

trabajos químicos, biológicos y toxicológicos respecto a este insecticida de tanta promesa hasta lograr conocimientos cabales de sus potencialidades y de sus limitaciones. Como era de esperarse, el DDT aun conserva su lugar predilecto en el campo de los insecticidas. Debido a que por lo general está al alcance de todos, el público ha tenido la oportunidad de evaluar el DDT. No obstante todas las investigaciones llevadas a cabo con el DDT y la popularidad universal de que goza, aun quedan muchas cosas por averiguar, particularmente las posibilidades de numerosos efectos secundarios producidos por la aplicación del DDT.

Se presume que debido al interés despertado por la propaganda a favor del control de los insectos durante la guerra, como también la multiplicación de los problemas que a ella se debieron, el uso de los insecticidas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo aumentará considerablemente. Se cree que los Estados Unidos jugarán un rol sobresaliente en la producción de insecticidas para otros países. El descubrimiento de las posibilidades del DDT ha revivificado y ha inspirado nuevas esperanzas a nuestros esfuerzos para hallar un mortífero y potente destructor de insectos mediante la investigación de grupos químicos que con anterioridad se creía eran de poca promesa como insecticidas. Se pueden anticipar nuevos desarrollos en el campo insecticida dentro de pocos años. El autor pone énfasis en el hecho que los insecticidas orgánico sintéticos son más o menos específicos y que no hay que anticipar que cualquiera de ellos sea una panacea. Por lo tanto se debe seguir adelante con la búsqueda de otros insecticidas para llenar las lagunas en el control de los insectos.—(Translation of a review by S. J. Carpenter, National Biscuit Company, New York, N. Y., which appeared in the March [1947] number of Mosquito News.)

ECOLOGICAL PICTURE OF *A. (N.) tarsimaculatus* Goeldi, 1905, IN NORTHEAST BRAZIL. Durval T. Lucena. A Folha Medica 27(15):1-46. Serviço Nacional de Malaria, Rio de Janeiro, 1946.

1. *Anopheles tarsimaculatus* Goeldi, 1905, has been referred to as an anopheline mosquito breeding along the coastal plains, certain authors reporting it living some few miles inland, in this case breeding in fresh water.

2. This paper is an attempt to clarify some of its ecological habits. Geographical distribution is successively studied (a) in Neotropical Region; (b) in Brazil and (c) particularly in Northeast of this country. Here the species was found in the Interior of the States of Pernambuco and Paraíba, respectively, at distances of 252 kilometers at Olho d'Agua dos Pombos, and 115 kilometers at Queimadas, far from the coast.

3. Physiography and preference to certain areas in the referred States are emphasized. The species is in so close dependence to salt diluted in water of breeding places from Zones of "Litoral," "Matta" and "Agreste," that eggs

oviposited by females captured in localities of high salinity rupture when laid in tap water. Besides sea water in coastal plains, rocks and soil provide salt for places where the mosquito breeds in the Interior. In João Pessoa, State of Paraíba, larvae of *Anopheles tarsimaculatus* were found in breeding places for fishes which water contained 33.345 grs. of salt per liter, while in Pernambuco, in the locality Russinha ("Agreste"), larvae breed in water until with 29.835 grs. of salt per liter.

4. Seventy-six samples of water of breeding places were tested for chlorides obtained from the Zones "Litoral," "Matta" and "Agreste." Results are shown in Table II. According to these data and a bibliographical revision it was possible to determine the zone of high salinity of Northeast that probably corresponds to the zone of *tarsimaculatus* incidence in the interior.

5. The following adults' habits were studied: (a) domesticity, (b) seasonal prevalence, (c) hour of penetration into houses. Zoophilic and anthropophilic habits were referred to as well.

6. *A. tarsimaculatus* was believed to be autochthonous in the Interior of Northeast States of Brazil: (a) because it breeds in salt water; (b) it was found inland 252 kilometers distant from the sea; (c) the water of streams, rivers, lakes, etc., in this region always contains salt; (d) geologically this is the most ancient region in South America.—Author's summary.

BOSQUEJO ECOLÓGICO DEL *A. (N.) tarsimaculatus* Goeldi, 1905, EN LA REGIÓN NORESTE DEL BRASIL (Esboço ecológico do *A. (N.) tarsimaculatus* Goeldi, 1905, no Nordeste Brasileiro). Durval T. Lucena, Excerpta de *A Folha Médica*, No. 15, 1946. Páginas 44 y 45.

## RESUMEN

1. Se han hecho referencias al *Anopheles tarsimaculatus* Goeldi, 1905, como un mosquito anofelino que se cría en las planicies del litoral, y ciertos autores relatan haberlo encontrado viviendo unas cuantas millas tierra adentro, en estos casos criándose en agua dulce.

2. Esta obra es un intento de esclarecer algunos de sus hábitos ecológicos. Sucesivamente se ha estudiado la distribución geográfica en: (a) Región Neotropical; (b) el Brasil; y (c) especialmente la región noreste de aquel país. Allí se ha encontrado la especie en el interior de los estados de Pernambuco y Paraíba, respectivamente distantes de la costa, 252 kilómetros en Olho d'Agua dos Pombos, y 115 kilómetros en Queimadas.

3. Se pone de relieve la fisiografía y la preferencia para ciertas zonas en dichos estados. Tan estrechamente está ligada esta especie con la sal diluida en el agua de los criaderos de las zonas del Litoral, el bosque y el Agreste, que los huevos ovipuestos en agua de grifo por hembras capturadas en localidades de alta salinidad, revientan al ponerse. Además del agua salina en las