

PRODROMUS ORNITHOLOGIAE PAPUASIAE ET MOLUCCARUM

AUCTORE

THOMA SALVADORIO

VIII.

CAMPOPHAGIDAE — ARTAMIDAE — DICRURIDAE — LANIIDAE.

Fam. CAMPOPHAGIDAE.

In Papuasias et Moluccis insulis sex et triginta Campophagidarum species hactenus inventae sunt; ex quibus Beccarius, D'Albertisius Bruinque venatores septem et viginti collegerunt, quas 212 exemplaria produnt; octo novae erant, haeque, ut etiam tres aliae in Museo Lugdunensi Batavorum servatae, a me, aut a Sharpeio descriptae fuerunt ⁽¹⁾.

Ex his, quas modo memoravi, species nulla prorsus invenitur in Indica regione; dum e contrario complures in Nova

(1) Hae sunt species novae:

1. *Graucalus subalaris*, Sharpe (D'Albertis).
2. » *pollens*, Salvad. (D'Albertis, Beccari).
3. » *parvulus*, Salvad. (Mus. Lugd.).
4. » *fortis*, Salvad. (Mus. Lugd.).
5. » *sclateri* « Finsch » Salvad. (Mus. Bremensi).
6. » *axillaris*, Salvad. (Bruijn).
7. *Edoliosoma dispar*, Salvad. (Beccari).
8. » *meyeri*, Salvad. (Beccari).
9. » *neglectum*, Salvad. (Beccari).
10. » *obiense*, Salvad. (Bruijn, Mus. Lugd.).
11. » *aruense*, Sharpe (Beccari).

quoque vivunt Hollandia. Genus unum, *Campochaera* appellatum, proprium omnino est Arcipelagi Austro-Malayensis, seu, ut verius dicam, Novae Guineae.

1. **Graucalus caeruleigriseus** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1858, p. 179 (♀).

Hab. in Papuasias — ins. Aru (*Wallace*); Nova Guinea, Peninsula septentrionali (*von Rosenberg*), Monte Arfak (*Bruijn*), Hatam (*D'Albertis*, *Beccari*), Profi (*Beccari*), Rubi (*Meyer*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Goldie*); Jobi (*von Rosenberg*, *Bruijn*) . Specim. 14.

2. **Graucalus boyeri** (G. R. Gr.), Gen. B. I, p. 283 (1846).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, ad litora occidentalia (*Hombon* et *Jacquinet*), ad litora occidentalia sinus Geelwinkiani (*von Rosenberg*), Andai (*von Rosenberg*, *D'Albertis*), Wa Samson (*Beccari*); Jobi (*Meyer*, *Beccari*); Misol (*Hoedt*) Specim. 4.

3. **Graucalus subalaris**, Sharpe, Mitth. zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 364, 366 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea meridionali, prope sinum Hall (*D'Albertis*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Ramsay*), ad Flumen Kataw (*Ramsay*) Specim. 5.

4. **Graucalus pollens**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. V, p. 75 (1874).

Hab. in Papuasias — ins. Kei (*D'Albertis*, *von Rosenberg*, *Beccari*).
Specim. 8.

5. **Graucalus parvulus**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 324 (1878).

Hab. in Moluccis — Halmahera (*Bernstein* in *Mus. Lugd.*) Specim. 0.

6. **Graucalus atriceps** (S. Müll.), Land- en Volkenk. p. 190 (1839-1844).

Hab. in Moluccis — Ceram (*Wallace*) Specim. 0.

7. **Graucalus magnirostris**, Forsten — Bp., Consp. I, p. 354 (1850).

Hab. in Moluccis — Halmahera (*Forsten*, *Beccari*, *Bruijn*); Ternate (*Wallace*); Batcian (*Bernstein*) Specim. 8.

8. **Graucalus melanops** (Lath.), Ind. Orn. Suppl. II, p. XXIV (1801).

Hab. in Nova Hollandia (*Latham, Gould*); Nova Zeelandia (*Hutton, B  ller*); in Papuasias — ins. Ludovicianis (*Mac Gillivray*); ? ins. Ducis York (*Ramsay*); ins. Freti Torresi (*Mac Gillivray, Masters*); ins. Yule (*D'Albertis*); Nova Guinea meridionali, Dourga (*S. M  ller*); ins. Aru (*Wallace, von Rosenberg, Beccari*); ins. Kei (*Beccari*); in Moluccis — Pulo Padjang (*von Rosenberg*); Tijoor (*von Rosenberg*); Amboina (*Mus. Lugd., Wallace, Hoedt*); — Timor (*S. M  ller*). Specim. 10.

9. **Graucalus fortis**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 326 (1878).

Hab. in Moluccis — Buru (*Hoedt*) Specim. 0.

10. **Graucalus papuensis** (Gm.), Syst. Nat. I, p. 371, n. 29 (1788).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (*Sonnerat*), Lobo (*S. M  ller*), Rubi, Waweji, Passim (ad litora sinus Geelwinkiani) (*Meyer*), Wandammen (*Bruijn*), Ajomesowar (*Bruijn*), Dorei (*Bruijn*), Andai (*Meyer*), Sorong (*D'Albertis*); Salvatti (*Wallace, Bruijn*); Batanta (*Bruijn*); Koffiao (*Beccari*); Misol (*Wallace*); in Moluccis ⁽¹⁾ — Obi (*Bernstein*); Batcian (*Wallace, Beccari*); Ternate (*Wallace, Bruijn*); Halmahera (*Meyer, Beccari, Bruijn*); Morty (*Wallace, Bernstein*) Specim. 25.

11. **Graucalus sclateri**, Finsch. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 325 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Fergusson fide Bennetti, Brown fide Sclateri*) Specim. 0.

12. **Graucalus hypoleucus**, Gould, P. Z. S. 1848, p. 38.

Hab. in Nova Hollandia, Peninsula Coburgi (*Gould*), prope Portum Denison (*Ramsay*); in Papuasias — Nova Guinea meridionali, prope Sinum Hall (*D'Albertis*), prope Portum Moeresby (*Stone*); ins. Aru (*Wallace, Beccari*); ins. Kei(?) (*Hoedt, Mus. Lugd.*); ins. Ludovicianis (*Mac Gillivray, fide Hartlaubi*) Specim. 9.

13. **Graucalus axillaris**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 925 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, prope Mansema (Monte Arfak) (*Bruijn*) Specim. 5.

⁽¹⁾ Specimina moluccana (*Campephaga melanolora*, Gray, P. Z. S. 1860, p. 353) a speciminibus papuensibus non satis diversa.

14. **Graucalus pusillus**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p. 71 (1879).

Hab. in Papuaasia — ins. Salomonis, Gaudalcanar (*Cockerell*)⁽¹⁾. Specim. 0.

15. **Graucalus sublineatus**, Sclat., P. Z. S. 1879, p. 448, pl. 30.

Hab. in Papuaasia — Nova Hibernia (*Brown*); Nova Britannia (?) Specim. 0.

16. **Graucalus maforensis** (Meyer), Sitzb. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 386 (1874).

Hab. in Papuaasia — Mafoor (*Meyer, Beccari*) . . . Specim. 1.

17. **Edoliosoma melas** (S. Müll.), Verh. Land.- en Volkenk. p. 189 (1839-1844)⁽²⁾.

Hab. in Papuaasia — Nova Guinea (*S. Müller, Wallace*), Dorei (*Lesson et Garnot, Bruijn*), Andai (*D'Albertis, Bruijn*), Lobo (*Hombron et Jacquinet*), Rubi, Nappan, Passim (*Meyer*), Sorong (*D'Albertis*); Jobi (*Meyer, Bruijn*); Batanta (*Beccari*); Nova Guinea meridionali, prope Sinum Hall (*D'Albertis*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*); ins. Aru (*Beccari*). Specim. 39.

18. **Edoliosoma dispar**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 329 (1878).

Hab. in Papuaasia — ins. Kei (*Beccari*); in Moluccis — Banda (*Hoedt*); Matabello (*von Rosenberg*); Monawolka (*von Rosenberg*); Pulo-Padjang (*von Rosenberg*); Tijor (*von Rosenberg*); Goram (*von Rosenberg, Wallace*).

Specim. 3.

19. **Edoliosoma montanum** (Meyer), Sitzb. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 386 (1874).

Hab. in Papuaasia — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer, Beccari, Bruijn*).

Specim. 8.

20. **Edoliosoma schisticeps** (G. R. Gr.), Gen. B. I, p. 283, n. 27 (1846).

Hab. in Papuaasia — Nova Guinea, ad litora occidentalia (*Hombron et Jacquinet*), Sorong (*Bernstein*), Andai (*von Rosenberg*); Misol (*Wallace, Hoedt*) Specim. 0.

⁽¹⁾ Species non satis cognita, sed *G. axillari*, Salvad. forsan affinis.

Quid *Graucalus dussumieri*, Ramsay (nec Less.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p. 71 (1879) ex Gaudalcanar?

⁽²⁾ *Lanius melas*, Less. et Garn. (nec Cuv.). — Less., Man. d'Orn. I, p. 128 (1828). — *Lanius niger*, Garn. (nec Gm.), Voy. Coq. Zool. I, 2, p. 589 (1828).

21. **Edoliosoma meyeri**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 327 (1878).

Hab. in Papuasias — Misori (*Meyer, Beccari*) . . . Specim. 7.

22. **Edoliosoma neglectum**, Salvad., nov. sp. ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Mafor (*Beccari, Meyer*) . . . Specim. 2.

23. **Edoliosoma remotum**, Sharpe, Mitth. zool. Mus. Dresd. III, 3, p. 369 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Huesker*); Nova Hannovera (*Huesker*); ins. Ducis York (*Brown*) . . . Specim. 0.

24. **Edoliosoma obiense**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 329 (1878).

Hab. in Moluccis — Obi (*Bruijn, Bernstein*) . . . Specim. 1.

25. **Edoliosoma aruense**, Sharpe, Mitth. zool. Mus. Dresd. III, 3, p. 369 (1878).

Hab. in Papuasias — ins. Aru (Lutor) (*Beccari*) . . . Specim. 1.

26. **Edoliosoma incertum** (*Meyer*), Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 387 (1874).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Meyer, Bruijn*) ⁽²⁾ . . . Specim. 3.

27. **Edoliosoma mülleri**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 927 (1875) ⁽³⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Utanata (*S. Müller*), Andai (*von Rosenberg*), Mansinam (*Beccari, Bruijn*), Sorong (*Bernstein*), ad Flumen Fly

⁽¹⁾ *Campephaga plumbea*, var., *Meyer*, Sitz. k. Ak. Wiss. Wien LXIX, p. 388 (1874) (*Mafor*).

Edoliosoma sp., (partim), Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII sp. 928, 929 (1875) (*Mafor*).

? *Edoliosoma incertum*, part., Salvad., ibid.

Edoliosoma meyeri, part., Sharpe, Cat. B. IV, p. 53 (1879) (*Mafor*).

Mas *simillimus mari* E. MEYERI, Salvad., sed colore plumbeo paullo pallidior et gula minus nigricante distinguendus.

Foemina differt a foemina E. MEYERI notaeo grisescentiore, gastraeo rufo pallidior.

Long. tot. 0^m, 235; al. 0^m, 125; caud. 0^m, 100; rostri 0^m, 020; tarsi 0^m, 024.

⁽²⁾ Species non satis cognita.

⁽³⁾ *Ceblepyris plumbea*, Müll. (nec Wagl.), Verh. Land- u. Volkenk., p. 189 (partim) (1839-1844).

Differt ab *E. tenuirostre* (J. et S.) ex Nova Hollandia tantum statura paullo minore.

(*D'Albertis*); ins. Yule (*D'Albertis*); ins. Aru (*Beccari*); Misol (*Wallace, Hoedt*); Koffiao (*Beccari*) Specim. 10.

28. **Edoliosoma grayi**, Salvad. — Sharpe, Mitth. zool. Mus. Dresd. III, 3, p. 369 ⁽¹⁾ (1878).

Hab. in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Halmahera (*Wallace, Bernstein, Bruijn*); Ternate (*Mus. Paris., Laglaize, Beccari*); Tidore (*Bernstein*); Morty (*Wallace*) Specim. 2.

29. **Edoliosoma amboinense** (Hartl.), Journ. f. Orn. 1865, p. 156 ⁽²⁾.

Hab. in Moluccis — Amboina (*Forsten, Wallace*); Ceram (*Wallace*); ? in Papuasias — Misol (!) (*Wallace*) Specim. 0.

30. **Edoliosoma marginatum** (Wall.), P. Z. S. 1863, p. 19.

Hab. in Moluccis — Buru (*Wallace, Bruijn*); Boano (*Mus. Lugd.*); ? Ceram (*Forsten, in Mus. Lugd.*) ⁽³⁾ Specim. 1.

31. **Lalage leucoptera** (Schleg.), Ned. Tijdschr. Dierk. III, p. 45 (1871).

Hab. in Papuasias — Misori (*von Rosenberg, Meyer, Beccari*).
Specim. 10.

32. **Lalage atrovirens**, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 430.

Hab. in Papuasias — Misol (*Wallace, Hoedt*); Salvatti (*Wallace, Hoedt, Bernstein, Bruijn*); Nova Guinea, prope Sorong (*Bernstein*). Specim. 1.

33. **Lalage tricolor** (Sw.), Zool. Journ. I, p. 467 (1825).

Hab. in Nova Hollandia (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea meridionali-orientali, prope Portum Moresby (*Stone*) Specim. 0.

34. **Lalage karu** (Less.), Voy. Coq. Ois. Atlas, pl. 12 (1826).

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Lesson*); ins. Ducis York (*Brown*); Nova Hanovera (*Huesker*); Nova Guinea meridionali, Naiabui (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Stone*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*); ins. Aru (*Wallace, Beccari*); ins. Kei (*Beccari, Challenger*); — ins. Freti Torresi (*Mac Gillivray*); Nova Hollandia septentrionali (*Gould, Ramsay*). Specim. 12.

⁽¹⁾ *Campephaga melanotis*, G. R. Gray (nec Gould), P. Z. S. 1860, p. 353.

⁽²⁾ *Edoliosoma ceramense*, Sharpe (nec Bp.), Mitth. zool. Mus. Dresd. III, 3, p. 136 (1878). — Id., Cat. B. IV, p. 47 (1879).

⁽³⁾ *Graucalus ceramensis*, Bp., Consp. I, p. 355 (1850) (Typo inspecto).

Forsan locus Ceram false huic speciei tribuitur, quapropter nomen *Graucalus ceramensis*, Bp. rejiciendum est.

35. **Lalage aurea** (Temm.), Pl. Col. 382, f. 2 (1825).

Hab. in Moluccis — Bateian (Wallace); Ternate (Wallace, Beccari, Bruijn); Tidore (Bruijn); Halmahera (Finsch, Beccari, Bruijn); Morty (Hartlaub) Specim. 19.

36. **Campochaera sloeti** (Schleg.), Ned. Tijdschr. Dierk. III, p. 253 (1866).

Hab. in Papuasie — Nova Guinea, Seleh (Bernstein), Sorong (D'Albertis) ⁽¹⁾, ad Flumen Fly (D'Albertis), in Monte Epa (D'Albertis), ad Flumen Goldie (Ramsay) ⁽²⁾. Specim. 3.

Fam. ARTAMIDAE.

Tres tantummodo hujus familiae species in Papuasie et Moluccis vivunt; quarum quidem duae propriae, tertia vero, cui titulus *Artamus leucogaster*, tum in Nova Hollandia, tum in Indica regione provenit. Rerum naturalium investigatores, de quibus supra mentionem feci, duo et quadraginta specimina ad duas species pertinentia collegerunt.

1. **Artamus leucogaster** (Valenc.), Mém. du Mus. H. N. VI, p. 21, pl. VII, f. 2 (1820).

Hab. in ins. Philippinis, Luçon (Hartlaub et Finsch), Negros (Meyer), Guimaras (Meyer), Cebu (Everett), Dimalou, Mindanao (Stere); Mangsi (Archipelago Sulu) (Peale); Borneo (Mottley, Doria et Beccari), Labuan (Mottley); Sumatra (Raffles, Beccari); ins. Andaman (Beavan, Ball, Hume); Insula Coco minore (Davison); Java (Horsfield); Timor (Valenciennes, Wallace); Flores (Wallace); Lombok (Wallace); Celebes (Wallace); in Moluccis — Bateian (Wallace, Bernstein); Halmahera (Wallace, Bruijn); Ternate (Bernstein, von Rosenberg); Morty (Wallace); Buru (Wallace, Hoedt, Bruijn); Amboina (Hoedt, Beccari); Goram (von Rosenberg); in Papuasie — ins. Kei (Hoedt, von Rosenberg, Beccari); Misol (Wallace, Hoedt); Salvatti (von Rosenberg, Bruijn); Batanta (Bruijn); Nova Guinea (S. Müller), Sorong (D'Albertis, Bruijn), ad Flumen Fly (D'Albertis), Naiabui (D'Albertis); ins. Aru (Wallace, von Rosenberg, Beccari); Ins. freti Torresi (Mac Gillivray); Nova Hollandia (Gould, Ramsay) Specim. 35.

⁽¹⁾ *Campephaga aurulenta*, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 692, pl. 54.

⁽²⁾ Specimina Novae Guineae meridionalis, ob colorem flavum occipitis et magnae pilei partis, a speciminibus Novae Guineae septentrionalis diversa, forsitan ad speciem alteram pertinent nomine *Campochaerae flavicipitis* distinguendam.

2. **Artamus maximus**, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 203 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer, Beccari, Bruijn*) Specim. 7.

3. **Artamus insignis**, Sclat., P. Z. S. 1877, p. 101, pl. XV.

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Brown*) Specim. 0.

Fam. DICRURIDAE.

Decem species, quarum una incerta est, hoc meo Prodromo numerantur; Beccarius, D'Albertisius et Bruijnus septem ex eisdem species collegerunt, quas 184 specimina nobis exhibent. Harum species nulla in Indica regione patet, una autem, *Dicruropsis bracteata*, vivit etiam in nova Hollandia. Tria omnia genera, ad quae decem illae species, mea quidem sententia, pertinent, Australianae regionis propria sunt atque in Indica desiderantur; unum, quod *Dicruropsis* appellatur, in omni regione Austro-malaiensi et in Nova Hollandia existit, duo reliqua in Papuasias solum inveniuntur, seu, ut exactius loquar, in Nova Guinea genus *Chaetorhynchus*, ac in insulis, quae ad Orientem Novae Guineae spectant, genus *Dicranostreptus*, quod, quamquam ad Indicum genus, quod *Dissemurus* appellatur, proxime accedit, ab eo tamen satis distat.

1. **Dicruropsis pectoralis** (Wall.), P. Z. S. 1862, pp. 335, 342.

Hab. in ins. Sulla (*Wallace*); in Moluccis — Obi (*Bruijn*). Specim. 2.

2. **Dicruropsis laemosticta** (Sclat.), P. Z. S. 1877, p. 101.

Hab. in Papuasias — Nova Britannia (*Brown*) Specim. 0.

3. **Dicruropsis bracteata** (Gould), P. Z. S. 1842, p. 132.

Hab. in Nova Hollandia (*Gould*); ins. freti Torresi (*D'Albertis*); in Papuasias — Nova Guinea meridionali, ad Flumen Fly (*D'Albertis*).

Specim. 4.

4. **Dicruropsis megalornis** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1858, p. 179.

Hab. in Papuasias — ins. Kei (*Wallace, Beccari*); in Moluccis — Goram (*Wallace*). Specim. 8.

5. **Dicruropsis atrocaerulea** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1860, p. 554.

Hab. in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Halmahera (*Wallace*, *Beccari*, *Bruijn*, *Meyer*) Specim. 58.

6. **Dicruropsis carbonaria** (S. Müll.) — Bp., Consp. I, p. 352 (1850).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (*Bonaparte*), Lobo (*S. Müller*), Dorei (*Bruijn*), Andai (*Bruijn*), Mansinam (*Bruijn*), Warbusi (*Beccari*), Rubi (*Meyer*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*), prope Sinum Hall (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Stone*), Sorong (*D'Albertis*), Ramoi (*Beccari*); Jobi (*Bruijn*, *Beccari*); Miori (*Meyer*, *Beccari*); Mafor (*Meyer*); Waigiou (*Wallace*, *Bruijn*, *Beccari*); Batanta (*Bruijn*, *Beccari*); Koffiao (*Beccari*); Misol (*Wallace*); ins. Aru ⁽¹⁾ (*Wallace*, *Beccari*) Specim. 93.

7. **Dicruropsis (?) amboinensis** (G. R. Gray), P. Z. S. 1860, p. 354 ⁽²⁾.

Hab. in Moluccis — Amboina (*Wallace*, *Beccari*); Ceram (*Wallace*, *D'Albertis*); Buru (*Wallace*, *Bruijn*) Specim. 7.

8. ? **Dicruropsis (?) comice** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, 1, p. 344 (1826) ⁽³⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Lesson*) Specim. 0.

9. **Dicranostreptus megarhynchus** (Quoy et Gaim.), Voy. Astrol. Zool. I, p. 184, Atlas, Ois. pl. 6 (1830).

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Mus. Britan.*, *Brown*); ins. Salomonis (*Sclater*) ⁽⁴⁾ Specim. 0.

10. **Chaetorhynchus papuensis**, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 493 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer*, *Bruijn*, *Beccari*) Specim. 12.

⁽¹⁾ Specimina insularum Aru (*D. assimilis*, Gray, P. Z. S. 1858, p. 179) non satis diversa.

⁽²⁾ *D. amboinensis* ob rostrum valde compressum ab aliis speciebus generis *Dicruropsis* appellati conspicue differt.

⁽³⁾ Species incerta.

⁽⁴⁾ Erratim Quoyus et Gaimardus (l. c.) speciem hanc in Nova Guinea habitare dixerunt, et typographici erroris causa inter aves insularum Kei a Grayo (P. Z. S. 1861, p. 435) eadem memorata fuit.

Fam. LANIIDAE.

Laniidarum familiam in Papuasias et Moluccis 49 species nobis praebeant; rerum naturalium investigatores viatoresque, quos saepius memoravi, 565 exemplaria ad species 38 pertinentia collegerunt, quarum 15 nondum fuerant descriptae; novam aliam speciem inveni in Lugdunensi Batavorum Museo ⁽¹⁾.

Genera *Cracticus*, *Grallina* et *Colluricincla* in Papuasias et Nova Hollandia inveniuntur, verum in Moluccis desiderantur, ubi genera quoque desunt *Rhectes*, *Pachycephalopsis* et *Pachycare*, Papuasias omnino propria; genus *Pachycephala* in omni Australiana regione ut et in Indica provenit.

1. *Cracticus cassicus* (Bodd.), Tabl. Pl. Enl. p. 38 (1783).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (*Sonnerat*), Lobo (*S. Müller*), Dorei (*Wallace*, *Hoedt*, *Meyer*, *Bruijn*), Mansinam (*Bruijn*), Pulo-Semo (*Beccari*), Mum, Passim, Waweji (*Meyer*), Has (*Beccari*), Sorong (*D'Albertis*, *Bernstein*), Faor (*D'Albertis*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*), prope Sinum Hall (*D'Albertis*); Krudu (*Beccari*); Jobi (*Meyer*, *Beccari*); Misori (*Meyer*, *Beccari*); Mafor (*Meyer*); Salvatti (*Bernstein*); Batanta (*Beccari*, *Bruijn*); Waigiou (*Wallace*, *Bernstein*, *Bruijn*); Guebeh (*Bernstein*, *Hoedt*); Misol (*Wallace*); ins. Aru (*Wallace*, *Hoedt*, *von Rosenberg*, *Beccari*).

Specim. 110.

⁽¹⁾ Hae sunt species novae:

1. *Cracticus mentalis*, Salvad. et D'Alb. (*D'Albertis*).
2. *Grallina bruijni*, Salvad. (*Beccari*).
3. *Rhectes aruensis*, Sharpe (*Beccari*).
4. » *decipiens*, Salvad. (*D'Albertis*, *Beccari*).
5. » *brunneiceps*, D'Alb. et Salvad. (*D'Albertis*).
6. » *cristatus*, Salvad. (*Beccari*).
7. » *holerythrus*, Salvad. (*Beccari*, *Bruijn*).
8. *Pachycephala obiensis*, Salvad. (*Mus. Lugd.*).
9. » *soror*, Sclat. (*D'Albertis*).
10. » *rufinucha*, Sclat. (*D'Albertis*).
11. » *miosnomensis*, Salvad. (*Beccari*).
12. » *cinerascens*, Salvad. (*Beccari*, *Bruijn*).
13. » *hyperythra*, Salvad. (*D'Albertis*, *Beccari*).
14. » *leucogastra*, Salvad. et D'Alb. (*D'Albertis*).
15. » *leucostigma*, Salvad. (*Beccari*, *Bruijn*).
16. *Pachycephalopsis albispectularis* (Salvad.) (*Bruijn*).

2. **Cracticus mentalis**, Salvad. et D' Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 824 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea meridionali-orientali, prope Sinum Hall (*D'Albertis, James*), prope Portum Moresby (*Stone*), ad Flumen Laloki (*Goldie*) Specim. 1.

3. **Cracticus quoyi** (Less.), Voy. Coq. Zool. Atlas, pl. 14 (1826) ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Dorei (*Lesson.*), Andai, Rubi (*Meyer*); Jobi (*Meyer*); Sorong (*Bernstein, D'Albertis*); Salvatti (*Bernstein*); Waigiou (*Wallace, Bernstein*); Misol (*Wallace*); ins. Aru (*Wallace, Hoedt, von Rosenberg, Beccari*); — Nova Hollandia septentrionali (*Gilbert*); ins. Barnard (*Masters*) Specim. 17.

4. **Grallina bruijni**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 929 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Bruijn*). Specim. 3.

5. **Rhectes uropygialis**, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 420.

Hab. in Papuasias — Misol (*Wallace*); Salvatti (*Bernstein, Beccari*); Nova Guinea (occidentali?) (*Wallace*) Specim. 2.

6. **Rhectes aruensis**, Sharpe, Cat. B. III, p. 285 (1877).

Hab. in Papuasias — ins. Aru (*Wallace, Beccari, Challenger*).
Specim. 3.

7. **Rhectes dichrous**, Bp., Compt. Rend. XXXI, p. 563 (1850).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (prope Lobo?) (*S. Müller*), Monte Arfak (*D'Albertis, Beccari, Bruijn*), Amberbaki (*Laglaize*), Naiabui (*D'Albertis*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*) Specim. 28.

8. **Rhectes decipiens**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 473 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, prope Nappan, Rubi, Waweji, In-viorage, Mum (*Meyer*), Warbusi (*Beccari*), Kapaor, Kulukadi (*D'Albertis*).
Specim. 5.

9. **Rhectes cirrocephalus** (Less.), Voy. Coq. Zool. Atlas, pl. 11 (1826).

⁽¹⁾ *Cracticus crassirostris*, Salvad., Atti R. Ac. Sc. Tor. IX, p. 430 (1874) (jun.).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Dorei (*Lesson, Bruijn, Beccari*), Andai (*Bruijn*), Mansinam (*Bruijn*) Specim. 39.

10. **Rhectes brunneiceps**, D' Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 70 (1879).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, ad Flumen Fly (*D'Albertis*).
Specim. 5.

11. **Rhectes cerviniventris**, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 430.

Hab. in Papuasias — Gagie (*Wallace*); Waigiou (*Wallace, Bruijn*); Ghemien (*Bernstein*); Batanta (*von Rosenberg, Bruijn*) . . . Specim. 2.

12. **Rhectes jobiensis**, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 205. (1874).

Hab. in Jobi (*Meyer, Bruijn, Beccari*); Krudu (*Beccari*). Specim. 15.

13. **Rhectes cristatus**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 930. (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Morait (*Beccari*). Specim. 1.

14. **Rhectes ferrugineus** (S. Müll.) — Bp., Compt. Rend. XXXI, p. 563 (1850).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Lobo (*S. Müller*), parte occidentali (*Hombron et Jacquinet*), Sorong (*D'Albertis, Bruijn*), Ramoi (*Beccari*), Dorei-Hum (*Beccari*), Dorei (*Bruijn*), Andai (*D'Albertis, Bruijn*), Mansinam (*Bruijn*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*), prope Sinum Hall (*D'Albertis*); Salvatti (*Bruijn, Beccari*); Misol (*Wallace*); ins. Aru (*Wallace, Beccari*).
Specim. 38.

15. **Rhectes holerythrus**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 474 (1878).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Beccari, Bruijn*) Specim. 3.

16. **Rhectes leucorhynchus**, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 430.

Hab. in Papuasias — Gagie (*Wallace*); Waigiou (*Wallace, Beccari*); Batanta (*Beccari, Bruijn*) Specim. 8.

17. **Rhectes nigrescens**, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 46 (1871) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Rhectes bennetti*, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 692 (♀).

Myiolestes (?) *pluto*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 83 (1874) (♂).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak, prope Hatam (*D'Albertis, Meyer, Beccari, Bruijn*) Specim. 16.

18. **Colluricincla brunnea**, Gould, P. Z. S. 1840, p. 164.

Hab. in Nova Hollandia septentrionali (*Gould, Ramsay*), et interiore (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea meridionali, prope Sinum Hall (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Stone*) Specim. 7.

19. **Colluricincla obscura** (Meyer), Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 390 (1874).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Meyer, Bruijn, Beccari*) ⁽¹⁾ Specim. 4.

20. **Colluricincla melanorhyncha** (Meyer), Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 494 (1874).

Hab. in Papuasias — Misori (*Meyer*) Specim. 0.

21. **Colluricincla megarhyncha** (Quoy et Gaim.), Voy. Astrol. Zool. I, p. 172, pl. 3, f. 1 (1830).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Dorei (*Quoy et Gaimard, Wallace, Bruijn*), Andai (*D'Albertis, Bruijn*), Mansinam (*Bruijn*), Mansema (*Beccari*), Monte Arfak (*Beccari, Bruijn*), Warbusi (*Beccari*), inviorage, Passim, Rubi, Nappan (*Meyer*), ad Flumen Fly (*D'Albertis*), Monte Epa (*D'Albertis*), Naiabui (*D'Albertis*), Dorei-Hum (*Beccari*), Wa-Samson (*Beccari*), Ramoi (*Beccari*), Sorong (*Bruijn*), Mariati (*Bruijn*), Warmon (*Bruijn*); Batanta (*Beccari, Bruijn*); Misol (*Wallace*); ins. Aru ⁽²⁾ (*Wallace, Beccari*).

Specim. 55.

22. **Colluricincla affinis** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1861, p. 430.

Hab. in Papuasias — Gagie (*Wallace*); Waigiou (*Wallace*). Specim. 5.

23. **Pachycephala astrolabi**, Bp., Consp. I, p. 329 (nota) (1850) ⁽³⁾.

Hab. in Papuasias — ins. Salomonis (ins. Sancti Georgi) (*Hombon et Jacquinet*). Specim. 0.

24. **Pachycephala mentalis**, Wall., P. Z. S. 1863, p. 30.

Hab. in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Ternate (*Wallace, Beccari*); Halmahera (*Wallace, Bruijn, Beccari*); Tidore (*Bruijn*). Specim. 40.

⁽¹⁾ *Colluricincla sordida*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 931 (1875).

⁽²⁾ Specimina aruana (*Myiolestes aruensis*, Gr., P. Z. S. 1858, p. 180) non satis diversa.

⁽³⁾ *Pseudorectes cinnamomeum* (sic), Ramsay, Nature, XX, 1879, p. 125, in insula Gaudalcanar (Ins. Salomonis) habitans, mihi videtur foemina *Pachycephalae astrolabi*.

25. *Pachycephala macrorhyncha*, Strickl., Contr. Orn. 1849, p. 91, 129, pl. 30 ⁽¹⁾.

Hab. in Moluccis — Amboina (*Strickland, Wallace, Beccari*); Ceram (*Wallace*); Buru (*Wallace, Bruijn*); ? ins. Sulla (*Wallace*) ⁽²⁾. Specim. 4.

26. *Pachycephala obiensis*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 330 (1878).

Hab. in Moluccis — Obi (*Bernstein*) ⁽³⁾ Specim. 0.

27. *Pachycephala melanura*, Gould, P. Z. S. 1842, p. 134.

Hab. in Nova Hollandia septentrionali (*Gould, Ramsay*); ins. freti Torresi (*Mac Gillivray, D'Albertis, Masters*); in Papuasie — Nova Guinea meridionali, prope Naiabui (*D'Albertis*); ? ins. Palikuüru (prope Novam Britanniam) (*Brown*). Specim. 11.

28. *Pachycephala collaris*, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 74 (1878) ⁽⁴⁾.

Hab. in Papuasie — ins. Coutance, ad litus meridionale Novae Guineae (*Ramsay*). Specim. 0.

29. *Pachycephala* sp. ⁽⁵⁾.

Hab. in Papuasie — Ins. Teste (ins. Ludovicianis) (*Ramsay*). Specim. 0.

30. *Pachycephala soror*, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 692 ⁽⁶⁾.

Hab. in Papuasie — Nova Guinea, Monte Arfak (*D'Albertis, Beccari, Bruijn*). Specim. 28.

31. *Pachycephala schlegelii*, Rosenb. — Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 43 (1871) ⁽⁷⁾.

Hab. in Papuasie — Nova Guinea, Hatam (*D'Albertis, Beccari, Bruijn*), Karons (*Laglaize*). Specim. 24.

⁽¹⁾ *Pachycephala xanthocnemis*, Gray, P. Z. S. 1860, p. 353 (jun.).

⁽²⁾ Specimina insularum Sulaensium (*Pachycephala clio*, Wall., P. Z. S. 1862, p. 335, 341) non vidi.

⁽³⁾ Specimina *Pachycephalae obiensis*, Salvad. cum speciminibus insularum Sulaensium comparanda sunt.

⁽⁴⁾ Species mihi non satis cognita; eam Ramsayus antea in insula Coutance, postea (l. c. p. 281) in insula Teste, habitare dicit.

⁽⁵⁾ *Pachycephala* sp., Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 282 (1879).

⁽⁶⁾ *Pachycephala* (♀ sp. ign.), Sclat., P. Z. S. 1873, p. 697 (femina).

⁽⁷⁾ *Pachycephala affinis*, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 392 (1874) (femina).

32. **Pachycephala rufinucha**, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 692.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Hatam (*D'Albertis, Beccari, Bruijn*).
Specim. 10.

33. **Pachycephala griseiceps**, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 178. ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — ins. Aru (*Wallace*); Misol (*Wallace*); Salvatti (*Wallace, Bernstein*); Waigiou (*Wallace, Beccari*); Guebeh (*Bernstein*); Gagie (*Bernstein*); Nova Guinea, Lobo (*S. Müller*), Rubi (*Meyer*), Andai (*Meyer, Bruijn*), Wandammen (*Beccari*), Wa Samson (*Beccari*).
Specim. 11.

34. **Pachycephala jobiensis**, Meyer ⁽²⁾, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 394 (1874).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Meyer, Beccari*) Specim. 4.

35. **Pachycephala miosnomensis**, nov. sp. ⁽³⁾.

Hab. in Papuasias — Miosnom (*Beccari*) Specim. 4.

36. **Pachycephala rufipennis**, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 178.

Hab. in Papuasias — ins. Kei (*Wallace, von Rosenberg*) Specim. 0.

37. **Pachycephala dubia**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p. 93 (nota) (1879) ⁽⁴⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, prope Portum Moeresby (*Stone*).
Specim. 0.

38. **Pachycephala griseonota**, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 429 ⁽⁵⁾.

Hab. in ins. Sula (*Wallace*); in Moluccis — Buru (*Wallace*); Ceram? (*Mus. Brit.*) Specim. 0.

⁽¹⁾ *Pachycephala virescens*, S. Müll., in Mus. Lugd. Batav. — Sclat., Pr. Linn. Soc. II, p. 161, n. 73 (1857) (descr. nulla).

Pachycephala squalida, Oust., Bull. Soc. Philom. de Paris, 8 Dic. 1877.

⁽²⁾ *Pachycephala griseiceps* var. *jobiensis*, Meyer, l. c.

⁽³⁾ *Pachycephala* P. JOBIENSI, Meyer, *simillima*, sed *major*.

Long. tot. 0^m, 160; al. 0^m, 092 — 0^m, 090; caud. 0^m, 068; rostri 0^m, 016; tarsi 0^m, 022 — 0^m, 021.

⁽⁴⁾ *Eopsaltria brunnea*, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 391 (1876).

Pachycephala brunnea, Ramsay (nec Wall.), op. cit. III, p. 282 (1878).

Species mihi ignota.

⁽⁵⁾ *Pachycephala rufescens*, Wall., P. Z. S. 1862, p. 335, 341 (Sula, Bouru) (♂ ad.).

Pachycephala lineolata, Wall., P. Z. S. 1862, p. 335, 341 (Sula, Bouru) (♀).

Specimen typicum *Pachycephalae griseonotae*, Gray, potius in Ceram, quam in Misol inventum fuisse existimo.

39. *Pachycephala cinerascens*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 332 (1878).

Hab. in Moluccis — Ternate (*Beccari*, *Bernstein*); Tidore (*Bruijn*, *Bernstein*); Morotai (*Bernstein*). Specim. 3.

40. *Pachycephala phaeonota* (S. Müll.) — Bp., Consp. I, p. 358 (1850) ⁽¹⁾.

Hab. in Moluccis — Banda (*Bonaparte*, *Wallace*, *Challenger*); Ceram-laut (*Beccari*); Ternate (*Bernstein*); Dammar (*Bernstein*); Mareh (*Bernstein*); Motir (*Bernstein*); Tifore (*Bruijn*); in Papuasias — Misol (*Hoedt*); Salvatti (*Wallace*); Waigiou (*Bernstein*, *Bruijn*); Mafor (*Meyer*, *von Rosenberg*, *Beccari*); ? ins. Aru (*von Pelzeln*). Specim. 19.

41. *Pachycephala hyperythra*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 932 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Kapaor (*D'Albertis*), Monte Arfak (*Beccari*). Specim. 3.

42. *Pachycephala leucogastra*, Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 822 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Epa (*D'Albertis*), ad Flumen Laloki (*Ramsay*) ⁽²⁾. Specim. 1.

43. *Pachycephala monacha*, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 179.

Hab. in Papuasias — ins. Aru (*Wallace*); Nova Guinea meridionali, Utanata (*S. Müller*) ⁽³⁾. Specim. 0.

44. *Pachycephala leucostigma*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 933 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari*, *Bruijn*).
Specim. 9.

⁽¹⁾ *Pachycephala brunnea*, Wall., P. Z. S. 1865, p. 478 (Banda, Salvatti).

Pachycephala senex, Pelz., Verh. zool. bot. Gesellsch. 1872, p. 429 (Aru).

Non satis constat, si typum *P. senecis* revera in insulis Aru inventum fuisse.

⁽²⁾ *Pachycephala fuliginata*, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 74 (1878), mihi videtur revera a *P. leucogastra*, Salvad. et D'Alb. non diversa.

⁽³⁾ *Pachycephala lugubris*, S. Müll., Mus. Lugd. — Sclat., Journ. Linn. Soc. II, p. 161, n. 72 (1857) (descr. nulla).

45. **Pachycephala citreogaster** (!), Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 66 (1876) (♀) ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Britannia (?) (*Ferguson*, fide *Ramsay*).

Specim. 0.

46. ? **Pachycephala spinicauda** (Jacq. et Pucher.), Voy. Pole Sud, Zool. I, p. 58, Atlas, pl. 6, f. 2 (1853) ⁽²⁾.

Hab. in Papuasias (?) — Nova Guinea (?) (*Jacquinet*), an in ins. Warrior Freti Torresi (?) (*Voy. Pole Sud*) Specim. 0.

47. **Pachycephalopsis** ⁽³⁾ **hattamensis** (Meyer), Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 391 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Hatam (*Meyer*, *D'Albertis*, *Beccari*, *Bruijn*) Specim. 14.

48. **Pachycephalopsis** (?) **albispecularis** (Salvad.), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 931 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Bruijn*). Specim. 1.

49. **Pachycare flavogrisea** (Meyer), Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 495 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer*, *Beccari*, *Bruijn*).
Specim. 13.

Scripsi Augustae Taurinorum die prima Novembris 1879.

(1) Species non satis cognita et incertae sedis.

(2) Specimen typicum *P. spinicaudae* (J. et P.), quod in Museo Parisiensi inspexi, est avis juvenis speciei incertae, forsan *P. melanurae* affinis. Patria quoque incerta est.

(3) Novum genus *PACHYCEPHALOPSIS* differt a genere *PACHYCEPHALA* tarsis elongatis, digitis longioribus et cauda breviuscula.



Salvadori, Tommaso. 1880. "Prodromus Ornithologiae Papuasiae et Moluccarum." *Annali del Museo civico di storia naturale di Genova* 15, 32–48.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/94472>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/117980>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.