

JOURNAL für ORNITHOLOGIE.

Dritter Jahrgang.

Nº 13.

Januar.

1855.

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von Jahrg. II, S. 403.)

II. Ordnung. *Passeres*.

A. FISSIROSTRES.

a. *Fissirostres nocturnae*.

1. Familie: *CAPRIMULGIDAE*.

1. Subfamilie: *STEATORNINAE*.

1. *Nyctibius* (Vieill.) *forficatus* (Lafr. et Vieillot.)
Caprimulgus furcatus Cuv. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 47, 48.
Im südlichen Afrika.

2. Subfamilie: *CAPRIMULGINAE*.

2. *Caprimulgus europaeus* Lin.
Buff. enl. 193. — Gould Birds of Eur. t. 51. — Smith Birds of South. Afr. t. 102. — *Caprimulgus Smithi* Bonap. Consp. p. 59.
Häufig in den meisten Gegenden Afrika's.
3. *Caprimulgus ruficollis* Natt. Temm.
Capr. rufitorques Vieill.
Einzeln in Nord-Afrika.
4. *Caprimulgus rufigena* A. Smith.
Birds of South Afr. t. 100.
Im südlichen Afrika und Abyssinien.
5. *Caprimulgus tristigma* Rüpp.
Syst. Uebersicht t. 3.
In Abyssinien.
6. *Caprimulgus poliocephalus* Rüpp.
Syst. Uebers. t. 4.
In Abyssinien.

7. *Caprimulgus infuscatus* Rüpp.
C. nubicus Licht. — Rüpp. Atl. t. 6.
 In Nubien und Kordofan.
8. *Capr. isabellinus* Temm.
C. aegyptius Licht. — Temm. Pl. col. 379.
 Mit Ausnahme Unter-Aegyptens in ganz Nordost-Afrika.
9. *Capr. eximius* Rüpp.
 Temm. Pl. col. 398.
 In Nubien, Sennaar und Kordofan nicht selten.
10. *Capr. lentiginosus* A. Smith.
 Birds of South. Afr. t. 101.
 In Süd-Afrika.
11. *Capr. natalensis* A. Smith.
 Birds of S. Afr. t. 99.
 Im südlichen Afrika.
12. *Capr. pectoralis* Vieill.
C. asiaticus Lath. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 49.
 Am Kap.
13. *Capr. indicus* Lath.,
 secundum Licht. Doubl. Cat. Nr. 608. — A. *Capr. europaeo* dist.?
 Kafferei.
14. *Capr. concretus* Temm.
 Bp. Consp. p. 60.
 Ashanté.
15. *Capr. madagascariensis* Sganz.?
 Von Bp. in dessen Consp. S. 60 citirt: Mem. Strasb. III. p. 28.
 — Eine mir unbekannte Species.

3. Subfamilie: PODAGERINAE.

16. *Scotornis* (Sw.) *climacurus* (Vieill.)
Capr. longicaudatus Steph. — Vieill. Gal. t. 122. — Allgem.
 deutsche Nat. Ztg. 1846. t. 5. — Drapiez, Dict. class. VI. p. 169.
 Häufig in Nubien, Sennaar und Kordofan. Im westlichen Afrika.
17. *Scot. trimaculatus* Sw.
 Birds of Western Afr. II, p. 70.
 Im westlichen Afrika.
18. *Macrodipteryx* (Sw.) *longipennis* (Shaw.)
M. africanus Sw. — G. R. Gray, Nat. Misc. t. 265. — Swains.
 B. of W.Afr. II. t. 5. — Sundev. Oefvers. Vet. Förh. 1849. S. 156.
 In Abyssinien, Kordofan und im westlichen Afrika.
19. *Macr. vexillaris* Gould.
 Icon. Av. t. 3.
 Auf Madagaskar und Bourbon.

b. Fissirostres diurnae.

II. Familie: HIRUNDINIDAE.

1. Subfamilie: CYPSELINAE.

20. *Cypselus* (Illiger) *murarius* Temm.

- *C. apus* Lin. — Buff. enl. 242. — *C. vulgaris* Steph. — Gould Birds of Eur. 53. — Naum. t. 147. 2.
Im nördlichen Afrika.
21. *Cyps. caffer* Licht.
In Süd-Afrika und Nubien.
22. *Cyps. murinus* Licht.
In Nubien.
23. *Cyps. alpinus* Temm.
C. Melba Lin. — *Cyps. gutturalis* Vieill. — *C. gularis* Steph. — Goulds B. of Eur. t. 53. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 243. — Vieill. Gal. d'Ois. t. 121.
In den höheren Gebirgsländern Süd- und West-Afrika's.
24. *Cyps. aequatorialis* mihi.
v. Müll. Beitr. z. Ornith. Afr. t. VII.
Diagnosis: *C. magnitudini Cypseli alpini* et colore *Cypseli murarii*.
Einzelnen in Abyssinien.
25. *Cyps. pygargus* Temm.
Pl. col. 460. 1.
Süd-Afrika.
26. *Cyps. Levaiillanti* v. Müll.
C. leucorrhous Steph. — *Hirundo nigra* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 244. 1.
Süd-Afrika.
27. *Cyps. ambrosiacus* (Lin.)
Hir. riparia senegal. Briss. Orn. II. 508. — *C. parvus* Licht. — Temm. Pl. col. 460.
In Nubien, Sennaar, Abyssinien, am Senegal, an der Goldküste und am Kap.
28. *Cyps. abyssinicus* Licht.
C. affinis Gray. — Hartl. Beitr. z. Orn. W. Afr. S. 16. — Id. Synops. W. Afr. sp. 45.
Goldküste, Cap Coast.
29. *Acanthylis* (Boie) *Sabinii* Gray.
Pallene leucopyga Boie. — *Chaetura bicolor* J. E. Gray, Zool. Misc. I, p. 6. — Griff. Anim. Kingd. II, p. 70. — Boie, Isis 1844, p. 168. — Hartl. Synops. sp. 44.
Sierra Leone und Fernando Po.
2. Subfamilie: HIRUNDININAE.
30. *Atticora* (Boie) *nigrita* Gray.
Gen. of Birds t. 20. — Allen Nig. Exped. II, p. 498. — Hartl. Synops. sp. 48.
River Nun.
31. *A. melbina* Verr.
Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 310. — Strickl. in Jard. Contrib. 1851, p. 131.
Gabun.
32. *A. pristoptera* Gray.

- Chelidon pristopectera* Rüpp. — *At. albiscapulata* Boie. — Rüpp.
Wirbelth. Abyss. t. 29, f. 2.
Im östlichen Abyssinien.
33. *A. velox* (Vieill.)
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 243. 2.
Süd-Afrika.
34. *Psalidoprocne cypselina* Cab.
Museum Heineanum I, p. 48, No. 302. — *Atticora hamigera*
Cassin. — *Hir. holomelas* Sundev.
Süd-Afrika.
35. *Hirundo rustica* Lin.
H. domestica Pall. — Buff. enl. 543. — Gould B. of Eur. t. 54.
— Sus. Voeg. Eur. VI. t. 2. 1. — Naum. t. 145. 2.
In Nord-Afrika; südwärts bis Abyssinien und Senegambien.
36. *Hir. cahirica* Licht.
H. Savignyi Leach. — *H. castanea* Less. — *H. Riocourii* Sav.
— *H. Boissoneauti* Temm. — Descr. de l'Egypt. t. 4, 4. —
Susem. Voeg. E. VI. t. 2, 2.
Standvogel im nordöstlichen Afrika.
37. *Hir. rufifrons* Shaw.
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 245, 2. — Vieill. Enc. p. 124.
Im südlichen Afrika, nordwärts bis Senegambien und Abyssinien.
38. *Hir. albigula* Bonap.
H. rufifrons Less. — *H. albigularis* Strickl. Contrib. to Orn.
1849, t. 17.
Süd-Afrika.
39. *Hir. cucullata* Bodd.
H. capensis Gm. — Buff. enl. 723. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 245.
Süd-Afrika.
40. *Hir. senegalensis* Lin.
H. rufula Gould. — *Cecropis senegalensis* Boie. — Buff. enl.
310. — Briss. Orn. t. 45, 1. — Swains. B. of W. Afr. t. 6. —
Gould Eur. t. 55.
In Senegambien, Ober-Aegypten, Abyssinien, Sennaar und Kor-
dofan.
41. *Hir. Gordoni* Jard.
Contrib. to Ornith. 1849. — Id. Contrib. 1851. part. 5. —
Hartl. Synops. sp. 55.
Goldküste, Cap Coast.
42. *Hir. cristata* Steph.
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 247.
43. *Hir. leucosoma* Sw.
Birds of W. Afr. II, p. 74. — Bp. Consp. p. 339.
West-Afrika.
44. *Hir. Smithii* Leach.
Tuckey Voy. Congo p. 407.
Südwest-Afrika (Congo.)
45. *Hir. abyssinica* Guérin.

Rev. de Zool. 1843, p. 322. — *H. puella* Temm. Faun. jap. p. 33. — *H. striolata* Rüpp. Vög. N.O.-Afr. t. 6. — Bp. Consp. p. 340.

In Abyssinien und West-Afrika.

46. *Hirundo filicauda* Frankl.

H. ruficeps Licht. — *H. filifera* Steph. — *H. erythrocephala* Gmel. — Lath. Gen. Histor. of Birds t. 113.

In Abyssinien, vorzüglich Adoa; Senegambien. (Ob in Süd-Afrika? Nubien: Lichtenst. Doubl. Catalog. No. 598.)

47? *Hir. francica* Gm.

Buff. enl. 544, 2.

Auf Isle de France, St. Maurice.

48. *Hir. melanocrissa* Rüpp.

H. rufula Temm. — *H. dauurica* Sav. — *H. alpestris* Bp. — Rüpp. System. Uebers. t. 5. — Susem. Voeg. E. VI, t. 1.

Nach Rüppell auf dem Hochplateau von Themben und in den Thälern von Simen. Ich erhielt sie häufig aus Adoa.

49. *Cotyle* (Boie) *palustris* (Steph.)

C. paludicola Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 246, fig. 2.

Im südlichen Afrika, Nubien und Abyssinien.

50. *Cotyle minor* Cab.

Museum Heineanum I, p. 49, No. 306.

Nordost-Afrika.

51. *Cotyle riparia* (Lin.)

Hir. cinerea Vieill. — Buff. enl. 543. — Gould B. of Eur. t. 58.

Im Winter in Nord-Afrika.

52. *Cotyle torquata* (Gmel.)

H. cincta Bodd. — Buff. enl. 723.

Am Cap, Senegal und Bacher el abiad. Häufig in Abyssinien.

53. *Cotyle rupestris* (Scop.)

H. montana Gm. — *H. rupicola* Hodg. — *H. inornata* Jerd.

— *Biblis rupestris* Less. — Scop. Stor. degli uccelli t. 409, f. 2.

— Gould Eur. t. 56.

Im nördlichen Afrika häufig in den Felsen am Nil in Nubien.

54. *Cotyle obsoleta* Cab.

Mus. Heineanum I, p. 50, No. 311.

Nordost-Afrika.

55. *Cotyle fuligula* (Licht.)

H. fulva Mus. Lugd. — *Cecrop. torquata* Steph. — Le Vaill.

Ois. d'Afr. 246, fig. 1. — Hartl. Synops. sp. 57.

Süd-Afrika.

56. *Chelidon* (Boie) *urbica* (Lin.)

H. lagopoda Pall. — Pl. enl. 542. — Gould Eur. t. 57.

Nord-Afrika.

III. Familie: CORACIADAE.

1. Subfamilie: CORACIANAE.

55. *Brachypteracias* (Lafr.) *leptosomus* (Less.)

Chloropygia leptosoma Sw. — Less. Ill. Zool. t. 22. — Lafr. Mag. de Zool. 1834, Ois. t. 31. — Bp. Consp. p. 166. — Reichenb. t. 436, fig. 3191—92.

Madagascar.

56. *Brachypteracias squamigera* Lafr.

O. des Murs t. 39.

Madagascar.

57. *Brachypt. pittoides* Lafr.

Atelornis pittoides Puch. — Mag. de Zool. 1834, Ois. t. 32.

Madagascar.

58. *Coracias garrula* Lin.

Galgulus garrulus Vieill. — Buff. enl. 486. — Le Vaill. Ois. de Parad. t. 32, 33. — Gould Eur. t. 60. — Naum. V. D. t. 60. — Reichenb. t. 431.

In ganz Nord-Afrika.

59. *Coracias caudata* Lin.

C. caudata Gm. — *C. caudata* Lath. — *Galgulus angolensis* Briss. — Le Rollier d'Angole Buff. — Long tailed Roller Lath. — Rollier d'Angole Daud. — *Coracias angolensis* Shaw. — Lin. 12. ed., vol. 1, p. 160, No. 6. — Lath. Index, p. 69, No. 3. — Briss. Ornith. 2, p. 72, No. 3, pl. 7, f. 1. — Buff. enl. 88. — Shaw. Gen. Zool. 7, pl. 51. — Reichenb. t. 432, fig. 3182.

Im südlichen und südwestlichen Afrika.

60. *Cor. abyssinica* Gm.

C. abyssinica Lath. — *C. abyssinica* Daud. — *Galgulus caudatus* Vieill. — Buff. enl. 626. — Le Vaill. Roll. pl. 25. — Reichenb. t. 431, f. 3181.

Mit Ausnahme der nördlichen Küstenländer in ganz Afrika.

61. *Cor. cyanogaster* Cuv.

Galgulus cyanogaster Vieill. — Le Vaill. Ois. de Parad. t. 26. — Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 123. — Swains. Birds of W. Afr. II. t. 13. — Reichenb. t. 432.

In Süd- und West-Afrika.

62. *Cor. Levaillantii* Temm.

C. pilosa Lath. — *C. crinita* Shaw. — *C. nuchalis* Sw. B. of W. Afr. II, 110. — Reichenb. t. 433, fig. 3184.

Innerhalb der Wendekreise.

63. *Eurystomus violaceus* Vieill.

Coracias madagascariensis Gmel. — *Colaris violaceus* Wagl. — Buff. enl. 501. — Le Vaill. Ois. de Parad. t. 34. — Reichenb. t. 438, fig. 3200.

Madagascar.

64. *Eurystomus* (Vieill.) *afra* (Lath.)

Coracias afra Lath. — *Colaris afra* Cuv. — *Eurystomus purpurascens* Dum. — *E. rubescens* Vieill. — Le Vaill. Ois. de Par. t. 35. — Shaw Nat. Misc. t. 401. — Reichenb. t. 438, fig. 3201. 2.

In Abyssinien, Nubien und Kordofan einzeln, häufiger auf der Westküste und in Senegambien.

- 65? *Eurystomus gularis* Vieill.
Eur. colaris Vig. — Jard. et Selb. Ill. t. 109. — Le Vaill.
 Ois. de Par. t. 56. — Reichenb. t. 438. fig. 3203.
 Nach Wagler in Afrika.
66. *Eur. viridis* Wagl.
 Syst. Avium sp. 5.
 In Senegambien.

IV. Familie: *TROGONIDAE*.

67. *Apaloderma* (Sw.) *narina* (Vieill.)
Trogon narina auct. Sw. — N. Dict. Hist. Nat. VIII, 318. —
 Le Vaill. Ois. d'Afr. 228, 229. — Gould Monograph. Trogon. 26.
 In den centralen Ländern Süd-Afrika's. In Abyssinien und am
 oberen blauen Nil.

V. Familie: *ALCEDINIDAE*.

1. Subfamilie: *HALCYONINAE*.

68. *Halcyon* (Sw.) *senegalensis* (Lin.)
 Buff. enl. 594. — Rev. et Mag. de Zool. 1851, p. 266. —
 Rüpp. Wirbelth. t. 21. — Sw., B. of W. Afr. II, p. 97.
 Im westlichen Afrika, in Abyssinien und am Bacher el abiad.
69. *H. torquata* Sw.
Alc. malimbica Shw. — B. of West. Afr. II, p. 99. — Hartl.
 Beitr. z. Orn. W. Afr. p. 45. — Lath. Gen. Hist. IV, p. 20. —
 Mag. de Zool. 1851, p. 265. — *H. cinereifrons* (Vieill.) Gal.
 d'Ois. t. 187.
 Auf Malimbo, Fernando Po.
70. *Alcedo semicoerulea* Gm.
 Rüpp. Wirbelth. Abyssiniens t. 24.
 Ost- und Süd-Afrika?
71. *Halcyon senegaloides* A. Sm.
 Birds of South. Afr. t. 63.
 Im südlichen Afrika.
72. *Alcedo Vaillantii* Temm.
A. fuscicapilla Lafr. — *Halc. fuscicapilla* Hartl. — Mag. Zool.
 1833. Ois. t. 18.
 Süd-Afrika.
73. *Halc. chelicuti* Stanley.
A. striolata Ill. — *A. variegata* Vieill. — *Dacelo pygmaea*
 Rüpp. Atl. t. 28. — Lath. Gen. Hist. IV, p. 32. — Vieill. Enc.
 p. 397.
 In Abyssinien und Kordofan.
74. *Halc. erythrogaster* Temm.
H. erythrorhyncha Gould. — *H. rufiventer* Sw. — *H. Swain-*
sonii A. Smith. — *Dacelo Actaeon* Less. — Buff. enl. 356. —
 Swains. B. of W. Afr. II, pl. 12.
 Im westlichen Afrika, in Fassokl und Abyssinien.
75. *Alcedo ispida* Lin.

- Gracula atthis* Gm. — Pl. enl. 77. — Gould Eur. t. 61.
Am rothen Meer, nach Rüppell, einzeln. Den Winter über häufig in Nord-Afrika.
76. *Alcedo cancropaga* Lath.
Halc. cancropaga Gr. — Pl. enl. 334. — Vieill. Enc. p. 238.
— Reichenb. t. 402, fig. 3036.
Senegambien.
77. *Alcedo cyanoleuca* Vieill.
Encyclop. p. 401. — Hartl. Synops. sp. 66.
78. *Halcyon Dryas* Hartl.
v. Müll. Beitr. z. Orn. Afrika's t. XI, fig. 1 u. 2; de Müll. Ois. d'Afr. t. XI, fig. 1 u. 2. (Irrthümlich auf der Tafel mit „Müll.“ bezeichnet statt „Hartl.“) — Hartl. in Cab. „Journ. f. Ornith.“ II, No. 7, p. 2.
Ilha do Principe und St. Thome.
79. *Halc. badia* Verr.
Mag. de Zool. 1851, p. 264. — Jard. Contrib. 1851, p. 134.
— Hartl. Synops. spec. 71.
Gabun.
80. *Alcedo semitorquata* Sw.
Zool. Ill pl. 151. — Rüpp. Vög. N.O. Afr. t. 7. — Reichenb. t. 395, fig. 3054.
Im westlichen Afrika, in Abyssinien und der Kafferei.
81. *Alcedo coeruleocephala* Gmel.
A. cyanecephala Shaw. — Buff. enl. 556, v. 316? — Reichenb. t. 397, fig. 3063.
Im westlichen und östlichen Afrika.
- 82? *Alcedo cyanostigma* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 24.
Gemein in Abyssinien. Vielleicht der junge Vogel des vorigen.
83. *Halcyon cyanotis* Sw.
Alcyone coronata Sm. — *Ispidina picta* Kaup. — Pl. enl. 783, fig. 1. — Sw. B. of W. Afr. II, p. 103. — Gray Gen. of B. t. 28.
Innerhalb der Wendekreise.
84. *Alcedo quadibrachys* Temm. Mus. Lugd.
Wahrscheinlich identisch mit *Alcedo azurea* Lath. (*tribrachys* Shw., *Alc. australis* Sw., *Ceyx cyanea* Less.)?
West-Afrika, Guinea.
85. *Alcedo leucogastra* Fras.
Proc. Zool. Soc. 1843, p. 4. — Allen, Niger Exp. II, p. 503.
— Reichenb. t. 395, fig. 3056.
Von Fernando Po.
86. *Alcedo cristata* L.
Pl. enl. 756, 1. — Br. Orn. IV, t. 37, 3. — Kittl. Kupf. 29. 3.
— Reichenb. t. 403. f. 3176.
Süd-Afrika.
87. *Alcedo vintsioides* Eyd. et Gerv.
Mag. Zool. 1836. Ois. t. 74. — Reichenb. t. 396, f. 3059.

Madagascar.

88. *Alcedo Nais* Kaup.
Corythornis Nais Kaup.
 Nach Kaup im Britischen Museum aus Afrika.
89. *Alcedo senegalensis* (Briss.)
Ispida senegalensis Br. Ornith. IV, t. 39, f. 1. — Hartl. Synops. sp. 74.
 Senegambien.
90. *Alcedo nitida* Kaup.
 Reichenb. Alced. p. 6. — Hartl. Synops. sp. 78.
 West-Afrika.
91. *Ceryle* (Boie) *rudis* (Lin.)
Ispida bicincta et *bitorquata* Sw. — *Ceryle varia* Strickl. —
 Edward Birds pl. 9. — Buff. enl. 62, 716. — Gould Eur. t. 62.
 Ueber ganz Afrika verbreitet, ungemein häufig am Nil.
92. *Ceryle tricolor* (Vieill.)
 Encyclop. I, p. 398. — Hartl. Synops. sp. 82.
 Senegambien.
93. *Ceryle maxima* (Pall.)
A. afra Shw. — *Alc. guttata* Bodest. — Spicil. VI, p. 15. —
 Reichenb. t. 409, fig. 3101—2.
 Congo.
94. *Alcedo gigantea* Sw.
 Birds of W. Afr. II, t. 11. — Buff. enl. 679. — Reichenb.
 t. 409, f. 3103 und t. 409 b. fig. 3486.
 West-Afrika, Congo.

VI. Familie: *MEROPIDAE*.

95. *Merops Apiaster* Lin.
M. galilaeus Hasselq. — *M. schaeghaghi* Forsk. — *M. Hungariae* Brehm. — Buff. enl. 938. — Le Vaill. Guêp. t. 1, 2. —
 Gould Eur. t. 59. — Descr. de l'Eg. t. 4, f. 3. — Reichenb.
 t. 443, fig. 3220—22. — Swains. B. W. A. II, p. 76.
 In ganz Afrika.
96. *Merops Savignyi* Sw.
 Le Vaill. Guêp. t. 6. — Sw. B. of W. Afr. II, t. 7. — Reichenb.
 t. 444, f. 3225—26.
 Westliches Afrika, Senegal.
- 97? *Merops Vaillantii* Bp.
 Consp. p. 161.
 Madagascar.
98. *Merops aegyptius* Forskh.
M. persica Pall. — *M. superciliosus* Licht. — Descr. de l'Egypt.
 t. 4, f. 3. — Kittl. Kupf. d. Vögel. t. 7, f. 1. — Bonap. Faun.
 Ital. t. 25, 1. — Le Vaill. Guêp. t. 6 adult. 16 juv. — Reichenb.
 t. 443 b. f. 3545.
 Im östlichen Afrika.
- 99? *Merops superciliosus* L.

Bp. Consp. p. 161.

M. Bonelli (Le Vaill.) — *Apiaster madagascariensis* Briss.
Orn. IV, t. 42, f. 1. — Pl. enl. 259. — Le Vaill. Guêp. t. 19.
Im östlichen Afrika, Madagascar.

100. *Merops albicollis* Vieill.

M. Savignyi Sw. Zool. Ill. t. 76. — *M. Cuvieri* Licht. — Le
Vaill. Guêp. t. 9. — Reichenb. t. 449, f. 3246.
In Abyssinien, Kordofan und Senegambien.

101. *Merops viridissimus* Sw.

M. viridis Lin. pt. — Reichenb. t. 445, fig. 3229—30.
Ueber ganz Afrika verbreitet.

102. *Merops Adansoni* (Le Vaill.)

M. senegalensis Shaw. — *M. longicauda* Vieill. — Pl. enl.
314. — Le Vaill. Guêp. t. 13. — Reichenb. t. 448, fig. 3243.
Oestliches und westliches Afrika.

103. *Merops nubicus* Gm.

M. coeruleocephalus Lath. — *M. superbus* Penn. — Pl. enl.
649. — Shaw. Nat. Misc. t. 78 und 613. — Le Vaill. Guêp. t. 3.
— Sw. B. of W. Afr. t. 9. — Bp. Consp. p. 161. — Reichenb.
t. 451, fig. 3254—55.

Im westlichen Afrika und Sudan.

104. *Merops nubicoides* O. des Murs.

Pl. p. 35. (1846.)
Afrika.

105. *Merops bicolor* Daud.

M. malimbicus Shaw. — Ann. Mus. II, t. 62, 1. — N. Misc.
t. 71. — Le Vaill. Guêp. t. 5. — Vieill. Gal. Ois. t. 186. —
Reichenb. t. 452, fig. 3256—57.

Im südöstlichen und westlichen Afrika.

106. *Merops hirundinaceus* Vieill.

M. tawa Cuv. — *M. chrysolaemus* Jard. — *M. azuror* Less. —
Le Vaill. Guêp. t. 8. — Sw. B. of W. Afr. t. 10. — Orn. Ill.
t. 99. — Reichenb. t. 446, fig. 3235—36. — *M. furcatus* Stanley.
In Süd- und West-Afrika.

107. *Melittophagus* (Boie) *erythropterus* (Gm.)

M. minutus Vieill. — *M. minutus* Cuv. — Pl. enl. 318. — Le
Vaill. Guêp. t. 17. — Lath. Syn. t. 31. — Lath. Gen. Hist. of B.
IV, t. 70. — Reichenb. t. 447, fig. 3240—41.

Mit Ausnahme der nördlichsten Gegenden über den ganzen Con-
tinent verbreitet.

108. *Melittophagus variegatus* (Vieill.)

M. cyanipectus Verr. — Mag. de Zool. 1851, p. 269. — Strickl.
Contrib. 1852, part. 6. — Vieill. Enc. p. 390. — Reichenb.
t. 446 b, fig. 3292—93. — Hartl. Synops. sp. 89.

In Abyssinien, am Gabun, Malimbe.

109. *Merops collaris* Vieill.

M. Sonnini et *collaris* Vieill. Encycl. p. 393. — Kittl. Kupfert.
7, f. 2. — Reichenb. t. 447, f. 3237—38.

Senegambien, Kordofan, Abyssinien.

110. *Melittophagus Lafresnayi* Guér.

O. des Murs. Pl. p. 34. — Reichenb. t. 447, fig. 3239.
Abyssinien.

111. *Mel. Bullocki* (Vieill.)

M. cyanogaster Sw. Birds of W. Afr. II, t. 8. — Le Vaill. Guép. t. 20. — Donovan. Nat. Rep. t. 45. — Reichenb. t. 450, fig. 3250—51.

Im südlichen und westlichen Afrika, einzeln in Abyssinien, Senaar und Kordofan.

112. *Mel. Bullockoides* (Smith.)

Birds of S. Afr. t. 9. — Reichenb. t. 450, fig. 3248—49.
Süd-Afrika.

113. *Mel. gularis* (Shw.)

Nat. Misc. t. 337. — Gr. et Mitch. Gen. B. t. 30. — Reichenb. t. 452, fig. 3258—59.
West-Afrika, (Goldküste.)

B. TENUIROSTRES.

I. Familie: UPUPIDAE.

1. Subfamilie: UPUPINAE.

114. *Upupa epops* Lin.

U. vulgaris Pall. — *U. macrorhyncha* Sand. — *U. senegalensis* Sw.? — Pl. enl. 52. — Edwards Birds t. 345. — Gould Eur. t. 238. — Le Vaill. Promer. t. 22.

Im nördlichen Afrika, südwärts bis Abyssinien und Senegambien.

115. *Upupa minor* Gm.

U. africana Bechst. — *U. cristatella* Vieill. — *U. capensis* Sw. — Vieill. Gal. des Ois. t. 184. — Jard. Ill. Orn. t. 142.

In Süd-Afrika.

116. *Upupa monolophos* Wagl.

Syst. Avium spec. 3. — Le Vaill. Prom. t. 9.
Süd-Afrika.

117. *Upupa senegalensis* Sw.

Birds. of W. Afr. II, p. 114. — Hartl. Synops. sp. 98.
Senegambien.

118. *Upupa varia* Bodd.

U. capensis Gm. — *U. madagascariensis* Shaw. — *Coracia cristata* Vieill. — Pl. enl. 697. — Le Vaill. Prom. t. 18. — Vieill. O. dor. t. 3. (Gehört nach Wagler [Syst. Avium Pastor spec. 13] zum Genus *Pastor*.)

Bewohnt Madagascar und die benachbarten Inseln.

119. *Irisor* (Less.) *erythrorhynchus* (Lath.)

U. viridis Licht. — Prom. *erythrorhynchus* Cuv. — *Irisor capensis* Less. — Vieill. Ois. dor. t. 6. — Le Vaill. Prom. t. 1, 2, 3.
Ausser den nördlichsten Theilen über ganz Afrika verbreitet.

120. *Irrisor melanorhynchus* (Licht.)
Nectar. melanorhyncha Licht. Doubl. Cat. p. 15. — *Falcinellus senegalensis* Vieill. — *Promer. senegalensis* Sw. II, p. 117.
 — Vieill. Prom. t. 4. — Gr. et Mitch. Gen. B. t. 31. — Hartl. Synops. sp. 99.
 Aus Senegambien, Kordofan und Abyssinien. (Ob nicht das Jugendkleid des vorhergehenden?)
121. *Irrisor caudacutus* Gr.
Epimachus obscurus Wagl. spec. 2. — Vieill. Promer. t. 8 u. 17. Madagascar.
122. *Irrisor indicus* (Lath.)
Upupa indica Lath. — *Epimach. coeruleus* Wagl. — *Promerops coeruleus* Shaw. — Vieill. Ois. dor. t. 9. — Le Vaill. Prom. t. 7. — Bp. Consp. p. 411.
 In Südost-Afrika.
123. *Irrisor unicolor* Gr. —
 Isis 1829, p. 656. — *Epimach. unicolor* Licht.
 Wahrscheinlich in Süd-Afrika.
124. *Irrisor lamprolophos* Wagl.
 Le Vaill. Prom. t. 11, 12.
 Süd-Afrika.
125. *Irrisor sibilator* Gr.
Epimach. sibilatrix Wagl. — *Falcinellus sibilator* Vieill. —
 Le Vaill. Prom. t. 10. — Bp. Consp. p. 411.
 Süd-Afrika.
126. *Irrisor pusillus* Sw.
Promerops aterrimus Steph. — B. of W. Afr. p. 120. — Lath. Gen. Hist. of B. IV, p. 111. — Hartl. Synops. sp. 100. — v. Müll. Ornith. Afrika's, t. XXIV.
127. *Irrisor cyanomelas* Gr.
Falcinellus cyanomelas Vieill. — *Promerops cyanomelas* Cuv. —
Upupa purpurascens Burch. — *Rhinopomastes Smithi* Jard. —
 Le Vaill. Prom. t. 5, 6. — Zool. Journ. IV, t. 1.
 Südwärts von Nubien in ganz Afrika.
128. *Irrisor minor* Rüpp.
 System. Uebers. t. 8.
 In Abyssinien. Scheint auch in Süd-Afrika vorzukommen.
129. *Irrisor Cabanisi* Defilippi.
 Revue et Mag. de Zool. 1853, No. 7.
 Am Weissen Nil.
130. *Falculia palliata* Is. Geoffr.
 Mag. de Zool. 1836, t. 49. — Bp. Consp. p. 411.
 Auf Madagascar.

II. Familie: PROMEROPIDAE.

1. Subfamilie: PROMEROPINAE.

131. *Promerops* (Briss.) *caffer* (Lin.)
Promer. capensis Less. — *Cinnyris longicaudatus* Vieill. —

Buff. enl. 637. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 287, 288. — Vieill. Ois. dor. t. 4. — Bp. Consp. p. 410.

Süd-Afrika.

2. Subfamilie: NECTARININAE.

132. *Nectarinia* (Illig.) *afra* (Lin.)

Cinnyris smaragdina Vieill. — *Certhia erythrogastra* Shw. — *Cinnyris pectoralis* Vieill. — Edw. Birds t. 347. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 300. — Shaw. Nat. Misc. t. 387. — Vieill. Ois. dor. t. 10. — Jard. Birds t. 2.

In Süd-Afrika.

133. *Nectarinia chalybea* (Lin.)

Certhia capensis Lin. — Pl. enl. 246, 2. — Sw. Ill. Zool. t. 95. — Shaw. Nat. Misc. t. 381. — Vieill. Ois. dor. t. 14 und 80. — Jard. Nectar. t. 1.

Süd- und West-Afrika.

134. *Nectarinia splendida* Gr.

Certhia splendida Shaw. — Gen. Zool. VIII, t. 26. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 295. — *Cinnyris bobicinus* Vieill. Ois. dor. t. 2. — Jard. Nectar. t. 5.

Südwest-Afrika.

135. *Nect. chloropygia* Jard.

Annal. of Nat. Hist. X, p. 188. — Illustr. of Ornith. pl. 50. — Jard. Monogr. pl. 17.

Senegambien, Fernando Po.

136. *Nect. collaris* (Vieill.)

N. Dict. d'Hist. nat. XXXI. p. 502. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 299. — Jard. Nect. t. 6.

137. *Nectarinia pusilla* Gr.

Certhia pusilla Vieill. — Le Vaill. Ois d'Afr. t. 298.

138. *Nectarinia fusca* Gr.

C. fusca Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 296.

Süd-Afrika.

139. *Nectarinia Verreauxi* Gr.

C. Verreauxi Smith Ill. South. Afr. Zool. Av. t. 51. — Jard. Monogr. Nect. t. 9.

Süd-Afrika.

140. *Nectarinia olivacea* Gr.

C. olivacea Sm.

Süd-Afrika.

141. *Nectarinia cuprea* Shw.

C. rubro-fusca Shw. — *Cinnyris tricolor* Vieill. — *C. erythronotos* Sw. — Vieill. Ois. dor. t. 23 und 27. — Sw. B. of W. Afr. t. 15. — Jard. Monogr. p. 187, 254.

Süd- und West-Afrika.

142. *Nectarinia cyanocephala* (Gm.)

Cinn. chloronotos Sw. — Birds of W. Afr. t. 16. — Vieill. Ois. dor. 7, 25. — Jard. Nect. t. 10.

Süd- und West-Afrika.

143. *Nectarinia senegalensis* (Lin.)

- C. senegalensis* Cuv. — *Cinn. discolor* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 295, 2. — Vieill. Ois. dor. t. 8, 9. — Briss. Orn. III. t. 34, 2. — Kittl. Kupf. Vög. t. 28, 2. — Jard. Monogr. t. 11. West- und Süd-Afrika.
144. *Nectarinia natalensis* Jard.
Monogr. Nectar. t. 12.
Süd-Afrika.
145. *Nectarinia cruentata* Rüpp.
Vög. N.O.-Afr. t. 9.
Häufig in Abyssinien.
146. *Nectarinia amethystina* (Shaw.)
Cinn. auratifrons Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 294, 2. — Vieill. Ois. dor. 5, 6. — Jard. Nect. t. 13. — Hartl. Synops. sp. 107. — *Certhia aurifrontalis* Bechst. — *Nectarinia aurifrons* Licht. — Doubl. Cat. No. 130.
Aus Süd- und Ost-Afrika
147. *Nectarinia famosa* (Lin.)
Pl. enl. 83, f. 1. — Vieill. Ois. dor. t. 37, 38. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 289, 290.
Im südlichen Afrika, auf der Westküste und in Abyssinien.
148. *Nectarinia pulchella* (Lin.)
Cinn. caudatus Sw. — Buff. enl. 670. — Vieill. Ois. dor. t. 41. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 293, 1. — Sw. B. of W. Afr. t. 14. — Hartl. Synops. sp. 101. — Jard. Monogr. p. 207, t. 18.
Ueber ganz Afrika, nördlich bis Nubien.
149. *Nectarinia rubescens* (Vieill.)
Enc. p. 593. — Jard. Monogr. Nect. p. 274.
Congo.
150. *Nectarinia cardinalis* Gr.
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 291.
Süd-Afrika.
151. *Nectarinia platyura* Gr.
N. sylviella Temm. — *Cinn. platyura* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 293, 2. — Temm. Pl. col. 347 (note.) — Jard. Nect. t. 19
Aus Senegambien.
152. *Nectarinia metallica* (Licht.)
Rüpp. Atl. t. 7. — Hempr. und Ehrenb. Symb. Phys. t. 1. — Temm. Pl. col. 347, 1. 2.
Nubien, Abyssinien, Kordofan, Darfur.
153. *Nectarinia affinis* Rüpp.
Abyss. Wirbelth. t. 31.
Kordofan, Sennaar, Abyssinien.
154. *Nectarinia aenea* (Vieill.)
Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 297.
Süd-Afrika.
155. *Nectarinia gularis* Rüpp.
Abyss. Wirbelth. t. 31.
Kordofan und Abyssinien.

156. *Nectarinia habessinica* Ehrenb.
Symbol. Phys. Aves t. 4. — *Cinnyris habessinica* Cab.
Mus. Heinean. I, p. 101.
Abyssinien.
157. *Nectarinia soui-manga* (Gm.)
C. madagascariensis Lath. — Briss. Orn. t. 32, 2, 3. — Vieill.
Ois. dor. t. 18, 19.
Auf Madagascar.
158. *Nectarinia Tacazze* Stanl.
Rüpp. Abyss. Wirbelth. t. 31, 3.
Abyssinien.
159. *Nectarinia Adalberti* Gerv.
Mag. Zool. 1833, Ois. t. 19. — Jard. und Selb. Ill. Orn. t. 49.
— Allen, Nig. Exp. II, p. 502. — Jard. Monogr. t. 30. — Hartl.
Synops. sp. 104.
Senegambien und Nigritien.
160. *Nectarinia violacea* Gr.
C. crocata Shaw. — *Cinn. crocea* Less. — Pl. enl. 670, 2. —
Le Vaill. Ois. d'Afr. 292. — Vieill. Ois. dor. t. 39. — Nat. Misc.
t. 210.
Afrika.
161. *Nectarinia melampogon* Ill.
Licht Doubl. Catal. No. 131, p. 15. — Hartl. Syn. sp. 102. —
[Ist identisch mit *N. pulchella* No. 148. — Cab.]
Senegal.
162. *Nectarinia cyanopygos* Licht.
Doubl. Cat. No. 132. — *N. platura* Vieill. — *C. ficorum* Voigt,
in Cuv Thier. I, p. 638. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 293, f. 2. —
Hartl. Synops. sp. 103.
Senegambien.
163. *Nectarinia fuliginosa* Gr.
Vieill. Ois. dor. t. 20, 21. — Jard. Nect. 14. — Mag. Zool.
1851, p. 315. — Hartl. Synops. sp. 106.
Congo, Gaboon.
164. *Nectarinia Stangeri* Jard.
Ill. Orn. t. 48. — Jard. Monogr. t. 15. — Verr. Mag. Zool.
1851, p. 313. — Hartl. Synops. sp. 105.
Fernando Po, Gaboon.
165. *Nectarinia rectirostris* Gr.
Cinn. elegans Vieill. — *Certh. rectirostris* Shaw. — Vieill.
Ois. dor. t. 75. — Vieill. Gal. Ois. t. 178.
Aus Süd-Afrika.
166. *Nectarinia purpurata* Illig.
Kittl. Kupf. Vög. t. 28, 1.
Abyssinien.
167. *Nectarinia virescens* Gr.
Vieill. Ois. dor. t. 34.
168. *Nectarinia cyanolaemus* Jard.

- Contrib. 1851, part. 6. — Hartl. Synops. sp. 114.
Fernando Po.
169. *Nectarinia hypodilus* Jard.
Contrib. 1851, part. 6.
Fernando Po.
170. *Nectarinia tephrolaemus* Jard.
Contrib. 1851, part. 6.
Fernando Po.
171. *Nectarinia Perreini* (Vieill.)
Cinnyris Perreini Vieill. — Enc. p. 595. — Less. Mon. II, p. 52.
Congo.
172. *Nectarinia fasciata* Jard.
Contrib. 1852, part. 3. —
Abomey (Westküste.)
173. *Nectarinia Johannaë* Verr.
Mag. Zool. p. 314.
Gaboon.
174. *Nectarinia erythrothorax* (Vieill.)
Enc. p. 594. — *C. ruber* Less. Tr. d'Ornith. p. 296. —
Congo.
175. *Nectarinia Fraseri* Jard.
Illustr. of Ornith. pl. 52.
Fernando Po.
176. *Nectarinia aurantium* Verr.
Mag. de Zool. 1851, p. 417. — Hartl. Synops. sp. 129.
177. *Nectarinia scarlatina* (Sparm.)
Certhia canora Scop. — *C. viridis* Lath. — Sonn. Voy. Ind.
II, t. 116, 2.
178. *Nectarinia obscura* Jard.
Monogr. p. 253.
Fernando Po.
179. *Nectarinia angladiana* (Shaw.) Gr.
Certh. lateria Lin. — Br. Orn. t. 33, 4, 5. — Pl. enl. 575,
2, 3. — Vieill. Ois. dor. t. 3, 4.
180. *Nectarinia venusta* Gr.
Certh. venusta Shaw. — *Cinn. pusilla* Sw. Birds of West.
Afr. II, p. 138. — *Cinn. quincolor* Less. — *Nect. parvula* Jard.
— Vieill. Ois. dor. t. 79. — Jard. Nect. t. 7. — Nat. Misc. t. 369.
— Lath. G. Hist. IV, 234. — Hartl. Syn. sp. 113.
Senegambien, Sierra Leone.
181. *Nectarinia bifasciata* Gr.
Cinn. nitens Vieill. — Vieill. Ois. dor. t. 24. — Jard. Nect. t. 4.
Congo, Damara-Gegend.
182. *Nectarinia superba* Gr.
Vieill. Ois. dor. t. 22. — *C. sugnimbindus* Less. Man. II, p. 48.
Congo, Gaboon.

(Fortsetzung folgt.)



1855. "Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's." *Journal
fu*
..

r Ornithologie 3, 1–16. <https://doi.org/10.1007/bf02002159>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/49380>

DOI: <https://doi.org/10.1007/bf02002159>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/141205>

Holding Institution

Natural History Museum Library, London

Sponsored by

Natural History Museum Library, London

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.