

NOTE XIX.

DEUX ELATÉRIDES NOUVEAUX DES ILES
DE LA SONDE.

DÉCRITS PAR

E. CANDÈZE.1. *Agraeus Ritsemae*, n. sp.

Niger, opacus; fronte plana; prothorace transverso, marginibus parallelis, inaequali, fortiter punctato, medio antice tuberculo punctatissimo apice bidentato, tuberculis basalibus destituto; elytris gibbosis, brevibus, fortiter punctatis, dorso lineis penicillatis ultra medium flavo-bimaculatis. — Long. fere 4 mill., lat. 2 mill.

Java oriental (Mulié).

Cette petite espèce, que j'avais vue autrefois parmi des insectes appartenant au Musée de Leyde, avait été nommée par moi *A. Mannerheimi*, à simple inspection et sans le comparer à ce dernier, que je n'avais pas sous les yeux.

Depuis lors et grâce à l'obligeance de M. Ritsema, j'ai pu l'examiner auprès du véritable *Mannerheimi*, dont un specimen a été trouvé à Sumatra orient. (Serdang) par le Dr. B. Hagen, et j'y ai reconnu de notables différences. La plus remarquable est l'absence complète, sur le prothorax, de tous tubercules umbiliqués et pinceaux de poils, en dehors du grand tubercule antérieur et médian.

Quant au *facies*, il est le même, à peu de chose près.

Serait-ce la femelle? Cette question ne peut être résolue actuellement, vu le très petit nombre de specimens que l'on possède de ce genre remarquable, dont six espèces seraient connues¹⁾, toutes représentées par un ou, au plus, deux individus.

Ceci ferait supposer que les formes spécifiques en sont nombreuses, bien que très rares. Le Musée de Leyde possède actuellement, outre le type de l'espèce décrite ci-dessus, un exemplaire de l'*A. Mannerheimi* Cand. de Serdang (Sumatra orient.) et le type de l'*A. constrictus* Rits. de Batavia (Java occident.).

2. *Diploconus Hasselti*, n. sp.

Rufus, nitidus, rufo-pubescent; antennis obscurioribus; prothorace latitudine vix longiore, apice parum angustato, sparsim punctato, medio sulcato, margine antico nigricante, angulis posticis divaricatis, fortiter unicarinatis; elytris apice integris, striis fortiter punctatis. — Long. 12 mill., lat. 3 mill.

Sumatra: Lebong (A. L. van Hasselt).

Cette espèce fait partie des récoltes faites pendant l'Expédition Scientifique Néerlandaise de 1877—78 par M. A. L. van Hasselt à qui je la dédie. Elle diffère peu, à première vue, du *D. rufus*, mais quand on l'examine plus

1) 1. *Mannerheimi* Cand. *Mon. Elat.* I. p. 166; t. 3, f. 4. Java, Sumatra.
 2. *Cuniculus* Cand. *Révis. Mon. Elat.* I. p. 105. Singapore.
 3. *Feroculus* Cand. *l. c.* pag. 105. Sumatra.
 4. *Mouhoti* Cand. *l. c.* pag. 106 Siam.
 5. *Constrictus* Rits. *Notes Leyden Mus.* III. p. 29. Java.
 6. *Ritsemae* Cand. décrit ci-dessus Java,
 sans compter deux espèces de Ceylan, les *Trachylacon fulvicollis* et *lobicollis*, de Motschulsky (*Etud. Entom.* VII. p. 61), qui appartiennent peut-être au même genre.

attentivement on constate plusieurs différences, parmi lesquelles la plus facile à reconnaître est dans la sculpture des angles postérieurs du prothorax, qui sont ici porteurs d'une seule carène, tandis qu'il y en a deux bien marquées chez le *rufus*.

Glain-lez-Liége, 30 Mai 1883.



Candèze, E. C. 1883. "Deux Elatérides nouveaux des îles de la Sonde." *Notes from the Leyden Museum* 5, 204–206.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36691>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/150415>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.