

M. Camus dépose sur le bureau, de la part de l'auteur, un travail de M^{me} Gatin intitulé *Recherches anatomiques sur le pédoncule de la fleur des Liliacées*.

M. Lutz résume les communications suivantes :

Plantes de la Guyane française

PAR M. MICHEL GANDOGER.

Pendant l'un de mes voyages autour du monde je visitai l'Amérique du Sud et, arrivé à la Guyane, j'y séjournai quelque temps pour en explorer la Flore, surtout dans la région du Maroni qui est la plus intéressante.

J'eus la bonne fortune d'y rencontrer le pharmacien de marine Geoffroy, mort prématurément, qui m'accompagnait souvent dans mes excursions et me donnait d'utiles conseils que moi-même, docteur en médecine, j'appréciais beaucoup sous un climat si différent du nôtre.

Une herborisation sous l'Équateur, en effet, est fort différente d'une facile et agréable promenade botanique en France. A la Guyane, la brousse, la forêt vierge sont infestées de plantes épineuses, de lianes inextricables qu'il faut abattre avec la hache. On doit se garer des insectes, des moustiques, des reptiles, auxquels se joint l'implacable soleil, le plus redoutable de tous les ennemis. Il faut aussi un aide pour porter la corbeille ou le grand panier destiné à recevoir les plantes tropicales, souvent énormes, et dont une seule suffirait à remplir l'humble boîte de Dillenius.

J'ai déterminé¹ une partie de mes récoltes guyanaises qui sont depuis longtemps intercalées dans mon herbier et qu'il

1. Ouvrages consultés : AUBLET, *Histoire des plantes de la Guyane française*, 4 vol. in-8°, Paris, 1775; DUSS, *Flore phanérogamique des Antilles françaises*, in-8°, Marseille, 1897; HEMSLEY, *Botany of central America*, 5 vol. in-4°, London, 1880-88; HUBER, *Arboretum amazonicum*, in-4°, Para, 1900-06; HUMBOLDT, *Reise in die Äquinactialgegenden N. Cont.*, in-4°, Stuttgart, 1860; KUNTH, *Synopsis plantarum*, 4 vol. in-8°, Parisiis, 1822-25; MIERS, *Illustrations of South American plants*, in-4°, London, 1846-51; POEPPIG et ENDLICHER, *Nova genera et species pl.*, 3 vol. in-fol., Lipsiæ,

me serait très difficile de retrouver à cause de son immensité. Je le regrette maintenant, car ces plantes auraient complété la liste suivante dont un certain nombre de noms m'ont été donnés par notre confrère, M. R. Benoist.

Cette liste n'a, du reste, nullement l'intention d'être un catalogue systématique; c'est pourquoi j'en dispose alphabétiquement les noms.

<i>Alsodeia guianensis</i> Eichler.	<i>Clidemia elegans</i> DC.
<i>Alternanthera sessilis</i> .	— <i>lappacea</i> DC.
<i>Amanoa guianensis</i> Aublet.	— <i>petiolata</i> DC.
<i>Andropogon bicornis anisolobus</i> (<i>Odontadenia</i>).	— <i>trichodes</i> DC.
<i>Arthrostemma Aubletii</i> DC.	<i>Coffea arabica</i> L.
— <i>ladanoides</i> DC.	<i>Conyza cayenensis</i> L.
— <i>latifolium</i> Don.	<i>Coccoloba latifolia</i> Lam.
— <i>villosum</i> DC.	<i>Conobea aquatica</i> Aub.
<i>Blakea</i> .	<i>Cordia nodosa</i> Lam.
<i>Becquepelia-cymosa</i> Brongn.	<i>Costus secundus</i> Aubl.
<i>Bertiera guianensis</i> Aubl.	<i>Cyperus Hamiltonii</i> Kth.
<i>Brosimum Aubletii</i> Poep. E.	— <i>nemosus</i> Meyer.
<i>Byrsonima lævigata</i> DC.	<i>Drepanocarpus lunatus</i> Meyer.
<i>Calyptocarya angustifolia</i> Nees.	<i>Desmodium asendens</i> DC.
<i>Calycopus glaber</i> .	<i>Echites puncticulosa</i> Rich.
<i>Calycophyllum</i> .	<i>Eleusine indica</i> Gærtn.
<i>Carolinea princeps</i> L.	<i>Eupatorium conyzoides</i> Vahl.
<i>Casearia macrophylla</i> Vahl.	<i>Eperua rubiginosa</i> Miq.
<i>Cassia Apourontia</i> Aubl.	<i>Erisma uncinatum</i> Warm.
— <i>calycioides</i> DC.	<i>Eugenia Patrisii</i> DC.
— <i>hispida</i> Coll.	<i>Exostemma</i> .
— <i>latifolia</i> W. Mey.	<i>Forsteronia guianensis</i> Müller.
— <i>patellaria</i> DC.	<i>Gleichenia pectinata</i> Sw.
— <i>prætexta</i> Vogel.	<i>Goupia glabra</i> Aubl.
<i>Cassipourea guianensis</i> Aublet.	<i>Guatteria brevipes</i> DC.
<i>Cephaelis ligularis</i> Rich.	— <i>Ouregoa</i> Dun.
— <i>oblonga</i> DC.	— <i>podocarpa</i> DC.
— <i>tomentosa</i> Vahl.	<i>Hancornia Amapa</i> Huber.
<i>Chiococca anguifuga</i> Mart.	<i>Helicostylis pedunculata</i> R. Ben.
<i>Clidemia agrestis</i> Don.	<i>Hemitelia multiflora</i> Kl/s.
— <i>anisophylla</i> DC.	<i>Heteropteris platyptera</i> DC.
— <i>bracteata</i> DC.	<i>Hiræa bracteata</i> Sagot.
— <i>conglomerata</i> DC.	<i>Hirtella americana</i> L.
— <i>depauperata</i> DC.	— <i>racemosa</i> Lam.
	<i>Hypoporum interruptum</i> Næs.

1835-45; PULLE, *Enumeration of the plants from Surinam*, in-8°, Leyden, 1905; SCHOMBURGK, *Reisen in Guyana und Orinoko*, in-8°, Leipzig, 1841; RAMON DE LA SAGRA, *Historia física y natural*, 13 vol. in-4°, Paris, 1832-62; SWARTZ, *Flora Indiæ occidentalis*, 3 vol. in-8°, Erlangen, 1797-1806; URBAN, *Symbolæ antillanæ*, 2 vol. in-8°, Lipsiæ, 1900-12.

- Inga ingoides Willd.*
 — *nobilis Willd.*
 — *stipularis DC.*
 — *sciotion Steud.*
 — *Thibaudiana DC.*
 — *virgultosa Desv.*
Isertia coccinea Vahl.
Jussiaea linifolia Vahl.
Lecythis corrugata Poir.
 — *parviflora Aubl.*
 — *Poiteaui Berg.*
Licania Hostmanni Fritsch.
Lisianthus grandiflorus Aubl.
Machærium diadelphum Vogel.
 — *ferrugineum Pers.*
 — *leiophyllum Bth.*
Macoubea guianensis Aubl.
Maripa glabra Choisy.
Markea coccinea Rich.
Mikania amora Willd.
Morinda
Mouriria abnormis Naud.
Myrcia ambigua DC.
Oldenlandia longifolia DC.
Oplismenus pseudo-undulatifolius Kth.
Ouratea guianensis Aubl.
Palicourea calophylla DC.
 — *longifolia DC.*
 — *pedunculosa DC.*
 — *umbellata DC.*
 — *xanthina DC.*
Panicum pilosum Sw.
Pariana campestris Aubl.
Payperola guianensis Aubl.
Phoradendron latifolium.
Piper Hostmannianum CDC.
Poraqueiba guianensis Aubl.
Pourouma aspera Trécul.
Protium leptophyllum March.
Psychotria bracteata DC.
 — *brevipes DC.*
 — *ficigemum DC.*
 — *mapurioides DC.*
Psychotria Patrisii DC.
 — *platypoda DC.*
 — *racemosa DC.*
 — *sororia Rich.*
 — *umbellata Schum.?*
Qualea rosea Aubl.
Quiina Decaisneana
Rizophora Mangle L.
Ronabea guianensis Aubl.
Scoparia dulcis L.
Securidaca paniculata Lam.
Serjania paniculata H. B.
 — *paucidentata DC.*
Sida rhombifolia L.
Siparuna decipiens DC.
 — *guianensis Aubl.*
Sloanea dentata DC.
 — *sinemariensis Aubl.*
Smilax guianensis Burm.
Solanum diphyllum L.
 — *Juripeba Rich.*
Spennera aquatica Mart.
Spermacoe riparia Cham. Schl.
Stenostemma arcanatum DC.
Sterculia pruriens Schum.
Stigmophyllum fulgens Juss.
Swartzia tomentosa DC.
Symphonia globulifera L.
Tabernæmontana fasciculata Poir.
 — *speciosa Poir.*
 — *undulata Vahl.*
Talauma Plumieri DC.
Talisia rosea Vahl.
Tapinia guianensis Aubl.
Tapura guianensis Aubl.
Teliostachya alopecuroides Ners.
Tephrosia cinerea Poir.
Vandellia crustacea Bth.
Vismia cayenensis Pers.
 — *guianensis Pers.*
 — *rufescens Pers.*
Vochysia guianensis Aubl.
Wulfia stenoglossa DC.



Gandoger, Michel. 1921. "Plantes de la Guyane française." *Bulletin de la Société botanique de France* 68, 52–54.

<https://doi.org/10.1080/00378941.1921.10836740>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/93710>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1921.10836740>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/161191>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.