

Deux individus originaires du Louristan reçus dernièrement d'E. von BODEMEYER, sous le nom spécifique d'« *atrocoeruleus* Reitt. », adopté et publié par DENIER, sont identiques au *type* d'*A. atripes* Pic, également de Perse.

Cette espèce devra prendre le nom générique d'*Eolydus* Den., mais aura pour synonyme le nom d'*atrocoeruleus* Denier.

Description de quelques nouveaux Chironomides [DIPT.]

par J.-J. KIEFFER.

Tendipes ripicola, n. sp. — ♂ ♀. Brun; antennes du mâle brun noir, à panache gris, celles de la femelle brun clair, 7^e article brun noir; mésonotum gris, à 3 bandes confluentes d'un brun noir, scutellum et pleures jaunâtres, métanotum et mésosternum brun-noir, balanciers blancs, pattes jaunâtres, genoux un peu assombris. Antennes du mâle de 12 articles, dont le 12^e est pointu et presque quatre fois aussi long que les 10 précédents réunis, 3-11 trois fois aussi gros que longs. Celles de la femelle de 7 articles, dont le 7^e est double du 6^e, 2^e non rétréci au milieu, aminci au bout, 3-6 fusiformes. Radius égalant les 2/3 du cubitus, transversale noire. Métatarse antérieur de moitié plus long que le tibia, son extrémité et le 2^e article barbus, celui-ci plus de deux fois le 3^e qui est égal au 4^e. Article terminal des forcipules arqué, sans longues soies alignées; appendice supérieur sublinéaire, l'inférieur large, arrondi au bout, ne dépassant pas le tiers de l'article terminal. L. 7-8 mill. — Larve aquatique.

Allemagne.

Tendipes signaticornis, n. sp. — ♀. Jaune sale; 3 bandes raccourcies sur le mésonotum, métanotum et mésosternum noirs, abdomen à larges bandes transversales d'un brun clair. Métatarse antérieur un peu plus de moitié plus long que le tibia, les articles suivants graduellement raccourcis. Antennes de 6 articles, dont le 2^e est rétréci au milieu, aminci au bout, 3-5 avec un col 2 fois, puis 3 fois aussi long que gros, 6^e presque 3 fois aussi long que le 5^e, distinctement rétréci un peu au-dessus de la base. Toutes les nervures pâles. L. 5 mill. — Larve mineuse dans *Glyceria*.

Allemagne.

Tendipes cauliginellus, n. sp. — ♂. Jaune brunâtre, dessus de l'abdomen brun, pattes jaunâtres, 3 bandes raccourcies sur le mésonotum, dont la médiane est double, métanotum, mésosternum, palpes et antennes avec le panache brun-noir. Antennes de 12 articles, dont le 12^e est pointu et 4 fois aussi long que les 10 précédents réunis, 3-11 trois fois aussi longs que gros. Métatarse antérieur presque deux fois aussi long que le tibia, son tiers distal et les articles 2 et 3 barbus. Nervure transversale d'un brun sombre. Abdomen aussi gros que le thorax; article terminal des forcipules sans longues soies alignées, à peine arqué dorsalement, droit ventralement, appendice supérieur sublinéaire, faiblement arqué, l'inférieur large, élargi à l'extrémité qui est tronquée obliquement et ne dépasse pas le tiers basal de l'article terminal. L. 7 mill. — Larve mineuse.

Allemagne.

Cricotopus limnanthemii, var. **scutellaris**, n. var. — ♀. Semblable au type sauf que l'abdomen est jaune avec les tergites 2-6 et le 8^e brun-noir, lamelles blanches; scutellum noir; la bande médiane du mésonotum non divisée, large, graduellement amincie en arrière, où elle atteint le milieu des latérales; cubitus non dépassé par la costale. L. 3,5 mill. — Larve mineuse.

Allemagne.

Cricotopus limnanthemii, var. **truncatus**, n. var. — ♀. Semblable au type, mais les tergites 2-6 et le 8^e ont une large bande transversale brune, plus large au milieu que sur les côtés; la bande médiane du mésonotum est divisée, mince, subitement tronquée en arrière, où elle ne dépasse pas le tiers antérieur des latérales; scutellum jaune; cubitus non dépassé. Long. 2 mill. — Larve aquatique.

Allemagne.

Notes synonymiques sur quelques Muscides africains [DIPT.]

par le Dr J. VILLENEUVE.

1. **Paratachina (Echinomyia) obliqua** LW = *Echinomyia Costae* Jaenn. = *Paratachina ingens* BB.
2. **Cyphocera (Tachina) javana** Wied. = *argyrocephala* Macq. = *pyrrhogaster* Rond.



Kieffer, J.-J. 1913. "Description de quelques nouveaux chironomides (Dipt.)."
Bulletin de la Société entomologique de France 1913, 279–280.
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.16290>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36377>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.16290>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/16290>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.