

— Sur la proposition de M. Ph. Grouvelle, la Société décide que dorénavant la rente affectée à l'entretien et la conservation de la collection Henri Brisout sera versée, par le Trésorier, entre les mains du Comité des Collections de la Société qui a pris à sa charge la garde de cette collection.

— Sur la proposition de M. le Trésorier, la Société décide que le *Bulletin* continuera à être envoyé comme par le passé au Concilium bibliographicum de Zurich, quoique son directeur, M. le Dr H.-A. Field, ait donné sa démission de membre de la Société.

Communications.

Description de deux nouveaux Torymides [HYMÉN.]

Par l'abbé J.-J. KIEFFER.

Diomorus violaceus n. sp. — Vertex et thorax violets; face et hanches vertes; base des antennes noire, massue d'un brun sombre; pattes rouges; fémurs antérieurs et intermédiaires bruns, avec un reflet verdâtre. Abdomen un peu comprimé, d'un jaune d'or brillant; d'un rouge feu, latéralement, dans sa moitié postérieure. Dessus du corps couvert d'une pubescence blanche. Métanotum grossièrement ridé. Dent des fémurs postérieurs grande. Ailes hyalines. Oviducte atteignant la longueur du corps, qui est de 5 mill. dans les deux sexes.

Cette espèce a été obtenue, de galles de *Cynips argentea*, par M. Th. de Stefani. Elle est probablement parasite d'un Crabronide nichant dans ces galles.

Patrie : Sicile.

Diomorus Fertoni n. sp. — ♂ Front vert avec reflet bleu; joues, vertex, occiput, thorax et cuisses d'un bleu azuré avec reflet vert; abdomen d'un rouge de feu très intense, avec reflet doré sur la base et les deux derniers segments; sur le dessus du grand segment, au milieu, une petite tache à reflet azuré. Écailles d'un brun noir luisant. Scape d'un vert métallique; funicule brun, genoux, tibias et tarsi d'un rouge testacé. Ailes hyalines. Pubescence blanche. — Long. 4,5 mill.

L'insecte est éclos en février d'une ronce recueillie à Rognac (Provence) par M. Ferton, capitaine d'artillerie à Ajaccio. Je suis heureux

de dédier cette espèce à notre collègue. *Diomorus Kollari* M. Först. a été obtenu en juin par M. Fertou, d'une ronce habitée par un Crabronide et d'une autre habitée par une *Osmia* (probablement *ligurica*).

Ajaccio et Toulou.

Description d'une Cétonide nouvelle [COL.]

PAR L. FAIRMAIRE.

Hyperastia n. g. — Corps ovalaire, convexe, surtout au corselet. Chaperou assez largement mais peu fortement sinué, yeux gros, très saillants, antennes assez courtes, insérées à découvert près de l'angle interne des yeux, scape médiocre, funicule de 7 articles, le 1^{er} assez gros, massue un peu plus longue que le funicule. Corselet très convexe, largement lobé au milieu de la base qui est un peu déprimée, les côtés du bord postérieur un peu obliques, non sinués. Écusson en triangle aigu. Élytres ovalaires, faiblement atténuées en arrière, très obliquement tronquées aux épaules, fortement sinuées sur les côtés de sorte que les épaules, rejetées en dehors par la troncature oblique de la base, forment un angle un peu aigu. Pygidium grand. Mésternum tronqué brusquement en avant et formant une saillie anguleuse et obtuse, épimères mésothoraciques très grandes, très remonantes et coupant obliquement la base des élytres. Saillie intercoxale triangulaire, peu aiguë. Pattes médiocres, tibias antérieurs faiblement bidentés, les intermédiaires et postérieurs élargis au milieu en dehors avec une petite saillie aiguë.

Ce nouveau genre est voisin des *Euryomia* dont il se distingue par les yeux gros, saillants, la tête plus large en avant, le corselet plus convexe, largement arqué, presque lobé à la base, la saillie métasternale plus forte, formant presque un tubercule, la saillie intercoxale moins aiguë, les tibias antérieurs faiblement dentés.

H. tricolor n. sp. — Long. 12 mill. — Ovato-oblonga, capite rufo, nitido, fronte aenescante, obscuriore, prothorace rubro, opaco, basi late transversim nigro-velutino, disco signaturis aliquot tenuibus coeruleo-albidis, basi medio macula coerulea, scutello coeruleo, elytris opaco-atris, utrinque fasciis 4 coeruleo-metallicis ornatis, 1^a ad basin, paulo obliqua, 2^a externa, 3^a fere mediana, 4^a anteapicali, vage lunata; pygidio rufo, utrinque macula coerulea, atrocincta; subtus nigra, nitidissima, epimeris, metapleuris, metasterni lateribus, abdominis segmentis 3 primis utrinque striga tenui, 4^o spacula lata coeruleis, ultimo rufo,



Kieffer, J.-J. 1898. "Description de deux nouveaux Torymides." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1898, 123–124.

<https://doi.org/10.5962/bhl.part.16845>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/38046>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.16845>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/16845>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.