

Es leben sonach in den beiden Mansfelder Seen  
an Wasser-Conchylien:

43 Species und 17 Varietäten,

an Land-Conchylien wurden in unmittelbarer Nähe der  
Seen beobachtet:

35 Species und 9 Varietäten,

in Summa also

104 Species incl. Varietäten,

ein beredtes Zeugniß für die Reichhaltigkeit der Mollusken  
der Provinz Sachsen und Thüringen an einer so beschränkten  
Localität.

Wie Eingangs schon erwähnt ist bereits ein grosser  
Theil der Seeconchylien zu Grunde gegangen. Das Schick-  
sal des Salzigen Sees ist besiegelt, möge daher vorstehendes  
Verzeichniß ein Wahrzeichen bleiben, da die Fauna des-  
selben schon im nächsten Jahre der Vergangenheit ange-  
hören dürfte.

Schliesslich kann ich nicht umhin, hierdurch sowohl  
Herrn Professor Dr. O. Boettger in Frankfurt a. M., als  
auch Herrn Dr. A. Westerlund in Ronneby, für die Durch-  
sicht einiger kritischer Arten meinen verbindlichsten Dank  
auszusprechen.

Halle a. S. im Oktober 1893.

---

---

**Beschreibung neuer Arten aus der Umgebung des  
Issykkul-See's.**

Von  
S. Clessin.

---

*Buliminus (Chondrulopsis) costatus* m. n. sp.

Gehäuse: rechtsgewunden, tonnenförmig, mit kurzer  
kegelförmiger Spitze, von röthlichbrauner Farbe, mit

scharfen quer über die Umgänge laufenden, sehr hervortretenden weissen Rippen. Umgänge 7, gewölbt, sehr langsam und gleichförmig zunehmend, der letzte etwas aufsteigend, nach unten fast gewinkelt; an demselben drängen sich gegen die Mündung zu die Streifen allmählich näher zusammen, verlieren an ihrer Schärfe und stehen die 3 letzten dicht gedrängt hart vor derselben; Mundsaum scharf, erweitert, nicht umgestülpt, weiss; Mündung eiförmig, ohne Zähne, ca.  $\frac{2}{3}$  der Gehäusehöhe einnehmend.

Höhe 6 mm, Durchm. 3,8 mm.

Fundort: Semiretschye am Tschuflusse, (legit Peter Schmidt Mus. Petersburg).

*Buliminus (Chondrulus) retrodens Mart. v. n. longulus m.*

Gehäuse: fein geritzt; länglich-eiförmig; Umgänge 7, langsam und gleichförmig zunehmend, wenig gewölbt, ziemlich deutlich unregelmässig gestreift; Mündung halb-eiförmig, mit einem Zahn auf der Mündungswand. Die Spindel dick, an derselben nach unten ein kleiner Zahn aufgesetzt.

Höhe 8 mm, Durchm. 3,2 mm.

Fundort: Semiretschye, Kastek (legit. P. Schmidt, Mus. Petersburg).

*Buliminus (Chondrulus) retrodens Mts. v. n. Schmidtii.*

Gehäuse: fein geritzt; Umgänge 7, wenig gewölbt, rascher an Breite zunehmend, fein gestreift, erst gegen die Mündung werden die Streifen stärker und stehen etwas weitläufiger. Mündung verdickt, schwach erweitert; auf der Mündungswand ein kurzer, ziemlich zurückstehender Zahn; Spindelrand verdickt, mehr umgeschlagen.

Höhe 8,5 mm, Durchm. 4 mm.

Fundort: Semiretschye, Kastek. — (legit P. Schmidt, Mus. Petersburg).

Bemerkung. Die bauchige plumpe Varietät stimmt in

der Form des Gehäuses, die schlanke in der Bezahnung mit der typischen Form überein.

*Macrochlamys Schmidtii* n. sp.

Gehäuse flach, Gewinde kaum hervortretend, glänzend, dünnschalig, von horngelber Farbe, nicht genabelt, Umgänge  $5\frac{1}{2}$ , anfangs langsam zunehmend, sehr fein gestreift dann rasch sich erweiternd, durch eine wenig vertiefte Naht getrennt, der letzte fast  $\frac{1}{3}$  des ganzen Gehäusedurchmessers einnehmend; Mund weit; Mundsaum scharf, geradeaus, der obere Rand weit vorgezogen.

Durchm. 15 mm., Höhe 5,3 mm.

Fundort: Ketwiengebirge, in der Nähe von Dorf Podgorny und in der Kapkak-Schlucht (legit P. Schmidt, Mus. Petersburg).

*Caspia Issykkulensis* n. sp.

Gehäuse: kaum geritzt, kegelförmig, aus 6 langsam und gleichmässig zunehmenden, stark gewölbten und durch tiefe Naht getrennten Umgängen bestehend von denen der letzte wenig mehr als  $\frac{1}{3}$  der Gehäuselänge einnimmt. Mündung eiförmig. Mundsaum nicht erweitert, nicht verdickt, zusammenhängend, oben der Anheftestelle der letzten Naht etwas vorgezogen.

Höhe 4,3 mm, Durchm. 2 mm.

Fundort: Im Issykkulsee. (legit P. Schmidt, Mus. Petersburg).

---

**Ein neuer Amphidromus aus Borneo.**

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt a. Main.

---

*Amphidromus martensi* n. sp.

Char. T. magna, sinistrorsa, brevissime rimata, late conico-ovata, solidissima, levissime dense striatula, subopaca,



Clessin, Stephan. 1894. "Beschreibung neuer Arten aus der Umgebung des Issykkul-See's." *Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozologischen Gesellschaft* 26, 64–66.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/53280>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/198750>

**Holding Institution**

Smithsonian Libraries and Archives

**Sponsored by**

Smithsonian

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.