

Tausch - Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Conchylien von Californien und Oregon.		Pteronotus festivus Hds. C.	1,50-2,80
Adula falcata, Gld. Calif.	0,50-1,80	Truncatella californica, Pfr.,	0,20-25
„ stylina. Carp. S. Cruz „	0,40-80	„ Stimpsonii, Stearn „	0,20-25
Corbula luteola, Crp. S. Diego		Katherina tunicata, Crp.	
Calif.	0,50	S. Francisco, „	0,60-1,20
Chione, similima, Sow. „	1,20	Mopalia muscosa, Gld. „	0,50-1
Donax californicus, Conr. „	0,40	„ lignosa Gld. „	1,50-2,50
Machaera patula, Dixon Oreg.	4	Nuttallina scabra, Rve. „	0,60 80
Meya Hemphilli, Newc. Cal.	0,45-70	Tonicella lineata, Wood „	0,50-80
Platyodon cancellatus Conr. „	2,50-3,50	Cerithidea sacrata, Gld. „	0,25-35
Schizothoerur Nutalli, Conr. „	3,50-5,50	Conus californicus, Hds. „	0,75-1,50
Solecurtus californicus „ „	0,60-1,50	<i>Helix</i>	
Bulla nebulosa, Gld. Diego „	0,50	arrosa & maxima, Gld. „	0,55-70
Bittium filiosum „ „	0,50	„ var. Gld. „	0,45-55
„ quadrifilatum Carp. „	0,25	ayresiana, Newc. S. Rosa „	0,70-85
Chlorostoma aureotinctum		californiensis Lea „	0,40-55
Forb. Calif.	0,60-1	„ v. vineta „	0,30-55
„ brunneum Phil. „	0,50-80	columbiana, Lea „	0,30-40
„ funebre, A. Adms. „	0,40-60	„ v. dentata <i>rara</i> „	1,50
„ gallina, Forbes „	0,40-70	Dupetithouarsi, Desh. „	0,30-45
Omphalius Pfeifferi Phil. „	0,45-60	exarata, Pfr. & major. „	0,35-50
Zizyphinus annulat. Martyn „	0,60-1,20	„ v. minor. „	0,35-40
„ canaliculatus, Martyn „	0,80-1	facta, Newc. „	0,45-55
„ costatus, Martyn Monter. „	0,40-50	fidelis, Gray Oreg.	0,50-75
Fusus dirus, Rve. Bobinas „	0,80-1,20	infumata, Gld. Calif.	1-1,40
Mya californica Conr. „	0,40-60	Kelletti, Forbes „	0,40-55
Marginella Jewetti, Charp. „	0,30	loricata, Gld. „	0,25-30
Planorbis opercularis, Gld. „	0,25-35	Nickliniana, Lea, Cal. s. f.	0,40
Lacuna unifasciata Crp. „	0,20-25	Stearnsiana, Gabb. Cal.	0,50-60
Monoceros ergonatum, Conr. „	0,40-65	„ var. Calif. infr.	0,60-80
„ lapilloides. Conr. „	0,35-50	Trioni, Newc. „	0,50-80
Macron lividus, A. Ald. „	0,25-50	Townseniana, Lea Idaho	0,70-90
Nacella incesso, Hds. „	0,35-60	Traskii, Newc. C. Ventura „	0,50-80
Nassa fossata, Gld. „	0,80-1,20	tudiculata, Binn. Calif.	0,50-75
„ tegula, Rve. „	0,40-50	„ var. cypreophila,	
Purpura canaliculata, Ducl. „	0,35-55	Calaferas Calif. <i>rara</i>	1,20
		mormonum, Pfr. „ „	1-1,20

	Mk.		Mk.
yatesii, Cpr. Cal. <i>rarissima</i>	3	havannensis, Pfr., Cuba	0,20
Bridgesii, Newc. Cal.	0,90	lacustris, Müll. Grm., Angl. etc.	0,10
" var. "	0,90	<i>Planorbis</i>	
Pupilla (Pupa) californica, Rowdl. Cal.	0,35	agraulus, Bourgt. Or. alger.	0,20
Zonites Newberryanus, Bin.,	60-1,20	albicans, Pfr. Cuba	0,35
Macrocyclus vancouverensis		albus, Müll. Germ., Angl. etc.	0,10
S. Francisco "	0,50-80	" v. lemniscatus, Hartm.	
" " var. maxima "	1-1,20	Suecia	0,15
Acmaea patina, Esch. Cal.	0,20-30	" vrs. maximus & Shp Angl	0,15
" persona, " "	0,20-30	bicarinatus, Say Mohawk	
" spectrum, Nutt. "	0,20-30	riv. Newyork	0,20
Myurella simplex, Carp. "	0,30-40	campanulatus, Say Boston	0,20
Olivella biplicata, Swby. "	0,20-30	carinatus, Müll. Angl., Car-	
Melampus olivaceus, Cpr. "	0,10-20	niola etc.	0,15
Hyalina inornata, Say		cinerascens, Rssm., Dalmatia	0,20
Mohawk	0,35-45	clathrus, D'Orb. Martinique	0,25
NB. Unter den Californiern ist die Verschiedenheit in der Grösse der Individuen und dem Ansehen derselben oft bedeutender, als dies gewöhnlich der Fall ist. — Zwischen dieser Auswahl befinden sich viele Prachtstücke.		Clessinii, Wstrld. Galicia	0,15
<i>Bulimulus</i>		complanatus, L. (marginatus, Drp.) Germ., Transsylv. etc.	0,10
sepulchralis, Pocy Cuba	0,30-45	complanatus v. pellucidus, Zgl. Hanau	0,15
fraterculus, Fér. Ind. occ.	0,40-55	contortus, L. Germ et Angl.	0,10
? n. sp. In. S. Lorenzo, Peru	0,45	" <i>rara</i> Angl. occid.	0,90
? n. sp. Rio Maranhon,		corneus, L. Germ. & Anglia	0,20
Peru orient.	0,45-60	" var. Transsylv. & Dalm.	0,20
? n. sp. Greytown, Nicaragua	1,20	" var. albinus <i>rara</i> Anglia	0,50
? n. sp. " "	0,40	" var. ferrugineus Silesia	0,20
Helix varians Mke. in 15 var.		" var. minor Transsylv.	0,20
" Eleuthera, Bahamas	0,30-40	deflectus, Say America bor.	0,20
Grayi, Pfr. N. australia	1,50-2	dispar, Westerlund, Suecia	0,15
<i>Ancylus</i>		Dufouri, Graells Algeria	0,25
abyssinicus, Jickeli, Abyss.	0,20	Eupheus, Bourgt. "	0,15-20
capuloides, Jan. Graecia	0,20	fontanus, Lightfoot Germ.	0,10
fluviatilis, Müll., Germania,		glaber, Jeffr. Birmigh. Angl.	0,15
Anglia etc.	0,10	guadalupensis, Sow. Portorico	0,25
" var. albus, Jeffr. Halifax "	0,15	leucostoma, Müll. Germ.	0,15
fragilis Tryon Oregon	0,20	lineatus, Walker Angl. orient.	0,15
		" major. Putney, London	0,20
		lugubris, Wagn. Surinam	0,45

	Mk.		Mk.
microstomus, Blz. Walachia	0,35	<i>Amphipeplea</i>	
nitidus, Müller Germ. etc.	0,10	glutinosa, Müll. Suecia etc.	0,25
occidentalis, Cooper Calif.	0,35	involuta, Harvey Kerry Hib.	0,15-35
opercularis, Gld. Amer. bor.	0,30	<i>Limnaea</i>	
parvus, Say, Boston	0,25	attica, Roth Attica	0,20
riparius, Westerl. Suecia	0,15	auricularia, Drp. Grm. etc. etc.	0,10
rotundatus, Poiret Berlin	0,10	„ v. ampla, Hrtm. „	0,15
similis, Bielz Transsylv.	0,20	„ v. intermedia (transitans	
spirorbis, Müll. Germ., Angl. „	0,10	ad ovata), Mich. Germ. etc.	0,10
„ v. major. Suecia	0,15	caperata, Say Vermont	0,20
trivolvus, Say Mohawk riv.		catascopium, Say Erie Canal	
New-York	0,22-25	New-York	0,20
vermiculatus, Gould Calif.	0,15	cubensis, Pfr. Cuba	0,20-25
Villae, Adami Italia s.	0,15	elodes, Say Na. Scotia	0,20
vortex, L. Germ., Angl. etc.	0,10	elongata, Drp. Angl. & Norveg.	0,20
<i>Physa</i> .		fragilis, L. (?stagnalis var.)	
acuta, Drap. Anglia	0,20	Germania	0,15
auriculata, Gassies N. Caled.	0,25	fusca, C. Pf. Transsylv.	0,10
cernica, Morel. Mauritius	0,15	gracilis, Say Ohio	0,30-45
convoluta, Parr. Pazo	0,20	longula, Küstr. Bangalore	
costata, Newc. Lac clear, Cal.	0,50	Mysore	0,30
cubensis, Pfr. Cuba	0,35	mauritiana, Morel., Mauriti.	0,20
distinguenda, Coop. Oregon	0,15	minuta, Drp. Germ. Trans-	
fontinalis, L. Germ., Angl. etc.	0,10	sylv. etc.	0,10-15
gyrina, Say Amer. bor.	0,20	obrussa, Say Amer. bor.	0,20
„ var. Hildrethiana, Lea		opaca, Zgl. Hanau, Hassia	0,10
Illinois	0,25	ovata, Drp. lac Boden & Angl.	0,10-15
guadalupensis, Fischer, Guad.	0,25	palustris, Müll. & var. major.	
heterostropha, Say, N.-York.	0,20	Germ. etc.	0,10-15
„ var. Nova Scotia	0,20	„ v. conica, Jeffr. Hammer-	
hypnorum, L. Germ., Angl. etc	0,10	smith, London	0,15
malleata, Coop. Idaho,		„ v. corva, Gmel. Cheshire	0,15
Amer. bor.	0,25	„ v. decollata, Birmingham	0,15
parvula, Mouss., Ins. Viti	0,25	„ v. elongata, Transsylv.	0,15
Sowerbyana, D'Orb. Jamaica	0,25	„ v. fusca, C. Pfr. Cassel	0,10
varicosa, Gassies Na. Caled.	0,30	peregra, Drp. & varietates	
Isidora contorta, Mich.		multae Germ., Norv.,	
Algeria & Transsilv.	0,80	Anglia etc. etc.	0,10
Forskalli, Ehrenberg. Abyss.	0,25	reflexa, Say Illinois u. Indiana	0,20
sericina, Jickeli „	0,30	rosea, v. Gallenstein Carinthia	0,15

	Mk.		Mk.
stagnalis L. Austria, German.		obliqua v. major. New-York	0,30
Hungaria, Norvegia, Suecia		oblonga, Drp. Germ. Hung. etc	0,15
Transsylv. etc.	0,15-25	ochracina, Gundl. Cuba	0,35
stagnalis v. bodanica, Cless.		oregonensis, Lea Idaho,	
lacus Boden	0,25-30	Amer. bor.	0,35
„ v. bottnica, Cless. Suecia	0,20	ovalis, Gld. (non Say) Illinois	0,30
„ v. fragilis, J. West.		Pfeifferi, Rsm. Germ., Angl. etc	0,10
Bromwich Angl. ?	0,20	pleuraulacea, Letourneux Alg.	0,20
„ v. quadrata, aqua calida		putamen, Gld. Ins. Samoa	0,40
Cheshire	0,50	putris L. & vars. Germ. etc.	0,10
truncatula, Müll. Anglia etc.	0,10	rufovirens, Morion Brasilia	0,35
thermalis, Zgl. Carniolia	0,15	rusticans, Gld. Nevada	0,30
tumida, Held Carinthia	0,20	sagra, D'Orb. Cuba	0,35
umbrosa, Say Vermont	0,25	Sillimani, Blnd. Calif.	0,40
Vahlia, Beck Grönland	0,20	semiserica, Gld. Rangoon	0,35
vulgaris, Rsm. Transsylv. etc	0,15	societatis? Ins. Raiatea	0,35
<i>Succinea</i>		<i>Amphibulina</i>	
avara, Say Ohio vera. teste		patula, Brug. S. Kitts	0,90
Bland & Binney	0,35	<i>Simpulopsis</i>	
avara v. minor Maine	0,20	rufovirens, Moricand Brasil.	0,65-80
„ v. Wardiana, Lea.		obtusa, Sowerby „	0,90
teste Binney	0,30	<i>Amphibola</i>	
approximans, Shuttl. Trinidad	0,35	avellana, Chm. Na. Seeland	0,70-95
aurea, Lea. Staten Isl. N.-Y.	0,35	<i>Marisa</i>	
campestris, Say Flor. & Carol.	0,35	cornu arietis, L. I. Trinid.	0,35-50
„ v. inflata, Lea Georgia	0,35	„ var. fasciata „	0,25-40
„ v. Augustin Florida	0,35	<i>Lanistes</i>	
candea, Lea Guadel.	0,35	carinatus, Olivi, Alexandria	0,75
costata, Newc. Calif.	0,45	ovum, Peters Mozambique	1,25
crocata, Gould Ins. Samoa	0,35	purpurea, Jonas „	0,85-1
elegans, Risso v. debilis,		<i>Valvata</i>	
Morel. Algeria	0,25	californiensis, Mouss. Calif.	0,30
elegans v. longiscata, Morel.		contorta, Mnke. Berlin ?	0,25
Algeria	0,25	cristata, Müll. Germ. & Angl.	0,10
grönlandica, Beck Grönland	0,45	macrostoma, Steenstr. Berlin	0,25
gundlachi, Pfr. Cuba	0,35	„ „ Grönl.	0,35
labiata, Pease Ins. Raiatia	0,40	piscinalis, Müll. Germ. & Angl.	0,10
Nuttalliana, Lea. Calif.	0,30	tricarinata, Say Mohawk r.	
obliqua, Say Massachusetts	0,25	New-York	0,15

	Mk.		Mk.
spirorbis, Drp. (cristata var.)		ventrosa v. elongata Guernsey	0,10
Hanau	0,15	? sp. St. Jean, Ind. occid.	0,10
<i>Bithynia</i>		anatina, Poiret Bretagne	0,10
muricata, Drp. Albania	0,10-15	australis, D'Orb. Brasilia	0,10-25
obtusa, Lea Erie Canal	0,10-15	baltica, Nilss. vars. de Gallia	
Orsinii, Chrp. Lepante Graecia	0,15	& Occ. germ.	0,10*
proxima, Erfeld. Hungaria	0,10-15	consociella, Frnfd. fl. solona	
scalaris, Zgl. Carniolia	0,10	Dalmatia	0,10*
tentaculata, L. & vars. Germ.,		ferruginea, Mnke. Sardinia	0,10
Anglia etc.	0,10-30*	Kutschigi, Küster Dalmat.	0,10
Troscheli, Paasch Potsdm. etc	0,10	lapidaria, Say Ohio	0,25
sp.? nova? Sicilia	0,10-20*	muricata, Lam. Albano	0,10
bulimoides, Olivi Nil	0,25	Reissii, Phil. Na. Hollandia	0,25
Leachii, Gray Antwerpen	0,15	Succinea, Pfr. Cuba	0,15
similis, Mich. Rostock	0,10	<i>Peringia</i>	
rubens, Mnke. Sicilia	0,10	pictorum, Palad. Bayonne	0,10*
<i>Hydrobia</i>		<i>Dolichia</i>	
acuta, Drp. Montpellier	0,10*	Maresi, Bourgt. Algeria	0,20
„ v. dubia Erie Canal N.-Y.	0,10*	<i>Amnicola</i>	
baltica, Nilss. litus Olden-		anatina, Poir. Montpellier etc.	0,15*
burgi, Holstein	0,10*	Auberiana, D'Orb. Cuba	0,20
Brondeli, Bourgt. Tenes., Alg.	0,10	candeara „ Jamaica	0,15
elachista, „ Constantine „	0,10	conovula, Parr. Pago, Dalm.	0,15*
gagatinella, Prr. Pago Dalmat	0,15*	coronata, Pfr. Cuba	0,20
nana, Tervor Algeria	0,10	Dupotetiana, Forbes Alger.	0,10
oranensis, Brgt. & var. Oran,		limosa, Say (porata Adms.)	
Algeria	0,15*	Nova Scotia	0,20
similis, Drp. fossis Thamesia		macrostoma, (Nilss.) Küster	
Kent	0,30	Attica	0,10
„ var. albida fossis Tha-		miliaris, Parr. Dalmatia	0,10
mesia Tilbury rara	0,50	pallida, Haldem Erie Canal,	
stagnalis, Basterot, Spikeroog		New-York	0,10
Oc. germ.	0,10	porata, Say (Gld.) Amer. bor.	0,15
thermalis, L. Pisano Italien	0,10*	tritunum, Bourgt. Morea	0,15
ulvae, Penn. & varietates		? sp. Cardenas, Cuba	0,15
Anglia etc.	0,10*	? sp. Insulae Viti	0,20
ventrosa, Montg. Anglia etc.	0,10*	<i>Paludinella</i>	
„ v. baltica Wiesmar	0,10*	aculea, Say (Gould) Boston	0,15

	Mk.		Mk.
austriaca, Frfld. Silesia	0,12*	Sturmii, Rosenh. (? amnicola	
brevis, Mich. Graecia	0,10	St.) Andalusia	0,15
Charpentieri, Roth Arcadia	0,15	viridis, Drp. Gallia australis	0,15*
Conradiella? Carniolia	0,15*	<i>Lithoglyphus</i>	
cyclolabris, Rssm. Chrp. „	0,15*	conovulus, Parr. Dalmatia	0,10
cyclostomoides, Neymair,		fluminensis, Lang Carniolia	0,10
Dalmatia	0,15	naticoides, Fér. v. tener	
Dunkeri, Frfld. Biedenkopf,		M. Bielz Banat	0,10
Hassia	0,10*	pannonicus, Frfld. Hungaria	0,10
fontinalis, Kokeil. Carinthia	0,10	pygmaeus „ Dalmatia	0,10
Lacheineri, Chrp. Castel-		<i>Somatagyryus</i>	
goffredo, Mantua	0,10*	integer, Say fluv. Ohio	0,15
„ v. alpestris, Villa Styria	0,10	subglobosus, Say Erie Canal	0,15
lata, Frfld. „	0,10*	<i>Emmericia</i>	
minutissima, Schm Carniolia	0,15*	patula, Brumati (= expansi-	
muricata, Nilss. Padua	0,15*	labris, Mühlf.) fluvius	
opaca, Zgl. Carinthia	0,15*	Salona Dalmatia	0,20-25
Parreyssi, Pfr. Cuba	0,20	patula vars. de Carniola &	
psittacina, Schmidt, Carniol.	0,10	Turcia	0,20-25
Schmidtii, Charp. „	0,10*	* Für je 2 Stück.	

Mittheilung.

Da ich eine grössere wissenschaftliche Sammelreise anzutreten gedanke, wodurch meine Rückkunft ungewiss werden dürfte, so habe ich den Tauschverein abgetreten. Derselbe wird unter der Adresse

Linnaea, Brönnerstrasse 30 II., Frankfurt a. M.

ohne Unterbrechung fortgeführt, wohin Tauschanträge und Bestellungen künftig zu richten sind. Ich danke allen geschätzten Mitgliedern für das mir während meiner 4½jährigen Führung des Tauschvereins geschenkte Zutrauen, und werde mir erlauben, gelegentliche Mittheilungen über meine Forschungen im Nachrichtenblatt zu machen.

Hochachtungsvoll

T. A. Verkrüzen.

Bezugnehmend auf obige Mittheilung bittet die ***Linnaea*** um recht zahlreiche Aufträge. Besonders erwünscht sind Offerten von Mollusken von sicheren Fundorten zum Tausch oder Ankauf.



Verkrüzen, T. A. 1879. "Tausch-Catalog." *Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft* 11, 99–104.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/97143>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/199192>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.