

Zur Heteropteren-Fauna Ceylon's.

Von

Anton Dohrn.

Durch mehrfache directe Sendungen aus Ceylon, theils von Herrn J. Nietner, theils von Herrn Cuming herstammend, habe ich ein ziemlich ansehnliches Material von Heteropteren dieser Insel in meiner Sammlung vereinigt. Ich will nachstehend versuchen, eine systematische Uebersicht dieses Materials mit Diagnosen der von mir für neu gehaltenen Arten zu geben, da es wahrscheinlich noch einer Reihe solcher Vorarbeiten bedarf, ehe es möglich sein wird, mit Erfolg an eine einigermaßen vollständige Monographie der Heteropteren dieser entomisch so reichbedachten Insel zu denken.

1. *Cantao ocellatus* Thunbg. *Germ. Zeitschr.* I. 123. 1.
2. *Scutellera nobilis* Fabr. *Germ. Zeit.* 124. 2.
3. *Callidea superba* Dall. *List* 23. 6.
4. *Callidea Erichsoni* Germ. *Zeit.* 113. 5.
5. *Callidea patricia* Fabr. *Syst. Rhyng.* 131.
6. *Hotea curculionoides* H.-Sch. *Wanz. Ins.* III. 106. tab. 107. fig. 331.
7. *Podops obscurus* Dall. *List* 52. 4.
8. *Coptosoma laticeps* Dall. *List* 68. 19.
9. *Coptosoma ceylonicum* n. sp.
C. convexum, flavo-testaceum, nitidum, fusco-punctatum; capite nigro, macula ancoriformi flavo-testacea; thorace lateribus dilatatis, dimidio antico linea longitudinali media, angulis anticis macula obliqua, aliaque in margine laterali, dimidio postico fusco-punctato, scutello margine angustissime nigro, linea media nigra, fasciam basalem testaceam intercludente; subtus nigrum, lateribus abdominis flavis, nigro-maculatis; pedibus antennisque flavo-testaceis; rostro fulvo; femoribus fulvo-punctatis. — $4\frac{1}{2}$ millim. —
10. *Coptosoma cribrarium* Fabr. *Germ. Zeitschr.* 26. 3.
11. *Coptosoma atomarium* Germ. *Zeitschr.* 27. 6.

12. *Coptosoma nobile* n. sp.

C. fuscum, metallice nitens, punctatum; capite maculis 3 flavis; oculis rufis; thorace margine laterali et antico, linea transversa interrupta sub marginem anticum maculaque subhumerali flavis; scutello basi maculis 2 ocellatis flavis, parte maxima postica flava punctis vel maculis fuscis; pectore opaco, abdomine fusco, nitido, marginibus, pedibus antennisque flavis. — $3\frac{1}{2}$ millim. —

13. *Brachyplatys septus* Germ. *Zeitschr.* 32. 19.14. *Brachyplatys Vahlii* Fabr. *Germ. Zeitschr.* 33. 23.15. *Aethus oblongus* Ramb. *Faun. de l'Andal.* 115. 7.16. *Aethus scutellatus* n. sp.

A. niger, nitidus, punctatus; capitis, thoracisque marginibus reflexis, pilosis; hoc convexo, sparsim punctato, lateribus leniter oblique impresso; scutello marginibus lineato-punctatis, disco vix punctato; elytris dense punctatis; membrana fusca; abdomine subtus nitido, lateribus punctato; rostro, antennis tarsisque fulvis. — 7 millim. —

17. *Aethus cyrtomenoides* n. sp.

A. ovatus, piceus, nitidus; capite margine reflexo, dilutiore, piloso; thorace margine antico pone oculos utrinque impresso, medio in mare leniter foveato, lateribus dimidioque postico (margine excepto) punctulato, hoc castaneo; scutello punctato, basi glabro, marginibus profundius punctatis; elytris castaneis; dense punctatis; membrana albida; subtus castaneo-piceus, nitidus; abdomine laevi, lateribus passim punctatis, pedibus castaneis, tarsis, rostro antennisque fulvo-flavis. — 4 millim. —

18. *Agonoscelis nubila* Fabr. *Hahn Wanz. Ins.* III. 29. tab. 82. fig. 251.19. *Erthesina fullo* Thunbg. *Wanz. Ins.* VII. 60.20. *Eusarcoris punctigerus* Thunbg. *Nov. Ins. Sp.* 32. tab. 2. fig. 47.21. *Eusarcoris* ? *dubius* Dallas. *Cat. of Hem.* 227. 7. (differt rostro non modo apice sed linea media longitudinali artic. ultimi et paenultimi nigro.)22. *Pentatoma trivialis* n. sp.

P. ovata, dilute fusca, nitida, punctatissima; capitis lobo medio dimidio apicali, lobis lateralibus margine densius punctatis; thorace antice obscuriore, maculis nonnullis impunctatis, postice strigis nonnullis

densius punctatis; scutello elytrisque punctatissimis, illius basi maculis 2 impunctatis; membrana fusco-maculata; subtus pallida; capitis pectorisque lateribus grosse, abdominis minus grosse punctatis; pedibus pallidis nigro-variegatis; rostro apice nigro, linea media fusca; antennis pallidis, articulo 1 nigro-punctato, ceteris fuscescentibus. — 15—18 millim. —

23. *Pentatoma fimbriata* Fabr. *H.-Sch. Wanz. Ins. V* 63. *tab. 164. fig. 505.*

24. *Pentatoma cruciata* Fabr. *H.-Sch. Wanz. Ins. V* 63. *tab. 164. fig. 506.*

25. *Pentatoma lemur* n. sp.

P. dilute viridis, paene decolor, dense punctata; thoracis elytrorumque margine laterali tenuissime flavo, elytris nonnihil virescentibus; membrana vitrea; abdomine subtus margine nebulis nonnullis nigrescentibus, pedibus antennis rostroque fuscescentibus. — 7—8 millim. —

26. *Catacanthus incarnatus* Drury. *Burm. Handb. II* 365. 1.

27. *Rhaphigaster prasinus* Linné et var. *torquatus* Fabr. et var. *viridulus* Linné. *Dallas Cat. of Hem.* 274.

28. *Rhaphigaster dorsalis* n. sp.

R. ovatus, lacte viridis, punctatus; humeris obtusis, prominulis, flavescentibus; scutelli apice flavescente; alarum margine externo totoque tergo sanguineo, hujus margine dilute virescente; subtus plane impunctatus, abdomine absque spina ventrali atque carina, disco abdominis nec non pectoris flavescente, pedibus viridibus, tibiis tarsisque apice fuscis; antennis flavescentibus artic. 3, 4, 5 apice rufescentibus; rostro flavescente, apice nigro. — 12—14 mill.

(In collectionibus versatur sub nomine: *punctatus* Sign. i. l.)

29. *Rhaphigaster flavolineatus* Hope. *Catal.* 31. et ejusdem varietas, cujus fascia thoracis et margines capitis, thoracis, abdominis elytrorumque sunt sanguinei.

30. *Rhaphigaster concinnus* Dallas. *List of Hem.* 285. 34.

31. *Tessaratomy cuprea* Hope. *Catal.* 27.

32. *Aspongobus Janus* Fabr. *H.-Sch. Wanz. Ins. VII* 78. *tab. 240. fig. 747.*

33. *Aspongobus siccifolius* Hope. *Catal.* 26.

34. *Placosternum taurus* Fabr. *Syst. Rhyng.* 145. 1.

35. *Dalader acuticosta* Am. & Serv. *Hem.* 188. 1. *pl. 4. fig. 7.*

36. *Mictis castanea* Dallas *List of Hem.* 389. 14.

37. *Mictis calcar* Dallas *List of Hem.* 397. 33.
38. *Physomerus grossipes* Fabr. *Burm. Handb.* II. 341. 1.
39. *Plinachthus* (Stål mss.) *acicularis* Fabr. *Syst. Rhynq.* 251. 14.
40. *Homoeocerus marginiventris* n. sp.
H. fulvo-testaceus, fusco-punctatus; thorace scutelloque linea media impunctata, thorace strigis nonnullis dilutioribus; subtus pectore grosse punctato; abdomine subtilissime verrucoso, nigro-fuscoque nebuloso, margine nigro-maculato; pedibus rostroque fulvo-testaceis, antennarum artic. 1 fulvo, apice et articulo 2 fusco, 3 fulvo, 4 aurantiaco. — $12\frac{1}{2}$ millim. —
41. *Anisoscelis orientalis* Dallas. *Burm. Handb.* II. 332. 3.
42. *Serinetha Dallasi* n. sp.
S. fuscescenti-rufa, grosse punctata; capite rufo, margine fusco-piloso, oculis et ocellis sanguineis, thorace margine antico calloso, transverse impresso, linea media elevata, postice fuscescente; membrana nigra; subtus obsolete fuscescente-rufa pedibus antennisque (articuli 1 basi excepta) nigro-fuscis, rostro nigro medium 3 segmentum attingente. — 12—15 millim. —
43. *Alydus clavatus* n. sp.
A. dilute castaneo-fulvus, opacus, ruguloso-punctatus; thorace humeris spinosis; capite pectoreque subtus nigris nitidis, lateribus ab apice capitis usque ad anum vitta lata albido-flava, in capite et thorace nigro-marginata; abdomine subtus nitido, castaneo, basi albido-flavo-maculato; pedibus antennisque castaneo-fulvis, femoribus posticis incrassatis, spinosis; tibiis posticis curvatis; rostro castaneo, supra nigro. — 11 millim.
44. *Alydus major* n. sp.
A. dilute fuscus; capite fulvo, margine fuscescente, ocellis flavis, nigro-circumdatis; thorace granulato, ruguloso, humeris spinosis, margine postico nigro; scutello nigro-fusco, apice flavo; abdomine supra fulvo, flavo-nigroque vario, margine fusco, flavo-maculato; subtus griseo-tomentosus, capite strigis 3 nigris; pectore medio nigrescente; abdomine basi flavo-variegato, segmento 3 disco nigro, marginibus et ceteris segmentis nigro-guttulatis; antennis fuscis articulo ultimo basi flavo; pedibus fuscis, femoribus posticis incrassatis, spinosis, tibiis posticis curvatis; rostro fusco. — 17 millim. —

45. *Leptocorisa maculiventris* Dallas *List of Hem.* 484. 6.

46. *Cletus bistillatus* n. sp.

C. testaceus, fusco-punctatus; capitis margine, thoracisque parte antica minus dense et obscure punctatis, humeris acutis, a spinis usque ad marginem posticum crenulatis, corio ad apicem rubescente ad marginem internum maculo albido; membrana pallida; dorso flavo, interdum nigro maculis 3, margine et apice flavis; subtus cum pedibus, antennis rostroque virescenti-flavidis, in thorace et abdomine utrimque serie singulorum punctorum nigrorum. — 8 millim.

(In collectionibus versatur sub nomine: *Gonocerus vari-notus mihi i. l.*)

47. *Cletus elongatus* n. sp.

C. elongatus, rufescente fulvus, fusco-punctatus, humeris acutissimis, fuscis; subtus flavo-testaceus seriebus 2 punctorum nigrorum; pedibus antennisque rufescente-fulvis. — 9 millim. —

48. *Clavigralla horrens* n. sp.

C. fulvo-testacea, granulata; capite thoraceque villosis, hoc disco gibbose elevato, humeris acutissimis, spinis nigris, margine postico pone spinas serrulato, supra scutellum spinis 2 flavis armato; scutello gibboso, apice flavo; elytris flavidis, fusco-punctatis, apice fuscis; membrana fusco-hyalina, cupreo-micante; subtus fusco-flavidoque vario, pectore fulvo lateribus flavo-liturato; abdominis margine 3-spinoso, fulvo-flavoque maculato; pedibus flavo-testaceis, fulvo-annulatis, femoribus posticis apice fulvis, flavo-guttatis; tibiis posticis basi curvatis; antennis rostroque fulvo-testaceis, hoc apice fusco. — 7 millim. —

49. *Clavigralla concolor* n. sp.

C. rufo-fulva, fusco-punctata; thorace antice griseo-villoso, humeris acutis, spinis nonnihil in frontem directis, margine laterali thoracis bidentato; membrana pallida; abdominis margine 3-spinoso; subtus griseo-flavo-tomentosa. — 7 millim. —

50. *Corizus rubicundus* Sign. *Ann. Soc. ent. France* III. série. tom. VII. 86. 15.

51. *Lygaeus militaris* Fabr. *H.-Sch. Wanz. Ins.* IX. 198.

52. *Lygaeus hospes* Fabr. *Ent. syst.* IV. 150. 50.

53. *Lygaeus argentatus* Fabr. *Syst. Rhyng.* 228. 120.

54. *Lygaeus incomptus* H.-Sch. *Wanz. Ins.* VIII. 104. fig. 875.

55. *Lygaeus maculatus* Dall. *List of Hem.* 545. 42.

56. *Rhyparochromus singalensis* n. sp.

R. niger, opacus, fusco-pilosus; capite thorace scutelloque nigris, thoracis margine laterali antico elytrisque fuscis, his basi clavi vittaque obsoleta post scutellum, apiceque nigris, macula ante apicem fuscescente-alba; membrana nigra, apice albida; subtus niger, tarsis fuscis. — $6\frac{1}{2}$ millim. —

57. *Rhyparochromus* ? *crassiceps* n. sp.

R. ? dilute fuscescens, opacus; capite magno nigro, oculis pallidis; thorace dimidio antico nigro, marginibus et dimidio postico fuscescentibus, hoc obscure maculato et plagiato; scutello nigro; elytris dilute fuscescentibus, juxta nervos utrimque serie punctorum fuscorum, inter nervos maculis dilutioribus, aliis praesertim ad apicem fuscis; membrana hyalina, fusco-nervosa; subtus nigro-fuscus, nitidus, antice punctatus; pedibus, antennis rostroque flavidis. — $4\frac{1}{2}$ mill.

58. *Plociomerus discoguttatus* n. sp.

P. niger, opacus; capite vix perspicue aciculato, oculis ocellisque fuscis; thorace antice nigro, postice punctato, fuscescente, guttis 4 fulvis, 2 in margine laterali, 2 in disco; elytris albidis, clavo maculaque baseos fuscescentibus, apice fasciaque discoidali irregulari interrupta fuscis; membrana pallida, fusco-nebulosa; subtus cum rostro femoribus anticis, ceterisque apice nigris; tibiis, femoribus mediis posticisque basi fuscis; antennis fuscis; articulo ultimo basi flavido. — $6\frac{1}{2}$ millim. —

59. *Plociomerus undulatus* n. sp.

P. nigro-fuscus, opacus; capite aciculato, oculis pallidis; thorace postice punctato, fusco, nigro-maculato; scutello grosse punctato, nigro, apice pallido; elytris pallide fuscis, fusco-punctatis, margine laterali basali, maculaque prope commissuram dilutioribus, apice, vitta prope clavum maculaque marginis fuscis; membrana pallida, fusco-undulata ac nebulosa; pedibus, rostro, antennisque sordide testaceis, femoribus anticis fuscis, nitidis, apice testaceis. — 6 millim. —

60. *Plociomerus Nietneri* n. sp.

P. niger, opacus; capite vix perspicue aciculato, oculis pallidis; thorace nitido, postice punctato, margine postico fuscescente; elytris fuscis, punctatis, margine laterali albido, maculis 2 prope marginem, una majore prope apicem albidis; pedibus sordide testaceis,

femoribus anticis fere totis nigris, nitidis, mediis posticisque apice modo nigris; rostro antennisque fuscescentibus. — $6\frac{1}{2}$ millim. —

61. *Dieuches punctipes* n. sp.

D. niger, opacus; capite macula parva lobi medii, 2 baseos sordide fulvis, oculis dilute fuscis, thorace antice nigro, margine laterali, punctis 2 antici totoque dimidio postico sordide fulvo-testaceis, hoc grosse nigro-punctato, interdum nigrescente; scutello nigro, maculis 2 fulvo-testaceis; elytris fulvo-testaceis fusco-punctatis, parte interiore nigro-fuscescente, macula prope apicem albido-testacea; membrana fusca, maculis parvis prope basin, unaque prope apicem albidis; subtus niger; pedibus, antennis, rostro maculis 3 marginis abdominis fulvo-testaceis; femoribus subtus punctis singulis nigris, apice fuscescentibus; antennarum articulo ultimo apice fusco. — $8\frac{1}{2}$ millim. —

62. *Dieuches femoralis* n. sp.

D. praecedenti affinis, differt femoribus anticis posticisque apice late nigris, rostri articulis 1 et 3 nigris. (antennae desunt). — 9 millim. —

63. *Geocoris marginicollis* n. sp.

G. chalybeo-niger, nitidus; capite ochraceo, oculis fuscis thoracis margine laterali pedibusque ochraceis; elytris pallidis, fusco-punctatis; membrana hyalina, litura fusca; antennis nigris, articulo ultimo ochraceo. — $4\frac{1}{2}$ millim. —

64. *Odontopus varicornis* Fabr. *Ent. syst.* IV. 151. 55.

65. *Dysdercus lineatipes* Sign. mss. n. sp.

D. niger, supra opacus; capite nitido; thorace margine laterali rubro, angustissime nitido; elytris rubris; clavo, apice, macula magna, fere fasciam efficiente, membranaque nigris; subtus nitidus, pectore nigro, margine sanguineo; abdomine sanguineo, maculis 5 utrimque nigris; pedibus nigris, lineis testaceis praesertim femorum, femoribus anticis dentatis; antennis nigris, articulo ultimo fuscescente, basi flavido, rostro coxas intermedias attingente, nigro-piceo. — 21 mill.

66. *Dysdercus fulvomarginatus* n. sp.

D. fulvescente-fuscus, holosericeus; capite nigro, opaco, basi indistincte fulvo-guttato; thorace margine laterali posticoque aurantiaco-fulvo; elytris aurantiaco-fulvo-marginatis; abdomine subtus aurantiaco-fulvo, segmentis singulis basi nigris, segmento ultimo ni-

grescente; pectore nigro, margine prothoracis postico et laterali maculaque supra coxas posticas aurantiacofulvis; pedibus antennisque nigris, holosericeis; rostro abdominis dimidium fere attingente, articulo ultimo fulvescente. — 19 millim. —

67. *Dysdercus Koenigi* Fabr. *Syst. Rhynq.* 222. 84.

68. *Pachypeltis singalensis* Dohrn mss.

69. *Deraeocoris fuscescens* Dohrn mss.

70. *Monanthia rarissima* Dohrn mss.

71. *Crimia nigra* Sign. mss.

C. nigra, granulata; capitis lobo medio apice integro, oculis fuscis; thorace margine postico acute sinuato; abdomine, pedibus rostroque nigrofuscis, antennis nigris articulo ultimo apice castaneo. — $10\frac{1}{2}$ millim.

72. *Diplodus melanophthalmus* Dohrn mss.

73. *Diplodus armiger* Dohrn mss.

74. *Sinea hoplites* n. sp.

S. sordide fusca; capite longiore, spinis 6 armato; thorace antice tuberculoso, spinis 4 armato, postice humeris spinosis; scutello flavido; membrana cupreo-fusca; abdomine subtus fulvo, flavo-rufoque-vario, linea media fusca; femoribus anticis nodosis, supra spinis 1 majore, 1 minore, subtus spinis 6 armatis; antennarum artic. 1 sanguineo, apice fusco, ceteris rufis, pilosis; rostro nitido, fulvo, subtus fusco. — 11 millim. —

75. *Sinea javanensis* Am. & Serv. *Hém.* 376. 2.

76. *Sinea peltastes* n. sp.

S. dilute rufo-fulva; capite brevior, supra postice nigro-fusco, spinis 6 armatis, harum mediis maximis; thorace antice 4 spinoso, humeris acutiusculis; membrana cupreo-fusca; femoribus anticis nodosis, supra unispinosis, subtus 8-spinosis; pectore subtus dilute nigrescente-maculato; antennis fulvis, nitidis; rostro testaceo, nitido. — 9 millim. —

77. *Cutocoris gilvus* Burm. *Ent. Trans. vol. II. pars II.* 104. 1.

78. *Camptopoda* (Dohrn mss.) *trochanterica* Dohrn mss.

79. *Reduvius* (Harpactor Lap.) *nigro-ruber* n. sp.

R. laete coccineus, nitidus; capite, membrana, pedibus (coxis exceptis) segmento ultimo abdominis, antennis rostroque nigris, nitidis. — 10 millim. —

80. *Reduvius* (Harpactor Lap.) *sordidipennis* n. sp.

R. dilute sordidus; capite nigro, nitido, subtus dilute

sordido; thorace antice rufo, postice griseo-castaneo; scutello nigro; elytris sordidis, apice infuscatis; abdomine subtus dilute sordido flavo; pedibus nigris. pilosis, nitidis, femoribus fusco-annulatis; antennis rostroque fulvis, nitidis. — 8 millim. —

81. *Sycanus reclinatus* Dohrn *Ent. Zeit. tom. XX. 98. 5.*
82. *Sycanus collaris* Fabr. *Ent. Zeit. tom. XX. 98. 6.*
83. *Loplocephala Guérini* Lap. *Am. & Serv. Hém. 386. 1.*
84. *Lenaeus pyrrhus* Stål *Öfv. af K. Vet. Akad. Förh. 1859. pag. 187.*
85. *Acanthaspis tergemina* Burm. *Handb. II. 233. 2.*
86. *Acanthaspis bistillata* Stål *Öfv. af K. Vet.-Akad. 1859. 188.*
87. *Acanthaspis angularis* Stål *Öfv. af K. Vet.-Akad. 1859. 188. 10.*
88. *Acanthaspis 5-spinosa* Fabr. *Ent. syst. IV. 206. 47.*
89. *Acanthaspis fusconigra* n. sp.
A. dilute fusca; capite thoraceque nigro-signata, humeris acute spinosis; elytris margine interno membranaque obscure fuscis; subtus nigrofusca, pilosa; abdomine carinato, margine dilute fusco-testaceo-maculato; pedibus dilute testaceo-fuscis, femoribus fusco-strigatis, tibiis fusco-annulatis; antennis dilute fusco-testaceis; rostro fusco, basi apiceque dilute testaceo. — 11 millim. —
90. *Conorhinus rubrofasciatus* Deg. *Am. & Serv. Hém. 384. 1.*
91. *Petalocheirus brachialis* Stål *Öfv. af K. Vet.-Akad. Förh. 1859. 191.*
92. *Canthesancus trimaculatus* Am. & Serv. *Hém. 389. 1.*
93. *Dipaltus* (Dohrn mss.) *nabiformis* Dohrn mss.
94. *Prostemma carduelis* Dohrn *Ent. Zeit. tom. XIX. pag. 229. tab. I. fig. 8.*
95. *Rasahus Cumingi* n. sp.
R. nigro-fuscus; capite fulvo-testaceo, nitido, lateribus ante oculos nigro-vittatis; thorace nitido, supra antice fusco, nigro-vario, subtus nigro; postice nigro; elytris nigrofuscis, basi flavo-testaceis, prope clavum nigro-maculatis; membrana nigro-fusca, apice flavo-testacea; abdominis margine flavo-testaceo, nigro-maculato; pedibus rostroque flavo-testaceis; antennis testaceis, artic. 2 basique articuli 3 fuscis. — 17—22 millim. —
96. *Peirates biguttatus* n. sp.
P. niger, argenteo-pilosus; oculis fuscis, ocellis fulvis;
27*

thorace antice nigro, postice corioque rufo-fulvis hoc basi apiceque infuscato; membrana nigra, basi et disco alboguttata; abdominis margine flavido-maculato, pedibus basi tibiisque anticis apice flavidis. — $9\frac{1}{2}$ mill.

97. *Peirates singalensis* n. sp.

P. niger; elytris clavo maculaque cum clavo confluenta, macula basali et apicali membranae, abdominis margine, pedibus, rostro antennisque flavo-testaceis; femoribus apice anguste dilute fuscis. — $12\frac{1}{2}$ millim.

98. *Peirates fuscicornis* n. sp.

P. fusco-niger; membrana macula basali flavo-testacea; abdominis margine flavo-testaceo-maculato; coxis apice, femoribus mediis posticisque tibiis tarsisque omnibus flavo-testaceis; rostro nigro, articulo 2 et 3 nitidis, 3 fuscescente; antennis dilute fuscis. — 13 millim. —

99. *Larymna pilicornis* Fabr. *Syst. Rhyng.* 272. 32.

100. *Emesa Henrici* Dohrn *Linn. entom.* XIV. 218. 1.

101. *Emesa invisibilis* Dohrn *Linn. entom.* XIV. 219. 2.

102. *Gardena melinarthrum* Dohrn *Linn. entom.* XIV. 214. 1.

103. *Halobates Ståli* n. sp.

H. supra niger, opacus; capite sordide flavo-testaceo, macula magna media, 3 anticis minoribus nigris, oculis fusco-fulvis, nigro-maculatis; thorace antice maculis 2 semi-circularibus, postice 2 mediis parallelis longitudinalibus, 1 utrimque uti comma figurata aliaque utrimque transversali, semicirculari tertia utrimque minore apice disci, tunc in parte prope insertionem pedum una transversali, 2 longitudinalibus, 3 apicalibus, minoribus flavo-testaceis; subtus cum lateribus flavo-testaceis, his longitudinaliter nigro-strigatis, macula supra coxas anticis, lineisque 3 plus minusve latis femorum anticorum nigris; antennis, pedibusque mediis posticisque nec non tibiis anticis nigrescentibus; rostro flavo-testaceo, apice nigro. — 7 millim. —

104. *Ptilomera laticauda* Hardw. *Am. & Serv. Hém.* 414. 1. pl. 8. fig. 3.

105. *Gerris Adelaidis* n. sp.

G. nigra, sericea; capite macula basali semi-lunari dilute fulva; thorace linea media elevata, antice fulva, marginibus lateralibus et postico dilute fulvis; elytris membranaque dilute fulvis extus nigris, nigro-venosis; pedibus nigrescentibus basi fulvo-grisescens; rostro basi dilute fulvo. — $11\frac{1}{2}$ millim. —

106. *Diplonychus rusticus* Fabr. *Burm. Handb. II. 194. 2.*
 107. *Belostoma indicum* Lep. & Serv. *Am. & Serv. Hém. 429. 1.*
 108. *Nepa flavo-venosa* n. sp.
N. fusca; capite linea media elevata; thorace et scutello ut in *N. rubra*; dorso rubro, fusco-vario; tubis respiratoriis corporis longitudine, apice dilutioribus; vena alarum externa et interna flavis, mediis fuscis; mesothorace subtus dimidio longiore metathorace; (*N. rubrae* mesothorace plus semel longiore metathorace). — 30 millim. (absque tubis respiratoriis). —
 109. *Ranatra sordidula* n. sp.
R. sordide fusco-testacea; capite tuberculo subacuto inter oculos; oculis castaneis; scutello prope apicem bi-subfossulata; elytris basin segmenti apicalis vix auperantibus; tubiis respiratoriis corporis fere longitudine; abdomine carinato; prosterno bisulcato; pedibus dilutioribus, annulis indistinctis pallidioribus; femoribus anticis basi haud dentatis, ponemedium bidentatis. — 23 millim. —
 110. *Sigara* sp. (adhuc indeterminata)
 111. *Sigara* sp. (id.)
 112. *Anisops* sp. (id.)

Synonymische Miscellaneen.

Vom Schulrath Dr. **Suffrian.**

XX.

Ueber das gegenseitige Verhältniss der *Coccinella tigrina* L. und *C. 20guttata* L. sprechen sich die neueren Autoren übereinstimmend dahin aus, dass dieselben lediglich als Varietäten einer und derselben Art zu betrachten seien. Linné's entgegengesetzte, beide als selbstständige Arten aufführende Ansicht war zuletzt nur noch von Fabricius (*S. Eleuth. II. 376*) und Olivier (*Ent. VI. 1038*) festgehalten worden, und zwar von Beiden mit dem Ausdruck des Zweifels; und hatte doch selbst Linné nach Mulsants Mit-



Dohrn, Anton. 1860. "Zur Heteropteren- Fauna Ceylon's." *Entomologische Zeitung* 21, 399–409.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/106288>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/205399>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.