

Das ♂ hat einen seichten Eindruck in der Mitte des letzten Bauchringes, dessen Hinterrand jederseits ausgebuchtet, dazwischen abgestutzt ist; das erste Tarsenglied ist ziemlich breit. — Penis dem von *Ludovicae* und *plagiata* ähnlich, jedoch vorn in eine große, breite, abgerundete Spitze vorgezogen, der Oberrand des *ductus* wird durch einen dreieckigen Ausschnitt in zwei breite, gerundete Läppchen getheilt.

Ceutorrhynchus punctiger und Verwandte.

Ceutorrhynchus marginatus Payk. trennt Seidlitz, Faun. Transsylv. 699, durch das rinnenlose Pygidium von *punctiger* Gyll., obgleich schon Thomson darauf hingewiesen hat, daß dieser Unterschied lediglich sexuell ist. Ich glaube, die nächsten Verwandten von *punctiger*, der in Deutschland häufigen Art, zu besitzen und theile hier die mir sicher scheinenden Trennungsmerkmale mit:

- 1 Zweites Tarsenglied gestreckt, deutlich länger als breit, nebst dem ersten Gliede sehr viel schmäler als das dritte Glied. Größere Art, mit langem, stark hervorstechenden weissen Scutellarfleck der Fld. Im größten Theile von Europa, wie es scheint, überall sehr selten *marginatus* Payk.
- 1' Zweites Tarsenglied quer, breiter als lang und wie das erste Glied wenig schmäler als das dritte. Kleinere Arten mit kurzem Scutellarfleck 2.
- 2 Beide Geschlechter mit einer Rinne auf dem Pygidium. ♂ mit einer sehr weiten, tiefen Grube auf dem letzten Bauchringe, welche jederseits von einem dreieckigen, kahlen Höcker begrenzt wird, ♀ mit einer kleinen, runden Eigrupe. Im größten Theile Europas häufig *punctiger* Gyll.
- 2' Das ♀ ohne Rinne, das ♂ mit einer kurzen Rinne auf dem Pygidium, die Grube auf dem letzten Bauchringe beim ♂ ziemlich klein, flach. Schweden; bei Berlin an vielen Orten; Glatz, Altvater *Mölleri* Thoms.

Ein Körnchen oder Höckerchen auf jeder Seite des Halssch. kann vorhanden sein oder fehlen, die Fld. sind bei allen drei Arten mehr braun oder mehr weißlich beschuppt (von *punctiger* kommen ganz weißlichgraue Fld. vor) und die Raspeln vor der Spitze der Fld. variiren sehr in der Größe, so daß diese Merkmale nicht als wesentlich anzusehen sind.

Den Penis habe ich nur von *punctiger* herausnehmen können. Er ist eine von oben ganz flach zusammengedrückte Röhre, welche sich vor der Mitte allmählich verengt, vorn plötzlich und gradlinig in eine scharfe Spitze verschmälert ist. J. Weise.



Weise, Julius. 1891. "Ceutorrhynchus punctiger und Verwandte." *Deutsche entomologische Zeitschrift* 1891(2), 376–376.

<https://doi.org/10.1002/mmnd.48018910254>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/103415>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.48018910254>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/235510>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.