

ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

13^e Mémoire (1)

Par M. EUGÈNE SIMON.

XX

Descriptions d'espèces et de genres nouveaux

DE LA

Famille des **DYSDERIDÆ**

(Séance du 23 Février 1881.)

Genre **LEPTONETA** E. Simon.

1. **LEPTONETA ABEILLEI**, sp. nov.

♂, ♀. Long. 4 mill.

Céphalothorax fauve rouge foncé finement et densément chagriné ; partie céphalique large et convexe ; partie thoracique à strie large et déprimée. — Yeux du premier rang en ligne fortement courbée en demi-

(1) Voir Annales 1873 : 1^{er} mémoire, n° I, p. 109 ; 2^e mémoire, n°s II, III et IV, p. 327. — Annales 1874 : 3^e mémoire, n°s V et VI, p. 241. — Annales 1876 : 4^e mémoire, n°s VII et VIII, p. 57. — Annales 1877 : 5^e mémoire, n° IX, p. 53 ; 6^e mémoire, n° X, p. 225. — Annales 1878 : 7^e mémoire, n°s XI, XII et XIII, p. 145 ; 8^e mémoire, n° XIV, p. 201 ; 9^e mémoire, n° XV, p. 399. — Annales 1879 : 10^e mémoire, n° XVI, p. 93. — Annales 1880 : 11^e mémoire, n° XVII, p. 97 ; 12^e mémoire, n°s XVIII et XIX, p. 377.

cercle, presque égaux et connivents, les latéraux ovales, allongés; yeux du second groupe assez petits et connivents; intervalle des deux groupes oculaires environ double du diamètre des latéraux antérieurs. — Bandeau peu incliné et plan, son bord antérieur étroit, avec les angles arrondis. — Plastron et chélicères fauve-rouge obscur, celles-ci longues et légèrement divergentes. — Pattes fauve rougeâtre; fémurs I et II comprimés et élargis à la base, pourvus en dessous de quelques séries granuleuses assez fortes, mais dépourvus d'épines; des épines patellaires, tibiales et métatarsales fines. — (♂). Patte-mâchoire longue; patella courte et convexe; tibia beaucoup plus long, sensiblement atténué à la base; tarse plus long que le tibia, cylindrique à la base, très fortement resserré vers le tiers terminal, ensuite très dilaté et convexe, sans saillie externe, seulement un peu anguleux à l'angle terminal externe et surmonté d'une épine noire, courte; bulbe volumineux, presque arrondi.

Ardèche : grotte Nouvelle, près Vallon; grotte de Saint-Martin, près Saint-Marcel. (Abeille.)

2. LEPTONETA MINOS, sp. nov.

♂, ♀. Long. 2,5 mill.

Céphalothorax fauve olivâtre, un peu plus foncé à la marge, assez fortement chagriné-réticulé, mais presque lisse en avant; partie céphalique peu convexe, presque de niveau; strie thoracique fine, non déprimée. — Yeux antérieurs égaux, en ligne fortement courbée en demi-cercle, les médians très légèrement, mais distinctement séparés, les latéraux ovales, courts et droits; yeux du second groupe petits et connivents; intervalle des deux groupes plus large que le diamètre des latéraux antérieurs, mais non double. — Bandeau à peine plus large que l'aire oculaire, plan, assez incliné, droit en avant, avec les angles arrondis. — Plastron et chélicères fauve brunâtre; plastron cordiforme, très large; chélicères longues et légèrement divergentes. — Pattes assez longues et fines, garnies de poils assez courts; fémurs inermes, à peine granuleux, I et II comprimés et un peu élargis à la base; des épines patellaires et tibiales noires, très fines et longues; point d'épines métatarsales. — Patte-mâchoire assez longue; tibia relativement court, à peine plus long que la patella, assez fortement atténué à la base; tarse plus long que le tibia, parallèle dans

la première moitié, sensiblement resserré vers le milieu, dans la seconde moitié un peu élargi et pourvu au côté externe d'une apophyse courte, large, non atténuée, tronquée carrément avec les angles obtus, et surmontée d'une petite épine; tarse garni de très longs crins et pourvu près la base, au côté externe, d'une longue épine noire; bulbe volumineux, lisse.

Pyrénées-Orientales : grotte de Villefranche!, Conat (sous les pierres)!, La Preste (dans les mousses)!. — Aude : grotte de Ginoules, de As-Pradels, de Belvis et d'Espezet, près Quillan!. — Ariège : grotte de Rieufourcand, près Belesta!.

3. LEPTONETA ALPICA, sp. nov.

♂, ♀. Long. 2 mill.

Céphalothorax fauve olivâtre obscur, avec une ligne marginale brune, lisse en avant, finement chagriné-réticulé en arrière; partie céphalique peu convexe, de niveau avec la partie thoracique; strie thoracique fine, assez longue, à bords non déprimés. — Yeux du premier groupe disposés en demi-cercle, gros et connivents, les médians visiblement plus gros et arrondis, les latéraux ovales, allongés et obliques; yeux du second groupe assez gros et connivents, relativement très peu reculés; intervalle des deux groupes oculaires à peine égal au rayon des yeux latéraux du premier. — Bandeau à peine aussi large que le groupe oculaire, presque vertical et plan. — Plastron et chélicères fauve brunâtre, celles-ci peu longues et presque parallèles. — Pattes fauve olivâtre, fines, dépourvues d'épines; fémurs antérieurs légèrement comprimés et un peu élargis à la base, très finement et peu densément rugueux en dessous. — Patte-mâchoire courte; tibia environ de même longueur que la patella, étroit et parallèle; tarse beaucoup plus long que le tibia, étroit et parallèle, sensiblement resserré et déprimé vers le dernier tiers, ensuite dilaté, convexe, et pourvu d'un fort tubercule externe conique, surmonté d'une épine; bulbe très volumineux, lisse, presque arrondi.

Alpes-Maritimes : Sospel!, Saint-Martin-Lantosque!.

Dans les mousses humides et épaisses des forêts.

4. LEPTONETA OLIVACEA, sp. nov.

♂, ♀. Long. 2,7 à 3 mill.

Céphalothorax fauve testacé olivâtre clair, très finement chagriné-réticulé; partie céphalique assez convexe; strie thoracique large et déprimée, surtout en avant. — Yeux antérieurs en ligne relativement peu courbée, presque égaux, les médians très légèrement mais distinctement séparés, les latéraux presque arrondis; yeux du second groupe petits et connivents, largement séparés de ceux du premier; intervalle des groupes ayant près de quatre fois le diamètre des latéraux antérieurs. Bandeau plus large que l'aire oculaire, plan et incliné, droit en avant, avec les angles arrondis. — Plastron et chélicères fauve obscur, celles-ci longues et un peu divergentes. — Pattes longues, fauve olivâtre, garnies de poils assez longs; fémurs antérieurs légèrement élargis à la base, nullement granuleux ni rugueux, pourvus de 3 épines internes courtes et de 3 dorsales fines et assez longues; des épines patellaires, tibiales et métatarsales très fines et longues. — (♂) Patte-mâchoire longue; patella petite, sensiblement convexe; tibia beaucoup plus long que la patella, légèrement atténué à la base; tarse presque aussi long, déprimé vers le milieu, pourvu dans la première moitié d'une courte saillie externe obtuse et perpendiculaire, prolongée par un fort crin noir dirigé en avant; bulbe globuleux.

Var : Trou-des-Fades, près Hyères!, grotte dite le Saint-Trou, près Toulon (Gounelle).

Genre TELEMA, gen. nov.

Céphalothorax court et large, à peine plus long que large, arrondi latéralement, obtusément tronqué en arrière, peu atténué en avant, à front large et obtus; assez convexe dans le milieu, incliné en avant et en arrière; strie thoracique nulle ou à peine sensible. — Pas d'yeux. — Chélicères longues, atténuées, un peu divergentes, à crochet long. — Pièce labiale grande, en triangle obtus aussi large que long. — Lames-maxillaires assez longues, étroites et parallèles, sensiblement inclinées, ne dépassant la pièce labiale que de sa longueur, atténuées et obtuses à

l'extrémité. — Pattes dans les proportions 1, 2, 4, 3 (ou 1, 4, 2, 3), longues et grêles, avec les fémurs de la première paire très élargis dans le milieu, atténués aux deux extrémités, fusiformes allongés, dépourvus d'épines; patellas et tibias pourvus chacun en dessus d'un long crin dressé.

♂. Patte-mâchoire courte; fémur, patella et tibia grêles; tarse étroit, sans saillie; bulbe très volumineux, piriforme allongé, pourvu de deux petites apophyses terminales.

♀. Épigyne dans aucune saillie.

Ce genre remarquable diffère du genre *Leptoneta*, non-seulement par l'absence complète des yeux, mais encore par l'élargissement des fémurs antérieurs, la pièce labiale plus grande, les lames-maxillaires plus courtes et sensiblement inclinées. — La patte-mâchoire du mâle a aussi une structure plus simple, le tarse n'a pas de saillie, et le bulbe piriforme allongé rappelle complètement celui des espèces du genre *Harpactes*.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce que nous avons découverte récemment dans les grottes des Pyrénées-Orientales.

5. TELEMA TENELLA, sp. nov.

♂, ♀. Long. 1,5 à 2 mill.

Céphalothorax, pièces buccales, sternum et pattes fauve testacé rougeâtre clair. — Abdomen gris verdâtre plus ou moins obscur, convexe, court, globuleux, parsemé de crins longs très fins. — Pattes garnies de crins plus courts que le diamètre des articles aux fémurs et disposés en bandes longitudinales peu régulières, plus longs aux tibias et aux métatarses; patellas pourvues en dessus, à l'extrémité, et tibias en dessus, vers le milieu, d'un crin fin dressé, très long.

♂. Patte-mâchoire courte; fémur court, très grêle et cylindrique; patella petite, nodiforme; tibia plus long que la patella, cylindrique; tarse au moins aussi long que le tibia, étroit, atténué et un peu courbe, appliqué sur le bulbe; bulbe très volumineux, beaucoup plus large et au moins aussi long que les trois articles basilaires, piriforme atténué, son

extrémité un peu courbe et pourvue de deux petites apophyses styloïdes croisées.

Pyrénées-Orientales : grotte Brichot, près La Preste !.

Habite sous les pierres, dans le fond de la grotte.

Genre SEGESTRIA Latr.

6. SEGESTRIA FUSCA, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 3 mill.; larg. 2,3 mill. — Pattes 1, 2, 3, 4.

♀. Céphaloth., long. 3,4 mill.; larg. 2,6 mill. — Pattes 1, 2, 4, 3.

Céphalothorax brun rouge plus foncé en avant, à pubescence blanchâtre très longue et peu serrée. — Yeux médians très gros, presque arrondis et connivents, les latéraux un peu plus petits, ovales et obliques, touchant presque au bord du bandeau; intervalle des médians aux latéraux à peine plus large que le rayon des médians. — Chélicères robustes et convexes, brun rouge presque noir, lisses ou à peine striées, garnies de crins simples très forts et longs. — Abdomen subcylindrique, très allongé, brunâtre violacé, plus clair sur les côtés; en dessous, région épigastrique légèrement convexe et un peu coriacée. — Pattes fauve rougeâtre, robustes, assez courtes, concolores; scopulas très peu serrées, presque nulles; métatarses I et II pourvus en dessous de 2-2 fortes épines latérales et d'une petite épine terminale, mais sans épines médianes près la base.

♂. Bulbe génital plus long et beaucoup plus large que le tarse, piriforme large, peu atténué, très brusquement rétréci vers le milieu et terminé en pointe fine, simple, environ de même longueur que le lobe et fortement arquée en avant. — Chélicères brunes, garnies de crins fins.

Aude : La Clape, ♂, ♀, avril !. — Pyrénées-Orientales : Collioure !.

7. SEGESTRIA PUSIOLA, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 3 mill.; larg. 2,2 mill. — Pattes 1, 2, 3, 4.

♀. Céphaloth., long. 3,3 mill.; larg. 2,5 mill. — Pattes 1, 2, 4, 3.

Céphalothorax brun rouge, avec une ligne marginale et sur la partie

céphalique quelques lignes ramifiées noirâtres, garni de pubescence blanchâtre très longue et assez serrée. — Yeux médians ovales larges, connivents, beaucoup plus gros que les latéraux, leur intervalle aux latéraux à peine plus large que leur rayon. — Chélicères brun rouge, lisses, avec quelques faibles stries transverses irrégulières, garnies de crins simples très longs. — Abdomen subcylindrique, blanchâtre testacé, marqué de quelques points noirs espacés sur les côtés et d'une bande médiane noire entière et continue, présentant dans la première moitié deux faibles élargissements obtus, et près l'extrémité postérieure une série de 4 ou 5 dilata-tions successives et rapprochées; ventre testacé clair, imponctué, avec une fine ligne brune de chaque côté des filières; pubescence blanchâtre, longue et peu serrée. — Pattes fauve rougeâtre; fémurs avec un anneau terminal et en dessous une tache médiane noirâtre plus large et plus constante aux paires postérieures; tibias et métatarses marqués chacun de deux anneaux; métatarses et tarses I et II souvent uniformément rem-brunis; scopulas peu serrées aux deux premières paires, presque nulles aux deux postérieures; métatarses I, II et III pourvus en dessous sur la ligne médiane d'une forte épine vers le tiers basilaire et d'une petite épine terminale, présentant de plus deux paires de longues épines et deux latérales internes et externes, les externes manquant chez le mâle.

♂. Bulbe génital beaucoup plus long et plus large que le tarse, piri-forme, assez large dans la première moitié, brusquement rétréci et grêle dans la seconde, terminé en pointe obtuse simple et presque droite; partie grêle un peu plus longue que la partie piriforme large. — Chélicères brunes, garnies de longs crins simples.

Corse !.

Genre *DYSDERA* Latr.

8. *DYSDERA DENTICHELIS*, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 4 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge carminé foncé, finement et uniformément chagriné et marqué de quelques petits points enfoncés très espacés et irréguliers. — Yeux supérieurs égaux, formant une ligne assez courbée; les médians connivents, ovales et obliques, les latéraux bien séparés (leur intervalle au moins égal à leur rayon) et arrondis; yeux antérieurs plus gros, leur intervalle environ égal à leur diamètre. — Chélicères brun

rouge, longues, un peu projetées, striolées en travers, pourvues en avant, dans la première moitié et au côté interne, d'un fort denticule dirigé obliquement en dedans. — Plastron brun rouge, finement chagriné-vermiculé,




Fig. 1. Chélicère du mâle. — Fig. 2.
Bulbe vu du côté externe.

avec des espaces lisses latéraux. Pattes brun rouge clair, les antérieures un peu plus foncées; pattes I et II et fémur III inermes; fémur IV pourvu en dessus, à la base, d'une ligne de 3 petites épines; tibias et métatarses III et IV pourvus d'épines. — Abdomen ovale, gris fauve testacé. — Patte-mâchoire brun rouge; fémur fortement convexe et un peu courbe dans la seconde moitié; tibia visiblement plus court que la patella; tarse plus long que le tibia, étroit et fortement atténué dans la seconde moitié; bulbe à lobe très développé, ovale beaucoup plus long que large et tronqué presque droit à l'extrémité; pointe terminale plus courte que le lobe, droite en avant, pourvue à la base en arrière d'une forte apophyse très obtuse, très légèrement bimamelonnée au sommet, son extrémité oblique et aiguë pourvue d'une lamelle perpendiculaire.

♀. Céphaloth., long. 6,2 mill. — Abd., long. 10 mill.

Plastron lisse brillant, avec quelques petits espaces latéraux légèrement vermiculés. — Chélicères robustes, relativement courtes, assez fortement striées en travers, pourvues à la base, au côté interne, d'une saillie conique très basse non prolongée en apophyse; bord de la rainure pourvu d'une série de trois dents équidistantes, dont la médiane plus petite. — Tibia IV pourvu en dessous de 2-2 épines éloignées, de chaque côté de 2-2 épines latérales et d'une épine intermédiaire au niveau de la première latérale. — Abdomen ovale allongé, gris violacé obscur passant au fauve mat en dessous et en avant.

Liban (Ch. de la Brûlerie).

Espèce remarquable, se distinguant à première vue par la singulière conformation des chélicères pourvues en avant chez le mâle d'une longue apophyse, chez la femelle d'une saillie conique.

9. *DYSDERA SPINICRUS*, sp. nov.

♀. Céphaloth., long. 4,5 mill. — Abd., long. 7,5 mill.

Céphalothorax brun rouge carminé très foncé, finement chagriné et parsemé de points enfoncés petits et irréguliers, espacés en dessus, beaucoup plus denses sur les côtés. — Yeux supérieurs égaux, formant une ligne assez courbée, les médians très légèrement séparés; intervalle des latéraux presque égal à leur rayon; yeux antérieurs plus gros, leur intervalle un peu plus large que leur diamètre. Bandeau au moins aussi large que l'intervalle des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, robustes, très atténuées, lisses, non striées, mais parsemées de granulations à la base et au côté externe. — Plastron lisse brillant, avec de petits espaces latéraux vermiculés correspondants aux intervalles des hanches. — Pattes fauve rouge obscur, les antérieures plus foncées et plus robustes; pattes I et II et fémur III inermes; fémur IV pourvu en dessus, dans la première moitié, d'un groupe de 4 ou 5 épines; tibias III et IV pourvus de chaque côté de 2 épines latérales, en dessus, dans la première moitié, de deux épines dorsales en ligne transverse, et, en dessous, dans la première moitié, de longues épines (5 au tibia III, 10 au tibia IV) disposées sur trois rangs peu réguliers; métatarses III et IV pourvus de fortes et nombreuses épines. — Abdomen ovale allongé, gris brunâtre satiné, plus pâle en dessous.

Liban (Ch. de la Brûlerie).

Espèce remarquable, facile à distinguer par l'armature des tibias postérieurs. C'est la seule espèce du genre pourvue d'épines tibiales dorsales et de nombreuses épines inférieures.

10. *DYSDERA LEPRIEURI*, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 4 mill.

Céphalothorax brun rouge carminé très foncé, un peu éclairci en avant, entièrement et assez fortement chagriné vermiculé, principalement sur les côtés. — Yeux supérieurs en ligne assez courbée, la base des latéraux presque au niveau du centre des médians, presque égaux, les médians

connivents, les latéraux bien séparés; yeux antérieurs plus gros, leur intervalle au moins égal à leur diamètre. Bandeau un peu plus large que le diamètre des yeux antérieurs. — Chélicères robustes, atténuées et projetées, parsemées au côté externe, principalement à la base, de quelques granulations assez grosses. — Plastron entièrement et fortement chagriné-vermiculé. — Pattes brun rougeâtre vif, les antérieures plus foncées; fémur I pourvu au côté interne, près l'extrémité, d'un groupe de 2 épines; fémur II, d'une petite épine supéro-interne; fémur III pourvu sur la face antérieure de 2 petites épines; fémur IV pourvu en dessus, à la base, d'un groupe de 3 ou 4 fortes épines; tibias et métatarses III et IV garnis d'épines.




Fig. 3. Bulbe vu du côté externe.

♂. Patte-mâchoire brun rouge vif; patella convexe en dessus; tibia un peu plus long que la patella, cylindrique; tarse un peu plus court que le tibia, de même largeur, peu atténué et obtus; bulbe à lobe assez long, large, presque droit en avant, avec une saillie obtuse à l'extrémité, très convexe en arrière; pointe un peu plus courte que le lobe, assez large, non atténuée et tronquée presque droit à l'extrémité, avec l'angle antérieur prolongé en pointe grêle membraneuse, obtuse, et l'angle postérieur prolongé en pointe noire très aiguë, un peu recourbée en haut.

Bordj-Menaël (D^r Ch. Leprieur).

Par la disposition des épines aux pattes, cette espèce se rapproche de *D. maurusia* Th., mais elle est constamment plus petite, ses téguments sont plus rugueux et le bulbe du mâle a une forme totalement différente.

11. DYSDERA ACICULATA, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 3,5 mill.

Céphalothorax assez convexe, à front large, brun rouge carminé, assez finement et entièrement chagriné vermiculé. — Yeux supérieurs gros, égaux, presque arrondis, les médians connivents, les latéraux légèrement séparés, en ligne assez courbée, la base des latéraux néanmoins un peu

en arrière du centre des médians; yeux antérieurs plus gros, leur intervalle visiblement plus étroit que leur diamètre. Bandeau un peu plus large que l'intervalle des yeux antérieurs. — Chélicères robustes, longues, atténuées et projetées, parsemées, surtout au côté externe, de petites granulations. — Plastron assez fortement et entièrement chagriné vermiculé. — Pattes fauve orangé, les antérieures un peu plus foncées; fémur I pourvu dans la seconde moitié, au côté interne, de 2 épines; fémur II, d'une seule; fémur III, d'une ligne de 2 sur la face antérieure; fémur IV pourvu en dessus, près la base, d'un groupe de 2 ou 3 épines courtes; tibias et métatarses III et IV garnis d'épines. — Abdomen ovale, gris-fauve. — Patte-mâchoire fauve rougeâtre; tibia un peu plus court que la patella, à peine plus étroit, cylindrique, garni de crins fauves assez serrés; tarse à peine plus court que le tibia, un peu plus étroit, à peine atténué et obtus, garni de crins semblables; bulbe à lobe basilaire assez allongé, ovale, plus convexe en arrière; pointe terminale environ de même longueur que le lobe, sans saillie antérieure; apophyse postérieure presque basilaire, longue, triangulaire, aiguë; extrémité du bulbe oblique, peu atténuée, inégalement bifide.




Fig. 4. Bulbe du mâle par la face externe.

Bou-Saada (D^r Ch. Leprieur).

Espèce voisine de la précédente et de *D. maurusia* Th.; elle se distingue par la forme du bulbe dont l'apophyse postérieure est longue et très aiguë.

12. *DYSDERA LUCIDIPES*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 3,5 à 4 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge carminé vif, assez fortement chagriné vermiculé, principalement sur les côtés, et parsemé de quelques granulations très espacées. — Yeux supérieurs gros, égaux, subconnivents, presque arrondis, en ligne assez courbée, la base des latéraux néanmoins en arrière du centre des médians; yeux antérieurs plus gros, ♀ leur intervalle plus large que leur diamètre, ♂ un peu plus étroit. Bandeau environ de même largeur que l'intervalle des yeux antérieurs. — Chélicères très

longues, très atténuées et projetées en avant, lisses, brillantes, un peu inégales seulement au bord externe et pourvues près la base, au côté externe, de quelques petites granulations espacées. — Plastron, ♂ entièrement et assez fortement chagriné vermiculé, ♀ plus légèrement, avec des espaces lisses. — Pattes jaune clair orangé vif; pattes I et II entièrement inermes; fémur IV pourvu en dessus, près la base, d'une petite épine; tibias et métatarses III et IV pourvus de quelques très petites épines espacées. — Abdomen ovale, blanc jaunâtre testacé.




Fig. 5. Bulbe par la face externe.

♂. Patte-mâchoire jaune orangé; tibia un peu plus court que la patella, à peine plus étroit, cylindrique, garni de crins fauves assez serrés; tarse à peine plus court que le tibia, un peu plus large dans le milieu, fusiforme allongé, garni de crins semblables; bulbe à lobe basilaire assez allongé, ovale; pointe terminale de même longueur que le lobe ou à peine plus longue, pourvue à la base, en avant, d'une saillie conique, et en arrière d'une saillie semblable, également obtuse, mais séparée du lobe par une légère échancrure; extrémité oblique, longue, atténuée, inégalement bifide.

Géryville (D^r Munier).

Diffère des espèces précédentes par l'absence d'épines aux fémurs des trois premières paires; sous ce rapport elle se rapproche de *D. crocata* C. Koch., mais s'en distingue par ses pattes fauve clair, son sternum beaucoup plus lisse, surtout chez la femelle, et par le bulbe du mâle, dont l'apophyse basilaire moins avancée rappelle davantage celle de *D. erythrina*.

13. *DYSDERA VESICULIFERA*, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 4,5 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge carminé foncé, assez finement chagriné en dessus et en arrière, plus fortement sur les côtés. — Yeux supérieurs gros, presque arrondis, formant une ligne légèrement courbe, la base des latéraux en arrière du centre des médians, les médians connivents, les latéraux bien séparés; yeux antérieurs plus gros, arrondis, leur intervalle à



Fig. 6. Bulbe par la face externe.

peine égal à leur diamètre. Bandeau plus large que le diamètre des yeux antérieurs. — Chélicères longues, atténuées, projetées, parsemées de quelques granulations près la base. — Plastron finement chagriné vermiculé, avec des espaces lisses. — Pattes fauve orangé, avec les hanches et les fémurs antérieurs rembrunis; pattes I et II inermes; fémur III inerme; fémur IV pourvu d'une épine en dessus à la base; tibias et métatarses III et IV garnis de quelques petites épines. — Patte-mâchoire fauve-rouge; patella et tibia presque égaux; tarse un peu plus court que le tibia, atténué, obtus; bulbe à lobe grand, ovale, convexe en arrière, sans saillie antérieure; pointe terminale environ de la longueur du lobe, terminée en pointe droite très atténuée et bifide; apophyse postérieure très grande, ovale large, vésiculeuse, touchant au bord du lobe.

Biskra.

Espèce remarquable par la structure du bulbe chez le mâle; à part cela elle est voisine de *D. crocata*.

14. *DYSDERA NUBILA*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2,5 à 3,2 mill. — Pattes 4, 4, 2, 3.

Céphalothorax fauve rouge orangé, avec un fin rebord noir; relativement étroit et long, finement et uniformément chagriné. — Yeux supérieurs gros, presque égaux, presque arrondis, en ligne assez courbée, les médians connivents, les latéraux un peu séparés; yeux antérieurs plus gros, arrondis, leur intervalle un peu plus large que leur diamètre. Bandeau égal au diamètre des yeux antérieurs. — Chélicères fauve rouge, longues, très atténuées, projetées, parsemées de granulations (surtout ♂). — Plastron finement chagriné mat, avec des espaces latéraux lisses. — Pattes fauve rougeâtre clair, relativement longues et peu robustes; fémurs I et II pourvus d'une épine supéro-interne; fémur III inerme; fémur IV pourvu en dessus, près la base, d'un groupe de 2 ou 3 épines; tibias et métatarses I et II inermes; tibia III présentant en dessous 1 épine dans la première moitié et 2 terminales, plus 2-2 épines latérales; tibia IV, 1 en

dessous près la base, 1 vers le milieu et 2 terminales, de plus 3-2 latérales ; métatarses III et IV épineux. — Abdomen ovale allongé, étroit, blanc testacé.

♂. Patte-mâchoire fauve rouge clair ; tibia un peu plus court que la patella, plus étroit, parallèle ; tarse à peine plus court que le tibia, atténué, obtus, garni de crins fauves assez serrés ; bulbe à lobe basilaire assez long, régulièrement ovale, fauve, lisse, avec une double ligne circulaire foncée non déprimée ; pointe terminale environ de la longueur du lobe, presque aussi large, avec la base un peu dilatée et anguleuse au côté interne, l'extrémité très obliquement tronquée, avec l'angle antérieur prolongé en forme de bec assez long et terminé par 3 petites pointes, l'angle postérieur également prolongé, mais beaucoup plus court et obtus ; à la base du bec antérieur, une petite saillie noire arrondie.

♀. Patte-mâchoire longue, grêle ; tibia sans brosse interne ; tarse plus long que le tibia, garni de crins fauves serrés, avec un espace feutré en dessus dans la seconde moitié.

Corse !. Commun dans toute l'île.

15. *DYSDERA PROVINCIALIS*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 3 à 3,7 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge très foncé, presque noir, fortement et densément chagriné ponctué, principalement sur les côtés. — Yeux supérieurs assez gros, égaux, en ligne assez courbée, les médians connivents, les latéraux distinctement séparés. — Yeux antérieurs plus gros que les postérieurs, leur intervalle, ♀ plus large que leur diamètre, ♂ de même largeur. Bandeau beaucoup plus étroit que les yeux antérieurs. — Chélicères longues, très atténuées, projetées, ♀ presque lisses, ♂ sensiblement plissées et un peu granuleuses, excepté à l'extrémité. — Plastron, ♂ finement chagriné-vermiculé, ♀ très lisse brillant. — Pattes fauve rouge orangé clair, médiocrement longues ; pattes I et II entièrement, fémurs III et IV inermes ; tibias III et IV offrant en dessous une épine avant le milieu et deux terminales ; tibia III, deux petites latérales internes et une externe ; tibia IV, une interne et une externe. — Abdomen ovale allongé, gris soyeux en dessus, testacé en dessous.

♂. Patte-mâchoire fauve rougeâtre ; tibia environ de même longueur que la patella, plus étroit ; tarse un peu plus court que le tibia, fortement atténué, garni de crins fauves assez serrés ; bulbe étroit et long ; lobe assez long, très étroit et cylindrique, tronqué très obliquement ; pointe plus longue que le lobe, atténuée et droite, sa base pourvue en arrière d'une petite apophyse très aiguë, recourbée en haut et dépassant le bord du lobe.

♀. Patte-mâchoire longue ; tibia à peine plus court que la patella, plus étroit, sans brosse interne ; tarse un peu plus long que le tibia, ovale allongé, garni, surtout à l'extrémité, de crins serrés.

Var : Ile^{de} Porquerolles !.

16. *DYSDERA LANTOSQUENSIS*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 3 à 3,5 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge très foncé, presque noir, assez court et large, très fortement et densément chagriné vermiculé et ponctué, principalement sur les côtés. — Yeux supérieurs assez gros, en ligne légèrement courbée, égaux, les médians connivents, les latéraux distinctement séparés ; yeux antérieurs plus gros que les postérieurs, presque arrondis, leur intervalle un peu plus étroit que leur diamètre. Bandeau presque aussi large que leur intervalle. — Chélicères longues, très atténuées, projetées, ♀ lisses, ♂ assez fortement plissées et éparsement granuleuses dans leurs deux tiers basilaires. — Plastron brun rouge, ♂ très fortement et entièrement chagriné-vermiculé, ♀ très lisse, éparsement et très finement ponctué. — Pattes fauve rouge, les antérieures plus foncées, médiocrement longues, robustes ; pattes I et II entièrement, fémurs III et IV inermes ; tibias III et IV pourvus en dessous d'une ligne de 2 épines et de 2 terminales ; tibia III présentant deux latérales externes ; tibias IV une latérale externe et une interne ; métatarses III et IV épineux. — Abdomen ovale, gris fauve en dessus, testacé en dessous.

♂. Patte-mâchoire brun rouge ; patella atténuée à la base ; tibia environ de même longueur ; tarse plus court que le tibia, ovale court très obtus, garni de crins fauves serrés ; bulbe étroit et long, lobe très long, étroit et cylindrique, tronqué très obliquement ; pointe environ de même lon-

gueur que le lobe, presque droite et atténuée, sa base pourvue en arrière d'une apophyse courte, dentiforme, recourbée en haut, précédée d'une petite échancrure et ne dépassant pas l'angle du lobe.

Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Lantosque !.

17. *DYSDERA FERVIDA*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., 2 à 3,2 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax assez allongé, chagriné, ♀ uniformément, ♂ plus fortement sur les côtés et ponctué, brun rouge très foncé carminé. — Yeux supérieurs gros, arrondis, en ligne légèrement courbée, les médians connivents, les latéraux un peu séparés et un peu plus gros ; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les latéraux postérieurs, arrondis, leur intervalle visiblement plus étroit que leur diamètre. Bandeau de même largeur que l'intervalle des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, longues, très atténuées, projetées, chagrinées et parsemées de granulations dans leur moitié basilaire (surtout ♂). — Plastron brun rouge, ♂ très fortement chagriné, ♀ presque lisse avec des espaces finement chagrinés vermiculés sur les côtés et en arrière. — Pattes jaune rougeâtre orangé vif, assez longues ; pattes I et II entièrement et fémurs III et IV inermes ; tibia III pourvu en dessous de 2 épines terminales et de 2 petites latérales externes ; tibia IV en dessous d'une épine vers le milieu, de deux terminales et d'une petite latérale externe ; métatarses III et IV épineux. — Abdomen ovale allongé, blanc testacé.

♂. Patte-mâchoire fauve rougeâtre ; patella et tibia presque égaux, allongés ; tarse visiblement plus court que le tibia, ovale atténué, garni de crins fauves serrés ; bulbe très long ; lobe assez étroit, long et cylindrique, non déprimé, tronqué obliquement à l'extrémité ; pointe plus longue que le lobe, pourvue en arrière, près la base, d'une petite apophyse très simple, subaiguë et un peu courbe, précédée d'une profonde échancrure, ensuite atténuée et presque droite.

♀. Patte-mâchoire assez longue ; tibia plus court que la patella, garni de crins assez serrés, mais ne formant pas brosse au côté interne.

Provence !. — Corse !.

18. *DYSDERA CRIBRATA*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2,7 à 3,7 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax assez court et large, brun rouge très foncé, presque noir, chagriné et ponctué plus fortement et plus densément sur les côtés, avec une ligne médiane ponctué. — Yeux supérieurs gros, égaux, arrondis, en ligne légèrement courbée, les médians connivents, les latéraux bien séparés; yeux antérieurs un peu plus gros que les postérieurs, arrondis, leur intervalle un peu plus étroit que leur diamètre, ♀ plus large. Bandeau, ♂ de même largeur que leur intervalle, ♀ beaucoup plus large. — Chélicères longues, très atténuées, projetées, un peu chagrinées et granuleuses seulement à la base. — Plastron brun rouge, ♂ très fortement et entièrement chagriné vermiculé, ♀ presque lisse, éparsement ponctué. — Pattes assez longues, fauve rouge, les antérieures un peu plus foncées et un peu plus robustes, surtout les fémurs; pattes I et II entièrement et fémurs III et IV inermes; tibias III et IV offrant en dessous une épine vers le milieu et 2 ou 3 terminales; tibia III, 2 latérales externes et 1 interne; tibia IV, une interne et une externe; métatarses III et IV épineux. — Abdomen ovale, gris plombé en dessus, testacé en dessous.

♂. Patte-mâchoire fauve rougeâtre; patella et tibia presque égaux; tarse aussi long que le tibia, longuement atténué, garni de crins fauves assez serrés; bulbe long, lobe ovale allongé, non déprimé et tronqué obliquement, marqué d'une double ligne circulaire foncée; pointe terminale plus longue que le lobe, graduellement atténuée, presque droite dans sa première moitié, fortement coudée et courbe dans la seconde, pourvue en arrière, au point coudé, d'une très petite pointe simple, aiguë, précédée d'une petite échancrure.

Hautes-Alpes: Savines!. — Basses-Alpes: Digne!. — Alpes-Maritimes: Saint-Martin-Lantosque!, La Madone-des-Fenêtres!.

19. *DYSDERA SCABRICULA*, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 3 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax assez allongé, convexe, noir un peu carminé, très forte-

ment et densément chagriné vermiculé et ponctué, principalement sur les côtés et en avant. — Yeux supérieurs assez gros, égaux, en ligne légèrement courbée, les médians connivents, les latéraux un peu séparés; yeux antérieurs plus gros que les postérieurs, leur intervalle un peu plus étroit que leur diamètre. Bandeau environ égal au diamètre des yeux antérieurs. — Chélicères longues, très atténuées, projetées, presque lisses, brillantes. — Plastron brun rouge, très fortement et entièrement chagriné vermiculé. — Pattes fauve rouge orangé vif, médiocrement longues et robustes, surtout les fémurs antérieurs; inermes, excepté au tibia iv une petite épine terminale, au métatarse iv une très petite épine en dessous, au delà du milieu, et une épine terminale semblable.

♂. Patte-mâchoire fauve rouge; patella atténuée à la base; tibia de même longueur; tarse un peu plus court que le tibia, atténué et obtus, garni de crins fauves serrés; bulbe à lobe grand, ovale assez large, plus convexe en arrière, tronqué presque droit; pointe plus courte que le lobe, présentant à la base une branche membraneuse, recourbée en arrière et arrondie; partie terminale atténuée, oblique, bifide, avec une petite dilatation anguleuse en dessus.

Var : Sainte-Baume (Sédillot).

20. DYSDERA RUDIS, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 3 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax court, large et convexe, noir un peu carminé, très fortement et densément chagriné vermiculé et ponctué, principalement sur les côtés et en avant. — Yeux supérieurs assez gros, égaux, en ligne peu courbée, les médians connivents, les latéraux bien séparés; yeux antérieurs plus gros que les postérieurs, arrondis, leur intervalle égal à leur diamètre. Bandeau plus large que le diamètre des yeux antérieurs. — Chélicères longues, très atténuées, projetées, un peu granuleuses à la base. — Plastron brun rouge, très fortement et entièrement chagriné vermiculé. — Pattes rouge orangé vif, assez courtes, robustes, surtout les fémurs antérieurs; inermes, excepté une ou deux petites épines terminales aux tibias III et IV.

♂. Patte-mâchoire fauve rouge; patella atténuée à la base; tibia presque

de même longueur; tarse à peine plus court que le tibia, fortement atténué, garni de crins fauves serrés, surtout à l'extrémité; bulbe très long, étroit; lobe long, ovale dans la première moitié, un peu atténué et coudé dans la seconde; pointe beaucoup plus longue que le lobe, chitineuse en avant dans toute sa longueur, pourvue en arrière, dans la première moitié, d'une forte saillie conique membraneuse, surmontée d'une petite apophyse simple, obtuse, recourbée en haut, son extrémité très atténuée, bifide, avec une branche dilatée et lamelleuse, l'autre étroite et portant deux petites pointes divergentes.

Var : Hyères !.

21. *DYSDERA FUSCIPES*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2,8 à 3,2. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge très foncé, presque noir, assez court et large, non chagriné, couvert de points enfoncés, plus gros, plus denses et irréguliers sur les côtés, avec une ligne médiane ponctuée. — Yeux supérieurs gros, arrondis, en ligne presque droite, les médians connivents, les latéraux à peine séparés, un peu plus gros que les médians; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les postérieurs, arrondis, leur intervalle aussi étroit que leur rayon. — Chélicères brun rouge, très atténuées, projetées, lisses, brillantes. — Plastron brun rouge, brillant, très lisse. — Pattes brun rouge obscur, avec la base des fémurs, les métatarses et tarses fortement éclaircis, assez courtes et robustes, surtout les fémurs I et II, inermes, excepté les métatarses III et IV; ceux-ci pourvus en dessous, au delà du milieu, d'une petite épine au bord externe et d'une épine terminale; souvent aussi une paire d'épines terminales au tibia IV. — Abdomen ovale court, gris plombé en dessus, testacé en dessous.

♂. Patte-mâchoire brun rouge clair; patella longue, presque parallèle; tibia beaucoup plus court que la patella, un peu convexe et garni d'une forte brosse de crins au côté interne; tarse plus long que le tibia, atténué surtout à l'extrémité, garni de crins semblables; bulbe très long; lobe régulièrement ovale, non déprimé et tronqué obliquement, marqué d'une double ligne circulaire foncée; pointe membraneuse au moins deux fois plus longue que le lobe, très effilée et comprimée, pourvue dans la première moitié, en arrière, d'une grande saillie conique surmontée d'une petite pointe chitineuse tronquée.

♀. Patte-mâchoire courte et robuste ; tibia plus court que la patella, pourvu d'une forte brosse interne.

Morbihan : Plouharnel (L. Bedel, A. Lèveillé).—Gironde : Arcachon !.—Portugal : Douro (coll. E. Simon).

22. *DYSDERA FLAVITARSIS*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 3 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge carminé très foncé, presque noir, court et large, non chagriné, couvert de points enfoncés, plus gros, plus denses et irréguliers sur les côtés, vermiculé en avant, avec une ligne médiane longitudinale ponctuée. — Yeux supérieurs gros, presque arrondis, en ligne à peine courbée, les médians connivents, les latéraux à peine séparés, plus gros que les médians ; yeux antérieurs beaucoup plus gros, arrondis, leur intervalle au moins d'un tiers plus étroit que leur diamètre. — Chélicères brun rouge, longues, très atténuées, projetées, sensiblement déprimées au côté interne, presque lisses, très légèrement striées. — Plastron brun rouge brillant, non chagriné, marqué de stries irrégulières vermiculées. — Pattes brun rouge, avec les tarsi à l'extrémité des métatarses fauve clair, courtes et robustes ; fémurs I et II comprimés et très larges, surtout à la base ; inermes, excepté les métatarses III et IV ; ceux-ci pourvus en dessous, au delà du milieu, d'une petite épine au bord externe et d'une épine terminale semblable. — Abdomen ovale assez court, blanc testacé.

♂. Patte-mâchoire brun-rouge foncé ; patella fortement atténuée à la base, convexe ; tibia un peu plus court, presque parallèle ; tarse de même longueur que le tibia, aussi large, un peu atténué aux deux extrémités, obtus, garni de crins fauves assez serrés ; lobe du bulbe court et large, régulièrement ovale, non déprimé, tronqué obliquement, fauve brillant, avec une double ligne circulaire foncée ; pointe plus longue que le lobe, très épaisse, coudée en avant presque dès la base, graduellement atténuée, subaiguë, pourvue en arrière, au point coudé, d'une forte saillie très obtuse.

Biscaye : Galdamès. — Pyrénées cantabriques : col de Pajares (Ch. de la Brûlerie).

23. *DYSDERA SANGUINIPES*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 4,5 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax noir profond un peu carminé, court, large et convexe, couvert de points enfoncés, inégaux et très irréguliers, plus denses sur les côtés, avec les intervalles un peu relevés et vermiculés, surtout en avant, et avec une profonde strie médiane ponctuée. — Yeux supérieurs gros, égaux, en ligne légèrement courbée, les médians connivents, les latéraux à peine séparés et arrondis; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les latéraux supérieurs, presque arrondis, leur intervalle environ d'un tiers plus étroit que leur diamètre. — Chélicères longues, très atténuées, projetées, fortement chagrinées au côté externe, surtout à la base. — Plastron brun rouge foncé, très fortement chagriné vermiculé. — Pattes rouge carminé vif, courtes et robustes; fémurs I et II épais, comprimés et dilatés en dessus à la base; pattes I et II entièrement et fémurs III et IV inermes; tibias III et IV pourvus de 2 petites épines latérales internes et externes, d'une petite épine en dessus, près la base, et en dessous de 2 terminales; tibia IV offrant de plus, en dessous, une paire d'épines près la base; métatarses III et IV épineux. — Abdomen ovale court, en dessus gris plombé, ponctué de brun, éclairci en avant, en dessous fauve clair testacé.

♂. Patte-mâchoire assez longue; fémur peu robuste, courbe et comprimé; patella légèrement atténuée à la base; tibia environ de même longueur, un peu plus étroit et parallèle; tarse beaucoup plus court, un peu plus large, ovale, garni en dessus, dans la seconde moitié, de poils courts feutrés; bulbe à lobe allongé, fortement resserré dans le milieu, lagéni-forme; pointe membraneuse courte et très large, tronquée carrément, avec chacun des angles prolongé en pointe courte et aiguë, son milieu pourvu d'un stylum grêle, arqué, assez court.

Corse : Bonifacio !. — Algérie. — Égypte.

Cette espèce est très voisine de *D. Westringi* Cb., de Syrie, dont le bulbe est presque semblable, ainsi que le céphalothorax. *D. Westringi* diffère cependant de *D. sanguinipes* par les pattes plus longues, avec le fémur de la 4^e paire pourvu en dessus d'un groupe d'épines, le sternum

beaucoup moins fortement chagriné, enfin par le bulbe, dont la lamelle terminale n'est pas denticulée sur les bords.

24. *DYSDERA IGNAVA*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 3,5 à 4 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge foncé, finement et uniformément chagriné mat. — Yeux supérieurs en ligne peu courbée, la base des latéraux beaucoup en arrière du centre des médians, presque égaux, les médians conivents, intervalle des latéraux beaucoup plus étroit que leur rayon; yeux antérieurs plus gros que les latéraux supérieurs, leur intervalle à peine égal à leur rayon. Bandeau plus large que le rayon des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, longues, légèrement striées et parsemées de granulations au côté externe. — Plastron brun rouge, entièrement chagriné mat. — Pattes assez longues, fauve rouge, les antérieures plus foncées, un peu plus robustes, à fémurs comprimés et convexes en dessus à la base; fémur I pourvu de 2 épines et fémur II d'une seule supéro-interne; fémur III, d'une épine en dessus près la base; fémur IV en dessus, dans la première moitié, de deux lignes de 3-2 épines; tibias et métatarses I et II inermes, III et IV fortement épineux. — Abdomen ovale, gris fauve testacé.

♂. Patte-mâchoire robuste; fémur peu long, un peu courbe, presque cylindrique, peu comprimé à la base; patella plus de trois fois plus longue que large, presque parallèle; tibia un peu plus court que la patella, légèrement convexe, un peu atténué aux deux extrémités; tarse un peu plus court que le tibia, un peu plus étroit, sensiblement atténué obtus, garni de crins fauves serrés; bulbe étroit et long, très simple, légèrement concave en avant et convexe en arrière, atténué à la base, fortement atténué à l'extrémité et terminé en pointe simple, obtuse.

Corse !. — Très commun dans les montagnes, particulièrement dans les forêts de hêtres, sous les pierres et dans les mousses.

25. *DYSDERA INÆQUIPES*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 4 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge très foncé, très finement et uniformément

chagriné mat, court, large et convexe. — Yeux supérieurs en ligne sensiblement courbée, la base des latéraux au niveau du centre des médians, égaux, les médians connivents, intervalle des latéraux presque égal au rayon des médians ; yeux antérieurs plus gros que les latéraux supérieurs, leur intervalle environ d'un tiers plus étroit que leur diamètre. — Bandeau un peu plus large que le rayon des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, longues, parsemées de granulations au côté externe. — Plastron brun rouge, fortement et entièrement chagriné mat. — Pattes peu longues, fauve rouge, les antérieures brunâtres, beaucoup plus robustes, à fémurs larges, comprimés et dilatés en dessus à la base (surtout ♂) ; fémur I pourvu de 2 fortes épines supéro-internes ; fémurs II et III inermes ; fémur IV pourvu en dessus, dans la première moitié, de 3 épines disposées en 2 lignes ; tibias et métatarses I et II inermes ; III et IV fortement épineux. — Abdomen ovale, gris fauve testacé, plus pâle en dessous.

♂. Patte-mâchoire robuste ; fémur court, un peu comprimé et courbe ; patella longue, presque parallèle, à peine atténuée à la base ; tibia un peu plus court que la patella, sensiblement atténué à la base, garni de crins fauves, surtout au côté interne ; tarse un peu plus court que le tibia, aussi large à la base, atténué obtus, entièrement garni de crins semblables ; bulbe long, étroit, presque cylindrique, peu atténué, assez fortement coudé dans la seconde moitié et tronqué droit à l'extrémité, prolongé par une apophyse grêle, déprimée, plus de deux fois plus courte que le lobe, simple, tronquée et lamelleuse à l'extrémité.

Corse : Bonifacio !, îles Lavesi !.

26. *DYSDERA DRASSOIDES*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 4 à 5,5 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge, ♂ finement et uniformément chagriné, ♀ presque lisse. — Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée, les médians plus petits, connivents, largement séparés des latéraux par un intervalle presque aussi large que leur diamètre ; yeux antérieurs un peu plus gros que les latéraux supérieurs, ovales, larges, obliques, leur intervalle un peu plus étroit que leur diamètre. — Bandeau beaucoup plus large que le rayon des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, longues,

irrégulièrement striées et parsemées de granulations au côté externe. — Plastron finement chagriné, surtout dans le milieu. — Pattes fauve rougeâtre, longues, les antérieures plus robustes et un peu plus foncées, surtout les fémurs; fémur I pourvu au côté interne, dans la seconde moitié, de 3 épines égales en ligne transverse; fémur II, de 3 épines disposées en deux groupes (2-1); fémurs III et IV, de deux lignes dorsales d'épines; tibias et métatarses I et II inermes, III et IV fortement épineux. — Abdomen ovale allongé, fauve brunâtre obscur, à pubescence assez courte et rude.

♂. Patte-mâchoire robuste; fémur long, un peu courbe, atténué et comprimé à la base; patella environ trois fois plus longue que large, atténuée à la base, convexe en dessus, nullement en dessous; tibia visiblement plus court que la patella, légèrement atténué à la base; tarse plus long que le tibia, étroit, longuement atténué, garni de crins fauves, serrés; bulbe très volumineux, plus long que patella et tibia réunis et plus de deux fois plus large, un peu plus convexe en avant qu'en arrière, peu atténué aux extrémités; pointe terminale au moins d'un tiers plus courte que le lobe, étroite dès la base, atténuée vers le milieu, un peu élargie, comprimée et tronquée à l'extrémité, avec l'angle externe prolongé par une apophyse courte et grêle donnant naissance, vers le milieu de son bord interne, à un stylum grêle, recourbé en arrière et replié en forme d'S.

Des Alpes, des Pyrénées et des montagnes du nord de l'Espagne.

Genre HARPACTES Templ.

27. HARPACTES CRASSIPALPIS, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 3,2 mill. — Pattes 4, 4, 2, 3.

Céphalothorax ovale court, à front large, fortement convexe, surtout en avant, brun rouge carminé foncé, finement et uniformément chagriné mat; à strie médiane très fine. — Yeux supérieurs presque connivents, en ligne assez courbée, la base des latéraux cependant en arrière du centre des médians, les médians un peu plus gros, ovales larges; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle à peine

aussi large que leur rayon. — Bandeau plus étroit que le diamètre des yeux antérieurs, mais plus large que leur intervalle. — Chélicères longues, atténuées, garnies au côté externe de petites granulations espacées. — Plastron chagriné mat avec un espace lisse en avant. — Pattes peu longues et assez robustes, brun rougeâtre clair, les antérieures un peu plus foncées; fémur I pourvu au côté interne, dans la seconde moitié, d'un groupe de 3 épines; fémur II pourvu dans la seconde moitié d'une ligne interne de 2 épines; fémurs III et IV pourvus en dessus de deux lignes d'épines semblables; patellas, tibias et métatarses I et II inermes; patella III pourvue de 2 petites épines en dessus; patella IV inerme; tibias et métatarses III et IV garnis d'épines.

♂. Patte-mâchoire très robuste; fémur large, très épais, claviforme; patella au moins trois fois plus longue que large, presque parallèle, non convexe en dessous; tibia un peu plus long que la patella, un peu plus étroit, cylindrique et légèrement courbe; tarse au moins de moitié plus court que le tibia, large à la base, très acuminé; bulbe volumineux et complexe; lobe basilaire ovale assez étroit, brusquement resserré à l'extrémité, néanmoins terminé par une forte dilatation (presque aussi volumineuse que le lobe) ovale transverse; partie rétrécie pourvue en avant




Fig. 7. Bulbe vu par la face externe. — Fig. 8. Le même vu par la face interne.

d'une large apophyse noire triangulaire, tronquée au sommet, avec les angles prolongés en petites pointes aiguës, et en arrière d'une apophyse conique un peu plus étroite et plus longue, supportant un long stylum un peu sinueux, rabattu transversalement sur le côté interne du bulbe.

Syrie (Ch. de la Brûlerie).

(1882)

1^{re} partie, 15.

28. *HARPACTES CORTICALIS*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge foncé, lisse en avant, très finement chagriné mat en arrière, assez convexe, un peu incliné en avant et en arrière. — Yeux supérieurs gros, égaux, connivents, en ligne assez courbée, la base des latéraux environ au niveau du centre des médians; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle plus étroit que leur rayon. — Bandeau plus étroit que le rayon des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, sensiblement striées, pourvues au côté externe, dans toute leur longueur, de granulations éparses. — Plastron, ♂ très finement chagriné dans le milieu, lisse en avant et sur les côtés; ♀ entièrement et finement chagriné mat. — Pattes assez longues, fauve-rouge vif; fémur I pourvu près l'extrémité, au côté interne, d'une épine fine et assez longue; fémur II, de 2; fémur III, de deux lignes de 2-2 et d'une basilaire; fémur IV, de 2 en dessus près la base; tibias et métatarses I et II inermes; III et IV épineux. — Abdomen étroit et cylindrique, gris blanchâtre testacé.

♂. Patte-mâchoire assez longue; fémur grêle, courbe et parallèle; patella grêle, légèrement atténuée à la base, plus de trois fois plus longue que large, pourvue d'une petite échancrure au côté externe dans la première moitié; tibia un peu plus long que la patella, grêle, très légèrement atténué à l'extrémité, pourvu de forts crins, surtout au côté interne; tarse beaucoup plus court que le tibia, plus large à la base et fortement atténué, garni, surtout en dessous, de forts crins longs; bulbe très simple, plus long que le tibia, étroit et allongé, longuement atténué à la base; pointe terminale simple, sétiforme et droite, formée de deux fines tiges accolées.

Corse I.

29. *HARPACTES MUSCICOLA*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun-rouge foncé, lisse en avant, très finement chagriné mat en arrière, à rebord noir aigu entier, assez convexe, incliné en avant et en arrière. — Yeux supérieurs gros, égaux, connivents, en ligne assez

courbée, la base des latéraux environ au niveau du centre des médians ; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle plus étroit que leur rayon. — Bandeau plus étroit que le rayon des yeux antérieurs. — Chélicères brun rouge, à peine striées, sans granulations ou pourvues de quelques petites granulations au côté externe, seulement à la base. — Plastron finement chagriné dans le milieu, lisse sur les bords. — Pattes assez longues, fauve rouge vif ; fémur I pourvu d'une seule épine près l'extrémité interne ; fémur II, d'une ligne de 3 dans la seconde moitié ; fémur III, de deux lignes de 2-2 ; fémur IV, d'une seule épine en dessus près la base ; tibias et métatarses I et II inermes ; III et IV épineux. — Abdomen étroit et cylindrique, gris blanchâtre testacé.

♂. Patte-mâchoire : fémur peu robuste, un peu courbe et parallèle ; patella plus de quatre fois plus longue que large, fortement atténuée à la base, pourvue d'une petite échancrure au côté externe dans la première moitié ; tibia près d'un tiers plus court que la patella, légèrement fusiforme, pourvu de longs crins, surtout en dessous ; tarse presque aussi long que le tibia, longuement et fortement atténué, subacuminé, garni de crins semblables ; bulbe piriforme assez large, pourvu à l'extrémité de deux pointes assez longues et très grêles, presque sétiformes, l'interne noire et arquée, l'externe membraneuse et presque droite.

Corse !.

30. HARPACTES MODESTUS, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun foncé rougeâtre ou olivâtre, lisse brillant en avant, très finement, à peine distinctement, chagriné en arrière, peu convexe. — Yeux supérieurs gros, presque connivents, les latéraux un peu plus gros que les médians, en ligne assez courbée, la base des latéraux environ au niveau du centre des médians ; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle beaucoup plus étroit que leur rayon. — Bandeau plus étroit que le rayon des yeux antérieurs, mais plus large que leur intervalle. — Chélicères brun rouge, légèrement striées, parsemées au côté externe de très petites granulations. — Plastron très finement chagriné, avec une large zone marginale lisse. — Pattes assez longues, fauve rougeâtre ; fémur I pourvu d'une épine fine et assez longue, près l'extrémité, au côté interne ; fémur II, de 2 ou 3 ; fémur III, d'une ligne

de 2-2 et d'une basilaire ; fémur IV, de 2 ou 3 en dessus, à la base ; tibias et métatarses I et II inermes ; III et IV épineux. — Abdomen étroit et long, gris blanchâtre testacé.

♂. Patte-mâchoire longue ; fémur grêle, courbe et parallèle ; patella grêle, à peine atténuée à la base, au moins quatre fois plus longue que large, pourvue d'une petite échancrure externe près la base ; tibia beaucoup plus long que la patella (près d'un tiers), cylindrique, garni de forts crins, surtout au côté interne ; tarse beaucoup plus court que le tibia, peu atténué, obtus, garni de crins semblables ; bulbe un peu plus court que le tibia, très simple, étroit et allongé, longuement atténué à la base ; pointe terminale simple, sétiforme et droite, formée de deux fines tiges accolées.

Basses-Alpes : Digne !. — Var : Sainte-Baume (R. P. Belon). — Alpes-Maritimes : Menton !, Sospel !, Saint-Martin-Lantosque !.

Dans les mousses et sous les écorces.

31. HARPACTES HISPANUS, sp. nov.

♂, ♀. [Céphaloth., long. 2 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge foncé, fortement chagriné, mais presque lisse en avant, à strie médiane très fine, à peine sensible. — Yeux supérieurs gros, égaux et connivents, en ligne fortement courbée, la base des latéraux en avant du centre des médians ; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle beaucoup plus étroit que leur rayon. — Bandeau plus étroit que le rayon des yeux antérieurs, mais plus large que leur intervalle. — Chélicères pourvues au côté externe de fortes granulations espacées. — Plastron densément et assez fortement chagriné, avec de petits espaces lisses formant taches, surtout en avant. — Pattes longues, grêles, fauve rougeâtre ; fémur I pourvu près l'extrémité, au côté interne, d'une épine fine et courte ; fémur II, d'une ligne de 2 ou 3 ; fémur III, en dessus, de deux lignes de 2-2 ; fémur IV, d'une seule épine plus longue, en dessus, à la base ; tibias et métatarses I et II inermes ; III et IV épineux. — Abdomen étroit, allongé, gris blanc testacé.

♂. Patte-mâchoire longue ; fémur grêle, courbe et parallèle ; patella très longue et grêle, plus de six fois plus longue que large, régulièrement

et longuement atténuée à la base, pourvue d'une petite échancrure au côté externe, près la base ; tibia visiblement plus court que la patella, garni latéralement de longs crins ; tarse presque aussi long que le tibia, étroit, peu atténué et obtus, garni de crins, longs en dessous à la base ; bulbe petit, étroit, allongé, longuement atténué à la base ; pointe terminale grêle dès la base, beaucoup plus courte que le bulbe, formée d'une petite tige sétiforme noire et d'une lame étroite et déprimée, membraneuse, un peu courbe et tronquée à l'extrémité.

Pyrenées-Orientales. — Catalogne.

Genre *DASUMIA* Thorell.

32. *DASUMIA* *ISTRIACA*, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2,5 mill. — Abdom., long. 3 à 4 mill.

Céphalothorax brun olivâtre clair, avec un fin rebord noir aigu, très finement et uniformément chagriné, peu convexe. — Yeux supérieurs en ligne fortement courbée, la base des latéraux au niveau du centre des médians, les latéraux légèrement séparés et un peu plus gros que les médians ; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle beaucoup plus étroit que leur rayon. — Bandeau environ égal à l'intervalle des yeux antérieurs. — Chélicères brun fauve, longues, presque parallèles, parsemées de granulations au côté externe. — Plastron brun fauve, finement chagriné, avec de petits points lisses et une zone marginale lisse. — Pattes assez longues, fauve testacé clair ; fémurs I et II pourvus d'une seule petite épine au côté interne près l'extrémité ; fémur III inerme ; fémur IV pourvu en dessus, près la base, d'une seule petite épine sétiforme ; tibias et métatarses I et II inermes ; III et IV épineux. — Abdomen ovale, blanchâtre testacé.




Fig. 9. Bulbe par la face externe.

♂. Patte-mâchoire robuste ; fémur épais, parallèle, courbe, convexe en dessus ; patella environ trois fois plus longue que large, un peu

atténuée à la base, nullement convexe en dessous ; tibia un peu plus long que la patella, presque cylindrique ; tarse à peine plus court que le tibia, peu atténué, obtus, garni de crins serrés ; bulbe piriforme, assez large, sa pointe terminale très développée, beaucoup plus longue que le lobe, d'abord dirigée en arrière, puis coudée en avant, pourvue en dessus, à la base, d'une petite apophyse noire et tronquée carrément, droite, parallèle dans sa partie terminale, son extrémité tronquée obliquement et un peu denticulée.

Istrie : Castelnovo (Stussiner).

Diffère de *D. tæniifera* Th. par sa taille plus petite, ses pattes plus longues et moins épineuses ; le bulbe du mâle, semblable par sa disposition générale, diffère par les détails, ainsi, la petite apophyse de la base est simplement tronquée, et la partie terminale de la branche principale est droite, nullement élargie, ni fusiforme.

Genre TEDIA, gen. nov.

Caractères essentiels des *Dysdera*, seulement :




Fig. 10. Pièces buccales. Lames-maxillaires, au delà de l'insertion du trochanter, très longues, très atténuées et un peu divergentes ; troncature interne très longue, très oblique et un peu concave ; pointe terminale subaiguë et un peu arquée en dedans. — Pièce labiale à peine deux fois plus longue que large, assez fortement atténuée dans la seconde moitié, tronquée et légèrement échancrée au sommet, pourvue de faibles stries submarginales. — Chélicères longues, atténuées et projetées ; bord de la rainure caréné, inerme. — Pattes médiocrement longues, assez robustes, presque inerme ; deux griffes tarsales accompagnées de fascicules de crins élargis.

Très voisin du genre *Dysdera*, mais s'en distingue par la forme toute différente des lames-maxillaires.

33. *TEDIA OXYGNATHA*, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 2,5 mill. — Pattes 1, 4, 2, 3.

Céphalothorax fauve rouge orangé vif, très lisse, brillant; ovale court, très convexe dans la partie céphalique, à front large. — Yeux supérieurs gros, égaux, en ligne peu courbée, la base des latéraux en arrière du centre des médians, les médians connivents, les latéraux à peine séparés; yeux antérieurs plus gros, largement séparés, leur intervalle presque de moitié plus large que leur diamètre. — Bandeau beaucoup plus étroit que le diamètre des yeux antérieurs. — Chélicères longues, très atténuées et projetées, fauve rouge orangé, très lisses, brillantes. — Plastron court et large, presque arrondi, fauve rouge, très lisse. — Pattes assez courtes, jaune clair, inermes, excepté deux petites épines sétiformes sur la face antérieure du tibia III, et en dessous une épine terminale plus forte au même article; une ou deux épines terminales semblables aux métatarses III et IV. — Patte-mâchoire




Fig. 11. Bulbe par la face externe.

jaune; patella et tibia presque égaux, celui-ci sensiblement atténué à la base et garni de crins fauves; tarse aussi long que le tibia, un peu atténué aux extrémités et très obtus; bulbe très simple, ovale allongé, étroit, terminé en pointe grêle, tronquée, simple, au moins de moitié plus courte que le lobe.

Syrie (Ch. de la Brûlerie).

Genre *HOLISSUS*, gen. nov.

Céphalothorax ovale court, convexe, marqué d'une strie médiane dans la partie thoracique, légèrement et entièrement rebordé. — Yeux, six, resserrés, disposés en ovale transverse, les quatre postérieurs en ligne légèrement courbée en arrière, presque connivents, les deux antérieurs plus gros, leur intervalle à peine égal à leur rayon. — Bandeau beaucoup plus

étroit que le diamètre des yeux antérieurs. — Plastron presque plan, large, plus long que large, atténué en arrière. — Chélicères assez longues, presque verticales, étroites et atténuées. — Lames-maxillaires longues, étroites et droites, arrondies, non anguleuses à l'extrémité externe, obliquement tronquées à l'interne, à peine déprimées. — Pièce labiale trois fois plus longue que large, presque parallèle, non à peine atténuée, tronquée droit, non échancrée au sommet, marquée de stries latérales n'atteignant pas son extrémité. — Abdomen ovale allongé; filières inférieures et supérieures également longues, les inférieures plus robustes. — Pattes longues, assez robustes, 4, 1, 2, 3; patellas, tibias et métatarses I et II pourvus en dessous de deux séries continues et serrées de longues épines très régulières, couchées en avant; fémurs des quatre paires, tibias et métatarses des deux paires postérieures pourvus d'épines isolées; trois griffes tarsales sans fascicules ni scopulas. — Téguments du céphalothorax et du plastron finement chagrinés.

L'espèce pour laquelle je propose ce genre a entièrement le faciès d'un *Harpactes* de moyenne taille, mais elle s'en distingue à première vue par les deux séries de longues épines serrées qui garnissent le dessous de ses patellas, tibias et métatarses aux deux premières paires; par ce caractère singulier, l'*Holissus unciger* se rapproche un peu du genre *Ariadne*.

34. HOLISSUS UNCIGER, sp. nov.

♂, ♀. Céphaloth., long. 2,2 à 2,5 mill. — Abdom., long. 3,5 à 4 mill.
Pattes 4, 1, 2, 3.

Céphalothorax ovale, assez convexe, brun rougeâtre clair, finement et entièrement chagriné, à rebord mince, aigu et entier, à strie médiane fine et assez longue. — Yeux supérieurs gros, presque égaux, en ligne fortement courbée, la base des latéraux environ au niveau du centre des médians, les latéraux ovales, très légèrement séparés; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle un peu plus étroit que leur rayon. — Bandeau plus étroit que le rayon des yeux antérieurs. — Abdomen ovale allongé, gris blanc testacé. — Plastron finement chagriné mat. — Chélicères longues, parallèles, pourvues de quelques petite

granulations très espacées. — Pattes fauve rougeâtre clair, longues (surtout ♂); fémur I pourvu au côté interne, dans la seconde moitié, d'un groupe de 6 épines; fémur II, d'une ligne de 2; fémur III, de deux lignes de 4-2; fémur IV, près la base, d'une ligne dorsale de 3 épines rapprochées et d'une petite épine supéro-interne; patellas, tibias et métatarses I et II pourvus en dessous de deux lignes continues et serrées de longues épines couchées.

♂. Patte-mâchoire longue; fémur robuste, un peu courbe, atténué près de l'extrémité; patella plus de trois fois plus longue que large, parallèle, plus étroite que le fémur; tibia un peu plus long que la patella, aussi étroit, un peu atténué près la base, garni latéralement de longs crins; tarse presque aussi long que le tibia, un peu plus large, légèrement fusiforme, garni de crins semblables; bulbe piriforme court, sa pointe terminale très développée, beaucoup plus volumineuse que le lobe, en forme d'épais bourrelet rougeâtre, fortement sinueux en forme d'S et dessinant un fer à cheval ouvert par le bas, avec chacun des angles prolongé par une apophyse lamelleuse noire, l'externe large et tronquée carrément avec les angles prolongés, aigus, l'interne plus longue, étroite et lancéolée.

Corse !. — Dans les forêts de hêtres des montagnes de l'intérieur.

Genre HARPASSA, gen. nov.

Céphalothorax ovale court, convexe, marqué d'une strie médiane dans la partie thoracique, légèrement rebordé en avant, nullement en arrière. — Yeux, six, resserrés, disposés en ovale transverse; les quatre postérieurs en ligne presque droite; les deux antérieurs un peu plus gros, leur intervalle environ égal à leur rayon. — Bandeau aussi large que le diamètre des yeux antérieurs. — Plastron convexe, très large, cependant plus long que large, atténué et arrondi en arrière. — Chélicères médiocrement longues, peu atténuées et verticales, à crochet peu long, robuste et recourbé. — Lames-maxillaires longues, étroites et droites, sans angle au côté externe, arrondies à l'extrémité externe, obliquement tronquées à l'interne, convexes à la base, ensuite un peu déprimées. — Pièce labiale trois fois plus longue que large, fortement atténuée et très obtusément

tronquée au sommet, presque arrondie, non échancrée, sans stries latérales ni rebord. — Abdomen ovale allongé ; flières inférieures et supérieures également longues, les inférieures plus robustes. — Pattes très fines et très longues, 1, 4, 2, 3, inermes ; hanches allongées ; trois griffes tarsales sans fascicules ni scopulas. — Téguments du céphalothorax et du plastron coriacés.

L'espèce type de ce nouveau genre est un petit Dysdéride des montagnes de la Corse, remarquable par la grande longueur et la gracilité de ses pattes, ce qui lui donne un peu l'aspect d'un *Pholcus* ; ses pattes sont inermes, et sa pièce labiale, très atténuée, est dépourvue de stries latérales, ce qui le distingue suffisamment des *Harpactes*. — Je ne connais que le mâle.

35. HARPASSA TENUIPES, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 2 mill. — Abdom., long. 2,5 mill.

Pattes 1, 4, 2, 3. = 10. 9. 9,5. 7,5.

Céphalothorax brun rouge clair vif, ovale assez court, convexe, à strie fine et assez longue, entièrement et fortement granuleux rugueux. — Yeux supérieurs très gros, en ligne presque droite, les médians connivents, les latéraux bien séparés et plus gros que les médians ; yeux antérieurs à peine plus gros que les latéraux postérieurs, leur intervalle un peu plus étroit que leur rayon. — Bandeau presque aussi large que le diamètre des yeux antérieurs. — Abdomen ovale étroit, gris blanc testacé, à pubescence fauve, fine et peu serrée. — Plastron brun rouge, cordiforme large, convexe, fortement rugueux réticulé. — Chélicères robustes, convexes, médiocrement longues, garnies de fines granulations au côté externe. — Pattes très longues, très fines, jaune clair testacé, inermes. — Patte-mâchoire relativement courte et fine ; fémur presque parallèle ; patella assez courte, convexe ; tibia presque d'un tiers plus long que la patella, légèrement atténué à la base, garni latéralement en dessous de longs crins fins ; tarse très long, plus long que le tibia, grêle et cylindrique ; bulbe très simple, en ovale étroit, très allongé, presque également atténué à la base et à l'extrémité, terminé en pointe fine, simple, un peu arquée en dedans.

Corse I. — Sous les pierres, dans les hautes montagnes.

Genre RHODE, gen. nov.

Céphalothorax ovale assez large, convexe, non rebordé, brusquement rétréci au bord postérieur et prolongé au-dessus du pédicule. — Yeux, six, très resserrés, subconnivents, disposés en ovale transverse, les quatre postérieurs en ligne arquée en arrière, les antérieurs beaucoup plus gros que les postérieurs, presque également resserrés. — Bandeau étroit. — Plastron très large, presque arrondi, convexe, prolongé en arrière au-dessous du pédicule. — Chélicères médiocrement longues, peu atténuées, verticales. — Lames-maxillaires longues, étroites et droites, sans angle au côté externe, arrondies à l'extrémité externe, obliquement tronquées à l'interne, convexes à la base, ensuite un peu déprimées. — Pièce labiale au moins trois fois plus longue que large, très légèrement atténuée, tronquée droit, non échancrée au sommet, marquée d'une strie latérale profonde, n'atteignant pas l'extrémité. — Pédicule abdominal très long et cylindrique. — Abdomen ovale court, recouvert en dessous (au moins chez le mâle) d'une grande plaque chitineuse, n'atteignant pas les filières; filières inférieures robustes et assez longues, les supérieures très courtes. — Pattes peu longues, 4, 1, 2, 3, assez robustes, inermes; hanches rejetées en dehors, les postérieures subglobuleuses; trois griffes tarsales sans fascicules de scopulas. — Téguments très fortement coriacés, épais.

L'espèce pour laquelle je propose ce nouveau genre est de la taille des petits *Harpactes*; son faciès la rapproche surtout des *Dysdera* du groupe de *Ninnii* et *flavitaris*; elle se distingue cependant à première vue de tous les représentants de la famille par la singulière conformation de son céphalothorax et de son plastron, l'un et l'autre prolongés en arrière sur le pédicule abdominal qui est très long.

Je ne connais que le mâle; il est probable que chez la femelle l'abdomen n'offre pas de scutum ventral.

36. RHODE SCUTIVENTRIS, sp. nov.

♂. Céphaloth., long. 1,6 mill. — Abdom., long. 2 mill.

Pattes 4, 4, 2, 3.

Céphalothorax brun rouge carminé presque noir, ovale assez allongé, convexe, régulièrement garni de très fortes granulations transverses et obliques ou arrondies; partie céphalique longue et parallèle; partie thoracique dépourvue de strie, un peu prolongée en arrière sur le pédicule. — Yeux supérieurs très gros, égaux, ovales, en ligne presque droite, les médians connivents, les latéraux un peu séparés; yeux antérieurs beaucoup plus gros que les supérieurs, leur intervalle beaucoup plus étroit que leur rayon. — Bandeau environ égal au rayon des yeux antérieurs. — Pédicule abdominal long, coriacé. — Abdomen ovale court, un peu élargi en arrière, en dessus gris blanc testacé, en dessous couvert d'une plaque chitineuse brun rouge presque lisse, arrondie en arrière et n'atteignant pas tout à fait les filières. — Plastron cordiforme très large, convexe, très fortement chagriné réticulé. — Chélicères courtes, très robustes et convexes, finement granuleuses au côté externe. — Pattes brun rouge carminé, courtes, robustes, surtout les fémurs, inermes. — Patte-mâchoire relativement courte; fémur comprimé; patella assez longue, convexe, atténuée à la base; tibia à peine plus long que la patella, assez fortement atténué à la base; tarse un peu plus long que le tibia, plus étroit, longuement atténué; bulbe grand, simple, piriforme, plus longuement atténué à la base qu'à l'extrémité, sa pointe terminale assez longue, droite, très fine, presque sétiforme.

Pyrénées cantabriques : col de Pajares (Ch. de la Brûlerie).

Genre SALSULA, gen. nov.

Céphalothorax large en arrière, fortement atténué en avant, à front néanmoins large et obtus; plan en dessus, fortement incliné en arrière dans le tiers postérieur. — Yeux, six, disposés en groupe transverse au

moins deux fois plus large que long et occupant presque toute la largeur du front, de chaque côté deux yeux latéraux connivents, deux médians placés assez en arrière, au niveau des latéraux postérieurs. — Bandeau beaucoup plus large que les yeux antérieurs et légèrement incliné en avant. — Pattes longues, 4, 2, 1, 3, fines; fémurs peu robustes, semblables et cylindriques; fémurs et tibias armés d'épines fines; intervalle des hanches de la 4^e paire beaucoup plus étroit que leur longueur; deux griffes tarsales fines portées par un article unguifère. — Téguments fins, garnis de crins isolés.

Ce genre appartient au groupe des *Oonopides* et est surtout voisin du genre *Orchestina* E. S. (= *Schænobates* E. S., non Bl.) (1), dont il diffère par la forme du céphalothorax, les pattes des quatre paires également grêles, les yeux médians plus reculés, étant placés au niveau des latéraux postérieurs. — Le *S. longipes* est la plus grande espèce du groupe des *Oonopides*; son faciès rappelle celui d'un petit *Loxosceles*.

37. *SULSULA LONGIPES*, sp. nov.

♂. Long. 2,7 mill.

Céphalothorax et pattes fauve testacé très clair. Abdomen blanc testacé, garni de crins isolés. — Fémur I pourvu de 2 épines sur la face antérieure et de 2 dorsales; fémur II, d'une seule dorsale; fémurs III et IV, de 2 ou 3 dorsales; tibias I et II pourvus de 3 longues épines latérales internes et externes. — Patte-mâchoire courte; patella large et convexe; tibia plus long que la patella, atténué; tarse petit, obtus; bulbe piriforme large, subglobuleux, prolongé en pointe, assez large et cylindrique dans la première moitié, très grêle et arquée dans la seconde.

Un seul mâle, trouvé à Ramleh, près Alexandrie, par M. A. Letourneux.

(1) Nous proposons le nom d'*Orchestina* pour l'espèce que nous avons décrite sous le nom de *Schænobates Pavesii* (in Mém. Soc. roy. Sc. Liège, 1873); le *Schænobates Walckeri* Blackwall, dont nous rapprochions alors cette espèce, paraît totalement différent et n'appartient probablement pas au sous-ordre des *Araneæ gnaphosæ*.

Genre OONOPS Templ.

38. OONOPS PROCERUS, sp. nov.

♂, ♀. Long. 3 à 3,2 mill.

Céphalothorax fauve rouge clair, parsemé de forts crins noirâtres, large et arrondi latéralement, fortement atténué en avant, à front étroit et obtus; convexe vers le tiers postérieur, très fortement incliné en arrière, plus légèrement en avant. — Groupe oculaire occupant presque toute la largeur du front; yeux gros, peu inégaux; médians connivents, allongés, droits au côté interne; latéraux postérieurs visiblement plus petits, obliques, touchant presque aux médians; latéraux antérieurs aussi gros que les médians, presque arrondis, sensiblement et également séparés des médians et des latéraux postérieurs. — Bandeau un peu plus étroit que les yeux antérieurs, tronqué droit, avec les angles un peu saillants et coniques, pourvu de quelques crins très forts, aigus. — Abdomen ovale allongé, convexe, rouge orangé vif, parsemé de crins gris épais. — Pattes assez longues et robustes, jaune testacé; fémurs larges et comprimés; fémur I pourvu dans la seconde moitié, au côté interne, de 3 ou 4 longues épines fines perpendiculaires rapprochées, un peu bulbeuses à la base; fémurs II, III et IV pourvus en dessus, dans la première moitié, d'une seule épine semblable, plus courte aux paires postérieures; tibias I et II pourvus en dessous de deux lignes de 4-4 épines fortes et très longues, couchées en avant; métatarses I et II, de deux lignes de 2-2 épines semblables; tibias et métatarses III et IV pourvus chacun de 2 épines latérales internes et externes et de deux paires d'épines inférieures.

♂. Patte-mâchoire assez courte; fémur court, grêle et cylindrique; patella très large et convexe à l'extrémité, atténuée à la base, piriforme; tibia environ de même longueur que la patella, aussi large, faiblement atténué à l'extrémité; tarse plus étroit et plus court que le tibia, sub-acuminé, pourvu de longs crins; bulbe volumineux, très large, piriforme déprimé, presque discoïde à la base, sa pointe terminale plus courte

que le lobe, très arquée en dedans, étroite et cylindrique à la base, fortement et brusquement élargie à l'extrémité en lobe cylindrique et tronqué, avec la troncature pourvue dans le haut d'une petite carène arquée finement denticulée.

Pyrénées-Orientales : La Preste, près le Prats-de-Mollo !; Conat, près Prades !.

Commun sous les grosses pierres un peu humides. Le cocon, déposé dans de petites cavités de la pierre, est composé d'une toile blanche disciforme et tendue recouvrant les œufs ; ceux-ci, au nombre de 3 ou 4 seulement, sont très gros et fortement colorés en rouge. La femelle se tient sur son cocon à découvert.

39. OONOPS ANGUSTATUS, sp. nov.

♂, ♀. Long. 4,8 mill.

Céphalothorax fauve rouge orangé clair, parsemé de crins assez courts et robustes ; ovale allongé, atténué en avant, à front étroit et obtus, peu convexe, cependant fortement incliné en arrière dans le tiers postérieur, à peine incliné en avant. — Groupe oculaire occupant presque toute la largeur du front ; yeux gros et presque égaux ; médians connivents, allongés, droits ; latéraux ovales, connivents, l'antérieur un peu plus gros, touchant presque au médian, le postérieur sensiblement séparé. — Bandeau plus étroit que le diamètre des yeux antérieurs. — Abdomen ovale allongé, blanc mat, parsemé de forts crins. — Pattes peu longues, fauve testacé, avec les fémurs fortement teintés de rouge ; fémurs robustes et comprimés ; sans épines, garnies de crins couchés très robustes, obtus et serrés, principalement aux tibias et métatarses antérieurs. — Plastron et pièces buccales parsemés de crins obtus. — Patte-mâchoire de la femelle garnie de crins semblables très serrés au tarse. Patte-mâchoire du mâle comme chez *O. pulcher*.

Hérault : bois de Fondfroide, près Montpellier !. — Var : île de Porquerolles !. — Corse !.

Se trouve dans les bois de pins, dans les tas de feuilles au pied des arbres.

40. OONOPS INERMIS, sp. nov.

♀. Long. 2,5 mill.

Céphalothorax fauve testacé, avec une fine ligne brune marginale, parsemé de crins fins, ovale court et large, fortement atténué en avant, à front étroit et obtus; fortement convexe vers le tiers postérieur, incliné en avant et en arrière. — Groupe oculaire occupant toute la largeur du front; yeux médians ovales, courts, connivents; latéraux connivents, presque égaux, également très rapprochés des médians. — Bandeau un peu plus étroit que les yeux antérieurs. — Abdomen ovale, convexe, gris violacé, parsemé de crins fins. — Pattes fauve clair testacé, assez longues, avec les fémurs assez robustes et comprimés; complètement inermes, garnies de crins fins mêlés en dessous, aux tibias et métatarses, de crins obtus. — Tarse de la patte-mâchoire de la femelle garni de crins obtus.

Var : vallée de Dardennes, près Toulon !.





Simon, Eugène. 1882. "Études Arachnologiques. 13e Mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des Dysderidae." *Annales de la Société entomologique de France* 2, 201–240.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/35956>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/24072>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.