

Symbolae ad Mycologiam fennicam.

Auctore

P. A. Karsten.

XI.

(Societati exhibitum die 2 Decembris 1882.)

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. olim in paroecia Tyrvis a nobis lectus est.

Hemicybe auricula (Fr.) Karst. var. *robusta* Karst.

Simplex. Pileus ochraceo-alutaceus (siccus), margine involuto, costato-rugoso. Caro basin versus usque ad 1 cm. crassa, in margine tenuis (vix 1 mm.). Lamellae 3 mm. latae. Sporae sphaeroideae, diam. circiter 3 mmm.

Ad truncos Pyri mali in paroecia Pojo, m. Sept. 1859, legit Lib. Bar. Edv. Hisinger.

Inocybe? pollicaris Karst. (N. sp.)

Pileus carnosulus, campanulato-expansus, squamis muricatis squarrosus, alutaceo-fuscescens, vix 1 cm. latus. Stipes aequalis, squamulis flocculosis, minutis squarrosus, pileo concolor, vix 3 cm. altus. Lamellae adnexae, confertae, ventricosae, cinnamomeo-fuscescentes (siccae subatrae). Sporae late ellipsoideae, fuscescentes et pellucidae (sub micr.), longit. 3—5 mmm., crassit. 2—3 mmm.

Helsingforsiae, in caldariis, m. Aprili, legit W. Nylander.

Pholiota subsquarrosa Fr. in Fennia australi haud nimis rara.

Crepidotus mollis (Schaeff.) Fr. in paroecia Tyrvis obvenit. — Sporae sphaeroideae, uniguttulatae, diam. 5—6 mmm. Basidia clavata, circ. 18 mmm. longa et 6 mmm. crassa.

Bjerkandera pallescens (Fr.) Karst.

**Bj. pura* Karst. (N. subsp.)

Pilei imbricati, reniformes vel semicirculares, basi decurrente con crescentes, pallescentes, 5—15 cm. lati. Pori albi, sicci lutescente pallidi, subinde laceri.

Ad truncum Ulmi et Alni in horto botanico Helsingforsensi hieme leg. W. Nylander.

Polyporellus varius (Fr.) **P. tubaeformis* Karst. (N. subsp.)

Pileus fere aequaliter carnosus, tubaeformis, repandus, glaberrimus, badius, 1—4 cm. latus. Stipes centralis, flexuosus, 2—4 cm. altus, nigrescente cinereus. Pori albid.

Ad ramos putrescentes Alni in Mustiala, m. Aug. 1880, legimus.

Daedalea Oudemansii Fr. var. *fennica* Karst.

Pileus carnososuberosus, tenuis, planus, basi decurrente con crescent, subvillosusstrigosus, glabrescens, laevigatus, azonus, pallescens, margine acuto, patente, demum passim nigricante, uncialis, intus concolor. Pori varii, laceri, concolores, demum (siccitate?) sordide fusciscentes. Sporae sphaeroideoellipsoideae, longit. 4 mmm., crassit. 3 mmm.

Ad lignum pineum sectum in paroecia Lempälä.

A *D. Oudemansii* pileo pallescente, unicolore, primitus undiqve velutino, azono differre videtur. Dissepimenta marginalia tenuia, poros angulatos, basalia crassiora sinulos angustos, flexuosos lacero-dentatosqve formantia.

Physisporus lacer Karst. (N. sp.)

Effusus, confluens, membranaceus, tenuis, mollis, laxe adhaerens, albus, ambitu tenui, byssino, concolori. Hymenium flavum. Pori minuti, angulati vel subrotundi, inaequales, dissepimentis tenuissimis, demum valde laceris.

Ad lignum Pini in par. Asikkala, m. Martio, leg. J. P. Norrlin.

A *Physisporo* mollesco affini poris angulatis, flavis receptaculoqve membranaceo diversus.

Physisporus callosus (Fr.) formam resupinatam *Tram. serialis* Fr. vix dubie sistit.

Antrodium hiantem Karst. (*Physisporum hiantem* Karst. Hattsv. II, p. 59) olim in par. Tyrvis legimus.

Trametes fraxinea (Bull.) Karst. in trunco *Fraxini excelsioris* in par. Jomala juxta praedium sacerdotale, m. Augusto 1881, a nobis deprehensa.

Fomes nigricans Fr. formam tantum *Fomit. igniarii* sistit.

Fomes protractus (Fr.) Karst. est status pileatus *Polypori contigui* Auctt. plur., vix Pers.

Fomes conchatus (Pers.) Karst. formam vel statum juvenilem *Fomit. salicini* (Pers.) Karst., ut videtur, sistit.

Fomes Abietis Karst. Hattsv. II, p. 242 ad *Fomit. Pini* se refert, fere ut *Fom. conchatus* ad *Fomit. salicinum*.

Poria unita (Pers.) Karst. ad lignum et corticem *Abietis* et *Pini* lecta in Merimasku, Asikkala: J. P. Norrlin et Pojo: Edv. Hisinger.

Clavaria longipes Karst. (N. sp.)

Tota alba, clavata. Clavula oblongato-ovoidea, 0,2 mm. longa, 0,13 mm. crassa. Stipes longissimus, filiformis, aequalis, flexuosus, 2 mm. circiter altus et 0,065 mm. crassus.

In foliis exsiccatis in caldariis horti botanici Helsingforsiensis, m. Januario 1861, leg. W. Nylander.

Pro *Typhula* facile sumitur, sed sclerotia desunt.

Stereum evolvens (Fr.) nominandum est *St. laeve* (Pers.) Karst.

Hymenochaete centrifuga (Weinm.) Karst., *Thelephora* Weinm., *Corticium* (*Coniophora*) Fr. Hym. eur., prope Helsingforsiam a W. Nylander lecta, nobis nuper visa est. — Vegetatione habituque cum *Hym. abietina* (Pers.) Karst. Hym. Fenn. p. 37 convenit veraque *Hymenochaete* est, etsi nondum receptaculo pileato inventa est. Receptaculum coriaceum, cinereum vel atrum, fusco-tomentosum; hymenium dense tomentosum; sporae ignotae.

Corticium puberum Fr. ad lignum *Sorbi* in horto botanico Helsingforsiensis olim legit Prof. W. Nylander. — Sporae cylindraceae, rectae vel leniter curvulae, incolores, subinde

spurie uniseptatae, longit. 5—7 mmm., crassit. 1,5—2 mmm. Setulae bacillares, acutatae, pellucidae, longit. circiter 90 mmm., crassit. 8—10 mmm. (medio).

Corticium ochraceum Fr. a *Cort. radiosum* Fr. specie non distingvendum est.

Corticium nudum Fr. ad *Cort. incarnatum* (Pers.) se habet, ut *Cort. ochraceum* ad *Cort. radiosum*.

Telephora terrestris Ehrh. per totam Fenniam et Lapponiam (Kola) passim obvenit.

Hypochnus subfuscus Karst. **H. tristis* Karst. (N. subsp.)

Villo vel tomento laxo, crasso, fusco contextus, ambitu similari, demum hymenio spurio crassiusculo, contiguo, laevi, fusco-ferrugineo-pulveraceo praedito, nigrescente, in olivaceum, subinde viridem vergente praeditus. Sporae sphaeroideae, crasse aculeatae, diam. 8—12 mmm.

Varia corpora incrustat. Semel m. Aug. in regione Mustialensi observavimus. Hyphae 5 mmm. crassae.

Hypochnus fuscus (Pers.) Karst. var. *radiosus* Karst.

Subtus pallide fibrillosus, ambitu fibrillis pallidis fimbriatus.

Helsingforsiae, supra lignum, m. Oct. 1858, legit. W. Nylander.

Calocera viscosa (Pers.) Fr. var. *dilatata* Karst.


Compressa, rami sursum dilatati, apice retusi.

In truncis putridis Pini observata est in Pojo a Lib. Bar. Edv. Hisinger et in Mouhijärvi a nobis.

Tremella intumescens Engl. Bot. e Fennia australi nobis nunc cognita est.

Tremella indecorata Somm. ad oppidum Jakobstad et in paroecia Messuby a nobis lecta est.

Mustiala, m. Novembri 1882.





Karsten, P. A. 1882. "Symbolae ad mycologiam Fennicam. XI." *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 9, 68–71.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/38384>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/246675>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.