

rhizomes couverts d'hyphes rouges identiques à celles du *Rhizoctone* du trèfle, et que, autant qu'on en pouvait juger, il se développait de ce mycélium des périthèces à parois pseudo-parenchymateuses rouge pourpre, revêtues de soies rouge foncé ; ces périthèces renfermaient des thèques avec 8 spores oblongues un peu recourbées. D'après la structure des périthèces, ils semblent appartenir au genre *Trichosphaeria*, ce qui peut-être peut fournir une indication relativement à la place que le *Rhizoctonia medicaginis* devra occuper dans la classification, lorsqu'on en trouvera les périthèces complètement développés.

Je ferai encore remarquer que, chez des exemplaires malades d'un an de *Fagus sylvatica* d'une pépinière en Séeland, j'ai trouvé les racines recouvertes d'un mycélium rose du *Rhizoctonia* et de scléroties noires tout à fait semblables aux tubercules infectieux décrits par Rob. Hartig chez le *Rosellinia quercina*.

Fungi novi vel minus bene cogniti Fenniae et Galliae descripsit P.-A. KARSTEN

CLITOCYBE LAUTA Karst.

Pileus carnosulus, e convexo subinfundibuliformis, laevis, sub-albus, nitens, glaber, 2-4 cm. latus. Stipes aequalis, basi leviter incrassatus, glaber, albidus, squamulis adpressis minimis fuliginis praeditus, circiter 6 cm. altus et 2 mm. crassus. Lamellae adnato-decurrentes, confertae, albae. Sporae ellipsoideae, longit. 8-10 mm., crassit. 4-5 mm. — Locis graminosis, praecipue in marginibus paludum, circa Mustiala Fenniae, m. Aug.

LENTINUS DOMESTICUS Karst.

Pileus carnosus-lentus, margine tenui, subinfundibuliformis, irregularis, obliquus, cuticula in squamas adpressas vel revolutas subobscuriores diffracta, ferrugineus, circiter 18 cm. latus, carne dilute fulvo-ferruginascente. Stipes excentricus, deorsum attenuatus, curvatus, solidus, ferruginascens, squamis innatis obsessus, basi intus albidus, longit. circ. 9 cm., crassit. circ. 3 cm. Lamellae longe decurrentes, subconfertae, utrinque aequaliter attenuatae, dentatae, dilute fulvo-ferruginascentes, demum leviter in carneum vergentes, usque ad 3 cm. latae. Sporae ovoideae, hyalinae, longit. 3-5 mm., crassit. 2-3 mm. — Ad tabulamenta in officina infectoris, Wiksberg, Fenniae.

BJERKANDERA MOLLUSCA Karst.

Alba. Pileus carnosus, gelatinoso-mollis, effuso-reflexus, elongatus, laevigatus, filamentis nonnullis, longiusculis praeditus, margine acuto. Pori inaequales, rotundi, elongati vel flexuosi, laceri, molles. — Ad ligna putrescentia Pini sylvestris in paroecia Tam-mela Fenniae.

FOMES THELEPHOROIDES Karst.

Pileus sessilis, subdimidiatus, subimbricatus, seruposus vel squamosus, azonus, umbrinus vel nigrescente-fuscus, intus floccosus, fomentarius, ferrugineus, margine tenui, lacero, pallidiore, 4-5 cm. latus et longus. Pori medii, inaequales, rotundi, oblongati vel sub-

flexuosi, glaucopruinosi. — Ad truncum *Pini sylvestris* prope Mustiala Fenniae, v. Aug.

Forma et colore *Telephoram laciniatam* omnino refert.

PHYSISPORUS INCONSTANS *Karst.*

Effusus, pertenuis, separabilis, mollis, nudus, siccitate ambitu tenuiter flocculoso-furfuraceus, albus, fractus dilute violascens. Pori stipati, rotundi, subintegri, exigui, sicci pallidi vel flavidi. Sporae elongatae, curvatae, longit. 3-4 mmm., crassit. 0,5-1 mmm. — In ligno putrido *Populi tremulae* in ditione Mustialensi Fenniae.

PHYSISPORUS AURANTIACUS (Rostk. 4, tab. 58) var. TALOISENSIS *Karst.*

Effusus, separabilis, crassiusculus, ambitu subnudo. Pori stipati, carnosi, minuti, angulati, inaequales, denticulati, tenues, vulgo obliqui, vitellini. — Ad ligna vetusta pinea prope Mustiala Fenniae.

PHYSISPORUS LUTEOALBUS *Karst.*

Effusus, separabilis, determinatus, glaber vel subglaber, subiculo tenuissimo, membranaceo. Pori minimi, tenues, rotundati, rarius oblongati, integri, demum saepe angulati et sublaceri, 1-2 mm. Altissimi, albo-lutescentes. Sporae oblongatae vel subellipsoideae, rectae; longit. 3-6 mmm., crassit. circiter 2 mmm. — In ligno putrescente pineo prope Mustiala in Fenniae.

PORIA CANESCENS *Karst.*

Irregulariter seriatimve effusus, coriaceus, separabilis, determinatus, glaber, intus ferruginascens. Pori minuti vel submedii, inaequales, rotundi vel flexuosi, saepe obliqui, firmi, canescentes, fracti fuscescentes, 2-3 mm. alti. Sporae oblongatae, curvatae, longit. 5-6 mmm., crassit. 1,5-2,5 mmm. — Ad corticem vetustum *Alni incanae* in alnetis udis in agro Mustialensi.

SARCODON FENNICUS *Karst.*

Syn. *Sarcodon scabrosus* (Fr.) Quél. var. *Fennicus* *Karst.* Haltsv. II, p. 104.

Pileus carnosus, fragilis, inaequalis, primitus flocculoso-squamulosus, demum diffractus, rufescente testaceus, dein obscurior, margine undulato lobatoque, 5-10 cm. latus, carne alba. Stipes sat validus, inaequalis, deorsum attenuatus, flexuosus vel curvatus, glaber, pileo concolor, basi acutata leviter albotomentellus, extus intusque subcoerulescente vel nigrescente cinereus, 2-8 cm. longus. 1-3 cm. crassus. Aculei decurrentes, aequales, subulati, ex albido fusci, circa 4 mm. longi. Sporae ellipsoideo-sphaeroideae vel subsphaeroideae, asperae, fuscescentes, longit. 4-6 mmm., crassit. 3-5 mmm. — Locis sabulosis in silva mixta haud procul a Mustiala Fenniae.

Sapore valde acerbo a *S. scabroso* (Fr.) affini mox dignoscitur, qua nota ad *S. acrem*. Quél. in Bull. de la Soc. bot. de Franc. Tom. XXIV, séance. du 22 oct. 1877. p. 324-XXX II, Pl. VI, f. I, accedit, a qua vero colore distat.

CONIOPHORA CROCEA *Karst.*

Membranacea, arcte adnata, contigua, glabra, ambitu similari, crocea, hymenio subtiliter setuloso-pulveraceo, ochraceo, laevi. Sporae subellipsoideae, flavae, longit. 6-9 mmm., crassit.



Karsten, P. A. 1887. "Fungi novi vel minus bene cogniti Fenniae et Galliae."
Revue mycologique 9, 9–11.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/43435>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/246683>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.