

**NOTE SUR UNE ESPÈCE AFRICAINE
D'ALCÉDINIDÉ, LE MYIOCEYX LECONTEI
(CASSIN)**

Par J. BERLIOZ

Ainsi que P. PFEFFER l'a relaté brièvement dans un tout récent travail sur des Oiseaux de Côte d'Ivoire (*Bull. Mus. Hist. Nat.*, 1961, p. 367), le Professeur M. LAMOTTE a rapporté de l'une de ses missions au Mont Nimba (Haute-Guinée), en 1956, deux spécimens d'une espèce d'Oiseau particulièrement rare, le *Myioceyx Lecontei* (Cass.), dont il a bien voulu faire don au Muséum. Ces deux spécimens, bien adultes, constituent donc avec le spécimen, ♀ immature, rapporté par PFEFFER lui-même de « Mama, Côte d'Ivoire », tout ce que l'on connaît jusqu'à présent avec certitude de l'existence de cet Oiseau en Afrique occidentale, à l'ouest du Ghana (= Côte de l'Or).

Rappelons tout d'abord que le *M. Lecontei*, ce petit Alcédinidé d'Afrique équatoriale, la plus petite espèce de toute la famille des Martins-Pêcheurs, doit précisément à sa taille si exiguë (comparable à celle d'un Roitelet) ainsi qu'à son habitat strictement cantonné aux régions de forêt dense, de passer si souvent inaperçu. De ce fait aussi, le nombre de ses dépouilles connues en collections et dans les musées se montre relativement faible, et le Muséum de Paris n'en possédait jusqu'ici qu'un exemplaire, provenant du Cameroun.

L'habitat pourtant de l'espèce est très vaste, et, maintenant que sa présence a été, comme il vient d'être dit, indéniablement établie dans l'important massif forestier d'Afrique occidentale, on peut admettre qu'elle existe dans toute l'immense zone forestière africaine qui s'étend depuis la Sierra Léone à l'ouest jusqu'au delà des Grands Lacs de l'Est africain, confirmant une fois de plus la remarquable homogénéité faunique du continent éthiopien.

Le premier spécimen connu (CASSIN 1856) fut un jeune, provenant du Gabon. Un an plus tard, G. HARTLAUB (*Syst. Orn. Westafr.*, 1857) décrivit l'adulte sous le nom de « *Ispidina ruficeps* » (p. 262), en ajoutant d'ailleurs assez curieusement en synonymie possible l'« *Ispidina nitida* Kaup », qu'il mentionne (p. 36) de Sierra Léone. Plus tard, B. SHARPE, au British Museum, en recevait un seul spécimen, adulte, en provenance de Fantee, Côte de l'Or. Je ne sais pas si d'autres captures ont été faites depuis lors en cette dernière région ; mais selon D. BANNERMAN (*Birds Trop. West Afr.*, 1933), l'espèce y est encore considérée comme extrêmement rare. Elle est par contre plus abondante, semble-t-il, dans le Cameroun méridional



Berlioz, J. 1962. "Note sur une espèce africaine d'Alcédinidé, le Myioceyx Lecontei (Cassin)." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 34(3), 200–201.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/241023>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/250887>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <http://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.