

dehors, une des petites saillies dont je viens de parler. En dehors de ce bourrelet, enfin, commencent les divisions du péricarpe. L'importance de cette disposition, tant au point de vue de la classification, qu'au point de vue de l'évolution morphologique, n'échappera à personne, je pense; aussi n'y insisterai-je pas davantage. Je rendrai compte, dans une prochaine note, des observations analogues que j'ai faites sur quelques autres Tulipes.

M. H. BAILLON. — *Liste des plantes de Madagascar* (suite de la page 332).

ANONACEÆ

UVARIA.

1. *U. Marenteria* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 304. — *Unona Marenteria* DC., *Syst.*, I, 487; *Prodr.*, I, 89, n. 4. — *Unona Marenteria* NOR. et DUP.-TH., *Gen. nov. madag.*, 18. — *Armenteria* DUP.-TH., herb.

Dupetit-Thouars. — *Humboldt*, n. 209, Manahar.

2. *U. Commersoniana* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 346.

Commerson (lib. Mus. et Juss.).

3. *U.?* *furfuracea* H. BN. — *Unona furfuracea* A. DC., *Mém. Anon.*, 29, n. 6. — *Houdetota volubilis* DUP.-TH., herb.

Dupetit-Thouars, *Madagascaria* (an *inquilina*?) (herb. Mus., Juss., DC.).

4. *Uvaria?* *callicarpa* H. BN. — *Hexalobus?* *callicarpus* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 347.

Chapelier, *Madag. costa orient.*

ARTABOTRYS.

1. *A. madagascariensis* MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 43. — *A. Hildebrandtii* O. HFFM., *Sert. pl. mad.*, 3.

Pervillé, n. 247, Nossibé. — *Boivin*, n. 2114³, Loucoubé. — *Hildebrandt*, n. 3044, Baly; n. 3274, Nossibé (*Herb. Mus. par. et lugd.-bat.*).

UNONA.

§ *Polyalthia*.

1. *U. Chapelieri*. — *Polyalthia Chapelieri* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 349.

Chapelier, Madag., costa orient.

2. *U. maritima*. — *Polyalthia maritima* H. BN, in *Adansonia*, VII, 348.

Dupetit-Thouars. — Boivin, S. Maria.

3. *U. Greveana*, spec. nov.

Fruticosa glaberrima ramosa; foliis distichis brevissime petiolatis oblongo-ellipticis, utrinque obtusiusculis; costa utrinque conspicua rufescente (ad 10 cent. long.); floribus parvis axillaribus solitariis; pedicello brevi pubescente. Calycis brevis foliola 3 cordato-ovata. Petala longiora crassa sessilia valvata; interiora 3 crassiora minora basi leviter angustata. Stamina crebra; connectivo ultra loculos dilatato truncato concaviusculo; loculis marginantibus linearibus. Carpella pauca, summo receptaculo breviter conico inserta; stylo acutiusculo brevissime papilloso. Ovulum 4, paulo supra loculi basin insertum adscendens.

Grévé, Mouroundava, n. 2, Madag. orient.

4. *U. Richardiana*. — *Polyalthia Richardiana* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 350. — O. HFFM., *Sert.*, 4.

Richard, Nossibé. — Boivin, n. 2114. — Hildebrandt, n. 3400. Nossibé.

§ *Popowia* (Endl.)

5. *U. Boivini*. — *Popowia Boivini* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 317. — O. HFFM., *Sert.*, 4.

Pervillé, — Boivin, Nossibé. — Hildebrandt, n. 3250, Nossibé; n. 3360, ins. Sakatia prope Nossibé.

6. *U. Pervillei*. — *Popowia Pervillei* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 317.

Pervillé, Nossibé. — Boivin, n. 2114², Nossibé, in sylv. Loucoubé et ad litt. maris.

7. *U. macrocarpa* (non DC.). — *Popowia? macrocarpa* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 216.

Boivin, Nossibé, ad litt. maris (1851).

8. *U.? glaucocarpa* — *Popowia glaucocarpa* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 319.

Pervillé, n. 376, Nossibé (1840).

§ *Clathrospermum*

9. *U. pilosa*. — *Popowia pilosa* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 323.

Chapelier (« vernac *Antoc* »). — *Boivin*, n. 2114³, Nossibé, in sylv. Loucoubé. — *Hildebrandt*, n. 3290, Nossibé.

‡ *Unonella*.

Adspectus et folia *Popowix*; cætera *Euunonæ*; flores *Polyalthiæ*, carpellis pluriovulatis.

9. *U. ambongoensis* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 350.

Pervillé, n. 675, Ambongo, in madidis.

BOCAGEA.

1. *B. heterantha* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 173; *Hist. des pl.*, I, 217, fig. 243-247.

Pervillé, n. 602, Ambongo, in sabulosis (« vernac. *Reilonbo* »). — *Hildebr.*, n. 3041, Baly (ex O. HFFM.).

XYLOPIA.

1. *X. buxifolia* H. BN, in *Adansonia*, IV, 143, not.

Dupetit-Thouars, Madagascar sept.

2. *X. Lastelliana* H. BN, in *Adansonia*, IV, 144, not.

De Lastelle, Madagascar or.

3. *X. Humblotiana*, spec. nov.

Arborea excelsa (ad 10 metr.); cortice ruguloso; ramis alternis. Folia obovata (circ. 4 cent.) vix petiolata, apice obtusa v. emarginata coriacea crassa integerrima, dite venosa, supra pallida glaucescentia; costa purpurascens. Flores axillares solitarii nuntantes; calyce brevi obtuse 3-lobo. Petala 6 albida (ad 1 cent. longa) supra basin dilatatam coarctata, apice longe attenuata. Stamina ∞ , receptaculo in tectum depressum supra germina producto inserta linearia; connectivo ultra loculos dilatato convexiusculo. Carpella ad 10; germinibus ∞ ovulatis; stylis angustis acutatis. Baccæ (scarlatinæ) arcuatæ obtusæ (4 cent. longæ, 2 cent. latæ), intus pulposæ, basi sensim angustatæ, odore aromatico.

Humblot, n. 117, ad lacum Nossibé, aprili florif. et fructif.

‡ *Pseudanona* H. BN.

4. *X. amplexicaulis* H. BN, in *Adansonia*, V, 142; *Hist. des pl.*, I, 226, not. 5. — *Anona amplexicaulis* LAMK, *Dict.*, II, 127. — DC., *Prodr.*, I, 86, n. 22. — BOJ., *Hort. maur.*, 5. — DUN., *Mém. Anonac.*, 76, t. 7.

Commerson, Madagascaria (hb. Mus. par. et Juss.).

5. *A. Lamarckii* H. BN, in *Adansonia*, V, 142, n. 2; *Hist. des pl.*, I, 226, 227. — *Anona grandiflora* LAMK. — DC., *Prodr.*, I, 86, n. 21 (nec alior.).

Commerson, Madagascaria (an a Mauritio introd ?) (herb. Juss., Thouin, Mus. par.)

ANONA.

1. *A. reticulata* L.

Hildebrandt, n. 3236. Madagascaria bor.-or. (introd.), Nossi Cumba, in littor.

2. *A. squamosa* L.

Madagascaria bor. or. (introd.).

3. *A. senegalensis* PERS.

Var. *Porpetac* (*A. Porpetac* BUN in herb.).

Boivin, n. 2115. — Pervillé, n. 362, Nossibé.

MONODORA

1. *M. madagascariensis* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 299, not.

— *Hexalobus madagascariensis* A. DC., *Mém. Anon.*, t. 5 A.

Bernier, 2^e env., n. 131, S. Maria, ad Diego-Suares, sec. riv. Ampanhi (herb. Mus., herb. DC.)

MONIMIACEÆ.

TAMBOURISSA.

1. *T. purpurea* A. DC. *Prodr.*, XVI, 659, n. 5. — *Ambora purpurea* TUL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, III, 30; *Monogr. Monim.*, 301, t. 26.

Boivin, n. 1729, S. Maria, in sylv. Tafondrou. — Bernier, 1^{er} env., n. 262, S. Maria.

2. *T. religiosa* A. DC., *loc. cit.*, n. 6. — *Ambora religiosa* TUL., *Mon.*, 302, t. 27.

Commerson, Madag. (hb. Juss.). — Pervillé, n. 295, Nossibé, in sylv. Loucoubé; n. 328, in vic. Passandarra. — Boivin, S. Maria, in coll. Andiboufolathre. — Poivre, Madag. bor. (hb. Juss.).

3. *T. Boivini* A. DC., *loc. cit.*, n. 7. — *Ambora Tambourissa* TUL., *Monogr.*, 303. — *Mithridatea Tambourissa* BOJ., *H. maur.*, 290 (part.).

Boivin, n. 1728, S. Maria, in sylv. Tafondrou.

4. *T. parvifolia* BAK., in *Trim. Journ. Bot.* (1882), 267.
Parker, centr. Madag, in hb. Kew. (h. v.).

MONIMIA.

1. *M. ? Lastelliana*, spec. nov.

Rami teretes ad nodos incrassatos compressiusculi. Folia opposita breviter petiolata ampla (ad 15 cent.) ambitu obovata, breviter acuminata, inæqui-dentata; nervis crebris reticulatis. Flores axillares, masculi globosi (ad 1 cent. longi) hispiduli, longiuscule pedicellati, cæterum ut in genere.

De Lastelle, Madag. orient.

MOLLINEDIA

‡ *Ehippiandra*.

1. *M. myrtoidea* H. BN. — *Ehippiandra myrtoidea* DCNE, in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, IX, 278, t. 7. — A. DC., *Prodr.*, XIII, 622.
Goudot, in prov. Emirnensi, circ. Tananarivo.

ROSACEÆ

Chrysobalanææ.

PARINARI.

1. *P. Chapelieri* H. BN, in *Adansonia*, IX, 148.
Chapelier, Madag. bor.-or.

HIRTELLA.

1. *H. Thouarsiana* H. BN, in *Adansonia*, VIII, 160. — *H. glandulosa* DUP.-TH., herb.
Dupetit-Thouars, Madag. bor. — *Boivin*, n. 2110 : Nossi-Cumba. — *De Lastelle*, Madag. or.

GRANGERIA.

1. *G. porosa* BVN, ex H. BN, in *Adansonia*, VIII, 161, 200; *Hist. des pl.*, I, 482. — *G. madagascariensis* O. HFFM., *Sert. ph. mad.*, 15.
Richard, n. 220, 582, Nossibé. — *Pervillé*, n. 507, Nossibé, in madidis. — *Boivin*, n. 2210, ad rivul. imi Loucoubé. — *Hildebrandt*, n. 3317, Vavatobé.

Agrimoniææ.

ALCHEMILLA.

1. *A. bifurcata* HILS. et BOJ., herb.

Bojer, in humid. sylv. prov. Ermina (hb. Mus. par., Kew, vindob.).

2. *A. potentilloides* HILS. et BOJ., herb.

Bojer, in mont. prov. Emirnæ.

3. *A. madagascariensis* O. HFFM., *Rel. Rutenb.*, 336.

Rutenberg, Ambatondrazaka, Antananivo (h. v.).

4. *A. Rutenbergii* O. HFFM., *loc. cit.*

Rutenberg, « in der Nähe d. Itasi-See's im Sumpf » (h. v.).

Fragariæ.

RUBUS.

1. *R. apetalus* POIR., *Dict.*, VI, 242. — DC., *Prodr.*, II, 557, n. 14.

Chapelier, Madag. or. — Lyall, Madag. centr. (hb. Kew.). — Bojer, in mont. Tananarivo (vern. *Roui-foutzi*). An e Maurilio introi?

2. *R. pinnatus* W., ex O. FOCKE, *Rel. Rutenb.*, 16.

Rutenb., « in d. Nähe d. Itasi-Sees » (h. v.).

3. *R. rosæfolius* SM., ex BAK., in *Trim. Journ. Bot.*, 268.

Kitching, « betw. Tamatave and Tananarivo » (h. v.).

M. E. PIERRE. — *De quelques produits du genre Garcinia et du mode d'extraction de la gomme gutte au Cambodge.* — On comptait 40 à 50 *Garcinia* il y a quelques années; et actuellement il y en a dans les herbiers 150 environ. Ils habitent tous la zone tropicale du globe au nord et au sud de l'équateur, à l'exception de l'Amérique où jusqu'ici aucune espèce n'a été trouvée. Quand l'Afrique, la Malaisie et l'Océanie seront mieux explorées, il est probable que ce nombre sera presque doublé. Ce sont des arbrisseaux ou de très grands arbres, méritant de prendre place dans la culture des pays chauds.

M. A. de Candolle n'a énuméré dans son ouvrage sur l'origine des plantes cultivées, qu'une espèce de *Garcinia* : le *G. Mangostana* L. Cependant nous savons par Rheede, Roxburgh, Griffith, etc., que dans l'Inde, les *Garcinia indica*, *Cambodgia lanceæfolia*, *pedunculata*, *paniculata*, sont soumis à la culture. Nous pouvons ajouter que les *G. Kydia*, *Cowa* et le *G. quærita* sont dans ce cas. En Indo-Chine, je puis aussi citer les *G. cochinchinensis*,



Baillon, H. 1879. "Liste des plantes de Madagascar (suite de la page 332)."

Bulletin mensuel de la

Socie

,

te

,

linne

,

enne de Paris 1(43), 338–343.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41445>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/292877>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at

<https://www.biodiversitylibrary.org>.