

*SUR LE CORYLUS YUNNANENSIS (FRANCHET) A. CAMUS,*

PAR M<sup>lle</sup> AIMÉE CAMUS.

Le *Corylus yunnanensis* (Franchet). A. Camus est une espèce bien distincte du *C. heterophylla* Fisch, auquel il a été rattaché comme variété. Comme il a été très sommairement décrit et est peu connu, il me paraît utile d'en donner une diagnose, d'après les échantillons types contenus dans l'herbier du Muséum.

**Corylus yunnanensis** A. Camus. — *C. heterophylla* Fisch. var. *yunnanensis* Franchet in Journ. de Bot., XIII, p. 198 (1899); Burkill in Journ. Linn. Soc., XXVI, p. 504 (1899); Winkler in Engler, Pflanzenr., IV, 61, p. 48 (1904); Schneider, Handb. Laubholz., VI, p. 896 (1912); Wilson, Plant. Wils., II, p. 450 (1916).

Rameaux d'abord très tomenteux, portant, avec de nombreux poils tecteurs, de plus longs poils sécréteurs capités. Bourgeons petits, brunâtres, subovoïdes, à peine pubérulents, munis d'écailles inférieures arrondies. Feuilles subarrondies ou brièvement ovales, tronquées et brusquement acuminées au sommet, terminées en acumen long de 1-1,5 cm. environ, subcordées à la base, longues de 6-10 cm., larges de 5-7 cm., presque glabres en dessus, densément tomenteuses-laineuses en dessous, à bords inégalement dentés; nervure médiane munie, non seulement de poils tecteurs, mais aussi, vers la base, de quelques longs poils glanduleux capités; 8-9 paires de nervures latérales assez saillantes en dessous, réunies par des anastomoses ténues un peu cachées dans le tomentum dense, assez long; bords munis de dents inégales; pétiole court, épais, long de 7-10 mm., longuement tomenteux, portant, avec des poils tecteurs nombreux, quelques poils glanduleux capités, allongés, semblables à ceux des jeunes rameaux; stipules asymétriques, ovales, un peu poilues. Pédoncule fructifère commun long de 3-4 cm., densément tomenteux-soyeux, blanchâtre, portant 2 à 4 cupules sessiles, rapprochées. Cupule ayant à la base 1,2-1,5 cm. de diamètre, longue de 2,6-3 cm., prolongée en tube au-dessus du fruit, environ une fois à une fois un tiers plus longue que le fruit, poilue blanchâtre, un peu striée à la base, découpée à la partie supérieure en lobes étroits, longs de 9-10 mm., lancéolés,

parfois presque linéaires, très aigus et parfois dentés, portant de très nombreux poils blanchâtres et quelques longs poils capités brunâtres. Fruit de 1,2 cm. de diamètre, soyeux, très peu aplati latéralement, soudé dans le tiers inférieur à la cupule, un peu sillonné longitudinalement vers la base.

Chine : Yun-nan, montagnes Hee-chan-men, alt. 3.000 m. (Delavay) type; mont Tsang-chan (Delavay, n° 555), type; Mengtze, alt. 2.000 m. (Henry, n° 9682), d'après Wilson.

Cette espèce diffère du *C. heterophylla* Fisch. et de sa var. *sutchuenensis* Franchet par sa cupule de forme différente, prolongée en tube, à lobes plus nombreux et plus étroits, ses feuilles plus cordées à la base, à pétiole gros et bien plus court, la présence d'assez nombreux poils capités allongés sur les jeunes rameaux, les pétioles et la base de la nervure médiane.



Camus, A. 1929. "Sur le *Corylus yuannensis* (Franchet) A. Camus." *Bulletin du Muse*

*um national d'histoire naturelle* 1(6), 438–439.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/244612>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/329137>

**Holding Institution**

Muséum national d'Histoire naturelle

**Sponsored by**

Muse

um national d'histoire naturelle

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <http://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.