

NOTE SUR LES ESPÈCES ASIATIQUES DU GENRE *SEHIMA* FORSK.,

PAR M^{lle} A. CAMUS.

Le genre *Sehima* créé par Forskal pour le *S. ischæmoides* comprend plusieurs espèces rattachées autrefois au genre *Ischæmum* et bien distinctes par leur grappe spiciforme unique et par la présence constante d'une arête à la glume supérieure de l'épillet sessile. Ce genre diffère du genre *Digastrium* (sous-genre *Digastrium* Hackel) par les articles du rachis et les pédicelles linéaires ou presque, à peu près parallèles et non obovales-ventrus. En Asie, les espèces de ce tableau sont à rattacher au genre *Sehima* :

- A. Épillet sessile à glumelle inférieure de la fleur supérieure lobée et aristée entre les lobes ; chaumes simples ou presque.
- a. Glume inférieure de l'épillet sessile munie de 6 côtes, déprimée à l'endroit de la nervure médiane et à la base étroitement sillonnée dans la dépression translucide.
- α. Plante vivace ; épillets sessiles de 8-9 millimètres ; arête très légèrement ciliée ; épillets pédicellés lancéolés-acuminés, de 9-11 millimètres, à glume inférieure à peine 2-dentée.
1. *S. nervosum* Stapf.
- β. Plante annuelle ; épillets sessiles de 9-14 millimètres ; arête distinctement ciliée ; épillets pédicellés étroitement lancéolés, longuement acuminés, atteignant 16 millimètres ; glume inférieure munie de 2 dents longuement sétacées.
2. *S. ischæmoides* Forsk.
- b. Glume inférieure de l'épillet sessile sans côtes, non ou à peine déprimée à l'endroit de la nervure médiane, ni sillonnée, ni translucide, à 2 nervures très vertes, rameuses au sommet.
3. *S. notatum* A. Camus.
- B. Épillet sessile à glumelle inférieure de la fleur supérieure munie d'une arête naissant du sommet.
4. *S. sulcatum* A. Camus.

1. *S. NERVOSUM* Stapf. ; *S. macrostachyum* Hochst. ; *Andropogon nervosus* Rottl. ; *A. striatus* Klein ; *A. tacazensis* St. ; *A. macrostachys* And. ; *Ischæmum laxum* R. Br. ; *I. laxum* a. *genuinum* Hack. ; *I. nervosum* Thw. ; *I. macrostachyum* Rich. ; *Pollinia striata* Sp. ; *Hologamium nervosum* Nees.

Inde. — Annam : Cameran (Balansa). — Siam : Doi Sootep (Kerr). — Chine, Australie, Afrique tropicale.

2. *S. ISCHÆMOIDES* Forsk. ; *S. Kotschyi* Hochst. ; *L. inscalptum* Hochst. ; *Andropogon Sehima* St. ; *A. lineatus* St. ; *A. schangulensis* Rupr. ; *A. inscalptum* And. ; *A. rhynchophorus* Stapf.

Yémen, Arabie, Inde. — Afrique tropicale.

3. *S. NOTATUM* A. Camus ; *Ischæmum notatum* Hackel.

Inde.

4. *S. SULCATUM* A. Camus ; *Ischæmum sulcatum* Hackel.

Inde.



Camus, A. 1921. "Note sur les espèces asiatiques du genre *Sehima* Forsk."
*Bulletin du
Muse
um national d'histoire naturelle* 27(5), 372-373.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27554>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/333173>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.