

Carabus (Limnocarabus) stygius n. sp.

Von L. Ganglbauer in Wien.

C. clathrato proximus, multo magis elongatus et depressus, supra niger, vix virescens, elytris triseriatim cupreo-foveolatis. Capite pone oculos valde prominulos fortius constricto, inter oculos utrinque longitudinaliter plicatulo, fronte antice laevi, postice punctata, sulcis frontalibus longis et profundis, palpis filiformibus, articulis ultimis apicem versus perparum dilatatis, antennis maris simplicibus. Gula leviter convexa, utrinque seta instructa. Prothorace transverso, postice haud angustato, lateribus reflexis, antice leviter rotundatis, pone medium sinuatis, angulis posticis brevissimis, extrorsum porrectis, postice truncatis, basi utrinque sinuata, disco medio subtiliter punctato, ad latera subtilissime et sat dense granuloso, ante basin utrinque profunde longitudinaliter impresso. Elytris elongatis, fere parallelis, antice fere truncatis, ante apicem sinuatis, dense et subtiliter granulosis, intervallis primariis fossulis magnis, antice granulo instructis, interruptis, intervallis secundariis parum elevatis, subtiliter crenulatis, postice evanescentibus, intervallis tertiariis in granula dissolutis, serie umbilicata distinctissima, margine laterali antice serratulo. Episternis metathoracis latitudine multo longioribus. Strigis ventralibus distinctis. Long. 30—33 mm. Talysch.

Dem *C. clathratus* sehr nahe stehend und von demselben durch viel flachere, gestrecktere Gestalt, längere und schlankere Fühler, Taster und Beine, relativ kleineren Halsschild und längere flachere Flügeldecken verschieden. Die Grübchen der Flügeldecken sind viel kleiner als bei *clathratus*, viel weiter von einander entfernt und durch deutliche Kettenelemente von einander getrennt. Die Secundärrippen sind schwächer als bei *clathratus* ausgebildet.

Diese Art wurde von Herrn Hans Leder im Talyschgebiete gesammelt und von Herrn E. Reitter als *C. clathratus* var. *Eversmanni* versendet. *C. Eversmanni* Fald. i. l., Motsch. Ins. Sib. 109 ist aber nach Motschulsky's Angaben: „N'est donc qu'une très légère variété du *C. clathratus* ordinaire et n'en diffère que par son corselet plus transverse. On se rencontre fréquemment sur les bords du fleuve Ichym“ nicht auf *stygius* zu beziehen.



Ganglbauer, Ludwig. 1890. "Carabus (Limnocarabus) stygius." *Wiener entomologische Zeitung* 9, 117.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/44208>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/34652>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.