

cana vielleicht abgeblaßt), Mandibeln rötlich; das zweite Geißelglied deutlich kürzer als das letzte, was aber auch bei der Type von *africana* der Fall ist. — Körperlänge 8·5 mm, Flügellänge 7 mm. Die hinteren Ozellen unter sich reichlich so weit wie von den Augen entfernt.

97. *Trigona tomentosa* Fr.

Ein ♀ von: Kamerun (Schäfer).

Gen. *Apis* L.

98. *Apis mellifica* v. *Adansonii* Latr.

Kamerun Int., Lamurde, 28. März 1909 (Riggenbach).

Übersicht der Arten der Curculioniden-Gattung *Caulomorphus* Faust.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Alle Arten sind einfarbig rotbraun und im Kaukasus und Talyschgebirge einheimisch.

1" Alle Zwischenräume der groben Punktstreifen auf den Flügeldecken gleichmäßig gewölbt, schmal.

2" Fld. nur mit äußerst kurzen Börstchenhaaren, auf den Flügeldecken reihig besetzt, diese stark nach hinten geneigt, im Profil nur am Absturze als abstehend erkennbar, die Brücken zwischen den dichten groben Punkten der Längsreihen viel niedriger als die rippenartigen Zwischenräume, Schulterwinkel stumpf, fast abgerundet. — Meskisches Gebirge: Surampaß, unter faulendem Buchenlaub. — Bull. Soc. Ent. Fr., 1880, 134.

Lederi Chevrl.

2' Fld. mit doppelt längeren, auf den Zwischenräumen der Flügeldecken reihig gestellten, abstehend geneigten Härchen besetzt, die alle im Profil frei sichtbar sind; die Brücken zwischen den dichten groben Punkten der Längsreihen so hoch als die schmalen, gewölbten Zwischenräume. Schulterwinkel abgerundet. — Kaspisches Meergebiet: Talyschgebirge. — Wiener E. Ztg., 1897, 126.

talyschensis Reitt.

1' Die Naht und die abwechselnden Zwischenräume der groben aber flach punktierten Streifen der Flügeldecken rippenförmig erhaben, die andere schmal und flach, Schultern eckig vorspringend, alle Zwischenräume mit äußerst feiner, wenig auffälliger Haarreihe; im übrigen den anderen Arten ähnlich. Long. 3—3·5 mm. — Svanetien. Von Hans Leder gesammelt. — Herrn Dr. A. Jul. Müller in Bregenz gewidmet. **Mülleri** n. sp.



Reitter, Edmund. 1911. "Übersicht der Arten der Curculioniden-Gattung Caulomorpha FAUST." *Wiener entomologische Zeitung* 30, 159.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/43787>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/40176>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.