Nouveaux Coléoptères exotiques

par

M. Pic.

Les types des nouveaux Coléoptères faisant l'objet du présent article font partié de la collection du Musée Natura Artis Magistra et m'ont été communiqués par l'intermédiaire de mon estimable collègue Corporaal. Un co-type de *Glipa subsinuata* figure, en outre, dans ma collection.

Ptilodactyla strangulata n. sp. ♂. Oblongo-elongata, nitida, hirsuta, sparse punctata, negro-picea, elytris lateraliter, infra corpore femoribusque ad basin rufis.

Oblong-allongé, brillant, orné d'une pubescence grise peu serrée et en partie redressée, à ponctuation espaceé, plus forte sur le prothorax que sur les élytres, noir de poix avec les élytres à rebord roux, dessous du corps et base des cuisses roux. Tête à peine ponctuée sur le vertex; antennes grêles, à rameaux assez longs, foncées à base un peu roussâtre, prothorax particulier, court, etranglé en avant, très large en arrière et presque angulé sur le milieu latéral devant la partie plus large, surplombant un peu la tête en avant, fortement explané sur les côtés posterieurs, sinué et non denticulé en arrière; écusson fortement impressionné au milieu; élytres de la largeur du prothorax à la base, un peu élargis vers le milieu et rétrécis ensuite, nettement explanés, à épaules un peu anguleuses, médiocrement et éparsément ponctués, marqués chacun d'un sillon présutural; dessus du corps brièvement et éparsément pubescent. Long 4,5 mill. Sumatra, à Padg. Pandjang, 1er trim. 1896. (Kannegieter).

Espèce des plus distinctes par la forme particulière de son prothorax. Peut se placer près de *P. ebinina* Chp.

Ennometes testaceicornis n. sp. ♂ Angustatus, parum nitidus, griseo pubescens, testaceus, antennis tarsisque pallidioribus, oculis nigris.

Etroit, peu brillant, orné d'une pubescence grise peu serrée et plutôt couchée, testacé-roussâtre avec les antennes et tarses de coloration plus claire, yeux noirs. Tête courte, étroite en avant, un peu impressionnée entre les antennes, densément ponctuée ; antennes à 1er article robuste, 2ème court, 3e et suivants assez longs et très longuement flabellés ; prothorax assez court et étroit, rétréci en avant, sinué sur les côtés, un peu bombé en avant, triimpressionné postérieurement, angles postérieurs un peu saillants ; élytres de la largeur du prothorax, parallèles, peu rétrécis à l'extrémité, à rangées rapprochées de gros points fovéolés, sans côtes marquées. Long. 9 mill. Sumatra, à Padang Pandjang, 1er trimestre 1896 (KANNEGIETER).

Voisin de *E. Rouyeri* PIC, mais antennes testacées, tâte à museau plus étroit et élytres moins foncés.

Glipa impressipennis n. sp. Elongata, fere opaca, nigra, palpis femoribusque anticis ad basin testaceis, elytris griseo-luteo notatis.

Allongé, presque mat en dessus, noir avec les palpes et la base des cuisses anterieures testacés, dessous du corps brillant, à pubescence blanche presque uniforme et peu dense, dessus du corps à dessins gris-jaunâtres, ondulés et fasciés sur le prothorax (analogues à ceux des espèces voisines) et formant sur chaque élytre : une fascie transversale presque droite postmediane, une fascie mediane arquée, ouverte en dehors et se joignant en avant à une macule discale de même pubescence. Tête en partie pubescente, à ponctuation rapprocheé ; prothorax court et robuste, nettement plus large que les élytres, ponctué comme la tête, nettement échancré de chaque côté postérieurement avec le lobe médian subarqué ; écusson subtriangulaire, densément pubescent de blanc ; élytres longs et étroits, rétrécis progressivement en arrière, séparément arrondis au sommet, marqués d'une longue dépression présuturale, en partie densement ponctués et ornés d'une pubescence couchée grisâtre peu serrée, pygidium

assez long, non en pointe au sommet, caréné en dessus. Long. 8 mill. Iles Batoe, Tanah Masa (KANNEGIETER).

Voisin de *G. formosana* PIC, élytres moins larges en avant et mats, dessins des élytres un peu différents et jaunâtres.

Glipa subsinuata n. sp. Parum elongata, supra paulo nitida, nigra, palpis, antennis pro parte femoribusque anticis ad basin testaceis, elytris griseo notatis.

Un peu allongé, attenué posterieusement, noir, palpes, partie des antennes et base anterieure des cuisses testacés, dessous du corps brillant, à pubescence blanche presque uniforme, dessus à peine brillant, à dessins gris ondulés et fasciés sur le prothorax (analogues à ceux du précédent) et formant sur les élytres: une macule anteapicale, une fascie arquée et un peu coudée postmediane remontant sur la suture, une fascie ondulée antérieure présuturale, émettant une branche externe à chacune de ses extrémités. Tête en partie pubescente, ponctuée à peu près comme le prothorax, ce dernier analogue à celui de *G. impressipennis* mihi; écusson triangulaire, pubescent de blanc; élytres plus etroits que le prothorax, pas très longs, nettement et progressivement atténués, séparément arrondis au sommet, peu impressionnés vers la suture; pygidium assez long, large et un peu échancré au sommet subcarèné postérieurement; éperons des tibias postérieurs en partie testacés. Long. 7—8 mill. Banka (Native collectors).

Voisin de *G. malaccana* PIC, dont il diffère, à première vue, par les fascies transversales grises plus régulières, les dessins antérieurs réduits.

Pic, Maurice. 1924. "Nouveaux Coléoptères exotiques." *Tijdschrift voor entomologie* 67, 29–31.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/87816
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/64757

Holding Institution
Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by
Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse
Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Rights: https://biodiversitylibrary.org/permissions

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 1 February 2024 at 01:27 UTC