

the pronotum are almost circular and closely packed, whereas in *A. spartocytisi* they are ovate, subcontiguous, and distinctly smaller than those on the elxtra.

**Apion senex** WOLL. 1864.

An examination of the type of this species shows that it is undoubtedly a synonym of *A. cretaceum* ROSH. 1856, which occurs also in Spain and North Africa.

---

## Ein neuer *Coccotrypes* (Ipidae, Col.)

von

HANS EGGERS, Stolberg

(Harz).

---

Herr Dr. D. L. UYTENBOOGAART, Renkum, sandte mir einen *Coccotrypes* welcher auf Gran Canaria gefunden wurde, zur Nachprüfung. Es ist eine neue Art, von *C. dactyliperda* F. verschieden durch die schlankere Form und dunkelbraune Behaarung.

### ***Coccotrypes canariensis* n. sp.**

♀: Pechbraun, mit ganz schmal dunkler gefärbter Naht auf den Flügeldecken, dicht und lang braun behaart.

Kopf flach gewölbt, fein und dicht runzelig gestrichelt, lang behaart.

Halschild länger als breit, eiförmig nach vorn verschmälert, grösste Breite kurz vor der Basis, Seiten nur schwach ausgebaucht, Hinterecken kaum abgerundet. Oben dicht gehöckert, mit einer glatten Mittellinie im hinteren Drittel. Vor der Basis werden die Höcker kleiner, seitlich haben sie längliche Form; Hinterrand mit deutlicher Kante.

Flügeldecken etwas breiter und um die Hälfte länger als das Halschild, bis zu  $\frac{2}{3}$  der Länge parallelseitig, dann verschmälert abgerundet, sodass der Käfer viel schlanker erscheint, als der breit gerundete *C. dactyliperda*. Auch seitlich gesehen

ist der Käfer schlanker, da sein Absturz etwa von der Mitte ab flacher abgewölbt ist; während bei *C. dactyliperda* die Abwölbung steil im letzten Drittel erfolgt. Reihenpunkte mässig gross, flach, dicht stehend; Reihen nicht eingedrückt. Zwischenräume ebenso dicht, aber etwas feiner und tiefer punktiert, dicht und lang abstehend braun behaart. Punktreihen ebenso dicht mit feinen und etwas geneigten Haaren besetzt.

Vorderschienen mit 4 seitlichen Dornen, während *C. dactyliperda* deren nur 3 hat.

♂: Schmäler, schlanker und kleiner als das ♀ und heller braun mit deutlich sich abhebender, dunkelbrauner Naht, schwächer behaart.

Kopf weniger deutlich gestrichelt mit schmalen Augen.

Halsschild fast um die Hälfte länger als breit; fast von der Basis an langsam verschmälert und daher sehr schlank erscheinend, sehr fein gehöckert.

Flügeldecken fast langoval, etwas breiter und um die Hälfte länger als das Halsschild, hintere Hälfte stark verschmälert, sehr fein punktiert.

Länge: ♀ 2 mm, ♂ 1.7 mm.

Fundort: Gran Canaria (Las Palmas) im Park Santa Catalina in den Samen einer noch nicht näher bestimmten Palme, gesammelt von Miss ROSALEEN SCOTT—ALLEN.

Typen in Sammlung EGGERS, Cotypen in Sammlung UYTENBOOGAART.

---



Eggers, Hans. 1928. "Ein neuer Coccotrypes (Ipidae, Col.)." *Tijdschrift voor entomologie* 71, 117–118.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/87818>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/64793>

**Holding Institution**

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

**Sponsored by**

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.