

Diagnosi di nuove specie di Uccelli del Tenasserim, raccolte dal Sig. Leonardo Fea.

Per TOMMASO SALVADORI. *

In attesa di aver condotto a termine il Catalogo di una importante collezione di uccelli del Tenasserim, fatta dal Sig. Leonardo Fea, do ora una breve descrizione di alcune specie, che mi sembrano nuove, e delle quali si discorrerà più diffusamente nel Catalogo, che verrà tra non molto pubblicato.

Merula Feae, nov. sp.

Merula M. PALLIDAE (Gm.) *simillima*, sed *superciliis latis albis et rectrice tantum extima ad apicem pogonii interni vix albo notata, diversa*.

Long. tot. 0^m, 260; al. 0^m, 131; caud. 0^m, 098; rostri culm. 0^m, 022; tarsi 0^m, 032.

Hab. in Montibus Mooleyit dictis.

Niltava Oatesi, nov. sp.

Niltava N. SUMATRANAE, Salvad. *simillima*, sed *valde major et colore caeruleo pilei, uropygii et supracaudalium laetiore, gula et lateribus capitis nigris, magis caeruleo tinctis, pectoris, abdominis et praesertim subcaudalium et tectricum alarum inferiorum colore rufo-cinnamomeo pallidiore, diversa*.

Long. tot. circa 0^m, 175; al. 0^m, 093; caud. 0^m, 074; rostri 0^m, 011; tarsi 0^m, 019.

Hab. in Montibus Mooleyit dictis.

Obs. Species affinis *N. sundarae*, Hodgs. et *N. vividae* (Swinh.), sed major.

Pericrocotus pulcherrimus, nov. sp. +

Pericrocotus P. IGNEO, Blyth, *similis*, sed major et maris colore rubro laetiore, magis cinnabarino, et tectricibus alarum inferioribus (basi nigra excepta), axillaribus et plaga alarum inferiore haud flavis, sed rubris, et foeminae colore fusco-cinereo pilei, cervicis et dorsi minime virescente, et uropygio et supracaudalibus haud rubris, sed virescente-flavis, diversus.

♂. Long. tot. 0^m, 180; al. 0^m, 085; caud. 0^m, 088; rostri 0^m, 011; tarsi 0^m, 015.

♀. Long. tot. 0^m, 180 - 0^m, 185; al. 0^m, 081 - 0^m, 085; caud. 0^m, 087 - 0^m, 095; rostri 0^m, 011; tarsi 0^m, 015.

Hab. in Montibus Mooleyit dictis.

Pericrocotus rubro-limbatus, nov. sp. +

Pericrocotus P. GRISEOGULARI, Gould, *simillimus*, sed rectricibus duabus mediis ad dimidiam partem apicalem pogonii externi rubro limbatis, diversus.

Long. tot. 0^m, 175; al 0^m, 082; caud. 0^m, 090; rostri culm. 0^m, 011; tarsi 0^m, 014.

Hab. in Montibus Mooleyit dictis.

Aceros nov. sp.? +

Aceros mari A. NEPALENSIS, Hodgs. *simillimus*, sed remigum primariarum tectricibus tribus ultimis, apicem versus, magna ex parte albis, diversus.

Hab. in Montibus Mooleyit dictis.

L' esemplare descritto non è adulto; esso non ha i cinque solchi obliqui neri sui lati della mascella presso la base, come nell' *Aceros nepalensis* adulto, ma soltanto una larga area obliqua nera. Le tre ultime grandi cuopritrici delle remiganti primarie in gran parte bianche nella parte apicale, la quale cosa

non è menzionata nelle descrizioni e neppure è indicata nelle figure dell' *Aceros nepalensis*, Hodgs., mi fanno dubitare che l'esemplare suddetto appartenga ad una specie distinta, che se veramente tale, propongo di chiamare *Aceros leucostigma*.

Torino, Museo Zoologico 4 dicembre 1887.



Salvadori, Tommaso. 1887. "Diagnosi di nuove specie di Uccelli del Tenasserim raccolti de Sig. L. Fea." *Annali del Museo civico di storia naturale di Genova* 5, 514–516.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/94500>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/68240>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.