

Quelques nouvelles espèces de Lamiinae du Muséum d'histoire naturelle de Genève

(Coleoptera, Cerambycidae)

II

par

Stephan BREUNING

Avec 1 figure dans le texte

***Sybra* (s.s.) *postbasicristata*, nov. sp.**

Proche de *bicristata* Breun. des Nilghiri Hills, mais les lobes inférieurs des yeux deux fois aussi longs que les joues et toute la pubescence brun jaunâtre entremêlée seulement d'un peu de brun. Troisième article des antennes un peu plus long que le cinquième, nettement moins long que le quatrième. Ponctuation de la base des élytres aussi forte que celle du pronotum, un peu plus grosse en arrière. Long.: 7 mm; larg.: 2 mm.

Type de l'Inde: Kerala, Cardamon Hills, entre Pambanar et Peermade, 950 m, 5.XI.1972, leg. Besuchet, Löbl, Mussard.

***Pterolophia* (Ale) *lineatipennis*, nov. sp.**

Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, frangées de poils courts, le troisième article un peu plus long que le scape. Lobes inférieurs des yeux sensiblement moins longs que les joues. Tête et pronotum peu densément et très finement ponctués. Pronotum transverse. Elytres très longs, un peu plus larges que le pronotum, assez largement tronqués à l'apex, avec des points

partiellement alignés peu serrés, bien marqués et profonds en avant, de plus en plus superficiels ensuite; une bosse discale postbasilaire peu accusée sur chaque élytre. Coloration d'un brun foncé avec une pubescence d'un blanc jaunâtre entremêlée de brun, la couleur brune formant dans la partie médiane des élytres d'étroites bandes longitudinales. Long.: 14 mm; larg.: 5 mm.

Type de Formose: Puli, Taitung, V-VI.1971, leg. K. H. Chen. — Un paratype idem.

Dans mon tableau dichotomique du genre *Pterolophia* Newm., sous-genre *Ale* Pasc. (*Ent. Arb. Mus. Frey*, 16, 1965, p. 189), cette espèce s'intercale près du n° 95 en différant en particulier d'*albohumeralis* Breun. et de *perplexa* Gah. par un dessin bien différent.

Brachyolene unicolor, nov. sp.

Proche de *brunnea* Aur., mais le troisième article des antennes presque aussi long que le quatrième article ou que le scape, la tête à peine ponctuée, les élytres finement ponctués; tout le corps d'un brun rougeâtre foncé et couvert d'une pubescence unicolore brun jaunâtre. Long.: 7,5 mm; larg.: 2,5 mm.

Type de Côte-d'Ivoire: Sassandra, XII.1949, leg. R. Mussard.

Moechotypa formosana, nov. sp.

Proche d'*umbrosa* Lac., mais plus petit, le front avec seulement quelques points sur les bords latéraux, l'épine latérale du pronotum très peu accusée, les côtés du disque du pronotum moins densément ponctués, les dessins rosâtres à peine indiqués, le quart apical de l'élytre non marbré de brun foncé, la pubescence foncière entremêlée un peu plus densément de brun. Chaque élytre avec une bosse postbasilaire médiane assez élevée et allongée, une bosse étroite assez élevée entre la bosse postbasilaire et l'épaule, enfin une petite crête allongée entre la bosse postbasilaire et la suture. Long.: 13 mm; larg.: 5 mm.

Type de Formose: Puli Taitung, V-VI.1971, leg. K. H. Chen.

Paraclodia, nov. gen. (fig. 1)

Allongé. Antennes fines, un peu plus longues que le corps, assez densément frangées de poils modérément longs, le scape long et assez mince, le troisième article sensiblement moins long que le quatrième, un peu plus long que le scape, le quatrième sensiblement plus long qu'un des articles suivants. Tubercules antennifères distants l'un de l'autre et non saillants. Yeux fortement échancrés, les ommatidies relativement grosses. Front très transverse, plutôt trapézoïdiforme. Pronotum transverse, avec deux dépressions transversales étroites, l'une en avant,




FIG. 1.

Paraclodia nov. gen. *besucheti* nov. sp. (dessin de M. Vit).

l'autre en arrière, et un tubercule latéral conique, obtus. Elytres très longs, un peu plus larges que le pronotum, parallèles, obliquement tronqués à l'apex (l'angle marginal presque pointu), pourvus de points alignés et densément garnis de poils semidressés assez courts. Tête non rétractile. Saillie prosternale étroite, moins haute que les hanches et arquée. Saillie mésosternale légèrement inclinée vers l'avant. Métasternum de longueur normale. Cavités coxales intermédiaires fermées. Pattes de longueur moyenne, les fémurs claviformes, les tibias intermédiaires échancrés, les crochets divariqués.

Type: *besucheti* Breun. Ce genre se place dans les *Acanthocinini*, près du genre *Clodia* Pasc.

***Paraclodia besucheti*, nov. sp.**

Lobes inférieurs des yeux deux fois aussi longs que les joues. Elytres peu densément et très finement ponctués. Coloration d'un brun rougeâtre clair, les poils semidressés d'un brun foncé, la pubescence foncière d'un jaune paille entre les taches, noire sur celles-ci. Disque du pronotum avec de chaque côté deux taches circulaires noires réunies dans le sens longitudinal. Elytres avec chacun neuf taches noires (fig. 1) bien marquées. Fémurs et moitié basale des tibias d'un brun rougeâtre clair; moitié apicale des tibias et tarsi d'un brun noirâtre. Partie apicale des articles antennaires d'un brun plus foncé que la partie basale. Long.: 7 mm; larg.: 2 mm.

Type de l'Inde: Kerala, Cardamon Hills, Periyar, 950 m, 4.XI.1972, leg. Besuchet, Löbl, Mussard. Attiré par les lumières de l'Hôtel Aranya Nivas.

***Oberoopsis verticenigra* Breun. forma *flvoaabdominalis* nov.**

Comme f. *kanalensis* Breun., mais l'abdomen entièrement d'un brun jaunâtre, couvert d'une pubescence jaunâtre. Le prosternum et la partie antérieure médiane du métasternum présentent également la même coloration des téguments et de la pubescence. Septième article des antennes entièrement jaunâtre, les trois derniers articles entièrement d'un brun noirâtre. Long.: 9 mm; larg.: 2 mm.

Type de l'Inde: Kerala, Trivandrum Dt., Poonmudi Range, 950 m, V.1972, leg. T.R.S. Nathan.

***Obereopsis coimbatorensis*, nov. sp.**

Proche de *coimbatorensis* Breun., mais les élytres ponctués jusqu'à l'apex, celui-ci subtronqué, les fémurs postérieurs ne dépassant que peu le bord postérieur du deuxième segment abdominal, les tibias et les tarsi non rembrunis. Entièrement d'un brun jaunâtre, sauf le bord marginal de la moitié postérieure des

élytres et l'apex de ceux-ci qui sont d'un brun noirâtre. Les quatre premiers articles des antennes d'un brun noirâtre, les articles suivants d'un brun rougeâtre plus ou moins rembruni à l'extrémité. Long.: 7-9 mm; larg.: 1,5-2 mm.

Type de l'Inde: Madras, Coimbatore, 500 m, XI.1971, leg. T. R. S. Nathan.
— Un paratype idem, X.1972.

Adresse de l'auteur :

Rue Durantin, 7
Paris 18^e
France



BHL

Biodiversity Heritage Library

Breuning, S. von. 1974. "Quelques nouvelles espèces de Lamiinae du Muséum d'Histoire naturelle de Genève (Coleoptera, Cerambycidae) II." *Revue suisse de zoologie* 81, 371–375. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.76008>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/126812>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.76008>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/76008>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: In Copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum d'histoire naturelle - Ville de Genève

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.