THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

580.7

D45t2

BIOLOGY

BIOLOGY
BIOLOGY
BIOLOGY

Return this book on or before the
Latest Date stamped below. A
charge is made on all overdue
books.

University of Illinois Library

~~AUG 7 1953~~

NOV 19 1980

~~JAN 02 1986~~

JUN 20 2006

L161—H41

TABLEAU

DE

ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI.

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI,

Par M. DESFONTAINES, Membre de l'Institut et de
la Légion-d'Honneur, Professeur de Botanique, etc.

Desfontaines, René Louiche,

SECONDE ÉDITION.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 9,

1815.

DE L'IMPRIMERIE DE FEUGUERAY,

rue Pierre-Sarrazin, n° 11.

AVERTISSEMENT.

580.7
D45t2

LE Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le Jardin du Roi. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Etrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Jardin par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'Ecole de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'ainé a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail; M. de Lamarck m'a communiqué ses herbiers; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du Jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'Ecole de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection des plantes vivantes cultivées au Jardin du Roi, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Ce Jardin est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Etablissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

*EXPLICATION des abréviations et des signes indicatifs
de la durée des Plantes.*

Af.	Afrique.	ile de F.	Ile de France.
Am. m.	Amérique méridionale.	N. esp.	Nouvelle-Espagne.
Am. s.	Amérique septentrionale.	N. holl.	Nouvelle-Hollande.
Ant. . . .	Antilles.		
As.	Asie.	(alim.)	Alimentaire.
As. min.	Asie mineure.	(écon.)	Economique.
Esp. . . .	Espagne.	(méd.)	Médicinale.
Eur. . . .	Europe.	(orn.)	Ornement.
F.	France.	(vén.)	Vénéneuse.
F. m. . . .	France méridionale.		

Noms d'Auteurs.

All. ped.	Allioni, Flora pedemontana.
— Auct.	— Auctuarium.
Andr. rep.	Andrews, Repository.
Arduin. spec.	Arduini, Specimen.
Balbis, add.	Balbis, Miscellanea et Additamentum ad Floram pedemontanam.
— H. taur.	— Hortus taurinensis.
Beauv. agrost.	Beauvois, Agrostographie.
Bellardi, app.	Appendix ad Floram pedemontanam.
Bill. N. holl.	La Billardièrre, Novæ Hollandiæ plant. Specimen.
Bonpland, malm.	Plantes rares de Navarre et de la Malmaison.
— Equinox.	— Plantes équinoxiales.
Bosc, dict.	Dictionnaire d'Agriculture.
— soc. Lin. par.	— Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
Bot. magaz.	Botanical Magazin.
Brotero, fl.	Flora lusitanica.
— phyt.	— Phytographia lusitaniæ Selector.
Brown. prodr.	Prodromus Floræ N. Hollandiæ.
Cav. ic.	Cavanilles, Icones.
— diss.	— Dissertationes.
Correa, s. Lin.	Transactions of the Linnean Society.
Crantz, austr.	Stirpium austriacarum Fasciculi.
Curtis, fl.	Flora Londinensis.
Cyrillo, dec.	Plant. rariorum regni neapolitani Fasciculi.
Dec. ann.	Decandolle, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
— astr.	— Astragalogia.

- dec. cat.* Decandolle, Catalogus plant. horti botanici
 Monspelienſis.
— fl. — Flore française.
delile, fl. Delile, Floræ ægyptiacæ illuſtratio.
— ægypt. — Description de l'Egypte.
desf. atl. Desfontaines, Flora atlantica.
— ann. — Annales du Muſéum d'Histoire naturelle.
— acad. — Mémoires de l'Académie des Sciences de
 Paris.
desvaux, journ. Journal de Botanique.
duham. arbr. Duhamel, Traité des Arbres et Arbustes.
— ed. n. — Nouvelle Edition.
dunal, sol. Histoire des Solanum.
encycl. Encyclopédie méthodique.
— suppl. — Supplément. (Poiret.)
fl. dan. Flora danica.
fl. per. Flora peruviana.
forsk. fl. Forskahl, Flora ægyptiaco-arabica.
gærtn. Gærtner, de Fructibus, etc.
good. s. lin. Goodnow, Transactions of the Linnean Society.
couan, ill. Illuſtrationes.
guers. s. philom. Guersant, Bulletin de la Société philomatique.
haw. meſemb. Haworth, Observations on the genus Mesem-
 bryanthemum.
h. k. Hortus Kewensis, ed. 2^a.
host, gram. Icônes et Descriptions graminum, etc.
jacq. amer. Jacquin, Selectarum Stirpium americanarum
 Historia.
— austr. — Flora austriaca.
— collect. — Collectanea.
— fragm. — Fragmenta botanica.
— h. schœn. — Hortus schœnbrunensis.
— hort. — Hortus vindobonensis.
— ic. — Icones plantarum.
— miscell. — Miscellanea.
— obs. — Observationes botanicæ.
— ox. — Oxalis.
juss. ann. De Jussieu, Annales du Muſéum d'Histoire na-
 turelle.
kœler, gram. Descriptio graminum.
lambert, pin. A description of the genus Pinus.
lamk, ill. Lamarck, Illuſtration des genres.
— journ. d'hist. nat. — Journal d'Histoire naturelle.
lapeyr. pyr. Lapeyrouse, Histoire des Plantes des Pyrénées.
zaroche, eryng. Eryngiorum Historia.
leers, herb. Flora herbornensis.
l'hérit. corn. L'Héritier, Cornus,
— ger. — Geranologia.

<i>L'hérit. sert.</i>	L'Héritier, Sertum anglicum;
<i>— stip.</i>	— Stirpes novæ.
<i>L.</i>	Linnaeus, Species Plantarum.
<i>— mant.</i>	— Mantissa.
<i>— L. f.</i>	— Filius, Supplementum.
<i>Lois. fl.</i>	Loiseleur, Flora gallica.
<i>Marsch. cauc.</i>	Marschall, Flora Taurico-caucasica.
<i>Mass. stap.</i>	Masson, Stapeliæ novæ.
<i>Mich. fl.</i>	Michaux, Flora boreali Americana.
<i>Mich. arbr.</i>	Michaux fils, Histoire des Arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.
<i>— Goett.</i>	— Commentaria Soc. Goettingensis.
<i>Murray, s. veg.</i>	Systema vegetabilium.
<i>Nester, pot.</i>	Potentillæ genus (<i>manuscrit</i>).
<i>Ortega, dec.</i>	Decades.
<i>Pallas, astrag.</i>	Species Astragalorum, etc.
<i>— itin.</i>	— Voyages.
<i>— N. Act. petrop.</i>	— Nova Acta Petropolitana.
<i>— Ross.</i>	— Flora rossica.
<i>Pers. syn.</i>	Persoon, Synopsis.
<i>Pollich. palat.</i>	Historia Plant. in Palatinatu sponte nascentium;
<i>Pouret, Act. tolos.</i>	Mémoires de l'Académie de Toulouse.
<i>Ramat. Journ. d'hist. nat.</i>	Ramatuelle, Journal d'Histoire naturelle.
<i>Ramond, s. phyl.</i>	Bulletin de la Société Philomatique.
<i>Red. Lil.</i>	Redouté, Liliacées.
<i>Reiz. obs.</i>	Reizius, Observationes botanicæ.
<i>Salisb. prodr.</i>	Salisbury, Prodrômus.
<i>Schk. car.</i>	Schkuhr, Histoire des Carex (<i>traduction</i>).
<i>Schousb. Maroc.</i>	Schousboe, Iagttagelser over vextriget i Marokko.
<i>Schrader, germ.</i>	Schrader, Flora germanica.
<i>Schreb. gram.</i>	Schreber, Gramina.
<i>— spicil.</i>	— Spicilegium.
<i>— vert.</i>	— Plantarum verticillatarum unilabiatarum ge- nera et species.
<i>Scop. carn.</i>	Scopoli, Flora carniolica.
<i>— insub.</i>	— Deliciæ floræ et faunæ insubricæ.
<i>Smith, fl.</i>	Flora britannica.
<i>— N. holl.</i>	— A Specimen of the Botany of New-Holland.
<i>— pict.</i>	— Icones pictæ.
<i>— soc. Lin.</i>	— Transactions of the Linnean Society.
<i>— spicil.</i>	— Spicilegium botanicum.
<i>Sonn. itin.</i>	Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc.
<i>Swartz, obs.</i>	Observationes botanicæ.
<i>— orchid.</i>	— Orchides.
<i>— prodr.</i>	— Prodrômus.
<i>Thouin, Ann.</i>	Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
<i>Thuilier, fl.</i>	Flore des environs de Paris.
<i>Vahl, sp.</i>	Enumeratio Plantarum.

<i>vahl, symb.</i>	Symbolæ botanicæ.
<i>wald. et kitt. hung.</i> ...	Waldstein et Kittaibel, Descriptiones et Icones, Plant. rariorum Hungariæ.
<i>wendl. sert. hann.</i>	Wendland, Sertum Hannoverianum.
<i>vent. choix de pl.</i>	Ventenat, Choix de Plantes.
— <i>h. cels.</i>	— Jardin de Cels.
— <i>inst.</i>	— Mémoires de l'Institut.
— <i>malm.</i>	— Jardin de la Malmaison.
<i>vill. delph.</i>	Villars, Histoire des Plantes du Dauphiné.
<i>willd. enum.</i>	Willdenow, Enumeratio Plantarum horti regii berolinensis.
— <i>enum. suppl.</i>	— Supplementum.
— <i>h. berl.</i>	— Hortus berolinensis.
— <i>sp.</i>	— Species plantarum.
<i>viviani, fragm.</i>	Floræ italicæ Fragmenta.
⊙.....	Annuel.
♂.....	Bisannuel.
℥.....	Vivace.
♣.....	Ligneux.
or.	Orangerie.
s. ch.	Serre chaude.

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI.

CLASSIS I.

CLASSE I.

ACOTYLEDONES.

ACTYLÉDONS.

NOTA. Cette Classe a été supprimée du Tableau , parce que les Plantes qu'elle renferme ne sont pas susceptibles d'être cultivées.

CLASSIS II.

CLASSE II.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

ORDO I.

ORDRE I.

FILICES.

FOUGÈRES.

I. Capsula nuda nec annulo cincta.

I. Capsules nues et sans anneau.

OPHIOGLOSSUM
vulgatum L.

OPHIOGLOSSE
commune. F. ☞

BOTRYCHIUM
lunaria swartz, syn. }
osmunda lunaria L. }

BOTRYCHIUM
lunaire. F. ☞

HYDROGLOSSUM
japonicum willd. H. berol. }
lygodium japonicum swartz, }
syn. }

HYDROGLOSSUM
du Japon. s. ch. ☞

OSMUNDA

regalis L.

II. *Capsula nuda, annulo cincta.*

ACROSTICHUM

aureum L.

marantæ L.

CETERACH

officinatum Willd. sp. }

Asplenium ceterach L. }

POLYPODIUM.

1. *Fronde simplici.*

crassifolium L.

2. *Fronde pinnatifida.*

phymatodes L. Mant.

aureum L.

vulgare L.

cambricum L.

3. *Fronde bipinnatifida.*

rheopteris L.

4. *Fronde supra-décomposita.*

dryopteris L.

III. *Capsula indusio velata.*

ASPIDIUM.

1. *Fronde ternata.*

trifoliatum Swartz, syn. }

Polypodium trifoliatum L. }

2. *Fronde pinnata.*

Lonchitis Swartz, syn. }

Polypodium Lonchitis L. }

achrosticoides Swartz, syn.

3. *Fronde bipinnatifida, indusio reniformi.*

oreopteris Swartz, syn.

rheopteris Swartz, syn. }

Polypodium rheopteris L. }

molle Swartz, syn.

cristatum Swartz, syn.

OSMONDE

officinale. F. ℥ (méd.)

II. Capsules nues, entourées d'un anneau.

ACROSTIC

doré. Antilles. s. ch. ℥

de Maranta. F. Alpes. ℥

CÉTÉRACH

officinal. F. ℥ (méd.)

POLYPODE.

1. Feuilles simples.

à feuil. épaiss. Ant. s. ch. ℥

2. Feuilles pinnatifides.

phymatode. Ind. s. ch. ℥

doré. Antilles. s. ch. ℥

commun. F. ℥ (méd.)

lacinié. F. ℥

3. Feuilles deux fois pinnatifides.

rhéoptéris. F. ℥

4. Feuillage décomposé.

dryoptéris. F. ℥

III. Capsules recouvertes d'une enveloppe.

ASPIDIUM.

1. Feuilles ternées.

trifolié. Antilles. s. ch. ℥

2. Feuilles pennées.

Lonchitis. F. Alpes. ℥

faux Acrostic. Virginie. ℥

3. Feuilles deux fois pinnatifides; enveloppe réniforme.

oreoptéris. F. ℥

rhépytéris. F. ℥

à feuil. moll. Am. m. s. ch. ℥

à crête. Suisse. ℥

4. *Fronde bipinnatâ triplicato-pinnatâve , indusiis reniformibus.* 4. Feuilles deux ou trois fois pennées ,
enveloppe réniforme.

Filix-mas swartz. syn. }
Polypodium filix-mas L. }
Filix foemina swartz. syn. }
Polypodium filix foemina L. }
aculeatum swartz. syn. }
Polypodium aculeatum L. }
dilatatum swartz. syn. }
rigidum swartz. syn. }
fragrans vill. delph. }
Halleri willd. sp. }
fontanum swartz. syn. }
bulbiferum swartz. syn. }
Polypodium bulbiferum L. }
fragile swartz. syn. }
Polypodium fragile L. }
rhæticum swartz. syn. }
Polypodium rhæticum L. }
montanum swartz. syn. }
myrrhidifolium vill. delph. }

Fougère mâle. F. ℥ (méd.)

Fougère femelle. F. ℥

à aiguillons. F. ℥.

dilaté. F. ℥

à feuilles roides. F. ℥

de Haller. Alpes. ℥

bulbifère. Canada. ℥

fragile. F. ℥

de Rhétie. Alpes. ℥

des montagnes. Alpes. ℥

ONOCLEA

sensibilis L.

ONOCLEA

sensible. Am. s. ℥

ASPLENIUM

septentrionale willd. sp. }
Acrostichum septentrion. L. }
marinum L.
acrostichoides swartz. syn.
Trichomanes L.
furcatum swartz. syn.
Ruta-muraria L.
Adiantum-nigrum. L.

ASPLENIUM

du nord. F. ℥

maritime. F. ℥

faux Acrostic. Am. s. ℥

Trichomanes. F. ℥

cunéiforme. Cap. or. ℥

rue des murailles. F. ℥ (méd.)

capillaire noir. F. ℥ (méd.)

SCOLOPENDRIUM

officinarum swartz. syn. }
Asplenium scolopendrium L. }

SCOLOPENDRE

officinale. F. ℥ (méd.)

BLECHNUM

occidentale L.
boreale swartz. syn. }
osmunda spicant L. }

BLECHNUM

d'occident. Inde. s. ch. ℥

du nord. F. ℥

WOODWARDIA

radicans swartz. syn.

WOODWARDIA

prolifère. Italie. or. ℥

PTERIS

aquilina L.
arguta swartz. syn.
serrulata L.

PTERIS

Fougère commune. F. ℥

à feuell. en scie. Canar. or. ℥

crênelée. Inde. s. ch. ℥

cretica L.
 longifolia L.
 crispa swartz. syn. }
 osmunda crispa L. }

de Crète. or. ℥
 à f. long. antill. s. ch. ψ
 crépue. Alpes. ℥

CHEILANTHES

odora swartz. syn. }
 polypodium fragrans Desf. Atl. }
 pteris acrosticha Balbis. Add. }

CHÉILANTHE

odorant. F. m. or. ℥

ADIANTUM

reniforme L.
 pedatum L.
 capillus-veneris L.

ADIANTUM

reniforme. canaries. or. ψ
 de Canada. ψ (méd.)
 de Montpellier. ψ (méd.)

DAYALLIA

canariensis swartz. syn. }
 trichomanes canariense L. }

DAVALLIA

des Canaries. or. ℥

ORDO II.

RHIZOSPERMÆ.

ORDRE II.

RHIZOSPERMES.

PILULARIA

globulifera L.

PILULAIRE

à globules. F. ψ

MARSILEA

quadrifolia L.

MARSILEA

à quatre feuilles. F. ψ

ORDO III.

CICADEÆ.

ORDRE III.

CICADÉES.

ZAMIA

pumila Encycl. (non Lin.)
 furfuracea Willd. sp.
 integrifolia Jacq. Ic.
 spiralis. Salisb. Prodr.
 tridentata Willd. sp.

ZAMIA

nain. Am. s. s. ch. ♀
 furfuracé. inde. s. ch. ♀
 à feuell. entières. inde. s. ch. ♀
 en spirale. N. Holl. s. ch. ♀
 tridenté. N. Holl. s. ch. ♀

CYCAS

circinalis L.
 revoluta Thunb. Jap.

CYCAS

en éventail. inde. s. ch. ♀
 roulé. Japon. s. ch. ♀

ORDO IV.

EQUISETACEÆ.

EQUISETUM

arvense L.
 sylvaticum L.
 palustre L.
 fluviatile L.

ORDRE IV.

ÉQUISÉTACÉES.

PRÉLE

des champs. F. ψ
 des bois. F. ℥
 des marais. F. ℥
 des rivières. F. ℥

limosum L.
hyemale L.

limoneuse. F. ☞
d'hiver. F. ☞

ORDO V.

N A I A D E S.

HIPPURIS

vulgaris L.

CHARA

vulgaris L.
tomentosa L.
flexilis L.

CERATOPHYLLUM

submersum L.
demersum L.

NAIAS

major Dec. Fl.
monosperma Willd. sp. }
minor Dec. Fl.
caulinia fragilis Willd. sp. }

SAURURUS

cernuus L.

POTAMOGETON

natans L.
perfoliatum L.
densum L.
lucens L.
crispum L.
compressum L.
pectinatum L.
gramineum L.
pusillum L.

RUPPIA

maritima L.

ZANICHELLIA

palustris L.

CALLITRICHE

verna L.
 — *angustifolia* }
 — *autumnalis* L. }

LEMNA

polyrhiza L.
minor L.
 — *gibba* L.
trisulca L.

ORDRE V.

N A I A D E S.

HIPPURIS (onagraires. Decand.)
aquatique. F. ☞

CHARA

commun. F. ☉
colonneux. F. ☉
flexible. F. ☉

CERATOPHYLLUM (salicaires. Dec.)
à fruit lisse. F. ☞
à fruit épineux. F. ☞

NAIADE

à feuilles lancéolées. F. ☉
à feuilles linéaires. F. ☉

SAURURUS

incliné. Am. s. ☞

POTAMOGETON (Alismacées. Dec.)

flottant. F. ☞
perfolié. F. ☞
bifurqué. F. ☞
luisant. F. ☞
crépu. F. ☞
comprimé. F. ☞
pectiné. F. ☞
à feuilles de Gramen. F. ☞
grêle. F. ☞

RUPPIA (Alismacées. Dec.)
maritime. F. ☉ ?

ZANICHELLE (Alismacées. Dec.)
des marais. F. ☉

CALLITRIC (onagraires. Dec.)
printanier. F. ☉
 — *à feuilles étroites.*

LEMNA

à larges feuilles. F. ☉
à petites feuilles. F. ☞
 — *gibbeux.*
à trois sillons. F. ☞

Plantæ monocotyledones

staminibus hypogynis.

O R D O I.

A R O I D E Æ.

I. *Spadix spathâ involutus.*

AMBROSINIA

Bassii L.

ARUM.

1. *Acaulia*, foliis compositis.

crinitum willd. sp. }

muscivorum L. f. }

clavatum.

dracunculus L.

dracontium L.

triphyllum L.

2. *Acaulia*, foliis simplicibus.

maculatum L.

italicum Encycl.

arisarum L.

colocasia L.

pictum L. f.

tenuifolium, L.

divaricatum L.

trilobatum L.

CALADIUM.

1. *Acaulia.*

reticulatum.

punctatum.

sagittifolium willd. sp.

violaceum.

bicolor Vent. II. cels.

2. *Caulescentia.*

lacerum willd. sp.

seguinum willd. sp.

auri um willd. sp.

tripartitum willd. sp.

CALLA

æthiopica L.

palustris L.

Plantes monocotylédones

à étamines sous le pistil.

O R D R E I.

A R O Î D E S.

I. Spadice entouré d'une spathe.

AMBROSINIA

de Bassi. sicile. or. ℥

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

chevelu. minorque. or. ℥

en massue. s. ch. ℥

serpenteaire. F. ℥ (méd.)

dracontium. Am. s. or. ℥

à trois feuilles. Am. s. ℥

2. Point de tiges, feuilles simples.

maculé. F. ℥ (méd.)

d'Italie. ℥

capuchon. F. m. or. ℥

colocase. Égypte. s. ch. ℥

veiné. minorque. or. ℥

à feuilles étroites. F. m. or. ℥

divergent. inde. s. ch. ℥

trilobé. inde. s. ch. ℥

CALADIUM.

1. Point de tiges.

à réseau. s. ch. ℥

moucheté. s. ch. ℥

hasté. Antilles. s. ch. ℥

violet. Antilles. s. ch. ℥

bicolor. Buénos-Ayres. s. ch. ℥

2. Une tige.

lacéré. Antilles. s. ch. ℥

à f. de balisier. Antill. s. ch. ℥

auriculé. Antilles. s. ch. ℥

trilobé. Caracas. s. ch. ℥

CALLA

d'Éthiopie. cap. or. ℥ (orn.)

des marais. F. ℥

DRACONTIUM

pertusum L.
polyphyllum L.

POTHOS

crassinervia Jacq. IC.
lanceolata L.
cordata L.

II. *Spadix spathâ destitutus.*

ORONTIUM

japonicum Thunb. Jap.

ACORUS

calamus L.
gramineus H. K.

ORDO II.**TYPHÆ.****TYPHA**

latifolia L.
angustifolia L.
minima Dec. Fl.

SPARGANIUM

erectum L.
simplex Smith. Fl.
natans L.

ORDO III.**CYPEROIDEÆ.****I. Flores monoici.****CAREX.****1. Spicâ unicâ simplici.**

dioica L.
pulcaris L.

2. Spicis androgynis.

foetida All. ped.
baldensis L.
cyperoides Schk. car.
bohémica Schreb. Gram. }
disticha Schreb. spic.
intermedia Good. s. Lin.
spicata Encycl.
arenaria Leers. herb. (non Lin.) }

DRACONTIUM

perforé. Antilles. s. ch. ♀
à f. nombr. surinam. s. ch. ♀

POTHOS

à gross. nervur. caracas. s. ch. ♀
lancéolé. Antilles. s. ch. ♂
à f. en cœur. Antill. s. ch. ♀

II. Spadice sans spathe.

ORONTIUM

du Japon. s. ch. ♀

ACORUS

aromatique. F. ♀ (méd.)
à feuilles étroites. chine. or. ♂

ORDRE II.**MASSETTES.****MASETTE**

à larges feuilles. F. ♀
à feuilles étroites. F. ♀
petite. F. ♀.

RUBAN-D'EAU

rameux. F. ♂
à tige simple. F. ♀
flottant. F. ♀

ORDRE III.**SOUCHETS.****I. Fleurs monoïques.****CAREX.****1. Un seul épi simple.**

dioïque F. ♀
pulcaire. F. ♀

2. Épis androgynes.

fétide. Alpes. ♀
du mont Baldo. Italie. ♂

cypéroïde. F. ♀

à deux rangs. F. ♂

atrata L.
 arenaria L.
 tenella *Rhul.* fl.
 ovalis *Good. s. Lin.*
 vulpina L.
 muricata L.
 stellulata *Good. s. Lin.*
 divulsa *Good. s. Lin.*
 curta *Good. s. Lin.*
 elongata L.
 brizoides L.
 paniculata L.
 teretiuscula *Good. s. Lin.*
 remota L.

noirâtre. Alpes. Ψ
 des sables. F. Ψ
 grêle. F. Ψ
 ovale. F. $\mathcal{L}$
 compacte. F. $\mathcal{L}$
 hérissé. F. Ψ
 étoilé. F. Ψ
 séparé. F. Ψ
 tronqué. F. Ψ
 allongé. F. $\mathcal{L}$
 brizoïde. F. $\mathcal{L}$
 paniculé. F. Ψ
 cylindrique. F. $\mathcal{L}$
 écarté. F. Ψ

3. *Spicis sexu distinctis, fœmineis sessilibus.*

digitata L.
 flava L.
 cederi *Roth. Germ.*
 extensa *Good. s. Lin.*
 montana L.
 collina *Willd. sp.* }
 tomentosa L.
 præcox *Jacq. Austr.*
 filiformis L.
 distans L.

3. Épis femelles sessiles, séparés des mâles.

digité. F. $\mathcal{L}$
 jaune. F. $\mathcal{L}$
 d'Oeder. F. Ψ
 à longues bractées. Anglet. $\mathcal{L}$
 de montagne. F. Ψ
 cotonneux. F. $\mathcal{L}$
 précoce. F. Ψ
 filiforme. F. Ψ
 distant. F. $\mathcal{L}$

4. *Spicis sexu distinctis, fœmineis pedunculatis.*

argentea *vill. delph.*
 scariosa *Encycl.*
 prostrata *All. ped.*
 clandestina *Schk. car.* }
 panicea L.
 sylvatica *Good. s. Lin.* }
 drymeja L. f.
 pallescens L.
 plantaginea *Encycl.*
 pseudo-cyperus L.
 depauperata *Good. s. Lin.*
 pendula *Good. s. Lin.* }
 maxima *scop. carn.* }

4. Épis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argenté. F. $\mathcal{L}$
 faux panis. F. Ψ
 des bois. F. $\mathcal{L}$
 pâle. F. $\mathcal{L}$
 à feuell. de plantain. Am. s. $\mathcal{L}$
 faux souchet. F. Ψ
 à fruits rares. F. Ψ
 à épis pendans. F. $\mathcal{L}$

5. *Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.*

cæspitosa L.
 glauca *scop. carn.*

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.

gazonnant. F. Ψ
 glauque. F. Ψ

stricta Good. s. Lin. }
verna Encycl. }
riparia Good. s. Lin.
paludosa Good. s. Lin.
acuta Schk. car.
secalina Willd. sp.
vesicaria L.
ampullacea Good s. Lin.
hirta L.
hordeistychos Vill. Delph.

II. Flores hermaphrodites.

SCHOENUS.

1. *Culmo tereti.*

mariscus L.
mucronatus L.
nigricans L.
fuscus L.
rhinospora fusca H. & K. }

2. *Culmo triquetro.*

compressus L.
albus L.
rhinospora alba Vahl. sp. }

ERIOPHORUM

polystachyum L. }
latifolium Schrad. germ. }
vaillantii Poiteau fl.
gracile Roth. catal. }
triquetrum Schrad. germ. }
angustifolium Schrad. germ.
vaginatum L.
capitatum Host. Gram.

SCIRPUS.

1. *Spicâ unicâ.*

articulatus L.
palustris L.
cæspitosus L.
acicularis L.
fluitans L.
ovatus Roth. catal.
campestris Roth. catal.

2. *Culmo tereti polystachyo.*

setaceus L.
supinus L.

serré. F. ♀

des rivages. F. ♀

des marais. F. ♀

aigu. F. ♀

à épi de seigle. F. ♀

vésiculeux. F. ♀

renflé. F. ♀

velu. F. ♀

épi d'orge. F. ♀

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHOENUS.

1. Chaume cylindrique.

des étangs. F. ♀

acéré. F. ♀

noir. F. ♀

brun. F. ♀

2. Chaume triangulaire.

comprimé. F. ♀

blanc. F. ♀

LINAIGRETTE

à larges feuilles. F. ♀

de Vaillant. F. ♀

grêle.

à feuilles étroites. F. ♀

engainée. F. ♀

à fleurs en tête. F. ♀

SCIRPE.

1. Un seul épi.

articulé. inde. s. ch. ♀

des marais. F. ♀

gazonnant. F. ♀

aiguille. F. ♀

flottant. F. ♀

ovale. F. ♀

des champs. F. ♀

2. Chaume cylindrique à plusieurs épis.

sétiforme. F. ♀

couché. F. ♀

lacustris *L.*
 holoschoenus *L.*
 romanus *L.*

3. *Culmo triquetro polystachyo.*

triquetus *L.*
 mucronatus *L.*
 maritimus *L.*
 sylvaticus *L.*
 annuus *All. ped.*
 biumbellatus *Forsk. fl.*
 dichotomus *L.*
 fimbriatilis dichotoma *Vahl.*
sp.

CYPERUS.

1. *Culmo tereti.*

junciformis *Desf. Atl.*
 articulatus *L.*

2. *Culmo triquetro.*

viscosus *Swartz. Prodr.*
 longus *L.*
 tenuiflorus *Jacq. Ic.*
 rotundus *L.*
 esculentus *L.*
 vegetus *Vahl. sp.*
 compressus *Jacq. Hort.*
 patulus *Willd. Enum.*
 strigosus *Willd. Enum.*
 glomeratus *Willd. Enum.*
 flavescens *L.*
 fuscus *L.*
 pannonicus *L. f.*
 papyrus *L.*
 alternifolius *L.*

KILLINGIA

triceps *L. f.*

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

CINNA

arundinacea *L.*
 Agrostis cinna *Willd. Enum.*

ANTHOXANTHUM

odoratum *L.*

des étangs. *F. V*
 à globules. *F. V*
 romain. *F. V*

3. Chaume triangulaire à plusieurs épis.

triangulaire. *F. m. V*
 piquant. *F. m. or. V*
 maritime. *F. V*
 des bois. *F. V*

annuel. Italie. *⊙*

SOUCHET.

1. Chaume cylindrique.

jonciforme. *F. m. V*
 articulé. Inde. *s. ch. V*

2. Chaume triangulaire.

visqueux. Antilles. *V*
 odorant. *F. V* (écon. méd.)
 à petites fleurs. *V*
 rond. *F. V* (méd.)
 comestible. Égypte. *or. V*

vert. *V*

étalé. Hongrie. *V*
 desséché. Virginie. *V*
 aggloméré. Italie. *⊙*
 jaunâtre. *F. V*
 brun. *F. V*
 de Hongrie. *V*
 papyrus. Sicile. *or. V*
 à feuil. alternes. Madagascar.
s. ch. V

KILLINGIA

à trois têtes. Antilles. *s. ch. V*

ORDRE IV.

GRAMINÉES.

CINNA

de Canada. *V*

FLOUVE

odorante. *F. V*.

amarum *brotero. phyt.* }
glaucum vahl. sp. }

glaucue. portugal. ℥

CRYPsis

CRYPsis

aculeata H. K. }
schœnus mucronatus L. }
anthoxanthum aculeatum L. f. }
antitragus aculeatus. Gœrt. }
Fruct. }
heleochloa aculeata Host. Gr. }
schœnoides H. K. }
phleum schœnoides L. }
heleochloa schœnoides Host. }
Gram. }

piquant. F. m. ψ

faux schœnus. F. m. ψ

CORNUCOPiÆ

CORNUCOPiÆ

cucullatum L.

en capuchon. orient. ☉

ALOPECURUS

ALOPECURE

utriculatus schrad. Germ. }
phalaris utriculata L. }
bulbosus L. }
agrestis L. }
pratensis L. }
arundinaceus Encycl. }
ventricosus Pers. syn. }
geniculatus L. }
Gerardi Vill. Delph. }
phleum Gerardi All. ped. }

à utricules. F. ☉

bulbeux. F. ψ

des champs. F. ℥

des prés. F. ℥

arundinacé. F. ψ

généculé. F. ψ

de Gérard. Alpes. ψ

PHLEUM

FLÉAU

pratense L. }
nodosum L. }
alpinum L. }
echinatum Host. Gram. }
arenarium L. }
bellardii Willd. Enum. }
phalaris bulbosa L. }
phalaris cylindrica Dec. Fl. }
phleum tenue schrad. Germ. }

des prés. F. ℥

bulbeux. F. ℥

des Alpes. F. ψ

hérissé. F. ℥

des sables. F. ℥

de Bellardi. F. ℥

LEERSIA

LÉERSIA

oryzoides Willd. sp. }
phalaris oryzoides L. }

des marais. F. ℥

PHALARIS

ALPISTE

aspera Retz. obs. }
phleum asperum Jacq. ic. }
minor Retz. obs. }
canariensis L. }
paradoxa L. }

rude. F. ☉

mineure. orient. ☉

des Canaries. ☉

rongée. orient. ☉

phleoides L.

phleum boehmeri schr. germ. }

inucronata.

phleum phalaroides will. }

delph.

capensis Thunb.

arundinacea L.

— picta.

fléau. f. ☞

à deux pointes. f. ☞

du Cap. or. ☞

roseau. f. ☞

— panachée.

BECKMANNIA

erucæformis Host. gr. }

phalaris erucæformis L. }

BECKMANNIA

chenillette. sibiérie. ☉

PASPALUM

stoloniferum Bosc. s. Lin. par. }

racemosum Jacq. ic. }

miliun latifolium L. }

membranaceum Lamk. ill. }

ceresia elegans Willd. Enum. }

tenellum Willd. Enum.

kora Willd. sp.

PASPALUM

rampant. Pérou. ☞

membraneux. Pérou. s. ch. ☞

délicat. s. ch. ☞

kora. inde. s. ch. ☞

CYNODON

dactylon. Willd. Enum. }

panicum dactylon L. }

CYNODON

chiendent. f. ☞ (méd.)

DIGITARIA

sanguinalis Willd. Enum. }

panicum sanguinale L. }

DIGITAIRE

sanguine. f. ☞

PANICUM.

1. Flores spicati.

verticillatum L.

viride L.

glaucum L.

geniculatum Willd. Enum.

maritimum Encycl.

italicum L.

germanicum Willd. sp.

verticillé. f. ☉

vert. f. ☉

glaucue. f. ☉

coudé. Antilles. s. ch. ☞

maritime. ☉

d'Italie. ☉

d'Allemagne. ☉

2. Flores spicati, spicis pluribus.

crus-galli L.

— aristatum.

echinatum Willd. Enum.

colonum L.

2. Plusieurs épis.

pied-de-poule. f. ☉

— barbu.

hérissé. Am. m. ☉

tacheté. inde. ☉

3. Flores paniculati.

sulcatum.

plicatum Lamk. ill. }

plicatum Willd. Enum. }

3. Fleurs en panicule.

silloné. Antilles? s. ch. ☞

plissé. inde. s. ch. ☞

proliferum *encycl.*
 virgatum *L.*
 coloratum *L.*
 miliaceum *L.*
 — nigrum.
 capillare *L.*
 latifolium *L.*

LUDOLPHIA

glaucescens *Willd. Enum.*
 panicum arborescens *Lam. ill.* }

MILIUM

paradoxum *L.*
 effusum *L.*
 confertum *L.*
 multiflorum *Schrad. Germ.* }
 agrostis miliacea *L.* }

GASTRIDIMUM

lendigerum *Beauv. Agr.* }
 milium lendigerum *L.* }

AGROSTIS.

1. *Aristata.*

spica-venti *L.*
 interrupta *L.*
 retrofracta *Willd. Enum.* }
 debilis *encycl. suppl.* }
 racemosa *Mich. Am.*

2. *Mutica.*

foliosa *Mertens.*
 stolonifera *L.*
 alba *L.*
 vulgaris *Smith. Fl.* }
 capillaris *Leers. Herb.* }
 dulcis.
 serotina *L.*
 pumila *L.*
 pungens *L.*
 mexicana *L.*
 tenacissima *Jacq. Ic.*

TRICHODIUM

caninum *Schrad. Germ.* }
 agrostis canina *L.* }
 laxiflorum *Mich. Fl.* }
 agrostis cornucopiae *Lam. ill.* }
 decumbens *Mich. Fl.*

prolifère. *Am. s. ℥*
 effilé. *Am. s. ℥*
 coloré. *Égypte. ☉*
 millet. *Inde. ☉ (écon.)*
 — noir.
 capillaire. *Am. s. ☉*
 à larg. feuell. *Am. m. s. ch. ♀*

LUDOLPHIA

glauque. *Inde. s. ch. ♀*

MIL

noir. *F. ℥*
 étalé. *F. ℥*
 ramassé. *F. ♀*
 à fleurs nombreuses. *F. ℥*

GASTRIDIMUM

tuberculeux. *F. ☉*

AGROSTIS.

2. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. *F. ☉*
 interrompu. *F. ☉*
 recourbé. *N. Holl. ℥*
 à grappes. *Am. s. ♀*

2. Fleurs sans arêtes.

feuill. *℥*
 traçant. *F. ♀*
 blanc. *F. ℥*
 commun. *F. ♀*
 doux. *orient. ☉*
 d'automne. *F. m. ♀*
 nain. *F. ℥*
 piquant. *F. m. ℥*
 du Mexique. *♀*
 à feuell. dures. *Inde. s. ch. ♀*

TRICHODIUM

des chiens. *F. ♀*
 à fleurs lâches. *caroline.*
 tombant. *Am. s. ℥*

CHAMAGROSTIS*minima* *schrad. Germ.**Agrostis minima* *L.**Knappia agrostidea* *Smith. Fl.***CHAMAGROSTIS***filiforme.* *F.* ☉**POLYPOGON***monspeliensis* *Desf. Atl.**Alopecurus monspeliensis* *L.**subspicatus* *Willd. Enum.**Chæturus subspicatus* *Beauv.*
*Gram.***POLYPOGON***de Montpellier.* ☉*de Portugal.* ☉**STIPA***capillata* *Willd. sp.**pennata* *L.**conferta.**Aristella* *Willd.**junceæ* *L.**tenacissima* *L.**tortilis* *Desf. Atl.***STIPA***chevelu.* *F.* ☿*plumeux.* *F.* ☿*à fleurs serrées.* ☿*à petites barbes.* *F.* ☿*jonciforme.* *F.* ☿*spart.* *esp. or.* ☿*tordu.* *barbarie.* ☿**ARISTIDA***cærulescens* *Desf. Atl.**canariensis* *Willd. Enum.***ARISTIDA***bleuâtre.* *barbarie.* ☉**SACCHARUM***officinarum* *L.*— *violaceum.**cylindricum* *Lamk. ill.**imperata cylindrica* *Beauv.*
*Agrost.**lagurus cylindricus* *L.***SUCRE***officinal.* *inde.* ☿ (écon.)— *violet.**cylindrique.* *F. m. or* ☿**ERIANTHUS***saccharoides* *Mich. Fl.**ravennæ* *Beauv. Agr.**Andropogon ravennæ* *L.***ERIANTHUS***faux sucre.* *caroline.* *or.* ☿*de Ravenne.* *F. m. or.* ☿**LAGURUS***ovatus* *L.***LAGURUS***ovale.* *F. m.* ☉**PENICILLARIA***spicata* *Willd. Enum.**Holcus spicatus* *L.***PÉNICILLAIRE***en épi.* *inde.* ☉ (écon.)**SORGHUM***vulgare* *Willd. Enum.**cernuum* *Willd. Enum.**saccharatum* *Willd. Enum.**cafrorum* *Willd. Enum.**halepense* *L.**Holcus halepensis* *L.***SORGHO***commun.* *inde.* ☉ (écon.)*penché.* ☉ (écon.)*sucré.* *inde.* ☉ (écon.)*des Cafres.* *Afr.* ☉ (écon.)*d'Alep.* ☉

HOLCUS

lanatus L.
mollis L.

HOLCUS

laineux. F. ☞
velouté. F. ☞

ANDROPOGON

Allionii *Decand. Fl.*
contortum *Allion. (non Lin.)* }
provinciale *Encycl.*
ischœmum L.
annulatum *Vahl. symb.*
nardus *Pers. syn.* }
citriodorum. }
strictum *Host. Gr.*
hirtum L.
distachyon L.
gryllus L.
schœnanthus L.
macrouros *Mich. Fl.*

ANDROPOGON

d'Allioni. F. ☞
de Provence. F. m. ☞
digité. F. ☞
annulaire. Égypte. or. ☞
odorant. île de F. s. ch. ☞
serré. Hongrie. ☞
hérissé. F. m. or. ☞
à deux épis. F. m. or. ☞
paniculé. F. ☞
jonc odorant. inde. s. ch. ☞
à grande panicule. caroline.
or. ☞

CHLORIS

petræa *Swartz. Prodr.*
ciliata *Swartz. Prodr.*
scoparia.
cynosurus scoparius *Encycl.* }
radiata *Swartz. Prodr.* }
Agrostis radiata L. }
Andropogon fasciculatum L. }
ex *Swartz.*

CHLORIS

des rochers. Antilles. s. ch. ☞
ciliée. Antilles. s. ch. ☞
à balais. inde. ☉
rayonnante. inde. ☉

CHONDROSUM Willd. Mss.

tenue *Willd. Mss.*
chloris filiformis *Encycl. sup.* }
chloris gracilis *Durand. Diss.* }

CHONDROSUM

filiforme. Mexique.

TRIPSACUM

dactyloides L.
hermaphroditum L.
Antephora elegans *Schreb. Gr.* }

TRIPSACUM

monoïque. Am. s. ☞
hermaphrodite. Antilles. ☉

TRAGUS

racemosus *Desf. Atl.*
cenchrus racemosus L.
Lappago racemosa *Willd. sp.* }

TRAGUS

à grappes. F. ☉

CENCHRUS

echinatus L.
ciliaris L.
pennisetum cenchroides *Pers.* }

CENCHRUS

hérissé. Antilles. ☉
cilié. cap. ☉

ECHINARIA

capitata *Desf. Atl.*
 cenchrus capitatus *L.*
 sesleria echinata *Schrad. Ger.* }

ÆGILOPS

ovata *L.*
 triuncialis *L.*
 squarrosa *L.*

ROTTBOELLIA

incurvata *L.*
 pannonica *Host. Gr.* }
 biflora *Pers. Syn.* }
 monandra *Schrad. Germ.* }
 nardus aristata *L.* }

AIRA

cæspitosa *L.*
 flexuosa *L.*
 juncea *Vill. Delph.*
 Deschampsia juncea *Beauv.* }
Agrost.
 caryophyllea *L.*
 præcox *L.*
 minuta *L.*
 canescens *L.*
 corynophorus canescens }
Beauv. Agrost.
 pubescens *Vahl. Symb.* }

CATABROSA

aquatica *Beauv. Agrost.* }
 Aira aquatica *L.* }

MELICA

ciliata *L.*
 pyramidalis *Lamk. Ill.*
 Bauhini *Willd. Enum.*
 uniflora *Retz. Obs.* }
 Lobelii *Vill. Delph.* }
 nutans *L.* }
 montana *Dec. Fl.* }
 altissima *L.*

MOLINIA

cœrulea *Beauv. Agrost.* }
 melica cœrulea *L.* }

SPARTINA

cynosuroides *Beauv. Agrost.* }
 trachynotia cynosuroides }
Mich. Fl.
 dactylis cynosuroides *L.* }

ECHINARIA

à fl. en tête. *f. m.* ☉

ÆGILOPS

ovale. *f.* ☉
 à longs épis. *f.* ☉
 rude. barbarie. ☉

ROTTBOELLIA

arqué. *f.* ☉
 de Hongrie. ☉
 à une étamine. *f.* ℥

AIRA

touffu. *f.* ℥
 tortueux. *f.* ℥
 jonciforme. Alpes. ℥
 étalé. *f.* ☉
 printanier. *f.* ☉
 filiforme. *esp.* ☉.
 blanchâtre. *f.* ☉
 pubescent. *f. m.* ☉

CATABROSA

aquatique. *f.* ℥

MELICA

cilié. *f.* ℥
 pyramidal. *f. m. or.* ℥
 de Bauhin. *f.* ℥
 à une fleur. *f.*
 à fleurs penchées. *f.* ℥
 élevé. sibiérie. ℥

MOLINIA

bleuâtre. *f.* ℥

SPARTINA

faux cynosurus. *Am. s.* ℥

DACTYLIS

glomerata L.

SESLERIAcœrulea *Arduin. spec.* }

cynosurus cœruleus L. }

elongata *Host. Gr.***DINEBA**ægyptiaca *Delile fl.* }dactylis paspaloides *Willd.* }*Enum.*curtipendula *Beauv. Agrost.* }chloris curtipendula *Mich.* }*fl.***CYNOSURUS**

cristatus L.

echinatus L.

durus L.

LAMARCKIAaurea *Dec. fl.* }

cynosurus aureus L. }

chrysurus cynosuroides *Pers.* }*syn.***ELEUSINE**

ægyptia. }

cynosurus ægyptius L. }

indica *Lamk. ill.* }

cynosurus indicus L. }

coracana *Lamk. ill.* }

cynosurus coracanus L. }

LOLIUM

temulentum L.

perenne L.

— tenue.

ELYMUS

arenarius L.

giganteus *Vahl. symb.* }racemosus *Lamk. ill.* }

virginicus L.

sibiricus *Schr. Gram.* }

tener L. f. ? }

canadensis L.

glaucofolius *Willd. Enum.*

ramosus.

europæus L.

hordeiformis.

DACTYLIS

aggloméré. F. ☞

SESLERIA

bleuâtre. F. ☞

à longs épis. Allem. ☞

DINEBA

d'Égypte. ☉

à fleurs pendantes. Am. s. ☞

CRETELLE

des prés. F. ☞

hérissée. F. ☉

roide. F. ☉

LAMARCKIA

jaune. F. m. ☉

ELEUSINE

d'Égypte. ☉

des Indes. ☉

coracan. barbarie. ☉

LOLIUM

ivraie. F. ☉

Raygrass. F. ☞

— grêle.

ELYME

des sables. F. ☞

gigantesque. ☞

de Virginie. ☞

de Sibérie. ☞

de Canada. ☞

glauque. Am. s. ☞

rameux. ☞

d'Europe. F. ☞

épi d'orge. ☞

ASPRELLA

hystrix willd. Enum. }
Elymus hystrix L. }

HORDEUM

vulgare *L.*
 — cœleste.
hexastichon L.
zeocriton L.
distichon L.
 — nudum.
maritimum L.
secalinum L.
murinum L.
jubatum L.

TRITICUM

vulgare *willd. Enum.*
 — hybernum.
compositum L. f.
durum Desf. Atl.
spelta L.
zea Host. Gr.
monococcum L.
polonicum L.
cristatum Pers. syn.
juncceum L.
rigidum Schrad. Germ. }
elongatum Host. Gram. }
repens L.
 — aristatum.
caninum L.
glaucum.
prostratum L. f.
patulum willd. Enum. }
secale pungens Pers. syn. }
poa Dec. Fl.
nardus Dec. Fl.
unilaterale L.

SECALE

cereale L.
villosum L.

BROMUS

mollis L.
parviflorus.
lanceolatus Roth. cat.
grossus. }
secalinus L. (ex Swartz.) }

ASPRELLA

divergent. orient. L.

ORGE

commune. Russie. O (écon.)
 — nue.
hexagône. O (écon.)
éventail. O (écon.)
à deux rangs. Russie. (écon.)
 — nue.
maritime. F. O
des prés. F. O
des murailles. F. O
chevelue. Syrie. O

FROMENT

cultivé. O (écon.)
 — d'hiver.
rameux. O (écon.)
corné. O (écon.)
épeautre. O (écon.)
zea. O (écon.)
monosperme. O (écon.)
de Pologne. O (écon.)
à crêtes. L
jonciforme. F. V
rude. Autriche. L
chiendent. F. L
 — barbu.
des chiens. F. V
glaucue. L
couché. Sibérie. O
étalé. Égypte. O
poa. F. O
filiforme. F. O
unilatéral. F. O

SEIGLE

cultivé. O (écon.)
cilié. orient. O

BROME

velu. F. O
à petites fleurs. O
lancéolé. orient. O
à gros épis. F. O

squarrosus L.
 dumetorum Lamk. ill. }
 asper L. f. }
 arvensis L.
 sterilis L.
 maximus Desf. All.
 madritensis L. }
 gynandrus Roth. cat. }
 tectorum L.
 pendulinus.
 commutatus Schrad. Germ. ? }
 giganteus L.
 pratensis Lamk. ill. }
 perennis Vill. Delph. }
 erectus Schrad. Germ. }
 purgans L.
 purpurascens Delile. Fl.
 rubens L.
 inermis Willd. sp.

FESTUCA

pinnata.
 Bromus pinnatus L. }
 Triticum pinnatum Dec. Fl. }
 sylvatica.
 Bromus sylvaticus Lamk. ill. }
 Festuca gracilis Schrad. Germ. }
 Triticum sylvaticum Dec. Fl. }
 scabra Zea.
 distachyos. }
 Bromus distachyos L. }
 stipoides Desf. All. }
 Bromus stipoides L. }
 bromoides L.
 ovina L.
 capillata Lamk. ill.
 tenella Willd. sp.
 heterophylla Lamk. ill.
 rubra L.
 duriuscula L.
 glauca Lamk. ill.
 dumetorum L.
 pratensis Schrad. Germ. }
 loliacea Dec. Fl. }
 elatior Lamk. ill. }
 varia Host. Gram.
 elatior Schrad. Germ. }
 arundinacea Vill. Delph. }
 loliacea Lamk. ill. }

rude. F. ☉

des buissons. F. ☿

des champs. F. ☉

stérile. F. ☉

à grands épis. F. ☉

de Madrid. ☉

des toits. F. ☉

pendant. ☉

gigantesque. F. ☿

des prés. F. ☿

purgatif. Canada. ☿

pourpre. F. m. ☉

rougeâtre. F. ☉

sans arêtes. F. Alpes. ☿

FESTUCA

penné. F. ☿

des bois. F. ☿

rude. ☉

à deux épis. F. m. ☉

stipoïde. F. m. ☉

bromoïde. F. ☿

des moutons. F. ☿

capillaire. F. ☿

à feuilles menues. Am. s. ☿

à feuilles variables. F. ☿

rouge. F. ☿

à feuilles dures. F. ☿

glauque. F. ☿

des buissons. F. ☿

des prés. F. ☿

panaché. F. ☿

élevé. F. ☿

myuros L.
uniglumis Willd. sp.
spadicea Willd. sp.
diandra Mich. fl.
unioloides Willd. H. Ber.
alopécuros Willd. Enum.
fascicularis Lamk. ill. }
polystachya Mich. fl. }
virgata Lamk. ill.
calycina L.
divaricata Desf. Atl.
phleoides Vill. Delph.

DANTHONIA

decumbens Dec. fl.
festuca decumbens L.
triodia decumbens Beauv. }
Agrost.

POA

fluitans Schrad. Germ. }
festuca fluitans L. }
aquatica L.
alpina L.
molinerii Balbis Miscell. }
badensis Willd. sp. }
bulbosa L.
seslerioides Mich. fl.
cenisia Allion. Auct.
cæsia Smith. fl.
trivialis L.
angustifolia L.
debilis Encycl.
pratensis L.
trinervata Dec. fl. }
sylvatica Pollich. Palat. }
pilosa L.
annua L.
compressa L.
nemoralis L.
rariflora.
ægyptiaca Willd. Enum.
rigida L.
procumbens Smith. fl.
maritima Willd. sp.
cristata Willd. sp.
peruviana Jacq. ic.
glomerata. }
elongata Willd. Enum. }

myuros. F. ♂
 à une seule valve. F. ☉
 jaune. Alpes. ℥
 à deux étamines. Am. s. ℥
 unioloïde. caroline. ☉
 plumeux. Maroc. ☉
 fasciculé. Am. s. ℥
 effilé. Antilles. ☉
 à grand calice. Esp. ☉
 étalé. Barbarie. ☉
 fléau. Alpes. ℥

DANTHONIA

incliné. F. ℥

POA

flottant. F. ℥ (écon.)
aquatique. F. ℥
des Alpes. F. ℥
de Molineri. Alpes. ℥
bulbifère. F. ℥
sesleriôide. Am. s. ℥
du mont Cénis. ℥
bleuâtre. Écosse. ℥
commun. F. ℥
 à feuilles étroites. F. ℥
foible. F. ℥
des prés. F. ℥
 à trois nervures.
velu. F. ℥
annuel. F. ☉
comprimé. F. ℥
des bois. F. ℥
 à fleurs rares. F. ℥
d'Égypte. ☉
roide. F. ℥
tombant. Angleterre. ☉
maritime. F. ℥
 à crêtes. F. ℥
du Pérou. ☉
aggloméré. Ind. s. ch. ℥

retroflexa curtis. Zond. }
distans. }
striata Lamk. ill. }
nervata Willd. sp. }
glauca Willd. Enum.
abyssinica L.
capillaris L.
tenella L.
ciliaris L.
sicula Jacq. obs.
megastachya Kœler. Gram. }
Briza eragrostis L. }

BRIZA

minor L.
media L.
maxima L.

UNIOLA

latifolia Mich. Fl.

AVENA

elatior L.
 — *nodosa.*
striata Lamk. ill.
sativa L.
 — *nuda.*
orientalis Willd. sp.
brevis Willd. sp.
fatua L.
sterilis L.
pubescens L.
pratensis L.
bromoides L.
distichophylla Vill. Delph.
flavescens L.
panicea Lamk. ill.
fragilis L.

ARUNDO.

1. *Calix multiflorus.*

nonax L.
 — *variegata.*
phragmitis L.

2. *Calix uniflorus.*

epigeios L.
calamagrostis epigeios Roth. }
germ. }

recourbé. F. ℥

strié. Am. s. ℥

glauque. ℥

d'Abyssinie. ⊙

capillaire. Am. s. ⊙

délicat. inde. ⊙

cilié. Antilles. ⊙

de Sicile. ⊙

Eragrostis. F. ⊙

BRIZA

triangulaire. F. ⊙

des prés. F. ℥

à grandes fleurs. F. ⊙

UNIOLE

à larges feuilles. Am. s. ℥

AVOINE

Fromental. F. ℥

— *bulbeuse.*

striée. F. Alpes. ℥

cultivée. ⊙ (écon.)

— *sans barbes.*

d'Orient. ⊙

courte. Brême. ⊙

Avron. F. ⊙

stérile. F. ⊙

pubescente. F. ℥

des prés. F. ℥

bromoïde. F. ℥

distique. F. Alpes. ℥

jaunâtre. F. ℥

panis. F. ⊙

fragile. F. ⊙

ROSEAU.

1. Calice à plusieurs fleurs.

à quenouille. F. m. ℥ (écon.)

— *panaché.*

à balais. F. ℥

2. Calice à une fleur.

épigeios. F. ℥

calamagrostis L.	}	plumeux. F. ㄥ
calamagrostis lanceolata roth. germ.		
arenaria L.	}	des sables. F. ㄥ
calamagrostis arenaria roth. germ.		
ORYZA		RIZ
saliva L.		cultivé. inde. ☉ (écon.)
EHRHARTA		EHRHARTA
panicea willd. sp.		à fleurs de panis. cap. or. ㄥ
NARDUS		NARD
stricta L.		serré. F. ㄥ
LYGEUM		LYGEUM
spartum L.		sparte. F. m. or. ㄥ (écon.)
ZEa		ZEa
maïs L.		maïs. pérou. ☉ (écon.)
COIX		COIX
lacryma L.		larme de Job. inde. ☉

CLASSIS III.

CLASSE III.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

(stamina perigyna).

(étamines attachées au calice).

ORDO I.

ORDRE I.

P A L M Æ.

P A L M I E R S.

I. Fronde pinnatâ.

I. Feuilles pennées.

PHOENIX

dactylifera L.

DATTIER

cultivé. Afr. s. ch. ㄥ (écon.)

CARYOTA

urens L.

CARYOTA

brûlant. inde. s. ch. ㄥ

II. Fronde palmatâ.

II. Feuilles palmées.

CHAMÆROPS

humilis L.

hystrix (an generis?).

CHAMÆROPS

commun. barb. or. ㄥ (écon.)

hystrix. s. ch. ㄥ

SABAL

adansonii guers. s. Philom.
 chamærops acaulis mich. fl.
 corypha minor jacq. hort.

SABAL

d'Adanson. Am. s. or. ㄥ

LATANIA

chinensis Jacq. Frag. }
borbonica Willd. sp. }

RHAPIS

flabelliformis Willd. sp.

ORDO II.

ASPARAGINEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

DRACÆNA

draco L. s. veg.

terminalis Jacq. H. sch.

marginata Encycl.

reflexa Encycl. }

cernua Jacq. H. sch. }

umbraculifera Jacq. H. sch.

DIANELLA

nemorosa Encycl.

dracæna ensifolia Willd. sp. }

cœrulea Bot. Mag.

ASPARAGUS

tenuifolius Encycl.

officinalis L.

— maritimus.

decumbens Jacq. H. sch. }

crispus Encycl. }

mauritiarius.

retrofractus L.

asiaticus L.

pectinatus Red. Lil.

albus L.

acutifolius L.

aphyllus L.

— horridus.

capensis L.

sarmentosus L.

MEDEOLA

asparagoides L.

TRILLIUM

sessile L.

PARIS

quadrifolia L.

LATANIER

de Chine. s. ch. ♀

RHAPIS

éventail. chine. s. ch. ♀

ORDRE II.

ASPARAGINÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACÆNA

sang-drag. can. s. ch. ♀ (méd.)

pourpre. chine. s. ch. ♀

à bords rouges. madagascar.

s. ch. ♀

recourbé. île de France. s. ch. ♀

en parasol. inde. s. ch. ♀

DIANELLE

des bois. inde. s. ch. ♂

bleue. N. Holl. s. ch. ♂

ASPERGE

à feuilles menues. F. ♂

officinale. F. (écon.)

— maritime.

tombante. cap. s. ch. ♀

de l'île de France. s. ch. ♀

coudée. cap. s. ch. ♀

d'Asie. s. ch. ♀

pectinée. or. ♀

blanche. orient. or. ♀

à feuilles aiguës. F. m. or. ♀

sans feuilles. orient. or. ♀

— hérissée.

du Cap. s. ch. ♀

sarmenteuse. ceylan. s. ch. ♀

MEDEOLA

sarmenteux. cap. s. ch. ♀

TRILLIUM

sessile. Am. s. ♂

PARISETTE

à quatre feuilles. F. ♂

CONVALLARIA

maialis L.
japonica *Thunb. Jap.*
ophiopogon japonicus *Bot.*
Mag. }

MUGUET

de mai. F. ♀ (orn.)

du Japon. or. ♀

POLYGONATUM

vulgare *Desf. Ann.*
convallaria polygonatum L. }
multiflorum *Desf. Ann.* }
convallaria multiflora L. }
verticillatum *Desf. Ann.* }
convallaria verticillata L. }

SCEAU-DE-SALOMON

commun. F. ♀

à plusieurs fleurs. F. ♀

verticillé. F. ♀

SMILACINA

racemosa *Desf. Ann.* }
convallaria racemosa L. }
stellata *Desf. Ann.* }
convallaria stellata L. }

SMILACINA

à grappes. Am. s. ♂

étoilé. Am. s. ♀

MAIANTHEMUM

bifolium *Desf. Ann.* }
convallaria bifolia L. }

MAIANTHEMUM

à deux feuilles. F. ♀

II. Flores unisexuales.

II. Fleurs unisexuelles.

RUSCUS

aculeatus L.
hypophyllum L.
hypoglossum L.
androgynus L.
racemosus L.

FRAGON

épineux. F. ♂ (méd.)
sans foliole. Italie. or. ♂
à foliole. Italie. or. ♂
androgyn. canaries. or. ♂
à grappes. Italie. ♂

SMILAX.

SMILAX.

1. *Caule aculeato, fruticoso.*

aspera L.
oblongata *Swartz. Prodr.*
mauritanica *Desf. Atl.*
excelsa? L.
horrida.
laurifolia L.
rotundifolia *Mich. Fl.*
glauca *Mich. Fl.*
pubera *Mich. Fl.*

1. Tige épineuse, ligneuse.

rude. F. m. or. ♂ (méd.)
à feuell. oblong. Antill. s. ch. ♂
de Mauritanie. Alger. or. ♂
élevé. orient. or. ♂
hérissé. Am. s. or. ♂
à feuilles de Laurier. Am. s. ♂
à feuilles rondes. Am. s. ♂
glauque. Am. s. ♂
velu. Am. s. ♂

2. *Caule herbaceo.*

herbacea L.

2. Tige herbacée.

herbacé. Am. s. ♂

RAJANIA

cordata L.

RAJANIA

à feuell. en cœur. Ant. s. ch. ♂

III. Flores unisexuales , ovarium semi-inferum.

DIOSCOREA

villosa L.

alata L.

TAMNUS

communis L.

ORDO III.

JUNCÆÆ.

APHYLLANTHES

monspeliensis L.

LOMANDRA

longifolia Bill. N. Holl.

JUNCUS.

1. Culmo nudo.

acutus L.

maritimus *Encycl.*

conglomeratus L.

effusus L.

glaucus *Willd. sp.*

australis.

trifidus L.

squarrosus L.

2. Culmo folioso.

articulatus L.

sylvaticus *Willd. sp.*

bulbosus L.

tenageia L. f.

bufonius L.

LUZULA

nivea *Dec. Fl.* }

juncus niveus L. }

campestris *Dec. Fl.* }

juncus campestris L. }

pilosa. }

vernalis *Dec. Fl.* }

juncus pilosus L. }

maxima *Dec. Fl.* }juncus maximus *Willd. sp.* }

compacta.

pediformis *Dec. Fl.*juncus pediform. *Vill. Delph.* }

III. Fleurs unisexuelles , ovaire moitié infère.

IGNAME

velue. Am. s. $\mathcal{L}$ ailée. inde. s. ch. Ψ (alim.)

TAMNE

commun. F. Ψ (méd.)

ORDRE III.

JONCÉES.

APHYLLANTHES

de Montpellier. F. m. or, $\mathcal{L}$

(écon.)

LOMANDRA

à feuilles long. N. Holl. or. Ψ

JONC.

1. Chaume nu.

aigu. F. Ψ maritime. F. $\mathcal{L}$ aggloméré. F. $\mathcal{L}$ étalé. F. $\mathcal{L}$ glaucue. F. $\mathcal{L}$ de la N. Hollande. or. Ψ trifide. Alpes. Ψ rude. F. $\mathcal{L}$

2. Chaume garni de feuilles.

articulé. F. $\mathcal{L}$ des bois. F. $\mathcal{L}$ bulbeux. F. $\mathcal{L}$ à fleurs sessiles. F. Ψ dichotôme. F. $\mathcal{L}$

LUZULA

à fleurs blanches. F. Ψ des champs. F. $\mathcal{L}$ velu. F. $\mathcal{L}$ à larges feuilles. F. Ψ à fleurs en tête. F. $\mathcal{L}$ en grappe. Alpes. $\mathcal{L}$

ORDO IV.

COMMELINEÆ.

COMMELINA.

1. *Petala inæqualia.*

- communis L.
 africana L.
 erecta L.
 pallida Willd. H. Ber. }
 rubens Red. Lil. }
 benghalensis L.
 caroliniana Willd. Enum.

2. *Petala æqualia aut sub-æqualia.*

- virginica L.
 dianthifolia Red. Lil.
 tuberosa L.
 cristata L.
 Tradescantia cristata Willd. sp. }
 zanonía L. }
 Tradescantia zanonía Willd. sp. }

TRADESCANTIA

- virginica L.
 erecta Jacq. Ic.
 rosea Michx. Fl.
 discolor Smith Ic.

ORDO V.

ALISMACEÆ.

BUTOMUS

- umbellatus L.

ALISMA

- plantago L.
 ranunculoides L.
 natans L.
 damasonium L.

SAGITTARIA

- sagittifolia L.

SCHEUCHZERIA

- palustris L.

TRIGLOCHIN

- palustre L.
 maritimum L.

ORDRE IV.

COMMÉLINÉES.

COMMÉLINE.

1. Pétales inégaux.

- commune. Am. ☉
 d'Afrique. cap. s. ch. ☿
 droite. virginie. ☿
 à fleurs pâles. s. ch. ☿
 du Bengale. s. ch. ☿
 de Caroline. or. ☿

2. Pétales égaux ou presque égaux.

- de Virginie. ☿
 à feuilles d'œillet. s. ch. ☿
 tubéreuse. Mexique. s. ch. ☿
 à crête. ceylan. ☉
 à fruit mou. Antilles. s. ch. ♀

EPHÉMÈRE

- de Virginie. ☿ (orn.)
 à tige droite. Mexique. ☉
 rose. Am. s. ☿
 de deux coul. Am. m. s. ch. ☿

ORDRE V.

ALISMACÉES.

BUTOME

- ombellifère. f. ☿ (orn.)

ALISMA

- plantain-d'eau. f. ☿
 renoncule. f. ☿
 flottant. f. ☿
 étoilé. f. ☿

FLÉCHIÈRE

- aquatique. f. ☿

SCHEUCHZERIA

- des marais. f. ☿

TRIGLOCHIN

- des marais. f. ☿
 maritime. f. ☿

ORDO VI.

COLCHICACEÆ.

NARTHECIUM

- caliculatum *Lamk. ill.*
 anthericum caliculatum *L.*
Toffieldia palustris Dec. Fl.
helonias borealis Willd. sp.

HELONIAS

- bullata *L.*

VERATRUM

- album *L.*
 nigrum *L.*

COLCHICUM

- autumnale *L.*
 variegatum *L.*
 montanum *L.*

MERENDERA

- bulbocodium *ram. bul. phil.*

ORDO VII.

LILIACEÆ.

TULIPA

- sylvestris *L.*
 suaveolens *roth. cat.*
 oculus-solis *red. Lil.*
 gesneriana *L.*

ERYTHRONIUM

- dens-canis *L.*

METHONICA

- superba,
 gloriosa superba *L.*

UVULARIA

- amplexifolia *L.*
 perfoliata *L.*

FRITILLARIA

- imperialis *L.*
 persica *L.*
 meleagris *L.*
 latifolia *red. Lil.*

ORDRE VI.

COLCHICACÉES.

NARTEC

- caliculé. *F. 2*

HELONIAS

- à fleurs roses. *Am. s. 2*

VERATRUM

- blanc. *F. (vénén.)*
 noir. sibiérie. *2*

COLCHIQUE

- d'automne. *F. 2*
 panaché. orient. *2 (orn.)*
 de montagne. Alpes. *2*

MERENDERA

- bulbocodium. pyrénées. *2*

ORDRE VII.

LILIACÉES.

TULIPE

- sauvage. *F. 2*
 odorante. *Asie. 2 (orn.)*
 œil-de-soleil. *F. m. 2 (orn.)*
 des jardins. orient. *2 (orn.)*

ERYTHRONIUM

- dent-de-chien. Alpes. *2*

METHONICA

- superbe de Malabar. inde.
 s. ch. (orn.)

UVULAIRE

- des Alpes. *F. 2*
 perfoliée. *Am. s. 2*

FRITILLAIRE

- couronne-impériale. *Asie. 2*
 (orn.)
 de Perse. *2*
 panachée. *F. 2 (orn.)*
 à larges feuilles. *2*

LILIUM

candidum *L.*
 bulbiferum *L.*
 croceum.
 tigrinum *Bot. Mag.*
 pomponium *L.*
 pyrenaicum *Gouan. ill.*
 martagon *L.*
 chalcedonicum *L.*
 pumilum *red. Lil.*
 philadelphicum *L.*
 superbum *L.*
 canadense *red. Lil.*
 penduliflorum *red. Lil.* }

YUCCA

gloriosa *L.*
 aloifolia *L.*
 draconis *L.*
 filamentosa *L.*
 boscii (*an yucca?*)

SANSEVIERA

zeylanica *willd. sp.*
 guineensis *willd. sp.*
 carnea *willd. Enum.*

ALETTRIS

fragrans
 dracæna fragrans *Bot. Mag.* }

VELTHEIMIA

capensis.
 viridiflora *willd. sp.* }
 Aletris capensis *L.* }
 glauca *Jacq. H. sch.*

TRITOMA

uvaria *red. Lil.*
 Aletris uvaria *L.* }
 veltheimia uvaria *willd. sp.* }
 sarmentosa.
 media *red. Lil.*
 Aletris sarmentosa *Andr. rep.* }

PITCAIRNIA

bromeliæfolia *l'her. sert.*

angustifolia *H. K.*
 latifolia *H. K.*

ALOE

purpurea *encycl.* }
 dracæna marginata *willd. sp.* }

LIS

blanc. *Asie. L (orn.)*
 bulbifère. *suisse. L (orn.)*
 orangé. *L (orn.)*
 tigré. *chine. or. L (orn.)*
 pomponien. *F. m. L (orn.)*
 des Pyrénées. *L (orn.)*
 martagon. *F. (orn.)*
 némérocale. *Asie. L (orn.)*
 nain. *L (orn.)*
 de Philadelphie. *L (orn.)*
 superbe. *Am. s. L (orn.)*
 de Canada. *L (orn.)*

YUCCA

à feuilles entières. *Am. s. L*
 à feuell. d'Aloès. *caroline. or. L*
 à larges feuell. *Am. m. s. ch. L*
 filamenteux. *caroline. or. L*
 de Bosc. *s. ch. L*

SANSEVIÉRA

de Ceylan. *s. ch. L*
 de Guinée. *s. ch. L*
 couleur de chair. *chine. or. L*

ALETTRIS

odorant. *cap. s. ch. L*

VELTHEIMIA

du Cap. *or. L*

glauque. *cap. s. ch. L*

TRITOMA

à grappe. *cap. or. L*

sarmenteux. *cap. or. L*

PITCAIRNIA

à feuilles d'Ananas. *Antilles. s. ch. L*

à feuell. étroit. *Antill. s. ch. L*

à larg. feuell. *Inde. s. ch. L*

ALOÈS

à bords rouges. *île de Bourbon. s. ch. L*

vulgaris *Dec. pl. gr.*
abyssinica *Encycl.*
paniculata *Jacq. Frag.*
rubescens *Dec. pl. gr.*
soccotrina *Dec. pl. gr.*
fruticosa *Encycl.*
arborescens *Dec. pl. gr.* }
ferox *H. K.*
mitræformis *Encycl.*
 — *angustior.*
rhodacantha *Dec. pl. gr.*
perfoliata. }
serra *Dec. pl. gr.* }
brevifolia *Dec. pl. gr.*
humilis *L.*
echinata *Willd. Enum.*
umbellata *Dec. pl. gr.*
maculata. }
picta *Dec. pl. gr.* }
tenuifolia *Encycl.*
variegata *L.*
nigricans.
disticha *L.*
 — *triangularis.*
 — *latifolia.*
carinata *Dec. pl. gr.*
obliqua *Dec. pl. gr.*
plicatilis *L.*
spiralis *L.*
viscosa *L.*
retusa *L.*
rigida *Dec. pl. gr.*
pentagona *H. K.*
margaritifera *L.*
radula *Jacq. H. Sch.*
cymbæfolia *Willd. Enum.*
arachnoidea *L.*
atrovirens *Dec. pl. gr.*

ANTHERICUM

frutescens *L.*
aloides *L.*
annuum *L.*

ECHEANDIA

terniflora *Red. Lil.* }
anthericum reflexum *Cav. Ic.* }

PHALANGIUM (*Anthericum* *L.*)

revolutum *L.*

commun. *barbarie.* *s. ch. ♀*
d'Abyssinie. *s. ch. ♀*
paniculé. *cap. s. ch. ♀*
rougeâtre. *inde. s. ch. ♀*
soccotrin. *cap. s. ch. ♀*

corne-de-belier. *cap. s. ch. ♀*

hérissé. *cap. s. ch. ♀*

mitré. *cap. s. ch. ♀*

— *à feuilles étroites.*

à épines rouges. *cap. s. ch. ♀*

perfolié. *cap. s. ch. ♀*

à feuilles courtes. *cap. s. ch. ♀*

nain. *cap. s. ch. ♀*

hérissé.

ombellifère. *cap. s. ch. ♀*

moucheté. *cap. s. ch. ♀*

à feuell. minces. *cap. s. ch. ♀*

perroquet. *cap. s. ch. ♀*

vert-noir. *cap. s. ch. ♂*

bec-de-canne. *cap. s. ch. ♀*

— *triangulaire.* *cap. s. ch. ♀*

— *à larg. feuell.* *cap. s. ch. ♀*

tuberculeux. *cap. s. ch. ♂*

oblique. *cap. s. ch. ♂*

éventail. *cap. s. ch. ♀*

en spirale. *cap. s. ch. ♀*

visqueux. *cap. s. ch. ♀*

écrasé. *cap. s. ch. ♂*

à feuilles roides. *cap. s. ch. ♀*

pentagone. *cap. s. ch. ♂*

perlé. *cap. s. ch. ♂*

radula. *cap. s. ch. ♂*

en nacelle. *cap. s. ch. ♂*

patte d'araignée. *cap. s. ch. ♀*

vert-livide. *cap. s. ch. ♂*

ANTHÉRIC

arbrisseau. *cap. or. ♀*

à feuell. d'Aloès. *cap. or. ♀*

annuel. *cap. ☉*

ECHEANDIA

à fleurs ternées. *cuba. s. ch. ♀*

PHALANGIUM

recourbé. *cap. or. ♀*

- ramosum* L.
Liliago L.
Liliastrium L.
bicolor Desf. Atl.
milleflorum Red. Lil.
Arthropodium paniculatum }
Brown. prodr.
pendulum Red. Lil.
- ASPHODELUS**
luteus L.
capillaris Red. Lil.
tauricus Mars. cauc.
ramosus L.
spicatus.
fistulosus L.
- EUCOMIS**
undulata H. K.
regia Red. Lil.
punctata L'Her. sert.
- MASSONIA**
pustulata Red. Lil.
latifolia Jacq. H. Sch.
violacea Red. Lil.
polyanthes pygmaea Jacq. Ic. }
Agapanthus ensifol. Willd. sp. }
mauhlia ensifolia Thunb. Pr. }
- DRIMMIA**
elata Jacq. Ic.
- HYACINTHUS**
non-scriptus L.
patulus. }
amethystinus Encycl. }
amethystinus L. }
hispanicus Encycl. }
romanus L.
serotinus L.
orientalis L.
viridis L.
Lachenalia viridis H. K. }
zuccagnia viridis Willd. En. }
- MUSCARI**
moschatum Willd. Enum.
comosum Willd. Enum.
— monstrosum.
- rameux*. F. ¶
à grappes. F. ¶
Lis de St. Bruno. Alpes. ¶
 (orn.)
bicolor. F. ¶
mille-fleurs. N. Holl. or. ¶
à fl. pendantes. N. Holl. or. ¶
- ASPHODÈLE**
jaune. F. m. ¶
capillaire. or. ¶
de la Tauride. ¶
rameux. F. ¶
à grappe. F. m. ¶
fistuleux. F. m. ¶
- EUCOMIS**
ondulé. cap. or. ¶
couronné. cap. s. ch. ¶
tacheté. cap. s. ch. ¶
- MASSONIA**
pustuleux. cap. s. ch. ¶
à feuil. larg. cap. s. ch. ¶
à fleurs violettes. cap. s. ch. ¶
- DRIMMIA**
élevé. cap. or. ¶
- JACINTE**
des bois. F. ¶
étalée. ¶
améthyste. pyrénées. ¶
de Rome. F. ¶
rouillée. Espagne. ¶
d'Orient. ¶ (orn.)
verte. cap. or. ¶
- MUSCARI**
odorant. orient. ¶ (orn.)
chevelu. F. ¶
— monstrueux. (orn.)

racemosum Willd. Enum.

botryoides Willd. Enum.

PHORMIUM

tenax Forster. gen.

PHORMIUM

lin de la N. Zélande. or. ʒ
(écon.)

LACHENALIA

pendula Jacq. ic.

lanceæfolia Jacq. ic.

pallida Willd. sp.

tricolor Jacq. ic.

luteola Jacq. ic.

angustifolia Jacq. ic.

orchioïdes Jacq. ic.

LACHENALIA

à fleurs pendantes. or. ʒ

lancéolé. cap. or. ʒ

à fleurs pâles. cap. or. ʒ

tricolore. cap. or. ʒ

jaune. cap. or. ʒ

à feuilles étroites. cap. or. ʒ

moucheté. cap. or. ʒ

CYANELLA

capensis L.

CYANELLA

du Cap. or. ʒ

ALBUCA

alba Encycl.

cornuta Red. Lil. }

major L.

minor L.

abyssinica Jacq. ic.

Asphodelus abyssinicus Enc. }

ALBUCA

blanc. cap. or. ʒ

jaune. cap. or. ʒ

petit. cap. or. ʒ

d'Abyssinie. s. ch. ʒ

SCILLA

maritima L.

peruviana L.

italica L.

amœna L.

Liliohyacinthus L.

poméridiana Dec. cat.

hyacinthoides L.

bifolia L.

undulata Desf. Atl.

autumnalis L.

SCILLE

maritime. f. m. or. ʒ (méd.)

du Pérou. Pyrénées. ʒ (orn.)

d'Italie. ʒ

agréable. orient. ʒ

Lis-jacinte. f. ʒ

poméridienne. f. ʒ

jacinte. madère. or. ʒ

à deux feuilles. f. ʒ

ondée. tunis. or. ʒ

d'automne. f. ʒ

ERIOSPERMUM

lanceæfolium Jacq. ic.

ERIOSPERME

lancéolé. cap. or. ʒ

ORNITHOGALUM

luteum L.

tenuifolium Red. Lil.

pyrénaïcum L.

pyramidale Willd. sp.

narbonense L.

trigynum Red. Lil.

lacteum Jacq. ic.

umbellatum L.

nulans L.

ORNITHOGALE

jaune. f. ʒ

à feuilles menues. or. ʒ

des Pyrénées. f. ʒ

pyramidal. f. m. ʒ

de Narbonne. f. ʒ

à trois styles. ʒ

blanc de lait. cap. or. ʒ

ombellifère. f. ʒ

à fleurs penchées. f. ʒ

longibracteatum Jacq. hort.

arabicum L.

thyrsoides H. K.

ALLIUM.

1. Folia teretia aut sub-teretia.

cepa L.

schœnoprasum L.

ascalonicum L.

glaucum.

foliosum Dec. syn. }

globosum Red. Lil.

moschatum L.

obtusiflorum Red. Lil.

bisulcum Red. Lil.

flavum L.

vineale L.

sphærocephalum L.

pallens L.

paniculatum L.

lusitanicum Red. Lil.

longispathum Red. Lil.

oleraceum L.

2. Folia plana.

carinatum L.

angulosum L.

baicalense Willd. Enum.

roseum L.

— bulbiferum.

striatum Jacq. Ic.

denudatum Red. Lil.

cernuum Roth. cat.

tartaricum L. f.

carolinianum Red. Lil.

album Red. Lil.

ciliare Red. Lil.

brachystemon Red. Lil.

subhirsutum L.

nutans L.

sativum L.

scorodoprasum L.

arenarium L.

obliquum L.

Ampeloprasum L.

porrum L.

monsperullanum Couan ill.

victoralis L.

à longues bractées. cap. or. ℥

d'Arabie. Alger. or. ℥ (orn.)

en thyrs. cap. or. ℥ (orn.)

All.

1. Feuilles cylindriques ou presque cylindriques.

oignon. ♂ (écon. méd.)

civette. sibérie. ♀ (écon.)

échalotte. palest. ℥ (écon.)

glauc. F. m. ℥

globuleux. caucase. ♀

musqué. F. ♀

à fleurs obtuses. corse. or. ℥

à deux sillons. ♀

jaune. F. ♀

des vignes. F. ♀

à tête ronde. F. ℥

à fleurs pâles. F. ♀

paniculé. suisse. ♀

de Portugal. ♀

à long spathe. F. ♀

verdâtre. F. ♀

2. Feuilles plates.

en carène. F. ℥

anguleux. F. ℥

du lac Baical. ♀

rose F. ♀

— bulbifère.

strié. cap. or. ♀

dénudé. ♀

incliné. ♀

de Tartarie. ♀

de Caroline. ℥

blanc. F. m. ♀

cilié. ℥

à courtes étamines. ♀

velu. orient. ♀

penché. sibérie. ♀

cultivé. sicile. ♀ (écon. méd.)

rocambolle. F. ♀ (écon.)

des sables. F. ♀

oblique. sibérie. ♀

Ampeloprasum. orient. ℥

poireau. suisse. ℥ (écon.)

de Montpellier. ℥

à feuilles de plantain. F. ♀

ursinum *L.*
 scorzoneraefolium *Red. Lil.*
 moly *L.*
 fragrans *Vent. H. cels.*

POLIANTHES
 tuberosa *L.*

HEMEROCALLIS
 fulva *L.*
 flava *L.*
 coerulea *Red. Lil.*
 japonica *Thunb. Jap.*

AGAPANTHUS
 crinum africanum *L.* }
 umbellatus *L'Her. sert.* }
 — minor.

ORDO VIII.

NARCISSEÆ.

DORIANTHES
 excelsa *correa s. Lin.* }
 correa *Brown. prodr.* }

AGAVE
 americana *L.*
 — variegata.
 lurida *Jacq. coll. ?* }
 mexicana. }
 — angustifolia.
 vivipara *L.*
 foetida *L.*
 manguai.
 bulbifera *Bonpland.* }
 yuccaefolia *Red. Lil.*
 spicata *Dec. cat.*

ALSTROEMERIA
 pelegrina *L.*
 ligtu *L.*

HEMANTHUS
 coccineus *L.*
 puniceus *L.*
 pubescens *L. f.*
 albiflos *Jacq. H. sch.*

pétiolé. *r. Ψ*
 à feuell. de scorsonère. *℥*
 moly. *r. Ψ*
 odorant. cap. or. *Ψ*

TUBÉREUSE
 des jardins. inde. or. *℥ (orn.)*

HÉMÉROCALLE
 rouge. chine. *℥ (orn.)*
 jauné. suisse. *Ψ (orn.)*
 bleue. chine. or. *℥ (orn.)*
 du Japon. *℥ (orn.)*

AGAPANTHUS
 ombellifère. cap. or. *Ψ (orn.)*
 — petit.

ORDRE VIII.

NARCISSÉES.

DORIANTHES
 élevé. *N. Holl. s. ch. 5*

AGAVE
 d'Amérique. *Am. m. or. 5*
 (orn.)
 — panaché.
 du Mexique. *s. ch. 5*
 — à feuilles étroites.
 vivipare. *Am. m. s. ch. 5*
 Aloès-Pitt. *Am. m. s. ch. 5*
 Manguai. *Mexique. s. ch. 5*
 à feuilles d'rucca. *s. ch. Ψ*
 à épis. *Am. m. s. ch. Ψ*

PÉLÈGRINE
 tachetée. *Pérou. or. Ψ (orn.)*
 veinée. *Pérou. or. Ψ (orn.)*

HÉMANTHE
 écarlate. cap. or. *℥ (orn.)*
 ponceau. cap. or. *℥ (orn.)*
 pubescent. cap. or. *℥ (orn.)*
 à fleurs blanches. cap. or. *Ψ (orn.)*

quadrivalvis *Jacq. H. sch.*

lanceæfolius. *Jacq. H. sch.*

multiflorus *Red. Lil.*

CRINUM

asiaticum *Red. Lil.*

americanum *Red. Lil.*

erubescens *Red. Lil.*

commelini. *Red. Lil.*

giganteum *Red. Lil.*

otaitense *Red. Lil.*

multiflorum.

CIRTHANTHUS

obliquus *Red. Lil.*

amaryllis umbellata *l'Her.* }

sert.

angustifolius *H. K.*

crinum angustifolium *L. f.* }

ANIGOZANTHOS

flavida *Red. Lil.*

AMARYLLIS

lutea *L.*

atamasco *L.*

formosissima *L.*

broussonetii *Red. Lil.* }

ornata *Bot. Mag.* }

longifolia *Red. Lil.*

belladonna *l'Her. sert.*

reginæ *l'Her. sert.*

revoluta *l'Her. sert.*

variabilis *Jacq. H. sch.* }

equestris *Red. Lil.* }

punicea. *Encycl.* }

vittata *l'Her. sert.*

josephineæ *Red. Lil.*

sarniensis *L.*

curvifolia *Jacq. H. sch.*

à quatre valves. cap. or. π

(orn.)

à f. en lance. cap. or. π (orn.)

à fleurs nombreuses. guinée.

s. ch. ψ (orn.)

CRINUM

d'Asie. malabar. s. ch. ψ (orn.)

d'Amérique. Am. m. s. ch. ψ

(orn.)

à bords rouges. Am. m. s. ch. ψ

de Commelin. Am. m. s. ch.

π (orn.)

gigantesque. siéra-Léona. s. ch.

ψ (orn.)

de Taiti. s. ch. ψ (orn.)

à fl. nombreux. s. ch. ψ (orn.)

CIRTHANTHUS

oblique. cap. or. ψ (orn.)

à f. étroites. cap. or. ψ (orn.)

ANIGOZANTHOS

à fleurs jaunes. N. Holl. or. ψ ,

AMARYLLIS

jaune. F. m. ψ (orn.)

atamasco. Am. s. π (orn.)

lis de S.-Jacques. mexique.

or. ψ (orn.)

de Broussonet. s. ch. ψ (orn.)

à feuilles longues. cap. or. π

(orn.)

belladone. cap. ψ (orn.)

de la reine cap. or. π (orn.)

réfléchie. cap. or. ψ (orn.)

rose. Am. m. s. ch. ψ (orn.)

veinée. cap. or. π (orn.)

de Joséphine. Afr. mér. s. ch.

ψ (orn.)

grénésienne. Grénese. or. ψ

(orn.)

à feuilles courbes. cap. or. ψ

(orn.)

gigantea H. K. }
Jagus Thomps. }
undulata L. s. *veg.*
aurea L'Her. *sert.*
spectabilis.

PANCRACTIUM

speciosum Red. *Lil.*
littorale Red. *Lil.*

fragrans Red. *Lil.*
declinatum Red. *Lil.*
amboinense L.
illyricum L.
maritimum L.

NARCISSUS

poeticus L.
biflorus Bot. *magaz.*
pseudo-narcissus L.
 — *bicolor* Gouan *ill.*
odorus L.
pumilus Red. *Lil.*
calathinus Red. *Lil.*
minor L.
tazetta L.
jonquilla L.
pseudo-jonquilla.
bulbocodium L.

LEUCOIUM

vernium L.
aestivum L.
trichophyllum Red. *Lil.*

GALANTHUS

nivalis L.

HYPOXIS

erecta L.
sobolifera Willd. *sp.*
stellata Red. *Lil.*
tridentata Red. *Lil.*

BROMELIA

ananas L.
pinguin L.

TILLANDSIA

serrata L. ?

gigantesque. siéra-Léona. s. ch.
 ψ (orn.)
ondulée. cap. or. ψ (orn.)
jaune. chine. s. ch. ℥ (orn.)
élégante. s. ch. ψ

PANCRACTIUM

élégant. Antilles. s. ch. ψ (orn.)
des rivages. Am. m. s. ch. ℥
 (orn.)
odorant. Am. m. s. ch. ψ (orn.)
abaissé. Guiane. s. ch. ψ (orn.)
d'Amboine. s. ch. ψ (orn.)
de Dalmatie. ℥ (orn.)
maritime. F. ψ (orn.)

NARCISSE

des poètes. F. ψ (orn.)
à deux fleurs. Angleterre. ψ
porion. F. ℥ (orn.)
 — *bicolor.* F. ℥ (orn.)
odorant. F. m. ψ (orn.)
nain. ℥
à grande coupe. Portug. or. ψ
petit. Espagne. ψ
à bouquets. F. m. ℥ (orn.)
Jonquille. F. m. ℥ (orn.)
Fausse Jonquille. ℥
trompette. F. m. ℥ (orn.)

LEUCOIUM

prinianier. Alpes ψ
d'été. F. ψ
à feuilles menues. corse. or. ψ

GALANTHUS

perce-neige. F. ψ (orn.)

HYPOXIS

à tige droite. Am. s. or. ℥
à rejeton. cap. or. ψ
étoilé. cap. or. ℥
à trois dents. cap. or. ψ

ANANAS

cultivé. Antilles. s. ch. ψ (alim.)
pinguin. Antilles. s. ch. ψ

TILLANDSIA

à feuell. en scie. Antill. s. ch. ψ

ORDO IX.

IRIDEÆ.

SISYRINCHIUM

- bermudiana *Willd. sp.*
 gramineum *Bot. magaz.* }
 anceps *Willd. sp.* }
 convolutum *Red. Lil.*
 tenuifolium *Red. Lil.*

striatum *Smith. Ic. pictæ.*

TIGRIDIA

pavonia *Red. Lil.*

FERRARIA

undulata *L.*

IRIS.

1. *Barbata.*

- susiana *L.*
 florentina *L.*
 germanica *L.*
 — cœrulea.
 — violacea.
 pallida *Lamk. ill.*
 flavescens *Red. Lil.*
 sambucina *Red. Lil.*
 plicata *Lamk. ill.*
 swertii *Lamk. ill.*
 squalens *L.*
 variegata *L.*
 aphylla? *L.*
 pumila *L.*
 — cœrulea.
 lutescens *Lamk. ill.*
 cristata *Red. Lil.*
 arenaria *Kitt. et Wald. hung.*

2. *Imberbes.*

- pseudo-acorus *L.*
 foetidissima *L.*
 monnieri *Red. Lil.*
 ochroleuca *Willd. sp.*
 spuria *L.*
 fimbriata *Vent. H. cels.*
 sibirica *L.* }
 pratensis *Lamk. ill.* }

ORDRE IX.

IRIDÉES.

BERMUDIENNE

- à petites fleurs. *Am. s. ♀*
 à feuilles de cramen. *virgini-*
nie. ♂
 roulée. *Mexique. or. ♂*
 à feuilles menues. *Mexique.*
or. ♀
 à réseau. *Mexique. or. ♂*

TIGRIDIA

panaché. *Mexique. or. ♀ (orn.).*

FERRARIA

ondulé. *cap. or. ♀*

IRIS.

1. *Fleurs barbues.*

- de Suze. *orient. or. ♀ (orn.)*
 de Florence. *italie. ♀ (méd.)*
 Flambe. *F. ♂ (orn.)*
 — bleue.
 — violette.
 pâle. *orient. ♂ (orn.)*
 jaunâtre. *♀ (orn.)*
 à odeur de sureau. *F. ♂*
 plissé. *orient. ♀*
 de Swert. *♀*
 sale. *F. m. ♂*
 panaché. *Hongrie. ♀*
 sans feuilles. *♂*
 nain. *F. ♀ (orn.)*
 — bleu.
 jaune-pâle. *F. ♂*
 à crête. *Am. s. ♀*
 des sables. *Hongrie. ♂*

2. *Fleurs sans barbe.*

- des marais. *F. ♂ (méd.)*
 fétide. *F. ♂*
 de le Monnier. *orient. ♂*
 jaune. *orient. ♂*
 bâtard. *F. ♀*
 frangé. *chine. or. ♀*
 de Sibérie. *♀*

versicolor *L.*
 stenogyna *red. Lil.* }
 cawleri *red. Lil.* }
 graminea *L.*
 scorpioides *Desf. Atl.*
 xiphium *L.*
 xiphioides *red. Lil.*
 tuberosa *L.*
 persica *L.*
 sisyrinchium *L.*
 curtopetala *red. Lil.*

VIEUSSEUXIA

glaucois *Dec. Ann. du Mus.* }
 iris tricuspid *Thunb. Prodr.* }

MORÆA

iridioides *L.*
 northiana *Andr. Rep.* }
 vaginata *red. Lil.* }
 elegans *Jacq. H. sch.* }
 sisyrinchium elegans *red. Lil.* }
 sordescens *Jacq. Ic.*
 chinensis *Willd. sp.* }
 ixia chinensis *L.* }
 belamcanda chinensis *red. Lil.* }

IXIA

bulbocodium *L.*
 — parviflorum *red. Lil.*
 crocata *L.* }
 hyalina *red. Lil.* }
 miniata *Jacq. H. sch.*
 — maculata.
 polystachia *L.*
 scillaris *Bot. Magaz.*
 tricolor *Bot. Magaz.*
 anemonællora *Jacq. Ic.*
 fusco-citrina *red. Lil.*
 leucantha *Jacq. Ic.*
 bulbifera *L.*
 longiflora *Lamk. ill.* }
 gladiolus longiflorus *Jacq. Ic.* }
 erecta *Vahl. sp.*
 maculata *Jacq. H. sch.*
 viridis *Jacq. H. sch.*
 cruciata *Jacq. Ic.*
 liliago. *red. Lil.*

bigarré. *Am. s. ♀*

à stigmates étroits. ♀

à f. de Gramen. Autriche. ♀

queue de scorpion. Barb. ♀

xiphium. *F. m. ♂ (orn.)*

xiphiode. *Esp. or. ♀ (orn.)*

hermodate. orient. or. ♀

de Perse. or. ♀

à feuilles de safran. or. ♀

à pétales bossus. or. ♀

VIEUSSEUXIA

à taches bleues. cap. or. ♀

MORÆA

faux iris. cap. or. ♂

à gaines. cap. or. ♂

élégant. cap. or. ♀

étalé. cap. or. ♀

de Chine. ♀ (orn.)

IXIA

bulbocodium. *F. ♀*

— à petites fleurs.

safrané. cap. or. ♂ (orn.)

couleur de minium. cap. or. ♂
 (orn.)

— maculé.

à plusieurs épis. cap. or. ♀

à fleurs de scille. cap. or. ♀

tricolor. cap. or. ♂

à fl. d'anémone. cap. or. ♂

brun-citron. cap. or. ♂

à fleurs blanches. cap. or. ♂

bulbifère. cap. or. ♀

à longues fleurs. cap. or. ♀

à tige droite. cap. or. ♂

maculé. cap. or. ♂

à fleurs vertes. cap. or. ♂

crucifère. cap. or. ♂

à fleurs de lis. cap. or. ♂

GALAXIA

ixiæflora red. Lil.
ixia columnaris Andr. rep. }

DIASIA

iridifolia red. Lil.
graminifolia red. Lil.

GLADIOLUS

communis L.
 — *grandiflorus.*
plicatus L.
mucronatus Jacq. Ic.
xanthophyllus red. Lil.
undulatus Jacq. Ic.
strictus red. Lil.
hirsutus Jacq. Ic.
cardinalis red. Lil.
tristis L.
angustus L.
carneus Jacq. Ic.
ringens Jacq. Ic.
cuspidatus Jacq. Ic.
lineatus red. Lil.
merianus Jacq. Ic. }
antholiza meriana L. }
tubatus Jacq. Ic.
tubiflorus Jacq. Ic. }
inclinatus red. Lil. }
juncæus red. Lil.
Lapeyrousia juncæa pourret. }
Act. Tolos.
securiger Bot. Magaz.
montbretia securigera red. }
Lil.

ANTHOLYZA

æthiopica L.
cunonia L.

CROCUS

vernus red. Lil.
multifidus ramond. s. Phil.
biflorus red. Lil.
susianus red. Lil.
luteus red. Lil.
sativus Willd. sp.

WACHENDORFIA

thyrsiflora L.

PONTEDERIA

cordata L.

GALAXIA

à fleurs d'ixia. cap. or. 2

DIASIA

à feuilles d'Iris. cap. or. 2
à feuell. de Gramen. cap. or. 2

GLAYEUL

commun. F. 2 (orn.)
 — *à grande fleur. (orn.)*
plissé. cap. or. 2
mucroné. cap. or. 2
à taches jaunes. cap. or. 2
ondulé. cap. or. 2
serré. cap. or. 2
velu. cap. or. 2
cardinal. cap. or. 2 (orn.)
triste. cap. or. 2
à feuilles étroites. cap. or. 2
couleur de chair. cap. or. 2
à deux lèvres. cap. or. 2
pointu. cap. or. 2
veiné. cap. or. 2
de Mérian. cap. or. 2
trompette. cap. or. 2
tubulé. cap. or. 2
jonciforme. cap. or. 2
en doloire. cap. or. 2

ANTHOLYZE

d'Ethiopie. cap. or. 2 (orn.)
cunonia. cap. or. 2 (orn.)

SAFRAN

printanier. F. 2 (orn.)
découpé. pyrénées. 2
à deux fleurs. 2 (orn.)
de Suze. orient. 2 (orn.)
jaune. 2 (orn.)
cultivé. orient. 2 (éc. méd.)

WACHENDORFIA

à fleurs en grappes. cap. or. 2

PONTEDERIA

à f. en cœur. Am. s. 2 (orn.)

CLASSIS IV.

CLASSE IV.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

(stamina epigyna.)

(étamines sur le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

MUSÆ.

BANANIER.

MUSA

sapientum L.

paradisiaca L.

— violacea.

coccinea Andr. rep.

BANANIER

à petit fruit. inde. s. ch. x
(alim.)à grand. fruit. inde. s. ch. x
(alim.)

— violet.

écarlate. chine. s. ch. x

HELICONIA

humilis Jacq. H. sch.

HÉLICONIA

de Jacquin. caracas. s. ch. x

RAVENALA

madagascariensis encycl.

RAVÉNAL

de Madagascar. s. ch. y

STRELITZIA

reginæ H. K.

STRÉLITZIA

de la reine. cap. s. ch. x

ORDO II.

ORDRE II.

CANNÆ.

BALISIERS.

CANNA

indica L.

glauca L.

gigantea red. Lil.

flaccida red. Lil.

BALISIER

des Indes. s. ch. x

glauque. caroline. or. x

gigantesque. s. ch. x

flasque. caroline. or. x

GLOBBA

nutans red. Lil.

renealmia nutans willd. }

Enum.

erecta red. Lil.

GLOBBA

à fleurs penchées. inde. s. ch. x

à fleurs droites. inde? s. ch. x

AMOMUM

zingiber L.

zerumbet L.

AMOME

gingembre. inde. s. ch. x

(écon. méd.)

zerumbet. inde. s. ch. x (écon.
méd.)

cardamomum L.

cardamome. inde. s. ch. ℥
(écon. méd.)

granum-paradisi L.

graine-de-paradis. Afr. s. ch.
℥ (méd.)

HEDYCHIMUM

coronarium Bot. Magaz.

HÉDYCHIMUM

à bouquets. inde. s. ch. ℥

COSTUS

arabicus L.

COSTUS

d'Arabie. inde. s. ch. ℥ (méd.)

MARANTA

arundinacea L.

MARANTA

à f. de balisier. Ant. s. ch. ℥

PERONIA

stricta Red. Lil.

PÉRONIA

à tige droite. s. ch. ℥

CURCUMA

longa L.

CURCUMA

safran des Indes. s. ch. (écon.
méd.)

KEMPFERIA

galanga L.

longa Jacq. H. sch.

angustifolia Willd. Enum.

KÆMPFERIA

galanga. inde. s. ch. ℥ (méd.)

allongé. inde. s. ch. ℥

à feuilles étroites. s. ch. ℥

ORDO III.

ORCHIDEÆ.

ORCHIS.

1. Bulbis indivisis.

bifolia L.

pyramidalis L.

coriophora L.

morio L.

mascula L.

laxiflora Encycl.

ustulata L.

militaris L.

variegata Encycl.

simia Encycl.

hircina swartz. orch. }

satyrium hircinum L. }

2. Bulbis palmatis.

latifolia L.

maculata L.

conopsea L.

abortiva L.

ORDRE III.

ORCHIDÉES.

ORCHIS.

1. Bulbes entières.

à deux feuilles. F. ℥

pyramidal. F. ℥

fétide. F. ℥

morio. F. ℥

mâle. F. ℥

à fleurs lâches. F. ℥

charbonné. F. ℥

militaire. F. ℥

panaché. F. ℥

singe. F. ℥

puant. F. ℥

2. Bulbes palmées.

à larges feuilles. F. ℥

maculé. F. ℥

à long éperon. F. ℥

avorté. F. ℥

viridis swartz orch. }
 satyrium viride L. }

vert. F. ψ

OPHRYS

anthropophora L.
 insectifera L.
 — musciflora.
 — arachnites.
 — rubiginosa.

OPHRYS

homme. F. ψ
 insecte. F. ζ
 — mouche.
 — araignée.
 — rouillé.

NEOTTIA

elata willd. sp.
 spiralis swartz. orch. }
 ophrys spiralis L. }
 æstivalis. }
 ophrys æstivalis *encycl.* }

NÉOTTIA

élané. Antilles. s. ch. ψ
 en spirale. F. ψ
 d'été. F. ζ

MALAXIS

lilifolia swartz orch. }
 ophrys lilifolia L. }
 Loeselii swartz. orch. }
 ophrys Loeselii L. }

MALAXIS

à feuilles de Lis. Canada, ψ
 de Loesel. F. ζ

EPIPACTIS

latifolia swartz. orch. }
 serapias latifolia L. }
 palustris swartz. orch. }
 serapias longifolia L. s. *veg.* }
 pallens swartz. orch. }
 serapias grandiflora L. }
 rubra swartz. orch. }
 serapias rubra L. }
 nidus-avis willd. sp. }
 ophrys nidus-avis L. }
 ovata willd. sp. }
 ophrys ovata L. }

EPIPACTIS

à larges feuilles. F. ζ
 des marais. F. ψ
 à grandes fleurs. F. ζ
 rouge. F. ψ
 Nid-d'oiseau. F. ψ
 double-feuille. F. ψ

LIMODORUM

tankervillæ swartz. orch.

LIMODORUM

de Tankerville. Chine. s. ch.
 ψ (orn.)

CYMBIDIUM

purpureum.
 Limodorum purpureum. }
encycl. }
 aloifolium swartz. orch. }
 Epidendrum aloifolium L. }
 sinense willd. sp. }
 Epidendrum sinense Andr. }
 rep. }

CYMBIDIUM

pourpre. Antilles. s. ch. ψ
 à feuilles d'Aloès. Indes. s. ch. ζ
 de Chine. s. ch. ψ

CYPRIPEDIUM

calceolus L.

CYPRIPEDIUM

des Alpes. ζ

EPIDENDRUM

cochleatum L.

elongatum Jacq. Ic.

VANILLA

aromatica Swartz. orch. }

epidendrum vanilla L. }

ORDO IV.

HYDROCHARIDÆ.

VALLISNERIA

spiralis L.

STRATIOTES

aloides L.

HYDROCHARIS

morsus ranæ L.

NYMPHÆA

alba L.

lutea L.

EPIDENDRUM

limacon. Antilles. s. ch. ʒ

allongé. Antilles. s. ch. ʒ

VANILLE

aromatique. Am. m. s. ch. ʒ

(écon.)

ORDRE IV.

HYDROCHARIDÉES.

VALLISNERIA

en spirale. F. ʒ

STRATIOTES

à feuilles d'Aloès. F. ʒ

MORÉNE

aquatique. F. ʒ

NYMPHÉA

blanc. F. ʒ

jaune. F. ʒ

CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ.

ARISTOLOCHIA

pubera Brown. Prodr.

altissima Desf. Atl.

sempervirens L.

ristolochia L.

oblongata Jacq. H. Sch.

caudata L.

trilobata L.

siphon L'Her. Stirp.

rotunda L.

clematidis L.

serpentaria L.

CLASSE V.

MONOCOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARISTOLOCHES.

ARISTOLOCHE

pubescente. N. Holl. or. ʒ

élevée. Alger. or. ʒ

toujours verte. orient. or. ʒ

crénelée. F. m. or. ʒ (méd.)

à f. oblong. Caracas. s. ch. ʒ

filifère. Antilles. s. ch. ʒ

trilobée. Antilles. s. ch. ʒ

en siphon. Am. s. ʒ

ronde. F. m. ʒ (méd.)

clématite. F. ʒ (méd.)

serpenteaire. Am. s. ʒ (méd.)

ASARUM

europæum L.
canadense L.
virginicum L.

ASARUM

d'Europe. F. L (méd.)
de Canada. L
de Virginie. or. L

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina perigyna.)

ORDO I.

ELÆAGNEÆ.

I. Stamina 5, aut pauciora.

THESIUM

linophyllum L.

OSYRIS

alba L.

HIPPOPHAE

rhamnoides L.
canadensis L.

ELÆAGNUS

angustifolia L.

NYSSA

aquatica L.
denticulata H. K.
angulisans Mich. Fl. }
villosa Mich. Fl.
candicans Mich. Fl.

II. Stamina sæpius 10.

BUCIDA

buceras L.

TERMINALIA

angustifolia Jacq. Hort. }
benzoin L. f. }

CLASSE VI.

DICOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

CHALEFS.

I. Cinq étamines, ou moins.

THÉSIUM

à feuilles de Lin. F. L

OSYRIS

blanc. F. L

HIPPOPHAE

rhamnoïde. F. L
de Canada. L

CHALEF

à feuell. étroit. orient. L (orn.)

TUPÉLO

aquatique. Am. S. L

velu. Am. S. L

blanchâtre. Am. S. L

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA

cornu. Antilles. S. ch. L

BADAMIER

à feuilles étroit. inde. S. ch. L

ORDO II.

THYMELÆÆ.

DIRCA

palustris *z.*

DAPHNÆ.

1. *Floribus lateralibus.*mezureum *z.*

— album.

thymelæa *z.*tarton-raira *z.*alpina *z.*pontica *z.*laureola *z.*2. *Floribus terminalibus.*odora *Thunb. Jap.* }sinensis *Encycl.* }collina *Smith. spicil.*cneorum *z.*gnidium *z.*

PASSERINA

hirsuta *z.*dioica *Ramond. Soc. Phil.* }daphne dioica *Gouan. ill.* }spicata *z. f.*filiformis *z.*grandiflora. *L. f.*

STELLERA

passerina *z.*

STRUTHIOLA

virgata *L. Mant.*erecta *L. Mant.*imbricata. *Andr. Rep.*

LACHNEA

eriocephala *Willd. sp.*

DAIS

cotinifolia *z.* }laurifolia *Jacq. Ic.* }

GNIDIA

simplex *L. Mant.*pinifolia *L. f.*

ORDRE II.

THYMÉLÉES.

DIRCA

Bois-cuir. *Am. s.* ♀

DAPHNÉ.

1. Fleurs latérales.

Bois-gentil. *F.* ♀ (orn.)

— à fleurs blanches.

Thymélée. *F.* ♀ (orn.)Tarton-raire. *F. m. or.* ♀

des Alpes. ♀

de Pont. *Asie.* ♀Lauréole. *F.* ♀

2. Fleurs terminales.

odorant. *Japon. or.* ♀ (orn.)d'Italie. *or.* ♀cneorum. *F.* ♀ (orn.)garou. *F. m.* ♀ (méd.)

PASSERINE

cotonneuse. *F. m. or.* ♀dioïque. *Pyrénées.* ♀à épis. *cap. or.* ♀filiforme. *cap. or.* ♀à grandes fleurs. *cap. or.* ♀

STELLERA

passerine. *F.* ☉

STRUTHIOLA

effilé. *cap. or.* ♀à tige droite. *cap. or.* ♀imbriqué. *cap. or.* ♀

LACHNEA

à tête laineuse. *cap. or.* ♀

DAIS

à feuilles de fusset. *cap. or.* ♀

GNIDIA

à tiges simples. *cap. or.* ♀à feuilles de pin. *cap. or.* ♀

ORDO III.

PROTEACEÆ.

PROTEA

- argentea L.
 pallens L. Mant.
 conifera L. Mant.
 toria Thunb. Diss.
 obliqua L. f.
 Levisanus L. Mant.
 hirta L. Mant.
 prolifera Lamk. (non Thunb.)
 saligna Thunb. Diss.
 passerina.
 conocarpa Willd. sp.
 Leucospermum conocarpum }
 Brown. Prot.
 ciliata. }
 Leucadendrum grandiflorum }
 Bot. Magaz.

BANKSIA

- serrata L. f.
 præmorsa Andr. Rep. }
 marcescens Brown. Prodr. }
 spinulosa Smith. N. Holl.
 ericifolia Brown. Prodr.
 longifolia.

HAKEA

- gibbosa Cav. Ic.
 dactyloides Cav. Ic.
 saligna Brown. Prodr. }
 Embothrium salicifolium }
 Vent. H. Cels.
 ceratophylla Brown. Prodr.
 suaveolens Brown. Prodr.
 epiglottis La Bill. N. Holl.
 pugioniformis Cav. Ic. ?
 acicularis Vent. Malm.

EMBOTHRUM

- sericeum Smith. N. Holl. }
 Grevillea sericea Brown. }
 Prodr. }
 speciosissimum Smith. N. }
 Holl. }
 telopea speciosiss. Brown. }
 Prodr. }
 silaifolium Smith. N. Holl.

ORDRE III.

PROTÉACÉES.

PROTEA

- Arbre d'arg. cap. or. ♀ (orn.)
 pâle. cap. or. ♀
 conifère. cap. or. ♀
 tordu. cap. or. ♀
 oblique. cap. or. ♀
 Levisanus. cap. or. ♀
 hérissé. cap. or. ♀
 prolifère. cap. or. ♀
 à feuilles de saule. cap. or. ♀
 passerina. cap. or. ♀

à fruits coniques. cap. or. ♀

cilié. cap. or. ♀

BANKSIA

- à feuell. en scie. N. Holl. or. ♀
 tronqué. N. Holl. or. ♀
 épineux. N. Holl. or. ♀
 à f. de bruyère. N. Holl. or. ♀
 à long. feuilles. N. Holl. or. ♀

HAKEA

- gibbeux. N. Holl. or. ♀
 dactyloïde. N. Holl. or. ♀
 à f. de saule. N. Holl. or. ♀
 à feuell. cornues. N. Holl. or. ♀
 odorant. N. Holl. or. ♀
 épiglote. N. Holl. or. ♀
 à long. pointes. N. Holl. or. ♀
 à feuilles grêles. N. Holl. or. ♀

EMBOTHRUM

- satiné. N. Holl. or. ♀
 écarlate. N. Holl. or. ♀ (orn.)
 à feuell. de silaüs. N. Holl. or. ♀

PERSOONIA
linearis brown. prodr.

PERSOONIA
à f. linéaires. N. Holl. or. 5

ORDO IV.

L A U R I N E Æ.

LAURUS.

1. *Folia perennantia.*
cinnamomum L.
camphora L.
cassia L.
persea L.
nobilis L.
indica L.
borbonia L. ?
caroliniensis Mich. fl.
fœtens H. K.

2. *Folia decidua.*

- geniculata Mich. fl.
benzoin L.
sassafras L.

HERNANDIA
sonora L.

ORDO V.

P O L Y G O N E Æ.

COCCOLOBA

- excoriata L.
uvifera L.
rheifolia. }
latifolia *encycl.* }
rugosa.
pubescens L.
pyrifolia. }
excoriata *encycl. var. B.* }
fagifolia Jacq. H. sch. }
nitida. }
nivea swartz. prodr.
laurifolia.

ORDRE IV.

L A U R I N É E S.

LAURIER.

1. Feuilles persistantes.

- cannellier. ceylan. s. ch. 5
(écon. méd.)
camphrier. japon. or. 5 (écon.
méd.)
cassia. inde. s. ch. 5
Avocat. antill. s. ch. 5 (alim.)
d'Apollon. orient. or. 5 (écon.
méd.)
des Indes. canaries. or. 5
borbonia. or. 5
de Caroline. or. 5
fétide. canaries. or. 5

2. Feuilles tombantes.

- généculé. caroline. or. 5
faux Benjoin. am. s. 5
sassafras. caroline. 5 (méd.)

HERNANDIA
sonore. inde. s. ch. 5

ORDRE V.

P O L Y G O N É E S.

RAISINIER

- écorcé. Antilles. s. ch. 5
à grappes. Antilles. s. ch. 5
à feuilles de rhapsodic. Antill.
s. ch. 5
ridé. Antilles. s. ch. 5
pubescent. Antilles. s. ch. 5
à feuilles de poirier. Antilles.
s. ch. 5
à feuilles de hêtre. Antilles.
s. ch. 5
à fl. blanch. Antilles. s. ch. 5
à feuilles de Laurier. Antilles.
s. ch. 5

BRUNNICHIA

cirrhosa Mich. fl.

ATRAPHRAXIS

undulata L.

spinosa L.

POLYGONUM.

1. Foliis indivisis, floribus octandris,
trigynis.

aviculare L.

bellardi All. ped.

maritimum L.

frutescens L.

divaricatum L.

alpinum All. ped.

angustifolium. }
diffusum Encycl. }2. Persicaria, stylo bifido, stamina
minus 8.

orientale L.

persicaria L.

— maculata.

lapathifolium L.

minus Smith. fl. }

pusillum Dec. fl. }

hydropiper L.

amphibium L.

virginianum L.

3. Bistorta, spica unica.

viviparum L.

bistorta L.

— latifolia.

4. Folia subcordata.

tataricum L.

ragopyrum L.

emarginatum Willd. sp.

convolvulus L.

dumetorum L.

scandens L.

acetosæfolium Vent. H. cels.

RUMEX.

1. Hermaphroditi, valvulis glandulâ
destitutis.

lunaria L.

vesicarius L.

BRUNNICHIA

à vrilles. Am. s. ♀

ATRAPHRAXIS

ondulé. cap. or. ♀

épineux. orient. ♀

POLYGONE.

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

renouée, centinode. F. ♀
(méd.)

de Bellardi. piémont. ♀

maritime. F. ♂

arbrisseau. sibérie. ♀

étalé. sibérie. ♀

des Alpes. ♂

à feuilles étroites. sibérie. ♀

2. Persicaires, style bifide, moins de
8 étamines.

d'Orient. ☉ (orn.).

persicaire. F. ☉

— maculée.

à feuilles de Lapatum. F. ☉

nain. F. ☉

poivre-d'eau. F. ☉

amphibie. F. ♂

de Virginie. ♀

3. Bistortes, un seul épi.

vivipare. Alpes. ♂

bistorte. F. ♂ (méd.)

— à larges feuilles.

4. Feuilles en cœur ou hastées.

de Tartarie. ☉ (écon.)

sarrazin. Asie. ☉ (écon.)

échancré. chine. ☉ (écon.).

liseron. F. ♂

des buissons. F. ♀

grim pant. Am. s. ♂

à f. d'oseille. Brésil. s. ch. ♂

RUMEX.

1. Hermaphrodites, calice sans glandes.

arbrisseau. canaries. or. ♀

vésiculeux. barbarie. ☉

roseus L.
 tingitanus L.
 scutatus L.
 — glaucus.
 digynus L.
 bucephalophorus L.

2. Flores declines.

abyssinicus Jacq. hort. }
 arifolius L. f. }
 alpinus L.
 tuberosus Encycl. an L. ?
 montanus.
 arifolius All. ped. }
 cordatus.
 acetosa L.
 acetosella L.
 spinosus L.

3. Floribus hermaphroditis , valvulis granulo notatis.

maritimus L.
 crispatus Mich. fl. }
 persicarioides Encycl. }
 ægyptiacus L.
 dentatus L. Mant.
 pulcher L.
 nemolapathum L. f.
 sanguineus L.
 purpureus Encycl.
 obtusifolius L.
 crispus L.
 hydrolapathum Willd. sp. }
 aquaticus Smith. fl. }
 patientia L.
 undulatus.

RHEUM

rhaponticum L.
 compactum L.
 undulatum L.
 ribes L.
 hybridum H. K.
 palmatum L.

TRIPLARIS

americana Vahl. symb.

CALLIGONUM

comosum Desf. All.

rose. Égypte. ☉
 de Tanger. or. ☿
 en bouclier. F. ☿ (écon.)
 — glauque.
 à deux styles. Alpes. ☿
 tête-de-Bœuf. F. ☉

2. Fleurs polygames.

d' Abyssinie. s. ch. ☿
 des Alpes. ☿ (méd.)
 tubéreux. or. ☿
 de montagne. Alpes. ☿
 en cœur. cap. or. ☿
 oseille des prés. F. ☿
 auriculé. F. ☿
 épineux. orient. ☉

3. Fleurs hermaphrodites , valves glanduleuses.

maritime. F. ☉
 crispé. Am. s. ☉
 d' Égypte. ☉
 denté. Égypte. ☉
 violon. F. ♂
 des bois. F. ☿
 sanguin. Am. s. ☿
 purpurin. ☿
 à feuilles obtuses. F. ☿
 crépu. F. ☿
 des marais. F. ☿
 patience. F. ☿ (méd.)
 ondé. Sibérie. ☿

RHUBARBE

rhapontic. Asie. ☿ (méd.)
 compacte. Chine. ☿ (méd.)
 ondée. Chine. ☿ (méd.)
 ribes. Asie min. ☿ (écon. méd.)
 hybride. Asie boréale. ☿
 palmée. Chine. ☿ (méd.)

TRIPLARIS

d' Amérique. s. ch. ♀

CALLIGONUM

hérissé. Afr. sept. or. ♀

PALLASIA

caspica L. f.

pallasia pterococcus pall.

ROSS.

calligonum pallasia Willd. sp. }

PALLASIA

de la mer Caspienne. or. 7.

ERYOGONUM

tomentosum Michx. fl.

ERYOGONUM

cotonneux. caroline. or. 7.

ORDO VI.

ATRIPLICEÆ.

I. Fructus baccatus.

PHYTOLACCA

octandra L.

decandra L.

dodecandra l'her. stirp.

icosandra L.

dioica L.

PHYTOLACCA

à 8 étamines. Mexiq. s. ch. 5

à 10 étamines. Am. s. 7

à 12 étamines. Abyss. s. ch. 5

à 20 étamines. Ind. s. ch. 5

dioïque. Am. m. s. ch. 5

RIVINA

humilis L.

lævis L. Mant.

purpurascens Willd. Enum.

brasiliensis Willd. sp. ?

tetrandra.

RIVINA

velu. Antilles. s. ch. 5

lisse. Antilles. s. ch. 5

pourpre. s. ch. 5

du Brésil. s. ch. 5

à 4 étamines. s. ch. 5

BOSEA

yerva-mora L.

BOSEA

yerva-mora. canaries. or. 5

II. Fructus capsularis.

II. Une capsule.

PETIVERIA

alliacea L.

PÉTIVÉRIA

alliagé. Antilles. s. ch. 5

POLYCNEMUM

arvense L.

POLYCNEMUM

des champs. F. ☉

CAMPHOROSMA

monspeliaca L.

CAMPHRÉE

de Montpellier. or. 5

PTERANTHUS

echinatus Desf. All.

camphorosma pteranthus L. }

Mant. }

louichea cervina l'her. stirp. }

PTÉRANTHUS

hérissé. barbarie. ☉

GALENIA

africana L.

GALÉNIA

d'Afrique. cap. or. 5

III. Semen testum calice , stamina 5.

III. Graines reconvertes par le calice ,
5 étamines.

BASELLA

rubra L.

alba L.

vesicaria *Encycl.*

BASELLE

rouge. inde. ♂ (écon.)

blanche. chine. ♂ (écon.)

vésiculeuse. pérou. s. ch. ♀

SALSOLA.

1. Fruticosæ.

brevifolia *Desf. Atl.*

fruticosa L.

chenopodium fruticosum

Willd. Enum.

prostrata L.

sericea *Willd. Enum.*chenolea diffusa *Willd. sp.*oppositifolia *Desf. Atl.*

2. Herbaceæ.

baccata.

sueda baccata *Delile. Fl.*

hortensis.

sueda hortensis *Delile. Fl.*

hirsuta L.

muricata L. *Mant.*laniflora *Pallas. itin.*arenaria *Wald. et Kitt. Hung.*

altissima L.

chenopodium altissimum

Willd. Enum.

soda L.

radiata *Desf. Ann.*platiphylla *Mich. Fl.*kochia dentata *Willd. Hort.*salsa L. *Mant.*

kali L.

tragus L.

SPINACIA

oleracea L.

— lævis.

BETA

vulgaris L.

— rubra.

cycla L.

trigyna *Wald. et Kitt. Hung.*

maritima L.

SOUDE.

1. Tiges ligneuses.

à f. courtes. barbarie. or. ♀

arbrisseau. F. ♀

couchée. sibérie. ♀

satinée. cap. or. ♀

à feuell. opposées. barb. or. ♀

2. Tiges herbacées.

baccifère. or. ♀

des jardins. ☉

velue. F. m. ☉

hérissée. égypte. or. ☿

laineuse. sibérie. ☿

des sables. F. ☉

élevée. Italie. ☉

commune. F. ☉

rayonnée. Am. s. ☉

salée. sibérie. ☉ (arts.)

kali. F. ☉ (arts.)

épineuse. F. ☉ (arts.)

ÉPINARD

cultivé. ☉ (alim. méd.)

— lisse.

BETTE

commune. Eur. Aust. ♂ (alim.)

— rouge.

racine de disette. Portugal. ♂

à 5 styles. Hongrie. ♀

maritime. F. ☉

CHENOPODIUM.

1. *Foliis angulatis.*

bonus-henricus L.
 urbicum L.
 atriplicis H. K.
 quinoa Willd. sp. ?
 rhombifolium Willd. Enum.
 crassifolium.
 opulifolium Nocca.
 murale L.
 hybridum L.
 ficifolium Smith. fl. ?
 album L.
 rubrum L.
 ambrosioides L.
 anthelminticum L.
 botrys L.
 multifidum L.
 foetidum Willd. Enum.
 glaucum L.

2. *Foliis integris.*

vulvaria L.
 lanceolatum Willd. Enum.
 caudatum Jacq. ic.
 polyspermum L.
 scoparia L.
 villosum Encycl.
 aristatum L.
 maritimum L.

ATRIPLEX

halimus L.
 portulacoides L.
 albicans Willd. sp.
 rosea L.
 sibirica L.
 microsperma Willd. sp.
 lacera.
 hortensis L.
 — rubra.
 — ruberrima.
 nitens Willd. sp.
 laciniata L.
 multifida.
 hastata L.
 patula L.
 angustifolia Willd. sp.
 littoralis L.

ANSERINE.

1. Feuilles anguleuses.

Bon-Henri. F. Z (méd.)
 triangulaire. F. ⊙
 à feuilles d'arroche. chine. ⊙
 quinoa. pérou. ⊙ (alim.)
 rhomboïdale. Am. s. ⊙
 à feuilles épaisses. ⊙
 à feuilles d'obier. ⊙
 des murailles. F. ⊙
 hybride. F. ⊙
 à feuilles de figuier. F. ⊙
 blanche. F. ⊙
 rouge. F. ⊙
 odorante. Mexique. ⊙
 anthelmintique. Am. s. or. ♄
 Botrys. F. ⊙ (méd.)
 laciniée. Buenos-Ayres. or. ♄.
 puante. ⊙
 glauque. F. ⊙

2. Feuilles entières.

fétide. F. ⊙
 lancéolée. Am. s. ⊙
 à longues grappes. Guinée. ⊙
 polysperme. F. ⊙
 Belvédère. chine. ⊙
 velue. Sibérie. ⊙
 barbe. Sibérie. ⊙
 maritime. F. ⊙

ARROCHE

halime. F. ♄
 à feuilles de pourpier. F. ♄
 blanchâtre. cap. or. ♄
 rose. F. ⊙
 de Sibérie. ⊙
 à petit fruit. Hongrie. ⊙
 lacérée. ⊙
 des jardins. Asie. ⊙ (écon.)
 — rouge.
 — très-rouge.
 luisante. Hongrie. ⊙
 laciniée. F. ⊙
 découpée. ⊙
 hastée. F. ⊙
 touffue. F. ⊙
 à feuilles étroites. F. ⊙
 des rivages. F. ⊙

III. *Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.*

AXYRIS

amaranthoides L.

BLITUM

capitatum L.

virgatum L.

chenopodioides L. Mant.

SALICORNIA

herbacea L.

fruticosa L.

CORISPERMUM

spicatum.

hyssopofolium L.

III. Graines recouvertes par le calice , moins de 5 étamines.

AXYRIS

fausse amarante. sibérie. ☉

BLETTE

à fleurs en tête. F. ☉

effilée. F. ☉

jausse anserine. tartarie. ☉

SALICORNE

herbacée. F. ☉

arbrisseau. F. m. or. ☿

CORISPERME

à épis. sibérie. ☉

à feuilles d'hysope. tart. ☉

CLASSIS VII.

CLASSE VII.

DYCOTYLEDONES

DYCOTYLÉDONS

APETALÆ.

APÉTALES.

(*stamina hypogyna.*)

(*étamines attachées sous le pistil.*)

ORDO I.

ORDRE I.

AMARANTHI.

AMARANTES.

AMARANTHUS.

AMARANTE

1. Flores triandri.

1. 3 étamines.

albus L.

græcisans L.

angustifolius Encycl. }

prostratus Willd. sp. }

tricolor L.

lividus L.

melancholicus L.

blitum L.

sylvestris.

polygonoides L.

2. Pentandri.

chlorostachys Willd. sp.

flavus Willd. sp.

blanche. Am. s. ☉

à feuilles étroites. Am. s. ☉

couchée. italié. ☉

tricolore. inde. ☉ (orn.)

livide. Am. s. ☉

mélancholique. inde. ☉

Blette. F. ☉

sauvage. F. ☉

membraneuse. Antilles. ☉

2. 5 étamines.

pâle. ☉

jaune. ☉

lætus Willd. sp.
paniculatus L.
hybridus L.
retroflexus Encycl. }
caudatus L.
sanguineus L.
spinosus L.

CELOSIA

argentea L.
margaritacea L.
trigyna L. Mant.
cristata L.
coccinea L.
castrensis L.
paniculata L.

IRESINE

celosioides L.
herbacea.

ACHYRANTHES

argentea Encycl.
fruticosa Encycl.
crispa Encycl. suppl.
virgata Encycl. suppl.
lappacea L.
atropurpurea Encycl. }
porrigens Jacq. II. sch.

GOMPHRENA

globosa L.
interrupta L.
decumbens Jacq. II. sch.
brasiliensis L.

ILLECEBRUM

lanatum. s. veget.
javanicum s. veget.
achyranthes alopecuroides }
Encycl.

PARONYCHIA

verticillata.
illecebrum verticillatum L. }
echinata Desf. Atl.
vulgaris.
illecebrum paronychia L. }
capitata.
illecebrum capitatum L. }

d'un vert gai. ☉
paniculée. ☉

hybride. F. ☉.

à longs épis. Pérou. ☉ (orn.)
couleur de sang. Antilles. ☉
épineuse. inde. ☉

CELOSIA

argenté. inde. ☉
perlé. inde. ☉
à 5 styles. Sénégal. ☉
à crêtes. Asie. ☉ (orn.)
écarlate. inde. ☉ (orn.)
aigrette. inde. ☉
paniculé. Antilles. ☉

IRÉSINE

faux celosia. Antilles. s. ch. ♀
herbacée. s. ch. ♀

CADÉLARI

argenté. sicile ☉
arbrisseau. inde. s. ch. ♀
crépu. s. ch. ♀
à longs épis. s. ch. ♀
hérissé. inde-s. ch. ♀
étalé. Pérou. s. ch. ♀

GOMPHRÉNA

globuleux. inde. ☉ (orn.)
interrompu. Antilles. s. ch. ♀
couché. Mexique. ☉
du Brésil. s. ch. ♀

ILLECEBRUM

laineux. inde. s. ch. ♀
de Java. s. ch. ♂

PARONIC

verticillé. F. ☉
hérissé. Barbarie. or. ♀
commun. F. m. or. ♂
à fleurs en tête. F. ♂

ficoidea L. }
 illecebrum ficoideum L. }
 tenella.
 sessilis. }
 illecebrum sessile L. }
 Achyrantha. }
 illecebrum Achyrantha L. }
 frutescens. }
 illecebrum frutescens L'Her. }
 stirp.

ficoïde. Antilles. s. ch. ☞
 délicat. s. ch. ℥
 sessile. inde. s. ch. ℥
 Achyrantha. orient. ○
 arbrisseau. Pérou. s. ch. ☞

HERNIARIA

suffruticosa. }
 illecebrum suffruticosum L. }
 fruticosa L. }
 glabra L.
 hirsuta L.
 incana Encycl.

HERNIOLE

sous-arbrisseau. Esp. or. ☞
 ligneuse. F. m. or. ☞
 glabre. F. ○
 velue. F. ○
 blanche. Alpes. ☞

ORDO II.

PLANTAGINEÆ.

PLANTAGO.

1. Caule folioso.

psyllium. }
 arenaria Willd. Enum. }
 cynops L.
 squarrosa Willd. sp.
 stricta Schousb. Maroc.

2. Caule aphylo.

maxima Jacq. Ic. }
 cucullata Lamk. ill. }
 asiatica Lamk. ill.
 cordata Lamk. ill.
 major L.
 media L.
 crassa Willd. sp. }
 crispa Jacq. collect. }
 saxatilis Marsch. cauc.
 sibirica.
 lanceolata L.
 lagopus L.
 amplexicaulis Cav. Ic.
 serraria L.
 vaginata Vent. H. cels.
 virginica L.

ORDRE II.

PLANTAGINÉES.

PLANTAIN.

1. Tige feuillée.

psyllium. F. ○
 cynops. F. ☞
 rude. Égypte. ○
 serré. Maroc. ○

2. Tige sans feuilles.

capuchon. Sibérie. ℥
 d'Asie. ℥
 en cœur. Am. s. ℥
 commun. F. ☞
 moyen. F. ☞
 charnu. ☞
 des rochers. caucase. ☞
 de Sibérie. ℥
 lancéolé. F. ☞
 lagopus. F. ○
 amplexicaule. Esp. or. ☞
 en scie. Barbarie. or. ℥
 à gaine. Canaries. or. ℥
 de Virginie. Am. s. ○

albicans L.
 interrupta *Encycl.*
 alpina L.
 sphærocephala *Encycl.* }
 alpina *Jacq. hort.* }
 microcephala *Encycl.* }
 villosa *Roith. cat.* }
 holostea *Lamk. ill.* }
 bellardi *Vahl. symb.* }
 graminea *Lamk. ill.*
 hirsuta *Thunb. Prodr.*
 tenuiflora *Wald. et Kitt. Hung.*
 maritima L.
 subulata L.
 coronopus L.

LITTORELLA
 lacustris L.

ORDO III.

NYCTAGINEÆ.

MIRABILIS
 jalapa L.
 — lutea.
 dichotoma L.
 longiflora L.

CALYXHYMENIA
 viscosa *Fl. per.* }
 mirabilis viscosa *cav. ic.* }
 glabrifolia *ortega. dec.*
 aggregata *ortega. dec.* }
 mirabilis aggregata *cav. ic.* }

BOERHAAVIA
 erecta L.
 diffusa L.
 hirsuta L. *Mant.*
 scandens L.
 tuberosa *Lamk. ill.*
 arborea *Vahl. sp.*

PISONIA
 aculeata L.
 fragrans.
 nitida.
 latifolia (*an generis?*)

blanchâtre. F. m. ℥
 interrompu. Am. s. ♀
 des Alpes. F. ℥
 à tête ronde. Alpes. ♀
 à petite tête. orient. ⊙
 holostea. Alpes. ℥
 à feuilles de Gramen. ℥
 pubescent. cap. ⊙
 à petites fleurs. Hongrie. ⊙
 maritime. F. ♀
 en alêne. F. m. or. ♀
 corne-de-cerf. F. ⊙

LITTORELLE
 des marais. F. ♀

ORDRE III.

NYCTAGINÉES.

MIRABILIS *dictage*
 belle-de-nuit. Mexiq. ⊙ (orn.)
 — jaune.
 dichotome. Mexique. ⊙
 à longues fleurs. Mexiq. or. ℥
 (orn.)

CALYXHYMENIA *caly baphus.*
 visqueux. Pérou. s. ch. ℥
 à f. glabres. N. esp. s. ch. ♀
 aggloméré. N. esp. s. ch. ℥

BOERHAAVIA
 à tige droite. Antilles. s. ch. ♀
 étalé. Antilles. s. ch. ℥
 velu. Antilles. s. ch. ℥
 grim pant. Am. m. s. ch. ♀
 tubéreux. Pérou. s. ch. ♀
 arbre. N. esp. s. ch. ♀

PISONIA
 épineux. Antilles. s. ch. ♀
 odorant. Antilles. s. ch. ♀
 luisant. Antilles. s. ch. ♀
 à larges feuilles. Ant. s. ch. ♀

ORDO IV.

PLUMBAGINEÆ.

PLUMBAGO

europæa L.

scandens L.

rosea L.

STATICE.

1. *Caule ramoso.*

monopetala L.

— angustifolia.

suffruticosa L.

limonium L.

latifolia *smith. s. linn.*spatulata *willd. hort.*bellidifolia *encycl.*mucronata L. *f.*graminifolia *willd. sp.*

tatarica L.

oleæfolia *scop. insubr.*tripteris *delile. fl.*

sinuata L.

spicata *willd. sp.*2. *Caule simplici, nudo, floribus capitatis.*

Armeria L.

maritima *willd. Enum.*fasciculata *vent. n. cels.*

pubescens.

ORDRE IV.

DENTELAIRES.

DENTELAIRE

d'Europe. f. Ψ (méd.)*grimpanse.* Antilles. s. ch. Ψ *rose.* inde. s. ch. Ψ

STATICÉ.

1. *Tige rameuse.**monopétale.* f. m. or. Ψ — *à feuilles étroites.**sous-arbrisseau.* sibérie. Ψ *Limonium.* f. Σ *à larges feuilles.* sibérie. Σ *en spatule.* f. or. Σ *à f. de paquerette.* f. m. or. Σ *crépue.* maroc. or. Σ *à feuilles de cramen.* sibér. Ψ *de Tartarie.* Ψ (orn.)*à f. d'olivier.* ital. or. Σ *à trois ailes.* égypte. or. Ψ *sinuée.* orient. or. Ψ *à épis.* perse. or. Ψ 2. *Tige simple, nue, fleurs en tête.**cazon-d'olympé.* f. Ψ *maritime.* f. Σ (orn.)*fasciculée.* sardaigne. or. Ψ *pubescente.* or. Ψ

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*corolla hypogyna.*)(*corolle attachée sous le pistil.*)

ORDO I.

ORDRE I.

LYSIMACHIÆ.

LYSIMACHIES.

CENTUSCULUS

minimus L.

CENTENILLE

naine, f. $\odot$

ANAGALLIS

- arvensis L.
 — cœrulea.
 monelli L.
 latifolia L.
 collina schousb. maroc. }
 fruticosa vent. ch. de pl. }
 tenella s. reg. }
 lysimachia tenella L. }

LYSIMACHIA

- vulgaris L.
 ephemerum L.
 orientalis Encycl. }
 atropurpurea murray. goett. }
 thyrsoflora L.
 verticillata marsch. cauc.
 punctata L.
 ciliata L.
 nemorum L.
 nummularia L.
 linum-stellatum L.

HOTTONIA

- palustris L.

CORIS

- monspeliensis L.

LIMOSELLA

- aquatica L.

TRIENTALIS

- europæa L.

ARETIA

- vitaliana s. reg.

ANDROSACE

- maxima L.
 septentrionalis L.
 elongata s. reg.
 lactea L.
 carnea L.
 villosa L.

PRIMULA

- veris L.
 elatior willd. sp.
 — acaulis.
 perreiniana Flugge. Ann.
 auricula L.

MOUÛON

- des champs. F. ◉
 — bleu.
 de Monelli. esp. ◉
 à larges feuilles. esp. ◉
 arbrisseau. barbarie. or. ♀
 rampant. F. ♀

LYSIMACHIE

- commune. F. ♀ (méd.)
 éphémère. esp. ♀
 d'Orient. or. ♂
 en thyrse. F. ♀
 verticillée. caucase. ♀
 ponctuée. F. ♀
 ciliée. Am. s. ♀
 des bois. F. ♂
 nummulaire. F. ♂
 lin-étoilé. F. ◉

HOTTONIA

- des marais. F. ♀

CORIS

- de Montpellier. F. m. or. ♂

LIMOSELLE

- aquatique. F. ◉

TRIENTALIS

- d'Europe. F. Alpes. ♀

ARETIA

- des Alpes. F. ♀

ANDROSACÉ

- à grand calice. F. ◉
 du Nord. russie. ◉
 à longs pédoncules. F. ◉
 blanc. Alpes. ♀
 couleur de chair. Alpes. ♀
 velu. Alpes. ♀

PRIMEVÈRE

- commune. F. ♀ (orn.)
 élevée. F. ♀
 — sans tige.
 de perrein. ♂ (orn.)
 oreille-d'ours. Alp. ♂ (orn.)

marginata willd. sp.
farinosa L.
viscosa All. ped.
integrifolia L.
villosa Jacq. Aust. suppl.
auriculata Encycl.
cortusoides willd. sp.

CORTUSA

matthioli L.

SOLDANELLA

alpina L.

DODECATHÉON

meadia L.

CYCLAMEN

europæum L.
hederæfolium H. K.

Genera Lysimachiiis affinia.

GLOBULARIA

alypum L.
longifolia H. K. }
salicina Encycl. }
vulgaris L.
nudicaulis L.
cordifolia L.

SAMOLUS

valerandi L.

UTRICULARIA

vulgaris L.
minor Smith. Fl.

PINGUICULA

vulgaris L.

MENYANTHES

trifoliata L.

ORDO II.**PEDICULARES.**

I. Stamina 2 aut plura non didynama.

POLYGALA.

I. Cristata.

vulgaris L.

bordée. suisse. ψ
farineuse. Alpes. ζ
visqueuse. Alpes. ζ
à feuilles entières. Alpes. ψ
velue. Alpes. ψ
auriculée. orient. or. ζ
à feuilles de cortusa. sibér. ζ

CORTUSA

de Matthiöle. Alpes. ψ

SOLDANELLE

des Alpes. ζ

DODÉCATHÉON

méadia. Am. s. ζ (orn.)

CYCLAMEN

d'Europe. F. m. ψ (orn.)
à f. de lierre. Italie. ζ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Lysimachies.

GLOBULAIRE

alypum. F. m. or. ψ
à long. feuilles. madère. or. ψ
commune. F. ψ
à tige nue. Alpes. ψ
à feuilles en cœur. Alpes. ζ

SAMOLUS

mouron-d'eau. F. ⊙

UTRICULAIRE

commune. F. ψ
grêle. F. ζ

GRASSETTE

commune. F. ψ

MÉNYANTHE

trèfle-d'eau. F. ψ (méd.)

ORDRE II.**PÉDICULAIRES.**

I. 2 ou plusieurs étamines non didynames.

POLYGALA.

I. Fleurs barbues.

commun. F. ψ

amara L.
monspeliaca L.
austriaca crantz. Austr.
myrtifolia L.
oppositifolia L. *Mant.*
cordifolia willd. sp.

2. *Imberbes.*

chamæbuxus L.
heisteria L.

amer. F. L
de Montpellier. ☉
d'Autriche. F. ☉
à feuilles de Myrte. cap. or. h
à feuilles opposées. cap. or. h
à feuilles en cœur. cap. or. h

2. Fleurs sans barbes.

à feuilles de Buis. F. h
d'heister. cap. or. h

VERONICA.

VÉRONIQUE.

1. *Spicata.*

gentianoides vahl. sp.
virginiana L.
spuria L.
maritima L.
longifolia L.
elator.
incana L.
spicata L.
hybrida L.
pinnata willd. sp.
incisa willd. sp.

2. *Corymboso-racemosa.*

officinalis L.
bellidioides L.
fruticulosa L.
alpina L.
decussata willd. sp.
serpyllifolia L.
beccabunga L.
anagallis L.
scutellata L.
teucrium L.
prostrata L.
chamædrys L.
latifolia L.
melissæfolia Encycl.
urticæfolia Jacq. Austr.
montana L. f.
multifida L.
austriaca L.
nitida.
orientalis vahl. sp.

1. Fleurs en épi.

à f. de gentiane. orient. L
de Virginie. L
à feuilles ternées. sibiérie. L
maritime. Eur. L
à longues feuilles. suisse. L
élevée. L
blanche. Russie. L
à épis. F. L
hybride. suède. L
pennée. sibiérie. L
incisée. sibiérie. L

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. L (méd.)
à f. de paquerette. Alpes. L
fruticuleuse. Alpes. h
des Alpes. F. L
croisette. Magellan. h
à feuilles de serpolet. F. L
Beccabunga. F. L (méd.)
Anagallis. F. ☉ (méd.)
à feuilles linéaires. F. L
à feuil. de Germandrée. F. L
couchée. F. L
chamædrys. F. L
à larges feuilles. F. L
à feuilles de mélisse. L
à feuilles d'ortie. F. L
des montagnes. F. L
découpée. sibiérie. L
d'Autriche. L
luisante. L
d'Orient. L

3. *Pedunculis unifloris.*

persica.
agreslis L.
arvensis L.
hederæfolia L.
triphyllus L.
verna L.
romana L.
peregrina vahl. sp. }
præcox vahl. sp.
acinifolia vahl. sp.
digitata vahl. sp.
chamæpithyoides Lamk. ill. }

SIBTHORPIA

europæa L.
africana L.

DISANDRA

prostrata L. f.

II. *Stamina 4 didynamæ.*

ERINUS

alpinus L.

MANULEA

oppositifolia Vent. Malm.
alternifolia.

EUPHRASIA

officinalis L.
odontites L.

PEDICULARIS

palustris L.
sylvatica L.

RHINANTHUS

crista-galli L.
hirsuta.

MELAMPYRUM

arvense L.
cristatum L.
pratense L.
sylvaticum L.

OROBANCHE

major Smith. fl.
caryophyllacea Smith. Soc. Lin.
minor Smith. fl.
ramosa L.

3. Pédoncules à une fleur.

de Perse. ☉
agreste. F. ☉
des champs. F. ☉
à feuilles de Lierre. F. ☉
à trois feuilles. F. ☉
printanière. F. ☉
romaine. F. ☉
précoce. F. ☉
à feuilles d'Acinos. F. ☉
digitée. F. m. ☉

SIBTHORPIA

d'Europe. F. ℥
d'Afrique. cap. or. ψ

DISANDRA

couchée: madère. or. ψ

II. 4. étamines didynames.

ERINUS

des Alpes. ψ

MANULEA

à feuilles opposées. cap. or. ψ
à feuell. altern. N. Holl. or. ψ

EUFRAISE

officinale. F. ☉ (méd.)
odontites. F. ☉

PÉDICULAIRE

des marais. F. ℥
des bois. F. ψ

COCRÊTE

crête-de-coq. F. ☉
velu. F. ☉

MELAMPYRUM

des champs. F. ☉
à crête. F. ☉
des prés. F. ☉
des bois. F. ☉

OROBANCHE

élevée. F. ψ
odorante. F. ψ
petite. F. ψ
rancuse. F. ψ

LATHRÆA

clandestina L.

CLANDESTINE

commune. F. L.

ORDO III.

ACANTHÆÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BARLERIA

prionitis L.

gentianoides.

eranthemum flavum Willd.

Enum. suppl.

ACHANTHUS

mollis L.

spinosus L.

spinosissimus Pers. syn.

RUELLIA

blechum L.

strepens L.

varians Vent. H. cels.

eranthemum pulchellum

Andr. rep.

ovata Cav. Ic.

lactea Cav. Ic.

patula Jacq. Ic.

tuberosa L.

II. Stamina 2.

JUSTICIA.

1. Fruticosa.

Adhatoda L.

hyssopifolia L.

orchioïdes L. f.

spinosa Jacq. Amer.

paniculata Vahl. sp.

nasuta L.

bracteolata Jacq. Ic.

coccinea Smith. pict.

pulcherrima Jacq. Ic.

formosa Willd. Enum.

lucida H. K.

cristata Jacq. H. sch.

infundibuliformis L.

ecbolum L.

ORDRE III.

ACANTHÉES.

I. 4 étamines didynames.

BARLERIA

prionitis. inde. s. ch. ♀

à fleurs de gentiane. s. ch. ♀

ACANTHE

branche-ursine. ital. L (méd.)

épineuse. italie. L

hérissée. P

RUELLIA

blechum. Antilles. s. ch. L

élastique. virginie. or. L

bleu. inde. s. ch. ♀

ovale. Mexique. s. ch. L

blanc. Mexique. s. ch. P

étalé. inde. s. ch. ♀

tubéreux. Antilles. s. ch. L

II. 2 étamines.

CARMANTINE.

1. Tiges ligneuses.

Adhatoda. ceylan. or. ♀ (orn.)

à f. d'hysope. canar. or. ♀

à fleurs d'orchis. cap. or. ♀

épineuse. Antilles. s. ch. ♀

paniculée. inde. s. ch. ♀

tubulée. inde. s. ch. ♀

bractéolée. caracas. s. ch. ♀

écarlate. caïenne. s. ch. ♀

mouchetée. am. m. s. ch. ♀

élégante. s. ch. ♀

luisante. s. ch. ♀

à crêtes. s. ch. ♀

infundibuliform. inde. s. ch. ♀

ecbolum. inde. s. ch. ♀

Gendarussa L. f.
quadrifida Vahl. sp. }
coccinea Cav. ic. }
resupitana Vahl. sp.
sexangularis Cav. ic. }
Dicliptera resupinata Juss. }
Ann.
bicaliculata Vahl. sp. }
ligulata Cav. ic. }
Dianthera malabarica L. f. }

2. *Herbaceæ.*

furcata Jacq. H. sch. }
peruviana Cav. ic. }
ciliaris L. f.
lithospermifolia Jacq. H. sch. }
ladanoides Lamk. ill. }

ORDO IV.

J A S M I N E Æ.

I. *Fructus capsularis.*

SYRINGA

vulgaris L.
persica L.
 — *laciniata*.

FRAXINUS

excelsior.
 — *argentea*.
 — *verrucosa*.
 — *jaspidea*.
 — *horizontalis*.
 — *pendula*.
rotundifolia Encycl.
lentiscifolia. }
parvifolia Encycl. }
monophylla Vahl. sp.
ornus L.
pubescens Encycl.
americana L.
juglandifolia Encycl.
sambucifolia Encycl.
quadrangulata Mich. fl.
platicarpa Mich. fl.
nana Duham. Arb. Ed. n.
atrovirens Duham. Arb. Ed. n.

Gendarussa. inde. s. ch. ♀
quadrifide. N. Esp. s. ch. ♀

à fl. renversées. N. Esp. s. ch. ♀

caliculée. inde. s. ch. ♀

2. Tiges herbacées.

fourchue. Pérou. ☞

ciliée. Ceylan. ☉

à feuilles de greuil. Pérou. ☉

O R D R E I V.

J A S M I N É E S.

I. Une capsule.

LILAS

commun. Asie. ♀ (orn.)
de Perse. ♀ (orn.)
 — *lacinié*.

FRÉNE

élevé. F. ♀
 — *argenté*.
 — *graveleux*.
 — *jaspé*.
 — *horizontal*.
 — *pleureur*.
 à feuilles rondes. Italie. ♀
 à f. de lentisque. Orient. ♀
 à une feuille. Am. s. ♀
 à fleurs. Italie. ♀
pubescent. Am. s. ♀
d'Amérique. ♀
 à feuilles de Noyer. Am. s. ♀
 à feuilles de sureau. Am. s. ♀
quadrangulaire. Am. s. ♀
 à fruit large. Am. s. ♀
nain. Am. s. ♀
vert-ombre. Am. s. ♀

FONTANESIA

phillyreoides Bill. Decad.

• FONTANESIA

à feuilles de Filaria. Asie. ♀
(orn.)

II. Fructus baccatus.

II. Une baie.

CHIONANTHUS

virginica Z.

CHIONANTE

de Virginie. ♀ (orn.)

OLEA

europæa Z.

— buxifolia.

undulata Jacq. H. Sch.

divaricata.

capensis Z.

americana L. Mant.

excelsa Vahl. symb.

fragrans Thunb. Jap.

emarginata Lamk. ill.

OLIVIER

cultivé. F. m. ♀ (écon.)

— à feuilles de buis.

ondulé. cap. or. ♀

étalé. or. ♀

du Cap. or. ♀

d'Amérique. or. ♀

élevé. canaries. or. ♀

odorant. Japon. or. ♀ (écon.)

échancré. Madagascar. s. ch. ♀

NOTELÆA

longifolia Vent. ch. de pl.

rigida.

NOTÉLÆA

à long. feuilles. N. Holl. or. ♀

à feuil. roides. N. Holl. or. ♀

PHILLYREA

angustifolia Z.

media Z.

latifolia Z.

— lævis.

FILARIA

à feuilles étroites. F. m. ♀

moyen. F. m. ♀ (orn.)

à larges feuilles. F. m. ♀ (orn.)

— lisse.

JOCORUM

sambac.

nyctanthes sambac Z.

jasminum sambac Vahl. sp. }

MOGORI

Jasmin d'Arabie. s. ch. ♀

(orn.)

JASMINUM

glaucum L. f.

simplicifolium Vahl. sp.

JASMIN

glauque. cap. or. ♀

à feuilles simples. île des Amis.

s. ch. ♀

à fleurs nombreuses. s. ch. ♀

cytise. F. m. ♀ (orn.)

d'Italie. or. ♀ (orn.)

jonquille. madère. or. ♀ (orn.)

des Açores. or. ♀ (orn.)

sarmenteux. inde. s. ch. ♀

(orn.)

de l'île de France. s. ch. ♀

officinal. inde. ♀ (orn.)

à grandes fleurs. inde. or. ♀

multiflorum Andr. rep. }

hirsutum H. K.

fruticans Z.

humile L.

odoratissimum Z.

azoricum L.

volubile Jacq. H. Sch.

mauritianum.

officinale L.

grandiflorum Z.

LIGUSTRUM

vulgare L.
japonicum Thunb. Jap.
lucidum H. K.

TROËNE

commun. F. 5 (orn.)
du Japon. or. 5
luisant. chine or. 5

O R D O V.

VITICEÆ.

I. Flores oppositè corymbosi.

CLERODENDRUM

viscosum Vent. Malm. }
infortunatum L. ? }
phlomis Vahl. symb.

siphonanthus H. K. }
siphonanthus indica L. }
ovieda mitis L.

VOLKAMERIA

tomentosa Vent. Malm.
aculeata L.
inermis L.
angustifolia Encycl.

ligustrina Jacq. coll.
japonica Jacq. H. Sch.
clerodendrum fragrans Willd. }
Enum.

ÆGIPHILA

martinicensis L. Mant.
macrophylla (an generis?).

VITEX

agnus-castus L.
— albidus.
incisa Encycl.
— alba.

CALLICARPA

americana L.
cana Vahl. symb.
tomentosa Willd. Enum.

CORNUTIA

pyramidata L.
hosta cœrulea Jacq. H. Sch. }

O R D R E V.

GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbe et opposées.

CLÉRODENDRUM

visqueux. inde. s. ch. 5
à feuilles de phlomis. inde.
s. ch. 5

à longues fl. inde. s. ch. 5

VOLKAMÉRIA

cotonneux. s. ch. 5
épineux. Antilles. s. ch. 5
sans épines. inde. s. ch. 5
à feuilles étroit. île de France.
s. ch. 5
à f. de Troëne. île de Fr. s. ch. 5
du Japon. s. ch. 5 (orn.)

ÈGIPHILA

de la Martinique. s. ch. 5
à grand. f. Antilles. s. ch. 5

VITEX

agnus-castus. F. m. 5 (méd.)
— blanc.
incisé. chine. 5 (orn.)
— blanc.

CALLICARPA

d'Amérique. Am. s. or. 5
blanc. inde. s. ch. 5
cotonneux. s. ch. 5

CORNUTIA

pyramidal. Antilles. s. ch. 5

II. Flores racemosi in racemis alterni.

CITHAREXYLUM

- villosum *Willd. sp.*
 tomentosum *Encycl. suppl.* }
 quadrangulare *s. reg.*
 coriaceum.
 pentandrum *vent. H. cels.*

DURANTA

- plumiéri *L.*
 ellisia *L.*
 microphylla.

LANTANA

- trifolia *L.*
 annua *L.*
 involucrata *L.*
 recta *H. K.*
 salvifolia *Jacq. H. sch. (non Lin.)*
 violacea.
 cinerea *Encycl.*
 nivea *vent. Malm.*
 suaveolens.
 camara *L.*
 aculeata *L.*
 — flava.

SPIELMANNIA

- africana *Willd. sp.* }
 Lantana africana *L.* }

ZAPPANIA

- globifera.
 verbenaglobifera *Her. stirp.* }
 odoratissima *scop. insubr.* }
 nodiflora *pers. syn.* }
 verbenanodiflora *L.* }

PRIVA

- mexicana *pers. syn.* }
 verbenamexicana *L.* }

STACHYTARPHETA

- angustifolia *Vahl. sp.*
 verbenaindica *Jacq. obs.* }
 (non *Lin.*). }
 mutabilis *Vahl. sp.*
 verbenamutabilis *Jacq. ic.* }
 jamaicensis *Vahl. sp.* }
 verbenajamaicensis *L.* }

II. Fleurs alternes en grappes

BOIS-GUITARE

- velu. Antilles. s. ch. ♀
 quadrangulaire. Antill. s. ch. ♀
 coriace. s. ch. ♀
 à 5 étamines. Antill. s. ch. ♀

DURANTA

- de Plumier. Antilles. s. ch. ♀
 lancéolé. Antilles. s. ch. ♀
 à petites feuell. Antill. s. ch. ♀

LANTANA

- à feuilles ternées. Ant. s. ch. ♀
 annuel. Antilles. ☉
 à involucre. Antilles. s. ch. ♀
 à tige droite. Antill. s. ch. ♀
 à feuell. de sauge. cap. or. ♀
 violet. s. ch. ♀
 cendré. Antilles. s. ch. ♀
 à fleurs blanch. inde. s. ch. ♀
 odorant. s. ch. ♀
 camara. Antilles. s. ch. ♀
 épineux. Antilles. s. ch. ♀
 — jaune.

SPIELMANNE

- d'Afrique. cap. or. ♀

ZAPPANIA

- globuleux. Antilles. s. ch. ♀
 nodiflore. F. m. or. ☿

PRIVA

- du Mexique. s. ch. ☿

STACHYTARPHETA

- à feuilles étroites. Am. m. ☉
 changeant. Chili. s. ch. ♀
 de la Jamaïque. s. ch. ♀

VERBENA

triphylla *l'her. stirp.*
 multifida *Fl. per.* }
 erinoides *Lamk. ill.* }
 Aubletia *L. f.*
 urticæfolia *L.*
 carolina *L.*
 stricta *vent. n. cels.* }
 rigens *Mich. fl.* }
 paniculata *Lamk. ill.*
 diffusa.
 hastata *L.*
 bonariensis *L.*
 bracteosa *Mich. fl.*
 officinalis *L.*
 supina *L.*

SELAGO

corymbosa *L.*

HEBENSTRETIA

dentata *L.*

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 fertilia.

LYCOPUS

europæus *L.*
 exaltatus *L. f.*

AMETHYSTEA

cœrulea *L.*

ZIZIPHORA

capitata *L.*
 tenuior *L.*
 cunila. }
 cunila capitata *L. f.* }
 pulegioides }
 cunila pulegioides *L.* }
 mariana. }
 cunila mariana *s. veg.* }

MONARDA

fistulosa *L.*
 didyma *L.*
 violacea. }
 clinopodia *L. ?* }
 punctata *s. veg.*

VERVEINE

à trois *f. chili. or. 5* (orn.)

laciniée. Pérou. ☉

à bouquets. caroline. or. ♂

à feuilles d'ortie. Am. s. 7
de Caroline. 7

fasciculée. Am. s. 7

paniculée. Am. s. 7

étalée. or. 5

hastée. Am. s. 7

de Buénos-Ayres. or. ♂

à longues bractées. Am. s. ☉

officinale. F. 7 (méd.)

couchée. F. ☉

SÉLAGO

corymbifère. cap. or. 5

HEBENSTRETIA

denté. cap. or. ♂

ORDRE VI.

LABIÉES.

I. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS

d'Europe. F. 7
 pinnatifide. Italie. 7

AMÉTHYSTÉE

bleu. Sibérie. ☉

ZIZIPHORA

à fleurs en tête. orient. ☉

lancéolé. orient. ☉

cunila. Sibérie.

à feuell. de pouliot. Canada. ☉

de Virginie. Am. s. 7

MONARDA

fistuleux. Am. s. 7 (orn.)

écarlate. Am. s. 7 (orn.)

violet. Am. s. 7

ponctué. Am. s. 7

WESTERINGIA
rosmarinifolia Andr. rep.

ROSMARINUS
officinalis L.

SALVIA.

1. Fruticosa.

pomifera L.
officinalis L.
— tricolor.
— variegata.
tenuior.
grandiflora Vahl. sp.
cretica L.
syriaca Lamk. ill. }
triloba L. f. ? }
africana L.
paniculata L. Mant.
chamaedryoides Cav. ic.
aurea L.
interrupta Schousb. Mar.
canariensis L.
mexicana L.
formosa L'Her. stirp. }
leonuroides Vahl. sp. }
polystachya Cav. ic.
melissæfolia.
scorodoniæfolia.
lamiifolia Jacq. H. Sch.
leucantha Cav. ic.
foetida Desf. Atl. }
tingitana Willd. sp. }
coccinea L. f.
pseudo-coccinea Jacq. ic.
diserms L.

2. Caule herbaceo.

pulchella Dec. Cat.
pinnata L.
azurea Vahl. sp. }
acuminata Vent. H. Cels. }
angustifolia Mich. Fl. }
reptans Jacq. H. Sch. }
angustifolia Cav. ic. }
scabiosæfolia Lamk., Journ. }
d'Hist. nat. }
habliziana Willd. sp. }

WESTERINGIA
à f. de romarin, N. Holl. or. ♀

ROMARIN
officinal. F. ♀ (méd. orn.)

SAUGE.

1. Tiges ligneuses.

pomifère. Crète. or. ♀
officinale. F. m. ♀
— de trois couleurs.
— panachée.
de Catalogne. F. m. ♀
à grandes fleurs. orient. ♀
de Crète. ♀
du mont Syriac. or. ♀
d'Afrique. cap. or. ♀
paniculée. cap. or. ♀
chamaedrys. Mexique. or. ♀
dorée. cap. or. ♀
interrompue. Maroc. or. ♀
des Canaries. or. ♀
du Mexique. or. ♀
écarlate. Pérou. s. ch. ♀
à plusieurs épis. Mexiq. or. ♀
à feuilles de mélisse. or. ♀
à feuil. de scorodonia. or. ♀
à feuilles de Lamium. or. ♀
à fleurs blanch. Mexiq. or. ♀
fétide. Alger. or. ♀
rouge. Floride. or. ♀
fausse écarlate. Ant. s. ch. ♀
diserms. Syrie. or. ♀

2. Tige herbacée.

élégante. or. ♂
pennée. orient. or. ♂
azurée. Caroline. or. ♂
rampante. N. Esp. s. ch. ♂
à f. de scabieuse. orient. or. ♂

glutinosa L.
amarissima *Vahl. sp.* }
circinata *Cav. Ic.* }
pratensis L.
sclarea L.
patula *Desf. Atl.*
præcox. }
spinosa *Jacq. Ic.* }
Æthiopis L.
austriaca *Jacq. Austr.*
argentea L.
phlomoïdes *Vahl. sp.*
indica L.
bicolor *Desf. Atl.* }
crassifolia *Jacq. Frag.* }
ceratophylla L.
ceratophylloïdes L. *Mant.*
runcinata L. *f.*
clandestina *Encycl. (non L.)*
erosa.
sylvestris L.
nemorosa L.
virgata *Jacq. Hort.*
gigantea.
nubia *Vahl. sp.*
nilotica L. *f.*
viscosa *Jacq. Ic.*
verticillata L.
napifolia *Jacq. Hort.*
ægyptiaca L.
horminum L.
— *rubens.*
viridis L.
nepetifolia.
lanceolata.
verbenaca L.
micrantha.
serotina L. *Mant.*
dominica L.
hispanica L.
tiliæfolia *Vahl. sp.*
nutans L. ?
pendula. }
nutans *Wald. et Kitt. Hung.* }

COLLINSONIA
canadensis L.

gluante. Alpes. ☞
amère. Mexique. or. ☞
des prés. F. ☞ (méd.)
sclarée. F. ♂ (méd.)
étalée. Barbarie. or. ♂
précocce. orient. ☉
cotonneuse. orient. ♂
d'Autriche. ☞
argentée. orient. or. ♂
phlomoïde. esp. or. ☞
des Indes. ☞
bicolore. Alger. ☞ (orn.)
corne-de-cerf. syrie. or. ♂
laciniée. sicile. or. ♂
pinnatifide. cap. or. ☞
clandestine. Italie. ♂
rongée. ☉
sauvage. Allem. ☞
des bois. Autriche. ☞
effilée. orient. ☞
gigantesque. ♂
de Nubie. ☉
du Nil. ☉
visqueuse. Italie. ☞
verticillée. F. m. ☞
à feuilles de Navet. F. ☞
d'Égypte. or. ☞
ormin. F. m. ☉
— *rouge.*
verte. Barbarie. ☉
à feuilles de cataire. ☉
lancéolée. ☉
verveine. F. ♂
à petites fleurs. ♂
tardive. orient. ♂
des Antilles. s. ch. ☞
d'Espagne. ☉
à feuilles de tilleul. Pérou. ☉
penchée. Russie. ☞
pendante. Russie. ☞

COLLINSONIA
de Canada. ☞

II. *Stamina 4 didynama , labium superius nullum aut brevissimum.*

II. 4 étamines didynames, lèvre supérieure nulle ou presque nulle.

ARUGA

orientalis L.
genevensis L.
pyramidalis L.
reptans L.

TEUCRIUM

canariense *Encycl.*
heterophyllum *willd. sp.* }
fruticans L.
rosmarinifolium *Encycl.*
betonicum *l'Her. stirp.* }
canescens *Forst. Goett.* }
maderiense *Encycl.* }
abutiloides *l'Her. stirp.*
campanulatum L.
orientale L.
resupinatum *Desf. Atl.*
chamæpitys L.
pseudo-chamæpitys L.
iva L.
Laxmanni *s. Veg.*
botrys L.
cubense L. *Mant.*
flavum L.
lucidum L.
chamædrys L.
— major.
myrtiflorum.
marum L.
multifolium L.
canadense L.
hyrcanicum L.
massiliense L.
asiaticum L. *Mant.*
scorodonia L.
scordium L.
montanum L.
pyrenaicum L.
aureum *Schreb. Vert.* }
flavicans *Encycl.* }
polium L.
capitatum L.
spinosum L.

BUGLE

d'Orient. or. ☞
de Genève. F. ☞
pyramidale. F. ☞
rampante. F. ☞

GERMANDRÉE

des Canaries. or. ♀
arbrisseau. F. m. or. ♀
à f. de romarin. orient. or. ♀
à f. de Bétoine. canar. or. ♀
à f. d'Abutilon. canar. or. ♀
campanulée. orient. ☞
d'Orient. or. ☞
renversée. Alger. or. ☞
chamæpitys. F. ☉ (méd.)
faux chamæpitys. barb. or. ☞
ivette. F. m. or (méd.)
de Laxmann. sibérie. ♂
botrys. F. ☉ (méd.)
de Cuba. s. ch. ☞
jaune. esp. ♀
luisante. F. m. ♀
chamædrys. F. ♀ (méd.)
— élevé.
à feuell. de Myrte. orient. or. ♀
marum. esp. or. ♀ (méd.)
à fleurs nombr. esp. or. ♀
de Canada. ☞
d'Hyrcanie. ☞
de Marseille. or. ♀
d'Asie. or. ♀
des bois. F. ☞ (méd.)
scordium. F. ☞ (méd.)
de montagne. F. m. or. ♀
des Pyrénées. F. ☞
jaunâtre. F. m. or. ♀
polium. F. m. or. ♀
à fleurs en tête. esp. or. ♀
épineuse. esp. ♂

III. *Stamina 4 didynama, corolla bilabiata.*

III. 4 étamines didynames, corolle à deux lèvres.

SATUREIA

- græca* L.
juliana L.
capitata L.
thymbra L.
montana L.
hortensis L.

HYSSOPUS

- officinalis* L.
 — *myrtifolius*.
angustifolius Marsch. cauc.
Lophanthus L.
nepetoides L.
scrophulariaefolius Willd. sp.
ocimifolius Encycl.
Mentha patrini Pallas. n. Act.
petr.
Mentha ovata Cav. Ic.
Elsholtzia cristata Willd. En. }

NEPETA

- cataria* L.
pannonica L.
marrubioides Willd. Enum.
incana Willd. sp.
nepetella L.
amethystina.
longiflora Vent. H. cels.
nuda L.
 — *alba*.
violacea L.
crispa Willd. sp.
italica L.
reticulata Desf. Atl.
tuberosa L.
bipinnata Cav. Ic.
botryoides Willd. sp.
multifida L. f. (non L. sp.) }
multifida L. }
lavendulacea L. f. }

PERILLA

- ocimoides* S. reg.

LAVANDULA

- spica* L.
latifolia.

SARRIETTE

- de Græc. or.* ℥
à feuell. linéair. orient. or. ℥
à fleurs en tête. orient. or. ♀
Thymbra. orient. or. ♀
de montagne. F. ♀
des jardins. F. ☉ (écon. méd.)

HYSOPE

- officinal.* F. ♀ (méd.)
 — *à feuilles de Myrte.*
à feuilles étroites. ibérie. ♀
à st. renversées. chine. or. ℥
à feuell. de cataire. Am. s. ℥
à f. de scrophulaire. canad. ℥

à grandes bractées. sibér. ☉

CATAIRE

- herbe-aux-chats. F.* ℥ (méd.)
paniculée. Hongrie. ℥
à feuilles de Marrube. ℥
blanche. orient. ℥
à feuilles étroites. F. ℥
améthyste. ℥
à longues fleurs. orient. or. ♥
nue. suisse. ℥
 — *à fleurs blanches.*
violette. esp. ℥
crépue. orient. or. ℥
d'Italie. ℥
rétilulée. barbarie. ♥
tubéreuse. esp. ℥

bipennée. sibérie. ☉

laciniée. russie. ℥

PÉRILLA

à feuell. de basilic. inde. ☉

LAVANDE

- spic. F. m.* ♀ (orn. méd.)
à larges feuilles. or. ♀

stæchas L.
heterophylla.
dentata L.
multifida L.
pinnata willd. sp.
elegans,
abrotanoides willd. sp. }

stêchas. F. m. or. 5 (méd.)
à feuilles variables. or. 5
dentée. Esp. or. 5
découpée. barbarie. ☉
pennée. madère. or. 5
élégante. canaries. or. 5

SIDERITIS.

1. Ebracteata.

cretica L.
candicans willd. sp.
canariensis L.
montana L.
romana L.
nigricans Encycl. }
elegans willd. sp. }

2. Bracteata bracteis integris.

syriaca L.
perfoliata L.

3. Bracteata bracteis dentatis.

hirsuta L. (exclus. syn. Bau-
hini.)
fœtida.
scordioides L.
hyssopifolia L.
incana L.

SIDÉRITIS.

1. Fleurs sans bractées.

de Crète. or. 5
blanchâtre. madère. or. 5
des Canaries. or. 5
des montagnes. F. ☉
de Rome. F. m. ☉
noirâtre. ☉

2. Fleurs accompagnées de bractées entières.

de Syrie. or. 5
perfolié. orient. or. 7

3. Bractées dentées.

velu. F. 5
fétide. Esp. 5
à feuilles de scordium. F. 7
à feuilles d'hysope. F. 5
blanc. Esp. or. 5

BISTROPOGON

canariense l'her. sert.
punctatum l'her. sert.

BISTROPOGON

des Canaries. or. 5
ponctué. canaries. or. 5

MENTHA.

1. Spicata.

lavandulæfolia.
sylvestris L.
viridis L.
rotundifolia L.
crispa L.
piperita L.

2. Capitata.

aquatica L.
citrata willd. sp.

MENTHE.

1. Fleurs en épis.

à feuilles de lavande. or. 7
sauvage. F. 7 (méd.)
verte. F. 7
ronde. F. 7
crépue. F. 7
poivrée. angleterre. 7 (méd.)

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. 7
citronnelle. europe. 7

3. *Verticillatæ.*

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS

capitata Jacq. *ic.*

GLECOMA

hederacea L.
hirsuta Wald. et Kitt. *Hung. ?*

LAMIUM

orvala L.
hirsutum *Encycl.*
maculatum L.
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album L.
molle H. K.

GALEOPSIS

tetrahit L.
ladanum L.
villosa Smith. *Fl.*
grandiflora Willd. *sp.* }
versicolor Smith. *Fl.* }

GALEOBDOLON

luteum Smith. *Fl.*
Leonurus galeobdolon Willd. }
sp. }
galeopsis galeobdolon L.

BETONICA

officinalis L.
hirsuta L. *Mant.*
orientalis L.
grandiflora Willd. *sp.*
alopecuros L.

STACHYS

sylvatica L.
palustris L.
coccinea Jacq. H. Sch.
lanata Jacq. *ic.*
germanica L.
intermedia Willd. *sp.*

3. Fleurs verticillées.

cultivée. Eur. Ψ (méd.)
purpurine. Eur. $\mathcal{L}$ (méd.)
des champs. F. $\mathcal{L}$ (méd.)
pouliot. F. Ψ (méd.)
fétide. F. $\mathcal{L}$

HYPTIS

à fleurs en tête. Antill. s. ch. $\mathcal{L}$

GLÉCOMA

lierre terrestre. F. Ψ (méd.)
velu. F. $\mathcal{L}$

LAMIUM

orvale. Italie. Ψ
velu. F. Ψ
maculé. F. $\mathcal{L}$
à feuilles de cataire. Italie. Ψ
pourpre. F. $\odot$
amplexicaule. F. $\odot$
blanc. F. $\mathcal{L}$ (méd.)
à feuilles entières. Ψ

GALEOPSIS

tétrahit. F. $\odot$
ladanum. F. $\odot$
velu. F. $\odot$
à grandes fleurs. F. $\odot$

GALEOBDOLON

à fleurs jaunes. F. Ψ

BÉTOINE

officinale. F. $\mathcal{L}$ (méd.)
velue. F. Ψ
d'Orient. $\mathcal{L}$
à grandes fleurs. orient. $\mathcal{L}$
jaune. Alpes. $\mathcal{L}$

STACHYS

des bois. F. $\mathcal{L}$
des marais. F. $\mathcal{L}$
écarlate. Mexique. or. Ψ
laineux. Sibérie. Ψ
cotonneux. F. Ψ
intermédiaire. Ψ

scordioïdes.
 palestina L.
 alpina L.
 circinata *Vher. stirp.*
 nepetifolia.
 hirta L.
 glutinosa L.
 mollissima *Willd. Enum.*
 arvensis L.
 recta L. *Mant.*
 purpurea.
 annua L.
 maritima L. *Mant.*

BALLOTA

lanata L.
 nigra L.

MARRUBIUM.

1. *Calicibus quinquedentatis.*
 Alysson L.
 peregrinum L.
 candidissimum L.
 supinum L.
 rugosum.
 astracanicum *Marsch. cauc.*
2. *Calicibus decemdentatis.*
 vulgare L.
 crispum L.
 pseudo-dictamnus L.
 hispanicum *Encycl. (non L.)*

LEONURUS

marrubiastrum, L.
 sibiricus L.
 cardiaca L.
 crispus L.
 villosus.
 tataricus L.

PHLOMIS

fruticosa L.
 — angustifolia.
 — latifolia.
 italica *Smith. spicil.*
 purpurea *Smith. spicil.*
 lychnitis L.
 laciniata L.

à f. de scordium. maroc. or. ☞
 de Palestine. or. ☞
 des Alpes. ☞
 à feuilles rondes. barb. or. ☞
 à feuilles de cataire. or. ☞
 velu. F. ☞
 gluant. crête. or. ☞
 velouté. ☞
 des champs. F. ☉
 crapaudine. F. ☞
 pourpre. or. ☞
 annuel. F. ☉
 maritime. ☞

BALLOTE

laineux. sibérie. ☞
 noir. F. ☞

MARRUBE.

1. Calices à 5 dents.

Alysson. esp. or. ☞
 étranger. orient. ☞
 très-blanc. orient. ☞
 couché. F. m. or. ☞
 ridé. or. ☞
 d'Astracan. ☞

2. Calices à 10 dents.

commun. F. ☞ (méd.)
 crépu. Italie. or. ☞
 faux dictame. crête. or. ☞
 d'Espagne. ☞

CARDIAQUE

à petites fleurs. allem. ☉
 de Sibérie. ♂
 officinale. F. ☞ (méd.)
 crépue. sibérie. ☞
 velue. ☞
 de Tartarie. ♂

PHLOMIS

arbrisseau. sicile. ☞ (orn.)
 — à feuilles étroites.
 — à larges feuilles.
 d'Italie. or. ☞
 pourpre. esp. or. ☞
 à feuell. de sauge. F. m. or. ☞
 lacinié. syrie. ☞

herba-venti *L.*
 tuberosa *L.*
 Leonurus *L.*
 nepetifolia *L. f.*
 zeylanica *L.*
 caribæa *Jacq. ic.*
 martinicensis *Willd. sp.* }

MOLUCELLA

lævis *L.*
 spinosa *L.*

CLINOPODIUM

vulgare *L.*
 incanum *L.*

ORIGANUM

dictamnus *L.*
 vulgare *L.*
 humile.
 pallidum.
 smyrneum *L.*
 ægyptiacum *L.*
 majoranoides *Willd. sp.*

THYMUS

serpyllum *L.*
 — villosum.
 — citratum.
 piperella *s. veg.*
 vulgaris *L.*
 — latifolius.
 majoranæfolius.
 filiformis *Willd. sp.*
 zygis *L.*
 hispanicus.
 mastichina *L.*
 alpinus *L.*
 patavinus *Jacq. obs.*
 acinos *L.*
 virginicus *s. veg.*
 brachystemum virginicum }
Mich. fl.

THYMBRA

spicata *L.*

MELISSA

officinalis *L.*
 hirsuta.
 grandiflora *L.*

violet. *F. m.* ☞
 tubéreux. sibiérie. ☞ (orn.)
 Léonurus. cap. or. ☞ (orn.)
 à feuilles de cataire. inde. ☉
 de Ceylan. ☉
 des Antilles. ☉

MOLUCELLE

lisse. syrie. ☉
 épineuse. syrie. ☉

CLINOPODIUM

commun. *F.* ☞
 blanc. am. s. ☞

ORIGAN

dictame. crête. or. ☞ (orn.)
 commun. *F.* ☞ (méd.)
 nain. ☞
 pâle. orient. ☞
 de Smyrne. orient. or. ☞
 à coquilles. orient. or. ☞ (orn.)
 marjolaine. orient. or. ☞

THYM

serpolet. *F.* ☞ (méd.)
 — velu.
 — citronnelle.
 piperelle. esp. or. ☞
 commun. esp. ☞ (orn. méd.)
 — à larges feuilles.
 à feuilles de marjolaine. ☞
 filiforme. mahon. or. ☞
 zygis. esp. or. ☞
 d'Espagne. or. ☞
 mastichine. esp. or. ☞
 des Alpes. ☞
 de Padoue. or. ♂
 acinos. *F.* ☉
 de Virginie. ☞

THYMBRA

à épis. orient. or. ☞

MÉLISSE

officinale. *F.* ☞ (écon. méd.)
 velue. ☞
 à grandes fleurs. Alpes. ☞

nepeta *z.*
calamintha *z.*
cretica *z.*

DRACOCEPHALUM

virginianum *z.*

canariense *z.*
peregrinum *z.*
austriacum *z.*
nuysschiana *z.*
sibiricum *z.*
moldavica *z.*
canescens *z.*
pellatum *z.*
nutans *z.*
thymiflorum *z.*

MELITTIS

melissophyllum *z.*

HORMINUM

pyrenaicum *z.*
melissa pyrenaica *willd. sp.* }
virginicum *z.*
caulescens *ortega. dec.* }
lepechinia spicata *willd.* }
Enum.

PLECTRANTHUS

fruticosus *l'her. stirp.* }
germanea urticæfolia *encycl.* }
punctatus *l'her. stirp.* }
ocimum punctatum *l. f.* }
parviflorus *willd. Enum.*

OCIMUM

gratissimum *z.*
zeylanicum.
micranthum *willd. Enum.*
tenuiflorum *z.*
basilicum *z.*
— fimbriatum.
— bullatum.
minimum *z.*

CUTELLARIA

fruticosa.
lupulina *z.*
alpina *z.*
lateriflora *z.*

népéta. *f. z.*
calament. *f. z.*
de Crète. *or. z.*

DRACOCEPHALUM

de Virginie, ou cataleptique.
z. (orn.)
des Canaries. *or. z.*
découpé. sibérie. *z.*
d'Autriche. *z.*
à feuilles linéaires. sibérie. *z.*
de Sibérie. *z.*
moldavique. sibérie. *z.*
blanc. orient. *z.*
en bouclier. orient. *z.*
à fleurs penchées. sibérie. *z.*
à fleurs de Thym. sibérie. *z.*

MELITTIS

à feuilles de mélisse. *f. z.*

ORMIN

des Pyrénées. *z.*
de Virginie. *z.*
jaune. Mexique. *or. z.*

PLECTRANTHUS

arbrisseau. cap. *or. z.*
tacheté. Afr. *z.*
à petites fleurs. Pérou. *s. ch. z.*

BASILIC

suave. inde. *s. ch. z.*
de Ceylan. *s. ch. z.*
à fleurs menues. *z.*
à petites fleurs. inde. *z.*
cultivé. inde. *z. (orn.)*
— lacinié.
— bulleux.
nain. ceylan. *z.*

SCUTELLAIRE

arbrisseau. perse. *or. z.*
jaune-pâle. sibérie. *z.*
des Alpes. *z.*
à grappes. Am. *s. z.*

galericulata L.
minor L.
integrifolia L.
peregrina L.
altissima L.
albida L. *Mant.*

BRUNELLA

vulgaris L.
grandiflora Willd. *sp.*
laciniata L.
hyssopifolia L.
ovata.

CLEONIA

lusitanica L.

PRASIMUM

majus L.
minus L.

ORDO VII.**SCROPHULARIÆ.**

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA

globosa Lamk. *ill.*
salvifolia Willd. *sp.*
salicifolia Jacq. *H. sch.*

SCOPARIA

dulcis L.

CAPRARIA

biflora L.
lucida Willd. *sp.*

HALLERIA

lucida L.

SCROPHULARIA

nodosa L.
aquatica L.
betonicifolia L. *Mant.*
auriculata L.
altaica Willd. *sp.*
scorodonia L.
scopolii Pers. *syn.*
sambucifolia L.
mellifera Vahl. *ymb.*

Toque. F. ℥
petite. F. ℥
à feuilles entières. Am. s. ♀
étrangère. Italie. ♀
élevée. Orient. ♀
blanche. Orient. ♀

BRUNELLE

commune. F. ℥
à grandes fleurs. F. ♀ (orn.)
laciniée. F. ℥
à feuilles d'hysope. F. m. ℥
à feuilles ovales. Am. s. ♀

CLÉONIA

de Portugal. ☉

PRASIUM

arbrisseau. F. m. or. ♀
herbacé. Italie. or. ♀

ORDRE VII.**SCROPHULAIRES.**

I. 4 étamines didynames.

BUDLEIA

à globules. Chili. ♀
à feuell. de sauge. Cap. or. ♀
à feuell. de saule. Cap. or. ♀

SCOPARIA

doux. Antilles. ☉

CAPRARIA

à deux fleurs. Ant. s. ch. ♀
à feuilles luisantes. Cap. or. ℥

HALLÉRIA

luisant. Cap. or. ♀

SCROPHULAIRE

des bois. F. ♀ (méd.)
aquatique. F. ℥ (méd.)
à f. de Bétoine. Portug. or. ℥
auriculée. Barbarie. or. ♀
de Sibérie. ♀
scorodonia. Barbarie. or. ♀
de Scopolii. Carniole. ℥
à f. de sureau. Portug. or. ♀
mellifère. Barbarie. or. ℥

trifoliata L.
appendiculata Jacq. H. sch. }
orientalis L.
vernalis L.
peregrina L.
glabrata Jacq. H. sch.
lucida L.
chrysanthemifolia Willd. H. Ber.
verbenæfolia.

à trois folioles. Barbar. or. ☞
 d'Orient. ☞
 printanière. F. ♂
 étrangère. Italie or. ☞
 glabre. canaries. or. ♂
 luisante. orient. or. ☞
 à feuell. de chrysanthême. F. ☞
 à feuilles de verveine. ☞

DODARTIA

orientalis L.

DODARTIA

d'Orient. ☞

LINARIA (Antirrhinum L.).

1. *Foliis angulatis.*

cymbalaria Willd. Enum.
pilosa Willd. Enum.
elatine L.
spuria L.
cirrhuosa Willd. Enum.
ægyptiaca L.

1. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. F. ☞ (méd.)
velue. Alpes. ☞
élatiné. F. ☉
velvete. F. ☉
 à vrilles. Égypte. ☉
 d'Égypte. ☉

2. *Foliis inferioribus oppositis.*

triphylla Willd. Enum.
triornithophora Willd. Enum.
purpurea Willd. Enum.
bipartita Willd. Enum.
versicolor Willd. Enum.
repens Willd. Enum.
marginata Desf. Atl.
supina Willd. Enum.
arvensis L.
simplex Willd. Enum.
pelissieriana L.
multicaulis L.
junceæ Encycl.
antirrhinumsparteum Cav. Ic }
alpina Willd. Enum.
elegans.
organifolia Willd. Enum.
minor Willd. Enum.
littoralis Willd. Enum.
pubescens.

2. Feuilles inférieures opposées.

à feuilles ternées. Tunis. ☉
 à grand. fleurs. Portugal. ☉
 pourpre. F. ☞
 à fleurs d'orchis. Maroc. ☉
 bigarrée. F. ☉
 rampante. F. ☉
 membraneuse. Barbarie. or. ☞
 couchée. F. ☉
 des champs. F. ☉
 à tiges simples. F. ☉
 de Pelissier. F. ☉
 paniculée. orient. ☉
 jonciforme. Esp. ☉
 des Alpes. ♂
 élégante. Esp. ☉
 à feuilles d'origan. F. in. ☉
 petite. F. ☉
 des rivages. Autriche. ☉
 pubescente. ☉

3. *Foliis alternis.*

hirta L.
genistifolia Willd. Enum.
vulgaris Willd. Enum.
chalepensis Willd. Enum.
canadensis L.

3. Feuilles alternes.

velue. Esp. ☉
 à feuilles de Genét. Suisse. ☞
 commune. F. ☞
 à long éperon. F. ☉
 de Canada. ☉

ANTIRRHINUM

majus L.
orontium L.
angustifolium *Encycl. suppl.*
molle L.
sempervirens *Lapeyr. Pyr.*
Asarina L.

ANARRHINUM

bellidifolium.
antirrhinum bellidifolium L. }

NEMESIA

foetens *vent. malm.*
chamaedryfolia *vent. malm.*
antirrhinum macrocarpum
vahl. symb. }

HORNEMANNIA

bicolor *willd. enum.*

DIGITALIS

canariensis L.
purpurea L.
minor L. *Mant.*
ambigua L. f.
lutea L.
aurea.
ferruginea L.
parviflora *Jacq. hort.*
orientalis *Encycl.*
obscura L. *Mant.*

USTERIA

scandens *cav. ic.*
maurandia semperflorens
Jacq. H. sch. }

II. *Stamina* 2.

CALCEOLARIA

pinnata L. *Mant.*

III. *Genera scrophulariis affinia*,
oppositifolia.

COLUMNEA

erecta *Encycl.*
cyrilla pulchella *P'her. stirp.*
nuchnera coccinea *scop. ins.*
gesneria coccinea *swartz. pr.*
achymenes coccinea *Pers. syn.*
trevirana coccinea *willd. en.*
hirsuta *swartz. prodr. ?* }

MUFLIER

des jardins. F. ♂ (orn.)
tête-de-mort. F. ☉
à feuilles étroites. or. ♀
velouté. Esp. or. ♀
toujours vert. F. m. or. ♀
Asarine. F. ♀

ANARRHINUM

à feuilles de Paquerette. F. ♂

NÉMÉSIA

fétide. cap. or. ♀

à f. de chamaedrys. cap. or. ♀

HORNEMANNIA

bicolore. cap. or. ♂

DIGITALE

des Canaries. or. ♀ (orn.)
pourprée. F. ♂ (méd. orn.)
petite. Esp. or. ♀
ambiguë. F. ♀
jaune. F. ♀
dorée. ♀
rouillée. Italie. ♀
à petites fleurs. ♂
d'Orient. ♀
à feuilles étroites. Esp. or. ♀

USTÉRIA

sarmenteux. Mexique. or. ♀

II. 2 étamines.

CALCÉOLAIRE

pennée. Pérou. ☉

III. *Genres qui ont de l'affinité avec les*
scrophulaires, feuilles opposées.

COLUMNÉA

écarlate. Antill. s. ch. ♀ (orn.)

velu. Antilles. s. ch. ♀

GRATIOLE

officinalis L.

MIMULUS

ringens L.

glutinosus Willd. sp. }

aurantiacus Bot. Mag. }

guttatus Dec. cat. }

luteus Bot. Mag. (non L.) }

LINDERNIA

pyxidaria L. Mant.

BROWALLIA

elata L.

demissa L.

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

CELSIA

orientalis L.

Arcturus s. Veg.

cretica L. f.

heterophylla Pers. syn.

HEMITOMUS

fruticosus l'Her. mss. }

celsia linearis Jacq. ic. }

hemimeris coccinea Willd. sp. }

urticæfolia. }

celsia urticæfolia Bot. Mag. }

hemimeris urticæfolia Willd. }

sp.

VERBASCUM

thapsus L.

thapsoides L.

elongatum Willd. Enum.

phlomoïdes L.

Lychnitis L.

— album.

nigrum L.

rugulosum Willd. Enum.

floccosum Willd. Enum.

pulverulentum Smith. Fl.

pyramidatum Marsch. cauc.

sinuatum L.

GRATIOLE

officinalis. F. Z (méd.)

MIMULUS

à deux lèvres. Am. s. Z

glutineux. s. ch. 5

tacheté. Pérou. s. ch. 7

LINDERNIA

pyxidaire. F. ☉

BROWALLIA

à tige droite. Pérou. ☉

à tige tombante. Am. m. ☉

ORDRE VIII.

SOLANÉES.

I. Une capsule.

CELSIA

d'Orient. ☉

Arcturus. orient. or. ♂

de Crète. or. ♂

à feuilles variables. or. ♂

HEMITOMUS

arbrisseau. Pérou. s. ch. 5

à feuilles d'ortie. Pérou. or. 5

MOLÉNE

commune. F. ♂ (méd.)

thapsoïde. F. ♂

à longue grappe. ♂

phlomoïde. F. ♂

cunéiforme. F. ♂

— à fleurs blanches.

noire. F. ♂

ridée. ♂

floconneuse. Hongrie. ♂

pulvérulente. F. ♂

pyramidale. caucas. ♂

sinuée. F. ♂

phœniceum L.
 blattaria L.
 — alba.
 blattarioides *encycl.*
 spinosum L.

RAMONDA

pyrenaica *Pers. syn.* }
 verbascum myconi L. }

HYOSCIAMUS

niger. L.
 pallidus *Willd. Enum.*
 reticulatus L.
 albus L.
 betæfolius *encycl.* }
 Datura *Forsk. Fl.* }
 inuticus L. *Mant.* }
 aureus L.
 pusillus L.
 physalodes L.
 scopolia L. *Mant.* }
 scopolia carniolica *Jacq. obs.* }

NICOTIANA

tabacum L.
 fruticosa L. ?
 glutinosa L.
 rustica L.
 paniculata L.
 plumbaginifolia *Willd. Enum.* }
 crispa. }
 undulata *Vent. Malm.*

DATURA

stramonium L.
 ferox L.
 Tatula L.
 fastuosa L.
 metel L.
 humilis.
 ceratocaula *Jacq. H. Sch.*
 lævis L. *f.*
 arborea. }
 suaveolens *Willd. Enum.* }

II. *Fructus baccatus.*

TRIGUERA

ambrosiaca *Cav. Diss.*

bleue. carniolle. ♂
 blattaire. F. ♂
 — à fleurs blanches.
 fausse blattaire. ♂
 épineuse. orient. or. ♀

RAMONDA

des Pyrénées. ♀

JUSQUIAME

noire. F. ♂ (vénén.).
 pâle. Hongrie. ⊙
 à réseau. orient. ♂
 blanche. F. m. ⊙
 à feuell. de bette. Égypte. or. ♂
 jaune. orient. or. ♀
 grêle. orient. ⊙
 faux coqueret. sibérie. ♀
 scopolia. Italie. ♀

NICOTIANE

tabac. Am. m. ⊙ (écon. méd.)
 arbrisseau. chine. or. ♀
 gluante. Pérou. ⊙
 rustique. Am. m. ⊙ (écon. méd.)
 paniculée. Pérou. ⊙ (écon.)
 crépue. Pérou. ⊙
 ondée. N. Holl. or. ♂

DATURA

épineux. F. ⊙ (vénén.)
 à grosses épin. chine. ⊙ (vén.)
 Tatula. Asie. ⊙
 violet. Égypte. ⊙ (orn.)
 métel. Asie. ⊙
 nain. ⊙
 cornu. Cuba. ⊙
 à fruit lisse. Abyssin. ⊙
 en arbre. Pérou. s. ch. ♀ (orn.)

II. Une baie.

TRIGUERA

odorant. Portugal. ⊙

SOLANDRA

grandiflora swartz. prodr. }
Datura sarmentosa Encycl. }

ATROPA

mandragora L.
belladonna L.
solanacea L. Mant.
arborescens L. }
cestrum campanulatum Enc. }
frutescens L.
procumbens Cav. Ic.

NICANDRA

physalodes. }
atropa physalodes L. }

PHYSALIS.1. *Perennes.*

somnifera L.
arborescens L.
aristata H. K.
incana.
chenopodiifolia Lamk. ill. }
curassavica L.
pensylvanica L.
Alkekengi L.

2. *Annua.*

barbadensis L.
prostrata l'her. stirp.
angulata L.
pubescens L.
fœtens.
philadelphica Lamk. ill.

SARACHA

umbellata Dec. cat.

LYCOPERSICUM

esculentum Dunal. sol. }
solanum lycopersicum L. }
cerasiforme Dunal. sol. }
solanum pseudo-lycopersi- }
cum Jacq. hort. }
Humboldtii. }
solanum humboldtii Willd. }
H. Ber.
peruvianum Dunal. sol. }
solanum peruvianum L. }

SOLANDRA

à grandes fleurs. Ant. s. ch. 5

ATROPA

Mandragore. F. 7 (méd. vén.)
Belladone. F. 7 (vénén.)
à f. de solanum. cap. or. 5
en arbre. inde. s. ch. 5
arbrisseau. esp. or. 5
couché. Mexique. 0

NICANDRA

du Pérou. 0

COQUERET.1. *Vivaces.*

somnifère. esp. or. 5
arbre. Antilles. s. ch. 5
barbu. canaries. or. 5
incane. Pérou. s. ch. 5
de Curaçao. s. ch. 7
de Pensylvanie. 7
Alkékonge. F. 7 (méd.)

2. *Annuelles.*

de la Barbade. 0
couché. Pérou. 0
anguleux. inde. 0
pubescent. inde. 0
fétide. N. esp. 0
à gros fruit. Am. s. 0

SARACHA

ombellifère. 0

TOMATE

cultivée. Am. m. 0 (écon.)

cerise. Pérou. 0

de Humboldt. Am. m. 0

du Pérou. s. ch. 7

SOLANUM.

1. *Inermia.*

dulcamara L.
triquetrum Cav. IC.
crassifolium Lamk. ill.
quercifolium L.
radicans L.
corymbosum Jacq. IC.
nigrum L.
villosum Lamk. ill.
miniaturum Dunal. sol.
suffruticosum Dunal. sol.
guineense Dunal. sol.
nodiflorum Jacq. IC.
tuberosum L.

reclinatum l'Her. stirp. }
pinnatifidum Lamk. ill. }
laciniatum H. K.
macrocarpon L.
æthiopicum L.
zucchagnianum Dunal. sol.
diphyllum L.
pseudo-capsicum L.

aggregatum Jacq. IC.
muricatum H. K. }
scabrum Lamk. ill. }
variegatum Fl. Per. }
pubigerum Dunal. sol.
lanceolatum Cav. IC.
macrophyllum Dunal. sol. }
grandiflorum Desf. Arbr. }
verbascifolium L.
auriculatum Lamk. ill.
bonariense L.
betaceum Cav. IC.

2. *Aculeata.*

esculentum Dunal. sol.
ovigerum Dunal. sol.
fuscatum L.
mammosum L.
ciliatum Lamk. ill.
aculeatissimum Jacq. IC.
coagulans Vahl. symb.
decurrens Walbis. H. Taur. }
walbisii Dunal. sol. }

SOLANUM.

1. Point d'aiguillons.

Douce-amère. F. ♀ (méd.)
triangulaire. N. esp. s. ch. ♀
à feuilles épaisses. Cap. or. ♀
à feuell. de chêne. Pérou. or. ♀
rampant. Pérou. or. ♂
corymbifère. Pérou. or. ♂
à fruit noir. F. ☉ (méd.)
velu. F. ☉
à fruit rouge. F. ☉
sous-arbrisseau. Barbarie? ♂
de Guinée. ☉
nodiflore. Île de Fr. s. ch. ♀
pomme - de - terre. Pérou. ♀
 (alim.)

recliné. Pérou. s. ch. ♂
lacinié. N. zél. or. ♀
à gros fruit. Pérou. s. ch. ♂
d'Éthiopie. ☉
de Zucchagni. s. ch. ♀
à deux feuell. Am. m. s. ch. ♀
Faux-Piment. Madère. or. ♀
 (orn.)

aggloméré. Guinée. s. ch. ♀

rude. Pérou. s. ch. ♀

pubescent. s. ch. ♀
lancéolé. Mexique. s. ch. ♀
à larges feuell. Mexiq. s. ch. ♀
à f. de molène. Antill. s. ch. ♀
auriculé. Île de Fr. s. ch. ♀
à bouquets. or. ♀ (orn.)
à f. de Bette. Pérou. s. ch. ♀

2. Tiges garnies d'aiguillons.

Melongène. ☉ (alim.)
ovifère. ☉
brun. Am. m. ☉
pomme-de-teton. Antilles. ☉
cilié. ☉
très-épineux. Am. m. s. ch. ♀
coagulant. Égypte. s. ch. ♀
décurrent. Île de Fr. s. ch. ♀

fontanesianum *Encycl. suppl.*

sodomæum *L.*

rostratum *Dunal. sol.*

heterodoxum *Dunal. sol.*

sarmentosum *Lamk. ill.* }

lanceæfolium *Jacq. ic.* }

vespertilio *H. K.*

nycterium cordifolium *Vent.* }

Malm.

giganteum *Jacq. ic.*

marginatum *L. f.*

tomentosum *L.*

coccineum *Jacq. ic.*

polygamum *Vahl. symb.*

elæagnifolium *Cav. ic.*

leprosum *Ortega. Dec.*

bahamense *L.*

igneum *L.*

pyracantha *Lamk. ill.*

polyacanthos *Lamk. ill.*

carolinense *L.*

milleri *Jacq. ic.*

ferrugineum *Jacq. H. sch.*

stramonifolium *Lamk. ill.*

torvum *Swartz. Prodr.*

ficifolium *Ortega. Dec.*

indicum *L. ex Swartz.*

glutinosum *Encycl. suppl.*

cuneifolium *Dunal. sol.*

lycioides *L. Mant.*

de Desfontaines. ☉

hérissé. cap. or. ♀

corniculé. s. ch. ♀

hétérodoxe. s. ch. ♀

sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀

vespertilion. canaries. or. ♀

gigantesque. cap. s. ch. ♀

blanc. Abyssinie. s. ch. ♀

cotonneux. éthiopie. s. ch. ♀

écarlate. s. ch. ♀

polygame. Antilles. s. ch. ♀

à feuilles de chalef. Am. m.

s. ch. ♀

lépreux. Chili. s. ch. ♀

de Bahama. s. ch. ♀

couleur de feu. Ant. s. ch. ♀

de Madagascar. s. ch. ♀

polyacanthos. Antill. s. ch. ♀

de Caroline. or. ♂

de Miller. cap. s. ch. ♀

ferrugineux. Antilles. s. ch. ♀

glutineux. s. ch. ♀

cunéiforme. Antilles. s. ch. ♀

Faux-Lycium. Pérou. or. ♀

(orn.)

CAPSICUM

grossum *L. Mant.*

— deflexum.

annuum *L.*

conicum.

frutescens *L.*

violaceum.

cerasiforme *Willd. Enum.*

baccatum *L. Mant.*

PIMENT

irrégulier. inde. s. ch. ♂

— abaissé.

annuel. Antilles. ☉ (écon.)

conique. s. ch. ♂

arbrisseau. inde. s. ch. ♀

violet. chine. s. ch. ♂

cerise. s. ch. ♀

baccifère. inde. s. ch. ♀ (écon.)

LYCIUM

afrum *L.*

europæum *L. Mant.*

carnosum.

rhutenicum *Willd. sp.*

barbarum *s. reg.*

LYCIUM

d'Afrique. esp. or. ♀

d'Europe. F. m. or. ♀

charnu. or. ♀

de Russie. ♀

lancéolé. chine. ♀

chinense *zamk. ill.*
 boerhaaviifolium *L. f.*
 ehretia halimifolia *L'her. stirp.* }

de Chine. 5
 à feuilles de boerhaavia. Pé-
 rou. or. 5

CESTRUM

nocturnum *L.*
 diurnum *L.*
 laurifolium *L'her. stirp.*
 macrophyllum.
 foetidissimum *Jacq. H. sch.*
 auriculatum *L'her. stirp.*
 salicifolium *Jacq. H. sch.*
 vespertinum *L'her. stirp.*
 alaternoides.
 parqui *L'her. stirp.*

III. Genera solaneis affinia.

BILLARDIERA

scandens *Smith. N. Holl.*

BONTIA

daphnoides *L.*

BRUNSFELSIA

americana *L.*

CRESCENTIA

cujete *L.*

CESTRUM

de nuit. chili. s. ch. 5
 de jour. chili. s. ch. 5
 à f. de laurier. Am. m. s. ch. 5
 à grand. feuell. Ant. s. ch. 5
 fétide. Antilles. s. ch. 5
 auriculé. Pérou. s. ch. 5
 à f. de saule. caracas. s. ch. 5
 à fruit noir. Antilles. s. ch. 5
 à f. d'Alaterne. Ant. s. ch. 5
 parqui. chili. 5

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
 solanées.

BILLARDIERA

sarmenteux. N. Holl. or. 5

BONTIA

à f. de daphné. Ant. s. ch. 5

BRUNSFELSIA

d'Amérique. Antill. s. ch. 5

CALEBASSIER

des Antilles. s. ch. 5

ORDO IX.**BORRAGINEÆ.**

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut
 arborescens.

CORDIA

officinalis *zamk. ill.* }
 myxa *L.* }
 crenata *Delile. Ægypt.*
 dentata *Vahl. Mss.*
 gerascanthus *L.*
 macrophylla *L.*
 nitida *Vahl. Mss.*
 parviflora *Ortega. Dec.*
 sebestena *Andr. rep.*
 patagonula.

EHRETIA

tinifolia *L.*
 beurreria *L.*

ORDRE IX.**BORRAGINÉES.**

I. Une baie, tiges ligneuses.

CORDIA

officinal. Égypte. s. ch. 5
 (méd. alim.)
 crénelé. Égypte. s. ch. 5
 à feuell. dentées. Ant. s. ch. 5
 à f. de verveine. Ant. s. ch. 5
 à grandes feuell. Ant. s. ch. 5
 à feuell. luisant. Ant. s. ch. 5
 à petites fl. N. esp. s. ch. 5
 sébestier. Antilles. s. ch. 5
 patagonula. s. ch. 5

EHRETIA

à f. de laurier-tin. Ant. s. ch. 5
 de Beurrer. Antill. s. ch. 5

VARRONIA

- ferruginea* Lamk. ill.
bullata L.
mirabilioides Jacq. Am. }
Tournefortia serrata L. }
corymbosa Desvauz, Journ. }
d'hist. nat. }
monosperma Jacq. H. sch. }

TOURNEFORTIA

- lucida*
volubilis L.
humilis L.
scabra Lamk. ill.
hirsutissima Swartz. obs.
cymosa Swartz. obs.
laevigata Lamk. ill.
angulosa.
laurifolia Vent. ch. de pl.
mutabilis Vent. ch. de pl.

MESSERSCHMIDIA

- arguzia* L. f.
fruticosa L. f.
angustifolia Lamk. ill.

II. *Fructus uni aut bicapsularis.*

ELLISIA

- nyctelea* L. Mant.

HYDROPHYLLUM

- virginianum* L.
canadense L.
magellanicum Lamk. ill.

DICHONDRA

- caroliniensis* Mich. fl.
argentea Willd. H. Ber.

CERINTHE

- major* L. }
glabra Dec. syn. }
aspera Dec. syn. }
minor L.

III. *Fructus gymnospermus*, faux
corollæ nuda.

HELIOTROPIUM

- peruvianum* L.
grandiflorum.
indicum L.

VARRONIA

- ferrugineux*. Am. m. s. ch. ♀
bulleux. Antilles. s. ch. ♀
à grandes fl. Antill. s. ch. ♀
corymbifère. Caracas. s. ch. ♀

TOURNEFORTIA

- luisant*. Antilles. s. ch. ♀
sarmenteux. Antill. s. ch. ♀
nain. Am. m. s. ch. ♀
rude. Antilles. s. ch. ♀
hérissé. Antilles. s. ch. ♀
à longs épis. Antilles. s. ch. ♀
lisse. Antilles. s. ch. ♀
anguleux. s. ch. ♀
à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♀
à fl. changeantes. Java. s. ch. ♀

MESSERSCHMIDIA

- herbacé*. Sibérie. π
arbrisseau. Canaries. or. ♀
à feuilles étroit. Canar. or. ♀

II. Une ou deux capsules.

ELLISIA

- de Virginie*. ☉

HYDROPHYLLUM

- de Virginie*. π
de Canada. π
de Magellan. ψ

DICHONDRA

- de Caroline*. or. ψ
argenté. île de Fr. s. ch. ψ

MÉLINET

- glabre*. F. ☉
rude. F. ☉
à fleurs aiguës. F. ♂

III. Quatre fruits distincts, entrée de la
corolle nue.

HÉLIOTROPE

- du Pérou*. or. ♀ (orn.)
à grandes fl. s. ch. ♀ (orn.)
des Indes. ☉

europæum L.
 parviflorum L. Mant.
 supinum L.
 curassavicum L.

ECHNIUM.

1. Herbacea.

vulgare L.
 pyrenaicum Desf. Atl. }
 italicum L. var. b. }
 australe Lamk. ill.
 violaceum L. Mant.
 plantagineum L. Mant. }
 creticum Lamk. ill. }
 prostratum.

2. Fruticosa.

giganteum L. f.
 candicans Jacq. Ic.
 strictum Lamk. ill. }
 virescens Dec. cat. }
 cynoglossoides.

LITHOSPERMUM

arvense L.
 officinale L.
 purpureo-cœruleum L.
 distichum Jacq. Fragm.
 tinctorium Dec. Fl. Fr. }
 Anchusa tinctoria Lamk. ill. }
 (non Lin.)
 fruticosum L.
 tenuiflorum L. f.

PULMONARIA

officinalis L.
 angustifolia L.
 virginica L.
 sibirica L.
 maritima L.

ONOSMA

echioides L.

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux
 corollæ instructa squamis.

SYMPHYTUM

officinale L.
 tauricum Willd. Enum. }
 orientale Marsch. cauc. }
 aspernum Marsch. cauc.

d'Europe. F. ⊙ (méd.)
 à petites fleurs. inde. ⊙
 couché. F. ⊙
 de Curaçao. s. ch. ℥

VIPERINE.

1. Tige herbacée.

commune. F. ♂ (méd.)
 des Pyrénées. F. or. ♂
 à fleur rouge. orient. ⊙
 violette. F. m. ⊙
 à feuell. de plantain. ital. ⊙
 couchée. Égypte. or. ♀

2. Tiges ligneuses.

gigantesque. canaries. or. ♀
 blanchâtre. canaries. or. ♀
 ramassée. canaries. or. ♀
 à f. de cynoglosse. canaries,
 or. ♀

GRÉMIL

des champs. F. ⊙
 officinal. F. ⊙
 bleu-pourpre. F. ℥
 distique. or. ♀
 des teinturiers. F. m. ♀
 arbrisseau. F. m. or. ♀
 à petites fleurs. Égypte. ⊙

PULMONAIRE

officinale. F. ℥ (méd.)
 à feuilles étroites. F. ♀
 de Virginie. ℥ (orn.)
 de Sibérie. ℥
 maritime. F. ⊙

ONOSMA

à f. de viperine. F. ♂

IV. 4 fruits distincts, tube de la corolle
 couronné d'écaillés.

CONSOUDE

officinale. F. ℥ (méd.)
 d'Orient. ♀
 à feuilles rudes. caucase. ℥

LYCOPSIS

arvensis L.

ECHIOIDES

nigricans Desf. Atl.

rubra Desf. Atl.

grandiflora.

MYOSOTIS

arvensis Willd. sp.

palustris.

Lappula L.

ANCHUSA

italica Retz. obs.

angustifolia L. ?

ochroleuca Marsch. cauc.

Barrelieri Dec. Fl.

Buglossum Barrelieri. All. ped. }

tinctoria L.

undulata L.

milleri Willd. Enum.

sempervirens L.

verrucosa Lamk. ill. }

asperugo ægyptiaca L. }

laxiflora Dec. syn.

BORAGO

officinalis L.

orientalis L.

indica L.

africana L.

ASPERUGO

procumbens L.

CYNOGLOSSUM

officinale L.

apenninum L.

montanum Lamk. ill.

hispidum Jacq. n. sch. }

canescens Willd. Enum. }

parviflorum Encycl. suppl. }

cheirifolium L.

linifolium L.

nitidum Willd. Enum.

omphalodes L.

RINDERA

tetraspis Pallas. itin. }

cynoglossum Rindera L. f. }

NOLANA

prostrata L.

LYCOPSIS

des champs. F. ☉

ECHIOIDES

à fleurs noires. Italie. ☉

à fleurs rouges. Italie. ☉

à grandes fleurs. ☉

MYOSOTIS

des champs. F. ☉

des marais. F. ♀

hérissé. F. ☉

BUGLOSE

officinale. F. ♂ (méd.)

à feuilles étroites. Italie. ♂

jaune-pâle. caucase. ♀

de Barrelier. Alpes. ♀

orcanette. F. m. or. ♀

ondulée. F. m. or. ♀

de Miller. Égypte. ☉

toujours verte. Esp. ♀

tuberculeuse. Égypte. ☉

à fleurs lâches. Corse. ♂

BOURRACHE

officinale. F. ☉ (méd.)

d'Orient. ♂

des Indes. ☉

d'Afrique. ☉

RAPETTE

couchée. F. ☉

CYNOGLOSSE

officinale. F. ♂ (méd.)

des Apennins. ♂

des Alpes. ♀

à petites fleurs. Inde. ☉

à feuilles de cheiri. Orient. ♂

à feuilles de Lin. Esp. ☉

luisante. Portugal. ♀

omphalodes. F. ♀ (orn.)

RINDERA

ailé. Russie.

NOLANA

couché. Pérou. or. ♂

ORDO X.

CONVOLVULACEÆ.

CONVOLVULUS.

1. *Caule volubili.*

arvensis L.
 sepium L.
 inflatus.
 panduratus L.
 farinosus L. Mant.
 batatas L.
 nervosus Lamk. ill.
 canariensis L.
 jalapa L. Mant.
 ipomœa macrorrhiza Mich. Fl. }
 althæoides L.
 pentaphyllus L.
 cairicus L.
 dissectus L. Mant.
 hermanniæ l'her. sert. }
 crenatus Jacq. Ic. }
 fruticulosus Lamk. ill.
 sibiricus L. Mant.
 ebracteatus Lamk. ill.
 siculus L.

2. *Caule non volubili.*

pentapetaloides s. veg.
 convolvuloides Desf. Atl. }
 humilis Jacq. coll. }
 undulatus Cav. Ic. }
 lineatus L.
 cneorum L.
 oleæfolius Lamk. ill.
 scoparius L. f.
 cantabrica L.
 pilosellæfolius Lamk. ill.
 dorycnium L.
 tricolor L.
 pes-capræ L.
 soldanella L.
 falkia.

ИПОМÆА

quamoclit L.
 coccinea L.

ORDRE X.

CONVOLVULACÉES.

LISERON.

1. *Tige grimpante.*

des champs. F. ℥
 des haies. F. ℥
 renflé. Am. s. ♀ (orn.)
 sinué. Am. s. ♀
 farineux. madère. or. ♀
 patate. Antilles. s. ch. ♀ (alim.)
 à nervures. inde. s. ch. ♀
 des Canaries. or. ♀
 jalap. Mexique. or. ℥ (méd.)
 à f. de Guimauve. F. m. or. ♀
 à cinq feuilles. Antilles. ⊙
 du Caire. or. ℥
 découpé. Antilles. ⊙
 à feuil. d'hermannia. Pérou;
 s. ch. ♀
 fruticuleux. canaries. or. ♀
 de Sibérie. ⊙
 sans bractées.
 de Sicile. ⊙

2. *Tige non grimpante.*

à 5 divisions. Italie. ⊙

ondulé. Barbarie. ⊙

rayé. F. m. or. ℥
 satiné. orient. or. ♀
 à feuilles d'olivier. or. ♀
 effilé. canaries. or. ♀
 à feuilles linéaires. F. ℥
 à f. de piloselle. orient. or. ♀
 dorycnium. orient. or. ♀
 tricolore. Esp. ⊙ (orn.)
 pied-de-chèvre. inde. s. ch. ℥
 soldanelle. F. ♀ (méd.)
 de Falk. cap. or. ♀

ИПОМÆА

quamoclit. inde. ⊙ (orn.)
 écarlate. Antilles. ⊙

*luteola Jacq. ic.**leucantha Jacq. ic.**bona-nox L.**tuberculosa.**stipulacea Jacq. H. sch.**convolvulus tuberculosus**Lamk. ill.**heterophylla Jacq. Fragm.**triloba L.**hederacea Jacq. ic.**nil.**convolvulus nil L.**ipomæa bicolor Lamk. ill.**purpurea Lamk. ill.**convolvulus purpureus L.**jaune. Antilles. ☉**à fleurs blanches. Am. m. ☉**bona-nox. inde. s. ch. ☉**tuberculeux. île de F. ℥**à feuell. variabl. cuba. s. ch. ℥**à trois lobes. Antilles. ☉**à feuell. de Lierre. Am. m. ☉**Nil. Antilles. ☉**pourpre. Antilles. ☉ (orn.)***EVOLVULUS***alsinoides L.**linifolius L.***EVOLVULUS***à feuilles d'Alsiné. inde. ☉**à feuilles de Lin. Antilles. ☉***CUSCUTA***europæa L.***CUSCUTE***d'Europe. F. ☉***ORDO XI.****POLEMONIACEÆ.****ORDRE XI.****POLÉMONIACÉES.****PHLOX***suaveolens H. K.**glaberrima L.**paniculata L.**divaricata L.**maculata L. Mant.**suffruticosa Willd. Enum.**ovata Bot. Mag.**subulata L.**reptans Mich. Fl.***PHLOX***odorant. Am. s. ℥ (orn.)**glabre. Am. s. ℥ (orn.)**paniculé. Am. s. ℥ (orn.)**étalé. Am. s. ℥ (orn.)**tacheté. Am. s. ℥ (orn.)**sous-arbrisseau. Am. s. ℥ (orn.)**ovale. Am. s. ℥ (orn.)**en alêne. Virginie. ℥**rampant. Am. s. ℥ (orn.)***POLEMONIUM***cœruleum L.**reptans L.***POLÉMOINE***à fleurs bleues. Eur. ℥ (orn.)**rampante. Am. s. ℥ (orn.)***CANTUA***ligustrifolia Juss. Ann.**periphragmos foetidus Fl. Pér.**vestia lycioides Willd. Enum.***CANTUA***à f. de Troène. Pérou. s. ch. ℥***BONPLANDIA***geminiflora Cav. ic.**caldasia heterophylla Willd.**H. Ber.***BONPLANDIA***à fleurs géminées. N. Esp. or. ℥***COBÆA***scandens Cav. ic.***COBÆA***grim pant. Mexiq. or. ℥ (orn.)*

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE

- glabra L.
obliqua Willd. sp.
barbata Cav. Ic.

PENTSTEMON

- lævigata Willd. sp.
pubescens Willd. sp.
chelone pentstemon L. Mant. }
campanulata Willd. sp. }
chelone campanulata Cav. Ic. }

SESAMUM

- orientale L.

BIGNONIA.

1. Foliis simplicibus.

- catalpa L.
catalpa syringifolia H. K. }
Quercus Encycl. }
longissima Willd. sp. }
catalpa longissima H. K. }
sempervirens L.

2. Foliis conjugatis.

- unguis-cati L.
pseudo-unguis.
capreolata L.
crucigera L.
paniculata Vahl. symb.

3. Foliis digitatis.

- triphylla L. ?
pentaphylla L.

4. Foliis pinnatis.

- grandiflora Andr. rep.
radicans L.
stans L.
pandorea Andr. rep. }
australis Brown. Prodr. }
chelonoides L. f. ?

MARTYNIA

- proboscidea Willd. sp.

ORDRE XII.

BIGNONES.

CHÉLONÉ

- glabre. Am. s. V
oblique. Virginie. T
barbue. Mexique. or. T (orn.)

PENTSTÉMON

- à feuilles lisses. Am. s. or. T
pubescent. Am. s. or. T
campanulé. Mexiq. or. T (orn.)

SÉSAME

- d'Orient. ☉ (écon.)

BIGNONE.

1. Feuilles simples.

- catalpa. Am. s. T (orn.)
à f. de chêne. Antill. s. ch. T
toujours verte. Am. s. or. T

2. Feuilles conjuguées.

- à griffes. Antilles. s. ch. T
Fausse-griffe. Antill. s. ch. T
à vrilles. Antilles. s. ch. T
crucifère. Am. s. or. T
paniculée. Antilles. s. ch. T

3. Feuilles digitées.

- trifoliée. Antilles. s. ch. T
à 5 feuilles. Antilles. s. ch. T

4. Feuilles pennées.

- à grand. fl. chine. or. T (orn.)
grimpante. Am. s. T (orn.)
droite. Antilles. s. ch. T
pandorea. île Norfolk. or. T
faux-chéloné. Inde. s. ch. T

MARTYNIA

- à longues cornes. Ant. ☉ (orn.)

angulosa *Encycl.* }
 diandra *Jacq. H. sch.* }
 perennis *L.* }
 gloxinia maculata *l'Her. stirp.* }

ORDO XIII.

GENTIANEÆ.

I. Capsula simplex unilocularis.

GENTIANA.

1. Corollis 5 fidis, subcampanulatis.

lutea *L.*
 asclepiadea *L.*
 pneumonanthe *L.*
 acaulis *L.*
 amarella *L.*

2. Corollis 4 fidis.

campestris *L.*
 cruciata *L.*

SWERTIA

perennis *L.*

CHLORA

perfoliata *s. veg.*

II. Capsula simplex, bilocularis.

CHIRONIA

decussata *vent. H. cels.*
 frutescens *L.*
 linoides *L.*
 baccifera *L.*

centaurium *Willd. sp.* }
 gentiana centaurium *L.* }

— minus.

filiformis.

gentiana filiformis *L.*

exacum filiforme *smith. Fl.* }

SAROTHTA

gentianoides *L.*

VILLARSIA

ovata *vent. ch. de pl.* }
 menyanthes ovata *L. f.* }

nymphoides *vent. ch. de pl.* }
 menyanthes nymphoides *L.* }

anguleux. Mexique. ☉ (orn.)

vivace. Antilles. s. ch. ☿

ORDRE XIII.

GENTIANÉES.

I. Une capsule à une loge.

GENTIANE.

1. Corolle presque en cloche, à 5 divisions;

jaune. Alpes. ☿ (méd.)
 à feuell. d'Asclépias. Alpes. ☿
 pneumonanthe. F. ☿
 sans tige. Alpes. ☿ (orn.)
 amarella. F. ☉

2. Corolle à 4 divisions.

des champs. F. ☉
 croisette. F. ☿

SWERTIA

vivace. F. ☿

CHLORA

perfolié. F. ☉

II. Capsule simple, à 2 loges.

CHIRONIA

à feuell. en croix. cap. or. ♀
 arbrisseau. cap. or. ♀ (orn.)
 à feuilles de Lin. cap. or. ♀
 baccifère. cap. or. ♀

petite-centaurée. F. ☉ (méd.)

— naine.

filiforme. F. ☉

SAROTHTA

filiforme. Am. s. ☉

VILLARSIA

ovale. cap. or. ☿

à feuilles de Nymphaea. F. ☿

SPIGELIA

Anthelmia L.*Marylandica* s. *veg.*

SPIGELIA

Anthelmia, Antilles. ☉*de Maryland*, or. ☿

ORDO XIV.

APOCYNÆÆ.

- I. *Germina* 2, *fructus bifollicularis*,
semina absque pappo.

VINCA

major L.*minor* L.*herbacea* *wald. et kitt. hung.**rosea* L.

TABERNÆMONTANA

angustifolia *willd. sp.**Amsonia* L.*citrifolia* L.*nervosa*.

CAMERARIA

latifolia L.

PLUMIERA

rubra L.*alba* L.

- II. *Germen duplex*, *fructus bifollicularis*,
semina papposa.

NERIUM

oleander.— *album*.*odorum* *willd. sp.**grandiflorum*.*coronarium* *Jacq. ic.*

STAPELIA

hirsuta L.*grandiflora* *Mass. stap.**Asterias* *Mass. stap.**cæspitosa* *Mass. stap.**papillosa* *Dec. pl. gr.**variegata* L.*reticulata* *Mass. stap.*

PERIPILOCA

græca L.*angustifolia* *Bill. Dec.*

APOCYNUM

androsæmifolium L.

ORDRE XIV.

APOCYNÉES.

- I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses,
graines sans aigrette.

PERVENCHE

grande. F. ☿ (méd.)*petite*. F. ☿*herbacée*. Hongrie. ♀*rose*. inde. s. ch. ♀

TABERNÆMONTANA

à feuilles étroites. Am. s. ☿*Amsonia*. Am. s. ☿*à f. de citronnier*. Ant. s. ch. ♀*à grosses nerv.* Antill. s. ch. ♀

CAMÉRARIA

à larg. feuell. Antill. s. ch. ♀

PLUMIÈRA

rouge. Antilles. s. ch. ♀ (orn.)*blanc*. Antilles. s. ch. ♀ (orn.)

- II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses,
graines aigrettées.

NÉRIUM

Laurier-rose F. m. or. ♀ (orn.)— *à fleurs blanches*.*odorant*. inde. or. ♀ (orn.)*à grande fleur*. or. ♀ (orn.)*à bouquets*. inde. s. ch. ♀ (orn.)

STAPÉLIA

velu. cap. s. ch. ♀*à grandes fleurs*. cap. s. ch. ♀*Astérias*. cap. s. ch. ♀*touffu*. cap. s. ch. ♀*mamelonné*. cap. s. ch. ♀*panaché*. cap. s. ch. ♀*à réseau*. cap. s. ch. ♀

PÉRIPILOCA

de Grèce. ♀*à f. étroites*. orient. or. ♀

APOCIN

à f. d'androsème. Am. s. ♀

cannabinum *L.*
 hypericifolium *Willd. sp.*
 venetum *L.*

CYNANCHUM

prostratum *cav. ic.*
 acutum *L.*
 monspeliacum *L.*
 caroliniense *Jacq. ic.*
 macrophyllum (*an generis?*).
 erectum *L.*
 mauritianum *Encycl.*

ASCLEPIAS

vincetoxicum *L.*
 nigra *L.*
 nivea *L.*
 curassavica *L.*
 incarnata *L.*
 tuberosa *L.*
 amoena *L.*
 linaria *cav. ic.*
 angustifolia *Willd. H. Ber.*
 mexicana *cav. ic.*
 carnosa *Bot. Mag.*
 fruticosa *L.*
 syriaca *L.*
 arborescens *L. Mant.*

III. *Germen simplex, fructus baccatus aut rarius capsularis.*

ALLAMANDA

cathartica *L. Mant.*
 verticillata.

RAUWOLFIA

nitida *L.*
 glabra *cav. ic.*

OPHIOXYLON

serpentinum *L.*

CERBERA

thevetia *L.*
 manghas *L.*

ARDUINIA

bispinosa *Willd. sp.*

THEOPHRASTA

americana *L.*

à fleurs vertes. *Am. s. 2*
 à f. d'hypericum. *Am. s. 2*
 denté. *italie. 2*

CYNANCHUM

couché. *mexique. s. ch. 2*
 aigu. *F. 2*
 de Montpellier. *or. 2*
 de Caroline. *or. 2*
 à grandes feuilles. *s. ch. 2*
 à tige droite. *syrie. 2*
 de l'île de France. *s. ch. 2*

ASCLÉPIAS

dompte-venin. *F. 2 (méd.)*
 noir. *F. 2*
 blanc. *Am. s. or. 2*
 de Curaçao. *s. ch. 2*
 incarnat. *Am. s. 2*
 tubéreux. *Am. s. or. 2*
 rose. *Am. s. 2*
 à f. de Linair. *or. 2*
 à f. étroites. *mexique? s. ch. 2*
 du Mexique. *s. ch. 2*
 charnu. *chine. s. ch. 2*
 arbrisseau. *tunis. or. 2*
 à la ouate. *Am. s. 2*
 arbre. *cap. s. ch. 2*

III. Ovaire simple, une baie ou plus rarement une capsule.

ALLAMANDA

cathartique. *caïenne. s. ch. 2*
 verticillé. *s. ch. 2*

RAUWOLFIA

à f. luisantes. *Antill. s. ch. 2*
 glabre. *N. esp. s. ch. 2*

OPHIOXYLON

noix-de-serpent. *Inde. s. ch. 2*

CERBERA

Thévétia. *Antilles. s. ch. 2*
 manghas. *Inde. s. ch. 2*

ARDUINIA

bisurqué. *cap. s. ch. 2*

THEOPHRASTA

d'Amérique. *Antilles. s. ch. 2*

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLUM

- melanophleas *L. Mant.* }
 laurifolium *Encycl.* }
 atrovirens *Encycl.*
 mastichodendrum *Jacq. coll.* }
 bumelia salicifolia *Swartz.* }
Prodr.
 lycioides *L.*
 tenax *L. Mant.*
 bumelia tenax *Willd. sp.* }

CHRYSOPHYLLUM

- glabrum *L.*
 cainito *L.*
 argenteum *Jacq. Am.*

ACHRAS

- sapota *L.*

MYRSINE

- africana *L.*
 retusa *Vent. H. cels.*

ORDRE XV.

SAPOTILLIERS.

SIDÉROXYLUM

- à f. de laurier. inde. s. ch. ♀
 vert-sombre. Am. m. s. ch. ♀
 à f. de saule. Antill. s. ch. ♀
 à feuilles de Lycium. Am. s. ♀
 satiné. caroline. or. ♀

CAIMITIER

- glabre. Antilles. s. ch. ♀
 cainito. Antilles. s. ch. ♀
 argenté. Antilles. s. ch. ♀

SAPOTILLIER

- cultivé. Ant. s. ch. ♀ (alim.)

MYRSINÉ

- d'Afrique. Cap. or. ♂
 à feuell. obtuses. Açores. or. ♀

CLASSIS IX.

CLASSE IX.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*Corolla perigyna.*)

(Corolle attachée au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

GUAIACANÆ.

PLAQUEMINIERS.

DIOSPYROS

- ebenum *Encycl.*

virginiana *L.*

lotus *L.*

kaki *L. f.*

PLAQUEMINIER

ébénier. île de fr. s. ch. ♀
(écon.)

de Virginie. ♀

lotos. orient. ♀

kaki. Japon. ♀ (écon.)

hirsuta Desf. Ann. }
royena hirsuta L. }
lycioides Desf. Ann.

ROYENA
lucida L.

VISNEA
mocanera L. f.

STYRAX
officinale L.
laevigatum Cav. Diss.
grandifolium Willd. sp.

HALESIA
tetraptera L.

HOPEA
tinctoria L. Mant. }
symplocostinctoria Willd. sp. }

ORDO II.

RHODODENDRA.

KALMIA
latifolia L.
angustifolia L.
glauca H. K.

RHODODENDRON
ferrugineum L.
hirsutum L.
chamæcistus L.
minus Mich. Fl.
punctatum Vent. H. cels. }
maximum L.
ponticum L.

AZALEA
viscosa L.
glauca L.
nudiflora L.
pontica L.
procumbens L.

RHODORA
canadensis L.

LEDUM
palustre L.
latifolium Encycl.
thymifolium Encycl.

velu. cap. or. ♀
à feuell. de lycium. cap. ? or. ♀

ROYENA
luisant. cap. or. ♀

VISNEA
mocanéra. canaries. or. ♀

STYRAX
officinal. F. m. ♀ (méd.)
glabre. Am. s. ♀
à grand. feuell. carol. or. ♀

HALESIA
à 4 ailes. Am. s. ♀ (orn.)

HOPEA
des teinturiers. caroline. ♀

ORDRE II.

ROSAGES.

KALMIA
à larges feuell. Am. s. ♀ (orn.)
à feuell. étroit. Am. s. ♀ (orn.)
glauque. Am. s. ♀ (orn.)

RHODODENDRON
ferrugineux. Alpes. ♀ (orn.)
velu. Alpes. ♀ (orn.)
à feuell. de ciste. Autriche. ♀
punctué. Am. s. ♀ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♀ (orn.)
de Pont. ♀ (orn.)

AZALÉA
visqueux. Am. s. ♀ (orn.)
glauque. Am. s. ♀ (orn.)
à fleurs nues. Am. s. ♀ (orn.)
de Pont. ♀ (orn.)
couché. Alpes. ♀

RHODORA
de Canada. ♀

LÉDUM
des marais. Alpes. ♀ (écon.)
à larges feuell. Am. s. ♀
à feuell. de thym. Am. s. ♀

BÉFARIA

paniculata Mich. Fl.
 Béfaria racemosa Vent. H. cels. }

MENZIEZIA

poliifolia Juss. Ann. }
 Erica naboecii L. }

ITEA

virginica L.

BÉFARIA

paniculé. Am. s. ♀

MENZIÉZIA

à feuilles de polium. F. ♀

ITÉA

de Virginie. Am. s. ♀ (orn.)

ORDO III.

ERICÆ.

1. *Antheræ aristatæ.*

a. *Foliis ternis.*

viridi-purpurea L.

b. *Foliis quaternis.*

arborea L.

Tetralix L.

abietina L.

c. *Foliis senis.*

mammosa L.

2. *Cristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris L.

b. *Foliis ternis.*

scoparia L.

cinerea L.

australis L. Mant.

c. *Foliis quaternis.*

baccans L.

3. *Muticæ.*

a. *Foliis ternis.*

ciliaris L.

versicolor. Andr. rep.

b. *Foliis quaternis aut pluribus.*

curviflora L.

tubiflora L.

simpliciflora Willd. sp.

cerinthoides L.

conspicua H. K.

mediterranea L.

multiflora L.

BRUYÈRES.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles ternées.

vert-pourpre. Portugal. ♀

b. Feuilles quatre à quatre.

en arbre. F. m. or. ♀

Tétralix. F. ♀

à feuil. de sapin. cap. or. ♀

c. Feuilles six à six.

mamelonnée. cap. or. ♀

2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. ♀

b. Feuilles ternées.

à balais. F. ♀

cendrée. F. ♀

australe. F. m. or. ♀

c. Feuilles quatre à quatre.

globuleuse. cap. or. ♀

3. Anthères sans appendice.

a. Feuilles ternées.

ciliée. F. ♀

bigarrée. cap. or. ♀

b. Feuilles quatre à quatre ou en plus grand nombre.

à fleurs courbes. cap. or. ♀

tubulée. cap. or. ♀

à fleurs simples. cap. or. ♀

à fl. de mélinet. cap. or. ♀

remarquable. cap. or. ♀

de la Méditerranée. F. m. or. ♀

à fl. nombreuses. F. m. or. ♀

vagans L.
herbacea Willd. sp. }
carnea L.

CYRILLA

racemiflora L.

ANDROMEDA

mariana L.
nitida Mich. Fl. }
lucida Encycl. }
coriacea H. K. }
axillaris H. K.
cassinefolia Vent. H. cels. }
speciosa Mich. Fl. }
pulverulenta Vent. Malm.
paniculata L.
racemosa L.
arborea L.
caliculata L.
crispa.
ferruginea L. f.
polifolia L.
— angustifolia.
— latifolia.

ARBUTUS

unedo L.
Andrachne L.
uva-ursi L.
alpina L.

CLETHRA

alnifolia L.
— pubescens.
arborea H. K.

PYROLA

rotundifolia L.
minor L.
maculata L.

EPIGEA

repens L.

GAULTHERIA

procumbens L.

VACCINIUM

myrtillus L.
pensylvanicum Encycl.
uliginosum L.

étalée. F. m. or. 5

précocce. suisse. 5

CYRILLA

à grappes. caroline. 5

ANDROMÉDA

de Maryland. Am. s. 5 (orn.)

luisant. Am. s. 5

axillaire. Am. s. 5

à feuell. de cassiné. Am. s. 5

pulvérulent. Am. s. 5

paniculé. Am. s. 5

à grappes. Am. s. 5

en arbre. Am. s. 5

caliculé. Am. s. 5

crépu. Am. s. 5

ferrugineux. Am. s. 5

à feuell. de polium. Am. s. 5

— à feuilles étroites.

— à larges feuilles.

ARBOUSIER

des Pyrénées. or. 5 (orn.)
Andrachné. orient. or. 5 (orn.)
busserole. Alpes. 5 (méd.)
des Alpes. 5

CLÉTHRA

à feuell. d'aune. Am. s. 5 (orn.)

— pubescent.

arbre. canaries. or. 5

PYRÔLE

à feuilles rondes. F. 7

petite. F. 7

maculée. Am. s. 5

EPIGÉA

rampant. Am. s. 5

GAULTHÉRIA

de Canada. Am. s. 5

MIRTEILLE

Lucet. F. 5

de Pensylvanie. 5

des marais. F. 5

vitis-idea L.
stamineum L.
amœnum H. K.
disomorphum Mich. Fl. }
macrocarpon H. K.
oxycoccus L.

STYPHELIA

daphnoides Smith. N. Holl. }
lissanthe daphnoides Brown. }
prodr.
cnidium Vent. Malm. }
leucopogon lanceolatus }
Brown. Prodr.

EMPETRUM

nigrum L.

ORDO IV.

CAMPANULACEÆ.

I. *Anthera distincta.*

MICHAXIA

campanuloides L'Her. N. Gen.

CANARINA

campanulata L. Mant.

CAMPANULA.

1. *Foliis lavibus; calicis sinibus non deflexis.*

uniflora L.
hederacea L.
rotundifolia L.
carpatia L. f.
rapunculus L.
persicifolia L. sp. ed. 1^a.
obliqua Jacq. H. Sch.
pyramidalis L.
lilifolia L.
grandiflora L. f. }
gentianoides Lamk. ill. }
rhomboidalis L.
verticillata L. f.

2. *Foliis asperis; sinibus calicis non deflexis.*

rhutenica Marsch. Cauc.

ponctué. Alpes. 3 (méd.)
à longues étamines. Am. S. 3
corymbifère. Am. S. 3
à gros fruit. Am. S. 3
canneberge. F. 3

STYPHÉLIA

à f. de daphné. N. Holl. or. 3

cnidium. N. Holl. or. 3

EMPÉTRUM

à fruit noir. Alpes. 3

ORDRE IV.

CAMPANULACÉES.

I. *Anthères distinctes.*

MICHAXIA

à fruit rude. Syrie. or. ♂

CANARINE

campaniforme. Madère. or. 2

CAMPANULE.

1. *Feuilles lisses; sinns du calice non abaissés.*

à une fleur. Alpes. 2
à feuilles de Lierre. F. 2
à feuilles rondes. F. 2
des monts Krapac. 2 (orn.)
raiponce. F. 2 (alim.)
à feuilles de pêcher. F. 2
oblique. ♂
pyramidale. F. ♂ (orn.)
à feuilles de Lis. Sibérie. 2
à grandes fleurs. Sibérie. 2
rhomboïdale. F. 2
verticillée. Russie. 2

2. *Feuilles rudes; sinns du calice non réfléchis.*

de Russie. 2

latifolia L.
 trachelium L.
 rapunculoides L.
 bononiensis L.
 glomerata L.
 petræa L.
 thyrsoides L.
 tomentosa Lamk. ill.
 peregrina L.
 lanuginosa Lamk. ill. }
 erinus L.

3. Sinubus calicis deflexis.

laciniata L.
 caucasica Marsch. cauc.
 betonicæfolia Marsch. cauc.
 lingulata Wald. et Kitt.
 medium L.
 longifolia Lapeyr. Fl.
 barbata L.
 spicata L.
 sibirica L.

4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

speculum L.
 hybrida L.
 perfoliata L.

5. Caule fruticoso.

aurea L. f.

TRACHELIUM

cœruleum L.

GESNERIA

tomentosa L.

PHYTEUMA

canescens Wald. et Kitt. Hung.
 spicata L.
 orbicularis L.
 hemisphærica L.
 pinnata L.

II. Anthæræ connatæ.

LOBELIA

fulgens Willd. Enum.
 surinamensis L.
 longiflora L.

à larges feuilles. Alpes. ♀
 cantelée. F. ♀
 fausse raiponce. F. ♀
 de Bologne. Italie. ♀
 agglomérée. F. ♀
 des rochers. Mont Baldo. ♀
 en thyrse. Alpes. ♂
 cotonneuse. orient. or. ♀
 hérissée. orient. or. ♂
 érine. F. ☉

3. Sinus du calice abaissés.

laciniée. crête. or. ♀
 du Caucase. ♀
 à feuilles de bétouine. cauc. ♀
 de Hongrie. ♂
 des jardins. F. ♂ (orn.)
 à long. f. pyrénées. ♀ (orn.)
 barbue. Alpes. ♀
 à épis. Alpes. ♂
 de Sibérie. ♂

4. Capsules en colonne ou prismatiques.

miroir de Vénus. F. ☉ (orn.)
 hybride. F. ☉
 perfoliée. Am. s. ☉

5. Tige ligneuse.

jaune. canaries. or. ♀

TRACHELIUM

à fl. bleues. Alger. or. ♀ (orn.)

GESNÉRIA

cotonneux. Antilles. s. ch. ♀

PHYTEUMA

blanchâtre. Hongrie. ♀
 en épi. F. ♀
 orbiculaire. F. ♀
 hémisphérique. F. ♀
 à feuil. pennées. orient. or. ♀

II. Anthères réunies.

LOBÉLIA

éclatant. Mexique. or. ♀ (orn.)
 de Surinam. s. ch. ♀
 à longues fleurs. Antilles. s. ch.
 ♀ (vénéen.)

cardinalis L.
 syphilitica L.
 inflata L.
 cliffortiana L.
 urens L.
 triquetra L. Mant.
 laurentia L.
 erinus L.
 pubescens Jacq. H. sch.
 minuta L. Mant.

cardinale. Am. s. ℥ (orn.)
 syphilitique. Am. s. ℥ (méd.)
 renflé. Am. s. ⊙
 de Clifffort. Antilles. s. ch. ⊙
 brillant. F. ⊙
 triangulaire. cap. or. ♂
 à longs pédoncules. Italie. ⊙
 à feuilles d'érine. cap. ⊙
 pubescent. cap. or. ℥
 nain. corsé. or. ℥

GOODENIA

ovata Smith. Soc. Linn.
 grandiflora Bot. Mag.
 lævigata Bot. Mag.

GOODÉNIA

à feuil. ovales. N. Holl. or. ℥
 à grandes fleurs. N. Holl. or. ℥
 lisse. N. Holl. or. ℥

JASIONE

montana L.

JASIONÉ

de montagne. F. ♂

CLASSIS X.

CLASSE X.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(Corollapistillo imposita; antheræ connatæ.) (Corolle sur le pistil; anthères réunies.)

ORDO I.

ORDRE I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

SEMIFLOSCULEUSES.

I. Receptaculum nudum; semen absque pappo.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

LAMPSANA

communis L.
 — crispa.
 lyrata Willd. Enum.

LAMPSANE

commune. F. ⊙
 — crépue.
 en lyre. mer casp. ℥

RHAGADIOLUS

stellatus Willd. sp. }
 Lampsana stellata L. }
 lampsanoides. }
 edulis Willd. sp. }
 Lampsana rhagadiolus L. }
 kolpinia. }
 Lampsana kolpinia L. f. }

RHAGADIOLE

étoilée. orient. ⊙
 comestible. F. ⊙
 kolpinia. Tartarie. ⊙

II. *Receptaculum nudum ; semen papposum.*

PRENANTHES

- muralis* L.
- hispida* Willd. sp.
- viminea* L.
- purpurea* L.
- pinnata* L. f.

CHONDRILLA

- juncea* L.

LACTUCA

- perennis* L.
- tenerrima* Willd. sp.
- saligna* L.
- sagittata* Wald. et Kitt. Hung.
- virosa* L.
- *laciniata*.
- maculata* Horn.
- scariola* L.
- *sanguinea*.
- saliva* L.
- *romana*.
- *capitata*.
- *crispa*.
- intybea* Jacq. Ic.
- spinosa* Desf. Atl.
- Prenanthes spinosa* Willd. sp. }

SONCHUS

- fruticosus* L'Her. stirp.
- pinnatus* H. K.
- congestus* Decand. cat.
- broussonetii* ?
- macranthos* Encycl. suppl. }
- tataricus* L. Mant.
- macrophyllus* Willd. sp.
- plumieri* L.
- alpinus* L.
- floridanus* L.
- multiflorus*.
- racemosus* Encycl. }
- oleraceus* L.
- *asper*.
- lacerus* Willd. Enum.
- divaricatus* Desf. Ann.
- chondrilloides* Desf. Atl.
- tenerrimus* L.

II. Réceptacle nu ; graine couronnée d'une aigrette.

PRÉNANTHES

- des murailles*. F. ♂
- hérissé*. Sibérie. ♀
- effilé*. F. L
- pourpre*. Alpes. L
- penné*. Canaries. or. ♀

CONDRIILLE

- jonciforme*. F. ♀

LAITUE

- vivace*. F. ♀
- glauque*. F. ♀
- lancéolée*. F. ⊙
- sagittée*. Hongrie. ♂
- vireuse*. F. ⊙
- *laciniée*.
- maculée*. ⊙
- Escariote*. F. ⊙
- *pourpre*.
- cultivée*. ⊙ (alim. méd.)
- *romaine*.
- *pommée*.
- *crépue*.
- à tige nue*. Antilles. ⊙
- épineuse*. Barbarie. or. ♀

LAITRON

- arbrisseau*. Canaries. or. ♀
- penné*. Madère. or. ♀
- aggloméré*. Canaries. or. ♀
- de Tartarie*. ♀
- à grandes feuilles*. Am. s. ♀
- de Plumier*. Alpes. ♀
- des Alpes*. L
- de la Floride*. Am. s. ♂
- à fleurs nombreuses*. ⊙
- commun*. ⊙
- *rude*.
- lacéré*. ⊙
- étalé*. Égypte. or. L
- à tige de condriille*. Barb. ♀
- lacinié*. F. ⊙

palustris L.
arvensis L.
uliginosus Marsch. cauc.
maritimus L.

des marais. F. ☞
des champs. F. ☉
aquatique. caucase ☉
maritime. F. ☞

HERACIUM.

1. *Caule folioso.*

fruticosum Willd. sp.
umbellatum L.
sabaudum L.
— maculatum.
— latifolium.
blattarioides L.
amplexicaule L.
villosum L.
grandiflorum Wald. et Kitt. }
 Hung. }
pappoleucum Vill. Delph. }
prostratum.
eriophorum Dec. syn.
lanatum Wald. et Kitt. Hung.
glaucum All. Ped.
lævigatum Willd. H. Ber.
nigrescens Willd. H. Ber.
alpinum L.
intybaceum Jacq. Austr. }
albidum Vill. Delph. }
tubulosum Encycl. }
paludosum L.
lampsanoides Couan. Ill.
prenanthoides L.
globosum.
Jacquini Vill. Delph. }
pumilum Jacq. Austr. }
humile Willd. sp. }
murorum L.
sylvaticum Willd.
prunellæfolium All. Ped. }
pumilum L. Mant. }
porrifolium L.
echioides Wald. et Kitt. Hung.

2. *Caule nudo multifloro.*

aurantiacum L.
florentinum Willd. sp.
piloselloides Vill. Delph.
cymosum L.

EPERVIERE.

1. *Tige feuillue.*

arbrisseau. madère? or. ☽
ombellifère. F. ☞
de Savoie. F. ☞
— tachetée.
— à larges feuilles.
à feuil. de blattaire. Alpes. ☞
amplexicaule. Alpes. ☞
velue. Alpes. ☞

à grandes fleurs. Alpes. ☞

couchée. ☞
lanugineuse. F. ☞
laineuse. Hongrie. ☞
glaucue. Alpes. ☞
lisse. ☞
à graines noires. ☞
des Alpes. ☞

tubulée. Alpes. ☞

des marais. Alpes. ☞
à f. de Lampsane. Pyrénées. ☞
à f. de Prenanthes. Alpes. ☞
globuleuse. ☞

de Jacquini. Alpes. ☞

des murailles. F. ☞
des bois. F. ☞

à feuil. de brunelle. Alpes. ☞
à feuil. de poivrau. Alpes. ☞
hérissée. Hongrie. ☞

2. *Tige nue à plusieurs fleurs.*

couleur de feu. Alpes. ☞ (orn.)
de Florence. ☞
à feuil. de piloselle. Alpes. ☞
corymbifère. Alpes. ☞.

repens.
auricula L. }
dubium L. }

3. *Caule nudo unifloro.*

pilosella L.
aureum Willd. sp. }
Leontodon aureum L. }
bulbosum Willd. sp. }
Leontodon bulbosum L. }

CREPIS

sibirica L.
hieracium sibiricum Willd. sp. }
parviflora.
coronopifolia Desf. Atl.
albida Vill. Delph.
alpina L.
rubra L.
pauciflora.
nemausensis Gouan. Ill. }
Andryala nemausensis Vill. }
Delph.
foetida L.
pulchra L.
prenanthes hieraciifolia }
Willd. sp.
hispidula Wald. et Kitt. Hung.
dioscoridis Thuill. Fl. (non L.)
patula.
tectorum L. }
virens Vill. Delph. }
biennis L.
taurinensis Willd. sp. }
Barkhausia taraxacifolia Dec. }
Fl.
rigida Wald. et Kitt. Hung.
aspera L.

DREPANIA

barbata. }
crepis barbata L. }
— pallida.

HYOSERIS.

1. *Caule ramoso.*

hedypnois L.
rhagadioloides L.
cretica L.

rampante. ℥
auriculée. F. ℥

3. *Tige nue à une fleur.*

piloselle. F. ℥
orangée. Alpes. ℥
bulbeuse. F. ℥

CRÉPIS

de Sibérie. ℥
à petites fleurs. orient. ⊙
à f. de corne-de-cerf. Barb. ⊙
blanc. Alpes. ℥
des Alpes. ⊙
rouge. F. ⊙ (orn.)
à fleurs rares. Égypte. ⊙
à tige nue. F. ⊙
fétide. F. ⊙
à feuil. de Lampsane. F. ⊙
hérissé. Hongrie. ⊙
de Dioscoride. F. ⊙
étalé. ⊙
des toits. F. ⊙
bisannuel. F. ♂
de Turin. F. ⊙
roide. Hongrie. ℥
piquant. orient. ⊙

DRÉPANIA

barbu. F. m. ⊙
— à fleurs pâles.

HYOSÉRIS.

1. *Tige rameuse.*

dormeuse. F. ⊙
rhagadiole. F. ⊙
de Crète. ⊙

2. *Caule nudo simplici.*

radiata L.
lucida L. *Mant.*
scabra L.
foetida *Gouan. Monsp.*
Lampsana foetida *Willd. sp.* }
minima L. }
Lampsana minima *Dec. Fl.* }
taraxacoides *Vill. Delph.* }
trincia hispida *Dec. Fl.* }

ZACINTHA

verrucosa *Willd. sp.* }
Lampsana zacintha L. }

TARAXACUM

dens-leonis *Desf. Atl.* }
Leontodon taraxacum L. }
obovatum.
Leontodon obovatus *Willd. sp.* }
palustre *Dec. syn.*

APARGIA

alpina *Willd. sp.* }
Leontodon pyrenaicum }
Gouan. ill.
autumnalis *Willd. sp.* }
Leontodon autumnale L. }
hastilis *Willd. sp.* }
Leontodon hastile L. }
hispida *Willd. sp.* }
Leontodon hispidum L. }
crispa *Willd. sp.* }
Leontodon crispum *Vill. Delph.* }

PICRIS

hieracioides L.
sprengeriana.
hieracium sprengerianum L. }
integrifolia.
globulifera. }
crepis dioscoridis *Dec. Ic.* }

HELMINTIA

echioides *Willd. sp.* }
picris echioides L. }

SCORZONERA

hispanica L.

2. *Tige nue simple.*

rayonnée. F. ☉
luisante. orient. ♂
rude. Italie. ☉
fétide. F. ☉
petite. F. ☉
commune. F. ♀

ZACINTHA

tuberculeux. orient. ☉

TARAXACUM

dent-de-lion. F. ♀
ovale renversé. Esp. ♀
des marais. F. ♀

APARGIA

des Alpes. ♀
d'automne. F. ♀
lancéolé. F. ♀
hérissé. F. ♀
crépu. F. ♀

PICRIS

épervière. F. ♂
de Sprenger. F. ☉
à feuilles entières. ☉
globuleux. F. ☉

HELMINTIA

hérissé. F. ☉

SCORSONÈRE

d'Espagne. ♂ (alim.)

angustifolia L.
 austriaca willd. sp.
 humilis L.
 laciniata L.
 calcitrapifolia vahl. symb.
 villosa scop. carn.
 eriosperma willd. sp.

à feuilles étroites. F. ♀
 d'Autriche. ♀
 petite. F. ♀
 laciniée. F. ♂
 à f. de chausse-trape. orient. ☉
 velue. carniote. ♂
 laineuse. F. m. ♀

PICRIDIMUM

vulgare Desf. Atl.
 scorzonera picroides L.
 sonchus picroides willd. sp.
 tingitanum Desf. Atl.
 scorzonera tingitana L.
 sonchus tingitanus willd. sp.

PICRIDIMUM

commun. F. ☉ (alim.)
 de Tanger. ☉

TRAGOPOGON

pratensis L.
 major Jacq. Austr.
 undulatus Jacq. Ic.
 mutabilis Jacq. Ic.
 porrifolius L.
 crocifolius L.

CERCIFIX

des prés. F. ♂ (alim.)
 élevé. Autriche. ☉
 ondulé. orient. ♂
 à fl. changeantes. Sibérie. ♂
 à feuilles de poireau. F. ♂
 à feuilles de safran. F. m. ♂

UROSPERMUM

dalechampii.
 tragopogon dalechampii L.
 arnopogon dalechampii
 willd. sp.
 picroides.
 tragopogon picroides L.
 arnopogon picroides willd.
 sp.

UROSPERMUM

de Dalechamp. F. ♂
 hérissé. F. ☉

III. Receptaculum villosum aut paleaceum.

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

GEROPOGON

glaber L.

GÉROPOGON

glabre. Italie. ☉

HYPOCHÆRIS

maculata L.
 helvetica Jacq. Ic.
 glabra L.
 radicata L.

HYPOCHÉRIS

tacheté. F. ♀
 de Suisse. ♀
 glabre. F. ☉
 à longues racines. F. ♀

SÉRIOLA

æthnensis L.
 cretensis L.

SÉRIOLA

de l'Etna. Italie. ☉
 de Crète. ☉

ANDRYALA

integrifolia L.

ANDRYALA

à feuilles entières. F. ♂

sinuata L.
lanata L.
ragusina L.
cheiranthifolia *Pier.* stirp.

sinué. F. ♂
laineux. F. ♀
de Raguse. or. ♀
à f. de giroflée, madère. or. ♂

CATANANCHÉ
cœrulea L.
lutea L.

CATANANCHÉ
bleu. F. ♂ (orn.)
jaune. F. m. ⊙

CICHIORIUM
intybus L.
endivia L.
 — *crispa.*
pumilum Jacq. obs.
spinosum L.

CHICORÉE
sauvage. F. ♀ (méd. alim.)
Endive. ♂ (alim.)
 — *crépue.*
naine. ⊙
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS
maculatus L.
hispanicus L.

SCOLYMUS
panaché. Italie. ⊙
d'Espagne. ♂

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

I. *Receptaculum setosum aut palaceum ;
 semen papposum ; flores flosculosi omnes
 hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)*

CNICUS.

I. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

centauroides Willd. sp.
cernuus Willd. sp.
oleraceus Willd. sp.
tataricus Willd. sp.
ochroleucus Willd. sp.
uliginosus Marsch. cauc.
erisithales Willd. sp.
semipectinatus Encycl.
rivularis Willd. sp.
pratensis Willd. sp. }
carduus anglicus Encycl. }
tuberosus Willd. sp.
serratuloides Willd. sp.
munitus Marsch. cauc.
arachnoideus Marsch. cauc.
ferox Willd. sp.
spinosissimus Willd. sp.

ORDRE II.

FLOSCULEUSES.

I. *Réceptacle garni de soies ou de paillettes ;
 graines aigrettées ; tous les fleurons her-
 maphrodites. (Polygamie égale.)*

CNICUS.

I. *Fenilles sessiles ou embrassantes.*

à feuilles de centauree. F. ♀
penché. Sibérie. ♀
des prés. F. ♂
de Tartarie. ♂
jaunâtre. F. ♀
des marécages. caucase. ♀
erisithalès. Alpes ♂
semipectiné. Tartarie. ♀
des ruisseaux. Autriche. ♀
des prés. F. ♀
tubéreux. F. ♂
à feuilles de sarrète. F. ♀,
armé. caucase. ♀
arachnoïde. caucase. ♀
hérissé. Alpes. ♂
très-épineux. Suisse. ♀

ciliatus willd. sp.
eriphorus willd. sp.
diacantha bill. dec.
casabonæ willd. sp.
stellatus willd. sp.
syriacus willd. sp.
acaulis willd. sp.
fruticosus.

2. *Foliis decurrentibus.*

arvensis. }
serratula arvensis L. }
lanceolatus willd. sp.
acarna willd. sp.
palustris willd. sp.
monspeulanus willd. sp.
pyrenaicus willd. sp.
canus willd. sp.

CARDUUS

leucographus willd. sp.
arabicus willd. sp.
argentatus willd. sp.
candicans Wald. et Kitt. hung.
crispus willd. sp.
personata willd. sp. }
arctium personata L. }
acanthoides willd. sp.
pycnocephalus willd. sp.
carlinoides Gouan. ill.
medius Gouan. ill.
desfloratus willd. sp.
nutans willd. sp.
glaucophyllus.
marianus willd. sp.
 — *viridis.*

ONOPORDON

acanthium L.
 — *viride.*
illyricum L.
arabicum L.
acaulon L.

CINARA

scolymus L.
cardunculus L.
humilis L.

cilié. sibérie. L.
à tête laineuse. F. ♂
à doubles épines. syrie. ♂
casabon. eur. austr. or. ♂
étoilé. orient. ☉
de Syrie. ☉
sans tige. F. L.
arbrisseau. or. ♀

2. Feuilles décurrentes.

des champs. F. ♂
lancéolé. F. ♂
acarna. esp. ☉
des marais. F. ♀
de Montpellier. F. ♀
des Pyrénées. ♀
blanchâtre. Autriche. ♀

CHARDON

panaché. F. m. ☉
d'Arabie. ☉
argenté. égypte. ☉
blanchâtre. Hongrie. ♂
crépu. F. ☉
fausse bardane. Alpes. ☉
à feuilles d'acanthé. F. ☉
à fleurs tombantes. F. ☉
fausse carline. pyrénées. L.
intermédiaire. pyrénées. ♀
désfleuri. Alpes. L.
à tête penchée. F. ♂
à feuilles glauques. ♀
Marie. F. ♂
 — *vert.*

ONOPORDON

à feuilles d'acanthé. F. ♂
 — *vert.*
d'Illyrie. ♂
d'Arabie. ♂
sans tige. pyrénées. ♂

ARTICHAUT

cultivé F. m. ♀ (alim.)
cardon. barbarie. L. (alim.)
nain. Alger. or. ♀

LEUZEA

conifera *dec. fl.* }
centaurea conifera *L.* }

LEUZEA

conifère. Alpes. $\mathcal{Z}$

CARLINA

subacaulis *dec. fl.* }
chamæleon *vill. delph.* }
caulescens *encycl.* }
acanthifolia *all. ped.* }
lanata *L.* }
corymbosa *L.* }
aggregata *willd. sp.* }
vulgaris *L.* }

CARLINE

à tige courte. Alpes. $\mathcal{Z}$

à f. d'acanthé. Alpes. $\mathcal{V}$ (alim.)
laineuse. *F. m.* $\odot$
corymbifère. Italie. or. $\mathcal{V}$
fasciculée. Croatie. $\mathcal{V}$
commune. *F.* σ

ATRACTYLIS

cancellata *L.*

ATRACTYLIS

charlon-prisonnier. *F. m.* $\odot$

CARTHAMUS

tinctorius *L.*
lanatus *L.*
creticus *L.*
cœruleus *L.*
mitissimus *L.*
corymbosus *L.* }
brotera corymbosa *willd. sp.* }
salicifolius *L. f.* }
carlowisia salicifolia *dec.* }
Ann. }

CARTHAME

des teinturiers. Égypte. $\odot$
laineux. *F.* $\odot$
de Crète. $\odot$
bleu. Esp. $\mathcal{Z}$
sans épines. *F.* $\mathcal{V}$

corymbifère. Tunis. or. $\mathcal{V}$

à f. de saule. Canaries. or. $\mathfrak{y}$

ARCTIUM

lappa *L.*
— tomentosa.
grandiflora.

BARDANE

officinale. *F.* σ (méd.)
— cotonneuse.
à grandes fleurs. *F.* σ

STÆHELINA

dubia *L.*
chamæpeuce *s. reg.* }
serratula chamæpeuce *L.* }

STÉNÉLINA

à f. de romarin. *F. m.* or. $\mathfrak{y}$
chamepeucé. Orient. or. $\mathfrak{y}$

SERRATULA

centauroides *L.*
tinctoria *L.*
quinquefolia *Marsch. cauc.*
coronata *L.*
heterophylla *Desf. Atl.*
pinnatifida. }
carduus radiatus *Wald. et* }
Kitt. Hung. }
alata.

SARRETTE

luciniée. Sibérie. $\mathcal{Z}$
des teinturiers *F.* $\mathcal{V}$
à cinq folioles. Perse sept. $\mathcal{Z}$
couronnée. Sibérie. $\mathcal{V}$
à feuilles variables. Alpes. $\mathcal{V}$
pinnatifide. Hongrie. $\mathcal{Z}$
aillée. $\mathcal{V}$

II. *Receptaculum setosum aut paleaceum; flosculi steriles in ambitu; semen papposum.* (*Polygamia frustranea.*)

ZOEGEA

Leptaurea L. Mant.

CENTAUREA.

1. *Squamæ calicinae levēs, nec ciliatæ, nec spinosæ.*

crupina L.
Lippii L.
Amberboi *Encycl.* }
suaveolens *Willd. sp.* }
moschata L.
rhutenica *Encycl.*
centaurium L.
alpina L.
africana *Encycl.*

2. *Squamæ calicinae serrato-ciliatæ.*

phrygia L.
Jacea L.
nigra L.
nigrescens *Willd. sp.*
uniflora L. Mant.
pullata L.
montana L.
axillaris *Willd. sp.* }
seusana *Will. Delph.* }
variegata *Encycl.* }
cyanus L.
paniculata L.
spinosa L.
ragusina L.
candidissima *Encycl.*
cinerea *Encycl.*
dealbata *Willd. sp.*
decumbens *Pers. syn.*
scabiosa L.

3. *Squamæ calicinae aridæ, scariosæ, ciliato-serratæ.*

atropurpurea *Wald. et Kitt.*
Hung.
orientalis L.
balsamita *Encycl.*

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines couronnées d'aigrettes; fleurons stériles à la circonférence. (*Polygamie frustranée.*)

ZOÉGÉA

d'Orient. ☉ (orn.)

CENTAURÉE.

1. Ecailles du calice lisses, ni ciliées, ni épineuses.

à f. de condrilla. F. m. ☉
de Lippi. Egypte. ☉
odorante. orient. ☉ (orn.)
musquée. orient. ☉ (orn.)
de Russie. ☿
grande. Italie. ☿
des Alpes. ☿
d'Afrique. barbarie. ☿

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

plumée. Alpes. ☿
Jacée. F. ☿
noire. F. ☿
brune. Autriche. ☿
à une fleur. F. m. ☿
à collerette. F. m. ☿
de montagne. Alpes. ☿

axillaire. Alpes. ☿

bluet. F. ☉ (orn.)
paniculée. F. ☉
épineuse. orient. or. ☿
de Raguse. orient. or. ☿
très-blanche. Italie. or. ☿
cendrée. Italie. or. ☿
blanchâtre. Thérie. ☿
couchée. Alpes. ☿
scabieuse. F. ☿

3. Ecailles du calice desséchées, ciliées, dentées en scie.

noire-pourpre. Hongrie. ☿
d'Orient. or. ☿
à f. de balsamite. orient. ☉

4. *Squamæ calicinæ scariosæ, integræ vel lacera.*

glastifolia L.
alata *Encycl.*
alba L.
picris *Willd. sp.*
splendens L.
rhapontica L.
macrocephala *Willd. sp.*

5. *Spinæ calicinæ palmatæ.*

sonchifolia L.
ferox *Desf. Atl.*
seridis L.
aspera L.
napifolia L.
sphærocephala L.
prolifera *Vent. H. cels.* }
straminea *Willd. sp.* }
melitensis L.
sicula L.
soslitialis L.

6. *Spinæ calicinæ composita.*

verutum L.
apula *Encycl.*
eriphora L.
benedicta L.
calcitrapa L.

7. *Squamæ calicinæ ciliatæ, spinâ terminatæ.*

diffusa *Encycl.*
multifida *Pers. syn.* }
pubescens *Willd. sp.* }
collina L.
diluta H. K.

8. *Squamæ calicinæ integræ; spinæ simplicibus.*

salmantica L.
pumila L.
crocodylum L.
muricata L.
galactites L.
galactites tomentosa *Dec.* }
Ann.

4. Écailles du calice desséchées, entières ou déchirées.

à f. de pastel. orient. ℥
 ailée. Tartarie. ℥
 blanche. Esp. ℥
picris. orient. or. ℥
 luisante. suisse. ♂
rhapontic. Alpes. ℥
 à grosse tête. ibérie. ℥

5. Épines du calice palmées.

à feuilles de Laitron. F. m. ⊙
 hérissée. Alger. ℥
 à feuilles de chicorée. Esp. ℥
 rude. F. m. ℥
 à feuilles de Navet. orient. ⊙
 à tête ronde. barbarie. ⊙
 prolifère. Égypte. ⊙
 de Malte. ⊙
 de Sicile. ⊙
 du solstice. F. ⊙

6. Épines du calice rameuses.

à longues épines. orient. ⊙
 de la Pouille. ⊙
 à tête laineuse. Alger. ⊙
 chardon-bénit. F. m. ⊙ (méd.)
 chausse-trape. F. ♂

7. Écailles du calice ciliées, terminées par une épine.

étalée. orient. ℥
 laciniée. ℥
 des collines. F. ℥
 rose-pâle. Eur. m. ⊙

8. Écailles du calice entières; épines simples.

de Salamanque. F. m. ℥
 naine. Égypte. or. ♂
 à f. de vulnéraire. Égypte. ⊙
 à fleurs de bluet. Esp. ⊙
 panachée. F. m. ♂

III. *Flosculi calice proprio cincti.*
(*Polygamia segregata.*)

ELEPHANTOPUS
scaber L.

SPHÆRANTHUS
indicus L.

LAGASCEA
mollis *willd. Enum.*

OEDEIRA
prolifera L.

ECHINOPS
sphærocephalus L.
nitro L.
strigosus L.

IV. *Receptaculum nudum; semina absque
pappo; flosculi omnes hermaphroditi.*
(*Polygamia aequalis.*)

BALSAMITA
ageratifolia.
chrysanthemum flosculo-
sum L. }
suaveolens. }
tanacetum balsamita L. }
annua. }
tanacetum annuum L. }

FLAVERIA
contrayerba *willd. Enum.* }
milleria contrayerba. *Encycl.* }

ETHULIA
conyzoides L.

HUMEA
elegans *smith. Exot. bot.* }
calomeria amaranthoides }
vent. Malm. }

V. *Receptaculum nudum, villosum aut
paleaceum; semina nuda; flosculi fœmi-
nei in ambitu.* (*Polygamia superflua.*)

HIPPIDIA
frutescens L. f.

GYMNOSTYLES
anthemifolia *Juss. Ann.*

III. Fleurons entourés d'un calice partiel.
(*Polygamie séparée.*)

ELÉPHANTOPUS
rude. inde. s. ch. ♀

BOULETTE
des Indes. s. ch. ♀

LAGASCEA
velouté. cuba. ☉

OEDEIRA
prolifère. cap. s. ch. ♂

ECHINOPS
à grosse tête. F. ♂
azuré. F. m. ♂
à feuilles rudes. esp. ☉

IV. Réceptacle nu; graines sans aigrettes;
tous les fleurons hermaphrodites. (*Poly-
gamie égale.*)

BALSAMITE
à f. d'ageratum. crète. or. ♂

odorante. F. m. ♂

annuelle. esp. ☉

FLAVERIA
contrayerba. pérou. ☉

ETHULIA
fausse conyse. inde. ☉

HUMEA
élégant. N. holl. or. ♂

V. Réceptacle nu, velu ou garni de pail-
lettes; graines nues; fleurons femelles à
la circonférence. (*Polygamie superflue.*)

HIPPIDIA
arbrisseau. cap. or. ♂

GYMNOSTYLE
à f. d'antémis. N. holl. ☉

TANACETUM

suffruticosum L.
vulgare L.
— crispum.
sibiricum L.

CARPESIMUM

cernuum L.
abrotanoides L.

GRANGÆA

latifolia *Encycl. suppl.*
maderaspatana *Encycl. suppl.*
Artemisia maderaspatana L.
cotula maderaspatana Willd. }
sp.
minima *Encycl. suppl.* }
Artemisia minima L. }
cotula minima Willd. sp. }

ARTEMISIA.

1. *Herbaceæ* ; calices oblongi.

capillifolia *Encycl.*
vulgaris L.
palmata *Encycl.*
maritima L.
suaveolens *Encycl.*

2. *Herbaceæ* ; calice hemispharico.

austriaca Jacq. Austr.
annua L.
leucanthemifolia.
campestris L.
neglecta Willd. Enum.
dracunculus L.
inodora Willd. Enum.
biennis Willd. sp. }
zeelandica *Encycl.* }
pectinata Pallas, itin.
sivertiana Willd. sp.
violacea.
tanacetifolia L.
glacialis L.
rupestris L.
insipida Vill. Delph.
Absinthium L.
pontica L.

TANAISIE

sous-arbrisseau. cap. or. ♀
commune. F. ♀ (méd.)
— crépue.
de Sibérie. ♂

CARPESIMUM

penché. F. ♂
à fl. d'Aurone. chine. s. ch. ♂

GRANGÆA

à larges feuilles. inde. ⊙

à feuilles sinuées. inde. ⊙

petit. inde. ⊙

ARMOISE.

1. Tiges herbacées ; calices oblongs.

capillaire. chine. or. ♂
commune. F. ♂ (méd.)
palmée. Esp. or. ♂
maritime. F. ♂
odorante. F. ♂

2. Tiges herbacées ; calice hémisphérique.

d'Autriche. ♂
annuelle. Sibérie. ⊙
à fl. de Leucanthème. ♀
des champs. F. ♀
de Sprengel. Sibérie. ♀
Estragon. Tartarie. ♀ (écon.)
inodore. Daourie. ♂
bisannuelle. N. Zélande. or. ♂
pectinée. Daourie. ⊙
fausse Absinthe. Sibérie. ♂
à fleur violette. ♂
à feuell. de Tanaisie. Alpes. ♂
des glaciers. Alpes. ♂
des rochers. Alpes. ♀
insipide. Alpes. ♀
Absinthe. F. ♀ (méd.)
de Pont. ♀ (méd.)

3. *Fruticosa.*

cœrulescens L.
corymbosa *Encycl.*
valentina *Encycl.*
Abrotanum L.
afra Willd. *sp.*
chinensis L.
argentea *l'her. sert.*
arborescens L.

MICROPUS

erectus L.
supinus L.
pygmæus. }
filago pygmæa L. }

VI. *Receptaculum nudum, rarius paleaceum; semina papposa; flosculi faminei in ambitu. (Polygamia superflua.)*

FILAGO

montana L.
germanica L.
gallica L.
pyramidata L.
Leontopodium L.

XERANTHEMUM

annuum L.
inapertum L.

ELICHRYSUM

fulgidum Willd. *sp.* }
xeranthemum fulgidum L. *f.* }
retortum Willd. *sp.* }
xeranthemum retortum L. }
bracteatum Willd. *Enum.* }
xeranthemum bracteatum }
vent. Malm.

GNAPHALIUM.

1. *Chrysocoma.*

stæchas L.
 — *minor.*
crassifolium *Encycl.* (non L.)
ovatum. }
crassifolium L. *Mant.* }
cymosum L.
orientale L.

3. Tiges ligneuses.

bleuâtre. *italie.* ♀
corymbifère. *italie.* ♀
de Valence. *esp. or.* ♀
citronnelle. *f. m.* ♀ (méd.)
d'Afrique. *cap. or.* ♀
moxa. *chine. or.* ♀ (méd.)
argentée. *canaries. or.* ♀
en arbre. *f. m. or.* ♀

MICROPUS

à tige droite. *f.* ⊙
couché. *f.* ⊙
nain. *f.* ⊙

VI. Réceptacle nu, rarement garni de paillettes; graines aigrettées; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

FILAGO

de montagne. *f.* ⊙
dichotome. *f.* ⊙
de France. ⊙
pyramidal. *f.* ⊙
pied-de-lion. *Alpes.* ♀

XÉRANTHÈME

annuel. *f.* ⊙ (orn.)
fermé. *f.* ⊙

ELICHRYSUM

éclatant. *cap. or.* ♂ (orn.)
contourné. *cap. or.* ♀
à grandes bractées. *N. Holl. or.*
 ♂ (orn.)

IMMORTELLE.

1. Fleurs jaunes.

stéchas. *f. m. or.* ♀ (méd.)
 — *naine.*
à feuilles épaisses. *or.* ♀
à feuilles ovales. *cap. or.* ♀
corymbifère. *cap. or.* ♀
d'Orient. *or.* ♀ (orn.)

arenarium L.
 luteo-album L.
 foetidum L.
 patulum L.

2. *Argyrocoma.*

diosmæfolium Vent. Malm.
 teretifolium L.
 undulatum L.
 spathulatum Encycl.
 glomeratum.
 serpyllifolium Encycl.
 margaritaceum L.
 dioicum L.
 leyseroides Desf. Atl.
 supinum L.
 alpinum L.
 sylvaticum L.
 uliginosum L.

CONYZA et BACCHARIS

neriifolia. }
 baccharis neriifolia L. }
 ivæfolia. }
 baccharis ivæfolia L. }
 halimifolia. }
 baccharis halimifolia L. }
 dioscoridis. }
 baccharis dioscoridis L. }
 odorata L.
 candida L.
 asteroides.
 gouani. }
 erigeron gouani L. }
 thapsioides Marsch. cauc.
 paniculata.
 ægyptiaca Willd. sp. }
 erigeron ægyptiacum L. }
 Mant.
 squarrosa L.
 rupestris L. Mant.
 sordida L. Mant.
 saxatilis L.

TUSSILAGO

alpina L.
 farfara L.
 alba L.
 petasites L.
 fragrans Will. Delph.

des sables. Allem. ☉
 jaune-blanche. F. ☉
 fétide. cap. ☉
 étalée. cap. or. ☿

2. Fleurs blanches.

à f. de *Diosma*. cap. or. ☿
 à feuell. cylindriq. cap. or. ☿
 ondulée. Antilles. ☉
 en spatule. ☉
 agglomérée. N. Holl. or. ☿
 à f. de *serpolet*. cap. or. ☿
 des jardins. Am. s. ☿ (orn.)
 Pied-de-chat. F. ☿ (méd.)
 à feuell. de *Leysera*. Tunis. ☉
 petite. Alpes. ☿
 des Alpes. ☿
 des bois. F. ♂
 des marais. F. ☉

CONYSE

à f. de *Nérium*. cap. or. ☿
 à feuilles d'*Iva*. Am. s. or. ☿
 à feuilles d'*Halime*. Am. s. ☿
 de *Dioscoride*. syrie. or. ☿
 odorante. Antilles. s. ch. ☿
 blanche. candie. or. ☿
 à feuilles d'*Aster*. s. ch. ☿
 de *Gouan*. canaries. or. ☿
 à feuell. de *molène*. caucase. ☿
 paniculée. ☉
 d'*Egypte*. or. ☿
 rude. F. ♂
 des rochers. barbarie. or. ☿
 à fleurs ternées. F. m. or. ☿
 à une fleur. F. m. or. ☿

TUSSILAGE

des Alpes. ☿
 Pas-d'âne. F. ☿ (méd.)
 blanc. F. ☿
 pétasite. F. ☿
 odorant. ☿ (orn.)

VII. *Receptaculum nudum*; *semen pap-
posum*; *flosculi omnes hermaphroditi*.
(*Polygamia æqualis*.)

CACALIA.

1. *Fruticosæ*.

laciniata Jacq. ic. }
articulata L. f. }
papillaris L.
Anteeuphorbium L.
kleinia L.
ficoides L.
cylindrica Encycl.
repens L. Mant.
odorata.
reticulata Vahl. symb.

2. *Herbaceæ*.

linaria Cav. ic.
porophyllum L.
suaveolens L.
senecioides.
petasites Encycl.
tomentosa Encycl.
alliariæfolia Encycl.
atriplicifolia L.
sagittata Willd. sp.

CHRYSOCOMA

dichotoma L. f.
coma-aurea L.
cernua L.
biflora L.
dracunculoides Encycl. }
linosyris L.
juncea.
graminifolia L.

VERNONIA

novæboracensis Willd. sp. }
serratula novæboracensis L. }
præalta Willd. sp. }
serratula præalta L. }
anthelmintica Willd. sp. }
conyza anthelmintica L. }

LIATRIS

spicata Willd. sp. }
serratula spicata L. }
squarrosa Willd. sp. }
serratula squarrosa L. }

VII. *Réceptacle nu*; *graine aigrettée*; *tous
les fleurs* *ont* *hermaphrodites*. (*Polyga-
mie égale*.)

CACALIA.

1. *Tiges ligneuses*.

lacinié. cap. s. ch. 5
mamelonné. cap. s. ch. 5
à feuilles ovales. cap. s. ch. 5
kleinia. canaries. s. ch. 5
Ficoïde. cap. s. ch. 5
cylindrique. cap. s. ch. 5
rampant. cap. s. ch. 5
odorant. n. holl. or. 5
à réseau. ile de F. s. ch. 5

2. *Tiges herbacées*.

à f. linéaires. n. esp. s. ch. 5
à f. poreuses. Antilles. s. ch. 5
suave. Am. s. 5
à fleurs de senegon. 5
à f. de Tussilage. Alpes. 5
cotonneux. Alpes. 5
à f. d'Alliaire. Alpes. 5
à f. d'Arroche. Am. s. 5
à f. hastées. Java. ☉ (orn.)

CHRYSOCOME

dichotome. canaries. or. 5
dorée. cap. or. 5
penchée. cap. or. 5
à deux fleurs. sibiérie 5
linosyris. F. 5
jonciforme. 5
à f. de Gramen. Am. s. 5

VERNONIA

de Newyork. 5 (orn.)
gigantesque. Am. s. 5 (orn.)
anthelmintique. inde. s. ch. 5

LIATRIS

à épis. Am. s. 5
rude. Am. s. 5

EUPATORIUM.**EUPATOIRE.**1. *Calix imbricatus, 3 ad 9 florus.*

1. Calice imbriqué, renfermant 3-9 fleurs,

Houstonia L. }
Mikania Houstonia Willd. sp. }
Dalea L. }
scandens L. }
Mikania scandens Willd. sp. }
altissimum L. }
cannabinum L. }
syriacum Jacq. Ic. }
sessilifolium L. }
purpureum L. }
maculatum L. }

de Houston. Am. s. s. ch. ♀
de la Jamaïque. s. ch. ♀
grimpante. Am. s. or. ♀
élevée. Am. s. or. ♀
à f. de chanvre. F. ℥ (méd.)
de Syrie. ♀
à feuilles sessiles. Am. s. ℥
pourpre. Am. s. ♀
maculée. Am. s. ℥

2. *Calix imbricatus, decemflorus et ultra.*

2. Calice imbriqué, renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurs.

atriplicifolium Vahl. symb.
deltoideum Jacq. II. sch.
perfoliatum L.
aromaticum L.
cœlestinum L.
ageratoides L. f.
fruticosum.

à f. d'arroche. Ant. s. ch. ♀
deltoïde. s. ch. ℥
perfoliée. Am. s. ♀
aromatique. Am. s. ℥
à f. de scorodonia. Am. s. ♀
agératoïde. Am. s. ♀
ligneuse. or. ♀

STEVIA**STÉVIA**

serrata Cav. Ic.
Ageratum punctatum Ortega, }
Dec. }
ivæfolia Willd. Enum.
purpurea Willd. Enum.
Eupatoria Willd. Enum.
pedata Cav. Ic. }
Ageratum pedatum Ortega, }
Dec. }

à f. en scie. Mexique. or. ℥
à f. d'iva. Mexique. or. ℥
pourpre. Mexique. or. ♀
fausse Eupatoire. Mexiq. or. ♀
en pédale. Cuba. ☉

KUHNTIA**KUHNTIA**

rosmarinifolia Vent. H. cels. }
Eupatorium canescens Or- }
tega, Dec. }

à f. de romarin. Cuba. s. ch. ♀

PIQUERIA**PIQUÉRIA**

trinervia Cav. Ic.

à trois nervures. Mexiq. s. ch. ℥

AGERATUM**AGÉRATUM**

conyzoides L.
cœruleum.

fausse conyse. Antilles. ☉
à fleurs bleues. Antilles. ☉

CEPHALOPHORA**CÉPHALOPHORA**

glauca Cav. Ic.

glauque. Chili. or. ♀

VIII. *Receptaculum villosum aut palaceum; semen nudum aut subnudum.*

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes; graines sans aigrette.

CALEA

aspera Jacq. Ic.

CALÈA

à feuilles rudes. Antilles. ☉

TARCHONANTHUS

camphoratus L.

TARCONANTE

camphré. cap. or. ♀

ATHANASIA

annua L.

trifurcata L.

crithunifolia L.

parviflora L. Mant.

tricuspis.

ATHANASIA

annuel. f. m. ☉

trifurqué. cap. or. ♀

à f. de bacelle. cap. or. ♀

à petites fleurs. cap. or. ♀

à trois pointes. cap. or. ♀

DIOTIS

maritima Desf. Atl.

Athanasia maritima L. }

DIOTIS

maritime. f. m. or. ☿

SANTOLINA

chamæcyparissus L.

rosmarinifolia L.

toментosa.

eriosperma Pers. syn. }

pinnata Viv. Fragm. }

SANTOLINE

commune. f. m. ♀

à f. de romarin. esp. or. ♀

colonneuse. esp. or. ♀

à tête laineuse. Italie. or. ☿

ANACYCLUS

aureus L. Mant.

ANACYCLUS

jaune. f. m. ☉

ORDO III.

RADIATÆ.

I. *Receptaculum nudum; pappus nullus.*

COTULA

aurea L.

anthemoides L.

coronopifolia L.

turbinata L.

Lidbeckia turbinata Willd. }
sp.

COTULA

jaune. esp. ☉

à feuilles d'anthémis. esp. ☉

corne-de-cerf. cap. ☉

conique. cap. ☉

BELLIS

annua L.

perennis L.

PAQUERETTE

annuelle. f. ☉

vivace. f. ☿ (orn.)

MATRICARIA

parthenium L.

parthenioides.

MATRICAIRE

officinale. f. ☿ (méd.)

inodore. ☿

ORDRE III.

RADIÉES.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

chamomilla L.
 suaveolens L.
 capensis L. Mant.

camomille. F. ☉
 odorante. F. ☉ (méd.)
 du Cap. ☉

CHRYSANthemum.

CHRYsANTHÈME.

1. *Leucanthema*.

Fruticosa.

frutescens L. }
 pyrethrum frutescens Willd. }
 sp. }
 pinnatifidum L. f. }
 grandiflorum. }
 pyrethrum grandiflorum }
 Willd. Enum. }
 asteroides. }

Herbacea.

præaltum Vent. H. cels. }
 pyrethrum partheniifolium }
 Willd. Enum. }
 pulverulentum. }
 pyrethrum pulverulentum }
 Willd. Enum. }
 corymbosum L. }
 pyrethrum corymbosum }
 Willd. sp. }
 tenuifolium. }
 pyrethrum tenuifolium Willd. }
 Enum. }
 coccineum Willd. sp. }
 pyrethrum roseum Willd. }
 Enum. }
 serotinum L. }
 pyrethrum serotinum Willd. }
 sp. }
 Leucanthemum L. }
 maximum Ramond. Bull. }
 Phil. }
 pyrethrum latifolium Willd. }
 grandiflorum Lapeyr. Pyr. }
 ceratophylloides All. ped. }
 arcticum L. }
 montanum L. }
 balsamita L. }
 pyrethrum balsamita Willd. }
 sp. }

1. Fleurs blanches ou roses.

Tiges ligneuses.

arbrisseau. canaries. or. ♀
 pinnatifide. canaries. or. ♀
 à grandes fl. canaries. or. ♀
 astéroïde. s. ch. ♀

Tiges herbacées.

à f. de Matricaire. caucase. ♀
 pulvérulente. ibérie. ♀
 corymbifère. F. ♂
 à feuilles menues. caucase. ♂
 rose. ibérie. ♂
 d'automne. Am. s. ♂
 grande Marguerite. F. ♂
 à larges feuilles. Pyrénées. ♂
 à feuilles cornues. alpes. ♂
 du Caucase. ♂
 des montagnes. F. ♀
 balsamite. or. ♀

multifidum.
 pyrethrum pinnatifidum }
willd. sp.
 matricaria tanacetifolia *En-*
cycl. Excl. syn. Tourn. }
 monspeliense *L.*
 alpinum *L.*
 pyrethrum alpinum *Willd.* }
sp.
 carinatum *Schousb. Maroc.*

2. *Chrysanthema.*

miconis *L.*
 segetum *L.*
 coronarium *L.*
 roxburghii.
 pyrethrum indicum *H. K.* }

CALENDULA

arvensis *L.*
 officinalis *L.*
 stellata *Cav. Ic.*
 hybrida *L.*
 pluvialis *L.*
 fruticosa *L.*
 chrysanthemifolia *Vent. Malm.*

flaccida *Vent. Malm.*

MADIA

viscosa *Cav. Ic.*

OSTEOSPERMUM

moniliferum *L.*
 spinosum *L.*
 pinnatifidum *l'Her. stirp.*

MILLERIA

quinqueflora *L.*

ERIOCEPHALUS

africanus *L.*

II. *Receptaculum nudum ; semina papposa.*

BELLIIUM

bellidioides *L. Mant.*

HELENIUM

autumnale *L.*
 quadridentatum *Bill. soc. nat.*

PECTIS

prostrata *Cav. Ic.*

lacinié. *℥*

de Montpellier. *F. ℥*

des Alpes. *℥*

caréné. *maroc. ☉*

2. Fleurs jaunes.

à feuilles entières. *F. ☉*

des moissons. *F. ☉*

des jardins. *F. m. ☉*

de roxburgh. *inde. ☉*

Souci

des champs. *F. ☉*

cultivé. *F. ☉ (écon.)*

étoilé. *esp. ☉*

hybride. *cap. ☉*

des pluies. *cap. ☉*

arbrisseau. *cap. s. ch. ♀*

à f. de chrysanthème. *cap.*
or. ♀

à fleurs rougeâtres. *cap. or. ♀*

MADIA

visqueux. *chili. ☉*

OSTÉOSPERME

à colliers. *cap. or. ♀*

épineux. *cap. or. ♀*

pinnatifide. *cap. or. ♀*

MILLÉRIA

à cinq fleurs. *am. m. ☉*

ERIOCÉPHALE

d'Afrique. *cap. or. ♀*

II. Réceptacle nu ; graines aigrettées :

BELLIIUM

fausse paquerette. *italie. ☉*

HÉLÉNIUM

d'automne. *am. s. ℥*

à quatre dents. *am. s. ℥*

PECTIS

couché. *n. esp. s. ch. ℥*

SCHKUHRIA

abrotanoides *roth. cat.*
 pectis multifida *ortega, dec.*
 pectis bipinnata *Lamk.*
Journ. d'hist. nat.

SKURIA

à f. d'Aurône. Mexique. ☉

TAGETES

erecta *L.*
 patula *L.*
 lucida *Cav. Ic.*
 tenuifolia *Cav. Ic.*
 minuta *L.*

TAGÉTÈS

œillet-d'Inde. Mexiq. ☉ (orn.)
 touffu. Mexique. ☉ (orn.)
 luisant. N. Esp. or. ☿
 à feuilles étroites. Pérou. ☉
 à petites fleurs. Chili. ☉

BOEBERA

chrysanthemoides *Willd. sp.*
 Tagetes papposa *Vent. H. cels.*

BOEBÉRA

à f. de chrysanthème. Am. S. ☉

DORONICUM

pardalianches *L.*
 plantagineum *L.*
 Arnica
 Arnica montana *L.*
 bellidiastrum *L.*
 Arnica bellidiastrum *Willd.*
sp.

DORONIC

pardalianchès. Alpes. ♀
 à feuilles de plantain. F. ♀
 Arnica. F. ♀ (méd.)

à fleurs de paquerette. Alpes. ♂

GORTERIA

ringens *L.*
 pectinata *Willd. sp.*

GORTÉRIA

à grandes fl. cap. or. ♀ (orn.)
 à f. pennées. cap. or. ♀ (orn.)

GRINDELIA

inuloides *Willd. Enum*

GRINDÉLIA

à fleurs d'année. Mexiq. or. ♀

INULA

helenium *L.*
 verbascifolia.
 bifrons *L.*
 oculus-christi *Encycl. (non L.)*
 britannica *L.*
 dysenterica *L.*
 pulicaria *L.*
 arabica *L. Mant.*
 crispa.
 gnaphalodes *Vent. H. cels.*
 Aster crispus *Forsk. Fl.*
 squarrosa *L.*
 spiræifolia *Encycl.*
 salicina *L.*
 ensifolia *L.*
 crithmoides *L.*
 hirta *L.*
 montana *L.*

AUNÉE

officinale. F. ♂ (méd.)
 à feuilles de molène. ♀
 decurrente. F. ♂
 œil-de-christ. F. ♂
 britannique. F. ♂
 dysentérique. F. ♂
 pulicaire. F. ☉
 d'Arabie. or. ♀
 crépue. Égypte. ☉

rude. F. ♂

à feuilles de saule. F. ♂
 ensiforme. F. ♀
 criste marine. F. ♀
 velue. F. ♀
 de montagne. F. ♀

cinerea *Encycl.* }
 vaillantii *All. ped.* }
 viscosa. }
 Erigeron viscosum *L.* }
 graveolens. }
 Erigeron graveolens *L.* }
 tuberosa. }
 Erigeron tuberosum *L.* }
 glutinosa. }
 Aster glutinosus *Cav. Ic.* }

ERIGERON

canadense *L.*
 siculum *L.*
 linifolium *Willd. sp.* }
 bonariense. }
 longifolium.
 annuum. }
 Aster annuus *L.* }
 delphinifolium *Willd. hort.*
Ber.
 philadelphicum *L.*
 amplexicaule.
 alpinum *L.*
 villarsii *Bellardi, App.* }
 atticum *Vill. Delph.* }
 acre *L.*
 foetidum *L.*
 viscosum.
 psiadia glutinosa *Jacq. H.* }
Sch. }

BOLTONIA

asteroides *l'Her. sert.*
 glastifolia *l'Her. sert.*

ASTER

liratus *Bot. Magaz.*
 argophyllus *Bill. n. Holl.*
 tomentosus *Willd. sp.* }
 dentatus *Andr. Rep.* }
 cymbalariae *H. K.*
 fruticosus *L.*
 argenteus *Mich. Fl.* }
 sericeus *Vent. H. cels.* }
 lithospermifolius.
 tenellus *L.*
 chrysocomoides.
 conyza chrysocomoides, *Desf.* }
All. }

cendrée. *F. T*

visqueuse. *F. m. or. T*

fétide. *F. O*

tubéreuse. *F. m. or. T*

glutineuse. *Mexique. or. D*

ERIGERON

de Canada. *F. O*
 de Sicile. *F. m. O*
 à feuilles de Lin. *O*
 à longues feuilles. *Am. s.*
 à fleurs blanches. *Am. s. O*
 à f. de delphinium. *Am. m.*
s. ch. A
 de Philadelphie. *T*
 amplexicaule. *Am. s. T*
 des Alpes. *T*
 de Villars. *Alpes. T*
 âcre. *F. O*
 fétide. *cap. or. O*
 visqueux. *Antilles. s. ch. D*

BOLTONIA

à fleurs d'Aster. *Am. s. T*
 à feuilles de Pastel. *Am. s. T*

ASTER

silloné. *N. Holl. or. D*
 blanchâtre. *N. Holl. or. D*
 cotonneux. *N. Holl. or. D*
 cymbalaire. *cap. or. D*
 arbrisseau. *cap. or. D*
 satiné. *Am. s. D*
 à feuilles de Grémil. *T*
 fragile. *cap. O*
 changeant. *barbarie. or. D*

tripolium L.
alpinus L.
pyrenæus.
amellus L.
amygdalinus *encycl.*
leucanthemus.
carolinianus *willd. sp.*
linifolius L. ?
acris L.
trinervis.
æstivus *willd. sp.*
punctatus *willd. sp.*
dracunculoides *encycl.*
diversifolius *mich. fl.*
adulterinus *willd. Enum.*
amplexicaulis *encycl.*
decorus.
novæ-angliæ L.
cordifolius L.
corymbosus *willd. sp.*
patulus *encycl.*
rubricaulis *encycl.*
lævigatus *encycl.*
longifolius *encycl.*
amœnus *encycl.*
concinus *willd. Enum.*
novi-belgii L. }
paniculatus *encycl.* }
salignus *willd. sp.*
versicolor *willd. sp.*
subulatus *mich. fl.*
inflexus.
salicifolius *encycl.*
strictus.
tradescanti L.
macrophyllus L.
coridifolius *mich. fl.*
ericoides L.
vimineus *encycl.*
tenuifolius L.
fragilis *willd. sp.*
rigidulus.
grandiflorus L.
chinensis L.

miser L.

maritime. F. ♂
des Alpes. ♀
des Pyrénées. ♀
Amelle. F. ♀ (orn.)
à f. d'amandier. AM. S. ♀,
à fleurs blanches. ♀
de Caroline. ♀
à feuilles de Lin. AM. S. ♀
âcre. F. M. ♀
à trois nervures. ♀
d'été. AM. S. ♀
punctué. Hongrie. ♀
à feuilles d'Estragon. ♀
à feuilles variables. AM. S. ♀
adultérin. AM. S. ♀
amplexicaule. AM. S. ♀ (orn.)
d'ornement. ♀
de la Nouv.-Angleterre. ♀ (orn.)
à f. en cœur. AM. S. ♀ (orn.)
corymbifère. AM. S. ♀
étalé. AM. S. ♀ (orn.)
à tige pourpre. AM. S. ♀
glabre. AM. S. ♀ (orn.)
à feuilles longues. AM. S. ♀
luisant. AM. S. ♀
à grappes serrées. AM. S. ♀

paniculé. AM. S. ♀

de Hongrie. ♀
bigarré. AM. S. ♀
en alêne. AM. S. ♀
courbé. ♀
à feuilles de saule. AM. S. ♀
ramassé. ♀
de Tradescant. AM. S. ♀
à larges feuilles. AM. S. ♀
à feuilles de coris. AM. S. ♀
à feuil. de bruyère. AM. S. ♀
flexible. AM. S. ♀
à feuilles minces. AM. S. ♀
fragile. AM. S. ♀
à feuilles rudes. ♀
à grandes fl. AM. S. ♀ (orn.)
reine-marguerite. chine. ☉
 (orn.)
grêle. AM. S. ♀

1. *Ramuli secundi patuli.*

sempervirens L.
elliptica *Encycl.* (an *Willd.* ?)
canadensis L.
glabra.
nutans.
procera H. K.
aspera H. K.
conferta *Encycl.*

2. *Racemi erecti.*

integrifolia.
multiflora.
mexicana L.
latifolia L.
bicolor L. *Mant.*
flexicaulis L.
virga-aurea L.
alpestris *Wald. et Kitt. Hung.*
corymbosa.
minuta L.
rigida L.
petiolaris *Willd. sp.*
hirta *Willd. Enum. ?*
arenaria.
gracilis *Encycl.*

CINERARIA

geifolia L.
lobata *l'her. sert.*
alpina *Willd. sp.*
amelloides L.
maritima L.
populifolia *l'her. sert.* }
appendiculata L. f. }
aurita *l'her. sert.*
lanata *l'her. sert.*
cruenta *l'her. sert.*
alliaræfolia.
præcox *Cav. ic.*

SENECIO.

1. *Flores flosculosi.*

cernuus L. f. }
rubens *Jacq. Hort.* }
hieracifolius L.
vulgaris L.

1. Grappes unilatérales étalées:

toujours verte. AM. S. ℥
elliptique. AM. S. ℥
de Canada. ψ (orn.)
glabre. AM. S. ψ (orn.)
à tête penchée. AM. S. ℥ (orn.)
élevée. AM. S. ψ (orn.)
rude. AM. S. ψ (orn.)
à grappes serrées. ℥

2. Grappes redressées.

à feuilles entières. AM. S. ψ
à fleurs nombreuses. ψ
du Mexique. ℥
à larges feuilles. AM. S. ψ
de deux couleurs. AM. S. ℥
tortueuse. AM. S. ψ
des bois. F. ψ
des rochers. Hongrie. ℥
corymbifère. ℥
petite. F. ψ
à feuilles dures. AM. S. ψ
à feuilles pétiolées. AM. S. ℥
velue. AM. S. ψ
des sables. ψ
grêle. ℥

CINÉRAIRE

à feuilles de Geum. cap. or. ℥
lobée. cap. or. ♪
des Alpes. ψ
à fleurs d'Amelle. cap. or. ♪
maritime. F. ℥
à f. de peuplier. canar. or. ψ
auriculée. canaries. or. ♪
laineuse. canaries. or. ♪
pourpre. or. ψ
à feuilles d'Alliaire. or. ψ
précoce. Mexique. S. ch. ♪

SENEÇON.

1. Fleurs flosculeuses.

à fleurs penchées. inde. ⊙
à f. d'Épervière. AM. S. ⊙
commun. F. ⊙

arabicus *L. Mant.*
 reclinatus *L'Her. stirp.*
 discolor.
 glomeratus.

2. *Flores radiati; ligulis revolutis.*

ægyptius *L.*
 sylvaticus *L.*
 viscosus *L.*
 coronopifolius *Desf. Atl.*

3. *Flores radiati; radio patente; foliis pinnatifidis.*

chrysanthemifolius *Encycl.*
 elegans *L.*
 jacobæa *L.*
 erucifolius *L.*
 lycopifolius.
 tenuifolius *S. reg.*
 parviflorus *All. ped.*
 incanus *L.*
 nebrodensis *L.*

4. *Flores radiati; radio patente; foliis indivisis.*

paludosus *L.*
 saracenicus *L.*
 nemorensis *L.*
 doria *L.*
 coriaceus *H. K.*
 doronicum *L.*
 longifolius *L.*
 halimifolius *L.*
 rigidus *L.*

OTHONNA

cheirifolia *L.*
 coronopifolia *L.*
 pectinata *L.*

III. *Semina non papposa; receptaculum paleaceum.*

ANTHEMIS.

1. *Floribus radio albo.*

cota *L.*
 altissima *L.*
 rigescens *Willd. Enum.*
 maritima *L.*

d'Arabie. égypte. ☉
 recliné. cap. or. ☿
 de deux couleurs. or. ♀
 aggloméré. n. Holl. ☉

2. *Fleurs radiées; demi-fleurons réfléchis.*

d'Égypte. ☉
 des bois. F. ☉
 visqueux. F. ☉
 corne-de-cerf. barbarie. ☉

3. *Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles pinnatifides.*

à f. de chrysanthème. sicile. ☉
 violet. cap. ☉ (orn.)
 jacobée. F. ☿
 à feuilles de roquette. F. ☿
 à feuilles de Lycopus. ☿
 à feuilles menues. F. ☿
 à petites fleurs. Alpes. ☿
 blanc. Alpes. ☿
 à feuell. de paquerette. Esp. ☉

4. *Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles entières.*

des marais. F. ☿
 traçant. F. ☿
 des forêts. F. ☿
 doria. F. m. ☿
 à f. de Limonium. orient. ☿
 doronic. Alpes. ☿
 à feuilles longues. cap. or. ♀
 à feuell. d'halime. cap. or. ♀
 rude. cap. or. ♀

OTHONNA

spatule. tunis. ☿
 corne-de-cerf. cap. or. ♀
 pectiné. cap. or. ♀

III. *Graines sans aigrette; réceptacle garni de paillettes.*

ANTHÉMIS.

1. *Demi-fleurons blancs.*

piquante. italie. ☉
 élevée. F. m. ☉
 à feuilles rudes. caucase. ☿
 maritime. F. ☿

mixta L.
montana L.
arvensis L.
clavata Desf. Atl.
cotula L.
nobilis L.
austriaca Jacq. Austr.

2. *Floribus radio luteo aut violaceo.*

tinctoria L.
valentina L.
— bicolor.
arabica L.
grandiflora Ramatuelle, }
Journ. d'Hist. nat. }
artemisifolia Willd. sp. }
chrysanthemum indicum }
Bot. Magaz. (non L.) }
ovalifolia Ortega, Dec. }
bupthalmoides Willd. sp. }
globosa Ortega, Dec. }
triloba Ortega, Dec.

ACHILLEA.

1. *Corollis radio luteo.*

santolina L.
falcata L.
tenuifolia Encycl.
Ageratum L.
ægyptiaca L.
bipinnata L.
Tanacetum myriophyllum }
Willd. sp. }
pubescens L.
pauciflora Encycl.
decumbens Encycl.
abrotanifolia L.

sempitectinata.
filipendulina Encycl.
partheniifolia.
velutina.
pectinata Willd. sp. }
ochroleuca Wald. et Kitt. }
Hung. }
flosculosa Pers. syn.

2. *Corollis radio albo aut purpureo.*
macrophylla L.

corne-de-cerf. F. ☉
des montagnes. Alpes. ☿
des champs. F. ☉
en massue. Barbarie. ☉
fétide. F. ☉
camomille. F. ☿ (méd.)
d'Autriche. ☿

2. Demi-fleurons jaunes ou violets,
des teinturiers. Alpes. ☿
de Valence. F. m. ☉
— de deux couleurs.
d'Arabie. Alger. ☉

à grandes fleurs. Chine. ☿
(orn.)

à f. ovales. Pérou. s. ch. ☿
globuleuse. Mexique. or. ☿
à trois lobes. N. esp. or. ☿

MILLEFEUILLE.

1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. or. ☿
falciforme. orient. or. ☿
à f. menues. orient. or. ☿
Eupatoire. F. m. ☿ (méd.)
d'Égypte. orient. or. ☿
bipennée. orient. ☿
pubescente. orient. ☿
à fleurs rares. orient. ☿
tombante. ☿
à feuil. de citronnelle. orient.
or. ☿
sempitectinée. ☿
à f. de Filipendule. orient. ☿
à feuilles de Parthenium. ☿
veloutée. ☿

pectinée. Hongrie. ☿

flosculeuse. ☿

2. Demi-fleurons blancs ou pourpres,
à grandes feuilles. Alpes. ☿

sambucifolia.
chrysanthemum macrophy-
lum wald. et kitt. hung. }
dracunculoides.
leucanthema pers. syn. }
clavennæ L.
herba-rota L. }
cuneifolia encycl. }
serrata retz. obs.
decolorans willd. Enum.
speciosa willd. Enum.
ptarmica L.
alpina L.
sibirica.
impatiens L.
magna All. ped. }
compacta encycl. }
nana L. }
lanata encycl. }
nobilis L.
ligustica All. ped.
setacea wald. et kitt. hung.
millefolium L.
— purpureum.
rosea.
aspleniifolia vent. H. cels. }

à feuell. de sureau. Hongrie. $\mathcal{Z}$

à f. d'Estragon. caucase. Ψ

corne-de-cerf. Alpes. Ψ

cunéiforme. Alpes. Ψ

à feuilles en scie.

décolorante. $\mathcal{Z}$

élégante. Ψ

sternutatoire. F. $\mathcal{Z}$ (méd.)

des Alpes. Ψ

de Sibérie. $\mathcal{Z}$

pectinée. Sibérie. Ψ

compacte. Alpes. Ψ

naine. Alpes. $\mathcal{Z}$

odorante. Alpes. Ψ

fasciculée. Alpes. $\mathcal{Z}$

sétacée. Hongrie. Ψ

commune. F. $\mathcal{Z}$ (méd.)

— pourpre. (orn.)

rose. Am. s. $\mathcal{Z}$ (orn.)

PARTHENIUM

hysterophorus L.

integrifolium L.

BUPHTALMUM

frutescens L.

arborescens L.

sericeum L. f.

cordifolium wald. et kitt. }
hung. }

inula caucasica pers. syn.

aquaticum L.

maritimum L.

spinosum L.

grandiflorum L.

procumbens.

SIGESBECKIA

orientalis L.

flosculosa l'her. stirp.

ECLIPTA

erecta s. reg.

prostrata L. Mant.

PARTHENIUM

lacinié. Antilles. ☉

à feuell. entières. Am. s. or. Ψ

BUPHTALMUM

arbrisseau. Am. s. or. $\mathfrak{h}$

arbre. Antilles. s. ch. $\mathfrak{h}$

satiné. canaries. or. $\mathfrak{h}$

à feuilles en cœur. Hongrie. $\mathcal{Z}$

aquatique. F. ☉

maritime. F. Ψ

épineux. F. ☉

à grandes fleurs. F. Ψ

couché. Ψ

SIGESBECKIA

d'Orient. inde. ☉

flosculeux. rérou. ☉

ECLIPTA

à tige droite. inde ☉

couché. inde. ☉

BALTIMORA*erecta L. Mant.***DYSODIUM***divaricatum Pers. syn.***ALCINA***perfoliata Cav. Ic.***DAHLIA***superflua.**georgina superflua Dec. Ann.**georgina variabilis Willd.**Enum.*— *purpurea.*— *rubra.*— *lilacina.*— *pallida.*— *flavescens.**frustranea.**georgina frustranea Dec. Ann.*— *crocea.*— *flava.***MELAMPODIUM***longifolium Willd. Enum.***POLYMNIA***uvudalia L.***ENCELIA***halimifolia Cav. Ic.**pallasia grandiflora Willd. sp.**canescens Cav. Ic.**pallasia halimifolia Willd. sp.***XIMENESIA***encelioides Cav. Ic.***SCLEROCARPUS***africanus Jacq. Ic.***SILPHIUM***laciniatum L.**terebinthinaceum Jacq. Hort.**perfoliatum L.**connatum L. Mant.**trifoliatum L.**ternatum.**scabrum.***BALTIMORA***à tige droite. Am. s. ☉***DYSODIUM***étalé. Am. m. ☉***ALCINA***perfolié. Mexique. ☉***DAHLIA***superflue. Mexique. ♀ (orn.)*— *pourpre.*— *rouge.*— *lilas.*— *pâle.*— *jaunâtre.**frustranée. Mexique. ♂ (orn.)*— *safranée.*— *jaune.***MELAMPODIUM***à feuil. longues. Mexique. ☉***POLYMNIA***à larges feuilles. Am. s. ♀***ENCELIA***à f. d'halime. N. Esp. s. ch. ♀**à f. blanches. Mexiq. s. ch. ♀***XIMÉNÉSIA***à f. d'Encélia. Mexique. ☉***SCLEROCARPE***d'Afrique. ☉***SILPHIUM***lacinié. Am. s. ♂ (orn.)**à f. en cœur. Am. s. ♀ (orn.)**perfolié. Am. s. ♂**à feuilles réunies. Am. s. ♀**à feuilles ternées. Am. s. ♂**trifolié. Am. s. ♀**à feuilles rudes. Am. s. ♂***COREOPSIS***auriculata L.***COREOPSIS***auriculé. Am. s. ♂*

tripteris *L.*
 verticillata *L.*
 delphinifolia *Encycl.*
 ferulefolia *Jacq. H. sch.*
 alternifolia *L.*
 alata *Cav. Ic.*

COSMOS

bipinnata *Cav. Ic.*

RUDBECKIA

laciniata *L.*
 — angustifolia.
 pinnata *Vent. H. cels.* }
 digitata *Willd. sp.* }
 aspera. }
 chrysomela *Mich. Fl.* }
 triloba *L.*
 hirta *L.*
 purpurea *L.*
 amplexicaulis *Bosc. Soc. nat.* }
 perfoliata *Cav. Ic.* }

SANVITALIA

villosa *Cav. Ic.*
 lorantea atropurpurea *Ortega, Dec.* }

IV. *Semina papposa ; receptaculum paleaceum.*

HELIANTHUS

annuus *L.*
 multiflorus *L.*
 tuberosus *L.*
 mollis *Encycl.* }
 pubescens *Vahl. symb.* }
 canescens *Mich. Fl.* }
 tubæformis *Jacq. H. sch.*
 atrorubens *Encycl. (non L.)*
 altissimus *L.* }
 virgatus *Encycl.* }
 giganteus *L.*
 angustifolius *L.*
 strumosus *Encycl. (an L. ?)*
 divaricatus *L.*
 lævis *L.*
 euphthalmum helianthoides *L.* }
 heliopsis lævis *Pers. syn.* }
 procumbens *Pers. syn.*
 dentatus *Cav. Ic.*

à trois ailes. *Am. s. L.*
 verticillé. *Am. s. L.*
 à f. de delphinium. *Am. s. P.*
 à f. de ferule. *Mexiq. or. L.*
 à feuilles alternes. *Am. s. L.*
 ailé. *Mexique. or. L.*

COSMOS

bipenné. *Mexique. ☉*

RUDBECKIA

lacinié. *Am. s. L. (orn.)*
 — à feuilles étroites.
 à feuilles pennées. *Am. s. L.*
 rude. *Am. s. P.*
 trilobé. *Am. s. ♂*
 velu. *Am. s. ♂*
 pourpre. *Am. s. or. L. (orn.)*
 amplexicaule. *Mexique. ☉*

SANVITALIA

velu. *N. Esp. ☉*

IV. Graines aigrettées ; réceptacle garni de paillettes.

SOLEIL

cultivé. *Pérou. ☉ (orn.)*
 à fleurs nombr. *Am. s. P. (orn.)*
 Topinambour. *Brésil. L. (alim.)*
 cotonneux. *Am. s. P.*
 renflé. *Mexique. ☉*
 noir-pourpre. *Am. s. P. (orn.)*
 élevé. *Am. s. P.*
 gigantesque. *Am. s. P.*
 à feuilles étroites. *Am. s. P.*
 fusiforme. *Am. s. P.*
 étalé. *Am. s. P.*
 lisse. *Am. s. P.*
 couché. *Pérou. or. L.*
 denté. *Mexique. or. P.*

GALARDIA

pulchella *Fougeroux, acad.* }
virgilia helioides *l'her. gen.* }

GALARDIA

élégante. *louisiane.* ☉ (orn.)

GALINSOGA

parviflora *cav. ic.*
triloba *cav. ic.*

GALINSOGA

à petites fleurs. *pérou.* ☉
à trois lobes. *n. esp.* ☉

PASCHALIA

glauca *ortega, dec.*

PASCHALIA

glauque. *chili. s. ch. z*

BALBISIA

elongata *willd. sp.*
amellus pedunculatus *or-* }
tega, dec. }

BALBISIA

à longs pédoncules. *mexiq.* ☉

AMELLUS

lychnitis *L.*

AMELLUS

bleu. *cap. or. y*

ZINNIA

pauciflora *L.*
multiflora *L.*
verticillata *Andr. rep.*
violacea *cav. ic.* }
elegans *Jacq. ic.* }
revoluta *cav. ic.* }
tenuiflora *Jacq. ic.* }

ZINNIA

à fleurs rares. *pérou.* ☉ (orn.)
à fleurs nombr. *Louis.* ☉ (orn.)
verticillé. *mexique.* ☉
violet. *mexique.* ☉ (orn.)
à fleurs renversées. *mexiq.* ☉
 (orn.)

VERBESINA

gigantea *Jacq. ic.*
atriplicifolia *Encycl.*
fruticosa *L.*
serrata *cav. ic.*
alata *L.*
nodiflora *L.*
synedrella nodiflora *Gærtn.* }
Fruct. }
mutica *L.*
wedelia carnosa *Persoon. syn.* }
euphthalmum repens *Willd.* }
sp. }

VERBESINA

gigantesque. *Antilles. s. ch. y*
à feuilles d'arroche. *s. ch. y*
arbrisseau. *Antilles. s. ch. y*
à f. en scie. *mexiq. s. ch. y*
ailée. *curaçao. s. ch. y*
nodiflore. *Am. m.* ☉
rampante. *Antilles. s. ch. y*

HETEROSPERMA

pinnata *cav. ic.*

HÉTÉROSPERME

à feuilles pennées. *n. esp.* ☉

BIDENS

tripartita *L.*
cernua *L.*
frondosa *L.*
pilosa *L.*
bullata *L.*

BIDENS

trifolié. *F.* ☉
penché. *F.* ☉
feuillu. *Am. s.* ☉
velu. *Antilles.* ☉
bulleux. *Italie.* ☉

nivea <i>L.</i>	}	<i>à fleurs blanches. Am. s. ☉</i>
melananthera hastata <i>Mich.</i> <i>Fl.</i>		
bipinnata <i>L.</i>	}	<i>bipenné. Am. s. ☉</i>
multifida.		
pauciflora <i>encycl. suppl.</i>	}	<i>lacinié. ☉</i>
serrulata.		
coreopsis serrulata <i>encycl.</i> <i>suppl.</i>	}	<i>à feuilles en scie. ☉</i>
heterophylla <i>orteg. dec.</i>		
SPILANTHUS		SPILANTHUS
oleracea <i>s. veg.</i>		<i>cresson de Para. inde. ☉ (méd.)</i>
fusca.		<i>brun. Am. m. ☉ (méd.)</i>
alcmella <i>L. mant.</i>		<i>Alcmella. inde. ☉</i>
AGRIPHYLLUM		AGRIPHYLLUM
spinosum.	}	<i>épineux. cap. or. ♀</i>
gorteria spinosa <i>L.</i>		
berckeya incana <i>Willd. sp.</i>	}	<i>cilié. cap. or. ♀</i>
rohria incana <i>Thunb. prodr.</i>		
ciliare.	}	
gorteria ciliaris <i>L.</i>		
berckeya ciliaris <i>Willd. sp.</i>	}	
rohria ciliaris <i>Thunb. prodr.</i>		
ARCTOTIS		ARCTOTIS
tristis <i>L.</i>		<i>à fleurs pâles. cap. ☉</i>
plantaginea <i>L.</i>		<i>à f. de plantain. cap. or. ♀</i>
reptans <i>Jacq. H. sch.</i>		<i>rampant. cap. or. ♀</i>
aspera <i>L.</i>		<i>à feuilles rudes. cap. or. ♀</i>
grandiflora <i>Jacq. H. sch.</i>		<i>à grandes fleurs. cap. or. ♀</i>
revoluta <i>Jacq. H. sch.</i>		<i>recourbé. cap. or. ☉</i>

CLASSIS XI.

CLASSE XI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*Corolla epigynæ ; antheræ distinctæ.*)(*Corolle sur le pistil ; anthères distinctes.*)

ORDO I.

ORDRE I.

DIPSACEÆ,

DIPSACÉES.

MORINA

persica L.

MORINE

de Perse. ♀ (orn.)

DIPSACUS

sylvestris willd. sp.
fullonum willd. sp.
laciniatus L.
pilosus L.

SCABIOSA.

1. *Corollis quadrifidis.*

alpina L.
tatarica L.
rigida L.
syriaca L.
dichotoma Encycl. }
centauroides Encycl.
corniculata wald. et kitt.
hung.
leucantha L.
succisa L.
arvensis L.
sylvatica L.
montana Marsch. cauc.
integrifolia L.

2. *Corollis quinquefidis.*

columbaria L.
ochroleuca L.
banatica wald. et kitt. hung.
suaveolens Dec. fl.
lucida Vill. delph.
setifera Encycl.
uniseta Savi.
urceolata Desf. Atl. }
rutæfolia Vahl. symb. }
divaricata Encycl. }
argentea L.
sicula L. Mant. }
divaricata Jacq. Austr. }
stellata L.
parviflora Desf. Atl. }
dichotoma Cirillo, Dec. }
prolifera L.
atropurpurea L.
africana L.
caucasica Marsch. cauc.
cretica L.
graminifolia L.
palæstina L. Mant.

DIPSACUS

sauvage. F. ♂
chardon-bonnetier. F. ♂ (arts.)
lacinié. F. ♂
velu. F. ☉

SCABIEUSE.

1. Corolles à 4 divisions.

des Alpes. F. ☿
de Tartarie. ♂
à feuilles dures. cap. or. ♀
de Syrie. ☉
fausse centaurée. F. m. ☿
cornue. Hongrie. ☿
à fleurs blanches. F. m. ☿
tronquée. F. ☿ (méd.)
des champs. F. ☿ (méd.)
des bois. F. ☿ (méd.)
de montagne. caucase. ♂
à feuilles entières. F. ☉

2. Corolles à 5 divisions.

colombaire. F. ☿
jaune-pâle. F. ♂
de Hongrie. ♂
odorante. F. ☿
luisante. Alpes. ☿
sétifère. Italie. ☉
à une soie. Italie. ☿
urcéolée. Barbarie. ☿
argentée. Orient. or. ☿
de Sicile. ☉
étoilée. F. m. ☉
à petites fleurs. Barbarie. ☉
prolifère. Orient. ☉
des jardins. Inde? ☉ (orn.)
d'Afrique. or. ♀
du Caucase. ☿ (orn.)
de Crète. or. ♀
à feuilles de gramin. F. Alpes.
de Palestine. or. ☿

KNAUTIA

orientalis L.*plumosa* L. Mant.

KNAUTIA

d'Orient. ☉*plumeux.* orient. ☉

ORDO II.

VALERIANEÆ.

VALERIANA

rubra L.*angustifolia* All. Ped.*calcitrapa* L.*dioica* L.*officinalis* L.*phu* L.*tripteris* L.*montana* L.*tuberosa* L.*celtica* L.*saxatilis* L.*pyrenaica* L.

VALÉRIANE

rouge. F. ☿ (orn.)*à feuilles étroites.* F. ☿*chausse-trape.* orient. ☉*dioïque.* F. ☿*officinale.* F. ☿ (méd.)*phu.* F. ☿*à feuilles ternées.* Alpes. ☿*de montagne.* Alpes. ☿*tubéreuse.* Alpes. ☿*Nard-celtique.* Alpes. ☿*des rochers.* Alpes. ☿*des Pyrénées.* ☿

FEDIA

cornucopiæ vahl, sp.*olitoria* vahl, sp.*vesicaria* vahl, sp.*coronata* vahl, sp.*echinata* vahl, sp.*sibirica* vahl, sp.

FÉDIA

corne-d'abondance. barb. ☉*mâche.* F. ☉ (alim.)*vésiculeuse.* orient. ☉*couronnée.* F. ☉*hérissée.* F. ☉*de Sibérie.* ♂

ORDO III.

RUBIACEÆ.

*I. Fructus dicoccus dispermus; stamina
sapè 4.*

SHERARDIA

arvensis L.*muralis* L.

SHÉRARDIA

des champs. F. ☉*des murailles.* F. ☉

ASPERULA

arvensis L.*odorata* L.*galioides* Marsch. cauc.*taurina* L.*cynanchica* L.*tinctoria* L.*calabrica* L. f.

ORDRE III.

RUBIACÉES.

*I. 2 graines accolées; ordinairement 4
étamines.*

ASPÉRULE

des champs. F. ☉*odorante.* F. ☿*à f. de caillelait.* caucase. ☿*de Turin.* Alpes. ☿*à Vesquinancie.* F. ☿*des teinturiers.* F. ☿*de Calabre.* or. ♀

1. *Fructu glabro.*

palustre L.
uliginosum L.
læve dec. Fl. }
umbellatum Encycl. }
bocconi All. Ped. }
nitidulum Thuil. Fl. }
verum L.
rubrum L. }
purpureum dec. Fl. (non L.) }
rubrum dec. Fl. }
purpureum L. }
mollugo L.
provinciale Encycl.
lucidum Pers. syn. (excl. syn.)
megalospermum dec. Fl. }
arenarium Loïs. Fl. }
tyrolense Willd. Enum.
spurium L.
glaucum L.
rubroides L.
sylvaticum L.
linifolium Encycl.
pumilum Encycl. }
trichophyllum All. Ped. }
anglicum Smith, Fl.
divaricatum Encycl.
tricorne Smith, Fl.

2. *Fructu hispido aut aspero.*

rotundifolium L.
aparine L.
hispidum Willd. Enum. }
scaberrimum Horn. cat. }
vaillantii dec. Fl.
parisiense L. }
litigiosum dec. Fl. }
maritimum L.
villosum Encycl.
boreale L.

CRUCIANELLA

angustifolia L.
latifolia L.
ciliata Encycl.
maritima L.

1. *Fruit glabre.*

des marais. F. ♀
aquatique. F. ♂
lisse. F. ♂
de Boccone. F. ♀
jaune. F. ♀ (méd.)
pourpre. F. ♂
rouge. F. ♂
blanc. F. ♀
de Provence. ♀
luisant. F. ♀
des sables. F. ♀
du Tyrol. ♀
faux Gratteron. F. ⊙
glaucue. F. ♂
à feuilles de garence. F. ♂
des bois. F. ♀
à feuilles de lin. F. ♀
nain. Alpes. ⊙
d'Angleterre. F. ⊙
étalé. F. ⊙
à trois cornes. F. ⊙

2. *Fruit hérissé ou rude.*

à feuilles rondes. F. ♀
Gratteron. F. ⊙
hérissé. Égypte. ⊙
de Vaillant. F. ⊙
de Paris. F. ⊙
maritime. F. ♂
velu. Esp. ♂
du Nord. F. ♀

CRUCIANELLE

à feuilles étroites. F. ⊙
à larges feuilles. F. ⊙
ciliée. orient. ⊙
maritime. F. or. ♀

VALANTIA

- muralis* L.
hispida L.
glabra L.
articulata L.
Aparine L.
Galium saccharatum Dec. Fl. }
cruciata L.

RUBIA

- tinctorum* L.
lucida s. *veg.*
angustifolia L. Mant.
cordifolia L. Mant.

ANTHOSPERMUM

- aethiopicum* L.

II. *Fructus dicoccus dispermus*; *stamina* 4, *rarius* 5 aut 6.

HOUSTONIA

- coccinea* Andr. rep.
ixora americana Jacq. H. }
sch.
Bouvardia triphylla H. K.

SPERMACOCE

- verticillata* L.
tenuior L.
rubra Jacq. H. sch.

PHYLLIS

- nobla* L.

III. *Fructus monocarpus bilocularis polyspermus*; *stamina* 5.

RANDIA

- aculeata* L.

PINCKNEIA

- pubens* Mich. Fl.

RONDELETIA

- triflora* Vahl. symb.
americana L.

GARDENIA

- florida* L.
Thunbergia H. K.
spinosa Thunb. diss.
radicans Thunb. diss.
longiflora H. K. ?

VALANTIA

- des murailles*. F. ☉
velu. F. ☉
glabre. F. ☉
articulé. orient. ☉
à gros fruit. F. ☉
croisette. F. ☿

GARENCE

- des teinturiers*. F. ☿ (arts.)
luisante. barbarie. or. ♀
à f. étroites. minorque. or. ♀
à feuilles en cœur. russie. ☿

ANTHOSPERMUM

- d'Ethiopie*. s. ch. ♀

II. 2 graines accolées; 4 étamines, rarement 5 ou 6.

HOUSTONIA

- écarlate*. Mexiq. s. ch. ♀ (orn.)

SPERMACOCE

- verticillé*. Antilles. s. ch. ♀
grêle. Am. m. ☉
à fleurs rouges. ☉

PHYLLIS

- à f. ternées*. canaries. or. ♀

III. Un fruit à deux loges polyspermes; 5 étamines.

RANDIA

- épineux*. Antilles. s. ch. ♀

PINCKNÉIA

- pubescent*. Am. s. or. ♀

RONDELÉTIA

- à trois fleurs*. Antilles. s. ch. ♀
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♀

GARDÉNIA

- à grandes fl.* cap. or. ♀ (orn.)
de Thunberg. cap. s. ch. ♀
épineux. chine. s. ch. ♀
rampant. japon. s. ch. ♀
à long. fl. sierra-leona. s. ch. ♀

IV. *Fructus monocarpus bilocularis*
dispermus ; stamina 4.

IXORA

coccinea L.

alba L.

V. *Fructus monocarpus bilocularis*
dispermus ; stamina 5.

SERISSA

foetida.

Lycium foetidum L. f.

Lycium indicum Retz. obs.

Lycium japonicum Thunb.

Jap.

Buchosia coprosmoides P'Her.

Gen.

CHIOCOCCA

racemosa L.

PSYCHOTRIA

undulata Jacq. H. sch.

COFFEA

arabica L.

PÆDERIA

foetida L. Mant.

VI. *Fructus monocarpus multilocularis ;*
loculis monospermis ; stamina 4, 5, aut
plura.

GUETTARDA

scabra Vent. ch. de pl. }
Matthiola scabra L. }

PLOCAMA

pendula H. K.

VII. *Fructus monocarpus multilocularis ;*
loculis polyspermis ; stamina 5.

HAMELLIA

patens L.

lucida ?

VIII. *Flores aggregati supra receptaculum*
commune.

MITCHELLA

repens L.

OPERCULARIA

ligustrifolia Juss. Ann.

CEPHALANTHUS

occidentalis L.

IV. Un fruit à deux loges monospermes ;
4 étamines.

IXORA

écarlate. inde. s. ch. ♀ (orn.)

blanc. inde. s. ch. ♀

V. Un fruit à deux loges monospermes ;
5 étamines.

SÉRISSE

fétide. japon. s. ch. ♀

CHIOCOCCA

à grappes. Antilles. s. ch. ♀

PSYCHOTRIA

ondulé. Antilles. s. ch. ♀

CAFÉ

d'Arabie. s. ch. ♀ (écon.)

PÉDÉRIA

fétide. inde. s. ch. ♀

VI. Un fruit à plusieurs loges mono-
spermes ; 4, 5 ou un plus grand nombre
d'étamines.

GUETTARDA

rude. Antilles. s. ch. ♀

PLOCAMA

incliné. canaries. or. ♀

VII. Un fruit à plusieurs loges poly-
spermes ; 5 étamines.

HAMELLIA

étalé. Antilles. s. ch. ♀

à feuilles luisantes. s. ch. ♀

VIII. Fleurs aggrégées sur un réceptacle
commun.

MITCHELLA

rampant. Am. s. ♀

OPERCULARIA

à f. de Troëne. N. Holl. or. ♀

CÉPHALANTE

d'Occident. Am. s. ♀ (orn.)

ORDO IV.

CAPRIFOLIA.

*I. Calix caliculatus aut bracteatus ;
stylus 1 ; corolla monopetala.*

LINNÆA

borealis L.

TRIOSTEUM

perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS

parviflora.

Lonicera symphoricarpos L. }

DIERVILLA

lutea.

Lonicera diervilla L. }

LONICERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora *Encycl.* }

dioica H. K. }

caprifolium L.

periclymenum L.

sempervirens L.

japonica Thunb. Jap.

2. *Caule recto ; pedunculis bifloris.*

tatarica L.

pyrenaica L.

nigra L.

cœrulea L.

xylosteum L.

alpigena L.

*II. Calix caliculatus aut bracteatus ;
stylus 1 ; corolla subpolypetala.*

VISCUM

album L.

*III. Calix bracteatus ; stylus 0 ; stigmata
3 ; corolla monopetala.*

VIBURNUM

tinus L.

— latifolius.

rigidum Vent. Malm.

ORDRE IV.

CHÈVREFEUILLES.

*I. Calice caliculé ou accompagné de
bractées ; 1 style ; corolle monopétale.*

LINNÉE

boreale. Alpes. ♀

TRIOSTEUM

perfolié. Am. s. ♂

SYMPHORINE

à petites fl. Am. s. ♀ (orn.)

DIERVILLA

jaune. Am. s. ♀ (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. *Tige sarmentueuse.*

à petites fleurs. Am. s. ♀ (orn.)

des jardins. F. m. ♀ (orn.)

des bois. F. ♀ (orn.)

toujours vert. Am. s. ♀ (orn.)

du Japon. or. ♀

2. *Tige droite ; pédoncules à deux fleurs.*

de Tartarie. ♀ (orn.)

des Pyrénées. F. ♀ (orn.)

à fruit noir. Alpes. ♀ (orn.)

à fruit bleu. Alpes. ♀ (orn.)

velu. Alpes. ♀ (orn.)

des Alpes. ♀ (orn.)

*II. Calice caliculé ou accompagné de
bractées ; 1 style ; corolle presque poly-
pétale.*

GUI

blanc. F. ♀ (méd.)

*III. Calice accompagné de bractées ; style 0 ;
3 stigmates ; corolle monopétale.*

VIOIRNE

Laurier-Tin. esp. ♀ (orn.)

— à larges feuilles.

à feuilles rudes. madère. or. ♀

nudum *L.*
 Lentago *L.*
 prunifolium *L.*
 pyrifolium *Encycl.*
 cassinoides *L.*
 puniceifolium
 Lantana *L.*
 — canadensis.
 dentatum *L.*
 — longifolium.
 acerifolium *L.*
 opulus *L.*
 — sterilis.

SAMBUCUS

ebulus *L.*
 canadensis *L.*
 nigra *L.*
 — virescens.
 — laciniata.
 racemosa *L.*

IV. *Calix simplex; stylus 1; corolla subpolypetala.*

CORNUS

sanguinea *L.*
 alba *L. Mant.*
 stricta *l'her. corn.*
 paniculata *l'her. corn.* }
 racemosa *Encycl.* }
 sericea *l'her. corn.* }
 amomum *Miller. dict.* }
 cœrulea *Encycl.* }
 circinata *l'her. corn.* }
 rugosa *Encycl.* }
 florida *L.*
 mas *L.*
 — flava.
 alternifolia *L. f.*

HEDERA

helix *L.*

nue. *Am. s. h (orn.)*
 luisante. *Am. s. h (orn.)*
 à feuell. de prunier. *Am. s. h*
 à feuell. de poirier. *Am. s. h*
 à f. de cassiné. *Am. s. or. h*
 à f. de grenadier. *Am. s. or. h*
 colonneuse. *F. h*
 — de Canada.
 dentée. *Am. s. h*
 — à longues feuilles.
 à f. d'Érable. *Am. s. h (orn.)*
 obier. *F. h (orn.)*
 — boule-de-neige. *(orn.)*

SUREAU

hièble. *F. v (méd.)*
 de Canada. *h*
 noir. *F. h (méd.)*
 — à fruit vert.
 — lacinié.
 à grappes. *F. (orn.)*

IV. *Calice simple; 1 style; corolle presque polypetale.*

CORNOUILLER

sanguin. *F. h (orn.)*
 blanc. *Am. s. h (orn.)*
 élané. *Am. s. h (orn.)*
 paniculé. *Am. s. h (orn.)*
 à fruit bleu. *Am. s. h (orn.)*
 à f. rondes. *Am. s. h (orn.)*
 à grandes fl. *Am. s. h (orn.)*
 mâle. *F. h (orn.)*
 — à fruit jaune.
 à f. alternes. *Am. s. h (orn.)*

LIERRE

commun. *F. h (méd. écon.)*

CLASSIS XII.

CLASSE XII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(*Stamina epigyna.*)(*Etamines sur le pistil.*)

ORDO I.

ORDRE I.

ARALIÆ.

ARALIES.

CUSSONIA

thyrsoides Thunb. diss.

CUSSONIA

à fleurs en thyrs. cap. or. ♀

ARALIA

*capitata Swartz. prodr.**Hedera capitata Smith. ic. pict.**arborea L.**spinosa L.**racemosa L.**hispida Michx. fl.**nudicaulis L.*

ARALIA

*à fl. en tête. Antilles. s. ch. ♀**arbre. Antilles. s. ch. ♀**épineux. Am. s. ♀**à grappes. Am. s. ♂**velu. Am. s. ♀**à tige nue. Am. s. ♂*

PANAX

*quinquefolium L.**aculeatum H. K.**zanthoxylum trifoliatum L. }**fruticosum L.*

PANAX

*ginseng. Am. s. ♂ (méd.)**épineux. Chine. or. ♀**lacinié. Amboine. s. ch. ♀*

ORDO II.

ORDRE II.

UMBELLIFERÆ.

OMBELLIFÈRES.

ÆGOPodium

podagraria L.

ÆGOPodium

Podagraire. F. ♂

PIMPINELLA

*saxifraga L.**magna L. Mant.**— rubens.**dissecta Retz. obs.**peregrina L.**dioica L. Mant.**villosa Schousb. Maroc. }**bubonoides Brotero, fl. }*

BOUCAGE

*saxifrage. F. ♂**élevé. F. ♂**— rouge.**lacinié. Suisse. ♂**étranger. Italie. ♂**dioïque. F. ♂**velu. Maroc. or. ♂*

glauca willd. sp.
anisum L.

CARUM

carvi L.

APIUM

petroselinum L.
— *crispum.*
— *tuberosum.*
graveolens L.
— *celeri.*
prostratum Willd. N. Holl.

ANETHUM

segetum L. Mant.
graveolens L.
fœniculum L.

SMYRNIUM

olusatrum L.
perfoliatum L.
integerrimum L.

PASTINACA

sativa L.
divaricata.
opopanax L.
lucida L. Mant.

THAPSIA

villosa L.
garganica L. Mant.

SESSELI

montanum L.
annuum L.
ammoides L.
elatum L.
leucospermum Wald. et Kitt.
hung.
petraeum Marsch. cauc.
tortuosum L.

IMPERATORIA

ostruthium L.
sylvestris.
angelica sylvestris L. }
verticillata Encycl. }
angelica verticillata Jacq. }
hort.

CHÆROPHYLLUM

sylvestre L.

glauque. F. ♂
Anis. orient. (écon. méd.)

CARVI

cultivé. F. ♂ (écon. méd.)

APIUM

**Persil. sardaigne. ♂ (écon.)*
— *crépu.*
— *tubéreux.*
des marais. F. ♂
— *céleri. (écon.)*
couché. N. Holl. or. ℥

ANET

des moissons. Portugal. ☉
fétide. Esp. ☉
Fenouil. F. ℥ (écon. méd.)

MACERON

à feuilles ternées. F. ♂
perfolié. orient. ♂
non denté. Am. s. ℥

PANAI

cultivé. F. ♂ (alim. méd.)
étalé. ♂
opopanax. sicile. ℥ (méd.)
luisant. mahon. ♂

THAPSIA

velu. F. m. ℥
lisse. F. m. ℥

SÉSÉLI

de montagne. F. ℥
annuel. F. ♂
à feuilles d'Ammi. Portugal. ☉
tuberculeux. F. ℥
à graines blanches. Hongr. ℥

des rochers. caucase. ℥
tortueux. F. m. or. ℥

IMPÉRATEIRE

des Alpes. ℥ (méd.)
des prés. F. ℥

verticillée. F. ℥

MERRIS

sauvage. F. ℥

bulbosum *z.*
 temulum *z.*
 aromaticum *z.*
 aureum *z.*
 hirsutum *z.*
 coloratum *z. Mant.*
 tuberculosum.

bulbeux. F. ♂
tacheté. F. ♂
aromatique. Autriche. z
jaune. F. z
velu. F. z
coloré. illyrie. ♂
tuberculeux. z

SCANDIX

odorata *z.*
 recten *z.*
 australis *z.*
 pinnatifida *vent. H. cels.*
 cerefolium *z.*
 Anthriscus *z.*

CERFEUIL

musqué. Alpes. z
peigne-de-Vénus. F. ⊙
austral. F. m. ⊙
pinnatifide. perse. ⊙
cultivé. F. ⊙ (écon. méd.)
hérissé. F. ⊙

CORIANDRUM

sativum *z.*
 testiculatum *z.*

CORIANDRE

cultivée. orient. ⊙ (écon. méd.)
bilobée. eur. austr. ⊙

ÆTHUSA

cynapium *z.*
 meum *s. veg.* }
 Athamanta meum *z.* }
 bunius *s. veg.*

ETHUSA

petite ciguë. F. ⊙ (vénén.)
meum. Alpes. z (méd.)
à feuilles de coriandre. F. ♂

CICUTA

virosa *z.*
 maculata *z.*

CIGUE

aquatique. F. z (vénén.)
tachetée. Am. s. z (vénén.)

PHELLANDRIUM

aquaticum *z.*
 mutellina *z.*

PHELLANDRIUM

aquatique. F. z (vénén.)
des Alpes. z

OENANTHE

fistulosa *z.*
 crocata *z.*
 prolifera *z.*
 globulosa *z.*
 peucedanifolia *Pollich. pal.*
 pimpinelloides *z.*

OËNANTHÉ

fistuleux. F. z
à feuilles de Persil. F. z
prolifère. sicile. z
globuleux. F. ♂
à f. de peucedanum. Allem. z
à feuilles de Boucage. F. z

CUMINUM

cuminum *z.*

CUMIN

officinal. orient. ⊙ (méd.)

BUBON

macedonicum *z.*
 galbanum *z.*
 gummiferum *z.*

BUBON

de Macédoine. ♂
galbanum. cap. or. y (méd.)
gommifère. cap. or. y

SISON

segetum *z.*

SISON

des moissons. F. ♂

Amomum L.
canadense L.
ammi L.
inundatum L.
verticillatum L.

amomum. F. ♂
de Canada. L
ammi. orient. ☉
aquatique. F. ☉
verticillé. F. L.

Sium

angustifolium Jacq. Austr.
latifolium L.
nodiflorum L.
repens L. f.
sisarum L.
falcaria L.
siculum L.

BERLE

à feuilles étroites. F. L
à feuilles larges. F. L
nodiflore. F. L
rampante. F. L
chervi. F. L (alim.)
falciforme. F. L
de Sicile. L

ANGELICA

archangelica L.

ANGÉLIQUE

de Bohême. Alpes. ♂ (écon. méd.)
luisante. Am. s. ♂

lucida L.
aquilegifolia.
Laserpitium aquilegifolium }
Jacq. Austr.

à feuell. d'ancolie. Autriche. L

LICUSTICUM

levisticum L.

LIVÈCHE

officinale. Alpes. L (écon. méd.)

peloponense L.
pyrenæum Gouan. ill. }
selinum seguieri Willd. sp. }
apiifolium Encycl. }
cicutæfolium Vill. Delph. }
austriacum Jacq. Austr.
peregrinum s. Veg.

cicutaire. carniol. L
des Pyrénées. F. L

à feuilles de persil. Alpes. L
d'Autriche. F. L
à feuell. de céleri. Portugal. ♂

HERACLEUM

sphondylium L.
longifolium Jacq. Austr.
alpinum L.
pumilum Vill. Delph.
laciniatum.
sibiricum L. Mant.
amplifolium Lapeyr. Fl. }
pyrenaicum Dec. Fl. }

BERCE

des prés. F. L (écon. méd.)
à feuilles longues. F. L
des Alpes. L
noine. Alpes. L
lacinée. Sibérie. L
de Sibérie. L
à grandes feuilles. Pyrénées. L

LASERPITIUM

latifolium L.
gallicum L.
 — *crispum*.
siler L.
triquetrum Vent. H. cels.

LASER

à larges feuilles. F. L
cunéiforme. F. L
 — *crépu*.
lancéolé. F. L
triangulaire. Asie. or. L

FERULA

communis L.
 ferulago L.
 tingitana L.
 nodiflora L.
 sibirica.
 peucedanum sibiricum }
 wald. et Kitt. hung. }

PEUCEDANUM

officinale L.
 italicum L.
 gallicum.
 parisiense Dec. Fl. }
 album.
 minus Encycl. (an L. ?) }
 tenuifolium Encycl.
 silaus L.
 tauricum Marsch. cauc.
 alsaticum L.

CACHRYS

tomentosa Desf. Atl.
 panacisfolia Vahl, symb. }
 libanotis L.
 sicula L.

CRITHMUM

maritimum L.

ATHAMANTA

libanotis L.
 condensata L.
 sibirica L. Mant.
 cervaria L.
 latifolia Riviani Frag.
 oreoselinum L.
 Matthioli Jacq. Ic.
 sicula L.
 cretensis L.

SELINUM

chabræi Jacq. Austr.
 sylvestre Dec. Fl.
 Athamanta flexuosa H. Par. }
 palustre L.
 pyrenæum Gouan, ill. }
 seseli pyrenæum L. }
 peregrinum Willd. Enum.
 peucedanoides.

FÉRULE

commune. Eur. austr. ψ
 luisante. barbarie. ℥
 de Tanger. ℥
 nodiflore. orient. ℥
 de Sibérie. ℥

PEUCÉDANUM

officinal. F. ℥
 d'Italie. ψ
 des bois. F. ℥
 à fleurs blanches. ψ
 à feuilles menues. ℥
 des prés. F. ψ
 de la Tauride. ψ
 d'Alsace. F. ψ

CACHRYS

cotonneux. barbarie. or. ℥
 libanotis. sicile. or. ψ
 de Sicile. or. ℥

CRITHMUM

maritime. F. ℥ (écon.)

ATHAMANTA

libanotis. Allem. ℥
 à fleurs serrées. sibérie. ψ
 de Sibérie. ℥
 à feuilles luisantes. F. ℥
 à larges feuilles. F. ℥
 oréosélinum. F. ψ
 de Matthiolo. carinthie. ψ
 de Sicile. or. ℥
 de Crète. Alpes. ψ

SÉLINUM

de Chabræus. F. ℥
 tortueux. F. ψ
 des marais. F. ψ
 des Pyrénées. ψ
 étranger. ψ
 à feuilles de peucedanum. ψ

austriacum *Jacq. Austr.*
 carvifolia *Jacq. Austr.*
 monnieri *L.*
 elegans *balbis.*
 latifolium *Marsch. cauc.*
 decipiens *Willd. sp.*

CONIUM

maculatum *L.*

BUNUM

bulbocastanum *L.*

AMMI

majus *L.*
 visnaga.
 daucus visnaga *L.* }

DAUCUS

meoides.
 ammi meoides *Pers. syn.*
 ammi anethifolium *Encycl.* }
 carota *L.*
 crinitus *Desf. Atl.*

CAUCALIS

grandiflora *L.*
 daucoides *L.*
 latifolia *s. reg.*
 platicarpus *L.*
 humilis *Jacq. hort.*
 maritima *Cav. Ic.*
 hispida.
 orientalis *Willd. sp.*
 Anthriscus *Willd. sp.* }
 Tordylium anthriscus *L.* }
 arvensis *Willd. sp.*
 nodosa *Willd. sp.* }
 Tordylium nodosum *L.* }

TORDYLIUM

syriacum *L.*
 officinale *L.*
 apulum *L.*
 maximum *L.*

BUPLEVRUM.

1. *Herbacea.*

rotundifolium *L.*
 longifolium *L.*
 stellatum *L.*

d'Autriche. Ψ
 à feuilles de carvi. *F.* Ψ
 de le Monnier. *F. m.* $\odot$
 à feuilles menues. Ψ
 à larges feuilles. *caucase.* Ψ
 arbrisseau. *or.* Σ

CONIUM

ciguë des jardins. *F.* σ (vén.)

BUNUM

terre-noix. *F.* Σ

AMMI

officinal. *F.* $\odot$ (méd.)
 bisnagre. *F.* $\odot$

CAROTTE

à feuilles de méum. Ψ
 cultivée. *F.* σ (alim. méd.)
 chevelue. *barbarie.* *or.* Ψ

CAUCALIS

à grandes fleurs. *F.* $\odot$
 à feuilles de carotte. *F.* $\odot$
 à larges feuilles. *F.* $\odot$
 à gros fruit. *F.* $\odot$
 à feuilles menues. *F.* $\odot$
 maritime. *F.* $\odot$
 hérissée. $\odot$
 d'Orient. *or.* Σ
 Anthriscus. *F.* $\odot$
 des champs. *F.* $\odot$
 nodiflore. *F.* $\odot$

TORDYLIUM

de Syrie. $\odot$
 officinal. *F. m.* $\odot$
 d'Italie. $\odot$
 lancéolé. *F. m.* $\odot$

BUPLEVRE.

1. Tige herbacée.

à feuilles rondes. *F.* $\odot$
 à feuilles longues. *Alpes.* Ψ
 étoilé. *Alpes.* Ψ

petræum L.
 ranunculoides L.
 falcatum L.
 semicompositum L.
 odontites L.
 junceum L.
 tenuissimum L.
 rigidum L.

2. *Fruticosa.*

spinosum L. f.
 fruticosum L.
 coriaceum *l'her. stirp.*
 gibraltarium *Encycl.*
 obliquum *Vahl, symb.*
 arborescens *Jacq. ic.*

ECHINOPHORA

tenuifolia L.

ASTRANTIA

major L.
 minor L.
 caucasica *Fischer.*
 heterophylla *Marsch. cauc.*

SANICULA

europæa L.
 marylandica L.

ERYNGIUM

planum L.
 aquaticum L.
 dichotomum *Desf. Atl.*
 pusillum L.
 alpinum L.
 asperifolium *Laroché, Eryng.*
 oliverianum *Laroché, Eryng.*
 spina-alba *Vill. Delph.*
 campestre L.
 dilatatum *Encycl.*
 bourgati *Gouan. ill.*
 maritimum L.
 tenue *Desf. Atl.*
 corniculatum *Encycl.*

HYDROCOTYLE

vulgaris L.
 sibthorpioides *Encycl.*

des rochers. Alpes. ℥
renoncule. Alpes. ℥
falciforme. F. ♀
demi-composé. F. m. ⊙
odontites. F. m. ⊙
jonciforme. F. ⊙
filiforme. F. ⊙
à feuilles dures. F. m. or. ℥

2. *Tiges ligneuses.*

épineux. esp. or. ♀
arbrisseau. F. m. ♀ (orn.)

coriace. barbarie. or. ♀

ECHINOPHORA

à petites feuilles. orient. ♀

ASTRANTIA

à grandes fl. Alpes. ℥ (orn.)
à petites fleurs. Alpes. ♀
du Caucase. ℥
à feuilles variables. cauc. ♀

SANICLE

d'Europe. F. ℥ (méd.)
de Maryland. ♀

ERYNGIUM

à feuilles planes. F. ♂
aquatique. Am. s. ♀
dichotome. Alger. ⊙
petit. barbarie. or. ♀
des Alpes. ℥ (orn.)
à feuilles rudes. ℥
d'olivier. orient. or. ℥
à épines blanches. Alpes. ℥
des champs. F. ♀ (méd.)
dilaté. Maroc. ♀
bourgati. F. m. ♀
maritime. F. ℥
filiforme. Alger. ⊙
cornu. Portugal. or. ♀

HYDROCOTYLE

écuelle-d'eau. F. ♀
à f. de sibthorpia. île de Fr.
s. ch. ♀

spananthe willd. sp.
spananthe paniculata Jacq. }
 IC.

barbu. caracas. ☉

LAGOECIA
cuminoides L.

LAGOËCIA
à feuilles de cumin. F. m. ☉

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(*Stamina hypogyna.*)

ORDO I.

RANUNCULACEÆ.

I. *Capsulæ monospermæ non dehiscentes.*

CLEMATIS.

1. *Scandentes.*

viorna L.
viticella L.
crispa L.
florida Thunb. Jap.
orientalis L.
vitalba L.
virginiana L.
flammula L.
cirrhusa L.
triternata.
calicina H. K. }
balearica Encycl. }

2. *Erectæ.*

erecta L.
integrifolia L.

ATRAGENE

alpina L.
 — *flava.*
indica.

THALICTRUM

saxatile Vill. Delph.

CLASSE XIII.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(*Etamines attachées sous le pistil.*)

ORDRE I.

RENONCULACÉES.

I. *Capsules monospermes, ne s'ouvrant pas.*

CLÉMATITE.

1. *Tiges sarmenteuses.*

viorne. Am. s. ♀
bleue. esp. ♀ (orn.)
crépue. caroline. ♀
à grandes fl. Jap. or. ♀ (orn.)
d'Orient. ♀
brûlante. F. ♀ (vénén.)
de Virginie. ♀
odorante. F. m. ♀ (orn.)
à vrilles. Alger. ♀ (orn.)
triternée. ♀
à grand calice. mahon. ♀

2. *Tiges droites.*

droite. F. m. ♂
à feuilles entières. Autr. ♂

ATRAGÉNÉ

des Alpes. ♀
 — *jaune.*
des Indes. s. ch. ♀

PIGAMON

des rochers. Alpes. ♂

foetidum *L.*
 sibiricum *L. ?*
 minus *L.*
 majus *Jacq. Austr.*
 nigricans *Jacq. Austr.*
 angustifolium *L.*
 crenatum.
 flavum *L.*
 angulosum.
 glaucum.
 speciosum *Encycl.* }
 rugosum.
 elatum *Jacq. Hort.*
 cinereum.
 medium *Jacq. Hort.*
 atropurpureum *Jacq. Hort.* }
 aquilegifolium *L.*

ANEMONE

hepatica *L.*
 vernalis *L.*
 pulsatilla *L.*
 alpina *L.*
 apiifolia *Willd. sp.*
 coronaria *L.*
 pavonina *Encycl.*
 stellata *Encycl.* }
 hortensis *L.* }
 sylvestris *L.*
 virginiana *L.*
 dichotoma *L.*
 trifolia *L.*
 nemorosa *L.*
 ranunculoides *L.*
 narcissiflora *L.*
 thalictroides *L.*

ADONIS

æstivalis *L.*
 autumnalis *L.*
 vernalis *L.*

ANAMENIA

coriacea *Vent. Malm.* }
 adonis capensis *L.* }

RANUNCULUS.

1. *Folii simplicibus.*
 flammula *L.*

fétide. *F. ♀*
 de Sibérie. *℥*
 des bois. *F. ♀*
 élevé. Autriche. *℥*
 noirâtre. Autriche. *℥*
 à feuilles étroites. *F. ♀*
 crénelé. *℥*
 des prés. *F. ℥*
 anguleux. *℥*
 glauque. *♀*
 ridé. *℥*
 élevé. Hongrie. *℥*
 cendré. *℥*
 moyen. Hongrie. *♀*
 à feuell. d'ancolie. Alpes. *℥*

ANÉMONE

hépatique. Eur. *♀ (orn.)*
 printanière. *F. ♀*
 Pulsatille. *F. ♀*
 des Alpes. *℥*
 à feuilles de persil. Alpes. *♀*
 des jardins. orient. *℥ (orn.)*
 œil-de-paon. orient. *℥ (orn.)*
 étoilée. *F. m. ℥ (orn.)*
 sauvage. *F. ♀*
 de Virginie. *♀*
 dichotome. Canada. *♀*
 à trois feuilles. *F. ♀*
 des bois. *F. ℥*
 Renoncule. *F. ℥*
 à fleurs de Narcisse. Alpes. *℥*
 à f. de pigamon. Am. s. *♀*

ADONIS

d'été. *F. ☉*
 d'automne. *F. ☉*
 printanier. Alpes. *℥*

ANAMÉNIA

à feuilles coriaces. cap. or. *♀*

RENONCULE.

1. Feuilles simples.
 petite douve. *F. ℥*

lingua L.
 gramineus L.
 nodiflorus L.
 ophioglossoides Vill. Delph.
 pyrenæus L. Mant.
 amplexicaulis L.
 parnassifolius L.
 ficaria L.
 thora L.

2. *Foliis dentatis et divisis.*

creticus L.
 lacerus bellardi, App.
 auricomus L.
 sceleratus L.
 pennsylvanicus L. f. }
 canadensis Jacq. Ic. }
 aconitifolius L.
 platanifolius L. Mant.
 asiaticus L.
 glacialis L.
 abortivus L.
 nivalis L.
 alpestris L.
 hirsutus Curt. Fl. }
 pallidior Vill. Delph. }
 philonotis Retz. obs. }
 tuberosus Lapeyr. Fl.
 bulbosus L.
 repens L.
 acris L.
 lanuginosus L.
 polyanthemus L.
 chærophyllos L.
 arvensis L.
 muricatus L.
 trilobus Desf. Atl.
 parviflorus L.
 falcatus L.
 hederaceus L.
 aquatilis L.
 — circinatus.
 peucedanifolius Desf. Atl. }
 fluviatilis Willd. sp. }

MYOSURUS

minimus L.

lancéolée. F. ℥
 à feuilles de gramin. F. ℥
 nodiflore. F. ℥
 à f. d'ophioglosse. Alpes. ℥
 des Pyrénées. ℥
 amplexicaule. Alpes. ℥
 à feuil. de parnassia. Alpes. ℥
 petite chélidoïne. F. ℥ (méd.)
 Thora. Alpes. ℥ (vén.)

2. Feuilles dentées et découpées.

de Crète. ℥ (orn.)
 lacérée. Alpes. ℥
 printanière. F. ℥
 scélérate. F. ℥ (vén.)
 de Pensylvanie. ℥
 à feuilles d'aconit. Alpes. ℥
 à feuilles de platane. Alpes. ℥
 d'Asie. ℥
 des glaciers. Alpes. ℥
 arborescente. Canada. ℥
 des neiges. Alpes. ℥
 des Alpes. ℥

velue. F. ⊙

tubéreuse. Pyrénées. ℥
 bulbeuse. F. ℥
 rampante. F. ℥
 âcre. F. ℥
 lanugineuse. F. ℥
 multiflore. F. ℥
 à feuilles de cerfeuil. F. ℥
 des champs. F. ⊙
 hérissée. F. ⊙
 trilobée. Alger. ⊙
 à petites fleurs. F. ⊙
 falciforme. F. m. ⊙
 à feuilles de lierre. F. ℥
 aquatique. F. ℥
 — arrondie.

à feuil. de peucedanum. F. ℥

MYOSURUS

queue-de-souris. F. ⊙

II. *Capsula polysperma.*

TROLLIUS

asiaticus L.
europæus L.

HELLEBORUS

hyemalis L.
niger L.
viridis L.
fœtidus L.
lividus H. K.

ISOPYRUM

thalictroides L.
fumarioides L.

NIGELLA

damascena L.
sativa L.
arvensis L.
hispanica L.
orientalis L.

GARIDELLA

nigellastrum L.

AQUILEGIA

vulgaris L.
alpina L.
viridiflora H. K.
canadensis L.

DELPHINIUM.

1. *Unicapsularia.*

consolida L.
ajacis L.

2. *Capsula 3 ad 5.*

ambiguum L.
peregrinum L.
grandiflorum L.
puniceum L. f.
revolutum.
elatum L.
— hirsutum.
staphisagria L.

ACONITUM.

1. *Corolla flava,*

lycoctonum L.

II. *Capsules polyspermes.*

TROLLIUS

d'Asie. π (orn.)
d'Europe. Alpes. ψ

HELLÉBORE

d'hiver. Alpes. ψ
noir. Alpes. ψ (orn.)
vert. F. ψ
pied-de-griffon. F. ψ (méd.)
livide. corse. π

ISOPYRUM

à feuilles de pigamon. F. $\odot$
à feuilles de fumeterre. F. $\odot$

NIGELLE

à involucres. F. m. $\odot$ (orn.)
cultivée. orient. $\odot$
des champs. F. $\odot$
d'Espagne. $\odot$
d'Orient. $\odot$

GARIDELLE

de Provence. $\odot$

ANCOLIE

des jardins. F. π (orn.)
des Alpes. π
à fleurs vertes. sibérie. π
de Canada. π (orn.)

DELPHINIUM.

1. *Une capsule.*

des moissons. F. $\odot$
d'Ajax. suisse. $\odot$ (orn.)

2. *3 à 5 capsules.*

de deux couleurs. maroc. $\odot$
étranger. barbarie. $\odot$
à grandes fleurs. sibérie. ψ
ponceau. sibérie. π
à feuilles recourbées. π
élevé. sibérie. ψ (orn.)
— velu.
staphisaigre. F. m. σ (vén.
méd.)

ACONIT.

1. *Corolle jaune.*

rue-loup. Alpes. ψ (vén.)

pyrenaicum L.

Anthora L.

2. Corolla carulea.

napellus L.

cammarum L.

CALTHA

palustris L.

PÆONIA

moutan Bot. mag.

mascula L.

corallina Retz. obs. }

fœmina L.

officinalis Retz. obs. }

villosa.

humilis Retz. obs. }

lobata.

albiflora Pallas, Ross.

anomala L. Mant.

tenuifolia L.

ZANTHORHIZA

apiifolia l'Her. stirp.

III. Germen 1; bacca unilocularis,
polysperma.

ACTÆA

spicata L.

— alba.

— rubra.

racemosa L.

PODOPHYLLUM

peltatum L.

ORDO II.

PAPAVÉRACEÆ.

I. Stamina indefinita; antheræ filamentis
adnatæ.

SANGUINARIA

canadensis L.

ARGÉMONE

mexicana L.

PAPAVER.

1. Capsulis hispidis.

hybridum L.

des Pyrénées. ψ (vén.)

Anthora. Alpes. ζ

2. Corolle bleue.

Napel. Alpes. ζ (vén.)

à grandes fleurs. F. Alpes. (vén.)

CALTHA

des marais. F. ψ (orn.)

PIVOINE

en arbre. chine. or. ψ (orn.)

mâle. suisse. ψ (orn. méd.)

femelle. Alpes. ψ (orn. méd.)

velue. esp. ψ (orn.)

lobée. ζ

à fl. blanches. sibérie. ζ (orn.)

laciniée. sibérie. ψ (orn.)

à f. menues. sibérie. ψ (orn.)

ZANTHORHIZA

à feuilles de Persil. Am. s. ψ

III. Un sem. ovaire; baie à une loge
polysperme.

ACTÆA

des Alpes. ζ (méd.)

— à fruit blanc.

— à fruit rouge.

à grappes. Am. s. ψ

PODOPHYLLUM

en bouclier. Am. s. ψ

ORDRE II.

PAPAVÉRACÉES.

I. Etamines indéfinies; anthères attachées
le long du bord des filets.

SANGUINAIRE

de Canada. ζ

ARGÉMONE

du Mexique. ⊙

PAVOT.

1. Capsules hérissées.

hybride. F. ⊙

Argemone L.
alpinum L.
nudicaule L.

2. *Capsulis glabris.*

rhæas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
somniferum L.
 — *nigrum*.

CHELIDONIUM

glaucium L.
corniculatum L.
hybridum L.
majus L.
 — *quercifolium*.

II. *Stamina definita.*

BOCCONIA

frutescens L.
cordata Willd. sp.

HYPECOUM

procumbens L.

FUMARIA

cucullaria L.
bulbosa L.
solida Smith, fl.
nobilis s. *veg.*
fungosa H. K.
sempervirens L.
aurea Willd. Enum.
lutea L. Mant.
vesicaria L.
parviflora Encycl.
officinalis L.
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosæ.*

RAPHANUS

sativus L.

Argémone. F. ☉
des Alpes. ♀
à tiges nues. Alpes. ♂

2. *Capsules glabres.*

coquelicot. F. ☉ (méd.)
à long fruit. F. ☉
jaune. Alpes. ♀
d'Orient. ♀ (orn.)
des jardins. F. ☉ (orn. méd.)
 — *à graines noires*.

CHÉLIDOINE

glauque. F. ♂
cornue. F. m. ☉
hybride. F. m. ☉
officinale. F. ♂ (méd.)
 — *à feuilles de chêne*.

II. *Etamines définies.*

BOCCONIA

arbrisseau. Antilles. s. ch. ♀
à f. en cœur. chine? s. ch. ♀

HYPÉCOUM

tombant. F. ☉

FUMETERRE

capuchon. Am. s. ♂
bulbeuse. F. ♂ (orn.)
solide. F. ♀ (orn.)
odorante. Sibérie. ♂
fongueuse. Am. s. ♀
toujours verte. Am. s. ☉
dorée. Canada. ♂
jaune. Barbarie. ♀
vésiculeuse. Cap. ☉
à petites fleurs. F. ☉
officinale. F. ☉ (méd.)
à vrilles. F. m. ☉
claviculée. F. m. ☉
à épis. F. m. ☉

ORDRE III.

CRUCIFÈRES.

I. *Siliqueuses.*

RAIFORT

cultivé. chine. ☉ (alim.)

— rotundus.
 — niger.
 raphanistrum L.
 tenellus Pallas, itin.
 chlorispermum tenellum H. K. }

— radis.
 — noir.
 des moissons. F. ☉
 délicat. sibérie. ☉

SINAPIS

arvensis L.
 alba L.
 nigra L.
 incana L.
 pubescens L. Mant.
 pyrenaica L.
 hispida Schousb. Maroc.
 hastata.
 integrifolia Willd. Hort.
 lævigata L.
 juncea L.
 erucoides L.

BRASSICA

cheiranthus Vill. Delph.
 eruca L.
 erucastrum L.
 tournefortii Gouan, ill.
 alpina L. Mant.
 vesicaria L.
 oleracea L.
 — sylvestris.
 — sabellica.
 — gongliodes.
 — botrytis.
 — viridis.
 — capitata.
 — rubra.
 rapa L.
 napus L.
 asperifolia sylvestris Encycl.
 arvensis L. Mant.
 campestris L.
 orientalis L.

TURRITIS

glabra L.
 hirsuta L.
 arabis hispida Encycl. }
 hispida. }
 arabis hispida L. f. }
 bellidifolia. }
 arabis bellidifolia L. Mant. }

MOUTARDE

des champs. F. ☉
 blanche. F. ☉
 noire. F. ☉ (écon.)
 incane. F. ♂
 pubescente. sicile. or. ♀
 des Pyrénées. F. ♀
 hérissée. Maroc. ☉
 à feuilles hastées. N. Holl. ☉
 à feuilles entières. ☉
 lisse. Esp. ☉
 jonciforme. chine. ☉
 fausse roquette. F. ☉

CHOU

à fleur de cheiri. Alpes. ♂
 roquette. F. ☉
 fausse roquette. F. ☉
 de Tournefort. F. ☉
 des Alpes. L
 vésiculeux. Esp. ☉
 commun. F. ♂ (alim.)
 — sauvage.
 — frisé.
 — rave.
 — fleur.
 — vert.
 — pommé.
 — rouge.
 Turneps. F. ♂ (alim.)
 navet. F. ♂ (alim.)
 navette. F. ☉ (écon.)
 violet. F. ♀
 des champs. F. ☉
 d'Orient. F. ☉

TOURETTE

glabre. F. ♂
 velue. F. ♂
 hérissée. Alpes. ♀
 à f. de paquerette. Alpes. L

verna. }
 Arabis alpina L. }
 — minor.
 saxatilis. }
 Arabis saxatilis All. ped. }
 Thaliana. }
 Arabis Thaliana L. }
 pendula. }
 Arabis pendula L. }

HESPERIS

matronalis L.
 tristis L.
 lyrata *encycl.*
 africana L.
 laxa *encycl.*
 verna L.
 maritima. }
 cheiranthus maritimus L. }
 chia. }
 cheiranthus chius L. }
 linifolia. }
 cheiranthus linifolius Pers. }
 syn. }

HELIOPHILA

pendula Willd. sp.

CHEIRANTHUS

cheiri L.
 mutabilis *l'her. stirp.*
 longifolius *vent. Malm.*
 semperflorens Schousb. Maroc.
 scoparius Willd. Enum.
 fenestralis L.
 sinuatus L.
 incanus L.
 annuus L.
 græcus. }
 Hesperis æstiva *encycl. var. v.* }
 littoreus L.
 tristis L.
 cuspidatus *Marsch. cauc.*
 parviflorus Willd. sp.
 tricuspidatus L.

ERYSIMUM

officinale L.
 barbarea L.
 præcox Smith, fl.
 Alliaria L.

printanière. Alpes. ♀
 — à petites fleurs.
 des rochers. Alpes. ☉
 paniculée. F. ☉
 pendante. Alpes. ♂

JULIENNE

cultivée. Alpes. ♂ (orn.)
 à fleurs brunes. Autriche. ♂
 à feuilles en lyre. Sibérie. ☉
 d'Afrique. F. m. ☉
 à fleurs lâches. Tartarie. ☉
 printanière. F. m. ☉
 de Mahon. ☉ (orn.)
 de Chio. orient. ☉
 à feuilles de Lin. Esp. or. ♀

HÉLIOPHILA

à fruit pendant. cap. ☉

GIROFLÉE

jaune. F. ♂ (orn.)
 changeante. Canaries. or. ♀
 à long. feuil. cavar. or. ♀
 de tous les mois. Maroc. or. ♀
 à balais. Canaries. or. ♀
 fenestrelle. ♂ (orn.)
 sinuée. F. ☉
 incane. Esp. ♀
 quarantain. Eur. austr. ☉ (orn.)
 grecque. orient. ☉ (orn.)
 des rivages. F. m. ♂
 brune. F. m. or. ♀
 à long style. caucase. ♂
 à petites fleurs. Maroc. ☉
 à trois pointes. F. m. ☉

ERYSIMUM

officinal. F. ☉ (méd.)
 à feuilles en lyre. F. ♀
 printanier F. ♂
 Alliaire. F. ♂ (méd.)

repandum L.
 cheiranthus paniculatus *Encycl.*
 cheiranthoides L.
 hieracifolium L.
 helveticum.
 cheiranthus helveticus *Jacq.*
hort.
 sylvestre.
 cheiranthus sylvestris *Encycl.*
 cheiranthus erysimoides L.
 alpinum.
 cheiranthus alpinus L.
 quadrangulum.
 cheiranthus quadrangulus
l'ner. stirp.
 cheiranthus cornutus *Encycl.*

festonné. F. ☉

à petites fleurs. F. ☉
à feuilles d'épervière. F. ♂

d'Helvétie. ℥

sauvage. F. ℥

des Alpes. ℥

à long style. sibérie. ℥

SISYMBRIUM.

CRESSON.

1. Siliquis declinatis, brevibus.

nasturtium L.
 palustre *Willd. sp.*
 terrestre *Smith, Fl.*
 sylvestre L.
 amphibium L.
 pyrenaicum L.
 tanacetifolium L.
 tenuifolium L.
 erysimifolium.
 Allioni *Pers. syn.*

1. Siliques courtes et abaissées:
de fontaine. F. ♀ (alim. méd.)
des marais. F. ☉
sauvage. F. ☉
amphibie. F. ♀
des Pyrénées. ℥
à feuil. de ranaisie. Alpes. ℥
fausse roquette. F. ♀
à feuilles de réclar. F. ♂

2. Siliquis sessilibus, axillaribus.

polycerastium L.
 supinum L.
 bursifolium L.

2. Siliques sessiles, axillaires.
à siliques nombreuses. F. ☉
couché. F. ☉
à feuilles de Tabouret. F. ☉

3. Caule nudo.

murale L.
 fracastrum *Couan, ill.*
 vimineum L.
 arenosum L.

3. Tige nue.
des murailles. F. ☉
grêle. F. ☉
des sables. Alpes. ☉

4. Foliis pinnatis.

nitidum *Zeae.*
 sophia L.
 altissimum L.
 asperum L.
 irio L.

4. Feuilles pennées.
à feuilles luisantes. ☉
sophia. F. ☉
élevé. F. ☉
à fruit rude. F. ♀
irio. F. ☉

columnæ Jacq. Austr.
Loeselii L.
obtusangulum Willd. sp.

5. *Foliis integris.*
strictissimum L.
juncum.
Erysimum juncum Willd. sp.}

CARDAMINE.

1. *Foliis simplicibus.*
alpina Willd. sp. }
bellidifolia All. ped. }
asarifolia L.

2. *Foliis ternatis.*
resedifolia S. Veg.
trifolia L.

3. *Foliis pinnatis.*
chelidonia L.
impatiens L.
hirsuta L.
parviflora L.
pratensis L.

DENTARIA

caneaphylla L.
pinnata Encycl. }
heptaphyllos Vill. delph. }
pentaphyllos L.

II. *Siliculosæ.*

RICOTIA

ægyptiaca L.

LUNARIA

rediviva L.
annua L.

BISCUTELLA

auriculata L.
lævigata L. Mant.
apula L. Mant.
depressa Willd. Enum.
leiocarpa Dec. Ann.
obovata Dec. Ann.
raphanifolia Desf. Atl.
cichoriifolia Dec. Ann.

CLYPEOLA

jonthlaspi L.

de Colonna. F. ☉
de Loesel. F. ☉
à angles obtus. Alpes. ☉

5. Feuilles entières.
ramassé. Alpes ☉
jonciforme. Hongrie. ♂

CARDAMINÉ.

1. Feuilles simples.

des Alpes. ♀
à feuilles d'Asarum. Alpes. ♂

2. Feuilles ternées.
à feuilles de réséda. Alpes. ♂
à feuilles ternées. F. ♀

3. Feuilles pennées.
à feuilles de chélidoine. F. ♂
élastique. F. ♂
velu. F. ☉
à petites fleurs. F. ☉
des prés. F. ♀

DENTAIRE

à neuf feuilles. Alpes. ☉
pennée. Alpes. ♂
à cinq feuilles. Alpes. ♂

II. *Siliculeuses.*

RICOTIA

d'Égypte. ☉

LUNAIRE

vivace. F. ♀ (orn.)
annuelle. F. ☉ (orn.)

BISCUTELLE

auriculée. F. ☉
à fruit lisse. F. ☉
à fruit rude. F. ☉
d'Égypte. ☉
à petit fruit. F. ☉
ovale renversé. F. ☉
à feuilles de rai ort. F. ☉
à f. de chicorée. Pyrénées. ♀

CLYPÉOLA

jonthlaspi. F. m. ☉

maritima L. *Mant.**Alyssum maritimum* Willd. }*sp.**alliacea.**peltaria alliacea* L. }*maritime.* F. ♂

à odeur d'ail. Autriche. ♀

ALYSSUM.

1. *Fruticulosa.**spinosum* L.*saxatile* L.*alpestre* L. *Mant.*2. *Herbacea.**argenteum* Willd. *sp.**incanum* L.*montanum* L.*campestre* L.*calicinum* L.*clypeatum* L.3. *Siliculis inflatis.**deltoideum* L.*sinuatum* L.*utriculatum* L. *Mant.*

ALYSSON.

1. Tige ligneuse.

épineux. F. m. ♀

des rochers. orient. ♀

des Alpes. ♀

2. Tige herbacée.

argenté. Alpes. ♀*blanc.* F. ♂

des montagnes. Alpes. ♂

des champs. F. ⊙

à petites fleurs. F. ⊙

en bouclier. Liban. or. ♂

3. Silicules renflées.

deltoïde. syrie. or. ♀*sinué.* esp. ♂

à utricules. orient. ♀

DRABA.

1. *Caule nudo.**aizoides* L. *Mant.**alpina* L.*verna* L.*pyrenaica* L.2. *Caule folioso.**muralis* L.*hirta* L.*incana* L.

DRABA.

1. Tige nue.

aizoïde. Alpes. ♀

des Alpes. F. ♀

printanier. F. ⊙

des Pyrénées. F. ♂

2. Tige feuillue.

des murailles. Alpes. ♀

hérissé. F. ♀*blanc.* Alpes. ♂

COCHLEARIA

officinalis L.*danica* L.*armoracia* L.*draba* L.*glastifolia* L.

COCHLÉARIA

officinal. F. ♂ (méd.)

de Danemarck. ♂

cran de Bretagne. F. ♀ (écon. méd.)*draba.* F. ♀

à feuilles de pastel. F. ♂

CORONOPUS

*vulgaris.**cochlearia coronopus* L. }

CORONOPUS

commun. F. ⊙

SENEBIERA

pinnatifida *nec. soc. phil.* }
Lepidium didymum *L. mant.* }

SENEBIÉRA

pinnatifide. *Asie.* ♂

IBERIS

sempreflorens *L.*

sempervirens *L.*

saxatilis *L.*

gibraltarica *L.*

rotundifolia *L.*

amara *L.*

umbellata *L.*

pinnata *L.*

linifolia *L.*

nudicaulis *L.*

IBÉRIIS

de tous les mois. *sicile.* *or.* ♀

(*orn.*)

toujours verte. *Alpes.* ♀

des rochers. *Alpes.* ♀

de Gibraltar. *or.* ♀

à feuilles rondes. *Alpes.* ♀

amère. *F.* ⊙ (*orn.*)

ombellifère. *Esp.* ⊙ (*orn.*)

pennée. *F. m.* ⊙

à feuilles de Lin. *F. m.* ♂

à tige nue. *F.* ⊙

THLASPI

arvense *L.*

campestre *L.*

alliaceum *L.*

montanum *L.*

perfoliatum *L.*

alpestre *L.*

hirtum *L.*

ceratocarpon *L. f.*

bursa-pastoris.

sativum.

Lepidium sativum *L.* }

— *latifolium.*

— *crispum.*

nudicaule. }

Lepidium nudicaule *L.* }

ruderales. }

Lepidium ruderales *L.* }

THIASPI

à grandes siliques. *F.* ⊙

pubescent. *F.* ♂

alliace. *F.* ⊙

de montagne. *Alpes.* ♀

perfolié. *Alpes.* ♂

des Alpes. ⊙

velu. *F. m.* ♂

à fruit cornu. *sibérie.* ⊙

bourse-à-berger. *F.* ⊙

cresson alénois. ⊙ (*écon.*)

— *à larges feuilles.*

— *crépu.*

à tige nue. *F.* ⊙

sans pétales. *F.* ⊙

LEPIDIUM

perfoliatum *L.*

subulatum *L.*

procumbens *L.*

alpinum *L.*

petræum *L.*

latifolium *L.*

iberis *L.*

cardamines *L.*

vesicarium *L.*

LÉPIDIUM

perfolié. *orient.* ⊙

en alène. *Esp.* ♀

couché. *F.* ⊙

des Alpes. *F.* ♀

des rochers. *F.* ⊙

passerage. *F.* ♀

ibéris. *F.* ♀

à feuilles lyrées. *Esp.* ♂

vésiculeux. *orient.* ⊙

ANASTATICA

hierochuntica *L.*

ANASTATICA

rose de Jériko. *orient.* ⊙

VELLA

pseudocytisus L.
annua L.

MYAGRUM

perenne L.
orientale L.
rugosum L.
perfoliatum L.
sativum L.
paniculatum L.
saxatile L.

BUNIAS

spinosa L. Mant.
erucago L.
ægyptiaca L.
balearica L. Mant.
orientalis L.
syriaca Willd. sp. }
Anastatica syriaca L. }

CAKILE

maritima. }
bunias cakile L. }

CRAMBE

maritima L.
tataria Jacq. Ic.
cordifolia Fischer.
hispanica L.
filiformis Jacq. Ic.

ISATIS

tinctoria L.
lusitanica L. ?

ORDO IV.

CAPPARIDÆ.

CLEOME

gigantea L. Mant.
pentaphylla L.
spinosa L.
dodecandra L.
icosandra L.
arabica L. Dec.
viscosa L.
ornithopodioides L.

VELLA

faux cytise. orient. or. }
annuel. barbarie. ⊙

CAMELINE

vivace. F. ℥
d'Orient. ⊙
ridée. F. m. ⊙
amplexicaule. F. ⊙
cultivée. F. ⊙
paniculée. F. ⊙
des rochers. Alpes. ℥

BUNIAS

épineux. Égypte. ♂
tétragône. F. m. ⊙
d'Égypte. ⊙
de Mahon. ⊙
d'Orient. ℥
de Syrie. ⊙

CAKILÉ

maritime. F. ⊙

CRAMBÉ

maritime. F. ℥ (écon.)
de Tartarie. ℥
à feuilles en cœur. Russie. ℥
d'Espagne. ⊙
filiforme. ℥

PASTEL

des teinturiers. F. ♂ (arts.)
de Portugal. ⊙

ORDRE IV.

CAPRIERS.

CLÉOMÉ

gigantesque. Guinée. s. ch. }
à cinq feuilles. Inde. ⊙
épineux. Antilles. ⊙
à douze étamines. Inde. ⊙
à vingt étamines. Ceylan. ⊙
d'Arabie. Égypte. ⊙
visqueux. Ceylan. ⊙
pied-d'oiseau. Orient. ⊙

CRATÉVA

fragrans Bot. Magaz. }
capparoides Andr. rep. }

CAPPARIS

spinosa L.
longifolia Swartz.
saligna Wahl, symb.
glandulosa.
frondosa L.
cynophallophora L.
tenuisiliqua Jacq. Am.

RESEDA

luteola L.
glauca L.
sesamoides L.
alba L.
lutea L.
undata L.
mediterranea L. Mant.
phyteuma L.
odorata L.
canescens L.

DROSERA

rotundifolia L.
longifolia L.

PARNASSIA

palustris L.

ORDO V.**SAPINDI.****CARDIOSPERMUM**

halicacabum L.

PAULLINIA

pinnata L.

SERJANIA

triternata Willd. sp. }
paullinia triternata L. Mant. }

KOELREUTERIA

paullinioides l'her. sert. }
koelreuteria paniculata En- }
cycl.

SAPINDUS

saponaria L.

CRATÉVA

odorant. sierra-leona. s. ch. 5

CAPRIER

épineux. F. m. 5 (écon. orn.)
à long. feuell. Antilles. s. ch. 5
à f. de saule. Antilles. s. ch. 5
glanduleux. s. ch. 5
feuellu. Antilles. s. ch. 5
à long fruit. Antilles. s. ch. 5
à fruit grêle. Antilles. s. ch. 5

RÉSÉDA

gaude. F. ♂ (teint.)
glauque. pyrénées. ♂
sésamoïde. F. ☉
blanc. esp. ☉
jaune. F. 7
à trois styles. esp. 7
de la Méditerranée. orient. ☉
à grand calice. F. ☉
odorant. Alger. ☉
velu. orient. or. 7

ROSSOLIS

à feuilles rondes. F. ☉
à feuilles longues. F. ☉

PARNASSIA

des marais. F. 7

ORDRE V.**SAVONNIERS.****CARDIOSPERME**

pois-de-merveille. inde. ☉

PAULLINIA

à f. pennées. Antilles. s. ch. 5

SERJANIA

triterné. Antilles. s. ch. 5

KOELREUTÉRIA

paniculé. chine. 5

SAVONNIER

commun. inde. s. ch. 5 (écon.)

rigida vahl, symb.
indica.

ALLOPHYLUS

racemosus swartz. Prodr.
smidelia occidentalis swartz. }
fl. ind.

EUPHORIA

lit-chi.
sapindus edulis vahl, symb. }
dimocarpus lit-chi willd. sp.

AMIROLA

nitida Pers. syn.
lagunea nitida fl. per. }

CUPANIA

glabra swartz. Prodr.

ORDO VI.**ACERA.****ÆSCULUS**

hippocastanum L.

flava H. K.

pavia L.

macrostachya Mich. fl. }

parviflora H. K.

oiotensis Mich. Arbr.

ACER

negundo L.

pensylvanicum L. }

striatum Encycl. }

montanum H. K. }

spicatum Encycl. }

tataricum L.

rubrum L.

eriocarpon Mich. fl.

saccharinum L.

platanoides L.

— laciniosum.

pseudo-platanus L.

campestre L.

opalus willd. sp.

opulifolium Vill. Delph.

monspessulanum L.

creticum L.

ALLOPHYLUS

à f. roides. Antilles. s. ch. 5
des Indes. s. ch. 5

EUPHORIA

à grappes. Antilles. s. ch. 5

AMIROLA

à f. luisantes. Pérou. s. ch. 5

CUPANIA

glabre. Antilles. s. ch. 5

ORDRE VI.**ÉRABLES.****ÆSCULUS**

marronnier d'Inde. Asie. 5
(orn.)

pavia jaune. Am. s. 5 (orn.)

pavia rouge. Am. s. 5 (orn.)

à long. grappes. Am. s. 5 (orn.)

de l'Oio. Am. s. 5 (orn.)

ERABLE

à f. de Frêne. Am. s. 5 (orn.)

jaspé. Am. s. 5 (orn.)

de montagne. Am. s. 5

de Tartarie. 5 (orn.)

rouge. Am. s. 5 (orn.)

à fr. cotonneux. Am. s. 5 (orn.)

à sucre. Am. s. 5 (écon.)

plane. F. 5 (orn.)

— lacinié.

sicomore. F. 5 (orn.)

champêtre. F. 5

opale. Alpes. 5

à feuilles d'obier. Alpes. 5

de Montpellier. 5 (orn.)

de Crète. 5

HIPPOCRATEA
volubilis L.

HIPPOCRATÉA
sarmenteux. Antilles. s. ch. 5

ORDO VII.

MALPIGHIACEÆ.

BANISTERIA
laurifolia L.
ciliata *encycl.*
tomentosa.
periplocifolia.
GYROCARPOS
gyrocarpos Jacquin, *noxb.*
corom.

TRIOPTERIS
jamaicensis L. ?

MALPIGHIA
glabra L.
punicifolia L.
myrtifolia.
urens L.
nitida L.
macrophylla.
coccifera L.
aquifolia L.
glandulifera Jacq. *ic.*

ERYTHROXYLUM
hypericifolium *encycl.*

ORDO VIII.

HYPERICA.

ASCYRUM
hypericoides L.

HYPERICUM.

1. *Trigyna.*

ægyptiacum L.
scabrum L.
coris L.
nummularium L.
pulchrum L.
tomentosum L.

ORDRE VII.

MALPIGHIACÉES.

BANISTÉRIA
à f. de Laurier. Ant. s. ch. 5
cilié. Brésil. s. ch. 5
cotonneux. Antilles. s. ch. 5
à f. de Périploca. Ant. s. ch. 5

GYROCARPOS
de Jacquin. inde. s. ch. 5

TRIOPTÉRIS
de la Jamaïque. s. ch. 5

MALPIGHIA
glabre. Antilles. s. ch. 5
à f. de Grenadier. Ant. s. ch. 5
à f. de Myrte. Antilles. s. ch. 5
brûlant. Antilles. s. ch. 5
luisant. Antilles. s. ch. 5
à grandes f. Antilles. s. ch. 5
à f. de kermès. Ant. s. ch. 5
à f. de houx. Antilles. s. ch. 5
glanduleux. Antilles. s. ch. 5

ERYTHROXYLUM
à f. d'hypéricum. île de fr.
s. ch. 5

ORDRE VIII.

MILLEPERTUIS.

ASCYRUM
à f. de millepertuis. Am. s. 5

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Égypte. or. 5
rude. orient. or. 5
verticillé. Alpes. 5
à f. de Nummulaire. Alpes. 25
élégant. F. 7
cotonneux. F. m. or. 25

elodes L.
crispum L. *Mant.*
humifusum L.
montanum L.
hirsutum L.
perforatum L.
quadrangulare L.
delphinense Vill. *Delph.* }
dubium Smith, *Fl.* }
canariense L.
Androsæum L.
hircinum L.
elatum *Encycl.*
prolificum L. *Mant.*

2. *Styli* 5.

richeri Vill. *Delph.* }
fimbriatum *Encycl.* }
amplexicaule *Encycl.*
calicinum L. *Mant.*
chinense *Encycl.* }
monogynum L. }
balearicum L.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA

rosea L.
flava L.

MAMMEA

americana L.

ORDO X.

AURANTIA.

I. *Fructus monospermus.*

BALANITES

ægyptiaca *delile*, *Fl.* }
xymenia ægyptiaca L. }

COOKIA

punctata Willd. *sp.*

des marais, F. L
crépu, Alger. V
couché, F. O
de montagne, F. L
velu, F. V
officinal, F. V (méd.)
tétragône, F. V
du Dauphiné, L
des Canaries, or. V
Androsème, F. V (méd.)
fétide, orient. V
élevé, Am. s. V
prolifique, Am. s. V (orn.)

2. 5 styles.

de Richer, Alpes. V
amplexicaule, L
à grand calice, orient. V (orn.)
de Chine, or. V (orn.)
de Mahon, or. V

ORDRE IX.

GUTTIERS.

CLUSIA

rose, Antilles. s. ch. V
jaune, Antilles. s. ch. V

MAMMÉA

d'Amérique, Antilles. s. ch. V
 (écon.)

ORDRE X.

ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE

d'Égypte, s. ch. V

COOKIA

punctué, île de Fr. s. ch. V

II. *Fructus polyspermus baccatus.*

MURRAYA

- exotica *L. Mant.*
 chalcas paniculata *L. Mant.*
 marsana buxifolia *sonn. itin.* }

CITRUS

- medica *L.*
 — acida.
 — cedra.
 — tuberosa.
 — balotina.
 — limon.
 — florentina.
 Aurantium *L.*
 — amarum.
 — olyssiponense.
 — violaceum.
 — multiflorum.
 — lunatum.
 — bergamium.
 decumana *L.*
 sinensis.
 triptera.
 hystrix *Dec. cat.*
 emarginata.

LIMONIA

- trifoliata *L.*

III. *Fructus polyspermus capsularis.*

TERNSTROMIA

- elliptica *swartz, Prodr.*
 meridionalis *L. f. ?*

THEA

- bohea *L.*

CAMELLIA

- japonica *L.*

II. Une baie polysperme.

MURRAYA

- buis de Chine. s. ch. ♀

CITRONNIER

- commun. inde. or. ♀ (écon. méd.)
 — aigre.
 — cédra.
 — poncire.
 — balotin.
 — lime douce.
 — de Florence.
 oranger. Asie. or. ♀ (orn. méd. écon.)
 — amer.
 — de Portugal.
 — violet.
 — riche dépouille.
 — ture.
 — bergamotte.
 pampelmousse. inde. or. ♀ (orn.)
 de Chine. or. ♀
 à feuilles ternées. s. ch. ♀
 hérissé. s. ch. ♀
 échancré. s. ch. ♀

LIMONIA

- à f. ternées. inde. s. ch. ♀

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA

- elliptique. Antilles. s. ch. ♀
 d'Amérique. Antilles. s. ch. ♀

THÉ

- bou. chine. or. ♀ (écon. méd.)

CAMELLIA

- du Japon. or. ♀ (orn.)

ORDO XI.

MELIACEÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA

canella L. f.

AYTONIA

capensis L. f.

II. Folia composita.

PORTESIA

ovata Cav. Diss.

trichilia pallida Swartz, }
prodr.

TRICHILIA

spondioides Swartz, prodr.

MELIA

Azedarach L.

SWIETENIA

mahagoni L.

CEDRELA

odorata L.

ORDO XII.

VITES.

Cissus

orientalis Lamk. ill.

acida L.

quadrangularis L. Mant.

sicyoides L.

quinquefolia.

vitis hederacea Willd. sp.

hedera quinquefolia L.

ampelopsis quinquefolia }
Michx. Am.

antarctica Vent. ch. de pl.

vitiginea L.

Vitis

vinifera L.

ORDRE XI.

AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA

cannelle blanche. Antill. s. ch.

h (méd.)

AYTONIA

du Cap. or. h

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA

à feuilles ovales. Ant. s. ch. h

TRICHILIA

à f. de monbin. Ant. s. ch. h

MÉLIA

Azédarac. inde. or. h (orn.)

SWIÉTÉNIA

mahagoni. Acajou à meubles.

Antilles. s. ch. h (arts.)

CÉDRÉLA

odorant. Acajou à planches.

Antilles. s. ch. h (arts.)

ORDRE XII.

VIGNES.

Cissus

d'Orient. perse. or. h

acide. Antilles. s. ch. h

quadrangulaire. inde. s. ch. h

à f. dentées. Antilles. s. ch. h

vigne vierge. Am. s. h (orn.)

antarctique. N. Holl. or. h

cotonneux. inde. s. ch. h

Vigne

cultivée. Asie. h (écon. méd.)

laciniosa L.
vulpina L.
labrusca L.
cordifolia Mich. Fl.
virginiana.
arborea F.
ampelopsis bipinnata Mich. }
 Fl.

laciniée. h (écon.)
de renard. Am. s. h
cotonneuse. Am. s. h
à feuilles en cœur. Am. s. h
de Virginie. L
à f. de persil. Antilles. s. ch. h

ORDO XIII.

GERANIA.

PÉLARGONIUM

fulgidum Willd. sp.
inquinans Willd. sp.
 — *roseum*.
hybridum Willd. sp.
flabellatum.
zonale Willd. sp.
 — *variegatum*.
acetosum Willd. sp.
glaucum Willd. sp.
Geranium lanceolatum Cav. }
 Diss.
diversifolium Willd. sp.
canum.
tomentosum Andr. rep. }
peltatum Willd. sp.
grandiflorum Willd. sp.
cortusæfolium Willd. sp.
melananthon Willd. sp.
sanguineum.
pilosum H. K.
hirtum Willd. sp.
hamatum.
echinatum Bot. Mag. }
tetragonum Willd. sp.
reniforme Bot. Mag.
papilionaceum Willd. sp.
australe Willd. sp.
vitifolium Willd. sp.
acerifolium Willd. sp.
penicillatum Willd. H. Ber.
beaufortianum.
cucullatum Willd. sp.
ribifolium Willd. sp.

ORDRE XIII.

GÉRANIUM.

PÉLARGONIUM

couleur de feu. cap. or. h
 (orn.)
écarlate. cap. or. h (orn.)
 — *rose*.
hybride cap. or. h
en éventail. cap. or. h
à zones. cap. or. h (orn.)
 — *panaché*.
acide. cap. or. h

glaucue. cap. or. h

à feuilles var. cap. or. h
à feuell. blanches. cap. or. h
en bouclier. cap. or. h
à grandes fleurs. cap. or. h
à f. de cortusa. cap. or. h
à fleurs brunes. cap. or. F
sanguin. cap. or. h
velu. cap. or. F
hérissé. cap. or. L
à crochets. cap. or. h
tétragone. cap. or. h
reniforme. cap. or. h
papilionacé. cap. or. h
austral. N. Holl. or. h
à feuilles de vigne. cap. or. h
à feuilles d'Erable. cap. or. h
moucheté. cap. or. h
de Beaufort. cap. or. h
capuchon. cap. or. h
à feuell. de Ribés. cap. or. h

tomentosum willd. sp.
 rigidum willd. sp.
 cordatum willd. sp.
 blattarium willd. sp.
 tricolor willd. sp. }
 geranium violarium Jacq. ic. }
 betulinum willd. sp.
 formosissimum.
 capitatum willd. sp.
 jatrophaefolium Dec. cat.
 glutinosum l'Her. Ger. }
 geranium viscosum Cav. Diss. }
 quercifolium willd. sp.
 terebinthinaceum. }
 graveolens l'Her. Ger. }
 radula willd. sp.
 scabrum willd. sp.
 tricuspidatum l'Her. Ger.
 bicolor willd. sp.
 quinquevulnerum Andr. rep.
 carnosum willd. sp.
 gibbosum willd. sp.
 ceratophyllum l'Her. Ger.
 exstipulatum willd. sp.
 crispum willd. sp.
 fragile willd. sp.
 ternatum willd. sp.
 trifidum Jacq. H. Sch. }
 tripartitum willd. sp. }
 adulterinum l'Her. Ger.
 incisum willd. sp.
 suaveolens.
 tabulare willd. sp. }
 geranium elongatum Cav. }
 Diss.
 alchimilloides willd. sp.
 odoratissimum willd. sp.
 astragalifolium. }
 pinnatum H. K. }
 multicaule.
 geranium multicaule Jacq. ic. }
 coriandrifolium willd. sp.
 rapaceum willd. sp. }
 geranium selinum Andr. rep. }
 myrrhifolium willd. sp.
 lacerum willd. sp.
 grossularioides willd. sp.
 carneum willd. sp.

drapé. cap. or. 5
 à feuilles dures. cap. or. 5
 à feuilles en cœur. cap. or. 5
 blattaire. cap. or. 5
 tricolore. cap. or. 5 (orn.)
 à f. de bouleau. cap. or. 5
 élégant. cap. or. 5 (orn.)
 à fleurs en tête. cap. or. 5
 à f. de jatropha. cap. or. 5
 glutineux. cap. or. 5
 à feuilles de chêne. cap. or. 5
 térébinthinacé. cap. or. 5
 radula. cap. or. 5
 rude. cap. or. 5
 à trois pointes. cap. or. 5
 bicolore. cap. or. 5
 à cinq taches. cap. or. 5
 charnu. cap. or. 5
 gibbeux. cap. or. 5
 à feuilles cornues. cap. or. 5
 sans stipules. cap. or. 5
 crépu. cap. or. 5
 fragile. cap. or. 5
 trilobé. cap. or. 5
 trifide. cap. or. 5
 adultérin. cap. or. 5
 incisé. cap. or. 5
 suave. cap. or. 5
 à longs pédoncules. cap. or. 7
 à f. d'Alchimille. cap. or. 5
 odorant. cap. or. 5
 à f. d'Astragale. cap. or. 7
 à tiges nombreuses. cap. or. 7
 à f. de coriandre. cap. or. 7
 rave. cap. or. 7
 à f. de myrris. cap. or. 7
 lacéré. cap. or. 7
 à f. de groseillier. cap. or. 7
 à petites fleurs. cap. or. 7

lobatum willd. sp.
triste willd. sp.
daucifolium. }
flavum willd. sp. }
abrotanifolium willd. sp.
tenuifolium willd. sp.

lobé. cap. or. ℥
à fl. brunes. cap. or. ʒ (orn.)
à f. de carotte. cap. or. ʒ
à f. d'Aurone. cap. or. ʒ
à feuilles menues. cap. or. ʒ

ERODIUM

alpinum willd. sp.
petraeum willd. sp.
cicutarium willd. sp.
romanum willd. sp.
moschatum willd. sp.
hirtum willd. sp.
laciniatum willd. sp.
maritimum willd. sp.
pulverulentum willd. sp. ?
malacoides willd. sp.
glaucophyllum willd. sp.
ciconium willd. sp.
gruinum willd. sp.
geifolium.
hymenodes willd. sp.
Geranium triphyllum cav. }
diss.
pusillum.
Geranium pusillum L. }
chamaedryoides willd. sp.
Geranium Reichardi syst. }
veget.
incarnatum willd. sp. }
punctatum cav. diss. }

ERODIUM

des Alpes. ʒ
des rochers. Pyrénées. ʒ
ciculaire. F. ℥
romain. F. ☉
musqué. F. ☉
pubescent. Egypte. or. ℥
lacinié. Alger. ☉
maritime. F. ℥
pulvérent. Esp. or. ʒ
malacoïde. F. m. ☉
à f. glauques. Egypte. or. ☉
Bec-de-cigogne. F. ☉
Bec-de-grue. F. ☉
à f. de Géum. barbarie. or. ʒ

petit. F. ☉

à f. de chamédrys. corse. or. ʒ

incarnat. cap. or. ʒ

GERANIUM

pyrenaicum L. Mant.
tuberosum L.
macrorrhizum L. Mant.
anemonæfolium l'her. Ger.
Geranium palmatum cav. }
diss.
phæum s. veg.
roseum l'her. mss.
reflexum L. Mant.
lividum l'her. Ger.
nodosum L.
striatum L.
aconitifolium l'her. Ger.
sylvaticum L.
maculatum L.

GÉRANIUM

des Pyrénées. ☉
tubéreux. Italie. ʒ
à grosses racines. Italie. ʒ
à f. d'Anémone. madère. or. ʒ
brun. Alpes. ʒ
rose. Alpes. ʒ
réfléchi. Alpes. ʒ
livide. Alpes. ʒ
nouveux. Alpes. ʒ
réticulé. Italie. ʒ (orn.)
à feuilles d'aconit. Alpes. ʒ
des bois. Alpes. ʒ
maculé. Am. s. ʒ

pratense L.
varium l'Her. Ger. }
cineraceum Lapeyr. Fl. }
incanum L.
argenteum L.
robertianum L.
lucidum L.
bohemicum L.
divaricatum Willd. sp.
carolinianum L. }
lanuginosum Jacq. H. Sch. }
molle L.
columbinum L.
dissectum L.
rotundifolium L.
sibiricum L.
sanguineum L.

MONSONIA

speciosa s. veg.

Genera Geraniis affinia.

TROPÆOLUM

majus L.
 — *multiplex*.
minus L.

IMPATIENS

balsamina L.
noli-tangere L.

OxALIS.

1. *Foliolis binatis.*

crispa Jacq. ox.
asinina Jacq. ox.
leporina Jacq. ox. ?

2. *Foliolis ternatis ; scapo uniflora.*

fabæfolia Jacq. ox.
acetosella L.
purpurea Jacq. ox.
 — *laxula*.
breviscapa Jacq. ox.
speciosa Jacq. ox.
 — *sigillata*.
 — *rigidula*.

des prés. F. ♀

cendré. pyrénées. ♂

incane. cap. or. ♀

argenté. F. m. ♀

herbe-à-Robert. F. ♂ (méd.)

luisant. F. ⊙

de Bohême. ⊙

étalé. Hongrie. ⊙

de Caroline. ⊙

velouté. F. ⊙

colombin. F. ⊙

découpé. F. ⊙

à feuilles rondes. F. ⊙

de Sibérie. ⊙

sanguin. F. ♂

MONSONIA

élégant. cap. or. ♀

Genres qui ont de l'affinité avec le
Géranium.

CAPUCINE

cultivée. Pérou. ⊙ (orn. écon.)

— *à fleurs doubles.* s. ch. ♂

à petites fleurs. Pérou. ⊙

BALSAMINE

des jardins. inde. ⊙ (orn.)

des bois. F. ⊙

OxALIS.

1. *Folioles deux à deux.*

crépu. cap. or. ♀

cartilagineux. cap. or. ♂

pied-de-lièvre. cap. or. ♀

2. *Folioles ternées ; hampe à une fleur.*

à feuilles de fève. cap. or. ♂

des bois. F. ♂

pourpre. cap. or. ♀

— *lâche.*

à hampe courte. cap. or. ♂

à grandes fleurs. cap. or. ♂

— *sigillé.*

— *hérissé.*

3. *Foliolis ternatis , rarius quaternis ; scapo multifloro.*

compressa Jacq. Fragm.
tetraphylla Cav. Ic.
violacea L.
maculata.
cernua Jacq. ox.
quinquepunctata.

4. *Caulo scentes ; foliis ternatis ; pedunculis unifloris.*

versicolor Jacq. ox.
 — *gracilis.*
elongata Jacq. ox.
rubella Jacq. ox.
polyphylla Jacq. ox.
multiflora Jacq. ox.
rosacea Jacq. ox.
incarnata L.

- 9 *Foliolis ternatis ; pedunculis multifloris.*

corniculata L.
stricta L.

6. *Foliis digitatis,*

pectinata Jacq. ox.
flava Jacq. ox.
flabellifolia Jacq. ox.
digitata.

3. *Folioles ternées , rarement quaternées ; hampes à plusieurs fleurs.*

comprimé. cap. or. ♀
à quatre folioles. Mexique. ♀
violet. Am. s. ♀
tacheté. cap. or. ♀
penché. cap. or. ♀.
à cinq glandes. cap. or. ♀

4. *Une tige ; folioles ternées ; pédoncules à une fleur.*

bigarré. cap. or. ♀
 — *grêle.*
allongé. cap. or. ♀
rouge. cap. or. ♀
à feuilles nombr. cap. or. ♀
à plusieurs fleurs. cap. or. ♀
rosacé. cap. or. ♀
incarnat. cap. or. ♀

5. *Folioles ternées ; pédoncules à plusieurs fleurs.*

cornu. F. ♀
ramassé. F. ♀

6. *Feuilles digitées.*

pectiné. cap. or. ♀
jaune. cap. or. ♀
éventail. cap. or. ♀
digité. cap. or. ♀

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

- I. *Stamina in tubum corolliferum connata , indefinita ; fructus multicapsularis , capsula capitata.*

PALAVIA

malvisolia Cav. Diss.
malope parviflora l'her. stirp. }

MALOPE

malacoides L.
trifida Cav. Diss.

KITAIBELIA

vitifolia Willd. sp.

ORDRE XIV.

MALVACÉES.

- I. *Étamines indéfinies , réunies en un tube adhérent à la corolle ; plusieurs capsules réunies en tête.*

PALAVIA

à feuilles de mauve. Pérou. ☉

MALOPE

à feuilles ovales. Alger. or. ♂
à trois lobes. Afr. s. ☉

KITAIBELIA

à feuilles de vigne. Hongr. ♀

II. *Stamina in tubum corolliferum connata ; fructus multicapsularis ; capsulae in orbem dispositae aut in unam coactae.*

II. Étamines réunies en un tube adhérent à la corolle ; plusieurs capsules disposées circulairement , ou réunies en une seule.

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata L.
polystachya Cav. Diss.
scoparia Cav. et l'her.
scabra Cav. Diss.
americana L.
angustifolia Cav. Diss.

2. *Foliis angulatis.*

asperrima Jacq. II. Sch.
miniala Cav. Ic.
fragrans Cav. Diss.
capensis Cav. Diss.
virgata Cav. Diss.
abutiloides L.
vitifolia Cav. Ic.
umbellata Cav. Ic.
peruviana L.
limensis L.
caroliniana L.
sherardiana L.
parviflora L.
verticillata L.
mareotica Delile, Ægyp.
rotundifolia L.
sylvestris L.
crispa L.
Alcea L.
moschata L.
ægyptia L.

MAUVE.

1. Feuilles entières.

à épis. Am. m. s. ch. ♀
à plus. épis. Pérou. s. ch. ♀
à balais. Pérou. s. ch. ♀
rude. Pérou. s. ch. ♀
d'Amérique. Antilles. ☉
à feuell. étroit. Mexiq. s. ch. ♀

2. Feuilles anguleuses.

rapeuse. Cap. or. ♀
rouge. s. ch. ♀
odorante. Cap. or. ♀
du Cap. or. ♀
effilée. Cap. or. ♀
à f. d'Abutilon. Ant. s. ch. ♀
à f. de vigne. Mexique. or. ♀
ombellifère. Mexique. s. ch. ♀
du Pérou. ☉
de Lima. ☉
de Caroline. ☉
de Sherard. Italie. or. ♂
à petites fleurs. Barbarie. ☉
verticillée. Chine. ☉
maréotique. Égypte.
à feuilles rondes. F. ℥ (méd.)
sauvage. F. ♂ (méd.)
crépue. Orient. ☉
Alcée. F. ℥
musquée. F. ℥
d'Égypte. ☉

LAVATERA.

1. *Caule fruticoso.*

arborescens L.
micans L.
olbia L.
pseudo-olbia.
unguiculata.
triloba L.
lusitanica L.
maritima Gouan, Ill.
acerifolia Dec. Cat.
phœnicea Vent. Malm.

LAVATÉRA.

1. Tige ligneuse.

arbre. Italie. or. ♀
brillant. Esp. or. ♀
olbia. F. m. or. ♀
faux olbia. or. ♀
onguiculé. or. ♀
à trois lobes. F. m. or. ♀
de Portugal. or. ♀
maritime. F. m. or. ♀
à f. d'Erable. Canaries. or. ♀
à fl. pourpres. Canaries. or. ♀

2. *Caule herbaceo.*

punctata *All. Auct.*
 cretica *L.*
 thuringiaca *L.*
 trimestris *L.*

ALTHÆA et ALGEA

rosca *Willd. sp.*
 — *sinensis.*
 ficifolia *Willd. sp.*
 officinalis *L.*
 narbonensis *Cav. Diss.*
 cannabina *L.*
 ludwigii *L. Mant.*
 hirsuta *L.*

MALACHRA

capitata *L.*
 alceaefolia *Jacq. Ic.*
 triloba.

PAVONIA

urens *Cav. Diss.*
 cuneifolia *Cav. Diss.*
 hibiscus præmorsus *L. f.* }
 spinifex *Cav. Diss.* }
 hibiscus spinifex *L.* }
 — *aristata.*
 zeylanica *Willd. sp.* }
 hibiscus zeylanicus *L.* }
 parviflora.
 columella *Jacq. H. Sch.*

URENA

lobata *L.*
 sinuata *L.*

NAPÆA

scabra *L.* }
 sida dioica *Cav. Diss.* }
 levis *L.* }
 sida napæa *Cav. Diss.* }

SIDA

spinosa *L.*
 frutescens *Cav. Diss.*
 carpinifolia *L. f.*
 rhombifolia *L.*
 alnifolia *L.*
 unilocularis *V. Her. stirp.*

2. *Tige herbacée.*

ponctué. Nice. ☉
 de Crète. ☉
 de Thuringe. ☉
 à opercule. F. m. ☉ (orn.)

ALTHÆA

rose trémière. chine. ♂ (orn.)
 — de Chine.
 à f. de Figuier. sibér. ♂ (orn.)
 officinal. F. ℥ (méd.)
 de Narbonne. ℥
 à feuilles de chanvre. F. m. ℥
 de Ludwig. sicile. ☉
 velu. F. ☉

MALACHRA

à fleurs en tête. Antilles. ☉
 à feuilles d'alcea. caracas. ☉
 à trois lobes. ☉

PAVONIA

piquant. île de Fr. s. ch. ♀
 cunéiforme. cap. or. ♀
 épineux. Antilles. s. ch. ♀
 — à longues arêtes.
 de Ceylan. ☉
 à petites fleurs. s. ch. ♀
 de Bourbon. s. ch. ♀

URENA

à f. lobées. chine. s. ch. ♀
 à f. sinuées. Antilles. s. ch. ♀

NAPÆA

rude. Am. s. ℥
 lisse. Am. s. ℥

SIDA

épineux. Antilles. ☉
 arbrisseau. s. ch. ♀
 à f. de charme. canar. or. ♀
 rhomboïdal. inde. s. ch. ♀
 à feuilles d'aune. inde. ☉
 à une loge. île de Fr. ☉

retusa L.
viscosa L.
angustifolia Cav. Diss.
umbellata L.
triquetra L.
virgata Cav. Ic.
periplocifolia L.
nutans l'Her. stirp.
fragrans l'Her. stirp.
ricinoides l'Her. stirp. }
palmata Cav. Diss. }
nudiflora l'Her. stirp. }
stellata Cav. Diss. }
crassifolia l'Her. stirp.
glauca Cav. Ic.
tricuspis.
mollissima Cav. Diss.
arborea L. f. }
peruviana Cav. Diss. }
reflexa Cav. Diss. }
retrorsa l'Her. stirp. }
tiliæfolia.
gigantea Jacq. H. Sch.
palmata Cav. Diss. }
jatrophioides l'Her. stirp. }
Abutilon L.
indica L.
occidentalis L.
asiatica L.
hirta Cav. Diss. }
pilosa l'Her. stirp. }
mollis Ortega, Dec.
mauritiana l'Her. stirp.
triloba Jacq. H. Sch.
hastata Willd. sp. }
Anoda hastata Cav. Diss. }
cristata. }
Anoda cristata Cav. Diss. }
parviflora. }
Anoda parviflora Cav. Diss. }

III. *Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus simplex, multilocularis.*

HIBISCUS

solandra l'Her. stirp. }
solandra lobata Syst. veget. }
palustris L.

émoussé. inde. ☉
visqueux. Antilles. s. ch. ☿
à f. étroit. île de Bourbon. s. ch. ☿
ombellifère. Antilles. ☉
triangulaire. Antilles. s. ch. ☿
effilé. Pérou. s. ch. ☉
à f. de périploca. Ant. s. ch. ☿
à fl. penchées. Pérou. s. ch. ☿
odorant. Antilles. s. ch. ☿
à feuilles de ricin. Pérou. ☉
à fleurs nues. Antilles. s. ch. ☿
à f. épaisses. Antilles. s. ch. ☿
glaucue. Sénégal. s. ch. ☿
à trois pointes. s. ch. ☿
velouté. Pérou. s. ch. ☿
arbre. Pérou. s. ch. ☿
réfléchi. Pérou. s. ch. ☿
à f. de tilleul. Ant. s. ch. ☿
gigantesque. Antilles. s. ch. ☿
à feuilles palmées. Pérou. ☉
Abutilon. suisse. ☉
des Indes. s. ch. ☿
d'Occident. Antilles. ☉
d'Asie. inde. ☉
hérissé. inde. ☉
à f. molles. Pérou. s. ch. ☿
de l'île de France. s. ch. ☿
à trois lobes. Cap. or. ☿
hasté. Mexique. ☉
à crête. Mexique. ☉
à petites fleurs. Mexique. ☉

III. *Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; une capsule à plusieurs loges.*

HIBISCUS

à trois lobes. île de Bourbon. ☉
des marais. Am. s. ☿ (orn.)

moscheutos L.
speciosus H. K.
pentacarpus L.
militaris Cav. Diss.
populneus L.
tiliaceus L.
mutabilis L.
rosa-sinensis L.
phoeniceus L. f.
syriacus L.
scaber Encycl.
ficulneus Cav. Diss. (non L.) }
diversifolius Willd. sp.
manihot L.
heterophyllus Vent. Malm.
cannabinus L.
digitatus Cav. Diss.
abelmoschus L.
esculentus L.
sabdariffa L.
tubulosus Cav. Diss.
vitifolius L. Mant.
pedunculatus L. f.
trionum L.

MALVAVISCUS

arboreus Cav. Diss. }
achania malvaviscus H. K.
hibiscus malvaviscus L.

LAGUNEA

squamea Vent. Malm. }
hibiscus patersonius Andr.
rep.

GOSSYPIUM

herbaceum L.
arboreum L.
hirsutum L.
vitifolium Encycl.
purpureum.

IV. *Stamina basi in urccolum sessilem connata ; omnia fertilia, definita aut indefinita.*

MELOCHIA

pyramidata L.
corchorifolia L.
ovata. }
brotera ovata Cav. Ic.
lomentosa L.

moscheutos. Am. s. 2 (orn.)
 à fl. pourpres. Am. s. 2 (orn.)
 à cinq fruits. Italie. 2
 à f. hastées. Louisiane. or. 2
 à f. de peuplier. Inde. s. ch. 2
 à f. de tilleul. Inde. s. ch. 2
 à fl. changeantes. Inde. s. ch. 2
 rose de Chine. s. ch. 2 (orn.)
 rose. Inde. s. ch. 2
 Mauve en arbre. orient. 2 (orn.)

à feuill. rudes. Ceylan. s. ch. 2

à grandes fleurs. Inde. s. ch. 2
 à feuill. var. N. Holl. s. ch. 2
 à feuilles de chanvre. Inde. ☉
 digité. Mexique. s. ch. 2
 abelmosc. Inde. s. ch. 2
 comestible. Inde. ☉ (alim.)
 oseille de Guinée. Inde. ☉
 tubulé. Inde. ☉
 à f. de vigne. Inde. s. ch. 2
 à longs pédoncules. Cap. or. 2
 vésiculeux. Italie. ☉

MALVAVISCUS

en arbre. Antilles. s. ch. 2

LAGUNEA

écailleux. N. Holl. or. 2

COTONNIER

de Malte. orient. or. 2 (orn.)
 en arbre. Inde. s. ch. 2
 velu. Antilles. s. ch. 2
 à f. de vigne. Inde. s. ch. 2
 pourpre. Antilles. s. ch. 2

IV. *Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies ; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.*

MELOCHIA

pyramidal. Brésil. s. ch. 2
 à feuilles de cocrête. Inde. ☉
 à f. ovales. N. Esp. s. ch. 2
 cotonneux. Antilles. s. ch. 2

STUARTIA*malacodendrum* L.*pentagyna* l'Her. stirp.**GORDONIA***lasianthus* l'Her. stirp.*pubescens* l'Her. stirp.**BOMBAX***ceiba* L.**ADANSONIA***baobab* L.

V. *Stamina basi in urceolum sessilem connata ; sterilia fertilibus intermixta , definita aut indefinita.*

PENTAPETES*phœnicea* L.**ABROMA***fastuosa* Jacq. hort.*ambroma augusta* L. f. }**GUAZUMA***ulmifolia.**Theobroma guazuma* L. }*bubroma guazuina* Willd. sp. }**DOMBEYA***ferruginea* Cav. diss.*acutangula* Cav. diss.**BYTTNERIA***ovata* Encycl.

VI. *Stamina basi in urceolum germini arcuè circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumquè definita et fertilis.*

AYENIA*pusilla* L.**HELICTERES***althæifolia* Encycl.**STERCULIA***monosperma* Vent. Malm.*platanifolia* L. f.*fœtida* L.**STUARTIA***monostyle.* caroline. or. ♀*à cinq styles.* virginie. or. ♀**GORDONIA***à f. glabres.* caroline. or. ♀.*pubescent.* caroline. or. ♀**BOMBAX***ceiba.* inde. s. ch. ♀**ADANSONIA***digité , pain-de-singe.* Afr. s.

ch. ♀

V. *Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.*

PENTAPÈTES*écarlate.* inde. ☉**ABROMA***à larges feuilles.* inde. s. ch. ♀**GUAZUMA***à f. d'orme.* Antilles. s. ch. ♀**DOMBEYA***ferrugineux.* île de F. s. ch. ♀*à angles aigus.* île de F. s. ch. ♀**BYTTNÉRIA***à feuell. ovales.* Pérou. s. ch. ♀

VI. *Étamines ordinairement définies et fertiles; filets réunis à la base autour de l'ovaire en un godet porté sur un pédicelle.*

AYÉNIA*petit.* Antilles. s. ch. ♂**HELICTÈRES***à f. d'Althéa.* Antilles. s. ch. ♀**STERCULIA***monosperme.* inde. s. ch. ♀*à f. de platane.* chine. or. ♀*fétide.* inde. s. ch. ♀

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILICIMUM

floridanum *L. Mant.*
parviflorum *Vent. H. cels.*

MAGNOLIA

grandiflora *L.*
glaucæ *L.*
acuminata *L.*
tripetala *L.*
umbrella *Encycl.* }
macrophylla *Mich. Fl.*
auriculata *Mich. Fl.*
yulan.
purpurea *Bot. Mag.* }
obovata *Willd. sp.*
discolor *Vent. Malm.* }
pumila *Andr. Rep.*

LIRIODENDRUM

tulipifera *L.*

Genera Magnoliis affinia.

DILLENNIA

scandens *Willd. sp.*
volubilis *Vent. Malm.*
speciosa *Bot. Mag.*
hibbertia volubilis *Andr. Rep.* }

ORDO XVI.

ANNONÆ.

JAMBOLIFERA

pedunculata *L. ?*

ANNOA

squamosa *L.*

cherimolia *Encycl.* }
tripetala *H. K.* }
glabra *L.*
triloba *L.*
orchidocarpon arietinum }
Mich. Fl.

ORDRE XV.

MAGNOLIERS.

BADIANE

de la Floride. or. ♀ (écon.)
à petites fleurs. floride. or. ♀

MAGNOLIA

à grandes fl. flor. or. ♀ (orn.)
glaucæ. virginie. ♀ (orn.)
à f. aiguës. Am. s. ♀ (orn.)

ombrelle. Am. s. ♀ (orn.)

à grandes f. Am. s. ♀ (orn.)
auriculé. Am. s. s. ch. ♀ (orn.)
rulan. chine. or. ♀ (orn.)

pourpre. chine. or. ♀ (orn.)

nain. chine. or. ♀ (orn.)

TULIPIER

de Virginie. ♀ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les
Magnoliers.

DILLÉNIA

sarmenteux. N. Holl. or. ♀

ORDRE XVI.

ANNONES.

JAMBOLIFÉRA

pédonculé. inde. s. ch. ♀

ANNONE

écailleuse, pomme-cannelle.
ind. s. ch. ♀

cherimolia. pérou. s. ch. ♀
(alim.)

glabre. caroline. s. ch. ♀

à trois lobes, Assiminier. Am.
s. ♀

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
pareira L.

MENISPERMUM
canadense L.
virginicum L.
carolinum L.

SCHISANDRA
coccinea Mich. fl.

ORDRE XVII.

MÉNISPERMES.

CISSAMPÉLOS
pareira-brava. Antilles. s. ch. ♀
(méd.)

MÉNISPERME
de Canada. ♀
de Virginie. ♀
de Caroline. ♀

SCHISANDRA
écarlate. Am. s. ♀

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS
vulgaris L.
— rubra.
— violacea.
— canadensis.
cretica L.
sibirica Willd. sp.
sinensis.

NANDINA
domestica Bot. magaz.

EPIMEDIUM
alpinum L.

HAMAMELIS
virginiana L.

ORDRE XVIII.

VINETTIERS.

BERBÉRIS
epine-vinette. F. ♀ (écon. méd.)
— à fruit rouge.
— à fruit violet.
— de Canada.
de Crête. ♀
de Sibérie. ♀
de Chine. ♀

NANDINA
de Chine. s. ch. ♀

EPIMÉDIUM
des Alpes. ♀

HAMAMÉLIS
de Virginie. ♀

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA
americana L.
arborescens Cav. Diss. }
indica Jacq. Ic.

HERMANNIA
denudata L. f.
hyssopifolia L.

ORDRE XIX.

TILIACÉES.

I. Étamines définies, réunies à la base.

WALTHERIA
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♀

HERMANNIA
lisse. cap. or. ♀
à f. d'hyssop. cap. or. ♀

lavandulæfolia L.
 althæifolia L.
 cuneifolia Jacq. H. sch.
 alnifolia L.
 micans Schrad. serl. }
 latifolia Jacq. H. sch. }
 rotundifolia Jacq. Ic. }
 disticha Willd. sp. }
 angularis Jacq. H. sch.
 trifoliata L.
 pulverata Andr. rep.
 scabra Jacq. H. sch.
 multiflora Jacq. H. sch.

MAHERNIA

pinnata S. veg.
 glabrata L. f.
 verticillata L. Mant.

II. Stamina distincta, plerumquæ indefinita; fructus multilocularis.

CORCHORUS

hirsutus L.
 siliquosus L.
 tridens L. Mant.
 trilocularis L.
 olitorius L.
 hirtus L.
 æstuans L. Mant.

HELIOCARPUS

americanus L.

TRIUMFETTA

lappula L.

FLACURTIA

ramontchi l'ner. stirp.

GREWIA

nitida Juss. Ann.
 occidentalis L.
 carpinifolia Juss. Ann.
 asiatica L. Mant.

TILIA

sylvestris. }
 microphylla Vent. Inst. }
 platiphyllus Vent. Inst. }
 — villosa.
 pubescens Vent. Inst.

à f. de zavanche. cap. or. ♀
 à f. d'althéa. cap. or. ♀
 cunéiforme. cap. or. ♀
 à feuilles d'aune. cap. or. ♀
 à feuell. brillantes. cap. or. ♀
 à feuilles rondes. cap. or. ♀
 anguleux. cap. or. ♀
 trifolié. cap. or. ♀
 pulvérulent. cap. or. ♀
 rude. cap. or. ♀
 à fleurs nombr. cap. or. ♀

MAHERNIA

à feuilles pennées. cap. or. ♀
 glabre. cap. or. ♀
 verticillé. cap. or. ♀

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies; fruit à plusieurs loges.

CORCHORUS

velu. Antilles. s. ch. ♀
 siliquieux. Antilles. s. ch. ♀
 à trois dents. inde. ☉
 à trois loges. inde. ☉
 cultivé. Afr. s. ☉
 hérissé. Antilles. ☉
 à six pointes. Antilles. ☉

HÉLIOCARPUS

d'Amérique. Antilles. s. ch. ♀

TRIUMFETTA

hérissé. Antilles. s. ch. ♀

FLACURTIA

ramontchi. inde. s. ch. ♀

GRÉWIA

à feuilles luis. chine. s. ch. ♀
 d'Occident. cap. or. ♀
 à f. de charme. Guin. s. ch. ♀
 d'Asie. s. ch. ♀

TILLEUL

sauvage. F. ♀ (orn. méd.)
 de Hollande. F. ♀ (orn. méd.)
 — velu.
 pubescent. Am. s. ♀ (orn.)

americana L. }
 glabra *vent. inst.* }
 canadensis *mich. fl.* }
 argentea. }
 rotundifolia *vent. inst.* }
 alba *willd. sp.* }

Bixa

orellana L.

ORDO XX.

CISTIA.

CISTUS.

1. *Corolla alba aut flavescens.*

populifolius L.
 laurifolius L.
 ladaniferus L.
 — maculatus.
 monspeliensis L.
 salvifolius L.

2. *Corolla rosea.*

symphytifolius *Encycl.* }
 vaginatus H. K. }
 purpureus *Encycl.*
 villosus *S. veg.*
 complicatus *Encycl.*
 incanus L.
 albidus L.
 crispus L.
 creticus L.

HELIANTHEMUM (CISTUS Lin.).

1. *Exstipulata fruticosa.*

umbellatum L.
 halimifolium L.
 ocymoides *Encycl.*
 alyssoides *Encycl.*
 lævipes L.
 fumana L.
 marifolium L.

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum L.
 Lippii L. *Mant.*

d'Amérique. ♀ (orn.)

argenté. Hongrie. ♀ (orn.)

Rocou

cultivé. Antilles. s. ch. ♀ (arts.)

ORDRE XX.

CISTES.

CISTE.

1. Corolle blanche ou jaune.

à f. de peuplier. Esp. or. ♀
 à f. de Laurier. F. m. or. ♀
 ladanifère. Alger. or. ♀
 — maculé.
 de Montpellier. or. ♀
 à f. de sauge. F. m. or. ♀

2. Corolle rose.

à f. de consoude. canar. or. ♀
 pourpre. orient. or. ♀
 velu. Esp. or. ♀
 plissé. orient. or. ♀
 incane. orient. or. ♀
 cotonneux. F. m. or. ♀
 crépu. F. m. or. ♀
 de Crète. or. ♀ (méd.)

HELIANTHÈME.

1. Tiges ligneuses ; point de stipules ;

ombellifère. F. ♀
 à f. d'halime. F. m. or. ♀
 à f. de Basilic. Esp. or. ♀
 à feuilles d'alysson. F. ♀
 glauque. F. m. or. ♀
 fumana. F. ♀
 à feuilles de marium. F. ♀

2. Tiges ligneuses ; feuilles accompagnées de stipules.

écailleux. Esp. or. ♀
 de Lippi. Égypte. or. ♀

lavandulæfolium *Encycl.* }
 syriacum *Jacq. 1c.* }
 serpyllifolium *L.*
 thymifolium *L.*
 pilosum *L.*
 vulgare.
 — latifolium.
 mutabile *Jacq. 1c.*

3. *Exstipulata herbacea.*
 guttatum *L.*

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
 salicifolium *L.*
 niloticum *L. Mant.*
 ægyptiacum *L.*

Genera Cistis affinia.

*Fructus trivalvis ; valvis seminiferis ;
 stamina definita.*

IONIDIUM.

polygalæfolium *Vent. Malin.* }
 viola verticillata *Ortega, Dec.* }

VIOLA.

1. *Acaules.*

hirta *L.*
 palustris *L.*
 odorata *L.*
 palmata *L.*

2. *Caulescentes ; stipulis indivisis.*

canina *L.*
 mirabilis *L.*
 striata *H. K.*
 canadensis *L.*
 montana *L.*
 biflora *L.*
 arborescens *L.*

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*
 — hortensis.
 rhotomagensis.
 grandiflora *L. Mant.*
 calcarata *L.*
 cornuta *L.*

à f. de Lavande. *F. m. or. ♀*

à feuilles de serpolet. *F. ♀*

à f. de Thym. *F. m. or. ♀*

velu. *F. ♀*

commun. *F. ♀*

— à larges feuilles.

à fl. changeantes. *F. m. ♀*

3. Tiges herbacées ; point de stipules.

maculé. *F. ☉*

4. Tiges herbacées ; feuilles accompagnées
 de stipules.

à feuilles de Lédum. *F. m. ☉*

à feuilles de saule. *F. m. ☉*

du Nil. *☉*

d'Égypte. *☉*

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Cistes.

3 valves séminifères ; étamines définies.

IONIDIUM

à f. de polygala. *N. esp. or. ♀*

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. *F. ♀*

des marais. *F. ♀*

odorante. *F. ♀ (orn.)*

palmée. virginie. *♀*

2. Une tige ; stipules entières.

de chien. *F. ♀*

sans corolle. *F. ♀*

striée. *Am. s. ♀*

de Canada. *♀*

de montagne. *Alpes. ♀*

à deux fleurs. *Alpes. ♀*

arbrisseau. *Esp. or. ♀*

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. *F. ☉ (orn.)*

— des jardins.

de Rouen. *F. ♀*

à grandes fl. pyrén. *♀ (orn.)*

à long éperon. *Alpes. ♀*

cornue. *pyrénées. ♀*

ORDO XXI.

RUTACEÆ.

I. Folia stipulacea, sapiens opposita.

TRIBULUS

terrestris L.
cistoides L.

FAGONIA

cretica L.

ZYGOPHYLLUM

fabago L.
morgsana L.
album L.

GUAIAECUM

sanctum L.

LARREA

nitida Cav. Ic.

PORLIERA

hygrometra Fl. Peruv.

BORONIA

pinnata Smith, Soc. Lin.

CORREA

alba L.
virens Smith, Exot. Bot.

CROVEA

saligna Smith, Soc. Lin.

RUTA

sylvestris.
legitima Jacq. Ic. }
montana H. K.
graveolens L.
chalepensis L. Mant. ?
linifolia L.
pinnata L. f.

PEGANUM

harmala L.

DICTAMNUS

albus L.

ORDRE XXI.

RUTACÉES.

*I. Feuilles ordinairement opposées ;
accompagnées de stipules.*

TRIBULUS

hérissé. F. ☉
à fleurs de ciste. Antilles. ☉

FAGONIA

de Crète. or. ♂

FABAGELLE

commune. orient. ☿
membraneuse. cap. or. ☿
à fleurs blanches. barb. or. ♀

GAIAEC

commun. Ant. s. ch. ♀ (méd.
arts.)

LARRÉA

à f. Luis. Buénos-ayres. s. ch. ♀

PORLIÉRA

hygrométrique. Pérou. s. ch. ♀

BORONIA

à f. pennées. N. Holl. or. ♀

CORRÉA

à fl. blanches. N. Holl. or. ♀
à fl. vertes. N. Holl. or. ♀

CROVÉA

à f. de saule. N. Holl. or. ♀

RUE

sauvage. barbarie. or. ♀

puante. F. ☿ (méd.)

ciliée. orient. or. ♀

à feuilles de Lin. esp. or. ☿

à f. pennées. canaries. or. ♀

PÉGANUM

harmala. barbarie. ☿

FRAXINELLE

cultivée. F. m. ☿ (orn.)

Genera Rutaceis affinia.

MELIANTHUS

- major L.
minor L.
comosus Vahl, symb.

DIOSMA

- rubra L.
purpurea.
virgata Encycl.
dellea.
ciliata L.
prolifera.
bucco prolifera Wendl. }
hirsuta L.
uniflora L.
glandulifolia uniflora Wendl. }
sert.
acuminata. }
bucco acuminata Wendl. }

O R D O XXII.

CARYOPHYLLÆ.

I. Calix partitus ; stamina 3 ; stylus 1
aut 3.

ORTEGIA

- hispanica L.

HOLOSTEUM

- umbellatum L.

POLYCARPON

- tetraphyllum L.

MOLLUGO

- verticillata L.

MINUARTIA

- campestris L.
dichotoma L.

POLYCARPEA

- teneriffæ Encycl.
mollia diffusa Willd. H. Ber. }

QUERIA

- canadensis L.

Genres qui ont de l'affinité avec les
Rutacées.

MELIANTHUS

- à larges feuilles. cap. or. ♀
à feuilles étroites. cap. or. ♀
velu. cap. or. ♀

DIOSMA

- rouge. cap. or. ♀
pourpre. cap. or. ♀
effilé. cap. or. ♀
à feuell. abaissées. cap. or. ♀
cilié. cap. or. ♀
prolifère. cap. or. ♀
velu. cap. or. ♀
à une fleur. cap. or. ♀
acuminé. cap. or. ♀

O R D R E XXII.

CARYOPHYLLÉES.

I. Calice partagé ; 3 étamines ; 1-3 styles.

ORTÉGIA

- d'Espagne. ☉

HOLOSTÉUM

- ombellifère. F. ☉

POLYCARPON

- à quatre feuilles. F. ☉

MOLLUGO

- verticillé. Am. s. ☉

MINUARTIA

- des champs. esp. ☉
dichotome. esp. ☉

POLYCARPÉA

- de Ténériffe. ☉

QUÉRIA

- de Canada. ☉

II. *Calix partitus ; stamina 4 ; styli 2-4.*

BUFONIA

tenuifolia L.

SAGINA

procumbens L.

erecta L.

III. *Calix partitus ; stamina 5 ad 8 ;
styli 2 ad 4.*

ALSINE

media L.

segetalis L.

mucronata L.

PHARNACEUM

cerviana L.

MOEHRINGIA

muscosa L.

ELATINE

hydropiper L.

alsinastrum L.

IV. *Calix partitus ; stamina 10 ; styli 3
aut 5.*

SPERGULA

nodosa L.

arvensis L.

pentandra L.

saginoides L.

CERASTIUM.

1. *Capsulis oblongis.*

perfoliatum L.

vulgatum Smith, Fl. }

viscosum Curt. Fl. }

semidecandrum Curt. Fl.

viscosum Smith, Fl. }

vulgatum Curt. Fl. }

dichotomum L.

arvense L.

alpinum L.

2. *Capsulis subrotundis.*

tomentosum Encycl.

repens Willd. Enum. (an L. ?) }

latifolium L.

aquaticum L.

II. Calice partagé ; 4 étamines ; 2-4 styles.

BUFONIA

à feuilles menues. F. ☉

SAGINA

couché. F. ☉

droit. F. ☉

III. Calice partagé ; 5-8 étamines ; 2-4 styles.

ALSINÉ

des oiseaux. F. ☉

des moissons. F. ☉

pointu. F. ☉

PHARNACÉUM

filiforme. esp. ☉

MOÉHRINGIA

touffu. Alpes. ☿

ELATINÉ

à feuilles de serpolet. F. ☉

verticillé. F. ☉

IV. Calice partagé ; 10 étamines ; 3 ou 5 styles.

ESPARGOUTTE

noueuse. F. ☿

des champs. F. ☉

à cinq étamines. F. ☉

à feuilles de sagina. F. ☿

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfolié. orient. ☉

aggloméré. F. ☉

à cinq-étamines. F. ☉

commun. F. ☿

dichotome. esp. ☉

des champs. F. ☿

des Alpes. F. ☿

2. Capsules arrondies.

cotonneux. F. ☿

à larges feuilles. Alpes. ☿

aquatique. F. ☿

CHERLERIA

sedoides L.

ARENARIA

peploides L.

tetraquetra L.

biflora L. Mant.

trinervia L.

ciliata L.

serpyllifolia L.

balearica l'her. stirp.

montana L.

rubra L.

media L.

dianthoides smith, ic. ?

cucubaloides smith, ic.

saxatilis L.

striata L.

verna L. Mant.

tenuifolia L.

fasciculata Jacq. ic.

triflora L. Mant.

STELLARIA

nemorum L.

holostea L.

graminea L.

uliginosa curt. Fl. }

alsine willd. sp. }

V. Calix tubulosus; stamina 10; styli 2-5.

GYPSOPHILA

repens L.

prostrata L.

viscosa s. veg.

paniculata L.

— grandiflora.

glomerata Marsch. cauc.

altissima L.

struthium L.

fastigiata Encycl. (an Lin. ?)

perfoliata L.

muralis L.

saxifraga L.

SAPONARIA

officinalis L.

vaccaria L.

ocymoides L.

lutea L.

CHERLÉRIA

sédoïde. Alpes. ♀

ARÉNARIA

à feuilles de Péplis. F. ♀

tétragône. F. m. ♀

à deux fleurs. Alpes. ♀

à trois nervures. F. ⊙

cilié. Alpes. ♀

à feuilles de serpolet. F. ⊙

de Mahon. ♀

de montagne. F. ♀

rouge. F. ⊙

membraneux. F. ⊙

à fleurs d'oeillet. orient. ♀

à fleurs de Béhen. orient. ♀

des rochers. F. ♀

strié. F. ♀

printanier. F. ♀

à feuilles menues. F. ⊙

fasciculé. F. ⊙

à trois fleurs. F. ♀

STELLULAIRE

des bois. F. ♀

des haies. F. ♀

à feuilles de Gramen. F. ♀

des marais F. ⊙

V. Calice en tube; 10 étamines; 2-5 styles.

GYPSOPHILA

rampant. Alpes. ♀

couché. Alpes. ♀

visqueux. orient. ⊙

paniculé. Sibérie. ♀

— à grandes fleurs.

aggloméré. caucase. ♀

élevé. Sibérie. ♀

struthium. Esp. or. b

corymbifère. Alpes. ♀

perfolié. Esp. ♀

des murailles. F. ♂

caliculé. F. ♀

SAPONAIRE

officinale. F. ♀ (méd.)

anguleuse. F. ⊙

à feuilles de basilic. F. ♀

jaune. Alpes. ♀

orientalis L.
porrigens Jacq. hort.

d'Orient. ☉
à longs pédoncules. orient. ☉

DIANTHUS.

OËILLET.

1. Flores aggregati.

barbatus L.
carthusianorum L.
Armeria L.
prolifer L.
atrorubens All. ped.
ferrugineus L. Mant.
collinus Wald. et Kitt. hung.
aggregatus Encycl. suppl.
capitatus Wald. et Kitt. hung.

1. Fleurs aggrégées.

de poète. F. ♂
à trois nervures. F. ♀
velu. F. ☉
prolifère. F. ☉
brun-pourpre. Alpes. ♂
rouillé. Italie. ♂
des collines. Hongrie. ♀
à fleurs serrées. ♀
à fleurs en tête. Hongrie. ♀

2. Flores solitarii plures in eodem caule.

corymbosus Encycl. suppl.
caryophyllus L.
— ruber.
moschatus Mayer. }
plumarius Dec. fl. }
monspessulanus Dec. fl.
superbus L.
chinensis L.
deltoides L.
attenuatus Smith, soc. Lin. }
longiflorus Encycl. }
leptopetalus Marsch. cauc.
bicolor Wald. et Kitt. hung.
squarrosus Marsch. cauc.
arenarius L.
dubius Dec. cat.
biflorus Delongch. Journ. de
Bot.
ochroleucus Pers. syn.
rhutenicus Encycl. suppl.
caucasicus Marsch. cauc.
serotinus Wald. et Kitt. hung.

2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbifère. ♀ (orn.)
des jardins. F. ♀ (orn.)
— ratafiat.
mignardise. ♀ (orn.)
de Montpellier. ♀ (orn.)
superbe. Alpes. ♀ (orn.)
de Chine. ☉ (orn.)
deltôide. F. ♀
à long calice. F. m. ♀
à pétales linéaires. caucase. ♀
bicolor. Hongrie. ♀
rude. caucase. ♀
des sables. F. ♀
douteux. ♀
biflore. F. ♀
jaune-pâle. orient. ♀
de Russie. ♀
du Caucase. ♀
tardif. Hongrie. ♀

3. Caule subunifloro, herbaceo.

alpinus L.

3. Tige herbacée, à une fleur.

des Alpes. ♀

4. Caule fruticoso.

rigidus Marsch. cauc.
involucratus Encycl. suppl.
arboreus L.

4. Tige ligneuse.

à feuilles roides. caucase. ♀
à involucre. or. ♀
à f. épaisses. orient. or. ♀

SILÈNE.

SILÉNÉ.

1. *Floribus solitariis, lateralibus.*

lusitanica L.
 quinque vulnera L.
 gallica L.
 hispida Desf. Atl.
 tridentata Desf. Atl.
 nocturna L.
 sericea All. ped.

2. *Floribus lateralibus, confertis.*

arenaria Desf. Atl.
 cypsophila
 tricuspidata.
 nutans L.
 paradoxa L.
 ocymoides.
 suffruticosa.
 fruticosa L.
 longiflora Willd. sp.
 bupleuroides L.
 gigantea L.
 viridiflora L.
 chlorantha Willd. sp.

3. *Floribus ex dichotomia caulis.*

sedoides Desf. Atl.
 conoidea L.
 conica L.
 behen L.
 dichotoma Wald. et Kitt. Hung.
 pendula L.
 bellidifolia Jacq. hort.
 noctiflora L.
 maritima Willd. sp.
 antirrhina L.
 inaperta L.
 polyphylla L.
 portensis L.
 apetala Willd. sp.
 cretica L.
 glauca Zea.
 muscipula L.
 rubella L. ?
 ornata H. K.
 bipartita Desf. Atl. }
 hispanica Jacq. Fragm. }
 stricta L.

1. Fleurs solitaires, latérales.

de Portugal. ☉
 à cinq taches F. ☉
 sans dents. F. ☉
 hérissé. barbarie. ☉
 à trois dents. barbarie. ☉
 nocturne. F. m. ☉
 soyeux. F. m. ☉

2. Fleurs latérales, ramassées.

des sables. barbarie. ☉
 à feuilles de cypsophila. ℥
 à trois pointes. ☉
 à fleurs penchées. F. ℥
 odorant. Italie. ℥
 à feuilles de basilic. ℥
 sous-arbrisseau. ♀
 arbrisseau. Sicile. or. ♀
 à longues fleurs. Hongrie. ℥
 à f. de bupleuvre. orient. ℥
 gigantesque. Afr. or. ♂
 à fleurs vertes. Alpes. ♂
 verdâtre. carinthie. ℥

3. Fleurs dans la bifurcation des tiges.

à feuilles de sédum. barbar. ☉
 à gros fruit. F. ☉
 conique. F. ☉
 faux behen. orient. ☉
 dichotome Hongrie. ☉
 à fleurs pendantes. Crète. ☉
 à feuilles de paquerette. ☉
 noctiflore. Suisse. ☉
 maritime. F. ℥
 à feuilles linéaires. Am. s. ☉
 fermé. Eur. austr. ☉
 à feuilles nombreuses. All. ☉
 paniculé. Portugal. ☉
 apétale. ☉
 de Crète. ☉
 glauque. ☉
 gobe-mouche. F. m. ☉
 incarnat. orient. ☉
 à fleurs pourpres. Cap. or. ♂
 à fleurs roses. Alger. ☉ (orn.)
 à fleurs serrées. F. m. ☉

4. *Floribus terminalibus.*

chloræfolia *smith*, *ic.*
picta *Pers. syn.*
flavescens *Wald. et Kitt. Hung.*
Armeria *L.*
Atocion *Jacq. hort.* }
orchidea *L. f.* }
rupestris *L.*
quadridentata *Dec. Fl.* }
alpestris *Jacq. Austr.* }
saxifraga *L.*
vallesia *L.*
acaulis *L.*

CUCUBALUS

stellatus *L.*
bacciferus *L.*
Behen *L.*
 — *alpinus.*
 — *angustifolius.*
roseus.
fabarius *L.*
tataricus *L.*
sibiricus *L.*
multiflorus *Willd. sp.*
cæspitosus.
viscosus *L.*
catholicus *L.*
fimbriatus *Marsch. cauc.*
otites *L.*
volgensis *Willd. Enum. suppl.*

LYCHNIS

grandiflora *Jacq. ic.* }
coronata *Thunb. Jap.* }
chalcædonica *L.*

flos-cuculi *L.*
viscaria *L.*
alpina *L.*
dioica *L.*
 — *rubra.*

GITHAGO

segetum. }
agrostemma *Githago* *L.* }

AGROSTEMMA

coronaria *L.*

4. *Fleurs terminales.*

à *f. de chlora.* orient. or. ♀
 à *réseau.* F. m. ♂
 à *fleurs jaunes.* Hongrie. ♀
 à *bouquets.* F. ☉ (orn.)
Atocion. orient. ☉
des rochers. Alpes. ♂
 à *quatre dents.* Alpes. ♀
saxifrage. Alpes. ♂
du Valais. ♀
sans tige. Alpes. ♂

BÉHEN

étoilé. Am. s. ♀
baccifère. F. ♀
commun. F. ♂
 — *des Alpes.*
 — à *feuilles étroites.*
 — à *fleurs roses.*
dichotome. Sicile. or. ♂
de Tartarie. ♀
de Sibérie. ♀
 à *fleurs nombr.* Hongrie. ♂
touffu. ♂
visqueux. Italie. ♂
de Rome. F. ♀
lacinié. Caucase. ♀
dioïque. F. ♂
du Volga. ♂

LYCHNIS

à *grandes fl.* Jap. or. ♀ (orn.)
croix-de-Jérusalem. Russie. ♀
 (orn.)
des prés. F. ♀
visqueux. F. ♂
des Alpes. ♀
dioïque. F. ♀
 — *rouge.*

GITHAGO

Nielle-des-blés. F. ☉

AGROSTEMMA

coquelourde. F. ♂ (orn.)

flos-jovis L.
 cœli-rosa L.
 parviflora Cav. IC.

rose. Alpes. ℥ (orn.)
 maritime. F. ☉. (orn.)
 à petites fleurs. Esp. ☉

VII. Calix tubulosus ; stamina pauciora
 quam 10 ; styli 2-3.

VI. Calice en tube ; moins de 10 étamines ;
 2-3 styles.

VELEZIA
 rigida L.

VÉLÉZIA
 à feuilles roides. Esp. ☉

Genera Caryophylleis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Caryophyllées.

FRANKENIA
 levis L.
 pulverulenta L.
 hirsuta L.
 virens.

FRANKÉNIA
 lisse. F. ℥
 pulvérulent. F. ☉
 velu. orient. ♀
 verdâtre. ℥

LINUM.

LIN.

1. Floribus cæruleis, albis aut rubentibus.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

usitatissimum L.
 perenne L.
 narbonense L.
 austriacum L.
 hirsutum L.
 tenuifolium L.
 alpinum Jacq. Austr.
 catharticum L.
 radiola L.

cultivé. ☉ (écon. méd.)
 vivace. Sibérie. ℥ (écon.)
 de Narbonne. ℥
 d'Autriche. ℥
 velu. Autriche. ♀
 à feuilles menues. F. ♀
 des Alpes. ♀
 cathartique. F. ☉ (méd.)
 radiola. F. ☉

2. Floribus luteis.

2. Fleurs jaunes.

gallicum L.
 strictum L.
 suffruticosum L.
 africanum L.
 trigynum Bot. Magaz.
 quadrifolium L.
 maritimum L.
 campanulatum L.

à petites fleurs. F. ☉
 rude. F. m. ♂
 sous-arbrisseau. Esp. or. ♀
 d'Afrique. cap. or. ♀
 à trois styles. Inde. or. ♀
 à f. quaternées. cap. or. ♀
 maritime. F. ℥
 campanulé. F. m. or. ♀

CLASSIS XIV.

CLASSE XIV.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(*Stamina perigyna.*)

(Etamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

SEMPERVIVÆ.

JOUBARBES.

TILLÆA

muscosa L.

TILLÉA

nain. F. ☉

BULLIARDA

*vaillantii Dec. fl.**Tillæa aquatica L.**Tillæa vaillantii Willd. sp.* }

BULLIARDA

de Vaillant. F. ☉

CRASSULA.

CRASSULE.

1. *Herbaceæ.*

1. Tiges herbacées.

*glomerata L. Mant.**ciliata L.**calicina.**acutifolia Encycl.**rubens L. f.* }*sedum rubens L.* }*orbicularis L.**lycopodioides Encycl.* }*muscosa L.**agglomérée. cap. ☉**ciliée. cap. or. ☿**à grand calice. N. Holl. or. ☿**à feuilles aiguës. cap. or. ♀**rouge. F. ☉**orbiculaire. cap. or. ♀**lycopode. cap. or. ♀*2. *Fruticosa.*

2. Tiges ligneuses.

*coccinea L.**scabra L.**perfoliata L.**perfossa Encycl.**tetragona L.**obvallata L. Mant.**cultrata L.**falcata H. K.**rochea falcata Dec. pl. Gr.* }*portulacea Encycl.* }*obliqua H. K.* }*lucida Encycl.* }*spathulata Thunb. Prodr.* }*écarlate. cap. or. ♀ (orn.)**rude. cap. or. ♀**perfoliée. cap. or. ♀**enfilée. cap. or. ♀**tétragone. cap. or. ♀**à feuilles en scie. cap. or. ♀**en serpe. cap. or. ♀**falciforme. cap. or. ♀ (orn.)**à f. de pourpier. cap. or. ♀**luisante. cap. or. ♀*

cordata L. f.
lactea H. K.
cotyledon Jacq. *Miscell.*

COTYLEDON

coccinea Cav. *ic.*
orbiculata L.
hemisphærica L.
ungulata *Encycl.*
tuberculosa *Encycl.*
hispida *Encycl.*
viscosa Vahl, *symb.* }
hispanica L.
umbilicus L.
lusitanica *Encycl.* }
lutea H. K. }

KALANCOE

laciniata Dec. *Pl. Gr.* }
cotyledon laciniata L. }
spatulata Dec. *Pl. Gr.*
ægyptiaca Dec. *Pl. Gr.*
crenata.
verrea crenata Andr. *Rep.* }
cotyledon crenata Vent. }
Malm.

SEDUM.1. *Planifolia.*

rhodiola. }
rhodiola rosea L. }
telephium L.
 — *purpureum*.
 — *maximum*.
anacampseros L.
 — *longifolium*.
aiizon L.
stellatum L.
hybridum L.
populifolium L. f.
cepæa L.

2. *Teretifolia.*

dasyphyllum L.
reflexum L.
virens H. K.
rupestre L.
altissimum *Encycl.*
sempervivum *sedifolium* }
Jacq. Hort.

en cœur. cap. or. ♀
blanche. cap. or. ♀
cotylédon. cap. or. ♀

COTYLÉDON

safrané. s. ch. ♀
orbiculaire. cap. or. ♀
hémisphérique. cap. or. ♀
ongulé. cap. or. ♀
tuberculeux. cap. or. ♀
hispide. barbarie. ☉
d'Espagne. ☉
Nombri-de-Vénus. f. ℥
corymbifère. Angleterre. ℥

KALANCOË

lacinié. inde. s. ch. ♀
en spatule. chine. s. ch. ♀
d'Égypte. s. ch. ♀
crénelé. cap. or. ♀

SÉDUM.1. *Feuilles aplaties.*

odorant. Alpes. ℥
orpin. f. ℥ (méd.)
 — *pourpre*.
 — *à larges feuilles*.
anacampséros. f. ℥
 — *à feuilles longues*.
aiizon. sibérie. ℥
étoilé. f. ☉
hybride. tartarie. ℥
à f. de peuplier. sibérie. ℥
cépéa. f. ☉

2. *Feuilles cylindriques.*

à feuilles courtes. Alpes. ℥
penché. f. ℥
verdoyant. Portugal. ℥
des rochers. f. ℥

élevé. eur. ℥

hispanicum L.
 album L.
 sexfidum *marsch. cauc.*
 glaucum *wald. et kitt. hung.*
 saxatile *dec. syn.*
 acre L.
 sexangulare L.
 anglicum H. K.
 villosum L.
 nudum H. K.
 cruciatum.
 monregalense *Balbis.* }

SEMPERVIVUM

arboreum L.
 canariense L.
 glutinosum H. K.
 tortuosum H. K.
 villosum H. K.
 Aizoides *Encycl.*
 tectorum L.
 globiferum L.
 hirtum L.
 montanum L.
 arachnoideum L.
 monanthos H. K.

PENTHORUM

sedoides L.

ORDO II.

SAXIFRAGÆÆ.

I. *Fructus superus ; capsularis birostris.*

HEUCHERA

americana L.

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris ; caule subnudo.*

longifolia *Lapeyr. Fl.*
 pyramidalis *Lapeyr. Fl.*
 cotyledon L.
 pensylvanica L.
 stellaris L.
 umbrosa L.
 hirsuta L.

d'Espagne. or. ♀
 blanc. F. ☉
 à six divisions. caucase. ♀
 glauque. Hongrie. ♂
 des rochers. Pyrénées. ☉
 vermiculaire. F. ♀
 hexagone F. ♀
 d'Angleterre. ♀
 velu. F. ☉
 à tiges nues. canaries. or. ♀
 à feuilles en croix. Alpes. ♀

JOUBARBE

en arbre. barbarie. or. ♀
 des Canaries. or. ♀
 glutineuse. canaries. or. ♀
 tortueuse. canaries. or. ♀
 velue. canaries. or. ♀
 Aizoïde. canaries. or. ♀
 des toits. F. ♀ (méd.)
 à globules. F. ♀
 hérissée. Alpes. ♀
 de montagne. Alpes. ♀
 arachnoïde. Alpes. ♀
 à une fleur. canaries. or. ♀

PENTHORUM

à grappes. am. s. ♀

ORDRE II.

SAXIFRAGÉES.

I. Ovaire supère ; une capsule à deux pointes.

HEUCHÉRA

d'Amérique. am. s. ♀

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières ; tige presque nue.

à longues f. pyrén. ♀ (orn.)
 pyramidale. pyrén. ♀ (orn.)
 cotylédon. Alpes. ♀
 de Pensylvanie. ♀
 étoilée. Alpes. ♀
 ombreuse. Alpes. ♀
 velue. Alpes. ♀

Geum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.
sarmentosa L. f.

2. *Foliis integris; caule folioso.*

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aizoides Willd. sp.
autumnalis Fl. Dan. (non L.) }
aspera L.

3. *Foliis lobatis.*

granulata L.
geranioides L.
tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoides L.
furcata Lapeyr. Fl. ?
palmata Smith, Fl. }
decipiens Ehrhart. }

TIARELLA

cordifolia L.
bitermata Vent. Malm.

MITELLA

diphylla L.
nuda L.

II. *Fructus inferus; capsularis aut baccatus.*

CHRYSOSPLENIUM

oppositifolium L.
alternifolium L.

ADOXA

moschatellina L.

HYDRANGÆA

arborescens L.
nivea Mich. Fl. }
radiata Willd. sp. }
quercifolia H. K.

HORTENSIA

opulifolia Encycl.
hydrangea hortensis Willd. }
sp. }

CALLICOMA

serrata Andr. rep.

céum. Alpes. ☞
cunéiforme. Alpes. ☞
à f. épaisses. Sibérie. ☞ (orn.)
sarmenteuse. Japon. ☞

2. Feuilles entières; tige fenillae.

à feuilles rondes. Alpes. ☞
à feuilles opposées. Alpes. ☞
Aizoïde. Alpes. ☞
rude. Alpes. ☞

3. Feuilles lobées.

grenue. F. ☞
à f. de Géranium. Pyrénées. ☞
à trois pointes. F. ☉
touffue. Alpes. ☞
hypnoïde. Alpes. ☞
fourchue. Pyrénées. ☞
palmée. Alpes. ☞

TIARELLE

à feuilles en cœur. Am. s. ☞
bitermée. Am. s. ☞

MITELLA

bifoliée. Am. s. ☞
à tige nue. Asie. ☞

II. Ovaire infère; une capsule ou une baie.

~~XXXXXXXX~~ *Dorine*

à feuilles opposées. F. ☞
à feuilles alternes. F. ☞

ADOXA

Moschatelle. F. ☞

HYDRANGÆA

en arbre. Am. s. ☞
cotonneux. Am. s. ☞
à feuilles de chêne. Am. s. ☞

HORTENSIA

à f. d'obier. Chine. ☞ (orn.)

CALLICOMA

à feuilles en scie. Or. ☞

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

RIBES.

1. *Inermia*.

rubrum L.

— album.

petraeum Jacq. Ic.

nigrum L.

prostratum l'her. stirp. }

glandulosum H. K. }

pennsylvanicum Encycl. }

floridum l'her. stirp. }

alpinum L.

2. *Aculeata*.

cynosbati L.

diacanthum L. f.

orientale.

grossularia L.

uva-crispa L.

— rubra.

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

1. *Opuntia caule plano*.

opuntia L.

— ficus indica.

— tuna.

— nana.

— inermis.

cochinillifer L.

curassavicus L.

brasiliensis Willd. Enum. suppl.

spinosissimus Encycl.

speciosus Bonpland, Malm.

(non Willd.)

phyllanthus L.

pereskia L.

2. *Echinato melocacti, subrotundi*.

mamillaris L.

pseudomamillaris.

ORDRE III.

CIERGES.

I. Pétales et étamines définis.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

commun. F. h (écon. méd.)

— blanc.

des rochers. Alpes. h

cassis. F. h (écon.)

couché. Am. s. h

de Pensylvanie. h

des Alpes. h

2. Tiges épineuses.

cynosbati. Am. s. h

à deux épines. Russie. h

du Liban. h

épineux. F. h (écon.)

à maquereau. F. h (écon.)

— rouge.

II. Pétales et étamines indéfinis.

CIERGE.

1. Opontias à tige aplatie.

opontia. Afr. s. s. ch. h (écon.)

— Figuier-d'inde.

— tuna.

— petit.

— sans épines.

à cochenille. Am. m. s. ch. h

de Curaçao. s. ch. h

du Brésil. s. ch. h

très-épineux. s. ch. h

rose. Am. m. s. ch. h

scolopendre. Am. m. s. ch. h

pereskia. Am. m. s. ch. h

2. Melocactes hérissés, presque ronds.

mamillaire. Antilles. s. ch. h

mamelonné. s. ch. h

stellatus Willd. Enum. suppl.
coronatus Willd. Enum. suppl.
Melocactus L.

3. *Erecti, cylindrici.*

cylindricus Encycl.
serpentinus Willd. Enum. suppl.
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
monstrosus.
abnormis Willd. Enum. suppl. }
royeni L.
multangularis Willd. Enum.
suppl.

4. *Repentes.*

grandiflorus L.
flagelliformis L.
parasiticus Dec. pl. cr. }
pendulus Willd. sp. }
funalis.
speciosissimus.
speciosus Willd. Enum. suppl. }
triangularis L.
proteiformis.
triqueter (non Willd.)

ORDO IV.

PORTULACÆ.

I. *Fructus unilocularis.*

PORTULACA

pilosa L.
oleracea L.

TALINUM

Anacampséros Willd. sp. }
portulaca Anacampséros L. }
patens Willd. sp.
reflexum Cav. ic.
trichotomum.
fruticosum Willd. sp. }
portulaca paniculata L. }

TURNERA

cistoides L.

étoilé. Am. m. s. ch. ♀
couronné s. ch. ♀
Mélocacte. Antilles. s. ch. ♀

3. *Tiges droites, cylindriques.*

cylindrique. Pérou. s. ch. ♀
sarmenteux. s. ch. ♀
heptagone. Am. m. s. ch. ♀
tétragone. Am. m. s. ch. ♀
du Pérou. s. ch. ♀
monstrueux. s. ch. ♀
de Royen. Am. m. s. ch. ♀
multiangulaire. s. ch. ♀

4. *Tiges rampantes.*

à grandes fl. Antilles. s. ch. ♀
serpentin. Am. m. s. ch. ♀
parasite. Antilles. s. ch. ♀
à tiges grêles. s. ch. ♀
éclatant. s. ch. ♀
triangulaire. s. ch. ♀
protéiforme. s. ch. ♀
à trois angles. s. ch. ♀

ORDRE IV.

PORTULACÉES.

I. *Fruit à une loge.*

POURPIER

velu. Antilles. ☉
cultivé. F. ☉ (écon.)

TALINUM

Anacampséros. cap. or. ♀
paniculé. Am. m. s. ch. ♀
à fl. jaunes. Am. m. s. ch. ♀
trichotome. s. ch. ♀
ligneux. Am. m. s. ch. ♀

TURNÉRA

à fl. de ciste. Antilles. s. ch. ♀

MONTIAfontana *L.***TAMARIX**gallica *L.*germanica *L.***TELEPHIUM**imperati *L.***CORRIGIOLA**littoralis *L.***SCLERANTHUS**annuus *L.*perennis *L.***TRIANTHEMA**monogyna *L. Mant.***CLAYTONIA**virginica *L.*cubensis *Bonpl. Equin.*perfoliata *Willd. Enum.***PORTULACARIA**afra *Jacq.*claytonia portulacaria *L.**Mant.***ORDO V.****FICOIDEÆ.****REAUMURIA**vermiculata *L.***NITRARIA**schoberi *L.*tridentata *Desf. Atl.***SESUVIUM**portulacastrum *L.*revolutifolium *Willd. Enum.***AIZOON**canariense *L.*hispanicum *L.***GLINUS**lotoides *L.***MESEMBRYANTHEMUM.**1. *Foliis planis.*cristallinum *L.***MONTIA**aquatique. *F. ☉***TAMARIX**de France. *h (orn.)*d'Allemagne. *h (orn.)***TÉLÉPHIUM**d'Impérati. *F. ☿***CORRIGIOLA**des sables. *F. ☉***SCLÉRANTHUS**annuel. *F. ☉*vivace. *F. ☿***TRIANTHÉMA**monogyne. Antilles. *☉***CLAYTONIA**de Virginie. *☿*de Cuba. *☉***PORTULACARIA**d'Afrique. cap. or. *h***ORDRE V.****FICOÏDES.****RÉAUMURIA**à feuell. de sédum. Barb. or. *h***NITRARIA**à feuilles entières. Russie. *h*à trois dents. barbarie. or. *h***SÉSUVIUM**

à f. de pourpier. inde. s. ch. ♂

à f. roulées. cuba. s. ch. ♂

AÏZOONdes Canaries. *☉*d'Espagne. *☉***GLINUS**lotoïde. esp. *☉***FICOÏDE.**

1. Fenilles planes.

cristalline. madère. *☉*

linguiforme *L.*
 tortuosum *L.*
 expansum *L.*
 pinnatifidum *L. f.*
 cordifolium *L. f.*
 cuneifolium *Jacq. Ic.* }
 limpidum *H. K.* }
 helianthoides *H. K.*

2. *Foliis subtus convexis.*

ciliatum *H. K.*
 geniculiflorum *L.*
 noctiflorum *L.*
 pallens *H. K.*
 bicolorum *L.* }
 coccineum *Dec. Pl. Gr.* }
 tuberosum *L.*
 tenuifolium *L.*
 violaceum *Dec. Pl. Gr.*
 stipulaceum *L.*
 corniculatum *L.*
 loreum *L.*
 veruculatum *L.*
 echinatum *H. K.*
 viridiflorum *H. K.*
 splendens *L.*
 villosum *L.*
 micans *L.*
 rostratum *L.*
 caninum *Dec. Pl. Gr.*
 felinum *Dec. Pl. Gr.*
 tigrinum *Haw.*
 testiculare *Jacq. Fragm.*

3. *Foliis teretibus.*

nodiflorum *L.*
 brachiatum *H. K.*
 hispidum *L.*
 striatum *Dec. Pl. Gr.*
 barbatum *L.*
 stellatum *Dec. Pl. Gr.*
 calamiiforme *L.*

4. *Foliis triquetris.*

falcatum *L.*
 reptans *H. K.*
 spinosum *L.*
 glomeratum *L.*

linguiforme. cap. or. $\mathcal{L}$
 tortueux. cap. or. $\mathcal{L}$
 ouvert. cap. or. $\mathfrak{h}$
 pinnatifide. cap. $\odot$
 en cœur. cap. or. $\mathfrak{h}$
 cunéiforme. cap. $\odot$
 à fleur de soleil. cap. $\odot$

2. Feuilles convexes en-dessous.

cilié. cap. or. $\mathfrak{h}$
 geniculiflore. cap. or. $\mathfrak{h}$
 de nuit. cap. or. $\mathfrak{h}$
 pâle. cap. or. $\mathfrak{h}$
 écarlate. cap. or. $\mathfrak{h}$
 tubéreux. cap. or. $\mathfrak{h}$
 à feuilles menues. cap. or. $\mathfrak{h}$
 violet. cap. or. $\mathfrak{h}$
 à stipules. cap. or. $\mathfrak{h}$
 cornu. cap. or. $\mathfrak{h}$
 courroie. cap. or. $\mathfrak{h}$
 à feuilles lisses. cap. or. $\mathfrak{h}$
 hérissé. cap. or. $\mathfrak{h}$
 à fleurs vertes. cap. or. $\mathfrak{h}$
 luisant. cap. or. $\mathfrak{h}$
 velu. cap. or. $\mathfrak{h}$
 argenté. cap. or. $\mathfrak{h}$
 bec-de-grue. cap. or. $\mathcal{L}$
 gueule-de-chien. cap. or. $\mathcal{L}$
 gueule-de-chat. cap. or. $\mathcal{L}$
 gueule-de-tigre. cap. or. $\mathcal{L}$
 bilobé. cap. or. $\mathcal{L}$

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. barbarie. or. $\mathfrak{h}$
 étalé. cap. or. $\mathfrak{h}$
 hispide. cap. or. $\mathfrak{h}$
 strié. cap. or. $\mathfrak{h}$
 barbu. cap. or. $\mathfrak{h}$
 étoilé. cap. or. $\mathfrak{h}$
 doigt-d'enfant. cap. or. $\mathfrak{h}$

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap. or. $\mathfrak{h}$
 rampant. cap. or. $\mathfrak{h}$
 épineux. cap. or. $\mathfrak{h}$
 aggloméré. cap. or. $\mathfrak{h}$

glaucum *L.*
 spectabile *Willd. sp.*
 aureum *Willd. sp.*
 serratum *L.*
 scabrum *L.*
 uncinatum *L.*
 — minus.
 pugioniforme *L.*
 filamentosum *L.*
 acinaciforme *L.*
 lacerum *H. K.*
 deltoïdes *L.*
 albidum *L.*
 bellidiflorum *L.*
 dolabriforme *L.*

TETRAGONIA

decumbens *Dec. pl. gr.*
 echinata *H. K.*
 expansa *syst. veget.*
 cristallina *L'her. stirp.*

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. *Styli plures.*

MYRIOPHYLLUM

spicatum *L.*
 verticillatum *L.*

PROSERPINACA

palustris *L.*

CERCODIA

erecta *Murr. Gælt.*
 ludwigia cercodia *Jacq. ic.*
 halogaris cercodia *H. K.*
 tetragonia ivæfolia *L. f.* }

II. *Stylus 1; fructus capsularis; stamina
 petalis numero æqualia aut pauciora.*

TRAPA

natans *L.*

LOPEZIA

racemosa *cav. ic.*
 hirsuta *Jacq. coll. suppl.*
 miniata *Dec. cat.*

glaucue. cap. or. 5
 à grandes fleurs. cap. or. 5
 doré. cap. or. 5
 denté. cap. or. 5
 rude. cap. or. 5
 à crochet. cap. or. 5
 — petit.
 en poignard. cap. or. 5
 filamenteux. cap. or. 5
 en sabre. cap. or. 5
 lacéré. cap. or. 5
 deltoïde. cap. or. 5
 blanc. cap. or. 7
 à fl. de paquerette. cap. or. 7
 en doloire. cap. or. 5

T'ÉTRAGONIA

tombant. cap. or. 5
 hérissé. cap. or. ⑤
 étalé. N. zél. ⑤
 cristallin. Pérou. ⑤

ORDRE VI.

ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU

à épis. F. 7
 verticillé. F. 7

PROSERPINACA

des marais. Am. s. 7

CERCODIA

à tige droite. N. zél. or. 5

II. Un style; une capsule; étamines en
 nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE

flottante. F. 7 (alim.)

LOPEZIA

à grappes. Mexique. ⑤ (orn.)
 velu. Mexique. ⑤
 arbrisseau. Mexique. s. ch. 5
 (orn.)

CIRCÆA

lutetiana L.

alpina L.

LUDWIGIA

macrocarpa Mich. Fl. }
alternifolia L. }III. Stylus 1 ; fructus capsularis ; stamina
petalorum dupla.

JUSSIÆA

erecta L.

OENOTHERA.

1. Capsulis teretibus.

biennis L.

grandiflora Willd. sp.

parviflora L.

muricata S. veg.

longiflora Jacq. Hort.

mollissima L.

odorata Jacq. Ic.

nocturna Jacq. Ic. }

albicans Encycl. }

sinuata S. veg.

2. Capsulis angulatis.

tetraptera Cav. Ic.

purpurea Bot. Mag.

rosea Willd. sp.

pumila L.

GAURA

biennis L.

fruticosa Jacq. Ic.

mutabilis Cav. Ic.

tripetala Cav. Ic.

undulata

EPILOBIUM

angustifolium Encycl. }

angustissimum H. K. }

spicatum Encycl. }

angustifolium H. K. }

hirsutum Willd. sp.

pubescens Roth. Germ.

montanum L.

palustre L.

CIRCÉE

des bois. F. ♀

des Alpes. ♀

LUDWIGIA

à gros fruit. Virginie. ♀

III. Un style ; une capsule ; étamines en
nombre double des pétales.

JUSSIÉA

à tige droite. Antilles. ☉

OENOTHÉRA

1. Capsules cylindriques.

commun. F. ♂

à grandes fleurs. Am. s. ♂

à petites fleurs. Am. s. ♂

tuberculeux. Am. s. ♂

à long. fl. Buenos-Ayres. s. ch. ♂

velouté. Buenos-Ayres. s. ch. ♂

odorant. Magellan. ♂

noctiflore. cap. ☉

sinué. Am. s. or. ♂

2. Capsules anguleuses.

à quatre ailes. N. esp. s. ch. ♀

pourpre. Am. s. ☉

rose. Pérou. or. ♀

nain. Am. s. ♀

GAURA

bisannuel. Am. s. ♂

arbrisseau. Antilles. s. ch. ♀

à fleurs changeantes. Mexiq.

s. ch. ♀

à trois pétales. or. ♀

ondulé. ♀

EPILOBIUM

à feuilles étroites. F. ♀

à grappes. F. ♀ (orn.)

velu. F. ♀

pubescent. F. ♀

de montagne. F. ♀

des marais. F. ♀

tetragonum *L.*
 dodonæi *Willd. Delph.*
 alpinum *L.*

FUCHSIA

magellanica *Encycl.* }
 coccinea *H. K.* }
 lycioides *Andr. Rep.*

MENTZELIA

hispida *Willd. sp.* }
 aspera *Cav. Ic. (non Lin.)* }

ORDO VII.**MYRTI.****MELALEUCA**

thymifolia *Smith, Soc. L.* }
 coronata *Andr. Rep.* }
 gnidiæfolia *Vent. Malm.* }
 hypericifolia *Smith, Soc. L.*

myrtifolia *Vent. Malm.* }
 squarrosa *Smith, Soc. L.* }
 armillaris *H. K.* }
 ericæfolia *Vent. Malm.* }
 styphelioides *Smith, Soc. L.* }
 diosmæfolia *Andr. Rep.* }
 gibbosa *Labill. N. Holl.* }
 linarifolia *Smith, Soc. L.* }
 metrosideros hyssopifolia }
Cav. Ic. }
 neriifolia *Andr. Rep.*

LEPTOSPERMUM

scoparium *Smith, Soc. L.*
 ambiguum *Smith, Soc. L.*
 myrtifolium.
 thea *Willd. sp.* }
 flavescens *H. K.* }
 melaleuca thea *Sert. Hann.* }
 pubescens *Willd. sp.* }
 juniperinum *Smith, Soc. L.* }
 lanigerum *Smith, Soc. L.*

FABRICIA

lævigata *Smith, Soc. L.*

METROSIDEROS

saligna *Smith, Soc. L.*

tétragône. *F. L.*
 de Dodoens. *F. V.*
 des Alpes. *V.*

FUCHSIA

écarlate. chili. or. *h* (orn.)
 à f. de *Lycium*. ant. s. ch. *h*

MENTZÉLIA

hérissé. mexique. s. ch. *L.*

ORDRE VII.**MYRTES.****MÉLALÉUCA**

à f. de *Thym*. *N. Holl. or. h*
 à f. d'*hypéricum*. *N. Holl. or. h*
h (orn.)

à f. de *Myrte*. *N. Holl. or. h*

armillaire. *N. Holl. or. h*

à f. de *styphélia*. *N. Holl. or. h*
 à f. de *diosma*. *N. Holl. or. h*
 gibbeux. *N. Holl. or. h*

à f. d'*hyssope*. *N. Holl. or. h*

à f. de *Nérium*. *N. Holl. or. h*

LEPTOSPERMUM

de la *N. Zélande*. or. *h*
 à long. étamines. *N. Holl. or. h*
 à f. de *Myrte*. *N. Holl. or. h*

Théa. *N. Holl. or. h*

pubescent. *N. Holl. or. h*
 à f. de *Genévrier*. *N. Holl. or. h*
 laineux. *N. Holl. or. h*

FABRICIA

lisse. *N. Holl. or. h*

MÉTROSIDÉROS

à f. de *saule*. *N. Holl. or. h*

lophanta vent. n. cels. }
lanceolata smith, soc. l. }
glandulosa.
corifolia vent. malm.
pinifolia wendl. collect.
linearis smith, soc. l. }
melaleuca linearis sert. hann. }
floribunda vent. malm.

lancéolé. n. holl. or. ♀ (orn.)
glanduleux. n. holl. or. ♀
à f. de coris. n. holl. or. ♀
à f. de pin. n. holl. or. ♀
à feuell. étroites. n. holl. or. ♀
à fleurs nombr. n. holl. or. ♀

EUCALYPTUS

robusta smith, soc. l. ?
oppositifolia.
obliqua l'her. sert.
amygdalina bill. n. holl.
piperita n. k.
discolor.

EUCALYPTUS

gigantesque. n. holl. or. ♀
à f. opposées. n. holl. or. ♀
oblique. n. holl. or. ♀
à f. d'Amancier. n. holl. or. ♀
poivrée. n. holl. or. ♀
de deux couleurs. n. holl.
or. ♀

PSIDIUM

pyriferum l.
montanum swartz. prodr.

GORAVIER

poire. inde. or. ♀
de montagne. ant. s. ch. ♀

MYRTUS

communis l.
— boëtica.
— romana.
— tarentina.
— belgica.
— mucronata.
rimenta l.

tomentosa n. k.
horizontalis vent. malm.

MYRTE

commun. f. or. ♀ (orn. méd.)
— d'Andalousie.
— romain.
— de Tarente.
— moyen.
— pointu.
pimento, tout-épice. Antilles.
s. ch. ♀ (écon.)
cotonneux. chine. s. ch. ♀
horizontal. ant. m. s. ch. ♀

EUGENIA

uniflora l.
jambos l.
malaccensis l.
baruensis jacq. ic.

EUGÉNIA

à une fleur. Brésil. s. ch. ♀
jamrose. inde. s. ch. ♀
de Malaca. inde. s. ch. ♀
de Barut. s. ch. ♀

CALYPTRANTHES

zuzygium swartz. prodr. }
myrtus zuzygium l. }

CALYPTRANTÈS

zuzygium. Antilles. s. ch. ♀

DECUMARIA

barbara l.

DÉCUMARIA

sarmenteux. caroline. ♀

PUNICA

granatum l.
— nanum.
— flayum.

GRENADIER

cultivé. tunis. or. ♀ (écon.)
— nain.
— jaune.

PHILADELPHUS
 coronarius L.
 — nanus.
 inodorus L.

SERINGAT
 odorant. F. ♀ (orn.)
 — nain.
 inodore. caroline. ♀ (orn.)

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

BLAKEA
 trinervia L.
 MELASTOMA
 elæagnoides swartz. prodr.
 cymosa willd. sp.

ORDRE VIII.

MÉLASTOMES.

BLAKÉA
 à trois nervures. ant. s. ch. ♀
 MÉLASTOME
 à f. d'éléagnus. ant. s. ch. ♀
 corymbifère. ant. s. ch. ♀

ORDO IX.

SALICARIÆ.

LAGERSTROEMIA
 indica L.
 LAWSONIA
 inermis L. }
 spinosa L. }
 LYTHRUM
 salicaria L.
 virgatum L.
 hyssopifolia L.
 CUPHEA
 viscosissima Jacq. hort. }
 Lythrum cuphea L. f. }
 ISNARDIA
 palustris L.
 GLAUX
 maritima L.
 PEPLIS
 portula L.

LAGERSTROËMIA
 des Indes. or. ♀ (orn.)
 LAWSONIA
 d'Orient. or. ♀ (orn. teint.)

ORDRE IX.

SALICAIRE.

SALICAIRE
 commune. F. ♂ (orn.)
 effilée. Autriche. ♂ (orn.)
 à feuilles d'hysopé. F. ☉

CUPHÉA
 visqueux. Brésil. ☉

ISNARDIA
 des marais. F. ♀

GLAUX
 maritime. F. ♀

PÉPLIS
 aquatique. F. ☉

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. *Germen simplex inferum; polystylum;
 pomum calycino limbo umbilicatum,
 multiloculare.*

MALUS
 communis.

ORDRE X.

ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère; plusieurs styles;
 une pomme à plusieurs loges, terminée
 par un ombilic couronné par le calice.

POMMIER
 commun. F. ♀ (écon.)

—sylvestris.
 —prasomila.
 —paradisiaca.
 —castanea.
 —apiosa.
 coronaria.
 pyrus coronaria H. K. }
 sempervirens.
 pyrus angustifolia H. K. }
 hybrida.
 pyrus hybrida Willd. sp. }
 baccata.
 pyrus baccata L. Mant. }
 spectabilis.
 pyrus spectabilis H. K. }
 japonica Andr. Rep.

PYRUS

communis L.
 —pyraster.
 —pompeiana.
 —rufescens.
 —liquescens.
 polveria L. Mant.
 sinai Thouin, Ann.
 salicifolia L. f.

CYDONIA

vulgaris.
 —lusitanica.
 sinensis Thouin, Ann.

CRATÆGUS

torminalis L.
 latifolia Encycl.
 aria L.
 —longifolia.
 chamæmespilus. }
 humilis Encycl. }
 arbutifolia Encycl.
 glabra H. K.
 pyrifolia Encycl.
 spicata Encycl.
 racemosa Encycl.
 amelanchier. }
 rotundifolia Encycl. }

SORBUS

aucuparia L.
 americana.

—sauvage.
 —de reinette.
 —de paradis.
 —de châtaignier.
 —d'apis.

odorant. Am. s. h

toujours vert. Am. s. h

hybride. h

baccifère. sibérie. h

à bouquets. chine. h (orn.)

du Japon. h

POIRIER

commun. F. h (écon.)
 —sauvageon.
 —bon-chrétien.
 —de roussellet.
 —de beuré.
 colonneux. F. h
 du mont Sinai, h
 à feuilles de saule. sibérie. h

COIGNASSIER

commun. F. h (écon.)
 —de Portugal.
 de Chine. h

ALISIER

des bois. F. h (écon.)
 à larges feuilles. F. h
 Allouchier. F. h
 —à feuilles longues.

nain. Alpes. h

à f. d'Arbousier. Am. s. h

glabre. chine. or. h

à f. de poirier. Am. s. h

à épis. Am. s. h

à grappes. Am. s. h

Amelanchier. F. h

SORBIER

des oiseleurs. F. h (orn.)
 d'Amérique. Am. s. h (orn.)

domestica L.
hybrida L.

cormier. F. ♀ (écon.)
de Laponie. ♀ (orn.)

MESPILUS

NÉFLIER

oxyacantha.
 — *plena*.
 — *rubra*.
monogyna Jacq. Austr.
Azarolus.
 — *aronia*.
sanguinea.
spathulata Mich. Fl.
tanacetifolia Encycl.
tomentosa L.
corallina.
acerifolia Encycl. }
coccinea.
pyrifolia.
cornifolia Encycl. }
linearis.
prunifolia Encycl.
crus-galli Encycl.
pyracantha L.
cotoneaster L.
germanica L.
japonica Thunb. Jap.

Aubépine. F. ♀ (orn.)
 — *double*. (orn.)
 — *rose*. (orn.)
monogyne. F. ♀
Azerole. F. ♀ (écon.)
 — *d'Orient*.
sanguin. Am. s. ♀
en spatule. Am. s. ♀
à f. de Tanaïsie. orient. ♀
cotonneux, Pinchaw. Am. s. ♀
Petit-corail. Am. s. ♀
écarlate. Am. s. ♀
à f. de poirier. Am. s. ♀
à feuilles étroites. Am. s. ♀
à f. de prunier. Am. s. ♀
Pied-de-coq. Am. s. ♀
Buisson-ardent. F. ♀ (orn.)
cotoneaster. F. ♀
cultivé. F. ♀
du Japon. ♀ (écon.)

II. *Germina indefinita*, calice urceolari
supra coarctato tecta, singula mono-
stylo.

II. Ovaies indéfinis renfermés dans un
 calice étranglé à son sommet, surmontés
 chacun d'un style.

ROSA.

ROSIER.

I. Fructibus subglobosis.

berberifolia Pall. Act. Petr.
eglantaria L. }
lutea H. K. }
 — *punicea*.
sulphurea H. K.
spinosissima L.
scotica.
cinnamomea L.
arvensis L. Mant.
carolina L.
parviflora Willd. sp.
lucida Willd. sp.
villosa L.
sinica.
kamitchatica Vent. ch. de F.

I. Fruits presque ronds.

à une feuille. perse. or. ♀
églantier. Allem. ♀ (orn.)
 — *ponceau*. (orn.)
jaune. orient. ♀ (orn.)
hérissé. F. ♀
d'Ecosse. ♀
cannelle. Alpes. ♀
des champs. ♀
de Caroline. ♀
à petites fleurs. Am. s. ♀
luisant. Am. s. ♀
velu. F. ♀
de Chine. ♀
du Kamitchatka. ♀

2. *Fructibus ovatis.*

remensis.
 burgundiaca.
 damascena *willd. sp.*
 centifolia *L.*
 — unguiculata.
 muscosa *H. K.*
 maxima.
 semperflorens (non *willd.*) }
 sempervirens *H. K.* }
 turbinata *H. K.* }
 francofurtensis. }
 gallica *L.*
 bracteata *vent. H. cels.*
 alba *L.*
 collina *Jacq. Austr.*
 rubiginosa *L. Mant.*
 canina *L.*
 glauca. }
 rubrifolia *vill. delph.* }
 alpina *L.*
 pendulina *L.*
 moschata *H. K.*
 diversifolia *vent. H. cels.* }
 semperflorens *Jacq. H. sch.* }
 sempervirens *L.*

III. *Germina plura definita (rarius unum),
 calice urceolari supra contracto recta,
 singula monostyla ; semina totidem.*

POTERIUM

sanguisorba *L.*
 polygamum *willd. sp.*
 hybridum *L.*
 ancistroides *Desf. Atl.*
 caudatum *H. K.*
 spinosum *L.*

SANGUISORBA.

officinalis *L.*
 media *L.*
 canadensis *L.*

ANCISTRUM

ascendens *rahl, sp.*
 repens *vent. H. cels.*

WALDSTEINIA

geoides *willd. sp.*

2. *Fruits ovales.*

de Champagne. ♀ (orn.)
 de Bourgogne. ♀ (orn.)
 de Damas. ♀ (orn.)
 à cent feuilles. (orn.)
 — onguiculé.
 mousseux. ♀ (orn.)
 de Hollande. ♀ (orn.)
 de tous les mois. ♀ (orn.)
 à gros calice. ♀ (orn.)
 de Provins. *eur.* ♀ (orn. méd.)
 de Macartney. *chine.* ♀ (orn.)
 blanc. *eur.* ♀ (orn.)
 des collines. *F.* ♀
 odorant. *F.* ♀
 de chien. *F.* ♀
 glauque. *Alpes.* ♀
 des Alpes. ♀
 à fruit pendant. ♀
 musqué. *barbar.* ♀ (orn. écon.)
 du Bengale. ♀ (orn.)
 toujours vert. *Allem.* ♀

III. *Ovaires en nombre défini (rarement
 un seul), surmontés chacun d'un style,
 renfermés dans un calice étranglé au
 sommet; autant de graines.*

PIMPRENELLE

des jardins. *F.* ♂ (écon. méd.)
 polygame. *Hongrie.* ♂
 hybride. *F. m.* ♂
 à f. d'Ancistrum. *Alger. or.* ♀
 à grappes. *madère. or.* ♀
 épineuse. *orient. or.* ♀

SANGUISORBE

officinale. *F.* ♂ (écon.)
 moyenne. *Am. s.* ♂
 de Canada. ♂

ANCISTRUM

à tige montante. *magellan.* ♂
 rampant. *pérou. or.* ♀

WALDSTEINIA

à f. de géum. *Hongrie.* ♂

ACRIMONIA

- Eupatoria* L.
 — *alba*.
 — *odorata*.
repens L.
agrimonoides L.

CLIFFORTIA

- ilicifolia* L.
tridentata Willd. sp.
ruscifolia L.

ALCHEMILLA

- vulgaris* L.
hybrida L.
alpina L.
pentaphyllea L.
aphanes.
aphanes arvensis L. }

SIBBALDIA

- procumbens* L.

IV. *Germina indefinita supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla; semina totidem nuda aut rarius baccata.*

TORMENTILLA

- erecta* L.
reptans L.

POTENTILLA1. *Foliis pinnatis.*

- fruticosa* L.
anserina L.
multifida L.
supina L.
bifurca L.
rupestris L.
pensylvanica L. Mant.

2. *Foliis digitatis.*

- recta* L.
laciniosa Wald. et Kitt. Hung.
pedata Nester, Pot.
obscura March. Cauc.
canescens Besser, Fl.
ascendens Vill. Delph.
recta Jacq. Austr. }

AIGREMOINE

- officinale*. F. ☞ (méd.)
 — *à fleurs blanches*.
 — *odorante*.
rampante. orient. ☞
à feuilles ternées. Italie. ☞

CLIFFORTIA

- à feuell. de houx*. cap. or. ☞
à trois dents. cap. or. ☞
à f. de fragon. cap. or. ☞

ALCHÉMILLE

- commune*. F. ☞ (méd.)
hybride. Alpes. ☞
satinée. Alpes. ☞
à cinq feuilles. Alpes. ☞
perche-pierre. F. ☉

SIBBALDIA

- couché*. Alpes. ☞

IV. Ovaires supères et indéfinis, attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style; autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE

- droite*. F. ☞
rampante. F. ☞

POTENTILLE1. *Feuilles pennées.*

- arbrisseau*. Sibérie. ☞
Argentine. F. ☞
laciniée. F. ☞
couchée. F. ☉
bifurquée. Sibérie. ☞
des rochers. Alpes. ☞
de Pensylvanie. ☞

2. *Feuilles digitées.*

- droite*. Alpes. ☞
laciniée. Hongrie. ☞
en pédale. ☞
obscur. Caucase. ☞

- blanchâtre*. F. ☞

hirta L.
 argentea L.
 verna L.
 alchimilloides Lapeyr. Fl.
 aurea L.
 intermedia L.
 incisa Nester, Pot.
 alba L.
 lupinoides Willd. sp. }
 valderia Vill. Delph. }
 caulescens L.

3. *Foliis ternatis.*

grandiflora L.
 monspeliensis L.
 norvegica L.
 parviflora. }
 fragaria sterilis Willd. sp. }
 emarginata. }
 vaillantii Nester, Pot. }

FRAGARIA

vesca L.
 — monophylla Willd. sp.
 — eflagellis.
 — semperflorens.
 — moschata.
 — nigra.
 — viridis.
 — virginiana Willd. sp.
 — chilensis Willd. sp.
 — ananassa.

COMARUM

palustre L.

GEUM

urbanum L.
 virginianum L.
 album Willd. Enum. }
 canadense Jacq. Hort. }
 canadense Murr. Goett. }
 strictum Willd. sp. }
 alepicum Jacq. Ic. }
 rivale L.
 nutans Encycl.
 pyrenaicum Willd. sp.
 montanum L.
 reptans L.

hérissée. F. m. ℥
 argentée. F. ℥
 printanière. F. ℥
 à f. d'Alchimille. Pyrénées. ℥
 dorée. Alpes. ℥
 moyenne. Alpes. ℥
 incisée. ℥
 blanche. Alpes. ℥
 à feuilles de lupin. Alpes. ℥
 montante. F. ℥

3. Feuilles ternées.

à grandes fleurs. Alpes. ℥
 de Montpellier. ℥
 de Norvège. ℥
 à petites fleurs. F. ℥
 échancrée. F. ℥

FRAISIER

des bois. F. ℥ (écon. méd.)
 — à une feuille.
 — sans coulans.
 — de tous les mois.
 — capiton.
 — noir.
 — vert.
 — de Virginie.
 — du Chili.
 — ananas.

COMARUM

des marais. F. ℥

BENOITE

officinale. F. ℥ (méd.)
 de Virginie. ℥
 à fleurs blanches. Am. s. ℥
 de Canada. ℥
 des ruisseaux. Alpes. ℥
 penchée. F. ℥
 des Pyrénées. ℥
 de montagne. Alpes. ℥
 rampante. Alpes. ℥

DRYAS

octopetala L.

RUBUS.

1. *Fruticosi.*

idaeus L.

occidentalis L.

villosus H. K. }

vulpinus. }

fruticosus L.

— inermis.

laciniatus Willd. H. Ber.

rosæfolius Smith, Ic.

cæsius L.

— crispus.

odoratus L.

2. *Herbacei.*

saxatilis L.

arcticus L.

chamæmorus L.

V. *Germina plura supera definita; capsulae totidem mono aut polyspermæ.*

SPIRÆA.

1. *Herbaceæ.*

filipendula L.

aruncus L.

ulmaria L.

lobata S. Veg.

trifoliata L.

2. *Fruticosa.*

sorbifolia L.

salicifolia L.

lævigata L.

tomentosa L.

hypericifolia L.

crenata L.

chamædrifolia L.

opulifolia L.

DRYAS

à huit pétales. Alpes. ♀

RONCE.

1. Tiges ligneuses.

framboisier. F. ♂ (écon.)

d'Occident. Am. s. ♂ (écon.)

velue. Am. s. ♂

des haies. F. ♂ (écon. méd.)

— sans épines.

laciniée. ♂

à f. pennées. île de F. s. ch. ♂

à fruit bleu. F. ♂ (écon.)

— crépue.

odorante. Am. s. ♂

2. Tiges herbacées.

des rochers. F. ♂

du Nord. suède. ♀ (écon.)

des marais. suède. ♂ (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini; autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÆA.

1. Tige herbacée.

filipendule. F. ♀ (orn.)

à grappes. F. ♀ (orn.)

ulmaire. F. ♂

à feuilles lobées. Am. s. ♂

à trois folioles. Am. s. ♀ (orn.)

2. Tiges ligneuses.

à f. de sorbier. sibér. ♂ (orn.)

à f. de saule. sibér. ♂ (orn.)

à feuilles lisses. sibérie. ♂

cotonneux. Am. s. ♂ (orn.)

à f. d'hypericum. F. ♂ (orn.)

à feuilles crénelées. sibérie. ♂

à f. de chamédrys. sibér. ♂

à f. d'obier. Am. s. ♂ (orn.)

VI. *Germen 1 monostylum; nux mono aut disperma, nuda vel drupacea.*

PRUNUS.

i. *Cerasi. Nucleo subrotundo.*

caroliniana H. K.

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style; une noix nue ou recouverte d'une pulpe, renfermant 1-2 graines.

PRUNIER.

1. Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. or. ♂

Laurocerasus L.
lusitanica L.
padus L.
 — *rubra*.
virginiana L.
serotina Willd. sp.
pumila L. Mant.
chamæcerasus Jacq. Ic.
mahaleb L.
semperflorens Willd. sp. }
serotina Roth. cat. }
cerasus L.
 — *nana*.
 — *ruberrima*.
 — *suavissima*.
 — *juliana*.
avium L.
 — *sylvestris*.
 — *nigra*.
 — *bigarella*.
persicifolia.

2. *Pruni. Nucleo ovato, subcompresso.*

spinosa L.
sinensis.
Amygdalus pumila L. }
prostrata Bill. Dec.
insititia L.
brigantiaca Vill. Delph.
domestica L.
 — *cerea*.
 — *cereola*.
 — *damascena*.
 — *hungarica*.
 — *claudiana*.
myrobalana.
cerasifera Willd. sp. }
hiemalis Mich. Fl.

3. *Armeniaca. Nucleo orbiculari, compresso.*

Armeniaca L.
 — *dulcis*.
 — *nigra*.
 — *macrocarpa*.

AMYGDALUS
persica L.

Laurier-cerise. F. 5 (orn. vén.)
Azarero. Portugal. 5 (orn.)
 à grappes. F. 5 (orn.)
 — à fruit rouge.
de Virginie. 5 (orn.)
tardif. Virginie. 5
ragouminier. Am. s. 5
chamécerasus. Autr. 5
Mahaleb. F. 5 (orn.)
de la Toussaint. 5
cerisier. F. 5 (écon.)
 — *nain*.
 — *de Montmorenci*.
 — *royal* ou *chéréduc*.
 — *Guignier à fruit noir*.
Merisier. F. 5 (écon.)
 — *des bois à fruit rouge*.
 — à fruit noir.
 — *Bigarotier*.
 à feuilles de pêcher. 5

2. Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

épineux ou *Prunellier*. F. 5
de Chine. 5 (orn.)
couché. orient. 5
sauvage. F. 5
de Briançon. 5
cultivé. F. (écon.)
 — *de Sainte-Catherine*.
 — *de mirabelle*.
 — *de Damas*.
 — *de Damas noir*.
 — *de reine Claude*.
de myrobolan. Am. s. 5 (écon.)
d'hiver. Am. s. 5

3. Abricotiers. Noyau orbiculaire, comprimé.

Abricotier. orient. 5 (écon.)
 — *alberge*.
 — à fruit noir.
 — *pêche*.

AMANDIER
pêcher. perse. 5 (écon.)

communis L.

— plena.

— amara.

nana L.

georgica.

orientalis H. K. }

argentea *Encycl.* }

CALYCANTHUS

floridus L.

lævigatus *Willd. Enum.* }

ferax *Mich. Fl.* }

præcox L.

BLACKWELLIA

axillaris *Lamk, ill.*

HOMALIUM

racemosum *Jacq. Am.*

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

I. Corolla regularis, quandoque nulla;
stamina distincta.

ACACIA.

1. Foliis simplicibus.

verticillata *Willd. sp.*

juniperina *Willd. sp.*

linifolia *Willd. sp.*

floribunda *Willd. sp.*

sophoræ *Bill. N. Holl. ?*

obliqua *Wendl. obs.* }

falcata *Willd. sp.* }

dodonæifolia *Pers. syn.*

longifolia *Willd. sp.*

suaveolens *Willd. sp.*

stricta *Willd. sp.*

latifolia. }

melanoxydon H. K. }

paradoxa *Dec. cat.*

armata H. K.

2. Foliis conjugatis simulque pinnatis.

pulchella H. K.

strombulifera *Willd. sp.*

coronillæfolia.

furcata.

cultivé. Asie. ♀ (écon.)

— double. (orn.)

— amer. (véén.)

nain. Sibérie. ♀ (orn.)

de Géorgie. ♀

satiné. Perse. ♀

CALYCANTHUS

de Virginie. ♀ (orn.)

à feuilles lisses. Am. s. ♀

du Japon. ♀ (orn.)

BLACKWELLIA

axillaire. Ile de F. s. ch. ♀

HOMALIUM

à grappes. Antilles. s. ch. ♀

ORDRE XI.

LÉGUMINEUSES.

I. Corolle régulière, quelquefois nulle;
étamines distinctes.

ACACIE.

1. Feuilles simples.

verticillée. N. Holl. or. ♀

à f. de Genévrier. N. Holl. or. ♀

à f. de Lin. N. Holl. or. ♀

à fl. nombr. N. Holl. or. ♀

sophora. N. Holl. or. ♀

oblique. N. Holl. or. ♀

à f. de Dodonée. N. Holl. or. ♀

à long. feuill. N. Holl. or. ♀

triangulaire. N. Holl. or. ♀

ramassée. N. Holl. or. ♀

à larges feuill. N. Holl. or. ♀

ondulée. s. ch. ♀

épineuse. N. Holl. or. ♀

2. Feuilles conjuguées et pennées.

élégante. N. Holl. or. ♀

tire-bouchon. Pérou. s. ch. ♀

à feuilles de coronille. s. ch. ♀

bifurquée. s. ch. ♀

3. *Foliis duplicato-pinnatis.*a. *Aculeatæ aculeis sparsis.*

sarmentosa.
uncinella.
trinervia.
ceratonia *willd. sp.*
rhodacantha.

b. *Spinosæ; spinis axillaribus.*

juliflora *willd. sp.*
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal *willd. sp.*
nilotica. }
vera *willd. sp.* }
indica.
farnesiana *willd. sp.*
eburnea *willd. sp.*
cornigera *willd. sp.*

c. *Inermes.*

muricata *willd. sp.*
portoricensis *willd. sp.*
leucocephala. }
mimosa leucocephala *Encycl.* }
lophantha *willd. sp.*
arborea *willd. sp.* }
mimosa filicifolia *Encycl.* }
tetragona *willd. sp.*
julibrisin *willd. sp.*
decurrens *willd. sp.*
peregrina *willd. sp.* }
angustifolia *Encycl.* }
Lebbek *willd. sp.*
trichodes *willd. sp.*
scandens *willd. sp.*
botrycephala. }
discolor *willd. sp.* }
lentiscifolia.

angustisiliqua. }
desmantus virgatus *willd. sp.* }
pubescens. }
mimosa pubescens *vent.* }
Malm. }
glandulosa *willd. sp.*
punctata. }
desmantus punctatus *willd.* }
sp.

3. Feuilles deux fois pennées:

a. Aiguillons épars.

sarmenteuse. s. ch. 5
à crochets. s. ch. 5
à trois nervures. s. ch. 5
à f. de caroubier. Ant. s. ch. 5
à épines de rosier. s. ch. 5

b. Epineuses; épines axillaires.

à chatons. jamaïque. s. ch. 5
de Guayaquil. s. ch. 5
de Maroc. s. ch. 5
Sénégal. Afr. s. ch. 5
du Nil. s. ch. 5

de l'Inde. s. ch. 5
de Farnèse. s. ch. 5
à épines blanches. s. ch. 5
à grosses épines. s. ch. 5

c. Tiges sans épines.

tuberculeuse. Antilles. s. ch. 5
de Porto-Rico. s. ch. 5
à tête blanche. Ant. s. ch. 5
en panache. N. Holl. or. 5
en arbre. Antilles. s. ch. 5
tétragone. caracas. s. ch. 5
arbre de soie. 5 (orn.)
décurrente. N. Holl. or. 5
à f. étroites. Antilles. s. ch. 5
Lebbek. inde. s. ch. 5
barbue. Pérou. s. ch. 5
grimpeante. inde. s. ch. 5
à grappes. N. Holl. or. 5
à feuell. de lentisque. mexiq.
s. ch. 5

à gousses étroites. Ant. s. ch. 5

pubescente. s. ch. 5

glanduleuse. Am. s. or. 5

punctuée. Antilles. s. ch. 5

lycopodioides.

lacustris.

desmantus lacustris *willd.* }
*sp.*à f. de *lycopode*. s. ch. 5

aquatique. mexique. s. ch. 12

MIMOSA

sensitiva *L.*pudica *L.*asperata *L.*

SENSITIVE

sensible. Brésil. s. ch. 5

commune. Antilles. ☉

rude. Antilles. s. ch. 5

SCHRANKIA

uncinata *willd. sp.*mimosa horridula *mich. fl.* }

SCHRANKIA

hérissé. Am. s. or. 5

INGA

vera *willd. sp.* }mimosa inga *L.* }punctata *willd. sp.* }mimosa fagifolia *Jacq. Am. ?* }unguis-cati *willd. sp.*foetida *willd. sp.* }mimosa foetida *Jacq. fragm.* }

INGA

ailé. Antilles. s. ch. 5

ponctué. Antilles. s. ch. 5

ongle-de-chat. Ant. s. ch. 5

fétide. Mexique. s. ch. 5

GLEDITSIA

triacanthos *L.*

— lævis.

monosperma *H. K.* }carolinensis *Encycl.* }sinensis *Encycl.*

ferox.

caspica.

FÉVIER

à trois pointes. Am. s. 5 (orn.)

— sans épines.

monosperme. Am. s. 5

de Chine. 5

à grosses épines. chine. 5

de la mer Caspienne. 5

GYMNOCLADUS

canadensis *Encycl.* }Guilandina dioica *L.* }

GYMNOCLADUS

de Canada. 5 (orn.)

CERATONIA

siliqua *L.*

CAROUBIER

commun. F. m. 5 (écon.)

TAMARINDUS

indica *L.*

TAMARINIER

des Indes. s. ch. 5 (méd.)

PARKINSONIA

aculeata *L.*

PARKINSONIA

épineux. Antilles. s. ch. 5

SCHOTIA

speciosa *Jacq. ic.* }Guaiacum afrum *L.* }

SCHOTIA

écarlate. cap. or. 5

CASSIA

thora *L.*bicapsularis *L.*viminea *L.*

CASSE

à fruit grêle. Antilles. ☉

à deux loges. Ant. s. ch. 5

sarmenteuse. Ant. s. ch. 5

- alata* L.
corymbosa *Encycl.*
falcata L. ?
occidentalis L.
stipulacea H. K.
fistula L.
latifolia.
atomaria Willd. sp. ? }
grandiflora.
corymbosa *ortega*, Dec. }
biflora L.
tomentosa L. f.
brasiliانا *Encycl.*
hirsuta L.
glandulosa L.
chamæcrista L.
marylandica L.
- SPANDONCEA**
tamarindifolia Desf. Dec. Phil. }
cadia purpurea Forsk. Egypt. }
- HOFFMANSEGGIA**
falcaria Cav. Ic.
larrea glauca *ortega*, Dec. }
- MORINGA**
nux-ben.
guilandina *moringa* L. }
hyperanthera *moringa* *vahl*, }
symb.
- HEMATOXYLUM**
campechianum L.
- ADENANTHERA**
pavonina L.
- POINCIANA**
pulcherrima L. }
cæsalpinia pulcherrima }
swartz. obs.
- CÆSALPINIA**
sappan L.
bahamensis *Encycl.*
vesicaria *Encycl.*
paniculata.
- GUILANDINA**
bonduc L.
bonducella.
- aillée*. Antilles. s. ch. ♀
corymbifère. Brésil. or. ♀
falciforme. Antilles. ☉
puante. Ant. s. ch. ♀ (méd.)
à grand. stipules. Chili. s. ch. ♀
des boutiques. Inde. s. ch. ♀
à larges feuil. Ant. s. ch. ♀
à grandes fl. Mexiq. s. ch. ♀
à deux fleurs. Ant. s. ch. ♀
cotonneuse. Chili. s. ch. ♀
du Brésil. s. ch. ♀
velue. Antilles. s. ch. ♀
glanduleuse. Antilles. ☉
chamæcrista. Antilles. ☉
de Maryland. ☿
- SPANDONCÉA**
à f. de tamarin. Afr. s. ch. ♀
- HOFFMANSEGGIA**
falciforme. Pérou. ☿
- MORINGA**
Noix-de-Ben. Indes. s. ch. ♀
 (écon. méd.)
- CAMPÊCHE**
commun. Ant. s. ch. ♀ (teint.)
- ADÉNANTHÉRA**
glabre. Inde. s. ch. ♀
- POINCILLADE**
élégante. Inde. s. ch. ♀ (orn.)
- CÆSALPINIA**
sappan. Inde. s. ch. ♀ (arts.)
de Bahama. s. ch. ♀
vésiculeux. Antilles. s. ch. ♀
paniculé. s. ch. ♀
- QUENIQUIER**
bonduc. Inde. s. ch. ♀
sarmenteux. Inde. s. ch. ♀

HYMENEA

courbaril L.

HYMÉNÉA

courbaril. cayenne. s. ch. 3

BAUHINIA

divaricata *Encycl.* (non *Lin.*)

porrecta H. K.

tomentosa *Encycl.*

aculeata L.

rufescens *Encycl.*

BAUHINIA

divergent. s. ch. 3

allongé. Antilles. s. ch. 3

cotonneux. inde. s. ch. 3

épineux. Antilles. s. ch. 3

à petites f. île de F. s. ch. 3

II. Corolla papilionacea ; stamina distincta ; legumen uniloculare bivalve.

II. Corolle papilionacée ; étamines distinctes ; gousse bivalve à une loge.

CERCIS

siliquastrum L.

canadensis L.

GAINIER

de Judée. orient. 3 (orn.)

de Canada. 3 (orn.)

ANAGYRIS

fœtida L.

ANAGYRIS

fétide. F. m. or. 3

SOPHORA

alopecuroides L.

flavescens H. K.

occidentalis Swartz.

japonica L. Mant.

microphylla H. K.

tetraptera H. K.

SOPHORA

queue-de-renard. orient. 2

jaune. Sibérie. 3

d'Occident. Antilles. s. ch. 3

du Japon. 3 (orn.)

à petites f. N. Holl. or. 3

à quatre ailes. N. zél. or. 3

PODALYRIA

capensis Willd. sp. }

sophora capensis L. Mant. }

aurea Willd. sp. }

virgilia aurea *Encycl.* }

robinia subdecandra l'Her. stirp. }

genistoides Willd. sp. }

sophora genistoides L. }

australis Willd. sp. }

sophora australis s. reg. }

tinctoria Willd. sp. }

sophora tinctoria L. }

alba Willd. sp. }

sophora alba s. reg. }

lupinoides Willd. sp. }

sophora lupinoides L. }

cuneifolia Vent. H. Cels.

biflora *Encycl.*

styracifolia Bot. Magaz.

PODALYRIA

du Cap. or. 3

à fl. jaune. Abyssinie. s. ch. 3

génistoïde. cap. or. 3

de Caroline. 2

des teinturiers. Am. s. 3 (teint.)

à fleurs blanches. Caroline. 3

à f. de lupin. Kamtchatka. 3

cunéiforme. cap. or. 3

à deux fleurs. cap. or. 3

à f. de styrax. cap. or. 3

VIRGILIA

lutea Mich. Arbr.

VIRGILIA

à bois jaune. Am. s. 3.

CHORIZEMA

nana H. K.

VIMINARIA

denudata H. K.

daviesia denudata Vent.

choix de Pl. }

SPHÉROLOBIMUM

vineum H. K.

OXYLOBIMUM

cordifolium Andr. rep.

EUTAXIA

myrtifolia H. K.

milvinia obovata Will. N. }

holl.

CALLISTACHYS

lanceolata Vent. Malm.

elliptica Vent. Malm.

III. Corolla papilionacea ; stamina 10
mona aut diadelphe ; legumen unilocu-
lare , bivalve.

ULEX

europæus L.

minor Rhot. cat. }

nanus Smith, Fl. }

PLATYLOBIMUM

formosum Smith, N. Holl. spec.

scolopendrium Andr. rep. }

bossiza scolopendrium H. K. }

BORBONIA

crenata L.

GENISTA.

1. Spinosa.

anglica L.

germanica L.

hispanica L.

2. Inermes.

pilosa L.

sagittalis L.

tinctoria L.

sibirica L. Mant.

canariensis L.

CHORIZÉMA

nain, N. Holl. or. ♀

VIMINARIA

dénudé, N. Holl. or. ♀

SPHÉROLOBIMUM

à tige grêle, N. Holl. or. ♀

OXYLOBIMUM

à f. en cœur, N. Holl. or. ♀

EUTAXIA

à f. de myrte, N. Holl. or. ♀

CALLISTACHYS

lancéolé, N. Holl. or. ♀

elliptique, N. Holl. or. ♀

III. Corolle papilionacée ; 10 étamines mo-
nadelphes ou diadelphes ; gousse bivalve,
à une loge.

AJONC

marin, F. ♀ (écon.)

petit, F. ♀

PLATYLOBIMUM

élégant, N. Holl. or. ♀

ailé, N. Holl. or. ♀

BORBONIA

crênelé, cap. or. ♀

GENET.

1. Tiges épineuses.

d'Angleterre, F. ♀

d'Allemagne, F. ♀

d'Espagne, ♀

2. Tiges sans épines.

tuberculeux, F. ♀

ailé, F. ♀

des teinturiers, F. ♀

de Sibérie, ♀

des Canaries, or. ♀

candicans L.
 juncea. }
 spartium junceum L. }

blanchâtre. F. m. or. 5
 jonciforme. F. m. 5 (orn. écon.)

SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphærocarpon L.
 monospermum L.
 cinereum Willd. sp. }
 genista scoparia Vill. Delph. }
 album Desf. Atl. }
 multiflorum L'Her. stirp. }
 genista alba Encycl. }
 multicaule. }
 genista multicaulis Encycl. }
 purgans L.
 scoparium L.
 triquetrum. }
 genista triquetra Willd. sp. }
 nubigenum H. K. }
 fragrans Encycl. }
 patens s. veg. }
 cytisus pendulinus L. f. }
 virgatum H. K.
 parviflorum Vent. H. cels.
 radiatum L.
 umbellatum Desf. Atl.
 linifolium Desf. Atl. }
 genista linifolia L. }

2. *Spinosa.*

horridum Vahl, symb.
 aspalatoides Desf. Atl.
 ferox Desf. Atl.
 scorpius L.
 spinosum L.
 lanigerum Desf. Atl.
 creticum. }
 aspalatus cretica L. ? }

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie. or. 5
 monosperme. F. m. or. 5
 cendré. F. 5
 à fleurs blanches. Alger. or. 5
 à tiges nombr. mahon. or. 5
 purgatif. F. 5
 à balais. F. 5 (écon.)
 triangulaire. esp. or. 5
 odorant. canaries. or. 5
 étalé. F. m. or. 5
 effilé. F. m. or. 5
 à petites fleurs. orient. or. 5
 à rayons. Italie. or. 5
 ombellifère. Alger. or. 5
 à feuilles de Lin. Alger. or. 5

2. Tige épineuse.

hérissé. F. 5
 aspalat. Alger. or. 5
 à grosses épines. Alger. or. 5
 scorpius. F. m. or. 5
 épineux. F. m. or. 5
 laineux. Alger. or. 5
 de Crète. or. 5

CYTISUS

sessilifolius L.
 nigricans L.
 laburnum L.
 — latifolium.
 cajan L.

hirsutus L.

CYTISE

à f. sessiles. esp. 5 (orn.)
 noirci. F. 5 (orn.)
 faux ébénier. F. 5 (orn.)
 — à larges feuilles.
 cajan ou pois d'Angole. Ant.
 s. ch. 5
 velu. F. m. 5

anagyrius l'her. stirp.
austriacus L.
divaricatus l'her. stirp. }
spartium complicatum L. }
leucanthus willd. ?
proliferus L. f.
foliolosus l'her. stirp.
triflorus l'her. stirp.
biflorus l'her. stirp.
supinus s. veg.
argenteus L.
volgaricus L. f. }
pinnatus Pallas, Ross. }

Anagyris. Esp. or. y
d'Autriche. y
étalé. F. y
à fleurs blanches. Hongrie. y
prolifère. canaries. or. y
feuillu. canaries. or. y
à fleurs ternées. F. m. or. y
à deux fleurs. Hongrie. y
couché. F. y
argenté. F. y
du Volga. y

CROTALARIA.

1. *Foliis ternatis.*

arborescens Encycl. }
incanescens L. f. }
incana L.
purpurascens Encycl.
purpurea Vent. Malm.

2. *Foliis simplicibus.*

sagittalis L.
junceae L.
semperflorens Vent. H. Cels.
retusa L.
benghalensis Encycl.
verrucosa L. }
angulosa Encycl. }
cœrulea Jacq. Ic. }
styracifolia.

GOODIA

lotifolia Bot. Mag.

RAFNIA

retusa Vent. Malm. }
templetonia retusa H. K. }

LUPINUS

varius L.
angustifolius L.
luteus L.

ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

antiquorum L.
spinosa L.
arvensis s. veg. }
hircina Willd. sp. }

CROTALAIRE.

1. Feuilles ternées.

en arbre. île de F. s. ch. y (orn.)
blanche. Antilles. ☉
rougedtre. île de F. ☉
pourpre. cap. or. y

2. Feuilles simples.

sagittée. Brésil. ☉
jonciforme. Inde. ☉
toujours fleurie. Inde. s. ch. y
émoussée. Inde. s. ch. ☉
du Bengale. ☉

à feuilles de styrax. s. ch. ☿

GOODIA

à f. de lotier. N. Holl. or. y

RAFNIA

émoussé. N. Holl. or. y

LUPIN

bigarré. F. m. ☉ (orn.)
à feuilles étroites. F. ☉
jaune. Alger. ☉ (orn.)

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches,
Arrête-bœuf. F. z (méd.)
épineux. F. v
des champs. F. v

altissima *Encycl.*
 mitissima *L.*
 cenisia *L. Mant.*
 alopecuroides *L.*
 cherleri *L.*
 rotundifolia *L.*
 fruticosa *L.*
 tridentata *L.*
 hirta.

2. Flores lutei.

viscosa *L.*
 natrix *L.*
 parviflora *Encycl.*
 minutissima *Jacq. (non L.)*
 columnæ *All. ped.*
 subocculta *Vill. Delph.*

ARACHIS

hypogea *L.*

EBENUS

cretica *L.*

ANTHYLLIS.

1. Fruticosæ.

barba-jovis *L.*
 cytisoides *L.*
 hermanniæ *L.*
 erinacea *L.*

2. Herbacææ.

cornicina *L.*
 montana *L.*
 tetraphylla *L.*
 vulneraria *L.*
 — purpurascens.

DALEA

violacea.
 petalostemum violaceum
Nich. Fl.
 candida.
 petalostemum candidum
Nich. Fl.
 linnæi *Nich. Fl.*

PSORALEA

pinnata *L.*élevé. *Allem. ℥*à fleurs serrées. *F. m. ℥*du mont Cénis. *℥*queue-de-renard. *Esp. ⊙*de Cherler. *F. m. ℥*à feuilles rondes. *Alpes. ℥*arbrisseau. *Alpes. ♀ (orn.)*à trois dents. *Esp. or. ♀*hérissé. *orient. or. ℥*

2. Fleurs jaunes.

visqueux. *F. m. ⊙*natrix. *F. ℥*à petites fleurs. *F. ♂*

ARACHIS

pistache-de-terre. *Antilles. ⊙*
 (écon.)

EBENUS

de Crète. *or. ♀*

ANTHYLLIS.

1. Tiges ligneuses.

satiné. *orient. or. ♀*
 à fleurs de cytise. *F. m. or. ♀*
 d'Orient. *or. ♀*
 épineux. *Esp. or. ♀*

2. Tiges herbacées.

cornu. *Esp. ⊙*
 de montagne. *F. ℥*
 à quatre feuilles. *F. m. ⊙*
 vulnérable. *F. ℥*
 — pourpre.

DALÉA

violet. *Am. s. or. ℥*blanc. *Am. s. or. ℥*de Linné. *Am. s. ℥*

PSORALÉA

à feuilles pennées. *cap. or. ♀*

odoratissima Jacq. H. sch.
 verrucosa Willd. sp. }
 angustifolia Jacq. H. sch. }
 aphylla L. Mant.
 bituminosa L.
 palestina Gouan, ill.
 pubescens Pers. syn.
 glandulosa L.
 americana L.
 bracteata L. Mant.
 corylifolia L.

MÉLILOTUS

cœrulea.
 indica.
 — minor.
 officinalis.
 alba.
 dentata.
 trifolium dentatum Wald. }
 et Kitt.
 polonica.
 italica.
 cretica.
 messanensis.
 sulcata Desf. Atl.
 ornithopodioides. }
 trigonella ornithopodioides }
 Dec. Fl.

TRIFOLIUM.

1. *Lotoidea, Leguminibus tectis, polyspermis.*
 lupinaster L.
 strictum L.
 angulatum Wald. et Kitt. hung.
 vaillantii Encycl.
 michelianum Savi, itin.
 repens L.
 alpinum L.
 involucreatum Willd. sp.
2. *Lagopoidea, Calicibus villosis.*
 subterraneum L.
 cherleri L.
 lappaceum L.
 rubens L.
 pratense L.
 diffusum Wald. et Kitt. hung.

odorant. cap. or. ♀
 tuberculeux. cap. or. ♀
 sans feuilles. cap. or. ♀
 bitumineux. F. m. or. ♀
 de Palestine. or. ♀
 pubescent. or. ♀
 glanduleux. Pérou. or. ♀
 d'Amérique. s. ch. ♀
 à grandes bractées. cap. or. ♀
 à feuill. de noisetier. inde. ☉

MÉLILOT

bleu. bohême. ☉ (écon.)
 des Indes. ☉
 — petit.
 officinal. F. ℥ (méd. econ.)
 blanc. sibérie. ♂ (écon.)
 denté. Hongrie. ☉
 de Pologne. ☉
 d'Italie. ☉
 de Crète. ☉
 de Messine. ☉
 sillonné. Alger. ☉
 pied-d'oiseau. F. ☉

TRÈFLE.

1. *Lotoïdes, Gousses polyspermes, recouvertes par le calice.*
 à feuilles de lupin. sibérie. ℥
 serré. F. ☉
 anguleux. Hongrie. ☉
 de Vaillant. F. ℥
 de Micheli. Italie. ℥
 rampant. F. ℥
 des Alpes. ℥
 à involucre. ℥
2. *Lagopodes, Calices velus.*
 souterrain. F. ☉
 de Cherler. F. m. ☉
 bardane. F. ☉
 rouge. F. ℥ (écon.)
 des prés. F. ℥ (écon.)
 étalé. Hongrie. ♂

bracteatum Willd. Enum.

alpestre L.

flexuosum Jacq. Fl. Austr. }

medium Willd. sp. }

pictum Roth. cat.

pannonicum L. Mant.

ochroleucum S. Veg.

pallidum Wald. et Kitt. Hung.

squarrosum L.

incarnatum L.

— *pallidum*.

angustifolium L.

arvense L.

gracile Thuill. Fl.

ligusticum Savi Itin.

maritimum Willd. sp.

stellatum L.

clypeatum L.

alexandrinum L.

scabrum L.

glomeratum L.

parviflorum Willd. sp.

striatum L.

suffocatum L. Mant.

albidum Willd. sp.

3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*

spumosum L.

tomentosum L.

fragiferum L.

resupinatum L.

4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*

montanum L.

agrarium Willd. sp. }

aureum Pollich. Palat. }

spadiceum L.

procumbens Smith, Fl.

filiforme Smith, Fl.

MEDICAGO.

1. *Leguminibus lunatis.*

arborea L.

radiata L.

circinata L.

sativa L.

falcata L.

lupulina L.

à grandes bractées, Maroc. ☉

à deux têtes. Alpes. ☿

tortueux. Alpes. ☿

tacheté. ☉

de Hongrie. ☿

jaunâtre. F. ☿

pâle. Hongrie. ☉

hérissé. F. ☉

incarnat. F. ☉

—pâle.

à feuilles étroites. F. ☉

des champs. F. ☉

grêle. F. ☉

d'Italie. ☉

maritime. Angleterre. ☉

étoilé. F. m. ☉

bouclier. orient. ☉

d'Alexandrie. ☉

rude. F. ☉

aggloméré. F. ☉

à petites fleurs. Hongrie. ☉

strié. F. ☉

nain. F. m. ☉

blanc. ☉

3. *Vésiculeux. Calices renflés.*

écumeux. F. ☉

cotonneux. F. ☉

Fraise. F. ☿

renversé. F. ☉

4. *Lupulins. Étendard de la corolle abaissé.*

de montagne. F. ☿

agraire. F. ☉

brun. F. ☉

tombant. F. ☉

filiforme. F. ☉

LUSERNE.

1. *Gousses falciformes.*

en arbre. orient. or. ☿

radiée. Italie. ☉

pennée. Italie. ☉

cultivée. ☿ (écon.)

falciforme. F. ☿

des prés. F. ♂

2. *Leguminibus cochleatis.*

prostrata L. f.
 glutinosa Marsch. cauc.
 marina L.
 orbicularis L.
 tornata L.
 — minor.
 elegans Willd. sp.
 tuberculata Willd. sp.
 aculeata Willd. sp.
 rigidula L.
 intertexta L.
 globulifera.
 tribuloides Encycl.
 murex Willd. sp.
 ciliaris L.
 maculata Willd. sp. }
 arabica L. }
 distans.
 coronata L.
 denticulata Willd. sp.
 apiculata Willd. sp.
 minima L.
 laciniata L.

TRIGONELLA.

1. *Flores in pedicello communi.*

platycarpus L.
 hybrida Dec. Fl.
 corniculata L.
 cancellata.
 prostrata. }
 hamosa L. }
 laciniata L.

2. *Flores sessiles.*

monspeliaca L.
 spinosa L.
 polycerata L.
 fœnum-græcum L.

LOTUS

edulis L.
 siliculosus L.
 tetragonolobus L.
 conjugatus L.
 peregrinus L.
 oligocercos Encycl. }

2. Gousses en limaçon.

couchée. Hongrie. ℥
 glutineuse. caucase. ℥
 maritime. F. m. or. ℥
 orbiculaire. F. ○
 Barillet. F. ○
 — petit Barillet.
 élégante. Sicile. ○
 tuberculeuse. F. m. ○
 à aiguillons. ○
 rude. ○
 entrelacée. F. m. ○
 à globules. ○
 à grosses pointes. Barbarie. ○
 Murex. ○
 ciliée. F. m. ○
 tachée. F. ○
 distante. ○
 couronnée. ○
 denticulée. F. m. ○
 à petites pointes. ○
 velue. F. ○
 laciniée. F. ○

TRIGONELLE.

1. Fleurs portées sur un pédicelle commun.

à gousses larges. Sibérie. ○
 hybride. F. m. ℥
 cornue. F. ○
 pied-d'oiseau. ○
 couchée. Orient. ○
 laciniée. Égypte. ○

2. Fleurs sessiles.

de Montpellier. ○
 épineuse. Crête. ○
 à gousses longues. F. m. ○
 Fœnu-græc. F. m. ○ (méd.)

— LOTIER

comestible. Orient. ○
 à grosses gousses. F. ℥
 à quatre ailes. Orient. ○
 conjugué. F. ○
 étranger. Barbarie. ○

diffusus *willd. sp.*
 hispidus *dec. cat.*
 arabicus *L. mant.*
 coimbrensis *willd. sp.*
 creticus *L.*
 jacobæus *L.*
 ornithopodioides *L.*
 corniculatus *L.*
 — major.
 — angustifolius.
 varians *Desvaux, Journ.*
 hirsutus *L.*
 rectus *L.*
 dorycnium *L.*
 dorycnium monspeliense }
willd. sp.
 fruticosus.

étalé. F. ☉
 hérissé. F. m. ☉
 d'Arabie. or. ☿
 de Coïmbre. ☉
 argenté. orient. or. ♀
 à fleurs brunes. Afr. or. ☿
 comprimé. Esp. ☉
 pied-d'oiseau. F. ☿
 — élevé.
 — à feuilles étroites.
 à fleurs chang. orient. or. ♀
 velu. F. m. or. ♀
 à tige droite. F. m. ☿
 dorycnium. F. m. or. ♀
 sous-arbrisseau. or. ♀

DOLICHOS

lablab *L.*
 — albus.
 sinensis *L.*
 sesquipedalis *L.*
 unguiculatus *L.*
 luteolus *Jacq. hort.*
 articulatus *Encycl.*
 minimus *L.*
 lignosus *L.*
 urens *L.*
 ensiformis *L.*
 acinaciformis *Jacq. Ic.* }
 gladiatus *Jacq. Ic.*
 soja *L.*
 biflorus *L.*

DOLIC

lablab. égypt. ☉ (orn.)
 — à fleurs blanches.
 de Chine. ☉
 à longues gousses. Antilles. ☉
 onguiculé. Antilles. ☉
 jaunâtre. Antilles. ☉
 articulé. Antilles. s. ch. ☿
 nain. Antilles. s. ch. ☿
 ligneux. inde. s. ch. ♀ (orn.)
 brûlant. Antilles. s. ch. ♀
 pois-sabre. Ant. s. ch. ♀
 à grandes gousses. Ant. s. ch. ♀
 soja. Japon. ☉
 à deux fleurs. inde. ☉

PHASEOLUS

vulgaris *L.*
 coccineus *Encycl.*
 multiflorus *willd. sp.* }
 lunatus *L.*
 vexillatus *L.*
 caracalla *L.*
 paniculatus *Nich. Fl.*
 radiatus *Encycl.*
 semierectus *L. mant.*
 nanus *L.*
 stipularis *Encycl.*
 sphærospermus *L.*

HARICOT

commun. inde. ☉ (écon.)
 écarlate. Antilles. ☉
 arqué. inde. ☉ (écon.)
 à grand étendard. Antilles. ☉
 caracolle. inde. s. ch. ♀ (orn.)
 paniculé. Am. s. ☿
 à rayons. ceylan. ☉
 pourpre. Antilles. ☉
 nain. inde. ☉
 à grandes stipules. inde. ☉
 à graines rondes. inde. ☉

ERYTHRINA

- herbacea L.
 corallodendrum L.
 abyssinica *Encycl.*
 aculeatissima.
 crista-galli *Willd. sp.* }
 laurifolia *Jacq. obs.* }

CLITORIA

- ternatea L.
 — alba.
 heterophylla *Encycl.*
 brasiliana L.
 virginiana L.
 glabella
 galactia glabella *Mich. Fl.* }

GLYCINE

- monoica L.
 caribæa *Jacq. Ic.*
 tomentosa L.
 bituminosa L.
 apios L.
 frutescens L.
 rubicunda *Bot. Mag.* }
 kennedia rubicunda *Vent.* }
 Malm. }
 bimaçulata *Bot. Mag.* }
 kennedia monophylla *Vent.* }
 Malm. }
 coccinea *Bot. Mag.* }
 kennedia coccinea *Vent.* }
 Malm. }

ABRUS

- precatorius *s. veg.* }
 glycine abrus L. }

AMORPHA

- fruticosa L.
 pumila *Mich. Fl.*

PISCIDIA

- erythrina L.

ROBINIA

- pseudo-acacia L.
 inermis.
 viscosa *Vent. H. cels.*
 hispida L. *Mant.*
 altagana *L'her. stirp.*

ERYTHRINA

- herbacé. caroline. or. ♀
 arbre de corail. Ant. s. ch. ♀
 d'Abyssinie. s. ch. ♀
 très-épineux. s. ch. ♀
 crête-de-coq. Brésil. s. ch. ♀

CLITORIA

- de Ternate. inde. s. ch. ♂
 — à fleurs blanches.
 à feuilles var. inde. s. ch. ♀
 du Brésil. ☉
 de Virginie. ☉
 glabre. Am. s. ♀

GLYCINE

- monoïque. Am. s. ♀
 des Antilles. s. ch. ♀
 cotonneux. Am. s. ♀
 bitumineux. cap. or. ♀
 apios. Am. s. ♀
 arbrisseau. Am. s. ♀ (orn.)
 à fl. rouges. N. Holl. or. ♀ (orn.)
 à deux taches. N. Holl. or. ♀
 écarlate. N. Holl. or. ♀

ABRUS

- à chapelet. Antilles. s. ch. ♀

AMORPHA

- faux indigo. Am. s. ♀ (orn.)
 nain. Am. s. ♀

PISCIDIA

- erythrina. Antilles. s. ch. ♀

ROBINIA

- faux acacia. Am. s. ♀ (orn.)
 sans épines. ♀ (orn.)
 visqueux. Am. s. ♀ (orn.)
 acacia rose. Am. s. ♀ (orn.)
 altagana. Daouric. ♀ (orn.)

caragana L.
pygmaea L.
frutescens L.
chamlagu l'her. stirp.
spinosa L. *Maunt.*
halodendron L. *f.*
squamata *Vahl, symb.*

COLUTEA

arborescens L.
alepica *Encycl.* }
pocockii *Willd. sp.* }
orientalis. *Encycl.* }
cruenta H. K. }
media *Willd. Enum.*
frutescens L.

LESSERTIA

perennans *Dec. Astr.* }
colutea perennans s. *veg.* }
annua *Dec. Astr.* }
colutea herbacea L. }

PHACA

bœtica L.
astragalina *Dec. Astr.* }
Astragalus alpinus L. }
alpina L.

OXYTROPIS.

campestris *Dec. Astr.* }
Astragalus campestris L. }
pilosa *Dec. Astr.* }
Astragalus pilosus L. }
deflexa *Dec. Astr.* }
Astragalus deflexus *Pallas,* }
Astr. }
hians *Jacq. ic.* }
parviflorus *Encycl.* }

ASTRAGALUS.

1. *Stipulis caulinis ; floribus rubris.*

austriacus L.
annularis *Forsk. ægypt.* }
maculatus *Encycl.* }
subulatus *Desf. Atl.* }
stella s. *veg.*
sesameus L.

caragana. sibérie. ♀ (orn.)
grêle. sibérie. ♀
arbrisseau. sibérie. ♀
chamlagu. chine. ♀ (orn.)
épineux. sibérie. ♀
saliné. sibérie. ♀
écailleux. Antilles. s. ch. ♀

BAGUENAUDIER

en arbre. F. m. ♀ (orn.)
d'Alep. orient. ♀ (orn.)
d'Orient. ♀ (orn.)
hybride. ♀
d'Ethiopie. cap. or. ♂ (orn.)

LESSERTIA

vivace. sibérie. ♀
annuel. cap. ☉

PHACA

de Portugal. or. ♀
faux Astragale. F. ♀
des Alpes. ♀

OXYTROPIS

des champs. F. ♀
velu. Alpes. ♀
à fruit pendant. sibérie. ♀

ASTRAGALE.

1. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs rouges.

d'Autriche. F. m. ☿
annulaire. Afr. s. ☉
étoilé. F. m. ☉
à fleurs sessiles. F. m. ☉

vesicarius L.
 pentaglottis L. *Mant.*
 purpureus *Encycl.*
 hypoglottis L. *Mant.*
 glaux L.
 onobrychis L.
 — major.
 hispidulus *Dec. Astr.*
 sulcatus L.

vésiculeux. Alpes. Ψ
 pentaglotte. barbarie. or. $\mathcal{L}$
 pourpre. F. m. $\mathcal{L}$
 hypoglotte. F. $\odot$
 glaux. Esp. $\odot$
 onobrychis. F. $\mathcal{L}$
 — de Sibérie.
 hérissé. égypte.
 sillonné. sibérie. Ψ

2. *Stipulis caulinis ; floribus ochroleucis.*

bœticus L.
 depressus L.
 epiglottis L.
 contortuplicatus L.
 trimestris L.
 hamosus L.
 reptans *Willd. H. Ber.*
 glyciophyllos L.
 cicer L.
 galegiformis L.
 asper *Jacq. Ic.*
 chloranthus *Pallas Astr.* }
 canadensis L.
 uliginosus L.
 odoratus *Encycl.*
 falcatus *Encycl.*
 christianus L.
 tomentosus *Encycl.*
 alopecuroides L.
 narbonensis *Gouan, Ill.*

2. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs d'un blanc jaune.

de Portugal. $\odot$
 déprimé. F. $\mathcal{L}$
 épiglotte. F. $\odot$
 recroquevillé. sibérie. $\odot$
 hâtif. égypte. $\odot$
 en hameçon. F. m. $\odot$
 rampant. Mexique. or. $\mathcal{L}$
 à feuilles de réglisse. F. $\mathcal{L}$
 à gousse ronde. F. $\mathcal{L}$
 caléga. sibérie. $\mathcal{L}$

rude. sibérie. $\mathcal{L}$
 de Canada. $\mathcal{L}$
 des marais. sibérie. Ψ
 odorant. orient. Ψ
 falciforme. Russie. $\mathcal{L}$
 de Judée. or. $\mathcal{L}$
 cotonneux. égypte. or. Ψ
 queue-de-renard. sibérie. $\mathcal{L}$
 de Narbonne. F. m. Ψ

3. *Stipulis petiolo adhaerentibus ; inermes.*

caprinus L.
 exscapus L.
 incanus L.
 monspesulanus L.

3. Stipules adhérentes au pétiole ; feuilles non épineuses.

odorant. barbarie. or. Ψ
 sans tige. suisse. Ψ
 blanc. F. m. Ψ
 de Montpellier. Ψ

4. *Spinescentes.*

longifolius *Encycl.*
 massiliensis *Encycl.* }
 tragacantha L. }
 sempervirens *Encycl.* }
 aristatus *Her. stirp.* }
 tragacantha *Vill.* }
 delph.

4. Feuilles terminées en épine.
 à long. feuilles. orient. or. $\mathfrak{h}$
 de Marseille. F. m. $\mathfrak{h}$

toujours vert. F. $\mathfrak{h}$

BISERRULA

pelecinus L.

GLYCYRRHIZA

echinata L.

glabra L.

fœtida Desf. Atl.

GALEGA

officinalis L.

orientalis Encycl.

rosea Encycl.

pulchella scop. insub. }

stricta H. K. }

cinerea L.

coronillæfolia.

caribæa Jacq. Am.

pubescens Encycl.

longifolia Jacq. Ic.

clitoria micrantha scop. ins. }

INDIGOFERA

viscosa Encycl.

tinctoria L.

Anil L. Mant.

argentea l'her. stirp. }

glaucæ Encycl. }

psoraloides Willd. sp.

cytisoides s. reg.

macrostachya Vent. Malm.

australis Willd. sp.

enneaphylla L. Mant.

LATHYRUS.

1. *Pedunculis unifloris.*

Aphaca L.

nissolia L.

axillaris Encycl. }

sphæricus Retz. obs. }

cicera L.

sativus L.

setifolius L.

tumidus Encycl.

2. *Pedunculis bifloris.*

clymenum L.

articulatus L.

odoratus L.

tingitanus L.

annuus L.

BISERRULA

en rateau. barbarie. ☉

RÉGLISSE

hérissée. Tartarie. ☿

officinale. F. ☿ (méd.)

fétide. barbarie. or. ☿

GALÉGA

officinal. F. ☿

d'Orient. ☿

rose. cap. or. ♀

élégant. cap. or. ♀

cendré. Antilles. ☉

à feuell. de coronille, s. ch. ♀

des Antilles, s. ch. ♀

pubescent. Antilles, s. ch. ♀

à long. feuilles. Ant. s. ch. ♀

INDIGOTIER

visqueux. Antilles, s. ch. ☿

des teintur. inde. s. ch. ♀ (écon.)

Anil. inde. s. ch. ♂ (écon.)

argenté. orient. or. ♀ (écon.)

faux psoraléa, cap. or. ♀

faux cytise. cap. or. ♀

à grands épis. chine. or. ♀

austral. N. Holl. or. ♀

à neuf feuilles. inde. ☉

GESSE.

1. Pédoncules à une fleur.

Aphaca. F. ☉

de Nissolle. F. ☉

axillaire. F. m. ☉

sillonée. Esp. ☉

cultivée. F. ☉ (écon.)

à feuilles étroites. F. m. ☉

renflée. ☿

2. Pédoncules à deux fleurs.

d'Espagne. ☉

articulée. F. m. ☉

odorante. ceylan. ☉ (orn.)

de Tanger. ☉

jaune. F. m. ☉

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L.
 tuberosus L.
 pratensis.
 sylvestris L.
 latifolius L.
 palustris L.

PISUM

sativum L.
 — ecortatum.
 — umbellatum.
 arvense L.
 maritimum L.
 ochrus L.

OROBUS

lathyroides L.
 vernus L.
 luteus L.
 tuberosus L.
 varius Bot. Magaz.
 albus L. f.
 sylvaticus L.
 niger L.
 tomentosus.
 Lathyrus tomentosus Cav. Ic. }
 vicia fruticosa Willd. sp. }

VICIA.

1. *Pedunculis elongatis.*

pisiformis L.
 dumetorum L.
 sylvatica L.
 cracca L.
 onobrychioides All. ped.
 atropurpurea Desf. Atl.
 benghalensis L.
 monanthos.
 Ervum monanthos L. }
 Ervilia Willd. sp. }
 Ervum Ervilia L. }

2. *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

sepium L.
 sativa L.
 — angustifolia.
 peregrina L.

3. *Pédoncules à plusieurs fleurs.*

velue. F. ☉
 tubéreuse. F. ♀ (écon.)
 des prés. F. ℥
 sauvage. F. ℥
 à larges feuilles. F. m. ♀
 des marais. F. ℥

POIS

cultivé. F. ☉ (écon.)
 — sans parchemin.
 — à bouquets.
 des champs. F. ☉
 maritime. F. ♀
 ailé. F. ☉

OROE

à feuilles de cresse, sibérie. ℥
 printanier. F. ♀
 jaune. Alpes. ♀
 tubéreux. F. ♀
 bigarré. Italie. ℥
 blanc. Autriche. ♀
 des bois. Alpes. ℥
 noir. F. ℥

cotonneux. Pérou. s. ch. ♀

VESCE.

1. *Pédoncules allongés.*

pisiforme. F. ♀
 des buissons. F. ♀
 des bois. F. ♀
 à fleurs nombreuses. F. ♀
 à feuil. de sainfoin. Alpes. ☉
 brun-pourpre. Barbarie. ☉
 du Bengale. ☉
 à une fleur. F. ☉

Ers. F. ☉

2. *Fleurs axillaires, presque sessiles.*

des haies. F. ℥
 cultivée. F. ☉ (écon.)
 — à feuilles étroites.
 étrangère. F. ☉

torulosa.
 lathyroides L. }
 ervum soloniense L. (ex *willd.*) }
 lutea L.
 hybrida L.
 pannonica Jacq. Austr.
 narbonensis L.

FABA

major.
 — minor.
 — viridis.

ERVUM

hirsutum L.
 tetraspermum L.
 lens L. }
 cicer lens *willd. sp.* }
 — minor.

CICER

arietinum L.

IV. *Legumen articulatum ; articulis monospermis.*

SCORPIURUS

vermiculata L.
 muricata L.
 sulcata L.

ORNITHOPUS

perpusillus L.
 compressus L.
 scorpioides L.

HIPPOCREPIS

unisiliquosa L.
 multisiliquosa L.
 comosa L.
 balearica Jacq. Ic.

CORONILLA

emerus L.
 valentina L. }
 stipularis *Encycl.* }
 glauca L.
 juncea L.
 minima L.
 varia L.
 globosa *Encycl.*
 cretica L.
 securidaca L.

bosselée. ☉

printanière. F. ☉

jaune. F. ☉

hybride. F. ☉

de Hongrie. ☉

de Narbonne. ☉

FÈVE

de marais. perse. ☉ (écon.)

— Féverole.

— verte.

LENTILLE

velue. F. ☉

à quatre graines. F. ☉

cultivée. F. m. ☉ (écon.)

— petite.

CICER

pois-chiche. orient. ☉

IV. Gousse articulée ; articulations monospermes.

CHENILLETTE

écailleuse. F. m. ☉

hérissée. F. m. ☉

sillonée. F. m. ☉

PIED-D'OISEAU

petit. F. ☉

comprimé. F. m. ☉

queue-de-scorpion. F. m. ☉

HIPPOCRÉPIS

à gousses solitaires. F. m. ☉

à plusieurs gousses. F. m. ☉

des champs. F. ♀

de Mahon. or. ♀

CORONILLE

éméris. Alpes. ♀ (orn.)

à grandes stipules. F. m. or. ♀

glauque. F. m. or. ♀

jonciforme. F. m. or. ♀

petite. F. ♂

bigarrée. F. ♂ (orn.)

globuleuse. orient. or. ♂

de Crète. ☉

à gousses plates. F. ☉

MEDYSARUM.

1. *Foliis simplicibus.*

maculatum L.
gangeticum L.
vaginale L.
vespertilionis L. f.

triquetrum L.

2. *Foliis ternatis.*

junceum L.
coriaceum.
canadense L.
canescens L. ?
marilandicum L.
diffusum.
gyrans L. f.

3. *Foliis pinnatis.*

alpinum L.
obscurum L.
coronarium L.
flexuosum L.
fruticosum L. f.
muricatum Jacq. ic.
lanuginosum.
capitatum Desf. Atl.
onobrychis L.
saxatile L.
caput-galli L.
crista-galli s. veg.

ÆSCHINOMENE

grandiflora L.
coronilla grandiflora Willd. }
sp. }
sesban L.
coronilla sesban Willd. sp. }
picta Cav. ic. }
coronilla picta Willd. sp. }
fusca.

℞. Corolla papilionacea ; legumen capsulare, submonospermum sapè, non dehiscens.

DALBERGIA.

latisiliqua Pers. syn.

GEOFFRÆA

inermis Swartz. Prodr.

SAINFŒIN.

1. Feuilles simples ;

panaché. inde. ☉
du Gange. inde. ☉
à gaines. inde. ☉
Aile - d'oiseau. cochinchine.
s. ch. ♂
triangulaire. inde. s. ch. ♀

2. Feuilles ternées.

effilé. sibérie. ℥
à feuilles coriaces. or. ♀
de Canada. ℥
blanchâtre. Am. s. or. ℥
de Mariland. ℥
étalé. s. ch. ♀
oscillant. Bengale. s. ch. ♂

3. Feuilles pennées.

des Alpes. F. ℥
à fruit lisse. Alpes. ℥
d'Espagne. ♂ (orn. écon.)
tortueux. orient. ☉
arbrisseau. sibérie. ♀
hérissé. Afr. ℥
laineux. orient. ℥
à fleurs en tête. Alger. ☉
cultivé. F. (écon.)
des rochers. Alpes. ℥
tête-de-coq. F. m. ☉
crête-de-coq. orient. ☉

ÆSCHINOMÈNE

à grandes fleurs. inde. s. ch. ♀
sesban. Égypte. s. ch. ♂
tacheté. N. esp. s. ch. ♂
à fleurs brunes. s. ch. ♀

V. Corolle papilionacée ; gousse capsulaire à une loge, ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

DALBERGIA

à gousse large. Ant. s. ch. ♀

GÉOFFRÆA

sans épines. Antilles. s. ch. ♀

PTEROCARPUS
ecastaphyllum willd. sp.

PTÉROCARPUS
à feuilles simples. Ant. s. ch. ♀

SECURIDACA
scandens L.
volubilis willd. sp. }

SÉCURIDACA
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

*Germen simplex ; fructus unilocularis ;
monospermus.*

ANACARDIUM
occidentale L.

ANACARDE
*d'Occident ou noix d'acajou.
Antilles. s. ch. ♀ (écon.)*

MANGIFERA
indica L.

MANGUIER
cultivé. ind. s. ch. ♀ (écon.)

RHUS.

SUMAC.

1. *Foliis pinnatis.*

coriaria L.
typhinum L.
glabrum H. K.
vernix L.
copallinum L.
semialatum Syst. veg.
javanicum L.

1. Feuilles pennées.

des corroyeurs. F. m. ♀ (écon.)
de Virginie. ♀ (orn.)
glabre. Am. s. ♀ (orn.)
vernix. Am. s. ♀
ailé. Am. s. ♀
semi-ailé. ind. s. ch. ♀
de Java. s. ch. ♀

2. *Foliis ternatis.*

Toxicodendrum L.
aromaticum H. K.
tomentosum L.
dentatum Thunb. prodr.
cuneifolium L. f.
glaucum.
Rhezera Desf. Atl.
Rhamnus pentaphyllus L. }
oxyacanthoides.
angustifolium L.
viminale H. K.
heterophyllum.
levigatum L.
lucidum L.
villosum L. f.
undulatum Jacq. H. sch.
nervosum.

2. Feuilles ternées.

vénéneux. Am. s. ♀
aromatique. Am. s. ♀
cotonneux. cap. or. ♀
denté. cap. or. ♀
cunéiforme. cap. or. ♀
glaucum. cap. or. ♀
Rhezera. Alger. or. ♀
à f. d'aubépine. orient. or. ♀
à feuilles étroites. cap. or. ♀
flexible. cap. or. ♀
à feuilles variables. or. ♀
lisse. cap. or. ♀
luisant. cap. or. ♀
velu. cap. or. ♀
ondulé. cap. or. ♀
veiné. cap. or. ♀

3. *Foliis simplicibus.*

cotinus L.

CNEORUM

tricoccum L.

COMOCLADIA

ilicifolia swartz. *Prodr.*

AMYRIS

polygama cav. *rc.*maritima Jacq. *Am.*

SCHINUS

molle L.

PISTACIA

terebinthus L.

trifolia L. }

vera L. }

chia.

atlantica Desf. *Atl.*

Lentiscus L.

BURSERA

gummifera L.

SPONDIAS

monbin s. *veg.* }

purpurea L. }

cytherea *Encycl.* }dulcis *Willd. sp.* }myrobalanus s. *veg.* }

lutea L.

II. *Germen multiplex; fructus multica-*
sularis.

AYLANTUS

glandulosa Desf. *Acad.*

BRUCEA

ferruginea l'her. *stirp.*

FAGARA

pterota L.

microphylla.

ZANTHOXYLUM

fraxineum *Willd. sp.* }cauliflorum *Mich. Fl.* }

clava-herculis L.

3. *Fenilles simples.*

Fustet. F. 3 (orn. teint.)

CNÉORUM

à trois coques. F. m. 3

COMOCLADIA

à f. de houx. Ant. s. ch. 3

AMYRIS

polygame. chili. s. ch. 3

maritime. Antilles. s. ch. 3

SCHINUS

mollé. pérrou. or. 3 (orn.)

PISTACHIER

Térébinthe. F. m. 3

cultivé. orient. or. 3 (écon.

méd.)

de Chio. or. 3

de l'Atlas. or. 3 (écon.)

Lentisque. orient. or. 3 (écon.)

BURSÉRA

gommifère. Antilles. s. ch. 3

SPONDIAS

monbin. inde. s. ch. 3

Arbre de Cythère. île de Fr.

s. ch. 3

jaune. Antilles. s. ch. 3

II. Plusieurs ovaires; autant de capsules.

AYLANTE

glanduleux. japon. 3 (orn.)

BRUCÉA

ferrugineux. Afr. s. ch. 3

FAGARA

à f. de jasmin. Ant. s. ch. 3

à petites feuilles. Ant. s. ch. 3

ZANTHOXYLUM

à feuilles de Frêne. Am. s. 3

à gros aiguillons. Ant. s. ch. 3

PTELEAtrifoliata *L.***DODONÆA**

viscosa *L. f.* }
 ptelea viscosa *L.* }
 angustifolia *L. f.*
 triquetra *Willd. sp.*

AVERRHOAbilimbi *L.***JUGLANS**

regia *L.*
 — serotina.
 fraxinifolia *Encycl.*
 alba *L.*
 olivæformis *H. K.* }
 cylindrica *Encycl.* }
 cinerea *L.*
 nigra *L.*

ORDO XIII.**RHAMNOIDEÆ.**

X. Stamina petalis alterna ; fructus capsularis.

STAPHYLÆA

pinnata *L.*
 trifoliata *L.*

EVONYMUS

europæus *L.*
 latifolius *L.*
 americanus *L.*
 atropurpureus *Jacq. hort.*
 verrucosus *Jacq. Austr.*

CELASTRUS

scandens *L.*
 cassinoides *l'her. sert.*
 octogonus *l'her. sert.*
 lucidus *l'her. sert.* }
 cassine concava *Encycl.* }
 buxifolius *L.*
 pyracantha *L.*
 senegalensis *Encycl.* }
 phyllacanthus *l'her. sert.* }
 multiflorus *Encycl.*

PTÉLÉAà trois feuell. *Am. s. h (orn.)***DODONÆA**

visqueux. *inde. s. ch. h*
 à feuell. étroites. *inde. s. ch. h*
 triangulaire. *N. Holl. or. h*

AVERRHOAbilimbi. *inde. s. ch. h***NOYER**

cultivé. *Asie. h (écon.)*
 — tardif.
 à feuilles de Frêne. *Asie. h*
 blanc. *Am. s. h*
 pacanier. *Am. s. h (écon.)*
 cendré. *Am. s. h*
 noir. *Am. s. (écon.)*

ORDRE XIII.**RHAMNOÏDES.**

I. Étamines alternes avec les pétales ; une capsule.

STAPHYLÉA

à feuilles pennées. *F. h (orn.)*
 à f. ternées. *Am. s. h (orn.)*

FUSAIN

d'Europe. *F. h (écon. orn.)*
 à larges feuilles. *F. h (orn.)*
 d'Amérique. *Am. s. h*
 noir-pourpre. *Am. s. h*
 galeux. *Autriche. h*

CÉLASTRUS

grim pant. *Am. s. h*
 à f. de cassiné. *canar. or. h*
 octogône. *Pérou. s. ch. h*
 luisant. *cap. or. h*
 à feuilles de nui s. *cap. or. h*
 à épines rouges. *cap. or. h*
 du Sénégal. *s. ch. h*
 à fleurs nombr. *cap. or. h*

II. *Stamina petalis alterna ; drupa aut bacca.*

RUBENTIA
mauritiana.

CASSINE
capensis L. Mant.
maurocena L.
xylocarpa Vent. choix de pl.

ILEX

aquifolium L.
— crassifolium.
— ferox.
— serratum.
— variegatum.
balearica.
maderiensis Encycl. }
perado H. K. }
cassine L.
canadensis Mich. Fl.
— angustifolia.
æstivalis Encycl. }
prinoides H. K. }
vomitoria H. K. }
cassine peragua L. }

PRINOS

verticillatus L.
glaber L.
lucidus H. K.

III. *Stamina petalis opposita ; fructus drupaceus.*

RHAMNUS.

1. *Spinosi.*

catharticus L.
infectorius Willd. sp.
thecozans L. Mant.
lycioides L.
oleoides L.
saxatilis Jacq. Austr.
erythroxylum Pallas, Ross.

2. *Inermes.*

frangula L.
colubrinus L.

II. *Étamines alternes avec les pétales ; un drupe ou une baie.*

RUBENTIA
bois d'olive. île de F. s. ch. ♀

CASSINÉ
du Cap. or. ♀
à f. convexes. cap. or. ♀
à fruit osseux. Ant. s. ch. ♀

HOUX

commun. F. ♀ (orn. écon.)
— à feuilles épaisses.
— hérisson.
— en scie.
— panaché.
de Mahon. ♀
de Madère. or. ♀
à f. de Laurier. carol. or. ♀
de Canada. ♀
— à feuilles étroites.
d'été. caroline. or. ♀
purgatif, Apalachine. Floride.
or. ♀

PRINOS

verticillé. Am. s. ♀
glabre. Am. s. ♀
luisant. ♀

III. *Étamines opposées aux pétales ; un drupe.*

NERPRUN.

1. *Tiges épineuses.*

purgatif. F. ♀ (arts, méd.)
graine d'Avignon. F. m. ♀
(teint.)
de Chine. or. ♀
à f. linéaires. F. m. or. ♀
à feuell. d'olivier. esp. or. ♀
des rochers. Alpes. ♀
à longues feuilles. Sibérie. ♀

2. *Tiges sans épines.*

Bourgène. F. ♀ (arts.)
ferrugineux. Antilles, s. ch. ♀

hybridus *l'her. sert.* }

burgundiacus. }

alpinus *L.*

alnifolius *l'her. sert.*

pumilus *Jacq. ic.*

glandulosus *H. K.*

ellipticus *H. K.*

ceanothus reclinatus *l'her. sert.* }

Alaternus *L.*

— angustifolius.

— hispanicus.

— rotundifolius.

— variegatus.

ZIZYPHUS

sinensis *Encycl.*

inguanea *Encycl.*

Lotus *Desf. Atl.*

sativa. }

vulgaris *Encycl.* }

spina-christi.

volubilis *L. f.*

PALIURUS

aculeatus.

PITTOSPORUM

undulatum *Vent. H. cels.*

coriaceum *Andr. rep.*

revolutum *H. K.*

Tobira *H. K.*

Evonymus Tobira *Willd. sp.* }

sinense.

ELÆODENDRUM

orientale *Jacq. ic.* }

rubentia longifolia. }

australe *Vent. Malm.*

Argan *Retz. obs.*

hybride. ♀

des Alpes. *F.* ♀

à feuilles d'aune. *Am. s.* ♀

nain. Alpes. ♀

glanduleux. canaries. *or.* ♀

elliptique. Antilles. *s. ch.* ♀

Alaterne. *F. m.* ♀ (orn.)

— à feuilles étroites.

— d'Espagne.

— à feuilles rondes.

— panaché.

JUJUBIER

de Chine. *or.* ♀

des Inguanes ou croc-de-chien.

Antilles. *s. ch.* ♀

des Lotophages. Tunis. *or.* ♀

cultivé. orient. ♀ (écon. méd.)

Napéca. Égypte. *s. ch.* ♀ (écon.)

sarmenteux. *Am. s.* ♀

PALIURUS

épineux. *F. m.* ♀

PITTOSPORUM

ondulé. *N. Holl. or.* ♀

coriace. madère. *or.* ♀

recourbé. *N. Holl. or.* ♀

Tobira. chine. *or.* ♀

de Chine. *or.* ♀

ELÆODENDRUM

d'Orient, madagascar. *s. ch.* ♀

austral. *N. Holl. or.* ♀

Argan. maroc. *or.* ♀ (écon.)

IV. Stamina petalis opposita ; fructus tricoccus.

IV. Étamines opposées aux pétales ; fruit à trois coques.

POMADERRIS

apetala *Bill. N. Holl.*

POMADERRIS

apétale. *N. Holl. or.* ♀

COLLETIA

ephedra *Vent. ch. de Pl.*

COLLÉTIA

sans feuilles. Pérou. *or.* ♀

CLEANOTHUS

africanus L.
americanus L.
azureus.
discolor *vent. Malm.*
macrophyllus.

PHYLICA

ericoides L.

axillaris *Lamk, ill.*
linearis.
plumosa L.
pubescens H. K.
squarrosa.
myrtifolia *encycl.* }
paniculata *willd. sp.* }
cordata L.
thymifolia *vent. Malm.*

Genera *Rhmnoideis affinia.*

BRUNIA

lanuginosa L.
capitata.

LASIOPETALUM

ferrugineum *Andr. rep.*

GOUANIA

integrifolia *encycl.*

AUKUBA

japonica *Thunb. Jap.*

CÉANOTHUS

d'Afrique. cap. or. ♀
d'Amérique. Am. s. ♀
azuré. ♀
de deux couleurs. N. Holl. or. ♀
à larges feuilles. ♀

PHYLICA

Bryère du Cap. cap. or. ♀
(orn.)
axillaire. cap. or. ♀
à feuilles linéaires. cap. or. ♀
plumeux. cap. or. ♀
pubescent. cap. or. ♀
à feuilles roides. cap. or. ♀
à feuilles de Myrte. cap. or. ♀
à feuilles en cœur. cap. or. ♀
à f. de *Thym.* N. Holl. or. ♀

Genres qui ont de l'affinité avec les
Nerprun.

BRUNIA

lanugineux. cap. or. ♀
à fleurs en tête. cap. or. ♀

LASIOPETALUM

ferrugineux. Bot. Bay. or. ♀

GOUANIA

à feuilles entières. s. ch. ♀

AUKUBA

du Japon. ♀

CLASSIS XV.**DICOTYLEDONES**

APETALÆ.

(*Stamina idiogyna.*)

ORDO I.**EUPHORBIACEÆ.**

I. *Styli plures definiti, sapius 3.*

MERCURIALIS

perennis L.

CLASSE XV.**DICOTYLÉDONS**

APÉTALES.

(Fleurs unisexuelles.)

ORDRE I.**EUPHORBIACÉES.**

I. Plusieurs styles définis, souvent trois.

MERCURIALE

vivace. F. K

annua L.
tonnentosa L.
elliptica *Encycl.*

annuelle. F. ☉ (méd.)
cotonneuse. F. m. ☿
elliptique. Portugal. or. ♄

EUPHORBIA.

1. *Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.*

hypericifolia L.
maculata Jacq. Hort.
picta Jacq. Ic.
pilulifera L.
capitata *Encycl.* }
thymifolia L.
canescens L.
chamæsyce L.
replis L.
prunifolia Jacq. H. Sch.

2. *Herbaceæ; umbella trifida.*

micrantha Willd. sp.
replus L.
falcata L.
exigua L.

3. *Herbaceæ; umbella quadrifida.*

Lathyris L.

4. *Herbaceæ; umbella quinquefida.*

purpurata Thuil. Fl.
flavicomma Dec. cat.
alepica L.
segetalis L.
Helioscopia L.
serrata L.
verrucosa L.
platiphylla L.
litterata Jacq. Ic.
buplevroides Desf. Atl.
orientalis L.
hyberna L.
sylvatica L.

5. *Herbaceæ; umbella multifida.*

Esula L.
virgata Wald. et Kitt. Hung.
illyrica *Encycl.*
linariæfolia *Encycl.*

EUPHORBE.

1. Tiges herbacées; ombelle bifide ou nulle.

à f. d'*hypericum*. inde. ☉
tacheté. Am. s. ☉
panaché. Am. m. s. ch. ♄
à globules. inde. ☉
à feuilles de *Thym*. inde. ☉
blanchâtre. Esp. ☉
chamésycé. F. m. ☉
réplis. F. m. ☉
à feuilles de *Prunier*. ☉

2. Tiges herbacées; ombelle à trois rayons.

à petites fleurs. Perse. ☉
réplus. F. ☉
falciforme. F. ☉
menu. F. ☉

3. Tiges herbacées; ombelle à quatre rayons.

Épurgé. F. ♂ (méd.)

4. Tiges herbacées; ombelle à cinq rayons.

purpurin. F. ☉
jaune d'or. F. ♄
d'Alep. syrie. or. ♄
des moissons. F. ☉
réveille-matin. F. ☉
en scie. F. ♄
tuberculeux. F. ♄
à feuilles larges. F. ☉
bariolé. ☉
à f. de *Bupleur*. Alger. or. ♄
d'Orient. ♄
à feuilles de *Lauréole*. F. ♄
des bois. F. ♄

5. Tiges herbacées; ombelle à plus de cinq rayons.

Esule. F. ♄
effilé. Hongrie. ♄
de Dalmatie. ♄
à feuilles de *Linaires*. F. ♄

pinifolia *Encycl.*
 cyparissias *L.*
 palustris *L.*
 salicifolia *Dec. itin.*
 myrsinites *L.*
 amygdaloides *Encycl.* }
 nicensis *Jacq. ic.* }

6. *Caule suffruticoso aut fruticoso.*

characias *L.*
 paralias *L.*
 rithyusa *L.*
 spinosa *L.*
 mauritanica *L.*
 virgata.
 dendroides *L.*
 atropurpurea *Dec. cat.*
 longifolia *Encycl.* }
 mellifera *H. K.* }
 linearis *Retz. obs. et Encycl.*
suppl.
 cotinifolia *L.*
 verticillata.
 heterophylla *L.*

7. *Carnosæ inermes.*

tithymaloides *L.* }
 myrtifolia *Encycl.* }
 lophogona *Encycl.*
 caput-medusæ *L.*
 tridentata *Encycl.* }
 anacantha *H. K.* }

8. *Carnosæ spinosæ.*

uncinata *Dec. pl. Gr.*
 canariensis *L.*
 histrix *Jacq. H. sch.* }
 loricata *Encycl.* }
 neriifolia *L.*
 officinarum *L.*
 mamillaris *L.*
 polygona.

PHYLLANTHUS.

1. *Fruticosa.*

grandifolia *L.*
 brasiliensis *Encycl.*
 reticulata *Encycl.*

à feuilles de pin. *F. Z.*
 petit cyprès. *F. Z.*
 des marais. *F. Z.*
 à feuilles de saule. *F. Z.*
 myrsinites. *F. m. Z.*
 à feuilles d'Amandier. *F. Z.*

6. Tige lignense ou presque ligneuse.

à fleurs brunes. *F. m. Z.*
 maritime. *F. Z.*
 à feuilles de Genévrier. *F. Z.*
 piquant. *F. m. or. Z.*
 de Mauritanie. *or. Z.*
 effilé. *Afr. or. Z.*
 en arbre. barbarie. *Z.*
 noir-pourpre. canaries. *or. Z.*
 mellifère. canaries. *or. Z.*
 linéaire. Antilles. *s. ch. Z.*
 à f. de Fustet. *Ant. s. ch. Z.*
 verticillé. Antilles. *s. ch. Z.*
 à feuilles var. *Ant. s. ch. Z.*

7. Tiges charnues, sans épines.

à feuilles ov. *Ant. s. ch. Z.*
 à crêtes. madagascar. *s. ch. Z.*
 tête-de-Méduse. *cap. s. ch. Z.*
 à trois dents. *cap. s. ch. Z.*

8. Tiges charnues, épineuses.

à crochets. *s. ch. Z.*
 des Canaries. *s. ch. Z.*
 hérissé. *cap. s. ch. Z.*
 à f. de Nérium. *inde. s. ch. Z.*
 des boutiques. *cap. s. ch. Z.*
 mamillaire. *cap. or. Z.*
 polygone. *cap. or. Z.*

PHYLLANTHUS.

1. Tiges ligneuses.

à grandes feuil. *Ant. s. ch. Z.*
 du Brésil ou bois enivrant.
s. ch. Z.
 à réseau. île de F. *s. ch. Z.*

2. *Herbacea.*

niruri L.
caroliniensis Mich. Fl.

KIRGANELIA

phyllanthoides.
virginica Encycl. suppl.
phyllanthus kirganelia Willd. }
sp.

XYLOPHYLLA

falcata Swartz, Prodr.
angustifolia Swartz, Prodr.
latifolia Swartz, Prodr.
ramiflora H. K.
obovata Willd. Enum. }
phyllanthus lucidus. }

KIGGELLARIA

africana L.

CLUTIA

pulchella L.
alaternoides L.
polygonoides L.
daphnoides Willd. sp.

ANDRACHNE

telephioides L.

AGYNEIA

impubes L. Mant.

BUXUS

sempervirens L.
 — *suffruticosa.*
 — *angustifolia.*
balearica Encycl.

SECURINEGA

nitida Pers. syn.

ADELIA

acitodon L. ?
acuminata Mich. Fl.
ovata.

RICINUS

communis L.

— *rutilans.*
viridis Willd. sp.
inermis Jacq. Ic.

2. *Tiges herbacées,*

niruri. inde. ☉.
de Caroline.

KIRGANÉLIA

à f. de phyllanthus. île de Fr.
s. ch. ♀

XYLOPHYLLA

falciforme. Antilles. s. ch. ♀
à f. étroites. Antilles. s. ch. ♀
à f. larges. Antilles. s. ch. ♀
à fleurs axillaires. Sibérie. ♀
ovale renversé. s. ch. ♀

KIGGELLARIA

d'Afrique. cap. or. ♀

CLUTIA

élégant. cap. or. ♀
à feuil. d'Alaterne. cap. or. ♀
à f. de polygonum. cap. or. ♀
daphnoïde. cap. or. ♀

ANDRACHNÉ

couché. orient. ♂

AGYNÉIA

glabre. chine. ☉

BUIS

toujours vert. F. ♀ (arts, orn.)
 — *nain.*
 — *à feuilles étroites.*
de Mahon. ♀

SÉCURINÉGA

à f. luisantes. île de F. s. ch. ♀

ADÉLIA

acitodon. Antilles. s. ch. ♀
acuminé. Am. s. ♀
ovale.

RICIN

commun. inde. ☉ (méd. écon. orn.)
 — *pourpre.*
vert. inde. ☉
à fruit lisse. inde. s. ch. ♀

JATROPHA

- curcas *L.*
 multifida *L.*
 napæifolia *Encycl.*
 gossypiifolia *L.*
 acuminata *Encycl.*
 panduræfolia *Andr. rep.* }

LOUREIRA

- cuneifolia *cav. ic.*
 mozinna spatulata *ortega, dec.* }

ALEURITES

- moluccana.
 ambinux *pers. syn.*
 croton moluccanum *L.* }

CROTON.**1. Fruticosa.**

- sebiferum *L.*
 penicillatum *vent. ch. de pl.*
 ciliato-glanduliferum *ortega, dec.* }

- punctatum *Jacq. ic.*
 balsamiferum *L. Mant.*
 lacerum.

2. Herbacea.

- dioicum *cav. ic.*
 argenteum *L.*
 tinctorium *L.*

- lobatum *L.*

ACALYPHA

- virginica *L.*
 alopecuroidea *Jacq. ic.*
 cuspidata *Jacq. H. sch.*
 virgata *L.*
 scabrosa *swartz, prodr.*

II. Stylus unicus.**TRAGIA**

- volubilis *L.*
 involucrata *L.*
 plumosa.

SAPIUM

- laurocerasum.

JATROPHA

- pignon-d'inde. *s. ch. ½ (méd.)*
 lacinié. Antilles. *s. ch. ½*
 à f. de Napéa. Ant. *s. ch. ½*
 à f. de cotonnier. Ant. *s. ch. ½*
 à f. pointues. cuba. *s. ch. ½*

LOUREIRA

- cunéiforme. Mexique. *s. ch. ½*

ALEURITÈS

- noix de Bancoul. inde. *s. ch. ½*

CROTON.**1. Tige ligneuse.**

- Arbre à suif. inde. *s. ch. ½*
 (écon.)

- pénicillé. cuba. *s. ch. ½*

- punctué. Antilles. *s. ch. ½*
 balsamique. Antilles. *s. ch. ½*
 lacéré. *s. ch. ½*

2. Tige herbacée.

- dioïque. Mexique. ☉
 argenté. Antilles. ☉
 des teinturiers ou tournesol.
 F. m. ☉ (écon.)

- lobé. Antilles. *s. ch. ♂*

ACALYPHA

- de Virginie. ☉
 queue-de-renard. ☉
 en pointe. caracas. *s. ch. ½*
 effilé. Antilles. *s. ch. ½*
 à feuilles rudes. Ant. *s. ch. ½*

II. Un style.**TRAGIA**

- sarmenteux. inde. *s. ch. ½*
 à involucre. inde. *s. ch. ½*
 plumeux. Antilles. *s. ch. ½*

SAPIUM

- à f. de Laurier-cerise. Antilles.
s. ch. ½

HURA

crepitans L.

DALECHAMPIA

villosa *Encycl.* }
 scandens L. }

SABLIER

élastique. Antilles. s. ch. ♀

DALÉCHAMPIA

sarmenteux. Antilles. s. ch. ⊙

ORDO II.**CUCURBITACEÆ.****GRONOVIA**

scandens L.

SICYOS

angulata L.

BRYONIA

dioica *Jacq. Austr.*
 africana L.
 palmata L.
 laciniosa L.
 pubescens.

MELOTHRIA

pendula L.

MOMORDICA

charantia L.
 luffa L.
 balsamina L.
 elaterium L.

CUCUMIS

colocynthis L.
 prophetarum L.
 anguria L.
 acutangulus L.
 melo L.
 — saccharinus.
 — cantalou.
 — viridis.
 chate L.
 nudaim L.
 sativus L.
 — minor.
 flexuosus L.

CUCURBITA

leucantha.
 — lagenaria.
 — latior.

ORDRE II.**CUCURBITACÉES.****GRONOVIA**

sarmenteux. vera-cruz. ⊙

SICYOS

anguleux. Am. s. ⊙

BRYONE

dioïque. F. ♀ (méd.)
 d'Afrique. cap. or. ♀
 palmée. ceylan. s. ch. ♂
 laciniée. ceylan. s. ch. ♂
 pubescente. s. ch. ♀

MÉLOTHRIA

à fruit pendant. Am. s. ⊙

MOMORDICA

charantia. inde. ⊙
 luffa. ceylan. ⊙
 balsamine. inde. ⊙
 concombre sauvage. F. m. ⊙

CONCOMBRE

coloquinte. barb. ⊙ (méd.)
 des prophètes. Arabie. ⊙
 d'Amérique. ⊙
 à angles aigus. inde. ⊙
 melon. Asie. ⊙ (alim. méd.)
 — brodé.
 — cantalou.
 — vert.
 Abdélaoui. égypte. ⊙
 orange. Afr. s. ⊙
 commun. ⊙ (alim.)
 — petit.
 serpent. inde. ⊙

COURGE

à fleur blanche. Am. m. ⊙
 — courgourde.
 — gourde.

— pyrotheca.
 — longa.
 pepo *L.*
 — luteus.
 — viridis.
 melopepo *L.*
 — verrucosus.
 — aurantiiformis.
 — pyriformis.
 — clypeatus.
 — radiatus.
 citrullus *L.*

TRICHOSANTHES
 Anguina *L.*

ORDO III.

PASSIFLORÆ.

PASSIFLORA.

1. *Foliis simplicibus.*
 maliformis *L.*

laurifolia *L.*
 quadrangularis *L.*

alata *H. K.*
 serratifolia *L.*
 cuprea *L.*

2. *Foliis bilobis.*
 normalis *L.*
 tuberosa *Jacq. H. Sch.*
 rubra *L.*
 biflora *Encycl.*

3. *Foliis trilobis.*
 ciliata *H. K.*
 punctata *L.*
 lutea *L.*
 suberosa *L.*
 minima *L.*
 heterophylla *H. K.*
 angustifolia *Willd. sp.*
 longifolia *Encycl.*
 glauca *Jacq. H. Sch.*
 adiantum *Willd. Enum.*
 glabra *Wendl. collect.*

— poire-à-poudre.
 — calebasse.
 pepon. ☉ (alim.)
 — jaune.
 — vert.
 mélopepon. ☉ (alim.)
 — tuberculeux.
 — orange.
 — pyriforme.
 — Bonnet-d'électeur.
 — Artichaux.
 Pastiche. orient. ☉ (alim.)

TRICHOSANTHES
 Anguina. chine. ☉

ORDRE III.

GRENADILLES.

GRENADILLE.

1. Feuilles simples.
 à gros fruit. Antilles. s. ch. ☿
 (alim.)
 à f. de Laurier. surin. s. ch. ☿
 quadrangulaire. Antilles. s. ch.
 ☿ (orn.)
 ailée. inde. s. ch. ☿ (orn.)
 à feuell. en scie. surin. s. ch. ☿
 cuivrée. bahama. s. ch. ☿

2. Feuilles bilobées.
 à lobes tronqués. Am. m. s. ch. ☿
 tubéreuse. Am. m. s. ch. ☿
 rouge. Antilles. s. ch. ☿
 à deux fleurs. Ant. s. ch. ☿

3. Feuilles trilobées.
 ciliée. Antilles. s. ch. ☿
 ponctuée. Pérou s. ch. ☿
 jaune. Virginie. or. ☿
 songueuse. Antilles. s. ch. ☿
 à petites fleurs. Ant. s. ch. ☿

à feuilles var. Ant. s. ch. ☿
 glauque. cayenne. s. ch. ☿
 adiantum. s. ch. ☿

holosericea L.
peltata Cav. Diss.
foetida L.
incarnata L.

4. *Foliis multilobis.*

cœrulea L.
filamentosa Cav. Diss.

CARICA

papaya L.
monoica Desf. Ann.
microcarpa Jacq. H. Sch.
cauliflora Jacq. H. Sch.

ORDO IV.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucro monophyllo reconditi.

FIGUS

carica L.
 — violacea.
mauritiana Encycl.
ulmifolia Encycl.
symphytifolia Encycl.
macrophylla
nymphæifolia L. Mant.

laurifolia Encycl. }
martinicensis Willd. sp. }
citrifolia Encycl. (non Willd.)
crassinervia

benghalensis L.
rubiginosa Vent. Malm. }
australis Willd. sp. }
populnea Willd. sp.
religiosa L.
racemosa L.
vestita.
phytolaccæfolia.
glaucophylla. }
cordata Thunb. Prodr. }
undulata.
pyrifolia.
arbutifolia. }
microcarpa L. f. }

veloutée. Mexique. s. ch. ♀
en bouclier. Antilles. s. ch. ♀
fétide. Antilles. s. ch. ♀
incarnate. Brésil. s. ch. ♀

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil. or. ♀ (orn.)
filamenteuse. Antilles. s. ch. ♀

PAPAYER

commun. Inde. s. ch. ♀
monoïque. s. ch. ♀
à petit fruit. Caracas. s. ch. ♀
à tige fleurie. Caracas. s. ch. ♀

ORDRE IV.

ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.

FIGUIER

cultivé. F. (écon.)
 — violet.
de l'Île de France. s. ch. ♀
à f. d'orme. Inde. s. ch. ♀
à f. de consoude. Inde. s. ch. ♀
à grandes f. N. Holl. or. ♀
à f. de Nymphéa. Caracas. s. ch. ♀

à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♀
à f. de citronnier. Ant. s. ch. ♀
à grosses nervures. Antilles. s. ch. ♀
du Bengale. s. ch. ♀

rouillé. N. Holl. or. ♀
à f. de peuplier. Ant. s. ch. ♀
des pagodes. Inde. s. ch. ♀
à grappes. Inde. s. ch. ♀
écailleux. s. ch. ♀
à f. de Phytolacca. s. ch. ♀

glaucue. Cap. s. ch. ♀
ondulé. Antilles. s. ch. ♀
à feuilles de poirier. s. ch. ♀
à f. d'Arbousier. Ant. s. ch. ♀

pumila L.
scandens *Encycl.* }
stipulata *Willd. sp.* }

DORSTENIA

contrayerva L.

II. Flores receptaculo communi multifloro
impositi, aut squamis involucrentibus
capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA

peltata L.

ARTOCARPUS

integrifolia L. f.

MORUS

alba L.
italica *Encycl.*
constantinopolitana.
nigra L.
rubra L.

BROUSSONETIA

papyrifera *Willd. sp.* }
morus papyrifera L. }

URTICA.1. *Foliis alternis.*

baccifera L.
nivea L.
canadensis L.

2. *Foliis oppositis.*

pumila L.
crassifolia *Willd. sp.*
cylindrica L.
cannabina L.
dioica L.
urens L.
pilulifera L.
Dodartii L.

FORSKALEA

tenacissima L. *Mant.*
angustifolia *Willd. sp.*

PARIETARIA

officinalis L.
arborea l'Her. *stirp.* }
urtica arborea L. f. }

à réseau. chine. s. ch. ♀

sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀

DORSTENIA

contrayerva. pérou. s. ch. ♀
(méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou
réunies en une tête accompagnée d'é-
cailles, ou distinctes et éparses.

CÉCROPIA

en bouclier. cayenne. s. ch. ♀

ARTOCARPUS

à f. entières. Antilles. s. ch. ♀

MURIER

blanc. Asie min. ♀ (écon.)
d'Italie. ♀ (écon.)
de Constantinople. ♀ (écon.)
noir. Asie min. ♀ (écon.)
rouge. Am. s. (écon.)

BROUSSONÉTIA

mârier à papier. chine. ♀
(écon.)

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Antilles. s. ch. ♀
cotonneuse. chine. or. ♀
de Canada. ♂

2. Feuilles opposées.

naine. Am. s. ♂
à f. épaisses. Ant. s. ch. ♀
cylindrique. Am. s. ♂
de Sibérie. ♀ (écon.)
dioïque. F. ♂
grièche. F. ⊙
à globules. F. ⊙
de Dodart. F. ⊙

FORSKALÉA

à larges feuilles. barbarie. ⊙
à feuilles étroites. Afr. ⊙

PARIÉTAIRE

officinale. F. ♀ (méd.)
en arbre. canaries. or. ♀

HUMULUS
lupulus L.

CANNABIS
sativa L.

THELIGONUM
cynocrambe L.

DATISCA
cannabina L.

Genera urticis affinia.

PIPER
medium Jacq. IC. }
plantagineum Encycl. }
aduncum L. }
scabrum Encycl. }
discolorum.
umbellatum L.
celtidifolium
tuberculatum Jacq. IC.
cuneifolium Jacq. IC.
magnoliæfolium Jacq. IC.
portulacoides Lmk Ill.

pereskiaefolium Jacq. IC.
blandum Jacq. IC.
rhomboidale.
suaveolens.
nitens.
pulchellum H. K.

IVA
frutescens L.

AMBROSIA
bidentata Mich. Fl.
artemisiæfolia L.
maritima L.
trifida L.
arborescens Encycl.
xanthium fruticosum L. f. }
franseria ambrosioides Cav. }
IC.

XANTHIUM
strumarium L.
orientale L.
spinosum L.

HOUBLON
cultivé. Z (écon.)

CHANVRE
cultivé. inde. O (écon.)

THÉLIGONUM
cynocrambé. F. O

DATISCA
chanvre de Crète. orient. Z

Genres qui ont de l'affinité avec les
Orties.

POIVRE
moyen. Antilles. s. ch. y
crochu. cayenne. s. ch. y
de deux couleurs. Ant. s. ch. y
ombellifère. Antilles. s. ch. y
à feuilles de celtis. s. ch. y
tuberculeux. Am. m. s. ch. y
cunéiforme. Antilles. s. ch. y
à f. de magnolia. Ant. s. ch. y
à f. de pourpier. ile de Fr.
s. ch. Z
à f. de Péreskia. Ant. s. ch. Z
à longs épis. Ant. s. ch. Z
rhomboïdal. s. ch. Z
odorant. s. ch. Z
vernissé. s. ch. Z
élégant. Antilles. s. ch. Z

IVA
arbrisseau. virginie. or. y

AMBROISIE
à deux dents. Am. s. Z
à feuilles d'Armoise. Am. s. Z
maritime. F. Z
à trois lobes. Am. s. O

en arbre. Pérou. or. y

LAMPOURDE
commune. F. O
d'Orient. O
épineuse. F. m. O

ORDO V.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

FOTHERGILLA

- alnifolia L. f.
— lanceolata.

ULMUS

- campestris L.
— latifolia.
— suberosa.
pedunculata Foug. Acad. }
effusa Willd. sp. }
americana L.
rubra Mich. Arb. }
fulva Mich. Fl. }
chinensis.
parvifolia Jacq. H. Sch. }

PLANERA

- ulmifolia Mich. Fl.
crenata.
richardi Mich. Fl.
ulmus polygama Encycl.
rhamnus carpinifolius Pall. }
ROSS.

II. Flores unisexuales.

CELTIS

- australis L.
occidentalis L.
cordata.
crassifolia Encycl. }
tournefortii Encycl. }
sinensis Bosc. Dict.
aspera.
mississippiensis Bosc, Dict.

SALIX.

1. Folia glabra.

- helix L.
triandra L.
hermaphroditica L.
pentandra L.
purpurea L.
rubra Smith, Fl.
vitellina L.

ORDRE V.

AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA

- à feuilles d'Aune. Am. s. ♀
— lancéolé.

ORME

- champêtre. F. ♀ (arts.)
— à larges feuilles.
— jongueux.
pédonculé. F. ♀
d'Amérique. ♀
rouge. Am. s. ♀
de Chine. or. ♀

PLANÉRA

- à feuilles d'orme. Am. s. ♀

à feuilles crénelées. sibér. ♀

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER

- de Provence. ♀ (arts, orn.)
de Virginie. ♀ (arts, orn.)
à feuilles en cœur. Am. s. ♀
de Tournesfort. orient. ♀
de Chine. ♀
râpeux. Am. s. ♀
du Mississipi. ♀

SAULE.

1. Feuilles glabres.

- hélix. F. ♀
à trois étamines. F. ♀
hermaphrodite. F. ♀
à cinq étamines. F. ♀
pourpre. F. ♀
rouge. F. ♀
osier jaune. F. ♀

nigra willd. sp.
fragilis L.
præcox willd. sp.
amygdalina L.
babylonica L.
pontederana willd. sp.
myrsinites L.
retusa L.

2. *Folia villosa.*

reticulata L.
incubacea L.
fusca L.
incubacea Encycl. }
lanata.
arenaria L. ? }
riparia willd. sp.
lavandulæfolia Lapeyr. fl. }
alba L.
viminalis L.
acuminata Smith, fl.
aurita L.
aquatica Smith, fl.
caprea L.

POPULUS

alba L.
 — *grisea.*
tremula L.
grandidentata Mich. Arbr.
græca H. K.
fastigiata
dilatata willd. sp. }
nigra L.
hudsoniana Mich. Arbr.
virginiana
molinifera H. K. }
canadensis Mich. Arbr.
angulata H. K.
marilandica Bosc, Dict.
heterophylla L.
argentea Mich. Arbr. }
balsamifera L.
candicans willd. sp.

MYRICA

gale L.
cerifera L.
pensylvanica
caroliniensis willd. sp. }

noir. Am. s. ♀
fragile. F. ♀
précoce. F. ♀
à feuilles d'amandier. F. ♀
pleureur. orient. ♀
de Pontédéra. Alpes. ♀
myrsinites. Alpes. ♀
émoussé. F. ♀

2. Feuilles velues.

à réseau. Alpes. ♀
des dunes. F. ♀
brunâtre. F. ♀
laineux. Alpes. ♀
à f. de Lavande. Pyrénées. ♀
blanc. F. ♀
à longues feuilles. F. ♀
acuminé. F. ♀
auriculé. F. ♀
aquatique. F. ♀
marceau. F. ♀

PEUPLIER

blanc. F. ♀
 — *grisaille.*
Tremble. F. ♀
à grandes dents. Am. s. ♀
d'Athènes. orient. or. ♀
d'Italie. ♀
noir. F. ♀
de la baie de Hudson. ♀
suisse. Am. s. ♀
de Canada. ♀
anguleux ou de Caroline. ♀
de Mariland. ♀
argenté. Am. s. ♀
Baumier. Am. s. ♀
blanchâtre. Am. s. ♀

MYRICA

galé. F. ♀
cirier de la Louis. ♀ (écon.)
de Pensylvanie. ♀ (écon.)

cordifolia L.
 quercifolia L.
 serrata *Encycl.*
 faya H. K.
 trifoliata.
 rhus suaveolens L. }

BETULA

alba L.
 populifolia *Mich. arbr.*
 nigra H. K.
 lutea *Mich. arbr.*
 papyrifera *Mich. fl.*
 lenta L.
 excelsa *Willd. sp.*
 nana L.
 pumila L.

ALNUS

communis.
 glutinosa *Willd. sp.* }
 — laciniata.
 subrotunda
 incana *Willd. sp.*
 serrulata *Willd. sp.*
 cordata.

CARPINUS

betulus L.
 — quercifolius.
 americana L.
 virginiana L.
 ostrya virginiana *Willd. sp.* }
 ostrya L.
 ostrya vulgaris *Willd. sp.* }
 — americana.

FAGUS

sylvatica L.
 purpurea
 ferruginea *Willd. sp.* }

CASTANEA

vesca *Willd. sp.* }
 fagus castanea L. }
 pumila *Willd. sp.* }
 fagus pumila L. }

QUERCUS.

1. *Foliis perennantibus.*
 ilex L.

à feuilles en cœur. cap. or. ♀
 à feuilles de chêne. cap. or. ♀
 à feuilles en scie. cap. or. ♀
 Faya. madère. or. ♀

à feuilles ternées. Am. s. ♀

BOULEAU

blanc. F. ♀ (écon.)
 à feuell. de peuplier. Am. s. ♀
 noir. Am. s. ♀
 jaune. Am. s. ♀
 à papier. Am. s. ♀
 merisier. Am. s. ♀
 élevé. Am. s. ♀
 nain. sibérie. ♀
 à feuell. de Marceau. Am. s. ♀

AUNE

commun. F. ♀
 — lacinié
 à feuilles arrondies. Am. s. ♀
 blanc. Alpes. ♀
 à feuilles en scie. Am. s. ♀
 à feuilles en cœur. ♀

CHARME

commun. F. ♀
 — à feuilles de chêne.
 d'Amérique. ♀
 de Virginie. ♀
 houblon. Italie. ♀
 d'Amérique.

HÊTRE

des bois. F. ♀
 pourpre. Am. s. ♀ (orn.)

CHATAIGNIER

commun. F. ♀ (écon.)
 chincapin. Am. s. ♀ (écon.)

CHÊNE.

1. Feuilles persistantes.
 reuze. F. ♀

—integrifolia.

—longifolia.

suber L.

ballota Desf. Atl.

coccifera L.

cinerea Mich. Arbr.

virens Mich. Arbr.

2. *Foliis deciduis.*

phellos L.

pseudo-suber Desf. Atl.

ægylopifolia Encycl.

crinita Bosc, Dict.

cerris L.

Tauza Bosc, Dict. }

pubescens Willd. }

lusitanica Bosc, Dict.

insectoria Oliv. Itin.

prasina Bosc. Dict.

rubra L.

coccinea Mich. Arbr.

catesbæi Mich. Arbr.

obtusiloba Mich. Arbr.

aquatica L.

pannosa Bosc. Dict. }

discolor Mich. Arbr. }

tinctoria Mich. Arbr.

Prinus Mich. Arbr.

alba L.

robur L.

pedunculata Willd. sp.

fastigiata Encycl.

apennina Encycl.

CORYLUS

rostrata H. K.

americana Mich. Arbr.

avellana L.

tubulosa Willd. sp.

columna L.

bizantina

LIQUIDAMBAR

styraciflua L.

imberbe H. K.

COMPTONIA

asplenifolia H. K.

—à feuilles entières.

—à feuilles longues.

Liège. F. m. or. ♀ (écon.)

ballote ou à glands doux. Al-

ger. or. ♀ (écon.)

au Kermès. F. m. ♀

cendré. Am. s. ♀

verdoyant. Am. s. ♀

2. Feuilles tombantes.

à feuilles de saule. Am. s. ♀

faux Liège. Alger. ♀

à feuilles d'Égylops. F. ♀

crinite. F. ♀

cerris. F. ♀

Tauzin. F. ♀

de Portugal. ♀

à la noix de galle. perse. ♀

Prase. Portugal. ♀

rouge. Am. s. ♀

écarlate. Am. s. ♀

de Catesby. Am. s. ♀

à lobes obtus. Am. s. ♀

aquatique. Am. s. ♀

velouté. Am. s. ♀

quercitron. Am. s. ♀ (écon.)

Prinus. Am. s. ♀

blanc. Am. s. ♀

rouvre. F. ♀

pédonculé. F. ♀

pyramidal. Portugal. ♀

des Apennins. ♀

NOISETIER

cornu. Am. s. ♀

d'Amérique. ♀

Avelinier. F. ♀

Avelinier rouge. F. ♀

glabre. orient. ♀

de Byzance. ♀

COPALME

d'Amérique. ♀

d'Orient. ♀

COMPTONIA

à f. d'Asplénium. Am. s. ♀

PLATANUS

- orientalis L.
— acerifolia.
occidentalis L.

PLATANE

- d'Orient. ♀ (orn. écon.)
— à feuilles d'érable.
d'Occident. Am. s. ♀ (orn.
écon.)

ORDO VI.

CONIFERÆ.

EPHEDRA

- monostachya L.
distachya L.
altissima Desf. Atl.

EPHÉDRA

- à un épi. sibérie. ♀
à deux épis. F. ♀
élevé. barbarie. ♀

CASUARINA

- equisetifolia L. f.
torulosa H. K.
stricta H. K. }
distyla Vent. H. cels. }
quadridentata.

CASUARINA

- à f. de préle. inde. s. ch. ♀
tuberculeux N. Holl. or. ♀
ramassé. N. Holl. or. ♀
à quatre dents. N. Holl. or. ♀

TAXUS

- baccata.

IF

- commun F. ♀ (écon.)

PODOCARPUS

- elongata l'her. Mss. }
taxus elongata H. K. }

PODOCARPUS

- allongé. cap. or. ♀

JUNIPERUS

- communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
bermudiana L.
virginiana L.
phœnicea L.
sabina mas C. B.
sabina foemina C. B.
thurifera H. K.
prostrata Mich. Fl.
excelsa Willd. sp. }
hermanni Pers. syn. }

GENÉVRIER

- commun. F. ♀ (écon.)
— de Suède.
cade. F. ♀ (écon.)
des Bermudes. ♀ (écon.)
de Virginie. ♀ (orn. écon.)
de Phénicie. F. m. or. ♀
sabine mâle. F. ♀ (méd. orn.)
sabine femelle. F. ♀ (méd.)
à l'encens. Espagne. ♀
couché. Am. s. ♀
élevé. orient. ♀

CUPRESSUS

- sempervirens L.
— horizontalis.
pendula l'her. stirp. }
lusitanica Mill. Dict. }
thyoides L.
juniperoides L.

CYPRÈS

- pyramidal. crête. ♀ (écon.)
— horizontal.
pendant. Goa. or. ♀
faux Thuya. Am. s. ♀ (écon.)
faux Genévrier. cap. or. ♀

SCHUBERTIA *mirbel.*

disticha.

cupressus disticha L. }

THUYA

occidentalis L.

orientalis L.

articulata *vahl.*, *symb.*

PINUS

sylvestris L.

— genevensis.

— rubra.

Laricio *Encycl.*mughus *willd. sp.*pumilio *willd. sp.*maritima *Encycl.*

pinea L.

halepensis *willd. sp.*mitis *Mich. Fl.*

tæda L.

rigida *Mich. Arbr.*inops *Mich. Arbr.*palustris *willd. sp.* }australis *Mich. Arbr.* }

strobis L.

adunca *Bosc.*

cembro L.

SCHOUBERTIA

cypres chauve. ♀ (écon.)

THUYA

d'Occident. Am. s. ♀ (orn.)

de la Chine. ♀ (orn.)

articulé. Barbarie. or. ♀ (écon.)

PIN

sauvage. ♀

— de Genève.

— rouge.

Laricio. corse ♀

Mugo. Alpes. ♀

pumilio. carinthie. ♀

maritime F. ♀ (écon.)

à pignons. F. m. ♀ (écon.)

d'Alep. F. ♀

jaune. Am. s. ♀

Téda. Am. s. ♀

épineux. Am. s. ♀

chétif. ♀

de marais. Am. s. ♀

de Weimouth. Am. s. ♀ (écon.)

de Monteray. ♀

cembro. Alpes. ♀

ABIES

taxifolia. }

pinus picea L. }

balsamea L.

canadensis *Mich. Arbr.*nigra *Mich. Arbr.*alba *Mich. Arbr.*

picea. }

pinus abies L. }

columbaria.

SAPIN

argenté. F. ♀ (écon.)

baumier de Gilead. Am. s. ♀

(méd.)

hémelock-spruce. Am. s. ♀

(orn.)

sapinette noire. Am. s. ♀

sapinette blanche. Am. s. ♀

Epicia. F. ♀ (écon.)

hérissé. île norfolck. or. ♀

LARIX

europæa }

pinus Larix L. }

americana *Mich. Fl.*pinus microcarpa *Lambert,* }*pin.*

cedrus. }

pinus cedrus L. }

MÈLEZE

d'Europe. Alpes. ♀ (écon.)

d'Amérique. ♀

cèdre du Liban. Asie min. ♀

(orn.)

Genera incertæ sedis.

Genres non classés.

POLLICHIA

campestris *H. K.*nekeria campestris *cmel.* }
synst.

POLLICHIA

des champs. cap. or. ♂

ARDISIA

crenulata *vent. ch. de pl.*

ARDISIA

crénélé. antilles. s. ch. ♀

CHLORANTHUS

inconspicuus *l'her. sert.*

CHLORANTHUS

à petites fleurs. chine. s. ch. ♀

AZIMA

tetracantha *encycl.*monetia barlerioides *l'her.* }
stirp.

AZIMA

à quatre épines. inde. s. ch. ♀

MONOTROPA

hypopitys *L.*

MONOTROPA

hypopitys. f. ℥

EUCLEA

racemosa *L. f.*

EUCLÉA

à grappes. cap. or. ♀

ARISTOTELIA

macqui *l'her. stirp.*

ARISTOTÉLIA

macqui. chili. or. ♀

SARRACENIA

purpurea *L.*flava *L.*

SARRACÉNIA

pourpre. am. s. ♀

jaune. am. s. ℥

BEGONIA

nitida *H. K.*obliqua *l'her. stirp.*minor *Jacq. ic.*purpurea *swartz, Prodr.* }dichotoma *Jacq. ic.*

suaveolens.

humilis *willd. sp.*hirsuta *Aublet, Guyan.*discolor *H. K.*

BÉGONIA

luisant antilles. s. ch. ♀

dicotome. caracas. s. ch. ♀

odorant. s. ch. ♀

nain. inde. s. ch. ♂

hérissé. cayenne. s. ch. ♂

discolor. chine. s. ch. ℥

COMMERSIONIA

echinata *L. f.*

COMMERSIONIA

à fruit hérissé. otaiti. s. ch. ♀

ANTIDESMA

alexiteria *L.*

ANTIDESMA

alexitére. ile de fr. s. ch. ♀

POGONIA

debilis *Andr. rep.*

scabra.

POGONIA

à tiges grêles. n. holl. or. ♀

à feuilles rudes. n. holl. or. ♀

BALANOPTERIS

tothila *Gærtn. Fruct.*

BALANOPTÉRIS

tothila. inde. s. ch. ♀

CONDALIA*microphylla cav. ic.***CONDALIA***à petites feuilles. chili. s. ch. 3***SAMYDA***serrulata L.***SAMYDA***à feuilles en scie. ant. s. ch. 3***CORIARIA***myrtifolia L.***REDOUL***à feuell. de myrie. f. 3 (écon.)***PANDANUS**

<i>odoratissimus Jacq. Fragm.</i>	}
<i>utilis Willd. Enum.</i>	

VACOUA*odorant. madagascar. s. ch. 3***GINKGO**

<i>biloba L. Mant.</i>	}
<i>salisburia adiantifolia Smith,</i>	
<i>soc. L.</i>	

GINKGO*bilobé. chine. 3 (écon.)*

F I N.

INDEX GENERUM.

A

Abies.	Page 247	Alcina.	Page 127
Abroma.	175	Aletris.	28
Abrus.	220	Aleurites.	256
Acacia.	207	Alisma.	26
Acalypha.	236	ALISMACEÆ.	<i>Ibid.</i>
ACANTHEÆ.	61	Allamanda.	95
Acanthus.	<i>Ibid.</i>	Allium.	52
Acer.	159	Allophyllus.	159
ACERA.	<i>Ibid.</i>	Alnus.	244
Achillea.	125	Aloe.	28
Achras.	94	Alopecurus.	11
Achyranthes.	53	Alsine.	181
Aconithum.	148	Alstroemeria.	55
Acorus.	7	Althæa.	170
Acrostichum.	2	Alyssum.	155
Actæa.	149	AMARANTI.	52
Adansonia.	173	Amarantus.	<i>Ibid.</i>
Adelia.	235	Amaryllis.	34
Adenantha.	210	Ambrosia.	241
Adiantum.	4	Ambrosinia.	6
Adonis.	146	Amellus.	129
Adoxa.	190	AMENTACEÆ.	242
Ægilops.	16	Amethystea.	66
Ægiphila.	64	Amirola.	159
Ægopodium.	158	Ammi.	143
Æschinomene.	226	Amomum.	59
Æsculus.	159	Amorpha.	220
Æthusa.	140	Amygdalus.	206
Agapanthus.	53	Amyris.	228
Agave.	<i>Ibid.</i>	Anacardium.	227
Ageratum.	116	Anacyclus.	117
Agrimonia.	203	Anagallis.	57
Agriphyllum.	130	Anagyris.	211
Agrostemma.	185	Anamania.	146
Agrostis.	13	Anarrhinum.	78
Agyneia.	235	Anastatica.	156
Aira.	16	Anchusa.	87
Ajuga.	69	Ancistrum.	202
Aizoon.	193	Andrachne.	255
Albuca.	51	Andromeda.	97
Alchimilla.	203	Andropogon.	15

Androsace.	Page 57	AROIDÆ.	Page 6
Andryala.	105	Artemisia.	112
Anemone.	146	Artocarpus.	240
Anethum.	159	Arum.	6
Angelica.	141	Arundo.	21
Anigozanthos.	54	Asarum.	43
Anona.	174	Asclepias.	95
ANONÆ.	174	Ascyrum.	160
Anthemis.	124	ASPARAGINÆ.	23
Anthericum.	29	Asparagus.	<i>Ibid.</i>
Antholiza.	58	Asperugo.	87
Anthospermum.	134	Asperula.	152
Anthoxanthum.	10	Asphodelus.	50
Anthyllis.	215	Aspidium.	2
Antidesma.	248	Asplenium.	3
Antirrhinum.	78	Asprella.	18
Apargia.	104	Aster.	121
Aphyllantes.	25	Astragalus.	221
Apium.	159	Astrantia.	144
APOCYNÆ.	92	Athamanta.	142
Apocynum.	<i>Ibid.</i>	Athanasia.	117
Aquilegia.	148	Atractylis.	108
Arachis.	215	Atragene.	145
Aralia.	158	Atraphaxis.	47
ARALIÆ.	<i>Ibid.</i>	Atriplex.	51
Arbutus.	97	ATRIPLICEÆ.	49
Arctium.	108	Atropa.	81
Arctotis.	150	Aucuba.	252
Ardisia.	248	Avena.	21
Arduinia.	95	Averrhoa.	229
Arenaria.	182	AURANTIA.	161
Aretia.	57	Axyris.	52
Argemone.	149	Ayenia.	175
Aristida.	14	Aylantus.	228
ARISTOLOCHIÆ.	42	Aytonia.	163
Aristolochia.	<i>Ibid.</i>	Azalea.	95
Aristotelia.	248	Azima	248

B

Baccharis.	114	Banksia.	45
Balanites.	161	Barleria.	61
Balanopteris.	248	Basella.	50
Balbisia.	129	Bauhinia.	211
Ballota.	75	Beckmannia.	12
Balsamita.	111	Befaria.	96
Baltimora.	127	Begonia.	248
Banisteria.	160	Bellis.	117

Bellium.	Page 119	Boronia.	Page 179
BERBERIDES.	175	Bosea.	49
Berberis.	<i>Ibid.</i>	Botrychium.	1
Beta.	50	Brassica.	151
Betonica.	72	Briza.	21
Betula.	244	Bromelia.	55
Bidens.	129	Bromus.	18
Bignonia.	90	Broussonetia.	240
BIGNONIÆ.	90	Browallia.	79
Billardiera.	84	Brucea.	228
Biscutella.	154	Brunia.	252
Biserrula.	225	Brunnichia.	47
Bistropogon.	71	Brunsfelsia.	81
Bixa.	177	Bryonia.	257
Blackwellia.	207	Bubon.	140
Blakea.	199	Bucida.	45
Blechnum.	5	Budleia.	76
Blitum.	52	Bufonia.	181
Bocconia.	150	Bulliarda.	187
Boebera.	120	Bunias.	157
Boerhaavia.	55	Bunium.	145
Boltonia.	121	Buphthalmum.	126
Bombax.	175	Buplevrum.	145
Bonplandia.	89	Bursera.	228
Bontia.	84	Bulomus.	26
BORAGINÆ.	84	Buxus.	255
Borago.	87	Byttneria.	175
Borbonia.	212		

C

Cacalia.	115	Calycanthus.	207
Cachrys.	142	Calyptranthes.	198
CACTI.	191	Calyxymenia.	55
Cactus.	<i>Ibid.</i>	Camellia.	162
Cæsalpinia.	210	Cameraria.	92
Cakile.	157	Campanula.	98
Caladium.	6	CAMPANULACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Calceolaria.	78	Camphorosma.	49
Calea.	117	Canarina.	98
Calendula.	119	Canna.	59
Calla.	6	Cannabis.	211
Callicarpa.	64	CANNÆ.	59
Callicoma.	190	Cantua.	89
Calligonum.	48	CAPPARIDÆ.	157
Callistachys.	212	Capparis.	158
Callitriche.	5	Capraria.	76
Caltha.	149	CAPRIFOLIA.	156

Capsicum.	Page 85	Chelone.	Page 99
Cardamine.	154	Chenopodium.	51
Cardiospermum.	158	Cherleria.	182
Carduus.	107	Chiococca.	155
Carex.	7	Chionanthus.	67
Carica.	259	Chironia.	91
Carlina.	108	Chlora.	<i>Ibid.</i>
Carpesium.	112	Chloranthus.	248
Carpinus.	244	Chloris.	15
Carthamus.	108	Chondrilla.	101
Carum.	139	Chondrosom.	15
CARYOPHYLLÆ.	180	Chorizema.	212
Caryota.	22	Chrysanthemum.	118
Cassia.	209	Chrysocoma.	115
Cassine.	250	Chrysophyllum.	94
Castanea.	244	Chrysosplenium.	190
Casuarina.	246	Cicer.	225
Catabrosa.	16	Cichorium.	106
Catananche.	106	Cicuta.	140
Caucalis.	145	Cinara.	107
Ceanothus.	252	Cineraria.	125
Cecropia.	240	Cinna.	10
Cedrela.	165	Circæa.	196
Celastrus.	229	Cissus.	165
Celosia.	55	CIST.	177
Celsia.	79	Cistus.	<i>Ibid.</i>
Celtis.	242	Citnarexylum.	65
Cenchrus.	15	Citrus.	162
Centaurea.	109	Claytonia.	195
Centunculus.	56	Clematis.	145
Cephalanthus.	155	Cleome.	157
Cephalophora.	116	Cleonia.	76
Cerastium.	181	Clerodendrum.	64
Ceratonia.	209	Clethra.	97
Ceratophyllum.	5	Cliffortia.	205
Cerbera.	95	Clinopodium.	74
Cercis.	211	Clitoria.	220
Cercodia.	195	Clusia.	161
Cerinthe.	85	Clutia.	255
Cestrum.	84	Clypeola.	151
Ceterach.	2	Cneorum.	228
Chærophyllum.	159	Cnicus.	106
Chamærops.	22	Cobcæa.	89
Chamagrostis.	14	Coccoloba.	40
Chara.	5	Cochlearia.	155
Cheilanthes.	4	Coffea.	155
Cheiranthus.	152	Coix.	22
Chelidonium.	150	COLCHICACEÆ.	27

Colchicum.	Page 27	Cratægus.	Page 200
Colletia.	251	Cratæva.	158
Collinsonia.	68	Crepis.	103
Columnnea.	78	Crescentia.	84
Colutea.	221	Crinum.	54
Comarum.	204	Crithmum.	142
Commelina.	26	Crocus.	58
COMMELINEÆ.	<i>Ibid.</i>	Crotalaria.	214
Commersonia.	248	Croton.	236
Comocladia.	228	Crovea.	179
Comptonia.	245	Crucianella.	153
Condalia.	249	CRUCIFERÆ.	150
CONIFERÆ.	246	Crypsis.	11
Conium.	143	Cucubalus.	185
Convallaria.	24	Cucumis.	237
CONVOLVULACEÆ.	88	Cucurbita.	<i>Ibid.</i>
Convolvulus.	<i>Ibid.</i>	CUCURBITACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Conyza.	114	Cuminum.	140
Cookia.	161	Cupania.	159
Corchorus.	176	Cuphea.	199
Cordia.	84	Cupressus.	246
Coreopsis.	127	Curcuma.	40
Coriandrum.	140	Cuscuta.	89
Coriaria.	240	Cussonia.	158
Coris.	57	Cyanella.	31
Corispermum.	52	CYCADEÆ.	4
Cornucopiæ.	11	Cycas.	<i>Ibid.</i>
Cornus.	157	Cyclamen.	58
Cornutia.	64	Cydonia.	200
Coronilla.	225	Cymbidium.	41
Coronopus.	155	Cynanchum.	95
Correa.	179	Cynodon.	12
Corrigiola.	195	Cynoglossum.	87
Cortusa.	58	Cynosurus.	17
Corylus.	245	CYPEROIDEÆ.	7
Cosmos.	128	Cyperus.	10
Costus.	40	Cypripedium.	41
Cotula.	117	Cyrilla.	97
Cotyledon.	188	Cyrthantus.	54
Crambe.	157	Cytisus.	215
Crassula.	187		

D

Dactylis.	17	Dalea.	215
Dahlia.	127	Dalechampia.	237
Dais.	44	Danthonia.	20
Dalbergia.	226	Daphne.	44

Datisca.	Page 241	DIPSACEÆ.	Page 130
Datura.	80	Dipsacus.	131
Davallia.	4	Dirca.	44
Daucus.	143	Disandra.	60
Daviesia.	212	Disodium.	127
Decumaria.	198	Dodartia.	57
Delphinium.	148	Dodecatheon.	58
Dentaria.	154	Dodonæa.	229
Dianella.	25	Dolichos.	219
Dianthus.	183	Dombeya.	175
Diasia.	38	Dorianthes.	55
Dichondra.	85	Doronicum.	120
Dictamnus.	179	Dorstenia.	240
Diervilla.	136	Draba.	155
Digitalis.	78	Dracæna.	25
Digitaria.	12	Dracocephalum.	75
Dillenia.	174	Dracontium.	7
Dineba.	17	Drepania.	105
Dioscorea.	25	Drimmia.	50
Diosma.	180	Drosera.	158
Diospyros.	94	Dryas.	205
Diotis.	117	Duranta.	65

E

Ebenus.	215	Epidendrum.	42
Echeandia.	29	Epigæa.	97
Echinaria.	16	Epilobium.	196
Echinophora.	144	Epimedium.	175
Echinops.	111	Epipactis.	41
Echioides.	87	EQUISETACEÆ	4
Echium.	86	Equisetum.	4
Eclypta.	126	Erianthus.	14
Ehretia.	84	Erica.	96
Ehrharta.	22	ERICÆ.	<i>Ibid.</i>
ELÆAGNEÆ.	45	Erigeron.	121
Elæagnus.	<i>Ibid.</i>	Erinus.	60
Elæodendrum.	251	Eriocephalus.	119
Llatine.	181	Eriogonum.	49
Elephantopus.	111	Eriophorum.	9
Eleusine.	17	Eriospermum.	51
Elichrysum.	115	Erodium.	166
Ellisia.	85	Ervum.	225
Elymus.	17	Eryngium.	144
Embothrium.	45	Erysimum.	152
Empetrum.	98	Erythrina.	220
Encelia.	127	Erythronium.	27
Ephedra.	246	Erythroxyllum.	160

Ethulia.	Page 111	Eupatorium.	Page 116
Eucalyptus.	198	Euphorbia.	253
Euclea.	248	EUPHORBACEÆ.	252
Eucomis.	50	Euphoria.	159
Eugenia.	198	Euphrasia.	60
Evolvulus.	89	Eutaxia.	212
Evonymus.	229		

F

Faba.	225	Flacurtia.	176
Fabricia.	197	Flaveria.	111
Fagara.	228	FLOSCULOSÆ.	106
Fagonia.	179	Fontanesia.	63
Fagus.	244	Forskalea.	240
Fedia.	152	Fothergilla.	242
Ferraria.	56	Fragaria.	204
Ferula.	142	Frankenia.	186
Festuca.	19	Fraxinus.	62
FICOIDEÆ.	195	Fritillaria.	27
Ficus.	259	Fuchsia.	197
Filago.	115	Fumaria.	150
FILICES.	I		

G

Galanthus.	55	Geum.	204
Galaridia.	129	Ginkgo.	249
Galaxia.	58	Githago.	185
Galega.	225	Gladiolus.	58
Galenia.	49	Glaux.	199
Galeobdolon.	72	Glecoma.	72
Galeopsis.	<i>Ibid.</i>	Gleditsia.	209
Galinsoga.	129	Glinus.	195
Galium.	153	Globba.	59
Gardenia.	154	Globularia.	58
Garidella.	148	Glycine.	220
Gastridium.	15	Glycyrrhiza.	225
Gaultheria.	97	Gnaphalium.	113
Gaura.	196	Gnidia.	44
Genista.	212	Gomphrena.	55
Gentiana.	91	Goodenia.	100
GENTIANEÆ.	<i>Ibid.</i>	Goodia.	214
Geoffréa.	226	Gordonia.	175
GERANIA.	164	Gorteria.	120
Geranium.	166	Gossypium.	172
Geropogon.	105	Gouania.	252
Gesneria.	99	GRAMINEÆ.	10

Grangea.	<i>Page</i> 112	Guetarda.	<i>Page</i> 138
Gratiola.	79	Guilandina.	210
Grewia.	176	GUTTIFERÆ.	161
Grindelia.	120	Gymnocladus.	209
Gronovia.	237	Gymnostyles.	111
GUAIACANÆ.	94	Gypsophila.	182
GUAIACUM.	179	Gyrocarpos.	160
Guazuma.	175		

H

Hæmanthus.	33	Hippocrepis.	225
Hæmatoxylum.	210	Hippophae.	45
Hakea.	45	Hippuris.	5
Halesia.	95	Hoffmenseggia.	210
Halleria.	76	Holcus.	15
Hamamelis.	175	Holosteum.	180
Hamellia.	135	Homalium.	207
Hebenstreitia.	66	Hopea.	95
Hedera.	137	Hordeum.	18
Hedychium.	40	Horminum.	75
Hedysarum.	226	Hornemannia.	78
Helenium.	119	Hortensia.	190
Helianthemum.	177	Hottonia.	57
Helianthus.	128	Houstonia.	134
Heliconia.	39	Humea.	111
Helicteres.	175	Humulus.	241
Heliocarpus.	176	Hura.	237
Heliophila.	152	Hyacinthus.	50
Heliotropium.	85	Hydrangea.	190
Helleborus.	148	HYDROCHARIDÆÆ.	42
Helmintia.	104	Hydrocharis.	<i>Ibid.</i>
Helonias.	27	Hydrocotyle.	144
Hemerocallis.	33	Hydroglossum.	1
Hemitomus.	79	Hydrophyllum.	85
Heracleum.	141	Hymenea.	211
Hermannia.	175	Hyosciamus.	80
Hernandia.	46	Hyoseris.	105
Herniaria.	54	Hypecoum.	150
Hesperis.	152	HYPERICA.	160
Heterosperma.	129	Hypericum.	160
Heuchera.	189	Hypochaeris.	105
Hibiscus.	171	Hypoxis.	35
Hieracium.	102	Hyptis.	72
Hippia.	111	Hyssopus.	70
Hippocratea.	160		

I

Jambolifera.	Page 174	Iresine.	Page 53
Jasione.	100	IRIDEE.	36
JASMINEÆ.	62	Iris.	<i>Ibid.</i>
Jasminum.	63	Isatis.	157
Jatropha.	236	Isnardia.	199
Iberis.	156	Isopyrum.	148
Ilex.	230	Itea.	96
Illecebrum.	53	Iva.	241
Illicium.	174	Juglans.	229
Impatiens.	167	JUNCEÆ.	25
Imperatoria.	139	Juncus.	<i>Ibid.</i>
Indigofera.	223	Juniperus.	246
Inga.	209	Jussiaea.	196
Inula.	120	Justicia.	61
Ionidium.	178	Ixia.	57
Ipomœa.	88	Ixora.	135

K

Kæmpferia.	40	Kirganelia.	235.
Kalankoe.	188	Kitaibelia.	168
Kalmia.	93	Knautia.	132
Kiggellaria.	255	Koelreuteria.	158
Killingia.	10	Kuhnia.	116

L

LABIATÆ.	66	Laserpitium.	141
Lachenalia.	31	Lasiopetalum.	232
Lachnea.	44	Latania.	23
Lactuca.	101	Lathræa.	61
Lagasca.	111	Lathyrus.	223
Lagerstromia.	199	Lavandula.	70
Lagoecia.	145	Lavatera.	169
Lagunea.	172	LAURINEÆ.	46
Lagurus.	14	Laurus.	<i>Ibid.</i>
Lamarkia.	17	Lawsonia.	199
Lamium.	72	Ledum.	93
Lampsana.	100	Leersia.	11
Lantana.	65	LEGUMINOSÆ.	207
Larix.	247	Lemna.	3
Larrea.	179	Leonurus.	73

Lepidium.	Page 156	Lobelia.	Page 99
Leptospermum.	197	Lolium.	17
Lessertia.	221	Lomandra.	25
Leucium.	35	Lonicera.	156
Leuzea.	108	Lopezia.	195
Liatris.	115	Lotus.	218
Ligusticum.	141	Loureira.	256
Ligustrum.	64	Ludolphia.	13
LILIACEÆ.	27	Ludwigia.	196
Lilium.	28	Lunaria.	154
Limodorum.	41	Lupinus.	214
Limonia.	162	Luzula.	25
Limosella.	57	Lychnis.	185
Linaria.	77	Lycium.	83
Lindernia.	79	Lycopersicum.	81
Linnæa.	156	Lycopsis.	87
Linum.	186	Lycopus.	66
Liquidambar.	245	Lygeum.	22
Liriodendrum.	174	Lysimachia.	57
Lithospermum.	86	LYSIMACHIÆ.	56
Littorella.	55	Lythrum.	199

M

Madia.	119	Medeola.	23
Magnolia.	174	Medicago.	217
MAGNOLIÆ.	<i>Ibid.</i>	Melaleuca.	197
Mahernia.	176	Melampodium.	127
Maianthemum.	24	Melampyrum.	60
Malachra.	170	Melastoma.	199
Malaxis.	41	MELASTOMÆ.	<i>Ibid.</i>
Malope.	168	Melia.	163
Malpighia.	160	MELIACEÆ.	<i>Ibid.</i>
MALPIGHIACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Melianthus.	180
Malva.	169	Melica.	16
MALVACEÆ.	168	Melilotus.	216
Malvaviscus.	172	Melissa.	74
Malus.	199	Melittis.	75
Mammea.	161	Melochia.	172
Mangifera.	227	Melotria.	257
Manulea.	60	MENISPERMA.	175
Maranta.	40	Menispermum.	175
Marrubium.	73	Mentha.	71
Marsilea.	4	Mentzelia.	197
Martynia.	90	Menziesia.	96
Massonia.	50	Menyanthes.	58
Matricaria.	117	Mercurialis.	252

Merendera.	Page 27	Momordica.	Page 27
Mesembryanthemum.	193	Monarda.	66
Mespilus.	201	Monotropa.	248
Messerschmidia.	85	Monsonia.	167
Methonica.	27	Montia.	195
Metrosideros.	197	Moræa.	37
Michauxia.	98	Morina.	130
Micropus.	113	Moringa.	210
Milium.	13	Morus.	240
Milleria.	119	Murraya.	162
Mimosa.	209	Musa.	39
Mimulus.	79	Musæ.	<i>Ibid.</i>
Minnartia.	180	Muscari.	30
Mirabilis.	55	Myagrurn.	157
Mitchella.	135	Myosotis.	87
Mitella.	190	Myosurus.	147
Mœrengia.	181	Myrica.	243
Mogorium.	63	Myriophyllum.	195
Molinia.	16	Myrsine.	94
Mollugo.	180	MYRTI.	197
Molucella.	74	Myrtus.	198

N

NAIADES.	5	Nerium.	92
Naias.	<i>Ibid.</i>	Nicandra.	81
Nandina.	175	Nicotiana.	80
Napæa.	170	Nigella.	148
NARCISSEÆ.	53	Nitraria.	193
Narcissus.	<i>Ibid.</i>	Nolana.	87
Nardus.	22	Notelæa.	63
Narthecium.	27	NYCTAGINEÆ.	55
Nemesia.	78	Nymphæa.	42
Neottia.	41	Nyssa.	43
Nepeta.	70		

O

Ocymum.	75	Onopordon.	107
OEdera.	111	Onosma.	86
OEnanthe.	140	Opercularia.	133
OEnothera.	196	Ophioglossum.	1
Olea.	63	Ophrys.	41
ONAGRÆ.	195	Ophyoxylum.	93
Onoclea.	3	ORCHIDÆÆ.	40
Ononis.	214	Orchis.	<i>Ibid.</i>

Origanum.	Page 74	Osmundā.	Page 2
Ornithogalum.	31	Osteospermum.	119
Ornithopus.	225	Osyris.	45
Orobanche.	60	Othonna.	124
Orobis.	224	Oxalis.	167
Orontium.	7	Oxylobium.	212
Ortegia.	180	Oxytropis.	221
Oryza.	22		

P

Pæderia.	155	Perilla.	70
Pæonia.	149	Periploca.	92
Palavia.	168	Peronia.	40
Paliurus.	251	Persoonia.	46
Pallasia.	49	Peiveria.	49
PALME.	22	Peucedanum.	142
Panax.	158	Phaca.	221
Paucratium.	55	Phalangium.	29
Pandanus.	249	Phalaris.	11
Panicum.	12	Pharnaceum.	181
Papaver.	149	Phaseolus.	219
PAPAVERACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Phellandrium.	140
Parietaria.	240	Philadelphus.	199
Paris.	25	Phillyrea.	65
Parkinsonia.	209	Philyca.	252
Parnassia.	158	Phleum.	11
Paronychia.	55	Phlomis.	75
Parthenium.	126	Phlox.	89
Paschalia.	129	Phœnix.	22
Paspalum.	12	Phormium.	51
Passerina.	44	Phyllanthus.	254
PASSIFLORÆ.	258	Phyllis.	154
Passiflora.	<i>Ibid.</i>	Physalis.	81
Pastinaca.	159	Phyteuma.	99
Paullinia.	158	Phytolacca.	49
Pavonia.	179	Picridium.	105
Pectis.	119	Picris.	104
PEDICULARES.	58	Pilularia.	4
Pedicularis.	60	Pimpinella.	153
Peganum.	179	Pinguicula.	58
Pelargonium.	164	Pinkneia.	154
Penicillaria.	14	Pinus.	247
Pentapetes.	175	Piper.	241
Penstemon.	90	Piqueria.	116
Penthorum.	189	Piscidia.	220
Peplis.	199	Pisonia.	55

Pistacia.	Page 228	Pomaderris.	Page 251
Pisum.	224	Pontederia.	38
Pitcairnia.	28	Populus.	245
Pittosporum.	251	Portiera.	179
Planera.	242	Portesia.	165
PLANTAGINÆ.	54	Portulaca.	192
Plantago.	<i>Ibid.</i>	Portulacaria.	195
Platanus.	246	PORTULACEÆ.	192
Platilobium.	212	Potamogeton.	5
Plectranthus.	75	Potentilla.	205
Plocama.	155	Poterium.	202
PLUMBAGINÆ.	56	Pothos.	7
Plumbago.	<i>Ibid.</i>	Prasium.	76
Plumiera.	92	Prenanthes.	101
Poa.	20	Primula.	57
Podalyria.	211	Prinos.	250
Podocarpus.	246	Priva.	65
Podophyllum.	149	Proserpinaca.	195
Pogonia.	248	Protea.	45
Poinciana.	210	PROTEACEÆ.	<i>Ibid.</i>
POLEMONIACEÆ.	89	Prunella.	76
Polemonium.	<i>Ibid.</i>	Prunus.	205
Polianthes.	55	Psidium.	198
Pollichia.	248	Psoralea.	215
Polycarpea.	180	Psychotria.	155
Polycarpon.	<i>Ibid.</i>	Ptelea.	229
Polycnemum.	49	Pteranthus.	49
Polygala.	58	Pteris.	3
Polygonatum.	24	Pterocarpus.	227
POLYGONÆ.	46	Pulmonaria.	86
Polygonum.	47	Punica.	198
Polymnia.	127	Pyrola.	97
Polypodium.	2	Pyrus.	200
Polypogon.	14		

Q

Quercus.	244	Queria	180
----------	-----	--------	-----

R

RADIATÆ.	117	RANUNCULACEÆ.	145
Rafnia.	214	Ranunculus.	146
Rajania.	24	Raphanus.	159
Ramonda.	80	Ravenala.	59
Randia.	134	Rauvolfia.	93

Reaumuria.	Page 195	Robinia.	Page 220
Reseda.	158	Rondeletia.	154
Rhagadiolus.	100	Rosa.	201
RHAMNOIDEÆ.	229	Rosacæ.	199
Rhamnus.	230	Rosmarinus.	67
Rhapis.	23	Rottbollia.	16
Rheum.	48	Royena.	95
Rhinanthus.	60	Rubentia.	250
RHIZOSPERMÆ.	4	Rubia.	154
RHODODENDRA.	95	RUBIACÆ.	152
Rhododendrum.	<i>Ibid.</i>	Rubus.	205
Rhodora.	<i>Ibid.</i>	Rudbeckia.	128
Rhus.	227	Ruellia.	61
Ribes.	191	Rumex.	47
Ricinus.	255	Ruppia.	5
Ricotia.	154	Ruscus.	24
Rindera.	87	Ruta.	179
Rivina	49	RUTACÆ.	<i>Ibid.</i>

S

Sabal.	22	Satureia.	70
Saccharum.	14	Saururus.	5
Sagina.	181	Saxifraga.	189
Sagittaria.	26	SAXIFRAGÆ.	<i>Ibid.</i>
SALICARIÆ.	199	Scabiosa.	131
Salicornia.	52	Scandix.	140
Salix.	242	Scheuchzeria.	26
Salsola.	50	Schinus.	228
Salvia.	67	Schizandra.	175
Sambucus.	157	Schkuhria.	120
Samolus.	58	Schœnus.	9
Samyda.	249	Schrankia.	209
Sanguinaria.	149	Scilla.	51
Sanguisorba.	202	Scirpus.	9
Sanicula.	144	Scleranthus.	195
Sanseveria.	28	Sclerocarpus.	127
Santolina.	117	Scolopendrium.	5
Sanvitalia.	128	Scolymus.	106
SAPINDI.	158	Scoparia.	76
Sapindus.	<i>Ibid.</i>	Scorpiurus.	225
Sapium.	256	Scorzonera.	104
Saponaria.	182	Schottia.	209
SAPOTÆ.	94	Scrophularia.	76
Saracha.	81	SCROPHULARIÆ.	<i>Ibid.</i>
Sarothra.	91	Scutellaria.	75
Sarracenia.	248	Secale.	18

Securidaca.	Page 227	Solidago.	Page 122
Securinega.	255	Sonchus.	101
Sedum.	188	Sophora.	211
Selago.	66	Sorbus.	200
Selinum.	142	Sorghum.	14
SEMIFLOSCULOSÆ.	100	Spaendoncea.	210
SEMPERVIVÆ.	187	Sparganium.	7
Sempervivum.	180	Spartina.	16
Senebiera.	156	Spartium.	215
Sanecio.	125	Spergula.	181
Scrapias.	41	Spermacoce.	154
Serjania.	158	Sphæranthus.	111
Seriola.	105	Sphærolobium.	212
Serissa.	155	Spielmannia.	65
Serratula.	108	Spigelia.	92
Sesamum.	90	Spilanthus.	150
Seseli.	159	Spinacia.	50
Sesleria.	17	Spiræa.	205
Sesuvium.	105	Spondias.	228
Sherardia.	152	Stachys.	72
Sibbaldia.	205	Stachytarpheta.	65
Sibthorpia.	60	Stæchelina.	168
Sicyos.	257	Stapelia.	92
Sida.	170	Staphylea.	229
Sideritis.	71	Statice.	56
Sideroxylum.	94	Stellaria.	182
Sigosbeckia.	126	Stellera.	44
Silene.	184	Sterculia.	175
Silphium.	127	Stevia.	116
Sinapis.	151	Stipa.	14
Sison.	140	Stratiotes.	42
Sisymbrium.	155	Strelitzia.	59
Sisyrinchium.	56	Struthiola.	44
Sium.	141	Stuartia.	175
Smilacina.	24	Styphelia.	98
Smilax.	Ibid.	Styrax.	95
Smyrnum.	159	Swertia.	91
Solandra.	81	Swietenia.	165
SOLANÆÆ.	79	Symphoricarpos.	156
Solanum.	82	Symphitum.	86
Soldanella.	58	Syringa.	62

T

Tabernæmontana.	92	Tamarindus.	209
Tagetes.	120	Tamarix.	195
Talinum.	192	Tamuus.	25

<i>Tanacetum.</i>	<i>Page</i> 112	<i>Tradescantia.</i>	<i>Page</i> 206
<i>Taraxacum.</i>	104	<i>Tragia.</i>	256
<i>Tarchonanthus.</i>	117	<i>Tragopogon.</i>	105
<i>Taxus.</i>	246	<i>Tragus.</i>	15
<i>Telephium.</i>	195	<i>Trapa.</i>	195
<i>TEREBINTHACEÆ.</i>	227	<i>Trianthema.</i>	195
<i>Terminalia.</i>	43	<i>Tribulus.</i>	179
<i>Ternstroemia.</i>	162	<i>Trichilia.</i>	165
<i>Tetragonia.</i>	195	<i>Trichodium.</i>	15
<i>Teucrium.</i>	69	<i>Trichosanthes.</i>	258
<i>Thalictrum.</i>	145	<i>Tridentis.</i>	57
<i>Thapsia.</i>	159	<i>Trifolium.</i>	216
<i>Thea.</i>	162	<i>Triglochin.</i>	26
<i>Theligonum.</i>	241	<i>Trigonella.</i>	218
<i>Theophrasta.</i>	93	<i>Triguera.</i>	80
<i>Thesium.</i>	45	<i>Trillium.</i>	25
<i>Thlaspi.</i>	156	<i>Triopteris.</i>	160
<i>Thuya.</i>	247	<i>Triosteum.</i>	156
<i>Thymbra.</i>	74	<i>Triplaris.</i>	48
<i>THYMELEÆ.</i>	44	<i>Tripsacum.</i>	15
<i>Thymus.</i>	74	<i>Triticum.</i>	18
<i>Tiarella.</i>	190	<i>Tritoma.</i>	28
<i>Tigridia.</i>	56	<i>Triumfetta.</i>	176
<i>Tilia.</i>	176	<i>Trollius.</i>	148
<i>TILIACEÆ.</i>	175	<i>Tropæolum.</i>	167
<i>Tillæa.</i>	187	<i>Tulipa.</i>	27
<i>Tillandsia.</i>	55	<i>Turnera.</i>	192
<i>Tordylium.</i>	143	<i>Turritis.</i>	151
<i>Tormentilla.</i>	205	<i>Tussilago.</i>	114
<i>Tournefortia.</i>	85	<i>Typha.</i>	7
<i>Trachelium.</i>	99	<i>TYPHÆ.</i>	7

U

<i>Ulex.</i>	212	<i>Urtica.</i>	240
<i>Ulmus.</i>	242	<i>URTICEÆ.</i>	259
<i>UMBELLIFERÆ.</i>	138	<i>Usteria.</i>	78
<i>Uniola.</i>	21	<i>Utricularia.</i>	58
<i>Urena.</i>	170	<i>Uvularia.</i>	27
<i>Urospermum.</i>	105		

V

<i>Vaccinium.</i>	97	<i>Vallisneria.</i>	42
<i>Valantia.</i>	134	<i>Vanilla.</i>	42
<i>VALERIANÆÆ.</i>	132	<i>Varronia.</i>	85
<i>Valeriana.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Velezia.</i>	186

Vella.	Page 157	Viminaria.	Page 212
Veltheimia.	28	Vinca.	92
Veratrum.	27	Viola.	178
Verbascum.	79	Virgilia.	211
Verbena.	66	Viscum.	156
Verbesina.	129	Visnea.	95
Vernonia.	115	VITES.	165
Veronica.	59	Vitex.	64
Viburnum.	136	VITICEÆ.	64
Vicia.	224	Vitis.	165
Vieusseuxia.	57	Volkameria.	64
Villarsia.	91		

W

Wachendorfia.	58	Westeringia.	67
Waldsteinia.	202	Winterania.	165
Waltheria.	175	Woodwardia.	5

X

Xanthium.	241	Ximenesia.	127
Xeranthemum.	113	Xylophylla.	255

Y

Yucca.	28
--------	----

Z

Zacintha.	104	Zea.	22
Zamia.	4	Zinnia.	129
Zanichellia.	5	Ziziphora.	66
Zanthorhiza.	149	Ziziphus.	251
Zanthoxylum.	228	Zoegea.	109
Zappania.	65	Zygophyllum.	179

SUPPLÉMENT.

Nota. Ce Supplément renferme plusieurs plantes que le Jardin royal a acquises depuis la publication de mon Tableau, et autres que j'avois omises. J'y indique aussi un nombre assez considérable d'espèces cultivées dans les pépinières du Roi, près Versailles, dans les jardins de MM. Cels, Noisette et autres, qui manquent à la collection du Jardin des Plantes, et que l'on pourra facilement se procurer par des échanges.

Je me fais un devoir et un plaisir de déclarer ici que mon collègue, M. Bosc, m'a beaucoup aidé dans ce travail, en me communiquant des observations qu'une longue expérience lui a acquises sur plusieurs arbres et arbrisseaux étrangers, dont il a enrichi les pépinières du Roi, et qu'il y cultive avec un grand succès.

ACER hybridum Bosc. Dict.

sigrum Mich. Arbr.

ACOSMUS pruriens Desvaux.

ADELIA acuminata, p. 255. }

BORIA acuminata Willd. sp. }

ligustrina Mich. Fl. }

BORIA ligustrina Willd. sp. }

AGRIPHYLLUM grandiflorum. }

RHORIA grandiflora Thunb. Prodr. }

BERCKHEIA grandiflora Willd. sp. }

ALNUS macrophylla.

oblongata Willd. sp.

rubra.

ANDROMEDA acuminata H. K.

canescens.

lanceolata.

ANNONA grandiflora.

ORCHIDOCARPON grandiflorum }

Mich. Fl. }

ANNONA parviflora.

ORCHIDOCARPON parviflorum }

Mich. Fl. }

ANNONA pygmæa Mich. Fl. }

ORCHIDOCARPON pygmæum }

Mich. Fl. }

ANTHEMIS elongata.

ARALIA pubescens Dec. cat.

ARCTOTIS anthemoides L.

ARISTOLOCHIA tomentosa Bot. Mag.

ARTEDIA squamata L.

ARUM pumilum.

ARUNDO ægyptia.

ASCLEPIAS angustifolia Willd. H.

Ber.

ASPARAGUS amarq Dec. cat.

ASTER canus Jacq. hort.

ericoides, p. 125, Deleat. L. }

et Mich. Fl. subjece. }

-multiflorus Willd. sp. }

ERABLE hybride. Am. s. 5

noir. Am. s. 5

ACOSMUS piquant. s. ch. 5

à feuell. de Troëne. Am. s. 5

AGRIPHYLLUM à grande fleur. cap.

or. 5

AUNE à grandes feuilles. 5

à feuell. oblongues. Europe. 5

rouge. 5

ANDROMEDA acuminé. Am. s. 5

velouté. Am. s. ? 5

lancéolé. Am. s. ? 5

ANNONE à grandes fleurs. Am. s. 5

à petites fleurs. Am. s. 5

petite. Am. s. 5

ANTHÉMIS à longs pédoncules. ☉

ARALIA pubescent. N. esp. s. ch. 5

ARCTOTIS anthémoïde. cap. ☉

ARISTOLOCHE colonneuse. Am. s. 5

ARTÉDIA écailleux. orient. ☉

ARUM petit. Am. s. 5

ROSEAU d'Égypte. 5

ACLÉPIAS à f. étroites. Mexique ?

s. ch. 5

ASPERGE à gros fruit. F. 5

ASTER incane. Allem. 5

- heterophyllum willd. Enum.*
leptophyllum.
lithospermifolium H. p. }
altaicum willd. Enum. }
paniculatum willd. sp.
pannonicum wald. et Kitt.
hung.
pendulum willd. sp. ?
reflexum L.
secundiflorum.
sparsiflorum Mich. Fl.
ASTRAGALUS micranthus Desvaux,
Journ.
ATRAGENE sibirica Bot. Magaz. }
alpina Pallas, Ross. }
ATRIPLEX salina Desvaux, Journ.
BALLOTA discolor.
parvifolia.
BARLERIA lactea.
BETONICA stricta H. K. (an varietas).
BETULA fruticans Pallas, Ross.
pontica.
pubescens willd. sp.
rubra Mich. Arbr.
BUCHNERA viscosa H. K.
CACALIA villosa Jacq. Ic. }
SENECIO purpureus willd. sp. }
CALADIUM pinnatifidum willd. sp. }
ARUM pinnatifidum Jacq. H. Sch. }
CALYCANTHUS nanus Dum. Cours.
Bot. cult.
CAMPANULA lactiflora Fischer.
versicolor Smith, Fl. Græcæ,
prodr.
CARDUUS tenuiflorus Smith, Fl.
CASSIA sulcata Dec. Cat.
CHRYSANTHEMUM Broussonetii }
Pers. Syn. }
PYRETHRUM grandiflorum willd. }
Enum. }
CINERARIA heterophylla.
platanifolia.
CNICUS araneosus.
semipinnatus. }
carduus pratensis Encycl. }
COMMELINA pallida Willd. H. Ber. }
rubens Red. Lil. }
stricta.
CORCHORUS japonicus Willd. sp.
CORNUS canadensis L.
- à feuell. changeantes. Am. s. ʒ*
à feuilles grêles. ʒ
à feuell. de Grémil. Sibérie. ʒ
paniculé. Am. s. ʒ
de Hongrie. ʒ
à rameaux inclinés. Am. s. ʒ
recourbé, cap. or. ʒ
à grappes unilatérales. ʒ
à fleurs éparses. Am. s. ʒ
ASTRALE à petites fleurs. ʒ
ATRAGÉNÉ de Sibérie. ʒ
ARROCHE des marais. F. ☉
BALLOTA discolor. or. ʒ
à petites feuilles or. ʒ
BARLÉRIA à fl. blanches. s. ch. ʒ
BÉTOINE à fleurs serrées F. ʒ
BÉTULA arbrisseau. Russie. ʒ
de Pont. ʒ
pubescent. F. ʒ
rouge. Am. s. ʒ
BUCHNÉRA visqueux. cap. or. ʒ
CACALIA velu. cap. or. ʒ
CALADIUM pinnatifide. Caracas.
s. ch. ʒ
CALYCANTHUS nain. Am. s. ʒ
CAMPANULA à fl. blanche. Russie. ʒ
versicolor. orient. or. ʒ
CHARDON à fleurs menues. F. ☉
CASSE sillonnée. s. ch. ʒ
CHRYSANTHÈME de Broussonet.
canaries. or. ʒ
CINÉRAIRE à feuilles variables. ʒ
à feuilles de platane. s. ch. ʒ
CNICUS à tête cotonneuse. ♂
pinnatifide. F. ʒ
COMMÉLINE à fleur pâle. Am. m.
s. ch. ʒ
ramassée. s. ch. ʒ
CORCHORUS du Japon. or. ʒ
CORNOUILLER de Canada. ʒ

- CRASSULA dejecta Jacq. H. sch.*
CRATÆGUS sorbifolia.
CROTON lineare Jacq. Am.
CROTON punctatum Jacq. Dele, et
jice, p. 256.
quinquepartitum.
variegatum L.
CUCUMIS lineatus Bosc. Journ.
d'hist. nat.
CUPRESSUS disticha L. p. 247.
TAXODIUM distichum Richard,
Ann. du Mus.
CURTISIA faginea H. K.
CYCLAMEN coum Willd. sp.
CYTISUS albidus Dec. cat.
alpinus Willd. Enum.
purpureus Scop. carn.
DALEA purpurea Vent. H. cels.
DAPHNE altaica Pallas, Ross.
oleoides L. Mant.
DIOSCORÆA waltheri.
DOMBEYA erithroxylum Willd. sp.
DONIA fruticosa.
glutinosa H. K.
inula glutinosa, p. 121.
doronicum glutinosum Willd.
sp.
squarrosa Bot. Magaz.
DRABA fladniziensis Jacq. Miscel.
ECHINUM parviflorum Willd. Enum.
EQUISETUM variegatum Willd. sp.
ramosum Dec. Fl.
ERODIUM lucidum Lapeyr. Fl. Pyren.
ERYTHRINA velutina Willd. sp.
EXACUM viscosum Smith. Ic. Pict.
FAGUS comptoniifolia (varietas)
FESTUCA multiflora Walther.
FLEMINGIA trinervia.
FRAXINUS caroliniana Willd. sp.
lancea Bosc. Dict.
longifolia Willd. sp.
nigra Bosc. Dict.
pallida Bosc. Dict.
parvifolia Encycl.
richardi Bosc. Dict.
viridis Mich. Arbr.
FUMARIA foetida H. K.
GALIUM ellipticum Willd. En. suppl.
- CRASSULE étalée. cap. or. ♀*
ALISIER à feuilles de cormier. ♀
CROTON à f. linéaires. Ant. s. ch. ♀
CROTON mucronatum Willd. sp. sub-
à cinq lobes. s. ch. ♀
panaché. inde. s. ch. ♀
CONCOMBRE strié. cayenne. ☉
CURTISIA à f. de hêtre. cap. or. ♀
CYCLAMEN de Cos. or. ☿
CYTISE blanc. or. ♀
des Alpes. ♀.
pourpre. carniol. ♀
DALÉA à fl. pourpres. Am. s. ☿
DAPHNÉ de Sibérie. ♀
à feuell. d'olivier. orient. or. ♀
DIOSCORÆA de Walther. Am. s. ☿
DOMBEYA de deux couleurs. ile
sainte-Hélène. s. ch. ♀
DONIA arbrisseau. or. ♀
à calice rude. Am. s. ? ☿
DRABA de Fladniz. ☿
VIPÉRINE à petites fleurs. Maroc. ☉
PRÉLE rameuse. F. ☿
ERODIUM luisant. pyrénées. ☿
ERYTHRINA velouté. Carac. s. ch. ♀
EXACUM visqueux. canaries. or. ☿
HÊTRE à feuilles de comptonia. ♀
FESTUCA à fl. nombreuses. Am. s. ♀
FLÉMINGIA à trois nervures. ile de
Fr. s. ch. ♀ (légumineuses).
FRÊNE de Caroline. or. ♀
à feuilles en lance. Am. s. ♀
à longues feuilles. Am. s. ♀
noir. Am. s. ♀
vert-pâle. Am. s. ♀
à petites feuilles. Esp. ♀
de Richard. Am. s. ♀
vert. Am. s. ♀
FUMETERRE à gr. fleurs. Am. s. ☿
CHILLENT elliptique. ☿

GOODIA lotifolia H. K.

GOODIA à feuell. de lotier. N. Holl.
or. ♀ (légumineuses).

GRINDELIA inulbides, p. 120. }

INULA serrata Pers. syn. }

HELIANTHEMUM alpestre. }

CISTUS alpestris Jacq. Fl. Austr. }

œlandicus Jacq. ibid. (an Lin.) }

HERMANNIA flammea Jacq. H. Sch.

HELIANTHÈME des Alpes. ♀

HERMANNIA couleur de feu. cap.
or. ♀

tenuifolia Bot. magaz.

à feuilles menues. cap. or. ♀

HIERACIUM foliosum Willd. sp.

EPERVIERE feuillue. Hongrie. ♂

lævigatum Willd. H. Ber.

lisse. ♂

ramosum Willd. sp.

rameuse. Hongrie. ♂

scabrum.

à tiges rudes. ♂

tubulosum, p. 102, species distincta ab H. intybaceo.

HIBBERTIA crenata Andr. rep. }

HIBBERTIA à f. crenelées. N. Holl.

grossulariæfolia Bot. magaz. }

or. ♀

HYOSCIAMUS ægyptiacus. }

JUSQUIAME d'Égypte. or. ♂

senecionis Willd. Enum. }

IBERIS nudicaulis, p. 156.

GUEPINIA iberis Bastard, Fl. suppl. }

TEESDALIA nudicaulis H. K.

ILEX Dahoon Mich. Fl.

HOUX Dahoon. caroline. or. ♀

opaca H. K.

opaque. Am. s. ♀

IRIS triflora Balbis, Add.

IRIS à trois fleurs. ♂

IXORA americana Jacq. H. Sch.

IXORA d'Amérique. Mexiq. s. ch. ♀

JUGLANS amara Mich. Arbr.

NOYER amer. Am. s. ♀

aquatica Mich. Arbr.

aquatique. Am. s. ♀

squamosa Mich. Arbr.

écailleux. Am. s. ♀

JUNCUS bicornis Mich. Fl.

JONC à deux cornes. Am. s. ♂

JUNIPERUS rigida.

GÉNÈVRIER à feuilles roides. N.

Holl. or. ♀

LAURUS diospyroides Mich. Fl.

LAURIER à feuilles de diospyros.

Am. s. ♀

glaucescens.

glaucescens. ♀

LEONURUS multifidus.

LÉONURUS lacinié. ☉

LINARIA viscosa.

ANTIRRHINUM viscosum Bot. Ma- }

gaz. (an Lin.). }

LINÀIRE visqueuse. esp. ☉

LITHOSPERMUM dispernum L. }

dec. }

GREMIL à deux graines, Sibérie. ☉

retortum Pallas, itin. (eadem }

Marsch.). }

LOBELIA alata Willd. N. Holl.

LOBÉLIA ailé. N. Holl. or. ♂

lutea L.

à fleurs jaunes. cap. or. ♂

LONICERA balearica.

CAPRIFOLIUM balearicum Dum. }

cours. Bot. cult. }

CHÈFREFEUILLE de Mahon. ♀

LUPINUS perennis Bot. magaz.

LUPIN vivace. Am. s. ♂

MADIA mellesa Jacq. H. Sch.

MADIA à fl. pédonculées. Chili. ☉

MALVAVISCUS mollis. }
ACHANIA mollis *H. K.* }
MANULEA alternifolia, *p. 60.* }
BUCHNERA fortida *Jacq. H. sch.* }
MELALEUCA chlorantha *Bonpl.*
Malm.
MELOCHIA varroniæfolia.
MESPILUS carolina *Encycl.*
celsiana Dum. cours. suppl.
elliptica Bosc.
eriocarpa Dec. syn. }
tomentosa Willd. sp. }
fissa Bosc.
flabellata Bosc.
flavescens Bosc.
heterophylla Flugge, Ann.
lobata Bosc.
lucida Dum. cours. Bot. cult.
nigra Willd. sp.
obovata Bosc.
odorata Andr. rep.
oliveriana Dum. cours. B. cult.
orientalis Bosc.
parvifolia. }
cratægus parvifolia Willd. sp. }
pectinata Dum. cours. Bot. cult.
prunellifolia Bosc.
purpurea Bosc.
quingeloba Bosc.
trifoliata Bosc.
METROSYDEROS crassifolia *Dum.*
cours. suppl.
citrina.
MIRABILIS hybrida *Willd. Enum.*
MORUS tartarica *L.*
NARCISSUS polyanthos *Delongch.*
sav. Etr.
subalbidus Delongch. sav. Etr.
NAUENBURGIA trinervata *Willd. sp.* }
BROTERA contrayerva *Schrad.* }
Journal.
NICOTIANA humilis.
OCHROMA lagopus *Willd. sp.*
OENOTHERA salicifolia.
OLEA exasperata *Jacq. H. sch.*
ORNITHOPUS lotoides *Viviani,*
Fragm.
OSMUNDA struthiopteris *L.* }
STRUTHIOPTERIS germanica *Willd.* }
sp.

MALVAVISCUS velouté. *s. ch. h*

MELALEUCA à fleurs blanches. *N.*
Holl. or. h

MÉLOCHIA à f. de varronia. *s. ch. h*

de Caroline. *h*

de Cels. orient. *h*

elliptique. *Am. s. h*

à fruit velu. *F. h*

incisée. *Am. s. h*

en évantail. *h*

jaunâtre. *h*

à feuilles variables. *h*

lobée. *Am. s. h*

luisante. *Am. s. h*

à fruit noir. *sibérie. h*

ovale-renversée. *h*

odorante. *h*

d'olivier. *perse. h*

d'Orient. *h*

à petites f. *Pinchaw. Am. s. h*

pectinée. *orient. h*

à feuil. de prunellier. *Am. s. h*

pourpre. *h*

à cinq lobes. *Am. s. h*

trifoliée. *orient. h*

MÉTROSYDÉROS à feuil. épaisses.

N. Holl. or. h

à fleurs pâles. *N. Holl. or. h*

MIRABILIS hybride. *ψ*

MURIER de Tartarie. *h*

NARCISSE à fleurs nombreuses. *F. ψ*

blanchâtre. *F. h*

NAVENBURGIA à trois nervures.

Am. m. ☉

NICOTIANE petite. *☉*

OCHROMA lagopus. *Antilles. s. ch. h*

ONAGRE à feuilles de saule. *♂*

OLIVIER tuberculeux. *cap. or. h*

ORNITHOPUS à feuilles de lotier.

Italie. ☉

OSMONDE d'Allemagne. *π*

- PACHYSANDRA procumbens** *mich. fl.* **PACHYSANDRA à tige tombante.**
am. s. 12
PANCRATIUM parviflorum. **PANCRATIUM à petites fleurs.** 12
PAULLINIA caracasana *jacq. h. sch.* **PAULLINIA de Caracas.** s. ch. 5
cauliflora jacq. ic. *cauliflore. caracas. s. ch. 5*
PEUCEDANUM petroselinum. **PEUCÉDANUM à feuil. de persil.** 12
PHYLLANTHUS ellipticus. **PHYLLANTHUS à f. elliptiq. s. ch. 5**
ovatus. *à feuilles ovales. s. ch. 5*
PINUS tournefortii. **PIN de Tournesfort.** *asie. 5*
PITOSPORUM sinense, *p. 251.* }
PITOSPORUM viridiflorum *bot. magaz.* }
PICRIS sprengeriana, *p. 104.* }
PICRIS pauciflora *willd. sp.* }
POA cristata *L. p. 20.* }
KOELERIA cristata *pers. syn.* }
POGOSTEMON plectranthoides *desf. mém. du mus.* **POGOSTÉMON à feuilles de plectranthus.** s. ch. 5 (labiées).
POPULUS tremuloides *mich. arbr.* **PEUPLIER, faux tremble.** *am. s. 5*
POTHOS digitata *jacq. ic.* **POTHOS digité.** *caracas. s. ch. 12*
lanceolata L. *lancéolé. barbade. s. ch. 12*
PRENANTHES hispida, *p. 101, chondrilla species.*
PRINOS ambiguus *mich. fl.* **PRINOS de Caroline.** 5
lanceolatus. *lancéolé. 5*
longifolius. *à longues feuilles. 5*
prunifolius. *à feuilles de prunier. 5*
PRUNUS acuminata *mich. fl.* **PRUNIER acuminé.** *am. s. 5*
chicasa mich. fl. *chicasaw. caroline. 5*
pensylvanica willd. sp. } *de Pensylvanie. 5*
borealis mich. arbr. }
pendula. *pendant. 5*
sphærocarpa mich. fl. *à fruit rond. am. s. 5*
susquihana dum. cours. suppl. *susquihana. am. s. 5*
PTEROSPERMUM acerifolium *cav. diss.* **PTÉROSPERME à feuilles d'érable.**
inde. s. ch. 5
PULMONARIA mollis *schrad. dec. cat.* **PULMONAIRE veloutée.** *Allem. 5*
PULTENÆA daphnoides *smith, soc. Lin.* **PULTENÆA à feuilles de daphné.**
N. Holl. or. 5
PYRUS michauxii *bosc. dict.* **POIRIER de Michaux.** *am. s. 5*
QUERCUS banisteri *mich. arbr.* **CHÊNE de Banister.** *am. s. 5*
prinus monticola mich. arbr. *prinus de montagnes. am. s. 5*
RHAMNUS latifolius *l'her. sert.* **NERPRUN à larges feuil.** *acores. 5*
RHODODENDRUM azaloides. **RHODODENDRUM à feuilles d'azaléa.** 5 (an species hybrida).
catesbæum dum. cours. suppl. *de Catesby. am. s. 5*
RHUS elegans *H. K.* **SUMAC élégant.** *am. s. 5*
RUBES palmatum. **GROSEILLIER à feuilles palmées.** 5
ROSA corymbosa *bosc. dict.* **ROSIER corymbifère.**
damascena willd. spec. *de Damas. F. 5*

evratina *Bosc. Dict.*
montana *Willd. Delph.*
pennsylvanica *Michx. Fl.*
pimpinellifolia.
rubripina *Bosc. Dict.*
sulphurea *minor.*
trifoliata *Bosc. Dict.*
turgida *Pers. syn.*
rapa *Bosc. Dict.* }

SANTOLINA pinnata Viviani, Fragm. distincta species a *S. eriophora*,
 p. 117.

SARACHA procumbens. }
ATROPA procumbens Cav. Ic. }
SAXIFRAGA ajugæfolia L.

aquatica *Lapeyr. Fl. Pyren.* }
petræa *Couan. ill.* }
ascendens *Willd. sp.* }
aretioïdes *Lapeyr. Fl. Pyren.*
groelandica L.
luteo-purpurea *Lapeyr. Fl.*
Pyren.
nervosa *Lapeyr. Fl. Pyren.*
ranunculoides.

SCUTELLARIA orientalis L.
SALIX acutifolia Willd. sp. }
violacea Andr. rep. }
aquatica *Smith, Fl.*
aurita *Smith, Fl.*
bicolor Willd. sp.
caroliniana Michx. Fl. }
nigra Willd. sp. }
cinerea L.
discolor Willd. sp.
forbyana Willd. sp.
lambertiana Smith, Fl.
malifolia Willd. sp.
phylicifolia L.
prunifolia Smith, Fl.
repens Smith, Fl.
russeliana Willd. sp.
sphacelata Willd. sp.
spathulata Willd. sp.
starkeana Willd. sp.
undulata Willd. sp.

SALVIA clusii Jacq. H. sch.
forsk. L. Mant.

SIDA crispa L.
pseudo-abutilon.
pulchella Willd. Enum.

d'Evrath. caroline. h
de montagne. Alpes. h
de Pensylvanie. h
à feuell. de Rimprenelle. F. h
à épines rouges. Am. s. h
jaune petit. h
trifolié. chine. h

turneps. Écosse. h

SARACHA à tiges tombantes. Mexique. ☉

SAXIFRAGE à feuilles d'Ajuga. Pyrénées. ☿

aquatique. Pyrénées. ☿

arétioïde. Pyrénées. ☿
du Groëland. Pyrénées. ☿
jaune-pourpre. Pyrénées. ☿

à nervures. Pyrénées. ☿.
à feuilles de renoncule. ☿

SCUTELLAIRE d'Orient. or. ☿

SAULE violet. h

aquatique. F. h
auriculé. F. h
bicolor. Allem. h
de Caroline. h
cendré. F. h
de deux couleurs. Am. s. h
Forbyana. Angleterre. h
de Lambert. Angleterre. h
à feuell. de pommier. Angl. h
à feuilles de phylica. h
à feuilles de prunier. Écosse. h
rampant. F. h
de Russel. F. h
sphacélé. F. h
en spatule. F. h
de Starke. silésie. h
ondulé. Allem. h

SAUGE de l'Ecluse. orient. or. h
de Forskal. orient. ☿

SIDA crépu. Antilles. ☉
faux abutilon. ☉
élégant. N. Holl. or. h

- SISYMBRIUM* *crisimifolium*, p. 155, deleatur. *syn.* *SISYMBRIUM* *allioni*
pers. syn.
- SONCHUS* *acuminatus* *willd. sp.* *LAITRON* à f. pointues. *am. s.* ☉
pinnatifidus. *pinnafide* *MADÈRE* ? *or.* ♀
virgatus. *effilé.* *am. s.* ☉
prænanthes virgata *mich. fl.* }
- SPIRÆA* *acutifolia* *willd. Enum.* *SPIRÆA* à feuilles aiguës. ♀
alpina *willd. sp.* *lancéolé.* *russe.* ♀
oblongifolia *wald. et kitt.* *à feuell. oblongues.* *hongrie.* ♀
ulmifolia *willd. sp.* *à feuell. d'orme.* *carniole.* ♀
- STEVIA* *laxiflora* *dec. mss.* *STÉVIA* à fl. lâches. *mexique.* *or.* ☿
ovata *willd. sp.* *à feuell. ovales.* *mexique.* *or.* ☿
- THALICTRUM* *rugosum*, p. 146, dele, et *Th. vaginatum* subijce.
- THUYA* *australis.* *bosc.* *THUYA* des terres australes. *or.* ♀
inæqualis. *à écailles inégales.* ♀
- THUNBERGIA* *fragrans* *willd. sp.* *THUNBERGIA* odorant. *inde. s. ch.* ♀
- TILIA* *rubra* *dec. cat.* *TILLEUL* rouge. *f.* ♀
mississippiensis *bosc. dict.* *du Misissipi.* ♀
- TORDYLIUM* *sulcatum.* *TORDYLIUM* sillonné. ☿
- TRIFOLIUM* *suavcolens* *willd. h. ber.* *TRÈFLE* odorant. *perse.* ☉
- ULMUS* *viscosus.* *ORME visqueux.* *am. s.* ♀
striata *bosc. dict.* *strié.* *am. s. ?* ♀
- VACCINIUM* *arboreum* *mich. fl.* *MIRTILLE* arborescent. *am. s.* ♀
arctostaphylos *andr. rep.* *d'Orient.* ♀
frondosum *L.* *feuillu.* *am. s.* ♀
glaucum *mich. fl.* *glauque.* *am. s.* ♀
ligustrinum *L.* *à feuilles de troëne.* *am. s.* ♀
myrsinites *mich. fl.* *myrtoïde.* *am. s.* ♀
nigrum. *à fruit noir.* ♀
nitidum *andr. rep.* *luisant.* *am. s.* ♀
resinosum *mich. fl.* *résineux.* *am. s.* ♀
- VIBURNUM* *acuminatum.* *VIORNE* acuminée. *am. s.* ♀
edule *mich. fl.* *comestible.* *am. s.* ♀
- ERVUM* *gracile* *dec. suppl.* }
- VICIA* *gracilis* *lois. fl.* }
- VICIA* *serratifolia* *jacq. austr.* *VESCE* à feuell. en scie. *autriche.* ☉
- VIOLA* *pedata.* *L.* *VIOLETTE* digitée. *am. s.* ☿
- YUCCA* *boscii* *Hort. paris.* quæ floruit in horto dicto *Litta* juxta *Milanum*,
 est genus novum *AGAVE* affine. *Balbis* in literis.

6
=

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

580.7D45T2

C001

TABEAU DE L'ECOLE DE BOTANIQUE DU JARDI

3 0112 009913325