Collin, H. — *Escharen paloloworum*, *Lysidice viridis* (Gray).

(1896).

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

39653

GIFT OF

Alexander Agassiz

June 3, 1913.

Entered

JUN 3 1913

39,653

A. Agassiz
UEBERREICHT
VOM VERFASSEN.

~~APR 27 1897~~

Anhang:

Bemerkungen über den essbaren Palolowurm, *Lysidice viridis* (Gray).

Von **Ant. Collin** in Berlin.

Einer freundlichen Aufforderung des Herrn Marinestabsarzt Dr. A. Krämer gern entsprechend, will ich im Anschluss an die vorstehende Arbeit einige zusammenfassende Bemerkungen über einen eigenthümlichen Bewohner der Korallenriffe, den essbaren Palolowurm des pacifischen Oceans geben; obwohl diese Notizen Neues kaum bieten werden, dürften sie doch vielleicht manchen Interessenten finden und Reisende, welche den Vorzug haben, jene gesegneten Gegenden besuchen zu können, vielleicht zu weiteren, eingehenderen Forschungen über diese biologisch so ausserordentlich merkwürdige, aber noch in vielfacher Hinsicht unklare Erscheinung anregen.

Lysidice viridis (Gray) 1847; Palolowurm.

Wichtigste Litteratur:

1847. *Palola viridis* (nicht Palolo). — Gray, An Account of Palolo, a Sea Worm eaten in the Navigator Islands. By the Rev. J. B. Stair, with a Description by J. E. Gray etc. — Proc. Zool. Soc. London XV, p. 17—18. Auch in: Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, p. 409 bis 410 (1847). Z. Th. abgedruckt in: Encyclop. Britann. 8th edit. Vol. XI, p. 297 (1856).
1858. „ „ — Macdonald, J. D. On the external Anatomy and Natural History of the Genus of Annelida named Palolo by the Samoans and Tonguese, and Mbalolo by the Fijians. — Trans. Linn. Soc. London XXII, pt. III, Nr. XVI, p. 237—239, pl. XLI.
1862. „ „ — Seemann, B. Viti: An Account of a Government Mission to than Vitian or Fijian Islands in the years 1860—61. Cambridge 8°, p. 59—63; 4 Textfig.
1863. „ „ — Hood, T. H. Notes of a Cruise in H. M. S. „Fawn“ in the Western Pacific in the Year 1862. — Edinburgh, 8°, 268 pp., 1863; p. 126—128 (Pulolo von Samoa.)
1865. *Lysidice palolo* — Quatrefages, A. de. Histoire naturelle des Annelés marins et d'eau douce. Annélides et Géphyriens I. Paris, 8°, 1865, p. 379.

1868. *Lysidice viridis* — Ehlers, E. Die Borstenwürmer (Annelida Chaetopoda) nach system. und anatom. Untersuchungen dargestellt. Bd. I. Leipzig 1864—1868, p. 367, Anmerkung, Taf. XVI, Fig. 17—18.
1875. *Palola viridis* — Whitmee, S. J. On the Habits of *Palola viridis*. — Proc. Zool. Soc. London 1875, p. 496—502. (Vorläuf. Mittheil., ibid., p. 158).
1883. *Palolo viridis* — Powell, Th. Remarks on the Structure and Habits of the Coral-reef Annelid, *Palolo viridis*. — Journ. Linn. Soc. (Zool.) XVI, p. 393—396.
1884. „ „ — Turner, G. Samoa a hundred years ago and long before. London, 8°, 1884, p. 206—207.
1885. „ „ — McIntosh, W. C. Report on the Annelida Polychaeta collected by H. M. S. Challenger during the years 1873—76. — Rep. Scient. Results Challenger, Zoology Vol. XII, p. 257—261.

Das von Herrn Marinestabsarzt Dr. Krämer gesammelte, gut conservirte Material von den Samoa-Inseln, aus den Monaten October und November 1893, enthält unter einer reichlichen Masse von Bruchstücken und Schwanzenden leider keinen einzigen Kopf. Das ist nicht mehr verwunderlich, seitdem man weiss, dass mit Kopf versehene Thiere zu den grössten Seltenheiten gehören und nur ganz zufällig an die Oberfläche kommen; sogar nur zweimal ist bisher ein Kopf dieses Wurmes beschrieben resp. abgebildet worden, und zwar von Macdonald und Seemann; dabei scheint es in dem letzteren Falle überhaupt zweifelhaft, ob Seemann wirklich einen Palolowurm vor sich gehabt hat, denn nach den übereinstimmenden Berichten vieler Beobachter erreichen schon allein die Bruchstücke des Wurmes bis $\frac{1}{2}$ m Länge, während Seemann's in natürlicher Grösse gegebene Abbildung des ganzen Thieres nur 9 cm misst; auch viele von Dr. Krämer gesammelte Bruchstücke und solche der Berliner Zoolog. Sammlung und des hiesigen Zoolog. Instituts erreichen eine viel bedeutendere Länge. Selbst wenn man die ausserordentliche Verschiedenheit der Körperlänge einer und derselben Chaetopoden-species in Betracht zieht, erscheinen die obigen Grössenunterschiede doch etwas zu bedeutend, und es dürfte sich in diesem Seemann'schen Falle also entweder um ein junges, nicht ausgewachsenes oder abnorm kurzes Exemplar, vielleicht gar um eine ganz andere Art handeln.

Ein Bruchstück einer Eunicide aus der Grube'schen Sammlung, jetzt im Besitz der Berliner Zoolog. Sammlung, welches als „*Palola viridis*, Gray, Kopf?“ bezeichnet war, gehört überhaupt nicht der Gattung *Lysidice* an.

Durch die Untersuchung Macdonalds scheint die systematische Stellung des Palolowurmes, als in die Gattung *Lysidice* gehörig, genügend klargestellt, wenn auch nähere Untersuchungen, namentlich des Kopfes, höchst wünschenswerth sind; daher muss der von Gray geschaffene Gattungsname *Palola* aufgegeben werden.

Der von Macdonald abgebildete Kopf (Fig. 1) zeigt die für *Lysidice* charakteristischen 3 Fühler und den Kieferapparat. Die darauf folgenden etwa 20 Segmente waren beträchtlich schmaler, als die Segmente der reifen Bruch-

stücke, auch waren auf den ersten Segmenten die typischen dunklen Rückenflecke sehr undeutlich und kaum sichtbar.

Die Bruchstücke, wie sie an der Oberfläche des Meeres gefangen werden, haben eine Länge bis 50 cm und gewöhnlich eine Breite von 2—3 mm, welche nach Powell auch $\frac{1}{4}$ inch (ca. = 6,3 mm) erreichen kann (Fig. 2). Die Parapodien tragen keine Kiemen, aber je einen dorsalen und ventralen Cirrus und Borstenbündel mit zweierlei Borsten: lange fein zugespitzte, welche, wie M'Intosh gegenüber Macdonald richtig bemerkt, nicht um ihre Längsachse gedreht sind, und zusammengesetzte Borsten, deren Endtheil zwei kleine Zähne trägt. Von jeder dieser beiden Borstenarten finden wir 2—3 in jedem Parapodium, in den vorderen Segmenten hinter dem Kopf sind sie jedoch nach Macdonald etwas zahlreicher. Auf jedem Segment liegt in der Medianlinie des Rückens ein dunkler Fleck, auf welchem nach Ehlers die Ausführungsgänge eines Drüsensystems münden. Diese dunklen Flecke sind durch eine über den ganzen Rücken laufende helle Längslinie verbunden. Am letzten Schwanzsegment finden sich zwei kürzere dorsale und zwei lange ventrale Cirren; einer dieser längeren Cirren war bei einem Exemplar von Dr. Krämer in 2 Theile zerspalten, so dass es den Anschein hatte, als ob 3 lange Analcirren vorhanden wären.

Die Farbe des Palolowurmes ist sehr verschieden, und zwar sind die Weibchen im Leben schmutzig-indigofarbig oder dunkelgrün, die Männchen dagegen hellbraun bis ockerfarbig oder weiss. In Alcohol sind die Weibchen meist schmutzig-graugrün, bisweilen auch vollständig weiss (Exemplare der Berliner Zoolog. Sammlung), die Männchen röthlichbraun. Die grünen Eier, mit welchen die weiblichen Bruchstücke prall gefüllt sind, haben einen Durchmesser von 0,21 mm.

Die Verbreitung des Palolo ist nach unserer jetzigen Kenntniss auf einige Inselgruppen des pacifischen Oceans beschränkt und zwar auf die Samoa-, Fidschi-, Tonga- und Gilbert-Inseln. Ob es sich bei der von Seemann ebenfalls als Fundort angegebenen Gruppe der Neuen Hebriden wirklich um Palolo handelt, scheint fraglich, denn einige Borstenwürmer, welche angeblich dort gegessen werden, stellten sich bei der Untersuchung nach M'Intosh als Phyllodociden heraus. In der Berliner Sammlung finden sich ferner einige von Putze gekaufte Exemplare, angeblich von Neu-Britannien.

Der Palolowurm ist ein Bewohner der Korallenriffe und steigt nur zweimal im Jahre in den Monaten October und November zur Ablage der Geschlechtsproducte an die Oberfläche. Er erscheint nur an gewissen Theilen der Inseln, an der Seite der Lagune, nahe dem äusseren Riff. Nach der Mittheilung von Stair (bei Gray) treten die Würmer am Rande der Riffe besonders da auf, wo viel Süsswasser ausströmt, doch ist das nach der Beobachtung von Dr. Krämer nicht der Fall. Während der übrigen Zeit des Jahres scheinen die Würmer in den tieferen Regionen der Korallenriffe zu leben, doch sind sie dort mit Ausnahme eines Falles noch nicht in ihren Schlupfwinkeln beobachtet oder dort gefangen worden: Whitmee fand nämlich ein Exemplar in den Spalten eines abgestorbenen Korallenblockes, welcher von einer Stelle nahe der Küste entnommen war, an welcher der Palolo erscheinen sollte.

Die Würmer steigen in so gewaltigen Massen zur Oberfläche auf, dass die See an solchen Stellen „mehr fest als flüssig erscheint“. Sie zeigen sich nur am frühen Morgen an bestimmten Tagen, über welche weiter unten Näheres mitgeteilt werden soll. Einzelne Exemplare erscheinen bei der ersten Morgendämmerung, dann werden sie von Minute zu Minute häufiger und beleben schliesslich bei Sonnenaufgang in so zahllosen Massen die Oberfläche, dass nach Aussage einer englischen Lady ein Taschentuch in einer Wassertiefe von 4 inches (= 10,16 cm) unter der Masse der Würmer nicht mehr sichtbar war. Das ganze Schauspiel dauert nur wenige Stunden, und alle Würmer sind einige Zeit nach Sonnenaufgang vollständig verschwunden. Immer sind es nur Bruchstücke ohne Kopf, welche an die Oberfläche kommen. Die bis $\frac{1}{2}$ m langen Stücke haben ihre eigene Bewegung und schwimmen entweder fast gerade ausgestreckt oder in grösseren spiraligen Windungen, oft sehr schnell durch einander. Powell glaubt den einzelnen Stücken einen besonderen Gesichtssinn zuschreiben zu müssen, da sie den Fangkörben geschickt auszuweichen suchen.

1

Die Beobachtung von Powell, dass die Bewegung ihrer Borsten beim Schwimmen denselben Eindruck hervorruft, wie die Wimperbewegung der Rotatorien, erscheint, wie auch M'Intosh sagt, etwas abenteuerlich. Die grösseren Stücke zerbrechen allmählig selbstständig in immer kleinere Theile, und es findet dabei eine ausgiebige Entleerung der männlichen und weiblichen Geschlechtsproducte statt, mit denen ihre Leibeshöhle vollständig vollgepfropft war. Die Theilung der Stücke setzt sich immer weiter fort, bis schliesslich nur ganz kurze Theilstücke von wenigen Segmenten übrig bleiben, welche dann ganz leer von Geschlechtsproducten zu Boden sinken. Die See ist dann durch die massenhafte Ausstossung der Eier und des Sperma weithin grünlich und weisslich-trübe gefärbt. Whitmee beobachtete ganz denselben Vorgang an einigen Stücken, welche er in ein Glasbassin gesetzt hatte: Männchen und Weibchen zerbrachen und die Flüssigkeit trübte sich durch die Beimischung des Sperma; die Eier setzten sich allmählig zu Boden. Uebrigens entwickelten sie sich im Aquarium nicht weiter.

2

Es scheint zweifellos, dass die Thiere allein zum Zwecke der Ablagerung der Geschlechtsproducte und zur Befruchtung der Eier an die Oberfläche kommen. Dieser Process wird durch die leichte Zerbrechlichkeit natürlich begünstigt und beschleunigt. Dass die Theilstücke, deren innere Organisation zum Theil atrophischen Character trägt und welche in der Bildung von Geschlechtsproducten gänzlich aufgegangen zu sein scheinen und ihren Endzweck damit erreicht haben, etwa nach ihrem Untersinken wieder zu neuen Thieren anwachsen sollten, scheint gänzlich ausgeschlossen, vielmehr werden sie sämmtlich zu Grunde gehen. Hiergegen würde auch Powells Beobachtung nicht sprechen, welcher grössere Bruchstücke, ohne weiter zu zerplatzen, durch „Ei- und Samenleiter“ (vielleicht die

Segmentalorgane?) Geschlechtsproducte ausstossen sah und die Stücke ganz unversehrt, aber ganz leer davon, fangen konnte. Die in der Tiefe zurückgebliebenen Kopftheile dagegen dürften wahrscheinlich wieder neue Endstücke hervorsprossen lassen.

Die merkwürdigste Erscheinung in der Biologie des Palolowurmes ist sein ganz regelmässiges Auftreten in den Monaten October und November zur Zeit des letzten Mondviertels; nur zu diesen zwei Zeitpunkten im Jahre erscheint er an der Oberfläche auf den Korallenriffen, und zwar ist der Novemberschwarm meist reichlicher, als der im October. Bisweilen ist sein Erscheinen an den einzelnen Inseln einer zusammengehörigen Gruppe auch verschieden; so tritt er nach Angabe des Herrn Dr. Krämer an der Insel Sawaii der Samoa-Gruppe besonders reichlich im October auf, während er bei Apia auf Upolu in der Regel im November häufiger ist. Ueberhaupt ist er manchmal im October an einer Stelle in Myriaden von Exemplaren vertreten und einen Monat später finden sich ebendasselbst nur wenige Exemplare, sowie umgekehrt.

Jedesmal erscheinen die Würmer in der Morgendämmerung am Tage vorher und am Tage des letzten Mondviertels selbst, einige Nachzügler zuweilen auch noch am Tage darauf. Da das Auftreten des Palolo ganz regelmässig so enge mit den Mondphasen verknüpft ist und er nur zu dem Zeitpunkte des letzten Mondviertels zur Oberfläche kommt, so ist es klar, dass er in jedem Jahre um mehrere Tage früher kommen würde, denn die Mondmonate fügen sich nicht dem Sonnenjahr. Erschiene der Palolo jedesmal nach 12 Mondmonaten (etwa 354 Tage) beim entsprechenden letzten Mondviertel, so käme er jedes folgende Jahr immer um etwa 11–12 Tage früher. Würde er 13 Mondmonate bis zu seinem Wiedererscheinen brauchen, so würde er sich jedes Jahr um etwa 18 Tage verspäten. In beiden Fällen würde seine Erscheinungszeit in kurzer Frist aus den Monaten October und November heraustreten und er könnte im Laufe der Jahre zu jeder beliebigen Jahreszeit, in jedem beliebigen Monate auftreten; dieses ist aber, so lange man ihn kennt, nicht der Fall gewesen, vielmehr ist er stets nur in der Zeit von etwa dem 5. October bis gegen Ende November sichtbar gewesen. Diese Thatsache brachte Whitmee auf den glücklichen Gedanken, dem Erscheinungsmodus des Palolo nachzuspüren. Seine zum Theil allerdings lückenhaften Beobachtungen erstrecken sich für die Samoa-Inseln auf den Zeitraum von 1861–1873, unter Berücksichtigung eines Datums von den Fidschi-Inseln. An der Hand dieser Daten stellt Whitmee die sehr annehmbare Behauptung auf, dass der Palolowurm stets zwei Jahre hintereinander nach je 12 Mondmonaten erscheint, dass aber in jedem dritten Jahr ein Intervall von 13 Mondmonaten auftritt. Dieses stimmt mit den bekannten Erscheinungsdaten des Wurmes überein und dabei überschreitet auch die Erscheinungszeit des Wurmes für längere Zeit nicht die Monate October und November. Derartige Intervalle von 13 Mondmonaten sind nach Whitmee in den Jahren 1862/63, 1865/66, 1868/69 und 1871/72 eingetreten.

Whitmee rechnet aber noch genauer. Wenn der Palolo nämlich zunächst 2 Jahre nach je 12 Mondmonaten, im 3. Jahre aber nach 13 Mondmonaten, also nach 3 Jahren zusammen in 37 Mondmonaten wiedererscheint, so kommt

er alle 3 Jahre noch immer um etwas mehr als 3 Tage früher, da 3 mittlere Sonnenjahre über 3 Tage länger sind, als 37 Mondmonate. Würde hier nicht eine Correction eintreten, so würde die Erscheinungszeit des Palolo noch immer nach einer längeren Reihe von Jahren die Monate October und November nicht mehr einhalten, sondern immer frühzeitiger fallen. Zum Ausgleich dafür müsste nach Whitmees Rechnung alle 28 bis 29 Jahre ein Extra-Mondmonat eingeschaltet werden; demnach würde dann eine solche dreijährige Paloloperiode zu dieser Zeit 1 Intervall von 12 und 2 von je 13 Mondmonaten umfassen. Eine solche Extra-Einschiebung von einem Mondmonat prophezeite Whitmee für 1873/74 und fand seine Vermuthung bestätigt, denn der Palolo zeigte sich 1874 erst nach Ablauf von 13 Mondmonaten am 31. October und 1. November.

Einfacher erklärt sich die Sache übrigens in folgender Weise. Da die Mondphasen alle 19 Jahre fast genau zu derselben Sonnenzeit wiederkehren (Metonischer Cyclus), so liegt es nahe, dass der Palolo alle 19 Jahre zu demselben Datum erscheinen wird; dieses finde ich durch die Thatfachen bestätigt, denn 1874 beobachtete Whitmee den Palolo auf Samoa am 31. October und 1. November; 19 Jahre später (1893) sammelte Dr. Krämer das mir vorliegende Material ebenfalls am 31. October und 1. November.

An den Gilbert-Inseln soll der Palolo nach Powell stets in den Monaten Juni und Juli erscheinen.

Aus Ursachen unbekannter Natur tritt der Palolowurm bisweilen auch in ganz anormaler Weise zu anderen Jahreszeiten auf; so soll er nach Whitmee gelegentlich, aber sehr selten auch im December bei Samoa vorkommen. Nach einer handschriftlichen Notiz von Herrn P. Stoos in Lübeck blieb der Palolo an den Fidschi-Inseln im Jahre 1885 ganz aus, erschien dann aber ausser der Zeit Ende Januar 1886. Ueber ein weiteres abnormes Auftreten berichtet Powell, nach welchem der Palolo am 21. März 1881 bei Samoa erschien. Wie mir Herr Professor Goldstein, hier, freundlichst mittheilte, war am 15. März 1881 Vollmond; der Wurm ist also an einem Tage erschienen, als der Mond kurz vor dem letzten Viertel stand; er hat somit, wenn auch nicht die Jahreszeit, so doch wenigstens die Mondphase eingehalten.

Auf Samoa und den Tonga-Inseln heisst der Wurm Palolo, auf den Fidschi-Inseln Mbalolo oder Balolo. Die Samoaner nennen den Wurm auch einen Fisch (i'a = ika in anderen polynesischen Dialekten, und = ikan im Malayischen). „Pa“ bedeutet nach Turner soviel wie „platzen“, „bersten“; „lolo“ heisst „ölig“ oder „fettig“. Die Eingeborenen benennen die Monate nach dem Namen Palolo; so heisst auf den Fidschi-Inseln der October vula i mbalolo lailai (= kleiner Palolomonat), der November vula i mbalolo levu (= grosser Palolomonat), weil im letzteren der Palolo am reichlichsten auftritt. Die Samoaner nennen nach Whitmee die Jahreszeit, wann der Passatwind am Anfang des Sommers oder der Regenzeit von Südost nach Nordost umschlägt, vāi-palolo (d. h. Zeit des Palolo); die entgegengesetzte Jahreszeit, wann der Passat von Nordost nach Südost wechselt, am Anfang der trockenen Jahreszeit, wird in ähnlicher Weise vāi to'elau genannt (d. h. Zeit des Umschlagens des Nordwindes). Diese Verbindung des Namens Palolo mit den Monaten und Jahreszeiten spricht wohl sicher dafür, dass sich

die Erscheinungszeit des Palolo im Laufe langer Zeiträume ebensowenig geändert hat, wie die Jahreszeiten selbst. Die Bewohner der Gilbert-Inseln nennen den Wurm „Te Nmatamata“ (d. h. der gleissende oder glänzende).

Der Palolowurm ist eine sehr begehrte Lieblingsspeise der Eingeborenen, auch manche dortige Europäer haben Geschmack daran gefunden. Das Erscheinen der Thiere auf den Korallenriffen ist für die Samoaner und Fidschi-Insulaner ein Freudenfest. Jung und Alt rudert in der Morgendämmerung hinaus, um die werthvolle Gabe der Natur von den Booten aus mit Sieben und schön gefertigten Körben, oder auch mit der blossen Hand einzuheimsen. Die Palolomasse wird entweder zum Theil gleich roh verzehrt oder in Brotfruchtblätter gebunden und über angezündeten Feuern gebacken. Händler kaufen an Ort und Stelle den Palolo auf, um andere Theile der Inseln damit zu versehen und Boten werden mit Palolo als Geschenk an ferner wohnende Häuptlinge gesandt, in deren Gegend die Schwärme nicht erscheinen. Sein Geschmack soll nach Hood's Mittheilung an eine Auster erinnern. Die Fidschi-Insulaner haben den Aberglauben, dass nach dem Palolofang grössere Regengüsse auftreten müssen, um „die Feuer, woran der Palolo geröstet ist, auszulöschen“; anderenfalls wird eine schlechte Yamswurzelernte erwartet.

Beiläufig gesagt ist übrigens die Zahl der zur Speise dienenden höheren Würmer nicht gross: ausser dem Palolo wird nach Dr. Krämer noch ein grosser Regenwurm theilweise von den Samoanern gegessen und nach M'Intosh geniessen die Bewohner der Neuen Hebriden Borstenwürmer aus der Familie der Phyllodo-ciden als Speise, welche sie A'oon nennen. Von einem auf Amboina gegessenen Wurm wird weiter unten die Rede sein. In China sollen ferner Sipunculiden genossen werden.

Die ausserordentliche öconomische Wichtigkeit, welche der Palolo für die Insulaner besitzt, hat es natürlich zur Folge, dass die Eingeborenen sein Erscheinen mit grösster Genauigkeit beachten und sogar meist mit gutem Erfolge vorherberechnen. Sie achten nach Whitmee und Powell zuerst auf die Blüthezeit der scharlachrothen Blumen von *Erythrina indica*, eines Strauches aus der Familie der Papilionaceen (Aloalo genannt). Beginnen dann noch der Tavai (*Rhus taitensis*), der Lagaali (*Aglaia edulis* Asa Gray) und die Sisi (*Eugenia* sp.) zu blühen, so sehen die Eingeborenen nach dem Stande des Mondes; wenn derselbe dann in der Morgendämmerung tief über dem westlichen Horizont steht, so erwarten sie am 10. Tage darauf den Palolo. Meist ist ihre Rechnung richtig, doch irren sie bisweilen, wann ein Intervall von 13 Mondmonaten seit dem vorigen Erscheinen des Palolo eintritt, um einen ganzen Monat. Von anderen wird dagegen auf das Untersinken gewisser Sternbilder unter den Horizont geachtet und daraus die Palolozeit berechnet. Hood berichtet, dass drei Tage vor dem Erscheinen des Palolo die „malio“ (gewisse Landkrabben, *Gecarcinus*) sich in grossen Zügen aus dem Innern an die Meeresküste begeben, und diese Wanderung soll so sicher mit der Palolozeit zusammentreffen, dass die Eingeborenen hierdurch auf die drei Tage später auftretenden Paloloschwärme vorbereitet werden. Dieses eigenthümliche Zusammentreffen brachte Hood auf den abenteuerlichen Gedanken, dass die Palolobrushstücke der Laich dieser Krabben seien, eine Annahme, die

aber weder bei den dortigen Europäern noch Eingeborenen Anklang fand, wie Hood selbst sagt.

Als begleitende Würmer des Palolo wird namentlich eine Nereis-Art angegeben; in dem Material von Herrn Dr. Krämer fanden sich in der Palolo-masse eine Anzahl Polychaeten aus den Gattungen Euphrosyne, Lirione und Phyllodoce.

Zum Schlusse sei noch auf eine dem Palolo-Auftreten ganz ähnliche Erscheinung hingewiesen, auf welche Ed. von Martens (Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde zu Berlin, Jahrg. 1887 p. 17) zuerst aufmerksam gemacht hat, nämlich auf die Schilderung eines essbaren Wurmes (Wawo) von Amboina in dem Werke von Georg Everhard Rumphius „D' Amboinsche Rariteitkamer“ etc., Amsterdam 1705. Ich will hier einen gekürzten Auszug aus seiner Beschreibung in freier Uebersetzung geben. Rumphius beschreibt auf Seite 51 ff. seine „Vermiculi marini' Wawo“ von Amboina wie folgt:

„Es sind kleine Würmchen, kaum 1 Fuss lang, in der Dicke einige wie Segelgarn, die meisten wie gezwirnte Seide, in Klümpchen durch einander vermisch, in welchen man immer einen grösseren, dickeren und längeren sieht, als die anderen, welchen man für die Mutter hält. Die meisten sind dunkelgrün, doch spielt darin auch etwas schmutzigweiss oder gelb, roth, braun und blau. Ihre rechte Gestalt kann man kaum erkennen, ausser dass sie wie ein verwirrter Strang Garn durcheinander hängen und sofort in Stücke brechen, wenn man sie anrührt; wenn man sie in Salzwasser bis zum anderen Tag stehen lässt, so kann man unter einem Vergrösserungsglas die folgende Gestalt daran erkennen; in jedem Klumpen ist ein etwas grösserer Wurm, als die anderen, welchen man die Mutter nennt; er ist dick wie grobes Segelgarn und bisweilen wie ein dünner Federkiel, bleichgelb oder weisslich; an dem Köpfchen kann man nur 2 Hörnchen erkennen, wie sie die Schnecken haben, und an jeder Seite vier deutliche Füsschen, wie Raupen. Die anderen Füsschen sind sehr fein, wie Härchen, unzählbar, und ziehen sich aus und ein. Die Kinder hängen rund um diese Mutter; in der Dicke sind sie wie feines Segelgarn oder gezwirnte Seide, und grünlich, einige eine Hand, andere $1\frac{1}{2}$ Fuss lang. Sie sind quer über den Leib gerippt, als ob sie aus vielen Gliedern beständen, doch sind sie so zart, dass sie gleich in Stücke zerbrechen, wenn man sie in die Hand nimmt; an den gekochten kann man die Glieder noch besser erkennen. Wenn man sie des Abends, frisch aus dem Wasser geholt, besichtigt, kann man deutliche Zeichen von Leben daran erkennen, aber man kann sie nicht bis zum nächsten Tage am Leben erhalten. Zeichen von Gesicht, Gehör und Geruch kann man auch daran bemerken, denn es scheint durch den Gesichtssinn zu geschehen, dass sie auf eine brennende Fackel oder Licht zuschiessen, doch wenn der Mond aufgeht, so verbergen sie sich wiederum. Das Gehör muss man ihnen zuschreiben, weil sie verjagt werden, wenn man grossen Lärm macht, und vom Geruch muss es kommen, dass sie so begierig nach schwangeren Frauen und nach mit Geschwüren behafteten Beinen zuschwimmen.

„Dieses Gewürm sieht man das ganze Jahr hindurch nicht, sondern allein am 2., 3. und 4. Abend nach dem vollen Mond, welcher eintritt, wenn die Sonne

in den Fischen steht, im Februar und März; alsdann muss man sie sofort nach Sonnenuntergang suchen mit angesteckten Fackeln, auf solchem Strand, wo grosse Klippen in der See stehen, die voll von Spalten und Rissen, aber glatt und nicht scharf sind; um diese sieht man die Würmer wimmeln und auf diejenigen zukommen, welche eine brennende Fackel im Boot haben; dann kann man sie mit ausgespannten Tüchern oder feinen Sieben schöpfen. Die ersten beiden Nächte findet man sie um die Klippen, später aber etwas weiter fort in die See getrieben. Die Eingeborenen wünschen, dass man beim Fang ruhig sein und das Boot ohne Lärm vorwärts treiben soll. — Am folgenden Vollmond sind die Würmchen schon grösser geworden, ungefähr strohhahldick, ganz wie junge Tausendfüsse, grün, braun und weiss gemischt und daher etwas abscheulich, welche auch einen besonderen Namen haben und nicht für das echte „Wawo“ gehalten werden. Am 5. Abend nach dem Vollmond verlieren sie sich und man kann sie das ganze Jahr hindurch nicht mehr sehen, ausser, wie gesagt, an dem folgenden Vollmond, zu welcher Zeit sie eine andere Gestalt und Namen haben. Der genannte Vollmond, wann der Mond in der Jungfrau und die Sonne in den Fischen steht, ist die gewöhnliche Zeit des Wawo, doch geschieht es bisweilen, dass man sie auch etwas früher findet, nämlich bei dem Vollmond, wann die Sonne noch nicht in die Fische getreten ist. Das Wawo kommt auch nicht jährlich in gleicher Menge an die Oberfläche; denn wenn viele warme Regen vorangehen, kommt es reichlich, und man kann es alle 3 Abende nach einander schöpfen; aber wenn viele trockene und heisse Tage vorangehen, kommt es wenig und nur an einem Abend. Am Tage kann man schon erkennen, ob es denselben Abend in die Höhe kommen wird, denn man sieht alsdann bei Tag schwarze Flecken im Seewasser, auch hat man erfahren, dass in jedem Jahre hohes Wasser ist und immer höher als die tägliche Fluth, wenn das Wawo erscheint.

„Die gewöhnliche Meinung ist, dass das Gewürm ein Auswurf der genannten Klippen ist; immer, wo solche Klippen fehlen, findet man das Wawo auch nicht. Das meiste wird gefangen in dem Amboinischen Golf, um den rothen Berg, an den drei Liasserschen Inseln, bei Latuhalay und in Banda, als auch auf den Molukken.

„Vorläufig mag es „Vermiculi marini“ heissen; der malayische Name ist unbekannt, weil es vielleicht in den Ländern nicht vorkommt; im gewöhnlichen Amboinisch heisst es Wawo und Wau, was man auch für Ternatisch hält. Auf Hitoe heisst es „Melatten“, auf Leijtimor „Laur“, auf den Uliazzers „Melattonno“, in Banda „Oele“. Weil es nun je nach den beiden Vollmonden zweierlei Art ist, so wird das erste und eigentliche „Wawo Kitsjil“ (= kleines Wawo), das andere oder grosse am folgenden Vollmond „Wawo bezaar“ (= grosses Wawo) genannt. Die Bewohner von Hitoe unterscheiden es genauer und machen 3 Arten daraus, die erste heisst Melatten Salanay, das sind kleine Würmchen, wie ein Haufen Faden aneinander hängend, welche am Vollmond im Januar vorkommen, wann die Sonne in den Wassermann tritt; doch weil es nicht alle Jahre an die Oberfläche kommt und es auch nur gering ist, wird es nicht gesammelt, sondern zur Nahrung für die Fische gelassen. Die zweite und eigentliche Sorte heisst Melatten Yan (d. h. Fisch-Melatten), als ob es nun schon zu lebenden Fischen oder kenntlichen

Geschöpfen geworden wäre. Die dritte Sorte heisst Melatten Lalian (d. h. Tausendfuss-Wawo), weil es dann die Gestalt von Tausendfüssen bekommen hat. Dies kommt hervor zu dem folgenden Vollmond des April und wird zum Essen für ungeeignet gehalten.

„Man macht viel Aufhebens von diesem Wawo in Amboina und in Banda, und diejenigen, welche daran gewöhnt sind, machen davon eine grosse Leckerei, obwohl es beim Anschauen hässlich erscheint; es wird auf dreierlei Art zubereitet.“

Rumphius giebt nun in eingehender Weise zahlreiche Küchen-Recepte, wie das Wawo mit verschiedenen Kräutern zusammen gekocht, gepökelt, geröstet, geräuchert und namentlich zu pikanten Brühen und Saucen verwendet wird. Die letztgenannte Wawo-Sorte soll bei Nacht in der See mit hellem Licht leuchten, wesshalb sie um so mehr verabscheut wird, weil sie diese Eigenschaft mit den Tausendfüssen gemein hat. Der Verfasser giebt dann die Daten für einige Jahre, wann das richtige Wawo gefangen ist:

- „1684. Vollmond am 1. März. Das Wawo wurde am 2., 3. und 4. März gefangen; es kam in reichlicher Menge vor; unter den Klippen, vom rothen Berg bis nach Hative Kitsjil; man schöpft es, sowohl in dem Boot sitzend, als auch bis zur Mitte des Körpers in das Wasser gehend, während jemand eine brennende Fackel in der Hand hält, wozu die Eingeborenen eine schwangere Frau wählen, doch muss sie mit der Fackel im Boot sitzen bleiben.
- 1685. Vollmond war am 20. März, als die Sonne in den Widder eintrat. Vor und nach dem Vollmond war sehr heisses Wetter, wesshalb nur wenig Wawo gesehen wurde, ausser am 22. März, wann sich das „Wawo-Jean“ zeigte, = Fisch-Wawo, weil man es für die Fische lässt. Am 23. März wurde das echte gefangen, doch nur in kleiner Menge.
- 1686. Vollmond war am 8. März. Wawo wurde am 11. gefangen, doch auch nur wenig wegen der vorhergegangenen Trockenheit.
- 1687. Vollmond war am 27. Februar. Am 1. März hätte es erscheinen müssen, doch wurde nichts gesehen, ausser einigen schleimigen rothen Fäden, welche keine Gestalt hatten, indem wiederum die vorhergehende Trockenheit die Ursache davon war.
- 1688. Vollmond war am 17. März. Am 19. und 20. März wurde wenig Wawo gefangen etc.
- 1690. Vollmond war am 27. März (im Widder); da es stilles Wetter mit wenig Regen war, hat man denselben Abend und die beiden folgenden das Wawo in reichlicher Menge bekommen.
- 1693. Am 24. März, am dritten Abend nach dem Vollmond (21. März) hat man begonnen, das Wawo zu fangen, vier Abende nach einander, in reichlich grosser Menge, denn um diese Zeit war stilles Wetter.
- 1694. Am 11. März, zwei Tage nach dem Vollmond (9. März) in den Fischen, wurde das Wawo gefangen; es war schönes stilles Wetter, doch ist nicht viel vorgekommen.“

Aus den obigen, stellenweise allerdings recht unklaren Angaben von Rumphius sieht man, dass die Erscheinung des „Wawo“ in sehr vielen Punkten mit dem Palolo übereinstimmt. Vielleicht handelt es sich um eine andere Wurm-Art, vielleicht auch um den richtigen Palolo. Auch das Wawo erscheint periodisch mit den Mondphasen und zwar, was Rumphius betont, immer nach dem Vollmond; mit demselben Rechte kann man aber sagen, dass es wenige Tage vor dem letzten Mondviertel erscheint, und hätte damit eine gewisse Uebereinstimmung mit dem Palolowurm. Die Jahreszeit ist allerdings eine ganz andere, aber auch bei den Gilbert-Inseln soll der richtige Palolo im Juni und Juli erscheinen, das Wawo bei Amboina im Februar und März. Handelt es sich in allen diesen Fällen um denselben Wurm, so würden vielleicht locale Verhältnisse sein Erscheinen zu verschiedener Jahreszeit beeinflussen.

Es ist merkwürdig, dass die Erscheinung des Wawo bei Amboina seit Rumphius ganz in Vergessenheit gerathen zu sein scheint, und dass man in den Berichten der dort gewesenen Europäer nichts mehr darüber findet. Jedenfalls scheint es der Mühe werth, diesen biologisch so interessanten Erscheinungen des Palolo und Wawo noch weiter nachzuspüren und die älteren Beobachtungen durch neue zu verbessern und zu ergänzen.

Gaylord Bros.
Makers
Syracuse, N. Y.
PAT. JAN. 21, 1908

3 2044 107 359 499