HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

31,239.

H. A. Hagen library.

June 6, 1908.

A. Hagen.

ENTOMOLOGISCHE
B E Y T R Ä G E

Z U

DES RITTER LINNÉ

ZWÖLFTEN AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

V O N

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede
der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, der
Herzoglichen deutschen Gesellschaft in Helmstädt, der
Naturforschergesellschaft in Halle, und der Königlich
Schwedischen patriotischen Gesellschaft
zu Stockholm.

DRITTEN THEILES ZWEYTER BAND.

Leipzig,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1780.

GAMBRIDGE LIBRARY
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

VORREDE.

Dieses dritten Theiles zweeter Band meiner entomologischen Beyträge begreift die fünfte und letzte Klasse der *Linnéischen Tagfalter*: nämlich die Papil. *Plebejos Rurales* und *Urbicolas*; ferner die *Sphinges* oder *Schwärmer*; und endlich von den *Phalaenis* die *Attacos*, nebst den beyden ersten Ordnungen der *Spinner* oder *Bombycum* bis auf die *Phalaena Bombyx Anostomosis* no. 53. Mit der dritten Ordnung der *Spinner*, oder mit den ohnzüngigen, mit niedergedrückten Flügeln und Kammrücken, werde ich den dritten Band anfangen, und demselben eine verhältnißmäßige Stärke zu den übrigen geben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird noch ein vierter folgen, weil diese Klasse der *Lepidopterorum* gar zu reichhaltig ist. Dies ist es, was ich hierbey zu erinnern habe.

Nun noch der *Nachtrag* zu den Tagfchmetterlingen, Schwärmern und ersten beyden Ordnungen der Phalänen, in dieses *dritten Theiles* *erstem und zweetem Bande*.

*Nachtrag zu des dritten Theiles
erstem Bande.*

I. Zu den *trojanischen Rittern*.

A. zu den *Linnéischen*.

- 1) *Hektor* p. 29. no. 2.
Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 451. no. 1.
der *Hektor*.
- 2) *Troilus* p. 31. no. 6.
Cramer Pap. exot. t. 207. f. ABC. AC *Mas*;
B *Femina*.
Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. t. II. f. 3. 5.
- 3) *Pammon* p. 32. no. 8.
Leske l. c. p. 451. no. 2. der *Pammon*.
- 4) *Polydamas* p. 34. no. 12.
Cramer Pap. exot. t. 211. fig. DE.
Sebae Thes. IV. t. 44. f. 14. 15.
Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. t. 17. f. 1. 2.

B. *Neue Trojaner* zu p. 39-45.

- 1) *Hecuba* p. 39. no. 1.
Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 11. t. 217. f. A B.
- 2) *Achates* p. 42. no. 11.
Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 84. t. 243. f. A.
Mas.

3) *Amphi-*

- 3) *Amphimedon*.
Cramer Pap. exot. t. 194. f. A.
Sebae Thes. IV. t. 16. f. 6. 7.
- 4) *Minos*.
Cramer l. c. p. 195. f. A.
- 5) *Empedocles*.
Cramer l. c. p. 199. f. A B.
- 6) *Astinous*.
Cramer l. c. t. 208. f. A B.
Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. t. II. f. I. 2.
- 7) *Vertumnus*.
Cramer l. c. t. 211. f. A. *Femina*; f. C. *Mas*.
- 8) *Amphrysus*.
Cramer l. c. Vol. III. p. 43. t. 219. f. A.
- 9) *Anceus*.
Cramer l. c. t. 222. f. A B.

II. Zu den griechischen Rittern.

A. Zu den Linnéischen.

- 1) *Menelaus* p. 47. no. 20.
Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 452. no. 3.
der *Menelaus*.
- 2) *Stelenes* p. 54. no. 30.
Leske l. c. p. 452. no. 4. der *Stelenus*.
- 3) *Leilus* ib. no. 31.
Leske l. c. no. 5. der *Leilus*.
- 4) *Pyrrhus* p. 50. no. 25.
Cramer l. c. Vol. III. p. 45. t. 220. f. A B.
- 5) *Machaon* p. 56. no. 33.
Leske l. c. no. 6. der *Schwalbenschwanz*.
Pap. d'Europe par Mr. Ernst etc. Vol. III.
p. 146. t. 34. no. 68. Le grand *Porte-*
queue.

6) *Podalirius* p. 61. no. 36.

Leske l. c. no. 7. der *Segelfalter*.

Pap. d'Europe par Mr. *Ernst* etc. Vol. III.
p. 150. no. 69. - *Le Flambe'*.

7) *Demoleus* p. 68. no. 46.

Cramer l. c. Vol. III. p. 65. t. 231. f. AB. *)

B) *Neue Griechen* zu p. 70-88.

1) *Marius*.

Cramer l. c. Vol. III. p. 200. f. DE.

Sebae Thes. IV. t. 34. f. 13. 14. t. 35. f. 3. 4.

2) *Cinna*.

Cramer l. c. t. 200. f. FG.

3) *Polycaon*.

Cramer l. c. t. 203. f. AB.

Sebae Thes. IV. t. 39. f. 2. 3.

Merian. Surin. t. 31.

Kleemanns Beytr. I. t. 7. f. 1. 2.

4) *Piranthus*.

Cramer l. c. t. 204. f. AB.

Merian. Surin. t. 31.

Sebae Thes. IV. t. 38. f. 13. 14.

Kleemanns Beytr. I. t. 8. f. 1. 2. **)

5) *Sesostris*.

Cramer l. c. t. 211. f. FG.

Sebae Thes. IV. t. 26. f. 19. 20. t. 45. f. 23. 24.

6) *Metellus*.

Cramer l. c. p. 42. t. 218. f. AB. (cf. Vol. I.
t. 71. f. A. *Perseus*.)

7) *Dru-*

*) Nach *Cramer* III. p. 67. t. 232. f. AB. ist der bey *Demoleus*
Linn. angeführte *Kleemannische* t. 1. f. 2. 3. *Eritbonius*.

**) Also nicht *Polidorus* *Linn.* no. 10.

7) *Drufius*.

Cramer l. c. Vol. III. p. 65. t. 229. f. A. t. 239.
f. A.

8) *Antheus*.

Cramer l. c. t. 234. f. BC.

9) *Aegistus*.

Cramer l. c. t. 241. f. CD.

10) *Brutus*.

Cramer l. c. t. 241. f. EF.

III. Zu den *Helikoniern*.A. zu den *Linnéischen*.1) *Apollo* p. 90. no. 50.

Leske l. c. p. 452. no. 8. der *Apollo*.

2) *Pasithoë* p. 96. no. 53. *)

Cramer l. c. p. 115. t. 258. f. EF. *Egialsa* Mas.

3) *Calliope* p. 97. no. 56.

Cramer l. c. t. 246. f. C.

4) *Mneme* p. 99. no. 59.

Leske l. c. p. 452. no. 10. die *Mneme*.

5) *Euterpe* p. 99. no. 61.

Cramer l. c. t. 246. f. D.

6) *Clio* p. 101. no. 66.

Cramer l. c. t. 257. f. DE.

7) *Psidii* p. 100. no. 64.

Cramer l. c. t. 257. f. F.

8) *Thalia* p. 101. no. 67.

Cramer l. c. t. 246. f. A.

Leske l. c. I. p. 452. no. 9. die *Thalia*.

9) *Eurita* p. 102. no. 69.

Cramer l. c. t. 233. f. A. Mas. B. *Femina*.

*) Dies ist Linn. *Aglaia* ed. 10. no. 44.

- 10) *Crataegi* p. 103. no. 72.
Leske l. c. p. 453. no. 11. *Baumweißling*.
 11) *Diaphanus* p. 108. no. 5.
Cramer l. c. t. 231. f. C.
 12) *Hecale* p. 112. no. 17.
Cramer l. c. Vol. III. p. 115. 116. *Note*.

B. *Neue Helikonier* zu p. 106-124.

- 1) *Alcionea*.
Cramer l. c. t. 215. f. A. *Mas*; f. FG. *Femina*.
 2) *Juno*.
Cramer l. c. t. 215. f. BC.
 3) *Cillene*.
Cramer l. c. t. 215. f. DE.
 4) *Epaea*.
Cramer l. c. t. 230. f. BC.
 5) *Lenea*.
Cramer l. c. t. 231. f. D.
 6) *Nise*.
Cramer l. c. t. 231. f. E.
 7) *Melanida*.
Cramer l. c. t. 231. f. F.
 8) *Laja*.
Cramer l. c. t. 232. f. CD. (coll. *Melite* Vol.
 II. t. 153. f. C.)
 9) *Amphione*.
Cramer l. c. t. 232. f. EF.
 10) *Rosalia*.
Cramer l. c. t. 246. f. B.
Sebae Thef. IV. t. 33. f. 27. 28.
 11) *Linus*.
Cramer l. c. t. 257. f. A.
Sebae Thef. IV. t. 4. f. 15. 16.
 12) *Flo-*

12) *Flora.**Cramer* l. c. t. 257. f. B C.*Sebae* Thef. IV. t. 30. f. 5. 6.IV. Zu den *Danaiden.*A. zu den *Linneischen.*a. zu den *weißen* einfarbigen.1) *Brassicae* p. 126. no. 75.*Leske* l. c. p. 453. no. 12. der *große Kohl-weißling.*2) *Rapae* p. 131. no. 76.*Leske* l. c. p. 453. no. 13. der *kleine Kohl-weißling.*3) *Napi* p. 133. no. 77.*Leske* l. c. p. 453. no. 14. der *Rübsenweißling.*4) *Cardamines* p. 141. no. 85.*Bergsträfers* Nomencl. III. p. 39. 40. t. 66.
f. 1. 2. 3. *Raupe und Puppe*; f. 4. 5. *Bergkressenfalter* Mas; f. 6. 7. *Femina.*— *Icon. Pap. Diurn. Decur. II. p. 8. t. 9.*
f. 1. 2. 3. 4-7.*Schaeff.* *Icon. t. 79. f. 2. 3.* (also dieser nicht *Daphidice* L.)5) *Hyparete* p. 146. no. 92.*Cramer* l. c. t. 207. f. D E.6) *Helcita* p. 147. no. 94. *)*Cramer* l. c. t. 129. f. C.7) *Rhamni* p. 156. no. 106.*Leske* l. c. p. 453. no. 15. der *Zitronenfalter.*

a 5

b. zu

*) Eigentlich eine *Phaläne*. S. unter den neuen *Attacis* no. 32.

b. zu den bunten und geschekten Danaïden.

- 1) *Midamus* p. 187. no. 108.
Leske l. c. p. 453. no. 16. *Midamus*.
- 2) *Niavius* p. 188. no. 109.
Cramer l. c. t. 234. f. A.
- 3) *Plexippus* p. 190. no. 117.
Cramer l. c. t. 206. f. EF.
- 4) *Hyperanthus* p. 195. no. 127. et p. 197. not. 3.
Vidua Mülleri.
Bergsträfers Nomencl. III. p. 24. t. 63.
f. 3. 4. coll. II. p. 17. t. 24.
— Icon. Papil. Diurn. Dec. II. p. 6. t. 4.
f. 3. 4.

B. Neue Danaïden p. 160 - 185.

a. weisse einfarbige.

- 1) *Thetis* p. 171. no. 32.
Cramer l. c. t. 238. f. D.
- 2) *Sophorae* p. 193. no. 121.
Cramer l. c. t. 253. f. A B Femina; C. Mas.
- 3) *Eucharis*.
Cramer l. c. t. 201. f. B C. Mas; t. 202. f. C.
Femina.
- 4) *Hippo*.
Cramer l. c. t. 195. f. B C.
- 5) *Cassiopea*.
Cramer l. c. t. 201. f. A.
- 6) *Epaphia*.
Cramer l. c. t. 207. f. DE.
- 7) *Thermopyle*.
Cramer l. c. t. 207. f. FG.
- 8) *Aretheusa*.
Cramer l. c. t. 210. f. EF.

9) *Eudoxia.**Cramer* l. c. t. 213. f. C.10) *Marianne.**Cramer* l. c. t. 217. f. CD. Femina; E. Mas.11) *Evagete.**Cramer* l. c. t. 221. f. F G. (coll. *Coronis* Vol. I. t. 44. f. B C.)12) *Aenippe.**Cramer* l. c. t. 229. f. B C. (coll. Vol. II. t. 105. f. C. et t. 157. f. C.)13) *Catilla.**Cramer* l. c. 229. f. D E.14) *Agathina.**Cramer* l. c. t. 237. f. D E.15) *Belifama.**Cramer* l. c. t. 258. f. A B.

b. bunte und gefcheckte.

1) *Aeropus* p. 199. no. 128.*Cramer* l. c. t. 254. f. A B. Femina.2) *Aurantiaco-maculatus* p. 212. no. 33.*Cramer* Pap. exot. Vol. III. pag. 49. t. 223. f. A B. Pap. *Licus*.3) *Cupavia.**Cramer* Pap. exot. t. 193. f. E F.4) *Phlegia.**Cramer* l. c. t. 197. f. F.*Sebae* Thes. IV. t. 34. f. 7. 8.5) *Pelasgus.**Cramer* l. c. t. 202. f. D.6) *Genutia.**Cramer* l. c. 206. f. C D.*Sebae* Thes. IV. t. 41. f. 9. 10.*Houttuin* H. N. P. I. D. XI. t. 88. f. 7.7) *Har.*

- 7) *Harmodius*.
Cramer l. c. t. 223. f. CD.
- 8) *Emilia*.
Cramer l. c. t. 223. f. EF.
- 9) *Amicus*.
Cramer l. c. t. 227. f. DE.
- 10) *Cometes*.
Cramer l. c. t. 227. f. F.
- 11) *Thysbe*.
Cramer l. c. t. 233. f. C.
- 12) *Phlegia*.
Cramer l. c. t. 197. f. F. Femina; t. 236.
f. C. Mas.

V. Zu den *Nymphen* oder *Ekflüglern*.

A. *Augennymphen*.

a. zu den *Linnéischen*.

- 1) *Io* p. 229. no. 131.
Leske l. c. p. 453. no. 17. *Pfauentagsfalter*.
- 2) *Orithya* p. 235. no. 137.
Leske l. c. p. 454. no. 18. *Orithya*.
- 3) *Maera* p. 240. no. 141.
Papil. d'Europe par Mr. *Ernst* etc. Vol. III.
p. 118. t. 26. no. 50. a b c d: le *Satyre*.
- 4) *Megaera* p. 243. no. 142.
Pap. d'Europe etc. l. c. t. 26. no. 51. le *Nemusen*.
- 5) *Aegeria* p. 245. no. 143.
Pap. d'Europe etc. Vol. III. pag. 117. t. 25.
no. 49. a. Raupe; b. Puppe; c. Vogel;
le *Tircis*.
- 6) *Ligea* p. 247. no. 144.
Pap. d'Europe etc. l. c. t. 25. no. 47. ab. le
Franconien.

7) *Gala-*

7) *Galathea* p. 250. no. 147.

Pap. d'Europe l. c. t. 30. no. 60. le *Demi-dévil*.

D. Kühn im 14 St. des *Naturf.* p. 54. t. 2. f. 7.

Raupe des *Damenbrets*; f. 1. a b. vergrößert; Kopf derselben mit besondern Theilen; und p. 57.

Capieux ib. p. 84. *Raupe* und *Puppe* der *Galathea*.

8) *Dejanira* p. 259. no. 154.

Papil. d'Europe l. c. t. 25. no. 48. a b. la *Baccante*.

9) *Jurtina* et *Janira* p. 260. no. 154 und 156.

Pap. d'Europe l. c. t. 28. no. 54. a-h. le *Myrtil*.

10) *Cardui* p. 264. no. 157.

Bergstr. Nomencl. III. p. 20. t. 52. f. 1. 2. Raupen; f. 3. 4. Puppen; f. 5. 6. *Distelfalter*.

— *Icon. Pap. Diurn. Dec. II.* p. 8. t. 10. f. 1-6.

11) *Iris* p. 267. no. 161. *)

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 454. no. 19. *Schillerrfalter*; t. 9. f. 6. 7. 8.

Bergstr. Nomencl. III. p. 25. t. 64. f. 1. *Bachweidenfalter* (dortige Spielart). Alle Varietäten der *Iris* gut aus einander gesetzt.

— *Icon. Pap. Diurn. Dec. II.* p. 7. t. 5. f. 1.

Capieux im 14ten Stück des *Naturforschers* p. 85. von der *Puppe* der *Iris*.

Pap. d'Europe etc. l. c. t. 31. no. 62. le *grand Mars changeant*.

— — — t. 32. no. 64. le *petit Mars changeant*. Dies der *Röfelsche* III. t. 42.

b. zu

*) Das *Schillern* kömmt wohl eigentlich daher, weil jedes Staubfederchen auf einer Seite blau, auf der andern braun ist.

b. zu den neuen *Augennymphen* p. 270 - 297.

1) *Lycaon* p. 273. no. 6.

Espers Schmetterl. I. p. 374. not. a.

2) *Arge* p. 276. no. 13.

Papil. d'Europe l. c. t. 30. no. 61. le *Demi-deuil aux yeux bleus*.

3) *Eudora* p. 276. no. 15.

Pap. d'Europe etc. l. c. t. 28. no. 55. le *Misis*.

4) *Lotis* p. 278. no. 26.

Cramer Pap. exot. III. p. 77. t. 238. f. FG.

5) *Pilosellae* p. 280. no. 36.

Pap. d'Europe etc. l. c. t. 27. no. 53. abcd.
l' *Amarillis* *)

6) *Polynice*.

Cramer Pap. exot. t. 195. f. DE.

7) *Erminia*.

Cramer l. c. t. 196. f. AB. *Mas*.

— — t. 241. f. AB. *Femina*.

8) *Evarete*.

Cramer l. c. t. 203. f. CD.

9) *Argante*.

Cramer l. c. t. 204. f. CD.

10) *Dorothea*.

Cramer l. c. t. 204. f. EF.

11) *Iphita*.

Cramer l. c. t. 209. f. CD.

12) *Hegesia*.

Cramer l. c. t. 209. f. EF.

13) *Archesia*.

Cramer l. c. t. 219. f. DE.

14) *Hippia*.

Cramer l. c. t. 222. f. CD. (coll. *Hyberbius*
t. 168. f. CE.)

15) *Evad-*

*) Wie mag aber unter die Citata p. 124. *Müllers* Natursystem
ster Th. p. 604. no. 150. mit *Linné's* Pap. *Phaëdra* gerathen seyn?

15) *Evadne.**Cramer* l. c. t. 222. f. EF.16) *Polibete.**Cramer* l. c. t. 234. f. DE. *Femina*; t. 235.
f. CD. *Mas.**Sebae* Thes. IV. t. 35. f. 15. 16.17) *Ifidora.**Cramer* l. c. t. 235. f. AB. *Femina*; f. EF.
*Mas.*18) *Remulia.**Cramer* l. c. t. 237. f. FG.19) *Valentina.**Cramer* l. c. t. 242. f. A.20) *Themyra.**Cramer* l. c. — f. B.21) *Celia.**Cramer* l. c. — f. C.22) *Mylitta.**Cramer* l. c. t. 253. f. DE.23) *Posloerta.**Cramer* l. c. t. 254. f. CD.24) *le Heros.**Papil. d'Europe* etc. Vol. III. p. 113. t. 25.
no. 46. ab.25) *le grand Mars orangé.**Pap. d'Europe* etc. l. c. t. 31. no. 63.26) *le grand Mars non changeant.**Pap. d'Europe* etc. l. c. t. 33. no. 65.27) *le petit Mars orangé.**Pap. d'Europe* etc. l. c. t. 33. no. 66.28) *le Mars bleu foncé changeant.**Pap. d'Europe* etc. l. c. t. 33. no. 67.

B. zu den *bandirten ohnmüßigen*.a. zu den *Linnéischen*.

- 1) *Populi* p. 298. no. 162.
Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 454. no. 20.
Pappelfalter; der *große Eisevogel*.
- 2) *Antiopa* p. 302. no. 165.
Leske l. c. p. 454. no. 21. der *Trauermantel*.
- 3) *C album* p. 312. no. 168.
Leske l. c. p. 454. no. 22. der *C-falter*.
- 4) *Dirce* p. 316. no. 171.
Cramer Pap. exot. t. 212. f. CD.
- 5) *Amathea* p. 317. no. 174.
Cramer l. c. t. 209. f. AB.
- 6) *Atalanta* p. 318. no. 175.
Leske l. c. p. 455. no. 23. der *Admiral*.
- 7) *Venilia* p. 322. no. 177.
Cramer l. c. t. 219. f. BC.
- 8) *Alimena* p. 323. no. 178.
Cramer l. c. t. 220. f. AB. *Femina*; *C. Mas*.
- 9) *Elea* p. 324. no. 183.
Cramer l. c. t. 242. f. DE.
Houttuin Nat. Hist. I Part. Piece II. p. 384.
no. 176. t. 89. f. 10.
- 10) *Camilla* p. 329. no. 187.
Bergsträfers Icon. Pap. Diurn. Decur. II.
p. 8. t. 8. f. 3. 4. *Mas*; *Hekkenkirschenfalter*.
- 11) *Prorsa* p. 336. no. 202.
Bergsträfers Nomencl. III. p. 24. t. 63. f. 5.
Waldneßelfalter. Spielart der *Prorsa*;
f. 6. noch eine Spielart.
— Icon. P. D. Decur. II. p. 6. t. 4. f. 5. 6.
- 12) *Paphia* p. 346. no. 209.
Leske l. c. p. 455. no. 24. *Silberstrich*.

13) *Aglaja* p. 349. no. 211.

Leske l. c. p. 455. no. 25. der *grofse Perlmutterfalter*.

14) *Vanillae* p. 359. no. 216.

Leske l. c. p. 455. no. 26. *Vanillenfalter*.

Cramer l. c. t. 212. f. AB.

b. zu den neuen ohndügigen *Nymphen* p. 360 - 390.

1) *Camilla Viennensium* p. 363. no. 7.

Bergsträffers Nomencl. III. t. 67. f. 5. 6.

Drusilla.

— Icon. Pap. Diurn. Decur. II. p. 8. t. 8.
f. 5. 6. *Alis dentatis nigro-coerulescentibus; subtus cinnami instar fusco-rufis; maculis in anterioribus, fasciisque in posterioribus utrinque albis.*

2) *Undularis* p. 375. no. 56.

Cramer l. c. t. 256. f. AB.

3) *Semire*.

Cramer l. c. t. 194. f. BC.

4) *Helle*.

Cramer l. c. t. 194. f. FG.

5) *Erosine*.

Cramer l. c. t. 203. f. EF.

6) *Lisianassa*.

Cramer l. c. t. 205. f. AB.

7) *Berenice*.

Cramer l. c. t. 205. f. EF. *Femina*.

8) *Heliodore*.

Cramer l. c. t. 212. f. EF.

Sebae Thef. IV. t. 16. f. 3. 4. 8. 9.

9) *Ilithya*.

Cramer l. c. t. 213. f. AB. *Mas*.

— — t. 214. f. CD. *Femina*.

Drury Illustr. of nat. hist. II. t. 17. f. 1. 2.

- 10) *Mardania*.
Cramer l. c. t. 213. f. F G.
- 11) *Inaria*.
Cramer l. c. t. 214. f. A B.
- 12) *Sulpitia*.
Cramer l. c. t. 214. f. E.
- 13) *Proserpina*.
Cramer l. c. t. 218. f. CD.
- 14) *Hippochlus*.
Cramer l. c. t. 220. f. CD.
- 15) *Thyonneus*.
Cramer l. c. t. 220. f. EF.
- 16) *Lotis*.
Cramer l. c. t. 230. f. DE.
(coll. *Hegeſippus* Vol. II. t. 180. f. A.)
- 17) *Enotrea*.
Cramer l. c. t. 236. f. A. B.
- 18) *Capanea*.
Cramer l. c. t. 236. f. D.
- 19) *Hyperia*.
Cramer l. c. t. 236. f. EF.
- 20) *Columbina*.
Cramer l. c. t. 238. f. AB.
- 21) *Cynira*.
Cramer l. c. t. 238. f. C.
- 22) *Cocala*.
Cramer l. c. t. 242. f. FG.
- 23) *Hera*.
Cramer l. c. t. 253. f. F G.
- 24) *Manilia*.
Cramer l. c. t. 255. f. A B.

25) *Adonia.**Cramer* l. c. t. 255. f. CD.26) *Porphyria.**Cramer* l. c. t. 255. f. EF.27) *Astarte.**Cramer* l. c. t. 256. f. CD.28) *Neste.**Cramer* l. c. t. 256. f. EF.VI. Zu den *Plebejern* in diesem Bande.A. zu den *Bauern.*a. zu den *Linnéischen.*1) *Quercus* p. 10. no. 222.

D. Kühn im 14ten Stück des *Naturf.* p. 50.
t. 2. f. 5. 6. die seltene *Raupe*, und das
Weibchen des *Blauschillers*.

b. zu den *neuen* p. 48 fqq.1) *Ortygnus.**Cramer* l. c. t. 243. f. B.2) *Petalus.**Cramer* l. c. t. 243. f. CD.3) *Pierus.**Cramer* l. c. t. 243. f. EF.4) *Venulius.**Cramer* l. c. t. 243. f. G.5) *Liger.**Cramer* l. c. t. 254. f. EF.6) *Menalcas.**Cramer* l. c. t. 259. f. AB.7) *Thallus.**Cramer* l. c. t. 259. f. CD.8) *Atys.**Cramer* l. c. t. 259. f. EF. *Mas.*— — — f. GH. *Femina.*

B. zu den Bürgern.

a. zu den Linnéischen.

- 1) *Proteus* p. 103. no. 259.
Cramer l. c. t. 260. f. DE.
- 2) *Phidias* p. 106. no. 263.
Cramer l. c. t. 244. f. AB.

b. zu den neuen p. 112 sqq.

- 1) *Endymion*.
Cramer l. c. t. 244. f. CD. *Mas.*
— — — f. EF. *Femina.*
Sebae Thes. IV. t. 33. f. 5. 6. 11. 14.
- 2) *Pygmalion*.
Cramer l. c. t. 245. f. AB.
- 3) *Vulcanus*.
Cramer l. c. t. 245. f. CD.
Sebae Thes. IV. t. 20. f. 12. 13.
- 4) *Pyramus*.
Cramer l. c. t. 245. f. E.
- 5) *Phidon*.
Cramer l. c. t. 245. f. FG.
- 6) *Idas*.
Cramer l. c. t. 260. f. AB.
- 7) *Exadeus*.
Cramer l. c. t. 260. f. C.
- 8) *Catillus*.
Cramer l. c. t. 260. f. FG.
- 9) *Busirus*.
Cramer l. c. t. 261. f. AB. *Femina.*
— — — f. C. *Mas.*
- 10) *Alcmon*.
Cramer l. c. t. 261. f. DE.
- 11) *Assaricus*.
Cramer l. c. t. 261. f. FG.

Beyträge zu den Schwärmern.

I. Zu den *Legitimis*.A. zu den *Linnéischen*.1) *Ficus* p. 164. no. 15.*Cramer* l. c. t. 246. f. E.B. zu den *neuen* p. 202 sqq.1) *Hasdrubal*.*Cramer* l. c. t. 246. f. F.2) *Choerilus*.*Cramer* l. c. t. 247. f. A.3) *Gordius*.*Cramer* l. c. t. 247. f. B.4) *Myron*.*Cramer* l. c. t. 247. f. C.5) *Abteus*.*Cramer* l. c. t. 248. f. A.6) *Pelagus*.*Cramer* l. c. t. 248. f. B.*Houttuin* N. H. p. 362. no. 29. t. 90. f. 6.II. Zu den *Adscitis*.A. zu den *Linnéischen*.1) *Cassra* p. 194. no. 37.*Cramer* l. c. t. 248. f. H.2) *Creusa* p. 197. no. 39.*Cramer* l. c. t. 248. f. F.B. zu den *neuen* p. 229 sqq.1) *Melanthus*.*Cramer* l. c. t. 248. f. C.2) *Enagrus*.*Cramer* l. c. t. 248. f. D.3) *Imaon*.*Cramer* l. c. t. 248. f. E.

4) *Leneus*.

Cramer l. c. t. 248. f. G.

5) *Auratus*.

Cramer l. c. t. 264. f. A.

Beyträge zu den *Phalaenis Attacis*.

Zu den neuen p. 270 sqq.

1) *Jucunda*.

Cramer l. c. t. 249. f. A.

2) *Irene*.Cramer l. c. t. 249. f. B. *Mas*.3) *Apollonia*.

Cramer l. c. t. 250. f. A.

4) *Cunina*.

Cramer l. c. t. 257. f. G.

5) *Alciphron*.Cramer l. c. t. 262. f. A B. *Mas*.— — t. 133. f. E. *Femina*.6) *Orithea*.

Cramer l. c. t. 262. f. CD.

7) *Liris*.Cramer l. c. t. 262. f. E. *Femina*.— — t. 63. f. F. *Mas*.

Bey dieser Gelegenheit will ich noch einen kleinen Nachtrag von *Insekten* liefern, die ich am 30 und 31sten August dieses Jahres auf dem höchsten Gipfel des *Brocken*, oder auf der *Königshöhe*, wie man ihn nennt, gefunden habe. Ich war acht Tage vorher schon einmal auf dieser Höhe von mehr als 3000 Fufs; es erlaubten es aber
damals

damals die Umstände nicht, entomologische Untersuchungen anzustellen, sondern ich begnügte mich mit dem prächtigsten Schauspiel der unter- und aufgehenden Sonne. Diesmal aber wollt' ich gerne selbst wissen, ob die oberste Höhe des Brockens so ganz leer von organisirten lebendigen Wesen sey, wie einige behaupten wollen. S. *Silberschlags* Besch. des Brockenbergs im 4 B. der Berlin. Besch. p. 383.

Ich fand auf dem Wege dahin den Pap. *Hyperanthus* L. ganz abgeflattert; nicht weit von dem Hexenaltar am Fußsteige in dem feuchten Moose eine Puppe einer Phal. *Geometra* mit einer feinen Schwanzspitze; auch selbst fieng ich eine Geometram mit fahlgelben braunlineirten Flügeln, die ich nicht kenne. Tipulae schwärmten auf den Wasserstellen in den Torfbetten umher. An den Kräutern am Hexenbrunnen fassen hin und wieder *Blattläuse*, deren viele auch oben auf dem Wasser in den moorigten Gegenden schwammen, aber todt waren. Nicht weit davon fand ich im Moose den *Carabus auratus*, ingleichen eine *Gryllum Locustam* von der kleinern Art. Ich schöpfte auch an verschiedenen Stellen etwas Wasser, sowohl aus den Torfgruben, als auch an solchen Oertern, wo viele Vegetabilien darinn stunden, und untersuchte es des Abends bey Lichte unter meinem Reifemikroskop; fand

aber

aber nur zwey oder drey *Infusionsthierchen* darinn, nämlich die *Monas Mülleri*. Des andern Morgens sah' ich *Drosseln*, auch eine *Heidelerche* und *Bachstelze* überziehen. Arm und öde ist zwar die höchste Brockenhöhe an lebendigen Geschöpfen; indessen getraute ich mir doch, wenn es meine Umstände erlaubten, eine Faunam Bructeram zu sammeln. Von dem Wasser von der Brockenhöhe nahm ich einige Gläser voll mit nach Hause, und fand am 2ten September die ganze Oberfläche mit *Lynceis Mülleri*, oder meinen *Wasserflöhen* mit dem *Eulenschnabel*, mit Müttern und Jungen, bedekt, deren Eyer vermuthlich mitgeschöpft, und welche binnen der Zeit ausgekommen waren.

Vor der Michaelismesse

1780.

GOEZE.

Rurales: alis maculis obscurioribus.

Urbicolae: alis saepius maculis pellucidis.

Millers Linn. Naturfyst. 5 Th. 1 B. p. 565.

E. *kleine gemeine*, Plebeji.

*) *Bauern*: mit schwachen Flekken.

**) *Bürger*: mit durchsichtigen Flekken.

— p. 622. E. *Bauernvögel*, oder gemeine Papi-
lions (Plebei Rurales).

— p. 630. E. *Bürger*vögel, oder gemeine kleine Schmetterlinge (Plebei Vrbcicolae).

Esper's Schmetterl. l. p. 19.

Fünfte Phalanx oder Horde: Plebeji, gemeine, oder *Pöbel*. Die eigentlichen Merkmale nicht so entscheidend bestimmt:

a. bey weitem nicht so groß, als die vorigen Horden;

b. ihre Raupen meist so genannte *Schildraupen*.

— *Kleinflügler.*

1. *Bauern*, Rurales: die Flügel flecke blafs farbig und matt.

2. *Bürger*, *Vrbicolae*: halbfarbige Flügel flecke.

a. vorzügliche Dicke des Körpers.

b. die Flügel stehen im Sitzen auseinander,
und sind nicht ganz geschlossen.

2 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebejus*.

Esper's Schmetterl. I. p. 19. 5te Horde: *Gemeine*.

1te Familie: *Bauern*; gemeine Kleinflügler.

2te Familie: *Bürger*; ädle Kleinflügler.

— p. 250. der Tagfchmetterlinge *fünfte* Phalanx oder Horde.

Plebeji, gemeine; Pöbel; Kleinflügler; *Kleinpunktirte Falter*.

1te Familie: *Gemeine*; *Bauern*; Kleinflügler.

— p. 299. 2te Familie: Plebeji vrbiculae; *Bürger*; ädle Kleinflügler; *dikköpfige Falter*; großköpfige Falter. Les Estropiés. *Geoffr.*

1te Familie: Plebeji rurales. *Bauern*.

1. entstehen aus lauter *Schildraupen*, Chenilles cloportes.

2. die Schmetterlinge machen *drey* Klassen:

a. *kleingeschwänzte Falter*, Papiliones subcaudati; les petits portes - queue. (*Flachschildraupen*: Betulae, Pruni, Quercus, Echion.)

b. *Vieläugige Falter*; *Argusarten*; *Blaulinge*; Argus; Papiliones Polyophthalmi. (*Hochschildraupen*; Arion, Argus, Argiolus, Boeticus.)

c. *Goldglänzende Falter*; *Feuervögel*; *Goldschmetterlinge*, Papiliones rutili; les Bronzés. (*Schmalschildraupen*; Phlaeas, Virgaureae, Hippothoë.)

Systematisches Verzeichniß der Schmetterl. der Wiener Gegend p. 180.

1. *Bauern* Pap. Pleb. Rur.

Affelförmige Raupen: Chenilles cloportes. *Reaum.*

a. *Schmalschildraupen*, Larvae oblongoscutatae; *goldglänzende Falter*, Papiliones *Rutili*; les Bronzés. *Geoffr.*

b. *Hoch-*

b. *Hochschildraupen*, Larvae gibboscutatae; viel-
 äugige Falter. Papiliones Polyophthalmi.
Aldrov. Les Argus. *Geoffr.* Les Cam-
 pagnards. *Seba.*

c. *Flachschildraupen*, Larvae depressoscutatae;
 kleinschwänzige Falter. Papiliones subcau-
 dati; les petits portes-queue. *Geoffr.* Les
 petits Pages. *Seba.*

2. *Bürger*, Pap. Pleb. Urbic. p. 159.

Afterwickelerraupe, Larvae tortriciformes; groß-
 köpfige Falter, Pap. Pleb. Urbic. Les Estropiés.
Geoffr. Les Bourgeois. *Seba.*

Sulzers abgek. Gesch. der Inf. p. 134.

f. *Plebejer*: kleine, oft Spannmesser.

Bauern mit schwachgefleckten Flügeln.

Bürger mit hellern Flügeln.

— p. 145. 146. *Bauern*; *Bürger*,

Schröters Abhandl. über verschiedene Gegenstände der
 Naturgesch. I. pag. 208. (von der 2ten Gattung der
 Bauern) oder von dem *Argus* unter den Papilionen,
 und dessen Abänderungen in Thüringen.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 57. §. 2.

1. Les petits portes-queue.

2. Les Argus p. 61.

3. Les Estropiés p. 66.

Cramer Pap. exot. I. préf. p. 12.

V. Plebeji of *Veldburgers*.

a. Plebeji *Rurales*, onedele *Veldburgers* of Schild-
 paddetjes; Plebeyens communs, ou *Cloportes*.

b. Plebeji *Urbicolae*, of *Dikkopjes*; Plebeyens
 nobles ou têtus.

Leske Anfangsgr. der Naturgesch. I. p. 455.

E. *Gemeine* (Plebeji) mit kleinen Flügeln: ihre
 Raupen meist *Schildraupen*.

a) *Bauern* (*Rurales*).

4 *Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural.*

i. *Plebeji Rurales, Bauern.*

217. *Cupido, der amerikanische Silbertropf. *)*

Müllers Linn. Naturfyst. 5 Th. 1 B. p. 622. no. 217.
der *Silbertropf*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 27. t. 3. f. 7. das ungemein
schöne Tagvögelein der *ersten* Klasse, mit sil-
bernen Flekken und langen Flügelspitzen.

Leske Anfangsgr. der N.G. I. p. 455. no. 27. der *Cu-
pido*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 59. Pap. *Cupido*.

Mus. Petropol. p. 690. n. 351. *Papilio praedatrix*
parva; *alis superioribus albis; inferioribus pun-*
ctis aureis elegantissime exornatis.

Petiv. Gazophyl. t. 10. f. 9. *Papilio Surinamensis*
caudatus minor, verruculis ex aureo argenteis
subtus eleganter adpersis.

Merian. Surin. t. 10. f. 1. **)

Fabric. S. E. p. 518. no. 320. Nom. Linn. *Larva*
alba, nigro-punctata.

Aubent. Miscell. t. 18. f. 4. 5.

Cramer Pap. exot. XIV. pag. 105. t. 164. Fig. D E.
Pap. *Cupido, Mas.* Fig. F G. *Foemina.*

Sebae Thes. Tom. IV. t. 33. f. 5. 6. *Papilio Ephebus*
albidus, partim flavus, fuscusque, auropuncta-
tus et duodecimcaudatus.

Papil-

*) Mit diesem fangen sich die *kleingeschwänzten* Falter an, und
gehen bis 229. *Thamyras* inclus.

**) Petit Papillon tout couvert de plumes sur le dos. Dessous
ses ailes on voit de petites pustules dont les couleurs sont ad-
mirables; ce sont comme de petits toupets de plumes rouges,
bleues, dorées et argentées, comme une plume de paon. Les
extrémités des ailes s'élevont vers la queue comme de petites
houpes de belles plumes.

Papillon *Page* à douze queues.

Papillon *Campagnard*, dit *Cupido*.

Sebae Thes. Tom. IV. t. 33. f. 7. 8. *Papilio Ephēbus*, duodecimcaudatus, partim flavescens, partimque fuscus,

218. *Polybe*, die indianische *Polybe*.*)

Müller l. c. p. 622. no. 218. die grüne *Seide*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 130. Pap. *Polybe*.

Linn. Amoen. Acad. Vol. 6. p. 404. no. 58.

Pap. *Polybe* D. alis integerrimis: *posticis* dentatis: *supra* fusco-virentibus; *subtus* viridi-fericeis, venis atris.

219. *Thero*, der afrikanische zweygeschwänzte Bauer.**)

Müller l. c. p. 623. no. 219. der *Schwanzbauer*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 155. Pap. *Thero*.

Fabric. S. E. p. 520. no. 328. Nom. *Linn.*

220. *Betulae*, der *Nierenflek*.

Müller l. c. p. 623. no. 220. der *Nierenflek*.

Früßlins Verz. schweizer. Inf. p. 31. no. 591. der *Nierenflek* (etwas selten).

— *Magazin für die Liebhaber der Entomologie.* 1 B. 2tes St. p. 262. Pap. *Betulae*. †)

Berlin. Magaz. II. pag. 68. no. 23. Dunkelolivengrün, mit orangefarbnem Flek auf jedem Oberflügel, und einer Spitze an jedem Unterflügel.

A 3

Röfels

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

†) Aus des Chorherrn *Meyers* Bemerkungen. — Die Raupen auf Pflaumenblättern gefunden. Die Schmetterlinge im Sommer 25 bis 26 Tage in der Puppe, von einer Raupe, die sich den 13ten *Hornung* verwandelt, der Vogel erst den 12ten *August*.

6. *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Röfels Insektenbel. I. Tagv. 2te Kl. p. 37. t. 6. f. 1-4.
Das dicke grasgrüne und gelbbordirte *Schild-
räuplein*, und dessen Veränderung zum Papi-
lion.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 186. O.
no. 2. *Birkenfalterraupe* (*Betulae albae*); *Bir-
kenfalter*.

Esper's Schmetterl. I. p. 256. t. 19. f. 1. der *Nierenflek*
(*Männchen*).

Gladbach's Katal. der *Schildvogel*.

Fischer's Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 337. der
Nierenflek.

Bergsträßer's Nomenkl. II. p. 55. t. 36. f. 1-4. der
Birkenfalter.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 455. no. 28. der *Bir-
kenfalter*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 36. Pap. *Betulae*.

Fabric. S. E. p. 520 no. 330.

Alis subcaudatis, fuscis, subtus luteis; postis
cis strigis duabus albis.

Mas macula alarum fulva distinguitur.

Larva obesa, viridis; lineis dorsalibus striis-
que obliquis transversis lateralibus, albis.

Pupa glabra, ferruginea.

Petiv. Oper. Tom. II. pap. brit. Tab. IV. f. 23. Pa-
pilio fuscus, subtus striatus.

— (*Gazoph. nat.* Tab. II. f. 10). *The Brown Hair*
streak: *Papilio minor* fuscus, duplici linea in-
ferna praeditus (*Mas*).

— f. 24. *Idem* agro aureo (*Gazophyl. nat.* Tab. II.
f. 11). *Papilio minor* fuscus; campo aureo, li-
nea gemina subtus ornatus (*Foemina*). *Golden-
Hair streak* f. 25. (*Unterseite*.)

Admiral Inf. t. 17. *Het groene Duikertje*.

Raj. Hist. Inf. p. 130. no. 10. *Papilio minor*; alis exterioribus nigricantibus, macula in medio lata arcuata fulva.

— p. 277. no. 3. *Eruca parva hirsuta*, millepedis seu *afelli* forma et magnitudine.

Système Naturel du Regne Animal etc. Tom. II. p. 135. no. 21. *Papillon du Bouleau.*

Schaeff. Icon. t. 212. f. 1. 2. *Pap. hexapus* alis caudatis 6tus; sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engrameille* Vol. III. p. 152. t. 35. no. 70. *Porte-queue à bandes fauves.*

— p. 159. t. 36. no. 75. *Porte-queue brun à taches fauves.*

Mülleri (Otto Fried.) *Zool. Dan. Prodr.* p. III. no. 1291. *Pap. Betulae.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 58. no. 27. *)

Papilio supra fuscus, macula fulva, *subtus* fulvus, linea duplici transversa albida; alis secundariis in imo caudatis.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.

Long. 9 lign. *Larg.* 17 lign.

221. *Pruni*, das *Punktband.*

Müller l. c. p. 623. no. 221. das *Punktband.*

Frieslins Verz. Schweiz. Inf. p. 31. no. 592.

Auf den Pflaumenbäumen: etwas selten.

Berlin. Magaz. II. pag. 68. no. 24. *Pap. Prorsa.*

Dunkelbraun, mit einem orangefarbnen Strich auf allen vier Flügeln, und zwo Spitzen an den Unterflügeln. Unten hellolivenbraun, mit einem weissen Querstreif und blauem Flek.

A 4

Natur-

*) Fort rare dans ce pays-ci.

8 *Insecta Lepidoptera* a. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Naturforscher 6 St. p. 6. no. 24. Pap. *Prorsa*. Dieses ist Pap. *Pruni* Linn. *)

Röfels Insektenbel. 1 Th. Tagv. 2 Kl. p. 41. t. 7. f. 1-5. Das kleine, grüne, hökriige Räuplein, und dessen Verwandlung zum Papilion.

Kleemanns Raupenkalender p. 28. no. 63. Pap. *Pruni*, das *Punktband*: p. 12. no. 9. *Punktband*.

System. Verzeichn. der Schmetterl. der W. G. p. 186. O. no. 4. *Pflaumenfalterraupe* (*Pruni domesticae*); la Chenille cloporte de l'Orme. *Réaum.* *Pflaumenfalter*.

*Esper*s Schmetterl. I. pag. 259. t. 19. f. 3. der *kleine Schlehenschmetterling* (*Weibchen*): p. 353. t. 39. Suppl. 15. f. 1. a. *Pruni Varietas*.

Gladbachs Katal. das *kleine Schwalbenschwänzchen*.

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 338. das *Punktband*.

Degeer Inf. Ueberf. 1 Th. 1 Qu. p. 59. Pap. *Pruni*. *Anm.*

Berg-

*) Davon hat Herr von *Rottenburg* zwey sehr merkliche Abweichungen angeführt:

Die *eine* mit *Röfels* Abb. 1 Th. Tagv. 2 Kl. t. 7. auf beyden Seiten völlig gleich, nur auf der Unterseite die Linien nicht blau, sondern ganz weifs.

Die *andere* auf der Oberseite völlig dunkelbraun. Auf der Unterseite die weissen Linien wie bey der ersten: aber der pomeranzengelbe Queerstreif auf den Hinterflügeln mangelt gänzlich; statt dessen auf denselben in angulo ani ein großer hellblauer Flek, und gleich an diesem ein etwas kleinerer orange-gelber. Ist es ein Unterschied des Geschlechts, oder sind es zwei verschiedene Arten?

Der zuletzt allhier beschriebene Vogel, der obigen beyden sehr gleicht, ist nach des Palt. von *Scheven* Bemerkung eine besondere Art; s. *Naturf.* 10 St. p. 89. und nach *Esper* I. p. 353. t. 39. Suppl. 15. f. 1. b. vielleicht Pap. *Ilidis* mas.

Bergsträfers Nomenklat. II. p. 56. t. 36. f. 5-9. der *Pflaumenfalter*.

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engramelle* Vol. III. p. 157. t. 36. no. 73. *le porte-queue brun à lignes blanches*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 141. Pap. *Pruni*.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. pag. 363. no. 24. Pap. *Pruni*.

Fabric. S. E. p. 521. no. 331. Nom. *Linn.*

Larva obesa, viridis, linea laterali albicante; dorso dentato.

Pupa fusca; capite albo.

Scop. Entomol. carn. p. 175. no. 459. Pap. *Pruni*.

Long. lin. 8. *Lat.* 5.

Alae concolores supra fuscae; *subtus* pallidiores; posticae caudula nigra, apice alba, *supra* ad angulum ani maculae colore gummi ceraforum; *subtus* linea transversa alba.

Reperitur etiam vbi *Prunus* nulla.

Réaum. Mém. I. t. 28. f. 6. 7. La *Chenille cloporte de l'Orme*.

Schaeff. Icon. t. 14. f. 1. 2. Pap. *hexapus* alis caudatis 1, erster *sechsfüssiger* Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln. *)

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 60. no. 28.

Papilio fuscus, supra macula fulva; *subtus* fascia duplici transversa macularum albicantium; alis secundariis lunularum ferruginearum serie, et in imo caudatis.

A 5

Le

*) Da diesem auf den Oberflügeln das *Blaue* gänzlich fehlt: so halten wir ihn eher mit *Fabricio* und *Esper* für *Linn.* Pap. *Pruni*, als für Pap. *Quercus*, wiewohl die vier rothfarbigen Punkte oben auf den Oberflügeln am Ende dem Pap. *Pruni* nicht eigen sind.

Le porte-queue brun a deux bandes de taches blanches.

Long. 7 lign. Larg. 15 lign.

222. *Quercus*, der Blauschwanz.

Müller l. c. p. 623. no. 222. der *Blauschwanz*.

Fließlins Verz. Schweiz. Schmetterl. p. 31. no. 593.

Bey Zürich und Bern selten.

— Magaz. der Entomol. I B. p. 262. Pap. *Quercus*. *)

— — II B. I St. p. 81.

Berlin. Magaz. II. p. 62. no. 9. Pap. *Quercus*, der kleine *Changeant*.

Dunkelaschgrau, mit zwei kleinen Spitzen an den Unterflügeln. Das Männlein mit einem spielenden blauen Flek auf den Oberflügeln.

Röfels Insektenbel. I. Tagv. 2 Kl. p. 52. t. 9. f. 1-5. (*Männchen*.)

Das kleine dicke und runderhabene rosenfarbene Schildröuplein auf den Eichenblättern, mit seiner Verwandlung zum Papilion.

Gleditsch. Forstwiss. I. p. 642. no. 2. der kleine *Schillervogel*; der kleine *Changeant*.

Kleemanns Raupenkalender p. 28. no. 65. Pap. *Quercus*, der *Blauschwanz*; *Schillervogel*.

Naturforscher I St. p. 85. von der *Raupe des kleinen Blauschillers*.

— II St. pag. 19. das *blauschillernde Schwalbenschwänzchen*; *Kellerefelchen*.

— XIV St. p. 50. D. Kühn vom kleinen *Blauschiller*: t. 2. f. 5. 6.

Systematisches Verzeichniß der Schmetterl. der Wiener Gegend pag. 186. no. 3. Pap. *Quercus*.
Eichen-

*) 25 Tage nach der Verwandlung der Raupe.

Eichenfalterraupe (*Quercus Roboris*); la Chenille-cloporte du Chêne. *Réaum. Eichenfalter.*

Sulzers Gesch. der Inf. p. 145. t. 18. f. 10. Pap. *Epeus*.)

Doppelgeschwänzte schwarze Flügel, in den vordern zween blaue ablange Flekken; unten aschfarb mit einem weislichen Querstrich, und zween rothen Punkten beym Schwanzwinkel.

*Esper*s Schmetterl. I. pag. 262. t. 19. f. 2. der *kleine Blauschiller*: a. das Weibchen; b. das Männchen; c. Raupe und Puppe auf einem Blatt. **)

Gladbachs Katal. das *blaue Kellerseslgen*.

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 339. der *Blauschwanz*.

Bergsträfers Nomenkl. II. p. 58. t. 37. f. 1. *Raupe* †) 2. Puppe. f. 3. 4. 5. der *Eichenfalter*. Pap. *Quercus*, alis subtus cinereis, linea alba, puncto ani gemino:

1. priimoribus supra nitide coerulescentibus, posterioribus subcaudatis (*Mas*).

2. vbiuis supra coerulescentibus; posterioribus angulatis (*Foemina*).

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engramelle* Vol. III. pag. 154. t. 35. no. 71. *Portequene bleu strié*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 144. Pap. *Quercus*, der *kleine Eichenschmetterling*.

Petiv. Oper. Tom. II. pap. brit. Tab. IV. f. 26. *Papilio minor coerulescens*, subtus striatus. Ray's *blew*

*) Nichts als eine Abänderung von dem Männchen des Pap. *Quercus*.

**) Der Papilion im *Esper* I. p. 356. t. 39. Suppl. 15. f. 3. mit der Unterschrift: *Quercus Varietas*, ein *neuer Ruralis*: Pap. *Lyncus*.

†) Die *Raupe* nach *Esper* richtig und vortreflich abgebildet.

blew Hair streak (das Weibchen). Fig. 27. Idem fuscus, agro coeruleo. Our blew Hair streak (das Männchen). Fig. 28. pars inferior.

Petiv. Mus. no. 319.

— *Gazophyl.* t. II. f. 9.

Raj. Hist. Inf. p. 129. no. 8. *Papilio minor*, supina facie tota nigricante; prona coeruleo viridi, cum linea in vtrisque alis oblique transversa alba.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 57. no. 26. *Papilio* supra coeruleus, subtus fuscus, linea undulata transversa albicante; alis secundariis infra macula duplici fulva, et in imo caudatis (*Foemina*).

Le porte-queue bleu à une bande blanche.

Long. 7 lign. *Larg.* 15 lign.

Schaeff. Icon. t. 158. f. 4. 5. *Papilio hexapus* alis caudatis sextus, sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln (*Foemina*).

Fabric. S. E. p. 521. no. 332.

Alis subcaudatis, coerulescentibus; subtus cinereis, striga alba, punctoque ani gemino fulvo.

Larva obesa, supra rosea; lineis tribus punctorum viridium.

Pupa glabra, ferruginea, lineis tribus dorsalibus punctorum fuscorum.

Mülleri Faun. Fridr. pag. 36. no. 333. Pap. *Quercus*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. III. no. 1292. Nom. *Linn.*

Harris. Inf. Tab. 10. f. d e.

223. *Marsyas*, der indianische schwarzpunktirte Doppelschwanz.

Müller l. c. p. 623. no. 223. der Doppelschwanz.

Seligmanns ausländ. Vögel Tom. IV. t. 57.

Kleemanns Beytr. I. p. 39. t. 5. f. 1. 2.

Der prächtige seladongrüne schwarzbraun eingefasste,

gefasste, und mit zwey Paar schwarzen kleinen Flügelspitzen versehene *westindianische* Tagpapilion der *zweiten* Klasse.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 104. Pap. Marsyas.

Fabric. S. E. p. 520. no. 327. — punctis atris.

Sebae Thes. Tom. IV. t. 5. f. 9. 10. Papilio Ephebus, pulchre coeruleus ex Oriente. P. Pleb. Rur. Marsyas.

— — t. 34. f. 15. 16. *Papilio Ephebus cyaneus, albo-guttatus, sexcaudatus. P. Pleb. Rur. Marsyas.*

224. *Echion*, das rothe *Ekauge*.

Müller l. c. p. 624. no. 224. das Ekauge.

Füßlins Verz. schweiz. Inf. p. 31. no. 595. bey Basel.

Kleemanns Beytr. I. p. 61. t. 7. f. 3. 4.

Der zur *zweiten* Klasse der Tagvögel gehörige kleine graulichbraune mit zwey schwarzen kleinen Flügelspitzen gezierte *westindianische* Papilion.

Esper's Schmetterl. I. p. 265. t. 20. f. 1. das Ekauge.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 65. Pap. Echion.

Cramer Pap. exot. XV. p. 120. t. 175. Fig. C D. Pap.

*Acis — au Cap de B. E. *)*

*Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 2. t. 1. f. 22. — de la nouvelle York. **).*

II

*) Bey diesem allein trifft die beygefügte *Linnéische* Anm. vollkommen zu: *Alae posticae ad basin caudarum macula ocellarum rubra.*

**) *Le petit Papillon Linn. no. 224 Echion* je considere comme une espece différente, ou, au moins, une *variété*. Son Papillon n'a point des *taches rouges* en dessus au dessus des queues (der *Drury'sche* hat 4), et les lignes traversant les ailes en dessous, sont

14 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Il déploie ses ailes environ *un pouce et un quart.*

Fabric. S. E. p. 519. no. 325. Nom. *Linn.*

Alae supra interdum coeruleo-nitidae.

225. *Telamon*, das indianische *Zweyek.* *)

Müller l. c. p. 624. no. 225. das *Zweyek.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 153. Pap. *Telamon.*

226. *Boeticus*, das *Afterauge.*

Müller l. c. p. 624. no. 226. das *Afterauge.*

Füeslins Verz. schweiz. Inf. p. 31. no. 594. Pap. *Coluteae*: auf der beygefügtten Tafel fig. 2. 2.

Im untern Wallis (auf der *Colutea arborefc.*).

Espers Schmetterl. I. p. 319. t. 27. Suppl. 3. f. 3. a. b. Pap. *Boeticus.*

Bergsträfers Icones Papilion. diurnorum etc. Decur. I. p. 7. t. 9. f. 1. 2.

Papilio Coluteae: alis caudatis coerulefcentibus, *subtus* cinereis, albo-vndulatis; angulo ani ocello gemino aurato.

— Nomenkl. III. p. 9. t. 53. f. 1. 2. der *Bläſleinfennafalter.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 38. Pap. *Boeticus.*

Raj. Hist. Inf. p. 130. no. 9. *Papilio* e mediis *minuscula*, alis latis, exterius versicoloribus e nigro et coeruleo, imo margine nigro, cum fimbria alba cinctis **).

Fabric.

sont colorées de rouge, outre quelques autres taches proche des épaules, qui manquent dans le mien, ce qui me porte à penser, que c'est une espece différente.

*) Nicht abgebildet.

**) Eben dieses Citatum findet sich im *Esper* schon pag. 262. bey Pap. *Quercus.*

Fabric. S. E. p. 522. no. 333.

Alis *caudatis*, coerulescentibus, subtus cinereis, albo-undatis; angulo ani ocello gemino aurato *).

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 57. no. 25. **).

Papilio supra coeruleus; *subtus* lineis undulatis fuscis et albicantibus striatus; alis *secundariis* infra fasciam albam, macula duplici nigro-aurata, et in imo caudatis.

Le porte-queue bleu strié.

Long. 7 lign. Larg. 15 lign.

227. *Thyra*, der kapensische Silberpurpur. †)

Müller l. c. p. 624. no. 227. der Silberpurpur.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 156. Pap. *Thyra*.

Fabric. S. E. p. 527. no. 356.

Alis *ecaudatis*, disco fulvo, nigro-punctato; *subtus* purpurascens; maculis argenteis — in *Guinea*.

Linn. Mus. Vdalric. p. 329. no. 147. Pap. *Thyra*.

Alae *primores* supra nigrae disco fulvo, quasi ex quatuor maculis connato.

— — *subtus* testaceo-ferrugineae disco magis fulvo.

— *posticae* supra nigrae, disco fulvo latiore, quam in primoribus, ut margo niger solus postice terminet discum.

— — *subtus* testaceo-ferrugineae.

228. *Thys-*

*) Cauda apice alba. Ocelli duo subtus ad angulum ani, iride aurata, pupilla nigra.

**) La Chenille de ce papillon est du nombre des Chenilles-cloportes. Elle vient sur le *bagnaudier* (*Colutea*), les pois et quelques autres plantes légumineuses, se logeant dans leurs cosses ou siliques, dont elle mange les fruits.

†) Nicht abgebildet.

228. *Thysbe*, die *kapensische Thysbe*.*)

Müller l. c. p. 624. no. 228. der *Goldflek*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 156. Pap. *Thysbe*.

Fabric. S. E. p. 524. no. 344.

Alis denticulatis, subcaudatis, fulvis, nigro-maculatis; posticis subtus striatis auroque maculatis.

Linn. Mus. Vdalric. p. 330. no. 148. Pap. *Thysbe*.

Alae primores supra fulvae, denticulatae, ad basin tectae villis cyaneis.

Maculae circiter octo nigrae in disco.

— — *subtus* fulvae, versus exteriora striatae.

Maculae circiter duodecim sparsae nigrae, quarum 4 f. 5 margini anteriori propiores pupilla albo-argentea elewantur.

— *posticae supra* fulvae, denticulatae, basi cyaneae.

Maculae circiter septem nigrae sparsae.

— — *subtus* flavae quasi fasciis duabus saturatius luteis, praeterea valde striatae versus posteriora.

Maculae deauratae plurimae (7 f. 8), quarum posteriores quasi ex duabus lineolis conflatae.

229. *Thamyras*, der *indianische Schwarzrand*.**)

Müller l. c. p. 625. no. 229. der *Schwarzrand*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 155. Pap. *Thamyras*.

Linn. Mus. Vdalric. p. 317. no. 135. Pap. *Thamyras*.

Alae omnes supra coeruleae, nitidissimae, integrae aut parum repandae, margine circum peripheriam nigro.

— — *subtus* cinereae.

Maculae

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Maculae copiosae, fuscae, rotundatae, sparsae, annulo albo cinctae.

— *posticae* desinentes in caudam brevem, obtusam, nigram.

— *subtus* fuscae ac viridi-sericeae versus angulum ani, et punctis 2 atris notatae.

230. *Arion*, der Randpunkt. *)

Müller l. c. p. 625. no. 230. der *Randpunkt*.

Füßlin's Verzeichn. schweiz. Inf. pag. 31. no. 596.

Bey uns *etwas selten*.

Berlin. Magaz. II. p. 70. no. 28. Pap. *Arion*.

Himmelblau mit breitem schwarzen Rande und einigen Flekken; unten aschgrau mit einigen schwarzen Punkten.

Naturforscher VI St. p. 7. no. 28. Pap. *Arion*.

Röfels Insektenbel. III. p. 262. t. 45. f. 3. 4. der *hochblaue Tagvogel* der *zweiten* Klasse mit schwarzgefleckten und dunkel eingefassten Flügeln.

Systematisches Verzeichn. der Schmetterl. der W. G. p. 182.

(*) Die Unterseite der Unterflügel graulich ohne rothgelbes Queerband.

No. 3. Pap. *Arion*. Unbekannte Raupe. Hochblauer (Männchen und Weibchen) schwarzfleckichter Falter. **)

Gle.

*) Mit diesem fangen sich die *viellängigten* Falter, oder *Argus*-arten an, und gehen bis no. 251. Pap. *Priassus* inclusive.

Die Raupe des Pap. *Arion* noch völlig unbekannt.

**) Nach der Bemerkung der Wiener Entomologen p. 154. ist weder der vom Linné angeführte *Sulzersche*, Kennz. t. 14. f. 87. noch der *Schäffersche*, Icon. It. 98. f. 5. 6. Pap. *Arion*; sondern der *erstere* der Wiener P. *Adonis* p. 184. no. 11. (*Weibchen*), und *letzterer* des Poda und Scop. Pap. *Coridon*: Ent. carn. pag. 179.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 733. no. 8. Pap. Pl. *Arion*.

Der große und falsche *Argus*, mit braunen, in der Mitte himmelblauen, und etwas schwarzgeflekten Flügeln. *)

Neuer Schaupl. der Natur I B. p. 382. *Arion*.

Martini allgem. Gesch. der Natur III B. p. 206. t. 97.

f. 2. 3. **) der *Arion*.

Espers

Dies hat mich bewogen, das Sulzerische und Schäfferische Citatum hier bey dem Pap. *Arion* wegzulassen, und dem Pap. *Adonis* unter den neuen Ruralibus beyzufügen. Denn der *erßere*, sagen die Wiener, muß auf der Oberseite in dem blauen Mittelraume der Oberflügel schwarze Flecken haben, (disco coeruleo maculis atris. *Syst.*) In disco coeruleo punctis nigris septem confertis, *Fann. Suec. ed. 2. no. 1073*. Dieser Karakter fehlt dem Schäfferischen und Sulzerischen völlig; auf dem Röselschen aber sind die 7 schwarzen Lituren deutlich zu zählen.

*) Ein ansehnlicher Vogel, und ein *Blumensanger*; aber desto seltener. Im *Julius* nur einzeln auf freyen und warmen Plätzen, in Vorhölzern, auf allerhand Strauchwerk, Blumen und Kräutern; auch in Gärten. Seine himmelblaue Flügel, die gegen die Mitte ins Dunkelbraune fallen, haben einen schwarzen und breiten Saum, und sind unterwärts fast aschgrau mit schwarzen Spiegelpunkten. Es giebt von dieser Art etliche Abänderungen an Orten, wo viele Weiden stehen, mit weisssgrauen Flügeln, in welchen die schwarzen Punkte einen weissen Grund haben. Man muß sich vorsehen, daß man die weiblichen nicht etwa der Farben halber in mehrere Arten theilet, als es giebt.

**) Ohnerachtet es p. 207 heisst: der Pap. *Acrion* des *Pontopp.* N. G. v. D. p. 218. t. 17. sey von dem *Arion* *Linn.* gar nicht merklich unterschieden; so hat doch solchen der Herr Staatsr. *Müller* Zool. Dan. Prodr. no. 1326. unter die neuen aufgenommen.

Esper's Schmetterl. I. p. 266. t. 20. f. 2. das große *Vielaue*; der *Handvogel*.*)

Gladbach's Schmetterl. p. 11. t. 5. f. 3. 4. *Männchen*; f. 5. 6. *Weibchen*;**) der *blaue Handvogel*.

Bergsträßer's Nomenkl. II. p. 33. t. 24. f. 5. 6. Pap. *Arion*, der *hochblaue schwarzfleckichte Falter*.

— p. 71. t. 43. f. 4. eine *angebliche Verschiedenheit* des *Arion*.

— *Icon. Dec.* I. p. 6. t. 7. f. 5. 6. *Arionis* apud nos *Varietas*.

Fischer's Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 340. der *Randpunkt*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 32. Pap. *Arion*.

Catholic. A. p. 477. Pap. *Arion*.

Fabric. S. E. p. 524. no. 345. Nom. *Linn.*

Petiv. Gazoph. t. 35. f. 2. *Papilio minor coeruleus*.

Scop. Ent. carn. p. 177. Pap. *Argus Arion*.

Long. lin. 10. *Lat.* 6.

Alae fuscae, disco coeruleo, fuscis maculis variegato.

In sylvestribus locis.

Variat statura minore, et macula ovata in medio alae anticae subtus, loco maculae cordiformis.

B 2

Mülleri

*) Die über des Herrn Diak. *Schröters* Argusarten im Thüringischen, Abhandl. über verschied. Gegenst. der Nat. I. p. 208. gemachten Anmerkungen befinden sich p. 272. not. e.

**) Da *Esper* bey dem *Arion* *Gladbach's* blauen *Handvogel* citirt, und Herr *Bergstr.* solchen *Telegonus* nennet; so scheint er hieher zu gehören. Die *Bergstr.* Abbild. ist ungleich schöner, als die *Gladbach'sche*. Wie viel ähnliches mit dem *Arion*? Sicher die *kleinere* vom *Scop.* angegebene Abänderung. S. unter den neuen *Rural.* no. 75.

20 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 36. no. 334. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 115. no. 1325. Pap. *Arion.*

Alis rotundatis cet.

231. *Zeuxo*, der afrikanische Zwergschmetterling.

Müller l. c. p. 625. no. 231. der *Zwergpapilion.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 163. Pap. *Zeuxo.*

Fabric. S. E. p. 527. no. 357.

Alis integris, disco fulvo, nigro-maculato, anticis subtus argenteo-maculatis.

Alae anticae subtus maculis plurimis nigris sparsis, pupilla coeruleo-argentea. *Posticae* immaculatae.

Linn. Mus. Vdalric. p. 331. no. 149. Pap. *Zeuxo.*

Alae primores supra nigrae, disco lato fulvo, vel potius fulvae, nitidae, margine undique lato nigro.

Maculae nigrae plures (9 circiter) saepius connexae, quadratae.

— — *subtus* cinerascens, in disco fulvescentes.

Maculae plurimae (ultra 10 s. 12) nigrae, sparsae, pupilla coeruleo-argentea coruscantes, exceptis 2 s. 3 versus marginem tenuiorem.

— *posticae supra* ut in primoribus.

— — *subtus* cinereo-nebulosae immaculatae.

232. *Argus*, der *Aeugler*.*)

Müller l. c. p. 625. no. 232. t. 19. f. 7. das *Silber-auge.*

Fließ-

*) Bey diesem Papilion müssen nothwendig viele vom *Linné* angeführte Schriftsteller wegfallen, weil sie das eigentliche Charakteristische des Ritters bey diesem Schmetterlinge nicht besitzen, oder nicht genau genug bestimmen haben. Herr *Esper* hat

Füesßlins Verzeichn. schweiz. Inf. p. 31. no. 597. der *Aeugler*. *)

Auf Wiesen und Feldern sehr gemein.

*Esper*s Schmetterl. I. p. 268. t. 20. f. 3. der *gemeine Argus*; der *Argus mit den blauen Silberpunkten*. (Männchen.)

Berlin. Magaz. II. p. 72. no. 29. Pap. *Argus*.

Himmelblau (*Männchen*); unten mit einem rostfarbigen Streif am Rande, und vielen kleinen schwarzen Flekken auf der ganzen Unterfläche, welche grau ist. **)

B 3

Schrö-

hat sich vorzüglich bey demselben viele Mühe gegeben, die Verwirrungen zu heben, und es ist ihm mehrentheils geglückt, wiewohl unseres Erachtens einige von ihm ausgemerzte Schriftsteller, als *Rajus*, *Geoffr.* u. s. w. wohl bleiben könnten. Das eigentliche Charakteristische dieses Schmetterlings ist bey beyderley Geschlecht das: *posticis ocellis coeruleo-argenteis*, oder nach der *Faun. Suec. ed. 2. no. 1074*:

Alae supra coeruleae (Maris), subtus ocellis numerosis nigris, et in alis secundariis subtus maculis marginalibus fulvis confertis in fasciam, *pupillis coeruleo-argenteis*.

Wo sich diese Merkmale nicht finden, da haben wir auch den eigentlichen *Linnéischen Argus* nicht.

*) Nach *Füesßlin* ist der *Rösfelsche* III. t. 37. f. 5. *Argus*, und f. 3. 4. *Argiolus* L. aber nach des Herrn von *Rottenburgs* Bemerk. im *Naturf. VI St. p. 21. f. 3. 5.* ein neuer *Rural. Icarus* Mas, und f. 4. auch ein neuer *Rur. Semiargus*, oder des *Geoffr. Demi-Argus*, wiewohl Herr *Esper* I. p. 270. die *Rösfelsche* f. 4. für den *Argiolus* L. und diesen mit vorgedachtem *Geoffroy'schen* für einanderley hält.

Nach *Bergsträfers* *Icon. Pap. Diurn. etc. Decur. I. p. 8. t. 10. f. 5. 6.* ist der *Rösfelsche* III. t. 37. f. 3. 4. der *Wiener Damoetas* p. 183 no. 7. und des *Geoffr. Demi-Argus*, also der *Semiargus* des Herrn von *Rottenburg*. Immer noch Verwirrung genug.

**) *S. Esper* l. c. p. 272 (not. a).

Schröters Abhandl. über verschiedene Gegenst. der N. G. I. pag. 212. Pap. Argus; das Silberauge; blaue Argus (Männchen).*)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 734. no. 9. Argus. **)

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 184. no. 14. Stechginsterfalterraupe (Genistae germanicae); Stechginsterfalter.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 381. Argusfalterling.

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. p. 199. der äugige blaue Argusfalterling.

Titii Wittenb. Wochenbl. 1773. p. 346. und 1774. p. 252. der kleine violetblaue Honigsfalterling. †)

Espers Schmetterl. I. p. 268. t. 20. f. 3. der gemeine Argus; der Argus mit den blauen Silberpunkten. (Männchen.)

Gladbachs Schmetterl. I. p. 64. t. 28. f. 1. 2. der Blauling; das Weibchen. Pap. Argus Foemina; das Weibchen vom blauen Silberauge.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 456. no. 29. der Argusfalter.

Bergsträfers Icon. Pap. Diurn. Decur. I. p. 3. t. 3. f. 1. 2. Mas.

Alis

*) Espers Erklärung darüber p. 272. not. e. Die Schrötersche Abhandl. steht schon in den Berlin. Samml. II. p. 341.

**) In unsern lichten Waldungen, und um dieselben häufig auf den glatten Weiden, in den Feldern und Wiesenheiden, auch an den Dämmen, auf den Kreuzdornen und Faulbaum. Die Flügel oberwärts vortreflich himmelblau, unten grau, sonst aber am Rande mit einer rothfarbigen Streife versehen, auch mit schwarzen Flekken, und blaulich-silberfarbuen Spiegeln.

†) Wenn sie die Heide (Erica) fleißig besuchen, soll es eine Anzeige eines guten Bienenjahres seyn. S. Martini Naturlox. III. pag. 202.

Alis angulatis *coeruleis*; posticis a margine in *coeruleo virgulatis*, fascia subtus in utrisque *fulva*, *ocellisque coeruleo-argenteis in postica.*

Der *Stechginsterfalter*.*)

Satis omnino ubivis locorum in Germania obvis, sed a *Viennensibus* tandem extra controversiam positus.

Larva in *Genista germanica* habitat.

Bergsträfers Nomencl. III. p. 7. t. 53. f. 1. 2. der *Stechginsterfalter* (des Linné *Argus*), *Mas*.

— p. 8. t. 53. f. 3. 4. *Foemina*. (*Idas* Esp. I. t. 20. f. 4.)

Degeer Inf. Ueberf. II Quart. p. 63. 64. *Argus*.**)

Onomat. hist. nat. P. I. p. 770. *Argus oculatus*, der äugichte *Argus*.

— — P. 6. p. 31. Pap. *Argus*.

Schaeff. Icon. t. 29. f. 3. 4. †)

Papilio hexapus alis *ocellatis* primus, erster *sechsfüßiger* Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Catholicon A. p. 475. *Argus*, der äugige *Argus*.

B 4

Petiv.

*) Die schönste und richtigste Abbildung, die ich gesehen habe.

**) Ich habe im 2ten Theile bey Pap. *Argiolus* erinnert, daß ich mich an diesem Orte durch das *Linnéische Citatum* verleiten lassen, diesen *Degeerischen* Papilion für den *Argus* zu halten, wie Herr *Bergsträfer* Nomencl. III. p. 7. mit Recht wider mich erinnert hat.

†) Der wahre *Linnéische Argus pupillis coeruleo-argenteis* subtus in posticis alis. Der Herr Staatsr. *Müller* hat bey demselben noch *Schaeff.* t. 98. f. 3. 4. angeführt; allein nach der Bemerkung der Wiener Entomologen S. V. p. 54. 55. soll dies das *Männchen* von ihrem Pap. *Adonis* seyn. *Linné* hielt ihn im *Anbange* für das Weibchen seines *Argus* oder *Idas*, welches *Esper* I. p. 274. not. a. mit Grunde bezweifelt. Eher mögte *Schaeff.* t. 168. f. 6. 7. dieser *Idas* seyn.

Petiv. Oper. Tom. II. pap. Brit. VI. f. 4. *Papiliunculus coeruleus*, limbis nigris. *)

Selvedg'd blew Argus.

— *Gazoph.* t. 35. f. 1.

Raj. Hist. Inf. p. 131. no. 11. *Papilio parva*, alis superne *purpureo-coeruleis*, subtus cinereis, maculis nigris circulo purpurante cinctis, punctisque nigris pulchre depictis (*Mas*). **)

The most common small blue Butterfly; the little blue Argus.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 61. no. 30. *Papilio* alis rotundatis integerrimis *coeruleis*; *subtus* ocellis numerosis (*Mas*). †)

L' *Argus* bleu.

Long. 7 lign. Larg. 14 lign.

Système Naturel du Regne Animal etc. Tom. II. p. 139. no. 32. *Argus des prés*; *Argus oculatus*.

Fabric. S. E. p. 525. no. 346. Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 36. no. 335. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 115. no. 1327. Nom. *Linn.*

β. *Idas*, der *Idas*schmetterling, oder das *Weibchen* des silberäugigten blauen *Argus*.

Esper Schmett. I. p. 268. t. 20. f. 4. der weibliche *Argus* von beyden Seiten. Pap. *Idas*. -- p. 273. ††) *Glad-*

*) Da Herr *Esper* meynt, daß *Petiver* hier den wahren Linnéischen *Argus* beschrieben habe, so können wir, dächt' ich, die Beschreibungen eines *Rajus* und *Geoffroy* noch eher beybehalten, die nicht einmal so unbestimmt sind, als diese *Petiverische*, ohnerachtet sie Herr *Esper* nicht hat wollen gelten lassen.

**) S. *Esper* Zweifel I. p. 270.

†) S. *Esper* Zweifel I. p. 270. not. b.

††) Ganz richtig giebt Herr *Esper* p. 273. not. a. das *coeruleis* in der

Gladbachs Schmett. I. p. 64. t. 28. f. 1. 2. der *Blau-ling*, das Weibchen. Pap. Argus foemina; das Weibchen vom blauen Silberauge.

Bergsträfers Icon. Pap. Diurn. Decur. I. p. 3. t. 3. f. 3. 4. *Argus* (foemina).

Alis angulatis *fuscis*, singulo macularum fulvarum ordine ad imum posticarum marginem; fascia subtus utrimque fulva, oculisque pone eandem *coeruleo-argenteis*.

Des Stechginsterfalters Weibchen.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 154.

Pap. *Idas*.

Schröters Abhandl. I. p. 216. der *braune Argus*.

Berlin. Magaz. II. p. 88. not. I. das Weibchen ist oberwärts nicht *himmelblau*, sondern *braun*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. p. 202. t. 97. f. 1. der *Argus* mit *braunem äugigem Saum* an den Unterflügeln, und *blauen silberfarbigen Spiegeln*.*)

Onomat. hist. nat. P. I. p. 769. *Argus fuscus*, der *braune Argus*.

Raj. Hist. Inf. p. 131. no. 12.***) *Papilio parva; alis supinis pullis*, cum linea seu ordine macularum lutearum ad imum marginem.

Systeme Naturel du Regne Animal etc. Tom. II. p. 139. no. 33. *Argus brun*, *Argus fuscus*.

B 5

Geoffr.

der Linn. Beschr. bey diesem als einen Druckfehler an, da *Linne* in der *Faun. Suec.* ed. 2. no. 1075 ausdrücklich sagt: a quo (*Argus*) differt *Idas*, alarum lateris superioris colore, qui non, ut in illo *coeruleus*, sed *omnino nigro-fuscus*.

*) p. 203. heist es: im Naturforscher III St. p. 19. der *Dukaten- oder Feuervogel*; darinn aber hat sich mein sel. Freund geirret. Denn es wird daselbst Rösel III. t. 37. f. 7. angeführt, welches sich nicht auf den *Idas*, sondern auf den Pap. L. *Hippoboe* beziehet.

**) Cf. W. Schmett. p. 154.

26 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 63. no. 32. *Papilio* alis rotundatis integerrimis *nigro-fuscis*, fascia marginali fulva, subtus cinereis ocellis numerosis.

L' *Argus brun.*

Long. 6 lign. Larg. 14 lign.

Schaeff. Icon. t. 168. f. 6. 7.

Papilio hexapus alis ocellatis octavus, achter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln. *)

Scop. Entom. carn. p. 178. Pap. *Idas*.

Alae supra ut in *Argiolo*, sed posticae subtus ordine macularum crocatarum in limbo.

Variat. 1-7.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$. Lat. 5.

Fabric. S. E. p. 525. β .

Mülleri Faun. Fridr. p. 36. no. 336. Pap. *Idas*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 115. no. 1327. Pap. *Idas* foemina est.

233. *Philiassus*, der algierische *Philiassus*. **)

Müller l. c. p. 625. no. 233. der *Zwey und Eins*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 124. Pap. *Philiassus*.

Fabric. S. E. p. 529. no. 367. Nom. Linn.

234. *Argiolus*, der Streupunkt.

Müller l. c. p. 626. no. 234. der *Streupunkt*.

Berlin.

*) Höchsthöchstwahrscheinlich ist dieser Schäfferische Papilion des Scop. Variat. 6 oder 7 von Pap. *Idas*.

6. Alis supra fuscis; anticis supra in limbo maculis crocatis obsoletis (3-4); subtus (4-5) apice fuscis, basi puncto fusco notatis; posticis supra maculis crocatis submarginalibus (4-5), subtus (8) conicis, puncto fusco ad basin signatis.

7. Alis iisdem, subtus canis, omnibus in limbo utrinque maculis crocatis in unam seriem dispositis.

*) Nicht abgebildet.

Berlin. Magaz. II. p. 72. no. 30. Pag. *Argiolus*.

Himmelblau, mit einem schwarzen Rande;
unten blaulichweiss, mit einzelnen schwarzen
Punkten.

Naturforscher VI St. p. 7. no. 30. Pap. *Argiolus*.

Diejenigen, welche auf der Oberseite ganz
blau sind, die *Männchen*; die mit dem breiten
schwarzen Rande, die *Weibchen*.

Berlin. Samml. II. p. 347. der *hellblaue*, oder *klei-
nere Argus* mit vier *Untergattungen*.

Schröters Abhandl. I. p. 215. der *hellblaue*, oder *klei-
nere Argus*.

Frieslins Verz. Schweiz. Inf. p. 31. no. 598. Pap. *Ar-
giolus*, der *Bläuling*.*)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 734. no. 10. der *kleine Ar-
gus*.**)

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. p. 210. t. 97.
f. 4. 5. der *kleine hellblaue Argusfalterling*;
der *Streupunkt*; der *Bläuling*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 184. no. 8.
Faulbaumfalterraupe (*Rhamni Frangulae*); *Faul-
baumfalter*.

Schriften der dronth. Gesellsch. III. p. 367. no. 32.
Pap. *Argiolus*. Nom. *Linn.*

Espers

*) Der hierbey angeführte *Schäfferische* t. 185. f. 1. 2. ist unmög-
lich *Argiolus*, eher *Semiargus* des Herrn von *Rottenb. Naturf.*
VI. p. 20. no. 6. oder der *Röselche* t. 37. f. 4.

**) Bey warmer Witterung etwas später und seltener als der *Ar-
gus*, doch im Julius und August in dem Dorf- und Weidenge-
büsche. Kleiner, als der vorige, hat himmelblaue Flügel
(das Männchen); mit einem schwarzen Rande (das Weibchen),
welcher oft (nämlich bey dem ersteren) fehlet. Unterwärts die
Farbe bläulich, ohne die schwarzen *Spiegelflecken*, auch nur
mit einzelnen wenigen und kleinen schwarzen Punkten be-
zeichner.

Espers Schmetterl. I. p. 277. das *kleine Vielauge*.

t. 21. f. 1. a. das *Männchen* von beyden Seiten.

— f. 1. b. das *Weibchen* eben so.

Glabachs Schmett. p. 49. t. 22. f. 3. 4. das *Weibchen vom Goldvögelchen*, Pap. *Argiolus foemina*, der *Dukatenvogel*, das *Weibchen*.*)

Bergsträssers Nomenklat. II. p. 74. t. 45. f. 5. 6. 7. 8. der *Faulbaumfalter*.

Pap. *Argiolus*, alis rotundatis integerrimis; subtus punctus oblique elongatis: supra

a) coeruleis (*Mas*),

b) fusco-coeruleis, virgula in anticis; punctisque ad marginem posticarum nigris (*foemina*).**)

— Icon. Decur. I. p. 7. t. 8. f. 5. 6. *Argioli foeminae* Varietas.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 31. Pap. *Argiolus*.

Catholicon A. p. 472. Pap. *Argiolus*.

— F. p. 335. La *Chenille Cloporte du Frangula*.

Raj. Hist. Inf. p. 132. no. 16. *Papilio minor*, alis coeruleis, exterioribus ad angulum anteriorem superne nigricantibus.

Petiver Oper. Tom. II. pap. britann. tab. 6. f. 11. 12. *Papiliunculus coeruleus*, subtus punctatus.

Blue speck Butterfly.

Scop. Entom. carn. p. 177. *Argus Argiolus*.

Long. lin. 5. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.

Alae

*) Das *Männchen* desselben, sagt Herr Gl. hat Rösel schon III. t. 37. f. 5. 6. (soll wohl heißen 6. 7.) beschrieben. Dies ist aber Pap. *Hippothoe*; daher, wenn der *Glabachsche* dazu das *Weibchen* seyn soll, so ist die Ueberschrift Pap. *Argiolus* falsch.

**) — Icon. Pap. Diurn. Decur. I. p. 8. t. 10. f. 1. 2. Pap. *Byzenus Mas*; f. 3. 4. *Byzene Foem.* Dies soll *Espers* *Argiolus Mas* et *Foem.* seyn; also hätte derselbe den *Argiolus Linn.* nicht.

Alae supra coeruleae, alba fimbria terminatae, posticae punctis nigris et absque maculis crocatis aut fulvis in limbo.

Degeer Mém. Tom. I. p. 288. t. 4. f. 9-15. Petite Chenille-Cloporte verte, qui mange les feuilles du Frangula (*Rhamnus* L.). *Uebersf.* II Quart. p. 62. 63 64. die kleine grüne Schildraupe auf den Faulbaumblättern.

— Tom. II. p. 182. Papillon à ailes bleues, avec un large bord noir, et qui sont en dessous d'un gris de perle bleuâtre avec des points noirs. Pap. *Argiolus* L. Papillon *Argus* à bandes noires. (*Weibchen*.)

Uebersf. II B. I Th. pag. 127. der schwarzgestreifte Streupunkt, mit blauen Flügeln, mit breitem schwarzen Rande, unten blaulich perlgrau mit schwarzen Punkten.

Mülleri Faun. Fridr. p. 36. no. 337. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 115. no. 1328. Pap. *Argiolus*. Nom. *Linn*.

235. *Pirithous*, der algierische *Pirithous*.*)

Müller l. c. p. 626. no. 235. der *Punktirer*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 127. Pap. *Pirithous*.

236. *Tespis*, der kapensische *Weissflek*.**)

Müller l. c. p. 626. no. 236. der *Weissflek*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 154. Pap. *Tespis*.

237. *Rubi*, der *Grünling*.

Müller l. c. p. 626. no. 237. der *Hinbeervogel*.

Fries.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Füeslins Schweiz. Inf. p. 31. no. 600. der *Grünling*:
nicht selten.

Berlin. Magaz. II. p. 82. no. 47. Pap. *Rubi*.

Oberwärts durchaus *braun*, unten *grün*.

— — *Samml.* II. p. 351.

Naturforscher VI. p. 12. no. 47. Pap. *Rubi*.*)

Schröters Abhandl. I. p. 219. der *blinde Argus*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. pag. 204. der
*blinde Argus*schmetterling; der *Himbeervogel*;
der *Grünling*; der *braune Tagvogel* der *Brom-*
beerstaude.

Gleditsch Forstwiss. II. pag. 1018. no. 1. der *braune*
Tagvogel der *Brombeerstaude*.**)

Systemat. Verz. der Schmett. der W.G. p. 186. no. 1.

Brombeerfalterraupe (*Rubi Fruticosi*): *Brom-*
beerfalter.

Sulzers Gesch. p. 146. t. 18. f. II. 12. der *Grünling*.

Fast geschwänzt, einfarbig braun, unten grün
safrangelb gefäumt, in den Hinterflügeln ein
Halbzirkel von weissen Punkten.

Esper's Schmetterl. I. p. 279. t. 21. f. 2. der *Grün-*
ling.

Glad-

*) Einige von dieser Art haben auf der Unterseite der Hinter-
flügel eine Reihe weisser Punkte; bey andern aber fehlt sie.
Vermuthlich bestimmt dieses Merkmal das Geschlecht. Wel-
ches sind aber die Männchen, und welches die Weibchen?
v. *Esper* I. p. 281. der die mit den sechs abgesetzten hellweissen
Strichelchen auf der Unterseite der Hinterflügel für die *Weib-*
chen hält.

**) Etwas selten; in manchen Jahren aber im Junius auf den
grossen schwarzen Brombeersträuchern, zwischen den Wiesen
und Forsten, auch auf anderm niedrigen Strauchwerk, an den
Vothölzern und Hügeln häufiger. Seine Flügel am Rande
mit zahnförmigen und geschwänzten Zakken versehen, sonst
aber oberwärts durchaus braun, und unterwärts grün.

Gladbachs Schmetterl. I. p. 21. t. 10. f. 5. 6. das kleine Schwalbenschwänzchen.

Bergsträfers Nomenkl. II. p. 28. t. 22. f. 8. 9. der Himbeerfalter.

— p. 47. t. 31. f. 4. Erste Verschiedenheit des Himbeerfalters mit den weissen Punkten im halben Zirkel. *)

Onomat. hist. nat. P. I. p. 769. *Argus coecus*, der blinde *Argus*.

— — P. 6. p. 147. Pap. *Rubi*.

Petiver Oper. Tom. II. pap. britan. tab. VI. f. 13.

Papilio minor, superne fuscus, inferne viridis.

Holly Butterfly (because I first observed it on that tree).

Raj. Hist. Inf. p. 133. no. 22. *Papilio parva*, alis supinis pullis, pronis viridibus.

Systeme Naturel du Regne Animal etc. Tom. II. p. 140. no. 35. *Argus avengle*; *Argus coecus*.

Scop. Entomol. carn. pag. 176. no. 460. Pap. *Rubi*.
Long. lin. $6\frac{1}{2}$. Lat. $4\frac{1}{2}$.

Alae supra pallide cervinae, subtus virentes: posticae semidentatae (*Mas*).

Alae posticae subtus punctis (4-5) albis; intimo dente incurvo (*Foemina*).

Fabric. S. E. p. 523. no. 339. Nom. *Linn*.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 64. no. 34. *Papilio* alis rotundatis integerrimis; subtus viridibus immaculatis.

L'*Argus vert*, ou l'*Argus avengle*.

Long. 6 lign. Larg. 14 lign.

Schaeff. Icon. t. 29. f. 5 6. *Papilio hexapus* alis caudatis secundus, zweiter sechsfüssiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Schaeff.

*) Höchstwahrscheinlich ein Weibchen.

32 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Schaeff. Abhandl. von Insekten 3ter und letzter Th.
p. 93. mit beygef. illum. Kupfertafel: *die grüngelbe*
Genisterraupe.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 112. no. 1293. Pap. *Rubi.*
Nom. Linn.

238. *Lara, die kapenfishche Lara.*)*

Müller l. c. p. 626. no. 238. der *Eins und Zwey.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 90. Pap. *Lara.*

Fabric. S. E. p. 528. no. 358.

Alis integerrimis, subtestaceis; supra anticis
uniocellatis, posticis biocellatis.

Ocelli nigri, iride alba. *Subtus* alae anti-
cae ocellis duobus, posticae coecae.

Linn. Mus. Vdalric. p. 320. no. 138. Pap. *Lara.*

Alae *primores* supra fusco-testaceae, limbo
exteriore magis fusco.

Ocellus ad angulum posticum niger, iride
alba.

Margo ciliis coeruleis vestitus.

— — *subtus* cinereae.

Ocelli ad angulum posticum duo, nigri iride
alba.

Striga obsoleta, albida, repanda, transversa,
ante ocellos.

— *posticae* supra similes primoribus.

Ocelli ad angulum posticum exacte similes et
oppositi ocellis alae primoris.

— — *subtus* cinereae.

Ocellus nullus.

239. *Pam-*

*) Nicht abgebildet.

239. *Pamphilus*, das braune Einauge.*)

Müller l. c. p. 626. no. 239. der *Heupapilion*.

Früßlins Verz. schweiz. Inf. p. 31. no. 601. das *Einauge*.

Auf allen Wiesen sehr gemein.

Berlin. Magaz. II. p. 78. no. 43. Pap. *Nephele*.

Röthlichgelb, mit einem schwarzgrauen Rande, und weissen Saume, unten mit *einem Auge* auf den Oberflügeln, weisslichgrau auf den Unterflügeln.

Naturforscher VI St. p. 10. no. 43. Pap. *Nephele*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 971. no. 3. Pap. *Pamphilus*.**)

Tityrus, oder der braune oder gelblichtbraune sehr veränderliche Tagvogel.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 168. no. 14. *Kammgrasfalterraupe* (*Cynofuri cristati*); *Kammgrasfalter*.

Esper's Schmetterl. I. p. 282. t. 21. f. 3. der *kleine Heuvogel*.

Gladbach's Schmetterl. I. p. 21. t. 10. f. 1-4. das *Augenvögelein*; f. 1. 2. Männchen; f. 3. 4. Weibchen.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 116. Pap. *Pamphilus*.

Peti-

*) Rösels Citat im Linné ist Pap. *Jurtina*: in Hufnagels Tab. Berl. Magaz. II. p. 76. no. 39. *Pamphilus*.

**) Dieser wechselt in unsern Waldungen, zwischen denselben, und den Wiesen, im Junius und August sehr häufig. Man bemerkt ihn vorzüglich auf dem Hartriegel, dem Malinenstrauche und Faulbaume. Die Oberflügel sind insgemein gelblichbraun, oder auch dunkelgelb, sonst aber auch wegen verschiedener Einmischung von Farben gar veränderlich. Sie führen unterwärts ein schwarzes Auge, die Unterflügel hingegen sind recht braun, und haben unterwärts eine hellgraue Binde.

Petiver Oper. Tom. II. Pap. Britan. Tab. V. f. 15.
The golden Heath-Eye; f. 16. idem margine fusco,
Selvedg'd Heath-Eye. Museum no. 311. Pa-
piliunculus aureus oculatus in Ericetis frequens.
The smal Heath Butterfly.

Raj. Hist. Inf. p. 125. no. 19. *Papilio parva e fulvo
et fusco bicolor, fulvo mediam alam, fusco oras
extremas occupante, cum ocello ad extimum an-
gulum alarum exteriorum.*

Système Naturel du Regne Animal etc. Tom. II.
p. 134. no. 18. *Papillon de Bruyere.*

Scop. Entom. carn. p. 175. no. 458. Pap. *Menalcas.*
Long. lin. 7. *Lat.* lin. 4½.

Alae primores vtrinque, posticae supra tan-
tum, pallide ochraceae. Ad apicem alae anti-
cae est macula aut punctum nigricans, quod subtus
ocellus est.

Fabric. S. E. p. 529. no. 368. Nom. *Linn.*

Poda Mus. graec. p. 97. no. 5. a. Pap. *Menalcas.*

Admiral Nederl. Inf. t. 25. Het Hooy-beestje.

Schaeff. Icon. t. 164. f. 2. 3. *Papilio tetrapus alis in-
tegris 14, 14ter vierfüßiger Tagfalter mit gan-
zen Flügeln.*

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 53. no. 21. *)

Papilio alis rotundatis fulvis, oris fuscis, pri-
mariis subtus ocello unico, secundariis subtus al-
bo-cinereoque variegatis.

Procris. *Long.* 5 lign. *Larg.* 1 pouce.

Papil-

*) Von der Raupe sagt er: Sa Chenille est noire, avec une tête
rouge, et son corps est chargé de tubercules ornés de quel-
ques poils. Ces Chenilles forment sur le gazon des toiles, dans
lesquelles elles vivent en société.

Hierinn hat er geirret, und die Raupe der *Cinxia* L. be-
schrieben. *S. Wien. Schmett.* p. 168. (not. ***.) *Esper's* Schmet-
terl. I. p. 284.

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engrame*
melle Vol. III. p. 128. t. 29. no. 56. le *Procris*.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 205. no. 9. tab. 2. f. 3.
Pap. *Pamphile*.

A ailes arrondies, d'un jaune aurore bordées
de gris, à tache en œil unique sur les supérieures,
et dont les inférieures sont grises avec une
bande transverse blancheâtre.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 146. no. 9. t. 2. f. 3. der
Pamphilus.

Mit rundlichten morgenrothen graugerändelten
Flügeln, und einem augenförmigen Flek
auf den Oberflügeln; die Unterflügel grau, mit
einer weißlichen Queerbinde.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. pag. 115. no. 1329. Nom.
Linn.

240. *Philocles*, der indianische *Philokles*.

Müller l. c. p. 627. no. 240. die *Queerwelle*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 124. Pap. *Philocles*.

Fabric. Mantiss. p. 259. no. 189-190. Pap. *Philocles*.
Nom. *Linn.* *)

Linn. Mus. Vdalric. p. 321. no. 139.

Alae primores supra fuscae.

Fascia albo-coerulea, transversa.

— — *subtus* fuscae.

Ocellus niger, iride grisea, pupilla alba, in
medio alae.

— *posticae supra* fuscae.

Regio exterior albida.

— — *subtus* lineolae transversae, undae,
versus apicem albicantes.

*) *Fabricius* rechnet ihn zu den *Festivis*.

36 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Cramer Pap. exot. XVI. p. 134. t. 184. fig. DE. Pap. *Philocles, Mas*; fig. F. *Foemina*. — à *Suriname.* *)

241. *Timantes*, der *indianische Timantes.* **)

Müller l. c. p. 627. no. 241. die *Augenspitze*.

Martini allgem. Gesch. der Natur IV. p. 90. die *Augenspitze*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 157. Pap. *Timantes*.

Linn. Mus. Vdalric. p. 322. no. 140. Pap. *Timantes*.

Alae supra omnes immaculatae, fuscae, seu subviolaceae.

— *subtus omnes viridi-coeruleae.*

Lineae 4 s. 5 fuscae, latae transversae, per omnes alas.

Ocellus niger, iride flava, ad apices primorum.

Ocelli aliquot, quorum nonnulli coeci ad marginem posticum secundariorum.

242. *Arcanius*, der *Rostflügel*.

Müller l. c. p. 627. no. 242. der *Rostflügel*.

Frieslins Verz. schweiz. Inf. p. 31. no. 602. Pap. *Arcanius*.

Auf den Wiesen etwas *selten*.

Berlin. Magaz. II. p. 72. no. 31. Pap. Arcania.

Die

*) Cramer macht ihn zu einem *Nymph. Gemmato*, und zwar sehr gegründet. Bey dem Cramerschen Exemplar ist bey dem Männchen das Auge auf der Oberseite der Flügel schwarz mit einer himmelblauen Einfassung, und drey weissen, im Dreyek stehenden Pupillen; auf der Unterseite ist die Iris okerfarbig, bey dem Weibchen aber auf der Oberseite schwefelgelb.

*) Nicht abgebildet.

Die Oberflügel oben röthlichgelb mit einem breiten Rande, unten mit einem kleinen Auge. Die Unterflügel oben braun, unten gelblich braun, mit einem breiten weissen Streif: auf jedem Flügel *fünf Augen*.

Naturforscher VI St. p. 7. no. 31. Pap. *Arcania*.*)

— — — VIII St. p. 125.

Martini allgem. Gesch. der Natur III. p. 218. *Arkanus*; Pap. *Arcanius*; *Rostflügel*.

*Esper*s Schmetterl. I. p. 285. t. 21. f. 4. der *Rostflügel*; das *Weibchen*.**)

Systemat. Verz. der Schmett. der W.G. p. 168. no. 12.†) *Perlgrasfalterraupe* (*Melicæ ciliatæ*); *Perlgrasfalter*.

Scop. Entom. carn. p. 174. no. 457. Pap. *Amyntas*.

Long. lin. 8. Lat. $5\frac{1}{2}$.

Alae anticae corticinae; limbo fusco, cui sub-
tus immersus est vnicus ocellus prope apicem.
Posticae fuscescentes; subtus fascia dentata alba et
ocellis sex: quinis infra, vnico supra fasciam.

C 3

Fabric.

*) Wie vormalis in der Faun. Suec. In dem System bekam er nachmals die männliche Endung: *Arcanius*. „Einige von dieser Art sind auf der Oberseite ganz dunkelbraun; unten aber den andern völlig gleich, nur dafs die weisse Binde auf den Hinterflügeln unterbrochen ist. Ich halte sie für die *Männchen*.“ *Rottenb.*

**) Im System hat Linné das *Männchen* beschrieben. Im *Esper* t. 35. Suppl. XI. f. 3. 4. eine Abänderung des *Arcanius*, oder *Rottenburgs* Dan. Festiv. *Tiphon*, *Naturf.* VI. p. 15. no. 1. den ich unter den neuen Festivis no. 104. im vorigen Bande aufgestellt habe. Fürs System hat ihn *Esper* also beschrieben:

Alis integerrimis, supra flavescentibus, margine paulo saturatiore; inferioribus fuscis, subtus griseis, fascia saepius interrupta, ocellisque senis minoribus oblitteratis.

†) Unter den *Gemmatis*.

38 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Fabric. S. E. p. 530. no. 369. Nom. Linn.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 53. no. 22. Papilio alis rotundatis, superioribus fulvis oris fuscis, subtus ocello vnico; secundariis supra fuscis, infra cinereis, fascia alba, ocellisque quinis.

Le Cephale.

Long. 7 lign. Larg. 17 lign.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 30. Pap. Arcanius.

Schaeff. Icon. t. 127. f. 4 5. Papilio tetrapus alis integris octavus, 8ter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Papillons d'Europe par Mr. Ernst et R. P. Engrameille Vol. III. p. 129. t. 29. no. 57. le Cephale.

*Degeer Mém. Tom. II. P. I. p. 207. no. 11. t. 2. f. 5. 6. Pap. Arcanie. *)*

Pap. à ailes arrondies, dont les supérieures sont d'un jaune aurore, avec un œil unique, et les inférieures brunes avec cinq ou six yeux en dessous et traversées d'une bande blanche.

— *Ueberf. II B. I Th. pag. 148. no. 11. t. 2. f. 5. 6. Arkanius.*

Der Tagfalter mit rundlichten Flügeln; die Oberflügel aurorarothe mit einem Auge; die Unterflügel braun, unten fünf bis sechs Augen, mit einer weißen Querstreife.

243. *Athemon, der amerikanische Athemon.*

Müller l. c. p. 627. no. 243. das Weißfeld.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 35. Pap. Athemon.

Fabric. S. E. p. 528. no. 362. Nom. Linn.

Sebae Thef. Tom. IV. t. 27. f. 25. 26. (test. Fabric.)

244. *Ca-*

*) *Degeer* hält des *Geoffroy Cephale* für den *Hero* *Linn.*

244. *Caricae*, der *amerikanische Papajafalter*.

Müller l. c. p. 627. no. 244. der *Augensaum*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. IV. p. 76. t. 120. f. 1.

Raupe; f. 2. Puppe: beyde auf einem Papajablatt;
f. 3. der *Schmetterling*; der *Augensaum*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 48. Pap. *Caricae*.

Fabric. S. E. p. 526. no. 352.

Alis integerrimis *fuscis*; disco communi albo, limbo cinereo *subocellato*.

D'Aubent. Miscell. t. 92. f. 3.

Cramer Pap. exot. XV. p. 113. t. 170. fig. E. Pap. *Caricae*; à *Suriname*.*)

245. *Metis*, der *kapenische Metis*.**)

Müller l. c. p. 628. no. 245. der *Roslflek*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 107. Pap. *Metis*.

Fabric. S. E. p. 528. no. 360. Nom. *Linn*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 28. t. 16. f. 3. 4.

Pap. *Metis* — du *Cap de B. E.*

Il déploie ses ailes un pouce et près d'un huitieme.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 103. t. 162. fig. G. Pap. *Metis* — du *Cap de B. E.*

246. *Neleus*, der *indianische Neleus*.

Müller l. c. p. 628. no. 246. der *Weißpunkt*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 110. Pap. *Neleus*.

Fabric. S. E. p. 528. no. 361. Nom. *Linn*.

Sebae Thes. Tom. IV. t. 30. f. 11. 12.

C 4

247. *Ta-*

*) Cf. IV. t. 47. Fig. F G. Pap. *Mantus*.

**) Gehört füglich zu den *Vrbicolis*. Man vergleiche hierbey
Fabric. *Paniscus* no. 377. unter unsern neuen *Vrbic*. no. 3. *Sulzers* Gesch. t. 19. f. 8. 9. *Naturf.* XII. p. 71. t. 2. f. 11. 12.

40 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

247. *Talaus*, der indianische *Talaus*.

Müller l. c. p. 628. no. 247. Pap. *Talaus*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 153. Pap. *Talaus*.

Fabric. S. E. p. 528. no. 363. Nom. Linn.

Sebae Thes. Tom. IV. t. 57. f. 18.

248. *Phereclus*, der amerikanische *Phereclus*.

Müller l. c. p. 628. no. 248. der Mohrenpapilion.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 122. Pap. *Phereclus*.

Fabric. S. E. p. 529. no. 364. Nom. Linn.

Cramer Pap. exot. XV. p. 126. t. 178. fig. D. Pap.

Phereclus — à Suriname.

— — XI. p. 40. t. 123. fig. B C. Pap. *Agyrtus*.*)

249. *Peleus*, der indianische *Peleus*.

Müller l. c. p. 628. no. 249. die *Mistice*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 121. Pap. *Peleus*.

250. *Lyfippus*, der amerikanische *Lyfippus*.

Müller l. c. p. 628. no. 250. der Bandflügel.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 98. Pap. *Lyfippus*.

Fabric. S. E. p. 529. no. 365.

Alis angulatis fuscis: omnibus striga rubra;
subtus cinereo-punctatis.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 4. t. 2. f. 2.2. de
la Jamaïque.

Il déploie ses ailes un pouce et demi.

251. *Priassus*, der indianische *Priassus*.**)

Müller l. c. p. 629. no. 251. das Pomeranzenband.

Ono-

*) Fig. C. hat nur hellgelbe Querstreifen, sonst der nämliche.
Vielleicht ein Unterschied des Geschlechts.

**) Nicht abgebildet.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 138. Pap. *Priassus*.

Fabric. S. E. p. 529. no. 366. Pap. *Priassus*.

Macula minor fulva, fascias uniens; *alae posticae* nigrae immaculatae.

Linn. Mus. Vdalric. p. 319. no. 137.

Alae primores concolores, nigrae, *fascia* in medio transversalis, fulva, *fascia* minor, fulva, extra priorem.

Macula minor, fulva, cruciformis, uniens priores duas fascias, descendens a latere exteriore fasciae superioris ad medium inferioris fasciae.

— *Posticae* concolores, nigrae, immaculatae.

252. *Phlaeas*, der *kleine Feuervogel*.*)

Müller l. c. p. 629. no. 252. der *Erdpapilion*.

Füßlins schweiz. Inf. p. 32. no. 605. Pap. *Phlaeas*: größer als die beyden folgenden.**)

C 5

Berlin.

*) 1) Mit diesen Schmetterlingen: *Phlaeas*, *Virgaureae* et *Hippothoë*, fangen sich die *Feuervögel* oder goldglänzenden Falter an, und gehen bis no. 255. *Hero* inclusive. 2) Diese drey sind und werden wegen ihrer nahen Verwandtschaft oft verwechselt. Am schönsten und richtigsten hat sie der Herr von *Rottenburg* im *Naturforscher* VI St. p. 11 sq. auseinander gesetzt. Die von Herrn *Esper* Schmett. I. p. 289. gelieferte Tabelle von den Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten dieser drey Falter, sowohl der Männchen als Weibchen, trägt auch viel bey, sie gehörig von einander zu unterscheiden. Meine Absicht erlaubt es nicht, dieses alles hier weitläufig zu wiederholen. Man halte sich vorzüglich an des Ritters *Faun. Suec.* ed. 2. und an die darinn gegebenen genauen Beschreibungen dieser Falter, vergl. mit den *Wien. Schmett.* p. 156. 157.

**) Gerade der kleinste unter allen; vermuthlich eine Verwechslung mit *Virgaureae*.

42 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Berlin. Magaz. II. p. 80. no. 44. Pap. *Phlaeas*.

Die Oberflügel glänzend feuerfarbig mit schwarzen Flekken, und schwarzem Rande. Die Unterflügel grau, mit einem feuerfarbigen Strich. Unten die Oberflügel etwas heller, die Unterflügel ganz grau.

Röfels Insektenbel. III. p. 263. t. 45. f. 5. 6.

Das kleinere feuerrothe, und goldglänzende Tagvögelchen der 2ten Klasse, mit dunkeln Auszierungen.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 181. no. 5.

Unbekannte Raupe. Goldfarbener, schwarzgefleckter, unten rothgrauer Falter.

Bergsträfers Nomenkl. III. pag. 38. t. 65. f. 4. 5. *Phlaeas*.

— *Deur.* II. p. 7. t. 6. f. 4. 5. Pap. *Phlaeas*: alis subintegris fulvis, nigro-punctatis; *subtus* canescentibus.

Gladbachs Katal. das schwarze Goldvögelchen.

Naturforscher IX St. p. 90. t. 1. f. 1. das Ey des gefleckten kleinen Feuervogels. *)

Espers Schmetterl. I. p. 282. t. 22. f. 1. der *Erdpapilion*; der kleine Feuervogel.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 456. no. 30. der kleine Feuerfalter.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 125. Pap. *Phlaeas*.

Petiver Oper. Part. II. Papil. britan. Tab. IV. f. 13. 14.

Papilio minor aureus, ex nigro permaculatus.

— Mus. no. 317. Smal Tortoise shell.

Raj. Hist. Inf. p. 125. no. 20. *Papilio parva*, alis exterioribus circa margines nigricantibus, media parte rufis, serici instar splendentibus, maculis longis nigris pictis.

Systeme

*) Ein Weibchen hat solches auf den wilden Saucrampfen gelegt.

Insecta Lepidoptera. 231. *Papilio Plebej. Rural.* 43

Système Naturel du Regne Animal etc. Tom. II.
p. 140. no. 36. Pap. *Bytyracea vulgaris*.

Fabric. S. E. p. 527. no. 355.

Alis *subintegris*, fulvis, nigro-punctatis;
subtus canescentibus.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 65. no. 35. *Papilio* alis ro-
tundatis fulvis, vtrunque punctis nigris.

Le *Bronzé*. Long. 5 lign. Larg. 13 lign.

Schaeff. Icon. t. 143. f. 3. 4. *Papilio hexapus* alis
caudatis quintus, 5ter *sechsfüßiger* Tagfalter mit
geschwänzten Flügeln.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 115. no. 1330.

Alis *integerrimis* fulvis etc.

— Faun. Fridr. p. 37. no. 338. Nom. *Linn.*

253. *Virgaureae*, der *Goldruthenfalter*.*)

Müller l. c. p. 629. no. 253. der *Feuerpapilion*.

Fießlins Verz. Schweiz. Inf. pag. 32. no. 606. Pap.
Virgaureae.**)

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 157. †)
und p. 180. no. 1. *Goldruthenfalterraupe* (*Solidaginis Virgaureae*); *Goldruthenfalter*. ††)

Esper

*) Bloß die Oberseite des *Weibchens* ist in dem *Linnéischen* System
beschrieben. *W. Schmett.* p. 157. Der in den *Hufnagelschen* Ta-
bellén im IIten B. des *Berlin. Magaz.* pag. 80. no. 45. so ge-
nannte Pap. *Virgaureae* ist nicht der *Linnéische* Virg. sondern
eine neue Art: Pap. *Alcipbron*. S. *Naturforsch.* VI St. p. 10.

**) Den hierbey angeführten Citatis zu Folge ist dies eher Pap.
Phlaeas als *Virgaureae*, und der P. *Virgaureae* bey ihm *Phlaeas*,
wie auch *Esper* angemerkt hat.

†) Wo der Unterschied dieser drey Papilions wohl auseinander
gesetzt, und einige Citaten berichtigt sind.

††) Die Raupe auch auf einer Art des *Ampfers* (*Rumex acutus*)
angetroffen.

44 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Esper Schmetterl. I. p. 291. t. 22. f. 2. a. das *Männchen*; f. 2. b. das *Weibchen*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 158. Pap. *Virgaureae*.

Der *Dronth. Gesellsch.* Schr. III. p. 367. no. 33. Pap. *Virgaureae*. Nom. *Linn.*

Scop. Ent. carn. p. 180. no. 462. Pap. *Virgaureae*.)
Long. lin. 6 — $8\frac{1}{2}$. *Lat.* $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$.

Alae anticae fulvae; margine externo, maculisque subtus atris; posticae ad angulum anibinis dentibus instructae.

Fabric. S. E. p. 527. no. 354. **)

Alis subangulatis, fulvis, margine fusco, subtus punctis nigris albisque.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 115. no. 1331.

Alis integerrimis etc.

Schaeff. Icon. t. 97. f. 7. †) *Papilio hexapus* alis integris sextus, sechster sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Bergsträßers Nomenkl. III. p. 37. t. 65. f. 1. 2. der *Goldruthenfalter*.

— Icon. Dec. II. p. 7. t. 6. f. 1. 2. P. *Virgaureae* *Mas.*

Alis subangulatis vtrunque fulvis, margine fusco, oculis albisque in postica inferiore maculis notatis.

— — t. 6. f. 3. 4. *Foemina*.

Alis subangulatis fulvis posticis supra praeter fasciam fuscis, punctis atris vtrimque sparsis.

254. *Hip-*

*) Nach dem dabey gesetzten Citato: *Rösel* III. t. 45. f. 5. 6. ist es nicht *Virgaureae*, sondern *Phlaeas*.

**) Sowohl bey *Virgaureae* als bey *Phlaeas* einerley Citatum des *Rösels* und *Geoffroy*.

†) Nach dem Zeugniß der *Wiener Entomol.* p. 157. das *Männchen* des Pap. *Virgaureae*.

254. *Hippothoë*, der *Feuervogel*.

Müller l. c. p. 629. no. 254. das *Vielauge*.

Frieslins Verz. Schweiz. Inf. pag. 32. no. 607. des *Feuervogel*.

Röfels Insektenbel. III. p. 230. t. 37. f. 6. 7. der goldglänzende, oder feuerfarbschimmernde Papilion der 2ten Klasse der Tagvögel. (*Männchen*.)

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 157. 158. et p. 181. no. 2. *Unbekannte Raupe: goldschimmernder, unten blaulichgrauer Falter*. Pap. *Hippothoë*.

Esper's Schmetterl. I. p. 292. t. 22. f. 3. Pap. *Hippothoë*. (*Männchen*.)

— — p. 329. t. 31. Suppl. 7. f. 3. Pap. *Eurydice*. (*Weibchen*.)

— — p. 342. t. 35. Suppl. 11. f. 5. Pap. *Hippothoë Varietas* (vom *Weibchen*).

— — p. 350. t. 38. Suppl. 14. f. 1. Pap. *Hippothoë Varietas*, a. das *Männchen*; b. das *Weibchen*.

Gladbachs Schmett. I. p. 17. t. 8. f. 5. 6. das *rothe Schillerchen*. (*Esper* t. 35. f. 5.)

Bergsträfers Nomenkl. II. p. 51. t. 3. 4. das *purpurfarbige Schillerchen*. (*Hippothoë Varietas*.)

Alis angulatis purpureo-rutilis, subtus cinerascens, punctis ocellaribus, numerosis: *primoribus* supra

α) *immaculatis* (*Mas*);

β) *nigro punctim sparsis* (*Foem*).

Schaeff. Icon. t. 280. f. 1. 2.

Bergstr. Icon. Decur. II. p. 7. t. 7. f. 1. 2. 3. Pap. *Hippothoë Mas*.

Berlin. Magaz. II. p. 80. no. 45. Pap. *Virgaureae*.*)

Braun, mit schwarzen und orangefarbenen Flecken.

*) Das *Weibchen* von *Hippothoë*; v. *Esper* p. 350. t. 38. f. 1. b.

Flecken. Die Unterflügel mit einem rothgelben Streif. Unterwärts die Oberflügel blafs-röthlichgelb, die Unterflügel grau mit schwarzen Punkten. (*Weibchen.*)

Berlin. Magaz. II. p. 90. not. q.

Naturforscher VI St. p. 10. Pap. *Alciphron* (*Männchen.* (v. *Esper* p. 350. t. 38. f. 1. a.)

— — p. 28. no. 16. Pap. *Euridice.* (*Weibchen.*) (v. *Esper* p. 294. t. 31. f. 3.)

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 341. das *Vielauge.*

Hollar Inf. t. 6. f. 4. Pap. *Hippothoë.* (Vid. *Naturf.* 9 St. p. 223.)

Scop. Entom. carn. p. 181. *)

Sexus alter alis anticis supra fulvis; margine toto maculisque octo fuscis, quarum tres posticae saepius conjunctae, subtus maculis ocellaribus 10; duabus infimis in vnam cohaerentibus.

— *posticis* murinis, punctis ad 15 nigris, maculisque lunatis fulvis in limbo (5-6), supra vero fuscis, fascia limbi dentata fulva.

Fabric. Mantiss. p. 270. no. 353-354. Pap. *Hippothoë.*

Alis integris, margine albo; subtus cinereis, punctis ocellaribus numerosis.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 76. Pap. *Hippothoë.*

255. *Hero*, das *Sechsauge.*

Müller l. c. p. 629. no. 255. das *Sechsauge.*

Naturforscher VIII St. p. 120. et 125. t. 3. f. E F. Pap. *Hero.*

Espers Schmetterl. I. p. 295. t. 22. f. 4. das *Sechsauge.*

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 321. no. 13. Pap.

*) Nach dem beygefügtten Citato: *Rösel* III. t. 37. f. 6. 7. Pap. *Hippothoë* *Mar.*

Pap. *Hero.* Brauner Scheinfilberüügigter Falter. Unbekannte Raupe. (v. *Esper* l. c. p. 298. not. a.)

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 342. das Sechsauge.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 75. Pap. *Hero.*

Catholicon H. p. 159. Pap. *Hero.*

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engramelle* Vol. III. p. 132. t. 29. no. 59. le *Moelibée*.

Fabric. S. E. p. 530. no. 372. Pap. *Hero.*

Alis integerrimis fuscis; subtus anticis ocello; posticis fenis.

— — — no. 371. Pap. *Sabaeus*.*)

Alis integerrimis, fuscis, posticis supra ocellis quatuor coecis; subtus sex pupillaribus.

Habitat in *Lipsiae* nemoribus.

Degeer Mém. Tom. II. Part. I. p. 206. no. 10. t. 2. f. 4. Pap. *Hero.* **)

Papillon à ailes arrondies d'un jaune aurore à deux taches en yeux sur les supérieures et six sur les inférieures, à bande onquée blancheâtre sur toutes les ailes.

— *Ueberf.* II. I Th. p. 147. t. 2. f. 4.

Der Tagfalter mit rundlichten aurorafarbigen Flügeln, zwey Augen auf den Ober- und sechs auf den Unterflügeln; auf allen aber eine geflammte weißliche Streife.

Unab.

*) Einerley mit *Hero*; v. *Esper* p. 297.

**) Nach *Degeers* eigenem Citat ist es *Geoffr. Cephalé*; dieser aber Pap. *Arcanius* Linn. Mithin zweifelt *Esper* l. c. p. 297. ob dieser *Degeerische* *Hero* nicht auch *P. Arcanius* sey, den aber der Verf. gleich in der folgenden Numer beschrieben, und meines Erachtens von *P. Hero* hinlänglich unterschieden hat.

Unabgebildete Linné'sche Pap. Pleb. Rurales.

1. No. 218. *Polybe.*
2. No. 219. *Thero.*
3. No. 225. *Telamon.*
4. No. 227. *Thyra.*
5. No. 228. *Thysbe.*
6. No. 229. *Thamyras.*
7. No. 233. *Philiassus.*
8. No. 235. *Pirithous.*
9. No. 236. *Thespis.*
10. No. 238. *Lara.*
11. No. 241. *Timantes.*
12. No. 251. *Priassus.*

Neue Papil. Pleb. Rurales.

1. *Eryx*, der *chinesische Eryx.*

Linn. Mantiss. p. 537.

Alis caudatis nigris, subtus viridibus; posticis postice subdentatis maculatisque.

Aubent. Miscell. t. 71. f. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 522. no. 336.

Alis caudatis, nigris, subtus viridibus; posticis margine subdentato maculatoque.

Müllers Supplem. und Regist. B. p. 298. no. 255 f.

Pap. Eryx, der chinesische Bauer.

2. *Amor*, der *ostindianische Amor.*

Fabric. S. E. p. 518. no. 321.

Alis tricaudatis fuscis: subtus disco variegato, strigae postica aurea.

Magnitudo P. Argioli.

3. *Hymen*, der *sierraleonische Hymen*.

Fabric. S. E. p. 519. no. 322.

Alis tricaudatis, fuscis; subtus albo-maculatis; posticis supra albis.

Statura praecedentis.

4. *Vulcanus*, der *ostindianische Vulkan*.

Fabric. S. E. p. 519. no. 323.

Alis bicaudatis, supra fuscis, fulvo-maculatis: subtus strigis flavis, fulvis argenteisque maculatis.

5. *Endymion*, der *brasilianische Endymion*.

Fabric. S. E. p. 519. no. 324.

Alis bicaudatis fuscis: macula rufa, subtus fascia maculisque duabus terminalibus rufis.

Affinis P. Echion L. no. 224.

6. *Sphinx*, der *ostindianische Sphinx*.

Fabric. S. E. p. 520. no. 326.

Alis bicaudatis coerulescentibus: subtus cinereis, angulo ani macula gemina atra.

7. *Centaurus*, der *neuholländische Zentaur*.

Fabric. S. E. p. 520. no. 329.

Alis caudatis coerulescentibus: limbo fusco, subtus cinereis; maculis bascos ocellaribus.

8. *Strephon*, der *ostindianische Strephon*.

Fabric. S. E. p. 522. no. 334.

Alis caudatis, fuscis, disco coerulescentibus, subtus cinereis: fascia alba, angulo ani ocello gemino rufo.

Pap. *Boeticus* L. no. 226. valde affinis; distinctus tamen et *minor*. Alae subtus haud albo-undatae, sed fascia unica obliqua, et ocelli rufi pupilla nigra.

9. *Cleon*, der *brasilianische Kleon*.

Fabric. S. E. p. 522. no. 335.

Alis *caudatis* fuscis; subtus cinereis: anticis striga; posticis fascia sanguinea, angulo ani oculo gemino rufo.

10. *Aeolus*, der *indianische Aeolus*.

Fabric. S. E. p. 522. no. 337.

Alis *caudatis* cyaneis; anticis macula nigra, omnibus subtus fascia alba, nigro-striata.

Statura P. *Quercus* L. no. 222.

Aubent. Miscell. t. 18. f. 6. 7.

11. *Simaëthis*, der *indianische Simaëthis*.

Fabric. S. E. p. 523. no. 338.

Alis *caudatis* fuscis, subtus viridibus, striga argentea.

Statura P. *Rubi* L. no. 237.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 3. t. 1. f. 3.

Il déploie ses ailes environ un ponce et un quart.

— De l'isle de St. *Christopher's*.

12. *Ixion*, der *indianische Ixion*.

Fabric. S. E. p. 523. no. 340.

Alis *caudatis* fuscis, subtus striga obliqua nivea; posticis fascia submarginali rufa.

13. *Rosimon*, der indianische *Rosimon*.

Fabric. S. E. p. 523. no. 341.

Alis caudatis albis, supra limbo punctisque
disci nigris; subtus angulo ani punctis tribus
aureis.

14. *Narcissus*, der neuholländische *Narzissus*.

Fabric. S. E. p. 524. no. 342.

Alis dentatis fuscis, disco coerulescente; sub-
tus fasciis maculisque sanguineis, argento-mar-
ginatis.

15. *Apelles*, der neuholländische *Apelles*.

Fabric. S. E. p. 524. no. 343.

Alis dentatis fulvis, limbo fusco; posticis
subtus fasciis rufis, argento-marginatis.

Praecedenti affinis.

16. *Erinus*, der neuholländische *Erinus*.

Fabric. S. E. p. 525. no. 348.

Alis integerrimis fuscis; subtus cinereis, an-
ticis angulo postico puncto gemino nigro.

Medius.

17. *Parfimon*, der sierraleonische *Parfimon*.

Fabric. S. E. p. 526. no. 349.

Alis integris fuscis, subtus cinereis, albo-
undatis: posticis basi punctis ocellaribus nigris,
apice ocello.

Major. Variat supra alis anticis macula me-
dia nigra, et posticis lunulis apicis albis macula-
que rufa.

52 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

18. *Damoetes*, der *neuholländische Damoetes*.

Fabric. S. E. p. 526. no. 350.

Alis integerrimis fuscis, subtus cinereo-undatis: posticis ocello gemino aurato.

Parvus ex hac familia.

19. *Hylax*, der *ostindianische Hylax*.

Fabric. S. E. p. 526. no. 351.

Alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis; subtus cinereis, nigro-punctatis.

Minimus in hoc genere.

20. *Midas*, der *indianische Midas*.

Fabric. S. E. p. 527. no. 353.

Alis subangulatis fuscis, macula albida; subtus basi albis, strigaeque rufa.

Statura praecedentis.

21. *Cephus*, der *indianische Zephus*.

Fabric. S. E. p. 528. no. 359.

Alis integris fuscis; subtus coeruleo-fasciatis; anticis ocello unico, posticis quatuor.

22. *Morpheus*, der *nordamerikanische Morpheus*.

Fabric. S. E. p. 530. no. 370.

Alis integerrimis fulvis; nigro-maculatis; posticis utrinque striga punctorum nigrorum.

Parvus: Magnitudine P. Pamphili L. n. 239.

23. *Aetæon*, der — *Aktion*.

Fabric. App. S. E. p. 829. no. 321-322.

Alis tricaudatis, coerulescentibus, apice nigris: subtus aureis, atomis nigris.

Magnitudo Pap. Cupidinis L. no. 217.

24. *Har-*

24. *Harpax*, der amerikanische *Harpax*.

Fabric. S. E. App. p. 829. no. 327-328.

Alis caudatis fulvis, nigro-maculatis: subtus cinereis, punctis aureis.

Medius.

25. *Pelion*, der nordamerikanische *Pelion*.

Fabric. Mantiss. p. 267. no. 322-323.

Alis subtricaudatis coeruleis, auro-punctatis; limbo fusco.

Cramer Pap. exot. I. t. 6. fig. EF. Pap. Pelion — du Berbice.

(Un Campagnard roturier.)

Müllers S. und R. B. p. 297. no. 255. c. Pap. Pelion, der Goldpage.

26. *Aunus*, der amerikanische *Aunus*.

Fabric. Mantiss. p. 267. no. 322-323.

Alis subtricaudatis coeruleis, limbo atro; subtus nigris albo-fasciatis.

Cramer Pap. exot. II. p. 36. t. 23. fig. EF. Pap. Aunus — de l'isle Araba près de Curacao.

(Une Tortue.)

27. *Ganymedes*, der indianische *Ganymedes*.

Fabric. Mant. p. 267. no. 323-324.

Alis bicaudatis coerulescentibus, limbo fusco; subtus basi virescentibus, punctis aureis.

Cramer Pap. exot. IV. p. 64. t. 40. fig. CD. Pap. Ganymedes — des Indes occidentales.

(Belle Tortue.)

28. *Mars*, der nordamerikanische *Mars*.

Fabric. Mantiss. p. 268. no. 324-325.

54 *Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural.*

Alis *bicaudatis* fuscis; posticis macula rufa,
subtus punctis duobus, fasciaque obliqua alba.

29. *Celeno*, der *surinamische Zeleno*.

Fabric. Mantiss. p. 268. no. 324-325.

Alis *bicaudatis* albis, subtus fasciis fuscis al-
bisque alternis, angulo ani ocello triplici rufo.

*Cramer Pap. exot. III. p. 51. t. 31. fig. CD. Pap. Ce-
leno — de Suriname.*

30. *Telemus*, der *nordamerikanische Telemus*.

Fabric. Mantiss. p. 268. no. 325-326.

Alis *bicaudatis* coeruleis nitidis, posticis sub-
tus striga marginali angulata atra.

*Cramer Pap. exot. I. p. 7. t. 4. fig. DE. Pap. Telemus
— du Berbice.*

31. *Hemon*, der *surinamische Hemon*.

Fabric. Mantiss. p. 269. no. 325-326.

Alis *bicaudatis*, supra fuscis immaculatis;
posticis subtus angulo ani fasciis tribus coeruleis.

Cramer Pap. exot. II. p. 30. t. 20. fig. DE. Pap. Hemon.

32. *Linus*, der *surinamische Linus*.

Fabric. Mantiss. p. 269. no. 341-342.

Alis *caudatis* albis, apice fuscis; subtus albo
atroque fasciatis, angulo ani punctis tribus albis.

33. *Icarus*, der *surinamische Ikarus*.

Fabric. Mantiss. p. 269. no. 348-349.

Alis *integris* supra albis, fasciis fuscis; sub-
tus fasciis albis nigrisque alternis.

*Cramer Pap. exot. II. p. 35. t. 22. fig. GH. Pap. Phi-
lemon — de la Berbice et de Surinam.*

34. *Cassius*, der *surinamische Cassius*.

Fabric. Mantiss. p. 270. no. 360-361.

Alis integris, supra albis: anticis limbo fusco,
posticis fimbria punctata.

Cramer Pap. exot. II. p. 36. t. 23. fig. CD. Pap. *Cassius* — de *Surinam*.

35. *Dorilis*, die *Dorilis*.

Berlin. Magaz. II. p. 68. no. 21. Pap. *Dorilis*.

Schwärzlich grau, mit einigen schwarzen
Flecken; unten bläsgelb mit vielen schwarzen
Flecken von ungleicher Grösse.

Naturforscher VI. p. 6. no. 21. Pap. *Dorilis*.

— Unter die *Vieläugigen*; auf der Unter-
seite, wie die *Argi*, viele kleine Augen. Von
den andern *Argis* dadurch am meisten unter-
schieden, daß die Hinterflügel nahe am Hinterleibe
(in angulo ani) in zwei stumpfe Spitzen aus-
laufen.

36. *Semiargus*, der *Halbargus*.

Naturforscher VI. p. 20. no. 6. Pap. *Semiargus*. (Hr.
von *Rottenburg*.)

- 1) das *Männchen* auf der Oberseite ganz dunkel-
blau, etwas ins Violette spielend;
- 2) am Rande alle vier Flügel schwarz eingefasst,
mit einem schmalen weissen Saum;
- 3) das *Weibchen* oben ganz dunkelbraun, unten
dunkelgraubraun, übrigens wie das *Männ-
chen*;
- 4) im *Junius* in den Gärten und Wiesen, weit
seltener, als der gewöhnliche *Argus* L.

Röfels Insektenbel. III. p. 230. t. 37. f. 4. der kleine, besonders hochblaue Tagpapilion der 2ten Klasse (alleg. von Rottenburg). (Männchen.)*)

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 63. no. 31.

Alis rotundatis integerrimis coeruleis; subtus ocellorum fascia solitaria.

Le *Demi-argus*.

Long. 5 lign. Larg. 14 lign.

Schaeff. Icon. t. 185. f. i. 2.

Papilio hexapus alis ocellatis nonus, neunter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.**)

Bergsträfers Icon. Pap. Diurn. Decur. I. p. 3. t. 3. f. 7. 8. Pap. *Argopoeus*.

Alis angulatis integris coeruleis, fimbria alba; subtus cinereo-fuscescentibus ordine ocellorum arcuato unico, inque posticarum disco macula ocellari lunata. †)

— — p. 8. t. 10. f. 5. 6. Pap. *Damocetas*. ††)

Alis rotundatis integerrimis coeruleis, subtus ocellorum fascia solitaria.

Berg-

*) Beym Esper dieser Röfelsche und Geoffroyische *Argiolus* L. Rösel hat bey seiner Abbildung des Männchens den kleinen schwarzen Strich in der Mitte der Unterflügel vergessen. Herr von Rottenburg sagt: es wäre in der Röfelschen Abbildung die Unterseite des Männchens.

**) Wegen des schwarzen weißeingefassten Strichs auf der Mitte der Unterflügel halt' ich diesen für den *Semiargus*.

†) An diesem der kleine vom Hrn. von Rottenburg angegebene schwarze Strich: auch das Doppelauge in angulo ani.

††) Bey diesem des Geoffr. *Demiargus* citirt. Mehr Aehnlichkeit mit Pap. *Cyllarus* des Herrn von Rottenburg. Ueberhaupt haben die meisten Argusarten des Hrn. Prof. Bergsträfers so viel Aehnlichkeit unter sich, daß ich sie kaum für besondere Gattungen halten kann. Wenigstens scheinen hin und wieder

Insecta Lepidoptera. 231. *Papilio Plebej. Rural.* 57.

Bergsträfers Nomenclat. III. p. 34. not. 1. der *Semiargus*, unser *Byzas*, t. 48. f. 5. 6. v. no. 85.

— — III. pag. 14. t. 57. f. 5. 6. *Wirbelkrautfalter*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 183. no. 7. Pap. *Damoetas*, der *Wirbelkrautfalter*.
(*Foem. P. Alexis Poda*).

37. *Cyllarus*, der *Rottenburgische Zyllarus*.

Naturforscher VI. p. 20. no. 7. Pap. *Cyllarus: Mas.*

- 1) Dem *Semiargus* auf der Oberseite der Flügel sehr ähnlich. Unten hellaschgrau.
- 2) Auf den Unterflügeln ein Bogen von sieben kleinen Augen, nur das unterste in angulo ani nicht doppelt, wie beym *Semiargus*.
- 3) Nahe am Leibe die Unterflügel schön grün-glänzend.

*Esper*s Schmetterl. I. p. 334. t. 33. Suppl. 8. f. 1. 2.

Alis coeruleis superioribus; subtus fascia transversali ocellorum coecorum majorum, inferiorum minorum.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 2. t. 2. f. 1. 2. Pap. *Cyllarus*.

Alis *rotundatis* integris fusco-coeruleis; subtus fusco-virescentibus, ocellisque in anticis octo, in posticis sex; at minoribus.

Similis *Dimis*, *Phobus* et *Brontis* infra —
— Nomencl. III. p. 34. not. 2. *Bronte*. Vid. unten no. 91. et p. 11. t. 54. f. 7. 8. t. 55. f. 1. 2.

D 5

38. *Ica-*

Männchen und Weibchen als besondere Arten aufgenommen zu seyn, wie sich denn der Verf. selbst wegen der großen Ähnlichkeit immer von einem auf den andern bezogen hat.

38. *Icarus*, der *Rottenburgische Icarus*.

Naturforscher VI St. p. 21. no. 8. Pap. *Icarus*. *)

- 1) Das *Weibchen* oben dunkelbraun am Rande eine Einfassung von orangegelben Flekken.
- 2) An einigen an der Einlenkung der Oberflügel ein großer blauer Flek.
- 3) Unten das *Weibchen* dem *Männchen* vollkommen gleich, nur in der Grundfarbe etwas dunkler.

Röfels Insektenbel. III. t. 37. f. 3. 5. (das *Männchen*.)
(*Teste v. Rottenburg*.)

Espers Schmetterl. I. p. 333. t. 32. Suppl. 8. f. 4.

Alis coeruleis immaculatis, subtus pallide griseis, ocellis numerosis.

39. *Alexis*, der *Rottenburgische Alexis*.

Naturforscher VI St. p. 22. no. 9. Pap. *Alexis*.

- 1) Das *Männchen* oben blau, wie fast alle *Argus*arten.
- 2) Das *Weibchen* auf der Oberseite dunkelbraun, am Rande mit orangefarbenen Flekken; weit roth-

*) Etwas besonderes ist es, daß unter dem *Weibchen* dieses Vogels sich viele Naturspiele in Absicht der Unterseite zeigen. Es sind nämlich bey einigen viele von den schwarzen Augen in einander gelaufen, und formiren bald *Bogen*, bald *lange Flekke*, bald noch *andere Figuren*. Ueberhaupt variirt das *Weibchen* von dieser Art gar sehr; daher man sich wohl in Acht zu nehmen hat, daß man daraus theils nicht verschiedene Arten mache, theils es nicht mit andern verwechsle.

Vom *Argus* L. ist dieser Vogel dadurch unterschieden: 1) das *Männchen* auf der Oberseite viel hellblauer; 2) auf der Unterseite nicht die grünglänzenden kleinen Augen am Rande der Unterflügel, wie der *Argus* L. welche der Ritter *Ocellos coeruleo-argenteos* nennet.

rothgelber und viel schöner und lebhafter;
als bey dem Weibchen vom Argo und Icaro.

- 3) Auf der Unterseite hellgrau; die schwarzen Augen in einer etwas andern Ordnung, als bey dem Argo und Icaro.

Berlin. Magaz. II. p. 78. no. 41. Pap. *Medon*: oben ganz braun, unten dem Argus L. sehr ähnlich. (Vergl. *Naturf.* VI. p. 10. no. 41. P. *Medon*.)

Esfers Schmetterl. I. p. 330. t. 32. Suppl. 8. f. 1. Pap. *Medon*.

Alis supra nigricantibus, fasciis utrinque macularibus fulvis ad marginem, subtus ocellis numerosis.

Bergsträfers Nomencl. III. p. 4. t. 50. f. 1. 2. *Salacia*.

— *Icon. Decur.* I. t. 5. f. 1. 2.

40. *Tiresias*, der Rottenburgische *Tiresias*.

Naturforscher VI St. p. 23. no. 10. Pap. *Tiresias*.

- 1) Das *Männchen* oben blau; das *Weibchen* dunkelbraun; an den Unterflügeln des letztern in angulo ani zween kleine orangefarbene Flekke, die einigen fehlen.
- 2) Auf der Unterseite beyde Geschlechter ganz weißlich mit einigen zerstreuten schwarzen Punkten ohne weißse Einfassung.
- 3) Auf jedem Unterflügel zween orangefarbene Flekke wie oben; unten noch zwey kleine grünglänzende Augen: unten dem Argiolo L. sehr ähnlich.
- 4) Das Hauptunterscheidungszeichen ein kleines *Spitzchen* an jedem Unterflügel in der Dicke eines Haars: ziemlich selten.

Espers Schmett. I. p. 337. t. 34. Suppl. 10. f. 1. *Weibchen*; f. 2. *Männchen*; Pap. *Tiresias*. — p. 384. t. 49. Suppl. 25. f. 2. Pap. *Tiresias Var.*

Alis supra coeruleis, subtus cinereis, ocellisque numerosis; inferioribus postice *cauda lineari*, ex setis tenuissimis.

Bergsträßer Nomencl. II. p. 73. t. 45. f. 1. 2. 3. 4. Pap. *Tiresias*. — t. 54. f. 3. 4. *Spielart des Weibchens*.

Alis *caudatis*, subtus in postica bimaculatis; supra

a) coeruleo colore, virgulisque in posticis atris ex margine procurrentibus (*Mas* f. 1. 2.);

b) fusco colore, maculaque ad caudam rotundata fulva. (*Foem.* f. 3. 4.)

— Icon. Pap. Diurn. Decur. I. p. 7. t. 8. f. 3. 4. *Tiresiae* foeminae Varietas.

— Nomencl. III. p. 34. not. 3.

41. *Thetis*, der *Rottenburgische Thetis*.

Naturforscher VI St. p. 24. no. II. Pap. *Thetis*.

1) Einer der *schönsten* unter den *Argusarten*.

2) Das *Männchen* oben schön hellblau; doch am Rande der Oberflügel ein schwärzlicher Schatten.

3) Das *Weibchen* oben ganz dunkelbraun, bey einigen blauschimmernd: die Flügel, wie bey dem Männchen, mit halbmondförmigen orangefarbenen, und nicht so zinnoberrothen Flekken, als bey jenem, eingefasst.

4) Unten dem Pap. *Coridon* sehr ähnlich.

Espers Schmetterl. I. p. 332. t. 32. Suppl. 8. f. 2. Pap. *Thetis*: *Mas*.

Alis coeruleis margine nigricante obductis, fascia

Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural. 61

fascia maculari utrinque fulva obsoletiori, sub-
tus ocellis numerosis.

Esper's Schmetterl. I. p. 335. t. 33. Suppl. 9. f. 3. Pap.
Thetis Foemina.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 2. t. 2. f. 5. 6. Pap.
Thetis. — *Salaciae* t. 5. f. 1. 2. Varietas.

— — pag. 7. t. 9. f. 3. 4. Pap. *Oceanus*; *Thetys*,
Salaciaeque Mas.

Alis *angulatis* fuscis, disco utrinque coerule-
lescentibus, maculisque ad margines fulvis, sub-
tus conicis.

-- Nomencl. III. p. 35. not. 5. wo Herr *Bergstr.*
versichert: daß der Herr *von Rottenburg* seine
Thetys, *Salacia*, *Pampholyge*, *Venilia* und *Ocea-*
nus unter dieser *Thetys* begreife; — et p. 9.
t. 53. f. 3. 4. *Oceanus*.

42. *Bellargus*, der *Rottenburgische Bellargus*.

Naturforscher VI St. p. 25. no. 12. Pap. *Bellargus*.

1) Unter allen *Argussen* auf der Oberseite am
schönsten *hellblau*.

2) Unten ebenfalls dem Pap. *Coridon* ähnlich.

Esper's Schmetterl. I. pag. 333. t. 32. Suppl. 8. f. 3.
Pap. *Bellargus*.

Alis supra *azureis* nitidis, margine nigro fim-
briaque alba, subtus obscure cinerascens, ocellis numerosis.

Gladbach's Schmetterl. I. p. 13. t. 7. f. 1. *Männchen*;
f. 2. *Weibchen*: der *Dresdner-Blau*.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 7. t. 9. f. 5. 6. Pap.
Bellargus.

Alis *angulatis* coeruleis nigro ab margine po-
sticarum virgulatis: subtus fuscescentibus, lim-
bumque versus in postica fulvo-maculatis.

Berg-

Bergsträfers Nomencl. III. p. 35. not. 5. p. 9. t. 53.
f. 5. 6. *Bellargus*.

43. *Arcas*, der *Rottenburgische Arkas*.

Naturforscher VI St. p. 25. no. 13. Pap. *Arcas*.

- 1) Auf der Oberseite ganz dunkelblau, dem Pap. *Arion* ähnlich, aber viel kleiner und unten völlig verschieden.
- 2) Unten ganz kaffeebraun, ohne andere Schattirung.
- 3) Auf jedem Oberflügel *sechs*, auf jedem Unterflügel *acht* schwarze Augen. Diese mit schwarzen Einfassungen, jene nicht.

Esper's Schmetterl. I. p. 338. t. 34. Suppl. 10. f. 4. 5
Pap. *Arcas*.

f. 4. Alis supra pallide coerulefcentibus immaculatis, fubtus fufcis, ocellis numerosis.

f. 5. Alis supra coerulefcentibus, limbo fufco, ocellis tribus coecis, fubtus fufcis, ocellis numerosis.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 6. t. 7. f. 1. 2. *Arctophylax*. An *Arcadis Varietas*?

— — f. 3. 4. Pap. *Arcas* (foemina).

Alis *angulatis* integris, pallide fufcis; fubtus fingulo in primoribus ocellorum arcu, in posticis duplici. An *Arcadis* et *Arctophylaxis* foemina?

— — p. 8. t. 10. f. 7. 8. Pap. *Arcas*. (Mas.)

Alis *rotundatis*, fufco-coerulefcentibus, maculis in anticis verfus marginem ternis cuneiformibus nigris; fubtus pallide fufcefcentibus, duplicique in utrifque punctorum ocellorumque arcu.

— Nomencl. III. p. 36. not. 6. et p. 6. t. 51. f. 3. 4.
(Mas t. 57. f. 7. 8.)

44. *Diomedes*, der *Rottenburgische Diomedes*.

Naturforscher VI. p. 26. no. 14. Pap. *Diomedes*.

- 1) Oben gleichfalls dunkelblau; alle vier Flügel eine breite schwarze Einfassung.
- 2) Unten bräunlich aschgrau, dem *Semiargus* sehr ähnlich.
- 3) Nur noch am Aussenrande aller vier Flügel eine Reihe schwarzer, weiss eingefasster Augen, die jenem fehlen: auch in der Mitte der Unterflügel, nicht weit von ihrer Einlenkung, noch ein Auge.

Bergstrüßers Nomencl. III. pag. 36. not. 7. scheint *Arctophylax* und *Arctophonius* zu seyn. v. unten no. 94. 96. *Decur.* II. p. 5. t. 1. f. 3. 4. *Arctophoni* Var.

45. *Chiron*, der *Rottenburgische Chiron*.

Naturforscher VI St. p. 27. no. 15. Pap. *Chiron*.

- 1) Seine ganze Oberfläche glänzend dunkelbraun.
- 2) In der Mitte der Oberflügel ein kleiner schwarzer Strich.
- 3) Vermuthlich ein Weibchen.

46. *Phocas*, der *Rottenburgische Phocas*.

Naturforscher VI St. p. 29. no. 17. Pap. *Phocas*.

- 1) Davon viele Varietäten: die gewöhnlichsten auf der Oberseite wie Pap. *Phloeas*, röthlich orangefarben, ohne allen Glanz.
- 2) Die Unterflügel ganz dunkelbraun, am äussern Rande mit einer orangegelben gekettelten Binde eingefasst.

Espers Schmetterl. I. pag. 339. t. 35. Suppl. II. f. 1. Weibchen; f. 2. Männchen. Pap. *Phocas*.

Alis

Alis superioribus fulvis, inferioribus subangulatis nigricantibus, fascia fulva, subtus flavis, maculis utrinque nigris.

Schröters Abhandl. I. p. 216. der *braune Argus*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. pag. 210. der *kurzsichtige Argus* Schmetterling.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 181. no. 7.

Unbekannte Raupe: kupferbrauner, schwarz-punktirter unten schwefelgelblicher Falter. Pap. Circe.

Bergsträfers Nomencl. III. p. 24. t. 63. f. 1. 2. Mas. p. 32. t. 64. f. 4. 5. 6. 7. Pap. *Phocas*.

(Mas) Alis subangulatis rutilis, nigroque utrimque punctatis: disco posticarum superiore fusco; inferiore canescente; margine subtus ante fasciam fulvam albido.

(Foemina) Alis subangulatis fuscis nigroque punctatis, subtus griseis confertimque ocellatis, fascia utrimque ad margines fulva.

— Icon. Decur. II. p. 6. t. 4. f. 1. 2. *Phocas Mas*.

— — p. 7. t. 5. f. 4. 5. 6. 7. *Phocas Femina*.

Onomat. hist. nat. P. I. p. 770. *Argus Myops*.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 64. no. 33.

Alis *rotundatis* integerrimis nigro-fuscis, fulvo-maculatis, subtus ocellis numerosis.

L' *Argus Myope*.

Long. 6 lign. Larg. 13 lign.

47. *Gordius*, der *Sulzerische Gordius*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 146. t. 18. f. 7. 8. Pap. *Gordius*.

Etwas gezähnte rothgelbe Flügel mit schwarzem Saume und Flekken, die unten einen grauen Rand haben. Die Hinterflügel unten grau, der hintere Rand gelb.

Espers

Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural. 65

Espers Schmetterl. I. p. 327. t. 30. Suppl. 6. f. 3. Pap. Gordius.)*

48. *Biton*, der *Sulzersche Biton*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 146. t. 18. f. 9. Pap. *Biton*.

Ungezähnte, blaue, außenher schwärzliche, weißgefäumte Flügel; unten aschgrau, in den vordern sechs, in den hintern sieben schwarze Flekken mit weißem Saum; ein weißer Streif der Länge nach mitten durch die Flügel.

Espers Schmetterl. I. p. 336. t. 33. Suppl. 9. f. 5. Pap. *Biton*.

Alis supra omnibus coeruleo-nitentibus, limbo fusco; subtus fascia ocellari, inferioribus linea longitudinali alba, ocellisque minoribus numerosis.

Systemat. Verz. der Schmett. der W.G. p. 182. no. 6.

Pap. *Damon*. *Hahnenkopffalterraupe* (*Hedysari Onobrychis*); *Hahnenkopffalter*.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 2. t. 2. f. 7. 8. Pap. *Damon* (*Mas*).

Alis rotundatis integerrimis fusco-coerulescentibus; infra fuscescentibus, ocellis in arcu anticarum quinis, punctis posticarum novem atris, fasciaque intermedia albida.

— — p. 4. t. 4. f. 3. 4. Pap. *Damon* (*Foemina*).

Alis rotundatis integerrimis fuscis, ocellis in arcu anticarum subtus senis, posticarum septem, fasciaque intermediarum albida.

— Nomencl. III. p. 12. t. 55. f. 7. 8. *Mas*. t. 56. f. 3. 4. *Foemina*.

49. *Cleo-*

*) Macht es höchstwahrscheinlich, daß es das Weibchen von der Varietät der *Hipbothoe* t. 38. f. 1. b. sey.

49. *Cleobis*, der *Sulzerische Kleobis*.

Sulzers Gesch. der Inf. pag. 146. t. 18. f. 13. 14. Pap.
Cleobis.

Ungezähnte, blaue, atfsehenher schwarze,
weißgefäumte Flügel; in den Vorderflügeln ge-
gen den obern Rand ein schwarzes Häkchen;
eben solche gegen den hintern Rand der Hinter-
flügel; unten silberweiß; in den vordern fünf,
in den hintern elf schwarze Punkte.

Espers Schmetterl. I. p. 360. t. 40. Suppl. 16. f. 3. Pap.
Cleobis.

Alis ecaudatis coeruleis, margine fusco; sub-
tus coeruleo-cinerascentibus, fasciis ex punctis
longiusculis.

50. *Melampus*, der *Füeslinische Melamp*.

Füeslins Verz. schweiz. Inf. p. 31. no. 604. (auf der
beygefügteten Taf. f. 6.) P. *Melampus*, das *Rostband*.

Der Leib ganz schwarz, haaricht; die Flü-
gel oben und unten braun, mit einem Bande
rostfarbiger Flekken; in jedem der Flekken ein
schwarzer Punkt.

Espers Schmetterl. I. p. 329. t. 30. Suppl. 7. f. 2. Pap.
Melampus.

Alis fuscis, fascia utrinque ferruginea, sin-
gulis utrinque ocellis fenis coecis.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 5. t. 5. f. 7. 8. Pap.
Melampus.

Alis rotundatis integerrimis fuscis, annulis
in primoribus versus marginem ferrugineis, ob-
longis, fenis, ocellis in posticis utrinque qui-
nis; subtus duobus in primoribus, tribusque fla-
vis maculis.

— Nomencl. III. p. 5. t. 50. f. 7. 8. *Melampus*.

51. *Coridon*, der *Skopolische Koridon*.

Scop. Entom. carn. p. 179. Pap. *Coridon*.

Long, lin. 7. *Lat.* 5½.

Alae supra coeruleo-argenteae, limbo fusco.
(*Formina. Naturf.* III. p. 19. no. 2.) Alae anticae subtus canae; posticae subtus cervinae, maculis submarginalibus crocatis conicis (7).

Poda Mus. graec. p. 77-78.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 154.
(Die Schäfferische Abb. t. 98. f. 5. 6. stellt eine besondere Falterart vor, die wir nach *Poda* und *Scopoli* *Coridon* nennen.)

— — p. 184. no. 10. Pap. *Coridon*. Unbekannte Raupe: silberblaulichter (das Männchen), oder mattbrauner (das Weibchen), oben rundäugiger Falter.

Schröters Abhandl. I. p. 219. t. i. f. i. grüner *Argus* (kleine Spielart des *Corydons*).

Berlin. Magaz. II. p. 88. Anm. H. zu no. 28. Pap. *Arion*.

Naturforscher III. p. 19. no. 2.

— VI. p. 7. no. 28.

Kleemanns Beytr. I. p. 122. t. 14. f. 3. 4.

Ein zur zweyten Klasse der Tagvögel gehöriger gelbgrünlich weißer, braun und weiß bordirter und mit weißen Ringen gezielter Papilion.

Esper's Schmetterl. I. pag. 335. t. 33. Suppl. 9. f. 4. Pap. *Coridon*.

Glabachs Schmetterl. I. p. 13. t. 7. §. 2. der *Müllerblau*.

Petiver Gazoph. t. 35. A. f. 2. Papiliunculus coerulelescens limbis nigris. *The pale blue Argus*. I have seen it in the thickets near Banstead downs and Purfleet.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 61. no. 30. *Argus* Variet. 1.
L' *Argus bleu.*

Schaeff. Icon. t. 98. f. 5. 6. Pap. *hexapus* alis *ocellatis* quartus, vierter *sechsfüßiger* Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln. (v. W. Schm. p. 154.)

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 5. t. 6. f. 1. 2. Pap;
Coridon.

Alis *rotundatis* integerrimis, argenteo-coeruleo-
rulescentibus margine versus fimbriam fusco,
maculis nigris ocellaribus, subtus partim canis,
partim cervinis, fasciaque posticarum maculis
conicis fulva, interrupta. (*Foeminam larvamque*
ignoro.)

— Nomencl. III. p. 3. t. 49. f. 1. 2. *Corydon.* Die
Larve zu den *Hochschildraupen* —

— Icon. Pap. Diurn. Dec. II. p. 5. t. 1. f. 5. 6. P. *Corydon foemina.*

— Nomencl. III. pag. 17. t. 59. f. 5. 6. *Corydonis*
(Wien. *Corydon* 184. n. 10.) *Foemina.*

— — — f. 7. 8. *Corydonis* foem. Var.

— Icon. Dec. II. p. 5. t. 1. f. 7. 8. *Corydonis* foem.
Var.

52. *Minimus*, der *Füßlinsche* *Kleinste.*

Füßlins Verz. Schweiz. Inf. p. 31. no. 599. Pap. *Minimus*, der *kleinste aller bekannten Tagvögel.*

Schröters Abh. I. p. 222.

Espers Schmetterl. I. p. 338. t. 34. Suppl. 10. f. 3. *Papilio Minimus.*

Alis *rotundatis*, fusco-coeruleo-
rulescentibus, sub-
tus ocellis sparsis minimis.

Schaeff. Icon. t. 165. f. 1. 2. *Papilio hexapus* alis
ocellatis septimus, siebenter *sechsfüßiger* Tag-
falter mit *geäugelten* Flügeln.

Berg-

Bergsträfers Icon. Dec. I. p. 5. t. 5. f. 5. 6. Pap. *Pseudolus*.

Alis *rotundatis* integerrimis fuscis, subtus cinereis, punctorumque ocellarium solitario arcu, praeter unum in anticarum ternosque in posticarum ocellos.

Nequaquam *Argorum* minimus, quem *Esperus* putavit; habemus minorem *Philonomen*, quam cum mare infra exhibituri sumus.

— Nomencl. III. p. 5. t. 50. f. 5. 6. *Pseudolus*.

53. *Lynceus*, der *Jungische Lynzeus*.

*Esper*s Schmetterl. I. pag. 356. t. 39. Suppl. 15. f. 3. Pap. *Lynceus*. (Auf der Tafel P. *Quercus* Variet.)

Alis *subcaudatis*, supra griseo-coerulescentibus, subtus cinereis, linea alba, macula antea coerulea, punctisque tribus coccineis.

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engrame*lle Vol. III. p. 158. t. 36. no. 74. *Porte-queue brun à taches bleues*.

54. *Telephii*, der *seltene Fetthennenfalter*.

*Esper*s Schmetterl. I. pag. 363. t. 41. Suppl. 17. f. 2. Pap. *Telephii*.

Alis *integerrimis*, atro-coeruleis, limbo nigro, subtus cinerascens, maculis plurimis quadratis, nigris, fasciaque in inferioribus fulva.

Naturforscher IX St. p. 95. t. 1. f. 4. 5. die *seltene Schildraupe* des Sedi *Telephii*.

— — p. 96. der *rare Bläuling* (vergl. *Rösel* I. Tagv. 2 Kl. t. 6. f. 2. *ähnliche Puppe*).

System. Lehrb. der drey Reiche der Natur, I. p. 381. t. 19. f. 4. 5. der *Vogel* von der *seltene Schildraupe*, Sedi *Telephii*; Pap. *coerulescens*, der *Bläuling*.

Pallas Reif. Tom. I. Anh. p. 471. no. 65. Pap. *Orion*.

Magnitudo *Argi*. Alae *supra* fuscae, disco coeruleo pulveratae, per ambitum nigricantes, fimbriis albo-dentatis, annulisque marginalibus concatenatis, subcoeruleis, lunula atra in medio disco. *Subtus* alae exalbidae, punctis crebris maximis, primores disci tribus, plurimisque in tres quasi fascias dispositis; secundariae lunula punctis 11 disci et 7 marginalibus, adjacentibus fasciae luteae, arcuatae atque connatae strigae nigrae.

In campis aridis circa *Sisfranium* observatus Majo.

Müllers S. und R. B. p. 297. no. 255. d. Pap. *Orion*, der *Orion*.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 4. t. 4. f. 1. 2. Pap. *Telephii*, der *Fetthennfalter*.

Alis *rotundatis* fusco-coeruleis, *subtus* numerosis punctis quadratis nigris, oculo nullo, sed fascia fulva.

Larva Sedi *Telephii* medulla vescitur.

— Decur. II. p. 5. t. 2. f. 1. 2. 3. *Telephii* Var. fortasse *foemina*.

— Nomencl. III. p. 12. t. 56. f. 1. 2. *Fetthennenfalter*.

— — p. 18. t. 60. f. 1. 2. 3. *Telephii* Varietas.

55. *Meleager*, der *Esperische Meleager*.

*Esper*s Schmetterl. I. pag. 375. t. 45. Suppl. 21. f. 3. Pap. *Meleager*.

Alis *dentatis* coeruleis, limbo fusco, albido-maculato; *subtus* canis punctis ocellaribus.

Syst. nat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 182. no. 1. Pap. *Endymion*; unbekannte Raupe; zackichter blankblauer Falter.

Berg-

Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural. 71

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 2. t. 2. f. 3. 4. Pap. Endymion.

Alis posticis *serratis*, supra nitide-coeruleis nigroque virgulatis in antica, infra griseis, ocellis in utroque alarum disco undeviginti.

— *Nomencl. III. p. 11. t. 55. f. 3. 4. Meleager.*

56. *Hylas*, der *Wiener Hylas*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 185. no. 16.

Pap. *Hylas*; *unbekannte Raupe*; *hellblauer schwarzgestrichelter Falter*.

Bergsträfers Nomenclat. II. p. 78. t. 47. f. 7. 8. Pap. Hylactor. (Foemina.)

Alis *rotundatis* integerrimis, supra coeruleis, nigroque virgulatis, subtus cinerascens, fasciaque in posticis fulva.

An *Variat. Scop. Alexis?*

Espers Schmetterl. I. pag. 375. t. 45. Suppl. 21. f. 3.

Pap. *Hylas*.

An *Variat. Thetidis?*

Alis *rotundatis*, argenteo-coeruleis immaculatis, subtus cinereis, punctis ocellaribus numerosis, margine fulvo-maculatis.

57. *Polyphemus*, der *Esperische Polyphem*.

Espers Schmetterl. I. p. 387. t. 50. f. 2. Pap. Polyphemus.

Alis *ecaudatis* fuscis, omnibus utrinque fascia marginali fulva, subtus fusco-cinereis, punctis ocellaribus numerosis.

— — pag. 388. t. 50. Suppl. 26. f. 3. Polyph. *Variet.*

58. *Spini*, der *Schlehenfalter*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 186. no. 5.
Schlehenfalterraupe (*Pruni spinosae*), *Schlehen-*
falter (*Subcaudatus*).

59. *Daphnis*, der *Daphnis*.*)

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 182. no. 2.
Unbekannte Raupe; *gezählter glänzend-fein-*
blauer Falter.

Bergsträssers Icon. Pap. Diurn. Decur. I. p. 1. t. 1.
f. 1. 2.

Alis posticis dentatis argenteo-coerulescenti-
bus singulo subtus ocellorum arcu, binisque ver-
sus margines obsoletis punctorum ordinibus.

— *Nomencl. III. p. 15. t. 57. f. 5. 6. Daphnis.*

60. *Alcon*, der *Alkon*.**)

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 182. no. 3.
Unbekannte Raupe. Gemeinblauer (das Männ-
chen), oder *halbbblauer, düsterfleckichter* (das
Weibchen), *unten staubbräunlichter Falter*.

61. *Acis*, der *Azis*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 182. no. 5.
Unbekannte Raupe. Vollblauer (das Männchen),
oder *schwarzbrauner* (das Weibchen), *unten asch-*
grauer Falter.

62. *Alfus*, der *Alfus*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 184. no. 9.
Unbekannte Raupe. Lazurblauer (das Männ-
chen),

*) Von no. 59 bis 69 *viellängigte* oder *Argusarten*.

**) Vielleicht *Bergsträssers Telejus*, oder *Telegonus*, *Nomencl. II.*
p. 71. t. 43. f. 5. 6. t. 44. f. 1. 2.

chen), oder *braunschwarzer, blaugestäubter* (das Weibchen), *unten lichtgrauer Falter.*

63. *Adonis*, der *Adonis*.*)

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 184. no. 11.

Unbekannte Raupe. Glänzend himmelblauer (das Männchen), oder *brauner blausprenglichter* (das Weibchen), *saumscheklichter Falter.*

— — p. 154. In dem Naturfyft. beziehet sich Linn. nebst andern auf *Sulzers* Kennz. der Inf. t. 14. f. 87. bey P. Arion; dieser Sulzerfche aber ist unser Pap. *Adonis*.

Sulzers Kennz. der Inf. t. 14. f. 87. Pap. *Adonis*.

Schaeff. Icon. t. 98. f. 3. 4. Pap. hexapus alis ocellatis tertius, dritter *sechsfüssiger* Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln. (Mas.)

(Vergl. W. Schmett. p. 154. 155. Nicht *Idas*; denn in der Sch. Abb. kömmt ganz kein solcher Randstreif vor (*fascia terminali ocellari rufa*), und die Oberseite aller Flügel ist, ausser einigen schwarzen Randpunkten, einfärbigt himmel- oder hochblau. Es ist *das Männchen unsers P. Adonis*, obschon nicht in seiner wahren Schönheit entworfen.) S. *Esper's* Schmett. I. p. 274. not. a.

64. *Alexis*, der *Wiener Alexis*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 184. no. 12.

Hauchechelfalterraupe (*Ononis spinosae*); *Hauchechelfalter.* Pap. *Alexis*. (Foem. Pap. *Alexis* Var. 2. Scop.)

Scop. Entom. carn. p. 179. Pap. *Alexis*.

Long. a lin. 6 ad 8. *Lat.* $3\frac{3}{4}$ - 5. *Var.* 2.

E 5

Alis

*) An *Argyrognomon* Bergsträfs. Nomencl. II. t. 46. f. 1. 2?

74 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Alis anticis supra puncto medio obscuriore,
maculisque limbi crocatis (3-4).

Alis anticis subtus maculis ocellaribus (10)
maculisque crocatis in limbo (6).

— posticis *supra* maculis crocatis ocellari-
bus (4-5).

— — *subtus* maculis iisdem (9).

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 61. no. 30. L'Argus bleu,
et l'autre Sexe l'Argus brun (Wiener Schmett.
pag. 184).

65. *Agestis, der Wiener Agestis.*

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 184. no. 13.

Unbekannte Raupe. Lichtfeuerblauer (das
Männchen), oder kaffebrauner (das Weibchen),
ganz randfleckiger Falter. Pap. Agestis (Foem.
Pap. Alexis Var. 1. Scop.)

Scop. Entom. carn. p. 179. Pap. Alexis Var. 1.

Alis anticis supra puncto in medio nigro et
maculis crocatis in limbo (6).

— subtus cinereis, maculis ocellaribus in
disco (7), crocatis limbi (6), punctisque fuscis
marginalibus totidem.

— posticis supra maculis crocatis, lunatis,
in limbo (4-5).

— — subtus cinereis, maculis crocatis
in limbo (9); quarum tres ad angulum ani coa-
litae.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 6. t. 6. f. 7. 8. Pap.
Astrarche.

Alis *rotundatis* integerrimis fuscis, utrinque
ad marginem crocatis, nigroque in disco antica-
rum supra virgulatis.

An *Alexis Scopolici* Varietas?

An *Viennensium* *Agestis*?

Berg-

*Bergsträssers Nomencl. III. p. 4. t. 49. f. 7. 8. Pap.
Astrarche.*

66. *Aegon*, der *Wiener Aegon*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 185. no. 15.
Geißkleefalterraupe (Cythifi austriaci); Geiß-
kleefalter.

Bergsträssers Icon. Decur. I. pag. 77. t. 47. f. 3. 4.
Pap. Argyrotoxus. (Mas.)

Alis rotundatis integerrimis, fusco-coeru-
leis; subtus utrisque fascia fulva, senisque pone
eandem in postica pupillis argenteis.

— — p. 78 f. 5. 6. *Foemina. Pap. Argyra.*

Alis rotundatis integerrimis fuscis, annulis
in postica senis fulvis; subtus fascia utrisque ful-
va, senisque pone eandem in postica pupillis
argenteis.

67. *Battus*, der *Wiener Battus*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 185. no. 17.
Unbekannte Raupe. Dunkelblauer, schwarz-
scheckichter Falter. Pap. Battus. (Pap. Argus
Scop.)

Scop. Entom. carn. p. 177. Pap. Argus.

Long. lin. 6½. Lat. 5½.

Alae subtus canae; posticae fascia crocata,
dentata, subtus prope limbum.

(Allo nicht Argus Linn.)

Esper's Schmett. I. p. 271, not. b. Pap. Argus Scop.
Pap. Battus Viennensium.

68. *Baton*, der *Bergsträsserische Baton*.

Bergsträssers Icon. Pap. Diurn. Decur. II. p. 6. t. 2.
f. 6. 7. 8.

Alis

76 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

Alis *rotundatis* integerrimis, fusco-coeruleis nigroque notatis, subtus canis, crocataque in posticis fascia.

Bergsträssers Nomencl. III. p. 18. t. 60. f. 6. 7. 8.
Baton — nicht der Wiener *Battus*.

69. *Amyntas*, der *Wiener Amyntas*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 185. no. 18.
Unbekannte Raupe. Hochfeuerblauer (das Männchen), oder *blauschwarzer* (das Weibchen), *kleinschwänziger, unten vieläugiger Falter*.

Bergsträssers Nomencl. II. pag. 72. t. 44. f. 3. 4. 5.
Pap. Polyperchon.

Alis *caudatis*, posticis ad marginem nigropunctatis; subtus in secundo punctorum ordine stria fulva; omnibus supra

a) coeruleis (Mas f. 3.)

b) nigro-coerulescentibus (Foemina f. 4. 5).

70. *Chryseis*, der *Wiener Chryseis*.*)

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 181. no. 3.
Unbekannte Raupe. Rothgold- und stahlblauschieler, unten staubfärbichter Falter.

Bergsträssers Icon. Dec. II. p. 8. t. 7. f. 4-8.

Alis integris chalybe renitescens; subtus pulveris instar canescentibus, punctisque ocellorum numerosis, superioribus

α) in mare fulvis,

β) in foemina fuscis maculatis.

— Nomencl. II. t. 34. III. p. 52. t. 64. f. 2. 3. *Hipponoës* foem. Var. t. 68. f. 1. 2.

71. *Helle*,

*) Von no. 70 bis 72 goldglänzende Falter, Feuervögel.

71. *Helle*, der *Wiener Helle*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 181. no. 4.
*Unbekannte Raupe. Goldgelber, blankviolett-
geflekter unten gelbgrauer Falter.*

Bergsträfers Icon. Decur. II. p. 7. t. 5. f. 2. 3. *Helles
Viennensium foemina.*

72. *Xanthe*, der *Wiener Xanthe*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 181. no. 6.
*Sauerampferfalterraupe (Rumicis acetosae);
Sauerampferfalter. Pap. Xanthe (Pap. Tityrus
Poda).*

Scop. Entom. carn. p. 180. Var. 4. Pap. *Alexis.*

An hic Tityrus Poda Mus. graec. p. 77? vi-
detur utique.

73. *Lampetie*, der *Wiener Lampetie*.

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 322. 8. (3*4). *Unbe-
kannte Raupe: gölden und vielblauschielender
Falter.*

74. *Dorylas*, der *Wiener Dorylas*.

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 322. 9. (11*12). *Un-
bekannte Raupe: feinblauer silberglänzender (viel-
äugiger) Falter.*

75. *Nausithous*, der *Bergsträfersche Nausithous*.

Bergsträfers Nomenclat. II. p. 70. t. 43. f. 1. Pap.
Nausithous (Mas).

*Alis rotundatis integerrimis fusco-coeruleis,
nigroque virgulatis, ocellorum subtus fascia so-
litaria.*

— — p. 71. f. 2. 3. *Foemina.*

*Alis rotundatis integerrimis fuscis; ordine
ocellorum subtus solitario.*

76. *Telejus*, der *Telejus*.*)

Bergsträfers Nomenclat. II. p. 71. t. 43. f. 5. 6.

Alis rotundatis integerrimis, fusco-coeruleis, maculis et punctis atris versus marginem notatis; subtus pallidius fuscis; ocellorumque duplici arcu.

77. *Telegonus*, der *Telegon*.

Bergstr. Nomenclat. II. p. 72. t. 44. f. 1. 2. Pap. *Telegonus* Mas.

Alis rotundatis integerrimis, fusco-coeruleis, nigro in antica virgulatis, postica versus marginem punctatis; infra fusco-cinerascentibus, binisque ocellorum arcubus notatis.

— — t. 52. f. 5. 6. *Foemina*.

— Icon. Decur. I. p. 3. t. III. f. 5. 6. Pap. *Telegone*.
(*Foemina* *Telegoni* et *Viennensium* *Alconis*.)

Alis rotundatis integerrimis fuscis, corpusque versus coeruleis, nigro in antica virgulatis, postica punctatis; ternis infra punctorum ocellorumque arcubus.

— Nomenclat. III. pag. 8. t. 52. f. 5. 6. t. 61. f. 7. 8.
Decur. II. t. 3. f. 7. 8.

Glabachs Schmetterl. I. p. 11. t. 5. f. 3. 4. 5. 6. der
blaue Handvogel: f. 3. 4. *Mas*; f. 5. 6. *Foem*.

78. *Dimus*, der *Dimus*.**)

Bergstr. Nomenclat. II. p. 71. t. 43. f. 7. 8. (cf. t. 54.
f. 7. 8.)

Alis angulatis fusco-coeruleis ternis posticarum

*) Dieser oder der folgende vielleicht der Wiener *Alcon* no. 60.

**) Demselben soll der *Esperische* zweyte *Cyllarus* sehr ähnlich seyn.

rum atris punctis versus marginem; subtus in primoribus ocellis senis; posterioribus unico coeruleo-virescentibus.

79. *Philonomus*, der *Philonomus*.

Bergstr. Nomenclat. II. p. 72. t. 44. f. 7. 8. Pap. Philonomus Mas.

Alis *rotundatis* integerrimis, coeruleo-nigris, infra cinerascens, ordinibus ocellaribus quatuor, fasciaque inter primos ad marginem fulva.

— — f. 6. Pap. *Philonome* Foemina.

Alis *rotundatis* integerrimis, *fuscis*, infra cinerascens, ordinibus ocellaribus quatuor, fasciaque inter primos ad marginem fulva.

80. *Argyrognomon*, der *Argyrognomon*.*)

Bergstr. Nomenclat. II. p. 76. t. 46. f. 1. 2. (Cf. Icon. Decur. I. p. 6. t. 7. f. 7. 8. Argyrognomonis Varietas.)

Alis *angulatis*, nigro-coeruleis, subtus cinerascens, fasciaque fulva ocellari, sed in anticis interrupta; posticis versus marginem maculis supra nigris, fulvo-coeruleoque annulatis, pupillis infra coerulescenti-argenteis.

(Cf. t. 57. f. 7. 8).

81. *Argyrocapelus*, der *Argyrokapelus*.

Bergstr. Nomencl. II. p. 76. t. 46. f. 2. 3.

Alis *angulatis* nigris, disco coeruleo, subtus cinerascens, fasciaque fulva ocellari; posticis versus marginem maculis supra nigris fulvo-annulatis, pupillis infra coerulescenti-argenteis.

82. *Ar-*

*) An Viennensium *Adonis*? no. 63.

80 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

82. *Argyroela*, die *Argyroela*.

Bergstr. Nomencl. II. p. 76. t. 46. f. 5. 6. Pap. *Argyroela Foemina*.

Alis *angulatis* integerrimis fuscis, annulis fulvis binis in anticis; senis in posticis; subtus cinerascens, fascia fulva, pupillisque ad posticum argenteis.

83. *Argyrocopus*, der *Argyrokopus*.

Bergstr. Nomenclat. II. p. 77. t. 46. f. 7. 8.

Alis *angulatis* integerrimis, nigro-coeruleis, annulis quinque in margine primorum coerulescentibus; posticarum fulvis; fascia subtus utrimque fulva, sed interrupta in anticis, pupillis in postica argenteis.

84. *Pampholyge*, die *Pampholyge*.

Bergstr. Nomencl. II. p. 77. t. 47. f. 1. 2.

Alis *angulatis* fuscis, lunulis anticarum ad marginem quinque, annulis posticarum senis fulvis, subtus cinerascens, fascia fulva.

(Cf. t. 50. f. 1. 2. *Foemina* Oceani Icon. Dec. I. t. 9. f. 3. 4. Ergo *Variet. Salaciae* t. 5. f. 1. 2.)

85. *Candybus*, der *Kandybus*.

Bergstr. Nomencl. II. p. 78. t. 48. f. 1. 2.

Alis *rotundatis* integerrimis coeruleis immaculatis, fimbria alba, subtus in utrisque fulvis maculis, ocellisque plurimis.

86. *Candiope*, die *Kandiope*.

Bergstr. Nomencl. II. p. 78. t. 48. f. 3. 4.

Alis *rotundatis* integerrimis fuscis, fulvo utrimque maculatis, subtus cinerascens.

87. *By-*

87. *Byzas*, der *Byzas*.*)

Bergsträfers Nomencl. II. p. 79. t. 48. f. 5. 6.

Alis *rotundatis* integerrimis coeruleis primoribus in disco, posticis a margine nigro-virgulatis: subtus ocellorum fascia solitaria (*Mas*).

— — f. 7. 8. Pap. *Byze* Foemina.

Alis *rotundatis* integerrimis fuscis, fimbria alba; subtus cinerascens, fascia ocellorum solitaria.

88. *Daphnis*, die *Daphnis*.

Bergsträfers Icon. Decur. I. p. 1. t. 1. f. 1. 2.

Alis *posticis dentatis*, argenteo-coerulescentibus, singulo subtus ocellorum arcu, binisque versus margines obsoletis punctorum ordinibus.

89. *Argester*, der *Argester*.

Bergstr. l. c. p. 1. t. 1. f. 3. 4.

Alis *rotundatis integerrimis*, splendide coeruleis; *subtus* cervinis; maculis fulvis versus marginem conicis; ocellorumque disporum singulo in utrisque ordine.

— Nomencl. III. t. 58. f. 3. 4. Icon. Decur. II. p. 6. t. 3. f. 1. 2. 3. 4. *Argester* alter.

90. *Argiphontes*, der *Argiphontes*.

Bergstr. l. c. t. 1. f. 5. 6.

Alis *rotundatis integerrimis* purpurascens-coeru-

*) Dieser *Byzas* soll des Herrn von Rottenb. *Semiargus*, f. oben no. 36. seyn; sagt Herr *Bergsträfer* Nomencl. III. p. 34. not. I. Ich kann aber darüber nichts entscheidendes sagen; deshalb hab' ich sie lieber noch zur Zeit als besondere Arten betrachten wollen.

82 *Insecta Lepidoptera* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

coeruleis; subtus canis obsoletisque et punctis et virgulis atris.

An *Thersanomis* t. 6. f. 5. 6. Varietas?

— Nomencl. III. p. 15. t. 58. f. 5. 6.

91. *Argyrobius*, der *Argyrobius*.

Bergstr. l. c. p. 2. t. 1. f. 7. 8.

Alis *angulatis* fusco-purpurascentibus; annulis in postica ferrugineis, subtus griseis, pone fulvam fasciam pupillis duabus in postica argenteis.

Argyrophalaræ t. 8. f. 1. 2. affinis.

— Nomencl. III. p. 13. t. 61. f. 7. 8.

92. *Argyrophylax*, der *Argyrophylax*.

Bergstr. l. c. p. 4. t. 4. f. 5. 6.

Alis coeruleo-fuscis, maculis annulisque ad limbum fulvis, sed in anticis jam fere obsoletis, subtus cinereis, fasciæ in utrisque fulva, pupillis argenteis aversa a parte quinis notata.

An sexta *Scopolici* Idæe Varietas?

— Nomencl. III. p. 10. t. 56. f. 5. 6.

93. *Bronte*, die *Bronte*.

Bergstr. l. c. p. 4. t. 4. f. 7. 8.

Alis violaceis fimbria albida, subtus griseis, ocellorum seniorum in utrisque arcu, sed minorum in postica virescente.

Similis *Cyllaris*, *Dimis*, *Phobisque* nostris.

— Nomencl. III. p. 34. not. 2. *Cyllarus* Rottenb. v. oben no. 37. et p. 13. t. 56. f. 7. 8.

94. *Candaon*, der *Kandaon*.

Bergstr. l. c. p. 5. t. 6. f. 3. 4.

Alis rotundatis integerrimis coeruleis immaculatis, fimbria alba; subtus maculis conicis in postica, fasciolaque mediis in marginalibus anticarum ocellis fulva.

Bergstr. Nomencl. III. p. 3. t. 49. f. 3. 4. Candaon.

95. *Thersanon*, der *Thersanon*.

Bergstr. l. c. p. 6. t. 6. f. 5. 6.

Alis rotundatis integerrimis, coerulescentibus, fimbria alba, virgulis nigris ex aduerso utrinque in disco binis; subtus solitario lineolarum punctorumque ordine.

An Mas Argioli?

An Argiphontes eius varietas?

— *Nomencl. III. p. 4. t. 49. f. 5. 6. Thersanon.*

96. *Arctophylax*, der *Arktophylax*.

*Bergstr. l. c. p. 6. t. 7. f. 1. 2. *)*

Alis angulatis integris, fusco-coeruleis, primoribus maculis quinis; posticis tribus punctis nigris, subtus pallide fuscis ocellari altero in antice arcu expresso, altero obsoleto.

— *Nomencl. III. p. 6. t. 51. f. 1. 2.*

97. *Argyrophalara*, der *Argyrophalara*.

Bergstr. l. c. p. 7. t. 8. f. 1. 2.

Alis angulatis fuscis, maculis anticarum, annulis posticarum fulvis; pupilla subtus una in posticis pone fulvam fasciam argentea.

Similis Argyrae.

— *Nomencl. III. p. 10. t. 54. f. 1. 2.*

F 2

98. *Ma-*

*) Dieser und no. 99. soll *Diomedes* Rottenb. seyn. S. oben no. 44.
Nomencl. III. p. 36. not. 7.

84 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

98. *Mamers*, der *Bergsträßerische Mamers*.

Bergstr. Icon. Decur. II. p. 5. t. 1. f. 1. 2.

Alis fusco-coeruleis angulatis, sordide infra fuscis, duplicique ocellorum ordine, pupillisque quatuor duplicibus.

— Nomencl. III. p. 16. t. 59. f. 1. 2.

99. *Arctophonus*, der *Arktophonus*.

Bergstr. l. c. p. 8. t. 9. f. 7. 8.

Alis angulatis fusco-coeruleis virgula in anticis singula, in posticis punctis tribus nigris; subtus pallide fuscis ocellari altero in anticis arcu expresso, altero in extremitatibus obsoleto.

— Nomencl. III. p. 10. t. 53. f. 7. 8. t. 59. f. 3. 4. Var.
Decur. II. p. 5. t. 1. f. 3. 4. Var.

100. *Byzenus*, der *Byzenus*.

Bergstr. l. c. p. 8. t. 10. f. 1. 2.

Alis supra coeruleis immaculatis; subtus pallide fuscis, solitario in utrisque, sed irregulari ocellorum et interrupto arcu.

Ab *Espero* pro *Argiolo* primum editus; vid. t. 21. f. 1. a. sed *Argiolus* ex communi Entomologorum sententia alius.

— — — f. 3. 4. *Foemina*.

Alis fuscis, solitario subtus in utrisque, sed irregulari et interrupto ocellorum arcu.

Esper t. 21. f. 1. b.

— Nomencl. III. p. 14. t. 57. f. 1. 2. *Foem.* f. 3. 4.

101. *Argiades*, der *Argiades*.

Pallas Reis. I. Anh. no. 66. *Pap. Argiades*.

Argiolo simillimus, sed dimidio minor;
alis-

Insecta Lepidoptera. 231. Papilio|Plebej. Rural. 85

alisque subcaudatis ut Pap. *Rubi*. Foemina ut in
P. *Argi* fusca.

In *Holco odorato*.

Müllers Suppl. u. R. B. p. 297. no. 255. e. Pap. *Ar-*
giades, der *Pallas*.

102. *Flavus*, der *Gelbling*.

Pontopp. N. G. von Dänn. p. 218. no. 36. t. 17.

Alis integerrimis flavis, limbo nigro albo-
terminato, supra infraque concoloribus.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. pag. 115. no. 1333. Pap.
Flavus.

Alis integerrimis fulvis, utrinque immacu-
latis.

103. *Acrion*, der *Akrion*.

Pontopp. N. G. von Dänn. p. 218. no. 37. t. 17. a. b.

Similis *Arioni*; at discus alarum superiorum
supra fulvus maculis atris; alae inferiores supra
fuscae margine fulvo nigro-maculato.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. pag. 115. no. 1326. Pap.
Acrion.

Alis *rotundatis*; superioribus fulvis, maculis
atris, inferioribus fuscis, margine maculato,
omnibus subtus canis punctis ocellaribus.

104. *Faunus*, der *afrikanische dreygeschwänzte Faun*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 2. t. 1. f. 4. 5.
Mas.

Il déploye ses ailes presque un ponce et un
quart.

Cramer Pap. exot. IV. p. 63. t. 39. fig. B C. *Faunus*
(*Mas*).

— — — VIII. p. 150. t. 96. fig. F G. *Fau-*
nus (Foemina).

86 *Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural.*

Alis *integerrimis rotundatis*, supra nigris, subtus niveis, striga transversa ferruginea: *posticis* supra tribus maculis quadratis albissimis, singulis *tricaudatis*.

105. *Pan*, der *jamaische Pan*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 40. t. 23. f. 3. 4.

Il déploie ses ailes *un pouce et un quart*.

Alis *rotundatis integerrimis*, supra fuscis, *posticis* bicaudatis, ad apicem albo-maculatis; *subtus* ad marginem binis maculis nigerrimis, rubro-marginatis.

106. *Abaris*, der *surinamische Abaris*.

Cramer Pap. exot. VIII. p. 146. t. 93. fig. C. Pap. *Abaris*; à *Suriname*.

Alis rotundatis, undique ciliatis, fuscis, aurantiaco-marginatis, nigro-signatis; *posticis* supra octodecim punctis nigris inaequalibus in areis sulphureis.

107. *Acmon*, der *surinamische Akmon*.

Cramer Pap. exot. V. p. 81. t. 51. fig. CD. Pap. *Acmon* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis*, cyaneis, viridi-micantibus, nigro-marginatis; *anticis* supra binis globulis aterrimis.

108. *Aktoris*, der *surinamische Aktoris*.

Cramer Pap. exot. VIII. p. 146. t. 93. fig. D. Pap. *Aktoris* — de *Suriname*.

Alis concoloribus fuscis, albo-perlatis; *posticis* subdentatis.

109. *Alcides*, der *sierraleonische Alcides*.

Cramer Pap. exot. VIII. p. 150. t. 96. fig. DE. Pap.
Alcides — de *Sierra Leona* — sur la côte d'or
de l'*Afrique*.

Alis concoloribus nigro-fuscis, undique ciliatis, ad basin quatuor maculis oblongis coeruleis; *posticis caudatis ensiformibus*.

110. *Amyntor*, der *surinamische Amyntor*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 76. t. 48. fig. F. Pap. *Amyntor* — de *Suriname*.

Alis *caudatis*, supra obscure-glaucis, nigro-marginatis.

Simillimus Pap. *Rubi* no. 237.

111. *Anius*, der *westindische Anius*.

Cramer Pap. exot. VIII. pag. 144. t. 92. fig. B. Pap.
Anius — des *Indes occidentales*.

Alis *rotundatis* fuscis, lineis transversis nigris, ad marginem viridibus, omnibus arcuatis.

112. *Arius*, der *surinamische Arius*.

Cramer Pap. exot. III. p. 51. t. 31. fig. E. Pap. *Arius* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* fusco-cinereis, nigro-punctatis, ad marginem albo-angulatis; binis in disco anticarum lituris transversis albis.

113. *Battus*, der *surinamische Battus*.

Cramer Pap. exot. V. p. 81. t. 51. fig. EF. Pap. *Battus* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis* coeruleis, purpureo-micantibus, nigro-marginatis; binis anticarum ocellis aterrimis, iride pallida.

114. *Celmus*, der *surinamische Zelmus*.

Cramer Pap. exot. V. p. 87. t. 55. fig. GH. Pap. *Celmus* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis concoloribus fuscis, nigro-venosis; *subtus* albicantibus, punctisque aurantiacis.

115. *Cyanea*, die *westindianische Zyanea*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 120. t. 76. fig. CD. Pap. *Cyanea* — des *Indes occidentales*.

Alis subcaudatis ciliatis, *cyaneis* nigro-marginatis; *subtus* 14 ocellis nigris, iride *cyanea*, marginalibus.

116. *Cyllarus*, der *surinamische Zyllarus*.

Cramer Pap. exot. III. pag. 43. t. 27. fig. CD. Pap. *Cyllarus* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis viridi-cyaneis, ad apicem margineinque nigris; binis bacillis transversis aterrimis.

117. *Clyton*, der *westindische Klyton*.

Cramer Pap. exot. VI. pag. 105. t. 67. fig. FG. Pap. *Clyton* — des *Indes occidentales*.

Alis rotundatis ciliatis, viridi-albis, nigro-arcuatis.

118. *Dindymus*, der *surinamische Dindymus*.

Cramer Pap. exot. IV. pag. 73. t. 46. fig. FG. Pap. *Dindymus* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis, hilare-cyaneis, apice nigris; *subtus* binis ocellis nigris marginalibus, iride aurantiaca.

119. *Emilius*, der *surinamische Emilius*.

Cramer Pap. exot. VI pag. 104. t. 66. fig. G H. Pap. *Emilius* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* fusco-nigris; *anticarum* binis fasciis transversis sulphureis, aurantiaco-marginatis; omnibus aurantiaco-alboque punctatis.

120. *Epulus*, der *surinamische Epulus*.

Cramer Pap. exot. V. p. 79. t. 50. fig. C D. Pap. *Epulus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* ciliatis fuscis, aurantiaco-maculatis; *posticis* 14 ocellis marginalibus.

121. *Ethemon*, der *westindische Ethemon*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 75. t. 48. fig. D. Pap. *Ethemon* — des *Indes occidentales*.

Alis *subcaudatis*, *subtus* ferrugineo-rubellis; *supra* nigris, disco obscure-glaucis.

122. *Gabriela*, die *berbizeische Gabriela*.

Cramer Pap. exot. I. p. 9. t. 6. fig. C D. Pap. *Gabriela* — du *Berbice*.

Magnus. Alis *caudatis* ciliatisque, hilarecyaneis, radiis ad basin obsoletis flavo-fuscis.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 296. no. 255. b. der *Affelpage*.

123. *Gyas*, der *berbizeische Gyas*.

Cramer Pap. exot. III. p. 45. t. 28. fig. F G. Pap. *Gyas* — du *Berbice*.

Minutus. Alis *rotundatis* ciliatis, *supra* concoloribus nigro-fuscis; *subtus* rubellis, viridifasciatis.

124. *Hebrus*, der *surinamische Hebrus*.

Cramer Pap. exot. V. p. 79. t. 50. fig. EF. Pap. *Hebrus* — de *Suriname*.

Alis rotundatis ciliatis, fufvescentibus, coeruleo-maculatis.

125. *Hyacinthus*, der *westindische Hyacinth*.

Cramer Pap. exot. III. p. 59. t. 36. fig. E. Pap. *Hyacinthus* — des *Indes occidentales*.

Alis subcaudatis ciliatis, *supra* hilare coeruleis; nigro-marginatis; *subtus* obscure cyaneis, fasciis latis transversis nigris.

126. *Hisbon*, der *westindische Hisbon*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 130. t. 83. fig. C. Pap. *Hisbon* — des *Indes occidentales*.

Alis rotundatis nigerrimis, hilare flavo-fasciatis.

127. *Imperialis*, der *surinamische kleine Kaiserpage*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 120. t. 76. fig. EF. Pap. *Imperialis* — de *Suriname*.

Alis caudatis nigris, disco viridi-coeruleo radiato; *subtus* anticis viridibus, aureo-punctatis; posticis aureo-lamellatis, lituris nigris.

Huius generis *pulcherrimus*.

128. *Inachus*, der *westindische Inachus*.

Cramer Pap. exot. III. p. 58. t. 36. fig. D. Pap. *Inachus* — des *Indes occidentales*.

Alis subcaudatis obscure-coeruleis; *subtus* fuscis, albo-lituratis.

129. *Mantus*, der *surinamische Mantus*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 74. t. 47. fig. FG. Pap.
Mantus — de *Suriname* et des *Berbices*.

Alis *elongato-rotundatis*, ad marginem exteriorem et inferiorem hilare coeruleis, atro-maculatis.

130. *Meneria*, die *surinamische Meneria*.

Cramer Pap. exot. VIII. p. 147. t. 94. fig. DE. Pap.
Meneria — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* atris, albo-punctatis, margine exteriore, fascia rubra interrupta, inferiore, linea rubra arcuata.

131. *Micalia*, die *surinamische Micalia*.

Cramer l. c. t. 94. fig. F.

Similis praecedenti, fascia marginali lata rubra.

132. *Naïs*, die *afrikanische Naïs*.

Cramer Pap. exot. IV. pag. 74. t. 47. fig. DE. Pap.
Naïs — du *Cap de bonne espérance*.

Alis *angulato-caudatis*, anticis *supra* ad basin albis nigro-punctatis; in disco coeruleis; ad apicem fuscis aurantiaco-lituratis; *posticis supra* ferrugineis coeruleo-punctatis; *subtus anticis* ferrugineis auro-punctatis; *posticis* fuscis auro-maculatis.

Ex *pulcherrimis*.

133. *Pelion*, der *berbizeische Pelion*.

Cramer Pap. exot. I. p. 10. t. 6. fig. EF. Pap. *Pelion*
— du *Berbice*.

Alis

92 *Insecta Lepidoptera. 231. Papilio Plebej. Rural.*

Alis *subcaudatis* ciliatis, furvis, disco coeruleo, auro-punctato.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 297. no. 255. C. der Goldpage.

134. *Regalis*, der *surinamische Königspage*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 114. t. 72. fig. EF. Pap. *Regalis* — de *Suriname*.

E maximis. Alis *caudato-setaceis*, *supra* coeruleis apice nigris; *subtus* viridibus, fusco-auroque punctatis, fascia atra sinuosa albo-marginata, rubraque lata albo-punctata.

135. *Sagaris*, die *surinamische Sagaris*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 130. t. 83. fig. D. Pap. *Sagaris* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* furvis, fascia transversa interrupta rubra.

136. *Telephus*, der *westindische Telephus*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 103. t. 66. fig. EF. Pap. *Telephus* — des *Indes occidentales*.

Alis *rotundatis* fuscis, *anticis supra* albo-punctatis: disco obsolete rubro; *subtus* nigricantibus, canescente-albo-variegatis.

137. *Alpheus*, der *afrikanische Alpheus*.

Cramer Pap. exot. XVI. p. 131. t. 182. fig. EF. Pap. *Alpheus* — du *Cap de B. E.*

Alis *ciliatis cuspidatis*, nigerrimis, hilare rubro-fasciatis; *subtus* pulcherrime variegatis, fascia transversa rugosa fusco-nigricante, *farcimen* referente.

138. *Amefis*, die *surinamische Amefis*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 13. t. 104. fig. F. Pap. *Ame-
fis* — de *Suriname*.

Alis rotundatis ciliatis ochraceis, fusco-li-
neatis.

139. *Apidanus*, der *surinamische Apidanus*.

Cramer Pap. exot. XII. pag. 63. t. 137. fig. F G. Pap. *A-
pidanus* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis ciliatis obscure-glaucis, ni-
gro marginatis.

140. *Arkas*, der *surinamische Arkas*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 127. t. 179. fig. E F. Pap. *Ar-
kas* — de *Suriname*.

Alis rotundatis ciliatis albo-glauciscentibus;
anticis supra et subtus albo-maculatis; ad api-
cem *posticarum* fascia nigerrima albo-termi-
nata.

141. *Archias*, der *surinamische Archias*.

Cramer Pap. exot. XVI. p. 129. t. 181. fig. C. Pap. *Ar-
chias* — de *Suriname*.

Alis rotundatis ciliatis, fuscescentibus, albo-
lineatis.

142. *Aulestes*, der *surinamische Aulestes*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 47. t. 128. fig. G. Pap. *Au-
lestes* — de *Suriname*. (Cf. t. 48. fig. C. t. 58.
fig. A. et t. 63.)

Alis late-caudatis nigris, rubro-tinctis, fa-
scia transversa aurantiaca, rubello-angulata.

94 *Insecta Lepidoptera.* 231. *Papilio Plebej. Rural.*

143. *Bitias*, der *surinamische Bitias*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 12. t. 104. fig. E. Pap. *Bitias* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis fuscis, obscure-viridi-micantibus, ad marginem posticarum virides litorae.

144. *Ceneus*, der *surinamische Zeneus*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 94. t. 156. fig. F. Pap. *Ceneus* — de *Suriname*.

Alis rotundatis ciliatis nigerrimis, margine albo-punctatis; lituris, fasciisque interruptis coeruleis.

E pulcherrimis.

145. *Crispus*, der *surinamische Krispus*.

Cramer Pap. exot. X. pag. 33. t. 118. fig. DE. Pap. *Crispus* (*Foemina*).

— — fig. F. (*Mas*) — de *Suriname*.

Foeminae *Alis rotundatis* ciliatis fuscis, disco rubiginosis, atro-punctatis.

Maris *Alis rotundatis* ciliatis purpureis, atro-lineatis, apice fuscis.

146. *Dolyas*, der *surinamische Dolyas*.

Cramer Pap. exot. X. p. 22. t. 111. fig. BC. Pap. *Dolyas* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis ciliatis furvis, disco coerulelescente; binis anticarum globulis obscure-ferugineis, nigro-marginatis.

147. *Dydimaon*, der *surinamische Dydimaon*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 59. t. 134. fig. A. Pap. *Dydimaon* — de *Suriname*.

Alis

Alis *subcaudatis* ciliatis furvis, ad basin rubris, albo-ocellatis.

148. *Ematheon*, der *surinamische Ematheon*.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 104. t. 163. fig. F G. Pap. *Ematheon* — de *Suriname*.

Magnus. Alis *subcaudatis* supra hilare coeruleis, apice nigris, binis maculis ovatis aterrimis; *subtus* nigro-furvis, albo-glaucisque variegatis.

Ex *pulcherrimis*.

149. *Eryx*, der *surinamische Eryx*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 75. t. 144. fig. D. Pap. *Eryx* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis* pallide-fuscis, fascia albonigra arcuata, angulo ani fusco rubro, binis punctis rubris.

150. *Euriteus*, der *surinamische Euriteus*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 89. t. 152. fig. DE. Pap. *Euriteus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* nigris, *anticis* disco, *posticis* ad marginem exteriorem glauco-maculatis.

151. *Formosus*, der *surinamische Cupido*.

Cramer Pap. exot. X. p. 33. t. 118. fig. G. Pap. *Formosus* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis*, supra fuscis, coeruleo-micantibus; *subtus* incarnato-flavis, maculis, margineque aureo fasciatis.

152. *Halesus*, der — *Halesus*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 3. t. 98. fig. B C. Pap. *Halesus*.

Alis

Alis *subcaudatis* ciliatis fusco-nigris, quatuor areis coeruleis; binis in iis anticarum maculis ovatis striatis, pallide-flavo-lunulatis.

153. *Ismarus*, der — *Ismarus*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 123. t. 176. fig. F. Pap. *Ismarus*.

Alis *subcaudatis* nigricantibus albo-lineatis variegatisque.

154. *Lagus*, der *surinamische* *Lagus*.

Cramer Pap. exot. X. p. 31. t. 117. fig. F G. Pap. *Lagus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* ciliatis *purpureis*, nigro-marginatis; binis *anticarum* maculis albissimis.

155. *Lycabas*, der *surinamische* *Lykabas*.

Cramer Pap. exot. X. p. 31. t. 117. fig. E. Pap. *Lycabas* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis* cinereis, ad basin nigricantibus; ad angulum ani posticarum ter flavo-lineatis.

156. *Lyfias*, der — *Lyfias*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 89. t. 152. fig. F G. Pap. *Lyfias*.

Alis *cordiformibus* ciliatis, coeruleis, apice nigris, albo-marginatis.

157. *Misenes*, der *surinamische* *Misenes*.

Cramer Pap. exot. X. p. 31. t. 117. fig. D. Pap. *Misenes* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis*, albis nigro-variegatis, binis in disco circulis atris.

158. *Pelops*, der *surinamische Pelops*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 114. t. 170. fig. F. Pap. *Pelops* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* ciliatis albo-flavescentibus, margine ferrugineo-nigricante, atro-punctato.

159. *Periander*, der *surinamische Periander*.

Cramer Pap. exot. XVI. p. 139. t. 188. fig. C. Pap. *Periander* — de *Suriname*.

Alis *longe-caudatis*; *anticis* fuscis ciliatis, quatuor fasciis transversis albis; *posticis* aterrimis, ochreo-maculatis.

160. *Phareus*, der *surinamische Phareus*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 113. t. 170. fig. C. Pap. *Phareus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis*, obscure-rubris, nigro-marginatis.

161. *Pholeus*, der *surinamische Pholeus*.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 104. t. 163. Fig. DE. Pap. *Pholeus* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis*, ciliatis, viridi-glaucis, atromarginatis.

162. *Pretus*, der *surinamische Pretus*.

Cramer Pap. exot. XVI. p. 131. t. 182. fig. CD. Pap. *Pretus* — de *Suriname*.

Alis *subdentatis* nigris, viridi-maculatis.

Ex *pulcherrimis*.

163. *Pyretus*, der *surinamische Pyretus*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 76. t. 144. fig. AB. Pap. *Pyretus* — de *Suriname*.

Alis caudatis incurvatis, subdentatis ciliatis; supra nigris, rubro-fasciatis; subtus coeruleo-lituratis.

164. *Sicheus*, der *surinamische Sicheus*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 76. t. 144. fig. CD. Pap. *Sicheus* — de *Suriname*.

Alis subcaudatis nigris, disco coeruleo-radiato.

165. *Symethus*, der *westindische Symethus*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 84. t. 149. fig. BC. Pap. *Symethus* — des *Indes occidentales*.

Alis acuminatis ciliatis; anticis nigris, disco albo, ad pectus fusco; posticis albo-fuscescentibus.

166. *Tedea*, die *surinamische Tedea*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 8. t. 102. fig. A. Pap. *Tedea* — de *Suriname*.

Alis caudato-incurvatis nigris, rufo-fasciatis.

167. *Theanus*, der *surinamische Theanus*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 65. t. 139. fig. F. Pap. *Theanus* — de *Suriname*.

Alis rotundatis subtus coeruleo-albicantibus.

168. *Timeus*, der *smyrnische Timeus*.

Cramer Pap. exot. XVI. p. 137. t. 186. fig. EF. Pap. *Timeus* — en *Smyrne*.

Alis acuminatis ciliatis, fuscis, rufo-fasciatis; atro-glaucisque punctatis.

169. *Meton*, der *surinamische Meton*.

Cramer Pap. exot. XVII. P. III. p. 15. t. 201. fig. DE.
Pap. *Meton* — à *Suriname*.

Alis caudatis furvis, disco albo-fusco, naevis
tenuissimis atris granulatis.

170. *Helius*, der *surinamische Helius*.

Cramer Pap. exot. III. p. 15. t. 201. fig. F G. Pap. *Helius* — à *Suriname*.

Alis subcaudatis, ciliatis, *supra* coeruleis,
margine atro; *subtus* variegatis.

171. *Etolus*, der *koromandelische Etolus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 28. t. 208. fig. E F. Pap.
Etolus — de la côte de *Coromandel*.

Alis acute caudatis ciliatis fuscis, aurantiaco-
maculatis; *caudarum* basi aureo-punctata, apice
nodoso fusco; *subtus* fasciis aurantiacis aureo-
lineatis.

172. *Liberia*, die *amboinische Liberia*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 31. t. 210. fig. GH.
Pap. *Liberia* — de l'Isle d'*Amboine*.

Alis rotundatis concoloribus cyaneo-griseis;
subtus viridi-flavis.

173. *Eurifus*, der *guineische Eurifus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. pag. 47. t. 221. fig. DE.
Pap. *Eurifus* — sur la côte de *Guinée*.

Alis rotundatis caudatis primoribus nigris;
posticis coeruleis.

100 *Insecta Lepidoptera*. 231. *Papilio Plebej. Rural.*

174. *Elis*, der *surinamische Elis*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 70. t. 233. fig. D. Pap.
Elis — à *Suriname*.

Alis caudatis fuscis concoloribus; *posticis* viridi-fasciatis, lineola transversa coerulea; *anticis* ocellis nigris, coeruleo-pupillatis.

175. *Laufus*, der *surinamische Laufus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 70. t. 233. fig. E. Pap.
Laufus — à *Suriname*.

Alis caudatis furvis, lituris pallide purpurascens.

176. *Nautes*, der *surinamische Nautes*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. pag. 70. t. 233. fig. F G.
Pap. *Nautes* — à *Suriname*.

Alis caudatis viridi-nigrescentibus, coeruleo-fasciatis.

177. *Daphnis*, die *Daphnis*.

Papillons d'Europe par Mr. *Ernst* et R. P. *Engramelle* Vol. III. p. 131. t. 29. no. 58. le *Daphnis*.

Alis ferrugineis rotundatis; *anticis* utrinque binis, *posticis* quatuor utrinque ocellis ferrugineis, fusco-pupillatis.

Anmerkung.

Aus dem *Seba* werd' ich keine weiter anführen, weil die Beschreibungen gar zu unbestimmt sind.

2. Plebeji *Vrbicolae*, *Bürger*; *Dikköpfe*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 456. *Bürger* (*Vrbicolae*), les *Eftropiës*.

256. *Comma*, das *Komma*.

Müllers Linn. Naturfyst. 5 B. I Th. p. 633. no. 256. das *Komma*.

Füßlins Verz. schweizer. Inf. p. 32. no. 608. das *Komma*.

Berlin. Magaz. II. p. 74. no. 32. Pap. *Comma*.

Röthlich gelb, mit einem *schwarzen Strich* auf den Oberflügeln.

— — p. 89. (L.)

Vielen fehlt der schwarze Strich, oder das Komma, sind dagegen aber ober- und unterwärts mit weißlichgelben Flekken besetzt; von einerley Gröfse, Gestalt, auch zu einerley Zeit, also für *einerley Art* zu halten, bis mehrere Erfahrungen kommen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 735. no. II. Pap. *Comma*.*)

Der dunkelgelbe, weißgedüpfelte Tagvogel, mit einem *schwarzen Strich* auf den Oberflügeln.

Naturforscher VI St. p. 8. no. 32. Pap. *Comma*.**)

G 3 *Syste-*

*) Eben die Bemerkung als in *Hufnagels* Tabelle. Die Oberflügel stehen weit aus einander, sind ober- und unterwärts mit häufigen weißen Flekken besetzt.

**) Vom Pap. *Thaumas* (Naturf. VI. p. 4. no. 10. unter unsern neuen *Vrbic.* no. 21.) blos durch die weißen Flekke auf der Unterseite, und durch den stärkern schwarzen Strich oder *Comma* auf den Oberflügeln unterschieden. Diejenigen, denen dieser *schwarze Strich* mangelt, sind die *Weibchen*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 160. A. no. 41. *Peltschenfalterraupe* (*Coronillae variae*); *Peltschenfalter*.

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 196. das Komma.

Esper's Schmetterl. I. p. 300. t. 23. f. 1. a. das Männchen; b. Weibchen; das Komma; der Strichfalter; la Bande noire; *Streakt golden Hog*.

Petiv. Opp. Tom. II. Pap. brit. t. 6. f. 15. *Papilio minor aureus*, stria nigra distinctus.

— *Gazoph.* t. 34. f. 9. *Streakt golden Hog*.

Raj. Hist. Inf. pag. 125. no. 21. *Papilio minima*; alis tam supra, quam subtus fulvis; linea nigricante cinctis, extremo tantum margine lutescentes.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 66. no. 37. *Papilio* alis divaricatis fulvis, limbo, nervisque nigris, primariis macula oblonga nigra.*)

La Bande noire.

Long. 5 lign. Larg. 1. pouce.

Fabric. Syst. Ent. p. 531. no. 374.

Alis integerrimis divaricatis fulvis, lineola nigra, subtus punctis albis.

Larva viridis, albo-punctata.

Pupa elongata, cylindrica.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 339. Pap. Comma. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 115. no. 1332. Nom. Linn.

Variat maculis obsoletis et splendide niveis.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 189. no. 1. t. 1. f. 4. 5. Pap. *Virgule*. Papillon à ailes d'un jaune d'ocre; en dessus avec un trait noir, et verdâtre en dessous à taches quarrées blanches.

Degeer

*) Die Varietät bey *Geoffroy* ist *Hufnagels* und *Esper's* *Thaumas*, oder der *Wiener Linea*.

Degeer Inf. *Uebersf.* II B. I Th. p. 132. no. I. t. I.
f. 4. 5. der *Strichfalter*: mit okergelben Flügeln;
oben ein schwarzer Strich; unten grünlich mit
viereckigen weissen Flekken.

Merian. Eur. t. 48. *Papillon d'un Verd mélangé.*

257. *Augias*, der javanische *Augias*.*)

Müller l. c. p. 630. no. 257. das Schiefband.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 36. *Pap. Augias.*

Cathol. A. p. 642. *Pap. Augias.*

Fabric. S. E. p. 531. no. 375. Nom. *Linn.*

Affinis praecedenti alis, antennis mucronatis,
clava subtus fulva; lingua nigra.

258. *Protumnus*, der kapensische *Protumnus*.**)

Müller l. c. p. 630. no. 258. der Schmutzer.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 140. *Pap. Protumnus.*

Mus. Lud. Vlr. Linn. p. 340. no. 158.

Proxime accedit ad *Pap. Comma*; sed duplo
maior.

Alae primores supra subtestaceae, fusco pas-
sim obscuratae.

— — subtus testaceae maculis, et ver-
sus posteriora fascia curva e maculis nigris.

— posticae supra testaceae, limbo fuscescen-
te, et macula una magna transversa.

— — subtus cano-fuscoque nebulosae.

259. *Proteus*, der amerikanische *Grasproteus*.

Müller l. c. p. 630. no. 259. der Fensterflek.

G 4

Sulzers

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Sulzers abgek. Gesch. der Inf. p. 146. t. 19. f. 1. 2.
Pap. *Proteus*.

a. *Proteus*: geschwänzte braune Flügel; in den vordern etliche durchsichtige Flekke.

Aus *Amerika*.

b. *Proteus*: geschwänzte braune Flügel; in den vordern zween durchsichtige Queerstriche.

Aus *Amerika*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. pag. 456. no. 31. der *Proteus*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 140. Pap. *Proteus*.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 333. no. 151. Pap. *Proteus*.*)

Alae primores supra fuscae. Maculae aliquot sparsae, hyalinae seu nudae pellucidae.

— — *subtus* nebulosae.

— *posticae* supra fuscae.

— — *subtus* fasciis nigricantibus nebulosae.

Fabric. S. E. p. 532. no. 379. Nom. *Linn.*

Variat maculis alarum.

Merian. Surin. t. 63. f. 2.**)

260. *Thrax*,

*) *Varietates* hujus in Indiis paene infinitae :

1. alis posticis caudatis : cauda longitudine fere alarum, subplumosa.
2. alis posticis caudatis : cauda longa alba.
3. alis ad basin virescentibus cum corpore.
4. alis primoribus vix maculatis.
5. alis rotundatis ; primoribus fascia transversali.
6. alis rotundatis subtestaceis, corpore crassiore, puncto flavo in secundariis.
7. alis subtrus albo-variegatis.

**) La *Chenille* n'est point couverte de pointes, et elle est presque sans poils ; elle est de diverses couleurs, et l'on voit sur tout son corps des lignes et des cercles noirs.

260. *Thrax*, der javanische dreyfache Fensterflek.

Müller l. c. p. 631. no. 260. das *Hakenhorn*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 156. Pap. *Thrax*.

Fabric. S. E. p. 533. no. 388.

— Maculis aliquot fenestratis, antennis uncinatis.

Antennae nigrae albo-annulatae; maculae alarum 4 seu 5.

261. *Butes*, das asiatische Fensterband.

Müller l. c. p. 631. no. 261. das *Fensterband*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 39. Pap. *Butes*.

262. *Aktorion*, der indianische Aktorion.

Müller l. c. p. 631. no. 262. der *Halbschwanz*.

Neuer Schaupl. der Nat. 1. pag. 92. Pap. *Aktorion*,
Halbschwanz.

Sulzers Gesch. p. 146. t. 19. f. 3. 4.

Fast geschwänzte braune Flügel; in den vordern zween weisse Punkte und zwey weisse Querbänder, davon das äussere gelb, das innere blau, unten marmorirt; in den vordern ein Auge, und zween weisse Punkte bey der Spitze.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 17. Pap. *Aktorion*.

Fabric. S. E. p. 533. no. 386. Nom. Linn.

Cramer Pap. exot. V. t. 49. fig. CD. Pap. *Aktorion*

— de Suriname.

Sebae Thes. Tom. IV. t. 4. f. 3. 4. t. 41. f. 17. 18.

G 5 263. *Phi-*

La fève grise, d'où sortit une très-belle *Mouche* grise et d'un beau verd de Mer, avec des taches d'argent; il y avoit des queues et des ailes à ses ailes de dessous.

263. *Phidias*, der *asiatische Phidias*.

Müller l. c. p. 631. no. 263. der *Rothmund*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 123. *Pap. Phidias*.

Linn. Mus. Lud. Vlr. pag. 334. no. 152. *Pap. Phidias*.

Alae *supra* omnes atrae, ex coeruleo et viridi parum nitentes.

— *subtus* atrae.

Fascia alba, lata, in basi secundariarum, praesertim quae ad primores adscendit.

Margo extimus posticarum albus.

Foeminae alae minores, caeterum similes: fascia nulla alba *subtus*. Margo (intra inferiorum alarum marginem) albus linea coccinea. Linea rubra ad basin ejusdem alae. Abdomen *subtus* maculis 4 rubris.

Varietas 1. alarum margine luteo.

2. alarum secundariarum margine albo, introrsum rubro.

Fabric. S. E. p. 534. no. 393. Nom. *Linn.*

Petiv. Gazoph. t. 43. f. 15.

Phalaena Luzon. aterrima, collo cauda extremitatibusque alarum aureis.

264. *Bixae*, die *amerikanische Milchbinde*.

Müller l. c. p. 631. no. 264. die *Milchbinde*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 38. *Pap. Bixae*.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 335. no. 153. *Pap. Bixae*.

Alae *primores supra* nigricantes, versus basin virescentes.

— — *subtus* subfuscae, interdum basi virescentes;

— *posticae* primoribus concolores.

— — *subtus* nigrae seu virescentes.

Fascia

Fascia lutea et fere nivea, lata, ovata, transversa, in disco alae versus basin.

Petiv. Gazoph. p. 51. t. 32. f. 5. Papilionoides caroliniana fusca, signatura aurea pellucida, subtus alba (Varietas).

Fabric. S. E. p. 534. no. 390. Nom. Linn.

Cramer Pap. exot. XVII. (P. III.) p. 12. t. 199. fig. CD. Pap. Bixae — à Suriname.

Clerk Icon. t. 42. f. 7. 8. Foemina.

— — t. 44. f. 1. 2. *Mas.*

Merian. Surin. t. 44. Papillon (nocturne) verd, tirant sur le brun (sur le Rocu).

265. *Polycletus*, der indianische Silberpunkt.

Müller l. c. p. 632. no. 265. der Silberpunkt.

Lepechins Tageb. der R. R. I. p. 302. der indianische Polyklet.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 130. Pap. Polycletus.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 336. no. 154. Pap. Polycletus.

Alae primores supra fuscae, versus basin virides: macula alba oblonga in medio.

— — subtus cinereae, latere interiore albae: maculae fulvae, numerosae, quadratae, cinctae margine nigro argenteoque.

— posticae fuscae; postice angulatae, vix caudatae.

— — subtus concoloribus primoribus, sed absque margine albo.

Fabric. S. E. p. 534. no. 591. Nom. Linn.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 99. t. 159. fig. F G. Pap.

Polycletus — sur les côtes de Bengale et de Comandel.)*

266. *Pi-*

*) Die Abbildung im Cramer, nebst den Citatis, trifft alles mit der Linnéischen Beschreibung im Museo zu; nur sagt Cramer im

266. *Pitho*, die *kapensische Blauwurzel*.*)

Müller l. c. p. 632. no. 266. die *Blauwurzel*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 127. Pap. *Pitho*.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 337. no. 155. Pap. *Pitho*.

Alae omnes *supra* nigricantes, versus basin cyaneae.

— *primores supra* maculis seu potius punctis 3 seu 4 albis.

— *posticae supra* ad marginem posticum 3 seu 4 ocellis obsoletis.

— — *subtus* omnes albae maculis fuscis reticulatae: margo posticus omnium albus nigro interruptus.

267. *Malvae*, der *Malvenfalter*.

Müller l. c. p. 632. no. 267. t. 19. f. 8. der *Malvenpapilion*.

Füeslins Verz. schweiz. Inf. p. 32. no. 609. das *Malvenvöglein*.

— *Magazin der Entomol.* p. 262.

Berlin. Magaz. II. p. 66. no. 20. Pap. *Malvae*.

Schwärzlich grau, oder okerbraun mit einigen weissen Flecken; die Flügel ausgezakt.

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 149. no. 343. der *Malvenpapilion*.

Blumenbachs Handb. der Naturgesch. p. 363. no. 25. Pap. *Malvae*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der Wiener Gegend, p. 159. A. no. 1. *Malvenfalterraupe* (*Malvae*

im Text: La tache bleue des ailes supérieures de ce petit *Sphinx* belier est luisante. — Dies muß wohl ein Versehen seyn. Im Indice steht er unter den *Ruralibus*, wohin er auch eigentlich gehöret.

*) Nicht abgebildet.

vae sylvestris); *Malvenfalter*.) Le Papillon de la Guimauve. *Réaumur*.

Röfels Insektenbel. I. Tagv. 2 Kl. p. 56. t. 10. f. 5. 6. die schwarzköpfige fahlbraune Pappelraupe mit dem gelbgefleckten Hals.

Bergsträfers Nomencl. II. p. 65. t. 40. f. 1. 2. 3. 6. 7. der *Malvenfalter*.

Gladbachs Katal. das *Pappelvögelein*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 456. no. 32. der *Malvenfalter*.

Petiv. Opp. Tom. II. Papil. britan. t. 4. f. 15. 16. *Papiliunculus fuscus*, punctis paucioribus albicantibus. *Brown March fritillary*.

— f. 17. 18. *Papiliunculus fuscus*, punctis plurimis albicantibus. *Small spotted brown March fritillary*.

Raj. Hist. Inf. p. 132. no. 20. *Papiliunculus fuscus* punctis paucioribus albicantibus.

Réaumur. Mém. IV. t. 2. f. ult. Le *Papillon de la Guimauve*.

Scop. Entom. carn. p. 181. no. 464. *Pap. Morio* Variet. 2.

Alis anticis supra albo-punctatis, fimbria albo-fuscoque varia; *subtus* albo-maculatis, eademque fimbria; *posticis* utrinque simili fimbria *subtus* albo-fordideque variis.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 101. *Pap. Malvae*.

Linn. It. Oel. p. 3. Ueberf. p. 6. *Papilio Malvae hexapus*; *alis* divaricatis denticulatis nigris, albo-punctatis.

Act.

*) Der *Pap.* des *Geoffroy* II. p. 67. no. 38. *Röfels* I. Tagv. 2 Kl. t. 10. f. 7. *Schaeff.* Elem. t. 94. f. 9. — *Icon.* t. 162. f. 1. 2. ingleichen *Espers* t. 23. f. 2. ist nicht *Pap. Malvae*, sondern *Fritillarius Poda*; oder der *Wiener Fritillum*, *Kartensfalter*.

Aët. Vpsal. 1736. p. 23. no. 34. *Papilio fuscus punctis plurimis albicantibus.*

Fabric. S. E. p. 535. no. 369. Nom. *Linn.*

Larva grisea capite nigro, collo punctis 4 sulphureis.

Pupa gibba coerulescens.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 340. *Pap. Malvae.*
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 113. no. 1309. *Pap. Malvae.*
Nom. *Linn.*

268. *Tages*, der *geschekte Tages*.

Müller l. c. p. 631. no. 268. die *Braunmalve*.

Hüeflins Verz. Schweiz. Inf. pag. 32. no. 610. *Pap. Tages.*

Berlin. Magaz. II. p. 80. no. 46. *Pap. Tages.*

Schwarzgrau mit weissen Flekken, unten etwas heller, mit weissen Flekken.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 159. A. no. 2.
Pap. Tages; *Manstreufalterraupe* (*Eryngii campestris*); *Manstreufalter*.

Espers Schmetterl. I. p. 306. t. 23. f. 3. *Pap. Tages*;
le Papillon grisette.

Naturforscher VI. p. 31. no. 19. *Pap. Geryon.*

Sulzers Gesch. p. 146. t. 19. f. 6. 7. *Pap. Tages.*

Gezähnelte braune Flügel mit weisslichen fast durchsichtigen Flekken; unten blafs strohgelb; die Flekke besonders in den hintern kaum merklich.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 153. *Pap. Tages.*

Scop. Entom. carn. p. 181. no. 464. *Pap. Morio.*

Long. lin. 6-7. *Lat.* 4-5. *Variet. 1.*

Alis supra totis fuscis, punctis albidis marginalibus.

Fabric. S. E. p. 535. no. 398. Nom. *Linn.*

Geoffr.

Geoffr. Inf. Tom. II. pag. 68. no. 39. Le Papillon grisette.

Long. 5. lign. Larg. 1. pouce.

Papilio alis divaricatis cinereis, punctorum alborum serie duplici transversa.

269. *Oileus*, die algierische *Weißlinie*.*)

Müller l. c. p. 632. no. 269. die Weißlinie.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 113. Pap. Oileus.

270. *Niso*, der kapensische *Niso*.**)

Müller l. c. p. 632. no. 270. der Zettelpunkt.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 112. Pap. Niso.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 339. no. 157. Pap. Niso.

Pap. capensis in medio punctis 4 albis sparsis.

— *europaeus* atomis quibusdam albis adpersus.

Fabric. S. E. p. 535. no. 399. Nom. Linn.

271. *Spio*, der kapensische *Spio*.†)

Müller l. c. p. 633. no. 271. der Rückflügel.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 152. Pap. Spio.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 330. no. 156. Pap. Spio.

Alae omnes supra nigrae maculis albis plurimis, difformibus, per totam paginam dispersis.

— — *subtus* simillimae, sed loco nigredinis fuscae.

Fabric. S. E. p. 535. no. 400. Nom. Linn.

272. *Phaleros*, der indianische *Phaleros*.††)

Müller l. c. p. 633. no. 272. der Narbenflügel.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 272. Pap. Phaleros.

273. *Cae-*

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

273. *Caeneus*, der indianische *Zäneus*.*)

Müller l. c. p. 633. no. 273. der *Vielpunkt*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 48. Pap. *Caeneus*.

Unabgebildete Linné'sche Pap. Rur. Vrbicolae.

1. Pap. <i>Augias</i>	No. 257.
2. — <i>Protumnus</i>	No. 258.
3. — <i>Pitho</i>	No. 266.
4. — <i>Oileus</i>	No. 269.
5. — <i>Niso</i>	No. 270.
6. — <i>Spio</i>	No. 271.
7. — <i>Phaleros</i>	No. 272.
8. — <i>Caeneus</i>	No. 273.

Neue Papil. Pleb. Vrbicolae, oder Bürger.

1. Pap. Pl. *Vrbic. Exclamationis*, das indianische *Ausrufungszeichen*.

Fabric. S. E. p. 530. no. 373.

Alis *integris*, *divaricatis*, *fuscis*; *anticis* *lineola punctoque flavescens*.

2. *Colon*, das indianische *Kolon*.

Fabric. S. E. p. 531. p. 376.

Alis *divaricatis*, *fulvis*; *macula media marginisque striato fuscis*.

3. *Paniscus*, der leipziger *Paniskus*.**)

Fabric. S. E. p. 531. no. 377.

Alis *integerrimis* *divaricatis*, *fuscis*, *flavo-maculatis*.

Sulzers

*) Nicht abgebildet.

**) Cf. *Linn. Pap. Pleb. Rur. Metis* no. 245.

Sulzers Gesch. p. 147. t. 19. f. 8. 9. *Paniskus*.

Ungezähnte, schwarzbraune Flügel mit rothgelben Flekken; unten blässer, mit gelblichen Flekken.

Naturforscher XII. p. 71. t. 2. f. 11. 12. *Pap. Paniscus*.

4. *Silenus*, der *sierraleonische Silen*.

Fabric. S. E. p. 531. no. 378.

Alis caudatis fuscis, subtus brunneis, striga flavescente.

5. *Faunus*, der *indianische Faun*.

Fabric. S. E. p. 532. no. 380.

Alis caudatis hyalinis, margine strigaeque nigris.

6. *Licursis*, der *indianische Likursis*.

Fabric. S. E. p. 532. no. 381.

Alis caudatis nigris; fasciis duabus hyalinis.

— *Mantiss.* p. 271. no. 381. *Pap. Licursis*.

Alis caudatis atris, fasciis duabus albis: angulo ani rubro bimaculato — *Surinami*.

7. *Tityrus*, der *amerikanische Tityrus*.

Fabric. S. E. p. 532. no. 382.

Alis subcaudatis, fuscis; anticis utrinque fascia flava, posticis subtus nivea.

Petiv. Gazoph. p. 51. t. 32. f. 5. *Papilionoides caroliniana* fusca, signatura aurea pellucida, subtus albida.

8. *Thyrsis*, der *amerikanische Thyrsis*.

Fabric. S. E. p. 532. no. 383.

Alis subcaudatis, fuscis; anticis fascia flava, subtus omnibus purpureis, flavo-irroratis.

9. *Amyntas*, der *amerikanische Amyntas*.

Fabric. S. E. p. 533. no. 384.

Alis subcaudatis fuscis, fenestrato-maculatis; posticis subtus puncto baseos atro.

10. *Coridon*, der *jamaische Koridon*.

Fabric. S. E. p. 533. no. 385.

Alis subcaudatis fuscis; anticis flavo-maculatis; posticis subtus fusco-glaucoque variis.

11. *Alexis*, der *indianische Alexis*.

Fabric. S. E. p. 533. no. 387.

Alis ecaudatis, nigricantibus; posticis subtus fascia coerulescente.

12. *Jacchus*, der *neuholländische Jacchus*.

Fabric. S. E. p. 533. no. 389.

Alis ecaudatis, flavo-maculatis; posticis subtus punctis sex niveis.

13. *Philemon*, der *amerikanische Philemon*.

Fabric. S. E. p. 534. no. 392.

Alis rotundatis, integerrimis atris, immaculatis; antennis uncinatis.

14. *Syrichtus*, der *amerikanische Syrichtus*.

Fabric. S. E. p. 534. no. 394.

Alis rotundatis, integris, nigro-alboque variis, posticis subtus cinereis, strigis undatis, nigris.

15. *Maimon*, der asiatische *Maimon*.

Fabric. S. E. p. 534. no. 395.

Alis integris albis, margineque maculisque nigris.

16. *Menalcas*, der indianische *Menalk*.

Fabric. S. E. p. 555. no. 397.

Alis integerrimis, concoloribus, albis; margine nigro.

17. *Pygmaeus*, der indianische *Zwerg*.

Fabric. S. E. p. 536. no. 401.

Alis integerrimis, fuscis, immaculatis.

18. *Meliboeus*, der surinamische *Meliböus*.

Fabric. Mantiss. p. 271. no. 381-382.

Alis caudatis fuscis; anticis striga, posticis duabus sanguineis, subtus cyaneo-nitidissimis.

19. *Aracanthus*, der österreichische *Arazinthus*.

Fabric. Mantiss. p. 271. no. 391-392.

Alis rotundatis integris, fuscis, posticis subtus griseis maculis ocellaribus albis.

20. *Menippus*, der surinamische *Menippus*.

Fabric. Mantiss. p. 272. no. 397-398.

Alis integerrimis striatis fuscis, fascia lata alba.

21. *Comma*, das Skopolische *Komma*.

Scop. entom. carn. p. 181. no. 463. Pap. Comma.

Alae concolores corticinae; limbo fusco; caput crassum, antennis unco terminatis.

Long. lin. 6 $\frac{1}{2}$. Lat. 3 $\frac{1}{2}$.

In Sylvestribus.

Noster caret maculis pallidis albidisque; caeterum idem cum *Linnaeano*, juxta descriptionem datam in *Faun. Suec.* Sexus unus habet lineam nigram, obliquam in medio paginae superioris alae anticae cuiusque. — Alter caret hac linea et pallidior est — uterque gerit alas subrectas.

Berlin. Magaz. II. p. 62. no. 10. *Pap. Thaum.*

Blafsröthlichgelb mit feinen schwarzen Adern; unten etwas verschossen, und ohne Zeichnungen.

Naturforscher VI. p. 4. no. 10. *Pap. Thaum.* *)

Esper's Schmetterl. I. p. 344. t. 36. Suppl. XII. f. 2. das *Männchen*; f. 3. das *Weibchen*.

Pap. Thaum.; la bande noire; the *Spottless Hog*.

Alis integerrimis divaricatis, fulvis, immaculatis, linea tenuiori nigra, alis superioribus (qua foemina caret).

Poda Mus. graec. *Pap. Sylvestris*.

Raj. Hist. Ins. p. 125. no. 22. *Pap. minima*, alis utrinque fulvis, *absque linea transversa* nigra, marginibus duntaxat nigris (*Foemina*).

Petiv. Opp. Tom. II. *Pap. Brit.* t. 6. f. 14. *Papilio minor aureus immaculatus*; the *Spottless Hog*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 160. no. 5. *Schmellenfalterraupe* (*Airae montanae*); *Schmellenfalter*; *Pap. Linea*.

Geoffr. Ins. Tom. II. p. 66. no. 37. *Papilio* alis divarica-

*) Unterscheidet sich vom *Pap. Comma* Linn. dadurch: dafs ihm die weissen Flekke auf der Unterseite der Flügel fehlen, die letzterer daselbst hat, und der kleine schwarze Strich in den Oberflügeln viel dünner ist, als bey *Pap. Comma*. Dem Weibchen fehlt dieser Strich ganz.

varicatis fulvis limbo nervisque nigris, primariis macula oblonga nigra. *La Bande noire.*

Long. 5 lign. *Larg.* 1. pouce.

22. *Akteon*, der *Rottenburgische Akteon*.

Naturforscher VI. p. 30. no. 18. *Pap. Akteon*; viel ähnliches mit *Pap. Thaumata*; aber doch verschieden.

Espers Schmetterl. I. p. 345. t. 36. f. 4. *Pap. Akteon*.

Alis integerrimis divaricatis fulvis superioribus supra macula in medio fusca; subtus pluribus pallidis.

23. *Sylvanus*, der *Waldgott*.

Espers Schmett. I. p. 343. t. 36. f. 1. *Pap. Sylvanus* (Foemina).

Alis integerrimis divaricatis fulvis maculis utrinque pallidioribus (mas linea nigra).

24. *Sao*, die *kleine Sao*.

Bergsträfers Nomencl. II. p. 67. t. 40. f. 8. 9. *Pap. Sao*.

Pap. Pleb. Urb. alis integris rotundatis, nigris, macula alba confertim notatis; *Fritillo* duplo minor.

Espers Schmett. p. 345. t. 36. f. 5. *Pap. Pl. Rur. Malvae* minor. *Var.*

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 159. no. 3. in der Note p. 160. — Noch eine Art nach der *dritten*; seltener als der *Kartenfalter*, um die Hälfte kleiner; auf der Unterseite der Unterflügel ziegelroth, oder zimmetfarben, sonst aber mit den nämlichen weissen Flekken besetzt.

25. *Fritillarius*, der *Kartenfalter*.

Röfels Insektenbel. I. 2 Kl. der Tagv. p. 60. t. 10. f. 7.

Ein Papilion mit dem vorigen (*Malvae*) fast von gleicher Art; daran aber eine verschiedene Farbe, und mancherley Flekke — noch keinen aus der Raupe gezogen.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 159. no. 3. *Kartenfalterraupe* (*Dipsaci Fullonum*); la Chenille du chardon à foulon, *Geoffr. Kartenfalter*, *Pap. Fritillum*; le plein Chant, *Geoffr.* (*Pap. Fritillarius. Poda.*)

Poda Mus. graec. p. 79. *P. Fritillarius.*

Espers Schmetterl. I. p. 302. t. 23. f. 2. a b. *) *Pap. Malvae.*

Bergsträfers Nomencl. II. p. 66. t. 40. f. 4. 5. der *Kartendistelfalter*.

Papilio Fritillum, alis divaricatis, integris, nigris, quadratis albo-maculatis.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 189. no. 2. *Pap. de la Guimauve.*

A ailes d'un brun noirâtre à taches et mouchetures blanches.

— *Ueberf.* II B. I Th. p. 133. no. 2. der Papilion mit braunschwärzlichen, weißgeflekten und eben so gesprenkelten Flügeln.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 67. no. 38. le *plein Chant*.

Long. 5 lign. *Larg.* 14 lign.

Papilio alis divaricatis denticulatis nigris, albo-punctatis.

Schaeff. Elem. t. 94. f. 9.

— *Icon.* t. 162. f. 1. 2. *Pap. hexapus* alis *obliquis* primis,

*) Wo alle Citata des *P. Malvae* und *Fritillarii* für einerley gehalten werden. Eigentlich ist der letztere abgebildet.

primus, erster *sechsfüßiger* Tagfalter mit *schiefen Flügeln*.

26. *Steropes*, der *Steropes*.

System. Verz. der Schmett. der W.G. p. 160. no. 7.
Unbekannte Raupe; Pap. *Steropes*.

Schwarzbrauner, unten weißlicht eyrundge-
fleckter Falter.

Espers Schmetterl. I. p. 361. t. 41. f. 1. Pap. *Steropes*.

Alis divaricatis fuscis nitentibus, superioribus
utrinque maculis flavis sparsis; inferioribus sub-
tus flavis, *maculis ovatis* albidis nigro inductis.

Pallas Reif. I. Anh. p. 471. no. 64. Pap. *Morpheus*.

Magnitudo P. *Virgaureae*, capite minus *cras-*
so, quam affines. *Alae* supra fusco-nigrae, al-
bo-denticulatae, primores apice macula una al-
terave lutea, minuta. At *subtus* secundariae
flavae, maculis crebris, ovalibus, albo-subar-
genteis, linea nigra inciusis, quasi fenestratae, pri-
mariae tantum lunula disci pallida, macula ver-
sus apicem nigro cincta flava, et margine flavae.

In Fruticetis circa *Samaram* rarior, nec nisi
vespera apparet.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 299. no. 275. Pap.
Morpheus, der *Morpheus*.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 66. no. 36. le *Miroir*.

Long. 6 lign. *Larg.* 15 lign.

Papilio nigro-fuscus nitens, alis subtus lim-
bo dentato fulvo, secundariis maculis duodecim
albis.

27. *Brontes*, der *Wiener Brontes*.

System. Verz. der Schmett. der W.G. p. 160. no. 6.
Pap. *Brontes*.

Unbekannte Raupe. Goldgelber, oben veilbrauner, unten bleichfleckiger Falter.

28. *Aetolus*, der *kapensische Aetolus*.

Sulzers Gesch. p. 147. t. 19. f. 10. 11. Pap. *Aetolus*.

Geschwänzte, silberweiße Flügel mit breitem braunen Rand, in den vordern ein schwarzer Flek, unten braun gestreift, bey'm Leib und äußern Rand gelb gefäunt.

29. *Palaemon*, der *Pallassische Palämon*.

Pallas Reif. I. Anh. no. 63. Pap. *Palaemon*.

Magnitudo et facies *Metis*.

Alae supra fuscae, maculis crebris luteis, primores magis minusve confluentibus; secundariae tribus maioribus disci et per ambitum circiter senis; subtus color e luteo cinerascit.

β. *Varietas* datur, tota aurea, fimbriis atris.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 299. no. 274. Pap. *Palaemon*, der *Palämon*.

30. *Iphis*, der *senegallische Iphis*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 27. t. 15. f. 3. 4. *)

Ses ailes presque quatre poudes — du Senegal, Gambia, Sierra-Leon, Anamaboë, et le Bite de Benin sur la côte d'Afrique.

Alis anticis oblongis, posticis fere quadrangularibus; supra nigris, viridi-fasciatis, lineis obliquis nigris undulatis; subtus flavo-viridibus, lineis longitudinalibus nigris.

31. *Aca-*

*) Hierbey ist Linn. *Metis* no. 245. citirt, der zu t. 16. f. 3. 4. gehöret.

31. *Acastus*, der *berbizéische Acastus*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 65. t. 41. fig. CD. Pap. *Acastus* — dans les *Berbices* et à *Suriname*.

Alis oblongis; *posticis* sinuatis pilosis, fuscis; *anticarum* supra binis maculis ferrugineis; *posticarum* argenteis.

32. *Chorinaeus*, der *surinamische Chorinaeus*.

Cramer Pap. exot. V. p. 92. t. 59. fig. A. Pap. *Chorinaeus* — de *Suriname*.

Simillimus *Trojano*. Alis albis, nigro-venosis; *posticis* longe-caudatis nigris; rubro-angulatis.

33. *Clarus*, der *surinamische Klarus*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 66. t. 41. fig. EF. Pap. *Clarus* — de *Suriname*.

Facies et statura *Sphingis*. Alis oblongis nigricantibus ciliatis; fasciis flavo-coeruleis, corpore coeruleo-annulato, apice rubro.

34. *Clonius*, der *surinamische Klonius*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 126. t. 80. fig. CD. Pap. *Clonius* — de *Suriname*.

Alis oblongis aterrimis, ciliatis, curvo-caudatis; fasciis anticarum transversa albissima.

35. *Coras*, der *surinamische Koras*.

Cramer Pap. exot. III. p. 51. t. 31. fig. F. Pap. *Coras* — de *Suriname*.

Ex parvis. Alis rotundatis ciliatis, fuscis, flavo-maculatis.

36. *Dorilas*, der *westindische Dorilas*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 75. t. 48. fig. C. Pap. *Dorilas* — des *Indes occidentales*.

Alis nigerrimis; *anticis rotundatis*, binis utrinque maculis canescentibus ovatis; *posticis* longe-caudatis, vti par pedum absque planta.

37. *Erythus*, der *surinamische Erythus*.

Cramer Pap. exot. V. p. 93. t. 59. fig. G. Pap. *Erythus* — de *Suriname*.

E maximis. Alis *denticulatis* viridi-nigris, albo-maculatis.

38. *Folus*, der *surinamische Folus*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 118. t. 74. fig. F. Pap. *Folus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis*, ciliatis, nigerrimis, griseo-albo-maculatis.

39. *Helirius*, der *surinamische Helirius*.

Cramer Pap. exot. V. p. 94. t. 60. fig. D. Pap. *Helirius* — de *Suriname*.

Alis fuscis, nigro-venosis, leviter sinuosis, ciliatis.

40. *Hiarbas*, der *surinamische Hiarbas*.

Cramer Pap. exot. II. p. 27. t. 18. fig. F. Pap. *Hiarbas* — de *Suriname*.

Alis *acute-dentatis* furvis, *anticis* fascia transversa aurantiaca.

41. *Midas*, der *surinamische Midas*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 99. t. 63. fig. G. Pap. *Midas* — de *Suriname*.

Alis oblongo - rotundatis, viridibus, cano-maculatis.

42. *Mimas, der surinamische Mimas.*

Cramer Pap. exot. V. p. 83. t. 52. fig. E F. Pap. Mimas — de Suriname.

Alis rotundatis ciliatis, nigro-fuscis; linea atro-punctata arcuata; anticis triangulo punctorum alborum.

43. *Niveus, der surinamische Schneevogel.*

Cramer Pap. exot. II. p. 33. t. 22. fig. C. Pap. Niveus — de Suriname.

Alis rotundatis pilosis, niveis, margine nigro.

44. *Salus, der surinamische Salus.*

Cramer Pap. exot. VI. p. 107. t. 68. fig. E. Pap. Salus — de Suriname.

Alis obtuse-dentatis, fuscis, obsolete-albomaculatis.

45. *Sergefus, der surinamische Sergefus.*

Cramer Pap. exot. VII. p. 117. t. 74. fig. C. Pap. Sergefus — de Suriname.

Alis rotundatis integerrimis, fuscis, flavomaculatis.

46. *Anaphus, der surinamische Anaphus.*

Cramer Pap. exot. XV. pag. 126. t. 178. fig. F. Pap. Anaphus — de Suriname.

Alis rotundatis, ciliatis, fuscis, viridi-striatis; apice posticarum flavo; corpore punctis pallidis annulato.

47. *Apastus*, der *surinamische Apastus*.

Cramer Pap. exot. X. p. 22. t. III. fig. DE. Pap. *Apastus* — de *Suriname*.

Alis *oblongis*; posticis *acute-dentatis*, ciliatis, nigricantibus albo-fasciatis, disco ad corpus viridi-piloso.

48. *Arinas*, der *surinamische Arinas*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 6. t. 100. fig. D. Pap. *Arinas* — de *Suriname*.

Alis *oblongis subdentatis*, ciliatis, albo-marginatis, aterrimis, albo-maculatis.

49. *Cebrenus*, der *surinamische Zebrenus*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 127. t. 178. fig. G. Pap. *Cebrenus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* ciliatis, fuscis, flavo-maculatis, disco pallidiore striato.

50. *Corytus*, der *surinamische Korytus*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 6. t. 100. fig. C. Pap. *Corytus* — de *Suriname*.

Alis *sphingiformibus* atris, margine pilosis, maculis et lituris canescentibus.

51. *Daunus*, der *surinamische Daunus*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 44. t. 128. fig. F. Pap. *Daunus* — de *Suriname*.

Alis *perdentatis*, ciliatis, margine rubescente, viridi-flavicante-variegatis, lineis transversis nigris, arabicum characterem referentibus.

52. *Eumelus*, der — *Eumelus*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 94. t. 156. Fig. E. Pap. *Eumelus*.

Alis *rotundatis*, ciliatis, *anticis* nigris, albo-fasciatis, *posticis* ferrugineis, nigro-striatis.

53. *Gentius*, der *surinamische Gentius*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 127. t. 179. fig. C. Pap. *Gentius* — de *Suriname*.

Alis *quadrangulo-dentatis*, ciliatis, nigris; disco, maculisque marginalibus flavis.

54. *Hemes*, der *surinamische Hemes*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 11. t. 103. fig. F. Pap. *Hemes* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* integerrimis nigris, *anticarum* maculis; *posticarum* disco albis.

55. *Lucagus*, der — *Lucagus*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 123. t. 176. fig. G. Pap. *Lucagus*.

Alis *rotundatis*, ciliatis, concoloribus viridicoeruleis.

56. *Nobilis*, der — *Edelmann*.

Cramer Pap. exot. IX. pag. 17. t. 108. fig. AB. Pap. *Nobilis*.

Alis *dentatis*, ciliatis, ferrugineis, atro-tra-beatis, nigro-flavoque marginatis.

57. *Orchamus*, der *surinamische Orchamus*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 92. t. 155. fig. EF. Pap. *Orchamus* — de *Suriname*.

Alis

Alis *subdentatis* purpurascens, ciliatis, margine luteo, maculis rhomboidalibus flavis albisque.

58. *Palaemon*, der *surinamische Palämon*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 54. t. 131. fig. F. Pap. *Palaemon* — de *Suriname*.

Alis *oblongo-acuminatis*, purpurascens, aureo-striatis, margine albo-ciliato; *posticarum* apicibus rubris.

59. *Phocus*, der *surinamische Phokus*.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 102. t. 162. fig. F. Pap. *Phocus* — de *Suriname*.

Alis *subcaudatis*, apice ciliatis, luteo-nigricantibus.

60. *Phorcus*, der *surinamische Phorkus*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 93. t. 156. fig. D. Pap. *Phorcus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis*, ciliatis, nigerrimis, cano-maculatis.

61. *Phyllus*, der *surinamische Phyllus*.

Cramer Pap. exot. XV. pag. 122. t. 176. fig. B. Pap. *Phyllus* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* ciliatis, nigerrimis, albo-maculatis.

62. *Phineus*, der *surinamische Phineus*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 123. t. 176. fig. E. Pap. *Phineus* — de *Suriname*.

Alis *obtusè dentatis*, ciliatis, virescentibus, luteo-maculatis.

63. *Procas*, der *surinamische Procas*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 127. t. 179. fig. D. Pap. *Procas* — de *Suriname*.

Alis rotundatis, ciliatulis, flavo-nigris.

64. *Talus*, der *surinamische Talus*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 122. t. 176. fig. D. Pap. *Talus* — de *Suriname*.

Alis oblongo-acuminatis, ciliatis, furvis, viridi-striatis.

65. *Virbius*, der *surinamische Virbius*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 75. t. 143. fig. G. Pap. *Virbius* — de *Suriname*.

Alis rotundatis, ciliatis, fuscis, flavo-lunulatis, apice albis.

66. *Helius*, der *westindische Helius*.

Cramer Pap. exot. XVII. (P. III.) p. 10. t. 198. fig. B. Pap. *Helius* — des *Indes occidentales*.

Alis aterrimis rotundato-acuminatis, ciliatis; posticis macula oblonga ferruginea.

67. *Acastus*, der *surinamische Akastus*.

Cramer Pap. exot. XVII. (P. III.) p. 12. t. 199. fig. E. Pap. *Acastus* — de *Suriname*.

Alis oblongo-rotundatis, ciliatis atris; posticis et corpore margine sanguineo.

Clerk Icon. t. 44. f. 3. 4.

68. *Amyclas*, der *surinamische Amyklas*.

Cramer Pap. exot. XVII. pag. 13. t. 199. fig. F. Pap. *Amyclas* — de *Suriname*.

Alis rotundatis furvis, margine ferrugineo.

Clerk Icon. t. 44. f. 5. 6.

Papiliones ambigu.

Ich war anfänglich willens, des

Scop. Papil. Macaronius, Entom. carn. p. 168.
no. 446. cf. *System. Verz.* der Schmett. der
W. G. p. 187. no. 1. und der Wiener

P. Coccajus im *Syst. Verz.* l. c. no. 2.

hierher zu bringen; da aber die Verfasser im Anh.
p. 322. geneigter sind, diese zwei Arten der zweifelhaften Familie von dem *Schmetterlingheere* auszuschließen, so will ich statt derselben einen ganz sonderbar gestalteten Schmetterling hier anführen, den ich in keiner einzigen entomologischen Schrift, weder beschrieben, noch abgebildet finde.

Ruifch ist der einzige, der desselben in seinem Thesaurol. Animalium, Amstel. 4. 1710. t. 1. f. 1. D. gedacht hat. Ein Werkchen, um welches es ewig Schade ist, daß es unvollendet geblieben. Die Beschreibung p. 2. no. 3. lautet also:

Papilio Turcicus, rarissimus, colore ex albo, nigro et dilute coeruleo-viridi coloratus, cujus alae inferiores seu posteriores longissimae, tenue stramen latitudine aequant; hoc modo aviculae caudam repraesentant, et hinc a me denominatur:

PAPILIO TURCICVS *versicolor*, alis posterioribus longissimis stramineae latitudinis.

Der Kopf wie ein spitzer Kegel. Daran nur zwei Spitzen, als Spuren der fehlenden Fühlhörner. An den Seiten vorstehende runde Augen. Die Oberflügel ovalrund, fast wie bey den *Helikoniern*. Statt der untern, gleich vom Körper an, zwei abgehende schmale Streifen, die am Ende noch etwas breiter als im Anfange sind, etwa in der Breite eines Strohhalms, wie ein Paar Balancirstangen. Ich würd' ihn daher Pap. *Halteratus* nennen.

Cramer

Cramer Pap. exot. t. 13. fig. A, hat eine Phaläne vom furinamischen Zuckerrohr mit besonders langen Schwanzstreifen der Unterflügel, die aber erst am Ende der Unterflügel ihren Anfang nehmen, und also eigentlich langgeschwänzte Unterflügel vorstellen.

Forskål Animal. etc. descr. gedenkt t. 35. fig. E. auch einer *Panorpa Halterata* mit sehr langen Balancirstangen statt der Unterflügel.

232. Gen. SPHINX, Dämmerungsfalterling; Abendvogel; Schwärmer; Unruhe; Sphinx.*)

Linn. Antennae medio crassiores, f. utraque extremitate attenuatae, subprismaticae.

Alae deflexae (volatu graviore vespertino f. matutino).

Müllers

*) Vom *Habitus* der Raupe, die wie ein aufgerichteter *Sphinx* der Alten zu sitzen pflegt. Der Hauptkarakter dieses Geschlechts ist,

1. das die *Raupen* auf dem eilften Ringe ein krummes Horn haben, keinesweges das Futteral der Schwanzspitze der Puppe. *S. Stralsund. Magaz. I. p. 232.*
2. die *Puppen* am Oberende einen umgebogenen Rüssel haben, als das Futteral des künftigen Rüssels; aber nicht bey allen.
3. die *Vögel* ihr eigenes Air, in Ansehung des Körpers und der Flügel haben, auch die eigentlichen nur in der Morgen- und Abenddämmerung fliegen.

Außer diesen noch zwey besondere Merkwürdigkeiten:

- a) die zwei kleinen glatten Ozellen, welche die Sphinx und Phalänen außer den gewöhnlichen netzförmigen Augen am Kopfe haben, den *Tagfaltern* aber fehlen; bey den Gattungen mit durchsichtigen Flügeln, als *Fuciformis*, *Apif. Statices*, am deutlichsten zu sehen;

Müllers Linn. Naturfyst. 5 B. I Th. p. 634. *Pfeilschwänze*; *Unruhen*: Holl. Onrusten; Pylstaart. *Füßflins* Verz. schweizer. Inf. p. 32. *Sphinx*, *Abendvogel*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. nebst ihren Kennzeichen. *Vorber*. — p. 5. *Pfeilvögel*.

Sulzers Kennz. p. 121. *Sphinx*, *Abendvogel*.

— *Gesch. der Inf.* pag. 147. der *Abendvogel*; *le Sphinx*; *Sphinx*.

System. Verz. der Schmetterl. der W.G. p. 24. §. 6. *Abendschmetterling*; *Sphinx*; *Abend- und Dämmerungsvogel*; *Schwärmer*.*)

— — p. 40. *Abendschmetterlinge*; *Schwärmer*; *Sphinges* Linn. Les Papillons à antennes prismatiques, *Réaum.* Les *Sphinx*, *Geoffr.*

I. *Spitzkopfraupen*, Larvae *Acrocephalae*; *Chenilles chagrinées*, *Réaum.* *Zackenflüglichte* *Schwärmer*, *Sphinges angulatae*. *Sphinx-bourçons*, *Réaum.* et *Geoffr.*

(*Sphinx ocellata*.)

II. *Stumpf-*

b) bey dem *Männchen* auf der Unterseite der Oberflügel dichte bey der Eingliederung am Körper, ein kleines senkrecht stehendes *Häkchen*, durch dessen Oeffnung sich ein langes steifes Haar zieht.

Degeer hält es für ein Organ, die Ausbreitung des Flügels zu erleichtern, am *Sph. Gallii*, Tom. I. p. 173. Ueberf. p. 154. *Sulzer* aber, *Gesch. der Inf.* p. 150. für ein Werkzeug bey dem Begattungsgeſchäfte, weil es nur das *Männchen* hat. S. *Esper* II. p. 15. 16. ff.

*) Die Eintheilung der Wiener Entomologen ist unstreitig die natürlichste und beste, die wir haben. Nach ihrer Meynung p. 21. §. 3. sollen diese *Schwärmer* den Uebergang zu den *Vögeln* machen, da man einigen den Augapfel ausnehmen könne. S. *Erxleben's* phys. Bibl. 4 B. p. 191. 192.

II. *Stumpfkopfraupen*, Larvae *Amblocephalae*; *ringleibichte* Schwärmer, *Sphinges fasciatae*; *Sphinx-éperviers*, Réaum. et Geoffr.

(*Sphinx Convolvuli.*)

III. *Flekkefraupen*, Larvae *maculatae*; *halbring-leibichte* Schwärmer; *Sphinges semifasciatae*.

(*Sphinx Euphorbiae.*)

IV. *Augenraupen*, Larvae *ophthalmicae*; *spitz-leibichte* Schwärmer; *Sphinges caudacutae*.

(*Sphinx Elpenor.*)

V. *Langleibraupen*, Larvae *elongatae*; *bartleibichte* Schwärmer; *Sphinges caudiberbes*.

(*Sphinx Stellatarum.*)

VI. *Milchhaarraupen*, Larvae *subpilosae*; *glasflüglichte* Schwärmer; *Sphinges hyalinae*. Les *Sphinx-mouches*, Geoffr.

(*Sphinx Fuciformis.*)

VII. *Scheinspinnerraupe*, Larvae *Phalaeniformes*; *flekkichte* Schwärmer; *Sphinges maculatae*. Les *Sphinx à cornes de belier*, Réaum. et Geoffr.

(*Sphinx Filipendulae.*)

Wien. Schmett. Nachtr. p. 309. 310. *Ann.*

Schwärmer; *Abendvögel*; *Dämmerungsfalter*; *Sphinges*; *Eperviers*; *Bourbons*.

— (*Adscitae*) füglich als Mittelstufen zwischen den *Faltern*, *Spinnern* und *Schwärmern*:

Mittler; *Flatterer*; *Papillons à corne de beliers*; *Sphinx beliers*; *Widderchen*.

Börners Samml. aus der Naturgesch. etc. I. p. 493.

Dämmerungsvögel; *Sphinx*.

Bekmanns Anfangsgr. der N. H. p. 105. der *Abendvogel*; *Sphinx*.

— Epitome S. L. p. 160. *Sphinx*.

Eberhards Versuch eines neuen Entw. der Thiergesch. p. 208. §. 240. *Dämmerungsfalter*, Sphinx.
Titii Lehrbegr. der N. G. p. 354. *Abendvogel*, Sphinx.
Berlin. Magaz. II. p. 174. *Abendvögel*, Sphinges.
von Rottenburgs Anmerk. über die Hufnagelschen Tabellen im 7ten St. des *Naturforschers* p. 105. *Abendvögel*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 80. *Abendvogel*, Sphinx.

Pontoppidans N. G. von Dännem. p. 218. Sphinx, *Dämmerungsvogel*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1510. no. 13. Papiliones (Sphinges), die *Abendvögel*, *Abendschmetterlinge*.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 53. *Abendvogel*, Sphinx, *Pfeilschwanz*.

— — — II. p. 287. *Dämmerungsvogel*.
 — — — VI. pag. 468. *Pfeilschwänze*;
 Sphinges.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 456. *Dämmerungsfalter*; *Schwärmer*; Sphinx.

Blumenbachs Handbuch der N. G. p. 363. Sphinx, *Abendvogel*.

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 150. *Pfeilschwanz*, Sphinx.

Eberts Naturl. für die Jugend III. pag. 90. *Abend-Dämmerungsvogel*.

*Esper*s Schmetterl. II. pag. 1. *Abendschmetterlinge*; *Abendfalter*; *Dämmerungsvogel*; *Schwärmer*; *Pfeilschwänze*; *Unruhen*; *Sphinx*.

— — p. 10.

A. *Erste Horde* (Sphinges legitimae); *Aechte Abendschmetterlinge*.

1. mit ekklichten Flügeln (alis angulatis); *Ekflüglichte Abendschmetterlinge*.

2. mit

2. mit *glatträndigen* Flügeln (*alis integris*);
glatträndige Abendschmetterlinge.

a) mit *einfachem*, oder *unzertheiltem*
Schwanz (*ano simplici*).

b) mit *zertheiltem* oder *bärtigem* Schwanz
(*ano barbato*).

B. *Zwote Horde* (*Sphinges adscitae*, habitu et
larva *diversae*).

Unächte Abendschmetterlinge:

noch in *geflechte*, und *einfärbige*.

Brunnichii Entomol. p. 72. 73. *Sphinx*, *Tusmorke-*
fugl.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 230. *Sphinx*, *Abend-*
oder Dämmerungsvogel.

Scop. Entom. carn. p. 182. *Sphinx*.

1. metamorphosi occulta sub terra.

2. — — — manifesta supra terram.

— Introd. ad hist. nat. p. 413. *Sphinges*.

Fabric. S. E. p. 536-556.

Statt des Linn. *Sphinx* drey besondere *Geschlechter*:

1. *Sphinx*: Palpi duo reflexi, pilosi. Lingua
spiralis, plerisque exserta. *Antennae squa-*
matae. (*Sph. ocellata*.)

2. *Sesia*: Palpi duo reflexi; lingua exserta trun-
cata. *Antennae cylindricae*. (*Sph. Stella-*
tarum.)

3. *Zygaena*: Palpi duo reflexi; lingua exserta,
setacea. *Antennae medio crassiores*. (*Sphinx*
Filipendulae.)

Ejusd. Gen. Inf. c. Mantiss. p. 158 *Sphinx*; p. 159
Sesia; p. 160 *Zygaena*.

Systeme Naturel du Regne animal etc. II. p. 141.
Sphinx.

Mülleri (Otto Friedr.) Faun. Fridr. p. 37. *Sphinx*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 116. *Sphinx*.

Réaumur. Inf. I. p. 288 (ed. 4). Les Papillons nocturnes à antennes prismatiques, 1 Class.

Geoffroy. Inf. Tom. II. p. 76. 77. Le Sphinx. Antennes prismatiques.

Fam. 1. Antennae prismaticae, vbiq̃ue fere aequales, elingues: *Sphinx-bourdons*.

— 2. Antennae prismaticae, ubiq̃ue fere aequales, spirilingues.

Larva laevis cornigera.

Sphinx-éperviers; p. 82.

— 3. Antennae prismaticae, in medio crassiores, spirilingues.

Larva villosa, non cornigera.

Sphinx-beliers; p. 88.

Degeer Inf. Tom. II. P. I.

1. des Papillons-*bourdons* p. 213.

1. 2. 3. Fam. p. 249.

2. des Papillons-*phalènes* p. 250.

3. des *Phalènes-Tipules* p. 257.

— *Uebers.* II B. I Th.

1. von den Sphinxen, oder *Schwärmern* p. 153.

1. 2. 3. Familie p. 179.

2. von den *Papilionsphalänen* p. 180.

3. von den *erdschnakenartigen Phalänen* p. 185.

Cramer Pap. exot. I. préf. pag. 12. Sphinges; les Sphinx; *Pylstaart-Vlinders*.

1. Sphinges alis *denticulatis*; gehakkelde *Pylstaarten*; Sphinx-*bourdons*; les ailes *dentelées*.

2. Sphinges alis *integris*; ongehakkelde *Pylstaarten*; Sphinx-*entiers*; les ailes *non dentelées*.

3. Sphinges; *Onrusten*; Sphinx-*éperviers* (*anobarbato*).

4. Sphinges *adscitae*; Bastard-*Onrustjes*; Sphinx-*beliers*

Stralsund. Magaz. I. pag. 233. An den meisten *Abend- und Nachtzweifaltern* (Phalaenae et Sphinges), am zweyten langen Gelenk der Vorderfüße, gleich bey der Einlenkung, ein länglichtes, bald größeres, bald kleineres hornartiges *Kölblein*, das dicht am Gliede anliegt, und bey den *Abendvögeln* (Sphinges) am deutlichsten zu sehen ist. Am besten mit denen zu vergleichen, welche bey den *Stink- und Glimmerkäfern* (Carabi Cicindelae) an der ersten Einlenkung ihrer Hinterfüße dicht am Leibe sitzen. *Noch von keinem Schriftsteller bemerkt.*

I. SPHINGES legitimae, *Aechte SCHWAERMER.*

1. Alis *angulatis*, mit *ekkigen* Flügeln, die einen *ausgewinkelten* Rand haben.

Esper's Schmetterl. II. p. 24. der *Abendschmetterlinge* erste Phalanx oder Horde.

Sphinges legitimae: *ächte, rechtmäßige, legitime* *Abendschmetterlinge*.

Papillons - bourdons à antennes prismatiques.

— p. 25. ff.

Erste Familie (alis angulatis): *ächte ekflügelichte* *Abendschmetterlinge* mit *winklichtem* *Rande*.

1. Sph. *Ocellata*, das *Abendpfauenauge*.*)

Müllers Linn. Naturfyst. 5 B. I Th. p. 635. no. 1. das *Glanzauge*.

I 4

Fließ-

*) Die *Raupe* hab' ich oft, wenn sie sich bald verwandeln will, in den *Wegen*, und den *Schmetterling* auch bey *Tage* an den *Baum-*

Füeslins Verzeichn. Schweiz. Inf. p. 32. no. 611. das *Blauauge*.

— *Magaz. für Liebhaber der Entomol.* pag. 262. *Sph. ocellata*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. I Kl. p. 1. die einsame, blaugeschwänzte dicke grüne Raupe, mit schiefen weissen Seitenstreifen.

— — p. 8. §. 10. *Schnorrbock; Molkendieb*.

— — III. p. 233. 234. t. 38. f. 4. Variet. der *Raupe* des *Sph. ocell.*

Berlin. Magaz. II. p. 178. no. 4. *Sphinx ocellata*, das *Nachtpfauenauge*.

— Die *Oberflügel* blafsroth, bald heller, bald dunkler; die *Unterflügel* mit einem Pfauenspiegel, und die andern Gelenke pfrsichblüchroth. *Bonnets* und anderer etc. Abhandlungen aus der Insektologie p. 95. no. 10.

Sulzers Kennz. der Inf. t. 15. f. 89. *Sph. ocellata*.

Schröters Abhandl. über versch. Gegenst. der N. G. I. p. 180. *Sph. ocellata*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 735. no. 12. *Sph. ocellata*, das *Nachtpfauenauge*.

Neuer

Baumstämmen, stillsitzend gefunden. Die erstere hat eine scharfe Chagrinhaut, die aus lauter zakkichten Kügelchen bestehet. Eine solche Raupe exenterirt, und die Haut mit der inwendigen Seite auf eine Glasplatte geklebt, und gepresst, giebt ein schönes Objekt. Man kann die Hautkügelchen, die Stigmata und den Hakenkranz an den Bauchfüßen vortreflich sehen. Besonders ist es, dafs sich das Weibchen des Ocell. mit dem Männchen des Pinaetri in einer Schachtel begattet, und ersteres zwar Eyer, aber unbefruchtete, gelegt hat. Schade, dafs sie gewaltsam von einander gerissen sind. Dies hat die Befruchtung der Eyer offenbar gehindert. S. *Espers* Schmetterl. II p. 10. Die Bemerkung ist vom Herrn Kammerrath *Jung* in Uffenheim, dem ich auch manches zu verdanken habe.

Insecta Lepidoptera. 232. Sphinges legitimae. 137

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 51. Sph. ocellata, Abendpfauenaug.

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 77. Sph. ocellata, Abendpfauenaug.

Eberts Naturl. für die Jugend III. t. 36. f. 1. 2. 3.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. p. 364. no. 1. das Nachtpfauenaug.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 41. no. 1. Weidenschwärmerraupe (Salicis albae etc. Linn.); Weidenschwärmer; le Demi-Paon, Geoffr.

Espers Schmetterl. II. pag. 27. t. 1. Sph. ocellata: Abendpfauenaug; halbe Pfauenaug; Nachtpfauenaug; le Demi-Paon, Geoffr.

Glabachs Verzeichniss: der Schnorrbok.

Meineke entomol. Beob. Naturf. IV. p. 113. von der Paarung des Sph. ocellata.

Kleemanns Raupenkalender p. 70. no. 197. p. 115. n. 322. Abendpfauenaug.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 457. no. 1. der Weidenschwärmer.

Beckmanni Epit. Syst. Linn. p. 160. no. 1. Sph. ocellata, Nachtpfauenaug. Nom. Linn.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 249. Sphinx ocellata, Nachtpfauenaug.

Vddm. diss. p. 58. f. 11. Phalaena subulicornis, elinguis, alis planiusculis cinereis, maculis fuscis, inferioribus ocello nigro, iride coeca, pupilla nigro-coerulea.

List. Goed. p. 68. f. 24. Viridis eruca salicum.)*

I 5

Scop.

*) Qui hac Tabula expressus est, masculus est; femellae non sunt tam formosae, sed coloris magis cinerei; iisque carent rotundis maculis, quae oculorum quandam speciem habere videntur.

Hier hat *Goedart* den *Sph. Populi* damit verwechselt, und solchen

Scop. Entomol. carn. p. 182. no. 465. Sphinx ocellata.

Long. unc. 1. lin. 4-6. Lat. 9½.

Alae *anticae* subangulatae; *posticae* ocello magno superne notatae, os elingue.

Albin Inf. t. 8. f. 2. Phalaena alis inferioribus macula *ophthalmoides* insignibus.

Leche nov. Insect. spec. p. 58. f. 8. Phalaena subulicornis elinguis, alis inferioribus ocello nigro, iride fusca, pupilla coerulea.

Raj. hist. Inf. p. 361. no. 58. Phalaena maior, corpore crasso, alis angulis interioribus, macula *ophthalmoides* insignibus.

— — p. 148. no. 2. *Eruca* maxima elegans, *Ligustrinae* similis, cauda cornuta.

Geoffr. Inf. II. p. 79. no. 1. Le Demi-Paon.

Long. 17 lign.

Sphinx elinguis, alis angulatis superioribus fuscis; inferioribus rubris, ocello coerulecente.

Fabric. S. E. p. 536. no. 1. Sph. ocellata.

Alis *angulatis*, posticis rufis, ocello coeruleo.

Larva solitaria, caudata, scabra, viridis, striis obliquis lateralibus albis, punctisque ocellaribus flavis.

Pupa fusca, dorso atro.

Sepp Nederl. Inf. III St. 2 Verhandl. p. 11. t. 2. De Paauwoog Pylstaart-Vlinder.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 341. Sphinx ocellata.

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1324. Sph. ocellata.*

Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 99. f. 5. 6.

Sphinx alis *angulatis* prima, erster Dämmerungsfalter mit ekkigen Flügeln.

Degeer

solchen für das Weibchen des *Ocellata* gehalten. *S. Espers Schmetterl. II. p. 33.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 243. t. 3. f. 3. no. 2. PAPPILLON-BOURDON *demi-paon.*

A antennes *prismatiques* et à petite trompe, à ailes découpées, dont les supérieures sont brunes nuancées de gris, et les inférieures rouges avec un œil bleu et noir.

— *Ueberf.* 2 R. I Th. pag. 175. t. 3. f. 3. das halbe Pfauenauge.

Das *Abendpfauenauge* mit prismatischen Fühlhörnern, kleine Saugrüssel, und ausgezackten Flügeln: die obern braun und grauschattirt; die untern roth, mit einem schwarzblauen Auge.

Merian. Eur. t. 87.

Sebae Thes. IV. t. 51. PP. *Sphinx pavoninis ocellis insignis.*

— — — t. 54. no. 5. 6.

— — — t. 59. f. 4-6.

c. *Larva et Pupa.*

2. *Populi*, der Pappelschwärmer.

Müller l. c. p. 636. no. 2. der Zahnflügel.

Füßlings Verz. schweizer. Inf. p. 32. no. 612. die Kreuzmotte.

— *Magaz. der Entomol.* p. 263.

Berlin. Magaz. II. p. 178. no. 6. *Sphinx Populi*, die Kreuzmotte.

Die Grundfarbe aller Flügel bräunlichgrau; die Unterflügel bey der Einlenkung zimmetfarbig.

Röfels Insektenbel. III. p. 187. t. 30.

Die grüne Pappelbaumraupe mit sieben Paa- ren schräger, gelblichtweißser Streifen, einem horizontalen Seitenstreif, und dem zugespitzten Kopf, nebst derselben Verwandlung in einen zu den Nachtvögeln 1 Kl. gehörigen Papilion.

Röfels

Röfels Insektenbel. III. p. 231. t. 38. f. 1. *Variet. der Raupe:* t. 30. f. 1.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 681. no. 2. Sph. *Populi*, die *Kreuzmotte*.

— — — II. p. 736. no. 13. *Sphinx Populi*, *Kreuzmotte*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der Wiener Gegend, p. 41. no. 4. *Albernschwärmerraupe* (*Populi nigrae*), *Albernschwärmer*.

Esper's Schmetterl. II. p. 34. t. 2. (*Mas.*) Sph. *Populi*, der *Pappelvogel*; *Schnorrbok*.

— — — t. 22. Suppl. 4. f. 2. *Variet. Sph. Populi* t. 2.

Glabachs Verz. der große *Ulmenvogel*.

Kleemanns Raupenkalender p. 63. no. 179. p. 80. no. 230. *Zahnflügel*; *Kreuzmotte*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 253. Sph. *Populi*, der *Pappelvogel*.

Bekm. Epit. Syst. Linn. p. 160. no. 2. Sph. *Populi*. Nom. *Linn.*

Système Naturel du Regne animal etc. II. p. 141. no. 2. Phalene du *Peuplier*.

Scop. Entom. carn. p. 183. no. 466. *Sphinx Populi*. *Long.* unc. 1. et lin. 6. *Lat.* 10.

Corporis alarumque color primarius, utrinque cinereus. Alae omnes dentatae, anticae supra puncto albo medio, posticae basi moscatinae; antennae osseae.

Fabric. S. E. p. 537. no. 3. Nom. *Linn.*

Larva solitaria, caudata, scabra, viridis utrinque, linea striisque transversalibus obliquis albis.

Pupa obscure grisea, postice ferruginea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 342. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 116. no. 1335. Nom. *Linn.*

Geoffr.

Geoffr. Inf. II. p. 81. no. 3. Le Sphinx à ailes dentelées.

Long. 1 pouce.

Sphinx elinguis, alis ferratis, cinereo-fuscis, superioribus fasciis obscurioribus transversis, inferioribus macula fulva.

Sepp Nederl. Inf. III. St. p. 1. t. 1. De gehakkelde Pylstaart-Vlinder.

Degeer Inf. Tom. I. Mém. IV. p. 148. t. 8. f. 1.

Chenille rase, verte, à corne sur le derriere, dont la peau est chagrinée, la tête plate et triangulaire, et qui mange les feuilles du Peuplier noir.

— — — t. 8. f. 5. p. 152. le *Sphinx*.

— — p. 694. t. 8. f. 5. *Phalene*.

A antennes prismatiques, et à trompe très-courte: grise, à ailes découpées, dont les inférieures qui débordent les supérieures, sont en partie rousses.

— Uebersf. I. 1 Quart. p. 110. t. 8. f. 1.

Die glatte, grüne Schwarzpappelraupe mit dem Schwanzhorn, chagrinirter Haut, und plattem dreyekkigen Kopfe.

— — p. 113. t. 8. f. 5. der *Sphinx*.

— — 4 Quart. p. 116. t. 8. f. 5.

Eine graue *Phaläne* mit prismatischen Fühlhörnern, sehr kurzem Saugrüßel und ausgekappten Flügeln; deren Unterflügel zum Theil braunroth, und vor die obern vorstehend.

— Tom. II. P. I. p. 243. no. 1. *Papillon-bourdon du Peuplier*.

— à antennes prismatiques et à petite trompe, à ailes dentelées d'un gris cendré avec des rayes ondées brunes, dont les inférieures sont rousses à leur base, et dont les supérieures ont une tache blanchâtre.

Degeer

Degeer Inf. *Uebers.* II B. I Th. pag. 175. no. 1. der *Pappelschwärmer.*

— mit prismatischen Fühlhörnern, kleinem Saugrüssel, aschgrauen ausgezackten Flügeln, mit wellenförmigen braunen Streifen. Die Unterflügel am Grundtheile braunroth, auf den Oberflügeln ein weißlicher Flek.

Schaeff. Icon. t. 100. f. 5. 6. *Sphinx alis angulatis* 5 et 6, der 5te und 6te *Dämmerungsfalter* mit ekkigen Flügeln.

Merian. Eur. t. 37.

Sebae Thef. IV. t. 53. f. 5. *Inquieta alis erosis*; t. 54. no. 1. 2. t. 59. f. 7-10. *Sph. Populi Variat.*

3. *Tiliae*, der *Lindenschwärmer.*

Müller l. c. p. 636. no. 3. der *Lindensauger.*

Füßlin Verz. Schweiz. Inf. p. 32. no. 613. die *Linden.*

— *Magaz. der Entomol.* p. 264. *)

Frisch Inf. VII. p. 3. 1 Pl. Taf. 2.

Die grüne Lindenraupe mit dem dreyekki- gen weißgefäumten Kopf, und den sieben weiß- sen und rothen Streifen an den Seiten samt ih- rem Papilion.

Röfels Insektenbelust. I. Nachtv. 1 Kl. p. 9. t. 2.

Die grüne blaugeschwänzte Lindenraupe mit schiefen roth und gelben Seitenstreifen, nebst ih- rer Verwandlung zum Papilion.

Berlin. Magaz. II. p. 188. no. 20. *Sph. Tiliae*, die *Lindenmotte.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 387. no. 1. *Sph. Tiliae*, die *Lindenmotte.*

Syste-

*) Die Raupen ziehen besonders bey der Häutung, wie die vori- gen des *Sph. Populi*, die Kopfhaut aus, und aus vielen *Pup-* pen sind *Raupenstecher* ausgeflossen (vom Chorherr Meyer).

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 41. no. 3.
Lindenschwärmerraupe, (*Tiliae europ.*) *Lindenschwärmer*. La Cochenille à corne du tilleul, Réaum.

Esper's Schmetterl. II. p. 38. t. 3. Sph. *Tiliae*; f. 1. *Männchen*; f. 2. *Weibchen*; der *Lindenvogel*; der *Lindenschwärmer*.

— — — t. 22. Suppl. 4. f. 3. Var. Sph. *Tiliae*.
Gladbach's Verz. der große *Lindenvogel*.

Kleemann's Raupenkalender p. 51. no. 140. p. 70. no. 198. der *Lindensfanger*; die *Lindennotte*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 457. no. 2. der *Lindenschwärmer*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 257. Sph. *Tiliae*, der *Lindenvogel*.

Fabric. S. E. p. 537. no. 4. Sph. *Tiliae*. Nom. *Linn.*
Larva solitaria, caudata, scabra, antice attenuata, viridis, striis lateralibus, obliquis, sanguineis flavisque.

Pupa obscure fusca.

Scop. Entom. carn. p. 183. no. 467. *) Sph. *Tiliae*.

Long. unc. 1. et lin. 1½. *Lat.* 6½-8.

Alae

*) *Variat*

1. corporis alarumque colore primario corticino utrinque;
2. partium omnium colore primario ochraceo, maculis cervinis;
3. corporis alarumque supra colore primario osseo, maculis ferrugineis, subtus vero potius ferrugineo;
4. alis anticis supra maculis umbrinis, disco subrubente, limbo utrinque fusco-limoniato,
— — subtus basi ferrugineis, limbo virescente,
— — posticis supra nuceis, subtus limbo virescente.

Huic proxima Roeseliana: *Nachtv.* ite Kl. t. 2. f. 5. 6; *huic* etiam uni conueniret descriptio *Linnei*. *Frishii* figura 3. t. 2. Part. VII. alae maculam maiorem subcordatam habet, quam ego nondum vidi.

Alae anticae sinuato-dentatae, maculis duabus obscurioribus, fasciam prae se ferentibus, una majore, aliaque alba, ad apicem basi dente notata.

Bekm. Epit. S. L. p. 160. no. 3. Sphinx Tiliae. Nom. Linn.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 80. no. 2. Le Sphinx du Tilleul.

*Long. 1 pouce. *)*

Sphinx elinguis, alis laceris, superioribus cinereo-virescentibus, fascia obscuriore transversa inaequali, inferioribus fusco-aurantiis.

Réaumur. Inf. Tom. I. t. 2. f. 1. Larva. La Chenille à corne, du tilleul.

Schaeff. Icon. t. 100. f. 1. 2. Sphinx alis angulatis 2 et 3; 2ter und 3ter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 246. t. 3. f. 7. Papillon-bourdon du tilleul.

— à antennes prismatiques et à très-petite trompe; à ailes étroites et découpées d'un gris couleur de foye avec des taches angulaires vertes, dont les inférieures sont d'un gris jaunâtre.

— *Ueberf. II B. I Th. p. 177. no. 3. t. 3. f. 7. der Lindenschwärmer.*

— mit prismatischen Fühlhörnern, sehr kleinem Saugrüssel, leberfarbiggrauen schmalen ausgezackten Flügeln, mit eckigen grünen Flecken, und graugelblichen Unterflügeln.

*Merian. Europ. t. 74. **)*

— Un

*) Das hierbey angeführte Citat. *Degeer I. p. 694. t. 8. f. 5.* gehört zu No. 3. *Sph. Populi.*

**) Im *Linné* steht hierbey unrichtig t. 24, statt tab. 74.

— Un grand *Papillon nocturne*, d'un jaune pâle, marqué de taches vertes.

Sebae Thes. IV. t. 53. E 4. F 5. G 6. *Inquieta* Tiliarum; *Inquiette* du tilleul.

— — — t. 59. f. 1 - 3.

4. *Ocypete*, der indianische Nebelschwärmer.

Müller l. c. p. 636. no. 4. t. 20. f. 1. der *Wolkenpfeil*.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 344. no. 4.

Corpus ASILI magnitudine, *nebulosum*.

Alae omnes griseo-fuscae, seu *nebulosae*.

— *posticae* supra, pone basin, albae.

5. *Nerii*, der *Oleanderschwärmer*.*)

Müller l. c. p. 636. no. 5. der *Oleandervogel*.

Berlin. Magaz. II. pag. 176. no. 2. *Sphinx Nerii*.

— — p. 191. Anm. 2. die *Oleandermotte*.

Frisch Inf. VII. p. 5. 1 Pl. t. 3. die *Oleanderraupe*.

Röfels Insektenbel. III. pag. 85. t. 15. 16. die zu der Nachtv. iter Kl. gehörige und schöne *Oleanderraupe*, nebst derselben Verwandlung in einen sehr prächtigen *Papilion*.**)

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 42. D. no. 1. *Lorbeerrosenschwärmerraupe* (*Nerii Oleandri*); *Lorbeerrosenschwärmer*.

Neuer Schaupl. der Nat. VI. p. 239. *Sphinx Nerii*, *Oleandervogel*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 364. no. 2. *Sphinx Nerii*, *Oleandervogel*.

Espers

*) Soll in manchem Sommer bey *Berlin* nicht so sehr selten seyn; vergl. *Espers* Schmetr. II. p. 46.

**) Etwas zu schönfarbig gemalt.

Espers Schmetterl. II. p. 43. t. 4. der *Oleandervogel* (Weibchen).

Gladbachs Verz. der *Oleandervogel*.

Kleemanns Raupenkalender p. 63. no. 178. p. 80. no. 129. der *Oleandervogel*.

Onomat. hist. nat. P. 7. p. 247. *Sphinx Nerii*, der *Oleandervogel*.

Behm. Epit. S. L. p. 160. no. 5. *Sphinx Nerii*. Nom. *Linn.*

— — physik. oekon. Bibl. V. p. 156. der *Oleandervogel* (*Sph. Nerii*) — im Garten am *Laurus Tinus*.

Fabric. S. E. p. 538. no. 5. Nom. *Linn.*

Larva solitaria, caudata, alba, punctata, collo ocello utrinque coeruleo, cauda deflexa, subarticulata.

Pupa flava, linea dorsali, punctisque lateralibus nigris.

Schaeff. Icon. t. 100. f. 3. 4. *Sphinx alis angulatis* 4, der 4te *Dämmerungsfalter* mit eckigen Flügeln.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 51. t. 224. Fig. D. *Sph. Nerii* — sur la côte de *Coromandel*.

2. *Alis integris*, ano *simplici*: mit ungezähnelten Flügeln, und unbehaartem After.

Espers Schmetterl. II. p. 50.

Zweite Familie: *Sph. leg. alis integr.* ächte glattflügelichte *Abendschmetterlinge* mit gleichem Rand.

Erste Linie p. 51.

Ano *simplici*, einfacher *Endspitze*; les *Sphinx Eperviers*; *Sphinges accipitrinae*.

6. *Convolvuli*, der *Windigschwärmer*.*)

Müller l. c. p. 637. no. 6. der *Windenschmetterling*.
(Indien unrichtig für dessen Vaterland angegeben.)

Berlin. Magaz. II. p. 176. no. 3. *Sph. Convolvuli*,
der *Windigvogel*.

Braungrau, mit vielen irregulären dunklen Zeichnungen. Der Hinterleib auf jeder Seite einige blaßrothe Flekke.

— — p. 192. Anm. 3.

Füßlins Verz. Schweiz. Inf. p. 32. no. 614. der *Windigvogel*.

Die *Raupe* in den Kornfeldern, und nährt sich vom *Windig*. Nicht selten.

K 2

Füßlins

*) Saugt gewöhnlich an tiefen Kelchblumen. Daher der Saugrüssel bey einigen 5 bis 6 Zoll lang. Unter den Haaren des Bruststücks und Rückens überaus schön gebildete Federn fürs Mikroskop. Kommt in manchem warmen späten Herbst in ungeheurer Menge aus: riecht von ferne wie Bisam, daher ihn einige den *Bisamvogel* nennen; geht des Abends schaarweise nach den Schweizerhosenblumen, und ist bey Mondschein leicht zu fangen. Seine Augen phosphorisiren, und leuchten des Abends wie eine Kohle. Da die Puppen aller Sphinxen, die einen langen Saugrüssel haben, vorn eine Nase tragen, worinn ein Theil des Rüssels verborgen liegt; so ist auch diese Puppe des *Convolvuli* damit versehen. Er holt aus der *Julappe* mit langen Blüthen (*Mirabilis Longiflora* Linn.) die innersten Feuchtigkeiten heraus, und senkt den langen Rüssel in das enge Trichterbehältniß hinein. Dies darf man nur zudrücken; so ist der Rüssel gefaßt, und der Vogel gefangen. Er kriecht auch ganz in den größern Trichter der *Datura Metel* L. Drückt man die sehr weite Korolle derselben zusammen; so ist er wie in einer Türe gefangen. Im Herbst 1775 war er bey Berlin so häufig, daß er des Abends nach dem Lichte in den Gartenhäusern flog, und in die Zukkerassierten fiel.

Fleißlins Magazin der Entomol. I B. p. 262. Sphinx
Convolvuli.

Verschiedene Spielarten. Unvollkommene
Verwandlungen. Der Vogel fliegt des Abends
schaarweise nach den Kürbisblumen (Chorherr
Meyer).

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. pag. 49. t. 7.
die große geschwänzte Windigraupe mit ihrer
Verwandlung zum Papilion.

— — III. p. 35. §. 4. t. 6. f. 3. Variat. der *Win-*
digraupe.

Espers Schmett. II. p. 52. t. 5. der *Windig* (Männ-
chen).

Gladbachs Verz. der *Windig*.

— Beschreib. der Schmett. p. 29. t. 13. f. 1. 2. der
Windig (Weibchen).

Kleemanns Raupenkalender p. 72. no. 203. der *Win-*
digvogel; der *Sperling*.

Bonnets und anderer Abhandl. aus der Insektol.
p. 95. no. 9. *Eidexe* (Raupe).

Naturforscher I. pag. 233. der große *Abendvogel*;
Sph. Convolvuli. (*Meineke*.)

Degeer Inf. Ueberf. I Th. 1 Qu. p. 12. 45. 57.

Breßl. Samml. Novemb. Cl. 4. Art. 7. §. 8. 1722.
der *schnellfliegende, unbeständige, schnorrende*
Molkendieb.

Hollar Inf. t. 3. f. 1. *Sph. Conv.* (*Naturf.* IX. p. 222.)

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 41. B.
no. 1. *Windeschwärmerraupe* (*Convolvuli arvens.*);
Windeschwärmer: *Sph. Convolvuli*.

Beschäft. der Berlin. Gesellsch. Naturforschender
Freunde III. p. 38. (*D. Kühn*.)

Ungeheure Vermehrung derselben im An-
fange des Mayes, und zu Ende des Augusts:
zweymal in einem Jahre.

Gleditsch

Gleditsch Forstwiss. II. p. 934. no. 3. *Sph. Convolvuli*;
der *Abendvogel* der kleinen *Akkerwinde*; der
Windigvogel.

Auch in den Gärten auf der *Mirabilis* Ja-
lappa.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. pag. 364.
no. 3. *Sph. Convolvuli*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 457. no. 3. der *Win-*
denschwärmer.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 257. *Sph. Convolvuli*,
der *Windenvogel*.

Jac. *Trew* Obss. de *Erucis magnis Convolvuli ma-*
joris albi: in *Commerc. Norib.* 1733. pag. 316.
c. figg.

List. Goed. p. 68. f. 27. *Larva*.

Bekm. Epit. S. L. p. 160. no. 6. *Sphinx Convolvuli*.
Nom. *Linn.*

Poda Mus. graec. p. 80.

Scop. Entom. carn. p. 184. no. 468. *Sph. Convolvuli*.

Long. unc. 2. *Lat.* unc. 1.

Lingua alarum anticarum longitudinem supe-
rans; abdominis acuminati latera fasciis rubris
et nigris alterne variegata.

Apud nos non rara.

Fabric. S. E. p. 544. no. 27. *Sph. Convolvuli*.*)

Alis integris nebulosis; *posticis* subfasciatis;
abdomine cingulis rubris, atris albisque.

K 3

Larva

*) Bey diesem hat *Fabr. Sepp* III. t. 4. angeführt, dessen Abbil-
dung aber den *Sph. Ligustri* vorstellte. Der *Sphinx* beym *Dru-*
ry I. t. 25. f. 4. den *Fabric.* auf *Convolv. Esper* aber auf *Ligu-*
stri gezogen hat, ist weder der eine, noch der andere, son-
dern eine besondere ausländische Gattung, die zwar von bey-
den etwas ähnliches, aber doch ihren eigenen Habitus und
Karaktere hat. S. unter den neuen No. 41. *Sph. Affinis*.

Larva caudata, vtrunque lineis lateralibus obliquis albis punctisque subocellatis.

Pupa brunnea, cornu reflexo, involuto.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1336. *Sph. Convolvuli*. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 86. no. 9. Le *Sphinx à cornes de boeuf*.

Long. 2 pouces.

Sphinx spirilinguis, alis omnibus fuscis; fasciis dentatis obscurioribus; abdomine fasciis transversis rubris.

Ses antennes grosses, longues de dix ou douze lignes.

Schaeff. Icon. t. 98. f. 1. 2.

Sphinx alis integris cauda simplici nona, neunter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanz.

Merian. Europ. t. 75. Gros Papillon nocturne. *)

Sebae Thes. IV. t. 52. fig. QR. Inquieta, Nostratibus

Merveille de Perou dicta.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 55. t. 225. fig. D. *Sph.*

Convolvuli — sur la côte de Coromandel.

7. *Carolina*, der karolinische Schwärmer.

Müller l. c. p. 637. no. 7. der karolinische Pfeilschwanz.

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 84. tab. 7. B. f. 2. der Vogel; f. 3. Raupe; f. 4. Puppe.

Der karolinische Abendvogel.

Linn.

*) Die römischen Buchstaben, welche die *Merianin* auf den Flügeln will gesehen haben: C B V M, sind wohl ein Spiel der Einbildung. Man kann, wenn man will, noch mehrere darauf entdecken.

Lin. Mus. Lud. Vlr. p. 346. no. 6. *Sphinx Carolina*.
Corpus mediae magnitudinis; statura *Convoluti*.

Caput cinereum.

Antennae albae.

Thorax cinereus.

Abdomen cinereum.

Ocelli 6 parium lutei, iride nigra, in dorso abdominis, scilicet in singulo segmento duo locati.

Puncta alba trium partium, in medio dorso, inter segmentorum ordines.

Tibiae anticae barbatae, introrsum callosae.

ALAE primores supra cinereo - nebulosae, punctum album in medio.

— — — *subtus* cinereae.

Margo posticus punctis septem albis.

— *posticae supra* fusco - cinereae.

Fascia una alterave albo - cinerea.

— — *subtus* cinereae.

Lineae duae undulatae transversae.

Margo posticus albus.

Merian. Sur. t. 57.

Drury Illustr. of natur. hist. Vol. I. p. 52. t. 25. f. 1.

Sph. Carolina.

Il déploye ses ailes environ *cinq* pouces. Je l'ai reçu de la nouvelle York, où ils engendrent en Juin et Septembre; je l'ai reçu aussi de la Maryland, la Virginie, et St. Christopher.

8. *Ligustri*, der *Ligusterschwärmer*.*)

Müller l. c. p. 638. no. 8. der *Hartriegel*.

K 4

Füß.

*) Ich habe schon oben erinnert, daß der *Drurysche* *Sphinx* l. t. 25. f. 4. weder dieser, noch der *Conv.* sey.

Füeslins Verz. schweiz. Inf. p. 32. no. 615. der *Ligustervogel*.

Etwas selten.

— *Magazin der Entomol.* I. p. 265.

Die Puppe liegt oft ein Jahr über (*Chorherr Meyer*).

Berlin. Magaz. II. p. 178. no. 5. *Sph. Ligustri*, der *Ligustervogel*.

Der Hinterleib mit sechs rosenrothen, und sechs braunen Queerstreifen geziert. Die Oberflügel bald hell, bald dunkelbraun. Die Unterflügel röthlich mit schwarzen Queerstreifen.

Röfels Insektenbel. III. p. 25. t. 5. die zu der Nachtvögel iten Kl. gehörige *Ligusterraupe*, oder die schöne geschwänzte grüne Raupe, mit sieben Paar schrägen Seitenstreifen, so halb purpurfarb, und halb weiß sind, nebst ihrer Verwandlung zum Papilion.

Bonnets und anderer etc. Abhandlungen aus der Insektol. p. 95. no. 6. der *Sphinx*, oder die *Ligusterraupe*.

Breßl. Samml. 1723. Julius Cl. 4. Art. 4. no. 6. Abbild. der Raupe, Puppe und Vogels.

Swammerd. Bib. der Nat. p. 223. et 388. 389. Tab. 29. f. 1. Raupe; f. 2. Puppe; f. 3. der *schnellfliegende Zwiefalter*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 342. *Sph. Ligustri*, die *Ligusterraupe*.

— — II. p. 891. no. 1. *Sph. Ligustri*, die *Ligusterraupe*; der *Abendvogel von der Ligusterraupe*. — p. 933. no. 2. der *Ligustervogel*.

Klee-

Mit den Puppen des Ligustervogels hat *Lyonet* wegen des *Athemholens* besondere Versuche angestellt. S. *Degeerische Uebers.* I Th. I Qu. p. 35. ff. *Neue Mannichf.* III. Jahrg. p. 50. *Lyonet* sur Lesser I. p. 78.

Kleemanns Raupenkal. p. 62. no. 175. p. 79. no. 227.
der *Ligustervogel*.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 41. B.
no. 2. *Rainweidenschwärmerraupe* (*Ligustri* vul-
gar.); *Rainweidenschwärmer*.

Gladbachs Verzeichn. der *Liguster*.

Ioh. Bauhin Abh. von den schädlichen geflügelten
Thieren, 1593. (Orig. Franz.)

Espers Schmetterl. II. pag. 61. t. 6. der *Liguster*-
vogel.

Blumenbachs Handb. der Nat. G. p. 364. no. 4. *Sph.*
Ligustri.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 246. *Sph. Ligustri*, der
Ligustervogel.

Bekm. Epit. S. L. p. 160. no. 8. *Sph. Ligustri*.

Système naturel du Regne anim. II. p. 141. Genr. II.
no. 1. *Sphinx*.

Raj. Hist. Inf. pag. 144. no. 1. *Phalaena maxima*
caudacuta; alis angustis longis acutis; abdomine
roseo, sex septemve areolis transversis nigris.

— — p. 362. no. 62. *Eruca glabra maxima*,
viridium nobilissima.

Fonst. Inf. t. 19. f. 1. 2. *Eruca viridis Ligustrina*.

List. Goed. p. 71. f. 25. (Papilio.)

Biblioth. Reg. Paris. p. 24. f. omnes.

Réaum. Inf. Tom. I. t. 14. f. 1. (Papilio); Tom. II.
t. 20. f. 1. 2. 3. 4. Le *Sphinx*, ou la Chenille
à corne du *Troënne*.

Geoffr. Inf. II. p. 84. no. 7. Le *Sphinx* du *Troënne*.
Long. 22 lign.

Sphinx spirilinguis; alis superioribus fuscis;
inferioribus, abdomineque fasciis transversis ru-
bris.

Sepp Nederl. Inf. III St. p. 15. Tab. III. fig. 1. Ey;
fig. 2. *Embryo*; f. 3. das aus dem Ey gefallene

Räupchen; fig. 4. etwas größere Raupe; fig. 5. ausgewachsene Raupe.

Sepp Nederl. Inf. III St. p. 15. Tab. IV. f. 1. Puppe; f. 2. 3. Vogel; de Liguster-Pylstaart-Vlinder.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 344. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 116. no. 1337. Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 545. no. 28. *Sph. Ligustri.* Nom. *Linn.*

Larva caudata, viridis, striis lateralibus obliquis, antice incarnatis, postice albis — quiescit corpore antico erecto, pedibus elevatis.

Pupa fusca, cauda quadridentata. *)

Scop. Entom. carn. p. 185. no. 470. *Sphinx Ligustri.*

Long. unc. 1. et lin. $8\frac{1}{2}$. *Lat.* lin. 11.

Alae posticae supra rufae, fasciis binis nigris. Abdomen rosatum. Linea dorsali et fasciis lateralibus utrinque quinque atris.

Degeer Inf. Tom. I. p. 14. t. 1. f. 6. La Chenille à corne du Troëne du lilas et de la spiræa.

— *Uebersf.* I Th. 1 Quart. p. 17. t. 1. f. 6. *Liguster-raupe.*

— — — — p. 35.

— Tom. II. P. I. p. 238. no. 5. *Papillon-bourdon du Troëne.*

A antennes prismatiques, et à longue trompe, dont les ailes supérieures sont brunes à nuances gris-blanchâtres, et les inférieures avec le ventre couleur de rose à bandes noires.

Der Ligusterchwärmer mit prismatischen Fühlhörnern, langem Saugrüssel, braun und grauweißlich schattirten Oberflügeln, und rosenfar-

*) Dies letztere hat man *Röseln* nachgesagt; es findet sich aber dergleichen nicht an der Schwanzspitze der Puppe. *S. Espers* Schmetz. II. p. 67. Anm.

senfarbigen, schwarzbandirten Unterflügeln und Hinterleibe.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 239. *Chenille verte à corne, avec sept bandes obliques violettes et blanches sur les côtés du corps.*

— *Uebers.* p. 172. die grüne gehörnte Raupe mit sieben schrägen violetten und weissen Seitenbinden des Körpers.

Merian. Europ. p. 63. no. 124. t. 124. Raupe, Puppe, Vogel.

Sebae Thes. IV. t. 53. fig. O P. *Inquieta Ligustrina; Liguster-Onruß* — t. 55. f. 13-15. t. 60. f. 19. 20.

9. *Atropos, der Todtenkopfschwärmer.*)*

Müller l. c. p. 638. no. 9. t. 14. f. 3.

(Falsch, daß die Raupe schwarz sey.)

Füßelins

- *) Lange ist die Raupe und der Vogel in unserm Vaterlande eine Seltenheit gewesen, weil man sie entweder nicht gesucht, oder nicht zu finden gewußt hat. Es ist nichts leichter, als die Raupe zu finden, wenn man ihre Oekonomie erst weiß. Sie gehört zu denen, welche bey Tage in der Erde stecken, des Abends gleich nach Untergang der Sonne hervorkommen, die Nacht durch fressen, und des Morgens bey Aufgang der Sonne wieder in die Erde gehen. Sie ist fast allenthalben anzutreffen, wo Hanf und Kartoffeln gebauet werden; auch im vorigen Sommer 1779, von dem jüngern *Graf von Borke* zu Stargoort in Hinterpommern auf den Kartoffelfeldern gefunden worden. Wie häufig sie in unsern Gegenden sey, erhellet daraus, weil *Monf. Sporon* zu Magdeburg im vorigen August über 70 Puppen zusammen- und alle glücklich ausgebracht hat. Da das Insektenstudium nun einmal auch ein *Handel* geworden, so verläßt er das Stück zu 2 Rthlr. Die eigentliche Methode, die Raupe zu finden, haben wir dem Herrn Prorekr. *Meineke* zu Quedlinburg zu danken. S. *Naturforscher* XIII. pag. 176. Sie bestehet kurz darinne: Man durchsucht am Tage die Kartoffelfelder, und zeichnet die angefressenen Stauden, unter welchen

Hüeslins Verz. Schweiz. Inf. p. 32. no. 616. Sphinx
Atropos, der Todtenkopf.

Alle Jahr, besonders auf dem *Hanf* die Raupe gefunden.

— Magaz. der Entomol. I. pag. 85. *Todtenkopfschwärmer.*

Röfels Insektenbel. III. p. 1. t. 1. 2. die zu der Nachtvögel 1 Kl. gehörige ungemein große, und mit Gelb und Blau wunderschön gezielte Jasminraupe,

welchen gemeinlich die großen Excremente der Raupe auf der Erde liegen, damit man sie des Abends wiederfinden kann. Gleich nach Untergang der Sonne gehet man an die gezeichneten Stellen, so wird man die Raupe gewiss entweder an eben der Straude, oder an dem dichte dabey stehenden Strauche finden. Man füttere sie in einem großen, halb mit feuchter Erde angefüllten Zuckerglase mit Kartoffelblättern, bis zur Verwandlung, die in der Erde geschieht. Die Puppe muß einige Tage ungestört in der Erde liegen, hernach grabe man sie aus. und mache ihr in einem Blumentopfe auf feuchtem Moos, darinn aber keine Milben stecken müssen, unter dem Ofen, oder in der Mittagssonne, ein warmes Lager; so wird der Vogel noch in demselben Herbst auskommen. In den Blumentopf stecke man eine rundgebogene Pappe, die noch einmal so hoch perpendicular herausstehet, damit der Vogel bey dem Auskommen in die Höhe kriechen, und sich gehörig entledigen kann; sonst bleibt er leicht ein Krüppel. Wenn die Raupen einander zu nahe kommen, so zischen sie, wie schon *Skopoli* bemerkt hat, und beißen sich auch unter einander. Das *Wimmern* des Vogels soll, wie *Réaumur* glaubte, durch das Reiben der Bartspitzen am Saugrüssel geschehen; wahrscheinlicher aber mit der Zunge, als durch das Reiben des Bruststücks. S. *Bekmanns* phys. oekon. Bibl. 8 B. p. 12. vergl. *Sulzers* Gesch. p. 121. *Sph. Atropos*, *Todtenvogel*; Uebers. des *Degeer* II B. I Th. p. 174. Anm.

Einer kleinern *Todtenkopfsphaliäne* gedenkt Herr *Kleemann* in seinen Beytr. I. p. 185. t. 22. f. 5. 6.

raupe, nebst ihrer Verwandlung in den sogenannten *Todtenvogel*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 234. §. 5. Nachricht von der *Jasminraupe*.

Kühns Anleit. Insekten zu sammeln p. 71. Von Erhaltung der *Todtenkopfspuppe* im Winter. *)

Kleins Naturfeltenheiten des Königreichs Ungarn, p. 69. §. 102. der *Todtenkopf*.

Kleemanns Raupenkal. p. 62. no. 174. p. 79. no. 226. der *Todtenkopf*.

Berlin. Magaz. II. p. 176. no. 1. Sph. *Atropos*, der *Todtenkopf*.

Die Grundfarbe der Oberflügel dunkel und hellgrau, mit oraniengelben Flekken; die Unterflügel oraniengelb mit schwärzlichen Zeichnungen. Auf dem Rücken die Figur eines *Todtenkopfs*.

— — p. 190. no. 1. Anm.

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Insekto-
tol. p. 94. no. 2. Sph. *Atropos*, der *Todtenkopf*.

Allgem. Magazin der Natur etc. IX. p. 331. *Todtenkopf* (Gegenstand des Aberglaubens).

Neue Mannichfaltigk. I Jahrg. p. 326. *Todtenkopf*.

Reise eines franzöf. Officiers nach den Inseln Frankreich etc. p. 95. **)

Neuer

*) Wenn die Raupen sich zu Ende des Augusts verwandeln, und ein warmer Herbst erfolgt: so kömmt der Vogel noch im September aus; wo nicht, so liegt die Puppe den Winter durch, und der Vogel erscheint erst im folgenden Frühjahr.

**) Man hat hier (auf der Insel Frankreich) einen grossen Nachtzweifalter, der auf der Brust die Gestalt eines *Todtenkopfs* trägt. Man nennt ihn *Au!* (Haï.) Er fliegt in die Zimmer. Man behauptet, daß der Staub seiner Flügel die Augen, die er trifft, blind macht. Sein Name kömmt von dem Erschrecken her, das seine Erblickung verursacht.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 429. *Sph. Atropos*,
Todtenkopf.

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. pag. 89. *Todten-*
kopf.

— — III. p. 493. t. 113. f. 1. 2. *Raupe*; f. 3. *Pup-*
pe; f. 4. *Exkrement*; f. 5. 6. *Vogel*.)

Atroposschmetterling; *Atroposvogel*; *Tod-*
tenkopf.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 891. no. 2. *Sph. Atropos*;
caput mortuum; der *Todtenkopf*.

— — p. 933. no. 1. *Sphinx Atropos*, der
Todtenkopf, *Todtenvogel*.

Naturforscher IX. p. 93. §. 4. (D. Kühn) von der
Todtenkopfsraupe, wie sie zur Verwandlung zu
 bringen.

— — XIII. p. 176. §. 2. (Konr. Meineke)
 Nachr. von der *Raupe* des *Sph. Atropos*, wie sie
 zu finden.**)

Gladbachs Verz. der große Todtenkopf.

Espers Schmett. I. p. 27. *Todtenkopf* (stammt aus
 Egypten).

— II. p. 69. t. 7. der *Todtenkopfschmetterling*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 365. no. 5. der
Todtenkopf.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 22. *Stech-*
apfelschwärmer; p. 41. B. no. 4. *Stechäpfelschwär-*
mer.

*) Unter den *Citatis* daselbst p. 494. findet sich ein falsches: *Brest*.
Samml. 1720. Aug. Art. 8. pag. 219. f. 1-4. *Raupe*, welche die
 große *Nasselraupe* heißt. Es ist aber nicht die *Raupe* des *Sph.*
Atropos, sondern der *Phal. Bomb. Quercifolia* L. no. 13. welche
Frisch Inf. III. p. 24. no. 12. 3te Platte t. 1-6. die größte brau-
 ne *Raupe* nennet.

**) Der Drukfehler pag. 177. Z. 9. in einem mit *Marmor*, und
 nicht etc. fällt in die Augen.

merraupe (*Daturae Stramonis*); *Stechäpfelschwärmer*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 457. no. 4. der *Todtenkopfschwärmer*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 232. Sph. *Atropos*, der *Todtenkopf*; der *Todtenvogel*.

Beckm. Epit. S. L. p. 160. no. 9. Sph. *Atropos*, der *Todtenkopf*.

Cardanus de Subtil. Lib. 9. p. 501. ed. Basil. 8.

(Die Raupe als ein Wurm, der aus dem Nachtschatten (*Solanum*) oder auch aus dem *Jasmin* wächst.)

Aldrov. de Inf. p. 105. ed. Francof. fol. p. 96.

(Aus der Raupe ein Papilion mit einem Fleck, der einem *menschlichen Hirnschedel* ähnlich gesehen.)

Réaum. Inf. I. t. 14. f. 2. II. t. 24. *Sphinx à tête de mort*.

Scop. Entom. carn. p. 184. no. 469. Sph. *Atropos*.

Long. unc. I. et lin. II. *Lat.* unc. I.

Bicolor, nempe ochracea, et nigricans; antennae tamen, apex et punctum medium alae anticae supra alba sunt. Alae posticae fasciis binis nigris utrinque.

Irritata *stridet* ut *Cerambyx*.

Larva irritata *stridet*.

Fabric. S. E. p. 539. no. II. Sph. *Atropos*. N. *Lin.*

Larva solitaria, caudata, flava, nigro-punctata; lineis lateralibus transversis, dimidiato-coeruleis viridibusque, cauda deflexa.

Pupa brunnea, stigmatibus utrinque quinque nigris.

Geoffr. Inf. II. p. 85. no. 8. Le *Sphinx à tête de mort*.

Long. 2 pouces $\frac{1}{3}$. *Larg.* 9 lign.

Sphinx spirilinguis, alis superioribus fusconebulosis, inferioribus abdomineque fasciis transversis.

versis luteis; thorace maculis *caput mortuum* referentibus.

Schaeff. Icon. t. 99. f. 1. 2. *Sphinx* alis integris cauda *simplici* decima, zehnter *Dämmerungsfalter* mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanz.

Degeer Inf. II. P. I. p. 242. Le *Papillon-bourdon à tête de mort*.

— Uebersf. II B. I Th. p. 174. der *Todtenkopf*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 123. t. 78. fig. A. *Sph. Atropos* — de *Batavia*; du *Cap de Bonne Espérance*; de *Suriname*.

— — Vol. III. p. 74. t. 237. fig. A. *Sph. Atropos* — sur la côte de *Bengale*. *Varietas*.

Houttuin Nat. Hist. I Deel XI St. p. 424. no. 8. t. 84. f. 3. la *Chenille* (schwarz angegeben).

10. *Capensis*, der kapensische Schwärmer.*)

Müller l. c. p. 638. no. 10. *kapischer Pfeilschwanz*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 84. der *kapische Abendvogel*; die *Kapmotte*.

Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 349. no. 9. *Sphinx Capensis*.

Corpus magnitudine *Ligustri*; cinerascens.

Antennae subfiliformes, rufescentes, apice acuto, uncinato; superciliaris regio albida.

Abdomen cinerascens, immaculatum, laevigatum, acutiusculum.

Pedes cinerascens.

Alae primores supra canescentes, immaculatae.

— — — *subtus* rubrae, sed limbo exteriori cinereo, et margine tenui, ad basin vix albo.

— *posticae* supra rubrae, versus basin extrorsum albae.

— — *subtus* cinerascens, vix rubicundae.

11. *Cari-*

*) Nicht abgebildet.

II. *Caricae*, der *Papajabaumschwärmer*.

Müller l. c. p. 639. no. II. t. 20. f. 2. der *Papajenvogel*.

Fabric. S. E. p. 547. no. 35. Nom. Linn. Sph. *Caricae*.

Larva viridi-flava, variegata.

Pupa testacea.

Merian. Surin. t. 64.

Cramer Pap. exot. IV. p. 73. t. 46. fig. E. Sph. *Cacus*
— de *Suriname*.*)

Fabric. Mantiss. p. 273. no. 6-7. Sph. *Cacus* Crameri.

Alis dentatis nigris, *strigis tribus approximatis pallidis*,**) *posticis* flavis nigro-striatis.

12. *Celerio*, der *Phoenixschwärmer*.

Müller l. c. p. 639. no. 12. t. 20. f. 3. der *Traubenlekker*.

Füßlin's Verz. Schweiz. Schmetterl. p. 32. no. 617.
Sph. *Celerio*, der *Phoenix*.

In den italiänischen Vogteyen.

Kleemanns Raupenkal. p. 53. no. 143. p. 71. no. 200.
der *Phoenix*.

Berlin. Magaz. II. p. 182. no. 12. Sph. *Celerio*, der
Phoenix.

Braun,

*) Unter den Zusätzen im 8ten Heft p. 155. findet sich, daß Cramer diesen Sphinx mit dem Sph. *Caricae* L. für einerley hält. Die Abbildung entspricht der Beschreibung des Ritters vollkommen; nur der einzige Unterschied bestehet darinn, daß L. sagt: *alis integris*; daß er aber bey Cramer *alas denticulatas* hat. Daher hat ihn auch Fabricius in seiner Mantissa für eine eigene Art angesehen.

**) Dies ist der Linnéische Ausdruck: *Alae superiores fuscae, vennis atris, undato-fusciatae*.

- Braun, mit gelben und weissen Strichen; die Unterflügel an der Einlenkung roth.
- Frisch* Inf. XIII. p. 4. no. 2. 1 Pl. t. 2. von der *braunen Weinblattraupe* und ihrem Papilion.
- Röfels* Insektenbel. IV. p. 59. t. 8. der, aus der, mit zwey Augenspiegeln gezierten Weinraupe entspringende, schöne, braune, mit rosenroth gefleckten Unterflügeln prangende, und zur ersten Klasse der Nachtvögel gehörige Papilion.
- Bonnets*, und anderer etc. Abhandl. aus der Insekto-
tol. p. 95. no. 8.
- Naturf.* I. p. 243. Sph. *Celerio*. (Conr. *Meineke*.)
- System. Verz.* der Schmett. der W. G. p. 42. C. no. 2.
Weinstokschwärmerraupe (*Vitis viniferae*);
Weinstokschwärmer.
- Esper*s Schmetterl. II. p. 83. t. 8. f. 1. 2. 3. fig. 4. *Variet.* der *große Weinvogel*; der *große Weinraupenfalter*.
- Sphinx *Livornica*.
- Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 365. no. 6. Sphinx
Celerio, der *Phoenix*.
- Gladbachs* Katal. der *rare große Weinvogel*.
- Onomat. hist. nat.* P. VII. p. 236. Sph. *Celerio*, der
Phoenix.
- Behm.* Epit. S. L. p. 160. no. 12. Nom. *Linn.* Sph.
Celerio, der *Phoenix*.
- List. Goed.* f. 26. *Raupe und Puppe.* (Erstere der
Elephant.)
- Raj.* Hist. Inf. p. 159. no. 9. *Phalaena media*, alis
longis angustis; *exterioribus* lineis et areolis ni-
gris albis, atro-rubentibus transversis pulchre
depictis; *interioribus* obscure-rubris (*Prick-tail*
Eruca). *)

Fabric.

*) S. *Esper* II. p. 88.

Fabric. S. E. p. 545. no. 30. Sph. *Celerio*.

Alis integris griseis, striis albis; *posticis* fuscis, maculis sex rubris.

Larva caudata, fusca, lineis duabus lateralibus albis, ocellisque utrinque duobus collaribus.

Pupa antice fusca, postice brunnea.

Cramer Pap. exot. XI. p. 124. t. 125. fig. E. Sph. *Celerio* — à la côte de *Coromandel*, à *Tranquebar*, et au *Cap* de B. E. *)

13. *Ello*, der indianische *Ello*schwärmer.

Müller l. c. p. 639. no. 13. der *Dikrand*.

Fabric. S. E. p. 538. no. 7. Sph. *Ello*.

Alis subdentatis — cet. *Linn.*

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 59. t. 27. f. 3. Sph. *Ello*.

Il déploie ses ailes près des trois pouces et demi — de *St. Christopher*.

14. *Labruscae*, der amerikanische rothe *Weinstock*schwärmer.

Müller l. c. p. 639. no. 14. der *Weißpunkt*.

Fabric. S. E. p. 546. no. 34. Nom. *Linn.*

Larva caudata, brunnea, albo-maculata; postice ocello albo.

Merian. Surin. t. 34.

L 2

Cramer

*) Der Hinterleib braun, mit doppelten Silberstrichelchen; die Oberflügel braun, mit einer längsziehenden Silberstreife, die Unterflügel schwarzbraun, mit sechs halb rothen, halb weiß-graulichen Flekken, bey der Einlenkung hochroth, mit einem Silberrande. Der ganze Habitus aber des *Celerio*: vid. *Esper* II. p. 90. t. 22. Suppl. 4. f. 1. Sph. *Indiae orientalis*; vulgo *Variet. Sph. Celerio.* (Tab. 8.)

164 *Insecta Lepidoptera*. 232. *Sphinges legitimae*.

Cramer Pap. exot. XVI. p. 133. t. 184. fig. A. *Sphinx Labruscae* — de *Suriname*.*)

15. *Ficus*, der *amerikanische Feigenschwärmer*.

Müller l. c. p. 639. no. 15. der *Feigennascher*.

Fabric. S. E. p. 540. no. 13. Sph. *Ficus*.

Alis fusco-nebulosis; *posticis* fascia nigra, anguloque ani albo.

Larva viridis, flavo-lineata, capite caudaque nigris.

Pupa brunnea.

Merian. Surin. t. 33.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 44. t. 26. f. 1. Sph. *Ficus*.

Le *Mâle* déploie ses ailes presque cinq pouces; la *Femelle* six — de la *Jamaïque*.

16. *Vitis*, der *amerikanische Weinstokschwärmer*.

Müller l. c. p. 640. no. 16. t. 20. f. 4. der *Weintrinker*.

System. Verz. der Schmett. der W. G. Titelpuffer. Erkl. p. 238. §. 4. Sph. *Vitis*.

Füßlins Magaz. der Entom. p. 212. Sph. *Vitis*.

Sulzers abgek. Gesch. p. 151. t. 20. f. 1. Sph. *Fasciatus*, der *Bandirte*.**)

Merian. Surin. t. 47.

Drury

*) In der Abbildung Körper und Oberflügel ganz dunkelgrün, und die Unterflügel roth, schwarz, gelb und blau schattirt. Mit der Zeit verblasst alles ins Braungelbe: darnach die *Linnéische* Beschreibung.

**) Diesen hält Herr *Füßly* in dem angezogenen Magaz. mit *Vitis* für einerley.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 60. t. 28. f. 1.

Il déploye ses ailes environ quatre pouces —
en Jamaïque de la St. Christopher.

17. *Elpenor*, der große Weinschwärmer. *)

Müller l. c. p. 640. no. 17. der *Elephantenrüssel*.

Füßlins Verzeichn. schweiz. Inf. p. 32. no. 618. der
Weinvogel.

Die Raupe sehr gemein in den *Weinbergen*;
auch auf dem *Epilobio* (*Weiderich*).

— *Magaz. der Entomol.* I. p. 265. Sph. *Elpenor*.

Die Vögel auf jedem Oberflügel in der Mitte
ein weißes Pünktchen, das *Röfels* Abbildung man-
gelt (*Chorherr Meyer*). **)

Kleemanns Raupenkal. p. 52. no. 142. p. 71. no. 200.
der große *Weinvogel*; der *Elephant*.

Berlin. Magaz. II. p. 180. no. 7. Sph. *Elpenor*, die
große *Weinmotte*.

Die Oberflügel theils rosenfarbig, theils
bräunlichgrün; die Unterflügel roth, an der Ein-
lenkung schwarz.

Frisch Inf. XII. p. 1. 1 Pl. t. 1. f. 1. 2. 3. die grüne
Weinblattraupe mit ihrem rosenfarbigen Papi-
lion.

Stralsund. Magaz. I. p. 242.

Die Raupen vor der letzten Häutung alle grün.
Eine braune und grüne Varietät; alle aber vor
der letzten Häutung grün.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. p. 25. t. 4. die
große geschwänzte und gespiegelte *Weinraupe*,
nebst ihrer Verwandlung zum Papilion.

L 3 *Röfels*

*) Die Raupe mit der Raupe des *Celerio* die größte Aehnlichkeit.

**) *Linn. Faun. Suec.* ed. 2. p. 288. no. 1089. *Punctum niveum*
in medio alae superioris, cui etiam margo interior albus.

Röfels Insektenbel. IV. p. 59. Viel ähnliches mit der Raupe des *Celerio*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 935. no. 4. Sph. *Elpenor*, die große *Weinmotte*.

— — — p. 974. no. 12. die große *Weinmotte*.

Bresl. Samml. 1722. Octobr. Cl. IV. Art. 8. p. 425. große schwarze Raupen auf den *Weinblättern*.

Naturforscher I. p. 243. Sph. *Elpenor* (Meineke).

Hanovs Seltenh. der Nat. I. p. 363-366. Raupe; 367. Vogel.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 43. D. no. 3. Schottenweiderichschwärmerraupe (*Epilobii hirsuti*); Schottenweiderichschwärmer.

Fischers N. G. von Livl. p. 153. no. 344. Elephantenrüssel.

Blumenbachs Handb. der N. G. pag. 365. no. 7. die *Weinraupe*; der große *Weinvogel*.

Espers Schmetterl. II. p. 91. t. 9. f. 1. der gemeine *Weinvogel*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 239. Sph. *Elpenor*, der größere *Weinraupenvogel*.

Bekm. Epit. S. L. p. 160. no. 17. Sph. *Elpenor*.

Systeme Naturel du Regne animal II. p. 141. no. 3. La Cochonne, *Porcellus*; *Phalene de Vigne*.

Raj. Hist. Inf. p. 145. no. 2. *Phalaena maior cauda acuta*; alis angustis acutis, ex viridi fulvo et purpureo rubente colore varia.

— — p. 146. no. 3. *Phalaena caudacuta media*, feu *Prædatrix* prima.

— — p. 281. no. 16. *Eruca Porcellus dicta*, corpore vario.

Petiv. Gazoph. t. 40. f. 11-13. *Phalaena accipitrina Luzonica pulchra* — *Eruca elephantina Luzonica virefcens*, maculis 4 flavis oculatis.

Scop.

Scop. Ent. carn. p. 186. no. 472. Sphinx Elpenor.

Long. unc. 1. et lin. 2. Lat. 7.

Bicolor; paleaceo nempe et pudorino colore tinctus; alis *posticis* supra basi nigris.

Fabric. S. E. p. 543. no. 25. Sph. Elpenor. Nom. Linn.

Thorax viridis, striis quatuor sanguineis.

Larva caudata, fusco maculata, ocellis collaribus, utrinque duobus coeruleis.

Pupa antice obscure grisea, postice fusca, stigmatibus obscurioribus.

*Geoffr. Inf. II. p. 86. no. 10. *)* Le *Sphinx de la Vigne.*

Long. 16 lign.

Sphinx spirilinguis, alis viridi-purpureoque fasciatis, fasciis linearibus transversis.

Schaeff. Icon. t. 96. f. 4. 5.

Sphinx alis *integris* cauda *simplici* octava, achter *Dämmerungsfalter* mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Merian. Europ. p. 39. t. 73.

Sebae Thef. IV. t. 53. fig. H I K. Inquieta Erucae

Elephantinae Elpenoris Linn. t. 55. f. 1. 2?

Degeer Inf. I. Mém. 4. p. 154. t. 9. f. 1. 2.

Grande *chenille* rase, noire, veloutée et à corne sur le derriere, dont le devant du corps est gros, et comme enflé, et qui mange les feuilles de la *Lyfimachie rouge* (*Epilobium*).

— *Uebers. I. 1 Quart. p. 114. t. 9. f. 1. 2.* die grofse, glatte, sammtartige, dikleibige, und auf dem rothen Weiderich lebende Raupe mit dem Rückenhorn.

L 4 *Degeer*

*) *Geoffroy* irrt sich, wenn er hierbey *Frisch XIII. pag. 4. t. 2.* *Eruca vitis brunnea* citirt; denn dies ist die Raupe des *Sphinx Celerio*.

- Degeer* Inf. I. Mém. 4. p. 158. t. 9. f. 8. 9. le Papillon.
 — *Uebersf.* l. c. p. 118. t. 9. f. 8. 9. Sphinx *Elpenor*,
Elephant; *Schweinerüssel*; *Weinvogel*.
 — p. 694. t. 9. f. 8. 9. *Phalene* à antennes prismatiques, d'un verd olive, dont le dessous du corps est couleur de rose.
 — *Uebersf.* 4 Quart. p. 117. t. 9. f. 8. 9. Ein olivengrüner *Nachtfalter*, mit prismatischen Fühlhörnern, der unter dem Bauche rosenroth ist.
 — II. Part. I. pag. 236. no. 3. *Papillon-bourdon*, à antennes prismatiques, et à longue trompe, d'un verd olive, dont les ailes supérieures ont trois bandes obliques couleur de rose, et dont les inférieures sont couleur de rose; mais noires à leur origine.
 — *Uebersf.* II. I Th. p. 170. no. 3. der olivengrüne grofse *Weinvogel*, oder der *Schweinerüssel*, mit prismatischen Fühlhörnern und langem Saugrüssel; auf den Oberflügeln drey schräge rosenrothe Binden; die Unterflügel auch rosenroth, bey der Einlenkung aber schwarz.
Papillon-bourdon grand porceau, das grofse *Schweinchen*.

18. *Porcellus*, der kleine *Weinschwärmer*.

- Müller* l. c. p. 641. no. 18. die *Schweinschnauze*.
Frieslins Verz. schweiz. Schmetterl. p. 32. no. 619. das *Schweinchen*.
 Die Raupe auf dem *Gallio*; bey uns selten.
Kleemanns Raupenkal. p. 50. no. 144. p. 71. no. 201. die kleine *Weinmotte*.
Berlin. Magaz. II. p. 180. no. 8. Sphinx *Porcellus*, die kleine *Weinmotte*.
 Die Oberflügel theils rosenroth, theils oliven-

vengrün, die Unterflügel blafsrofenroth, theils schwarz, theils olivengrün.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 935. no. 5. *Sphinx Porcellus*, die *kleine Weinmotte*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. p. 33. t. 5. die kleinere ungeschwänzte gespiegelte Raupe, und derselben Verwandlung zum Papilion.

Bresl. Samml. 1723. Julius Cl. 4. Art. 4. no. 6. beygef. *Kupfertafel.* Von einer grossen schönkolorirten Raupe, und deren Schmetterling.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 43. D. no. 4. *Labkrautschwärmerraupe* (*Gallii veri*); *Labkrautschwärmer*; *Sphinx Porcellus*.

Fischers N. G. von Livl. p. 150. no. 345. *Schweinschnauze*; *Spiegelraupenschmetterling*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 365. no. 8. die *kleine Weinmotte*.

Espers Schmetterl. II. pag. 97. t. 10. f. 1. der *kleine Weinvogel*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 254. *Sphinx Porcellus*, der *kleinere Weinraupenvogel*.

Behm. Epit. S. L. p. 161. no. 18. *Sph. Porcellus*.

Fabric. S. E. p. 544. no. 26. *Sph. Porcellus*.

Alis integris, flavo-purpureoque variis, abdomine subtus fanguineo, albo-punctato.

Larva ecaudata, fusca, ocellis utrinque tribus collaribus coeruleis.

Pupa nigricans.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1339. *Sph. Porcellus*. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 88. no. 12. Le *Sphinx à bandes rouges dentelées*.

Long. 1 pouce.

Sphinx spirilinguis, alis viridi-purpureoque fasciatis; fasciis ferratis transversis.

Merian. Europ. t. 22?

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 237. no. 4. *Papillon-
bourdon petit pourceau.*

— à antennes prismatiques et à longue trompe, d'un verd d'olive, dont les ailes supérieures ont une bande et deux taches couleur de rose, et dont les inférieures sont brunes à bande olive.

— *Uebersf.* I. 1 Quart. p. 119. Sph. *Porcellus.*

— — II B. I Th. p. 170. no. 4. das *kleine Schweinchen.*

— der kleine olivengrüne *Schweinrüssel* mit prismatischen Fühlhörnern und langem Saugrüssel; auf den Oberflügeln eine rosenrothe Binde, und zweien dergleichen Flekke; die Unterflügel braun mit einer Olivenstreife.

β) *Bombyliiformis*, der *rüsselfliegenartige Schwärmer.* *)

Linn. Syst. Nat. ed. 10. p. 493.

Abdomine coccineo; alis hyalinis luteo-variis; posticis margine albis.

*Esper*s Schmetterl. II. t. 23. Suppl. 5. f. 2. Sph. *Bombyliiformis.*

19. *Euphorbiae*, der *Wolfsmilchschwärmer.* **)

Müller l. c. p. 641. no. 19. der *Wolfsmilchvogel.*

*Fües*slins Verzeichn. Schweiz. Inf. p. 32. no. 642. der *Wolfsmilchvogel.* †)

*Fües*s-

*) Meines Wissens noch nicht abgebildet.

**) Vom Sph *Gallii* zu unterscheiden. S. unter den neuen no. 27. Das *Linn.* Citatum bey diesem: *Degeer* I. t. 8. f. 6-11. Tom. II. P. I. p. 236. betrifft den Sph. *Gallii.*

†) *Fües*slin hat hierbey *Schaeff.* Icon. t. 78. f. 1. 2. und t. 99. f. 3. 4. angeführt; ersterer aber ist offenbar Sph. *Gallii.* S. *Wiener Schmetterl.* p. 146.

Füesflins Magaz. der Entomol. I. p. 266. Sph. *Euphorbiae* (Chorherr *Meyer*).

Frisch Ins. II. p. 43. no. 12. 3 Pl. t. II. von der *Wolfsmilchraupe* und ihrem *Zwiefalter*.

Berlin. Magaz. II. p. 180. no. 9. Sph. *Efulae*, *Euphorbiae*, der *Wolfsmilchvogel*.

Die Oberflügel blassgelb, mit etwas Roth vermenget, und einigen dunkelgrünen grossen Flecken; die Unterflügel schön roth mit einem schwarzen Queerstreif und schwarzen Flecken an der Einlenkung.

— — p. 192. Anm. 4. *)

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. pag. 17. t. 3. die schöne grosse *Wolfsmilchraupe*, und deren Veränderung bis zum *Papilion*.

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Insektol. p. 93. no. 1. die schöne Raupe auf der *Wolfsmilch* mit schmalen zypresenähnlichen Blättern.

Ledermüllers Nachlese der mikrosk. Gem. und Augenergötzung p. 48. 14 Brief t. 26-29. Eine der schönsten Raupen, ihre Verwandlung, und einige besondere Theile ihres *Vogels*.

— t. 26. f. a. *Raupe*; b c *Puppe*; d e *Vogel*.
Breßl. Samml. Jul. 1720. Cl. IV. Art. 5. Aug. Cl. 4. Art. 5. *Affel-* oder *Nasseltaupe*.

Kleemanns Raupenkal. p. 52. no. 141. p. 70. no. 199. die *Hundespoore*; der *Wolfsmilchvogel*.

Naturforscher I. p. 244. Sph. *Euphorbiae*.

— — VII. p. 105. no. 9. Sph. *Efulae* f. *Euphorbiae*, vom Sph. *Gallii* verschieden.

— — X. pag. 110. dessen erstorbene Larven leuchten im Finstern. (Past. *Gronau*.)

Syste-

*) Wo *Hufnagel* schon den Sph. *Gallii* als eine besondere Art beschreibet.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 42. C.
no. 1. *Wolfsmilchschwärmerraupe* (Euphorbiae
Cypariif.) *Wolfsmilchschwärmer*.

Blumenbachs Handb. der N. G. pag. 365. no. 9. die
Wolfsmilchraupe.

Espers Schmetterl. II. p. 100. t. II. f. 2. der *Wolfs-
milchvogel*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 241. Sph. *Euphorbiae*,
der *Wolfsmilchschmetterling*.

Behm. Epit. S. L. p. 161. no. 19. Sph. *Euphorbiae*.

Scop. Entom. carn. p. 186. no. 471. Sph. *Euphorbiae*.
Long. unc. 1. et lin. 4. *Lat.* 9.

Dorsum nuceum, lateribus albis; alae omnes
subtus corpusque rosato colore tinctae, posticae
supra basi fasciaque nigris; anticae subtus macu-
la disci nigra.

Fabric. S. E. p. 541. no. 17. Sph. *Euphorbiae*. Nom.
Linn.

Larva caudata nigra, albo-punctata, linea
dorsali sanguinea, laterali punctisque flavican-
tibus.

Pupa brunnea, stigmatibus nigris.

Schaeff. Icon. t. 99. f. 3. 4.

Sphinx alis *integris* cauda *simplici* undecima,
eiffter *Dämmerungsfalter* mit ganzen Flügeln,
und einfachem Schwanze.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 343. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1340. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 87. no. 11. Le *Sphinx du Tithy-
male*.

Long. 17 lign.

Sphinx spirilinguis, alis, viridi-fulvo-pur-
pureoque varie fasciatis et maculatis, subtus pur-
pureis.

Merian. Europ. t. 123.

Insecta Lepidoptera. 232. Sphinges legitimae. 173

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 64. t. 29. f. 3.

Il déploie ses ailes environ *trois pouces* —
de la *Hollande*, et de l'*Allemagne*.

20. *Alecto*, der indianische Alektoschwärmer.

Müller l. c. p. 641. no. 20. der Grauflügel.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 179. Sph. Alecto, der Grauflügel.

Fabric. S. E. p. 546. no. 31. Sphinx Alecto. Nom. Linn.

Antennae supra albae, subtus brunneae.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 48. t. 27. f. 4. Sph. Alecto.

Il déploie ses ailes environ *trois pouces*, et
trois quarts — de *Madras*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 62. t. 137. fig. D. Sph. Alecto
— aux *Indes orientales*; sur la côte de *Coro-*
mandel, et à *Madras*.

21. *Megaera*, der indianische Megäraschwärmer.

Müller l. c. p. 642. no. 21. t. 20. f. 5. der Grünflügel.

Clerk Icon. t. 47. f. 2.

Linn. Mus. L. U. p. 358. no. 18. Sph. Megaera.

Corpus mediocris magnitudinis, viride.

Alae primores supra virides.

Macula fusca versus angulum ani.

— — — subtus virides.

Dimidium alae basin versus luteum.

— posticae supra luteae.

Macula nigricans in medio.

Margo posticus ferrugineus.

— — subtus luteae cinereo nebulosae.

22. *Pinastri*, der *Fichtenschwärmer*.

Müller l. c. p. 642. no. 22. der *Tannenpfeilschwanz*.
Früßlins Verzeichn. schweiz. Inf. pag. 33. no. 621.

Sph. *Pinastri*.

Bey uns selten.

— Magaz. der Entom. I. pag. 266. Sph. *Pinastri*.
(Chorherr Meyer.) Im Häuten werfen die
Raupen besonders den Kopf weg.

Berlin. Magaz. II. p. 182. no. 10. Sph. *Pinastri*, die
spitzflügelichte Fichtenmotte.

Alle vier Flügel grau mit einem weissen
Rande; die Oberflügel mit einigen schwarz-
grauen Strichen.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. p. 41. t. 6. die ge-
schwänzte schöne, grün, gelb, weifs- und braun-
gestreifte *Fichtenraupe* mit dem *Heuschreckenkopf*,
nebst ihrer Verwandlung bis zum Papi-
lion.

Kleemanns Raupenkal. p. 71. no. 202. p. 87. no. 249.
Tannenpfeil.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 501. no. 1. Sph. *Pinastri* et
Piceae, die *spitzflügelichte Fichtenmotte*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 41. B.
no. 3. *Föhrenschwärmerraupe* (*Pini sylvestris*);
der *Fichtenschwärmer*.

Esper's Schmetterl. II. t. 12.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 251. Sph. *Pinastri*, der
Fichtenvogel.

Scop. Entom. carn. p. 187. no. 473. Sph. *Pinastri*.

Long. unc. 1 et lin. 4. Lat. 9.

Alae canae; *anticae* in medio lineis tribus
inaequalibus caesatis, cingulis abdominis lineis-
que lateralibus in dorso thoracis pariter caesatis.

Poda Mus. graec. p. 80.

Fabric. S. E. p. 541. no. 16. *Sph. Pinastr*i.

Alis integris canis; *anticis* lineolis tribus confertis nigris, abdomine fusco, cingulis albis.

Larva caudata, virescens, linea dorsali ferruginea, laterali flava, stigmatibus ferrugineis subocellaribus.

Pupa brunnea.

Schaeff. Icon. t. 110. f. 1. 2.

Sphinx alis integris cauda simplici duodecima, zwölfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Sepp Nederl. Inf. III. p. 23. t. 5. De *Denne Pylstaart-Vlinder*.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 58. t. 27. f. 2. *Sphinx Pinastr*i.

Il déploie ses ailes environ trois pouces et trois quarts — de l'Allemagne.

Degeer Inf. I. Mém. 4. p. 169. t. 10. f. 1. 2. 3.

Grande *Chenille* rase, à corne noire sur le derriere, dont le corps est couleur de lilas sale et un peu blanchâtre, garni de plusieurs rides noires, et dont la tête est d'un jaune-brun.

— — p. 695. t. 10. f. 3. *Phalene* à antennes prismatiques; d'un brun cendré, dont la base des ailes est bordée de blanc.

— *Uebers.* I. 1 Quart. 4 Abh. p. 126. t. 10. f. 1. 2. 3. die große glatte Fichtenraupe von weißgraulicher Lilafarbe, mit vielen schwarzen Runzeln, einem schwarzen Horn auf dem Rücken, und gelbbraunem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 117. t. 10. f. 3. Ein brauner aschfarbiger *Nachtfalter*, mit prismatischen Fühlhörnern; am Grundtheile der Flügel weißbordirt.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 234. no. 1. *Papillon-bourdon du Pin.*

— à antennes prismatiques, et à longue trompe, d'un brun griseâtre, dont les ailes sont bordées de blanc par derrière, avec trois petits traits noirs au milieu des supérieures et deux bandes noires sur le corcelet.

— Uebersf. II. I Th. pag. 168. no. 1. der *Fichtenschwärmer.*

— mit prismatischen Fühlhörnern, und langem Saugrüssel von bräunlichgrauer Farbe, dessen Flügel hinten weiß eingefasst sind, nebst drey kleinen schwarzen Strichen mitten auf den Oberflügeln, und zwei schwarzen Binden auf dem Brustschilde.

23. *Tisiphone*, der indianische *Tisphoneschwärmer.**)

Müller l. c. p. 642. no. 23. die *Parallelschnur.*

Linn. Mus. L. U. p. 359. no. 19. Sph. *Tisiphone.*

Corpus Afilo minus, griseum.

Antennae subtus albae.

Abdomen dorso characteribus albis paribus.

Alae primores supra cinerascetes.

Fascia pallida linearis longitudinalis.

— *posticae supra* nigrae, basi rubrae.

Lineae sex incarnatae obtusae, parallele versus marginem exteriorem ductae.

24. *Theylia*, der indianische *Theylia*schwärmer.

Müller l. c. p. 642. no. 24. die *Schwarzschnur.*

Clerk Icon. t. 46. f. 4.

Fabric. S. E. p. 547. no. 37. Sph. *Theylia.*

Parva. Thorax lineis longitudinalibus fuscis.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 58. t. 226. f. E. Sph. *Theylia*; Foem. f. F. Mas — sur la côte de Coromandel.

3. Aechte

*) Nicht abgebildet.

3. Aechte *Schwärmer*, oder sogenannte *Unruhen*, mit glatten ungekerbten Flügeln, und einem zottigen rauchen oder bärtigen After.

25. *Tantalus*, der *indianische Tantalus*schwärmer.

Müller l. c. p. 643. no. 25. der *Weißgürtel*.

Fabric. S. E. p. 547. *Sesia Tantalus*: no. 1. Nom. Linn.

In Europa australi; *Aegypto*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 107. t. 68. fig. F. *Sph. Tantalus* — à *Suriname* et à *Curacao*.

26. *Ixion*, der *indianische Ixions*schwärmer.*)

Müller l. c. p. 643. no. 26. der *Weißpunkt*.

27. *Stellatarum*, der *Karpfenschwanz*schwärmer.**)

Müller l. c. p. 643. no. 27. die *Buntseite*.

Hüeslins Verz. schweiz. Inf. p. 33. no. 622. *Sphinx Stellatarum*.

Nicht selten auf dem *Gallio*.

Berlin. Magaz. II. p. 182. no. 11. *Sph. Stellatarum*, der *Taubenschwanz*, *Karpenkopf*.

Die Oberflügel schwärzlichgrau; die Unterflügel dunkelorange gelb.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 1 Kl. p. 57. t. 8. f. 5. 6. die grüne weißgestreifte, blau und gelb geschwänzte Raupe mit weissen erhabenen Punkten.

Klee-

*) Nicht abgebildet. Linné hat zwar dabey das M. L. U. angeführt, doch ohne Seite und Numer, und ich habe ihn auch darinn nicht gefunden.

**) Hierbey hat Linn. Schaeff. Elem. t. 116. f. 3. angeführt; solcher gehört aber zu dem folgenden *Fuciformis*.

Kleemanns Raupenkal. p. 153. no. 146. p. 72. no. 204.
Karpenkopf; *Karpen Schwanz*; *Taubenschwanz*;
 das *Mäuslein*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 43. E.
 no. 2. *Sternkraut Schwärmerraupe* (*Gallii veri* etc.);
Sternkraut Schwärmer.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 365. no. 10. *Tau-*
benschwanz; *Karpenkopf*.

Naturforscher I. p. 234. Sph. *Stellatarum*, *Karpen-*
kopf; warum er noch im späten Herbst aus-
 kömmt (*Meineke*).

Espers Schmetterl. II. t. 13.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 458. no. 6. der *Stern-*
kraut Schwärmer; der *Karpenkopf*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 256. Sphinx *Stellata-*
rum, der *Taubenschwanz*, *Karpenkopf*.

Behm. Epit. S. L. p. 161. no. 27. Sph. *Stellatarum*,
Taubenschwanz, *Karpenkopf*.

List. Goed. p. 41. f. 14. *Erucae lactucae* admodum
 amantes.

Musca accipitraria p. 43. ed. gall. Tom. II.
 tab. 24.

Raj. Hist. Inf. p. 133. no. 1. *Papilio velocissima*, alis
 brevibus, corpore crasso, inter volandum stri-
 dorem edens.

Réaum. I. t. 12. f. 5. 6. *La Chenille à corne du Cail-*
lélait; *L'épervier*.

Scop. Entom. carn. p. 187. no. 474.

Long. lin. $9\frac{1}{2}$. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.

Alae anticae supra umbrinae, fasciis binis ob-
 scurioribus; posticae supra ochraceae, basi et
 margine obscuriores. Pectus album. Volatus
diurnus, rapidissimus.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 548. Sefia Stellatarum no. 3.

Larva caudata, albo-punctata, cauda subulata, coerulea, apice ferruginea.

Pupa fusca.

*Geoffr. Inf. Tom. II. p. 83. no. 6. t. II. f. 5. Le Mo-
rio-Sphinx.*

Long. 13 lign.

Sphinx spirilinguis, alis superioribus fuscis
nebulosis, inferioribus ferrugineis.

Bibl. reg. Paris. p. 39. f. 7. 8. 9.

Schaeff. Icon. t. 16. f. 2. 3.

Sphinx alis integris cauda pilosa secunda,
2ter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und
haarigtem Schwanz.

Merian. Eur. p. 41. t. 79.

*Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 226. no. 1. Papillon-
bourdon à ailes inférieures jaunes.*

— à antennes en massue et à longue trompe,
dont les ailes supérieures sont d'un brun cendré
à rayes obscures, et les inférieures d'un jaune
orangé.

— *Uebers. II B. I Th. p. 162. no. 1. der gelbe Un-
terflügel.*

Der Schwärmer mit keulenförmigen Fühl-
hörnern, langem Saugrüssel, aschfarbigbraun-
und dunkelgestreiften Ober- und oraniengelben
Unterflügeln.

β. *Belis*, der *Belis*schwärmer.

Linn. S. N. ed. 10. p. 493. no. 31.

Abdomine barbato, supra nebuloso, subtus
flavescente; alis posticis basi flavis.

*Cramer Pap. exot. VIII. p. 147. t. 94. fig. C. Sph. Be-
lis — de la Chine.*

Une variété de l'*Epervier*, ou *Sphinx de la Garence* (Stellataris).

28. *Fuciformis*, der hummelartige Schwärmer.

Müller l. c. p. 643. no. 28. der *Hummelschmetterling*.
Frieslins Verz. Schweiz. Inf. p. 33. no. 623. Sph. *Fuciformis*, der *Durchsichtige*.

Nicht selten auf der *Lonicera* (*Waldwinde*).

— Magaz. der Entom. I. p. 267. Sph. *Fuciformis*.

Verwandelt sich über der Erde in einem Gespinnste von wenig Fäden und untermengter Erde; theils zwischen zusammengezogenen Blättern. (Chorherr Meyer.)

Berlin. Magaz. II. p. 184. no. 13. Sph. *Fuciformis*, die *Hummelmotte*.

Die Flügel durchsichtig, wie Frauenglas mit braunem Rande; der Leib theils gelblichgrün, theils schwarz.

— — p. 194. Anm. 5.

Röfels Insektenbel. III. p. 232. t. 38. f. 2. 3. der zur ersten Klasse der *Nachtvögel* gehörige kleine *Papilion* mit durchsichtigen Flügeln.

— — — IV. p. 231. t. 34. f. 1. 2 *Raupe*; f. 3. *Gespinnste*;) f. 4. *Puppe*.

Sulzers Kennz. t. 15. f. 90.

Klec.

*) p. 233. §. 4. beschreibt Röfel das Gespinnste dieser Raupe, und hat solches auch als einen länglichten, dichtgewebten Zylinder abgebildet; dafs er sich aber ohne Schuld geirrt habe, hat Friesly erst kürzlich, im 1 B. seines Entomol. Magazins p. 267. in der Note, entdeckt:

„Ich hatte ihm die Puppen dieses Sph. *Fuciformis*, in dem Gespinnste der *Phal. potatoria* übersandt, damit sie auf der Reise keinen Schaden nehmen mögten, solches aber zu melden vergessen.“

Insecta Lepidoptera. 232. Sphinges legitimae. 181

Kleemanns Raupenkal. p. 24. no. 54. p. 47. no. 129.
p. 80. no. 231. die *Hummelmotte*.

System. Verz. der Schmett. der W.G. p. 44. F. no. 1.
Skabiosenschwärmerraupe (*Scabiosae arvens.*);
Skabiosenschwärmer.

Esper's Schmett. II. t. 14. f. 1. a b c.

Leske Anfangsgr. der N.G. I. p. 458. no. 7. der *Ska-*
biosenschwärmer.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 245. Sph. *Fuciformis*,
der *Hummelschmetterling*.

Behm. Epit. S. L. p. 161. no. 28. Sph. *Fuciformis*.

Scop. Entom. carn. p. 188. no. 475. Sph. *Fuciformis*.
Long. — Lat. — perit.

Abdomen barbatum nigrum, *fascia flave-*
scente; alae hyalinae, venis et margine obscu-
rioribus.

— Volatus diurnus — *Metamorphosis oc-*
*culta.**)

Fabric. S. E. p. 548. *Sesia Fuciformis* no. 5. Nom.
Linn.

Larva viridis; linea laterali flava, segmentis
utrinque maculis duabus brunneis.

Geoffr. Inf. II. p. 82. no. 5. Le *Sphinx — vert à ai-*
les transparentes.

Long. 10 lign.

Sphinx spirilinguis viridis; alis *vitreis* pellu-
cidis, venis limboque fusco-ferrugineis.

Schaeff. Elem. t. 116. f. 3. Sph. *Fuciformis*.

— *Icon.* t. 16. f. 1.

Sphinx alis *integris* cauda *pilosa* seu barbosa
prima, erster *Dämmerungsfalter* mit ganzen
Flügeln und *haarigem* oder *bärtigem* Schwanz.

M 3

Degeer

*) Dies fällt nunmehr weg. *S. Füesl. Magaz. der Entomol. I.*
p. 266.

Degeer II. Part. I. p. 227. no. 2. *Papillon-bourdon Mouche.*

— à antennes en massue, et à longue trompe; à ailes vitrées bordées d'un brun-roussâtre, avec des poils olives roux et jaunes sur le corps.

— Uebersf. II B. I Th. p. 162. no. 1. der *Fliegensphinx.*

Der *Schwärmer* mit keulenförmigen Fühlhörnern, langem Saugrüssel, braunröthlich bordirten Glasflügeln, und olivenfarbigen fuchsröthlichen und gelben Haaren am Leibe.

Mülleri Faun. Fridr. p. 37. no. 345. Sph. *Fuciformis.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1342. Sph. *Fuciformis.* Nom. Linn.

β. *Tityus*, der *Tityus*schwärmer. *)

Linn. S. N. ed. 10. p. 493. no. 24.

Abdomine barbato, cingulo nigro.

29. *Apiformis*, der bienenartige Schwärmer. **)

Müller l. c. p. 644. no. 29. der *Bienenschmetterling.*

Früeslins Verz. schweiz. Inf. p. 33. no. 624. Sphinx *Apiformis*, der *Bienenvogel.*

Bey Winterthur; sehr selten.

Berlin. Magaz. II. p. 184. no. 14. Sph. *Vespiiformis*, die *Wespenmotte.*

Die Flügel durchsichtig mit gelblichbraunem Rande und Adern; der Leib mit gelben und braunen Ringen.

Natur-

*) *An pictus*?

**) Der vom Linn. hierher gezogene Sph. *Scopigera* Scop. ist von diesem sehr verschieden, und scheint eher eine Abänderung von *Tipuliformis* L. zu seyn. S. *Wiener Schmetterl.* p. 44. Anmerk.

Naturforscher VII. p. 105. no. 14. Sph. *Vespiiformis*.

Dieser Sph. *Apiformis* L. (Herr von Rottenburg.)

Linné Reise durch Oeland p. 167. Sph. *Apiformis*.

Sulzers Gesch. p. 152. t. 20. f. 6. Sph. *Apiformis*, der *Bienenschmetterling*.

Die Flügel federlos, wie aneinander gewachsen, rothbraun und schwärzlich gesäumt; der gelbe Hinterleib hat fünf schwarze Ringe von ungleicher Breite.

In der Schweiz selten.

Bekmanns phys. oekon. Bibl. VIII B. p. 13. Sphinx *Apiformis*.

Die Raupe eine *Holzraupe* in den Löchern der Pappelbäume.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. no. 2.

Sphinx *Crabroniformis*, *Pappelbaumschwärmer-raupe* (*Populi albae ligno*); der *Pappelbaumschwärmer*.*)

Espers Schmett. II. t. 14. f. 2.

Acta Vpsal. 1736. p. 26. no. 85. *Papilio apiformis* abdomine aureo.

Système Naturel du Regne animal II. p. 142. no. 5.

Phalene des bosquets et des jardins.

Papilio apiformis abdomine aureo.

Fabric. S. E. p. 549. *Sesia apiformis* no. 6. Nom. *Linn.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1341. Nom. *Linn.*

M 4

Schaeff.

*) Soll dieser vielleicht der bienenähnliche Schwärmer (Sph. *Apiformis*) des Herrn von *Linné* seyn? — Wir sollten es glauben, da es die Oekonomie der Raupe in dem Holz der Pappelbäume so wahrscheinlich macht.

Schaeff. Icon. t. III. f. 2. 3.

Sphinx alis integris cauda pilosa tertia, dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwänze.

Geoffr. Inf. II. p. 82. no. 4. Le *Sphinx-Mouche*.

Long. 5 lign.

Sphinx elinguis; alis lanceolatis vitreis venis nigris, superioribus macula limboque nigris, fulvoque nebulosis.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 227. no. 3. t. 2. f. II. *Papillon-bourdon Guépe.*

— à antennes en massue, et à très-petite trompe; à ailes vitrées bordées de brun, dont le corps est noir à bandes jaunes, avec deux taches jaunes sur le corcelet et à jambes rouffes.

— Uebersf. II B. I Th. p. 163. no. 3. t. 2. f. II. der *Wespenchwärmer*.*)

Der *Schwärmer* mit keulenförmigen Fühlhörnern, sehr kleinem Saugrüssel, braunbordirten Glasflügeln, schwarz und gelbgestreiftem Körper, zween gelben Flekken auf dem Brustschilde und fuchsröthlichen Füßen.

30. *Culiciformis*, der *schnakenartige Schwärmer*.

Müller l. c. p. 644. no. 30. der *Mücken-schmetterling*.

Füesflins Verz. schweiz. Inf. p. 33. no. 624. *Sph. Culiciformis*, der *Mückenvogel*.

Auf Blumen — *selten*.

Berlin. Magaz. II. p. 184. no. 15. *Sph. Culiciformis*, die *Mückenmotte*.

Die Flügel durchsichtig, mit einem braunen Flek auf jedem; der Rand derselben braun. Der Leib

*) Außer den netzförmigen Augen noch zwei kleine glatte und belle Ozellen dicht am Oberrande der ersteren — p. 165.

Leib stahlblau mit einem breiten oranienfarbenen Ringe.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 975. no. 14. Sph. *Culiciformis*, die *Mückenmotte*.

Sulzers Gesch. p. 152. t. 20. f. 5. Sph. *Culiciformis*, die *Mückenmotte*.

Die Flügel federlos, durchsichtig; die vordern mit zwei rothen Querbändern; der Hinterleib schwarz mit zweien gelben Ringen.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. F. no. 3. *Unbekannte Raupe. Schnakenähnlicher Schwärmer.*

Glabachs Besch. I. p. 60. t. 26. f. 5. 6. Sph. *Culiciformis*, das *rare kleine Glasvögelein*.

— — p. 61. t. 26. f. 7. 8. Sph. *Culiciformis* cum annulo rubro, das *rare kleine Glasvögelchen* mit dem rothen Ringel.

*Esper*s Schmetterl. II. t. 15. f. 1.

Acta Vpsal. 1736. p. 26. no. 86. *Papilio apiformis*, abdomine nigricante.

Systeme Naturel du Regne animal II. p. 145. no. 9. *Phalene en forme d'Abeille*, dont le bas-ventre est noir.

Scop. Entom. carn. p. 188. no. 476. Sph. *Culiciformis*.
Long. — *Lat.* —

Alae subnudae; *anticae* lanceolatae margine fasciaque nigris; *abdomen* barbatum pilis lateralibus apice albis atro-coeruleum, *cingulo medio fulvo-rubro*.

Corpus semiunciale. Volatus tardus diurnus.

Fabric. S. E. p. 549. *Sesia* Culicif. no. 8. Nom. *Linn.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1343. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 135. f. 5. 6. *Sphinx* alis integris cauda pilosa quarta, vierter *Dämmerungsfalter* mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 232. t. 2. f. 13. *Papillon-bourdon Cousin*.

— à antennes en massue, et à longue trompe; à ailes vitrées, bordées de brun-noir, dont le corps est noir avec une seule bande transverse rousse au milieu.

— Ueberf. II B. I Th. p. 166. no. 5. t. 2. f. 13. der *mückenartige Schwärmer*.

Der *Mückenschwärmer* mit keulenförmigen Fühlhörnern, langem Saugrüssel; gläsernen, schwarzbraun eingefassten Flügeln, und schwarzem Körper, mit einer einzigen bräunlichgelben Querbinde in der Mitte.

31. *Vespiiformis*, der *wespenartige Schwärmer*.

Müller l. c. p. 644. no. 31. t. 20. f. 6. der *Fensterflügel*.
Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. F.
no. 5. *Raupe unbekannt*; der *wespenähnliche Schwärmer*.

Esper Schmetterl. II. t. 15. f. 2.

32. *Tipuliformis*, der *erdschnakenartige Schwärmer*.

Müller l. c. p. 644. no. 32. der *Schnakenschmetterling*.

Berlin. Magaz. II. p. 188. no. 19. Sph. *Salmachus*, der *Zwerg*.

Die Flügel durchsichtig mit braunem Rande und braunem Flecke auf jedem Oberflügel. Der Leib stahlblau mit drey gelben schmalen Ringen.

Naturforscher VII. p. 106. no. 19. Sph. *Salmachus*.

Des Linn. Sph. *Tipuliformis* (Herr von Rotenburg).

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. no. 4. Unbekannte Raupe; erdschnakenähnlicher Schwärmer.

Esper's Schmetterl. II. t. 15. f. 3. vergrößert f. 3 ().*

Scop. Ent. carn. p. 188. no. 477. Sph. Scopigera.

Statura Vespae parietum. Abdominis segmenta margine flava, apex terminatus pilis rotundum ventilabrum prae se ferentibus.

An haec Sphinx Vespiformis Linn.?)*

Fabric. S. E. p. 549. Sesia Tipuliformis no. 9. Nom. Linn.

Variat interdum abdomine toto atro.

Schaeff. Icon. t. 224. f. 1. 2.

Sphinx alis integris cauda pilosa quinta, fünfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanz.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 230. no. 4. t. 2. f. 12. Papillon-bourdon Tipule.

— à antennes en massue, et à longue trompe; à ailes vitrées bordées de brun-noir; à corps noir, dont les anneaux sont alternativement bordés de jaune.

— *Ueberf. II B. I Th. p. 165. no. 4. t. 2. f. 12. der Erdschnakenschwärmer. **)*

Der erdschnakenförmige Schwärmer mit keulenförmigen Fühlhörnern, langem Saugrüssel; gläsernen, schwarzbraun eingefassten Flügeln und schwarzem Körper, dessen Ringe wechselsweise gelb eingefasst sind.

II. Ad-

*) Nach der Meynung der *Theresianer Entomologen* p. 44. Anm. eine Abänderung von *Sph. Tipuliformis* Linn.

**) Hat auch zwei kleine glatte Ozellen. Eine dritte kann man nicht entdecken.

II. *Adscitae*, Bastarte: unächte Schwärmer.

Habitu et Larva diversae.

33. *Auxo*, der *chinesische Auxoschwärmer*.*)

Müller l. c. p. 645. no. 33. der *Rundflügel*.

34. *Filipendulae*, der *Steinbrechschwärmer*.

Müller l. c. p. 645. no. 34. der *Steinbrechschmetterling*.

Fießlins Verz. schweizer. Inf. p. 33. no. 626. der *Rothflek*.

Häufig auf den Wiesen — auch *bis auf die Gletscher*.

— *Magaz. der Entomol.* I. p. 267. Sph. *Filipendulae*.

Etwas von der *Verwandlungszeit* (Chorherr *Meyer*).

Berlin. Magaz. II. p. 186. no. 16. Sph. *Filipendulae*, die *Zirkelmotte*.

Die Oberflügel glänzend dunkelgrün, mit karmesinrothen Flekken; die Unterflügel roth, mit einem schmalen grünen Saum.

— — p. 195. no. 6. von verschiedenen *Abänderungen*. Einige mit zusammengelaufenen langen Flekken; bey andern die sechs rothen Flekke auf den Oberflügeln völlig abgefordert.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 289. t. 57. f. 5. 7. die dicke hellgelbe und schwarzgefleckte Raupe mit ihrer Verwandlung zum Papilion.

Naturforscher V. p. 221. Sph. *Filipendulae*, *Zirkelmotte*.

Tren-

*) Nicht abgebildet.

Trennen sich in der Begattung nicht, wenn sie auch beyde aufgespießt werden (*Degeer*).

Naturforscher VI. pag. 73. *Sphinx Filipendulae* (D. Kühn).*)

— — VII. p. 105. no. 15. *Sph. Filipendulae*.

Die mit *langen rothen* Flekken eine besondere Art — nie mit den andern mit *runden* Flekken in der Paarung gefunden. Leztere aus der Raupe gezogen, nie einen von den erstern (Hr. von Rottenburg).

— — X. p. 95. (Past. von *Scheven*) sieben einander sehr ähnliche Arten dieser Gattung beschrieben; die *sieben Brüder*.

— — XIII. p. 229. §. 7. die sehr gemeinen *Sph. Filipendulae* in Menge, im Julius an der Scabiosa, und dem Cyano in coitu — Die mit *langen rothen* Flekken eine besondere Gattung; die mit *runden rothen* Flekken wieder eine besondere Gattung. Diese leztere die *Sph. Scabiosae* des Past. von *Scheven*. Der Geschlechtsunterschied durch nichts als den Farbenschimmer zu bestimmen: der *grünliche Glanz* der *männliche* Karakter (D. Kühn); v. *Esper* II. t. 24. Suppl. 6. f. 2. *Sph. Pilosellae*: a. Mas; b. Foem.

Sulzers Kennz. t. 15. f. 91.

Kleemanns Raupenkal. p. 16. no. 23. die *Zirkelmotte*. *Systemat. Verz.* der Schmett. der W. G. p. 45. G. no. 4. *Erdeichelschwärmerraupe* (*Spiraeae filipendulae*); *Erdeichelschwärmer*.

— — p. 148. *Sph. Filipendulae*.

Blumenbachs Handb. der N. G. pag. 366. no. 11. die *Zirkelmotte*.

Esper

*) Der besondere *Sphinx Hedyfarum* *Onobrychis* (*Esper* setze), mit fünf rothen, weißrändigen Flekken auf den Oberflügeln, ist sicher *Sph. Carniolica Scopoli*.

Esper Schmett. II. t. 16. fig. d. *Mas*; e. *Foem.* fig. f.
Var. ex Italia.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 458. no. 8. der *Erd-eichelschwärmer.*

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 243. Sph. *Filipendulae*,
der *Leopard.*

Behm. Epit. S. L. p. 161. no. 34. Sph. *Filipendulae.*
Nom. *Linn.*

List. Goed. p. 100. f. 37. Sph. *Filipendulae* (maculis
6 rotundis).

Raj. Hist. Inf. p. 134. no. 2. *Papilio pratensis*, alis
pendulis, *minor*, corpore crasso nigro, alis ex-
ternis ex coeruleo nigricantibus cum maculis san-
guineis.

Système Naturel du Regne animal II. p. 142. no. 6.
Phalene mouffe, ou à corne de belier; le *Leo-
pard*; *Leopardus.*

Scop. Entom. carn. p. 189. no. 479. Sph. *Filipendulae.*
Long. lin. 7. *Lat.* 3½.

Nigra, alis *anticis* cyaneis, rubro-macula-
tis; *posticis* cinnaberinis immaculatis.

Fabric. S. E. p. 550. *Zygaena* *Filipendulae* no. 1.
Nom. *Linn.*

Larva obesa, caudata, sulphurea, lineis qua-
tuor punctorum nigrorum.

Pupa fusca, medio sulphureo, stigmatibus
fuscis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 38. no. 346. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 116. no. 1344. Sph. *Fili-
pendulae.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 69. f. 4. 5.

Sphinx alis *integris* cauda *simplici* quarta,
vierter *Dämmerungsfalter* mit ganzen Flügeln
und einfachem Schwanze.

Merian. Eur. t. 67.

Geoffr. Inf. II. p. 88. no. 13. Le *Sphinx-belier*.

Long. $8\frac{1}{2}$ lign.

Sphinx spirilinguis, alis superioribus subcoeruleis punctis sex rubris; inferioribus rubris.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 250. *Sphinx Filipendulae*.

— — p. 252. no. 1. *Papillon-phalene belier**)

— à antennes en massue simples, dont les ailes supérieures sont d'un bleu verdâtre luisant à taches rouges et les inférieures rouges.

— — p. 254. *Chenille* rase d'un jaune citron, avec cinq suites de taches noires arrangées en rayes.

— Uebersf. II B. I Th. p. 180. 181. no. 1. *Sph. Filipendulae*, das *Bokshorn*.

Die *Boks-Papillons-Phaläne* mit einfachen keulenförmigen Fühlhörnern, glänzend blaugrünlischen rothgefleckten Ober- und rothen Unterflügeln.

— — p. 183. Die glatte zitrongelbe *Raupe* mit fünf Reihen schwarzer, streifenweise liegender Flekke.

— Tom. VII. p. 591. no. 1. t. 44. f. 1. *Papillon-phalene belier*.

Papilio-phalaena (aries), antennis simplicibus; alis superioribus viridi-coeruleis nitidis: maculis rubris, inferioribus rubris.

In der Abbildung nur vier rothe Flekke auf den Oberflügeln.

Die *Raupe* einer gewissen Art von *Schlupfwespen* sehr unterworfen.

*) Mit diesem und dem *Sph. Statices* macht Degeer den Uebergang zu den *Phalänen*.

35. *Phegea*, der Ringelschwärmer.*)

Müller l. c. p. 645. no. 35. t. 20. f. 7. die *Ringelmotte*.
Früßlins Verz. schweiz. Inf. p. 33. no. 627. der *Weiß-
 flek*.

Frisch Inf. VI. p. 33. t. 15. von der Raupe mit den
 acht Federkielbüschen, und dem Papilion mit
 schwarzen Flügeln, und sechs weissen Flekken
 darauf.

Berlin. Magaz. II. p. 186. no. 18. Sph. *Phegea*, die
Ringelmotte.

Glänzend schwarz mit sechs weissen Flekken
 auf jedem Oberflügel, um den Leib ein gelber
 Ring.

Naturforscher X. p. 95. Sph. *Phegea*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 974. no. 13. Sph. *Phegea*,
 die *Ringelmotte*.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 45. G.
 no. 9. *Kahneichenschwärmerraupe* (*Quercus Ro-
 boris*); *Kahneichenschwärmer*.

— *Nachtr.* p. 307. Anm. (*)

Blumenbachs Handb. der Nat. G. p. 366. no. 12. die
Ringelmotte.

Espers Schmetterl. II. t. 17. f. 1. *Mas*; f. 2. *Foem*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 251. Sph. *Phegea*, die
Ringelmotte.

Bekm. Epit. S. L. p. 161. no. 35. Sph. *Phegea*, *Rin-
 gelmotte*.

Scop. Entom. carn. p. 190. no. 480. Sph. *Phegea*.

Long. lin. 8. *Lat.* 5 $\frac{1}{2}$.

Atro-coerulea, alis *anticis* maculis albis (6);
 abdominis macula baseos cinguloque paleaceis.

Fabric.

*) Der hierbey gemeiniglich angeführte *Schaeff.* Icon. t. 165.
 f. 3. 4. ist zwar dem *Phegea* sehr ähnlich; aber doch in Anse-
 hung der Flekke auf den Oberflügeln eine besondere Art.
S. Naturf. X. p. 95. Sph. *Schaefferi*.

Fabric. S. E. p. 550. *Zygaena Phegea* no. 2. Nom. *Linn.*

Larva fusca, capite pedibusque rufis, dorso fasciculato.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 53. t. 25. f. 2. *Sphinx Phegea.*

Il déploie ses ailes environ un pouce et trois quarts — de l'Allemagne.

36. *Ephialtes*, der *Rothringelschwärmer*.

Müller l. c. p. 645. no. 36. der *Rothringel*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. t. 57. f. 6. *Männchen*.

Hollaar Inf. t. 3. f. 3. (*Naturf.* IX. p. 221. 222.)

Naturforscher X. pag. 96. t. 2. f. 7. das *Weibchen*.
(*Past. von Scheven*.) *)

Die Raupe etwas grünlichgelb; drey derselben an einem Eichstamm.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 45. G. no. 6.
Sichelkleeschwärmerraupe (*Medicaginis Falcatae*);
Sichelkleeschwärmer, *Sph. Falcatae*; *Sph. Ephialtes* *Linn.*

Espers Schmetterl. II. t. 17. f. 3. *Foemina*.

Fabric. S. E. p. 551. *Zygaena Ephialtes* no. 3. Nom. *Linn.*

— *Mantiss.* p. 275. no. 1. 2. *Zygaena Fulvia*.

Cyanea;

*) Die umständlichere Beschreibung im Linné ist offenbar vom Weibchen genommen, wie es der Herr von Scheven abgebildet hat. Beym Männchen sind die Unterflügel roth; beym Weibchen schwarz. Daher sagt L. inferiores nigrae, puncto albo, das allerdings dem Männchen fehlt. Auch die Oberflügel mit den Flekken sind so beschrieben, wie wir sie beym Weibchen finden.

Cyanea; alis anticis viridibus, punctis quinque rubris; posticis sanguineis immaculatis. *)

Schaeff. Icon. t. 71. f. 1. Mas. (Naturf. X. p. 96.)

Sphinx alis integris cauda simplici quinta, fünfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

37. *Caffra*, der Kafferschwärmer.

Müller l. c. p. 646. no. 37. der Kaffer.

Füßlings Schweiz. Inf. p. 33. no. 628. Sph. *Caffra*.

Naturforscher X. p. 96. Sph. *Caffra*. **)

System.

*) Hierbey hat Fabric. Schaeff. t. 71. f. 1. angeführt, und also diesen Sph. für eine besondere Art angegeben. Er nennet nur fünf rothe Flekke auf den Oberflügeln, da wir doch in der Schäfferschen Abbildung deutlich sechs unterscheiden, wenn gleich die beyden ersten am Körper unten etwas zusammenstoßen, welches Fabric. bewogen, in der umständlichen Beschreibung zu sagen: *Alae anticae virides maculis quinque sanguineis, duabus bascos coimatis*; allein das — *abdomine cingulo sanguineo* in der Linn. Beschr. des *Ephialtes* ist hier ganz übersehen, welches doch der Schäffersche Sph. augenscheinlich hat. Wir stehen keinen Augenblick an, ihn mit Past. von Scheven, Naturf. X. p. 96. für das Männchen des *Ephialtes* zu halten.

**) Hier möchte wohl von dem sonst so genauen von Scheven Schaeff. t. 80. f. 4. 5. mit *Sphinx carniolica* Scop. unrichtig angeführt seyn. Man vergleiche nur die Wien. Schmett. pag. 147. 148. Wahr ist's, daß Schaeffer t. 80. f. 4. 5. den *Sphinx carniol.* Scop. genau vorsteller, wie denn hierbey die rothen NB. weiß eingefassten Flekke allein den Ausschlag geben; aber die Oberflügel des Sph. carn. und des Schäfferschen sind grünblank (*viridi-nitentes*), aber nicht braungrau (*fusco-cinereae*), wie Linné von der *Caffra* behauptet. Eben so wenig paßt die Beschreibung der *Esperetteschwärmer* vom Herrn D. Kühn, Naturf. VI. p. 72. auf den *Caffra*, weil er ausdrücklich des weißen Randes der rothen Flekke gedenkt.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 148. Sph. Caffra. (mit Carn. Scop. vergl.)

*Esper's Schmetterl. II. t. 17. f. 4. a. Mas b. Variet. *)*
vergl. t. 24. Suppl. 6. f. 1. a. *Sph. Lonicerae* Mas;
b. Foem.

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 362. no. 22. Sph. Caffra.

Corpus Sph. Filipendulae dimidio minus.

Antennae longitudine dimidii corporis, subclavatae, atro-coerulescentes.

Caput nigrum. *Lingua* spiralis. *Os* sanguineum; *punctum sanguineum* ante et pone oculos.

Thorax niger punctis utrinque duobus sanguineis.

Abdomen fuscum, segmentis margine rubris.

Pedes fusci, subtus rubescentes.

Alae superiores fusco-canescentes, *punctis* 5 sanguineis: primo ad basin alae e rotundo in lineolam elongato, reliquis rotundis alternis, at punctum tertium transverso-oblongiusculum.

— *inferiores* sanguineae, limbo postico nigrae. **)

Fabric. S. E. p. 551. Zygaena Caffra no. 5. Nom. *Linn.*

Thorax niger, utrinque punctis duobus rubris.

Schaeff. Icon. t. 16. f. 6. 7. †)

N 2

Sphinx

*) Nichts anders als *Sph. Carniol.* Scop. oder *Schaeff. Icon. t. 80. f. 4. 5*; aber nicht *Caffra*.

**) Wie wenig trifft diese genaue Beschreibung mit *Sph. carniol.* Scop. *Schaeff. t. 80. f. 4. 5.* überein!

†) Hier sind verschiedene Merkmale nach der *Linn. Besch.* der *Caffra*, verschiedene fehlen. Die Oberflügel sind fusco-cinereascen-

Sphinx alis integris cauda simplici tertia, dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

38. *Cerbera*, der kapensische Zerberuschwärmer.*)

Müller l. c. p. 646. no. 38. der Kaper.

Sulzers Gesch. p. 152. t. 20. f. 8. Sph. *Cerbera*.

Schwarzgrün mit glasartigen Flekken; um den schwarzen Hinterleib gehen sechs rothe Ringe — Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 458. no. 9. *Cerbera*.

Fabric. S. E. pag. 551. *Zygaena Cerberus*: no. 7. Nom. Linn.

Z. Phegeae fere duplo minor.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 56. t. 26. f. 2.

Il déploie ses ailes presque un pouce et demi — du Cap de bonne Espérance.

Cramer Pap. exot. VII. p. 131. t. 83. fig. F. Sph. *Cerbera* — du Cap de B. E. (Foemina.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 363. no. 23. Sph. *Cerbera*.

Corpus coeruleum f. cyaneum, statura et magnitudine Sph. Phegeae et Creusae, inter quas media.

Anten-

rascentes, die beyden ersten rothen Flekke ziehen sich länglicht, die Rände der Ringe des braunen Hinterleibes rth u. f. w. An *Cassia* Linn.? die fünf rothen Flekke der Oberflügel sind offenbar vorhanden, und mit keinem weissen Rande eingefasst. Vielleicht gehört hierzu auch des Past. von Scheven Sph. *Lonicerae*, Naturf. X. p. 97. no. 6.

Petiv. Mus. p. 36. no. 330. *Papilionoides virescens*, maculis 5 miniatis ornatus.

Merret Pin. 198. *Papilio minor* cum alis 5 maculis internis rubris, und Wien. Schmett. p. 149.

*) Ein ganz anderer ist des Pallas Sph. *Cerberus*. S. unter den neuen Adsc. no. 125.

Antennae nigrae, apice subtus albae.

Thorax ad latera puncto sanguineo.

Abdomen supra lineola rubra transversa ad basin, et 3 transversis rubris f. sanguineis in medio.

Tibiae posticae apice annulo albo.

Alae cyaneae, maculis f. punctis fenestratis; superiores 1, 2, 3; inferiores 2: altera minore versus basin.

39. *Creusa*, der indianische Kreuzschwärmer.

Müller l. c. p. 646. no. 39. der Rothrand.

Lepetchins Tageb. I. p. 197. Am Gehänge des Gebirges bey dem Ursprunge der Wasserquellen des Dorfes Baidulina, der in den mittägigen Ländern einheimische *Abendvogel Kreuzsa* (*Sphinx Creusa*).

Clerk Icon. t. 46. f. 5.

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 365. no. 25. Sph. *Creusa*.

Corpus magnitudine Sph. *Filipendulae*.

Antennae nigrae, filiformes, in medio crassiores vt Sph. *Filip.* nigrae.

Thorax niger, pectore albo.

Abdomen teretiusculum, nigrum, basi viride, segmentorum marginibus rubris.

Pedes fusci.

Alae primores nigrae oblongae, maculis fenestratis 1, 2, 3.

Macula una parva ad basin, dein secunda, tum tertia f. quarta in medio.

— *posticae* nigrae oblongae duplo minores.

Macula una f. gemina ad basin.

Maculae binae coalitae in medio.

40. *Polymena*, der *asiatische Polymenaschwärmer.*

Müller l. c. p. 646. no. 40. der *Gelbflek.*

Fabric. S. E. pag. 553. *Zygaena Polymena* no. 13.
Nom. *Linn.*

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 55. t. 26. f. 1. Sph. *Polymena.*

Il déploie ses ailes presque deux pouces — de la *Chine.*

Cramer Pap. exot. II. p. 20. t. 13. fig. D. Sphinx *Bâtard Polymena*: à antennes en plume — sur la côte de la *Guinée.*

41. *Cassandra*, der *amerikanische Kassandraschwärmer.* *)

Müller l. c. p. 646. no. 41. der *Rothafter.*

Fabric. S. E. pag. 552. *Zygaena Cassandra* no. 10.
Nom. *Linn.*

Alae nigrae immaculatae.

42. *Fausta*, der *rothflüglichte schwarzgeflekte Schwärmer.*

Müller l. c. p. 647. no. 42. der *Glücksvogel.*

Frieslins schweiz. Inf. p. 33. no. 629. Sph. *Fausta.*

Sulzers Gesch. der Inf. p. 152. t. 20. f. 7. Sph. *Fausta*, der *Glücksvogel.*

Die vordern Flügel bluthroth; ein schwarzer Flek heym Grund, und vier andere mit dem schwarzen Saum verbunden; die hintern bluthroth, schwarz gefäumt.

System. Verz. der Schmett. der W. G. p. 307. no. 11.
Sphinx *Fausta*, *rothflüglichter schwarzgeflekter Schwärmer.*

Espers

*) Nicht abgebildet.

Esper's Schmetterl. II. t. 18. f. i. a. *Mas*; f. i. b. *Foemina*.

Fabric. S. E. p. 553. *Zygaena Fausta* no. 15. Nom. *Linn.*

Statura et antennae Sph. *Filipendulae*.

43. *Infausta*, der *Unglückschwärmer*.*)

Müller l. c. p. 647. no. 43. der *Unglücksvogel*.

Fabric. S. E. p. 553. *Zygaena infausta* no. 16. Nom. *Linn.*

44. *Pectinicornis*, der *asiatische Federkammchwärmer*.

Müller l. c. p. 647. no. 44. der *Violetflügel*.

Fabric. S. E. p. 554. *Zygaena pectinicornis* no. 18. Nom. *Linn.*

45. *Pugione*, der *Thomaschwärmer*.**)

Müller l. c. p. 647. no. 45. der *Thomaschmetterling*.

Fabric. S. E. p. 554. *Zygaena Pugione* no. 17. Nom. *Linn.*

46. *Auge*, der *amerikanische Augeschwärmer*.†)

Müller l. c. p. 647. no. 46. das *Spießhorn*.

Fabric. S. E. p. 554. *Zygaena Auge* no. 20.

Sanguineo-cyaneoque variegata, alis fenestratis: marginibus nigris.

47. *Statice*, der *kleine goldgrünchangirende Schwärmer*.

Müller l. c. p. 648. no. 47. t. 20. f. 8. der *Taubenhals*.

N 4

Fließ-

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Füßlins Schweiz. Inf. p. 33. no. 630. Sph. *Statice*,
der *Taubenhals*.

Nicht selten in Wiesen und Feldern auf Blumen.

Berlin. Magaz. II. p. 186. no. 17. Sph. *Statice*, der
Taubenhals.

Oberflügel und Leib glänzendgrün; Unterflügel braun.

Stralsf. Magaz. I. p. 226. goldgrüne *Grasenule* (Sph. *Statice*).

Naturforscher VII. p. 106. no. 17. Sph. *Statice*.

Das *Männchen* hat kammförmige Fühlhörner.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 46. G. no. 10. *Seenelkenschwärmerraupe* (*Statice Armeriae*); *Seenelkenschwärmer*.

(In verschiedenen Jahren wohl hundert *Raupen* auf Schlehen (*Pruno Spinosa* L.), niemals aber eine auf Seenelken. Kann nicht L. unrecht berichtet seyn?)

Gladbachs Besch. I. p. 35. t. 16. f. 1. 2. *Mas*; f. 3. *Foem.* Sph. *Statice*, der grünblaue *Fliegenvogel*; der *Taubenhals*.*)

Esper's Schmetterl. II. t. 18. f. 2. a. *Mas*; f. 2. b. *Foemina*.

Onomat. hist. nat. P. VII. p. 255. Sph. *Statice*, der *Taubenhals*.

Bekm. Epit. S. L. p. 161. no. 47. Sph. *Statice*, der *Taubenhals*. Nom. *Linn.*

Lyonet für *Lesser* I. p. 167. (*Neue Mannigfalt.* III. p. 98. 99.)

Raupe häutet sich auf neunmal.

Raj.

*) Wie kann *Gladbach* sagen: dessen *Raupe* noch unbekannt, da sie die *Theresianer* bey Hunderten gehabt haben?

Raj. Hist. Inf. p. 134. no. 3.

Papilio parva, alis pendulis, corpore et alis undique viridibus, aut coeruleis.

Scop. Ent. carn. p. 190. no. 484. Sph. *Statice*.

Long. lin. 6. Lat. 3.

Alae *anticae* supra viridi-coerulescentes; *subtus* una cum posticis utrinque umbrinae. Antennae *maris* pectinatae.

Conjungit *Sphinges* cum *Phal. Bombycibus*.

Fabric. S. E. p. 555. *Zygaena* *Statice* no. 26. Nom. Linn.

Schaeff. Icon. t. 1. f. 8. 9.

Sphinx alis *integris* cauda *simplici* prima, erster *Dämmerungsfalter* mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Geoffr. Inf. II. p. 129. no. 40.

La *Turquoise*.

Long. 6 lign.

Phalaena *pectinicornis* *spirilinguis* viridi-coerulea nitens; alis inferioribus fuscis.

Système Natur. du Regne anim. II. p. 149. no. 29.

Phalaena viridi-coerulea, nitens, alis inferioribus fuscis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 38. no. 347. Sph. *Statice*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1346. Sph. *Statice*. Nom. Linn.

In *Copula* reperi *marem* coerulescentem, *foeminam* viridem. *Ova* lutea sunt.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. pag. 255. no. 2. t. 3. f. 8. *Papillon-phalene Turquoise*.

— à antennes en massue, et à barbes, d'un verd doré et luisant; à ailes inférieures brunes.

— Uebersf. II B. I Th. p. 183. no. 2. t. 3. f. 8. die *Türkis-Papilions-Phaläne*.

Der *Türkis*, oder die grünlichgoldne und glänzende *Papilionsphaläne* mit keulenförmigen gebärteten Fühlhörnern, und braunen Unterflügeln.

Unabgebildete Schwärmer.

1. No. 10. Sph. *Capensis.*
2. No. 23. — *Tisiphone.*
3. No. 26. — *Ixion.*
4. No. 28. β. — *Tityus.*
5. No. 33. — *Auxo.*
6. No. 41. — *Cassandra.*
7. No. 43. — *Infauſta.*
8. No. 45. — *Pugione.*
9. No. 46. — *Auge.*

Neue Schwärmerarten.

I. *Aechte (Legitimæ).*

1. Sph. *Lugubris*, der amerikanische Trauerschwärmer.

Linn. Mantiff. p. 537. Sph. Lugubris.

Alis angulatis ferrugineo - fuscis, puncto atro: corpus magnitudine Sph. Elpenor.

In America: Antigua.

Fabric. S. E. p. 537. no. 2. Sph. Lugubris.

Alis angulatis brunneis; anticis puncto sub-ocellari atro.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 61. t. 28. f. 2. Sphinx Lugubris.

Il déploie ses ailes environ deux pouces et trois quarts — de Antigua.

Müllers

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 301. no. 5. a. Sph. *Lugubris*, der *Dämmerungsvogel*.

2. *Tetrio*, der *amerikanische Flekbauch*.*)

Linn. Mantiss. p. 538. Sph. *Tetrio*.

Alis *denticulatis* cano-nebulosis; abdomine subtus maculis quatuor nigris: corpus magnitudine Sph. *Atropos*, cano-cinereum.

Fabric. S. E. p. 540. no. 14. Sph. *Tetrio*.

Alis *dentatis*, cinereis, fusco-variis; abdomine subtus albo; punctis quatuor ferrugineis.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 301. no. 5. b. Sph. *Tetrio*, der *Vierek*.

3. *Tersa*, der *maryländische braungeftrichelte Schwärmer*.

Linn. Mantiss. p. 538. Sph. *Tersa*.

Alis *integerrimis* glaucescentibus, fusco-lineatis; subtus testaceis fusco-punctatis.

Corpus statura Sph. *Porcelli*.

In *Marylandia*, *Jamaica*, *Antigua*.

Fabric. S. E. p. 547. no. 36. Sph. *Tersa*.

Alis *integris* griseis, puncto fusco; posticis nigris, basi fasciaque maculari albis.

In *America meridionali*.

Drury Illustr. of. nat. hist. p. 61. t. 28. f. 3. Sphinx *Tersa*.

Il déploie ses ailes environ trois pouces — de *Maryland*, de la *Jamaïque*, *St. Christopher* et *Antigua*.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 302. no. 24. a. Sph. *Tersa*, die *Langlinie*.

4. *Stri-*

*) Nicht abgebildet.

4. *Strigilis*, der *amerikanische gestreifte Schwärmer.*

Linn. Mantiss. p. 538. Sph. *Strigilis*.

Alis integris; superioribus supra nebulosis,
puncto fusco; inferioribus luteis strigis fuscis.

Corpus mediae magnitudinis.

In *America*.

Fabric. S. E. p. 539. no. 10. Sph. *Strigilis*.

Alis integerrimis, griseis; posticis fulvis, strigis fuscis.

In Insula *St. Crucis in America*.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 62. t. 28. f. 4. Sph. *Strigilis*.

Il déploie ses ailes environ cinq pouces et un quart — de la *Jamaïque*.

Cramer Pap. exot. IX. t. 106. fig. B. Sph. *Strigilis*
— de *Curacao* et de *Jamaïque*.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 302. no. 48. Sph. *Strigilis*, der *Braunstrich*.

5. *Hylas*, der *chinesische Hylaschwärmer*.*)

Linn. Mantiss. p. 539. Sph. *Hylas*.

Alis fenestratis; abdomine fascia purpurascente: corpus affine fuciformi.

Fabric. S. E. p. 547. *Sesia* *Hylas* no. 2.

Alis fenestratis; abdomine barbato, viridi, cingulo purpureo.

In *China*.

Anus barbatus, barbae lateribus nigris, puncto baseos albo.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 303. no. 50. Sph. *Hylas*, der *Hylas*.

6. *Satel-*

*) Nicht abgebildet.

6. *Satellitia*, der *jamaische Nebelschwärmer*.

Linn. Mantiss. p. 539. Sph. Satellitia.

Alis integris griseo-nebulosis, superioribus puncto nigro ocellari fesquialtero; inferioribus basi cinereis.

In Jamaica.

Corpus e maioribus.

Fabric. S. E. p. 542. no. 20. Sph. Satellitia. Nom. Linn.

Drury Illustr. of nat. hist. p. 63. t. 29. f. 1. Sph. Satellitia (Foemina).

Il déploie ses ailes près de cinq pouces et demi.

— — — *f. 2. Mas. Il déploie ses ailes quatre pouces et un quart — de la Jamaïque.*

Müllers Suppl. und R. B. p. 303. no. 51. Sph. Satellitia, der Trabant.

7. *Obscura*, der *amerikanische aschgraue Schwärmer*.*)

Fabric. S. E. p. 538. no. 6. Sph. Obscura.

Alis dentatis; posticis rubris, margine nigro; abdomine supra pallido, immaculato.

Statura Sph. Ello, at paulo minor — In America.

8. *Iatrophæ*, der *amerikanische Iatrophenschwärmer*.

Fabric. S. E. p. 538. no. 8. Sph. Iatrophæ.

Alis subdentatis, posticis nigris, basi rufis fasciaque fenestrata, capite bicorni.

In Americae Iatropa gossypifolia.

Nostratibus multo major.

Larva viridis, cauda moniliformi.

Pupa brunnea, cauda cylindrica, inflexa.

Drury

*) Nicht abgebildet.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 43. t. 25. f. 1. Sph.
Antaeus. (La Femelle) déploye ses ailes sept
pouces et un quart —

— le Mâle six pouces — de la Jamaïque.

Merian. Surin. t. 38.

9. *Clotho*, der *Klothoschwärmer*.

Fabric. S. E. p. 540. no. 12. Sph. *Clotho*.

Alis *integerrimis*; *anticis* viridibus; *posticis*
disco coerulescente; abdomine subtus utrinque
punctis quinque niveis.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 48. t. 28. f. 1. Sph.
Clotho.

Il déploye ses ailes presque quatre pouces —
de *Madras*.

10. *Rustica*, der *amerikanische Bauernschwärmer*.

Fabric. S. E. p. 540. no. 15. Sph. *Rustica*.

Alis *variegatis*, puncto medio albo; abdo-
mine ocellis trium parium fulvis.

Sulzers Gesch. p. 151. t. 20. f. 2. der *Bauer*; Sph.
Rustica.

Die Farbe der Vorderflügel und des Leibes
aschgrau, rothfarb und schwarz gemengt, ein
weißser Punkt in der Mitte; drey Paar unge-
wöhnliche Flekke auf dem Leibe.

Aus *Amerika*.

11. *Lineata*, der *amerikanische Linienschwärmer*.*)

Fabric. S. E. p. 541. no. 18. Sph. *Lineata*.

Alis virescentibus, fascia strisque albis; po-
sticis nigris, fascia rubra.

Statura Sph. *Euphorbiae*.

12. *Olden*.

*) Nicht abgebildet.

12. *Oldenlandiae*, der indianische Oldenlandische Schwärmer. *)

Fabric. S. E. p. 542. no. 21. Sph. Oldenlandiae.

Alis integerrimis griseis, vitta argentea punctoque medio fusco; abdomine lineis tribus punctorum nigrorum.

Mediae magnitudinis.

In Indiae Oldenlandiis, vite.

13. *Boerhaviae*, der Boerhavienschwärmer.

Fabric. S. E. p. 542. no. 22. Sph. Boerhaviae.

Alis integris cinereis; posticis rubris, apice fuscis; abdomine griseo, vtrinque linea aurea.

In Indiae Boerhaviis.

Duplo minor Sph. Oldenlandiae.

Sulzer's Gesch. p. 151. t. 20. f. 8. der Boerhavienvogel;

Sph. Boerhaviae.

Ganze aschgraue Vorderflügel; die hintern roth, am Rande schwärzlich; der Hinterleib grau mit einer goldnen Linie zu beyden Seiten.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 457. no. 5. der Boerhavienschwärmer.

14. *Didyma*, der amerikanische Zwillingpunkt. **)

Fabric. S. E. p. 543. no. 23. Sph. Didyma.

Alis integris, fuscis; anticis punctis duobus approximatis, albis.

15. *Parce*, der brasilianische Parzeschwärmer. †)

Fabric. S. E. p. 543. no. 24. Sph. Parce.

Alis integris; anticis griseis, lunula media argentea; posticis rufescentibus.

16. *Cin-*

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

16. *Cingulata*, der *amerikanische Gürtelschwärmer*.*)

Fabric. S. E. p. 545. no. 29. *Sph. Cingulata*.

Alis integris; *posticis* nigro - fasciatis, basi sanguineis margine albo-punctatis; abdomine cingulis sanguineis atrisque.

17. *Gnoma*, der *indianische Gnomaschwärmer*.**)

Fabric. S. E. p. 546. no. 32. *Sph. Gnoma*.

Alis integris cinereis; *posticis* supra vitta nigra.

Statura et magnitudo *Sph. Alesto*.

18. *Hespera*, der *ostindianische Hesperaschwärmer*.***)

Fabric. S. E. p. 546. no. 18. *Sph. Hespera*.

Alis integris; *anticis* viridi-nebulosis; *posticis* fuscis, immaculatis.

19. *Thysbe*, der *amerikanische Thysbeschwärmer*.†)

Fabric. S. E. p. 548. no. 19. *Sesia Thysbe*.

Abdomine *barbato*, postice fusco; alis nigris, macula hyalina.

20. *Haemorrhoidalis*, der *indianische Rothafter*.††)

Fabric. S. E. p. 549. no. 7. *Sesia Haemorrhoidalis*.

Alis hyalinis; margine strigae nigris; ano *barbato* sanguineo.

Mediae magnitudinis.

21. *8-maculata*, der *indianische Achtflek*.†††)

Fabric. Append. S. E. p. 830. no. 3-4.

Sesia alis atris; maculis duabus anticarum flavis, posticarum albis. — *Parva*.

22. *Lusca*,

*) Nicht abgebildet. **) Nicht abgebildet. ***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet. ††) Nicht abgebildet. †††) Nicht abgebildet.

22. *Lusca*, der amerikanische blindäugigte Schwärmer. *)

Fabric. Mantiss. p. 272. no. 2-3. *Sphinx* *Lusca*.

Alis angulatis obscuris, puncto atro; posticis atris, fascia fulva.

Statura *Sph. Lugubris*.

23. *Fenestrina*, der österreichische glasmaklichte Schwärmer.

Fabric. Mantiss. p. 272. no. 3-4. *Sphinx* *Fenestrina*.

Alis eroso-dentatis fusco-aureis: maculis duabus fenestratis.

Magnitudo maioris Muscae.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. F. no. 7. Raupe unbekannt. Glasmakelichter Schwärmer; *Sph. Fenestrina*.

24. *Plebeja*, der amerikanische Pöbelschwärmer.

Fabric. Mantiss. p. 273. no. 16-17. *Sph. Plebeja*.

Alis integris griseis, puncto medio albo; abdominis lateribus albis, nigro-marginatis.

In Americae insula *St. Crux*.

Magnitudo *Sph. Pinastri*.

25. *Pluto*, der amerikanische Plutoschwärmer.

Fabric. Mantiss. p. 274. no. 22-24. *Sph. Pluto*.

Alis integris virescentibus; posticis fuscis fascia fulva; abdomine subtus aureo.

In America meridionali.

Mediae magnitudinis.

26. *Melas*,

*) No. 22 — 25. nicht abgebildet.

26. *Melas*, der *surinamische Melaschwärmer*.

Fabric. Mantiss. p. 274. no. 2-3. *Sesia* *Melas*.

Alis fenestratis, margine atro; abdomine cyaneo, basi atro; cingulis tribus flavis.

Magnitudo Sph. *Hylas*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 71. t. 45. fig. G. Sph. *Melas*
— de *Suriname*.

27. *Galii*, der *Labkrautschwärmer*.

Fabric. Mantiss. p. 273. no. 17-18. Sph. *Galii*.

Alis integris virescentibus vitta alba; *posticis* pallidis basi strigaeque atra, antennis fuscis.

In *Germaniae Galio*.

Nimis affinis Sph. *Euphorbiae*.

Schaeff. Icon. t. 78. f. 1. 2.

Sphinx *alis integris* cauda *simplici* sexta, 6ter
Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und ein-
fachem Schwanze.

Pallas Spicil. Zool. XI. *Sphinx* *Francofurtana*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 42. C.
no. 2. *Sphinx* *Galii*, *Wallstrohschwärmerraupe*
(*Galii veri*); *Wallstrohschwärmer*.

— — p. 146. 147. Sph. *Galii* ist *Schäffers* Sph.
t. 78. f. 1. 2. — entstehet aus einer ganz andern
Raupe als *Euphorbiae*, die nie Wolfsmilch frisst,
sondern von der *Färberröthe* (*Rubia*), *Wallstrok*
(*Galium*) und dem *Waldmeister* (*Asperula*) lebt.
Berlin. Magaz. II. p. 192. Anm. 4. wo *Raupe* und
Vogel nach standhaften Unterscheidungszeichen
bestimmt, aber doch diese Art von dem *Sphinx*
Euphorbiae noch nicht abgefondert worden.

Röfels Insektenbel. III. p. 33. t. 6. f. 1. 2. 4. *Raupe*.

Kleemanns Raupenkal. p. 52. Anm. (*).

Die untere Seite der vier Flügel des Schwär-
mers

mers nichts *Roths*, wie *Euphorbiae*, sondern
 blasolivengrün.

Naturforscher I. p. 244. die Raupe auch auf dem
Wegebreit und *Weiden*: vom *Sph. Euphorbiae*
 unterschieden (*Meineke*).

— — III. p. 22. *Sph. Galii* (*D. Kühn*).

— — VII. p. 107. no. 1. *Sph. Galii*; standhaft
 vom *Sph. Euph.* unterschieden (*Herr von Rot-*
tenburg).

Esper's Schmetterl. II. t. 21. Suppl. III. *Sph. Galii*.

Gladbach's Besch. pag. 18. t. 9. f. 1. das *Männchen*;
 f. 2. das *Weibchen*; *Sph. Galii*, die *rare Esula*.

— — p. 71. t. 32. f. 1. 2. 3. die *Raupe* nebst ih-
 rem *Gespinnst* und *Puppe* von der raren schwar-
 zen *Esula*.

Degeer Inf. Tom. I. p. 162. t. 8. f. 6. 11.

Grande *Chenille* très-rase, couleur d'olive
 verdâtre, à grandes taches couleur de soufre,
 bordées de noir, et à corne rouge sur le der-
 rière, du *Caille-lait*.

— *Uebers.* I. 1 Quart. p. 122. t. 8. f. 6. 11. die große,
 ganz glatte olivengrüne, auf dem Labkraut (*Ga-*
lio) lebende Raupe, mit großen schwefelgelben,
 schwarzgerändelten Flekken, und einem rothen
 Horn hinten auf dem Rücken (*Anm.* *).

— — p. 694. t. 8. f. 9. 11. *Phalene* à antennes
 prismatiques d'un vert obscur, dont les ailes su-
 périeures ont une large bande découpée blanche.

— *Uebers.* I. 4 Quart. p. 116. t. 8. f. 9. 11. ein dun-
 kelgrüner Nachtvogel mit prismatischen Fühl-
 hörnern und einer breiten weissen ausgezakten
 Streife auf den Oberflügeln (*Sph. Galii*).

— Tom. II. Part. I. p. 236. no. 2. *Papillon-bourdon*
du Caille-lait.

— à antennes prismatiques, et à longue trompe,
 O 2 d'un

d'un verd obscur, dont les ailes supérieures ont une bande longitudinale découpée blanche, et les inférieures une tache rouge.

Degeers Inf. Uebersf. II B. I Th. p. 169. der Galium-schwärmer.

Der dunkelgrüne *Wallstrohschwärmer* mit prismatischen Fühlhörnern und langem Saugrüssel, dessen Oberflügel eine weisse, längs herunterlaufende ausgezakte Streife, die Unterflügel aber einen rothen Flek haben.

28. *Quercus*, der *Eichenschwärmer*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 41. A. no. 2. Eichenschwärmerraupe (Quercus roboris) t. I. a. f. I. Eichenschwärmer t. I. b. f. I.

— — pag. 244. der *Eichenschwärmer*, *Sphinx Quercus*.

Alis angulatis; primoribus testaceis bifasciatis; posticis rufis.

Larva viridis, striis obliquis pallidis, alternis latioribus.

Espers Schmett. II. t. 19. Suppl. I. Sph. Quercus.

29. *Oenotherae*, *Nachtkerzenschwärmer*.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 43. E. no. 1. Nachtkerzenschwärmerraupe (Oenotherae biennis); Nachtkerzenschwärmer.

S. Titelpuffer und Erklärung p. 239. Sphinx Oenotherae.

Füeslins Magaz. der Entomol. 2 B. 1 St. p. 65. t. 1. f. 9. 10. Sph. Oenotherae.

Espers Schmetterl. II. t. 20. Suppl. II. Sph. Oenotherae.

30. *Tenthrediniformis*, schlupfwespenähnlicher Schwärmer.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. F. no. 6. *Unbekannte Raupe.*

31. *Ichneumoniformis*, raupentödterähnlicher Schwärmer.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 44. no. 7. *Unbekannte Raupe.*

32. *Afiliformis*, raubfliegenähnlicher Schwärmer.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. Nachtr. p. 305. no. 9. *Unbekannte Raupe.*

Naturforscher VII. p. 108. no. 2. Sph. *Afiliformis.*

33. *Afiliformis exotica*, der indianische raubfliegenähnliche Schwärmer.

Fabric. Append. Syst. Ent. p. 830. no. 2-3.

Alis eroso-dentatis; *anticis* cinereis fascia obscuriore, puncto nigro; *posticis* rubris margine nigro.

34. *Spheciformis*, raupenfresserähnlicher Schwärmer.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. Nachtr. p. 306. no. 10. *Unbekannte Raupe.*

35. *Oestriformis*, der viehbremenähnliche Schwärmer.

Naturforscher VII. p. 109. no. 3. Sph. *Oestriformis.*

Espers Schm. II. t. 23. Suppl. 5. f. 3. Sph. *Oestriformis.*

36. *Tabaniformis*, der viehfliegenähnliche Schwärmer.

Naturf. VII. p. 110. no. 4. Sph. *Tabaniformis.*

Medius inter Sph. *Apiformem* et *Culiciformem* L.

37. *Proserpina*, der kleinste *Sphinx* mit ausgeschweiften Flügeln.

Pallas Spicil. Zool. Fasc. IX. p. 26. t. 2. f. 7. *Sphinx Proserpina*.

Magnitudine *Sph. Porcelli*; figura et colore *Sph. Tiliae*.

— Uebersf. IX. p. 34. t. 2. f. 7. der kleinste *Sphinx* mit ausgeschweiften Flügeln. *)

38. *Medusa*, der *Medusafchwärmer*.

Pallas Reisen durch Rußl. Ausz. I. Anh. pag. 20. no. 67. *Sph. Medusa*.

Magnitudo et facies *Sph. Phegeae*, tota atrocoerulea nitidissima; abdomen cingulo carmineo — habitat in *Athamanta cervaria*.

Müllers Suppl. und R. B. p. 305. no. 54. *Sph. Medusa*, die *Meduse*.

39. *Cruenta*, der *Blutschwärmer*.

Pallas Reisen Ausz. I. Anh. pag. 35. no. 94. *Sphinx Cruenta*.

Magnitudine et forma *Sph. Phegeae*; eya-neo-atra, sericea. Cingulum abdominis rubrum. Alae primariae maculis rubris, albo-marginatis quinis, quarum mediae confluentes; secundariae rubrae, nigro-marginatae. **)

In

*) In der Uebersetzung heist es: er gleiche an Grösse und Dicke des Kopfs dem *Sphinx* der wilden Röthe (*Sph. Stellatarum*).

**) Sollte dieses nicht die Abänderung des *Sph. Carniolica* Scop. no. 478. feyn: cingulo abdominis rubro, die *Esper* II. r. 17. f. 4. b. für eine Abänderung des *Cassra* ausgiebt? Allein die Maculae rubrae quinae, albo-marginatae auf den Oberflügeln zeigen offenbar, dafs es nicht *Cassra*, sondern *Carniolica* sey; nur mit

In Australibus ad *Volgam* et *Irtin*, locis herbidis non infrequens sub initium *Julii*.

Müllers Suppl. und R. B. p. 305. no. 55. Sph. *Cruenta*, der *Blutring*.

40. *Steropes*, der *Steropes*schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 54. t. 25. f. 3. Sphinx *Steropes*.

Totus ater; alis *integris* atris, maculis canescentibus; pedibus rufis; antennisque nigris *pectinatis*.

Il déploie ses ailes près de deux pouces et demi — de la *Jamaïque*.

Je ne le trouve décrit par aucun auteur.

41. *Affinis*, der amerikanische dem *Windig- und Ligustervogel* ähnliche Schwärmer. *)

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 54. t. 25. f. 4. Sph. *Affinis*.

E maximis. Alis *integris*; anticis fusco-cinerascentibus, tribus in una characteribus glaucis, binis caudatis; posticis basi hilare rubris; abdomine cingulis rubro-nigris. Sph. *Convoluti* et *Ligustri* similis; toto autem habitu diversus.

— de *St. Christopher's*.

Il déploie ses ailes environ quatre pouces et demi.

Je ne le trouve décrit par aucun auteur.

O 4

42. Sa-

mit der einzigen Abänderung des cinguli abdominis rubri. Scopoli hat den Umstand auch nicht übersehen: Maculae alarum una vel duae connatae.

*) S. unsere Anmerk. bey Sph. *Convoluti*. no. 6.

42. *Sagittata*, der jamaïsche Pfeilschwanz.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 56. t. 26. f. 3. *Sphinx*
Sagittata.

Alis integris; anticis abdomineque sagittato
fuscis, binis punctis utrinque albis; posticis atris;
maculis quinque flavissimis.

— de la Jamaïque.

Il déploie ses ailes environ trois pouces et
demi.

— ne décrit par aucun auteur.

43. *Terpunctata*, der amerikanische dreypunktirte
Schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 57. t. 26. f. 5. *Sph.*
Terpunctata.

Alis integris furvo-cinerascentibus, nigro-
friatis, abdominis cingulo albo; ano barbato.

— de St. Christopher.

Il déploie ses ailes près de deux pouces et un
quart.

— ne décrit par aucun auteur.

44. *Flavicans*, der jamaïsche Gelbling.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 58. t. 27. f. 1. *Sph.*
Flavicans.

Alis denticulatis; anticis fusco-undulatis;
posticis dimidio flavis, dimidio atris; ano piloso.

— de la Jamaïque.

Il déploie ses ailes près de quatre pouces et
un quart.

— ne décrit par aucun auteur.

45. *Ocellata jamaicensis*, das jamaische Abendpfauen-
auge.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 43. Tab. 25. f. 2. 3.

Sph. *Ocellata*.

Alis *angulatis*, rubicundo-viridibus; *posticis*
pallide-flavis, disco rubello, nigro-lineato;
ocellis coeruleis binis, atro-marginatis.

— de la *Jamaïque*.

Il déploie ses ailes deux pouces et trois huitièmes.

— ne décrit par aucun auteur.

46. *Astylus*, der neuyorkische *Astylus*schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 45. t. 26. f. 2. Sph.

Astylus.

Alis *angulatis*; *anticis* fusco-rubris, apice
undulatis; *postice* apice rubris, medio et basi
flavis; *binis ocellis* coeruleis, margine nigro-
striato.

— de la *nouvelle York*.

Il déploie ses ailes deux pouces et sept huitièmes.

— ne décrit par aucun auteur.

47. *Hylaeus*, der neuyorkische *Hylaeus*schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 45. t. 26. f. 3. Sph.

Hylaeus.

Alis integris, fusco-nigris, lineis transversis
atris undulatis; basi albis; punctis *anticarum*
utrinque binis albis.

— de la *nouvelle York*.

Il déploie ses ailes deux pouces et demi.

— ne décrit par aucun auteur.

Cramer Pap. exot. IX. p. 16. t. 107. fig. C. Sph. *Hylaeus*.

— de la nouvelle York.

48. *Nessus*, der *Madras Nessus*schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 46. t. 27. f. 1. Sph. *Nessus*.

E maximis. Alis apice *falcatis*; *anticis* viridi-fuscis, tribus *lineis* longitudinalibus parallelis; *posticis* nigris, basi flavis, margine viridi, nigro-striato: *abdomine* sagittato viridi-nigro-lineato, marginibus flavis.

— de *Madras*.

Il déploie ses ailes presque cinq pouces.

— ne décrit par aucun auteur.

49. *Astreus*, der *bengalische gestirnte* Schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 49. t. 28. f. 4. Sph. *Astreus*.

Alis *integris* carneis, apice viridi-striatis; *thoracis* punctis decem; binis utrinque ad basin *anticarum* nigris.

— de *Bengale*.

Il déploie ses ailes presque trois pouces.

— ne décrit par aucun auteur.

50. *Achemon*, der *jamaïsche Achemon*schwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 51. t. 29. f. 1. Sph. *Achemon*.

E maximis. Alis *angulatis*, coloris lila, fusco-maculatis; *posticis* basi rubris, quatuor ad marginem utrinque lituris nigris.

— de la *Jamaïque*.

Il déploie ses ailes quatre pouces et un quart.

— ne décrit par aucun auteur.

51. *Passalus*, der chineſiſche *Passalusſchwärmer*.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. II. p. 52. t. 29. f. 2. *Sph. Passalus*.

Totus *caſtaneus*; alis integris; *poſticis* ad baſin flavis, tribus margine abdominis maculis flavis; ano orbiculato.

— de la Chine.

Il déploie ſes ailes deux pouces.

— ne décrit par aucun auteur.

52. *Brontes*, der newyorkiſche *Brontesſchwärmer*.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. II. p. 53. t. 29. f. 4. *Sph. Brontes*.

E. maximis. Alis *angulatis* variegatis; abdominis binis punctis fulcis.

— de la nouvelle York.

Il déploie ſes ailes quatre pouces.

— ne décrit par aucun auteur.

53. *Cluentius*, der weſtindianiſche *Kluentiusſchwärmer*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 124. t. 78. fig. B. *Sph. Cluentius* (Mas) — des *Indes occidentales*.

Alis integris fulco-nigris, atroque maculatis; *poſticis* baſi aurantiacis; abdomine decem maculis aurantiacis marginalibus. Lingua admodum longa.

— — XI. p. 43. fig. A. *Sph. Cluentius* (Fœmina) — de Suriname.

54. *Fadus*, der ſurinamiſche *Fadusſchwärmer*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 95. t. 61. fig. C. *Sph. Fadus* — de Suriname.

Alis obtuſe-angulatis, fulco-nigris; anticis faſciis utrinque binis tranſverſis albo-nigris articulatis: ano barbato.

55. *Japix*, der *newyorkische Japixschwärmer.*

Cramer Pap. exot. VIII. p. 138. t. 87. fig. C. Sph. *Japix* — de la *nouvelle York.*

Alis denticulatis fuscis, admodum variegatis: Gagatis instar.

56. *Licaon*, der *westindianische Likaonschwärmer.*

Cramer Pap. exot. V. p. 86. t. 55. fig. A. Sph. *Licaon* — des *Indes occidentales.*

Magnus. Alis integris; anticis fuscis, variegatis; utrinque fasciis transversis quatuor nigris undulatis; posticis virescentibus, binis maculis grandibus fuscis.

57. *Lycetus*, der *bengalische Lyzetuschwärmer.*

Cramer Pap. exot. VI. p. 96. t. 61. fig. D. Sph. *Lycetus* — dans les *Indes, à Bengale; sur les côtes de Coromandel et de Ceylon.*

Statura Sph. Celerio. Alis integris fusco-flavicanibus; posticis brunneis, basi ferrugineis: anticis, thorace abdomineque aureo-striatis.

58. *Peneus*, der *sierraleonische Peneuschwärmer.*

Cramer Pap. exot. VIII. p. 139. t. 88. fig. D. Sph. *Peneus* — à la *Sierra Leona* sur la côte d'or de l'*Afrique.*

Alis fusco-albicantibus; posticis angulatis; anticis utrinque binis maculis albis; ano piloso.

59. *Phorbas*, der *ost- und westindische Phorbaschwärmer.*

Cramer Pap. exot. V. p. 86. t. 55. fig. B. Sph. *Phorbas* — des *Indes orientales, ou bien des Indes occidentales.*

Ex maximis. Alis integris furvis: *anticis* griseo-flavo-striatis, cyaneoque fasciatis; *posticis* flavo-maculatis.

60. *Pholus*, der westindische *Pholus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. VIII. p. 137. t. 87. fig. B. *Sphinx Pholus* — des *Indes occidentales*.

Alis *angulatis* fusco-rubris; *antitarum* una macula alba.

61. *Anubus*, der surinamische *Anubus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XI. p. 46. t. 128. fig. C. *Sph. Anubus* — à *Suriname*.

Statura *Sph. Celerio*.

Alis omnibus *ciliatis*; *anticis* falcatis rutilantibus, quatuor lineis longitudinalibus nigris, binis maculis obsoletis fuscis; *posticis* fusco-nigris, sex maculis albicantibus.

62. *Bubastus*, der koromandelsche *Bubastus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 84. t. 149. fig. E. *Sph. Bubastus* — de la côte de *Coromandel*.

Alis falcato-denticulatis concoloribus *oliveis*; *anticis* binis maculis albissimis, minore maioreque: ano furcato piloso.

63. *Butus*, der koromandelsche *Butus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 88. t. 152. fig. A. *Sph. Butus* — de la côte de *Coromandel*.

Alis falcato-angulatis pallide rutilantibus; *posticis* furvis margine griseo; *corpus* crassum, ingens, griseo-virescens.

64. *Caicus*, der *surinamische Kaikuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 42. t. 125. fig. C. Sph. *Caicus* — à *Suriname*.

Alis falcatis; anticis pallide fuscis, griseo-striatis; posticis rubris atro-striatis.

65. *Cajus*, der *kopenfische Kajuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 80. t. 146. fig. F. Sph. *Cajus* — au *Cap de B. E.*

Alis denticulatis fusco-nigris; albo-nigro-que striatis; abdomine tribus lineis longitudinalibus albo-aurantiacis.

66. *Ceculus*, der *surinamische Zekuluschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 80. t. 146. fig. G. Sph. *Ceculus* — à *Suriname*.

Simillimus Sph. *Belis* t. 94. fig. C.

Alis denticulatis fusco-nigris; posticarum fascia transversa flavissima; abdomine quatuor maculis aurantiacis; ano quadridentato.

67. *Chiron*, der *koromandelsche Chironschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 63. t. 137. fig. E. Sph. *Chiron* — de la côte de *Coromandel*.

Alis denticulatis concoloribus fusco-nigris; abdomine cingulis flavis, nigro-rubroque striatis.

68. *Crantor*, der *ostindianische Krantorschwärmer*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 11. t. 104. fig. A. Sph. *Crantor* — des *Indes orientales*.

Alis falcatis; anticis fuscis, atro-maculatis; posticis ciliatis rubris, nigro-lituratis; ad marginem interiorem tres maculae nigrae tessulatae.

69. *Daucus*, der nordamerikanische *Daukus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XI. p. 41. t. 125. fig. D. Sph. *Daucus* — dans l'*Amerique septentrionale*; à la nouvelle *Tork*; à la *Virginie*; et sur l'Isle de *Jamaïque*.

Houttuin Nat. Hist. P. I. p. 438. t. 90. fig. 4.

Statura Sph. *Celerio*.

Alis *integerrimis*; *anticis* fuscis, lineis transversis albo-nigris, margine cyaneo; *posticis* nigerrimis, fascia transversa lata rubra.

70. *Dentatus*, der koromandelsche *Zahnschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 42. t. 125. fig. D. Sph. *Dentatus* — à la côte de *Coromandel*.

Alis admodum *dentatis* fuscescentibus; *anticis* fasciis albo-glaucis, fusco punctatis; *posticis* fuscis concoloribus, linea transversa albissima.

71. *Drancus*, der ostindianische *Drankus*.

Cramer Pap. exot. XI. p. 56. t. 132. fig. F. Sph. *Drancus* — des *Indes orientales*.

Alis *integerrimis* fusco-nigris, striis *anticarum* longitudinalibus lividis, binis utrinque punctis atris in area oblonga livida; *abdominis* lateribus versus anum aurantiacis.

72. *Erotus*, der — *Erotus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. IX. pag. 12. t. 132. fig. B. Sphinx *Erotus* —

Ex maximis. Alis *integerrimis*; *anticis* fuscis, griseo- et pallide flavo-variegatis; binis utrinque ad basin *lituris* parallelis nigris transversis; *posticis* ferrugineis margine atro; *abdomine* crassissimo livido.

73. *Gor-*

224 *Insecta Lepidoptera*. 232. *Sphinges legitima*.

73. *Gorgon*, der *surinamische Gorgonschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 73. t. 142. fig. E. *Sph. Gorgon* — à *Suriname*.

Alis angulatis fusco - nigris; *anticis* binis utrinque globulis fuscis in disco nigro.

74. *Hydaspus*, der *surinamische Hydaspuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. X. p. 31. t. 118. fig. A. *Sph. Hydaspus* — à *Suriname*.

Omnium maximus. *Alis dentatis* fuscis, lineis rectis, curvis, undulatis nigris albisve, innumerisque lituris flavis admodum variegatis; *anticis* utrinque numero 8 distinctissime notatis; *abdominis* lateribus maculis aurantiacis albisque.

Merian. *Surin*. t. 38.

Variet. Houttuin Hist. nat. P. I. Tom. XI. p. 432. t. 90. f. 2.

75. *Morpheus*, der *koromandelsche Morpheuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 84. t. 149. fig. D. *Sphinx Morpheus* — de la côte de *Coromandel*.

Similis *Sph. Bubastus* no. 62.

Alis integris; *anticis* fusco - olivaceis; binis utrinque punctis albissimis; *posticis* furvis; *abdomine* cingulis nigris; *ano* piloso.

76. *Nechus*, der *westindische Nechuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 125. t. 178. fig. B. *Sph. Nechus* — des *Indes occidentales*.

Alis denticulatis; *anticis* viridibus, fascia transversa fusca; *posticis* furvis flavo - maculatis; thorace abdomineque viridibus, septem paribus punctorum nigrorum.

77. *Pha-*

77. *Phalaris*, der koromandelsche *Phalaris*schwärmer.

Cramer Pap. exot. Vol. II. (13 H.) p. 83. t. 149. fig. A.
Sph. *Phalaris* — de la côte de Coromandel.

Alis integris amplissimis; totus habitus *Phalaenoides*; *anticis* fusco-lividis, maculis glaucis, tribusque lineis transversis nigris; *posticis* fusco-rubris, angulo interiore glauco.

78. *Picus*, der koromandelsche *Specht*schwärmer.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 83. t. 148. fig. B. Sph.
Picus — de la côte de Coromandel.

Alis integris albis, nigro-venosis marginatisque; corpore ingenti viridi-flavo-striato; *abdominis* cingulo rubro.

79. *Titan*, der surinamische *Titan*schwärmer.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 73. t. 142. fig. F. Sph.
Titan — à Suriname.

Affimilis Sph. *Tantalus* t. 68. fig. E.

Alis integris fusco-furvis; *anticis* tribus lineis, binis albis, una flava; *abdominis* fusci cingulo albo.

80. *Pylas*, der surinamische *Pylas*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 23. t. 206. fig. A. Sph.
Pylas — à Suriname.

Alis *angulatis*, fusco-nigroque purpurascensibus.

81. *Hannibal*, der — *Hannibal*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 39. t. 216. fig. A. Sph.
Hannibal.

Magnus. Alis *subdentatis* ciliatis fuscis, fasciis transversis nigris.

82. *Paphus*, der — *Paphus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 39. t. 216. fig. B. Sph.
Paphus.

Alis *rotundato-ciliatis* nigris, lituris cyaneis.
Merian. Surin. t. 55.

83. *Oiclus*, der — *Oiklus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 39. t. 216. fig. C. Sph.
Oiclus.

Alis *angulatis* nigro-griseoque variegatis,
ano piloso.

84. *Pan*, der — *Pan*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 39. t. 216. fig. D. Sph.
Pan.

Alis *angulatis* nigro-aurantiacoque variega-
tis, ano piloso.

85. *Pluto*, der — *Pluto*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 40. t. 216. fig. E. Sph.
Pluto.

Alis *angulatis*, fusco-griseoque nigris; ano
late-piloso.

86. *Triptolemus*, der — *Triptolemus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 40. t. 216. fig. F. Sph.
Triptolemus.

Alis *subdentatis* atro-testaceis, linea margi-
nali undulata flava, ano piloso.

87. *Panopus*, der *javanische Panopus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 50. t. 224. fig. A B.
Sph. *Panopus* — de l'Isle de Java.

Alis

Alis amplissimis, *dentato-ciliatis*, rubro-griseo-viridibus, punctatis; *anticis* ocello nigro coeco.

88. *Anchemolus*, der *surinamische Anchemolus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 50. t. 224. fig. C. Sph.
Anchemolus — à *Suriname*.

Alis longis *subdentatis*, fusco-nigro-viridibus, linea marginali undulata flavicante.

89. *Caunus*, der *surinamische Kaunus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 52. t. 224. fig. E. Sph.
Caunus — à *Suriname*.

Alis *fenestratis* nigro-venosis, abdomine rubro.

90. *Almon*, der *surinamische Almon*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 52. t. 224. fig. F. Sph.
Almon — à *Suriname*.

Alis nigris, albo-fasciatis, abdomine nigro, aureo-lineato.

91. *Camertus*, der *surinamische Kamertus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 53. t. 225. fig. A. Sph.
Camertus — à *Suriname*.

Alis *subdentatis*, fordide fuscis; *anticis* medio purpurascens.

92. *Danum*, der — *Danum*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 53. t. 225. fig. B. Sph.
Danum.

Alis *subdentatis* purpurascens, corpore rubiginoso, albo-lineato.

93. *Achemenides*, der — *Achemenides*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 53. t. 225. fig. C. Sph.
Achemenides.

Alis subfalcatis furvis, viridi-striatis.

94. *Fegeus*, der — *Fegeus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 53. t. 225. fig. E. Sph.
Fegeus.

Alis angulatis nigro-fuscis, linea marginali
aurantiaca.

95. *Lyctus*, der — *Lyctus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 56. t. 225. fig. F. Sph.
Lyctus.

Alis dentatis concoloribus ferrugineis.

96. *Aeas*, der *kapensische Aeas*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 57. t. 226. fig. A. Sph.
Aeas — au Cap de B. E.

Alis subfalcatis; *anticis* viridi-micantibus;
posticis rubris.

97. *Cecrops*, der *kapensische Zekrops*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. pag. 57. t. 226. fig. B.
Sph. *Cecrops* — au Cap de B. E.

Alis subfalcatis; *anticis* griseo-viridibus; *posticis* rubris, atro-lituratis.

98. *Eson*, der *kapensische Eson*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 57. t. 226. fig. C. Sph.
Eson — au Cap de B. E.

Alis subfalcatis; *anticis* fusco-alboque striatis;
posticis rubris, basi margineque nigris.

99. *Nessus*, der javanische *Nessus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 58. t. 226. fig. D. Sph.
Nessus — de l'Isle de Java.

Alis amplissimis *subfalcatis*, viridi-griseoque
variegatis; *posticis* purpurascens, fascia trans-
versa flavicante.

100. *Polidamon*, der kapensische *Polidamon*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 75. t. 237. fig. B. Sph.
Polidamon — au Cap de B. E.

Alis *rotundatis* nigris, aurantiaco-maculatis.

101. *Tiburtus*, der surinamische *Tiburtus*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 75. t. 237. fig. C. Sph.
Tiburtus — à Suriname.

Statura Sph. *Phegae*.

Alis *rotundatis* nigris, albo-maculatis, ad
basin auro splendentibus; abdomine inaurato,
binis lineis longitudinalibus nigris. *)

II. *Unächte* (Adscitae).

102. *Thetis*, der jamaikanische *Thetis*schwärmer.

Linn. Mantiss. p. 539. Sph. *Thetis*.

Coerulea; humeris rubro-punctatis; alis ni-
gris; *superioribus* apice, *inferioribusque* disco
hyalinis.

Corpus paulo maius *Tabano* in Jamaica.

Fabric. S. E. p. 552. no. 8. *Zygaena Thetis*. Nom.
Linn.

P 3

Drury

*) Sph. *Vespertilio*: Espers Schmetterl. II. t. 22. Suppl. 4. f. 4.
noch ohne Text. — *Fenestrina* l. c. t. 23. Suppl. 5. f. 1. 2.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 57. t. 26. f. 4.
Sph. *Thetis* — de la *Jamaïque*.

Il déploie ses ailes près d'un pouce et demi.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 303. no. 49. Sph. *Thetis*, die *Thetis*.

103. *Annulata*, der *neuholländische Ringelschwärmer*.

Fabric. S. E. p. 551. no. 4. *Zygaena Annulata*.

Nigra; alis *anticis* maculis sex; *posticis* basi maculaque flavis; abdomine flavo annulato.

In *Nova Hollandia*.

104. *Guineensis*, der *guineische Schwärmer*.

Fabric. S. E. p. 551. no. 6. *Zygaena Guineensis*.

Alis fuscis; maculis duabus albis; abdomine cyaneo, cingulo fulvo; *antennis pectinatis*.

105. *Fenestrata*, der *chinesische gefensterter Schwärmer*.

Fabric. S. E. p. 552. no. 9. *Zygaena Fenestrata*.

Alis fuscis; maculis *anticarum* quatuor; *posticarum* una hyalinis; abdomine flavo nigroque annulato.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 50. t. 28. f. 5.
Sph. *Fenestrata* — de la *Chine*.

Il déploie ses ailes près d'un pouce et trois quarts.

106. *Eryx*, der *südamerikanische Eryxschwärmer*.

Fabric. S. E. p. 552. no. 11. *Zygaena Eryx*.

Alis atris; *anticis* basi aureis; macula media abdomineque subtus sanguineis.

107. *Melissa*, der — *Melissaschwärmer.*

Fabric. S. E. p. 553. no. 12. *Zygaena Melissa.*

Alis atris; disco hyalino; abdomine nigro,
lineis tribus aureis; ano fulvo.

Statura Sph. *Polymenae.*

108. *Lethe*, der afrikanische *Letheschwärmer.*

Fabric. S. E. p. 553. no. 14. *Zygaena Lethe.*

Alis nigris; maculis duabus luteis; abdomine
cingulis rubris, nigris, cyaneis alboque.

109. *Pylotis*, der karolinische *Pylotischwärmer.*

Fabric. S. E. p. 554. no. 19. *Zygaena Pylotis.*

Alis nigricantibus; anticis fascia obliqua ni-
vea.

Statura Sph. *Pectinicornis* L. no. 44.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 9. t. 5. f. 3.

PHALAENA *Pylotis* — de la Baie de Honduras.

Il déploie ses ailes deux pouces et demi.

110. *Capistrata*, der amerikanische Sägrükkenschwär-
mer.

Fabric. S. E. p. 554. no. 21. *Zygaena Capistrata.*

Alis nigris; anticis fasciis duabus; posticis
disco fenestratis; abdomine sanguineo; dorso
nigro (utrinque ferrato).

Statura Sph. *Ephialtes* L. no. 36.

III. *Diptera*, der ostindianische zweyflüglichte Schwär-
mer. *)

P 4

Fabric.

*) *Zygaena Diptera* und *Halterata* machen ein merkwürdiges Zer-
teuglied zwischen den Schmetterlingen und den Fliegen aus.
S. Lekanus phys. oekon. Bibl. VII. p. 293.

Fabric. S. E. p. 555. no. 22. *Zygaena Diptera.*

Alis fuscis; *anticis* maculis quinque fenestratiss; *posticis breuissimis* macula nava.

Statura *Sph. Statices* L. no. 47.

112. *Halterata*, der *braslianische* Schwärmer mit kurzen fadenförmigen *Unterflügeln*.

Fabric. S. E. p. 555. no. 23. *Zygaena Halterata.*

Alis hyalinis; macula fusca; *posticis breuissimis filiformibus* nigris.

113. *Tibialis*, der *afrikanische* langschenklichte Schwärmer.

Fabric. S. E. p. 555. no. 24. *Zygaena Tibialis.*

Alis *anticis* fuscis; *posticis* hyalinis; pedibus *posticis elongatis*, hirsutissimis.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 49. t. 28. f. 2.

Sph. Tibialis — de *Sierra Leon en Afrique.*

Il déploie ses ailes presque un pouce et un huitieme.

114. *Pholus*, der *afrikanische* *Pholus*schwärmer.

Fabric. S. E. p. 555. no. 25. *Zygaena Pholus.*

Atra; alis basi luteis.

Statura *Sph. Statices* L. no. 47.

Drury Illustr. of. nat. hist. Vol. II. p. 49. t. 28. f. 3.

Sph. Pholus — de la nouvelle Angleterre; à la nouvelle York, Maryland, Virginie, et la Caroline.

Il déploie ses ailes presque un pouce et un quart.

115. *Acharon*, der *neuholländische* *Acharon*schwärmer.

Fabric. S. E. p. 556. no. 27. *Zygaena Acharon.*

Cyanea;

Cyanea; alis fuscis; ano rufo.

Statura Sph. *Statice*.

116. *Styx*, der afrikanische *Styx*schwärmer.

Fabric. S. E. p. 556. no. 28. Zygaena Styx.

Parva. Statura praecedentium; corpore alisque cyaneis; thorace rufo.

117. *Andromacha*, der amerikanische *Andromacha*schwärmer.

Fabric. App. S. E. p. 830. no. 10-11. Zygaena Andromacha.

Atra; alis hyalinis, margine fasciaque nigris; ano sanguineo.

118. *Flabellicornis*, der südamerikanische fächerhörnerichte Schwärmer.

Fabric. App. S. E. p. 836. no. 16-17. Zygaena Flabellicornis.

Alis oblongis, atris; posticis subcaudatis, basi virefcentibus.

Magna.

119. *Pythia*, der *Pythia*schwärmer, oder der lange Rothflek.

Fabric. Mantiss. p. 275. no. 1-2. Zygaena Pythia.

Atra; alis anticis viridibus; maculis tribus oblongis approximatis sanguineis; posticis rubris.

Affinis Sph. *Filipendulae* L. no. 34.

Otto Fridr. *Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 116. no. 1345. Sph. Purpuralis.*

Alis superioribus hyalinis nigricantibus; maculis tribus oblongis rubris; inferioribus rubris, immaculatis.

234. *Insecta Lepidoptera. 232. Sphinges Adscitae.*

Pontopp. Nat. Gesch. von Dännem. pag. 219. t. 17.
Sph. Purpuralis.

(In Prodr. Insect. Siaell. p. 29. no. 18.)

Schaeff. Icon. t. 16. f. 4. 5.

Sphinx alis integris cauda simplici secunda,
zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln
und einfachem Schwanze.

Naturforscher X. p. 97. Sph. Scabiosae.

— — XIII. p. 229. §. 7. *Sphinges (Filipendulae)* an der *Scabiosa* und dem *Cyano* in ipso coitu: die mit *langen rothen Flecken* eine *besondere Gattung.*

Espers Schmetterl. t. 25. Suppl. 6. f. 3. Sph. Scabiosae, a. Mas; b. Foem.

120. *Bromus, der surinamische Bromuschwärmer.*

Fabric. Mantiss. p. 276. no. 10-13. Zygaena Bromus.
Ferruginea; alis hyalinis; margine omni nigro.

Cramer Pap. exot. III. p. 56. t. 35. fig. G. Sph. Bromus — à Suriname. (Foem.)

121. *Helymus, der surinamische Helymus.*

Fabric. Mantiss. p. 276. no. 14-15. Zygaena Helymus.

Atra; abdomine lineis tribus aureis.

Cramer Pap. exot. I. p. 4. t. 2. fig. DE. Sph. Helymus — à Suriname.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 304. no. 52. Sph. Helymus, die schwarzbraune Unruhe.

122. *Eriphia, der surinamische Eriphaschwärmer.*

Fabric. Mant. p. 276. no. 16-17. Zygaena Eriphia.

Virescens; alis posticis atris, fascia alba; antennis pectinatis.

123. *Erynnis*, die *surinamische Erynnis*.

Fabric. Mantiss. p. 277. no. 19-20. Zygaena Erynnis.
Alis atris; anticis fascia obliqua testacea.

124. *Carniolica*, der *kärnthische Schwärmer*.

Fabric. Mant. p. 275. no. 5-6. Zygaena Carniolica.

Atra; alis anticis cyaneis, punctis quinque sanguineis subocellatis; posticis rubris, limbo nigro.

In Austria. Maculae alarum annulo albo cinctae, postica transversa. Abdomen atrum rarius cingulo postico sanguineo.

Scop. Entom. carn. p. 189. no. 478. Sph. Carniolica.

Nigra; alis anticis umbrinis; maculis quinque cinnaberinis, MARGINE ALBO; posticis cinnaberinis immaculatis.

Maculae alarum anticarum una vel duae connatae cuneiformes ad basin; tres subrotundae in disco, quinta in limbo oblonga transversa.

Folliculus ovatus, paleaceus, laevis, latere adhaerens folio.

Pupa post partum, prominens ex apice trivalvi sui folliculi.

Schaeff. Icon. t. 80. f. 4. 5.

Sphinx alis integris cauda simplici septima, siebenter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 45. no. 5.

Hahnenkopfschwärmerraupe (Hedysari Onobrychis); Hahnenkopfschwärmer; Sphinx Onobrychis.

— — pag. 148. *Sph. Carniolica*: grünblanke Oberflügel (viridi-nitentes), oder grünlichtblau-glänzende;

— dar-

— darauf nicht *fünf*, sondern *sechs* (so, wie bey der *Filipendulae* berechnet,) hochrothe beträchtliche Makeln, und NB. *diese mit weißen Ränden umgeben.**)

Manipulus *Insector. Taurinensium* a Carolo *Allionio* editus: Otto Frid. *Mülleri* Sph. *Virginea.***)

Naturforscher VI St. p. 73. (D. *Kühn.*) *Sphinx* *He-dysar. Onobrychis.*

Auf jedem Oberflügel nur *fünf* rothe Flekke, und überdies ein jeder Flek mit einem *weißen Saum* regelmäsig eingefasst.

— — X. p. 96. no. 4. wo dieser mit *Caffra* offenbar verwechselt wird.

Esper's Schmetterl. II. t. 17. fig. 4. (*Caffra*): a. *Mas*; b. *Varietas*: †)

125. *Cau-*

*) Dies Unterscheidungszeichen, sagen die Wiener Entomologen mit Recht, hätte man nie übergehen müssen, indem es das sichtbarste und standhafteste ist, und diese *Carniolicam* von *Caffra*, *Filipendulae*, *Ephialtes*, *Pythias* u. s. w. gar zu deutlich unterscheidet.

**) Nach dem Zeugniß der Wiener Entomologen l. c. mit der *Carniol.* einerley. Denn die unterste aus den sechs rothen Makeln ist auch bey unserem Schwärmer immer überqueer sehr lang und schmal; bey einigen einzelnen Stükken aber auch durch die eindringende *weiße Einfassung* verschieden getheilet; wodurch freylich in dem *Müllerschen* Stükke an der Stelle der *sechsten Makel* fünf rothe Punkte erscheinen könnten.

†) Alle Kennzeichen: 1) die beyden hochrothen Makeln bey der Basis der Oberflügel, die in zwey getheilt, und bey einigen nur als einer anzusehen sind; 2) alle mit der weißen Einfassung; 3) die letzte transversa; auch 4) der vom Rath *Scopoli* angegebene besondere Umstand, bey der Var. b. des *Esper's*: abdomen atrum rarius cingulo postico sanguineo, beweisen, daß dieser *Esperische Sphinx* unmöglich *Caffra* Linn. sondern die wahre *Carniolica* Scop. sey.

125. *Caudata*, der *geschwänzte Schwärmer*.

Fabric. Mant. p. 277. no. 21 - 22. Zygaena Caudata.

Alis flavo-hyalinis apice fuscis, corpore auro maculato.

In America meridionali.

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. p. 27. t. 2. f. 8. Sph. Cereberus; Sph. Rattus (Mas).

Magnitudo Sph. Vespiformis.

— *Uebersf. IX. p. 35. t. 2. f. 8. der Bastardsphinx mit dem Rattenschwanz; der Rattensphinx; der rattenschwänzige Bastardsphinx (das Männchen).*

Cramer Pap. exot. I. p. 7. t. 4. fig. F et G. Sph. Coarctata; Sphinx Bourdon; la Queue au Rat — de Demerary et du Berbice. F. Mas; G. Foemina.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 46. t. 27. f. 2. Sph. Coarctata (Foemina) — de la Baye de Honduras; près de la côte Moskito ou Meskite.

Il déploye ses ailes un pouce et trois quarts.

Sebae Thes. Tom. IV. t. 25. f. 17.

Müller's Suppl. und Reg. B. p. 304. no. 53. Sph. Coarctata, der Ratzenschwanz.

126. *Minos*, *schwärzlicher, dreifleckichter Wiesen-Schwärmer*.

*Systemat. Verz. der Schmett. der W.G. p. 45. no. 1. Sph. Minos. *)*

127. *Vi-*

*) Die *Raupen* dieser Art kommen des Abends auf Wiesen zum Vorschein, ruhen auf einer Pflanze, oder kriechen langsam über verschiedene weg, als wollten sie nur frische Luft schöpfen; ihr Futter unbekannt, weil sie in ihren Behältnissen binnen zwey oder drey Wochen nichts genossen haben.

238. *Insecta Lepidoptera*. 232. *Sphinges Adscitae*.

127. *Viciae*, Frühlingswikkenschwärmer.

Wiener Schmetterl. p. 45. no. 2. *Sph. Viciae* (thyroidis).

128. *Loti*, Krähenklauschwärmer.

Wiener Schmetterl. p. 45. no. 3. *Sph. Loti* (corniculati).

129. *Coronillae*, Kronenwikkenschwärmer.

Wiener Schmetterl. p. 45. no. 7. *Sphinx Coronillae* (variae).

130. *Aeacus*, schwarzer Schwärmer mit gelben Unterflügeln.

Wiener Schmetterl. p. 45. no. 8. *Sph. Aeacus*. Unbekannte Raupe.

131. *Pruni*, der Schlehenschwärmer.

Wiener Schmetterl. Nachtr. p. 308. no. 12. *Sph. Pruni* (spinosae): f. p. 46. *Ann.*

132. *Plumipes*, der federfüßige amerikanische Honduraschwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 47. t. 27. f. 3. *Sph. Plumipes* — de la Baye de Honduras.

Il déploie ses ailes un pouce et trois quarts.

Atræ; alis fusco-cinereis; capite, thorace, abdominisque parte antica nigris albo-punctatis, postica albo-annulatis; pedibus posticis longissimis; tibiisque plumosis.

133. *Phalaenoides*, der phalänenartige Honduraschwärmer.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 50. t. 28. f. 6. *Sph. Pha.*

Phalaenoides — de la Baye de *Honduras* en *Amerique*.

Il déploie ses ailes *un pouce et trois quarts*.

Habitus *Phalaenae*; alis *anticis* virefcentibus, apice flavicantibus; *posticis* albo - flavis, venis atro - punctatis; abdomine flavo, fusco - annulato.

134. *Pulchra*, der *chinesische Prachtschwärmer*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 52. t. 29. f. 3.

Sph. *Pulchra* — de la *Chine*.

Il déploie ses ailes seulement *un pouce*, étant le plus petit Insecte de cet genre que j'aie jamais vu.

Tota atra; flavo - maculata.

135. *Inaurata*, der *surinamische Goldschwärmer*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 151. t. 20. f. 4. Sphinx *Inaurata*.

Caput, quatuorque priora abdominis segmenta ad latera *inaurata*; reliqua obscure glauca; tria priora abdominis segmenta inferiora nigra, reliqua rubra; alae nigrae macula sanguinolenta, ad pectus virefcentes - *inauratae*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 67. t. 140. fig. E F. Sph. *Inaurata* — à *Suriname*.*)

136. *Capys*, der *surinamische Kapyschwärmer*.

Cramer Pap. exot. V. p. 88. t. 56. fig. E. Sph. *Capys* — à *Suriname*.

Alis integris; *anticis* fuscis, apice albis; *posticis* olivaceis.

137. *Da-*

*) Vom *Cramer* unter die *Adscitas* gerechnet.

240 *Insecta Lepidoptera.* 232. *Sphinges Adscitae.*

137. *Dares*, der westindische *Dares*schwärmer.

Cramer Pap. exot. IV. p. 76. t. 48. fig. F. Sph. *Dares*
— des *Indes occidentales*.

Cineraescens, albo-maculatus; ad caput duo
puncta sanguinolenta.

138. *Egeon*, der chinesische *Egeon*schwärmer.

Cramer Pap. exot. V. p. 91. t. 59. fig. B. Sph. *Egeon*
— de la *Chine*, aussi à *Suriname*.

Albicans, aurantiaco-marginata fasciataque;
antennis pectinatis. (Cf. Fasc. VIII. p. 55. Ad-
dit. p. 91. lin. 17. LIX. fig. B. *Egeon*: voy. *Linn.*
Att. *Fenestra* no. 9.)

139. *Leucaspis*, per berbizeische *Leucaspis*schwärmer.

Cramer Pap. exot. V. p. 83. t. 52. fig. CD. Sph. *Leu-*
caspis — de *Berbices*.

Alis omnibus albis hyalinis, nigro-marginatis;
thorace abdomineque viridibus, aureo-annulatis;
ano sanguinolento.

140. *Lades*, der surinamische *Lades*schwärmer.

Cramer Pap. exot. VII. p. 131. t. 83. fig. E. Sph. *La-*
des — à *Suriname*.

Furva, f. fusco-nigra; ad pectus maculae bi-
nae inauratae; cingulis abdominis aureis.

141. *Lichas*, der westindische *Lichas*schwärmer.

Cramer Pap. exot. IV. p. 70. t. 45. fig. B. Sph. *Li-*
chas — de *St. Thomas*.

Alis integris; *anticis* cinnamomeis; *posticis*
rubris, atro-marginatis; *abdomine* nigricante.

142. *Marica*, der *surinamische Marikaschwärmer*.

Cramer Pap. exot. II. p. 31. t. 20. fig. F G. Sph. *Marica* — à *Suriname*.

Alis *anticis* pallide flavis, fusco-maculatis; *posticis* atris, ad basin albicantibus.

143. *Phlegmon*, der *surinamische Phlegmonschwärmer*.

Cramer Pap. exot. III. p. 57. t. 35. fig. H. Sph. *Phlegmon* — de *Suriname*.

Alis aterrimis; maculis quinque albis, binisque viridibus; abdomine flavo.

144. *Brunnus*, der *surinamische Brunnuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 81. t. 147. fig. C. Sphinx *Brunnus* — de *Suriname*.

Tota brunnea; alis angulatis.

145. *Pretus*, der *westindische Pretuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 121. t. 175. fig. E. Sphinx *Pretus* Foemina; fig. F. *Mas* — de *St. Thomas*.

Foemina tota fusca, abdomine albo-maculato; *Mas* alis incarnatis, flavo-marginatis.

146. *Scyton*, der — *Skytonschwärmer*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 5. t. 99. fig. B. Sph. *Scyton* —

Alis incarnatis glaucescentibus; ano luteo.

147. *Sperchius*, der *sierraleonische Sperchiuschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 79. t. 146. fig. C. Sphinx *Sperchius* — à la *Sierra Leona*.

Alis aterrimis, flavo-maculatis marginatisque; abdomine coeruleo, nigro-cingulato, auroque punctato.

148. *Sypilus*, der *surinamische Sypilus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. IX. p. 4. t. 99. fig. A. Sph. *Sypilus*
— de *Suriname*.

Alis furvis, aurantiaco - fasciatis; abdomine
cingulis binis luteis, punctisque coeruleis.

149. *Thelebas*, der *bengalische Thelebas*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XIII. p. 86. t. 150. fig. D. Sph. *The-*
lebas — de *Bengale*.

Alis aterrimis, griseo - maculatis; binis anti-
carum punctis viridibus; abdomine nigro - luteo-
rubroque annulato.

150. *Hypparchus*, der *sierraleonische Hypparchus-*
schwärmer.

Cramer Pap. exot. XVII. p. 7. t. 197. fig. C. Sphinx
Hypparchus — à la *Sierra Leona*; et sur la
côte de *Guinée*.

Alis aterrimis, aureo - maculatis.

151. *Eumolphos*, der *guineische Eumolphos*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XVII. p. 8. t. 197. fig. D. Sph. *Eu-*
molphos — sur la côte de *Guinée*.

Alis aterrimis, flavo - maculatis, lituris anti-
carum coeruleis.

152. *Cepheus*, der *surinamische Zepheus*schwärmer.

Cramer Pap. exot. XVII. p. 8. t. 197. fig. E. Sph. *Ce-*
pheus — à *Suriname*.

Alis fuscis, flavo - coeruleo - rubroque macu-
latis.

153. *Eagrus*, der *surinamische Eagrusschwärmer*.

Cramer Pap. exot. XVII. p. 10. t. 198. fig. C. Sph. *Eagrus* — de *Suriname*.

Alis albicantribus, nigro-venosis; abdomine toto nigricante, ad latera sanguinolento-piloso.

154. *Fanias*, der *surinamische Fanias*.

Cramer Pap. exot. III. p. 36. t. 213. fig. DE. Sphinx *Fanias*.

Alis caudatis, supra nigris coeruleo-fasciatis, subtus viridibus.

(An Sphinx adscita? potius Pap. *Plebejus ruralis*.)

233. Gen. PHALAEANA; *Phaläne*; *Nachtfalter*; *Nachtschmetterling*; *Nachtvogel*.*)

Linn. Antennae setaceae a basi ad apicem sensim attenuatae.

Alae (sedentis) saepius deflexae (volatu nocturno).

Q 2 I. *Attaci*

*) Bey diesem Geschlechte sind die Uebergänge der Natur deutlich zu merken. Von den Schwärmern macht sie ihn unstreitig durch die sphinxartigen Raupen, die doch wahre Phalänen geben, als Versicolora und Mori; mithin ist bey der Eintheilung nicht bloß auf einige Charaktere der Vögel, sondern auch auf die Beschaffenheit und Oekonomie der Raupen Rücksicht zu nehmen, wie die Wiener Entomologen ganz vortrefflich gethan haben. Die Attacos L. müßte man doch meines Erachtens beybehalten, weil sie in ihrem Habitus, und an den Spiegelflecken auf den Flügeln ganz was eigenes haben, daher sie auch mit Recht Spiegelträger heißen. Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 459. Attaci, mit weit ausgedehnten Flügeln, gehören vielleicht, sagt er, zu den Spinnern.

1. *Attaci* alis patulis inclinatis:
 - a) pectinicornes elingues,
— — spirilinges;
 - b) feticornes spirilingues.
 2. *Bombyces* alis incumbentibus, antennis pectinatis:
 - a) elingues absque lingua manifeste spirali;
alis reversis,
alis deflexis;
 - b) spirilingues lingua involuto-spirali;
laeves } dorso.
cristatae }
 3. *Noctuae* alis incumbentibus; antennis setaceis, nec pectinatis:
 - elingues,
spirilingues.
 4. *Geometrae* alis patentibus horizontalibus quiescentes:
 - pectinicornes,
feticornes,
alis rotundatis.
 5. *Tortrices* alis obtusissimis ut fere retusis, margine exteriori curvo.
 6. *Pyralides* alis conniventibus in figuram deltoideam forficatam.
 7. *Tineae* alis convolutis fere in cylindrum, fronte prominula.
 8. *Alucitae* alis digitatis fissis ad basin usque.
- Müllers Linn. Natursyft. 5 B. 1 Th. p. 694. *Nachtvögel*, Phalaenae.
1. *Atlasse* mit ausstehenden Flügeln p. 651.
 2. *Spinner* mit Wendeflügeln p. 656.
 - a) Spinner, welche große Seidentönnchen spinnen, mit Wendeflügeln, deren Hinterflü-

terflügel vorne hervorragen, ohne Zunge oder Sauger.

b) mit glattem Rücken p. 663. ohne Zunge, deren Flügel niedergedrückt liegen: die roth und gelb gezeichneten unter ihnen *ädle Spinner* (Nobiles).

c) mit Kammrücken p. 669. mit niedergedrückten Flügeln, ohne Sauger.

d) Glattrücken mit hangenden Flügeln pag. 674. Saugrüßel, mit glattem Rücken und niedergebogenen Flügeln:

e) Kammrücken mit hangenden Flügeln p. 677. *Kammsauger*.

3. *Eulen*:

a) ohne Saugrüßel p. 679. ohne sichtbaren Saugrüßel.

b) mit Saugrüßel und glattem Rücken pag. 680 — ohne Kamm.

c) mit Saugrüßel und Kammrücken p. 686. — *Kammsauger*.

4. *Spannenmesser*:

a) Ekflügel p. 703.

b) Rundflügel mit kammartigen Fühlhörnern p. 707.

c) mit büstenartigen *) Fühlhörnern und eckigen Flügeln p. 711.

d) mit büstenartigen Fühlhörnern und runden Flügeln p. 713.

5. *Blattwickler* p. 723.

6. *Feuerwürmlein* p. 731.

7. *Motten* p. 735.

8. *Federeulen* p. 759.

Q 3

Füeslins

*) Setosae, besser *borstenartige*; damit man nicht denke, es wären Fühlhörner, wie Büsten, fascelinae, à brosse.

Fries's Verzeichn. schweizer. Inf. p. 33. *Phalaena, Nachtvogel.*

Röfels Insektenbel. Nachtvögel 2te Klasse: *Attaker, Spinner* und *Eulen*; 3te Klasse: *Spannmesser*; 4te Klasse: *Blattwickler* u. f. w.

Sulzers Kennzeichen der Inf. pag. 123. *Phalaena, Nachtvogel:*

1. Seidenspinner;
2. Nachteulen;
3. Spannenmesser;
4. Blattwickler;
5. Lichtmücken;
6. Schaben;
7. Mücken;

— *Geschichte der Inf. p. 152. Nachtvogel, Phalaena; la Phalene:*

1. Attaci;
2. Seidenspinner;
3. Eulen;
4. Spannenmesser;
5. Blattwickler;
6. Feuervöglein;
7. Motten;
8. Federmotten.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 48. Nachtschmetterlinge, Phalaenae; les Papillons de nuit ou les Phalenes.

1. Spinner p. 48.
2. Eulen. Papillons Phalenes à tête de hibou p. 66.
3. Spanner p. 95.
4. Zünsler; Lichtmücken; Pinceurs p. 118.
5. Blattwickler. Chenilles plieuses; Papillons larges d'épaules p. 125.

6. Scha-

6. Schaben, les Teignes p. 132.

7. Geißichen; Federmücken p. 144.

Börners Samml. aus der N. G. etc. I. p. 494. *Nachtvögel*, *Phalaena*.

1. *Attaker*.

2. *Seidenspinner*.

3. *Nächtliche*.

4. *Spannenmesser*.

5. *Blattwikler*.

6. *Lichtmücke*.

7. *Motten*.

8. *Fächerfalter*.

Bekmanns Anfangsgr. der N. H. p. 106. *Nachtvogel*, *Phalaena*.

— *Epitome* S. L. p. 161. *Phalaena*, *Nachtvogel*.

Eberhards Verf. eines neuen Entw. der Thiergesch. p. 208. §. 240. *Nachtfalter*, *Phalaena*.

Titii Lehrbegr. der N. G. p. 354. *Nachtvogel*, *Phalaena*.

Eberts Naturl. für die Jugend III. p. 92. *Nachtvögel*.

Berlin. Magaz. II. pag. 391 ff. *Nachtvögel*: 1. *Seidenspinner*; 2. *Nachteulen*; 3. *Spannenmesser*; 4. *Blattwikler*; 5. *Lichtmücken*; 6. *Schaben*; 7. *Federmotten*. (*Hufnag. Tabellen.*)

Von *Rottenburgs* Anmerk. über die *Hufnag. Tab.* 8 St. des *Naturf.* p. 101. *Nachtvögel*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1510. no. 14-20. *Papilion*es (*Phalaenae*), *Nachtvögel*: 1. *Strikker*; *Seidenspinner*; 2. *Spannenmesser*; 3. *Blattwikler*; 4. *Nachteulen*, *Eulchen*; 5. *Lichtmücken*; 6. *Motten*, *Schaben*, *Nachtmotten*.

Pontoppid. N. G. v. Dänn. p. 219. *Phalaenae*, *Eulen*. *Neuer Schaupl.* der Nat. VI. p. 30. *Nachtvogel*.

Fischers N. G. von Livl. p. 150. *Nachtschmetterlinge*, *Phalaenae*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 366. *Nachtvogel*,
Phalaena.

Esper's Schmetterl. *)

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 458. *Nachtfalter*.

Onomat. hist. nat. P. VI. p. 311. *Phalaena*; *Nacht-*
vogel; *Nachtpapilion*; *Papilio nocturnus*.

1. Spinner; 2. Eulen; 3. Spannenmesser;
4. Blattwickler; 5. Feuerwürmlein; 6. Motten;
7. Federeulen.

Charlet. Onom. Zoic. p. 40. *Phalaenae*; *Angl. Souls*,
Papilio Bombycum; the Silk-worm's Butterfly.

Brunnichii Entomol. p. 74. 75. *Phalaena*, *Natfugl*.

Scop. Entomol. carn. p. 191. *Phalaena*.

Fabric. S. E. p. 556-672. (8 Geschlechter.)

1. *Bombyx*, *Spinner*.

Palpi duo compressi, reflexi. *Lingua* bre-
vis membranacea. *Antennae* filiformes.

2. *Noctua*, *Eule*.

Palpi compressi pilosi; apice cylindrici nudi.
Lingua porrecta, cornea. *Antennae* setaceae.

3. *Phalaena*, *Nachtvogel*.

Palpi cylindrici. *Lingua* porrecta mem-
branacea. *Antennae* filiformes.

4. *Pyrallis*, *Lichtmücke*.

Palpi mediunculi, basi cylindrici, medio
dilatato-ovati, apice subulati.

5. *Hepialus*, *Lichtflieger*.

Palpi duo reflexi, pilosi. Rudimentum
linguae bifidum inter palpos. *Antennae*
moniliformes.

6. *Pterophorus*, *Fächervogel*.

Palpi lineares. *Lingua* exserta, membra-
nacea. *Antennae* setaceae.

7. *Alu-*

*) Sind noch nicht heraus.

7. *Alucitae, Federmotte.*

Palpi duo ad medium bifidi, lacinia interiore acutissima. *Antennae* setaceae.

8. *Tinea, Motte.*

Palpi quatuor inaequales. *Antennae* setaceae.

Fabric. Genera Insect. c. adj. Mantiss. p. 161-168.

Système Naturel du Règne animal etc. p. 141. Papillons nocturnes, ou Phalenes.

Réamur Inf. Tom. I. Mém. 7. p. 285. Des caractères des classes et des genres des Phalenes, ou Papillons nocturnes — et p. 296.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 93. Phalaena; la Phalene, et 90. Pterophorus; le Pterophore.

Fam. 1. *Pestiniornes*; à antennes en peigne.

a) *Elingues*; sans trompe.

b) *Linguatae alis deflexis*; avec une trompe et les ailes rabattues.

c) *Linguatae alis planis*; avec une trompe, et les ailes étendues.

Fam. 2. *Antennis filiformibus*; à antennes filiformes.

a) *Linguatae alis planis*; avec une trompe et les ailes étendues.

b) *Linguatae alis deflexis*; avec une trompe et les ailes rabattues.

c) *Elingues*; sans trompe.

— — p. 173. *Tinea*; la *Teigne*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 38. Phalaena.

— *Zool. Dan. Prodr. p. 117-138.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 257. Papillons - Tipules; p. 268. des Phalenes. Mém. III - VI.

— *Uebers. II B. I Th. p. 185. Erdschnakenphalänen; p. 191. von den Nachtfaltern; 3-6te Abhandl. 5 Familien.*

Cramer Pap. exot. I. Préf. 13. Papillons nocturnes (Phalaenae).

1. Phalenes à miroir (Attaci); Spiegeldrager; Atlas-Kapellen.
2. Phalenes fileuses (Bombyces); Zyden-Spinders.
3. Phalenes hiboux (Noctuae); Draadsprietigen.
4. Phalenes arpenteuses (Geometrae); Landmeeters; Bandviltjes.
5. Phalenes rouleuses (Tortrices); Bladrollers.
6. Phalenes fourchues (Pyrales); Geschaarde of gevorkte.
7. Phalenes teignes (Tineae); Mot-Viltjes.
8. Pterophores (Alucitae); Veer-Viltjes.

1. Attaci (*Attaker*) mit weit ausstehenden Flügeln; *Atlasse*; *Spiegelträger*.

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. p. 500. *Attaker*; *Atlasse*.

1. *Atlas*, der *asiatische große Atlas*.*)

Müllers Linn. Naturfyst. 5 B. 1 Th. p. 651. no. 1. der *Pfauenspiegel*; der *große Spiegelträger*.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 427. *Atlas*; der *große Spiegelträger*; der *Pfauenspiegel*.

Fermin Besch. der Kolon. Surinam II. p. 304. der *Spiegelträger*.

Breßl.

*) Befindet sich in natura im herzoglichen Kabinet zu Braunschweig. Die vom *Linné* angeführte *Merian*. Surin. t. 52. ist nicht unser Atlas, sondern eine eigene Art: nämlich *Kramers Aurora*, die wir unter den neuen Attakern no. 17. anzeigen werden.

Breßl. Samml. 1722. Octob. Cl. 4. Art. 8. §. 2. p. 426.
das königliche *Pfauenauge*; der *große Atlas*.

Blankaart Schaupl. der Raupen etc. p. 54. 55. das
königliche *Pfauenauge*; der *große Atlas*.

t. 18. von unten; t. 19. von oben.

Martini allgem. Gesch. der Nat. III. p. 472. t. 106.

f. 1. *Atlasphaläne*; *Atlasvogel*; der *große Spiegelträger*; *Pfauenspiegel*; das königliche
Pfauenauge; Phal. Atlas.

f. 2. die Raupe;

f. 3. das Tönnchen des Gespinnstes.

Blumenbachs Handbuch der Naturg. p. 368. no. 1.
Atlas.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 459. no. 1. *Atlas*.

Cathol. A. p. 583. le grand *Atlas*, der *große Atlas*.

Bekm. Epit. S. L. p. 162. no. 1. Phal. *Atlas*. Nom. L.

— physik. ökon. Bibl. X. p. 227. dessen Gespinnst
heißt in China *wilde Seide*.

Fabric. S. E. p. 556. no. 1. BOMBYX *Atlas*. Nom.
Linn.

Cramer Pap. exot. I. p. 13. t. 9. fig. A. Phal. *Atlas*
— dans la *Chine*.

Sebae Thes. IV. t. 57. f. 1-3.

— — — t. 58. f. 6-10.

Vincent. Mus. 6. *Papilio nocturnus* Amboin. vulgo
Atlas hyalinus et marmoratus.

Mus. Petropol. 691. no. 356. *Papilio maxima Surinamensis* hyalina, singulis alis vitro moscovitico simili macula insignitis.

Petiv. Gazoph. t. 8. f. 7. *Phalaena plumata maxima*.

2. *Hesperus*, der amerikanische kleine Spiegelträger.

Müller l. c. p. 651. no. 2. t. 21. f. 1. der kleine Spiegelträger.

Fermins Besch. von Suriname II. p. 304. der *kleine Spiegelträger.*

Fabric. S. E. p. 557. no. 2. *Bombyx Hesperus.*

Alis patentibus, falcatis, luteo-variis, macula fenestrata; posticis rotundatis.

Cramer Pap. exot. VI. p. 106. t. 68. fig. A. *Phal. Attac. Hesperus* — de *Suriname.*

Sebae Thes. IV. t. 57. f. 5. 6.

— — — t. 58. f. 12. 13.

D'Aubenton Planch. enlum. 66. f. 1. *La Vitrée de Cayenne.*

Houttuin Nat. Hist. I Deel XI St. p. 486. no. 2. t. 91. f. 1. la *Femelle.*

3. *Cecropia*, die *amerikanische Zekropiaphaläne.*

Müller l. c. p. 652. no. 3. t. 21. f. 2. der *Sichelflügel.*

Fabric. S. E. p. 557. no. 3. *Bombyx Cecropia.* *Nom. Linn.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 34. t. 18. f. 2. *Phal. Attac. Cecropia* — de la *nouvelle York.*

Elle déploie ses ailes environ *six pouces et demi.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 66. t. 42. fig. A B. *Phal. Attac. Cecropia* — dans la *Caroline*, à la *nouvelle York*, et à la *Jamaïque.*

Hottuin Nat. Hist. I Deel XI St. p. 488. no. 3. t. 91. f. 2.

Sebae Thes. IV. t. 58. f. 4. 5.

Catesby Car. II. p. 86. t. 86. *)

4. *Pa-*

*) Dieß ist die Beschreibung von *Karolina* des *Catesby* in 2 Fol. B. wie sie *Linné* citiret hat. Es ist aber vor zwey Jahren eine besondere Sammlung von den *Naturschriften* des *Catesby*, in groß Folio mit illuminirten Kupfern, unter folgendem Titel in *Teutschland* herausgekommen:

4. *Paphia*, die guineische Fensterscheibe.

Müller l. c. p. 652. no. 4. t. 21. f. 3. die Fensterscheibe.

Sulzers Gesch. p. 159. t. 21. f. 2. *Paphia*.

Ohne Zunge, gelblichgrau, sehr pelzig. Die *Vorderflügel* etwas sichelförmig, dunkelgrau mit drey Feldern; in dem mittlern ein gelbes Auge mit einem gläsern Stern, schwarz und weißem Ringe; in dem *Hinterflügel* das Auge größ-

Piscium, Serpentum, Insectorum, aliorumque nonnullorum Animalium, nec non Plantarum quarundam Imagines, quas Marcus Catesby in posteriore parte splendidi illius operis, quo *Carolinae, Floridae et Bahamensium insularum* tradidit historiam naturalem, eiusque appendice descripsit, vivis coloribus pictas, edere coeperunt

Nicol. Fridr. Eisenberger et Georg. Lichtensteger
et ad finem perduxerunt

Beati Georg. Wolfgangi Knorrii Heredes.

Die Abbildungen

verschiedener *Fische, Schlangen, Insekten*, einiger andern *Thiere und Pflanzen*, welche Herr Marcus Catesby im zweyten Theil und im Anhang seines vortrefflichen Werks der natürlichen Historie von *Carolina, Florida* und den *Bahamischen Inseln* beschrieben, in ihren natürlichen Farben vorgestellt herausgegeben von

Nicol. Friedr. Eisenberger und Georg Lichtensteger;
und fortgesetzt von Georg Wolfgang Knorr
seel. Erben.

Nürnberg gedruckt bey Paul Jonathan Felsecker

1777.

Ich habe dieses Werk aus der schönen Bibliothek des Herrn Graf von Wernigerode zum Gebrauch erhalten. Die *Cecropia* heist hierinn p. 86. t. 86. *Phalaena magna ex rufo et albo vario Americana*; der *Nachtsommervogel von Karolina*.

größer. Das Weibchen größer mit ungekämmtten Fühlhörnern. Die Farben der Flügel blasser.

Fabric. S. E. p. 557. no. 4. Bombyx Paphia. (Foemina.)

Alis patentibus, falcatis, concoloribus, flavis; strigis rufis ocelloque fenestrato.

— — *p. 558. no. 6. Bomb. Mylitta. (Mas Paphiae.)*

Alis patentibus falcatis, flavis; striga ferruginea, ocelloque fenestrato partito.

In Famboliferis Indiae orientalis.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. pag. 8. t. 5. f. 1.

Phal. Attac. Mylitta — de Bengale. (Mas.)

Déploie ses ailes six pouces et un quart.

Sebae Thes. IV. t. 23. f. 5. 6. Mas.

Catesby Abbild. p. 91. t. 91. Phalaena ingens Caroliniana, oculata, e luteo fusca, lineis dilute purpureis insignita.

Großer Sommervogel aus Karolina.

Cramer Pap. exot. XIII. pag. 78. t. 146. fig. A. Phal.

Att. Paphia — sur les côtes de Coromandel et de Bengale et sur l'Isle d'Amboine. (Foemina.)

— — *p. 81. t. 147. fig. A B. Phal. Paphia (Foemina) — à Tranquebar.*

— — *p. 82. t. 148. fig. A. Paph. Mas.*

5. *Luna, der nordamerikanische Halbmond.*

Müller l. c. p. 652. no. 5. der Halbmond.

Fabric. S. E. p. 558. no. 9. Bombyx Luna.

Alis patentibus, caudatis, concoloribus, virescentibus, ocello disci lunato.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 49. t. 24. f. 1.

Phal. Att. Luna — en la Caroline, la Virginie et la Maryland. (Foemina.)

Elle déploie ses ailes environ cinq pouces et demi.

Cramer Pap. exot. I. p. 3. t. 2. fig. A. Phal. Attac. *Luna* (Mas) — de la *Jamaïque*.

Sa Chenille se nourrit de feuilles de *Sassafras*.

— — p. 50. t. 31. fig. A. *Foemina*; fig. B. *Mas*

— de la côte de *Coromandel* et aussi de *Ceylon*.

Houttuin Nat. Hist. I Deel XI St. p. 491. no. 5.

Catesby Abbild. etc. p. 84. t. 84.

6. *Lunus*, der indianische Vollmond.*)

Müller l. c. p. 653. no. 6. der *Vollmond*.

Fabric. S. E. p. 590. no. 1. NOCTUA *Lunus*.

Alis patulis, caudatis, undulatis, ocellis caudalibus subternis.

Cramer Pap. exot. XVII. (III Th.) p. 13. t. 200. fig. A.

Lunus Mas; fig. B C. *Foemina* — à *Suriname*.

7. *Pavonia*, das Nachtpfauenaug.

α. *Minor*, das kleine.

Müller l. c. p. 652. no. 7. der kleine *Pfau* (größere und kleinere Art).**)

Füesflins Verz. schweizer. Inf. p. 33. no. 632. Phal.

Pavionella, der kleine Nachtpfau.

In der Schweiz nicht selten.

Füesflins

*) S. unsere Anm. 3 B. I Th. p. 50. bey Linn. *Patroclus* no. 24. Der *Lunus* sowohl als *Patroclus* und *Empedocles* gehören zu den Griechen unter den Tagvögeln, wie sein ganzer Habitus ausweist. Linné hat ihn zu den *Phalaenis Attacis*, Fabricius aber zu den *Noctuis* gerechnet.

**) Von der Raupe heisst es daselbst: sie spinnt sich in einen dichten länglichten Beutel ein, wodurch die Schlupfwespen nicht stechen können. Warum machen sich denn nicht alle Spinner solche Beutel? Und wie, wenn die Raupe schon angestochen ist, ehe sie sich eingesponnen hat?

Füeslins Magaz. der Entomol. I. p. 268. Phal. *Pavonia minor.*

(Die Raupen fressen auch *Erdbeerstauden*.
Chorherr *Meyer.*)

Kleemanns Raupenkal. p. 29. no. 67. das *kleine* Nacht-
pfauenauge.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. pag. 25. t. 4. 5.
die schöne große grüne Raupe, mit runden, er-
habenen, rothen, auch gelben Knöpfen, und
ihre Verwandlungen zum Papilion.

— — — t. 4. f. 6. 7. t. 5. f. 8. 9. 11. das merk-
würdige reusenförmige Gespinnste. *)

— — — t. 5. f. 12. 14. *Weibchen*; f. 13.
Männchen.

Berlin. Magaz. II. p. 394. no. 1. Phal. *Pavonia mi-
nor*, das *kleine* *Pfauenauge.*

Röthlichgrau mit einem grossen Auge auf
jedem Flügel, und einem blutrothen Fleck an
der Spitze der Oberflügel.

— — p. 428. *Anm. A.*

Altes Hamb. Magaz. I. p. 320. von dem Bau des
Gespinnstes der grossen, dicken grünen Raupe,
mit den stachlicht scheinenden Knöpfen und tie-
fen Einschnitten.

Bonnets Betr. über die Natur mit *Spallanz.* Anm.
p. 520. Raupen, die ihre Verwandlungshül-
fen in Gestalt eines Trichters, oder *Fischrense*
spinnen.

Gleditsch

*) Da unter allen Spinnern diese Raupe die *einzige* ist, die sich
ein so merkwürdiges reusenförmiges Gespinnste macht: so muß
auch die Natur dabey ganz besondere Absichten haben, wovon
wir unten etwas sagen werden. Wäre dieses, wie Röfel, Reau-
mur und andere geglaubt haben, allein die Absicht, dadurch
alle schädliche Insekten von der Puppe abzuhalten; so müßten
es alle, wenigstens mehrere, machen.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 359. no. 1. *Pavonia minor*,
das kleine *Pfauenauge*.

— — p. 568. no. 3. Phal. *Pavonia*.

— II. p. 736. no. 14. Ph. *Pavon. minor*, das kleine
Pfauenauge.

— — p. 819. no. 5. p. 1019. no. 2. p. 1032. no. 1.
Sulzers Kennz. p. 38. t. 16. f. 92. *Pavonia*.

Naturforscher I. p. 237. das *Gespinnste* der Raupe
mit ihren elastischen Fäden (*Meineke*).

— — VIII. p. 127. *Meineke* über die Absicht
der besondern Einrichtung des *Gespinnstes*, wel-
ches die Raupen der sogenannten *Nachtpfauen-*
augen verfertigen, nebst andern an diesen Insek-
ten beobachteten Merkwürdigkeiten. *)

Fießlins Magaz. der Entomol. I. p. 268. (wird die
Sache bestätigt.)

Naturforscher XII. p. 72. *Walchs* Beytr. zur N. G.
der Inf. — ein *Zwitter* von der Phal. *Pavon.*
minore; t. 2. f. 6.

Syste-

*) Aus Factis der Natur selbst erwiesen. Die Säfte dieser Raupe und Phaläne sind besonders zähe. Sie verbreiten oder ergießen sich nicht von selbst in die Flügeladern, wenn der Vogel auskriecht. Sie müssen durch ein periodisches Drücken des, sich durch die Fischreufe durchdringenden Vogels hineingetrieben werden. Mithin ist die Fischreufe mit den elastischen Fäden ein *Drukwerk*, wodurch die Säfte aus dem in der Klemme steckenden Hinterleibe des Vogels ausgedrückt werden. Wird derselbe zwischen den Fingern gedrückt, wenn der Vogel noch nicht vollkommen ist, so breiten sich die Flügel aus. Läßt man nach, so sinken sie wieder. Alle aus dem *Gespinnste* genommene Puppen, und ihre Vögel, bleiben *Krüppel*, weil sie nicht durch das ihnen von der Natur angewiesene *Drukwerk* durchpaßirt sind.

Systemat. Verz. der Schmett. der W. G. p. 49. 50. B.
Sternraupen, Larvae Verticillatae; Chenilles à
tubercules, Réaum. Degeer et Bazin.

Pfauenaugigte Spinner, Phalaenae Bomby-
ces *Pavoniae* L. Phalenes - Paon, Réaum. et Geoffr.

No. 2. *Schwarzdornspinnerraupe* (Pruni spi-
nofae); *Schwarzdornspinner*, B. Spini; le *Paon*
moyen. *)

No. 3. *Haynbuchenspinnerraupe* (Carpini Be-
tuli frutic.); la Chenille à tubercules de la Char-
mille, Réaum. *Haynbuchensspinner*, B. *Carpini*;
le *petit-paon*, Réaum.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 368. no. 2. *Pfau-
vogel*; *Nachtpfauenauge.* **)

Leske

*) Die Wiener Entomologen haben auch das *große Nachtpfauen-
auge* no. 1. wie wir unten anführen werden, also wirklich *drey*
verschiedene Arten. In der Anmerkung sagen sie: Réaumur,
Degeer und Geoffroy zählten ebenfalls drey Arten: die *Große*,
Mittlere und *Kleine*. Allein wir halten ihre *zwo letzten* nur für
Abänderungen unserer *dritten* Art: B. *Carpini*. Sie gründeten
die Verschiedenheit der *zwo* Arten auf die oraniengelben oder
rosenrothen Knöpfe, und grösseren oder kleinern schwarzen
Flecken, die ihre einzelne Raupen auf der grünen Haut hatten.
Wir haben öfter ganze Bruten dieser Raupen auch aus den
Eiern gezogen, und dann, wie sehr sie, besonders im Betreff
der schwarzen Flecken, abändern, mit Verwunderung ge-
sehen. Von unserer *mittlern* Art ist die Raupe, die man in
einigen Jahren hier herum häufig, doch immer nur auf *Schle-
ben* findet, vom Eye an bis zur Puppe, immer gänzlich und
glänzend schwarz, nur die anfangs stahlblauen, und hernach
goldgelben Knöpfe ausgenommen. Es ist also *sicher* eine von
der ersten (*Pavonia maior*) und dritten (*Carpini*) unterschiede-
ne Art, welches auch der Schmetterling einigermaßen zeigt.

**) Wo noch die allgemeine Absicht bey dem Puppengehäuse an-
gegeben ist, daß kein feindseliges Insekt hineindringen kann.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 459. no. 2. der *kleine Pfau-Nachtvogel.*

Bekmanni Epit. S. L. p. 162. no. 7. *Pavonia minor.*
Nom. *Linn.*

Onomat. hist. nat. P. VI. p. 394. Phal. *Pavonia*, der *Pfau.*

Système Naturel du Regne animal etc. Tom. II.
pag. 148. no. 26. Phalene de la *Rose* et de la *Ronce.*

Raj. Hist. Inf. p. 146. no. 1. *Phalaena major pulchra*; *maculis ophthalmoidibus* in singulis alis singulis.

— — p. 147. *Eruca viridis*, rarius pilosa, fulvis seu rubentibus in medio annulis — *Geranacula* Mouffeti p. 189. (*Pavonia minor.*)

Petiv. Gazophyl. p. 53. t. 33. f. 12. *Phalaena nigrescens*; *maculis majoribus*, subtus flavescent.

Scop. Entom. carn. p. 191. no. 483. Phal. *Pavionella.*
Long. unc. 1. lin. 1. *Lat.* 8½.

Pavoniae (maioris) facies, sed diversa ocellis alarum primorum maculae albae impositis, iisdemque pupilla nigra, sed lineola coerulescente inscripta, iride ferruginea, linea ciliari coerulescente, annuloque communi nigro latiore.

Rarior apud nos.

Fabric. S. E. p. 559. no. 14. *Bombyx Pavonia minor.*
Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 89. f. 2. 3. *Phalaena pectinicornis* alis planis undecima, elfter *Nachtfalter* mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

(*Pavonia media.*)

— — — f. 4. 5. — *duodecima* etc.

(*Pavonia minor.*)

Mülleri Faun. Fridr. p. 38. no. 348. Phal. *Pavonia.*
Nom. *Linn.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1347. *Phal. Pavonia.* Nom. *Linn.*

Dan. Paafugl - Oye; Paa - Oye.

Geoffr. Inf. II. p. 101. no. 2. *Phalaena pectinicornis elinguis*; alis cinereo - fuscis planiusculis, singulis ocello; *minor*; le *Paon moyen.*

(*Linn.* Syst. Nat. ed. 10. p. 496. no. 6. *Phalaena Bombyx elinguis*, alis patulis rotundatis, griseo - nebulosis subfasciatis; ocello nictitante subfenestrato.)

— — — no. 3.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis planiusculis ferrugineo - luteoque variis, singulis ocello, fasciaque fusca. *Mas.* t. 12. f. 1. 2.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis planiusculis cinereis, in medio albidis, singulis ocello, fasciaque fusca. *Foemina.* t. 12. f. 3.

Le petit paon.

Larg. 2 pouces 5 lign. *Long.* 11 lign.

(*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. no. 835. *Phalaena pectinicornis elinguis*; alis planiusculis cinereis; singulis ocello, fasciaque fusca.)

Réaumur. Inf. Tom. I. pag. 630 et 631. t. 50. f. 4. 5.

Moyen paon femelle.

— — — f. 9. 10. *Mâle.*

— — — t. 49. f. 7. *Petit paon femelle.*

Merian. Eur. t. 13. *Petit paon mâle.*

— — — t. 23. — — — *femelle.*

Degeer Inf. Tom. I. p. 270. t. 19. f. 1. 12.

Grande Chenille verte, à tubercules, qui sont couleur de rose sur quelques individus, et d'un jaune couleur d'or sur d'autres, qui a seize jambes, et qui mange les feuilles de l'Ozier et du Saule.

— — — p. 697. t. 19. f. 7. 8. *Phalene à antennes à bar-*

à barbes sans trompe, à tache noire en œil sur chaque aile. La petite espece: le *petit-paon* de Mr. *Réaumur*.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 290. Phalene à antennes barbues, sans trompe; à ailes étendues cendrées avec des rayes ondées brunes, et une tache en œil sur chacune; la *petite*.

Phalene petit-paon.

— *Uebersf.* I. 2 Qu. p. 47. t. 19. f. 1-11. die große grüne sechzehnfüßige Raupe mit Knöpfen, die bey einigen rosenroth, bey andern goldgelb find. Auf den Bind- und Sahlweiden.

— — 4tes Quart. p. 120. t. 19. f. 7. 8. ein Nachtvogel mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüssel, mit einem schwarzen Augenflek auf jedem Flügel; die kleinere Art; *Réaumur's kleiner Pfau*.

— — II B. I Th. p. 206. no. 1. die kleinere Phaläne, mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Sauger und breitliegenden aschfarbigen, braun wellenförmig-gestreiften Flügeln, mit einem Augenflek auf jedem.

Der kleine Pfau.

β. *Major*, das größere.

Füeslins Verz. Schweiz. Inf. p. 33. no. 631. *Phalaena Pavonia*, der *große Nachtpfau*.

Bey Genf, Roche, in Wallis, Veltlein, besonders in den italiänischen Vogteyen, im ganzen Pays-de-Vaud.

Röfels Insektenbel. IV. p. 117. t. 15. 16. 17. die zur Nachtvögel zwoten Klasse gehörige außerordentlich große mit türkisblauen Knöpfen und schwarzen Sternenspitzen gezierte Raupe, nebst

derselben Verwandlung in den sehr grossen und prächtigen *Pfauenpapilion*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 117. t. 15. f. 1. Raupe; 2. verschlossene Gespinnste; 3. die eine Seite bloss, um das Reusenförmige desselben zu sehen.

— — — t. 16. fig. 4. die Puppe; f. 5. der der Vogel: das *Männchen*.

— — — t. 17. fig. 6. das *Weibchen*; f. 7. Eyer; fig. d ee ff, Eyer mit abgestossenen Deckeln; fig. ggg, erst aus den Eyern ausgekrochene Räupecken.

— — — p. 137. t. 23. die Eyer, und die aus selbigen erzogenen *Raupen* des grossen und prächtigen *Pfauenpapilions*.

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Insektol. p. 94. no. 3. das *grosse Nachtpfauenauge*.

Hollaar Inf. t. 5. f. 1. 2. Phal. Attac. *Pavonia major*. (*Naturf.* IX. p. 222.)

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 49. B. no. 1. *Birnspinnerraupe* (*Pyri communis*); la Chenille à tubercules du poirier; *Birnspinner*; Bomb. *Pyri*; le grand Paon (de nuit), *Réaumur* etc.

Speñacle de la Nature I. p. 62. Pav. *major*.

Scop. Entom. carn. p. 191. no. 482. Phal. *Pavonia*.

Long. Vnc. 2 et lin. 8. *Lat.* unc. 1. et lin. 8.

Gigas nostrarum; alis omnibus utrinque limbo albo margine cervino, maculaque ophthalmoides, cui pupilla nigra, iris cervina, linea ciliaris alba, palpebra cinnamomea, annulus communis niger.

In *Pyro* et *Mato*.

Poda Mus. graec. p. 83.

Fabric. S. E. pag. 560. no. b. Bombyx *Pavonia major*.

Mas antennis magis pectinatis, alisque posticis basi flavescens.

Larva gregaria, viridis, verticillata, verrucis rubris flavisque piliferis: pilis setaceis.

Pupa nigricans, folliculata: folliculo apice foramine elastico dehiscente.

List. Goed. fig. 28. *ed. gall.* Tom. I. tab. N.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 100. no. 1. *Phalaena pectinicornis* elinguis, alis cinereo-fuscis, planiusculis, singulis ocello, *major*.

Le *grand-paon* de nuit.

Larg. 5½ pouces. *Long.* 2 pouces.

Réaum. Inf. I. p. 630. t. 47. 48. Le *grand-paon*.

Sebae Thes. IV. t. 60. f. 9-14.

8. *Tau*, der *T-Vogel*.

Müller l. c. p. 653. no. 8. der *Nagelflek*.

Früßlins Schweiz. Inf. p. 33. no. 633. der *T-Vogel*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 56. t. 7. f. 3. 4. der zur zwoten Klasse der Nachtvögel gehörige, okergelbe und zimmetbraune Nachtpapilion mit vier grossen Augenflecken, worinn sich ein besonderes weisses Maal befindet.

— III. p. 394. t. 68. f. 1. die völlig ausgewachsene Raupe ohne Dornen; f. 2. Puppe; f. 3. 4. Häkchen an derselben.

— — p. 421. t. 70. f. 4. a. f. 5. a. die kleine blafsgrüne Raupe mit hochcarminrothen *Dornspitzen*, so sich auf den Birken aufhält.

— — — f. 4. a. wie sie aus dem Ey kömmt. f. 5. a. vergrößert.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. XI. p. 135. t. 4. f. 1-9.

f. 7. *Männchen*; f. 8. 9. *Weibchen*.

Beschreibung der Blattraupe am wilden Apfel,
Buchen und Dornen (vom geh. Rath *Rabe*).
Naturforscher VI. p. 119. no. IV. Beytrag zur Natur-
geschichte der Phal. *Tau*.

(*Meineke*.) Die Raupe behält die *Dornen*,
die sie mit aus dem Ey bringt, bis zur dritten
Häutung. (*Sanders* Güte und Weisheit Gottes
in der Natur p. 434.)

Gleditsch Forstwiss. I. p. 550. ad no. 7. zuweilen
auch Phal. B. *Tau* auf den Birken.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 49. A.
no. 8. *Rothbuchenspinnerraupe* (*Fagi sylvaticae*);
Rothbuchenspinner B. *Tau* L. *La Hachette* du
Soissonnois, *Buffon*.

Bekm. Epit. S. L. p. 162. no. 8. Phal. *Tau*. Nom.
Linn.

Scop. Entom. carn. p. 192. no. 484. Phal. *Tau*.

Long. unc. I et lin. 7. *Lat.* II.

Alae paleaceae; macula atro-violacea, sphae-
rica, in cujus medio macula alba parva trigona,
clavi capitulo similis.

In *Betula*.

Fabric. S. E. p. 560. no. 15. *Bombyx Tau*. Nom.
Linn.

Ocellus in alis anticis utrinque, in posticis sub-
tus pupilla hastata majori alba, absque iride.

Larva viridis, striis obliquis lateralibus albis,
dorso nodoso.

Pupa brunnea, pilosa.

Schaeff. Icon. t. 85. f. 4. 5. 6. *Phalaena pectinicornis*
alis planis quinta et sexta, fünfter und sechster
Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und
flachen Flügeln: f. 4. 5. *Mas*; f. 6. *Foemina*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 38. no. 348. Nom. *Linn*.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 117. no. 1348. Phal. *Tau*.

9. *Fenestra*, das indianische Doppelfenster.

Müller l. c. p. 654. no. 9. das *Fenster*.

Fabric. S. E. p. 559. no. 9. B. *Fenestra*. Nom. Linn.

Cramer Pap. exot. V. p. 91. t. 59. fig. B. Sph. *Egeon*.
v. Fasc. VIII. p. 55. Addit. (unter unsern neuen
Sph. Adsc. no. 138.)

10. *Perspicua*, das indianische Glasband. *)

Müller l. c. p. 654. no. 10. das *Glasband*.

Fabric. S. E. p. 559. no. 11. B. *Perspicua*.

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 373. no. 8. Phal. *Perspicua*.

Corpus magnitudine Phal. *Jacobaeae*.

Antennae pectinatae, longae, nigrae, valde
acuminatae.

Alae primores utrinque fuscae, *fascia fenestrata* f. nuda, transversa versus apicem, brevis, quae non attingit margines.

— *posticae* in diverso sexu.

♂ *supra* fuscae, latere occultato coeruleo; *subtus* flavae margine postico fuscae.

♀ *supra* fuscae *fascia* obliqua flava; *subtus* concolores.

11. *Odora*, die amerikanische *Odoraphaläne*.

Müller l. c. p. 654. no. 11. der *Riecher*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 6. t. 3. f. 1. Phal.

Att. *Odora* — de St. Christopher, de Antigua, de Nevis et de la Jamaïque. **)

Elle déploie ses ailes de sept à sept pouces et demi.

R 5

Sloan.

*) Nicht abgebildet.

**) Drury setzt hinzu: J'ai aussi reçu de St. Christopher une
espece moindre que celle-ci, mais dont la forme, les marques et
les

Sloan. Jamaic. II. t. 236. f. 13. 14. *Papilio maximus* odoratus oculatus; alis utrinque e fusco purpureis, lineis undatis fuscis variegatis.

Cramer Pap. exot. XV. p. III. t. 169. fig. A. Phal. Attac. *Odora*; le *Mâle*; fig. B. la *Femelle* — de *Suriname*.*)

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 374. no. 9. Phal. *Odora*.

Corpus primae magnitudinis, hirsutum, cinereum.

Alae *supra* omnes simul griseae, fusco-nubulosae.

Fascia cinerascens transversa in medio.

Macula *ocellaris*, nigra, reniformis, margine ferrugineo; in medio primorum inter fasciam et basin.

Ocellus magnus annulo nigro repando; pupilla duplici, altera nigra, altera grisea, ad angulum posticum secundariorum.

Puncta triangularia, pallida, intra marginem.

— *subtus* alae ferrugineae.

Fascia linearis, obsoleta, una alterave transversa.

Punctum

les couleurs s'accordent; excepté une barre étroite dentelée couleur de chair, qui traversant les ailes supérieures et inférieures, transversalement, se rencontre proche des extrémités du corps. — Cette différence se considère comme de si peu de conséquence, qu'elle ne mérite pas une autre figure — et peut-être l'insecte est de l'autre sexe. La figure, que donne *Sloane* dans son *Jamaïque* Tom. II. t. 236. f. 13. 14. (qui est fort petite), et la description faite par *Linné* S. N. ed. 12. pag. 811. no. 11. (*Odora*) je considère comme de rapport seulement à la dernière espèce.

Gleichwohl sagt *Sloane* in seiner Beschreibung: *Papilio maximus* odoratus etc.

*) Die kleinere Art.

Punctum fuscum in medio primoris.

Puncta 8 sagittata, intra marginem primorum; itidem in posticis, sed duplici ordine.

12. *Militaris*, die asiatische Krone.

Müller l. c. p. 654. no. 12. die Krone.

Röf's Insektenbel. IV. pag. 51. t. 6. f. 3. ein unvergleichlich schöner indianischer gelb- und blauer Nachtpapilion der zwoten Klasse.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 385. Phal. *Militaris*.

Fabric. S. E. p. 559. no. 12. Bomb. *Militaris*. Nom. Linn.

Cramer Pap. exot. III. p. 46. t. 29. fig. B. Phal. *Militaris* — en Chine.

Daubenton t. 67. f. 1. l'Arlequine.

13. *Crepuscularis*, die amerikanische Dämmerungsphaläne.

Müller l. c. p. 655. no. 13. der Dämmerungsvogel.

Neuer Schauplatz der Nat. II B. p. 287.

Drury Illustr. of. nat. hist. Vol. I. p. 39. t. 20. f. 1. 2. Phal. Att. *Crepuscularis* — de la Chine.

Elle déploie ses ailes environ quatre pouces et un quart.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 98. t. 159. fig. A. Phal. Att. *Crepuscularis* (Mas); t. 160. fig. B. Crepusc. *Foemina*.

Sebae Thef. IV. t. 20. f. 2. 3. *Crepuscularis* (Mas).

14. *Occidua*, das amerikanische Mondauge.

Müller l. c. p. 655. no. 14. der Abendländer.

Fabric. S. E. p. 561. no. 18. Bomb. *Occidua*. Nom. Linn.

Pedes fusci, albo-annulati.

Cramer

Cramer Pap. exot. XV. p. 116. t. 173. fig. A B. Phal.
Att. *Occidua* — à *Suriname*.

15. *Punctigera*, der indianische Punktträger.

Müller l. c. p. 655. no. 15. der Punktträger.

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 380. no. 15. Phal. N. *Puncti-
gera*.

Corpus Phal. *Jacobaeae*, pallidum.

Antennae pedesque pallidi.

Alae primores cinerascens.

Area lunata, albida; cornu altero medium
marginem exteriorem, altero apicem respi-
ciente.

Ocellus niger iride flava, in pagina superiore,
ad apicem alae.

— *posticae* albo-flavescentes.

— *subtus* omnes flavescentes.

Nota *singularis*. Punctum callosum crassum
ad marginem interiorem alae primoris, in medio
supra dorsum.

16. *Fullonica*, der indianische Schwarzmond.

Müller l. c. p. 655. no. 16. der *Walker*.

Fabric. S. E. pag. 593. no. 10. Phal. Noctua *Diosco-
reae*.

Laevis, alis incumbentibus, dentatis, griseis,
posticis luteis, *lunula* limboque nigris.

Clerk Icon. t. 48. f. 1. 2. 3.

17. *Mundana*, die Doppelbinde.

Müller l. c. p. 655. no. 17. die *Mittagslinie*.

Frieslin Schweiz. Inf. p. 33. no. 634. die *Dachmotte*.

Bey uns nicht selten in den Häusern unter
den Dächern, die mit Hohlziegeln bedeckt sind.

Die

Die Raupe ist braun und haaricht, nährt sich von dem *Steinmoos*, der sich gewöhnlich auf alten Ziegeln ansetzt.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 650. no. 22. Phal. *Mundana*, die *Dachmotte*.

Hollaar Inf. t. 4. f. 2. Phal. *Mundana*. (*Naturf.* IX. p. 222.)

Fabric. S. E. p. 645. no. 2. Phal. *Pyralis Mundana*.

Alis denudatis, albidis; strigis duabus punctoque medio, obsolete fuscis.

Schaeff. Icon. t. 159. f. 6. 7.

Phalaena seticornis alis planis 21, 21ter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 478. no. 9. *Phalaena Tortrix Mundana*.

Phalene chappe à ailes transparentes.

— à antennes filiformes à trompe, à ailes larges grises et transparentes avec deux rayes onduées transverses brunes sur les supérieures.

— *Ueberf.* II B. I Th. p. 353. no. 9. die *Mantelphaläne* mit durchsichtigen Flügeln.

— die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüßel, und breiten, grauen, durchsichtigen Flügeln mit zwei gewässerten braunen Queerstreifen auf den Oberflügeln.

Unabgebildete Attaker.

I. No. 10. *Perspicua*.

Neue Arten von Attacis, oder Atlasphalänen.

1. *Rufa*, die braunrothe südeuropäische Atlasphaläne.

Linn. App. S. N. ed. 12. p. 1068. no. 13.

Phalaena Attacus, alis albidis; macula dorsali lunulisque posticis sex fuscis.

Corpus magnitudine *Tabani*.

Müllers Suppl. und R. B. p. 308. no. 17. d. Phal. *Rufa*, der Braunmond.

2. *Macrops*, die ostindianische Makropsphaläne.

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. p. 225.

Phalaena Attacus (macrops) feticornis spirilinguis; alis fuscis atro-undulatis; superioribus supra ocello ferrugineo, subtus albo-maculatis.

Fabric. S. E. p. 591. no. 3. Phal. NOCTVA *Bubo*.

Alis patulis, dentatis fuscis, nigro-undulatis; anticis macula magna ocellari, nigra.

In China.

Statura N. *Strigis* L. no. 82; at paulo minor.

Sulzers Gesch. p. 160. t. 22. f. 2. *Phalaena* N. *Bubo* Fabr. 3.

Dunkelbraun, mit schwärzlichen wellenförmigen Streifen und Flekken; in den Vorderflügeln ein schwarzer eyrunder Ring, in welchem der Theil gegen den Leib rothbraun, der äußere schwarzblau mit zwey hellblauen Pünktchen; auf der Unterseite alle schwärzlichbraun, mit einer Sammtlinie von halben Mündchen, innert derselben (an der Innenseite derselben) einen andern von runden Flekken, beyderley weiß. Die Fühlspitzen oben nakkend.

Aus China.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 308. no. 17. e. Phal.
Macrops, das *Großauge*.

Cramer Pap. exot. XV. p. 114. t. 171. fig. A B. Phal.
Attac. *Macrops* — à la côte de *Coromandel*,
à *Tranquebar* et à *Bengale*.*)

3. *Cytherea*, die *kapensische Zytherea*.

Fabric. S. E. p. 557. no. 5. Bombyx *Cytherea*.

Alis patentibus, concoloribus, griseis, strigis cinereis ocelloque fenestratis — Ad Cap.
B. Sp.

4. *Promethea*, die *amerikanische Prometheaphaläne*.

Fabric. S. E. p. 558. no. 7. Bomb. *Promethea*.

Alis patulis subfalcatis, margine griseis; antice utrinque ocello atro.

Mas alis atris; foemina ferrugineis.

Larva viridis, nigro-punctata, antice spinis quatuor rubris.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 18. t. II. f. 1. 2.
Phal. Attac. *Promethea Mas* — de la *Virginie*
et de la *nouvelle York*.

Déploye ses ailes quatre pouces et un huitieme.

— — t. 12. f. 1. 2. Phal. Attac. *Promethea foemina*.

Déploye ses ailes quatre pouces et un quart.
(Cf. Vol. I. t. 18. f. 2. *Cecropia*.)

Cramer Pap. exot. VII. p. 119. t. 76. fig. A B. Phal.
Attac. *Promethea Mas* — dans l'*Amerique septentrionale*, à la *nouvelle York* et à la *Jamaïque*.

5. *Nicti-*

*) Bey Sulzers Citato sagt Cramer: où on la place à tort parmi les Phalènes, qui n'ont point la trompe visible.

5. *Niſtitans*, das -- große Roſtauge.

Fabric. S. E. p. 558. no. 8. Bomb. *Niſtitans*.

Alis patentibus, fuſcō - incarnatis; *poſticiſ*
ocello ferrugineo, pupilla fenestrata.

Minor *Promethea*.

6. *Caſtalia*, die neuholländiſche Kaſtaliaphaläne.

Fabric. S. E. p. 559. no. 13. Bomb. *Caſtalia*.

Alis patentibus rotundatis, medio albis; *an-*
ticiſ ocello, *poſticiſ* puncto fuſco.

Statura *Pavoniae*.

7. *Io*, die ameriſche Iophaläne.

Fabric. S. E. p. 560. no. 16. Bomb. *Io*.

Alis patulis flavis; *anticiſ* ſubtus; *poſticiſ* ſu-
pra ocello atro, pupilla alba.

Statura *Tau*.

8. *Proſerpina*, die ameriſche Proſerpinaphaläne.

Fabric. S. E. p. 561. no. 17. Bomb. *Proſerpina*.

Alis patulis rotundatis, nigris, fascia alba;
macula ſubocellari nigra.

Statura *Io*.

9. *Semiramis*, die ameriſche Zuckerphaläne.

Fabric. Mantiff. p. 277. no. 8-9. Bomb. *Semiramis*.

Alis patentibus *caudatis* verſicoloribus puncto
fenestratis, *caudis longiſſimis*.

In *Sacharo Americae meridionalis*.

Cramer Pap. exot. II. p. 19. t. 13. fig. A. Phal. Attac.

Semiramis — très-rare ſur la Canne à ſucre
à Suriname.

10. *Pen-*

10. *Penelope*, die indianische *Penelopephaläne*.

Fabric. Mantiss. p. 278. no. 10-11. Bomb. Penelope.

Alis patentibus flavescentibus fusco-irroratis,
ocelloque centrali fenestrato.

Magna et crassa.

Cramer Pap. exot. IV. p. 70. t. 45. Fig. A. Phal. Attac. Penelope — à Suriname — rare.

11. *Tyrrhea*, die kapensische *Tyrrheaphaläne*.

Fabric. Mantiss. p. 278. no. 10-11. Bomb. Tyrrhea.

Alis patentibus griseis, strigis albis, ocelloque centrali atro, pupilla fenestrata.

Cramer Pap. exot. IV. p. 71. t. 46. Fig. A. Phal. Attac. Tyrrhea — du Cap de B. E.

12. *Cynthia*, die chinesische *Zynthiaphaläne*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 10. t. 6. f. 2. Phal. Att. Cynthia.

Elle déploie ses ailes cinq pouces et un quart.

Alis patentibus subfalcatis fuscis, griseo-maculatis; anticarum apice ocello fusco, albo-lunulato.

Cramer Pap. exot. IV. p. 62. t. 39. fig. A. Phal. Attac. Cynthia — de la Chine.

Daubent. Pl. 42. f. 1. Le croissant.

13. *Epimethea*, die afrikanische *Epimetheaphaläne*.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 22. t. 13. f. 1.

Phal. Attac. Epimethea — de la côte d'Afrique — près de Callabar.

Elle déploie ses ailes presque cinq pouces et un quart.

Alis fuscis; anticis falcatis, posticis acuminatis; ocello atro, pupilla sulphurea.

Cramer Pap. exot. XV. p. 122. t. 176. fig. A. Phal. Attac. *Epimethea* — sur la côte de *Guinée*.

14. *Abas*, die *surinamische Abasphaläne*.*)

Cramer Pap. exot. VII. p. 121. t. 77. fig. A. Phal. Att. *Abas* — de *Suriname*. *Mas*.

(Een zogenaamde Paauw - oog of Atlas - Vil. — Oeil de Paon ou d'Atlas nocturne.)

— Fig. B. *Foemina*.

Statura *Pavoniae minoris*.

Alis fusco - canescentibus, subfalcatis; *anticis* binis utrinque ocellulis sulphureis, iride nigra; *posticis* rotundatis, ocello magno ferrugineo, albo - pupillato, iride nigra.

15. *Agis*, die *surinamische Agisphaläne*.

Cramer Pap. exot. III. p. 49. t. 30. fig. F. Phal. Attac. *Agis* — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* albo - rubellis, nigro - venosis; abdomine ferrugineo, nigro - cingulato.

16. *Angulata*, die *surinamische Winkelphaläne*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 96. t. 61. fig. E F. Phal. Att. *Angulata* — de *Suriname*.

Alis fuscis, *aurantiaco* - acute dentatis.

17. *Aurota*, die *surinamische Aurotaphaläne*.

Cramer Pap. exot. I. p. 11. t. 8. fig. A. Phal. Att. *Aurota* — de *Suriname*.

Grandis. Alis *subfalcatis* rubris, maculis quatuor albis fenestratis.

Diversa a Phal. Att. *Atlas* L. no. 1.

Merian.

*) Im *Cramer* hab' ich einige Verwirrung bey diesen Arten gefunden. Verschiedene sind hinten im Indice Phal. Attaci, im Text aber entweder *Noctuae* oder *Bombyces*, wie sie denn auch wirklich sind.

Merian. Surin. t. 52.

Sebae Thes. IV. t. 57. f. 56.

Houttuin Nat. hist. part. XI. p. 484. 1.

18. *Boreas*, die westindische *Boreasphaläne*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 110. t. 70. fig. B. Phal. Att. Boreas — des *Indes occidentales*.

Alis fusco-rubellis; anticis falcatis, binis utrinque ocellis albis; posticis admodum caudatis.

19. *Catilina*, die surinamische *Katilinaphaläne*.

Cramer Pap. exot. VII. p. 126. t. 79. fig. E F. Phal. Att. Catilina.

Alis patentibus nigris, rotundatis, viridi-fasciatis, alboque ad marginem punctatis.

20. *Egeus*, die surinamische *Egeusphaläne*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 100. t. 64. fig. C. Phal. Att. Egeus — de *Suriname*.

Alis rotundatis; anticis fusco-testaceis; posticis incarnatis, ad basin rubris, arcu nigro transverso extus sinuato, ocelloque magno, nigro-marginato.

21. *Hircia*, die surinamische *Hirziaphaläne*.

Cramer Pap. exot. III. p. 49. t. 30. fig. G. Phal. Att. Hircia — de *Suriname*.

Alis rotundatis testaceo-flavoque variegatis; anticis binis maculis; posticis lituris nigris.

22. *Janus*, die surinamische *Janusphaläne*.

Cramer Pap. exot. VI. p. 100. t. 64. fig. A B. Phal. Att. Janus (Foemina) — de *Suriname*.

276 *Insecta Lepidoptera*. 233. *Phalaena Attacus*.

Alis *subfalcatis* viridi-rubris; *anticis* macula ovata argentea; *posticis* ocello magno aterrimo, litura in medio alba.

23. *Papilionaris*, die chinefische *papilionsartige Phaläne*.

Cramer Pap. exot. III. p. 45. t. 29. fig. A. Ph. Attac.
Papilionaris — en Chine.

Alis *rotundatis* nigro-sulphureis; *anticis* margine superiore coeruleo.

Drury Illustr. of nat. hist. II. p. 4. t. 2. f. 4. Phal.
Noctua papilionaris — de la Chine.

Elle déploie ses ailes trois pouces et presque un quart.

24. *Polyphemus*, die newyorkische *Polyphemusphaläne*.

Cramer Pap. exot. I. p. 8. t. 5. fig. AB. Phal. Attac.
Polyphemus — dans la Nouvelle York.

Alis *subfalcatis* rubellis nigro-fasciatis; *anticis* ocello ovato albo-flavo-nigroque; *posticis* ovulo aterrimo albo-punctato, macula alba, flavo-marginata.

Magnitudo *Pavoniae majoris*.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 307. no. 17. c. Phal.
Polyphemus, der Augenspiegel.

25. *Tarquinia*, die surinamische *Tarquiniaphaläne*.

Cramer Pap. exot. I. pag. 6. t. 4. fig. A. Phal. Attac.
Tarquinia Foemina — fig. B C. *Tarquinus Mas*.

Alis *rotundatis*; *anticis* furvis, apice fuscis, albo-punctatis; in medio longitudinaliter Y album; *posticis* rubris litura nigra.

Maris supra anticis variegatis disco nigricante cum *Tpsilon albo*; *posticis* rubellis, *subtus* concoloribus rutilantibus.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 306. no. 17. a. Phal.

Tarquinia, das weiße T.

— — no. 17. b. Phal. *Tarquinus*, das kleine T.

26. *Tiresias*, die surinamische *Tiresiasphaläne*.

Cramer Pap. exot. VIII. p. 133. t. 85. fig. B. Phal. Attac. *Tiresias* — de Suriname.

Alis patentibus *rotundatis* nigris, flavo-maculatis, ad marginem superiorem et inferiorem albo-punctatis.

27. *Achelous*, die westindische *Achelousphaläne*.

Cramer Pap. exot. X. p. 22. t. III. fig. A. Phal. Attac. *Achelous* — des Indes occidentales.

Alis *subfalcato-ciliatis* testaceis, fascia transversa cinerascens sinuata, alia albida; *anticis* binis punctis albis.

28. *Agarista*, die kurakaische *Agaristaphaläne*.

Cramer Pap. exot. XV. pag. 112. t. 170. fig. A. Phal. Attac. *Agarista* — à Curacao.

Simillima Phal. *Odora* L. no. II.

Alis *angulatis* supra virefcentibus, subtus purpureo-micantibus; multis fasciis nigris transversis undulatis; *anticis* binis maculis nigris, coeruleo-punctatis, rufo-marginatis, *reniformibus*.

29. *Alciphron*, die koromandelsche *Alciphronphaläne*.

Cramer Pap. exot. XII. p. 58. t. 133. fig. E. Phal. Att.

Alciphron — de la côte de Coromandel à Tranquebar.

Alis rotundatis, anticis incarnatis, posticis flavis, atro-maculatis.

30. *Conspicillator*, der amboinische Brillenträger.

Cramer Pap. exot. IX. p. 1. t. 97. fig. A B. Phal. Att.
Conspicillator — à Amboine.

Alis subfalcatis, anticis testaceis, binis conspicillis albo-punctatis; posticis nigricantibus, disco rubro, apice albis.

31. *Glaucia*, der surinamische Blauling.

Cramer Pap. exot. IX. p. 17. t. 107. fig. E. Phal. Att.
Glaucia — de Suriname.

Alis rotundatis nigricantibus, fascia transversa albo-rubra, 12 radiis glaucis ad basin ex abdomine glauco exeuntibus.

32. *Helcita*, die afrikanische Helzitaphaläne.

Cramer Pap. exot. XI. p. 48. t. 129. fig. C. Phal. Att.
Helcita antennis pectinatis.

S. III Th. I B. p. 147. no. 94. Beym Linné
aus Mangel der Fühlhörner ein *Pap. Dan. Cand.*

33. *Hippodamia*, die surinamische Hippodamiaphaläne.

Cramer Pap. exot. XI. p. 43. t. 126. fig. B. Phal. Att.
Hippodamia — de Suriname.

Alis falcatis concoloribus fuscis, margine exteriori albo-flavicante, lituris atris; posticis lineâ nodosa alba, binisque nigris undulatis.

34. *Laocoon*, die bengalische Laokoönphaläne.

Cramer Pap. exot. X. p. 30. t. 117. fig. A. Phal. Att.
Laocoon Mas; fig. B C. Foemina — à Bengalen.

Alis

Alis *rotundatis* fusco-testaceis, albo-maculatis, lineis transversis ferrugineis, undulatis.

35. *Maja*, die *virginische Majaphaläne*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 3. t. 98. fig. A. Phal. Attac.
Maja Mas — en *Virginie*.

Alis *rotundatis* nigris, albo-fasciatis; *anticis* ocello aterrimo, albo-lineato.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 42. t. 24. f. 3.
Phal. Bombyx *Maja* Foemina — de la *Nouvelle-York*.

Elle déploie ses ailes deux pouces et un quart.

36. *Salmonea*, die *surinamische Salmoneaphaläne*.

Cramer Pap. exot. XIV. p. 101. t. 162. fig. A. Phal.
Att. *Salmonea*.

Alis *rotundatis*; *anticis* fuscis, strigis transversis flavis; *posticis* testaceis, ocello atro, albolutulato.

37. *Speciosa*, die *schöne blaßrothe surinamische Phaläne*.

Cramer Pap. exot. IX. p. 16. t. 107. fig. B. Phal. Att.
Speciosa — de *Suriname*.

Alis *rotundatis* pallide rosaceis; *anticis* furca alba, nigro-marginata.

38. *Zenobia*, die *surinamische Zenobiaphaläne*.

Cramer Pap. exot. X. p. 27. t. 115. fig. A. Phal. Attac.
Zenobia — de *Suriname*.

Maxima et *ravissima*. Alis *angulatis* egregie variegatis; *anticis* binis maculis griseis *reniformibus*.

39. *Phoronea*, die *surinamische Phoroneaphaläne*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 77. t. 239. fig. A B. Phal.
Attac. *Phoronea*: Foem. C. *Mas* — à *Suriname*.

Alis amplissimis rotundatis furvo-carneo-
purpurascentibus, aurantiaco-maculatis.

40. *Sylla*, die *surinamische Syllaphaläne*.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 79. t. 240. fig. A. Phal.
Att. *Sylla* — à *Suriname*.

Alis maximis rotundatis fuscis lineis transver-
sis undulatis testaceis.

II. *Spinner*; *Bombyces*.

I. *Zungenlose mit Wendeflügeln*: elingues alis re-
versis (spinnen große Seidentönchen).

18. Phal. Bomb. *Quercifolia*, der *Eichenblattspinner*.

Müllers Linn. Natursyst. 5 Th. 1 B. pag. 656. no. 18.
das *Eichenblatt*.

Füßlins Schweizer. Inf. p. 33. no. 636. das *Eichen-*
blatt.

— *Magaz. der Entomol.* 1 B. p. 269. Phal. *Querci-*
folia: die Raupe frisst auch *Schlehdornenblät-*
ter. (Chorherr *Meyer*.)

Frisch Inf. III. p. 24. no. 12. 3 Pl. t. 1. von der größ-
ten braunen Raupe; no. 1. Raupe; no. 2. Ge-
spinnst; no. 3. Puppe; no. 4. der Zweyfalter;
no. 5. Eyer; no. 6. der schwarze Rückenstreif
bey einigen.

Berlin. Magaz. II. p. 394. no. 2. Phal. *Quercifolia*,
die *Obstmotte*.

Röthlichgelb, oder braunroth, oder auch bleifarbig mit stark ausgezakten Flügeln und einem wellenförmigen Queerstreif durch die Oberflügel.

Die Raupe kriecht noch in dem Jahre aus dem Ey, da es gelegt worden, behilft sich den Winter über in Baummoos, bleibt in einer Art von Erstarrung, und fängt im Frühjahr an aufzuleben, p. 429.

Maders (Kleemanns) Raupenkal. p. 15. no. 19. *Phal. Quercifolia*, das *Eichblatt*; die *Obstmotte*; der *trockene Blätterbündel*, p. 102. no. 289.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 233. t. 41. die große haarige, mit vielen Warzen und Zapfen bewachsene Grasraupe, nebst ihrer Verwandlung zum Papilion.

— lieber *Stammraupe*; *Wunderraupe*. (Kleemann.)

— fressen Apfel- Birn- Pflaumenlaub und von andern Obstäumen — fressen nur des Nachts. (Kleemann.)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 376. no. 15. *Phal. Quercifolia*, die *Obstmotte*.

— auf dem *Schlehdornstrauche*, dem *wilden Birnbaum*, der *Lorbeerweide* und andern glatten *Weidenarten*; zuweilen auch im *Grase* wird die Raupe angetroffen.

Sulzers Kennz. der Inf. p. 38. t. 16. f. 93. *Phal. Quercifolia*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 56. I. *Halsbandraupen*; *Larvae Collariae*; *zahnflügelichte Spinner*; *Phal. Bomb. dentatae*.

No. 1. *Frühbirnspinnerraupe* (*Pyri communis*); *Frühbirnspinner*.

Fischers N. G. von Livl. p. 150. no. 346. Phal. *Quercifolia*, das *Eichblatt*. —

Auf der *Weide* und in einigen *Grasgärten*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 368. no. 3. Phal. *Quercifolia*, das *Eichblatt*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 459. no. 3. das *Eichenblatt*; *Frühbirnspinner*; P. B. *Quercifolia*; *le paquet de feuilles seches*.

Bernoulli Abhandl. über das Vermögen gewisser Arten Schmetterlinge, fruchtbare Eyer zu legen, ohne sich gepaart zu haben. *) S. *Neues Hamb. Magaz.* 96 St. p. 504. Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Berlin A. 1772. Nouv. Mém. de l'Acad. A. 1772. p. 24-35. *Allgem. d. Bibl.* 26 B. p. 11. 12.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 406. Phal. *Quercifolia*, das *dürre Eichblatt*.

Bekm. Epit. Syst. Linn. p. 162. no. 18. Ph. *Quercifolia*.
Raj.

*) Prof. *Baster* ist der erste, der dies bey der Phal. *Quercifolia* bemerkt hat. *Bernoulli* hat ein gleiches nachher im Jahr 1767 an der Phal. *Coeruleocephala* L. no. 59. beobachtet. Die Raupe hat sich in der Schachtel verpuppt; nachher ist die Phaläne ausgekrochen, hat Eyer gelegt, und ist gestorben. Nach vierzehn Tagen ist die vergessene Schachtel erst geöffnet, und darin eine zahlreiche Familie kleiner Räupchen gefunden, welche das Gehäuse der Mutter, und zum Theil ihre Eyerschalen verzehret hatten. Ein Beweis also, schließt der würdige Verfasser, daß ein Schmetterling fruchtbare Eyer legen kann, ohne sich vorher gepaart zu haben. Ohnerachtet ich nicht das mindeste Mißtrauen in die Beobachtungen so genauer Naturforscher setze; so wünscht' ich doch, daß es ihnen gefallen hätte, die ausgekrochenen Räupchen genauer zu beobachten, und eine richtige Abbildung zu geben, insonderheit aber solche Räupchen nachher, wenn sie noch leben, mit ihrem gewöhnlichen Futter zu versehen, um zu erfahren, wie weit sie in ihrem

Raj. Hist. Inf. p. 141. no. 1. *)

Phalaena maxima, tota obscure rufa, antennis plumosis, capite grandi; alis interioribus, cum sedet, ultra exteriores extantibus et sursum reflexis.

— — p. 342. no. 2.

Larva maxima ex albo et nigro coloribus variegata.

Merian. Europ. p. m. 19. t. 17. Chenilles extraordinaires; Vermes *miraculosi*; des Papillons nocturnes de couleur d'orange obscur.

Scop. Entom. carn. p. 193. no. 485. Ph. *Quercifolia*.

Long. unc. 1. et lin. 7. *Lat.* unc. 1. et lin. 3.

Tota corticina; alis dentatis, reversis: *posticis*, dum sedet animal, ultra marginem crassiorum anticarum exporrectis.

In

Wachsthum und in ihrer Vollkommenheit gelangen würden. Mir sind bey einigen Schmetterlingen, die in Schachteln ausgekommen und gestorben waren, dergleichen Phänomene vorgekommen, das ich glaubte, kleine Räupchen aus den gelegten Eyern vor mir zu sehen. Als ich aber genauer nachsahe, fand ich, das es kleine *Ichneumonlarven* waren, davon der kleine *Ichneumon* in die Schachtel gerathen war, und den Eyern seine Brut beygebracht hatte. Ist es aber an sich richtig; so treten wir den beyden vom Herrn *Bernoulli* angegebenen Ursachen bey: das es entweder durch die Zusammenkunft besonderer Umstände von Wärme und dergleichen bewirkt werde, oder, welches mir noch wahrscheinlicher vorkömmt, das eine und eben dieselbe Befruchtung zu drey, vier, und mehrern Generationen dienen könne. Wir werden künftig auf diesen Umstand aufmerkfamer seyn.

*) Er macht schon die artige Bemerkung:

Caeterum in genere *Phalaenarum*: *Antennas plumosas habere* non est speciei alicuius nota, sed *sexus masculini* communis index.

In *Amygdalo persica*, et *Pruno spinosa*.

Folliculus oblongus, tenuis. *Pupa* albida veluti farina adsperfa.

Poda Mus. graec. p. 84.

Réaumur. Inf. Tom. II. p. 317. t. 23. f. 1-10. Le Papillon paquet de feuilles seches.

Schaeffer. Icon. t. 71. f. 4. 5.

Phalaena pectinicornis alis deflexis 15, 15ter
Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fabric. Syst. Ent. p. 561. no. 19. *Bombyx Quercifolia*.

Alis reversis, dentatis, ferrugineis, ore tibisque nigris.

Larva subcaudata, pilosa, ferruginea, collaribus coeruleis.

Pupa folliculata, fusca, fasciis rubris.

*Müller*i Faun. Frid. p. 39. no. 354. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1349. Nom. *Linn*.

Geoffr. Inf. II. p. 110. no. 11.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis reversis dentatis ferrugineis, margine ferrato.

La feuille morte.

Long. 15 lignes.

Biblioth. reg. Par. p. 21. f. omnes.

Degeer Inf. II. Part. I. p. 299.

— *Ueberf*. II B. I Th. p. 213. not. **). *Phal. Quercifolia*.

19. *Ilicifolia*, der Stechpalmenspinner.

Müller l. c. p. 656. no. 19. das Stechpalmenblatt.

*Füesßlin*s Schweiz. Inf. p. 33. no. 637. *Phal. Ilicifolia*, das Stechpalmenblatt.

In der Schweiz sehr selten.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 737. no. 16. die rothfarbige und zackichte Weidenmotte, mit dem weisbunten hintern Flügelrande.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 56. I. Halsbandraupen; zackenflügelichte Spinner: no. 2. Traubeneichenspinnerraupe (*Quercus Roboris*); Traubeneichenspinner.

Fabric. S. E. p. 562. no. 20. *Phal. Bomb. Ilicifolia*: — margine postico albo punctato.

Catholicon I. p. 96. La Phalene de l'ilex aquifolium, ou la Phalene du houx, die Stechpalmphaläne.

Degeer Inf. I. p. 229. t. 14. f. 7. 8. 9.

Chenille grande et longue, dont le corps est jaune-brun en dessus, et noir en dessous, avec des taches blanches et jaunes, qui est velue à poils courts, et qui mange les feuilles du faule.

— — p. 697. t. 14. f. 7. 8. 9.

Phalene à antennes à barbes, sans trompe; d'un brun roussâtre mêlé de nuances grises, et dont les ailes inférieures débordent les supérieures.

— Tom. II. Part. I. p. 298. no. 1.

Phalene petit paquet de feuilles seches.

Phalene à antennes barbues sans trompe, à ailes débordées dentelées d'un brun roussâtre avec des rayes ondées obscures, des nuances d'un gris d'agate et bordées de blanc.

— *Uebers.* I. 2 Quart. pag. 17. t. 14. f. 7. 8. 9. die grosse, lange, oben braungelbe, und unterschwarze, weiss und gelb gefleckte, kurzhaarichte Sahlweidenraupe.

— — 4 Quart. p. 119. t. 14. f. 7. 8. 9.

Ein braunröthlicher *Nachtvogel* mit grauen Schattirungen, bärtigen Fühlhörnern, ohne Saug-

Saugrüßel, dessen Unterflügel, vor den obern vorstehen.

Deger Inf. Uebersf. II B. I Th. pag. 212. no. 1. das kleine trockene Blattbündel.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern. Die Flügel gezähnelte, und die untern stehen vor den obern etwas hervor. Ihre Farbe braunfuchsröthlich mit gewässerten dunkeln Streifen, achatgrauen und weißgerändelten Schattirungen.

20. *Capensis*, der *kapensische Spinner*.*)

Müller l. c. p. 657. no. 20. das Zimmetblatt.

Fabric. S. E. p. 562. no. 21. *Bomb. Capensis.* Nom. *Linn.*

21. *Rubi*, der *Brombeerspinner*.

Müller l. c. p. 657. no. 21. das Himbeerblatt.

Frieslins Schweiz. Inf. p. 34. no. 638. *Phal. B. Rubi*, der *Vielfraß*.

Die Raupe bey uns sehr gemein, und frisst alle Arten von Baumblättern und Gräsern.

— *Magaz. der Entomol.* I. pag. 269. *Phal. Rubi.* (Chorherr *Meyer*.)

— hat einige hundert dieser Raupen aus den Eyern gezogen; fressen die Eyersehen; jede häutet sich viermal; leben den Winter durch; eine spinnt sich am 1ten *Brachmonat* ein, und die *Phaläne* kommt am 26ten aus.

Röfels Insektenbel. III. p. 283. t. 49. der *Vielfraß*, oder die zu der Nachtv. 2 Kl. gehörige große, schwarzhaarige Raupe, nebst ihrer Verwandlung zum Papilion.

Maders

*) Nicht abgebildet.

Maders (Kleem.) Raupenkalender p. 113. no. 317.
Vielfraß; das *Himbeerblatt*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 737. no. 18. Phal. Bomb.
Rubi, die *Brombeermotte*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 56. K.
Pelzraupen; *weißmaklichte Spinner*; no. 2. *Brom-*
beerspinnerraupe (*Bromi sterilis*); la *Beuvense*,
Goed. *Brombeerspinner*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 409. Ph. B. *Rubi*, der *Vielfraß*.

Bekm. Epit. S. L. p. 162. no. 21. Ph. B. *Rubi*.

Scop. Entom. carn. p. 197. no. 492. Ph. *Rubi*.

Alae reversae, cervinae, immaculatae; strigis duabus albidis; subtus nullis.

Schaeff. Icon. t. 178. f. 3. 4.

Phalaena seticornis *) *alis deflexis* 30, 30ter
Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *ab-*
hängenden Flügeln: *Mas* — — f. 5. 6. *Femina*.

Système Naturel du Regne anim. II. p. 147. no. 21.
Phalene très-velue et assez grande, dont la tête et
le corcelet sont épais; no. 22. *Mas*.

Ad. Vpsal. 1736. p. 25. no. 65. *Papilio* alis depres-
sis, cinereo-testaceis, lineis binis albis obliquis.

Fabric. S. E. p. 565. no. 35. Bomb. *Rubi*. Nom. *Linn.*

Larva pilosa, subtus nigra, supra ferruginea,
annulis nigris.

Pupa folliculata, nigricans, annulis tribus
luteis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 39. no. 351.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 117. no. 1350. Ph. B. *Rubi*.
Nom. *Linn.*

22. *Pruni*,

*) Soll wohl heißen: *pectinicornis*.

22. *Pruni*, der *Pflaumenblattspinner*.

Müller l. c. p. 657. no. 22. das *Pflaumenblatt*.

Fließlins Schweiz. Inf. p. 34. no. 639. Ph. *Pruni*, der *Fischschwanz*.

Bey uns etwas selten.

Berlin. Magaz. II. pag. 394. no. 3. Ph. *Pruni*, der *Fischschwanz*.

Gelbroth, mit einem weissen Punkte in der Mitte der Oberflügel.

— — p. 430. C. Raupe kriecht auch noch vor dem Winter aus.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 209. t. 36. die graue, braungefleckte *Fischschwanzraupe*, und derselben Verwandlung.

Maders (Kleemanns) Raupenkal. p. 101. no. 288. der *Fischschwanz*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 650. no. 23. Phal. *Pruni*, der *Fischschwanz*.

— II. p. 737. no. 17. der *Fischschwanz*.

Naturforscher VIII. St. p. 101. no. 3. Phal. *Pruni*.

Die Raupe schon im November auf der Birke gefunden.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 56. I. no. 3. *Pflaumenspinnerraupe* (*Pruni domesticae*); *Pflaumenspinner*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 402. Ph. *Pruni*.

Schaeff. Icon. t. 60. f. 6. 7.

Phalaena pectinicornis alis deflexis nona, 9ter *Nachtfalter* mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fabric. S. E. p. 563. no. 26. Phal. Bomb. *Pruni*.

Alis reversis, dentatis, flavis, strigis duabus fuscis, punctoque albo.

Larva

Larva laevis, cinerea, coeruleo-lineata, collo lateribusque fasciculato-pilosis; pedibus posticis porrectis, distantibus.

Pupa folliculata, antice nigra; postice brunea.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1351. Ph. *Pruni*.

Elinguis, *alis lacteis*; strigis duabus fulvis, punctoque albo.

23. *Potatoria*, der *Trespenspinner*.

Müller l. c. p. 657. no. 23. der *Trinker*.

Füßslins schweiz. Inf. p. 34. no. 640. der *Trinker*.

Bey uns sehr gemein; die *Raupe* im *Gras*.

— Magaz. der Entomol. I. p. 270. Phal. *Potatoria*.

Kein Schmetterling vor der 5ten Woche nach der Verwandlung. Beym Häuten werfen die Raupen die Hornhaut des Kopfs besonders weg. (*Meyer*.)

Berlin. Magaz. II. p. 398. no. 4. Phal. *Potatoria*, das *Einhorn*.

Röthlichgelb mit einem blassen breiten Querstreif durch alle Flügel.

— — p. 430. D. die Phalänen der sogenannten *Filzraupen* am besten nach den *Raupen* zu unterscheiden.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. pag. 9. t. 2. die große, braunhaarige, bordirte, und hinten und vorne mit einem haarigen Zapfen bewachsene *Grasraupe*, nebst ihrer Verwandlung zum *Papilion*.

Bekm. Epit. Syst. Linn. p. 162. no. 20. *Phalaena Potatoria*.

List. Goed. p. 195. no. 82. f. 82.

Eruca admodum *siticulosa*, cum bibit, immergit caput aquae.

Raj. Hist. Inf. p. 142. no. 3.

Phalaena maxima; alis e fulvo flavicantibus;
linea fulva ab extimo alae angulo ad marginem
ejus interiorem oblique ducta; interioribus ultra
exteriores extantibus. (*Femina.*)

— — p. 143. *Eruca pilosa* major, obscure
coerulea seu pulla, pilis oblongis fulvis, albis et
flavis maculis in lineis secundum longitudinem
fitis, distincta.

Merian. Europ. p. 27. t. 16.

Schaeff. Icon. t. 67. f. 10. 11.

Phalaena pectinicornis alis *deflexis* 13, 13ter
Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *ab-*
hängenden Flügeln.

Fabric. S. E. p. 564. no. 28. Bomb. *potatoria*.

Alis reversis, *subdentatis* etc.

Larva caudata, cristata, pilosa, lateribus
albo-maculatis.

Pupa folliculata, brunnea.

Ova oblonga, plumbea, utrinque annulo
punctoque medio viridibus.

Sepp Nederl. Inf. IV St. p. 37. t. 8. De Vlinder de
Riet-Vink.

Mülleri Faun. Fridr. p. 40. no. 359.

— Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1352. Ph. *Potatoria*.

24. *Pini*, der *Fichtenspinner*.*)

Müller l. c. p. 657. no. 24. der *Fichtenwanderer*.

Frösslins schweiz. Inf. p. 34. no. 641. Phal. *Pini*, die
Fichteneule.

Bey uns selten.

Berlin.

*) Mit dieser der Frösslinsche *Fichtenspinner* Magaz. II B. 2 St.
p. 232. t. 3. nicht zu verwechseln, den weder Linné noch Fa-
bricius haben, und den wir unter den neuen *Spinndern* anfüh-
ren werden.

Berlin. Magaz. II. p. 398. no. 5. Phal. Pini, die Fichtenmotte.

Entweder aschfarbig oder braun, mit geschwungenen Streifen am Rande, und einem *weißen Flek* in der Mitte der Oberflügel.

— — p. 431. E — davon sehr viele *Abänderungen.*

Frisch Inf. X. p. 13. t. 10. von der Kienbaumraupe.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 297. t. 59. die große Kühn- oder Waldraupe mit ihrer Verwandlung.

Naturforscher II. p. 19. Phal. Pini.

Bey Berlin häufig.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 501. no. 2. Phal. B. Pini, die Fichten- und Tannenmotte.

An den Zakken und Stämmen der Fichten und Kiefern im *Junio* und *Julio* häufig.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 56. I. no. 4. Föhrenspinnerraupe (Pini sylvestris); Föhrenspinner.

Oekon. Nachr. der patriotischen Gesellsch. in Schlesien, VI. p. 404.

Der Staub, Haare und Ausdünstungen dieser Raupen sehr schädlich. *S. Sulzers Gesch. der Inf. p. 153. Die haarigen Raupen in der Volkssprache Teufelskatzen. Die feinen Härchen gehen in die Poren der Haut, verursachen Jucken und Geschwulst — (haben aber auch feine Widerhäkchen).*

Behm. Epit. S. L. p. 163. no. 24. Phal. Pini.

— physik. oekon. Bibl. X. p. 227. das Gespinnst der *Fichtenraupe die coische Seide.*)*

T 2

Ono-

*) *Plin. H. N. Lib. XI. c. 23. Humore lentescere more ceras.*

292 *Insecta Lepidoptera.* 233. *Phalaena Bombyx.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 397. der große Wald-raupenvogel.

Schaeff. Icon. t. 86. f. 1. 2. 3.

Phalaena pectinicornis alis *deflexis* 17 et 18, 17ter und 18ter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fabric. S. E. p. 565. no. 32. *Bombyx Pini.*

Alis reversis, griseis; fascia ferruginea, punctoque triangulari albo.

Larva subcaudata, albo-griseo-fuscoque variegata; collaribus coeruleis; punctis utrinque rufis.

Pupa folliculata, fusca.

Scop. Introd. ad hist. natur. p. 416. *Phal. Pini* L.

Larvae binae, intra unicum, quem pararunt, folliculum, mutatae sunt in unicam Pupam, unde animal dimidia corporis parte masculum, antenna plumosa, alisque binis majoribus; alia vero femineum, antenna setacea, alisque binis majoribus. Quod vero mirabilius, pars mascula emissio pene foecundavit ovula foeminae, quae deposita perfectas larvas protulerunt. *) R. D. Piller Prof. Tirnaviensis.

25. *Quercus*, der Eichenspinner.

Müller l. c. p. 658. no. 25. der Eichensteiger.

Früßlins schweiz. Inf. p. 34. no. 642. *Phal. Quercus*, der Hekkenkriecher.

Bey uns die Raupe meistens in den Dornheken; frisst fast alle Arten Stauden und Baumblätter: sehr gemein.

Berlin.

*) Sonderbar, daß dieses zufällige Zusammenwachsen doch so geschehen, daß sich die Geschlechtsglieder einander haben erreichen können.

Berlin. Magaz. II. p. 398. no. 4. Phal. *Quercus*, die *Grasmotte*.

Braunroth mit einem weislichen gelben Querstreif durch die Oberflügel und einem weissen Punkt zu der Mitte derselben.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 193. t. 35. a. f. 1. 2. 3. *Raupe*, *Gespinnste*, *Puppe*; t. 35. b. f. 4. 5. 6. *Vogel*.

Die grosse filzhaarige, gelbbraune *Schlehen- und Quittenraupe*, und ihre Verwandlung.

Kleemanns (eigentlich *Maders*) Raupenkal. p. 14. no. 16 Phal. *Quercus*, der *Hekkenkriecher*. *)

Gleditsch Forstwiss. I. p. 549. no. 6. Phal. *Quercus*.

Die glatte, haarichte, graue, schwarzringlichte und weisgeflekte *Eichenraupe*.

— — p. 643. no. 3. die *Grasemotte*.

Naturforscher VIII. p. 102. no. 6. Phal. *Quercus*: wo beyde Röfelsche Vögel, I. t. 35. a b, als *zwo verschiedene Arten* angegeben werden, ob sie gleich *Linne'*, und mehrere, für einerley gehalten haben.

— XIII. p. 230. §. 9. Aus einem grossen, festen Kokkon der Phal. *Quercus* frisst sich ein dicker weisser *Fleischengerling* (*Oestruslarve*) heraus: kleiner als die Engerlinge des Wildes; doch die rechte Ringelzahl, die *zwo* hintern Augenpunkte, und die *zwo* scharfen Haken am Vorderringel. Es müssen daher gewisse *kleine Bremsen*, denen

T 3 die

*) In der Note daselbst hat Herr *Kleemann* den *Röfelschen* Fehler berichtigt, den *Friesli* schon vorher in seinem Verz. schweiz. Insekten bey Phal. *Dumeti* berichtigt hatte, daß er t. 35. a. die *Raupe* von Phal. *Quercus* f. 1. 2. 3. t. 35. b. aber f. 4. 5. 6. den *Vogel* derselben; ferner t. 35. a. f. 4. 5. Phal. *Dumeti*, und t. 35. b. f. 1. 2. 3. die *Raupe* derselben vorgestellt habe.

die Thierhäute zu stark sind; diese *filzhaarichte Raupen* verfolgen.*).

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 57. K. no. 3. *Eichenspinnerraupe* (*Quercus Roboris*); *Eichenspinner*.

Gewöhnlicher Weise die Raupe auf niedern Stauden, besonders auf *Weißdornen*, *Schlehen*, *Stachelbeeren* u. s. w. doch auch einmal eine auf einer ziemlich hohen *Eiche*; also genug, bey dem *Linneischen Namen* zu bleiben.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 408. Phal. *Quercus*.

Bekm. Epit. S. N. L. p. 163. no. 25. Phal. *Quercus*.

List. Goed. p. 203. no. 88. f. 88. la *Piquante*.

Vescitur foliis *ruborum* et *salicum*,

— ed. Gall. T. II. t. 7.

Raj. Hist. Inf. p. 142. no. 2.

Phalaena maxima fulva; alarum exteriorum superiore medietate intensius colorata, cum macula in medio alba, inferiore dilutiore.

Réaumur Inf. Tom. I. p. 519. 520. t. 35. f. 7. 8.

— — — P. 531.

Une grande chenille velue — vit de feuilles de *charmille*, d'*orme*, de *noisetier*, de *cornouiller* etc.

Scop.

*) Dafs es noch viele unbekannte Arten von *Oestrus* gebe, beweiset die neue Art des *Oestrus Columbacensis* (die kolumbacher Bremse), welche sich im temeswarer Banat aufhalten, in Heerzügen wie Wolken erscheinen, und über die Kälber, Schafe, Rinder u. s. w. herfallen, sich an alle kahle Stellen des Körpers, ans Maul, an die Nase, um die Augen herum, und an die Schamtheile ansetzen, so dafs die Thiere entweder gleich nach dem Anfall, oder nach wenig Stunden, auch in der folgenden Nacht sterben, und ihre aufgeschwollene Leiber zeigen, dafs diese Insekten giftig und tödtlich sind. S. Franz *Griseini* Versuch einer polirischen und natürlichen Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte II Th. S. 125 ff.

Scop. Entom. carn. p. 194. no. 487. *Phal. Quercus.**)

Long. unc. 1. *Lat.* lin. 8.

Alae utrinque concolores: anticae supra puncto albo; margine nigro, qui septem lineas ab apice distat; nec non fascia pallidiore, punctum album inter et apicem posita; posticae fascia prope limbum, priori simili.

Fabric. S. E. p. 562. no. 24. *Bomb. Quercus.* *Nom. Linn.*

Larva pilosa, grisea, nigro-annulata alboque maculata.

Pupa dense folliculata, viridis, antice fusca.

Mas alis brunneis; *foemina* pallidioribus.

Schaeff. Icon. t. 87. f. 1. 2. *Mas*; f. 3. *Foemina*.

Phalaena pectinicornis alis planis septima et octava, 7ter und 8ter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Geoffr. Inf. II. p. III. no. 13.

Phalaena pectinicornis elinguis rufa; alis rotundatis, fascia pallidiore; *superioribus* puncto albo.

Le Minime à bande.

Long. 1 pouc. 9 lign.

Leche nov. Inf. sp. no. 59.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis fulvis, fascia flava, punctoque albo (*Mas*).

Bibl. reg. Paris. p. 22. *figg. omnes.*

Mülleri Faun. Frid. p. 39. no. 353. *Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 117. no. 1353. *Ph. Quercus.*
Nom. Linn.

T 4

26. Du-

*) Vix inde natam *foeminam* acu tabulae lignae adfixeram, Ann. 1760, jam *sexdecim mares* e vicinia advolantes, et cubile ingressi, mira cupidine circa eandem vagabantur, quales annis prioribus nullibi videram. Quam stupendi sensus animalium! Quae vis effluviorum!

26. *Dumeti*, der *Hekkenspinner*.

Müller l. c. p. 658. no. 26. der *Hekkenkriecher*.

Füßlins schweizer. Inf. pag. 34. no. 643. die *Grasmotte*.

Die Raupe immer im Grase, nährt sich von den *Schmalgräsern*.

— Magaz. der Entom. I B. p. 212. Phal. *Dumeti*.

Maders (Kleemanns) Raupenkal. p. 15. no. 17. Phal. *Dumeti*, die *Grasmotte*.

— — p. 32. no. 77. *Grasmotte*.

— — p. 58. no. 158. *Grasmotte*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. t. 35. b. f. 1-3. *Raupe*; t. 35. a. f. 4. 5. *Vogel*. (S. *Naturf.* VIII. p. 102. no. 6.)

Berlin. Magaz. II. pag. 416. no. 31. Phal. *Taraxaci*, die *Erdmotte*.

Schwarzbraun, mit einem olivengelben breiten Queerstrich durch alle vier Flügel. *)

Naturforscher VIII St. p. 106. no. 31. Ph. *Taraxaci*.

— nährt sich auch von der *Pilosella*.

— X. p. 93. Phal. *Dumeti*.

— die Raupe nährt sich auch vom *Salut*.

Das *Männchen* fliegt im späten Herbst bey warmem Wetter auf Wiesen. (Pfl. von Scheven.)

— VI. p. 75. §. 3. t. 3. f. 1. 2. 3. 4. von einer *unbekannten*

*) p. 436. not. M. „Eine der *seltensten*. Wer die Raupe findet, und zur Verwandlung bringt, muß gegen den October täglich darnach sehen, ob die Phaläne ausgekrochen ist. Hat sie nur eine Nacht über im Glase gefressen, so wird sie sich die Flügel durch das viele Flattern ganz beschädigt haben.“

Daher mag es wohl gekommen seyn, daß einige Naturforscher die frischen und matten Exemplare verwechselt, und jene für eine neue Art ausgegeben haben.

kannten großen filzhaarigen Raupe und ihrem Nachtvogel. (D. Kühn.)*)

Sulzers Gesch. der Inf. p. 159. t. 21. f. 3. Phal. *Dumeti*, der *Hekkenkriecher*.**)

Die *Vorderflügel* fast ziegelroth mit einem gelben Punkt, einer schlangenförmigen gelben Querbinde und röthlich gelbem Saum. Der Hinterleib braun mit gelben Ringen sehr haarig.

Systemat. Lehrgeb. über die drey Reiche der Natur, I. p. 382. t. 19. f. 6. Phal. G. †)

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 57. K. no. 5. *Löwenzahnsplinnerraupe* (*Leontodontis Taraxaci*); *Löwenzahnsplinner*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 293. no. 1107. Ph. *Dumi*. In *Sylvis rarius*. Dan. *Theel*.

Magnitudo Phal. *Quercus*. *Corpus* luteum. *Alae* omnes *supra* fuscae; fascia flexuosa lutea, antice repanda; *superiores* puncto subtrigono luteo

T 5

teo

*) Nichts anders als ein *frisches* Exemplar der Phal. *Dumeti*, wie auch Herr *Füesli* Magaz. I. p. 212. 213. dieser Meynung ist; D. Kühn hat ein *Männchen* abgebildet, dessen Grundfarbe allezeit viel dunkler ist. Es hat auch viel breitere gelbe Faszien, oder Bänder, als das Weibchen.

**) Die *Sulzerische* Abbildung ist nach einem gefangenen, halbverwischten *Weibchen* gemacht, daher die Grundfarbe der Flügel hier so matt ist. *Füesl.* Magaz. I. p. 212. 213. wo F. ausdrücklich sagt: „ich kann diesen Nachtvogel mit Herrn D. Kühn für keine *neue* Gattung, sondern muß ihn mit *Sulzer* für Phal. *Dumeti* L. halten. Man vergleiche nur des Linn. Beschreibung: Faun. Suec. ed. 2. no. 1107. und *Petiv. Gaz.* t. 45. f. 13. mit der *Sulzerischen* und *Kühnschen* Abbildung.“

†) Ebenfalls das *Männchen* von Phal. *Dumeti*, mithin hätte solches den ihm hier beygelegten Namen nicht verdient.

teo ante fasciam. Margo posticus omnibus luteus. Omnes alae *subtus* luteae.*)

Fabric. S. E. p. 565. no. 33. Bomb. Dumeti.

Alis reversis, fuscis; *anticis* puncto, fascia margineque postico luteis — *Abdomen* luteum.

27. *Catax*, der *Holzbirnspinner*.

Müller l. c. p. 658. no. 27. der Rollrand.

Füeslins schweiz. Insf. p. 34. no. 644. Phal. *Catax*.

Röfels Insektenbel. III. p. 425. t. 71. f. a. 1. a. 2. a. 3. die zu der Nachtvögel 2ten Klasse gehörige große, graue Raupe, mit dem breiten schwarz eingefassten, blaugrauen Rückenstreif, und rothbraunen haarigen Flecken und Punkten.

— IV. p. 239. t. 34. f. a b. der zur 2ten Klasse der Nachtvögel gehörige, mehr blafsrothe als zimmetbraune *Nachtvogel*.**)

Maders (Kleemanns) Raupenkal. p. 21. no. 41.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 57. L.

Haarraupen; wollichte Spinner; no. 3. Holzbirnspinnerraupe (Pyri communis, sylv.); Holzbirnspinner.

Fabric. S. E. p. 567. no. 39. Bomb. Catax.

Alis reversis, *ferrugineis* etc.

Larva viridis; linea laterali alba, cornu ruf.

Pupa folliculata, atra; postice strigis flavis.

28. *La-*

*) Ich dächte, diese Beschreibung gäbe bey dem *Kühnischen* Exemplar, *Naturf. VI. t. 3. f. 1.* den völligen Ausschlag.

**) Linn. sagt bey dem *Röfelschen* Citat: sed abdomen in meo lanatum non erat. Ein Zweifel, den *Röfel l. c. p. 240.* schon aufgelöst hat: „dieser Wollenstaub ist vermuthlich den Weiblein nur allein eigen, damit es seine Eyer damit bedecken könne;“ *Linné* hat also ein *Männchen* vor sich gehabt.

28. *Lanestris*, der *Wollstrikker*.

Müller l. c. p. 658. no. 28. der *Wollenafter*.

Frieslin's Schweiz. Inf. p. 34. no. 645. *Lanestris*, der *Wollenafter*.

— Magaz. der Entomol. I. B. p. 270. Ph. *Lanestris*.

Die Raupen bringen ihre Jugend unter einem gemeinschaftlichen Gewebe zu, das einen *Ein-* und einen *Ausgang* hat. Die Bürstgen sind dann noch nicht vorhanden, oder doch sehr undeutlich.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 305. t. 62. die violetschwarzen Raupen, mit gelbrothen Haarborsten, nebst ihrer Verwandlung zum Papilion.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 388. no. 2. Phal. *Lanestris*, der eisenfarbige wollichte Strikker.

— II. p. 740. no. 26. Phal. *Lanestris*, der eisenfarbige wollichte Strikker.

Maders (Kleemanns) Raupenkalender p. 35. no. 89. der *Wollenafter*.

— — p. 60. no. 165.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 57. L. no. 2. *Kirschenspinnerraupe* (Pruni Cerasi; *Kirschenspinner*).

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 380. Phal. *Lanestris*, der *Wollenafter*.

Scop. Entom. carn. p. 199. no. 499. Phal. *Lanestris*.
Long. lin. 7. Lat. 6.

Cariophyllina; alis anticis striga maculisque duabus albis.

Schaeff. Icon. t. 38. f. 10. II.

Phalaena pestinicornis alis deflexis sexta, 6ter *Nachtfalter* mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fabric. S. E. p. 566. no. 37. Bomb. *Lanestris*. Nom. L.

Larva gregaria, pilosa, nigra, segmento singulo punctis tribus albis inter maculas duas rubras penicillatas.

Pupa folliculata, sulphurea.

Ova lana densa cinerea tecta.

Mülleri Faun. Fridr. p. 39. no. 352.

— Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1354. Phal. *Lane-
stris.*

29. *Vinula*, der Gabelschwanz.

Müller l. c. p. 659. no. 29. der Gabelschwanz, *Hermelin.*

Füßlins Schweiz. Inf. p. 34. no. 647. Phal. *Vinula*,
der Gabelschwanz.

— Magaz. der Entomol. I. p. 271. Phal. *Vinula*.
(Chorherr *Meyer.* *)

Frisch Inf. VI. p. 18. no. 8. 2te Platte t. 8. von der
Gabelschwanzraupe und ihrem Papilion.

Berlin. Magaz. II. p. 400. no. 7. Phal. *Vinula*, der
Gabelschwanz.

Weiß mit fein gezogenen schwarzbraunen
Strichen und Punkten.

— — p. 431. not. F.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2te Kl. p. 121. t. 19.
die schöne, dickleibige, grüne *Weidenraupe*,
welche

*) 1) Dafs die älteren Raupen, wenn sie sich zur Wehre setzen,
nur aus der rechten, nie aus der linken Schwanzspitze, den ro-
then Faden hervorstrekken.

2) Eine strekt bey der Berührung auch den linken hervor,
kann ihn aber, da sie den rechten einziehet, nicht wieder zu-
rückbringen: bleibt acht Tage so, verdorret, wird abgeschnit-
ten, und die Raupe verwandelt sich doch.

3) Fressen ihren abgelegten Balg ganz auf.

4) Gebrauchen die wässerichte Feuchtigkeit, die sie ausspri-
tzen, bey dem Bau des Gewebes als ein Gummi.

welche anstatt der Hinterfüsse mit einem gedoppelten Schwanze begabt ist, und deren mannigfaltige Veränderungen bis zum Papilion.

— Note, *Kleemann*: die große zweygeschwänzte grüne Raupe.

— p. 125. Note **), spritzt aus einem fast unmerklichen schwarzen Schlitz unter dem Maule einen Strahl heller Feuchtigkeit von sich, die scharf ist und beißt, wenn sie in die Augen kömmt.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 73. Ph. *Vinula*, der Gabelschwanz.

— — p. 55. no. 150. p. 74. no. 210. p. 87. no. 251. *Lessers* Theol. der Inf. p. 177. not. o. (Vermuthlich diese *Vinula*, weil sie ihm die Hand bespritzt hat.)

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Insectol. p. 106. von der großen Raupe der Sahlweide mit dem gegabelten Schwanz — Der Saft, den sie von sich spritzt, ist eine wirkliche und sehr wirksame Säure. (*Bonnet.*)

— — p. 320. t. 3. f. 1. 2. 3. (*Degeer*) von der besondern Eigenschaft der großen vierzehnfüßigen Weidenraupe mit dem Gabelschwanze, einen Saft von sich zu spritzen.

Schröters Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Naturgesch. I. p. 177. Phal. *Vinula*.

Pontopp. N. G. von Dännem. p. 219. no. 6. Ph. *Vinula*, Gabelschwanzraupe.

Norw. Lövaame.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 643. no. 4. der Gabelschwanz:

— beißt Löcher in das schon vest werdende Holz, worinn sie sich selbst verwandelt.

— II. p. 738. no. 19. Gabelschwanz.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 153. Phal. *Vinula* — Die Raupen sitzen immer oben auf den Blättern in der stärksten Sonnenhitze.

Naturforscher XII. p. 228. no. 6. Phal. *Vinula*, der große *Hermelinvogel* — von der schnellen Befruchtung ihrer Eyer. (D. Kühn.)

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 368. no. 4. Phal. *Vinula*, *Gabelschwanz*, *Hermelinvogel*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 459. no. 4. Phal. *Vinula*, der *Gabelschwanz*.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 64. S. *Gabelraupen*; *zackenstriemigte Spinner*; no. 3. *Bandweidenspinnerraupe* (*Salicis viminalis*); *Bandweidenspinner*.

Bekm. Epit. Syst. Linn. p. 163. no. 29. Phal. *Vinula*, *Gabelschwanz*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 416. Phal. *Vinula*.

List. Goed. p. 56. no. 20. f. 20. a b.

— ed. gall. Tom. 3. t. C.

— Metam. t. 65.

Raj. Hist. Inf. p. 153. no. 5.

Phalaena major pulcherrima, alis amplis, exterioribus cinereis, maculis et lineis nigris elegantior depictis.

— *Eruca bicaudata* elegantissima, *Vinula* dicta.

Commentar. Lips. in sc. nat. et med. Dec. I. Vol. I. p. 41. II. p. 578. VI. p. 519. 520.

Reaum. Inf. Tom. II. p. 265. t. 21.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 294. no. III2.

Larva e propria vesicula exspuit liquorem lacescita longissime; caput intra thoracem quadrangulum retrahere potest.

Scop. Entom. carn. p. 195. no. 488. Phal. *Vinula*.

Long. unc. 1. et lin. 1. *Lat.* 7 $\frac{1}{2}$.

Pilis albis densis lanatum corpus et bases alarum

rum posticarum. Dorsum linea media punctisque nigris. Alae anticae punctis striisque nigris repandis dentatisque variegatae; venis ferrugineis.

— *Ichneumon* vix alia (larva) magis obnoxia.*)

Lesser Theol. des Inf. par *Lyonet* Tom. II. p. 48.

— à queue fourchue.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 104. no. 5.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis diaphanis, vasis obscuris.

La queue fourchue.

Système Naturel du Règne animal Tom. II. p. 144. no. 11. Phalene nommée *Vinula*.

Schaeff. Icon. t. 144. f. 1. 2.

Phalaena pectinicornis alis deflexis 29, 29ter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern, und abhängenden Flügeln.

Sepp Nederl. Inf. IV St. p. 21. t. 5. De Vlinder uit de Groote Twesstaart-Rups; de groote Hermelyn-Vlinder.

(Raupen in allen ihren Stellungen, und die Vögel,

*) Daher hat sie auch so viele Werkzeuge, sich zu wehren, als das Spritzwasser und die beyden Gabelfpitzen. Dessen ohnerachtet nisten sich doch die Schlupfwespen bey ihr ein. Sie würden aber diese Gattung gänzlich aufreiben, wenn sie nicht diese Wehrorgane hätte, die gleichwohl auch bey ihren Verwandlungsperioden ihre Dienste thun. Wir fehlen also allemal, wenn wir bey diesem oder jenem Organ eines Insekts fragen: was ist die Absicht desselben? und nur eine einzige auszuforschen suchen. An dieser Raupe haben wir ein Beispiel, daß durch ein Mittel, als das Spritzwasser, mehrere Absichten zugleich erreicht werden sollen. Und so möcht' es auch wohl mit den Fühlhörnern der Insekten beschaffen seyn. Gewiß sind sie der Sitz mehr als eines Sinnes.

Vögel, ganz unnachahmlich schön, als wenn sie lebten.) S. *Blumenbachs* Handb. der Naturgesch. p. 369. (*)

Fabric. S. E. p. 566. no. 36. Bomb. *Vinula*.

Alis subreversis, fusco - venosis striatisque, corpore albo, nigro-punctato.

Larva solitaria, gibba, viridis, dorso fusco, cauda bifida.

Pupa folliculata, fusca.

Mülleri Faun. Fridt. p. 39. no. 356. Phal. *Vinula*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 117. no. 1355. Ph. *Vinula*.

Nom. Linn. —

Dan. Hermelinus-Phalaene.

Norv. Löv - Aame.

— Monogr. t. 1. 2. Pile-Larven med dobbelt Hale.

Bey den eingesperrten Raupen versiegt die Quelle ihres Saftes nicht. Die feinigen haben im Zimmer bis ins 5te Glied gezeugt,

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 10. p. 318. (v. t. 23. *)

Grande chenille verte, à quatorze jambes, et à double queue, qui a sur le dos deux grandes taches figurées brunes, et qui vit sur le Peuplier et sur le Saule.

— — p. 331. Papillon à ailes velues.

— — p. 698. t. 23. f. 12. Phalene à antennes à barbes, sans trompe, cendrée à nuances noires, à ailes velues, et dont le corcelet est à points noirs.

— Tom. II. Part. I. p. 312. no. 3. *Phalene grande à queue double*, die große Doppelschwanz-Phaläne.

Phalene

*) Der Verf. hatte anfänglich Phal. *Furcillata* L. no. 51. mit den jungen Raupen der *Vinula* verwechselt. S. Tom. II. Part. I. t. 4. f. 18 - 21.

Phalene à antennes barbuës sans trompe, à corcelet huppé, picqué de points noirs, dont les ailes sont velues cendrées blancheâtres à taches et nuances noirâtres.

— *Uebersf.* I. 2 Quart. p. 81. t. 23. die groſſe, grüne, vierzehnfüßige, zweygeſchwänzte Pappel- und Sahlweidenraupe mit zween groſſen, braunen, beſonders geſtalteten Rückenſtücken.

— — p. 91. der *Haarflügel*.

— 4 Quart. p. 120. t. 23. f. 12. Ein aſchfarbiger, ſchwarz ſchattirter *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Rüſſel, mit haarichten Flügeln, und ſchwarzpunktirtem Halskragen.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 224. no. 3. die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern, einem mit ſchwarzen Punkten geprenkelten Rückenſtück mit haarichten, weißlich aſchgrauen, ſchwarzgeſtückten und ſchattirten Flügeln.

— — p. 225. Beſchreibung ihres Geſpinnſtes.

30. *Fagi*, der *Eichhornſpinner*.

Müller l. c. p. 659. no. 30. das *Eichhörnlein*.

Füßſtins ſchweiz. Inf. p. 34. no. 648. Phal. *Fagi*.

Bey uns ſelten auf *Haſelſtauden*.

Röſels Inſektenbel. III. p. 69. t. 12. die zu der Nachtv. 2 Kl. gehörige beſondere *Eichhornraupe* mit vier langen Vorderfüßen und zwey Schwanzſpitzen, neßt ihrer Verwandlung zum Papilion.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 549. no. 3. Phal. *Fagi*, *Büchenraupe*: — die Raupe auf *Rothbüchen*, *Haſelſtauden* und *Birken*; im *Junius*.

Maders (*Kleem.*) Raupenkal. p. 79. no. 228. Phal. *Fagi*, die *Eichhornraupe*, das *Eichhorn*.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. etc. Uebersf.
XIB. 1749. pag. 137. t. 4. f. 10-14. *Buchenraupe*.
(G. R. Rabe.)

(Sonderbar, daß der Schmetterling den 19ten
des Christmonats erschienen ist. S. Kästners
Anm. p. 138.)

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 63. S.
no. 2. *Buchenspinerraupe* (*Fagi sylvaticae*); *Bu-*
chenspinner.

Aldrov. de Inf. ed. Franc. fol. lib. 2. p. 107. B. *Eru-*
caranenum.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 364. Phal. *Fagi*, der *Eich-*
hornvogel.

Fabric. S. E. p. 562. no. 23. Bomb. *Fagi*. Nom. *Linn.*

Larva brunnea; dorso dentato, pedibus sex
anterioribus elongatis; cauda reflexa, corniculis
duobus; quiescit capite caudaque elevatis; pedi-
bus anticis pendentibus.

Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 39. no. 357. Phal. *Fagi*.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 117. no. 1356. Phal. *Fagi*.
Nom. *Linn.*

31. *Bucephala*, der *Mondvogel*.

Müller l. c. p. 659. no. 31. der *Waffenträger*.

Füßlins schweizer. *Inf.* p. 34. no. 649. der *Gelb-*
kopf.

— *Magaz. der Entomol. I.* pag. 283. Phal. *Buce-*
phala.

Auf *Eichen* und *Haselstauden*. Die Raupen
leben gemeinschaftlich unter einem Gewebe,
und sitzen so dicht neben einander, daß man
kaum eine Nadel zwischen sie bringen kann;
häuten sich alle zehn Tage. Die neuen Köpfe
sind anfänglich *unförmlich groß*, werden aber
von

von Tage zu Tage geschmeidiger. (Chorherr Meyer.)*)

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. pag. 89. t. 14. die schwarz- und gelbgestreifte, haarige, große Raupe, mit ihrer Verwandlung.

Maders (Kleemanns) Raupenkal. p. 74. no. 209. der Mondvogel.

Frisch Inf. XI. p. 26. no. 26. 1 Pl. t. 4. von der Erlenraupe und ihrem Papilion.

Berlin. Magaz. III. p. 204. no. 1. Phal. *Bucephala*, der halbe Mond.

Weißlich aschgrau; die Oberflügel an der Spitze mit einem okergelben Flekke, in Gestalt eines halben Monds.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 389. no. 6. Ph. *Bucephala*, der halbe Mond.

— — p. 549. no. 5. II. p. 743. no. 34.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 59. M. Halbhacarraupen; großstirnigte Spinner; no. 1. Lindenspinnerraupe (*Tiliae europaeae*); Lindenspinner.

Fischers N. G. von Livl. p. 150. no. 347. Ochsenkopf; Waffenträger; Mondvogel.

V 2 Neue

*) Mit Recht erinnert der Herausgeber, daß nicht sowohl die Köpfe, sondern die Leiber in der Zwischenzeit gewachsen sind, bis sie wieder das gehörige Verhältniß zum Kopfe erhalten hätten. Denn es sey bekannt, daß bey allen Raupen nach einer Häutung der Kopf immer merklich größer als vorher sey, und es sey ihm daher wahrscheinlich, daß der Kopf nach einer Häutung schon die Größe habe, die er bis zur folgenden Häutung haben müsse. Eine artige Bemerkung! Also auch bey den Raupen, so lange sie sich häuten, und gleichsam im Embryonenstande sind, der Kopf der größte Theil, wie im Thierreich bey allen Embryonen sowohl bey Sangthieren, als bey Vögeln.

Neue Mannichfalt. 2 Jahrg. p. 614.

Bekm. Epit. Syst. L. p. 163. no. 31. Phal. *Bucephala*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 324. Ph. *Bucephala*.

List. Goed. p. 213. no. 95. f. 95.

— ed. Gall. Tom. II. t. 34.

Raj. Hist. Inf. p. 162. no. 14.

Phalaena media; antennis tenuibus, capite, facie et oculis *noctuae* fulvis; alis oblongis ex rufo-cinereo, fulvo, et albicante-variis.

Stop. Entom. carn. p. 208. no. 515. Ph. *Bucephala*.

Long. lin. $9\frac{1}{2}$. *Lat.* $5\frac{1}{3}$.

Alae subdentatae; anticae linea caesata, duplici antice, aliaque simili versus limbum fasciatae, apice macula ovata magna occipiteque stramineo colore tinctis.

Fabric. S.E. p. 571. no. 52. Bomb. *Bucephala*. Nom. *Linn.*

Larva pilosa, nigra; annulis lineisque luteis; punctis albis lateralibus.

Pupa nuda, postice corniculis duobus.

Geoffr. Inf. Tom. II. p. 123. no. 28.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis tectiformibus, superioribus cinereis; fascia duplici ferruginea, et extremo circulariter pallescente; subtus omnibus flavescens, fascia undulata fusca.

La Linnule. *Long.* 11 lign.

Biblioth. Reg. Par. p. 26. f. 1. 8.

Schaeff. Icon. t. 31. f. 10. 11.

Phalaena pectinicornis alis *deflexis* quinta, fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

Mülleri Faun. Fridr. p. 40. no. 361. Phal. *Bucephala*.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 118. no. 1357. Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. I. p. 221. *Mém.* 6. t. 13. f. 14. 19.

Chenille velue à poils courts d'un jaune foncé,
garnie

garnie de taches noires alignées selon la longueur du corps, et qui vit en société sur l'Ozier, le Chêne et l'Erable.

Degeer Inf. Tom. I. p. 697. t. 13. f. 18. 19.

Phalene à antennes à barbes en bouquets de poils, sans trompe; d'un gris de perle obscur, à grande tache jaune-blanchâtre vers le postérieur des ailes supérieures.

— Tom. II. Part. I. p. 317. no. 5. *Phalene Lunule.*

Phalene à antennes barbues sans trompe, à corcelet huppé jaune rayé de roux, dont les ailes supérieures sont gris-de-perle cendré, avec une grande tache jaune à l'extrémité.

— *Uebersf.* I Th. 2 Quart. pag. 12. t. 13. f. 14-19.

Die rauche, kurzhaarichte, dunkelgelb- und schwarzgestreifte gefellige Raupe auf den Wollweiden, Eichen- und Ahornbäumen.

— — 4tes Quart. p. 119. t. 13. f. 18. 19.

Ein dunkel perlgrauer *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern wie Haarbüschel, ohne Saugrüssel, mit einem grossen gelbweisslichen Flek am Hintertheile der Oberflügel.

— II B. I Th. p. 229. no. 5. *Phal. Bucephala*; *Phalene Lunule*, der *Mondvogel*.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem gelben, fuchsrothgestreiften Rückenkehl und aschfarbig-perlgrauen Oberflügeln, mit einem grossen gelben Flek am Ende.

32. *Verficolora*, der *Buntflügel*.

Müller l. c. p. 660. no. 32. der *Buntflügel*.

Füßlin's Schweiz. Inf. p. 34. no. 650. *Phal. Verficolora*, die *Buntmotte*.

Auf Birken und Haselstauden selten.

Fließlin's Magaz. der Entomol. I B. p. 213. Ph. *Verficolora*.

Sulzer hat das *Männchen* zuerst abgebildet.

— — II B. p. 40. Phal. *Verficolora*; t. I. f. 4. die Raupe zuerst vom *Fließlin* abgebildet; viel ähnliches mit den *Schwärmerraupe*n.

Röfels Insektenbel. III. p. 237. t. 39. f. 3. der große, weiß- und zimmetbraungefleckte *Nachtpapilion*, so ebenfalls zur 2ten Klasse der Nachtv. gehört. (Das *Weibchen*.)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 738. no. 20. Ph. *Verficolora*, die *Elfenmotte*.

Naturforscher VI. p. 117. no. III. Nachricht von der Raupe derjenigen schönen Phaläne, die im dritten Bande der *Röfelschen* Insektenbel. t. 39. f. 3. abgebildet ist. (*Meineke*.)

(Man vergleiche die Beschr. dieser Raupe mit der *Fließlinischen* l. c.)

— VIII. p. 102. no. 7. Ph. *Verficolora*. Die Raupe auch auf *Haselsträuchern*.

Herr von *Rottenburg* verspricht eine Abbildung und ausführlichere Beschreibung derselben.

— XIV. St. pag. 66. t. 3. Past. von *Scheven* seltene Raupe der Phal. *Verficolora*.

Berlin. Magaz. II. p. 400. no. 8. Phal. *Verficolora*, die *Elfenmotte*.

Das *Weibchen* weißlich mit vielen irregulären braunen Zeichnungen; das *Männchen* gelbbraun mit vielen weißen Zeichnungen. Die Unterflügel ganz gelbbraun.

— — p. 432. not. G. artige Bemerkungen von der Raupe.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 159. t. 21. f. 4. Ph. *Verficolora*, der *Buntflügel* (*Männchen*).*)

Die

*) Das *Röfelsche* Citat im *Sulzer* Tom. IV muß heißen Tom. III.

Die Vorderflügel durch weisse und schwarze Striche in drey Felder getheilt; in dem äussersten drey deutliche und eben so viel undeutliche weisse Flekken; in dem mittlern ein schwarzes Halbmondchen, auf der Unterseite blasser; die hintern Flügel einfarbiger.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 49. A. *Scheinschwärmerraupe*; *mondmaklichte Spinner*; no. 2. *Hagebuchenspinnerraupe* (Carpini Betuli); *Hagebuchensspinner*.

Fabric. S. E. p. 565. no. 34. Bomb. *Versicolora*.

33. *Mori*, der Seidenfalter.

Müller l. c. p. 660. no. 33. *Seidenwurm*; *Seidenraupe*; *Bombyx*; Ver à Soye; *Engl.* Silkworm; *Ital.* Bombici; Bigatti da Seta.

Füesflins schweiz. *Inf.* p. 34. no. 651. Ph. *Mori*, die *Seidenmotte*.

Berlin. Magaz. II. p. 400. no. 9. Phal. *Mori*, die *Seidenmotte*.

Weiss, mit okergelb und braun vermengt, an den Unterflügeln ein schwarzer Flek.

— — p. 433. not. H.

Röfels Insektenbel. III. pag. 37. t. 7. 8. die zu der Nachtv. 1 Kl. gehörige, sehr nützliche *Maulbeer-raupe*, oder der sogenannte *Seidenwurm*, nebst seinen Eigenschaften und Verwandlungen. *)

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. VII B. p. 24. Zergliederung des Seidenwurms. (*Triewald.*)

Allgemeines Magaz. der Natur etc. II. p. 202. von der Art, die *Seidenwürmer* zu ziehen.

Aktes Hamb. Magaz. I. p. 107.

V 4

Frankf.

*) In Frankreich allein sollen sich an zwei Millionen Menschen mit der Seidenarbeit beschäftigen.

Frankf. neue Auszüge IV. p. 10.

Der Mensch 381 St.

Reich der Nat. und Sitten, 224 St.

Der Arzt III B. p. 121.

Hannov. Magaz. 1763. p. 898.

Bresl. Samml. II. 1718. p. 1741. Geschichte der Seidenwürmer und des Seidenbaues. — p. 841.

Bonnets Betr. über die Natur, p. 445. Arbeit des Seidenwurms.

Sulzers Vorübungen etc. p. 55.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 300. VIII. p. 172.

Pontopp. N. G. von Dännem. p. 219. no. 7. Phal.

Mori, Seidenwurm.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 49. A.

Scheinschwärmerraupe; no. 1. *Maulbeerspinner-raupe* (*Mori albae*); *Maulbeerspinner.*

Eberts Naturl. für die Jugend III. p. 93.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 369. no. 5. Ph.

Mori, Seidenwurm. *)

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 5. Ph. *Mori, der Seidenspinner.*

Onomat. hist. nat. II. p. 257. *Bombyx*, der Seidenwurm.

— VI. p. 385. Phal. *Mori.*

Bekm.

*) Der Bombyx der Alten ist wohl schwerlich der gegenwärtige Seidenwurm gewesen; doch ist ihnen die Seide bekannt gewesen. Kaiser *Justinian* hat um das Jahr 560 die Seidenwürmer durch Mönche, die er nach Indien geschickt hatte, nach Konstantinopel bringen lassen. Ein Kokkon von drittheilb Gran am Gewicht, bestehet aus einem 900 Fuß langen Faden, und zu einem einzigen Pfund reiner Seide werden über 2000 Würmer erfordert; zehn Personen aber sind zur Wartung für 300,000 Würmer zureichend. Ursprünglich lebt der Wurm in China auf dem Maulbeerbaume.

Bekm. Epit. S. L. p. 163. no. 33. Phal. Mori, die Seidenraupe.

Joh. Coleri Diff. de Bombyce, Gieff. Hass. 1765.

Hier. Vida de Bombycis cura et usu, Lugd. 1537. 8.

Journal des Savants 1773. Nov. p. 220. 234.

Bomar. Dict. XII. p. 113. Ver à Soye.

Journal oeconom. 1752. Juill. p. 43.

Commentar. Lipsf. Decur. I. V. p. 228. III. 503. Suppl. p. 107. Vol. XVII. p. 581.

Loevenh. Opp. Tom. I. Contin. epistol. p. 41. Tom. III. p. 409.

Schwenkf. Theriotr. Silef. p. 514. Bombyx domesticus; Bombylis; Bombylius; Eruca serica; Vermis indicus; Vermis lanificus; Vermis indicus corniger; Seidenwürmlein; Seidenraupe.

Malpighi Opp. Lugd. B. 4. 1687. Tom. II. Diff. epistolica de Bombyce cum figg. plus 54.

Système Naturel du Regne animal, Tom. II. p. 148. no. 23. Phalene du Ver à Soye.

Charleton Onomast. Zoic. p. 40. Papilio Bombycum.

L'Art de cultiver les Muriers blancs et d'élever les Vers à Soye et de tirer la soye des cocons, avec figures, à Paris 8. 1757.

Geoffr. Inf. II. p. 116. no. 18. le Ver à Soye.

Phalaena pectinicornis elinguis tota alba; alis deflexis, bombyx dicta.

Scop. Entom. carn. p. 193. no. 486. Phal. Mori.

Long. lin. 10½. Lat. 7.

Alba; alis anticis obiter sinuatis.

Hostes Larvarum mures; fumus Tabaci.

Fabric. S. E. p. 567. no. 41. Bombyx Mori. Nom. Linn.

Larva caudata, nuda, alba.

Pupa folliculata, brunnea.

34. *Populi*, der *Pappelspinner*.

Müller l. c. p. 660. no. 34. der *Pappelndvogel*.

Füesflins schweiz. Inf. p. 34. no. 652. Phal. *Populi*, der *Pappelndvogel*.

— *Magaz. der Entomol.* I. p. 285. Phal. *Populi*.

Die Raupen haben einen schönen oranien-
gelben Querstrich am Halfe. (*Meyer.*)

Maders (*Kleem.*) Raupenkalender pag. 17. no. 24.

Phal. *Populi*, *Pappelndvogel*; *Kreuzmotte*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2te Kl. p. 301. t. 60.
die auf den *Apfelbäumen* sich aufhaltende, filz-
haarichte, graue *Raupe*, mit braunen Flekken,
und oraniengelben Punkten.

— III. pag. 428. t. 71. f. c 7. c 8. c 9. die zu der
Nachtv. 2ten Klasse gehörige breitleibige, weifs-
graue Raupe mit schwarzen Flekken von ver-
schiedener Form und Grösse, nebst ihrer
Puppe.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 569. no. 3. Ph. *Populi*, die
hellbraune ungeflekte *Pappelndmotte*.

— — p. 683. no. 5. Phal. *Populi*, die *Aspen-
motte*.

System. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 58. L.
Haarraupen; no. 9. *Albernspinnerraupe* (*Popu-
li nigrae*); *Albernspinner*.

Stralsund. Magaz. I. p. 238. Phal. *Populi*, *Kreuz-
motte*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 401. Phal. *Populi*.

Bekm. Epit. S. L. p. 163. no. 34. Phal. *Populi*.

Fabric. S. E. p. 566. no. 38. Bomb. *Populi*. Nom.
Linn.

Larva cinerea, dorso obscuriore; segmentis
singulis punctis duorum parium rubris.

Pupa folliculata, antice fusca, postice rufa.

35. *Neustria*, der *Baumringelspinner*.

Müller l. c. p. 661. no. 35. *Ringelraupe*; *Ringelvo-*
gel. *)

Fließlins Schweiz. Inf. p. 34. no. 653. Ph. *Neustria*,
die *Ringelmotte*.

Berlin. Magaz. II. p. 402. no. 11. Ph. *Neustria*, die
Ringelmotte.

Braungelb, mit einem breiten etwas starken
braungelben Queerstreif durch die Oberflügel.

Frisch Inf. I. p. 10. Beschreibung der *Ringelraupe*;
1te Pl. t. 2. f. 1-6.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 41. t. 6. die
schädliche, gefellige, gestreifte *Ringelraupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 12. no. 10. Ph. *Neu-*
stria, der *Stammringelvogel*. — p. 29. no. 68.

Pontopp. N. G. v. D. p. 219. no. 8. Ph. *Neustria*.

Glafer von schädlichen Raupen der Obstbäume,
p. 37. Phal. *Neustria*, *Ringelraupe*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 738. no. 21. Phal. *Neustria*,
Ringelraupenmotte.

Breßl. Samml. 1720. May p. 571. 1722. Novembr.
Cl. 4. Art. 7. p. 549.

Fischers N. G. von Livl. p. 151. no. 348. Phal. *Neu-*
stria, der *Ringelvogel*.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 370. no. 6. *Rin-*
gelraupe.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 57. L.
no. 4. *Weißbuchenspinnerraupe* (Carpini Betuli);
Weißbuchenspinner.

Ono-

*) Die daselbst angeführte und t. 22. f. 1. abgebildete Phaläne ist
Castrensis L.

Wir nennen diese Phalaene den *Baumringelspinner* zum Un-
terschiede der folgenden, weil diese letztere ihre Eyer an nie-
drige Kräuter, jene aber allezeit um die Zweige der Bäume
legt.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 386. Phal. *Neustria*, der Ringelvogel.

Bekm. Epit. S. L. p. 163. no. 35. Ph. *Neustria*, Ringelraupe.

List. Goed. p. 204. no. 89. f. 89.

Eruca bibax, admodum sicca, multoque potu indigens.

Raj. Hist. Inf. p. 214. no. 8. *Phalaena media*, tota cinerea, area lata transversa obscuriore medias alas exteriores percurrente.

— — pag. 213. no. 6. *Eruca sepiaria* major, pulchre colorata.

Système Naturel du Regne animal, Tom. II. p. 145. Phalene, dont la chenille fait des Bagues: *Annularia*.

Fabric. S. E. p. 567. no. 42. Bomb. *Neustria*.

Alis reversis, griseis; strigis duabus ferrugineis; subtus unica.

Larva gregaria, glauca; lineis utrinque tribus rubris dorsaliq. alba.

Pupa folliculata, fusca.

Mülleri Faun. Fridr. p. 39. no. 350. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 118. no. 1358. Nom. *Linn.*

Réaum. Inf. II. t. 4. f. 1. 11. la *Livrée*, die *Livrey-raupe*.

Geoffr. Inf. II. p. 114. no. 16.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis pallidis, fascia alarum transversali saturatiore.

La *Livrée*. *Long.* 8 lign.

Degeer Inf. II. Part. I. p. 299. la *Livrée des arbres*.

— *Uebers. I B. 1 Quart.* p. 11. 136. II B. I Th. p. 214. *Baumlivreyraupe*.

36. *Castrensis*, *Wiesen- oder Krautringelspinner.* *)

Müller l. c. p. 661. no. 36. t. 22. f. 1. der *Lagervogel*.
Füßlins schweiz. Inf. p. 34. no. 654. Ph. *Castrensis*,
die *Lagermotte*.

Bey uns selten.

Frisch Inf. X. p. 10. no. 8. 2. Platte t. 8. von der zweo-
ten Art *Wolfsmilchraupe* mit ihrem Papilion.

Berlin. Magaz. II B. p. 402. no. 10. Ph. *Castrensis*,
die *Lagermotte*.

Das Weibchen hellbraun, mit zwey weiß-
lichgelben Queerstreifen durch die Oberflügel;
das Männchen weißlichgelb mit einem breiten
Streif durch die Oberflügel; die Unterflügel
ganz braun.

— — p. 436. not. L. wo erwiesen wird, daß
Neustria und *Castrensis* zwey verschiedene Arten
sind.

Röfels Insektenbel. IV. p. 109. t. 14. die zu der Nacht-
vögel 2ter Klasse gehörige 2te Art der geselligen
auf der *Wolfsmilch* sich aufhaltenden *Ringel-
raupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 22. no. 46. Phal. *Ca-
strensis*, die *Lagermotte*, der *Krautringelvogel*.
p. 44. no. 121.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 739. no. 22. Ph. *Castrensis*,
die *Lagermotte*.

Allgem. Magaz. der Natur, IX B. p. 347. Phal. *Ca-
stralis*.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 57. L.
no. 5. *Flokkenblumenspinnerraupe* (*Centauryae*
Jaceae); *Flokkenblumenspinner*.

Onomat.

*) In den Eyern derselben unendlich kleine Schlupfwespen, davon
im 15ten St. des Naturforschers etwas vorkommen wird.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 336. *Phal. Castrensis*, der *Lagervogel*.

Békm. Epit. S. L. p. 163. no. 36. *Phal. Castrensis*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 292. no. 1102. *Ph. Bomb. Neustria* (β. *)

Fabric. S. E. p. 568. no. 43. *Bomb. Castrensis*.

*Alis reversis, obscuris: fasciis duabus pal-
lidis.*

Larva gregaria, pilosa, coerulea, lineis ru-
bris, nigro-maculatis.

Pupa folliculata, obscura.

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 6. p. 216. t. 13. f. 1-6.

Chenille velue, à poils courts, ornée de rayes
longitudinales, jaunes, bleues et noires, qui
mange les feuilles d'une espèce de Bec de grue,
et que je nomme la *Livrée des Prés*.

— — p. 696. t. 13. f. 4. 5. 6.

Phalene à antennes à barbes, sans trompe;
dont la femelle est brune, à deux rayes d'un
jaune clair, et le mâle d'un jaune blanc à rayes
brunes.

— *Uebers. I Th. 2 Quart.* p. 7. t. 13. f. 1-6.

Die rauche, kurzhaarichte, gelb-blau- und
schwarzgestreifte Raupe auf dem Storchschnabel
(Geranium): oder die *Wiesenslivreyraupe*.

— — 4 Quart. p. 119. t. 13. f. 4. 5. 6.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern,
ohne Saugrüssel; das Weibchen braun mit zwei
hellgelben Streifen; das Männchen gelbweiß
mit braunen Streifen.

Degeer

*) Hier hat sie der Ritter noch für eine Varietät der *Neustria* ge-
halten; in der 12ten Ausgabe des N. S. aber seine Meynung
geändert.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 299. Phal. Bomb. *Castrensis*; *Phalene Livrée des prés.*

Phalene à antennes barbues, sans trompe, à ailes débordées brunes à deux rayes obliques d'un jaune clair dans la femelle, et jaunes blanchâtres à rayes brunes dans le mâle.

— Ueberf. II Th. I B. p. 213. der *Wiesenslivrey-spinner.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern. Die Unterflügel über den obern vorstehend. Die Flügel selbst braun mit zwei weissen Querstreifen bey dem Weibchen; bey dem Männchen gelblichweiss mit braunen Streifen.

37. *Processionea*, der *Processionschwärmer.*

Müller l. c. p. 662. no. 37. t. 22. f. 2. die *Katzeneule.*
Füßflins schweiz. Inf. p. 34. no. 655. die *Processionsmotte.*

In manchen Jahren auf den Eichen häufig.

Berlin. Magaz. II. p. 402. no. 12. Ph. *Processionea*, die *Processionsmotte.*

Schwarzgrau mit irregulären weisslichen Zeichnungen.

— p. 434. not. K. wo 1) ihre Wanderung beschrieben; 2) wider das von ihren feinen Haaren entstehende Jukken nach *Réaumur*, *frischer Peterfiliensaft*, auch frische Erde und Urin empfohlen, und das Vorurtheil, als ob sie giftig wären, widerlegt wird.

Bonnets und anderer etc. Abhandlungen aus der Insektol. p. 158. von den falschen Luftlöchern der *gesellschaftlichen Fichtenraupe.*

— Betracht. über die Natur, p. 404. ff. die *Raupen*, welche in *Procession* gehen.

Naturforscher XIV St. p. 60. no. 4. von den *Processionsraupen*. (D. Kühn.)

Gleditsch Forstwiss. I. p. 644. no. 5. Ph. *Processionea*, die *Processionsraupe*; die wandernde Raupengesellschaft.

Das Jukken, und die Geschwulst bey ihrer Berührung an den Händen und im Gesicht, wenn man mit den Händen daran kömmt, entsteht von den feinen in die Haut dringenden Haaren.

Stralsund. Magaz. I B. p. 245. die gesellige wandernde Fichtenraupe.

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 58. L. no. 10. *Viereichenspinnerraupe* (*Quercus Roboris*); *Viereichenspinner*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 6. der *Processionsraupenspinner*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 401. Phal. *Processionea*, die *Katzeneule*.

Réaum. Inf. Tom. II. t. II. La *Chenille processionnaire*.

Fabric. S. E. pag. 567. no. 40. Bomb. *Processionea*. Nom. Linn.

Larva gregaria, pilosa, fusco-cinerea, dorso nigricante; verrucis luteis. Incedunt per paria inaequalia numero. *Exuviae* tactu inflammationes excitant.

Geoffr. Inf. I. p. 141.

In den Nestern dieser Raupen die Larven des *Carabus Sycophanta* L. no. 12.

2. Zungenlose, mit niedergedrückten Flügeln und glatten Rücken: unter denselben die roth und gelb gezeichneten Aedlen Spinner, Bombyces Nobiles.

38. *Caja*, der Bärvogel.

Müller l. c. p. 663. no. 38. der Bär.

Früßlins Verz. schweizer. Inf. p. 34. no. 656. Phal.

Caja, die braune Bärmotte.

— Magaz. der Entomol. I. p. 285. Phal. *Caja*.

Die Raupe reißt sich die Haare, die sie ins Gespinnste mischen will, nicht wie andere aus, sondern *schneidet sie mit den Zähnen ab*: daher sie kurz vor der Verwandlung ausfieht, als wäre sie mit dem Scheermesser geschoren. (Chorherr Meyer.)

— — II B. pag. 70. ein seltener Bärenvogel: Phal. *Cajae affinis* f. *Flavia*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. pag. 1. t. 1. die schwarzhaarichte Bärenraupe mit ihrer Verwandlung.

Frisch Inf. II. p. 38. no. 10. 3te Pl. t. 9. von der Bärenraupe.

Berlin. Magaz. II. p. 404. no. 13. Phal. *Caja*, die braune Bärenmotte.

Die Oberflügel kaffeebraun mit weissen zusammenhangenden Streifen; die Unterflügel roth mit blaulich schwarzen Flekken.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 976. no. 19. Phal. B. *Caja*, die braune Bärmotte.

Neue berlin. Mannichfalt. III Jahrg. p. 98. häutet sich achtmal.

Naturforscher II St. p. 17. no. 4. t. 1. f. 4. ein Naturspiel des Bärvogels (D. Kühn). S. dessen Anleitung. Insekten zu sammeln, p. 108.

Naturforscher III St. p. 17. Phal. *Caja*; ein ausgeartetes Weibchen.

— VIII St. p. 102. no. 13. Phal. *Caja*; p. 103. ein merkwürdiges Naturspiel derselben (von *Rottenburg*).

Systemat. Verz. der Schmetterl. der W. G. p. 52. E. *Bärenraupen*, Larvae *Vrfinae*; ädle *Spinner*, Phal. Bomb. *Nobiles*. No. 1. *Nesselspinnerraupe* (*Vrticae dioicae*); *Nesselspinner*.

Fischers N. G. von Livl. p. 151. no. 349. der *Bär*.

Blumenbachs Handb. der Naturgesch. p. 370. no. 7.

Phal. *Caja*, die schwarze *Bärenraupe*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 7. Ph. *Caja*, der *Nesselspinner*; *Bär*.

Behm. Epit. S. L. p. 163. no. 38. Phal. *Caja*.

Onomat. hist. nat. P. VI. p. 328. der *Bärenraupenvogel*.

Catholicon H. p. 148. la *Herisonne*, *Bär-raupe*.

Raj. Hist. Inf. p. 151. no. 3.

Phalaena major; alis amplis oblongis, albicante et fusco coloribus pulchre variegatis; interioribus rutilis cum maculis nigris.

— — p. 152. no. 7.

Eruca densius pilosa magna, pilis longissimis incanis, fulvis et nigris varia, cum punctorum albertium lineis annularibus.

Schaeff. Icon. t. 29. f. 7. 8.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 100. not. the *Great-Tiger*; le *Grand-Tigre*: legt über 600 *Eyer*.*)

Fabric.

*) Nach der Versicherung des Staatsr. *Müllers* soll zuweilen ein solches Weibchen auf 1600 *Eyer* legen, welches ihm selbst unglaublich vorgekommen, sich aber durch wiederholtes Nachzählen bestätigt hat.

Fabric. S. E. p. 581. no. 581. no. 87. *Bomb. Caja.*
Nom. Linn.

Polyphaga.

Larva solitaria, hirta, nigricans; segmentis
utrinque punctis tribus elevatis, coerulescentibus.

Pupa folliculata, nigra, opaca.

System. Natur. du Regne animal II. p. 144. no. 12.
Ours; Phalene de la Laitue.

Scop. Ent. carn. p. 201. no. 503. *Phal. Caja.*

Long. unc. 1. lin. 1-3½. *Lat.* 6-8.

Alae anticae caesatae; rivulis albis; *posticae*
rubrae; maculis nigris.

Variat 1. *Alis* primoribus supra puncto al-
bo prope apicem; posticis supra maculis nigris
rotundis tribus in limbo, quarum duae interio-
res sese fere contingentes, tertia nigrae basi im-
posita, nec non maculis binis pariter nigris in
disco contiguas, una cordiformi.

2. *Alis* iisdem pallidioribus et fere cervinis;
posticis maculis limbi tribus sphaericis, sed in-
terioribus remotioribus; aliis in disco ovatis
unitis.

3. *Alis* iisdem cervinis, curva linea ad api-
cem loco puncti, maculaque marginis antica in
rivum mutata; posticis macula unica disci, tri-
bus in limbo, sed exteriori exigua.

List. Goed. p. 217. no. 99. f. 99. *Eruca hirsuta.*

— *Passeres* aliaeque *aves* has non edunt.

— ed. gall. Tom. II. f. 17.

Réaumur. Inf. I. p. 514. t. 36. f. 1-7. l' *Herissonne de*
l'orme; la Marté.

Geoffr. Inf. II. p. 108. no. 8.

Long. 1 pouce.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis, superioribus fuscis, rivulis albis; inferioribus purpureis, punctis sex nigris.

L'écaille martre ou herissonne.

Mouffet lat. p. 186. f. 2. *Ambulo* secundus.

Biblioth. Reg. Paris. p. 13. f. 1-8. p. 16. f. 1.

Papilio purpurascens, circulis atro-coeruleis notatus; alis flavescentibus virgatis, cum maculis fuscis.

Mülleri Faun. Fridr. pag. 41. no. 371. Phal. *Caja*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 118. no. 1359. Phal. *Caja*.
Nom. *Linn.*

— *Pile-Larven*, p. 13.

Sepp Nederl. Inf. IV. p. 9. t. 2. De Vlinder uit de
groote *Beer-Rups*; vom Ey f. 1. bis zur Phal-
läne f. 6. 7.

Degeer Inf. Tom. I. p. 198. t. 12. f. 8. 9.

Chenille très-velue noire, dont les poils des
côtés du corps sont roux, qui a douze tubercu-
les, et qu'on nomme l'*Herissonne* ou la *Marte*.

— — p. 696. t. 12. f. 8. 9.

Phalene à antennes à barbes, sans trompe;
dont les ailes supérieures sont brunes et blanches
et les inférieures rouges à grandes taches noires.

— II. Part. I. p. 301. no. 1. Phal. *Herissonne*.

— à antennes barbuës sans trompe; à ailes
en toit arrondi, dont les supérieures sont brunes
à rayes irrégulières blanches, et les inférieures
rouges à taches noires.

— *Uebersf.* I. 1 Quart. p. 147. t. 12. f. 8. 9.

Die schwarzhaarichte *Raupe* mit rothen Sei-
tenhaaren und zwölf Bückeln; der *Igel*, oder
der *Marder*.

Degeer Inf. *Uebers.* I. 4 Quart. p. 119. t. 12. f. 8. 9.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüssel; dessen Oberflügel braun und weiss, die Unterflügel aber roth sind, und grosse schwarze Flekke haben.

— II. 2 Th. p. 215. no. 1. die *Igelphaläne*.

— ohnzünftig mit bärtigen Fühlhörnern; die Flügel wie ein abgerundetes Dach; die obern braun mit unordentlichen weissen Streifen; die untern roth mit schwarzen Flekken.

39. *Virgo*, die *pensylvanische Jungfer*.

Müller l. c. p. 663. no. 39. die *Jungfer*.

Fabric. S. E. p. 582. Bomb. *Virgo*. Nom. *Linn.*

Paulo minor B. *Caja*; et rivuli alarum anticarum plures reticulati; abdomen supra rubrum, subtus nigrum.

40. *Hebe*, die *Wittwe*.

Müller l. c. p. 663. no. 40. die *Wittwe*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 186. t. 27. f. 1. 2.

Ein sonderbarer schöner *Nachtvogel* der 2ten Klasse mit hochkarminrothen Unterflügeln und Hinterleib, und weissen über die Queere mit schwarzen Flekken ausgezierten Oberflügeln.

Kleemanns Beytr. I. p. 110. t. 13. f. 1-4. die zur 2ten Klasse der *Nachtvögel* gehörige mit bräunlich-grauen Haaren besetzte *Bärenraupe*; auf der an sandigen Oertern stehenden hohen *Hunds-* oder *Wolfsmilch* (*Esula*).

— (*Maders*) *Raupenkal.* p. 11. no. 8. Phal. *Hebe*, die *Wittwe*; p. 25. no. 25.

Berlin. Magaz. II. p. 416. no. 32. Phal. *Festiva*, die *weisse Bienenmotte*.

Die Oberflügel weiss mit schwarzen Quer-

strichen; die Unterflügel roth mit schwarzen Flekken.

— Also nicht *Virgo* p. 437. not. N.

Naturforscher VIII St. p. 106. no. 32. Phal. *Festiva*.

— — — IX. St. p. 222. *Hollaar* Inf. t. I. f. I.

Frisch Inf. VII. p. 14. no. 9. 2 Pl. t. 9. vom schwarz- und weißfleckigen Nachtpapilion mit dem rothen Leib und Unterflügeln, und der Raupe, woraus er wird.

Wiener Schmetterl. p. 52. E. no. 2. *Garbenspinner-raupe* (*Achillaeae Millefolii*); *Garbenspinner*.

Catholicon H. p. 92. Phal. *Hebe*.

Onomat. hist. nat. P. VI. p. 376. Phal. *Hebe*.

Fabric. S. E. p. 581. no. 86. Bomb. *Hebe*.

Alis deflexis, nigro-fasciatis; posticis sanguineis; nigro-maculatis.

Schaeff. Icon. t. 28. f. I. 2.

Geoffr. Inf. II. p. 109. no. 9.

L'écaille couleur de rose. Long. 10 lign.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis; superioribus albis, rivulis transversis nigris; inferioribus roseis, macula triplici nigra.

41. *Villica*, der schwarze Bär.

Müller l. c. p. 664. no. 41. t. 22. f. 3. der *Raumflek*.

*Füßlin*s schweizer. Inf. p. 35. no. 657. Phal. *Villica*, die schwarze Bärmotte.

Berlin. Magaz. II. p. 404. no. 14. Phal. *Villica*, die schwarze Bärenmotte.

Die Oberflügel schwarz mit weißen Flekken; die Unterflügel gelb mit schwarzen Flekken.

Frisch Inf. X. p. 3. no. 2. 1 Pl. t. 2. Vom Papilion mit schwarzen und weißfleckigen Oberflügeln, pomeranzengelben Unterflügeln und rothem Leibe.

Röfels Insektenbel. IV. p. 192. t. 28. f. 2.

Ein zur 2ten Kl. der Nachtv. gehöriger ungem. schöner kohlschwarzer Papilion mit weissen Flekken und oraniengelben schwarzgefleckten Unterflügeln nebst karminrothem Hinterleibe.

— — p. 197. t. 29. f. 1-4. Die zur Nachtvögel 2ter Kl. gehörige seltene braunhaarige Bärenraupe mit rothem Kopf und Füßen.

Kleemanns (*Maders*) Raupenkalender, p. 10. no. 5. Phal. *Villica*, der schwarze Bär; der Raumsflek, p. 24. no. 51.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 359. no. 2. Phal. *Villica*; der Rüfternspinner; die schwarze Bärenmotte.

— II. p. 977. no. 20. Phal. *Villica*, die schwarze Bärenmotte.

Wiener Schmetterl. p. 53. E. no. 7. Spinatspinnerraupe (*Spinaciae oleraceae*); Spinatspinner.

Fischers Naturgesch. von Livl. p. 151. no. 350. Phal. *Villica*, der Raumsflek.

Naturforscher IX. p. 223. (*Hollaar* Inf. t. 6. f. 7. t. 8. f. 4. Phal. *Villica*.)

Bekm. Epit. S. L. p. 163. no. 41. Phal. *Villica*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 415. Phal. *Villica*.

Système Naturel du Regne animal II. p. 144. no. 13. *Phalene de l'Ortie à feuille ovale.*

Harris. 9. t. 4.

Raj. Hist. Inf. p. 156. no. 4.

Phalaena media, alis oblongis; exterioribus nigris, maculis majusculis ochroleucis illitis; interioribus luteis, maculis nigris depictis.

Réaum. Inf. Tom. I. p. 489. t. 31. f. 1-6.

Chenille pourvue d'aigrettes de poils, disposés en rayons.

Schaeff. Icon. t. 130. f. 1.

Scop. Entom. carn. p. 203. no. 504. Phal. *Villica*.

Long. unc. 1. et lin. 1. Lat. $7\frac{1}{2}$.

Alae anticae nigrae, maculis octo isabellatis albisve. Posticae flavae cerae colore; maculis apiceque nigris.

Fabric. S. F. p. 581. no. 85. Bomb. *Villica*. Nom. L.

Larva hirsuta, nigricans, fulvo-maculata, capite pedibusque rufis.

Pupa folliculata, nigra.

Mülleri Faun. Frid. pag. 42. no. 376. Phal. *Villica*.

Nom. Linn.

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1360. Nom. Linn.

Geoffr. Inf. II. p. 106. no. 7. *)

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis, superioribus atris, areis flavescentibus; inferioribus luteis nigro-maculatis; abdomine rubro.

L'écaille marbrée.

Long. 1. pouce.

Petiv. Gazoph. t. 33. f. 10. 12.

Biblioth. Reg. Paris. p. 14. f. omnes.

42. *Plantaginis*, der *Wegerichspinner*. **)

Müller l. c. p. 664. no. 42. t. 22. f. 4. die spanische Fahne.

Füesflins Schweiz. Inf. p. 35. no. 658. Phal. *Plantaginis*, die spanische Fahne.

Röfels

*) Geoffr. sagt p. 107: Linnés Beschreibung passe nicht sowohl auf diese *Villica*, als *Hera* no. 91, weil sie nicht, wie er behauptete, schwarze Flekke mit weissen Binden habe, sondern schwarz mit weißlichen Flekken sey. Es kömmt aber darauf an, wie man es nimmt.

**) Die vom Linn. hierbey angeführte *Phalena chinée* Geoffr. II. p. 145. no. 74. ist Linn. *Hera* no. 91.

Röfels Insektenbel. IV. pag. 167. t. 24. Die kleine schwarze und ziegelrothe Bärenraupe, nebst ihrer Verwandlung in einen sehr schönen, zur 2ten Klasse der Nachtvögel gehörigen Papilion.

Kleemanns (Maders) Raupenkalender p. 66. no. 188. p. 83. no. 240. Phal. *Plantaginis*, die spanische Fahne.

Wiener Schmetterl. p. 53. E. no. 4. *Wegerichspinnerraupe* (*Plantaginis majoris*); *Wegerichspinner*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 398. Phal. *Plantaginis*, der *Wegerichvogel*.

Bekmann. Epit. Syst. Linn. p. 164. no. 42. Ph. *Plantaginis*.

Schæff. Icon. t. 92. f. 5. 6. 7.

Scop. Entom. carn. p. 205. no. 507. Phal. *Alpicola*.
Long. lin. $7\frac{1}{2}$. Lat. 4.

Fusca; alis anticis macula rivulisque albis; posticis limbo ochraceo, maculis fuscis.

In gramineis alpium *Vochinensium*.

— *Ann. quintus* historico-natur. p. 114. no. 122. *Phalaena Plantaginis* Linn. omnino mea *Alpicola*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 41. no. 372. Phal. *Plantaginis*. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 118. no. 1361. Phal. *Plantaginis*. Nom. Linn.

Fabric. S. E. p. 580. no. 83. Bomb. *Plantaginis*.

Alis deflexis atris, rivulis albis; posticis luteis; margine maculisque nigris.

Mas fulvus; *femina coccinea*.

Larva pilosa atra, dorso brunneo.

Pupa atra.

Geoffr. Inf. II. p. 109. no. 10.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis;

xis; superioribus fuscis, maculis luteis, inferioribus rubris; maculis quatuor nigris.

L'écaille brune.

Longueur 8 lign.

43. *Monacha*, die *Nonne*.

Müller l. c. p. 665. no. 43. die *Nonne*.

Fießlins Schweiz. Inf. p. 35. no. 659. Phal. *Monacha*, die *Nonne*.

Kleemanns Beytr. I. p. 273. t. 73.

Die großköpfige, breitleibige, graulichbraun- und weißgefleckte, haarige, mit einem dunkelblauen Rückenflecken und blauen Knöpfchen gezierte Baumraupe, mit ihrer Verwandlung in einen Nachtpapilion der 2ten Klasse.

— *Raupenkal.* p. 26. no. 60. Phal. *Monacha*, die *Nonne*.

Berlin. Magaz. II B. p. 404. no. 15. Phal. *Monacha*, die *Nonne*.

Weiß und grau schattirt, mit geschwungenen und stark ausgezakten Queerlinien.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 645. no. 6. Phal. *Monacha*, die *Nonne*.

— II. p. 739. no. 23. Phal. *Monacha*, die *Nonne*.

Wiener Schmetterl. p. 52. D. *Knöpferaugen*, Larvae *nodosae*; *weißlichte Spinner*; Ph. *Bomb. albidae*; no. 5. *Apfelspinnerraupe*, *Pyri mali*; *Apfelspinner*; Phal. *Monacha*.

Schaeff. Icon. t. 68. f. 2. 3.

Scop. Ent. carn. p. 196. no. 490. Phal. *Monacha*.

Long. lin. 9. *Lat.* 4.

Alae albae; *maculis marginalibus striisque transversis, undatis, fuscis*; *posticae fascia obsoleta obscuriore*. *Incisurae abdominis rubrae*; *antennae nigrae*.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 574. no. 58. Bomb. Monacha. Nom. Linn.

Larva fusco-cinerea, fasciculis dorfi rubris, segmento secundo macula cordata nigra.

Pupa nigra.

Raj. Hist. Inf. p. 158. no. 7. Phalaena media ex cinereo albicante et nigro coloribus varia.

— — p. 159. no. 8. *Eruca Rubum idaeum depascens.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. pag. 118. no. 1362. Phal. Monacha. Nom. Linn.

44. *Dispar*, die Stammotte.

*Müller l. c. p. 665. no. 44. t. 16. f. 2. II. Männchen und Weibchen in der Begattung; der Großkopf. *)*

Früßlins Schweizer. Inf. p. 35. no. 660. Ph. Dispar, der Großkopf.

Den Obstbäumen sehr schädlich.

— *Magaz. der Entomol. p. 286. Phal. Dispar.*

Die *Raupen*, die der Chorherr *Meyer* gezogen, sind darinn von den *Röfelschen* verschieden, daß die Grundfarbe des Oberleibes braun, ins Dunkelgraue fallend, und die des übrigen Leibes, die okergelben Linien ausgenommen, heller als schwarzgrau war.

Frisch Inf. I. p. 14. t. 3. die buntnöpfige Garten- und Waldraupe.

Berlin.

*) „Wir nennen ihn, sagt Herr M. den *Großkopf*, denn dieser Schmetterling hat verhältnißmäßig unter allen den größten Kopf.“ Dies ist aber falsch: nicht der Schmetterling, sondern die *Raupe* hat einen vorzüglich dicken und großen Kopf.

Im *December* hab' ich die *Eyer* unter ihrer Dekke an den Baumstämmen abgenommen, und sie mikroskopisch untersucht, da ich denn in einigen zerdrückten schon den völlig gebildeten *Embryo mit den Haaren* gefunden habe.

Berlin. Magaz. II. p. 406. no. 16. *Phal. Dispar*, die *Schwammotte*.

Weiß mit braunen Zeichnungen; das Männchen hellbraun mit weißen Zeichnungen.

— III. p. 8. no. 2. die *buntknöpfige Garten- und Waldraupe*; *Phal. Dispar*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 17. t. 3. Die schädliche, großköpfige, haarige, braune Raupe, mit roth- und blauen Knöpfen, nebst ihrer Verwandlung zum Papilion.

Kleemanns (Maders) Raupenkalender p. 99. no. 282. *Phal. Dispar*, die *Stammotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 388. no. 3. *Phal. Dispar*, die *Schwammotte*.

— II. p. 739. no. 24. *Phal. Dispar*, die *Stammotte*; *Schwammotte*.

Glafer von schädlichen Raupen, p. 39. die *Eichen- und Ulmraupe* mit Ohren; die *buntknöpfige Garten- und Waldraupe*; die schädliche großköpfige haarichte braune Raupe.

Schrebers Samml. XIII. p. 153.

Schäffers Eulenzwitter, mit der *Baumraupe* etc. *Regensb.* 4. 1761.

— *Icon.* t. 28. f. 3-6.

Neueste Entdeckungen im russ. Reich I. p. 371. *Phal. Dispar*.

Breslauer Samml. 1720. *Majus*, Cl. 4. Art. 6. p. 567. von den *Eyerneestern* dieser Raupen.

— — — — *Junius*, Art. 4. p. 661.

— — — — 1723. *Octobr.* Cl. 4. Art. 5. *Danfskakker*.

Wiener Schmetterl. p. 52. no. 6. *Rosenspinnerraupe* (*Rosae centifoliae*); *Rosenspinner*.

Fischers N. G. von Livl. p. 151. no. 351. *Phal. Dispar*; der *ungleiche Nachtschmetterling*; der *Großkopf. Blumen-*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 370. no. 8. Phal. Dispar.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 8. Phal. Dispar, der Grofskopf.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 350. Phal. Dispar.

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 44. Phal. Dispar.

Réaum. Inf. II. t. 1. f. 11-14. Chenille à oreilles.

Geoffr. Inf. II. p. 112. no. 14.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis albis; fascia quadruplici transversa nigra, acute undulata.

Le Zig-zag.

Long. 1 pouce.

Bibl. Reg. Paris. p. 27. f. omnes.

Stop. Entom. carn. p. 197. no. 491. Phal. Dispar.

Long. lin. $9\frac{1}{2}$. Lat. $5\frac{1}{2}$ Mas.

Mas alis pallide ochraceis; anticis supra fusco-nebulosis; posticis subtus macula fusca.

Femina alis albis; anticis lituris aliquot nigricantibus.

Fabric. S. E. p. 570. no. 49. Bomb. Dispar. Nom. Linn.

Larva pilosa, albo-lineata; punctis anticis coeruleis; posticis rubris. Manus pruritu inficit.

Pupa folliculata, punctis quatuor anticis nigris: tacta in gyrum se volvit.

Mas alis fusco-griseis, nebulosis.

Femina duplo major, alis albis lituris nigris, ova pilis pulverulentis obducit.

Degeer Inf. II. Part. I. p. 293. no. 3. Phalene Disparate.

— à antennes barbuës sans trompe, à ailes étendues blanches avec quelques taches noires dans la femelle, et brunes à rayes ondées noirâtres

tres dans le mâle, à pattes et antennes noires dans la femelle.

Merian. Inf. t. 18. 31. 69. 72. 77. 183. *)

45. *Chrysorrhoea*, der *Goldafter*.

Müller l. c. p. 665. no. 45. der *Goldafter*.

Füeslin schweiz. Inf. p. 35. no. 661. der *Goldafter*.

— *Magaz. der Entomol.* p. 286. Phal. *Chrysorrhoea*.

Frisch Inf. III. p. 8. no. 4. 2 Pl. t. 1. von den bunten Winterruppen, und von dem Zwiefalter daraus. **)

Berlin. Magaz. II. p. 406. no. 17. Ph. *Chrysorrhoea*, der *Schwan*.

Ganz weifs; das Weibchen ist mit einem gelbhaarichten Büschel am Ende des Leibes versehen.

— III. p. 10. no. 3. die *schädliche sogenannte bunte Winterraupe*; Phal. *Chrysorrhoea*.

Naturforscher VIII St. p. 103. no. 16. Phal. *Chrysorrhoea*. †)

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 137. t. 22. die *gesellige, braune, rothhaarige schädliche Baumraupe*.

Kleemanns (Maders) Raupenkal. p. 101. no. 287. Ph. *Chrysorrhoea*, der *Goldafter* *Schwan*; der *Brandreitel*; die *Brandeule*. — p. III. no. 311.

Glafer.

*) Weil die Merianinn den Unterschied der Geschlechter nicht gewusst hat, so hat sie so viele Abbildungen dieser Phaläne wiederholt.

**) Im *Linné* ist dieses Citatum des *Frisch* ganz falsch angegeben. *Füeslin* hält diesen Nachtfalter des *Frisch* für seine *Similis* no. 662. *Röfel* Nachtv. 2 Kl. t. 21.

†) Der Herr von *Rottenburg* hält diese *Chrysorrh.* L. und *Röfels* *Schwan*, *Similis*, Nachtv. 2 Kl. t. 21. nicht für einerley, sondern für zwei verschiedene Arten.

Glaſer von ſchädlichen Raupen, p. 44. §. 24. Phal. *Chryſorrhoea*, die *Flekraupe*.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 554. no. 3. Phal. *Chryſorrhoea*, der *Schwan*.

— II. p. 784. no. 4. Phal. *Chryſorrhoea*, der *Schwan*.
Wiener Schmetterl. p. 52. no. 3. *Weißdornſpinner-
raupe* (*Crataegi Oxyacanthae*); der *Weißdorn-
spinner*.

Fiſchers N. G. von Livl. p. 151. no. 352. Phal. *Chryſorrhoea*, der *Goldafter*.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 341. der *Goldafter*.

Bekm. Epir. S. L. p. 164. no. 45 Phal. *Chryſorrhoea*.

Raj. Hiſt. Inf. p. 156. no. 1. (P. M. 15). *Phalaena
media*, alis niveis, cauda obtuſa; lanugine den-
ſa fulva obſita.

— — p. 343. no. 5. *Eruca piloſa mediae ma-
gnitudinis*, ſcapulis in gibbum elatis, rubro et
albo coloribus varia. *The Devil's Gold-Ring*
pueris Eſſexienſibus.

Réaum. Inf. I. t. 6. f. 2. 10. *Chenille commune*. II. t. 5.
f. 4-12. t. 6. t. 7. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 197. no. 493. Ph. *Chryſorrhoea*.
Long. lin. 6. *Lat.* 3.

Alba; abdominis apice barbato flavo.

Fabric. S. E. p. 577. no. 74. *Bombyx Chryſorrhoea*.
Alis deflexis niveis; ano barbato ferrugineo.

Larva gregaria, piloſa, nigricans, lineis dua-
bus dorſalibus rubris, lateribus albo-faſciculatis.

Pupa folliculata, nigricans.

Ova lutea lana copioſa fulva tegit.

Geoffr. Inf. II. p. 117. no. 20.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis
albis; foeminae ano piloſo ferrugineo.

La Phalene blanche à cul brun.

Long. 9 lign.

Bibl. Reg. Paris. p. 29. f. omnes.

Schaeff. Icon. t. 131. f. 1. 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 41. no. 369. *Ph. Chrysorrhoea.*
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 118. no. 1363. *Ph. Chrysorrhoea.* Nom. *Linn.*

46. *Salicis*, der *Ringelfuß*.

Müller l. c. p. 666. no. 46. der *Ringelfuß*.

Frieslins schweizer. *Inf.* p. 35. no. 663. *Ph. Salicis*,
der *Ringelfuß*.

— *Magaz. der Entomol.* II. p. 1. *Phal. Salicis.*

Rösel hat der zwey rothbraunen, auf dem neunten und zehnten Abfatze stehenden, *Knöpfchen*, welche die Raupe aus- und einziehen kann, nicht gedacht; eben so wenig der kurzen schwarzen Hörnchen, deren zwey sehr nahe beysammen, sowohl auf dem vierten Gelenke, als auf dem fünften neben einander stehen. (*Chorherr Meyer.*)

Frisch Inf. I. p. 22. 2 Pl. t. 4. von der gelbflekkigen rauhen *Weidenraupe* und deren *Zweyfalter*.

Berlin. Magaz. II B. p. 406. no. 18. *Phal. Salicis*, die *Weidenmotte*.

Die Farbe aller vier Flügel glänzendweiss; die Füße schwarz mit schwarzen Ringelchen.

Stralsund. Magaz. I. p. 233. die gelbflekkige *Weidenraupe*; der silberweisse *Zweifalter*.

Blankart Schaupl. etc. p. 35. t. 8. f. A-D. von dem silberglänzigten *Schmetterlinge*.

Rösels *Insektenbel.* I. *Nachtv.* 2 Kl. p. 57. t. 9. die braunhaarige *Weidenraupe* mit weissen Rücken-schilden und rothbraunen Knöpfen.

Kleemanns *Raupenkal.* p. 100. no. 283. *Phal. Salicis*, der *Ringelfuß*.

Gleditsch

Gleditsch Forstwiss. I. p. 682. no. 4. *Phal. Salicis*, die *Weidenmotte*.

— — — II. p. 740. no. 25. *Phal. Salicis*, die *Weidenmotte*.

Wiener Schmetterl. pag. 52. no. 2. *Weidenspinner-raupe* (*Salicis albae*); *Weidenspinner*.

Fischers N. G. von Livl. pag. 151. no. 353. *Weiden-schmetterling*; *Ringelfuß*; *Phal. Salicis*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 411. der *Weidenvogel*.

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 46. *Phal. Salicis*.

List. Goed. p. 202. no. 87. f. 87.

Hae Erucae ob insignem suam albedinem, et quia in summitatibus arborum morantur, e longinquo conspiciuntur.

— ed. belg. I. pag. 25. t. 3. *Procul spectabilis*.

Schaeff. Icon. t. 131. f. 1. 2.

Système Naturel du Regne animal II. pag. 145. no. 14.

Phalene d'une chenille velue, et à Y grec; *Phalaena procul spectabilis*.

Réaum. Inf. t. 34. f. 4. 6.

Chenille, qui vit sur le peuplier blanc, et sur le saule.

Geoffr. Inf. II. p. 116. no. 19.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, pedum annulis, antennisque nigris.

L'apparent.

Long. II. lign.

Act. Vpsal. 1736. p. 124. no. 58.

Papilio alis depressis niveis; antennis pennatis; pedibus annulis nigris.

Scop. Entom. carn. p. 198. no. 495. Phal. *Salicis.*

Long. lin. 10. *Lat.* 6.

Alba; antennis cervinis; rachi alba; pedibus nigris, albo-annulatis.

Fabric. Syst. Ent. pag. 578. Bombyx *Salicis.* Nom. *Linn.*

Larva pilosa, nigra; dorso longitudinaliter albo maculato rubroque punctato.

Pupa folliculata, pilosa, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. pag. 41. no. 370. Phal. *Salicis.* Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Prodr. p. 118. no. 1364. Phal. *Salicis.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. I. p. 191. t. II. f. 13. 14.

Chenille velue, à tubercules et à aigrettes, dont les poils sont dirigés vers les côtés, qui a de grandes taches couleur de soufre sur le dos, et qui mange les feuilles du Peuplier et du Saule.

— — p. 696. t. II. f. 13. 14.

Phalene à antennes noires à barbes sans trompe; très-blanche, à jambes picotées de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 302. no. 2.

Phalene à antennes barbues noires sans trompe; à ailes en toit à vive arrête blanches, dont les pattes sont tachetées noir.

— — — *Phalene* apparente.

— *Ueberf.* I. 1 Qu. p. 141. t. II. f. 13. 14.

Die rauche Büschelraupe auf den Sahlweiden und Pappeln, deren Haare an den Seiten wegstehen,

stehen, mit grossen schwefelgelben Rücken-
flecken.

Degeer Inf. Uebersf. I. 4 Quart. p. 118. t. 11. f. 13. 14.

Ein sehr weisser Nachtvogel mit schwarzen
bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüssel, und
mit schwarzgesprenkelten Füßen.

— II B. I Th. p. 216. no. 2. *Phal. Salicis.*

Die von ferne scheinbare, und in die Augen
fallende weisse Phaläne.

Die ohnzüngige Phaläne mit schwarzen bär-
tigen Fühlhörnern, welche ihre ganz weisse
Flügel wie ein scharfkantiges Dach zu tragen
pfl egt, mit schwarzgefleckten Füßen.

47. *Mendica*, der Bettler.

Müller l. c. p. 666. no. 47. der Bettler.

Füesflins schweizer. *Inf.* p. 35. no. 664. *Phal. Men-
dica*, der Bettler.

Berlin. Magaz. II. p. 424. no. 45. *Phal. Murina*,
die Mausmotte.

Ganz mausfarbig mit einem schwarzen Punkt
in der Mitte der Oberflügel.

Naturforscher VIII St. pag. 109. no. 45. *Phal. Mu-
rina* ist *Phal. Mendica* L.

Sie hat in jedem Oberflügel zween überein-
ander stehende schwarze Punkte.

Wiener Schmetterlinge, pag. 54. F. *Hasenraupen*;
Larvae Celeripedes; gelbfüssige Spinner; *Phal.*
Bomb. Luteopedes: no. 3. *Frauenmünzenspin-
nerraupe* (*Tanaceti Balsamitae*); *Frauenmün-*

zenspinner. *) (*Réaum.* la chenille du Coq des jardins.)

Fischers N. G. von Livl. p. 152. no. 354. Phal. *Mendica*, die Bettlerin.

Clerk Phal. t. 3. f. 5. Phal. *Mendica*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 299. no. 1127. Phal. *Mendica*.

Magnitudo minor; *antennae* magis fuscae *ra-
chi* alba.

48. *Crataegi*, der Weißdornspinner.

Müller l. c. p. 666. no. 48. die Dorneule.

Füesflins Schweiz. Inf. p. 35. no. 665. Phal. *Crataegi*, die Dorneule.

Wiener Schmetterl. p. 58. L. Haarraupen; Larvae pilosae; wollichte Spinner, Phal. Bombyx *Tomentosae*.

No. 8. Hagedornspinnerraupe (*Crataegi Oxycanthae*); Hagedornspinner.

Espers Zwitterphaläne des Bomb. *Crataegi*, mit einer illuminirten Kupfertafel, Erlang. 4. 1778. f. 3. 4. 5.

Réaum. Inf. t. 44. f. 10.

La Chenille demi-velue d'aube-épine.

Degeer Inf. I. p. 193. Mém. 5. t. 11. f. 20. 21.

Chenille velue noire, à rayes transversales en demi-cercle d'un blanc jaunâtre et à quatre tuber-

*) Der Ritter hat nur das aschfarbige Männchen dieser Art beschrieben; das Weibchen ist jederzeit weifs.

tubercules rouffes, qui vit fur le Saule et l'O-
zier.

Degeer Inf. I. p. 696. t. II. f. 20. 21.

Phalene à antennes à barbes, fans trompe;
d'un brun grifâtre à large bande obscure fur les
ailes supérieures.

— *Tom.* II. Part. I. p. 300. no. 3. *Phalene à queue
fourchue.*

— à antennes barbues fans trompe, à ailes
un peu débordées, d'un gris cendré avec une
large bande transversale obscure fur les supé-
rieures.

— *Ueberf.* I. 1 Quart. pag. 143. t. II. f. 20. 21.

Die *schwarze rauche Raupe* auf den Woll- und
Bruchweiden; mit weißgelblichen halbrun-
den Queerstreifen, und vier fuchsrothen Knö-
pfen.

— — 4 Quart. p. 119. t. II. f. 20. 21.

Ein graulichbrauner Nachtvogel mit bärti-
gen Fühlhörnern, ohne Saugrüßel, mit einer
breiten dunklen Streife auf den Oberflügeln.

— II B. I Th. pag. 214. no. 3. der *Gabelschwanz-
spinner.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühl-
hörnern, deren Unterflügel vor den obern et-
was vorstehen. Die Farbe aschgrau mit einer
dunkeln Queerstreife auf den Oberflügeln.

49. *Atra*, die *Mohrin.*

Müller l. c. p. 667. no. 49. der Mohr.

Frieslins schweizer. Inf. pag. 35. no. 666. die *Möh-
rin.*

Berlin. Magaz. II. pag. 418. no. 36. Phal. *Unicolor*,
die *einfarbige Motte.*

Durchaus schwarzbraun; das *Weibchen ohne
Flügel.*

Naturforscher VIII. p. 107. no. 36. Phal. *Unicolor.*

Nicht ganz schwarz, sondern *schwarzbraun*;
von weitem nur schwarz.

Wiener Schmetterl. p. 133. A. *Scheinspinner*schaben,
Phal. *Tineae Bombyciformes.*

No. 1. *Gras*schabenraupe (*Holci lanati* Bro-
mi etc.); *Gras*schabe, *Tinea Graminella*, Phal.
Bomb. *Atra* L.

Catholicon A. p. 584. Phal. *Atra*, die ganz schwarze
Phaläne ohne Zunge.

Fabric. S. E. p. 568. no. 44. Bomb. *Hieracii.*

Alis subreversis, atro-fuliginosis.

Larva pilosa atra, linea dorsali sanguinea.

Pupa folliculata, ferrugineo-fusca.

Geoffr. Inf. II. p. 203. no. 51.

Tinea involucro palearum longitudinalium
ordine multiplici composito.

La teigne à fourreau de paille composé.

50. *Coryli*, der *Hasel*spinner.

Müller l. c. p. 667. no. 50. die *Hasel*leule.

Frieslins schweiz. Inf. p. 35. no. 667. Phal. *Coryli*,
die *Hasel*motte.

Berlin. Magaz. II. p. 408. no. 19. Phal. *Coryli*, die
*Hasel*motte.

Die Oberflügel hellgrau mit weißlichen braunen und gelblichen Zeichnungen; die Unterflügel hellkergelb; der Rand mit braunen Flecken versehen.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 294. t. 58.

Die auf der Haselnußstaude sich aufhaltende kleine gelbliche fleischfarbige Bürstenraupe mit zwey Haarhörnern.

Kleemanns (Maders) Raupenkalender p. 88. no. 254. Ph. *Coryli*, die *Haselmotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 569. no. 4. Phal. *Coryli*, die *Haselmotte*.

Wiener Schmetterl. p. 55. G. *Bürstenraupen*, Larvae fasciculatae; Chenilles à broffes; *streckfüßigte Spinner*, Phal. Bomb. *Tendipedes*.

No. 4. *Haselnußspinnerraupe* (*Coryli Avelanae*); *Haselnußspinner*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 344. Phal. *Coryli*, der *Haselstaudenvogel*.

Behm. Epit. S. L. p. 164. no. 50. Phal. *Coryli*.

Fabric. S. E. p. 573. no. 56. Bombyx *Coryli*.

Alis deflexis, glaucis; fascia ferruginea; puncto nigro albo-annulato, thorace variegato.

Larva fascicularis, pilosa, rubra, fasciculis dorsilibus duobus, caudae unico, collaribus longioribus.

Pupa folliculata, antice nigra, postice brunnea.

Degeer Inf. Tom. I. p. 265. t. 18. f. 4. 5.

Chenille à broffes et à aigrettes, d'un blanc jaunâtre, et rayée de noir, du Bouleau.

— — p. 699. t. 18. f. 4. 5.

Phalene à antennes à filets et à courte trompe, moitié brune et moitié cendré-blanchâtre.

Degeer Inf. Tom. II. p. 319. no. 8. Phal. du *Noisetier*.

— à antennes barbues sans trompe, à corcelet huppé rayé de gris et de brun, dont les ailes supérieures sont moitié brunes et moitié cendré-blanchâtres, à tache ovale blanchâtre bordée de noir.

— *Uebersf.* I. 2 Quart. p. 42. t. 18. f. 4. 5.

Die weißgelbliche, schwarzgestreifte Bürsten- und Büschelraupe auf den Birken.

— — 4 Quart. p. 122. t. 18. f. 4. 5.

Ein hellbrauner und halbaschweißlicher Nachtvogel, mit fadenförmigen Fühlhörnern, und einem kurzen Saugrüssel.

— II B. I Th. p. 231. no. 8. die *Haselphaläne*.

Die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern, einem grau- und braungestreiften Rücken, und halb braun, halb aschfarbig-weißlichten Oberflügeln mit einem eiförmigen weißlichen schwarzgerändelten Flecke.

51. *Furcula*, der kleine Gabelschwanz.

Müller l. c. p. 667. no. 51. der *Brustpunkt*.

Füesflins schweizer. Inf. p. 35. no. 668. Phal. *Furcula*, der *Doppelschwanz*.

Die *Raupe* wie no. 29. *Vinula*.

— *Magaz. der Entomol.* I. p. 280. Phal. *Furcula*, die kleinere *Weidenraupe* mit dem doppelten Schwanze — eine besondere Gattung — auf der breitblättrichten Weide. (Chorherr *Meyer*.)

Berlin. Magaz. II B. p. 420. no. 37. Phal. *Furcula*, der *Gabelschwanz*.

Weißgrau mit einem breiten braunen, und einem gezakten und ausgeschwungenen schmalen

len Queerstreif über die Oberflügel, an deren Rande eine Reihe brauner Punkte.

Naturforscher XIV. p. 63. no. 5. von der *kleinen Gabelschwanzraupe*; Phal. *Furcula.* (D. Kühn.)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 746. no. 48. Phal. *Furcula*, der *Gabelschwanz*.

Wiener Schmetterl. p. 64. S. *Gabelraupen*, Larvae *furcatae*, *zackenstriemigte Spinner*; Phal. Bomb. *Flexuoso-striatae* (*Chenilles à queue fourchue*): no. 4. *Pappelweiden-spinnerraupe* (*Populi nigrae*); *Pappelweiden-spinner*; Phal. *Furcula*.

Wilks p. 13. t. 1. f. 1.

Fabric. S. E. p. 584. no. 96. Bombyx *Furcula.* Nom. *Linn.*

Larva solitaria, nuda, bicaudata, viridis.

— Reife durch Norw. p. 233. Larva Ph. *Furculae*. Auf den Weiden.

Sepp Nederl. Inf. IV. p. 29. t. 6. De Vlinder uit de kleine *Tweestaart-Rups*; de kleine *Hermelyn Vlinder*.

(Ganz unvergleichlich.)

Deger Inf. Tom. II. Part. I. pag. 313. no. 4. t. 4. f. 18-21. Phalene petite *queue double*.

Phalene à antennes barbues sans trompe; à corcelet huppé noir rayé de jaune, à ailes d'un gris-de-perle avec des rayes transverses ondées noires bordées de couleur d'orange, et des suites de points noirs.

— — p. 315. *Chenille* verte rase à 14 pattes, et à *double queue*, dont la grande tache brune du dos est découpée comme une feuille.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 226. no. 4. t. 4. f. 18-21. der *kleine Gabelschwanz*.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem schwarzen gelbgestreiften Rückenamm, und perlgrauen Flügeln mit gewälften schwarzen orangegelb gerändelten Querstreifen, und einigen Reihen schwarzer Punkte.

— p. 227. Die grüne glatte vierzehnfüssige Raupe mit doppeltem Schwanz, und grossem braunen, blattförmig gezähnelten Rückenflecke.

52. *Curtula*, der *Erpelschwanz*.

Müller l. c. p. 668. no. 52. der *Kurzarfch.*

Füesflins Schweiz. Inf. p. 35. no. 669. Phal. *Curtula*.

— Magaz. der Entomol. II. pag. 2. Phal. *Curtula*.

Die kleine *Weidenraupe* mit den oraniengelben Knöpfgen, und zwey weissen Punkten auf dem vierten Abfatze. (Chorherr Meyer.)

Die *Röfelse* IV. t. II. f. 1. 6. von dieser sehr verschieden.*)

Berlin. Magaz. II. pag. 408. no. 20. Phal. *Curtula*, der *Erpelschwanz*.

Afchgrau, mit einem grossen maufefarbenen Flek an der Spitze der Oberflügel, in welcher eine weisse geschwungene Linie.

Röfels Insektenbel. III B. p. 256. t. 43. Die zu der Nachtv. 2 Kl. gehörige kleine *Weidenraupe* mit dem fleischfarbigen Rückenstreif und zwo rothen Rückenwarzen.

Gleditsch

*) Diese *Röfelse* IV. t. II. f. 1-6. ist merklich kleiner als *Curtula*, und des *Hufnagels* Ph. *Pigra*, Berl. Magaz. II. p. 426. no. 46. der kleine *Erpelschwanz*; Naturf. VIII. p. 109. no. 46. Ph. *Pigra*. Der Herr von Rottenburg hält ihn für eine eigene Gattung, und für keine blosse Varietät.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 646. no. 9. Phal. *Curtula*,
der *Erpelschwanz*.

— II. p. 740. no. 27. Ph. *Curtula*, der *Erpelschwanz*.

Wiener Schmetterl. p. 55. H. Schopfraupen, Larvae
cristatae; *stirnstreifigte Spinner*, Ph. B. *Signatae* :
no. 2. *Rosenweidenspinner-raupe* (*Salicis Helicis*);
Rosenweidenspinner.

Frisch Inf. V. p. 18. no. 6. 1 Pl. t. 6. von der *Weiden-*
raupe mit zween weissen Bukkelpunkten.

Kleemanns (*Maders*) Raupenkal. p. 112. no. 316. der
große Erpelschwanz; der *Waffenträger*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 347. Phal. *Curtula*.

Fabric. S. E. p. 574. no. 61. Bomb. *Curtula*.

Alis deflexis, glaucis, strigis albis maculaque
apicis fusca.

Larva solitaria pilosa fusca; stria dorsali in-
carnata, verrucis duabus elevatis punctisque later-
alibus rufis.

Pupa fasciculata, brunnea.

Imago Anastomosi (no. 53.) affinis.

Thorax macula antica brunnea.

Müller's Faun. Fridr. p. 41. no. 367. Phal. *Curtula*,
Nom. Linn.

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1366. Phal. *Curtula*.
Nom. Linn.

Sepp. Nederl. Inf. IV. t. 1. f. 12-18. De *kleine Wa-*
pendrager uit de Matjes-Rups.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 323. no. 11. t. 5. f. 1.
Phalene hausse-queue fourchue.

— à antennes barbues sans trompe, à corce-
let huppé avec une grande tache ovale d'un brun
obscur, à ailes d'un gris-de-souris, avec quatre
lignes

lignes transverses blanchâtres, un point blanc, et une tache rousse.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 325. *Chenille* demivelue grise, à tubercules jaunes, avec deux rayes noires, et deux rayes jaunes aux côtés, et deux points noirs veloutés sur le dos.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 234. no. II. t. 5. f. 1. die *Phaläne mit einem hochstehenden Gabelschwanz.*

Die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern, einem Rückenkaum mit einem großen eyförmigen dunkelbraunen Flek, und mausfahlen Flügeln mit vier weißlichen Queerlinien, einem weißen Punkt und fuchsfichten Flek.

— — p. 236. Die *Raupen* grau und halbhaaricht mit gelben Knöpfen, zwo schwarzen und zwo gelben Seitenstreifen, und zween sammet-schwarzen Rückenpunkten.

53. *Anastomosis*, der *Espenspinner*.

Müller l. c. p. 668. no. 53. das *Wirrband*.

Früßlins schweiz. Inf. p. 35. no. 670. Ph. *Anastomosis*.

— *Magaz. der Entomol.* II B. p. 3. Ph. *Anastomosis*.

Werfen im Häuten die *Kopfhaut* besonders weg. (Chorherr *Meyer*.)

Berlin. Magaz. II. p. 420. no. 39. Phal. *Anastomosis*, die *Espenmotte*.

Grau, an einigen Orten ins Gelbbraune fallend, mit braunen Punkten und schwarzen Queerstreifen.

Kleemanns (Maders) Raupenkalender p. 57. no. 154. Phal. *Anastomosis*, die *Espenmotte*; das *Wirrband*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 741. no. 30. Phal. *Anastomosis*, die *Espenmotte*.

Röfels Insektenbel. I. Nachtv. 2 Kl. p. 158. t. 26. die buntfarbige, und besonders niedlich gezeichnete *Zapfenraupe*.

Wiener Schmetterl. p. 55. no. 1. *Lorbeerweidenspinneraupe* (*Salicis pentandrae*); *Lorbeerweidenspinner*.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 315. Phal. *Anastomosis*.

Fabric. S. E. p. 575. no. 62. Bomb. *Anastomosis*.

Alis deflexis griseis; strigis tribus pallidis, subanastomofantibus; thorace ferruginato.

Larva fusca, dorso albo-punctato lineaque laterali flava rubro-punctata, tubere humeri anique.

Pupa folliculata, nigra, striis duabus rubris.

Mülleri Faun. Fridr. p. 41. no. 368. Phal. *Anastomosis*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Prodr.* p. 118. no. 1365. Nom. *Linn.*

Scop. Ent. carn. p. 201. no. 1. Phal. *Anastomosis*.

Long. lin. 6. *Lat.* 6.

Thorax cristatus; antice macula brunnea.

Corpus et alae cinerascens; striis subquaternis albidis, maculaque corticina ad apicem margini insidente.

Catholicon A. p. 320. Phal. *Anastomosis*.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 322. no. 10. *Phalene hausse-queue grise*.

— à antennes barbues sans trompe, à corcelet huppé avec une grande tache ovale d'un brun obscur, à ailes d'un gris brun mêlé de roux avec des lignes transverses onduées pâles.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 323. *Chenille* demi-velue brune, à tubercules rouges, blanches, et jaunes, avec deux rayes jaunes aux côtés et deux mamelons élevés carnus.

— *Uebersf.* II B. I Th. pag. 233. no. 10. der *graue Hochschwanz*.

Die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern; einem Rückenamm mit einem großen eyförmigen dunkelbraunen Flecke, und graubraunen mit Fuchsroth gemischten und mit gewässerten Queerlinien beworfenen Flügeln.

— — p. 234. Die *Raupe* halbhaaricht, braun; mit rothen, weissen und gelben Knöpfen, zwei gelben Seitenstreifen, und zwei erhabenen Fleischwarzen.