Paul Leverkühn

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

591.948

N59s

v. 2¹

Biology

SKANDINAVISK FAUNA.

EN

HANDBOK FÖR JÄGARE OCH ZOOLOGER;

AF

SV. NILSSON,

*Professor Reg., Intendent vid Naturh. Museum i Lund;
Ledamot af K. Vetensk. Acad. i Stockholm, Acad. Cæs.
Naturæ Curiosorum i Bonn, Gesellschaft naturforschender
Freunde i Berlin, Physiograph. Sällsk. i Lund, K. Vetensk.
och Vitterh. Samhäll. i Gótheborg, Senkenbergische Natur-
forsch. Gesellsch. i Frankfurt a. M., Societas physica i
Zürick, samt Corresp. af Wetterauische Gesellsch. i Hanau
och Gesellsch. zur Beförd. d. gesammt. Natur-
wissensch. i Marburg.*

Andra Delen.

F o g l a r n a.

Första Bandet.

LUND 1824.

Tryckt uti Berlingska Boktryckeriet.

57. 940
N592
v. 2¹

05.1.1.02-21-0441 (b) (6) 32, 49, 49 K-1-0.

HOGÄDLE HERR DOCTORN
CARL PETER THUNBERG,
PROFESSOR, COMMENDEUR AF K. WASA ORDEN:

SAMT
HÖGVÖRDIGE HERR DOCTORN
SAMUEL ÖDMANN,
PROFESSOR, LEDAMOT AF K. NORDSTJERNE ORDEN,

TILLEGNAS ' DETTA ARBETE

VÖRDNADSFULLT
AF
SV. NILSSON.

F ö r e t a l.

Snart äro nio år förflutna sedan jag utarbetade första delen af Ornithologia Svecica. Under denna tid har Vetenskapen utomlands framskridit med jättesteg, och äfven i vårt Fädernesland hafva åtskilliga upptäckter deri blifvit gjorda. Att med begagnande af dessa upptäckter och dessa främsteg åter afhandla Fäderneslandets Ornithologi, torde derföre ej anses för ett onyttigt eller öfverflödigt företag. Och att denna Upplaga deraf blifvit författad på Fäderneslandets språk, hoppas jag kunna lända Vetenskapen till större nytta, än om den blifvit skrifven på ett främmande. Vi hafva hittills aldrig ägt någon på Svenska utgifven Handbok i Sveriges Ornithologi; derföre har också, om jag ej misstäger mig, mången lärarik anmärkning och mången ny upptäckt af vettgiriga Svenska Jägare för vetenskapen gått förlorad. Ty först sedan man känner hvad som redan är bekant, är det lätt att göra nya upptäckter, rättelser och tillägg. Genom denna Handboks kringspridande bland vettgiriga Jägare och unga Zoologer på vår Halfö, hoppas jag åtminstone att för framtiden hafva beredt lättare tillgång till Ornithologiska upplysningar och till sällsynta fogelarter, än den man hittills haft. Äfven för utländska Ornithologer

torde det hädanefter blifva mindre svårt än det hittills varit att bekomma Nordens foglar. Vinnas dessa åsyftade ändamål med bokens kringspridande, så har jag icke för vetenskapens framtida utveckling arbetat förgäfves.

Då det redan är på fjerde året sedan första Delen af min *Handbok för Jägare*, hvori Däggande djuren beskrifvas, lemnade pressen; så torde det af mången anses besynnerligt att denna Del, som afhandlar foglarne, så länge uteblifvit, isynnerhet som jag redan förut, fastän på ett annat språk, bearbetat samma ämne. Egentliga orsaken till detta dröjsmål har varit den önskan jag hyst att åt mina Landsmän kunna lemna ett någorlunda originelt Arbeta öfver Fäderneslandets foglar; icke blott en öfversättning af ett äldre verk. Jag ville derföre åter granska och efter Naturen beskrifva hvarenda till mitt ämne hörande fogelart: jag ville ej blott se en eller ett par individer af hvarje art, ej blott teckna det ena eller andra könet, ej blott utmärka artens utseende under en viss årstid eller en viss ålder; utan jag ville känna och beskrifva hvarje art fullständigt, och visa dess utseende hos olika kön, under olika årstider och i olika åldrar. Om jag icke fullkomligt uppnått detta mål, så har jag åtminstone bemödat mig att, så mycket möjligt varit, närma mig det.

Olika syften göra således att närvarande upplaga af Sveriges Ornithologi framträder ej blott på ett annat språk, utan äfven under en annan form, än den förra. Det var isynnerhet ändamålet med Or-

nithologia Svecica att visa utländska Naturforskare, hvilka fogelarter Sverige verkligen ägde, och hvilka genom misstag fått ett rum i dess Fauna. Fullständiga beskrifningar och en utförlig, med kritik samlad synonymi, kunde för detta ändamål vara tillräckliga. Afsigten med närvarande Arbete är deremot att åt Fäderneslandets Jägare och Naturälskare lemna en passande handledning, ej blott att riktigt kunna skilja förekommande arter, utan äfven att i Naturen kunna anställa egna undersökningar öfver hvarje arts lefnadssätt och sedvanor. Det var således här mindre fråga om en vidlyftig synonymi, än om lätta kännemärken för arterna, samt säkra uppgifter öfver hvarje arts vistelseort, lefnadssätt, nytta och skada m. m., samt öfver de brukliga methoderna att jaga eller fänga dem. För det förra ändamålet kunde det stundom vara nog att hafva granskat foglen i ett kabinett; för det sednare var det nödvändigt att undersöka dess hushållning och lefnadssätt i den fria Naturen.

Många skattbara upplysningar hafva blifvit mig meddelade af Vetenskapens Vänner och Idkare i Fäderneslandet; många har jag samlat under resor och excursioner. Då jag derföre nu framlägger en kort berättelse om de hjelpredor jag haft, samt de resor jag anställt för att samla materialier till närvarande arbete, så får jag äfven tillfälle att offentligt ådaga-lägga min tacksamhet och förbindelse till de Herrar, hvilka af nit för Vetenskapen lemnat mig upplysande och lärorika bidrag.

Redan före utgifvandet af *Ornithologia Svecica*, hade jag undersökt de Ornithologiska Samlingarne i Lund, Stockholm och Upsala, samt det utmärkt rika Paykullska Museum på Wallox-Säby i Upland, hvilket sedermera blifvit flyttadt till Stockholm. Jag hade i dessa Muséer haft tillfälle att granska Originalerna till flera figurer och beskrifningar, som af Sveriges äldre Ornithologer blifvit publicerade och af utländska omtvistade. Äfven hade jag haft den förmånen att i Stockholm få rådfråga det berömda Rudbeckska planche-verket öfver Svenska foglar, hvilket Linné i sin *Fauna* ofta citerat, och af hvars figurer han någon gång tagit sina beskrifningar *). Till Leches otryckta anteckningar öfver Svenska foglar hade jag äfven haft tillgång.

Sedan första Delen af *Ornithologia Svecica* var färdig skrifven och manuseriptet sändt till Förläggaren, företog jag i April 1816 åt den högre Norden en Naturhistorisk resa, hvars hufvudändamål var Ornithologiskt. Genom Halland och Bohuslän togs vägen åt Norrige. Från Christiania öfver Hedemarken och genom Guldbbrandsdalen anlände jag till Dowresfjäll i slutet af Maji. Härifrån fortsattes resan i början af Juni genom Guledalen till Trondhjem, samt vidare landtvägen genom Wärdalen, Stördalen o. s. v. till Årgård. Här togs båt, hvori resan fortsattes uppåt kusten, dels inåt fjärderna dels utåt öarna i Hel-

* Öfver detta för vår *Fauna*, och isynnerhet för Linnéanska synonymien högst märkvärdiga verk, har i K. Vetensk. Acad:s Handlingar för år 1816 och 1817 blifvit infördt ett Register med kritiska anmärkningar.

gelands och Saltens fögderier ända till Bodön, hvarifrån återresan börjades mot slutet af Augusti, då en annan segelled än under uppresan togs till Trondhjem, der jag inträffade i början af Oktober. En stor del af de fjäll, så väl inom som utom polcirkeln, hvilka lågo nära min väg, hade jag bestigit, isynnerhet för att undersöka de på dem boende foglar i deras egentliga hemort. — Från Trondhjem togs vägen öfver Rörås och Öresundsvandet till Funneshals tull i Herjedalen, samt vidare genom nämnde provins, Dalarna, Westmannland o. s. v. till Stockholm och Upsala, der Muséerna åter besöktes. I Mars 1817 återkom jag till Lund. Jag emottog då första Delen af Ornithologia Svecica som redan var färdig; men det ark som innehöll beskrifning öfver Riporna lät jag, före uspridandet af boken, omtryckta, emedan jag haft tillfälle ätt noggrannare utreda dessa foglars historia.

Utom nämnde Resa, har jag under hvarje sommar sedan 1814 gjort mer eller mindre vidlyftiga resor för min vetenskap. Under dessa har jag antingen en eller flere gånger besökt följande landskap: Småland, Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland, Öland, Nerike, Södermanland, Upland. Dock har jag mest undersökt Skåne, min födelsebygd der jag tillbringat min mesta tid. Under alla dessa resor har jag antecknat det anmärkningsvärda jag träffat, äfven rörande foglarnes hushållning, och dessa anteckningar hafva isynnerhet legat till grund för de i närvarande Arbeta meddelade underrättelser öfver hvarje foglarts vistelseort, lefnadssätt m. m.

Alla Ornithologiska Muséer i Sverige och de fleste Kabinetter har jag bevistat och granskat. De hafva med utmärkt godhet för mig blifvit öppnade af deras Ägare eller Föreståndare. Isynnerhet bör jag i detta afseende med tacksamhet nämna: Herr Hofmarskalken och Riddaren, Baron G. von PAYKULL, hvars förträffliga Museum på Wallox - Säby, jag flera gånger fått begagna; Herr Professorn och Commenduren C. P. THUNBERG i Upsala, genom hvars godhet jag flera gånger fått besöka dess eget och Kgl. Academiens rikhaltiga Museum; Herr Professorn Dr DALMAN i Stockholm, som vänskapsfullt låtit mig för jämförelse granska Kgl. Wettenskaps Academiens fogelsamling; Herr Hofmarskalken Baron-GYLLENKROK, hvars vackra Kabinett på Björnstorp jag äfven fått bese.

Dessutom har jag fått granska *Grillska Museum* på Söderforss (som lyser många ganska märkvärdiga foglar); Herr Prof. FALLÉNS fogelsamling i Lund; Herr ASPEGRENS i Carlskrona, och Herr Doctor SCHAGERSTRÖMS i Landskrona.

Hans Excellence m. m. Herr Grefven TROLLE WACHTNEISTER har under en längre tid fortsatt att gunstigt meddela mig interessanta Ornithologiska iakttagelser och H. E. har äfven sändt mig mången mindre allmän fogelart. Också hafva sällsyntare foglar eller ornithologiska anmärkningar blifvit mig meddelade af Herr Hof-Jägmästaren STRÖM och Herr Profess. A. RETZIUS (Sonen) i Stockholm; Herr Öfver-Jägmästaren H. FALK, Herr Doctor HÖGBERG och Herr Bruksförvaltaren LINDQVIST i Wermeland; Herr

Doctor BERGMAN i Dalarna; Herr Rector BACKMAN i Jemtland; Herr Brukspatron W. HISINGER i Westmanland; Herr Lieutenant BOHEMAN, Herr Landskamrerer. och Riddaren S. INGM. LJUNGH i Småland; Herr SAM. SCHRÖDER i Blekinge; Herr Kammarherren Baron SCHWERIN, Herrar Grefvarne CARL och CHRISTIAN DÜCKER, H:r Mag. A. CRONSHOE, H:r Mag. B. FRIES, H:r Mag. SUNDEWALL, Herr PETERSSON, H:r CARLSTRÖM m. fl. i Skåne.

För att göra denna Handbok så fullständig som ändamålet fordrade, har jag ansett det ej blott för tillåtet utan äfven för pligt, att begagna godkända Författares uppgifter. Några af de meddelade underrättelserne om foglarnes nästen, samt om antalet och färgen af äggen, äro hämtade hos en eller annan af de citerade Författarne. Men rörande foglarnes vistelseort, lefnadssätt m. m. har jag sällan anfört något, som jag ej genom egen erfarenhet kunnat bevittna, och ingen enda fogelart är af mig i Fauna upptagen, som jag ej haft tillfälle att sjelf undersöka och efter Naturen beskrifva. Det jag funnit mest öfverensstämmande med Naturen har jag anfört, antingen det öfverensstämde med det som andra Författare sagt eller stridde deremot. Jag har undvikit alla sårande angrepp, då andras uppgifter ej instämde med min erfarenhet. Verkeliga fel har jag anmärkt utan sidohugg och utan smädelse. Der jag utan skäl blifvit angripen, har jag frimodigt försvarat mig; der jag i förra upplagan begått misstag, har jag i denna erkänt och rättat dem. Att jag besvarat Herr Temmincks ej sällan ganska obilliga anmärkningar, har

endast skett för sakens och sanningens skull. Då min bok sannolikt kommer att läsas af många bland dem som äfven äga hans; så är det billigt att de sättas i tillfälle att se saken från olika synpunkter för att derigenom slutligen finna det rätta.

Många goda och viktiga bidrag till Fäderneslandets Ornithologi hafva tid efter annan af Svenska Författare blifvit meddelade i *K. Wetenskaps Academiens Handlingar*, och i *Acta Upsaliensia*. Bland dessa utmärka sig isynnerhet de monographier och anteckningar som blifvit lemnade af H. E. Herr Grefven TR. WACHTMEISTER, Herr Prof. Dr ÖDMANN och Herr Dr TENGMALM, m. fl. Dessa skrifter har jag vid författandet af närvarande arbete äfven rådfrågat.

I synonymien har jag likväl sökt att undvika en onödig vidlyftighet. LINNÉs *Fauna Svecica* har jag trott mig böra öfver allt citera, emedan LINNÉ var den förste som beskrifvit och bringat i system Sveriges foglar. Min *Ornithologia Svecica* har jag äfven funnit nödigt att alltid anföra, för att visa identiteten af de arter jag der beskrifvit, med de här uppräknade. RETZII edition af LINNÉs *Fauna Svecica* har jag också vid de flesta arter citerat. Att denna edition innehåller långt flera Arter än LINNÉs, det ser hvar och en; och att den med flit och skarpsinnighet är utarbetad, det finner man isynnerhet då man vet att Författaren ej sällan saknade tillfälle att själf granska och efter Naturen beskrifva de arter han måste införa. Men den som endast känner denne odödlige Lärde som Ornitholog, känner isanning blott en ringa del af hans förtjenster.

Efter utgifvandet af Ornithologia Svecica och efter inhämtandet af de upplysningar jag kunnat samla under min resa åt den högre Norden, hafva ett par för Nordens Ornithologi ganska viktiga Skrifter blifvit publicerade; neml. H:r FR. FABERS *Prodromus der Isländischen Ornithologie*, och H:r F. BOIES *Reise durch Norwegen* 1817. Den förra innehåller många nya och förträffeliga iakttagelser, isynnerhet rörande Vattenfoglarna, som jag i nästa Band kommer att beskrifva. Den sednare lemnar en mängd högst interessanta bidrag till en närmare kännedom af den högre Nordens foglar. Författarens Broder H:r D:r H. Boie som redigerat Resebeskrifningen, har äfven riktat den med upplysande Noter Med en skarpsinnighet som utmärker den sanne Forskaren, har Författaren beskrifvit flera förut mindre kända Foglars hemseder och hushållning, och med en urskillning som förråder den grundlige Kännaren, har han såsom nytt anført endast det nya, såsom bekant hänvist till det redan kända, och således gjort hvar man rätt. Den Resebeskrifning skall med nöje läsas af hvarje bildad Man, och isynnerhet värderas af hvarje praktisk Ornitholog.

Äfven förekomma, i H:r Prof. J. W. Zetterstedts *Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker* 1821, en hel hop ornithologiska uppgifter antecknade, hvilka jag äfven citerat så ofta de äga någon slags märkvärdighet.

Anmärkning: Herr Zetterstedt har, i N:r:is 119 och 125 af Stockholms Posten för förledit år, infört en så kallad Antikritik mot en anonym Referent, som i ett föregående Blad af samma Tidning anmärkt att H:r Zett.

utan skäl och på ett opassande sätt tadlat ett ställe i 1:sta Delen af min Skandin. Fauna. I stället för att grundligt vederlägga den anonyme Författarens förebråelser, har Hr Z. behagat isynnerhet rigta sin antikritik mot mig och mina vetenskapliga arbeten, samt författa den i en ton som förräder mer animositet, än som synes kunna förenas med nit för sanning och billighet. Om någon till Hr Z:s ursäkt vill anföra att han af den anonyme Referenten varit angripen och att detta angrepp berättigat honom till den förolämpande ton han tagit; så torde man få fråga hvem som berättigat Hr Z. att förut i sin Resa angripa min Fauna, isynnerhet då han ej kunnat, eller troligare ej velat läsa rätt innantill, innan han företog sig att kritisera? Det ställe han anmärkt såsom felaktigt, är det visserligen icke *); men om det ock hade varit ett misstag, så var det i sjelfva verket en småsak, som lätt kunnat rättas, utan att derigenom söka tillfälle till ett sidohugg. — Om någon tror att Hr Z. dermed velat hämnas ett föregående angrepp, så får jag härmed offentligt förklara att Hr Z:s vetenskapliga väg hittills varit så helt och hållet skild från min, att jag aldrig kunnat, om jag ock hade velat, nämna honom, än mindre tadla honom i mina skrifter. Jag har aldrig förr än i detta Arbeta låtit trycka ett enda ord hvarken om eller mot Hr Z. — Naturforskningens fällt än gränslöst; det är tillräckligt för alla, utan att den ena behöfver stöta emot eller förolämpa den andra. Dessutom måste det rena nöje som kan hämtas

*) Jag har aldrig bestridit och vill icke bestrida riktigheten af Hr Z:s uppgift rörande Renens mjölkkvantitet, men jag kan därför icke medgifva att min uppgift är felaktig; ty begge stödja sig på mångårig erfarenhet af Män som länge bott i Lappland. Den uppgift som Hr Z. fått under sin resa, instämmer ungefär med den som Hr Hollstén meddelat i sin Afhandling om Renen, införd i Vet. Acad. Handl. för år 1774, och hvilken afhandling jag äfven i Fauna citerat. Att jag likväl i beskrifningen öfver Renen anförde Hr Grapes uppgift, meddelad i samma Acad:s Handlingar för år 1804, kom ej blott deraf att den var skriven 30 år sednare än Hollsténs, utan isynnerhet deraf att den öfverensstämde med de underrättelser jag fått under min resa i Norden. Om man därför är billig och ej ensidigt och egenkärt nekar andras erfarenhet, därför att den ej fullkomligt instämmer med den man sjelf har; så torde man kunna inse att mjölkkvantiteten hos Renen, liksom hos Kon och andra tama djur, kan vara mycket olika efter olika individer och i olika trakter.

af Naturens undersökning derigenom förhållas; och jag vet icke om den angripande är i en lyckigare sinnesstämning än den angripne. Kan Hr Z. uträtta något godt och nyttigt på Naturforskningens bana, så ländar det honom säkert till heder och nöje. Men det han hittills uträttat och kundgjort gör honom visserligen icke berättigad att föra ett sådant språk, som det han tillåtit sig i den nämnda Antikritiken. De insidiösa insinuationer som deri på flera ställen förekomma, underlåter jag att besvara; ty det svar de förtjena, passar ej med tendensen af närvarande Skrift. Men då Hr Z. gör så mycket väsende af sina i Resan meddelade ornithologiska upptäckter och iakttagelser, hvarigenom de i en lättrogen Compilerars händer möjligen kunde åstadkomma ny oreda och förvirring i vår Fauna; så torde den upplyste Läsaren finna det billigt att jag här mönstrar dem något strängare, än jag eljest skulle hafva gjort.

Hr Z. uppräknar i sin Antikritik en lång rad af foglar vid hvilka han påstår sig hafva gjort nya iakttagelser. "Om de iakttagelser i sin vidd", yttrar sig Hr Z., "hvilka jag anført om Lapps katan etc. etc. . . lunnar o. fl. blifvit gjorda förut och i tryckta skrifter anförda, så har ägaren till dessa skrifter varit om dem alltför jaloux (?*), ty till allmänhetens eller min kännedom äro de visserligen icke komna". Om Hr Zett. likväl behagar öppna blott de allmännaste ornithologiska skrifter, hvilka nästan alla finnas på härvarande Kgl. Academiens Bibliothek, och hvilka ingen som gör anspråk på Ornithologisk kunskap kan ignorera, t. ex. en Pennants, Lathams, Pallas's, Bechsteins, Meyers, Temmincks m. fl:s; så skall Hr Z. till sin förvåning finna, att de iakttagelser han åberopar som nya, redan voro gjorda långt innan Hr Z. företog sin resa; ja en del af dem tillhöra så gammal dato att de redan voro beskrifna innan Hr Z. blef född, ehuru gammal han än säger sig vara. Dessa iakttagelser hade således visserligen kommit till Allmänhetens, om ock icke till Hr Zett:s kännedom. Att i en Resebeskrifning införa så bekanta saker, var likväl blott öfverflödigt; men det blef felaktigt då Hr Z. utgaf dem för nya och åberopade dem såsom viktiga bidrag till vår Fauna. Med undantag af Tallbitens (Sk. Fn. p. 360) ägg, som Hr Z. beskrifvit, och hvaraf man förut

*) Hvad vill det säga? Äro skrifterna tryckta, som Hr Z. ganska riktigt gissar, så har ju äfven Hr Z. kunnat bli ägare till dem! —

Blott hade beskrifvit en utblekt hvit varietet (churu man länge vetat att nämde fogel fortplantar sig så väl i Lapp-land, som i Skottland, Ryssland, Siberien, Norra Amerika o. s. v.), finnes ingen ny iakttagelse af värde antecknad, rörande någon enda af de på anförda ställe i antikritiken uppräknade foglar. Man kände äfven nämde foglars vistelseort, lika så väl förut som efteråt. Deremot är det lätt att ur Hr Zets resa uppräknade en lång rad af grofva misstag, som visa huru varsam man bör vara vid bokens begagnande, om man vill undvika att deraf missledas. Äfven då Hr Zett. vid beskrifningen af sistnämde fogel, yttrar sig att vid boet träffas stundom honan röd; så är denna uppgift så äfventyrlig att om den ej genast bestrides utan blott betyffas, så sker det endast af ren höflighet.

Att begå sådana misstag som t. e. att förblanda *Falco Lagopus* som är en Vråk med *Falco naevius* som är en Örn; att påstå det *Sylvia Svecica* endast tillhör den högre Norden, churu hon åtminstone 300 år varit bekant som en invånare äfven af det södra Europas bergstrakter; att försäkra det *Saxicola Oenanthe* upphör långt innan trädgränsen, churu hon förekommer nästan på alla höga fjäll i Norden; att uppgifva Nordmalings socken i Vesterbotten som första stationen i Norden der Vildgäss öfversomra och lägga ägg, churu det är bekant att Vildgäss årligen öfversomra och lägga ägg ända ned i Småland, ja till och med i Blekinge och Skåne; att af den inunder hvita och den öfver allt mörka varieteten af *Lestris parasitica* göra två arter och föra den ena till *Lestris catarractes* *); att låta *Uria Grylle* i 3:de eller 4:da året erhålla en ren svart färg som hon sedermera bibehåller; att förblanda en ung Fjällracka (*Canis Lagopus* Lin.) med Svarta Räfven (*Canis nigro-argenteus* N.); att låta den minsta storm skrämma Hvalfisken så att han går ned (under vattenytan) och uppkommer icke så länge stormen räcker, churu Hvalfisken såsom Däggande djur, hvilket andas med lungor, måste hvar 5:te — 10:de minut upp för att draga andan, ehvad det är storm eller stilla luft; att ideligen yttra fruktan för de vilda djuren, hvilka han dock som resande Zoolog just borde söka; att genom berättelsen om en Björn som uppehöll sig i orten, låta skrämma sig från att göra excursionser etc. etc. etc., förräder verkligen sammanlagdt ej de fram-

*) Den rätta *Lestris catarractes* är så stor som en af de större Måsarne och kan aldrig jämföras i storlek med Tärnan (*Sterna hirundo*).

steg i Nordens Ornithologi och Mastologi, hvilka man bordt vänta hos den, som genom en syllogism söker bevisa att ingen bör befatta sig med att skrifva en Skandinavisk Fauna, förr än han eller någon annan förut skrifvit en Lappsk.

Herr Z. försäkrar oss att han åt Sveriges Fauna af dess högre och skönaste djurklass upptäckt och i resan infört 2:ne nya arter m. m. Förmodligen menar Hr Z. de två i dess bok beskrifna och figurerade foglarne: *Parus sibiricus*, Gmel. (Skand. Fn. p. 284) och *Emberiza rustica*, Pall. (Skand. Fn. p. 308). Huru det förhåller sig med upptäckten af dessa foglar, finner man på de anförda ställen i denna Handbok. Hr Z. tillkommer det likväl att hafva oriktigt benämnt dem begge och äfven att hafva illa beskrifvit den sistnämde. Den som ej ser sjelfva foglen utan blott Hr Z:s beskrifning, skall svårligen deri igenkänna Pallas's *Emb. rustica*; men den som jemför foglen med Pallas's beskrifning, kan ej betvifla identiteten. Troligen är Hr Zetts misstag redan bringadt i omlopp; det är derföre så mycket viktigare att det här rättas.

Vidare citerar Hr Z. de ställen ur sin Resa, der han säger sig ha rättat misstag. Vi vilja följa hans anvisning och närmare granska dem: 1 Del. sid. 243. not. Här läser man att Temminck har orätt då han angifver *Svenskans* ägg hvita; ty Hr Z. fann fläckiga ägg af denna fogel. Men hvar och en som vet huru fogelägg variera, inser lätt att ifrågavarande fogelart, liksom många andra, kan lägga både fläckiga och ofläckade samt för öfrigt mer eller mindre färglösa ägg. Har icke just Hr Z. sjelf i 1 Del. sid. 257 anført att *Sylvia svecica* har än fläckiga än enfärgade ägg; och har han icke i 2. Del. sid. 67 uppgifvit ofläckade ägg till *Turdus pilaris* som eljest har dem fläckiga, samt i noten till samma sida yttrat (ehuru föga sannolikt) att fläckarna på denna fogels ägg — hvilka nästan alltid finnas — ”torde vara tillfälliga”. Huru kan han då här så bestämdt neka att just det samma torde vara händelsen med *Svenskans*! Hr Z. torde alltid göra bäst att blott anföra sin egen erfarenhet, utan att derföre så positift neka andras. — Sid. 256 not. Här anmärkes den uppgiften vara allt för öfverdrifven att sången af *Sylvia svecica* i lugnt väder höres nära en mil. Denna anmärkning var det barnsligt att göra, och ännu barnsligare att åberopa den som en vigtig rättelse af misstag i Ornithologien. Hvilken Ornitholog skulle väl i våra dagar låta förleda sig att tro, det en liten fogel ej större än en vanlig Rödstjert hade en röst som kunde höras nära en mil. Sid. 257. not. Här påstår Hr Z. att

de författare som uppgifva att *Sylvia svecica* bygger i buskar och hål, ej sett förhållandet i Naturen. Då nu likväl Hr Z. fått veta att den fogel han trott endast tillhöra den högre orden, verkligen finnes kringstridd nästan öfver hela Europa, och att den både förekommer och fortplantar sig till och med i graunskapet af de Ornithologers boningar, hvilkas uppgift Hr Z. vill bestrida; så torde han ålertaga sin beskyllning mot dem, att de ej sett hvad de dock sjelfva påstå sig hafva erfårit. — Således hafva vi graunskat de misstag Hr Z. påstår sig hafva rättat, utan att bland dem kunna upptäcka några misstag som behöfde rättas, om ej just de misstag som finnas i sjelfva rättelserna.

Här slutar jag mina anmärkningar, ehuru jag kunde ha åtskilligt att tillägga. Om de äro mindre angenäma för Hr Z., så må han beslutta att han sjelf nödgat mig till dem genom sitt anfall mot mig i en allmän Tidning. Jag vill blott råda Hr Z. att aldrig onödigtvis angripa någon eller att inlåta sig i en vetenskaplig strid, isynnerhet om han ej i den kan bruka andra vapen än dem han använt i sin antikritik.

Anvisning att uppstoppa och förvara Foglar i en Samling.

Man väljer vackra och fullfjädrade exemplar, så framt arten ej är mycket sällsynt, då man ej bör förkasta mindre vackra individer. De foglar som äro fångade eller fälda med puströr, äro tjenligare till uppstoppning än de som äro skjutna med hagel. Dock kan man ofta förekomma att ej de foglar, som man skjuter för att uppstoppa, blifva blodiga på fjädrarna. Man skjuter dem med så fina hagel som möjligen ske kan. Den nyss skjutna foglen bär man så länge i näbben eller i ett ben, tills blodet stelnat; derefter gör man en strut af papper hvari man nedsätter honom (om det är en mindre fogel) samt lägger honom löst öfverst i skjutvätskan så att han ej kramas. Lägger man genast ned honom, eller kramar honom innan blodet stelnat, så klibba fjädrarne i blodet,

som utpressas ur såren, och få blodfläckar. Om blod utkommer på fjädrarne genast då foglen är fälld, så beströr man det med torkande pulver, eller i brist deraf med torr sand eller torr jord, samt bär honom fritt tills blodet stelnat.

Den fogel af hvilken man vill taga skinnet för att uppstoppa, lägger man framför sig på ett bord e. d. så att hufvudet är vändt åt vänstra och stjerten åt högra sidan, samt bröstet uppåt. Man skiljer fjädrarna och gör ett snitt genom huden från bröstbenets början till stjerten. Derefter lossar man huden från köttet, afskär det så kallade lårbenet i öfra leden, affår huden ned öfver det så kallade knäet samt borttager allt köttet från lårbenet. På samma sätt fortfar man på andra sidan. Derefter afskär man gumpbenet, och flår sedan skinnet öfver ryggen upp till vingarna. De större foglarna hängas härvid i ett snöre; de mindre håller man i handen. Vinghnen afskäras i den led som är närmast kroppen (mellan scapula och os humeri) och huden drages öfver halsen och hufvudet ända fram öfver ögonen, hvilka med en spetsig hake uttagas bakom den framlagda huden. Derefter afskäres halsen tätt vid nacken. Nackhålet utvidgas och hjernan uttages. Tungan jemte allt köttet i gomen och på käkarna bortskäres noga och alla dessa delar ingnidas väl med den salfva som nedanföre beskrifves. Sedan fyllas ögonhålen med bomull, och man gör af blånor en tapp, litet tjockare än foglens naturliga hals, samt något längre. Denna tapp instickes med ena ändan genom nackhålet i hufvudskålen, och för att så mycket säkrare fästa honom, klyfver man honom i ändan och låter en del deraf utgå genom hvardera ögonhålet. Derefter stryker man huden åter tillbaka öfver hufvudet och halsen samt lägger alla fjädrarna val i ordning på de nämnda delarna. Vingarna rensar man från allt kött. Första vingbenet (os humeri) är lätt att rensa; ty man kan lätt flå huden öfver ända till nästa led; men för att befria de två derpå följande benen från muskler, måste man på vingens undre sida göra ett

långsgående snitt genom huden, och derigenom uttaga allt köttet samt ingnida salfvan.

Vill man ej vidare uppstoppa sin fogel, utan t. c. bortskicka honom innan han uppstoppas; så lägger man blott en tapp blånor i huden i stället för kroppen; man lägger vingarna böjda i naturlig ställning till kroppen, samt alla fjädrarne i riktig ordning, och låter foglen några dagar torkas i luften, hvarefter han kan inpackas i blånor i en låda c. d. och transporteras.

Då man flår en fogel bör man hafva vid handen ett pulver af krita och bränd alun att dermed beströ det blodiga köttet, så att ej fjädrarna klibba deri och smutsas. Sedan skinnet är aftagit, ingnides det väl öfver allt på inre sidan med följande salfva, som är det bästa förvaringsmedel man hittills känner mot mal och andra insekter:

Rec.	Osläckt Kalk	I	uns.
Sönderrifven	hvit Tvål	—	IV uns.
Pulveriserad	hvit Arsenik	IV	uns.
Potaska	—	IV	uns.
Campfert	—	I	uns.

Campferten upplöses i Spiritus vini; Arseniken fuktas med några droppar vatten, för att ej damma. Alla Species pulveriseras särskilt och hopblandas der-
 efter noga, till en massa som bör likna smör, och som man förvarar i slutna kärl der hon efter hand blir hård. Då man skall bruka henne, upplöser man litet i spir. vini eller brännvin och påstryker det med en hårpensel.

De foglar och Däggande djur, som med denna salfva äro väl präparerade, angripas aldrig af mal eller andra insekter. Men man bör varsamt handtera henne; ty hon är ganska giftig.

Vill man genast uppstoppa sin fogel, sedan man på förutnämnda sätt aftagit skinnet; så hopvrider man af blånor en fast tapp ungefär af samma storlek och form som foglens kropp, inlägger denna tapp

i huden, och fyllar med lösa blånor der ännu något tomt rum finnes; äfven snos blånor kring lårbenen och öfverarmbenen. Derefter lägges huden öfver, och snittet från bröstet till stjerten sys tillhopa med fin tråd. Sedan spetsar man två ståltrådar af hvilka man sticker en i hvart ben, så att han går upp genom fotsålan under huden längs benet och låret samt upp i kroppen så långt att han får säkert fäste. En del af ståltråden lemnar man qvar under fotsålan och med denna del fästar man foglen på ett bräde eller en ställning. Från hjessan längs genom halsen nedför man en annan tillspetsad ståltråd som man äfven fästar i kroppen. Vingarna fästas genom en ståltråd som man låter gå in genom den ena vingen och ut genom den andra. Derefter gifver man foglen den ställning man behagar, lägger alla fjädrarna väl i ordning och ombinder vingarna med band, samt fästar papper med knappnålar på de fjädrar som stå upp. — Sedan foglen har den form och hvarje fjäder det läge man önskar, torkar man honom småningom i luften och derefter i torkugn. Derefter insätts ögon af glas på hvars inre sida ögonringen är målad. Banden aftagas; ståltrådarnas utstående ändar afklippas, och foglen är fardig. De på detta sätt uppstoppade foglar uppställas i systematisk ordning i lådor med hvitt glas för främre sidan. Vid hvarje fogel sätter man ett nummer och i katalogen antecknar man dess namn, och kön, samt årstiden då foglen blifvit dödad.

De Skandinaviska Foglarnas Indelning.

FÖRSTA AFDELNINGEN.

LANDTFOGLAR:

*Tårna klufna och benen fjädertäckta åtminstone
nedom knäleden.*

FÖRSTA ORDNINGEN.

Roffoglar. (Raptatores).

*Fötterna ha tre tår framåt, en bakåt; den yttersta framtån förenad med den medlersta genom en hud vid tår-roten, eller ock vändbar.
Klorna starka, krökta, spetsiga.*

Näbben tjock och stark, kort eller medelmåttig, vid roten klädd med näbbhud och i spetsen krökt till hake.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

Hökartade Roffoglar. (Raptatores accipitrini).

1:sta Släktet: Falkar, *Falco*, Linn.)

a) Ädelfalkar. (*Falco*, Cuv.)

- 1 *Falco Islandicus*, Lath.
- 2 — *Lanarius*, Lin.
- 3 — *peregrinus*, Lath.
- 4 — *Subbuteo*, Lin.
- 5 — *Lithofalco*, Gmel.
- 6 — *Tinnunculus*, Lin.

b) Hökar. (Astur, Bechst.)

- 7 Falco palumbarius, Lin.
8 — Nisus, Lin.

c) Örnar, (Aquila, Briss.)

- 9 — Chrysaëtos, Lin.
10 — nævius, Gmel.
11 — Albicilla, Lin.
12 — leucocephalus, Lin.
13 — Haliætos, Lin.
14 — longipes, Nilss.

d) Glador. (Milvus, Bechst.)

- 15 — Milvus, Lin.

e) Vråkar. (Buteo, Bechst.)

- 16 — Buteo, Lin.
17 — Apivorus, Lin.
18 — Lagopus, Brünn.

f) Kärrhökar. (Circus, Bechst.)

- 19 — rufus och æruginosus, Lath.
20 — strigiceps, Nilss. (f. cyaneus et pygargus, Linn.)

ANDRA UNDERORDNINGEN:

Ugleartade Roffoglar. (Raptatores strigini).

2:dra Slägtet: Ugglor: (Strix, Lin.)

1. Egentliga Ugglor. (Strix, N.)

a) Dagugglor. (Surnia).

- 21 Strix Nyctea, Lin.
22 — Ulula Lin. Str. funerea, Lath.
23 — psilodactyla, Nilss.
24 — passerina, Lin.

b) Nattugglor. (Noctua).

- 25 Strix Lapponica, Sparrm.
 26 — liturata, Thunb. et Retz.
 27 — Aluco, Linn.
 28 — funerea, Linn. St. Tengmalmi, Gmel.

2. Ufvar. (Bubo).

- 29 — Bubo, Linn.
 30 — Otus, Linn.
 31 — brachyotos, Lath.

ANDRA ORDNINGEN.

Gångfoglar. (Ambulatores).

Fötterna hafva tre tår framåt, en bakåt; fram-
 tårna alldeles klufna, eller ock den yttersta vid
 roten hopvuxen med den medlersta.

Näbben af åtskillig form; vid roten bar.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN:

Haknäbbar. (Incisirostres).

1:sta Familien: Tjocknäbbar. (Crassiro-
 stres) eller Kråkfoglar. (Coraces).

3:dje Slägtet: Korpar. (Corvus, Linn.)

- 32 Corvus Corax, Lin.
 33 — Corone, Lin.
 34 — Cornix, Lin.
 35 — frugilegus, Lin.
 36 — Monedula, Lin.
 37 — Pica, Lin.

4:de Slägtet: Skrikor. (Garrulus,
 Briss. et Cuv.)

- 38 Garrulus infaustus. Corvus infaustus, Lin.
 39 — glandarius. Corvus glandarius, Lin.

5:te Slägtet: Törnskator. (Lanius, L.)

- 40 Lanius Excubitor, Lin.
 41 — Collurio, Lin.

6:te Slägtet: Blåkråkor. (Coracias, L.)

- 42 Coracias Garrula, Lin.

7:de Slägtet: Gyllingar: (Oriolus, L.)

43 Oriolus Galbula, Lin.)

8:de Slägtet: Sidensvansar. (Ampelis, Lin.)

44 Ampelis Garrulus, Lin.

2:dra Familien: Tunn-Näbbbar. (Tenuirostres) eller Sångfoglar, (Canori).

9:de Slägtet: Flugsnappare, (Muscicapa, Linn.)

45 Muscicapa Grisola, Lin. Syst. — Motacilla Ficedula, Lin. Fn.

46 — atricapilla, Lin.

10:de Slägtet: Sqvättor. (Saxicola, B.)

47 Saxicola Oenanthe, Mey.

48 — Rubetra, Mey.

11:te Slägtet: Sångare. (Sylvia, Lath. Motacilla, Lin.)

a) Egentliga Sångare. (Curruca B.)

50 Sylvia Luscinia, Lath.

51 — Philomela, Bechst.

52 — Nisoria, Bechst.

53 — atricapilla, Lath.

54 — hortensis, Bechst. Motacilla salicaria, Lin. Fn.

55 — cinerea, Lath. Motac. Sylvia, Lin.

56 — curruca, Lath. Motac. curruca, Lin.

b) Qvickstjertar. (Ficedula, Bechst.)

57 — Rubecula, Lath. Motac. Rub. L.

58 — Svecica, Lath. Mot. Svec. L.

59 — Phoenicurus, Lath.

60 — Tithys, Lath.

c) Löfsångare. (Asilus, Bechst.)

61 — Hippolais, Lath.

62 — Sibilatrix, Bechst.

63 — Trochilus, Lath.

64 — rufa, Lath.

65 — Regulus, Lath.

d) Kärrensångare. (Calamodytæ, Mey.)

66 Sylvia Schœnobæus, Nilss. (Motac. Schœnobæus, Lin.)

67 — arundinacea, Lath.

e) Gårdsmygar. (Troglodytes, Mey.)

68 — Troglodytes, Lath.

13:de Släktet: Trastar. (Turdus, Lin.)

69 Turdus viscivorus, Lin.

70 — pilaris, Lin.

71 — musicus, Lin.

72 — iliacus, Lin.

73 — torquatus, Lin.

74 — Merula, Lin.

75 — roseus, Lin.

14:de Släktet: Strömstarar. (Cinclus, B.)

76 Cinclus aquaticus, Bechst.

15:de Släktet: Årlor. (Motacilla, Lath.)

77 Motacilla alba, Lin.

78 — flava, Lin.

16:de Släktet: Piplärkor. (Anthus, B.)

79 Anthus rupestris, Nilss.

80 — pratensis, Bechst. Alauda pratensis, Lin.

81 — arboreus, B. Al. trivialis, Lath.

82 — campestris, B. Al. novalium, Frisch.

ANDRA UNDERORDNINGEN:

Helnäbbar. (Integrirostris).

1:sta Familien Kegelnäbbar.
(Conirostres).

1:sta Tribus: Korta Kegelnäbbar.
(Brevicones) eller Sparffoglar, (Passerini).

17:de Släktet: Lärkor, (Alauda, Lin.)

83 Alauda arvensis, Lin.

84 — arborea, Lin.

18:de Släktet: Mesar. (Parus, Lin.)

85 Parus major, Lin.

86 — ater, Lin.

- 87 *Parus cristatus*, Lin.
 88 — *sibiricus*, Gmel.
 89 — *palustris*, Lin.
 90 — *cœruleus*, Lin.
 91 — *cyaneus*, Pall.
 92 — *caudatus*, Linn.

19:de Slägtet: Sparfvar. (*Emberiza*, Lin.)

- 93 *Emberiza miliaria*, Lin.
 94 — *citrinella*, Lin.
 95 — *hortulana*, Lin.
 96 — *Schœniolus*, Lin.
 97 — *rustica*, Pall.
 98 — *nivalis*, Lin.
 99 — *lapponica*, Qvens.

20:de Slägtet: Finkar. (*Fringilla*, Illig.)

a) Stenknäckar. (*Coccothraustes*).

- 100 *Fringilla Coccothraustes*, Ill. *Loxia cocc.* Lin.
 101 — *domestica*, Lin.
 102 — *montana*, Lin.
 103 — *chloris*, Mey. *Loxia chloris*, Lin.

b) Finkar.

- 104 — *Cœlebs*, Lin.
 105 — *montifringilla*, Lin.
 106 — *nivalis*, Lin.
 107 — *cannabina*, Lin.
 108 — *flavirostris*, Lin.

c) Siskor.

- 109 — *Linaria*, Lin.
 110 — *Spinus*, Lin.
 111 — *carduelis*, Lin.

21:sta Slägtet: Domherrar. (*Pyrrhula*, Briss.)

- 112 *Pyrrhula vulgaris*, Br. *Loxia pyrrh.* Lin.

22:dra Slägtet, Tallbitar, (*Corythus*, C.)

113. *Corythus Enucleator*, — *Loxia Enucl.* L.

23:dje Slägtet: Korsnäbbar, (*Loxia*, Br.)

- 114 *Loxia pythiopsittacus*, Bechst.
 115 — *curvirostra*, Lin.

2:dra Tribus: Långa Kegelnäb-
bar. (Longicones).

24:de Slägtet: Starar, (Sturnus, Lin.)

116 Sturnus vulgaris, Lin.

25:te Slägtet: Nötkrakor, (Caryo-
catactes, Gesn.)

117 Caryocatactes guttatus, Nilss. (Corvus Caryocat. Lin.)

26:te Slägtet: Nötväckor, (Sitta, Lin.)

118 Sitta Europæa, Lin.

2:dra Familien: Sylsnäbbar,
(Subulirostres).

27:de Slägtet: Trädkrypare, (Certhia L.)

119 Certhia familiaris, Lin.

28:de Slägtet: Härfoglar, (Upupa Lin.)

120 Upupa Epops, Lin.

29:de Slägtet: Biätare, (Merops Lin.)

121 Merops Apiaster, Lin.

3:dje Familien: Gapnäbbbar.
(Fissirostres).

30:de Slägtet: Svalor, (Hirundo, Lin.)

122 Hirundo rustica, Lin.

123 — urbica, Lin.

124 — riparia, Lin.

31:sta Slägtet: Tornsvalor, (Cypselus, Ll.)

125 Cypselus Apus — Hirundo Apus, Lin.

32:dra Slägtet: Nattskärror, Capri-
mulgus, Linn.)

126 Caprimulgus Europæus, Lin.

TREDJE ORDNINGEN:

Klättrare, (Scansores).

Fötterna ha två tår framåt och två bakåt rigtade; framtårna vid roten hopvuxna; baktårna alldeles skilda.

Näbben med hela käkkanter, dels rak, mångkantig eller trind; dels böjd och hoptryckt.

33:dje Slägtet: Hackspettar. (Picus, L.)

- 127 Picus Martius, Lin.
- 128 — viridis, Lin.
- 129 — canus, Gmel.
- 130 — leuconotus, Bechst.
- 131 — major, Lin.
- 132 — medius, Lin.
- 133 — minor, Lin.
- 134 — tridactylus, Lin.

34:de Slägtet: Göktytor. (Jynx, Lin.)

- 135 Jynx Torquilla, Lin.

35:te Slägtet: Gökar. (Cuculus, Lin.)

- 136 Cuculus canorus, Lin.
- 137 — rufus, Bechst.

FJERDE ORDNINGEN:

Hönsfoglar. (Gallinacei).

Fötterna hafva tre tår framåt en bakåt; framtårna vid roten förenade genom en hud (ej hopvuxna).

Näbben: öfverkäken hvälfd öfver underkäken, vid roten bar eller försedd med en uppsvälld, köttig hud hvari näsborrarna ligga.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN:

Egentliga Höns. (Gallinæ).

36:te Slägtet: Orrar. (Tetrao, Lin.)

- 138 Tetrao Urogallus, Lin.

139 Tetrao Tetrix, Lin.

Bastarder: 1) Tetrao Tx. Urogallides
Sv. Tjäderorren, Rackelhanen.
Tetr. hybridus, Lin. Mus.
Carlson. tab. 15.

2) Tetrao Tx. Lagopides, Sv.
Riporren, Mus. Carlson. tab. 65.
Orn. Svec. I. p. 303. var. ♂ et ♀
Vet. Acad. Handl. 1808, p.
195. t. 3. Boies Reise, Anh. p.
330.

3) Tetrao Tx. Bonasides
Exempl. i Grillska Mus.

140 Bonasia, Lin.

37:de Slägtet: Ripor. (Lagopus, Plin.)

141 Lagopus saliceti. Tetrao subalpinus, Nilss.

142 — rupestris. T. alpinus, Nilss.

38:de Slägtet: Rapphöns. (Perdix, Lath.)

143 Perdix cinerea Lath. Tetrao Perdix, Lin.

144 — Coturnix, Lath. Tetr. Coturnix, Lin.

ANDRA UNDERORDNINGEN:

Dufvor. (Columbæ.)

39:de Slägtet: Dufvor. (Columba, Lin.)

145 Columba Palumbus, Lin.

146 — Oenas, Lin.

Skandinaviens Foglar.

FÖRSTA AFDELNINGEN.

LANDTFOGLAR:

med klufna tår och fjädertäckta ben, åtminstone nedom höckelleden.

FÖRSTA ORDNINGEN.

Roffoglar. (Raptatores, Illig.)

Fötterna hafva tre tår framåt, en bakåt; den yttersta framtån förenad med den medlersta genom en hud vid roten, eller ock vändbar. Klorna starka, krökta, spetsiga.

Näbben tjock och stark, kort eller medelmåttig, vid roten klädd med näbbhud och i spetsen krökt till hake.

De till denna Ordning hörande foglar utmärka sig genom starka, krökta och spetsiga näbbar och klor. Det äro dessa mordvapen som göra dem så fruktansvärda för hela den öfriga fogelskaran, för de svagare bland Däggande djuren, Amphibierne och Fiskarne m. m. Hvad Roffdjuren äro i föregående klass, det äro Roffoglarna i denna.

Deras *Näbb*, som är något kortare än hufvudet, är stark och hoptryckt; öfverkäken är vid roten klädd med en hud, och i spetsen nedböjd i form af en spetsig hake. *Näsborrarna* äro öppna, än nakna, än täckta af framåt-liggande hårlika fjädrar. *Benen*, som alltid äro fjädertäckta nedom höckelleden, stundom ända till klorna, äro oftast ganska muskelfulla, och *Tarserne* *) äro vanligen korta och starka. *Tårna*, fyra till antalet, äro skilda (dock är den yttersta, hos de flesta, förenad med den medlersta genom en kort hud vid tår-roten, eller ock är, då denna hud saknas, ut-tån vändbar), på undre sidan knöliga och skråfliga, hvarigenom de desto lättare kunna fasthålla rofvet, samt väpnade med långa, starka, spetsiga och krökta klor.

Hjernan är, i förhållande till hela kroppsmassan, i allmänhet mindre än hos *Sångföglarne* och *Klättrarne*, men större än hos de flesta andra foglar. Deras yttre sinnen äro utbildade och skarpa. *Ögonen* äro stora och konvexa, och syn-nerven stor. *Öron-öppningen* är hos *Ugglorna* mycket stor, hos *Falkarne* äfven betydlig. *Näsborrarna* äro vanligen stora och öppna, och lukten fin. Känselfinnet tyckes vara koncentreradt i den nervfulla och känsliga hud (*cera*), som bekläder näbb-roten, isynnerhet hos *Falksläktet*.

*) Så kallas den delen af benet, som finnes mellan knäet (höckelleden) och tårna.

Deras *mage* är membranös och afsöndrar en magsalt, som i ordets egentliga bemärkelse *upplöser* *) det kött de förtära. Ingen *trituration*, eller gnidning af magens väggar mot hvarandra, äger här rum, som hos de växt-ätande, hvilkas mage derföre är mycket muskulös.

Deras kött är alldeles odugligt till föda för människan.

Roffoglarne utmärka sig i allmänhet genom mod och list. De äro icke så läraktiga som en del *Sångfoglar* och *Klättrare*, icke heller hafva de en så utmärkt konst-drift. Deras näste är aldrig med sådan skicklighet och konst sammansatt. Likväl äro de läraktigare än en stor del andra foglar, och de bygga dock alltid *något* bo.

De lefva alla af rof, — deraf deras namn. Graden af deras rofbegär, styrka och mod är väl ganska olika hos olika arter; men de komma dock alla deri öfverens att de helst lefva af djur som de sjelfva dödat **), och blott en del af dem tillgripa i

*) Detta bevises genom REAUMURS och SPALLANZANIS bekanta försök.

**) Att här blott är fråga om Skandinaviens Roffoglar, behöfver jag knapt erinra. I de varmare klimaten, der de lefvande varelserna äro talrikare, och de döda hastigare öfvergå till förruttnelse, finnas Roffoglar som lefva endast af döda djur och som synas vara af naturen bestämda att rensa landet från kadaver, hvilkas stinkande utdunstning snart skulle förpesta luften. I vårt kalla klimat behöfvas ej dessa naturens polis-be-

nödfall kadaver. Oftast lefva de af varmblodiga djur. Några föda sig dock hufvudsakligen af Fiskar och Amphibier, och några få förtära nästan endast Insekter.

Då tillfället medgifver äta de omåttligt, men de kunna också länge uthärda hunger. Med näbben uthugga de stycken af rofvet, hvilka de nedsvälja jemte hår, fjädrar och ben. Dessa till näring otjenliga ämnen kasta de sedan åter upp ur magen i form af bollar. De dricka ej vatten, ty blodet af de rof som de fälla, släcker deras törst.

Roffoglarna tycka om vilda och ödsliga trakter. De ströfva merendels ensamma omkring, och de lefva alla i engifte. De tillreda sitt bo bland otillgängliga klippor, i murar, i träd, högst sällan på marken, och antalet af deras ägg öfverstiger nästan aldrig fyra. Honorna äro alltid större än Hanarna; hos en del arter äro de en tredjedel större.

Man indelar Roffoglarne i två underordningar, nemligen:

tjenter; också finnas de här icke. Hr TEMMINCK, i Manuel d'Ornithologie, anförer väl äfven norra Europas berg såsom stamhåll för *Vultur fulvus*, Gmel., och *Pernopterus*, Linn.; men aldrig har någon Naturforskare, så vida jag känner, sett dessa foglar här; och om de blifvit lemnade med den uppgift att de kommit härifrån, så torde detta ha sin grund i ett misstag.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

Hökartade Roffoglar (Raptatores accipitrini, *Illig.*)

Hufvudet af meddelmåttig storlek, med ögonen rigtade åt sidorna.

Näbben ofvan vid roten klädd med en stor, naken, tjock och färgad hud, hvare näsborrarna ligga.

Tårna aldrig fjäderklädda; den innersta och bakre, äfven som deras klor, äro starkast, och den yttersta och medlersta äro vid roten förenade genom en hud *).

Fjäderbeklädningen är fast, pennorna hårda och styfva, flykten merendels hög och snabb.

Deras mage är nästan helt och hållet membranös; deras tarmkanal kort, deras blindtarmar ganska korta. Alla ben sakna merg och den i luftsäckarne innehållna luften intränger äfven i benens ihåligheter. Bröstbenet är stort, bredt och hvälfdt, antingen alldeles helt, eller blott försedt med ett par små hål vid bakre brädden; dess kam är mycket hög, stark och konvex, — allt detta för att åt de starka flygmusklerne gifva så mycket större utrymme. Nyckelbenen äro starka. Gaffelbenet (*furcula*) är nästan halfcirkelformigt, bredt, starkt och

*) Endast Fisk-örnen (*Falco Haliæetus*) gör härifrån ett märkvärdigt undantag; hos honom är uttån lika stor som intån, och saknar hinna vid roten, samt synes vara vändbar som hos Ugglorna.

mycket utspärradt, för att under de starka vingarnas rörelser hindra att ej öfra ändarna af öfverarmens ben (*ossa humeri*) tryckas mot hvarandra och klämma bröstet.

De Skandinaviska arter som höra hit förer man till ett enda Slägte, nemligen :

Falk-Slägtet (Falo, *Linn.*)

Hufvudet och halsen tätt beklädda med fjädrar.

Näbben krumböjd, vid roten försedd med en färgad näbbhud.

Näbborrarna, som öppna sig i näbbhuden på sidorna af näbben, äro obetäckta, rundaktiga eller ovala.

Ögonbrynen utgörande en utstående kant öfver ögonen *).

Dessa foglars färg är i yngre åren mycket olik med hvad den sedan blifver, och de få ej sin beständiga färg förr än i tredje, fjärde eller femte året. Ungarna äro vanligen mer fläckiga och spräckliga än de gamla, och de arter som, sedan de fått sin beständiga dräkt, hafva tvärgående fläckar och band, hafva i de yngre åren, i deras ställe långsgående fläckar. De rugga ej mer än en gång om året. Honan är merendels en tredjedel större än Hannen.

*) Detta kommer af ett ben (os superciliare) som är eget för dessa Roffoglar.

De till detta Slägte hörande foglar skilja sig märkbart från hvarandra genom olika grader af styrka, mod och roflystnad. Dessa olikheter i lynnet uttrycka sig genom olikheter i de yttre formerna. Vi vilja här efter indela detta vidlyftiga Slägte i flera underordnade, och vi vilja sätta dem främst, hos hvilka Ordningens idéer är starkast uttryckt. Dessa äro :

I. Egentliga Falkar eller Ådelfalkar *)
(*Falco*, *Bechst.* et *Cuv.*)

Näbben kort och tjock, ofvan något ryggad, på sidorna kullrig, krökt ända från roten, försedd med en spetsig tand bakom spetsen på hvardera sidan af öfverkäken, och med ett motsvarande hak i underkäken.

Näsborrarna nästan runda och merendels i midten försedda med en upphöjd punkt.

Vingarna långa och spetsiga; den 2:dra vingpennan längst, och den 1:sta längre eller lika med den 4:de.

Benen starka, fjädrade något nedom höckelleden. *Tarserna* korta, bara; ben-öfverdraget nätformigt; endast framtill öfver tå-roten ligga några få (4 — 5) tvärplåtar. *Klorna* mycket starka, krökta och spetsiga.

De hithörande Arter nära sig endast af lefvande rof. De föda sig mest af foglar

*) Förmodligen så kallade emedan de inöfvas till jagt, och Falkjagten fordom var en rättighet som uteslutande tillhörde Adeln.

och mindre Däggande djur, sällan af amphibier och Insekter, aldrig af kadaver. De ådagalägga den största skicklighet då de jaga. Deras långa och spetsiga vingar göra att flygten är utmärkt snabb. Förföljande foglen i flygten skjuta de stundom upp i bågformig rigtning med den hastighet att det hviner i luften, och de kasta sig ofta från den största höjd, med pilens snabbhet, nästan lodrätt ned på sitt rof.

De äro de läraktigaste, modigaste och listigaste af alla Roffoglar. Häraf har man vetat att draga fördel genom att inöfva dem till jagt, hvartill de flesta arter kunna användas.

De bygga sitt näste i höga otillgängliga klippor eller ock i höga träd, murar o. d.

1. Jagtfalken (*Falco Gyrfalco*, Linn.)

Artm. Grundfärgen hvit med flera eller färre ofvan tvärgående, inunder långsgående bruna fläckar eller strek. Stjerten längre än vingarne, med smala bruna tvärstrek. Tarsen kortare än mellantån.

Längd 1 fot 10 tum — 2 fot.

Falco Gyrfalco, Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 38. —

Faucon Gerfaut Temm. Man. d'Ornith. I. p. 17. —

Gammal fogel: *Falco Islandicus* Lath. Ind. Orn. I. p.

32. — Wachtin. Wet. Acad. Handl. 1801. p. 193.

— *Falco candicans* Gmel. Syst. I. p. 275.

Ung fogel: *Falco Gyrfalco* Lin. Faun. Svec. p. 22.

Edw. Birds t. 53. — *Falco fuscus* Fabric. Fn.

Grönl, p. 56. — *F. umbrinus* Billberg Wet. Acad.

Handl. 1809, p. 20. tab. vi. — Sv. Islandsfalk,

Hvitfalk, Blåfot.

Beskrifn. *Gammal Hanne*: Hela grundfärgen hvit med bruna linier längs åt fjäderpolarna på hufvudet och halsen, samt glesa tvärgående band, hvilka stundom bilda hjertlika fläckar, på ryggen och vingtäckarena; inunder stundom ofläckad, stundom tecknad med små långsgående bruna fläckar, hvilka vid sidorna äro större. Vingpennorna hvita med ett åt spolen långsgående, i kanterne tandadt brunt band, som mot spetsen intager hela pennan, hvars yttersta spets dock är hvit. Stjertpennorna hvita med smala tvärgående bruna strek. Längden 1 fot 10 tum. Från vingvecket till spetsen 1 f. 3 t. Stjerten $8\frac{1}{2}$ tum. Tarsen $2\frac{5}{8}$ t. således något kortare än mellantån, som är $2\frac{6}{8}$ tum.

Gammal Hona: Dess grundfärg är äfven hvit, men de tvärgående mörkbruna banden på kroppens öfra delar, samt de långsgående fläckarne på dess undra delar äro talrikare och större. Längd 2 fot; från vingvecket 16 tum. Stjerten 10 tum; Tars. $2\frac{3}{4}$ t. mellantån $2\frac{7}{8}$ tum.

Ungarna hafva i första året nästan intet tecken till den hvita grundfärg som sedan småningom utvecklar sig. De äro ofvan gråbruna med smutsigt hvita eller gulaktiga fjäderkanter, samt hafva på bakre ryggen och vingtäckarena några tvärgående linier eller små fläckar af samma färg. Öfver ögonen och i nacken finnas äfven några dylika fläckar. Inunder är grundfärgen hvitaktig med långsgående bruna fläckar,

hvilka på strupen och undergumpen äro smalare och glesare; på bröstet och magen större, talrika, ovala. Stjertpennorna gråbruna med tolf gulaktigt hvita, vid spolen afbrutna tvärlinier. Benen blåaktiga. Näbbhud och ögonkrets blåa.

Anmärkn. Med hvarje ruggning i andra, tredje och fjerde året blir den hvita grundfärgen mer och mer utvecklad, till dess foglen omsider får den först angifna beständiga färgen. Af de talrika förändringar, foglen under tiden undergår, äro de hufvudsakligaste upptagna i Ornith. Svec. I. p. 40 — 42. och den der beskrifna *Honan* är, som jag äfven då förmodade, en yngre fogel.

Vistelseort och Lefnadssätt: Jagtfalken bebor om sommaren endast de nordligare landskapen och isynnerhet dem som äro belägna inom och i grannskapet af polcirkeln, t. e. Lappland, Nordlanden och Finnmarken. Mera sällan finnes han om sommaren och fortplantar sig i de fjälltrakter som äro aflägsna från polcirkeln t. e. på Dowrefjäll, i Jemtland, Herjedalen m. m. Dess stamhåll äro klippfulla och skogiga trakter. Mot vintren, då han ströfvar omkring, infinner han sig också stundom på odlade och bebodda ställen, och träffas då äfven någon gång, fastän sällan, här i Skåne. Likväl hafva, så vida man känner, endast yngre foglar af denna art blifvit sedda i Rikets sydliga landskap.

Dess flygt är utomordentligt skön, snabb och ut hållande. Dess syn är skarp, dess lukt fin. Då han upptäckt en fogel på marken, stadnar han stundom i sin flygt och uppehåller sig stilla på samma punkt, troligen för att förmå foglen att uppflyga; ty helst

griper han foglen i flykten eller i ett träd, sällan på marken. Under denna jagt söker han alltid vinna höjden, och sedan han vunnit den, nedskjuter han på sitt rof med pilens hastighet i en nästan lodrätt riktning. Om hösten och vintren följer han de på bergen kringstrykande skarorne af Fjällripor, hvilkas farligaste fiende han är, och han vet till och med att med slughet och försigtighet dela Ripjägarens fångst. Korpen synes vara hans arfffiende. De slåss ofta; men då flera Korpar samla sig, måste Falken gifva vika och flyga bort.

Födämnen: Dessa bestå i större foglar och mindre däggdjur. Isynnerhet lefver han af Harar, Ripor, Hjerpar, Orrar, Tjädrrar, Vildgäss, Måsar, Teister, Änder m. fl.

Fortplantning: I öfversta delen af någon hög stel och otillgänglig klippa bygger han af ris och qvistar ett stort flackt näste, och lägger deri tre ägg. Ungarna uppfödas af begge de gamla, hvilka rikligen förse dem med dödade foglar *).

Nytta och Skada. Som Jagtfalken i hög grad förenar styrka och snabbhet med mod och list, så är han, i de trakter der han uppehåller sig, en af de

*) Enligt Hr Faber, i Prodom. der Isl. Ornith., är den hvita "artförändringen" med mörka fläckar äfven på Island temligen sällsynt. Hr Faber såg den endast om vintren. Han fann likväl nästet till denna Art i Juli. Vi se således deraf att foglen fortplantar sig redan innan han fått sin beständiga hvita färg.

mest ödeläggande roffoglar. Sällan insinner han sig dock i bebodda och odlade trakter. Den skada han gör är derföre mindre märkbar.

Bland de Falkar som inöfvas till jagt är detta den bästa och mest värderade. *Falkjagt* var fordom ett temligen allmänt nöje för Furstar och andra höga personer; men den är nu bortlagd nästan öfver allt i Europa. Dock skola ännu Falkonerer hållas vid några få Hof i Tyskland (Beckst. 823). Också skall Falkjagten ännu öfvas af några få magnater i Skottland, och (som man försäkrat mig) äfven i Ryssland. I Persien lär den vara mest öfvad. Hos oss brukas den nu mera ingenstädes.

Att inöfva en Falk till jagt, fordrar mycken både tid och möda. Nästan endast de yngre äro der till skickliga; de som öfverlefvat en vinter, och således nära ett år ägt sin frihet, äro mycket svåra att tämja. Man uppsökte derföre dels sjelfva nästena, af hvilka ungarna togos, uppföddes och inöfvades; dels fångade man om hösten de utflugna ungarna. För 60 — 70 år sedan kommo årligen Tyska eller Holländska Falkfångare till vår halfö. De anlade här sin Falkfångst på flera ställen t. e. i Halland, på Dowrefjäll, i Dalfjällen, Herjedalen, Jemtland o. fl. st. En gammal Man har som ögonvittne försäkrat mig att i hans barndom infunno sig årligen Tyska Falkonerer i Halland. De anställde der sin Falkfångst på två ställen, neml. vid Falkenberg och vid Strandgår-

den nära Halmstad. Den art de mest eftersökte och värderade kallade de *Blåfot* (sannolikt en ung *Gyr-falco*). Den method de nyttjade för att fånga denna var följande: I en kulle belägen på något öppet fält, och hvarifrån man hade en vidsträckt utsigt, gräfde man en passande grop eller hydda som man öfvertäckte med ett litet tak af torfvor. Detta låga tak uppbars af smala stolpar, mellan hvilka man ur hyddan kunde se sig omkring åt alla sidor. På taket hade man i en bur en lefvande *Varfogel* (*Lanius Excubitor*) som genom sitt skrik tillkännagaf Falkens ankomst, och som just af denna vakthållning fått sitt namn. Nära vid den underjordiska kojan stodo två höga stänger i jorden. I öfversta ändan af hvardera stängen var en trissa, i hvilken en lina gick, och vid det stycket af linan som gick mellan stängerna, hade man bundit en lefvande Dufva, som oupphörligt flaxade. Vid denna var en annan lina anbragt, med hvilken Falkjägaren i en hast kunde neddraga Dufvan i en med slagnät försedd Falkbur, som stod nedunder på marken. Så snart någon Falk visade sig i luften, gaf Varfoglen det genast tillkänna genom ett eget läte, och gjorde derigenom Jägaren uppmärksam. Då Falken gjort några svängningar i luften, angrep han Dufvan, som i samma ögonblick blef af Jägaren med linan neddragen i den nämnda Falkburen, och med Dufvan följde äfven Falken, hvarefter nätet genast drogs öfver och Falken var fången. Falken uttogs då med aktsamhet ur buren

af Falkoneren, som derefter beklädde dess hufvud med en lädermössa, hvilken gick ned öfver ögonen.

Ungefär på samma sätt beskrifver Hr Hülphers i sin *Resa genom St. Kopparbergs Höfdingedöme* sid. 238. det sätt hvarpå Holländska Falkonerer fångade Falkar i Dalfjällen. Utom *Jagtfalken* fångades äfven för samma ändamål *Pilegrimsfalken*, *Slagfalken*, och kanske ändå flera arter, t. e. *Dufhöken*. — Fångsten anställdes vanligen om hösten från Bartholomæi till Mårtensmessa. — I Byn *Falkenswerth* i det fordnä Flandern sysselsatte isynnerhet fångandet, uppfödandet och inöfvandet af Falkar ett antal menniskor, som deraf hade sitt underhåll och höllo sin konst hemlig, samt försågo nästan hela Europa med dresserade Falkar. En till jagt inöfvad Falk kostade 6 — 800 Holländska gyllen. (Bechs. 749). — Enligt en annonce, införd i *Inrikes Tidningarne* n. 87 för år 1761, hade samma år i Oktober sex Falkonerer från Ansback rest genom Linköping med 44 lefvande Falkar, som de fångat på Fjällen mellan Jemtland och Norrige. — På ett fartyg som d. 1 September 1754 ankom från Island till Köpenhamn, medfördes 148 Falkar.

Då man till jagt vill inöfva en Falk, börjar man med att kufva dess vilda lynne samt att betaga honom lusten att flyga bort. Man sätter honom i ett tunnband, hvilket man upphänger fritt i en lina, så att det är rörligt. Så snart man märker att han vill sofva stöter man till tunnbandet, hvarigenom han

blir nödsakad att hålla sig fast, och följakteligen att ständigt vara vaken. I denna afsigt afvexla några Jägare med hvarandra i tre dagar och tre nätter. Falken blir genom detta fortsatta vakandet utomordentligt spak och låter behandla sig, efter godtycke. Kring benen på honom fästar man läderremmar, i hvilka man under dresseringen binder ett snöre. Ögonen äro betäckta af den förutnämnda läderhufvan, så att han ej oftare kan se sig omkring, än man selsätter hans uppmärksamhet. På vänstra handen drager man en tjock läderhandske, hvarpå man sätter honom, samt vänjer honom småningom att äta ur handen. Derefter vänjer man honom småningom att på något afstånd flyga till handen och mottaga det rof man visar honom. Sedan han flera gånger gjort detta med lätthet och utan att visa lust att flyga bort, tager man honom med sig ut i fria luften, (dock ännu ständigt bunden med ett långt snöre), och öfvar honom på något längre håll samt vänjer honom att liksom Jagthunden lyda ett visst appell och hvissling. Derefter inöfvar man honom på Harar, Rapphöns, Änder, Vildgäss o. s. v. (Se Bechst. 853).

2. Slagfalken. (Falco Lanarius. Linn.)

Art m. Ofvan gråbrun med rostfärgade fjäderkanter och ett hvitt band öfver ögat till nacken; inunder vit med långsgående bruna fläckar. Stjerten längre än vingarna, gråbrun med ovala tvärfleckar på

de inre fanen och några motsvarande runda, nära spetsen, på de yttre. Tarsen längre än mellantån.

Längd 1 fot 8 — 10 tum.

Falco Lanarius Linn. Faun. Svec. p. 22. — Lath. Ind. Ornith. I. p. 38. n. 92. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 44. n. 17. (yngre fögel). *Faucon Lanier* Temm. Man. d'Ornith. I. p. 20.

Beskrifn. Hannen: Ofvan gråbrun med rödbruna eller rostfärgade fjäderkanter, hvilka på öfra delen af hufvudet äro bredast, hvarigenom denna del synes rostfärgad och tecknad med bruna långsgående fläckar. Öfver ögonen bort till nacken går ett bredt hvitt band, fläckigt af bruna småstrek. Från näbbviken går nedåt vid sidan af strupen ett smalt svartaktigt strek. Inunder är foglen hvit med små lancettformiga bruna fläckar som på sidorna och lårfjädrarna äro större. Strupen och stjertens undra täkfjädrar ofläckade. Stjerten, af hvilken en tredjedel räcker utom de hoplagda vingarna, är gråbrun med hvita, i rostbrunt stötande ovala tvärstående fläckar, isynnerhet på de inre fanen. Benen och näbben blåa. Näbbhud, iris och ögonkrets gula.

Honan: Dess rödbruna fjäderkanter ofvan äro smalare än Hannens; dess lancettformiga eller ovala fläckar inunder äro större; på strupen och de undre stjerttäckarne stå bruna, långsgående, smala strek.

Anm. Den beskrifning som finnes i Meyers Vögel Liv. — u. Esthl. p. 20, och som Meyer håller för att tillhöra en ung *F. Gyr falco*, hörer säkert hit.

Ung fogel: Kroppen ofvan gråbrun med ett mörkare strek åt hvarje fjäderspole och otydligt rostfärgade fjäderkanter. Hufvudet ofvan svartaktigt; pannan, ett band öfver ögonen, samt nacken hvitaktiga med svarta långsgående linier och strek. Hufvudets sidor hvita; nedåt sidan af strupen från näbbviken går en aflång svart fläck. Inunder är kroppen hvitaktig med svarta långsgående, upptill spetsiga fläckar, som på zsidorna stå tätast. Strupen hvit, ofläckad. Undergumpen smutsigt hvit med bruna linier på fjäderspolarna. Vingpennornas inre fan med 8 — 12 gulaktigt hvita tvärstående ovala fläckar. Vingarnas undre täckfjädrar med hvita runda fläckar. Stjerten brungrå med hvit spets och 9 — 10 rostaktigt hvita tvärstående ovala fläckar på inre fanen, hvilka fläckar nära stjertspetsen hafva några motsvarande runda på yttre fanen. Näbben blåaktig med svart spets. Benen blåa. Längd 1 fot 5 tum. Tars. $2\frac{2}{3}$ t. Mellantån 2 t. Stjert. 7 tum, räcker $1\frac{1}{2}$ tum utom vingarna.

Anm. Detta är den i Ornithol. Spec. beskrifna *F. Lanarius*.

Vistelseort: Denna Falkart är hos oss mycket sällsyntare än den föregående. Han tillhör troligen mera de östliga, mindre undersökta trakterna af vår Faunas område, än de vestra kusttrakterna. Om hösten visar han sig högst sällan i det södra Sverige,

och de få som här blifvit skjutna hafva endast varit unga foglar.

Födämnena: Liksom föregående art anställer han jagt på större foglar och mindre däggdjur.

Fortplantning: I bergiga skogstrakter bygger han sitt näste i klippor, stundom i träd. Äggen okända.

3. Pelegrimsfalken. (*Falco peregrinus*, Lath.)

Artm. Hufvudet och halsen ofvan svartaktiga; manteln gråblå med mörkare, eller gråbrun med ljusare tvärstrek. Från näbbviken nedåt står en svart fläck. Halsen framtill vit; bröstet, magen och låren med talrika bruna tvärstrek. Stjerten ej längre än vingarna, med gråa och bruna tvärlinier. Mellantån längre än tarsen.

Längd 1 fot 3 — 5 tum.

Falco peregrinus Lath. Ind. Orn. I. p. 33. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 42. — *Falcon Pèlerin* Temm. Man. d'Ornith. I. p. 22. — *Wanderfalke* och *Tannenfalke* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 744 och 759.

Beskrifn. *Gammal Hanné*: Hufvudet ofvan och halsryggen svartaktiga. Ryggen och vingtäckarena askegrå-blåa med svartaktiga tvärstrek. Från näbbviken nedgår ett svart strek på hvardera sidan af strupen. Halsen framtill och öfra bröstet hvita med få långsgående bruna småfläckar eller strek; öfriga bröstet, magen och låren gulaktigt hvita med talrika bruna tvärstrek. Vingpennorna af första ordningen svartaktiga med många (kring 10) rödbrunaktigt hvita, tvärstående, ovala fläckar. Stjerten med afvexlande

askegråa och bruna tvärlinier. Näbben blåaktig. Iris, ögonkretsen, näbbhuden och benen gula. Längd 1 f. 3 t.; Från vingvecket 12 $\frac{1}{2}$ t. Stjert. 5 $\frac{1}{2}$ t. Tars. 2 $\frac{1}{3}$ t. Mellantån 2 $\frac{1}{4}$ tum.

Hona: Hufvud och hals ofvan svartaktiga; från näbbviken under ögat nedgår en svartaktig fläck vid sidan af strupen. Rygg och vingtäckare gråbruna med ljusare gråa tvärstrek. Halsen nedunder vit med glesa långsgående bruna fläckar. Bröst, mage och lårfjädrar smutsigt hvita med bruna vågor. Stjerten brun med gråa tvärstrek och hvitaktig spets. Längd 1 f. 5 t.

Unge: Ofvan svartgrå med rostbruna fjäderkanter; hufvudets sidor och pannan smutsigt hvita med svarta strek; en svartaktig fläck står under ögat på sidan af halsen. Kroppens undra delar gulaktigt hvita med långsgående bruna nästan sammanlöpande fläckar på mage och bröst. Strupen ofläckad. Undergumpen med tvärgående bruna linier. Stjerten med smala askegråa och bruna tvärstrek, och gulaktig spets. Näbben blåaktig med svart spets.

Vistelseort: Pelegrimsfalken bebor bergiga trakter med stela klippor, isynnerhet i de nordligare delarna af vår halfö, så väl på fasta landet som på öarna. I Sveriges södra provinser är han sällsynt *) och i Skåne förekommer han icke, om ej någon gång

*) Jag har här ej funnit honom bosatt mer än på ett enda ställe, neml. i en hög och brant klippa vid namn

under sin flyttning. Likasom de flesta samslägtingar har han en hög och skön flygt. Om våren under fortplantningstiden då luften är klar, ser man stundem hanne och hona tillsammans stiga upp till en förvånande höjd och sväfva kring i kretsar. — Han är en flyttfogel som kommer i Mars eller i början af April och går bort i Oktober eller November.

Födämnena: Alla slags större foglar: Tjädrar, Orrar, Hjerpar, Ripor, Dufvor m. m. som finnas i grannskapet af dess stamhåll. Äfven dödar och förtär han Vattenfoglar såsom Gäss, Änder, Beckasiner o. s. v. hvilka bebo de insjöar kärr och haf som finnas nära dess vistelseort *). Han förföljer och griper sitt rof på samma sätt som Jagtfalken. Sedan han i flykten gripit en fogel, bär han honom i klorna till någon kal klippa eller torrt träd der han förtär honom.

Walhall i Blekinge, $3\frac{1}{4}$ mil från Carlshamn. I remnorna i denna klippa bo årligen några par, och Allmogen i orten försäkrar att de från urminnes tider der haft sitt tillhåll. De infinna sig i sista hälften af Mars, eller i början af April, anställa ödeläggande härjningar bland vildt och tamt fjäderfä i grannskapet, och fara bort i November kring Märtensdag. Då denna Falkart ej finnes bosatt på något annat ställe i orten, så tror Allmogen att han ensamt tillhör denna gamla ättstupa, och derföre kallas han här allmänt Walhöken. I de norra klippfulla kusttrakterna af Norrige har jag funnit honom bosatt på flera ställen, ända inom polcirkeln.

*) På Lovunnen, — en ö nära polcirkeln vid Norrska kusten, — bodde ett par i en klippa, hvilka dagligen gjorde nederlag bland den talrika svärmen af Lunnfoglar som bosatt sig på denna ö.

Fortplantning: I klyftorna uti höga och branta klippor lägger han sitt bo. Detta består af torrt ris och pinnar. Han skall äfven bygga i träd, fastän sällan. Äggen 3 — 4 rödaktigt gula, med bruna fläckar.

Äfven denna Falkart inöfvas till jagt och fångas på samma sätt som *Jägstfalken* (sid. 12 — 15). Den skada han gör på nyttiga vilda och tama foglar, är ganska betydlig.

4. Lärkfalken. (*Falco Subbuteo*. Linn.)

Art m. Ofvan mörkt blågrå (Honan mörkt gråbrun). Strupen vit. Under ögonen en halfmånformig svart fläck. Bröst och mage vitaktiga med långsgående svarta fläckar. Undergump och lår rostfärgade. Stjerten kortare än vingarna, ofvan enfärgad, inunder bandad.

Längd 12 — 14 $\frac{1}{2}$ tum.

Falco Subbuteo Lin. Faun. Svec. p. 20. — Lath. Ind. Ornith. I. p. 47. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 46. — *Faucon Hobereau* Temm. Man. d'Ornith. I. p. 25. — *Baumfalke* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 764.

Beskrifn. Gammal Hanne: Rygg, vingtäckare och öfvergump mörkt askeblåa med svartaktiga fjäderspolar. Hufvud och hals ofvan svartaktiga. Halsens sidor hvita med en stor halfmånformig svart fläck under ögonen; denna fläck har spetsarna nedåt vända och den främre bildar ett bånd på sidan af strupen. Strupen vit. Bröst och mage gulaktigt hvita med långsgående svarta fläckar. Lår, undergump och undre stjerttäckare roströda. Stjerten kortare än de hoplagde vingarna, nästan tvär, synes ofvan enfär-

gad som ryggen; men sidopennorna hafva i inre fanen talrika (kring 10) mörkbruna ock rostgula tvärstrek, hvilka isynnerhet synas på undra sidan. Vingpennorna svartaktiga med ovala rostgula tvärfläckar på inre fanen. 1:sta vingpennan längre än 3:dje. Iris brun. Näbbhud, ögonlock och ben gula.

Hona: Ofvan mörkt gråbrun. Strupen gulaktigt hvit. Fläckarna på bröst och mage svartbruna. Det roströda på låren och undergumpen mattare.

Ung hanne af ett eller två år: Ofvan med bruna fjädrar bland de mörkt askeblåa på ryggen och bland de svarta på hufvudet. Lårens och undergumpens roströda färg mattare än hos den gamle, och med aflånga, droppformiga, svartaktiga fläckar på låren. Stjertpennorna med rostgula tvärband i båda fanen, och rostgul spets.

Års unge: Ofvan mörkbrun med rostbrunaktiga fjäderkanter. Panna, nacke och kinder gulaktigt hvita. Strupen hvitaktig. Bröst och mage gulaktigt hvita med stora bruna fläckar. Stjertpennorna i spetsen hvitaktiga. Näbbhud och ögonlock blåaktiga. Benen blekt gula.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Falkart tillhör mera de södra än de nordliga landskapen af Skandinavien. I Skåne finnes han talrikt och är en af de allmännaste Falkarter. Äfven förekommer han på Öland. Men i de norra trakterna af halfön ser man honom icke. Han bebor i synnerhet sådana

skogar, lunder eller större trädgårdar, som ligga nära intill fält, der han på småfogel kan anställa jagt. Om dagarna vistas han derföre nästan ständigt på fältet, och endast om nätterna hvilar han sig i skogen. Dess flygt är utomordentligt hastig; då han söker sitt rof far han fram med pilens snabbhet öfver marken, och han griper till och med Svalan i flykten. Han har det gemensamt med de föregående Falkarterna att han oftast, om ej alltid griper sitt rof i flykten. Detta tyckas Lärkorna, som isynnerhet äro blottställda för dess förföljelser, af instinkt känna; ty så snart de bli honom varse i luften, kasta de sig genast ned till marken och söka gömma sig bland gräs, eller buskar. Finna de ej denna tillflygtsort, skynda de upp i luften så högt som möjligt, för att ej hafva fienden öfver hufvudet. Härigenom blir det honom ofta svårt att ertappa dem; ty likson de föregående, fångar han sitt rof genom att från höjden störta ned öfver det i lodrätt rigtning. Hos oss är han en flyttfogel som vandrar bort om hösten i sällskap med den mängd af Finkor, Sparfvar och annan småfogel, hvilka då i skaror lemna oss, och återkommer med dem om våren.

Födämnena: Dessa bestå hufvudsakligen i småfogel af alla slag, isynnerhet Sånglärkor; äfven unga Rapphöns, Vaktlar, Snäppor, Beckasiner m. fl. Äfven säges han ofta förtära Fältmöss och Skalbaggas.

Fortplantning: Redan i April månad parar han sig. Sitt bo bygger han i toppen af höga träd eller

ock inreder han åt sig ett gammalt öfvergifvet kråkbo. Der tillfället medgifver bygger han äfven stundom i bergsrefvor. Dess ägg, 3 — 4 till antalet, äro afrundade, hvitaktiga med oregelbundna gråa och olivbruna fläckar.

5. Stenfalken. (*Falco Lithofalco*, Gmel.)

Artm. Ofvan blågrå (Honan mer brun) med svarta strek åt fjäderspolarna; bröst och mage rostgulaktiga med bruna längsstrek, eller fläckar. Stjerten längre än vingarna med fem svarta (eller gulaktiga) tvärstrek och hvitaktig spets.

Längd. 11 — 12 $\frac{1}{4}$ tum.

2:dra och 3:dje vingpennan mycket längre än de öfriga och lika långa; 1:sta och 4:de lika långa.

Falco Lithofalco, Nilss. Ornith. Svec. I. p. 48. — *Le Rochier* Buff. Ois. I. p. 286. pl. ent. 447. (gammal). — *Emérillon* pl. enl. 468 (yngre). — *Falco Aesalon*, Lath. Ind. Ornith. I. p. 49 (yngre fogel). — *Zwergfalke* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 787.

Beskrifn. *Gammal Hanne*: (skjuten på Skånes slättbygd i slutet af Maji). Hela foglen ofvan gråblå med ett långsgående svart strek eller fläck åt hvarje fjäderspole. Ögonbrynen hvita. Hufvudets sidor och halsryggen rostfärgade med svarta fläckar. Strupen vit. Bröst och mage rostfärgade med bruna långsfläckar och strek. Undergump och lårfjädrar tegelfärgade med långsgående mycket smala strek. Vingpennorna svartbruna med rostaktigt hvita fläckar. Stjerten 1 tum längre än vingarna, gråblå med 4 — 5 svarta tvärstrek och ett brett svart band framom den hvita spetsen. Näbben blåaktig med

svart spets. Näbbhud, ögonkrets och ben gula. Klor svarta. Längd $11 - 11\frac{1}{2}$ tum.

Hona: (skjuten vid Lund i början af April): Ryggen, skuldrorna och de små vingtäckarne dunkelt blågråa med smala rostfärgade fjäderkanter och svarta strek åt spolarna. Hufvudet ofvan brunt med inblandad rostfärg och långsgående svarta strek. Panan samt ett strek öfver ögonen hvitaktiga med svarta smålinier. En rostfärgad ring med mörka fläckar omger halsryggen. Strupen vit, ofläckad. Bröstat och magen hvita stötande i gult, och tecknade med aflånga rödbruna fläckar, genom hvilka dan svarta fjäderspolen går. Undergumpen, lårfjädrarne och de undre stjerttäckarne hvitaktiga, stötande i smutsigt gult, och de två sednare med smala långsgående bruna strek. Vingpennorna mörkbruna, i inre fanen med ljust rostgråa tvärstrek, i yttre med fläckar af samma färg. Stjerten svartbrun med fem smala smutsigt rostgula tvärstrek och hvitaktig spets. Längd $12\frac{1}{4}$ tum. Vingbredden 2 f. 3 tum. Näbbhuden, ögonlocken och benen gula. Iris mörkbrun. Stjerten utom vingarna $1\frac{1}{4}$ tum.

Ung Hona: (skjuten om hösten). Näbbhuden blek, ofvan grönaktig. Iris och ögonlockens kant mörkbruna. Munvikarna och näbben ljustgråa, den senare mot spetsen svartaktig. Benen gula; klorna svarta.

Rygg, skuldror och vingtäckare brunaktigt askgråa med smala rostfärgade fjäderkanter och svarta

strek längs åt spolarna. Hufvudet ofvan brunt med rostfärgade fjäderkanter och bredare svarta längsstrek. Pannan samt ett strek öfver ögonen hvitaktiga med svarta smålinier. Under ögat en liten svart fläck, och från näbbviken på sidan af strupen ett af svarta längsstrek bestående litet band. Kring halsen en hvitaktig af svartbruna fläckar afbruten ring. Strupen vit, ofläckad. Bröst, mage, lår och undergump hvitaktiga med rostgul anstrykning och mörkt rödbruna längsfläckar, genom hvilka den svarta fjäderspolen går. Dessa fläckar, som äro större och tätstående på bröstet, sidorna och främre magen, något mindre och glesare på låren, saknas nästan alldeles på bakre delen af magen och på undergumpen, samt äro pilformiga på undre stjerttäckarne. Vingpennorna och deras större täckfjädrar mörkbruna och skönt tecknade, i yttre fanen med rundaktiga roströda, i inre fanen med något blekare och större ovala tvärfläckar. Undre vingtäckarne rödbruna med hvita runda fläckar. Stjerten tvär (dock den yttersta pennan något kortare) mörkbrun med 5 smala hvitaktigt rostgula tvärband och vit spets.

Vistelseort och Lefnadssätt: Denna Falkart, som bland de Skandinaviska är den minsta, tillbringar sommaren och fortplantar sig i de norra trakterne af halfön. Inom och i grannskapet af polcirkeln finnes han under denna årstid talrikt. Dess södra gränslinie synes mig ungefär inträffa med Tornfalkens norra, och redan så sydligt som Trondheim, är han af

Tornfalken utträngd. Till utseende, flygt och lefnads-sätt kommer han närmast Lärkfalken, och det är nästan endast på storleken som man kan skilja dem då de, på något afstånd, hålla jagt efter småfögel.

Om hösten flyttar Stenfalken mot södren, ofta under denna flyttning följande de från nordn utvandrande stora skarorna af Bergfinken och Snösparfven, hvilka utgöra en betydlig del af hans näring. Likväl är dessas utvandring icke, som man trott, orsaken till Stenfalkens flyttning; ty han infinner sig i mängd på Skånes fält äfven långt förr än dessa anlända från nordn. Här håller han ifrigt jagt efter Lärkor, Sparfvar, Vaktlar, Rapphöns m. m. Då Jägaren med sin hund uppstöter någon Rapphöna eller Vaktel, är Stenfalken ofta tillreds att förfölja den. Liksom de förra, kastar han sig med pilens fart ned från luften öfver sitt rof. Han är utomordentligt försigtig och slug, så att man sällan kommer honom inom skotthåll, om ej då han förföljer någon fögel.

Födämnen: Lärkor, Finkarter, Sparfarter och andra småföglar, samt stundom äfven Vaktlar, Dufvor och Rapphöns.

Fortplantning: I södra Sverige fortplantar han sig icke, så vida man vet. Men i de norra skogfulla och bergiga landskapen, bygger han sitt näste i träd eller bergsrefvor. Dess ägg sägas vara 5 — 6 hvitaktiga och, isynnerhet vid ena ändan, kastanjbrunt marmorerade.

6. Tornfalken. (*Falco Tinnunculus*, Linn.)

Art m. Kroppen ofvan rödbrun med svarta fläckar eller tvärstrek. Stjerten afrundad, längre än vingarna, med ett bredt svart band framför den hvitaktiga spetsen.

Längd 14 — 16 tum.

Falco Tinnunculus, Lin. Faun. Sv. p. 21. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 49. — *Faucon Cresserelle*, Temm. Man. d'Ornith. I. p. 29. — *Thurmfalke*, Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 798.

Beskrifn. *Gammal Hanne*: Hufvud och stjärt blågråa, det förra med bruna fjäderspolar, den senare med ett bredt svart tvärband framför den temligen bredt hvita spetsen. Rygg, skuldror och vingsäckare brunröda med små, glesa, hjertformiga svarta fläckar. Inunder blekt rostgul med svarta långsgående strek eller droppformiga fläckar på bröst, mage och sidor. Strupen och låren ofläckade. Vingpennorna svartaktiga, i inre fanen tecknade med hvita tvärfleckar. Näbben blåaktig, vid roten gulaktig. Näbbhuden, den nakna ögonkretsen, Iris och benen gula. Klorna svarta. Längd 14 tum.

Hona: Ofvan blekare rödbrun, på hufvudet med långsgående svartbruna strek, på de öfriga öfradelarna med svartbruna tvärband. Stjerten rödbrun med svarta tvärstrek och ett bredare band framför den gulaktigt hvita spetsen. Inunder blekt rostgul med långsgående svarta fläckar. Strupe och undergump med få bruna längs-linier. Längd 16 tum.

Unge: Lik Honan, men med talrikare långsstrek på hufvudet och tätare tvärbånd på ryggen. Pan-
nan smutsigt hvitaktig. Inunder blekt rostgul med
täta bruna längsfläckar på bröst och mage. Från
näbbviken nedgår ett otydligt svartaktigt strek. Iris
brun. Näbbhud gulgrön. Benen blekt gula.

Falco fasciatus Retz. Faun. p. 70. — *Falco brun-*
neus Bechst. N. D. 2. p. 807.

Vistelseort och lefnadssätt: Tornfalken är hos
oss, i södra Sverige, en af de allmännaste rof-
foglar, äfven som han är en af de vackraste. Lika-
som Lärkfalken tillhör han mera de sydliga än de
norra landskapen af vår halfö. I Skåne förekommer
han allmänt; men han finnes icke så långt mot
norden som *Stenfalken*, och han synes upphöra der
dennas egentliga stambåll vidtager. Dock förekommer
han i temlig mängd ännu vid Trondhiem; till och
med nordligare, neml. nära Tarrock vid Bindalsfjor-
den, på gränsen af Helgeland, (och således föga mer
än en grad söder om polcirkeln), har jag funnit ho-
nom bosatt i höga klippor. Likväl minskas dess an-
tal i samma mån som man nalkas polcirkeln, inom
hvilken han troligtvis aldrig finnes.

I jemna trakter har han sitt tillhåll i skogarna
samt i gamla torn och kyrkor, äfven i städerna *);

*) I Lunds kyrktorn finnes han dock icke. Flera gånger
om våren har jag sett ett par anlända som der för-
sökt att bosätta sig; men de hafva ständigt blifvit an-
fallna och oroade af de der boende Kajor, hvarföre de
alltid efter 8 — 14 dagars vistande lemnat stridsfältet
och begifvit sig bort.

i bergiga trakter uppehåller han sig bland klipporne, isynnerhet i sådana der skog finnes i grannskapet. Han är en flyttfogel som om hösten i September eller Oktober lemnar oss, och om våren i Mars eller April återkommer. Om hösten under flyttningstiden är han isynnerhet talrik här i Skåne på släta fält, der ensamt stående träd finnas, på hvilkas högsta topp han ofta hvilar sig.

Liksom alla dess samslägtingar är han munter och liflig; liksom de har han en lätt och snabb flygt och en skarp syn. Från en betydlig höjd i luften upptäcker han på marken under sig en liten fogel eller rotta. För att så mycket säkrare träffa sitt rof, stadnar han då i sin flygt och uppehåller sig en stund flaxande på samma punkt, hvarunder det på afstånd nästan ser ut som om han hängde i en snara, och i ett ögonblick ser man honom derefter i en lodrätt linia nedstörta på sitt byte. Han har dock ej en sådan styrka och säkerhet i klorna som de två föregående arterna, och rätt ofta förfelar han den fogel eller rotta som han anfaller, oaktadt han länge sigtat på dem.

Födämnen: Småfogel, såsom Spärfvar, Finkar, Lärkor o. s. v. Äfven griper han unga Rapphöns, Vaktlar, samt Rottor och Fältmöss. Också förtär han små Grodor, Källfrön, Ödlor, Skalbaggas, Gräshoppor, m. m. Dufvor anfaller han sällan och stundom har han sitt bo i skogen i samma trakt som Vilddufvorne.

Fortplantning: I hål och remnor i gamla murar och torn, äfven midt inne i de största städer bygger han sitt näste. I skogarna lägger han sina ägg i hål uti gamla ekar och andra ihåliga träd, och äfven någon gång på deras grenar, isynnerhet i gamla kråkbon. Dess 3 — 4 ägg äro gulaktigt röda eller brunröda med mörkare bruna fläckar. — Ungarna skola kunna inöfvas till jagt på Lärkor och unga Rapphöns.

II. H ö k a r. (Astur, Bechst.)

Näbben tjock och stark, krökt ända från roten, ofvan kullrig, på sidorna platt; öfverkäken i midten märkbart utdragen till en hvass egg *), och i spetsen krökt till en mycket stark hake.

Benen fjädertäckta något nedom höckelleden. Tarsen längre än mellantån; benöfverdaget framtill deladt i tvärliggande plåtar; mellantån mycket längre än de öfriga.

Vingarna korta; 4:de vingpennan längst; 1:sta mycket kortare än 2:dra, lika med 9:de; 2:dra något kortare än 6:te; 5:te knapt kortare än 4:de.

Stjerten lång, räcker med ena hälften utom de hoplagda vingarna.

Till detta underordnade Slägte höra ej mer än två inhemska arter. Dessa äro mo-

*) Denna motsvaras af en dylik utdragen hvass egg i underkäken. Af dessa sönderskäras födämnena på samma sätt som af en sax.

diga, djerfva och snabba, och komma i många afseenden närmast Falkarna. Likasom dessa kunna de tämjäs och inöfvas till jagt. Deras flygt är snabb, utan att de likväl hastigt röra vingarna. Under parningstiden ser man dem ofta i flygten beskrifva kretsar i luften. De äro listiga och tilltagsna, samt lefva liksom Falkarna endast af rof som de sjelfva döda, och de gå aldrig på kadaver *). Foglar gripa de ofta i flygten. De bygga i höga träd, eller, der tillfället medgifver, i otillgängliga klippor. Deras tillhåll om sommaren äro stora skogar, isynnerhet der berg finnas. Om hösten, vintren och våren ströfva de vidt omkring efter rof, och förekomma då äfven på slättlandet.

7. Dufhöken. (*Falco palumbarius*, Linn.)

Artm. Ofvan blåaktigt eller brunaktigt grå, inunder hvit (eller hvitaktig) med mörkbruna långsfläckar eller tvärstrekar. Stjerten lång, afrundad, med 4 — 5 breda gråa och mörkbruna tvärband och hvitaktig spets.

Längd 22 — 24 tum.

Falco palumbarius Lin. Faun. p. 23. — Nilss Ornith. Svec. I. p. 33. — *L'Autour* Buff. Ois. I. p. 230. — Pl. enl. 418. — Temm. Man. d'Ornith. I. p. 55. — *Hühnerhabicht* Bechst. Nat. D. 2. p. 711. — *Falco gallinarius* Gmel. Syst. I. p. 266. (yngre fogel). — *Falco gentilis* Lin. Fn. p. 20. (yngre fogel). — Sv. Dufhök, Hönshök, Slaghök.

*) Her Bechstein anför väl att Dufhöken om vintren äfven går på as; men detta har jag aldrig märkt hos oss, och det synes mig också föga troligt.

Beskrifn. Den anförda diagnosen inträffar temligen på alla åldrar. Arten varierar otroligt dels efter ålder, dels tillfälligt.

Gammal Hanne: Hufvudet ofvan svartbrunt med ett bredt, hvitt, fläckigt strek, som går öfver ögonen bort åt nacken. Alla öfriga delar ofvan brungråa stötande i askeblått; inunder hvit med mörkbruna fjäderspolar och tvärgående vågformiga strek. Stjerten lång med fyra eller fem en tum breda gråa och svartbruna tvärband samt hvitaktig spets. Näbben blåaktigt svart, vid roten blek. Näbbhuden och munvikarna gulgröna. Iris skönt saffrangul. Benen gula. Längd 22 tum; stjerten $9\frac{1}{2}$ t. räcker 5 tum utom vingarna.

Honan ofvan mer brun än blåaktig; inunder är grundfärgen gulaktigt eller smutsigt hvit och tvärstreken på strupen äro talrikare. Längd 2 fot.

Ung fogel i första året: Ofvan mörkbrun med rödbruna eller rostgula fjäderkanter, som isynnerhet äro breda på hufvudet och halsen. Ögonbrynen, hufvudets och halsens sidor af en hvitaktig rostfärg med långsgående bruna strek. Flera hvitaktigt rödbruna fläckar i nacken. Inunder är grundfärgen hvitaktig stötande i rödbrunt med långsgående mörkbruna fläckar som på låren och undergumpen äro smalare, på sidorna bredare, nästan hjertformiga. Stjertens svartbruna tvärband äro ofta genom en hvitaktig linia skilda från de gråa. Iris hvitaktigt grå.

Varierar på många sätt. Än förekommer han helt och hållet hvit, än hvit med långsgående rödbrunnaktiga fläckar på kroppens öfra delar och långsgående linier af samma färg på dess undra delar; än äro ryggens och vingarnes täckfjädrar kantade med hvitt eller grått o. s. v.

Anm. Om våren, redan i April månad, börjar fjäderymsningen, då, mellan de fjädrar på undra kroppsdelarna, som karakterisera den yngre foglen (neml. ockergula med mörkbruna långsfläckar) framkomma hvita fjädrar med mörkbruna tvärstrek. Jag äger ett sådant exemplar fångadt i medlet af April, hvilket är en *Falco gallinarius* Auctor. men med några fjädrar af *F. palumbarius* på mage och lår.

Vistelseort och lefnadssätt: Dufhöken är hos oss en allmän Roffogel, som under fortplantningstiden vistas i stora och bergiga skogar. Huru långt mot nordén denna Hökart förekommer, känner man icke; men att han finnes i Norrland och de motsvarande trakterna af Norrige, är mig genom egen erfarenhet bekant *). Under hösten infinner sig en mängd af de yngre på Skånska slättbygden; men vid den strängare köldens annalkande försvinna de och vandra då troligen åt sydligare länder. Endast de äldre tyckas blifva qvar hos oss under den kallaste vintren, och ströfva di kring efter rof, äfven på slättlanden.

Dufhöken är modig och djerf, hvarföre han ofta blifvit inöfvad till jagt; men med de kortare vingarna flyger han hvarken så högt eller så snabbt

*) I Herjedalen har jag sett honom fångad i de snaror som om hösten utsättas för Skogshönsen.

som Jagtfalken. Dess sätt att angripa är äfven olika. Han nedskjuter aldrig lodrätt på en flygande fogel som han vill fånga; utan antingen anfaller han honom i en sned rigtning åt sidan, eller ock nedifrån då han kastar sig om i luften med benen och klorna uppåtsträckta.

Födämnena: För de svagare vilda och tama foglarna är Dufhöken en farlig fiende. Han angriper Orrar, Tjädrrar, Hjerpar, Dufvor o. s. v. Ej sällan vågar han sig fram till gårdarna der han anfaller och dödar tama höns, änder, unga gäss m. m. Ungharrar, Igelkottar, Mullvadar och Fältmöss blifva äfven ofta hans rof. Någon gång griper han Kajor, Kråkor, Skrikor o. s. v. och han till och med slåss med sjelfva Korpen och bortjagar honom, om denne kommer i den trakt der Höken har sitt bo.

Fortplantning: Dufhöken bygger sitt näste på de högsta träd i täta skogar. Dess ägg, 3 — 4 till antalet, äro blåaktigt hvita med bruna fläckar och strek.

Jagt och fångst: Bland de roffoglar som man om hösten fångar i *Hökburen*, är detta den som oftast förekommer, — åtminstone här i Skåne. Man nyttjar i denna bur en lefvande hvit Dufva som lockfogel, hvilken han på ett betydligt afstånd upptäcker och vill anfalla. Med bössa nedskjuter man honom merendels i flykten.

8. Sparfhöken. (*Falco Nisus*, Linn.)

Art m. *Ofvan blåaktigt askegrå, (eller brungrå) med hvita fläckar i nacken; inunder hvit med längs-*

gående linier på strupen och tvärgående strek på bröst, mage och lår. Stjerten lång, tvär, askegrå med fem svartaktiga tvärband. Längd $12\frac{1}{2}$ — 15 tum.

Falco Nisus, Lin. Faun. Sv. p. 23. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 36. — *L'Epervier* Buff. Ois. I. p. 255. Pl. enl. 467. 412. — *Sparrow Hawk*, Lath. Syn. I. p. 99. id. Suppl. I. p. 26. — *Der Finkenhabicht* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 726.

Beskrifn. Denna Hökart liknar mycket den föregående. Men utom det att han är betydligt mindre, har han mycket längre och smalare ben.

Gammal Hanne: Ofvan blåaktigt askegrå med en vit fläck i nacken och stundom några dylika på skulderfjädrarna samt på de innersta vingtäckarna. Ett hvitt, afbrutet strek öfver ögat synes stundom knapt. Halsen på sidorna med rostgul anstrykning. Undra kroppsdelarna hvita med ett svartaktigt strek åt hvarje fjäderspole, och med täta tvärstrek på bröst, mage och undergump. Dessa äro på bröstet rostgula, på magen och undergumpen mer mörkbruna. Vingpennorna gråbruna med mörkbruna tvärband. Stjerten tvär, grå, med fem mörkbruna tvärband och vitaktig spets; dess undra täckfjädrar hvita, ofläckade. — Näbben svart, vid roten ljus blå. Vaxhuden gröngul. Näbborrarna äggformiga, framåt spetsiga. Iris skönt gul. Benen gula. Klorna svarta. Längd $12\frac{1}{2}$ tum; vingsbredd. 2 fot. 1 tum.

Gammal Hona: Ofvan mer gråbrun och mindre askeblå, än hannen. Ett hvitt strek öfver ögonen och hvita fläckar i nacken; inunder vit med grå-

bruna tvärstrek; på strupen långsgående linier. Vinggar och stjärt som hos Hannen. Längd 15 tum; vingbredd 2 fot 5½ tum.

Ungre Hanne: Ofvan mörkare gråbrun och mindre askeblå, än den gamle. Pannan rostgråaktig. De undra kroppsdelarnas tvärstrek bredare med blandning af svartbrunt och roströdt.

Ungre Hona: Ofvan gråbrun med rostbruna fjäderkanter isynnerhet på vingtäckarne och öfvergumpen; inunder med talrikare långsstrek på strupen och bredare tvärstrek på de andra delarna, samt med en liten rostgul fläck vid spetsen af hvarje fjäder på bröst och sidor.

Ungarna i första året: Ofvan mörkbruna med rostbruna fjäderkanter; pannan och ögonbrynen hvitaktiga med bruna strek. Inunder hvitaktiga med rostgult öfverdrag; strupen tecknad med strek, - bröstet med hjertformiga fläckar och magen samt sidorna med tvärgående band, dels bruna dels rostfärgade med brun infattning.

Vistelseort och lefnadssätt: Sparfhöken finnes i alla landskap af Skandinaviska halfön, från Skåne ända till Norrland. Dess gräns mot norden är likväl ännu icke känd. — Om sommaren har han sitt tillhåll i skogarna, isynnerhet i sådana som äro bergiga och gränsa till flacka fält; om hösten lemnar han skogarna och följer de bortgående sparf-skarorna åt Skånska fälten samt stundom vidare åt sydligare länder. Om en del, som det synes, flytta bort mot vintren, så göra dock

ej alla det; ty man finner dem ej sällan, äfven under vintren, på fälten och vid gårdarna, åtminstone i det södra Sverige.

Sparfhöken är försigtig, modig och listig. Han flyger sällan mycket högt, utan merendels tätt vid marken, der han framsväfvar med den största snabbhet, samt ofta utan att märkbart röra vingarna. Denna lilla hökart injagar förskräckelse hos de flesta småfoglar, och de söka att gömma sig vid dess åsyn. Dock förföljes han med skrik af några t. e. Ringärlan, Svalan o. s. v.

Födämnena: Dessa äro isynnerhet foglar af mindre storlek såsom Lärkor, Sparfvar, Finkar, Dufvor m. m. samt vilda och tama Höns m. m. Liksom dess närmaste anförvandt *Dufhöken*, sväfvar han ej länge öfver sitt rof, utan så snart han på långt afstand upptäckt det, anfaller han det med pilens snabbhet, merendels från sidan, griper det med klorna, slår det antingen under sig till marken, eller, om han förmår, flyger bort med det till ett träd eller en sten, der han förtär det. Utom foglar förtär han äfven Mullvadar, Näbbmöss, Fältlemlar m. m.

Fortplantning: Dess näste finner man i höga träd, mest i barrskogar, i Maji och Juni månader. Äggen, 3 — 5 till antalet, äro smutsigt hvita med rostbruna kantiga fläckar, hvilka isynnerhet finnas i en krans kring den tjockare ändan. De rufvas endast af honan i tre veckor under hvilken tid hannen säges föda henne.

III. Örnar. (*Aquila, Briss.*)

Näbben, mycket stark, temligen lång, vid roten rak, och endast vid spetsen krökt till en lång hake; öfverkäkens kant föga märkbart utdragen i stället för tand.

Hufvudet och halsryggen täckta med (oftast) långa, spetsiga fjädrar.

Benen merendels mycket starka. Tarserna fjädrade eller nakna; tårna väpnade med mycket starka, krökta klor.

Vingarna långa och breda; 1:sta vingpennan kort, något kortare än 7:de; 2:dra kortare än 3:dje, 4:de och 5:te längst.

Bland Örnarna finnas de största Arter i Slägtet, och de starkaste af alla Rofoglar. Med klorna gripa de lefvande rof och bära dem till sina ungar; men de lefva ej, som de föregående, uteslutande af sådana rof som de sjelfva dödat, utan i nödfall kasta de sig äfven på kadaver. De flesta arter lefva isynnerhet af Däggande djur och större foglar; andra nära sig hufvudsakligen af fiskar, och några få förtära äfven Amphibier och Insekter.

Deras flygt är hög och stark; deras blick skarp, och deras mod merendels djerft.

De hithörande Arter skiljas vidare i två underafdelningar:

Första underafdelningen:

Landtörnar. (Aquila, Cuv.)

Tarserna fjädertäckta ända till tårna.

9. Kungsörnen. (Falco Chrysaëtos, Linn.)

Artm. Hufvud och hals ofvan gulbruna, inunder svarta. Kroppen ofvan mörkbrun, inunder svartaktig. Stjerten afrundad, längre än vingarne, gråspräcklig eller hvit, med yttre tredjedelen svartaktig.

Längd 3 — $3\frac{1}{4}$ fot; vingbredden 7 — $7\frac{1}{2}$ fot.

Falco Chrysaëtos, Nilss. Ornith. Svec. I. p. 1. — *Aigle royal*, Temm. Man. d'Ornith. I. p. 38. — *Steinadler* Meyer Vögel Liv — u. Esthl. p. 2.

Gammal fogel: *Falco chrysaëtos* Lin. Faun. Svec. p. 19. — Syst. nat. I. p. 125. n. 5. Lath Ind. Orn. I. p. 12. n. 8. — *Aigle royal*, Buff. pl. enl. 410.

Ung fogel: *Falco fulvus* Lin. Syst. I. p. 125. n. 6. — *Aigle commun* Buff. pl. enl. 409. Edw. av. I. t. 1. — Sv. Örn, Landtörn, Gullörn, Skogsörn.

Beskrifn. Gammal fogel: Hufvudet och halsen ofvan täckta med långa, tillspetsade rödbruna fjädrar, som i kanterna och spetsarna äro blekare gulbruna. Pannan brunaktig. Rygg, skuldror och vingtäckare mörkbruna, med der och hvar inblandade gråa fjäderkanter. Vingpennorna svarta. Underhakan och strupen rent svarta. Undra delen af halsen, bröstet och magen svarta med rödbruna fjäderaknter, som isynnerhet äro breda och märkbara på bröstet, hvilket deraf synes rödbrunt med svarta långsfläckar. Tarserne fjädertäckta ända till tårna, samt låren invändigt rostbruna. Stjerten något af-

rundad, brun, oregelbundet spräcklig med hvitt och askegrått, ut mot spetsen enfärgadt svartaktig, $2\frac{1}{2}$ — 3 tum längre än de hoplagda vingarna. Näbben blåaktigt svart. Näbbhud och tår gula. Iris brun.

Anm. Den beskrifna är mycket gammal. En dylik förvaras på Academiens Museum i Lund.

Ung fogel: Det rostbruna på hufvudet och halsen är dunklare och intager en mindre rymd än hos de gamla. Både pannan och hjessan äro mörkbruna. Främre ryggen svart, bakre mörkbrun. Skuldror och vingar täckta med svarta och gråbruna fjädrar. Underhakan och strupen svarta; halsen för öfrigt, samt bröstet, magen och de långa lårfjädrarne brunaktigt svarta. Tarserna och låren på insidan hvita. Stjerten hvit från roten till två tredjedelar af sin längd, derefter svart. Dess undra täckfjädrar sinutsigt hvita; dess öfra hvita och mot spetsen svarta.

Anm. Mellan dessa här beskrifna åldrar finnas flera öfvergångar. Småningom utvecklar sig den brungula färgen på hufvudet och halsryggen, samt blir ljusare och intager större rymd. Låren få invändigt bruna fläckar. Stjertens hvita del blir i yttre pennan askegrå och börjar att få små bruna fläckar i närheten af dess svarta del. Dess undre täckfjädrar få bruna fläckar o. s. v.

Varierar tillfälligtvis: helt hvit. Denna artförändring är mycket sällsynt. En sådan skall, för flera år sedan, ha blifvit skjuten här i Skåne.

Vistelseort och lefnadssätt: Kungsörnen har sitt stamhåll i stora och bergiga skogar, icke blott i Europa, utan äfven i Asien. På Skandinavien vistas han isynnerhet i de norra bergiga och skogfulla Landska-

pen, och träffas äfven i Lappland; men är i kusttrakterna mindre allmän än Hafsörnen. På Skånes slättbygder synes han väl endast under sina ströftåg om hösten och vintren. — Han är en i hög grad modig, grym och glupsk roffogel. Dess fruktansvärda vapen, näbb och klor, äro utomordentligt starka, krökta och spetsiga. Kroppen är undersättsig, benen och vingarna muskelfulla och kraftiga; dess ålder skall, om man kan sätta tro till uppgifterna, räcka öfver hundra år. Dess ställning är rak och majestätisk, dess syn skarp, dess rörelser raska, dess flygt snabb. Af alla foglar flyger denna högst, hvarföre han af forntidens folk blef kallad *himmelens fogel* eller *Jupiters budbärare*, och åt denne hedniske Gud var han helgad, liksom Påfoglen åt Juno och Ugglan åt Minerva.

Födämmen: Dessa bestå af varmblodiga djur, neml. Däggande djur, såsom Harar, Räfvar, Lamm, unga Getter o. s. v. samt större foglar, såsom Gäss, Orrar, Tjädrar, Ripor, Tranor, Storkar m. fl. Äfven anfaller han och dödar unga Hjortar, Renar, Rådjur och Kalfvar. Han förmår ej att höja sig upp från marken med ett rof af någon betydlig tyngd; icke derföre att han saknar styrka att föra det genom luften, utan derföre att vingarna äro långa och benen korta. Då klorna häfta i ett rof, kan han således icke gifva åt benen den spänstighet som fordras för att häfva honom så högt från marken, att vingarna kunna nog utveckla sig, eller få nog luft under sig. Af de större djur, som han faller, förtär

han derföre på stället så mycket han förmår, och afhugger derefter stora stycken, hvilka han förer till sitt näste. Hanne och Hona jaga merendels tillsammans, eller åtminstone i samma trakt, under alla årstider, undantagande när honan rufvar sina ägg; ty då jagar Hannen ensam och bär föda till sin maka. — Likasom alla Roffoglar, uppkastar Örnen hvarje morgon de bollar af hår och fjädrar, hvilka samlat sig i dess mage, hvarigenom kräfvan blir rensad och hans apptit ökad. — Då han ej har tillgång på lefvande djur, går han på friska kadaver, och man träffar honom ej sällan, isynnerhet vintertiden, der döda hästar blifvit utlagda. Sällan eller aldrig dricker han vatten; ty blodet af de djur han dödar är tillräckligt att släcka hans törst.

Fortplantning: Dess näste, som ej bygges blott för ett år, utan för hela lifstiden, är nära tre alnar i genomsnitt, och fullkomligt platt, utan någon märklig fördjupning, samt hopflätadt af torrt ris och käppar, betäckta med ljung, rör och grästorfvor. Detta näste bygger han på klippor eller på mycket höga träd. I medlet af Mars månad lägger Honan två, sällan tre ägg af smutsigt hvit färg och tecknade med rödbruna fläckar. Efter en månads rufning utkläckas ungarna. Så snart dessa kunna flyga, blifva de utdrifna för att sjelfva jaga, och så snart de förmå att sjelfva föda sig, få de ej längre vistas inom föräldrarnes jagtpark.

Jagt och fångst: Om vintren skjuter man dem i skottkoja på luder. Äfven gå de stundom på Räf-saxen och fångas der.

Nytta och skada: Den skada de göra ser man af deras födämner. Man har äfven exempel på att små Barn, som varit lemnade ensamma ute i skogs-trakter, der denna Örn haft sitt näste i grannskapet, blifvit af honom anfallna och bortförda. Pontoppidan omtalar, i sin Norska Naturalhistoria, (II. sid. 169.) en sådan händelse, hvilken skall hafva tilldragit sig år 1737 i Norderhougs socken i Ringerige. En Gosse af två års ålder låg naken och lekte för sig sjelf på marken ej långt ifrån sina föräldrar, som der arbetade. I en hast slog en Örn ner ur luften, högg klorna uti Gossen och förde honom bort med sig i Föräldrarnas åsyn, som ej nog hastigt kunde komma till för att rädda sitt barn. — Lyckligare aflopp en dylik stöld på en af Orkadiska öarna, der en Moder, som var sysselsatt att hämta ved, hade under denna förrättning laggt sitt späda insvepta barn ifrån sig på marken. En Örn infann sig, högg sina klor i barnets svepning och bortförde det genom luften. På Modrens skrik och jenmerrop anlände snart fyra Män, som genast rodde till det ställe der de visste att Örnen hade sitt näste, samt återförde Barnet oskadadt. (Raji Prodr. Hist. Nat. Scot. Lib. III. P. II. p. 14). — På vissa trakter veta fattigt folk att draga fördel af de Örnnästen som finnas i deras grannskap. De besöka dem dagligen då Örnarna äro ute

på jagt, och borttaga det färska villebråd som blifvit fördt till ungarna; sedan desse blifvit flygvuxna, fastbinda de dem i nästet, för att så mycket längre förmå Örnarna att skatta åt dem.

Anm. I några sydliga trakter af Europa finnes en Landtörn, mycket lik föregående, men dock skild Art, hvilken man kallat *Kejsareörnen*; men som hittills icke blifvit funnen hos oss. Då det likväl icke är omöjligt att han äfven kan finnas här, vill jag utsätta dess skiljemärken:

Kejsareörnen. (*Falco imperialis*, *Bechst.*)

Artm. Hufvud och hals ofvan rödbruna; kroppen ofvan mörkbrun, inunder svartbrun; magen rödgul; några skulderfjädrar hvita. Stjerten ej längre än vingarna, kantig, askegrå, spräcklig med svart, och med ett dylikt band framför den gulaktiga spetsen. Iris gul.

Längd. 2 fot 6 tum — 3 fot.

Han skiljes från Kungsörnen äfven derigenom att näbbviken går ända under bakre brädden af ögat och att han har 5 plåtar på yttersta leden af mellantå. Hos Kungsörnen står näbbviken under främre ögonbrädden, och han har ej mer än tre plåtar på nämnde tå-led.

10. *Skrikörnen.* (*Falco nævius*, *Gmel.*)

Artm. Gråaktigt rödbrun med svarta vingpenor, och svartaktig, enfärgad stjert med ljusare spets.

Längd 22 — 24 tum.

Falco nævius, Nilss. Ornith. Svec. I. p. 7. — Gmel. Syst. I. p. 258. — Lath. Ind. Orn. I. p. 14. n. 18. — *Falco maculatus*, Gmel. Syst. I. p. 258. — Lath. Ind. Orn. I. p. 15. (ung fogel). — *Der Schreier* Bechst. N. D. 2. p. 226. *Schreiadler*, Mey. Liv — u. Esthl. p. 6. — *Aigle criard*, Temm. Man. I. p. 42.

Beskrifn. *Gammal fogel*: Hela kroppen rödbrun, stötande i grått; skulderfjädrarna långa och mörkare; lårfjädrarna och undergumpen ljusare bru-

na. Vingpennorna, de af första ordningen svarta, vid roten hvita; de af andra ordningen svartaktiga, vid roten gråaktiga med ljusare rödgråaktiga kanter i spetsen. Stjerten föga längre än vingarna, svartbrun, enfärgad, utom spetsen som är ljusare och rödgråaktig. Tarserna täckta ända till tårna med gråaktigt rödbruna fjädrar. Tårna och näbbhuden gula. Näbben svartaktig.

Ung fogel: Svartbrun med större och mindre ovala hvita fläckar på vingtäckarna och skulderfjädrarne samt ett rödgrått strek åt spolen som slutar hvarje fjäder på halsen. Inunder gråbrun med hvitaktiga droppformiga fläckar på låren.

Vistelseort: Denna Örn förekommer mycket sällan hos oss, och, så vida man hittills känner, endast i de trakter af Lappland som gränsa till Ryssland *). I dessa trakter förekomma sällan andra än gamla individer; de unga äro deremot talrika i södra Europa. — Dess stamhåll äro skogiga bergstrakter, isynnerhet der floder och insjöar finnas. — Han är mycket läraktig och blir snart tam; men han har ej ett mod och en styrka som svarar mot hans storlek. Dess läte är ett ängsligt klagande skrik, hvaraf han äfven fått sitt namn.

Födämnen: Dessa skola om sommaren hufvudsakligen bestå af Insekter. Under sina ströftåg, de

*) Den *Falco naevius*, som omtalas i H:r Zetterstedts Lappska Resa II Del. p. 163 är ej annat än en *Vråk* (*Falco Lagopus*). Exempläret kan ses på Museum.

andra årstiderna, angriper han äfven och förtär dag-gande djur och foglar.

Fortplantning: Sitt näste bygger han i höga träd, och lägger två hvita ägg, tecknade med rödbruna strek.

Andra underafdelningen:

Fisk-Örnar eller Sjö-Örnar. (*Haliætus*).

Tarserna blott till hälften fjädertäckta, eller ock helt nakna.

A) *Tarserna* till hälften fjädertäckta; Lårfjädrarne långa. (*Haliætus*, Savigny).

11. Hafs-Örnen. (*Falco Albicilla*, Linn.)

Artm. Stjerten rundad, icke längre än vingarna; dess medlersta pennor $11\frac{1}{2}$ tum, dess sidopennor 10 tum.

Fjäderbeklädnaden hos unfoglar: rostgrå med svarta fläckar; hufvud och hals svartaktiga; stjerten svart, i inre pennfanen vit och spräcklig; näbben svart.

— hos de gamla: grå, med hufvud och hals blekare gråa eller vitaktiga, samt rent vit stjert; näbben gul.

Längd $2\frac{1}{2}$ — 3 fot.

Falco Albicilla Lin. Faun. p. 19. — Lath. Ind. Orn. I. p. 9. — Ödmann Acta Upsal. iv. p. 229. — Wachtmeister Vet. Acad. Handl. 1801. p. 175. — Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 11. (med uteslutande af några synonymer som höra till följande art). — *Der Fischadler* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 222. — *Hafsörn*, Svensk Zool. I. 2. n. 8. (ej mycket gammal). — *Ung Hafsörn*: *Falco ossifragus*, hos flera Författare. — *Der Seeadler*, Borkhaus. Teutsche Ornith. xvii.

Beskrifn. *Gammal fogel*: Hela kroppsbeklädnaden gråbrun med blekare gråa, breda fjäderkanter. Hufvud och hals ännu blekare gråa, stundom hvitaktigt gråa. Vingpennorna, de af första ordningen svarta, mot roten askegråa, med hvita spolar; mage och lårfjädrar bruna. Stjerten lika lång med de hoplagda vingarna, rundad, rent hvit, stundom vid roten spräcklig med brunt; dess undra täckfjädrar svartbruna; dess öfra hvita, vid spetsen och vid roten stundom brunspräckliga. Näbben vaxgul. Iris, näbbhuden och benen gula.

Ung fogel i första året: Hufvud och hals svartbruna, dock slutas hvarje fjäder med en ljusare rostgrå spets. Rygg, skuldror och vingar ofvan rostgråa med svarta fläckar; (ty hvarje fjäder är rödbrunaktigt grå och slutas med svart); inunder rostgrå med långsgående svarta fläckar, der och hvar på bröstet med hvitaktig infattning. Vingpennorna svarta. Stjertpennorna vid roten, i yttre fanet och i spetsen svartbruna, i inre fanet hvitaktiga mer eller mindre spräckliga af bruna småfläckar. — Näbben svart. Näbbhuden svart. Iris brun. Benen gula.

Ung fogel i andra året: Hufvud och hals ljusare bruna, eller gulbruna med ännu blekare fjäderspetsar; alla andra öfra kroppsdelar mörkbruna med något ljusare gråbruna fjäderkanter; på undra kroppsdelarna är hvarje fjäder hvit med yttre delen brun och ett brunt strek åt spolen af hvarje fjäder. Det

hvita på stjärt pennorna ökad, men ännu är dock roten och spetsen af hvarje penna svartaktiga och det öfriga mer eller mindre småfläckigt. Näbben ljusbrun, vid roten gulaktig. Näbbhuden gulaktig. Iris blekare brun än hos föreg. Benen gula.

A n m. 1. Dessa beskrifningar öfver unga Hafsörnar äro gjorda efter exemplar hvilka Hans Exc. H:r Grefve TROLLT WACHTMEISTER låtit som ungar taga ur nästet och uppföda. De förvaras nu uppstoppade på Acad:s Museum i Lund. — Det är således felaktigt som H:r Temminck påstår, att näbbroten och näbbhuden under första lefnadsåret äro gulaktiga. Denna färg erhålla de ej förr än de äro två år gamla.

A n m. 2. Ju äldre foglen är, desto blekare är hans brungråa kroppsbeklädnad och desto ljusare äro hufvud och hals. I Grillska Museum på Söderfors förvaras, under N:o 3, en mycket gammal Hafsörn som har hufvudet, halsen och öfra delen af bröstet rent hvita, endast med bruna fjäderspolar; strupe och stjärt äro snöhvita. Rygg och vingtäckare blekt askegråa. — Jag har trott mig böra anföra detta, emedan vissa Författare försöka att denna Art aldrig, till hvilken ålder han ock må komma, får hvitt hufvud. Se Temm. Man. d'Orn. I. p. 60. not.

Vistelseort och lefnadssätt: Hafsörnen vistas helst i bergstrakter och i skogar som finnas i grannskapet af insjöar, stora floder eller hafvet. Vid hafskusterna ser man honom ofta sitta på klippor eller stora stenar och lura på rof. Om vintren träffas han ej sällsynt vid det södra Sveriges hafskuster, och då dessa blifva tillfrusna, begifver han sig ut på isen vid sidan af det öppna vattnet. Om sommaren träffas han mera sällan i det sydliga och medlersta Sverige; men oftare har han denne årstid förekommit mig i halföns nordligare trakter, ända inom polcirkeln. Han

synes icke vara så modig eller liflig som Landtörnen. Blott några timmar om dagen jagar han lefvande rof, eller håller måltid på något kadaver. Den öfriga tiden sitter han vanligen stilla och hvilat sig i toppen af något högt träd, på en klippa eller en sten, från hvilken han har en vidsträckt utsigt. I denna sin fallenhet för lättja, äfven som deri att han förtär rutnande kadaver, visar han någon förvandtskap med Gamarna. Dess lukt måste vara utmärkt fin; ty på ett otroligt afstånd uppvädrar han kadavern. Dess läte, då han sväfvar i kretsar högt i luften öfver nästet, är ett gällt, hvisslande: *cri-cri-cri-cri-cri-cri* *). I fångenskapen blir han lätt tam, isynnerhet om han som unge uppfödes, och visar då mera feghet än mod. Man försäkrar att han då aldrig ofredar tama foglar, om han ock går lös bland dem på gården; utan tvärtom skyddar han dem, genom sin närvaro, från de mindre Roffoglar som skulle vilja angripa dem.

Födämnen: Dessa äro isynnerhet större fiskar, så väl hafs- som insjö-fiskar, samt vattenfoglar, såsom Gäss, Änder, Hägrar, Alkor m. m. Äfven angriper han unga Skälhundar, som simma i vattenbrynet. Någon gång slår han sina krokiga klor i de

*) Hr Boie tillägger detta skrik åt *Falco leucoccephalus*. Men att äfven *F. Albicilla* låter höra det vid nästet, kan jag af egen erfarenhet bevittna. Herr Dr Ödmann karakteriserar det på följ. sätt: *Vox avis penetrantissima est, acutissimo & abrupto sibilo haud absimilis. Act. Ups. l. c.*

gamla ; men då dessa äro af en större och starkare Art, måste han med lifvet plikta för sin djerfhet. Ty så snart Skälen märker sig vara angripen, rusar han genast ned under hafsytan, och Örnen, som ej nog hastigt kan lossa klorna, måste mot sin vilja göra honom sällskap. Samma öde väntar honom stundom då han hugger klorna i någon stor Helgflundra. Af däggande djur blifva oftast Lamm, Kid, Harar och Grisar hans rof. Då annan föda saknas, går han på as, och nöjer sig äfven med dem, som redan börjat äfvergå till förrutnelse ; till och med ruttnade och på stranden uppkastade fiskar uppsöker och förtär han med begärlighet.

Fortplantning: Vid hafskusten, på öarna eller i grannskapet af någon insjö, stundom ända till $\frac{1}{2}$ mil från vatten, bygger Hafsörnen ett stort flackt näste, af ris och tångrötter, bäddadt med mossor och halm, än på högsta spetsen af höga otillgängliga klippor, än i höga träd. Dess ägg äro hvita, till antalet två, stundom tre, af hvilka dock sällan mer än två, stundom blott *en* unge utkläckes, och blir vid lif. De gamla bära ofta lefvande rof till sina ungar, som det synes, för att tidigt lära dem att sjelfva mörda. Dessa rof bestå af mindre däggdjur, såsom Harar, Fjällräfvar m. m. samt foglar, isynnerhet vattenfoglar och större fiskar.

Anm. De Hafsörnar som man träffar vid nästet hafva alltid hvit stjert. Således fortplantar foglen sig icke förr än han fått sin beständiga färg. H:r Faber har gjort samma anmärkning.

Jagt och fångst: Man skjuter honom på luder vid skottkoja. Äfven fångar han sig stundom i Råfsaxen, då han vill borttaga betet.

Nytta och skada: Ses ofvanföre under Artiklen *födämn*. Äfven denna Örn skall någon gång hafva röfvat och bortfört barn till sina ungar. Se Bechst. och Ödmann p. a. st.

12. Hvithöfdade Öرنen. (*Falco leucocephalus*, Linn.)

Art. *Stjerten* längre än vingarna; *dess medlersta pennor* $13\frac{1}{2}$ — 15 tum, *dess sidopennor* kring 12 tum.

Fjäderbeklädningen hos unga foglar: *rostgrå med svarta fläckar; hufvud och hals svartaktiga; stjerten svart, i inre pennfanen rostgråaktigt spräcklig; näbben svart.*

— hos de gamla: *enfärgadt mörkbrun, med hufvud, halsrygg och stjärt rent hvita. Näbben vitgul.*

Längd 2 fot 11 t. — 3 f. 2 t.

Äldre: *Falco leucocephalus*, Lin. Syst. Nat. I. p. 124.

— Lath. Ind. Orn. I. p. 11. — *Aigle à tête blanche*, Buff. Ois. I. p. 99. pl. enl. 411. Cuv. Regne Anim. I. p. 315. — *Bald Eagle* Lath. Syn. I. p. 22.

Yngre: *Falco ossifragus* Nilss. Orn. Svec. I. p. 14.

Anm. De flesta Författares *F. ossifragus* är helt visst, som redan Herrar Ödmann och Wachtmeister anmärkt, yngre individer af *F. albicilla*; men jag är öfvertygad att under detta namn ofta en ung *F. leucocephalus* blifvit beskrifven. Ätminstone förvaras individer deraf i flera nordiska Museer under benämningen *F. ossifragus*, — en benämning som jag nästan är frestad att bibehålla för arten, då den andra så rakt motsäges af foglens ungdomsdrägt.

Beskrifn. *Gammal fogel:* hela fjäderbetäckningen är mörkbrun (chocolad-brun) enfärgad med

hufvudet, halsryggen och stjerten] samt dess täckfjädrar rent hvita. Näbb, näbbhud och ben gulaktigt hvita. Iris nästan hvit.

Ung fogel (troligen i första året): Hufvud och hals svartaktiga med ljusare brun spets på hvarje fjäder. Rygg, skuldror och vingar ofvan rostgråa (rödbrunaktigt gråa) med en svartaktig fläck i spetsen af hvarje fjäder; inunder rostgrå med svarta långsfläckar. Stjertpennorna svarta, i inre fanen småfläckiga och spräckliga med rostgrått och svart. (Det spräckliga går ända till spetsen).

Anm. Någon gammal fogel af denna Art, har jag ännu icke haft tillfälle att se. Beskrifningen deraf är lånad hos Cuvier och Meyer. Af unga foglar är det en hona som jag beskrifvit i Ornithol. Svec. I. p. 14; och en ung hanne, som förleden vinter blef skjuten här i Skåne, liknar fullkomligt honan både till färg och delarnas förhållanden; men är betydligt mindre. Dess längd är 2 fot 11 tum. Näbben från näbbviken 3 $\frac{1}{8}$ t. från pannan 2 $\frac{1}{2}$ t. Vingen från vecket sill spetsen 2 fot 1 $\frac{1}{2}$ t. Tarsen 4 $\frac{1}{2}$ t. Mellantån 2 $\frac{3}{4}$ t. dess klo 1 $\frac{1}{8}$ tum. Baktån 1 $\frac{1}{2}$ t. Stjerten som räcker vid pass två tum utom de hoplagda vingarna, är 13 $\frac{1}{2}$ tum lång, och dess sidopennor nära 12 tum. — Dess färg är så lik den ettåriga Hafsörnens, att man lätt skulle förblanda honom dermed, om ej stjerten, som dels absolut, dels relativt till vingarna, är längre än hos Hafsörnen, utvisade en skild Art. Ungfoglar af denna art torde ej under vintertiden vara sällsynta i södra Sverige, fastän man hittills icke skilt dem från förra Artens.

Vistelseort: Denna art tillhör egentligen norra Amerika; men det är mer än sannolikt att han äfven tillbringar sommaren och fortplantar sig ide nordligaste delarna af Europa. Enligt Hr Boie skall han under denna årstid finnas på Lofoden, och fastän icke Hr Boie fick skjuta något exemplar för att evident öfvertyga sig, så är dock uppgiften trolig och

vinner mera visshet derigenom att denna Art verkligen under vintren infinner sig i det södra Sverige. Att endast unga foglar under denna årstid här visa sig, är alldeles icke någon egenhet för denna art. Det samma inträffar med flera Falkarter, som om sommaren bebo den högre nordnen, och af hvilka endast ungarna infinna sig här i Skåne under vintren t. e. F. Gyrfalco, F. Lanarius m. fl.

Födämnena: Synes isynnerhet vara fisk. Han går äfven på kadaver, åtminstone om vintren.

Fortplantning: Okänd.

B) *Tarserna* nakna. *Lårffjädrarna* korta.
(Pandion, Savigny).

13. Fiskörnen. (Falco Haliætus, Linn.)

Art m. Manteln, och ett bredt band nedåt halsens sidor, mörkbruna; hufvud och halsrygg samt kroppens undra delar hvita, med mörka längsstrek på hjessan och bröstet. Stjerten kortare än vingarne. Klorna trinda.

Längd 22 tum — 2 fot.

Falco Haliætus Lin. Faun. p. 22. n. 63. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 16. — *Le Balbuzard* Buff. Ois. I. p. 103. t. 2. — Pl: enl. 414. — *Osprey Eagle* Lath. Syn. I. p. 45. — *Der Flussadler* Bechst. N. D. 2. p. 577. — Sv. Fiskhök, Sjöhök. Smål. Fisk-tjuf.

Beskrifn. Hufvudet ofvan mörkbrunt med gulaktigt hvita fjäderkanter; nacken och en del af halsryggen gulaktigt hvita med långsgående bruna strek. Från näbben, genom ögonen på sidan af halsen nedlöper ett bredt mörkbrunt band. Alla andra

öfra delar bruna, der och hvar med gråa fjäderkanter. Alla undra delar hvita, på öfra delen af bröstet med rostgult öfverdrag och bruna strek åt fjäderspolarna. Stjerten kortare än de hoplagda vingarna, tvär, dess sidopennor i inre fanet med hvita och bruna tvärband; dess medlersta pennor enfärgade, askegråbruna. Näbben svart. Iris gul. Näbbhud och fötter blåa. Lårfsjädarne mycket korta. Tarserne belagda med små skråfliga fjäll. Tårna inunder med skarpa taggar; den yttre vändbar, saknar hinna vid roten. Klorna trinda nästan lika stora, halfcirkelformigt böjda.

Varierar med flera eller färre fläckar på hufvudets öfra del och på bröstet. Stjertens tvärband mer eller mindre tydliga. — Troligen hörer *Falco Lapponicus* Sparr. i Svensk Ornithologi, som varietet till denna Art.

Vistelseort och lefnadssätt: Fiskörnen är hos oss en flyttfogel, som lemnar våra kuster vid vintrens början då insjöar och floder tillfrysa, samt återvänder om våren vid islossningen. Han förekommer i alla Landskap af Halfön, ända inom polcirkeln. I Skåne och i de nordligaste trakterna af Norrige och Lappland är han mera sällsynt; men desto talrikare i Rikets medlersta Landskap. Isynnerhet träffas han i sådana bergiga skogar, som gränsa till insjöar och floder. Mera sällan infinner han sig vid hafsstränderna, om icke i vissa trakter vid Östersjöns kuster och öar, der han skall vara talrik. Dess syn är ut-

märkt skarp, och han kan, från en betydlig höjd, upptäcka fiskens rörelser i vattenytan. Dess flygt är sväfvande, och då han varseblifver något rof, flaxar han deröfver, likt Tornfalken, med uppåtrigtade vingar och nedsträckta ben.

Föddämnena: Dessa bestå endast i fiskar, isynnerhet insjöfiskar, hvilka han upptäcker i vattenytan och angriper med klorna. Han säges kunna ur vatten upplyfta dem som väga ända till 5 — 6 skålp.; men stundom händer det att han hugger klorna uti större fiskar, t. e. stora Gäddor, hvilka draga honom med sig ned under vattenytan. Sitt rof förtär han sällan på stället; vanligen flyger han dermed bort till något träd, der han i all maklighet uppäter det.

Fortplantning: Sitt näste bygger han af ris och käppar i toppen af höga träd. Det är tätt och starkt bygdt, helt flackt ofvan, samt invändigt fodradt med mossor och grästorfor. Dess ägg, vanligen 2 à 3, sällan 4, äro smutsigt hvita och beströdda med stora och små rödbruna fläckar, som i större ändan äro nästan sammanlöpande.

14. Högbenta Örnen. (Falco longipes, Nilss.)

Artem. Manteln mörkbrun. Hufvud och hals vitaktiga med tätstående svarta fläckar; inunder rostgulaktigt vit med mörkbruna fläckar, som på de korta lårfjädrarna bilda tätstående tvärstrek. Stjerten lång, grå, med 8 smala svarta tvärstrek och ett bredare bånd framför den vitaktiga spetsen. Tarserna höga. Tårna korta. Längd 23 tum.

Falco longipes Nilss. Orn. Svec. I. p. 18. Tab. 1.
(fig. teml. dålig).

Anm. På anförda ställe är yttrat den förmodan att denna fogel kunde möjligen vara den samme som Bechsteins *F. leucopsis* (Naturg. Deutschl. 2. p. 572). Ännu har jag ej haft tillfälle att jemföra honom med nämnde Art från Tyskland; men en senare undersökning af det beskrifna exemplaret, som nu jemte den öfriga Paykullska fogelsamlingen förvaras i Stockholm i Vet. Akademiens Museum, har hos mig bekräftat min förut yttrade mening. Det är i min tanka en yngre individ, eller en Hona under ruggningen. Det oaktadt har jag här behållit namnet *F. longipes*, emedan det synes mig mera passande än något af de många andra, som samma fogel bär t. e. *Aquila leucomphoma*, *Aquila brachydactyla*, *Falco leucopsis* &c. Hr Temminck i sin *Man. d'Ornith.* I. p. 69. vill närma min fogel till *F. apivorus*, på hvad grund, är mig alldeles obekant, — eller ock vill han deraf göra en Kärrhök. Att det är en Örn synes dock äfven af figuren, ehuru dålig den för öfrigt är.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och halsryggen svarta; nacken och halsen ofvan beströdda med gulaktigt hvita fläckar, af hvilka en större finnes bakom hvardera ögat. Dessa fläckar uppkomma deraf att alla fjädrarna på nämnda delar äro hvita och blott i spetsarna svarta. (På de öfriga delar ofvan, äro fjädrarna vid roten ej hvita utan gråa). — Rygg och skuldror bruna med inblandade svartaktiga fjädrar. De mindre vingtäckarna mörkbruna med smala rostbruna kanter; de större, samt de inre vingpennorna, gråbruna med mörkbruna otydliga tvärstrek. Främre vingpennorna svarta, vid roten hvita med svarta tvärstrek; 1:sta vingpennan mycket kortare än den 2:dra; denna något kortare än 3:dje; 4:de och 5:te längst. Foglen inunder hvitaktigt ockerfärgad, med smala svartaktiga streck på en hvitaktig

tig botten under ögonen och på strupen, med mer breda fläckar på bröstet och magen, samt tätstående svarta tvärstrekar på låren, och glesa tvärfäckar på undergumpen. Stjertens öfra täckfjädrar svarta med breda hvita kanter. Stjerten grå med åtta smala mörkbruna tvärstrekar, och ett bredare svart band vid den hvitaktiga spetsen. Inunder synes stjerten hvitaktig med 4 — 5 smala, och ett bredare, mörkbruna tvärstrekar. Dess pennor äro vid roten och i inre fanet hvitaktiga, samt på senare stället tecknade med svarta tvärstrekar. Det medlersta paret är ljusgrått med det svarta bandet framföre spetsen, samt dessutom oregelbundet på längs fläckigt och strimmigt med svartaktigt.

Näbben stor, svart, inunder vid roten blek. *Näbbhuden* hvitaktig. *Näsborrarna* stora, sneda och äggformiga. Trakten mellan näbb och öga nästan bar, belagd med glesa hårliga fjädrar. Iris - - - Ögonlocken kantade med svarta hår. Hufvudet ofvan plattadt, tätt beklädt med temligen smala och spetsiga fjädrar. Lårens täckfjädrar korta och trubbiga. *Tarserna* höga, baktill nakna ända till hället, framtill något derunder fjädrade, för öfrigt nakna, fjälliga, endast framtill och baktill belagda med ringar. *Tårna* korta, ofvan belagda med tvärringar, af hvilka 12 på mellantån, 5 på den yttre, och 4 på den inre. *Klorna* svarta, starka, spetsiga, på sidorna hoptryckta utom den medlersta som inåt är utvidgad.

Längd 23 tum; Näbben från pannan till spetsen $1\frac{1}{2}$ t. från munviken $1\frac{3}{4}$ t. Från vingleden till vingspetsen, 15 tum. Stjerten $9\frac{1}{2}$ tum; Stjerten utom vingarna 4 tum; Tarsen $4\frac{1}{2}$ tum; Baktån $1\frac{5}{8}$ tum, hvaraf klon $1\frac{1}{8}$ tum; mellantån $1\frac{3}{4}$ tum.

Anm. 1. Hvad färg tarserna och näbbkuden haft kan ej bestämdt afgöras. På det beskrifna uppstoppade exemplaret äro de hvitaktiga, der de ej äro öfverstrukna med färg.

Anm. 2. Den beskrifna Foglen har, då han dött, varit inbegripen i fällningsperioden. De svarta fjädrar som der och hvar sticka fram på ryggen mellan de bruna, äro blodpennor.

Vistelseort: Denna fogel är på Skandinavien mycket sällsynt; ty så vida man hittills känner, är ännu ej mer än ett enda exemplar deraf skjutit, och detta är fälldt i någon af de trakter i Lappland som gränsa till Ryska området. — Dess lefnadssätt och sedvanor äro mig hittills alldeles okända.

IV. G l a d o r. (Milvus, *Bechst.*)

Näbben mycket koptryckt, vid roten föga böjd; öfverkäkens kant utan märkbar tand. *Munviken* gående tillbaka midt under ögat.

Hufvudet och halsen täckta med långa, smala och spetsiga fjädrar.

Tarserna korta, och fjäderklädda ett stycke nedom höckelleden.

Vingarna långa och sabelformigt böjda; den 4:de vingpennan längst; den 1:sta något längre än 7:de, mycket kortare än 6:te; 2:dra myc-

ket kortare än 3:dje, som är litet kortare än 4:de.

Stjerten klufven.

De hithörande foglar äro, i anseende till sin storlek, bland de fegaste och trögaste i hela släktet. De gripa aldrig sitt rof i flygten, utan endast då det sitter på marken eller i träd, kasta de sig derpå. Deras mycket långa vingar och breda stjärt göra att flygten är lätt, hög och utmärkt vacker. Med nästan orörda vingar synas de ofta liksom simma i luften och deri beskrifva bågar.

15. Alm ä n n a G l a d a n. (*Falco Milvus*, Linn.)

Artm. Ofvan rödbrun med ljusare fjäderkanter; inunder roströd med svartbruna långsstrek. Hufvud och hals hvitaktiga med bruna strek. Stjerten mycket klufven, rödbrun med svartaktiga tvärstrek.

Längd 2 f. 2 tum.

Falco Milvus Linn. Faun. Sv. p. 20. — Lath. Ind. Ornith. I. p. 20. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 25. (med uteslutande af de Synonymer som höra till *F. ater*). — *Milan royal* Briss. Ois. I. p. 414 t. 33. — Buff. Ois. I. p. 197. Pl. enl. 422. — *Rother Milan*, Bechst. Nat. D. 2. p. 591. — Borkh. Tentshe Ornith. 5 Heft. t. 1. 2. — Sv. Glada; i Skåne: Glänta; i Smål. Ormvåka.

Beskrifn. Hufvud och hals hvitaktiga med långsgående bruna strek. Rygg och vingtäckare mörkt rödbruna med rostbruna och hvitaktiga fjäderkanter. Bröst och mage ljusare rödbruna med svartbruna strek längs åt fjäderspolarna. Lår och undergump

blekt rostbruna med svartbruna fjäderspolar. De yttre vingpennorna svarta; de inre svartaktiga med rostbrunaktiga kanter. Stjerten mycket klufven, rödbrun med svartaktiga tvärstrek. Näbben svart. Näbbhuden och benen gula. Iris blekgul. Längd 2 fot, 2 — 4 tum.

Honan ofvan svartbrun med breda rödbruna eller hvitaktiga fjäderkanter; hufvudet och halsen, samt kroppens undra delar hvitaktigt rödbruna med ett svartaktigt strek längs åt spolen af hvarje fjäder.

Unge som nyligen lemnat nästet: Fjädrarna på hufvudet och halsen äro kortare, afrundade, rostbruna, mot spetsen blekare, smutsigt hvita, med ett svart strek åt spolen. Ryggen och vingtäckarne åt midten svarta, i kanterna rödbruna. Näbbhud, munvikar och undre näbbroten gula. Benen ljust gula. Iris blekgrå.

Anm. Hr Temminck fränkänner hufvudets fjädrar sina längsstrek, som verkligen finnas, och tillägger deremot stora hvita fläckar ned på halsen, hvilka det aldrig lyckats mig att kunna upptäcka, ehuru många unga foglar af denna Art jag undersökt.

Vistelseort och lefnadssätt: Gladan är en flyttfogel som om sommaren finnes i de flesta Landskap af Skandinavien, undantagande de nordligaste. I det södra Norrige, i det medlersta Sverige och isynnerhet i Skåne är hon en allmän rosfogel. I September flytta de flesta bort, och de sista lemna oss vanligen kring medlet af Oktober. Under vintren förekommer hon aldrig på vår Halfö; men hon återvänder till

Skåne i Mars månad, vanligen mellan den 20:de och 25:te, stundom något tidigare. Hon är således ett af vårens säkraste förebud, och då Landtmannen ser en Glada i luften, är han viss på att vintren är öfverstånden. Gladans stamhåll om sommaren äro skogar, så väl bergiga som jemna, och isynnerhet sådana som gränsa till flacka fält. Hon är af naturen trög, feg och skygg. Af Korpar och Kråkor låter hon bortjaga sig, och hon använder mot dem inga andra vapen än sina vingar, med hvilka hon, så hastigt och så högt som möjligt, söker att undfly deras förföljelser. Också är hennes flygt utmärkt hög och skön. Ofta då luften är klar och ren stiger hon till en sådan höjd, att hon för det oväpnade ögat synes blott som en liten punkt; och med alldeles orörda vingar sväfvar hon ej sällan kring i vida kretsar, hvarvid hon blott med stjertens rörelser styrer och rigtar sin kosa. Af dess högre flygt slutar Landtmannen till fortsarande vackert väder, och då hon sväfvar närmare jordytan anser han det som ett förebud till storm och rägn. Om natten hvilar hon sig i träd, om dagen ser man henne oftare sitta på stenar eller jordklimpar. Under flykten låter hon stundom höra ett hvisslande ljud.

Födämnena: Dessa bestå endast i mindre och svagare djur, samt fogelungar, amphibier och maskar. Alldeles oskicklig att gripa någon fogel i flykten, anställer hon jagt på gåsungar, ankungar, kycklingar, unga rapphöns, lärkor o. s. v. Fältmöss, mullvadar och rottor, samt ödlor, grodor, ormar, ormslår m. m.

blifva ofta dess rof, och dermed föder hon äfven sina ungar. Ofta går hon på kadaver, och ej sällan förtär hon döda och rutnade fiskar som flyta på vattenytan.

Fortplantning: Sitt näste bygger hon i toppen af höga träd. Dess underbädd består af större rispinnar, och inuti af mindre qvistar, stundom af strån, mossar och ull. Äggens antal 3, af smutsigt hvit färg, tätt beströdda med ljusbruna fläckar och punkter.

Anm. I Ornithol. Svecica I. p. 25. har jag upptagit *Falco ater* Gmel. och *Milan noir* Buff. såsom synonymier till den yngre *F. Milvus* Lin. Dertill föranledes jag af *Le Vaillant*, som i sin *Hist. Nat. des Ois. d'Afrique* 12:mo I. p. 157. försäkrar att hans *Parasite* är till arten skild från *Le Milan noir*, hvilken senare, enligt hans tanka, ej är annat än en ung *Allmän Gladan*. Han stödjer denna uppgift på egen erfarenhet. Han försäkrar att han tagit flera af dessa föregifna *Milans noirs* ur den *Allmänna Gladans*, nästen och uppfödt dem. — Efter senare undersökningar skall dock *F. ater* Gmel. vara samma Art som *Vaillants Parasite* och således skild från *F. Milvus*. — Denna *F. ater* finnes i Afrika och i södra Europa; men den hörer visserligen lika så litet till vår Fauna, som en del andra exotiska foglar, hvilka fordom deri blifvit upptagna. Åtminstone är denna Art ännu aldrig, mig vetterligt, funnen hos oss; och de uppstoppade exemplar som finnas i Museerna förskrifva sig alla från utrikes orter. I Vet. Acad:s Museum i Stockholm förvaras ett exemplar med följande karakterer:

Svarta Gladan. (*Falco Ater*, Gmel.)

Stjerten föga klufven, mörkbrun. Vingpennorna svarta. Kroppen mörkt rödbrun med hufvudet och halsen hvitaktiga och ett svart strek längs hvarje fjäder. Längd nära 2 fot.

Falco ater Gmel. Syst. I. p. 262. — *Milan noir* Buff. Ois. I. p. 203. pl. enl. 472 (yngre).

Finnes i Afrika, i det södra Europa, äfven i Tyskland; men är hittills aldrig funnen hos oss.

V. Vråkar. (Buteo, Bechst.)

Näbben liten och svag, krökt ända från roten; öfverkäkens kant med antingen alldeles ingen, eller ock en obetydlig utvidgning i stället för tand.

Tarserna korta, fjädertäckta antingen till tårna, eller åtminstone ett stycke nedom höckelleden; i senare fallet är benöfverdraget fram till deladt i tvärplåtar. Lårfjädrarna långa.

Kroppen tjock och undersättsig.

Vingarna temligen långa, breda och trubbiga. Den 1:sta vingpennan kort, ungefär som 8:de; 2:dra och 3:dje kortare än 4:de, som är längst.

Stjerten tvär, eller något rundad, föga längre än vingarna.

De till denna underafdelning hörande foglar utmärka sig genom en trög flygt, samt breda och trubbiga vingar. Deras hufvud är stort, deras kropp undersättsig; men deras näbb är liten i förhållande till kroppsstorleken, och deras klor sakna den styrka och skicklighet, som man träffar hos de flesta andra Roffoglar. Också fånga de aldrig något rof i flygten. De lefva derföre blott af svagare, mera värnlösa djur, såsom fogelungar, fältmöss, grodor, ödlor, insekter och maskar. De bygga sitt näste i träd.

16. Allmänna Vråken. (Falco Buteo, L.)

Artm. Ofvan mörkbrun; inunder än mörkbrun, än smutsigt hvit med talrika mörkbruna fläckar. Stjer-

ten föga längre än vingarne, mörkbrun med tolf gråa tvärstrek. Trakten mellan ögon och näbb beväxten med borstlika hår. Längd 1 fot 8 — 10 tum.

Falco Buteo, Lin. Fn. p. 21. Syst. I. p. 127. — Lath. I. p. 23. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 28. — *La Buse* Buff. Ois. I. p. 206. — pl. enl. 419. — *Common Buzzard*, Pen. Brit. Zool. I. p. 188. — *Mäuse-Bussard*, Bechst. Nat. D. 2. p. 623. — *Sv. Quidfogel, Musvåg, Musvråk, Slaghök*. Norr. *Skiör-vinge*.

Beskrifn. Gammal Hanne: Hela fjäderbeklädningen mycket mörkt brun eller svartbrun; på hufvud och hals enfärgad, på skuldror och vingtäckare med rödgråaktiga fjäderkanter. Strupen (*stundom*) hvitaktig med långsgående mörkbruna strek. Undradelen af bröstet samt magen och undergumpen tecknade med hvita vågformiga tvärstrek. Stjertens undra täckfjädrar med mörkbruna och hvita eller rostgula tvärstrek. Vingens undra täckfjädrar svarta med hvita eller roströda tvärlinier. Lårfjädrarne långa, svartbruna, ofläckade. Stjerten svagt rundad, med talrika rödgråa tvärstrek och ett bredt svart tvärband framför den rödgråa spetsen. — Näbben svart. Näbbhuden, iris och benen gula.

Ungre fogel: Ofvan mörkbrun med gråa eller rostfärgade fjäderkanter, isynnerhet på hufvud, skuldror och vingtäckare. Strupen hvitaktig med långsgående bruna strek. Halsen framtill och öfra delen af bröstet med stora mörkbruna fläckar som nästan löpa sammans, eller dess fjädrar äro kantade med hvitaktigt. Undradelen af bröstet och magen smut-

sigt hvit med hjertformiga mörkbruna fläckar. Låren mörkbruna med rostfärgade kanter och fläckar. Undergumpen smutsigt hvit (eller gulaktigt hvit), med glesa, spetsiga tvärläckar. Stjerten med talrika (10 - 12) gråa tvärstek och rostgrå spets. Näbben svart. Näbbhud och ben gula. Iris grå.

Anm. Ungefär sådana äro de flesta som man får här i Skåne om höst-tiden, och som då förekomma i stor mängd.

Varierar oändligen, så att ganska få individer fullkomligt likna hvarandra.

Variet. 1. Hufvudet och hela kroppen hvita stötande i ockerfärg med bruna fläckar på ryggen, och några glesa af samma färg vid sidorna af bröstet. Vingpennorne bruna med hvita spetsar. Stjerten i inre hälften hvit, i yttre askegrå med bruna tvärlinier och hvit spets.

Variet. 2. Hufvudet och hela kroppen inunder hvita med några få bruna fläckar på hjessan. Från näbbviken nedåt sidan af halsen står en rad af bruna fläckar. På bröstet stå talrika, nästan sammanlöppande, på magen små och glesa, bruna fläckar. De mindre vingtäckarna hvita med bruna fläckar.

Variet. 3. Hufvud och hals samt rygg och vingtäckare bruna med blekt rostfärgade fjäderkanter, isynnerhet på främre delen af halsen och på vingtäckarne. Under ögonen en hvitaktig aflång fläck. Bröst, mage och undergump hvita, ofläckade, med svag rostgul anstrykning. Övergumpen rostgulaktigt hvit, med en stor brun fläck i midten. Stjertpennorna vid roten och vid spolarne rostgulaktigt hvita med talrika gråa och bruna tvärlinier.

Var. 4. Hufvud och hals hvita med glesa bruna fläckar. Rygg och vingtäckare bruna med breda hvita fjäderkanter. Bröst och mage samt låren utvändigt hvita ofläckade. Låren invändigt och undergumpen hvitaktigt rostfärgade. De medlersta stjärt pennorna hvita med bruna tvärband; de öfriga med gråa och bruna tvärband.

A n m. Till varieteterne af denna Art höra *F. albidus* Gmel. och *Spotted Falcon*, Pen. m. fl.

Vistelseort och lefnadssätt: Qvidfoglen är en af de allmännaste roffoglar i Sverige. I Skåne förekommer han i mängd, isynnerhet höst och vår, då han flyttar till och från Europas sydligare länder. En och annan tyckes likväl qvarblifva hos oss under lindriga vintrar. Äfven träffas han i Rikets öfra landskap t. e. i Östergötland, Uppland, o. s. v. samt i vissa trakter af Norrige; någon gång förekommer han till och med i Lappland. Om sommaren vistas han i skogar som gränsa till ängar och fält, på hvilka sednare han merendels om dagen uppehåller sig. Han är en af de trögaste och oskickligaste roffoglar; ofta sitter han hela timmarna hopkrumpen på ett träd eller en gårdsgård, och endast den yttersta hunger drifver honom att jaga. Dess flygt är långsam och trög; stundom flyger han dock högt och svänger sig kring i vida kretsar nästan som Gladan. Han har en hög men klagande stämma, (*Gaah!*) hvilken han ej sällan låter höra, så väl då han flyger som då han sitter.

Födämnen: Dessa bestå isynnerhet i amphibier, såsom Ormar, Ormslår, Grodor, Ödlor m. m. samt stora Insekter såsom Gräshoppor o. d. Äfven förtär

han rägnmaskar, sniglar, snäckor m. m. Med sin långsamma flygt och stora oskicklighet kommer han lättast åt dessa rof. Rottor, Fältmöss, Mullvadar m. m. blifva också af honom anfallna. Bland andra djur griper han nästan endast Harungar samt Fogelungar. En enda gång har jag i dess näste funnit en till större delen förtärd Orrhöna. — Äfven går han ofta på kadaver.

Fortplantning: Dess näste finner man i skogarna på stora sträd, isynnerhet på gamla ekar eller bokar. Äfven på höga granar. Dess ägg, 3 — 4 till antalet, äro hvitaktiga med grönaktig anstrykning och tecknade med glesa gulbruna fläckar.

Nytta och skada: Qvidfoglen är mer nyttig än skadlig, emedan han förtär flera för menniskan skadliga än nyttiga djur. Kring Lyon, der han i mängd skall finnas om vintren, spisas han och anses för välsmaklig. Dess fett kan användas att smörja läder o. d.

17. Bi-Vråken. (*Falco Apivorus*, Lin.)

Artn. Trakten mellan näbb och ögon täckt med tät fjädrar. Stjerten gråaktig, tecknad med 3 — 4 bruna tvärband. Näbben saknar alldeles tand; klorna temligen räta.

Längd 22 — 24 tum.

Falco apivorus, Lin. Faun. Svec. p. 23. — Lath. Ind. Orn. I. p. 25. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 31. — *Wespenbussard och grauschnäblicher Bussard*, Bechst. Nat. D. 2. p. 656 och 664. — Sv. Slaghök. *Vesphök*.

Beskrifn. Näbben svart; öfverkäken måttligt böjd saknar alldeles tand på sidan. Iris och be-

nen gula. Klorna svarta, föga böjda. Näbbhuden mörkgrå eller gul, i senare fallet är stundom hela näbbroten äfven gul.

Varierar mycket efter ålder och kön. Stundom är hela foglen svartbrun, strupen hvitaktig tecknad med mörkbruna strek, magen med fläckar. Stjerten gråbrun med fyra breda svartbruna band och rostgrå spets.

Stundom är hufvudet på sidorne ljust askegrått; hufvan och manteln bruna med ljusa fjäderkanter; inunder gråbrun med mörkbruna lågsstrek, samt med hvita tvärfläckar på mage och undergump.

Stundom är han ofvan svartbrun med en liten hvit fläck i spetsen af hvarje fjäder på hufvud och hals. Inunder hvitaktig; på strupen med strek, på bröst och mage med breda fläckar af svartbrun färg. Låren och undergumpen gulaktigt hvita med bruna tvärfläckar. Vingpennorne svartaktiga, i spetsen tecknade med en hvit fläck. Stjertpennorna svartbruna, med tvärgående askegråa och hvita linier samt ett bredt svart band framför den hvita spetsen.

Skjuten i Augusti månad.

Stundom: Hufvud och hals ofvan rostfärgade med med bruna och hvitaktiga småfläckar. Pannan smutsigt hvit. Genom ögat en brun fläck. Rygg och vingtäckare svartbruna med rostfärgade fjäderkanter. Hela foglen inunder rostfärgad med bruna linier åt fjäderspolarne. Stjerten svartaktig med rostgråa tvär-
linier och ett svart band framför den hvitaktiga spetsen.

An m. Hit hörer *Falco dubius* Sparrm. Mus. Carlson. tab. 28. Lär vara en ung fogel.

Vistelseort och lefnadssätt: I de sydligare trakterna af Sverige är denna roffogel sällsynt, och i Skåne har jag ännu aldrig träffat honom. I Rikets medlersta landskap förekommer han deremot oftare *). Liksom föregående är han en flyttfogel, som om hösten lemnar Norden och återvänder hit om våren. Dess tillhåll om sommaren äro skogiga trakter, och isynnerhet sådana som gränsa till jemna fält. I lefnadssätt och färg äger denna hökart ganska mycket gemensamt med föregående. Dess flygt är långsam, trög och låg; undantagande under parningstiden då han, liksom Qvidfoglen, svänger sig högt upp i luften. Dess ljud är ett hvisslande: *kik, kik, kik*, hvilket han dock endast låter höra under fortplantningstiden, eller då han slåss med andra roffoglar, Kråkor och Korpar. (Bechst.)

Födämnena: Liksom föregående, kan denna hökart ingenting fanga i flykten. Han lefver derföre af fältmöss, mullvadar, grodor, ödlor och oskadliga ormar; äfven af Insekter, såsom Bi, vespor, humlor m. m. samt larver; stundom förtär han rägnmaskar och sniglar. I nödfall kastar han sig på kadaver.

Fortplantning: I småskogar eller i skogsbrynen lägger han sitt näste på höga träd. Dess 3 — 4 ägg

*) Dock torde föregående art någon gång blifvit ansedd för denna, isynnerhet af de Författare som icke nämna *F. Buteo*, men deremot påstå att *F. Apivorus* är allmän. I Müllers prodr. p. 10. n. 68. höra de Danska och Norrska namnen under *F. Apivorus* påtagligen till *F. Buteo*.

äro gulaktigt hvita, tecknade med stora rödbruna fläckar; stundom äro fläckarna så talrika och hopgående, att den hvita grundfärgen knapt synes. De späda ungarna näras i början med vespor, bi, larver och puppor; derefter födas de mest med amphibier, grodor och ödlor m. m.

18. Fjösbenta Vråken *). (*Falco Lagopus*, Bränn.)

Artm. Ofvan mörkbrun med rostgula fjäderkanter. Hufvud och hals rostgula eller vitaktiga med mörkbruna långsstrek. Magen tvärs öfver mörkbrun. Stjerten från roten utåt vit, och framför den vitaktiga spetsen brun. Tarserna fjädertäckta ända till tårna.

Längd 20 tum — 2 fot.

Falco Lagopus, Bränn. Orn. bor. p. 4. n. 15. — Retz. Fn. p. 62. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 8 (med utslutande af ett par synonymmer). — Graafalk, L. Parel. Act. Nidros. 4. p. 417. — Leem Lapp. p. 236. not. (Unge). — *Rauhfüssiger Bussard*, Bechst. Nat. D. 2. p. 647. Sv. Gråfalk. Norr. Graafalk.

Anm. Herr Temminck har i en not till sid. 66 af sin Manuel d'Ornith. anmärkt att jag misstagit mig då jag i Orn. Svec. bland synonymerne till *F. Lagopus* äfven anført *F. S. ti Johannis* och *F. pennatus*. Det sednare felet har likväl äfven Herr Temminck sjelf begått i första upplagan af sin bok. — På flera ställen i nämnde Arbete behagar H:r Temminck endast citera mig för de fel, som af många andra, äfven nyare Författare, blifvit begångna. Det ser nästan ut som H:r T. hade den goda tankan om mig, att jag ensam borde vara infallibel, — en artighet hvarföre jag är honom mycket förbunden.

*) Man torde ej ogunstigt upptaga denna provins-benämning. I flera trakter kallar man sådana höns, som hafva benen fjädertäckta, Fjösbenta höns.

Beskrifn. Näbben svart. Iris brun, stötande i gult. Näbbhud, munvikar och tår gula. Stjerten nästan tvär, knapt längre än vingarna. 1:sta vingpennan ej längre än dem af 2:dra ordningen; 2:dra knapt längre än 6:te, 3:dje och 5:te nästan lika; 4:de längst.

Hufvud, halsrygg, strupe och bröst rostgulaktiga eller hvitaktiga med mörkbruna långsgående strek och fläckar. Trakten mellan ögon och näbb beklädd af svarta hår med hvita dun vid rötterne. Rygg och vingar ofvan mörkbruna med rostgula fjäderkanter. Magen tvärsöfver, från ena sidan till den andra, mörkbrun, stundom med hvita fläckar. Låren och tarserna rostgulaktiga, de förra med större, de sednare med mindre bruna fläckar. Vingpennorna af första ordningen från spetsen öfver midten svarta, i yttre fanen askegråa, i inre vid roten hvita. Stjerten från roten utåt rostgulaktigt hvit, derefter svartbrun och i spetsen kantad med hvitgrått. Dess öfre täckfjädrar gulaktigt hvita med mörkbruna fläckar; de undra blekt rostgulaktiga, ofläckade.

Honan har mera hvitt och mindre rostgult. Hufvud, hals och bröst hvita med svartbruna långsstrek och fläckar. Stjerten från roten till två tredjedelar rent hvit. Lår, ben och undre stjerttäckare smutsigt hvita; de förra med bruna fläckar.

Ungarna äro nästan lika *honan*; hafva grå iris.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna roffogel tillbringar hos oss sommaren i de norra skogfulla trakterna af halfön, bland sjöar och berg, i Norrige,

Norrland och Lappland. I Skåne förekommer han endast någon gång under sina vandringar till och från sydligare länder *). I dess tröga och låga flygt samt ängsliga, hopkrympta ställning, igenkänner man lätt dess nära släktskap med Qvidfoglen. Endast under fortplantningstiden stiger han högt i luften och svänger sig der omkring, med nästan orörda vingar, i vida kretsar. Dess läte liknar Qvidfoglens, men är högre; och han är mindre skygg än de flesta andra roffoglar.

Födämnen: Isynnerhet rottor och möss af alla slag, samt grodor, ormar och insekter. Äfven ungharar och fogelungar.

Fortplantning: Dess näste lägges i höga träd, och, efter någras uppgifter, i bergrefvor. Äggen 4—5 hvita och skuggade med rödbrunaktigt.

VI. Kärrhökar. (Circus, Bechst.)

Näbben temligen liten svag och hoptryckt med platta sidor. Öfverkäkens kant med en mindre märkbar utdraging. Vid näbbroten finnas framåt-rigtade hår, som glest skyla näbbhuden och näsborrarne.

Tarserna långa och spensliga; klorna smala, men temligen långa och mycket skarpa.

*) Herr Temmincks påstående, att denna art under höst och vinter besöker det norra Europa, synes derföre mindre riktigt. Sannare synes oss Hr Bechsteins uppgift att en stor del individer komma om hösten från norren till Tyskland, och att några af dem under vintern flytta åt ännu sydligare länder.

Kroppen *smärt*.

Vingarna *långa*. 1:sta vingpennan kortare än 5:te; 2:dra något kortare än 4:de; 3:dje eller 4:de längst.

Stjerten *lång och afrundad*.

De hithörande foglar äro mindre oskickliga och oviga än Vråkarna; men de sakna det mod och den styrka som utmärker Falkarna. De nedkasta sig med temlig snabbhet öfver sitt rof, som de gripa på marken. De vistas merendels i jemna trakter, vid kärr och moras, der de bygga sitt näste på marken bland säf och gräs. Deras föda består mest i amphibier och fiskar, äfven foglar och små däggdjur.

19. Rödbruna Kärrhöken. (*Falco rufus*, *Lath.*)

Artm. Mörkbrun eller rödbrun; hufvan, nacken och strupen rostgulaktigt hvita. Vingpennor och stjertpennor utan tvärband.

Längd 20 — 22 tum.

Beskrifn. *Gammal fogel*: Hufvudet ofvan och en del af halsryggen rostgulaktigt hvita med långsgående bruna strek. Strupen rostgulaktig ofläckad. (Stundom finnes en dylik stor fläck på skuldran). — Öfra delen af bröstet rostgul med långsgående bruna fläckar. Hela öfriga fjäderbeklädningen ofvan mörkt rödbrun, inunder något ljusare rödbrun. Vingpennor vid roten hvita; de af första ordningen för öfrigt svarta, de af andra ordningen samt stjertpen-

norna askegråa. Näbben svartaktig. Näbbhud, ben och iris gula. Längd 21 — 23 tum.

Falco rufus, Lath. Ind. Orn. I. p. 25. n. 51. — Gmel. Syst. Nat. I. p. 266. — Retz. Faun. Svec. p. 65. — *Falco rufus* Auctor: Nilss. Orn. Svec. I. p. 21. n. 8. — *Wasserweihe*, Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 683.

Ung fogel: Fjäderbeklädningen ofvan mycket mörkt brun. Hufvudet ofvan och en del af halsryggen rostgulaktigt hvita, med eller utan långsgående bruna fläckar. Strupen rostgulaktigt hvit, ofläckad. Undra kroppsdelarne rödbruna, med eller utan ljusare fläckar på bröstet. Vingpennorna vid roten brungråa; de af andra ordningen samt vingtäckarne i spetsen kantade med rostgrått. Stjerten ofvan rödbrun, inunder grå.

Falco æruginosus, Lin. Faun. Svec. p. 66. — Nilss. Orn. Svec. p. 20. n:o 8. — Lath. Ind. Orn. I. p. 25. n. 53. — Bechst. N. D. 2. p. 671. — *Falco arundinaceus*, Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 681.

Anm. Unga och gamla individer af denna Art äro, ända till de sistförflutna åren, ansedda för två skilda Arter. I min Ornithol. Svec. I. c. beskref jag dem såsom en Art, men begick det misstag att med Bechstein och Meyer anse Författarnes *F. æruginosus* för äldre, och *F. rufus* för yngre, då det i sjelfva verket förhåller sig tvärtom. Herr Temminck har mycket orätt då han säger att jag tillagt den fullvuxne foglens synonymer åt års-ungen. De synonymer jag tillagt Författarnes *F. æruginosus*, höra till honom, och dem jag tillagt deras *F. rufus*, de höra verkligen dit. Hvari felet ligger har jag nämnt. — Att jag ensam citeras för detta fel, är ett vackert bevis på Herr Temmincks opartiskhet.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna roffogel hörer hos oss till de sällsyntare. Någon gång förekommer han dock, så väl här i Skåne, som i Rikets nordligare

Landskap och i Norrige. Han finnes aldrig i stora och täta skogar, utan endast bland buskar och rör, på sådana ställen som gränsa till moras, floder eller insjöar. Han är hos oss en flyttfögel.

Födämnena: Unga vattenföglar, grodor, ödlor, näbbmöss, vattenrottor, fiskar, samt sniglar och insekter.

Fortplantning: Sitt näste lägger han på marken bland rör och säf, eller i buskar nära vid vatten. Dess ägg, 3 — 4 till antalet, äro hvita och afrundade.

20. Kärrhöken med halskrage.) *Falco strigiceps*, Nilss.)

Artm. Hufvudets sidor (liksom hos Ugglorna) omgifna med en krans af täta styfvare fjädrar. Stjertpennorna tecknade med tvärband, och vingpennorna vid roten invändigt samt öfra stjerttäckarne hvita.

Längd 18 — 21 tum.

Hannen ofvan blågrå, inunder hvit, ofläckad.

Honan ofvan brun, inunder tegelfärgad med långsgående bruna fläckar.

Falco strigiceps Nilss. Orn. Svec. I. p. 21. — *Falco cyaneus* et *Pygargus* Lin. Syst. Nat. I. p. 126. nr: 10 et 11. — Edw. av. t. 225 (gammal hanne).

Beskrifn. *Hanne:* Hufvudet, ryggen och vingarne ofvan blågråa. Halsen framtill och öfra delen af bröstet ljusare blågråa; det öfriga af bröstet, samt magen, låren, undergumpen och vingarnes undra täckfjädrar rent hvita. Vingpennorna af första ordningen svarta, vid roten invändigt hvita. Stjert-

pennorna: de två medlersta askeblåa, enfärgade; de öfriga i yttre fanet askegråa, i inre fanet och vid spolen hvita med gråa tvärstrek. Stjertens öfra täckfjädrar hvita. Längd vid pass 18 tum.

Honan: Alla öfra kroppsdelar mörkbruna med rostgula fjäderkanter på hufvud, hals och vingtäckare. Hufvudets sidor hvitaktiga med en brun fläck på örontrakten. Mellan ögon och näbb en svartaktig fläck som går nedåt sidan af munviken. Alla undra kroppsdelar rostgula eller tegelfärgade med långsgående bruna fläckar, som på hals och bröst äro bredare, på mage och lår bilda smala strek. Vingpennorna utåt dunkelt gråa med glest stående svartaktiga tvärband. Stjertens medlersta pennor dunkelt askegråa med fem svartaktiga tvärband; de öfriga med rostgula och svartaktiga tvärband; alla i spetsen rostgulktiga. Dess öfra täckfjädrar hvita med en liten rödbrun fläck i midten af hvardera. — Näbben svart, vid roten inunder blek. Munvikarne gulgröna. Näbbhuden gul. Iris svartbrun. Benen gula. — Längd $21\frac{1}{2}$ tum. Stjerten 3 tum längre än de hoplagda vingarne. 3:dje vingpennan nästan lika lång som 4:de.

Anm. 1. Den beskrifna är en Hona — kanske yngre — skjuten i Oktober.

Anm. 2. Herr Montagu har för några år sedan upptäckt en Hökart som kommer mycket nära den beskrifna och som han kallar *Falco cineraceus*. Då jag icke tviflar på att ju äfven denna finnes i Sverige, vill jag här i korthet uppgifva dess karakteristik, jemförd med den beskrifnas:

Falco Strigiceps:

Stjerten räcker med en tredjedel utom de hoplagda vingarne. Vingpennorna vid

Falco cineraceus:

Stjerten ej längre än vingpetsarne; vingpennorne vid roten jävändigt (hos

roten invändigt hvita; den 3:dje och 4:de lika långa. Mage och undergump (hos hannen) hvita ofläckade. Lgd 18 — 19 till 21 tum.	Hannen) svarta; den 3:dje längst. Mage och undergump (hos hannen) hvita med rödbruna långsfläckar. Längd 17 — 18 1/2 tum.
---	---

Vistelseort och lefnadssätt: Denna roffogel är hos oss mindre allmän, och i Skåne har jag endast sett honom om våren och hösten under sina vandringar. Dess tillhåll äro jemna trakter, der sjöar, dammar och moras finnas. Stora skogar besöker han sällan, utan bevistar blott de skogsbryn som gränsa till flacka fält. Om hösten i September och Oktober månader finner man rätt ofta de yngre här i Skåne, vid kärr, mossar, åar och andra sumpiga ställen, öfver hvilka de merendels flyga nära vid jordytan för att söka rof. Äfven ser man dem, liksom de äldre om våren, öfver åkrar och fält *). Då han varseblifver en fogel eller rotta på marken, stannar han en stund flaxande deröfver, och kastar sig sedan med temlig snabbhet nästan lodrätt ned öfver sitt rof. Ofta förfelar han det dock; ty han har hvarken den styrka i klorna, eller den snabbhet i vingarna, som utmärker de egentliga Falkarna.

Föddämnena: Grodor, ödlor, rottor och mullvar. Äfven slår han efter rapphöns, vaktlar och småfogel. And-ungarne hafva i honom en af sina farligaste fiender.

*) På afstånd kan man lätt taga den gamla hannen för en fiskmåsa; ty både flygt, färg och vistelseort äro temligen lika.

Fortplantning: Sitt näste lägger han på marken på sumpiga ställen bland säf och högt gräs. Äggen 4 — 5 blåaktigt hvita, ofläckade.

ANDRA UNDERORDNINGEN.

Uggleartade Roffoglar. (Raptatores strigini).

Hufvudet stort, tätt beklädt med yfviga fjädrar; ögonen mycket stora, rigtade framåt och omgifna med en vid krets af styfva håriga fjädrar, hvilka från ögat såsom medelpunkt utgå strålformigt åt alla sidor *).

Näbben krökt ända från roten och der beklädd med en (stundom nog otydlig) näbbhud, vid hvars främre kant näsborrarna ligga, samt till större delen gömd bland de från ögonkretsen framåtliggande borstlika fjädrarne.

Tarserna alltid och tårna merendels tätt beklädda med mjuka yfviga fjädrar.

Tårna alldeles klufna: en bakåt, tre framåt rigtade, af hvilka likväl ut-tån kan äfven vändas tillbaka (är vändbar, digitus versatilis).

Fjäderbeklädningen är oftast mjuk, pennornas fan veka; flygten derföre merendels långsam och tyst.

*) Denna krets kallar jag ögonkretsen, och den krans af täta, uppstående, fjälligt lagda fjädrar, hyarmed den ofta omgifves, kallar jag slöjan.

Deras mage är mer muskulös än Hökarnas; deras tarmkanal kort *), deras blindtarmar långa och i botten utvidgade. Bröstbenet är smalt, kort och baktill medelst två djupa hak på hvardera sidan inskuret. Äfven gaffelbenet är mycket svagare än hos Hökarna. Det är neml. V-formigt, föga utspärradt, samt spensligt och tunnt. Häraf kommer det att flykten merendels är svag och föga uthållande.

En stor del af dessa foglar äro mest i rörelse om natten i månskenet, i gryningen eller i skymningen. Om dagen dölja de sig på mörka ställen i bergsrefvor eller murar o. s. v. emedan de äro besvärade af solljuset. Framkomma de om dagen, blifva de med skrik och larm förföljda af Skator, Kråkor och Sparfvar, hvilka samla sig kring dem och ofreda dem på allt sätt.

Alla hithörande foglar blefvo af Linné förda till ett enda Slägte, neml.

Uggle-Slägtet, (*Strix*, *Lin.*)

hvilket tillräckligen igenkännes af de för underordningen uppgifna karakterer.

A n m. Detta Slägte är ganska naturligt och bestämdt. Man har dock i senare åren försökt att dela det i många Släkten; men det gifvas sådana öfvergångar från det ena till det andra, att det är omöjligt att mellan dem uppdraga bestämda gränslinier. Hr Temminck har nyligen in-

*) Hela canalis cibarius från svalget till anus förhåller sig till kroppslängden som 3 $\frac{1}{2}$ å 4 $\frac{1}{2}$ till 1.

delat de egentliga Ugglorna i sådana som jaga om dagen, och sådana som jaga i skymningen; men han har ej kunnat uppgifva någon enda bestämd karakter hvarigenom de skiljas, och dessutom har han helt säkert misstagit sig, då han till de förra räknat *Strix lapponica* Sparrm, och till de senare *Str. passerina*, Linn.

Första Familjen:

Egentliga Ugglor. (*Strix*.)

Hufvudet slätt d. ä. utan långa fjädrar, som kunna uppresas öfver öronen.

Dessa åter kunna indelas efter olikheter i de yttre karaktererne och i lefnads-sättet, uti 2:ne underordnade Släkten:

I. Dag-Ugglor. (*Surnia*).

Hufvudet mindre; ögonkretsen liten, ofullkomlig, neml. upptill afbruten, är icke omgifven af någon slöja. Öronöppningen ej stor, oval, saknar flik framtill. Fjäderbeklädnaden styfvare; kroppen smärtare. 1:sta vingpennan vanligen lika lång med 4:de, 5:te eller 6:te, alltid längre än 7:de; 3:dje vingpennan längst.

Anm. *Str. passerina* gör, hvad vingpennornas förhållande beträffar, ett undantag.

De hithörande Ugglor jaga om dagen, utan att märkbart besväras af dess ljus, och deras flygt är mera hög och snabb. I anseende till lefnadssättet, äfven som till kroppsformen, stå de således emellan de Hökarta-

de Roffoglarna och Natt-ugglorna. De Skandinaviska Arterna äro följande:

1. Fjäll-Ugglan. (*Strix Nyctea*, Linn.)

Artm. Hvit antingen utan fläckar, eller ock tecknad med flera eller färre bruna fläckar och tvärstrek. Ansigte och fötter ofläckade. Stjerten svagt rundad. Näbb och klor svarta.

Längd 22 — 24 tum.

Strix Nyctea, Lin. Faun. p. 25. Retz. Fn. p. 78. Lin. Syst. Nat. I. p. 132. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 56. — *Chouette Farfang* Temm. Man. d'Ornith. p. 82. — *Strix nivea* Thunb. Vet. Acad:s Handl. 1798. p. 184. (Gammal Hanne). — *Great White Owl*, Edw. Birds II. t. 61. — *Harfang* Buff. pl. enl. 458. — Blumenb. Abbild. Naturh. Gegenst. t. 75. (En Hona). Ej en Unge, som Hr Temminck föreger. Jag äger flera hon-exemplar, skjutna om våren, hvilka alla äro likaså fläckiga, och en del ännu fläckigare än den afbildade. Sv. Snö-uggla, Fjäll-uggla, Harfång; Herjed. Fjällberg-uf. Nor. Lemens-gris, Gysfugl.

Beskrifn. Hufvudet temligen litet; Öronöppningen liten, oval; Ögonkretsen rent hvit, ofläckad, temligen stor, men ofullständig, ofvan afbruten, omgifves ej af någon så kallad slöja. Näbben svart, stundom helt och hållet gömd i hvita hårlika fjädrar. Iris skönt pomeransgul. Tårna klädda med yfviga dunfjädrar, som äfven till en del skyla de svarta krökta och skarpa klorna. Stjerten något rundad.

Hela foglens grundfärg är snöhvīt, antingen utan alla fläckar, eller också tecknad med flera eller färre bruna fläckar; dessa äro på hufvudet och halsryggen små rundaktiga, på ryggen, skuldrorna, vin-

garna, stjerten, bröstet och magen tvärgående, och bilda tvärstrek. Ansigtet, strupen och fötterna ofläckade. — Längden $22\frac{1}{2}$ — 23 tum; vingbredden 4 fot 8 — 10 tum; från vingleden till spetsen 16 tum; Stjerten $8\frac{1}{4}$ tum, räcker utom vingarna. 1:sta vingpennan lika med 4:de; 2:dra och 3:dje längst. *Hanne*.

Hannen: är 2 fot lång och dess vingbredd 5 fot 4 tum. Grundfärgen hvit, dock ej så snöhvīt som hannens, utan vanligen stötande i smutsigt gult samt tecknad med talrika mörkbruna eller svartgrå fläckar och tvärstrek. Ansigte, strupe och fötter ofläckade.

Anm. 1. Ju äldre foglen är, desto hvitare och mindre fläckig är han. Fläckarne bibehålla sig längst på hufvudet, skulderfjädrarna och vingtäckarna, der de slutligen äro mycket små, glesa och rundaktiga, samt vid spetsarna af ving- och stjertpennorna, på hvilka sistnämndas medlersta par de sist försvinna. Mycket gamla Hannar äro snöhvita, utan alla fläckar. — Hos individer af lika ålder är alltid Honan mer fläckig än Hannen; hvilket jag ofta haft tillfälle att iakttaga, då Hanne och Hona blifvit skjutna på en och samma gång.

Anm. 2. *Strix scandiaca*, Linn. som af flera Författare blifvit upptagen såsom egen art, stödjer sig endast på en figur i Rudbecks fogelverk, hvilken figur likväl nu mera saknas både i det De Geerska och det Grillska exemplaret af Rudbecks *aves pictæ*. En trovärdig Svensk Naturforskare har berättat mig att han för längre tid sedan sett den af Linné citerade Rudbeckska figuren i Grillska Bibliotheket på Söderfors, och att han fann denna figur föreställa *Strix Nyctea*. Detta och den korta beskrifning som Linné lemnat i *Fauna Svec.* är allt hvad man hittills känner om denna ofta omtvistade fogel. Hr Prof. Retzius förmodar att den kan vara en varietet af *Strix Bubo*; men anför honom dock som egen art i sin *Fauna*. Hr Temminck (p. a. st. p. 83 i noten) delar min öfvertygelse att ifrågavarande fogel är en *Strix nyctea*. Men då Hr Tem. i samma not kallar Rudbecks figurer dåliga, synes detta omdöme nog vågadt om ett verk som Hr Tem. visserligen aldrig sett, och som af alla kännare

måste anses för ett för sin tid utmärkt mästerstycke af skönhet och noggrannhet. — Det De Geerska exemplaret är vida bättre än det Grillska, hvilket senare lär vara en copie.

Vistelseort och lefnadssätt: Lapplands, Norrlands och Norriges fjällryggar och berg äro denna Ugglas egentliga stamhåll. Dock tyckes hon mera tillhöra de inre fjällarna i landet, än dem som finnas i grannskapet af hafvet. I Finnmarkens öknar utkläcker hon sina ungar i stela klippor och bergsrefvor (Leem), och på fjällen i Herjedalen skall hon äfven förekomma mindre sällsynt. På fjällen sitter hon vanligen på stenar och klippor, från hvilka hon söker att upptäcka något rof.

Endast mot vintren lemnar hon stundom fjällarna och begifver sig då äfven åt sydligare trakter af halfön. Till och med i det sydligaste Skåne insinner hon sig *alla år* i Oktober eller November, samt i Februari eller Mars månader, — hvaraf synes att åtminstone en del årligen flytta åt sydligare länder *). Under dessa ströflåg träffas hon alltid parvis, eller hanne och hona i samma trakt. — Dess flygt är hög och snabb som Falkarnas, och liksom dessa jagar hon om dagen, äfven i det klaraste solskenet, samt nedskjuter på sitt rof med pilens snabbhet i en nästan lodrätt riktning.

*) Det är derför orätt som Herr Temminck påstår att hon "alldeles icke utan af någon händelse lemnar polarkretsen". Tem. Man. I. p. 83. — Under nämde månader kan man hvarje år vara säker att få se henne på Skånska slättbygden.

Födämnena: Dessa bestå i foglar och mindre däggdjur, såsom vilda hönsarter, harar, rottor, m. m. Ripor, harar och fjällmöss utgöra på fjällen dess förnämsta näring. De förstnämndas sträcktåg följer hon om höst och vinter, liksom Jagtfalken, och de sistnämnda förföljer och utrotar hon äfven under deras periodiska vandringar. Äfven under sina flyttningar åt sydligare länder lefver hon hufvudsakligen af rottor och foglar *).

Fortplantning: Sitt näste lägger hon i stela klippor och bergsrefvor i fjälltrakterna uti det inre af landet. Dess ägg sägas vara till färgen hvita och till antalet 3 — 4.

2. Hök-Ugglan. (*Strix Ulula*, Lin.)

Art m. Ofvan mörkbrun och vitfläckig; inunder vit med tvärgående bruna strek. Stjerten lång, vigglik, brun med vit spets och 7 — 8 hvita tvärlinier.

Längd 15 — 16 tum.

Strix Ulula Lin. Fn. Svec. p. 26. Syst. Nat. I. p. 133. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 64. (Med uteslutande af några synonymer). — *Strix funerea* Tengm. Vet. Acad:s Handl. 1793. — Retz. Fn. p. 83. — Lath. Ind. Ornith. I. p. 62. — Temm. Man. d'Ornith. I. p. 86. — *Strix nisoria* Mey. Vögel Liv - u. Esthl. p. 31. — *The little Hawk Owl*, Edw. Birds t. II. tab. 62. — *Chouette à longue queue de Sibirie*, Buff. pl. enl. 463. — *Habichtseule* Bechst. N. D. 2. p. 984.

*) I nästan alla dem jag öppnat här i Skåne har jag i ventriklen funnit Rottor, isynnerhet Fältrottor (*Mus sylvaticus* Skand. Fn. I. sid. 161.) och hos dessa har alltid nacken varit krossad, om de ock för öfrigt varit hela.

Beskrifn. Hufvudet temligen litet och kroppen smärt, långlagd, med lång vigglik stjert. Ögon och öron mindre än hos de flesta i detta släkte. Ögonkretsen upptill afbruten, hvitaktig med många svarta borstfjädrar mellan öga och näbb.

Hufvudet och halsen ofvan svartaktiga, tätt beströdda med hvita fläckar, som på hufvudet äro små och runda. Från bakre delen af ögat går ett svart band som böjer sig i en båge kring örat och slutas ned på sidan af halsen. Bakom detta står en stor hvit fläck, och bakom denna, på båda sidor af halsryggen, en svart fläck; och en dylik finnes midt på halsryggen. Kroppen ofvan brun med hvita fläckar; dessa äro större och stå tätt på skuldrorna, på hvilkas utsida de bilda en enda mycket lång hvit fläck. Framryggen nästan ofläckad; öfvergumpen tecknad med hvita tvärband, och vingtäckarne med rundaktiga hvita fläckar. Undra kroppsdelarna hvita med tättstående tvärlinier på bröst, mage och undergump. Strupen gråaktig. Tvärt öfver bröstet går ett hvitt bredt band, nästan utan fläckar. Benen ända till klorna klädda med yfviga fjädrar, smutsigt hvita med otydliga bruna tvärstrek. Vingpennorna bruna, i inre fanet och (hos de flesta) i yttre kanten med hvita runda eller på tvärs ovala fläckar. Stjerten brun, vigglik, med hvit spets och 7 — 8 hvita tvärlinier, som på inre fanen af sidopennorna bilda bredare band. Näbben gul, öfverkäkens kant och hela underkäken svartaktiga. Iris ljusgul. Längden $14\frac{1}{2}$ —

15 tum; från vingleden till spetsen $9\frac{1}{2}$ t. Stjerten $7\frac{1}{4}$ t. räcker $3\frac{1}{2}$ t. utom vingarna, vigglik, sidopennorna $1\frac{1}{2}$ tum kortare än de medlersta. 1:sta vingpennan lika med 6:te; 3:dje längst.

Honan något större, kring 16 tum, har mindre rena färger och dess grundfärg inunder är smutsigt hvit.

Vistelseort och lefnadssätt: Hök-ugglans egentliga stamhåll äro de stora ödsliga skogarna i Rikets norra landskaper. I Herjedalen, Dalarna, norra Wermland o. s. v. förekommer hon temligen talrikt. Hon tyckes der intaga alldeles samma trakter som *Laf-Skrikan*. Under vintren stryker hon vidt omkring åt sydligare orter, och träffas då äfven, fastän mycket sällan, i Skånes skogar. — I sitt lefnadssätt har hon mycket gemensamt med Falkarna. Liksom dessa jagar hon midt på ljusa dagen, och dess flygt är hög och snabb. Vanligen sätter hon sig på den högsta spetsen i en hög gran, och låter den långa stjerten nedhånga. Stundom höjer hon stjerten, liksom Göken, med hvilken hon då, på något afstånd, har en icke obetydlig likhet. Hon är mycket skygg, och svår att komma inom skotthåll.

Föddämnena: Rottor, Lemlar och småfögel. Äfven säges hon förtära Insekter.

Fortplantning: Dess näste skall hon bygga på höga träd, och lägga två hvita ägg. — Dess hushållning är dock hittills icke tillräckligt undersökt.

3. Ugglan med gleshåriga tår. (*Strix psilodactyla*).

(*Strix passerina* Temm. men alldeles icke Linnés).

Artm. Ofvan gråbrun beströdd med hvita, droppformiga fläckar; halsen framtill vit, ofläckad, bröst och mage rödbrunaktigt hvita med bruna längsfläckar. Stjerten med hvita tvärlinier och hvitaktig spets. Tårna nästan nakna, glest belagda med hår.

Längd 8 — 9 tum.

Strix nudipes Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 68. —
Strix noctua Retz. Fn. p. 84. (Retzii beskrifn.). —
Kleiner Kautz Bechst. N. D. 2. p. 963. — *Strix*
passerina Temm. Man. d'Ornithol. I. p. 92. —
Meyer Vögel Liv - u. Esthl. p. 36.

Anm. Äfven denna Ugglan har af en och annan utländsk Ornitholog blifvit ansedd för Linnés *Strix passerina*. Men Linné kände i sanning icke och har ingestädes beskrifvit denna fogel. Dess *Strix passerina* är en helt annan art, hvilket jag redan sökt ådagalägga i Ornithol. Svec. och jag skall nedanföre vidare upprepa det. I Ornithol. Svec. kunde jag derföre, åt den här beskrifna arten, alldeles icke behålla namnet *Str. passerina*, som orätt blifvit den samma tillagdt af några nyare Författare. Jag valde namnet *Str. nudipes* emedan det var characteriskt; men jag fann snart, att samma namn förut blifvit af Daudin tillagdt en Amerikansk Ugglan. Jag har derföre ändrat det; men jag kan icke förmå mig att med Herr Temminck begå det, åtminstone likaså "grofva misstag" att kalla denna Ugglan för *Str. passerina*, och den verkliga *Str. passerina* Lin. för *Strix acadica* Lin., — ett namn som alldeles icke finnes i Linnés skrifter, och som, der det finnes, hörer till en helt annan Art.

Beskrifn. Hela foglen ofvan gråbrun beströdd med hvita rundaktiga fläckar som på hufvudet äro mindre och tätare, på ryggen och vingtäckarna större, ärt-lika; strupe och hals framtill rent hvita, ofläckade; bröst och mage rostbrunaktigt hvita, med långsgående nästan sammanlöpande bruna fläc-

kar. Vingpennorna bruna, i inre fanet med ovala, i yttre kanten med trekantiga eller halfrunda hvita fläckar, hvarigenom den hoplagde vingen, synes nästan rutig. Stjerten tvär, af ryggens grundfärg, med hvit spets och fem hvita tvärlinier. Tarserna fjäderklädda rostbrunaktigt hvita; tårna nästan nakna och glest belagda med borstlika hvita hår.

Näbben gulaktig, stark. Iris gul. Ögonkretsen liten, ofullkomlig (upptill afbruten). Öronöppningen oval, icke stor. Tarserne teml. höga; 1:sta vingpennan lika med 6:te, längre än 7:de; 2:dra lika med 4:de; 3:dje litet, längre, längst.

Vistelseort: Denna Ugglan är en af Sveriges sällsyntaste foglar, och hon är, så vida man vet, ej mer än en enda gång funnen hos oss, neml. i en kyrka på Skånska slättbygden. Dess stamhåll äro eljest gamla förfallna byggnader, äfven midt inne i städerna, kyrkor, torn, murar, gamla ihåliga träd o. s. v.

Anm. Dess lefnadssätt är mig icke af egen erfarenhet bekant. En del påstår att denna Ugglan ser ganska godt vid dagsljuset, och att hon då jagar Svalor och andra småfoglar. Hr Bechstein nekar detta, och försäkrar att hon bländas af sol-ljuset. Hon har dock alla yttre karakterer af en dag-uggla, och synes mig böra dela lefnadssätt med följande Art, hvilken visserligen icke bländas af dagsljuset.

Födämnen: Småfogel, rottor och möss af alla slag, samt insekter.

Fortplantning: Sina 2 — 4 hvita, rundaktiga ägg lägger hon i springor i gamla murar, under tak, eller i ihåliga träd.

4. Sparf-Ugglan. (*Strix passerina*, Linn.)

Artm. Ofvan askegråaktigt brun, beströdd med hvita punkter och småfläckar; inunder hvit med långsgående bruna fläckar. Stjerten med hvita tvärlinier. Fötterna beklädda med yfviga dunfjädrar ända till klorna.

Längd $6\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{8}$ tum.

Strix passerina, Lin. Faun. Svec. p. 26. — Syst. Nat. I. p. 133. — Rudb. av. pict. fol. 163. — Tengmalm Vet. Acad. Handl. 1793. p. 294. — Retz. Fn. p. 86. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 69. — Swartz Svensk Zool. Häft. 10. fig. 56. — *Strix pygmaea* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 978. — Meyer Vögel Liv- u. Esthl. p. 38. — *Strix acadica* Temminck Man. d'Ornith. I. p. 96.

Anm. Det är denna och ingen annan fogel, som Linné och med honom alla Svenska Ornithologer kallat *Strix passerina*. Tillräckeligt bevis härföre lemna deras beskrifningar och framför allt den citerade förträffliga figuren hos Rudbeck, som Linné påtagligen haft för ögonen vid bestämmandet af sin fogel. Utländska Ornithologer hafva misstagit sig om denna Art, och tillagt namnet *Str. passerina* åt helt andra, neml. än åt *Str. funerea* Lin. än åt vår *Str. psilodactyla*. Detta var förlåtligt då de ej hade tillgång till RUDBECKS planche-verk, ett hufvudverk vid bestämmandet af Linnés foglar i Fauna Svecica. Men sedan man fått säker upplysning härom, kan jag åtminstone icke inse, hvarföre man, med Hr Temminck, skulle tillägga den Linneanska benämningen *Strix passerina* åt en fogel som Linné aldrig sett och aldrig beskrifvit. Hr Temminck medgifver väl pag. 93, att Linné; *Str. passerina* synes vara hans *chouette chevêchette*; men tillägger att "denna art af Linné äfven fått namn af *Strix acadica*". — Detta är ett underligt misstag. Linné har icke någonsin eller någonstades tillagt någon fogel namn af *Str. acadica*. Latham har i sin Synops. I. t. p. 149. n. 38. beskrifvit en Uggla under namn af *Acadian owl*, och derifrån har Gmelin i sitt Syst. fått sin *Str. acadica*; men denna Uggla är Nordamerikansk, och tyckes äfven till färgen vara så betydligt skild från Linnés *Strix passerina*, att om man jemför denna med Lathams *Acadian owl*, synes man visserligen icke hafva skäl att förena dem.

Beskrifn. Hannen: Hela foglen ofvan mörkbrun med askegrå anstrykning, samt beströdd med hvita punkter och småfläckar. Örontrakten med tvärgående, böjda, hvita och svartaktiga linier; mellan öga och näbb en svartaktig fläck. Undra kroppsdelarna hvita; från strupen nedgår åt båda sidor en rent vit fläck som utbreder sig och bildar en trekant; bröstet tecknad med bruna nästan sammanlöpande fläckar, som på dess sidor äro tvärgående; magen med skilda långsgående strek. Vingarna bruna, i yttre kanten och i inre fanet med hvita fläckar. Stjerten temligen lång, tvär, brun med hvitaktig spets och 4 — 5 hvita, med mörkbrunt infattade tvärlinier.

Näbben gröngul med ljusare spets. Näbbhuden uppdrifven, hävld bakom de rundaktiga näsborrarna. Iris skönt gul. Ögonlockens kanter bruna. Ögonkretsen liten, ofullkomlig, upptill afbruten. Öronöppningen liten, oval. Tarser och tår tätt beklädda med yfviga, dunlika, hvita, utvändigt något brunaktiga fjädrar, ända till klorna; dessa äro svartbruna, teml. långa, mycket spetsiga. Fotsålorna gula. 1:sta vingpennan $\equiv 9$; 2:dra $\equiv 6$; 3:dje och 4:de längst. — Stjerten $2\frac{1}{8}$ t. räcker $\frac{6}{8}$ tum utom vingarna. — Längden $6\frac{1}{4}$ tum; vingbredden 11 tum.

Honan är större, men har samma färg som Hannen, utom det att hon ofvan stöter mindre i askeblått och dess bruna längsfläckar inunder äro glesare. Längd $7\frac{1}{8}$ tum; vingbredden $13\frac{1}{2}$ tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna vår minsta Uggla, och som icke är större än en Domherre, men

med något större hufvud, har sitt tillhåll i täta skogar, och tyckes oftare förekomma i Rikets medlersta Landskaper: Småland, Blekinge, Halland, Uppland m. m., än i det sydligare Skåne. Dock synes hon allestädes böra räknas bland de mindre allmänna foglarna.

Sparf-ugglan är en verkelig *Dag-uggla*, som icke blott flyger, utan äfven jagar midt på ljusa dagen, utan att märkbart besväras af dess sken. Då hon om vintertiden framkommer till gårdarne, blifver hon, liksom andra roffoglar, omgifven af sparfvar, hvilka med skrik och larm följa efter henne. Dock ser man dem alltid hålla sig på något afstånd, och vid dess minsta rörelser flyga de förskräckta undan. De tyckas af instinkt känna sin fara; ty Sparfugglan flyger ganska snabbt, samt äger både mod och styrka att tukta dem. — I hur kan man med småfogel underhålla denna lilla vackra Uggla. Hon klättrar der både med näbb och klor, liksom en Papgoja. Något annat läte än ett qvittrande: *kirr, kirr*, låter hon då icke höra.

Födämnen: Dessa bestå i rottor och småfoglar, hvilka hon fångar midt på ljusa dagen. Innan hon förtär sitt rof, befriar hon det med sorgfällighet från fjädrar och hår. — Äfven säges hon förtära Insekter.

Fortplantning: Sitt näste lägger hon uti ihåliga träd. Dess ägg äro hvita och till antalet vanligen 4.

II. Nattugglor. (Noctua.)

Hufvudet stort; ögonkretsen stor, fullkomlig, omgifven med en slöja, d. ä. en krans af täta, uppstående, fjälligt lagda fjädrar. Öronöppningen mycket stor, halfmånformig, framtill tillsluten med en flik af huden. Fjäderbeklädningen mjuk, yfvig, hvarigenom kroppen synes mycket undersättsig; 1:ta vingpennan vanligen ej längre än den af 2:dra ordningen, alltid kortare än 7:de; merendels äro 4:de och 5:te de längsta.

De hithörande Ugglor bländas af dagsljuset, hvarföre de dölja sig om dagen på mörka ställen i skogarna bland löf och qvistar, i ihåliga träd, i murar, torn, o. s. v. och framkomma först i skymningen, då de anställa sin jagt.

5. Lapp-Ugglan. (Strix Laponica, Sparrm.)

Artm. Ofvan brun beströdd med gulaktiga och hvita tvärvågor; inunder vit med bruna tvärstrek på hals och bröst, och långsgående fläckar på magen; några stora hvita fläckar på skuldror och vingtäckare. Stjerten lång, rundad, gråbrun, med gråa spräckliga tvärband och mörkbrun spets.

Längd 2 fot 2 — 4 tum.

Strix Lapponica Sparrm. Svensk Ornithol. (med en misslyckad figur). — Nilss. Ornithol. Svecica I. p. 58. — *Barred owl* Pen. Arct. Zool. 2. p. 234. — *Strix nebulosa* Temm. Man. d'Ornith. I. p. 88. och troligen äfven *Strix lapponica* Temm. I. c. p. 81.

Anm. Detta är den Uggla som i Paykullska, Thunbergska och Stockholmska Muséerne kallas *Strix Laponica*. Det var afl. Prof. Sparrman som först tillade henne detta namn; men den figur han deraf lemnat är mindre god. Prof. Retzius införde derefter denna Art i sin edition af Fauna Svecica; men då denna vördnadsvärde Lärde aldrig hade tillfälle att se sjelfva foglen, måste han hämta beskrifningen deröfver af andras skriftligt meddelade uppgifter. — Detta har jag måst anföra; då en hos Temminck p. a. st. under namn af *Strix Laponica* Retz. beskrifven Uggla synes mig tvetydig. Att min *Strix Laponica* är identisk med Sparrmans; är så mycket säkrare som jag haft tillfälle att undersöka just samma exemplar som Hr Sparrman låtit gravera; och att denna art är just den samma som Hr Temmincks *Strix nebulosa* och Pennants *Barred Owl*, ser hvar och en som jemförer beskrifningarna. Om derföre Herr Temmincks *Strix Laponica* är en från denna skild art, som Hr T. föreger, men hvarpå men dock tills vidare torde få tvifla; så bör den väl ej bära ett namn, hvilket redan längesedan blifvit tillägd en annan.

Beskrifn. Hufvudet ganska stort. Näbben ljusgul nästan helt och hållet gömd i fjädrar. Ögonkretsen stor, fullkomlig askegrå med koncentrisk (kretsformiga) bruna linier och en stor hvit fläck framtill mellan näbb och ögon; bakom denna, på främre sidan, är ögat till hälften omgifvet af en halfmånformig svart fläck. Ögonkretsen omgifven med en krans (slöja) af täta fjälligt stälda, af svart och gulaktigt på tvärs bandade fjädrar. Benen klädda med yfviga fjädrar ända till klorna, och dessa hårlika fjädrar bortgömma nästan den inre hvita hälften af klorna; den yttre hälften är svart.

Kroppen ofvan mörkbrun; hufvudet och halsen tecknade med bruna och gulaktiga eller hvita tvärfacklar på fjäderkanterna, hvarigenom dessa delar synas ofvan nästan beströdda med hvita eller gulaktiga vågor; ryggen och vingtäckarne på tvärs

spräckliga med hvitt och gulaktigt; några stora hvita fläckar finnas på de närmaste vingtäckarena och på skulderfjädrarna. Halsen framtill och bröstet hvitaktiga med bruna längsfläckar och tvärlinier; undra delen af bröstet och magen hvita med långsgående bruna fläckar utan sidovågor. Slaksidorna och stjertens undre täckfjädrar med tvärgående vågformiga linier. Benen smutsigt hvita med otydliga bruna tvärlinier. Vingpennorna med gråa spräckliga eller (på några af de yttre) hvita tvärband. Vingarnas undre täckfjädrar bruna med tätt strödda hvita fläckar. Stjerten gråbrun, mot spetsen mörkare brun, med 5 — 6 en half tum breda gråa, spräckliga tvärstrek; de två medlersta pennorna stundom öfver allt spräckliga, utom i den dunklare spetsen; stjerten inunder hvitaktig, på inre pennfanen spräcklig, samt med ett bredt mörkbrunt band i spetsen. Längd 2 fot 4 t.; från vingleden till spetsen $17\frac{1}{2}$ tum. Stjerten 12 t.; utom vingarna $4\frac{1}{2}$ tum. 1:sta vingpennan $2\frac{1}{2}$ tum kortare än 2:dra; 2:dra $1\frac{1}{2}$ tum kortare än 3:dje; 4:de och 5:te en half tum längre, längst. Stjerten rundad; dess sidopennor $1\frac{1}{2}$ tum kortare än de medlersta.

A n m. Ett annat undersökt exemplar är i alla dimensioner litet mindre.

Vistelseort: Lapp-ugglan förekommer på vår halfö endast i de trakter, som äro belägna inom och i grannskapet af polcirkeln. Ännu aldrig har man sett henne i de sydligare provinserne.

Dess lefnadssätt och hushålling är mig icke af egen erfarenhet bekant; men hon är identisk med

den Nordamerikanska *Strix nebulosa* Gmel., och om denna vet man att hon föder sig af harar, rottor och alla slags vilda hönsarter; lägger sitt bo i träd och värper två runda, hvita ägg.

6. Slag-Uggla n. (*Strix liturata*, Thunb.)

Artm. Ofvan gråaktig med bruna och hvita längsfläckar; inunder vitaktig med bruna långsgående strek. Stjerten lång, vigglik, brun med hvit spets och 5 — 6 vitaktigt gråa tvärband.

Längd 22 — 24 tum.

Strix liturata Nilss. Ornith. Svec. I. p. 59. — *Strix uralensis*, Pall. Itin. I. p. 455. — Lepechin Reis. 2. p. 181. tab. 3. — Temm. Man. d'Ornith. I. p. 84. — *Strix macroura* Meyer Vögel Liv - u. Esthl. p. 29.

Anm. *Strix Lindrothii* Sparrm. Svensk. Orn. fig. synes mig vara en utblekt varietet af denna Art.

Beskrifn. Till hela formuttrycket (*habitus*) synes mig denna Uggla komma närmast Katt-uggla (*Str. Aluco*), med undantag af den längre vigglika stjerten. Liksom hos denna är hufvudet stort och kroppen undersättsig. Ögonkretsen stor, fullkomlig, ljusgrå med svartaktiga fjäderspolar och framtill med många svarta hårlika strålfjädrar, omgifves med en krets (slöja) af täta, fjälligt lagda, hvit- och svartaktigt fläckiga fjädrar. Näbben gul till en stor del gömd bland de svarta borstlika fjädrar som från ögonkretsen ligga framåt. Öronöppningen stor, 1 tum lång med en flik framtill som tillslutar honom. Benen klädda med smutsigt hvita, nästan omärkligt fläckiga, dunfjädrar, hvilka på tårna äro kortare och dessa

äro i ändarna något nakna (liks. hos Str. Aluco). Klorna vid roten gulaktiga, utåt svartaktiga.

Hela foglen ofvan gråaktigt brun med långsgående hvita fläckar: medlersta delen af hvarje fjäder på hufvud, hals och framrygg är mörkbrun och dess sidor hvita eller tecknade med hvita ovala fläckar. De yttersta skulderfjädrarna hvita med ett smalt brunt strek åt spolen; de öfriga skulderfjädrarne och de öfversta vingpennorna gråa med långsgående bruna fläckar på de förra och tvärband på de senare. Undra delarna hvita med smala svartbruna strek längs åt fjäderspolarna och utan minsta spår till tvärstrek. Vingpennorna med bruna och hvitgråa (de förra en tum breda, de senare något smalare) tvärband och hvit spets. De öfra minsta täckfjädrarna samt bakryggen bruna ofläckade; de öfriga täckfjädrarna med större och mindre hvita fläckar. Stjerten brun med 5 — 6 hvitgråa tvärband och hvit spets. — Längd 2 fot; från vingleden till dess spets $14\frac{1}{2}$ tum; Stjerten 11 tum, räcker 4 — 5 t. utom vingarne, något vigglik, dess sidopennor 2 tum kortare än de medlersta. 1:sta vingpennan nära $2\frac{1}{2}$ tum kortare än 2:dra; denna $1\frac{1}{2}$ tum kortare än 3:dje; 4:de något kortare än 5:te som är längst. Tarsen $2\frac{1}{2}$ tum.

An m. Denna beskrifning är tagen af original-exemplaret till den anförda benämningen. Det förvaras ännu i Grillska Museum på Söderfors under N:o 17. Enligt Dr Lindroths anteckning i den skrifna katalogen var det Prof. Thunberg som först tillade foglen namnet Str. liturata. Benämningen Str. Uralensis Pall. torde väl vara äldre; men den är såsom local-benämning mindre riktig

och den af mig begagnade är redan längesedan genom tryckta skrifter bringad i omlopp. — Ett till storlek och färg med det beskrifna alldeles likdant exemplar äger jag själf från Wermeland, och detta är en Hona skjuten i Juni månad. I några Muséer förvaras individer som till alla dimensioner äro något mindre, neml. längden 1 fot 8 tum; från vingleden till spetsen 13 $\frac{1}{2}$ t. Stjerten 10 $\frac{1}{2}$ tum räcker utom vingarna 3 — 4 tum; men färgen är alldeles densamma. Troligen äro dessa Hannar.

Vistelseort: I skogarna uti Sveriges och Norriges nordliga Landskaper förekommer denna fogel, och som det synes, icke just sällsynt. Ända ned i Uppland och Wermeland har han flera gånger blifvit skjuten, äfven midt under Sommaren, hvilket tyckes visa att foglen också i dessa trakter fortplantar sitt släkte *). Eljest anser man polar-länderne för dess egentliga stamhåll.

Födämnen: Dessa bestå i rottor, småfoglar, riapor, hjerpar o. s. v.

Fortplantning: Hon säges lägga sitt bo uti ihålliga träd och värpa 3 — 4 hvita ägg.

7. Katt-Ugglan. (*Strix Aluco*, Linn.)

Artm. Spräcklig af brunt, grått, rostgult och hvitt med långsgående mörkbruna, i kanterne vågligt spräckliga strek, samt en stor långsgående vit fläck på skuldran.

Strix Aluco, Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 60. — *Chouette hulotte*, Temm Man. d'Ornith. I. p. 89. — *Nachtkautz* Bechst. Nat. Deutschl. 2. B. sid. 930.

*) Det förutnämnda Hon-exemplaret är skjutet i Norra Wermeland den 2:de Juni, af Herr Öfver-Jägmäst. H. Falk, och godhetsfullt mig tillsänt jemte flera sällsynta foglar. Hr Falk gör äfven den anmärkning att denna Ugglan hör till Natt-Ugglorna.

— *Strix Aluco* Lin. Fn. Svec. p. 25. n. 72. (Hannen). — *Strix stridula* Lin. Fn. p. 26. n. 77. (Honan). — Sv. *Haruggla, Kattuggla, Nattuggla, Skrik-uggla*; Norr. *Nat-uggle*.

Anm. Att *Strix Aluco* och *Stridula*, Lin. är en och samma Art bevises bäst genom Rudbecks fogelverk, jemfördt med Linnés Fauna. Se Ornith. Svec. I. p. 61. Obs. — Vet. Acad. Handl. 1816. p. 50.

Beskrifn. Om man borttager tvärvågorna hvaraf de mörkbruna längsfläckarna infattas, och tänker sig stjerten något längre; så har man fullkomligt bilden af föregående Art, både till form och färg.

Hufvudet mycket stort. Kroppen kort och undersättsig. Ögonen stora, framstående. Iris svart. Näbben gulaktig till större delen gömd bland de borstlika fjädrarna; näbbluden grönaktig. Ögonkretsen stor, fullkomlig, ljus grå, med afbrutet svartaktiga fjäderspolar och framtill med många svarta hårlika strålfjädrar, omgifves med en krets (slöja) af tätta, fjälligt lagda, af brunt, rostgult och hvitt tvärfleckade fjädrar. Öronöppningen stor, något mer än 1 tum lång med en flik framtill som tillslutar honom. Benen och tårna klädda med smutsigt hvita, utåt småfläckiga dunfjädrar; tårna i yttersta ändan något nakna. Klorna vid roten gulaktiga, utåt svartaktiga.

Alla öfra kroppsdelar tecknade med långsgående mörkbruna fläckar mellan hvilka de äro fint på tvärspräckliga med brunt, rostgult eller grått och hvitt: hufvudet ofvan, halsen och främre ryggen mer mörka; de bruna fläckarne mer svartaktiga och tätstående.

På de yttre skulderfjädrarna stå stora hvita fläckar som tillsammans bilda ett långsgående rent hvitt band. På vingarnas större täckfjädrar finnas äfven stora hvita fläckar. Undra kroppsdelarna hvitaktiga med långsgående svartbruna, i kanterne med brunt på rostgul botten vattrade fläckar. Undergumpen vit med bruna pil-lik fläckar. Vingpennorna med bruna och rostgråa, oredigt fläckiga tvärband. Stjerten kantig, dess pennor med bruna och rostgråa oredigt fläckiga tvärband och hvitaktig spets; det medlersta pennparet helt spräckligt, utan tvärband. — Längd 14 — 15 tum; vingbredden 2 fot 10 tum. Stjerten $6\frac{1}{2}$ tum, räcker nära två tum utom vingarna. 1:sta vingpennan mycket kortare än 2:dra, af lika längd med 9:de; 2:dra kortare än 6:te; 3:dje kortare än 4:de som jemte 5:te äro längst.

Honan är i allmänhet mera rödbrun än Hannen; neml. ofvan rödbrun der hannen är grå eller vit; den stora fläcken på skuldrorna samt grundfärgen på undre kroppsdelarna rostgulaktigt vit. Ögonkretsen rostbrunaktigt grå, framtill (vid näbben) med många svarta hårlika fjäderstrålar.

Ungarna likna *Honan*.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna är den allmännaste af alla våra Ugglor. Dess stamhåll om sommaren äro skogarna, isynnerhet täta löfskogar med gamla ihåliga träd. Här sitter hon dold om dagen i bergsklyftor, i hål uti träd, eller bland de tätaste grenar och snår. Först i skymningen lemnar hon denna hviloplats och flyger ut på jagt. Om vin-

tren visar hon sig ej sällan i trädgårdarne och vid husen, äfven på slättbygden. Dess flygt sker utan det minsta buller, emedan dess vingpennor äro utomordentligt mjuka och veka. Under parningstiden har hannen ett tjusande läte: *huh- huh- huh- huhuh*. Honans läte är deremot mer skrikande.

Födännen: Denna Uggla jagar aldrig om dagen, utan blott i skymningen eller i månskenet. Hon förtär rottor, fältmöss, mullvadar, samt grodor och skalbaggar. Också griper hon någon gång små foglar då de sofva, eller då de äro fångna i snara. Om vintren då rottorne samla sig i ladorne och sädesstackarne, infinner hon sig äfven der och förtär dem. Stundom besöker hon också dufslagen.

Fortplantning: Till näste väljer hon vanligen något öfvergifvet korpbo eller kråkbo; stundom ihålliga träd, bergshålor o. s. v. Dess 3 — 4 hvita, nästan runda ägg finner man vanligen i början af April. Under äggen finnes nästan ingen bale, blott litet smolk.

Nytta och skada: Denna Uggla, liksom dess flesta samslägtingar, är mycket mer nyttig än skadlig. Hon förtär och utrota en mängd skadliga rottarter, och högst sällan griper hon någon ung dufva eller annan nyttig fogel.

8. Perl-Uggla n. (*Strix funerea*, Lin. Fn.)

Artm. Ofvan kastanjbrun med hvita fläckar; inunder oregelbundet brun- och vit-fläckig. Stjerten med parvis ställda hvita fläckar och dylika i yttre fa-

nen af de främre vingpennorna. Fötterna klädda med yfviga dun.

Längd $9\frac{1}{2}$ — 10 tum.

Strix funerea Nilss. Ornith. Svec. I. p. 66. — *Noctua major* &c. Rudb. av. pictæ fol. 170, och derifrån *Strix funerea* Lin. Faun. Svec. n. 75. — *Noctua major* &c. Rudb. av. pict. fol. 165, och derifrån *Strix* . . . Lin. Fn. n. 74. — *Strix noctua* Tengm. Vet. Acad. Handl. 1793. p. 289. *Strix Tengmalmi* Gmel. Syst. I. p. 291. Lath. Ind. I. p. 64. Tomm. Man. d'Ornith. I. p. 94. — *Strix dasypus* Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 972. Meyer Liv- u. Esthl. p. 37.

Beskrifn. Näbben gulaktig, (mörknar efter foglens död), till en stor del gömd i framåtliggande hårlika fjädrar från ögonkretsen. Näsborrharna runda med uppdrifven hvälfd näbbhud. Iris skönt gul. Ögonkretsen som är stor, fullkomlig, hvit, utåt skuggad af svarta fjäderstrålar och inåt (mellan öga och näbb) tecknad med en svart fläck, omgifves med en krans (slöja) af svartbruna hvitfläckiga fjädrar. Öronöppningen stor. Klörna svartaktiga, långa, mycket skarpa. Fjäderbeklädnaden mycket yfvig, tät och silkesmjuk.

Hela foglen ofvan mörkt rödbrun eller kastanjbrun med hvita fläckar; dessa äro på hufvudet små rundaktiga och talrikare; på halsryggen och skulderfjädrarna större och bredare (bilda tillsammans på de senare en stor långsgående fläck); på ryggen få eller inga; på vingtäckarne små, runda, perlformiga. Undre kroppsdelarna tecknade med oregelbundna bruna och hvita fläckar: neml. hvarje fjäder brun med en hvit rund fläck i hvardera fanet,

eller ett hvitt band framför spetsen. Benen täckta ända till klorna med täta yfvida dunlika fjädrar, smutsigt hvita, oredigt brunfläckiga. Vingarna af ryggens färg; de yttersta vingpennorna i yttre kanten och i inre fanet med hvita fläckar. Stjerten kantig brun med 4 — 5 parstående hvita fläckar; spetsen enfärgad (ej hvit). — Längd $9\frac{1}{2}$ — 10 tum; vingbredden 22 tum; från vingleden 7 tum; stjerten 4 tum, räcker knapt 1 tum utom vingarna. 1:sta vingpennan kortare än 7:de; 2:dra något kortare än 3:dje som är litet längre än 4:de och längst.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Ugglas stamhall under sommaren äro stora och vilda skogar i de norra trakterna af vår halfö. I norra delen af Wermeland, Dalarna, Herjedalen, m. m. samt i Norrige, åtminstone ända till fjällryggen, förekommer hon under denna årstid. Huru långt mot Norden hon finnes, samt om hon är mer eller mindre sällsynt, känner man ännu icke bestämdt. Såsom mera tillhörande natten än dagen, är dess historia svår att utreda, och åtminstone ännu icke fullständigt utredd. Mot vintrens annalkande, i Oktober och November månader, infinner hon sig äfven i Skåne, och förekommer då, fastän mera sällsynt, i skogslundar och trädgårdar. Hon sitter vanligen gömd bland de tätaste grenarne, eller tryckt mot stammen. Man ser henne aldrig jaga om dagen; hon är föga skygg, och man finner lätt att dagsljuset besvärar henne. Blir hon uppskrämd t. e. af en kastad sten c. d., så flyger hon väl omsider; men dess flygt är osäker och vack-

ande, och hon sätter sig åter, så snart hon finner ett passande gömställe.

Föddämnena: Dessa äro i synnerhet rottor och småfoglar. Äfven skall hon förtära insekter.

Fortplantning: Hon säges lägga sina 3 — 4 hvita ägg uti ihåliga träd.

Andra Familien.

Ufvar, (Bubo.)

Hufvudet med två fjäderbuskar som kunna uppresas öfver öronen.

9. Berg-Ufven. (Strix Bubo, Lin.)

Artm. Ofvan fläckig och spräcklig med svart, ockergult och grått. Magen, sidorna och undergumpen tecknade med tvärgående smala, bruna linier. Fjäderbuskarna långa och nästan helt svarta.

Längd 2 fot 2 — 4 tum.

Strix Bubo Lin. Fn. p. 24. — Retz. Fn. p. 76. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 52. — Lath. Ind. Orn. I. p. 51. — *Le grand Duc*, Buff. Ois. I. p. 322. t. 22. — pl. enl. 435. — *Great eared Owl*, Lath. Syn. I. p. 116. — *Grosse Ohreule*, Bechst. N. D. 2. p. 882. — Sv. Uf, Hornuf, Berguf. Norr. Bierg-ugle, Berg-ule, Roper. Lapp. Lidnoh.

Beskrifn. Kroppen ofvan fläckig och spräcklig med svart och ockergult, samt med något hvitt eller grått på skuldror och vingar; inunder ockergul med långsgående svarta fläckar på hals och bröst, och med tvärgående dylika linier på mage, sidor och undergump. På strupen en vit fläck. Fjäderbuskarna öfver öronen långa (kring 3 tum).

svarta, i inre fanet med ockergult spräckliga. Stjerten rundad, längre än vingarna, med mörkbruna och ockerfärgade, spräckliga tvärband. Fötterna ända till klorna tätt beklädda med smutsigt ockerfärgade, otydligt brun-vattrade fjädrar. — Näbb och klor blåaktigt svarta. Iris rödgul. Klorna ljust bruna.

Honan är alltid något större än hannen, har något ljusare fjäderbeklädnad och saknar den hvita fläcken på strupen.

Vistelseort och lefnadssätt: Berg-ufven förekommer mindre sällsynt nästan öfver allt på halfön, från Skåne ända upp i polarländerne. Dess tillhåll äro bergiga och klippfulla trakter, så väl skogbevuxna som nakna. Äfven förekommer han på de klippiga och skoglösa öarne vid Nordlandens och Finnmarkens kuster. I det medlersta, bergiga och skogfulla Sverige synes han vara mest talrik. Till Skånes slättbygd kommer han endast under vintren, då han liksom Örarna stryker vidt omkring efter rof.

Berg-ufven besväras icke mycket af dagsljuset; man ser honom ofta jaga före skymningen, och då han sittande blir någon människa varse, upflyger han merendels redan på ett betydligt afstånd. Om dagen flyger han vanligen lågt; men om aftonen stiger han ofta ganska högt i luften. Dess rysligt tjutande stämman höres under nattens stillhet vidt omkring. Den har, på afstånd hörd, någon likhet med en i lifsfara stadd människas nödrop, och den har ej sällan, hos vidskepligt folk, gifvit anledning till spök-

historier *). — Berg-ufvens mod svarar mot dess styrka och storlek. Mot kråkor och korpar förer han ett beständigt krig, och han slåss stundom med sjelfva Örnen och bortjagar honom. Då Jägaren ser en mängd kråkor flyga i en krets i luften med skrik och larm öfver en viss fläck, och derpå slå ned samt åter sväfva upp, så kan han nästan vara säker att der sitter en Berg-uf.

Födämnena: Dessa bestå hufvudsakligen i harar, mullvadar, rottor och möss. Räfven är icke heller säker för honom. Äfven dödar han unga calfvar af hjortar, rådjur och renar. Större foglar, såsom tjädrar, orrar, ljerpor, änder m. m. blifva ofta hans rof.

Fortplantning: I bergsklyftor och hål lägger honan sina ägg, merendels utan särdeles underbädd. Äggen äro vanligen 2 — 3, högst sällan 4, nästan runda och till färgen hvita.

*) I kustbygderna och på öarne i det norra Norrige omtalar man en gast, som man kallar Roperen, och som stundom om nätterna låter höra sig från de klippfulla öarna, der han med ett ängsligt båt-båt! tillropar de förbiseigande. Denna förmenta gast, som fiskarena tro vara någon drunknad kamrat, är ingen annan än Berg-ufven. — I Tyskland skall Berg-ufven genom sitt skrik och larm, isynnerhet under fortplantningstiden, ha gifvit anledning till fabeln om den vilde Jägaren. Jag får likväl anmärka, att i det fallet är Tyskarnes wilder Jäger alldeles icke det samma som det man hos oss kallar Odens jagt, och som man får höra i luften om aftnarne efter solnedgången i November och December månader, isynnerhet i vissa trakter af Luggude och Ousjö Härad i Skåne. Detta liknar temligen en stöfwarejagt, och lär härleda sig från någon mot södren flyttande sjöfogel-art.

10. Skogs-Ufven. (*Strix Otus*, Linn.)

Artm. Ofvan spräcklig med brunt, ockergult och grått; inunder ljust ockergul med långsgående bruna fläckar. Öronsfjädrarna långa. Stjerten kortare än vingarna. Längd 1 fot 1 — 2 tum.

Strix Otus Lin. Fu, p. 24. — Lath. Ind. Orn. I. p. 53. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 54. — *Le moyen Duc ou Hibou*, Buff. Ois. I. p. 342. Pl. enl. 29. — *Die mittlere Ohreule*, Beshst. Nat. Deutschl. 2. p. 896. — *Longeared Owl* Lath. Syn. I. p. 121. — Sv. Horn-uggla.

Beskrifn. Hela foglen ofvan fint spräcklig af brunt, rostgult och grått, samt långs åt fjäderspollarna tecknad med smala bruna fläckar. På skuldrorna och vingtäckarna stå några större rundaktiga hvita fläckar. Öronsfjädrarne 6 — 8 till antalet och $1\frac{1}{2}$ tum långa, svarta, i inre kanten hvita, i yttre rostgula. Inunder är foglen ljust ockerfärgad med långsgående, på sidorna vattrade, bruna fläckar på bröst och mage. Undergumpen och benen offläckade. Vingpennorna vid roten rostfärgade, utåt tecknade med bruna tvärband. Stjerten nästan tvär, med rostgula och bruna tvärstreck. — Ögonkretsen stor, grå med inblandad rostfärg på dess bakre del, och hvit framtill; den omgifves med en krans af täta fjälligt lagda, med vitgult och brunt spräckliga fjädrar. Öronöppningen mycket stor, tillslutes framtill med en flik. Näbben svart, Iris brandgul. Stjerten 1 tum kortare än vingarna. Vingbredden 3 fot.

Honan är större och något ljusare till färgen.

Vistelseort och *lefnadssätt*: Denna Uggla hörer, åtminstone i det södra Sverige, till de mindre

sällsynta Arterna. Om sommaren har hon sitt tillhåll i täta skogar, isynnerhet i sådana der många gamla och ihåliga träd finnas; om vintren besöker hon ej sällan de mindre skogslundar och trädgårdar som finnas nå Skånes slätthyggd, och stundom ser man henne äfven i gamla förfallna stenbyggnader och torn i städerna.

Hon tillhör mer natten och är mer ömtålig för dagsljuset än Berg-ufven. Om dagen sitter hon derföre oftast dold bland de tätaste snår, eller på någon gren och tryckt till stammen, eller ock i något hål. Hon är icke heller så skygg som föregående. — Om en del af dessa Ugglor flytta mot vintren åt sydligare länder, vet man ännu icke bestämdt; men säkert är det åtminstone att de mot vintrens annalkande stryka omkring, stundom i flockar af 10 — 15, och infinna sig då i trakter der de eljest aldrig förekomma.

Födämnena: Dess förnämsta föda består i rottor och möss af alla slag: Fältmöss, vattenlemlar, mullvadar, näbbmöss o. s. v. Äfven förtär hon skalbaggar.

Fortplantning: Vanligen lägger hon sina ägg i något gammalt öfvergifvet kråkbo, dusbo, eller ekorrebo; sällan i ihåliga träd eller stenklyftor. Äggen 4 — 5, hvita, näsan runda.

11. Kortörade Ufven. (*Strix brachyotos*, *Lath.*)

Artem. Ofvan mörkbrun med rostgula fjäderkanter och fläckar; inunder kjust ockergul med långs-

gående bruna strek. Öronfjädrarne korta. Ögonkretsen svart. Stjerten kortare än vingarna med rostgula och bruna tvärband. Längd 13 tum.

Strix brachyotos Lath. Ind. I. p. 55. n. 11. — *Strix tota flammea*, Rudb. av. pict. — Lin. Fn. n. 73. *Strix brachyura* Nilss. Orn. Svec. I. p. 62. — *Hibou brachiote*. Tem. Man. d'Orn. I. p. 99. — *Strix Arctica* Sparrm. Mus. Carls. III. n. 51. — *Short eared Owl*, Pen. Brit. Zool. I. p. 204. n. 66. — *Die Kurzöhrige Ohreule*, Bechst. N. D. 2. p. 909.

Anm. 1. Denna Ugglan och en figur deröfver hos Rudbeck har varit den enda anledningen till införandet af *Strix flammea* i Fn. Svec.

Anm. 2. I Ornithol. Svec. satte jag denna Ugglan bland de slätthöfdade, ej af okunnighet om dess korta öronfjädrar; ty dem har jag nämnt, pag. 64, utan af öfvertygelse att de flesta som behöfva examinera denna Art, icke söka den bland Ufvarna. Det var derföre jag ej upptog namnet *Str. brachyotos*, och att jag i dess ställe kallade henne *Str. brachyura*, kom deraf, att hon, af alla slätthöfdade Ugglor som jag sett, har den kortaste stjert. — Hr Temminck förebrår mig i en not, att jag ökat confusionen genom en ny benämning. Jag för min del tror att ingen confusion kan derigenom uppkomma, då man så fullständigt utreder synonymien, som på nämnde ställe skett i Orn. Svec. — Hr Temminck erinrar i samma not att hans Manuel d'Ornith. utkom två år före min Ornith. Svec. — Hvertill denna erinran här tjenar, vet jag ej, om icke att jag deraf borde lärt, att denna fogel hörde till Ufvarna; men det visste ju många före Hr Temminck! — För öfrigt får jag en gång för alla förklara, att då jag år 1815 skref min Ornith. Svecica, (1816 då jag reste i Norrige trycktes boken och Förläggaren satte året 1817 på titelbladet), så hade jag aldrig hört Hr Temmincks namn, långt mindre sett hans bok.

Beskrifn. Kropps formen som hos föregående Art; men hufvudet mindre. Öronöppningen stor, halfmånformig. Ögontrakten temligen stor med en svart fläck, hvori ögonen ligga. Slöjan småspräcklig af svartbrunt och rostgult, samt med en större svart-

brun fläck på sidan. Öfver öronen på pannan sitta några få (2 — 4) fjädrar, kring $\frac{1}{4}$ tum längre än de andra, och hvilka foglen efter behag kan uppresas. På en död fogel ligga de ned och öfverses då lätt.

Hela foglen ofvan mörkbrun med rostfärgade fjäderkanter på hufvud och hals samt dessutom rostgula fläckar på ryggen och vingarna; inunder ljus rostgul med långsgående bruna strek på bröst och mage. Undergump och ben ofläckade. Underhakan hvit. Vingpennorna af första ordningen vid roten rostfärgade, utåt med bruna och rostfärgade tvärband. Stjerten med rostfärgade och bruna tvärband och hvitaktig spets. — Näbben svart. Iris gul.

Vistelseort och lefnadssätt: Dess-tillhåll om sommaren äro de norra trakterna af halfön, och hon förekommer då äfven inom polcirkeln. Endast under dess flyttning, höst och vår, träffas hon här i Skåne. Under dessa vandringar på de nämnde årstiderna, finner man henne icke sällan äfven på Skånes slättbyggd i torfmossar och på kärraktiga ställen bland högt gräs, der hon om dagen döljer sig, och uppflyger ej förr än man är henne mycket nära. Stundom träffar man ett större antal tillsammans.

Födämnena: Isynnerhet rottarter af alla slag. Hon följer och förtär fjällrottorna under deras periodiska vandringar; äfven lefver hon af grodor och insekter.

Fortplantning: Denna art ynglar endast i den högre nordn. Hon säges lägga sitt näste på marken på någon tufva, i en myr bland högt gräs. Äggen okända.

ANDRA ORDNINGEN.

Gångfoglar. (*Ambulatores, Illig.*)

Fötterna hafva tre tår framåt, en bakåt; framtårna antingen alldeles klufna, eller ock är den yttersta hopvuxen med den medlersta, med en, två eller tre täleder.

Näbben af åtskillig form: knifformig, kegelformig, syllik, m. m. rak eller något nedböjd, alltid bar (d. ä. saknande näbbhud) vid roten.

De till denna Ordning hörande foglar äro de talrikaste i hela klassen. Vid första påseendet tyckes Ordningens karakter vara blott nekande; ty den innefattar alla de Landtfoglar, som hvarken äro *Roffoglar*, *Klättrare* eller *Höns* *). Men ehuru en del af dessa foglar både till storlek och lefnadssätt äro mycket olika, så gripa de dock smånigom och oförmärkt genom föreningslänkar i hvarandra, och vid närmare betraktande finner man en sådan likhet i organisationen, och framför allt sådana omärkliga öfvergångar från det ena släktet till det andra, att det är svårt att mellan dem uppdraga skarpa gränser för afdelningarna, samt omöjligt att deraf bilda flera skilda Ordningar.

*) Man jemföre CUVIER *Regne animal* I. p. 334. — Hr Bar. CUVIER kallar de hithörande foglar: *LES PASSEREAUX*.

Till lefnadssättet äro de väl, i allmänhet sagdt, *omnivora*, — d. v. s. de lefva både af animalisk och vegetabilisk föda *). Likväl utgöra de i detta afseende, genom en mängd öfvergångar, föreningslänken mellan de af djurriket *endast* lefvande *Roffoglarne*, till de helt och hållet växtätande *Hönsen*. De Släkten, som hafva tjocka spetsiga näbbar med mer eller mindre böjd öfverkäke, och med en tand eller ett hak bakom spetsen, närma sig mera Roffoglarna och äro dem äfven i lefnadssättet mycket like. De njuta icke blott insekter, utan de förfölja, döda och förtära äfven mindre däggande djur, foglar och amphibier, och de äro till lefnadssättet så fullkomliga Roffoglar, att i detta afseende visst ingen skarp gränslinia mellan dessa fogel-ordningar kan dragas. — Oförmärkt blifva deras näbbar (genom en mängd Släkten) mer och mer tunna och fina, och de lefva i samma mån mer uteslutande af insekter, (aldrig af fullkomligare djur), och derjemte stundom af bär.

De deremot, som hafva kegelformiga, mer eller mindre tjocka näbbar med hela käk-kanter, utan någon inskärning eller tand, äro nästan uteslutande fröätande; och det i samma mån, som deras näbbar äro mer tjoc-

*) Jag har derföre börjat Ordningen med de Släkten hos hvilka denna egenskap renast framstår, neml. med *Corvus*, *Garrulus*; ej med *Lanius*, hos hvilken Roffoglarnes idé är mer utvecklad.

ka och starka. De åter bland *Helnäbbarna*, hvilkas näbbar äro mindre tjocka, lefva derjemte af insekter, och ju tunnare deras näbbar äro, desto mer uteslutande insektätande äro äfven dessa.

Deras mage är i allmänhet tjock och muskulös, och det i samma mån som de äro mer fröätande; de hafva vanligen två mycket korta blindtarmar. Hos dem, som fägnar oss med omvexlande toner och melodisk sång, finnas vid larynx inferior en mängd muskler, hvilka saknas hos andra foglar.

Deras flygt är, i allmänhet sagdt, icke så hög, snabb och uthållande som *Roffoglar*nas; men icke heller så kort och afbruten som *Hönsens*. Dock häri, liksom i den relativa längden af deras vingar samt i dessas byggnad, variera de ganska mycket. — Deras bröstben har vanligen blott en enda inskränning på hvardera sidan vid bakre kanten. Dock har *Blåkråkan* två, och *Biätaren* ingen.

Alla hithörande foglar lefva i engifte, eller hvarje hanne har ej mer än en hona. De draga gemensamt omsorg om sin afföda, och hos en stor del rufvas äggen vaxelvis af begga könen. Vanliga antalet af deras ägg är 6; i somliga släkten är antalet något större.

De flesta arter tillhöra skogarna eller fälten; en del bebo kala klippor, en del träffas blott vid vatten, och några finnas endast vid

menniskors boningar. De bygga i träd, buskar, bergsrefvor, murar, ihåliga träd eller på marken. Deras bo är mer eller mindre konstigt byggt, och bland dem träffas de, som i detta afseende förråda den mest förvånande konst-drift. De mesta uppehålla sig under fortplantningstiden parvis ensamma; en del äfven då flockvis, och många arter bruka att, sedan ungarna äro uppfödda, slå sig tillsammans i stora skaror och ströfva kring i skogar och på fält.

Hannen är vanligen något större än honan, och dess fjäderbeklädnad oftast vackrare och mer glänsande. De flesta rugga ej mer än en gång om året, nemligen om hösten; men hos en stor del äger en partiel ruggning om våren rum. De mista då en del af sin för sommaren öfverflödiga vinterklädnad, och hannarna få då vanligen en vackrare dräkt och bli mer olika honorna.

Köttet är välsmakande och läckert hos dem som mest lefva af korn, frö och bär; men segt, hårdt och illa smakande hos de omnivora med tjocka näbbar.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

Haknäbbar. (Incisirostres).

Öfverkäkens kanter bakom spetsen med en tand eller ett hak; spetsen mer eller mindre nedböjd.

Första Familien.

Tjocknäbbar, (Crassirostres),

eller

Kråkfoglar. (Coraces).

Näbben kegelformig, stark, medelmåttig, mer eller mindre hoptryckt, något böjd eller rak.

Näsborrharna täckta med framåtliggande styfva borstlika fjädrar, eller ock nakna.

Benen temligen undersättsiga.

De hithörande foglar hafva sitt tillhåll i skogarna, och några få bland dem uppehålla sig i grannskapet af människors boningar.

De lefva i engifte; lägga sina bon på träd, buskar, i hål i träd, murar, torn m. m. Ofta bo flera par nära tillsammans. — Sedan ungarna blifvit fullvuxna, förena sig merendels flera familier och ströfva kring i stora flockar. De lefva af säd, frön, frukter, insekter, maskar m. m. stundom äfven af rödblodiga djur. Deras kött är merendels segt och odugligt.

Korp-Slägtet. (Corvus, Linn).

Näbben tjock och stark, oftast längre än hufvudet, utåt hoptryckt, något litet nedböjd. Näbbsömen efter hela sin längd något bågförmigt böjd.

Näsborrharna vid näbbroten, rundaktiga, täckta med framåtliggande styfva, borstlika fjädrar från pannan.

Fjäderbeklädningen mindre yfvig (än hos Skrikorna), mer hård.

Benen: Tarsen längre än mellantån.

Vingarna: 1:sta vingpennan medelmåttig; 2:dra längre än 6:te; 3:dje nästan lika med 5:te eller 4:de, som är längst.

Anm. Hos Skatan är dock ett annat förhållande mellan vingpennorna.

Till detta Slägte höra de största foglar i hela denna Ordning. De hafva nästan alla en hög och säker, fastän icke just snabb flygt. Deras vingar äro långa och vingpennorna tillspetsade, så att de under flygten ej sluta tätt tillsammans, utan äro utspärrade från hvarandra likasom fingrar. — Dessa foglar äro i egentelig mening allätande (omnivora); ty de förtära utan åtskillnad animalisk och vegetabilisk föda, så väl frön, säd, kärnor, frukt och grönsaker, som insekter, maskar, ägg, fisk, afskräden och as m. m. De hafva en ytterst fin lukt och de kunna på ett betydligt afstånd uppvädra ett kadaver. De bruka nästan alla att gömma ett öfverflöd till en annan måltid. Äfven hafva de den besynnerliga instinkten att samla och undangömma allt det som glänser, fast de icke kunna använda det, t. e. silfverskedar, mynt, ringar m. m. samt andra glänsande

metallbitar. Äfven glödande kol bära de stundom bort i sina gömställen. — De utmärka sig genom list, slughet och läraktighet. Dessa egenskaper göra dem också skickliga att mottaga ett slags uppfostran. Några arter kunna äfven lära att temligen redigt tala. De lefva nästan alla i stora flockar, åtminstone efter fortplantningstiden.

1. Korpen. (*Corvus Corax*, Linn.)

Artem. Svart med purpurglans. Stjerten starkt afrundad. Näbben lika lång med tarsen.

Längd, 2 fot.

Corvus Corax Lin. Fn. Sv. p. 29. Retz. Fn. p. 90. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 78. — Gmel. Syst. I. p. 364. — *Le Corbeau*, Buff. Ois. 3. p. 13. t. 2. pl. enl. 495. — *Raven* Lath. Syn. I. p. 367. — *Kolkrabe* Bechst. N. D. 2. p. 1148. — Sv. *Körp.* Sk. *Ravn.*

Beskrifn. Hela foglen svart med skön purpurglans på öfra kroppsdelarna och på bröstet, samt grön glans på stjärt och vingar. — Stjerten starkt afrundad. Vingarna spetsiga, räkka hoplagda till stjärtspetsen. Näbben lika lång med tarsen, stor och tjock, täckt af pannsjädrarna (capistrum) ut öfver halfva längden, glänsande svart, äfven som benen. Tarsen framtill belagd med 6 — 7 halfringar. Iris med två cirklar, af hvilka den inre är gråbrun, den yttre hvit. Längden 2 fot.

Honan är litet mindre, men till färgen lik Hannen.

Varierar tillfälligtvis: helt hvit eller gulaktigt hvit. — Hvita korpar äro, liksom alla albinos varieteter, mycket sällsynta.

Vistelseort och lefnadssätt: Korpen förekommer i alla trakter af Skandinavien, från det sydligaste Skåne till de nordligaste delarna af Lappland. Han vistas om sommaren så väl i de stora skogarna i det inre af landet, som i skogslundarne och någon gång i trädgårdarne på Skånes slättbygd, samt på de nakna, klippfulla öarna vid Norriges kuster. — Dock är han, i allmänhet sagdt, en sträckfogel, som om sommaren förekommer mera i skogarna, och om vintren infinner sig mera på slätterne och vid kusterna. Alla arter af detta släkte utmärka sig genom en ytterst fin lukt; dock skall korpen här öfverträffa dem alla. Denna egenskap gör att han på ett förvånande afstånd kan uppvädra ett kadaver. Slug och försigtig låter han sällan Jägaren komma inom skott-håll *).

Dess flygt är hög och skön, isynnerhet om våren under parningstiden, då hanne och hona, vid klart väder, stiga till en betydlig höjd i luften, och sväfva der omkring i kretsar. Härvid låter han ofta höra ett välljudande *klong, klong*; dess läte är eljest ett sträft *krak, krak*, eller *kruck, kruck*.

Både unga och gamla kunna lätt tämjas och lära äfven att uttala vissa ord. Man underhåller stundom tama korpar på värdshusen i Tyskland och p. fl. st. hvilka med sitt prat roa gästerna **).

*) Vid fiskare-kojorna på Norriges öar är dock korpen mer tam och mindre rädd än jag funnit honom på något annat ställe. Troligen därför att han der aldrig efterställs.

**) Man berättar många anekdoter om tama korpar, som kunnat tala. Under Kejsare Tiberii tid gjorde en tam

Mot Roffoglarna förer Korpen ett ständigt krig, och om flera korpar på samma gång göra anfall, måste den modigaste Roffogel gifva vika för dem. — Man beskyller korpen för tjufnad, och derifrån har man ordspråket: *stjälja som en korp*. Detta kommer deraf att korpen, liksom alla dess samslägtingar, uppsnappar och undangömmar allt det som glänser. — Man påstår att denna fogel skall hinna till en ganska hög ålder, neml. ända till hundra år och deröfver.

Födämnena: Korpen är af en rofgirig natur. Ofta griper han unga dufvor, änder, ripor, samt andra vilda och tama ungfoglar. Ripor och andra hönsarter, som blifvit fångade i snarorna, uppäter han ej sällan. Äfven stjäl han fogelägg och förer dem bort i näbben. Unga harar, lamm, mullvadar, näbbmöss, rottor m. m. blifva ofta hans rof. Liksom Måsorna uppsöker han musslor, sjöborrar m. m. vid stranden, fattar dem med näbben och uppflyger med dem öfver någon klippa, mot hvilken han låter dem falla och sönderslås, för att åtkomma och förtära invånaren. Vid fiskarekojorna, på öarna, der han i mängd

korp en lång tid mycket uppscende i Rom derigenom att han om morgnen flög till torget och rådsplatsen, och der helsade först Kejsaren, sedan Prinsarna Germanicus och Drusus, och derefter Romerska folket. Då denna korp sedermera blef ihjülslagen af en Skomakare, hvars arbete han nedsudlat, så gaf folket honom en präktig begrafning och utdrefvo samt dödade banemannen. — Då Kejsar Augustus en gång kom tillbaka till Rom från en seger, så hälsades han af en korp som ropade mot honom: Ave Caesar, Victor, Imperator! (Välkommen Kejsare, Segrare, Herrskare!)

förekommer, förtär han fisk och afskräden. — Bär t. e. kråkbär, blåbär o. s. v. samt frukt s. s. päron, äplen, körsbär, potäter o. s. v. äter han ock. — Äfven går han gerna på kadaver.

Fortplantning: parningstiden infaller mycket tidigt, redan i Februari eller Mars månad. Sitt näste bygger han i höga träd eller i stela klippor. Dess 3 — 6 ägg äro till färgen smutsigt gröna med små bruna fläckar och strek.

Nytta och skada: Köttet är alldeles odugligt till spis; men vingpennorna äro mycket eftersökta af ritare, hvilka isynnerhet bruka dem att dermed draga fina strek. Äfven brukas de till skrifpennor. Den skada korpen gör ser man af dess födännen.

2. Svarta Kråkan. (*Corvus Corone*, Linn.)

Artm. Svart med violett glans; stjerten svagt afrundad. Näbben kortare än tarsen.

Längd 18 — 19 tum.

Corvus Corone Gmel. Syst. I. p. 365. — Lath. Ind. Orn. I. p. 151. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 79. — *La corneille noire* Buff. Ois. 3. p. 45. t. 5. — pl. enl. 483. — Temm. Man. d'Orn. I. p. 108. — *Carrion Crow* Lath. Syn. 1. p. 370. — *Rabenkrähe*, Bechst. N. D. 2. p. 1167. — På Gottl. *Rauk*.

Beskrifn. Hela föglen svart med stark violett eller stålblå glans. Stjerten svagt afrundad, längre än de hoplagda vingarna. Näbben tjock (alldeles af samma form som hos Kråkan) täckt af borstfjädrar knapt till hälften, och, från pannan räknadt, kortare än tarsen. Denna är framtill belagd med 8 rin-

gar. — Vingpennorna: 1:sta $3\frac{1}{2}$ tum kortare än 2:dra; denna 1 tum kortare än 3:dje; 4:de litet längre och längst. Längden 1 fot 6 — 7 tum; tars. $2\frac{3}{8}$ t. Näbben från munviken af samma längd; mellanlång utan klo $1\frac{1}{2}$ tum. Näbb och ben svarta. Iris nöthbrun.

Honan är mindre och har äfven mindre liflig glans.

Varierar tillfälligtvis: svart med en större eller mindre hvit fläck på strupen. *Cervus clericus*, Mus. Carlsson; I. t. 2. — Är en ung fogel. En dylik skjöts äfven i Skåne för några år sedan.

Vistelseort: Denna kråkart är hos oss på fasta landet sällsynt, och, så vida jag vet, förekommer hon aldrig i de vestra och nordvestra delarna af Sverige eller Norrige. I de östra trakterna längs med Östersjön träffas hon deremot stundom, och på Öarna Gottland och Öland finnes hon i större antal.

Dess tillhåll äro skogslundar som gränsa till flacka fält, samt äfven ensamt stående fält-träd, trädgårdar m. m. der ängar och åkrar finnas i grannskapet. — Om hösten slå sig flera familier tillsammans och stryka omkring i stora skaror; och mot vintrens annalkande tyckas de flesta flytta åt sydligare länder *). Dock träffar man, äfven under vintren, en och annan hos oss.

Födämnen: Rågnmaskar, Insekter, fältmöss, ägg, fogelungar, frö, korn, frukter, bär, kadaver m. m.

*) Redan i slutet af September hade de lemnat sina sommar-stationer på Öland.

Fortplantning: Sitt näste lägga de bland grenarne på träden. Merendels bygga flera i samma trakt, dock aldrig mer än ett par i samma träd. Honan lägger 4 — 6 blågröna ägg beströdda med stora och små askegråa och olivbruna fläckar.

A n m. Denna Kråka säges para sig och frambringa ungar med Gråa Kråkan i de sydliga och östra trakterna af Europa, der foglen är sällsynt. Om detta samma äger rum hos oss, vet man ännu icke.

3. Gråa Kråkan. (*Corvus Cornix*, Linn.)

A r t m. *Askegrå med hufvudet vingarna och stjerten svarta.* Längd 1 fot 7 — 8 tum.

Corvus Cornix Lin. Fn. p. 30. — Retz. Fn. p. 92. — Lath. I. p. 153. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 82. — *Corneille mantelée*, Buff Ois. 3. p. 61. t. 4. pl. enl. 76. — *Hooded Crow* Lath. Syn. I. p. 374. — *Nebelkrähe*, Bechst. N. D. 2. p. 1186. — Sv. Kråka; Norr. Kraake.

Beskrifn. Hufvudet, strupen, vingarna och stjerten svarta, glänsande; de öfriga kroppsdelarna askegråa. Stjerten afrundad. Näbben tjock, svart, och täckt till midten med borstlika fjädrar. Tarsen framtill belagd med 8 ringar. Benen svarta. Iris gråaktig.

Honan är något mindre. Den svarta färgen på strupen går ej så långt ned mot bröstet, och kroppens askegråa färg stöter i rödgråaktigt.

Vistelseort och lefnadssätt: Kråkan är en ganska allmän fogel och förekommer öfver allt på vår halfö, så väl i Lappland som i Skåne. I de nordligaste trakterna träffas hon dock isynnerhet vid hafskusterna

och på öarna, der hon är mera tam och närgången än annorstädes. Hon är på de flesta ställen en sträckfogel, och kanske till någon del en flyttfogel. Om hösten, sedan säden är bergad, samlas Kråkor i flockar på Skånes åkerfält, antingen ensamma eller i sällskap med råkor och kajor. Om vintren ser man dem icke i de inre, skogiga trakterna af landet. De insinna sig då vid städer och byar, der afskräden blifvit utkastade, på gödsellögar, på kadaver, på vägarne vid hästspillningen, vid hafskusterne, och sedan dessa lagt sig, vid brädden af det öppna vattnet o. s. v. — Kråkan är icke alldeles så skygg eller så slug som dess samsläktingar, och Jägaren kan lättare komma henne inom skotthåll, så framt hon ej någon gång blifvit anskjuten, eller misstänker försåt; ty då är hon mycket försigtig och rädd. Likasom Korpen och Måsarna, vet äfven hon att flyga upp i luften med de musslor, sjöborrar m. m., som hon vill krossa, och att låta dem falla ned på en klippa.

Födämnen: Kråkan lefver i allmänhet af alla de ämnen, hvaraf menniskor och djur taga sin föda. Om våren följer hon plogen och upplockar maskar och insekt-larver m. m. Om sommaren förtär hon möss, grodor, insekter, och deras larver, musslor och snäckor, kräftor, fiskar, fogelungar, fogelägg m. m. Om hösten gör hon ofta skada i trädgårdarna på körsbär och andra trädfrukter. Om vintren förtär hon afskräden, korn och frön, isynnerhet i gödslen; kadaver och ruttnade samt till stranden uppkastade fiskar tyckas alltid utgöra dess läckraste kost. I Nor-

rige och i Norrland säges hon förtära Orrhöns och Ripor, som fastnat i snarorne. Anskjutna och sårade harar och foglar blifva äfven ofta hennes rof.

Fortplantning: Sitt näste bygger hon i träd, så väl midt inne i täta och stora skogar, som i skogsbrynen, i smärre lundar, och i ensamt stående fältträd. Det är temligen starkt hoplagdt af större risqvistar med jordtorfvor mellan, och det är inuti bäddadt med mindre qvistar, mossar, ull och hår. Äggen 5 — 6 grönaktigt gråa, tät beströdda med större och mindre gråbruna fläckar, som isynnerhet löpa sammans på ena ändan. — De gamla uppsöka årligen samma näste och inreda det att å nyo hysa deras afföda.

Nytta och skada: Dess kött som är segt och illa luktande ätes i allmänhet icke. Dock förtäres det någon gång om vintren, och det finnas de som sätta mycket värde på Thormånads-Kråkor. Eljest gagnar Kråkan mest derigenom att hon förtär en mängd skadliga insekt-larver och maskar. Hon skadar derigenom att hon förstör ägg och ungar af nyttiga foglar, och i Norrige derigenom att hon uppäter Ripor, Orrhöns, Hjerpar m. m. som fångats i snarorne. I trädgårdarna gör hon stundom stor skada, men sällan upplockar hon den utsådda säden på åkrarna.

4. Råkan. (*Corvus frugilegus*, Linn.)

Artm. Svart med violett- och purpurglans; näbben lika lång som tarsen, tillspetsad och nästan rak. Näbbroten bar.

Längd 1 fot 6 — 7 tum.

Corvus frugilegus, Lin. Fn. p. 29. — Retz. Fn. p. 91.
 — Nilss. Orn. I. p. 81. — Lath. Ind. I. p. 152.
 — *Le Freux ou la Frayonne*, Buff. Ois. 3. p. 55.
 pl. enl. 484. — *Die Saatkrähe*, Bechst. Nat.
 Deutschl. 2. p. 1199. — *Rook-Crow*, Lath. Syn.
 I. p. 572. — Sv. *Råka*. *Rok*.

Beskrifn. Hela foglen svart med skön violet och purpurglans. Näsborrharnas täckfjädrar saknas hos de gamla, och en naken torr och vårtfull hud omger näbbroten på pannan, kinderna och strupen. Näbben är längre och spetsigare, samt mindre böjd än hos de föregående; räknadt från näbbviken är han längre än tarsen. Denna är framtill belagd med 9 tvärringar. Stjerten afrundad. Näbb och ben svarta. Iris hvitgrå.

Honan är något mindre än hannen, och dess fjädrar ha mindre glans.

Ungarna hafva i början pannan och näbbroten täckta med fjädrar, likasom de öfriga arterne i detta slägte. Man skiljer dem då från *svarta Kråkan* lättast genom den olika näbbformen. — Endast småningom förlora nämnde delar sina fjädrar och blifva kala derigenom att foglen ständigt borrar med näbben ned i jorden efter maskar och larver.

Vistelseort och lefnadssätt: Hos oss förekommer *Råkan* endast i Skåne och på Öarne i Östersjön. På Skånska slättbygden öfversomrar hon i stor mängd i skogslundar, vid byar och gårdar der stora träd, isynnerhet almar och askar finnas. Hon är en flyttfögel som lemnar oss sent om hösten, och återvänder ganska tidigt, redan i Februari eller början af

Mars. Hon förråder snart sin ankomst genom sitt gälla och vidriga skrik: *gaarb, gaarb*. Sällan bor ett eller annat par ensamt, utan der de valt sitt stamhåll för sommaren, finnes merendels en större koloni, hvilken genom sitt ständiga skrik gör ett gräsligt larm. Om hösten sedan ungarna äro utflugna, slå sig flera kolonier tillsammans och träffas då, stundom i stora skaror, på de inbergade åkerfälten, oftast i sällskap med Kajor, Kråkor och Korpar. Om aftnarna begifva de sig till en skog, lund eller trädgård, der höga träd finnas, i hvilka de hvila sig öfver natten. Hos oss tillbringa de aldrig vintren; men finnas då i södra Tyskland, Frankrike o. s. v.

Födämnena: Om våren följa de plogen och upplocka maskar, insekter och larver; äfven borra de med näbben i jorden för att åtkomma dessa, samt någon gång de utsådda och uppmjuknade sädeskornen. Dessutom förtära de fältsmöss, snäckor, gräsrotter m. m.

Fortplantning: Då Råkörna om våren återkomma, uppsöka de gamle genast sina förra nästen och de unga bygga sig nya. Dessa bygga de i höga träd i skogsbryn som gränsa till åkerfält, i lundar och trädgårdar. På ett och samma träd finnes ofta ett stort antal nästen, ej sällan tätt vid hvarandra, och då två träd stå nära tillsammans, lägga de stundom reddar på qvistarne från begge. Dessa nästen äro byggda af ris och qvistar, samt inuti belagda med jord, mossor, hår och ull. Deras ägg, 4 — 5 till antalet, äro långlagda, bleka, grönaktigt gråa, glest be-

strödda med fläckar af askegrå och brun färg. I slutet af Maji eller i början af Juni äro ungarna flygvuxna och träffas då på grenarna vid nästet der de länge låta föda sig af de gamla. Om de här märka någon fara, t. e. ett lossadt skott e. d., smyga de sig åter genast i nästet, samt ligga der tysta och orörliga tills faran är förbi, då de åter gemensamt med de gamla, skrika med full hals.

Nytta och skada: De förtära många skadliga insekter, larver och maskar, och ersätta härmed fullkomligt den skada de göra derigenom, att de upplöcka några sädeskorn af de nysådda åkrarna. För ärt-åkrar skola de dock vara mest skadliga, emedan de med sin spetsiga näbb borra i myllan och upphämta de sådda ärterne, samt äfven afbita den nyss uppkomna brodden. — Ungarna anses af en del som läckra. Innan de stekas eller kokas aflås den svarta flottiga huden, då köttet blir hvitare och bättre.

5. Kajan. (*Corvus Monedula*, Linn.)

Art m. Svart, naken och halsryggen samt hufvudets och halsens sidor ljusgråa.

Längd $13\frac{1}{2}$ tum.

Corvus Monedula, Lin. Fn. p. 30. — Retz. Fn. p. 93. — Lath. Ind. I. p. 154. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 84. — *Le Choucas*, Buff. Ois. 3. p. 69. pl. enl. 523. — *Jackdaw* Lath. Syn. I. p. 378. — *Die Dohle*, Bechst. N. D. 2. p. 1213. — Sv. Kaja. Skån. *Allika*; Norr. *Kaa*, *Kaje*, *Ravnkaate*.

Beskrifn. Pannan och hjessan svarta; nacken halsryggen, samt hufvudets och halsens sidor ljus

askegråa, eller liksom pudrade, och denna färg är ljusast bakom hjessan, samt blir småningom mindre ljus på halsen och öfverryggen. Alla de andra öfra kroppsdelarna svarta med violett glans. De undra kroppsdelarna svarta. Iris hvit. Näbb och ben svarta. Längd $13\frac{1}{2}$ — $13\frac{3}{4}$ t. vingbredd. 27 tum.

Honan: glansen på dess fjädrar är mera matt; undra kroppsdelarna ha askegrå anstrykning; nackens ljusgråa färg sträcker sig ej långt ned åt ryggen.

Varierar tillfälligtvis: Hela fjäderbeklädningen helt hvit eller något stötande i rostgult. Näbb och klor hvita, stötande i blått. Iris hvit, stundom röd. Benen hvitgulaktiga.

Vistelseort och lefnadssätt: Kajan förekommer nästan öfver allt på kyrktorn och klockstaplar m. m. i det södra och medlersta Sverige, samt i Norrige ända till Fjällryggen. Norr om denna är hon mindre allmän, men träffas dock till och med norr om Trondhiem på flera ställen; och kyrkan vid det i historien märkvärdiga Stieckerstad är den yttersta punkt i norden, åtminstone åt detta håll, der Kajor träffas. — I det södra Sverige bor hon någon gång, men sparsamt, äfven i skogarne, isynnerhet der gamla ihåliga ekar finnas. — I det skogiga Småland öfvervintrar hon aldrig *); men i Skåne blir hon qvar hela året vid städer och kyrkor, och det samma händer äfven i nordligare trakter t. e. vid Upsala, der hon förekommer under hela vintren.

*) Ödm. Act. Ups. V. 58. — Upgiften att Kajor öfvervintra ännu vid Upsala, grundar sig på egen erfarenhet. — I Trondhiem visa de sig sällan.

Kajan är, liksom dess samslägtingar, en slug och skygg fogel; men i allmänhet är hon mycket lifligare än dessa, och snabbare i alla sina rörelser. Nästan beständigt hörer man dess något klagande eller jamande: *jaah, jaah*, eller *jäck, jäck*; och der många bo tillsammans uppstämman de ofta samfält ett hiskeligt skrik, som likväl icke är på långt när så starkt eller oangenämt som Råkornas. Då en Rofogel visar sig i grannskapet af deras boning, samla de sig genast och förfölja honom ett långt stycke bort.

Kajan blir lätt tam, och fattar tillgifvenhet för sin ägare. Man kan lära henne att uttala vissa ord, att lyda appell o. s. v.

Födämnen: Liksom föregående art, följer äfven denna plogen och upplockar regnmaskar, insekt-larver o. d. Ofta sätter hon sig på ryggen på svin och får, för att bortplocka insekter. Äfven förtär hon fogelägg, säd, skidfrukter, körsbär och andra trädgårdsfrukter, och hon afbiter ej sällan de nyss uppkomna köksväxterna. Om vintren äter hon, i sällskap med dess samslägtingar, kadaver och afskräden, samt gödsel och de deri liggande kornen.

Fortplantning: I gamla torn, slott, kyrkor och andra byggnader, isynnerhet i städer, bygga Kajorna sina nästen, oftast flera bredvid hvarandra, i remnor, i skorstenar, under taken o. s. v. Äfven lägga de sitt bo uti ihåliga träd, så väl i trädgårdar som

(någon gång) i skogar *). Boet består af ris, och balen deri af gräsrotter, hår och ull. Äggen 4—6, någon gång 7, hvitaktiga, i blågrönt stötande med glänsare bruna och svarta punkter och fläckar.

6. Skatan. (*Corvus Pica*, Linn.)

Artm. Svart med blå och grön glans; skuldrorna, undre delen af bröstet samt magen hvita. Stjerten lång och vigglik.

Längd 18 — 19 tum.

Corvus Pica, Lin. Faun. Sv. p. 31. Retz. Fn. p. 95. — Lath. Ind. I. p. 162. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 85. — *La Pie* Buff. Ois. 3. p. 85. — pl. enl. 488. — *Magpie* Lath. Syn. I. p. 392. — *Elster* Bechst. N. D. z. p. 1267. — Sv. *Skata*. Upl. *Skjura*. Gotl. *Skära*. Norr. *Skjur*, *Skjor*, *Skjer*, *Tunfugl*; Stördal. *Skära*.

Beskrifn. Hufvudet, halsen, ryggen och öfra delen af bröstet sammets svarta. Vingarna svarta med en schön blå och vid vingroten grön glans (på de hoplagda); undra delen af bröstet, magen, sidorna och skuldrorna rent hvita. Låren, undergumpen och stjerttäckarna svarta. Vingpennorna af första ordningen svarta, i inre fanen hvita, men kantade i spetsen och uppåt inre sidan med svart. Stjerten lång, vigglik, svart med grön och blå glans. Iris brun. Näbb och ben svarta.

*) I ett ihåligt träd på Lundegård bygger ärligen ett par. I den s. k. Fäladsskogen vid Roslätt, i en gammal skog vid Rönneholm och p. fl. st. i Skåne, bygga de ärligen i ihåliga träd i skogen.

Varietas tillfälligtvis: 1:mo helt hvit, äfven näbb och ben hvita. Iris röd. — 2:do Hvit, på hufvud och hals samt på några af ving- och stjärtpenorna rostfärgad; näbben hvit, benen svartaktiga. Sparr. Sv. Ornithol. — 3:tio Grå der den vanliga är svart. Iris röd. Näbb och ben svarta. Sparrm. Mus. Carlsson. t. 53. — 4:to Smutsigt grå der den vanliga är svart. Stjerten hvitaktig. Näbb och ben svarta. Kallas *Cervus Lapponicus* af Thunb. Wet. Acad. Handl. 1798. p. 178. — *Corvus Tornensis* Sparrm. Sv. Ornith. med fig.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel tillhör mera de norra än de södra trakterna af Europa. Hos oss förekommer han öfverallt der menniskor bosatt sig, från Skåne ända långt inom polcirkeln, så väl på slättlanden, som i dalbygderna och i fjälltrakterna. Ja han synes verkligen tilltaga i mängd mot Norden. Så förekommer han i stor mängd vid gårdarna på Dowrefjäll och i Rörås. Han träffas ända upp till Alten och Hammarfest i Westfinnmarken; deremot skall han mycket sällan visa sig i Ostfinnmarken. — I den högre Norden bygger han ofta i skogarne, aflägsset från människors boningar; i södra Sverige märkes detta aldrig. I Skanör och på ön Hven finnes han icke bosatt, och man har anmärkt att då en Skata visar sig på dessa ställen, är det ett säkert förbåd till en snart inträffande storm. Skatan tillbringar hela året hos oss. Äfven i flykten skiljer hon sig märkbart från sina samsläktningar. Dess flygt är neml. mer tung och långsam, med

ryckvis hopslagna och dessemellan hastigt rörda vingar. Detta kommer af vingpeunornas egna förhållanden, och af den långa vigglika stjerten. Hon flyger derföre, isynnerhet i blåsväder, blott kortare sträckor. — Ehuru Skatan nästan alltid uppehåller sig i grannskapet af menniskor, är hon likväl skygg och mistrogen så att hon sällan låter Jägaren komma inom skotthåll. — Äfven Skatan har den vanan att bortföra och gömma glänsande saker, och äfven hon kan lära att eftersäga ord. Hon blir ganska tam och visar sin ägare mycken tillgifvenhet.

Födämnen: Om vintren lefver hon af afskräden från köken, af kadaver, gödsel, insekt-puppor, rönnbär, oxelbär och flera bärsorter, säd, gräsrötter m. m. stundom af rottor och små foglar. Om sommaren förtär hon rägnmaskar, insekter, larver, jordfrukter, körsbär, äpplen, ållon, äfven ägg och fogelungar. Då hon finner mer föda än hon kan förtära, bär hon det öfverflödiga bort och gömmer det tills hon åter blir hungrig.

Fortplantning: Redan i Februari börjar vanligen Skatan att bygga sitt bo. Detta lägger hon merendels i toppen af höga träd som finnas nära husen. Det är tätt sammanflätadt af ris och pinnar, det har till underlag jord och torfvor, samt är inuti fodradt med rötter. o. d. öfver sig har det ett tak af ris, till skydd mot oväder och roffoglar, och på sidan finnes en, stundom två ingångar. Dess ägg, som värpas i Mars eller April, äro till antalet vanligen 5 — 6, till

formen aflånga, till färgen bleka stötande i grönt med bruna och gråaktiga, vid ena ändan sammanlöpande fläckar och punkter.

Nytta och skada: Skatan är nyttig derigenom att hon förtär många skadliga insekter och maskar; men hon skadar ofta derigenom att hon dödar och förer till sina ungar så väl tama som vilda fogelungar. Äfven sönderhackar hon ofta fogelägg. I trädgårdarna afbiter hon om vintren knopparne, om sommaren förtär hon körsbär, plommon och andra trädfrukter. Halmtaken skadar hon om vintren då hon i dem söker efter puppar o. s. v. Hon är således nyttig på fälten, men skadlig i trädgårdarne och vid hus med halmtak.

Jagt och fångst: Då Skatan är, som nämndes, mycket misstrogen och försiktig, så kommer man henne vanligen icke inom skotthåll, så vida man ej der vid döljer sig för henne. För att utrota henne, eller åtminstone att minska dess antal på de ställen der hon är skadlig, brukar man flera medel, hvilka äfven kunna användas mot dess samslägtingar: Kråkor, Kajor och Korpar. Man gör sig strutar af papper, hvilka man invändigt bestryker med fogellim *), och lägger i dem ett stycke rått kött, samt nedsticker dem i jorden eller i snön på de ställen der Skatan brukar infinna sig. Då hon med näbben vill upphämta köttbiten, blir struten fastsittande kring hufvudet, så att hon alldeles icke kan se. Hon flyger

*) Huru fogellim tillredes skall jag på ett annat ställe nämna. Se registret.

då vanligen fäkt i luften, så högt hon förmår, och faller derefter åter lodrätt ned, samt träffas merendels död. — På små fisk-krokar, så stora att Skattau kan jemnt svälja dem, fångar man henne, då man på dem fästar en liten köttbit och upphänger dem i snören på grenar i de träd, der Skator pläga sitta. — Om man under vintren kastar ut blod, tarmar e. d. af något slagadt djur, så samlas vanligen derpå en mängd Skator, Kajor, Kråkor m. m. och sitta ofta tätt tillsammans. Man kan då lätt skjuta dem från ett på passande afstånd anlagdt skjul. — Äfven dödar man dem om man bland nämnde läckerhet strör räfkaka (*Strychnos Nux vomica*, Lin.), som fås på Apotheken. — Också kan man fånga dem i donor, eller på limspön då man nyttjar kött e. d. till lockmat.

Skrike-Slägtet. (Garrulus, *Briss. et Cuv.*)

Näbben kortare än hufvudet, aflångt kegelformig, alldeles rak, trind, utåt litet hoptryckt; öfverkäken knapt längre, i yttersta spetsen litet nedböjd; underkäken rak; begge bakspetsen försedda med ett hak eller tand. Näbbsömnen alldeles rak.

Näsborrarna vid näbbroten, ovala, täckta af framåttliggande styfva fjädrar, med hårlika skilda utspärrade strålar.

Fjäderbeklädnaden yfvig, silkeslen, med utspärrade fjäderstrålar.

Hufvudet betäckt med långa, yfviga fjädrar, som foglen efter behag kan uppresa.

Benen: Tarsen längre än mellantån.

Vingarna: 1:sta vingpennan temligen kort eller medelmåttig; 2:dra lika med 10:de; 3:dje kortare än 7:de; 4:de kortare än 6:te; 5:te längst.

Stjerten lång, nästan tvär, eller graderad.

De hithörande foglar uppehålla sig om sommaren i täta och vilda skogar, der hvarje par ensamt fortplantar sig. De äro icke flyttfoglar; men efter fortplantningen stryka de omkring i skogarna med sina ungar, då ofta flera familjer slå sig tillsammans. De äro icke särdeles rädda, men dock lifliga och oroliga foglar, som ständigt äro i rörelse. Då man kommer dem nära, flyga de undan med gälla och genomträngande skrik. Deras flygt är mycket olik *Korparnas*, hvilket redan vingarnas olika byggnad tillkännagifver; den är neml. kort och ojemn, eller ock sväfva de med utbredda nästan orörda vingar, mellan de lägre grenarna och på marken. De lefva så väl af ållon och bär, som af insekter, maskar, foglar och mindre däggande djur. De synas i allmänhet vara mer rofgiriga än de flesta arter i föregående släkte, och de närma sig i detta afseende mera till Törnska-torna. De bygga sitt bo på trädens grenar, aldrig i hål.

1. Låfskrikan. *Garrulus infaustus*).

Art m. Rödbrunnaktigt grå med svartbrunt hufvud; vingtäckarne, öfver- och undergumpen, samt stjerten roströda med de två medlersta stjertpennorna askegråa. Längd 11 tum.

Lanius infaustus, Lin. Syst. I. p. 138. — *Corvus infaustus*, Lin. Faun. p. 32. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 87 II. p. 261. — Mus. Carlsson. t. 76 (god figur). — *Geai de Sibirie* Bull. Ois 3. p. 118. — pl. enl. 603. — *Garrulus infaustus*, Boies Reise, durch Norw. på flera ställen. — Sv. Låfskrika; Dal. Enskrika; Herjed. Telltjuxa; Ångerm. Flårskrika.; Jemtl. Rödjtjuxa; Norr. Lavskriig; Røfuhre; Guldbrd. Reudskjövve (Rødstjert) och Lavskrike. Verdal. Reudtjuxa (Rødstjert).

Beskrifn. Kroppen askegrå, mer eller mindre stötande i rödbrunt; hufvudet svartbrunt; de fjädrar som betäcka näbbroten och näsborrarna rostgula. De undre vingtäckarne, de större öfra, öfvergumpen, undergumpen, samt stjertpennorna, — utom de två medlersta, — brunröda. Vingpennorna mörkbruna, de inre helt och hållet samt yttre fanen af de öfriga och de två medlersa stjertpennorna brunaktigt askegråa. — Stjerten, som räcker nära 3 tum utom vingarne, är starkt afrundad eller graderad; dess sidopennor äro vid pass 1 tum kortare än de medlersta. Näbb och ben svarta. Längden nära 11 tum.

Honan är alldeles lik *Hannen*.

Vistelseort och lefnadssätt *): Låfskrikan är, i de norra trakterna af vår halfö, en ganska allmän

*) Utom de iakttagelser öfver denna fogels seder och hushållning, hvilka jag sjelf hade tillfälle att göra un-

fogel, och synes der förekomma ännu talrikare än *Nötskrikan* i de södra trakterne. I Herjedalen i norra delarne af Dalarne och Wermeland i Verdalen, i Guldbrandsdalen m. m. och i de andra Landskapen af Sverige och Norrige under samma bredd, samt vidare åt Norden ända inom polcirkeln, finnes hon i mängd, och träffas isynnerhet om hösten och vintren under sina ströftåg i skogarne. Någon gång träffar man henne under nämnde årstid i långt sydligare trakter t. e. vid Stockholm och Christiania; men sällan. Dess stambåll om sommaren äro täta barrskogar, der hvarje par bor ensamt; och på fjällarnes sidor har jag träffat henne så högt upp, som granar och tallar växa. — I sitt lefnadssätt har denna art ganska mycket gemensamt med följande *). Liksom denna är hon föga skygg; men då man kommer henne för nära, flyger hon undan med ett gällt och genomträngande skrik **). Om man kastar en sten e. d. efter henne, skriker hon vanligen äfven, och samlar snart, genom sitt skrik, flera af sina likar. Då hon är sysselsatt med att plocka insekter o. d. bland de täta grenarne, är hon merendels alldeles tyst, och man kan då ofta gå nära förbi

der min resa i Norden 1816, samt utom dem hvilka Hr Boie meddelat i sin högst intressanta *Reise durch Norwegen* 1817, har jag att tacka Hr Öfver-Jägmästaren H. Falk i Wermeland och Provincial-Läkaren Hr. Dr Bergman i Fahlun för ganska viktiga bidrag till denna fogels historia.

*) Jemför Orn. Sv. II. p. 261.

**) Dess skrik uttryckes af Hr Boie genom: S'kruih - S'kruih.

en hel familj utan att märka dem. Sällan är hon stilla; än söker hon insekter och puppor bland renlafven, hvaraf marken i dessa trakter är helt hvitklädd; än sväfvar hon mellan de lägsta grenarna af barrträden. Än håller hon sig med sina skarpa klor vid spetsarne af grenarne och nedhänger sväfvande, liksom Mesarne, för att plocka insekter. Stundom sätter hon sig på öfversta spetsen af en hög gran och låter då höra åtskilliga hvisslande ljud.

Anm. LINNÉ berättar att under dess resa i Lappland var Lafskrikan ofta så näsvis att hon vågade sig fram till honom och hans sällskap, och tog mat från dem. (Fn. Sv. p. 32.) Förmodligen var det likväl blott de köttbitar man kastade till henne, att sluta af det som anföres i en sednare skrift (Syst. nat. l. c.) — Hr DER BERGMAN nämner i ett bref att en Gosse, som en gång fällde träd i skogen der Lafskrikan hade bo, berättat honom att hon var så närgången att hon satte sig på hans hatt.

Födännen: Lafskrikan är af rofgirig natur. Ej sällan håller hon jagt efter smärre foglar, och ofta förtär hon de större som fastnat i snaror, t. c. orrhöns, ripor, hjerpar m. m. så att blotta skräfvet ligger kvar, då ägaren till snarorna kommer för att vittja dem. Äfven griper och uppäter hon mindre daggande djur, såsom rottor och möss. Dessutom förtär hon insekter, isynnerhet skalbaggar samt larver och puppor. Äfven bär t. c. cnbär, blåbär, o. s. v.

Fortplantning: Lafskrikan tillbringar sommaren och fortplantar sitt släkte i alla de nämnda nordliga trakter af halfön. Hon bygger sitt bo i tallar eller granar, ej högt (3 à 4 alnar) från jorden. Boet af ungefär 6 tum diameter, är väl sammansatt af laf eller mossor, strå, hår och dun. I Maji månad säges

honan lägga 5 — 6 ägg, något mindre än Skatägg och af blågrå färg (med mörka fläckar?). — I början af Juni ser man redan utflugna ungar; och kring den 20:de Juni har jag sett dem följa de gamla, som mata dem med insekter och larver.

Nytta och skada: Låfskrikan utrotar en mängd för skogarne skadliga insekter, samt deras larver och puppor, och är derigenom en mycket nyttig fogel. — Betydlig skada gör hon ofta genom att förtära de skogshöns som fastnat i snarorna, och som utgöra en af de hufvudsakligaste inkomster för invånarne i dessa nordliga trakter.

2. Nötskrikan. (*Garrulus glandarius*).

Artm. Rödbrunaktigt grå med hvit öfver- och undergump samt svartaktiga vingar och stjärt. Vingtäckarne blåa med svarta tvärstrek.

Längd 13 $\frac{7}{8}$ tum.

Corvus glandarius, Lin. Fn. p. 30. — Retz. Fn. p. 93. — *Lanius glandarius*, Nilss. Orn. Sv. I. p. 75. — *Le Geai*, Buff. Ois. 3. p. 107. t. 8. pl. enl. 481. — *Garrulus* Briss. Orn. 2. p. 47. — *Jay* Lath. Syn. I. p. 384. — *Nötskrika*, Sv. Zool. Häft. 5. n:o 26. — *Eichelkrähe*, Bechst. Nat. D. 2. p. 1243. — Sv. *Nötskrika*, *Allonskrika*; Österg. *Kornskrika*; Sk. *Skogskata*.

Anm. Att jag i Ornith. Svec. skilde denna fogel från Korpslägtet, var riktigt; men att jag förernade honom med Törnskatorna var ganska oriktigt. Jag hade då icke sett föregående Art utan blott i Kabinetterne, eljest hade jag ganska säkert fört dem till ett slägte. I det Supplement till 2:dra Delen af Ornith. Svec. hvilket jag skref efter hemkomsten från min resa i Norden, sökte jag redan fästa uppmärksamheten på dessa foglars nära förvandtskap. Sedermåra har jag under föreläsningar alltid förenat dem, och att de böra förenas har H:r Boie vidare satt utom allt tvifvel. Se Boies Reise durch Norwegen.

Beskrifn. Grundfärgen ofvan och inunder askegrå med rödbrun anstrykning, dock så att halsen ofvan och på sidorna stöter mera i rödbrunt, ryggen och bröstet mera i askegrått. Främre delen af hufvudet hvitaktig med svarta fläckar och långsgående strek. Bakom underkäkens rot står på sidan af underhakan en svart fläck. Strupen hvitaktig: Undergumpen och öfvergumpen rent hvita. Vingpennorna af första ordningen svartaktiga och i yttre fanet hvitgråa; de fyra följande svarta, i midten af yttre fanet perlhvita; de följande svarta; häraf uppkommer en stor vit fläck på den hoplagde vingen. De större vingtäckarne azurblåa med tvärgående svarta strek. Stjerten nästan tvär, svart, vid roten askegrå med svarta tvärstrek. Näbben svart. Iris gråhvit. Benen brunaktigt köttfärgade. Längden $13\frac{1}{2}$ tum; vingbredden $20\frac{1}{2}$ tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Liksom föregående art tillhör äfven denna skogarna, och träffas så väl i löfskogar som i barrskogar; dock synes han föredraga de förstnämnda och isynnerhet dem i hvilka ekar finnas. Allmännast förekommer han i de sydligare och medlersta Landskapen af halfön; likväl träffas han äfven, fastän mera sällan, norr om fjällryggen t. e. i Stördalen o. s. v. *). Inom polcirkeln eller i dess grannskap finnes han icke.

Dess flygt och sedvanor likna ganska mycket den föregåendes. Då man kommer honom nära bortflyger

*) Jag har äfven sett honom i skogen vid Årgård i början af Oktober.

han med ett gällt och sträfft skrik: *gääk, gääk*; dock sätter han sig vanligen snart åter. Han är nästan i en ständig rörelse äfven då han sitter, och han hoppar oupphörligt på trädens grenar och på marken. Vanligen flyger han blott korta sträckor, från ett träd till ett annat. Endast om hösten och vintren, då han vandrar familjvis eller flockvis från en skog till en annan, flyger han både längre och högre. Han besöker då äfven någon gång skogslunderna och trädgårdarna på Skånes slättbygd. Under dessa ströftåg i skogarne ser man stundom ett ganska stort antal förenade; dock flyga de aldrig tätt sammans, utan spridda. Han träffas hos oss under hela året. Denna, och troligen äfven förra arten, kan bli tam och lär sig då att efterhärma ord.

Födämnen: Under hösten och hela vintren lever han isynnerhet af ollon, hvilka han dels plockar af träden, dels på marken sedan de fallit ned, och han kan äfven genom sin fina lukt, uppvädra dem under snön. Dessutom förtär han insekter, maskar, fogelägg, bär och frukter. Foglar som fastnat i donorna blifva ej sällan hans rof. På de åkrar som gränsa till skogslundar der han har sitt stamhåll gör han ofta skada på den mogna säden. I trädgården upprycker han stundom de nyss uppkomna köksväxterna, och förtär äfven de mogna skidfrukterna.

Fortplantning: Nötskrikan bygger sitt bo i träd, så väl i löfträd som barrträd. Det är sammanflätadt af ris och qvistar, samt invändigt fodradt med

fina rötter. Äggen 5 — 6 ljus blågröna, beströdda med små olivbruna punkter.

Jagt och fångst: Man skjuter Nötskrikan lättast om man döljer sig och efterhärmar dess skrik. Ofta fångar hon sig i donor med rönnbär, hvilka hon mycket tycker om. — Hr Bechstein uppgifver ett artigt sätt att fånga henne i mängd, hvilket i korthet är följande: under Nötskrikans sträckt看id om hösten, väljer man i skogen, der denna fogel plägar vistas, en gran eller tall, som åtuinstone i en omkrets af 6 — 8 steg står skild från andra träd. Från denna borthugger man de öfverflödiga grenarna och låter blott några i spiralförm kring stammen sitta kvar. Äfven dessa stympar man så att de blott äro 5 — 6 spann långa. På dessa skär man hak i hvilka man fästar limspön långs åt grenarna, dock icke liggande på grenarna utan något uppstående. Kring stammen bygger man på marken en hydda af tjocka grenar, hvilka ofvantill glest täcka henne. På hyddan ställer man en lefvande eller uppstoppad uggle, som man med ett snöre eller en käpp ned i hyddan sätter i rörelse. Före soluppgången eller ock före dess nedgång sätter man sig i hyddan, och härmar en ugglas skrik, genom en dertill inrättad pipa. Vid detta skrik samla sig en mängd Nötskrikor, sätta sig på limspöna och nedfalla med dem i hyddan. Äfven en mängd andra foglar t. e. Hackspettar, skator, rödhakar, mesar, trastar o. s. v. framlockas af detta skrik och blifva fångade.

Törnskate Slägtet. (Lanius, Linn.)

Näbben *medelmåttig, stark, rak, under hela sin längd mycket hoptryckt; käkarna i spetsen böjda mot hvarandra; den öfra längre, bakom den starkt böjda spetsen försedd med en tand.*

Näsborrarna *äggrunda, glest täckta med borstlika fjädrar från pannan.*

Näbbvikarna *ofvan kantade med styfva borst.*

Benen: *Tarsen längre än mellantån.*

Vingarna: *1:sta vingpennan temligen kort; 2:dra kortare än 3:dje, som jemte 4:de är längst.*

De till detta slägte hörande foglar utmärka sig genom mod och rofgirighet. De äro till lefnadssättet verkliga roffoglar. Liksom de smärre bland dessa, förtära de, utom små däggande djur och foglar, äfven insekter. Deras näbb som är stark, hoptryckt och bakom den nedkrökta spetsen försedd med en tand, liknar temligen Falkarnas, men deras klor äro svaga. De gripa därför roffet med näbben, men fasthålla det med klorna under det de sönderhugga det. — De hafva sitt tillhåll i skogar och bland buskar. De hafva om våren en icke obehaglig sång, och en af våra Svenska arter utmärker sig genom förmåga att härma andra sångfoglars toner. I lefnadssätt, läte och sedvanor tyckas de mig förråda en icke obetydlig förvandt-

skap med Skrikorna, och de utgöra en omisskännelig föreningslänk mellan Roffoglarna och Sångfoglarna *). En af våra arter blir kvar om vintren; den andra flyttar åt sydligare länder.

1. Större Törnskatan. (*Lanius Excubitor*, Linn.)

Art m. Ofvan ljus askeblå, inunder hvit. Genom ögonen ett svart band. Vingarna svarta med två hvita fläckar. Stjerten svart, i sidorna och spetsen hvit; det medlersta pennparet helt svart.

Längd $9\frac{1}{2}$ — 10 tum

Lanius Excubitor, Lin. Fn. p. 27. — Retz. Fn. p. 87. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 74. — *Pie-grièche grise*, Buff. Ois. I. p. 296. t. 20. — pl. enl. 445. — *Great cinereous Shrike*, Lath. Syn. I. p. 160. — *Gemeiner Würger*, Bechst. Nat. D. 2. p. 1306. Sk. Warfögel.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ofvan samt ryggen, öfvergumpen och skuldrorna ljus blågråa. Från näsborrarna genom ögonen går ett svart band, som på örontrakten utvidgar sig. Från den hvitaktiga pannan bortgår öfver ögonen ett smalt hvitt strek. Alla undre kroppsdelar rent hvita. Vingarna svarta med en större hvit fläck i midten och en mindre vid nedre kanten; detta kommer deraf att vingpennorna äro från roten till midten hvita. Vingpennorna af 2:dra ordningen och de stora vingtäckarne

*) Dock tyckas de, som redan Bechstein anmärkt, både till skapnad och lefnadssätt bäst förenas med Kråkfoglarna.

i spetsen kantade med hvitt. Stjerten lång, starkt afrundad eller vigglik, svart; den yttersta pennan i hela yttre fanet vid roten och i bakre hälften hvit; hos de följande aftager gradvis det hvita hvarmed de slutas, och det medlersta paret är helt svart. Näbb och ben svarta. Iris brun. 1:sta vingpennan teml. kort; 2:dra något kortare än 6:te; 4:de längst; 3, 4, 5 nästan lika. Längd $9\frac{1}{2}$ — 10 tum; stjerten utom vingarna $3\frac{1}{4}$ tum.

Honan har den ljust askeblåa färgen ofvan mer matt; inunder smutsigt hvit, fint vattrad med grått.

Ungarna likna nästan honan.

Vistelseort och lefnadssätt: Varfoglen är hos oss temligen sällsynt, och mig har han förekommit endast i de sydliga och östra trakterna af halfön *). I Skåne och Blekinge finnes han knapt utan om hösten och vintertiden, och äfven då nog sparsamt. Han har sitt tillhåll i skogsbryn, buskar och ensamt stående träd i grannskapet af öppna fält. Om vintren då han stryker vidt omkring efter sin näring, förekommer han ensam äfven i trädgårdarne på Skånes slättbygd. Man ser honom merendels sitta på högsta spetsen af ett träd eller en buske, för att se sig om efter rof. Han är skygg och flyger vanligen bort på ganska långt afstånd. Dess flygt liknar Hackspettens och är bågformig uppåt och nedåt. Då han sitter utbreder han ofta stjerten och slår honom upp

*) Enligt Brünniche skall han likväl äfven finnas i Norrige.

och ned, liksom följande art. — Varfoglen är modig och tilltagsen. Han bortjagar äfven de starkare roffoglar som nalkas hans stamhåll. Då han blir varse någon Falk eller Hök, gifver han det tillkänna genom ett eget skarpt skrik, och varnar derigenom Sparfvar och andra småfoglar att rädda sig. Denna egenskap har gifvit honom sitt namn och gjort honom skicklig att användas som väktare vid Falkfångsten. (Man jemföre sid. 13). Till lynne och lefnads-sätt är han sjelf en roffogel, och om han ägde en styrka i klorna och en snabbhet i flykten som svarade mot hans mod och tilltagsenhet, så skulle han säkert för småfoglarna vara en af de farligaste.

Födämnena: Dessa bestå isynnerhet i fältmöss, sparfvar, finkar, lärkor och andra småfoglar. Stundom anfalla de äfven större foglar; men det lyckas dem sällan att bemäktiga sig någon, om ej dem som fastnat i snara. I anseende till sina svaga fötter gripa de alltid sitt rof med näbben, slå det genast till marken och döda det. Bli de uppskrämda, föra de, liksom Falkarna, sitt rof med sig i klorna. Om sommaren förtära de, utom ödlor, grodor, ormslår och fogelungar, dessutom, och framför allt, större insekter med hvilka de äfven föda sina ungar.

Fortplantning: Sitt bo bygger Varfoglen i träd och i buskar. Det är stort och består af ris, pinnar, strå och mossor m. m. samt invändigt fodradt med hår och ull. Äggen 5 — 7 hvitaktiga och beströdda med smutsigt bruna fläckar.

2. Allmänna Törnskatan. (*Lanius Collurio*, Linn.)

Ar t m. Ryggen rödbrun; hufvudet, halsryggen och öfvergumpen hos hannen askeblåa, hos honan gråaktigt rödbruna. Undra delarne hvita, hos hannen med rosenröd anstrykning, hos honan med bruna vågor.

Längd $7\frac{1}{2}$ tum.

Lanius Collurio, Lin. Fn. Sv. p. 27. — Retz. Fn. p. 88. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 72. — *Pie-grièche ecorcheur*, Buff. Ois. I. p. 304. t. 21. — pl. enl. 31. f. 2. (Hannen) f. 1. (Honan). — *Der rothrückige Würger*, Bechst. Nat. D. 2. p. 1335. — Sv. Törnskata.

Beskrifn. Hanne i vårdrägt: Hufvudet ofvan, halsryggen och öfvergumpen blåaktigt askegråa; pannan och ett strek öfver ögonen ljusare. Öfver näbbroten går ett svart strek, och från näbben genom ögat till örtrakten ett bredt rent svart band. Rygg, skuldror och vingtäckare skönt brunröda, glänsande. Alla undra delar hvita med rosenröd anstrykning som är starkast på halsen, bröstet och sidorna, och på dessa sistnämnda öfvergår denna färg småningom i ryggens. Magen, stjertens och vingarnas undra täckfjädrar rent hvita. Vingarna svartbruna, kantade med brunrött, isynnerhet de innersta. Stjerten lång; den yttersta pennan kortare än de andra; de två medlersta helt svarta; de öfriga från roten till två tredjedelar af sin längd hvita med svarta spolar och hvita ändkanter; för öfrigt svarta. — Näbben blåaktigt svart. Iris brun. Benen mörkt blyfärgade. — 1:sta vingpennan kort; 2:dra något längre än 5:te. — Längd $7\frac{1}{2}$ tum; stjerten utom vingarna $1\frac{3}{4}$ tum;

Honan är mycket olik hannen: ofvan matt rödbrun, halsryggen och öfvergumpen med askegrå anstrykning. Genom ögat till örat går ett brunt strek. Strupen, medlersta delen af magen samt undergumpen hvita offläckade. Bröstat och magens sidor med bruna vågor. Vingpennorna och täckfjädrarna mörkbruna med rödbruna kanter. Stjerten rödbrun, vid roten mer grå, mot spetsen mer mörk; den yttersta pennan kantad med ett *gulaktigt* hvitt bräm, inom hvilket finnes vid spetsen en svartaktig linia. De fyra medlersta rostbruna enfärgade. Näbben svartbrun.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Törnskata förekommer allmänt i Sveriges södra trakter; mera sparsamt träffas han i dess medlersta landskap, och finnes äfven åtminstone i det sydliga Norrige. Han är en flyttfogel som lemnar oss i början af September och återvänder efter medlet af Maji. Dess tillhåll äro buskar, isynnerhet sådana som äro täta och taggiga t. e. Hagtorn, törne och slänbuskar, belägna på öppna fält. På dessa sitter han merendels i yttersta spetsen af en gren, eller ock på en gärdstör o. d. Hannens sång är både vacker och uthållande, och han härmar härvid på ett förvånande sätt de foglar som bo i dess grannskap. Äfven då han hålles i bur efterhärmar han de foglars sång som finnas i samma rum. Då man nalkas den buske der han har sina ungar, hoppar han ond och orolig på qvistarna, utbreder stjerten, rörer honom än åt den ena, än åt den andra sidan, och skriker med full hals sitt *gäck, gäck, gäck*. De foglar som händelsevis närma sig hans näste förföljer han genast med skrik och hugg.

Födämnena: Dessa bestå isynnerhet af insekter, såsom skalbaggar, gräshoppor, brömsar o. d. Äfven unga möss, unga foglar, grodor och ödlor. Han har den besynnerliga vanan att spetsa nämnde födämnena eller att fästa dem på taggarna af de buskar på hvilka han uppehåller sig; och man träffar ofta på taggarna af sådana buskar, isynnerhet ned mot marken, ett ganska stort antal insekter fästade, och bland dem antingen hela eller styckade ödlor, grodor, möss och småfoglar. Då de flesta andra foglar genast uppsluka de födämnena som träffas, och sitta overksamma då de äro mätta; så håller denna deremot ordentliga måltider, och samlar förut allt hvad han öfverkommer *).

Fortplantning: Sitt bo bygger han i någon tät buske. Det är stort efter foglens storlek och består utvändigt af grofva grässtrån, stjelkar och rötter, hvarpå följer ett lag af mossor; invändigt är det bäddadt med fint gräs. Äggen 5 — 6 hvitaktiga, stötande i gult med rostfärgade fläckar, som bilda en krans kring den tjockare ändan. Under det honan rufvar äggen, samlar hannen födämnena åt henne och spetsar dem på taggar vid boet. Dessemellan sjunger han i hennes grannskap.

Jagt och fångst: Som Törnskatan icke är rädd så kan han lätt fällas med skjutgevär. Vill man fån-

*) Något dylikt, fast icke så reguliert, märkes äfven hos Arterne af de två föregående Släkten; ty äfven de samla mer än de kunna förtära, och de nedgräfvade öfverflödiga i mossor eller i jorden, för framtida behof.

ga honom lefvande, så sätter man *Spränklor* antingen på den buske der han vanligen uppehåller sig, eller ock på störrar af 3 — 5 alnars längd, hvilka man slår ned i marken några steg från busken. Äfven fångar man honom om man tager en lefvande insekt t. e. en gräshoppa, bröms e. d., fastbinder den genom ett tagel vid ett par ben och låter den fladdra, samt lägger *Limspön* dervid och drifver foglen sakta till stället.

Nytta och skada: Denna fogels kött är välsmakande. Äfven gagnar han derigenom att han förtär en mängd skadliga insekter. Han gör ingen skada.

Blåkråk-Slägtet. (*Coracias*, *Linn*).

Näbben medelmåttig, stark, hoptryckt, nästan rak; öfverkäken i spetsen nedböjd.

Näsborrarna på sidan vid näbbroten aflånga, snedt liggande, bara, till hälften täckta af en fjäderklädd hud.

Näbbvikarna kantade med styfva borst.

Benen: Tarsen kortare än mellantån; tårna alldeles skilda.

Vingarna långa; 1:sta vingpennan föga kortare än 2:dra, som är längst.

De hithörande arter uppehålla sig parvis i gamla skogar der ihåliga träd finnas, och de äro vilda och rädda. Deras föda består hufvudsakligen i insekter och maskar. De lägga sina ägg i hål uti träd. Färgorna på deras fjädrar äro lysande och vackra.

1. Allmänna Blåkråkan. (*Coracias garrula*, Linn.)

Art m. Blågrön med brunröd rygg och svarta vingpennor. Längd $13\frac{1}{2}$ tum.

Coracias garrula, Lin. Fn. p. 32. — Retz. Fn. p. 97. — Nils. Orn. Sv. I. p. 92. — *Le Rollier*, Buff. Ois. 3. p. 135. t. 70. — pl. enl. 486. — *Roller* Lath. Syn. I. p. 406. — *Die blaue Racke*, Bechst. N. D. 2. p. 1282. — Sv. *Blåkråka*; *Spansk Kråka*.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ljusblåa med grön anstrykning och ett blekare spanskgrönt strek åt hvarje fjäder ofvanpå halsen; ryggen, skuldrorna och de innersta vingpennorna brunröda; bröstet, magen och de undra vingtäckarna maringröna. Vingarnas större täckfjädrar af samma färg, men något mörkare; de mindre vingtäckarne glänsande skönt viol-blåa. Vingpennorna svarta med blå glans, inunder skönt viol-blåa. Stjertens medlersta pennor blågröna; de öfriga från roten öfver midten blåa, i yttre delen hvitgrönaktiga; den yttersta längre än de andra, i spetsen afsmalnande och svart. — Näbben svart, vid roten inunder brun. Ögonkretsen bar. Iris brungrå. Benen gulaktiga, klorna svarta. Längd $13\frac{1}{2}$ tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Blåkråkan träffas om sommaren parvis i de flesta löfskogar i det södra och medlersta Sverige. Hon förekommer äfven i Grefskaperna i Norrige. Isynnerhet finner man henne bland gamla ekar och bokar, i hvilka ihåliga stammar hon lägger sina ägg och på hvilka torra grenar hon helst

sitter. Som flyttfogel lemnar hon oss i medlet af September och återvänder i början af Maji. Hon är en skygg och vild fogel som icke låter tämja sig, och som sällan låter jägaren komma inom skotthåll. Dess vingar äro långa och spetsiga; dess flygt är derföre snabb och har någon likhet med Dufvans. Ofta tumlar hon kring i luften med sina kamrater och låter härunder ständigt höra sitt sträfva och starka läte: *rack, rack, rack*.

Födämnen: Dessa bestå hufvudsakligen i insekser, larver, regnmaskar, sniglar och snäckor. Äfven äter hon unga grodor och ödlor. Om hösten skall hon också förtära korn, och annan säd, samt bär, ollon m. m.

Fortplantning: Sitt bo lägger hon uti ihåliga träd. Det är byggt af ris, qvistar och mossor samt invändigt fodradt med fjädrar och hår. Dess ägg 4 — 6 äro glänsande hvita ofläckade.

Nytta: Dess kött skall om hösten, då hon mest lefver af säd, vara välsmakande.

Gylling-Slägtet. (*Oriolus*, *Linn.*)

Näbben *kegelformig temligen utdragen, försedd med ryggkant och något böjd efter hela sin längd, samt utåt hoptryckt, och vid spetsen med ett hak utskuren.*

Näsborrarna *på sidan vid näbbroten, bara, små, öppnas genom en springa i undre kanten af en stor hinna.*

Benen: *Tarsen lika lång som mellantån, hvilken är vid roten hopvuxen med uttån.*

Vingarna medelmåttiga; 1:sta vingpennan ganska kort; 2:dra kortare än 3:dje som är längst.

De till detta Slägte hörande foglar uppehålla sig om sommaren parvis i skogarna, och förena sig efter fortplantningstiden familj-vis för sin resa åt sydligare länder. Deras bo, som är byggt med mycken konst, finnes fästadt vid spetsen af någon gren i ett högt träd. — De lefva af insekter och bär. — Hos Hannarna är alltid den gula färgen härskande; honorna hafva mindre vackra grönaaktiga färger.

1. Sommar-Gyllingen. (Oriolus Galbula, Linn.)

Artm. Gul eller gulgrön med svarta vingar och stjärt. Längd $9\frac{1}{4}$ tum.

Oriolus Galbula, Lin. Syst. Nat. I. p. 160. — Sparrm. Svensk Ornithol. (med figur öfver hanne, hona och bo). — *Coracias Oriolus*, Lin. Fn. p. 33. — *Coracias Galbula*, Bechst. Nat. D. 2. p. 1292. — Sv. Gylling; Gultrast; Sommarguling. Fin. Kukankeittäjä.

Beskrifn. Hannen: Gullgul med ett strek mellan näbb och öga, samt vingar och stjärt svarta. På vingarna står en liten gul fläck som kommer af spetsarna af de yttersta bland de närmsta vingtäckarna. Stjärt pennorna slutas med gult. Längd $9\frac{1}{4}$ tum.

Honan: Ofvan gulgrön, inunder hvitaktig med mörka linier åt fjäderspolarna. Sidorna och under-

gumpen höggula. Vingar och stjert som hos hannen, dock det svarta brunare och det gula blekare.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna är en af Sveriges sällsyntaste foglar, och han är ännu aldrig sedd i Rikets sydligare landskap. Kring Hedemora i Dalarna visar han sig stundom, och i Westerbotten skall han äfven vara sedd. I Finland deremot förekommer han i flera skogar, isynnerhet i björkskogar nära sjöstranden, och i Karelen och Savolax skall han finnas talrikt. Han är öfverallt i dessa trakter en flyttfogel som kommer sent om våren och återvänder tidigt om hösten. Denna fogel säges vara munter och skygg. Han uppehåller sig ständigt i de tätaste och bladrikaste träden. Dess sång har likhet med Trastens, dock är den icke så melodisk.

Föddämn: Om våren och sommaren lefver han af insekter; då bären mogna uppsöker han och förtär dem. Äfven körsbär utgöra hans kost.

Fortplantning: Denna fogel äger en utmärkt konstdrift. Dess näste, som är konstigt sammanflätadt af fina grässtrån och rötter, mossar, tunn hvit björkbark, ull m.m. och till formen liknande en djup korg eller pung, sinner man upphängdt i en klyka af en gren i något träd eller buske, och der fastbundet med bast, ull eller gräs. Det synes utvändigt hvitaktigt, och man träffar deri 4 — 5 hvita ägg som kring den tjockare ändan äro glest beströdda med svartbruna fläckar och punkter.

Sidensvans-Slägtet, (*Ampelis*, L.)

Näbben kort, rak, undersättsig vid roten bred, utåt något hoptryckt, öfverkäken med upphöjd, i båge gående ryggkant och nedböjd spets; underkäken rak med uppböjd spets; båda försedda med ett hak bak spetsen.

Näsborrarna vid roten, ovala, täckta af framåtliggande, styfva, hårlika fjädrar.

Benen korta; tarsen af mellantåns längd.

Vingarna temligen långa; 1:sta och 2:dra vingpennan längst.

Anm. Till detta Slägte hörer ej mer än en enda Europeisk art, och dennas historia är ännu icke på långt när tillräckligen känd. I de södra trakterna af halfön förekommer han endast under höst och vinter som flyttfögel, och ännu har det icke lyckats någon i de nordliga landskapen resande natur-historicus att utforska dess lefnadshållning. Man har ej en gång hittills riktigt vetat hvar han tillbringar sommaren. — Ännu vet man ej bestämt om foglen undergår en enkel eller dubbel ruggning. — Hans Excellence Herr Grefve TROLLE WACHTMEISTER har meddelat mig den underrättelsen att två Sidensvansar, som finnas i Dess volière, och som ditkommo förleden sommardag, undergingo en fullkomlig ruggning i sista hälften af Oktober. — Således inträffar foglens höst-ruggning, och san noli äfven dess fortplantning, mycket sent.

Sidensvansen. (*Ampelis Garrulus*, Lin.)

Artm. Rödaktigt grå. Strupen och ett band genom ögonen svarta. I nacken en fjädertofs. Vingar och stjärt svarta; de inre vingpennorna med pergamentartade röda spetsar; de yttre med en gul och vit fläck. Magen askegrå. Undre stjärttäckarne kastanjerbruna.

Längd 8 tum.

Ampelis Garrulus, Lin. Syst. I. p. 297. — Retz. Fr. I. p. 231. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 184. — *Lanius Garrulus*, Lin. Fn. Sv. p. 28. — *Le Jaseur de Boheme*, Buff. Ois. 3. p. 429. t. 26. pl. enl. 261.

— *Bohemian chatterer*, Lath. Syn. 3. p. 91. — Pen. Arct. Zool. 2. p. 346. — *Seidenschwanz*, Bechst. N. D. 3. p. 410. — Svensk Zool. Häft. 6. n:o 32. — *Sidensvans*. Smål. Rönnbärshane. Westerb. Toppsparf.

Beskrifn. Denna är en af Europas vackraste foglar. Hela fjäderbeklädningen, med undantag af vinggar och stjärt, är mjuk och silkeslik. Hufvans fjädrar äro långa och bilda en tofs, som vanligen nedhänger öfver nacken, men kan äfven uppresas. Öfverhuden och inunder askegrå med rödbrun anstrykning som är dunklast på ryggen och vingtäckarna, öfvergår på pannan i rödbrunt och saknas nästan alldeles på magen och öfvergumpen. Ett strek från näbbarna öfver näbbroten, ett bredt band genom ögonen till nacken, samt strupen rent svarta. Underkäkens rotgrenar på sidorna hvita. Vingpennorna af första ordningen svarta, vid spetsen kantade utvändigt med gult, invändigt med hvitt; de af andra ordningen svartgråa, hafva äfven en hvit fläck i yttre fanet vid spetsen och slutas dessutom med en pergamentartad aflång, röd tillsatts. De närmsta vingtäckarna på de yttre vingpennorna svarta, i spetsen hvita. Stjärten tvär, svart, slutas med ett bredt gult band, dess undre täckfjädrar kastanjbruna. Näbb och ben svarta. Iris rödbrun. — Vingbredden 14 tum.

Honan har det svarta på strupen mindre utbreddt; de främre vingpennorna hafva i yttre fanet vid spetsen en smal hvit eller gulaktig fläck, men de äro ej i spetsen och inåt kantade med hvitt. Det gula bandet hvarmed stjärten slutas är smalare och

blekare; de pergamentartade tillsattserna på vingarna mindre och färre.

Vistelseort och lefnadssätt: Sidensvansen förekommer i de södra landskapen blott som flyttfogel under höst och vinter; och endast som sådan känna honom äfven Invånarne i de norra kusttrakterna af vår halfö. Man har uppgifvit polarländerna som dess enda stamhåll under sommaren; men detta torde ej vara alldeles riktigt, och ännu har ingen, så vida man vet, derstädes funnit dess bo. Sannolikare synes mig att foglen tillbringar sommaren och fortplantar sig i de inre bergiga och skogfulla trakterna af det norra Sverige och Norrige, så väl i grannskapet af polcirkeln, som ock mycket sydligare. Säkert är det åtminstone att han tillbringar *hela sommaren* i norra Wermeland *); men ännu återstår att under nämnde årstid utforska dess hushållning. Mot vintrens analkande anländer foglen till de södra landskapen, antingen familjvis eller ock flockvis; och man träffar honom här äfven midt under vintren. Dock uppehåller sig en flock icke länge på samma ställe, utan stryker kring efter sin föda från en trakt till en annan. De träffas då isynnerhet der rönnbär och andra bärsorter finnas, och de fångas ofta i donor bland kramsfoglar. Denna fogel är nog dum och trög i sina rörelser, dock är han, enligt min erfarenhet, ofta rätt skygg, isynnerhet utåt våren, och låter då ej gerna Jägaren komma inom skotthåll, om denne ej

*) För denna och flera högst intressanta uppgifter har jag att tacka Herr Öfver-Jägmästaren H. FALK.

kan dölja sig. Dess sång, som han om vintren i klart väder låter höra, är låg och föga melodisk. Troligen sjunger han bättre i sin hemort om sommaren. Dess flygt är snabb; ty vingarna äro långa och spetsiga.

Födämnen: Om vintren lefver han isynnerhet af åtskilliga slags bär, såsom rönnbär, oxelbär, enbär, hagtornbär, berberisbär m. fl. samt trädknoppar. Äfven söker han denna årstid, då marken är bar, på våta ställen insekter och puppor. Om våren och troligen äfven om sommaren lefver han af insekter, hvilka han från toppen af ett träd fångar i luften på samma sätt som Flugsnapparna. — I kamaren håller han till godo med alla slags spis, och lär vara en bland de största storätare; ty han skall, enligt Bechsteins iakttagelse, nästan dagligen förtära en portion föda af lika vikt som han sjelf.

Fortplantning: Denna är hittills icke med säkerhet känd.

Nytta: Dess kött är välsmakligt och sundt.

Andra Familien.

Tunn-näbbar, (Tenuirostres)

eller

Sångfoglar. (Canori.)

Näbben tunn, rak, merendels syllik, medelmåttig eller kort; öfverkäkens spets nedböjd, försedd med ett hak.

Näsborrarna till hälften täckta af en hinna, nakna eller gläst belagda med hår.

Benen merendels tunna och spensliga; ut-tån hopvuxen med mellantån genom första tåleden.

De hithörande foglar utmärka sig genom en tonfull och harmonisk sång. De flesta låta höra den ur skogar och buskar; några uppstämman den i kärr bland rör och vass, och några få lifva dermed sandhedarna och de nakna klipporna. — De lefva i engifte, parvis skilda, och de lägga vanligen flera kullar om året. — De nära sig under sommaren af insekter, och de flesta förtära om hösten bär. Största antalet äro flyttfoglar som lemna oss före vintrens annalkande. Deras kött är läckert.

Flugsnappare Slägtet. (Muscipa, Linn.)

Näbben temligen kort, stark, rak, ryggad, trekantig, vid roten nedtryckt, bred; näbboikarna kantade med styfva borsthår.

Näsborrarna på sidan vid näbbroten, rundaktiga, ofvan täckta med en hinna, belagda med glesa hår.

Benen: Tarsen af lika längd med mellantån, (då klon äfven räknas). Näbben kortare än baktån, krökt och hoptryckt.

Vingarna: 1:sta vingpennan ganska kort; 2:dra något kortare än 3:dje som är längst.

Flugsnapparna uppehålla sig i skogarna. De äro flyttfoglar som komma sent och gå tidigt bort. De lefva endast af flugor och

andra insekter, hvilka de upptäcka från någon trädtopp eller gren, fånga i flykten, och återvända derefter till sin förra plats. Då de sitta röra de tät och hastigt vingarna. Bland våra två Svenska arter undergår åtminstone den ena en dubbel ruggning och både hanner, honor och ungar blifva om hösten lika.

1. Gråa Flugsnappare n. (*Muscicapa* *Grisola*, *Lin.*)

Art m. Ofvan brungrå med mörkbruna fläckar på hufvudet; inunder vit med gråbruna långsfläckar på hals och bröst. Längd 6 tum.

Muscicapa Grisola, Lin. Syst. Nat. I. p. 328. — Retz. Fn. p. 251. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 187. — *Motacilla Ficedula*, Lin. Fn. p. 90. — *Le gobe mouche*, Buff. Ois. 4. p. 517. t. 25. f. 2. pl. enl. 565. f. 1. — *Spotted Flycatcher*, Lath. Syn. 3. p. 323. — *Geflechter Fliegenfänger*, Bechst. Nat. D. 3. p. 421.

Beskrifn. Hufvudet ofvan mörkbrunt med gråa fjäderkanter, eller ock grått med en långsgående brun fläck åt spolen af hvarje fjäder; pannans fjädrar med vitgråa kanter. Halsen ofvan, ryggen, skuldrorna och öfvergumpen brunt askegråa. Vingpennorne mörkbruna, de inre jemte de större täkfjädrarna kantade med vitgrått. Stjerten något klufven, mörkbrun, dess yttre pennor utvändigt kantade med grått. Undra kroppsdelarna hvita med långsgående brungråa strek på hals och bröst; midtåt strupen och magen ofläckad. — Näbben svart, inunder vid roten blek. Näsborrharna runda, belagda med

glesa hår. Iris brun. Benen svartbruna. Stjerten räcker $\frac{1}{2}$ tum utom vingarna.

Honan knapt märkbart skild från hannen.

Unge som nyss lemnat boet: Näbben gråbrun. Benen gråa. — Ofvan mörkbrun beströdd med rostgulaktiga fläckar; inunder hvitaktig, halsen framtill och bröstet skuggade med smutsigt brunt eller svartaktigt. Vingarna svartaktiga med rostgula kanter på de inre vingpennorna och de större täcksjäderna.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogelart förekommer hos oss i skogarne temligen allmänt från Skåne ända inom polcirkeln *), och så väl i kustbygderna som i de inre trakterna af landet. Som flyttfogel lemnar han oss midt i September, och återvänder knapt förr än midt i Maji. Under vartiden träffas han äfven i trädgårdarne i Skåne, han håller sig då merendels i topparne af de högre träden, och förråder sig snart genom ett pipande läte: *ist, ist*.

Under fortplantningstiden är han, enligt min erfarenhet, mycket sällsynt i Skåne, men allmän i de öfriga skogiga landskapen. Deremot förekommer han under sträcktiden om hösten, i Augusti och början af September, ganska talrikt i Sveriges sydliga landskap. — Då han sitter i högsta toppen af ett träd eller på en torr qvist och får se en insekt i luften eller ned vid marken, så flyger han genast ut och fångar den, samt återvänder merendels tillbaka till

*) Jag fann honom äfven bosatt i Fondalen nära glaciären.

sitt förra ställe. Sittande lyfter han ofta och hastigt på vingarna, liksom för att ständigt vara färdig till jagt på insekter.

Födämnen: Hos oss förtär han endast insekter, såsom flugor, brömsar, vespor, bi, fjärillar o. s. v. Huru han fångar dem är redan nämdt.

Fortplantning: I Maji och Juni träffar man dess bo med ägg. Man finner det i ihåliga träd, stockar, stubbar m. m., äfven på en tjock gren vid stammen, vid en gårdsgård eller vägg af flätadt ris o. s. v. Det består af mossor, strå och gräsrötter, samt är inuti fodradt med ull och fjäder. Äggen 5, gulaktigt eller blåaktigt hvita beströdda med gråa och rostbruna fläckar. De rufvas vexelvis af båda könen.

2. Svart- och hvita Flugsnapparen. (*Muscicapa atricapilla*, Linn.)

Artm. Ofvan svart med hvit panna (honan ofvan gulbrun enfärgad) och med en lång hvit fläck på den hoplagda vingen. Inunder hvit. Stjerten svart med de två (eller 3) sidopennorna i yttre fanet hvita.

Längd $5\frac{1}{4}$ tum.

Muscicapa atricapilla, Lin. Syst. Nat. I. p. 326. n. 9. — Retz. Fn. Sv. p. 250. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 187. — Gmel. Syst. I. 2. p. 935. — Lath. Ind. Orn. I. p. 467 (med uteslutande af några Synonymer. — *Muscicapa atricapilla*, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 431. — *Muscicapa Muscipeta*, Id. ibid. 435. — *Cold Finch*, Edw. Birds t. 30. f. 1. Hannen; fig. 2. honan eller ungen. — *Muscicapa luctuosa*, Tem. Man. d'Ornith. I. p. 155.

Anm. Det är mig alldeles omöjligt att inse nödvändigheten af en ny benämning (*Musc. luctuosa*) för

denna fogel, som länge och allmänt har varit känd under namn af *Muscic. atricapilla*.

Beskrifn. Gammal hanne om våren: Hela foglen ofvan samt hufvudets och halsens sidor rent svarta, med rödaktigt askegrå öfvergump och en tvärgående vit fläck i pannan. Undra ögonlocket med hvita dun. Vingarna svarta med en stor långsgående vit fläck, hvilken kommer deraf att de långa vingtäckarne och de tre innersta vingpennorna äro rent hvita, undantagande inre kanten, der de senare äro svarta. Dessutom äro vingpennorna från 6:te till 16:de i yttre fanet nära roten hvita. Stjerten rent svart; de två yttersta pennorna i yttre fanet nästan ända till spetsen hvita; den 3:dje *stundom* i yttre kanten vit. Hela foglen inunder rent vit. — Näbben glänsande svart. Iris svartbrun. Benen svarta. Stjerten tvär, räcker $\frac{3}{4}$ t. utom vingarna. — Längd $5\frac{1}{2}$ t. vingbredd. $9\frac{1}{2}$ tum.

Hona i vårdrägt: Ofvan gråbrun; pannan öfver näbbroten något ljusare, smutsigt gulaktig. Den långa fläcken på de hoplagda vingarna smalare än hos hannen och smutsigt vit. Stjerten svartbrun: dess tre yttersta pennor i yttre fanet hvita, samt i spetsen smalt kantade med hvitt. Stjertens närmaste, långa, öfra täckfjädrar svarta. Hela foglen inunder vit med smutsgulaktig eller gråaktig svag anstrykning på hals, bröst och sidor. Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Anm. Herr Temminck behagar påstå att honan icke har någon vingfläck (*miroir*); men deri misstager han sig.

Unga och gamla i höstdrägt: Pannan, hufvudet och halsen ofvan, samt ryggen och skuldrorna dun-

kelt bruna, knapt stötande i olivbrunt. Strupen, halsen framtill, bröstet och slaksidorna med brunaktig anstrykning blandad med gult. Magen hvit. Vingarna svartaktiga. Dess pennor från 6 till 16 i yttre fanet nära roten gulaktigt hvita; de tre innersta utvändigt och de längsta vingtäckarne i spetsen kantade med samma färg; häraf uppkommer ett smalt gulaktigt hvitt band öfver den hoplagda vingen. Stjerten svartaktig, dess två eller tre yttersta sidopennor i yttre fanet hvita.

Unge som nyss lemnat boet: Ofvan mörkbrun, beströdd med rostgulaktiga fläckar; inunder hvitaktig, på bröstet oredigt vattrad med svartaktigt. Vingfläcken isabellgul. De tre yttersta stjertpennorna i yttre fanet från roten utåt hvita.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogolart finnes i skogarna både i Sverige och Norrige, på många ställen talrikt *). Som flyttfogel anländer han till Skåne mot slutet af April månad och träffas då, under förbifarten, i mängd i trädgårdarna. Under flera år har jag anmärkt att Hannarna komma först, och Honorna några dagar senare. Kring den 15:de Maji är sträcktiden förbi, då de försvunnit ur trädgårdarna; de träffas då parvis i skogarna, så väl i Skåne som i Lappland och Norrige, ända inom polcirkeln. Dess sång, som han låter höra från en gren eller från toppen af ett träd, består af några ganska

*) Det är märkvärdigt att denna fogel som nu är allmän, synes för några decennier sedan ha varit ganska sällsynt på vår halfö.

välljudande och rena toner. Merendels uppehåller denna fogelart sig på trädens lägsta grenar, gör derifrån sina utflygter då han varseblifver en förbiflygande insekt, och återvänder vanligen till samma gren. Då han sitter rör han vingarna ständigt och snabbt. — Sedan ungarne blifvit fullväxta, i sista hälften af Juli och i hela Augusti månad, förekomma de tillika med de gamla, ganska talrikt i skogarna i det södra Sverige. Hannar, honor och ungar äro då alla nästan lika. Kring medlet af September månad försvinna de småningom.

Födämnen: Liksom föregående art lefver äfven denna endast af insekter, hvilka han fångar i luften eller plockar på bladen.

Fortplantning: Sitt bo lägger han i ihåliga träd eller mellan trödrötter, o. s. v. Det består af grässtrån, tunn bark m. m. I Juni månad finner man deri 4 — 5 mycket ljusblåa, ofläckade ägg.

Anm. *Muscicapa leucomela*, Lath. tillhör äfven Skandinavians Fauna. Hr Magister Fries, som under sommaren 1821 gjorde en resa i Lappland, såg vid Torne-elfven en fogel, hvilken Hr Fries dock ej fick skjuta, men som efter beskrifning ej kunde vara någon annan än denna. Hr Temminck, som kallar denna art *Saxicola leucomela*, säger äfven att han förekommer i Lappland. Då jag likväl ej sjelf sett foglen, och jag anser mig ständigt böra följa den föresatts att i Fauna icke införa andra arter, än dem jag sjelf haft tillfälle att undersöka och efter naturen beskrifva; så har jag här blott velat anmäla nämnde art och till underrättelse för dem som kunna finna honom, vill jag äfven meddela dess:

Artm.: Svart, hufvudet ofvan, nacken, öfvergumpen, magen och största delen af stjerpen: örnarna hvita.

Långd kring 6 tum.

Sqvätt-Slägtet. (Saxicola, Bechst.)

Näbben rak, tunn, spetsig, vid roten något mer bred än hög, mot spetsen hoptryckt, öfverkäken något längre, i spetsen märkbart nedböjd, och bak spetsen inskuren; näbbroten kantad med styfva borsthår.

Näsborrorna vid näbbroten, äggformiga, ofvan halftäckta af en bar hinna.

Benen med höga och spensliga tarser; bakklon kortare än baktån och mycket krökt.

Vingarna: 1:sta vingpennan kort; 2:dra eller 3:dje längst.

Stjerten tvär, temligen kort.

Sqvättorna hafva i sitt utseende och lefnadssätt mycket gemensamt med *Flugsnapparne*, och de utgöra den tydligaste öfvergång från dem till *Sångarne*, med hvilka de förr blefvo förenade i ett och samma slägte. De uppehålla sig vanligen på steniga och öppna ställen, på klippor och stenhögar, stundom bland buskar, aldrig i stora skogar. De äro lifliga och muntra foglar. Deras tarser äro långa och de löpa snabbt, samt fånga under loppet insekter, hvilka utgöra deras enda näring. De lägga sitt bo på marken eller i hål bland stenar. De rugga ej mer än en gång om året; men de undergå derjemte en partiel ruggning *) om våren,

•) Hvad jag förstår med partiel ruggning, som jag ofta kommer att nämna, skall jag förklara under Sparfslägtet.

och de hannar som äro olika honorna hafva under nämnde årstid en helt annan färg än om hösten. De äro flyttfoglar som lemna oss mot vintren och återvända om våren.

1. Stensqvättan. (*Saxicola Oenanthe*, *Mey.*)

Ar t m. Ryggen grå; pannan öfvergumpen och ett strek öfver ögonen hvita; genom ögonen ett svartaktigt band; stjerten vit med svart spets.

Längd $5\frac{1}{2}$ — 6 tum.

Saxicola Oenanthe, Nilss. Orn. Svec. I. p. 197. — *Motacilla Oenanthe*, Lin. Fn. p. 93. — Retz. Fn. p. 259. — *Sylvia Oenanthe*, Lath. Ind. Orn. I. p. 529. — *Cul-blanc ou Vitrec*, Buff. Ois. 5. p. 237. — pl. enl. 554. fig. 1. 2. — *Wheat-ear*, Lath. Syn. 4. p. 465. — *Weisschwänziger Steinschmätzer*, Bechst. N. D. 3. p. 675. — Sv. *Stensqvätta*; *Stengölp*; Norr. *Stendolp*.

Beskrifn. Hannen om våren: Hufvudet och halsen ofvan samt ryggen askegråa. Pannan, ett strek öfver ögonen och strupen hvita. Från näsborrarna genom ögonen ett svart band som utvidgar sig på tinningarna. Undre kroppsdelarna hvita med en svag rostgul skuggning på bröstet. Vingarna svarta; de sekundära vingpennorna i spetsen kantade med blekt rostgrått. Stjerten från roten öfver midten vit, det öfriga deraf, jemte det medlersta pennparet, svart. Öfra stjerttäckarna hvita. Längden 6 tum; vingbredden 12 tum. — Näbb, iris och ben svarta.

Honan: Öfra kroppsdelarna brungråa, med rostgråaktig panna och en brun fläck på tinningarna;

halsen framtill och bröstet rostbrunaktiga; magen och undergumpen med rostgul anstrykning. Vingarna bruna der hannens äro svarta. Stjertens hvita färg mindre utbredd.

Foglen i höstdrägt efter ruggningen: Öfra kroppsdelenarna gråbruna med rostbrun anstrykning. Halsen framtill, bröstet och sidorna rostbrunaktiga. Ett svartaktigt strek mellan näbb och öga. Underhakan, magen och undergumpen hvitaktiga med rostbrunaktig anstrykning. Vingarna svarta med rostbruna kanter både på pennor och täckfjädrar, samt de förra i spetsen rostbrunaktigt hvita. Stjerten från roten öfver midten rent vit, (utom de två medlersta pennorna som blott vid roten äro hvita), för öfrigt svart med rostbrunaktigt hvita spetskanter. Öfra stjertäckarne rent hvita

Vistelseort och lefnadssätt: Stensqvättan är en bland de allmännaste föglar på hela Skandinaviska halfön, och förekommer så väl i det sydligaste Skåne som i det nordligare Norrige och Lappland, långt inom polcirkeln. Hon träffas icke blott i de lägre regionerna, utan äfven på fjällarna högt öfver trädgränsen och stundom ännu i grannskapet af den ständigt liggande snön. På Dowrefjäll såg jag henne på Harbacken och på flera fjälltoppar, äfven högst uppe på Mofjället, på Middagsfjället vid glaciären i Fondalen, samt på andra fjäll både inom och utom polarkretsen. — Dessutom förekommer hon äfven på Island och i Grönland *). — Dess tillhåll äro

*) Se Faber, Fabricius. — Hr Zetterstedts påstående i sin *Lappska Resa* 2 Del. s. 99; not

öfverallt steniga och för skog blottade trakter, klippor, stenhögar, stengårdsgårdar o. s. v. — Stensqvättan är en orolig och munter fogel. Med utmärkt snabbhet löper hon efter insekter på stenar och på marken. Då man nalkas dess bo, visar hon sig isynnerhet orolig, flyger från en sten eller stör till en annan, böcker sig, utbreder stjerten och ropar *hit-acktacktack, hit*. Som flyttfogel kommer hon till Skåne kring den 10:de April, och i slutet af Maji var hon redan anländ till Dowrefjäll. Om hösten träffas hon familjvis på fälten, och i September månad flyttar hon åt sydligare länder.

Födämnena: Dessa äro blott insekter, isynnerhet smärre skalinsekter och flugor.

Fortplantning: Mellan stenarna i gårdsgårdar, i stenrösen, i hål och remnor i klippor o. s. v. lägger hon sitt näste. Detta består af gräsrötter och strå, och är inuti belagdt med fjäder, ull och hår. Äggen 6, sällan 7, grönaktigt hvita, eller mycket ljusblåa. — Då honan lemnar nästet för att söka föda åt sig, rufvas äggen af hannen. Då ungarna blifvit utkläckta näras de af båda föräldrarna, som gemensamt bära föda till dem i näbben.

2. Busk-sqvättan. (*Saxicola Rubetra*, *Mey.*)

Artem. Ofvan svart med rostgråa fjäderkanter. Ett band öfver ögat och en fläck på vingen, samt un-

att Stensqvättan icke träffas på de högre fjällen, utan "upphör långt innan trädgränsen", är derföre ganska felaktigt.

derhakan och sidorna af strupen, hvita. Halsen fram-
till rostgul. Längd 5 tum.

Saxicola Rubetra, Nilss. Orn. Svec. I. p. 194. — *Motacilla Rubetra*, Lin. Fn. p. 93. — Retz. Fn. p. 260. — *Sylvia Rubetra*, Lath. Ind. Orn. I. p. 252. — *Grand Traquet ou Tarier*, Buff. Ois. 5. p. 224. pl. enl. 678. f. 2. — *Whin-chat*, Lath. Syn. 4. p. 454. — *Braunkehliger Steinschmätzer*, Bechst. N. D. 3. p. 684.

Beskrifn. *Hanne i sommarträkt*: Hufvud, rygg och skuldror svarta med rostgråa fjäderkanter, hvilka äro minst (stundom nästan inga) på hufvudet, samt bredast och mer roströda på öfvergumpen. Från näsborrarna öfver ögonen till nacken går ett hvitt band. Från näbbviken på sidan af hufvudet under ögat ett mycket bredt svart band. Från den hvita underhakan nedlöper på hvardera sidan af strupen och öfriga halsen ett hvitt strek. Halsen framtill och bröstet vackert rostgula. Magen hvit; sidorna och undergumpen med rostgul anstrykning. Vingarna svartaktiga med en stor aflång vit fläck, och en mindre under denna vid vingkanten. Stjerten från roten till midten vit; pennspolarne, yttre stjerthälften samt det medlersta pennparet svartbruna. Längden 5 tum; vingbredden $9\frac{1}{2}$ tum; näbb och ben svarta. Iris gråbrun.

Honan har streket öfver ögat rostgulaktigt, vingfläcken mindre; det svarta breda bandet under ögat är otydligare, och på tinningarna finnes en rödbrunaktig fläck.

Ungarna om hösten: de gråbruna eller rödbruna fjäderkanterna på de öfra kroppsdelarna äro bre-

dare, hvaraf foglen synes ofvan gråaktigt rödbrun beströdd med svarta fläckar, och hvarje fjäder slutas med en hvitaktig kant. Streket öfver ögat, halsen framtill, bröstet och sidorna hvitaktiga med rostgul anstrykning som på bröstet är starkast och har der några små, otydliga fläckar. På örontrakten står en brun fläck. — Vingarna svarta med rostbruna pennkanter och fjäderkanter; den hvita vingfläcken saknas helt och hållet. Det hvita på stjertpennorna är mindre och mindre rent; i spetsen äro de bredt kantade med blekt rostbrunt.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel är hos oss icke sällsynt, dock är han ej så allmän som föregående art. Han förekommer här och der i alla landskap på halfön från Skåne till Lappland, och träffas äfven inom polcirkeln, men likväl icke på fjällen som *Stensqvättan*. Som flyttfogel anländer han till Skåne kring den 25:te April. Man träffar honom vanligen bland buskar och vid skogsbryn som gränsa till fält och åkrar. Merendels sitter han på högsta toppen af en buske, och på åkrarna hvilar han sig vanligen på de öfver säden uppstående tistlarne. Härifrån gör han sina utfarter då han varseblir någon insekt i luften eller på marken, och fångar den i hast nästan på samma sätt som Flugsnapparne. — Liksom föregående är denna fogel munter och orolig. Då man nalkas honom flyger han än hit än dit, rör stjerten upp och ned, skriker och väsnas. Dess sång, som ej är oangenäm, får man isynnerhet från fälten höra om aftonen sent och om morgonen bit-

tida. Om hösten träffas han liksom föregående familjvis ofta på sommarkrifna åkrar, der han sitter på de upphöjda jordklimparna. I September flyttar han bort.

Födämnena: Insekter, så väl skalinsekter som bi, flugor, o. s. v.

Fortplantning: Dess näste, som består af gräs, strå och mossor, samt är inuti belagdt med hästhår och fjäder, träffas vanligen på marken bland gräs och buskar, mer sällan i en buske lågt ned vid jorden. Äggen 5^e blågröna ofläckade.

Jernsparf-Slägtet. (*Accentor, Bechst.*)

Näbben syllik, rak, trind, spetsig, vid roten temligen undersättsig; kanterna af båda käkarna starkt inböjda.

Näsborrarna nakna, ofvan halftäckta af en bar hinna.

Benen temligen undersättsiga; bakklon störst och mest krökt.

Vingarna: 1:sta vingpennan nästan ingen; 2:dra något kortare än 3:dje som jemte 4:de är längst.

Af detta Slägte känner man nu tre arter i Europa och af dessa tillhör den ena äfven vår Nord. Dessa föglar äro icke blott insektätande, utan de förtära äfven växtfrön, bär o. d. Om sommaren bebo de bergstrakter, om vintren gå de ned på slätterna, och

en del bland dem öfvervintra hos oss. Hannar och honor likna hvarandra mycket. De synas ej rugga mer än en gång om året.

1. Jernsparfven. (*Accentor modularis*, Koch.)

Artm. Ryggen rostbrun med svarta fläckar; hufvud hals och bröst askeblåa med bruna fläckar på hufvudet. Längd 6 tum.

Accentor modularis, Koch Bay. Zool. — Cuv. Regne anim. I. p. 368. — Tem. Man. d'Orn. I. p. 249. — *Sylvia modularis*, Lath. Ind. I. p. 511. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 217. — *Motacilla modularis*, Lin. Fn. Sv. p. 89. — *Traine-buisson*, Buff. Ois. 5. p. 151. pl. enl. 615. f. 1. — *Die Braunnelle*, Bechst. N. D. 3. p. 616.

Beskrifn. Hufvud och hals ofvan askegråa med mer eller mindre tydliga bruna långsfläckar. Halsen framtill och på sidorna samt bröstet askeblåa, ofläckadc. På tinningarna en brun fläck med hvitaktiga fjäderspolar. Rygg och skuldror rostbruna med en stor svart fläck i midten af hvarje fjäder. De stora vingtäckarne svartaktiga med rostbruna kanter och en liten gulaktigt hvit fläck i spetsen af hvardera. Vingpennorna mörkbruna, de inre med breda de yttre med smalare rostbruna kanter. Kroppens sidor och öfvergumpen gråaktigt rostbruna. Magen hvit. Undre stjerttäckarne bruna med breda hvita kanter. Stjerten tvär, brun. Näbben svart. Iris rödbrun. Benen brungula. Längd 6 tum; Vingbredden $8\frac{1}{2}$ tum.

Honan har flera och tydligare bruna fläckar på hufvudet.

Vistelseort och lefnadssätt: Jernsparfven bebor om sommaren de nordligare trakterna af vår halfö, och träffas under denna årstid ej sällan äfven inom polcirkeln. Dess stamhåll äro då bergiga och med skog beväxta trakter. Först mot vintrens annalkande lemna han de skogiga bergstrakterna och begifver sig ned i dalbygden och på slätterna. Han in finner sig då på Skånes slättbygd, der han äfven som i Halland och i flera af Sveriges södra landskap ej sällan öfvervintrar. En del af arten flytta likväl åt sydligare länder, och dessa återvända till oss i Mars och April månader. De uppehålla sig då någon tid i trädgårdar, buskar och pilhäckar; men de försvinna alla utan undantag före sommarens annalkande. — Jernsparfven är en munter och liflig fogel, som ständigt är i rörelse och hoppar eller kryper bland de tätaste grenarna i häckar och snår. Dess lockton är ett temligen skarpt: *issri!* och dess sång, som han merendels låter höra från öfversta spetsen af en ung gran, är ganska melodisk och vacker.

Födämnen: Insekter, larver, puppor och regnmaskar utgöra om våren och sommaren dess mesta föda; om hösten och vintren lefver han hufvudsakligen af granfrön och andra växtfrön, samt af bär.

Fortplantning: Sitt bo bygger Jernsparfven i täta buskar, 2 — 4 alnar från marken. Det består af mossor, små pinnar och rötter, och är inuti fodradt med hår. Äggen, 5 — 6 blågröna, rufvas vaxelvis af begge könen.

Sångare-Slägtet. (*Sylvia*, *Latb.*)

Näbben rak, tunn, syllik, spetsig, merendels nägot hoptryckt och försedd med ryggkant; öfverkäken i spetsen vanligen litet nedböjd och bak spetsen inskuren; underkäken rak.

Näsborrarna vid näbbroten, äggformiga, ofvan halftäckta af en bar hinna.

Benen temligen spensliga med tarsen längre än mellantån; bakklo kortare än baktån, hoptryckt och böjd.

Vingarna: 1:sta vingpennan kort, eller ganska kort, stundom nästan ingen; 2:dra kortare än 3:dje, som merendels jemte 4:de är längst. Af de innersta vingpennorna är ingen längre än de andra sekundära, och alla äro mycket kortare än de primära.

Detta Slägte är ett af de vidlyftigaste i vår Fauna. Alla hithörande arter äro små, och bland dem träffas de minsta foglar i Europa. De vistas till största delen i skogar, na bland lummiga träd och buskar; några bebo säf, rör och vass vid sidan af åar, grafvar och insjöar. De äro alla sångfoglar, och isynnerhet utmärker sig största delen af de förstnämnda genom en skön och melodisk röst. Deras föda består om sommaren endast af maskar och insekter, hvilka de icke som Flugsnapparne fånga i flygten, utan de plocka dem från löfven, qvistarna och säfven, hvilka de derföre ständigt genomleta. De rugga ej mer än en gång om året, och han-

narna äro sällan mycket olika honorna Stundom är skilnaden knapt märkbar. Några få blifva qvar hos oss under vintren; men största delen äro flyttfoglar som lemna oss om hösten och återvända om våren.

För mera redighet skull, kan man indela detta vidlyftiga Slägte i följande underordnade :

I. Näktergalar. (*Curruca*, *Bechst.*)

Näbben temligen stark, mer hög än bred, mot spetsen hoptryckt. Vingarna medelmåttigt långa. Benen temligen undersättsiga. Stjerten tvär eller litet urnupen och den yttersta pennan något kortare.

De vistas i skogar och bland buskar; de lefva till största delen af insekter, och blott några få njuta derjemte om hösten bär; de bygga sina nästen i buskar; deras sång är melodisk och rik på afvexlingar. De äro alla flyttfoglar.

1. Egentliga Näktergalen. (*Sylvia Luscinia*, *Lath.*)

Artm. Ofvan gråaktigt rödbrun med brunröd stjert; inunder hvitaktig med askegrå anstrykning på bröstet och sidorna. 1:sta vingpennan kort; 2:dra kortare än 4:de. Längd $6\frac{1}{4}$ tum.

Sylvia Luscinia, *Lath.* Ind. Orn. I. p. 506. — *Motacilla Luscinia*, *Lin.* Fn. Sv. p. 88.? — *Die Nachtigall*, *Bechst.* Nat. Deutsch. 3. p. 476. — *Becfin Rossignol*, *Tem. Man.* d'Ornith. I. p. 195. — Sv. Näktergal.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar gråbruna med en stark rödbrun anstrykning; öfvergumpen och stjerten brunröda; strupen och magen hvitaktiga; bröstet och sidorna ljust askegråa med svag gulaktig anstrykning; undergumpen och stjertens undre täckfjädrar hvita stötande i rostgult. — Längden $6\frac{1}{4}$ tum; Stjerten $2\frac{5}{8}$ tum; 1:sta vingpennan kort, dock längre än de primära vingpennornas täckfjädrar; 2:dra vingpennan något kortare än 4:de.

Honan är knapt märkbart olik *Hannen*.

Vistelseort och lefnadssätt: Näktergalar finnas aldrig i Norrige, och i västra trakterna af Sverige gå de ej längre i norr än Skåne. De öfverstiga aldrig eller högst sällan Hallandsås, churu de finnas talrikt i de lummiga lundarna vid Engelholm, tätt nedanför åsen. I östra trakterna af Sverige finnas de deremot icke blott i Skåne, utan äfven i stor mängd i vissa trakter af Blekinge, på Öland, Gottland m. m. Äfven förekomma de på Svartsjölandet, Fullerön, i Uppland o. s. v. Men huru vida de på nämnde ställen förekommande Näktergalar höra till denna eller följande art, eller om begge arter träffas på alla de anförda ställen, det återstår ännu att med noggrannhet afgöra *). Enligt min erfarenhet är dock denna art, åtminstone i Skåne, mer sällsynt än följande, som i vissa trakter är mycket talrik.

*) Man har länge ansett denna och följande för en och samma art; men de äro skilda både till storlek, färg och sång m. m.

Det är denna fogel som i äldre och nyare tider varit namnkunnig och beundrad för sin härliga sång. Också kan man ej med skäl neka honom första rummet bland skogens sångare. Det är förvånande att en så liten fogel äger en så stark och uthållande stämma. Men det är icke blott för styrkan, som dess sång så högt skattas; det är isynnerhet för dess mångfaldiga och angenäma afvexlingar, dess fylliga och klara toner, och dess sköna harmoni, som den af hvarje, icke alldeles känslolös människa värderas. Den består af vid pass fyra och tjugo olika strofer. H:r Bechstein har försökt att med ord uttrycka dem, och man kan ej neka att han i detta försök temligen lyckats. För dem, som önska veta om det är denna eller följande art de hafva för sig, då de höra en Näktergal sjunga, tror jag mig höra, med H:r Bechsteins ord, anföra några af de första stroferna:

Tiuu tiuu tiuu tiuu,

Spe tiu zqua,

Tio tio tio tio tio tio tio tix:

Qutio qutio qutio qutio,

Zquo zquo zquo zquo

Tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzi,

Quorror tiu zqua pipiquisi.

För att ej vara för vidlyftig, anför jag ej alla; för ändamålet torde de anförda vara tillräckliga. Liksom bland andra sångfoglar, så finnas äfven bland Näktergalarna bättre och sämre sångare. Den ena utmärker sig i ett afseende, den andra i ett annat; och det gifvas också bland dem virtuosor, som hos sig förena alla röstens och dess modulationers fullkom-

ligheter. Man har äfven hos dessa små sångare upptäckt tydliga spår till egenkärlek och afundsjuka. Den ena vill ej låta sig öfverträffas af den andra. Då flera sjunga i samma trakt, eller i samma volière, skrika de sig ofta hesa, och stundom händer att de under denna täflan anstränga sig så, att ett blodkärl springer, och de falla döda ned, liksom rödda af slag (Bechst.). — Herr Goetze berättar i sin Europ. Fauna V. p. 14. ett märkvärdigt lithörande exempel: En af hans vänner i Brunsvig hade några år ägt en Näktergal, som var bland de utmärktaste sångare. En Jude som lärt sig att med mun och tunga fullkomligt efterhärma Näktergalens sång, lät höra sig i Brunsvig. Denna Jude blef af ägaren till Näktergalen anmodad att täfla med honom, och företog sig det en gång då Näktergalen sjöng med fullkomlig munterhet. Juden började, — Näktergalen instämde. Juden höjde stämman; äfvenså Näktergalen. Juden tog än högre, och Näktergalen försökte, men kunde ej komma öfver honom. Då han märkte sig vara öfverträffad, teg han bums stilla, och efter ett par dagar var han död af grämselse. — Som flyttfogel anländer Näktergalen till Skåne i slutet af April eller i början af Maji. Hannarna komma alltid några dagar förr än honorna. De uppsöka då vanligen sina förra stamhåll och de tilikännagifva genast sin ankomst med sång, hvilken de då merendels låta höra om nätterna, för att locka till sig de antågande honorna. Sedan dessa äro anlända, sjunga en del hannar mest om dagen, en del deremot isynnerhet om natten, och

man har anmärkt att dessa olika vanor äro ärfstehiga. — Näktergalens tillhåll äro skuggrika trakter, der täta buskar finnas. Dess sångtid är kort och varar hos oss knapt mer än sex veckor; ty så snart ungarna blifvit utkläckta, använda de gamla sin tid på deras underhåll, och sången upphör derföre redan före Midsommar. Efter denna tid och ända till Augusti träffar man ännu både unga och gamla i täta löfskogar, och de senare gifva, då man nalkas dem, sin närvaro tillkänna endast genom en egen och kännelig lockton: *vitt-krrrr*, som de låta höra under det de ängsligt hoppa från gren till gren. I Augusti eller början af September försvinna de oförmärkt.

Födämnen: Insekter och larver; om hösten äfven bär, såsom fläderbär, vinbär, o. s. v.

Fortplantning: De bygga sitt bo i en tät buske nära marken, eller på en busk-stubbe, i en rishög o. s. v. Det är utan särdeles konst sammanlagdt af gräs, gräsrötter och torra löf. Äggen 4—6, smutsigt olivgröna; begge könen rufva dem vexelvis och uppföda gemensamt sina ungar med insektlarver.

2. Större Näktergalen. (Sylvia Philomela, Bechst.)

Artm. Ofvan dunkelt gråbrun med rödbrun stjert; strupen hvit med mörkgrå infattning; bröstet brungrått. 1:sta vingpennan ganska kort; 2:dra längre än 4:de. Längd $6\frac{3}{4}$ — 7 tum.

Sylvia Philomela (Sprosser) Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 507. — Temm. Man. d'Ornit. I. p. 196. — *Motacilla Luscinia major*, Gmel. Syst. Nat. I. p. 950. n. 1. β .

Anm. Det är omöjligt att af blotta beskrifningen bestämdt afgöra om Linné haft denna eller föregående Art för sig då han införde *Motacilla Luscinia* i sin Fauna Svec. — De äro hvarandra så lika att de lätt kunna förblandas, om man ej ser begge på en gång, eller är uppmärksam på de här angifna skiljemärken. — Det var denna art, jag i Ornith. Svec. I. p. 199. beskref under namn af *Sylvia Luscinia*.

Beskrifn. Denna fogel skiljes, vid jemförelse med föregående, derigenom att han är större, har dunklare mer smutsigt bruna, samt mindre rena rödbruna färger. En hufvudsaklig skilnad är dessutom vingpennornas olika förhållanden.

Alla öfra kroppsdelar äro dunkelt gråbruna med rödbrun anstrykning; stjerten och dess öfra täckfjädrar mer rödbruna. Strupen åt midten hvit, med gråbrun infattning, eller nästan ett gråbrunt strek åt hvardera sidan; bröstet och sidorna gråa skuggade med brunt; magen hvit. Undergumpen och stjertens undre täckfjädrar rostgulaktiga. — Näbben hornfärgad, inunder blek. Munvikarna utstående gula. Näsborrharna äggformiga, ofvan omgifna med en hvalfd hinna. Munnen inuti gul. Tarserna bleka, perlfärgade; tårna något mörkare, mer blyfärgade. Iris rödbrun. Stjerten $2\frac{7}{8}$ tum, något rundad. Vingpennorna: 1:sta ganska kort, smal och spetsig, mycket kortare än de primära vingpennornas täckfjädrar; 2:dra vingpennan längre än 4:de. Längd $6\frac{3}{4}$ — $7\frac{1}{8}$ tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna art är i Sverige, åtminstone i Skåne, mycket allmännare än föregående, och i många trakter der man tror sig hafva Näktergalar i mängd, har man blott denna. I en del låga och kärraktiga samt med täta buskar eller

lummig skog bevuxna trakter här i Skåne, hörer man honom om sommaren sjunga nästan ur hvarje buske. Dess sång är mycket olik den föregåendes, och på långt när icke så melodisk och skön; den är högre och mer skorrande, men också mindre rask och mer afbruten. Den har någon likhet med Sångtrastens. Framför allt saknar den de ljuftva, intagande strofer och de accordlika sluttoner, som utmärka den föregåendes sång. Hr. Bechstein har äfven försökt att med bokstäfver uttrycka denna, och jag vill deraf, till skilnad från den föregåendes, anföra de första stroferna:

Gia — gy gy gy!

Hâgoi, hâgoi, zy zy zy zy.

Gergegegegegeh,

Hoa, goigoigoi gi;

Zicka zicka zicka.

Davitt davitt davitt!

m. m. — Då flera sjunga på en gång, är deras sång på närmare håll besvärlig och nästan odräglig. De sjunga mest om nätterna. — Deras lockton, som man isynnerhet får höra då man närmar sig den trakt der de hafva sina ungar, är ett fint pipande: *hy, hy!* och stundom derjemte ett lågt *arrr!* — Som flyttfogel anländer denna art till oss i början af Maji, och före Midsommar upphör han att sjunga.

Födämnena: Liksom föregående art lefver äfven denna om sommaren endast af insekter och larver. Under sina vandringar skall han också förtära bär.

Fortplantning: Dess näste träffar man merendels på låga, med täta buskar beväxta ställen. Det ligger vanligen på en tufva eller buskstubbe och är konstlöst sammansatt af gräs och torra löf, hvilka sednare ofta utgöra dess enda inre beklädnad. Äggen äro större än föregåendes, olivbruna och ofläckade.

3. Bröstvattrade Sångaren. (*Sylvia nisoria*, *Bechst.*)

Artm. *Ofvan mörkt askegrå; inunder hvit med gråa vågiga tvärstrek. Stjertpennorna gråbruna; de två yttersta med en hvit fläck vid spetsen af inre fanet.*
Längd 7 tum.

Sylvia nisoria, *Bechst.* *Naturg. Deutschl.* 3 B. p. 547.

— *Nilss.* *Ornithol. Svec.* I. p. 201. tab. 5. —

Bec-fin rayé, *Tem.* *Man d'Ornith.* I. p. 200.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar mörkt askegråa; skuldrornas och öfvergumpens fjädrar sluttande sig med en hvitaktig kant inom hvilken finnes ett brunt strek. De undra kroppsdelarna hvita med gråbruna tvärlinier eller vågor på strupen, halsen, bröstet och sidorna. Midten af magen hvit. Vingarna bruna; de inre vingpennorna och de största vingtäckarne i spetsen kantade med hvitt. Stjerten mörkt gråbrun, tvär; den yttersta pennan (som är något kortare) utvändigt med en smal hvitaktig kant och med en stor hvit fläck i inre fanet vid spetsen; den andra med en något mindre hvit fläck vid spetsen; de följande i inre spetsen blott kantade med hvitt. Undre stjerttäckarne gråbruna med

breda hvita kanter. Näbben brun, inunder vid roten blek. Iris skönt gul. Benen gråa.

Ung fogel: Öfra kroppsdelarna brunaktigt askgråa med hvitaktiga smala bräm i spetsen af hvarje fjäder, isynnerhet på pannan, öfver ögonen, på skuldrorna och öfvergumpen. En hvitaktig fläck mellan näsborrarna och ögat. Undra delarna hvita med gråbruna tvärvågor, som äro tydligast på sidorna af halsen, bröstet och magen, samt mindre märkbara midt åt strupen och bröstet.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel, som först för några år sedan blifvit funnen i Sverige, tillhör, så vida man hittills känner, endast dess södra och östra trakter, och är äfven der sällsynt. Blett i östra trakterna af Skåne samt i Blekinge, på Öland och Gottland har han hittills blifvit sedd. Han har sitt tillbäll bland täta och lummiga buskar, isynnerhet bland sådana som gränsa till ängar och falt. Liksom dess mesta samslägtingar kryper han gerna bland täta snår, för att plocka insekter och larver; men med få Sångare äger hannen den vanan gemensam att från en buske uppstiga vertikalt i luften och att, från denna höjd, sjungande åter sakt nedsänka sig med utbredda vingar, liksom Piplärkan. Han är för öfrigt en orolig och rädd fogel, och då man nalkas det ställe der han har sina ungar, flyger han med ängsligt skrik från en buske till en annan, nästan som Törnskatan, med hvars hona han äfven till utseendet på afstånd har någon likhet.

Föddämnena: Insekter och larver, äfven daggmäskar, och stundom bär.

Fortplantning: Sitt bo bygger han i täta buskar. Dess 4—5 ägg äro hvitaktiga med rödgråa eller askegråa fläckar.

4. Svarthufvade Sångaren. (*Sylvia atricapilla*, Lath.

Artem. Ofvan askegrå eller gråbrun med olivgrön anstrykning; hals bröst och sidor ljust askegråa (hos honan gråa rostgulaktiga); hufvan hos hannen svart, hos honan rostbrun.

Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Motacilla atricapilla, Lin. Fn. p. 93. — Retz. Fn. p. 260. — *Sylvia atricapilla*, Lath. Ind. Orn. I. p. 508. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 202. — *La Fauvette à tête noire*, Buff. Ois. 5. p. 125. t. 8. f. 1, — pl. enl. 580. f. 1. 2. — *Black cap*, Lath. Syn. 4. p. 415. — *Der Mönch*, Bechst. Nat. D. 3. p. 512.

Beskrifn. Hela hufvan från pannan genom öfra delen af ögonen till nacken rent svart, glänsande. Sidorna af hufvudet och halsen samt halsryggen rent askegråa. Ögonlocken ofvan klädda med svarta, inunder med hvita korta dun. Rygg, skuldror vingtäckare och öfvergump askegråa med olivgrön anstrykning. Vingpennor och stjärtpennor bruna, kantade med ryggens färg. Underhakan och magen hvita. Bröstet och sidorna ljust askegråa. Undre stjärttäckarne gråa med breda hvita kanter. — Näbben svartaktig. Benen brungråa. 1:sta vingpennan ganska kort; 2:dra kortare än 3:te; 3:dje längst, något längre än 4:de. —

Längd $6\frac{1}{4}$ tum; vingbredd. 9 t. — Stjerten utom vingarna $1\frac{1}{2}$ tum.

Honan: Hufvan rostbrun; hufvudets och halsens sidor gråaktiga, sakna den sköna askeblåa färg som pryder hannen. Halsen ofvan och ryggen gråaktigt olivfärgade. Strupen och magen hvitaktiga. Halsen framtill, bröstet och sidorna ljus brungråa stötande i gult.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sångare förekommer, ehuru temligen sparsamt, på hela Skandinavien från Skåne, ända till de nordligaste landskapen. Som flyttfogel återvänder han till oss i slutet af April, och låter snart höra sin sång i lundar och trädgårdar. Äfven får man höra den i Juli och i början af Augusti. Denna sång som är omvexlande och vacker, har stor likhet med Trädgårdssångarens, äfven som foglarne sjelfva likna hvarandra ganska mycket; men dennes sång är ej så rask, eller så uthållande. Då foglen sjunger sitter han merendels i högsta toppen af ett högt träd. Äfven häri skiljer han sig från Trädgårds-sångaren, som merendels, då han sjunger, gömmer sig bland de tätaste löfven i en trädtopp eller buske.

Föddämnena: Dessa bestå hufvudsakligen i åtskilliga slags Insekter, insektlarver och puppor. Om hösten förtär han derjemte bär, t. e. fläderbär, vinbär; och i Botaniska trädgården uppsöker han med begärlighet de mogna mulbären.

Fortplantning: Dess näste bygger han i buskar, merendels i hagtorn eller någon annan taggig buske.

Äggen 4 — 6, temligen stora trubbiga, gulaktigt hvita, marmorerade med gult eller rostfärg och beströdda med bruna punkter.

5. Trädgårds Sångaren. (*Sylvia hortensis*, *Bechst.*)

Artm. Ofvan gråbrun med olivgrön anstrykning; bröst och sidor ljusgråa, stötande i rostgult. Ögonlocken hvita. Benen blyfärgade.

Längd $5\frac{3}{4}$ tum.

Sylvia hortensis, Nilss. Orn. Svec. I. p. 204. — *Motacilla salicaria*, Lin Faun. p. 90. — *Motacilla Hippolais*, Tengmalm. Vet. Acad. Handl. 1783. p. 53. — *La petite Fauvette*, Buff. pl. enl. 579. f. 2. — *Die graue Grasmücke*, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 524.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar brungråa med mer eller mindre märkbar olivgrön anstrykning. Öfver ögat ett kort hvitaktigt strek; under ögat en liten hvitaktig fläck. Ögonlocken äfven bevuxna med korta hvita dun. Tvärt öfver halsens sidor ett rent askegrått strek. Strupen hvitaktig. Magen och undergumpen hvita. Halsen framtill bröstet och sidorna ljusgråa, med otydlig rostgul anstrykning. Vingpennorna bruna, kantade med ryggens färg. Stjertpennorna gråbruna, knapt mörkare än ryggen, i spetsen kantade med hvitaktigt. — Näbben ofvan brun, inunder perlgrå. Benen blygråa. Iris rödbrun. 1:sta vingpennan nästan ingen; 2:dra längre än 4:de och föga kortare än 3:dje som är längst. Stjerten $2\frac{1}{2}$ tum, räcker $1\frac{1}{8}$ tum utom vingarna.

Honan: är nästan alldeles lik hannen.

Anm. Från honan till föregående art, hvilken han vid första påseendet ganska mycket liknar, skiljes han derigenom att hufvan har samma färg som ryggen: att hela foglen och isynnerhet stjerten är kortare, och framför allt att vingpennarnas relativa längd är helt olika.

Vistelseort och lefnadssätt: Trädgårds Sångaren är en flyttfogel, som återvänder till våra trakter kring medlet af Maji månad. Han är mycket allmänare än föregående och förekommer talrikt i trädgårdar och löfskogar, icke blott i södra Sverige, utan äfven långt upp åt nordn. Jag har både hört honom sjunga och skjutit honom inom polcirkeln. Dess sång, som han låter höra från ett lummigt träd eller en buske, bland hvars tätaste löf han vanligen döljer sig, är munter, uthållande och vacker. Man hör den under sommaren hela dagen.

Föddämn: Om sommaren lefver han af insekter och larver; om hösten förtär han äfven bär t. e. fläderbär, vinbär, körsbär, o. s. v.

Fortplantning: I täta buskar, isynnerhet i hagtorn och törnbuskar bygger han sitt bo. Det består af torra gräsrötter och grässtrån, och är inuti belagdt med hästhår. Äggen vanligen fem, äro gråaktigt hvita beströdda med större eller mindre olivbruna fläckar. Då man nalkas dess bo eller ungår, hoppar foglen orolig från gren till gren bland löfven, och förråder sig med ett temligen sträft skrik *gääk, gääk*, eller *tack - tack - tack!* — Kring medlet af September flyttar han bort.

6. Gråa Sångaren. (*Sylvia cinerea*, Lath.)

Artm. Ofvan grå med rostbrun anstrykning; hufvudets sidor askegråa. Strupen rent hvit. Ving-

pennor och täckfjädrar med breda roströda kanter. Den yttersta stjärtpennan utvändigt öfver midten hvit; den andra med hvit spets. Längd 6 tum.

Sylvia cinerea, Lath. Ind. Orn. I. p. 514. — Nilss. Ornith. Sv. I. p. 206. — *Fauvette grise*, Buff. Ois. 5. p. 132. — pl. enl. 579. f. 3. — *Bec-fin grisette*, Temm. Man. d'Orn. I. p. 207. — *White-Throat*, Lath. Syn. 4. p. 429. — *Die Föhle Grasmücke*, Bechst. N. D. 3. p. 534.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och på sidorne askgrått, ofvan mer eller mindre stötande i brunt. Rygg, skuldror och öfvergump gråa med rostbrun anstrykning. Vingarna svartbruna; de två eller tre yttersta vingpennorna med en smal hvit kant; de inre, samt alla de större vingtäckarne med breda roströda kanter. Strupen och magen rent hvita; bröstet svagt rosenrödt, och sidorna af bröst och mage rostgråaktiga. Stjerten tvär. Stjärtpennorna mörkbruna, den yttersta kortare än de andra, utvändigt från spetsen öfver midten snedt hvit, samt med hela yttre fanet hvitt; den andra i spetsen hvit. Längden 6 tum; vingbredden $8\frac{1}{2}$ tum; Näbben ofvan brun, inunder blek. Iris ljust rötbrun. Benen brungula.

Honan har den askgråa färgen på hufvudet mindre märkbar, och det hvita på strupen mindre utvidgadt; det inskränker sig nästan blott till underhakan. En hvit fläck mellan ögat och näsborrarna. Bröstet mer anstruket med rostgråaktigt.

Vistelseort och lefnadssätt: I skogar och trädgårdar, men isynnerhet i täta busksnår förekommer denna Sångare mindre sällsynt. Han träffas icke

blott i de södra trakterna af halfön, utan han finnes äfven i de norra, och jag har sett honom på flera ställen norr om Trondhiem. Han är en i hög grad munter och liflig fogel, som, för att söka insekter och larver, städse genomkryper de tätaste snår och buskar. Då han sjunger, sitter han merendels i toppen af en buske. Dess sång är rask, omvexlande och vacker. Den består af ett långt piano, som endast höres på nära håll, och ett kort forte, som foglen sjunger under det han höjer sig några fot i luften, svingar sig om i en liten krets, och sätter sig, då han slutat, åter på sin buske. Då han blir rädd eller ond, uppreser han hufvudsjädrarna, hoppar orolig bland qvistarna och skriker temligen sträft: *gä, gä*. — Soni flyttfogel infinner han sig i Skåne kring medlet af Maji månad, och träffas då isynnerhet i trädgårdar, häckar och ensamma busksnår på fälten. I September flyttar han bort.

Födämnena: Dessa bestå hufvudsakligen af insekter och larver. Blott i nödfall förtär han bär, såsom fläder- och vinbär.

Fortplantning: Dess bo träffar man i täta buskar nära marken, stundom bland högt gräs mellan buskarne, eller ock mellan rötter o. d. Det består af grässtrån och mossor, och är inuti belagdt med hästhår. Äggen 5 — 6 grönaktigt hvitgråa, med rödbruna och olivfärgade punkter, hvilka isynnerhet äro talrika vid den tjockare ändan.

7. Årt-Sångaren. (*Sylvia Curruca*, Lath.)

Artm. Ofvan gråbrun med askegrått hufvud och ett mörkare strek genom ögonen, hvilket bildar en brun fläck på tinningarne. Inunder hvit. Yttersta stjärtpen-
nan i yttre fanet, samt i spetsens inre kant, hvit.

Längd $5\frac{1}{4}$ tum.

Sylvia Curruca, Lath. Ind. I. p. 509. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 208. — *Curruca garrula*, Briss. Orn. 3. p. 384. — *Fauvette babillarde*, Buff. Ois. 5. p. 135. — *Bec-fin babillard*, Tem. Man. d'Ornith. I. p. 209. — *Babbling Warbler*, Lath. Syn. 4. p. 417. — *Das Müllerchen* (*Sylvia garrula*), Bechst. N. D. 3. p. 540.

Beskrifn. Hufvudet ofvan askegrått; från näbbviken genom ögat går ett mörkare strek, som bak ögat på örontrakten utbreder sig till en dunkelt gråbrun fläck. Halsen ofvan, ryggen, skuldrorna, vingtäckarne och öfvergumpen gråbruna. Vingarna mörkbruna, dess pennor kantade med gråbrunt. De undra kroppsdelarne hvita; bröst, sidor och undergump svagt skuggade med rostgrått; strupe och mage rent hvita. Stjerten tvär; dess pennor svartbruna; den yttersta något kortare, gråbrun, i hela yttre fanet hvit, äfvensom i inre fanet i kanten och nära spolen som dock själf är brun. De två följande *stundom* i spetsen kantade med hvitt. Näbben ofvan hornfärgad, inunder vid roten blek. Iris brunröd, omgifves af en hvit ring. Benen mörkt blyfärgade. Stjerten $2\frac{1}{8}$ tum, räcker $1\frac{1}{4}$ tum utom vingarna.

Honan, som är $\frac{1}{4}$ tum kortare än hannen, skiljes knapt derifrån. Dess färg är dock ofvan något

ljusare, skuggningen på bröstet stagare och stjertpennorna ej så svartbruna.

Vistelseort och lefnadssätt: Kring den 18:de eller 20:de Maji återvänder denna lilla Sångare från sina sydliga tåg, och träffas då i trädgårdar, häckar och skogslundar här i Skåne. Han finnes äfven i Rikets medlersta landskap, och i Norrige har jag sett honom ända upp i Värmdalen. Sitt tillhåll om sommaren har han helst i täta buskar, belägna på öppna fält eller vid skogsbryn. Här genomkryper han ständigt de tätaste, låga snår och sätter sig sällan högt i ett träd. Dess besynnerliga sång: *klapp, klapp, klapp, klapp*, liknar nästan ljudet af en med slaga försedd väderqvarn, som nyttjas att bortskrämma Sparf ur trädgårdar eller hampland. Detta ljud har också på vissa ställen i Tyskland förskaffat honom namn af Weissmüller eller Müllerchen. Detta är likväl icke hans enda eller egentliga sång; ty denna är melodisk och omvexlande, men så låg att man måste vara nära för att höra den. Han har äfven ett annat läte: *sza, sza*, som han endast låter höra då han tror någon fara hota honom eller dess bo. I September flyttar han bort.

Födämnen: Insekter, larver och insektägg.

Fortplantning: Sitt bo bygger han vanligen i taggiga buskar, krusbärs buskar o. s. v. Det består af gräsrötter och grässtrån, och är inuti merendels belagdt med svinhår eller hästhår. Äggen 4 — 6 hvita med blåaktiga och gulbruna fläckar, som bilda en krans kring den tjockare ändan.

II. Qvickstjertar. (*Ficedula*, *Bechst.*)

Näbben vid roten något bred, utåt trind och mycket spetsig. Benen höga och spensliga.

De hafva sitt tillhåll i skogar eller bland buskar; de föda sig af maskar och insekter, hvilka sednare de fånga i flykten eller plocka från bladen. Till lyunnet äro de alla trätgiriga och bitas ofta med sina likar. De lägga sitt bo på marken i hål, i stubbar, stockar, mellan rötter o. s. v. stundom i buskar.

8. Rödhake-Sångaren *). (*Sylvia Rubecula*, *Lath.*)

Artm. Ofvan grå med mörkt olivgrön anstrykning. Halsen framtill och bröstet gulröda.

Längden $5\frac{3}{4}$ tum.

Motacilla Rubecula, Lin. Fn. p. 95. — Retz. Fn. p. 264. — *Sylvia Rubecula*, Lath. Ind. Orn. I. p. 520. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 210. — *Rouge-gorge*, Buff. Ois. 5. p. 196. t. 11. pl. enl. 361. f. 1. — *Red-breast*, Lath. Syn. 4. p. 442. — *Rothkehlchen*, Bechst. N. D. 3. p. 579. — Sv. Rotgel, Rödhake, Rödhane, Rödbrosta.

Beskrifn. Hufvudet och halsen, ofvan, samt ryggen och vingtäckarne gråa med mörkt olivgrön anstrykning. Ett streck öfver näbbroten, hufvudets sidor genom ögonen, halsen framtill och öfra delen af bröstet gulröda. Denna färg har på halsens sidor en askeblå infattning som isynnerhet utbreder sig på kroppens sidor och får der en olivgrön anstrykning.

*) Namnet är bildadt af foglens provins-benämning: Röd-ha-ken.

Medlersta delen af undra bröstet och magen hvita. Vingpennorne bruna. Stjertpennorne bruna och deras kanter vid roten samt öfre täckfjädrar rostbrunaktiga. De yttersta 3 — 4 af de längsta vingtäckarne med en rostgul fläck i spetsen. Iris svartbrun. Benen bruna. Näbben svart. Längden $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ tum.

Unge före första ruggningen: Alla öfra kroppsdelar gråaktigt olivfärgade med en liten rostgulaktig fläck nära spetsen af hvarje fjäder; sjelfva spetsen brun. Strupe och bröst smutsigt rostgulaktiga med bruna kanter i spetsen af hvarje fjäder. Måge och undergump smutsigt hvita.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna är en af de allmännaste Sångare på vår halfö. Han träffas om sommaren så väl i de sydligaste landskapen, som i de norra ända upp i grannskapet af polarkretsen. Som flyttfögel lemnar denna art oss mycket sent, och vanligen försvinna ej de sista ur Skånes trädgårdar förr än starkt frost i slutet af December eller i Januari bortjagar dem. De återvända tidigt, nemligen redan före slutet af Mars månad. Sällan blir en eller annan kvar under hela vintren. Om våren och hösten finnas de i mängd i Skånes trädgårdar; om sommaren vistas de i skogarna. Deras sång, som man äfven under sträcktider, vår och höst, får höra ur trädgårdarne, men isynnerhet om sommaren ur lummiga träd i skogarna, är melancholisk, temligen låg, och i korta strofer afbruten. Skönast och tydligast höres den i skymningen under en vacker och lugn sommarafton.

Rödhake-Sångaren är liflig, munter och snabb i alla sina rörelser. Ständigt flyger han från en buske till en annan, eller hoppar från en gren till en annan, bockar sig, slår stjerten i vädret och ropar sitt: *sits* eller *sisri*. Ute är han föga skygg, och i rum blir han genast tam, samt kan der med passande föda underhållas i flera år. Liksom de öfriga Qvickstjertarna, är han ond och trätgirig, och tåler ingen af sina likar hos sig. Då flera finnas i samma rum eller i samma bur, slåss de ofta och stundom bita de till och med hvarandra ihjäl.

Födämnen: Åtskilliga slags insekter, daggmaskar, bär t. e. blåbär, vinbär, fläderbär, rönnbär o. s. v. I kammaren håller han till godo med allt hvad man kastar för honom, såsom kött, bröd, ost, krossad hampfrön o. s. v. Men dagligen måste han ha färskt vatten, ej blott för att dricka, utan ock för att bada sig. Helst låter man honom flyga lös i rummet; sätter man, honom i bur, fordras bättre föda och mer omvårdnad om han skall bli vid lif.

Fortplantning: Nästet bygges på marken i mossan, mellan trädrötter, i ihåliga trädstockar samt i andra hål. Det består utvändigt af mossan, invändigt af grässtrån. Man träffar deri vanligen 5 ägg, till grundfärgen smutsigt hvita, beströdda med rödbruna punkter, hvilka vid den tjockare ändan löpa sammans.

Jagt och fångst: Med blåsröret kan man lätt fälla denna fogel. Om hösten då fläderbären äro mogna, fångar man honom med dem i *Spränklor*, hvilka man sätter på marken mellan buskar och snår i

trädgårdarne, der han under denna årstid förekommer i mängd. Äfven fastnar han ofta i de *Donor*, som man i skogen utsätter för Kramsföglar, och i hvilka man till lockmat nyttjar rönnbär.

Nytta: Köttet är läckert och sundt. Då han håles inne i rum, rensar han det för flugor och andra insekter. Äfven värderas han för sin sång.

9. Blåhake-Sångaren *). (*Sylvia svecica*, Lath.)

Artm. Ofvan mörkt gråbrun. Stjertens inre hälft roströd, dess yttre svart; medlersta pennparet helt brunt. Strupen: hos hannen himmelsblå med en stor brunröd fläck; hos honan hvit med svart infattning.

Längd $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ tum.

Motacilla svecica, Lin. Fn. Sv. p. 94. — Retz. Fn. 263. — *Sylvia svecica*, Lath. Ind. Orn. I. p. 521. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 216. — *La gorge bleue*, Buff. Ois. 5. p. 206. t. 12. — pl. enl. 610. f. 1. 3. — *Becfin gorge bleue*, Tem. Man. d'Orn. I. p. 216. — *Blue throated Warbler*, Lath. Syn. 4. 444. — *Blaukehliger Sänger*, Bechst, N. D. 3. p. 589. — Meyer Taschenb. Deutsch. Orn. I. p. 240. — Id. Zusätze p. 241.

Beskrifn. *Gammal Hanne*: Alla öfra kroppsdelar mörkt gråbruna; hufvan framtill, isynnerhet åt sidorna, svart med rostgråa fjäderkanter. Från näsborrarna öfver ögat går ett smalt rostgulaktigt strek; mellan näbbviken och ögat en svart fläck; på tinningarna en brun. Strupen och halsen framtill glänsande och skönt azurblåa, hvilken färg omgifver en stor roströd fläck, och är nedtill begränsad af en

*) Namnet är bildadt i öfverensstämmelse med föregående.

Bred svart gördel, nedom hvilken finnes ett smalt hvitt strek, och främre delen af bröstet är mer eller mindre roströd. För öfrigt äro bröstet och magen hvitaktiga, samt undergumpen svagt stötande i rostgult. Vingarna af ryggens färg. Stjerten nästan tvär (dock äro sidopennorna något kortare), dess två medlersta pennor af ryggens färg, de öfriga från roten till midten roströda, i yttre hälften svarta, stundom med rostgula spetsar. 1:sta vingpennan kort; 2:dra lika med 6:te; 3:dje och 4:de längst.

Gammal hona: Streket från näsborrarna öfver ögat hvitt. Underhakan och strupen hvita; den senare på sidorna och nedtill infattad af svarta, isynnerhet vid sidorna sammanlöpande, fläckar. Bakom dessa finnas på bröstet mindre, bruna fläckar. Bröstet för öfrigt och magen hvita med mycket svag rostgul anstrykning. Alla öfra kroppsdelar samt vingar och stjärt som hos hannen; dock äro stjärt pennorna i yttre hälften ej svarta utan mörkbruna.

Anm. De flesta Ornithologer instämma deri att Hannen har frampå den azurblåa halsen en stor rent hvit fläck. Hos intet enda af de han-exemplar jag undersökt, (af hvilka jag skjutit ett stort antal i Norriges norra kusttrakter under fortplantningstiden, och andra blifvit af Hr B. Fries skjutna under samma årtid i Lappland), finnes denna hvita fläck. Hos alla är den roströd. — Honorna som äfven blifvit skjutna vid sina bon, sakna allt spår till blå färg på strupen. — Man skulle häraf lätt kunna falla på den tankan att, under namn af *Sylvia svecica*, två skilda arter innefattas. Hr Brehm har också i sina *Beiträge* 2 B. beskrifvit två i Tyskland förekommande *Blåhake-Sångare*, af hvilka han kallar den ena *Sylvia Svecica* och den andra *Sylvia Wolfii*; men Hr Meyer har, i sina *Zusätze und Berichtigungen* p. a. st., redan sökt visa att Hr Brehms *Sylv. Svecica* och *Wolfii* utgöra en och samma art i olika åldrar, och att denna art, som Hr Meyer kallar *Sylvia Cyanecula*, är identisk med Latham's *S. Svecica* och Linnés *Motacilla Svecica*.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sångare, äfven som dess flesta Svenska samslägtingar, finnes ganska vidt kringsspridd. Han förekommer nästan öfverallt i Europa, der lokalen är passande. Han tycker neml. mest om bergiga, med buskar bevuxna och af floder eller bäckar genomskurna trakter. Han finnes vid Gibraltar, på Pyrenéerna, i Sveitz, på vissa ställen nog talrikt (*Schinz*), i Rhen- och Maintrakterna i mängd (*Meyer*), i Frankrike och Holland (*Temm.*), i Österrike, Schlesien, på Harz, i Hessiska landet, och i dalarna vid Thüringer skogen (*Bechst.*), samt på flera ställen *).

*) Detta har länge varit känt af Ornithologerna, och redan gamle Gesner vet att omtala föglen som en Sweitz's invånare. Det är därför obegripligt att Hr Zetterstedt, oaktadt han alldeles icke sätter i fråga att ju dess *Sylvia Svecica* är den samma som andra Författares, likväl kunnat påstå, (i dess Lappska Resa I. Del. sid. 258. not.) att denna fögel "endast tillhör den högre Norden". (!) — Äfven påstås i samma not att denna fögels hushållning "ingenstädes med fullständighet blifvit beskrifven". Den är likväl beskrifven af de flesta Europas Ornithologer, och af några både mer vetenskapligen fullständigt och sannt än af Hr Zetterstedt, som vid dess beskrifning begått flera misstag. — I sammanhang med den förstnämnda högst oriktiga uppgiften står äfven den oriktiga benämningen af "Nordens Näktergal", som Hr Z. tillagt denna fögel. Han är alldeles icke Nordens uteslutande tillhörighet, utan han sjunger lika så väl i det södra som i det norra Europa. — Då vetenskapsmannen bildar nya namn, böra de framför allt vara sådana att de i vetenskapen kunna adopteras, eljest duga de till platt intet; men ifrågavarande fögel kan aldrig i något System komma att bland Sångarne stå i samma Afdelning som innefattar Näktergalarna. Han äger med dem blott en aflägsen släktskap. Ja till och med dess sång, churu vacker, har med deras ingen likhet. Mer lik Näktergalens sång är Talltrastens, och denna fögel kallas derför af allmogen på vissa ställen i Norrige: den Norske Nattergal.

På Skandinavien förekommer denna fogel i Fjälltrakterna i Norrige och Lappland. På fjällens sidor går han så högt upp som björken växer. Han finnes i temlig mängd på Dowrefjäll *), äfven som i Helgeland och Salten; och det synes mer än sannolikt att han äfven förekommer bland fjällarne i det sydvästra Norrige. I det södra Sverige träffas han deremot aldrig, ej en gång under sina vandringar höst och vår **). Liksom dess flesta samslägtingar är neml. äfven denna en flyttfogel, som blott om sommaren finnes på vår halfö. Vid floder och bäckar bland vide och björkbuskar, är dess vanliga tillhåll. — I lefnadsätt och lynne har denna utmärkt vackra Sångare den största likhet med följande art. Liksom denne är han föga sällskaplig. Hvarje par bor ensamt och tillåter ej att andra komma inom dess lilla distrikt. Sker detta, så uppkommer genast strid och den främmande blir bortdrifven. Liksom *Rödstjert-Sångaren* skakar han ständigt stjerten, utbreder honom som en

*) Här hörde jag honom i början af Juni. Isynnerhet förekom mig dess sång i dessa vilda trakter angenäm om mornarna i gryningen, då jag var ute på Ripjagt. Redan kl. 1 började han, och han var den förste fogel som bröt nattens tystnad. Näst efter honom låt Gökken höra sig.

**) Denna omständighet inträffar äfven med andra Sylvier, hvilka om sommaren bebo så väl det södra Europa, som de norra trakterna af Skandinavien, att de neml. aldrig finnas i det mellanliggande södra Sverige: t. e. *Sylvia rufa*, och trol. flera. Denna omständighet tyckes endast kunna förklaras derigenom, att en del anställa sina tåg från och till det södra Europa genom Jutland och det södra Norrige, andra gå öfver Finland och Norrhöten. Se Vet. Acad:s Handl. 1819. p. 115.

solfjäder, slår honom upp och ropar *huit, huit*. Då han-
nen sjunger sitter han merendels på en qvist eller på
marken i grannskapet af boet. Nalkas man detta, så
tystnar sången; foglen hoppar då ond eller ängslig på
qvistarna och tillkännager sin oro genom ett ofta
upprepadt: *tack, tack* *). — Dess sång som i och för
sig sjelf är ganska vacker, förekommer ännu skönare
då den höres i de ödsliga och på sångfoglar fattiga
fjälltrakterna. Den består af flera afväxlande strofer,
hvilka utan afbrott fortsättas. Herr Bechstein har
ganska karakteristiskt beskrifvit den på följande sätt:
"den har någon likhet med ljudet af en lira, d. v. s.
dess grundton är ett oafbrutet surrande, hvori några
höga, angenämt klingande strofer blandas, så att det
låter som om foglen gäfvade två slags ljud från sig på
en gång. Dess sång liknar således mera Ringarlans
och Starens än Näktergalens" **).

*) Dessa vanor har han gemensamma med de flesta sam-
släktningar. Herr Zetterstedt tror att han upphör att
sjunga då man nalkas honom, derföre att han är "af-
undsjuk om sin sång, hvilken han odelad
vill egnas åt sin maka", och att han äfven der-
före, "då han märker sig vara af någon annan hörd,
förändrar det rena ljudet i ett mera
squattrande läte", (Zs Resa a. st. sid. 258.) —
Sådana åsigter kunna väl hafva sina behag för den ro-
man-älskande dilettanten, men i vetenskapen böra de
såsom falska förkastas. Foglen ändrar lätet, ej derföre
att han är afundsjuk om sin sång, utan derföre att han
är rädd om sitt bo.

**) Herr Zetterstedt har, p. a. st. sid. 255. gjort Näk-
tergalen (*Sylvia Luscinia*) ganska mycken orätt,
då han nedsätter dess sång under Blåhakens. Men
af den korta beskrifning han ger på Näktergalens sång,
finner man tydligt att Herr Z. aldrig hört *Sylvia Lu-*
scinia, utan blott *Sylvia Philomela*; ty endast

Födämnena: Insekter, isynnerhet vatteninsekter, larver, puppor och rägnmaskar. Med följande art har han äfven den vanan gemensam att stundom, liksom Flugsnapparne, fanga en förbiflygande insekt i luften och att derefter återvända till sin förra plats. Oftast plockar han dock insekter på marken eller på bladen. Vatteninsekter och rägnmaskar söker han begärligt på våta ställen.

Fortplantning: Dess bo träffar man i sednare hälften af Juni, vanligen vid brädden af bäckar, floder och andra vatten, i hål mellan de blottade rötterna af täta videbuskar, stundom på marken vid sidan af en tufva, stundom i en tät buske *). Det består utvändigt af mossor och torra grässtrån, invändigt af finare grässtrån eller hår. Äggen 5 — 6 llekt grönaktiga enfärgade, eller med otydliga rödbruna fläckar beströdda.

denna, men icke *S. Luscinia* "lutar sina korta strofer med ett skorrande läte". — För att än mera upphöja "*Nordens Näktergal*" öfver andra sångfuglar, försäkrar Hr Z. att han har egna läten för de särskilda känslorna: "tillfredsställelsen, ledsnaden, upptäkten af en hotande fara o. s. v." Detta är väl sant men det kan med lika skäl sägas om alla foglar, både sångare och icke sångare. Sjelfva Hönan har ju ett annat läte då hon värpt, ett annat då hon är hungrig, ett annat då hon varseblir en Rosfögel, o. s. v. — Af ungefär lika grundlighet är Hr Z:s jemförelse mellan den lefvande och uppstoppade foglens olika liflighet. (sid. 256.)

*) Hr Zetterstedt fann några nästen af denna fogel på marken, och detta var för honom tillräckligt för att påstå det foglen aldrig lägger sitt bo på annat ställe, och att de författare som säga sig ha funnit det i hål eller i buskar "säkert icke sett förhållandet i naturen". (Zett. p. a. st. 257. not.) Sådana ensidiga slutsatser förekomma på flera ställen i hans

10. Rödstjert-Sångaren. (*Sylvia Phoenicurus*, Lath.)

Artm. Stjerten roströd med det medlersta pennparet brunt. Hannen har halsen framtill svart, bröstet roströdt, pannan hvit, ryggen askegrå. Honan ofvan rostgrå, halsen framtill vitaktig, bröstet roströaktigt. Längd $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ tum.

Motacilla Phoenicurus, Lin. Fn. p. 94. — *Sylvia Phoenicurus*, Lath. Ind. I. p. 511. — Nils. Orn. Svec. I. p. 212. — *Rossignol de murailles*, Buff. Ois. 5. p. 170. t. 6. f. 2. — pl. enl. 351. f. 1. 2. — Redstart. Lath. Syn. 4. p. 421. n. 11. — *Bec-fin de murailles*, Temm. Man. d Orn. I. p. 220. — *Gartenrothschwänzchen*, Bechst. N. D. 3. p. 607.

Honan: *Motacilla Erithacus*, Lin. Fn. p. 94. Retz. Fn. p. 262. — Unge om hösten: *Motac. Tithys*, Lin. Fn. I. edit. p. 85. — Sv. Rödstjert. Vippstjert. Quickstjert.

Beskrifn. Hannen: Pannan rent hvit. Ett band öfver näbbroten, halsens och hufvudets sidor upp genom ögonen, strupen och halsen framtill rent svart. Hjessan nacken och främre ryggen askeblåa. Öfvergumpen, bröstet och sidorna vackert roströda. Stjerten roströd; de två medlersta stjertpennorna bruna, vid roten och i yttre kanten roströda. Magen hvit. Undergumpen och stjertens undre täckfjädrar

bok, och af denna beskaffenhet äro för det mesta alla hans åberopade "rättelser af misstag". Om Hr Z. känt huru mycket de flesta fogelarter variera i platsen för sina nästen, och i färgen af sina ägg, så skulle han säkert visat mer aktning för andra Författares uppgifna erfarenhet.

Till dessa Anmärkningar har Hr Zetterstedt själf uppmanat mig genom anfall i ett offentligt Tidningsblad. Se Företalet.

blekt roströda. Vingarna bruna med smala rostgråa pennkanter. 1:sta vingpennan kort; 2:dra lika med 6:te; 3:dje litet kortare än 4:de som är längst. Näbb och ben svarta; iris mörkbrun; stjerten något kantig. — Längd $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ tum; vingbredden $9\frac{1}{2}$ tum.

Honan är mycket olik Hannen: Ofvan grå med rostbrun anstrykning. Strupen och halsen framtill hvitaktiga. Bröstat och sidorna smutsigt roströda. De stora vingtäckarne med rostgula kanter. Magen hvitaktig. Undergumpen och undra stjerttäckarne blekt rostgulaktiga.

Hanne om hösten: Strupen och halsen framtill svarta med hvita fjäderkanter, hvarigenom dessa delar synas liksom vattrade med svart och hvitt. Pannans fjädrar hvita, de öfra med gråa kanter, hvarigenom pannans hvita strimma är smalare än hos de gamla. Ett hvitt strek öfver ögat. Bröstat roströdt, vattrade med hvitt. Öfra kroppsdelarna askegråa med rostbrun anstrykning isynnerhet på ryggen. De stora vingtäckarne och de inre vingpennorna bredt kantade med rostgult.

Hona om hösten: Ofvan mörkgrå med ganska svag rostbrun anstrykning. Inunder, på halsen gråaktig med hvitaktigt hår och der inblandadt; på bröstet och sidorna rostbrunaktig med hvitaktiga fjäderkanter. Magen vit. Undergumpen och undre stjerttäckarne rostgula. Vingarne svartaktiga, med rostgråa fjäderkanter, isynnerhet breda på de större vingtäckarne och de inre vingpennorna. Öfvergumpen och stjerten ljus roströda med de två medlersta stjertpennorna svartaktiga.

Vistelseort och lefnadssätt: Rödstjerten finnes i alla Landskap på vår halfö, från Skåne ända inom polarcirkeln, och så väl i kustbygderna, som i det inre af landet. Som flyttfogel anländer han till oss om våren efter den 20:de April, och han träffas efter denna tid talrikt i trädgårdar, häckar och buskar, äfven på Skånska slättbygden. Om sommaren vistas han i skogarna, eller i trädgårdar och busktrakter i grannskapet af skogarna.

Rödstjerten är en munter och liflig fogel som ständigt är i rörelse, flyger och hoppar. Då han sätter sig skakar han hastigt stjerten. Under sina vandringar höst och vår uppehåller han sig mest i låga buskar och häckar; om sommaren sjunger han från de högre träden. Dess sång består af korta strofer och har några ganska angenäma, men några skärrande toner. Dess lockton är ett hvisslande: *huit, huit*. — Då man nalkas dess bo eller ungar, blir foglen orolig och ond, flyger från det ena trädet till det andra, löper på grenarna, skakar stjerten, bocskar sig och ropar: *huit - ké - ké! huit - ké - ké - ké!* — Om hösten före bortresan infinna sig åter både unga och gamla i mängd i trädgårdarne och häckarne i Skåne. Efter medlet af September försvinna merendels de sista.

Födämnena: Åtskilliga slags insekter, larver, puppor och rägnmaskar. Äfven vinbär och fläderbär.

Fortplantning: Nästet lägges i ihåliga träd, i remnor i murar, under taklisten m. m. Det är konst-

löst sammanlagdt af grässtrån, gräsrötter, fjäder och hår. Äggen 6 — 8, stundom 9, ljus blågröna, ofläckade. Ungarna äro nog lika Näktergalens; men de skiljas genom svart näbb och svarta ben, samt det medlersta pennparet svartbrunt.

11. Svarta Rödstjert-Sångaren. (Sylvia Tithys, Lath.)

Art m. Stjerten roströd med det medlersta pennparet brunt. Hannen har halsen framtill och bröstet svarta; hufvudet, halsen ofvan och ryggen askeblåa. Honan ofvan smutsigt askegrå, inunder ljusare askegrå. Längd nära 6 tum.

Sylvia Tithys, Lath. Ind. Orn. I. p. 512. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 215. — *Black redtail*, Lath. Syn. 4. p. 426. n:o 16. — *Hausrothschwänzchen*, Bechst. Nat. D. 3. B. p. 597.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet och halsen ofvan samt ryggen och de mindre vingtäckarne mörkt askeblåa. Ett band öfver näbbroten, hufvudets sidor genom ögonen, strupen och halsen framtill samt bröstet svarta, med mer eller mindre märkbara askegråa fjäderkanter, hvilka i bredd tilltaga nedåt bröstet, så att magen och sidorna äro helt askeblåa. Öfvergumpen, stjertens öfra och undra täckfjädrar samt stjerten roströda; det medlersta pennparet brunt. Vingpennorna bruna; de inre, samt de stora vingtäckarne kantade med hvitt. 1:sta vingpennan kort; 2:dra lika med 7:de; 4:de och 5:te längst.

Honan: ofvan mörkt askegrå; inunder ljusare askegrå, hvilken färg baktill på magen öfvergår i

hvitaktigt. Vingtäckarne och de inre vingpennorna svartbruna med askegråa kanter.

Vistelseort: Denna är en af Sveriges sällsyntaste foglar, och det har ännu aldrig lyckats mig att få se honom på andra ställen än i Kabinetterna. I det södra Sverige är han, så vida man vet, aldrig sedd; men kring Stockholm och Upsala har han en och annan gång blifvit fälld. H. E. H:r Grefve Trolle Wachtmeister har en gång under vårtiden skjutit honom på sistnämnde ställe; och i Paykullska och Stockholmska Muséerna förvaras exemplar äfven fälda i Uppland. — Dess egentliga fädernesland är det södra Europa, och dess ursprungliga stamhåll äro höga, nakna klippor. Derifrån nedkommer han på taken af torn, slott och hus i städerna.

Födämnen: Insekter, larver, maskar och bär.

Fortplantning: Han säges lägga sitt näste i hål i klippor och murar; äfven under taken af höga hus, kyrkor och slott. Äggen 5 - 6 hvita, glänsande.

III. Löfsångare. (*Asilus*, *Bechst.* *Phyllopseusta*, *Mey.*)

Kroppsfärgen merendels grönaktig eller gulaktig; **Näbben** något olika, oftast mycket tunn och mot spetsen hoptryckt. **Stjerten** tvär eller något tvåklufven. **Benen** mest spensliga.

De vistas i skogarna. De lefva af Insekter, hvilka de antingen fånga i luften eller plocka från bladen. De mesta hafva en kort

och föga melodisk sång, och dessa bygga sitt klotrunda bo på marken.

12. Gulbröstad e Sångaren. (*Sylvia Hippolaïs*, Lath.)

Artm. Ofvan grönaktigt grå, inunder ljusgul. De inre vingpennorna och stjertens sidopennor med vitaktiga kanter. Näsborrharna rundaktiga. Benen blygråa. Längd $5\frac{2}{3}$ tum.

Motacilla Hippolaïs, Lin. Fn. Sv. p. 90. — (Diagn.) Gmel. Syst. I. p. 954. — *Sylvia Hippolaïs*, Lath. Ind. 2. p. 507. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 219. — *La Fauvette de ros'aux*, Buff. pl. enl. 581. f. 2. — *Bec-fin à poitrine jaune*, Tem. Man. d'Ornit. I. p. 222. — *Gelbbäuchiger Laubvogel*, Bechst. 3. p. 553. — Sv. Bastard-Näktergal; Gulmagad Sångare.

Beskrifn. Alla öfra delar gråa med olivgrön anstrykning. Trakten mellan öga och näbb samt en krets kring ögat, gula. Alla undra kroppsdelar från strupen till undra stjerttäckarne ljusgula. Vingpennorna mörkbruna; de stora vingtäckarna samt de inre vingpennorna med breda gråhvita kanter. Stjerten tvär brun; dess sidopennor kantade med hvitt.

Hufvudet framtill nedtryckt och spetsigt utlöpan- de i näbben, som, isynnerhet vid roten, är nedtryckt och bred, och afsmalnar småningom mot spetsen, utan att på sidorna vara hoptryckt; han är tvärtom under hela sin längd mer bred än hög *); sedd ofvanifrån inneslutas dess sidor af nästan convexa, ej (som

*) Denna näbbform tillhör ingen annan Svensk art i detta släkte.

hos de andre) af concava linier; ofvan köttfärgadt-brun, inunder köttfärgadt gul; med gula käkkanter och näbbvikar, öfver hvilka tre svarta borst nedstå. Käkarna lika långa. Näsborrharna rundaktiga. Munnen inuti citrongul. Iris rödbrun. Benen temligen starka, blyfärgade. 1:sta vingpennan ganska kort, 2:dra lika med 5:te; 3:dje och 4:de längst.

Honan skiljes medelst färgen knapt från *Hannen*.

Vistelskort och *lesnadssätt*: Denna förträfflige sångfogel anländer till oss kring medlet af Maji. Han anländer genast sin ankomst genom en rask och omvexlande sång. Han finnes i det södra och medlersta Sverige mindre sällsynt, och i Norrige har jag träffat honom norr om Trondhiem i Wärdalen och på gränsen af Helgeland. Han vistas helst i skogslundar, trädgårdar, skogsbryn, eller på sådana ställen som bland buskar hafva några glesa löfträd. Midt inne i stora och täta skogar träffas han sällan. Till lynnet är han ytterst munter och liflig, samt ganska skygg. Dess sång, som man vanligen får höra från en tät, löfrik trädtopp eller buske, är ganska afvexlande och består af en mängd olika strofer. Man tycker den vara sammansatt af åtskilliga foglars läten: man igenkänner deri ljud som eljest tillhöra Lärkfalken, Staren, Svalan, Hämplingen o. s. v. — Nalkas man dess bo eller ungar, så kringflyga de gamla retade och oroliga, med ett sträff: *tack, tack, tack, tack*; och då de rätt komma i affekt skrika de: *täck - täckahyö, täckahyö-hy*. —

Föddämnena: Endast insekter och larver.

Fortplantning: Bland alla Sångare bygger denna det vackraste bo, äfven som han lägger de vackraste ägg. Dess bo finner man i Juni månad, i en buske ett par alnar från jorden, byggt i en klyka mellan 3 — 4 grenar. Det är omvänt kegelformigt och med mycken skicklighet sammansatt af torra grässtrån, hängen af videarter, m. m. samt utvändigt prydt med den tunna, hvita ytterbarken af björk, (hvarigenom det på något afstånd synes helt hvitt) och invändigt belagdt med hästtagel. Äggen 5 blekt rödaktiga, eller rosenröda, glést beströdda med större och mindre runda svarta punkter och strek.

13. Gröna Sångaren. (*Sylvia Sibilatrix*, Bechst.)

Artm. Ofvan grön med ett gult strek öfver och ett mörkbrunt genom ögonen. Hufvudets sidor och halsen framtill gula. Bröstat, magen och undergumpen rent hvita. Öfvergumpen och pennkanterne ljusgröna.

Längd $4\frac{1}{2}$ tum.

Sylvia Sibilatrix, Bechst. N. D. 3. p. 561. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 225. tab. 7. — *Sylvia sylvicola*, Transact. Lin. Soc. 4. p. 35. — *Wood-Wren*, Transact. Lin. 2. p. 245. — *Bec-fin siffleur*, Tem. Man. d'Orn. I. p. 223.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar skönt gröna; denna färg är renast och vackrast på hufvudet, och mer ljusgrön framåt pannan och på öfvergumpen. Från näsborrarna öfver ögat och örat bort mot nacken går ett gult strek; under detta genom ögat ett

mörkbrunt; hvarunder hufvudets sidor, strupen och halsen framtill, äfven som armhålan, vingvecket under kanten, samt låren, äro rent gula. Alla de andra undra kroppsdelarna rent hvita. Vingpennor och stjertpennor, äfven som vingtäckarne svartbruna, vackert kantade med ljusgrönt. Alla vingpennor af andra ordningen och de flesta af första ordningen i spetsen kantade med hvitaktigt. — Näbben ofvan brun, inunder köttfärgad. Iris brun. Benen ljusbruna. Näsborrharna äggformiga, framtill spetsiga. 1:sta vingpennan ganska kort, smal och spetsig, (nästan ingen); 2:dra lika med 4:de; 3:dje litet längre, längst. Stjerten något klufven räcker $\frac{3}{4}$ tum utom vingarna.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sångare är hos oss mycket mindre allmän än följande art; dock förekommer han i bokskogarna öfver allt i Skåne. Äfven har jag träffat honom i bokskogarna i Halland, — och sannolikt finnes han allestädes på halfönder nämnda skogar växa. Som flyttfogel anländer han till oss i medlet af Maji månad och låter då äfven höra sig i trädgårdarna på Skånska slättbygden. Hvarje vår får man, vid nämnde årstid, höra honom i Lund bland träden på Lundegård och i Paradislyckan. Till storlek och färg kan han lätt förblandas med Löfsångaren; men den som lärt sig att på locktonen och sången skilja fogelarter, igenkänner honom snart. Dess lockton, hvarmed han äfven vanligen börjar sin sång, är ett långdraget och ängsligt *tjuh, tjuh*. Dess sång är rask och gäll: *ipp-*

sipp - sippserrrrr. Den liknar nästan ljudet af en silfverdaler som man låter på kanten kringlöpa och dallrande nedfalla på ett bord. Under sommaren sjunger hannen nästan ständigt i den trakt der han har sitt bo, och han tiger sällan utan för att fånga insekter, dels i luften, dels på grenarna och bladen. Han är ständigt i rörelse, flyger sväfvande från ett träd till ett annat, hoppar från gren till gren, och sjunger så väl då han flyger som då han sitter. — Mot slutet af Juli och i Augusti flyttar han bort. Man hör då åter dess lockton i trädgårdarna på Skånes slättbygd.

Födämnena: Flugor och andra små insekter.

Fortplantning: Sitt näste lägger denna fogelart på marken vid sidan af en tufva, eller mellan trädens rötter, i slutet af Juni eller början af Juli. Det är konstlöst sammanlagdt af mossor och gräsströar, samt inuti belagdt med fina grässtrån, och har öppningen på sidan. Äggen 5 — 6 blekgråa med rödbruna och mörka fläckar och strek. — Äfven sedan Ungarna äro utkläckta, hörer man Hannen sjunga i grannskapet af nästet.

14. Löf-Sångaren. (*Sylvia Trochilus*, Lath.)

Artem. Ofvan gråaktigt grön med ett blekgulaktigt strek öfver ögat. Hufvudets sidor brungråaktiga. Halsen och bröstet gulaktiga. Undergumpen blekgul.
Längd $4\frac{1}{2}$ tum.

Motacilla Trochilus, Lin. Fn. p. 96. n. 264. — *Motacilla acredula*, Lin. Fn. p. 96. n. 263. — *Sylvia Trochilus*, Lath. Ind. I. p. 550. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 228. — *Le Pouillot ou Chantre*, Buff.

Ois. 5. p. 344. — pl. enl. 651. f. 1. — *Yellow Wren*, Lath. Syn. 4. p. 512. n. 147. — Sv. Sparf-kung, Skogsknutt.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar olivgröna (gråaktigt gröna). Från näsborrarne öfver ögonen går ett smalt smutsigt hvitt eller gulaktigt strek (som är mindre och kortare än hos föregående art, hos hvilken det är rent gult); mellan öga och näbb ett brunt strek. Hufvudets sidor brungråaktiga, med gult inblandadt. Strupen och undergumpen hvita med svag gulaktig anstrykning. Halsen framtill, bröstet och sidorna smutsigt hvita, svagt anstrukna med gult. Magen rent hvit. Vingpennor, stjärtpennor och vingtäckare mörkbruna, utvändigt kantade med olivgrönt; de flesta vingpennorne i spetsen mycket smalt kantade med hvitaktigt. — Näbben ofvan brun, in- under gulbrun. Benen ljusbruna. Näsborrarna aflånga, jembreda, något uppåtböjda. — 1:sta vingpennan kort; 2:dra föga längre än 6:te; 3:dje och 4:de lika, längst.

Hannen är ofvan märkbart mörkare än *Honan*, hvilken äfven på hufvudets sidor och frampå halsen är något ljusare; men har för öfrigt lika mycket gult som *Hannen*.

Ungarna om hösten: Ofvan mera rent gröna, in- under gula, isynnerhet på framhalsen, bröstet, sidorna och undergumpen. Ett kort gult strek öfver ögat. Ving- och stjärtpennor mörkbruna, kantade med grönt. De flesta vingpennor, utom de 4 - 5 första, i yttersta spetsen kantade med hvitaktigt.

Vistelseort och lefnassätt: Denna lilla Sångare förekommer i alla trakter af halfön der skog och buskar finnas. Han träffas lika så väl i Skåne som i Lappland och norra delarna af Norrige. På fjällens sidor finnes han så högt upp som björken växer, men högre har jag icke sett honom. Till Skåne anländer han mellan den 20:de och 30:de April, och han gifver strax från trädens toppar sin ankomst tillkännan genom en kort och sorglig, men likväl ljuf sång: *Didi, dydy, dehi, zia, zia!* Samma sång får man sedan äfven höra under hela sommaren. Denna Sångare synes föredraga björkskogarne för alla andra, och der björkar äro blandade med andra träd, uppehåller han sig helst i de förra. Dess lockton, som han ofta låter höra, är ett hvisslande: *huit, huit!* Till lynnet är han munter, orolig och liflig. Ständigt är han i rörelse bland buskarna och träden der han plockar insekter, lockar och sjunger.

Födämnen: Smärre insekter, samt insektägg och larver.

Fortplantning: Sitt bo lägger han merendels på marken vid en buske bland löf eller mossor. Det är stort, hvälfdt som en bakugn, och har på sidan en rund öppning. Det är sammanlagdt af grässtrån och torra löf, samt inuti belagdt med fjäder och dun. Äggen 6, nästan runda, hvita, beströdda med rödbruna prickar.

Nytta: Denna fogel förtär en mängd skadliga insekter och är derföre för skogar och fruktträdgårdar en nyttig gäst. Om man låter honom flyga lös

inne i kammaren, så bortplockar han flitigt de flugor och andra insekter, som der finnas.

15. Gran-Sångaren. (*Sylvia rufa*, Lath.)

Art m. Ofvan gråbrun stötande i olivgrönt, med ett blekgult strek öfver ögat; Hufvudets och halsens sidor brungråa. Inunder hvit med inblandadt gult; 2:dra vingpennan kortare än 7:de.

Längd $4\frac{1}{2}$ tum.

Sylvia rufa, Lath. Ind. II. p. 516. — Nilss. Orn. Svec. II. p. 264. — *Sylvia abietina*, Vet. Acad. Handl. 1819. p. 113. — *Bec fin veloce*, Temm. Man. d'Orn. I. p. 225. — *Weiden Sänger*, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 649.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar gråbruna, mer eller mindre skuggade af olivgrönt. Från näsborrarna öfver ögat går ett blekgult strek; mellan öga och näbb ett brunt strek. Tinningarna, halsens och bröstets sidor brungråaktiga med inblandadt gult. Strupen hvit. Undra kroppsdelarna hvita, med gult här och der inblandadt. Vingar och stjert bruna; de yttre vingpennorna smalt kantade med grått, de andra med olivgrönt. Stjerten tvär; den yttersta pennan kantad med gråhvitt; de andra med olivgrönt. De undre vingtäckarne gula; de undra stjerttäckarne blekgula. — Näbben ofvan mörkbrun, inunder ljusbrun. Iris brun. Benen mörkbruna. — 1:sta vingpennan kort; 2:dra lika med 8:de; 3:dje lika med 5:te; 4:de litet längre, längst.

Vistelseort och lefnadssätt: Gransångaren har man hittills funnit på vår halfö endast i skogarna

norr om Trondhiem i Norrige *). Att han äfven förekommer i de motsvarande trakterna inom Svenska gränsen, samt i det sydvästra Norrige, är mer än sannolikt. I det södra Sverige finnes han icke. — Redan i medlet af Maji månad och sedermera under hela sommaren, hörer man dess sång i de nämnda trakterna af Norrige. Men innan man hinna polcirkeln har foglen försvunnit, och på fjällens sidor ser man honom ej högre upp än der granen upphör att bilda skog. Då han sjunger, sitter han vanligen i öfversta toppen af en hög gran. Dess sång, som är släpande och fåtonig, kan nog igenkänneligt uttryckas med: *J-if, jäff, jäff, jäff, trrr, trrr!* — *J-if, jäff, jäff, jäff!* Man hörer ofta flera foglar sjunga på en gång, men de sitta alltid på afstånd från hvarandra, och då den ene råkar inom den andres lilla jagt-distrikt, uppstår genast strid; ty äfven denna är en munter, orolig och trätgirig fogel.

Födämnen: Små insekter, insektägg och larver.

Fortplantning: Dess näste lägger han på marken, vid sidan af en tufva o. s. v. bland mossor och löf. Det är stort, konstlöst sammansatt af grässtrån och invändigt belagdt med fjäder och ull, samt har öppningen något vänd af ena sidan. Äggen 4 — 5 hvita, beströdda med svartröda småprickar, som stå tätast på den tjockare ändan.

*) Under min Resa 1816 blef denna lilla recrüt för Skandinaviens Fauna först anmärkt i Stördalens, Inderöns och Nummedalens granskogar. Hr Boie såg honom äfven under sin Resa.

16. Gulkronade Sångaren. (*Sylvia Regulus, Lath.*)

Artm. *Ofvan olivgrön, inunder smutsigt ljusgrå. Hufvudets sidor askegråa utan något svart strek genom ögonen. Hjessan, hos Hannen saffrangul, hos Honnan citrongul, med ett svart band vid hvardera sidan. Näbben mycket tunn och syllik. Längd 3 ½ tum.*

Motacilla Regulus, Linn. Fn. Sv. p. 95. — Retz. Fn. p. 265. — *Sylvia Regulus*, Lath. Ind. I. p. 548. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 230. — *Gold-crested Wren*, Lath. Syn. 4. p. 508. — *Das Goldhähnchen*, Bechst. N. D. 3. p. 655. — Sv. *Kungsfogel; Fogelkung; Busklus.*

Beskrifn. *Hannen*: Fjädrarna på hufvudet äro långa och kunna uppresas till en tofs. Hjessan med en långsgående saffrangul fläck, omgifven på begge sidor af ett svart band som går ända till nacken. Ögat, hvars lock äro svartaktiga, tyckes ligga i en ljusare fläck; från munviken nedgår ett smalt, otydligt, svartaktigt strek. Hufvudets sidor för öfrigt rent askegråa. Fjädrarna öfver näbbroten och på strupen hvitaktiga. Halsens sidor gråa med tunn olivgrön anstrykning. Rygg, skuldror och vingtäckare gråbruna med olivgrön anstrykning, som på öfvergumpen öfvergår i gulgrönt. De undra kroppsdelarna ljusgråa med olivgrön anstrykning. Magen mer hvit. Vingarna svartbruna med två hvitaktiga tvärband, samt bakom det bakre en rund, rent svart fläck, stor som en ärt; utom denna äro vingpennorna utvändigt smalt kantade med olivgrönt. Stjerten något klufven, dess pennor mörkbruna, kantade utvändigt från roten utåt med olivgrönt. — Näbben

svart, mycket tunn, syllik, utåt hoptryckt, ofvan med ryggkant. Näsborrharna aflångt äggformiga, baktill slutna med en hvälsd hinna, täckta af en enda styf, gråbrun fjäder med hårlika, skilda strålar. Benen bruna. Baktån stark, dess klo temligen stor, hoptryckt.

Honan: Hjessan citrongul, dess sidoband smälare. Benen något blekare bruna. För öfrigt alldeles lik hannen.

Vistelseort och lefnadssätt: I barrskogarna träffas denna lilla Sångare både sommar och vinter. Han finnes så långt åt nordnorden som barrskog växer, och han förekommer således äfven inom polcirkeln. Under senhösten slå sig flera familjer sammans och stryka då omkring äfven i Skånes löfskogar. Under vintren och sommaren har jag icke sett honom der. En del flytta åt sydligare länder, och dessa träffas under senhösten, i Oktober, familjvis i trädgårdarna i södra Skåne, och om våren i Mars och April månader ses de här åter parvis. De uppehålla sig då i buskar och häckar, samt i grantoppar, och de genomkrypa gerna de täta krusbärs buskarna.

Födämnen: Små insekter, larver, insektägg och puppor. Dessa plocka de från grenarna och deras yttersta spetsar, hvilka de på alla sidor undersöka.

Fortplantning: Denna art säges bygga ett klotrunt, vackert näste på yttersta ändan af grenarna i en fur eller gran. Det består utvändigt af fin moss och invändigt af fjäder. Samt har öppningen än ofvan, än på sidan. Äggen 8 - 11 rosenfärgade och svagt vattrade med starkare röd färg.

Anm. Redan Hr Bechstein omtalar i sin *Naturg. Deutschl.* 3. p. 658. en märkvärdig varietet af föregående art, och som skiljes derifrån genom mindre storlek, med ett svart strek genom ögonen och ett hvitt öfver dem. Hr Brehm har i sina *Beiträge zur Vögelkunde* 2. B. visat, att nämnde varietet är en egen art. Oaktadt denna Art ännu icke är anmärkt såsom Svensk; så kan man dock knapt tvifla på att han ju äfven förekommer hos oss. Jag tror mig derföre här böra utsätta dess känne- märken:

Brandkronade Sångaren. (*Sylvia ignicapilla*, *Brehm.*).

Artm. *Ofvan olivgrön, inunder smutsigt ljusgrå. Hufvudets sidor med tre långsgående band, af hvilka ett svart går genom ögonen och ett hvitt öfver, ett annat under dem. Hjessan hos hannen lifligt brandgul.*

Längd $3\frac{1}{4}$ tum.

Detta är den minsta af alla Europas foglar. Han finnes i barrskogarna i Tyskland, Frankrike och Nederländerna: men han är ännu icke anmärkt hos oss. Dess hushållning liknar föregående.

IV. Kärrsångare. (*Calamodyte*, *Mey.*)

Pannan *nedtryckt och spetsigt utlöpande i näbben, som är temligen långsträckt, utåt hoptryckt och försedd med tydlig ryggkant. Vingarna korta, afrundade med tydligen böjda vingpennor. Stjerten temligen lång, starkt afrundad. Klorna stora, spetsiga och krumböjda.*

De vistas vid sidan af floder, grafvar och insjöar bland täta rör och säf, mellan hvilka de dölja sig och på hvilka de klättra. De lefva af insekter och bygga sina nästen med mycken konst, samt fästa dem mellan rören i vassen. Deras sång är mindre melo-

disk och mer skärrande än de flesta föregående.

17. Säfsångaren. (*Sylvia Schoenobæus, mihi*).

Art m. Ofvan olivgrå med bruna fläckar, som på hufvudet äro tätare och mer svarta. Öfvergumpen rostbrun, ofläckad. Ett bredt strek öfver ögonen och kroppens undra delar rostgulaktigt hvita. Stjerten rundad.

Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Motacilla Schoenobæus, Lin. Fn. Sv. p. 89. — *Sylvia Schoenobaenus*, Nilss. Orn. Sv. I. p. 223. — *Sedge bird*, Pen. Brit. Zool. I. p. 381. (god beskrifn.) — *Sedge Warbler*, Lath. Syn. IV. p. 430. — *Schilfsänger* (*Sylvia phragmitis*), Bechst. Nat. D. 3. p. 633. — Sv. Säfstigare.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och ryggen olivgråa med en brun fläck i midten af hvarje fjäder; dessa fläckar äro på hufvudet mer tätstående och svarta, isynnerhet vid sidorna af hufvan, der de nästan bilda ett bredt svart band. Från näsborrarna öfver ögonen går ett bredt gulaktigt hvitt band, och genom ögonen till tinningarna ett brunt. De större vingtäckarna och de innersta vingpennorna svartaktiga, kantade med olivgrått, Öfvergumpen och de öfra stjerttäckarna rostbruna, ofläckade. — Vingpennorna mörkbruna, utvändigt med smala olivgråa kanter; de af första ordningen sabelformigt böjda; de af andra ordningen ej urnupna, alla rundade. Stjerten kantigt rundad, mörkbrun med afrundade pennor, i spetskanterna blekare. Hela foglen inunder hvit med rostgul anstrykning, som är märkbarast på bröst,

sidor och lår, samt minst märkbar på strupe och mage, hvilka äro nästan rent hvita. — Nabben ofvan svartaktig, inunder perlgrå. Iris rödbrun. Benen gråa, stötande i köttfärg. Näsborrharna rundaktiga. Stjerten rundad, räcker i $\frac{1}{4}$ tum utom vingarna; 1:sta vingpennan nästan ingen; 2:dra och 3:dje lika och längst.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel uppehåller sig om sommaren bland de täta säf och rör som finnas vid brädden af vatten, floder, insjöar och kärr. I Skåne är han icke sällsynt, och i några trakter förekommer han talrikt. Äfven finnes han i det öfra Sverige, och Norrige ända inom polcirkeln. Han är en munter och liflig fogel som alltid är i rörelse, kryper och klättrar på vassen, fångar insekter och sjunger. — Då han märker någon fara, gömmer han sig genast bland den täta vassen. Om man derföre vill skjuta honom, och vet honom vara inom håll men dold, så bör man ej ändra plats, utan stå helt stilla; ty merendels får man då, efter en liten stund, se honom klättra upp åt toppen af ett säf. — Dess sång, som han sittande låter höra, är munter och rask. Man igenkänner deri ljud som likna Gulärlans, Svalans och Lärkans; men den är blandad med egna sträfva och skärrande toner, som nästan likna rörbladens gnidning mot hvarandra i vassen då det blåser. Ej sällan höjer han sig, likt en Piplärka, sjungande i luften, svingar sig om i en båge och nedsänker sig åter på vassen. Dess sång höres isynnerhet om mornarna, samt om aftnarna ända långt in på

natten. — Som flyttfogel infinner han sig hos oss i Maji, och flyttar bort i September. Man träffar honom ej sällan, under sina höstvandringar, ensam bland höga gräsväxter och örter vid hafstränderna i det södra Skåne, Öland o. s. v.

Föddämnena: Åtskilliga slags insekter, isynnerhet sådana som vistas i vassen vid vatten.

Fortplantning: Dess näste liknar en korg och är konstigt hopflätadt af torra grässtrån, säf och rörblad, samt invändigt fodradt med fina gräsrötter och hår. Det är fästadt mellan några rör i vassen eller ock mellan qvistarna i en videbuske vid brädden af vattnet. Äggen 5 smutsigt hvita, eller rostbrunaktigt gråa, med små bruna prickar och strek.

18. Rör-Sångaren. (*Sylvia arundinacea*, Lath.)

Artm. Ofvan enfärgad, gråbrun med rostbrun anstrykning; inunder hvit med rostgul anstrykning på bröst, sidor och undergump. Längd 5 tum.

Sylvia arundinacea, Lath. Ind. I. p. 510 — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 221. — *Bet-fin des roseaux ou éfarvatte*, Temm. Man. d'Orn. I. p. 191. — *Red-Wren*, Lath. Syn. 4. p. 615. — *Teich laubvogel*, Bechst. N. D. 3. p. 566.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar enfärgade, utan fläckar, gråbruna, stötande i rostbrunt. Från näsborrarna till öfra ögonlocket går ett smalt blekgulaktigt strek. Strupen rent hvit. Bröst, mage och undergump hvita, svagt skuggade med rostgult eller rostbrunt, som isynnerhet är märkbart på sidorna.

Vingarna bruna, kantade med ryggens färg. Stjerten mycket rundad, brun med bleka fjäderkanter isynnerhet vid spetsen. — Näbben hoptryckt, ofvan mörkbrun, märkbart ryggad. Längd 5 tum. 1:sta vingpennan nästan ingen; 2:dra något längre än 5:ta; 3:dje knapt längre än 4:de och längst.

Vistelseort: I södra Sverige har jag ännu aldrig funnit denna fögel; men i Sveriges medlersta landskap skall han någon gång förekomma, och i Muscéerna förvaras exemplar som på nämnde ställe blifvit skjutna. — Liksom föregående, har han sitt tillhåll bland säf och rör, vid sidan af floder och sjöar.

Födämnen: Insekter.

Fortplantning: Nästet liknar en aflång korg, är konstigt byggt och fästadt bland säfven. Äggen sägas vara 4 — 5 grönaktigt hvita med gröna och bruna fläckar.

V. Gärdsmygar. (Troglodytes, Mey.)

Näbben lång, något böjd, mycket tunn, hoptryckt och spetsig. Vingarna och den upprättstående stjerten korta.

Den enda hithörande inhemska arten blir qvar hos oss både sommar och vinter.

19. Gärdsmygen. (Sylvia Troglodytes, Lath.)

Artm. Ofvan dunkelt rostbrun med svartaktiga tvärlinier på rygg, vingar, stjärt och undergump. De yttersta vingpennorna med afvexlande bruna och hvita fläckar. Längd 4 tum.

Motacilla Troglodytes, Lin. Fn. Sv. p. 95. — Retz. Fn. p. 264. — *Sylvia Troglodytes*, Lath. Ind. I. p. 547. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 231. — *Le Troglodyte*, Buff. Ois. 5. p. 352. t. 16. f. 1. — pl. enl. 651. f. 2. — *Wren*, Lath. Syn. 4. p. 506. — *Der Zaunkönig*, Bechst. N. D. 3 p. 232. — Sv. *Gärdsmyg. Tummeliten. Norr. Pernonsmad, Thomas i gärdet.*

Beskrifn. Alla öfra delar bruna, mer eller mindre rostbruna, med smala svartaktiga tvärlinier på rygg och öfvergump. Öfver ögat står ett hvitaktigt strek. Vingpennorna mörkbruna, de yttersta i yttre kanten med afvexlande hvitaktiga och bruna fläckar; de öfriga samt stjertpennorna rostbruna med svartaktiga tvärstrek. Strupe och bröst hvitaktiga stötande i askeblått. Mage och undergump rostbrunaktiga med svarta tvärstrek. Längd 4 — $4\frac{1}{4}$ tum. 1:sta vingpennan kort, 2:dra lika med 9:de; 3:dje, 4:de och 5:te längst.

Honan är ofvan mera rödbrun med otydligare svartaktiga tvärstrek.

Vistelseort och lefnadssätt: Gärdsmygen förekommer i alla landskap af Skandinavien från Skåne till Lappland. Om sommaren vistas han i skogarna, isynnerhet i låga, täta snår, i grannskapet af vatten. Om hösten infinner han sig i trädgårdarne i städer, byar och torp, och qvarblifver der under hela vintren. Han har då sitt tillhåll i täta häckar och andra busksnår, samt i gårdsgårdar mellan stenar o. s. v. Han är en munter och liflig fogel som ständigt är i rörelse, hoppar och genomkryper alla hål, vinklar och springor. Stjerten bär han alltid upprätt, och de

korta vingarna låter han litet nedhänga. Dess sång hörer man både sommar och vinter, äfven då djup snö fallit, blott solen skiner. Denna sång är, i jemförelse med den lilla Sångaren, ganska stark; den har flera afvexlande strofer och deribland några rätt vackra. Dess lockton är äfven ett starkt: *zrr, zrr, zezzererr!*

Födämnen: Insekter små maskar och larver. Äfven säges han om hösten förtära fläderbär. Om vintren förtär han spindlar, insektägg och puppor.

Fortplantning: Dess näste finner man i rishögar, mellan trädrötter, i hål i träd, under taklister m. m. Det är ganska fast och konstrikt byggt, utvändigt af grön mossor, invändigt af fjäder ull och hår; det är mycket stort, till formen klotrundt, och har på sidan en rund öppning, så stor att foglen jemt kan gå in och ut. Äggen 7 — 8, små, runda, hvita, med små rödaktiga prickar, som sitta i en krans kring den tjockare ändan.

Trast-Slägtet. *Turdus*, (Linn.)

Näbben medelmåttig, nästan rak, något knifformig, utåt hoptryckt; öfverkäken i spetsen nedböjd och med ett hak på hvardera sidan.

Näsborrarna vid näbbroten på sidan, äggformiga, ofvan till hälften täckta af en bar hinna.

Näbbvikarna ofvan försedda med några få hår.

Benen: Tarserna längre än mellantån; ut-tån vid roten hopvuxen med mellantån.

Vingarna: 1:sta vingpennan ganska kort, 3:dje och 4:de längst; 2:dra och 5:te föga kortare.

Alla hit hörande arter äro af medelmåttig storlek. De uppehålla sig i stora skogar, och de flesta besöka under sina vandringar äfven trädgårdar och mindre skogslundar. De äro till en del flyttfoglar, och lefva om sommaren af insekter och maskar, om hösten och vintren af åtskilliga slags bär. Nästan alla hafva en angenäm sång. Deras kött är läckert och sundt. De rugga ej mer än en gång om året. Könen äro sällan till färgen mycket olika.

1. Dubbel-Trasten. (*Turdus viscivorus*, Lin.)

Artm. Öfvan olivbrun med de större vingtäckarne och de tre yttre stjärt pennorna i spetsen hvita. Inunder gulaktigt hvit med svartaktiga fläckar, på bröstet trekantiga, på magen och sidorne tvärs ovala. Undra vingtäckarne hvita. Langd 12 tum

Turdus viscivorus, Lin. Fn. Sv. p. 79. — Retz Fn. p. 226. — Lath. Ind. I. p. 326. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 172. — *La Draine*, Buff. Ois. 3. p. 295. t. 19. f. 1. — pl. enl. 489. — *Missel thrush*. Lath. Syn. 3. p. 16. — *Mistel drossel*, Bechst. Nat. D. 3. B. p. 325. — Sv. Dubbel kramsfogel, *Mistel-trast*.

Beskrifn. Alla öfra delar brungrå med olivgrön anstrykning, hufvudet mer stötande i askegrått, öfvergumpen mer i gröngult. Hufvudets och halsens

sidor äfvensom alla undre kroppsdelar hvita med rostgul anstrykning på hals, sidor och undergump, samt svartaktiga fläckar, som på bröstet äro bredt trekantiga, uppåt spetsiga, på magen och sidorne tvärstående ovala; strupen midt åt vit med mycket små fläckar. Vingarna mörkbruna; dess pennor kantade med olivgråaktigt eller hvitaktigt; de inre vingpennorna samt de större täckfjädrarna i spetsen och kanterne hvita. De undra täckfjädrarna rent hvita. Stjerten tvär; de tre yttre stjärtpennorna i spetsen hvita. Stundom är den yttersta i hela yttre sidan och snedt öfver midten vitgrå. Stjertens undre täckfjädrar gråbruna med ett bredt hvitt band åt spolen och vit spets. Längden 12 tum; vingbredden 19 tum. Näbben mörkbrun, vid roten inunder gul. Iris brun. Benen smutsigt ljusgula.

Vistelseort och lefnadssätt: Om sommaren finnes denna Trast i de stora skogarna i det norra och medlersta Sverige, och i Norrige har jag äfven sett honom norr om Trondhiem i Stördalen. I Hallands, Bohusläns, Smålands, Blekinges m. fl. skogar, isynnerhet i barrskogar, tillbringar han sommaren och fortplantar sitt släkte. I lundar och trädgårdar här i Skåne infinner han sig, ehuru mycket sparsamt, under flyttiden höst och vår; men under fortplantningstiden har jag ännu icke sett honom i denna provins. En del flytta mot vintren åt sydligare län-der; men äfven under de starkare vintrarne blifva de flesta qvar, och träffas då familjvis i skogarne i Småland, Halland o. s. v. antingen ensamma eller i

sällskap med Björktrasten. — Denna fogel är ganska sällskaplig och slåss aldrig med sina likar; men han är derjemte mycket skygg och låter svårligen Jägaren komma inom skottbåll. Dess lockton, som han äfven låter höra då han blir skrämmd och flyger undan, är ett fint: *Iis!* hvarpå följer ett sträft nästan snarkande: *Arrr!* Dess sång är ganska gäll, fastän melancholisk, och består af flera afbrutna strofer. Denna sång låter han redan tidigt om våren höra från öfversta toppen af något högt träd. Dock har jag ej hört honom sjunga här i Skåne under sin genomresa om våren, såsom Talltrasten och de flesta Sångfoglar *).

Födämnena: Deras förnämsta föda består i rägnmaskar hvilka de uppsöka vid skogskärren. Äfven förtära de snäckor, gräshoppor, larver m. m. och om hösten åtskilliga slags bär, såsom rönnbär, enbär, blåbär m. m. De som blifva hos oss qvar öfver vintern, föda sig hufvudsakligen af enbär och lingon. De som tidigt om våren komma från sydligare länder söka genast kärddragen, der snön smält undan, och der de finna rägnmaskar i mängd.

Fortplantning: Deras näste träffar man oftare på barrträd än på löfträd. Det står än lägre, än högre från jorden, på en gren, och är byggt af risqvistar, mossor och lafvar. Äggen 5 grönaktigt hvita,

*) I allmänhet sagdt sjunga väl Sångfoglarne under sina vandringar om våren; men aldrig är deras sång då så hög eller fyllig och liflig, som i deras stamhåll sedan de börjat para sig och bygga bo.

med violetta fläckar och rödbruna prickar, hvilka äro större på den tjockare ändan. — Ungarna uppfödas med insekter och daggmaskar.

Jagt och fångst: Denna fogelart är mycket skygg och således svår att få inom skottåll, så framt man ej döljer sig och efterhärmar dess snarande lockton; ty då kan man lätt locka honom nära sig, höst och vår. Man fångar honom om hösten och vintren i *Donor* eller *Spränklar* med rönnbär *).

Nytta: Deras kött är läckert; deras sång angenäm, och de förtära många skadliga insekter och maskar.

2. Björk-Trasten. (*Turdus pilaris*, Linn.)

Artem. Hufvudet och öfvergumpen askegrå; ryggen kastanjbrun; undra vingtäckarna hvita. Stjertpennorna svarta, den yttersta vid spetsen inåt kantad med hvitt. Längd $10\frac{1}{2}$ — $10\frac{3}{4}$ tum.

Turdus pilaris, Lin. Fn. p. 78. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 177. — Lath. Ind. Orn. I. p. 330. — *La Litorne*, Buff. Ois. 3. p. 301. t. 19. — pl. enl. 490. — *Fieldfare*, Lath. Syn. 3. p. 24. — *Wachholderdrossel*, Bechst. N. D. 3. p. 336. — Sv. *Björkdrossel*; *Snöskata*. Sk. Fogelf. *Berkedrösla*. Norr. *Graa-trost*; *Fjeld-trost*; *Nordenvinds-pibe*.

Beskrifn. Hanne i vårdrägt: Hufvud och hals ofvan askegrå med små spetsiga svartaktiga

*) Här i Skåne falla de dock sällan eller aldrig i de Donor som om hösten utsättas för Kramsfoglar.

fläckar i pannan och på öfra delen af hufvudet. Från näsborrarna öfver ögonen ett hvitt strek. Mellan näbb och öga en svart fläck som sträcker sig äfven under ögat. Rygg, skuldror och vingtäckare kastanjbruna; de sistnämnda med askegrå kanter, hvilka på de förra äro smalare eller saknas. Öfvergumpen ljust askegrå, enfärgad. Halsen framtill och bröstet rostgula med svarta långsgående fläckar; sidorna nio breda svarta fläckar. Magen hvit. Stjertens undre täckfjädrar mörkgrå med ett bredt hvitt strek åt spolen och i ändan med en bred kant af samma färg. Vingpennorna svartaktiga med brungrå kanter, på de yttre smala och mer ljusgrå, på de inre breda och mer bruna. Undre vingtäckarne snöhvita. Stjerten tvär, svart; dess yttersta penna på inre sidan i ändan kantad med hvitt. — Näbben gul med svart spets; iris mörkbrun; ögonlockens kanter gulaktiga. Benen bruna med svartbruna tår. — Längden $10\frac{3}{4}$ tum, bredden 18 tum.

Honan har mer brun anstrykning på det askegråa hufvudet, samt strupen mer hvitaktig.

Varierar med hufvudet, halsen och några vingtäckare hvita. (Vet. Acad. Handl. 1808. p. 197. tab. 5); stundom helt hvit, mer eller mindre fläckig. Se Brisson Orn. II. p. 218 & 218, A. & B.

Vistelseort och lefnadssätt: Dess egentliga hemvist om sommaren äro Nordens barrskogar. Här träffas han flocktals i förvånande mängd, och i den skogstrakt der en skara valt sitt stamhåll, finnas dess bon, i Juni och Juli månader, nästan på hvart enda

träd. Åt norr förekommer denna art på vår halfö ända upp i polarländerna, och han finnes äfven i de sydligare Landskapens barrskogar, t. e. i Smålands, der han årligen fortplantar sitt släkte, fastän icke i så stor mängd som i den högre Norden. Om hösten stryker han omkring i skogarna i stora flockar, och mot vintrens annalkande infinner han sig äfven i Skåne. Ehuru en mängd under denna årstid flytta åt sydligare länder, och träffas då i tallösa skaror, i Tyskland, Frankrike och Italien; så märkes likväl denna förlust föga i våra skogar, hvilka ofta om vintren vinla af denna Trastart. De kvarblifvande skarorna flytta då nästan oupphörligt från en trakt till en annan och förekomma isynnerhet, antingen ensamma eller i sällskap med föregående art, i sådana skogar och på sådana falt som äro bevuxna med enbuskar, hvilkas bär, under denna årstid, utgöra deras förnämsta näring. Mot vårens annalkande draga dessa åter mot norden, och snart ersättas de af andra skaror, hvilka såsom flyttfoglar återkomma från sydligare länder. Dessa slå merendels ned på fuktiga ängar der snön är bortsmält, för att der plocka rägnmaskar.

Björktrasten är en munter, orolig och skygg fogel. Dess lockton hvarigenom han kallar sina likar är ett fint: *quiqui!* och det skrik, hvarigenom han manar dem till uppbrott, är ett squattrande: *scha-schaschack!* Under fortplantningstiden sjunger Hannen, och utmärker sig då från andra Trastarter derigenom att han, liksom *Piplärkorna* och *gråa Sån-*

garen (sid. 190.), under sången lyftar sig några fot öfver det träd på hvilket han satt, och sänker sig åter ned med den sista strofen *). Dess sång är qvackande och föga vacker samt ofta afbruten genom den sqvattrande locktonen, hvaribland dock några rena, melodiska ljud blandas.

Föddämnena: Om sommaren lefver Björktrasten af insekter och rägnmaskar. Om hösten och vintren förtär han bär, såsom rönnbär, enbär, lingon, kråkrisbär o. s. v. Om våren, så snön smälter och marken blir bar, uppsöker han genast rägnmaskar och försmår bär.

Fortplantning: Dess bo bygges på grenarna vanligen invid stammen af mindre tallar, björkar eller alar. Denna art har bland sina samsläktningar det egna, att liksom Råkorna vistas flockvis tillsammans äfven under fortplantningstiden, då de flesta andra foglar som lefva i engifte, uppehålla sig parvis. I den skogsdunge der en koloni bosatt sig, träffar man vanligen deras nästen tätt bredvid hvarandra och ofta flera på ett och samma träd. Nästet liknar föregående; det består af mossor och strån, och är inuti belagdt med gräsrötter. Äggen 5 — 6 grönaktiga, brunspräckliga eller beströdda med oregelbundna bruna fläckar. De ha ofta till grundfärg och fläckar mycken likhet med Kråkans.

Jagt och fångst: Såsom mycket skygga foglar äro de svåra att få inom skotthåll. Af en- eller

*) Jemför H. r. Boie's Reise in Norw. p. 110.

granris bygger man sig en liten skottkoja på passande afstånd från rönнар som hafva bär, hvilka Björkdrosseln i skaror plägar besöka. Bättre än att skjuta denna fogel är dock att fånga honom med snara eller nät. Om hösten samlar man för det ändamålet en mängd rönnbär, och om vintren, då Björkdrosslarna anlända, utlägger man en hop åt gången på ett passande ställe, samt sätter dervid ett stort *slagnät*, hvilket man med ett snöre i kojan kan öfverdraga. — Bland enbuskar, der denna Art infinner sig, utsätter man äfven tagelsnorar. I Skåne fångar man honom med rönnbär i *Donor* jemte dess samsläktningar. Han är bland de sista kramsfoglar som stryka öfver denna provins; och då fogelfångaren träffar Björkdrosslar i sina donor, är han säker att donfångsten för året är nära sitt slut *).

Nytta: Dess kött är utmärkt läckert och skall vara mest närande af alla Kramsfogel-arters.

3. Sång-Trasten, (*Turdus musicus*, Linn.)

Artm. Öfvan olivbrun; de undra vingtäckarne rostgula de öfra större med rostgula spetsar. Hals och bröst med omvändt-hjertformiga, sidor och mage med äggformiga svartbruna fläckar. Längd 9 tum.

Turdus musicus, Linn. Fn. p. 79. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 173. — Lath. Ind. Orn. I. p. 327. — *La Grive*, Buff. Ois. 3. p. 280. — pl. enl. 406. — *Throstle*, Lath. Syn. 3. p. 18. — *Singdrossel*,

*) Donfångsten här i Skåne är nemligen endast beräknad på de åt södren flyttande Kramsfogelskarorna. Om vintren vittjas här ej Donorna. Se följande art.

Bechst. N. D. 3. p. 349. — Sv. *Talltrast*; *Klädra*; *Fjällstare*; *Kramsfogel*. Smål. *Klera*. — Skånska fogelfångarne: *Kramsful*. Norr. *Maaltrost*; Werdal. *Natvuku* (Nattvaka); den Norske *Nattergal*.

Beskrifv. *Hanne i vårdräkt*: Hela foglen ofvan olivbrun med svag askegrå anstrykning som på öfvergumpen är enfärgad, på ryggen nästan vattrad. Från näsborrarna till ögat går ett gulaktigt strek. Hela foglen inunder hvit med svag rostgul anstrykning på halsen, bröstet och sidorna; samt dessa delar beströdda med talrika omvändt hjertformiga svartbruna fläckar; strupen ofläckad omgifves på hvardera sidan af ett svartaktigt kort strek. Magen hvit; på sidorne med större, midtåt med mindre ovala svartaktiga fläckar. Vingpennorna svartbruna, i yttre fanen olivbruna; de undra täcksjädrarna rostgula, de öfra olivbruna med en rostgul fläck i spetsen af dem som tillhöra de två större raderna. Stjerten tvär, dess pennor olivbruna, enfärgade, kantigt tillspetsade. — Näbben mörkbrun, inunder från roten till midten gulaktig. Iris brun. Näbbvikarne gula. Ögonlockens kanter bruna. Benen perlgrå, tårna mörkare. Längd 9 tum; vingbredden $14\frac{1}{2}$ tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Sångtrasten bebor så väl de sydligaste som de norra landskapen af vår halfö; och både det norra Sveriges och Norriges tallskogar genljuda ofta af dess sång, isynnerhet under de ljusa sommarnätterna. En del blifva kvar i skogarna under lindriga vintrar; men de mesta flyt-

ta om hösten åt varmare länder. De besöka under genomtåget Skånes med täta buskar blandade löfskogar, och mot slutet af September samt i hela Oktober infaller här deras egentliga sträckt看. I slutet af Mars eller i början af April begynnas deras återtåg åt norden, och varar i hela sistnämde månad. Under denna tid träffas de i trädgårdar, häckar och buskar, eller vid sidan af vatten samt på våta ängar der snön bortsmält. — Äfven under sträcktiden får man stundom höra deras sång från trädtopparne. Den är hög afvexlande och melodisk. Locktonen är ett fint: *Zipp, zipp*, och då de bli skrämde låta de stundom höra ett qvackande *jack-jack-jack*. Sångtrasten är för öfrigt, liksom dess samsläktningar, en skygg fogel som ej gerna låter menniskor närma sig honom, men som gerna lefver i sällskap med sina likar. Dock är han ej så sällskaplig som Björktrasten.

Födämnen: Dessa äro om sommaren daggmaskar, sniglar, insekter m. m. Om hösten bär, isynnerhet rönnbär och enbär.

Fortplantning: Dess näste bygges vanligen på grenarna af granar och tallar, stundom på löfträd; mera sällan finnes det på en busk-stubbe. Det består utvändigt af några smärre qvistar, invändigt af hvitmossa och murket träd, som med våt jord, lera eller slem är så sammanfästade att nästet är ganska hårdt och fast. Äggen 4—6 blågröna med glesa svarta prickar.

Jagt och fångst: Äfven denna Trast-art är svår att skjuta; men om hösten kan man fånga honom i mängd i donor med rönnbär, och det är isynnerhet för denna fogel som man i vissa trakter i Skåne utsätter ett stort antal snaror *).

Nytta: Dess kött är läckert och sundt. Med skäl kan denna fogel räknas bland de bästa sångfoglar.

4. Rödvinge-Trasten. (*Turdus iliacus*, Linn.)

Art m. Ofvan olivbrun; de undra vingtäckarne och sidorna rödbruna; öfver ögat ett bredt hvitaktigt strek. På halsen svartaktiga, på bröstet och sidorna gråbruna långsgående fläckar. Längd $8\frac{1}{2}$ tum.

*) I Luggude Härad här i Skåne, der jag som barn och ung gosse hvarje höst fångade en mängd kramsfoglar i Donor, är förhållandet med fogelfångsten följande: Så snart rönnbären äro väl mogna samlar man af dem en tillräcklig mängd. Man låter dem sitta förenade i klasarne och borttager derifrån endast löfven. I medlet af September utsätter man *Donorna*, hvilka dels äro *lösdonor*, dels *hängdonor*. (Huru dessa göras skall jag på ett annat ställe nämna. Se Registret), Dessa utsättas i en rad i skogen, mer eller mindre aflägsna från hvarandra, allt som lokalen är mer eller mindre passande. Man låter helst sin Don-kedja stryka genom buskiga trakter, isynnerhet ung Björkskog; och fogelfångaren låter denna kedja börjas och slutas så nära dess boning, som lokalen tillåter. En eller två gånger om dagen vittjar han sina Donor. Den första kramsfogel-art som om hösten faller i donorna, och som här fångas i största mängd, är *Sångtrasten*, hvarföre denna af fogelfångaren företrädesvis kallas *Kramsfogel*. Jemte honom fastnar ofta *Rödake-Sångaren* och några *Mes*-arter, samt derefter en och annan *Koltrast* (*Solsvarta*). Sednare insinner sig *Rödvingen*; men hvarje år sparsammare än Sångtrasten. Jemte honom får man vanligen *Domherrar*, och då nattrosten tilltaga falla Björkdrosslar i mängd, samt jemte dem *Sidensvansar*, hvarmed fogelfångsten för året slutas.

Turdus Iliacus, Lin. Fn. Sv. p. 79. — Retz. Fn. p. 228. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 175. — *Le Mauvis*, Buff. Ois. 3. p. 309. — pl. enl. 51. — *Redwing*, Lath. Syn. 3. p. 22. — *Rothdrossel*, Bechst. N. D. 3. p. 360. — Sv. Rödvinge.

Beskrifn. *Hanne i vårdragt*: Hela foglen ofvan olivbrun, på öfvergumpen stötande något i grått. Från näsborrarne öfver ögat går ett bredt hvitaktigt strek bort mot nacken; mellan näbb och öga står en svartaktig fläck. Halsen framtill och bröstet hvita med svag rostgul anstrykning, och svarta långsgående fläckar, som isynnerhet äro tättstående vid sidorna af halsen och på öfra bröstet; bakom dessa finnes på sidan af halsen en gul fläck. Bakre delen af bröstet och sidorna af magen med gråbruna fläckar, som äro mörkare åt spolarna. Magen hvit. Vingarnas undra täckfjädrar och Kroppens sidor brunröda. Vingpennorna och de större vingtäckarne mörkbruna med breda olivgrå kanter. Stjerten olivbrun; dess yttersta penna vid ändan inåt med en smal hvit kant. — Näbben svart, inunder från roten till midten gul. Iris och ögonlockens kanter bruna. Näbbvikarne gula. Benen perlgrå, tårna dunklare.

Längden $8\frac{1}{2}$, bredden 14 tum.

Honan har streeket öfver ögat smalare och gulaktigt (hos hannen är det bredare och nästan rent hvitt). Näbben svartbrun, endast gul på underkäkens rotgrenar; strupen ofläckad. Halsens långsfläckar svartbruna. Den gula fläcken på sidan af halsen tydligare. Benen något mer stötande, i köttfärg. — Eljest alldeles lika.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Trast tillhör mera de norra och nordligaste än de södra trakterna af vår halfö. I Skåne förekommer han endast under sträcktiderna vår och höst, och äfven då mera sparsamt än de föregående. Högst sällan ser man någon midt under vintren. I slutet af Mars eller i början af April infinner han sig under sin förbifart familjvis i trädgårdarna och i skogslundarna i det södra Skåne; men efter några få dagar har han åter försvunnit och synes här icke mer förrän vintrens annalkande, då han åter stryker genom provinsen åt sydligare länder. Han kommer då sednare än Sångtrasten och vanligen ej förr än några starka frostnätter föregått.

Denna art liknar till vanor och lefnadssätt, liksom till färgen, mest Sångtrasten. Liksom denne hoppar han gärna på marken mellan buskar och snår; men han skiljes lätt derifrån, äfven på afstånd, genom märkbart mindre växt, och genom sitt breda, hvita strek öfver ögonen. Då han sjunger sitter han i toppen af ett träd; men man får sällan höra dess sång i dessa södra trakter, åtminstone aldrig så hög, och ren som i dess egentliga hembygd. Der, nemligen i den högre Nordens, Lapplands, Norrlands och det nordliga Norriges skogar, tillbringar han sommaren och fortplanter sitt släkte. Han söker då merendels lågländta, af buskskog tätt beväxta ställen. I dessa trakter är han under sommaren icke sällsynt; men han lefver blott parvis. På fjällens sidor har jag träffat honom så högt upp som granen växer. Dess sång,

hvilken stundom förekommer vandraren i dessa ödemarker så melancholiskt skön, består af några få rena flöjt-toner åtföljda af ett kort och hastigt qvitter, hvilket sednare endast höres då man är foglen helt nära.

Födämnena: Liksom dess samslägtingar lefver äfven denna om sommaren af insekter och daggmaskar, om hösten af bär.

Fortplantning: Dess näste träffar man vanligen lågt ned mot marken i täta björkbuskar, kring medlet af Juni månad. Äfven har jag funnit det på en tufva vid en buske. Äggen 5 — 6 grönaktiga med bruna fläckar. Ungarne uppfödas med insekter och larver.

Fångst: I donor med rönnbär om hösten.

Nytta: Samma som de föregåendes.

5. Ringtrasten. (*Turdus torquatus*, L.)

Art m. Svartaktig med en stor, halfmånformig, vit eller rostgrå fläck på öfra delen af bröstet.

Längd 11 tum.

Turdus torquatus, Linn. Fn. Sv. p, 80. — Lath. Ind.

I. p. 343. — Nilss. Orn. Svec. p. 181. — *Merle*

à plastron blanc, Buff Ois. 3. p. 340. t. 31. —

pl. enl. 516. — *Ring-Ouzel*, Lath. Syn. 3, p. 46.

n. 49. — *Ringdrossel*, Bechst N. D. 3. p. 369. —

Sv. *Ringtrast*; *Ringdrossel*. Norr. *Ringtrost*.

Beskrifn. *Gammal Hanne i vårdrägt:* Hela fjäderbeklädningen svart, mer eller mindre stötande i brunt; strupen, bröstet, sidorna och magen med smala hvitgrå fjäderkanter; Öfra delen af bröstet om-

gifven af en stor halfmånformig hvit fläck. Vingarne svartaktiga; de mindre vingtäckarne med smala, de större samt vingpennorna (isynnerhet de medlersta) med breda ljust askegrå kanter. De undre vingtäckarne gråbruna med breda hvita kanter. Stjerten svart; dess yttersta penna vid spetsen svagt kantad med hvitgrått. De undre stjerttäckarne svarta med hvita spolar och kanter. — Näbben blekgul, i spetsen och mellan näsborrarne svartaktig; inuti och tungan gula. Iris brun. Benen mörkbruna. Stjerten lång, tvär; den yttersta pennan något kortare. — Längd 11 tum, vingbredden 17 tum.

Honan: Längd $10\frac{3}{4}$ tum. Hela fjäderbeklädningen mörkbrun med hvitgrå fjäderkanter på de undra delarna, och askegrå på de öfra. Bröstfläcken rödbrunaktigt grå, stundom föga märkbar, hvarje dess fjäder slutande sig med sotbrunt. — Näbben svartbrun, vid roten af underkäken och i midten af öfverkäken ljusare gulbrun. Näbbvikarna gula. Iris brun. Benen bruna.

Vistelseort och lefnadssätt: Äfven denna art har sitt egentliga hemvist i de norra och nordligaste trakterna af vår halfö, och han träffas aldrig i de sydliga utan endast höst och vår under sina sträcktåg till och från Europas södra länder. Här, vid Lund i Skåne, infinner han sig årligen i trädgårdarna om våren kring medlet af April, och om hösten i Oktober månad. Men han uppehåller sig här ej länge, och förekommer dessutom mest sparsamt af alla Trastarter. I de norra och bergiga trakterna af halfön är

han om sommaren icke sällsynt, och han träffas äfven långt inom polcirkeln. I synnerhet ser man honom bland stenrasen vid foten och uppåt sidorna af fjällen. Äfven här är han ganska skygg och låter svåriligen Jägaren komma inom håll. Till lyne och lefnadssätt liknar han mest Koltrasten. Liksom denna slår han ofta stjerten i vädret, utbreder honom och ropar: *tack-tack-tack*. Dess sång som är fåtonig och melancholisk kan igenkänligt uttryckas med stafvelserna: *tu-tick, tu-tick, tu-tick*.

Föddömmen: Insekter, maskar och bär.

Fortplantning: Nästet lägges på marken vid sidan af en buske; mera sällan på en stubbe några fot från marken. Äggen 4—6 ljusgröna, tecknade med rödbruna fläckar och punkter. — I början af Juli har jag sett flygvuxna ungar.

Fångst: Man kan fånga honom i donor med rönnbär *). — På Alstenö i Norrige fångar man honom äfven med bären af *Cornus suecica*.

Nytta: Äfven af denna art är köttet förträffligt.

6. Koltrasten. (*Turdus Merula*, Linn.)

Art m. Hannen svart med näbb och ögonlock gula; Honan svartbrun med näbb och ben bruna.

Längd 10 tum.

Turdus Merula, Linn. Fn. Sv. p. 80. — Retz. Fn. p. 230. — Lath. Ind. I. p. 340. — *Le Merle*, Buff. Ois. 3. p. 330. t. 20. — pl. enl. 2. (Hannen) och 555. (Honan). — *Blackbird*, Lath. Syn. 3. p. 43.

*) Dock faller han sällan eller aldrig i donorna här i Skåne med de andra Trastarterna.

Suppl. p. 141. — *Schwarzdrossel*, Bechst. Nat. D. 3. p. 376. — Sv. *Koltrast*; Sk. *Solsvärta*; Norr. *Sort-Trost*, *Solsort*.

Beskrifn. *Hanne*: Hela fjäderbeklädningen rent svart. Näbben utan och innan, samt ögonlockens kanter gula. Håren öfver näbbviken svarta. Iris svartbrun. Benen svarta. Längden 10 — 10 $\frac{1}{4}$ tum.

Honan: Svartbrun; ofvan mörkare, enfärgad; på bröstet med rostbrun och på magen med mörkt askegrå anstrykning. Underhakan hvitaktig och strupen rostgul med svartbruna, uppåt spetsiga fläckar: dessa synas äfven på öfre delen af bröstet men otydligare. — Näbben brun, gulspräcklig. Ögonlockens kanter och näbbvikarne gula. Benen bruna.

Ungarna ofvan mörkbruna med ett gult strek åt hvarje fjäderspole på hufvud, hals och skuldror. Halsen framtill, bröstet och sidorna rostfärgade; med svartbruna ändkanter på alla fjädrarna. Näbb och ben bruna.

Vistelsort och *lefnadssätt*: Denna Trastart tillhör mera de sydliga och medlersta, än de norra trakterna af vår halfö. Dock förekommer han temligen långt åt nordn och skall träffas ända upp i Wärdalen, norr om Trondhiem. I den högre nordn ser man honom icke, utan här tyckes Ringtrasten hafva intagit dess plats. I det södra Sverige förekommer han under alla årstider, och i Skåne synes han vara talrikare om vintren än om somma-

ren. Dess tillhåll äro de tätaste ställen i buskiga skogar, isynnerhet i bergiga trakter, och han förekommer talrikare i barrskogar än i löfskogar. I sådana bergiga skogar som hafva höga och täta enbuskar, vistas han oftast. Under de täta snåren hoppar han bland löfven på marken eller döljer sig bland de tätaste grenarna; nalkas man honom, så flyger han endast från en buske till en annan, merendels lågt, men dock snabbt. Då han sätter sig slår han ofta stjerten i vädret, och rörer vingarna. Bliir han uppskrämd, så gifver han ofta från sig ett smackande läte: *tack-tack-tack*. Dess sång är mindre rask och mer sorglig, samt mindre afvexlande än Sångtrastens. Isynnerhet är den skön under en stilla sommaraftron efter ett mildt regn.

Födämnena: Om sommaren förtär han dagmaskar och insekter, och dermed uppföder han äfven sina ungar. Om hösten och under vintren lefver han af bär, såsom rönnbär, enbär, o. s. v.

Fortplantning: Tidigt om våren bygger Koltrasten sitt bo. Det består utvändigt af tunna qvistar och mossor, som invändigt är sammansmetad af lera och annan fet jord. Man finner det i de tätaste snår, oftast lågt ned. Äggen 4—6 grågröna beströdda med ljusbruna fläckar.

Fångst: De fångas om hösten i Donor med rönnbär, i sällskap med de andra Kramsfogelarterne.

7. Rosenfärgade Drosseln. (*Turdus roseus* *), Linn.)

Art m. Rosenröd med hufvud, hals, vingar och stjert svarta; nacken med fjädertofs.

Längd $8\frac{1}{2}$ tum.

Turdus roseus, Lin. Fn. Sv. p. 79. — Lath. Ind. I. p. 344. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 182. — *Pastor roseus*, Temm. Man. I. p. 136. — *Merle couleur-de rose*, Buff. Ois. 3. p. 348. t. 22. — pl. enl. 251. — *Rose-coloured Ouzel*, Pen. Brit. Zool. 2. p. 627. Append. t. 5. — Lath. Syn. 3. p. 50. — *Rosenfarbige Drossel*, Bechst. Nat. D. 3. p. 393.

Beskrifn Hufvudet, halsen och öfra delen af bröstet svarta med violett glans. I nacken en fjädertofs af samtliga färg. Ryggen, undra delen af bröstet samt magen skönt rosenfärgade. Vingarna bruna, med grönaktig glans. Stjerten svartaktig, glänsande. Stjertens undre täckfjädrar och lären svarta med hvita fjäderkanter. — Längden vid pass $8\frac{1}{2}$ tum. Benen gulaktiga. Näbben rosenfärgad, vid roten svart.

Honan har mindre nacketofs, och mindre lifliga färger.

Vistelseort: Denna är en af Sveriges sällsyntaste foglar; — om han annars verkligen är Svensk. Han säges förekomma i Lappland, och äfven någon gång i Dalarne. Eljest tillhör han egentligen de var-

*) Herr Temminck har af denna Art gjort ett eget Släkte som han kallar *Pastor*, och låter det följa efter *Sturnus*, samt stå vida skildt från *Turdus*. — Då jag icke nu har något exemplar af denna fågel till hands och jag gjort mig till lag att icke afskrifva, måste jag låta foglen stå kvar i sitt Linneanska Släkte.

ma delarna af Asien och Afrika. I de södra provinserna af Italien och Spanien träffas han blott under sina ströftåg; i Tyskland och England är han ytterst sällsynt.

Anm. Det förekommer mig ganska tvifvelaktigt om denna fogel verkligen hör till vår Fauna. I Linnés Fauna Suecica anföres väl, efter Adlerheims uppgift, Lappska fjällarna som dess stamhåll; och till åtskilliga Museer hafva exemplar blifvit lemnade med uppgift att det vore en Lappsk fogel: kanske blott derföre att han af Linné anföres som Lappsk. Äfven visas exemplar som skola ha kommit från Dalarne; men i Dalarne bodde en Assess. Blom, som under sin lifstid ägde en samling af åtskilliga utländska Naturalster, hvilka efter hans död kringspreddes. — Allt synes således ännu hvila blott på Hr Adlerheims uppgift, som jag visst icke vill bestrida, men önskade att få bekräftad.

Strömstare-Slägtet. (Cinclus, Bechst.)

Näbben medelmåttig, tunn, rät, på sidorna starkt hoptryckt med inböjda käkkanter; öfverkäken i spetsen något böjd.

Näsborrarna, vid näbbroten på sidan, bilda en springa och äro ofvan täckte af en hinna.

Hufvudet litet, uppåt hoptryckt; pannan långsträckt; ögonen temligen små, ligga högt.

Benen: Tarsen längre än mellantån; sidotån nästan lika.

Vingarna och stjerten korta. 1:sta vingpeunan ganska kort; 2:dra något litet kortare än 3:dje och 4:de som äro längst.

De vistas vid bäckar, åar och strömmar, isynnerhet vid vattenfall. De hämta sin föda i

vattnet, hvari de dyka med utmärkt skicklighet, oaktadt de ej hafva minsta spår till simhud mellan tårna. Kroppen är nedtryckt och bred, liksom Simfoglarnas; dess fjäderbeklädning är mycket stark och de ha så täta *dun* att skinnet ej synes sedan alla *fjädrar* äro afplockade. De rugga ej mer än en gång om året. Könen äro föga olika.

1. Ström-Staren. (*Cinclus aquaticus*, Bechst.)

Art m. Svartaktig, halsen framtill och bröstet hvita. Längd 7 tum.

Sturnus Cinclus, Lin. Fn. Sv. p. 78. — Retz. Fn. 225. — *Turdus Cinclus*, Lath. Ind. I. p. 343. — *Cinclus aquaticus*, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 808. — *Le merle d'eau*, Buff. Ois. 8. p. 134. t. 11. — pl. enl. 940. — *Water Ouzel*, Lath. Syn. 3. p. 48. id. suppl. p. 142. — *Der Wasserschwätzer*, Bechst. l. c. — Sv. *Wattenstare*; *Strömstare*. Norr. *Fosse-kold*, *Elv-konge*, *Strömstär*.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och på sidorna samt halsen ofvan mörkt rostbruna (sotfärgade); alla andra öfra kroppsdelar: ryggen, skuldrorna, öfvergumpen och de mindre täckfjädrarna, askegrå med breda svarta fjäderinfästningar, hvaraf dessa delar synas svarta och beströdda med askegrå fjällika fläckar. Strupen, halsen framtill och bröstet ända till midten af bröstbenet rent hvita. Bröstet bakom det hvita, samt magen åt midten svartaktigt rostbruna. Sidorne och undergumpen mörkt askegrå. Vingarna svarta; de sekundära vingpennorna och de större täckfjädrarna kantade med askegrått;

de förstnämnda med smala hvitgrå spetskanter. Stjerten tvär, dess pennor svarta med askegrå infattning, eller och gråaktigt svarta. — Näbben svartbrun, ofvan mörkare. Benen framtill perlgrå, baktill och på tålederna bruna. Iris ljusbrun. Ögonlocken hvita. Längden nära 7 tum; vingbredden $11\frac{1}{2}$ tum.

Honan är ofvan på hufvudet och halsen mer gråbrun; det hvita frampå halsen och bröstet är mindre utvidgadt och mindre rent,

Anm. De individer som blifvit beskrifna, äro skjutna om vintren i Januari — Mars månader.

Vistelseort och lefnadssätt; Vatten-Starens egentliga hemvist om sommaren äro fjällströmmarna i Norden, och han träffas under den årstiden parvis vid forsar och vattenfall bland klipporna, ända långt inom polcirkeln. Endast om vintren ser man honom i de södra landskapen, vid qvarndammar eller forsar i åar och bäckar, der vattnet ej fryser. Merendels finnes ej mer än en enda vid samma öppna vatten och denne tillåter ej andra att besöka dess fiskställe. Stundom träffar man dock ett större antal samlade vid en och samma vak *). Dessa äro då nästan ständigt i rörelse, löpa på isen, jaga hvarandra, bitas, qvittra och sjunga. Från sidan af det öppna vattnet dyka de ned deri, löpa på botten mot strömmen och uppkomma efter en stund vid en annan sida utan att det synes på deras fjädrar att de varit i vatten. Stundom kasta de sig ned i de mest skummande for-

*) I den lilla ån som kommer ur Ifösjön, går förbi Årup och kastar sig ut i Östersjön, träffar man stundom om vintren en mängd Vattenstare samlade.

sar och dyka der omkring vid bottnen eller näraytan. Deras sång som de låta höra, äfven midt under den kallaste vintren, från ett isstycke, en klippa eller ett träd vid det brusande vattenfallet, har mer likhet med *Sångarnes* än med *Trastarnes*.

Födämnena: Vatteninsekter och om våren fiskrom.

Fortplantning: Nästet i stenklyftor vid sidan af vatten. Äggen 4 — 6 sägas vara rent hvita.

Årle-Slägtet. (*Motacilla*, *Lath.*)

Näbben rak, mycket tunn, trind och syllik; underhäkens kanter utåt hoptryckta.

Näsborrarna vid näbbroten på sidan, äggformiga, ofvan till hälften täckta af en bar hinna.

Benen spensliga; tarsen dubbelt så lång som mellantån (då klon afräknas). Baklon längre än framklorna, som äro små och föga böjda.

Stjerten mycket lång, tvär.

Vingarna: 1:sta vingpennan ganska kort; 2dra, 3:dje och 4:de nästan lika, längst. En af de innersta (den 17:de) är längre än hela öfriga vingen.

Årlorna vistas merendels på öppna fält, vid kärr, vid sidan af vatten, på ängar och betesmarker bland boskapen o. s. v. De röra ständigt den långa stjerten upp och ned; de löpa snabbt på marken efter insekter, hvilka jemte maskar utgöra deras enda näring. De lägga sitt bo på marken, bland gräs, eller i hål bland stenar. De rugga två gånger om året, höst och vår. Om våren och sommaren äro hannarne olika honorna; om

hösten få de alla, äfven ungarna, lika drägt. De äro flyttfoglar.

1. Ring-Årlan. (*Motacilla alba*, Linn.)

Artem. *Ofvan askegrå; inunder samt pannan, hufvudets och halsens sidor hvita; hjessan, nacken och halsen framtill svarta. De två yttersta stjeripennorna öfver hälften utåt hvita; bakklon kortare än tån och krökt.*

Längd $7\frac{1}{2}$ tum.

Motacilla alba, Lin. Fn. Sv. p. 92. — Retz. Fn. p. 256. — Lath. Ind. 1. p. 501. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 234. — *La Lavandière*, Buff. Ois. 5. p. 251. t. 14. f. 1. — pl. enl. 652. f. 1. (Hanne i vårdräkt) f. 2. (i höstdräkt). — *White Wagtail*, Lath. Syn. 4. p. 397. — *Die weisse Bachstelze*, Bechst. N. D. 3. p. 446. — Sv. Ringärta; Sädessärta. Nörr. Erle, Linerle.

Beskrifn. *Hanne i vårdräkt*: Pannan, hufvudets och halsens sidor samt de undre kroppsdelarne rent hvita; hjessan, nacken, en del af halsryggen, strupen och halsen framtill samt öfra bröstet rent svarta. Ryggen, skuldrorna och kroppens sidor askeblå. De större vingtackarne och de innersta vingpennorna svarta med breda hvita ändkanter; deraf uppkomma två hvita strek öfver vingen. Vingpennorna svartaktiga med smala gråaktiga utkanter. De minsta täcksjädrarne askegrå. Stjerten svart; dess två sidopennor öfver midten utvändigt snedt hvita. — Nabb och ben svarta. Iris mörkbrun. Näsborrarne ovalt-afslånga, något böjda. Bakklon ej längre än tån och krökt. Längd: $7\frac{1}{2}$ tum, vingbredden 11 tum. Stjerten $3\frac{1}{3}$ t. utom vingarna 2 tum.

Hona i vårdrägt: Pannan och hufvudets sidor ej så rent hvita; hjessan och nacken svartaktiga; vingtäckarnes kanter grå. Stundom saknas den svarta färgen på hufvudet, och dess färg liknar ryggens.

Ugarna: De öfra kroppsdelarna askegrå med olivgrön anstrykning; hufvan mörkare med ett svart strek öfver hvardera ögat. Inunder smutsigt hvit med ett smalt svartaktigt strek på hvardera sidan af strupen och en större halfmånformig svartaktig fläck på öfra delen af bröstet. De två yttersta stjärt pennorna nästan helt hvita. Näbb och ben bleka, gråbruna.

Unga och gamla i vinterdrägt: Ofvan askegrå, pannan hvitaktig och derifrån går ett hvitt strek öfver ögonen; strupen och halsen framtill rent hvita; på underdelen af halsen står en stor månformig svart fläck, hvars hörn fortsätta sig med en fläck åt hvardera sidan af strupen. Tinningarna gråbruna.

Hit hör: *Motacilla cinerea*, Gmel. Syst. I. p. 961.
— *La Bergeronnette grise*, Buff. Ois. 4. p. 261. pl. enl. 644. f. 1.

Vistelseort och lefnadssätt: Som flyttfogel anländer *Ring-Årlan* till Skåne under de första dagarna af April månad. Hon förekommer om sommaren i alla landskap af halfön. I trakten af polarcirkeln finnes hon ännu temligen talrikt, och hon går långt inom den; ja hon tyckes mig till och med vara talrikare i Norden än i Skåne, der hon under de sednare åren synes ha blifvit mindre allmän. Vid sin ankomst om våren träffar man henne på nyplöjda åkrar, på gator, tømter och gårdar. Om sommaren

träffas hon äfven vid sidan af sjöar och bäckar, på ängar och betesmarker m. m. — På de höga, spensliga benen löper hon snabbt och fångar under loppet insekter. Stjerten rör hon oupphörligt upp och ned. Flygten sker ryckvis, och under ett beständigt skrik: *qui, qui, quirrivi!*; dess sång är qvittrande och sagta. Då hon varseblir en Roffogel förföljer hon honom genast med skrik, och blir stundom, men sällan, ett offer för denna instinkt. Om hösten uppehålla sig Ring-ärlorna familjvis, och före afresan slå sig flera familjer tillsammans. I Oktober lemna de oss småningom *), och i början af November försvinna de sista.

Födämnena: Myggor, flugor, brömsar och andra insekter som uppehålla sig hos Boskapen; äfven sökas sådana insekter som vistas vid bäckar, dammar och vattenpussar. Då Ringärlan om våren följer plogen, plockar hon insekt-larver och puppor.

Fortplantning: Denna sker vanligen två gånger om året. Nästet lägges i en stenhög, i en stenbro, i en springa mellan stenarne i en klippa, i ett ihåligt träd, i hål vid brädden af något vatten o. s. v., det är konstlöst sammanlagdt af gräsrötter och strån, samt invändigt belagdt med hår. Äggen 6, hvitaktiga, beströdda med större och mindre bruna och grå fläckar.

Ofta måste *Ringärlan* utkläcka och uppföda en Gökunge. Som bekant är, rufvar Göken aldrig sjelf

*) De sågos ännu den 8 Oktober på gatan i Rörås.

sina ägg, eller uppföder sina ungar. Denna omsorg lemnas oftast åt Ringärlan. Se *Gökens* historia.

2. Gulärlan. (*Motacilla flava*, Linn.)

Artm. Ofvan olivgrön, inunder gul; de två yttre stjärt pennorna öfver hälften utåt hvita; bakklon längre än tån och föga krökt. Längd $6\frac{3}{4}$ tum.

Motacilla flava, Lin. Fn. p. 92. — Retz. Fn. p. 257. — Nilss. Orn. I. p. 237. — Lath. Ind. Orn. I. p. 504. — *Bergeronette de printemps*, Buff. Ois. 5. p. 265. t. 14. f. 1. — pl. enl. 674. f. 2. — *Tellow Wagtail*, Lath. Syn. 4. p. 400. — Edw. t. 258. — *Gelbe Bachstelze*, Bechst. Nat. D. 3. B. p. 466. — Sv. *Gulärsla*.

Beskrifv. *Hanne i vårdragt*: Hufvudet ofvan askeblått, stundom med inblandadt olivgrönt på hjesan. Från näsborrarna öfver ögat bort mot nacken går ett hvitt strek. Från näbbviken genom ögat till örat står en mörkbrun bakåt bredare fläck, som under ögat är blandad med hvitt. Halsryggen och skulderfjädrarna olivgröna, hvilken färg på öfvergumpen blir mera gulgrön. Underhakan hvit; för öfrigt är hela foglen inunder skönt gul. Vingpennorna mörkbruna, kantade med grått eller gulaktigt; de tre innersta svartaktiga, utåt bredt kantade med hvitgult, spetsiga, och den 3:dje (inifrån) är längre än någon af de andra vingpennorna. De två raderna af större vingtäckare äro vid spetsen bredt kantade med gulaktigt. Stjertens pennor svarta, utom de två yttersta på hvardera sidan, hvilka äro hvita och blott från roten utåt inre kanten svartaktiga; den 3:dje utvändigt kantad med hvitt. — Näbb och ben svarta. Iris

mörkbrun. Längd $6\frac{3}{4}$ tum; vingbredden $10\frac{1}{4}$ tum. Stjerten nära 3 tum, räcker $1\frac{3}{4}$ t. utom vingarna.

Hona i vårdragt: Färgorna mattare och mindre vackra, neml. olivfärgen ofvan dunklare och mer blandad med grått; det gråa på hufvudet och halsen mer blandadt med brunaktigt; den gula färgen på de undre kroppsdelarna mycket blekare, isynnerhet på halsen, som är nästan hvitaktig; en krans af otydliga grönaktiga fläckar stå på undre delen af halsen och på sidorna af strupen. — Längd $6\frac{1}{2}$ tum, vingbredden $9\frac{1}{4}$ tum.

Ungarna: Hufvud och rygg ofvan bruna med olivgrön anstrykning. Öfver ögat ett gulaktigt hvitt strek, öfver hvilket finnes ett svart band. Genom ögonen till tinningarne går ett brunaktigt band. Undre kroppsdelarna smutsigt gulhvita. På hvardera sidan af strupen nedgår ett svart strek och slutar sig i en större svartaktig fläck på öfre delen af bröstet. Dessa fläckar och strek försvinna efter första ruggningen. Dock finnas hos honan några spår efter dem, i de mörkare grönaktiga fläckarne, som ofvanför blifvit nämnda.

Varicrar: 1:mo Hufvudet ofvan svart, i nacken med askegrått inblandadt. Strupen hvit med några svarta punkter. På undre delen af framhalsen stå några bruna, nästan sammanlöpande fläckar. För öfrigt lik den vanliga Gulärlan. Payk. Mus. — Från Lappland.

— 2:do Undra kroppsdelarna hvita med svag gulaktig anstrykning på främre bröstet och undergumpen.

— 3:tio Hvit med gul anstrykning på hufvudet.

Muscicapa alba, Mus. Carss. tab. 74. An?

Vistelseort och lefnadssätt: Gulärlan anländer om våren till Skåne något sednare än Ringärlan, eller kring den 20:de April. Hon förekommer i alla landskap af halfön och i de södra trakterna synes hon talrikare än Ringärlan. Lixväl går hon långt åt Norden, och hon träffas äfven inom polcirkeln, så väl i kustbygderna som i det inre af Lappland. Om våren ser man henne ofta följa plogen; om sommaren bebor hon isynnerhet kärraktiga ängar, betesmarker m. m. der hon ständigt löper på marken för att fånga insekter. Om hösten slå sig ofta flere familier tillsammans och träffas då, fastän alltid spridda, bland den betande boskapen och på sumpiga ängar, m. m. I början af Oktober flyttar hon småningom åt sydligare länder. I sin flygt, vistelseort, läte m. m. har hon en icke obetydlig likhet med Piplärkan.

Födämnen: Insekter och larver, isynnerhet sådana som uppehålla sig hos boskapen och på sumpiga ställen.

Fortplantning: Boet lägges på marken, bland gräset eller säden, på en tufva, i ett hål, o. s. v. Det är konstlöst hoplagdt af grässtrån och gräsrötter, samt inuti fodradt med hår eller ull. Äggen 5-6 gråaktigt-gröna, brunspräckliga.

Anm. I åtskilliga länder af Europa finnes en Art af detta släkte; hvilken liknar Gulärlan men skiljes derifrån genom följande karakterer:

Grå-Årlan. (Motacilla Boarula, Lath.)

Öfvan askegrå med gröngul öfvergump; strupen (hos hannen) svart; de andra undre delarna gula; den yttersta stjertpennan helt hvit, de två följande hvita, i yttre fanet svarta. Längd $7\frac{1}{2}$ tum; stjerten nära 4 tum, räcker $2\frac{3}{4}$ tum utom vingarna. Bakklon kort och krökt.

Uppehåller sig isynnerhet vid klara steniga bäckar.

Att den i Linnés *Mantissa plantarum* I. p. 527 beskrifna *Motacilla Boarula* ej är annat än *Motacilla flava*, samt att den verkliga *Motacilla Boarula* icke finnes i Sverige, har jag redan nämnt i *Ornith. Svec.* I. p. 237. obs. — Sedermera har denna fogel icke heller blifvit funnen någonstädes hos oss.

Piplärk-Slägtet. (Anthus, Bechst.)

Näbben rak tunn, syllik, trind, mot spetsen hoptryckt; käkkanterna i midten merendels inböjda; öfverkäken vid roten försedd med ryggkant, i spetsen något nedböjd och inskuren.

Näsbörrarna vid näbbroten, äggrunda, öfvan halftäckta af en bar, hvälfad himna.

Benen merendels något undersättsiga; tarserna längre än mellantån; bakklon mer eller mindre krumböjd, merendels af samma längd eller kortare än tån.

Vingarna: 1:sta vingpennan ingen; 2:dra, 3:dje och 4:de nästan lika och längst. Af de sekundära vingpennorna är den 3:dje, inifrån räknadt, lika lång som de längsta primära.

De hithörande foglar blefvo länge räknade till *Lärkorna*, med hvilka de nästan endast hafva den gräspräckliga färgen gemensam. De skilja sig från dem genom spensli-

gare kroppsform, längre stjärt, kröktare bakklö, spetsigare hufvud och olik näbbform. Häri komma de närmare *Årlorna*, med hvilka de äfven hafva lika födämnena och till en stor del lika sedvanor. De lefva endast af Insekter, samt uppehålla sig vanligen på öppna skoglösa fält och vid vatten. Blott en enda art bebor skogarna. På marken löpa de snabbt, liksom *Årlorna*, och likasom dessa röra de den långa stjärten upp och ned. Under fortplantningstiden stiger hannen sjungande i luften, svingar sig der i båge och nedsänker sig merendels på samma ställe hvarifrån han flög upp. Denna luftfart upprepas ofta. Sitt bo lägga de på marken, och då man nalkas det, låta de höra ängsliga, pipande läten.

1:sta Underafdelningen.

Bakklon lika med eller längre än tån. Näbben mycket tunn.

De uppehålla sig vid vatten och på sum-piga ställen.

1. Skär-Piplärkan. (*Anthus rupestris*, Nilss.)

Artm. Ofvan mörkt askegrå med mörkbruna fläckar isynnerhet på ryggen; inunder vitaktig, beströdd med gråbruna fläckar. Tittersta stjärt pennan utåt snedt vitaktig; 2:dra i spetsen vitaktig. Bakklon af tåns längd, böjd. Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Anthus rupestris, Nilss. Orn. Svec. I. p. 245. tab. 9.

— *Alauda petrosa*, Montagu. Act. Soc. Lin. IV.

p. 41. — *Alauda obscura*, Lath. Ind. Orn. I. p. 494. (yngre). *Anthus aquaticus*, Bechst. N. D. 3. p. 245. — Temm Man. d'Ornith. I. p. 265. — Sv. Strandlärka, Klipplärka;

Beskrifn. *Hannen om sommaren*: Öfra kroppsdelarna dunkelt askegrå med en mörkbrun fläck i midten af hvarje fjäder, isynnerhet på ryggen. Skulderfjädrarne med olivgrön anstrykning. Ett hvitaktigt strek öfver ögonen. Undre kroppsdelarne hvitaktiga med svag rostgulaktig anstrykning på bröst och sidor. Underhakan och strupen åt midten offläckade; sidorna af strupen, halsen framtill samt bröstet och kroppssidorna beströdda med bruna eller gråbruna fläckar. Vingpennorna bruna kantade med blekgrått. De små vingtäckarne mörkbruna med askegrå eller olivgrå kanter; de stora med hvitgrå ändkanter, hvarigenom två hvitgrå band uppkomma öfver vingen. Stjerten tvär, litet klufven. Stjertpennorna svartaktiga, den yttersta i yttre kanten och snedt-öfver åt spetsens inre sida hvitaktig; den följande i spetsen hvitaktig; de två medlersta brungrå. — Näbben svart, vid roten inunder mörkt köttfärgad. Näsborrharna ovala. Iris brun. Benen mörkbruna; tårna svartaktiga. Bakklön knapt längre än baktån och temligen krökt. 1:sta vingpennan ingen; de 4 följande nästan lika långa, och längst. Längd $6\frac{3}{4}$ tum, vingbredden $11\frac{1}{2}$ tum.

Honan är lik hannen och skiljer sig blott genom ett större antal fläckar på de undra kroppsdelarna.

Ungarna om hösten: Ofvan mörkbruna med olivgrön anstrykning och otydliga svarta fläckar på huf-

vudet och ryggen. Ett gulaktigt strek öfver ögat och en dylik fläck under tinningarna. Undre kroppsdelarna smutsigt gula med mörkbruna fläckar på sidorna af strupen, på halsen, bröstet och kropps sidorne, samt dylika strek på magen. Vingar och stjert svartaktiga med olivgröna pennkanter och två gråaktiga tvärstrekar öfver vingen. Yttersta stjertpennan utvändigt snedt öfver spetsen hvitaktig, den andra med en dylik viggformig fläck i spetsen. Näbben ofvan brun, inunder vid roten gulaktig. Benen blekbruna.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogelart, som länge blifvit öfversedd eller misskänd, är alldeles icke sällsynt på vår halfö. Han träffas här, på stenar, skär och klippor, vid alla de hafskuster, som jag haft tillfälle att besöka, och på några ställen är han talrik. Åt västra kusten förekommer han vid Kullabergs udde, vid Torekow, vid Hallands och Bohusläns kust, vid Norrska kusten ofvanför Trondhjem t. ex. vid Helgeland, Salten o. s. v. ända inom polcirkeln. Vid Östersjöns stränder har jag äfven träffat honom i Skåne, samt i Blekinge och på Öland. Men han förekommer aldrig i det inre af landet; allestädes är han inskränkt till de steniga hafsstränderna, samt till skären och klipporna i hafvet. Som flyttfogel anländer han om våren och flyttar bort om hösten. Han synes af naturen vara bestämd att med sin sång och qvitter lifva de kala och dystra klipporna, på hvilka ingen annan Sångfogel trifves. Ofta låter han höra sin drillande sång, under det han raskt höjer

sig i luften och med stilla utbredda vingar åter sakta nedsänker sig på en klippa. I sitt lefnadssätt har han mesta likhet med Äng-piplärkan, med hvilken han lätt kan förblandas, men från hvilken han, äfven på afstånd, skiljes derigenom att han är större och mörkare till färgen. Han är temligen skygg och flyger, då man nalkas honom, från en klippa eller sten till en annan, med ett hest *'st, 'st.*

Födämnen: Insekter och larver.

Fortplantning: På klippor i hafvet och vid dess kuster bygger denna Piplärka sitt konstlösa näste i en remna i klippan eller bland gräset. Nästet består af torrt gräs eller tång. Äggen 5 grå brunspräckliga.

Nytta: Af fiskarena i Blekinge anses *Skär-piplärkan* som en mycket nyttig fogel, emedan hon, då vattnet faller, infinner sig i ebban och uppäter med begärlighet *Märkan* (*Cancer pulex* Lin.), hvilken säges tillfoga fisk-garnen betydlig skada, och som till och med på en enda höstnatt skall kunna förstöra ett helt garn.

2. Äng-Piplärkan. (*Anthus pratensis*, Bechst.)

Art m. Ofvan olivgrå med svartaktiga fläckar; inunder smutsigt hvit med svarta fläckar på hals, bröst och sidor. Strupen med ett svart långsstrek åt hvardera sidan. Näbben smal, syllik. Bakklon längre än tån och föga krökt. Längd 6 tum.

Alauda pratensis, Lin. Fn. Sv. p. 76. — *Anthus pratensis*, Bechst. Nat. D. 3. p. 732. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 241. — Temm. Man, d'Orn. I. p. 269. — Sv. Änglärka.

Beskrifn. *Hanne i sommardrägt*: Hela foglen ofvan olivgrå med svartaktiga fläckar som äro störst fram på ryggen, (eller hvarje fjäder på hufvud, hals, rygg och skuldror är svartaktig med olivgrå kanter). Öfvergumpen olivgrå utan tydliga fläckar. Ett hvitaktigt strek går från näbben öfver ögat och tinnigarna. På dessa står en mörkbrun fläck. Alla undra kroppsdelar hvita med ganska svag gul anstrykning, som märkes mest på strupen och bröstet, minst på hakan och magen. Halsen framtill, bröstet och sidorna tecknade med långsgående svarta fläckar. På halsen äro dessa fläckar små och utgöra från hvardera underkäkgrenen ett upptill smalt nedlöpande strek (för öfrigt är strupen ofläckad); på bröstet äro fläckarne mer skilda (utom midt på bröstet der de stundom sammanlöpa till en stor fläck), ovala eller upptill spetsiga, och på sidorna bilda de smala strek. De minsta vingtäckarne olivfärgade, de större svartaktiga med hvit utkant, isynnerhet på de näst längsta; häraf uppkommer *ett* tydligt och *ett* mindre tydligt, smalt hvitt tvärstrek öfver vingen. Vingpennorna svartbruna, de medlersta utvändigt smalt kantade med olivgrönt, de yttersta med hvitaktigt, de inre med grått. Stjerten något klufven, svartaktig; den yttersta pennan till hälften snedt utåt hvit, den andra med en vigglik hvit fläck i spetsen; de två medlersta gråaktiga. — Näbben svartaktig, vid roten inunder blekare. Näsborrharna ovala. Iris svartbrun. Benen blekt bruna, stundom mer gulbruna; tårna mörkare. Baktån $\frac{6}{8}$ tum, hvaraf klon, som är

temligen rak, utgör något mer än hälften. — Längd $5\frac{1}{4}$ — 6 tum, vingbr. 10 tum. Stjerten utom vingarna $1\frac{1}{4}$ tum.

Honan är ofvan svartbrun der hannen är svartaktig; inunder smutsigt hvit med föga märklig gul anstrykning.

Unga och gamla i höstdrägt: Hela fjäderbeklädnaden är yfvig och foglen synes större. Alla öfra kroppsdelar grönaktiga med svarta fläckar, eller, kanske rättare, svarta med gröna fjäderkanter. Ögonlocken hvitaktiga; från näbbviken ett svartaktigt strek under ögat; öfver ögat ett gulaktigt strek. Hela foglen inunder ockergul beströdd med svarta fläckar på halsen, bröstet och sidorna. Vingarna svartaktiga med gröngrå pennkanter. De inre vingpennorna och de större vingtäckarne med breda hvitaktiga kanter. Stjerten svart; dess två medlersta pennor med breda hvitaktiga kanter; den yttersta utvändigt till hälften snedt hvit; den följande med en hvit fläck i spetsen. Ett par af de längsta undre stjerttäckarena äro svarta med ockergula kanter. Näbben ofvan brun, inunder vid roten köttfärgad, gulaktig. Benen blekt brunaktiga.

Anm. I denna drägt är foglen mycket lik Träd-piplärkan i höstdrägt, men skiljes derifrån genom: tunnare näbb, längre bakklo än baktå, svartfläckig öfvergump, mindre tillspetsade stjertpennor, hvitaktiga kanter på det medlersta pennparet, större fläckar på halsen, bröstet och isynnerhet på sidorna, mer ockergul mage, o. s. v. — I denna drägt är foglen äfven beskrifven i Ornith. Svec. I. p. 244.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Piplärka bebor kärraktiga eller tufviga ängar och betesmarker.

Hon förekommer om sommaren allestädes på vår halfö der lokalen är passande, så väl i det södra Skåne som på Lapplands och Norriges fjällar, äfven inom polcirkeln, och till och med högt öfver trädgränsen. Ehuru visst icke sällsynt i de södra trakterna, är hon dock talrikare i de norra. Som flyttfogel anländer hon till Skåne redan i Mars månad, och träffas då på våta ängar vid sidan af vatten der snön bortsmält. Då man nalkas dess stamhåll, blir man vanligen mottagen af ett eller flera par, som med ett hest *'st-'st-'st!* eller *hist-hist-hist!* och med ryckvis höjd och sänkt flygt, tillkännage sin närvaro. Under fortplantningstiden stiger hannen, från en tufva eller en låg buske, med angenämt klingande toner: *ticke, ticke, ticke!* högt i luften, sväfvar der omkring i en cirkel och nedsänker sig åter med en raskare sång. Han är den bästa Sångfogel på de fuktiga och ödsliga hedarna. — Om hösten i Augusti och September träffas de familjvis på åkrarne och i pilhäckarne i Skåne. De hafva då ett egen lockton: *gick! gick!* som man ej får höra under sommaren, och de sätta sig då äfven i träd, hvilket sällan sker under någon annan årstid. I September och Oktober flytta de bort.

Födämnena: Insekter, larver och insektägg.

Fortplantning: På sumpiga, med tufvor belagda eller med låga enbuskar glest bevuxna ängar och hedar lägga de sitt bo på en tufva bland säf och gräs, eller under en buske. Boet är byggt af grässtrån och invändigt belagdt med hår. Äggen 5 — 6, grå, fint brunspräckliga.

2:dra Underafdelningen.

Bakklon kortare än tån. Näbben temligen undersättsig.

De uppehålla sig på torra fält eller i skogar.

3. Träd-Piplärkan. (*Anthus arboreus*, *Bechst.*)

Artm. Ofvan olivgrönaktigt grå med bruna fläckar; inunder ockergul med svarta fläckar på bröstet. Ttitersta stjärt pennan till yttre hälften snedt vitt; den andra med en spetsig vitt fläck. Bakklon kortare än tån och krökt. Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Anthus arboreus, *Bechst.* N. D. 3. p. 706. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 251. — Tem. Man. d'Ornith. I. p. 271. — *Alauda trivialis*, *Lath.* Ind. Orn. I. p. 493. — *Field Lark*, *Pen.* Britt. Zool. I. p. 358. — *Lath.* Syn. 4. p. 375. — Sv. *Piplärka*.

Beskrifn. Hela fjäderbeklädningen ofvan olivgrönaktigt grå med en mörkbrun fläck åt midten af hvarje fjäder. Dessa fläckar äro märkbarast på hufvudet och ryggen, nästan omärkliga på halsryggen och öfvergumpen. Öfver ögat går ett smalt gulaktigt hvitt strek och öfver vingen ett dubbelt tvärband af samma färg, hvilket kommer deraf att de två större täckfjädderraderna äro i spetsen kantade dermed. Hela foglen inunder vitt med ockergul anstrykning, som är starkast på halsen och bröstet, svagast på underhakan och magen. Halsen framtill och bröstet tecknade med svarta fläckar, hvilka på främre delen af bröstet äro störst och ovala; på halsen äro de min-

dre och bilda på hvardera sidan af strupen en rad, som börjar vid underkäkens grenar; på kroppens sidor bilda de smala strek. Vingpennorna mörkbruna, utvändigt smalt kantade med olivgrått; de innersta med gulaktiga kanter. Stjerten något klufven; dess pennor mörkbruna; den yttersta nästan till häften utvändigt snedt hvit, den andra med en liten vigglik hvit fläck i spetsen. — Näbben ofvan brun, inunder vid roten blekt köttfärgad. Iris brun. Näsborrharna rundaktiga. Benen bleka; gulaktiga; tårna något skuggade med brunt. Bakklon krökt, kortare än baktån. Längd $6\frac{1}{2}$ t. Vingbredden $10\frac{3}{4}$ — 11 tum.

Unga och gamla i höstdrägt äro så olika foglen i sin vårdrägt att man lätt kunde anse dem för skilda arter. Hela fjäderbetäckningen är yfvigare och foglen synes större. Hufvudet och halsen ofvan samt ryggen och skuldrorna ljust gröna med svarta långsgående fläckar; bakre ryggen och öfvergumpen af samma grundfärg, men stötande i grått, och utan fläckar. Från näsborrharna öfver ögat ett gult strek. Ögonlocken gulaktiga. Underhakan och magen hvita offläckade; halsen framtill, bröstet och sidorna gula; bröstet beströdt med talrika svarta fläckar, sidorna med glesa smala linier; på båda sidor af strupen nedgår från underkäken ett svart strek. Undergumpen och de undre stjerttäckarne hvita, offläckade med gulaktig anstrykning. Vingarna svartaktiga med gröngrå fjäderkanter och två gulaktigt hvita tvärstrekar. Stjerten svart med grönaktiga pennkanter och tillspetsade pennor. 1:sta pennan utvändigt

till hälften snedt hvit; adra med en vigglik hvit fläck i spetsen. — Näbben ofvan svartaktig, inunder vid roten köttfärgad, benen bleka.

Anm. I denna dräkt är foglen äfven antydd i Orn. Sv. I. p. 243, under rubriken: *Avis junior*. Hvarigenom denna skiljes från Ång-piplärkan i höstdräkt, se sid. 262.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Piplärka bebor skogarna och förekommer der, så väl i Skåne som i de norra trakterna af halfön, ända inom polarcirkeln. I den högre norden finnes hon likväl icke så talrikt som föregående art, och på fjällens sidor går hon ej högre upp än skogslandet räcker. Som flyttfogel anländer hon sednare och går tidigare bort. Vid slutet af April ser man henne först i Skåne. Hon träffas då bland träden i trädgårdarna. Snart öfverger hon dem, och flyttar till skogarna. Från toppen af ett träd eller en hög buske uppstiger Hannen i luften med hastigt rörda vingar och ett raskt: *kipp-kipp-kipp*; och då han hunnit en viss höjd, sänker han sig åter sväfvande ned med orörda vingar och ett ömt klagande: *zia, zia, zia!* — Då man nalkas boet gifva Hanne och Hona från sig egna sorgliga läten, *zip, zip!* hvilka de endast låta höra under fortplantningstiden. Under de andra årstiderna hafva de en annan lockton, ungefär: *ist, ist!* — Om hösten lemna de skogarna och träffas familjvis på fälten, på åkrarne och i pilläckarne på Skånska slättbygden. I September lemna de oss oförmärkt.

Föddämnena: Insekter och larver.

Fortplantning: Boet träffar man på marken bland gräs, ljung, o. s. v. under gamla trädstockar och

stubbar, eller under en buske. Det är bygd af torra grässtrån. Äggen 5 grå, stundom hvitaktiga, stundom stötande i rött, alltid spräckliga af bruna fläckar och strek.

4. Fält-Piplärkan. (*Anthus campestris*, Bechst.)

Artm. Ofvan grå eller rostgrå med bruna fläckar och ett bredt hvitaktigt strek öfver ögonen; inunder ockergul med några små bruna strek på bröstet. Vingarna med rostgula fjäderkanter. De två yttersta stjärt pennorna utvändigt snedt öfver hvita. Bakklon kort, nästan rak.

Längd $6\frac{3}{4}$ — 7 tum.

Anthus campestris, Bechst. N. D. 3. p. 722. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 248. — *Alauda Novalium*, Frisch Vogel Deutschl. tab. 15. f. 2. — *Brachpieper*, Bechst. I. c. — Sv. Fältlärka.

Anm. Linnés *Alauda campestris*, sådan som den i Fauna Svecica p. 77. beskrifves, är en *Saxicola Rubetra*, Bechst. (*Motacilla Rubetra*, Lin.)

Beskrifn. De öfra kroppsdelarne grå med grågul anstrykning, och bruna, bakåt spetsiga fläckar som äro tydligast på hufvudet, mindre tydliga på ryggen och försvinna på öfvergumpen. Denna är gråbrun med rostgul anstrykning. Från näsborrarna öfver ögat åt sidan af nacken löper ett bredt smutsigt hvitt strek; genom ögat går ett brunt strek och på tinningarne står en brun fläck. Strupen livit. Alla andra undre kroppsdelar blekt ockergula. På hvardera sidan af strupen står en liten svartaktig linia som nedgår från underkäkens rot, och från munviken på sidan af hufvudet går en dylik något bredare. Frampå bröstet finnas några ganska små bruna

strek. Vingarna bruna; dess pennor och täckfjädrar kantade med rostgult. Stjerten svartaktig; den yttersta pennan utvändigt snedt öfver midten hvit eller rosthvit; den andra med en dylik smal utkant och en lång smal hvit eller rostgulaktig fläck längs inre sidan af den bruna spolen. De två medlersta bruna med rostgrå kanter.

Näbben ofvan mörkbrun, inunder och vid roten ofvan blek. Näsborrhårne rundaktiga. Iris brun. Benen blekt köttfärgade eller perlgrå; tårna brunaktiga. Bakklon kortare än tån och ganska litet krökt. 2:dra, 3:dje och 4:de vingpennan lika och längst; 5:te något kortare. — Längden $6\frac{3}{4}$ — 7 tum. Vingbredden 11 tum.

Anm. 1. Jag äger ett exemplar skjutit på sandfältet vid Torekow, hvilket har bakklon längre än tån och krökt som hos Skär-piplärkan.

Anm. 2. Några individer hafva nästan alldeles inga bruna småstrek på bröstet, och den svartaktiga linien på sidorna af strupen har äfven till större delen försvunnit.

Ung fögel: Ofvan mörkbrun med rostgula kanter på hvarje fjäder; de inre vingpennorna, de stora täckfjädrarne och de medlersta stjertpennorna hafva breda roströda kanter. Från underkäksgrenen nedgår på sidan af strupen ett svart strek, som nedåt sidan af halsen blir bredare. På bröstet och sidorna stå svartaktiga, breda uppåt spetsiga fläckar. Näbben svartbrun, inunder ljust köttfärgad. Benen perlgrå, tårna något dunklare.

Vistelseort och lefnadssätt: På torra fält och sandbedar i det södra Sverige, är denna Piplärka icke sällsynt, och på somliga ställen förekommer hon

talrikt. I Skåne träffar man henne öfver allt på högländta och sandiga, samt med ljung eller enris glest bevuxna hedar och fäladsmarker (allmänningar till sommarbete för boskapen). Äfven har jag sett henne i Halland, i Blekinge och på Öland; men aldrig i det öfra Sverige eller i Norrige. Som flyttfogel anländer hon i början af Maji, och bortflyttar i September. — På marken löper hon snabbt, liksom Ärlorna, och fångar under loppet insekter. Nästan ständigt rörer hon stjerten upp och ned. Dess flygt liknar Träd-piplärkans, och alla dess sedvanor, samt dess spetsigare och smalare kroppsform, skilja henne, äfven på afstånd, tillräckligt från Sånglärkan, med hvilken hon ofta har lika vistelseort och nästan lika färg. Någon egentlig sång har hon icke; men en egen lätt igenkännelig hastig lockton: *zirr-huit! zirr-huit!* som hon dels flygande, dels sittande på en sten eller stör, ofta upprepar.

Födämnena: Insekter.

Fortplantning: I Juli månad finner man dess bo på marken bland gräs, under en buske eller vid en sten. Det är bygd af torra grässtrån och mossor samt invändigt belagdt med hår. Äggen 4 — 6 blåaktigt hvita med rödbruna och violetta fläckar och strek.

ANDRA UNDERORDNINGEN.

Helnäbbar. (Integrirostres).

*Käkarnas kanter alldeles hela. Öfverkäkens spets
merendels rät.*

Första Familien.

Kegelnäbbar. (Conirostres).

Näbben kegelformig, kort eller långdragen.

Första Roten:

Korta Kegelnäbbar, (Brevicones),
eller

Sparffoglar. (Passerini).

*Näbben kort, kegelformig, mer eller mindre tjock
och stark.*

*Näsborrharna vid näbbroten, oftast täckta af
framåt riktade små fjädrar.*

*Benen med temligen korta tarser; uttån vid
roten förenad med mellantån.*

De hithörande foglarne vistas på fälten eller i skogarna, och några bland dem sjunga med en stark och melodisk röst. De föda sig hufvudsakligen af växtfrön, korn, kärnor, o. s. v. Under fortplantningstiden förtära de äfven Insekter och de uppföda dermed sina ungar. De lefva om sommaren parvis i engif-

te. Om hösten slå sig flera familier tillsammans, stundom i stora flockar, och stryka då omkring på åkerfälten eller i skogarna. De flesta arter flytta (åtminstone till större delen) mot vintren åt sydligare länder; andra kvarblifva under hela året i sin hemort; andra tillbringa sommaren i de norra och vintren i de södra trakterna af halfön. De rugga ej mer än en gång om året, neml. om hösten; men en stor del undergå om våren en partiel ruggning och hos dessa synes hannen efter denna årstid i en mycket vackrare dräkt än honan. Om hösten äro begge könen nästan lika. — Köttet kan ätas och är sundt; men det är stundom till smaken något bittert eller aromatiskt.

Lärk-Slägtet. (*Alauda*, Linn.)

Näbben medelmåttig, rak, kegelformig, trind, vid roten mer bred än hög; käkarne lika långa; öfverkäken ofvan något kullrig; dess kanter hela, icke inböjda.

Näsborrarna vid näbbroten på sidorna, rundaktiga, omgifna af en i kanten uppstående hinna, glest skylda af småfjädrar.

Benen: Tarserna längre än mellantån; denna vid roten hopvuxen med uttån. Klorna nästan raka; bakklon ganska lång.

Vingarna: 1:sta vingpennan ganska kort; 2:dra föga kortare än 3:dje som är längst.

De uppehålla sig på fälten eller i skogarna; de föda sig af sädeskorn, och andra

växtfrön. Under fortplantningstiden stiger hannen sjungande upp i luften nästan i en lodrätt riktning, samt uppehåller sig der med fladdrande vingar, en längre eller kortare tid. De vistas mest på marken, der de söka sin näring; de röra ej stjerten som Piplärkorna, och de bada sig i sand (liksom Hönsen). — Könen äro nästan lika. De äro hos oss flyttföglar.

1. Sånglärkan. (*Alauda arvensis*, Linn.)

Artm. Ofvan rostgrå med svartaktiga fläckar; inunder rostgulaktigt vit med små bruna fläckar på bröstet. Stjerten klufven, temligen lång; dess yttersta penna utvändigt öfver midten vit, den följande i yttre spetsen och yttre fanet vit. Längd $7\frac{1}{2}$ tum.

Alauda arvensis, Lin. Fn. p. 76. — Retz. Fn. p. 202. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 255. — Lath. Ind. Orn. I. p. 491. — *L'Alouette ordinaire*, Buff. Ois. 5. p. 1. t. 1. — pl. enl. 363. f. 1. — *The Sky-Lark*, Lath. Syn. 4. p. 368. — *Die Feldlerche*, Bechst. Nat. D. 3. p. 755. — Sv. Lärka, Sånglärka; Sk. Topplärka; kring Ystad: *Himmelslärka*. Norr. *Sånglärke*, *Topplärke*.

Beskrifn. I höstdrägt: Alla öfra kroppsdelar svartaktiga med gråbruna mot spetsen blekare fjäderkanter. Från näsborrarna öfver ögat går ett gulaktigt strek. Tinningarna bruna. De två eller tre innersta vingpennorna och deras långa täckfjädrar vid spetsen kantade med hvitt. Vingpennorna svartaktiga med rödbruna kanter; de medlersta i den urnupna spetsen blekt grå. Stjertpennorna svarta, den yttersta från roten utvändigt, och snedt öfver, mer än till

hälften, rent hvit; den följande i yttre fanet gulaktigt hvit; de två medlersta med breda gråbruna kanter. Halsen framtill och öfra delen af bröstet med rostgrå anstrykning, samt med täta svartaktiga fläckar, som på sidorna bilda långa strek. Öfriga delen af bröstet samt magen hvita med svag ockergul anstrykning, ofläckade. Undergumpen med rostbrun anstrykning. — Näbben ofvan brun, inunder blek, vid roten gulaktig. Benen ljust köttfärgade, tårna mer gulaktiga, öfver ledgångarne bruna. Längd $7\frac{1}{2}$ tum vingbredden $14\frac{1}{2}$. Från vingvecket $4\frac{1}{2}$; stjerten nära 3 tum, räcker 1 tum utom vingarne.

Foglen i vårdrägt: har något ljusare färger: neml. på öfra kroppsdelarne äro fjädrarna i midten svartbruna och kantade med rostgult eller rostgrått. Tinningarna rostbruna. Undre kroppsdelarne smutsigt hvita med rostgul anstrykning och svartbruna strek på framhalsen, bröstet och sidorna.

Honan, som är något mindre än hannen, har blekare grundfärg och mörkare fläckar på ryggen och bröstet.

Varierar tillfälligtvis: 1:mo Helt svart eller sotbrun. — 2:do Stjertpennorna och de flesta vingpennorna hvita. — 3:tio Hela foglen hvit eller gulaktigt hvit.

Dessa färgförändringar uppkomma ej sällan i bur af vanliga Lärkor. Man tror att för kraftig föda åstadkommer den förstnämnda varieteten.

Vistelseort och lefnadssätt: Sånglärkan förekommer på åkerfälten öfverallt på vår halfö från Skåne

till Norrland. Kring Trondhiem och i Stördalen finnes hon ännu talrikt, och i kustbygderna af det norra Norrige har jag sett henne ända upp till Ranen-fjorden. I det södra Sverige är hon mycket allmän. Som flyttfogel anländer hon till Skåne mycket tidigt, och i blida vintrar får man under vackra solskens-dagar redan höra dess sång mot slutet af Januari månad. Af alla flyttfoglar är hon den förste som återkommer. Då hon sjunger sitter hon stundom på marken på en tufva, men vanligen uppstiger hon med utbredd stjert och fladdrande vingar i en lodrätt eller spiralförmig riktning högt i luften, och neddrillar derifrån sin raska och skönt omvexlande sång *). Hon sjunger från de första dagarna af sin ankomst, ända till Augusti. Under parningstiden om våren sjunger äfven honan några melodiska strofer. Under denna årstid ser man ofta hannen uppresa de långa fjädrarna till en tofs på hufvudet, och deraf har han i somliga trakter blifvit kallad *Topplärka*. Dess lockton om våren är ett ömt *tirl!* om hösten liknar det mera: *driit*. — Om hösten i September och Oktober månader samla sig Lärkorna och stryka kring i spridda flockar från ett åkerfält till ett annat. Småningom försvinna de; dock träffar man en och annan ända fram i December, då vädret är blidt, och de sista flytta ej bort förr än starkt frost eller snö bortjagar dem.

*) Man erinrar sig Taubmanns bekanta distichon:
 Ecce! suum tirili, tirili, tiritirliri tractum
 Candida per vernum cantat alauda solum.

Födämnen: Insekter och larver, sädeskorn och åtskilliga slags växtfrön. I bur förtär Lärkan söndersmuladt bröd som i mjölk blifvit uppmjukadt, korngröpe, stötta hampfrön, vallmofrön o. s. v. hvori man stundom blandar sönderhackad källkrasse, kål eller sallat. Buren bör vara rymlig och klädd ofvan med linväf, eljest sönderstöter hon lätt hufvudet, då hon är van att ofta flyga upp. (Bechst.)

Fortplantning: Bland säden på åkrarne träffar man Lärkans bo i en liten fördjupning vanligen vid en jordklimp eller annan upphöjning. Det är utan mycken konst sammanlagdt af torra grässtrån och hår. Äggen 4 — 5 gråaktiga beströdda med bruna, oregelbundna fläckar, som på den tjockare ändan sammanflyta. Hon lägger vanligen två kullar om året. Ungarna uppfödas blott med insekter.

Nytta: Hon sjunger angenämt äfven i bur. Köttet är läckert och sundt.

Jagt och fångst: Hos oss bryr man sig ingensstädes om lärkfångsten. I andra länder t. e. i Tyskland drifves den i stort, och enligt Goetze infördes till Leipzig på en enda månad 404,304 fångade Lärkor. Man fångar dem mest med garn under sträcktiden om hösten.

2. Trädlärkan. (*Alauda arborea*, Linn.)

Art m. Ofvan rostgrå med svartaktiga fläckar. Ett hvitt band öfver ögonen omgifver nacken. En vit fläck på vingvecket. Inunder hvitaktig med bruna fläckar på hals och bröst. Stjerten tvär, kort; de tre yttersta pennorna med vit fläck i spetsen.

Längd 6 tum.

Alda arborea, Lin. Fn. Sv. p. 77. — Gmel. Syst. I. p. 793. — Lath. Ind. I. p. 492. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 258. — *Alda nemorosa*, Gmel. Syst. I. p. 797. — *Al. cristatella*, Lath. Ind. I. 499. — *Le Lulu*, Buff. Ois. 5. p. 74. — pl. enl. 503. f. 2. — *Wood Lark* och *Lesser crested Lark*, Lath. Syn. 4. p. 371 och 391. — *Baumlerche*, Bechst. N. D. 3. p. 781. — Sv. *Skogslärka*.

Beskrifn. Till kroppsformen synes hon tjockare och kortare än *Sånglärkan*, och isynnerhet är stjerten kortare. Fjädrarna på hufvudets öfra del äro långa men ej tillspetsade. De öfra kroppsdelarna, hufvudet, ryggen och skuldrorna svartbruna med breda rostgrå fjäderkanter. Öfvergumpen och öfra stjertäckarne rostgrå, ofläckade. Från näsborrarna öfver hvardera ögat går ett hvitaktigt band och förenar sig i nacken med det motsvarande från andra sidan. På tinningarna står en mörkt rödbrun fläck som ofvan är svart. Undra kroppsdelarna hvita med gulaktig anstrykning; halsen och bröstet tecknade med smala långsgående svartbruna strek. Vingpennorna svartbruna; de yttersta 4 — 5 kantade med hvitt; de följande i spetsen urnupna hvitaktiga; de innersta samt de närmaste täckfjädrarna svartbruna med rostgrå kanter; på vingvecket står en hvit fläck. Stjerten tvär svart; den yttersta stjertpenna snedt öfver spetsen samt utvändigt hvitaktig, de tre följande med en kantig hvit fläck i spetsen; det medlersta pennparet rostgrått, blott åt spolen brunt. Näbben ofvan mörkbrun, inunder blek. Benen bleka. Bakklon gulaktig. Längd 6 — 6 $\frac{1}{2}$ tum, vingbredden 12 — 12 $\frac{1}{2}$ tum.

Honan har undra kroppsdelarne mera rent hvita, samt fläckarne på bröstet talrikare.

A n m. Om hösten efter ruggningen äro fläckarna på kroppens öfra delar svarta, och fjäderkanterna mer rostbruna; undra kroppsdelarne mer ockergula, och de svartaktiga fläckarna på halsen och bröstet större.

Vistelseort: Trädlärkan är en flyttfogel, som om sommaren har sitt tillhåll i skogarne, isynnerhet uti barrskogarne nära ängar och fält, i de landskap som äro belägna ofvan Skåne. I Skåne har jag icke träffat honom under denna årstid; men vår och höst flyttar han familjvis öfver Skåne och träffas då på åkrarna. Redan vid Mars månads slut infinner han sig här, och då han i September månad åter tågar åt sydligare länder, slå sig ofta flera familjer tillsammans och träffas flocktals på åker-stubben. Under dess vandringar, vår och höst, har jag aldrig sett denna fogel sätta sig i träd. Dess lockton är ett väljudande: *dadigoj!* Dess flygt är bågformig, samt ryckvis lägre och högre. Härigenom, och äfven genom den korta stjerten, skiljes han på afstånd lätt från Sånglärkan. — Om sommaren, då han vistas i skogarne, stiger hannen ofta från toppen af ett träd ganska högt i luften och uppehålla sig der sjungande, med utbredd stjärt och fladdrande vingar, en lång stund på samma fläck. Dess sång är melodisk och schön. Då han sitter på ett träd eller löper på marken, uppreser han ofta de långa hufvudfjädrarna till en tofs.

Födämnen: Om hösten förtär han åtskilliga slags växtfrön och sädeskörn; om sommaren insekter och maskar. I bur underhålles han med samma slags födämnen som Sånglärkan.

Fortplantning: Sitt bo lägger han på marken bland högt gräs eller ljung, stundom under en enbuske. Det består af torra grässtrån, hopflätade med mossor, ull och hår. Äggen 4 — 5 grå med bruna fläckar isynnerhet vid den tjockare ändan.

Mes-Slägtet. (Parus, Lin.)

Näbben kort, rak, smalt-kegelformig, hoptryckt, spetsig med helä käk-kanter och dess rot täckt med framåtliggande håriga fjädrar.

Näsborrharna på sidorna vid näbbroten, små, runda, täckta med framåtriktade fjädrar.

Benen undersättsiga; klorna hoptryckta och spetsiga, bakklon starkast.

Vingarna: 1:sta vingpennan af medelmåttig längd eller temligen kort (hos alla Svenska arter); 2:dra mycket kortare än 3:dje; denna något kortare än 4:de och 5:te som äro längst.

De hithörande foglar äro små, ytterst lifliga och föga skygga. Ständigt äro de i rörelse, hoppa eller klättra på grenarna, hänga sig ned under qvistarna och bladen, samt genomsöka dem på alla sidor och i alla riktningar. De lefva dels af insekter och puppor, dels af frön, bär och frukter; icke heller försmå de kött, talg o. s. v. och de angripa stundom sjuka eller i snaror fastnade foglar. De bygga sina bon i ihåliga träd, och lägga ett stort antal ägg, vanligen 8 — 12,

stundom ända till 15. — Flyttfoglar äro de egentligen icke, men efter fortplantningstiden samla de sig i större eller mindre sällskap, och ströfva då omkring från en skog eller trädgård till en annan.

1. Talg-Mesen. (*Parus major*, *Lin.*)

Art m. Hufvudet och framhalsen svarta, tinnigarne hvita; ryggen olivgrön, bröstet och magen gula med ett långsgående svart band.

Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Parus major, *Lin.* *Fn.* *Sv.* p. 96. — *Retz.* *Fn.* p. 268. — *Lath. Ind.* I. p. 562. — *Nilss. Orn.* *Sv.* I. p. 268. — *La grosse Mesange ou Charbonniere*, *Buff. Ois.* 5. p. 392. t. 17. — *Pl. enl.* 3. f. 1. — *Great Titmouse*, *Lath. Syn.* 4. p. 536. — *Die Kohlmeise*, *Bechst. Nat. D.* 3. p. 834. — *Sv. Talgoxe.*

Beskrifn. Hufvudet, strupen och halsen fram till glänsande svarta. Från näbbviken på sidan af hufvudet en stor rent vit fläck. Ryggen olivgrön; nacken gröngul; vingtäckarne och öfvergumpen askeblå. Bröstet och magen gula med ett bredt långsgående svart band. Vingpennorna svartaktiga, de första utvändigt smalt kantade med askeblått; de innersta med en bred, gulaktigt vit infattning. De största vingtäckarne med hvita spetsar; deraf ett hvitt tvärstrek öfver vingen. Stjerten något rundad; dess pennor i inre fanet svartaktiga, i yttre mörkt askegrå; de två medlersta af sistnämnde färg; den yttersta utvändigt till hälften snedt vit; den andra i spetsen vit. De undra stjärtäckarne hvita.

Honan har mindre lifliga färger, och det svarta långsgående bandet på de undra delarne sträcker sig blott till midten af magen.

Vistelseort och lefnadssätt: I de södra och medlersta trakterna af halfön är denna fogel mycket allmän; i de norra trakterna träffas han deremot mer sparsamt, och norr om fjällryggen förekommer han sällan. Här synes *Kärrmesen*, som är temligen talrik, hafva intagit dess plats. Likväl har jag äfven sett *Talgmesen* på några ställen norr om Trodhiem. Dess tillhåll äro skogarna så väl i jemna som i bergiga trakter, och så väl löfskogar som barrskogar. Om hösten samla sig flera familjer och stryka omkring från en skog eller trädgård till en annan. Samma lefnadssätt föra de under hela vintren, och de flytta icke bort under denna årstid. Först mot våren upplösa de sig parvis, och söka ett passande ställe för sin afföda. Deras sång om våren är ej oangenäm, men fåtonig, och består nästan blott af: *Šizidā, Šizidā!* hvilket de ofta upprepa *). Deras lockton är ett gällt: *fink, fink* eller *zizerrh!* — Liksom alla deras samslägtingar, äro de modiga, lifliga och i ständig rörelse; men de utmärka sig framför de andra, genom grymhet och rofbegär. Sjuka foglar anfalla de ej sällan; de öppna med sin spetsiga näbb hufvudskålen, och uthacka hjernan. Vid foglar som fastnat i snaror, samla de sig stundom i stort antal

*) Skånska Landtmannen tycker sig i denna sång höra orden: litet hö, litet hö! emedan han vanligen har litet foder kvar, då han får höra detta läte.

och uppäta dem *). Då de äro i bur eller kammare inspärrade hos andra småfoglar, anfalla de dem ej sällan och döda dem, isynnerhet om de lida brist på föda.

Födämnen: Om sommaren förtära de en mängd insekter, larver och insektägg; om hösten och vintren förtära de äfven växtfrön, hafra, fruktkärnor fur- och granfrön, bokollon, nötter o. s. v. Ofta gå de äfven på kadaver. De skala ej fröna, utan de hålla dem mellan tårna och hacka ut kärnan. I fångenskapen äta de allt hvad man lägger för dem, så väl af växt- som djurriket.

Fortplantning: I ihåliga träd, i springor eller hål i murar o. s. v. bygger Talgmesen sitt bo. Bollen består af mossor, grässtrån, ull, tistelfjun och fjäder. Äggen 10 — 13, hvita, beströdda med brunröda prickar. Hanne och hona rufva dem växelsvis, och uppföda sina ungar med insekter och larver.

Fångst: Om hösten och vintren fångar man dem lätt i *Talgox-buren* (*Mes-fällan*). Äfven fångas de med limspön. De gå också stundom i Donor på rönnbär.

2. Svart-Mesen. (*Parus ater*, Linn.)

Artm. *Hufvudet och framhalsen svarta med en stor vit fläck på sidorna och ett dylikt strek i nacken; ryggen askeblå; bröstet hvitt.*

Längd $4\frac{1}{2}$ tum.

*) Jag har en gång sett dem nästan helt och hållet uppäta en Orre som var inlagd i en med linväf omgifven ostbur.

Parus ater, Lin. Faun. Sv. p. 97. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 276. — *La petite charbonnière*, Buff. Ois. V. p. 400. — *Colemouse*, Lath. Syn. IV. p. 540. — *Tammenmeise*, Bechst. N. D. 3. B. p. 853.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och halsryggen samt strupen och halsen framtill glänsande svarta. Från näbbviken under ögat på sidan af hufvudet och halsen finnes en stor aflång hvit fläck, och ett strek af samma färg från nacken längs åt halsryggen. Ryggen, skuldorne och de mindre vingtäckarne askeblå, bröstet hvitt. Mage, undergump och sidor grå. Öfver vingarne två hvita tvärstrekar. Stjerten klufven. Näbben svart, temligen spenslig, spetsig och hoptryckt. Iris brun. Benen blyfärgade. — Vingbredden 7 tum.

Honan liknar hannen, men har mindre svart framtill på halsen och mindre hvitt på dess sidor.

Vistelseort och lefnadssätt: Svart-mesen bebor om sommaren de stora barrskogarne i Rikets sydligare och medlersta landskap. I de norra är han mera sällsynt, men träffas dock någon gång ända inom polarcirkeln. I Skånes löfskogar och trädgårdar in finner han sig under sina ströftåg om hösten, vintren och våren; men han ses här aldrig om sommaren. Under nämnda ströftåg har han merendels i sitt sällskap Gullkronade Sångaren och Kärr-mesen. Munter och liflig är han ständigt i rörelse, klättrar på grenarna och genomletar barren eller löfven på alla sidor, för att finna insekter och puppor. I fångenskapen är han likaså ondsint som den föregående, men

mindre stark och således för de andra foglarna mindre farlig.

Födämnena: Insekter, larver och puppor; äfven förtär han frön af tall och gran m. m.

Fortplantning: Sitt näste bygger Svartmesen i ihåliga träd, i gamla kullfallna trädstammar, i gamla rotthål i marken o. s. v. Balen består af mossor och hår. Äggen 6 — 8 hvita, öfver allt beströdda med ljusst lefverbruna prickar.

Fångst: Svartmesen är alldeles icke skygg, och kan derföre lätt fällas med *blåsröret*. Äfven kan man fånga honom med ett limspö, som man fastbinder på ändan af en stång och sticker till honom.

3. Tofs-Mesen. (*Parus cristatus*, Linn.)

Art m. Hufvudet med en spetsig fjädertofs. Strupe, framhals och halsband svarta. Kroppen ofvann rödbrunaktigt grå, inunder hvit.

Längd $4\frac{1}{2}$ tum, vingbr. $7\frac{1}{2}$ tum.

Parus cristatus, Lin. Fn. Sv. p. 97. — Lath. Ind. Orn. I. p. 567. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 275. *La mésange huppée*, Buff. Ois. 5. p. 447. — Pl. enl. 502. f. 2. — *Crested Titmouse*, Lath. Syn. 4. p. 545. — *Haubenmeise*, Bechst. Nat. Deut. 3. p. 869. — Sv. *Tofstita*; *Meshatt*; *Toppmes*. Norr. *Top-meise*.

Beskrifn. Hjessan försedd med en tofs af långa spetsiga svarta fjädrar med hvit infattning; hela öfriga kalotten af samma färg hvarföre pannan, der de hvita fjäderkanterne äro breda, synes hvit. Kinder, tinningar och halsens sidor hvita. Strupen och framdelen af halsen svarta. Från nedra delen deraf

går ett svart band tillbaka uppåt till nacken, der det förenar sig med ett dylikt från andra sidan. Bak örat en böjd svart fläck. Rygg och skuldror rödbrunaktigt grå. Bröst och mage hvita, på sidorne och undergumpen med rödbrunaktig anstrykning. Vingar och stjert gråbruna. Näbben svart, smal, hoptryckt. Iris brun. Benen blyfärgade.

Honan: Det svarta på strupen och framhalsen är mindre, och fjädertofsen på hufvudet kortare.

Vistelseort och lefnadssätt: I barrskogarna i Småland, Blekinge, Halland, Upland o. s. v. är denna fogel icke sällsynt, fastän han ingenstädes förekommer i stor mängd. I Skånes löfskogar och trädgårdar infinner han sig aldrig, som dess flesta samsläktningar. I barrskogarne, som han aldrig lemnar, stryker han, om höst och vinter, familjvis omkring. Oftast ser man honom på sådana ställen der många enbuskar finnas. Dess lockton är ett gällt: *krrr-it!* hvarigenom han äfven på afstånd lätt röjer sig.

Födämnen: Insekter, larver och insektägg samt enbär och frön af fur och gran.

Fortplantning: I hål uti träd, stockar och stenar m. m. Balen består af lafvar, ull och hår. Äggen 8 — 10 hvita, kring den tjockare ändan tecknade med blodröda fläckar.

4. Siberiska Mesen. (*Parus sibiricus*, Gmel.)

Art m. Ofvan rödbrunaktigt grå; strupen, framhalsen och öfra delen af bröstet svarta; tinningarna och halsens sidor hvita; magen och undergumpen rostgrå.
Längd $5\frac{1}{4}$ tum.

Parus sibiricus, Gmel. Syst. I. 2. p. 1013. n. 24. — Lath. Ind. Orn. I. p. 571. n. 25. — *La Mesange à ceinture blanche de Sibirie*, Buff. Ois. 5. p. 446. — Pl. enl. 708. f. 3. — *Siberian Titmouse*, Lath. Syn. 4. p. 556. — *Parus lugubris*, Zetterst. Resa genom Lappm. I. p. 249 — 250. tab. 3.

Anm. Herr Zetterstedt kallar, p. a. st., denna Mes *Parus lugubris*; men detta namn tillkommer en helt annan art, som finnes i det sydöstra Europa. Att *Parus sibiricus* tillhör de nordligaste delarna af Europa (följaktligen Lappland), visste Hr Temminck att berätta redan i rsta upplagan af sin Manuel d'Ornithologie. Herr Buffon har också redan gifvit en god figur öfver samma fogel.

Beskrifn. Ofvan rödbrunaktigt grå, något brunare på hufvudet och halsryggen. Strupen, framdelen af halsen och öfra delen af bröstet svarta. Kinderna, tinningarna, halsens sidor och en bred gördel öfver undra delen af bröstet hvita. De framliggande fjädrar som täcka näsborrarna rostgula. Magen åt midten hvit; sidorna och undergumpen rostgråaktiga. Vingpennorna och stjertpennorna mörkbruna, utvändigt kantade med askegrått. Stjerten lång något vigglik. Näbben svart, hoptryckt, spetsig. Benen flyfärgade. — Längd $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$ t. Stjerten $2\frac{1}{2}$ tum.

Honan liknar alldeles hannen.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Mesart som synes närmast beslägtad med Kärrmesen tillhör de nordligaste delarna af Europa och Asien. I Siberien blef han först anmärkt och deraf har han fått sitt namn; sedan är han äfven funnen i Lappland, der han icke tyckes vara sällsynt, hvarken i det inre af landet eller i kusttrakterna *). Det synes ganska sannolikt

*) Herr Magister Fries såg honom äfven vid Alten.

att han om vintren, liksom dess samslägtingar, stryker familjvis omkring, och att han då äfven träffas i sydligare trakter af halfön än om sommaren. Han har sitt tillhåll i skogarna, så väl i barrskogar som löfskogar. Till lefnadssättet liknar han mest *Kärrmesen*. Äfven har dess lockton någon likhet med dennas, men den är mer hög och gäll.

Föddämnena: Insekter och växtfrön.

Fortplantning: Sitt bo lägger han i ihåliga träd. Balen består af mossor, renhår o. s. v. Äggen okända.

5. Kärr-Mesen. (*Parus palustris*, Linn.)

Artm. Hufvan och en del af halsryggen samt strupen svarta; kinderna och tinningarna hvita; ryggen och vingtäckarna grå; bröstet och magen vitaktiga. Längd $4\frac{1}{2}$ tum.

Parus palustris, Lin. Fn. Sv. p. 98. — Retz. Fn. p. 270. — Lath. Ind. I. p. 565. — Nilss. Orn. Sv. 1. p. 277. — *La Mesange de marais*, Buff. Ois. 5. p. 403. — Pl. enl. 3. f. 3. — *Marsh-Titmouse*, Lath. Syn. 4. p. 541. n. 8. — *Die Sumpmeise*, Bechst. N. D. 3. p. 873. — Sv. *Entita*. Norr. *Tete*, *Hamp-meis*.

Beskrifn. Hela kalotten från näbbroten genom ögonen, samt en del af halsryggen, rent svarta. Ryggen och vingtäckarne grå, svagt stötande i brunt. Under hakan en svart rundaktig fläck. Hufvudets sidor under kalotten hvita. Undre kroppsdelarna hvita, stötande i grått. Ving- och stjärtpennorne bruna, kantade med ljusst askegrått. Näbben svart. Iris brun. Benen blyfärgade. Längden $4\frac{1}{2}$ t. Stjerten $2\frac{1}{4}$ tum, räcker $1\frac{1}{2}$ tum utom vingarna.

Honan har mindre svart på underhakan.

Vistelseort och lefnadssätt: Entitan träffas i Sverige och Norrige, åtminstone ända upp emot polcirkeln. I Skåne så väl som i det öfra Sverige är hon icke sällsynt; men dess gräns åt Norden synes ännu icke vara med säkerhet bestämd *). Hon vistas så väl om sommaren som om vintren i trädgårdar, buskar och löfskogar, i synnerhet träffas hon i alkärr och bland enbuskar i gles skogsmark. Om hösten slå sig flera familjer tillsammans och ströfva omkring under hela vintren i skogar och trädgårdar, oftast i sällskap med sina samslägtingar. Mot våren upplösa de sig parvis och hvarje par söker sig ett passande ställe för sin fortplantning. Till lynnet är han ytterst munter och liflig. Dess lockton låter ungefär: *Dia, dia! hitzi - äh - äh!*

Födämnen: Insekter, larver och puppor samt växtfrön och bär. I trädgårdarna och i skogarna befriar han träden från många skadliga insekter; äfven förtär han frön af tistel, kardborrar, kål, solblommor m. fl. växter. Af bär tycker han isynnerhet om rönnbär, hvarföre han ofta fångas i de Donor, som om hösten utsättas för Kramsfoglar.

Fortplantning: I gamla ihåliga träd i skogar och trädgårdar lägger han sitt bo. Det består af mossa och gräs samt är fodradt med hår, ull och fjäder. Äggen 10 - 12 hvita, beströdda med brunröda prickar; således

*) De Författare, som påstå att denna Mes-art träffas talrikt inom polcirkeln, torde kanske stundom hafva förblandat honom med den föregående.

till färgen alldeles lika Talg-mesens, blott något mindre och ovala.

6. Blå-mesen. (*Parus caeruleus*, Linn.)

Art m. Pannan, ögonbrynen och tinningarna hvita. Hjessan och halsbandet blåa. Kroppen ofvan olivgrön; inunder gul. Längd $4\frac{1}{2}$ tum.

Parus caeruleus, Lin. Fn. p. 97. — Retz. Fn. p. 269. — Lath. I. p. 566. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 269. *La Mesange bleue*, Buff. Ois. 5. p. 413. — Pl. enl. 3. f. 2. — *Blue Titmouse*, Lath. Syn. 4. p. 543. — *Die Blaumeise*, Bechst. Nat. D. 3. p. 860. Sv. *Blåmes*.

Beskrifn. Hjessan ljusblå, pannan, ett strek som går öfver ögonen och omgifver nacken, samt kinderne och tinningarne hvita. Från den svarta strupen går ett smalt svartblåaktigt strek under tinningarne till nacken; ett dylikt går genom ögonen till nacken, der de båda förena sig i ett bredt mörkblått tvärband. Ryggen och skuldrorna olivgröna. Bröstat, sidorne af ryggen och undergumpen gula; magen åt midten whitaktig med ett svartblått längsstrek. Vingtäckarne skönt ljusblå. Vingpennorne i inre fänet svartaktiga, i yttre blå; de yttersta utvändigt smalt, de innersta i spetsen bredt kantade med hvitt. Öfver vingen ett hvitt tvärstrek. Stjerten nästan tvär, dess pennor blå, de yttersta utvändigt uppåt kantade med hvitt. Näbben svartaktig med hvita käkkanter. Iris brun. Ben och klor blyfärgade.

Honan har den blåa färgen mindre ren, och längsstreket åt magen mindre tydligt.

Vistelseort och lefnadssätt: Blåmesen är icke sällsynt i det södra och medlersta Sverige. Om sommaren vistas han i skogarna; om hösten och vintren infinner han sig i trädgårdarna, äfven i det sydligaste Skåne. Dess lockton är: *hyt - hyt, kerrerekéké!* Till skaplynne liknar han sina samsläktingar.

Födämnen: Om sommaren insekter, larver och puppor; om hösten derjemte bär, kärnor och växtfrön; om vintren insektägg och puppor, genom hvilkas förstörande han isynnerhet är nyttig för trädgårdarna.

Fortplantning: I skogarna lägger Blåmesen sina ägg i hål uti träd. Balen består af mossor, hår och fjädrar. Äggen 8 — 10 hvita med rödbruna prickar, till form och färg lika Talgmesens, men mindre.

7. Azur-mesen. (*Parus cyanus*, Pall.)

Artm. Pannan, tinningarna, nacken och undra kroppsdelarna hvita. Ögonbrynen och ett bredt tvärband öfver halsryggen mörkblå. Ryggen ljusblå. Stjerten lång, vigglik.

Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Parus cyanus, Pallas, Nov. comm. Petrop. 14. p. 538. n. 8. t. 23. f. 3. — Gmel. Syst. I. p. 1007. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 271. — *Parus sæbyensis*, Mus. Carlss. I. t. 25. — *La grosse Mesange bleue*, Buff. Ois. 5. p. 455. — *Azure-Titmouse*, Lath. Syn. 4. p. 538. — *Lazur-Meise*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 865.

Beskrifn. Pannan, tinningarna, en stor fläck i nacken och alla undre kroppsdelar rent hvita; på

hjessan stöter den hvita färgen i azurblått. Från näbben genom ögonen till sidan af halsen går ett mörkblått strek; på halsryggen står ett bredt mörkblått tvärband. Ryggen, öfvergumpen och vingarna vid roten ljusblå. Vingarna mörkblå med hvita spetsar på de inre vingpennorna och de långa täcksjädrarna, hvaraf ett bredt hvitt tvärband öfver vingen uppkommer. De medlersta stjertpennorna azurblå; sidopennorna utvändigt till hälften snedt hvita. Stjerten lång vigglik. — Näbben kort, tjock, hoptryckt, något trubbig; käkkanterna bleka. Benen mörkblå.

Vistelseort: Denna Mesart bebor de nordligaste delarna af Ryska riket och flyttar om vintren åt sydligare trakter. Han synes äfven om sommaren bebo Lappland, och han är en enda gång (förmodligen om vintren) skjuten i Södermanland.

Födämnena och Fortplantning okända.

8. Stjert-mesen. (*Parus caudatus*, Linn.)

Artm. Stjerten vigglik och mycket längre än hela kroppen; hufvudet, halsen och bröstet hvita; ryggen svart; skuldrorna och undergumpen rödaktiga.

Längd kring 6 tum.

Lanius biarmicus, Lin. Faun. Sv. p. 29. (Beskrifningen sänd af Leche, från Skåne; Diagnosen hörer ej hit). — *Lanius caudatus*, Lin. Fn. Sv. p. 28. — (Beskrifningen gjord efter Rudbecks något för granna figur; se fol. 114. de Geerska exempl.) — *Parus caudatus*, Retz. Fn. p. 271. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 273. — *La Mesange à longue queue*, Buff. Ois. 5. p. 437. t. 19. — Pl. enl. 502. f. 3. — *Longtailed Titmouse*, Lath. Syn. 4.

p. 550. n. 18. Suppl. I. p. 190. — *Die Schwanzmeise*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 879. — Sv. *Altitä; Stjörtmes.*

Anm. Att *Lanius biarmicus*, Lin. Fn. Sv. n. 84, till hvilken figuren på tab. I. hörer, ej är annat än en vanlig *Parus caudatus*; det kan hvar och en lätt inse. Att beskrifningen öfver *Parus caudatus* i Linnés Fauna Svcc. n. 83. är något för grann, isynnerhet beträffande vingarnes färg, ser man äfven. Förhållandet med allt detta är följande: Linné beskref sin *Lanius caudatus* efter en figur i Rudbecks fogelverk, — och denna figur är en bland de minst goda i hela Verket. Sedermåra fick Linné en figur och beskrifning öfver samma fogel af Dr Leche i Lund, och Linné kunde ej i dessa begge så olika figurer se en och samma fogelart. Den Lechiska kallade han derföre *Lanius biarmicus* och tillade honom en Diagnos, tagen annorstädes ifrån, och som alls icke tillhör samma art som beskrifningen och figuren. — Endast denna confusion har gifvit anledning dertill att den rätta *Parus biarmicus* blifvit införd och beskrifven i en sednare edition af Linnés Fauna, samt derefter af Bechstein och Temminck anförd som Svensk. Sådana misstag behöfva rättas. — Hittills är *Parus biarmicus* aldrig funnen i Sverige.

Beskrifn. Hela hufvudet och halsen samt de undre kroppsdelarna ända till magen rent hvita. Ryggen svart; skuldrorna, sidorna, magen och undergumpen rosenröda, hvilken färg är starkast på skuldrorna. Stjerten mycket lång, vigglik, svart; de tre yttersta pennorna i yttre fanet, och snedt öfver hela spetsen, hvita; den 4:de kantad med hvitt. Vingarna svarta; de inre vingpennorna bredt kantade med hvitt. — Näbb och ben svarta.

Honan har ett bredt svart band öfver ögonen.

Ungarna hafva hufvudet ofvan, trakten mellan ögon och näbb, samt strupen och bröstet hvitakti-

ga; hufvudets sidor samt nacken svarta. Det rödaktiga på skuldrorna mindre tydligt. Stjerten är absolut, ej blott relativt, längre än hos de äldre.

Vistelseort och lefnadssätt: Stjertmesen bebor tätta och buskiga skogar i Sverige och Norrige, åtminstone ända till Dowrefjäll; men allestädes nog sparsamt. I det södra Sveriges skogar är han om sommaren sällsynt; men om hösten och vintren då han kringstryker familjvis eller flockvis, träffas han mindre sällan isynnerhet i alkärren. Under dessa ströftåg från en skogspark till en annan, hörer man ständigt dess skrik: *Ii, Ii gegegeh!* Han flyger långsamt, och, som det synes, med mycken ansträngning förmedelst den långa stjerten.

Födämnena: Små insekter, spindlar, larver och insektägg.

Fortplantning: På en tjock gren tätt vid trädstammen bygger han sitt bo. Det är stort, ovalt eller aflångt och mer än en half fot högt. Utvändigt består det af hvit trädmossa; invändigt är det fodradt med fjädrar. På sidan finnes ett litet rundt hål till ingång. — Sällan träffas boet i ett ihåligt träd. Äggen ända till 15 hvita, med rödbruna punkter vid den tjockare ändan.

Sparf-Slägtet. (*Emberiza*, Linn.)

Näbben kort, kegelformig, hoptryckt, med inböjda, skarpa, hela käkkanter; öfverkäken smalare än underkäken; käksömmen bildande

vid näbbroten en trubbig vinkel. Gomen försedd med en benknöl.

Näsborrarna rundaktiga, belägna vid näbbroten tätt vid hvarandra, och täckta med småfjädrar.

Benen: ut-tån vid roten förenad med mellantån. Baktåns klo merendels kort och krökt; stundom lång och temligen rak.

Vingarna: 1:sta, 2:dra och 3:dja vingpennorna nästan lika långa; dock är 2:dra litet längre än de öfriga; eller ock äro 2, 3, 4 lika och längst; 1 och 5 lika, och litet kortare.

Stjerten klufven, till hälften täckt af vingarna.

Sparfvarne nära sig hufvudsakligen af mjöliga växtfrön; äfven förtära de insekter. De flesta vistas i skogarna, isynnerhet bland buskar, uti eller under hvilka de bygga sina bon; några få bebo odlade fält, och besöka aldrig skogarna; några vistas på fjällarna bland de nakna klipporne.

De äro alla sångfoglar; men deras sång är kort och fåtonig. Då de sjunga, sitta de på en upphöjd plats: en sten, stör eller trädtopp. Hannarna äro vanligen olika honorna, och deras sommardrägt olik vinterdräkten. Likväl undergå de ej mer än en fullkomlig ruggning om året. — De flesta äro flyttfoglar.

Anm. Man vet nu med visshet att en stor del arter af detta och följande släkten; hvilkas sommardrägt är

mycket olik vinterdräkten, likväl icke rugga mer än en gång om året, om hösten. De hafva nemligen på en del af de nya fjädrar, som då framkomma, olikfärgade, merendels grå kanter, hvilka mot våren försvinna, så att de mer lifligt färgade delar, som om vintren lågo dolda under dem, framkomma i dagen. Det synes oss föga troligt att detta försvinnande af nämnde kanter, vid fortplantningsperiodens annalkande, skulle vara en följd af mekanisk afnötning och gnidning (frottement) eller luftens åverkan, som man föregifvit. Ty om så vore så skulle väl det snnma inträffa med alla andra foglar, hvilkas fjädrar äro utsatta för lika åverkan af luften och lika gnidning. Säkert skulle då icke kanterna afnötas så reguliert som nu sker, eller hos alla till samma art hörande på samma tid. Sannolikare har det blifvit oss, genom flersfaldiga iagttagelser, att denna fjäderkanternas reguliera fällning är att anse som en årlig partiel ruggning, hvilken har samma grund som den årliga totala ruggningen. Den synes oss nemligen åstadkommas genom en egen lifsprocess, hvarigenom de fina capilar-kärl som föra närande och färgande vätskor, mot våren obstrueras, hvarigenom de delar, till hvilka de gingo, bortdö, samt (liksom alla bortdöda delar i en lefvande organism) småningom förtorkas och bortfalla.

1:sta Underafdelningen. Egentliga Sparfvar.

Baktåns klo kortare än tån, och krökt.

De vistas i skogar och buskmarker eller på odlade fält.

1. Kornsparfven. (*Emberiza miliaria*, L.)

Artem. Ofvan brungrå med långsgående svartaktiga fläckar; inunder smutsigt hvit med svartaktiga småfläckar eller längsstrek på hals och bröst.

Längd $7\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ tum.

Emberiza Calandra, Linn. Fn. Sv. p. 83. — *Emberiza miliaria*, Linn. Syst. Nat. I. p. 308. — Lath. Ind. I. p. 402. Retz. Fn, p. 239. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 162. — *Le Proyer*, Buff. Ois. 4. p. 355. t. 16. pl. enl. 233. — *Common Bunting*, Lath. Syn 3. p. 171. — *Der Graunummer*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 262. — Skån. Kornlärka.

Beskrifn. *Hannen om våren*: Hufvudet ofvan halsen, ryggen och skuldrorna askegrå stötande i rödbrunt med en långsgående svart fläck i midten af hvarje fjäder; bakre ryggen och öfvergumpen af samma grundfärg, med bruna fläckar. Öfver ögonen åt sidan af nacken går ett hvitaktigt band med bruna småstrek; på tinningarna en stor brunaktig fläck. Underhakan hvit, ofläckad. Halsen framtill hvit med små, kantiga, på sidorna af strupen och frampå bröstet sammanlöpande svartbruna fläckar; sidorna af kroppen med smala strek af samma färg. Magen och undergumpen smutsigt hvita, ofläckade. Vingarna och stjerten svartbruna med grå fjäderkanter; de näst sista vingtäckarne vid spetsen kantade med hvitaktigt. — Näbben gul, dess rygg brun. Iris mörkbrun. Benen bleka, gulaktiga. Stjerten något klufven, räcker $1\frac{1}{6}$ tum utom vingarna. — Längd $7\frac{1}{2}$ t. vingbredden 13 tum.

Honan är nästan alldeles lik hannen.

Foglen i höstdrägt, efter ruggningsen i slutet af Augusti och i September: Alla öfra kroppsdelar svarta med breda gulbruna eller lerbärgade fjäderkanter; dessa äro bredast på öfvergumpen och halsryggen, der de bilda grundfärgen, som är beströdd med svarta småfläckar. Från näsborrarna öfver ögat går ett bredt rostrött strek. Hufvudets sidor af samma färg, men med svarta punkter; dessa sammanlöpa till ett strek som nedtill begränsar örontrakten. Från näbbroten längs åt hufvan ett mer eller mindre tydligt rostfärgadt strek. Vingtäckarne och de

innersta vingpennorna med breda blekt ockerfärgade, och de yttre vingpennorna med rostbruna, kanter. Halsen framtill och öfra delen af bröstet rostgula med svartaktiga fläckar, som äro mycket små och glesa på strupen, men stora och tätstående på bröstet och sidorna; öfriga bröstet, magen och sidorna hvita. Stjertpennorna svartbruna kantade med rostgrått; yttersta pennan snedt utåt till hälften *otydligt* rostgrå, och den följande har i ipre fanet vid spetsen en fläck af samma färg. — Näbben blek, perlgrå, ofvan brunaktig. Benen bleka, svagt stötande i köttfärg.

Anm. Unga och gamla hafva om hösten efter ruggningen denna färg. — Äfven Kornsparfven undergår således om våren en partiel ruggning; ty alla fjädrar äro om hösten i spetsen mer breda och afrundade, om våren tillspetsade och i kanterna naggade. Kanternas färg synes ej kunna uthlekas från lergult till askegrått, icke heller grundfärgen på halsen, bröstet och ögonbrynen från rostgult till hvitt. Visserligen kan fjädrarnes nötning och luftens inverkan på dem vid allt detta hafva ett stort inflytande; men att hela orsaken till förändringen skulle ligga utom foglen, och dennes lifskraft dervid förhålla sig passivt, är ganska otroligt, isynnerhet som näbb och ben äfven undergå förändringar, hvilka tydligen härleda sig från inre orsaker.

Varierar tillfälligtvis: 1:mo helt hvit. 2:do med flera eller färre inströdda hvita fjädrar bland de vanliga. — En sådan blef skjuten den 15 Sept. och var en gammal fogel inbegripen i ruggning.

Vistelseort och lefnadssätt: Kornsparfven tillbringar hela året, så väl sommar som vinter, på slättlandet bland sädesfälten. Det slättland, till hvilket han en gång kommit, lemnar han aldrig. Han

har alldeles icke den instinkten som Husfinken, att i ödemarker uppsöka nybyggen och odlade platsar; ty han flyttar aldrig öfver någon skog. Endast denna omständighet kan förklara det märkvärdiga factum, att, oaktadt denna Art finnes i oräknelig mängd på Skånes slättbygd, der han hela året vistas; så träffas han dock aldrig hvarken på Östergötlands bördiga slätter eller på det nästan likdana Hedemarken i Norrige, eller på Fahlbygden i Vestergötland. Ömtålighet för ett nordligare klimat kan ej vara orsaken härtill; ty han är så litet ömtålig för källden, att han icke blott qvarblifver hos oss under hela vintren, utan äfven sjunger glad och rask under den strängaste köld *). Dess sång är qvittrande, kort och liflig, men sträf. Den kan uttryckas med stafvelserna: *toi, toi, toi, tiritz!* Sedan ungarerna äro utkläckta tystnar sången och höres ej åter förr än uppfostrings omsorgerna äro slutade. Efter denna tiden får man stundom om hösten åter höra den, likväl mer sällan, samt mindre munter och stark än om vintren och våren. Denna fogel har det egna att han flyger på helt annat sätt under fortplant-

*) Jemför Ornith. Svec. I. p. 164. not. — I Thüringen är Kornsparfven en flyttfogel. Hr Bechst. tror därför att de individer deraf som öfvervintra i det norra Tyskland, äro sådana som komma från nordligare länder, och att de infödda flytta åt södren. Men denna förmodan är ogrundad. I Skåne, som ligger ännu nordligare, blifva de samma qvar om vintren som om sommarens. Inga flytta härifrån och inga komma hit. Det sednare är klart deraf att de aldrig finnas i någon nordligare provins; det förra deraf att de äro likså talrika om vintren som om sommaren.

ningstiden än under de andra årstiderna. Vid nämnde tid låter han under flykten benen hänga ned, slår vingarna högt upp och rörer dem hastigt, samt liksom släpar sig på detta sätt långsamt från en upphöjd plats till en annan. Han träffas under denna årstid blott ensam eller parvis. Om hösten slå sig flera familjer tillsammans och ströfva i stora skaror från ett åkerfält till ett annat. Om vintren, då snön betäcker marken, infinna de sig på gödselhögarne, på vägarna vid hästspillningen, vid lador och sädestackar m. m. Deras flygt är då utmärkt hastig, och de gifva under flykten ett eget smackande läte med näbben. De bada sig i vatten, äfven om vintren, och de hvila sig i träden vid vägarne och gårdarna.

Födämnena: Deras hufvudsakliga näring består i korn, hafra och andra sädesslag, samt växtfrön. Om sommaren förtära de insekter och larver, och dermed uppföda de äfven sina ungar.

Fortplantning: Sitt bo bygga de nära marken bland mossor och gräs eller bland säd, på åkrar, åkerrenar och ängar. Det är konstlöst sammanlagdt af torrt gräs samt inuti fodradt med hästhår. Äggen 5 — 6 blekgrå med askegrå, bruna och svarta fläckar och strek som oftast äro störst och sammanlöpande på den tjockare ändan. De variera otroligt och man träffar sällan i samma bo två fullkomligt lika ägg.

Jagt och fångst: Om vintren då marken är betäckt med snö, blottar man en plats vid en lada eller på en gård och strör derpå agnar samt säd och frön. Kornsparfvarna samlas då snart i sällskap med Gulsparfvar och åtskilliga Finkarter. Man fän-

gar dem der i stort antal med *slagnätet*, eller skjuter dem med fogeldunst. Äfven skjuter man dem höst och vinter i träden, men de sitta sällan så tätt att man får flera i hvart skott.

Nytta: De äro feta och ganska läckra.

2. Gulsparfven. (*Emberiza citrinella*, L.)

Artm. *Hufvudet* hos hannen gult, hos honan olivfärgadt, svartfläckigt. *Undre kroppsdelarna* gröngula. *De två yttersta stjärt pennorna med en vit vigglig fläck i inre fanet vid spetsen* *). Längd 7 tum.

Emberiza citrinella, Lin. Fn. Sv. p. 48. — Retz. Fn. p. 240. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 166. — Lath. Ind. I. p. 400. — *Le Bruant*, Buff. Ois. 4. p. 342. t. 8. — Pl. enl. 30. f. 1. — *Yellow Bunting*, Lath. Syn. 3. p. 170. — *Goldammer*, Bechst. N. D. 3. p. 252. — Sv. Gröning; Skån. *Gulsparf*, *Gulspink*. Norr. *Gulspurr*.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet ofvan och på sidorna samt halsen framtill skönt gula. En liten svartaktig fläck på hvardera sidan af pannan samt svarta långslinier på hjessan och nacken. Hos mindre gamla individer går ett bredt grönt strek med svarta smålinier på hufvans sidor bort åt nacken. Örontrakten omgifves baktill af en mörkt brun fläck. Bröstat upptill rödbrunt, ofläckadt. Bakre delen af bröstet samt magen gröngula, ofläckade. Sidorna med långsgående svarta strek. Halsen ofvan samt ryggen och skuldrorna gråaktigt rödbruna med svarta fläckar på rygg och skuldror. Öfvergumpen skönt rödbrun, ofläckad. Vingpennorna och de större täck-

*) Denna sista karakter är gemensam för flera arter.

fjädrarna svartaktiga med rostgrå kanter; de minsta täckfjädrarna med olivgröna kanter. Stjerten klufven, svartaktig med en vit kilformig fläck i inre fanet på de två yttersta pennorna. Undre stjerttäckarne blekt gula med gråbruna fläckar och svarta spolar. — Näbben ofvan svarthrun, inunder gråaktig, Iris mörke brun. Benen gulaktiga med brunaktiga tår. Längd 7 — $7\frac{1}{4}$ tum; vingbredden 11 tum. Stjerten utom vingarna $1\frac{3}{4}$ tum.

Honan: $6\frac{1}{2}$ — 7 tum. Det gula på hufvudet är beströdt med talrika svarta långsstrek; på underhakan och halsen med svarta småfläckar. Bröstat ofvan rostgråaktigt med svartaktiga småstrek. Sidorna med större svarta långsfläckar. Öfvergumpen med svartaktiga fläckar och dess rödbruna färg mindre liflig.

Unge före ruggningen: Öfvan beströdd med svarta fläckar och med gröngula fjäderkanter, inunder smutsigt gröngul med talrika svartaktiga fläckar på hals, bröst och sidor. Öfvergumpen rödbrun med svarta fläckar. De inre vingpennorna och de medlersta stjertpennorna med breda rödbruna kanter; de yttersta med smala gula. Näbben ofvan brun, inunder samt benen köttfärgade.

Varierar tillfälligtvis: 1:mo helt blekgul, enfärgad. I denna dräkt liknar han på afstånd en *Karnariefogel*. 2:do vingarnas täckfjädrar blekgula.

Vistelseort och lefnadssätt: Gulsparfven bebor om sommaren skogsbyn, lundar och busktrakter som gränsa till fält. Mera sällan förekommer han midt inne i stora och bergiga skogar; och aldrig

under denna årstid på kala och från all skog blottade fallt. I Skånes skogstrakter är han allmän; äfven förekommer han i det medlersta Sverige och i Norrige ända till fjällryggen. Norr om denna är han mindre allmän, men träffas dock äfven norr om Trondhiem, samt upp emot polcirkeln. Om hösten i September månad börjar han att infinna sig på Skånska slättbygden, och qvarblifver der under hela vintren i sällskap med Kornsparfven och Husfinken. Liksom dessa träffas han då på gödselhögar, gator och vägar, vid lador, stall, sädes-stackar m. m. — Dess sång, som han endast låter höra om våren och sommaren, isynnerhet mot aftonen, från ett träd eller från toppen af en buske, är välljudande och består af följande toner; *titti-titti-titti-ty-y!* Om sommaren uppehåller han sig gerna i de tätaste buskar och hoppar ofta bland löfven under dem, liksom Sångtrasten.

Födämnen: Om hösten och vintren lefver Gulsparfven af sädeskorn och åtskilliga slags växtfrön; hvilka han stundom uppsöker i hästspillningen på vägar och gödselhögar. Om sommaren förtär han derjemte insekter och larver, och dermed föder han äfven sina ungar.

Fortplantning: I en låg buske nära marken, eller ock under en buske bland gräs och mossor, bygger Gulsparfven sitt bo. Det består af gräshalm, och är inuti belagdt med hår. Äggen 4 — 5 gråaktigt hvita eller blekgrå, med bruna och svarta ådror, samt merendels fläckar af samma färg.

Fångst: Man fångar honom på samma sätt som föregående. Emedan han är mindre skygg, kan man äfven om vintren der man strött hafra o. d. fånga honom under ett Säll som man uppställer med en pinne i hvilken man bundit ett snöre, hvarmed man, då man behagar, kan nedfälla Sället. — Med limspön fångar man honom äfven lätt.

Nytta: Köttet är förträffeligt.

3. *Ortolan-Sparfven.* (*Emberiza hortulana*, Linn.)

Artm. Hufvudet och halsen ofvan askegrå med olivgrön anstrykning; ögonkretsen och strupen gula; andra kroppsdelarna brunröda.

Längd $6\frac{1}{4}$ — $6\frac{1}{2}$ tum.

Emberiza hortulana, Lin. Fn. Sv. p. 84. — Lath. Ind. Orn. I. p. 399. — Nils. Orn. Sv. I. p. 164. — *Emberiza Mälbyensis*, Sparrm. Mus. Carlss. tab. 21. — *Ortolan*, Buff. Ois. 4. p. 395. t. 14. — Pl. enl. 247. f. 1. — *Ortolan-Bunting*, Lath. Syn. 3. p. 166. — *Gartenammer*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 283. — Sv. *Ortolan*.

Beskrifn. *Hannen:* Hufvudet och halsen ofvan och på sidorna samt bröstet upptill askegrå med olivgrön anstrykning. En fläck kring ögonen, samt strupen gula, ett strek från hvardera näbbviken har samma färg och skiljes från den gula strupen genom ett svartaktigt strek. Kroppen ofvan gråaktigt rödbrun med långsgående svarta fläckar på främre ryggen och svartaktiga linier på de bakre stjärtäckarna. Bröstet, magen, sidorna och undergumpen brunröda med grå fjäderkanter. Vingpennorna och deras

större täcksjädrar svarta, kantade med rostgrått. Stjerten svartaktig; dess två yttersta pennor i inre fanet från spetsen nästan till midten hvita, eller ock bildar den hvita färgen ett band som går mycket snedt från spetsen af inre fanet till midten af det yttre. — Näbben köttfärgad, ofvan mörkare, inunder ljusare. Benen köttfärgade. Iris brun.

Honan har talrika bruna strek åt fjäderspolarerna på hufvudet och halsen. Ögonkretsen, strupen och en del af framhalsen blekgula. Bröstit upptill tecknad med bruna fläckar; för öfrigt blekt rödbrunt; magen ännu blekare. Öfra kroppsdelarna mindre mörka.

Ungarna likna honan: men ha det gula på strupen mer blandadt med grått.

Vistelseort och lefnadssätt: Ortolanen förekommer isynnerhet i de södra och västra trakterna af vår halfö. Han tycker mest om gles buskmark, der björkar och enbuskar finnas. Äfven träffas han i tätare björkskogar samt i skogsbrynen. Han förekommer talrikt på vissa ställen i Skåne t. ex. vid Hör, Billinge, Bårslöf, Engelholmstrakten o. s. v.; i Halland t. e. vid Fröllinge, på Asahed m. m.; i Bohuslän; i Norrige kring Christiania och på Hedemarken, äfven ses han hela vägen uppåt ända till Dowrefjäll; men norr om detta fjäll har jag ingenstädes träffat honom *). — Som flyttfogel anländer han till Skåne

*) H:r Boie (i Reise d. Norw. p. 257.) förmodar att det var denna art som han vid Bodö träffade tillsammans med *Ember. Schœniclus*. Sannolikare synes mig att det var *Ember. rustica*; ty den lär i Norden ofta finnas, men aldrig Ortolanen, tillsammans med Säfsparfven.

i böijan af Maji, och vid Christiania sjunger han redan före medlet af Maji. Då han sjunger sitter han på grenen af ett träd eller i toppen af en buske: Dess sång är ganska välklingande och har likhet med Gulsparfvens; men på sista tonen skiljer man den lätt. Den kan igenkänneligt uttryckas med stafvelsena: *tink, tink, tink, tink, tjöhhrr!* Den sista tonen *tjöhhrr* är djup och grof, samt skiljes ganska lätt från Gulsparfvens ljudande: *ty-y!* Äfven de första tonerna äro mindre raska, mer ensliga, men också mer lena och ljufva än Gulsparfvens. Man hörer dess sång så väl om dagen som långt in på natten, och under hela sommaren, med undantag af den tid då ungarna uppfödas. Sedan dessa äro utflugna och kunna föda sig sjelfva, hörer man åter de gamla sjunga. — I Augusti och September flyttar han bort.

Födämnen: Under den tiden han uppehåller sig hos oss, lefver han isynnerhet af insekter och larver, hvarmed han äfven uppföder sina ungar. Eljest förtär han också åtskilliga slags växtfrön och säd.

Fortplantning: Sitt bo lägger han bland gräset under en buske. Det består af grässtrån och hyser 4 — 5 blekgrå ägg, glest beströdda med större och mindre svarta punkter eller fläckar, samt andra otydliga gråaktiga.

Nytta: Om hösten äro Ortolanerne mycket feta och deras kött utmärkt läckert. I Italien och Frankrike fångas de om hösten i mängd. De mesta fångas likväl på Cypern, förvällas i hett vatten, inläggas

derefter i kryddor och ättika samt skickas på fat inlagda till Europas större städer.

Anm. I Bechsteins Naturg. Deutschl. 3. p. 291. läser man att "Ortolanen blir i Sverige, för sin förträffliga smak, stundom betald med enDukat". — Om han än icke finge mer än hälften så mycket, skulle dock en skickelig fogelfångare inom få år kunna bli en ganska rik man; ty här är visst ingen brist på Ortolaner.

4. Säfsparfven. (*Emberiza Schoeniclus*, L.)

Artm. *Ofvan rödbrun med svarta fläckar; under vit med bruna strek på bröstet och sidorna. Hufvudet och framhalsen på hannen svarta; det förra på honan rödbrunt med svarta fläckar.*

Längd 6 tum.

Emberiza Schoeniclus, Lin. Fn. Sv. p. 84. — Syst. Nat. 311. n. 17. — Lath. Ind. I. p. 402. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 168. — *Ortolan de roseaux*, Buff. Ois. 4. p. 315. — Pl. enl. 247. f. 2. (Hannen). och 497. f. 2. (Honan). — *Reed Bunting*, Lath. Syn. 3. p. 173. n. 9. — *Rohrhammer*, Bechst. N. D. 3. p. 269. — Sv. *Säfsparf*, Norr. *Rör-spurf*.

Beskrifn. *Hanne om våren*: Hela hufvudet samt halsen framtill svarta, med ett smalt hvitt strek som uppkommer vid näbbvinkeln, löper nedåt sidan af halsen och omgifver halsryggen. Ryggen, skuldrorne och vingtäckarne svarta med rödbruna fjäderkanter. Öfvergumpen askegrå med svarta fläckar. Bröstet, magen och undergumpen hvita med långsgående bruna strek på bröstet och sidorna. Vingpennorne och deras täckfjädrar svartbruna med rödbruna fjäderkanter, hvilka isynnerhet på vingtäckarne och de inre pennorne äro mycket breda. 2:dra, 3:dje och 4:de vingpennan längst lika långa; 1:ste och

5:te något kortare och lika långa. De små vingtäckarne skönt rödbruna. Stjerten svartaktig, något klufven; den yttersta stjertpennan i yttre hälften snedt hvit, dock i yttre fanet nära spetsen brun; den andra med en vigglik hvit fläck; det medlersta paret med breda rostgrå kanter. Längd 6 tum; vingbredden $9\frac{1}{2}$ tum. Näbben svart, inunder gulaktig. Iris mörkbrun. Benen gråbruna.

Honan: Ofvan svartaktig med fjäderkanterna på hufvudet rostbruna, på halsen askegrå och på ryggen och vingtäckarne rostgulaktiga. Öfvergumpen askegrå med bruna långsfläckar. Öfver ögat ett rostgulaktigt strek. Kinder och tinningar bruna. Från underkäken på hvardera sidan af strupen ett hvitt band som böjer sig uppåt kring tinningen. Undre kroppsdelarna hvita med svartaktiga, på halsen nästan sammanlöpande, fläckar, på bröstet långsstrek. På de två yttersta stjertpennorne en lång hvit vigglik fläck. — Näbben svartaktig.

Hannen i höstdrägt: Hela hufvudet samt halsen framtill svarta, med rödbruna fjäderkanter på hufvudet och rostgrå på strupen och halsen, hvilka nästan helt och hållet betäcka det svarta. Ett gulbrunt band går öfver ögonen, och en mörkbrun fläck genom ögonen utvidgar sig på tinningarna. Ett hvitaktigt strek börjar från underkäken, böjer sig kring tinningarna och omgifver ehuru otydligt halsryggen, der hvarje dess fjäder slutas med en rostbrunaktig kant och en liten brun fläck. Öfvergumpen rödbrun. För öfrigt lik hannen om våren.

Anm. Äfven denna art ruggar ej mer än en gång om året, neml. om hösten; men Hannen fäller mot våren de rostbruna fjäderkanterna på hufvudet, framhalsen och halsryggen.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna art tillbringar, enligt min erfarenhet, aldrig sommaren eller fortplantar sig, i de sydliga trakterna af vår halfö. Under denna årstid förekommer han deremot i Rikets medlersta landskap, och i halföns nordligaste delar. Inom och i grannskapet af polcirkeln finnes han talrikt både i dalbygderna och på fjällens sidor vid vatten bland rör, säf och buskar. Isynnerhet träffas han bland de små björkarna och videbuskarna vid bergens fot. Då han sjunger sitter han i högsta toppen af en buske. Dess sång har likhet med Ortolanens: *zi, zi, zi, zi*; men då denna slutas med ett gröfre *zörr!* slutas Säfsparfvens deremot med ett qvitter. Om hösten och våren flyttar han från och till Norden. Om våren mot slutet af April och i början af Maji träffas han parvis i pilhäckarne och busktrakterna i Skåne. Om hösten mot slutet af September träffas han åter familjvis i pilhäckarna, i buskarna och bland kålen i kåltäpporna i det södra Skåne. Han har således vid denna årstid fullkomligt samma vistelseort som Äng-piplärkan, hvilken han äfven i storlek, färg och flygt temligen liknar, så att han på något afstånd är svår att skilja derifrån. Men locktonen förråder honom snart. Denna består i ett långdraget, ängsligt: *küv*, då Äng-piplärkans är ett hastigare och raskare *zit-zit-zit!* eller *'st, 'st, 'st!*

Födännen: Växtfrön, isynnerhet af sådana växter som finnas vid sidan af vatten. Ungarna uppfödas med insekter.

Fortplantning: Boet lägges bland rör eller högt gräs nära marken; stundom mellan trädrötter vid sidan af vatten. Äggen 4—5 grå något stötande i grönt med svartbruna fläckar och krokiga strek.

5. Vide-Sparfven. (*Emberiza rustica*, *Pall.*)

Art m. Ofvan rödbrun med svarta fläckar på ryggen; under vit med brunröda fläckar på bröstet. Hufvudet på Hannen svart. (på Honan svartaktigt) med ett hvitt (eller rostgrått) långsgående strek öfver hjessan och ett hvitt band öfver ögonen till nacken.

Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Emberiza rustica, Pallas Reise durch Russl. 3 Theil. s. 698. n. 21. (Hannen). — Gmel. Syst. Nat. 1. 2. p. 871 n. 29. — Lath. Ind. Orn. I. p. 413. n. 51. — *Emberiza Schoeniclus* variet. Nilss. Orn. Svec. I. p. 170. (Honan, varietet.) — *Der Bauernammer*, Lath. Syn. Uebers. von Bechst. 3. p. 210. n. 68. — *Emberiza borealis*, Zetterst. Resa genom Lappm. I. p. 107. t. 1 och 2.

An m. Denna Sparfart blef först funnen af Pallas i Dawurien (i Siberien) år 1773 och Hannen beskrifven i dess Resa p. a. st. — En Hona af samma art blef skjuten här vid Lund i April 1814 och i Ornith. Svecica beskrifven som varietet under *Emb. Schoeniclus*, hvars hona hon mest liknar; dock med den yttrade förmodan att den tillhörde en egen Art. Honan af denna art var förut aldrig beskrifven; ty Pallas hade blott beskrifvit Hannen. — Hr Mag. B. Fries upptäckte och sköt ett par, Hanne och Hona, af samma art, vid Haparanda i Maji månad 1821. Dessa beskref Hr Zetterstedt och lät afrita i sin Resa p. a. st. såsom en ny fogelart. Att Hr Zetterstedt häri misstog sig var försläktigt, ehuru Pallas's beskrifning öfver Hannen ord från ord inträffar med det exemplar Hr Zett. mottagit af Hr Fries, för att

beskrifva, och hvilket nu förvaras på Museum i Lund; men sämre är det att Hr Z. både i Artmärket och Beskrifningen öfver hannen utlemnade det mest karakteristiska kännetecknet, neml. det längsgående hvita streket åt hjessan. Detta är icke heller utsatt på någon af figurerna.

Beskrifn. *Hannen i vådrägt:* Hufvudet ofvan och på sidorna svart med rostgrå fjäderkanter i pannan. Från näbbroten midt åt hjessan till nacken går ett smalt hvitt strek, som i nacken utvidgar sig till en bredare fläck; från näsborrarna öfver ögat och öfver örontrakten står ett bredt hvitt band. Halsryggen, de små vingtäckarna samt öfvergumpen vackert brunröda, ofläckade. Ryggen, de större vingtäckarne och de innersta vingpennorna svarta med brunröda fjäderkanter. De två större raderna af vingtäckare i spetsen kantade med hvitaktigt, hvar igenom ett dubbelt hvitaktigt tvärstrekk öfver vingen uppkommer. Underhakan, halsen framtill samt alla undre kroppsdelar hvita med rostfärgade nästan sammanlöpande fläckar på främre delen af bröstet och på sidorna. Vingpennorna mörkbruna; de af 1:sta ordningen utvändigt smalt kantade med grått; 2:dra längst; 1:sta och 3:dje nästan af samma längd; 4:de föga kortare. Stjertpennorna svartaktiga; den yttersta i yttre hälften snedt hvit ända till roten, dock i yttre fanet vid spetsen brun; den andra med en smal, vigglik, lång, hvit fläck från spetsen framåt; det medlersta paret med breda rostgrå kanter. — Längden $5\frac{1}{2}$ tum. Näbben till formen som Säf-sparfvens, men något större och mer långdragen, ofvan brun, under gul. Benen gulaktiga.

Honan har mindre rena färger: Hufvudet svartaktigt med rostgrå fjäderkanter och ett rostgrått långsgående band från pannan till nacken. Bandet öfver ögat till nacken samt fläcken i nacken äro smutsigt hvita. På tinningarna en stor fläck, midtuti rostgrå, i kanterna svart. Strupen smutsigt hvit med små svartaktiga fläckar på sidorna (liksom hos *Anthus pratensis*); på bröstet och kroppssidorna stå rödbruna fläckar. Halsryggens, de små vingtäckarnes och öfvergumpens rödbruna färg mindre liflig än hos Hannen. Ryggfjädrarnas kanter mer rostgrå.

Variet. Stjertens 2:dra penna *stundom* ofläckad.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sparfart är, liksom Säfsparven dess närmaste anförvandt, en flyttfogel som mot vintren flyttar åt Södren och om våren återvänder till sitt nordliga hem. Han tillbringar sommaren i de nordligare delarna af Europa och Asien. Han vistas då bland videbuskarna i grannskapet af vatten. Redan i Mars månad finnes han i mängd bland videbuskarna i Da-urien; i April träffas han stundom, men högst sällan i pillhäckarne i Skåne i sällskap med Säfsparfven; och i Maji är han funnen i sällskap med samma fogelart i grannskapet af Torneå *). I lefnadssättet, liksom i färgen, synes han hafva mesta likhet med Säfsparfven.

Födämnena: Om våren växtfrön.

Fortplantning: Okänd.

*) Högst sannolikt träffas han om sommaren på flera ställen inom och i grannskapet af polcirkeln. Jag har förut yttrat min förmodan att det var denna Sparfart som Hr Boie såg vid Bodön i sällskap med Säfsparfven. Boies Reis. p. 257.

2:dra Underafdelningen. Sparfvar
med sporre.

Baktåns klo längre än tån, och temligen rak.

De vistas på öppna fält eller på nakna berg.

6. Snösparfven. (*Emberiza nivalis*, L.)

Art m. Vingpennorna af andra ordningen, kroppen under och de tre yttersta stjärt pennorna rent hvita; de sistnämnde med en svart fläck i spetsen. Hufvudet och halsen hvita, stundom med kastanjbrun anstrykning. Ryggen svart, stundom med rostgrå fjäderkanter. Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Emberiza nivalis, Lin. Fn. Sv. 82. — Fabric. Faun. Groenl. p. 117. — Retz. Fn. p. 237. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 160. — Faber Prodröm. der Isländ. Orn. p. 15. — *L'Ortolan de neige*, Buff. Ois. 4. p. 329. Pl. enl. 497. f. 1. — *Snow-Bunting*, Lath. Syn. 3. p. 161. — Edw. Av. t. 126. — *Der Schneeammer*, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 305. — Sv. *Snösparf*, *Snölärfka*, *Sjölärfka*; Dal. *Illvärsfögel*; Upl. *Hårdvärsfögel*; Norr. *Sneefugl*, *Sne-Spurr*, *Sneetit*.

Beskrifn. *Hanne i sommardrägt*: Hela hufvudet, halsen, öfvergumpen och alla undre kroppsdelar, äfven som de medlersta vingpennorna och deras täckfjädrar rent hvita. Ryggen och skulderfjädrarna glänsande svarta, stundom med spår till hvitgrå fjäderkanter *). De tre innersta vingpennorna,

*) Alla fjädrarne på dessa delar äro vinkelformigt tillspetsade och man ser tydligt att kanterna äro bortfallna.

lillvingen samt yttre hälften af de 8 första vingpennorna svarta med hvitaktiga kanter. De tre yttersta stjärtpennorna hvita med en svart längsfläck i yttre fanet vid spetsen; den fjärde svart med yttre fanet hvitt och med hvita fläckar i inre fanet; de öfriga svarta. — Näbben svart. Benen svarta. Iris mörkbrun. 1:sta vingpennan längst; 2:dra föga kortare; 3:dje litet kortare o. s. v. — Längd $6\frac{1}{2}$ — 7 tum; vingbredden $12\frac{1}{2}$ tum.

Hona: Det hvita hufvudet och halsen ofvan skuggade med kastanjbrunt; på bröstet en gördel af samma färg. Ryggen, skuldrorna och de innersta vingpennorna svarta med blekt rostbruna fjäderkanter. Vingpennorna och de medlersta stjärtpennorna kantade med hvitaktigt. Det öfriga som hos hannen.

Hannen om vintren: Är mer lik honan: Ryggens, vingarnas och stjärtens svarta fjädrar hafva en bred rostgrå eller blekt askegrå infattning. Hufvudet, halsen och tinningarna skuggade med kastanjbrunt. Öfvergumpen med kastanjbrun anstrykning och svarta fläckar. Näbben gul med svart spets.

A n m. Från November till Mars varar vinterdräkten; från April till Oktober sommardräkten.

Ungärna: Ofvan dunkelt rödbruna med svarta fläckar på ryggen och skuldrorna; hufvudet ofvan kastanjbrunt; halsens sidor och strupen brungrå; öfra bröstet isynnerhet på sidorna kastanjbrunt; det öfriga bröstet samt magen och undergumpen hvitaktiga med rostbrun anstrykning; vingtäckarne med hvitaktig in-

fattning. Vingpennorna mörkbruna; de af andra ordningen hvitaktiga, i yttre fanet och mot spetsen bruna med hvitaktig infattning. Stjertpennorna svartbruna; de två yttersta hvita, vid roten och i yttre fanet vid spetsen bruna; den tredje brun med ett hvitt strek längs åt spolen; de öfriga kantade med rödbrunt.

Vistelseort och lefnadssätt: Snösparfven tillbringar sommaren i de nordligaste trakterna af vår halfö, bland Lapplands och Norriges fjäll. Mot vintren, stundom redan före medlet af November, infinner han sig i stora skaror i de södra Landskapen, och träffas der på fälten och vägarna merendels under hela vintren. Ju kallare vintren är, desto talrikare förekommer han; men under mycket lindriga vintrar ser man honom sällan. Sällan sätter han sig i ett träd eller på ett tak; vanligen löper han på marken och plockar frön af fältväxterne och sädeskorn af häst-spillningen på vägarna. Vid vårens analkande återvänder han till Norden *). Här tillbringar han sommaren och fortplantar sig på fjällen bland de nakna klipporna och i fjälldalarna, samt går ända upp bland drifvorna af den ständigt qvarliggande snön. Redan i början af Mars begynner Hannen att qvittra på snön, och om sommaren sjunger han angenämt. (Faber.) — Dess sång har mycken likhet med Lärkans (Boie).

*) Dock lemna ej alla sina nordliga sommar-stationer om vintren. Jemför Faber p. a. st. och Lcem Lappm. sid. 255.

Födännen: Om sommaren lefver han mest af insekter och larver; om hösten och vintren förtär han frön och sädeskorn.

Fortplantning: I Maji och i början af Juni finner man dess näste i stenklyftor bland bergen. Det består utvändigt af gräs och är inuti fodradt med fjädrar och hår. Äggen 5 hvitaktiga beströdda med bruna och grå fläckar, isynnerhet kring den tjockare ändan. Man träffar redan fullväxta Ungar i Juli.

Nytta: Köttet är läckert och sundt.

7. Lapp-Sparfven. (*Emberiza Lapponica*, Quens.)

Art m. *Ofvan svart med rostfärgade fjäderkanter; inunder hvit. Hufvudet, framhalsen och bröstet på Hannen svarta, på Honan rostgrå med svarta fläckar. Stjertpennorna svartaktiga med en hvit fläck på de två yttersta.* Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Emberiza Lapponica, Quensel Svensk Zool. I. tab. 2. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 157. — *Fringilla Lapponica*, Lin Fn. Sv. p. 86. — Fabric. Fn. Gröen. p. 119. — *Fringilla calcarata*, Pall. Resa 2. p. 710. n. 20. t. E. — Grauer Spörner, Bechst. N. D. 3. p. 246. — *Plectrophanes calcaratus*, Mey. Zusätze zum Taschenb. p. 57.

Beskrifn. *Hanne i sommardrägt:* Hufvudet ofvan och på sidorna, underhakan, halsen framtill och en del af bröstet rent svarta och glänsande. Från näsborrarna öfver ögat till sidan af nacken går ett rostgult band och i nacken finnas fläckar af samma färg. Halsryggen vackert brunröd. Ryggen, skuldrorna och vingtäckarne svarta med rostfärgade fjäderkanter. Mellan den brunröda halsryggen och den

svarta framhalsen nedlöper på sidan ett hvitt band. Undre delen af bröstet, magen och undergumpen hvita; sidorna tecknade med svarta fläckar och strek. Vingpennorna mörkbruna; de af första ordningen, isynnerhet den 1:sta, utvändigt kantad med hvitt; de af andra ordningen i spetsen med en bredare hvit infattning. Stjerten något klufven, dess pennor svartaktiga, den yttersta med en hvit fläck som går snedt öfver hela pennan; den andra med en spetsig hvitaktig fläck i ändan; de två medlersta kantade med grått. Iris och benen bruna. Näbben gul med svart spets. Längd $6\frac{1}{2}$ tum. Vingpennorna 1, 2, 3, längst, lika långa. Baktåns klo mycket lång och föga krökt, liknar en Lärkas.

Honan: Hufvudets och ryggens fjädrar svartaktiga med rostgrå kanter; halsryggen och öfvergumpen rostgrå med svartaktiga småfläckar. Hufvudets sidor med en svart, inuti rostbrun fläck. Från näbben öfver ögat går ett hvitaktigt i rostgrått stötande band som fortsättes bakåt och nedgår kring tinningfläcken. Halsen framtill, öfra delen af bröstet och sidorna smutsigt hvita stötande i rostgrått; bröstet och kroppssidorna med talrika svartaktiga fläckar. Magen och undergumpen hvita ofläckade. Vingarna och stjerten som hos Hannen.

Vistelseort och lefnadssätt: Lappsparfven tillbringar sommaren i de nordligaste trakterna af vår halfö; men han synes endast tillhöra de inre delarna af landet. I kustbygderna af Norrige träffas han icke, men på fälten och i skogarna i Lappland

förekommer han under sommaren, dock mindre allmänt. Mot vintren flyttar han åt sydligare länder och om våren i Maji månad återvänder han till sin nordliga hembygd. Dess tåg från och till Lappland tyckas gå öfver Finland och Ryssland; ty han träffas aldrig, ej en gång under flyttiden, i det södra Sverige. — Under denna tid förekommer han i flockar på åkrarne i Norrland och det södra Lappland. Dess gång är ej hoppande som de egentliga Sparfvarnes och Finkarnes, utan han löper på marken liksom Lärkorna. Dess lockton, som han under flygten låter höra, är ett starkt och kort pipande eller hvissling (Qvens.). Dess flygt liknar Hämplingens. Dess sång säges äfven hafva likhet med Hämplingens och vara vacker. Under sången sitter foglen icke på marken utan fladdrar i luften, liksom Lärkorna. (Fabr.)

Födämnen: Västfrön.

Fortplantning: Nästet bygges på någon tufva i sumpiga trakter. Det är konstlöst sammanlagdt af gräs och mossor samt inuti fodradt med fjädrar. Äggen 5—6 smutsgula liknande trippel med mörkare fläckar.

Finksläktet. (Fringilla, Illig.)

Näbben kort, alldeles kegelformig, rak, spetsig; öfverkäken utan ryggkant, lika bred eller bredare än underkäken och den förras kanter gående utom den sednares. Käksömmen rak eller föga böjd, bildar ingen vinkel, och gommen saknar benartad knöl.

Näsborrarna vid näbbroten, små, runda, täckta med småfjädrar från pannan.

Benen korta.

Vingarna: 1:sta, 2:dra och 3:dje vingpennorna nästan lika, dock merendels 2:dra eller 1:sta längst.

Stjerten merendels urnupen eller tvåklufven.

Dessa foglar lefva isynnerhet af växtfrön och kärnor, hvilka de förut med näbben afskala. En del förtära derjemte om sommaren Insekter, och uppföda dermed sina ungar. De flesta bebo skogar som gränsa till fältt, andra uppehålla sig vid husen och gårdarna. Vanligen lägga de två eller tre kullar om året. Om hösten samla de sig i flockar. De kunna lätt tämjas. De flesta hafva en angenäm sång.

I. Stenknäckar. (Coccothraustes).

Näbben bildar en tjock och kullrig kegle; öfverkäken något längre och i spetsen obetydligt nedböjd:

1. Stenknäck-Finken. (Fringilla Coccothraustes, Ill.)

Artm. Näbben mycket stor och tjock. Hufvudet och öfvergumpen rödbruna; manteln kastanjbrun; strupen, infattningen kring näbbroten samt trakten mellan ögonen och näbben svarta. En aflång fläck på vingen, och stjertpennorna i spetsen hvita.

Längd, $6\frac{3}{4}$ — 7 tum.

Loxia Coccythraustes, Lin. Fn. Sv. p. 80. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 127. — Lath. Ind. I. p. 371. — *Le Gros-bec*, Buff. Ois. 3. p. 444. t. 27. f. 1. — Pl. enl. 99 — 100. — *Gros-beak*, Lath. Syn. 3. p. 103. n. 4. Suppl. p. 148. — Edw. av. t. 188. — *Kirsch-kernbeisser*, Bechst. N. D. 3. p. 35. — Sv. *Stenknäck*.

Beskrifn. Näbben om sommaren ljus blågrå, underkäken inunder hvit; om vintren blekt köttfärgad med svartaktig spets; den är utmärkt undersättsig och bildar en tjock kon; käksömnen något bågbojd samt öfverkäken något längre och i spetsen litet nedböjd. Ögonen små. Iris perlfärgad. Benen blekt köttfärgade.

Hela föglen utmärkt undersättsig, tjock och kort. Stjerten temligen kort, och i spetsen något urnupen. Vingarna medelmåttiga; 1:sta vingpennan nästan lika med 2:dra och 3:dje som äro längst; 4:de föga kortare.

Gammal Hanne om våren: Öfvergumpen, de öfra stjerttäckarne och hufvudet gulaktigt rödbruna med blekare panna. Infattningen kring näbbroten, ett strek från näbben till ögat samt en stor fläck under hakan rent svarta. Ett bredt askegrått band kring halsryggen. Rygg, skuldror och de tre innersta vingpennorna kustanjbruna. Halsen framtill, bröstet och magen rödbrunaktigt askegrå. Vingarna svarta med en stor aflång hvit fläck, som härrör af täckfjädrarna. Vingpennorna med en stor hvit fläck i midten af inre fanet och mot spetsen glänsande stålblå; de medlersta (5 — 16) i ändarne liksom afhuggna och

kantigt utskurna. Stjertpennorna från roten till midten samt i yttre fanet svarta; för öfrigt hvita. De medlersta i yttre fanet rödbruna. De undre stjerttäckarne och undergumpen i midten hvita.

Honan har mattare och dunklare färger; dess vingfläck är gråaktigt hvit; de inre vingpennorna i yttre fanet askegrå. Hufvudet gråaktigt kastanjbrunt; de undre kroppsdelarna askegrå, blott på bröstet och sidorna med rödbrunaktig anstrykning.

Ungarna om hösten: Hufvudet, sidorna och halsen, bröstet och kroppssidorna rödbrunaktigt grå; dock är hufvudet mörkare. Strupen svartbrun. Ryggen kastanjbrun. Vingfläcken smutsigt hvit. Vingpennorna svartbruna, i yttre kanten askegrå. Näbben köttfärgad med svartbrun spets.

Vistelseort och lefnadssätt: Stenknäcken förekommer blott i de södra och vestra trakterna af halfön, och äfven der är han temligen sällsynt. Hittills har jag blott sett honom i Skåne och Halland. Som flyttfogel anländer han till oss i första hälften af April och träffas då familjvis i Skånes trädgårdar. Likväl flytta icke alla; ty man träffar en och annan äfven midt under vintren. Om sommaren vistas han och fortplanter sig i skogarna, och mot hösten då körsbären mogna besöker han åter familjvis de trädgårdar hvari dessa finnas.

Dess flygt är temligen snabb, oaktadt han är utomordentligt undersättsig och tjock samt har korta vingar; men han flyger med täta vingslag och synes under flygten använda mycket bemödande. De i

spetsen utbredda och tvära vingpennorna kunna äfven bidraga att öka styrkan i de korta vingarna. Om våren sätter han sig ofta i högsta trädtoppen, vänder sig än hit än dit och lockar på detta sätt honor till sig. Om hösten och under sträcktiden hoppar han merendels bland grenarna. Dess lockton är ett fint pipande : *its* eller *tziss*, och då han flyger ropar han *zick, zick!* Han är ganska skygg och låter ej gerna Jägaren komma nära.

Födämnen: Dessa bestå i åtskilliga slags frön och kärnor t. ex. frön af ask, lönn, fur och gran; hampfrön, roffrön, kålfrön o. s. v. kärnor i rönnbär, oxelbär m. m. Då körsbären mogna går han med begärlighet efter dem. Likväl förtär han ej själva bären eller det så kallade köttet, utan han låter det falla och behåller stenen, hvilken han med sin starka näbb skickligt klyfver för att derur uttaga och förtära kärnan.

Fortplantning: På träd och buskar isynnerhet i bokskogarna bygger han sitt bo i en klyka mellan några grenar. Det är konstigt sammanflätadt af risqvistar och invändigt fodradt med fina rötter. Äggen 3 — 5 askegrå, skiftande i grönt med bruna fläckar och svartblå strek.

Nytta och skada: Dess kött är förträffligt. — Ett litet sällskap af denna fogelart, kan på en kort tid bortplocka alla körsbären på ett träd. Under detta arbete sitter foglen helt tyst bland löfven och man märker dess närvaro blott på de nedfallande bären.

2. Husfinken. (*Fringilla domestica*, Linn.)

Artm. Hufvudet ofvan askegrått. Kroppen ofvan med svarta och rödbruna fläckar. Ving- och stjertpennorna svartbruna kantade med rödbrunt. Ett enda hvitt band öfver vingen. Längd 6 tum.

Fringilla domestica, Lin. Fn. p. 88. — Retz. Fn. p. 249. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 140. — Lath. Ind. I. p. 432. — *Le Moineau*, Buff. Ois. 3. p. 474. t. 29. f. 1. — pl. enl. 6. f. 1. 2. — *House Sparrow*, Lath. Syn. 3. p. 248. Suppl. p. 163. — *Hausesperling*, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 107. — Sv. Gråsparf, Gråspink; Norr. Hus-Spurv, Huskald.

Beskrifn. Hannen: Hufvan och halsryggen askeblå. Bakom ögonen åt sidan af nacken ett kastanjbrunt band som utbreder sig baktill vid sidan af halsryggen. Bak ögat en liten hvit fläck. Trakten mellan ögon och näbb, samt strupen och halsen fram till svarta, med hvitgrå fjäderkanter ned på halsen. Tinningarna askegrå. Hufvudets och halsens sidor ljus askegrå. Ryggen, skuldrorna och vingarna svarta med breda rödbruna fjäderkanter. De mindre täckfjädrarna enfärgade, skönt kastanjbruna. Den öfra raden af vingtäckare vid roten svarta, i yttre hälften hvita, hvarigenom ett bredt hvitt tvärband öfver vingen. Öfvergumpen grå. Bröst och sidor smutsigt askegråaktiga. Medlersta delen af bröstet och magen smutsigt hvita. Stjertpennorna svartbruna, kantade med rödbrunt. Längd $6\frac{1}{4}$ tum. Stjerten något klufven, räcker $1\frac{1}{4}$ t. utom vingarna. 2:dra och 3:dje vingpennan lika, längst; 1:sta och 4:de lika, föga kortare. Näbben svart. Benen ljus köttfärgade.

Honan gråbrun på hufvud, halsrygg och öfvergump. Öfver ögat till nacken går ett smutsigt ockergult strek. Tvärbandet öfver vingen smutsigt hvitt. Kinderna, halsen framtill och sidorna smutsigt askegråaktiga; strupen och magen hvitaktiga. Näbben ofvan gråbrun, inunder ljusare, vid roten gul.

Varierar tillfälligtvis: A) Helt hvit med hvita ben och näbb. Mus. Lund. Är *Fring. candida* Mus. Carlss. I. t. 20. — B) Med flera eller färre hvita fjädrar inströdda bland de vanliga. — C) gulaktigt hvit med de vanliga färgerna svagt antydda. — D) Svartbrun.

Vistelseort och lefnadssätt: Gråspinken förekommer aldrig i skogarna; utan han vistas alltid vid människors boningar, vid torp, gårdar, byar och städer i Europa från Alperna och Pyrenéerna till Lappland och Nordlanden. På Skandinaviska halfön förekommer han allmänt ända till polcirkeln. Inom denna finnes han mera sparsamt; men han träffas dock ännu vid pass en breddgrad nordligare. På Bodön finnes han, och man påstår att Vågön i Salten skall vara dess nordligaste hemvist i denna kustbygd. På Lofoden och i Finnmarken synes han aldrig. Oaktadt han ingenstädes förekommer i skogarna på obebodda ställen, så träffas han dock vid de ensliga skogstorpen, och han äger en förundransvärd instinkt att genast uppsöka bebodda platser der åkerbruk drifves. Man försäkrar att sällan något nybygge finnes, om det också är anlagdt midt i den vildaste skogstrakt, vid hvilket ej i första eller an-

dra året ett par Gråspinkar infinna sig och inrätta sin bostad.

Vid städer och byar förekomma de talrikt och qvarblifva i samma trakt både sommar och vinter. Om hösten slå de sig stundom sammans i större flockar och besöka de närbelägna åkerfälten samt de vid dem växande buskar och häckar.

Oaktadt Gråspinken ständigt lefver i grannskapet af menniskor, är han dock temligen skygg och misstrogen, isynnerhet om han märker försåt. Dess flygt är snabb; men dess gång ovig och hoppande, och han nästan släpar dervid magen på marken. Dess sång är föga angenäm; den består i ett ofta upprepadt qvitter: *Dip, dack, dack, zitschischi*. Detta qvitter hvarmed Hannen tillkännagifver den annalkande parningstiden, hör man redan i Februari och Mars månader då blidt väder inträffar.

Födämnen: Om våren förtär Gråspinken insekter och larfver, och dermed föder han äfven sina ungar. Om sommaren förtär han frön af åtskilliga växter, samt körsbär, vinbär, gröna sockerärter m. fl. trädgårds växter. När säden börjar att mogna, infinner han sig på åkerfälten och förtär i mängd de mogna kornen. Om vintren föder han sig af frön och säd, som han uppsöker på gårdar, i logar, lador, sädesstackar m. m. Äfven plockar han de korn som finnas i hästgödseln.

Fortplantning: Gråspinken fortplantar sig två eller tre gånger om året. De gamla börja redan att

i Mars månad para sig och tillreda sitt bo. Man känner ingen fogel och i allmänhet intet djur som är så brunstigt som Gråspinken. — Sitt bo lägger han under halmtaken mellan sparrverket, i hål, i murar, i takrännor, under takskägget, i ihåliga träd o. s. v. Det består af hö och halm samt är inuti fodradt med fjädrar och hår. Stundom bemäktigar han sig ett Svalbo, hvilket han då inreder på sitt vis. Man ser lätt om en Gråspink bebor ett sådant; ty då hänga alltid långa halmstrån utom öppningen, liksom ur Gråspinkens egna nästen. Äggen 4 — 6 hvitaktiga stötande i grönt och tätt beströdda med askegrå och bruna prickar; de rufvas vexelvis af begge makarne.

Jagt och fångst: Om hösten då de samlat sig i flock kan man med ett skott fogeldunst nedlägga ett stort antal. Om vintren då snön betäcker marken beströr man en plats på gården med agnar och hafra; Gråspinkarne samlas då snart och sätta sig mycket tätt tillsammans, så att man med passande hagel och med en bössa af temlig grof kaliber kan fälla 40 — 50 i skottet. Äfven om man anlägger ett slagnät vid en sådan med agnar och hafra beströdd plats, kan man fånga en mängd Gråspinkar, Gulsparfvar, Kornsparfvar, Bofinkar m. fl. Har man ej slagnät, så kan man nyttja ett såll hvilket man uppställer med en pinne under kanten, och i pinnen binder man ett snöre, hvarmed man på afstånd kan nedfälla sållet. — I lador och stall fångar man dem om natten på det sätt att en person ställer sig i en

vrå med en lyckta som endast har glas på *en* sida; en annan person drifver med en stång Gråspinkarna fram ur sina gömställen. De flyga då efter ljussketnet vid lycktan, der en tredje griper dem. — Med Limspön kan man, enligt min erfarenhet, lätt fånga dem på följande sätt: Man tager ett träd, t. e. en pilgren af 3 — 4 alnars längd och med många samt utspärrade smågrenar och qvistar. Dessa bortskär man en tum från deras ursprung och tillspetsar stubbarne. Derefter tager man några årsskott af fläder, skär dem i tums långa stycken och fästar ett stycke på hvarje stubbe efter de bortskurna qvistarna. Sedan tillspetsar man sjelfva trädet, gör hål med en jernstång, (om marken är frusen) och sätter det fast i jorden på en gård eller annat ställe der Gråspinkar vistas. Derefter tager man raka tunna pilqvistar af 10 — 12 tums längd, tillspetsar dem i den tjockare ändan, bstryker dem med stark fogellim och sätter dem mycket fast in de nämnda fläderstycken. Sedan drifver man Gråspinkarna sakta mot trädet och det lyckas merendels snart att få en eller annan att sätta sig derpå. Det behöfves ej mer än en; ty så snart denne vill hoppa från den qvist der han satt sig, och märker sig sitta fast, skriker han genast af alla krafter och flaxar med vingarna. De andra Spinkarne som höra dessa nödrop vilja veta hvad som felas kamraten, och samlas kring honom på trädet. Hvar och en som der sätter sig blir fast, och börjar genast på lika sätt skrika med full hals. Inom ett par minuter samlas allt hvad i grannskapet

finnes af Gråspinkar, Gulsparfvar m. m. Det gräsli-gas skriket ditlockar äfven Skator, Kråkor m. fl. som i sin mån bidraga att öka larmet. Limspöträdet blir slutligen så fullt att ej flera Spinkar kunna rymmas derpå *).

Nytta och skada: Köttet, isynnerhet af de yngre kan ätas och är sundt. De rensa fruktträden och marken från en mängd skadliga insekter och larver; men de förtära äfven nyttiga växter, såsom socker-ärter, körsbär, nyss uppkomna köksväxter, frön af hamp m. m. Äfven förtära de säd både på fältet och i ladorna. Deras stora nytta torde dock uppväga den skada de göra. Likväl bör en förståndig Landt-hushållare söka förekomma deras allt för starka till-växt. Då de fått vana att besöka körsbärsträden eller de besådda trädgårds-sängarne, har man ej säk-rare medel att förekomma den skada de der kunna göra, än att kasta ett nät öfver hvarje träd, och äf-ven spanna nät öfver sängarna. Vid skräckbilder el-

*) Till fogellim har jag nyttjat blott Linolja, hvil-ken jag låtit koka i flera timmar, då hon blifvit tjock och seg. Den kokas på glöder utan låga; ty lågan itän-der den genast. Om detta sker släcker man medelst ett lock eller en botten som man lägger öfver kärlet. Att förekomma det fogellimmen ej må bli för tjock och hård, neddoppar man tid efter annan i den kokau-de oljan en pinne, låter honom kallna i luften och för-söker derefter med fingrarne om limmen är nog seg och stark. Med denna fogellim fångar man de flesta slags mindre foglar. Vanligen sätter man Lockfogel un-der limspöträdet och låter spöna sitta så löst att de genast nedfalla, så snart en fogel sätter sig på dem. Han slår då äfven vingarna fast, och fångas så mycket säkrare.

ler så kallade Hampspöken som uppställas, för att afvärja dem, vänja de sig snart.

3. Pilfinken. (*Fringilla montana*, Linn.)

Art m. Hufvudet ofvan mörkt rödbrunt; dess sidor, samt en i nacken afbruten halsring, hvita med en svart fläck på tinningarna. Öfra kroppsdelarna rödbruna med svarta fläckar. Öfver vingen två hvita tvärband. Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Fringilla montana, Lin. Fn. p. 88. — Reitz. Fn. p. 250. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 142. — Lath. Ind. I. p. 433. — *Le Friquet*, Buff. Ois. 3. p. 489. t. 29. f. 2. — Pl. enl. 267. f. 1. — *The tree-sparrow*, Lath. Syn. 3. p. 252. Suppl. I. p. 163. — *Feldsperling*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 124. — Sv. Fältsparf, trädsparf; Skån. Pilsparf. Tysk Sparf.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ofvan mörkt rödbruna eller kopparröda. Trakten mellan näbben och ögat, en fläck på öronöppningen, samt underhakan och strupen svarta. Hufvudets sidor för öfrigt rent hvita med ett halsband af samma färg, endast på halsryggen afbrutet. Ryggen och skuldrorna rödbruna med svarta fläckar. Vingarna och stjerten svarta med rödbruna fjäderkanter; de större vingtäckarne af samma färg, men med hvita spetsar, hvaraf två hvita tvärband öfver vingen uppkomma. Bröstat askegrått. Magen vit. Näbben svart, vid roten på sidorna merendels gul. Iris brun. Benen grå eller blekt köttfärgade. 1:sta vingpennan litet kortare än 2:dra, som jemte 3:dje är längst. Stjerten något rundad räcker $1\frac{3}{4}$ tum utom vingarna.

Honan är knapt märkbart skild från *Hannen*; dock är den hvita färgen på hufvudets sidor ej så ren, och halsbandet kortare.

Varierar tillfälligtvis med flera eller färre hvita fjädrar bland de vanliga; stundom helt hvit. Stundom de vanliga färgerna svagt antydda: Hufvudet ofvan samt strupen bruna; rygg, skuldror och öfvergump rostbruna med bleka kanter; vingar och stjert hvitaktiga, vingpennorna med rostbruna kanter.

Vistelseort och lefnadssätt: Trädspinken förekommer mycket allmänt i de södra trakterna af vår halfö. Äfven finnes han i de nordligare; dock är dess gräns åt Norden ännu icke bestämd. I Skåne ser man honom öfverallt i trädgårdarna, i buskarne och häckarne vid åkerfälten, i skogsbrynen och i de vid vägarne planterade pilträden. Vid byarne och städerna förekommer han isynnerhet om vintren talrikt, stundom talrikare än den föregående *). Denna art är ganska sällskaplig och lefver ständigt tillsammans i flockar, undantagande under fortplantningstiden då han träffas parvis. Han är muntrare och lifligare än den föregående; dess flygt är snabb, men dess gång hoppande och oskicklig. Dess lockton liknar Gråspinkens, och äfven dess vårqwitter har mycken likhet med dennes. Hos oss qvarblifver han hela året och flyttar icke bort.

Födämnen: Om våren och sommaren förtär han en mängd skadliga insekter och larver, om hösten

*) Hr Temmincks uppgift i Man. d'Ornith. I. p. 355, att Trädspinken aldrig förekommer i städer eller byar, inträffar således icke med dess lefnadssätt hos oss.

begifver han sig i stora flockar ut på åkerfälten och föder sig af korn, hafra, hvefe o. s. v. Äfven förtär han frön, s. s. hampfrön, tistelfrön o. s. v. Om vintren besöker han, i sällskap med Gråspinken, ladugårdarna och upplockar vid stallen och logarna de korn han finner. Äfven besöker han alträden i sällskap med Siskan och förtär alfrön.

Fortplantning: I ihåliga träd, isynnerhet gamla pilträd, lindar eller fruktträd tillreder han sitt bo. På ett underlag af strån, mossor, fjäder och hår lägger honan 5 — 6 grå med mörkgrått och brunt marmorade ägg. De rufvas vaxelvis af begge könen och dessa uppföda äfven gemensamt sina ungar med insekter och larver.

Nytta och skada: I trädgårdarna förtär Trädspinken en mängd skadliga insekter och larver, isynnerhet der han uppföder sina ungar. Han bör därför såsom en ganska nyttig fogel i trädgårdarna fredas. Men på de åkerfält som äro belägna vid häckar och skogsbyn, gör han stundom skada på säd, hampa m. m. — Dess kött är mer smakligt än Gråspinkens.

Jagt och fångst: Om vintren då de äro samlade i stora täta skaror, kan man lätt med fogeldunst nedlägga ett stort antal i hvarje skott, isynnerhet om man på en fläck undansopar snön och strör agnar och korn. Äfven fångar man dem då med slagnätet. Med limspön fångas de liksom föregående art.

4. Grönfinken. (*Fringilla chloris*, *Mey.*)

Art m. De yttersta vingpennorna i yttre kanten och stjertens sidopennor vid roten gula. Hannen grön med gul anstrykning. Honan gråbrun med mindre grönt. Längd 6 tum.

Loxia chloris, Lin. Fn. Sv. p. 82. — Retz. Fn. p. 236. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 131. — Lath. Ind. I. p. 382. — *Fringilla chloris* Meyer Vögel Liv- u. Esthl. p. 76. — *Le Verdier*, Buff. Ois. 4. p. 172. t. 15. pl. enl. 267. f. 2. — *Greenfinck*, Lath. Syn. 3. p. 134. Suppl. p. 152. — *Grüner Kernbeisser oder Grünling*, Bechst. N. D. 3. p. 45. — Sv. Svenska. Skån. Gröning. Norr. Svensk Irisk.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet, halsen, ryggen och skuldrorna samt alla undre kroppsdelar gråaktigt gröna med gul anstrykning som är starkast på bakre ryggen, de mindre vingtäckarne och bröstet. Öfvergumpen och magen gröngula. De större vingtäckarne, stjerttäckarne och yttre fanet af de inre vingpennorna askegrå. Vingleden, de yttre vingpennornas yttre kanter samt stjertens sidopennor från roten öfver midten skönt gula. För öfrigt äro stjert- och vingpennor svartbruna. Undergumpen hvit med gul anstrykning. Näbben och benen köttfärgade. Iris brun.

Honan brungrå, ofvan mörkare, inunder blekare, med gröngul anstrykning isynnerhet på öfvergumpen, de mindre vingtäckarne, bröstet och magen. Stjertens sidopennor vid roten och de yttre vingpennorna i yttre kanten blekt gula.

Varierar tillfälligtvis: helt hvit eller gulaktigt hvit, stundom brokig.

Vistelseort och lefnadssätt: I det södra Sverige har jag aldrig träffat denna Art om sommaren; men om vintren insinner han sig här, likväl icke talrikt. Sommaren tillbringar han i halföns medlersta och nordliga trakter samt förekommer der, äfven norr om Fjällryggen. Han vistas hellre i skogsbryn och busktrakter som gränsa till fält, der han brukar söka sin näring, än i stora och höga skogar. Om hösten och vintren då han insinner sig i Skåne uppsöker han merendels frön af tistel, karborrar och andra fröbärande växter. Vid denna årstid är han föga skygg och föga liflig; om sommaren deremot är han mer vild och rädd. Dess flygt är tung och han skriker derunder *Jäck, Jäck*. Dess lockton är eljest *Svoinz*. Hannen sjunger i grannskapet af sitt bo ganska flitigt och dess sång är icke oangenäm.

Födämnen: Alla slags oljaktiga frön, såsom hampfrön, linfrön, roffrön, kärnorna af enbär, frön af tistel m. m. Om vintren förtär han äfven trädknoppar.

Fortplantning: Han lägger vanligen två kullar om året. Sitt bo bygger han i buskar, träd eller häckar. Det är konstigt bygdt af lafvar och ull samt invändigt belagdt med fina rötter och hår. Äggen 4 — 6, silfverfärgade med ensliga bruna och violetta prickar.

Fångst: Med limspön som man om vintren lägger öfver karborrar m. m. Äfven med lockfogel på limträd.

Nytta: Denna art blir i bur och volière ganska tam och kan lära att flyga ut och in samt att efterpipa arier m. m.

II. Egentliga Finkar:

Näbben bildar en ordentlig keglä som på alla sidor inneslutes af rätta linier. Öfverkäken sällan längre än underkäken, och äfven i spetsen helt rät.

5. Bofinken. (*Fringilla Cœlebs*, Lin.)

Artm. Ryggen kastanjbrun eller gråbrun med grön öfvergump. Hufvudet och halsen ofvan på Hanne askeblå, på Honan gråbruna. Vingarna svarta med två hvita tvärband. De två yttersta stjärtspennorna snedt hvita. Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Fringilla Cœlebs, Lin. Fn. Sv. p. 85. — Retz. Fn. p. 243. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 138. — Lath. Ind. I. p. 437. — *Le Pinçon*, Buff. Ois. 4. p. 109. — f. 4. — Pl. enl. 54. f. 1. — *Chaffinch*, Lath. Syn. 3. p. 257. — Suppl. I. p. 165. — *Gemeiner Fink*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 75. — Sv. Bofink. Smål. Hamptätting.

Beskrifn. *Gammal Hanne om våren:* Pannan svart. Hufvudet och halsen ofvan rent askeblå. Ryggen och skuldrorna kastanjbruna, hvilken färg på bakryggen öfvergår i grönt. Hufvudets sidor rödbruna. Halsen framtill, bröstet och sidorna köttfärgadt-rödbruna, hvilken färg blir blekare på magen och öfvergår i hvitt på undergumpen. Vingarna och stjärten svarta. På vingarna två hvita tvärband af hvilka det främre är bredast. De två yttersta stjärtspennorna hafva en vigglik hvit fläck från spetsen till midten, och den tredje stundom en liten fläck i yttersta spetsen. De två medlersta brunaktigt askegrå. Näbben mörkblå. Iris kastanjbrun. Benen bruna.

Honan är något mindre, har hufvudet och halsen ofvan samt ryggen och skuldrorna gråbruna med olivgrön anstrykning. Hufvudets sidor, halsen och bröstet grå med olivgrön anstrykning. Strupen, magen och medlersta delen af bröstet smutsigt hvita. Af tvärbanden öfver vingen är det främre mindre bredt och det bakre gulaktigt. Näbben om våren gråbrun, om vintren hvitaktig.

Hannen om hösten: efter ruggningen hafva de svarta fjädrarna på pannan gråbruna, de askeblåa på hufvud och hals kastanjbruna och de kastanjbruna på ryggen ljusare kanter. Äfven de undre kroppsdelarne hafva bleka, grå kanter. Det bakre vingstrecket gulaktigt. Näbben om vintren hvitaktig. Först mot våren, då nämnde fjäderkanter fällas, får foglen den först angifna färgen.

Vistelseort och lefnadssätt: Bofinken tillhör mera de sydligare än de norra trakterna af vår halfö. I den högre Norden har Bergfinken, dess närmaste anförvandt, intagit dess plats. Likväl förekommer Bofinken temligen allmän ända upp mot polcirkeln; men inom denna träffas han sällan, åtminstone i kusttrakterna. I det södra Sveriges skogar förekommer han allestädes, så väl i barrskogar som löfskogar. Redan mot slutet af September börjar han att samla sig i flockar på Skånes åkerfält och i Oktober stryker han kring i stora skaror, ofta i sällskap med Bergfinken. Då vinterkölden börjar, flytta de mesta åt sydligare Länder; men några kvarblifva, åtminstone i Skåne äfven under de strängaste vintrar och

träffas då i trädgårdarne, vid husen och på vägarna. De som flytta bort om hösten, återvända tidigt om våren, neml. redan i Mars månad. Liksom hos flera fogelarter flytta de olika könen i skilda flockar. Hannarna flytta förr bort och återvända tidigare än Honorna. Redan i första hälften af nämnde månad då någon vacker solskensdag inträffar, får man höra Bofinkens sång från trädtopparna, och af denna raska och muntra sång genljuder under de följande månaderna hvarje skog och hvarje lund. Under fortplantningstiden intager dock hvar par sitt eget lilla distrikt och tåler ej att andra besöka det; sker detta, så uppkommer genast strid, hvarunder de stundom rätt illa bita hvarandra.

Födämnena: Insekter och larver, men isynnerhet oljaktiga och mjöliga frön och korn: frön af gran, fur, al och björk; hafra, hampa och åtskilliga slags vilda växtfrön m. m. hvilka de merendels upplocka på marken. Om vintren flyga de på rönträden och de ännu qvarsittande bären; äfven uppsöka de hafrekorn i hästgödseln på vägar, vid stall och lador m. m.

Fortplantning: Bofinken bygger sitt bo på grenarne af träd och buskar, än högre än lägre. Det är halfrundt till formen och skickligt sammansatt af mossor, lafvar, grässtrån, fina rötter och växtfjün, samt inuti fodradt med hår eller fjäder. Nedtill är det med spindelväf, hår m. m. fästadt till grenarne. Äggen 3 — 5 ljusblåaktigt gröna med glesa svartbruna punkter och strek. Hanne och Hona bygga

boet, rufva äggen och uppföda ungarna gemensamt och med lika sorgfällighet. De lägga två kullar om året, och man har gjort den anmärkning att nästan blott Hannar finnas i den första kullen och Honor i den sednare. Äggen rufvas fjorton dagar.

Fångst: Om våren fångas de på limspön med lockfogel; om vintren med slagnätet på gårdar o. s. v. der man utstrött hafra.

Nytta och skada: Köttet är läckert; om hösten äro de fetast. Deras sång är angenäm och de hållas derföre ofta i bur. På hampfrön samt frön af trädgårdsväxter göra de stundom skada.

6. Bergfinken. (*Fringilla montifringilla*, Linn.)

Art m. Strupen, bröstet och skuldrorna rostgula; Öfvergumpen och magen hvita. Hufvudet och framryggen på Hannen svarta, på Honan rostgrå med svarta fläckar. Längd 6 — 6½ tum.

Fringilla montifringilla, Lin. Fn. p. 85. — Retz. Fn. p. 244. — Lath. Ind. Orn. I. p. 439. — *Carduelis Lulensis*, Rudb. av. pict. fol. 88, öfra figuren; derifrån: *Fringilla Lulensis*, Lin. Fn. p. 86. — Retz. Fn. p. 245, samt tab. f. 2. — *Pinçon d'Ardennes*, Buff. Ois. 4. p. 123. — Pl. enl. 54. f. 2. — *The Brambling*, Lath. Syn. 3. p. 261. — *Der Bergfink*, Bechst. Naturg. Dent. 3. p. 97. — Sv. *Bergfink*, Norrqvint. Norr. Quäker.

Beskrifn. Hannen i vårdrägt: Hufvudet och halsen ofvan och på sidorna samt främre ryggen svarta med blå glans; — stundom synas spår efter de rostbruna fjäderkanterna. Skuldrorna, bröstet och strupen gulaktigt rostbruna. De minsta vingtäckar-

ne gula. Bakre delen af bröstet samt magen hvita. Undergumpen vit stötande i brungult. Öfvergumpen vit på sidorna svart. Öfre stjerttäckarne svarta med hvitaktiga spetsar. Vingarna svarta med två tvärband, af hvilka det främre är bredast och hvitt, det bakre smalare och rostgult; de inre vingpennorna med breda, de yttre med smala rostgula kanter; de tre yttersta för öfrigt helt svarta; de följande med en vit fläck i yttre fanet framom midten. De undre vingtäckarne skönt gula. Stjerten klufven, svart; den yttersta stjertpennan utvändigt vit ett stycke från roten; de två medlersta kantade med vitgrått. Näbben blåaktig, mot spetsen svart. Iris brun. Benen brunt köttfärgade. Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Honan; Hufvudet ofvan rostgrått med ett bredt svart band på hvardera sidan af hufvan från näsborrarna till halsryggen. Halsen ofvan och på sidorna för öfrigt askegrå. Ryggens fjädrar svartbruna med rostgrå kanter. Strupen och öfra delen af bröstet gråaktigt rostgula. Skuldrorna och två band öfver vingen rostgula. Det öfriga liksom hos Hannen.

Anm. Om hösten efter ruggningen äro alla svarta fjädrar på de öfra kroppsdelarne hos Hannen försedda med breda rostgrå kanter, och dess rostgula fjädrar äro kantade med grått, hvarigenom färgen synes mindre liflig. Dessa kanter afnötas under vintren, så att föglen om våren visar sig i den beskrifna dräkten.

Vistelseort och lefnadssätt: Norrqvinten lefver om sommaren i skogarne i de norra trakterna af vår halfö. Endast höst och vår under sina vandringar, samt stundom under vintren, träffas han i Sveriges sydliga landskap. Eljest tillbringar han vanligen vin-

tren i Tyskland och Frankrike, och någon gång blir ett eller annat par qvar i Thüringer skogen under sommaren och fortplantar sig der. I April och i början af Maj återvänder denna fogel till vår halfö familjvis eller flocktals. Redan i början af Junii har han parvis skilt sig i skogarna norr om Dowrefjäll, samt i Nordlanden, Lappland och Norrland. På sidorna af fjällen går han så högt upp som björken växer. Dess vårläte, som man äfven får höra under dess vandringar, är ett sqväkande ofta upprepadt: *Qvääk!* Dess lockton är eljest *Svoinz.* I sitt lefnadssätt har han största likhet med Bofinken hvars ställe han i Norden synes hafva intagit; och han är i sin hembygd ännu mindre skygg än denna. Redan i medlet af September samlar han sig i stora skaror på Skånes åkerfält, isynnerhet i skogstrakterna. Vanligen flyttar han bort före vintrens annalkande; men under vintren $\frac{1819}{1820}$ då väderleken i November och December var ganska lindrig och en ovanlig mängd bokollon fanns, qvarblefvo tallösa skaror af Bergfinken i Skånes bokskogar och gjorde otrolig skada genom att uppäta Ollonen för de redan på skogarna fördelta Svinkreaturen. Om aftnarna sökte foglarne sig hviloplatz i någon skog eller lund af barrträd, och om mornarna återvände de till bokskogarna. Efter Nyåret 1820, då snö och starkt frost inföll, försvunno de alla nästan på *en* gång *). Vid samma tid

*) Ingen, icke en gång de äldsta Landtmän, kunde påminna sig att någonsin hafva sett dessa foglar i sådan

som Bokskogarna härjades, hemsöktes äfven sädesstackarne vid gårdarna på slättbygden af samma fogelart.

Födämnena: Dessa äro de samma som Bofinkens, neml. om sommaren insekter, om hösten frön, korn m. m., om senhösten och vintren isynnerhet bokollon.

Fortplantning: I Juni månad finner man dess bo, på grenarna af en björk, eller ett barrträd. Det liknar fullkomligt Bofinkens bo är byggt af mossor och lafvar samt inuti belagdt med hår, fjäder eller ull. Äggen 5 — 7 grönaktiga, otydligt marmorerade med gråbrunt samt tecknade med glesa, lefverbruna prickar. Honan har, under liggtiden, samma smäktande lockton som Bofinken. Ungarna uppfödas med Insekter.

Fångst: Under flyttningstiden kunna de fångas med lockfogel på limspön. Då de flyga i stora täta skaror kunna de i mängd nedskjutas med fogeldunst.

Nytta och skada: Köttet är bittert; men finnes af somliga icke just oangenämt. — Den skada de göra på Bokskogarna under goda ollonår, är förut nämd.

mängd i bokskogarna om vintren. Deras qvarstannande här kunde ej hafva till grund den lindriga vintren; ty den har ofta varit lindrigare. Men i mannaminne hade ej en sådan mängd bokollon funnits i Skånes skogar. Det var således tydligt derföre som foglen blef kvar. Äfven i Tyskland och Frankrike tillbringar han vintren blott i de skogar der ollon finnas. Han förekommer således ej alla år i samma trakt.

7. Snöfinken. (*Fringilla nivalis*, Linn.)

Artm. Hufvudet och halsen askegrå. Ryggen brun. Vingpennorna af andra ordningen samt stjertens sidopennor hvita. De öfriga vingpennorna och de två medlersta stjertpennorna svarta. Längd $7\frac{1}{2}$ tum.

Fringilla nivalis, Lin. Syst. I. p. 321. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 134 (Honan). — *Le Pinçon de Neige ou Niverolle*, Buff. Ois. 4. p. 136. — *Snow-Finch*, Lath. Syn. 3. p. 264. — *Gros-bec niverolle*, Tem. Man. d'Orn. I. p. 362. — *Der Schneefink*, Bechst. Nat. Deutschl. 3 B. p. 136. — Sv. *Snöfink*.

Beskrifn. Hufvud och hals blåaktigt askegrå. Ryggen, skuldrorna och de innersta vingpennorna bruna, kantade med rostgrått. Vingpennorna af första ordningen och de två medlerta stjertpennorna svarta; de andra i spetsen svarta. Vingpennorna af andra ordningen, täckfjädrarne och de öfriga stjertpennorna rent hvita. Öfra stjerttäckarne till största delen svarta; de undra hvita med bruna spetsar. Underhakan och strupen svarta med vitgrå fjäderkanter; de öfriga undra kroppsdelarna vitaktiga, stötande i askegrått. Näbben gul, med brunaktig spets. Benen svarta. *Hannen om vintren*.

Honan: Hufvudets och halsens askegråa färg blandad med brunt. Underhakan och strupen vitaktiga. Vingarne och de två medlersta stjertpennorna svartbruna.

Vistelseort: Snöfinken bebor de högsta bergen i Europa, neml. Alperne och Pyreneerna. Äfven förekommer han i norra Amerika och på det norra Europas fjällar; men här är han mycket sällsynt, och

är ännu aldrig sedd i de sydligare landskapen under flyttningstiderna. Han är en af Skandinaviens sällsyn-
taste foglar.

Födämnena: Insekter, frön och korn.

Fortplantning: Säges bygga sitt bo på klipporna eller i deras springor. Äggen 3 — 5 blekgröna, beströdda med orediga fläckar och askegrå punkter, blandade med mörkgröna fläckar.

8. Hämpling-Finken. (*Fringilla cannabina*, Linn.)

Artm. Strupen vitaktig och fläckig. Ryggen kastanjbrun; hufvudet och halsen grå. Bröstet och pannan på Hannen blodröda, på Honan brunfläckiga. Stjertpennorna samt de yttre vingpennorna svarta med hvita kanter. Näbben om sommaren blåaktig, om vintern vitgrå. Längd $5\frac{1}{2}$ — 6 tum.

Fringilla cannabina, Lin. Fn. Sv. p. 87. — Retz. p. 247. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 144. — Lath. Ind. Orn. I. p. 458. — *Fringilla Linota*, Lath. Ind. I. p. 457. — *La grande Linotte de vignes*, Buff. Ois. 4. p. 58. — Pl. enl. 485. fig. 1. et 151. f. 1. 2. — *Greater redheaded Linnet or Redpole*, Lath. Syu. 3. p. 304. Suppl. p. 176. — *Gemeiner Hämpling*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 141. — Sv. Hämpling.

Beskrifn. Gammal Hanne i vårdrägt: Framdelen af hufvudet ofvan, samt bröstet framtill och på sidorna blodröda. Hufvudet för öfrigt och halsryggen askegrå. Ryggen, skuldrorne och vingtäckarne kastanjbruna. Underhakan och strupen vitaktiga, med brunaktiga småfläckar. Bröstet i midten, samt magen och undergumpen hvita; sidorna rost-

gulaktiga. Vingpennorna svarta; de af första ordningen, isynnerhet de medlersta, i yttre kanten hvita; de af andra ordningen i spetsen urnupna och der kantade med hvitt, i yttre kanten rostgråaktiga. Stjerten tvåklufven; dess pennor svarta, i yttre och inre kanten hvita. De öfra stjerttäckarne svarta med breda kanter; de undra hvita, ofläckade. Näbben tjock, trind och spetsig, ofvau mörkt blåaktig, inunder blek. Benen köttfärgadt bruna. Iris brun. Längd nära 6 tum; vingbredden $9\frac{1}{2}$ tum.

Gammal Hona i sommarträkt: Hufvud och halsrygg brunaktigt askegrå, beströdt på dess främre del med svartbruna fläckar. Underhakan och strupen hvitaktiga med bruna småfläckar. De undra kroppsdelarne rostgulaktiga eller blekt rostbruna isynnerhet på bröstet och sidorna. Mage och undergump smutsigt hvita. Undre stjerttäckarne hvitaktiga med en svartaktig fläck åt spolen. Rygg, skuldror och vingtäckare kastanjbruna med ett mörkare brunt strek åt midten af hvarje fjäder. För öfrigt lik Hannen.

Hanne om hösten efter rugningen: Den blodröda färgen på pannan och bröstet synes icke utan då fjädrarna skiljas åt; ty de smutsgula fjäderkanterna äro så breda att de dölja densamma. Halsryggen och hufvudets sidor askegrå; hufvudet ofvan tecknad med svarta fläckar. Ryggen rödbrunaktig med mörkt kastanjbruna långsfläckar. Bröst och sidor smutsigt rostgula, strupen blekare, med bruna fläckar. Stjertens öfra täckfjädrar midtåt svarta med rostgulaktiga kanter. De medlersta stjertpennorna,

samt de andra mot spetsen, kantade med rostgulaktigt.

Anm. De smutsigt gulaktiga kanterna på pannans, bröstets och ryggens fjädrar fällas mot våren så att foglen under fortplantningstiden får den förut angifna färgen.

Ungarna före första ruggningen: Hufvud och hals smutsigt ljusgrå med mörkare långsstrek. Rygg och vingtäckare brungula med svartaktiga fläckar. De större vingtäckarne och de inre vingpennorna med rödbruna yttre kanter och brungula spetsar. Öfvergumpen oredigt fläckig med hvitaktigt och brunt. Alla undre kroppsdelar smutsigt hvita med grågul anstrykning och bruna långsfläckar på bröst, sidor och undre stjerttäckare. Näbben ofvan hornfärgad, inunder blek. Benen rödgrå.

Vistelseort och lefnadssätt: Hämplingen tillhör mera de södra än de norra delarna af vår halfö. I Skåne och de öfriga södra Landskapen i Sverige träffas han allmänt. Äfven förekommer han i det sydliga Norrige; men norr om Dowrefjäll kan jag icke påminna mig att hafva sett honom. Om sommaren bebor han skogar isynnerhet skogsbryn och buskmarker; om hösten samlar han sig i stora flockar och ströfvar kring åkerfälten; om vintren träffar man äfven en del qvar; men största delen tyckas under denna årstid lemna oss och flytta åt sydligare Länder. Dessa återvända i medlet af Mars månad och låta redan då höra sin angenäma sång från träden i trädgårdar och lundar. Denna sång består af höga, rena flöjttoner och har flera afvexlande strofer.

Föddämnena: Dessa bestå i växtfrön af åtskilliga slag, äfven hampfrön och linfrön. Om vintren förtära de derjemte äfven trädknoppar. I bur underhållas de med frön af åkerkål, åkersenap, roffrön o. s. v. Hampfrön skada dem. De böra ej fodras för starkt, eljest blifva de alltför feta, och dö. De bada sig i sand och vatten. Salt är för dem ett godt præservativ för åtskilliga sjukdomar.

Fortplantning: De bygga sitt bo i buskar och häckar. Det är väl byggt och består utvändigt af grässtrån, mossor, fina gräsrötter, tistelfjun m. m. och är invändigt fodradt med ull och hår. Äggen 5 — 6 blåaktigt hvita, på den tjockare ändan tätt beströdda med kötröda punkter. Sällan äro äggen ofläckade. Vanligen läggas två kullar om året och ungarna uppfödas med växtfrön. De para sig i bur med kanariefoglar och frambringa bastarder.

Fångst: Om våren kan man fånga dem på fogellim med lockfögel. Om vintren strör man frön af tistel, åkerkål m. m., anlägger dervid ett slagnät och sätter en lockfögel i bur. De samlas då ofta på lockmaten och fångas med nätet.

Nytta och skada: Deras sång är angenäm, hvarföre de ofta underhållas i bur. De gagna äfven genom att förtära en mängd ogräsfrön. De skada köksväxterne, lin- och hamplanden, genom att uppäta frön.

9. Gulnäbbade Finken. (*Fringilla flavirostris*, Linn.)

Artm. Ofvan svart med rostgulaktiga fjäderkanter; strupen rostgul ofläckad; bröstet och sidorna

rostgula med bruna fläckar. Magen och undergumpen hvita; vingpennorna och stjärtpennorna svarta, de medlersta kantade med hvitt. Längd $5\frac{3}{8}$ tum.

Fringilla flavirostris, Lin. Fn. Sv. p. 87., hvartill beskrifningen är tagen af Rudbecks Aves pic. fol. 58, der föglen kallas: "*Fringilla fusca rostro flavicante*. Svedis Riska". — *Fringilla flavirostris*, Nilss. Orn. Svec. I. p. 146. t. 4. — Pallas Reise II. p. 710. — Müller Prodröm. p. 32. — Meyer Zusätze u. Berichtig. p. 54. — Graa Irisk (*Fringilla flavirostris*), Gunner. i Leems Lappm. p. 256. not. — *Fringilla montium*, Temminck Man. d'Ornith. I. p. 368. — *The Twite*, Pen. Brit. Zool. I. p. 346. t. 53. — Arct. Zool. 2. p. 380. C. — Sv. Riska; Siserönnika; Gulnäbba; Skjäska.

Anm. Herr Temminck har, i 1:sta upplagan af sin Man. d'Ornith. p. 208, med flere Ornithologer begått det misstag att förblanda Linnés och Pallas's *Fringilla flavirostris* med *Fring. linaria*. I andra upplagan har han väl upptagit föglen som skild art; men icke under namn af *Fr. flavirostris*, Lin. utan af *Fringilla montium* Gmel., — en benämning som han i förra upplagan hänförde som synonym till *Fring. canabina*. Man iuser ej rätt hvarföre H:r Tem. undvikit det Linneanska namnet, då det likväl är både äldre och vida mer karakteristiskt samt säkert är det han valt. Ty, att sluta af Gmelins diagnos på *Fring. montium*: gutture et pectore nigricantibus, så synes den ej gerua kunna vara identisk med den Linneanska *Fring. flavirostris*, hvilken dock H:r Tem. beskrifvit. Det H:r Tem. behagar påstå i Anm. sid. 369, att neml. *Fring. flavirostris* är helt simpelt en Gräsiska (*Fring. Linaria*), är alldeles oriktigt. Ingen enda Författares *Fring. flavirostris* är en *Fring. linaria*; men väl har den rätta *Fring. flavirostris* hos en och annan, — hvaribland äfven H:r Tem. är, — fått uppträda som synonym under *Fr. linaria*. Ty hvad Retzii *Fr. flavirostris* i Fauna Svec. fig. 1. beträffar, så är den så mycket säkrare identisk med Linnés *Fring. flavirostris*, som den just är en copie, — ehuru illa gjord, — af den samma figur hos Rudbeck, efter hvilken Linné införde sin *Fring. flavirostris* i Fauna. Copien har blifvit Sal. Prof. Retzius meddelad af Dr Lindroth, och originalet, hvori man lätt igenkänner den rätta *Fr. fla-*

virostris, är märkt af Rudbecks egen hand med samma diagnos, som den Linné i Fauna anför. Man kan således ej tvifla på att Rudbecks figur tillhör Linnés fogel, och då Retzii figur är deraf en copie, så måste hon väl äfven böra räknas till samma art.

Beskrifn. Näbben kort, rak, trind och spetsig, gul med svartaktig spets, käkarna af lika längd. Iris brun. Benen svarta. Längd $5\frac{3}{8}$ t. Näbben $\frac{1}{4}$ t. Stjerten $2\frac{1}{8}$ t. räcker $1\frac{1}{4}$ t. utom de hoplagda vingarna. Tarsen $\frac{2}{3}$ tum.

Hufvudet, ryggen och skuldrorna svarta med matt rostgulaktiga fjäderkanter. Öfvergumpen ponceauröd. Strupen, halsen framtill och på sidorna, bröstet och kroppssidorna samt de fjädrar som omgifva näbbroten, rostgula; bröstet och sidorna tecknade med bruna fläckar. Magen och undergumpen hvita offläckade. Vingpennorna svarta; de fyra yttersta med en ganska smal hvitaktig utkant; de följande fem (5 — 9) med en bredare hvit kant; de af andra ordningen i spetsarna bleka. De mindre vingtäckarne mörkbruna, fint kantade med rostbrunt; de större (närmaste) mörkbruna, i spetsen kantade med rostgulaktigt hvitt. Stjerten klufven, dess pennor svarta, i yttre kanten med ett smalt i inre kanten med ett bredare hvitt bräm; de två medlersta på båda sidor kantade med rostgrått. Undre stjärtäckarne gråbruna med breda hvita kanter. *Hannen tidigt om våren.*

Honan samt Ungarna om vintren: Näbben blekgul med svartaktig spets och näbbrygg. Benen bruna. Öfra kroppsdelarna svartbruna med smutsigt blekt.

rostgula fjäderkanter. Öfvergumpen fläckig som ryggen, utan spår till rött.

Hos den gamla Hannen efter ruggningen i början af vintren äro öfvergumpens ponceauröda fjädrar kantade med rostgult.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel bebor om sommaren de trakter af vår halfö, som finnas inom och i grannskapet af polcirkeln. Han förekommer der i de lägre regionerna, isynnerhet bland de stenblock som ligga strödda vid foten af bergen och fjällen. Under vintren gör han utvandringar från denna sin hembygd åt sydligare länder och träffas då, i mindre eller större skaror, äfven här i Skåne. Isynnerhet infinner han sig här under kalla och långvariga vintrar då mycken snö faller. Han finnes stundom qvar här ännu om våren i April månad. I sin hembygd är han om sommaren skygg, men under sina vandringar om vintren är han dum och spak, samt låter lätt fånga sig. Dess lockton om sommaren liknar Hämplingens: dess sång är icke angenäm; den är skärrande och sträf.

Födämnen: Åtskilliga slags växtfrön som han träffar på fälten.

Fortplantning: Okänd.

Fångst: Om vintren med slagnät eller limspön.

III. Siskor.

Näbben bildar en långdragen, på sidorna isynnerhet mot spetsen mycket hoptryckt keglä; sedd ofvan ifrån inneslutas sidorna af inböjda linier. Käkarna lika långa, alldeles raka och ganska spetsiga.

10. Gråsiskan. (*Fringilla Linaria*, Linn.)

Artm. Hjessan karmosin-röd; strupen svart. Bröstat och öfvergumpen hos Hannen rosenröda; hos Honan smutsigt gulaktiga, brunfläckiga. Öfver vingen två hvita tvärstrek. Längd $5\frac{2}{3}$ tum.

Fringilla Linaria, Lin. Faun. Sv. p. 87. — Fabric. Fn. Grönl. p. 121. — Retz. Fn p. 248. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 149. — Lath. Ind. I. p. 458. n. 83. — Lesser Redpole, Lath. Syn. 3. p. 305. — Bechst. Öfvers. 3. p. 295. — Pen. Arct. Zool. 2. p. 262. — Gunner. i Leems Lappm. p. 292. not. — Bergzeisig, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 231. — Sv. Gråsiska; Iris; Vinterhämling. Norr. Graasiske, Mo-Irisk.

Beskrifn. Pannan svart med grå fjäderkanter; en svart fläck mellan näbben och ögat samt en dylik under hakan. Öfra delen af hufvudet mörkt karmosin röd, glänsande. Halsen framtill, bröstet och öfvergumpen af en hög rosenröd färg. Nacken, ryggen och skuldrorna grågula med svarta långsfläckar. Magen och undergumpen hvita; på sidorna och de undre stjerttäckarne med svarta långsfläckar. Vingarna och den klufna stjerten svartaktiga; Vingpennorna af andra ordningen samt stjertpennorna kantade med hvitt. Vingtäckarne svartbruna. de långa med hvita kanter i spetsen, hvaraf två hvita tvärstrek uppkomma öfver vingen. — Näbben liten, mycket hoptryckt och spetsig, gul med svart spets. Iris brun. Benen svartbruna.

Honan har blott främre delen af hjessan karmosin-röd och denna färg är ljusare nästan stötande i gult. En svart fläck mellan näbb och öga samt en

annan under hakan. Halsen framtill och på sidorna hvit med smutsgul anstrykning. Bröstat, sidorna och öfvergumpen af samma färg med svartaktiga längsfläckar.

Varierar tillfälligtvis: Hvit med hjessan och bröstet röda; Hvitaktig med små bruna längsfläckar som ofvan äro talrikare, inunder glesare. Hjessan ljus blekröd.

Vistelseort och lefnadssätt: Gråsiskan tillbringar sommaren och fortplantar sig i de norra trakterna af vår halfö, inom och i grannskapet af polcirkeln Först mot vintrens annalkande lemnar hon detta hemvist och flyttar åt sydligare trakter. Hon förekommer då flocktals i Skåne och uppehåller sig isynnerhet i alträden, eller på fälten bland fröbärande örter. Mot våren flyttar hon åter åt Norden och man träffar henne aldrig om sommaren i det södra Sverige *). I Norden vistas hon under denna årstid bland björkbuskar eller låg björkskog, stundom äfven i barrskogen. Dess lockton är: *pü-wit!* och dessa ljud förekomma ofta i dess sång, som är låg men angenäm och kan uttryckas med: *zi-zi-zörr*. I dess hembygd är hon mera skygg än under sina vandringar, då hon merendels är spak och enfaldig.

Föddämnar: Växtfrön af åtskilliga slag. Om vintren isynnerhet frön af al, tistel, åkerkål m. m.

*) I Thüringer skogen i Tyskland öfversomrar hon dock stundom och fortplantar sig, enligt H. r. Bechsteins försäkran.

Fortplantning: Sitt bo lägger han vanligen i mindre björkar, tallar eller björkbuskar. Det är sammansatt af gräs, grässtrån, m. m., blandade med ängull, och invändigt fodradt med Ripfjädrar och renhår. Äggen likna till form och färg Hämplingens, men äro mindre, 4—5 blåaktigt hvita, beströdda med brunröda prickar, isynnerhet vid den tjockare ändan.

Fångst: Om vintren fångas hon lätt med limspön eller med slagnät.

11. Grönsiskan. (*Fringilla Spinus*, Linn.)

Artm. Ofvan grönaktig med mer eller mindre märkbara svartaktiga fläckar. Hannens hufva svart. Stjert- och vingpennor vid roten gula. Ett gult strek genom ögat och två öfver vingen. Inunder är hannen gul, honan vitaktig med svarta fläckar.

Längd $4\frac{3}{4}$ tum.

Fringilla Spinus, Lin. Fn. Sv. p. 87 — Retz. Fn. p. 246. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 153. — Lath. Ind. I. p. 452. — *Le Tarin*, Buff. Ois. 4. p. 221. — Pl. enl. 485. f. 3 — *Siskin*, Lath. Syn. 3. p. 289. — *Erlenzreisig*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 220. — Sv. Grönsiska.

Beskrifn. *Hannen:* Hufvan och underhakan svarta; den förras fjädrar stundom kantade med grått, den senares med gult. Halsen ofvan, ryggen, skuldrorna och de öfra stjerttäckarne gröna, blandadt med askegrått och med otydliga svartaktiga längsfläckar. Ett bredt band genom ögonen till nacken, halsen framtill och bröstet gula. Magen hvit. Sidorne och undergumpen hvita blandadt med gult och tecknade med svarta längsstrek. De små vingtäckarne och öfvergumpen gröngula. Vingpennorna svart-

aktiga, de yttre utvändigt med en smal grönaktig kant, de inre med en bred hvitaktig; alla, med undantag af de tre yttersta, vid roten blekgula. De större täcksjäderna svarta, i spetsen bredt gula; hvaraf två gula tvärstrek öfver vingen. Stjerten klufven; dess pennor i yttre tredjedelen svartaktiga, för öfrigt gula; de två yttersta utvändigt nästan till roten, och de två medlersta helt och hållet svartaktiga. — Längd $4\frac{1}{4}$ tum. Näbben grå; mot den hoptryckta spetsen brun. Iris och fötterna bruna.

Honan ofvan gråaktigt grön med tydliga svarta fläckar. Öfvergumpen gul med svarta fläckar. Två blekgula tvärstrek öfver vingen. Inunder hvit med gulgrön anstrykning och en mängd svartaktiga fläckar på bröst, sidor och undergump.

Varierar tillfälligtvis: Helt hvit, eller mer och mindre brokig af hvita fjädrar. Stundom svartaktig beströdd med gulgröna glänsande fläckar, ofvan gleasa, under sammanlöpande. Denna uppkommer endast i bur.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel finnes om sommaren parvis i barrskogarna och de höga enbuskarne i Sveriges medlersta Landskap, från Halland och Småland ända till Norrland; och i Norrige har jag sett honom äfven norr om Trondhiem i Stördalen. I Lappland och Finnmarken förekommer han troligen icke. Icke heller har jag sett honom i Skåne under sommaren, men om hösten och under hela vintren träffas han här i stora skaror. Om hösten stryker han kring i björkskogarna; om vintren up-

behåller han sig isynnerhet i altråden. Han flyger gerna i täta flockar, och hela flocken slår merendels ned i en och samma trädtopp. Liksom Mesarna, kan Grönsiskan klättra förträffligt, och på alla sidor undersöka fröhusen. Dess sång är ett angenämt qvitter; dess lockton är ett starkt: *Dillah!*

Födämnen: Frön af åtskilliga slags träd och örter t. e. af björk, fur, gran, al, tistel, m. m. I bur underhålles han med vallmo- och krossade hampfrön.

Fortplantning: I bergiga trakter, isynnerhet i barrskogen, bygger Grönsiskan sitt bo nära yttersta spetsen af en hög gren. Det är medelst spindelväf och skägglafvar fästadt vid grenen. Utvändigt består det af fina qvistar, rötter, skägglaf, videhängen, ängull; inuti fodradt med fina rötter. Äggen 5 — 6 gråhvita, tät beströdda med rödaktigt purpurbruna små fläckar och punkter, isynnerhet på den tjockare ändan.

Fångst: Denna är en af de foglar som man lättast fångar på limpspön med lockfogel. Stundom slår sig en hel flock på limspö-trädet. Denna fångst anställes höst och vinter.

12. Steglits-Siskan. (*Fringilla Carduelis*, Linn.)

Artm. Pannan, kinderne och strupen karmosinröda. Hjessan svart med ett nedgående band bak örat. Ryggen brun. Vingarne och stjerten svarta med hvita fläckar och ett bredt gult band öfver vingen.

Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Fringilla carduelis, Lin. Faun. Sv. p. 86. — Retz. p. 245. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 151. — Lath. Ind. I.

- p. 449. — *Le chardonneret*, Buff. Ois. 4. 187. t. 10. — Pl. enl. 4. f. 1. — *Goldfinch*, Lath. Syn. 3. p. 281. — *Distelzeisig*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 200. — Sv. *Steglits*. *Steglitsa*.

Beskrifn. *Hanne*: Panna, kinder och strupe skönt karmosinröda. Trakten mellan öga och näbb samt underhakan och ett strek kring näbbroten rent svarta. Hjessan och nacken svarta; från denna ledlöper ett svart band bak örat på sidan af halsen. Bak om nacken står en hvit tvärfläck, och bak om ögat öfver tinningarna nedgår på hvardera sidan ett bredt hvitt band, hvilka förena sig framtill på halsen. Rygg och skuldror ljus kastanjbruna, hvilken färg från halsryggen nedstiger på sidorna af bröstet. Eljest är bröst, mage och undergump samt stjertens öfra och undra täckfjädrar rent hvita. Vingpennorna svarta med en hvit fläck i spetsen; den yttersta ofläckad; de andra i yttre fanet från roten till midten skönt gula, hvilket, i förening med de långa täckfjädrarne, bildar ett långsgående gult strek och ett dylikt bredt band öfver vingen. Vingtäckarne för öfrigt svarta. Stjerten något klufven, svart; sidopennorna (de 2 eller 3) med en stor hvit fläck på inre fanet; de öfriga med en hvit spets. Näbben (temligen lång, spetsig och hoptryckt), hvitaktig med svartaktig spets. Iris kastanjbrun; Benen ljusbruna.

Honan har det karmosinröda på pannan, kinderna och strupen ej så bredt eller skönt. Kinderne med ljusbrunt inblandadt. Kapsonen och de små vingtäckarna bruna. Vingarnes svarta och gula färg mindre liflig.

Vistelseort och lefnadssätt: Steglitsen bebor vår halfö ända upp till Norrland och Dowrefjäll; han skall äfven förekomma Nordanfjälls, ehuru sällsynt, och enligt Leem *) till och med i Finnmarken. I det södra Sverige finnes han under alla årstider, dock ingenstädes talrikt, aldrig i flock; alltid blott parvis eller familjvis. Om sommaren träffas han i skogsbyn som gränsa till åkerfält; om hösten och vintren infinner han sig på sådana ställen der en mängd tistlar och karborrar växa.

Steglitsan är en munter och liflig fogel som ständigt är i rörelse, hoppar på qvistarna och vrider kroppen än åt en sida, än åt en annan. Dess lockton är ett välljudande *Ziflit* eller *Sticklik*, hvarifrån dess namn härleder sig. I bur blir han snart tam, och underhålles utan mycken omsorg. Man kan lätt lära honom en hel hop små artiga konster, som roa en Liebhaber t. e. att medelst ett snöre eller kedja med näbben och klorna sjelf upphissa till sig ett litet embar med föda och dryck, att äta ur handen, eller ur munnen, att flyga ut och åter vända tillbaka på handen då man ropar honom, att sjunga sittande på fingret, o. s. v. Dess sång är hög, fyllig och angenäm samt fortsättes i bur under alla årstider undantagande ruggningstiden. Utom dess egna sång, lär han äfven att efterpipa vis-toner o. d., dock ej med den lätthet som Hämplingen och Karnariefoglen.

Födämnen: Frön af tistel, karborre, groblad, lejon tand, vägvårda, salat, kål, m. fl. Om vintren för-

*) Lappm. sid. 258.

tär han äfven alfrön. I bur underhålles han med hanpfrön och vallmofrön. Man gifver honom derjemte stundom litet grönt, s. s. sallat, kål, källkrasse o. s. v. Hvarje dag bör han hafva friskt vatten att dricka.

Fortplantning: I skogar, så väl barrskogar som löfskogar, bygger Steglitsen sitt bo i en klyka mellan grenarna af en trädtopp. Det består af fin moss, lafvar, fina rötter, ängull, tistelfjun m. m. och är invändigt fodradt med ull och hår. Äggen 4—6 ovala, blekt blågröna, glest beströdda med blekröda små fläckar och strek.

Med Kanariefoglen frambringar Steglitsen fruktbar afköda. De ungar sägas blifva bäst som födas af Kanariehona med Steglitshanne. De äro ofta utmärkt vackra, och sjunga vanligen mycket väl.

Fångst: Man fångar Steglitsen om vintren på limspön med lockfogel. Äfven fångas den på limspön som man lägger öfver tistlar och karborrar der denna fogel brukar infinna sig; i slagburar eller med spränklor, då man nyttjar karborrar till lockmat.

Domherre Slägtet. (Pyrrhula, *Briss.*)

Näbben mycket kort och tjock, trind (lika bred som hög) kegelformig, på alla sidor ganska kullrig; öfverkäken något längre och i spetsen nedböjd, saknar tydlig ryggkant.

Näsborrarna vid näbbroten, små, runda; täckta med hårlika fjädrar från pannan.

Benen: tarserna korta, ungefär af mellantåns längd.

Vingarna temligen korta, räckta ej till midten af stjerten; 1:sta vingpennan kortare än 4:de; 2:dra och 3:dje längst, nästan lika långa.

Stjerten temligen lång, tvär eller något rundad.

Domherrarna tillbringa sommaren i stora bergiga skogar. Deras föda består i frön och kärnor, hvilka de merendels skala innan de förtära dem. De hafva i sitt lefnadssätt mycket gemensamt med arterna af föregående släkte. De äro dock mindre lifliga; men också mindre tröga än arterna i det följande. Könen äro till färgen mycket olika.

1. Allmänna Domherren. (*Pyrrhula vulgaris*, *Briss.*)

Artem. Hufvudet, vingarna och stjerten svarta; öfvergumpen vit; ryggen askegrå; de undra delarna hos Hannen röda, hos Honan grå.

Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Loxia Pyrrhula, Lin. Fn. Sv. p. 81. Retz. p. 235. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 129. — Lath. Ind. I. p. 387. — *Pyrrhula vulgaris*, Temm. Man. d'Orn. I. p. 338. — Briss. Orn. 3. p. 303. — *Le Bouvreuil*, Buff. Ois. 4. p. 372. t. 17. — Pl. enl. 145. — *Bulfink*, Lath. Syn. 3. p. 145. — Suppl. p. 152. *Der rothbrüstige Gimpel*. — Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 53. — Sv. Domherre.

Beskrifn. Hannen: Hela hufvan ned genom ögonen samt ett strek kring näbbroten rent svarta

med blå glans på hufvan. Halsen ofvan, ryggen, skuldrorna och de mindre vingtäckarne blåaktigt askegrå. Öfvergumpen, undergumpen och de undre stjerttäckarne rent hvita. Halsen framtill och på sidorna, bröstet, magen och kroppssidorna cinober-röda. Vingarna svarta; de inre vingpennorna och de långa vingtäckarne lysande med blå glans; de sednare med gråhvita spetsar, hvarigenom ett tvärband öfver vingen af denna färg uppkommer. Stjerten och dess öfra långa täckfjädrar svarta med blå glans. Näbben svart. Benen svartgrå. Iris brun.

Honan har mer brungrå rygg och de undre kroppsdelarna rödaktigt askegrå.

Varierar tillfälligtvis: A) Hvit med karmosinröd anstrykning på hufvudets öfra del, på dess och halsens sidor samt på de undre kroppsdelarna. Näbbroten omgifven af svartaktiga småfjädrar; bakre ryggen der och hvar skuggad af mörkgrått; några af vingpennorna samt spetsarna af de närmaste stora täckfjädrarna svartbruna. Stjertpennorna utvändigt smutsgrå. Näbben och benen hvita. *Loxia Flamengo*, Mus. Carlson, t. 17. *B)* Hufvudet ofvan helt svart; dess sidor och halsen framtill svarta med inströdda grå fjädrar. Halsen ofvan, ryggen och undergumpen grå med svart der och hvar anstruken. Undradelarna rödgrå, svartfläckiga. En del af de undre stjerttäckarne glänsande svarta, en del hvita. *Hona*. — *C)* Helt svart med ett långsgående strek på vingen samt stjertens undra täckfjädrar hvita.

Anm. Alla dessa Artförändringar, som jag haft tillfälle att undersöka, hafva lefvat i bur och der undergått

förvandlingen. — Redan 1815 då jag skref Ornith. Svecica, hade jag haft tillfälle att i Paykullska Museum på Wallox-Säby granska originalet till Sparrmans Loxia Flamengo (Mus. Carls. t. 17.) Jag kunde derföre med visshet sätta denna varietet under Domherren, dit han hör. Detta oaktadt behagar dock Hr Temminck påstå i andra upplagan af sin Man. d'Ornith. I. p. 339, att Loxia Flamengo Sparrm. alldeles icke är en varietet af Domherren, utan af Tallbiten, under hvilken han äfven anført honom p. a, st. sid. 334. — Foglen är dock ännu vid makt och kan sjelf försvara sin härkomst af Domherren. Han förvaras nu i Vetensk. Acadis Museum i Stockholm. All vidare tvist-härom är derföre alldeles öfverflödig. Men jag kan äfven lemna den upplysning, som Ornithologen Doctor Lindroth meddelat i ett bref till Herr Prof. Retzius, dateradt Söderfors d. 28 April 1791, att Regements-Fältskären Dr, Eklund hade ifrågavarande fogel länge lefvande i bur såsom vanlig Domherre, till dess han der efter en sjukdom fick den hvita färgen, med hvilken han blifvit uppstoppad, samt afritad och graverad i Mus. Carlson.

Den svartaktiga varieteten B) undergick sin förändring i bur här i Lund, sedan hon en längre tid blifvit född med hampfrön.

Vistelseort och lefnadssätt: Domherren träffas aldrig om sommaren i det södra Sverige; först mot vintrens annalkande infinner han sig här familjvis i skogar och trädgårdar, isynnerhet på sådana ställen der rönnbär finnas. Under hela vintren uppehåller han sig här och mot våren flyttar han åter bort. Om sommaren vistas han i halföns bergiga och skogfulla landskap. I grauskapet af polcirkeln har jag sett honom under nämnde årstid, och i norra delen af Wermeland tillbringar han äfven hela sommaren *).

*) Enligt gunstigt meddelad underrättelse af Herr Öfver-Jägmäataren H. Falk.

Domherren är föga skygg, och blir i fångenskapen lätt tam, samt lärer sig snart att efterpipa åtskilliga arier och melodier. Dess naturliga sång är knirkande och föga melodisk. Äfven honorna sjunga och äro läraktiga. Dess lockljud är en ren flöjtton: *hui! hui!* som man visslande kan lätt efterhärma. Äfven de gamla som fångas blifva snart tama.

Födämnena: Frön af åtskilliga slags träd, såsom af fur, gran, rönnbär, enbär, njupon, hagtornbär, olvon m. m. Äfven trädknoppar och åtskilliga öttfrön. Bären bortkastas, endast frön eller kärnorna förtäras.

I fångenskapen underhåller man dem med hampfrön och roffrön, hvaribland man stundom smular uppmjukadt bröd.

Fortplantning: I träd eller buskar i skogarna bygga de ett konstlöst näste af fina risqvistar, fodradt med mossor. Äggen 3 — 6 blåaktigt hvita med violetta och brunaktiga fläckar kring den tjockare ändan. Begge könen rufva dem vexelvis i femton dagar.

Fångst: På vanligt limspö-träd, (se sid. 325.) under hvilket man antingen sätter en lockfogel, eller i brist derpå, själf ditlockar dem genom att efterhärma deras lockton.

Nytta och skada: Köttet är välsmakligt och sundt. Hannarna värderas för sin skönhet och sång. — De skada stundom trädgårdarna om vintren derigenom att de äta knoppar af fruktträden.

Anm. *Karmosinröda Domherren*. (Pyrrhula erythrina, Temm.)

Hannen: Hufvudet, halsen ofvan och framryggen skönt karmosinröda; öfvergumpen, hufvudets sidor, strupen, framhalsen och bröstet rosenfärgade; ryggen och vingtäckarna gråbruna. Vingarne och stjerten svartaktiga.

Längd 5 1/2 tum.

Honan: Ofvan gråbrun; strupen och kinderna med hvita och bruna fläckar. Framhalsen och alla undra kroppsdelar hvita med stora, långsgående mörkbruna fläckar.

Pyrrhula erythrina, Tem. Man. I. p. 336. — Fringilla erythrina, Mey. Vögel Liv- u. Esthl. p. 77. fig. — Loxia cardinalis, Beseke Vög. Curl. p. 77.

Bebor de nordöstliga delarna af Europa; förekommer i Finnland, Kurland o. s. v.

Högst sannolikt hörer denna fogel äfven till Skandinavians Fauna, fastän han mig vetterligt ännu ej är funnen på vår halfö; så framt ej Linnés Fringilla flammea Fu. p. 87. bör räknas hit. Om denna fogel känner man ej mer än de få ord som stå i Linnés Fauna; ty den figur hos Rudbeck som citeras, finnes nu mera icke, hvarken i det De Geerska eller Grillska exemplaret af Rudbecks aves pict.

Tallbit-Slägtet. (Corythus, Cuv.)

Näbben kort, tjock, hoptryckt kegelformig, mera hög än bred, kullrig; öfverkäken längre, ofvan försedd med tydlig ryggkant och i spetsen nedböjd till en hake.

Näsborrharna vid näbbroten, små, runda, täckta med framåttiggande korta hårlika fjädrar.

Benen: tarserna föga längre än mellantån.

Vingarna temligen långa; 2:dra och 3:dje vingpennan längst; 1:sta föga kortare, och längre än 4:de.

Stjerten lång, klufven.

De hithörande foglar, af hvilka ej mer än *en* art är känd i Europa, komma till lefnadssättet och kropp-formen närmast *Korsnåbbarna*, hvilka de äfven till färgombytet mest synas likna. Hannarna äro olika honorna och de få ej sin beständiga färg förr än 2:dra eller 3:dje året. De lefva af frön och kärnor.

1. Allmänna Tallbiten. (*Corythus Eucleator*).

Artm. *Vingar och stjärt svartaktiga med två hvita tvärstreck öfver de förstnämnda. Kroppsfärgen hos Hannen röd eller gul; hos Honan gråbrun eller gulaktig.* Längd $7\frac{1}{2}$ — 8 tum.

Loxia Eucleator, Lin. Fn. Sv. p. 81. — Retz. Fn. p. 234. — Lath. Ind. I. p. 372. — Lin. Syst. I. p. 299. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 125. — *Pyrrhula Eucleator*, Tem. Man d'Orn. I. p. 333. — *Fringilla Eucleator*, Mey. Vög. Liv- u. Esthl. p. 74. — *Gros-bec du Canada*, Buff Ois. 3. p. 457. pl. enl. 135. f. 1. — Edw. tab. 123 124. — *Pine Grosbeak*, Pen. Brit. Zool. I. p. 317. n. 114. — Arct. Zool. 2. p. 348. Suppl. p. 64. — Lath. Syn. 3. p. 111. n. 5. Suppl. p. 148. — *Haaken-Kreutzschnabel*, Bechst Naturg. Deut. 3. p. 28. — *Svenskan*, Zett. Lapp. Resa I. p. 243. — *Sv. Tallbit*, *Svenska*, *Svensk papgoja*: *Nattvaka*; Smål. *Waktel*.

Beskrifn. *Gammal Hanne*: Hufvud, hals, öfvergump och alla undre kroppsdelar pomeransgula. En vitgrå fläck mellan näbben och ögat; öfver denna ett mörkt strek. Ryggen och skuldrorna mörkbruna, med gröngula fjäderkanter. Magen åt midten samt undergumpen askegrå. Vingarna och stjärten

svartaktiga med två hvita tvärstrek öfver de förstnämnda. Benen och näbben ofvan mörkbruna; den sednare inunder ljusare.

Tugre Hanne: Vingar och stjert som hos föregående, dock mer svarta. Hufvudet och öfvergumpen karmosinröda. Genom ögat ett svartaktigt strek. Halsen ofvan och ryggen svartaktiga med karmosinröda fjäderkanter. Strüpen, frambalsen och bröstet ljust karmosinröda. Magen askegrå. Undergumpen hvit.

Anm. Denna färg öfvergår småningom i gult; neml. alla röda delar blifva först rödgula (mörkt pomeransfärgade) och sedan ljusare gula.

Honan: Ofvan gråbrun med gul anstrykning på hufvudet och öfvergumpen; inunder askegrå, svagt stötande i gult.

Anm. Ingen Ornitholog har någonsin sett en röd Hona af denna art. Herr Zetterstedt påstår dock p. a. st. att "vid ett och samma bo träffas stundom Hannen röd och Honan gulaktig, vid ett annat är förhållandet tvertom", — således honan röd och hannen gulaktig!

Varierar tillfälligtvis: Hvit, hufvudet ofvan samt halsryggen och öfvergumpen stötande i gult. Vingarna svartaktiga med hvita fläckar och strek. Stjerten svartaktig.

Anm. *Loxia Flamengo*, Sparrm. hörer icke till denna art, utan till *Pyrrhula vulgaris*. Se sid. 356.

Vistelseort och lefnadssätt: Till Skåne kommer Tallbiten, dock icke alla år, i November eller December, förr än starkt frost eller snö inträffar. I Småland och de öfriga skogfulla och bergiga landskapen af det medlersta Sverige, insinner han sig stundom under senhösten och vintren flocktals. Mot vå-

ren återvänder han till Lappland, i hvars skogar han tillbringar sommaren och fortplantar sig *). Dock synes han under denna årstid mera tillhöra det inre af landet än kusttrakterna.

Till lynnet är denna fogel utomordentligt dum och trög, samt låter utan möda fånga sig och blir i fångenskapen genast tam. Dess sång som består af rena flöjt-toner är ganska omvexlande och utmärkt vacker; dess färg är schön, och han blir snart sin ägare ganska tillgifven. För dessa sednare egenskaper skull, har man honom ofta i bur, och han hör i sanning till de angenämaste sångfoglar; men han tåler ej värma. Om man derföre vill behålla honom vid lif, måste man låta honom vistas i kallt rum.

Födämnena: Frön af fur och gran, samt kärnor af rönnbär, oxelbär, enbär m. m. I fångenskapen kan man underhålla honom med samma födämnena samt med hafra, gryn, m. m. Af hamprön blir han allt för fet och dör snart.

Fortplantning: Sitt bo bygger Tallbiten på trädens grenar invid stammen, i täta barrskogar 4 — 6 alnar från marken. Det är förfärdigadt af risqvistar och stråu samt stundom fodradt med fjäder. I Juni månad lägger Honan 3 — 4 ägg, stora som Kornsparfvens, blekt grönaktiga med större och mindre svarta, lefverbruna och grå punkter, isynnerhet kring den tjockare ändan.

Anm. Af denna, så väl som af flera foglar, hvilka vanligen lägga fläckiga och färgade ägg, har man funnit

*) Äfven fortplantar foglen sig i Skottland och Norra Amerika. Se Pennants Arct. Zool. 2. p. 348.

dem ofläckade och utblekta, således hvita. Se Pen. Arct. Zool. 2. p. 348.

Jagt och fångst: Med hagel kan man lätt skjuta denna fogelart, emedan han alldeles icke är skygg. I Småland och på flera ställen i Sverige, der han stundom om vintren i mängd infinner sig och besöker rönträden, fånga Gossar honom på det sätt att de vid ändap af en lång käpp fästa en snara af hästtagel, som de träda öfver hufvudet på honom, samt neddraga på detta vis den ena efter den andra ur trädet.

Nytta: Köttet är ätligt. — Som angenäm sångfogel hålles han ofta i bur.

Korsnäbb-Slägtet. (*Loxia, Briss. **).

Näbben medelmåttig, stark, på sidorna hoptryckt, ofvan och inunder kullrig; båda käkarne krökta, den öfra nedåt, den nedra uppåt, så att spetsarne korssa hvarandra; underkäkens kanter inböjda.

Näsborrarna vid näbbroten, små runda, täckta med framåtliggande borstlika fjädrar.

Benen temligen undersättsiga, ut-tån vid roten hopvuxen med mellantån; klorna temligen starka och krumböjda.

*) Benämningen *Loxia* kommer af Grekiska ordet *λοξος* sned, krumböjd, och blef först tillaggd *Korsnäbbarna*, men utsträcktes af *Linné* till alla Sparfvar med tjock och kegelformig näbb. Sedermera har benämningen åter blifvit inskränkt till sin ursprungliga betydelse.

Vingarna medelmåttiga; 1:sta, 2:dra och 3:dje vingpennan nästan lika, dock 2:dra längst.

De hithörande foglar uppehålla sig om sommaren i barrskogarne i Halföns nordligare Landskap, och de finnas der så långt åt Norden som tallar växa, således ända inom polcirkeln. Om hösten och mot vintren stryka de familj-vis eller i stora skaror omkring i skogarne i det sydligare Sverige, och nedkomma då ej sällan till Skåne, der de träffas i skogar, trädgårdar och lundar, isynnerhet der rönnbär växa, som här, vid nämnde årstid utgöra deras hufvudnäring. I barrskogarne lefva de nästan endast af fur- och graufrön, till hvilkas utplockande ur kottarne deras ovanliga näbbform synes isynnerhet danad *).

Anm. Det är märkvärdigt att det sydligare Europas Ornithologer påstå, att dessa foglar hos dem lägga bo och fortplanta sig midt under kalla vintren, och att de mot sommaren flytta mot Norden, just i omvänd ordning mot allt hvad man hittills känner om andra foglar. (Se Temm. Man. d'Ornith. I. p. 325.) Och det som ännu mer synes öka det besynnerliga häri, är att dessa foglar icke blott finnas i våra mest nordliga provinser om sommaren, utan äfven fortplanta sig der under nämnde årstid. Den nedanför beskrifna ungen af *Loxia curvirostra*, som nyss lemnat nästet, blef skjuten i en granskog vid Hogdal i Herjedalen, i början af Juli, af Hr Prof. A. Retzius, Sonen. — Detta synes bevisa riktigheten af Hr Brehms påstående att dessa foglars fortplantning icke är bunden till någon viss årstid. Se Meyers Zusätze p. 43.

*) Härpå väckte redan Linné uppmärksamheten. Se Fn. Sv. p. 81.

1. Större Korsnäbben. (*Loxia pytiopsittacus*, *Bechst*)

Art n. Näbben mycket stark och undersättsig $\frac{2}{16}$ tum hög och likaså bred vid roten. Käkarne starkt krökta; öfverkäkens spets perpendikulär mot hufvudets långslinja; underkäkens uppstående, synes sällan öfvernäbbryggen. Längd 7 tum.

Loxia pytiopsittacus, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 21. — *Meyer Zusätze*, p. 43. — *Crucirostra pinetorum*, Meyer Vogel-Liv- u. Esthl. p. 71. — Nilss. Ornith. Sv. I. p. 120. — *Loxia alia species*, Rudb. av. pict. fol. 100. — *Loxia curvirostra major*, Gmel. Syst. I. p. 843. — Sv Större Krumsnabel. Större Korsnäbb.

B skrifn. Näbben mörkt hornfärgad med ljusare käkkanter (som hos de yngre äro gulaktiga), mycket undersättsig och tjock, något kortare än mel-lantån, då klon räknas. Käkarne, som bibehålla sin tjocklek ett stycke från roten, äro trubbigare tillspetsade och mer krökta i spetsarne, så att öfverkä-kens spets fortsatt skulle bilda en rät vinkel med hufvudets longitudinella axis. Underkäkens spets öf-verstiger sällan näbbryggen *). Underkäken inunder mycket kullrig, dess rotgrenar starkt utspärrade. — Hufvudet är äfven större än hos följande art, och synes nästan fyrkantigt Ögonen små. Iris kastanj-brun. Benen bruna, hos de yngre gråbruna. — Läng-den 7 — $7\frac{1}{4}$ tum, hvaraf stjerten ungefär $2\frac{1}{2}$ tum,

*) Dock händer det ibland att han verkligen öfverstiger den; liksom det stundom hos följande art inträffar att underkäkens spets icke hinna näbbryggens hori-zontella plan. Exempel på båda fallen har jag just nu för mig.

och af denna betäcka vingarna $\frac{2}{3}$; vingbredden 12 tum. Näbben från näbbviken $\frac{6}{8}$ t.; mellantån med klo något längre. Tarsen $\frac{1\frac{3}{4}}{6}$ tum.

Hannen: Röd, än zinnoberröd, än mynjeröd, än tegelröd; på ryggen och vingtäckarne mörkare brunaktig; på hufvudet, på de undra kroppsdelarna och isynnerhet på öfvergumpen ljusare röd och glänsande. På tinningarne en mörkbrun fläck. Magen åt midten hvitaktig. Ving- och stjärt pennor svartaktiga med en smal rödaktig kant. Undra stjärttäckarne hvita med en svartgrå fläck i midten.

Anm. Att sluta af analogien med följande art, som jag af egen erfarenhet närmare känner, så är den beskrifna en yngre Hanne. Följande färg tillkommer en

Äldre Hanne: Grön eller gulgrön på alla de delar der föregående är röd, och med samma färgnuancer, neml. mörkare grön på rygg och skuldror, ljusare gulgrön på hufvudet och de undre kroppsdelarne, samt ännu ljusare eller ljust gröngul på öfvergumpen. Vingpennornas och stjärtens smala kanter äfven gröngula.

Hona: Grå, ofvan mörkare med mer eller mindre tydliga grönaktiga fjäderkanter; inunder ljustgrå med grönaktig anstrykning på bröst och sidor. Öfvergumpen gröngul. Ving- och stjärt pennor svartbruna, smalt kantade med grönaktigt eller grått.

Unge före första ruggningen: Ofvan svartgrå med ljusgrå eller grågula fjäderkanter; inunder hvitaktig med gulgrön anstrykning och långsgående smala svartgrå fläckar på bröstet, magen och sidorna. Ving- och stjärt pennor svartaktiga med gulgrå kanter.

Vistelseort och lefnadssätt: Större Korsnäbben uppehåller sig i barrskogarna så väl i de sydligare som norra delarna af halfön. Under vissa årstider träffas han här talrikare än följande art. Så har jag ofta funnit honom familj-vis eller i sällskap af 10 — 20 — 30 stycken kringsvärmande i Blekinges, Smålands, Upplands m. m. barrskogar, i Juli och Augusti månader, då jag sällan derstädes, under nämnde årstid träffat följande art. Man har anmärkt att denna föredrager tallskogarna, då deremot den *mindre Korsnäbben* hellre vistas i granskogarna; förmodligen sker detta derföre att dennas näbb är starkare, så att han lättare kan öppna de hårda tallkottarna. Han är äfven så litet liflig och skygg som följande art, hvars lefnadssätt han till det mesta delar. Då en skara slagit sig ned i topparna af en tallskog för att äta frön, sitta de helt stilla och man kan gå inunder utan att upptäcka deras närvaro på annat än de nedfallande kottarna.

Födämen: Tallfrön.

Fortplantning: Sitt bo lägger han i toppen af de högsta tallar. Äggen 3 — 4 gråaktigt hvita med blodröda fläckar och punkter.

2. Mindre Korsnäbben. (*Loxia curvirostra*, Linn.)

Artm. Näbben *mindre undersättsig*, $\frac{7}{18}$ tum hög och lika så bred vid roten; käkarne mer utdragna, svagt krökta, afsmalnande; underkäkens spets vanligen öfverstigande öfverkäkens rygg; dennas spets sned mot hufvudets långslinja. Längd $6\frac{1}{2}$ tum.

Loxia curvirostra, Lin. Faun. Svec. p. 81. — *Meyers Zusätze*, p. 45. — *Crucirostra abietina*, Mey Livn. Esthl. p. 72. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 122. — *Fichten-Kreuzschnabel*, Bechst. N. D. 3. p. 5. — Sv! *Mindre Korsnäbb*, *Kegelrifuare*; *Krumsnabel*.

Beskrifn. Näbben mindre undersättsig, hornfärgad; käkarne afsmalnande ända från näbbroten, äro svagt krökta och mer långsträckta, så att underkäkens spets merendels öfverstiger öfverkäkens rygg; båda bilda med hufvudets långtlinia, om den utdrages, spetsiga, ej rätta vinklar; deras kanter bleka; underkäkens i midten uppstående och skarpa. — Iris brunn. Benen gråbruna. — Längd $6\frac{1}{2}$ — $6\frac{3}{4}$ t. vingbredden $11\frac{1}{4}$ t. Stjerten $2\frac{1}{4}$ t. räcker $\frac{7}{8}$ t. utom vingarna. Näbben från näbbviken $\frac{6}{8}$ tum; mellantån, äfvensom tarsen af samma längd.

Hanne: Röd på hufvudet, halsen och hela kroppen; ofvan mörkare isynnerhet på ryggen och skuldrorna; något ljusare på hufvudet och på kroppens undra delar, och ännu ljusare på öfvergnuppen. På tinningarna en mörkbrun fläck, som synes sträcka sig framåt genom ögonen; och spår till bruna fläckar finnas äfven i nacken. Magen åt midten hvitaktig. Vingar och stjärt svarta med smala rödaktiga pennkanter, och röd anstrykning på de små vingtackarne. Stjertens undre täcksfjädrar svartgrå med breda, hvita fjäderkanter.

Anm. Genom flerfaldiga iakttagelser i Naturen tror jag mig böra med Bechstein antaga att den beskrifna är en yngre *Hanne* efter första ruggningen, och att följande *Hanne* är en

Gammal Hanne: Grön eller gröngul på alla de delar der föregående är röd: ryggen och skuldrorna

mörkast eller bruna med gröna fjäderkanter; hufvudet, halsen och kroppens undra delar grönaktigt gula, öfvergumpen gul. På tinningarna en mörkbrun fläck, och äfven i nacken finnas dylika. Ving- och stjertpennor svartaktiga med smala grönaktiga kanter. De små vingtäckarne med bredare gröna kanter. De närmaste vingtäckarne och de innersta vingpennorna med bredare hvitgråaktiga spetskanter, hvarigenom ett dylikt smalt strek öfver vingen uppkommer.

Anm. Den beskrifna Hannen blef dödad i medlet af Maj. Honan har stundom alldeles samma färg.

Hona: Ofvan gråbrun med gröna fjäderkanter på hufvud och rygg. Öfvergumpen gröngul. Undra kroppsdelarna grå med gröngul anstrykning på bröst och sidor. Pannan, hufvudets och halsens sidor askegrå, med en brun fläck på tinningarna. Strupen och medlersta delen af magen grå hvitaktiga. — På andra individer är den gröna och gula färgen mer utvecklad så att de fullkomligt likna den beskrifna gamla Hannen. I ingen ålder äro de röda; denna färg tillkommer endast de yngre Hannarna.

Ungarna före första ruggningen: Ofvan mörkbruna med gulgrönt der och hvar inblandadt samt med grå eller hvitaktiga fjäderkanter. Öfvergumpen samt kroppens undra delar hvitaktiga äfven med mer eller mindre gulgrönt, samt med långsgående svartbruna fläckar och strek. De begge raderna af stora vingtäckare samt de innersta vingpennorna kantade med hvitaktigt.

Unge som nyligen lemnat boet: Ofvan mörkbrun med gröngulaktiga, otydliga fjäderkanter som på huf-

vudet äro bredare och ljusare; inunder hvit med gulaktig anstrykning och talrika långsgående svartaktiga fläckar. Ving- och sljertpennor svartaktiga med smala hvitaktiga kanter. På öfvergumpen och på sidorna af halsen gulgrön. — Näbbkåkarna korsahvarandra icke; ty underkåkens spets är föga uppböjd. Längd 5 tum.

Anm. Herr Brehm, enligt Meyer i dess *Zusätze*, utgifver de gröna Hannarna af denna och föregående art för ettåriga, och de röda för gamla; och Hr Meyer antager äfven denna mening. Häri kan jag för min del icke instämma. Dessa foglars färg-förändring är fullkomligt analog med Tallbitens (*Corythus Eucleator*) och hos denna få Hannarna bestämdt först röd, sedan rödgul och derefter mer gul färg.

Vistelseort och lefnadssätt: Dess egentliga stamhåll äro furu- och granskogarna, så väl i Sverige som Norrige. Han finnes långt åt Norden, äfven inom polarcirkeln, så långt som barrskog växer. Om hösten träffar man honom familjvis kringstrykande i barrskogarna, der han söker sin näring. Mot vintrens annalkande kommer han stundom ned i trädgårdarna på Skånska slättbygden.

Korsnäbben är af naturen trög och enfaldig; hvarföre han af fogelfångaren lätt kan ertappas. Dess rörelser äro föga lifliga, och han är alldeles icke skygg. I barrträden ser man honom stundom hela timman sittande på en och samma kotte, af hvilken han utplockar fröna och hvilken han med uppmärksamhet genomletar på alla sidor och sittande i alla riktningar. Fallor kotten lös, så flyger foglen skyndsamt ned och fortsätter sin undersökning på marken. Han blir lätt tam, men fägnar icke sin ägare genom

hågon angenäm sång. Går han lös i kammaren, så söndergnagar han allt hvad han kommer åt; ty han har i näbben en otrolig styrka. Sätter man honom i bur, så måste denna vara af jern, ty en träbur söndergnagar han snart. Han klättrar i buren med tillhjälp af näbben, likasom en Papegoja.

Födämnena: Korsnäbben lefver endast af kärnor och frön, isynnerhet af gran- och tallfrön, hvilka han, med sin på sidorna vigglikt hoppträckta näbb och dess krumböjda spetsiga käkar, lätt kan framleta mellan de på hvarandra lagda fjäll hvaraf kotten består. Vid detta arbete fasthåller han sig på kotten med de hvassa, krökta klorna, och klättrar kring honom på alla sidor, ofta hängande inunder honom som en Mes. Blir kotten lös och nedfaller, så följer stundom foglen med och fortsätter sitt arbete på marken. Äfven förtär han alfrön, rönnbär och trädknoppar. I fångenskapen kan man föda honom med hampfrön.

Fortplantning: Denna är icke bunden till någon viss årstid, utan man finner dess näste så väl midt om vintren som midt om sommaren. Detta bygger han på de högsta grenarna af barrträden. Det består utvändigt af fina qvistar, hvarpå följer ett tjockt underlag af mossor, och invändigt är det vanligen fodradt med skägglafvar. Äggen 3 — 4 gråaktigt hvita med röda och bruna fläckar och strek.

Jagt och fångst: Korsnäbben kan lätt skjutas med hagel eller fällas med puströr, då han ej är skygg. Äfven fångas han på limspön för lockfogel.

Nytta och skada: Köttet kan ätas. Foglen gör i vilda tillståndet ingen annan skada än att han förtär en mängd trädfön.

Andra Roten.

Långa Kegelnäbbar. (Longicones).

Näbben medelmåttig eller lång, långsträckt-kegelformig, rak, trind, något nedtryckt.

Näsborrharna vid näbbroten skylda af framåtliggande hårlika fjädrar, eller halftäckta af en hvälfd hinna.

Benen med temligen korta tarser; uttån vid roten förenad med mellantån.

De hithörande foglar hafva sitt tillhåll i skogarna. Deras föda består hufvudsakligen i insekter och larver. Äfven förtära de frön, och några derjemte nötter, ollon m. m. De lägga sina nästen uti ihåliga träd. De rugga ej mer än en gång om året, och könen äro nästan lika. Deras kött är segt och föga läckert.

Anm. Den grupp af foglar som här blifvit förenade torde vid första påseendet förekomma mindre naturlig. Men intet enda af de hiträknade Släkten, passar för någon af de andra Afdelningarna. Stararna utgöra liksom öfvergången från Kråkfoglarna till Sångfoglarna; de ha vissa karakterer som tillhöra de förra, andra som tillhöra de sednare. Emedlertid tillåter ej deras näbbform att förena dem med någondera. Nötkrakorna bilda öfvergången från Korpslägdet bland Kråkfoglarna till Hackspettslägdet bland Klättrarna; men näbben tillåter ej att räkna dem bland de förra, och fötternas form förbjuder att föra dem till de sednare. Nötväcken närmar sig tydligen till Klättrarna o. s. v.

Emedlertid hafva de både i lefnadssätt och former mycket gemensamt, och de tyckas tillsammans förena. 2:ne skilda Ordningar, neml. Gångfoglar och Klätt-rare. — Hr Illiger sätter Sitta och Sturnus i samma Familj, under namn af Gregarii; Hr Temminck har Sturnus i samma Ordning som Caryocatactes; och Herr Bar. Cuvier sätter Släktena Sturnus, Sitta och Corvus näst efter hvarandra.

Stare-Slägtet. (Sturnus, Linn.)

Näbben medelmåttig, rak, långdraget-kegelformig, kantig, nedtryckt; något trubbig. Öfverkäken vid roten med en i pannan inskjutande rygg, i spetsen mycket nedtryckt, öfverböjd, i kanterne utstående och hel. Näbbsömmen bildande vid roten en vinkel.

Näsborrarna vid näbbroten på sidan, äggformiga, ofvan halftäckta med en hvälfad hinna.

Benen: tårserne föga längre än mellantån.

Vingarna långa; 1:sta vingpennan ganska kort; 2:dra längst.

Stararna lefva isynnerhet af insekter och larver. De bygga uti ihåliga träd, i murar, under tak o. s. v. Sedan ungarna äro utflögna, slå de sig tillsammans i stora täta skaror och flytta åt sydligare länder. Ungarna äro före ruggningen mycket olika de gamla.

i. Allmänna Staren. (Sturnus vulgaris, Linn.)

Artm. Svartaktig med purpurröd, grön, och blå metall glans; ofvan beströdd med små blekt rostfärgade fläckar.

Längd $8\frac{1}{2}$ tum.

Sturnus vulgaris, Lin. Fn. p. 77. — Retz. Fn. p. 224.
 — Nilss. Orn. I. p. 264. — Lath. Ind. I. p. 231.
 — L'Etourneau, Buff. Ois. 3. p. 176. t. 15. —
 Pl. enl. 75. — Tem. Man. I. p. 132. — *Stare*,
 Lath. Syn. 3 p. 2. Suppl. p. 137. — *Gemeiner*
Staar, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 816. — Sv.
Stare. Norr. *Stär*.

Beskrifn. *Hannen i vårdrägt*: Hela föglens grundfärg är svart och skönt glänsande, på hufvudet och strupen af purpur, på främre ryggen och främre bröstet af metallgrönt, på vingtäckarne, bakre ryggen, bröstet och sidorna af azurblått. Alla öfra kroppsdelar ända från nacken beströdda med små blekt roströda trekantiga fläckar; ty fjädrarna äro spetsiga och spetsarna ha denna färg. Vingarnes och stjertens undre täckfjädrar kantade med rostgulaktigt hvitt. Vingpennorna svartaktiga, mot spetsen mörkt askegrå, omgifna af ett svart band och kantade utvändigt med rostgult. Stjerten tvär; dess pennor mörkt askegrå, med svart spole och omgifna af ett svart band samt smalt kantade med rostgult. Näbben under fortplantningstiden gul, eljest svartaktig. Benen brunt-köttfärgade. Iris brun. Längd $8\frac{1}{2}$ — $8\frac{3}{4}$ t. Vingbredd. 15 — $15\frac{1}{2}$ tum.

Honan är mindre glänsande; de rostgula fläckarna på öfra kroppsdelarna mindre talrika, smärre och blekare; öfvergumpens fjädrar kantade med rostgrått; magen och undergumpen med talrika, stundom sammanlöpande hvita fläckar. Näbben har mindre gult.

Ungarna före ruggningen: Gråbruna, ofläckade; vingarne och stjerten af samma färg, men med smala

rostgrå eller (på vingpennorna af 2:dra ordningen) hvitgrå, kanter. En svart fläck mellan näbben och ögat. Strupen hvitaktig med rostbrun anstrykning; magen med otydliga hvitaktiga och gråbruna fläckar.

Anm. I slutet af Augusti och i September rugga Stararna, och efter denna tid äro:

Unga och gamla efter höstruggningen: lika de gamla i vådrägt och med samma glans; alla öfra kroppsdelar ända från pannan äro tätt beströdda med rödbruna (på framryggen blekare) fläckar; men dessa fläckar äro ej så trekantiga, ty fjädrarna äro ej så spetsiga, utan i spetsen mer afrundade: äfven de afsmalnande hufvudsfjädrarna äro i sjelfva spetsen afrundade. Bakryggens fjädrar bredt kantade med rödbrunt. Undre kroppsdelarna beströdda med hvita, på halsen små och runda, på bröstet och magen något större tvärs ovala fläckar, alla nästan tvådelade genom ett svart strek. Ving- och stjärt pennor med breda rödbruna kanter. Näbben svartaktig. Benen rödbruna.

Anm. Fjäderysningen hos de unga, hvarigenom den gråbruna färgen ombytes till den svarta glänsande och fläckiga, börjar på bröstet och öfvergumpen, fortsättes derefter på midten af främre ryggen, på skuldrorna, vingpennorna och deras närmaste täckfjädrar, deras mindre täckfjädrar, stjärt pennorna; derefter på öfra delarna af hufvudet, sist på strupen och hufvudets sidor.

Varierar tillfälligtvis: Hvit, antingen helt och hållet, eller på en och annan kroppsdel. Stundom smutsigt isabellgul eller rostbrunaktig.

Vistelseort och lefnadssätt: Stararne bebo om sommaren de flesta skogstrakter af vår halfö från

Skåne ända inom polcirkeln. I Helgeland äro de ej sällsynta, och i Salten förekomma de äfven. Dock synes detta Fögderi utgöra deras gräns åt Norden, i kusttrakterna af halfön. I Finnumarken finnas de icke.

Som flyttfoglar återkomma de till Skåne tidigt om våren, redan i Mars månad, och träffas då i flockar på sankar ängar vid sidan af åar och kärr. Redan i April träffar man dem i skogarna, der de parvis fördelt sig för sin fortplantning. I Juni träffar man fullvuxna ungar, och efter denna tiden slå sig flera familjer tillsammans i stora täta skaror, och ströfva kring på ängar och betesmarker. Ofta ser man dem hela dagen söka sin föda bland boskapen. Mot aftnarna svärma de omkring och hvila öfver nätterna i träd, eller i vassen bland rör och säf. I September träffas de ännu flocktals äfven i det öfra Sverige, och först i Oktober försvinna de småningom äfven i Skåne. Om vintren träffas de högst sällan på vår halfö *).

Staren är af naturen en mycket sällskaplig fogel, som icke blott under sträcktiden lefver flockvis, utan som äfven under fortplantningstiden, liksom Råkan och Björktrasten, ofta bildar talrika kolonier. I gamla eklundar, belägna vid ett fält, eller i höga trädbyggnader, kyrkor, klockstaplar o. d. belägna i skogstrakter, träffas han ofta i mängd, och flera par hafva ej sällan sina bon i samma träd eller i samma

*) En enda gång har jag sett en Stare midt om vintren vid Malmö, der han i sällskap med Kajor sökte sin föda på gödselhögarna.

byggnad. — Staren är liflig och munter, och blir i fångenskapen snart tam. Han har, liksom arterna af Korpslägtet, förmågan att lära eftersäga ord, och han lär sig äfven att efterhärma andra djurs och foglars läten och sång, samt att hvissla vis-toner o. d. Dess naturliga sång består af hvarjehanda besynnerliga surrande och hvisslande toner. Honan sjunger äfven; men ej så bra som hannen.

Föddämnena: Insekter, larver, daggmaskar, sniglar och åtskilliga slags frön och korn. Ofta sätta Stararna sig på ryggen af får och annan boskap för att bortplocka flugor, brömsar och andra insekter. Stundom kasta de sig på kadaver i sällskap med Kråkor och Kajor; kanske likväl blott för att uppsöka maskar och insekter. — I fångenskapen kan man föda dem med bröd eller korngröpe som blifvit i mjölk uppmjukadt. Stundom ger man dem krossade hampfrön, mask, kött, ost m. m. Äfven böra de ständigt hafva ett kärl med vatten för att kunna bada sig.

Fortplantning: I hål i gamla träd, i klockstaplar, under taken, i murar o. s. v. lägga de sina bon. Äfven bygga de i ihåliga trädstycken som ha en öppning på sidan och som man uppsätter der de hafva sitt tillhåll. Boet består af strån, löf, hår, ull, fjädrar m. m. och är utan konst sammanlagdt. Äggen 4 — 6 ljusst blågröna ofläckade. Ungarna uppfödas med insekt-larver. De ungar, man tager ur nästet och uppföder, lära lättare än de gamla att eftersäga ord, att hvissla arier o. d.

Jagt och fångst: Då de icke äro särdeles skygga, samt flyga eller sitta flockvis tätt tillsammans, kan man lätt med ett skott finna hagel nedlägga ett stort antal. Isynnerhet kan man lätt öfverraska dem om afnarna i träden eller vassen der de slagit ned för att hvila öfver natten. I Tyskland brukar man äfven att fanga dem med slagnät.

Nytta: Köttet af unga Starar är ätligt, ehuru visst icke läckert. — Stararna gagna mest derigenom att de förtära en mängd skadliga och besvärliga insekter, gräshoppor, flugor o. s. v. samt larver.

Nötkrake-Slägtet. (*Caryocatactes*, *Cuv. et Nilss.*)

Näbben längre än hufvudet långdraget-kegelformig, rak, nästan trind, slutas med en nedtryckt trubbig spets; Öfverkäken längre, saknar ryggkant; Underkäken inuti försead med en långsgående knöl.

Näsborrarna vid näbbroten, runda, öppna, skylda af styfva framliggande fjädrar från pannan.

Benen: Tarsen längre än mellantån.

Vingarna: 1:sta vingpennan medelmåttig; 2:dra längre än 8:de; 4:de längst.

Detta Slägte utgör en tydlig öfvergång från Korpslägtet till Hackspettarna. Liksom de sistnämnda klättrar Nötkrakan på trädens stammar, samt slår och borrar i barken med näbben för att få insekt-larver, hvilka utgöra

dess föda. Äfven förtär hon nötter, kärnor, frukter m. m. Hon bygger i ihåliga träd. Om hösten slå sig flera familjer flockvis tillsammans och strefva kring i skogarna. Könen äro nästan lika; och ungarna äro föga olika de gamla.

1, Nötkrakan. (*Caryocatactes guttatus*, N.)

Artm. Brun beströdd med hvita droppformiga fläckar. Vingar och stjert svarta, med stjertspetsen och de undre stjerttäckarne hvita. Längd 13 tum.

Caryocatactes guttatus, Nilss. Orn. Sv. I, p. 90. — *Corvus Caryocatactes*, Lin. Fn. p. 31. — Retz. p. 94. — *Nucifraga Caryocatactes*, Tem. Man. d'Orn. I. p. III. — *Le Casse-Noie*, Buff. Ois. 3. p. 122, t. 9. — Pl. enl. 5p. — Edw. Av. t. 240. — *Nutcracker*, Lath. Syn. I. p. 400 Suppl. p. 82. — *Der Tannenheher*, Bechst. N. D. 2. p. 1257. — *Nötkraka*. *Nötknäcka*. Öl. *Nötskrika*.

Beskrifn. Hela kroppsbeklädnaden brun; beströdd med hvita droppformiga fläckar på rygg och skuldror, men ofläckad på hufvudet och i nacken. Undra kroppsdelarna med talrikare och större hvita fläckar. Strupen tecknad med hvita strek och trakten mellan öga och näbb hvit. Vingarna svarta; de medlersta vingpennorna i inre fanet med en hvit fläck. Stjerten svart med hvit spetskant som tilltager i bredd på sidopennorna. Undra stjerttäckarne hvita, öfra svarta.

Honans bruna färg är mer rostbrun.

Vistelseort och lefnadssätt: I Sveriges medlersta Landskap är denna fogels egentliga stamhåll om sommaren. Äfven förekommer han då i dess nord-

ligare trakter, samt i Norrige ända upp i Stördalen, ofvan Trondhjem. I Skåne har jag aldrig träffat honom utan om hösten och vintren, dock icke alla år. Om sommaren bebor han helst täta skogar i bergiga trakter, så väl barrskogar som löfskogar. Om hösten då han flockvis ströfvar omkring, besöker han isynnerhet ek- bok- och hasselskogarne. Dess skrik liknar Hackspettarnes; dess flygt mera Kajans.

Födämnen: Om sommaren isynnerhet insekter och larver, som han uppsöker under trädens bark. Äfven förtär han daggmaskar och sniglar. Om hösten äter han ollon, nötter, frön af tall och gran, rönnbär m. m. Om vintren upplockar han hafrekorn i hästspillningen på vägarne. — Äfven förtär han foglar som fastnat i snaror, Fogelungar och ägg skola ej heller vara säkra för honom.

Fortplantning: I täta bergiga skogar lägger han sitt bo i ihåliga träd. Äggen 5 — 6 smutsigt gulbruna med små rostfärgade och mörkbruna fläckar och punkter.

Jagt och fångst: Om sommaren äro de alldeles icke skygga och kunna då lätt fällas med skjutgevär. Om hösten fastna de stundom i de med rönnbär försedda donor som utsättas för Kramsfoglar.

Nytta: Köttet kan ätas.

Nötväcke-Slägtet. (Sitta, Linn.)

Näbben medelmåttig, rak, långsträckt-kegelformig, trind, vid roten nedtryckt, utåt något hoptryckt.

Näsborrarna rundaktiga, glest skylda af fram-
åtliggande hår.

Benen: Tårna långa med krökta spetsiga klor;
isynerhet är baktån lång och dess klo stark.

Stjerten tvär, mjuk.

Vingarne: 1:sta vingpennan mycket kort;
2:dra kortare än 3:dje; denna litet kortare
än 4:de som är längst.

Nötväckorna klättra på trädens stammar
både uppåt, nedåt och i alla rigtningar. De-
ras lefnadssätt närmar dem till Mesarna. De
lefva af insekter och larver, samt ollon och
nötter. De bygga i ihåliga träd. Könen äro
nästan alldeles lika, och ungarne äro föga
olika de gamla.

1. Nötväckan. (*Sitta Europæa*, Linn.)

Arten Ofvån blågrå med ett svart strek genom
ögonen; inunder hvitaktig. Stjertpennorna svarta med
en vit fläck framför den grå ändan; de två medler-
sta blågrå. Längd $5\frac{3}{4}$ tum.

Sitta Europæa, Lin. Fn. p. 37. — Retz. p. 106. —
Nilss. Örn. I. p. 100. — Tem. Man. I. 407. —
La Sittelle, Buff. Ois. 5. p. 460. f. 20. — Pl. enl.
623. f. 1. — *Nuthatch*, Lath. Syn. 2. p. 648.
Suppl. p. 117. — *Der Kleiber*, Bechst. Nat. D. 2.
p. 1061. — Sv. Nötpacka, Nötväcka; Norr. Nöt-
väcke, Egde, Eremit.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar blågrå. Från
näsborrarna genom ögat och vidare åt sidan af hal-
sen går ett svart band. Undre kroppsdelarna hvita
med svag rostgul anstrykning på bröst och mage.
Slaksidorna och låren roströda. Vingpennorna mörk-

bruna; de inre af ryggens färg. Stjerten teml. kort, dess pennor svarta; de 3 — 4 yttre med en hvit fläck mot spetsen; alla i själfva spetsen, och de två medlersta öfver allt askegrå. De undra stjertläckarna hvita med roströda kanter. — Näbben mörkt gråblå; inunder hvitaktig. Iris nötbrun. Benen gulaktigt grå. Längd $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ tum. Vingbredden $9\frac{1}{4}$ tum.

Honan är något mindre, har mindre lifliga färger och det svarta bandet mindre tydligt.

Vistelseort och lefnadssätt: Nötväckan förekommer allmänt i skogarna i det södra Sverige. Äfven träffas hon i Norrige och i det öfra Sverige. Dess gräns åt Norden är dock ännu ej bestämd. Hon blir kvar hos oss hela året, bebor om sommaren isynnerhet löfskogar der gamla ekar, bokar o. s. v. finnas; om hösten och vintren besöker hon trädgårdarna. Denna fågel är alldeles icke skygg. Ständigt är han i rörelse, klättrar på trädstammarna uppåt, nedåt och åt sidorna. Dess lockton är ett gällt och hastigt hvisslande: *tjutt, tjutt, tjutjutt, tjutjutt!* Om natten döljer han sig i hål i träd.

Födämnen: Isynnerhet insekter, hvilka han uppsöker i trädens bark. Om hösten förtär han äfven ollon och nötter. Dessa sätter han fast i en springa i barken, ställer sig deröfver med hufvudet nedåtvändt, bultar derpå med näbben, hvarvid han använder hela kroppens tyngd, och öppnar på detta sätt skalet, samt uttager kärnan. — I fångenskapen kan

man föda honom med hampfrön, hafra, bröd, och gröppning som blifvit uppmjukadt i mjölk. — I fria tillståndet samlar han förråd af sitt öfverflöd i hål i träd. Äfven i fångenskapen märker denna dess instinkt att undangömma det öfverflödiga till en annan måltid.

Fortplantning: I gamla ihåliga träd, då öppningen är för stor, tillsmetar han den med våt jord så att den ej blir större än att han jemt kan gå in och ut. Äggen 6 — 7 hvita beströdda med röda fläckar. Begge makarna rufva vaxelvis.

Nytta och skada: Köttet är ätligt. — Om hösten gör foglen skada på nötskogarna.

Andra Familien.

Sylnäbbar, (Subulirostres)

eller

Tunn-näbbar, (Tenuirostres).

Näbben *lång eller medelmåttig, smal, hoptryckt, böjd och kantig.*

Näsborrarna *vid näbbroten, bara eller glest skylda af fjädrar från pannan.*

Benen *korta, uttån hopvuxen med mellantån till första stundom till yttersta tåleden.*

De hithörande foglar lefva af Insekter hvilka de uppsnappa antingen klättrande på trädstammarne, eller löpande på marken, eller sväfvande i luften. De lägga sina bon i

hål i träd, i klippor, murar, eller i bräddar vid vatten. Könen äro föga olika, och ungearne likna de gamla.

Trädkrypare-Slägtet. (*Certhia*, L.)

Näbben medelmåttig, smal, något bågböjd, hoptryckt, spetsig.

Näsborrarna vid näbbroten, bara, aflånga, halftäckta af en kullrig hinna.

Benen: uttån vid roten hopvuxen med mellantån: Klorna mycket krökta och spetsiga; bakklon störst.

Stjerten vigglik, bestående af styfva, spetsiga och något nedböjda pennor.

Vingarna: 1:sta vingpennan kort; 2:dra kortare än 3:dje och denna något kortare än 4:de och 5:te som äro längst.

De klättra på trädens stammar, liksom Hackspettarna, och de stödja sig dervid på den styfva, elastiska och inböjda stjerten. De föda sig af små insekter, larver och insektägg.

1. Trädkryparen. (*Certhia familiaris*, L.)

Artm. Ofvan fläckig af brunt, rostgult och hvitaktigt; inunder hvit; Öfver de utbredda vingarna ett gulaktigt tvärband. Längd $5\frac{1}{4}$ tum.

Certhia familiaris, Lin. Fn. p. 38. — Retz. p. 108.

— Nilss. Orn. I. p. 98. — Lath. Ind. I. p. 280.

— Le Grimpercau, Buff. Ois. 5. p. 531. t. 21. f.

1. — Pl. enl. 681. f. 1. — Sparrm. Svensk Orn.

fig. — *Common Creeper*, Lath. Syn. 2. p. 701. Suppl. p. 126. — *Gemeiner Baumläufer*, Bechst. Naturg. D. 2. p. 550. — *Motacilla scolopacina*, Norske Vidd. Selsk. nye Skrift. 2. p. 367. m. fig. Sv. Trädkrypare.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ofvan mörkbruna beströdda med hvitaktiga och rostbruna långsfläckar. Ryggen och skuldrorna mer rostbruna beströdda med hvitaktiga fläckar. Öfvergumpen rostgul. Öfver ögonen ett hvitaktigt strek. Alla undra kroppsdelar hvita med rostfärgad anstrykning på undergumpen och slaksidorna. Vingpennorna svartbruna med hvitaktig spetsfläck. Ett matt rostgulaktigt band går öfver dem alla, utom de 3 yttersta, yttre kanten hos de medlersta utåt rostgrå. Vingtäckarne svartbruna med hvitaktiga spetsfläckar. Stjertpennorna rostgrå, i inre fanet mer bruna, styfva, spetsiga. Näbben ofvan svartbrun, inunder hvitaktig. Iris brun. Benen gråbruna. Bakklon längre än baktån.

Honan saknar det rostgula på kroppens öfra delar, och bandet öfver vingarne är hvitt.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel tillhör mera de södra än de norra trakterna af vår halfö. Likväl förekommer han äfven i Sveriges medlersta landskap och i Norrige till och med någon gång norr om Fjällryggen. Dess gräns åt Norden känner man likväl ännu icke. I Skåne, Halland, Småland och Blekinge är han temligen allmän i skogarna. Om hösten infinner han sig äfven i trädgårdarna på Skånska slättbygden. Med största lätthet och skicklighet klättrar han på trädstammarna, och han är så litet

skygg att man kan gå nära in till honom, utan att han flyger. Under det han klättrar har han ständigt hufvudet uppåt vändt, och han kan icke, såsom Nötväcken, vända det nedåt eller åt sidorna. Liksom hos Hackspettarna tjänar honom, under klättrandet den styfva elastiska stjerten till understöd.

Föddämnena: Insekter, larver, puppor och insekt-
ägg, hvilka han uppsöker mellan barken på träden.

Fortplantning: Sitt bo lägger han i hål i träd, eller i springor mellan träd. Balen består af mossa, små ris, fjäder och hår. Äggen 6 — 9 hvita, bestrodda med rostbruna prickar.

Nytta: Denna lilla fogel förtär många för skogarna skadliga Insekter.

Härfogel-Slägtet. (*Upupa*, Linn.)

Näbben mycket lång, smal, något bågböjd, trekantig och hoptryckt.

Näsborrarna vid näbbroten på sidan, öppna, ovala.

Benen korta; tarsen af mellantåns längd; denna hopvuxen med uttän till första leden.

Stjerten tvär, bestående af tio pennor.

Vingarna medelmåttiga; 1:sta vingpennan medelmåttig; 2:dra och 3:dje kortare än 4:de och 5:te som äro längst.

Härfogeln vistas oftare på marken än på träden. På fuktiga skogsängar söker han insekter och larver, som utgöra dess näring. Han lägger sitt bo i ihåliga träd, eller i

springor af klippor och gamla murar. Om sommaren lefver han parvis i skogarna; om hösten träffas han familjvis under sina resor åt sydligare länder.

Härfoglen. (*Upupa Epops*, Linn.)

Art m. Rostgul fjäderkam med svart kant. Rygg och vingar svarta med gulhvita tvärband. Stjerten svart med ett hvitt tvärband. Längd $11\frac{1}{2}$ tum.

Upupa Epops, Lin. Sv. p. 37. — Retz. Fn. p. 107. — Lath. Ind. 1. p. 277. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 96. — *La Huppe*, Buff. Ois. 6. p. 439. t. 21. — Pl. enl. 52. — *Hoopoe*, Lath. Syn. 2. p. 637. — Edv. tab. 345. — *Gemeiner Wiedehopf*, Bechs. Naturg. Deut. 2. p. 107. — Sv Härfogel; Skån. Popp. Hall. Oäringsfögel. Norr. Äerfugl.

Beskrifn. På hufvudet från pannan till nacken sitta två rader af långa fjädrar hvilka bilda en hög fjäderkam, som efter behag kan uppresas och nedfällas. Dessa fjädrar äro rostgula och i ändarna svarta. Hufvudet, halsen, bröstet och öfra delen af ryggen rödgrå med rostgul anstrykning. Rygg skuldror och vingar svarta med gulaktigt hvita tvärband. Öfvergumpen rent vit. Magen vit med långsgående svarta strek. Vingpennorna svarta; de främre (10) med ett bredt rent hvitt tvärband; de af 2:dra ordningen med fyra hvita tvärband; de innersta bredt kantade med gulaktigt. Stjerten svart med ett bredt hvitt tvärband; dess öfra täckfjädrar svarta; dess undra hvita. — Näbben svart; vid roten inunder

köttfärgad. Tungan mycket kort. Benen mörkt askegrå. Iris brun: Längd $11\frac{1}{2}$ — 12 tum.

Honan är något mindre; dess fjäderkam är kortare, och färgerna blekare samt mindre rena.

Ungarna då de lemna nästet hafva kortare nästan rak näbb, fjäderkammen kort, och färgteckningen mindre utmärkt.

Vistelseort och lefnadssätt: Härfoglen förekommer i skogiga och buskrika trakter, helst i grannskapet af sumpiga ställen. Han finnes, ehuru allestädes sparsamt, i det sydliga och medlersta Sverige, samt i Grefskaperna i Norrige. I de norra trakterna af Sverige och norr om Fjällryggen i Norrige förekommer han högst sällan. Som flyttfogel anländer han till vår halfö i April eller i början af Maji. Om hösten sedan ungarna äro utflögna, träffas han i sällskap af 6 — 8 i lågländta busktrakter, och på betesmarker. Han uppehåller sig då vanligen på marken, men flyger merendels i träd, då han blir uppjagad. I Augusti eller September flyttar han bort. Härfoglen är liflig och skygg. På marken löper han ganska snabbt, och då han blir rädd eller ond slår han fjäderkammen upp; då han löper eller flyger låter han den ligga ned. Ofta får man i skogarna höra dess besynnerliga läte: *Opp-opp-opp!* *Opp-opp-opp!* som han ofta upprepar. Och som man derunder sällan får se foglen, som är ganska skygg och som då man nalkas, flyttar sig undan och låter höra samma läte från ett annat håll; så har någon gång denna fogel oskyldigtvis gifvit anledning till spökhistorier och ej

sällan blifvit räknad bland elaka förebåd af krig och dyr tid. Från detta skrock härleder sig dess Svenska namn: *Härfogel*, och dess Halländska benämning: *Oäringsfogel*. Dess Skånska namn *Popp*, har afseende på dess läte.

Födämnena: Insekter isynnerhet sådana som uppehålla sig på sumpiga ställen eller i boskapens spillning. Äfven myror och myrugg. För att uppgräfvade dessa födämnena begagnar han sig af sin långa näbb.

Fortplantning: I ihåliga träd eller i hål i klippor och murar; sällan på marken. På en underbädd af kospillning och rispinnar lägger honan 4-5 gråaktigt hvita, ofläckade ägg.

Nytta: Härfoglen förtär skadliga Insekter. — Ungarna blifva mycket tama om de tagas ur boet och uppfödas. I början bör man gifva dem mjölmaskar, myrugg och insekter. Sedan hålla de till godo med kokadt kött, bröd, o. s. v.

Bi-ätareslägtet. (*Merops*, Linn.)

Näbben temligen lång, något bågböjd, spetsig, hoptryckt med upphöjd ryggkant.

Näsborrarna vid roten på sidan, öppna, rundaktiga, glest täckta med hår från pannan.

Benen: tarserna mycket korta; både ut-tån och in-tån hopvuxna med mellantån till den näst yttersta leden. Baktån bred vid roten.

Vingarna: 1:sta vingpennan mycket kort, nästan ingen; 2:dra längst.

De hithörande foglar lefva af bi, vespor, humlor, gräshoppor och andra insekter, hvil-

ka de fånga i flykten. Till nästen gräfva de sig hålör i jorden vid brädden af vatten och lägga deri sina ägg på en underbädd af mossor. — I lefnadssättet närma de sig Svalorna.

Bi-ätaren. (*Merops Apiaster*, Linn.)

Artm. Rygg och vingtäckare brunröda; hufvudet mörkare kastanjbrunt; genom ögonen ett svart strek; strupen gul; kroppen inunder blågrön. De två medlersta stjärt pennorna längre än de andra.

Längd. 11 tum.

Merops Apiaster, Lin. Syst. Nat. I. p. 182. — Nilss. Orn. Sv. 2. p. 262. — *Le Guepier*, Buff. Ois. 6. p. 480. t. 23. — Pl. enl. 938. — *Gemeiner Bienenfresser*, Bechst. Nat. D. 2. p. 1099.

Beskrifn. Pannan hvit med grönaktig och blå anstrykning upptill och öfver ögonen. Hufvudet ofvan, och halsryggen kastanjbruna, hvilken färg på framryggen och vingtäckarne öfvergår i brunröd; den öfriga ryggen rostgul. Från näbbviken genom ögat till hörseltrakten går ett svart band. Öfra delen af framhalsen gullgul, hvilken färg nedtill slutas med ett svart band. Undra kroppsdelarna grönaktigt blå, hvilken färg blir ljusare bakåt undergumpen. Vingpennorna, de främre och innersta utvändigt blågröna; de af 2:dra ordningen äro brunröda och slutas med ett bredt svart band. Stjerten blågrön tvär, de två medlersta pennorna nästan en tum längre än de andre och tillspetsade. Längd 11 tum.

Honan har i allmänhet mattare färger; ett gult strek öfver ögonen och rödbrunaktig anstrykning på bröstet.

Vistelskort: Denna fogel hörer egentligen till det södra Europa, Asien och Afrika. I Spanien, Italien, Sicilien, Sardinien, Turkiet och Grekland är han allmän; i södra Tyskland, Sveitz och Frankrike förekommer han äfven. I det nordligare Tyskland ser man honom högst sällan. Det är derföre ganska märkvärdigt att han någon gång förekommer äfven i Skåne. Under sommaren (i Junii månad 1816) såg man ett par, hanne och hona, i en by nära Ystad, der de valt sitt tillhåll i en hög ask, som stod nära en bäck. Sedan de der uppehållit sig en veckas tid, blef den ena skjuten; den andra kom undan. Troligen hade de i, sällskap med andra flyttfoglar, förflugit sig så långt mot Norden.

Tredje Familien.

Brednäbbar eller Gapnäbbar. (*Fissirostres*, *Cuv.* *Hiantes*, *Illig.*)

Näbben ganska kort, liten; vid roten mycket nedtryckt, ganska bred, klufven långt tillbaka (under ögonen), hvaraf gapet är mycket stort; öfverkäken i spetsen nedböjd.

Benen korta, svaga; tårna klufna eller vid roten förenade genom en kort hinna; baktån hos somliga äfven framåt vänd; klorna krökta, spetsiga.

Vingarna långa, spetsiga.

De till denna familj hörande foglar lefva endast af insekter, hvilka de fånga i flyg-

ten; de njuta aldrig andra födämnena. Deras flygt är ganska snabb och lätt. Då de jaga, hålla de näbben öppna; och deras breda klibbiga gap gör det lätt för dem att underflygten fånga insekter. De äro alla flyttföglar.

Svale-Slägtet. (*Hirundo*, *Linn.*)

Näbben mycket kort, utåt trind, inåt mycket nedtryckt och bred, klufven ända under främre delen af ögat. Öfverkiken i spetsen litet nedböjd, underkiken rak. Näbbviken saknar borst.

Näsborrarna vid roten, aflånga, till en del slutna genom en hinna.

Benen korta; tårna och klorna spensliga; tre tår framåt en bakåt; uttån hopvuxen med mellantån till första leden.

Stjerten klufven, bestående af tolf pennor.

Vingarna långa: 1:sta vingpennan längst.

Svalorna lefva af Myggor, Dagsländor och andra Insekter som vistas vid vatten. De uppehålla sig derföre helst på sådana ställen der dessa träffas. Deras flygt är utomordentligt lätt och snabb, och de tyckas liksom simma i luften. De ej blott fånga sitt rof, utan de släcka äfven sin törst och bada sig under flygten. De bygga sina nästen af våt jord, lera, o. d. och fodra dem inuti med fjädrar. En del tillreda sitt bo i hål i jordbranter eller klippor. De rugga ej mer än

en gång om året, i Februari eller Mars månad; således under det de äro borta från oss och vistas i varmare länder. (*Natterer, enligt Tem. Man. I. p. 426*). — Efter första ruggningen likna ungarna de gamle; till dess äro de dem olika.

1. Ladusvalan. (*Hirundo rustica, Linn.*)

Artm. Svart med blå glans; pannan och strupen rödbruna; bröstet, magen och undergumpen hvitaktiga. Stjertpennorna med en hvit fläck i inre fanet; de yttersta mycket långa och smala. Längd 7 tum.

Hirundo rustica, Lin. Fn. p. 98. — Retz. Fn. p. 273. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 280. — *Hirondelle de cheminée*, Buff. Ois. 6. p. 591. t. 25. f. 1. — Pl. enl. 543. f. 1. — *Chimney Swallow*, Lath. Syn. 4. p. 561. — Suppl. I. p. 192. — *Die rauchschwalbe*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 902. — Sv. *Ladusvala*; Norr. *Ladesvala*; Dowrefj. *Sulu*.

Beskrifn. Pannan och strupen mörkt rödbruna. Alla öfra kroppsdelar, samt halsen på sidorna och framtill ända till bröstet svarta med blå glans. Alla öfriga undra kroppsdelar hvita med rostbrun anstrykning. Stjertpennorna svarta med en stor hvit fläck i inre fanet; de två medlersta enfärgade; den yttersta på hvardera sidan mycket smal. Längd 7 - 7 $\frac{1}{2}$ tum; vingbredden 13 tum.

Honan har mindre rödbrunt på pannan och det svarta frampå halsen går ej så långt ned. Undra kroppsdelarna äro mer hvita och de yttre stjertpennorna ej så långa.

Varierar tillfälligtvis: helt hvit, eller gulaktig; stundom med flera eller färre hvita fjädrar bland de vanliga.

Vistelseort och lefnadssätt: Ladusvalan vistas om sommaren vid husen och gårdarne öfver allt på vår halfö, från Skåne ända till polcirkeln. Vid Trondhiem förekommer hon i mängd äfvensom, norr om denna Stad i Stördalen och Sparbo. Vid Mo innanför Ranensfjorden har jag äfven sett henne; dock blir hon sällsyntare ju mer man närmar sig polcirkeln, inom hvilken hon ej går långt. Någon gång ser man henne likväl vid Hundholmen; men aldrig på Lofoden. Äfven vistas hon vid hus och gårdar i fjälltrakterna, såsom i Rörås och på Dowrefjäll.

Denna art så väl som alla Svalor äro flyttföglar, hvilka lemna oss om hösten i början af September och återvända om våren. Till Skåne komma de första Svalor vanligen mot slutet af April (d. 23 - 26 o. s. v.) eller de första dagarna af Maji. Till Rörås anlända de kring den 20 Maji; men till gårdarna på Dowrefjäll voro de ännu icke ankomna den 1:ste Juni.

Denna Svala kan flyga ganska snabbt; dock ser man henne ofta svafva saktare i luften. Då himlen är klar och ren, stiger hon stundom till en betydlig höjd; då det är mulet och rägnigt sväfvar hon lågt vid jordytan eller vattenytan. Orsaken här till är den att de insekter hon fångar i flygten stiga högt då luften är klar, men vistas vid jordytan då luften är mulen. Härifrån har det kommit att Sva-

lan genom en högre eller lägre flygt tros behåda torka eller rägn. Utomordentligt grannsynt, är hon på visst sätt en väktare för andra foglar, höns, kycklingar, dufvor m. fl. som finnas vid den gård eller hus der hon bor. Så snart hon blir en Roffogel varse, gifver hon det genast tillkänna med ett hvasst läte: *Zifit*, hvars betydelse de nämnda värnlösa foglarne ganska väl förstå. De lemna i ögonblicket sin föda, löxa kring efter den hotande faran, och löpa i skjul om varningen förnyas. Liksom Ringärulan förföljer hon äfven de Roffoglar som närma sig. Dess qvittrande och knirkande sång, låter hon ofta, under vackra dagar, höra från skorstenarna och taken.

Innan Svalorna om hösten flytta bort, samla de sig på höga hus eller bland rör och vass vid dammar och insjöar. Då kall och mulen väderlek i första hälften af September inträffar, ser man dem ibland på nämnda ställen till hundrade eller tusendtals, och på en enda natt flyttar hela skaran bort. De vandra då åt varmare länder och skola isynnerhet förekommar i Afrika under den tid de saknas hos oss. Dock sträcka de ej sina resor ut öfver vändkretsen. Om våren återvända de ej i sällskap, utan ensliga eller parvis.

Anm. Man har fordom trott, och mången torde ännu vara af den tankan, att Svalorna ej flytta bort om hösten, utan lägga sig i vinterqvarter bland gyttnar på botten af sjöar, dammar och träsk. Förr berättade man det samma om många andra flyttfoglar; nu återstå dylika sager blott om Svalorna. Saken tyckes dock vara till den grad orimlig, och så stridande mot physiologiska grunder, att man åtminstone har rätt att tvilla derpå, till dess man får säkrare facta, än dem man hittills äger. Nog har man sett Svalor sent om hösten samla sig på rören vid insjöar och

dammar. Man har äfvensett dem, stelnande af köld och sökande vatten-inskter, sätta sig tätt tillhopa på ett och samma rör som slutligen försvagt för den ökade bördan, sänkt belä sällskapet i vattnet; men dessa Svalor hafva varit sådana ungar, som ännu för svaga att göra den långa resan, blifvit lemnade hemma af de bortflyttade föräldrarne, och i sin nöd sökt sitt uppehälle vid vatten, tills de slutligen deri omkommit. Äfven har man om våren, då frost eller snö inträffat sedan de första Svalor anländt, funnit dem af hunger och köld utmattade, och efter utscendet liflösa, vid vatten eller på sumpiga ställen, der de sökt insekter. Man har burit dem in i varmt rum, der de efter hand qvicknat vid. Men sådana händelser bevisa alldeles intet mot Svalornas flyttning, som dessutom bestyrkes af ovedersägliga facta, meddelade af resande Naturkunniga. Det enda säkra bevis för deras vinterdvala är, om man, som man påstår, uppfiskar dem med isnoten eller eljest finner dem i vatten midt under vintren, och om de, under nämnde årstid funna, qvickna vid när de komma i varmt rum. Många berättelser härom har jag äfven hört; men ingen enda till den grad pålitlig att jag i en så otrolig sak dervid kan trygga mig. Om någon skulle såsom ögonvittne hafva säker erfarenhet härom, så önskar och beder jag att han ville låta den, omständligen bestyrkt, komma till Naturforskarnes kännedom. Tills detta sker måste jag anse Svalan, äfven i Sverige för flyttfogel.

Födämnena: Åtskilliga slags insekter med mjuka vingar, såsom myggor, flugor, dagsländor, humlor, bi, mal, samt små fjärillar m. fl.

Fortplantning: I städer, byar och torp bygger denna Svala sitt bo inuti husen i lador, stall, förstugor m. m., under taken vid bjelkar, sparrverk, läkten, fönsterramar o. s. v. Boet bygges af våt, klabbig jord blandad med halm eller hö. Det liknar till formen ett halfklot, och har ofvan en öppning hvarigenom foglen kan flyga in och ut. Invändigt är det fodradt med mossor, gräs och fjäder. De gamla nästen repareras och begagnas åter det följande året. Honan lägger två gånger om året 5 — 6 ägg som äro hvita och glest beströdda med rostfärgade fläckar.

Nytta: Svalorna gagna genom att förtära en mängd skadliga insekter. — På somliga ställen i Tyskland, Italien och Spanien ätas Svalor; men detta brukas icke hos oss.

2. Hussvalan. (*Hirundo urbica*, Linn.)

Artm. Ofvan svart med blå glans; inunder samt öfvergumpen hvita; stjärt pennorna ofläckade.

Längd $5\frac{1}{2}$ tum.

Hirundo urbica, Lin. Fn. p. 98. — Retz. Fn. p. 273. — Nilss. Orn. Sv. I p. 283. — *Hirondelle à cul blanc*, Buff. Ois. 6. p. 64. t. 25. f. 2. — Pl. enl. 542. f. 2. — *Martin*, Lath. Syn. 4. p. 504. — Suppl. I. p. 192. — *Die Hausschwalbe*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 915. — Sv *Hussvala*.

Beskrif. Hela hufvudet ofvan samt ryggen och skuldrorna svarta med blå glans. Vingar och stjärt svarta utan glans. Stjerten klufven, dess pennor ofläckade. Alla undra kroppsdelar samt öfvergumpen rent hvita. Tarserna och tårna glest fjädrade.

Honan kan knappt skiljas från hannen.

Varierar tillfälligtvis helt hvit, eller ock mer och mindre hvitfläckig. — På samma sätt variera alla arter af detta Slägte.

Vistelseort och lefnadssätt: Äfven denna Svala finnes om sommaren i de flesta trakter af halfön, ända till grannskapet af polcirkeln. Vid Trondhiem och i Stördalen förekommer hon ännu i mängd; och vid Ranensfjorden har jag sett henne på flera ställen t. e. Hemnäs, Mo. — I dessa nordliga kusttrakter finner man henne stundom i stort antal bosatt högt uppe i

remnorna af höga och branta klippväggar *). Som flyttfögel anländer hon till Skåne ett par veckor sednare än Ladusvalan, eller kring medlet af Maji. I det södra Sverige är hon allmän vid kyrkor och andra höga byggnader. Hon flyger högre än Ladusvalan, men mindre snabbt. Hon flyttar bort i sista hälften af Augusti.

Födämnen: Insekter.

Fortplantning: Nästet bygges af våt, klibbig jord och fästes utanpå husen under taklisten, under bjelkhufvuden o. s. v. Det är invändigt fodradt med fjäder och honan lägger deri 3 — 5 hvita ofläckade ägg.

3. Strandsvalan. (*Hirundo riparia*, Linn.)

Artm. *Gråbrun med strupen magen och undergumpen hvita.* Längd 5 tum.

Hirundo riparia, Lin. Fn. p. 99 — Retz. Fn. p. 274. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 284. — *L'Hirondelle de rivage*, Buff. Ois. 6. p. 632. — Pl. enl. 543. f. 2. — *Sand-Martin*, Lath. Syn. 4. p. 563. — *Uferschwalbe*, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 922. — Sv. *Strandsvala*, *backsvala*, *jordsvala*.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar och ett bredt band fram öfver bröstet gråbruna eller musblack. Strupen, undra delen af bröstet, magen och undre stjerttäckarne hvita. Vingar och stjert svartbruna, den sednare klufven, kortare än vingarne. Tarsen och

*) Så fann jag henne i talrik mängd bosatt i en klippa mellan Tarrock och Vigestad. Hr Boie såg en dylik koloni i en klippa på Alstenö. Boie Reise p. 111.

tårna bara, endast några få dun vid roten af baktån. Näbben svart. Iris brun. Benen svartbruna.

Vistelseort och lefnadssätt: Strandsvalan förekommer temligen talrikt äfven inom polcirkeln. I sandbackarna innanför Ranenfjorden förekommer hon i mängd bosatt; och vid Saltenfjorden träffades hon i Augusti under sitt återtag från ännu nordligare länder. I Skåne är hon allmän i jordbranter, i sandiga stränder vid åar, sandgropar, lergrafvar, jordvallar, och i höga stenbroar. Som flyttfogel anländer hon tidigare än Hussvalan, neml. mot slutet af April, och träffas genast vid sina boplatzar. I slutet af Augusti och i början af September flyttar han bort.

Födämnena: Insekter som lefva i vattnet och i luften.

Fortplantning: I jordbrinkar, sandiga branter o. s. v. gräver hon horisontela gångar ofta af 3 alnars längd och lägger in vid botten af dem sitt näste som består af gräsrötter och fjädrar. Äggen 5 — 6 aflånga, hvita. Stundom bygger hon i ihåliga träd.

Torn-Svale-Slägtet. (Cypselus, Illig.)

Näbben mycket kort, utåt något hoptryckt, inåt mycket nedtryckt och bred, klufven ända midt under ögonen; öfverkäken i spetsen nedböjd, underkäken litet uppböjd. Näbbviken saknar borsthår.

Näsborrarna klufna långsamt sidan af näbbrotens rygg, öppna, med upphöjda kanter.

Benen mycket korta; alla fyra tårna framåtrigtade, klufna ända till roten; tårna och klor-na korta och tjocka

Stjerten tvåklufven, bestående af tio pennor.

Vingarna mycket långa: 1:sta vingpennan lika med 2:dra och längre än de öfriga.

De hithörande foglar lefva, liksom Svalorna, af insekter hvilka de fånga i luften; och i detta element äro de nästan oupphörligt i rörelse. Aldrig ser man dem sätta sig på marken; sällan på upphöjda platsar. Deras flygt är utomordentligt snabb och de synas dervid knapt röra vingarna. I springor i höga murar och torn, eller i klippor samt i ihåliga träd lägga de sitt näste. De rugga en gång om året, vid samma tid som Svalorna.

Torn-Svalan. (*Cypselus Apus*, Illig.)

Artm. Svårtaktig med hvit strupe.

Längd $7\frac{1}{4}$ tum.

Hirundo Apus, Fn. p. 99. — Retz. Fn. p. 275. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 285. — *Le grand Martinet*, Buff. Ois. 6. p. 643. — Pl. enl. 542. f. 2. — *Swift*, Lath. Syn. 4. p. 584. — *Thurmschwalbe*, Bechst. Naturg. Deut. 3 p. 929. — Sv. Torn-svala, Ringsvala. Norr. Svart-Sulu, Fjeld-Sulu.

Beskrifn. Strupen hvitaktig. Hela öfriga fjäderbeklädningen svartbrun med mer eller mindre märkbar grönaktig metallglans på ryggen, öfvergumpen, bröstet och magen. Näbben svart. Iris mörkbrun. Tarserna framtill fjäderade; baktill samt tårna

nakna, ljusbruna. Klorna mycket krökta och skarpa. Längd $7\frac{1}{4}$ t. Vingbredd. $16\frac{1}{2}$ t. De hoplagda vingarna räcka 1 — 2 tum utom stjerten.

Honan är föga skild från hannen.

Vistelseort och lefnadssätt: Tornsvalan anländer till Skåne kring den 12:te, 15:de Maji, och förråder genast sin ankomst genom ett skarpt hvisslande läte. Icke blott i halföns södra och medlersta trakter, utan äfven i dess nordligare delar förekommer denna fogel. I Trondhiem, och ännu nordligare, i Stördalen, finnes han i mängd. Vid kyrkor, torn, klockstaplar och andra höga byggnader lefver han vanligen i större eller mindre antal. Merendels alltid träffar man en hel koloni, der de uppslagit sin bostad. Blott i skogarna träffar man dem endast parvis boende i ihåliga träd. — Tornsvalan flyger både högt och snabbt. Med örörda vingar genomsçar hon luften med pilens fart, och det torde knapt gifvas någon fogel som i jemförelse med dess storlek flyger snabbare än denna. Ofta flyger hon i större eller mindre sällskap, och låter under flygten höra sitt hvassa genomträngande skrik. Hon hvilar sig i sitt näste eller på taken, och man ser henne aldrig sätta sig på marken, emedan dess långa vingar och korta ben skulle göra det svårt om ej omöjligt för henne att åter flyga upp.

Födämnen: Insekter, merendels sådana som flyga högt; äfven vatten-insekter.

Fortplantning: Bygger i ihåliga träd i skogarna, under tegelpannor, på höga hus, i springor i murar, i torn o. s. v. Äggen 2 aflånga, hvita.

Nattskärre-Slägtet. (*Caprimulgus*, Linn.)

Näbben mycket kort, nedtryckt, klufven ända bak under ögat; öfverkäken i spetsen nedåt- och underkäken uppåt-böjd; näbbriken kantad med styfva framåtriktade hår.

Näsborrarna vid näbbroten tillslutna med en hinna beklädd med fjädrar.

Benen: tre tår framåt, förenade till första leden genom en hinna; en baktå med dess klo mycket korta. Mellantåns klo inåt kamformig.

Stjerten afrundad, bestående af tio pennor.

Vingarna långa: 1:sta vingpennan föga kortare än 2:dra, som är längst.

Dessa foglar hafva i lefnadssättet mycken likhet med Svalorna; men, liksom Ugglorna bland Roffoglarna, äro de nattliga foglar som dölja sig om dagen och flyga utendast i skymningen och i gryningen för att jaga. Liksom Ugglorna bländas de af dagsljuset, och liksom dessa hafva de stora ögon och stora öron. Deras fjädrar äro mjuka, och deras flygt sker utan buller. De rugga en gång om året. Hannarna skiljas från honorna genom hvita fläckar på de yttersta stjärtpenorna. Ungarna äro föga olika de gamla.

Nattskärren. (*Caprimulgus*, *Europæus*, Linn.)

Artn. Ofvan gråspräcklig, med långsgående svarta fläckar och strek; inunder med rostgulaktiga och svartbruna tvärstrekar. Längd $10\frac{3}{4}$ tum.

Caprimulgus Europæus, Lin. Fn. p. 100. — Retz. Fn. p. 275. — Nilss. Orn. I. p. 288. — *L'Engoulevent*; Buff. Ois. 6. p. 512. — Pl. enl. 193. — *European Goatsucker*, Lath. Syn. 4. p. 593. — Suppl. p. 194. — *Der Europäische Tagschläfer*, Bechst. Nat. Deut. 3. p. 939. — Sv. *Nattskräfva*, *Nattskärna*, *Nattblacka*; *Kärrgylta*; Norr. *Qvällknarr*.

Beskrifn. Hela fjäderbeklädnaden spräcklig af askegrått, svart, rostgult och hvitaktigt. På hufvudet och längs åt ryggen finnas svarta långsgående strek och fläckar. Öfver vingarna går ett perlband af rostgulaktiga fläckar; och längs näbbviken går under ögat ett hvitt strek. Undra kroppsdelarna tecknade med rostgula och svartaktiga tvärstrek. Vingpennorna svartbruna med rostgula fläckar i yttre fanen, och en stor rund vit fläck i inre fanet på hvardera af de tre yttersta. Stjerten spräcklig af askegrått, rostgult och svartaktigt, samt tecknad med 9 — 10 svartaktiga tvärband; de två yttersta pennorna slutas med en bred rent vit spets. — Ögonen stora, svarta. Näbben svart. Öronen vida. Benen bruna. Tarserna framtill, till en del fjäderklädda. Längd $10\frac{3}{4}$ t., vingbredd. 1 f. $9\frac{1}{2}$ t. utom ving. 2 tum.

Honan har hela fjäderbeklädnaden betydligt ljusare, och de svarta streken, isynnerhet stjertens tvärstrek, mycket smalare. Hon saknar dessutom alldeles de stora hvita fläckarne på inre fanet af vingpennorna, och den hvita spetsen på de yttersta stjertpennorna.

Fistelseort och lefnadssätt: Nattskärnan vistas i skogarna, isynnerhet på sådana ställen der mycken ljung och få träd finnas. Äfven ligger hon om dagen på stenar och klippor merendels på södra sidan vid skogsbrynen; ty hon tycker om varma platsar. Först i skymningen flyger hon ut och fångar insekter tills det blir helt mörkt. Äfven jagar hon i mån-
skenet, och om morgonen i gryningen. Då hon om dagen blir uppskrämd, flyger hon hastigt upp; men sätter sig åter snart antingen på marken, eller också lägger hon sig ned längs åt en gren. Man ser henne aldrig löpa. Under vackra aftnar i Maji och Juni månader får man ofta i skogarne höra dess besynnerliga uthållande sång: *Irrrrr* eller *urrrrr!* som har någon likhet med ljudet af en källfrö eller med bullret af en surrande spinnrock. Sittande på en torr gren fortsätter hon denna sång med vissa afbrott, och då flera finnas i en och samma trakt af skogen, skärpa de vaxelvis och liksom aflösa hvarandra, hvilket under en vacker sommaraftron gör en rätt angenäm musik. Nattskärnan finnes ej blott i det södra Sverige, utan äfven i dess nordligare trakter och i Norrige. Som flyttfogel anländer hon i början af Maji och flyttar bort i September. Under Augusti och September månader träffar man henne ofta i skymningen på ängar och betesmarker på Skånska slättbygden. Då hon jagar, flyger hon med öppen näbb, och de insekter hon träffar fastna lätt i dess vida klabbiga gap.

Födämnen: Öfver lågländta öppna fält jagar Nattskärnan flygande insekter så väl med mjuka som

hårda vingar: Skalbaggar, dagfjärillar, nattfjärillar m. fl.

Fortplantning: På marken bland ljungen, i hål, i träd eller i en bergskrefva lägger honan två aflånga hvita ögg, regelbundet tecknade eller marmorerade med bruna och grå fläckar.

Nytta: Hon förtär en mängd för skogarna skadliga Insekter. — Dess kött har en angenäm smak.

Rättelser:

I Dedicationen i några exemplar rad. 3:dje står Ornithologr; läs Ornithologer.

Sid. xvi. rad. 25 står: fältt än; läs: fält är.

Sid.	3	rad.	13	Sångfoglar; läs: Gångfoglar.
—	6	—	8	Falo; läs: Falco.
—	8	—	19	Jagtfalken (Falco Gyrfalco, Lin.) kan ändras till: Islandsfalken, (Falco Islandicus, Lath.)
—	36	—	25	vaxhuden; läs: näbbhuden.
—	46	—	18	I dessa trakter; — i de nordliga trakterna.
—	64	—	30	Allmänna Vråken, - Ormvråken.
—	73	—	28	Sannare - Sannolikare.
—	94	—	20	hvarpå men - hvarpå man.
—	101	—	6	tjusande - tjutande.
—	—	—	24	utrota - utrotar.
—	106	—	35	detta liknar, läs: detta läte liknar.
—	112	—	16	och de äro; läs: och några bland dem äro.
—	119	—	30	utdrefvo; läs: utdref.
—	124	—	18	Thormånadskråkor; tillägg: De kallas i Småland Marskråkor och anses ätliga.
—	137	—	4	delarna; läs: delen.
—	141	—	13	förenade; läs: församlade.

Sid.	175	rad.	28	icke; läs: sällan.
—	176	—	10	Näktergalar; läs: <i>Egentliga Sångare</i> .
—	—	—	18	blott några få; läs: de flesta.
—	196	—		sista raden: föregående; läs: föregående.
—	209	—		sista raden: convexa; läs: utböjda.
—	210	—	2	concava; läs: inböjda.
—	237	—	38	nattrosten tilltaga; läs: nattfrosten tilltaga.
—	246	—	8	anføres; läs: anföras.
—	—	—	18	önskade; läs: önskar.
—	260	—	22	prætentis; läs: prætensis.
—	270	—	23	förtära de; läs: förtära de flesta.
—	—	—	24	och de uppföda; läs: och uppföda.
—	294	—	11	summa; läs: samma.
—	299	—	5	flera; läs: många.
—	308	—	14	eller rostgrätt; läs: på honan rostgrätt.
—	364	—	21	de mot; läs: de likväl mot.
—	—	—	22	ordning; tillägg: (hvad fortplantningen beträffar).
—	367	—	17	slagit; läs: satt.
—	378	—	28	klättrar; läs: sätter sig.
—	383	—	5	märker; läs: märkes.

Mindre fel tackes Läsaren själf rätta.