qQL
137
M687Z
MOLL.

QL
137
M687Z
Mollusken
Moll.

6852
1410

Int.

¹
Beiträge

²
zur

³
Meeresfauna der Insel Mauritius und der Seychellen.

Division of Mollusks
Sectional Library

⁴
Mollusken

bearbeitet

von

Prof. E. v. Martens.

Mit 4 Tafeln.

1880.

Berlin.
1880.

U M I. 21. 39. 1.

Vorbemerkungen.

Die Meerkonchylien von Mauritius sind seit 200 Jahren, die Landschnecken seit Beginn unseres Jahrhunderts so vielfach gesammelt worden, dass eine Bearbeitung der von Prof. Möbius mitgebrachten Ausbeute aus dieser Abtheilung des Thierreichs vorwiegend eine Bestimmung nach der schon vorhandenen Literatur werden musste und die bescheidene Nachlese von neuen Arten noch mehr ist als erwartet werden konnte. Aber auch die Controle und Bestätigung früherer Angaben durch neue Exemplare, die Lösung etwaiger Zweifel über Artberechtigung und geographische Verbreitung bestimmter Formen durch neues Material hat ihren Werth für die Wissenschaft. Unter diesen Umständen zog ich es vor statt eine einfache Liste der gesammelten Arten zu geben, lieber die Literaturstudien, die doch der Bestimmung und Benennung wegen gemacht werden mussten, zu einer gedrängten Zusammenstellung der überhaupt aus dem vorliegenden geographischen Gebiet bekannten Arten zu benutzen und die Originalangaben über das Vorkommen derselben, soweit sie mir leicht zugänglich, zu sammeln, um so mehr als das zoologische Museum in Berlin auch zahlreiche Conchylien direkt aus diesem Gebiete, früher (um 1834) von Lamare Picquot, in neuester Zeit von Herrn Caldwell (als Geschenk) und von Herrn Robillard durch Kauf erhalten. Es hat ein gewisses Interesse, die Kenntniss der Fauna nach rückwärts zu verfolgen, aus unserem jetzigen Wissen die unbestimmten älteren Angaben zu deuten, zu sehen, welche Arten zuerst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, welche als Nahrungsmittel für den Menschen benutzt werden u. dergl. Es wurde dadurch allerdings eine grössere Anzahl von Citaten nothwendig und dabei sind die Namen der Verfasser, welche selbst in diesem Gebiete beobachtet haben oder wenigstens nachweislich aus dem Gebiet stammende Exemplare beschreiben, durch *cursive Schrift* ausgezeichnet, im Gegensatz zu denjenigen, welche nur als Autoren des Artnamens oder wegen der Abbildungen zur Kennzeichnung der Art überhaupt ohne direkte Beziehung zum Vaterlande zu nennen sind; die am häufigsten vorkommenden ganze Faunenlisten gebenden Autoren Dufo, Sganzin, Deshayes und Lienard sind ohne Wiederholung des Buchtitels nur nach der Seitenzahl und meist abgekürzt angeführt. Das geographische Gebiet wurde für die Land- und Süsswasser-Mollusken auf die zunächst zusammengehörigen Maskarenen (Mauritius oder Ile de France, Bourbon oder Réunion, Rodriguez oder Diego Ruiz) und die Seychellen, wo Prof. Möbius auch gesammelt, nebst den an diese sich unmittelbar anschliessenden Amiranten begrenzt, für die Meerschnecken aber auch auf das

benachbarte Madagascar, namentlich dessen jenen Inseln zugewandte Nordostküste (Sganzin) ausgedehnt, da hier die Meeresfauna wesentlich dieselbe, die Landfauna aber schon ganz verschieden ist.

Die vorstehenden Buchstaben bezeichnen die geographische Verbreitung in folgender Weise:

S Seychellen.

A Amiranten.

G Galega oder Agalega.

Md Madagaskar.

C Cargados (Corda dos Garajaos oder Nazarethbank).

D Rodriguez (Diego Rodriguez, D. Ruiz).

M Mauritius (Ile de France).

B Bourbon (Reunion).

† nicht weiter verbreitet.

R auch im Rothen Meer.

Af auch an der Ostküste des Festlandes von Afrika (Zanzibar, Mossambique, Natal).

SAf auch in Süd-Afrika (aussertropisch).

I auch in Indien (Nikolaren, Ceilon, malaiischer Archipel).

P auch in Polynesien.

Au auch in Australien.

Die von Prof. Möbius mitgebrachten Arten sind durch ein Sternchen (*) ausgezeichnet.

Chronologische Liste der hauptsächlichsten Arbeiten und Materialien für die Mollusken-Fauna der Maskarenen und Seychellen.

Lister, Martin, *historiae conchyliorum libri I—IV* 1685—1687. London, Fol.

Den für ihre Zeit recht guten Abbildungen ist oft eine Fundortsangabe beige druckt und als solche findet sich bei 1 Landschnecke und 34 Meerkonchylien Mauritius oder Madagaskar, meist abgekürzt zu Maurit. und Mad. Wer sie dort gesammelt, ist nicht angegeben. Die meisten darunter sind leicht zu erkennen und richtig, nur einzelne Cypraceen und Conus bleiben zweifelhaft; die Artnamen *Cypraea Mauritiana* Linne, *C. Madagascariensis* und *Tellina Madagascariensis* Gmelin sind Lister's Angaben entlehnt.

(Bernardin St. Pierre) *Voyage à l'île de France, à l'île de Bourbon, au Cap de bonne espérance etc. avec des observations nouvelles sur la nature et sur les hommes, par un Officier du Roi.* Neuchatel 1773. 8.

S. 102—111, im 10. Brief, von Port Louis (Mauritius) 12. Januar 1769 datirt, giebt eine kurze Aufzählung der auffälligeren Schalthiere unter französischen Benennungen und mit dem Versuch einer natürlichen Klassifikation, meist Meerkonchylien, doch auch einige von Land und Süßwasser. Mit Berücksichtigung des damaligen conchyliologischen Sprachgebrauchs (vgl. die beiden folgenden Werke) lassen sich viele derselben mit Wahrscheinlichkeit erkennen. Eine deutsche Uebersetzung ist 1774 in Altenburg erschienen.

Favanne, d'Argenville *conchyliologie, édition troisième, revue et augmentée.* Paris 1780, 4. 2 Bde. Text und 1 Bd. Tafeln.

Der (unvollendete) Text giebt eine spezielle Beschreibung der Gattungen Napfschnecken, Wurm- röhren, Nautilus, Turbo, Trochus, Natica und Nerita, Conus und Oliva, mit zahlreichen Fundortsangaben, worunter Isle de France und Madagaskar ziemlich oft vorkommt, doch nicht immer zuverlässig, da öfters mehrere Arten in Eine zusammengefasst und die Abbildungen auch für ihre Zeit ziemlich schlecht, meist verkleinert, sind.

Chemnitz, neues systematisches Conchylien-Cabinet, Bd. IV, 1780 bis XI, 1795, Nürnberg. 4.

Enthält neben der älteren Literatur auch einige Originalangaben über Conchylien aus Mauritius (öfters „Mauritien“ oder „St. Mauritius“ geschrieben) und eine aus Bourbon, die meist aus der Sammlung von Sponglar herrühren. Die Nomenklatur bildet einen schrittweisen Uebergang von der früheren diagnostischen zur linneischen binären, die Abbildungen sind vom 5. Bande an recht gut.

Bruguière, J. G., in der französischen Encyclopédie methodique. Abtheilung Vers, 1792.

Mehrere Originalangaben aus Madagaskar, deren Zuverlässigkeit in Betreff des Fundortes aber nicht ganz zweifellos ist.

Bory St. Vincent, Voyage aux quatre principales isles d'Afrique. Paris 1803. 3 Bände Text und 1 Atl. Fol.

Der Verfasser begleitete die Expedition des Kapitän Baudin (1801 und 1802, Schiffe Géographe und Naturaliste) bis Isle de France und beobachtete die eigenthümliche Septaria Borbonica näher.

Cuvier, G., Mémoires pour servir à l'histoire et l'anatomie des Mollusques. Paris 1816. 4.

Zoologisch-anatomische Untersuchung mehrerer meist schalenloser mariner Arten, welche Franc. Peron, der Naturforscher der obengenannten Baudin'schen Expedition, von Ile de France mitgebracht. Die meisten der betreffenden Abhandlungen sind auch einzeln in den Annales du Museum d'hist. nat. erschienen.

— le règne animal distribué d'après son organisation. 1817. vol. II. 8.

Enthält neben dem Wesentlichsten aus der vorgenannten Arbeit auch noch einige Originalangaben über Mollusken von Ile de France, welche der Verfasser von einem Herrn Mathieu erhalten hat (z. B. Notarchus, Dolabella).

Lamarck, histoire naturelle des animaux sans vertèbres tome V und VI, 1818—22. Paris. 4.

Die speziellen Angaben über Conchylien aus Ile de France beruhen hauptsächlich auf den Sammlungen von Fr. Peron.

Ferussac, tableaux systematiques des animaux mollusques, suivis d'un prodrome général pour les moll. terrestres. Paris 1821—1822. Fol.

Erste Spezialangabe zahlreicher Landschnecken von Ile de France, meist nach Peron's Sammlung, freilich nur Namen ohne Beschreibung, aber die meisten durch die gleichzeitigen oder bald darauf folgenden Abbildungen in desselben Verfassers histoire générale et particulière des mollusques terrestres leicht erkennbar.

Ferussac, Catalogue des espèces de Mollusques terrestres et fluviatiles, recueillies par M. Rang, officier de la marine royale, dans un voyage aux grandes Indes. Im Bulletin des sciences naturelles et de géologie, tome X, 1827, pp. 298—307 und 408—415.

Mehrfache Beobachtungen über Lebensweise und Weichtheile.

Quoy und Gaimard, Zoologie 1824 in: Freycinet, Voyage autour du monde sur la corvette Uranie 1817—1820. Paris. 4.

Lesson, Zoologie 1829 in: Duperey, Voyage de la Corvette Coquille autour du monde 1822—1825. Paris. 4. Atlas. Fol.

Quoy und Gaimard, Zoologie vol. II, 1832 und III, 1834, in: Dumont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe autour du monde 1826—1829. Paris. 8. Atlas. Fol.

Rang, Manuel de l'histoire naturelle de Mollusques. Paris 1829. kl. 8.

Enthält mehrere eigene Beobachtungen über das Vorkommen von Mollusken in unserem Gebiete.

Dufo, Observations sur les Mollusques terrestres, marins et fluviatiles des îles Seychelles et des Amirantes, in Annales des sciences naturelles, 2 série, tome XIV. 1840. 8.

Erste Arbeit über die Molluskenfauna der Seychellen, sie giebt zahlreiche, bis jetzt wenig beachtete Beobachtungen über Lebensweise, Nahrung, Deckel, Periostracum u. s. w. Die neuen Arten sind leider ziemlich ungenügend beschrieben, so dass sie schwer zu erkennen sind.

Sganzin, Vict., Catalogue des coquilles trouvées aux îles de France, de Bourbon et de Mada-

gascar, in Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strasbourg, vol. III, part. 2. 1843. 30pp. 4.

Enthält auch kurze Angaben über das Vorkommen. Die von Madagaskar angegebenen Arten sind an der Nordostküste dieser Insel, bei Tamatave, Tintingue und auf der Insel St. Marie (Nossi Burra) gesammelt.

Morelet, Arth., Series conchyliologiques, comprenant l'énumération de Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis pendant le cours de différents Voyages. Deuxième livraison, Nov. 1860. Iles orientales de l'Afrique. p. 38—127, pl. 4—6. gr. 8.

Kritische Bearbeitung der vom Marinearzt Eugène Vesco auf Mauritius und Bourbon, sowie Madagaskar und an der Ostküste Afrika's gesammelten Land- und Süßwasser-Mollusken.

Deshayes, G. P., Catalogue des Mollusques de l'île de la Réunion (Bourbon) aus L. Maillard's Notes sur l'île de la Réunion. Paris 1863, mit eigener Paginirung, 144 Seiten, 14 Taf. (28—41). gr. 8.

Reichhaltige und zuverlässige Aufzählung, 560 Arten, jede mit einem Citat und Beschreibung der neuen, auch einiger neuen Gattungen (Prasina, Cryptobia und Scalenostoma).

Adams, Henry, Descriptions of New Species of Shells collected by Geoffroy Nevill Esq. at Mauritius. In Proceed. of the Zoological Society of London 1867, p. 300—307, pl. 19.

Vorherrschend Landschnecken.

— Further descriptions of New Species of Shells collected at Mauritius by Geoffroy Nevill Esq. Ebend. 1868, p. 12—14, pl. 4.

Meer- und Landschnecken. Neue Gattung Thyreopsis.

Nevill, G., On some species of land Mollusca inhabiting Mauritius and the Seychelles. Ebend. 1868, p. 257—261.

— Additional notes on the land shells of the Seychelles islands. Ebend. 1869, p. 60—66.

von der Decken, Reisen in Ost-Afrika, III. Band, 1869, S. 45—66 und 148—160, Mollusken von E. v. Martens, mit 3 Tafeln.

Enthält neben den neu auf dem ostafrikanischen Festland gesammelten Conchylien auch mehrere von den Seychellen und eine Liste der von dort bekannten Land- und Süßwasser-Schnecken.

Nevill, G., On the land shells of Bourbon. Journ. As. Soc. XXIX 2, 1870, p. 413—416.

Nevill, G. und H., Descriptions of new Mollusca from the Eastern Regions. Im Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXIX, part. 2, 1871, p. 1—11, pl. 1.

Verschiedene neue Arten, hauptsächlich Meerschnecken, von Mauritius und den Seychellen.

— — — Descriptions of new Marine Mollusca from the Indian Ocean. Ebend. vol. XLIV, part. 2, 1875, p. 83—104, pl. 7, 8.

Neue Arten von Mauritius und Bourbon, gelegentliche Fundortsangaben und Berichtigungen der Synonymie und Angaben über Ferussac'sche Original-Exemplare in der Sammlung des Jardin des Plantes zu Paris.

Crosse, H., Faune malacologique terrestre et fluviatile de l'île Rodriguez. Journal de Conchyliologie XXII, 1874, p. 221—242, pl. 8.

24 Arten von A. Desmazes, der dort Schiffbruch gelitten, gesammelt.

Morelet, Arth., Appendice à la conchyliologie de Rodriguez. Journal de Conchyliologie XXIII, 1875, p. 21, 30, pl. 1.

Ausgestorbene Schnecken von Rodriguez, von Hrn. Bewsher gesammelt.

Liénard, Elizé, Catalogue de la faune malacologique de l'île Maurice et de ses dépendances. Paris 1877. 115 Seiten. 8.

881. Arten Conchylien von Manritius, 130 von den Seychellen, 245 von den Chagosinseln (viel weiter östlich in der südlichen Verlängerung der Maldiven), 45 von Rodriguez und 92 von den Cargados sind hier aufgezählt, sie sind hauptsächlich den Sendungen des Herrn Robillard in Mauritius zu verdanken; die Bestimmung bleibt öfters zweifelhaft und ist nicht zu kontroliren, da keine Citate gegeben sind. Einige Unvollkommenheiten, Wiederholungen und Irrthümer in den Namen sind verzeihlich, da der Verfasser vor dem Drucke der Arbeit gestorben ist.

Nevill, Geoffr., Hand List of Mollusca in the Indian Museum, Calcutta. Part I. Gastropoda Pulmonata and Neurobranchia. Calcutta 1878, 33 S. 8.

Der Verfasser, welcher mit so gutem Erfolge auf Mauritius, Bourbon und den Seychellen sammelte, hat seine Ausbeute an das Indian Museum abgetreten und wir erhalten somit in diesem Werke eine dem neuesten Standpunkte der Systematik entsprechende kritisch gesichtete Uebersicht nicht nur der indischen, sondern auch der maskarenischen Landschnecken und luftathmenden Wasserschnecken mit zahlreichen sehr speciellen Fundortsangaben.

Kobelt, Wilh., Inselfaunen, in Jahrbuch der malakologischen Gesellschaft, V, 1878, S. 170—185.

Allgemeine Betrachtungen und Listen der Land- und Süsswasserarten nach der vorhandenen Literatur, ohne neues Material.

A. Land- und Süsswasser-Mollusken der Maskarenen und Seychellen.

a. Landschnecken.

Pneumopoma.

Cyclostomacea.

- S† Cyathopoma Blanfordi *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 65 und 291, pl. 28, Fig. 13 Mahé, von *Nevill* gefunden, auf abgefallenem Laub, in ziemlicher Höhe, sehr selten. *Nevill* handl. p. 258 Mahé, in einem feuchten Wald, am Boden, 1000 Fuss üb. d. Meer. *Lien*. 81.
- S† Leptopoma Seychellarum *Pfr.* Proc. Zool. Soc. 1854 p. 302; mon. pneum. II, p. 76 Seychellen.
- D†? Cyclostoma (Tropidophora) articulatum *Gray* Griffith animal Kingdom pl. 28, Fig. 1. *Pfr.* mon. pneum. I, 192 Insel Rodriguez, *Benson*. *Woodward* Proc. Zool. Soc. 1859 p. 204, pl. 46, Fig. 10—13, lebendes Thier, Rodriguez, *Ida Pfeiffer*. *Morelet* series conch. II, p. 99. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 233 Rodriguez, auf Bäumen, sehr häufig, *Desmazuures*. *Nevill* handl. 305 Rodr., *Caldwell* und *Dupont*. — *C. filusum* *Sow.* Zoology of Beechey p. 146, pl. 38, Fig. 31; thesaur. conch. pl. 23, Fig. 14. *Pfr.* Chemn. ed. nov. Taf. 18, Fig. 12, 13. *Lien*. 104 Rodriguez.
- Soll nach früheren Angaben von Gruteloup und Morelet auch auf Madagaskar vorkommen, was aber noch der Bestätigung bedarf.
- MB†? Cyclostoma (Tropidophora) tricarinatum *Müller* hist. verm. II, p. 84. Chemnitz Conch. Cab. IX, Fig. 1103, 1104, cop. ed. nov. Cyclostoma Taf. 4, Fig. 16, 17.

Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 355. Pfr. mon. pneum. I. p. 197. *Sganz.* 18 Ile de France, halb fossil in einer unterirdischen Grotte. *Desh.* 85 Reunion. Nevill Journ. As. Soc. 1870, II, p. 417; handlist p. 305 Mahébourg auf Mauritius, halb fossil. *Lien.* 60.

Auch diese Art soll nach früheren Angaben (Deshayes) auf Madagaskar vorkommen.

- M† Cyclostoma (Tropidophora) *Caldwellianum* Nevill handlist p. 305 Pouce Mt., Mauritius, halb fossil.
- B† Cyclostoma (Tropidophora) *defloratum* Morelet Journ. de Conch. XIV, 1876, p. 88. pl. 3, Fig. 3, Bourbon, sub fossil. Pfr. mon. pneum. IV, p. 416.
- M†? Cyclostoma (Tropidophora) *Michaudi* Grateloup Act. Soc. Linn. de Bordeaux XI, 1841, p. 440, pl. 3, Fig. 11 (Madagaskar). Pfr. mon. pneum. I, p. 200, Chemn. ed. nov. Taf. 18, Fig. 14—16. *Lien.* 60 Mauritius. Nevill handl. 306 Mauritius, Dupont. — *C. carinatum* Sow. thesaur. conch. pl. 26, Fig. 117, Woodward l. c., *Lien.* 59.
- M† Cyclostoma (Tropidophora) *Barclayanum* Pfr. Proc. Zool. Soc. 1851; mon. pneum. I, p. 200, Chemn. ed. nov. Taf. 32, Fig. 3, 4, Ile de France, Barclay. Morelet series conch. II, p. 102 Black river district, Maur., an bewaldeten etwas trocknen Abhängen. *Lien.* 59. Nevill handl. 306 Trois Mamelles Mount, Maur., unter grossen Blöcken. Sehr nahe der vorigen.
- M† Cyclostoma (Tropidophora) *Mauritianum* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 305, pl. 12, Fig. 10, Pouce Mountain, Maur. Pfr. pneum. IV, p. 171. *Lien.* 60. Nevill handl. 305 ebenda. halb fossil.
- S† *Cyclostoma (Tropidophora) *pulehrum* Gray Griffith animal kingdom, mollusca 1834, pl. 28, Fig. 3. Pfr. mon. pneum. I, p. 203 Seychellen. *Lien.* 81 Nevill handl. 305 Mahé, Praslin, Silhouette. — *C. ortyx* Valenciennes Mus. Paris, *Eydoux* Magasin de Zoologie 1838, pl. 117, Fig. 2 Seychellen. Dufo 191 Mahé, in Wäldern, auf den Höhen der Berge, auf Gebüsch und Schlingpflanzen. Sow. thesaur. pl. 23, Fig. 27, 28. Pfr. Chemn. ed. nov. Taf. 16, Fig. 13, 14. Nevill Proc. Zool. Soc. 1869, p. 65 Mahé, Praslin, Silhouette, auf Lodoicea. — *C. Arthurii* Grateloup loc. cit. p. 438, pl. 3, Fig. 7 und 12 (fälschlich von Ceilon angegeben).

Prof. Möbius hat das lebende Thier auf Mahé beobachtet und folgende Notizen niedergeschrieben: Kopf vorn ausgeschweift, Fühler keulenförmig, schwarz, 7 mm lang, Augen aussen an der Basis derselben. Fusssohle 12—13 mm lang, während des Kriechens verschiebt sich die rechte Hälfte gegen die linke noch mehr als bei *Litorina litorea* (wie auch bei *Cycl. elegans*, vergl. Rossmässler Iconographie I, Fig. 82). Hinterende des Fusses winklig zugespitzt.

- D† Cyclostoma (Tropidophora) *bipartitum* Morelet Journ. de Conch. XXIII, p. 27, pl. 1, Fig. 3 Rodriguez, sub fossil, in Uferhöhlen mit Knochen der Dronte.
- M† Cyclostoma (Ligatella*) *Listeri* Gray, wahrscheinlich *Lister* hist. conch. 1682, pl. 44, Fig. 42 Mauritius. Gray Annals of Philosophy 1821. Sow. thesaur. pl. 23, Fig. 22, 23. Pfr. mon. pneum. I, p. 185 (Otopoma), Chemn. ed. nov. Taf. 12, Fig. 30, 31. Mauritius. Morelet series conch. II, p. 99 Port Louis, Mauritius, am

*) Die gerundeten kleineren afrikanischen Cyclostomen mit einfachem, geradem Mundsäum und schwächerer Spiralskulptur, meist mit dunkleren Bändern auf der unteren Hälfte, deren bekannteste Art *C. ligatum* Müll. aus Süd- und Ostafrika, mögen mit diesem neuen Gruppennamen bezeichnet werden. *Otopoma* Gray, unter welchem Pfeiffer manche und Nevill alle hierhergehörigen auführt, gehört den grossen glatten weissen Arten mit mehr oder weniger geschlossenem Nabel an (*O. naticoides*, *clausum* etc.).

Fuss der Cocospalmen in der Küstengegend. *Lien.* 60 Nevill handl. 307 Mauritius, nahe der Seeküste, eine Abart auch halb fossil.

- M † **Cyclostoma (Ligatella) haemastoma* Anton Verzeichn. Conchyl. S. 54; *Pfr.* mon. pneum. I, p. 186 (Otopoma), Chemn. ed. nov. Taf. 3, Fig. 3, 4. *Dupont* bei *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 234 Ile Ronde, kleine Insel bei Mauritius, mit Palmen und Pandanus bedeckt, wo sie die einzige Schnecke ist. *Lien.* 59. *Nevill* 308, dieselbe Fundortsangabe. Round island und Bel Ombre, Prof. *Moebius*. — *C. fimbriatum* (non Lam.) *Quoy et Gaimard* Vog. de l'Astrolabe, zool. II, p. 188, pl. 12, Fig. 31, 35, Ile de France, ist nach *Morelet* ser. conch. II, p. 101 dieselbe Art.
- D † *Cyclostoma (Ligatella) haemastoma* var. *Rodriguezense* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 141; XXII, p. 234, *Morelet* ibid XXIII, p. 29, Port Mathurin, Insel Rodriguez, sehr häufig.
- M B *Cyclostoma (Ligatella) fimbriatum* Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 360 (fälschlich von Neuhollland angegeben). *Petit* Journ. de Conch. I, 1850, p. 42, Mauritius. *Morelet* series conch. II, p. 101, Mauritius und Madagaskar. *Desh.* 85, Reunion. *Lien.* 59. *Nevill* handl. 307, Mauritius. — *C. undulatum* Sow. thes. pl. 23, Fig. 29, 30 (fälschlich von Bengalen); *Pfr.* mon. pneum. I, 223, Chemn. ed. nov. Taf. 12, Fig. 24, 26, Mauritius, *Benson*. *C. Philippii* Grateloup loc. cit. p. 446, pl. 3, Fig. 21, Madagaskar. Vermuthlich *C. variegatum* *Ferussac* Bull. sc. nat. X, 1827, p. 410 von Bourbon.
- Cyclostoma (Ligatella)* var. *semisculpta* *Nevill* handl. p. 307, Mauritius.
- M † *Cyclostoma (Ligatella) scabrum* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1867, p. 306, pl. 19, Fig. 11. Pouce mount., Mauritius. *Pfr.* mon. pneum. IV, p. 177. *Lien.* 60. *Nevill* handl. p. 305, ebenda, halb fossil.
- D † *Cyclostoma (Ligatella) Desmazuresi* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1877, p. 140; XXII, p. 235, pl. 8, Fig. 9 Montagne des Limons, 500 m hoch, Insel Rodriguez. *Pfr.* mon. pneum. IV, p. 172. Gewissermassen auch mit *C. pulchrum* verwandt.
- D † *Cyclostoma (Ligatella) Bewsheri* *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 28, pl. 1, Fig. 4 Rodriguez, subfossil, mit *C. bipartitum* verwandt.
- Ganz zweifelhaft, weil nicht abgebildet, bleibt *Cyclostoma Eugeniae* *Reeve* Proc. Zool. Soc. 1857, p. 209; *Pfr.* mon. pneum. III, 183, von Mauritius; *Pfeiffer* vermuthet darin den Jugendzustand irgend einer andern Art.
- C. insulare* *Pfr.* wurde von *Pfeiffer* ursprünglich, mon. pneum. I, p. 215 von Ile de France angegeben, später aber, IV, 176, nur von Natal und fehlt auch bei *Nevill*.
- Lienard* 59, 60 führt auch noch *C. ligatum* Müll., affine Sow. (= *ligatum* var.), *Kraussianum* (*Pfr.*), *clathratulum* (*Recluz*), *unifasciatum* Sow. und *unicolor* Sow. von Mauritius an, obwohl sonst Niemand sie von dort kennt; die 3 ersten gehören dem Festland von Ostafrika an, *clathratulum* Yemen und der Insel Sokotora, *unifasciatum* Madagaskar, von *unicolor* ist noch kein sicherer Fundort bekannt.
- S? M *Cyclotopsis conoidea* *Pfr.* Zeitschr. f. Malakozool 1846, S. 44, mon. pneum. I, p. 33 (*Cyclotus*), Chemn. ed. nov. Taf. 13, Fig. 19—21, Ile de France, *Barclay*. *Blanford* Ann. Mag. nat. hist. (4) III, p. 342 (*Cyclotopsis*). *Lien.* 59. *Nevill* handl. p. 308, Gipfel des Mount Oriz, Mauritius, sehr selten. — *Cyclostoma spurcum* Sow. Proc. Zool. Soc. 1834, p. 60, thesaur. pl. 24, Fig. 75, 76, Seychellen. Schalenhabitus wie bei *Cyclotus*.

- M? *Mascaria crocea* Sow. (Cyclostoma) thesaur. pl. 29, Fig. 190, 191, *Pfr.* Chemn. ed. nov. Taf. 24, Fig. 15, 16, mon. pneum. I, p. 125, Black river, Mauritius, in Bergwäldern nach *Benson*, dagegen nach *Morelet* Journ. de Conch. XXIV, 1876, p. 90 gar nicht auf Mauritina, sondern nur in Madagaskar. Ueber die Gattung s. *Angas* Proc. Zool. Soc. 1878 p. 310.
- M *Omphalotropis aurantiaca* Desh. (Cyclostoma) *Belanger* voy. Ind., zool. p. 416, pl. 1, Fig. 16, 17 (angeblich Pondichery). Desh. Lam. VIII, p. 373. *Pfr.* mon. pneum. I, p. 309. *Nevill* handl. p. 320 Mauritius, Cycl. *Belangeri* *Pfr.* Chemn. ed. nov. Cycl. Taf. 30, Fig. 1—3.
- MB† **Omphalotropis rubens* *Quoy et Gaimard* (Cyclostoma) *Voy. de l'Astrolabe*, zool. II, p. 189, pl. 12, Fig. 36, 39 Montagne du Pouce, Ile de France. Desh. Lam. VIII, p. 368. *Pfr.* mon. pneum. I, p. 310. Chemn. ed. nov. Taf. 30, Fig. 10—12, Mauritius, *Barclay*. *Morelet* series conch. II, p. 107 Bourbon u. Maurice, auf Gebüsch, in den höhern Gegenden, soweit sie feucht sind. Desh. 84 Reunion. *Blanford* Ann. Mag. n. h. (3) III 1869, p. 340. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX 1870, p. 415; handl. 317 Mauritius u. Salazie, Bourbon. *Lien.* 60.
- B† *Omphalotropis Moreleti* Desh. (Cyclost.) moll. de Reunion p. 84, pl. 10, Fig. 7, 8 Reunion. *Pfr.* mon. pneum. IV, p. 220. *O. rubens* var. *Moreleti* *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX 1870 p. 415, handl. 319 Salazie, Bourbon.
- M† *Omphalotropis Dupontiana* *Nevill* handlist p. 320 Pouce Mt., Mauritius, halbfossil.
- M† *Omphalotropis variegata* *Morelet* (Hydrocena) *Revue et Mag. de Zool.* XVIII, 1866, p. 63 Vacoa, Mauritius. *Pfr.* mon. pneum. IV, p. 241. *Nevill* handl. 319.
- MB† **Omphalotropis expansilabris* *Pfr.* Proc. Zool. Soc. 1851, mon. pneum. I p. 312, Chemn. ed. nov. Taf. 39, Fig. 17—19 Mauritius, im Innern der Insel, auf Gesträuch, *Barclay*. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX 1870 p. 416, handl. 62 Pouce Mount, Trou-aux-cerfs und Savaune, Mauritius; Salazie Bourbon.
- MB† **Omphalotropis picturata* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1867 p. 306, pl. 19, Fig. 13 Pouce Mountain, Mauritius. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX 1870 p. 416; handl. 320 Pouce Mt., Vacoa und Corps du Garde, Mauritius; Salazie, Bourbon. *Lien.* 60.
- M† **Omphalotropis globosa* *Benson* (Cyclost.) *Pfr.* Proc. Zool. Soc. 1851; mon. pneum. I p. 311, Chemn. ed. nov. Taf. 39, Fig. 14—16. Mauritius, an Bäumen im Wald. *Lien.* 60. *Nevill* handl. 319 Grand Bassin, Maur.
- D† *Omphalotropis taeniata* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 142; XXII pl. 8, Fig. 12 Rodriguez, selten, *Desmazuures*. *Pfr.* mon. pneum. IV p. 223.
- D† *Omphalotropis Hameliana* *Crosse* ibid. p. 143, Fig. 11 Rodriguez, *Desmazuures*. *Pfr.* ibid. 223.
- M† *Omphalotropis plicosa* *Pfr.* Proc. Zool. Soc. 1851, mon. pneum. I, p. 311, Chemn. ed. nov. Taf. 46, Fig. 41, 42 (Fundort unbekannt). *Nevill* handl. p. 320 Moka, Pouce Mt. und Mount. Oriz, Maur.
- **Omphalotropis plicosa* var. *harpula* *Benson* Ann. Mag. n. h. (3) III p. 100. *Pfr.* mon. pneum. III p. 178 Mauritius.
- M† *Omphalotropis clavulus* *Morelet* (Hydrocena) *Revue et Mag. Zool.* XVIII, 1866

- p. 63, Vacoa, Mauritius. Pfr. mon. pneum. IV p. 228. *Lien.* 60. *Nevill* handl. 320. Mt. Oriz, Pouce Mt., Trou-aux-cerfs und Corps du Garde, Maur.
- M† Omphalotropis multilirata Pfr. Proc. Zool. Soc. 1851, mon. pneum. I, p. 311. Mauritius, *Barclay*. *Nevill* handl. 320, Monat Oriz, Mauritius, *Dupont*.
- M† Omphalotropis costellata H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 106, pl. 19, Fig. 12 Ponce Mt., Maur. Pfr. mon. pneum. IV, p. 220. Soll nach H. Adams bei *Nevill* handl. 220 nicht von der vorigen zu trennen sein.
- D Omphalotropis littorinula *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 143, XXII, pl. 8, Fig. 10 Pointe aux Coraux, Rodriguez, selten, *Desmazuures*. (*Ferussac* Mus.).
- B† Omphalotropis Rangii *Potiez* et *Michaud* galerie moll. de Douai I, p. 240, pl. 24, Fig. 18, 19 Bourbon. *Nevill* handlist 320 Salazie Bourbon. — O. Borbonica H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 292, pl. 28, Fig. 16 Bourbon; *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 415 in feuchten Wäldern. Vermuthlich auch Cyclostoma Rangii *Ferussac* Bull. sc. nat. X, 1827, p. 409, mit Beschreibung des Thieres, aber nicht der Schale, von Bourbon und Ile de France.
- M† *Omphalotropis Moebii n. sp. Taf. 19, Fig. 1.
 Testa anguste umbilicata, ovato-conica, confertim costulata et medio filocarinata, spiratim arcte striatula, pallide rubello-flavida, unicolor; spira conica, acutiuscula, anfr. $5\frac{1}{2}$; planiusculi, priores 2 aurantiaci, nitidi, rotundati, ultimus basi circa umbilicum infundibuliformem carinato-angulatus; apertura dimidiam testae longitudinem subaequans, sat obliqua, ovata, superne acutangula, peristomate tenui, continuo, breviter expanso, albido, margine columellari non dilatato, basali subangulato.
 Long. 6, diam. $4\frac{1}{4}$, apert. long. 3, lat. $2\frac{1}{3}$ Mill.
 Bel'Ombre, Mauritius, Prof. Möbius.
 Hat Aehnlichkeit mit O. major Morelet, ist aber bedeutend kleiner.
- M† Omphalotropis major *Morelet* (Hydrocena) Revue et Mag. de Zool. 1866, p. 63. Vacoas, Maur. Pfr. mon. pneum. IV, p. 229. *Nevill* handl. 319 Pouce Mt., Maur. und var? Curepipe. 12 mm lang.
 Von den vorstehenden Arten sind ausgezeichnet:
 durch gegitterte Skulptur O. major.
 durch ausgesprochene Spiral-Skulptur: O. multilirata, costellata, littorinula.
 durch feine Punktreihen O. Rangii (Borbonica).
 durch Radialfalten O. plicosa mit harpula, Möbii, schwächer bei clavulus.
 durch einen Kiel in der Mitte des letzten Umgangs O. Rangii, expansilabris, aurantiaca, rubens, major, clavulus, Möbii.
 durch ausgebogenen Mundrand O. expansilabris, aurantiaca, rubens, variegata, Möbii.

Helicinidae.

- S† Helicina Theobaldiana *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 65 (ohne Artnamen) Mahé, Praslin und Silhouette, unter abgefallenem Laub, roth oder orange; Journ. As. Soc. XXXIX, 1871, p. 8, pl. 1, Fig. 8. Seychellen, unter modernem Laub am Boden; handl. 325. Pfr. mon. pneum. IV, p. 284. Sehr nahe verwandt mit H. Nicobarica Philippi.

- M† *Helicina undulata* *Morelet* Journ. de Conch. XXVI, 1878, p. 172. Mauritius, ausgestorben.

Stylophorophora.

Oxygnatha.

(*Parmacella* siehe *Hyalimax*.)

- B† *Vitrina? Borbonica* *Morelet* series conchyliologiques II, p. 48, pl. 4, Fig. 1 Bourbon. Pfr. V, 462. Nach *Nevill* Journ. As. Soc. 1870, p. 404 vielleicht eine junge *Pachystyla coelatura*.
- M† *Microcystis Poweri* *H. Adams* (*Nanina*) Proc. Zool. Soc. 1868, p. 293, pl. 28, Fig. 20 Peter Botte mountains, Mauritius, Dr. *Power*. Pfr. V, 123. *Lien*. 57. *Nevill* handlist p. 40, von *Evenor Dupont* gesammelt.
- MB† *Microcystis nitella* *Morelet*, Revue zool. 1851, p. 219; ser. conch. II, p. 61, pl. 4, Fig. 9 Mauritius, auf dem Gipfel des Berges Pouce, selten. Pfr. V, 469. *Desh*. 85, Bourbon. *Lien*. 57. *Nevill* P. Z. S. 1868, p. 258; handlist etc. p. 40 Pouce Mountain Mauritius. Dieses ist vermuthlich *Sganzin's* 16 *Helix nitida* (Müll. Lam.) von Bourbon.
- MB† *Microcystis proletaria* *Morelet* ser. conch. II, p. 60, pl. 4, Fig. 4, Mauritius. Pfr. V, 467. *Desh*. 85 Réunion. *Lien*. 57. *Nevill* handlist p. 40 Salazie, Insel Bourbon; *Nanina Geoffreyi* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 289, pl. 28, Fig. 3 Bourbon; *G. Nevill* Journ. Asiat. Soc. Beng. XXXIX, part. 2, 1870, p. 406. Pfr. VII, 122. *Helix nulla* *Ferussac* Bulletin des sciences naturelles X, 1827, p. 302 Bourbon, *Rang*, ohne Beschreibung.
- M† *Microcystis perlucida* *H. Adams* (*Macrochlamys*) Proc. Zool. Soc. 1867, p. 303, pl. 19, Fig. 3 Peter Botte, Grand Bassin, Trou-aux-Cerfs, Mauritius, von *G. Nevill* gesammelt; Mantel lebhaft gelb, schwarzfleckig, Fuss gelb, Fühler schwarz. Pfr. VII, 145. *Lien*. 57. *Nevill* handlist p. 40. Verschieden von *Hyalina? perlucida* *Issel* 1874 aus Borneo.
- SM† *Microcystis Virginia* *Morelet* ser. conch. II, p. 62, pl. 4, Fig. 8 Mauritius, auf dem Berge Pouce, in feuchten Waldschluchten, unter abgefallenen Blättern. Pfr. V, 469. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 257; handlist p. 40. *Lien*. 58 Maur. und 90 Seychellen.
- MB† *Microcystis Maillardi* *Desh*. (*Helix*) moll. de Réunion p. 86, pl. 10, Fig. 12—16. Bourbon. *Nevill* Journ. Asiat. Soc. XXXIX, part. 2, 1870, p. 406, handlist p. 40, Pouce Mountain, Mauritius und Salazie, Bourbon. Pfr. VII, 111.
- M† *Microcystis minima* *H. Adams* (*Macrochlamys*) Proc. Zool. Soc. 1867, p. 303, pl. 19, Fig. 2 Port Louis, Mauritius. Pfr. VII, 112. *Lien*. 58. *Nevill* handlist p. 40. Verschieden von *Hyalina minima* *Cox* 1868 aus Tasmanien.
- S† *Microcystis subturritula* *Nevill* (*Conulus*) Journ. Asiat. Soc. Beng. XXXIX, part. 2, 1871, p. 7. in einer feuchten Schlucht auf Mahé, Seychellen, ungefähr 800 Fuss über dem Meere. Pfr. VII, 72. Vermuthlich *Helix* (*Conulus*) n. sp.

Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 63, Mahé, Félicité und Silhouette, unter feuchten Blättern.

Nach *Nevill's* Vorgang sind diese 8 kleinen Arten hier unter *Microcystis* zusammengestellt, da sie sehr wahrscheinlich unter sich nahe zusammengehören; ob sie freilich mit den ächten polynesischen *Microcystis* wirklich nächstverwandte seien, muss vorerst dahingestellt bleiben.

- M† **Pachystyla inversicolor* *Ferussac* *Bernardin* *St. Pierre* voy. à l'île de France 1773, p. 106 Lampe antique. *Ferussac*, prodr. 1821 (*Helix Helicigona*) nro. 132, hist. nat. d. moll. terr. pl. 58A, Fig. 7—12 Ile de France, von *Peron* auf *Baudin's* Expedition gesammelt. *Rang* Bull. sci. nat. X, 1827, p. 302 Ile de France. *Pfr.* mon. I, 21, Chemn. ed. nov. Taf. 86, Fig. 6, 7. *Reeve* conch. ic. VII, *Helix* Fig. 177. *Morelet* series conch. II, p. 50 Mauritius auf bewaldeten Höhen und in feuchten Schluchten, unter Steinen. *Binney* Proc. Ac. Philad. 1874, p. 48 (Geschlechtsapparat). *Lien.* 56. *Nevill* handlist p. 43 Mauritius in den Wäldern. — *Carocolla bicolor* *Lam.* an. s. vert, en. 2, VIII, p. 146 Ile de France; *Sganz.* 16 ebenda an Baumstämmen in Wäldern.

Diese Schnecke variiert bedeutend in Höhe und Breite: ein ungewöhnlich hohes Exemplar, von Prof. *Möbius* gesammelt, ist 25 mm hoch und nur 32 breit, das grösste Exemplar im Berliner Museum nur 24 mm hoch und 45 breit, so dass also auch hier, wie bei den grossen Planorbis (*corneus*, *Indicus*, *tenagophilus*, vgl. *Malakol.* Blätt. 1868, p. 189) u. a. Schnecken die Dimensionen sich gegenseitig compensieren und so bei verschiedenen Formen doch der Rauminhalt annähernd gleich bleibt. Unausgewachsene Exemplare zeigen einen zahnartigen Höcker am Columellarrand, Taf. 19, Fig. 6.

- M† *Pachystyla Mauritiana* *Lam.* (*Carocolla*) an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 146 Ile de France. *Sganz.* 16 ebenda in Wäldern an Baumstämmen. *Nevill* handl. p. 43 Mauritius, im Kulturland. — *H. inversicolor* var. *Ferussac* pl. 58A, Fig. 1—6. — *H. stylodon* (non *Pfr.*) *Reeve* conch. ic. VII, Fig. 181. — *H. leucostyla* *Pfr.* IV, 18 Maur.; *Morelet* series conch. II, p. 51 Mauritius, mit der vorigen. *Lien.* 56. Sehr ähnlich den höheren kleineren Formen der vorhergehenden, aber Ober- und Unterseite gleichfarbig.

- M† *Pachystyla Mauritanella* *Morelet* *Revue zool.* 1851, p. 209; series conch. II, p. 4, Fig. 2 Black river, Mauritius, im Wald unter Steinen. *Pfr.* III, 37. *Lien.* 56. *Nevill* handl. p. 43. — *H. Mauritiana* *Pfr.* Proc. Zool. Soc. 1851, mon. III, 57. Black river, auf den Bergen; Chemn. ed. nov. Taf. 147, Fig. 1, 2. *Reeve* Fig. 189. *Lien.* 57. Nach *Morelet* ist dieses die ursprüngliche *Helix detecta* *Ferussac's*. *Ferussac* Bulletin des sciences naturelles X, 1827, p. 302, Insel Bourbon unter abgefallenen Blättern im Bette des Flusses St. Denis, welche derselbe von *Rang* erhalten.

- B† *Pachystyla detecta* *Pfeiffer* *symbolae* ad hist. helic. II, 1842, p. 27, Bourbon; mon. I, p. 219; Chemn. ed. nov. Taf. 92, Fig. 20, 21. *Philippi* Abbild. I. Taf. 3, Fig. 7. *Albers* *Heliceen*, 1. Ausgabe 1850, S. 115 (*Rotula*). *Reeve* Fig. 1234. *Desh.* 85. *Stoliczka* Journ. As. Soc. XL, part. 2, p. 231. *Nevill* handlist p. 43. — *Stylodonta bewsheri* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1872, p. 18, pl. 3, Fig. 18.

Basin du diable bei St. Denis, Bourbon, *Caldwell*; *ibid.* 1873, p. 209. Pfr. VII, 303.

Durch die starken Radialrippen und den frei vorstehenden Kiel abweichend und in der allgemeinen Gestalt sich mehr an *semicerina* anschliessend.

- D† *Pachystyla Bewsheriana* *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 23, pl. 1, Fig. 1, Insel Rodriguez, ausgestorben, in Höhlen mit Knochen von *Didus* zusammen.
 M† *Pachystyla Nevilli* *H. Adams* (Stylodonta) Proc. Zool. Soc. 1867, p. 304, pl. 19, Fig. 5, Pouce Mountain, Mauritius, *Nevill*. Pfr. VII, 92. *Lien.* 57.

Peripherie abgerundet, wie bei den folgenden.

- D† *Pachystyla Rodriguezensis* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 137; XXII, p. 230, pl. 8, Fig. 1, Nouvelle Decouverte auf Rodriguez, unter Mangobäumen, *Desmazuers*. Auch subfossil.
 M† *Pachystyla rufozonata* *H. Adams* (Stylodonta) Proc. Zool. Soc. 1869, p. 275; Pfr. VII, 98. — *St. rufocincta* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1867, p. 303, pl. 19, Fig. 4 (non *Helix rufocincta* Newcomb von Californien) Mauritius.

Helix (*Helicostyla*) *ochroleuca* *Ferussac* prod. nro. 308, hist. moll. terr. pl. 30, Fig. 1, „les grandes Indes“ ist nach *Nevill*, der die Original Exemplare im Pariser Museum verglichen hat (Journ. As. Soc. XLIV, 1875, p. 104) dieselbe Art, aber es scheint nicht passend, sie deshalb nochmals umzutaufen (*Nevill* handl. p. 43), da der Name *ochroleuca* nur ganz verbleichte Exemplare bezeichnet; frisch ist sie gelbbraun mit dunkelrothbraunem Band.

- M† *Pachystyla* (*Erepta*) *stylodon* Pfr. symbol. hist. hel. II, 1842, p. 40 (unrichtig von Pondichery angegeben); mon. I, 34 Mauritius, IV, 57; Chemn. ed. nov. Taf. 28, Fig. 18, 19. *Reeve* conch. ic. Fig. 1167 (nicht 191). *Albers* Heliceen erste Ausgabe 1850, S. 109 (*Erepta*) Ile de France. *Morelet* series conch. II, p. 51 Moka, Maur., unter Steinen, *Binney*, Proc. Acad. Philadelph. 1874, p. 48 (*Radula*). *Lien.* 57. *Nevill* handl. p. 44 Moka. — *Helix* (*Helicostyla*) *depressa* *Ferussac* prod. nro. 314, ohne Fundort, nach *Morelet* und *Nevill*. — *Helix monodonta* *Gratelpoup* Act. Soc. Linn. de Bordeaux XI, 1841, p. 399. pl. 1, Fig. 11 Mauritius, in Bergwäldern (non *H. monodonta* *Lea* 1832). — *Helix albidorsalis* *Benson* Ann. and Mag. nat. hist. XI, 1853, p. 31 Mauritius, von *Bacon* gesammelt; *Reeve* Fig. 1167.

In der Färbung an die vorhergehende erinnernd, aber durch den Columellarzahn verschieden.

- M† **Pachystyla odontina* *Morelet* Revue et Mag. Zool. 1881, p. 219 Mauritius. Pfr. III, 34. *Morelet* series conch. II, p. 55 Mauritius, am innern Abhang der Hügel, welche die Insel umgeben. *Nevill* handlist p. 44 Pouce Mountain, Maur. — *Helix suffulta* *Benson* Ann. and Mag. n. h. XI, 1853, p. 31 Mauritius, *Bacon*; *Reeve* Fig. 1175. *Lien.* 58.

Helix Lightfooti Pfr. Proc. Zool. Soc. 1851; mon. III, 150; *Reeve* Fig. 779, angeblich von Brisbane in Australien, soll dieselbe Art sein.

- M† **Pachystyla* (*Coelatura*) *Duponti* *Morelet* (*Helix*) Revue zoologique 1866, p. 72 Berg „Ory“, Mauritius, subfossil. Pfr. V, 465. *Lien.* 56. *Martens* in Pfeiffer's Novitates conchol. V, S. 179, Taf. 152, Fig. 1–3. — *Nanina sulcifera* *Barclay*, *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 15, pl. 4, Fig. 12 „Montagne au riz“, Mauritius, von *Barclay* gesammelt, ausgestorben (Offenbar dieselbe Lokalität, nur mit anderer Orthographie). Pfr. VII, 321. *Lien.* 56 und 57, nur todt, in Sand und

Erde gefunden. Auch von Professor *Möbius* mitgebracht und von Herrn *Caldwell* erhalten.

Scheint mir nächstverwandt mit der folgenden.

- B † *Pachystyla caelatura* *Férussac* (*Helix Helicogena*) prodrome 1821, nro. 48, hist. nat. d. moll. terr. pl. 28, Fig. 3, 4, Bourbon, von *D. Fredouille* erhalten. *Lamarck* an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 39 (coel. wie die folgenden). Pfr. I, 20; Chemn. ed. nov. Taf. 29, Fig. 3, 4. *Reeve* Fig. 183. *Sganz.* 16 Bourbon, auf Bäumen, an alten Mauern, unter trockenen Blättern, nie in der Niederung. *Morelet* series conchyl. II, p. 49 Bourbon, in hohen bewaldeten Gegenden, unter Steinen und in hohlen Baumstämmen, *E. Vesco.* *Desh.* 85. *Nevill.* Journ. As. Soc. XXXIX 2, 1870, p. 403 (lebendes Thier). *Semper* Reisen im Archipel der Philippinen, Landschnecken I, 1870, S. 39 (*Rotula*), Taf. 3, Fig. 22 Geschlechtsorgane, und Taf. 7, Fig. 1. Kiefer und Radula.

Semper's Untersuchung der Weichtheile zeigt, dass diese Art doch in die Nähe der *Naninen* gehört, obwohl das Horn über dem Fussende fehlt und die Mantellappen wenig entwickelt sind, wesshalb *Nevill* sie wieder zu *Helix*, nicht zu *Nanina* stellen wollte. Diese Art wurde auch schon in früherer Zeit von *Lamare Picquot* von den Maskarenen dem zoologischen Museum in Berlin gegeben und war daselbst früher mit dem nicht publicirten Namen *Helix exarata* bezeichnet.

- D † *Pachystyla* (*Coelatura*) *Bewsheriana* *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 23, pl. 1, Fig. 1. Insel Rodriguez, ausgestorben, in Höhlen mit Knochen der *Dronte* gefunden.

- MB? † *Pachystyla* (*Coelatura*) *scalpta* *Martens*, Monatsberichte d. Akad. d. Wiss. in Berlin 1877, S. 267. *Helix rufa* (non Lesson) *Pfeiffer* monogr. I. p. 73; Chemn. ed. nov. Taf. 87, Fig. 4, 5. Mauritius nach *Guerin*, *Reeve* Fig. 193, Gray catal. Pulm. 136. *Morelet* series conch. II, p. 64 Maur., Black river distrikt unter Steinen und abgefallenen Blättern. *Semper* Reise Philippin., Landschnecken I, S. 11, Taf. 3, Fig. 23 Geschlechtsorgane, Taf. 7, Fig. 3 Radula, angeblich von Bourbon. *Lien.* 57 Mauritius. — *Nanina semifusca* (*Desh.*) *Nevill*, Journal de Conchyliologie XXVI, 1878, p. 59 Mauritius, handlist p. 32 Port Louis, Maur.

Nevill und ich haben ungefähr zu gleicher Zeit die früher bestandene Verwirrung dieser Schnecke mit einer neuirländischen, *rufa* Lesson, auseinandergesetzt, aber *Nevill* glaubt, die maskarenische sei die halb verschollene *Helix semifusca* *Deshayes* in *Belanger* Voy. aux Indes, zool. p. 414, pl. 1, Fig. 8 bis 10, Pfr. I, 54, und diese fälschlich von Pondichery statt aus Mauritius angegeben; ich kann mich aber davon nicht überzeugen, da weder auf der Abbildung noch in der Beschreibung etwas von der so charakteristischen Skulptur zu finden ist.

- M † *Pachystyla* (*Coelatura*) *semicerina* *Morelet* (*Helix*) *Revue et Mag. de Zoologie* 1851, p. 219 Mauritius. Pfr. III, 79. *Morelet* series conch. II, p. 56 Trou au Cerf, in der Mitte der Insel Maur., unter Steinen und Blättern. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 407; handlist p. 43. *Stoliczka* ibid. XL, p. 232. *Lien.* 58. — *Helix Rawsonis* *Barclay*, *Reeve* conchol. icon. VII, 1851, Fig. 199 Mauritius, in Wäldern. Pfr. I, 56, Chemn. ed. nov. Taf. 147, Fig. 3, 4. *Lien.* 57. *Binney* Proc. Acad. Philadelph. 1874, S. 48 (*Radula*).

- MB† **Pachystyla* (*Coelatura*) *argentea* *Reeve* *conch. ic.* Fig. 1434 Mauritius. *Pfr.* IV, 39; V, 236. *Morelet* *series conch.* II, p. 56 Maur. *Desh.* 85 Reunion. *Nevill Journ. As. Soc.* XXXIX, p. 407; handlist p. 43 Maur. und Salazie, Bourbon. *Lien.* 56. *Binner* loc. cit. (*radula*). — *Helix delibata* *Ferussac*, *Bull. sc. nat.* X, 1827, p. 302 Bourbon, Rang, ohne Beschreibung, ist nach *Nevill Journ. As. Soc.* XLIV, p. 104 dieselbe Art. — *Helix argentea* var. *turbinata* *Morelet* *Revue zool.* 1851, p. 219. — Auch von Prof. *Möbius* mitgebracht.
- MB† *Pachystyla* (*Coelatura*) *linophora* *Morelet* *series conch.* II, p. 57, pl. 4, Fig. 6 Bourbon. *Pfr.* V, 468. *Nevill* loc. cit. p. 406.
- M† *Pachystyla* (*Coelatura*) *implicata* *Nevill Journ. As. Soc.* XXXIX, 1870, p. 407. Peter Botte mountains, Maur.; handlist p. 43. *Pfr.* VII, 91. *Lien.* 56. *Binney* loc. cit. (*radula*).
- M† *Pachystyla* (*Caldwellia*) *philyrina* *Morelet* *Revue et Mag. de Zoologie* 1851, p. 218 Mauritius; *series conch.* II, p. 58 Trou au cerfs, Maur., auf Gebüsch und an feuchten Felsen. *H. Adams* *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 209. *Lien.* 57. *Binney* *Proc. Acad. Philadelphia* 1874, p. 48 (*Radula*). *Nevill* handl. 46, Savanne, Maur. — *Helix mucronata* *Pfr.* *Proceed. Zool. Soc.* 1851; mon. I, 36 Maur.; *Reeve* *conch. ic.* Fig. 197.
- M† **Pachystyla* (*Caldwellia*) *Cernica* *H. Adams* *Proc. Zool. Soc.* 1868, p. 12, pl. 4, Fig. 3 Mauritius. *Pfr.* VII, 70. *Nevill* *P. Z. S.* 1868, p. 258; handl. 45, Vacoa, Maur., am Boden.
- MB† *Pachystyla* (*Caldwellia*) *imperfecta* *Desh.* *moll. de Réunion* p. 89, pl. 10, Fig. 24 bis 26 Bourbon. *Pfr.* V, 57. *Nevill Journ. As. Soc.* XXXIX, 1870, p. 404, handl. 45 Mauritius und Bourbon. *Lien.* 56.
- M† *Pachystyla* (*Caldwellia*) *Boryana* *Morelet Journ. de Conch.* XXIII. 1875, p. 31 Mauritius. *Pfr.* VII, 522.

Die hier als Gattung *Pachystyla* zusammengefassten Arten gehen zwar in einzelnen Charakteren weit auseinander, sind aber doch nicht nur geographisch, sondern auch im Habitus und durch vermittelnde Arten deutlich untereinander verbunden; *detecta* verbindet unsere erste Gruppe mit *Rawsonis* in der dritten, *rufozonata* die erste mit der zweiten, die weitmündige *coelatura* und die dünn-schalige *argentea* bereiten auf die *Caldwellien* vor. Was die anatomischen, von Semper und Binney (siehe bei den einzelnen Arten) untersuchten Charaktere betrifft, so stimmen sie im Wesentlichen unter sich überein, sie schliessen sich nach *Radula* und Geschlechtsapparat zunächst an die *Naninen* an, unterscheiden sich aber von denselben durch den Mangel einer hornartigen Verlängerung über der Schleim-pore am Fussende und durch nicht merklich vorragende Mantellappen.

Früher waren die einzelnen Arten wegen ihrer Verschiedenheit in der äussern Form, namentlich in Betreff des Kiels, selbst in Versuchen einer natürlichen Classification mehrfach zerstreut, *inversicolor* meist bei den westindischen *Carocollen* untergebracht, *caelatura* bei den *Helicogenen* (*Ferussac* 1821), bei den westindischen *Eurycrateren* (*Beck* 1837, *Albers* 1. Ausg., *Pachystoma* *H.* und *A. Adams* *Otala*) oder bei den eigentlichen *Naninen* (*Albers* 2. Ausg.), die kleineren Formen von *Ferussac* bei den *Helicostylen*, während für zwei einzelne besonders markirte Arten *Albers* 1850 zwei eigene Gruppen, *Rotula* und *Erepta*, bildete. *Mörch* fasste 1852 wenigstens zwei bis dahin weit von einander entfernte Arten, *Mauritiana* und *ochrolenca*, als *Pachystyla* zusammen, *H.* u. *A. Adams* vereinigten eine grössere Anzahl mit der unten zu erwähnenden für die Seychellen eigenthümlichen *Helix*-Gruppe *Stylodonta*, *Semper* 1870 stellte schon die Mehrzahl unter dem Namen *Rotula* zusammen; aber dieser Name, ursprünglich von *Albers* für die nicht hierher gehörige *H. Massoni* und für *detecta* allein eingeführt, war schon früher bei den Echinodermen durch *Agassiz* vergeben; auch *Erepta* ist ursprünglich nur speciell für *H. stylodon* gegeben und überdies sinnlos; so blieb das ziemlich bezeichnende

Pachystyla noch als Gattungsname übrig; als Unterabtheilungen lassen sich neben der auch anatomisch abweichenden dünnchaligen *Caldwellia* (H. Adams 1873) noch die mit Spiralskulptur versehene *Coelatura*, und die durch bleibenden Columellarzahn ausgezeichnete *Erepta* Albers 1850 (im ursprünglichen Sinn von den Pachystylen in engerm Sinn einigermaßen unterscheiden.

Aulacognatha.

- M† **Helix*(?) *Caldwelli* Benson Ann. Mag. nat. hist. (3) III, 1859. p. 98 Mauritius. *Pfr.* Malakozool. Blätter VI, 1859. S. 12; mon. V, 1504. *Lien.* 56. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 258 (lebendes Thier) Pouce Mt., immer am Boden.; handlist p. 44 (Nanina, *Erepta*). Binney Proc. Acad. Philadelphia 1874, p. 48 *Radula*. *Helix* Paulus *Morelet* series conchyl. II, 1860, p. 63, pl. 4, Fig. 7 Moka, Maur., unter einem Stein. *Pfr.* V, 473. Auch von Prof. Möbius gefunden.
- Diese Art gleicht im weiten Nabel, der gedrückten Gestalt, den scharfen Rippenfalten und der braunen Färbung durchaus einer *Patula*, zeichnet sich aber durch die auffällige Verdickung des Columellarrandes aus, was wieder an *Pachystyla*, speziell *Erepta*, erinnert.
- M† *Helix* (*Patula*) *Newtoni* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XXXIX, part. 2, 1871, p. 6. Pouce Mountain, Maur.; handlist p. 44 (*Rotula*?). *Pfr.* mon. VII, 160. *Lien.* 57. Aehnlich unserer *H. rotundata*, aber die Ränder des Nabels gekerbt.
- M† *Helix* (*Patula*) *vorticella* H. Adams (*Discus*) Proc. Zool. Soc. 1868, p. 12, pl. 4. Fig. 2 Bamboo, Mauritius, *Nevill*. *Pfr.* VII, 160. *Lien.* 58. *Nevill* handl. p. 66.
- S† *Helix* (*Patula*) *serrata* H. Adams (*Discus*) Proc. Zool. Soc. 1868, p. 63 und 1870, p. 290, pl. 28, Fig. 6, Silhouette islands, Seychellen, Mahé, Praslin und auf feuchtem Boden. *Pfr.* VII, 204. *Lien.* 80.
- B† *Helix* (*Patula*) *Salaziensis* *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, part. 2, p. 405 Salazie, Bourbon; handlist p. 66. *Pfr.* mon. VII, 138. Sehr klein.
- S† *Helix* (*Patula*) *Levieuxi* *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, part. 2, 1871, p. 6 Mahé. *Pfr.* VII, 204. Etwas höher gewunden.
- M† **Helix* (*Pella*) *cyclaria* *Morelet* Journ. de Conchyl. XXIII, 1875, p. 31, Unsere Taf. 19, Fig. 3—5. Mauritius, subfossil, *Dupont*. Auch von Prof. Möbius mitgebracht. Scheint am besten bei den südafrikanischen *Pella* zu stehen, trotz ihrer bedeutenderen Grösse, wodurch sie zu *Helix Menkeana* *Pfr.* hinüberführt (*Phasis* Albers), welche jedenfalls auch besser neben *Pella* als neben *Planispira* zu setzen ist.
- B† *Helix* (*Pella*) *praetumida* Ferussac Bullet. d. scienc. nat. X, 1827, p. 303 Bourbon, Rang, ohne Beschreibung. *Morelet*, series conch. II, p. 64, pl. 4, Fig. 10 Brulé de St. Denis, Bourbon, 500 m ü. d. M.; *Pfr.* V, 469. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, p. 408; handlist p. 28 Salazie, Bourbon.
- B† *Helix* (*Pella*) *Condemoyi* *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 408; handlist p. 28 Salazie, Bourbon. *Pfr.* VII, 111.
- M B† *Helix* (*Pella*) *setiliris* Benson Ann. Mag. n. h. (3) III, 1859, p. 99 Mauritius, in Wäldern. *Pfr.* V, 356. *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XXXIX, 1870, p. 404; handlist p. 44 Salazie, Bourbon und Mauritius. — *Helix turbida* Ferussac Bull. sci. nat. X, 1827, p. 303 Bourbon, Rang, ohne Beschreibung. — *Helix Vinsoni* *Desh. moll. de Réunion* p. 88, pl. 10, Fig. 20—23. *Pfr.* V, 482.

Durch borstige Vertikalrippen ausgezeichnet.

- MB† *Helix* (Pella?) *Barclayi* Benson Ann. and Mag. nat. hist. (2) VI, 1850, p. 252. Moka-hills, Mauritius, unter Steinen. Pfr. III, 58. Reeve Fig. 1178. Nevill Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 405 Salazie, Bourbon; handlist p. 41 Nanina (*Microcystis*) Bourb. und Maur. Lien. 56 Maur. *Helix Eudeli* Desh. moll. de Réunion 1863, p. 87, pl. 10, Fig. 18, 19 Réunion.

Vielleicht neben *Mauritianella* zu stellen, aber viel kleiner.

- B† *Helix* (Pella?) *Frappieri* Desh. moll. de Reunion p. 86, pl. 10, Fig. 15—17 Reunion. Pfr. V, 60.

- SMB **Helix* (*Fruticicola*) *similaris* Fer. prodr. nro. 262, hist. nat. d. moll. terr. pl. 25 B, DI Fig. 1—4, pl. 27 A, Fig. 1—3 Bullet. scienc. nat. X, 1827, p. 301 Bourbon, sehr häufig in Gärten und Acacia-Hecken (*Rang*). Annal. de scienc. nat. XXIV, 1831, p. 15 Bourbon. Dufo 198 Mahé und Praslin, in Gemüsegärten am Meeresufer. Pfr. I, 336 var. ohne Band, mit rötlichem Mundsaum, von Mauritius, Barclay; Chemn. ed. nov. Taf. 60, Fig. 13—16, Mousson Moll. Juv. S. 21, Taf. 2, Fig. 4, 5. Martens Ostasiat. Landschnecken S. 19, 43 und 270, Reeve Fig. 149 und 767. Bland und Binney Am. Journ. Conch. 1871, p. 176 *Radula* und Kiefer. Morelet series conch. II, p. 58 Mauritius und Bourbon, häufig von der Küste bis zum Fuss der Berge, in verschiedenen Varietäten. Desh. 85 Reunion. Nevill P. Z. S. 1869, p. 62 Inseln Mahé und Praslin, nur in der Nähe des bebauten Landes und nicht in beträchtlicher Höhe, kleiner und dünner als auf Mauritius, selten mit einem Band. v. d. Decken Reisen in Ostafrika III, S. 56 Seychellen. Lien. 57 Maur. und 80 Seychellen. Crosse Journ. de Conchyl. XXII, 1874, p. 230 Rodriguez, häufig bei Fort Mathurin. Desmazes, ohne Band. Eine gelbfleckige Abart ist *Helix Brardiana* Pfr. Proc. Zool. Soc. 1851; mon. III, 228 von der Insel Bourbon, Chemn. ed. nov. Taf. 142, Fig. 7, 8. Reeve Fig. 604. Morelet loc. cit. Nevill handlist p. 79 Maur., Bourb. und Seychellen.

Bekanntlich in der Tropenzone beider Hemisphären weit verbreitet, ohne Zweifel durch Schiffe verschleppt.

H. Borbonica Desh. moll. de Reunion p. 85, pl. 10, Fig. 9—11 Reunion, selten, Maillard, ist doch wohl nur eine Abart von *similaris*, durch die Breite des dunkeln Bandes ausgezeichnet.

- SM *Helix* (*Pomatia*) *aspera* Müll. Diese bekannte süd- und westeuropäische Art findet sich gegenwärtig, absichtlich oder unabsichtlich eingeführt, auch auf den Seychellen, v. d. Decken, Reisen in Ostafrika III, S. 56, und auf Mauritius, E. Dupont bei Nevill handlist p. 97.

- S† *Helix* (*Stylodon*) *Studeriana* Ferussac prodr. nro. 316, hist. nat. pl. 103, Fig. 6. Dufo Ann. sc. nat. 1840, p. 200 Insel Praslin, in Gebüsch und an Schlingpflanzen auf den Gipfeln der Berge, selten, lebendig gebärend, und zwar sollen nur die heller gefärbten Individuen Junge haben. Pfr. I, 243; Chemn. ed. nov. Taf. 41, Fig. 1, 2. Reeve Fig. 153. Nevill Proc. Zool. Soc. 1869, p. 63 und handlist p. 81 nur auf der Insel Praslin, an den Stämmen der *Lodoicea Seychellarum*, eine dunkelbraune und eine hellgelbe Varietät. Lien. 80.

- S† **Helix* (*Stylodon*) *unidentata* Chemnitz Conch. Cab. XI, S. 273, Fig. 2049, 2050.

Ferussac hist. nat. pl. 104, Fig. 8, 9. *Dufo* loc. cit. 199. Insel Mahé, an Gebüsch und Schlingpflanzen in der mittlern Region der Berge, auch lebendig gebärend, und ebenfalls nur die heller gefärbten. Pfr. I, 303. Reeve Fig. 156. *Columpica uniplicata* Hartmann Gasteropoden S. 187, Taf. 67, Fig. 3—5. *v. d. Decken* Reisen in Ostafrika III, S. 56, Taf. 1, Fig. 4 a—c., Seychellen, sehr veränderlich in Grösse, relativer Höhe, Ausprägung der peripherischen Kante, Skulptur der letzten Windung und Intensität der Färbung, var. *exanthematica* mit ringförmigen Erhebungen des Periostracums, var. *normalis* mit Runzeln und var. *globata*, ohne solche auf dem letzten Umgang. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 63 und handlist p. 81 auf den Inseln Mahé, Felicité, Curieuse und Silhouette am Boden unter modernden Blättern, auf den drei letztgenannten kleinen Inseln dicker, höher und mit deutlichem Band. *Lien.* 80. — *Helix militaris* Pfr. IV, 245, ebenfalls von den Seychellen, dürfte sich in Anbetracht jener Veränderlichkeit nicht wohl als eigene Art halten lassen.

Diese *Helix*-Gruppe ist für die Seychellen ebenso eigenthümlich, wie *Pachystyla* für Mauritius und Bourbon, und auch hier finden wir eine Art mit und eine ohne Columellarzahn (*Studeriana*) wie ähnlich innerhalb *Pachystyla*. Trotzdem können wir schon nach dem Habitus der Schale beide Gruppen nicht vereinigen und die Untersuchung der Radula durch Binney (*Ann. Lyc. nat. hist. New-York* XI, 1875, p. 172, pl. 14, Fig. C. *Helix Studeriana*) zeigt, dass in der That *Stylodon* zu dem eigentlichen *Helix* mit kurzen 2—3lappigen Randzähnen gehört, obwohl der Kiefer keine Rippen zeigt. Beide Arten sind vivipar (*Dufo* und Binney loc. cit.).

SMB **Achatina fulica* Fer. (*Helix*, *Cochlitoma*) prodr. nro. 347, 1821, hist. nat. moll. terr. pl. 124A, Fig. 1. Ile de France; Bulletin des scienc. nat. X 1827, p. 303. Ile Bourbon u. Mauritius eingeführt. Ach. couroupa *Lesson* Voy. de la Coquille zool. II, p. 318, pl. 9, Fig. 2 (lebendes Thier), copirt von Oken, allg. Naturgesch. Taf. 10, Fig. 4, Mauritius, häufig aber eingeführt. Hel. Borbonica Fer. ibid. nro. 346 Bourbon. Ach. Mauritiana *Lam.* an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 297. *Quoy et Gaimard* Voy. de l'Astrolabe, zool. II, p. 152, pl. 11, Fig. 10—15 (lebendes Thier), anat. pl. 49, Ile de France, von den Negern couroupa genannt. *Dufo* 198 Mahé, in feuchten Schluchten zahlreich. *Sganzin* 17 Mauritius und Bourbon, in Gärten und Feldern. Ach. fulica Pfr. II 254. Reeve conch. X, Fig. 8, Mauritius. *Benson* Journ. de Conch. VII, 1858, p. 266, Moka auf Mauritius, häufig auf Rasen und um die Landhäuser eingeführt. *Morelet* series conch. II, 1860, p. 70, Mauritius und Bourbon, häufig in Gärten und Wäldern, an Baumstämmen und Pisangstengeln. *Desh.* 90 Reunion. *V. d. Decken* Reisen in Ostafrika III S. 58, Taf. 2, Fig. 1, Seychellen, zahlreich. *Lien.* 54 Maur. und 80 Mahé, Praslin, *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1869 p. 64, Seychellen, nur auf bebautem Land, dünner als auf Mauritius; handl. p. 145. — Seychellen, *Möbius*. (Anatomie Semper Reis. Arch. Philipp, Landschnecken III, S. 143, Taf. 12, Fig. 17). Nach *Lesson* loc. cit. erst aus Madagaskar eingeführt, seit Kurzem wieder selten geworden. Die var. *umbilicata*, eigentlich eine durch Verletzung verursachte Abweichung in der Richtung der Spirale, wodurch die Schale verkürzt und genabelt wird, schon bei *Ferussac* loc. cit. p. 303, (*Reeve* pl. 11, Fig. 8c, *v. d. Decken* loc. cit. Fig. 1b, 1c) auf den Seychellen von *Dufo* und *v. d. Decken*. auf Mauritius von *Barclay* (Pfr. loc. cit. var. E.), *Dupont* und *Nevill* gefunden, eine *Scalaride* von *Nevill* ebenda, links

gewundene auf Madagaskar von *Duisabo* (Grateloup. Act. Soc. Linn. XI, 1841, p. 415, pl. 2, Fig. 6).

- MB *Achatina panthera* Fer. prodr. n. 349, hist. nat. moll. terr. pl. 126, Fig. 1, 2. Lam. Desh. VIII, 309. Pfr. II, 252. Reeve Fig. 11. *Benson* Journ. de Conch. VII, 1858, p. 267 von *David Barclay* auf Mauritius eingeführt um 1847. *Morelet* series conchyl. II, p. 69 von Madagaskar in die Gärten auf Mauritius gebracht. *Desh.* 90 Reunion. *Lien.* 54, von Madagaskar auf Mauritius eingeführt. *Nevill* handl. 145, Mauritius. *Dupont* Journ. de Conch. XXVI, 1878, p. 171, ersetzt jetzt fast überall die auf der Insel Mauritius seltener gewordene *Ach. fulica*. Beide werden von den Einwohnern gegessen.
- Nach *Desh.* 90 sollen auch *Ach. fulva* Brug. und *purpurea* Chemn. auf Bourbon vorkommen, es scheint mir das sehr zweifelhaft, da beide sonst nur von Westafrika bekannt sind, vielleicht sind Varietäten von *fulica* und *panthera* gemeint. — *Ach. Lamarckiana* Pfr. erhielt das Berliner Museum auch von Hrn. Caldwell aus Mauritius, sie soll in Madagaskar zu Hause sein.
- S† **Buliminus* (*Pachnodes*) *fulvicans* Pfr. symbolae hist. helic. I, 1841, p. 42; mon. II, 100, Seychellen. Philippi Abbild. I, *Bulimus* Taf. 1, Fig. 10. *Reeve* V, Fig. 241. *Lien.* 79. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 258, Mahé, Praslin, Silhouette, die einzige auf der Cocospalme lebende Schnecke; 1869, p. 63, handl. 131, Mahé.
- S† *Buliminus* (*Pachnodes*) *ornatus* Dufo (*Bulimus*) Ann. sc. nat. XIV, 1840, p. 197, Mahé, auf Schlingpflanzen und Gebüsch in mittlerer Höhe der Berge. Höchst wahrscheinlich identisch mit *Bul. pulverulentus* Pfr. symb. I, 1841, p. 42, mon. II, 100, unbekannten Fundortes, *Reeve* Fig. 552.
- S† **Buliminus* (*Pachnodes*) *velutinus* Pfr. symbol. I, p. 42; mon. II 193, Seychellen; Chemn. ed. nov. Taf. 61, Fig. 11, 12. *Reeve* Fig. 362. *Lien.* 59. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868 p. 258; handl. 131, Inseln Mahé, Praslin und Silhouette, auf Gebüsch und unter todtten Blättern der Cocospalme, lebhaft in seinen Bewegungen und Lebenszeichen. *Bulimus strigilosus* Fer. msr. *Dufo* loc. cit. 1840, p. 199, ohne Beschreibung, Mahé an feuchten bewachsenen Stellen. Eine hellgelbe Abart, auch von *Nevill* und *Lien.* erwähnt.
- S† *Buliminus* (?) *niger* *Dufo* loc. cit p. 197, Mahé und Praslin, spiral gestreift, dunkelbraun bis schwarz, gekielt, mit geradem Mundrand wie *velutinus*, nur 4 Windungen (Pfr. II 168). *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868 p. 258, Mahé, hoch an einer Palme. Vielleicht nur Abart von *B. fulvicans*.
- Nevill* handl. p. 132 führt noch eine unbenannte Art von der Seychellen-Insel Fregatte an, von *E. Dupont* gesammelt, während er dagegen *pulverulentus* nicht als eigene Art anerkennt.
- Prof. Möbius hat das lebende Thier von *B. velutinus* auf Mahé beobachtet und folgende Notizen darüber gemacht: Während des Kriechens 16–20 mm lang, obere Fühler keulenförmig, 7 bis 8 mm lang, untere ebenfalls keulenförmig, 2–3 mm lang; Farbe des Thieres braunschwarz, nur die Sohle und die Mitte des Unterkopfes grau. *Nevill* loc. cit. bemerkt, dass sowohl bei *B. velutinus* als bei *B. fulvicans* der Fuss hinten lang zugespitzt und mit einer Mittelreihe von Knötchen besetzt sei. Eine nähere Beschreibung der Mundtheile von *B. velutinus* siehe im Anhang.
- M† *Buliminus* (*Rhachis*) *sanguineus* *Barclay* Ann. Mag. n. h. 1857. Pfr. IV, p. 472. *Lien.* 54. *Nevill* handl. 130, Mount Oriz, Maur.
- B? *Buliminus* (*Rhachis*) *venustus* (*Morelet* Journ. de Conch., 1861, p. 40, Insel Mayotte, Pfr. VI 62) nach *Desh.* 90 auch auf Reunion.

- M?† *Buliminus* (*Chondrula*?) *vesiculatus* *Benson* Ann. Mag. n. h. (3) III 1859. p. 99; Mal. Blätt. 1859, S. 41; Pfr. VI, 67, Mauritius, sehr selten.

Diese Art steht unter den ostafrikanischen so sehr vereinzelt, dass die Vaterlandsangabe zweifelhaft erscheint, vielleicht beruht sie auf Verwechslung mit der folgenden.

- M† **Cionella* (*Ferussacia*) *Barclayi* *Benson*, *Spiraxis* B. Pfr. IV, 580, Ile de France. *Lien*. 54. *Ferussacia* B. *Nevill* handl. p. 161, Mount. Oriz und Moka, Mauritius, sehr ähnlich der europäischen *C. folliculus*, haufenweise unter grossen Steinblöcken, auch ein linkes Exemplar. „*Glandina vesiculata* *Benson*“. *Semper* Reisen im Archip. d. Philippin., *Landschnecken* III, S. 135, Anatomie, gehört nach *Nevill* hieher.

- SM† *Caeciliana* *Mauritanu* *H. Adams* (*Acicula*) *Proc. Zool. Soc.* 1868, p. 64 und 290, pl. 28, Fig. 7, Mauritius und Mahé, unter Steinen. *Nevill* Pfr. VIII 295. *Lien* 81, Seychellen. *Nevill* handl. 163, Pouce Mount., Mauritius, Mahé und Silhouette, Seychellen.

- M† *Caeciliana* (*Geostilbia*) sp. n., *Nevill* handl. 163, Pouce Mount., Mauritius.

- MB† *Tornatellina* *Cernica* *Benson* Ann. Mag. nat. hist. (2) VI, 1850, p. 254 Moka, Mauritius, an Zäunen. Pfr. III 526. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 413, handl. 160 Reduit ravine und Vacoa, Mauritius, sowie oberhalb Salazie, Bourbon. *Achatina minutissima* *Barclay* mscr. T. mauritiana Pfr. *Proc. Zool. Soc.* 1851. *Küster* Chemn. ed. nov. Pupa Taf. 18, Fig. 30, 31.

- SMBD? *Stenogyra* (*Opeas*) *clavulina* *Potiez et Michaud* (*Bulimus*) *galerie d. moll.* I, p. 136, pl. 14, Fig. 9, 10, Bourbon. *Reeve* V, *Bulimus* Fig. 595, Moka auf Mauritius, an waldigen Ufern, *Barclay*. Pfr. III 394; Chemn. ed. nov. Taf. 20, Fig. 7, 8. *Morelet* series conch. II, p. 68 Bourbon, Mauritius, auch Madagaskar und Komoren. *Nevill* *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 64 *Subulina* n. sp.?, Mahé, Praslin, Silhouette und Félicité; Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 409, zwei Formen: A) 8 mm lang, 3 mm breit, Mündung $2\frac{3}{4}$ mm lang, 7 Umgänge; Bourbon, Mauritius, Seychellen; B) 6 mm lang, $2\frac{2}{3}$ mm breit, Mündung $2\frac{1}{4}$ mm lang, 6 Umgänge, Mauritius; handl. p. 165. *Lien*. 79 Seychellen.

Hierher gehören sehr wahrscheinlich auch *Helix clavulus* var. a. *Ferussac* prodr. nro. 381 von Ile de France, Bull. sc. nat. X, 1827, p. 304 Ile de France und Bourbon, und *Quoy et Gayard* Voy. de l'Âstrolabe, zool. III, p. 133, pl. 11, Fig. 30–33, Ile de France, welche gewöhnlich zur westindischen *St. Goodalli* *Miller* gerechnet wird, sowie wahrscheinlich auch *Bulimus octonus* (Fer.) *Dufo* 198 Mahé, an Moosen in Felsenspalten, oben auf den Bergen; dass *Dufo* seine Art zu *Bulimus* und nicht zu *Achatina* stellt, zeigt schon, dass es nicht die ächte (amerikanische) *octona* Chemn., Lam. ist; endlich auch die von *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 229 aufgeführte *Stenog. gracilis* *Hutt.* von *Rodriguez*, sehr häufig bei Port Mathurin von *Desmazuères* gefunden, und „*Bulimus Goodalli*“ von *Rodriguez*, *Morelet* Journ. Conch. XXIII, p. 24.

- SM† **Stenogyra* (*Opeas*) *Mauritiana* Pfr. *Proc. Zool. Soc.* 1851; mon. III, p. 402; Chemn. ed. nov. Taf. 30, Fig. 15, 16 Mauritius, 9 mm lang, 3 mm breit, Mündung 3 mm, Umgänge 7. — *Subulina* M. *Nevill* *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 64; handl. p. 165 Seychellen und Mauritius, unter Steinen und an den Schalen der Cocosnüsse. *Lien*. 54 und 80. Petit sable, Maur. *Möbius*.

- B† Pupa (*Pupilla*) *pupula* *Desh.* moll. de Reunion p. 92, pl. 11, Fig. 2–4. Reunion,

- 3 mm lang, $1\frac{1}{2}$ mm breit, erinnert an muscorum L. (eher umbilicata). Pfr. VI 303. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, p. 412, handl. p. 191 (pupilla) Salazie, Bourbon.
- D† Pupa (Pupilla) *Desmazurei* Crosse Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 140; XXII, pl. 8, Fig. 3, Pointe aux coraux, Insel Rodriguez, *Desmazurei* $2\frac{1}{4}$ mm lang, 1 Parietal-, 1 Columellar- und 1 Gaumenfalte. Pfr. VIII 377.
- M† Pupa (Pagodella) *ventricosa* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 304, pl. 19, Fig. 6, Schluchten bei Moka, Mauritius. Pfr. VI 308. *Nevill* handlist 195 Vacoa und Reduit, Mauritius.
- B† Pupa (Pagodella) *incerta* *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 413; handlist p. 195 Salazie, Bourbon. Pfr. VIII 370. Mehr nahe der vorhergehenden.
- B† Pupa (Vertigo?) *Borbonica* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 390, pl. 28, Fig. 8 Bourbon, $2\frac{1}{2}$ mm lang, $1\frac{1}{2}$ mm breit, mit 1 Parietal-, 1 Columellar- und 2 Aussenzähnen. Pfr. VIII 394. *Nevill* handl. 196 Salazie, Bourbon.
- M† Pupa (Vertigo) *exigua* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 13, pl. 4, Fig. 4 Maur., $1\frac{1}{2}$ mm lang, $\frac{3}{4}$ mm breit, 1 Parietal-, 1 Columellar- und 2 Gaumenfalten. Pfr. VIII 381.
- MD† Pupa (Vertigo) *Lienardiana* Crosse Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 140; XXII, pl. 8, Fig. 4. *Lien.* 55. Pointe aux coraux, Insel Rodriguez, von *Desmazurei*, Mauritius, von *Dupont* gesammelt, $1\frac{1}{2}$ mm lang, $\frac{8}{4}$ mm breit, 1 Parietal-, 1 Columellar-, 1 Basal- und 2 Aussenzähne. Pfr. VIII 394.
- SMB† Pupa (Vertigo) *microscopica* *Nevill* handlist 197. *Carychium* micr. einiger Sammler. Port Louis, Mauritius, Bourbon und Seychellen. Keine Beschreibung. Vermuthlich *Carychium* sp. n.? von *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 65 Praslin, Seychellen, am Fuss einer Cocospalme.

Agnatha.

- S† *Streptaxis Souleyetianus* Petit (Helix) Revue zool. 1841, p. 99 Seychellen; Philippi Abbild. II, Taf. 8, Fig. 6. Pfr. I, 8; Chemn. ed. nov. Taf. 102, Fig. 21, 23. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 260; 1869, p. 63, Mahé, Praslin und Silhouette, auf feuchtem Boden; Weichtheile grau, Fühler schwarz; handlist p. 4. *Lien.* 80. Hierher gehört vermuthlich auch *Helix Dussumieri* Fer. mscr. *Dufo* 199 Mahé, oben auf den Bergen.
- D?† *Streptaxis piriformis* Pfr. Philippi Abbild. II, S. 8, Taf. 8, Fig. 8; mon. I, 10; Chemn. ed. nov. Taf. 102, Fig. 31—34 Rodriguez. Parietalfalte, Zähne am Mundrand. Von *Desmazurei* nicht daselbst gefunden, daher etwas verdächtig, Crosse Journal de Conch. XXII, p. 224.
- Str. distortus Jonas, in der Cuming'schen Sammlung ebenso, wie piriformis von Rodriguez angegeben (Pfr. mon. I, 11), ist noch zweifelhafter, da er nach Jonas selbst Guinea angehört.
- M† *Gibbulina* (*Gibbus*) *Lyonetiana* Pallas (Helix) *spicilegia* X, p. 33, Tab. 3, Fig. 7, 8; Chemn. Conch. Cab. V, Fig. 1513. *Ferussac* prodr. 1821, nro. 472 (Cochlodonta) Ile de France. Bull. sc. nat. X, 1827, p. 306 Ile de France, Rang. *Lam.* an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 229 (Bulimus). *Gibbus Lyonnetii* Montfort conch. syst. II,

p. 303, pl. 76. Pfr. mon. II, 298; Chemn. ed. nov. Pupa Taf. 10, Fig. 12, 13. Reeve *Bulimus* Fig. 257. *Sganz.* 17 Ile de France, in Wäldern unter trockenem Laub. *Lien.* 54, nur bei St. Aubin, im Distrikt Savanne, Mauritius. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 258; handlist p. 8 Dry forest, Savanne, Mauritius. Weichtheile vorn rothgetüpfelt, hinten und unten gelb.

G. Antoni Pfr. Zeitschr. f. Mal. 1847, S. 146, mon. II, 298; Chemn. ed. nov. Pupa Taf. 10, Fig. 9—11 (Pupa *Grateloupiana*, Pfr. VI, 287) ebenfalls von Mauritius, und *G. obtusus* Pfr. Zeitschr. f. Mal. 1850, S. 87, mon. III, 528, dürften nur individuelle Abänderungen sein. Auch eine linksgewundene ist vorgekommen.

Montfort's Gattungsname *Gibbus* ist allerdings älter, aber war von Anfang an nur für die in ihrer Gestalt so eigenthümliche *Lyonetiana* bestimmt, während Beck der erste war, der diese Art mit ihren natürlichen Verwandten von minder ungewöhnlicher Form, *pagoda*, *sulcata*, *modiolus*, *palanga* u. s. w. in eine Gruppe vereinigte, daher sein Name *Gibbulina* der Gattung in diesem Umfang gebührt.

- M† **Gibbulina* (*Gonidomus*) *pagoda* *Ferussac* (*Cochlodonta*) prodr. 1821 nro. 470 Ile de France; Bull. sc. nat. X. 1827, p. 306 Ile de France, *Rang.* *Lesson* Voy. de la Coquille, zool. II, p. 326, pl. 8, Fig. 6 Mauritius, in feuchten Waldschluchten. Pfr. mon. II, 320; Küster Chemnitz ed. nov. Pupa Taf. 9, Fig. 4, 5. *Helix* *concamerata* Wood ind. testaceol., suppl. 1828, pl. 7, Fig. 21 (fälschlich vom Cap angegeben). *Helix* *Barclayana* Pfr. I, 118; Reeve VII, Fig. 188 (unausgewachsen). *Morelet* series conch. II, 82, ziemlich selten in der Mitte der Insel, auf bewaldeten Höhen, besonders in den Wäldern von Curepipe und Blackriver. — *Lien.* 54 Savanne. *Nevill* handl. 8 Curepipe und Savanne, Mauritius. Auch von *Lamare Piquot*, *Möbius* und *Caldwell* aus Mauritius erhalten. Vermuthlich auch *Bernardin St. Pierre* voy. à l'Ile de France 1773, S. 107 l'enfant en maillot.
- M† **Gibbulina* (*Gonidomus*) *sulcata* Müller (*Helix*) hist. verm. II, p. 108; Chemn. Conch. Cab. IX, Fig. 1232. *Fer.* prodr. nro. 471 Ile de France? Bull. sc. nat. X, 1827, p. 306 Ile de France, *Rang.* *Lesson* voy. de la Coquille, zool. II, p. 327, pl. 8, Fig. 7 Mauritius. Pfr. (Pupa) mon. II, 301 (fälschlich von Ceilon angegeben); Küster Chemn. ed. nov. Pupa Taf. 9, Fig. 1—3. Potiez et Mich. gal. I, p. 161, pl. 16, Fig. 5. 6. *Sganz.* 17 Ile de France, unter dürrem Laub. *Morelet* series conch. II, 83, viel häufiger als die vorhergehende, ebenfalls auf bewaldeten Höhen, Pouce, Moka, Curepipe und Trou-au-cerf. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 160 handlist p. 9, Weichtheile vorn schwärzlich, hinten gelbgrün. *Lien.* 54.
- M† *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Mülleri* *Morelet* Journal de Conch. 1875, p. 32 Mauritius, subfossil. Pfr. VIII, 348.
- M† *Gibbulina* (*Gonidomus*) *majuscula* *Morelet* Journ. de Conch. XXVI, 1878, p. 171 Mauritius, ausgestorben, 41 mm lang.
- M† *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Newtoni* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1867, p. 305, pl. 19, Fig. 8. Trou - aux - Cerfs, Mauritius, *Caldwell* und *Nevill*. *Lien.* 55. *Nevill* handlist 9.
- MB† *Gibbulina* (*Gonimodus*) *funicula* *Valenciennes*, Pfr. symbol hist. helic. II, p. 54, mon. II, 303 Ile de France. Küster Pupa Taf. 11, Fig. 16, 17. *Morelet* series conch. II, 83 Brûlé de St. Denis, Insel Bourbon, an bewaldeten Stellen. *Desh.* 90

- Reunion. *Bulimus trochalus* *Albers* Heliceen 1. Ausgabe, S. 181, Mauritius, *Lamare-Picquot*.
- D † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *metableta* *Crosse* Journ. de Conch. XXII, 1874, p. 224, pl. 8, Fig. 5. Pfr. VIII, 348. — *G. Dupontiana*. *Crosse* Journ. de Conch. 1873, p. 138 (non Nevill). *Rodriguez, Desmazures*.
- MD † **Gibbulina* (*Gonidomus*) *modiolus* *Ferussac* prodr. nro. 466 Ile de France; Bull. sc. nat. X, 1827, p. 306 Ile de France, *Rang. Pfr.* symbol I. p. 45; mon. II, 319. *Küster* Pupa Taf. 11, Fig. 8, 9. *Morelet* series conch. II, 88, pl. 5, Fig. 12 Maur., weniger häufig; Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 24 *Rodriguez. Lien.* 55. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 259; handlist 9, Weichtheile bräunlichroth oder ziegelroth; lebt auf Bäumen. *Vacoa* und *Trou-aux-cerfs*.
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *helodes* *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 31 Maur., subfossil. Pfr. VIII, 350. *Lien.* 55.
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Mondraini* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 13. pl. 4, Fig. 5 Mauritius. Pfr. VIII, 352. *Lien.* 55. *Nevill* handlist 9 „*Mondrainestate, Vacoa*,“ Mauritius.
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Barclayi* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 13, pl. 4, Fig. 6 Mauritius. Pfr. VIII, 352. *Lien.* 55. *Nevill* handlist 9 *Vacoa, Pouce Mt.* and *Trou-aux-cerfs*. Sollte diese Art nicht *Pupa farinosa*, *Küster* Pupa Taf. 14, Fig. 34—36 sein, deren Original verloren gegangen?
- M † **Gibbulina* (*Gonidomus*) *Mauritiana* *Morelet* series conch. II, p. 86, pl. 5, Fig. 13 Mauritius. Pfr. VI, 293. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 260; handlist p. 9 Maur., Weichtheile grünlichgelb. *Lien.* 55.
- D † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Rodriguezensis* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873; XXII, p. 225, pl. 8, Fig. 6 *Rodriguez, Desmazures*. Pfr. VIII, 349.
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *brevis* *Morelet* Journ. de Conch. XV, 1867, p. 439 Maur. Pfr. VI, 295. *Lien.* 55. *Nevill* handlist 9 *Pouce Mt.*
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *modiolina* *Morelet* (non *Ferussac*) Journ. de Conch. XV, 1867, p. 439 Mauritius. Pfr. VI, 296. *Nevill* handlist 9 *Pouce Mt., Maur.*
- B † *Gibbolino* (*Gonidomu*) *turgidula* *Desh.* moll. de Reunion p. 93, pl. 11, Fig. 7, 8 Reunion. Pfr. VI, 287. *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 412, handl. p. 10 *Pass bei Salazie, Bourbon.*
- D † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *chloris* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 139, XXII, pl. 8, Fig. 7 *Pointe aux coraux, Rodriguez, Desmazures*. Pfr. VIII, 350.
Nächstverwandt mit der vorhergehenden.
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Adamsiana* *Nevill* Journ. As. Soc. XXXIX, 1871, p. 7, pl. 1, Fig. 17 *Curepipe, Maur., selten; handl. p. 9. Pfr. VIII, 351. Lien.* 54.
- M † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *Dupontiana* *Nevill* ibid. p. 411; XL, p. 7; handl. p. 9, *Savanne, Mauritius.*
- MB † *Gibbulina* (*Gonidomus*) *versipellis* *Ferussac* prodr. nro. 468 (*versipolis*), hist. nat. d. moll. terr. pl. 156, Fig. 29, 30 Ile de France; Bull. sc. nat. X, 1827, p. 306 Ile de France und *Bourbon*, im Bett des Flusses *St. Denys*, Weichtheile lebhaft

orangeroth. Pfr. symbol. I, p. 45 (var. minor); mon. II, 319 (var. β). Küster Pupa Taf. 11, Fig. 11, 12. Morelet series conch. II, p. 89, pl. 5, Fig. 14 Mauritius und Bourbon. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 260 Mauritius, Weichtheile orange; Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 411; handlist p. 10 Salazie, Bourbon. Lien. 56 Maur.

Die grössere von Pfeiffer a. a. O. beschriebene und von Küster Fig. 10 abgebildete Form weicht durch ihre breitere fassförmige Gestalt, ähnlich der von modiolus, wesentlich von dem Ferussac'schen Typus ab. Uebrigens nennt Ferussac selbst noch eine cylindrische und eine subkonische Varietät und auf diese Veränderlichkeit bezieht sich wohl auch sein Artnamen, versipellis, sein Aussehen ändernd, während versipolis, wie bei ihm gedruckt steht und überall nachgeschrieben wird, überhaupt kein Wort ist.

- M† Gibbulina (Gonidomus) striaticosta Morelet Revue et Mag. de Zool. 1866, p. 62 Vacoas, Mauritius. Pfr. VI, 294. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 259; handlist 10 Savanne, Mauritius, Weichtheile schwarz mit orangefarbenen Flecken und Bändern; lebt am Boden. Lien. 55. — G. clavulus H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 16, pl. 4, Fig. 13 Mauritius, Barclay; Pfr. VIII, 352.
- B† Gibbulina (Gonidomus) Deshayesi H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 290, pl. 28, Fig. 9 Bourbon. Nevill Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 412; handlist p. 10 Salazie, Bourbon.
- M† Gibbulina (Gonidomus) holostoma Morelet series conch. II, p. 91, pl. 5, Fig. 16 Mauritius. Pfr. VI, 296. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 259; handl. p. 9 Vacoa, Mt. Oriz, Corps du garde und Pouce Mt., Maur.; Weichtheile orangeroth. Lien. 55.
- M† *Gibbulina (Gonidomus) callifera Morelet ibid. p. 90, pl. 5, Fig. 15, Moka, Maur., unter dürrer Laub. Pfr. VI, 295. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 259, handlist p. 9 Vacoas etc., Mauritius, Weichtheile schwarz mit orangefarbigem Mittelstreifen. Lien. 55 (Pupa obesa Bens.).

Durch stärkere oben stark gebogene Rippen ausgezeichnet.

- B† Gibbulina (Gonidomus) Bourguignati Desh. moll. de Reunion p. 90, pl. 10, Fig. 27, 28 Reunion. Pfr. VI, 295. Nevill Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 410; handlist p. 10 Salazie, Bourbon.

Mit sehr schwachen, geraden Streifen.

- B† Gibbulina (Gonidomus) intersecta Desh. ibid. p. 91, pl. 11, Fig. 1 Reunion. Pfr. VI, 295. — G. Bourguignati var.? Nevill loc. cit.

Der vorigen ähnlich, aber durch weit von einander abstehende starke, gerade Rippen ausgezeichnet.

Die drei letzten Arten weichen in ihrer Skulptur merklich von den hierin sehr übereinstimmenden übrigen ab. Eine Eintheilung nach Vorhandensein oder Fehlen der Parietalfalte lässt sich nicht gut durchführen, da manche Arten bald eine schwache Parietalfalte zeigen, bald nicht, so die typischen G. Lyonetiana und pagoda selbst, ferner Mondraini und Mauritiana. Eine deutliche Parietalfalte findet sich bei G. modiolus, Barclayi, brevis, modiolina, versipellis, Adamsiana, striaticosta, Deshayesi, holostoma, callifera, Bourguignati und intersecta; sie fehlt bei sulcata, Mülleri, Newtoni, funicula, metableta, helodes, Rodriguezensis, turgidula, chloris.

- M† *Gibbulina (Gonospira) palanga Ferussac (Helix, Cochlodonta) prodr. nro. 464 Ile de France, Bulletin d. scienc. nat. X, 1827, p. 306, häufig daselbst. Lesson Voy.

de la Coquille, zool. II, p. 328, pl. 8, fig. 8 Mauritius, unter Laub und zwischen Baumwurzeln. Potiez et Michaud galerie d. moll. pl. 17, Fig. 5, 6. Pfr. mon. II, 317. Küster Pupa Taf. 10, Fig. 5, 6. Morelet series conch. II, 83. Crosse et Fischer Journ. de Conch. XVII, 1869, p. 213, pl. 11, Fig. 6—8 Radula. Lien. 85. Nevill Proc Zool. Soc. 1868, p. 260, handlist p. 9, Weichtheile orange. Auch von Lamare-Picquot, Möbius und Caldwell erhalten.

- M† *Gibbulina (Gonospira) producta H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 14, pl. 4, Fig. 7 Mauritius. Nevill ibid. p. 259, handlist p. 10 Mauritius, Weichtheile gelbröthlich, Fühler roth. Pfr. VIII, 353. — Pupa palangula (non Ferussac) Morelet Revue et Mag. de Zool. 1866, p. 62 Vacoas, Maur. Pfr. VI, 294. Lien. 55.
- M† *Gibbulina (Gonospira) Nevilli H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 304, pl. 19, Fig. 7 Pouce Mt., Mauritius, Nevill. Pfr. VI, 293. Lien. 56. Nevill handl. p. 10 Deux Mamelles und Pouce Mt.
- M† *Gibbulina (Gonospira) baeillus Pfr. Proc. Zool. Soc. 1856, p. 35; mon. IV, 661; Novitat. conchol. I. Taf. 20, Fig. 17, 18 Mauritius. Morelet series conch. II, p. 90 Maur. Lien. 55. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 259; handl. 10 Vacoa, Trou-aux-cerfs, Savanne und Pouce Mt., auf Bäumen; Weichtheile gelb, Fühler roth.
- M† *Gibbulina (Gonospira) teres Pfr. Proc. Zool. Soc. 1856, p. 35; mon. IV, p. 661; Novitat. conch. I, Taf. 20, Fig. 19, 20 Mauritius. Morelet series conch. II, p. 88 Mauritius, unter Steinen, nicht häufig. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 259; handlist p. 10 Maur., Weichtheile weiss. roth getüpfelt, Fühler roth. Lien. 56. — Helix palangula Ferussac prodr. nro. 467 Ile de France, nach Morelet.
- B† Gibbulina (Gonospira) cylindrella H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 291, pl. 28, Fig. 11 Bourbon. Nevill Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 412; handlist p. 10 Salazie, Bourbon. Pfr. VIII, 353.
- Diese Gruppe, Gonospira, ist der vorhergehenden noch sehr nahe verwandt und nur durch die länger gestreckte, cylindrische, nicht fassförmige Gestalt verschieden; eine Parietalfalte ist bei allen hier genannten Arten vorhanden.
- M† *Gibbulina (Nevillia n.) clavulata Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 174 Ile de France, Delessert recueil pl. 27, Fig. 3. Pfr. symbol. I, p. 46, mon. II, p. 328. Küster Pupa Taf. 11, Fig. 19—21. Sganz. 17 Ile de France. Morelet series conch. II, p. 92 Mauritius, an feuchten Stellen, unter Steinen und dürrem Laub. Ennea cl. Nevill Proc. Zool. Soc. 1868, p. 260; handl. p. 6 Pouce Mount., Mauritius, Weichtheile gelb, Fühler orange mit schwarzer Spitze. Pfr. VII, 500. Lien. 56. — Helix (Cochlodonta) modiolina Ferussac prodr. nro. 469 Ile de France.
- Innen weit genabelt.
- M† Gibbulina (Nevillia) modesta H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 305, pl. 19, Fig. 9 Mauritius. Pfr. VII, 500. Lien. 56. Nevill handl. 6 Pouce Mt., Maur. — Pupa Caldwelli Morelet Journ. de Conch. XV, 1867, p. 493 Mauritius. Pfr. VI, 297. Lien. 55.
- B† Gibbulina (Nevillia) uvula Desh. moll. de Reunion p. 92, pl. 11, Fig. 5, 6 Reunion. Pfr. VI, 296. Nevill Journ. As. Soc. XXXIX, 1870, p. 412, handl. p. 10 Pass bei Salazie, Bourbon.

Diese drei unterscheiden sich von den übrigen Gibbulinen durch die engeren Windungen und die gedrängten senkrechten starken Rippenfalten, wesshalb Deshayes seine Art nicht unpassend mit der westindischen *Strophia ura* vergleicht. Auch Nevill handl. p. 6 betrachtet sie als eigene Unterart, ohne jedoch dieser einen Namen zu geben, und so möge sie den dieses um die Kenntniss der Maskarenenfauna hochverdienten Conchyliologen führen. Alle drei haben eine starke Parietalfalte.

- M? *Ennea* (*Edentulina*) *anodon* Pfr. IV, 336 Zeitschr. f. Mal. 1855, S. 60; Novitat. conchol. I, Taf. 17, Fig. 5. 6. *Morelet* series conch. II, p. 78 Mauritius und Mayotte.
- S†? *Ennea* (*Edentulina*) *Dussumieri* *Ferussac* mscr. *Dufo* 198 (Pupa), Mahé, auf den Höhen der Berge, an Gebüsch und Schlingpflanzen. *Reeve* *Bulinus* Fig. 457 Seychellen. Pfr. III, 362. *Morelet* series conch. II, p. 79, pl. 5, Fig. 8 Seychellen und Madagaskar. *Lien.* 80. Nevill P. Z. S. 1868, p. 260; handl. 8 Mahé, Praslin, Silhouette und Félicité; Weichthum grau, Fühler schwarz.
- S† **Ennea* (*Edentulina*) *Moreleti* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 64 und 291, pl. 28, Fig. 10 Silhouette, sehr selten, *Nevill*. Pfr. VIII, 350. *Nevill* handlist 8. Prof. Möbius brachte von Mahé ein etwas grösseres Exemplar mit, long. 12. diam. 5, apert. long. $5\frac{1}{3}$, diam. 4 mm. Lebendes Thier oben hellroth, obere Fühler bis 3 mm, untere 1 mm, Fuss gelbgrau, während des Kriechens 10—12 mm lang.
- SMB **Ennea* (*Huttonella*) *bicolor* *Hutton* Journ. As. Soc. Beng. III, 1834, p. 86. Pfr. II, 352. Küster Pupa Taf. 13, Fig. 9, 10. Pfr. Novitat. Taf. 32, Fig. 15—17. — Pupa *Largillierti Philippi* Zeitschrift Malakozool. I, 1844, S. 352 Bourbon, *Largilliert*. Pupa bic. *Benson* Ann. Mag. nat. hist. (2) IV, p. 125 Mauritius. *Morelet* series conch. II, p. 93 Maur., selten. *Desh.* 90 Reunion. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 64 Port Victoria, Mahé; handl. p. 6. *Lien.* 80. Bekanntlich weit verbreitet in Ostindien und auch im tropischen Amerika wiedergefunden, also wahrscheinlich verschleppt. Vielleicht ist diese Art auch *Rang's* *Carychium gigas*, Bull. sc. nat. X, 1827, p. 408 von Ile de France, mit karminrothem Thier.
- S† *Streptostele* (*Elma*) *Nevilli* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 291, pl. 28, Fig. 12 Seychellen. *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 63; handl. 8 Inseln Mahé und Silhouette, dort selten, hier häufiger, am Boden unter todtten Blättern. *Lien.* 80. *Pfr.* mon. VII, 508.

Elasmognatha.

- SMB *Succinea Mascarenensis* *Nevill* (Mascarenensis) Journ. As. Soc. Bengal. XXXIX, D† 1870, p. 414 Mauritius und Bourbon: handl. p. 213 Praslin, Silhouette, Mahé, Maur. *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 25 Rodriguez. — *Helix elongata* var. *Ferussac* Bull. scienc. nat. X, 1827, p. 301 Ile de France. *Succ. striata* *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 64. *S. striata* (Krauss?) *Desh.* 90 Reunion. *Lien.* 81 Seychell. *S. Nevilli* *Crosse* Journ. de Conch. XXI, 1873, p. 141; XXII, 1874, p. 231, pl. 8, Fig. 2 Rodriguez.

Was *Ferussac* als *Helix* (*Cochlohydra*) *angularis*, prodr. nro. 13, hist. moll. terr. pl. 11A, Fig. 5 von Mauritius? abbildet, *Simpulopsis* a. bei Pfeiffer II, 512, ist ohne Zweifel Jugendzustand irgend einer andern Landschnecke, wie schon Deshayes im Text zu *Ferussac* II, S. 96—24 andeutet, vielleicht einer *Pachystyla*.

- M† *Hyalimax perlucidus* Quoy et Gaimard (Limax) Voy. de l'Astrolabe, zool. II, 1832, p. 146, pl. 13, Fig. 10—13 Montagne du Pouce, Ile de France (Desh. Lam. VII, p. 724, Gray Fig. moll. pl. 74, Fig. 7.) *Drusia* p. Gray catal. Pulmonata Brit. Mus. p. 59. *Hyalimax* p. H. et A. Adams gen. moll. II, p. 219. *Nevill* handlist 216 Pouce Mountain.
- B† *Hyalimax Maillardi* Fischer Journ. de Conch. XV, 1867, p. 218, pl. 10, Fig. 5—9 Bourbon, Maillard, ohne Zweifel der von Desh. 90 erwähnte „limacien“. *Nevill* handl. p. 216 Salazie, Bourbon. — *Succinea unguicula* Valenciennes mscr. Paris.
- M† *Hyalimax Mauritianus* Ferussac (Parmacella) Bullet. d. scienc. nat. X, 1827, p. 300; *Rang* manuel d. moll. 1829, p. 155, pl. 4, Fig. 5—7 Ile de France, Rang. *Fischer* Journ. de Conch. XX, 1872, p. 202 Mauritius. *Lien*. 54.
- M?B *Hyalimax Rangianus* Ferussac (Arion) Bullet. d. scienc. nat. X, 1827, p. 300 Ile de France, Rang. Gray catal. Pulm. p. 60. *Parmacella Rangiana*, *Rang* manuel d. moll. 1829, p. 155 Bourbon und Madagaskar, an feuchten Felsen.
- S† *Mariaëlla Dussumieri* Gray catal. Pulmonata Brit. Mus. 1855, p. 62, 63. *Clypeidella* D. Valenciennes Mus. Paris. Mahé, *Dussumier*, gehört vielleicht auch zu dieser Gattung.

Vaginulidae.

- B† *Vaginulus Maillardi* Fischer Nouv. Arch. du Museum VII, 1871, p. 154; Journ. de Conch. XX, 1872, p. 144 Bourbon, Maillard. *Nevill* handlist 199 Salazie, Bourbon.
Wahrscheinlich auch die Art, welche Rang man. de moll. 1829, p. 153 von Bourbon, in Gärten und Wäldern, unter alten Baumstämmen anführt.
- M *Vaginulus punctulatus* Ferussac Bulletin d. sc. nat. X, 1827, p. 299 Ile de France, Port Louis. *Rang* manuel de moll. 1829, p. 152 in Wäldern und Gärten unter altem Holz, Mauritius. *Nevill* handlist p. 199. *Fischer* loc. cit. p. 155.
- S† **Vaginulus Seychellensis* Fischer Nouv. Arch. du Museum VII, 1871, p. 155, pl. 11, Fig. 7, 8; Journ. de Conch. XX, p. 145 Mahé unter Steinen, Rousseau. Auch von Prof. Möbius mitgebracht.

b. Strand- und Brackwasser-Schnecken.

Truncatellidae.

- SMBR *Truncatella Guerini* Villa dispositio systematica conchyliorum 1841, p. 59 Bourbon. *Pfr.* mon. auricul. p. 184 Mauritius. *Lien*. 61 Isle d'Ambre, Maur. *Nevill* handl. 253 Mahébourg. Maur. und Seychellen. Auch am Rothen Meer nach *Nevill*.

- MIP *Truncatella Ceilanica* Pfr. mon. auricul. p. 186 von Ceilon. *Nevill* handl. 253 Mahébourg, Maur.

Nach demselben ist *T. semicostata* Montrouzier von Neu-Caledonien dieselbe Art und diese überhaupt wenig von der vorhergehenden verschieden.

- MD *Truncatella teres* Pfr. Proc. Zool. Soc. 1856; mon. auricul. p. 188 Mauritius. *Crosse* Austr. Journ. de Conch. XXII, 1874, p. 240 Port Mathurin auf Rodriguez, *Desmazures*. Auch in Australien.

Diese fehlt bei *Nevill*, dafür:

- SMBI *Truncatella valida* (Pfr. ostindisch) var. minor, distinct species? *Nevill* handlist p. 255 Seychellen, Mauritius, Bourbon, auf Ceilon, Andamanen, Nikobaren und an der Torresstrasse.

Auriculidae.

(Carychium siehe Pupa und Ennea.)

- MR? *Cassidula labrella* *Deshayes* (Auricula) Encycl. method. II, 1830, p. 92, Magas. de Af? Zool. 1830, pl. 14 Ile de France. Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 337. Pfr. mon. Auricul. p. 112. *Lien.* 58. *Nevill* handl. 225 Mauritius. — Wahrscheinlich auch *Auricula fabula* *Ferussac* prodr. 1821, nro. 24 von Ile de France, ohne Beschreibung. C. Kraussi Küster Auric. Taf. 3, Fig. 6—8 von Natal und dem Rothen Meer (Jickeli Moll. v. Nordostafrika S. 186).

- M† *Cassidula parva* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 306, pl. 19, Fig. 14 Port Louis, Maur. Pfr. mon. pneum. IV, p. 351. *Nevill* handl. 224.

- SMB? *Cassidula* (*Plecotrema*) *octanfracta* Jonas (*Pedipes*) Zeitschr. f. Mal. 1845, p. 169 IP (Sandwichinseln), Jickeli Nachrichtenblatt d. mal. Gesellsch. 1872, S. 65. — Pl. clausa H. et A. Adams Proc. Zool. Soc. 1853, p. 121, Pfr. mon. Auricul. p. 103. Novitat. conch. I, Taf. 5, Fig. 9—11 (ebenfalls Sandwichinseln), Pease Proc. Zool. Soc. 1871, p. 469 (ebenso). *Nevill* handl. p. 224 Mauritius, Seychellen, Andamanen, Bombay, Australien.

Vermuthlich gehört auch die von *Desh.* 83 mit Fragezeichen als *striata* Phil. bezeichnete Art von Reunion hierher und *Nevill's* unbestimmte Art von Port Victoria auf Mahé, Proc. Zool. Soc. 1869, p. 66.

- M† *Cassidula* (*Plecotrema*) *exigua* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 307, pl. 19, Fig. 15 Trou d'eaux douces, Mauritius. Pfr. mon. pneum. IV, p. 345. *Nevill* handlist p. 223.

- MP *Marinula* (*Auriculastra* n.) *elongata* Parreyss, Küster Chemn. ed. nov. Auricula S. 56, Taf. 8, Fig. 6—8. Pfr. mon. Auricul. p. 140 (Sandwich- und Viti-Inseln). *Morelet* series conch. II, p. 93 Mauritius. Vielleicht auch *Auricula* sp. n.? *Nevill* handl. 226 Mauritius.

Pfeiffer stellt diese Art und die ihr nächstverwandte im indischen Archipel häufige *subula* Quoy et Gaim. in die Gattung *Auricula* im engsten Sinne, wegen des verdickten Aussenrandes, aber die ächten grossen Auriculen, *Midæ* und *Judæ*, zeichnen sich durch einen Knopf am Ende der Fühler und durch ganz versteckte Augen aus (Malak. Blätt. 1863, S. 126), was bei *A. subula* nicht der Fall ist, ich

stelle daher diese und ihre nähern Verwandte als eigene Untergattung *Auriculastra* zu *Marinula* in weiterm Sinn.

- S?MB *Marinula* (*Laemodonta*) *affinis* Ferussac prodr. 1821, p. 109 *Pedipes* nro. 4 Ile de France. Pfr. mon. Auricul. I, p. 72. *Desh.* moll. de Reunion p. 83, pl. 10, Fig. 5, 6. Pfr. mon. pneum. IV, p. 334. *Lien.* 58. *Nevill* handl. 220 Mauritius, Andamanen, Aden. var.? Seychellen.
- SIP *Marinula* (*Laemodonta*) *conica* Pease Proc. Zool. Soc. 1862, p. 242, Am. Journ. Conch. IV, 1868, p. 101, pl. 12, Fig. 15 (Paumotu-Inseln), Martens Südsee-Conchylien S. 57, Taf. 3, Fig. 13. *Nevill* handlist p. 220 Seychellen, Andamanen, Bombay.
- SMB *Melampus fasciatus* *Desh.* (*Auricula*) *Encycl. method.* II, 1830, p. 90, Lam. an. sc. RAfIP vert. ed. 2, VIII, p. 337, Guérin iconographie, moll. pl. 7, Fig. 8. Mousson moll. jav. S. 46, Taf. 5, Fig. 7. Martens Südseeconchylien S. 55. Aur. monile Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrol., zool. II, p. 166, pl. 13, Fig. 28—33 (Neu-Irland, Neu-Guinea). — *Desh.* 83 Reunion. *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, p. 25 Rodriguez. *Lien.* 58 Mauritius und 81 Mahé, Praslin. *Nevill* Proc. Z. Soc. 1869, p. 66 Mahé und Praslin; handlist p. 216, 217 Mauritius, Seychellen. Weit verbreitet an den Küsten und auf den Inseln des indischen Oceans, und auch noch auf Mayotte (*Morelet*).
- SAfIP *Melampus Caffer* Küster Auric. S. 36, Taf. 5, Fig. 6, 8. Krauss südafr. Moll. S. 82. Pfr. mon. Auric. p. 40 (Philippinen). *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 66 Mahé, handl. 216 Seychellen, Mayotte, Nikobaren etc. *Lien.* 81.
- SMB *Melampus lividus* *Desh.* (*Auricula*) *Encycl. meth.* II, 1830, p. 91. Lam. an. s. vert. Af ed. 2, p. 338. Küster Auric. Taf. 6, Fig. 21, 25. Krauss südafr. Moll. S. 81 (Natal). Pfr. mon. Auric. I, p. 40 Mauritius, in Cuming's Sammlung. *Desh.* 83 Reunion. *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, p. 25 Rodriguez. *Lien.* 58 Mauritius und 81 Mahé, Praslin. *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 66 Mahé und Praslin; handl. 217 Mauritius, Seychellen, Nikobaren.
- MBIP *Melampus luteus* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrol., zool. II, p. 163, pl. 13, Fig. 25 bis 27 (Vanikoro). *Desh.* Lam. an. s. vert. ed. 2. VIII, p. 338. Küster Auricul. Taf. 6, Fig. 1—3. Mousson moll. jav. S. 47, Taf. 5, Fig. 6. Pfr. mon. Auricul. p. 37. Martens Südseeconchylien S. 55. *Desh.* 83 Reunion. *Nevill* handl. 217 Mauritius, Diego Garcias (Chagosinseln). Weit verbreitet im indischen Ocean.
- MD† *Melampus Dupontianus* *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 25, pl. 1, Fig. 2 Mauritius und Rodriguez. Pfr. mon. pneum. IV, p. 311.
- MB Af *Melampus castaneus* Mühlfeld (*Voluta*) Magazin d. Gesellsch. d. naturforsch. Freunde IP in Berlin VII, 1818, S. 4, Taf. 1, Fig. 2. Pfr. mon. Auric. p. 30 (Sandwichinseln). Aur. fusca Philippi, Küster Taf. 5, Fig. 18—20. M. leucodon Beck A. Adams et Reeve Voy. Samarang. Moll. p. 55, Taf. 4, Fig. 17 (lebendes Thier, Celebes). — *Desh.* 83 (fuscus) Reunion. *Lien.* 58 Mauritius. *Nevill* handl. 216 (castaneus) Mauritius, Nikobaren u. s. w. ?217 (fuscus Phil.?) Mauritius.
- MIP *Melampus parvulus* Nuttall Pfr. mon. Auricul. p. 24 (Sandwichinseln). Martens Süd-

see-Conchylien Taf. 3, Fig. 10. *Nevill* handlist p. 217 Mauritius, Nikobaren, Tongatabu.

- M I Melampus granifer Mousson moll. jav. S. 46, Taf. 5, Fig. 9 und Taf. 20, Fig. 7 (Java). Pfr. mon. Auricul. p. 42 (Philippinen). *Nevill* handl. 218 Trou d'eau douce, Mauritius.
- M?P Melampus semiplicatus Pease Proc. Zool. Soc. 1860, p. 146, 1869, p. 60 von den Sandwichinseln. Pfr. mon. pneum. IV, p. 304. — Var.? *Nevill* handl. p. 318 Trou d'eau douce, Maur.
- S P Melampus (Persa) melanostomus Garrett Am. Journ. Conchol. VII, 1872, p. 24, pl. 19. Fig. 11 Vitiinseln. Pfr. mon, pneum. IV, p. 325. *Nevill* handl. p. 220 var. major Mahé.
- M† Melampus corticinus *Morelet* Journ. de Conch. XXV, 1877, p. 216 Mauritius.
- S† Melampus Bridgesi Carpenter. *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 66 Mahé.

Von den vorstehenden Melampusarten sind alle mit Ausnahme von melanostomus mit mehreren Horizontalfalten an der Innenseite des Aussenrandes versehen, also typisch, semiplicatus und parvulus haben nur Eine Falte auf der Mündungswand (abgesehen von der Columellarfalte), castaneus zwei, fasciatus, Caffer, lividus; luteus, Dupontianus, granifer drei. Durch ihre Skulptur ausgezeichnet sind granifer, körnig-gegrittet, nicht glänzend, und semiplicatus, in der obern Hälfte längsgefaltet. M. melanostomus hat keine Gaumenfalten und zwei Parietalfalten. — *Ferussac* Bull. Sc. nat. X, 1827, p. 408 nennt als Auriculaceen, welche Rang auf Ile de France gefunden: Auricula monile var., minuta n., fasciata n. Pedipes ovulus und ringens n.; beim Mangel jeder Beschreibung ist es nicht möglich, dieselben zu errathen.

c. Süßwasser-Schnecken.

Limnaeidae.

- M (I) *Limnaea Mauritianae *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 33 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* gesammelt, Taf. 1, Fig. 9, 10, bis 19 mm lang, wovon die Mündung 14½ einnimmt, und 10 breit, hell bräunlichgelb, nächstverwandt mit den nordindischen Arten, fast genau übereinstimmend mit L. sulcatula Troschel Archiv f. Naturgeschichte 1867, S. 167 aus Bengalen (Exemplare im Berliner Museum), nur kleiner, von L. acuminata Lam. durch relativ etwas kürzeres und breiteres Gewinde eben noch zu unterscheiden. L. rufescens (Sow. auch vorderindisch). *Lien.* 58 dürfte wohl dieselbe sein.
- S M M Physa Borbonica *Ferussac* Bulletin des sciences naturelles X, 1827, p. 408 Bourbon, auf Steinen, häufig, von Rang mitgebracht. *Sganz.* 18 ebenda, in Bächen häufig. *Morelet* series conch. II, p. 97, pl. 6, Fig. 5. — Ph. Seychellana v. *Martens* in v. d. *Decken* Reisen in Ostafrika III, S. 60, Taf. 2, Fig. 3 Seychellen.

Sehr nahe der südeuropäischen Art Ph. acuta *Drap.*, etwas matter und stärker gestreift, 14 mm lang.

- *Physa Borbonica var. Ph. nana *Potiez et Michaud* galerie de moll. de Douai I, p. 225, pl. 22, Fig. 15, 16 Bourbon, nur 8 mm lang und 4 breit, in Exemplaren verschiedener Grösse, Taf. 1, Fig. 11, 12, bis 9 mm lang, wovon 7 mm auf die

Mündung, und 5 mm breit, von Prof. *Möbius* bei Black river, Mauritius gesammelt. Dieses ist vermuthlich auch die kleinere unbenannte *Physa* bei *Morelet series conch.* II, p. 98 von Mauritius.

- M Af **Isidora Forskalii* Ehrenberg symbolae physicae n. 3; Jickeli Land- u. Süssw.-Moll. Nordostafrika's S. 203. Mauritius, Prof. *Möbius* in zahlreichen Exemplaren, Taf. I, Fig. 7, 8. Die einzige afrikanische und nicht indische Süsswasserschnecke, ob eingeführt?

Physa Cernica *Morelet* Journ. de Conch. XV, 1867, p. 440 von Mauritius, 8 mm lang, 4 breit, ist vielleicht dieselbe, da ihr spira elongata zugeschrieben wird, ebenso die nicht beschriebene *Physa spiralis* Ferussac Bull. sc. nat. X, 1827, p. 408, von *Rang* auf Ile de France gesammelt.

- M (I) *Planorbis Mauritianus* *Morelet* Journ. de Conch. XXIV, 1876, p. 91, pl. 3, Fig. 7 Mauritius. Scheint mir nach Beschreibung und Abbildung nicht verschieden von *Pl. compressus* Benson, der in Vorderindien und dem indischen Archipel weit verbreitet ist.

- D† *Planorbis Rodriguezensis* Crosse Journ. de Conch. XXI, 1872, p. 144; XXII, p. 232, pl. 8, Fig. 8 Source de la rivière de Cocos, Rodriguez, *Desmazures*. Auch dieser gehört, wie der vorhergehende, in die Gruppe von *Pl. albus*.

Paludinidae.

- M(†) **Paludina zonata* *Hanley*, *Reeve conchol. icon.* Fig. 34 Mauritius. *Lien.* 46 „introduite à Maurice“. *Nevill catal. of the Mollusca of the Indian Mus. Calcutta*, fasc. E. 1877, p. 31 Trou d'eau douce, Maur., doch wohl nur eine Lokalrasse von *P. Bengalensis* Lam. Auch von Prof. *Möbius* und Hrn. *Caldwell* erhalten.

- S Af *Paludomus Ajanensis* *Morelet conch.* II, p. 110, pl. 6, Fig. 10 von Ras Hafun, Somaliküste, kommt nach *Nevill P. Z. S.* 1869, p. 66 auch auf Mahé, Seychellen, in einem schnellfließenden Bach vor. *Lien.* 82.

- S†? *Paludomus* sp. *Nevill P. Z. S.* 1869, p. 66 Silhouette (Seychellen), hoch oben.

- M? *Paludomus punctata* *Reeve Proc. Zool. Soc.* 1852, p. 127 Mauritius, länglich mit Spiralgürteln und dazwischen punktirt. Vielleicht zu *Cleopatra* zu stellen.

Die sogenannte *Melania amoena* *Morelet* Journ. de Conch. II, 1851, pl. 5, Fig. 9 von Madagaskar, nach *series conch.* II, p. 118 dagegen von Zanzibar und den Seychellen, hat nach *Brot matériaux Melaniens* II, p. 41 einen concentrischen Deckel und steht meiner *Paludomus Africana* (Monatsberichte Berl. Akad. 1878, S. 297, Taf. 2, Fig. 11—13) mindestens sehr nahe. Sie dürfte eher dem Festlande von Ostafrika als den Inseln angehören, und schliesst sich am besten an *Cleopatra bulimoides* an.

- M B *Melania amarula* (L. part.) Lam. *Bernardin de St. Pierre voyage à l'isle de France* 1773, p. 107 Mitre fluviatile. *Spengler* bei *Schröter* Gesch. der Flussconchylien 1779, S. 299 und 390, Taf. 9, Fig. 11 Flusspabstkrone aus Mauriten. *Chemnitz Conch. Cab.* IX, p. 157, 159, Fig. 1218, 1219 Insel Maurice (Ile de France) und Bourbon. Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 431, 432 *Melania amarula*, hab. les grandes Indes, Madagascar, l'Ile de France etc. Ferussac Bull. sc. nat. X, 1827 p. 410 Bourbon und Ile de France, häufig in Teichen und Flüssen, von den Fischen gefressen, lebendes Thier beschrieben. *Sganz.* 19 Ile de France et Bourbon, in Teichen und Flüssen, gegessen. *Morelet series conch.* II, p. 111 *M. mitra*, ile

Maurice, nicht sehr häufig (*M. amarula* auf Madagaskar und den Komoren). *Brot materiaux* fam. Melaniens I, p. 54 *M. amarula*, I. de France; Chemn. ed. nov. *Melania* S. 289, Taf. 29, Fig. 1 Bourbon (Genfer Museum), Mauritius, Madagaskar, Komoren. *Desh.* 81 Reunion. *Lien.* 44. *M. acanthica*, *amarula* und *M. mitra*, Maurice.

Diese Art, für welche Brot den Namen *amarula* beibehalten, unterscheidet sich durch weniger zahlreiche (9—10 auf dem letzten Umgang), senkrecht stehende und nach unten etwas verlängerte Stacheln von der auf Amboina lebenden, welche 12—14 ganz kurze, nicht herablaufende, dagegen etwas nach aussen gebogene Stacheln hat (*diadema* Lea, Brot loc. cit. Taf. 29, Fig. 2) und welche höchstwahrscheinlich die ursprüngliche *Amarula* von Rumph amb. rariteitkamer S. 106 (*M. setosa* eingeschlossen) darstellt.

SMD **Melania scabra* Müll. hist. verm. II, p. 136, 1774; Chemn. Conch. Cabin. IX, IP Fig. 1259, 1260 aus Vorderindien. Schröter Flussconch. S. 299, Taf. 6, Fig. 13. *M. spinulosa* Lam. (von Timor) Quoy et Gaimard Voy. Astrol. III, p. 147, pl. 56, Fig. 12—14 (von Vanikoro), Mousson moll. jav. S. 76, Taf. 11, Fig. 11, 12. — *Reeve* conch. ic. XII, Fig. 183 Mauritius und Seychellen. Brot materiaux II, p. 38, pl. 2, Fig. 6. pl. 3, Fig. 8; III, pl. 1, Fig. 15. Chemn. ed. nov. *Melania* S. 266, Taf. 27, Fig. 14, 15. *Lien.* 44 Mauritius. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, 1874, p. 240 Port Mathurin, Rodriguez, Fouquets und Grande Baie, Maur., *Möbius*. — *Mel. Mauriciae* Lesson Voy. de la Coquille, zool. II, p. 354, ohne Abbildung, von Mauritius ist vielleicht dieselbe.

SMB *Melania tuberculata* Müller 1774 (*Nerita*), fasciolata Olivier, virgulata Ferussac et DMd truncatula (Lam.) Ferussac Bull. Sc. nat. X, 1827, p. 411 Bourbon, häufig an RAI Felsen und an von Quellen befeuchteten Mauern. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe III, p. 141 und 143, pl. 56, Fig. 1—4 und 5—7 lebendes Thier, Flacq, Ile de France in Bächen und an Flüssen. Sgan. 19 *M. truncatula*, Ile de France und Bourbon, auf Steinen in Flüssen. Mousson jav. S. 73, Taf. 11, Fig. 6, 7. Morelet series conchyl. II, p. 111—115 *M. tuberculata* var. *virgulata*, Maurice. Reeve XII. Fig. 87. *Desh.* 81 Reunion. Nevill P. Z. S. 1869, p. 66 Insel Praslin. *Lien.* 44 *M. tuberc.*, virgul. Mauritius und 82 tuberc. Mahé, Praslin, Silhouette, Nevill. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 241 Port Mathurin, Rodriguez, Desmazes. Brot Chemn. ed. nov. *Melania* S. 248, Taf. 26, Fig. 11 Maur., Madagaskar u. s. w.

Bekanntlich weit verbreitet in Indien und Afrika, auf unsern Inseln wahrscheinlich eingeschleppt.

MBD *Melania Commersoni* Morelet series conch. II, p. 116, pl. 6, Fig. 4 von Madagaskar. (Md) Reeve Fig. 237 und Brot Chemn. ed. nov. *Mel.* S. 244, Taf. 26. Fig. 1 ebendaher. *Desh.* 81 Reunion. *Lien.* 44 Mauritius. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, 1874, p. 240 Port Mathurin, Rodriguez, Desmazes.

S† *Melania* (*Hemisinus*) *dermestoides* Lea. Proc. Z. Soc. 1850, p. 181. *Reeve* conch. ic. XII, *Hemisin.* Fig. 9 Seychellen.

- S† *Melania* (*Hemisinus*) *contracta* Lea Proc. Zool. Soc. 1850, p. 182. *Reeve* ibid. Fig. 19 Seychellen.

Ich muss es dahin gestellt lassen, ob diese Arten wirklich mit den mittelamerikanischen *lineolata* Wood (Typus von *Hemisinus*), *Osculati* Villa, *ornata* Poey u. s. w. in dieselbe natürliche Gruppe gehören. *Hemisinus* ist neuerdings aus einer natürlichen geographisch begränzten Gruppe zu einer unnatürlichen Gattung erhoben worden.

Neritidae.

- MB **Neritina* (*Neripteron*) *Mauriciae* Lesson Voy. de la Coquille, zool. II, p. 384
(Md) (*Mauritii*) Mauritius in Flüssen. *Morelet* series conch. II, p. 119 Ile Maurice und Madagaskar. *Martens* Chemn. ed. nov. *Neritina* S. 27 und 276, Taf. 6, Fig. 7—9 nach Exemplaren aus Reunion von *Robillard*. *N. cariosa* Gray Wood ind. testac. suppl. p. 25, pl. 8, Fig. 9 (Africa). *N. auriculata* (Lam.) *Rang* manuel d. moll. p. 47 Insel Bourbon in Brackwasser, mit *Meleagrina* und *Aplysia*; ebenso bei *Ferussac* Bull. sc. nat. X, p. 412. Sow. thes. conch. II, pl. 113, Fig. 129, 130; *Reeve* conch. ic. IX, Fig. 83. *N. Deshayesii* *Pease* Am. Journ. Conch. IV, 1868, p. 130 Bourbon. Journ. de Conch. XIX, 1871, p. 101. *N. Sandwichensis* *Desh.* 81 Reunion. *Lien.* 48 Maur. *N. alata* *Robillard* mscr.

Die wiederholte Verwechslung dieser auch noch auf Madagaskar vorkommenden Art mit *N. Sandwichensis* *Desh.* ist von mir a. a. O. auseinandergesetzt worden.

- SMB **Neritina* *gagates* Lam. an. s. vert. ed. 1, VI, p. 185, ed. 2, VIII, p. 570: Delessert
D recueil pl. 32, Fig. 2. *Bernardin St. Pierre* voy. à l'isle de France p. 105 limaçon fluviatile. *Ferussac* Bull. sc. nat. X, 1827, p. 411 (*N. zigzag*) Bourbon, in Flüssen und Brackwasserteichen z. B. bei St. Paul, vom Volke gegessen, *Rang.* *Lesson* Voy. de la Coquille, zool. II, p. 377 Mauritius. Sow. thes. Fig. 103, 104. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 66 Seychellen. *Lien.* 82. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 241 Rodriguez. *Martens* Chemn. ed. nov. *Neritina* S. 94 und 279, Taf. 16, Fig. 1. 2, Taf. 10, Fig. 18, 19 und Taf. 13, Fig. 8 Mauritius. *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, S. 29 Rodriguez. — *N. Caffra* Gray Wood ind. testaceol. suppl. pl. 8, Fig. 10. Sow. thes. Fig. 111, 112. *Reeve* Fig. 37 Maur. *Chenu* manuel conch. I, p. 335, Fig. 2448. *Lien.* 48. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 241 Rivière de la grande Baie, Rodriguez, *A. Desmazes*. — *N. zigzag* (Lam.??) *Morelet* series conch. II, p. 120 sehr häufig in den kleinen Flüssen von Mauritius, essbar. *Desh.* 79 Reunion. *Nevill* P. Z. S. 1869, p. 66 Insel Praslin, in einem schnellfließenden Bach. *Lien.* 48. Vermuthlich auch *N. strigilata* (Lam.) *Desh.* 79 Reunion und *N. lineolata* (Lam.) *Lien.* 48 Mauritius.

Diese Art variirt sehr in der Erhebung des Gewindes, vgl. die angeführten Abbildungen und ihre normal sehr feine schwarze Zickzackzeichnung auf grüngelbem Grund wird oft von einem schwarzen Ueberzug ganz verdeckt, daher sie vielfach verkannt und mit andern Arten aus dem indischen Archipel und selbst Amerika verwechselt wurde.

- B† *Neritina* *modicella* *Desh.* moll. de Reunion p. 79, pl. 10, Fig. 3, 4.
B† *Neritina* *fulgurata* *Desh.* moll. de Reunion p. 80, pl. 10, Fig. 1, 2.

Beide einander sehr nahe stehend.

- M B D **Neritina* (*Clithon*) *longispina* *Recluz* Revue zool. 1841, p. 312 Maur., Madagaskar.
 (Md) *Nerita corona* Linne ex parte. *Bernardin St. Pierre* voy. à l'isle de France 1773, p. 105 limacon fluviatile à pointe(s). *Spengler* im Naturforscher IX, 1776, S. 160 dornigte *Nerita*, Mauritius; *Schröter* Flussconchylien S. 218. *Favanne* conchyliologie pl. 61, Fig. D 7. *Clithon corona* Montfort conch. syst. II, p. 327. *Neritina corona* Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 571 (part.) Ile de France. *Sganzen* 19 Maur. und Bourbon, essbar. *Rang* bei Ferussac Bull. sc. nat. X, 1827, p. 412 (*N. corona*) Bourbon, häufig, gegessen. *Lesson* Voy. de la Coquille zool. II, 1, p. 380 Maur., in Flüssen. *Sow.* thes. Fig. 62 Rodriguez, *Hinds*. *Chenu* manuel I, p. 337, Fig. 2474. *Reeve* Fig. 21. *Morelet* series conch. II, p. 120 häufig in den süßen Gewässern von Bourbon, Mauritius und Madagaskar, essbar. *Desh.* 79 Reunion. *Lien.* 48 Maur. *Martens* Chemn. ed. nov. *Neritina* S. 147, Taf. 15, Fig. 16, 17 und 20, 21.

- M D *Neritina* (*Clithon*) *Mauritiana* *Morelet* Journ. de Conch. XV, 1867, p. 440 Maur. *Lien.* 48. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 242 Rivière de la grande Baie, Rodriguez, *Desmazures*.

- M† **Neritina* (*Neritilia*) *consimilis* *Martens* in der neuen Ausgabe von Chemn. S. 243, Taf. 23, Fig. 25 und 26.

Testa parva, oblique elliptica, leviter confertim striatula, nitidula, diaphana, nigricanti-flavescens; spira paululum prominens, nigricans, sutura leviter descendente; anfractus ultimus ventre subcomplanatus; apertura valde obliqua, semielliptica, margine externo arcuato, supero substricto, tenui, infero leviter arcuato, subdilato, margine columellari subrectilineo, inferne paulum arcuato, edentulo, area columellari convexuscula, subtiliter rugulosa, nigricante, postice indistincte terminata. Operculum nigricans, margine columellari subaequaliter reflexo, appendicibus distinctis nullis. Diam. maj. $3\frac{1}{3}$, min. 3, alt 2, marg. colum. 2, lat. areae $1\frac{2}{5}$ mm.

Creole river, Mauritius, *Möbius*.

Sehr ähnlich der *N. succinea* *Recluz* aus Guadeloupe, aber am Deckel leicht zu unterscheiden.

Zweifelhaft bleiben mir *N. rara* *Dufa* 195 von Mahé, in den reissendsten Bächen, besonders an Wasserfällen, und *N. pulligera* (Lam.) *Sganzen* 19 Bourbon, in Bächen und Flüssen sehr zahlreich, gegessen; unter letzterer ist vielleicht *N. Knorri* *Recluz* von Madagaskar (*Martens* a. a. O. S. 56, Taf. 8, Fig. 4—6) gemeint, vielleicht aber auch nur *N. gagates*, die sonst bei *Sganzen* nicht vorkommt.

- S M B **Septaria* *Borbonica* (*Bory St. Vincent*) *Bernardin St. Pierre* voyage à l'isle de France 1773, p. 105 lépas fluviatile couvert d'une peau noire. *Favanne* conchyl. I, p. 562, pl. 4, Fig. E1 Ile de France. *Patella Borbonica* *Bory St. Vincent* Voy. dans les quatre principales îles etc. 1803, I, p. 287, pl. 37, Fig. 2 ABC Bourbon, in den nicht austrocknenden Bächen und Flüssen, an Felsen angeheftet, an der Mündung der Flüsse kleiner, als weiter oben, von den Schwarzen gegessen. *Crepidula* *Borb.* *Roissy*. *Septaria* *Borb.* *Ferussac* essai d'une methode conchyliol. 1807, p. 60—64. *Blainville* malacologie pl. 48, Fig. 5. *Navicella elliptica* *Lamarck* Philosophie zool. 1809, Encycl. meth. pl. 456, Fig. 1 und an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 563 Ile de France, Indien und Molukken, in Flüssen. *Quoy* et *Gaimard* Voy.

de l'Uranie pl. 71, Fig. 3 kopirt Isis 1834, Taf. 8; Voy. de l'Astrolabe zool. II, p. 206 (pl. 58, Fig. 25—34 von Guam.). *Rang* bei Ferussac Bull. sc. nat. X, 1827. p. 412 Bourbon, Maur., Rodr., Madagaskar. *Dufo* 195 Sept. ellipt. Mahé, selten, in Bächen an Steinen, vivipar. *Sganz.* 21 Navic. ellipt., Bourbon, sehr häufig in Bächen, wird gegessen. *Reeve* conch. ic. IX, Navicella porcellana Fig. 6 Bourb., Mauritius, Rodriguez. *Morelet* series conch. II, p. 119 Navic. porcellana, p. 126 Madagaskar, Bourbon, Maurice, Comores. *Desh.* 81 Reunion. *Lien.* 48 Mauritius. *Crosse* Journ. de Conch. XXII, p. 242 Port Mathurin, Rodriguez, *Desmazuress.*

Navicella bimaculata *Reeve* Fig. 2 Mauritius. *Lien.* 48. *Morelet* Journ. de Conch. XXIII, p. 30 Rodriguez ist nicht wohl als Art zu unterscheiden. Die Arten dieser Gattung sind überhaupt schwer gegeneinander abzugränzen, doch scheint es mir, dass die auf den ostafrikanischen Inseln lebende nicht mit irgend einer des indischen Archipels identisch sei. *Patella porcellana* L. (*Desh.* an. s. vert. loc. cit. und Hanley ipsa liun. conch. p. 416) dürfte sich auf die indische bei Rumph abgebildete Art beziehen.

Man kennt demnach auf den Maskarenen und Seychellen zusammen mit Ausschluss von Madagaskar 150 Arten von Landschnecken, von denen nur sehr wenige, 3, auch auf andern Kontinenten vorkommen, *Helix aspersa*, *similaris*, *Ennea bicolor*, erstere sicher, und wahrscheinlich absichtlich, aus Europa, die beiden letzteren vermuthlich und unabsichtlich aus Indien durch Menschen eingeführt, dazu kommen noch die 2 aus Madagaskar nach übereinstimmenden Aussagen eingeführten grossen Achatinen, bleiben also 145 ursprünglich auf diesen Inseln einheimische und nicht weiter verbreitete Arten, $\frac{29}{30}$ der vorhandenen. Immerhin dürften noch einige derselben auf Madagaskar und den Komoren vorkommen. Ausgestorben scheinen davon 14 zu sein. Aber auch innerhalb des betreffenden Gebiets sind die allermeisten auf ein engeres Gebiet, eine einzige Insel oder eine kleinere Inselgruppe (Seychellen) beschränkt, nämlich 122 oder $\frac{12}{13}$, davon kommen auf Mauritius 67, auf Bourbon 24, auf Rodriguez 15, auf die Seychellen 16 ganz eigenthümliche Arten. Die eingeführten ausgeschlossen haben Mauritius und Bourbon 19, Mauritius und Rodriguez 4, Mauritius und die Seychellen 5, alle vier zusammen nur 2 Arten (1 *Stenogyra* und 1 *Succinea*) gemeinsam. Ueberhaupt zählt Mauritius 95, Bourbon 46, Rodriguez 20, die Seychellen 26 Arten: jedenfalls ist Mauritius am vollständigsten untersucht, sein Uebergewicht dürfte daher wirklich nicht so gross sein, als es nach dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse erscheint. Was die am meisten charakteristischen Gattungen und Untergattungen betrifft, so finden wir *Pachystyla*, *Gibbulina* und *Hyalimax* nur auf den südlicheren Inseln: Mauritius, Bourbon und Rodriguez, die allermeisten (46 von 62) auf ersterer, dagegen *Stylodonta* und *Pachnodes* ausschliesslich, *Ennea* vorherrschend auf den Seychellen. Die *Cyclostomen*, auf Madagaskar so reich entwickelt, sind auch auf den südlicheren Inseln zahlreicher und durch grössere Arten vertreten als auf den Seychellen, wo von der Gattung *Cyclostoma* selbst nur *C. pulchrum* vorkommt, dagegen finden sich daselbst noch je 1 Repräsentant der indischen Gattungen *Cyathopoma* und *Leptopoma*: hierauf beschränkt sich aber auch die nähere Uebereinstimmung dieser Landschneckenfauna mit der indischen. Madagaskar hat noch 3 sehr charakteristische *Heliceengruppen*, welche auf unsern Inseln fehlen: *Ampelita*, *Helicephanta* und *Clavator*; auch *Mascaria* unter den *Cyclostomaceen* gehört wesentlich Madagaskar an.

Die Süßwasserschnecken sind, wie auf allen Inseln, so auch hier nur spärlich vorhanden, im Ganzen 23 Arten, wovon 16 auf Mauritius, 12 auf Bourbon, 7 auf Rodriguez, 9 auf den Seychellen. Eine ist weit verbreitet, afrikanisch-indisch, *Melania tuberculata*, eine andere weit durch Indien verbreitet, aber dem Festland von Afrika fremd, *M. scabra*, 3 wahrscheinlich Varietäten indischer Arten: *Paludina zonata*, *Limnaea Mauritiana*, *Planorbis Mauritianus*, 1 weit verbreitet afrikanisch, *Isidora Forskalii*, all diese können mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit als durch den Menschen eingeführt betrachtet werden. Zwei Arten sind etwas zweifelhaft nur den Seychellen mit einzelnen Punkten der Ostküste Afrikas gemein. *Paludomus Ajanensis* und *amoena*. Bleiben 15 eigenthümliche Arten, von denen aber die am meisten charakteristischen, *Melania amarula*, *Neritina longispina* und *Septaria Borbonica* sehr nahe Verwandte in Indien und seinem Archipel, aber keine auf dem Festlande Afrikas finden. Die Süßwasserfauna unserer Inseln ist also im Allgemeinen indisch zu nennen, während die Landschnecken mehr eigenthümlich sind. Was die Vertheilung auf die einzelnen Inseln betrifft, so hat Mauritius 2, Bourbon 2, Rodriguez 1 und die Seychellen 2 (oder mit den obengenannten *Paludomus* 4) ganz eigenthümliche, 8 aber, also über die Hälfte jener 15, sind mehreren Inseln gemeinsam, 2 allen vier (*Neritina gagates* und *Septaria Borbonica*), 2 Mauritius, Bourbon und Rodriguez (*Melania Commersoni* und *N. longispina*), 2 Mauritius und Bourbon, 1 Mauritius und Rodriguez, 1 Mauritius, Bourbon und den Seychellen (*Ph. Borbonica*) gemeinsam. Süßwassermuscheln sind von unsern Inseln gar nicht bekannt; Sganzi 8 giebt zwar den europäischen *Unio sinuatus* von St. Paul auf Bourbon an, dass ist aber offenbar an sich ganz unglaubwürdig, er selbst zweifelt daran. Der Mangel an grösseren, nicht reissenden, das ganze Jahr durch sich erhaltenden Gewässern dürfte dieses erklären.

Die Auriculiden und die Truncatellen sind absichtlich nicht unter die Landschnecken mitgezählt worden, es sind submarine oder Litoralschnecken und zeigen als solche eine viel weitere Verbreitung der einzelnen Arten. Von den 21 Arten sind 11, also über die Hälfte auch noch in Polynesen, 13 in Indien, mindestens 6 auch an der Ostküste des Festlandes von Afrika vorhanden, nur 3 Arten, *Cassidula parva*, *Melampus Dupontianus* und *corticinus*, sind bis jetzt nur in dem vorliegenden Inselgebiet gefunden, und auch von diesen wenigstens *M. Dupontianus* sowohl auf Mauritius als auf Rodriguez, so dass nur 2 als auf Eine Insel, Mauritius, beschränkt bleiben. Ueberdies gehören diese Auriculiden zu den wenig gesuchten und beliebten Schnecken und ist auch die Abgrenzung der Arten bei ihnen ziemlich schwierig, es kann daher sehr wohl kommen, dass auch jene noch anderswo gefunden worden.

Die Eigenthümlichkeit der Inselfauna tritt demnach an der Küste und in den Niederungen (Süss- und Brackwasser-Schnecken) weit weniger hervor als im Innern und auf den Höhen (Landschnecken), aber auch hier ist sie im Schwinden begriffen, gerade mehrere der grössten Arten unter den eigenthümlichen Landschneckenformen sind auf das Innere beschränkt und merklich seltener geworden, z. B. *Pachystyla caelatura*, *Gibbulina pagoda*, oder soviel wir wissen, nicht mehr lebend zu finden, wie *Pachystyla Duponti* und *Bewsheriana*, beide grösser als *caelatura*, *Gibbulina majuscula* und *Mülleri*, dagegen die eingeführten Landschnecken, Achatinen und *Helix similaris*, im Kulturlande viel häufiger. Die Fauna wird also allmählig mehr international.

B. Meeresmollusken der Seychellen, Maskarenen und Madagaskar's.

C e p h a l o p o d a

Dibranchia.

Octopoda.

- B Af I *Octopus Indicus* Rapp bei Orbigny hist. nat. d. Cephalop. 1835—48, pl. 25. *Desh.* 140 Reunion, *Maillard*.
- M R *Octopus aranea* Orb. loc. cit. p. 58, pl. 5. Gray catal. moll. Brit. Mus., Cephalopod. 1849, p. 7 Ile de France, *Mathieu* und *Quoy* et *Gaimard*.
d'Orbigny führt in seinem systematischen Werke über die Cephalopoden S. 22, 30 und 48 auch noch *O. vulgaris* Lam., *macropus* *Risso* (Cuvieri d'Orb.) und *rugosus* *Bose* von Ile de France nach den Sammlungen von *Quoy* und *Gaimard* an; der zweite soll auch von *Dussumier* auf den Seychellen gefunden sein. Die beiden ersten sind europäische, die dritte eine westindische Art. Da die Artunterscheidung nach Spiritus-Exemplaren in dieser Gattung sehr schwierig ist, so dürfte eine neuere Bestätigung der Identität abzuwarten sein.
- M I *Argonauta tuberculata* *Shaw*, *nodosa* *Solander*, *tuberosa* *Lam.* Martini Conchylien-Cabinet I, Fig. 156 und 160. d'Orbigny pl. 4. *Sganz.* 30 Ile de France, selten. *Lien.* 1.
- M B I P *Argonauta hians* *Solander*, *nitida* *Lam.* Martini I, Fig. 158, 159. d'Orbigny pl. 5. Adams and Reeve Zoology of the Samarang pl. 3, Fig. 2 Ile Bourbon, *Quoy* und *Gaimard* (bei d'Orbigny). *Sganz.* 30 Ile de France, selten.

Decacera.

- (M)† *Onychoteuthis Dussumieri* d'Orbigny Cephalop. p. 335, pl. 13. *Ancistroteuthis* *D.* Gray catal. Brit. Mus. Cephalop. p. 56 Indischer Ocean, 200 lieues nördlich von Mauritius.
- M† *Sepiola stenodactyla* *Grant* Transact of the Zool. Soc. I, 1833, p. 84, pl. 11, Fig. 1, 2 und 6, kopirt bei Orbigny p. 238, pl. 2, Mauritius, *Ch. Telfair*.
- M B?† **Loligo tricarinata* *Gray* catal. Brit. Mus., Cephalopoda 1849, p. 73 Isle of France, Lady Francis Cole. — *Deshayes* 140 erwähnt einer von Reunion durch *Maillard* mitgebrachten Schulpe, welche ähnlich derjenigen der (nordamerikanischen) *L. Pealei* *Lesueur* sei.
- M R Af *Sepioteuthis Mauritiana* *Quoy* et *Gaimard* Voy. de l'Astrolabe, zoologie II, 1832, p. 76, pl. 4, Fig. 2—6 Ile de France. *Orbigny* p. 304, pl. 5 und 7. Wahrschein-

lich dieselbe Art mit *Chondrosepia loliginiformis* Leuckart 1828 aus dem rothen Meer.

- MB Af **Spirula Peroni* Lam. *Bernardin St. Pierre* Voyage à l'Isle de France 1773, p. 105
 I Au. cornet de St. Hubert. *Favanne* conchyliologie I, p. 731, pl. 7, Fig. E. Ile de France. *Desh.* 140 Reunion. *Lien.* 1. Bei Fouquets, Prof. *Möbius*. Die leere Schale dieses lebend äusserst selten gefundenen Thieres wird bekanntlich an den meisten tropischen und subtropischen Küsten mehr oder weniger häufig angeschwemmt gefunden, da sie wegen ihrer Luftkammern im Wasser sich schwimmend erhält und so weit fortgeführt wird.

P t e r o p o d a .

Von dieser der hohen See angehörenden Weichthierklasse, deren Arten durchschnittlich in den heissen Meeren weit verbreitet sind, sind mir keine speciellen Angaben aus dem Meere zwischen Madagaskar, Mauritius und den Seychellen bekannt, dagegen aus südlicheren Breiten die 3 folgenden:

- Md † *Clio Australis* *Bruguère* Encyclopédie méthodique, Vers p. 597, pl. 75, kopirt bei *Rang* Pteropodes p. 79, pl. 8, Fig. 1, 2, häufig an der Südküste von Madagaskar.
Clidita fusiformis *Quoy et Gaimard* Annales des sciences nat. VI, 1824, p. 74, pl. 2, Fig. 3, 4 und Voy. de l'Uranie zool. pl. 66. *Rang* p. 81, pl. 8, Fig. 3. Während der Ueberfahrt vom Cap der guten Hoffnung nach Mauritius gefangen.
Clidita caduceus *Quoy et Gaimard* ebenda Fig. 2, *Rang* Fig. 5. Ebendaher.

Gastropoda.

P e c t i n i b r a n c h i a .

Toxoglossa.

- SA Md **Conus marmoreus* L. *Favanne* in Argenville's conchyologie, edit. 3, II, p. 539, pl. 14,
 M I Af Fig. E4 Ile de France. *Encycl. meth.* pl. 315, Fig. 4. *Kiener* pl. 2, Fig. 1.
 P *Reeve* conchol. icon. I, Fig. 74. *Dufo* 176 Seychellen und Amiranten. *Sganzin* 29 Ile de France und Madagaskar. Auch von Prof. *Möbius* von den Seychellen mitgebracht.
Conus marmoreus var. *nocturnus* *Hwass.* *Encycl.* pl. 318, Fig. 1 u. 6. *Kien.* pl. 2, Fig. 2. *Reeve* Fig. 42. *Sganzin* 29 ebenda.
 M I *Conus peplum* Chemnitz var. *Nicobaricus* *Hwass.* Chemnitz Conchylien-Cabinet X, Fig. 1292. *Encycl.* pl. 318, Fig. 4. *Kien.* pl. 8, Fig. 1, 2. *Reeve* Fig. 41. Nur durch *Caldwell* aus Mauritius erhalten.
 SA Md **Conus imperialis* *Linne* (einschliesslich *fuscatus* Born), *Martini* Conch. Cab. II,
 MB Af Fig. 693 Ile de France. *Favanne* II, p. 535, pl. 14, Fig. A. 3 und E. 2. *Chemnitz*
 I Conch. Cab. X, Fig. 1289 Mauritius und Bourbon. *Encycl.* pl. 319, Fig. 1—4 u. 7.

- Kien. pl. 5, Fig. 1. Reeve Fig. 60, 182 u. 184. *Dufo* 176 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 29 Madagaskar. *Desh.* 133 (fuscatus) Reunion. *Lien.* 32, 33 u. 76 Mauritius und Seychellen. Von Prof. *Möbius* bei Fouquets gefunden.
- A M I *Conus* (*Lithoconus*) *literatus* L. *Martini* II, Fig. 667, 668. *Encycl.* pl. 315, Fig. 3. Kien. pl. 19, Fig. 1. Reeve Fig. 183. *Dufo* 171: Alphonse (Amiranten), selten. *Lien.* 33 Mauritius.
- S A Md **Conus* (*Lithoconus*) *millepunctatus* Lam. *Martini* II, Fig. 666. *Favanne* II, p. 585, M B Af pl. 18, Fig. A. 1 Ile de France. Kien. pl. 18, Fig. 1. Reeve Fig. 178. *Dufo* 169 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 34 Mauritius. Von Prof. *Möbius* bei Fouquets gefunden.
- A Md M *Conus* (*Lithoconus*) *eburneus* *Hwass.* *Martini* II, Fig. 674. *Encycl.* pl. 324, Fig. 1. I Kien. pl. 17, Fig. 2. Reeve Fig. 106. *Dufo* 175 Amiranten, selten. *Sganz.* 30 Ile Marie und Ile de France.
- S A Md **Conus* (*Lithoconus*) *tessellatus* *Hwass.* *Martini* II, Fig. 653 u. 654. *Favanne* pl. 16, M R Af Fig. A. 1 Ile de France. Kien. pl. 17, Fig. 1. Reeve Fig. 163 Mauritius. *Dufo* 173 I Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30 Insel St. Marie. *Lien.* 36 u. 76 Mauritius und Seychellen. Auch von Prof. *Möbius* auf den Seychellen und Mauritius gesammelt.
- S A? *Conus* (*Lithoconus*) *Prometheus* *Hwass.* *Encycl.* pl. 331, Fig. 5. Reeve Fig. 172 Md? M? Seychellen, von *Caldwell* gesammelt. Weinkauff Monogr. Taf. 52, Fig. 2. Vermuthlich auch die von *Dufo* 174 als *C. papilionaceus* Lam. angeführte Art, auf den Amiranten selten an Felsen, $3\frac{1}{2}$ —4 m tief, und ebenso die von *Sganzin* 30 als *C. genuanus*, aile de papilion, erwähnte, Madagaskar und Mauritius, selten. Alle drei Arten sind unter sich nahe verwandt, *C. Genuanus* und *papilionaceus* aber sicher westafrikanisch, der Name *Genuanus* (de geneesche tort, Rumph S. 108) wahrscheinlich ursprünglich Missverständniss für guineisch.
- M I *Conus* (*Dendroconus*) *glaucus* L. *Martini* II, Fig. 671. Chemnitz X, Fig. 1277, 1278. Kien. pl. 25, Fig. 2. Reeve Fig. 10. Nur von *Caldwell* aus Mauritius erhalten, in grossen Exemplaren.
- S A Md **Conus* (*Dendroconus*) *betulinus* L. *Martini* II, Fig. 665. *Favanne* II, p. 586, pl. 16, M B Af I Fig. L1 Ile de France. Chemn. X, Fig. 1321. Kien. pl. 38, Fig. 1, Madagaskar. Reeve Fig. 67. *Dufo* 172 Seychellen selten, Amiranten häufig. *Sganz.* 30 Madagaskar und Ile de France. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 21 Mauritius. Von Prof. *Möbius* bei Fouquets und auf den Seychellen gesammelt.
- A Md M *Conus* (*Dendroconus*) *figulinus* L. *Martini* II, Fig. 656. *Encycl.* pl. 332, Fig. 1. R Af I P Kien. pl. 28, Fig. 1. Reeve Fig. 160. *Dufo* 171 Amiranten. *Sganz.* 29, Madagaskar. *Conus* (*Dendroconus*) var. *quercinus* *Hwass.* *Martini* II, Fig. 657. *Favanne* II, p. 575, pl. 15, Fig. D3 von Madagaskar und Ile de France. Kien. pl. 32 und 33, Fig. 1. *Dufo* 172 Amiranten, selten. Auch von *Caldwell* aus Mauritius erhalten.
- S Af I *Conus* (*Puncticulis*) *obesus* *Hwass.* (*Ceylonicus* Chemn.). Kien. pl. 10, Fig. 3. Reeve Fig. 37. *Dufo* 174 Seychellen, selten. *Lien.* 76 Seychellen.

- S A M d **Conus (Puncticulis) arenatus* *Hwass.* Martini II, Fig. 696 u. 696. *Favanne* II, p. 700, M B R * pl. 15, Fig. F2, von Madagaskar. Encycl. pl. 320, Fig. 1. Kien. pl. 72, Fig. 5. A f I Reeve Fig. 92. *Dufo* 174 Seychellen und Amiranten. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 31 und 75 Mauritius und Seychellen. Bei Fouquets (Mauritius), Prof. Möbius.
- M I *Conus (Puncticulis) stercus-muscarum* L. Martini II, Fig. 711, 712. *Favanne* II, p. 708, pl. 15, Fig. F4 von Ile de France. Encycl. pl. 341, Fig. 6. Kien. pl. 58, Fig. 3. Reeve Fig. 90. *Lien.* 36 Mauritius.
- S C D *Conus (Puncticulis) pulicarius* *Hwass.* Martini II, Fig. 698. Encycl. pl. 320, Fig. 2. M I Reeve Fig. 94. *Dufo* 174 Seychellen. *Lien.* 35, 76, 103 und 108; Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- S A C D **Conus (Coronaxis) miliaris* *Hwass.* Encycl. pl. 329, Fig. 6. Kien. pl. 13, Fig. 1. M A f I Reeve Fig. 198. *Dufo* 174 Seychellen, Amiranten. *Lien.* 34, 76, 103 und 108 P Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- S C M B *Conus (Coronaxis) coronatus* Dillwyn (minimus auct., non Linne) Martini II, I P Fig. 703—705. Kien. pl. 14, Fig. 1. Reeve Fig. 143. Weinkauff Taf. 25, Fig. 9—11, Taf. 28, Fig. 5, 6. *Dufo* 174 Seychellen. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 34, 76 u. 108 Mauritius, Seychellen und Cargados.
- M P *Conus (Coronaxis) encaustus* Kien. pl. 14, Fig. 2. Sowerby thesaur. conch. Fig. 79. Martens Südseeconchylien S. 31. Weinkauff Taf. 31, Fig. 4, 5. C. praetextus Reeve Fig. 277. *Lien.* 32 Mauritius.
- M † **Conus (Coronaxis) tenuisulcatus* Sowerby Proc. Zool. Soc. 1873, pl. 15, Fig. 2 Mauritius. *Lien.* 36. Auch von Möbius und Robillard aus Mauritius erhalten.
- M † *Conus (Coronaxis) articulatus* Sow. Proc. Zool. Soc. 1872, p. 145, pl. 15, Fig. 3 Mauritius. *Lien.* 31.
- S A C **Conus (Coronaxis) Hebraeus* L. (einschliesslich *vermiculatus Lam.) Lister hist. Md M B conch. pl. 779, Fig. 25 und 26 von Mauritius. Martini II, Fig. 617, 699 und 700. R A f I *Favanne* pl. 14, Fig. B1 Ile de France. Encycl. pl. 321, Fig. 8. Kien. pl. 4, Fig. 2 P und pl. 8, Fig. 3. Reeve Fig. 104. *Dufo* 170 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 29 Madagaskar. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 33, 37, 76 und 108 Mauritius, Seychellen und Cargados. Von Prof. Möbius bei Fouquets und auf den Seychellen gesammelt.
- S M I *Conus (Coronaxis) musicus* *Hwass.* Encycl. pl. 332, Fig. 4. Kien. pl. 13, Fig. 6. Reeve Fig. 113. Weinkauff Taf. 48, Fig. 6—9. *Dufo* 176 Mahé. *Lien.* 34 Maur. Auch von Caldwell erhalten.
- S M d M *Conus (Coronaxis) pusillus* Chemn. Conch. Cab. XI, Fig. 1788, 1789; (non Lam.). B I P Kien. pl. 55, Fig. 7, Madagaskar. Martens Südseeconch. S. 31. Reeve 154 Seychellen, von Cloué erhalten. Sow. thes. III, Fig. 144 Seychellen. *Desh.* 134 Reunion. *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIV, 1875, p. 83 Mauritius, Seychellen. *Lien.* 35 und 76 Mauritius, Seuchellen.
- M B I *Conus (Coronaxis) Ceylanensis* *Hwass.* Encycl. pl. 322, Fig. 10. Kien. pl. 16, Fig. 5. Reeve Fig. 199. Weinkauff Taf. 31, Fig. 12. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 32 Mauritius.
- M P *Conus (Coronaxis) sponsalis* Solander, Chemnitz Conch. Cab. XI, Fig. 1766, 1767.

- Kien. pl. 14, Fig. 4. Reeve Fig. 109. Weinkauff Taf. 54, Fig. 1. *Lien.* 35 Mauritius. Auch von Robillard erhalten. *C. nanus* Brod. aus der Südsee, wenig davon verschieden, wird von *Lien.* 34 auch für Mauritius angegeben.
- S A M d Conus (Lithoconus part.) *virgo* L. *Lister* hist. conch. pl. 758, Fig. 3 Mauritius.
M Af I Martini II, Fig. 585, 586. *Favanne* II, p. 576, pl. 15, Fig. P von Ile de France. Encycl. pl. 326, Fig. 5. Kien. pl. 36, Fig. 1. Reeve Fig. 119. *Dufo* 172 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar und Mauritius. *Lien.* 37 Mauritius.
- S A M B *Conus (Lithoconus part.) *flavidus* Lam. Kien. pl. 26, Fig. 4. Reeve Fig. 207.
R Af I Weinkauff Taf. 28, Fig. 7, 8. *Dufo* 173 Seychellen, Amiranten. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 32 Mauritius. (Derselbe hebt noch besonders die Varietät Kiener Taf. 106, Fig. 2 hervor, welche eher zu *lividus* gehören dürfte.) Auch *Möbius* sammelte die Art zahlreich bei Fouquets und auf den Seychellen.
- S A M d *Conus (Lithoconus) *lividus* Hwass. *Lister* pl. 758, Fig. 3 Mauritius. Mar-
M B R tini II, Fig. 694. *Favanne* II, p. 544, pl. 15, Fig. M Ile de France. Encycl. pl. 321,
Af I P Fig. 5. Kien. pl. 9, Fig. 2. Reeve Fig. 211. *Dufo* 173 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar und Mauritius. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 33 Mauritius. Ebendaher von *Möbius* und *Robillard*.
- Conus (Lithoconus) *lividus* var. *elongatus* (non Chemnitz). Reeve Fig. 157. Kien. pl. 33, Fig. 1. *Lien.* 32 Mauritius.
- Conus (Lithoconus) *lividus* var. *citrinus* Gmel. Martini II, Fig. 681. *Sow.* thes. III, Fig. 70 Mauritius. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 32 Mauritius.
- C M I Conus (Lithoconus) *sugillatus* Reeve Fig. 247. Kien. pl. 26, Fig. 3. Weinkauff Taf. 32, Fig. 9, 10. *Lien.* 36 und 108 Mauritius und Cargados.
- S † Conus (Lithoconus) *Moussoni* *Crosse* Journ. Conch. 1865, p. 299, pl. 10, Fig. 3 Seychellen. *Sow.* thes. III, pl. 286, Fig. 607.
- C M † Conus (Lithoconus part.) *Cernicus* *Barelay* mscr. *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 272, pl. 19, Fig. 1 Barkly island und Mauritius. Reeve suppl. Fig. 279. Weinkauff Taf. 42, Fig. 7, 8. *Lien.* 32 und 108 Mauritius und Cargados. Kaum als Art zu unterscheiden von dem indischen *C. balteatus*.
- C? Conus (Lithoconus) *pigmentatus* A. Adams und Reeve Zoology of the Samarang p. 18, pl. 5, Fig. 11 (unbekannten Fundortes). Reeve suppl. Fig. 237. Weinkauff Taf. 42, Fig. 9, 10. *Lien.* 108 Cargados. Auch dieser ist kaum als Art vom vorigen zu trennen.
- A M I Conus (Lithoconus) *lithoglyphus* Meuschen. Martini II, Fig. 630, 631. *Favanne* pl. 18, Fig. F Ile de France. Kien. pl. 29, Fig. 1. Reeve Fig. 20. Weinkauff Taf. 29, Fig. 5, 6. *Dufo* 175 Amiranten, selten. *Lien.* 33 Mauritius. Auch von *Caldwell* erhalten.
- S M I Conus (Lithoconus) *pulchellus* var. *cinctus* Swains. *Sow.* thes. Fig. 231. Weinkauff Taf. 36, Fig. 7, 8. *Lien.* 82 Seychellen. Eine Abart ganz ohne Band aus Mauritius von *Robillard* erhalten.
- M I Conus (Lithoconus) *planorbis* Born, senator Dillwyn (non Linne). Martini II, Fig. 584. Kien. pl. 27, Fig. 1. Reeve Fig. 197. *Lien.* 35 Mauritius.

- Md M I Conus (Lithoconus) vitulinus Hwass *Favanne* II, p. 616, pl. 15, Fig. R. Ile de France und Madagaskar. *Encycl.* pl. 326, Fig. 3, 4. *Kien.* pl. 22, Fig. 1. *Reeve* Fig. 132.
- M I Conus (Lithoconus) lineatus Chemnitz X, Fig. 1285. *Encycl.* pl. 326, Fig. 2. *Kien.* pl. 18, Fig. 4. *Reeve* Fig. 131. *Weinkauff* Taf. 56, Fig. 11. *Lien.* 33 Mauritius. Auch durch *Caldwell* aus Mauritius erhalten.
- Die drei letztgenannten Arten sind einander sehr ähnlich und können leicht verwechselt werden.
- M B † Conus (Lithoconus) planaxis *Desh.* Moll. de Reunion p. 134, pl. 13, Fig. 11, 12 Reunion. *Sow.* thes. III, pl. 287, Fig. 625 Bourbon. *Lien.* 35 Mauritius, selten.
- Md M Conus (Leptoconus) generalis L. Martini II, Fig. 646. *Encycl.* pl. 325, Fig. 1—4. *BI* *Kien.* pl. 30, Fig. 1. *Reeve* Fig. 48. *Sganz.* 30 Madagaskar und Mauritius, selten. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 33 Mauritius. Auch von *Caldwell* aus Mauritius erhalten.
- S A Md Conus (Leptoconus) generalis var. Maldivus Hwass Martini II, Fig. 645—648. *M* *Encycl.* pl. 325, Fig. 5, 6. *Kien.* pl. 30, Fig. 1b. *Reeve* Fig. 185. *Dufo* 175 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar und Mauritius. *Lien.* 33 Mauritius.
- M I *Conus (Leptoconus) monile Hwass. Chemnitz X, Fig. 1301—1303. *Encycl.* pl. 325, Fig. 7—9. *Kien.* pl. 31, Fig. 1. *Reeve* Fig. 61. *Lien.* 34 Mauritius. Bei Fouquets von Prof. Möbius gesammelt.
- M † Conus (Leptoconus) Macarae *Bernardi* Journ. de Conch. VI, 1857, pl. 11, Fig. 2 Mauritius. *Sowerby* thesaurus conch. III, Fig. 677. *Weinkauff* Taf. 44, Fig. 10, 11.
- M B † Conus (Leptoconus) spirogloxus *Desh.* moll. de Reunion p. 135, pl. 13, Fig. 13, 14. *Sow.* thes. III, pl. 287, Fig. 626 Bourbon. *Lien.* 35 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten. Der Name von γλωξ, Granne, Spitze.
- M. Paulucci erklärt diese Art geradezu für den Jugendzustand von *C. generalis*, Journ. de Conch. XXV, p. 274; nach den mir vorliegenden Exemplaren könnte es nur derjenige von *C. monile* sein, da dieser, nicht aber *generalis*, Grübchen an der Nath der obern Windungen zeigt, wie *spirogloxus*, und auch die Färbung besser zusammenstimmt.
- M I Conus (Leptoconus) splendidulus *Sow.* *Kien.* pl. 35, Fig. 2. *Reeve* Fig. 40. *Lien.* 38 Mauritius.
- A M I Conus (Leptoconus) varius L. Martini II, Fig. 639. *Favanne* II, p. 562, pl. 16, Fig. E3. Chemnitz X, Fig. 1284. *Kien.* pl. 7, Fig. 3. *Reeve* Fig. 58. *Dufo* 175 Amiranten. *Lien.* 36 Mauritius.
- M † Conus (Leptoconus) Hwassii *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1853 Mauritius. *Weinkauff* Taf. 42, Fig. 6. *C. varius* var. *Reeve* Fig. 58b. *C. pulchellus* *Sow.* Proc. Zool. Soc. 1834, conchol. illustr. Fig. 61. (non Swains.) *Lien.* 33. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- M S A f Conus (Leptoconus) plumbeus *Reeve* Fig. 253. *Weinkauff* Taf. 42, Fig. 2, 3. *Lien.* 35 Mauritius. Sonst aus Südafrika.
- M ? I Conus (Leptoconus) ammiralis L. var. granulata. *Kien.* pl. 21, Fig. 1d. *Reeve* Fig. 11a. *C. archithalassus* *Dillwyn*, *Sow.* thes. III, Fig. 24, 25 Mauritius. *Lien.* 31 Mauritius.
- S † Conus (Leptoconus) Keati *Sow.* thesaur. conch. III, Fig. 479 Seychellen, *W. Keate*.

Weinkauff Taf. 32, Fig. 13, 14. *Lien.* 76 Seychellen. Wohl nur Abart von *Conus inscriptus* Reeve aus dem Rothen Meer.

- MI *Conus* (*Rhizoconus*) *coffea* Gmelin Martini II, Fig. 618. *C. fumigatus* Hwass. Encycl. pl. 337, Fig. 7. Kien. pl. 50, Fig. 2. Reeve Fig. 135. *Lien.* 32 Maur., einschliesslich der Abart *C. incarnatus* Sow. thes. III, suppl., Fig. 616.
- MdRAf *Conus* (*Rhizoconus*) *classarius* Hwass. Chemn. X, Fig. 1786, 1787. Encycl. pl. 335, Fig. 7. Reeve Fig. 180. Nur von *Sganz.* 30 für Madagaskar aufgeführt, aber wenig zweifelhaft, da er hauptsächlich im Rothen Meere vorkommt.
- SAM *Conus* (*Rhizoconus*) *rattus* Encycl. p. 338, Fig. 7. Chemn. XI, 1764, 1765. Kien. B Af I pl. 44, Fig. 3. Reeve Fig. 78 (*C. Tahitensis*). *Dufo* 175 Seychellen und Amiranten, *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 35 Mauritius.
- MI *Conus* (*Rhizoconus*) *rattus* var. *Tahitensis* Hwass Encycl. pl. 336, Fig. 9. Kien. pl. 66, Fig. 4. *Lien.* 36 Mauritius.
- S? A? *Conus* (*Rhizoconus*) *pellis hyaenae* Chemn. XI, Fig. 1750, 1751. *Weinkauff* Md?R? Taf. 50, Fig. 11, 12. *C. hyaena* Reeve suppl. Fig. 275, *punctatus* Sow. thes. III, I Fig. 91, 92 Madagaskar. Vermuthlich ist diese Art von *Dufo* 172 als *C. hyaena* Lam. von Mahé und allen Amiranten gemeint. Der ächte *C. hyaena* Hwass Lam. scheint dagegen westafrikanisch zu sein.
- SMd *Conus* (*Rhizoconus*) *Nemocanus* Hwass Encycl. pl. 338, Fig. 5. Kien. pl. 35, Fig. 3 M Af I Madagaskar, Seychellen. Reeve Fig. 161 Mauritius. Sow. thes. III, Fig. 152, 153 Mauritius. *Lien.* 34. Auch von *Caldwell* und *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- SAC *Conus* (*Rhizoconus*) *capitaneus* L. Martini II, Fig. 660—662. *Favanne* pl. 15, DMR Fig. A1 von Ile de France. Encycl. pl. 327, Fig. 2. Kien. pl. 20, Fig. 2. Reeve AfIAu Fig. 54. *Dufo* 172 Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar. *Lien.* 31, 75, 103 u. 108 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- MI *Conus* (*Rhizoconus*) *capitaneus* var. *mustelinus* Hwass Encycl. pl. 327, Fig. 6. Chemn. X, Fig. 1280. Kien. pl. 20, Fig. 2. Reeve Fig. 34. *Lien.* 34 Mauritius. Auch von *Robillard* Exemplare mit 3 Bändern, wie Kien. Fig. 26 aus Mauritius erhalten.
- M† *Conus* (*Rhizoconus*) *laevigatus* Sow. thes. III, Fig. 149, 150 Mauritius. Sehr ähnlich dem vorigen.
- MB *Conus* (*Rhizoconus*) *sulfuratus* Kien. pl. 66. Fig. 3 und pl. 78, Fig. 4. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 36 Mauritius. Vielleicht nur Jugendzustand des vorigen.
- S† *Conus* *Seychellensis* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIII, 1874, p. 22 Seychellen, selten.
- SCM *Conus* (*Rhizoconus*) *vexillum* Gmelin Martini II, Fig. 629. Chemnitz XI, DI Fig. 1758, 1759. Kien. pl. 34, Fig. 1. Reeve Fig. 3. *Lien.* 36, 76, 103 u. 108 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- SAC **Conus* (*Rhizoconus*) *miles* L. Martini II, Fig. 663, 664. *Favanne* pl. 15, Fig. B MdMB Ile de France. Kien. pl. 38, Fig. 2. Reeve Fig. 9 Mauritius. *Dufo* 171 Seychellen AfIP und Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar und Ile de France. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 34, 76 und 108 Mauritius, Seychellen und Cargados.

- MBI *Conus* (*Rhizoconus*) *distans* Hwass Chemn. X, Fig. 1281. Kien. pl. 3, Fig. 1. Reeve Fig. 174. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 32 Mauritius.
- MI *Conus* (*Pionoconus*) *Janus* Hwass *Martini* II, Fig. 647 von Mauritius, nach *Spengler*. *Favanne* II, p. 684, pl. 17, Fig. O Ile de France. Kien. pl. 29, Fig. 2. Reeve Fig. 33. *Lien.* 33 Mauritius.
- CI *Conus* (*Pionoconus*) *Timorensis* Hwass *Encycl.* pl. 341, Fig. 3. Kien. pl. 75. Fig. 4. Reeve Fig. 111. Weinkauff Taf. 52, Fig. 7, 8. *Lien.* 108 Cargados.
- Md† *Conus* (*Pionoconus*) *Frauenfeldi* *Crosse* Journ. de Conch. XIII, 1865, p. 307, pl. 10, Fig. 1 Madagaskar.
- MAfI *Conus* (*Pionoconus*) *magus* L. *Martini* II, Fig. 579, 580. *Favanne* II, p. 669, pl. 17, Fig. A1. Kien. pl. 67, Fig. 1. Reeve Fig. 190c von Mauritius. *Lien.* 34 Mauritius selten.
- Conus magus* var. *carinatus* Swains Kien. pl. 27, Fig. 2. Reeve Fig. 175 von Mauritius.
- Conus magus* var. *epistomium* (non Kien.) Reeve Fig. 227 von Mauritius.
- MI *Conus* (*Pionoconus*) *spectrum* (L.) Hwass *Martini* II, Fig. 582, 583. *Favanne* II, p. 688, pl. 14, Fig. H2 Ile de France. Kien. pl. 54, Fig. 5. Reeve Fig. 80 Mauritius. *Sow.* thes. Fig. 457, 458 Mauritius.
- M† *Conus* (*Pionoconus*) *Dusaveli* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1872, p. 13, pl. 3, Fig. 17 Mauritius, von *Du Savel* gesammelt.
- Md† *Conus* (*Pionoconus*) *Kieneri* Reeve suppl. Fig. 282. *C. nesus* Kien. pl. 59, Fig. 4 Madagaskar.
- SACD **Conus* (*Chelyconus*) *catus* Hwass *Martini* II, Fig. 609, 610. Kien. pl. 43, Fig. 1
- MRI Ile de France. Reeve Fig. 79 Mauritius. *Sow.* thes. III, Fig. 277, 280 Mauritius. *Dufo* 173 Seychellen und Amiranten. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 31, 76, 103 und 108 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados. Auch von Professor Möbius gesammelt.
- SMI *Conus* (*Chelyconus*) *pertusus* Hwass *Bonanni* recr. Fig. 19. Kien. pl. 51, Fig. 2a. Reeve Fig. 25. *Lien.* 76 Seychellen.
- Conus* (*Chelyconus*) *pertusus* var. *festivus* Chemn. XI, Fig. 1770, 1771. *Conus amabilis* Lam. Reeve Fig. 57. *Lien.* 32 Mauritius. Ebendaher von *Robillard* erhalten.
- MI *Conus* (*Chelyconus*) *nucleus* Reeve suppl. Fig. 280 (von den Philippinen). *Lien.* 34 Mauritius, sehr selten.
- MIP *Conus* (*Conella*) *atramentosus* Reeve suppl. pl. 7, Fig. 265. *Lien.* 31 Mauritius.
- MIP *Conus* (*Hermes*) *glans* Hwass *Favanne* II, p. 656, pl. 17, Fig. G Ile de France. Chemn. X, Fig. 1331. Kien. pl. 80, Fig. 1. Reeve Fig. 145. *Lien.* 33 Mauritius.
- Conus* (*Hermes*) *glans* var. *tenuistriatus* *Sow.* thes. Fig. 532, 533. *Lien.* 36 Mauritius.
- MP *Conus* (*Hermes*) *tendineus* Hwass *Chemn.* X, Fig. 1330 von Mauritius. Kien. pl. 8, Fig. 2. Reeve Fig. 55 Mauritius. *Lien.* 36. (*C. violaceus* Gmelin. *Oliva fenestrata* Martyn).

- S C D *Conus (Hermes) terebra Born (terebellum Gmelin) Martini II, Fig. 577. *Favanne*
M B I II, p. 662, pl. 17, Fig. K2. Kien. pl. 32, Fig. 2. Reeve Fig. 38. *Desh.* 134
Reunion. *Lien.* 36, 76, 103 und 108 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und
Cargados. Auch von Prof. Möbius auf Mauritius gesammelt.
- S A C D Conus (Hermes) Nussatella L. Martini II, Fig. 567. *Chemn.* X, Fig. 1329. Kien.
M d M B pl. 53, Fig. 2. Reeve Fig. 56. *Dufo* 178 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30
R A f I Ile de France und Madagaskar. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 34, 76, 103 und 108
Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- M I Conus (Hermes) clavus L. Martini II, Fig. 570. *Chemn.* X, Fig. 1327. Kien. pl. 87,
Fig. 2. Reeve Fig. 194. *Lien.* 32 Mauritius.
- M ? Conus (Hermes) Cailliaudi Kien. pl. 55, Fig. 5. *Lien.* 108 Cargados.
- M d M B Conus (Hermes) mitratus Hwass *Encycl.* pl. 342, Fig. 4. Kien. pl. 88, Fig. 7.
I Reeve Fig. 100. *Sganz.* 30 Ile de France und Madagaskar. *Desh.* 134 Reunion.
Lien. 34, 35 (pupaeformis) Mauritius.
- M I Conus (Hermes) cylindraceus Brod. et Sow. Kien. pl. 65, Fig. 2. Reeve Fig. 84.
Weinkauff Taf. 46, Fig. 9. *Lien.* 32 Mauritius.
- S A M Conus (Textilia) aulicus L. *Favanne* II, p. 647 und 650, pl. 18, Fig. C3 und 7
R A I Ile de France. *Chemn.* X, Fig. 1328 von Mauritius. *Encycl.* pl. 343, Fig. 43.
Kien. pl. 53, Fig. 1. Reeve Fig. 134 von Mauritius. *Dufo* 176 Seychellen und
Amiranten. *Lien.* 31 Mauritius.
- Conus (T.) aulicus var. auratus Hwass *Encycl.* pl. 343, Fig. 1. Kien. pl. 86,
Fig. 2. Reeve Fig. 141 von Mauritius. *Lien.* 31 Mauritius, sehr selten.
- A M R Conus (Textilia) episcopus Hwass *Martini* II, Fig. 595 von Mauritius. *Encycl.*
A f I pl. 345, Fig. 2. Kien. pl. 91, Fig. 1. Reeve Fig. 189. *Dufo* 177 Alphonse (Ami-
ranten). *Lien.* 32 Mauritius.
- A C A f I Conus (Textilia) omaria Hwass *Martini* II, Fig. 592. *Favanne* pl. 18, Fig. C5 von
Madagaskar. *Encycl.* pl. 344, Fig. 3. Kien. pl. 79, Fig. 1. Reeve Fig. 177c—e.
Dufo 177 Alphonse (Amiranten). *Lien.* 108 Cargados.
- M d M † Conus (Textilia) Madagascariensis Sow. *thesaur. conch.* III, Fig. 582 Madagaskar.
Lien. 33 Mauritius.
- M d M ? Conus (Textilia) rubiginosus Hwass *Martini* II, Fig. 593, 594. *Encycl.* pl. 344,
Fig. 1, 2. Kien. pl. 82, Fig. 1. *Sganz.* 30 Madagaskar. *Lien.* 35 Mauritius.
- Diese und die 3 vorhergehenden sind sehr nahe unter sich verwandt und kaum als Arten von
einander zu trennen.
- M I Conus (Textilia) pennaceus Born *Encycl.* pl. 344, Fig. 4. Kien. pl. 89, Fig. 2.
Lien. 34 Mauritius. Hierher vielleicht auch *Lister* pl. 788, Fig. 40 von Maur.
- M A f Conus (Textilia) colubrinus Lam. Kien. 82, Fig. 3 Weinkauff Taf. 35, Fig. 6, 7.
Lien. 32 Mauritius.
- S A C Conus (Textilia) textile L. *Martini* II, Fig. 598. *Bernardin de St. Pierre* 106 drap
M d M B d'or. *Favanne* II, p. 634 und 637, pl. 18, Fig. B3 und 5 Ile de France. Kien.
A f I A u pl. 90. Reeve f. 209. *Dufo* 177 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 30 Madagaskar

- und Ile de France. *Desh.* 134 Reunion. *Lien.* 36, 76, 103 und 108 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- Conus (Textilia) textile var. telatus Reeve suppl. Fig. 270. *Lien.* 36 Mauritius.
- Conus (Textilia) textile var. tigrinus Sow. thes. Fig. 569 Madagaskar. *Lien.* 36 und 76 Mauritius und Seychellen.
- Conus (Textilia) textile var. vicarius Lam. Martini II, Fig. 599. *Reeve* Fig. 210 von Mauritius.
- *Conus (Textilia) textile var. verriculum Reeve Fig. 208. Kien. pl. 95, Fig. 2. Weinkauff Taf. 39, Fig. 3, 4. *Lien.* 35 und 108 Mauritius und Cargados. Bei Fouquets von Prof. Möbius gesammelt.
- Conus (Textilia) textile var. scriptus Sow. thes. Fig. 563. *Lien.* 35 und 108 Mauritius und Cargados.
- Md MI Conus abbas Hwass. *Chemn.* X, Fig. 1326 b und c von Mauritius. Kien. pl. 86, Fig. 1. *Reeve* Fig. 162. *Sow.* thesaur. III, Fig. 575 Madagaskar. *Lien.* 31 Mauritius.
- *Conus abbas var. archiepiscopus Hwass *Encycl.* pl. 346, Fig. 7. *Reeve* Fig. 223. *Lien.* 31 Mauritius, Black river-bay Möbius.
- SACI Conus (Textilia) canonicus Hwass *Encycl.* p. 345, Fig. 1. Kien. pl. 95, Fig. 1. Weinkauff Taf. 53, Fig. 7—9. *Dufo* 177 Seychellen und Amiranten. Cargados, Robillard.
- Md? M Conus (Textilia) pyramidalis Lam. Kien. pl. 85, Fig. 2. *Sow.* thes. III, Fig. 579 Madagaskar? Weinkauff Taf. 39, Fig. 5. *Lien.* 35 Mauritius.
- MI Conus (Textilia) retifer Menke, solidus Sow. Kien. pl. 54, Fig. 1. *Reeve* Fig. 23. Weinkauff Taf. 39, Fig. 7, 8. *Lien.* 35 Mauritius.
- SAC Conus (Nubecula) gubernator Hwass *Encycl.* pl. 340, Fig. 4, 6. Kien. pl. 48, Fig. 1. *Reeve* Fig. 59. *Dufo* 171 Seychellen und Amiranten. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 33, 76 und 108 Mauritius, Seychellen, Cargados. Von Nossi-Be (Madagaskar) durch Robillard erhalten.
- M† Conus (Nubecula) terminus Lam. *Reeve* Fig. 39 von Mauritius.
- SCRM Conus (Nubecula) striatus L. Martini II, Fig. 715, 716. *Favanne* II, p. 666, Fig. N
- BR Af Ile de France. *Encycl.* pl. 340, Fig. 1, 2. Kien. pl. 47, Fig. 1. *Reeve* Fig. 179.
- IAustr *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 36, 76, 103 und 108 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados.
- M† Conus (Nubecula) Julii *Lienard* Journ. de Conch. 1871, p. 71. pl. 1, Fig. 6 Maur. C. floccatus var. Kien. pl. 106, Fig. 3. *Lien.* 32, 33 Mauritius „trouvé pour la première fois sur l'îlot après le raz-de-marée qui a formé l'îlot“.
- SMIP Conus (Nubecula) bullatus L. *Chemn.* X, Fig. 1315, 1316. Kien. pl. 58, Fig. 2. *Reeve* Fig. 95. *Lien.* 31 und 75 Mauritius, sehr selten, und Seychellen.
- SMB Conus (Nubecula) tulipa L. Martini II, Fig. 718—722. *Favanne* II, p. 719, pl. 19, Fig. L2. *Encycl.* pl. 322, Fig. 11. Kien. pl. 12, Fig. 2. *Reeve* Fig. 128. *Pease* Am. Journ. Conchyl. IV, p. 125. *Dufo* 178 Mahé. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 36 Mauritius.

- MI Conus (Nubecula) obscurus Reeve Fig. 82. Kien. pl. 68, Fig. 1. Weink. Taf. 59, Fig. 7, 8. *Lien.* 34 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
Wenig vom vorigen verschieden.
- SAMB *Conus (Nubecula) geographus L. *Lister* hist. conch. tab. 747. Fig. 41 von Mauritius.
Af I Martini II, Fig. 717. Favanne II, p. 715, pl. 19, Fig. L1. Encycl. pl. 322, Fig. 12. Kien. pl. 12, Fig. 1. *Reeve* Fig. 130 von Mauritius. *Sow.* thes. III, Fig. 560 Mauritius. Martens in v. d. Decken's Reise III, Taf. 3, Fig. 1. *Dufo* 178 Seychellen und Amiranten. Desh. 133 Reunion. *Lien.* 33 und 76 Mauritius und Seychellen.
Auch von Professor *Möbius* von den Seychellen mitgebracht, ein Exemplar 114 mm lang.
- MB† Conus (Nubecula) Borbonicus H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868 Bourbon. *Lien.* 31 Mauritius. Auch von *Robillard* daher erhalten.
Lienard führt ferner noch *C. pontificalis* und *puncturatus*, beide australisch, für Mauritius, *C. Mindanus*, trotz seines Namens eine westindische Art, für die Seychellen und *Dufo* auch den westindischen *C. nebulosus* für die Amiranten an. Ebenso giebt Favanne einige entschieden westindische auch von Ile de France an.
- MIP Pleurotoma Babylonia L. Chemn. IV, 1331, 1332. *Quoy et Gaim.* Voy. Astrol. pl. 35, Fig. 4—7 lebendes Thier. Kien. pl. 1, Fig. 1. *Reeve* I, Fig. 5. Weink. Taf. 1, Fig. 5. *Lien.* 4 Mauritius.
- SR *Pleurotoma Jickelii Weinkauff Taf. 4, Fig. 2 St. Anne, auf den Seychellen, 5 Faden tief, Prof. *Möbius*.
- SMdM *Pleurotoma tigrina Lam. Encycl. pl. 439, Fig. 6. Kien. pl. 8, Fig. 1 Madagaskar.
I *Reeve* Fig. 3. Weink. Taf. 2, Fig. 5—7. *Lien.* 4 Mauritius. Von Prof. *Möbius* bei Mahé, Seychellen, gesammelt.
- MI Pleurotoma spectabilis Reeve Fig. 6 Philippinen. Nach *Lien.* 4 auch auf Maur.
- MI Pleurotoma abbreviata Lam. *Reeve* Fig. 86. Weinkauff Taf. 11, Fig. 2. *Lien.* 3 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* auf Mauritius gesammelt.
- SMdM Pleurotoma cingulifera Lam. Kien. pl. 17, Fig. 1 Madagaskar. *Reeve* Fig. 1.
- R Af I Weinkauff Taf. 2, Fig. 8, 9. *Dufo* 48 Mahé an Felsen, 3—4 m tief. *Lien.* 4 Mauritius.
- M?I *Pleurotoma (Surcula) tuberculata Gray *Reeve* Fig. 72. Weinkauff Taf. 9, Fig. 1—3. Von Prof. *Möbius* mitgebracht, ohne nähere Fundortsangabe.
- MI *Pleurotoma (Drillia) varicosa *Reeve* Fig. 141 von den Philippinen. Weinkauff Taf. 18, Fig. 6 und 11 Mauritius, Prof. *Möbius*.
- MP Pleurotoma (Drillia) lauta Pease Am. Journ. Conch. 1867, p. 220, pl. 15, Fig. 18 Mauritius, von *Robillard* erhalten.
- M?I Pleurotoma (Drillia) albovirgulata Souverbie Journ. de Conch. VIII, 1860, p. 125, pl. 2, Fig. 12 von Neu-Caledonien. Nach *Lien.* 4 auch auf Mauritius.
- M†? *Pleurotoma (Clavus) exasperata *Reeve* Fig. 8. Weink. Taf. 12, Fig. 1 und 3 Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

Vielleicht ist das auch die angebliche echinate (Lam.) bei *Lienard* 4 von Mauritius. Beide Arten sind einander sehr ähnlich und die letztere ist mir nicht von Ostafrika vorgekommen.

- MB† *Pleurotoma (Clavus) mediocris* Desh. Moll. de Reunion p. 108, pl. 12, Fig. 11.
Lien. 4 Mauritius.
- MAf *Pleurotoma (Clavus) zebra* Brug. Lam. *Kien.* pl. 23, Fig. 3. *Reeve* Fig. 135 von Mauritius. *Lien.* 4 Mauritius.
- M† **Pleurotoma (Crassispira) Barklyensis* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1869, p. 272, pl. 19, Fig. 3 Barkly island, Mauritius. *Weinkauff* Taf. 18, Fig. 1—4 (schlecht).
Lien. 4 Mauritius, auch von Prof. *Möbius* erhalten.
- MdM *Pleurotoma cincta* Lam. ed. 2, IX, p. 347 Ile de France. *Kien.* pl. 19, Fig. 2. *Weinkauff* Taf. 9, Fig. 7, 8. *Sganz.* 24 Mauritius und Madagaskar, ziemlich selten.
Lien. 4 Mauritius.
- MI *Pleurotoma (Crassispira) bijubata* *Reeve* Fig. 87. *Weinkauff* Taf. 9, Fig. 10 u. 11.
Lien. 4 Mauritius. Auch von *Caldwell* und *Robillard* erhalten.
- MP *Clathurella rubida* Hinds Voy. Sulfur. moll. pl. 6, Fig. 6. *Reeve* *Pleurot.* Fig. 220.
Pleur. angulata *Kien.* pl. 26, Fig. 4 aus Mauritius von *Robillard* erhalten. *Cl. roseotincta* (Montrouzier Journ. de Conch. XXI, 1873, pl. 4, Fig. 1 von Neu-Caledonien) *Lien.* 5 Mauritius ist wohl dieselbe.
- M† **Clathurella rufinodis* n. sp. Taf. 20, Fig. 2.
Testa elongata, nodoso-clathrata, alba, nodis plerisque rufo-aurantiis, anfr. $6\frac{1}{2}$, superiores convexi, tribus nodorum seriebus cincti, sutura sat profunda, ultimus oblongus seriebus 6; apertura dimidiam longitudinem non aequans; margo externus incrassatus, intus sulcatus, superne prope insertionem sinu distincto rotundato instructus; margo columellaris perpendicularis. laevis; canalis brevis, rectus, apertus, extus seriebus nodorum minorum obliquis 2—3 cinctus.
Long. $6\frac{1}{2}$, diam. $2\frac{1}{3}$, apert. long. vix. 3, lat. 1 mm.
Mauritius, *Möbius* und *Robillard*.
- MB† *Clathurella claudestina* Desh. moll. de Reunion p. 110, pl. 12, Fig. 15, 16 Reunion.
Lien. 5 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MBI **Clathurella scalarina* Desh. ibid. p. 109, pl. 12, Fig. 12—14. *Nevill* Journ. As. Soc. Bengal. XLIV, 1875, p. 86, 87 Mauritius, Bourbon und Ceilon. Auch auf Mauritius von Prof. *Möbius* gefunden.
- MBIP **Clathurella rugosa* Mighels (Proc. Bost. Soc. n. h. 1845, p. 23. *Martens* Südsee-Conchylien Taf. 1, Fig. 5) var. *fallax* *Nevill* loc. cit. p. 87 Mauritius, Bourbon und Ceilon.
- M† *Clathurella Robillardii* *Barclay* mscr. H. Adams Proc. Zool. Soc. 1869, p. 272, pl. 19, Fig. 2 Barkly island, Mauritius. *Lien.* 5. Von *Robillard* erhalten.
- MB† *Clathurella alba* Desh. loc. cit. p. 110, pl. 12, Fig. 17, 18. *Lien.* 5 Mauritius.
- MI *Clathurella lemniscata* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIV, 1875, p. 92, pl. 7, Fig. 11 Mauritius, Ceilon.
- M† *Clathurella exquisita* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIV, 1875, p. 87 Mauritius.
- MB(I) *Clathurella*(?) *Reeveana* Desh. moll. de Reunion p. 106, pl. 12, Fig. 5—7. *Nevill* Journ. As. Soc. XLIV, 1875, p. 88 Mauritius und Andamanen.

- MB† *Mangelia*(?) *cyclophora* *Desh.* moll. de Reunion p. 111, pl. 12. Fig. 19, 21. *Nevill* loc. cit. p. 88 Mauritius.
- MP *Daphnella* *Cumingi* *Powis* (*Buccinum*) *Reeve* I, *Pleurotoma* Fig. 110 (von der Südsee). *Lien.* 4 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MP **Daphnella* *nitida* *Kiener* (*Pleurotoma*) p. 66, pl. 22, Fig. 4 Ile de France; *Reeve* conch. ic. I, Fig. 130 und *Columbella* *Marquesa* *Gaskoin*, *Reeve* conch. ic. XI, Fig. 217 von den Marquesas-Inseln, *Martens* *Don.* Bismark. S. 22. — Unsere Taf. 20, Fig. 3, 4.

Testa oblongo-turrita. sublaevis, pallide flavescenz, maculis fulvis albidisque et saepius lineis spiralibus fuscis variegata; spira attenuata, anfr. 8, primus et secundus laeves, subglobosi, pallide cinerei, tertius, quartus et quintus rosei, confertim verticaliter costulati, sequentes nitidi, levissime striatuli, sutura superficiali, ultimus antice paulum ascendens, basi spiratim striatus; apertura dimidiam testae longitudinem subaequans, lanceolata, margine externo incrassato, inflexo, superne distincte et sat profunde sinuato, margine columellari laevi, reflexo, distincte terminato, canali brevi, aperto.

Long. 10, diam. $4\frac{1}{2}$, ap. long. $4\frac{1}{2}$, diam. 2 mm.

Mauritius, von *Möbius* und *Robillard* gesammelt.

Der verdickte nach innen sich wendende Aussenrand erinnert an *Columbella*, aber die deutliche Bucht verweist sie zu den *Pleurotomiden*.

- M†? *Daphnella* *limnaeiformis* *Kiener* (*Pleurotoma*) pl. 22, Fig. 3 Ile de France.
- M† *Daphnella* *trivariata* n. sp. Taf. 20, Fig. 1.

Testa oblongo-turrita, spiratim costata et confertim lirata, pallide flavescens; anfr. 7, convexiusculi. 4 superiores costis perpendicularibus crassiusculis clathrati, quintus et sextus costis perpendicularibus evanidis, spiralibus 2 supra suturam conspicuis, ultimus costis perp. nullis, spiralibus 4—5, quintus, sextus et septimus varicibus distinctis ternis per singulos anfractus continuis insignes: apertura anguste elliptica, dimidiam testae longitudinem subaequans, margine externo leviter arcuato, subincrassato, undulato, superne leviter sinuato, margine columellari laevi, callo tenui tecto, canali brevissimo aperto.

Long. 15, diam. $6\frac{1}{2}$, apert. long. 7, lat. $2\frac{2}{3}$ mm.

Mauritius, *Robillard*, Berl. Mus. 21970.

Erinnert sehr an *Pl. lactea* *Reeve* conch. icon. I, Fig. 123 von den Philippinen, die aber keine Varicen zeigt und nach der Abbildung auch auf den letzten Windungen Vertikalsculptur hat.

- M?B† *Daphnella* *candida* *Desh.* 106 Reunion und *Lien.* 4 Mauritius.
- MB *Cithara* *gracilis* *Reeve* III, *Mangelia* Fig. 11. *Desh.* 111 Reunion. *Lien.* 5. Auch von Prof. *Möbius* bei Fouquets gesammelt.
- M† *Cithara* *amabilis* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIII, 1874, p. 23 Mauritius.
- MRI *Cithara* *Isseli* var. *Cernica* *Nevill* Beng. XLIV, 1875, p. 94 Mauritius.
- MI *Cithara* *dubiosa* *Nevill* Journ. As. Soc. ibid. p. 93 Mauritius und Andamanen.
- MBIP *Cithara*? *gemma* *Desh.* Moll. de Reunion p. 107, pl. 12, Fig. 8—10.

Diese Art hat wenig Charakteristisches und ist daher schwer zu klassifizieren, Nach *Nevill* Journ. As. Soc. Bengal. XLIV, 1875, p. 86 identisch mit *Mangelia interrupta* Reeve Fig. 16 und mit *Daphnella bella* Pease Proc. Zool. Soc. 1860, Martens Südsee-Conchyl. Taf. 1, Fig. 4, häufig auf Ceilon, auch auf Mauritius. Sie ist vielleicht zu den Columbellen zu stellen.

Die wahrscheinlich westindische *Pleurotoma virgo* Lam. wurde von Chemn. Conch. Cab. IV, Vignette p. 143, Fig. B und die westafrikanische Pl. (Genota) *mitraeformis* Wood von Wood ind. testaceologicus suppl. p. 15 Murex nro. 25 als von Mauritius stammend angeführt; beide sind seitdem unsres Wissens nicht mehr dort beobachtet worden; auch Pl. *albicostata* Sow. Reeve Fig. 62 von den Gallapagos, von *Lien.* für Mauritius angeführt, erscheint sehr zweifelhaft.

M† Lachesis? *Rissoina abnormis* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIV, 1875, p. 100, pl. 8, Fig. 23 Mauritius, im Sand.

SAMB **Terebra maculata* L. Chemn. IV, Fig. 1440. Kien. Fig. 1. Reeve Fig. 4. Eydoux
RAfI et Souleyet Voy. de la Bonite pl. 41, Fig. 31 lebendes Thier. *Dufo* 65 alle
Seychellen und Amiranten, auf weissem Sandgrund, 2½—4 m tief, 15—20 cm in
den Sand eingegraben, fleischfressend. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 28 Mauritius.
Von Prof. *Möbius* bei Fouquets gefunden.

AMI *Terebra chlorata* Lam. Kien. Fig. 8. Reeve Fig. 11. T. Knorri Gray Proc. Zool.
Soc. 1834. *Dufo* 66 Amiranten selten. *Lien.* 28 Mauritius.

MB? *Terebra tigrina* Gmelin. Chemn. IV, Fig. 1448. Kien. Fig. 4b. Reeve Fig. 8.
IP Martens Südseeconchylien S. 23. *Desh.* 132 Reunion? *Lien.* 29 Mauritius.

SAMB *Terebra lanceata* L. Chemn. IV, Fig. 1450. Kien. Fig. 22. *Dufo* 68 Alphonse
P (Amiranten). *Lien.* 28 (lanceolata) Mauritius.

Terebra lanceata var. *venosa* Hinds. Kien. Fig. 22b. Reeve Fig. 95b. Pease Am.
Journ. Conch. IV, p. 123. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 29 Mauritius.

**Terebra lanceata* var. *penicillata* Hinds. Kien. Fig. 22a. Reeve Fig. 98 Seychellen.
Möbius ebenda bei St. Anne, 5 Faden tief.

Lienard führt auch *T. hastata* (Gmel.) Kien. Fig. 23 auf, es ist das aber eine westindische Art.

SMAf **Terebra muscaria* Lam. Chem. IV, Fig. 1441. Encycl. pl. 402, Fig. 2. Kien.
I Fig. 4 (ohne die Varietäten). Reeve Fig. 9. *Dufo* 67 Mahé und Praslin, selten. *Lien.*
28 Mauritius. Von Prof. *Möbius* auch auf den Seychellen gefunden.

SAMd **Terebra dimidiata* L. Chemn. IV, Fig. 1444. Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe
MAfI pl. 36, Fig. 17, 18 (lebendes Thier). Kien. Fig. 2. Reeve 27. *Dufo* 66 Seychellen
P und Amiranten. *Lien.* 28 Mauritius. Seychellen, *Möbius*. Nossibe, *Hildebrandt*.

MRAf *Terebra duplicata* L. Chemn. IV, Fig. 1455. Kien. Fig. 26 Ile de France. Reeve
I Fig. 3. *Lien.* 28 Mauritius. — *T. Lamarckii* Kien. Fig. 19. *Lien.* 28 ist nicht
wohl davon zu trennen.

BI *Terebra nitida* Hinds. Sow. thes. Fig. 103. Reeve Fig. 115. *Desh.* 132 Reunion.

MI **Terebra livida* Reeve Fig. 116. Von Prof. *Möbius* auf Mauritius gesammelt.

Eine weisse Abänderung derselben ebenfalls aus Mauritius von Hrn. *Robillard*
erhalten.

SI *Terebra plumbea* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. moll. pl. 36, Fig. 29, 30 von den
Molukken. Reeve Fig. 111. *Dufo* 68 Praslin, sehr selten.

MIP *Terebra strigilata* L. einschliesslich *T. concinna* (Desh.) Argenville pl. 11, Fig. Q u. R.

- Martini IV, S. 235, Fig. 3. Kien. Fig. 18. Reeve Fig. 85. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 123. *Lien*, 29 Mauritius.
- MB *Terebra Matheroniana* Desh. Proc. Zool. Soc. 1859, p. 287. *Desh.* 182 Reunion. Auch aus Mauritius erhalten.
- SMdM *Terebra crenulata* L. Chemn. IV, Fig. 1445. Kien. Fig. 9. Reeve Fig. 9. Pease R Af IP Am. Journ. Conch. IV, p. 123. *Buccinum luteolum* Martin univers. Conch. pl. 93. *Dufo* 67 Seychellen. *Sganz.* 28 Madagaskar. *Lien.* 28 Mauritius.
- BI *Terebra luctuosa* Hinds Sow. thes. Fig. 121. *Desh.* 132 Reunion.
- SM Af *Terebra* (Impages) *coerulescens* Lam. *Buccinum niveum* Gmelin. Bonanni recr. IP Fig. 109. Gualtieri tab. 56, fig. C. Kien. Fig. 12, 12a, 12b. Reeve Fig. 26. Martens Südseeconchylien S. 25. *Dufo* 66 Mahé, auf Sand. *Lien.* 28 Mauritius.
- Terebra coerulescens* var. *flammulata* n. Taf. 20, Fig. 5.
Vgl. Kiener iconogr. pl. 6, Fig. 12d und Reeve conch. icon. XII, Fig. 26a.
Das vorliegende Exemplar von den Seychellen, durch Hrn. Robillard erhalten, ist viel heller als die angeführte Abbildung bei Reeve, zeigt aber doch regelmässige hellbraune Striemen, welche unmittelbar unter der obern Nath dunkler sind, dann in annähernd gleicher Intensität bis zur Peripherie oder untern Nath herablaufen, dort durch ein breites weisses Band unterbrochen sind (dem gelben bei Reeve entsprechend) und an der Basis der Schale noch einmal in grösserer Intensität auftreten, so dass sie nahezu ein zusammenhängendes braunes Basalband bilden. In Skulptur und Form nicht von der typischen *coerulescens* verschieden; wenn wir uns die Flammen mit Ausnahme des dunkleren Anfanges unter der obern Nath verschwunden denken, so erhalten wir die gewöhnliche Zeichnung der *coerulescenz*, wie bei Kiener Fig. 12a—c und Reeve 26b.
- Terebra coerulescens* var. *T. castanea* Kiener p. 19, pl. 7, Fig. 14 Ile de France.
- M(Af) *Terebra cuspidata* Hinds. Reeve Fig. 141. *Lien.* 28 Mauritius.
- SMB *Terebra* (Abretia) *cerithina* Lam. Kien. Fig. 25. Reeve Fig. 38. *Dufo* 66 Af IP Seychellen und Amiranten. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 28 Mauritius. Bei St. Anne (Seychellen) in 5 Faden von Prof. Möbius gesammelt.
- MR Af **Terebra* (Abretia) *affinis* Gray 1834. Reeve Fig. 39. • Martens Südseeconchylien IP S. 27. *T. striata* Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe pl. 36, Fig. 23, 24. *T. pertusa* var. Kien. Fig. 24b Fouquets auf Mauritius, Möbius.
- M?I *Terebra* (Abretia) *raphanula* Lam. Kien. Fig. 20. Reeve 77. *Lien.* 29 Maur.
- Md? *Terebra* (Myurella) *flammea* Lam. Chemn. IV, Fig. 1446. Kien. Fig. 10. Reeve Fig. 13. *Sganz.* 28 Madagaskar, auf Sandboden. Da sie sonst nicht aus Ostafrika angegeben wird, ist mir dieses Vorkommen noch zweifelhaft.
- SAMd *Terebra* (Myurella) *subulata* L. Kien. Fig. 6. Reeve Fig. 22. Quoy et Gaimard MRAf Voy. Astrol. pl. 36, Fig. 19, 20 (lebendes Thier). *Buccinum varium* Martyn univ. IP conch. pl. 93. *Dufo* 67 Seychellen und Amiranten häufig, auf sandig-schlammigem Boden. *Sganz.* 28 Madagaskar. *Lien.* 29 Mauritius.
- MIP *Terebra* (Myurella) *Argus* Hinds. Reeve Fig. 21. *nebulosa* Kiener 1838 (non Sow. 1825) p. 23, pl. 10, Fig. 22 Ile de France.

- MP *Terebra* (*Myurella*) *ligata* Hinds. Reeve Fig. 90. *Lien.* 28 Mauritius.
- SMI *Terebra* (*Myurella*) *oculata* Lam. Chemn. IV. Fig. 1942. Kien. Fig. 7. Reeve Fig. 18. *Buccinum ornatum* Martyn univ. conch. pl. 92. *Dufo* 67 Seychellen. *Lien.* 29 Mauritius.
- MIP *Terebra* (*Myurella*) *Babylonia* Lam. Encycl. pl. 402, Fig. 5. Kien. Fig. 35. *Lien.* 28 Mauritius.
- MAfI *Terebra* (*Myurella*) *cingulifera* Lam. Reeve Fig. 44. *Lien.* 28 Mauritius.
Terebra (*Myurella*) *cingulifera* var. *laevigata* Quoy. Reeve Fig. 108. *Lien.* 28 Mauritius.
- SAfIP **Terebra* (*Myurella*) *monile* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. zool. pl. 36, Fig. 21—23. Kien. Fig. 29. Reeve Fig. 42. *T. succinea* Hinds. Sow. thes. Fig. 40. Auf den Seychellen von Prof. *Möbius* gefunden.
- SAu? **Terebra* (*Myurella*) *pertusa* Born testac. Mus. Caes. tab. 10, Fig. 13. Gray Proc. Zool. Soc. 1834, p. 59. Reeve Fig. 20 (non Kiener). *Dufo* 67 Mahé auf reinem Sand. St. Anne (Seychellen), 5 Faden, *Möbius*.
- BP *Terebra* (*Myurella*) *funiculata* Hinds. Sow. thes. Fig. 63. Reeve Fig. 48. *Desh.* 132 Reunion.
-
- MB * *Cancellaria costifera* Sow. thes. pl. 95, Fig. 65, 66. Reeve X, Fig. 57. *Desh.* 106 Reunion. *Lien.* 45 Mauritius. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- M *Cancellaria scalarina* Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 403 Ile de France. *Kien.* pl. 5, Fig. 3. Reeve Fig. 25. *Sganz.* 24 Ile de France, an Felsen.
- M **Cancellaria scalata* Sow. Kien. pl. 7, Fig. 3. Reeve Fig. 19. Von *Möbius*, *Caldwell* und *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- MI **Cancellaria textilis* Kien. iconogr. pl. 7, Fig. 1 (Molukken). Reeve Fig. 28. Fouquets, *Möbius*.
- MdI *Cancellaria asperella* Lam. Martini I, Fig. 1136, 1137. Encycl. pl. 374, Fig. 3. Kien. pl. 3, Fig. 1. (Reeve Fig. 17?) *Sganz.* 24 Madagaskar auf Riffen, selten.
- M† *Cancellaria hystrix* Reeve Fig. 67 Mauritius.

Rhachiglossa.

Muricidae.

- MdMR *Murex crassispina* Lam. tribulus (L. part.) Reeve III, Fig. 83. *M. ternispina* (non AfIAu Lam.) Kien. pl. 8 und 9. *Bernardin St. Pierre* Voy. à l'isle de France 1773, p. 105 Bécassa. *Sganz.* 25 Madagaskar auf den Riffen, selten.
- MdAfI *Murex haustellum* L. Martini III, Fig. 1066. Kien. pl. 18, Fig. 1. Reeve Fig. 95. *Sganz.* 25 Madagaskar.
- SAMd **Murex* (*Cichoreus*) *inflatus* Lam. ramosus L. part. Martini III, Fig. 980, 981.
- MBR Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 36, Fig. 1, 2 lebendes Thier und Anatomie. Kien.
- AfIP pl. 1. Reeve Fig. 3. *Dufo* 58 alle Seychellen und Amiranten, auf Schlammgrund

- zwischen 2½ und 8 m Tiefe, wird gegessen. *Sganz.* 25 Madagaskar. *Desh.* 112 Reunion. *Lien.* 2 Mauritius, Seychellen, *Möbius*.
- BRAfI Murex (Cichoreus) anguliferus Lam. Martini III, Fig. 1030 (Kanal verstümmelt). Kien. pl. 31, Fig. 1. Reeve Fig. 43. *Desh.* 112 Reunion. Der vorhergehenden Art verwandt, namentlich auch durch den Zahn am Aussenrand, aber die Varicen viel einfacher.
- MI Morex (Cichoreus) palma-rosae Lam. Martini III, Fig. 996, 997. Kien. pl. 17 u. 18. Reeve Fig. 30. *Lien.* 2 Mauritius.
- MI Murex (Cichoreus) Sauliae Sow. conchol. illustr. Fig. 77. *Desh.* Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 607. Reeve Fig. 31. *Lien.* 2 Mauritius.
- S Murex (Cichoreus) microphyllus Lam. Encycl. pl. 415, Fig. 5. Reeve Fig. 40. *Dufö* 58 Mahé, selten.
- S?MdM Murex (Cichoreus) adustus Lam. Martini III, Fig. 990, 991. Kien. pl. 33, Fig. 1. AfIP Reeve Fig. 29. Eydoux et Souleyet Voy. de la Bonite, zool. pl. 44, Fig. 3–5. M. ramosus L. part. Purpura scabra Martyn univ. conch. pl. 113. *Sganz.* 25 Madagaskar, auf den Riffen. *Lien.* 2 Mauritius.
- Dufö* 56 hat einen M. erythrostomus, häufig auf den Seychellen und Amiranten, auf Felsengrund 1½–4 m tief; es bleibt mir zweifelhaft, ob er damit M. adustus oder vielleicht anguliferus meint.
- MR Murex (Homalacantha) rota Sow. Reeve Fig. 105. *Lien.* 2 Mauritius.
- SM? *Murex (Phyllonotus) noduliferus Sow. Reeve Fig. 150. *Lien.* 2 Mauritius und Seychellen, *Möbius*. Aus Mauritius auch von *Caldwell* erhalten.
- MRAf Murex (Phyllonotus) fiscellum Chemnitz Conch. Cab. X, Fig. 1524, 1525. Reeve I Fig. 124. *Nevill* Journ. As. Soc. Bengul. XLIV, 1875, p. 84 Mauritius. M. Lienardi *Crosse* Journ. de Conch. XXII, 1874, p. 74, pl. 3, Fig. 4 Mauritius.
- MdRI Murex (Pteronotus) triqueter Born testac. Mus. Caes. tab. 11, Fig. 1, 2. Martini III, Fig. 1038. Reeve Fig. 4. M. trigonulus Lam. Encycl. pl. 417, Fig. 4. Kien. pl. 25. *Sganz.* 25 Madagaskar, selten.
- MI Murex (Pteronotus) tripterus Born testac. Mus. Caes. tab. 10, Fig. 18, 19. M. triatlatus Kien. pl. 31, Fig. 2. *Lien.* 3 Mauritius.
- MI Murex (Pteronotus) clavus Kien. pl. 37, Fig. 2. Reeve Fig. 9 Mauritius, von *Caldwell* erhalten.
- SMIP Murex (Ocinebra) gibbus Pease (Latirus) Anc. Journ. Conch. 1867. *Nevill* Journ. As. Soc. XLIV, 1875, p. 83 Seychellen. Murex *Crossei*, *Lienard* Journ. de Conch. XXII, 1874, p. 70, pl. 1, Fig. 2 Mauritius.
- MI *Murex (?) breviculus Sow. conchol. illustr. Fig. 37. Kien. pl. 4, Fig. 2. Reeve Fig. 118 (tetragonus). E. Smith Proc. Zool. Soc. 1879, p. 806. *Lien.* 2 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* und von *Caldwell* auf Mauritius gesammelt.
- M† Murex (Ocinebra) tetragonus Sow. conch. ill. Fig. 36 (non Reeve) Mauritius, *Robillard*, nur kleine Exemplare, 10 mm lang und 6 mm breit, Mündung ohne Kanal kaum 4 mm hoch.
- M? Murex (?) fenestratus Chemnitz X, Fig. 1536, 1537. Reeve Fig. 158. *Lien.* 2 Maur.
- Lienard* erwähnt noch den südafrikanischen M. uncinarius Lam. (Capensis Sow. conch. illustr.) zweimal, S. 2 und 3 von Mauritius.

- S M Typhis. Vielleicht meint *Lienard* 2 eine Art dieser Gattung unter seinem „*Murex Cumingii* Born“, 2 Mauritius und 72 Seychellen; Born kannte noch nichts von Cuming, aber Broderip hat eine *T. Cumingi* von der Westküste Centralamerikas beschrieben.
- M R *Ricinula Maurittii Gmelin* (Buccinum). *Chemn.* IV, Fig. 1153, 1154. *Purpura fragum* Blainville *Nouv. Ann. Mus. d'hist. nat.* I, 1832, p. 204, pl. 9, Fig. 4. *Kien.* Fig. 21. Die Art ist auch im rothen Meer von Ehrenberg gefunden worden; sie hat eine gewisse Verwandtschaft mit *Purpura elata*, s. weiter unten.
- M I *Ricinula concatenata Lam.* (Murex) an. s. vert. ed. 2, IX, p. 599 Ile de France. *Purpara conc.* Blainv. loc. cit. p. 204. *Kien.* Fig. 20. Reeve III, Ric. Fig. 18. *Sganz.* 25 Ile de France, auf den Riffen, selten.
- M B I *Ricinula siderea* Reeve Fig. 14 (Philippinen). Martens vorderasiatische Conchylien S. 95, Taf. 5, Fig. 4 (vom persischen Meerbusen). *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius, von *Robillard* erhalten.
- S A M d * *Ricinula tuberculata Blainville* (Purp.). *Lister hist. conch.* pl. 954, Fig. 5 Mauritius, M B R a f Blainville. *Nouv. Ann. Mus.* I, 1832, p. 204. pl. 9, Fig. 3 Madagaskar, von *Goudot* I P A u gesammelt. *Kien.* Fig. 10. Reeve Ric. Fig. 11. Eydoux u. Sculeyet *Voy. Bonite*, moll. pl. 39, Fig. 11—13. *Purp. granulata* Duclos *Annal. d. scienc. nat.* XXVI, 1832, pl. 2, Fig. 9. *Dufo* 74 gemein auf allen Seychellen und Amiranten, auf Felsengrund, 2½ m tief. *Desh.* 114 Reunion, Fouquets, Grand Baie und Black river auf Mauritius, St. Anna auf den Seychellen, *Möbius*.
(NB. *Desh.* an. d. vert. IX, p. 116 erklärt den Namen *granulata* für älter, 1826 publicirt, es ist das aber wohl nur Verwechslung mit Band 26.)
- S A M d * *Ricinula morum* Lam. *Lister hist. conch.* pl. 954, Fig. 5 Mauritius. Martini III, M B I P Fig. 970. *Encycl.* pl. 395, Fig. 6. Quoy et Gaimard *Voy. Astrol. moll.* pl. 39, Fig. 23—28 lebendes Thier. *Kien.* Fig. 9 Ile de France. Reeve Fig. 10. Martens Südseeconch. S. 9. *Dufo* 75 Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 27 Madagaskar und Mauritius, gemein. *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 12 Mauritius. Fouquets, *Möbius*.
- M R I P *Ricinula Anaxares* Duclos loc. cit. *Kien.* Fig. 17. Reeve *Purp.* Fig. 61. Küster neue Ausg. von Chemnitz, *Purp.* Taf. 28, Fig. 12, 13. *Lien.* 12 Mauritius. Auch von Mayotte durch *Hildebrandt* erhalten.
Engina nodicostata Pease *Am. Journ. Conch.* III, 1867, p. 274, pl. 23, Fig. 8, Martens Südsee-Conchylien S. 23 ist dieser Art mindestens sehr ähnlich.
- S A B *Ricinula cancellata* Quoy et Gaimard (Purp.) *Voy. Astrol. moll.* pl. 37, Fig. 15, 16. A f I P . Pease *Am. Journ. Conch.* IV p. 117. *Purp. fenestrata* Blainville loc. cit. pl. 10, Fig. 11. *elongata* (Blainv.) Gould. *Explor. Exped.* Fig. 304. *Dufo* 76 Seychellen und Amiranten, selten. *Desh.* 114 Reunion. Auch von Mayotte durch *Hildebrandt* erhalten.
- S M d M *Ricinula undata* Chemnitz (Murex) XI, Fig. 1851, 1852. *Nevill Journ. As. Soc.* B I Bengal. XLIV, 1875, p. 83 Mauritius, Bourbon, Seychellen. *Purp. fiscellum* (non Chemnitz) Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 83. *Blainville Nouv. Ann. Mus.* I, 1832, pl. 10, Fig. 8 Madagaskar von *Goudot* erhalten. *Kien.* Fig. 12 und 12a. *Dufo* 17 Mahé, selten, 3—4 m tief. *Lien.* 11 Mauritius.
- M †? *Ricinula elongata* Blainville *ibid.* Reeve Ric. Fig. 25 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten. Der vorigen sehr nahe stehend.

- MI *Ricinula biconica* Blainville loc. cit. pl. 9, Fig. 1. Kien. Fig. 24. *Ric. bicatenata* Reeve Fig. 48. *Lien.* 12 Mauritius.
- MdMB *Ricinula muricina* Blainville loc. cit. pl. 10, Fig. 2—4. Kien. Fig. 13 und 15. Pease
RAfIP Am. Journ. Conch. IV, p. 109. Martens Südseeconchylien S. 11. Purp. Pothuani
Eyedoux und Souleyet Voy. Bonite pl. 39, Fig. 30, 31. Reeve Fig. 59b. Purp.
fiscellum var. Krauss südafrik. Moll. S. 116 von Natal nach von ihm erhaltenen
Exemplaren. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius. Nossi-Be, *Hildebrandt*.
Diese Art ist durch ihre kleinschuppige Skulptur ausgezeichnet; Purp. turbinoides Blainville,
Kien. Fig. 82, Madagaskar, und Reeve Fig. 59a, ist vielleicht nur eine Abart derselben mit sehr ver-
kürztem Gewinde.
- MI? *Ricinula squamulosa* *Desh.* Voy. de Belanger, zool. pl. 2, Fig. 6—8; an. s. vert. X,
p. 104. *Lien.* 11 Mauritius.
- B† *Ricinula leucostoma* *Desh.* Moll. de Reunion p. 116, pl. 12, Fig. 23 Reunion.
- MBP *Ricinula ochrostoma* Blainville, Kien. Fig. 29. Reeve Fig. 31. Pease Am. Journ.
Conch. IV, p. 116. Purp. nassoides var. Quoy et Gaimard Voy. Astrol., moll. pl. 38,
Fig. 10, 11. *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 12 Mauritius.
- MRI *Ricinula chrysostoma* Reeve Fig. 12 Mauritius, von *Nevill* erhalten.
- SMdM **Ricinula clathrata* Lam. Martini III, Fig. 974, 975. *Encycl.* pl. 395, Fig. 5. Kien.
BR Af Fig. 5. Reeve Fig. 9. Martens Südseeconch. S. 10. *Dufo* 73 Mahé und île aux
cerfs, auf Felsengrund mit Meerpflanzen, 3 m tief. *Sganz.* 27 Madagaskar, selten
(*R. miticula* ist Jugendzustand derselben). *Desh.* 115 Reunion. Grand Baie und
Fouquets auf Madagaskar, *Möbius*.
- SAMd **Ricinula horrida* Lam. Martini III, Fig. 972, 973. *Encycl.* pl. 395, Fig. 1. Kien.
MBR Fig. 1. Reeve Fig. 3. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 39, Fig. 1—3, lebendes
IP Thier. *Dufo* 71 Seychellen und Amiranten, 3 m tief. *Sganz.* 26 Bourbon und Mada-
gaskar. *Desh.* 115 Reunion. Von Prof. *Möbius* sowohl bei Fouquets auf Mauritius,
als auf den Seychellen gesammelt.
**Ricinula horrida* var. *R. albolabris* Blainv. loc. cit. pl. 9, Fig. 5. Kien. Fig. 2.
Dufo 73 Mahé. *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 12 Mauritius. Bei Fouquets und Grand
Baie von Prof. *Möbius* gesammelt.
- SAMd **Ricinula ricinus* L. (*Murex*) Gualtieri tab. 28, Fig. N. Martini III, Fig. 976, 977.
MAfI *R. arachnoides* Lam. *Encycl.* pl. 395, Fig. 3. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. moll.
P pl. 39, Fig. 17—19, lebendes Thier. Kien. Fig. 3. Reeve Fig. 5. *Dufo* 73
Seychellen und Amiranten. *Sganz.* 27 Madagaskar. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.
- SMdM *Ricinula digitata* Lam. dactyloides Schumacher, grossularia (Bolten) Mörch. Mar-
BI tini III, Fig. 978, 979. *Encycl.* pl. 395, Fig. 7. Kien. Fig. 6. Reeve Fig. 2.
Dufo 73 Mahé und Praslin, selten. *Sganz.* 27 Madagaskar und Mauritius, selten.
**Ricinula digitata* var. *lobata* Blainv. loc. cit. pl. 9, Fig. 7. Kien. Fig. 7. Reeve
Fig. 2b Seychellen, *Rousseau*. *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 12 Mauritius. Fouquets
auf Mauritius, *Möbius*.
- SMB **Enzina mutica* Lam. (*Ricinula*) *Encycl.* pl. 395, Fig. 2. Kien. Purp. Fig. 8 Ile de
Af France. Reeve Ric. Fig. 6. *Dufo* 77 Mahé und Praslin, an Felsen. *Sganz.* 27 île

Bourbon, bei St. Denis. *Desh.* 115. *Lien.* 12 Mauritius. Fouquets und Grand Baie auf Mauritius, *Möbius*.

Ricinula pisolina Lam. an. d. vert. ed. 2, X, p. 52 von Ile de France, *Sganz.* 27 ebendaher, ist nach Kiener Fig. 8a der Jugendzustand dieser Art.

S A Md **Enzina mendicaria* L. (Voluta) Martini II. Fig. 460, 461. *Columbella mend.* Lam.

M B R Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 40, Fig. 27, 28, lebendes Thier. *Kien.* pl. 6,

Af I P Fig. 1 Mauritius. *Ricinula mend.* Reeve Fig. 8. *Dufu* 56 Seychellen und Amiranten, an Felsen mit Meerpflanzen, 3 m tief, pflanzenfressend. *Sganz.* 28 Madagaskar. *Desh.* 131 Reunion. *Lien.* 24 Mauritius. Fouquets und Grand Baie auf Mauritius, *Möbius*.

M P *Enzina monilifera* Pease Proc. Zool. Soc. 1860, p. 142. Martens Südseeconch. S. 22 von den Sandwichinseln. Aus Mauritius durch *Robillard* erhalten.

M R **Enzina histrio* Reeve Ric. Fig. 36. Grand Baie und Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

M? **Enzina astricta* Reeve Ric. Fig. 30 (unbekannten Vaterlands), aus Mauritius von *Möbius* und *Robillard*.

Lienard's Ric. porphyrostoma 12 von Mauritius ist vielleicht dieselbe Art oder die oben genannte Ric. chrysostoma.

S A I P *Purpura hystrix* (L.?) Lam. Martini III, Fig. 974, 975. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 39, Fig. 14—16, lebendes Thier. *Kien.* Fig. 4. Reeve III, Fig. 13. Küster Purp. Taf. 33, Fig. 1. *Dufu* 75 Seychellen und Amiranten, 3 m tief, fleischfressend, sehr häufig.

Obgleich sie sonst von Keinem aus unserm Gebiet angeführt wird, erscheint diese Angabe doch nicht unwahrscheinlich, da sie im indischen Ocean sehr verbreitet ist. Sie steht gewissermassen zwischen *Purpura* und *Ricinula* in der Mitte, wie auch *Dufu* die Aehnlichkeit des Deckels mit demjenigen von *Ricinula* hervorhebt; namentlich kommt Ric. clathrata ihr nahe.

S A Md *Purpura mancinella* (L.) Lam. Martini III, Fig. 967, 968. Chemn. XI, Fig. 1847,

M 1848. Encycl. pl. 397, Fig. 3. *Kien.* Fig. 46. Reeve Fig. 2. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 38, Fig. 14—16. *Dufu* 79 Seychellen und Amiranten, ziemlich selten. *Sganz.* 27 Madagaskar, gemein. Aus Mauritius von *Robillard* erhalten.

S A Af *Purpura echinulata* Lam. *Kien.* Fig. 47. Reeve Fig. 1. Küster Taf. 17, Fig. 1 und Taf. 24a, Fig. 1, 2. Troschel Arch. f. Nat. 1852, Taf. 6, Fig. 6 (Deckel). *P. mancinelloides* Blainv. Nouv. Ann. Mus. I, 1832, pl. 11, Fig. 3. *Dufu* 78 Seychellen und Amiranten, besonders häufig auf Mahé, 3 m tief. Sehr nahe der vorhergehenden.

S A M **Purpura elata* Blainville ibid. pl. 11, Fig. 1 (1832). *Kien.* Fig. 27. Purp. Mar-

B I tiniana Anton 1839. Martini III, Fig. 971 von Mauritius. *Ricinula spectrum* Reeve Fig. 19. *Dufu* 76 Seychellen und Amiranten, ziemlich häufig. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

S A M B **Purpura armigera* Chemnitz XI, Fig. 1798, 1799. Quoy et Gaimard Voy. Astrol.,

R? I P moll. pl. 37, Fig. 17—19, lebendes Thier. *Kien.* Fig. 30 Bourbon. Reeve Fig. 27. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 109. *Dufu* 75 Mahé häufig, Amiranten selten. *Desh.* 114 Reunion. Fouquets auf Mauritius und Seychellen, *Möbius*.

Lienard erwähnt diese Art nicht, obwohl sie auch in *Robillard's* Sendungen sich findet, dagegen *P. haemastoma* 11 von Mauritius und 102 von Rodriguez. Letztere Art kommt zwar bekanntlich weit verbreitet im atlantischen Ocean vor, aber ihr Vorkommen im indischen ist mir doch noch zweifel-

haft und namentlich ist sie mir noch nicht aus Ostafrika bekannt geworden, wenn *P. consul* Chemn. davon unterschieden wird.

SAMB *Purpura hippocastanum* (L.) Lam. Martini III, Fig. 945, 946. Description de l'Egypte pl. 6, Fig. 1 (*P. Savignyi* Desh.). Quoy und Gaimard Voy. Astrol. pl. 38, Fig. 1—4, lebendes Thier. Kien. Fig. 33. Reeve Fig. 34. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 109. *Dufo* 75 Mahé, und Alphonse (Amiranten); selten. *Lien.* 11 Mauritius.

**Purpura hippocastanum* var. *intermedia* Kien. Fig. 34. Desh. an. s. vert. X, p. 100. Reeve Fig. 38. Küst. Taf. 31, Fig. 6. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 11 Maur. Fouquets und Grande Baie auf Mauritius, *Möbius*. Auch von *Robillard* erhalten.

P. distinguenda Dunker Mollusken d. Novara, Fig. 1—3 von den Nikobaren lässt sich nicht wohl davon unterscheiden. Die Färbung der Columelle variirt bei dieser Art, bald ist sie ganz dunkel mit einem weissen Streifen (*intermedia*), bald bräunlich mit helleren Stellen (*hippocast.* im engeren Sinn), bald weisslich (*Savignyi*).

SAMB **Purpura pica* Blainville Nouv. Ann. Mus. I, 1832, pl. 9, Fig. 9. *Murex hippocastanum* Af I Linne nach Hanley. *Mancinella castanea* Link. Martini III, Fig. 957, 958. Kien. Fig. 31. Reeve Fig. 36. *Dufo* 78 Seychellen und Amiranten, sehr häufig, fleischfressend. *Desh.* 114 Reunion. Grand Baie auf Mauritius, *Möbius*. Durch die erhabenen Streifen im Schlunde von den andern Arten unterschieden.

SAMdI *Purpura bufo* Lam. Kien. Fig. 60 Bourbon, Madagaskar. Küster Taf. 18, Fig. 1, 2 und Taf. 20, Fig. 3. *P. callosa* Lam. *P. tumida* Schubert und Wagner Chemn. Conch. Cab. XII, 1829, Fig. 4076, 4077. *Dufo* 78 Seychellen und Amiranten, von den Schwarzen gegessen. *Sganz.* 27 Madagaskar, häufig.

Dufo 76, 77 hat noch drei neue Arten *P. quadridentata*, *costifera* und *costastriata* von Mahé, die aber aus seinen Beschreibungen schwer wiederzuerkennen sind; sie haben alle deutliche Zähne an der Innenseite des Aussenrandes.

SR Af *Purpura* (*Jopas*) *sertum* Bruguière. Quoy et Gaimard voy. Astrol. pl. 39, Fig. 11—13, I P lebendes Thier. Kien. Fig. 96, Seychellen. Reeve Buccin. Fig. 42. Pease Am. Journ. Conch. IV, 117. Martens Südseeconchylien S. 9. *Dufo* 80, alle Seychellen und Amiranten, häufig auf Felsengrund, 1—3 m tief. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius. — *Bucc. francolinus* (*coronatum* Gmelin), ist durch Uebergänge damit verbunden. Vergl. Martens Südseeconchylien S. 9.

Vielleicht gehört hierher auch *Dufo* 68 *Buccinum Seychellarum* von Mahé.

MB(I) **Purpura* (*Vexillia*) *vexillum* Chemn. X, Fig. 1504, 1505. Kien. Cassidaria Fig. 6. Reeve Bucc. Fig. 79. Küster Bucc. Taf. 11, Fig. 3, 4. *V. picta* Swains. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

MBP **Purpura* (*Vexillia*) *taeniata* Powis Proc. Zool. Soc. 1835. Reeve Bucc. Fig. 78. Martens Südseeconchylien S. 9. *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius, parasitisch an langstachligen Seeigeln. Fouquets, *Möbius*. Exemplare aus der Südsee, Baker's island, von Pease erhalten, sind übereinstimmend.

SMd *Purpura* (*Microtoma*) *Rudolphi* Lam. Chem. X, Fig. 1467, 1468. Kien. Fig. 68. Af I Reeve Fig. 10. *Dufo* 79 Mahé, selten. *Sganz.* 27 Madagaskar, selten.

SMdM **Purpura* (*Microtoma*) *Persica* L. Martini III, Fig. 760. Encycl. pl. 397, Fig. 1. BR?Au Kien. Fig. 67. Reeve Fig. 8. *Bernardin St. Pierre* voy. à l'isle de France 1773, p. 105, Conque Persique. *Dufo* 79 Mahé, häufig, gegessen. *Sganz.* 27 Ile de France

und Madagaskar, häufig. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 11 Mauritius, 73 Seychellen und 102 Rodriguez. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

B† *Purpura* (*Microtoma*) *variabilis* *Desh.* moll. de Reunion p. 115, pl. 12, Fig. 22.

Desh. führt ebenda S. 114 auch *P. patula* Lam. von Reunion auf; diese Art ist mir nicht aus dem indischen Ocean, sondern nur von beiden Küsten Amerika's bekannt; *Lienard* 10 *P. cataracta* (Chemn.) und *cingulata* (L., *trochlea* Brug., Lam.) von Mauritius, beides sonst auf Südafrika beschränkte Arten, für deren Vorkommen an einer so viel besuchten Insel wie Mauritius diese einzige Angabe kaum genügt.

M† *Coralliophila coronata* *Barclay* mscr. *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 272, pl. 19, Fig. 4. Barkly island bei Mauritius.

Erinnert noch sehr an *Murex*, verbindet die Coralliophiden untrennbar mit *Cuma Swains.* 1840, wovon wiederum *Rapana Schumacher*, typ. bezoar L., nicht getrennt bleiben kann.

M† *Coralliophila Barclayana* *H. Adams* Proc. Zool. Soc. 1873, p. 205, pl. 23, Fig. 1, Mauritius, Als „*Murex alocatus*“ von *Robillard* erhalten.

MIP **Coralliophila costularis* Lam. (*Murex*) *Encycl.* pl. 419, Fig. 8. *Blainville* *Nouv. Ann. Mus.* I, 1832. *Purpura* pl. 11, Fig. 9. *Philippi* Abbildungen *Fusus* Taf. 4, Fig. 7. *Reeve* III, *Purp.* Fig. 63. *Reeve* *Am. Journ. Conch.* IV, p. 114. *Purp. nympha* *Duclos.* *Annal. sciens. nat.* XVI, 1832, pl. 1, Fig. 3. *Lien.* 14 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*. Von *Robillard* erhielt das Berliner Museum neben den typischen Exemplaren aus Mauritius auch solche mit einer wirklichen Kante im obern Theil jeder Windung.

MP **Coralliophila deformis* Lam. (*Pyrula*) an. s. vert. ed. 2, IX, p. 520. *Martini* III, Fig. 954, 955 (*plicata* *Mörch.*) *Encycl.* pl. 436, Fig. 2. *Pease* *Am. Journ. Conch.* IV, p. 115, Fig. 56a. *Purp. abbreviata* var. *difformis* (*vix* Lam., non Kien.) *Reeve* Fig. 75. *Purp. galea* var. *Küster* Taf. 29, Fig. 8. *Rhizochilus exaratus* *Pease* Proc. Zool. Soc. 1860. *Desh.* 115 *Purp. exarata*, Reunion. *Lien.* 11 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

M? *Coralliophila clathrata* A. Adams (*Rhizochilus*). *Lien.* 12 Mauritius. Mir nicht näher bekannt.

SAMd **Coralliophila neritoidea* *Chemnitz* (*Murex*) X, Fig. 1577, 1578. *Encycl.* pl. 435, MBIP Fig. 2. *Pyrula ner.* Lam. *Purpura ner.* *Quoy et Gaimard* *Vog. Astrol., moll.* pl. 38, Fig. 22—24. *Purp. diversiformis* *Kien.* *Purp.* Fig. 37. *Reeve* *Purp.* Fig. 68 *squamulosa* und 70 *violacea*. *Küster* Taf. 29, Fig. 11 und 12. *Pease* *Am. Journ. Conch.* IV, p. 113. *Dufo* 80 Seychellen und Amiranten in der Brandung, besonders da, wo Meerpflanzen den Boden bedecken, 2—3 m tief. *Sganz.* 25 Mauritius und Madagaskar, an den Riffen. *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 13 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

Diese Art variirt sowohl in der Form, in dem das Gewinde mehr oder weniger verkürzt und die letzte Windung kantig oder abgerundet ist, als auch in der Skulptur, bald etwas rauhschuppig, bald glatt, wie polirt.

MBR **Coralliophila madreporarum* Sow. genera of shells, *Purpura* Fig. 2 (1832). *Reeve* IP Fig. 69. *Voyage au pole sud*, moll. pl. 22, Fig. 34, 35. *Purp. monodonta* *Quoy et Gaimard* *Voy. Astrol.* II, p. 561, pl. 37, Fig. 9—11. *Kien.* Fig. 50. *Küster* Taf. 29, Fig. 13—15. *Voy. au pole sud*, moll. pl. 22, Fig. 32, 33. *Pease* *Am.*

Journ. Conchyl. IV, p. 109 (mit Bemerkungen über die Weichtheile und Altersverschiedenheiten). *Desh.* 115 Reunion. *Lien.* 12 Mauritius. Balch island und Fouquets, *Möbius*.

- MB I **Rapella papyracea* Lam. (*Pyrula*) *Bulla rapa* L. Martini III, Fig. 747—749. Encycl. pl. 436, Fig. 1. Kien. Pyr. pl. 14, Fig. 1—3. Reeve Fig. 21. *Sganz.* 25 Bourbon. *Lien.* 25 (*Ficus pap.*) Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

Variirt in der Skulptur, die obere Hälfte bald glatt, bald ebenso spiral gerippt wie die untere, in der Farbe, weiss gelb oder röthlich, in dem Vorhandensein eines Nabels und in der Länge und Richtung des Kanals; *Ficula caudata* Swains malacol. und *Pyrula incurva* Dunker novital. conchol. dürften nur individuelle Variationen sein.

- MB † *Leptoconchus Cuvieri* *Desh.* moll. de Réunion p. 128, pl. 13, Fig. 6, 7 Reunion. *Reeve* XVIII, *Magilus* Fig. 4. *Lien.* 13 Mauritius. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.

- SMBR **Leptoconchus striatus* *Rüppell* Trans. zool. Soc. I, 1834, pl. 35 (anat.). *Desh.* loc. cit. p. 117—124, pl. 14 (anat.) Reunion. *Reeve* Fig. 6 Mauritius. *Lien.* 13 *Magilus Peroni* (Lam.) Chenu illustr. pl. 1, Fig. 5, 6. Prof. *Möbius* beobachtete diese Art bei Fouquets auf Mauritius, sowie auf den Seychellen, in Korallen aus den Gruppen der Maeandrinen und Astraeen und hat darüber folgende Notizen gemacht, vgl. Taf. 21, Fig. 1: Die Höhle in der Koralle ist so gross, dass sich die Schnecke darin frei bewegen kann. Ein Kanal führt nach der Oberfläche der Koralle. Es befinden 1, 2 oder 3 Exemplare in derselben Koralle. Waren mehrere Exemplare darin, so pflegten deren Höhlungen zu kommunizieren.

Der Fuss kann sich sehr ausdehnen, mittelst desselben setzt sich die Schnecke so fest an die Wand ihrer Höhle, dass sie schwer abzuziehen ist.

Kopf flach, Fühler konisch fadenförmig.

Augen aussen an der Basis der Fühler.

Der Siphon kann sich so weit ausdehnen, dass er ebenso lang wird wie Kopf und Fühler zusammen sind.

Fast alle Exemplare, welche er in der zweiten Hälfte des Novembers 1874 bei Ile aux Fouquets aus Korallen herausmeisselte, trugen Brutkapseln in ihrer Mantelhöhle. Aus einem zog er 9 Brutkapseln mit bräunlichen Embryonen hervor. Die Brutkapseln sind flache Säcke, welche sich bikonvex ausdehnen, wenn die Embryonen schwimmfähig sind (Fig. 1b).

- MB † *Leptoconchus Rüppelli* *Desh.* loc. cit. p. 126, pl. 13, Fig. 4, 5 Reunion. *Reeve* Fig. 11. Auch aus Mauritius von *Robillard* erhalten.

- MB † **Leptoconchus Cumingi* *Desh.* loc. cit. p. 125, pl. 12, Fig. 26, 27 Reunion. *Reeve* Fig. 2. *Lien.* 13 Maur. *Magilus Peroni* var. Chenu illustr. pl. 1, Fig. 7. Fouquets auf Mauritius in Millepora, Prof. *Möbius*, Taf. 21, Fig. 2: Kopf flach, Fühler konisch fadenförmig, über doppelt so lang als der Kopf breit ist. Augen aussen an der dickeren Basis der Fühler. Die Basis der Fühler durchscheinend bläulich, das fadenförmige Ende gelblich. Der Siphon ist rinnenförmig, bläulich weiss. Der Fuss ist lang ausdehnbar, gelblich weiss; vorn mit zwei dreieckigen Lappen, wenn er ganz ausgedehnt ist.

- MB† **Leptoconchus Lamarcki* Desh. loc. cit. p. 127, pl. 12, Fig. 1—3. Reeve Fig. 14. *Lien.* 13 Mauritius. Auch von Möbius und Robillard in Mauritius gefunden.
- M† *Leptoconchus costatus* Chenu (Magilus) illustr. conchyl. 1843—1845, pl. 1, Fig. 9. *Coralliobia fimbriata* A. Adams. L. Robillardi *Lienard* Journ. de Conchyl. XVIII, 1870, p. 305 Mauritius. Nevill Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal XXXIX, 1871, p. 5, pl. 1, Fig. 1. Reeve Mag. Fig. 13. Von Caldwell und Robillard aus Mauritius erhalten.
- B† *Leptoconchus Maillardi* Desh. loc. cit. p. 124, pl. 12, Fig. 28, 29 Reunion. Reeve Fig. 16.
- MBR *Magilus antiquus* Montfort conch. syst. II, p. 43. Davila catal. III, pl. 2, Fig. B1. Rüppell Mom. de la soc. d'hist. nat. de Strasbourg I. Carus Museum Senckenbergianum II, 1837. Chenu illustr. conchyl. pl. 1, Fig. 1, 2 und pl. 2. Reeve XVIII, Fig. 1 Bourbon. Sgan. 4 Ile de France. Desh. 117 Reunion. *Lien.* 13 Mauritius.
- Sgan.* erwähnt ebenda unausgewachsener Exemplare von St. Marie, Madagaskar, an Turbo und Trochus anhängend. Es muss dahin gestellt bleiben, ob das vielleicht *Leptoconchus* oder was sonst gewesen.

Buccinidae.

- SAAfI *Turbinella Ceramica* L. Martini III, Fig. 943. Kien. pl. 11, Fig. 1. Reeve Fig. 46. *Dufo* 46 Mahé und Alphonse, selten.
- SAMB **Turbinella cornigera* Lam. *Voluta turbinellus* L. Martini III, Fig. 944. Chemn. XI, R Af I Fig. 1725, 1726. Quoy et Gaimard Vog. Astrol., moll. pl. 33, Fig. 24—26, lebendes Thier, kopirt bei Kien. pl. 1. Reeve Fig. 40. *Dufo* 50, alle Seychellen und Amiranten, auf Felsengrund, 1½—3 m tief. Desh. 112 Reunion. *Lien.* 15 Mauritius und 74 Seychellen. Mauritius und Seychellen, Prof. Möbius.
- Md I *Turbinella scolymus* Gmelin. Chemn. IV, Fig. 1325. Encycl. pl. 431 bis Fig. 2. Kien. pl. 2, Fig. 3. Reeve Fig. 4. Nur von Sgan. 24 angeführt, aber nach ihm gemein auf den Riffen Madagaskar's.
- S? Md? *Heimifusus pugilinus* Born. (Murex). Chemn. IV, Fig. 1323, 1324. *Pyrula vespertilio* I Lam. Encycl. pl. 434, Fig. 3. Kien. pl. 5, Fig. 1. Reeve Fig. 1. Eydoux und Souleyet Voy. de la Bonite, moll. pl. 42, Fig. 7—12, lebendes Thier. Aus unserm Gebiet nur von Sgan. 24 aus Madagaskar, an Riffen, selten, erwähnt.
- Diese Art ist meines Wissens auch vom Festlande Ostafrika's nicht bekannt, dagegen im indischen Archipel häufig und weit verbreitet (bei Singapore von Feod. Jagor, an der Nordwestküste Borneo's von mir gefunden). Kiener's *Pyrula bucephala* von den Seychellen, p. 4, ist vielleicht nur *H. pugilinus* mit stark ausgebildeten Knoten; der ächte *H. bucephalus* soll von Mexiko stammen. Umgekehrt ist es auffallend, dass der an der Ostküste Afrika's so häufige *H. pirum* Gmelin (*Pyrula citrina* und *nodosa* Lam. *paradisiaca* Mörch.) aus unserm Gebiet gar nicht genannt wird; nur Martini III, S. 205, Fig. 915 sagt von einer Form derselben, sie stamme vermuthlich von „Mauritien“.
- MI *Pisanea spiralis* Gray (Bucc.) Zoology of Beechey 1839. Reeve III (Bucc.), Fig. 13 von Mauritius. Bucc. Prevostii Valenciennes Voy. de Venus, 1841—1843, moll. pl. 6, Fig. 3.

Lienard's *Cantharus Tranquebaricus*, S. 3 von Mauritius dürfte dieselbe sein.

- SMdM **Pisania fumosa* Dillwyn 1817. Chemn. IV, Fig. 1145, 1146. Pease Am. Journ. DIP Au Conch. IV, p. 104. Martens Südseeconchylien S. 5. Bucc. undosum Quoy et Gaimard

- Voy. Astrol. pl. 30, Fig. 1—4 (lebendes Thier). Tritonium plicosum Menke catal v. d. Malsburg 1829. Bucc. Proteus Reeve Fig. 51. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 104. *Lien.* 9 Mauritius, 73 Seychellen, 101 Rodriguez. Auch von Prof. Möbius auf den Seychellen gesammelt. Nossi-Be Hildebrandt.
- MR† *Pisania rubiginosa Reeve (Bucc.) Fig. 47. Bucc. rubens Küster Bucc. Taf. 6, Fig. 7—9 Fouquets auf Mauritius, Möbius, unter mehreren rothen auch ein ganz weisses Exemplar. Der vorigen ganz nahe kommend.
- SAMB *Pisania undosa L. (Bucc.) Chemn. IV, 1126, 1127 und 1135. Encycl. pl. 422, Fig. 5.
- DIP *Kien.* Bucc. p. 39, Fig. 41 Ile de France. Triton und. Lam. Bucc. cinctum Quoy et Gaimard Voy. Astrol., moll. pl. 30, Fig. 5—7 (lebendes Thier). Pease Am. Journ. Conch. IV, 1868, p. 104 (Tritonidea). Dufo 52 Turbinella undosa, alle Seychellen und Amiranten, an schlammigen Stellen. Desh. 129 Reunion. *Lien.* 7 (Triton) und 9 (undulosum) Mauritius, 72, 73 Seychellen und 101 Rodriguez. Auch von Prof. Möbius und Caldwell auf Mauritius gesammelt.
- MI *Pisania marmorata Reeve Bucc. Fig. 95 (Philippinen). *Lien.* 3 Mauritius. Auch von Prof. Möbius und von Robillard gefunden.
- M? Pisania crocata Reeve Bucc. Fig. 97 Mauritius von Robillard und Caldwell eingesandt.
Sollte diese Art nicht Fusus rubens Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 458 von Mauritius sein.?
- MI *Pisania gracilis Reeve Bucc. Fig. 96 (Philippinen). *Lien.* 3 Mauritius. Ebenfalls von Caldwell, Prof. Möbius und Robillard gefunden.
- M† Pisania naevosa n. sp. Taf. 20, Fig. 8.
- Testa ovato-oblonga, subfusiformi, costis verticalibus crassiusculis (12—14 in anfr. penultimo, 16—17 in anfractu ultimo) et Ilris spiralibus elevatis angustis, (8—9 in anfr. penultimo conspicuis, circa 20 in ultimo) cancellata, pallide fulva, rufo-variegata; anfr. 7½, primus globosus, laevis, sequentes convexi, sutura profunda discreti, valide costati, sat celeriter crescentes, ultimus subangustatus, costis obsolescentibus; apertura cum canali dimidiam fere testae longitudinem occupans, alba, margine externo tenui, plus minusve conspicue fusco-maculato, extus varice valido munito, intus plicis nonnullis obsoletis, suprema magis distincta, munito; pariete aperturali prope angulum superum uniplicato, margine columellari appresso, subrecto, infra plicis nonnullis obliquis, canali brevi, subrecto, ab apertura distincto.
- Long. 16, diam. 7½, long. apert. incl. canali 8, excl. 6, lat. 4 mm.
- Mauritius, Robillard.
- Habitus ähnlich dem von P. Orbigny Payr.
- M† Pisania amphodon n. sp. Taf. 20, Fig. 9.
- Testa fusiformi-oblonga, costis verticalibus crassis (10 in anfr. penultimo, 11 in ult.) et liris spiralibus elevatis angustis, (5—6 in anfr. penultimo conspicuis, 11 in ult.) cancellata, fulvo-rufa, subunicolor; anfr. 8, primus depressus, laevis, secundus et tertius declives, sequentes convexi, sutura sat profunda discreti, ultimus subangustatus, apertura cum canali dimidiam fere testae longitudinem occupans, margine externo recto incrassato, intus denticulis conspicuis albis 6, alternatim majoribus, retrorsum in plicas elongatis munito, pariete aperturali concavo, denticulis

globosis 3, margine columellari recto, item denticulis globosis 3 munito, canali longiusculo paulum recurvo, aperto.

Long. 13, diam. $5\frac{1}{2}$, apert. incl. canali long. $6\frac{1}{3}$, exclus. 4, apert. lat. 2 mm.

Mauritius, *Robillard*.

Aehnlich der vorigen, kleiner und schlanker, fast einfarbig, durch die scharf ausgeprägten Zähne sowohl am Aussenrand, als an der Mündungswand und dem Columellarrand kenntlich.

MP *Pisania puncticulata* Dunker Malakolog. Blätter VIII, 1861, p. 44. Mauritius von *Robillard* erhalten. Diese Art kommt den kleinen Tritonien, Gruppe Colubraria. z. B. *angulatum* Reeve, sehr nahe, so dass ich zweifle, ob sie nicht besser dort steht, obgleich sie keine Varicen zeigt.

SMBI **Pisania fasciculata* Reeve Bucc. Fig. 76. Hombron et Jacquinot Voy. au pôle sud pl. 21, Fig. 3, 4. *Desh.* 129 Reunion. *Lien.* 3 und 72 Mauritius und Seychellen. Auch von Prof. *Möbius* und von *Caldwell* erhalten.

MRIP *Pisania ignea* Gmelin (Bucc.) Chemn. IV. Fig. 1217. Martens Südseeconchylien S. 5. Bucc. *flammulatum* Quoy et Gaimard Voy. Astrol., moll. pl. 30, Fig. 29, 30. Bucc. *pictum* Reeve Fig. 74. Küster Taf. 11, Fig. 1, 2. *P. buccinula* Pease Am. Journ. Conch. IV, 1868, p. 104. *Lien.* 3 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.

Pisania crenilabrum A. Adams Proc. Zool. Soc. 1854, p. 138 (von Westindien) nach *Desh.* p. 129 von Reunion erscheint um so mehr zweifelhaft, als A. Adams sie in dem spätern Werk genera of moll. an. 1858 gar nicht mehr aufführt.

I *Phos textus* Gmelin Martini IV, Fig. 1201, 1202. Bucc. *Blainvillei* *Desh.* Voy. de Belanger, moll. pl. 2, Fig. 1, 2. Kien. Bucc. Fig. 38. Reeve Bucc. Fig. 100. Sow. thesaur. conch. III, Fig. 242. Bucc. *cancellatum* Quoy et Gaimard Voyage Astrol. pl. 32, Fig. 30, 31.

SM? **Phos textus* Gmelin var. *rhodostoma* n. Taf. 20, Fig. 7.

Testa oblongo-conica, verticaliter costata et spiratim lirata, griseo-albida, spira elongata, acuta, anfr. 9, gradati, supra angulati, ultimus basi angustatus, cingulo basali obliquo crasso munitus; apertura ovata, superne acuta, peristomate roseo, margine externo recto, columellari soluto, fauce spiratim lirata.

Long. 15, diam. $8\frac{1}{2}$, apert. 8 mm.

St. Anne, Seychellen, 5 Faden Tiefe, Prof. *Möbius*.

Stimmt im Wesentlichen mit *Phos textus* (Gmelin) Sowerby thes. conch. Fig. 242 überein, und weicht hauptsächlich nur durch die lebhaft rosenrothe Färbung des Mundsauces ab. Mit *Phos roseatus* Hinds., an den man dieser Färbung wegen denken könnte, stimmt Skulptur und Gestalt nicht überein, doch dürfte vielleicht Lienard unter seinem *Ph. roseatus* von Mauritius auch diese Art gemeint haben.

BI *Hindsia egregia* Reeve II, Tritonium Fig. 78. *Desh.* 113 Reunion.

M? *Hindsia carduus* Reeve II, Tritonium Fig. 95. *Lien.* 7 Mauritius.

M? *Cyllene striata* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1850; Petit Journ. de Conch. IV, p. 147 Albrokkasinseln; Sow. thes. III, pl. 217, Fig. 26. *Lien.* 9 Mauritius.

MdMB **Nassa* (*Alectryon*) *papillosa* L. Chemn. IV, 1204, 1205. Encycl. pl. 400, Fig. 2.

IP *Kien.* Bucc. p. 58, Fig. 54 Madagaskar. Reeve VIII, Fig. 12. *Sganz.* 27 Mada-

gaskar, häufig auf Riffen und Steinen. *Desh.* 129 Reunion. Von Prof. *Möbius* und Herrn *Caldwell* auf Mauritius gesammelt.

- MI Au **Nassa* (*Alectryon*) *suturalis* Lam. *Chemn.* IV, Fig. 1199, 1200. *Kien.* p. 55, Fig. 96 Ile de France. Reeve Fig. 4. *Alectr. intermedius* Dunker Moll. d. Novara Taf. 1, Fig. 2. *Lien.* 10 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* daselbst gesammelt.
- M? **Nassa* (*Alectryon*) *elegans* Kien. Fig. 97, p. 56. *Lien.* 10 Mauritius, Black river, Prof. *Möbius*.
- SMD **Nassa* (*Zeuxis*) *olivacea* Bruguière *Encycl.* pl. 304, Fig. 7. *Bucc. taenia* Gmelin. AfIP Knorr Vergnüg. d. Augen V, Taf. 10, Fig. 3. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 32, Au Fig. 13, 15 lebendes Thier. Kien. Fig. 53. Reeve Fig. 19. Eydoux et Souleyet Voy. de la Bonite, moll. pl. 41, Fig. 14—16. Martens Südseeconch. S. 6. *Lien.* 9 Mauritius, 72 Seychellen, 101 Rodriguez. Auf Mauritius auch von Prof. *Möbius* und *Caldwell* gesammelt.

Diese Art variiert bedeutend, die Rippen finden sich in der Regel nur auf den obersten Windungen, zuweilen aber bis zur letzten herab (*N. approximata* Pease Am. Journ. Conch. III, pl. 23, Fig. 5 und Voy. pole sud. pl. 21, Fig. 16, 17); zuweilen finden sich viel heller gefärbte Exemplare, selten welche ohne Band, solche fand ich z. B. bei Singapore. Von Lamarck wird sie fälschlich aus Westindien angegeben.

- MdRAf **Nassa* (*s. str.*) *coronata* Bruguière Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 180 Madagaskar. IP *Kien.* Fig. 112. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 32, Fig. 8—10 (lebendes Thier). Reeve Fig. 20 Madagaskar. Küst. Taf. 8, Fig. 4, 5. *Sganz.* 27 Madagaskar, nicht selten an Felsen und Steinen. *Lien.* 10 Mauritius.

- M *Nassa* (*Nassa s. str.*) *granum* Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 176. *Kien.* ic. *Bucc.* p. 22, pl. 16, Fig. 58 Ile de France. Vielleicht auch *N. picta* (Dunker) *Lien.* 10 Maur. Die ächte *Nassa picta* Dkr. Phil. abb. *Bucc.* Taf. 2, Fig. 6 fand ich auf den Inseln Batjan und Timor.

- SAMd **Nassa* (*Nassa*) *arcularia* L. incl. *Rumphii* *Desh.* und *pullus* Lam., Kien. Martini II, Fig. 409—412. *Encycl. meth.* pl. 394, Fig. 1, 2. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 32, Fig. 8—10 lebendes Thier. Kien. Fig. 114, 115. Reeve Fig. 22 und 25. *Dufo* 69 Seychellen und Amiranten, überall häufig, auf Sand oder sandig-schlammigem Grund, bei der Ebbe im Trockenen, sehr lebhaft, bohrt Löcher in die Schale von *Cerithium morum*. *Sganz.* 27 Madagaskar, auf Steinen, sehr gemein. *Desh.* 120 (*pullus*) Reunion. *Lien.* 9 Mauritius und 73 Seychellen. Ebendaher von *Möbius*. Nossi-Be *Hildebrandt*.

Bei der am meisten ausgeprägten Form ist der Rücken fast glatt, die Falten auf der vorletzten Windung sind weniger zahlreich und die Mündungswulst reicht entschieden an der Bauchseite auf die vorletzte Windung hinauf; bei einer Mittelform (*N. Rumphii* *Desh.*) zeigt der Rücken noch Spiralfurchen, die Falten auf der vorletzten Windung sind zahlreicher, die Mündungswulst reicht kaum oder gar nicht an die obere Kante der letzten Windung; bei der am mindesten ausgeprägten (*N. pullus* Lam., non L., *N. plicata* Mörch) ist der Rücken der letzten Windung wie die vorhergehenden mit ziemlich zahlreichen Falten und Spiralfurchen gegittert; hier ist also die Skulptur der oberen Windungen am längsten beibehalten. Alle diese Formen sind aber durch Uebergänge eng verbunden.

- Md† *Nassa* (*Nassa*) *tiarula* Kiener iconogr. *Buccin.* p. 111, pl. 30, Fig. 4 Madagaskar. Reeve Fig. 92.
- MI **Nassa* (*Nassa*) *callosa* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. Reeve Fig. 185 Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.

- MdI *Nassa* (*Nassa*) *coronula* A. Adams Reeve Fig. 99 Nossi-Be *Hildebrandt*. Ob dieselbe?
- MI *Nassa* (*Nassa*) *cancellata* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. Reeve Fig. 155. *Lien*. 9 Mauritius.
- I *Nassa* (*Nassa*) *Thersites* Brug., pullus L. nach Hanley. Martini II, Fig. 413. Encycl. pl. 394, Fig. 8. Kien. Fig. 113. Reeve Fig. 65.
- M **Nassa* *Thersites* var. *Irus* n. Taf. 20, Fig. 10.

Von der typischen Form, *Kiener* Buccinum Fig. 113 und Reeve Fig. 65, durch viel geringere Ausbildung der Schwiele am Mündungsrand und geringere Ausbildung des Höckers, der mehr als schiefe Falte erscheint, unterschieden. Bei der typischen *N. Thersites* erhalten sich die Falten ziemlich unverändert bis zum Höcker, bei unserer Abart hören dieselben schon beim Uebergang von der vorletzten zur letzten Windung auf und treten nur noch zwei vereinzelte breitere Falten in der ersten Hälfte der letzten Windung vor den Höcker auf. Die rothbraune Farbe der unsrigen beruht vermuthlich auf Abreibung, wohl erhalten ist *N. Thersites* grünlichgrau.

Mauritius, Prof. *Möbius* und Hr. *Caldwell*.

- MBR† *Nassa* (*Nassa*) *Kieneri* Desh. moll. de Reunion p. 129. *N. marginulata* (non Lam.) Reeve Fig. 43. *Lien*. 10 Mauritius (Nicht *N. Kieneri* Anton 1839).
- MI *Nassa* (*Nassa*) *sinusigera* A. Adams (Proc. Zool. Soc. 1851. Reeve Fig. 113 Philippinen) var. *Cernica* *Nevill* Journ. As. Soc. Beng. XLIII, 1874, p. 25, pl. 1, Fig. 7 Mauritius.
- MI **Nassa* (*Tritia*) *crenulata* Brug. Encycl. pl. 394, Fig. 6. Kien. Fig. 49 (*N. Siquijorensis* A. Adams, Reeve Fig. 53 scheint nicht hinreichend verschieden). *Lien*. 9 (Bucc.) Mauritius. Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.
- MAu **Nassa* (*Tritia*) *fasciata* Lam. (Bucc.) an. s. vert. ed. 2, X, p. 169 von Neuholland. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 32, Fig. 18—21 lebendes Ths. *Lien*. 10 Maur. Ebenda von Prof. *Möbius* gesammelt.

Auf Verwechslung mit dieser Art beruht vielleicht, dass *Kiener* p. 67 auch die europäische *N. reticulata* L. von Madagaskar angiebt.

- MP **Nassa* (*Tritia*) *concinna* Powis Reeve Fig. 91 (Südsee). *Lien*. 9 Mauritius und 101 Rodriguez. Fouquets *Möbius*. Auch von *Caldwell* erhalten.
- SMdM **Nassa* (*Tritia*) *albescens* Dunker Philippi Abbild. Bucc. Taf. 2, Fig. 15, 1846. Reeve Fig. 100. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 108. Martens Südseeconchyl. S. 7. *N. acinosa* Gould 1850, Explor. Exped. Fig. 329. *N. bicolor* Hombron et Jacquinot Voy. pol sud pl. 21, Fig. 41, 42. *Lien*. 9 (*acinosa*) Mauritius. Fouquets und Black river auf Mauritius, St. Anne auf den Seychellen, *Möbius*, Bourbon, Pease Nossi-Be, *Hildebrandt*.

Vielleicht ist dieses auch die Art, welche Desh. als *N. retecosa* Reeve mit Fragezeichen von Reunion anführt.

- MB **Nassa* (*Hima*) *Capensis* Dunker Zeitschr. f. Malakoz. 1846, p. 110. Krauss süd-afrik. Moll. p. 122. Küst. Bucc. Taf. 12, Fig. 13—16. *N. pulchella* A. Adams

- Proc. Zool. Soc. 1851. Reeve Fig. 90. *Desh.* 130 Reunion. Weit verbreitet in Südafrika, von Prof. *Möbius* auch aus Mauritius mitgebracht.
- MR **Nassa* (Hima) *Erythraea* Issel Descript. de l'Egypte pl. 6, Fig. 4 Mauritius Prof. *Möbius*.
- MAfI *Nassa* (Hebra) *horrida* Dunker Philippi Abbild. Bucc. Taf. 2, Fig. 8. Reeve Fig. 69. *Lien.* 10 Mauritius.
- MBI **Nassa* (Hebra) *muricata* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. moll. pl. 32, Fig. 32, 33. Reeve Fig. 73. *Desh.* 129 Reunion. *Lien.* 10 Mauritius, Fouquets, Grande Baie und Black river auf Mauritius, *Möbius*.
- MB† *Nassa* (Hebra) *onerata* *Desh.* moll. de Reunion p. 130, pl. 12, Fig. 24, 25 Reunion. *Lien.* 10 (ornata) Mauritius.
- Diese drei sind unter sich und mit *N. subspinoso* Lam. nahe verwandt.
- MBI? **Nassa* (*Amycla*) *luctuosa* A. Adams. Reeve Fig. 109. *Desh.* 130 Reunion. Mauritius, *Möbius* und *Caldwell*.
- MB **Nassa* (*Amycla*) *mucronata* A. Adams, Reeve Fig. 8. *Desh.* 130 Reunion. AfIP Fouquets, *Möbius*. Auch von *Caldwell* und *Robillard* erhalten. Im Berliner Museum auch von den Sandwichinseln, Samoainseln und von Mossambique vorhanden.
- MBIP *Nassa* (*Amycla*) *punctata* A. Adams Reeve Fig. 54 (nicht Bucc. punctatum Kien. Fig. 51). *Desh.* 130 Reunion. *Lien.* 10 Mauritius.
- Wenig von der vorhergehenden verschieden. Auch *N. graphitera* Hombr. et Jacq. Voy. pole sud, moll. pl. 21, Fig. 28, 29 scheint hierher zu gehören, ebenso *N. gaudiosa* Hinds. Voy. Sulf. pl. 9, Fig. 15, 16. 1844. Vgl. Martens Südseeconchylien S. 8.
- MI *Nassa* (*Amycla*) *sertula* A. Adams Reeve Fig. 89. *Desh.* 129 Reunion. *Lien.* 10 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius*.
- BI *Nassa* (*Aciculina*) *vittata* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. Reeve Fig. 160. *Desh.* 130 Reunion.
- MdM† *Bullia* *Mauritiana* Gray Zool. of Beechey p. 126 Mauritius. Reeve III, Fig. 12 Madagaskar.

Nächstverwandte mit *B. Grayi* Reeve und *annulata* Gray, eine südafrikanische Form.

Fusidae.

- MB *Fusus* *oblitus* Reeve conch. ic. IV, Fig. 29. Bucc. turris-picta Martyn univ. conch. Af? pl. 90. *F. Nicobaricus* (non Chemn.) Kiener pl. 6, Fig. 1. *Desh.* 112 Reunion. *Lien.* 3 Mauritius.
- SAMd *Fusus* *tuberculatus* Lam. Encycl. pl. 424, Fig. 4. Kien. pl. 7, Fig. 1. Reeve AfI Fig. 38. *Dufo* 48 alle Seychellen und Amiranten, auf Sandboden; Eikapseln pyramidal-dreieckig. *Sganz.* 24 Madagaskar.
- MdI *Fusus* *colus* L. Chemn. IV, Fig. 1342. Kien. pl. 4, Fig. 1. Reeve Fig. 11. Bucc. turris-clavata Martyn univ. conch. pl. 90. *Sganz.* 24 Madagaskar.
- SR Au *Fusus* *multicarinatus* Lam. Kien. pl. 10, Fig. 1. Vielleicht auch Descr. Eg. pl. 4, Fig. 18. *Dufo* 49 Mahé, auf Schlammgrund.

Sganzin 24 führt noch *F. sulcatus* Lam. von Madagaskar an; diese Art, Encycl. pl. 424, Fig. 3 und Kien. pl. 13, Fig. 1, ist mir nur aus dem südlichen Australien bekannt und dürfte mit *pyrulatus*

Reeve Fig. 50 zusammenfallen; Sganzin meinte vielleicht *F. multicarinatus*; *Lien.* 3 *Fusus „tricularia“* Kien. von Mauritius, sehr selten, mir ganz unbekannt, vielleicht verschrieben für *turricula*.

- SAMd **Fasciolaria trapezium* L. Chemnitz IV, Fig. 1298, 1299. Encycl. pl. 431, Fig. 3.
 MBR *Kien.* Fig. 6 Ile de France. Reeve Fig. 15. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. zool.
 AfI II, p. 511 Ile de France, auf dem Markt zum Essen verkauft. Eydoux et Souleyet
 Voy. de la Bonite pl. 44, Fig. 11, 12. Dufo 49 häufig an allen Seychellen und
 Amiranten, auf Felsengrund, 2—3 m tief, gegessen. Sganz. 24 Madagaskar, auf
 den Riffen, häufig. Desh. 112 Reunion. Lien. 14 Mauritius und 73 Seychellen.
 Black river in Fouquets, Möbius.
- S MdM *Fasciolaria filamentosa* Lam. Chemn. IV, Fig. 1310, 1311. Encycl. pl. 424, Fig. 7.
 BRAfI Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 35, Fig. 2 lebendes Thier. Kien. pl. 8, Fig. 1.
 P Reeve Fig. 4. Fasc. inermis Jonas Philippi Abbildungen Taf. 3, Fig. 3 (Abart
 ohne Knoten). Dufo 50 Mahé und Praslin, häufig. Sganz. 24 Madagaskar, ziem-
 lich selten. Desh. 112 Reunion. Lien. 14 Mauritius.
Lienard 14 führt noch *F. princeps* Sow. von Mauritius an, diese Art gehört aber der West-
 küste Amerika's an.
- C† *Plicatella Belcheri* Reeve conch. ic. IV, Turbinella Fig. 22 Cargados, Garajos, auf
 Korallengrund, Belcher.
- M† *Plicatella Barclayi* Reeve Turb. Fig. 20 Mauritius, Barclay.
- M? *Plicatella carinifera* Lam. (Turbinella) Encycl. pl. 423, Fig. 3. Kien. Turbin. pl. 13,
 Fig. 1. Reeve Turbin. Fig. 14. Lien. 15 Mauritius.
- SMdM **Plicatella polygona* L. Lister pl. 922, Fig. 15 Mauritius. Chemn. IV, Fig. 1306,
 BR Af 1307, 1314, 1315. 1384 (Mur. pardalis Gmel.). Encycl. pl. 423, Fig. 1. Lam. an.
 IP s. vert. ed. 2, IX, p. 385 Ile de France. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 35,
 Fig. 12 lebendes Thier. Kien. pl. 13, Fig. 2. Reeve Fig. 1. Eydoux et Souleyet
 Voyage Bonite pl. 44, Fig. 13—15. Dufo 52 Mahé und Curieuse, auf sandig-
 schlammigem Grund. Sganz. 24 Madagaskar und Mauritius, nicht selten. Desh. 112
 Reunion. Lien. 14 Mauritius und 74 Seychellen. Fouquets und Black river auf
 Mauritius, sowie Seychellen, Möbius.
- M† *Plicatella Robilliardi* Tapparone Canefri (Latirus) Journ. de Conch. 1879, p. 318
 Mauritius, Robillard. Wahrscheinlich Lienard 15 Turbinella nodosa (statt nodata).
- SMBI **Plicatella craticulata* Lam. (Turbinella) Chemn. IV, Fig. 1382, 1383. Encycl.
 pl. 429, Fig. 3. Kien. pl. 19, Fig. 2. Reeve Fig. 7. Desh. 114 Reunion. Lien. 15
 Mauritius und 74 Seychellen. Fouquets auf Mauritius, Möbius.
- SMB *Plicatella turrita* Gmelin (Voluta) Chemn. IV, Fig. 1317, 1318. Reeve Turbin.
 RIP Fig. 57. Turbinella lineata Lam. Encycl. pl. 429, Fig. 4. Quoy et Gaim. Voy.
 Astrol. pl. 35, Fig. 14 lebendes Thier. Kien. pl. 18, Fig. 2. Dufo 52 Mahé,
 Digue und Praslin, selten. Desh. 112 Reunion. Lien. 15 Mauritius.
- M? *Plicatella gracilis* Reeve Turb. Fig. 53. Lien. 15 Mauritius.
- MP **Plicatella Caledonica* Petit Journ. de Conch. II, 1851, pl. 10, Fig. 6. Kobelt in
 der neuen Ausgabe von Chemnitz, Turbinella Taf. 22, Fig. 4, 5. Lien. 14 (Non
 meensis). Auch von Prof. Möbius von Mauritius mitgebracht.

- M† Plicatella aureocincta Sow. Proceed. Zoolog. Soc. 1875, p. 129, pl. 24, Fig. 3 Mauritius.
- S A Md Plicatella (Lagena) smaragdulus L. (Bucc.) Martini III, Fig. 1104, 1105. Reeve
- M I P Turb. Fig. 18. Turbin. rustica Lam. Quoy et Gaimard Voyage Astrol. pl. 35, Fig. 20—22 lebendes Thier. Kien. p. 39, pl. 19, Fig. 1 Seychellen. Dufo 51 Seychellen und Amiranten, häufig. Sgan. 24 Ilot Louquet bei St. Marie, Madagaskar, auf den Riffen und Steinen, zahlreich. Lien. 15 Mauritius.
- S Md M *Plicatella (Peristernia) nassatula Lam. Kien. p. 42, pl. 11, Fig. 2 Seychellen.
- B R I Schubert und Wagner Chemn. XII, Fig. 4025, 4026. Reeve Fig. 45. Quoy et Gaimard Voy. Astrol., moll. pl. 35, Fig. 17—19 lebendes Thier. Dufo 52 Mahé, selten. Desh. 112 Reunion. Lien. 15 Mauritius und 74 Seychellen. Fouquets, Black river und Grande Baie, Möbius. Bossi-Be, Hildebrandt.
- M P Plicatella (Peristernia) Wagneri Anton, Schubert und Wagner Chemn. XII, Fig. 4023, 4024 (crenulata Kien., Reeve), var. Samoënsis Kobelt Turbinella Taf. 26, Fig. 14, 15 Mauritius, von Robillard erhalten.
- B P Plicatella (Peristernia) gemmata Reeve Turb. 5. Voy. Pole Sud, moll. pl. 25, Fig. 23, 24. Pease Proc. Zool. Soc. 1864, p. 53. Martens Südseeconchylien S. 12. Desh. 114 Reunion.
- M R I Plicatella (Peristernia) incarnata Desh. an. s. vert. IX, p. 395. Kien. pl. 18, Fig. 3. Reeve Fig. 55. Lien. 15 Mauritius.
- M I P *Plicatella (Peristernia) fragaria Wood (Voluta) ind. test. suppl. pl. 3, Fig. 27, 1828. Turbinella Carolinae Kien. pl. 18, Fig. 1, 1841. Tapparone-Canefri Journ. de Conch. 1879, p. 323. Ricinula bella Reeve Proc. Zool. Soc. 1846, conch. ic. III, Fig. 15 Mauritius, Möbius, Caldwell und Robillard.
- M R Plicatella (Peristernia) Paulucciae Tapparone-Canefri loc. cit. p. 325 Mauritius, Robillard. Von Ehrenberg auch im Rothen Meer gesammelt.
- S *Plicatella (Peristernia) bonasia n. Taf. 20, Fig. 6.

Testa biconica, spiratim tuberculato-costata, costis in anfractu ultimo 12, prima, quarta et octava validioribus, ferrugineo-rufa. tuberculis compluribus, inprimis validioribus, albis; apertura $\frac{2}{3}$ longitudinis testae aequans, angusta, superne latior et subcanaliculata, margine externo in medio incrassato, quadridentato, pariete aperturali tenuiter sulcato, margine columellari tuberculato, columella obtuse prominula, remote biplicata, canali brevi vix recurro.

Long. 13—15, diam. maj. 7—9, min. 6—7, apert. long. $8\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$ mm.

Seychellen, Prof. Möbius.

Aehnlich der Pl. turbinella (Ricinula) Reeve, aber mehr eiförmig, mit kürzerem Gewinde, mehr rötlich und fleckig, die grosse Reihe weisser Knoten unterhalb, nicht oberhalb der Nath. Die Färbung, mattroth und weiss in kleinen Flecken, erinnert an diejenige des Haselhuhns, Tetrao bonasia L.

Lienard 14, 15 führt noch Turb. aspera Gmel., nodosa? und ocellata Lam. von Mauritius auf; die letzte ist eine westindische Art, die beiden andern sind mir unbekannt, aspera scheint auf Murex asper Gmelin, Martini IV, Fig. 1396, 1397 sich zu beziehen, dieser soll aber ausdrücklich keine Falten an der Columelle haben und ist wahrscheinlich irgend eine Pisania.

Columbellidae.

SCMB *Columbella flavida* Lam. Martini II, Fig. 467. Kien. pl. 8, Fig. 3. Sow. RIP Fig. 55, 56. Reeve XI, Fig. 28 (flava Brug.). *Desh.* 131 Reunion. *Lien.* 74 Seychellen.

**Columbella flavida* var. *undata* Duclos Kien. pl. 9, Fig. 1. Reeve Fig. 27. Lischke japan. Moll. III, Taf. 2, Fig. 1—4. *Lien.* 24 Mauritius. Auch von Möbius bei Black river und Fouquets gesammelt. *Lien.* 75 Seychellen und 106 Cargados.

Vermuthlich ist dieses auch die angebliche *C. strombiformis* von den Seychellen und Amiranten, an Meerpflanzen, 3 m tief, bei *Dufo* 56, die ächte *C. strombiformis* Lam. gehört der Westküste Amerikas an, vielleicht auch *Lienard's* *C. tringa* von den Cargados, 106.

SACM *Columbella turturina* Lam. Kien. pl. 11, Fig. 3. Sow. thes. Fig. 38, 39. Reeve BAfIP Fig. 83. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 122. *Dufo* 56 Seychellen und Amiranten, selten. *Desh.* 131 Reunion. *Lien.* 24 Mauritius, 74 Seychellen und 106 Cargados.

CIAu *Columbella versicolor* Sow. Martini II, Fig. 462. *C. scripta* Lam. Kien. pl. 6, Fig. 3 (non *C. scripta* L.). — Sow. thes. Fig. 41 und 46. Reeve Fig. 57. *Lien.* 106 Cargados.

MAf *Columbella araneosa* Kien. pl. 9, Fig. 4. *C. rasolia* Duclos Sow. Fig. 53, 54. Reeve Fig. 205. *Lien.* 23 (arenosa) Mauritius.

S?CB *Columbella varians* Sow. thes. Fig. 47, 48. Reeve Fig. 91. Martens Südseeconchylien S. 20. *Desh.* 131 Reunion. *Lien.* 106 Cargados (nana).

Diese drei Arten stehen einander sehr nahe. *C. azora* (Duclos) Kiener iconogr. p. 18, pl. 6, Fig. 2 von den Seychellen gehört vermuthlich auch zu ihnen.

M? *Columbella Hindsi* Gaskoin Reeve Fig. 43. Mauritius, von *Robillard* erhalten.

MdM *Columbella fulgurans* Lam. incl. *punctata* Lam. Martini II, Fig. 471. Encycl. RAfI pl. 374, Fig. 4 und 7. Kien. pl. 7, Fig. 1. — Sow. thes. Fig. 95, 96. Reeve Fig. 50. *Sganz.* 28 Madagaskar, gemein. *Lien.* 24 Mauritius.

MI *Columbella ligula* Duclos, Kien. pl. 13, Fig. 2. Sow. thes. Fig. 83. Reeve Fig. 96. *Lien.* 24 Mauritius.

S† *Columbella lactea* Duclos, Kien. pl. 15, Fig. 4 Seychellen (nicht Reeve Fig. 120).

B† *Columbella Hanleyi* *Desh.* moll. de Réunion pl. 131, pl. 13, Fig. 8—10 Reunion.

M† *Columbella unifascialis* Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 273 Ile de France. *Sganz.* 28. Mir nicht näher bekannt.

M *Columbella alabastrum* Reeve conch. ic. XI, Fig. 232 (Fundort unbekannt). Unsere Taf. 20, Fig. 13.

Testa conico-turrita, laevis, nitida, diaphana, albido-grisea, maculis opace albis plus minusve strigaeformibus aliisque parvis rotundis picta, serie macularum minimarum custaneofuscarum spirali supra alteraque infra peripheriam picta; anfr. 9, plani, sutura valde superficiali, ultimus subtus subito valde attenuatus, basi spiratim striatus; apertura $\frac{3}{4}$ longitudinis occupans, subtetragona, margine externo incrassato, intus denticulato, superne paulum sinuato, canali perbrevis, aperto.

Long. 9, diam. $\frac{3}{2}$, apert. long. 4, diam. 2 mm.

Mauritius, *Robillard*.

Da ich nicht ganz sicher bin, ob dieses die von Reeve gemeinte Art ist, lasse ich sie noch einmal abbilden; sie erinnert, abgesehen von der Färbung, an *C. minor* Scacchi.

MBI *Columbella puella* Sow. thes. Fig. 60, 61. Reeve Fig. 65. *Desh.* 131 Reunion. *Lien.* 24 Mauritius.

M† *Columbella balteata* Nevill Journ. As. Soc. XLIV, 1875, p. 96, pl. 8, Fig. 4 Mauritius.

Diese beiden Arten sind längsgerippt.

MI **Columbella Cumingi* Reeve conchol. icon. vol. XI, Fig. 156. Unsere Taf. 20, Fig. 11.

Testa turrita, spiratim conferte striata, pallide fulva, infra suturam fusco-et albo-articulata; anfr. 9, primus laevis, globosus, oblique impositus, sequentes duo costulis verticalibus subrectis clathrati; apertura $\frac{2}{5}$ totius longitudinis occupans, anguste ovata, margine externo intus incrassato et plicis circa 6 brevibus munito, superne breviter emarginato, pariete aperturali prope angulum superum uniplacato, margine columellari subverticali, appresso, canali brevi, tortuoso, oblique truncato.

Long. 13, diam. 4, apert. long. 5, lat. 2 mm.

Mauritius, *Möbius* und *Robillard*.

Aehnelt sehr der Abbildung von *Buccinum clausiliforme* bei Kiener pl. 13, Fig. 46, das aber nach der Vaterlandsangabe doch wohl zur *C. scripta* L. (*Bucc. Linnaei* Payraudeau) des Mittelmeers gehören dürfte. Diese Art ist hier noch einmal beschrieben und abgebildet, da die Reeve'sche Abbildung nicht alle Details deutlich zeigt.

MI *Columbella lumbricus* Reeve Fig. 186 (Philippinen). *Lien.* 24 Mauritius.

S† *Columbella nympha* Kiener iconogr. p. 33, pl. 10, Fig. 4 Seychellen. *Lien.* 74 ebendaher.

Hat Form und Färbung einer *Daphnella*.

M† **Columbella spiratella* n. Taf. 20, Fig. 12.

Testa parva, oblongo-turrita, distincte spiratim lirata, pallide flavescent, costulis abbreviatis, nodiformibus, albidis in peripheria sculpta; anfr. 8, primus laevis globosus, aurantiacus; apertura angusta, dimidiam longitudinem non aequans, margine externo subsimplice, columellari indistincto, canali perbrevis recurvo aperto.

Long. $4\frac{1}{2}$, diam. 2, apert. long. 2, diam. $\frac{2}{3}$ mm.

Mauritius, im Sand, *Möbius*.

M† **Columbella cincinnata* n. Taf. 20, Fig. 14.

Testa minima, oblonga, laevis, nitida, griseo-albida, lineis fuscis angustis subundulatis confertis et maculis sat magnis opace albis, biseriatis picta; apex roseo-violascens; anfr. 5, convexiusculi, sutura superficiali, ultimus infra sensim attenuatus; apertura angusta, dimidiam testae longitudinem subaequans, margine externo subsimplice? canali perbrevis, aperto.

Long. 3, diam. $1\frac{1}{3}$, apert. long. $1\frac{1}{2}$, diam. $\frac{1}{2}$ mm.

Der Mundsau ist nicht verdickt, aber das Exemplar möglicherweise nicht ausgewaschen. Erinnert an *C. pusilla* Sow., Reeve Fig. 109, 110 und 112 von Westindien, und die viel grössere *C. margarita* Sow. von den Sandwichinseln.

MP *Columbella* (*Zafra*) *purpurea* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1873, pl. 23, Fig. 3 (von den neuen Hebriden). *Nevill* Journ. As. Soc. XLIV, p. 97 Mauritius.

M† *Columbella* (*Zafra*) *polita* Nevill ibid. p. 97, pl. 8, Fig. 5 Mauritius (non Reeve Fig. 221).

Lamarck, *Kiener* und *Sganz*. 27 giebt ausserdem ein *Buccinum flexuosum*, an. s. vert. ed. 2, X, p. 175 von Ile de France an, es ist das aber eine westindische Columbelle, *Lienard* 23, 24 auch die *C. rustica* des Mittelmeeres, die westindische *C. mercatoria* und schliesslich den zweifelhaften westafrikanischen stipon Adansons (wahrscheinlich eine *Marginelle*); *Deshayes* für Reunion die westindischen *Col. tessellata* (*C. B. Adams*) und *pusilla* Sow., all diese scheinen mir äusserst zweifelhaft.

Mitridae.*)

- SAMd **Mitra episcopalis* L. *Bernardin St. Pierre* 107 *Mitre maritime*. Chem. IV, Fig. 1360.
 MBG Kien. pl. 1, Fig. 1. Reeve Fig. 5 Mauritius. Quoy et Gaim. Voy. Astrol., moll.
 AfIP pl. 45, Fig. 1—7 lebendes Thier. Dufo 181 Seychellen und Amiranten, auf
 Au schlammigem Sandboden, eingegraben. Sganz. 28 Madagaskar. Desh. 132 Reunion.
Lien. 18 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, Möbius. Agalegainseln Robillard. Das
 lebende Thier sondert einen purpurbraunen Saft ab, der wie grüne Walnusschale
 riecht und die Hand röthlichbraun färbt (Möbius).
 MdMI *Mitra cardinalis* Gmelin Lister hist. conch. pl. 838, Fig. 65 Mauritius. Chemn. IV,
 Fig. 1358, 1359 Mauritius. Kien. pl. 3, Fig. 6. Reeve Fig. 26. Vol. pertusa L.
 part. Sganz. 28 Madagaskar. Lien. 16 Mauritius.
 CM? *Mitra Rossiae* Reeve Fig. 198. Sow. thes. IV, Fig. 113 Mauritius. ornata (non
 Schubert et Wagn.) Kien. Fig. 8. Lien. 20 Mauritius, und 106 (rosinae) Car-
 gados. Von Robillard erhalten.
 MP **Mitra nucea* Gronov. Reeve Fig. 86. olivaria Lam. Encycl. pl. 371, Fig. 3. Kien.
 Fig. 102. Lien. 20 Mauritius. Auch von Caldwell und Robillard erhalten.
 C† *Mitra floccata* Reeve Fig. 16. Sow. Fig. 186. Lien. 105 Cargados.
 MdM *Mitra erronea* Dohrn Malak. Blätt. 1862. M. nebulosa (non Swains.) Reeve Fig. 3
 Af Madagaskar. Sow. thes. Fig. 39 Mad. M. versicolor (non Martyn) Kien. Fig. 18.
 Lien. 19 Mauritius. Auch von Robillard.
 M† *Mitra zephyrina* Duclos, Sow. thes. Fig. 306—308 Mauritius. M. Nevillii Hanley.
 SAM **Mitra fissurata* Lam. Kien. Fig. 110. Reeve Fig. 30. Sow. thes. IV, Fig. 89, 90
 RAfI Maur. Dufo 181 Seychellen und Amiranten, auf reinem Sande, sehr selten. Lien.
 18 Mauritius und 74 Seychellen. Mauritius, Möbius.
 MAf **Mitra filum* Wood Reeve Fig. 218. M. bicolor (non Swains.) Desh. Kien. Fig. 106.
 Fouquets auf Mauritius, Möbius. Auch von Caldwell und Robillard aus Mauritius
 eingeschickt.
 MAf *Mitra casta* Solander Reeve Fig. 40 Mauritius. Sow. thes. Fig. 46 Maur. M. fas-
 ciata Martyn univ. conch. pl. 20. M. matronalis Schumacher 1817.
 SC
 MdM *Mitra papalis* L. Chemn. IV, Fig. 1353, 1354. Kien. Fig. 3. Reeve Fig. 9. Sganz.
 AfIP 28 Madagaskar. Lien. 20 Mauritius, 74 Seychellen und 105 Cargados.

*) Der Schalenähnlichkeit wegen lasse ich diese Familie vorläufig im Sinne der Lamarck'schen Gattung *Mitra* beisammen, obwohl der *Radula* nach *Mitra* im engern Sinn zu den *Fusiden*, *Imbricaria* zu den *Bucciniden* gehört *Turricula* und *Strigatella* aber allein eine eigene Familie bilden würden.

- S A B *Mitra pontificalis* Lam. Chemn. IV, Fig. 1355, 1356. Encycl. pl. 370, Fig. 2. Kien. AfIP Fig. 2. Reeve Fig. 23. Martens Südseeconchylien S. 13. *Dufo* 181 Seychellen, sehr selten, und Amiranten. *Desh.* 132 Reunion.
- Md I *Mitra puncticulata* Lam. Kien. Fig. 20. Reeve Fig. 9. *Sganz.* 28 Madagaskar.
- MI *Mitra digitalis* Chemn. X, Fig. 1432, 1433. Reeve Fig. 21. *Sow.* thes. Fig. 207 Mauritius. Vol. *pertusa* L. part. *M. millepora* Lam. Encycl. pl. 370, Fig. 5. *Kien.* Fig. 19 Ile de France. *Lien.* 18 Mauritius. Auch von *Lamare-Picquot* von daher erhalten.
- M† *Mitra floridula* *Sow.* thes. Fig. 283 und 611 Mauritius.
- MIP *Mitra coronata* Chemn. XI, Fig. 1719, 1720. Encycl. pl. 371, Fig. 6. Kien. Fig. 60. Reeve Fig. 104. *Sow.* thes. Fig. 217—220 Mauritius. Pease Am. Journ. Conch. IV p. 119. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 17 Mauritius. Auch von *Caldwell* und *Robillard* ebendaher erhalten.
- M? *Mitra tiarella* Swainson, *Sow.* thes. Fig. 56 Mauritius. Der vorigen sehr ähnlich.
- M† *Mitra luctuosa* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851; *Sow.* thes. Fig. 229 Mauritius.
- MI *Mitra texturata* Lam, Schubert und Wagner Chemn. XII, Fig. 4005. Kien. Fig. 4. Reeve Fig. 155. *Lien.* 21 Mauritius. (*Voluta nubecula* L. nach Hanley.)
- MI *Mitra guttata* Swains. Reeve Fig. 69. *Sow.* Fig. 166 Mauritius, von Herrn *Caldwell* erhalten.
- CM Af *Mitra (Nebularia) terebralis* Lam. Kien. Fig. 21. *Lien.* 21 Mauritius und 106 Cargados.
- MI *Mitra (Nebularia) ambigua* Swains. zool. illustr. 2, I, pl. 30, Fig. 2. *Kien.* p. 40. Fig. 16 Ile de France. *Desh.*, Lam. X, p. 347. Reeve Fig. 8.
- MBIP *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam. Chemn. IV, Fig. 1380, 1381. Kien. Fig. 23. Reeve Fig. 28. *Sow.* thes. Fig. 15 Mauritius. *M. Martiniana* Menke 1828. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* Mauritius.
- MIP **Mitra (Nebularia) chrysostoma* Swains. Reeve Fig. 12. *Sow.* thes. Fig. 95*, 96* Mauritius. *M. contracta* (non Swains.) Kien. Fig. 25. *M. Kieneri* Philippi, Zeitschr. Malak. 1850. *Lien.* 17 Ilot, Mauritius. Ebendaher von Prof. *Möbius* und Herrn *Caldwell*.
- M† *Mitra (Nebularia) Barclayi* Hankey. *Sow.* thes. Fig. 225 und 612, Flacq, Mauritius, Barclay. *Lien.* 16, *Robillard*.
- M† *Mitra (Nebularia) infecta* Reeve Proc. Zool. Soc. 1844. *Sow.* thes. Fig. 607 Mauritius.
- M† *Mitra (Nebularia) nassoides* *Sow.* thes. Fig. 631 Mauritius, *Barclay*.
- M? *Mitra (Nebularia) caeligena* Reeve Fig. 227 Mauritius, von *Robillard*.
- MIP *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve Fig. 280. *Sow.* thes. Fig. 210—212 Mauritius. *Lien.* 16 Mauritius.
- M† *Mitra (Nebularia) cretacea* *Sow.* thes. Fig. 577, 578 Mauritius.
- M† *Mitra (Nebularia) serotina* A. Adams, *Sow.* thes. Fig. 216 Mauritius.
- Md? M *Mitra (Nebularia) pellis-serpentis* Reeve Fig. 66. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 20
- BI Mauritius, auch von *Robillard*.

Dieses ist vielleicht auch die von *Sganzin* 28 für Madagaskar erwähnte *M. granulosa* Lam.; die ächte dieses Namens ist westindisch.

- MIP *Mitra* (*Scabricula*) *sphaerulata* Martyn univ. conchol. I, Fig. 21. Reeve Fig. 37. Martens Südseeconchyl. S. 15. Vol. leucostoma Gmelin. *M. scabriuscula* Lam. Schubert et Wagn. Chemn. XII, Fig. 3090, 3091. Kien. Fig. 9. *Lien.* 21 Maur.
- MI *Mitra* (*Scabricula*) *crenifera* Lam. Encycl. pl. 370, Fig. 3. Kien. Fig. 11. Reeve Fig. 38 Mauritius. Sow. thes. Fig. 29—31 Mauritius. Auch von *Lamare-Picquot* erhalten.
- M† **Mitra* (*Scabricula*) *eximia* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851; Sow. thes. Fig. 266 Mauritius. *Lien.* 18. Auch von Prof. *Möbius* und *Robillard* erhalten. Kaum verschieden von *M. lacunosa* Reeve Fig. 65.
- M† *Mitra* (*Scabricula*) *Mauritiana* Sow. thes. Fig. 610 Mauritius, *Barclay*.
- MI *Mitra* (*Scabricula*) *granatina* Lam. Encycl. pl. 371, Fig. 4. Kien. Fig. 10. *scabricula* (Linne?) Mörch. Reeve Fig. 35. *Lien.* 21 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MI? *Mitra* (*Scabricula*) *Desetangsi* Kiener iconogr. p. 98, Fig. 94 Ile de France. *variegata* (Reeve) Sow. Fig. 162, 163 Maur. Auch von *Robillard* erhalten.
Lienard Journ. de Conch. XVII, 1869, p. 226 erklärt sie für verschieden von *variegata* Reeve Fig. 111 (von den Philippinen), dagegen in seinem Catalog 1877 p. 17 für identisch, führt aber p. 22 *variegata* noch einmal besonders auf.
- MAf **Mitra* (*Scabricula*) *acupicta* Reeve Fig. 76 (von Zanzibar). Sow. thes. Fig. 548. *Lien.* 16 Mauritius. Auch von *Möbius* gesammelt.
- MBIP **Mitra* (*Cancilla* Ad.) *filaris* L. Chemn. IV, Fig. 1388, 1389, *nexilis* Martyn, *filosa* Lam. Schubert et Wagn. Chemn. XII, Fig. 3092, 3093. Kien. Fig. 12. Reeve Fig. 81. Sow. thes. Fig. 82, 83 Mauritius. Philippi Zeitsch. Malak. 1850, p. 25. Martens Südseeconchyl. S. 14. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 18 Mauritius, *Fouquets*, *Möbius*.
- MAfI **Mitra* (*Cancilla*) *annulata* Reeve Fig. 103. Sow. thes. Fig. 91—93 Maur. *nitens*. Kien. Fig. 12. *Lien.* 16 und 20 Mauritius. *Fouquets*, *Möbius*.
- MI *Mitra* (*Cancilla*) *circulata* Kien. Chemn. IV, Fig. 1391. Kien. Fig. 13. Reeve Fig. 77. Sow. thes. Fig. 86, 87 Maur. *Lien.* 17 Ilot, Mauritius.
- M† *Mitra* (*Cancilla*) *crebrilineata* Sow. thes. Fig. 626 Mauritius.
- MI *Mitra* (*Cancilla*) *Solandri* Reeve Fig. 172. *Lien.* 21 Mauritius.
- MIP *Mitra* (*Cancilla*) *interlirata* Reeve Fig. 70. Martens Südseeconch. S. 18. *foveolata* Dohrn Novitat. conchol. Taf. 15, Fig. 5, 6. *Lien.* 19 Mauritius.
- MIP *Mitra* (*Cancilla*) *flammea* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. moll. pl. 45 bis Fig. 23—25, lebendes Thier. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 121. *flammigera* Reeve Fig. 173. *Lien.* 18 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- M† *Mitra* (*Cancilla*) *Cernica* Sow. thes. Fig. 670 Mauritius.
- M† *Mitra* (*Cancilla*) *angustata* Sow. thes. Fig. 671 Mauritius.
- SAMB **Mitra* (*Chrysame*) *cucumerina* Lam. Chemn. IV, Fig. 1398, 1399. Encycl. pl. 375, IP Fig. 1. Kien. Fig. 24. Reeve Fig. 201. Sow. thes. Fig. 279 Mauritius. Gray guide of mollusca p. 29 (*Radula*). Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 121. *Dufo* 182

- Seychellen und Amiranten, ziemlich häufig, auf Felsengrund, 2—4 m tief. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 17 Maur. und 74 Seychellen. Fouquets und Grande Baie, *Möbius*.
- MI Mitra (Chrysame) *rubiginea* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851; *Sow.* thes. Fig. 257, 258 Mauritius.
- MR *Mitra (Chrysame) *sulcata* Menke catalog. Malsburg 1829, S. 84. *M. fraga* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 43 bis Fig. 28, 29. *Sow.* Fig. 284. *Lien.* 18 Maur. *M. peregra* Reeve Fig. 186; Mauritius, Prof. *Möbius* und *Caldwell*.
- MI Au Mitra (Chrysame) *aurantia* Gmelin Chemn. Chemn. IV, Fig. 1393, 1394. *M. Peroni* Lam. *Lien.* 16 Mauritius.
- M† Mitra (Chrysame) *nana* Reeve Proc. Zool. Soc. 1844. *Sow.* thes. Fig. 434 Maur.
- MI *Mitra (Chrysame) *telescopium* Reeve pl. 20, Fig. 80. Mauritius, *Möbius* und *Robillard*.
- MI Mitra (Chrysame) *tabanula* Lam. Kien. Fig. 27. Reeve Fig. 332. *Lien.* 21 Maur.
- MP Mitra (Chrysame) *rotundilirata* Reeve Fig. 178. *Lien.* 21 Mauritius.
- MP Mitra (Chrysame) *turgida* Reeve Fig. 273. *Lien.* 22 Mauritius.
- SMBI *Mitra (Phaeomitra n.) *fulva* Swains. zool. illustrat. II, pl. 30, Fig. 1. Reeve Fig. 24.
- P (? *M. coffea* Wagner et Schubert Chemn. XII, 1829, Fig. 3096, 3097). *Sow.* thes. Fig. 615 Mauritius. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 17 und 18 Mauritius. Seychellen und Fouquets, *Möbius*.
- M. fulvescens* Reeve 255, *Lien.* 18 Mauritius, ist nach Reeve selbst vielleicht nur Jugendzustand derselben.
- MI Mitra (Phaeomitra) *Ticaonica* Reeve Fig. 181. *Lien.* 22 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MB Mitra (Phaeomitra) *oleacea* Reeve Fig. 105. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 20 Maur.
- S?MI Mitra (Phaeomitra) *polita* Reeve conch. ic. Fig. 94. *Sow.* thes. Fig. 98 (beide von den Philippinen). Unsere Taf. 20, Fig. 15.
- Testa fusiformi-turrita, spiratim punctato-sulcata, nitida, obscure fusca, zona angusta lutea paulo infra suturam picta, apice parvo laevi, pallide flavo; anfr. 7, plani, sutura lacera superficiali juncti, priores 4 sulcis spiralibus impressis punctiferis senis conspicuis, sequentes totidem seriebus punctorum sculpti, ultimus basi attenuatus ibique spiratim sulcatus; apertura elongata, dimidiam testae longitudinem aequans, margine externo simplice, columella alba, quadriplicata.
- Long. 22, diam. 8, apert. long. 11, diam. 3 mm.
- Mauritius, *Robillard*.
- Unter dem Namen *M. ebenus* Lam. erhalten, aber *M. ebenus* Lam. ist eine dem Mittelmeer eigenthümliche Art, welche allerdings in der Färbung ähnlich ist, aber sogleich durch den Mangel der Furchen und Punktreihen zu unterscheiden ist. Das schmale gelbe Band fällt bei unserer Art auf die dritte Furche oder Punktreihe von oben an gerechnet. Der Nathrand ist öfter etwas heller und vorstehend.
- M† Mitra (Phaeomitra) *bilineata* Reeve 294. *Lien.* 16 Mauriten.
- MI Mitra (Phaeomitra) *typha* Reeve 267. *Lien.* 22 Mauritius.
- M† Mitroidea Barclayi *H. Adams* (Mauritia) Proc. Zool. Soc. 1869, p. 273, pl. 19,

Fig. 5. *Mitra dibaphiformis* Sowerby thes. Fig. 309, 310. *Lien.* 18 Mauritius, zuerst von *M'Andrew* bei der kleinen Insel Barkly gefunden; das Berliner Museum erhielt sie auch von *Caldwell* und *Robillard*.

Der Gattungsname *Mitroidea* Pease ist von 1865, also älter als *Mauritia*, die von Pease beschriebene Art polynesisch. Die Färbung dieser Schnecke erinnert auffällig an diejenige von *Mitra Rossiae* Reeve, die ja auch bei Mauritius vorkommt, Macdonald (Transact. R. Soc. of Mauritius, V, 1871, Journ. de Conch. XXI, p. 383) hat die Radula dieser Schnecke untersucht und mit derjenigen der ächten *Mitra* übereinstimmend gefunden.

M† *Mitroidea telum* Sow. thes. (*Mitra*) Fig. 613, 614 Mauritius.

MGP *Dibaphus edentulus* Swainson (Conohelix), Reeve conch. icon. II *Mitra*, Fig. 80, Philippi Archiv für Naturgeschichte 1847, S. 63, Taf. 3, Fig. 1—3. Adams genera of moll. pl. 26, Fig. 7. D. Philippii Crosse Revue zoologique 1858, pl. 3, Fig. 1. Weinkauff in der neuen Ausgabe von Chemnitz, Lieferung 238, S. 2, Taf. A, Fig. 2. Sow. thes. *Mitra* Fig. 608, 609. *Lien.* 18 (*Mitra* ed.) Mauritius, auch von *Caldwell* erhalten. Agalega-Inseln, *Robillard*.

A. Garrett hat das lebende Thier beobachtet und fand Uebereinstimmung mit andern Mitridae (Proc. Zool. Soc. 1872, p. 843). Was aus der Schale allein geschlossen werden kann, hat schon Philippi a. a. O. gut auseinandergesetzt, indem er neben *Mitra* und *Conus* auch an *Terebellum* und *Strombus terebellatus* erinnert. Weinkauff betont die Aehnlichkeit mit *Conus mitratus* und ist nicht abgeneigt, *Dibaphus* nur für eine Missbildung desselben zu halten; er sagt, an den obern Windungen, mit Ausnahme der letzten, sei „ein Unterchied, selbst der allerkleinste, nicht zu bemerken“. Dem entgegen muss ich hervorheben, dass doch zwischen den obern Windungen von *Conus mitratus* (3 Exemplare) und *Dibaphus* (4 Exemplare) recht merkliche Unterschiede bestehen, bei ersterem ist der sichtbare Theil jedes Umgangs verhältnissmässig viel niedriger als bei *Dibaphus*, Höhe zum Durchmesser bei *Conus mitratus* etwa wie 1:3, bei *Dibaphus* auf dem vorletzten Umgang wie 1:2, und die Sculptur ist bei *Conus mitratus* gekörnt, bei *Dibaphus* aus scharfen Kieleisten gebildet, endlich ist das ganze Gewinde bei *Dibaphus* schlanker, im Profil etwas konkav, bei *Conus mitratus* breiter und konvex. Sollte Weinkauff etwa noch eine andere Art vor sich gehabt haben? Grössere Aehnlichkeit, doch auch nicht völlige Uebereinstimmung finde ich zwischen den obern Windungen von *Mitra abbatis* (Chemnitz) und denen von *Dibaphus*.

Md(M?) *Turricula regina* Swainson Chemn. X, Fig. 1444, 1445. Desh. Lam. an. s. vert. X, I p. 345. Kien. pl. 19, Fig. a. Reeve Fig. 48. *Mitra taeniata* Lam. part., *Sganz.* 28 Madagaskar. Aus Nossi-Be von *Robillard* erhalten. *Lien.* 22 führt einfach *M. taeniata* Lam. von Mauritius an.

MI? *Turricula lyrata* Lam. Chemn. IV, Fig. 1434, 1435 (Vol. subdivisa). Kien. Fig. 71. Reeve Fig. 46. Sow. thes. Fig. 23. *Lien.* 19 Mauritius. Auch von *Lamare-Piquot* und *Robillard* ebendaher erhalten.

MdAfI *Turricula intermedia* Kien. (*Mitra*) p. 73, pl. 22, Fig. 70 Madagaskar. Reeve Fig. 60.

MI **Turricula cinctella* Lam. Kien. Fig. 62. Reeve Fig. 63 Fouquets auf Maur., *Möbius*.

SIP *Turricula corrugata* Lam. Chemn. IV, Fig. 1364. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 45, Fig. 10. Kien. Fig. 67. Reeve Fig. 57. *Dufo* 181 Seychellen, auf Schlammgrund, selten. Häufig im indischen Archipel, z. B. bei Amboina und bei Batjan von mir gesammelt.

MI **Turricula Gruneri* Reeve Fig. 119 Mauritius, *Möbius*.

SMRI **Turricula rigida* (Swainson?) Reeve Fig. 169. M. Michauï Crosse Journ. de Conch. XII, 1867, p. 337. *Lien.* 20 Mauritius. *M. alauda* Sow. thes. Fig. 134, 135

Mauritius. Von Prof. Möbius bei St. Anne, Seychellen, gesammelt; von Robillard auch aus Mauritius erhalten. Hierher auch *M. alauda* (Quoy) *Lien.* 16.

Wahrscheinlich auch *M. Deshayesi* Sow. thes. Fig. 155 u. 618 Mauritius. *Lien.* 18; die vorliegende Art wird durch Verbleichung scheinbar der *Deshayesi* ähnlich; die ächte *Deshayesi* ist mir nur aus der Südsee (*Uvea*, Godeffroy) bekannt.

M *Turricula corallina* Reeve Fig. 330 Mauritius, Robillard, mit zwei weissen Binden.

BI *Turricula funerea* Reeve Fig. 108. *Desh.* 132 Reunion.

MI *Turricula crebrilirata* Reeve Fig. 92. *rosea* Kien. Fig. 73. *Lien.* 17 Mauritius.

MI *Turricula obeliscus* Reeve Fig. 107. *Lien.* 20 Mauritius.

Nahe verwandt mit *M. oniscina* Lam.

MI **Turricula angulosa* Küster neue Ausgabe von Chemnitz, Mitra Reeve Fig. 223. *Lien.* 16 Mauritius. Auch von Möbius und Robillard.

SAMI **Turricula* (*Callithea*) *sanguisuga* L., var. **stigmataria* Lam., mit zwei Reihen rother Flecken auf den Rippen. Chemn. IV, Fig. 1367, 1368. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 45, Fig. 11, 12, lebendes Thier. Kien. Fig. 74. Reeve Fig. 15. Sow. thes. 47 Mauritius. Dufo 181 Seychellen sehr selten, Amiranten etwas häufiger, auf Sand, 2—3 m tief. *Lien.* 21 Mauritius. Bei St. Anne, Seychellen, von Prof. Möbius gesammelt.

Die mit ganz rothen Rippen, Chemn. IV, Fig. 1373, 1374, *sanguisuga* Lam. und diejenige ganz ohne Roth, *granosa* Chemn. IV, Fig. 1442, 1443, scheinen noch nicht in unserm Gebiet beobachtet zu sein.

M **Turricula* (*Callithea*) *crocata* Lam. Kien. Fig. 85. Reeve Fig. 206. Reeve Fig. 206. *Lien.* 17 Mauritius. Auch von Prof. Möbius und Robillard ebenda gesammelt.

MBI *Turricula* (*Callithea*) *aureolata* Swainson, Sow. thes. Fig. 497—501 Mauritius.

Mitra *venustula* Reeve Fig. 204. *Desh.* 132 Reunion. *Lien.* 16 (*aureolata*) und 22 Mauritius. Auch von Robillard erhalten.

Turricula (*Callithea*) *aureolata* var. *flavescens* Reeve Fig. 207. Ebenfalls durch Robillard aus Mauritius erhalten.

Turricula (*Callithea*) *aureolata* var. *affinis* Reeve Fig. 211. Ebenfalls durch Robillard aus Mauritius erhalten.

Der vorstehenden sehr nahe stehend, doch stärker vertikal gefaltet.

MI *Turricula* (*Callithea*) *turben* Reeve Fig. 213. Sow. thes. Fig. 457 Mauritius. *Lien.* 22. Auch von Robillard.

MI **Turricula* (*Callithea*) *clathrata* Reeve Fig. 71. Sow. thes. Fig. 532 und 616 Mauritius. *Lien.* 17. Fouquets, Möbius.

MI *Turricula* (*Callithea*) *militaris* Reeve Fig. 236 Mauritius, von Robillard erhalten. Das rosenfarbige Band sehr blass, Nabelritz bei einem Exemplar offen, bei einem andern geschlossen.

M†? *Turricula* (*Callithea*) *rugosa* Sow. Reeve Fig. 101. *Lien.* 21 Mauritius. Auch von Robillard.

MP *Turricula* (*Callithea*) *mucronata* Swains. Proc. Zool. Soc. 1835. Reeve Fig. 125. Sow. thes. Fig. 377—380 Mauritius. Vol. *coronata* Helbling Abhandl. einer böh-

mischen Privatgesellschaft IV, 1779, Taf 2, Fig. 28, 29 (nicht *Mitra coronata* Chemn., Lam.). *Lien.* 19 Mauritius.

M P . *Turricula* (*Callithea*) *mucronata* var. *concentrica* Reeve Fig. 128: *Lien.* 17 Mauritius, *Robillard*.

S Md M **Turricula* (*Callithea*) *exasperata* Chemn. X, Fig. 1438, 1439, Menke 1829. Reeve Af I Fig. 126. *Mitra torulosa* Lam. *Kien.* p. 90, Fig. 77 Madagaskar. *Lien.* 18 Mauritius und 74 Seychellen. St. Anne, *Möbius*. Auch Querimbainseln, Peters.

S M B **Turricula* (*Callithea*) *cadaverosa* Reeve Fig. 160. *Sow.* thes. Fig. 386 Mauritius. R P Martens Südseeconchylien S. 14. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 16 Mauritius. Seychellen, Prof. *Möbius*.

M. *Pharaonis* Gené in Issel malacol. del mar rosso pl. 3, Fig. 8 scheint nicht davon verschieden, sie wurde auch von Ehrenberg im rothen Meer gesammelt.

M B *Turricula* (*Callithea*) *discolor* Reeve Proc. Zool. Soc. 1844; conch. ic. Fig. 230. *Desh.* 133 Reunion. Auch auf Mauritius von *Möbius* und *Robillard* gesammelt.

M I *Turricula* (*Callithea*) *cruentata* Chemn. X, Fig. 1438, 1439; Menke 1828; Reeve Fig. 126. *Mitra harpaeformis* Lam. *Kien.* Fig. 78. Vergl. auch Nevill Journ. As. Soc. Beng. XLIV, 1875, p. 99 (verschiedene Varietäten). *Lien.* 19 Mauritius.

M † *Turricula* (*Callithea*) *cineracea* Reeve Fig. 311. *Lien.* 16 Mauritius.

M I *Turricula* (*Callithea*) *modesta* Reeve Fig. 254. *Sow.* thes. Fig. 540. *Lien.* 19 Mauritius.

M † *Turricula* (*Callithea*) *corbicula* *Sow.* Proc. Zool. Soc. 1870; thes. Fig. 538 Maur.

M R *Turricula* (*Callithea*) *Pharaonis* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1872, pl. 3, Fig. 1 (rothes Meer). *Lien.* 20 Mauritius.

Verschieden von M. *Pharaonis* Gené bei Issel 1869, vergl. oben bei M. *exasperata*.

M I *Turricula* (*Callithea*) *purpurata* Reeve Fig. 275. *Lien.* 20 Mauritius. Auch von *Robillard* ebendaher.

M R *Turricula* (*Callithea*) *Osiridis* Issel malacologia del mar rosso pl. 3, Fig. 9. *Lien.* 20 Mauritius.

M † *Turricula* (*Callithea*) *subquadrata* *Sow.* thes. Fig. 485 Mauritius.

M † *Turricula* (*Callithea*) *brevicundata* *Sow.* ibid. Fig. 410 Mauritius.

M † *Turricula* (*Thala*) *Cernica* *Sow.* thes. 1874, Fig. 670, Mauritius. (Non Nevill 1873).

M † *Turricula* (*Thala*) *angustata* *Sow.* ibid. Fig. 671 Mauritius.

M † **Turricula* (*Thala*) *simulans* sp. n. Taf. 20, Fig. 18.

Testa minima, fusiformi-oblonga, noduloso-cancellata, seriebus nodulorum spiralibus in anfr. penultimo 3 conspicuis, in ultimo 12—12, verticalibus in anfr. ult. 10, rosea; anfr. 5(?), planiusculi, spiram obtusam conoideam efficientes, ultimus angustus, basi sensim attenuatus; apertura angusta, dimidiam longitudinem superans, margine externo incrassato, extus crenulato, superne emarginato, columella triplicata, plicis introrsum validioribus, ad aperturam debilioribus, canali brevi, aperto.

Long. $4\frac{1}{2}$, diam. $1\frac{1}{3}$, apert. long. $2\frac{1}{2}$, diam. $\frac{1}{2}$ mm.

Mauritius, in dem von Prof. *Möbius* mitgebrachten Sande von Herrn G. Schacko

aufgefunden, und zwar nur einige unvollkommene, namentlich an der Spitze beschädigte Stücke.

Diese Art scheint auf den ersten Anblick eine Clathurella zu sein, aber die im Innern deutlich ausgebildeten Columellarfalten verweisen sie zu Mitra. *M. todilla* Mighels von den Sandwichinseln ist ähnlich, aber grösser, mit 4 Columellarfalten und etwas mehr Knotenreihen.

- MBI *Turricula* (*Pusia*) *patriarchalis* Lam. Kien. Fig. 88. Reeve Fig. 146. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 20 Mauritius.
- MP *Turricula* (*Pusia*) *patriarchalis* var. *tuberosa* Reeve Fig. 227. Sow. thes. Fig. 267 Mauritius. *Lien.* 22 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
Nur durch kürzeres Gewinde von der vorigen zu unterscheiden.
- MI **Turricula* (*Pusia*) *muriculata* Lam. Chemn. X, Fig. 1428. Kien. Fig. 92. Reeve Fig. 205. Sow. thes. Fig. 202, 203 Mauritius. *Lien.* 19 Mauritius. Ebendaher auch von *Möbius* und *Robillard*.
Grundfarbe bald intensiv rothbraun, bald hellgelb.
- M **Turricula* (*Pusia*) *pinguis* Reeve 304 Mauritius, *Möbius* und *Robillard*.
Nahe verwandt der folgenden.
- MI *Turricula* (*Pusia*) *nodosa* Swainson 1839, Reeve Fig. 196. Sow. thes. Fig. 268, 269 Mauritius. *M. fraga* Kien. Fig. 87 (non Quoy et Gaimard). *M. cancellarioides* Anton 1839. *Lien.* 20 Mauritius.
- MP *Turricula* (*Pusia*) *dermestina* Lam. Kien. Fig. 91. Reeve Fig. 143. Pease Amer. Journ. Conch. IV, p. 119. *Desh.* 135 Reunion.
- MI *Turricula* (*Pusia*) *lauta* Reeve Fig. 244. Mauritius, *Robillard*.
Sehr nahe der vorigen.
- BIP *Turricula* (*Pusia*) *porphyretica* Reeve Fig. 195. Sow. thesaur. Fig. 489. *Desh.* 133 Reunion.
- MI **Turricula* (*Pusia*) *tusa* Reeve Fig. 283. *Lien.* 22 Mauritius. Fouquets, *Möbius*.
- MI *Turricula* (*Pusia*) *speciosa* Reeve Fig. 209. *Lien.* Fig. 21. Sow. thes. Fig. 414, 415 Mauritius.
- MI *Turricula* (*Pusia*) *pardalis* Küster Chemnitz neue Ausgabe Taf 17, Fig. 14, 15. Reeve Fig. 240. Sow. thes. Fig. 470, 471 Mauritius. *Lien.* 20. Auch von *Robillard*. Ebendaher.
- MP *Turricula* (*Pusia*) *Cernica* Nevill Journ. As. Soc. XLIII, 1873, p. 24 Mauritius. Nahe der vorigen. *Lien.* 17.
- MI *Turricula* (*Pusia*) *Adamsoni* Gray. Reeve Fig. 150. Sow. thes. Fig. 285 und 627 Maur. *Lien.* 15 (*Adanson*).
- BI *Turricula* (*Pusia*) *coriacea* Reeve Fig. 231 (Philippinen). *Desh.* 133 Reunion.
- M† *Turricula* (*Pusia*) *mediomaculata* Sow. Proc. Zool. Soc. 1870, thes. (*Mitra*) Fig. 472 Mauritius.
- Md? P *Strigatella* *columbellaeformis* Kien. *Mitra* p. 47, Fig. 46 Madagaskar. *Desh.* Lam. X, p. 357. Reeve Fig. 638. Sow. thes. Fig. 255, 256 Madagaskar. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 120. *Mitra striata* Gray Zool. Beech. pl. 36, Fig. 7. Vergl. Martens Südseeconchyl. S. 16.

- MBP? **Strigatella auriculoides* Reeve Fig. 228. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 16 Mauritius. Black river. *Möbius*. *M. fuscescens* (Pease) Sow. thes. Fig. 303 Mauritius.
- M† *Strigatella flexilabris* Sow. Proceed. Zool. Soc. 1875, p. 127, pl. 24, Fig. 4 Mauritius.
- MIP **Strigatella acuminata* Swains. zool. illustr. 2, III, pl. 128. Reeve Fig. 138. *Mitra lutea* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, moll. pl. 45 bis, Fig. 7—8 lebendes Thier. *Desh.* Lam. an. s. vert. X, p. 351. Martens Südseeconchylien S. 13. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 16 Mauritius. Black river und Fouquets, *Möbius*.
- SCMB **Strigatella paupercula* L. Chemn. IV, Fig. 1386, 1387. Quoy et Gaim. Voyage
- RAfIP Astrol. pl. 45, Fig. 13—15 lebendes Thier. Kien. Fig. 48. Reeve Fig. 84. Sow. thes. Fig. 428, 429. Martens Südseeconch. S. 13. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 20 Mauritius, 74 Seychellen und 106 Cargados. Fouquets, *Möbius*.
- **Strigatella paupercula* var. *M. tigrina* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851; Sow. thes. Fig. 438 Mauritius. *M. jucunda* Tapparone-Canefri Zoologia del viaggio della Magenta, p. malacol. 1874, p. 27, pl. 1, Fig. 2 Mauritius.
- Nur durch Verkürzung des Gewindes und Verschmälerung des letzten Umgangs nach unten von *paupercula* verschieden, daher Uebergang zur folgenden. Die Massangabe 0,43 m im italienischen Original ist, wie die Figur zeigt, auf 0,043 m zu reduzieren.
- Strigatella paupercula* var. *M. retusa* Lam. Chemn. X. 1417, 18. Kien. Fig. 49. Reeve Fig. 199. Sow. thes. Fig. 447, 448 Maur. *Dufo* 182 Mahé, selten.
- SMB **Strigatella literata* Lam. Kien. Fig. 50 Bourbon. Reeve Fig. 153. *Dufo* 182
- RI Mahé. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 19 Mauritius. *Mitra* Black river und Fouquets, *Möbius*.
- Cylindra* siehe Marginellidae.
- MP *Imbricaria ossea* Reeve *Mitra* Fig. 219. *Conohelix punctata* Swainson, *Mitra Vanikorensis* (Quoy et Gaimard) var. Kiener Fig. 113a. *Lien.* 22 Mauritius. Von *Robillard* erhalten.
- MIP *Imbricaria conica* Schumacher 1817. *Desh.* Lam. X, p. 355. *Mitra marmorata* Schubert et Wagner Chemn. XII, Fig. 4000, 4001. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. zool. II, p. 647, pl. 45b, Fig. 1—4 lebendes Thier. Kien. *Mitra* Fig. 112. *Conohelix Swainsoni* Lesson Voy. Coquille, zool. pl. 11, Fig. 5. Nur von *Lienard* 19 Mauritius für unser Gebiet erwähnt.

Marginellidae.

- MBR **Cylindra crenulata* Chemn. X, 1413, 1414. *Mitra cr.* Lam. Kien. Fig. 105. Reeve Fig. 190. Sow. thes. Fig. 354, 355 Maur. *C. coronata* Schumacher. *Desh.* 133 Reunion. *Lien.* 17 Mauritius. Auch von *Möbius* und *Robillard* ebendaher.
- MI *Cylindra glans* Reeve *Mitra* Fig. 191. *Lien.* 19 Mauritius.
- C† *Marginella majuscula* n. Taf. 22, Fig. 2.

Testa globosa-ovata, alba, concolor, spira plane obtecta, margine externo extus incrassato, variciformi, intus leviter denticulato, pariete aperturali supra et medio inermi, infra 5 quinqueplicato, plica suprema abbreviata minima, secunda et

tertia horizontalibus angustis, quarta et quinta descendentibus crassioribus paulo brevioribus.

Long. 16, diam. 11, apert. diam. incluso peristomate 4, excl. $2\frac{1}{2}$ mm.

Cargados, von *Robillard* erhalten.

Es ist mir keine andere Art bekannt, welche dieser sehr nahe stehen würde.

- M Af *Marginella festiva* Kien. (pl. 10, Fig. 4, Reeve XV, Fig. 93) var. *gemma* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1855, p. 112. Reeve Fig. 94. *Weinkauff* Jahrb. nat. Gesellsch. VII, p. 43 Mauritius.
- M † *Marginella picturata* *Nevill* Journ. As. Soc. Bengal. XLIII, 1874, p. 23; 1875, pl. 8, Fig. 8, 9 Mauritius. *Jousseaume* Revue zool. 1875, p. 191. *Weinkauff* Neue Ausgabe von Chemnitz Marg. Taf. 22, Fig. 13, 14 Mauritius.
- M B † **Marginella Borbonica* *Jousseaume* Revue zool. 1875, p. 176 Bourbon, sehr häufig. *Weinkauff* Taf. 22, Fig. 9. *Volvaria pusilla* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1867, p. 303, pl. 19, Fig. 1 (non Marg. *pusilla* Fr. Edwards foss.) Port Louis, Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* gesammelt.
- B † *Marginella Lantzi* *Jousseaume* ibid. p. 178, pl. 7, Fig. 5 Bourbon.
- M I *Marginella Nevilli* *Jousseaume* loc. cit. p. 191. *Weinkauff* Taf. 18, Fig. 5 und 8, Taf. 22, Fig. 13 und 16. *M. inconspicua* (non Sow.) *Nevill* Journ. As. Soc. Bengal. XLIII, 1874, p. 23; 1875, pl. 8, Fig. 10, 11 Mauritius, auch von Bombay. Nach *Weinkauff* identisch mit der vorhergehenden Art.
- M B I *Marginella fusiformis* Hinds Voy. Sulphur. pl. 13, Fig. 20, 21. Sow. thesaur. Fig. 76, 77. Reeve Fig. 79. *Desh.* 136 Reunion. *Lien.* 23 Mauritius.
- M B S Af **Marginella rufula* Gaskoin Proc. Zool. Soc. 1849. Reeve Fig. 149. *Jousseaume* p. 176 Bourbon, Mauritius. *Weinkauff* Taf. 13, Fig. 2 und 3. *M. neglecta* (non Sow.) *Desh.* 136 Reunion. Mauritius, im Sand, *Möbius*.
Blassrothgrau mit einem weisslichen Band in Schulterhöhe.
- M B † *Marginella* (*Serrata*) *Delessertiana* Recluz Revue zool. 1841, p. 183. *Jousseaume* loc. cit. p. 231 Bourbon, Maurice. *M. triticea* (non Lam.) Sow. thes. Fig. 121. *Weinkauff*, Taf. 24, Fig. 7, 8. *Lien.* 23.
- M B † *Marginella* (*Serrata*) *Lienardi* *Jousseaume* loc. cit. p. 230 Mauritius, Bourbon. *M. triticea* Sow. thesaur. Fig. 119, 120. *Lien.* 23. *M. varia* (non Sow.) *Desh.* 136 Reunion.
- M † *Marginella* (*Serrata*) *serrata* Gaskoin Reeve Fig. 124. *Jousseaume* loc. cit. p. 230 Mauritius. *Weinkauff* Taf. 14, Fig. 1 und 4. *Lien.* 23.
Nach Reeve westindisch.
- M B ? † *Marginella* (*Gibberula*) *asellina* *Jousseaume* loc. cit. p. 243, pl. 7, Fig. 6 Maur. *Weinkauff* Taf. 20, Fig. 9 und 12. *Lien.* 23. Vermuthlich auch *M. miliaria* *Desh.* 136 Reunion.
- B † *Marginella* (*Granula*) *pulvis* *Jousseaume* loc. cit. p. 249, pl. 7, Fig. 2 Bourbon. *Weinkauff*, Taf. 20, Fig. 1 und 4.
- M † *Marginella* (*Closia*) *ovum* Reeve Fig. 89. *Weinkauff* Taf. 12, Fig. 6 und 7. Cl. Paros *Jousseaume* loc. cit. p. 255. *Lien.* p. 23 Mauritius.

MI Marginella (Closia) Sarda Kien. Fig. 38 Mauritius. Sow. thes. Fig. 174, 175. Reeve Fig. 91. Weinkauff Taf. 8, Fig. 1 und 4. Auch von Robillard aus Mauritius erhalten.

CM† Marginella (Closia) Marcelli Jousseume loc. cit. p. 256. pl. 8, Fig. 4 Mauritius Weinkauff Taf. 18, Fig. 6 und 7. Lien. 23. Sehr ähnlich der vorhergehenden.

Sganz. 28 giebt Marginella persicula L. als gemein an der Küste von Madagaskar an, es muss das Irrthum oder falsche Bestimmung sein, die Art ist westafrikanisch. Deshayes 136 Marg. lactea Kien. mit Fragezeichen von Reunion. Diese ist aber nach Jousseume und Weinkauff westindisch, Lienard für Mauritius 22 M. amygdala Kiener, die westafrikanisch ist, M. crassitabrum Sow. (= Leai Jousseume pag. 200 unbekannten Fundorts) und die ebenfalls westafrikanische stipon Adamson's.

Volutidae.

CAfI Voluta (Lyria) costata Swainson exotic conchol. pl. 42. Sow. thes. Fig. 71, 72. Reeve VI, Fig. 51. Vol. Anna Lesson illustr. zool. pl. 44. Kien. pl. 41, Fig. 1. Lien. 105 Cargados.

Nach Reeve und Crosse von den Molukken.

Md† Voluta (Lyria) Delessertiana Petit Magasin de Zoologie 1842, pl. 57 Nossi-Bé. Sow. thes. Fig. 73, 74. Reeve VI, Fig. 5 Tiger-Bay, Madagaskar. Crosse Journ. de Conchyl. XIV, p. 112 Mayotte und Nossi-Be.

Cymbium Aethiopicum L. (Martini III, Fig. 784). Kiener Voluta pl. 31, Fig. 5. Sow. thesaur. Fig. 9, 13, 14, 19. Reeve XIII, Fig. 1) nach Perry conchology pl. 37, Fig. 1 von Madagaskar.

Md?I Cymbium (Melo) melo Solander Lam. Kien. Vol. Fig. 15. Melo Indicus (Gmelin) Sow. thes. Fig. 1—5. Reeve Fig. 9. Sganz. 28, Madagaskar, selten.

Olividae.

SMGI *Oliva textilina Lam. Martini II, Fig. 559. Encycl. pl. 362, Fig. 5. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 46, Fig. 1 lebendes Thier. Chenu illustr. conch. pl. 15, Fig. 4—6. Reeve VI, Fig. 9. Sow. thesaur. IV, Fig. 130 sericea, Mauritius. Lien. 73 Seychellen. Von Professor Möbius auf Mauritius und auf den Seychellen gesammelt.

Oliva textilina var. pica Lam. olympiadin Duclos Chenu ill. conchyl. pl. 13, Fig. 8, 10 und 11. Reeve Fig. 5 Mauritius. Sow. thes. Fig. 111 ebendaher. Dufo 179 Seychellen und Amiranten auf sandigem und sandig-schlammigem Grund, auf letzterem mehr bräunlich, aber ebenso glänzend, 3—5 m tief. Sganz. 29 Mauritius, selten. Auch von den Agalegas von Robillard erhalten.

SMB *Oliva tremulina Lam. nobilis Reeve Fig. 3 Mauritius. Chenu illustr. conch. pl. 12, DI? Fig. 1—7. Dufo 179 Seychellen. Desh. 140 Reunion. Lien. 14 Mauritius, 73 Seychellen und 102 Rodriguez. Auch von Prof. Möbius von Mauritius und von St. Anne (Seychellen) erhalten.

SMdM Oliva erythrostoma Lam. Martini II, Fig. 476, 477, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. DRIP pl. 46, Fig. 7—17 lebendes Thier, Anatomie. Reeve Fig. 7. Chenu ill. conch. Au pl. 14. porphyretica Mörch. (non porphyrea Linne), Sow. thes. Fig. 105 Mauritius.

- Sganz.* 29 Mauritius, häufig, Madagaskar, selten. *Lien.* 14 Mauritius und 73 Seychellen.
- Oliva erythrostoma* var. *ponderosa* Duclos *Reeve* Fig. 4 Mauritius. Chenu illustr. conch. pl. 14, Fig. 6—9. *Sow.* thes. Fig. 104 Maur. *Desh.* 140 Reunion. *Lien.* 14 Mauritius. Durch *Robillard* auch von Rodriguez und Aldabra (nordwestlich von Madagaskar) erhalten.
- SMI **Oliva irisans* Lam. *Reeve* Fig. 8. Chenu illustr. conch. pl. 30, Fig. 10—12 (non Marrat nec Sow.). *O. Ceylonica* (Lam.?) Philippi Abbildungen III, Taf. 1, Fig. 3. *Sow.* thes. Fig. 125, 126 Maur. *Lien.* 73 Seychellen. Ebenda von Prof. *Möbius* gesammelt.
- SMRI *Oliva Maura* Lam. Martini II, Fig. 472—474 und 502—504. *Bernardin St. Pierre* 106 (Olive noire). *Favanne* pl. 19, Fig. F Ile de France. *Encycl.* pl. 366, Fig. 1, 2, pl. 365, Fig. 2, 3. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 46, Fig. 20, 21 lebendes Thier. *Reeve* Fig. 10 Mauritius. Chenu pl. 25, Fig. 1—7. *O. Mauritiana* *Sow.* thes. Fig. 135—140 Maur. *Dufo* 179 Seychellen. *Sganz.* 29 Mauritius, selten. *Lien.* 14 Mauritius.
- SAI *Oliva funebris* Lam. Martini II, Fig. 480, 481. *O. leucostoma* Duclos Chenu illustr. conch. pl. 29, Fig. 14 und 20. *O. maura* var. *Reeve* Fig. 10a. *Dufo* 179 Seychellen und Amiranten.
- SMI *Oliva Macleayana* Duclos Chenu illustr. conch. pl. 23, Fig. 13—16. *Lien.* 14 Maur. und 73 Seychellen.
- SAfI **Oliva scripta* Lam. *Encycl.* pl. 362, Fig. 4. *Reeve* Fig. 27. St. Anne auf den Seychellen, 5 Faden, *Möbius*.
- Vielleicht gehört hierher auch *Dufo's* *O. araneosa* Lam. von Mahé 179; die ächte *araneosa* wird allgemein zur westindischen *reticularis* gerechnet.
- SAfI **Oliva elegans* Lam. *Encycl.* pl. 367, Fig. 3. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 46. Au Fig. 2—4 lebendes Thier. *Reeve* Fig. 20. Chenu ill. pl. 23, Fig. 1—6. Seychellen. *Möbius*.
- MdMB *Oliva tigrina* Lam. Chenu ill. pl. 23, Fig. 7, 8 und 17—19. *Reeve* Fig. 21 Madagaskar. *Sow.* Fig. 181 holoserica, Maur. *Desh.* 140 Reunion (var. nigra). Aus Madagaskar von *Robillard* erhalten.
- MI *Oliva tricolor* Lam. Martini II, Fig. 511 und 478, 479. *Reeve* Fig. 22 Mauritius. Chenu ill. pl. 22, Fig. 9—12. *guttata* Mörch. Adams, *Sow.* Fig. 163 Maur. Aus Mauritius von *Robillard* eingeschickt.
- MdMI *Oliva sanguinolenta* Lam. Martini II, Fig. 512, 513. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 46, Fig. 5, 6 lebendes Thier. *Reeve* Fig. 25. Chenu ill. pl. 22, Fig. 14—16. *virescens* Mörch. Adams, *Sow.* Fig. 171 Maur. *Sganz.* 29 Mauritius. Aus Madagaskar durch *Cox* in Sidney erhalten.
- SMdM **Oliva episcopalis* Lam. Gualtieri tab. 23, Fig. F. *Encycl.* pl. 362, Fig. 6. *Reeve* Fig. 24. Chenu ill. pl. 11, Fig. 11, 12. *caerulea* (Bolten) Adams *Dufo* 180 Seychellen. *Lien.* 13 Mauritius. Bei Fouquets auf Mauritius und auf den Seychellen von Prof. *Möbius* gesammelt. Auch aus Madagaskar durch *Cox* erhalten.

SAMI *Oliva guttata* Lam. Martini II, Fig. 491, 492. *Favanne* pl. 19, Fig. B4 Ile de France. Encycl. pl. 368, Fig. 2. *cruenta* Solander, Dillwyn, Reeve Fig. 30. *emicator* Mörch, Sow. thes. Fig. 57—59. *Dufo* 179 Seychellen und Amiranten, auf reinem Sand, 3—4 m tief. *Sganz.* 29 Mauritius, ziemlich häufig. *Lien.* 13 Mauritius.

Oliva guttata var. *annulata* Gmelin Martini II, Fig. 564. Sow. thes. Fig. 59. *leucophaea* Lam. Encycl. pl. 363, Fig. 2. Chenu illustr. conch. pl. 16, Fig. 8. *mantichora* Duclos. *Dufo* 179 nur auf der Insel Alphonse (Amiranten), sehr selten.

SMdM *Oliva inflata* Lam. Martini II, Fig. 507, 508. Encycl. pl. 364, Fig. 5 und (undata B R Af Lam.) Fig. 7. Reeve Fig. 31. Chenu illustr. pl. 24, Fig. 1, 2. *bulbosa* (Bolten) Mörch. *ventricosa* Solander. *Sganz.* 29 Mauritius, häufig. *Desh.* 140 Reunion. *Lien.* 73 Seychellen. Nossi-Be, *Hildebrandt*.

Oliva inflata var. *bicincta* Lam. Encycl. pl. 364, Fig. 1, Reeve Fig. 31a. Chenu illustr. pl. 24, Fig. 4. *Sganz.* 29 Mauritius.

MP *Oliva Caroliniana* Duclos. Chenu ill. conch. pl. 21, Fig. 3—8. Ducros revue critique du genre *oliva* p. 73. *Lien.* 13 Ilot, Mauritius.

MBRI *Oliva ispidula* L. Martini II, Fig. 522—525, 527, 530, 531 und 538. *Favanne* pl. 19, Fig. G1 Ile de France. Encycl. pl. 366, Fig. 6. Reeve Fig. 34. Chenu illustr. conch. pl. 8, Fig. 1—18. Sow. Fig. 244 Maur. *Ispidula variabilis* Gray. *Dufo* 180 Seychellen häufig. *Sganz.* 29 Mauritius, gemein. *Desh.* 140 Reunion. *Lien.* 13 Mauritius.

Die Schreibart *ispidula* ist falsch, die Art hat nichts Borstiges, sondern wurde mit einem kleinen Eisvogel (*Alcedo ispida* L.) verglichen.

M?I *Oliva oriolus* Lam. Martini II, Fig. 534—538. Encycl. pl. 366, Fig. 3. *brunnea* Marrat, Sow. thes. Fig. 54, 55. Nur von *Lien.* 14 für Mauritius erwähnt.

Vielleicht nur dunkelbraune Abart der vorhergehenden.

MI *Oliva carneola* Lam. Martini II, Fig. 495. *Favanne* pl. 19, Fig. H2 Ile de France. Encycl. pl. 365, Fig. 5. Reeve Fig. 60c. Chenu ill. pl. 28, Fig. 5—16. *Dufo* 180 Alphonse (Amiranten), selten, auf Sand, 3½ m tief.

SAM **Oliva lepida* Duclos Chenu illustr. conch. pl. 27, Fig. 15—20. Reeve Fig. 60a, b und f. Ducros revue crit. p. 70. *O. laeve* (Marrat) Sow. thes. Fig. 330, 331 Maur. *Dufo* 180 Alphonse (Amiranten). *Lien.* 14 Mauritius und 73 Seychellen, Mahé, *Möbius*.

SMdM **Oliva* (*Clivella*) *panniculata* Duclos Chenu illustr. conch. pl. 6, Fig. 15—18 Madagaskar. Reeve Fig. 77. *Ducros* Revue crit. p. 64 Mahé, *Möbius*. Mauritius, *Caldwell*.

Vermuthlich ist das auch *Lienard's* 14 *O. nitidula* von Mauritius, da die ihr allerdings ähnliche ächte *nitidula* Dillwyn (*Dominicensis* Menke) Martini II, Fig. 546, 547 westindisch ist, und wahrscheinlich auch von *Favanne* pl. 19, Fig. J1, Ile de France. Auch *O. fusifera* *Dufo* 180 von Alphonse (Amiranten) dürfte hierher gehören.

Md† *Oliva* (*Olivella*) *zenopira* Duclos Chenu illustr. pl. 3, Fig. 11, 12. Reeve Fig. 69 Madagaskar. Sow. thes. Fig. 291 ebendaher.

Dufo 180 führt noch *O. utriculus* (= *gibbosa* Born) für die Seychellen „ziemlich selten“ an, sie ist mir desshalb zweifelhaft, weil kein Anderer diese sonst häufige und wohlbekannte Art in

unserm Gebiet wiedergefunden hat; seine *O. ancillaria* endlich ist mir ganz unbekannt. - Zweifelhaft ist mir ferner *O. (Anazola) literata* Lam., da sie nur von *Sganzin* 29 als selten auf Mauritius und dann wieder von *Deshayes* 140 mit Fragzeichen nach einem jungen Exemplar für Reunion angeführt wird.

MdM *Ancillaria Mauritiana* Sow. *Desh.* in Lamarck an. s. vert. ed. 2, X, p. 593 Ile de
Af St. Maurice. *A. volutella* Deshayes in Guérin Magasin de Zoologie 1831, p. 31.
Kiener pl. 1, Fig. 1. *A. torosa* (Meuschen) Sow. thes. III, Fig. 31, 32. *Reeve* XV,
Fig. 14 Madagaskar und Mauritius.

MI *Ancillaria candida* Lam. Martini II, Fig. 722. Encycl. pl. 393. Fig. 6. Kien. pl. 5,
Fig. 4. *ampla* Gmelin Sow. thes. III, pl. 212, Fig. 26 und 29. *Reeve* Fig. 27
Mauritius, Capt. *Maryatt*.

SR **Ancillaria lineolata* *Reeve* Fig. 35. Sow. thesaur. Fig. 22, 23 St. Anne, Sey-
chellen, *Möbius*.

SMR **Ancillaria ovalis* Sow. thes. Fig. 82, 83. *Reeve* Fig. 40 vom Rothen Meer. *Lien*.
14 Mauritius. St. Anne, Seychellen, *Möbius*.

Nach *Reeve* kommt auch *Anc. rubiginosa* Swains. sowohl von Madagaskar als China (?) vor.

MdM *Harpa costata* L. (Buccinum) Martini III, Fig. 1093. *imperialis* Chemnitz X,
D† Fig. 1452. *Reeve* I, Fig. 5 Mauritius. Sow. thes. III, pl. 231, Fig. 4, 5 Maur.
multicostata Sow., *ventricosa* var. Kiener Fig. 2. *Sganz.* 27 Mauritius und Mada-
gaskar, sehr selten. *Lien.* 24 Mauritius und 102 Rodriguez. Auch von *Robillard*
erhalten. Auf Sand an felsigen Stellen in tiefem Wasser, *Cuming*.

SAC **Harpa ventricosa* Lam. Lister pl. 993, Fig. 55. Martini III, Fig. 1090. *Bernardin*
MdMB St. Pierre 106 Harpe. Encycl. pl. 404, Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 42,
AfIAu Fig. 1—4 lebendes Thier. Kiener Fig. 1 Ile de France und Bourbon. *Reeve* Fig. 2
Mauritius. Sow. thes. III, pl. 232, Fig. 18—22 Mauritius. *Dufo* 69 Seychellen
und Amiranten, ziemlich selten auf Felsengrund, 2½—4 m tief, pflanzenfressend.
Sganz. 27 (ventr. und striata, jung) Mauritius und Madagaskar, häufig auf den
Riffen. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 25 Mauritius, 75 Seychellen und 106 Cargados.
Von Prof. *Möbius* ebenfalls auf den Seychellen und auf Mauritius gefunden.

Hierher als Jugendzustand vielleicht auch *H. Cabriti* (Fischer Journ. de Conch. VIII, 1860,
pl. 4, Fig. 1, 2) *Lien.* 24 Mauritius.

MI *Harpa conoidalis* Lam. Kien. Fig. 3. *Reeve* Fig. 7. Nur von *Lien.* 25 für Maur.
erwähnt, auch von *Robillard* eingeschickt.

SAMB **Harpa minor* Lam. Martini III, Fig. 1097. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 42,
DRAfI Fig. 5—7 lebendes Thier. Kien. Fig. 6. *Reeve* Fig. 6. Sow. thes. III, pl. 283,
Au Fig. 27—29 Mauritius. *Dufo* 70 Seychellen und Amiranten, 2—3 m zahlreich.
Desh. 114 Reunion. *Lien.* 24 Mauritius, 75 Seychellen und 102 Rodriguez.

Fuss, Kopf und Athemröhre violettbräunlich, safrangelb punktiert.

Harpa minor var. *crassa* Philippi Kien. Fig. 6a. *Reeve* Fig. 6a. *Lien.* 24 Maur.
Auch im Rothen Meer.

Harpa rosea Lam. wird von *Sganzin* 27 und *Lien.* 25 aus Mauritius angeführt, gilt aber sonst
als westafrikanisch.

Taenioglossa.**Cassididae.**

- CMB **Cassis cornuta* L. Martini II, Fig. 348, 349, 362. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. DI pl. 43, Fig. 1—6 lebendes Thier und Anatomie. Kiener Fig. 3. Reeve V, Fig. 2. *Bernardin St. Pierre* 106 grand casque. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 25 Mauritius, 75 Seychellen, 102 Rodriguez und 106 Cargados. Auch von Professor Möbius auf Mauritius gesammelt.

Conrad Journ. Acad. nat. scienc. of Philadelphia I, 1847, glaubt eine westindische *C. labiata* (Chemnitz) von der ostindischen *cornuta* unterscheiden zu können, aber die angegebenen Unterschiede scheinen sich nicht geographisch zu bewähren und überdiess hat Chemnitz seine *labiata* (XI, Fig. 1790, 1791, kopirt bei Küster Taf. 40, 41) von Tranquebar in Ostindien direkt erhalten. Mörch. Malakoz. Blätt. 1877, S. 37 führt keine *cornuta* oder *labiata* aus Westindien auf, vergleiche jedoch die folgende.

- Md? *Cassis Madagascariensis* Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 20 Madagaskar. Favanne pl. 25, Fig. B1. *Kien.* Fig. 2. *Reeve* Fig. 5 Madagaskar. *Sganz.* 26 häufig bei Madagaskar.

Dagegen nach Mörch. Mal. Blätt. 1877, S. 37 westindisch. Es ist mir auffallend, dass für diese grosse Art keine neueren Ortsangaben aus unserem Gebiet vorhanden sind, Reeve's Vaterlandsangabe scheint nur aus Lamarek entlehnt und Sganzin könnte *C. cornuta*, die er nicht anführt, für *Madagascariensis* genommen haben. Daher scheint das Vorkommen trotz des Namens noch zweifelhaft.

- SACM **Cassis rufa* L. Martini II, Fig. 341, 346 und 347. *Kien.* Fig. 12. *Reeve* Fig. 20. BDafI *Dufo* 71 alle Seychellen und Amiranten. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 25 Mauritius, 75 Seychellen, 102 Rodriguez und 107 Cargados. Fouquets, Möbius.
- CB?†? *Cassis exarata* Reeve Fig. 32. Von *Deshayes* 114 mit Fragzeichen von Reunion, von *Lienard* 107 ohne solches für die Cargados angeführt.

Reeve kannte ihr Vaterland nicht. Nächstverwandte mit der ostindischen *glauca* L., aber der letzte Umgang spiral gefurcht und die früheren gekörnt.

- CMI *Cassis plicata* L. Martini II, Fig. 356a. Chemn. X, Fig. 1459, 1460. *Reeve* Fig. 27. *C. plicaria* Lam. *Kien.* Fig. 11. *Lien.* 75 Mauritius und 107 Cargados.
- SCMD *Cassis areola* L. Martini II, Fig. 360, 361. *Kien.* Fig. 16. *Reeve* Fig. 4. *Bernardin I St. Pierre* casque blanc truité. *Lien.* 25 Mauritius, 75 (aureola) Seychellen, 102 Rodriguez und 106 Cargados.
- SMdM **Cassis torquata* Reeve Martini II, Fig. 383—386. *Kien.* Fig. 21 und 21a (erinaceus). R *Reeve* Fig. 1a—c. Küster Taf. 48, Fig. 5; 6 und Taf. 50, Fig. 7. Seychellen und Mauritius, Möbius und Robillard, Nossi-Be, Hildebrandt.
- Von der folgenden namentlich auch durch den fast in seiner ganzen Länge gezahnten Aussenrand der Mündung verschieden, und wie jene, bald glatt, bald knotig.
- SCMD **Cassis vibex* L. incl. *erinaceus* L. Martini II, Fig. 363—365. *Kien.* p. 22, Fig. 20 RAfI und 20a Ile de France, an Felsen. *Reeve* Fig. 15 und 15a. Küster Taf. 47, Fig. 3, 4; Taf. 49, Fig. 5, 6 und Taf. 51, Fig. 5, 6. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 25 Mauritius, 75 Seychellen, 102 Rodriguez und 107 Cargados. Fouquets auf Mauritius und Seychellen, Prof. Möbius, grosse glatte Form.
- MIP *Cassis Ceilanica* Lam. *Kien.* Fig. 26. *C. pyrum* var. *Reeve* Fig. 29c und Küster Taf. 49, Fig. 3, 4. *Lien.* 25 Mauritius.

MdSAf *Cassis achatina* Lam. Encycl. pl. 407, Fig. 1. Kien. Fig. 24. Reeve Fig. 28.
 Au P Küster Taf. 50, Fig. 3, 4. *Sganz.* 26 Madagaskar.

Diese Angabe, obwohl seitdem nicht wiederholt, erscheint doch um so eher glaubwürdig, als diese Art auch in Südafrika vorkommt, Algoa-Bay nach Reeve, Port Elizabeth nach einem Exemplar im Berliner Museum. Zweifelhaft ist dagegen Sganzin's *C. fasciata* Lam. (spinosa Gronov.) ebenfalls von Madagaskar. Das Berliner Museum erhielt diese Art neuerdings aus Loanda, woher sie schon Dunker früher angegeben hatte. Ihre Vaterlandsangabe in den systematischen Werken sind meist ziemlich unbestimmt. Noch zweifelhafter *Oniscia cancellata* Sow., nur von Kiener, *Cassidaria* p. 7 von Ile de France angegeben, sonst nur aus China mir bekannt.

CMdM *Dolium* (Malea) *pomum* L. Martini II, Fig. 370, 371. Quoy et Gaimard vergl.
 BR Af Astrol. pl. 41, Fig. 9, 10, lebendes Thier. Kien. Fig. 8. Reeve Fig. 6. *Sganz.* 27
 IP Au Madagaskar, nicht selten. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 25 Mauritius und 107 Cargados.
 SAR *Dolium galea* L.? *Dufo* 70 Ile aux Cerfs bei Mahé, und auf allen Amiranten, auf
 Af Sandgrund, 3—4 m tief.

Es ist nicht leicht, über die im Gebiet des indischen Oceans vorkommenden der Mittelmeerart zunächst sich anschliessenden Formen etwas Bestimmtes zu sagen. Das Berliner Museum besitzt von sicher angegebenen Fundorten aus diesem Gebiet keine mit der des Mittelmeers ganz übereinstimmende, sondern nur eine mit merklich breiteren Rippen, aus Java von mir mitgebracht, vielleicht *D. ampullaceum* Philippi, Abbild. Band III, Taf. 2, Fig. 2, und eine mit merklich längerem Gewinde, von den Querimbainseln an der Küste von Mossambique durch Prof. Peters, vielleicht *D. amphora* Philippi, Abbild. Band III, S. 12. Eine von diesen beiden dürfte auch die von Dufo gemeinte sein, vielleicht auch *Bernardin St. Pierre's* 106 tonne ronde.

MdI *Dolium maculatum* Lam. Martini III, Fig. 1073, 1074. Kien. Fig. 4. Reeve Fig. 4.
Sganz. 27 Madagaskar, nicht selten.

Kiener, *Dolium* p. 9 führt auch *D. variegatum* Lam. von Ile de France an, sonst ist es nur aus Neuholland bekannt.

MAfI *Dolium costatum* Menke 1828. Martini III, Fig. 1072 und 1082. Reeve Fig. 4.
fasciatus var. Kien. Fig. 6. *latesulcatus* (Martini) Hanley Proc. Zool. Soc. 1859.
 Von *Robillard* aus Mauritius eingesandt.

MdMR *Dolium olearium* Brug., Lam. Martini III, Fig. 1076, 1077. Encycl. pl. 403, Fig. 1.
 AfIP Quoy et Gaimard Voy Astrol. pl. 41, Fig. 9, lebendes Thier. Kien. Fig. 1. Reeve
 Fig. 14. *D. cepa* (Martini) Hanley. *Sganz.* 27 Madagaskar, nicht selten. *Lien.* 25
 Mauritius. Auch durch *Robillard* von Mauritius erhalten, in einer Form, welche in
 der bandweisen Vertheilung der Flecken dem *D. Deshayesii* Reeve ganz ähnlich ist,
 aber die tiefe Nath von *olearium* behält.

CMdM* *Dolium perdix* L. Martini III, Fig. 1079. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 41,
 DR Af Fig. 1—8 Anatomie. Reeve Fig. 9. *Bernardin St. Pierre* 106 tonne alongée ou aile
 IP de perdrix. *Sganz.* 27 Madagaskar, nicht selten. *Desh.* 114 Reunion. *Lien.* 25
 Mauritius und 107 Cargados. Fouquets, *Möbius*. Sehr blass gefärbt von Rodriguez
 durch *Robillard*.

Diese Art kommt bekanntlich auch in Westindien vor, die westindischen Exemplare sind aber, nach den Exemplaren im Berliner Museum zu urtheilen, dickschaliger.

MdI *Ficula ficus* L. Martini III, Fig. 734, 735. Kiener *Pyrula* pl. 13, Fig. 1. *Rousseau*
 Institut 1841 IX, p. 301. *Ficula laevigata* Reeve Fig. 1. Adams und Reeve zool.
 Samarang pl. 9, Fig. 4, lebendes Thier. *Sganz.* 24 Madagaskar, auf den Riffen, häufig.
 CMd *Ficula ficoides* Lam. (Pyrula) Lister hist. conch. pl. 750, Fig. 46. Kiener *Pyrula*
 AfI pl. 13, Fig. 2. *Ficula reticulata* (non Lam.). Reeve Fig. 1, Adams und Reeve

zool. Samarang pl. 9, Fig. 5, lebendes Thier. *Sganz.* 24 Madagaskar, weniger häufig. *Lien.* 107 Cargados.

Es ist auffällig, dass diese Arten sonst von Niemand aus unserm Gebiet erwähnt worden; am Vorkommen der letztern wenigstens ist deshalb nicht zu zweifeln, da sie auch auf den Querimba-Inseln an der Küste von Mossambique von Prof. Peters und bei Zanzibar von v. d. Decken u. A. gefunden wurde. Die Gattung kann nicht leicht verkannt werden.

MdMB Tritonium variegatum Lam. Gnaltieri tab. 48, Fig. A. Kiener pl. 2. Reeve IV, Fig. 3.

IP *Sganz.* 25 Madagaskar, häufig auf den Riffen. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 6 Ilot, Maur.

SAMd *Tritonium (Lampas) lampas L. Chemn. IV, Fig. 1238, jünger 1236, 1237, 1239.

MRI *Kien.* pl. 5, Fig. 1 Madagaskar. Reeve Fig. 30. *Bernardin St. Pierre* 107 culotte de Suisse. *Dufo* 54 Seychellen und Amiranten, selten. *Lien.* 8 (Ranella) Mauritius. Fouquets, Möbius.

MB?D Tritonium (Simpulum) gemmatum Reeve Fig. 60, 1844. Martens Südseeconchylien

P S. 3. mundum Gould Proc. Bost. Soc. 1849. Explor. Exped. pl. 17, Fig. 297. *Desh.* 113 mit Fragzeichen, Reunion. *Lien.* 6 Mauritius, 101 Rodriguez.

SMdM *Tritonium (Simpulum) pileare L. Chemn. IV, Fig. 1242, 1243 und 1248—1251.

RAfIP *Kien.* pl. 7, Fig. 1. Reeve Fig. 23. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 40, Fig. 13—15, lebendes Thier. *Dufo* 53 Mahé und Praslin, auf Schlammgrund, selten, nährt sich von Muscheln. *Sganz.* 26 Madagaskar, auf den Riffen, seltener. *Lien.* 6 Ilot, Maur. Fouquets und Black river, Möbius.

Bei dieser Art ist es mir nicht möglich, westindische Exemplare (T. Martinianum Orbigny) konstant von ostindischen zu unterscheiden.

MI Tritonium (Simpulum) aquatile Reeve Fig. 24. *Lien.* 5 Ilot, Maur. Ebendaher von *Caldwell* erhalten.

Kommt auch in Westindien vor.

MI Tritonium (Simpulum) aegrotum Reeve Fig. 42. *Lien.* 6 Mauritius.

MR Af *Tritonium (Simpulum) rubecula L. Chemn. IV, Fig. 1259—1267. *Encycl.* pl. 413,

I Fig. 2. *Kien.* pl. 18, Fig. 2. Reeve Fig. 29. *Lien.* 6 Mauritius. Ebendaher von Möbius und *Caldwell*.

SAMB *Tritonium (Simpulum) chlorostomum Lam. Chemn. IV, Fig. 1244, 1245. *Kien.*

AfI pl. 12, Fig. 2, Ile de France (kleinere Varietät). Reeve Fig. 25 Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, zool. II, p. 541, pl. 40, Fig. 16, 17, lebendes Thier, Ile de France. *Dufo* 54 Seychellen und Amiranten, sehr häufig, auf Felsengrund, 3 m tief, frisst allerlei Mollusken. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 5 Ilot, Mauritius. Grand Baie und Fouquets, Möbius.

MIP Tritonium (Simpulum) eximium Reeve Fig. 7. *Lien.* 5 Mauritius.

MI *Tritonium (Cymatium) lotorium L. Rumph. Tab. 26, Fig. B. *Encycl.* pl. 415, Fig. 3 (distortum). Schubert et Wagner Chemn. XII, Fig. 4071. *Kien.* pl. 9, Fig. 1. Reeve Fig. 19. *Lien.* 6 Ilot Barkly, Mauritius. Fouquets, Möbius.

MAfI Tritonium (Cymatium) pirum (L.) Lam. Martini III, Fig. 1040—1043. *Kien.* pl. 11 Fig. 2. Reeve Fig. 33. *Lien.* 6 Mauritius.

MI Tritonium (Cymatium) tripus Chemn. XI, Fig. 1858, 1859. *Kien.* pl. 8, Fig. 2. Reeve Fig. 16. *Lien.* 6 Ilot, Mauritius.

- MI *Tritonium (Cymatium) Sinense Reeve Fig. 18 Mauritius, *Möbius*.
- S A Md *Tritonium (Cymatium) tuberosum Lam. Martini III, Fig. 1050, 1051. Quoy et
M B R Gaimard Voy. Astrol. pl. 48, Fig. 18, lebendes Thier. Kien. pl. 14, Fig. 2. Reeve
I P Fig. 1. Eydoux et Souleyet Voy. Bonite, zool. pl. 44, Fig. 27, 28. Martens Südsee-
conchylien S. 3. *Dufo* 53 Seychellen, besonders Mahé, und Amiranten, auf Felsen-
grund, 2½ m tief, frisst Mollusken. *Sganz.* 26 Madagaskar, selten. *Desh.* 113
Reunion. *Lien.* 6 Mauritius. Fouquets, Grande Baie und Black river, *Möbius*.
Auch diese Art kommt wieder in Westindien vor (T. Antillarum Orb.). T. albocingulatum
Desh. 113, Reeve Fig. 1a, dürfte schwerlich davon zu trennen sein.
- MI Tritonium (Cymatium) clavator Lam. Martini III, Fig. 1048, 1049. Chemn. XI,
Fig. 8025, 8026. Kien. pl. 10, Fig. 2. Reeve Fig. 7. *Lien.* 5 Mauritius.
- MI Tritonium (Cymatium) moritinctum Reeve 49. *Lien.* 6 Hot, Mauritius.
- BI Tritonium (Cymatium) retusum Lam. Martini III, Fig. 745, 746. Kien. pl. 4, Fig. 2.
Reeve Fig. 47. Monoplex obesus Perry conchol. pl. 3, Fig. 2. *Desh.* 113 Reunion.
- M? S Af Tritonium (Doliarium) doliarium (L.) Lam. Encycl. pl. 422, Fig. 1. Kien. pl. 15.
Au Fig. 2. Reeve Fig. 56. Zu dieser südafrikanischen Art eher als zu dem mittel-
meerischen cutaceum L. dürfte *Lienard's* cutaceum 5 von Mauritius gehören.
- M Af Tritonium (Doliarium) vespacum Lam. Kien. pl. 3, Fig. 2. Reeve Fig. 62. *Lien.* 7
Au Mauritius. Auch von *Robillard* eingesandt.
- M Af I *Tritonium (Doliarium) labiosum Wood ind. test. suppl. 1828 pl. 5, Fig. 18. Reeve
Au Fig. 52. T. rutilum Menke. spec. moll. Nov. Holland 1843 p. 25. *Lien.* 6 Mau-
ritius. Ebenda von *Möbius* und *Caldwell* erhalten.
Auch in Westindien, Mörch Malakozool. Blätt. 1877, S. 34, T. Loroisi Petit Journ. de Conch
1852, pl. 2, Fig. 8.
- MI Tritonium (Colubraria) maculosum Gmelin Chemn. IV, Fig. 1257, 1258; Encycl.
pl. 416, Fig. 1. Kien. pl. 17, Fig. 1. Reeve Fig. 64. *Lien.* 6 Mauritius.
- M? Tritonium (Colubraria) Sowerbyi Reeve Fig. 65. Chemn. X, Fig. 1552, 1553 Maur.
Lien. 7 Mauritius.
- M BI Tritonium (Colubraria) obscurum Reeve Fig. 63. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 7 Maur.
- M P Tritonium (Colubraria) clathratum Swainson (non Lam.) Reeve Fig. 57. *Lien.* 7
(Cumingii) Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- M I P Tritonium (Colubraria) distortum Schubert et Wagner Chemn. XII, Fig. 4074, 4075.
Kien. pl. 17, Fig. 2. *Desh.* Lam., IX, 645. Reeve Fig. 66. Pease Am. Journ.
Conch. IV, p. 106. *Lien.* 7 Mauritius.
T. tortuosum Reeve Fig. 74 dürfte davon nicht hinreichend verschieden sein.
- M I P *Tritonium (Colubraria) nitidulum Sow. Reeve Fig. 70. Pease Am. Journ.
Conch. IV, p. 106. Martens Südseeconchylien S. 4. *Lien.* 7 Mauritius. Auch von
Prof. *Möbius*, *Caldwell* und *Robillard* daselbst gesammelt.
T. Ceilanense Sow. Reeve Fig. 53, *Lien.* 7 Mauritius dürfte nur als Varietät zu betrachten sein.
- M I P Tritonium (Colubraria) truncatum Hinds (Reeve Fig. 83) var. *decapitatum
Reeve Fig. 85. Martens Südseeconch. S. 4. *Lien.* 7 Maur. Ebendaher von *Möbius*.
- S M BI *Tritonium (Colubraria) sculptile Reeve Fig. 76. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 7
Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten. Fouquets und Seychellen, *Möbius*.

- M *Tritonium (Colubraria) convolutum* Brod. Reeve Fig. 92. *Lien.* 7 Mauritius.
Auch von *Robillard* erhalten.
- MI *Tritonium (Colubraria) angulatum* Reeve Fig. 88 Mauritius. von *Robillard*, schwarz-
fleckig, mit nur 1 Varix.
Lienard nennt noch 7 T. *decollatum* Sow., *lanceolatum* Menke und *testatum* Mawe von Mau-
ritius; das erstere ist sonst nur aus der Südsee bekannt, das zweite aus dem Mittelmeer und Westindien,
das dritte mir ganz unbekannt, vielleicht *tessellatum* Reeve.
- MRI **Tritonium (Persona) reticulare* L., Mörch, *mulus* Dillw., *cancellinum* Roissy,
clathratum Lam. Martini II, Fig. 405, 406. Encycl. pl. 414, Fig. 4. Kien. pl. 14.
Fig. 1. Reeve Fig. 45. Fouquets, *Möbius*.
Auch in Westindien nach Mörch loc. cit.
- SMdM **Tritonium (Persona) anus* L. Martini II, Fig. 403, 404. Encycl. pl. 413, Fig. 3.
- BRAfI Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 40, Fig. 6–10, lebendes Thier. Kien. pl. 15, Fig. 1.
Reeve Fig. 44. *Sganz.* 26 Madagaskar, gemein. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 5
Mauritius und 72 Seychellen. Seychellen, *Möbius*.
- MdM *Tritonium (Linatella) clandestinum* Chemn. XI, Fig. 1856, 1857. *Lam. an. s. vert.*
IP ed. 2, IX, p. 639 Ile de France. Kien. pl. 11, Fig. 2; Reeve Fig. 13. *Sganz.* 26
Madagaskar, gemein. *Lien.* 5 Ilot, Mauritius. Auch von *Caldwell* aus Mauritius
erhalten.
- M? *Ranella ponderosa* Reeve II, Fig. 14. *Lien.* 8 Mauritius.
Erinnert an *R. scrobiculata* L. aus dem Mittelmeer. Nach Menke ist diese Art westafrikanisch.
- MBRI *Ranella spinosa* Lam. Chemn. IV, Fig. 1274, 1275. Encycl. pl. 412, Fig. 5. Kien.
pl. 5. Reeve Fig. 7 Mauritius. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 8 Mauritius.
- MAfI *Ranella crumena* Lam. Encycl. pl. 412, Fig. 3. Reeve Fig. 7. Kien. pl. 5, Fig. 1
(*elegans*). *Lien.* 8 Mauritius. Auch von *Caldwell* erhalten.
- Md?M? *Ranella foliata* Brod. *Desh.* an. s. vert. IX, p. 553 Mauritius? Reeve Fig. 8 Mau-
Af ritius? *Kien.* p. 3, pl. 2, Fig. 1 (*crumena*).
Zanzibar, v. d. Decken, Querimba-Inseln, Prof. Peters. Daher jene Angaben nicht unwahr-
scheinlich.
- SAMB **Ranella bufonia* Gmel., Lam. Chemn. IV, Fig. 1240, 1241; XI, Fig. 1843, 1844.
RI Encycl. pl. 412, Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 40, Fig. 11, 12, lebendes
Thier. Reeve Fig. 23a. *Biplex rosa* Perry conchol. pl. 4, Fig. 1. *Dufo* 55
Seychellen und Amiranten, 2½–3½ m tief, frisst Schalthiere. *Lien.* 8 Mauritius.
Fouquets, *Möbius*.
Ranella bufonia var. *alba*. Chemn. XI, Fig. 1845, 1846. *Kien.* p. 11, pl. 7, Fig. 1
Seychellen; Reeve Fig. 23b. *Dufo* 55 sehr selten, nur in grosser Tiefe. *Desh.* 112
Reunion. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- MI **Ranella siphonata* Reeve Fig. 38. *Lien.* 8 Mauritius. Fouquets, *Möbius*. Auch von
Robillard erhalten.
Steht der vorigen noch sehr nahe.
- MI *Ranella cruentata* Sow. Kien. pl. 7, Fig. 2. Reeve Fig. 20. *Lien.* 8 Mauritius.
Auch von *Caldwell* erhalten.
R. asperima Dunker Novitat Taf. 19, Fig. 3 ist kaum davon zu unterscheiden.
- MI *Ranella tuberosissima* Reeve Fig. 39. *Lien.* 9 Mauritius.

- MR *Ranella Grayana* Dunker Novitat tab. 19, Fig. 5, 6 Mauritius, *Robillard*. Vielleicht *Lienard's* R. *Bergeri* (?) 8.
- MI *Ranella rhodostoma* Sow. conch. illustr. Fig. 10. *Desh.* Lam. IX, p. 552. *Reeve* Fig. 32. *Lien.* 8 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
Nach Mörch, Mal. Blätt, 1877 auch westindisch.
- MBR *Ranella affinis* Brod. *Reeve* Fig. 19. *Pease* Am. Journ. Conch. IV, p. 107. *Desh.*
IP 112 Reunion. *Lien.* 8 Mauritius.
- MRI **Ranella Cumingiana* Dunker Novitat. conch. tab. 19, Fig. 7, 8. *Fouquets*, *Möbius*.
Auch aus dem rothen Meer mehrfach im Berliner Museum.
- MP *Ranella livida* *Reeve* Fig. 28. *Lien.* 8 Mauritius.
- SMAf **Ranella granifera* Lam. Chemn. IV, Fig. 1234—1237. *Encycl.* pl. 414, Fig. 4.
Au Kien. pl. 11, Fig. 1. *Reeve* Fig. 30. *Dufo* 54 Mahé, 2½—3 m tief, ziemlich selten. *Lien.* 8 Mauritius. Seychellen, *Möbius*. Mauritius. *Robillard*.
- MBAfI *Ranella semigranosa* Lam. *Reeve* Fig. 25 (non Kiener). *Desh.* 113 Reunion. Mauritius, durch *Robillard*.
Diese fünf Arten sind nahe unter einander verwandt und werden leicht verwechselt.
- MRI *Ranella tuberculata* Brod. Chemn. IV, Fig. 1229, 1230. Kien. pl. 12, Fig. 2. *Reeve* Fig. 66. *Eydoux* et *Souleyet* Voy. Bonite moll. pl. 44, Fig. 24, 25. *Biplex elegans* *Perry* conchol. pl. 5, Fig. 3. *Lien.* 8 Mauritius.
- MP **Ranella pusilla* Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. *Reeve* Fig. 44. *Triton laciniatum* *Mighels* Proc. Bost. Soc. 1845, p. 24; *Pease* Am. Journ. Conch. IV, p. 106. *Lien.* 8 Mauritius. Ebendaher durch *Möbius* und *Robillard*.
- BR? *Ranella rosea* *Reeve* Fig. 46. *Desh.* 113 Reunion.
R. concinna Dunker Novitat. Tab. 18, Fig. 3, 4 aus dem rothen Meer kommt ihr sehr nahe.
Dufo 55 führt noch *R. Argus* Lam. als sehr selten auf Mahé an, es ist dies eine südafrikanische Art, welche nicht wohl so weit in die Tropenzone hinein sich erstrecken dürfte; vermuthlich falsche Bestimmung. *Lienard* 8 *R. anceps* Lam. von Mauritius; diese eigenthümliche Art, Untergattung *Aspella* Mörch, wird sonst bald von der Westküste Centralamerikas, bald von Westindien angegeben.

Cypraeidae.

- SAC **Cypraea tigris* L. *Lister* hist. conch. pl. 682, Fig. 79 Madagaskar. *Bernardin*
- MdMB *St. Pierre* 107 Porcelaine tigrée. *Martini* I. Fig. 232—234 Mauritius. *Lam.* an. s.
- DRAfI vert. ed. 2, X, p. 503 Madagaskar, Ile de France. *Quoy* et *Gaim.* Voy. Astrol.
- PAu pl. 49, Fig. 1—4, Anatomie. *Kien.* pl. 45 und 46. *Reeve* III, Fig. 12. *Dufo* 183 Seychellen und Amiranten, von den Negern gegessen. *Sganx.* 29 Madagaskar und Mauritius, sehr häufig. *Quoy* et *Gaimard* Voy. Astrol., zool. III, p. 30, pl. 47, Fig. 1, 2 Ile de France. *Desh.* 137 Reunion. *Lien.* 42 Mauritius, 78 Seychellen, 104 Rodriguez und 110 Cargados. Auch von Prof. *Möbius* auf den Seychellen gesammelt.
Die nahe verwandte *C. pantherina* Solander (*tigrina* Lam.), häufig im rothen Meer, wird von Niemand aus unserm Gebiet angegeben.
- SAMd **Cypraea lynx* L. *Lister* hist. conch. pl. 683, Fig. 30 Mauritius. *Linne* syst. nat.
- MBRAf ed. 10 Madagaskar. *Martini* I, Fig. 230, 231. *Lam.* an. s. vert. ed. 2, X, p. 514
- IAu Madagaskar, Ile de France. *Kien.* pl. 25, Fig. 2. *Reeve* Fig. 23. *Dufo* 183

Seychellen und Amiranten, häufig auf Schlammgrund, 2—4 m pflanzenfressend. *Sganz.* 29 Mad., Mauritius. *Desh.* 137 Reunion. *Lien.* 40 Maur., 78 Seychellen, Ebendaher von *Möbius*.

Md† *Cypraea Broderipi* Gray *Reeve* Fig. 13. Madagaskar, auf Riffen, *Hennah.* *Sow.* thes. IV, Fig. 287 ebenda.

SMdM **Cypraea vitellus* L. Martini I, Fig. 228. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 48, BRAfI Fig. 8, 9 lebendes Thier. Kien. pl. 19, Fig. 1. *Reeve* Fig. 12. *Dufo* 184 Sey-
PAu chellen. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius. *Desh.* 137 Reunion. *Lien.* 42 Mauritius. Seychellen, *Möbius*.

SAfI *Cypraea onyx* L. Chemn. X, Fig. 1341. Kiener p. 16, pl. 44, Fig. 1 Seychellen. *Reeve* Fig. 39.

SMAf **Cypraea undata* Solander, Lam. Martini I, Fig. 226, 227. Kiener pl. 30, Fig. 3. C. diluculum *Reeve* Fig. 65. *Lien.* 42 Mauritius und 78 Seychellen. Ebendaher von Prof. *Möbius*.

MAfI *Cypraea ziczac* L. Martini I, Fig. 224, 225. Kiener pl. 31, Fig. 2. *Reeve* Fig. 97. *Lien.* 42 Mauritius.

MBD **Cypraea cribraria* L. Martini I, Fig. 336. Quoy et Gaimard loc. cit. pl. 48, AfI Fig. 12 lebendes Thier. Kien. pl. 29, Fig. 1. *Reeve* Fig. 81. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 39 Mauritius, 104 Rodriguez. Mauritius, *Möbius*. Eine Abart davon unter dem Namen C. cribellum Gaskoin bei *Lien.* 39 Maur. und ebendaher von *Robillard* erhalten.

MIP *Cypraea esontropia* Duclos Magasin Zoolog. 1833, p. 26. Kiener pl. 29, Fig. 2. *Reeve* Fig. 80. *Lien.* 39 Maur. Ebendaher von *Caldwell* und *Robillard*.

MBI **Cypraea clandestina* L. Kien. pl. 31, Fig. 4. *Reeve* Fig. 106. C. moniliaris
Au Lam. Potiez et Michaud galerie d. moll. d. Douai pl. 35, Fig. 9. 10. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 39 Mauritius. Ebendaher von *Möbius*.

MBI *Cypraea poraria* L. Martini I, Fig. 237, 238. Kiener pl. 49, Fig. 2. *Reeve* Fig. 99. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 41 Mauritius. Ebendaher auch von *Caldwell*.

SAMd **Cypraea erosa* L. *Lister* hist. conchyl. pl. 693, Fig. 39 Mauritius. *Linne* syst.

MBRAf nat. éd. 10 Mauritius. Martini I, Fig. 320, 321. Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 515
PAu Ile de France. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 47, Fig. 12, 13 lebendes Thier. Kien. pl. 9, Fig. 2. *Reeve* Fig. 43 Mauritius. *Sow.* Fig. 110 Mauritius. *Dufo* 184 Seychellen und Amiranten, 3—4 m tief. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius. *Desh.* 137 Reunion. *Lien.* 39 Mauritius, 78 Seychellen. Mauritius und Seychellen, *Möbius*. Auffallend gelb gefärbte Exemplare aus Mauritius von *Robillard* erhalten.

SAMd **Cypraea caurica* L. *Lister* hist. conchyl. pl. 677, Fig. 24, 25 Madagaskar. Mar-
MBR tini I, Fig. 301, 302. Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 516 Madagaskar. Kien.
AfIAu pl. 10, Fig. 2. *Reeve* Fig. 46. Adams und *Reeve* Zool. of the Samarang pl. 5, Fig. 5 lebendes Thier. *Dufo* 183 Seychellen und Amiranten häufig, auf Felsen-
grund, 2—2½ m. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, ziemlich häufig. *Desh.* 137 Reunion. *Lien.* 39 Mauritius, 77 Seychellen. Ebenfalls auf Mauritius und

den Seychellen von Prof. Möbius gefunden. Monstrositäten aus Mauritius bei Sow. thes. Fig. 318, 319.

MRI Cypraea erronea L. Born test. mus. Caes. tab. 8, Fig. 14 (spurca). Sow. conchyliol. Au illustr. Fig. 124. C. olivacea Lam. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 48, Fig. 13 lebendes Thier. Sgan. 29 Madagaskar und Mauritius. Lien. 39 Maur.

MBR *Cypraea variolaria Lam. Martini I, Fig. 303. Quoy et Gaimard loc. cit. pl. 48, Af Fig. 6, 7 lebendes Thier. Kien. pl. 27, Fig. 2, 3. C. cruenta Reeve Fig. 38 (nicht C. cruenta Gmelin, Gnaltieri tab. 15, Fig. E, welche eher zu caurica gehört). Desh. 138 Reunion. Lien. 39 (cruenta) Mauritius. Ebendaher von Möbius.

MAfI Cypraea Lamarcki Duclos, miliaris Kiener (non Gmelin) pl. 30, Fig. 2. Reeve Fig. 37. Lien. 40 Mauritius.

Vielleicht ist diese Art auch Sganin's 29 C. turdus von Madagaskar und Mauritius. Die ächte C. turdus Lam., Reeve Fig. 31 ist mir nur aus dem Rothen Meer und persischen Golf bekannt.

CMBD Cypraea ocellata L. Kien. pl. 49, Fig. 3. Reeve Fig. 73. Desh. 138 Reunion. Lien. I 41 Mauritius, 104 Rodriguez und 110 Cargados.

MAfI Cypraea Listeri Gray Kien. pl. 14, Fig. 2. Reeve Fig. 83. Sow. thes. Fig. 241 Maur. Lienard 40 führt auch noch C. nebulosa Kien. für Mauritius an, diese ist aber nach Reeve die westafrikanische zonata, daher sehr zweifelhaft.

ACMB Cypraea scurra Chemn. X, Fig. 1338. Martini I, Fig. 276, 277. C. Indica Gmel. D Af P Kien. pl. 5, Fig. 2. Dufo 185 Amiranten, selten, 4 m tief. ?Bernardin St. Pierre Au 107 lièvre. Sgan. 29 Madagaskar und Mauritius. Desh. 137 Reunion. Lien. 41 Mauritius, 104 Rodriguez und 110 Cargados.

SAMd Cypraea Argus L. Martini I, Fig. 285, 286. Kien. p. 77, pl. 37 und 38 Madagaskar und Seychellen. Reeve Fig. 8. Dufo 184 Seychellen, Amiranten. Sgan. 28 Maur. MBDI und Madagaskar, ziemlich selten. Desh. 137 Reunion. Lien. 38 Mauritius, 77 Seychellen, 103 Rodriguez.

MBI Cypraea testudinaria L. Martini I, Fig. 271, 272. Kien. pl. 15 und 16. Reeve Fig. 9 Mauritius. Sow. thesaur. Fig. 83 Mauritius. Desh. 137 Reunion. Lien. 41 Mauritius.

SAMd *Cypraea talpa L. Lister hist. conch. pl. 668; Fig. 11 Madagaskar. Martini I, MBAfI Fig. 273, 274. Lam. ed. 2, X, p. 505 Madagaskar. Kien. pl. 12, Fig. 2. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. zool. III, p. 34, pl. 38, Fig. 1 lebendes Thier, Flacq, Mauritius. Dufo 184 Seychellen, selten, Amiranten dunkler, auf Felsengrund, 3—4 m tief, pflanzenfressend. Sgan. 29 Madagaskar und Maur. Desh. 137 Reunion. Lien. 41 Mauritius, 110 Cargados. Seychellen, Möbius.

SAMd *Cypraea carneola L. Martini I, Fig. 287, 288. Kien. pl. 37, Fig. 3. Reeve MBRAf Fig. 19. Dufo 184 Seychellen und Amiranten. Sgan. 29 Madagaskar und Mauritius. Desh. 138 Reunion. Lien. 39 Mauritius und 77 Seychellen. Auch eine Abart mit weisser Mündung nach Sow. thes. Fig. 322 und Lienard auf Mauritius. IAu

SAMd *Cypraea isabella L. Lister hist. conch. pl. 660, Fig. 4 Mauritius und Madagaskar. MBRAf Linne syst. nat. ed. 10 ebenso. Martini I, Fig. 275. Lam. an. s. vert. ed. 2, X, IP Au p. 518 Madagaskar und Ile de France. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 48, Fig. 18 lebendes Thier. Kien. pl. 48, Fig. 3. Reeve Fig. 51 Mauritius. Sow. Fig. 16

Mauritius. *Dufo* 185 Seychellen und Amiranten, häufig, auf Felsengrund, 3 m tief. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, häufig. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 40 Maur., 78 Seychellen. Black river, Maur. und Seychellen, *Möbius*.

MR Cypraea stolidia L. Born test. Mus. Caes. tab. 8, Fig. 15. Kien. pl. 31, Fig. 1. Reeve Fig. 67, *Lien.* 41 Mauritius.

MB Af Cypraea tabescens Solander, Lam. Kien. pl. 5, Fig. 3. Reeve Fig. 66b. *Sow.* I Au thes. Fig. 261 Maur. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 41 Mauritius.

Md MI Cypraea cylindrica Born test. Mus. Caes. tab. 8, Fig. 10. *Kien.* pag. 89, pl. 16, Fig. 3 Madagaskar. Reeve Fig. 64. *Lien.* 39 Mauritius.

SMdM *Cypraea asellus L. Lister hist. conchyl. pl. 666, Fig. 10. Martini I, Fig. 280. R I Au Kien. pl. 31, Fig. 3. Reeve Fig. 98. *Dufo* 185 Mahé, Praslin und Curieuse, an Meerpflanzen, 2—3 m tief, selten. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, ziemlich selten. *Lien.* 38 Mauritius, 77 Seychellen. Grande Baie, Maur., *Möbius*.

M† Cypraea neglecta *Sow.* conchol. illustr. Fig. 12.* Reeve Fig. 100 Mauritius. *Sow.* thes. Fig. 374 ebendaher.

MB† Cypraea Menkeana *Desh.* moll. de Reunion p. 139, pl. 13, Fig. 21, 22 Reunion. *Lien.* 40 Reunion.

CMB Cypraea hirundo L. Born test. mus. Caes. pl. 8, Fig. 11. Martini I, Fig. 282. Af I Kien. pl. 32, Fig. 1. Reeve Fig. 104. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 40 Mauritius und 110 Cargados. Hierher wohl auch C. Oweni Gray *Sow.* thes. Fig. 366 Maur.

CMBR Cypraea felina Gmelin Martini I, Fig. 283, 284. Kiener pl. 33, Fig. 3. Reeve Af I Au Fig. 105. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 39 Mauritius und 110 Cargados. Auch von *Caldwell* erhalten.

MRIP Cypraea fimbriata Gmelin Martini I, Fig. 263. Kiener pl. 31, Fig. 4. Reeve Fig. 92. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 126. *Lien.* 39 Mauritius.

SCMB Cypraea ursellus Gmelin Martini I, Fig. 241. Kiener pl. 33, Fig. 4. *Desh.* 138 D I (urcellus) Reunion. *Lien.* 42 Mauritius, 78 Seychellen, 104 Rodriguez und 110 Cargados.

Diese Art ist nicht zweifellos; häufig werden abgeriebene, daher oben braun aussehende Stücke von C. hirundo, felina oder fimbriata für ursellus genommen.

CMBI *Cypraea punctata L. Martini I, Fig. 290, 291. Reeve Fig. 101. atomaria Gmelin, Kien. pl. 39, Fig. 2. C. stercus muscarum Lam. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 38 und 41 Mauritius, 110 Cargados. Mauritius, *Möbius*.

MBI Cypraea microdon Gray Kiener pl. 56, Fig. 5. Reeve Fig. 139. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 40 Mauritius.

M? Cypraea chrysalis Kien. pl. 54, Fig. 4 (unbekannter Herkunft). *Lien.* 39 Maur.

M† Cypraea Cernica *Sow.* thes. Fig. 238 New island, Maur. *Lien.* 39.

SMdM *Cypraea Mauritiana L. Lister hist. conch. pl. 702, Fig. 52 Mauritius. *Linne* syst. BAf I nat. ed. 10 Mauritius. *Bernardini St. Pierre* 107 Porcelaine d'un rouge brun à dos d'âne. Martini I, Fig. 317—319, X, Fig. 1337. Lam. X. p. 492. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 48, Fig. 2—4 lebendes Thier. Kien. pl. 39 und pl. 40. Reeve Fig. 1. *Sow.* 51 Mauritius. *Dufo* 183 (Maura) Seychellen, selten. *Sganz.* 28 Mada-

gaskar und Mauritius, häufig. *Desh.* 137 Reunion. *Lien.* 40 Mauritius. Grande Baie und Fouquets, *Möbius*.

SCMd *Cypraea reticulata* Martyn univers. conchyl. pl. 15; arlequina *Chemnitz* X, MBaf Fig. 1346, 1347 Mauritius. *histrio* Gmelin. *Lam.* X, p. 496 Madagaskar. Quoy IP et Gaim. Voy. Astrol. pl. 47, Fig. 10, 11 lebendes Thier. *Kien.* pl. 18, Fig. 1. Reeve Fig. 3. *Dufo* 184 Seychellen. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 40 und 41 Reunion, 78 Seychellen, 110 Cargados. — *C. amethystea* *Linne* *Lister* pl. 662, Fig. 6, syst. nat. ed. 10, von Madagaskar, dieselbe abgeschliffen.

Die Unterschiede, welche Redfield in den Annals of the Lyceum of nat. hist. at New-York IV, 1848, p. 477 zwischen *C. reticulata* aus der Südsee und *histrio*-arlequina aus dem indischen Ocean aufgestellt hat, erscheinen bei Vergleichung vieler Exemplare von mehreren Fundorten nicht stichhaltig.

SAMd **Cypraea Arabica* L. Martini I, Fig. 328—330. Quoy et Gaim. Voy. Astrolabe MBRAF pl. 48, Fig. 5 lebendes Thier. *Kien.* pl. 17, Fig. 1. Reeve Fig. 2. *Dufo* 182 I Au Seychellen und Amiranten, zahlreich, auf Felsengrund, 2—4 m tief, pflanzenfressend. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, gemein. *Desh.* 137 Reunion, Fouquets, *Möbius*.

Wahrscheinlich Lienard's *C. Arabicula* *Lam.* von Mauritius, 38 und den Seychellen, 103, da er *Arabica* selbst nicht nennt und die ächte *Arabicula* *Lam.* nur an der Westküste Amerika's vorkommt.

SCMd *Cypraea mappa* L. Martini I, Fig. 245, 246. *Kien.* pl. 20, Fig. 1 und 2. Reeve MI Fig. 18. *Sow.* thes. Fig. 24 Seychellen, Mauritius. *Bernardin* *St. Pierre* 107 carte de géographie. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, selten. Von den Cargados durch *Robillard* erhalten und zwar die Varietät entsprechend Fig. 2 bei Kiener.

SMdM **Cypraea caput-serpentis* L. *Lister* hist. conch. pl. 702, Fig. 50 und pl. 704, BD Af Fig. 53 Mauritius. *Linne* syst. nat. ed. 10 Mauritius. *Martini* I, Fig. 316 Maur. I Au *Lam.* X, 508 Ile de France. *Kien.* pl. 49, Fig. 1. Reeve Fig. 44. *Quoy et Gaim.* Voy. Astrol. moll. III, p. 33, pl. 47, Fig. 14, 15 lebendes Thier, Ile de France. *Dufo* 184 Seychellen. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, ziemlich häufig. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 39 Mauritius, 77 Seychellen. Fouquets, *Möbius*.

Eine Abart mit ganz weissem Rücken von Rodriguez durch *Robillard* erhalten.

SAC **Cypraea helvola* L. Martini I, Fig. 326, 327. *Kien.* pl. 28, Fig. 1. Reeve MdMB Fig. 72. *Dufo* 185 Seychellen und Amiranten, zahlreich, auf Felsengrund, 3 m R Af I tief. *Sganz.* 29 Madagaskar und Mauritius, ziemlich selten. *Desh.* 138 Reunion. *Lien.* 40 Mauritius und 110 Cargados. Fouquets, Maur. und Seychellen, *Möbius*. MdM †*Cypraea citrina* Gray *Kiener* p. 70, pl. 43, Fig. 4 Madagaskar. Reeve Fig. 78. *Sow.* Fig. 218 Madagaskar. *Lien.* 39 Mauritius.

Diese Art gleicht so sehr der vorhergehenden, dass nur nach den Abbildungen zu urtheilen es fraglich erscheint, ob sie vielleicht nur auf nicht völlig ausgebildeten Stücken von *helvola* beruhe.

C?PAu *Cypraea ventriculus* *Lam.* Quoy et Gaimard Uranie pl. 72, Fig. 6, 7. Reeve Fig. 28. *C. achatina* Solander, *Kien.* pl. 38, Fig. 3. Nur von *Lien.* 110 für die Cargados erwähnt, daher zweifelhaft, sonst aus Neuholand und Polynesien bekannt.

- SACM **Cypraea moneta* L. Martini I, Fig. 337, 339. Quoy et Gaimard Voyage Astrol. DRAf pl. 48, Fig. 17 lebendes Thier. Kien. pl. 34, Fig. 1. Reeve Fig. 74. Dufo 185 I PAu Seychellen und Amiranten, häufig, 2½ m. Lien. 40 Mauritius, 78 Seychellen, 104 Rodriguez und 110 Cargados. Fouquets, Maur. und Seychellen, Möbius.
- C. *icterina* Lam., Kien. pl. 34, Fig. 3. Desh. 138 von Reunion, scheint nur eine unentschiedene Zwischenform zwischen dieser und der folgenden.
- SAMB **Cypraea annulus* L. Martini I, Fig. 239, 240. Quoy et Gaimard pl. 48, RAfIP Fig. 14—16 lebendes Thier. Kien. pl. 34, Fig. 2. Reeve Fig. 71. Dufo 184 Au Seychellen und Amiranten. Desh. 138 Reunion. Lien. 38 Mauritius. Fouquets, Maur. und Seychellen, Möbius.
- M†? *Cypraea albella* Lam. an. s. vert. ed. 2, X, p. 545 Ile de France. Sganz. 29 Madagaskar und Mauritius, selten. Mir ganz unbekannt, auch bei Reeve und Kiener fehlend.
- Md MI **Cypraea* (*Pustularia*) *Madagascariensis* Gmelin, Lister pl. 710, Fig. 61 Madagaskar. Sow. conch. illustr. Fig. 116. Desh. Lam. X, p. 565. Kien. pl. 3, Fig. 4. P Reeve Fig. 75 Mad. Martens Südseeconchylien S. 34. Fouquets, Möbius.
- SMB **Cypraea* (*Pustularia*) *nucleus* L. Rumph. amb. rar. tab. 39, Fig. J. Quoy et IP Gaim. Voy. Astrol. pl. 48, Fig. 10, 11 lebendes Thier. Kien. pl. 3, Fig. 2. Reeve Fig. 70. Desh. 138 Reunion. Lien. 41 Mauritius, 78 Seychellen. Auch von Möbius und Caldwell aus Mauritius erhalten.
- SMBD **Cypraea* (*Pustularia*) *staphylaea* L. Born test. mus. Caes. tab. 8, fig. 18. Martini I, Fig. 313, 314. Kien. pl. 35, Fig. 1, 2. Reeve Fig. 82b. Desh. 138 Reunion. RIAfP Au Lien. 41 Mauritius, 78 Seychellen, 104 Rodriguez. Auch von Möbius auf den Seychellen gesammelt.
- Cypraea* (*Pustularia*) *staphylaea* var. *limacina* Lam. Martini I, Fig. 312. Kien. pl. 35, Fig. 1. Reeve Fig. 82a. C. *interstincta* Wood. Dufo 185 Mahé, selten. Lien. 40 Mauritius.
- SCMB *Cypraea* (*Epona*) *cicercula* L. Born test. mus. Caes. tab. 8, Fig. 19. Martini I, I Fig. 233, 234. Kien. pl. 50, Fig. 3, 4. Reeve Fig. 116. Lien. 39 Mauritius und 78 Seychellen.
- Cypraea* (*Epona*) *cicercula* var. *globulus* L. Born tab. 8, Fig. 20. Reeve Fig. 118. Desh. 138 Reunion. Lien. 40 (globosus) Mauritius, 78 Seychellen und 110 Cargados.
- M† *Cypraea* (*Epona*) *Lienardi* Jousseaume Revue zoologique 1874, pl. 1, Fig. 1, 2 Maur. Lien. 40 Maur. und 78 Seychellen. Von Robillard erhalten.
- M† *Cypraea* (*Epona*) *tricornis* Jousseaume ibid. Fig. 3, 4 Mauritius. Lien. 42.
- MBP *Cypraea* (*Epona*) *annulata* Gray Reeve Fig. 114. Desh. 138 Reunion, Lien. 38 Mauritius.
- MBI *Cypraea* (*Epona*) *Childreni* Gray Sow. conch. illustr. Fig. 69. Desh. Lam. X, p. 566. Kien. pl. 40, Fig. 3 Ile de France. Reeve Fig. 115. Desh. 138 Reunion.
- MI **Cypraea* (*Trivia*) *Adamsoni* Gray Kien. pl. 46, Fig. 3. Reeve Fig. 135. Desh. 138 Reunion. Lien. 38 Mauritius. Fouquets, Möbius.

- MBRI **Cypraea* (*Trivia*) *oryza* Lam. Rumph. amb. rar. tab. 39, Fig. P. Kien. pl. 52, P Fig. 2. Reeve Fig. 140. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 127. Martens Südseeconch. S. 34. *Desh.* 238 Reunion. *Lien.* 41 Mauritius. Fouquets, *Möbius*.
Sehr ähnlich der westindischen *nivea* Gray Reeve Fig. 136, Kien. pl. 43, Fig. 3 (*scabriuscula*).
- MBP *Cypraea* (*Trivia*) *hordeacea* Kiener p. 149, pl. 54, Fig. 5 Bourbon. *Desh.* 138. *Lien.* 40 Mauritius. Pease Am. Journ. Conchyl. IV, p. 127 C. *insecta* Mighels. Weiss, länglich.
- MBP *Cypraea* (*Trivia*) *tremeza* Duclos Magasin de Zool. 1883, pl. 25. Kien. pl. 53, Fig. 4. Reeve Fig. 148. *Desh.* 139 Reunion. *Lien.* 42 Mauritius.
- M? *Cypraea* (*Trivia*) *subrostrata* Gray Kien. p. 152, pl. 45, Fig. 5 Ile de France. Reeve Fig. 147.
Lienard führt noch C. *Australis* Lam. 110 für die Cargados, C. *candidula* Gask., *quadripunctata* Gray 41 für Mauritius auf, die erstere ist bis jetzt nur aus Australien, die zwei letzteren aus Westindien bekannt; da die Arten dieser Gruppe leicht zu verwechseln sind, trage ich Anstand, sie hier aufzunehmen; Deshayes bei Lamarck X, p. 569 C. *pulex* für Ile de France. C. *livida* Gmelin Lister pl. 656, Fig. 1 Mauritius und C. *squalina* Gmelin, Lister pl. 686, Fig. 33 Madagaskar, beruhen auf jungen und unausgefärbten Exemplaren.
- MB† **Erato nana* Duclos Sow. thes. pl. 219, Fig. 12, 13. Reeve XV, Fig. 18. *Desh.* 136 Reunion. *Lien.* 23 Mauritius. Auch von *Möbius* auf Mauritius gesammelt.
- M† *Erato guttata* Sow. conch. illustr. Fig. 50; thes. III, pl. 219, Fig. 29, 30 Mauritius. Reeve XV, Fig. 15.

Ovulidae.

- SAMd **Ovula ovum* L. Martini I, Fig. 205, 206. Reeve XV, Fig. 3. *oviformis* Lam. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 47, Fig. 7 lebendes Thier. Adans und Reeve zool. Samarang pl. 6, Fig. 7 lebendes Thier. Kien. pl. 1. Bernardin St. Pierre 107 l'oeuf d'un blanc de faïence. Dufo 186 Seychellen und Amiranten, zahlreich, auf Felsengrund, 3—4 m tief, pflanzenfressend. *Sganz.* 28 Madagaskar auf den Riffen, häufig. *Desh.* 136 Reunion. *Lien.* 42 Mauritius. Seychellen, *Möbius*.
- SCMd *Ovula verrucosa* L. Martini I, Fig. 220, 221. Encycl. pl. 357, Fig. 5. Quoy et MAfI Gaim. Voy. Astrol. pl. 47, Fig. 3—6 lebendes Thier. Kien. pl. 2, Fig. 3. Reeve P Fig. 2. Dufo 186 Mahé, sehr selten, unter Meerpflanzen, 3 m tief. *Sganz.* 28 Madagaskar und Mauritius, selten. *Lien.* 42 Mauritius und 100 Cargados.
- MBI *Ovula lactea* Lam. Kien. pl. 6, Fig. 1. Sow. thes. Fig. 67, 69. *Ovulum semistriatum* Reeve Fig. 16. *Desh.* 136 Reunion. *Lien.* 42 Mauritius.
- S† *Ovula alba* Dufo Ann. Sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 187 Mahé, an Felsen, 2—3 m tief, sehr selten, weiss.
- MI *Ovula concinna* A. Adams und Reeve Zool. voy. Samarang pl. 6, Fig. 8. Reeve Fig. 21. *Lien.* 42 Mauritius.
- M *Ovula frumentum* Sow. thes. Fig. 37. Reeve Fig. 15. *Lien.* 42 Mauritius.
- MI *Ovula nuberculata* A. Adams und Reeve loc. cit. pl. 6, Fig. 12. *Lien.* 42 Maur.
- BI *Cvula punctata* Duclos Magasin de Zoologie 1831, pl. 7. Kien. p. 13, pl. 5, Fig. 3 Bourbon. Reeve Fig. 22 (Philippinen).

- B†? *Ovula* (*Radius*) *longirostrata* Sow. thes. Fig. 59, 60. Kien. pl. 5, Fig. 5. *Bulla birostris* Linne, non *Ov. birostris* Lam. *Desh.* 136 Reunion.
- MB† *Ovula* (*Radius*) *Borbonica* *Desh.* Moll. de Reunion pl. 136, pl. 13, Fig. 18—20 Reunion. *Lien.* 42 Mauritius.
- S† *Ovula* (*Radius*) *nigerina* *Dufo* Ann. Sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 186 Mahé, an Meerpflanzen, 2½ m tief, sehr selten, violett.
- CI *Ovula* (*Radius*) *obtusata* Sow. thes. Fig. 34. Reeve Fig. 31. *Lien.* 110 Cargados.
- BM?† *Pedicularia elegantissima* *Desh.* moll. de Reunion p. 50, pl. 6, Fig. 23—26. Reeve XX, Fig. 3. Vermuthlich auch *Lienard's* unbestimmte Art 43 von Maur.

Lamellariidae.

- M† **Lamellaria* (*Chelynotus*) *nigra* *Blainville* manuel de malacologie p. 466, pl. 42, Fig. 1 (*Coriocella*) von Ile de France; *Guerin* iconographie, moll. pl. 15, Fig. 12. *Coriocella Rang* manuel de moll. p. 236. — *Sigaretus Tonganus*, variété de Maurice, *Quoy et Gaimard* Voy. de l'Astrolabe, zool. II, p. 219, pl. 66 bis, Fig. 9 Rade du port Louis, Ile de France, auf Sand, mehrere Faden tief; *Chelynotus Mauritianus Bergh* Marseniaderne p. 103, pl. 5B, Fig. 2. — *Fouquets*, Mauritius, *Möbius*, Schale 36 mm im grossen Durchmesser, 25 im kleinen, und ebenso hoch; eine Zeichnung des lebenden Thiers Taf. 21, Fig. 9.
- MB† *Lamellaria Berghi* *Desh.* (Marsenia) moll. de Reunion p. 77, pl. 9, Fig. 18—28 Bourbon (nur die Schale). *Lien.* 26 Mauritius.
- SA Vermuthlich gehört *Cryptostoma nigrum* *Dufo* 201 von den Seychellen und Amiranten, 3—4 m tief, pflanzenfressend, auch in diese Gattung.

Naticidae.

- SRIP **Natica* (*Nacca*) *Sinensis* Lam. Chemn. V, Fig. 1887—1891. Encycl. pl. 453, Fig. 3. Reeve Fig. 82. *Lien.* 75 Seychellen. Ebendaher, *Möbius*.
- MI *Natica* (*Nacca*) *areolata* Recluz Philippi *Natica* in Küster's Forts. v. Chemn. Taf. 11, Fig. 2. *Lien.* 26 Mauritius.
- BI *Natica* (*Nacca*) *zebra* Lam. Chemn. V, Fig. 1885, 1886. Reeve Fig. 53. *Desh.* 79 Reunion.
- MdBaf *Natica* (*Nacca*) *zonaria* Lam. taeniata Menke Chemn. V, Fig. 1868—1871, alapapilliones Reeve Fig. 60. *Favanne* conchyl. II, p. 263, pl. 11, Fig. C Madagaskar. *Desh.* 79 Reunion.
- Md?M? *Natica* (*Nacca*) *millepunctata* Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 636 Madagaskar, *Favanne* conch. II, p. 270, pl. 11, Fig. D9. *Sganz.* 20 Madagaskar, selten. *Lien.* 26 (Hebraea) Mauritius.

Ich kann nicht glauben, dass die bekannte Art des Mittelmeers auch auf Madagaskar oder Mauritius vorkomme, habe auch nie eine damit leicht zu verwechselnde von dort gesehen. Bei Favanne finden sich manche falsche Fundortsangaben, aber was Sganzin und Lienard vor sich hatten, bleibt unaufgeklärt. Vgl. *N. maculosa*.

- MI **Natica* (*Nacca*) *violacea* Sow. Philippi Taf. 10, Fig. 3. Reeve Fig. 65. *rhodo-*

stoma Philippi Abbild. I, Taf. 1, Fig. 7. *Lien.* 27 Mauritius. Auch von Professor *Möbius* ebenda gesammelt.

MdMR Natica (Nacca) rufa Born test. mus. Caes. tab. 17, Fig. 4, 5. *Chemn.* V, Fig. 1872, I 1873. spadicea Gmelin (non Swainson) Mauritius. fasciata Martyn univers. conch. pl. 110. *Lam.* ed. 2, VIII, p. 639 Ile de France. Reeve Fig. 70. *Sganz.* 20 Mauritius und Madagaskar, selten, an Felsen. Von Lienard nicht erwähnt.

Md?I Natica (Nacca) maculosa Lam. *Chemn.* V, Fig. 1892, 1893. *Favanne* II, p. 266 la peau de tigre, Madagaskar. Reeve Fig. 57. Eydoux et Souleyet Voy. de Bonite pl. 35, Fig. 18 (lebendes Thier).

Seit Favanne nicht mehr aus unserem Gebiet erwähnt, aber so häufig im indischen Archipel, z. B. Singapore und Java, dass mir ihr Vorkommen gar nicht unwahrscheinlich ist. Sollte sie mit *millepunctata* verwechselt worden sein? aber Favanne nennt beide.

SMBR *Natica (Nacca) unifasciata Lam. Delessert recueil pl. 32, Fig. 13. Reeve Fig. 49.

AfIP Maroccana var. Philippi loc. cit. Taf. 12, Fig. 5. Marochiensis (Gmel.) Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 66, Fig. 16, 17 lebendes Thier. Desh. 79 Reunion. *Lien.* 26 Mauritius. Bei Fouquets, Grande Baie, Black river auf Mauritius, und auch auf den Seychellen von Prof. *Möbius* gesammelt.

Weit verbreitet im indischen und stillen Ocean bis zur Westküste von Amerika; aus dem atlantischen Ocean ist sie mir nicht mit Sicherheit bekannt, daher ich N. Maroccana Chemn. = Marochiensis Gmel. noch nicht unbedingt mit ihr identifizieren kann.

Natica (Nacca) unifasciata var. lurida Philippi Taf. 12, Fig. 2—4. Mauritius von *Robillard* erhalten.

Natica (Nacca) unifasciata var. avellana Philippi Taf. 11, Fig. 14. *Lien.* 26 Mauritius.

MAf Natica (Nacca) Antoni Philippi Taf. 19, Fig. 8. *Lien.* 26 Mauritius.

S† Natica (Nacca) Mahesiensis *Dufo* Ann. Sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 193 Mahé, selten. Reeve Fig. 58 Mahé.

MI Natica (Nacca) Gnaltieriana Recluz Philippi Taf. 10, Fig. 8. Reeve Fig. 114. *Lien.* 26 Mauritius.

Lienard führt noch N. Collei Recluz (Reeve Fig. 110 vom Schwanenfluss, Neuholland) sowie die mir unbekannte Cernica, Marcelli und viridis für Mauritius an, letztere vielleicht Missverständniss für *Neritina viridis*.

SAC *Natica (Mamma) mammilla L. *Chemn.* V. Fig. 1928, 1929. Eydoux et Souleyet

MdMB Voy. de la Bonite, moll. pl. 35, Fig. 16, 17. Reeve Fig. 27. *Dufo* 192 Seychellen

DRAfI und Amirauteen, überall häufig auf sandig-schlammigem Boden, 1—4 m tief, pflanzenfressend. *Sganz.* 20 Bourbon, Mauritius und Madagaskar, sehr häufig, an Felsen. Desh. 79 Reunion. *Lien.* 26 Mauritius, 75 Seychellen, 102 Rodriguez, 107 Cargados. Fouquets auf Mauritius und Seychellen, Prof. *Möbius*, 49 mm lang und 42 breit, Mündung 44 mm lang.

Natica (Mamma) mammilla var. piriformis Recluz Philippi Taf. 9, Fig. 8. Reeve Fig. 16. *Lien.* 27 Mauritius.

MI Natica (Mamma) albula Recluz Reeve Fig. 23. *Lien.* 26 Mauritius.

MdIAu Natica (Neverita) Chemnitzii Recluz *Chemn.* V, Fig. 1856, 1857. *Favanne* conch. II, p. 281, p. 10, Fig. K und L Madagaskar. N. glaucina Lam. (non L.) Reeve

Fig. 8. *N. didyma* (Bolten) Philippi Chenu illustr. conch. pl. 3, Fig. 4. Eydoux et Souleyet Voy. Bonite, moll. pl. 35, Fig. 4, 5 (lebendes Thier). Häufig im indischen Ocean.

- CI *Natica* (propr. subgen.) *pes-elephantis* Chemn. V, Fig. 1922, 1923 Desh. Lam. VIII. p. 650. Philippi S. 28. *alba* Gray, *columnaris* Recluz Journ. de Conch. I, 1850, p. 394. Reeve Fig. 19. *Lien.* 107 Cargados.
- SA Md **Natica* (*Mammilla*) *melanostoma* Gmelin Chemn. V, Fig. 1926, 1927. Lam. Quoy MBRAf et Gaim. Voy. Astrol. pl. 66, Fig. 1—3 lebendes Thier. Reeve Fig. 30 Seychellen.
- IP Martens Südseeconchylien S. 24. *Dufo* 192 Seychellen, selten, und Amiranten, auf erdigem, mit Meerpflanzen bedecktem Grund, 2—3 m. *Sganz.* 20 Madagaskar und Mauritius, sehr häufig. *Desh.* 78 Reunion. *Lien.* 26 Mauritius. Fouquets und Black river, *Möbius*.
- MI *Natica* (*Mammilla*) *Priamus* Recluz Philippi Taf. 18, Fig. 2. Reeve Fig. 36. *Lien.* 26 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MBR *Natica* (*Mammilla*) *simiae* Desh. Chemn. V, Fig. 1938. Desh.; Lam. VIII, p. 652. Af Reeve Fig. 76. *sigaretina* Menke synops. 1830 (non Lam. foss.). *Natice fibreuse* Eydoux et Souleyet Voy. Bonite, moll. pl. 35, Fig. 8—11 (lebendes Thier). *Desh.* 78 Reunion. *Lien.* 27 Mauritius.
- SM?Af **Sigaretus planus* Philippi Abbild. I, S. 146, Taf. 1, Fig. 7, 1844. *S. planulatus* I Recluz 1843—1845. Reeve XV, Fig. 7. *Bernardin St. Pierre* 105 une espèce de coquille blanche. St. Anne, Seychellen, 5 Faden tief, *Möbius*. Vermuthlich gehört auch der unbestimmte *Sigaretus Lienard's* 27 von Mauritius hierher; auch *Favanne* I, S. 590 nennt schon Ile de France als Fundort für *Sigaretus*.
- S† *Sigaretus Carolinus Dufo* 201 Mahé, 3—4 m pflanzenfressend, sehr selten. Vielleicht dieselbe Art.

Strombidae.

- SBR *Strombus tricornis* Lam. Martini III, Fig. 843, 845. Kien. Fig. 7 und jung Fig. 33. Reeve VI, Fig. 22. *Dufo* 168 Seychellen. *Desh.* 113 Reunion.
- SMdM **Strombus auris-Dianae* L., Desh. Lam. IX, p. 694. Kien. pl. 16, Fig. 1. Reeve BAf Fig. 36b. *Lamarckii* Sow. thes. II, Fig. 93. *striatogranosus* Mörch. *Sganz.* 26 Madagaskar, häufig. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 37 Mauritius. Seychellen, *Möbius*.
- SCMB *Strombus lentiginosus* L. Martini III, Fig. 827, 828. Quoy et Gaim. voy. Astrol. AfIAu pl. 50, Fig. 3—5 lebendes Thier. Kien. pl. 18, Fig. 1. Reeve Fig. 31. *Dufo* 168 Seychellen, 3—3 $\frac{1}{3}$ m tief. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 37 Mauritius, 109 Cargados. Auch von *Caldwell* erhalten.
- MI *Strombus papilio* Chemnitz X, Fig. 1510, 1511. Quoy et Gaimard Voyage Astrol. pl. 50, Fig. 1, 2 lebendes Thier. Kien. pl. 17, Fig. 2. Reeve Fig. 29. *Lien.* 37 Mauritius.
- MdMR *Strombus urceus* L. Martini III, Fig. 803—806. Encycl. pl. 408, Fig. 3. Sow. AfI thes. Fig. 34—37. Kien. pl. 30, Fig. 2, 3. Reeve Fig. 24. *Sganz.* 26 Madagaskar selten.

- Strombus urceus* var. *plicatus* Lam. Rumph. amb. rar. tab. 37, Fig. T. Encycl. pl. 408, Fig. 2. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 51, Fig. 5, 6, lebendes Thier. Sow. Fig. 56. Kien. pl. 31, Fig. 1. Küster Taf. 13, Fig. 3, 4. Reeve Fig. 17. *Lien.* 37 Mauritius. Auch von *Caldwell* und *Robillard* erhalten.
- Strombus urceus* var. *elegans* Sow. thes. Fig. 43, Rüppelli Reeve Fig. 5. *Lien.* 37 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MB *Strombus haemastoma* Sow. thes. Fig. 51, Reeve Fig. 5, Str. *Hellii* Rousseau. Desh. 114 Reunion. *Lien.* 37 Mauritius. Auch von *Caldwell* erhalten. Noch sehr nahe dem vorigen.
- SCMB **Strombus floridus* Lam. Martini III, Fig. 807. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 51, RAfIP Fig. 12, 13, lebendes Thier. Kien. pl. 32, Fig. 1. Reeve Fig. 11. Martens Südsee-Au conchylien S. 32. *Dufo* 168 Seychellen. Desh. 114 Reunion. *Lien.* 37 Mauritius, 77 Seychellen, 109 Cargados. Black river, *Möbius*.
- SCR **Strombus columba* Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 702. Kien. pl. 25, Fig. 1. Sow. thes. Fig. 3. *Lien.* 109 Cargados. Seychellen, *Möbius*.
- SAC **Strombus gibberulus* L. Martini III, Fig. 792—796. Mauritius Quoy et Gaim loc. MdMB cit. pl. 50, Fig. 14. Kien pl. 28 Fig. 1. Sow. thes. Fig. 25, 26. Reeve Fig. 15b. DRAf *Dufo* 166 Seychellen und Amiranten, überall sehr gemein, auf sandig-schlammigem I P Grund, 1½—2½ m tief, aassfressend. *Sganz.* 26 Madagaskar, sehr gemein. Desh. 114 Reunion. *Lien.* 37 Mauritius, 77 Seychellen, 103 Rodriguez, 109 Cargados. Fouquets und Black river auf Mauritius und Seychellen, *Möbius*. Auch von Mayotte durch *Hildebrandt* erhalten.
- SMD **Strombus Mauritianus* Lam. *Lister* hist. conch. pl. 850, Fig. 5. *Bernardin St. Pierre* RAfI 106 rouleau à bouche d'un beau ponceau. Lam. an. s. vert. ed. 2 IX, p. 699. Ile de France. Kien, pl. 27, Fig. 2. Reeve Fig. 20 Mauritius. *cylindricus* Swains. Sow. thes. Fig. 50 und 59, *Sganz.* 26 Mauritius, selten. *Lien.* 20 Mauritius, 77 Seychellen, 103 Rodriguez. Fouquets, *Möbius*.
- Strombus Mauritianus* var. *coniformis* Sow. thes. Fig. 55 und 61 Chemn. X Fig. 1499 Mauritius; Str. *laevilabris* Menke 1830.
- SAC *Strombus Luhuanus* L. Martini III, Fig. 789—791. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. MdMB pl. 51, Fig. 3, 4 lebendes Thier. Kien. pl. 27, Fig. 1. Sow. thes. Fig. 54. Reeve DIAu Fig. 19. *Dufo* 168 (*lucanus*) Seychellen und Amiranten, selten. *Sganz.* 26 Madagaskar, selten. Desh. 114 Reunion. *Lien.* 37 Mauritius, 103 Rodriguez, 109 Cargados.
- MB Af **Strombus dentatus* L., samar Chemn. X, Fig. 1501, 1502, *tridentatus* Gmelin, Lam. Kien. pl. 56, Fig. 2, Sow. thes. Fig. 86, 87. Desh. 113 (*Samarensis*) Reunion. *Lien.* 38 Mauritius. Ebendaher von *Möbius*.
- SAMd **Pterocera chiragra* L. Martini III, Fig. 851—854, 856, 857, 895, 898, 900, 901. MBR Kien. pl. 5 und pl. 10, Fig. 2. Reeve Fig. 2. — *Bernardin St. Pierre* 107 araignée. AfI *Dufo* 169 Seychellen und Amiranten auf Sandgrund, 2½ m tief, aassfressend. *Sganz.* 26 Madagaskar, häufig. Fouquets, *Möbius*.

- Pterocera chiragra* var. *rugosa* Sow. thes II, Fig. 9, 16. Reeve Fig. 6. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 38 Mauritius.
- SAMd **Pterocera bryonia* Chemn. X, Fig. 1512—1515, jung Martini III, Fig. 904, 905.
- MBR *Pt. truncata* Lam., Kien. pl. 1 und jung pl. 10, Fig. 3. Reeve Fig. 1. Ganz
- AfI jung: *Pyrula bengalina* Grateloup Actes de la Soc. linnéenne de Bordeaux 1841. *Dufo* 169 Seychellen und Amiranten, auf Sand. 4—5 m tief, ziemlich selten. *Sganz.* 26 Madagaskar, ziemlich selten. *Desh.* 113 Reunion. Mauritius. *Möbius.*
- MdMB *Pterocera lambis* L. Martini III, Fig. 855, 858, 859, jung 884. Chemn. X, Fig. 1478.
- RAfP Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 50, Fig. 6—13, pl. 49, Fig. 18—20, lebendes Thier und Anatomie. Kien. pl. 3 und 4. Reeve Fig. 8. *Sganz.* 26 Madagaskar, häufig. *Desh.* 113 Reunion. *Lien.* 38 Mauritius. Auch von Mayotte durch *Hildebrandt* erhalten.
- MdMI *Pterocera millepeda* L. Martini III, Fig. 861, 862, und jung 906, 807. Kien. pl. 9. Reeve Fig. 10. *Sganz.* 26 Madagaskar, häufig.
- Pterocera millepeda* L. var. *elongata* Swainson, Reeve Fig. 9. Chemn. X, Fig. 1479, 1480. *Lien.* 38 Mauritius,
- SAMd *Pterocera scorpius* L. Martini III, Fig. 860. *Bernardin St. Pierre* 107 Scorpion à
- MI sept crochets. Kien. pl. 6. Reeve Fig. 3. *Dufo* 168 Seychellen und Amiranten, ziemlich selten, auf Sandgrund, 3 Meter tief, aassfressend. *Sganz.* 26 Madagaskar, häufig. *Lien.* 38 Mauritius. Auch von Mayotte durch *Hildebrandt* erhalten.
- MdAf *Pterocera aurantia* Lam. Chemn. X, Fig. 1508, 1509. Kien. pl. 7. Reeve Fig. 7. *Sganz.* 26 Madagaskar, selten.
- SCMI **Terebellum subulatum* Lam. Martini II, Fig. 569. Chemn. X, Fig. 1362, 1363. *Favanne conchyliologie* pl. 19, Fig. D Ile de France. Kien. pl. 1, Fig. 1. Adams und Reeve Zoology of the Samarang pl. 9, Fig. 6, lebendes Thier. *Dufo* 178 (nebulosum) Mahé, auf Schlammgrund, 10—12 m tief, sehr selten. *Lien.* 109 Cargados. Mauritius, *Möbius.*

Cerithiidae.

- MdM *Cerithium (Vertagus) vertagus* L. Chemn. IV, Fig. 1479, 1480. Kien. pl. 18,
- AfI Fig. 2. Quoy et Gaim. Voy. Astrol., Zool. pl. 54, Fig. 24, 25, lebendes Thier. *Clava fusca* Martyn univ. conch. pl. 98. *Vertagus vulgaris* Schumacher, Reeve XV, Fig. 19. *Sganz.* 24 Madagaskar, ziemlich selten. *Lien.* 44 Mauritius.
- SAR *Cerithium (Vertagus) fasciatum* Brug. Chemn. IV, Fig. 1481, 1482. Kien. pl. 20,
- AfP Fig. 1. *V. lineatus* var. Reeve Fig. 15a. *Dufo* 60 Seychellen und Amiranten, überall häufig, auf sandig-schlammigem Grund, 2 m tief, gesellig, pflanzenfressend.
- SMdM **Cerithium (Vertagus) asperum* L. Chemn. IV, Fig. 1483. *Lam. an. s. vert.* ed. 2
- RAfP IX p. 295 Ile de France. *Encycl.* pl. 443, Fig. 3. Kien. pl. 21, Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. zool. pl. 54, Fig. 7, 8, lebendes Thier. Reeve Fig. 21 Ile de France. *Clava rugata* Martyn univ. conch. pl. 12. *Sganz.* 24 Madagaskar, ziemlich häufig. Grande Baie, Black river und Fouquets auf Mauritius, St. Anne auf den Seychellen. *Möbius.*

- Md M I *Cerithium* (Aluco) aluco L. Chemn. IV, Fig. 1478. Encycl. pl. 443, Fig. 3. Kien. P Au pl. 6, Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. zool. pl. 54, Fig. 19, 20, lebendes Thier, Reeve Vertag. Fig. 3. *Sganz.* 23 Madagaskar, nicht häufig. *Lien.* 43 Mauritius.
- S A M **Cerithium* (Aluco) obeliscus Brug. Chemn. IV, Fig. 1489. Encycl. pl. 443, Fig. 4. B R Af Kien. pl. 5, Fig. I. Reeve Vertag. Fig. 7. Sinense Gmelin. *Dufo* 60, Mahé, Praslin und Amiranten, auf Sandboden. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 43 Ilet, Maur.
- M B I P **Cerithium* (Aluco) cedo-nulli Sow. thes. Fig. 39, 40. Reeve Vertag. Fig. 1. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 43 Mauritius, Fouquets, *Möbius*. Auch von *Caldwell* erhalten.
- S A M B **Cerithium* (*Cerithium*) nodulosum Brug. Chemn. IV, Fig. 1473, 1474. Encycl. R A f I P pl. 442, Fig. 3. Quoy et Gaim. loc. cit. pl. 54, Fig. 5, 6. Kien. pl. 2, Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. zool. pl. 54, Fig. 5, 6. Reeve Fig. 3. *Dufo* 59 Seychellen und Amiranten, in der Brandung, bis 3 m tief, pflanzenfressend. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 43 Mauritius. Fouquets, *Möbius*.
- Md R *Cerithium* (*Cerithium*) Erythraeonense Lam. *Kiener iconogr.* p. 6, pl. 3, Fig. 2 Madagaskar. Reeve Fig. 5.
- S M B **Cerithium* (*Cerithium*) Adansoni Brug. Kien. pl. 4, Fig. 2. Reeve Fig. 11. Clava Af rubus Martyn univ. conch. pl. 58. *Desh.* 95 Reunion. Fouquets und Seychellen *Möbius*.
- M? *Cerithium* (*Cerithium*) spatuliferum Sow. Reeve Fig. 50. Mauritius, non *Robillard*.
- S A Md **Cerithium* (C.) echinatum Lam. *Kien.* p. 7, pl. 3, Fig. 1 Madagaskar und Seychellen. M B Reeve Fig. 10. columna var. Sow. thes. Fig. 58. *Dufo* 61 Seychellen und Amiranten, überall zahlreich, an mit Pflanzen bewachsenen Steinblöcken auf Schlammgrund, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ m tief. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 43 Mauritius. Fouquets und Seychellen, *Möbius*.
- M R I P **Cerithium* (C.) columna Sow. gen. of shells Fig. 7, thes. Fig. 56, 57. Reeve Fig. 2. Au Martens Südseeconchylien S. 35. *Lien.* 43 Mauritius. Fouquets, Grande Baie und Black river, *Möbius*.
- M B I *Cerithium* (C.) citrinum Sow. thes. Fig. 66. Reeve Fig. 1. columna Kien. pl. 4. Fig. 1. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 43 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- S M B **Cerithium* (C.) rostratum Sow. thes. Fig. 105. Reeve Fig. 95. Martens Südsee-Af I P conchylien Taf. 2, Fig. 5. gracile Pease Proc. Zool. Soc. 1860. *Desh.* 96 Reunion. *Lien.* 44 Mauritius und 78 Seychellen. Mauritius und St. Anne, Seychellen, *Möbius*.
- M B? **Cerithium* (C.) torulosum L., Brug. Chemn. IV, Fig. 1486; X, Fig. 1575, 1576, Murex larva und annularis Gmelin. *Kien.* p. 27, pl. 2, Fig. 2 Bourbon. Sow. thes. Fig. 92. Reeve Vertag. Fig. 25. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 44 Mauritius. Grande Baie, *Möbius*.
- M R I **Cerithium* (C.) Kochi Philippi Abbildungen III, Taf. 1, Fig. 3. Reeve Vertag. Fig. 26 a. Fouquets, *Möbius*.
C. eburneum, *Kiener iconogr.* p. 82, pl. 26, Fig. 1 von Ile de France angegeben, ist nach Reeve westindisch.
- M B R? *Cerithium* (C.) uncinatum Gmelin Schröter Geschichte der Flussconchylien Taf. 8, Fig. 15. *Desh.* Lam. IX, p. 315. Sow. thes. Fig. 78, 79. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 44 Mauritius.

- MB† *Cerithium* (C.) *Menkei* *Desh.* Moll. de Reunion p. 97, pl. 11, Fig. 15 Reunion. *Lien.* 43 Ilot, Mauritius.
- SMdM **Cerithium* (C.) *morum* Lam. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. zool. pl. 54, Fig. 13—15, lebendes Thier. *Kien.* 52, pl. 15, Fig. 1 Madagaskar. Sow. thes. Fig. 159, 160. *Reeve* Fig. 42 Madagaskar. *Dufo* 61 Mahé, zahlreich auf sandig-schlammigem Grund, auf mit Meerpflanzen bewachsenen Erhöhungen, bei der Ebbe im Trocknen. *Sganz.* 24 Madagaskar, ziemlich häufig. *Desh.* 95 Reunion. *Lien.* 43 Mauritius. Grande Baie und Fouquets auf Mauritius, St. Anne, Seychellen, *Möbius*.
- SI? *Cerithium* (C.) *Bornii* Sow., *tuberculatum* Born. testac. Mus. Caes. tab. 10, Fig. 16, 17. Chemn. IV, Fig. 1490. *Reeve* Fig. 26 Seychellen.
- SMdM **Cerithium* (C.) *rugosum* Wood (Strombus) ind. testac. suppl. pl. 4, Fig. 10. *Kien.* RAfIP pl. 15, Fig. 3. Sow. thes. Fig. 195, 196. *Reeve* Fig. 45. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 127. Martens Südseeconchylien S. 36. *Lien.* 44 Mauritius. St. Anne, Seychellen, *Möbius*. Nossi-Be, *Hildebrandt*.
- MIP **Cerithium* (Bittium) *lacteum* Kiener pl. 7, Fig. 3. *Reeve* Fig. 85. Martens Südseeconchylien S. 36. *pusillum* Nuttall (non Gould) Fouquets und Grande Baie, *Möbius*. Auch von *Robillard* erhalten. Von mir bei Anjer auf Java gefunden.
- MB† **Cerithium* (Bittium) *Crossei* *Desh.* moll. de Reunion p. 96, pl. 11, Fig. 12—14 Reunion. Mauritius. *Möbius*.
- MB† **Cerithium* (Bittium) *aspersum* *Desh.* ibid. p. 95, pl. 11, Fig. 16—18 Reunion. Black river und Fouquets auf Mauritius, *Möbius*.
- MB† **Cerithium* (Bittium) *zebra* *Kiener* p. 71, pl. 25, Fig. 4 Ile de France. *Desh.* Lam. IX, p. 317. *Desh.* 96 Reunion. *Lien.* 44 Mauritius.
- BP *Cerithium* (Bittium) *galapagium* („galapaginis“) Sow. thes. Fig. 155, 156. *Reeve* Lampania Fig. 10. *Desh.* 140 Reunion.
- MP **Cerithium* (Bittium) *tricarinatum* Pease *Reeve* Fig. 127 (Sandwichinseln). Mauritius. *Möbius*.
- SAMd **Potamides* (Pyrazus) *palustris* L. Chemn. IV, Fig. 1472. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 55, Fig. 14—16, lebendes Thier. *Kien.* Cerith. pl. 1. Hombron et Jacquinet Voy. au pôle sud., moll. pl. 23, Fig. 2, lebendes Thier. *Reeve* Pyraz. Fig. 2. *Dufo* 62 Mahé, Curieuse und Alphonse; auf Schlammgrund, an und in Flussmündungen, als Köder benutzt. *Sganz.* 23 Madagaskar, ebenso, gemein. *Nevill* Proc. Zool. Soc. 1869, p. 66 Port Victoria, Mahé. *Lien.* 82 Mahé. St. Anne, Seychellen, *Möbius*.
- MdIAu *Potamides* (Pyrazus) *sulcatus* Brug., *Moluccanus* Gmelin. Chemn. IV, Fig. 1484, 1485. Encycl. pl. 442, Fig. 2. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 54, Fig. 22, 23, lebendes Thier. *Kien.* Cerith. pl. 27, Fig. 1, 2. Quoy et Gaim. Voy. Astrol., zool. pl. 54, Fig. 22, 23. *Reeve* Potam. Fig. 1. *Sganz.* 23 Madagaskar, häufig auf Steinen und Felsen.
- MdBI *Potamides* (Telescopium) *telescopium* L. Chemn. V, Fig. 1507, 1509. *Kien.* pl. 28, Au Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol., zool. pl. 55, Fig. 4—6. Hombr. et Jacq. Voy.

- pole sud. pl. 23, Fig. 1, lebendes Thier. Reeve Telesc. Fig. 1. *Sganz.* 23 Madagaskar, nicht gemein. *Desh.* 95 Reunion.
- SAfI Potamides (Cerithidea) varicosus Sow. Kien. Cerith. pl. 30, Fig. 2. Reeve Cerith. Fig. 19. *Lien.* 78 Seychellen.
- MdAfI Potamides (Cerithidea) decollatus (Linne?) Bruguière, *Kien.* iconogr. p. 96, pl. 28, Fig. 2, Madagaskar.
- MdIAu Potamides (Cerithidea) obtusus Sow. *Kiener* p. 95, pl. 29, Fig. 1 u. 2 Madagaskar. Hombron et Jacq. voyage au pole sud moll. pl. 23, Fig. 3 lebendes Thier. Reeve Fig. 4.
- MRP *Triforis rosea Hinds Voy. of the Sulphur. moll. pl. 8, Fig. 19. Mauritius, *Möbius*. Auch im rothen Meer von Jickeli gesammelt. Oberster Körnergürtel gelb, die folgenden rosenroth.
- MP *Triforis violacea Quoy et Gaimard Voy. Astrol. zool. pl. 55, Fig. 22, 23 Maur. T. rubra Hinds scheint kaum davon verschieden.
- B† Triforis pupaeformis *Desh.* moll. de Reunion p. 105, pl. 12, Fig. 3, 4.
- M† *Triforis crassula n. Taf. 22, Fig. 1.
Testa ventricosa, conico-ovata, granulis supra suturam biseriatis, fusconigricans, apice pallide flavescens; anfr. circa 6, sat celeriter crescentes, ultimus angustus, basi liris circa 3 granosis cinctus, apertura parva, simplice.
Long. $2\frac{1}{2}$, diam. $1\frac{1}{3}$, apert. $\frac{2}{3}$ mm.
Mauritius, im Sand, Prof. *Möbius*.
Der obere Gürtel ist öfters heller gefärbt, aschgrau. Obgleich nur unvollkommene Exemplare vorliegen, so ist der Gesamthabitus doch so eigenthümlich, dass ich ihnen einen Artnamen nicht versagen wollte. Nächstverwandte sind Trif. pupaeformis *Desh.* moll. de Reunion pl. 12, Fig. 3, 4, welche durch die helle Färbung und die ungekörnte Basis sich unterscheidet, und T. atomus *Issel malacologia del mar rosso* pl. 4, Fig. 4, p. 280 fossil und noch kleiner, $1\frac{1}{2}$ mm lang, $\frac{3}{4}$ breit.
- BI Triforis sculpta Hinds Voyage of the Sulphur. moll. pl. 8, Fig. 3. *Desh.* 98 Reunion.
- MP *Triforis concinna Hinds *ibid.* Fig. 20. Mauritius im Sand, *Möbius*. Ein dunkelbraunes Band dicht über der Nath.
- BI *Triforis monilifera Hinds *ibid.* Fig. 14. *Desh.* 98 Reunion. — Mauritius, im Sand, *Möbius*. Dunkelbraune Flecken zwischen den Knoten der mittleren Reihe.
- B† Triforis Hindsii *Desh.* moll. de Reunion p. 98, pl. 11, Fig. 19, 20 Reunion.
- MB† *Triforia crenulata *Desh.* *ibid.* p. 99, pl. 11, Fig. 21, 22 Reunion. Mauritius, im Sand, *Möbius*. Weissfleckig, ähnlich der T. hilaris Hinds, Spitze scharf abgegrenzt, braun.
- B† Triforis Adamsi *Desh.* *ibid.* p. 100, pl. 11, Fig. 23, 24 Reunion.
- B† Triforia Reevei *Desh.* *ibid.* p. 101, pl. 11, Fig. 25, 26 Reunion.
- MB† *Triforis trilirata *Desh.* *ibid.* p. 102, pl. 11, Fig. 27, 28 Reunion. Mauritius, im Sand, *Möbius*.
- B† Triforis formosa *Desh.* *ibid.* p. 102, pl. 11, Fig. 29 Reunion.
- B† Triforis distincta *Desh.* *ibid.* p. 103, pl. 11, Fig. 30, 31 Reunion.

- B† Triforis mirifica *Desh.* ibid. p. 104, pl. 11, Fig. 32, 33. Reunion
- B† Triforis angustissima *Desh.* ibid. p. 104, pl. 12, Fig. 1, 2 Reunion.
- M† *Triforis acicula Issel malacologia del mar rosso p. 279, tab. 4, Fig. 3 (fossil).
Mauritius, im Sand, *Möbius*. Einfarbig weiss.
- SAMd *Planaxis pyramidalis Gmelin (Buccinum) Martini IV, Fig. 1170, 1171. undulatus
- MBAfI Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 236. sulcatus *Quog et Gaimard* Voy. Astrol. zool. pl. 33, Fig. 25—29 lebendes Thier, Ile de France. Reeve XX, Fig. 4. *Dufo* 65 (sulcata) Seychellen und Amiranten, sehr häufig, an Felsen, bei Ebbe über Wasser. *Sganz.* 23 (sulc.) Madagaskar, sehr häufig, an Felsen und Steinen. *Desh.* 64 Reunion. *Lien.* 45 Mauritius. Grande Baie, Maur., und Seychellen, *Möbius*.
Der westindische Pl. sulcatus Lam. ist kaum zu unterscheiden.
- B P Planaxis lineolatus Gould Proc. Boston Soc. of nat. hist. III, 1849, p. 118. Exploring Exped. pl. 15, Fig. 251. Martens Südseeconchylien S. 42. Reeve Fig. 31. *Desh.* 64 Reunion.
Bruguère, Dict. sc. nat., und *Lamarck* an. s. vert. ed. 2, X, p. 89 führen auch Pl. nucleus (Buccinum, Purpura) aus Madagaskar an, *Lienard* 45 aus Mauritius; es ist das aber eine in Westindien häufige Art, und ihr Vorkommen in unserm Gebiet sehr verdächtig. Ist vielleicht der ähnliche Pl. abbreviatus Pease Am. Journ. Conch. IV, pl. 12, Fig. 16 aus Polynesien gemeint?
- M B Planaxis (Holcostoma) piliger *Philippi* Zeitschr. f. Malakozool. 1848. H. setigerum *A. Adams* Proc. Zool. Soc. 1853. A. et H. Adams gen. moll. pl. 34, Fig. 4. Reeve XX. Fig. 38 Mauritius. *Desh.* 131 Reunion.

Turritellidae.

- Md I Turritella duplicata L. Chemn. IV, Fig. 1414. Encycl. pl. 449, Fig. 1. Kien. pl. 1, Fig. 1. Reeve V, Fig. 1. *Sganz.* 23 Madagaskar, auf Sandboden, selten.
Sonst von Niemand aus unserm Gebiet erwähnt. Auf Point de Galle, Ceilon, fand ich sie zahlreich am Strand, ebenfalls auf Sand.
- M† Turritella concava n. sp. Taf. 20, Fig. 19.
Testa conico-elongata, carinata, alabastrino-alba, oblique striatula, anfr. 10, supremis 2 laevibus, sequentibus bicarinatis, carina superiore in anfr. 3—7 valde prominula, in ulterioribus obsolescente, carina inferiore suturae incumbente, usque in anfr. ult. perdistincta, basi concava, apertura acutangulo-rhombea, margine externo valde sinuato, margine columellari arcuato.
Long. 16, diam. $5\frac{1}{2}$, apert. long. vix 3, diam. $2\frac{1}{2}$ mm.
Mauritius, *Robillard*.
Frinnert zunächst an T. carinifera Lam. aus Südafrika.

Litorinidae.

- M B *Litorina reticulata Anton Philippi Abbildungen II, Taf. 4, Fig. 12. *Desh.* 64 Reunion. Fouquets, Maur., *Möbius*.
Vielleicht ist dieses die von *Lienard* 15 als L. granocostata Reeve erwähnte Art; die Reeve'sche kommt von Ostaustralien.
- SI *Litorina melanostoma Gray Philippi Abbild. II, Taf. 6, Fig. 4. Reeve X, Fig. 45. Seychellen, *Möbius*.

SAMd **Litorina scabra* L. Rumph. amb. rar. Taf. 29, Fig. Y (*Buccinum foliorum*). Chemn. MAfIP XI, Fig. 2074. Philippi Abbild. II, Taf. 5, Fig. 3—5. *angulifera* (Lam.) Quoy et Gaim. Voy. Astrol., zool. pl. 33, Fig. 1—3 lebendes Thier. Reeve Lit. Fig. 21. Martens Malakozool. Blätt. X, 1863, p. 39; Südseeconchylien S. 39. *Dufo* 190 (*angulif.*) Seychellen und Amiranten, häufig, auf Schlammgrund, unter Meerpflanzen. *Sganz.* 23 (*angulif.*) Madagaskar, sehr häufig, auf Riffen und Steinen. *Lien.* 45 Mauritius. Fouquets, Maur., und Seychellen, *Möbius.* Nahe verwand der atlantischen *angulifera* Lam. (*Phasianella*).

Md Af I P *Litorina intermedia* Philippi ebenda Fig. 8—11. Nossi-Be, *Hildebrandt.*

MIAu **Litorina Mauritiana* Lam. (*Phasianella*) an. s. vert. ed. 2, IX, p. 244 Ile de France. Philippi Abbild. II, Taf. 3, Fig. 15—17. *Delessert* recueil pl. 37, Fig. 14. Reeve X, Fig. 100 Mauritius. *Sganz.* 23 Mauritius, häufig an Felsen. Fouquets, *Möbius.* Von mir bei Hongkong gesammelt, im Berliner Museum auch von Lhotzki und Cox aus Australien (Port Jackson) erhalten.

Lienard führt diese Art nicht an, dagegen 45 Lit. (*Neritoides*) *neritoides* L. eine europäische Art, die nicht wohl in Mauritius vorkommen kann, und wobei überdies die mittelmeeerische Lit. *neritoides* L. mit der nordeuropäischen Lit. (*Neritoides*) *obtusata* L. = *Turbo neritoides* Lam. confundirt scheint; vielleicht meint er eine der südafrikanischen, der ersteren nahe verwandten Arten.

MBP **Litorina pintado* Wood. ind. tesl. suppl. pl. 6, Fig. 34. Philippi Abbild. II, Taf. 4, Fig. 20. Reeve Fig. 54. Pease Am. Journ. Conch. IV, p. 127. Martens Südseeconchylien S. 39. *L. serialis* Eydoux et Souleyet Voyage Bonite, moll. pl. 31, Fig. 34—36. *Desh.* 64 Reunion. *Lien.* 45 Mauritius. Ebendaher von *Möbius.*

SMdM **Litorina glabrata* Philippi Abbild. III, Taf. 7, Fig. 5. Krauss südafrik. Moll. B Af I S. 103 (von Natal). Reeve Fig. 104. *Desh.* 64 (*laevis*) Reunion. *Lien.* 45 (*laevis*) Mauritius. Mauritius und Seychellen, *Möbius.* Nossi-Be, *Hildebrandt.* Von mir auch bei Singapore gesammelt. *L. laevis* Philippi Abbild. III, Taf. 6, Fig. 6 ist sehr ähnlich.

SMdM **Modulus tectum* Gmelin (*Trochus*) Chemn. V, Fig. 1567, 1568. *Favanne* conchyliol. B RAf II, p. 150, pl. 8, Fig. D Ile de France. *Monodonta t.* Lam. Pease Amer. Journ. Conch. IV, p. 128. *Dufo* 189 Mahé, ziemlich selten, auf schlammigem und felsigem Grund, 2½—3 m tief, pflanzenfressend. *Sganz.* 22 Madagaskar und Mauritius, auf den Riffen, selten. *Desh.* 65 Reunion. *Lien.* 45 Mauritius. Fouquets, *Möbius.*

M. obtusatus? *Lien.* 45 von Mauritius ist wahrscheinlich nur Varietät der vorhergehenden.

Auch die von *Lister* hist. conch. pl. 653, Fig. 53 abgebildete Art von *Modulus*, welche daselbst ausdrücklich als von Mauritius stammend angegeben wird, dürfte auf einem abgeriebenen Exemplar von *M. tectum* beruhen. Dagegen ist es offenbar ein Irrthum in der Vaterlandsangabe, wenn *Favanne* conchyliologie II, p. 150, pl. 8, Fig. D dem westindischen *Modulus unidens* Chemn. (*Monodonta Carchedonia* Lam.) Ile de France als Fundort zuschreibt.

MI *Rissoina monilis* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. Schwartz v. Mohrenstern Monogr. S. 46, Taf. 1, Fig. 7 (Philippinen). Mauritius, durch *Robillard* erhalten.

M? *Rissoina Burdigalensis* Orb. (fossil im Wiener Becken und bei Bordeaux) Schwartz v. Mohrenst. S. 51, Taf. 2, Fig. 13 lebend an der Küste der Insel Mauritius.

MAu *Rissoina obeliscus* Recluz Schw. v. Mohrenstern S. 53, Taf. 2, Fig. 15 Mauritius.

- B I P *Rissoina costata* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1861. Schw. v. Mohr. S. 53, Taf. 2, Fig. 16 Chile und Philippinen. *Desh.* 62 Reunion.
- M? *Rissoina subangulata* C. B. Adams contrib. to conchol. 1856 (von Jamaika). *Schw.* v. *Mohrenstern* S. 56, Taf. 3, Fig. 20 Jamaika und Mauritius.
- M R P *Rissoina scalariformis* C. B. Adams Panama catal. 1852. Schw. v. *Mohrenstern* S. 59, Taf. 3, Fig. 24 Panama und Mauritius. *Desh.* 61 Reunion. *Lien.* 45 Mauritius.
- M P **Rissoina pusilla* Brocchi conchol. foss. subappen. II, tab. 6, Fig. 5. *Schwarz* v. *Mohrenstern* S. 65, Taf. 4, Fig. 29 Mauritius und Sandwichinseln. Mauritius, im Sand, *Möbius*.
- M B R **Rissoina myosuroides* Recluz *Schw.* v. *Mohrenstern* S. 66, Taf. 4, Fig. 30 Maur. *Desh.* 62 Reunion. Fouquets, *Möbius*.
- M(?)†? *Rissoina conifera* Montagu test. brit. tab. 15, Fig. 2. *Schw.* v. *Mohrenstern* S. 68, Taf. 4, Fig. 33 Mauritius.
- M(?) *Rissoina Bryerea* Montagu test. brit. tab. 15, Fig. 8. *Schw.* v. *Mohrenstern* S. 71, Taf. 5, Fig. 36 Westindien und Mauritius.
- M(?) I *Rissoina Chesneli* Michaud genre Rissoa Fig. 23, 24 Indien. *Desh.* Lam. VIII, 483. *Schw.* v. *Mohrenst.* S. 73, Taf. 5, Fig. 39 Mauritius und Westindien.
- M I *Rissoina reticulata* Sow. gen. of shells Fig. 1. *Schw.* v. *Mohrenst.* S. 74, Taf. 5, Fig. 40 Mauritius, Philippinen und Westindien.
- M I *Rissoina decussata* Montagu test. brit. tab. 15, Fig. 7. *Schw.* v. *Mohrenst.* S. 80, Taf. 6, Fig. 44 Mauritius und Westindien.
- M I **Rissoina concinna* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. *Schw.* v. *Mohrenst.* S. 85, Taf. 6, Fig. 47 Philippinen. Mauritius, *Möbius*.
- M R P *Rissoina Erythraea* Philippi Zeitschr. f. Malakozool. 1851. *Schw.* v. *Mohrenst.* S. 95. Taf. 8, Fig. 59 Mauritius, Sandwichinseln und Rothes Meer.
- B † *Rissoina Mohrensterni* *Desh.* moll. de Reunion p. 62, pl. 6, Fig. 6, 7 Reunion. Reeve XX, Fig. 57.
- B † *Rissoina rosea* *Desh.* (*Rissoa*) ibid. p. 61, pl. 7, Fig. 29 Reunion.
- M *Rissoina percrassa* *Nevill* Journ. As. Soc. Bengal. XLIII, 1874, p. 26, pl. 1, Fig. 13 Mauritius.
- M † **Rissoa* (*Alvania*) *Mauritiana* n. sp. Taf. 20, Fig. 17.
 Testa ovata, crassiuscula, spiratim costata et nodoso-cancellata, alba; anfr. $4\frac{1}{2}$ valde convexi, ultimus rotundatus, seriebus nodulorum 5—6 (in anfr. penultimo 2 conspicuis), apertura subperpendicularis, $\frac{3}{7}$ longitudinis aequans, ovata, peristomate incrassato, recto.
 Long. $1\frac{1}{2}$, diam. $\frac{3}{4}$, long. apert. $\frac{1}{2}$ mm.
 Mauritius, im Sande, von Prof. *Möbius* von Fouquets mitgebracht, durch Hrn. *Schacko* gefunden.
 Aehnelt der westindischen *R. Caribaea* Orb.
- M † **Barleia?* *microthyra* n. sp. Taf. 20, Fig. 18.
 Testa ovato-oblonga, laevis, nitidula, corneofusca, sutura interdum albofilosa;

apex obtusiusculus; anfr. 5, convexiusculi, ultimus rotundatus, ad aperturam paulo descendens; apertura parva, subcircularis, circiter $\frac{1}{3}$ longitudinis testae aequans, peristomate crasso, recto.

Long. $1\frac{1}{2}$, diam. $\frac{2}{3}$, apert. $\frac{3}{5}$ mm.

Mauritius, in dem von Professor Möbius mitgebrachten Sande durch Herrn G. Schacko aufgefunden.

Leider ist weder der Deckel, noch Reste der Weichtheile vorhanden, aus denen die Radula noch heraus präparirt werden könnte, es ist daher schwer diese kleine Schnecke, welche so wenig eigenthümliche Charakter bietet, mit einiger Sicherheit im System an ihre richtige Stelle zu bringen; zunächst denkt man der auffällig kleinen Mündung wegen an die Gattung *Stenothyra* Benson (*Nematura*), aber es ist doch bedenklich sie zu einer bis jetzt noch nicht auf den Maskarenen beobachteten Süßwassergattung zu stellen, da sie im Meeressande nur mit marinen Conchylien gefunden wurde. Dagegen findet sich auch einige Aehnlichkeit mit der europäischen *Barleia* (früher *Rissoa*) *rubra* Dacosta und so möchte ich sie vorläufig neben dieser unterbringen.

MB† *(*Rissoina*) *insolita* Desh. moll. de Reunion p. 63, pl. 13, Fig. 15, 16 Reunion. Reeve XX, Fig. 43. Mauritius, im Sand, ein Stück, Möbius.

Sollte diese nicht vielmehr zu den Pyramidelliden gehören.

MRIP *Zebina tridentata* Michaud genre Risson Fig. 5, 6 Indien. Desh. Lam. VIII, p. 482. Schw. v. Mohrenst. *Rissoina* S. 107, Taf. 9, Fig. 74 Mauritius.

MBP *Zebina bidentata* Philippi Arch. f. Naturgesch. 1845. Schw. v. Mohrenst. S. 108, Taf. 9, Fig. 75 Mauritius. Desh. 62 Reunion. Lien. 46 Mauritius.

MB† *Zebina coronata* Recluz Schw. v. Mohrenst. S. 109, Taf. 10, Fig. 77 Mauritius. Desh. 62 Reunion.

Xenophoridae.

M? *Xenophora*. Lienard allein führt eine hierher gehörige Art unter dem Namen *Phorus conchyliophorus* Born 46 von Mauritius an. Diese Art ist westindisch und wahrscheinlicher dürfte eine nahe verwandte ostindische wie *corrugeta* Reeve oder *cerea* Reeve gemeint sein.

Naricidae.

MP *Narica cancellata* Chemn. (*Nerita*) X, Fig. 1596. 1597. Sigaretus c. Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 11. Sganz. 21 Mauritius. Recluz Revue zool. 1845, p. 17, pl. 119. Lien. 47 Mauritius.

B† *Narica disparilis* Desh. moll. de Reunion p. 77, pl. 9, Fig. 15—17.

MR **Narica Mauritiae* Recluz Revue zool. 1845, p. 19, pl. 120 Mauritius, in grobem Sand. Ebendaher von Möbius. Auch aus dem rothen Meer von Ehrenberg im Berliner Museum.

SI *Narica ligata* Recluz Reeve zool. 1845, p. 22, pl. 121, Fig. 2 (Philippinen). Reeve conch. icon. XX (Vanikoro), Fig. 6 Seychellen.

MBAfI *Narica granulosa* Recluz ibid. p. 32, pl. 125, Fig. 1 Lord Hood Insel und Zanzibar. PAu Desh. 77 Reunion. Lien. 47 Mauritius.

BI *Narica rosea* Recluz ibid. p. 36, pl. 126, Fig. 1 (Molukken). Desh. 77 Reunion.

MBI *Narica Gueriniana* Recluz ibid. p. 43, pl. 128, Fig. 2 (Philippinen). Desh. 77 Reunion. Lien. 47 Mauritius. Radialgefaltet.

- MAfI *Narica acuta* Recluz ibid. p. 60, pl. 133, Fig. 1, 2 (Lord Hood Insel, Molukken und Natal). *Lien.* 47 Mauritius. Spiralgestreift.
- MB†? **Narica Cuvieriana* Recluz ibid. p. 63, pl. 134, Fig. 1, 2. *Desh.* 77 Reunion. *Lien.* 47 Mauritius. Fouquets, *Möbius*. Spiralgestreift.
- MB *Narica rugata* A. Adams(?) *Desh.* 77 Reunion. *Lien.* 47 Mauritius.
- M *Narica scalaris* Recluz(?) *Lien.* 47 Mauritius. Mir unbekannt.

Caecidae.

- MR *Caecum annulatum* Brown Carpenter Proc. Zool. Soc. 1858, p. 423, Issel malacologia del mar rosso p. 211. In Sand, den Prof. *Möbius* aus Mauritius mitgebracht, von *G. Schacko* gefunden.

Capulidae.

- MdMB **Capulus intortus* Menschen (Patella) Naturforscher XVIII, Taf. 2, Fig. 10. Pileopsis int. Lam., Blainville manuel de malacologie pl. 49 bis, Fig. 1. Delessert recueil pl. 25, Fig. 1. Patella incurva Gmelin syst. nat. ed. 13 (1788—91), p. 3715. *Sganz.* 13 Insel St. Marie, auf Austern. *Desh.* 51 (*Hipponix incurva*) Reunion. Auch aus Mauritius (Fouquets) durch *Möbius* und *Robillard*.
- B? *Capulus* (*Brocchia*) *reducta* *Desh.* 51, nicht näher beschrieben, Reunion.
- SAMB **Hipponyx acutus* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. moll. pl. 72, Fig. 35—38. *Desh.*
- RAfI Lam. VII, 615. Vermuthlich diese Art, die auch im rothen Meer von Ehrenberg, an der Küste von Mossambique von Prof. Peters, auf Amboina und Flores von mir gesammelt worden, ist gemeint bei *Dufo* 207 H. orientalis, Seychellen und Amiranten, auf Conchylien festsitzend, in verschiedenen Tiefen, sehr häufig. *Desh.* 51. H. cassida Dillw. Reunion. *Lien.* 46 Hipp. spec? Mauritius. *Möbius* sammelte sie bei Fouquets und auf den Seychellen.

Calyptraeidae.

- MAfI *Calyptra equestris* L. Lam. Reeve XI, Fig. 1. *Calyptraea Roissyi* *Dufo* 206 Mahé, 3 m tief, sehr selten. *Desh.* 51 Reunion. *Lien.* 46 Mauritius.
- Sehr nahe verwandt ist die westindische *C. rugosa* Menke, Martini I, Fig. 117, 118.
- MBI *Calyptra Neptuni* Schumacher Martini I, Fig. 119, 120. *C. dormitoria* Reeve Fig. 5. *Desh.* 51 Reunion. *Lien.* 51 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- Kaum davon verschieden ist *C. fibulata* Reeve Fig. 11 (Philippinen). *Desh.* 32 Reunion.
- MdMB **Calyptraea tectum* Sinense Chemn. X, Fig. 1630, 1631. Martini I, Fig. 125, 126.
- I Sowerby genera of shells Fig. 1. Reeve Fig. 10. *Sganz.* 13 Ile de France und Madagaskar, an Tangen. *Desh.* 52 Reunion. *Lien.* 46 Maur. Fouquets, *Möbius*.
- MIP *Crepidula aculeata* Chemnitz X, Fig. 1624, 1625. Orbigny Voyage dans l'Amérique Au merid., moll. pl. 58, Fig. 4, 5. Reeve Fig. 22 und 27. Aus unserm Gebiet nur von *Favanne* conchyliologie I, p. 564, pl. 4, Fig. F2 für Ile de France erwähnt, aber da diese Art ziemlich circumtropisch ist, sowohl von Westindien, Rio Janeiro

als vom südlichen Japan, den Sandwichinseln, Peru und Chile im Berliner Museum, so erscheint diese Angabe nicht unwahrscheinlich.

Vermetidae.

MB?R **Vermetus* (*Serpulorbis*) *eruca* Lam. an. s. vert. ed. 2, V, p. 634. Fouquets auf Af Mauritius, *Möbius*. Vielleicht auch die unbestimmte Art bei *Desh.* 65 von Reunion. V. Quoyi A. und H. Adams genera of moll. an. pl. 39, Fig. 3a dürfte dieselbe Art sein. Kein Deckel. Von Ehrenberg im rothen Meer, von Prof. Peters an der Küste von Mossambique gesammelt.

S?A? **Vermetus* (*Siphonium*) *maximus* Sow. Wood general conchology pl. 8, Fig. 2.

Md?M Leuckart in Rüppell's Atlas, Evertebrat. p. 39. Mörch. Journ. de Conch. VII, p. 354. V. *gigas* Gray spicilegia zoologica, kopirt in Fig. moll. animals II, pl. 128, Fig. 2. Wahrscheinlich auch V. *giganteus* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. moll. pl. 67, Fig. 13—15, kopirt in Adams gen. moll. Taf. 38, Fig. 7, nicht 7a. Deckel, vollständig, concav, mit vielen Windungen. Fouquets auf Mauritius, *Möbius* (Oberkopf und Fuss violett, Mantelkragen rosenroth). Vermuthlich gehört hierher auch *Bernardin St. Pierre* voy. à l'Isle de France 105 grande espèce de Vermiculaire in Madreporen und *Sganz.* 4 *Serpula arenaria* auf Madreporen bei Tintingue, Madagaskar, und *Dufo* 191 Verm. *lumbricalis*, Seychellen und Amiranten, zahlreich, besonders auf Schlammgrund. Dieselbe Art wurde im rothen Meer von Ehrenberg und an der Küste von Mossambique von Prof. Peters gesammelt.

Unbestimmte Arten von Mauritius bei *Lien.* 46.

B? *Spiroglyphus*, unbestimmte Art *Desh.* 65 Reunion.

B† *Cryptobia heteropsammiarum* *Desh.* 65—67 Reunion.

B† *Cryptobia Michelini* *Desh.* 65—67 Reunion.

Aus der spiralen Höhlung im Innern der Korallengattungen *Heteropsammia* und *Heterocyathus* erschlossen, ohne dass das Mollusk selbst untersucht worden ist. Könnte es nicht auch ein Wurm (*Sipunculus*?) sein?

Md *Siliquaria lactea* Lam. an. s. vert. ed. 2, V, p. 584. Chenu illustr. conchyl. pl. 2, Fig. 1. Reeve XX, Fig. 5. *Sganz.* 3 Tamatave auf Madagaskar, im Sand.

MBI *Siliquaria trochlearis* Mörch Proc. Zool. Soc. 1860. Reeve Fig. 4. Wahrscheinlich meint *Sganz.* 3 unter *S. anguinea* Lam. von Ile de France und Bourbon, häufig im Sande, diese Art, die ich auch bei Singapore fand und nicht die dem Mittelmeer angehörende Art, *anguina* Born, Lam. oder *obtusa* Mörch, Reeve.

MdI *Siliquaria muricata* Born test. mus. Caes. tab. 8, Fig. 16. Martini I, Fig. 14 und 13B, C. Reeve Fig. 7 (*anguina*). *Sganz.* 3 Insel St. Marie, im Sandstrand eingebohrt, häufig.

Ptenoglossa.

Scalariidae.

MBI *Scalaria fasciata* Sow. Chemn. X, Fig. 1430, 1431. Sow. thes. Fig. 12, 13. Reeve conch. ic. vol. XIX, Fig. 13. *Desh.* 61 Reunion. *Lien.* 27 Mauritius.

- M† *Scalaria latifasciata* Reeve Fig. 117. Mahébourg, Mauritius, *Barclay*.
- MI *Scalaria* Pallasi Kiener Fig. 3. Sow. thes. Fig. 15. Reeve Fig. 40. notha Menke 1830. Nicobarica Beck. *Lien*. 27 Mauritius.
- MI *Scalaria coronata* Lam. Kien. Fig. 8. Sow. thes. Fig. 133. Reeve Fig. 34. *Lien*. 27 Mauritius.
- Nach den Exemplaren zu urtheilen, welche ich auf Amboina und Buru erhalten, unterscheiden sich die ostindischen Exemplare durch schwächer gewölbte Windungen, entsprechend den citirten Abbildungen, von den typischen, in der Encycl. pl. 451, Fig. 5 abgebildeten, welche vielleicht west-indisch sind.
- MI *Scalaria multicostata* Reeve Fig. 65 (Philippinen). *Lien*. 27 Mauritius.
- CI *Scalaria lineolata* Sow. Fig. 45, 46, 48. Reeve Fig. 32. Vielleicht *Turbo ambiguus* Linne. *Lien*. 107 Cargados. Ebendaher von *Caldwell* und *Robillard* erhalten.
- BI *Scalaria bullata* Sow. thes. Fig. 87. Reeve Fig. 8 (Philippinen). *Desh*. 60 Reunion.
- SCI **Scalaria alata* Sow. Reeve loc. cit. Fig. 15. *Lien*. 107 Cargados. Seychellen, Prof. *Möbius*.
- MdCM **Scalaria perplexa* Pease Am. Journ. Conch. III, 1867, p. 288. Reeve Fig. 91
- BP Bourbon. *S. monocycla* (non Lam.) Kiener Fig. 9. Martens Südseeconchyl. S. 24. *Desh*. moll. de Reunion p. 60, pl. 8, Fig. 1 Reunion. *Lien*. 107 (monocycla) Cargados. Mauritius, *Möbius* und *Robillard*, Wahrscheinlich auch *Sganzin's lamellosa* 22 von Ile de France und Madagaskar, und *Lienard's clathrus* L. 27.
- MI *Scalaria laxata* Sow. Proc. Zool. Soc. 1844. Reeve Fig. 38 (Philippinen). *Lien*. 27 Mauritius.
- MI *Scalaria marmorata* Sow. thesaur. Fig. 9. Reeve Fig. 16 (Indien). *Lien*. 27 Mauritius.
- MAf *Scalaria*(?) *cancellata* Humphrey, *decussata* Sow. thes. Fig. 140 Arabia. Reeve XIX, Fig. 114 (nicht *Sc. decussata* Lam., eine fossile Art) Mauritius.
- MI *Scalaria* (*Cirsotrema*) *varicosa* Lam. Encycl. pl. 451, Fig. 4. Kien. Fig. 22. Sow. Fig. 126—128. Reeve Fig. 11. *Turbo attenuatus* Helbling Abhandlgn. Privat-Gesellsch. Böhm IV, 1779, Taf. 1, Fig. 10. *Lien*. 27 Mauritius.
- M† *Scalaria* (*Cirsotrema*) *raricosta* Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 76. *reticulatus* Helbling ebenda Taf. 1. Fig. 11. Reeve Fig. 9 und pl. 16, Fig. 9b Round island, Maur. *Lien*. 27 Mauritius. Ebendaher durch *Robillard* erhalten.
- M† *Scalaria* (*Cirsotrema*) *abbreviata* Sow. Reeve Fig. 124 Tamarind-Bay bei Black river, Maur.
- M† *Scalaria* (*Cirsotrema*) *multiperforata* Sow. Reeve Fig. 125 Black river, Maur.

Janthinidae.

- SAMd **Janthina communis* Lam. Chemn. V, Fig. 1577, 1578. Encycl. pl. 456, Fig. 1.
- MBI *fragilis* Lam. Mörch. Journ. de Conch. VIII, 1860. *trochoidea* Reeve Fig. 10.
- Au *Dufo* 196 Seychellen und Amiranten. *Sganz*. 21 Madagaskar. *Desh*. 94 Reunion. Mauritius, *Möbius* in mehr und minder hohen Exemplaren.
- BI *Janthina globosa* Swainson Reeve Fig. 22. Mörch loc. cit. *J. violacea* Blainville man. mal. pl. 2. b, Fig. 1. *Desh*. 94 Reunion. Auch im atlantischen Ocean.

- B Au *Janthina exigua* Lam. Encycl. pl. 456, Fig. 2. Sow. gen. of shells Fig. 2. Reeve Fig. 21. *J. capreolata* Montrouzier Journ. de Conch. 1860, pl. 2, Fig. 4. *Desh.* 94 (capr.) Reunion. Auch im atlantischen Ocean.
- B † *Janthina Vinsoni* *Desh.* moll. de Reunion p. 94, pl. 11, Fig. 9, 10 Reunion. Nächstverwandte der vorhergehenden.
- B R *Recluzia Jehennei* Petit Journ. de Conch. IV, 1853, pl. 5, Fig. 3. *Desh.* 94 Bourbon. Auch durch *Robillard* erhalten.

Solariidae.

- MdMB *Solarium perspectivum* L. (part.) Sow. gen. of shells Fig. 1. *Kien.* Fig. 1 Madagaskar. S. trochleare Hinds Philippi in Küster's neuer Ausgabe von Chemnitz Taf. 1, Fig. 1. Reeve Fig. 10. *Sganz.* 22 Madagaskar, auf den Riffen, nicht selten. *Desh.* 68 Reunion. *Lien.* 30 Mauritius.
- Md I *Solarium laevigatum* Lam. Encycl. pl. 446, Fig. 3. *Kien.* pl. 2, Fig. 2. Reeve Fig. 9. *Sganz.* 22 Madagaskar, selten.
- MAfP **Solarium* (Philippia) *cingulum* *Kien.* Fig. 6. Chemn. V, Fig. 1704, 1705. Sow. thes. Fig. 55, 56. Reeve Fig. 19. Martens Jahrbuch malak. Gesellsch. II, 1875, p. 107. *Lien.* 30 Mauritius. Fouquets und Grande Baie, *Möbius*.
- Solarium* (Philippia) *cingulum* var. *subconcolor*, Chemn. V, Fig. 1702, 1703. *Kien.* Fig. 5a. Sow. thes. Fig. 39. Martens a. a. O. S. 108 Mauritius, von *Robillard*.
- MB Af **Solarium* (Philippia) *hybridum* Lam. Encycl. pl. 446, Fig. 2. *Kien.* Fig. 5. Sow. P Fig. 42. Reeve Fig. 21. Martens a. a. O. S. 107. *Desh.* 68 Reunion. *Lien.* 30 Mauritius. Fouquets, *Möbius*.
- MBIP *Torinia perspectiviuncula* Chemn. V, Fig. 1708, 1709. *Philippi* S. 12, Madagaskar. Sow. thes. Fig. 63. Martens Südseeconchylien S. 29. *S. variegatum* Gmelin, Lam. Encycl. pl. 446, Fig. 2. *Kien.* Fig. 7. *Desh.* 68 Reunion. *Lien.* 31 Mauritius.
- B † *Torinia dilecta* *Desh.* moll. de Reunion p. 68, pl. 19, Fig. 3—6 Reunion.
- MBIP **Torinia crenella* Linne (Turbo), *infundibuliformis* Gmelin Chemn. V, Fig. 1706, 1707. Sow. thes. Fig. 91—93. S. Chemnitzii *Kien.* p. 12, Fig. 8 Bourbon. *Desh.* 68 Reunion. *Lien.* 30 Mauritius. Ebendaher durch *Möbius* und *Caldwell*.
- Ersterer hat das lebende Thier bei Fouquets beobachtet und Folgendes notirt: Thier aschgrau, mit schwarzen Flecken. Fuss vorn zweilappig. Fühler konisch fadenförmig. Augen aussen an der Basis der Fühler.
- MB(P) *Torinia trochoides* *Desh.* Journ. de Conch. VII, 1858, pl. 14, Fig. 2 (Neu-Caledonien). *Desh.* 68 Reunion. *Lien.* 30 Mauritius.

Scutibranchia.

Neritidae.

- SA **Nerita plexa* Chemnitz Conch. tab. V, Fig. 1944, 1945. Dacosta elements of conchology pl. 3, Fig. 14; Reeve conch. icon. Fig. 12. *Norita exuvia* (non Linne) Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 599, nro. 2; Encycl. meth. pl. 454, Fig. 1. *Dufo*

- 194 Seychellen und Amiranten, häufig an Felsen, welche fast immer vom Meer bedeckt sind. Auch von Prof. *Möbius* auf den Seychellen gesammelt.
- Md I *Nerita chlorostoma* Lam. *Encycl.* pl. 454, Fig. 4; Sowerby genera of shells Fig. 3 (? Reeve *conch. ic.* Fig. 32). *Sganz.* 20 kleine Insel Louquet bei St. Marie, Ostküste von Madagaskar, an Felsen.
- MB? *Nerita bisecta* Reeve *conch. ic.* Fig. 39 und 45. — Mauritius, von *Robillard* erhalten. Wahrscheinlich meint *Desh.* 79 auch diese Art unter dem Namen *N. Antillarum*, von Reunion.
- SAMd **Nerita albicilla* Linne Chemnitz V, Fig. 2000a—h; *Favanne conchyliologie* II, MBR p. 207, pl. 10, Fig. E. und p. 208, pl. 11, Fig. F. Ile de France; Lam. VIII, AfIP p. 605; Reeve Fig. 64. *Sganz.* 20, Ile St. Marie, sehr häufig auf Felsen. *Dufo* 194, Au Seychellen und Amiranten, zahlreich. *Desh.* 79 Reunion. *Lien.* 47 Mauritius. Fouquets, Mauritius und Seychellen, *Möbius*.
- Md I *Nerita chamaeleo* Linne Chemnitz V, Fig. 1988—1991; Lam. VIII, p. 606; Hanley ipsa Linn. *conch.* pl. 4, Fig. 8. *N. stella* Chemnitz, Reeve Fig. 60. *Sganz.* 20, Ile St. Marie, an Felsen. Häufig im malaiischen Archipel.
- MdIP *Nerita signata* Lam. VIII, p. 610; Delessert *recueil* pl. 32, Fig. 7; Reeve Fig. 44. Au Pease *Am. Journ. Conch.* IV, p. 129. Wahrscheinlich ist es diese Art, welche *Sganz.* 20 als *N. peloronta* var. von der kleinen Insel Louquet bei St. Marie, an Felsen, anführt.
- Die ächte *N. peloronta* L. Lam. ist westindisch, obwohl ihr Artnamen aus Rumph's amboinischer Raritätenkammer entlehnt ist, aber *N. signata*, im malaiischen Archipel nicht ganz selten, ist die einzige indische Art, welche einen blutrothen Flecken auf der Columellarwand hat, ähnlich wie *N. peloronta*.
- SMdC **Nerita plicata* Linne Born test. Mus. Caesarei tab. 17, Fig. 17, 18. Chemnitz V, MBR Fig. 1952, 1953; *Favanne conch.* II, p. 226, pl. 10, Fig. Q3, Ile de France und IAF P Madagaskar; Lam. VIII, p. 609; Reeve Fig. 40. *Sganz.* 20, Ile St. Marie. *Desh.* 79 Reunion. *Lien.* 48, 79, 104 und 111 Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados. Fouquets auf Mauritius und Seychellen, Prof. *Möbius*.
- SAIP **Nerita undata* Linne Chemn. V, Fig. 1950. 1951; Lam. VIII, p. 601; *Encycl.* pl. 454, Fig. 6. *N. striata* Burrow, Mörch. *Dufo* 194, Seychellen und Amiranten. Auch von Prof. *Möbius* auf den Seychellen gesammelt.
- SAC **Nerita polita* Linne. *Lister hist. conch.* pl. 600, Fig. 17 Mauritius. Chemn. *Conch.* MdMB Cab. V, Fig. 2002—2012; *Bernardin St. Pierre* 106 Nérîte lisse, de toutes les RIP nuances. *Favanne conch.* II, p. 235, pl. 10, Fig. S, Ile de France; Lam. VIII, p. 604; Reeve *conch. ic.* Fig. 2. *Sganz.* 20, Ile de France, sehr gemein auf Felsen und Steinen. *Dufo* 193, Seychellen und Amiranten, auf Felsen, welche nur kurze Zeit bei der Fluth unter Wasser sind, pflanzenfressend, von den Bewohnern gegessen. *Desh.* 79 Reunion. *Lien.* 48, 79, 104 und 111, Mauritius, Seychellen, Rodriguez und Cargados. Fouquets und Seychellen, *Möbius*. Nossi-Be (var. *florescens*), *Hildebrandt*.
- SAM† *Nerita punctata* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, zool. III, p. 185, pl. 65, Fig. 41, 42, lebendes Thier. Mapou, Mauritius, *Dufo* 194 (*N. tunctata* ist wohl nur Druckfehler) Seychellen und Amiranten.

- MdMB **Nerita nigerrima* Reeve conch. icon. Fig. 11. *N. Mauritiae* Recluz nach Deshayes. *N. atrata* (non Chemnitz) *Sganz.* 20, Ile St. Marir. *Desh.* 79 Reunion. *Lien.* 47 Mauritius. Bei Fouquets von Prof. Möbius gesammelt.

Die schwarzen Neritaarten sind vielfach unter sich verwechselt worden; der Name *atrata* Chemn. Gmel. Lam. gehört einer westafrikanisch-westindischen Art, Chemnitz Conch. Cab. V, Fig. 1954, 1955, wahrscheinlich identisch mit Adanson's *dunar*, *aterrima* Gmelin der bei Chemnitz ebenda Fig. 1985, 1986 abgebildeten.

- S† *Nerita debilis* Dufo 195. Mahé, im Nordwesten der Insel, in der Brandung, auf Meerpflanzen, 2—3 m tief.

Selten, dünn, schwärzlich, grau marmorirt, ohne Zähne in der Mündung, Deckel mit zwei getrennten Fortsätzen. Nicht wieder gefunden oder nicht wieder erkannt.

Deshayes führt noch *N. versicolor* Gmelin und (*Neritina*) *Listeri* (Pfr.) Recluz, beide westindisch, für Reunion an, *Lienard* *N. carbonaria* Philippi und *N. ornata* Sow., eine westamerikanische Art. An das Vorkommen derselben im indischen Ocean kann ich nicht glauben.

- MBI **Neritopsis radula* Linne. Born test. Mus. Caes. tab. 17, Fig. 7, 8; Chemnitz V, Fig. 1946, 1947, Crosse und Fischer Journ. de Conch. XXIII, 1875, p. 57—66, pl. 4, Fig. 8 und pl. 2, Fig. 4 (Deckel und Zunge). *Desh.* 79 Reunion. *Lien.* 47 Mauritius. Auch von Möbius, Caldwell und Robillard aus Mauritius erhalten, von letzterem mit Deckel.

- MdMR *Neritina* (*Smaragdia*) *Rangiana* Recluz Revue zool. 1841; Sow. thes. V, pl. 116, I Au Fig. 227, 228; Reeve Fig. 142. v. Martens in der neuen Ausgabe von Chemnitz, *Neritina* S. 349, Taf. 23, Fig. 27, 28. *N. viridis* var. *Rang* in Ferussac's Bulletin des sciences X, 1827, p. 412: manuel des mollusques p. 193 Madagaskar, an Felsen im Meer. Auch aus Mauritius von Robillard erhalten. Wahrscheinlich meint *Lien.* diese Art unter seiner *Natica viridis* 27 von Mauritius.

Trochidae.

- SM Af **Phasianella Aethiopica* Philippi in der neuen Ausgabe von Chemnitz, 1853, Taf. 13, Fig. 3; Reeve conchol. icon. XIII, Fig. 12, von den Seychellen. Fouquets auf Mauritius, Möbius. Auch von Robillard erhalten.

- MdMR *Phasianella lineolata* Wood ind. test. suppl. 1828 Turbo Fig. 26 Isle of France.

- Af *Philippi* a. a. O. S. 9, Taf. 3, Fig. 7, Mauritius, fehlt bei Reeve und Kiener, häufig im rothen Meer von Ehrenberg gesammelt, bei Nossi-Be von Hildebrandt.

- Md† *Phasianella grata* Philippi a. a. O. S. 9, Taf. 3, Fig. 8, Madagaskar, sehr ähnlich der vorigen, aber auch der neuholländischen *Ph. lentiginosa* Reeve Fig. 10.

- SA-† *Phasianella marmorata* Dufo Ann. des scienc. nat. (2) XIV, 1840, p. 191, Seychellen und Amiranten, in der Brandung an Meerpflanzen, 2—3 m tief, pflanzenfressend.

Vielleicht eine der vorhergehenden Arten, jedenfalls eine ächte *Phasianella*, nach der bunten Schale und dem kalkigen Deckel zu urtheilen; Grösse nicht angegeben.

- MB† **Phasianella vitrea* Desh. Moll de Reunion p. 75, pl. 8, Fig. 8, Mauritius, im Sand, den Prof. Möbius mitgebracht, von G. Schacko gefunden.

Klein, einfarbig weiss, glänzend glatt. Deckel normal.

Deshayes giebt noch *Ph. Capensis* Dunker und *Kochi* Philippi für Reunion an; auch *Lienard's* *Ph. „Rockii* Philippi“ p. 48 von Mauritius ist wohl aus einem unleserlich geschriebenen *Kochii* zu erklären. Diese beiden Arten sind charakteristisch für die Südspitze Afrika's und werden ihrer schön

rothen Farbe wegen von den Durchreisenden gern mitgenommen, sie fehlen aber schon an der Natalküste und ihr Vorkommen an einer tropischen Küste scheint mir sehr zweifelhaft.

- MS Af **Phasianella* (*Chromotis*) *neritina* Dunker, Zeitschr. f. Malakoz. 1846, S. 110. Krauss südafrikanische Mollusken S. 105. Taf. 6, Fig. 6. Philippi in der neuen Ausgabe von Chemnitz, *Phasianella* Taf. 5, Fig. 6. *Gena lineata* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1850. Sow. thes. pl. 178, Fig. 26, 27. Reeve vol. XIX, *Gena* Fig. 6 (H. und A. Adams Proc. Zool. Soc. 1863, p. 3), Mauritius, in von Prof. Möbius mitgebrachten Sand.

Schon der Mangel einer Perlmutterschicht weist diese Schnecke zu *Phasianella* und nicht zu *Stomatella*, trotz der weiten Mündung, und überdies hat Prof. Krauss einen kalkigen Deckel, wie bei den ächten *Phasianellen*, an ihr gesehen.

- SA Md **Turbo marmoratus* Linne Chemn. V, Fig. 1775, 1776. *Favanne* Conchyliologie II, I p. 75, pl. 8, Fig. K1 u. 2 von Ile de France. Encycl. pl. 448, Fig. 1. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 59, Fig. 10—16, lebendes Thier und Anatomie. Kien. pl. 1, 2. Reeve VII, Fig. 2. *Sganz.* 23 Ile St. Marie. *Dufo* 189 Seychellen und Amiranten, häufig auf Felsengrund unter der Ebbegränze, von den Schwarzen gegessen. Auch von Prof. Möbius auf den Seychellen gefunden.

- Md *Turbo imperialis* Gmelin Chemn. V, Fig. 1790. Kien. pl. 3, Fig. 1, Nossi-Be, *Hildebrandt*.

- SA Md **Turbo setosus* Gmelin Chemnitz V, Fig. 1795, 1796. *Favanne* conchyliologie II, MI p. 66, pl. 9, Fig. A1 le leopard. Kien. pl. 9, Fig. 1. Reeve Fig. 37. *Sganz.* 23, Ile St. Marie auf den Riffen. *Dufo* 190, Seychellen und Amiranten, gegessen. Auch von Prof. Möbius auf den Seychellen gesammelt, von *Robillard* aus Maur. eingesandt.

- M ?*Turbo tumidulus* Reeve Fig. 45. Kien. pl. 40, Fig. 2. Mauritius, *Robillard*.

- BR Af *Turbo radiatus* Gmel. Chemn. V, Fig. 1788, 1789. Kien. pl. 8, Fig. 1a und 1b. Descript. de l'Egypte pl. 5, Fig. 25, T. Chemnitzianus Reeve. *Desh.* 72 Reunion.

- SA M *Turbo argyrostomus* Linne *Bernardin St. Pierre* 105 bouche d'argent simple. Chemn. V, B Af Fig. 1760, 1761. *Favanne* II, p. 61, pl. 9, Fig. A2, Ile de France. Kien. pl. 37, Fig. 1 und pl. 36, Fig. 1. T. margaritaceus Reeve Fig. 29. Die stärkeren Spirallrippen quergestreift, mit oder ohne Schuppen. *Sganz.* 23, Ile St. Marie, sehr häufig auf den Riffen. *Dufo* 190 Seychellen und Amiranten. *Desh.* 72 Reunion. *Lien.* 49 Mauritius.

- SMAfI **Turbo margaritaceus* Linne. Chemnitz V, Fig. 1762. Hanley ipsa Linn. Conch. p. 335. T. crassus Gray. Reeve Fig. 10. Die grössern Spirallrippen glatt. Eine Abart mit Schuppen aber ohne Querlinien auf denselben ist Chemn. V, Fig. 1758, 1759. T. argyrostomus Lam., Reeve Fig. 7, T. princeps Philippi Zeitschr. f. Malakozool. 1846. Diese wurde von Prof. Möbius auf Mauritius bei Fouquets und auf den Seychellen gesammelt und ist vermuthlich auch *Dufo's* und *Sganzin's* T. argyrostomus, sowie *Bernardin St. Pierre's* bouche d'argent épineuse. Beide Arten stehen einander sehr nahe und wurden vielfach verwechselt.

- MdMR *Turbo chrysostomus* Linne Chemn. V, Fig. 1766. *Favanne* conch. II, p. 59, pl. 9, AfI Fig. A2, Ile de France. Kien. pl. 2, Fig. 2. Reeve Fig. 28: *Bernardin St. Pierre* p. 105 la bouche d'or. *Sganz.* 23, Ile St. Marie, selten.

Md Af *Turbo coronatus* Gmelin Chemn. V, Fig. 1791—93. Kien. 12, 2. Rv. 22 Nossi-Be, *Hildebr.*

Lienard führt auch noch *T. Japonicus* und *histrio* Reeve von Mauritius auf. *Favanne* II, p. 52 und 69, *Turbo cidaris* und *petholatus*.

Die folgenden viel kleineren Arten bilden eine besondere Gruppe oder vielleicht besser Gattung, welche sich an *Collonia* anschliessen dürfte.

MB† **Turbo filifer* Desh. Moll. de Reunion p. 74, pl. 8, Fig. 11—13. *Lien.* 49. Auch von Prof. *Möbius* und Herrn *Caldwell* auf Mauritius bei Fouquets gesammelt.

MBP? *Turbo phasianellus* Desh. Moll. de Reunion p. 74, pl. 9, Fig. 13, 14. *Lien.* 49 Mauritius.

Gleicht in der Zeichnung dem *T. Natalensis* und nähert sich auch sehr, wie Deshayes bemerkt, den Phasianellen. Nach Fischer Journ. de Conch. XXII, p. 156 kommt dieselbe Art auch in Neu-Caledonien vor und gehört dem Deckel nach zu *Trochus*.

B† *Turbo semilugubris* Desh. Moll. de Reunion p. 72, pl. 9, Fig. 9, 10.

Deckel leider unbekannt, die Schale erinnert an *Liotia*.

MB† *Leptothyra purpurata* Desh. (*Turbo*) Moll. de Reunion p. 73, pl. 9, Fig. 11, 12.

**Leptothyra purpurata* (Desh.) var. *tricingulata*.

Testa subglobosa, umbilicata, anfr. 3, gradatis, ultimo cingulis tribus elevatis appropinquatis, supremo noduloso, sculpta, latericeo-rubra, basi alba, fascia intensius rubra cincta; apertura circularis, alba, margine columellari incrassato.

Diam. maj. $1\frac{1}{2}$, alt. $1\frac{3}{4}$, apert. $\frac{2}{3}$ mm.

Ein angebrochenes Stück im Sand, den Prof. *Möbius* von Mauritius mitgebracht, daher die Maasse nicht genauer angegeben werden können.

M† **Leptothyra roseocincta* n. sp. Taf. 20, Fig. 22.

Testa globosa, imperforata, laevis, alba, apice rosea, fascia peripherica latiuscula, saepius composita, alteraque basali angusta roseis picta; anfr. $3\frac{1}{2}$, convexiusculi, sutura superficiali, ultimus rotundatus, basi foveola centrali umbilici loco praeditus; apertura diagonalis, circularis, peristomate albo, incrassato.

Diam. maj. $1\frac{1}{2}$, alt. $1\frac{1}{2}$ apert. vix 1 mm.

Zahlreich im Sand, den Prof. *Möbius* von Mauritius mitgebracht hat. Die peripherische rosenfarbige Binde ist bald einfach, bald etwas wolkig oder fleckig, oft aber zerfällt sie auch in 2—3 schmale Binden.

Leider ist an keinem der Exemplare noch der Deckel vorhanden, der zur sicheren Bestimmung der Gattung nothwendig sein würde. Der Habitus erinnert an einige südafrikanische *Trochus*, z. B. *Tr. zonatus* Wood (*Menkeanus Philippi*), aber andererseits scheint sie mir doch zu nahe verwandt mit *Turbo purpuratus* Desh., um beide in verschiedene Gattungen zu stellen und ich glaube in den polynesischen *Leptothyra*-arten ihre nächsten Verwandten zu finden. Perlmutter ist im Innern der Mündung und sonst nicht zu erkennen.

MS Af **Liotia granulosa* Dunker bei Krauss südafr. Moll. p. 94, Taf. 5, Fig. 28 als *Delphinula*. Mauritius im Sande zahlreich, *Möbius*.

Calcar aster Philippi. Chemnitz Fig. 1720. *Favanne* conchyliologie II, p. 401, pl. 12, Fig. E1 von Ile de France und den Molukken, seitdem von Niemand mehr an den ostafrikanischen Inseln gefunden, daher zweifelhaft.

Md M? *Trochus Niloticus* Linne Chemn. V, Fig. 1605 und 1614; *Favanne* conchyliologie II,

I p. 355, pl. 12, Fig. B1 non Ile de France. Quoy et Gaim. Voy. Astrol. pl. 62, Fig. 12. Kiener Fig. 10. — Jüngerer Zustand: Chemnitz Fig. 1606, 1607. *Favanne* ebenda p. 370, Fig. B2 von Madagaskar. *Tr. marmoratus* Lam. — Noch jünger:

Chemn. Fig. 1611. *Tr. spinesus* Gmel. Reeve Fig. 3b. — *Sganz.* 22, Ile St. Marie auf den Riffen. selten.

SMB *Trochus* (*Cardinalia*) *virgatus* Gmelin Chemn. V, Fig. 1514. *Kiener-Fischer* p. 97, AfI pl. 8. Fig. 1 und pl. 27, Fig. 1, Seychellen, Bourbon. Reeve Fig. 69. Nur von *Lienard* 49 für Mauritius erwähnt, übrigens im Berliner Museum auch aus der Sammlung von *Lamare Piquot*, der auf Mauritius und in Vorderindien gesammelt, vorhanden.

SMdM **Trochus* (*Pyramis*) *Mauritianus* Gmelin List. hist. conch. pl. 625, Fig. 11. Chemnitz B?RAf Conch. Cab. V, Fig. 1547, 1548. Bourbon und Mauritius. *Favanne* conch. II, p. 390, pl. 13, Fig. S. Ile de France. *Lam.* ed. 2, IX, p. 143, Ile de France. *Reeve* XIII, Fig. 19. *Kiener-Fischer* p. 91, pl. 25, Fig. 1 und pl. 30, Fig. 1 Madagaskar, Seychellen. *Tectus muricatus* Mörch. catal. coll. Yoldi p. 159. *Sganz.* 22 beide Inseln. an Felsen. *Lien.* 49; dagegen von Deshayes nicht für Reunion aufgeführt. Auch von *Möbius* bei Fouquets gesammelt.

SAI *Trochus* (*Pyramis*) *pyramis* Born test. mus. Caes. 1780, p. 333. Chemn. V, Fig. 1510 (eine schlanke Abart Fig. 1511, 1512). *Troch. obeliscus* Gmelin, *Lam.*, *Kiener* pl. 19, Fig. 1. Reeve Fig. 8. *Pyramis viridis* Schumacher. Der Jugendzustand *Tr. acutus* *Lam.* *Dufo* 187 Seychellen und Amiranten, häufig, an Felsstücken mit Meerpflanzen auf Schlammgrund, 2—3 m tief, pflanzenfressend.

MdRAf *Trochus* (*Polydonta*) *maculatus* Linne Chemn. V, Fig. 1615—1624. *Kien.* pl. 29. IPAn Reeve Fig. 4. Eine sehr variable Art, deren Grenzen schwer zu bestimmen sind. *Sganz.* 22 Ile Marie auf den Riffen, selten. *Lien.* 49 Mauritius.

Md† *Trochus* (*Polydonta*) *subincarnatus* *Fischer* Fortsetzung von *Kiener* p. 405, pl. 119, Fig. 6 Nossi-Be, Madagaskar, *L. Rousseau*. Wenig verschieden vom vorigen.

MBI *Trochus* (*Polydonta*) *flammulatus* *Lam.* Delessert recueil pl. 35, Fig. 10. *Kien.* pl. 27, Fig. 2. *Desh.* 71 Reunion. *Lien.* 49 Mauritius.
Reeve's *flammulatus* Fig. 70 ist abweichend und neigt mehr zu *maculatus* hin.

MIP **Trochus* (*Polydonta*) *tubiferus* *Kiener* pl. 37, Fig. 3. *Lien.* 49 Mauritius. Auch von *Möbius* bei Fouquets gesammelt.

Reeve's *Troch. concinnus* Fig. 15 und Dunker's *Tr. rota* von Japan scheinen wenig davon unterschieden.

BAfI *Trochus* (*Polydonta*) *squarrosus* *Lam.* Delessert pl. 35, Fig. 12. *Kien.* pl. 21, Fig. 2. Reeve Fig. 9). — *Desh.* 71 Reunion.

MdI *Trochus* (*Polydonta*) *radiatus* Gmelin Chemnitz Conch. Cab. V, Fig. 1642. Philippi *Troch.* Taf. 10, Fig. 5—8. Reeve Fig. 80. *Kiener-Fischer* p. 304. pl. 97, Fig. 1. Madagaskar, *Petit*.

BR *Trochus* (*Polydonta*) *Kochi* Philippi Abbildungen I, Taf. 4, Fig. 8. Monogr. v. *Trochus* Taf. 17, Fig. 3. *Kiener-Fischer* p. 120, pl. 39, Fig. 2 Bourbon, *Cloué*.

MdRAf *Trochus* (*Polydonta*) *cariniferus* Beck. Philippi *Troch.* Taf. 38, Fig. 6. *Kiener-Fischer* p. 229, pl. 75, Fig. 1, 2. Madagaskar, *L. Rousseau*.

SMdM *Trochus* (*Polydonta*) *concavus* Gmelin Chemnitz V, Fig. 1620, 1621. *Rang* manuel B† de moll. p. 203, belle espèce du genre *Infundibulum*, auf Bourbon als *Esswaare*

verkauft. *Sganz.* 22 Ile de France und Bourbon, auf Felsen. *Desh.* 71 Reunion. *Kiener-Fischer* p. 105, pl. 33, Fig. 2. Seychellen, von *Rousseau* gesammelt, und Madagaskar.

S MdM *Trochus (Clanculus) Pharaonius Linne Chemn. V, Fig. 1672, 1673. Kien.
R Af pl. 56, Fig. 1. Philippi Trochus in Küster's neuer Ausgabe von Martini-Chemnitz
Taf. 14, Fig. 1. *Sganz.* 22 Ile de France und St. Marie, auf Riffen und Felsen.
Lien. 50 Mauritius und 79 Seychellen. Auf Mauritius auch von *Möbius* und *Cald-*
well gesammelt. — Tr. rarus *Dufo* Ann. d. Sc. nat. (2), XIV, 1840, p. 188 von
Mahé an Felsen, 2—3 m tief, ist vielleicht dieselbe Art.

S† Trochus (Clanculus) flosculus *Fischer* Journ. de Conch. 1878, p. 211. Fortsetzung
von Kiener p. 300, pl. 96, Fig. 1 Seychellen.

S AMd *Trochus (Monodonta) labio Linne Chemn. V, Fig. 1579, 1580. *Favanne* conch. II,
M Af I p. 49, pl. 8, Fig. A2 la bouche double granuleuse von Ile de France. Philippi
Troch. Taf. 27, Fig. 1—3. *Dufo* 188 Mahé, Silhouette und Praslin in Felsen-
spalten, von den Einwohnern gegessen. *Sganz.* 22 Ile St. Marie, an Felsen, sehr
häufig. Von Prof. *Möbius* auf Mauritius und auf den Seychellen gesammelt, von
Hildebrandt bei Nossi-Be.

S A Md *Trochus (Monodonta) Australis Lam. Tr. labio australis Chemn. XI, Fig. 1890,
M Af 1891. Krauss südafrik. Moll. S. 100 von Natal. Philippi Troch. S. 169, Taf. 27,
Fig. 4, 7. *Dufo* 188 Seychellen und Amiranten, häufig an Felsen, die etwas entfernter
vom Ufer sind, unter Wasser, die Jungen etwas höher. *Kiener-Fischer* p. 227,
pl. 71, Fig. 1, 2 Seychellen und Madagaskar, *L. Rousseau*. Fouquets auf Mauritius
und Seychellen, Prof. *Möbius*.

Dass diese in Südostafrika häufige Art auch in Neuholland vorkomme, ist zu bezweifeln.

Der nahe verwandte, aber fast ganz glatte Tr. dama Phil. soll von *L. Rousseau* bei Diego
Suarez auf Madagaskar gesammelt sein, was übrigens *Fischer* Forts. v. Kiener S. 361 bezweifelt.

Deshayes und *Lienard* nennen auffallender Weise keine dieser Arten, dagegen der erstere Mono-
donta florida Philippi Trochus S. 243, Taf. 36, Fig. 15, was eine neuholländische Art ist. *Sganzin*
nennt ferner Monodonta lugubris Lam. von Mauritius und St. Marie, die Lamarck'sche Art ist
nach *Delessert's* Abbildung ohne Zweifel der europäische Tr. crassus Pulteney, Montagu (lineatus Da-
costa 1778, crocatus Born 1778) der nicht wohl in Ostafrika leben kann, schon sein angebliches Vor-
kommen an der tropischen Westküste von Afrika dürfte zweifelhaft sein.

MdRAf Trochus (Aphanotrochus n.) obscurus Wood index testaceol. pl. 5, Fig. 26. Philippi
Abbild. II, Taf. 6, Fig. 3. Monogr. v. Trochus Taf. 30, Fig. 2. Krauss südafr.
Moll. S. 98. *Kiener-Fischer* p. 208, pl. 69, Fig. 2 Insel St. Marie bei Madagaskar,
L. Rousseau.

Diese Art bildet mit den zwei folgenden eine kleine ächt afrikanische Gruppe, welche im all-
gemeinen Habitus der europäischen Gruppe Gibbula ähnlich ist, aber durch den gezähnelten Colu-
mellarrand sich davon unterscheidet und dadurch der Gruppe Polydonta und Eichelus näher kommt;
ihres unscheinbaren Aeussern wegen mag sie Aphanotrochus heissen.

M† *Trochus (Aphanotrochus) chrysolaemus n. Taf. 20, Fig. 20.

Testa conoideo-ovata, perforata, liris spiralibus elevatis supra suturam circa
8, infra 11 sculptus, griseo-albidus, aufr. 5, convexi, sutura sat profunda divisi,
ultimus rotundatus, basi convexa, apertura ovato-circulari, modice obliqua, parva

margine externo crassiusculo, recto, margine columellari calloso-incrassato, obtuse denticulato, fauce aurea spiratim striata.

Diam. maj. $6\frac{1}{2}$, min. 5, long. $7\frac{1}{2}$, apert. long. 4, diam. $3\frac{1}{2}$ mm.

Black river, Mauritius, *Möbius*.

- Md† Trochus (*Aphanotrochus*) *Goudoti* *Fischer* Journ. de Conch. XXVI. 1878, p. 62, Fortsetz. v. Kiener S. 371, Taf. 113, Fig. 3 Insel St. Marie bei Madagaskar, *Goudot*.
- M† Trochus (*Calliostoma*) *comptus* A. Adams Reeve conchol. ic. XIV, Zizyptinus Fig. 48. Im Berliner Museum.
- Md† Trochus (*Calliostoma*) *Suarezensis* *Fischer* Forts. von Kiener S. 378, Taf. 115, Fig. 2. Diego Suarez, Madagaskar, *L. Rousseau*.
- M†? Trochus (*Calliostoma*) *jububinus* *Gmelin* Chemn. V, Fig. 1612, 1613 von Mauritius. *Favanne* conch. II, p. 349, pl. 12, Fig. L Ile de France. *Lam.* an. s. vert. ed. 2, IV, p. 143 Ile de France. Kiener pl. 18, Fig. 2. Reeve Fig. 22. *Sganz.* 22 Ile de France, an Felsen.
- B† Trochus (*Gibbula*?) *saterius* *Desh.* Moll. de Reunion p. 72, pl. 9, Fig. 7, 8.
- B† Trochus (*Margarita*?) *Eudeli* *Desh.* ibid. p. 75, pl. 8, Fig. 9, 10 Reunion.
- M? I Trochus (*Chrysostoma*) *Nicobaricus* Chemnitz Conch. Cab. V, Fig. 1822—1825. *Helix paradoxa* Born Test. Mus. Caes. 1780, tab. 13, Fig. 16, 17. *Nerita chrysostoma* Karsten Museum Leskeanum I, 1789, tab. 2, Fig. 7. Nur von *Caldwell* aus Mauritius erhalten.
- SI *Rotella elegans* Beck. Kien. pl. 3, Fig. 6. Reeve conch. ic. Fig. 6. Nur von *Lien.* 79 für die Seychellen angeführt.
- Delphinula laciniata* Lam. Turbo *delphinus* L. Chemn. V, Fig. 1733—1735. Kien. pl. 1, Fig. 1. Philippi Taf. 1. Reeve IV, Fig. 9. Nur von *Sganz.* 22 angeführt und zwar: „assez rare et accidentellement sur les récifs de l'île de Madagascar; je pense qu'on la trouve aussi, mais très-rarement, à l'Isle de France“. Also ziemlich unsicher.
- Liotia* vgl. oben S. 294.
- MB *Stomatella pulchella* A. Adams Sow. thes. III, pl. 173, Fig. 17, 18. *Desh.* 71 Reunion. *Lien.* 50 Mauritius.
- MR *Stomatia phymotis* Helbling Chemn. X, Fig. 1601, 1602. Sow. Fig. 48—52. Reeve XIX, Fig. 2. *Lien.* 50 Mauritius.
- S† *Stomatia irisata* *Dufo* Ann. scienc. nat. (2) XIV, 1840, p. 201 (als *Stomatella*) Mahé, selten.
- M† *Stomatia variegata* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1868, p. 12, pl. 4, Fig. 1 Mauritius. *Reeve* XIX, Fig. 5 Mauritius.
- S† *Gena minima* *Dufo* (*Stomatella*) loc. cit. p. 202 Mahé auf einer Perlenmuschel aus einer Tiefe von 7 Faden.
- BP *Broderipia iridescens* Broderip (*Scutella*) Sow. thes. pl. 173, Fig. 32, 33. Reeve conchol. icon. XIX, Fig. 4. *Desh.* 69 Reunion. Sonst nur aus dem stillen Meer bekannt.
- B† *Broderipia nitidissima* *Desh.* Moll. de Reunion p. 69, pl. 6, Fig. 20—22. *Reeve* XIX, Fig. 3 Bourbon.

Haliotidae.

MBR **Haliotis varia* Linne Martini I, Fig. 144. Reeve conch. ic. III, Fig. 4. Fouquets
AfIAu auf Mauritius, Möbius. Häufig im malaischen Archipel, durch das verhältnissmässig
grosse Gewinde und die Knötchen an der Rückenseite kenntlich.

MAfI **Haliotis pustulata* Reeve Fig. 52. Grande Baie und Black river, Maur., Möbius.
Auch von Caldwell aus Mauritius erhalten.

Aehnlich der vorigen, aber merklich flacher, mit Knötchenreihen statt der schiefen Runzeln.
Bei beiden das Gewinde verhältnissmässig gross.

L'oreille de mer Bernardin St. Pierre voy. à l'isle de France 1773, p. 105. Favanne p. 588,
pl. 5, Fig. D u. H. unilaterialis (Lam.) Sgan. 21 von Ile de France und Bourbon dürfte eine dieser
beiden Arten sein.

B† *Haliotis revelata* Desh. Moll. de Reunion p. 70, pl. 9, Fig. 1, 2.
Mehr länglich und oben glatt, Gewinde klein.

Fissurellidae.

S? A? **Parmophorus corrugatus* Reeve Sow. thes. Fig. 7 und 4. Martens Monatsber.
MdMB? d. Berlin. Akad. 1879, S. 735. Fouquets auf Mauritius, Möbius. Vielleicht dieselbe
AfI Art ist der von Dufo 206 angegebene *P. granulatus* (Lam.) von den Seychellen
und Amiranten, aus der Tiefe von 3 m. *P. granulatus* (Lam.) Desh. 45 von
Reunion und der unbestimmte *Parmophorus* bei Lien. 51 Mauritius.

P. corrugatus und *granulatus* sind einander sehr ähnlich, letzterer ist hinten stärker ver-
schmälert. *P. breviculus* (Blainville) Reeve Fig. 4 von Madagaskar gehört wahrscheinlich auch zu
derselben Art, vgl. Edgar Smith Quart. Journal of Conchology II, 1879, p. 261.

S† *Emarginula plantarum* Dufo Ann. sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 205 Mahè, selten an
Meerpflanzen in 3 m Tiefe. Vielleicht derselbe mit der folgenden.

MB† *Emarginula scutellata* Desh. Moll. de Reunion p. 45, pl. 7, Fig. 1, 2. Reeve XIX,
Fig. 63. Lien. 51 Mauritius.

B† *Emarginula brevirimata* Desh. ibid. p. 46, pl. 6, Fig. 17—18 Reunion.

B† *Emarginula costulata* Desh. ibid. p. 47, pl. 7, Fig. 3—5. Reeve Fig. 65 Reunion.

B† *Emarginula decorata* Desh. ibid. p. 47, pl. 7, Fig. 6—8. Reeve Fig. 66 Reunion.

B† *Emarginula spinosa* Desh. ibid. p. 48, pl. 7, Fig. 9—11 Reunion.

B† *Emarginula fenestrella* Desh. ibid. p. 49, pl. 7, Fig. 12—15. Reeve Fig. 68 Reun.

MRAf **Fissurella Rüppelli* Sow. conchological illustrations Fig. 75; Descript. de l'Egypte
moll. pl. 1, Fig. 4. Reeve conch. ic. VI, Fig. 54. Mauritius, Möbius und Robillard.

Dieses ist vermuthlich auch Lienard's *F. reticulata*?, p. 50 von Mauritius.

M†? *Macroschisma compressum* A. Adams Proceed. Zool. Soc. 1850, p. 202. Desh.
45 Reunion. Möbius.

M†? *Rimula* sp.? „*Fissurella cemorica*“ Lien. 50 Mauritius.

Docoglossa.**Acmaeidae.**

M† *Acmaea squamosa* Quoy und Gaimard (Patelloida) Voy. de l'Astrolabe III, p. 360,
pl. 71, Fig. 38, 39 Ile de France. Desh. Lam. an. s. v. ed. 2, VII, p. 550.

MB Af *Acmaea profunda* *Desh.* Moll. de Réunion p. 44 (Patella) pl. 6, Fig. 15, 16. *Lien.* 51 Mauritius.

Der glatte farbig gegliederte Rand macht es mir wahrscheinlich, dass diese Art zu *Acmaea* gehöre.

Patellidae.

MI *Patella testudinaria* Linne Martini Conch. Cab. I, Fig. 45—48. Reeve conch. ic. VIII, Fig. 6. *Bernardin St. Pierre* 105 lépas uni et aplati. *Sganz.* 13 ohne Angabe der einzelnen Inseln. Durch *Robillard* unter verschiedenen Namen aus Mauritius erhalten.

SMdM **Patella variegata* Reeve conch. syst. pl. 136, Fig. 1; conch. ic. VIII, Fig. 36.

RAfI Descript. de l'Egypte pl. 1, Fig. 2. Wahrscheinlich auch *P. aurifera* *Dufo* Ann. sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 204 Mahé, an Felsen über Wasser. Von Prof. *Möbius* auf den Seychellen und auf Mauritius, hier bei Fouquets, gesammelt, Nossi-Be, *Hildebrandt*. Häufig im rothen Meer und im indischen Archipel, wo ich sie bei Palabuan (Java) und Batjan (Molukken) sammelte.

SMB *Patella rota* Chemnitz Conch. Cab. X, Fig. 1619. *P. scalata* Reeve conch. icon. RI? Fig. 89. *Desh.* 42 und 43 Reunion. *Lien.* 51 Mauritius. Durch *Robillard* von den Seychellen und Mauritius erhalten.

Reeve's *P. rota* Fig. 39 scheint mir davon durch ihre ovale Gestalt etwas verschieden.

M† *Patella novemradiata* *Quoy* und *Gaimard* voy. de l'Astrolabe III, p. 346, pl. 70, Fig. 22—23 Ile de France. *Desh.* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 546.

M† *Patella Cernica* *H. Adams* (Nacella) Proc. Zool. Soc. 1869, p. 273, pl. 19, Fig. 7 mit zahlreichen rothen Strahlen, Barkly island, bei Mauritius.

B† *Patella garconi* *Desh.* Moll. de Reunion p. 42, pl. 6, Fig. 11, 12 Reunion.

SA?B? **Patella pica* Reeve conch. ic. Fig. 45. Auf den Seychellen von Professor *Möbius* I gesammelt.

Vielleicht ist es *Dufo's P. dentata* 204, zahlreich auf den Seychellen und Amiranten, aber nicht näher beschrieben. Auch *P. levata* *Desh.* moll. de Reunion p. 44, pl. 6, Fig. 14 scheint mir damit übereinzustimmen.

MB? *Patella chitonoides* Reeve Fig. 52. *Desh.* 43, 44 Reunion, in mehreren Varietäten. *Lien.* 51 Mauritius.

B† *Patella Moreli* *Desh.* Moll. de Reunion p. 43, pl. 6, Fig. 13 Reunion.

SA† *Patella viridis* *Dufo* Ann. sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 204 Seychellen und Amiranten, zahlreich; meist über Wasser.

S† *Patella virginum* *Dufo* ibid. p. 205 Mahé, selten.

S† *Patella malicolor* *Dufo* ibid. p. 205 Mahé, sehr selten.

Die 3 letztgenannten sind leider nicht abgebildet und nur kurz beschrieben, so dass sie nur durch den Fundort wieder erkannt werden dürften.

Ausserdem werden noch verschiedene Patellaarten von unsern Inseln aufgeführt, die mehr oder weniger zweifelhaft erscheinen, zunächst eine Anzahl solcher, welche wesentlich der Südspitze Afrika's angehören und leicht als Schalen in die Hände von Sammlern kommen konnten, so *P. granatina* L., *oculus* Born, und „œil de Meduse“ von *Favanne* conchyliologie I, p. 507—510, und *Sganzin* 13 für Mauritius, die letztere als daselbst sehr gemein bezeichnet, obwohl sie kein Anderer dort wieder gefunden, also vielleicht auch falsche Bestimmung, *P. miniata* bei *Favanne* p. 488, dann *P. com-*

pressa L. und spinifera Lam. (= plicata Born, Reeve) bei *Favanne* p. 521 u. *Lien*. 51 ebenfalls für Mauritius. Prof. Möbius selbst hat ein Exemplar der ebenfalls südafrikanischen so ganz charakteristischen *P. cochlear* Born von Fouquets auf Mauritius mitgebracht. Endlich giebt *Deshayes* 44 *P. pentagona* Born für Reunion an und *Lienard* 51 wiederholt es für Mauritius. *P. pentagona* ist nach Born's Abbildung eine sehr sonderbare Art, die ich noch nicht in Natur gesehen, vielleicht gar keine Patella. Uebrigens hat Robillard unter den Namen *P. profunda* und *P. compressa* unzweifelhafte Exemplare von *P. testudinaria*, s. oben, aus Mauritius an das Berliner Museum geschickt.

Chitonidae.

- M† Chiton (*Lepidopleurus*) *Mauritianus* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe III, p. 397, pl. 73, Fig. 1—3 Ile de France, selten. Desh. Lam. ed. 2, VII, p. 502.
- M† Chiton (*Lepidopleurus*) *angusticostatus* Quoy et Gaimard ibid. p. 398, pl. 73, Fig. 4. Ile de France von J. Desjardins erhalten.
- MB† *Chiton (*Lepidopleurus*) *rusticus* Desh. Moll. de Reunion p. 39, pl. 6, Fig. 1—3 Reunion. Von Prof. Möbius zahlreich bei Fouquets auf Mauritius gefunden.
Sollte Ch. nigrovirescens Blainville Dictionnaire des sciences naturelles XXXVI, 1825, p. 538 von Südafrika vielleicht dieselbe Art sein?
- MB† *Chiton (*Lepidopleurus*) *sanguineus* Desh. Moll. de Reunion p. 40, pl. 6, Fig. 4—7. Ebenfalls bei Fouquets von Prof. Möbius gefunden.
- MB† Chiton (*Tonicia*?) *Maillardi* Desh. Moll. de Reunion p. 38, pl. 5, Fig. 14. Auch aus Mauritius durch Robillard erhalten
- MB† *Chiton (*Acanthopleura*) *Borbonicus* Desh. Moll. de Reunion p. 37, pl. 5. Fig. 12, 13 Reunion. Mauritius von Prof. Möbius gefunden.
Dem Ch. petholatus Sow. Reeve IV, Fig. 74 unbekannten Fundorts, mindestens sehr ähnlich, wenn nicht derselbe. Vgl. auch Ch. nebulosus Wood suppl. Fig. 4.
- MRAf *Chiton (*Acanthochaetes*) *Garnoti* Blainville Dictionnaire d. scienc. naturelles XXXVI, 1825, p. 552. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe III, pl. 73, Fig. 9 bis 14. Krauss südafr. Moll. S. 42. Fouquets auf Mauritius, Prof. Möbius.
Der südafrikanische Ch. fascicularis (L.) bei Chemnitz Conch. Cab. X, Fig. 1688, dürfte dieselbe Art sein.
- B† Chiton (*Acanthochaetes*) *penicillatus* Desh. Moll. de Reunion p. 41, pl. 6, Fig. 8 bis 19 Reunion.

Tectibranchia.

Pyramidellidae.

- MI Pyramidella *auris-cati* Chemn. Conch. Cab. XI, Fig. 1711, 1712. *P. plicata* Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 55 Ile de France. Encycl. pl. 452, Fig. 3. *Ferussac* prodrome p. 106. *Kiener* pl. 1, Fig. 4. Sow. thes. Fig. 1. Reeve XV, Fig. 21. *Sganz*. 21 Ile de France in Felsenspalten und unter Steinen.
- SM *Pyramidella *mitralis* A. Adams Sow. thes. Fig. 9. Reeve conch. ic. XV, Fig. 20. Bei Fouquets, Mauritius, und bei St. Anne, Seychellen, von Prof. Möbius gesammelt, auch von Herrn *Caldwell* aus Mauritius erhalten. Vermuthlich auch *P. corrugata* (Lam.?) *Kiener* p. 6, pl. 2, Fig. 6 von Ile de France.
- M Pyramidella *variegata* A. Ad. Sow. Fig. 10. Desh. 57 Reunion. *Lien*. 29 Maur. Wenig von der vorigen verschieden.

- SBMR **Pyramidella* (*Lonchaeus*) *maculosa* Lam. *Kiener* pl. 2, Fig. 5 Ile de France.
 AfIP Chemnitz Conch. Cab. IV, Fig. 1493, 1494. *Ferussac* prodrome p. 106 Ile de France. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. pl. 65, Fig. 1, 2 lebendes Thier. punctata Sow. thes. Fig. 14. Reeve Fig. 5. *Desh.* 57 Reunion, Grande Baie und Black river auf Mauritius, St. Anne auf den Seychellen, Prof. *Möbius*. Auch aus dem rothen Meer durch Ehrenberg und der Küste von Mossambique durch Prof. Peters im Berliner Museum.
- SMP **Pyramidella* (L.) *sulcata* A. Adams Sow. thes. II, pl. 171, Fig. 34. Reeve Fig. 12. Grande Baie und Fouquets auf Mauritius, St. Anne auf den Seychellen, Prof. *Möbius*. Auch von *Robillard* und *Caldwell* aus Mauritius erhalten. Sonst nur von den Sandwichinseln im Berliner Museum.
- SMI **Pyramidella* (*Obeliscus*) *terebellum* Müller *Kiener* pl. 1, Fig. 2. Sow. Fig. 5, 6. Reeve Fig. 14 von Westindien. Vgl. Jickeli Malakozool. Blätt. XXI, 1873, S. 18. *Lien.* 29 Mauritius. Black river und Grande Baie auf Mauritius, St. Anne auf den Seychellen, Prof. *Möbius*.
 Es ist mir nicht möglich, west- und ostindische Exemplare bestimmt zu unterscheiden.
- M *Pyramidella* (*Obeliscus*) *teres* A. Adams Reeve Fig. 6. *Lien.* 29 Mauritius.
- M† **Chemnitzia chrysozona* n. sp. Taf. 20, Fig. 21.
 Testa conico-subulata, dense cancellata, interstitiis excavatis, alba, fascia flava in anfr. superioribus una, in mediis duabus, in ultimo tribus cincta; anfr. 12—13, primus obliquus, subglobosus, nucleo laterali, sequentes convexi, sutura impressa distincti, regulariter crescentes, nonnulli (septimus, octavus et decimus) univaricosi, ultimus basi subangulatus, apertura trapezoideo-rotundata, margine externo paulum arcuato, tenui, margine columellari perpendiculari, crassiusculo, basi plicula obliqua munito.
 Long. 15, diam. 4, apert. long. $2\frac{1}{3}$, diam. $1\frac{2}{3}$ mm.
 Fouquets, Mauritius, im Sand, Prof. *Möbius*.
- MB† **Scalenostoma carinatum* *Desh.* Moll. de Reunion p. 58, 59, pl. 7, Fig. 26—28 Reunion. Auch in Sand von Mauritius, den Prof. *Möbius* gesammelt, gefunden, und von *Robillard* erhalten.
Eulima polygyra A. Adams Sow. thes. pl. 169, Fig. 36 ist sehr ähnlich.
- MP **Eulima major* Sow. thes. pl. 169, Fig. 3, 4. Reeve conch. ic. XV, Fig. 5. Martens Südseeconchylien S. 28. *Lien.* 30 kleine Insel, Barkly bei Mauritius. Von Prof. *Möbius*. Hrn. *Robillard* und *Caldwell* auf Mauritius gefunden.
- MB†? *Eulima inflexa* Blainville (*Phasianella*) malacologie pl. 35, Fig. 5. *Desh.* 57 Reunion. *Lien.* 29 Maurice. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- MP *Eulima arcuata* A. Adams Reeve Fig. 14. Die am stärksten gekrümmte Art, kaum hinreichend von den beiden vorigen verschieden, von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- MI *Eulima lactea* A. Adams Sow, Fig. 2. Reeve Fig. 2 von den Philippinen. *Desh.* 57 Reunion. *Lien.* 30 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.

- MI **Eulima subangulata* Sow. thes. Fig. 11, 12. Reeve Fig. 13. Von Prof. Möbius aus Mauritius mitgebracht.
- MBI *Eulima acuta* Sow. Fig. 29, 30. Reeve Fig. 15. *Desh.* 57 Reunion. *Lien.* 29 Mauritius.
Lienard erwähnt ferner noch *E. Cumingii*, *flexuosa* und *hastata* A. Ad. von Mauritius.
- BI *Eulima obesula* A. Ad. Sow. thes. pl. 169, Fig. 34. Reeve Fig. 28. *Desh.* 57 Reunion.
- MB†? *Eulima* (*Liostraca*) *Metcalfi* A. Ad. Sow. thes. pl. 170, Fig. 12, 13. Reeve Fig. 5.
Desh. 57 Reunion. *Lien.* 30 Mauritius.
- MB† **Stylifer eburneus* *Desh.* Moll. de Réunion p. 57, pl. 7, Fig. 25 Reunion.
Wahrscheinlich dieselbe Art bei Fouquets, Mauritius, von Prof. Möbius gefunden, ziemlich ähnlich dem *St. ovoideus* H. et A. Ad., doch etwas mehr länglich.
- M†? *Stylifer Cumingianus* A. Adams Reeve conch. ic. XX, Fig. 5. *Lien.* 30 Mauritius.
Länglich, konisch.
- B†? *Stylifer pyramidalis* Reeve elements of conchology I, pl. 12, Fig. 56. *Desh.* 57 Reunion. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
Langgezogen dem westindischen subulatus Broderip et Sowerby (Adams genera of shells pl. 25, Fig. 4, Mörch. Mal. Blätt. 1875 S. 184) sehr ähnlich, daher wohl auch *Lienard's* *St. subulatus* 30.
- M† *Stylifer speciosus* A. Adams, Reeve Fig. 10.
Durch die engen Windungen ausgezeichnet. Von *Robillard* unter dem Namen ovoideus aus Mauritius erhalten.
Nach *Lienard* 30 sollen auch *St. exaratus* A. Ad. (Reeve Fig. 14 von den Philippinen) und subangulatus A. Ad. (Reeve Fig. 13, Mörch a. a. O., westindisch) in Mauritius vorkommen.

Tornatellidae.

- SAMI **Tornatella solidula* Linne Chemn. Conch. Cab. X, Fig. 1405; Kiener Fig. 2; Reeve XV, Fig. 3. *Sgan.* 21 Ile de France und St. Marie, auf Steinen und Felsen. *Dufo* 196, alle Seychellen und Amiranten. *Lien.* 52 und 79 Mauritius und Seychellen. Grande Baie, Black river und Fouquets auf Mauritius, Prof. Möbius.
- SMR **Tornatella sulcata* Gmelin Martini Conch. Cab. II, Fig. 440, 441. *T. punctata* Ferussac prodr. nro. 5. *T. tessellata* Reeve Fig. 6. *Voluta solidula* Linne Mus. Lud. Ulr. Bei Fouquets, Mauritius und St. Anne. Seychellen, Möbius. Wenig von der vorigen verschieden.
- MAf† *Tornatella flammea* Gmelin Martini Conch. Cab. II, Fig. 439; Kiener Fig. 1. Reeve Fig. 2. *Lien.* 52 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- SM† **Tornatella nitidula* Lam. an. s. vert. ed. 2, IX, p. 42, Ile de France. *Encycl.* pl. 452, Fig. 2; *Ferussac* prodrome p. 108; *Kien.* Fig. 5; Reeve Fig. 5. *Sgan.* 21, Ile de France. *Dufo* 196, Mahé, auf Schlammgrund in 2—3 m, pflanzenfressend. *Lien.* 52 und 79 Mauritius und Seychellen. Fouquets und St. Aune, gewöhnlich einfarbig rosenroth, andere weiss, Möbius.
Diese Art ist zwar glatt wie die europäische tornatilis L., stimmt aber in den Falten mehr mit solidula überein.
- MB *Tornatella oryza* Reeve Proc. Soc. 1842. *Desh.* 57 Reunion. *Lien.* 52 Mauritius.
Dufo und *Lienard* erwähnen auch *T. fasciata* Lam. von den Seychellen und Mauritius, es ist das eine Art des Mittelmeeres, deren Vorkommen im indischen Ocean sehr unwahrscheinlich ist.

Ringiculidae.

- M† Ringicula apicata Nevill Journ. Asiat. Soc. XXXIX, 1871, p. 3, pl. 1, Fig. 12, Port Louis, Mauritius, sehr selten.

Bullidae.

- MI Tornatina coarctata A. Adams, Sow. thes. II, Fig. 31. *Lien.* 52 Mauritius.
- MI *Utriculus Borneensis A. Adams, Reeve XVIII, Fig. 6. Bel Ombre, Mauritius, *Möbius*.
- SI *Atys naucum Linne Martini Conch. Cab. I, Fig. 200, 201. Sow. thes. Fig. 107—109. *Dufo* 203 Mahé, selten, auf Sand und an einzelnen Felsen, 2—3 m tief. Seychellen, Prof. *Möbius*.
- SMR *Atys cylindricus Helbling Abhandl. Privat-Gesellsch. in Böhmen IV, 1779: Chemn.
- AfAu Conch. Cab. X, Fig. 1356, 1357; Ehrenberg symbolae physicae; Sow. thes. Fig. 114. *Bulla solida* Bruguière *Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 673* Ile de France. *Lien.* 53 Fouquets und Black river auf Mauritius, St. Anne auf den Seychellen. Prof. *Möbius*.
- Wahrscheinlich gehört auch *B. (Haminea) succisa* Desh. 54 von Reunion hierher, da Sowerby thes. Fig. 116, welche er anführt, mir nicht die ächte *Bulla succisa* Ehrenberg (Atys), deren Original im Berliner Museum sich befindet, sondern nur eine unbedeutende Varietät von *A. cylindricus* darzustellen scheint. Auch *Dufo's* *Bulla albicita*, 203, bei Mahé, auf Schlammgrund, dürfte diese oder eine nahe verwandte Art sein.
- MP Atys (Dinia) dentifer A. Adams, Sow. thes. Fig. 124, Reeve XVII, Fig. 13. *Lien.* 53 Mauritius.
- SMdM *Bulla ampulla Linne Lister hist. conch. pl. 713, Fig. 69 Mauritius. Martini Conch.
- RAfI Cab. I, Fig. 188, 189; Reeve conch. ic. Fig. 3. *Sganz.* 13 Ile de France und Ile St. Marie. *Dufo* 203, Seychellen und Amiranten, auf Schlammgrund, 1—4 m tief. *Lien.* 52. *Möbius*, Fouquets und St. Anne, bis 48 mm lang und 40 mm breit, mit zackiger Zeichnung.
- BI *Bulla rubicunda* Schröter Wiedemann's Archiv IV, 1804. *B. cruentata* A. Adams Sow. thes. Fig. 75; Reeve Fig. 2. *Desh.* 54 Reunion.
- MB Af Haminea cymbalum Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe pl. 26, Fig. 26, 27. *Desh.* 54 Reunion. *Lien.* 53 Mauritius.
- MB *Haminea tenera A. Adams Sow. thes. Fig. 103. *Desh.* 54 Reunion. *Lien.* 53 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* auf Mauritius gesammelt.
- MAf *Haminea Natalensis Krauss südafr. Moll. Taf. 4, Fig. 14; Reeve Fig. 7. Black river, Mauritius, Prof. *Möbius*.
- B Haminea ambigua A. Adams Sow. thes. Fig. 97. *Desh.* 54 Reunion.
- Zu einer dieser Arten gehört vermuthlich auch die grünliche und die goldgelbe nicht näher beschriebene *Bulla* bei *Sganzin* 14, zwischen Meerpflanzen lebend.
- MAfI Acera soluta Gmelin Chemnitz Conch. Cab. X, Fig. 1359, 1360; Sow. thes. Fig. 40; Au Reeve XVI, Fig. 4. *Bulla Ceylanica* Bruguière. Eine mit *Bulla fragilis* verwandte, aber grössere Art *Sganz.* 14. *Lien.* 53 Mauritius.
- MP *Bullina scabra* Chemn. Conch. Cab. X, 1788, Fig. 1352; Sow. thes. Fig. 1. *Voluta ziczac* Mühlfeld Magazin d. Gesellsch. d. naturforsch. Freunde in Berlin VIII, 1818,

Taf. 1, Fig. 4. *Bulla undata* Bruguière, vgl. v. Martens Südsee-Conchylien S. 51. Mauritius, von *Robillard* erhalten.

B† *Bullina vitrea* (Pease Proc. Zool. Soc. 1860 p. 19?). *Desh.* Moll. de Reunion p. 56, pl. 8, Fig. 23.

Die Gattung *Bullina* ist von Ferussac, tableaux systematiques 1821, p. 30 für *Bulla undulata*, physis, amplustre, scabra und velum gegründet und durch die Anwesenheit zweier deutlicher Fühler charakterisirt, sie entspricht also im Wesentlichen der älteren Gattung *Hydatina* in weiterem Sinne. Die Gebrüder Adams beschränken den Namen auf *scabra* und die nächsten Verwandten mit Spiralskulptur, über deren Fühler meines Wissens nichts bekannt ist. Ich behalte den Namen in diesem Sinne bei, obwohl ein neuer hier zu rechtfertigen wäre.

MBIP **Hydatina Guamensis* Quoy et Gaimard (Bullaea) Voy. de l'Uranie, pl. 66, Fig. 11, 12; Pease Am. Journ. of Conchology IV, p. 152; Martens Südseeconchyl. S. 52. *Bulla Ferussaci* *Desh.* bei Lamarck an. s. vert. ed. 2, VII, p. 57, Ile de France. *H. nitidula* (Dillwyn) *Reeve* conch. icon. XVI, Fig. 1, 2, Mauritius. *Desh.* 57 Reunion; *Lien.* 53 Mauritius. Auch von Prof. *Möbius* bei Fouquets und von *Robillard* gesammelt.

MB† *Hydatina eximia* *Dosh.* Moll. de Reunion p. 55, pl. 7, Fig. 23, 24; *Lien.* 53 Mauritius. Sehr ähnlich der vorigen.

SMBI **Hydatina aplustre* Linne Chemnitz X, Fig. 1350, 1351. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe II, p. 366, pl. 26, Fig. 4—7, lebendes Thier, ilots aux cerfs, Ile de France. Eydoux und Souleyet Voy. de la Bonite pl. 25, Fig. 14—17, lebendes Thier; Sow. Fig. 4—6, *Aplustre fasciatum* Schumacher. *Amplustre thalassiarchi* H. und A. Adams. *Reeve* XVI, Fig. 2 Mauritius im Schlamm an Flussmündungen. *Dufo* 203, Mahé, selten, auf Schlammgrund an Flussmündungen. *Desh.* 55 Reunion. *Lien.* 52 Mauritius. Fouquets, *Möbius*.

„Thier durchscheinend weiss. Lippenfühler ebenso breit wie die Vorderfühler des Kopfes, nicht so dünn fadenförmig, wie bei Adams, *Rec. Moll.* pl. 56, abgebildet ist. Im Mantel viele ovale Schleimzellen, welche einen weisslichen fadenziehenden Schleim reichlich absondern.“ *Möbius*.

SARC **Hydatina physis* Linne Martini Conch. Cab. I, Fig. 196, 197; Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe II, p. 363, pl. 26, Fig. 1—3, Port Louis auf Riffen. Mörch Mal. Blatt. 1875, p. 175; Sow. Fig. 9—11; *Reeve* Fig. 2 Mauritius. *H. filosa* Schumacher. *Dufo* 203 Seychellen und Amiranten, auf reinem Sand, 1—3 m tief. *Desh.* 54 Reunion. Fouquets, *Möbius*. Auch von *Robillard* von Mauritius, Rodriguez und den Cargados in mehreren Varietäten eingesandt.

Hydatina physis var. *virgata* Martyn univers. conchologist pl. 11. *Desh.* 54 Reunion. *Lien.* 53 Mauritius.

MAfI *Hydatina velum* Gmelin Chemnitz X, Fig. 1348, 1349. *B. circulata* Martyn. *B. fasciata* Bruguière, Lam., Eydoux et Souleyet Voy. de la Bonite pl. 25, Fig. 18; lebendes Thier; Adams und *Reeve* Zool. of the Samarang pl. 19, Fig. 4, lebendes Thier. *Lien.* 52 Mauritius. Auch von *Robillard* ebendaher eingesandt.

BIP *Smaragdinella viridis* Rang manuel d. mollusques p. 148 *Bulla* (ohne Artnamen), Bourbon, an Felsen über Wasser. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe II, p. 352, (pl. 26, Fig. 13—16, lebendes Thier), Insel Bourbon. Sow. Fig. 52, 53. *Reeve* XVIII, Linteria Fig. 3. Martens Südseeconchylien S. 53. *Desh.* 57 Reunion.

MR Af **Cryptophthalmus smaragdinus* Leuckart wirbellose Thiere R. M. Taf. 11, Fig. 2.
Fouquets, *Möbius*.

M † **Chelidonura hirundinina* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe p. 367, pl. 26, Fig. 20—25, ilots aux cerfs, Ile de France, an stillen Stellen, bei Ebbe 1 Zoll unter Wasser. *Desh.* Lam an. s. vert. VII, p. 665. Von Prof. *Möbius* bei Fouquets lebend beobachtet und gezeichnet, Taf. 21, Fig. 5 und 6. Kriechend 25 mm lang.

Kopf mit 3 flachen Buchten, die mittlere seichter als die seitlichen. Nach hinten ist der Kopf in einen zungenförmigen Lappen verlängert, der sich bis in die Herzgegend über den Rücken legt.

Der Hinterkörper ist höher und breiter als der Kopf. Er läuft aus in zwei spitze, seitlich zusammengedrückte Anhänge, welche nach aussen konvex, nach innen konkav sind. Der linke Anhang ist grösser als der rechte.

Der Fuss hat Seitenlappen, welche sich auf der Mitte des Rückens berühren oder ein wenig übereinandergreifen können.

Das eine Exemplar (Fig. 5) war bräunlich schwarz. Der Kopf oben bräunlich roth, mit einer rothen Saumlinie eingefasst. Auf dem Rücken waren zwei lange braune, mit rothen Linien eingefasste Felder. Auch auf dem Hinterkörper ist ein braunes, roth eingefasstes Mittelfeld, welches sich zweispitzig über die Körperanhänge ausdehnt, und zwei Seitenfelder. Neben den rothen Linien laufen blaugrüne Linien. Auf dem Kopfe ist ein dreieckiger gelbweisser Fleck mit feinen schwarzen Punkten. Ein kleiner sichelförmiger Fleck von derselben Farbe ist auf dem Hinterende des zungenförmigen Kopflappens und hinter diesem ein ähnlicher grösserer Fleck auf dem Rücken. Unter und vor dem letzteren pulsirt das Herz.

Ein zweites Exemplar, welches ich fing (Fig. 6), war bläulich schwarz mit gelben Flecken, die an der Rückenseite zahlreicher waren, als an der Bauchseite. Die auf dem Rücken liegenden Fussränder hatten einen schmalen hellgrünen Saum.

Die Schnecke kriecht langsam, die hintern Anhänge meist gerade ausgestreckt nachziehend.

Vorn am Kopfe stehen auf den beiden Seitenwülsten und an den neben diesen befindlichen Buchten zahlreiche eigenthümliche Tastorgane, welche bei Lupenvergrösserung wie Büschel von Borsten aussehen. Es sind biegsame konische Röhren (Fig. 5a und 6ab), auf deren abgestumpftem freien Ende ein Büschel zahlreicher sehr feiner Haare steht.

Das freie Ende der Röhre kann durch einen Muskel in das angewachsene eingestülpt werden (Fig. 6b). Unter der Basis des Haarbüschels ist ein eiförmiges Ganglion, an welches ein Nerv tritt.

Ausgestülpt wird der Endtheil der Röhre wahrscheinlich durch die Ringmuskelfasern derselben, vielleicht auch durch Blutschwellung. Das Ein- und Ausstülpen geschieht sehr schnell. Sobald die Haarspitzen irgendwo anstossen, werden sie zurückgezogen, kommen aber ebenso schnell wieder hervor.

M † **Doridium cyaneum* Martens var. *vittatum* n. (vergl. Sitzungsberichte der Akad. Berl. 1879, S. 738).

Lebend 7 cm. lang, 3—4 cm. breit. Rücken braun mit schwefelgelben Flecken. Auf dem Kopfe zwei braungelbe Längslinien, auf dem Rücken zwei braungelbe Flecken. Fussränder, Kopf und Mantel blau und gelb gesäumt, Sohle bläulich braun. An dem einen Spiritus-Exemplar haben sich wohl die braungelben Längsbänder zu beiden Seiten auf dem Kopfschilde und am Fussrande erhalten, aber nicht die Flecken des Rückens.

Fouquets auf Mauritius, Prof. Möbius.

M† **Doridium guttatum* n. sp.

Lebend 4—5 cm lang, 2,5—3 cm breit. Kopf und Rücken braun, mit dichten isabellgelben Flecken, in welchen braune Pünktchen oder Linien sind. Sohle bläulich braun mit gelben Flecken, die Ränder blau und gelb. Vielleicht nur eine Varietät der vorigen (Prof. Möbius). In Spiritus ziemlich hell graubraun, Kopfschild und Rücken mit dunkelrothbraunen Flecken, Adern und Punkten, Fuss dunkler mit zahlreichen isabellgelben rundlichen Flecken. Der Kopfschild ist bei dieser (an Spiritusexemplaren) so lang oder länger als der Rückenthail und mehr grob gekörnt als gerunzelt, bei der vorigen kürzer und mehr längsgerunzelt.

Fouquets auf Mauritius, Prof. Möbius.

Bemerkenswerth ist, dass auch hier, wie im Mittelmeer, zwei Arten nebeneinander vorkommen, eine fleckige und eine mehr einfarbige, dunkle mit Längsbändern, *D. Meckelii* und *D. aplysiaeforme*, Delle Chiaje und Philippi; sollte etwa irgend eine nähere Beziehung zwischen beiden Formen vorhanden sein?

Aplysiidae.

M† **Dolabella gigas* Rang hist. des Aplysiens pl. 3, Fig. 4. *Desh.* 53 Reunion. *Lien.* 53 Mauritius. Von Prof. Möbius lebend auf Mauritius gefunden.

Bis 30 cm lang, violett und grau, mit konischen an der Spitze abgerundeten einfachen Warzen, während die folgende Art olivengrün ist, mit spitzen Warzen, worauf spitze Papillen stehen. Beide stossen violetten Schleim aus dem Mantelspalt aus.

S A Md **Dolabella Rumphii* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 699 und *Cuvier* Ann. Mus.

M B Af d'hist. nat. V, p. 436, pl. 29, Fig. 1—5. Ile de France, von *Peron* gesammelt. *Rang.*

I Au hist. d. Aplysiens p. 46, pl. 1. Ile de France, auf Sand- und Schlammgrund, an ruhigen Stellen. *Sganz.* 14 Ile de France und St. Marie, auf Sandgrund, sehr häufig. *Dufo* 202, Seychellen und Amiranton, zahlreich. *Desh.* 53 Reunion. *Lien.* 53. Mauritius, *Möbius*. Wahrscheinlich schon bei *Bernardin St. Pierre* S. 102 erwähnt als „masse informe, molle et membraneuse, au contre de la quelle se trouve un seul os plat, un peu cambré.“

M I *Dolabella Hasselti* Rang var. *Quoy* et *Gaimard* Voy. de l'Astrolabe p. 306, pl. 23, Fig. 1—3, ilots aux cerfs, Ile de France.

B P *Dolabella teremidi* Rang Aplys. pl. 3, Fig. 1—3. *Desh.* 53 Reunion.

S† *Dolabella elongata* *Reeve* conchol. icon. XVI, Fig. 2, Seychellen, vielleicht nur Missbildung.

M B† **Dolabrifera Cuvieri* A. Adams, *Aplysia dolabrifera* *Cuvier* règne animal II, 1817, p. 398 Ile de France, von *Mathieu* gesammelt; *Lam.* an. s. vert. ed. 2, VII, p. 702; *Rang* Aplys. p. 51, pl. 4, Fig. 1—6, Ile Bourbon, in Brackwasserpfüten am

Meeresstrande, unter Steinen, mit Neritinen und einer kleinen *Avicula* zusammen.
Reeve conch. icon. XVI, Fig. 2. *Desh.* 53 Reunion. Fouquets, *Möbius*.

- B † *Dolabrifera Maillardi* *Desh.* Moll. de Reunion p. 53, pl. 7, Fig. 20—22 Reunion.
 S A M **Aplysia tigrina* *Rang* hist. nat. d. Aplysiens 1828, p. 57, pl. 9 und *Quoy et Gaimard*
 B † *Voy. de l'Astrolabe*, Moll. II, p. 308, pl. 24, Fig. 1, 2, Port Louis, Ile de France.
Desh. Lam. VII, p. 691. *Dufo* 202, Seychellen und Amiranten, selten, in Vertiefungen von Felsen an Meerpflanzen, 2—3 m tief. *Desh.* 54 Reunion. Fouquets, *Möbius*. Graubraun, schwarz marmorirt, mit weissen Warzen, deren Basis meistens schwarzbraun ist. Innenseite der Fusslappen mit grossen unregelmässigen schwarzen Flecken. 15 cm lang. — Kleinere Exemplare, in Spiritus nur 3 cm lang, mit Augenflecken ohne sonstige Zeichnung, sind vielleicht nur Jugendzustände derselben Art. Fouquetsriff, *Möbius*.

- M † **Aplysia nigrocincta* n. sp. Taf. 21, Fig. 3. In Spiritus nur 17 mm lang, 11 hoch, 7 breit, glatt, hellbraun, die freien Ränder der Fusslappen, der Rand der Fusssohle und der Rand des ziemlich grossen Loches im Mantel (Schilde) schwarz, meist kontinuierlich, zuweilen etwas fleckig. Schale stark gewölbt, verhältnissmässig gross, lebhaft bernsteingelb, durch den Schild röthlich durchscheinend, löffelförmig, mit seichtem Ausschnitt und stark eingebogener Spitze, 11½ mm lang, 8 breit, 5 hoch, mehr als die Hälfte der Länge des zusammengezogenen Thieres einnehmend. Erinert an *Apl. virescens* *Risso* Taf. 19, Fig. 5, unbekannten Fundorts, aber Färbung und Schalenform sind verschieden.

Fouquets, Mauritius, *Möbius*.

- M † *Aplysia Juliana* *Quoy et Gaimard* *ibid.* p. 309, pl. 24, Fig. 5, 6, Ile de France. Einfarbig grün.

Desh. 54 führt für Reunion noch *Aplysia maculata* auf, welche nach *Rang* selbst in der Tafelbai lebt.

- M † **Notarchus Indicus* *Schweigger* 1820. *Notarchus* sp. nov. *Cuvier* *régne animal* II, 1817, p. 398, pl. 11, Fig. 1. Ile de France, von *Matthieu* gesammelt. N. *Cuvieri* *Blainville* *manuel de malacolog.* 1825. *Aplysia gelatinosa* *Rang* *Aplys.* p. 70, pl. 33, Fig. 1—5 1828. *Quoy et Gaimard* *Voy. de l'Astrolabe*, moll. II, p. 312, pl. 24, Fig. 3, 4, Ilots aux cerfs, Ile de France. zahlreich auf dem weissen Korallensand des ruhigen Binnenriffes bei Fouquets, 2 m tief, *Möbius*, Taf. 21, Fig. 4:

Länge 3—4,5 cm, Breite 2 cm, Höhe 2,3 cm. Die Breite des Kopfes beträgt ungefähr ⅓ des aufgeblähten Leibes.

Vorderfühler abgestumpft, ohrförmig; Hinterfühler etwas länger, ohrförmig ausgehöhlt. Mund längsgespalten. Augen seitlich vor der Basis der Hinterfühler. Fuss vorn abgestumpft mit zwei Lappen, welche meist spitz auslaufen. Sohle mit einer Längsfurche in der Mitte. Der Körper wird wie aufgeblasen gehalten. Auf dem Rücken etwas vor der Mitte hat der Mantel eine Oeffnung, deren Ränder übereinandergelegt werden können. Wenn diese sich weit von einander entfernen, so heben sie sich nach vorn zu wie eine Klappe in die Höhe (Fig. 4a). Durch diese Oeffnung zieht die Schnecke Wasser zum Athmen ein und stösst es

rhythmisch (alle 5 Sekunden) wieder aus. Wenn sie aufrecht in einem Gefässe sitzt und nur eine dünne Wasserschicht (von 1 mm ungefähr) über sich hat, so treibt sie das Athemwasser springbrunnenartig gegen 5 mm hoch über die Oberfläche. Beim Ausathmen zieht sie den ganzen Körper plötzlich zusammen, um ihn gleich nachher wieder auszudehnen.

Die konischen Spitzen auf der Mitte des Rückens und an den beiden Seiten können niedergezogen werden.

Farbe: gelblichweiss durchscheinend, braungelb oder gelblichbraun marmorirt und punktirt. Manche Exemplare sind grünlichgrau mit olivengrünen Flecken. Die Fusssohle ist bläulich, ohne Flecken. Der ganze Mantel ist weiss punktirt, am dichtesten auf den konischen Spitzen, welche bei manchen Exemplaren hellgelb sind.

Bewegungen. Sie kriecht langsam, fällt leicht seitwärts um, schwimmt, sich kopfüber wälzend, durch Ausstossen des Wassers aus der Mantelhöhle. Nimmt man das Thier auf einige Augenblicke aus dem Wasser, so gelangt leicht Luft in die Mantelhöhle, welche die Schnecke verhindert, an den Grund zu kommen. Sie wälzt sich dann so lange kopfüber, bis sie die Luft aus der Mantelhöhle ausgetrieben hat.

M† * *Aclesia cirrifera* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. II, p. 311, pl. 24, Fig. 8 Ile de France.

10 cm lang, 3 cm breit, 3 cm hoch.

Graugrün mit braunen Pünktchen. Auf dem Rücken, an den Seiten und auf dem Kopfe hellblaue Flecke, die von einem gelben Ring umgeben sind. Viele dieser Pfauenaugenflecke sind von braunen Linien umzogen.

Der ganze Mantel ist mit konischen Papillen besetzt. Die grossen Rückenpapillen tragen kleinere Papillen. Auf den Tentakeln lange Papillen. Sohle schmal.

Beim Athmen erweitert und verengt sich die Mantelhöhle sehr kräftig. Die Kieme ist graugrün, mit braunen Streifen. — Die Schnecke sondert einen intensiv kobaltblauen Saft ab. Ein Theil dieses Saftes sank nieder und färbte weissen Korallensand blau, ein anderer blieb im Wasser gelöst.

Fouquets, Mauritius, *Möbius*.

MI * *Aclesia striata* Quoy et Gaimard Voy. Astrol. II, p. 315, pl. 24, Fig. 9, 10.

Kriechend 30—50 mm lang, 7—8 mm breit. Grünlichgrau mit weissen zackigen Warzen. Schwarze Flecke und einzelne blaue von einem braunen Ring umgeben. Diese werden erst unter dem Mikroskop deutlich. Der After liegt in einer kurzen Röhre im Hintergrunde der Kiemenhöhle. Das Athemwasser fliesst von vorn nach hinten.

Der Koth enthält Foraminiferenschalen.

Fouquets, *Möbius*.

Von Quoy und Gaimard auf schwimmenden Tang bei Neu-Guinea gefunden.

Pleurobranchidae.

SAMd **Umbrella Indica* Lam. 1812, *Chemnitz Conch. Cab. X. Fig. 1645, 1646* Mauritius
 M B Af und Bourbon. *Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 573.* Eydoux et Souleyet *Voy. de*
 P Au la Bonite *zool. pl. 27 (Anatomie).* — *Sganz. 13 île aux Sorciers bei Madagaskar.*
Dufo 202 Seychellen und Amiranten, in der Brandung, an kleinen Meerpflanzen,
2—3 m tief. Desh. 52 Reunion. Lien. 53 Mauritius. Fouquets, Möbius (Fuss dick,
gelb mit weissen runden Warzen, Sohle orange). Von *Robillard* in verschiedenen
 Färbungen der Innenseite braun, gelblich oder weiss, aus Mauritius erhalten. Miss-
 bildete Exemplare werden von *Lienard* und *Deshayes* erwähnt.

B† *Umbrella Cumingi Desh. moll. de Reunion p. 52, pl. 8. Fig. 4, 5 Reunion.*

M† **Pleurobranchus Peronii* Cuvier *Annales du Mus. d'hist. nat. V, pl. 18, Fig. 1, 2.*
Mem. anat. Mollusq. Ile de France (Gray moll. pl. 167, Fig. 8). *Quoy et Gaimard*
Voy. de l'Astrolabe zool. II, p. 296, pl. 22, Fig. 7—10 Port Louis, Ile de France,
auf Kiesgrund. Fouquetsbai, Prof. Möbius.

Dunkelpurpurroth, Rücken in der Mitte heller, Mantel überall mit niedrigen
 runden Warzen.

Sohle auch dunkelpurpurroth, nur etwas ins Bläuliche.

Schale auch lebhaft purpurroth gefärbt, sehr klein, nur 4 mm lang und 3
 breit, bei einem Exemplar, dessen Mantel in Spiritus noch 25 mm lang und 16 breit
 ist, im Leben gegen 50 lang und 30 breit. An den Spiritus-Exemplaren erscheinen
 die Warzen des Mantels intensiver roth gefärbt, als deren Zwischenraum.

Fouquetsriff, 29. Sept. 1874.

An einer andern, leider nicht mehr zu bestimmenden Art von *Pleurobranchus*,
 welche ebenda vorkommt, beobachtete Prof. *Möbius* rhythmische Contraction der
 Tentakel; die Warzen des Mantels derselben waren von einer braunen und einer
 weissen Linie umgeben, der Fuss braun mit weissen Flecken.

M† *Pleurobranchus mammillatus Quoy et Gaimard ibid. p. 294, pl. 22, Fig. 1—6 Port*
Louis, Ile de France, auf Kiesgrund. Desh. Lam. VII, p. 589.

M† **Pleurobranchus scutatus* n. Taf. 21, Fig. 8.

Mantel vorn tief eingeschnitten, ringsum den Fuss überragend, am Rand
 wulstig und etwas lappig, überall gleichmässig fein gekörnt, gelbbraun, mit dunkel
 purpurbraunen runden Flecken, welche sehr zerstreut stehen, zahlreicher nahe am
 Rande und im Umkreis des die Schale bedeckenden Manteltheils. Schale verhält-
 nissmässig sehr gross, länglich, oval, flach, dünn, blassröthlich, mit nach rechts ge-
 drehter Spitze und starken Anwachsstreifen. Fühler und Ecken des Kopfes dunkel
 purpurbraun. Kieme fast die ganze hintere Hälfte der Rumpfseite einnehmend.

Thier im Leben 18 mm lang, an Spiritusexemplaren 10 mm lang, $7\frac{1}{2}$ breit,
 der Fuss 6 lang und $3\frac{1}{2}$ breit, die Kieme $2\frac{1}{2}$ lang, Schale 6 lang, $2\frac{1}{2}$ breit.

Fouquets, Mauritius, *Möbius*.

Diese vermuthlich neue Art gleicht im Habitus der *Berthella porosa* Blainville, siehe Gray fig.
 of moll. an. pl. 43, Fig. 1, unterscheidet sich von derselben aber sofort durch die tiefe vordere Mantel-
 spalte. Es ist auffällig, dass die kleineren *Pleurobranchus*arten in der Regel verhältnissmässig viel

grössere Schalen haben als die grossen, vgl. z. B. Philippi moll. sicil. Taf. 20 und 21; ist etwa bei jungen Thieren die Schale verhältnissmässig und vielleicht auch absolut grösser als bei erwachsenen, so dass die Jungen, namentlich wenn auch andere Färbung dazukommt, bis jetzt für eigene Arten gelten? Eine Rückbildung der Schale im Leben jedes Individuums findet bekanntlich in noch weit höherem Grade bei den Nudibranchien statt.

Siphonariidae.

- S Af **Siphonaria variabilis* Krauss südafrik. Mollusken S. 59, Taf. 4, Fig. 4. Seychellen, Prof. Möbius.
- M† *Siphonaria punctata* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe zool. II, p. 341, pl. 25, Fig. 13, 14 Port Louis, Ile de France, an Felsen. *Desh. Lam.* ed. 2, VII, p. 559.
- M B† *Siphonaria plana* Quoy et Gaimard *ibid.* p. 345, pl. 25, Fig. 21, 22 Port Louis, Ile de France. *Desh. Lam.* ed. 2, VII, p. 558, und *Moll. de Reun.* 83.
- M B† **Siphonaria incerta* *Desh.* *Moll. de Reunion* p. 81, pl. 7, Fig. 16, 17 Reunion. *Lien.* 59 Mauritius. Auch im Sand, den Prof. Möbius von Mauritius mitgebracht.
- M B† *Siphonaria parvicostata* *Desh.* *Moll. de Reunion* p. 82, pl. 7, Fig. 18, 19 Reunion. *Lien.* 59 Mauritius.
- M B†? *Siphonaria ferruginea* Reeve *conchol. icon.* Fig. 26. *Desh.* 82 Reunion. *Lien.* 59 Mauritius. Auch von *Lamare-Picquot* dem Berliner Museum gegeben.
- Reeve giebt noch *Siph. concinna* zugleich vom Gambia und Mauritius an.
- M† **Gadinia Mauritiana* n. Taf. 22, Fig. 3.

Testa depressa, pentagono-orbicularis, costis radiantibus angustis elevatis subflexuosis numerosis, vertice fere mediano, recurvo, laevi, margine leviter crenulato; extus alba vel flavido-alba, intus alba vel virescenti-alba, impressione musculari hippocrepiformi et canaliculo dextro centromarginali distinctis.

Long. $7\frac{1}{2}$ —10, lat. $6\frac{1}{2}$ —9, alt. 2— $4\frac{1}{2}$ mm.

Fouquets, Mauritius, von Möbius und Robillard.

Deshayes *Moll. de Reunion* pg. 83, *Lienard* pg. 51 und *Nevill* handlist of Mollusca, Indian Museum p. 248 führen nur *G. Afra* Gray von Bourbon und Mauritius an; es ist das eine westafrikanische Art (*Patella Afra* Gmelin, le gadin Adanson pl. 2, Fig. 4 von Gorée) und die Artbestimmung daher bei der grossen Aehnlichkeit der Gadinien unter sich etwas zweifelhaft.

Nudibranchia.

Die von Prof. Möbius mitgebrachten Arten aus dieser Ordnung werden von Dr. R. Bergh in Kopenhagen bearbeitet werden, daher hier auf dieselbe nicht näher eingegangen wird.

Pulmonata.

(Marina.)

- M R Af *Onchidium Peronii* Cuvier *Ann. Mus. d'hist. nat.* V, p. 37, pl. 6, Fig. 1—3 Ile de France, an Felsen unter Wasser, *Peron.* *Peronia Mauritiana* *Blainville.*
- S†? *Onchidium* sp. *Nevill* *Proc. Z. S.* 1869, p. 65 Insel Mahé, unter Steinen, an feuchten Stellen, schwarzfleckig.
- S†? *Onchidium* sp. *Nevill* ebenda, Insel Praslin an Steinen, und an Blättern der *Lodoicea*, warzig, einfarbig.

Solenochonchae.

- Md RI Dentalium aprinum Lam. Martini Concholyol. Cab. I, Fig. 5B. Deshayes monogr. Dental. pl. 16, Fig. 18, 19. Sow. thes. III, pl. 223, Fig. 5, 6. Reeve conch. ic. XVIII, Fig. 2. *Sganz.* 3 Tintingue, Küste von Madagaskar, im Sand, selten.

Derselbe führt noch eine andere glatte Art von Tamatava, ebenfalls im Sande lebend, an, die er *D. corneum* Lam. nennt; was aber Lamarck als solches beschrieben, ist wahrscheinlich gar keine Molluskenschale; vielleicht meint *Sganzin* *D. eburneum* Linne (Martini I, Fig. 3A = *D. politum* Lam. = *annulatum* Sow. = *Indicum* Chenu), das im indischen Meer nicht selten ist. *Favanne* conchyliologie p. 636, pl. 5, Fig. E5 le grand Dentale à cannelures von Ile de France ist vermuthlich unser *aprinum*.

Bivalvia.

Ostracea.

- MB *Anomia*, zwei unbestimmte Arten ohne Beschreibung von *Deshayes* 36 für Reunion aufgeführt; schon *Bernardin St. Pierre* führt 1773 für Ile de France p. 109 eine Art als pelure d'oignon an.

- S?MBI *Ostrea denticulata* Born testac. Musei Caesar. Vindobon. 1780, tab. 6, Fig. 9, 10, copirt Encycl. meth. pl. 183, Fig. 3, 4. Chemnitz Conch. Cab. VIII, Fig. 672, 673, copirt Encycl. pl. 183, Fig. 1, 2. Reeve conch. icon. XVIII, Fig. 14. *Bernardin St. Pierre* Voy. à l'isle de France 1773, p. 108, l'huitre commun? (ebenda noch mehrere schwer zu bestimmende Arten). *Sganz.* 12 Mauritius auf Felsen, häufig gegessen. *Desh.* 35 Reunion.

Diese Art hat ihren Namen von den kleinen Zähnchen und Grübchen an der Innenseite des Randes nahe dem Schlosse, wie sie übrigens auch bei *Ostrea edulis* gar nicht selten vorkommen. *Dufo* 208, 209 nennt von den Seychellen zwei von ihm für neu gehaltene Arten, *dentifera* und *elliptica*, beide mit ähnlichen Zähnchen und beide auf Mahé und Praslin gegessen, beide an Manglebäumen, letztere auch an Felsen; möglicherweise ist eine oder beide identisch mit *denticulata*.

- Md?M **Ostrea violacea* *Desh.* moll. de Reunion 1863, p. 35, häufig an Felsen, der vorigen B† ähnlich, aber ohne die genannten Zähnchen. *Lien.* 71 Mauritius. Auch von Prof. Möbius bei Fouquets gesammelt. *Ostrea inaequalis* Sow. bei *Reeve* Fig. 82 von Mauritius und Madagaskar ist vielleicht dieselbe Art.

- MB Au *Ostrea numisma* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 222 von Australien. *Desh.* 36 mit Fragzeichen von Reunion. *Lien.* 71 Mauritius.

- M† *Ostrea Barclayana* Sow. bei *Reeve* Fig. 77 Point de Flacq, Mauritius.

- S† *Ostrea crocea* *Dufo* Annal. d. scienc. nat. (2) XIV, 1840, p. 209 Mahé, selten, 3 m tief, kreisrund, innen roth marmorirt.

- MB† *Ostrea cucullina* *Desh.* moll. de Reunion p. 36. *Reeve* Fig. 2 Bourbon und pl. 31, Fig. 2c, d Barclay island. Nur 20 mm gross, der *O. cochlear* des Mittelmeeres ähnlich. Vielleicht mit der vorhergehenden zusammengehörig.

- S?I *Ostrea echinata* Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe III, p. 455, pl. 76, Fig. 13, 14 (von Amboina). *Desh.* Lam. an. sc. vert. ed. 2, VII, p. 237. *Reeve* Fig. 79, bei beiden *spinosa* genannt. Wahrscheinlich ist es diese Art, welche *Dufo* 208 als

O. spinosa von Mahé, an Felsen, die nur bei der Fluth vom Meer bedeckt sind angiebt. Klein, mit schwarzen Stacheln.

- MI **Ostrea cerata* Sow. bei Reeve Fig. 71 von Diego Garcia (Chagos). Zu dieser Art möchte ich eine *Auster* rechnen, welche *Robillard* von Mauritius eingesandt hat: sie ist weiss, die linke Schale fast ganz an Madreporen angeheftet, der Vorderrand steil aufgebogen, stark gefaltet; das vorliegende Exemplar hat in beiden Schalen die parallelen Rippen und Furchen seiner Unterlage angenommen, wie man es öfters bei *Anomien* findet.

- Md MI *Ostrea radiata* Valenciennes. Chemnitz Conch. Cab. VIII, Fig. 660 („*Ostrea parasitica Indiae orientalis*“), kopirt Encycl. pl. 184, Fig. 4. *O. cristata* var. b. Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 222 Ile de France (nicht *O. radiata* Lam. nro. 48, die zu *hyotis* gehört). *O. bicolor* Hanley Proc. Zool. Soc. 1845; conchol. miscell. pl. 1, Fig. 2; cat. of bivalve shells p. 304. *O. Orientalis* Jay catal. ed. 4, 1850. *Sganz.* 12 Madagaskar, häufig, wird sehr gross, von den Europäern gegessen. *O. vitrefacta* Sow. bei Reeve Fig. 180 Rivière de la rempart, Mauritius, häufig gegessen, dürfte dieselbe sein.

Diese Art hat viel Aehnlichkeit mit *O. depressa* Phil. aus dem Mittelmeer, welche auch mit ähnlichen breiten dunkelpurpurnen Strahlen z. B. in Dalmatien vorkommt.

- SAMR *Ostrea (Alectryonia) hyotis* L. Chemn. VIII, Fig. 685. Encycl. pl. 186, Fig. 1.

- I Reeve Fig. 7. *Dufo* 207 Seychellen und Amiranten, an Madreporen. Breit gerundet, mit zahlreichen, etwas welligen Falten, dunkelroth. *O. nobilis* Sow. bei Reeve Fig. 81 Barclay island, Mauritius, scheint nicht davon verschieden zu sein.

- SAGR *Ostrea (Alectryonia) crista-galli* L. Chemn. VIII, Fig. 683, 684. Encycl. pl. 186,

- I Fig. 6–8. Reeve Fig. 22. *Dufo* 208 Seychellen und Amiranten, an Madreporen, selten. Durch *Robillard* auch von den Agalegainseln (zwischen Seychellen und Mauritius) eingesandt. Gelbbraun oder dunkelviolet, mit wenigen hohen scharfkantigen Falten.

- CI *Ostrea (Alectryonia) frons* L. Chemn. VIII, Fig. 686. Reeve Fig. 47. *O. limacella* Lam. *Lien.* 112 Cargados. Länglich mit klammerartigen Fortsätzen Rhizophorenzweige umfassend, häufig im indischen Ocean.

- SAMB **Spondylus aurantius* Lam. Sow. I. thes. Fig. 1, 2. Reeve conch. icon. IX, Fig. 10 Seychellen. *Dufo* 209 Seychellen und Amiranten, zahlreich, an Madreporen oder Muscheln auf Sand- oder Schlammgrund, 3 m tief. *Sganz.* 11 Mauritius, an Korallen. *Desh.* 34 Reunion. Auf den Seychellen auch von Prof. *Möbius* gesammelt *Lienard's* 70 Sp. radians von Mauritius ist vielleicht dieselbe Art. Lamarek selbst giebt seinen Sp. *aurantius* aus Amerika an.

- MBI *Spondylus Nicobaricus* Chemn. Conch. Cab. VII, Fig. 469. Sow. thes. Fig. 48. Reeve Fig. 50. *Desh.* 35 Reunion. *Lien.* 70 Mauritius. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.

- CM *Spondylus coccineus* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 188. Reeve Fig. 44. *Lien.* 70 Mauritius und 112 Cargados. Auch durch *Robillard* von Mauritius erhalten.

SI **Spondylus croceus* Chemn. VII, Fig. 463. Lam., Reeve Fig. 19. Seychellen, Prof. Möbius.

MBRI **Spondylus zonalis* Lam. Sow. thes. Fig. 12, 18, 27 und 60. Reeve Fig. 29 Maur. Chenu illustr. conchyliolog. pl. 7, Fig. 3, 4. Desh. 34 Reunion. Lien. 70 Maur. Fouquets, Möbius.

B† *Spondylus concavus* Desh. moll. de Reunion p. 34, pl. 5, Fig. 1—3 Reunion.

MRI *Spondylus nudus* Chemn. XI, Fig. 1989, 1990. Sow. thes. Fig. 39, 40. Reeve Fig. 2 Mauritius. Lien. 70.

Lienard 70 führt noch *Sp. tenuispinosus* Sow. (thes. Fig. 37, Reeve Fig. 23) und *spectrum* Reeve (Fig. 49) von Mauritius auf, beide sind nach philippinischen Arten aufgestellt. Im Allgemeinen sind die Arten von *Spondylus* ihrer unregelmässigen Form und einer gewissen Variabilität in der Färbung wegen sehr schwer scharf gegeneinander abzugrenzen, daher mögen oft von verschiedenen Autoren unter verschiedenen Namen dieselben Arten gemeint sein und auch umgekehrt.

MBAf **Plicatula multiplicata* Desh. moll. de Reunion p. 33, pl. 5, Fig. 5, 6 Reunion. Lien. 71 Mauritius. Fouquets, Möbius. Pl. Australis Krauss südafrik. Moll. S. 30 ist nach vom Autor erhaltenen Exemplaren diese Art.

MBAn *Plicatella imbricata* Menke specim. moll. Novae Hollandiae 1843, p. 55. Sow. thesaur. pl. 90, Fig. 6. Reeve XIX, Fig. 5. Desh. 33 Reunion. Lien. 71 Mauritius.

B† *Plicatula complanata* Desh. loc. cit. p. 33, pl. 5, Fig. 4 Reunion.

MAfI *Plicatula ramosa* Lam. Chemn. VII, Fig. 479. Sow. thesaur. Fig. 1. Reeve XIX, Fig. 5. Lien. 71 Mauritius.

Auch an der Küste von Mossambique durch Prof. Peters gesammelt, daher an der Bestimmung nicht zu zweifeln. Dagegen ist *Pl. cristata* und *depressa* Lam., welche Lienard ebenfalls für Mauritius anführt, die erstere sicher, die zweite wahrscheinlich amerikanisch.

SMRI *Pedum spondyloideum* Chemn. VII, Fig. 669, 670. Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 112 Ile de France. Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe zool. III, p. 450, pl. 76 (Anatomie) Seychellen, Sow. thes. pl. 91, Fig. 1—3. Reeve XI, Fig. 1. Sgan. 11 Mauritius, selten. In einem Korallenblock aus Mauritius von Robillard eingesandt. Ehrenberg sammelte die Art auch im rothen Meer.

MBAf *Pecten noduliferus* Sow. thes. pl. 13, Fig. 38, 39 und 94. *P. corallinoides* (Orb.) Reeve conch. ic. VIII, Fig. 27. Desh. 31 Reunion. Lien. 69 Mauritius.

Ähnlich dem bekannten *P. nodosus* L. aus Westindien, aber kleiner bleibend und schwächer radial gestreift, mit schwächeren Knoten und etwas höher (länglicher) als gleich grosse Exemplare von *P. nodosus*, immer mit zahlreichen weissen Flecken und schmalen weissen Ziczaclinien. Auch bei Zanzibar gefunden.

MI *Pecten mirificus* Reeve Fig. 102 (von Amboina). Durch Robillard aus Mauritius eingesandt, mit der Angabe, er sei im Magen eines Fisches gefunden, der in einer Tiefe von 40 Faden gefangen worden. Lien. 72 *Pectea* ohne Artnamen ist daher wohl derselbe.

Das Robillard'sche Exemplar, unsere Taf. 22, Fig. 5, ist kleiner als die Abbildung bei Reeve, nur 18 mm hoch und 19 breit; auf der rechten Schale sind 11 annähernd gleiche, auf der linken ebensoviele aber abwechselnd breitere und schmalere Rippen vorhanden; die meisten Rippen der rechten und nur die breiteren der linken sind mit einzelnen sehr starken Knoten besetzt, welche namentlich auf der linken Schale hoch aufgerichtet, kugelig, aber etwas abgeflacht und unten hohl sind, so dass sie die Gestalt einer Blüthe von *Calceolaria* darbieten. Farbe aus lebhaft Roth und Weiss gemischt,

das Weiss gegen die Wirbel zu vorherrschend; einige Knoten weiss, die meisten roth. Die Ohren sehr entschieden ungleich.

SAMI *Pecten pallium* L. Chemn. VII, Fig. 607. Sow. thesaur. Fig. 148—150. Reeve Fig. 63. Chenu illustr. pl. 26, Fig. 1—5. *Bernardin St. Pierre* 110 le manteau ducal. *Dufo* 210 Seychellen und Amiranten, an Felsen, ohne Byssus, selten. *Sganz.* 11 Mauritius, nicht selten.

MR Af **Pecten porphyreus* Chemn. VII, Fig. 632. *P. aurantius* Lam., senatorius (non Chemn.) Reeve Fig. 81 Grande Baie, Mauritius, Prof. *Möbius*. Wahrscheinlich *Lien.* 69 *P. senatorius* und *asperrimus* von Mauritius.

Durch die dreitheiligen dicht beschuppten Rippen und die schmälere winklig vertieften Zwischenräume, in denen öfters noch schwache Rippen auftreten, vom ächten senatorius Chemnitz (florens Lam., Delessert recueil pl. 15, Fig. 1) unterschieden und sehr ähnlich dem australischen *P. asperrimus* Lam. (Australis Reeve Fig. 103b); von der Küste von Mossambique und aus dem rothen Meer im Berliner Museum vertreten.

CMI *Pecten irregularis* Sow. thes. Fig. 51, 52. Reeve Fig. 19. *Lien.* 71 Maur. und 112 Cargados.

MRAfI *Pecten squamosus* Gmel. Chemn. VII, Fig. 629 (sulfureus). Sow. thes. Fig. 48—50. Reeve Fig. 65. *Lien.* 69 Mauritius. In verschiedenen Farbenvarietäten: violett, schwefelgelb und gelblichweiss, von *Robillard* aus Mauritius eingesandt.

MR Af *Pecten lividus* Lam. Sow. thes. Fig. 61, 89 und 91. Reeve Fig. 71. *P. serratus* Reeve Fig. 46. Zahlreich von *Robillard* eingesandt, von verschiedener Färbung und Grösse. Unsere Taf. 22, Fig. 6—10.

Rippen sind eigentlich dreierlei vorhanden: 10—11 stärkere, meist mit Schuppen, dazwischen je eine etwas schwächere und dann noch je 2—5 ganz schwache zwischen denselben. Die Farbe ist vorherrschend gelblichweiss mit mehr oder weniger Violett gemischt, und gegen den Wirbel zu mit dunkelvioletten bis schwärzlichen Flecken zwischen den stärkeren Rippen, nie auf diesen, in verschiedener Anzahl und Grösse; daneben finden sich auch noch dieselben schmalen weisslichen oder hier auch hellgelben quer im Ziczac verlaufenden Binden, welche für *P. squamosus* so charakteristisch sind. Steht dem vorhergehenden noch sehr nahe.

MP *Pecten cuneolus* Reeve Fig. 131. Aus Mauritius von *Robillard* erhalten, unsere Taf. 22, Fig. 11—13.

Schale mit 14 deutlich getrennten Rippen, welche selbst wieder kleinere beschuppte Rippchen tragen. Färbung dreierlei: grauweiss mit kreideweissen Ziczacbinden und mit schwarzen Flecken, oder schwefelgelb mit weissen Ziczacbinden oder rosenroth mit weisslichen undeutlichen Ziczacbinden und mit wenig vortretenden etwas dunklern Flecken, 12 mm hoch (lang) und 11—12. breit (eigentl. lang), aus Mauritius von *Robillard*.

M *Pecten rubromaculatus* Sow. thes. Fig. 34. *Lien.* 69 Mauritius.

MBR *Pecten concinnus* Reeve Fig. 167 (vom rothen Meer). *Desh.* 31 Reunion. *Lien.* 69 Mauritius. Scheint dem *P. sanguinolentus* ähnlich zu sein.

BI *Pecten inaequalis* Sow. thesaur. Fig. 193—195 (von den Philippinen). *Desh.* 31 Reunion. Die beiden Ohren ungefähr gleich.

MI *Pecten spectabilis* Reeve Fig. 128. Aus Mauritius von *Robillard* erhalten, ohne rothe Zeichnung, sonst gut übereinstimmend.

B† *Pecten elegantissimus* *Desh.* moll. de Reunion p. 32, pl. 4. Fig. 11, 12. Mit 9 viergespaltenen Rippen.

Deshayes 31, 32 erwähnt für Reunion noch 5 weitere Arten, nach halben Schalen, von denen er 3 als *P. textilosus*, *cauteriatus* und *rosaceus* benennt, aber ohne sie zu beschreiben; *Lien.* 69

wiederholt dieselben 3 Namen für Mauritius, aber auch ohne ein beschreibendes Wort, nur setzt er zu *textiliosus* als synonym „*suratus* Sow.“; wenn das *serratus* heissen soll, so ist damit vielleicht die oben geschilderte Art gemeint, die andern vielleicht Farbenvarietäten derselben oder von *P. cuneolus*. Ferner nennt *Lienard* noch *P. radula* L., *gibbus* L., *nodosus* L., *ornatus* Lam. und *corallinoides* Orb. für Mauritius: der erstere ist im indischen Archipel nicht selten, z. B. bei Singapore häufig, aber obwohl gross und nicht wohl zu verwechseln, doch bis jetzt sonst noch nicht von Ostafrika bekannt, so dass ich Anstand nehme, ihn nur auf diese Angabe hin aufzunehmen; die 4 andern sind entschieden atlantisch, hauptsächlich westindisch; betreffs *nodosus* und *corallinoides* mögen *P. noduliferus* und vielleicht *mirificus*, betreffs *ornatus* vielleicht *P. concinnus*, *inaequivalvis* oder auch *serratus* Anlass zur Verwechslung gegeben haben.

Hinnites. *Lien.* 70 führt *H. sinuosus* Sow. von Mauritius an; es ist das eine Art der Nordsee = *distortus* *Dacosta* = *Pecten pusio* der englischen Autoren (nicht *pusio* aus dem Mittelmeer = *multilineatus* *Poli*), und diese kann nicht bei den Maskarenen vorkommen. Vielleicht meint *Lienard* *H. corallinus* Sow. thes. II, Fig. 71. *Reeve* VIII, Fig. 1, welcher ostafrikanisch sein soll.

SMBI Lima (*Ctenoides*) *tenera* Chemn. Conch. Cab. VII, Fig. 653. *Encycl.* 206, 3. Sow. thes. pl. 21, Fig. 2, 3, 10, 11, 13. *Reeve* conch. ic. XVIII, Fig. 7. *L. annulata* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, p. 117 Ile de France, von *Mathieu* gesammelt. *Sganz.* 11 Mauritius, auf Steingrund. *Desh.* 31 Reunion. *Lien.* 70 Maur.

Ohne Zweifel ist es auch diese Art, welche *Dufo* 211 als *L. glacialis* Lam. aus dem Innern von Madreporen bei Mahé, Seychellen, anführt, denn die ächte *L. glacialis* Lam. = *scabra* *Born* ist westindisch.

S?BAf Lima (*Radula*) *Sowerbyi* *Desh.* moll. de Reunion p. 30 (*L. squamosa* var. Sow. thes. Fig. 18).

Kaum von der europäischen *L. squamosa* verschieden. *Dufo's* *L. squamosa*, sehr selten bei Mahé, Seychellen, auf Felsengrund, ohne Byssus, ist vermuthlich auch diese oder vielleicht die folgende Art. Aehnliche Formen kommen auch an der Küste Ostafrika's vor.

BRI Lima (*Radula*) *bullifera* *Desh.* ibid. p. 30, pl. 4, Fig. 9, 10. *Reeve* Fig. 27 Reunion. Dieselbe Art auch aus dem indischen Ocean bis Celebes, Flores und Neu-Guinea im Berliner Museum vertreten. Gegen 20 Rippen mit kugelförmig gewölbten Schuppen.

BR Lima (*Radula*) *paucicostata* Sow. thes. Fig. 17. *Reeve* Fig. 9. *Desh.* 30 Reunion. Auch im rothen Meer von Ehrenberg gesammelt. Nur 12 Rippen.

MI Lima (*Mantellum*) *fragilis* Gmelin Chemnitz Conch. Cab. VIII, Fig. 650. Sow. thes. Fig. 34—36. *Reeve* Fig. 18. *L. linguatula* Lam. *Lien.* 70 Mauritius.

S†? Lima (*Mantellum*) *natans* *Dufo* Ann. sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 211 Mahé, auf schlammigem Grund, sehr selten. Vielleicht dieselbe wie die vorigen.

BI Lima (*Mantellum*) *Cumingi* Sow. thesaur. Fig. 24, 25 von den Philippinen. *Reeve* Fig. 19. *Desh.* 31 Reunion.

MAf *Lima (*Mantellum*) *tenuis* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1870, p. 793, pl. 48, Fig. 18 vom rothen Meer. *Fouquets* auf Mauritius, Prof. *Möbius*.

Klappt weit, schwimmt lebhaft stossweiss, kriecht mittelst der Cirren. Diese werden beim Schwimmen lang ausgestreckt. Während der Ruhe sind sie einwärts gerollt.

Die ringförmigen Anschwellungen der Tentakelcirren enthalten Schleimzellen, welche bei Berührung klebrige Schleimfäden absondern. Greift man mit dem Finger zwischen die Cirren, so hat man eine ähnliche Empfindung wie bei der Berührung der Tentakel einer Aktinie (*Möbius*).

Lienard führt noch *L. fasciata* L. von Mauritius an; es bleibt mir zweifelhaft, welche Art er darunter versteht, vielleicht die südafrikanische *rotundata* Sow. Fig. 19, *Reeve* Fig. 5 oder die polyneisische *inflata* Lam., *Reeve* Fig. 17.

Heteromya.

Aviculidae.

- MBRI *Avicula crocea* Chemnitz Conch. Cab. XI, Fig. 2023—2026. Lam. an. sans vert. VII, no. 6. Reeve conch. ic. X, Fig. 57. *Mytilus hirundo* Linne zum Theil. *Sganzin* 10 Ile de France, zwischen Miesmuscheln, mittelst des Byssus an Felsen, angeheftet. *Desh.* 29 Reunion. *Lien.* 67 Mauritius.
- MI **Avicula semisagitta* Lam. Reeve Fig. 64. Black river, Mauritius, *Möbius*.
- MRAfI **Avicula ala-corvi* Chemnitz Conch. Cab. VIII, Fig. 727 = *Encycl.* pl. 177, Fig. 6. Reeve Fig. 44. Mauritius, *Möbius*.
 Von Aden durch Prof. Fritsch, von der Bougainvilleinsel durch die Expedition der „Gazelle“ erhalten.
- SAu **Avicula malleoides* Reeve conchol. icon. Fig. 46 (von Australien). Seychellen, *Möbius*.
- B†? *Avicula vespertilio* *Desh.* *Encycl. meth. vers* II, p. 99. Lam. ed. 2, VII, p. 102. *Desh.* moll. de Reunion 29, ohne Beschreibung.
- SAMd **Avicula* (*Meleagrina*) *margāritifera* Linne, die ächte Perlenmuschel. Chemnitz
- MBRAf Conch. Cabin. VIII, Fig. 718 = *Encycl. meth.* pl. 177, Fig. 4. Reeve Fig. 21.
- IP Au *Bernardin St. Pierre* p. 109 l'huitre perlière, Ile de France und St. Marie: „dans les hauts fonds; mangée par les Européens“. *Sganz.* 11. — Seychellen und Amiranten, häufig an Madreporen, die älteren tiefer; können sich von ihrem Byssus ablösen und einen neuen bilden, *Dufo* 213. — Reunion, *Deshayes* 29. — Fouquets auf Mauritius, bis 70 mm hoch und 67 breit, mit grünbraunem Rand, *Möbius*.
- MdMAf *Perna ephippium* Linne Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 576. Reeve conch. icon. I XI, Fig. 8. *Sganz.* 10 Ile de France und St. Marie. Auch von *Robillard* aus Mauritius erhalten.
- MdMI *Perna avicularis* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, n. 4. Delessert recueil pl. 14, Fig. 3. Ile de France und St. Marie, *Sganz.* 10.
- SRAfI **Perna vitrea* Reeve Fig. 10 vom rothen Meer. Seychellen, *Möbius*.
 Auch von Mossambique und von Amboina im Berliner Museum, kaum hinreichend verschieden von der vorhergehenden, nicht so sehr dünnchalig als der Reeve'sche Name andeutet.
- SMdM *Perna sulcata* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, no. 8 von Neuholland. *Sganzin* 10 Au St. Marie. *Dufo* 212 Mahé und Praslin, Seychellen.
 Zweifelhafte Art.
- MB† *Perna Maillardi* *Desh.* moll. de Reunion p. 29, pl. 4, Fig. 13, 14. *Lien.* 67 Mauritius.
- MdMB *Perna vulsella* Lam. an. s. vert. ed. 2, VII, no. 9. *Encycl.* pl. 175, Fig. 1. *Sganz.* 10 R Af von Madagaskar; Krauss südafrikanische Mollusken p. 28 von Natal; Reeve Fig. 21. *Sganz.* 10, St. Marie, sehr selten. *Desh.* 30 Reunion. *Lien.* 67 Mauritius.
 Ebenfalls zweifelhaft, da *vulsella* Lam. nach Mörch eine amerikanische Art ist.
- BAf *Perna dentifera* Krauss südafrikanische Mollusken p. 28, Taf. 2, Fig. 9 von Natal. *Desh.* 30 Reunion.
- SA†? *Perna rupella* *Dufo* Ann. sc. nat. (2) XIV, 1840, p. 211, Seychellen und Amiranten,

häufig an Felsen, die nur bei der Fluth von den aufspritzenden Wellen benetzt werden.

SA †? *Perna planerbis* Dufo ibid. p. 212, Seychellen und Amiranten. an kleinen Felsstücken auf Schlammgrund.

MdMR *Perna isognomon* Linne Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 584, mit rechtwinklig ab-
Af I stehendem langem Fortsatz nach hinten. *Sganzin* 10 Ile de France und St. Marie.
Perna isognomon var. *P. femoralis* Lam. Chemn. Fig. 582, Fortsatz kürzer. *Sganz.* 10
und *Lien.* 67 Mauritius.

Perna isognomon var. *P. canina* Lam. Rumph amboinische Raritätenkammer Taf. 47,
Fig. J. Reeve conch. ic. Fig. 24 isognomon. Schief und verbogen. *Sganz.* 10,
Ile de France und St. Marie.

MdRI *Valsella lingulata* Lam. Chemn. VII, Fig. 11. Eucycl. pl. 178, Fig. 4. Reeve XI,
Fig. 6. *Sganz.* 12, St. Marie, Madagaskar.

SR Af *Valsella spongiarum* Lam. Chemn. VI, Fig. 8, 9; Reeve XI, Fig. 15. *Dufo* 213
Mahé und Praslin, Seychellen, in Schwämmen auf Schlammgrund.

Pinnidae.

SMR **Pinna aequilatera* n. sp. Taf. 22, Fig. 4. *Pinna saccata* (non Linne) Chemnitz
Af Conch. Cab. VI, Fig. 779 von Südafrika.

Testa subaequilatera, trigona, leviter costulata, costulis circa 17 subundulatis, laevibus, interstitia subaequantibus, concentrice dense striata, pallide grisea; fissura apicali distincta; margo dorsalis leviter concavus, ventralis subrectilineus, ambo subaequales, margo terminalis transversus, subrectilineus, utrinque ad angulos leviter rotundatus.

Long. ab apice ad medium marginis terminalis 165 mm, long. marginis dorsalis 160, ventralis 170, marginis terminalis 95, crassitudo 24 mm.

Mauritius, Prof. Möbius.

Von den bei Reeve abgebildeten *Pinna*-Arten ist dessen *muricata* Fig. 23 sehr ähnlich, vielleicht dieselbe, aber mit Stacheln bewaffnet; eine solche hat auch Ehrenberg vom rothen Meer und Prof. Peters von Mossambique mitgebracht, die letzte ist von mir in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1879, S. 741 als *P. muricata* aufgeführt worden; es scheint mir nicht unmöglich, dass dieselbe Art bald mit, bald ohne Stacheln vorkommt. Was aber gewöhnlich als *P. muricata* aus Westindien betrachtet wird, als solche z. B. auch von Verkrüzen versandt wurde, ist etwas ganz Anders, ohne Apicalspalte, also zu einer andern Untergattung (*Pennaria*, *Atrina*) gehörig und schliesst sich zunächst an *seminuda* Lam., *ramulosa* und *alta* Reeve, auch *nobilis* Chemnitz Fig. 775 (non Linne). Auch die südafrikanische *P. squamifera* Sow., Krauss südafr. Moll. Taf. 2, Fig. 8 gehört in diese Gruppe. Der unsrigen dagegen ähnlich sind noch *P. fumata* Reeve Fig. 27, die junge, nur viel schmaler, aber nicht die alte, Fig. 28, und ferner *P. hystrix* Reeve Fig. 60, diese aber ungleichseitiger und sehr stachlig.

Vielleicht gehört auch *P. flabellum* Lam. *Sganz.* 10 von Madagaskar hierher.

CMB *Pinna Kraussi* Hanley. *P. squamifera* (Sow.) Krauss südafrikanische Mollusken S. 27.
Af Taf. 2, Fig. 8. *Desh.* 29 Reunion. *Lien.* 67 und 112, Mauritius und Cargados.

Md Af *Pinna (Atrina) nigrina* Lam. Chemn. VIII, Fig. 774 („*Perna nigra fumigata*“). Reeve
Fig. 4. *Sganz.* 10, Ile aux sorciers bei Madagaskar, gut zu essen.

Md MR Pinna (Cyrtopinna) bicolor Chemn. VIII, Fig. 780. Reeve Fig. 17. *P. dolabrata*
Af I *Sganz.* 10, Ile, Ile de France und St. Marie. Auch im rothen Meer von Ehrenberg
gesammelt.

SAMB Pinna (Streptopinna n.) saccata Linne Encycl. meth. pl. 200, Fig. 4; Reeve Fig. 6
R Af I Seychellen und Amiranten, senkrecht in Höhlungen der Madreporen, ohne Byssus,
Dufo 215 Reunion. *Desh.* 29. Mauritius, *Lien.* 68 und *Caldwell.* Im rothen Meer
von Ehrenberg, bei Amboina von mir, auf den Tongainseln von der Expedition der
Gazelle gefunden.

Diese Art unterscheidet sich von allen andern der Gattung Pinna durch die unregelmässige in
jedem Exemplar einigermassen anders verdrehte Form und verdient daher als eigene Gruppe einen
besondern Namen; eine Spalte an der Spitze ist nicht vorhanden.

Mytilidae.

SAM *Septifer bilocularis Linne Chemn. Conch. Cab. VIII, Fig. 736, 737. Reeve conch.
Af I ic. X, 62 *M. Nicobaricus.* — *Tichogonia Wiegmanni* Küster. Seychellen und
Amiranten, häufig an Felsen, Madreporen und Conchylien, *Dufo* 215. — Fouquets
und Grande Baie auf Mauritius, *Möbius.* Vom rothen Meer bis Nangasaki verbreitet.
MBR Septifer Kraussi Küster neue Ausgabe von Chemnitz Taf. 6, Fig. 1—6, Krauss
südafr. Moll. p. 26; Reeve Mytilus Fig. 40. *Des.* 25, Reunion. *Lienard* 66
Mauritius.

Wenig von der vorigen verschieden, rothbraun statt grün. Auch *Mytilus exustus* Born (non
Linne) und *M. crenatus* Chemnitz Conch. Cab. VIII, Fig. 744 = Encycl. p. 220, Fig. 1 dürften
hierher gehören.

Md M *Septifer excisus Wiegmann Arch. Nat. 1837 S. 49. Reeve Mytilus Fig. 13 von Ma-
Af dagaskar. Septifer fuscus Recluz 1848. Fouquets und Grande Baie auf Mauri-
tius, *Möbius.*

Auch Wiegmann's Original Exemplare kamen vielleicht von da, da sie von *Lamare-Piquot* ge-
sammelt sind. Durch den Ausschnitt an der Scheidewand, stärkere Wölbung, gröbere Sculptur und
hellbraune Farbe leicht zu unterscheiden.

MdMB Mytilus sp. eine der europäischen (edulis) analoge Art, von *Sganzin* 9 für Ile de France, Bourbon und
St. Marie bei Madagaskar angeführt, ist mir nicht näher bekannt.

SMd? *Modiola auriculata Krauss südafr. Moll. S. 20, Taf. 2, Fig. 4. Martens Südsee-
MBR conchylien S. 263. *Desh.* 23 Reunion. *Lien.* 66 Mauritius. Fouquets auf Mauritius
Af P und Seychellen, *Möbius.* Vermuthlich meint *Sganz.* 9 dieselbe Art unter seiner
M. semifusca von Ile de France und St. Marie, von Madreporen.

M. semifusca Lam. wird gewöhnlich für die amerikanische *Guyanensis* Lam. (Brasiliensis
Chemn. XI, Fig. 2020) genommen, aber *Lamarck* selbst giebt seine Art mit Fragezeichen von Ile de
France an (an. s. vert. ed. 2, VII, p. 22) und der Beschreibung nach könnte es immerhin unsere
auriculata sein. Diese ist häufig an der Ostküste Afrika's vom rothen Meer an bis Natal; an der Küste
von Koromandel findet sich die ähnliche, aber länger gezogene *M. microptera* *Desh.* (Chemnitz VIII,
Fig. 760).

S?MB Modiola cinnamomea Chemn. Conch. Cab. VIII, Fig. 731. Encycl. pl. 221, Fig. 4.
R Af Descript. de l'Egypte, Moll. pl. 11, Fig. 2. *Lam.* an. s. vert. ed. 2, VII, Fig. 25,
Ile de France. Reeve conch. ic. X, *Lithodomus* Fig. 5. *Desh.* 23 Reunion. *Lien.*
66 Mauritius. Vielleicht gehört *M. arcuata* *Dufo* 215, ohne Beschreibung, aus dem
Innern der Madreporenblöcke, ohne Byssus, von den Seychellen, auch hierher.

- B† *Modiola parasitica* Desh. moll. de Reunion p. 24, pl. 4, Fig. 1—3. Langgezogen, aber nicht fingerförmig abgerundet, auffällig an die kalifornische *M. (Adula) falcata* Gould 1851 = *Lithodomus Gruneri* Phil. 1857 erinnernd. *Maillard* fand sie in leeren Höhlen von *Teredo*, an Ankerstücken in einer Tiefe von 25 Faden.
- SAMB **Lithodomus teres* Philippi Abbildungen neuer Conchylien Taf. 1, Fig. 3. Chemnitz AfI Conch. Cab. VIII, Fig. 729. *Mytilus lithophagus* Linne zum Theil. Desh. 23 Reunion. *Dufo* 215 *lithophaga* Seychellen und Amiranten, im Innern der Madreporen. *Lien*. 66 Mauritius. Seychellen, *Möbius*. Auch von *Caldwell* auf Mauritius gesammelt.
- Die Exemplare von den Seychellen stimmen näher mit *L. gracilis* Phil. ebenda Taf. 2, Fig. 1, Reeve *Modiola* Fig. 4 überein, welche übrigens nicht wohl als Art von *teres* getrennt gehalten werden kann. Die Art kommt auch im indischen Archipel vor, ich fand sie bei Batavia und auf der kleinen Insel Adenave östlich von Flores.
- SAf *Lithodomus plumula* Hanley Reeve conch. ic. X. *Modiola* Fig. 23. Seychellen, von Baron v. d. Decken dem zoologischen Museum in Berlin gegeben.
- B† *Modiolaria difficilis* Desh. moll. de Reunion p. 23, pl. 3. Fig. 22—24 Reunion.
- MAu? *Modiolaria Cumingiana* Dunker Proc. Zool. Soc. 1856; Reeve *Modiola* Fig. 63 (von Australien. *Lien*. 66 Mauritius.
- MB† **Julia* (Gould 1861) = *Prasina* (Desh. 1863), **borbonica* Desh. moll. de Reunion p. 29, pl. 4, Fig. 4—8, am Strande gefunden, wahrscheinlich aus der Tiefe. Fouquets auf Mauritius, einzelne Schälchen im Sande, *Möbius*.

Arcacea.

Arcidae.

- MB Af *Arca Kraussi* Philippi Abbild. neuer Conch. Taf. 5, Fig. 8—10; Krauss südafr. Moll. S. 14, Taf. 1, Fig. 13, von Natal. Desh. 22 Reunion. *Lien*. 68 Mauritius.
- MR **Arca Arabica* Rüppell, Philippi ebenda Taf. 4, Fig. 2; Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 522; Descript. de l'Egypte pl. 10, Fig. 12, aus dem rothen Meer. Bei Fouquets auf Mauritius von Prof. *Möbius* gesammelt. Vermuthlich auch *Bernardin St. Pierre* 110 arche de Noé.
- SAf **Arca acuminata* Krauss südafr. Moll. S. 14, Taf. 1, Fig. 11 von Natal. Seychellen, Prof. *Möbius*.
- SMdM **Arca (Barbatia) fusca* Bruguière Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 535 = Encycl. B R Af pl. 309, Fig. 1. — Reeve conch. ic. II, Fig. 82. *A. cruciata* Philippi Abbild. I Au Taf. 5, Fig. 7. *Sganzin* 8 Ile de France und St. Marie. *Dufo* 216: Mahé im Bereich der Brandung (brisans) mittelst des Byssus befestigt, selten. *Lien*. 68 (doppelt) Mauritius. Von Prof. *Möbius* auf den Seychellen gesammelt.
- MRAfI **Arca (Barbatia) lacerata* Linne Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 536. 537 = Encycl. pl. 309, Fig. 2; Desh. Lam. an. s. vert. VI, no. 38; Reeve Fig. 93. Aus Mauritius von *Robillard* erhalten, bei Fouquets von Prof. *Möbius* eine kleinere Form (*A. setigera* Reeve Fig. 94) gesammelt. Im rothen Meer von Ehrenberg gefunden. An den breiten hautartigen Fransen leicht zu kennen.

SMBR **Arca* (*Barbatia*) *decussata* Sow. Reeve Fig. 81. Vermuthlich auch *reticulata*
AfIPAu Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 540. *Desh.* 22 Reunion. *Lien.* 68 Mauritius. Von
Prof. *Möbius* bei Fouquets und auf den Seychellen gesammelt.

Diese Art ist weit verbreitet — das Berliner Museum besitzt Exemplare aus dem rothen Meer, 28 Faden, durch Herrn Siemens, aus Singapore und den Philippinen von Herrn Jagor, von den Paumotuinseln durch Pease und von Neuseeland durch Hutton — und wie alle angehefteten und weitverbreiteten Arten auch sehr veränderlich; mehrere von Prof. *Möbius* gesammelte Exemplare kommen sehr nahe der *A. Petersi* Dunker Novitat. conchol. Taf. 45, Fig. 5—7 von den Querimbainseln an der Küste von Mossambique; diese ist wohl nur als extreme Varietät von *decussata* zu betrachten.

SAMdI *Arca* (*Barbatia*) *trapezina* Lam. an. s. vert. ed. 2, VI, no. 18; Delessert recueil de coquilles pl. 11, Fig. 13, 14; Reeve Fig. 103. — *Sgan.* 8 Ile St. Marie. *Dufo* 216 Seychellen und Amiranten, im Bereich der Brandung, mittelst eines langen verfilzten Byssus befestigt.

MI *Arca* (*Barbatia*) *velata* Sow. Reeve Fig. 79. Dunker novitat. conchol. Taf. 41. *Lien.* 78 Mauritius.

MB† *Arca* (*Barbatia*) *revelata* *Desh.* moll. de Reunion p. 22, pl. 3, Fig. 20, 21. *Lien.* 68 Mauritius.

Diese drei Arten stehen der *A. decussata* noch sehr nahe.

B† *Arca* (*Barbatia*) *dichotoma* *Desh.* ebenda p. 21, pl. 3, Fig. 18, 19 Reunion.

M†? **Arca* (*Barbatia*) *caelata* Reeve Fig. 110 (ohne Fundort). Mauritius, *Möbius*.

BI *Arca* (*Barbatia*) *tenella* Reeve Fig. 91 von den Philippinen. *Desh.* 23 Reunion.

MIP. **Arca* (*Acar*) *divaricata* Sow. Reeve Fig. 108 von Polynesien. Martens Südseeconchylien S. 65. Fouquets und Grande Baie auf Mauritius, *Möbius*. Auch im indischen Ocean, bei Macassar von mir, bei Lucipara von der Expedition der Gazelle gefunden.

MAf *Arca* (*Acar*) *donaciformis* Beeve Fig. 104 von Mossambique. *Lien.* 68 Mauritius. Der vorhergehenden nahe verwandt.

MdM *Arca* (*Anadara*) *uropygmaelana* Bory, Mörch, = *holoserica* Reeve Fig. 11. Nossi-Be AfI *Hildebrandt*. Wahrscheinlich diese an den ostafrikanischen Küsten nicht seltene Art meint *Sgan.* 8 unter seiner *A. antiquata* von Ile de France und St. Marie.

MdRAf *Arca* (*Anadara*) *scapha* Chemn. VII, 548; *Encycl.* pl. 306, Fig. 2 (nicht 1); Reeve I Fig. 25. *Sgan.* 8 Ile St. Marie.

MAf *Arca* (*Anadara*) *cuneata* Sow. Reeve Fig. 37 von Zanzibar. *Lien.* 68 Mauritius.

MAf **Arca* (*Scapharca*) *Natalensis* Krauss südafr. Moll. p. 17, Taf. 1, Fig. 12. Grande Baie auf Mauritius, *Möbius*. Nahe verwandt der *A. inaequalis* Brug. und wie diese mit einseitig übergreifendem Rande.

Lienard führt auch noch *A. formosa* Reeve Fig. 10, eine mexicanische Art, von Mauritius auf, was sehr unwahrscheinlich ist.

M?I *Cucullaea concamerata* Chemn. und *auriculifera* Lam. sollen nach *Jay* und *Reeve* von Ile de France kommen, aber Niemand sonst bestätigt es.

BR *Pectunculus lividus* Reeve conch. ic. I, Fig. 51 vom rothen Meer. *Desh.* 22 Reunion.

Md? *Pectunculus morum* *Reeve* Fig. 40 Madagaskar?

MI *Leda Mauritiana* Sow. conchol. illustr. *Nucula* Fig. 17; thes. III, Fig. 99 Mauritius. *Reeve* conch. ic. XVIII, Fig. 33. Auch von Zeilon und China angegeben.

Lucinacea.

Astartidae.

- SAMB Cardita (Mytilicardia) variegata Brug. Chemnitz Conch. Cab. VII; Fig. 500, 501;
 R Af I XI, Fig. 1999—2002; Encycl. pl. 233, Fig. 6. Reeve conch. ic. I, Fig. 3. Card.
 calyculata Lamarck, non Linne. Dufo 216 Seychellen und Amiranten, an Felsen,
 und in der Brandung. Desh. 21 Reunion. Lien. 66 Mauritius.
- M† *Cardita (Mytilicardia) rufescens Lam. an. s. vert. ed. 2. VI, p. 431, no. 14.
 Reeve Fig. 19. Fundort bis jetzt unbekannt. Einige von Prof. Möbius auf Mau-
 ritius gesammelte Stücke scheinen dieser Art anzugehören.
- B† Cardita (Mytilicardia) calyculaeformis Desh. mollusq. de Reunion p. 21, pl. 3,
 Fig. 10, 11 Reunion.
- Md†? Cardita (Mytilicardia) pectunculus Bruguière, Reeve Fig. 4 angeblich von Ma-
 dagaskar, nach Menke dagegen westindisch.

Lucinidae.

- SAMB *Lucina (Lentillaria) tigrina Linne Chemnitz Conch. VII, Fig. 390, 391. Reeve
 R Af conch. icon. VI, Fig. 3. Cytherea t. Lam. Sganzin 7 Ile de France und Bourbon.
 Dufo 219 Seychellen und Amiranten, auf steinigem und schlammigem Grund, ziem-
 lich selten. Desh. 19 Reunion, zahlreich im Sande des Ufers, mit Asaphis deflorata
 zusammen. Die von Prof. Möbius auf den Seychellen gesammelten Exemplare zeigen
 kein Roth an der Innenseite des Randes.
- Es ist mir so wenig wie Deshayes u. A. möglich die ostafrikanischen Exemplare bestimmt von
 westindischen zu unterscheiden.
- SAMB *Lucina (Lentillaria) punctata Linne Chemnitz VII, Fig. 397, 398. Reeve no. 2.
 Af Cytherea p. Lamarck. Dufo 220 Seychellen und Amiranten, in der Brandung.
 Desh. 19 Reunion. Lien. 65 Mauritius. Fouquets auf Mauritius, Möbius.
- M B R Lucina (Lentillaria) divergens Philippi Abbildungen III, Taf. 2, Fig. 4. Martens
 I P Südseeconchylien S. 68. Luc. fibula Reeve Fig. 33, 37 und 38. Desh. 20 Reunion.
 Lien. 65 Mauritius.
- Auch aus dem rothen Meer durch Ehrenberg, aus dem persischen Golf durch Hausknecht, aus
 der Bai von Yeddo durch mich und von den Herveyinseln im stillen Ocean durch Pease im Berliner
 Museum vertreten.
- M B† Lucina (Lentillaria) Reevei Desh. moll. de Reunion p. 19, pl. 3, Fig. 8, 9. Lien.
 65 Mauritius.
- B† Lucina minuata Desh. ibid. p. 20, pl. 3, Fig. 4—7 Reunion.
- S M R Lucina (Divaricella n.) angulifera n. sp. Unsere Taf. 22, Fig. 14.

Testa circularis, modice convexa, alba, nitida, striis incisis divaricatis, a sulco radiali submediano
 angulatim descendentes sculpta; vertice paulum antrorsum inclinato, lunula parva, profunda margine
 antico et postico subaequalibus, denticulatis dent. lateral. obsoletis. Long. 25, alt. 24, crass. 14 mm.

Mauritius, von Robillard erhalten, auch im rothen Meer von Ehrenberg gesammelt. Vermuth-
 lich auch Dufo's L. divaricata 218, bei Mahé auf Schlammgrund gesammelt, und Reeve's divaricata
 Fig. 47b. Ich nenne die Lucinen mit auseinanderweichenden tiefen Streifen Divaricella.

- S Af Lucina (s. str.) clausa Philippi Zeitschr. f. Malak. 1848, S. 151, Abbild. III, Taf. 2,
 Fig. 2. — L. barbata Reeve Fig. 16, 1850. v. d. Decken III, S. 66 Seychellen.

M R Af *Lucina* (*Anodontia*) *globosa* Forskal Chemnitz VII, Fig. 430, 431 aus dem rothen Meer. *Desh.* 21 Reunion. *Lien.* 65 Mauritius.

L. pila Reeve Fig. 24 ist nach Exemplaren aus der Gruner'schen Sammlung nicht davon verschieden.

M† *Lucina* (*Anodontia*) *ovulum* Reeve Fig. 58 Mauritius.

B† *Kellia pustula* *Desh.* (*Erycina*) Moll. de Reunion p. 16, pl. 2, Fig. 10—12.

B† *Kellia approximata* *Desh.* (*Erycina*) *ibid.* p. 17, pl. 2, Fig. 13—15.

Galeommidae.

M B† **Scintilla aurantia* *Lamarck* (*Psammobia*) an. s. v. ed. 2, VI, p. 178 Ile de France. *Galeomma Mauritanum* *Sowerby* genera of shells Fig. 4, 5. Reeve XIX. *Scintilla* Fig. 20 (nicht Fig. 19). *Sganzin* 6 St. Giller, Mauritius und Bourbon. *Desh.* 17. *Lien.* 66. Lebendes Thier von Prof. *Möbius* gezeichnet Taf. 21, Fig. 10.

M† *Scintilla aperta* *Sow.* bei Reeve 20 Mauritius. Der vorigen sehr ähnlich, noch mehr klaffend.

MdMB *Scintilla lutea* *Lam.* (*Lucina*) an. s. vert. ed. 2, VI, p. 231. *Delessert* recueil pl. 6, † Fig. 9 Ile de France. *Sganz.* 7 Mauritius, Bourbon und Madagaskar, im Sand. *Sc. pisum* *Sow.* thesaur. Fig. 27 und Reeve Fig. 47 von Mauritius ist vielleicht dieselbe.

B† *Scintilla incerta* *Desh.* Mollusques de Reunion p. 18, pl. 3, Fig. 16—18. Reeve Fig. 27 Weiss, Reunion.

B† *Galeomma denticulatum* *Desh.* moll. de Reunion p. 18, pl. 3, Fig. 1—3. Rand gezähnelte. Reunion.

Lien. 66 führt *G. Turtoni* *Sow.* von Mauritius an, es ist das eine europäische Art, daher ihr Vorkommen dort sehr unwahrscheinlich.

M† *Thyreopsis coralliophila* *A. Adams* Proc. Zool. Soc. 1868, p. 14, pl. 4, Fig. 8. Schale weitklaffend, das Thier kaum ganz umfassend, rothbräunlich. Lebt auf Korallen, Mauritius.

Chamacea.

Tridacnidae.

SDMB **Tridacna elongata* *Lam.* Chemnitz Conch. Cab. VII, 1784, Fig. 193 (jung) Bourbon R Af I und Maurice. Encycl. pl. 235, Fig. 4. Reeve conch. ic. XIV, Fig. 2. *Bernardin* Au *St. Pierre* 109 la tuillée. *Desh.* 21 Reunion. *Lien.* 65 Maur. und 105 Rodriguez. Seychellen. *Möbius*.

Die Exemplare, welche Prof. *Möbius* auf den Seychellen gesammelt hat, nähern sich einigermaßen der *T. rudis* Reeve Fig. 4, zu der auch Chemnitz Conch. Cab. VI, Fig. 494 gehören dürfte, und welche durch Zwischenformen mit *elongata* verbunden scheint, wie auch *elongatissima* *Bianconi* und *compressa* Reeve. Am lebenden Thier fand Prof. *Möbius* den Mantelrand grau oder braun mit schwarzen Punkten, den Saum 1 mm breit, schön spangrün. Ein Exemplar von 25 cm Länge enthielt reifes Sperma.

MdMIP *Tridacna gigas* *Lam.* Chemn. VII, Fig. 495 Maurice. Encycl. meth. pl. 235, Fig. 1. Reeve Fig. 1 Ile de France und St. Marie. — *Sganz.* 9. Auch an der Küste von Mossambique.

MdIP *Tridacna crocea* Lam. Chemn. VI, Fig. 496. Encycl. pl. 235, Fig. 2. *Quoy et Gaim.*
Voy. de l'Astrolabe pl. 79, Fig. 2, 3. *Sganz.* 9 Madagaskar.

MdMI *Hippopus maculatus* Lam. *Chama hippopus* Linne. Chemnitz Conchyl. Cab. VI,
 P Au Fig. 498, 499. Encycl. pl. 236, Fig. 2. *Quoy et Gaim.* pl. 80. Fig. 4—6. Reeve
 XIV. Allein von *Sganzin* 9 aus Mauritius und St. Marie angeführt.

Auch diese Muschel variirt sehr beträchtlich in der Form, bald kurz, bald länglich.

Chamidae.

MBP **Chama imbricata* Broderip Transactions of the zoological Society I, pl. 39, Fig. 2.
 Reeve conchol. icon. IV, Fig. 3 von Polynesien. *Desh.* 16 Reunion. *Lien.* 65
 Mauritius. Bei Fouquets von Professor *Möbius* gesammelt. Sitzt mit breiter
 Fläche auf.

MBI *Chama aspersa* Reeve Fig. 24 von den Philippinen. *Desh.* 16 Reunion. *Lien.* 65
 Mauritius.

BR *Chama Rüppelli* Reeve Fig. 30 vom rothen Meer. *Desh.* 16 Reunion.

Diese Art scheint mir identisch mit *Ch. Corbieri* Audouin Descript. de l'Egypte pl. 14, Fig. 8.

MBRI *Chama fibula* Reeve Fig. 27 von den Philippinen. *Desh.* 16 Reunion. *Lien.* 65
 Mauritius.

Die Arten dieser Gattung sind sehr schwer gegeneinander abzugrenzen, daher ihre Bestimmung
 und Benennung oft etwas willkürlich.

Cardiacea.

SI *Cardium biradiatum* Bruguière Chemnitz Conch. Cab. VII, Fig. 185, 186 (laevigatum).
 Encycl. pl. 298, Fig. 6. Reeve conch. ic. II, Fig. 49. *C. columbinum*
 Martyn universal conchologist pl. 146. Seychellen, v. d. *Decken* Reisen in Ost-
 Afrika III, p. 66 und *Lien.* 82.

MI **Cardium* (Trachycardium) *elongatum* Bruguière Seba thesaur. III, tab. 86, Fig. 2.
 Reeve Fig. 46. *C. nebulosum* Martyn univ. conchol. pl. 140. Grande Baie auf
 Mauritius, *Möbius*. Vermuthlich *Bernardin St. Pierre* 110 coeur strié et cannelé.
 Von mir bei Larentuka (Flores) gesammelt.

CMBI *Cardium* (Trachycardium) *leucostoma* (Born testacea Mus. Caes. Vindobon tab. 3,
 Fig. 6, 7. Chemnitz VI, Fig. 179). Reeve Fig. 47. *Desh.* 12 Reunion. *Lien.* 64
 Mauritius und 111 Cargados.

Im Berliner Museum ist diese Art nur in westindischen Exemplaren vertreten, wie auch Born
 selbst und Chemnitz sie nur aus Westindien kennen; dagegen giebt Reeve Singapore als Fundort der
 seinigen an. Vielleicht sind hier noch 2 Arten mit einander verwechselt.

MdRAf *Cardium* (T.) *rugosum* Lam. Chemnitz VI, Fig. 191; Descript. de l'Egypte pl. 9,
 I Fig. 8. Reeve Fig. 68 (nicht befriedigend) von Madagaskar. Vielleicht *C. flavum*
 Linne. Die häufigste Art im malayischen Archipel, auch im rothen Meer von
 Ehrenberg, an der Küste von Mossambique von Prof. Peters gefunden, für die
 Maskarenen auffallender Weise von Keinem erwähnt, aber wohl für Ile St. Marie
 bei Madagaskar von *Sganzin* 8: auf sandigen Stellen zwischen Felsen von Korallen.

Lien. führt auch noch *C. Dupuchense* Reeve (Fig. 67 von der Torresstrasse) als bei Mauritius vorkommend an, doch setzt er selbst ein Fragezeichen zu dieser Bestimmung.

MI Au **Cardium* (Hemicardium) *unedo* Linne Chemnitz VI, Fig. 168, 169. Encycl. pl. 295, Fig. 4. Reeve Fig. 13. „Die rothe Erdbeere“. *Sganzin* 8 Ile de France, an sandigen Stellen zwischen Korallenriffen. Bei Fouquets, Prof. *Möbius*.

Lienard führt diese Art nicht von Mauritius an, dagegen *Cardium medium* L., welches westindisch ist.

MAf I **Cardium* (Hemicardium) *fragum* Linne Chemnitz VI, Fig. 166. Encycl. pl. 295, Fig. 3. Reeve Fig. 23. „Die weisse Erdbeere“. Auf Mauritius von *Sganzin* 8 an denselben Oertlichkeiten wie die vorhergehenden, *Lien.* 68 und Prof. *Möbius* gesammelt, im rothen Meer von Ehrenberg.

SARI *Cardium* (Hemicardium) *hemicardium* Linne Chemnitz VI, Fig. 159—161. Encycl. pl. 295, Fig. 2. Reeve 38. *Dufo* 217 Seychellen und Amiranten, in sandig-schlammigen Boden sich eingrabend.

SRI *Cardium* (Hemicardium) *subretusum* Sow., *retusum* Reeve Fig. 103. v. d. *Decken* Reisen in Ost-Afrika III, S. 66 Seychellen.

BR Af *Cardium* (Hemicardium) *retusum* Linne Chemn. Conch. VI, Fig. 139—142; Encycl. meth. pl. 294, Fig. 3. *C. auricula* Forskal descript. anim. 1775, p. 122. Reeve Fig. 39. *Desh.* 12 Reunion.

Bildet der grossen stark vertieften Lunula wegen eine eigene Untergattung *Lunulicardia* bei H. und A. Adams, ist aber im Uebrigen dem *C. subretusum* Sow. (*retusum* Reeve Fig. 103) äusserst ähnlich.

MI *Cardium* (Hemicardium) *cardissa* Linne Chemnitz V, Fig. 143, 144; Encycl. pl. 293, Fig. 3. Reeve Fig. 15. Nur von *Sganzin* 8 für Mauritius angeführt, an denselben Oertlichkeiten wie *C. unedo*.

Bildet das Endglied der Reihe der eckigen Cardien, die mit *C. unedo* beginnt.

M† *Cardium victor* *Angas* Proc. Zool. Soc. 1872, p. 612, pl. 42, Fig. 9 Mauritius. Von *Robillard* aus Mauritius erhalten.

Diese Art, durch ihre schön orange-rothe Farbe, die zahlreichen dreieckig zusammengedrückten Stacheln, hinten auf allen Rippen, vorn und in der Mitte je eine überspringend, ausgezeichnet, steht ziemlich isolirt, scheint sich aber doch einigermaßen an *C. multispinosum* Sow., *fimbriatum* Wood und *Asiaticum* *Desh.* anzuschliessen und mit ihnen eine eigene Gruppe zu bilden. Die Lunula ist auffallend ungleichseitig.

MI Au *Cardium* (Papyridea) *papyraceum* Chemnitz Conch. Cab. VI, Fig. 184. Reeve Fig. 9. *C. laevigatum* Linne nach Hanley. *Lien.* 64 Mauritius.

B† *Cardium* (Papyridea) *dulce* *Desh.* mollusques de Reunion p. 12, pl. 2, Fig. 4, 5 Reunion.

SCMI? **Cardium* (Papyridea) *pulchrum* Reeve conch. ic. Fig. 98 (von China). *Lien.* 111 Cargados. Mauritius, *Möbius*. Var. v. d. *Decken* Reisen in Ostafrika III, S. 66, Taf. 5, Fig. 2 Seychellen.

Lienard 64 erwähnt noch ein *C. bicolor* Sow., das mir ganz unbekannt ist, von Mauritius.

SAf I *Cardium* (Amphicardium n.) *lyratum* Sow. Reeve Fig. 42. v. d. *Decken* Reisen in Ostafrika III, S. 66 Seychellen.

Diese Art und die nächstverwandte *C. Aeolicum* Born, werden von Mörch und Adams zu *Lio-cardium* gestellt, dürften aber ihrer ganz eigenthümlichen Sculptur wegen eine eigene Gruppe *Amphicardium* bilden.

Veneracea.

Veneridae.

- SRI *Circe scripta* Linne Chemnitz VII, Fig. 420—425. Sow. thes. II Cytherea Fig. 38, 40, 41, 43. Reeve XIV, Fig. 1. Römer Monogr. v. Venus I. Taf. 52, Fig. 1. — *v. d. Decken* Reisen in Ostafrika III, S. 65 Seychellen.
- MdRAf *Circe corrugata* Chemn. VII, Fig. 410, 411. Gray catal. Brit. Mus. Veneridae p. 85 Madagaskar. Reeve Fig. 4. Römer Monogr. I, S. 201, Taf. 45, Fig. 2 Madagaskar.
- Md† *Circe paralytica* Römer ebenda 211, Taf. 58, Fig. 1 Madagaskar.
- BRI *Circe dispar* Chemnitz Conch. Cab. XI, Fig. 1981, 1982. *Cytherea muscaria* und *pulicaris* Lam. Sow. thes. pl. 163, Fig. 53, 54. Reeve XIV Cytherea Fig. 24. Römer Monogr. von Cytherea Taf. 50, Fig. 1 und Taf. 51, Fig. 2. *Desh.* 12 Reunion.
- SAMd *Circe* (Crista) *pectinata* Linne Chemnitz VII, 1784, Fig. 418, 419 „St. Maurice“.
- MBR Descript. de l’Egypte pl. 8, Fig. 17. Sow. thes. Fig. 1—3. Reeve Fig. 20. Römer Af Taf. 47, Fig. 1. *Dufo* 220 Seychellen und Amiranten, häufig gegessen. *Sganz.* 7 Ile de France, Bourbon und St. Marie, im Sand. *Lien.* 63 Mauritius.
- SAI **Circe* (Crista) *gibbia* Lam. Chemnitz VII, Fig. 415, 416; *Encycl.* pl. 271, Fig. 4. Au Sow. thes. Fig. 4 und 7. Reeve Fig. 21c und d. Römer S. 176, Taf. 47, Fig. 2. *Dufo* 219 Seychellen und Amiranten, in 2—3 Zoll tiefen Löchern im Schlamm und Sand, von den Negern gegessen und als Köder benutzt. *v. d. Decken* III, S. 66 Seychellen. Auch von Prof. *Möbius* auf den Seychellen gesammelt.
Cyth. *ranella* Dufo p. 220 ist Jugendzustand derselben Art.
- MI **Circe* (Lioconcha) *picta* Lam. Chemnitz VI, 1782, Taf. 35, Fig. 380 Insel Maurice; *Encycl.* pl. 273, Fig. 2, 3. Reeve Fig. 42. Römer S. 164, Taf. 45, Fig. 3. *Lien.* 63 Mauritius. Grande Baie auf Mauritius, *Möbius*.
- MBR **Artemis histrio* Gmelin Venus exoleta variegata Chemnitz VII, Fig. 407. Sowerby AfI thesaur. Fig. 83. Reeve VI, Fig. 33. Römer Monogr. v. Dosinia S. 33, Taf. 6, Fig. 2, 3. *Desh.* 12 Reunion. *Lien.* 63 Mauritius. Black river auf Mauritius, Prof. *Möbius*.
Schon *Lister* hist. conch. 1685, p. 261 bildet eine Artemis von Mauritius ab.
- B† *Artemis minor* *Desh.* moll. de Reunion p. 12. pl. 2, Fig. 1—3.
- SMBI *Cytherea* (Calliste) *costata* Chemnitz XI, Fig. 1975. Reeve XIV, Fig. 9. Römer Monogr. S. 62, Taf. 18, Fig. 3. *Desh.* 12 Reunion. *Lien.* 63 Mauritius. Auch von den Seychellen durch *v. d. Decken* im Berliner Museum, unter dem Namen *grata* *Desh.* in dessen Reise III, S. 65 erwähnt.
- SMdR *Cytherea* (Calliste) *florida* Lam. Descript. de l’Egypte pl. 9, Fig. 1. Delessert Af recueil pl. 8, Fig. 7. Philippi Abbild. Taf. 5, Fig. 4. Gray catal. Brit. Museum Veneridae p. 62 Madagaskar. Reeve Fig. 1. Römer S. 67, Taf. 20, Fig. 1 von Madagaskar. *v. d. Decken* Reisen in Ostafrika III, S. 65 Seychellen.
- MBI *Cytherea* (Caryatis) *laeta* Linne? Chemnitz Conchyl. Cabin. VI, 1782, Taf. 34,

- Fig. 353, 354 Insel Maurice. Encycl. pl. 266, Fig. 4. Sow. thes. Fig. 123 u. 124. Reeve Fig. 35. Cyth. inflata Sow. thes. Fig. 127. C. affinis Gmelin Römer S. 105, Taf. 33, Fig. 6, 7. *Desh.* 12 Reunion. *Lien.* 63 Mauritius.
- M Af I Cytherea (Caryatis) obliquata Hanley Reeve Fig. 35b (laeta) und 37a, b (inflata). Römer Monogr. S. 107, Taf. 29, Fig. 1 und Taf. 33, Fig. 4, 5. Aus Mauritius von *Robillard* und *Caldwell* erhalten.
- Lienard 63 führt noch Cyth. varians Hanley von Mauritius und p. 111 C. rubiginosa von den Cargadosinseln an; diese beiden Namen gehören einer und derselben brasilisch-westindischen Art an; vielleicht hatte Lienard die vorhergehenden vor sich.
- ?B?MI Sunetta Meroë Linne (Donax) Chemnitz VII, Fig. 450—453. Encycl. pl. 261, Fig. 1. Sow. thes. II, pl. 126, Fig. 1, 2. Reeve XIV. Meroë Fig. 5. Nur von *Sganz.* 7 für Mauritius und Bourbon erwähnt.
- M An *Venus (Gomphina) undulosa Lam. Philippi Abbild. Taf. 1, Fig. 1. Sow. thes. II, pl. 158, Fig. 142—146. Reeve XIV. Venus Fig. 126. Diese bis jetzt nur von der Westküste Neuhollands bekannte Art findet sich in mehreren Exemplaren unter den von Prof. *Möbius* bei Grande Baie auf Mauritius gesammelten Conchylien vor.
- Md M Venus (Antigona) puerpera Linne Chemnitz VI, Fig. 398, 399. Encycl. pl. 278, B Af I Fig. 1. Sow. thes. Fig. 1. *Gray* catal. Brit. Mus. Veneridae p. 105 Bourbon und Madagaskar. Reeve Fig. 10. *Sganz.* 7 Ile de France.
- MBAf *Venus (Antigona) crispata *Desh.* catal. Brit. Mus. p. 107. Sow. thesaur. Fig. 7. V. Listeri var. Reeve Fig. 31. V. cancellata Chemnitz VI, Fig. 304, 305. Mauritius, *Möbius*. Wahrscheinlich gehört auch hierher *Desh.* 11 V. Listeri von Reunion und *Lien.* 63 von Mauritius.
- Die ächte V. Listeri Gray ist westindisch.
- Md† Venus (Chione) foliacea *Philippi* Abbild. II, S. 107, Taf. 5, Fig. 1 Madagaskar. Reeve Fig. 109a.
- MBI *Venus (Chione) marica Linne Chemnitz VI, Fig. 282—284; Encycl. pl. 275, Fig. 2. Sow. thes. Fig. 107—110. Reeve Fig. 104. *Desh.* 12 Reunion. *Lien.* 63 Maur. Grande Baie und Fouquets, Mauritius, *Möbius*.
- Sganzin* führt diese recht auffällige Art nicht an, dagegen V. flexuosa L., welche westindisch ist; sollte er vielleicht abgeriebene Exemplare von marica für flexuosa gehalten haben.
- Venus (Ventricula) verrucosa L. Diese aus dem Mittelmeer wohlbekannte Art erhielt das Berliner Museum von *Robillard* aus Mauritius; das Exemplar stimmt nicht mit der von *Dunker* unterschiedenen, übrigens kaum standhaft verschiedenen V. nodosa aus Westafrika (*Moll. v. Guinea* S. 57). Uebrigens soll verrucosa auch am Cap vorkommen, s. *Krauss* südafr. *Moll.* S. 10.
- C?M?P Venus (Ventricula) toreuma Gould Proc. Boston Soc. 1850. *Lien.* 63 Maur. und 111 Cargados, beide mal mit Fragezeichen.
- Md M I Tapes papilionaceus Lam. Chemnitz VII, Fig. 441. Encycl. meth. pl. 281, Fig. 3. An Sow. thes. II, Fig. 1, 2. — T. rotundatus (non Linne) *Gray* catal. Brit. Mus. Veneridae p. 168 Madagaskar. Reeve conch. icon. XIV, Fig. 7. *Sganz.* 7 Ile de France, auf Sandgrund.
- MI Tapes literatus Linne Chemnitz VII, Fig. 432, 433. Encycl. pl. 280, Fig. 4 und pl. 281, Fig. 1. Sow. Fig. 43 und 48. Reeve Fig. 2. *Lien.* 63 Mauritius.
- MI Tapes punctatus Chemnitz VII, Fig. 437. *Valentyn* Fig. 19. Römer Monogr.

- Taf. 13, Fig. 2. *V. punctifera* Lam.; *literata* var. Sow. Fig. 44. Reeve Fig. 2b. Gröber gefurcht als *literatus*. *Lien.* 63 Mauritius.
- S Af I *Tapes adpersus* Chemnitz VII, Fig. 438; Encycl. pl. 281, Fig. 4. Sow. Fig. 52. Reeve Fig. 5. Römer Taf. 14, Fig. 2. — *Duf* 219 Seychellen und Amiranten auf Schlammgrund mit Meerpflanzen. 6—9 cm tief eingegraben.
- SI *Tapes radiatus* Gmelin Chemn. VII, Fig. 439; Encycl. pl. 282, Fig. 1. Reeve Fig. 16a (nicht Römer Taf. 14, Fig. 3) Seychellen. v. d. Decken III, S. 66.
- M? Au *Venerupis carditoides* (Lam. an. s. vert. ed. 2, VI, p. 164; Delessert recueil pl. 5, Fig. 3; Sow. thesaur. II, Fig. 4; Reeve conch. icon. vol. XIX, Fig. 5 von Neuholland) nach *Lien.* 64 von Mauritius, vielleicht die folgende gemeint.
- MRAf I **Venerupis derelicta* Deshayes Sow. thes. II, Fig. 16. Reeve XIX, Fig. 5 von den Philippinen. Mauritius, von *Möbius* und *Robillard* gesammelt. Auch im rothen Meer von Hemprich und Ehrenberg.
- MB† **Cypricardia dolosa* Desh. coq. de Reunion p. 13, pl. 2, Fig. 6, 7 Bourbon. Auch in Mauritius von *Möbius* gesammelt. Vielleicht auch *Lienard's* Cypr. Guinaica Lam. p. 64.
- B† *Cypricardia modesta* Desh. ibid. p. 14, pl. 2, Fig. 8, 9 Bourbon.
- MI Au *Cypricardia oblonga* Sowerby genera of shells; Reeve I, Fig. 4 (nicht *Chama oblonga* Linne). *Cardium gilva* (-um) Martyn universal conchologist pl. 148. *Lien.* 64 Mauritius. Auch von *Robillard* erhalten.
- MAu *Cypricardia angulata* Lam. Chemnitz XI, Fig. 1993, 1994. *Libitina bicarinata* Schumacher. Reeve Fig. 2 (von Neuholland). *Lienard* 64. Auch von *Robillard* erhalten.
- Md MI *Cypricardia rostrata* Lam. Reeve Fig. 3 (von Neuholland und den Philippinen).
Au *Sqanz.* 8 Ile St. Marie. *Lien.* 64. Auch von *Robillard*.
- MP **Cypricardia* (*Coralliophaga*) *coralliophaga* Chemnitz X, Fig. 1673, 1674. Encycl. pl. 234, Fig. 5. Reeve Fig. 12. Mauritius, von *Möbius* und *Robillard* gesammelt.
Kommt auch im rothen Meer (Jickeli), und wie es scheint, in Westindien und in der Südsee vor.
- M† **Cypricardia* (*Coralliophaga*) *decussata* Reeve Fig. 6. Mauritius. *Möbius*.
- S† *Cypricardia* (*Coralliophaga*) *tenuis* Rousseau Voy. au pole sud, mollusque pl. 26, Fig. 5 Seychellen.
- S† *Cypricardia* (*Coralliophaga*) *incrustans* Rousseau ibid. Fig. 4 Seychellen.
- B† *Anisodonta Borbonica* Deshayes moll. de Reunion pg. 16. pl. 3, Fig. 15—17 Reunion.
- B† *Anisodonta Maillardi* Desh. ibid. p. 15, pl. 3. Fig. 12—14 Reunion.
- MRAf I *Petricola lapicida* Chemnitz X, Fig. 1664, 1665. Reeve XIX, Fig. 24 von Mauritius.

B Keine *Macra* ist mir aus unserm Gebiet bekannt geworden, nur Deshayes erwähnt S. 9 eines jungen Exemplars einer unbestimmten Art aus Bourbon.

Tellinacea.

- MI Amphidesma crenulatum Sow. Reeve conch. ic. VIII, Fig. 8. Mauritius von Robillard erhalten.
- MI Amphidesma Jukesi A. Adams Proc. Zool. Soc. 1853; Reeve Fig. 7. Mauritius von Robillard unter dem Namen A. concentricum erhalten, daher vermuthlich A. concentricum Nevill *Lien.* p. 62.
- B† Amphidesma obscurum Desh. moll. de Reunion p. 9, pl. 1, Fig. 16, 17 Reunion.
- B† Amphidesma Borbonicum Desh. ibid. p. 10, pl. 1, Fig. 18, 19 Reunion.
- M† Thyella lamellosa H. Adams Proceed. Zoolog. Soc. 1873, p. 208, pl. 23, Fig. 15 Mauritius.
- B† Cumingia sinuosa A. Ad. Proc. Zool. Soc. 1850 p. 25; Desh. p. 11 Reunion.
- SABR *Mesodesma glabratum Lam. Encycl. pl. 257, Fig. 3; Reeve VIII, Fig. 20. —
AfI Desh. 9 Reunion, Fouquets, Mauritius und Mahé. Seychellen, Möbius. Dieselbe Art ist wohl Dufu 218 Crassatella striata. Seychellen und Amiranten, häufig, auf Sandgrund, 9—12 cm tief eingegraben, von den Bewohnern gegessen.
- MAu Mesodesma corneum Lam. (Amphidesma) an. s. vert. ed. 2, VI, p. 127; Delessert recueil pl. 4, Fig. 5 von Ile de France.
Seitdem nicht mehr erwähnt, donaxförmig, sehr ähnlich M. transversum Desh. Reeve Fig. 2.
- Md† Donax Madagascariensis Wood ind. suppl. Fig. 3 Madagaskar. Reeve VIII, Fig. 50.
- MdI Donax (Latona) granosus Lam. an. s. vert. ed. 2, VI, p. 242, nro. 8; Römer Monographie Taf. 14, Fig. 11—13. Sgan. 7. Tamatave an der Ostküste von Madagaskar, auf Sandgrund, sehr häufig.
- MI Donax faba Chemn. VI, Fig. 266, 267; Römer Monographie Taf. 2, Fig. 12—17; Reeve conch. ic. VIII, Fig. 26; D. radians Lam., D. radiatus Spengler, Schröter Einleitung III, Taf. 8, Fig. 3. D. biradiata und sexradiata Wood ind. test. suppl. p. 5, pl. 2, Fig. 4 und 5. Isle of France. Lien. 62 Mauritius. Auch von Robillard erhalten.
- MB Af Donax (Latona) bicolor Gmelin Gualtieri tab. 88, Fig. G. Lam. an. s. vert. ed. 2, VI, nro. 13; Reeve Fig. 28. Sgan. 7 Ile de France und Bourbon. Weit verbreitet im indischen Ocean.
Lienard 62 führt noch D. Australis Lam. und triradiata Desh. von Mauritius an, erstere ist eine mit bicolor verwandte australische Art, letztere mir ganz unbekannt, wenn nicht etwa trifasciatus Linne, Chemnitz VI, Fig. 114. Reeve Fig. 7, gemeint ist.
- SM† Tellina elegans Gray, Wood index test. suppl. pl. 1, Fig. 5 (ohne Fundort); Sow. thes. Fig. 179; Reeve conch. ic. XVII, Fig. 17; Römer Monographie Taf. 5, Fig. 12. v. Decken III, S. 65 Seychellen. Lien. 62 Mauritius und 82 Seychellen. Auch durch Robillard von den Seychellen eingesandt.
Die Angabe bei Reeve, dass sie aus dem Golf von Mexiko stamme, erscheint diesen übereinstimmenden Zeugnissen gegenüber unwahrscheinlich.
- SRAfI Tellina (Tellinella) rastellum Hanley Proc. Zool. Soc. 1844; Sow. Fig. 231 und 342; Römer Taf. 6, Fig. 4—6; Reeve Fig. 85. T. Philippii Auton, Philippi Abbildungen I, Taf. 2, Fig. 8. — v. Decken III, S. 65 Seychellen. Sonst von

der Küste Ostafrika's, Zanzibar und den Querimbainseln im Berliner Museum vertreten.

S M R **Tellina* (*Tellinella*) *virgata* Linne Chemn. VI, Fig. 67; Encycl. pl. 288, Fig. 2;
Af I Römer Taf. 7, Fig. 2; Reeve Fig. 49. — v. *Decken* III, S. 65 Seychellen. Von Prof. *Möbius* auch auf Mauritius gesammelt. Gemein im indischen Ocean, z. B. bei Singapore (F. Jagor) und an der ostafrikanischen Küste.

S M R **Tellina* (*Tellinella*) *staurella* Lam. Chemn. VI, Fig. 66, 69—71; Philippi Abbildungen I, Taf. 2, Fig. 6; Delessert recueil pl. 6, Fig. 2; Sow. Fig. 171; Römer Taf. 7, Fig. 6, 7; Reeve Fig. 27. — *Lien.* 62 Mauritius. Auf den Seychellen von Prof. *Möbius* gesammelt. Ebenfalls weit verbreitet in Ostafrika und Indien.

M R Af *Tellina* (*Tellinella*) *rugosa* Born Chemn. VI, Fig. 62; Encycl. pl. 290, Fig. 1; Sow. I Fig. 238; Römer Taf. 11, Fig. 6, 7; Reeve Fig. 36. — *Lien.* 62 Mauritius. Auch von *Caldwell* von Mauritius eingesandt. Ebenso verbreitet.

S I **Tellina* (*Tellinella*) *perplexa* Hanley Proc. Zool. Soc. 1844; Sow. Fig. 139; Römer Taf. 14, Fig. 4—6; Reeve Fig. 121 von den Philippinen. Bei St. Anne auf den Seychellen von Prof. *Möbius* gesammelt; ich fand sie auf Amboina.

T. ostracea Lam. Encycl. pl. 290, Fig. 13 könnte dieselbe Art sein.

M d M B *Tellina* (*Tellinella*) *lingua-felis* Linne Chemn. VI, Fig. 65; Encycl. pl. 289, Fig. 6; I Au Sow. Fig. 236; Römer Taf. 14, Fig. 4—10; Reeve Fig. 61. *Cardium nassa* Martyn univ. conchologist pl. 138, Fig. 1. Nur von *Sganz.* 7 für Ile de France, Bourbon und St. Marie erwähnt, was aber, da die Art in Ostindien weit verbreitet ist, nicht unwahrscheinlich sein dürfte; von der ostafrikanischen Küste kenne ich sie allerdings nicht.

M I *Tellina* (*Tellinella*) *subtruncata* Hanley Sow. Fig. 48. Reeve Fig. 241. *Lien.* 62 Mauritius.

M R Af I *Tellina* (*Tellinella*) *inflata* Chemnitz VI, Fig. 76; Römer Taf. 15, Fig. 1—3. *T. hippoidea* Jonas, Philippi Abbildungen I, Taf. 1, Fig. 13. *T. striatula* (non Lam.) Sow. Fig. 175; Reeve Fig. 34. — *Lien.* 62 Mauritius. Auch im rothen Meer von Ehrenberg gesammelt.

S M ? I *Tellina* (*Tellinella*) *vulsella* Chemnitz VI, Fig. 105; Sow. Fig. 162, 163; Römer Taf. 16, Fig. 7—9; Reeve Fig. 56. *T. rostrata* Gmelin, Lam., Encycl. pl. 289, Fig. 1, non Linne. — v. *Decken* III, S. 65 Seychellen.

Vielleicht ist die von *Lien.* 62 als *T. rostrata* von Mauritius angeführte Art dieselbe, doch könnte er auch die ächte *rostrata* Linne = *Spengleri* Chemnitz meinen, die ebenfalls indisch ist, ich fand sie bei Muntok auf Banka.

M R Af *Tellina* (*Tellinella*) *semilaevis* Martens Ann. and Mag. of nat. hist. 1865. p. 428; Römer Taf. 18, Fig. 1—4. Aus Maur. durch *Robillard* erhalten. Sonst ostafrikanisch.

M d † ? *Tellina* (*Tellinella*) *Madagascariensis* Gmelin Lister hist. conchyl. 1685, pl. 390 (386), Fig. 233 von Madagaskar; Sow. Fig. 217; Römer Taf. 17, Fig. 4—7; Reeve Fig. 2 und 18. *T. obliqua* Lam. *Sganz.* 7. Tintingue an der Küste von Madagaskar, auf Sandgrund.

Eine sehr ähnliche Schale erhielt das Berliner Museum von der Loangoküste.

MdMB *Tellina* (*Arcopagia*) *scobinata* Linne Chemn. VI, Fig. 122—124; Encycl. pl. 291, I Fig. 4; Sow. Fig. 235; Römer Taf. 20, Fig. 5—8; Reeve Fig. 65. — *Sganz.* 7 Ile de France und Insel St. Marie bei Madagaskar, häufig auf Sandgrund. *Desh.* 11 Reunion. *Lien.* 62 Mauritius.

MBI *Tellina* (*Arcopagia*) *remies* Linne Chemn. VI, Fig. 113; Encycl. pl. 290, Fig. 3; Sow. Fig. 226; Römer Taf. 21, Fig. 1—3; Reeve Fig. 23. *T. sulcata* Lam. *Sganz.* 7 Ile de France bei St. Gilles und Bourbon, in den Sand eingegraben.

Obwohl diese grosse und leicht kennliche Art von keinem Späteren angeführt ist, glaube ich doch, da sie im indischen Ocean weit verbreitet ist, Sganzin's Angabe nicht bezweifeln zu dürfen.

SMAu **Tellina* (*Arcopagia*) *robusta* Hanley Proc. Zool. Soc. 1844; Sow. Fig. 23; Römer Taf. 24, Fig. 4—6, von Australien und Polynesien. Reeve Fig. 77, angeblich von Westindien. *Lien.* 62 Mauritius. Von Prof. Möbius auf den Seychellen gesammelt.

MB Af *Tellina* (*Angulus*) *hilaris* Hanley Sow Fig. 54; Reeve Fig. 274; Römer Taf. 31, Fig. 8, 10, aus dem rothen Meer. — *Lesh.* 11 Reunion. *Lien.* 61 Mauritius.

MAfI **Tellina* (*Angulus*) *rhomboides* Quoy und Gaimard Voyage de l'Astrolabe, Moll. pl. 81, Fig. 4—7; Sow. Fig. 92, 96, 97; Römer Taf. 31, Fig. 14—17. *T. clathrata* *Desh.* bei Lamarck an. s. vert. ed. 2, VI, nro. 57. Auf beiden Schalen schief gestreift. Fouquets auf Mauritius, Prof. Möbius.

Jickeli fand diese leicht kenntliche Art im rothen Meer bei Massaua, ich auf Timor, Quoy und Gaimard auf den Marianen.

MAfI *Tellina* (*Angulus*) *dispar* Conrad Journ. Acad. Philadelphia VII, 1837; Sow. P Fig. 108, 113, 114; Reeve Fig. 10; Römer Taf. 32, Fig. 7—9; Martens Monatsberichte d. Akad. in Berlin 1879, S. 744; Südseeconchylien S. 62. Nur die eine Schale schief gestreift. *Lien.* 61 Mauritius.

Ursprünglich von den Sandwichinseln bekannt, aber Prof. Peters hat dieselbe auch auf den Querimbainseln an der Küste von Mossambique gefunden.

MR Af *Tellina* (*Phylloda*) *foliacea* Linne Chemn. VI, Fig. 95; Encycl. pl. 287, Fig. 4; I Sow. Fig. 253; Reeve Fig. 11; Römer Taf. 34, Fig. 1—3. *T. cinnamomea* Martyn univ. conchol. pl. 156. — *Lien.* 61 Mauritius. Im rothen Meer von Ehrenberg gesammelt, sonst als indisch bekannt.

MI *Tellina* (*Tellinides*) *vestalis* Hanley Sow. Fig. 67; Römer Taf. 35, Fig. 9; Reeve Fig. 230, nicht 87, von den Philippinen. *Lien.* 62 Mauritius.

B† *Tellina* (*Tellinides*) *acuminata* Hanley Sow. Fig. 141. Reeve Fig. 51. *Desh.* 11 Reunion.

Endlich führt *Lienard* 61 noch die allbekannte westindische *T. carnaria* Linne von Mauritius auf, diese ist mit ihren nächsten Verwandten im indischen Ocean und an den ostafrikanischen Küsten ganz unbekannt, die ähnlichsten sind *T. splendida* Auton, die ich auf Sumatra, und *T. cyrenoides* Hanley, die ich auf Batjan (Molukken) gesammelt habe; sollte *Lienard* etwa *T. rhomboides*, welche er nicht anführt, der schiefen Streifen und rothen Färbung wegen für *carnaria* gehalten haben? aber die Form und Bezeichnung ist doch zu verschieden.

SMdM **Asaphis deflorata* Linne, Lister hist. conch. tab. 429, Fig. 273 Maur. Chemn. VI, BR Af Fig. 82, 83. Reeve conch. ic. X, Capsa Fig. 1. *Capsa rugosa* Lam. *Venus violascens* Forskal etc. Häufig im rothen Meer und indischen Ocean. — *Dufo* 220; Seychellen und Amiranten, häufig auf Schlammgrund mit Meerpflanzen, einige Zoll

tief eingegraben. *Sganz.* 6 Ile Marie, Madagaskar, im Sand, von den Eingebornen gegessen. *Desh.* 11 Reunion. *Lien.* 61 Mauritius. Von Prof. *Möbius* zu Fouquets auf Mauritius und auf den Seychellen gesammelt.

S?MI **Psammobia* (*Psammotaea*) *radiata* *Desh.* Reeve conch. icon. X, Capsella Fig. 7 von den Philippinen. Auf Mauritius von Prof. *Möbius* gesammelt. Vielleicht meint *Dufo* 220 dieselbe Art unter seiner *Psammocola serotina* Lam. von Flussmündungen bei Mahé, Seychellen.

BAf *Psammobia* (*Heteroglypta* n.) *contraria* *Desh.* moll. de Reunion p. 11, pl. 1, Fig. 20, 21 Reunion. Auch durch Zanzibar durch v. d. Decken gefunden.

Die Psammobien, bei denen der hintere Theil der Schale eine auffällig verschiedene Skulptur zeigt, dürften eine eigene Gruppe bilden, der ich den Namen *Heteroglypta* geben möchte; hierher gehören *Ps. squamosa* Lam., *caerulescens* Lam. (= *amethystea* Chemnitz VI, Fig. 93 = *tripartita* *Desh.*), *bipartita* Philippi (= *amethystea* Chemn. Fig. 92 = *caerulescens* Reeve Fig. 60 = *Descript.* de l'Egypte pl. 8, Fig. 1), *corrugata* *Desh.* (= *Tellina scabra* Chemn. VI, Fig. 94), *costulata* Turton und einige andere.

Sganzin führt *Sanguinolaria livida* Lam. von der Insel Marie bei Madagaskar an, es ist das eine neuholländische Art = *epidermia* *Desh.*, Gruppe *Soletellina*, die nicht wohl in unserm Gebiet vorkommen dürfte.

Inclusa.

Solen bis jetzt noch nicht aus unserm Gebiet bekannt.

M?B† *Saxicava similis* *Desh.* moll. de Reunion p. 9, pl. 1, Fig. 13—15, kopirt bei *Reeve* Fig. 13. Vielleicht auch *Lienard's* unbestimmte *Saxicava* von Mauritius.

MdM *Pholas silucula* Lam. a. s. vert. ed. 2, VI, p. 45 von Ile de France. *Delessert* recueil B† pl. 1, Fig. 19. *Sganz.* 6: Ile de France, Bourbon und Madagaskar, in Thonerde.

Von keinem Späteren erwähnt; nach Tryon monogr. 1862 soll *Ph. silucula* die europäische *Ph. candida* sein. — Es ist auffällig, dass die im indischen Ocean durch Treibholz weit verbreitete und auch an der Küste von Mozambique von Prof. Peters beobachtete *Ph. (Martesia) striata* L. nicht von unsern Inseln angegeben wird.

B† *Teredo affinis* *Desh.* moll. de Reunion p. 6, pl. 1, Fig. 8—12. *Reeve* XX, Fig. 13 Reunion.

MdB† *Teredo* (*Xylotya*) *brevis* *Desh.* ibid. Fig. 8—12. *Reeve* XX, Fig. 14 Reunion. Vielleicht ist es dieselbe Art, welche *Sganz.* 6 als *T. palmulata* Lam. aus Schiffstrümmern bei der Insel St. Marie, Madagaskar, anführt.

Desh. loc. cit. nennt noch 4 andere unbestimmte, vermuthlich neue Arten von Reunion.

MdRAf *Teredo* (*Cuphus*) *arenaria* Rumph. amb. rar. Taf. 41, Fig. D, E. Martini-Chemnitz I I, Fig. 6. *Reeve* XX. *Sganz.* 5 Tintingue und Tamatave an der Ostküste von Madagaskar.

MI *Teredo* (*Uperotis*) *clava* Gmelin Walch im Naturforscher X, 1777, Taf. 1, Fig. 9, 10. *T. nucivora* Spengler ebenda XIII, 1779, Taf. 1 und 2, kopirt *Encycl.* pl. 167, Fig. 6—16. *Reeve* XX, *Teredo* Fig. 17 von Mauritius. *Fistulana gregata* Lam.

SAMB **Gastrochaena cuneiformis* Spengler Nye Samling K. Danske Selskabs Skrifter II, 1783, Taf. I, Fig. 8—11. *Pholas hians* Chemnitz X, Fig. 1678, 1679 von Westindien. Lam. an. s. vert. ed. 2, VI, p. 49 von Ile de France. Philippi Archiv f.

Naturgeschichte 1845, Taf. 7, Fig. 2. Reeve XX, Fig. 20. — *Dufo* 221 Seychellen und Amiranten, 2 oder 3 Ellen tief im Innern der Madreporen. Auch von Prof. *Möbius* von den Seychellen mitgebracht. *Desh.* 9 Reunion. *Lien.* 61 Mauritius.

B† *Gastrochaena interrupta* *Desh.* Proc. Zool. Soc. 1854, p. 329; moll. de Reunion p. 9 Reunion.

Md MI *Gastrochaena* (*Spengleria*) *mytiloides* *Lam.* an. s. vert. ed. 2, VI, p. 49 von Ile de France. Rumph Amboinische Raritätenkammer Taf. 45, Fig. P. Reeve Fig. 12. Tryon monogr. of Pholadacea p. 52. — *Sganz.* 6 Ile de France und Insel Saint Marie bei Madagaskar, in Madreporen. Auch von Zanzibar im Berliner Museum.

MB† *Gastrochaena* (*Spengleria*) *Retzii* *Desh.* Moll. de Reunion p. 7, pl. 1, Fig. 1—3 Reunion. *Reeve* XX, Fig. 6. *Lien.* 61 Mauritius. Auch durch *Robillard* von Mauritius erhalten.

Diese Art ist nahe verwandt mit der vorigen, sowie mit der westindischen *rostrata* Spengler (*Chemn.* X, Fig. 1681 = *callosa* Philippi = *Chemnitziana* Orbigny). Manche bohrende Muscheln sind weit verbreitet, da sie einer passiven Verschleppung leicht fähig sind.

SA† *Gastrochaena dentifera* *Dufo* 221 Seychellen und Amiranten, selten.

Diese Art ist zu kurz beschrieben, und daher ihre systematische Stellung zweifelhaft.

B? *Clavagella*, unbestimmte, vielleicht neue Art von Reunion, *Desh.* 7.

Brachiopoda.

M† *Terebratula Cernica* *Crosse* Journal de Conchyliologie XXI, 1873, p. 285, XXII, p. 75, pl. 1, Fig. 3. *Lien.* 72. Mauritius, in einem Fisch gefunden.

MSAf *Kraussia pisum* *Lam.* (*Terebratula*) an. s. vert. ed. 2, VII, p. 330 Ile de France. Sow. thes. I, Fig. 37—39. *Sganz.* 12 in der Baie des tombeaux, Mauritius, in grosser Tiefe.

B† *Morrisia gigantea* *Desh.* Moll. de Reunion p. 37, pl. 5, Fig. 9—11 Bourbon, auf einem Krebs, der in einer Tiefe von 200 Faden gefunden, 9 mm breit, $7\frac{1}{2}$ lang.

Im Vorhergehenden sind aufgeführt:

Cephalopoden und Pteropoden	12 Arten
Meer-Gastropoden	985 Arten
Meer-Bivalven	232 Arten
Brachiopoden	3 Arten

Zusammen: 1232 Arten.

Zeichen	Davon finden sich	Cepha- lopoden und Ptero- poden	Meer- Gastro- poden	Meer- Bival- ven	Brachio- poden	Zu- sammen
S	Auf den Seychellen	1	273	59	—	333
A	Auf den Amiranten	—	119	20	—	139
C	Auf den Cargados	—	66	7	—	73
Md	Auf Madagaskar	3 (Pter.)	201	35	—	237
M	Auf Mauritius	8	788	146	2	944
B	Auf Bourbon	—	438	91	1	533
D	Auf Diego Rodriguez	—	33	—	—	33
G	Auf den Agalegas	—	3	1	—	4
†	Nur in unserem Gebiete bis jetzt bekannt	3	225	49	2	280
R	Auch im rothen Meer	2	152	58	—	212
Af	Auch an der Ostküste des tropischen Afrika	3	214	72	—	289
I	Auch in Ostindien	4	522	104	—	630
P	Auch in Polynesien	1	192	11	—	204
Au	Auch in Australien südlich vom Wendekreise	1	67	15	—	83
SAf	Auch in Südafrika jenseits des Wen- dekreises	3	5	—	1	9
	Auch im Atlantischen Ocean oder Westindien	1	89	1	—	91

Das gegenseitige Verhältniss dieser Zahlen bezeichnet mehr den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse als die Natur der Sache selbst, so vor allem das gewaltige Ueberwiegen der Zahlen für Mauritius gegenüber Bourbon, Madagaskar und Seychellen welches zeigt, um wieviel

Anmerkung. Während des Druckes sind mir noch die Listen der polynesischen Mitren und Cypræen von Garret (Quarterly journal of conchology 1879 und 1880) zugekommen, wodurch sich diese Zahl auf 264 erhöht.

mehr eben dort schon gesammelt worden ist. Doch lassen sich jetzt schon einige Bemerkungen zur näheren Charakteristik der Fauna daran knüpfen.

1. Zunächst fällt die geringe Anzahl der Bivalven gegenüber den Gastropoden auf; etwa wie $1:4\frac{1}{4}$. Einige sonst weit verbreitete Bivalvenfamilien sind bis jetzt gar nicht vertreten, z. B. die Soleniden und Mactriden. Es beruht das wohl hauptsächlich darauf, dass Korallen- und Felsengrund an den betreffenden Inseln vorherrscht, Sand- und Schlammgrund mehr zurücktritt, denn jene sind eben reicher an Schnecken, diese an Muscheln. In der That sind die artenreichen Gattungen unseres Verzeichnisses, wie *Conus*, *Mitra*, *Cypraea*, *Cerithium*, solche, welche gern auf Korallenriffen leben, und diese geben der gausen Liste den Stempel des Allgemein-Tropischen. Beitragen mag dazu allerdings auch, dass bis jetzt viel mehr in der Litoralregion als aus der Tiefe gesammelt worden ist, und in der Litoralregion überwiegen die Gastropoden, in der Tiefe halten sich diese und die Bivalven mehr die Wage. (Ebendaher auch die so kleine Anzahl der Brachiopoden.) Wenn wir andere Faunen vergleichen, so haben wir z. B. in Orbigny's westindischer Molluskenfauna 270 Gastropoden und 109 Bivalven, in Krauss' südafrikanischen Mollusken (einschliesslich der tropischen Natalküste) 67 Meer-Bivalven auf 307 Meer-gastropoden (beinahe $1:5$), in Issel's Fauna des rothen Meeres 172 auf 390 Gastropoden ($1:2\frac{1}{4}$), in Weinkauff's Catalog der europäischen Meeresconchylien 331 Bivalven auf 852 Gastropoden (etwa $1:2\frac{3}{5}$); allerdings fehlen hier die ganz schalenlosen Gastropoden, aber wir können diese Zahlen doch vergleichen, da auch für Mauritius und die andern Inseln gewiss noch viele Nudi-branchien mit der Zeit hinzukommen werden. Im eigentlichen Eismeer (Spitzbergen, Grönland, Melvillearchipel, Nowaja-Semlja) kommen nach einer handschriftlichen Zusammenstellung des gegenwärtigen Materials 52 Bivalven und 66 Gastropoden vor, also etwa $1:1\frac{1}{4}$.

2. Im Gegensatz zu den Land- und Süsswasser-Bewohnern sind die Meermollusken der hier betrachteten Inseln und Inselgruppen im Wesentlichen unter einander übereinstimmend; wir zählen jetzt schon 336 Arten, welche sowohl auf Mauritius als Bourbon gefunden worden sind ($\frac{3}{4}$ aller von Bourbon bekannten), und 246, welche zwischen Seychellen oder Amiranten einerseits, Mauritius oder Bourbon andererseits gemeinschaftlich sind (über die Hälfte aller von den Seychellen bekannten). Die grosse Mehrzahl der bis jetzt nur von Einer Insel oder Einer Inselgruppe bekannten Arten ist entweder schwer zu finden (selten, z. B. *Mauritia*, *Dibaphus*, oder klein), oder weniger leicht zu identifiziren (kritisch, zweifelhaft, unvollständig beschrieben). Besonders für die Seychellen charakteristische Gattungen oder Untergattungen gegenüber den Maskarenen lassen sich nicht anführen, für Madagaskar nur sehr zweifelhaft *Voluta* und *Cymbium*.

3. Die faunistische Uebereinstimmung der Meerconchylien erstreckt sich aber noch weiter; nur 280 von 1232 Arten, also etwas unter $\frac{1}{4}$, sind auf die ostafrikanischen Inseln beschränkt, und diese sind wieder vorherrschend klein, selten oder zweifelhafte Arten, die übrigen sind weiter im indischen Ocean und den damit unmittelbar zusammenhängenden tropischen Meeren verbreitet, 212 finden wir wieder im rothen Meer, 289 an der afrikanischen Ostküste (Zanzibar, Mossambique, Natal), 630 (nahezu $\frac{1}{2}$) in Ostindien, z. B. Ceilon, Nikobaren, Sunda-inseln oder Molukken, die meisten von mir selbst dort gesammelt, so dass ich an der Richtigkeit des Vorkommens nicht zweifeln kann, endlich noch 204, beinahe $\frac{1}{6}$, auf den kleinen Inseln der Südsee. Es war mir sehr auffällig, viele ganz kleine Arten, welche direkt von den Sandwich-

inseln nach Berlin gekommen (vergl. Donum Bismarkianum von Dr. Langkavel 1871), wieder unter den von Robillard aus Mauritius eingesandten zu finden und ich neigte schon zu dem Verdachte hin, dass der letztere auch Conchylien aus der Südsee erhalten und mit den maskarenischen vermengt habe, aber manche derselben finden sich nun auch wieder unter den von Prof. Möbius gesammelten, einige wurden erst in Berlin aus dem mitgebrachten Sande ausgelesen: da ist nun kein Zweifel mehr möglich, es sind dieselben natürlichen Bedingungen, Tropenklima und Korallengrund, und der unmittelbare Wasserzusammenhang, welche das Vorkommen derselben Arten auf Mauritius und den Sandwichinseln (oder auch den Gesellschaftsinseln u. a.) begreiflich machen, auch wenn sie in den zwischenliegenden Gegenden bis jetzt noch nicht gefunden sind. 85 unserer Arten sind von der Küste Afrika's (Roths Meer, Mossambique oder Natal) bis Polynesien verbreitet, die meisten aus sicheren Fundorten beiderseits im Berliner Museum vertreten und direkt verglichen, darunter auch manche aus dem rothen Meer, welche Issel nicht aufführt; man kann also nicht annehmen, dass zwei verschiedene Faunen, eine ostafrikanische und eine indische auf Mauritius zusammentreffen und sich mischen, sondern es ist im Grossen und Ganzen Eine, die indische im weitesten Sinne des Wortes, welche von den Küsten Ostfrika's bis zu den Sandwich-, Marquesas- und niedrigen Inseln herrscht, dieselben vorherrschenden Gattungen und viele gemeinsame Arten, wenn auch wieder viele andere Arten nur hier und andere nur dort auftreten. Indopacifisch möchte ich diese Fauna weniger gerne nennen, da sie nur einen Theil des stillen Oceans umfasst, die Westküste Amerika's nicht erreicht.

4. Die eigentlich südafrikanische Fauna vom Wendekreise des Steinbocks an und die entsprechende südaustralische Fauna sind wesentlich von dieser indischen verschieden; die südafrikanische hat nur 9, die südaustralische aber 83 Arten mit den Maskarenen und Madagaskar gemein. Für Südafrika diente die bekannte sehr verdienstliche Arbeit von Krauss nach Abzug der nur in Natal gefundenen Arten als Quelle, für das aussertropische Australien vorzugsweise die Angaben von Quoy und Gaimard in „Voyage de l'Astrolabe“, die Arbeit von Menke 1843 über die von L. Preiss in Westaustralien (speziell zwischen Freemantle und Cape Richo) gesammelten Conchylien und die Liste der Meerconchylien bei Port Jacksen von Angas (Proc. Zool. Soc. 1867) und Cox 1868, worunter sich allerdings noch manche weit verbreitete indische finden, z. B. zahlreiche Cypraeen, bei denen man zu fragen versucht ist, ob sie nicht vielleicht nur in den Sammlungen, aber nicht im Meere von Port Jackson zu finden seien. Freilich konnte ich bei den meisten dieser australischen die Bestimmung nicht an Exemplaren kontrolliren und kann daher die artliche Uebereinstimmung nicht verbürgen, doch sind allbekannte Arten darunter, die nicht leicht zu verkennen sind. Eine andere Frage ist, ob den Fundorten immer zu trauen ist, die Menge der gemeinen indischen Cypraeaarten fällt in der Liste von Cox auf, es fragt sich, ob sie alle dort leben, und andererseits führt Menke unter den westaustralischen von Preiss gesammelten manche auf, die sonst nur von Südafrika bekannt sind, z. B. *Bullia achatina*, *Purpura trochlea*, *Patella granatina*, *granularis*, *pectinata*, an deren Vorkommen in Australien ich nicht glauben kann, wie umgekehrt zwei höchst wahrscheinlich ausschliesslich südaustralische (*Trochus punctatus* und *Bankivia varians*) unter den südafrikanischen bei Krauss; analoge Arten existiren ohne Zweifel manche zwischen Südafrika und Südaustralien.

aber um identische anzunehmen, müssen wir uns doch die einzelnen Fundortsangaben ganz genau ansehen und wo möglich mehr als Einen Gewährsmann haben.

5. Mit dem Gebiet des atlantischen Oceans hat das hier behandelte der ostafrikanischen Inseln 91 Arten gemein, es sind das theilweise solche, welche in den tropischen und subtropischen Meeren sehr weit verbreitet sind, so zu sagen circumtropische, wie man von circumpolaren spricht, z. B. *Crepidula aculeata*, die vielleicht durch Schiffe, *Janthina* und *Spirula*, welche als pelagisch durch die Meeresströmungen verbreitet werden; auffallend ist, dass hierher auch mehrere Arten von *Tritonium* und *Dolium* gehören, bei denen ich sicher westindische und sicher ostindische nicht konstant zu unterscheiden vermag, obgleich sie von einigen Autoren getrennt werden, so *Tritonium pileare*, *Dolium perdix* und *olearium*; auch *D. galea* aus dem Mittelmeer und aus Ostindien sind nicht wohl zu trennen; ferner nimmt Schwarz v. Mohrenstern manche Rissoinen als gemeinsam zwischen Westindien und Mauritius an. Endlich ist *Venus verrucosa* zu nennen, welche vom Mittelmeer und längs der Westküste Afrika's bis zum Cap und hier noch ein Stück weit nach Osten in den indischen Ocean verbreitet scheint, wenn Robillard's Angabe richtig ist (vgl. oben).

~~~~~

A n h a n g.

Anatomie einiger Landschnecken von G. Schacko.

1. *Buliminus velutinus*.

Taf. I, Fig. 13—23.

Das in Weingeist aufbewahrte Thier zeigte eine grauschwarze Haut, der Mantel schwarz, am Rande gelblich. Der Rücken fiel gegen die Schwanzspitze rasch ab, und das Schwanzende war zugespitzt mit weisslich gelbem Kiel versehen, sonst schwarz und gerunzelt. Die Sohle des Fusses schwarzgrau, in der Mitte tief eingeschnitten, nach beiden Seiten gefaltet und stark gerunzelt, 1 cm lang und 4 mm breit. Der Schlundkopf war von gewöhnlicher Birnenform, von ihm gehen zwei Speicheldrüsengänge zu den gelblich gefärbten Speicheldrüsen, die sich an den Oesophagus eng anlegen, Fig. 16.

Der Oesophagus ist durch die dünne Schlundröhre mit dem Schlundkopf verbunden. Der Magen hat eine langgestreckte sackförmige Form, verengt sich mehrere Mal und geht dann in einen dünnen langen Darm über.

Die Genitalien zeigen den Typus der Gattung. Der gemeinsame Geschlechtsgang ist sackförmig erweitert und an seinem Ende mündet der zuerst winklig gebogene schlauchartige am Ende kolbige, 4 mm lange Theil des Flagellum. An der kolbigen Spitze setzt sich fadenförmig dünn 10 mm lang das Flagellum fort und erweitert sich ein wenig an dem äussersten Ende.

Ganz dicht wo das Flagellum in die Vagina tritt, mündet auch der 6 mm lange rechtwinklig gebogene kolbige, dunkelbraun gefärbte Penis. An seinem oberen Theil setzt sich der Musculus retractor an und fast gipfelständig inserirt sich das nur 6 mm lange Vas deferens an die Spitze des Penis, und mündet anderseits kurz über dem Eintritt des Blasenstieles in die Vagina. Der kurze 3 mm lange kaum gebogene Blasenstiel, trägt die 1 mm grosse Samenblase.

Die Vagina ist hier 4 mm lang und 1 mm breit und von derselben setzt sich der 12 mm lange und 2 mm breite Uterus stark gewunden und gefaltet bis zur Eiweissdrüse fort. Dieselbe ist gelblich braun, 3 mm lang. Am untern Ende der Eiweissdrüse mündet der lange vielfach gewundene Zwittergang in die weissliche viel gefaltete Prostata. Die Zwitterdrüse war nicht recht erkennbar.

Der Kiefer. Fig. 13.

Der Kiefer ist ziemlich stark gekrümmt. Der innere kleinere Bogen glatt gerundet, in der Mitte etwas flacher gebogen als an den Seiten. Der äussere grössere Bogen nach beiden Seiten unregelmässig ausgerandet. Eine Plattenbildung findet nicht statt, da die scheinbaren Ansätze fest verwachsen sind und daher eine starke Längsstreifung entsteht. Der Kiefer hat 15 stark hervortretende Langstreifen. Ferner tritt noch eine feinere Längsstreifung auf. Die Farbe des Kiefers ist nach den Seiten zu dunkel graubraun, die mittlere obere Partie gelbbraun. Bei starker Vergrösserung erscheinen die einzelnen feinen Ausscheidungsprodukte der Zellen feinkörnig, so dass der ganze Kiefer matt sammetartig erscheint. Derselbe ist 2 mm breit, an beiden Seiten 0,5 mm und in der Mitte 0,35 mm lang.

Die Radula. Fig. 14, 15, 18—23.

Die Radula hell, zart, ohne jede Färbung, ist 4,5 mm lang und 2,7 mm breit. Sie ist im Verhältniss breiter als bei europäischen *Buliminus*-Arten, welche keine so grosse Zahl von Marginal- oder Randzähnen bilden. Die Schwingungslinie (Fig. 14) oder die Stellung der Zahnplatten in der Querreihe weicht entschieden von dem Typus europäischer *Buliminus*-Arten ab. Die Richtung der Linie gegen die Medianlinie der Radula ist fast rechtwinklig, bei den Lateral- oder Seitenzähnen wie gewöhnlich bei den europäischen *Buliminus*-Arten, weicht aber bei den Marginalzähnen entschieden ab, indem sie sich statt oben der Spitze der Radula zuzuwenden, in einen Winkel von 140° nach unten, also ganz der sonstigen Richtung entgegen, zuwendet.

Die Amerikanischen *Bulimulus*, nämlich aus der Gruppe *Dryptus*, *Otostomus*, *Rhinus* und die *Orthalicus* richten die Querreihen nach der Spitze der Radula zu, ja *Otostomus virginalis* direkt unter scharfem Winkel gegen die Mittellinie nach unten am Rande aber nach oben, ohne eigentliche Lateralzähne zu zeigen, die sonst rechtwinklig zur Medianlinie sich stellen. Der afrikanische *Buliminus tumefactus* hat mit den amerikanischen *Buliminus* Aehnlichkeit in der Richtung der Reihen, doch weichen die Zahnplatten entschieden davon ab (vergl. meine Untersuchungen in v. Martens Binnenmollusken von Venezuela 1873, Taf. 2).

Buliminus fallax Say und *B. abyssimicus* Rüpp. schliessen sich hierin den europäischen Arten an.

Achatina, *Perideris*, *Limicolaria* bieten keinen Vergleich, da die Querreihen der Radula rechtwinklig gegen die Medianlinie stehen. Somit zeigt unser *Buliminus velutinus* eine entschiedene Abweichung von den mir bis jetzt bekannten *Buliminus*-Arten, und zeigt dies ebenfalls in der Form der einzelnen Zahnplatten.

Die Formel für die Anzahl der Zahnplatten in einer Querreihe ist folgende $190 + 13 + 1 + 13 + 190$. Die Radula hat somit 407 Längsreihen und 158 Querreihen.

Die Zahnplatten sind sehr dicht gestellt. Diese enge Stellung wird dadurch bewerkstelligt, dass die Zahnspitzen und die Basalplatten einer oberen Reihe sich in die Zwischenräume, welche die nachfolgende Reihe mit ihren schräggestellten ovalen Halsschildern bildet, sich schräg hineinschieben.

Die obere Reihe überragt, mit Ausnahme des Mittelzahns, zwar mit ihren Zahnhakenspitzen die nächst folgende Reihe, deckt sie aber nicht, und das ist nur deshalb möglich, weil die Basalplatten dreieckig sind, während sie bei andern *Buliminus*-Arten zumeist eine viereckige Form haben.

Der Mittelzahn, Fig. 18M der Radula ist einspitzig, kleiner als der nächste Seitenzahn, und sein Haken ist im Verhältniss kurz zur Basalplatte. Er hat eine schlanke dreieckige wappenförmige Gestalt und ist am Halse stark abgerundet mit kegelförmiger etwas stumpfer Spitze. Oefter zeigt sich noch am breiten Ende des freien Nagels der Zahnspitze auf beiden Seiten ein schwacher Ansatz als sollten Nebenzähnen gebildet werden wie sie bei europäischen *Buliminus*-Arten sich stets ausgebildet finden und dann 3spitzige Zähne bilden. Hier scheint also nur noch eine schwache Andeutung davon vorhanden zu sein. Die Basalplatte ist lang und viereckig, an beiden unteren Seitenecken stark verdickt. Der Mittelzahn zeigt eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Mittelzahn des *Buliminus abyssinicus* Rüpp., der eigentlich auch verkümmerte Nebenzähnen an dem schlankeren Mittelzahn zeigt.

Die Seitenzähne Fig. 18, S1, S2 und Fig. 19, S11, 12, 13 sind grösser als der Mittelzahn, haben eine spitze ovale, schildförmige Form. Sie stellen sich nicht mit ihren Hakenspitzen parallel zur Medianlinie, sondern die freie Hakenspitze neigt sich zu derselben und der ganze Zahn erscheint dadurch etwas winklig gebrochen. Nach der Innenseite bilden die Seitenzähne keine Nebenzähne, wohl aber findet sich ein gut ausgebildeter Nebenzahn an der Aussenseite, dessen Nagelspitze ebenfalls nach der Medianlinie sich neigt. Die ovale wappenförmige Fläche ist nicht ganz gleich gewölbt, sondern zeigt mehrere schärfer hervortretende Anschwellungen, besonders gegen die Halskante des Seitenzahns. Die freie grosse Hakenspitze der Seitenzähne ist breit und an dem äussersten Ende nicht spitz zulaufend, sondern mehr schaufelförmig und etwas abgeflacht und zeigt in den meisten Fällen eine Neigung einen schwachen Ansatz zu bilden Fig. 20. Zu einer Spaltung bildet sich dieser Ansatz nie aus.

Aehnlichkeit zeigen die Seitenzähne auch mit denen von *Buliminus abyssinicus*, indem sich hier auch die oval spitze Form der ganzen Zahnplatte wiederfindet, dann aber auch der nach der Medianlinie zu gebrochene Zahn sich deutlich zeigt. Jickeli Moll. Nord-Ost-Afrika Taf. II. Fig. 2 (8).

Die Basalplatten der Seitenzähne sind mehr dreieckig geformt und nach der einen Seite hin ausgeschweift, am untersten Ende verdickt, lappenförmig auslaufend, und verschwinden schon in der Gegend des kleinen äusseren Nebenhakens des Seitenzahns.

Die Marginal- oder Randzähne Fig. 19 R1, R2 und Fig. 21, 22 und 23 stehen an Grösse und Stärke gegen die Seitenzähne zurück. Der erste Marginalzahn F. 19 R1 und auch der zweite R2 behalten die Form der Seitenzähne bei, nur hat der kleine äussere Nebenhaken sich in 2 Theile bei R1 und in 4 Theile bereits bei R2 getheilt, bei den folgenden Marginalzähnen wird die Hauptfläche des Schildes immer schmäler und die Wucherzacken mehrten sich bis auf 6, und nun bleibt die Wucherung constant bis zum äussersten 5. Randzahn, wo sich nur noch 4 und beim letzten Randzahn 2 Wucherzacken zeigen.

Da auch bei den Marginalzähnen die Basalplatten dreieckig (Fig. 23) sind, so legen sich die Zähne schräg an einander und zwar sehr dicht, so dass sie fast wie Nanina-artig gebildet erscheinen. Eine sehr nahe scheinbare Aehnlichkeit haben sie mit den Marginalzähnen der (noch nicht sicher gestellten) *Helix insculpta*, doch liegt bei dieser der Bildung des Randzahns der Hyalinen-Charakter zu Grunde.

Der *Buliminus abyssinicus* bildet zwar auch bei Marginalzähnen den Nebenzahn als Wucherzahn aus, aber hier treten nie mehr als 2 kleine Zacken daran auf. Da die Basalplatte

aber 4eckig ist, so legt der Marginalzahn sich nicht auf die Seite und bildet mit seinen Wucherzacken stets ein Rechteck und bleibt parallel zur Mittellinie.

Der Mittelzahn.

Breite des als Schildplatte erscheinenden Hakenhalses	0,013 mm
Länge des Zahnhakens vom Halse bis zur Spitze	0,017 mm
Länge der Basalplatte	0,024 mm
Breite der Basalplatte am unteren Ende	0,015 mm.

Lateral- oder Seitenzähne.

Länge der Schildplatte vom Halse bis zur Hakenspitze	
Seitenzahn S1	0,028 mm
Seitenzahn S2	0,03 mm
Seitenzahn S13	0,025 mm
Breite der Schildplatte	0,019 mm
Breite der grossen Hakenspitze	0,007 mm
Länge der Basalplatte	0,032 mm

Marginal- oder Randzähne.

Länge des ersten Randzahns	0,023 mm
Länge des zehnten Randzahns	0,03 mm
Länge des letzten Randzahns	0,01 mm

Vergleicht man europäische Buliminus-Arten in Betreff der Radula mit *Buliminus velutinus*, so findet man keine Aehnlichkeit der Zahnform, z. B. *Buliminus detritus* Müll. hat einen grossen dreispitzigen Mittelzahn und fast ebenso grosse Seitenzähne mit hoher runder Schildform, die sich aber parallel zur Medianlinie stellen, mit viereckiger Basalplatte; er zeigt wenig Neigung zur Wucherung, bleibt fast immer 2spitzig bis zum Rande.

Buliminus montanus Drp. hat ebenfalls 3spitzigen Mittelzahn, der kleiner ist als der Seitenzahn, aber die Schildfläche ist ganz flach oben abgestutzt, der erste Nebenzahn zeigt ausserdem noch einen kleinen Innen-Nebenhaken, doch verschwindet derselbe bald. Beim 12. Zahn beginnt der Aussenzacken sich zu theilen und beim 16. tritt Wucherung ein, die mit 6 Zähne endet.

Buliminus obscurus Müller hat einen 3spitzigen Mittelzahn. Der Seitenzahn grösser, aber ganz flach abgestutzt, 11 Stück Randzähne, zuerst 2spitzig, dann tritt Wucherung mit 5 Zacken auf.

Buliminus abyssinicus Rüpp. (Gruppe *Petraeus*). Mittelzahn 3spitzig, schmale, lange, aber kräftige Seitenzähne mit äusseren Nebenhaken. Bei den Randzähnen bleibt derselbe zu Anfang unverändert, dann aber theilt er sich.

Buliminus punctatus aus Südost-Afrika (Gruppe *Rhachis*) von Tette nähert sich sehr dem *B. obscurus*, hat einen 3spitzigen sehr kleinen Mittelzahn, ein grosses schräg abgestutztes Mittelschild bei dem sehr kräftigen Seitenzahn, rechtwinklig und parallel gestellte Zahnreihen. Randzähne sehr wuchernd, 7 Nebenzacken.

Buliminus tumefactus Reeve von der Cameroon Bay, der Schale nach unserm *velutinus* nicht unähnlich, ist sehr abweichend in der Zahnform. Die eigentlichen Randzähne neigen sich zu dem amerikanischen *Bulimulus virginalis*, auch setzen die Querreihen direkt unter scharfem Winkel gegen die Medianlinie ein. Er wird wohl von *Buliminus* abgezweigt werden müssen und stellt sich eher zu *Bulimulus papyraceus* Mawe.

Buliminus Natalensis Krauss zeigt nach der Untersuchung von W. G. Binney (Ann. New-York Acad. 1879 p. 362, pl. 14, Fig. J) Kiefer und mittlere Zähne ähnlich den hier beschriebenen, die Seitenzähne etwas abweichend.

Buliminus syriacus Pfr. (Petraeus, Uebergang zu *Napaeus*) hat einen grossen fast gleichseitig 3eckigen Mittelzahn, der die Basalplatte überragt, die Seitenzähne haben dieselbe Form, bilden erst später noch einen kleinen Aussenzacken, der bei den Randzähnen wieder in 2 Zacken zerfällt.

Der Haupthaken bei *Buliminus* theilt sich nie, und nur an der äussersten Spitze, sobald sie Schaufelform annimmt, zeigt sich eine kleine Andeutung.

Buliminus hat in Rücksicht der Radula wenig Aehnlichkeit mit *Achatina*, da der Mittelzahn bei *Achatina purpurea* verschwindend klein wird, der erste Seitenzahn stark entwickelt ist ohne Nebenzähne, die erst bei den Randzähnen als kleine Aussenzacken zum Vorschein kommen.

Bei *Achatina pulchella* Martens ist der Mittelzahn sehr klein, die Seitenzähne mit Nebenhaken und die Randzähne bilden den Innenzacken so, dass sie 3spitzig werden.

Perideris auripigmentum Reeve ganz abweichend, fast mit verschwindend kleinem Mittelzahn, dann treten runde Schaufelzähne als Seitenzähne auf. Randzähne ähnlich 3spitzig, wie bei *Bulimini tumefactus*.

Es zeigt somit die Form der Radulazähne des *Buliminus velutinus* für Mittel- und Lateralzahn Anschluss an den europäischen *Buliminus*, während der Marginalzahn sich mehr dem amerikanischen *Otostomus* zuneigt.

2. *Pachystyla inversicolor*.

Der Kiefer war durch Kochen in Aetzkali wahrscheinlich in kleinere Stücken zerfallen, scheint somit wenig Consistenz zu besitzen.

Die Radula ist 8 mm lang und 3 mm breit, am unteren Ende gelb gefärbt.

Der Mittelzahn zeigt deutlich die Naninenform (typus) an. Die Basalplatte wenig sichtbar. Die Schneide des Hakens ist spitz, nach der entgegengesetzten Seite breit auslaufend und ragt zu beiden Seiten über den Hakenhals hervor. Die Querreihen werden nur durch die äussersten Spitzen der folgenden gedeckt. Die Seitenzähne sind etwas breiter, ihre Schildflächen ein wenig der Medianlinie zugeneigt. Der sich bildende Aussenzacken tritt erst beim 18. Seitenzahn entschieden hervor.

Die Randzähne, die sich sehr auf die Seite legen, indem die Schildfläche verschwindet, liegen schräg gegen die Mittellinie gerichtet. Der Aussenzacken tritt neben dem Mittelzahn an die Spitze und bildet eine 2spitzige abgerundete Schneide, eine bei Naninen charakteristische Form.

Formel für die Längsreihen der Radula:

$$80 + 22 + 1 + 22 + 80 = 215 \text{ Längsreihen und } 157 \text{ Querreihen.}$$

Der Fuss ist dunkelschwarz, 30 mm lang, Rücken 7 mm hoch, an den Seiten unregelmässig runzlig gestreift, am Ende abgestutzt und mit einer Schwanzpore versehen, und an der Kante gegen die Sohle zu durch 2 schmale Längsstreifen oder Furchen gesäumt, wovon die der Sohle näher liegenden fein gerunzelt, die darüber gröbere Runzelstreifen hat.

Der Geschlechtsapparat:

Penis und Vagina münden dicht neben einander in den sehr kurzen Geschlechtsgang. Der vordere Theil des Penis ist schlauchförmig, dann setzt sich derselbe in rechtem Winkel kolbenförmig erweitert fort, mit zugespitztem Ende, von der Spitze setzt derselbe sich ferner als dünner Schlauch 26 mm lang noch fort und unten in rechtem Winkel schliesst sich das 45 mm lange Flagellum an. Dasselbe war stellenweis mit kolbenartigen Körpern angefüllt.

Kurz vor der sackartigen Spitze des Penis tritt das vas deferens ein, ist gegen 20 mm lang und führt zur Prostata des Samenleiters. Die Prostata geht bis zur Eiweisdrüse, die eine gelblich graue langgestreckte Masse bildet. Am andern Ende derselben befindet sich der nicht lange Zwittergang, von der Zwitterdrüse kommend.

Der Uterus steigt vielfach gefaltet an der Vagina von der Insertion des vas deferens bis zur Eiweisdrüse gerade empor ohne sich um dieselbe zu winden.

Fast parallel mit der Vagina laufend und nur mit schwachen Bindefasern an den Uterus geheftet befindet sich der Blasenstiel mit dem Receptaculum seminis, das in die Vagina mündet. Das untere Ende ist stark und fest, dann aber setzt sich dieser zarthäutige Schlauch unregelmässig dick 44 mm lang fort und endet in eine etwas langgestreckte unregelmässig geformte Blase. Als ich dieselbe öffnete, fand sich darin ein Spermatophor in Form einer hornartigen flachen Schote, 12 mm lang, die auf der einen Seite eine fadenförmig umgebogene Verlängerung zeigte von etwa 3 mm, auf der andern Seite aber einen 30 mm langen sehr feinen haarförmigen Faden aufwies. Das so an der einen Spitze umgebogene Spermatophor nahm somit fast die ganze Länge des Ausführungsganges (Blasenstiel) der Samentasche ein. Ausserdem fanden sich noch 2 andere weniger lang entwickelte hornige Spermatophoren darin vor.

Der Schlundkopf im Verhältniss klein, 7 mm lang. Magen und Darm war schon sehr zersetzt und konnte nicht beobachtet werden.

3. *Stylodonta unidentata*.

Der Kiefer hatte eine Spannung von 4 mm, war 0,9 mm breit, von dunkelbrauner Färbung und schwach quer dicht- und feingestreift.

Leider waren die beiden zu untersuchenden Exemplare sehr zerfetzt.

Die Radula zeigte Helixzähne.

Der Mittelzahn hat fast dreieckige Form mit scharfer Spitze und kurzer abgerundeter Hinterfläche des Mittelschildes.

Der Seitenzahn, etwas schräg nach der Mittellinie gerichtet, ist bedeutend grösser.

Der Randzahn, bedeutend kleiner, legt sich sehr schräg, bildet eine schaufelförmige Mittelspitze und daran einen kleinen Aussenzacken.

Formel $43 + 17 + 1 + 17 + 43 = 121$ Längsreihen und 155 Querreihen. Die Radula ist 10 mm lang und 4 mm breit.

Die Geschlechtstheile des untersuchten Individuums waren bedeutend ausgebildet und zeigten in ihren Lumen Längs-Lamellen, welche durch Reihen feiner Querplättchen gebildet werden, deren Spitzen alterierend nach rechts und links gerichtet sind. Von weiblichen Organen war hier nichts deutlich zu erkennen. Wohl wurde ein dem Zwittergang entsprechender Canal aufgefunden. Dieser Befund spricht dafür, dass bei dieser Landschnecke die Geschlechter ausnahmsweise getrennt sind wie schon Dufo angedeutet hat. Der erwähnte Gang ist alsdann einfach Ausführungsgang des Hodens.

Beschreibung einer Bullide von Prof. Möbius.

Taf. 21, Fig. 7.

Bis 4 cm lang, 1,5 cm breit.

Kopf flach, vorn breit, hinten mit zwei halblanzettlichen Zipfeln, vor welchen die Augen sitzen. Der Fuss besteht aus zwei Haupttheilen. Der vordere ist sehr breit wie der Kopf und dehnt sich oft noch breiter aus. Er ist durch eine sehr feine Querfurchen in eine kürzere vordere Abtheilung und eine doppelt so lange hintere Abtheilung gesondert. Die hintere zerfällt in eine rechte und linke Hälfte, welche beide die Seiten und einen Theil des Rückens der Schale bedecken. Vorn wird die Schale von den Kopflappen bedeckt und hinten durch eine grosse Mantelkappe. Wenn sich die aufsteigenden Seitenlappen des Fusses nach vorn ziehen und die Mantellappen nach hinten, so werden auch die Seiten der Schale etwas blossgelegt.

Die Grundfarbe der Schale ist dunkelgrün. Sie hat grössere braungelbe weiss gesäumte Flecke und kleinere gelbrothe Flecke.

Das Weichthier ist zart hellgrün, die Oberseite lichter als die untere. Das Grün ist überall mit runden orangegelben Flecken besäet.

Die Schnecke kriecht langsam und sondert viel dicken Schleim ab. Die Schleimdrüsen sind länglich eiförmig.

Sie wurde am 21. December 1874 auf Fucus neben Basaltblöcken im äussern Theile der Bucht Grande Baie gefangen.

Leider ist das Original zu dieser von Prof. Möbius nach dem Leben entworfenen Beschreibung und Abbildung nicht mehr in seiner Sammlung nachweisbar und daher, da eine Charakteristik der Schalenform fehlt, nicht mehr systematisch zu bestimmen.

Sie dürfte der Gattung *Cryptophthalmus* am nächsten kommen.

TAFEL XIX.

Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1, 2. *Omphalotropis Möbii* n. sp. S. 189.
- 3—5. *Helix cyclaria* Morelet (natürliche Grösse. S. 195.
  - 6. *Pachystyla inversicolor* Fer. jung. S. 191.
  - 7, 8. *Isidora Forskalii* Ehrenb. S. 210.
  - 9, 10. *Limnaea Mauritianae* Morelet. S. 209.
  - 11, 12. *Physa Borbonica* var. *nana* Potiez et Michaud. S. 209.
  - 13—23. Anatomie von *Buliminus velutinus* Pfr., von G. Schacko. S. 337—342.
  - 13. Kiefer, 12mal vergrössert.
  - 14. Verlauf der Querreihe der Zähnchen auf der Radula von der Mittellinie zum Seitenrand.
M. Mittelzahn, S. Seitenzähne, R. Randzähne.
  - 15. Radula, doppelt vergrössert.
  - 16. Schlundkopf, Magen und Darmkanal.
  - 17. Geschlechtsapparat, 4mal vergrössert: Z. Zwitterdrüse, Zg. Ausführungsgang derselben,
E. Eiweissdrüse, Ut. Uterus, Vg. Vagina, Rs. Receptaculum seminis, Vd. Vas deferens,
P. Penis, Mr. Musculus retractor, Fl. Flagellum, M. Muskel desselben.
  - 18. Mittelzahn (M), erster und zweiter Seitenzahn der Radula (S1., S2.)
  - 19. Elfter und dreizehnter Seitenzahn (S.), erster bis dritter Randzahn (R.)
  - 20. Haupthakenspitze
  - 21. Randzähne
  - 22. Aeusserste Randzähne
  - 23. Randzahn in verschiedenen Ansichten
- } 660mal
vergrössert.

~~~~~

TAFEL XX.

- Fig. 1. *Daphnella trivariatica* n. sp., vergrößert, der nebenstehende Strich giebt, wie bei den folgenden, die natürliche Grösse an. S. 228.
- 2. *Clathurella rufinodis* n. sp., vergrößert. S. 227.
 - 3, 4. *Daphnella nitida* Kien., vergrößert. S. 228.
 - 3a. Spitze, noch mehr vergrößert.
 - 3b. Seitenansicht der Mündung.
 - 5. *Terebra coerulescens* var. n. *flammulata*. S. 230.
 - 6. *Plicatella bonasia* sp. n. S. 246.
 - 7. *Phos textus* var. n. *rhodostoma*. S. 241.
 - 8. *Pisania naevosa* sp. n. S. 240.
 - 9. *Pisania amphodon* sp. n., vergrößert. S. 240.
 - 10. *Nassa Thersites* var. n. *Irus*. S. 243.
 - 11. *Columbella Cumingi* Reeve, vergrößert. S. 248.
 - 11a. Spitze stärker vergrößert.
 - 12. *Columbella spiratella* sp. n., vergrößert. S. 248.
 - 13. *Columbella alabastrum* Reeve, vergrößert. S. 247.
 - 14. *Columbella cincinnata* sp. n., vergrößert. S. 248.
 - 15. *Mitra polita* Reeve. S. 252.
 - 16. *Turricula simulans* sp. n., vergrößert. S. 255.
 - 17. *Rissoa Mauritiana* sp. n., vergrößert. S. 285.
 - 18. *Barleeia? microthyra* sp. n., vergrößert. S. 285.
 - 19. *Turritella concava* sp. n., vergrößert. S. 283.
 - 20. *Trochus chrysolaemus* sp. n., vergrößert. S. 296.
 - 21. *Chemnitzia chrysozona* sp. n., vergrößert. S. 301.
 - 21a. Skulptur stark vergrößert.
 - 22—25. *Leptothyra roseocincta* sp. n., verschiedene Farbenvarietäten. S. 204.

~~~~~

TAFEL XXI.

Grösstentheils nach Originalzeichnungen von Prof. *Möbius*.

- Fig. 1. *Leptoconchus striatus* Rüppell. S. 238.
 1a. Eikapsel desselben.
- 2. *Leptoconchus Cumingi* Desh. S. 238.
 2a. Eikapsel desselben.
 2b. Kleinere Eikapsel.
- 3. *Aplysia nigrocincta* sp. n. S. 307.
 3a. Schälchen desselben von der Seite.
 3b. Schälchen desselben von unten.
- 4. *Notarchus Indicus* Schweigger, von der Seite. S. 307.
 4a. Derselbe, von oben.
 4b. Derselbe, von unten.
- 5. *Chelidonura hirundinina* Q. G., dreimal vergrössert. S. 305.
 5b. Borstenförmige Anhänge am Vorderrand des Kopfes desselben, 25mal vergrössert.
- 6. *Chelidonura hirundinina* var., von der Bauchseite, 3mal vergrössert. S. 305.
 6a. Einer der borstenförmigen Anhänge am Kopf, 300mal vergrössert.
 6b. Derselbe sich einstülpend.
 6c. Zellen des Flimmerepithels desselben.
- 7. Unbestimmte Bullide. S. 343.
- 8. *Pleurobranchus scutatus* sp. n. S. 309.
 8a. Schälchen desselben.
- 9. *Lamellaria nigra* Blainv. S. 275.
- 10. *Scintilla aurantia* Lam., von der Seite. S. 322.
 10a. Dieselbe, von oben.
 10b. Mantelpapille desselben, stark vergrössert.
-

TAFEL XXII.

- Fig. 1. *Triforis crassula* sp. n. S. 282.
- 2. *Marginella majuscula* sp. n. S. 257.
- 3. *Gadinia Mauritiana* sp. n., von oben. S. 310.
    3a. Dieselbe, von unten.
    3b. Dieselbe, von der Seite.
- 4. *Pinna aequilatera* sp. n. S. 317.
- 5. *Pecten mirificus* Reeve. S. 313.
- 6—10. *Pecten lividus* Lam., Farbenabänderungen. S. 314.
- 11—13. *Pecten cuneolus* Reeve, Farbenabänderungen. S. 314.
- 14. *Lucina angulifera* sp. n. S. 321.
    14a. Dieselbe im Durchschnitt.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00070 7372