MUSEUM LIBRARY.

S. Mollusks
Moricand, Stefano
Coquilles terres-
tres et fluviatiles,
envoyées de Bahia
par M. S. Blanchet.
Geneva. 1835

UNITED STATES NATIONAL

qQL
405
M67
1836
v.1
MOLL

H952717

954
405
M67
1836
v. 1
MOLL

A Monsieur Secrétaire Philadelphien
A Monsieur l'Intendant de la ville de Philadelphie
Par l'auteur

Division of Mollusks
Sectional Library

MÉMOIRES

SUR QUELQUES

COQUILLES FLUVIATILES ET TERRESTRES

D'AMÉRIQUE.

PAR STEFANO MORICAND.

(Extrait des Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.)

MÉMOIRE

SUR LES

COQUILLES TERRESTRES ET FLUVIATILES,

ENVOYÉES DE BAHIA PAR M. S. BLANCHET.

PAR STEFANO MORICAND.

Division of Mollusks
Sectional Library

(Extrait du Tome VII des Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.)

HELIX Feruss.

2^{me} Sous-genre COCHLOHYDRA. Fer. Succinia Drap.

✓ Art. 1. *H. unguis*, Fer.

Hab. Sur les bords de la lagune nommée *la Digue* ou *le Baril*, tout près de la ville de Bahia. L'animal est beaucoup plus gros que sa coquille qui n'abrite qu'une partie du dos, comme dans les testacelles.

2. *H. sulculosa*, Fer.

Hab. aux Illheos.

✓ 3. *H. brasiliensis*. Sowerby. Sub Succinia.

Hab. les bois humides de S. Gonzalves.

Elle est tout-à-fait membraneuse, quand on en retire l'animal, elle se déforme et s'aplatit entre les doigts; on lui rend sa forme en soufflant dedans comme dans une gousse de raisin. Elle est d'un beau vert et l'animal est bleu.

✓ 4. *H. atrovirens*. Nob. t. 2, fig. 1.

Testa ventricosa, sub membranacea, atrovirens, læviuscula, spira depressa, apertura magna transversè ovata.

Hab. à Portao sur l'espèce de Palmier, nommée Patioba par les habitants.

C'est une des grandes espèces d'Ambrettes, elle a 11 millimètres de hauteur et 21 millimètres de largeur. Elle est formée de trois tours de spire, dont le dernier est beaucoup plus grand que les deux autres; elle est d'une consistance membraneuse, élastique, transparente, d'une couleur vert-olive, et sa surface est marquée de stries peu saillantes et irrégulièrement espacées. Le sommet de la spire est fort peu saillant et très-petit, comparativement à l'ampleur du dernier tour; la bouche à 15 millimètres de largeur, sur 12 de hauteur. L'animal m'est inconnu.

OBSERVATIONS. Ces trois dernières espèces, le *sulculosa*, le *brasiliensis* et l'*atrovirens* ont de grands rapports entre elles, mais sont bien faciles à distinguer quand on les a toutes les trois sous les yeux.

La 1^{re} (*sulculosa*) est aussi haute que large, a 4 tours de

spire, dont le dernier est moins grand que dans les deux autres espèces, la spire élevée et conique, elle est d'un vert jaunâtre pâle, chargée de sillons pressés, réguliers et profonds.

La 2^{me} (*brasiliensis*) est plus large que haute, n'a que trois tours, la spire surbaissée; elle est d'un vert gai, chargée de sillons réguliers et profonds comme la précédente.

La 3^{me} (*atrovirens*) a la même forme que le *brasiliensis*, mais elle est deux fois plus grosse, d'un vert foncé olivâtre, et n'est point sillonnée, du moins sur le dernier tour, car le sommet de la spire offre quelquefois des stries analogues aux sillons des deux précédentes.

4^{me} Sous-genre. *HELICODONTA*. Fer.

5. *H. comboïdes*, d'Orb. var. *brasiliensis*, Nob.

H. testa globulosa, deformata, perforata, lævigata, striata, tenui, diaphana, albido succinea, subtus lucida; spira obliqua brevi, contusa, septem anfractibus, apice obtuso; apertura personata, subtriangulari, bidentata, columella brevi; labro crasso reflexo albo. Long. 8 millim., lat. 10 millim.

Je cite la phrase de M. d'Orbigny, parce qu'elle fera mieux saisir les petites différences que j'ai remarquées entre les individus qu'il a rapportés de Chiquito dans la république de Bolivie, et qu'il a bien voulu me communiquer, et ceux recueillis par M. Blanchet aux environs de Bahia. Ces derniers sont en général plus petits, et la bouche, au lieu de n'avoir que deux dents, en a trois très-fortes, l'une placée sur la columelle, est très-saillante, les deux autres sont situées sur la lèvre droite,

la première vis-à-vis de la dent columellaire, et la seconde, qui est la plus large, sur le bord inférieur. Cette bouche est en petit fort semblable à celle de l'*H. labyrinthus*. Quelques individus offrent des stries fines et régulières sur toute la spire, d'autres en sont complètement privés; dans tous la partie inférieure du dernier tour est lisse et luisante. Il n'y a du reste aucun doute sur l'identité de l'espèce, qui est remarquable par le dernier tour qui s'écarte plus ou moins de l'axe de la spire, comme dans l'*H. contusa* et quelques autres.

J'avais d'abord nommé cette coquille *H. dejecta*. M. Férussac à qui je l'avais communiquée, m'a écrit que M. d'Orbigny l'avait nommée de son côté *H. chiquitensis*, nom qu'il a sans doute abandonné pour celui de *comboïdes* qui doit lui rester. Mais je rappelle les autres, parce que j'en ai envoyé à plusieurs de mes correspondans, d'abord sous celui de *dejecta* N. et ensuite sous celui de *chiquitensis*, d'Orb.

5^{me} Sous-genre. *HELICIGONA*. Fer.

6. *H. pyramidella*, Wagn. *Helicina pyramidella*, Spix, tab. 16, f. 1, 2.

H. Blanchetiana, Moric., Mémoires de la Soc. de Phys. et d'Hist. nat. de Genève, Vol. VI, t. 1, fig. 3.

Ayant reçu, depuis la publication de mon premier Mémoire sur quelques espèces nouvelles de coquilles d'Amérique, un grand nombre de variétés de cette coquille, j'ai reconnu que mon *H. Blanchetiana* rentre dans l'espèce de Spix, dont elle n'est qu'une des variétés que je classe ainsi.

α. *Immaculata*, toute blanche, sans bandes ni taches, bouche rose.

β. *Bipunctata*, blanche, deux taches intérieures sur la lèvre droite, point de bandes, bouche rose ou blanche.

γ. *Blanchetiana*, blanche, deux taches sur la lèvre droite, et une bande brune sur la partie inférieure du dernier tour.

H. Blanchetiana, M. loc. cit.

δ. *Rosea*, coquille rose, la bande inférieure et les taches.

ε. *Rosea immaculata* rose, la bande inférieure, point de taches.

ς. *Spixiana*, blanche, une bande inférieure et deux autres sur le dernier tour au-dessus de la carène, dont une seule est visible sur les tours suivans, point de taches, la bouche rose. *H. pyramidella*, Spix, loc. cit.

ζ. *Versicolor*, rosée, brun-clair, ou chocolat avec ou sans taches, bouche rose ou blanche, une seule bande noire sur le dernier tour (outre la bande inférieure), avec une bande blanche ou jaune, qui touche à la suture et se prolonge quelquefois jusqu'au sommet de la spire.

Cette dernière variété pourrait se subdiviser en plusieurs autres. Le caractère de la bouche rose ou blanche paraît se retrouver indistinctement dans toutes les variétés, et l'on conçoit que combiné avec les deux taches de la lèvre, les bandes brunes nulles, ou au nombre de 1, 2 ou 3 sur le dernier tour, la bande blanche ou jaune, de la dernière variété, et le fond blanc, rose ou chocolat de la coquille, le nombre de variétés peut se multiplier à l'infini.

Elle habite les grands bois, et se trouve plus particulièrement sur les fougères grimpantes.

OBSERVATION. L'*H. pyramidella* n'est peut-être elle-même qu'une variété de l'*H. Bosciana*. Fér., t. 64, fig. 1 ; cependant celle-ci est plus évasée de la base et la spire moins élevée, elle présente donc une pyramide plus surbaissée, elle est d'une consistance plus épaisse et plus solide, et la bouche est rentrante, l'angle supérieur ne s'appliquant pas sur la carène du dernier tour, mais sur la surface plane inférieure à quelque distance du bord formé par la carène.

7. *H. navicula*, Wagn. *Navicula fasciata*, Spix, t. 15, fig. 2, 3. Elle offre deux variétés.

α. *Fasciata*, deux larges bandes brunes, sur un fond jaune chamois, c'est celle figurée par Spix.

β. *Unicolor*. Sans bandes.

Elles ont toutes deux la spire rose au sommet.

C'est une des plus curieuses et des plus rares coquilles du Brésil ; elle a été trouvée aux Illheos, près Almada, sur les feuilles d'un palmier, appelé dans le pays *Olho de Cana*.

8. *H. pileiformis*, Nob. t. 2, fig. 2.

Testa pyramidata trocheiformis, tenuis, fragilis fusco-olivacea; spira elevata septem anfractibus planulatis constans ultimus carinatus; apertura semi-ovata peristomate reflexo.

Hab. aux Illheos.

Cette espèce, que je crois fort rare, puisque je n'en ai reçu qu'un seul individu, est remarquable, entre ses congénères, par la grande élévation de sa spire. Elle est d'une couleur brun-olivâ-

tre matte et uniforme; les deux premiers tours du sommet de la spire sont marqués de fines stries qui ne reparaissent plus sur les suivans; le tour inférieur est fortement caréné; l'ombilic petit; la bouche semi-ovale, arrondie en bas, un peu anguleuse à la place qui correspond à la carène, le péristome un peu réfléchi, l'intérieur est lisse, luisant et d'une couleur vineuse-pâle.

6^{me} Sous-genre *HELICELLA*. Fer.

9. *H. vitrina*, Wagn. Spix, t. 17, f. 6.

Hab. aux environs de Bahia, sous les feuilles mortes.

10. *H. similaris*, Fer. var. β . *zonulata*, Fer. prod. N. 262.

Très-commune aux environs de Bahia. J'en ai reçu des individus vivans, l'animal est d'un blanc sale, et n'offre rien de particulier.

11. *H. candida*, N. *H. perspectiva*, Wagn. non Merg. nec Say. *Solarium candidum*, Spix, t. 17, f. 3, 4.

Elle offre deux variétés; la première, celle de Spix, est lisse en-dessous, mais finement et régulièrement striée en-dessus, c'est-à-dire, sur toute la spire; l'autre est entièrement lisse et sans stries; chacune de ces variétés est constante dans les individus jeunes comme dans les adultes: cependant ces coquilles, aux stries près, sont tellement semblables, qu'il n'est pas possible d'en faire deux espèces, et il suffira de les désigner par α . *Striata*, et β . *lævissima*.

L'animal est extrêmement allongé; quand il marche, son pied occupe un espace quatre fois plus long que le diamètre de

la coquille, il est jaune, et ses tentacules, d'un rose vif, font un joli effet sur sa tête jaune-pâle, les yeux sont noirs. Elle se trouve dans les grands bois, sous les feuilles mortes, aux endroits humides. Quoiqu'elle ne soit pas rare, les individus frais et adultes ne se rencontrent pas fréquemment.

12. *H. pellis serpentis*, Var. *minor*. *Helix punctata*, Wagn. et *solarium serpens*, Spix, ^{reb} tom. 17, fig. 1, 2.

Cette coquille varie dans sa grandeur, mais elle est toujours plus petite que la grande variété de Cayenne, dont elle diffère encore par sa spire plus déprimée, la carène plus aiguë, le test strié et comme treillissé et non granuleux; on n'y remarque jamais non plus le pli si singulier du dernier tour de spire de celle de Cayenne; et sans la confiance que méritent les observations de M. Rang, consignées dans les *Annales des Sciences naturelles*, l'on serait fort tenté de séparer ces deux coquilles.

L'animal est allongé, mince, d'une couleur obscure et vineuse. On la trouve dans les bois humides et sous l'écorce des arbres.

13. *H. polygyrata*. Von. Born. Test. t. 14, fig. 19, 20. Férussac, t. 69. A. fig. 7, 8, 9.

Quelques individus de cette précieuse espèce, qui ressemble à un grand planorbe et qui est encore si rare dans les collections, ont été trouvés par M. Blanchet dans les bois de la Caxoeira, dans les rocailles et la terre fraîche, près des ruisseaux. L'épiderme est vert-olive en-dessous et brun-marron sale en-dessus. Elle varie beaucoup dans sa taille; quelques individus,

quoique bien adultes, n'ont que 8 tours et 35 millimètres de diamètre, et j'en possède un qui a 10 tours et 6 centimètres. L'animal a le pied assez court, une fois et demi le diamètre de sa coquille, le manteau brun avec une teinte vineuse, les tentacules courts et un peu coniques, les plus grands ocellés au sommet.

8^{me} Sous-genre. COCHLOSTYLA. Fer.

14. *H. undata*, Fer. *Bulimus undatus*, Brug.

La variété que M. Blanchet a envoyée, et qui se trouve en abondance sur les orangers, les tamariniers et autres arbres fruitiers dans les trous desquels elle se retire, est fort belle, plus grande que la variété ordinaire qui vient communément de Fernambouc, et remarquable par les bandes longitudinales en zigzag, étroites, nombreuses, qui ornent le dernier tour, et la rapprochent un peu de l'*H. Sultana*.

Les jeunes individus offrent des traits noirs et des taches jaunes et orangées, très-vives et d'un bel effet; je crois que dans cet état elle a été nommée *H. Princeps*, par M. Broderip.

10^{me} Sous-genre. COCHLICOPA. Fer.

15. *H. lamellata*, Fer.

Cette petite coquille se trouve dans le sable, au pied des arbres et dans les trous de leurs troncs.

11^{me} Sous-genre. COCHLICELLA. Fr.e

16. *H. oryza*, Fer. Prodr. N. 380. *Bulimus oryza*, Brug.

17. *H. clavulus*, Fer. Prodr. N. 381.

Ces deux petites espèces se trouvent avec la précédente, mélangées avec la terre, le sable fin au pied des arbres et dans les cavités des vieux troncs.

18. *H. sylvatica* (nomen mutandum). *Bulimus sylvaticus*, Wagn. *Columna sylvatica*, Spix, t. 10, fig. 4.

Elle est assez commune dans les forêts aux environs de Bahia, au pied des arbres, sous les feuilles mortes et humides.

19. *H. obeliscus*, Moric. loc. cit., tab. 1, fig. 4.

L'individu que j'ai figuré n'était pas adulte, j'en ai reçu depuis lors qui ont 16 tours de spire, et un autre plus grand encore, dont la pointe est cassée (ce qui arrive souvent), et qui a dû en avoir 18 et 11 centimètres de longueur; il ressemble alors à l'espèce suivante, dont il est cependant bien distinct.

Quelques individus me sont parvenus avec l'animal vivant; il est blanc, pâle, et traîne sa coquille en marchant; je les conserve avec soin et j'en donnerai plus tard une figure, mais je ne dois point passer sous silence l'observation suivante, relative à leur ponte. Je les tiens dans un vase à moitié rempli de terreau mêlé de sable et de poussière de bois pourri et toujours humide; ils n'ont touché ni aux feuilles, ni aux légumes, ni aux fruits que je leur ai donnés, mais ils mangent de la farine dont ils paraissent s'accommoder fort bien; je renouvelle chaque jour leur provision, et par conséquent je les observe régulièrement.

Ayant cependant laissé passer une journée sans les voir, je fus agréablement surpris le surlendemain (27 juillet), de trouver plusieurs petits individus, à peine éclos, mêlés avec les anciens; ils n'avaient que trois tours de spire, et si je n'avais pas trouvé en même temps un œuf encore entier, j'aurais pu croire que cette espèce était vivipare, car 48 heures auparavant il n'y avait certainement aucune trace de ponte, et deux heures après, ce dernier œuf était éclos; mais à mon grand regret cette opération ne s'est pas passée sous mes yeux, ce qui aurait été d'autant plus intéressant que ces œufs ne ressemblent point à ceux des autres Hélices que j'ai pu observer; ils sont dépourvus d'enveloppe calcaire et ne présentent qu'une membrane extrêmement mince, parfaitement diaphane, remplie d'un liquide clair et limpide, au milieu duquel on voit la jeune hélice bien formée, et n'ayant que trois tours de spire; l'œuf ressemble absolument à une grosse goutte d'eau ovale (voy. tab. 2, fig. 28). Je n'ai pu constater de quelle manière ce liquide se dissipait, s'il était absorbé par le jeune animal, ou s'il s'écoulait par la rupture de la membrane; mais cette membrane restait pendant quelques heures appliquée et desséchée sur la coquille jusqu'à ce que l'animal, en marchant, s'en fût débarrassé. J'avais ainsi une petite famille de 8 jeunes *H. obeliscus*, dont 3 ou 4 individus vivent encore au moment où je livre ces lignes à l'impression (février); mais ils se sont enterrés, ainsi que les gros, aux premiers froids de l'automne, qui ont arrêté leur développement, qui avait été assez rapide dans le commencement, car le 17 août ils avaient déjà cinq tours de spire.

20. *H. caxapregana*, N. *Columna maritima*, Spix, t. 10, fig. 1, 2. *Bulimus calcareus*, Wagn. non Brug.

Cette belle coquille, l'une des plus grandes de ce sous-genre, atteint jusqu'à 12 centimètres de longueur; elle a 11 tours de spire dans son plus grand développement, et alors le péristome est un peu épaissi, formant un léger bourrelet; son épiderme est olivâtre dans les jeunes et d'un beau brun-marron dans les individus plus âgés, l'intérieur de l'ouverture est bleuâtre; elle varie dans son épaisseur, c'est-à-dire que des individus sont beaucoup plus pesans que d'autres, quoique au même degré de développement; quelques-uns offrent des zones plus pâles qui règnent rarement sur tous les tours de la spire; souvent elles ne sont visibles que sur les derniers tours, et quelquefois même une zone blanchâtre commence brusquement un tour et ne reparaît plus sur les suivans. L'animal est couleur de chair pâle, et les tentacules assez courts.

Cette espèce se trouve dans les forêts vierges au pieds des arbres, dans plusieurs provinces du Brésil; mais elle paraît y être assez rare; cependant elle a été trouvée en assez grand nombre sous les feuilles des Bromelia, dans l'îlot de Caxaprego ou Cachaprego, à l'embouchure du Jagoaripe, près de Maragogipe et de Nazareth das Farinhas; c'est pourquoi le nom de *H. maritima* ayant été appliqué depuis long-temps à une espèce du midi de la France, je propose celui de *Caxapregana* à ceux qui, comme moi, adoptent le genre *Helix*, comme l'entend M. de Férussac.

OBSERVATIONS. Il existe de grands rapports entre les deux espèces qui précèdent, et l'*H. calcarea*, Fer. *Bulimus calcareus*, Brug, qui se trouve à Madagascar. Cependant elles sont toutes trois bien distinctes. L'*H. caxapregana* est non-seulement beaucoup plus grande que l'*H. calcarea*, mais sa forme est différente; elle décroît régulièrement depuis le dernier tour au premier, tandis que dans l'*H. calcarea*, les deux ou trois derniers tours sont proportionnellement plus renflés et plus grands; dans celui-ci, la hauteur réunie des deux derniers tours surpasse de beaucoup celle du reste de la spire; dans le *caxapregana*, ces deux derniers tours sont plus courts que les autres réunis. Le *calcarea* est fortement strié longitudinalement, et sans aucunes stries transversales; dans le *caxapregana* les stries longitudinales sont bien moins profondes, et l'on observe surtout près des sutures des stries transversales très-fines, qui coupent les premières.

L'*H. obeliscus* diffère de toutes deux par les tours de spire plus nombreux, 16 à 18, au lieu de 10 à 12, et dont les deux derniers forment à peine le tiers de la longueur totale de la coquille, qui n'est striée qu'en long.

21. *H. subuliformis*, N. t. 2, fig. 3.

Testa turrita, elongata, angustissima, lævis, nitida, alba anfractibus planatis numerosis apice obtuso; apertura ovata labro acuto.

Cette espèce, qui me paraît nouvelle, est remarquable par le grand nombre de tours de sa spire, qui est de 14 dans les individus que je possède, et qui paraissent n'être pas adultes,

ainsi que par sa forme très-allongée. Elle est mince, fragile, d'un blanc pâle, luisante, presque point striée, les tours de la spire presque planes, les sutures peu profondes. Long. 22 millimètres, épaisseur 3 millimètres.

Elle se trouve au bois de St.-Gonsalves, non loin de Bahia, et ne paraît pas y être fort commune.

12^{me} Sous-genre. COCHLOGENA. Fer.

22. *H. rhodospira*, N. *H. melanostoma*, Fer. non Draparnaud. *Bulimus melanostomus*, Swaison. *Auris melanostoma*, Spix.

Cette belle espèce offre plusieurs variétés, soit dans ses dimensions, soit dans les couleurs, et plus particulièrement dans celles de la bouche.

Voici celles que je possède :

α. *Vulgaris*, coquille assez courte et renflée, bouche noire, ou plutôt d'un violet très-foncé et noirâtre, le sinus de la lèvre gauche à l'extrémité de la columelle, bien prononcé.

β. *Chrysostoma*, même forme de coquille que la précédente, bouche blanche bordée de jaune, sinus plus ou moins prononcé.

γ. *Illheocola*, coquille plus grande et plus allongée, bouche blanche bordée de jaune, sinus presque nul, toute la coquille d'un rose plus décidé, et les taches brunes moins prononcées que dans les deux autres variétés; l'on n'y remarque point non plus cette zone, soit carène blanchâtre, qui s'observe sur le dernier tour des précédentes.

Dans toutes les variétés , la partie de la lèvre gauche qui est appliquée sur le dernier tour est constamment noire , et les premiers tours de la spire sont toujours d'un rose plus ou moins vif. Le nom de *melanostoma* n'est pas heureux , puisque dans le plus grand nombre des individus la bouche n'est pas noire , et comme il existe déjà une *H. melanostoma* de Draparnand , je suis d'autant plus disposé à proposer celui de *rhodospira* , qu'il exprime un caractère plus constant.

Les œufs de cette *Hélice* sont ovales et d'un beau vert céladon (t. 2 , fig. 29.)

Les deux premières variétés se trouvent fréquemment sur les figuiers et les orangers , aux environs de Bahia ; la troisième vient des Illheos.

23. *H. velutino-hispida* , N. tab. 2 , fig. 4.

Testa perforata , ovato-globosa epidermide pallide bruno , pubescente et pilis rectis , seriatis , longioribus hispido ; sex anfractibus ; apertura ovata peristomate reflexo.

Hauteur , 27 millimètres ; largeur , 22 millimètres.

Elle est solide , quoique mince et translucide , finement striée , à spire conique , composée de cinq tours et demi , dont le dernier forme les deux tiers de la coquille ; sa couleur paraît être olivâtre , avec une zone blanche qui occupe le milieu du dernier tour à peine visible en-dehors dans la coquille fraîche et revêtue de son épiderme ; mais bien marquée dans l'intérieur , qui est d'une couleur vineuse claire ; la bouche est ovale , le péristome blanc et réfléchi , l'ombilic bien apparent et profond. L'épiderme est brun clair , couvert de deux sortes de

poils, les uns courts, nombreux et serrés, le rendent comme velouté; les autres droits, raides comme des petits aiguillons, distans et rangés par séries transversales et plus longs que les premiers, le rendent hispide. L'animal est d'une couleur obscure, avec une teinte rosée.

Elle se trouve dans les lieux humides, sur la terre, sous les feuilles mortes.

24. *H. heterotricha*, N. tab. 2, fig. 5, 6.

Testa perforata, ovato oblonga epidermide castaneo pubescente et pilis rectis seriatis hispido; septem anfractibus; apertura ovata peristomate reflexo. Long. 55 mil., larg. 32 mil.

Elle a tant de rapports avec la précédente qu'elle pourrait bien n'en être qu'une variété; elle n'en diffère que par les caractères suivans: elle est plus grande du double, elle a un tour de plus $6 \frac{1}{2}$ au lieu de $5 \frac{1}{2}$; la spire est proportionnellement plus élevée, formant un angle de 72 degrés, tandis que dans la précédente il est de 85 à 90; sa couleur est d'un brun pourpré foncé, et l'animal est entièrement noir, sans cette teinte rosée de celui du *velutinohispida*. Du reste, elle est couverte des mêmes poils que celle-là, les uns plus courts, couchés ou inclinés en arrière; les autres plus longs, raides et dressés; seulement les uns et les autres sont plus distans entre eux.

M. Blanchet ne m'indique pas où il l'a trouvée; mais vraisemblablement elle habite les grands bois.

25. *H. cantagallana*, Rang.

Cette espèce, qui se rapproche infiniment de la variété à

bouche blanche du *Bulimus ovatus*, varie beaucoup dans ses dimensions; quelques individus ont 14 centimètres de longueur, tandis que d'autres, également adultes et comptant le même nombre de tours, n'ont que 8 centimètres.

Elle n'est pas rare dans les forêts vierges.

26. *H. Maximiliana*, Fer. *Bulimus bilabiatatus*, angl.

Cette rare et singulière coquille, si remarquable par ses grosses côtes et par l'épaisseur de son double péristome, offre deux variétés, l'une à bouche noire que je désignerai par :

β. *melanostoma*; celle-ci ne diffère de l'espèce que par la couleur de sa bouche qui est noire au lieu d'être blanche avec un lizeré jaune. L'autre :

γ. *minor*, est de moitié plus petite, les côtes un peu moins sail-
lantes et habituellement d'une couleur rose - pâle, la bouche
blanche. Enfin j'ai reçu un exemplaire scalaire :

δ. *monstrum scalaris*, dont je donne une figure. tab. 2,
fig. 20, encore jeune, la bouche n'étant point formée, mais
d'autant plus remarquable, que c'est je crois le premier exemple
d'une semblable monstruosité dans les *Bulimes*.

Les unes et les autres ont été recueillies aux Illheos.

27. *H. signata* (nomen mutandum). *Bulimus signata*, Wagn.

Auris signata, Spix, tab. 12, fig. 3, non. *H. signata*, Fer.

Cette curieuse espèce est aussi assez rare et a été trouvée aux
Illheos. L'animal est blanc; quand il marche, la partie posté-
rieure de son pied égale la longueur de sa coquille; les deux
grands tentacules ont 7 à 9 lignes de long; ils sont également

blancs, l'œil noir; les petits tentacules sont des deux tiers plus courts. Ce sera encore un nom à changer, vu qu'il y a déjà une *H. signata* de Férussac.

28. *H. auris leporis*, Fer. *Bulimus auris leporis*, Brug.

Très-commune à Caravellas, sur les bananiers.

29. *H. viminea*, Moric. loc. cit., t. 6, p. 540, tab. 1, fig. 5.

Beaucoup moins commune que la précédente, elle se distingue très-bien de la suivante par la forme de sa bouche quand elle est adulte; mais il est impossible de les reconnaître dans les jeunes individus qui sont tachés de la même manière.

30. *H. zebra*, non Férussac. *Bulimus zebra*, Spix, tab. 7, fig. 5.

Ce sera encore un nom à changer, pour ne pas la confondre avec l'*H. zebra*, Fer., qui est l'*achatina zebra*, Lamr.

Elle n'est pas très-commune.

31. *H. lita*, Fer. Prodr. N. 403. *Bulimus litturatus*, Spix, tab. 7, fig. 3.

C'est une des espèces les plus communes du Brésil.

32. *H. vittata*. *Bulimus vittatus*, Spix, tab. 7, fig. 4.

Celle-ci m'a offert trois variétés.

α. *Vittata zonata*. Fond de la coquille jaunâtre, tirant plus ou moins sur le brun ou sur la couleur vineuse, les stries brunes, et la bande foncée qui orne le dernier tour vers la base et rentre dans l'ouverture, d'un brun noirâtre dans les adultes; c'est celle figurée par Spix.

β. *Vittato-ezonata*. Les stries comme dans la précédente, mais la bande manque.

γ. *Unicolor*. Entièrement d'un jaune citrin, sans stries, ni bande.

Toutes ces variétés se trouvent sur les grands arbres, dans les forêts des Illheos.

33. *H. coxeirana*, N. t. 2, fig. 7 à 11.

Testa oblonga conica, levi, nitida, perforata, citrina fasciis brunnis transversis notata; apertura ovata labro sub-reflexo.

Hauteur, 33 mill.; largeur, 15 mill.

Cette espèce, voisine de la précédente, est comme elle solide, quoique mince et translucide, finement striée et luisante; mais elle est plus renflée, les tours de spire un peu plus convexes et dépourvus de flammes, soit stries longitudinales colorées. Le fond de la coquille est d'un jaune citrin clair; le dernier tour, qui est un peu plus long que les six autres réunis, est orné, dans la variété α, de trois bandes d'un brun noirâtre; la première de ces bandes rentre dans l'intérieur de la coquille, en touchant par son bord inférieur le point où la lèvre gauche vient rejoindre la spire; la seconde arrive au point où la lèvre droite s'applique au précédent tour, et se prolonge ainsi moitié en-dedans et moitié en-dehors, de manière à être visible sur les sutures de toute la spire; la troisième est un peu plus étroite et plus pâle que les deux précédentes, et continue sur les tours suivans. Cette dernière bande manque dans la variété β, mais dans la variété γ elle est au contraire tellement large qu'elle se confond avec la seconde et s'étend jusqu'à la

suture ; en sorte que la coquille , depuis la seconde bande jusqu'au sommet de la spire , est entièrement noire ou brun foncé. Dans la variété δ , les bandes noirâtres manquent complètement, mais une bande de couleur vineuse occupe sur le dernier tour l'espace que laissent entre elles les deux bandes dans la variété β . Enfin la variété ϵ est entièrement d'un jaune citrin, pâle, sans aucune trace de bandes.

Je les désigne ainsi :

α . *Trizona*. Trois bandes foncées sur un fond clair (tab. 2, fig. 7).

β . *Dizona*. Deux bandes foncées sur un fond clair (tab. 2, fig. 8).

γ . *Nigrescens*. Deux des bandes plus ou moins réunies et la spire plus ou moins noire (tab. 2, fig. 9).

δ . *Purpurascens*. Une seule bande vineuse (tab. 2, fig. 10).

ϵ . *Unicolor*. Point de bandes, coquille jaunâtre.

Dans toutes celles de ces variétés qui en sont pourvues, les bandes sont visibles à l'intérieur de la coquille, comme à l'extérieur, et dans les individus adultes elles n'atteignent pas le bord de la lèvre droite, qui est un peu évasée ; la lèvre gauche est réfléchie sur l'ombilic ; l'ouverture est parallèle à l'axe de la spire et a 13 millimètres de long sur 9 de large.

L'animal a le pied et le mufle noirâtres, le dessus du corps ainsi que les grands tentacules jaunes, et cela dans toutes les variétés.

Cette coquille se trouve à la Caxoeira, dans la province de Bahia et dans les bois de St.-Gonzales.

34. *H. capueira*, N. *Stenostoma capueira*, Spix, t. 13, fig. 4, et *Bulimus virgatus*, ejusd. t. 6, fig. 4, testa incompleta. *Bulimus angiostomus*, Wagn.

Cette jolie espèce ne se trouve point aux environs de Bahia; elle a été envoyée des montagnes de la Jacobine, et y habite les pâturages bien peuplés de bestiaux.

35. *H. angulosa*, Fer. l. c. N. 402.

Moins commune que l'espèce suivante, elle en diffère par la spire plus conique, les tours moins convexes, l'ouverture plus courte, et par la carène du dernier tour.

36. *H. tenuissima*, Fer.

C'est une des espèces les plus communes au Brésil sur les murs.

37. *H. pseudo-succinea*, N. t. 2, fig. 18.

Testa ovato-oblonga, tenuissima, lucida, hyalina, pallide citrina, anfractibus quinque convexiusculi; apertura ovata labro acuto.

Hauteur, 21 mill.; largeur, 10 mill.

Cette coquille a l'aspect d'une *ambrette*, elle est mince, fragile, transparente de manière à laisser voir très-distinctement l'évolution intérieure de la spire, très-finement striée, luisante et d'une couleur jaune très-pâle; le dernier tour est plus grand que les quatre autres réunis. Elle se trouve aux environs de Bahia. Peut-être est-ce une jeune coquille: cependant j'en ai reçu un très-grand nombre d'individus, tous sem-

blables, et il serait étonnant que, après des recherches suivies et prolongées pendant deux années, M. Blanchet n'eût pas rencontré quelques adultes. Cette même réflexion est aussi applicable à la suivante.

38. *H. citrino-vitrea*, N. t. 2, fig. 19.

Testa ovata, globosa, inflata, tenuissima striata, lucida, fragilis, hyalina, citrina; anfractibus quinque convexi; spira obtusiuscula; apertura magna labro acuto.

Hauteur, 13 mill.; largeur, 10 mill.

Celle-ci a des rapports avec la précédente, étant comme elle luisante, finement striée et assez transparente pour laisser voir les tours intérieurs de la spire; mais elle est beaucoup plus courte, le dernier tour étant un peu plus large que long, et sa couleur est d'un jaune d'ambre plus décidé.

Elle se trouve aux environs de Bahia.

39. *H. polygramma*, N. t. 2, fig. 12 à 14.

Testa parvula, perforata, ovato-oblonga, fulva, striis numerosissimis elevatis albidis lineolata; apertura ovata labro acuto reflexo.

Hauteur, 13 mill.; largeur, 5 mill.

Cette jolie petite espèce a 6 tours de spire, dont le dernier est égal aux cinq autres réunis. Elle est striée par des lignes blanches, longitudinales, étroites, un peu saillantes, nombreuses, presque parallèles, qui se détachent élégamment du fond fauve de la coquille. Une bande blanchâtre règne à l'extrémité inférieure du dernier tour, et entoure l'ombilic, qui est

brun. L'ouverture est ovale, le péristome blanc et un peu réfléchi.

Elle a été trouvée dans les grands bois à la Caxoeira.

OBSERVATION. Elle paraît avoir de grands rapports avec le *Bulinus lineatus* Spix, mais elle est plus petite, à stries beaucoup plus nombreuses et plus étroites que dans la figure de cet auteur, tab. 7, fig. 6, et ne ressemble nullement au *Bulinus radiatus*, auquel Spix compare la sienne.

40. *H. Heterogramma*, N. t. 2, fig. 15 à 17.

Testa parvula, perforata, ovato-oblonga, fragilis, fulva lineolis obscurioribus, albidisque irregulariter notata; apertura ovata labro acuto reflexo.

Longueur, 13 mill.; largeur, 5 mill.

Cette petite espèce a 6 tours de spire, dont le dernier égale les cinq autres réunis; sa consistance est mince et fragile, sa superficie, vue à la loupe, offre des stries transversales, c'est-à-dire qui suivent le sens de la spire et qui sont formées par des séries de petits poils extrêmement courts, ce qui la rend mate et point luisante. Sa couleur est fauve, interrompue par des lignes blanchâtres, alternant avec d'autres lignes d'un fauve plus foncé; ces lignes sont comme brisées et ne sont point régulièrement distribuées, elles manquent quelquefois sur une portion d'un tour, reparaissent sur le suivant, cessent de nouveau, laissant ainsi des espaces d'un fauve uniforme sans raies. La bouche est ovale, les lèvres pâles et peu réfléchies.

Elle se trouve avec la précédente.

41. *H. bahiensis*, Moric., loc. cit. t. 1, fig. 6.

OBSERVATION. C'est par une erreur de copiste, qu'en décrivant cette coquille, j'ai dit « qu'elle était voisine du *Clausilia exesa* Spix, avec laquelle elle n'a presque point de rapports. Cette phrase doit être transportée à la description de l'*H. Pantagruelina*.

42. *H. pudica*, Gm. *Partula pudica*, Fer.

Cette belle espèce offre deux variétés.

α. *Leucostoma*, bouche blanche.

β. *Rhodostoma*, bouche d'un beau rose pourpré. Ces deux variétés se trouvent dans un terreau noirâtre, provenant de la décomposition des vieux troncs dans les forêts vierges, et qui recouvre d'une teinte noire l'épiderme, dont la couleur naturelle est un brun clair, le test est rose.

L'animal est d'un gris bleuâtre en-dessus, blanc en-dessous, il a quatre tentacules, dont les plus grands ont un pouce de long et n'est point vivipare, comme on l'avait cru; ses œufs sont ovales, un peu pointus par les deux bouts, d'une consistance dure, blancs et brillans comme de la porcelaine ou mieux encore, comme les graines du *Coix lacryma*; ils ont 14 à 16 millimètres de long, sur 9 à 10 de large. Les jeunes coquilles, lors même qu'elles ont déjà plus de 30 millimètres de long, sont minces comme une pelure d'oignon, transparentes et d'un vert olivâtre avec une légère teinte rougeâtre à l'extérieur.

Elles ont une sensibilité extrême, et rentrent précipitamment dans la coquille à la moindre approche. Est-ce cette timi-

dité ou son habitude de vivre cachée sous terre, ou simplement la couleur rosée de son test, qui a valu à cette *Helice* le nom de *pudique*?

13^{me} Sous-genre. COCHLODONTA. Fer.

43. *H. pupoides*, N. *Pupa inflata*, Wag. *Clausilia pupoides*, Spix, t. 14, f. 4.

Ce n'est pas le *Cochlodina inflata*, Fer. *Bulimus inflatus*, Oliv.; encore moins le *Caracolla inflata*, Lam.

Souvent elle n'a que quatre dents comme la figure de Spix la représente, au lieu de six que la description lui donne, et que j'ai en effet retrouvées sur un seul individu.

Elle est commune dans les plantations.

44. *H. Tomigera*, N. *Helix clausa*, Wagn. non Rafin. *Tomigerus clausus*, Spix, tab. 15, fig. 4, 5.

Spix dit que cette coquille est de la plus grande rareté, et le très-petit nombre d'individus que M. Blanchet en a pu recueillir, malgré ses recherches minutieuses et prolongées dans les bois de la Caxoeira, le prouve bien.

L'animal n'en ayant pas été observé, il est douteux que la place que je lui assigne provisoirement lui convienne; les singuliers plis de sa bouche et ceux extérieurs à l'extrémité du dernier tour, la rapprochent des *cochlodines*; mais par sa forme générale, assez analogue à celle de l'*H. Lyonetiana*, elle a plus de rapports avec les *cochlodontes*. Peut-être appartient-elle au genre *Scarabe*.

14^{me} Sous-genre. COCHLODINA. Fer.

45. *H. Pantagruelina*, Moric. loc. cit. tab. 1, fig. 7.

Dans ma première notice il s'est glissé des fautes d'impression qui dénaturent assez le texte pour que je doive les relever; je disais que «*cette espèce était voisine du Clausilia exesa. Spix;*» or l'on a transporté cette phrase dans la description de l'*H. bahiensis*, N° 6, où elle est tout-à-fait déplacée; ensuite en annonçant que c'était le *Scarabus labrosus* de Mencke, j'ajoutais «*comme elle n'appartient probablement pas à ce genre, etc.,*» le correcteur a omis le mot *probablement*, ce qui donne à ma phrase un ton affirmatif qui n'était point alors dans ma pensée; ce n'était qu'une opinion et non un fait que j'énonçais.

En décrivant cette coquille dont je n'avais alors qu'un seul exemplaire à ma disposition, j'exprimais le doute que les dents de la bouche fussent constamment telles que je les indiquais: or cette prévision s'est pleinement justifiée. Depuis lors j'ai reçu plusieurs de ces coquilles, et j'ai vu que ces dents sont sujettes à varier, et même à manquer entièrement; il n'y en a que quatre qui m'ont paru constantes, et que j'ai retrouvées sur tous les individus qui ne sont pas édentés: ce sont les plus grosses, dont l'une est placée sur la columelle dont elle est comme la continuation; une autre vis-à-vis de celle-ci, sur le bord droit de l'ouverture; la troisième un peu plus bas sur le même bord, et la quatrième au haut de l'ouverture, sur la convexité du dernier tour. Ces quatre dents varient un peu quant à leur plus ou moins grand développement, et sont doubles ou simples; mais leurs formes et leurs positions respectives sont toujours sem-

blables; les autres petites dents manquent souvent en tout ou en partie. La bouche est ordinairement couleur de chair, et le péristome, toujours évasé et réfléchi, ne forme un bourrelet continu que dans les individus parfaitement adultes, mais il varie assez dans sa forme; dans quelques individus il approche de celle d'un carré long, les deux côtés étant presque parallèles; dans d'autres il est presque ovale, dans d'autres il est plus élargi en bas qu'en haut; enfin l'on en trouve où c'est le contraire, le plus grand diamètre de l'ouverture est donc tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt au milieu. La surface de la coquille varie aussi, car j'en ai une qui est toute lisse sans traces de sculptures quoique bien adulte. Enfin j'en ai reçu une variété moitié plus petite que l'espèce normale, qui paraît avoir toujours la bouche blanche. Si ces coquilles deviennent moins rares l'on pourra peut-être établir d'autres variétés; voici en attendant celles que je distingue.

α. *Major dentata*. Bouche dentée, couleur de chair, environ 7 centimètres de hauteur.

β. *Major edentula*. Même taille, bouche couleur de chair et sans dents.

γ. *Minor*. 45 millimètres de hauteur, bouche blanche et dentée.

45. *H. Exesa*. *Clausilia exesa*, Spix, t. 14, fig. 1. *Pupa exesa*, Wagn.

Cette jolie coquille est aussi rare que la précédente, avec laquelle elle a de tels rapports que j'ai été tenté de les réunir. La figure de Spix est bonne quoique un peu grossière, mais

celle de Férussac, t. 163, fig. 3, 4, est fort mauvaise ; elle est trop renflée au second tour, le péristome n'y est ni continu, ni assez évasé ; elle paraît faite d'après une autre espèce, et cela me surprendrait d'autant moins qu'il y a peu de mois encore que le véritable *exesa* de Spix n'existait dans aucune des collections de Paris, où l'on tenait sous ce nom une espèce de *Cochlodine* ou de *Cochlodonte* voisine du *pupoides* et du *sexdentata*, mais très-différente de la coquille de Spix.

ANCYLUS. Geoff. Drap.

46. *A. culicoides*, d'Orb. *A. bahiensis*, Nob. ined.

J'ai tout lieu de croire que cette espèce d'*Ancile*, que j'ai envoyée à plusieurs de mes correspondans, sous le nom de *bahiensis*, est la même que celle de M. d'Orbigny.

Elle se trouve dans le lac du Baril, attachée aux feuilles des aroides et dans les touffes de *Tonina fluviatilis*.

CYCLOSTOMA. Drap.

47. *C. Blanchetianum*, N. t. 2, f. 21, 22, 23.

Testa orbiculato depressa, late umbilicata, transversim striata, epidermide olivaceo-brunneo fasciâ castaneâ cincta. Larg. 3 centimètres, hauteur 2 centimètres.

Cette coquille est formée de quatre tours de spire arrondis, et dont chacun ne recouvre que la moitié de celui qui le précède, de manière que l'ombilic est très-évasé et laisse compter tous les tours à l'intérieur ; ces tours croissent rapidement, le

diamètre de l'ouverture est toujours le $\frac{1}{3}$ du diamètre total de la coquille. Le sommet de la spire est très-surbaissé. Elle est finement et régulièrement striée, blanche, recouverte d'un épiderme brun marron ou un peu olivâtre, cette couleur s'affaiblit vers le milieu de la convexité du dernier tour, de manière à partager la coquille par une bande étroite, blanchâtre, qui détache nettement la zone d'un brun marron foncé qui l'entoure. L'ouverture n'est pas parfaitement ronde, elle forme un petit angle au point de contact avec le tour précédent, le péristome est un peu épaissi dans les individus que je considère comme adultes, mais ne forme point de véritable bourrelet. L'ombilic est blanchâtre.

L'animal est couleur de chair, les tentacules, au nombre de deux, sont d'un beau rose tendre, les yeux noirs, situés à la base externe des tentacules. Il est fort sensible et au moindre attouchement il rentre dans sa coquille, qu'il ferme avec son opercule.

Elle se trouve dans les bois de la Caxoeira.

HELICINA. Lamk.

48. *H. Variabilis*, Wagn.

α. *Zonata*. *H. fasciata*, Spix, t. 16, f. 3, 4.

β. *Unicolor*. *H. flava*, Spix, t. 16, f. 5.

Commune dans les bois, sur les arbres et sur les feuilles vertes.

49. *H. caracolla*, *N. t.* 2, f. 24, 25.

Testa depressa, acute carinata, striata, citrina, apertura triangularis labro albo reflexo. Larg. 20 mill., haut. 10 mill.

Cette espèce a la forme d'une carocolle, elle a cinq tours de spire presque planes et obliquement striés en travers, ces stries obliques sont coupées par d'autres stries longitudinales; le dernier tour est partagé par une forte carène tranchante. L'ouverture triangulaire jaune citron en-dedans, le péristome large, évasé, blanc et réfléchi en-dehors. L'opercule est triangulaire et rouge.

Elle se trouve à Almada, sur les troncs d'arbres couverts de mousse.

NERITINA. Lamk.

50. *N. Zebra*, Lamk.

51. *N. Virginea*, Lamk.

Ces deux espèces, qui habitent dans les eaux douces, et y sont fort communes, offrent, surtout la dernière, une prodigieuse quantité de variétés de couleurs et de dessins.

AMPULLARIA. Lamk.

52. *A. lineata*, Spix, t. 25, f. 5, 6. *A. canaliculata*, Lam.?

Elle varie beaucoup dans le nombre et la disposition des bandes.

Commune dans les eaux douces.

53. *A. decussata*. N. t. 2, f. 26, 27.

Testa perforata, globosa, ventricosa, subcrassa striis longitudinalibus et transversis decussatis reticulata, apex erosus. Haut. 3 centimètres, larg. 3 centimètres.

Cette espèce me paraît distincte de toutes celles que je connais par les stries longitudinales régulières et proéminentes, qui coupent à angle droit les stries transversales, et forment comme un réseau à mailles carrées à sa surface. Elle est d'un vert noirâtre, relevé par des zones d'un jaune orangé obscur, plus marquées et plus brillantes à l'intérieur de la coquille; le nombre et la largeur de ces bandes sont très-variables, quelquefois elles manquent entièrement, et l'intérieur de la bouche est alors d'une couleur uniforme, brune ou violet noirâtre, à l'exception du bord gauche qui est toujours rouge orangé. L'ombilic est profond, le sommet de la spire toujours rongé.

Elle se trouve avec la précédente.

CYCLAS. Drap. Lamk.

54. *C. bahiensis*, Spix, t. 25, f. 5, 6.

Cette petite cyclade, qui se trouve avec l'ancylus, N. 46, sur les feuilles flottantes des plantes aquatiques au Baril, est jusqu'à présent la seule espèce de bivalve fluviatile que M. Blanchet ait trouvée aux environs de Bahia.

NB. Tout ce qui est relatif aux animaux que je n'annonce pas avoir reçus vivans, et à leurs habitudes, est extrait des notes de M. Blanchet, et les fig. 6 et 11 sont faites d'après les dessins qu'il m'a envoyés.

EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

- Fig. 1. *Helix (cochlohydra) atrovirens*.
2. (*helicigona*) *pileiformis*.
3. (*cochlicella*) *subuliformis*.
4. (*cochlogena*) *velutino hispida*, *vue de deux côtés*.
5. *heterotricha*.
6. *la même vue avec l'animal*.
7. *coxeirana*. *var. trizona*.
8. *var. dizona*.
9. *var. nigrescens*.
10. *var. purpuræscens*.
11. *la même avec l'animal*.
12. *polygramma*, *grandeur naturelle, vue par-devant*.
13. *la même, grossie et vue par-derrière*.
14. *la même, grandeur naturelle, et vue de côté*.
15. *heterogramma*, *grandeur naturelle, par-devant*.
16. *la même grossie et vue par-derrière*.
17. *la même, grandeur naturelle, id.*
18. *pseudo-succinea*.
19. *citrino-vitrea*.
20. *maximiliana. var. scalaris*.
21. *Cyclostoma Blanchetianum*, *vu par-dessus*.
22. *le même, vu de côté*.
23. *le même, vu par-dessous*.
24. *Helicina caracolla*, *vue de côté*.
25. *la même, vue par-dessous*.
26. *Ampullaria decussata*, *présentant la bouche*.
27. *la même, vue par-derrière*.
28. Oeuf de l'*Helix (cochlicella) obeliscus*.
29. Oeuf de l'*Helix (cochlogena) rhodospira*.

1. *Helix. Berlandieriana* 2. *H. Texasiana* 3. *H. Blanchetiana*
 4. *H. abeliscus* 5. *H. viminea* 6. *H. Bahiensis* 7. *H. Pantagruelina*

NOTE

SUR

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES

DE

COQUILLES TERRESTRES.

PAR STEFANO MORICAND.

1. *Helix* (*Helocogena*) *Berlandieriana*. Tab. I, fig. 1.

H. testa globosa, perforata, lucida, alba vel cinerea, fascia unica, angusta cincta; labro exteriori crassiusculo patulo.

Long. 8 millim. Larg. 7 millim.

Habite le Mexique, dans la province de Texas, d'où elle m'a été envoyée par M. Berlandier.

Cette coquille, très-voisine par sa forme de l'*H. torulus* Fer. est d'un blanc sale, formée de cinq tours, le sommet obtus; très-finement striée, les stries peu sensibles et très-

rapprochées : une bande étroite d'un gris clair, transparente, occupe le milieu du dernier tour, et se prolonge sur le bord extérieur des tours de la spire : l'ouverture est semi-circulaire ; la lèvre intérieure, peu apparente, l'extérieure plus épaisse que le reste de la coquille, renflée intérieurement par un bourrelet qui la fait paraître évasée, le bord inférieur réfléchi sur l'ombilic dont il couvre la moitié.

Obs. Les individus que j'ai reçus étaient tous dépouillés de leur épiderme.

2. *Helix* (Helicodonta) *Texasiana*. Tab. I, fig. 2.

H. testa orbiculata, depressa, umbilicata, striata, apertura contracta, tridentata, peristomate reflexo.

Long. 5 mill. Larg. 10 mill.

Hab. avec la précédente, et envoyée aussi par M. Berlandier.

J'ignore si à l'état frais cette coquille, comme quelques-unes de ses congénères, ne porte point de poils ; mes échantillons étant dépouillés de leur épiderme, sont blancs ou d'une teinte légèrement rosée. Elle est orbiculaire, la spire très-déprimée, quelquefois presque entièrement plate, le plus souvent un peu convexe ; les tours, au nombre de 5 $\frac{1}{2}$ finement et régulièrement striés, les stries obliques, plus fortes à l'extrémité du dernier tour près de la bouche. Celle-ci offre extérieurement un étranglement étroit et un péristome épais et réfléchi, elle est oblique relativement à l'axe de la coquille. Intérieurement la lèvre collumellaire offre un pli en forme de dent très-saillante, et la lèvre opposée un

large bourrelet et deux dents saillantes, obtuses, de manière que l'ouverture présente trois fortes dents et trois sinus arrondis.

5. *Helix* (*Helicigona*) *Blanchetiana*. Tab. I, fig. 3.

H. testa conica, trochiformi, tenuissima, fragilissima, carinata, diaphana, alba, lævi, anfractibus subplanis, ultimo inferne unizonato et superne bimaculato.

β . immaculata.

Long. 15 mill. Larg. 15 mill.

Hab. le Brésil, aux environs de Bahia où elle a été trouvée par M. Blanchet, ainsi que les suivantes.

Cette coquille, très-voisine de l'*H. Bosciana* Fer. est extrêmement mince et fragile, transparente, blanche ou légèrement jaunâtre; le sommet est pointu, les tours planes ou fort peu convexes, au nombre de 7, si finement striés qu'ils paraissent lisses et luisans; le dernier a la carène aiguë, il est le plus souvent marqué intérieurement et en-dessous d'une bande brune qui s'évanouit avant d'arriver à l'ouverture, et de deux taches également brunes à une petite distance du bord de la lèvre extérieure; la transparence de la coquille rend ces taches et la bande visibles au-dehors. Dans la variété β elles manquent absolument. La bouche est anguleuse par l'effet de la carène, la partie de la lèvre qui est au-dessus de celle-ci offre un bord droit et tranchant, le bord de la partie de la lèvre inférieure à la carène est réfléchi.

4. *Helix* (Cochlicella) *obeliscus*. Tab. I, fig. 4.

H. testa elongata, terebriformi, anfractibus 15, tenuissime striata, cinereo-lutescens, labro simplici.

Long. 8 cent. 5 millim. Larg. 17 mill.

Du Brésil, près de Caravelhas.

Ce bulime, qui paraît être d'une grande rareté, car je n'en connais qu'un seul individu, est remarquable par le grand allongement de sa spire; elle est formée de quinze tours légèrement convexes, mince, d'une couleur uniforme gris-olivâtre, un peu plus prononcée sur les derniers tours; les 4 ou 5 premiers sont lisses, les autres sont finement striés, le sommet obtus. L'ouverture ovale sans échancrure, la columelle solide, droite, sans ombilic; la lèvre extérieure simple et tranchante.

5. *Helix* (Cochlogena) *viminea*. Tab. I, fig. 5.

H. testa perforata, conico-oblonga, nitida; subtilissime striata, ex albo, luteo et cinereo vittata; apertura ovato-oblonga, basi utrinque plicata, intus brunnea, peristomate albo.

Long. 3 centim. Larg. 15 millim.

Habite le Brésil, dans la province de Bahia.

Cette jolie espèce de bulime est remarquable par les bandes étroites longitudinales, alternées, blanches, grises et jaunes, qui ornent les deux derniers des 7 tours dont elle est composée, et qui rappellent un peu certains ouvrages en osier; les deux tours suivans offrent des flammes bru-

nes plus irrégulières, et les trois premiers sont ordinairement d'un gris un peu rosé. L'intérieur de la coquille est d'un brun marron, avec des bandes plus foncées, correspondantes aux flammes grises de l'extérieur.

Les lèvres sont d'un blanc de lait, l'extérieur porte sur le milieu de l'avant-dernier tour; elle offre aux deux tiers de sa longueur, près de sa base, qui se prolonge un peu obliquement, une dépression, ou large pli, correspondant à une dépression semblable sur la lèvre intérieure ou columellaire, ce qui produit un étranglement assez sensible dans l'ouverture. Cette lèvre intérieure est un peu réfléchi sur la columelle qui est un peu perforée.

6. *Helix* (Cochlogena) *Bahiensis*. T. I, fig. 6.

H. testa ovato oblonga, fragili, lævigata, alba, anfractibus 7, apertura oblonga, labro patulo, columella unidentata.

Long. 2 cent. Larg. 6 mill.

Hab. le Brésil dans les bois près de Bahia.

Cette espèce, voisine du *Clausilia exesa*. Spix, est mince, blanche, presque transparente, lisse, ovale, oblongue, l'avant-dernier tour étant le plus renflé, le dernier un peu moins grand que les six autres réunis. L'ouverture est ovale, allongée, son plan est oblique, relativement à l'axe de la coquille, les bords tombent verticalement sur le milieu de l'avant-dernier tour, où ils forment un angle à leur réunion; le péristome est continu et réfléchi, l'ombilic étroit. La lèvre extérieure offre en-dedans vers le milieu de sa longueur un

renflement, provenant d'une légère dépression à l'extérieur de la coquille, et la collumelle une forte dent.

7. *Helix* (Cochlodina) *Pantagruelina*. Nob. T. I, fig. 7.

H. testa fusiformi, solida, perforata; cinerea apice acuta: apertura oblonga subquadrangulata, dentata, labro subcontinuo, reflexo, carneo.

Long. 6 cent. 5 mill.

Hab. le Brésil.

Cette espèce est le géant du sous-genre auquel elle appartient, car elle est d'un tiers plus grande que l'*H. gargantua*, de laquelle elle se rapproche par ses principaux caractères. Elle est fusiforme, solide, composée de 8 tours dont le dernier, en y comprenant la lèvre qui est très-développée, est plus grand que les autres réunis. Sa surface est finement striée sur les 4 ou 5 premiers tours de la spire et comme burinée sur les deux derniers par des stries plus fortes, irrégulières et ondulées, plus marquées près de l'ombilic. Dépouillée de son épiderme, sa couleur est uniformément grise, légèrement teinte de couleur de chair, excepté sur la lèvre où cette dernière couleur est bien prononcée. L'ouverture est grande, parallèle à l'axe dans son plan et dans sa direction, la lèvre très-grande, réfléchie en-dehors; la bouche est armée de plusieurs dents disposées comme suit: une très-grosse, large, obtuse, un peu creusée en cuillère sur la convexité du dernier tour; une autre sur la collumelle, alongée dans le sens de l'ouverture, se prolongeant intérieurement, en tournant sur la collumelle, et qui est dentelée et

comme formée de la réunion de 3 ou 4 dents; au-dessous de celle-ci, près de l'extrémité gauche de la bouche, une dent à trois pointes, plus petite que les précédentes et accompagnée d'une autre très-petite dent rudimentaire; sur le bord opposé à la columelle en commençant par le bas, une forte dent conique comprimée, vis-à-vis les dernières décrites; plus haut une dent semblable, suivie immédiatement d'une autre de même forme et d'une plus forte, obtuse, comme tronquée à son sommet; enfin, trois autres petites dents pointues dont la dernière est plus écartée, occupent l'espace qui reste jusqu'à l'angle supérieur de l'ouverture. J'ai décrit toutes ces dents telles qu'elles se présentent dans l'individu que j'ai sous les yeux, mais vu leur nombre et leur irrégularité, je ne serais pas surpris qu'elles ne fussent sujettes à varier.

OBS. Cette coquille est certainement le *Scarabus labrosus*, de Moench. Mais comme d'un côté elle n'appartient pas à ce genre, et que de l'autre j'ai cru devoir en donner une figure, j'ai dû la ramener au genre *Helix*, tel que l'entend M. de Ferussac, et à son sous-genre *Cochlodina*; puisque dans cette note j'ai adopté cette nomenclature, je n'ai pas pu conserver non plus le nom spécifique, vu qu'il existe déjà une *Helix labrosa*. J'ai pensé que le nom sous lequel je la désigne, rappelait sa parente avec l'*H. Gargantua*, Fer.

Au reste, cette coquille paraît être encore de la plus grande rareté, elle n'existe dans aucune des collections de Paris, et deux seuls individus en étaient connus avant les deux que j'ai reçus moi-même.

FIN.

PREMIER SUPPLÉMENT

AU MÉMOIRE

SUR LES

COQUILLES TERRESTRES ET FLUVIATILES

DE LA PROVINCE DE BAHIA,

ENVOYÉES PAR M. BLANCHET.

De Stefano MORICAND.

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle, le 5 Janvier 1857.)

M. BLANCHET ayant continué ses recherches, et ses nouveaux envois contenant des espèces qui ne se trouvaient pas dans les premiers, je m'empresse de les faire connaître, afin de donner un tableau, aussi complet que possible, des mollusques terrestres et fluviatiles de cette province que mon ami a si heureusement exploitée.

N° 1. *Helix* (*Cochlogena*) *auris muris*. Nob. Pl. III, f. 1, 2, 3.

H. testa ovato-conica, perforata, lævis, lucida, anfractibus senis, ultimo basi carinato, apertura subquadrata edentula margine reflexo.

Hab. Dans les troncs de vieux arbres pourris à la fazenda de Palmeirinha, entre Caxoeira et Jacobina, province de Bahia.

Cette coquille, quoique très-voisine de l'*H. auris leporis*, me paraît devoir en être distinguée, et je ne peux mieux la faire connaître qu'en la comparant à cette dernière. L'*auris leporis* a toujours la surface terne et d'un aspect mat. Les stries longitudinales sont coupées transversalement par d'autres stries très-fines; dans l'*auris muris* on ne voit point de stries transversales, et la surface est constamment lisse et brillante. Le dernier tour de spire de l'*auris leporis* va en s'élargissant, depuis la suture à la base, de manière que sa plus grande largeur, abstraction faite du prolongement de la lèvre, est à sa base même, tandis que dans l'*auris muris*, ce dernier tour est plus renflé vers son milieu, et la base plus contractée, en sorte que sa plus grande largeur est très-sensiblement au milieu du tour. La carène, à la base, est plus prononcée dans l'*auris muris*; l'espace compris entre cette carène et l'ombilic est plat, et même un peu concave, et marqué de deux ou trois sillons, qui viennent aboutir à la lèvre droite; dans l'autre espèce on ne voit point ces plis ou sillons, et cette partie, comprise entre l'ombilic et la carène, est convexe. Dans l'*auris muris*, la bouche est bien moins prolongée obliquement que dans l'*auris leporis*. Dans cette dernière, elle a dix lignes de long sur moins de six de large, mesurée dans ses plus grandes dimensions, et

les lèvres comprises. Dans ma nouvelle espèce, elle a sept lignes dans sa plus grande longueur, et cinq lignes et demie de large; les lèvres sont un peu plus épaisses et plus décidément réfléchies; en outre, l'on remarque ordinairement à la base de la bouche, sur le bord, près de l'angle inférieur, un petit renflement, soit saillie, qui correspond à l'un des sillons dont j'ai parlé plus haut.

Quoique dans les deux espèces le fond de la coquille varie du blanc au brun clair, et que les flammes et zones brunes dont elles sont ornées soient également très-variables, cependant je ne les ai jamais vues semblables dans le très-grand nombre d'individus que j'ai observés de l'une et de l'autre. L'*auris leporis* a ordinairement une bande brun-noirâtre, un peu au-dessus de la carène (la pointe de la spire étant tournée en haut), et presque constamment une autre bande qui part de l'ombilic, et arrive près de la lèvre, n'ayant ainsi qu'une longueur de deux à trois lignes; cette bande-là manque toujours dans l'*auris muris*, qui a souvent le dernier tour de spire orné de quatre ou cinq bandes transversales, bien nettes ou interrompues par des zig-zags, ou qui n'offre point de bandes, mais des flammes longitudinales; or, sur plus de mille individus de l'*auris leporis* que j'ai eus sous les yeux, je n'en ai observé aucun avec des flammes longitudinales ou avec plusieurs zones transversales, nettement dessinées.

2. *Helix* (Cochlogena) *Maximiliana*. Var. minor. Pl. III, f. 4.

Cette variété n'ayant pas encore été figurée, je la donne d'autant plus volontiers, que je peux la représenter avec l'animal.

3. *Helix* (Cochlodina) *Pantagruelina*. Pl. III, fig. 5.

Je reviens de nouveau sur cette espèce, dont je puis aussi donner une figure avec l'animal qui, comme l'on voit, a quatre tentacules, les plus longs portant les yeux au sommet, ce qui confirme ce que j'avais présumé, que ce n'était point un *scarabe*, mais une véritable *hélice*.

Aux variétés que j'ai signalées il faut ajouter la grande aussi à bouche blanche. J'en ai reçu des individus dont le péristome est remarquablement réfléchi; elle offre, comme celle à bouche rose, plusieurs modifications dans les dents; les individus qui sont parfaitement adultes ont presque toujours l'extrémité de la spire cassée.

4. *Helicina* *Hæmatostoma*. Nob. Pl. III, fig. 6, 7.

H. testa globulosa, anfractibus rotundatis quaternis, apertura semi rotunda labro crassiusculo subreflexo rubro supernè plicatulo.

Hab. dans la province de Bahia.

Cette *hélicine* est globuleuse à stries très-fines, les transversales à peine visibles, les tours de spire au nombre de quatre, arrondis; elle est d'un blanc un peu jaunâtre avec la pointe de la spire rouge, ou bien elle offre sur ce fond blanc-jaunâtre une large bande violette, qui occupe le tiers supérieur des deux derniers tours, et comme l'on n'aperçoit que cette même partie des deux premiers, la pointe de la spire est d'un violet foncé presque noir; cette bande, lorsqu'elle existe, est d'un rouge de sang à l'intérieur de la coquille. Dans l'une et l'autre variété le péristome est aussi de cette même couleur de sang très-vive,

et qui fait un joli effet; l'opercule est de la même couleur, mais plus foncée. La lèvre extérieure est épaisse, un peu réfléchie; elle s'applique au milieu du tour précédent, et porte un peu au-dessous de sa jonction avec le dit tour une espèce de pli, ou plutôt une inflexion qui rend cette partie de la lèvre un peu saillante. La lèvre columellaire est très-mince, et appliquée sur la columelle, autour de laquelle elle forme une large tache rouge. Elle paraît assez rare, à en juger par le petit nombre d'individus que M. Blanchet a pu s'en procurer. Largeur, 9 millim.; hauteur, 7 millim.

5. *Planorbis cimex*. Nob. Tab. III, fig. 8, 9.

P. testa depressissima, utrinque leviter concava, 6-volva, ultimo anfractu subtus plano, suprâ semi rotundato.

Hab. les eaux douces aux environs de Bahia.

Ce petit *planorbe* n'a que six millimètres de diamètre, et un millimètre d'épaisseur. Les tours, au nombre de six, sont très-serrés, plats en-dessous, et convexes en-dessus, sans carène saillante; mais le dernier tour paraît caréné, la moitié inférieure étant plate, et la moitié supérieure bombée, elles forment naturellement un angle à leur jonction. Sa couleur est cornée claire. Les tours s'enroulant dans un même plan, le centre de la spire est légèrement et également enfoncé dessus et dessous.

6. *Planorbis depressissimus*. Nob. T. III, fig. 10, 11.

P. testa depressissima subtus plana, suprâ leviter concava, 5-volva, ultimo anfractu in medio acute carinato.

Hab. avec le précédent.

Celui-ci est un peu plus grand que le *cimex*, et encore plus déprimé, n'ayant pas tout à fait un millimètre d'épaisseur sur un diamètre de neuf millimètres. Les tours sont un peu arrondis en-dessus et en-dessous, et le dernier est partagé, presque au milieu de son épaisseur, par une carène aiguë; le bord inférieur de l'ouverture s'appliquant sur la carène du tour précédent rend la face inférieure de la coquille plane, la supérieure est légèrement concave. Sa couleur est comme dans presque tous les planorbes cornée claire, quand elle n'est pas masquée par une matière noirâtre ou par une ochre ferrugineuse qui paraît constituer le fond du sol de Bahia.

7. *Melanopsis brasiliensis*. Nob. Pl. III, fig. 12, 13.

M. testa elongata, conico turrita, apice acuta, transversim multisucata, anfractibus 8-9 plano convexis; epiderme olivaceo lineolis fuscis interruptis sæpe ornato; apertura ovali.

Hab. les eaux douces près de Villa de Barra, mais sans indication d'une localité précise.

C'est la première espèce de *mélanopside* qui, à ma connaissance, ait été trouvée au Brésil; elle a trente-cinq millimètres de long sur treize millimètres dans la plus grande épaisseur du dernier tour; mais ces dimensions varient dans leurs proportions, quelques individus étant un peu plus épais, et d'autres, au contraire, plus effilés que celui dont je donne les mesures. Elle a huit à neuf tours dans son état le plus complet; ces tours sont presque planes, ou légèrement convexes, et marqués chacun de quinze à dix-huit sillons transversaux plus ou moins profonds, mais presque toujours fort apparents et sensibles sur

Pl. III

toute la coquille qui est allongée, conique et pointue; les côtes entre les sillons sont planes et forment de légères crénelures au bord de la lèvre où elles se terminent; la troisième de ces côtes, à compter de la suture, est quelquefois plus élevée que les autres, et forme ainsi sur le dernier tour une petite carène; il en résulte une légère échancrure au bord de la lèvre extérieure. Les stries d'accroissement sont très-nombreuses, fines, serrées et plus ou moins marquées. Toute la coquille est d'un vert-olive souvent jaunâtre, avec des petites lignes interrompues d'un rouge-brun presque noir, très-irrégulières, formant comme des petits traits sur les côtes, et suivant la même direction qu'elles; quelquefois ces lignes manquent entièrement. L'ouverture est ovale, échancrée à l'extrémité de la columelle qui forme un canal un peu courbé, peu profond, mais très-distinct. L'intérieur de la coquille est blanc sale, avec deux, trois ou quatre zones brunes, souvent bien séparées entre elles, d'autre fois plus ou moins confondues, mais qui s'arrêtent toujours à deux ou trois millimètres du bord de la lèvre qu'elles n'atteignent jamais; quelquefois aussi ces zones manquent tout-à-fait.

8. *Unio* (Monocondylea) *Franciscana*. Nob. tab. 3, f. 14, 15, 16, 17.

U. Subtriangulari-rotundata, inflata, crassiuscula, crebrissime striata, limbo posteriori dilatato, margine compressiusculo, sulcis duobus elevatis munito, fasciis tribus viridi-nigrescentibus signato, anteriori rotundato, epidermi olivaceo, natibus obtusis decorticatis, dente crasso obtuso, lunula nulla, margarita intus rosea.

Hab. le fleuve S. Francisco, avec l'*Anodonta Spixii*, dont elle a la forme et la couleur.

Cette espèce appartient évidemment au sous-genre créé par M. D'Orbigny, pour un petit groupe de mulettes, qui se font remarquer par une forme arrondie, bombée, et surtout parce que chaque valve ne porte qu'une seule dent cardinale, lisse, obtuse, quoique très-saillante, sans aucune trace de lames. Elle est presque aussi longue que large, arrondie, mais dilatée aux deux côtés de la charnière, de manière à lui donner un aspect obliquement triangulaire. Sa surface est très-finement et régulièrement striée, l'épiderme d'un vert-olive, le bord postérieur plus dilaté que l'antérieur, un peu comprimé sur le bord et muni de deux côtes longitudinales peu saillantes, d'un vert noirâtre sur leur crête. Ce bord postérieur étant de la même couleur obscure, la coquille se trouve marquée ainsi de trois fascies, dont celle du milieu est la plus étroite, et la marginale la plus large. Les crochets sont peu proéminents, obtus et rongés. La charnière se compose, sur chaque valve, d'une seule dent très-saillante, épaisse, ovale, obtuse, et d'une fossette pour recevoir la dent opposée. L'intérieur est nacré, d'un beau rose, excepté sur les bords, qui sont d'un blanc bleuâtre.

Je n'en ai reçu qu'un seul individu, dont voici les mesures : longueur, 37 millimètres ; largeur, 40 millimètres ; épaisseur, 24 millimètres.

9. *Anodonta anserina*. *Anodon anserinus*. Spix t. 21, f. 1, 2.

Hab. l'Utinga, bras du S. Francisco.

M. D'Orbigny rapporte cette espèce à l'*A. exotica*, Lam.

peut-être a-t-il raison; cependant elle diffère de tous les exemplaires de l'*exotica* que je possède, et dont quelques-uns m'ont été donnés par M. D'Orbigny lui-même, par ses valves constamment béantes aux deux bouts, et ne se touchant dans la coquille fermée que sur un espace d'environ un pouce de long dans la moitié du bord postérieur, dont l'extrémité arrondie est toujours baillante sur tout son contour.

10. *Anodonta obtusa*. *Anodon obtusum*. Wagn.

Anodon obtusum. Spix t. 22, f. 3.

Anodon litturatum. Spix tom. 22, f. 4, le jeune.

Hab. le Rio Tapicuru, qui traverse la ville de la Jacobina.

11. *Anodonta Spixii*. D'Orb.

Anodon trapezeus. Spix t. 20, f. 1.

Anodon rotundus. Spix t. 20, f. 2, 3, 4.

Hab. le fleuve S. Francisco.

12. *Anodonta siliquosa*.

Anodon siliquosum. Spix t. 22, f. 2.

Anodon pygmeum. Spix t. 23, f. 3, 4, le jeune.

Mycetopoda siliquosus. D'Orb.

Iridina siliquosa. Lea.

Je présume que c'est uniquement d'après l'opinion de M. de Férussac, émise toutefois avec doute par ce savant, à qui l'animal de cette espèce n'était point connu, que M. Lea l'a rapportée au genre *Iridine*.

Si M. D'Orbigny a vu l'animal, ce qui est très-probable, la

question est tranchée, et cette coquille doit faire réellement partie de son genre *Mycetopoda*; et si j'émetts quelque doute à cet égard, c'est parce que les deux extrémités des valves sont si légèrement béantes, que j'ai peine à croire que l'animal soit pourvu de ce long pied non rétractile dans la coquille, qui caractérise ce nouveau genre.

M. Blanchet l'a reçue de la Serra Jacobina ou de Villa di Barra, mais sans désignation de localité plus précise.

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

- Fig. 1. *Helix auris muris*, var. à flammes longitudinales.
2. La même, var. à zones transverses, offrant la bouche.
3. La même, var. à zones interrompues.
4. *Helix Maximiliana*, var. minor, avec l'animal.
5. *Helix Pantagruelina*, var. major, avec l'animal.
6, 7. *Helicina hæmatostoma*, du côté de l'ouverture.
12, 13. *Melanopsis brasiliensis*.
8. *Planorbis cimex*, grossi.
9. Le même, de grandeur naturelle.
10. *Planorbis depressissimus*, grandeur naturelle.
11. Le même, grossi.
14. *Unio (monocondylea) Franciscana*, vue extérieurement.
15. La même, intérieur de la valve gauche.
16. La même, les deux valves fermées.
17. La même au trait, valves séparées pour montrer leurs dents.

2
SECOND SUPPLÉMENT

AU

MÉMOIRE

SUR LES

COQUILLES TERRESTRES ET FLUVIATILES

DE LA PROVINCE DE BAHIA,

ENVOYÉES PAR M. BLANCHET.

De Stefano MORICAND.

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 7 Février 1858.)

N° 1. *Helix candida*. Nob. t. 4, f. 1. *Solarium candidum*.
Spix, t. 17, f. 3, 4. *Helix perspectiva*. Wagn. non Merg.
nec Say.

Je donne une figure d'un des plus gros individus que je possède de cette espèce, autant pour en faire ressortir la différence

avec la suivante, que parce que Spix ne l'a pas représentée vue de côté.

N° 2. *Helix Coffreana*. Nob. t. 4, fig. 2, 3.

H. testa alba, orbiculato depressa, late umbilicata, striata, spira obtusissima, peristomate crasso reflexo.

Hab. dans la province de Bahia.

Cette coquille a tellement de rapports avec la précédente, que je ne la présente qu'avec doute comme espèce distincte. Cependant ayant eu à ma disposition un nombre assez considérable de l'une et de l'autre, elle m'a offert des caractères suffisants pour l'en séparer, et même à plus juste titre que bon nombre d'espèces européennes ou africaines qui sont assez généralement admises.

Voici en quoi elle diffère de l'H. *candida*, en comparant des individus que je regarde comme adultes. Elle est de moitié plus petite, ne dépassant guère 20 millim. de diamètre, tandis que l'H. *candida* en a souvent 30 et au delà. Elle est beaucoup plus déprimée, la spire plus plane, sa hauteur n'est que la moitié de sa largeur, et dans l'autre elle est presque toujours égale au tiers. L'ouverture est dans les mêmes proportions, c'est-à-dire que dans l'H. *Coffreana*, elle a un quart de hauteur de moins que de largeur; dans l'H. *candida*, la hauteur de l'ouverture est égale à sa largeur. Le péristome, dans ma nouvelle espèce, est beaucoup plus épais, plus large et plus réfléchi. Enfin elle n'a que six tours, et l'H. *candida* en a sept. Je l'ai dédiée à M. Coffran, qui habite la colonie Léopoldine, près des Illheos, et qui a communiqué à M. Blanchet beaucoup de plantes et de coquilles de ce district.

N° 3. *Helix* (cochlogena) *oblonga*. Mull. *Bulimus oblongus*.

Brug. *Bulimus hoemastomus*. Scop.

Cette coquille a été envoyée de la *Serra-Jacobina*.

Elle ne diffère point de l'espèce ordinaire, seulement elle est un peu plus blanche extérieurement que les individus que j'ai reçus de Cayenne, et l'ouverture est d'un rose très-foncé.

N° 4. *Helix* (cochlogena) *Manoelii*. Nob. t. 4, fig. 4, 5.

H. testa conica, perforata, lævi, lucida, minutissime striata, alba e violaceo vel roseo nebulosa, ultimo anfractu zonis binis cærulescentibus notato, spira elevata obtusa, apertura ovato rotundata, peristomate albo sub reflexo.

Hab. la province de Bahia.

Cette espèce est très-difficile à caractériser; elle se rapproche beaucoup de l'H. *picturata*. Fer. de mon H. *caxoeirana* et du *Bulim. vittatus*. Spix. Cependant elle est constamment de moitié plus petite que ces derniers, et ses couleurs sont moins tranchées que dans aucune de ces espèces. Le fond de la coquille est blanc sale, plus ou moins mélangé de rose pâle et de rougeâtre ou de violet bleuâtre qui se fondent en différentes teintes indécises et nébuleuses. Les deux bandes d'un noir clair bleuâtre qui entourent le dernier tour dans sa moitié inférieure, paraissent très-constantes, et quoique parfaitement distinctes ne sont jamais bien nettement tranchées sur les bords comme dans l'H. *caxoeirana*; elle ne porte jamais de flammes ou raies longitudinales comme le B. *vittatus*, et la coloration des bandes est toute différente de celle de l'H. *picturata*. Du reste, la forme générale de la coquille est à peu près la même, sauf la taille,

que dans ces trois espèces. Elle a 20 à 24 millimètres de hauteur sur 12 de largeur.

Je la dédie au créole Manoel, qui a recueilli beaucoup d'objets d'histoire naturelle pour M. Blanchet, et qui dans ce moment fait pour le compte de ce dernier un voyage dans l'intérieur de la province, particulièrement dans le *Certam* ou *Sertao* (désert).

N° 5. *Helix* (cochlogena) *cinnamomeo-lineata*. Nob. t. 4, fig. 6, 7.

H. testa conica, perforata septemgyra, lævi, lucida, minutissime striata, alba, strigis longitudinalibus rectis cinnamomeis virgata, spira elevata obtusa, apertura ovato-rotundata peristomate reflexo albo.

Hab. la province de Bahia.

Ce Bulime a 24 millimètres de hauteur et 11 à 12 dans sa plus grande largeur; il est très-reconnaissable par ses raies longitudinales couleur de cannelle sur un fond blanc un peu sale. Le péristome est blanc de lait réfléchi, le bord columellaire assez épais, un peu recourbé à sa jonction avec le corps de la coquille, mais ne cachant point la fente ombilicale. L'ouverture a 11 millimètres de long sur 7 de large; sa longueur est donc égale au plus grand diamètre de la coquille, et le dernier tour de la spire se trouve à peu près égal aux quatre suivants. Je ne connais point le *Bulimus lineatus* Spix. figuré pl. 7, fig. 6 de ses *Testacea Brasil.*, avec lequel ma coquille paraît avoir de grands rapports; mais en consultant sa figure et sa description, l'on voit que la sienne a l'ouverture moins arrondie, plus rétré-

cie dans le haut, que le bord gauche couvre davantage la fente ombilicale, que la forme générale de la coquille est plus allongée ; elle a même un tour de plus à la spire ; le dernier est au moins égal à tous les autres réunis, et les lignes dont elle est peinte paraissent plus régulières et moins serrées que dans l'espèce que je viens de décrire.

N° 6. *Helix* (cochlodina) *exesa*. Clausilia *exesa*. Spix.

Var. *zonata*. Nob. t. 4, fig. 8, 9.

Parmi les derniers individus que j'ai reçus de cette jolie espèce, il s'en trouve deux qui offrent sur le dos du dernier tour une large bande d'un brun noirâtre ; cette bande occupe le milieu du tour et commence précisément au-dessous de l'ouverture ; elle va en s'élargissant et n'atteint pas tout à fait la tache longitudinale noirâtre qui borde extérieurement le large péristome rose et réfléchi de cette coquille.

Cette variété n'ayant point été signalée, j'ai cru devoir la faire figurer.

N° 7. *Melanopsis creno-carina*. Nob. t. 4, fig. 10, 11.

M. testa conoidea, solida, costulis transversis numerosis scalariformibus, longitudinalibus raris, anfractibus superne angulato planis, margine carinato crenulato, epidermide brunneo demùm nigrescente.

Hab. le Rio de Pedra Branca, province de Bahia.

Voici une seconde espèce de Melanopside du Brésil bien caractérisée et très-remarquable, assez rapprochée par sa forme du *Melania amarula*, mais plus grosse et plus ventrue. Les

côtes longitudinales qui marquent les accroissements successifs de la coquille sont tantôt assez rapprochées, tantôt très-distantes, en sorte que l'on en compte quelquefois dix ou douze sur le dernier tour, mais le plus souvent trois ou quatre seulement. Les côtes transversales sont plus régulières en forme d'escalier et assez ordinairement au nombre de quinze à dix-huit sur le grand tour, dont une à trois sur la partie supérieure et plane, dont le bord fortement caréné est ondulé et crénelé par des tubercules comprimés plus ou moins saillants et souvent rongés ; ces crénelures continuent sur les tours de la spire dont il est rare de trouver plus de quatre, les autres étant toujours rongés dans les individus adultes. En outre de ces côtes et de ces varices elle est très-finement striée en long. Le bord droit de l'ouverture est tranchant et crénelé par la saillie des côtes transversales. L'épiderme est brun marron tirant quelquefois sur le jaune olivâtre avec quelques flammes très-irrégulières noires ; dans les individus tout à fait adultes il est presque entièrement noir. La couleur de l'intérieur est variable, et on peut sous ce rapport distinguer trois variétés bien tranchées ; savoir :

α. *Melanostoma*, bouche entièrement noire en dedans.

β. *Leucostoma*, bouche blanche en dedans.

γ. *Bilineata*, bouche offrant intérieurement sur un fond blanc deux larges bandes noires qui partent du fond de la coquille et n'atteignent pas tout à fait le bord de la lèvre droite.

Dans toutes ces variétés l'opercule est ovale, noir et corné. Hauteur de la coquille 35-40 millimètres, largeur 22-25. Ces dimensions sont celles des plus grands individus.

N° 8. *Unio rotundus*, t. 4, fig. 12—14.

Testa rotundo rhomboidea, compressa, valvulis crassiusculis, posteriùs angustata, anteriùs rotundata, epidermide ex olivaceo nigrescente, natibus in junioribus longitudinaliter rugosis, in adultis decorticatis, dentibus cardinalibus crassis, striatis; margarità albâ iridescente.

Mya variabilis. Mutton. Transact. of Linn. Soc. V^e X, t. 24, fig. 4, 7.

Unio variabilis. Lea.

Diplodon rotundum. Spix. Test. Bras. t. 26, fig. 3, 4.

Unio rotundus. Wagn.

Ayant eu quelques doutes à l'égard de cette naïade, la figure de Spix représentant un jeune individu et celle de Matton un plus jeune encore, je crois convenable d'en publier une dans l'état adulte, d'autant plus que les plis des sommets des valves, très-prononcés dans les jeunes sujets, disparaissent entièrement avec l'âge, même dans ceux qui ne sont pas rongés comme il arrive ordinairement, et je n'aurais pu reconnaître cette espèce, si je n'en eusse reçu de très-jeunes individus qui correspondent bien alors aux figures citées; ils sont d'un vert olivâtre plus ou moins foncé, mais plus âgée elle devient presque noire. Les stries d'accroissement sont très-fines et très-nombreuses. Elle atteint dans son plus grand développement 65 millimètres de long sur 85 millimètres de large, et son épaisseur est de 30 millimètres.

Quelques individus sont sensiblement plus bombés que les autres, je présume que cela tient à une différence de sexe; mais

n'ayant aucune connaissance de l'animal, je ne puis rien affirmer à cet égard.

Les nombreux exemplaires que M. Blanchet m'a envoyés ont été pêchés dans le Rio S. Francisco, aux environs de Villa di Barra, dans l'intérieur de la province de Bahia. Elle a beaucoup de rapports avec l'*Unio panamensis* Lea; mais si l'on consulte la figure que cet auteur a donnée de cette dernière espèce, tabl. 14, fig. 42 du 5^e vol. des Transact. de la Soc. philosoph. de Philadelphie, on verra qu'elle s'en éloigne beaucoup par sa forme générale.

N^o 9. *Unio ellipticus*. Wagn.

Diplodon ellipticum. Spix, t. 26, f. 1, 2.

Elle se trouve non-seulement dans le fleuve S. Francisco où Spix l'indique, mais dans plusieurs autres petits fleuves des environs de Bahia; elle varie un peu de grandeur dans ces différentes localités, et suivant la nature du fond; dans ceux qui sont pierreux les sommets sont considérablement rongés; dans ceux qui sont vaseux, elle est fortement encroûtée d'un limon ferrugineux.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00048 7785