LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

595.78
B636e

Q531 OC NMP

NATURAL
HISTORY BIOLOGY

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

ESSAI
SUR UNE
MONOGRAPHIE
DES
ZYGÉNIDES,

SUIVI
DU TABLEAU MÉTHODIQUE,
DES LÉPIDOPTÈRES D'EUROPE;

PAR M. J. A. BOISDUVAL,
MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES,
CONSERVATEUR DU CABINET DE M. LE COMTE DEJEAN, etc.

PARIS,
CHEZ MÉQUIGNON-MARVIS, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DU JARDINET, N° 13;
CROCHARD, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DE SORBONNE, N° 5.
BRUXELLES,

AU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA LIBRAIRIE MÉDICALE FRANÇAISE.

—
1829.

AVERTISSEMENT.

Quoique un grand nombre des espèces qui composent cet Essai aient déjà été décrites ou figurées par plusieurs auteurs, j'ai cru faire plaisir à ceux qui s'occupent de lépidoptères, en réunissant en une sorte de Monographie les travaux des entomologistes qui m'ont précédé, et en y ajoutant les faits nouveaux et les espèces inédites que j'ai été à même d'observer. J'aurais pu, en citant beaucoup d'autres auteurs, donner plus d'extension à la partie synonymique ; mais j'ai pensé que cela était assez inutile, et je me suis contenté de donner les synonymes des auteurs systématiques et des ouvrages iconographiques.

Les sésies, dont Laspeyres nous a donné une monographie qui peut servir de modèle pour toutes celles que l'on publiera dans la suite, étant devenues pour moi le type d'une nouvelle tribu, je n'ai point cru devoir faire connaître les espèces découvertes dans l'Amérique du nord depuis

quelques années : 1° parce que je ne possède point encore de renseignemens suffisans sur leurs mœurs ; 2° parce que, publiant en ce moment l'histoire et l'iconographie des lépidoptères de la partie septentrionale du Nouveau-Monde, j'ai voulu éviter un double emploi ; d'autant plus que ce genre n'appartient nullement à la tribu des ZYGÉNIDES. Cependant j'ai décrit deux insectes (*thyris fenestrina* et *vitrina*) de cette tribu, pour faire connaître leurs larves et leurs métamorphoses. Mais ces deux genres, ainsi que celui d'*hecatesia* et d'*ægocera*, ne font point partie de la Monographie que je publie en ce moment ; j'ai seulement pris occasion de cet opuscule pour en donner la description.

Quant au genre *cocytia*, dont la chenille est inconnue, je crois, après l'avoir examiné avec attention, qu'il doit être mis à côté des *zygæna* ; cependant il faut que je dise que M. Latreille, le premier des entomologistes, et dont l'opinion est d'un si grand poids en pareille matière, pense qu'il serait mieux placé dans le voisinage des *hesperia*, des *urania*, ou dans la tribu des

CASTNIAIRES, à côté des *coronis* et des *agarista*.

J'ai aussi pris sur moi de séparer de la tribu des ZYGÉNIDES les genres à antennes pectinées, qui y avaient été réunis dans le temps par M. Latreille, et d'en créer un nouveau groupe, sous le nom de PROCRIDES.

Si, par leur port, ces insectes se lient d'un côté aux *zygæna*, ils semblent se réunir de l'autre à divers genres de ma tribu des CHÉLONIAIRES. Cependant cette division, en partie motivée par les larves, n'était pas tellement indispensable que je n'eusse pu laisser les choses dans l'état où elles étaient; mais les espèces à antennes pectinées sont si nombreuses, que j'ai cru faciliter leur étude, en les groupant ainsi que je l'ai fait pour les zygénides; et si le public accueille cet Essai avec bienveillance, je publierai de la même manière la tribu des PROCRIDES, qui formera la seconde partie de cet ouvrage.

Si d'ici à cette époque on découvre quelques espèces nouvelles appartenant à la tribu des ZYGÉNIDES, j'aurai grand soin de les donner en supplément dans la seconde partie de l'ouvrage. C'est

pourquoi je prie toutes les personnes qui s'occupent de cette partie de l'histoire naturelle, de vouloir bien me communiquer les espèces qu'elles croiront nouvelles.

On me reprochera peut-être de n'avoir point assez multiplié les figures, ainsi que je le pouvais, en faisant représenter des variétés; mais cela m'a semblé superflu, et je crois qu'à l'aide du texte on parviendra facilement à reconnaître ces dernières. A ce sujet, je me permettrai d'engager les amateurs qui détermineront leurs espèces, à ne pas négliger de lire les descriptions, après avoir consulté les figures; car tous les individus d'une même espèce ne se ressemblent pas. Les taches, par exemple, peuvent être plus ou moins grandes, plus ou moins irrégulières; la bordure des ailes inférieures peut être plus ou moins large, le fond de la couleur plus ou moins foncé, suivant le sexe de ces individus et les localités où ils auront été recueillis, etc., etc. : or toutes ces différences ne peuvent être bien rendues qu'à l'aide du texte. Malheureusement il y a beaucoup de personnes qui, la plupart du temps, font des erreurs grossières

en déterminant leurs insectes, parce qu'elles s'en rapportent seulement aux figures, et qu'elles ne lisent jamais les descriptions qui accompagnent les ouvrages iconographiques, et, je ne crains pas de l'avancer, ce mal n'est que trop commun.

Parmi les espèces que j'ai décrites, il en est un petit nombre que je n'ai pas pu avoir à ma disposition ; pour celles-ci, j'ai pris leurs descriptions dans les auteurs qui les ont fait connaître les premiers. Si, par la suite, je suis assez heureux pour me les procurer en nature, je m'empresserai de les faire figurer.

J'ai encore profité de la publication de cette Monographie pour donner une sorte de *conspectus* sur un projet de classification des lépidoptères d'Europe, avec le catalogue des espèces connues, divisées par genres (ou plutôt par sous-genres), et groupées par tribus. Dans ce catalogue, je donne la synonymie des principaux auteurs ; je réunis comme variétés les prétendues espèces nouvelles qui m'ont paru établies sur des bases trop peu solides pour pouvoir subsister ; enfin je donne la description des espèces inédites que je connais.

Je ne puis m'empêcher de faire observer ici que, dans l'état actuel de la science, c'est le comble du ridicule et du scandale de voir des entomologistes, fort recommandables d'ailleurs, donner des noms nouveaux à des espèces connues depuis près d'un siècle, soit qu'ils s'en fassent un plaisir, soit qu'ils négligent de consulter les ouvrages des auteurs qui les ont précédés, et dont les travaux méritent cependant bien que les noms qu'ils ont imposés soient religieusement conservés. Par exemple, quel est l'entomologiste qui n'a pas trouvé absurde que, dans ces derniers temps, on ait appelé *neriene*, la *colias palæno*; *dispar*, le *polyommatus hippothoe*; *fasciuncula*, le *bombix crenata*; *dives*, l'*hadena contigua*; *humeralis*, l'*hadena thalassina*; *seladonia*, l'*hadena protea*; *charlotta*, l'*argynnis aglaja*? etc., etc., etc. On conçoit facilement qu'une espèce réellement nouvelle puisse être décrite presque en même temps par deux personnes, et porter deux noms différens; mais, ce qu'on ne comprendra pas, c'est que des espèces, très-bien décrites par Linné, Fabricius, Borkhausen, Ochsenheimer, Treitschke, ou figurées par Rœsel,

Engramelle, Esper, Hubner, etc., soient nommées de nouveau par des auteurs qui regardent comme non avenu tout ce qui a été fait avant eux. Où en serions-nous s'il plaisait à chaque naturaliste de donner ainsi des noms nouveaux aux espèces qu'il décrit? Quel est celui qui, dans quelques années, pourrait débrouiller ce chaos?

Je pense donc qu'avant de décrire une espèce que l'on croit nouvelle, il faut se livrer à toutes les recherches nécessaires, pour se bien assurer qu'en effet elle est inconnue.

Dans ce catalogue je ne donne pas encore la classification des géomètres et de toutes les autres tribus qui se placent à la suite, telles que *pyralides*, *tinéïdes*, *crambides*, etc.; j'espère l'offrir plus tard, à la fin de la seconde partie de ma Monographie qui comprendra les PROCRIDES.

Je ne terminerai pas sans prier les entomologistes, qui ont bien voulu se charger de faire mes dessins d'en recevoir tous mes remerciemens. Parmi ces personnes, sont M. Duponchel, continuateur de l'ouvrage de Godart sur les *Lépidoptères de France*; M. Lepaige, ancien membre de la

Chambre des Députés, auquel je suis redevable de plusieurs observations curieuses sur les insectes du département des Vosges, et M. Poey, de Cuba, qui s'occupe en ce moment d'un travail fort intéressant sur les insectes de son pays. Je dois encore témoigner ici ma reconnaissance aux personnes qui ont eu la bonté de m'aider dans mon travail, soit en mettant leurs collections à ma disposition, soit en m'envoyant les espèces rares qu'elles possédaient; et, dans le nombre de ces personnes, je me plais à distinguer particulièrement MM. le comte Dejean, le comte de Saporta, Duponchel, Lefebvre, le baron Wimmer, Passerini, Bouisset, etc., ainsi que MM. les professeurs du Muséum royal, et surtout M. Latreille, dont les conseils bienveillans ont été pour moi le guide le plus sûr.

J. A. BOISDUVAL,

Rue Saint-Jacques, n° 101.

Paris, ce 30 septembre 1828.

RAPPORT
DE MM. LATREILLE ET BOSC
SUR UN MANUSCRIT DE M. BOISDUVAL,
PRÉSENTÉ
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES LE 10 SEPTEMBRE 1827,
ET INTITULÉ :
ESSAI SUR UNE MONOGRAPHIE DE LA TRIBU DES
ZYGÉNIDES.

Il est de toute évidence que, vu l'innombrable multitude d'espèces d'insectes que l'on découvre chaque jour, la difficulté de les bien grouper et de les faire bien connaître, lorsqu'on embrasse un système général, il faut restreindre le cercle de ses études, n'embrasser que certaines familles ou même un seul genre, et donner, en un mot, les ouvrages spéciaux appelés Monographies, et qui sont aux sciences naturelles ce que sont les topographies à la géographie générale. Persuadés de cette vérité, divers auteurs ont, à cet égard,

rendu de grands services à l'entomologie. Mais ces travaux, quoique très-approfondis et très-détaillés, quant à la synonymie et à la partie descriptive, présentent presque tous une lacune importante : rien, ou presque rien de neuf, par rapport aux mœurs des animaux qui en sont l'objet. Plusieurs de ces ouvrages encore, sont dénués de figures; or, celui dont nous allons rendre compte, est, sous tous ces points, à l'abri de la critique. L'auteur, M. Boisduval, dont les travaux et le zèle pour les sciences médicales avaient déjà été couronnés par divers prix, qui avait fourni à feu Godart, auteur de l'*Histoire Naturelle des Lépidoptères de France*, bon nombre d'observations curieuses, qui a des relations habituelles avec les savans étrangers, s'occupant plus particulièrement de cet ordre d'insectes, auquel enfin M. le comte Dejean a confié la garde et la conservation de sa riche collection d'insectes, s'est préparé à la publication de sa *Monographie des Zygénides*, par huit ans au moins de recherches faites sur le vivant. A la manière des Réaumur, des Degéer, il a commencé par observer la nature sur son théâtre même, et c'est ce qui lui a permis de bien distinguer les différences sexuelles ainsi que les variétés. Nous ne le suivrons point dans l'exposition qu'il fait des changemens qu'a éprouvés le

genre *sphinx* de Linné; il nous suffira de vous prévenir que Fabricius a formé, avec plusieurs de ces espèces (les *sphinx-béliers* de Geoffroy) un genre propre, sous le nom de *zygæna*; que cette coupe elle-même a ensuite été démembrée, et que tous ces genres composent aujourd'hui, avec les sésies de Fabricius, la tribu des ZYGÉNIDES.

M. Boisduval a pensé qu'il était convenable, tant elle est étendue, de la scinder en trois, et d'en établir deux nouvelles, sous la dénomination de SÉSIAIRES et de PROCRIDES. La première se composera des genres *sesia*, *thyris*, etc., qui vivent dans des tiges, à la manière des *cossus*. La seconde renfermera les zygénides à antennes pectinées, soit dans les deux sexes, soit dans les mâles seulement. Par opposition, la tribu des ZYGÉNIDES propres ne comprendrait plus que celles dont les antennes sont toujours simples. Tel est le sujet de la Monographie qu'il a eu l'honneur de vous offrir. Sept genres, *hecatesia*, *ægocera*, *thyris*, *co-cytia*, *zygæna*, *syntomis* et *psychotoe* en font partie. Le premier a été formé sur un insecte de la Nouvelle-Hollande, envoyé à l'un de vos commissaires par M. Alexandre Macleay, secrétaire-général de l'administration de cette colonie. M. Boisduval a cru devoir adjoindre seulement la connaissance de ce genre, ainsi que de celui

d'*ægocera*, en manière d'appendice ; il soupçonne avec raison qu'ils doivent être placés dans le voisinage des *hesperia*, près des *agarista* et des *coronis*, dans la tribu des CASTNIAIRES. Le genre *thyris* n'appartient pas non plus à sa Monographie, mais il en profite seulement pour faire connaître les chenilles de ces insectes.

Quoique M. Boisduval connaisse un bon nombre d'espèces nouvelles de *sesia* de l'Amérique septentrionale, il n'a pas cru devoir les ajouter à la monographie des espèces européennes, publiée par Laspeyres de Berlin, parce qu'il n'a pas encore pu obtenir les renseignemens nécessaires sur les mœurs de ces lépidoptères.

Les quatre derniers genres, savoir : ceux de *cocytia*, *zygæna*, *syntomis* et *psychotoe*, deviennent donc plus spécialement l'objet de sa Monographie. Malgré les travaux de Fabricius, Borkhausen, Ochsenheimer, Godart, il règne encore, relativement aux espèces et à leur synonymie, une grande confusion, et nous pouvons observer que M. Boisduval n'a rien négligé pour la dissiper.

Les généralités précédant cette nomenclature inspirent un vif intérêt par l'exposition de faits nouveaux et curieux.

Je ne parlerai pas du genre *cocytia*, formé d'après un insecte très-remarquable, recueilli à la

Nouvelle-Guinée par M. d'Urville, et qui lui est dédié. Il se rattache, selon l'auteur, aux macroglosses, par un rameau latéral.

Parlons des *thyris*, dont les habitudes nous étaient entièrement inconnues. On n'en avait décrit qu'une seule espèce, celle qu'on a nommée *fenestrina*. On la rencontre dans diverses contrées tempérées de l'Europe, et même de l'Amérique septentrionale. Elle vole en plein jour à l'ardeur du soleil, sur les fleurs des ombellifères, mais surtout sur les cimes des hyèbles et des sureaux. C'est aussi dans l'intérieur de ces végétaux que vit sa chenille. Elle ressemble, sous ce rapport, à celles des sésies et des cossus; la chrysalide est pareillement garnie de petites épines, observation que M. Boisduval étend aux nymphes des priones, des capricornes, et généralement à celles de divers autres insectes lignivores. Ces petites épines servent à la chrysalide, à s'avancer du fond de sa retraite jusqu'à son ouverture extérieure, pour que l'insecte, parvenu à son état parfait, n'éprouve point d'obstacles à sortir librement. Nous remarquerons, en passant, que plusieurs nymphes de divers autres coléoptères, qui, sous la forme de larves, avaient vécu dans la terre, se rapprochent aussi, dans le même but, de sa surface. L'Espagne et l'Amérique du nord,

ont fourni à notre auteur une seconde et nouvelle espèce de *thyris*.

Le genre *zygæna* a surtout fixé son attention, et lorsqu'il nous annonce qu'il l'a étudié pendant huit ans, nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment d'admiration pour la patience qu'il a montrée à cet égard. Il faut aussi convenir qu'il est le plus nombreux de cette tribu, et que la plupart de ses espèces sont propres à nos climats.

Il se compose de petits lépidoptères, dont la couleur dominante est d'un bleu plus ou moins métallique, mélangé de rouge; cette teinte affecte, à l'exception du bord postérieur, les ailes inférieures, et forme diverses taches sur les supérieures, et dans plusieurs, un anneau sur l'abdomen, et quelquefois une sorte de collier sur le thorax. Les ailes ne sont jamais unicolores. Le rouge est, dans un petit nombre, remplacé par du jaune, mais ce n'est qu'accidentellement et dans de pures variétés.

Les zygènes éclosent à la fin du printemps ou dans le milieu de l'été; elles volent en plein jour, rapidement et en ligne droite, et peu de temps; elles se reposent isolées ou en petits groupes, sur les têtes des *staticées*, des *scabieuses*, des *centaurees*, des *phyteuma*, etc.; c'est toujours sur les fleurs qu'elles s'accouplent, et elles demeurent

ainsi réunies douze à vingt-quatre heures. Le mâle vit encore deux ou trois jours, et la femelle périt après la ponte. L'auteur décrit bien la forme des œufs, qui sont oblongs, jaunâtres ou verdâtres, luisans, et qui éclosent au bout de deux à trois semaines.

Il a plusieurs fois rencontré des individus de diverses espèces, accouplés; mais il n'a jamais obtenu d'œufs provenant de ces mariages adultérins. Il a observé que les femelles non fécondées d'un grand nombre de lépidoptères, qu'il a gardées intactes, ne pondent point; mais qu'il n'en est pas ainsi, lorsqu'on les fixe, en traversant, comme on le fait d'ordinaire, leur corselet, au moyen d'une épingle. Attachées de même, les femelles fécondées se débarrassent de leurs œufs plus promptement.

Après leur seconde mue, et quoique la saison soit encore assez chaude, et que les alimens habituels ne manquent point, les chenilles s'engourdissent, ne donnent aucun signe de vie, et restent dans cet état jusqu'au printemps prochain. Ayant alors repris leur activité primitive, elles changent pour la seconde fois de peau, continuent de manger, de se développer jusqu'au dernier terme de leur croissance, qui a lieu à la fin de mai ou de juin. Elles passent alors à l'état de chrysalide;

une seule espèce cependant, la *zygæna achilleæ*, écrot de très-bonne heure, comme au commencement de mai, et reparait en juillet ou en août, dans divers départemens méridionaux de la France. Diverses plantes légumineuses herbacées, les trèfles, les luzernes, le sainfoin, sont l'unique nourriture des chenilles. Nous disons des légumineuses herbacées, parce que M. Boisduval leur a vainement offert des légumineuses frutescentes ou arborescentes. Dès-lors, les divers noms spécifiques, et pris d'autres plantes étrangères à cette famille, qu'on a donnés à ces insectes, sont-ils impropres. Les chenilles vivent toujours à découvert, solitairement ou réunies en petit nombre.

Les cocons sont attachés à quelques plantes grêles ; ils sont jaunes ou jaunâtres, de la consistance du parchemin ou de la coquille d'œuf, vernissés en dehors et en dedans, le plus souvent en forme de bateau, et, dans les autres (ceux des zygènes ayant des taches en forme d'yeux), ovoïdes.

La chrysalide est courte, de peu de consistance, brune, avec les fourreaux des ailes et l'abdomen ordinairement un peu plus pâles. Elle demeure dans cet état deux à trois semaines. C'est toujours par l'extrémité du cocon regardant le ciel que sort l'insecte parfait.

On ne connaît qu'une seule zygène dans la partie septentrionale du nouveau continent. Les régions tempérées de l'Europe, la Syrie, la Perse et le cap de Bonne-Espérance, sont leur patrie. On n'en a pas encore rapporté de la Nouvelle-Hollande.

Les syntomis ont de grands rapports avec les lépidoptères précédens; leurs ailes sont toujours noires ou bleuâtres, avec des taches blanches ou jaunes, plus ou moins transparentes, et disposées comme dans les zygènes; leur corps est noir, ou d'un vert bronzé, annelé de jaune ou de rouge. Elles volent aussi en plein jour, mais moins rapidement et moins long-temps que ces derniers lépidoptères, et quelquefois en grand nombre, autour des buissons. Ces observations, faute de renseignemens sur les espèces exotiques, ne s'appliquent qu'à la *syntomis phegea*, la seule que nous possédions en Europe. Les chenilles ressemblent peu à celles des zygènes; elles se roulent à la manière des chenilles de certaines *chelonias*, et de quelques autres *bombicytes*; mais elles font leur coque sous la mousse, sous des feuilles sèches, et son tissu est léger. Elles sont sujettes au même engourdissement que celles des zygènes. Leur chrysalide est plus allongée.

Il est très-douteux qu'il existe des syntomis en

Amérique. Ce genre paraît être plus spécialement propre aux climats chauds de l'ancien monde, et jusqu'à la Nouvelle-Hollande. Le dernier genre est celui de *psychotoe*; il a pour type un insecte à ailes concolores, à antennes moniliformes, ayant le port des psychés et des syntomis. Il est établi sur une espèce envoyée du Bengale par MM. Diard et Duvaucel. L'auteur décrit quinze espèces de syntomis, dont plusieurs inédites. Le nombre de celles du genre zygène est de quarante-deux, sur lesquels il y en a huit de nouvelles. Sept planches, sur les huit qui accompagnent ce manuscrit, sont consacrées à ces deux coupes génériques. L'autre représente un individu de celles appelées *cocytia*, *hecatesia*, *ægocera*, qui ne comprennent encore chacune qu'une seule espèce. Nous avons dit plus haut que celles du genre *thyris* se réduisaient à deux. Les descriptions et la synonymie sont très-complètes, et précédées d'une bonne phrase spécifique, en latin.

En séparant les *sesia* et les *thyris* des *zygénides*, M. Boisduval a suivi les avis de l'un de vos commissaires; il a cru aussi pouvoir détacher de cette tribu les genres à antennes pectinées, soit dans les deux sexes, soit au moins dans les mâles, et il en a formé sa tribu des PROCRIDES. Cependant, comme les *procris* se lient par des nuances bien

déliçates, avec les zygénides à antennes simples, que leurs habitudes ont quelques rapports, cette séparation n'était pas trop nécessaire. Il n'en est pas de même des sésies et des thyris; leurs chenilles vivant à la manière de celles des cossus, des hépiales, dans l'intérieur des végétaux, leurs chrysalides offrant des caractères particuliers, il y avait lieu à faire une nouvelle tribu. Il nous a paru aussi que, par les antennes et les palpes, les *cocytia* avaient autant de ressemblance avec les *uranies*, les *agaristes*, qu'avec les *zygénides*. A ma connaissance, on n'a pas encore découvert aucune espèce de ces deux genres, ainsi que de celui de *zygæna*, dans l'Australasie et la Polynésie; mais ces contrées sont le séjour spécial des *agaristes* et de quelques *uranies*, recueillies avec les *cocyties*, par M. le capitaine Durville. Au surplus nous ne voulons point prononcer, mais inviter M. Boisduval à revenir sur cet examen, afin de bien constater les rapports naturels de ces insectes.

Quoiqu'il n'ait donné à son ouvrage que le titre modeste, *Essai d'une Monographie*,..... vous avez cependant pu vous convaincre, par cette analyse, que, tant par l'observation des habitudes des insectes dont il traite, que pour les signalements et la synonymie des espèces, il a fait tout

ce qu'on pouvait attendre d'un bon naturaliste, dans l'état actuel de la science. Peu de monographies peuvent être comparées à celle-ci, et vos commissaires sont d'avis qu'elle mérite de trouver place dans les mémoires des savans étrangers, dont l'Académie ordonne l'impression.

Paris, ce 1^{er} Octobre 1827.

BOSC, Commissaire.

LATREILLE, Rapporteur.

TABLE

DES PRINCIPAUX AUTEURS

CITÉS

DANS LA MONOGRAPHIE OU DANS LE CATALOGUE.

BERGSTRESSER, Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau, im Verlage des Verfassers, 1779 und 1780, in-4.

BORKHAUSEN, Naturgeschichte der europæischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung, vol. II, Sphinx, Schwarmer. Frankfurt a. M., 1789, in-8.

BOISDUVAL, Annales de la Société Linnéenne de Paris, 1826-1827, in-8.

BONNELLI, Mémoire sur les Lépidoptères nouveaux de la Sardaigne. Turin, in-4.

BRAHM, Handbuch der ökonomischen Insectengeschichte, in Form eines Kalenders bearbeitet, vol. I. Mayence, 1791.

CLERK, Icones insectorum rariorum, sectio I. Holmiæ, 1759, in-4.

CRAMER, Papillons exotiques. Amsterdam, 1782, in-4.

CURTIS, British Entomology, being illustrations and descriptions. London, 1824, in-8. (Cet ouvrage est exécuté avec un luxe et une exactitude remarquables. Je n'en connais encore que trois volumes.)

CYRILLI (Dominici M. D.), *Entomologiae Neapolitanæ Specimen*, I. Neapoli, 1787, in-fol.

DAHL (Georg.), marchand à Wharing, près Vienne, connu dans toute l'Europe par le commerce qu'il fait en insectes. Il est très-peu scrupuleux sur l'établissement des espèces nouvelles.

DALMAN (J. W.), *Analecta Entomologica*, 1 vol. in-4. Holmiæ, 1823.

— Mémoires de l'Académie suédoise.

DEPRUNNER, *Lepidoptera Pedemontana. Augusta-Taurinorum*, 1798.

DUPONCHEL, voy. GODART.

DRURY, *Illustrations of natural History*. London, III vol. in-4.

ENGRAMELLE, *Papillons d'Europe peints d'après nature*, tom. III. Paris, 1779, in-4. (Les auteurs allemands, au lieu de citer Engramelle, qui est l'auteur de l'ouvrage, ont l'habitude de citer Ernst, qui n'en est que le peintre.)

ESPER, *die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur*, vol. IV. Erlangen, 1779, in-4.

FABRICII *Systema Entomologiae. Flensburger et Lipsiæ*, 1775, in-8.

— *Species Insectorum*, tom. II. Hamburgi et Kilonii, 1781, in-8.

— *Mantissa Insectorum*, tom. II. Hafniæ, 1787, in-8.

— *Entomologia Systematica*, emendata et aucta, t. III, pars I. Hafniæ, 1793, in-8.

— *Genera Insectorum. Kilonii*. 1777, in-8.

FISCHER, Entomographia Imperii Russici, vol. II, in-4, Moscow.

FUESSLY, Verzeichniss der ihm bekannten schweizerischen Insecten. Zurich und Winterthur, 1775, in-4.

— neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie, vol. II. Zurich, 1785, in-8.

GEOFFROY, Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris, tom. II. Paris, 1764, in-4.

GIORNA, Figlio, Calendario Entomologico. Torino, 1791, in-8.

GODART, Histoire naturelle et Iconographie des Lépidoptères ou Papillons de France. (Cet ouvrage, depuis la mort de l'auteur, est continué par M. Duponchel.) Les cinq premiers volumes sont de Godart. Paris, chez Méquignon-Marvis, rue du Jardinets, in-8.

— Encyclopédie méthodique, article *papillon*, 1 vol. en 2 parties, in-4.

GOEZE, entomologische Beyträge zu Linne's 12 Ausgaben des Natursystems. Leipzig, 1777.

HAWORTH, Lepidoptera Britannica. London.

HERBST, Natursystem der Schmetterlinge, XI Theile, mit ausgemahlten Kupfertafeln. Berlin, 1783, in-8.

HUBNER (Jacob), Sammlung europäischer Schmetterlinge. Augsburg, 1796, in-4. (Cet ouvrage est le plus complet et un des meilleurs que je connaisse pour l'exactitude des figures. Malheureusement l'auteur est

mort il y a deux ans, et je crains beaucoup que la continuation ne soit pas aussi parfaite.)

HUFNAGELS Tabellen von den Tagvögeln der Berliner Gegend, im zweyten Bande des Berlinischen Magazins, 1766, in-8.

ILLIGER, Magazin für Insectenkunde. Braunschweig, bei Karl Reichard, in-8.

KINDERMANN, marchand de lépidoptères et bon observateur à Bude. Tous les insectes que l'on reçoit de lui sont très-bien préparés, et presque tous élevés de chenilles.

KNOCH, Beyträge zur Insectengeschichte. Leipzig, 1781-1782-1783, in-8.

LANG, Verzeichniss seiner Schmetterlinge, u. s. w. Zweite Auflage. Augsburg, 1789, in-8.

LASPEYRES (Jacob-Henri), Sesia Europæ iconibus et descriptionibus illustrata. Berlin, 1801, in-4, sumptibus auctoris.

LATREILLE, Genera Crustaceorum et Insectorum. Paris, IV vol. in-8.

— Familles naturelles. Paris, I vol. in-8.

LEFEBVRE, Annales de la Société Linnéenne de Paris, in-8.

LINNÉ, Systema Naturæ, tom. I, pars I, ed. XII. Holmiæ, 1766, in-8.

— Fauna Svecica, editio altera. Holmiæ, 1761, in-8.

— Museum Ludovicæ Ulricæ reginæ. Holmiæ, 1764, in-8.

LJUNG, Mémoires de l'Académie de Stockholm.

MARCEL-SERRES, Annales de la Société Linnéenne de Paris, 1826, in-8.

MULLER (C. L.), Fauna Lepidoptera Silesiaca, 1. Abth., 1. Heft, Papiliones. Breslau.

NATURFORSCHER (der), vii. St. Halle, 1775, XVIII. St. Halle, 1782, in-8.

OCHSENHEIMER (Ferdinand), die Schmetterlinge von Europa, IV vol., 1806-1810. Leipzig, in-8. (Cet ouvrage est le plus complet que nous ayons sur les lépidoptères d'Europe. Ochsenheimer a décrit toutes les espèces qu'il connaissait, jusqu'aux bombycites inclusivement, et a donné de plus un catalogue systématique des noctuélides. Son continuateur, M. Friedrich Treitschke, a publié, sur le même plan, et avec le même succès, III vol. de noctuélides et II de phalénides. Sous peu il paraîtra un volume des pyralides.)

PALLAS Reise durch verschiedene Provinzen des rüssischen Reichs. St. Petersburg, 1771.

PALLAS Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Stadthalterschaften des russischen Reichs, in den Jahren 1793 und 1794. Leipzig, 1799, in-4.

PANZER, Faunæ Insectorum Initia.

PETAGNA (Vincentio), Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. Francofurti et Moguntiae, 1787, in-4.

— Institutiones Entomologicae, tom. II. Neapoli, 1792, in-8.

PODA (Nicolaus), Insecta Musei græcensis. Græcii, 1761.

ROSSI (Petrus), *Fauna Etrusca*, tom. II. Liburni, 1790, in-4.

— *Mantissa Insectorum*, exhibens species nuper in Etruria collectas, tom. II. Pisis, 1794, in-4.

SCHÆFFER, *Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum*, tom. I-III. Ratisbonæ, 1767, in-4.

SCHRANK, *Fauna Boica*, II. B. Ingolstadt, 1801, in-8.

SCHWARTZ, *neuer Raupenkalender*. Nürnberg, 1791, in-8.

SCOPOLI, *Entomologia Carniolica*. Vindobonæ, 1763, in-8.

SCHNEIDER, *systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge*. Halle, 1787, in-8.

SCRIBA, *Beyträge zu der Insectengeschichte*, III. Heft. Frankfurt a. M., 1793, in-4.

— *Journal für die Liebhaber der Entomologie*. Frankfurt, 1790, in-8.

SULZER, *abgekürzte Geschichte der Insecten*, nach dem Linnæischen System, II Theile. Winterthur, 1776, in-4.

THUNBERG, *Dissertationes academicæ Upsaliæ habitæ*, vol. III. Gættingæ, 1801, in-8.

TREITSCHKE, voy. OCHSENHEIMER.

VILLERS (DE), *Entomologia Linneana*, tom. II. Lugduni, 1789, in-8.

VIEWEG, *tabellarisches Verzeichniss der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge*, fasc. I. Berlin, 1789, in-4.

MONOGRAPHIE

DES

ZYGÉNIDES.

GÉNÉRALITÉS.

M. Latreille a ainsi caractérisé sa tribu des zygénides : Des palpes comprimés , grêles , cylindracés ou cylindrico-coniques, barbus ou hérissés, ayant le troisième article très-distinct; des antennes nues ou pectinées, en fuseau ou en corne de bélier.

Les genres *sesia*, *thyris*, *ægocera*, *zygæna*, *syntomis*, *procris*, *atychia*, *glaucopis*, *aglaope* et *stygia*, faisaient partie de cette tribu; mais les nombreuses découvertes faites en entomologie depuis plusieurs années, et surtout la quantité considérable de lépidoptères nouveaux rapportés de l'Amérique méridionale, m'ont engagé à scinder en trois ce groupe, devenu trop nombreux.

Je réunis dans la tribu des SÉSIAIRES (1) les genres *sesia*, *sphecomorpha* et *thyris*; dans celle des ZYGÉNIDES, je

(1) La place de cette tribu n'est pas encore fixée d'une manière positive.

placé toutes les espèces à antennes simples, et dont les chenilles vivent à découvert : tels sont les genres *cocyta*, *zygæna*, *syntomis* et *psychotœ* ; je réunis dans ma tribu des PROCRIDES toutes les autres espèces dont les antennes sont pectinées, soit dans les mâles, soit dans les deux sexes. Quant au genre *stygia*, la découverte récente de sa chenille m'a engagé à le placer dans ma tribu des ZEUZÉRIDES, à côté des genres *cossus*, *zeuzera*, *hepialus*, etc.

Après avoir examiné avec attention le genre *ægocœra*, je suis resté convaincu qu'on devait le mettre près des hespéries, dans la tribu des CASTNIAIRES, à côté des *agarista*, *coronis*, etc., de même que le genre *hecatesia*, que j'ai établi dans cet ouvrage.

Linné, dans ses divers ouvrages, n'a fait qu'un genre de la famille des crépusculaires, sous le nom de *sphinx* ; mais, voyant déjà que par leur port, leurs mœurs, et surtout par leurs larves, les zygénides en différaient très-sensiblement, il les appela *sphinges adscitæ*.

Plus tard, Fabricius partagea les lépidoptères qui composent actuellement la famille des crépusculaires de M. Latreille en trois genres, *sphinx*, *sesia* et *zygæna*. Quelque temps avant de mourir, dans son *Systema Glossatarum*, ouvrage qu'il n'a pas eu le temps de terminer, et qui par cette raison n'a jamais été publié, il y ajouta les genres *laothœ*, *ægéria*, *amata*, *glaucopis* et *procris*. Tous les autres genres établis depuis sont d'Illiger et de M. Latreille.

On voit par ce qui précède que la tribu des zygénides,

telle que je l'ai réduite, ne contiendra plus que quatre genres. Cependant, le genre *ægocera* étant très-peu connu des entomologistes, j'ai profité de cette Monographie pour le décrire et le faire figurer; il en est de même du genre *hecatesia*, qui est très-intéressant, et que j'ai établi sur un lépidoptère de la Nouvelle-Hollande. J'ai aussi fait figurer la *thyris fenestrina* et une autre espèce nouvelle du même genre, quoique ces deux insectes n'appartiennent pas à la tribu que je me suis proposé de faire connaître; mais je n'ai pu résister au désir de décrire les larves et les chrysalides de ces deux lépidoptères, que je place dans ma Monographie, ainsi que les deux précédens, en manière d'appendice.

Le genre *thyris* paraît être très-peu nombreux; la seule *thyris fenestrina* a été connue des auteurs; elle se trouve partout où croissent des *sambucus*; elle habite également l'Europe et le nord du nouveau continent; la *thyris vitrina*, que je décris pour la première fois, a été trouvée en Espagne, et rapportée depuis de la Géorgie d'Amérique par M. Leconte. Leurs larves sont nues, cylindriques, blanchâtres, tachetées de petits points réguliers; elles ont seize pattes, et vivent à la manière des *cossus* et des *scsia*, dans les tiges des hyèbles, des sureaux, des légumineuses et des synanthérées; leur chrysalide est raccourcie, pointue et garnie de petites épines qui la rendent un peu scabre. Ce dernier caractère est applicable à toutes les chrysalides dont les chenilles vivent dans l'intérieur des tiges. J'ai observé le même fait pour les nymphes des

priones, des cérambyx, etc. Il paraît que ces épines courtes qui sont sur les deux côtés servent à fixer la nymphe dans l'intérieur de la tige, et lui permettent de se mouvoir et d'arriver jusqu'au bord du trou par où doit sortir l'insecte parfait; car il est certain que les chrysalides des lignivores, après l'éclosion, sont toujours placées à l'entrée du trou qui leur a servi d'issue, quoique pendant l'état d'engourdissement elles en soient éloignées de plusieurs pouces horizontalement, ou de bas en haut, ce qui prouve qu'elles peuvent exercer un léger mouvement de progression.

Le genre *cocytia* est le premier de ma tribu des zygénides; je l'ai établi sur un très-bel insecte rapporté de la Nouvelle-Guinée par M. le capitaine Durville.

Le genre *zygæna* ou *sphinx-béliers* de Geoffroy a été créé par Fabricius, et adopté par M. Latreille et tous les entomologistes modernes. Ce genre étant presque entièrement propre à l'Europe, j'ai dû l'étudier d'une manière plus approfondie; aussi ce n'est qu'après de longues observations, recueillies depuis plus de huit années, que je me suis hasardé à publier cet essai; enfin, ce n'est qu'après avoir étudié plusieurs fois chaque espèce sous ses différens états que j'ai entrepris cette Monographie.

Ce genre a les ailes en toit, plus longues que le corps, les supérieures d'un bleu plus ou moins métallique, avec des taches rouges (rarement blanches ou jaunes), jamais unicolores. Les inférieures sont presque toujours rouges avec le bord bleu, rarement jaunes ou de la

couleur des supérieures. Le corps est bronzé, bleuâtre, quelquefois cerclé de rouge ou de jaune.

La couleur jaune n'appartient pas aux zygènes ; elle n'est jamais qu'accidentelle, et ne se rencontre que dans des variétés. Toutes les fois que les taches des ailes supérieures seront jaunes, les ailes inférieures et l'anneau de l'abdomen, si c'est le propre de l'espèce, seront constamment de cette dernière couleur. Je ne citerai pour exemple que la *zyg. æacus* de Fabricius, le *sphinx luteola*, Hub., la *zyg. coronillæ*, Fabricius, etc.

Les zygènes éclosent toutes à la fin du printemps ou au milieu de l'été ; elles volent en plein jour à l'ardeur du soleil ; leur vol est rapide, en ligne directe, et de peu de durée. Ces petits lépidoptères aiment à se reposer en petits groupes sur les têtes des *statice*, des *scabiosa*, des *centaurea*, des *phyteuma*, etc. C'est toujours sur les fleurs qu'a lieu l'accouplement ; elles y restent pendant douze ou vingt-quatre heures. Le mâle vit encore pendant deux ou trois jours, et la femelle périt après avoir achevé sa ponte.

Je dois dire ici qu'il m'est arrivé quelquefois de trouver des espèces différentes accouplées ensemble ; ainsi j'ai trouvé plusieurs fois la *filipendulæ* accouplée avec la *peucedani* et la *trifolii* avec l'*hippocrepidis*. J'ai fait pondre les femelles pour obtenir des hybrides, mais jamais je n'ai été assez heureux pour voir éclore les œufs résultant de ces mariages adultérins, quoique les œufs des zygènes éclosent très-facilement. Il est possible cependant que quelques-uns éclosent dans la nature.

J'ajouterai encore une autre observation, c'est que j'ai renfermé dans des boîtes des femelles non fécondées que j'avais obtenues *ex larva*; elles ont vécu long-temps en refusant constamment de pondre; mais si je venais à leur enfoncer une épingle dans le corselet, presque aussitôt elles pondaient abondamment. Les femelles fécondées, renfermées dans les mêmes circonstances, pondent, mais beaucoup plus vite si on leur perce le corselet. Je crois que tous les lépidoptères sont à peu près dans le même cas; car j'ai répété ces expériences sur un grand nombre d'individus de la famille des bombycites, qui, comme chacun sait, pondent avec la plus grande facilité. C'est ainsi que les *bomb. dispar* et *chrysorrhæa*, qui tapissent de leurs œufs tous les arbres de nos boulevards, n'ont jamais produit d'œufs en captivité, les femelles n'étant ni fécondées ni piquées.

Les œufs des zygènes sont ovoïdes, oblongs, jaunâtres ou verdâtres; luisans; ils éclosent au bout de quinze jours ou de trois semaines au plus tard.

Les petites chenilles, en sortant de l'œuf, sont velues, noirâtres ou brunâtres, sans aucunes taches; elles conservent cette couleur jusqu'à la première mue. Après le second, mais plus ordinairement après le troisième changement de peau, elles prennent le dessin qu'elles doivent conserver jusqu'à leur métamorphose. Ces chenilles adultes sont très-raccourcies, épaisses, vertes, jaunes ou glauques, toujours avec des points ou taches noires disposées régulièrement, et des poils rares et soyeux, non tuberculés.

Un fait très-remarquable, c'est que ces petites chenilles passent l'hiver à l'état de larves, quoiqu'elles éclosent en été. Dès qu'elles sont écloses, elles commencent à manger, et continuent de se nourrir pendant une quinzaine; puis, quand elles ont subi leur seconde mue, elles cessent de manger, elles s'engourdissent, ne donnant aucun signe de vie, quoique la saison soit encore très-chaude et qu'elles aient une nourriture fraîche et abondante. Elles restent pendant tout l'automne et l'hiver dans cet état de torpeur. Au printemps suivant, dès les premiers beaux jours, elles se réveillent, se donnent beaucoup de mouvement, mangent abondamment pendant quelques jours, changent de peau pour la troisième fois, et continuent de se développer jusqu'à la fin de mai ou de juin, époque où elles se mettent en chrysalides. Il est une espèce cependant, *zyg. achilleæ*, qui éclot de très-bonne heure : aux environs de Paris, il n'est pas extraordinaire de la rencontrer dès le commencement de mai; elle reparait en juillet et août dans les parties chaudes de la France. Je l'ai prise moi-même, à cette époque, dans la haute Bourgogne et le Dauphiné : c'est la seule, à ma connaissance, qui soit dans ce cas.

Ce genre de lépidoptères est exclusivement propre aux légumineuses herbacées, telles que *coronilla minima*, *hippocrepis*, *lotus corniculatus*, *siliquosus*, *compressus*, tous les *trifolium*, les *medicago*, l'*hedysarum onobrychis*, etc. En captivité, elles se nourrissent indistinctement de toutes les plantes ci-dessus; mais j'ai vainement

tenté de leur donner des légumineuses frutescentes ou arborescentes. Cela explique très-bien pourquoi on ne rencontre jamais de zygènes dans les pays où il n'existe point de petites légumineuses, et les noms de *peucedani*, *achilleæ*, *cynaræ*, *filipendulæ*, *lavandulæ*, *brizæ*, etc., ne conviennent nullement à ces insectes, puisqu'ils induisent en erreur. Cependant je ne me suis point permis de changer ces noms, qui sont généralement adoptés, car je pense que lorsqu'une espèce porte un nom, bon ou mauvais, on doit le conserver, pour ne point augmenter une synonymie déjà trop embrouillée.

Les chenilles des zygènes vivent toujours à découvert, solitaires, ou réunies en petit nombre sur la même plante. Parvenues à leur grosseur, elles filent un cocon qu'elles attachent à la tige de quelque plante grêle; ce cocon est mince, jaune ou blanchâtre, vernissé en dehors et en dedans, de la consistance du parchemin ou de la coquille d'œuf; le plus souvent en forme de bateau, quelquefois en forme d'œuf. (Cette dernière forme appartient aux zygènes à taches ocellées.)

La chrysalide est raccourcie, de peu de consistance, brune ou noire, avec les enveloppes des ailes et les anneaux de l'abdomen moins colorés. Elle reste ordinairement de quinze jours à trois semaines sous l'état de nymphe.

Les zygènes sortent toujours de leur cocon par l'extrémité tournée du côté du ciel.

Je ne connais qu'une seule espèce trouvée dans la partie septentrionale du Nouveau-Monde; c'est prin-

cipalement dans les régions tempérées de l'Europe qu'on rencontre ces charmans insectes. Il en existe aussi au cap de Bonne-Espérance, mais on en sera peu surpris lorsqu'on saura que nos *noctua suffusa*, *tirrhæa*, *scapulosa*, *c. nigrum* et plusieurs autres de nos lépidoptères habitent cette partie de l'Afrique. J'en ai vu deux espèces de la Perse et une de la Sibérie; mais tout me porte à croire que ce dernier pays, et surtout le plateau central du Thibet, offriraient plusieurs espèces nouvelles. Quant à l'Australasie, je ne pense pas qu'on y en trouve jamais.

Le genre *syntomis* se distingue des zygènes, au premier coup d'œil, par les antennes fusiformes et non en massue, par les quatre ailes, qui sont toujours concolores et jamais tachées de rouge. Je ne parlerai pas ici des autres caractères; je les ai exposés en détail en tête du genre. Il a été établi par Illiger sur la *zygæna quercus* de Fabricius, *sph. phegea*, L. Il lui a donné le nom de *syntomis*, de *συντομος*, *brevis*, à cause des palpes, qui sont très-courts.

Ces insectes, par leurs mœurs, se rapprochent beaucoup des zygènes; de même ils aiment à voltiger à l'ardeur du soleil, mais leur vol est plus lourd et moins soutenu. On les voit quelquefois, au moment de la plus grande chaleur du jour, voler en grand nombre autour des buissons, ce qui a probablement été cause que Fabricius a donné à la *phegea* le nom impropre de *zygæna quercus*.

Dans leur premier état, ces insectes diffèrent essentiellement des zygènes; leurs chenilles ont des tuber-

cules hérissés de poils longs et roides; lorsqu'on les touche, elles se roulent en boule à la manière de ces chenilles appelées vulgairement *écailles* ou *hérissonnes*; elles n'attachent point leur coque à la tige des végétaux, mais elles se changent sous la mousse ou les feuilles sèches dans un tissu très-léger. La chrysalide est plus consistante et plus allongée que celles des zygènes.

Les ailes des *syntomis* sont toujours noires ou bleuâtres, luisantes, avec des taches blanches ou jaunes plus ou moins transparentes, disposées comme dans les zygènes; leur corps est noir ou d'un vert bronzé, annelé de jaune ou de rouge.

Un seul insecte de ce genre est propre aux parties chaudes de l'Europe; mais l'Afrique, la Nouvelle-Hollande, et surtout les îles de l'Archipel des Indes, en possèdent certainement un grand nombre. Je ne suis pas sûr qu'on en ait jamais trouvé en Amérique. J'ai vu dans une collection la *syntomis cerbera*, comme venant du Brésil; mais j'ai d'autant plus de peine à le croire, que cette espèce est propre au Bengale, au cap de Bonne-Espérance et au Sénégal.

Le genre *psychotoe* est le dernier de ma Monographie; il est établi sur un très-petit lépidoptère trouvé au Bengale par M. Duvaucel. Il est distinct de tous les autres par ses antennes moniliformes et ses ailes dépourvues de taches.

GENRE HECATESIA. *Mihi.*

Antennis cylindricis, fusiformibus, articulis distinctis, pilosis, clava oblonga; palpis dilatatis, hirsutissimis, articulis vix distinctis, clypeum ultra non assurgentibus; lingua cornea in spiris convoluta. Alis deflexis; thorace hirsutissimo.

Antennes hérissées, fusiformes comme dans les nymphales, à articles assez distincts jusqu'à la massue; palpes très-velus, à articles peu distincts, ne dépassant pas le chaperon. Trompe cornée, roulée en spirale; corselet très-velu; ailes couchées sur le corps.

HECATESIA FENESTRATA. *Mihi.* Pl. I, fig. 2.

H. Alis anticis nigro fuscis, fasciis duabus transversis, albis maculaque diaphana ad costam; posticis luteis, margine lato punctoque discoidali, nigris; abdomine luteo, serie punctorum nigrorum.

Les premières ailes sont d'un brun noir, avec deux bandes transverses d'un blanc très-légèrement jaunâtre et une large tache transparente près de la côte. Cette tache se trouve au milieu de l'aile, occupe un tiers de sa longueur, et présente à son rebord costal une duplicature très-épaisse. Les deux petites bandes jaunâtres dont j'ai parlé partent des deux extrémités de la tache transparente, et s'étendent jusqu'au bord interne.

Les secondes ailes sont d'un jaune fauve, avec une

bordure noire , large et sinuée intérieurement ; elles ont en outre une tache noire discoïdale, qui se lie par un côté à la bordure externe.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, mais il est plus pâle , et on remarque à leur base une touffe de poils d'un jaune fauve.

Le dessous des secondes ailes ressemble au dessus.

La frange des premières ailes est brune, celle des secondes est entrecoupée de blanc et de noir, et on aperçoit en dessus, mais plus particulièrement en dessous des quatre, une rangée marginale de petits points blancs.

Le corselet est panaché de poils noirs et de poils jaunâtres, avec une touffe de poils fauves à la base de l'épaule ; l'abdomen est fauve en dessus et en dessous, avec une tache d'un bleu noir sur chaque incision.

Les antennes sont velues, entrecoupées de noir et de blanc, avec la massue noire à sa base, et blanche vers l'extrémité en dessus. Les pattes sont noires, annelées , ou tachées de blanc jaunâtre.

Cette espèce habite la Nouvelle-Hollande, et avait été donnée à M. Latreille par son ami M. Alexandre Mac-Leay, maintenant secrétaire général de l'administration de cette colonie.

GENRE ÆGOCERA. (Lat.)

Palpi clypeum ultra insigniter assurgentes; articulo secundo pilis, in fasciculum producto et rostriforme, hirsutissimo. Antennæ distincte fusiformes (in medio crassiores, et sensim a basi ad apicem graciliores); alæ deflexæ, superiores trigonæ. Tibiæ squammis elongatis vestitæ. (Lat.)

Palpes dépassant le chaperon d'une manière remarquable; le second article très-velu, garni de poils fasciculés réunis en une sorte de bec; antennes fusiformes, en cornes de bélier, renflées au milieu; ailes un peu en toit dans le repos; les supérieures triangulaires; jambes recouvertes d'écailles allongées.

ÆGOCERA VENULIA. Pl. I, fig. 3.

Æ. Alis anticis ferrugineo-fuscis, vitta longitudinali albida rubro marginata; alis posticis fulvis margine maculaque discoidali fuscis; abdomine fulvo.

Ægocera venulia, LAT., *Gen. crust. et ins.*, t. IV, p. 211.

Phalæna venulia, CR., *Pap. exot.*, tab. 165, f. 2.

Ægocera venulia, LAT., *Dict. d'Hist. nat.*

Bombyx venulia, FAB., *Suppl. ent.*, 158-9.

Elle est de la taille de l'*hesperia Aracynthus*. Ses premières ailes sont d'un brun-ferrugineux plus ou

moins obscur, avec une bande blanche longitudinale qui part de la base, et qui s'étend jusqu'auprès du sommet; cette bande se dilate dans son milieu pour former un petit angle, dont le sommet regarde le bord externe de l'aile; elle est en outre bordée par une ligne rouge, et marquée de trois points de la même couleur; les deux supérieurs se fondent avec la ligne, dont ils ne paraissent être qu'une continuation, et interrompent quelquefois la bande blanche ci-dessus.

Les ailes inférieures sont d'un jaune fauve, avec une large bordure et une tache discoïdale d'un brun clair.

Le dessous des quatre ailes est beaucoup plus pâle que la face opposée; celui des inférieures offre absolument le même dessin que le dessus; celui des supérieures est d'un brun très-pâle, avec la bande longitudinale d'un blanc jaunâtre, et les trois points de la surface correspondante d'un rouge-brun assez pâle.

L'abdomen est d'un jaune fauve en dessus et blanchâtre en dessous.

La frange des quatre ailes est blanchâtre.

Les palpes, le corselet et les épaulettes sont d'un blanc grisâtre, quelquefois teinté de jaunâtre.

Les antennes sont noires, avec l'extrémité ferrugineuse.

Les pattes sont jaunes, ponctuées de noir seulement en avant, ce qui les fait paraître entrecoupées.

Le mâle ne diffère de la femelle que parce qu'il a un pinceau de poils à l'anüs.

Parmi tous les individus que j'ai eus à ma disposition, je n'en ai vu qu'un chez qui la bande blanche longitudinale était interrompue par un des points rouges : c'est celui que je fais représenter.

Elle habite le Bengale.

GENRE THYRIS (1). (*Illig., Lat.*)

Palpis cylindrico-conicis, articulo ultimo acuminato. subnudo; antennis fusiformibus (in fœmina gracilioribus); tibiis calcaratis; alis denticulatis abbreviatis.

Palpes s'élevant au-delà du chaperon, cylindrico-coniques, avec le dernier article presque nu et terminé par une sorte de pointe; antennes fusiformes, plus fortes dans le mâle que dans la femelle; jambes postérieures munies de forts ergots; ailes horizontales, courtes, denticulées; abdomen conique.

Chenilles nues, à tête grêle, atténuées antérieurement, vivant dans l'intérieur des tiges. Chrysalides scabres.

THYRIS FENESTRINA. Pl. I, fig. 4.

Th. Alis denticulatis, aureo-fuscescentibus, punctis rufis, maculisque duabus fenestratis.

Sesia fenestrata, SCHRANK, *Faun. Boic.* 2, B. 1; *Abth.*, S. 255, n. 1402.

Sphinx pyralidiformis, HUBN., *Sph.*, tab. 3, f. 16.

Thyris fenestrina, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 175. n. 1.

Sphinx fenestrina, FAB., *Ent.*, S. III. 1, 357, 8.

Phalæna fenestrella, SCOP., *Ent. carn.*, 217, 538.

(1) De θυρίς-ιδος, fenêtre, à cause des taches transparentes.

Le pygmée, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. CXXII, f. 167. a. b., p. 122.

Sphinx fenestrina, BORKH., *Eur. Schmett.*, S. 113 u. 155.

Sph. fenestrina, WIEN VERZ., S. 44, fam. F, n. 8.

Sphinx fenestrina, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXIII, suppl. V, f. 1, S. 179.

Thyris fenestrina, GOD., *Pap. de France, Crép.*, t. III, pl. XXIII, f. 1, p. 123.

Sphinx fenestrina, ROS., *Faun. Etr.*, t. II, 163, 1057.

Ce petit lépidoptère a les quatre ailes concolores d'un noir brun de part et d'autre, ponctuées et striées transversalement de fauve doré, avec deux taches transversales blanches, très-étroites, plus larges aux inférieures qu'aux supérieures; sur ces dernières, elles coupent transversalement tout le disque de l'aile. Les premières ailes sont un peu denticulées; mais elles le paraissent davantage parce que la frange noire est entrecoupée de blanc dans deux endroits.

Les secondes ailes sont dentelées, avec la frange entrecoupée de noir et de blanc.

Le corps est de la couleur des ailes, avec le quatrième et le dernier anneau blancs en dessous, et jaunâtres en dessus.

Les antennes sont grêles, noirâtres; les pattes sont d'un noir brun avec les ergots, les tarses et la partie interne des cuisses antérieures, blanchâtres.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est plus grande, plus brillante, avec les anneaux de l'abdomen moins apparens, et quelquefois nuls.

Il y a des individus chez qui les taches transparentes sont interrompues, punctiformes, d'autres chez qui elles sont tellement continues qu'elles forment une espèce de demi-cercle qui traverse le disque des quatre ailes. Ceux que l'on prend en Espagne, en Italie, et particulièrement en Toscane, sont presque toujours d'un noir-brun très-foncé, avec un petit nombre de points et de stries fauves.

J'en ai vu un très-grand nombre pris en Sicile par M. Alexandre Lefebvre; ils ne diffèrent pas des individus que nous trouvons en France.

La chenille est nue, d'un blanc sale, avec deux lignes latérales de petits points d'un noir brunâtre; la tête, les pattes écailleuses et le dessus du premier anneau sont d'un noir brun; sa partie antérieure est un peu effilée. Elle vit à la manière des *cossus*, dans les tiges des *sambucus ebulus et nigra*, et même dans celle de l'*arctium lappa*.

La chrysalide est raccourcie, légèrement épineuse sur les côtés comme celles des *sesia*.

L'insecte parfait éclot en juillet; il vole à l'ardeur du soleil sur les ombellifères, et plus particulièrement sur les fleurs d'hyèbles. Il habite la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne et l'Amérique septentrionale.

THYRIS VITRINA. *Mih.* Pl. I, fig. 5.

T. Alis subdentatis fuscis, maculis rubris; anticis macula minima, posticis lata, fenestratis.

Cette espèce belle et nouvelle est plus d'un tiers plus grande que la *fenestrina*; ses premières ailes sont d'un brun uniforme, avec deux taches rouges vers l'extrémité, dont la plus inférieure est près de l'angle interne; elles ont en outre sur leur milieu une tache très-étroite et transverse, d'un blanc transparent. Les secondes ailes sont brunes, avec la base et le bord interne d'un rouge rutilant, et une large tache blanche, presque carrée, sur le milieu du disque; vers l'extrémité, ces mêmes ailes ont deux taches rouges, presque unies par une liture.

Le dessous des supérieures est d'un gris-violâtre luisant, avec la tache blanche, ocellée de noir. A peine si on y aperçoit quelques vestiges des deux taches rouges de la surface opposée.

Le dessous des inférieures est d'un gris violâtre, avec les taches rouges du dessus dessinées en jaunâtre; la tache blanche quadrangulaire du dessus est la même que sur la face opposée.

La frange des quatre ailes est brunâtre, luisante, nullement entrecoupée de blanc ni de jaunâtre.

Le contour des ailes de devant est entier, celui des inférieures est denticulé. Le corselet est brunâtre, ainsi que la tête; l'abdomen est rougeâtre rutilant en dessus, et grisâtre en dessous.

Les pattes sont brunes, ainsi que les antennes.

La chenille, d'après le dessin que j'en ai reçu de l'Amérique septentrionale, est d'un jaune roussâtre, avec deux rangées longitudinales de points d'un noir brun et une bande verte sur le milieu du dos. Cette bande est bordée de blanc, et elle s'étend depuis le cinquième anneau jusqu'au dixième. La tête est brune, avec une tache triangulaire de cette couleur sur le premier anneau. Les pattes sont d'un jaune roux.

La chrysalide est brune, raccourcie, pointue à l'extrémité et légèrement scabre. Cette chenille est assez commune en Géorgie, dans l'intérieur des tiges des *phaseolus*.

Cette espèce se trouve dans différentes contrées de l'Amérique septentrionale; on me l'a aussi envoyée comme se trouvant en Andalousie, mais il paraît qu'elle y est beaucoup plus rare que dans les États-Unis.

TRIBU DES ZYGÉNIDES.

Palpes cylindracés , barbus ou hérissés , le troisième article très-distinct et quelquefois nu ; antennes en fuseau ou en corne de béliet , souvent renflées en une sorte de massue qui s'amincit à l'extrémité , ou cylindriques et moniliformes , jamais pectinées ; trompe longue , roulée en spirale ; jambes munies à leur extrémité de deux paires d'ergots plus ou moins prononcés.

Ailes en toit pendant le repos , plus longues que le corps.

Chenilles pubescentes ou velues , épaisses , raccourcies , vivant des feuilles de végétaux , n'hivernant jamais sous l'état de chrysalide , se métamorphosant toujours dans une coque épigée.

GENRE COCYTIA. *Mihi*.

Antennis fusiformibus, subuncinatis; palpis dilatatis ex articulis tribus, articulo primo breviori, secundo paulo longiori, ambobusque squammosis, tertio longo, nudo, gracili, cylindrico, ultra frontem ascendente; lingua longa, cornea; alis horizontalibus, vitreis.

Antennes longues, en fuseau, se terminant en crochet à l'extrémité; palpes écartés; de trois articles très-distincts: le premier un peu plus court que les deux autres; le second le plus long et garni, de même que le précédent, de poils imbriqués; le troisième long, nu, cylindrique, grêle et dépassant le chaperon; langue longue et cornée; ailes horizontales, vitrées.

COCYTIA DURVILLII. *Mihi* (1). Pl. I, fig. 1.

C. Alis omnibus utrinque aterrimis, nervis nigris in disco vitreo, maculaque fulva ad basin; antennis longis fusiformibus, atris; capite, humeris, corpore, palpis, pectore, femoribus et ventre æneo-cyaneis micantibus.

Ce beau lépidoptère est de la taille du *sphinx lineata*; ses premières ailes sont trigones, d'un noir foncé dans tout leur pourtour, avec le disque vitré, chatoyant et traversé par les nervures de l'aile, qui sont de la même couleur que le fond; outre cela, il y a près de la nais-

(1) Dédicée à M. d'Urville, savant infatigable, qui fait en ce moment le tour du monde pour la seconde fois.

sance de ces mêmes ailes une belle tache fauve, qui, d'un côté, est bornée par la partie transparente, et des autres par le noir de la base. Entre chaque nervure on remarque des rayons noirs qui naissent dans la couleur du fond, et qui vont se perdre vers le milieu de l'aile; ces rayons sont un peu plus larges que les nervures elles-mêmes, et se terminent en pointe aciculaire.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que la teinte générale est plus claire.

Les secondes ailes sont arrondies, noires, avec le disque vitré et des rayons aciculaires entre les nervures, comme aux précédentes; vers la base de la côte de ces ailes, il y a une tache d'un jaune d'ocre en dessus, et d'un fauve vif en dessous; cette tache est cachée par le noir du contour des supérieures, mais en dessous elle s'unit avec celle des premières ailes.

Les antennes sont noires, ainsi que le troisième article des palpes; le corselet et les épaulettes sont panachés de faisceaux de poils courts, d'un bleu noir et d'un vert bleu très-brillants; le corps, le front, la poitrine et les cuisses sont de la même couleur; le ventre est d'un vert-azuré très-chatoyant.

Ce nouveau genre habite la Nouvelle-Guinée; il vole en plein jour dans les bois.

C'est jusqu'à présent une des plus grandes raretés entomologiques. M. le capitaine d'Urville n'en a rapporté que trois individus de son voyage autour du monde, lors de l'expédition du capitaine Freycinet.

GENRE ZYGÆNA. (*Fab.*, *Lat.*, *Ochs.*, *God.*) (1)

SPHINX-BÉLIERS (*Geoff.*):

SPHINGES ADSCITÆ (*Lin.*).

SPHINX (*Esp.*, *Hubn.*).

ANTHROCERA (*Scop.*).

Palpis cylindrico-conicis, acutis ultra frontem vix ascendentibus; lingua cornea spiraliter convoluta; antennis claviformibus; alis maculis discoloribus notatis; larva obesa, pubescente; folliculo chartaceo, caulibus herbaceis adfixo.

Palpes cylindrico-coniques, pointus, s'élevant un peu au-delà du chaperon; antennes claviformes, renflées brusquement vers leur extrémité; langue longue, roulée en spirale; ailes bleues ou d'un bleu verdâtre, luisantes, à taches discolores; abdomen cylindrique, obtus; chenilles épaisses, pubescentes, raccourcies; coque d'une consistance solide, coriace, attachée aux tiges des végétaux.

Les ailes supérieures sont ordinairement d'un bleu brillant, tirant quelquefois sur le verdâtre, avec des

(1) De *ζυγαίνα*, qui signifie poisson à marteau (*squalus zygæna*). Fabricius a employé ce nom pour indiquer le renflement brusque des antennes vers leur sommet.

taches rouges symétriques, rarement blanches ou jaunes. Les ailes inférieures sont presque toujours rouges, avec la bordure bleue ; elles sont rarement de la couleur des supérieures.

Le corselet est arrondi , plus ou moins velu , de la couleur des ailes supérieures, quelquefois un peu blanchâtre ou grisâtre sur les épaulettes.

L'abdomen est cylindrique, ordinairement de la couleur des ailes supérieures, quelquefois plus foncé , et souvent entouré par un cercle rouge.

Les pattes sont ordinairement bleues ou verdâtres, quelquefois un peu jaunâtres ou grisâtres.

Les antennes sont d'un bleu foncé , quelquefois blanches ou jaunâtres à leur sommet.

Les yeux sont latéraux, de grandeur moyenne.

Les zygènes ont le vol lourd , mais rapide, en ligne droite; elles aiment à se reposer sur les fleurs; elles éclosent à la fin du printemps ou au commencement de l'été.

PREMIÈRE DIVISION.

ZYGÈNES A TACHES NON OCELLÉES.

† Les deux taches basilaires longitudinales et se prolongeant au-delà du milieu de l'aile.

- A. La postérieure sécuriforme. a. et le bord interne des ailes rouge. *Erythrus*.
 b. { et le bord interne des ailes de la
 couleur du fond..... *Minos*.
 c. { et un petit point entre les deux
 basilaires *Punctum*.
 d. { point de petit point, les ailes
 très-petites *Lathyri*.

B. La postérieure cunéiforme *Pluto*.

C. La postérieure arrondie et les deux basilaires étranglées ou même interrompues..... *Scabiosæ*.

D. La postérieure étroite, linéaire et parallèle aux deux basilaires.... *Brizæ*.

E. Un anneau rouge autour de l'abdomen..... *Balearica*.

†† La basilaire interne longitudinale, l'externe courte.

A. Ailes demi-transparentes, un anneau rouge..... *Sarpedon*.

††† Trois grosses taches irrégulières.

A. Un anneau et le collier rouges..... *Cuvieri*.

†††† Cinq taches plus ou moins arrondies.

- A. Ailes un peu transparentes. a. taille très-petite, ailes arrondies. *Corsica*.
 b. ailes étroites lancéolées..... *Meliloti*.
 c. corps très-velu..... *Exulans*.
 d. un anneau rouge..... *Cynaræ*.
 e. la tache postérieure sécuriforme. *Achilleæ*.
 f. { la tache postérieure avec un pe-
 tit prolongement oblique.... *Janthina*.
 g. { un anneau rouge, corselet et
 anus jaunes *Concinna*.

B. Ailes d'un bleu foncé.

a. les taches grosses, séparées.... *Lonicæræ*.

b. les deux médianes connées.... *Trifolii*.

††††† Six taches plus ou moins arrondies.

A. Bordure des inférieures large. a. { les taches petites et les antennes
 jaunes au sommet..... *Medicaginis*.

b. { les taches ordinaires et les an-
 tennes bleues au sommet.... *Charon*.

B. Bordure des infér. presq. nulle. a. { antennes à sommet blanc, infé-
 rieures minuscules *Hippocrepidis*.

- b. les taches connées..... *Transalpina*.
 c. les taches séparées..... *Filipendulæ*,
 d. { les taches séparées et les an-
 tennes jaunâtres au sommet.. *Angelicæ*.
 C. Abdomen cerclé de rouge. a. un demi-anneau en dessus..... *Dorycnii*.
 b. un anneau complet..... *Peucedani*.
 D. Les quatre ailes bleues. { les deux taches basilaires et un
 anneau discolores..... *Ephialtes*.

DEUXIÈME DIVISION.

ZYGÈNES A TACHES OCELLÉES.

† Taches plus ou moins cerclées de noir.

- A. Les quatre ailes bleues. a. { un collier blanc et deux taches
 rouges sur les inférieures.... *Lavandulæ*.
 b. { point de collier blanc et le mi-
 lieu des inférieures rouge... *Stæchadis*.
 B. Les ailes inférieures rouges. a. les six taches séparées..... *Rhadamanthus*.
 b. les deux postérieures connées... *Oxytropis*.
 c. palpes, collier et anneau rouges. *Caffra*.

†† Taches entourées de blanc ou de jaunâtre.

- A. Toutes les taches séparées. a. { trois taches, le collier et un an-
 neau rouges..... *Olivieri*.
 b. { six taches semblables, le collier
 et un anneau rouges..... *Anthyllidis*.
 c. { six taches, dont la postérieure
 blanche et semi-lunaire..... *Occitannica*.
 d. { six taches, dont la postérieure
 rouge et semi-lunaire..... *Onobrychis*.
 B. Toutes les taches confluentes. a. collier, anus et anneau rouges.. *Fausta*.
 b. { collier blanchâtre, point d'an-
 neau rouge..... *Hilaris*.
 c. { un demi-anneau rouge en des-
 sus..... *Faustina*.
 d. { les taches pâles, miniacées, et
 un anneau rouge très-large... *Læta*.

(1) *Nota*. Avec ce tableau on peut aisément analyser toutes les espèces connues, à moins que ce ne soit des variétés extraordinaires, comme il s'en présente quelquefois; mais, avec un peu d'habitude, on parviendra toujours à les déterminer: ainsi, par exemple, dans le *trifolii*, toutes les taches forment quelquefois une bande sinueuse; si on fait attention aux lobes de cette bande, on verra qu'ils représentent cinq taches confluentes.

ZYGÆNA ERYTHRUS. Pl. I, fig. 6.

Z. Alis anticis cyaneo-virescentibus, subdiaphanis, maculis tribus miniaceis elongatis, valde dilatatis margineque interiori miniaceo : posticis miniaceis, tenuiter nigro marginatis ; collari humerisque lutescentibus.

Zygæna erythrus, OCH., Schmett. von Eur., t. II, p. 21, n. 1.

Sphinx erythrus, HUBN., *Sphing.*, tab. XVIII, f. 87 (fœm.); text., S. 77, n. 1.

Sphinx polygalæ, ESP., t. II, tab. XXXIV, cont. IX, f. 4.

Elle est de la taille de la *minos*, avec laquelle elle a quelque ressemblance. Ses premières ailes sont d'un bleu terne, quelquefois verdâtre, et un peu transparentes, avec trois taches longitudinales, très-dilatées et le bord interne rouge.

Les secondes ailes sont rouges, avec une légère bordure bleuâtre.

Le dessous des quatre ressemble au dessus, mais il est plus pâle.

Les antennes sont noires, ainsi que l'abdomen ; le collier et les épaulettes sont garnis de poils blanchâtres ; les pattes sont d'un gris jaunâtre.

La femelle est un peu plus grande que le mâle ; ses premières ailes sont d'un bleu verdâtre ou jaunâtre, transparentes, et les inférieures sont d'un rouge beaucoup plus pâle.

Dans la plupart des individus que j'ai eus à ma disposition, les taches se confondent; de sorte qu'on pourrait très-bien les décrire en disant que les quatre ailes sont entièrement rouges, excepté l'extrémité des supérieures et la frange des inférieures. Je n'en ai jamais vu avec des taches aussi distinctes que dans l'individu femelle représenté par Hubner pl. 18, fig. 87.

Cette jolie zygène n'a encore été trouvée qu'en Italie, particulièrement dans les Abruzzes. M. Bouisset, amateur très-zélé, l'a rapportée des environs de Rome, et M. Lefebvre m'a assuré l'avoir prise en Sicile.

Je crois que c'est bien à cette espèce, et non à *la minos*, que l'on doit rapporter le *sphinx polygalæ* d'Esper.

ZYGÆNA MINOS. Pl. I, fig. 7.

Z. Alis anticis cyaneis aut virescentibus, maculis tribus elongatis, dilatatis sanguineis, posteriore securiformi; posticis rubris, margine tenuissimo, cyanescente, antennis clavatis.

Zygæna minos, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 22, n. 2.

Sphinx minos, HUBN., *Sphing.*, tab. II, f. 8 (fœm.); N. text., S. 77.

Sphinx minos, WIEN VERZ., S. 45, fam. G, n. 1.

Zygæna pythia, FAB., *Mantissa*, t. II, p. 101, n. 2.

Zygæna scabiosæ, FAB., *Ent. Syst.*, t. III, p. 386, 2.

Sphinx pilosellæ, ESP., *Schmett.*, II, Th., tab. XXIV, suppl. VI, f. 2, a. b.; tab. XL, cont. XV, f. 3 (larva).

Sphinx de la piloselle, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCV, f. 133. a-d., p. 46.

Sphinx pilosellæ, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, Th., S. 25, n. 17; S. 125 u. 164.

Sphinx viciæ, LANG., *Verz. 2 Ausg.*, S. 67, n. 607, 609.

Sphinx purpuralis, MULL., *Zool. Dan.*, p. 116, n. 1545.

Elle est de la taille de la *filipendulæ*; ses premières ailes sont bleuâtres, avec une légère transparence et trois taches rouges longitudinales; la première part de la base, et s'étend jusqu'au milieu; la seconde, qui part aussi de la base, est plus étroite, et longe la côte jusqu'au-delà du tiers de l'aile; la troisième commence en pointe entre les deux précédentes, et s'étend, en se dilatant, jusque près de l'extrémité, où elle devient sécuriforme.

Les secondes ailes sont d'un rouge vermillon de part et d'autre, avec une légère bordure d'un bleu noirâtre.

Le dessous des premières ailes est d'un bleu très-pâle, et les taches du dessus y sont aussi d'un rouge moins vif.

Les antennes, l'abdomen et le corselet sont noirs, tant en dessus qu'en dessous.

Les épaulettes ont quelques poils grisâtres. La frange des ailes supérieures est souvent d'un jaune roussâtre.

La femelle est ordinairement d'un vert jaunâtre, avec le collier et les épaulettes blanchâtres; l'abdomen est d'un bleu-verdâtre bronzé.

J'ai vu un très-grand nombre d'individus de cette espèce pris en Sicile par M. Alexandre Lefebvre. Ils sont généralement plus grands que ceux des autres parties de l'Europe, et les femelles sont beaucoup plus jaunâtres.

Je crois que ce n'est point à la *minos*, mais bien à une légère variété de l'*erythrus*, que l'on doit rapporter le *sphinx polygalæ* d'Esper.

L'individu que j'ai fait figurer est une femelle prise en Sicile.

La chenille ressemble beaucoup à celle de la *scabiosæ*; elle est pubescente, d'un jaune plus pâle, et quelquefois verdâtre; sa tête et ses pattes écailleuses sont noirâtres; elle a, outre cela, sur chaque côté deux rangées de douze taches noires.

La coque est fusiforme, très-allongée et d'un jaune brunâtre; elle se trouve, en mai et en juin, sur le *trifolium montanum*, l'*hippocrepis comosa*, le *lotus corniculatus* et plusieurs autres légumineuses; elle éclot en juillet et août.

Elle se trouve en France, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Suisse, etc.

ZYGÆNA PLUTO. Pl. II, fig. 4.

Z. Alis anticis cyaneis aut cyaneo-virescentibus, maculis tribus elongatis rubris, posteriore cuneiformi; posticis rubris, margine nigro cyaneo; antennis clavatis.

Zygæna Pluto, Ochs., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 26, n. 3.

Sphinx pythia, HUBN., tab. XVIII, f. 88 (mas).

Elle est de la taille de la *minos*, avec laquelle elle a de très-grands rapports.

Ses premières ailes sont d'un noir bleu ou d'un bleu verdâtre, avec trois taches rouges longitudinales, dont l'intermédiaire cunéiforme, caractère seul qui la distingue de la *minos*, chez qui cette tache est toujours sécuriforme; d'ailleurs elle est ordinairement plus petite, la massue des antennes est plus mince, les ailes sont plus arrondies vers le bout, et la couleur en est plus sombre; les secondes ailes ont en outre une bordure qui va en s'élargissant un peu vers l'angle externe. Elle offre pour le reste tous les caractères de la *minos*.

La femelle est ordinairement verdâtre, avec les épau-
lètes blanchâtres.

Elle n'a encore été trouvée qu'en Autriche, probablement parce qu'on l'aura confondue avec la *minos*.

Elle éclot en juillet.

ZYGÆNA LATHYRI. *Mihi*. Pl. II, fig. 1.

Z. Alis anticis cyaneo-violaceis, subdiaphanis, maculis tribus elongatis, dilatatis rubris, posteriore subsecuriformi; posticis rubris, margine latiori, cyanescente-violaceo, subdiaphano.

Elle est de la taille de la *fausta*; ses premières ailes sont d'un bleu violâtre, presque transparentes, avec

trois taches allongées, savoir : deux à la base, disposées en petit comme dans la *minos*, et une postérieure commençant en pointe entre ces deux dernières pour gagner l'extrémité de l'aile, où elle devient un peu sécuriforme.

Les secondes ailes sont d'un rouge-carmin très-pâle, avec une bordure bleuâtre transparente, large à l'angle externe, mais se rétrécissant peu à peu et n'atteignant pas l'angle anal.

Le dessous des ailes supérieures est d'un bleu très-pâle, avec les mêmes taches qu'en dessus ; celui des ailes inférieures ressemble à la face opposée.

Le corselet est d'un noir bleu ou verdâtre, avec les épaulettes et le collier d'un gris blanchâtre.

L'abdomen est d'un noir bleu. Les antennes sont courtes, fortement en massue à leur extrémité, et d'un bleu très-obscur.

Les pattes sont jaunâtres, surtout dans leur partie antérieure.

La femelle est un peu plus grande que le mâle, et ses premières ailes sont moins transparentes.

Cette nouvelle espèce a été découverte, par M. le comte Dejean, dans les environs de Raguse.

ZYGÆNA PUNCTUM. Pl. II, fig. 2.

Z. Alis anticis cyaneis aut virescentibus, maculis duabus rubris elongatis, puncto intermedio concolore, maculaque securiformi ad apicem; posticis rubris, margine cyaneo.

Zygæna punctum, Ochs., Schmett. von Eur., t. II, p. 36, n. 7.

Cette zygène a été décrite pour la première fois par Ochsenheimer; elle est de la taille de l'*achilleæ*. Ses premières ailes, quelquefois grisâtres, sont bleu verdâtre ou noirâtre, avec quatre taches rouges disposées ainsi : deux oblongues et divergentes, partant de la base comme dans la *minos*; une autre très-petite et punctiforme, placée entre les deux taches ci-dessus; enfin une dernière tache sécuriforme vers l'extrémité, à-peu près comme dans l'*achilleæ*.

Les secondes ailes sont d'un rouge-carmin plus ou moins vif, avec une légère bordure bleuâtre.

Le dessous des ailes supérieures est plus pâle que la surface opposée; les taches y sont un tant soit peu plus confondues, et le point caractéristique qui existe entre les deux taches allongées de la base ne s'y distingue que difficilement.

Le dessous des ailes inférieures ressemble au dessus.

La frange des premières ailes est d'un jaune roussâtre, très-distincte; celle des ailes postérieures est bleuâtre; la tête et le corselet sont garnis de poils d'un gris blanchâtre; l'abdomen est d'un noir bleuâtre de part et d'autre; les pattes sont d'un gris jaunâtre; les antennes sont assez courtes, d'un noir bleu, et terminées par une massue assez forte.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le fond

des premières ailes est d'un bleu un peu jaunâtre ou grisâtre.

On trouve cette espèce en Hongrie. M. Lefebvre l'a aussi retrouvée en Sicile, où elle est assez commune.

ZYGÆNA BRIZÆ. Pl. II, fig. 3.

Z. Alis anticis subdiaphanis, pallide cyanescentibus; maculis tribus oblongis, parallelis, coadunatis, rubris; posticis rubris; antennis sub clavatis.

Zygæna brizæ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 27, n. 4.

Sphinx brizæ, ESP., *Schmett.*, II, Th., tab. XLIII, cont. XVIII, f. 3, 4, fortf., S. 27.

Sphinx brizæ, HUEN., *Sphing.*, tab. XVIII, f. 85 (mas).

Cette espèce est à peu près de la taille de la *scabiosæ*; les ailes supérieures sont un peu transparentes, d'un bleu noirâtre, avec trois taches rouges longitudinales. La première, ou celle qui est le plus près du bord interne, est la plus longue : elle s'étend depuis la base jusqu'aux deux tiers de l'aile, en conservant toujours la même largeur; la seconde, ou celle qui longe la côte, commence aussi à la base, et atteint à peine la moitié de la longueur de l'aile; la troisième, qui est la plus courte et cunéiforme, commence en pointe entre les deux autres, et se prolonge vers l'extrémité. Ces trois taches sont quelquefois très-peu séparées l'une de l'autre.

tre, et semblent, dans quelques individus, n'en former qu'une seule.

Les ailes inférieures sont d'un rouge rose de part et d'autre, avec une bordure bleue, assez large vers l'angle externe, et presque nulle à l'angle anal.

Le dessous des ailes supérieures est un peu plus pâle que le dessus; du reste, le dessin est le même.

La frange des quatre ailes est d'un bleu un peu grisâtre.

Les antennes sont grêles et en massue; le corselet est d'un bleu-noirâtre foncé, ainsi que l'abdomen; les pieds sont d'un noir tirant sur le roussâtre.

La femelle ne diffère du mâle que par la grosseur de l'abdomen.

J'ai vu une variété où les taches rouges et les ailes inférieures étaient d'un rouge pâle et presque jaunâtre.

Elle paraît en juillet et en août en Autriche et en Hongrie. Elle est assez rare.

ZYGÆNA SCABIOSÆ. Pl. II, fig. 6.

Z. Alis anticis subdiaphanis, cyaneis vel pallide cyanescentibus; maculis tribus elongatis, angustioribus rubris; posticis rubris, margine nigrescente; antennis subfiliformibus, vix clavatis.

Zygæna scabiosæ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 28, n. 5.

Zygæna scabiosæ, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 386, 2.

Sphinx scabiosæ, HUBN., *Sphing.*, tab. XVIII, f. 86 (mas), text., S. 78, n. 5.

Sphinx filipendulæ, SCOP., *Ent. Carn.*, p. 190.

Zygæna scabiosæ, SCHÆFF., *Icon.*, tab. XVI, f. 4, 5.

Sphinx purpuralis, MULL., *Zool. Dan.*, p. 116, n. 1345.

Sphinx scabiosæ, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXIV, suppl. VI, f. 3, a. b, S. 187.

Sphinx de la scabieuse, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCVI, f. 134, a.-d., p. 49; fig. 135, p. 50; *Sph. béliér noir à bandes rouges*.

Sphinx scabiosæ, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 24, n. 16, S. 122, n. 15.

Zygæna pythia, ROSS., *Faun. Etrus.*, t. II, p. 166, n. 1067.

Sphinx scabiosæ, LANG., *NATURE.*, FUESLY.

Zygæna minos, SCHRANK, *Faun. Boic.*

Sphinx scabiosæ, DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 111, n. 47.

Les ailes supérieures sont arrondies à l'extrémité, d'un bleu pâle et légèrement transparentes, avec trois taches rouges longitudinales et dilatées extérieurement. Celle qui est le plus près du bord interne commence à la base, et continue, en se dilatant, jusqu'aux deux tiers de l'aile; le milieu de cette tache est fortement étranglé, et quelquefois comme interrompu. La seconde, qui naît aussi de la base, est longitudinale, et suivie d'une

autre tache qui va en se dilatant vers l'extrémité de l'aile. La troisième est arrondie et placée au bout de l'aile.

Les ailes inférieures sont rouges de part et d'autre, avec le bord d'un noir bleu et assez large, principalement vers l'angle externe.

Le dessous des ailes supérieures est d'un bleu-pâle luisant, et représente tout le dessin du dessus.

Les antennes sont longues, très-grêles, et se terminent à peine en massue; le corselet est d'un bleu noir. Le corps est grêle, d'un noir-bleu obscur. Les pattes sont jaunâtres.

J'ajouterai qu'ayant examiné un grand nombre d'exemplaires, j'ai remarqué que dans quelques-uns les taches inférieures et supérieures sont tout-à-fait interrompues; de sorte que l'on pourrait dire que les ailes ont cinq taches, dont deux à la base, une très-petite vers la côte, et deux oblongues ovalaires vers l'extrémité. Dans d'autres individus, comme celui figuré par Hubner, on n'observe que deux longues taches continues et étranglées.

La chenille se trouve, en mai et juin, sur le trèfle et plusieurs autres légumineuses herbacées; elle est un peu plus petite que celle de la *filipendulæ*, d'un jaune doré, et couverte de poils blancs; elle porte sur chaque côté deux rangées de neuf taches noires; la tête est noire, sillonnée de blanc; les pattes, écailleuses, sont noires, avec la couronne blanche; les stigmates sont comme dans ses congénères; la coque est allongée.

d'un jaune très-brillant et de la consistance du parchemin.

L'insecte parfait éclot vers la fin de juillet ou le commencement d'août.

J'ai pris cette zygène dans les Alpes du Dauphiné. M. Alexandre Lefebvre l'a trouvée abondamment en Sicile. Elle habite aussi l'Autriche, la Hongrie et l'Italie.

ZYGÆNA BALEARICA. *Mihi*. Pl. II, fig. 5.

Z. Alis anticis cyaneis aut virescentibus, subdiaphanis, maculis duabus elongatis, maculaque dilataia subsecuriformi ad apicem; posticis subdiaphanis rubris, limbo lato, cyaneo; abdomine cingulato.

Cette espèce a le port de la *sarpedon* et la taille de la *punctum*. Ses premières ailes sont un peu diaphanes, d'un bleu verdâtre, avec trois taches rouges. Deux à la base, d'égale longueur, et s'étendant en divergeant, l'une le long du bord externe, et l'autre le long de la côte, jusqu'au-delà du milieu, et une autre assez grosse et un peu sécuriforme vers l'extrémité. Le dessus de ces mêmes ailes est bleuâtre, pâle, avec les mêmes taches qu'en dessus, mais d'un rouge moins vif.

Les secondes ailes sont d'un rouge-pâle un peu transparentes, surtout vers l'angle externe, où elles sont largement bordées de bleuâtre par une bande qui gagne à peine l'angle anal. Le dessous ne diffère pas du dessus.

Les antennes sont grosses, fortement en massue; le collier, le corselet et les épaulettes sont panachés de

poils blanchâtres. Les pattes sont d'un gris jaunâtre; le corps est d'un noir bleu, avec un anneau rouge assez large vers son extrémité et visible seulement en dessus.

La femelle ne diffère du mâle que parce que ses ailes sont moins transparentes, et que les inférieures ont la bordure plus étroite et la couleur rouge plus vive.

Cette espèce se distingue de la *punctum* par l'anneau rouge et l'absence du petit point caractéristique; de la *sarpedon*, par les deux taches de la base, qui sont très-allongées l'une et l'autre; par la tache de l'extrémité, qui est très-grande et un peu sécuriforme, et par les ailes inférieures, qui sont d'un rouge plus vif.

Sa patrie est l'Espagne méridionale et les îles Ba-léares.

ZYGÆNA SARPEDON. Pl. II, fig. 7 et 8.

Z. Alis anticis subdiaphanis, plumbeo-cærulescentibus aut virescentibus, nitidis, maculis tribus elongatis, rubris; posticis diaphanis, rubris, dilutioribus, margine latiori, sinuato, plumbeo; abdominis cingulo rubro; antennis clavatis, nigricantibus; thorace villosa grisescente.

Zygæna sarpedon, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 58, n. 8.

Zygæna sarpedon, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, n. 8, texte, p. 141.

Sphinx sarpedon, HUBN., *Sphing.*, tab. II, fig. 9 (mas), text., S. 85, n. 25.

Sphinx trimaculata, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XL, cont. XV, fig. 7, 8, fortif., S. 16.

Sphinx sarpedon, BORKH., *Rhein. Mazag.*, I, B., S. 629, n. 9.

Zygæna cynaræ, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, n. 7, texte, p. 139 (vix varietas).

Les premières ailes sont bleues, luisantes, transparentes, avec trois taches rouges (1), dont deux à la base et une vers l'extrémité. Les deux de la base sont très-inégales, l'inférieure est trois fois plus longue que la supérieure et très-souvent interrompue; la troisième, qui est vers l'extrémité de l'aile, est ordinairement orbiculaire. Dans un grand nombre d'individus, on aperçoit en outre un très-petit point rouge à la bifurcation de la principale nervure. Le dessous diffère à peine du dessus.

La frange est peu apparente et jaunâtre.

Les ailes postérieures dans le mâle sont du même ton que les supérieures, avec le disque d'un rose très-pâle, et se fondant avec la couleur de l'aile. Dans la femelle, au contraire, la couleur rose s'étend jusqu'à la bordure, qui chez elle est très-étroite. Le corps est d'un bleu noir, avec un anneau rouge sur le dessus de l'abdomen; les antennes sont très-fortes, et brusquement

(1) A l'exemple de tous les auteurs, j'ai dit qu'elle avait trois taches rouges sur chaque aile; mais il serait plus convenable de dire qu'elle en a quatre, car parmi le grand nombre d'individus que j'ai eus entre les mains, il s'en est à peine trouvé deux chez qui la tache inférieure de la base ne fût point interrompue.

en massue. Le collier et le corselet sont mélangés de quelques poils grisâtres. Les pattes sont noirâtres, avec le côté interne des cuisses, des jambes et des tarses d'un jaune-roussâtre luisant.

La femelle se distingue encore du mâle par son anneau rouge, qui est beaucoup plus large.

Cette zygène habite l'Espagne, le Portugal et nos départemens les plus méridionaux. Elle paraît en juillet; elle se plaît sur les petits côteaux arides : on la trouve souvent reposée sur les scabieuses, la *lavandula spica* et la *lavandula vera*. Je l'ai prise au mois d'août dans nos montagnes sous-alpines.

ZYGÆNA ACHILLEÆ. Pl. III, fig. 1 et 2.

Z. Alis anticis cyaneo-virescentibus vel cyaneo-lutescentibus, maculis quinque rubris, subtus confluentibus, solitaria majori et securiformi; posticis rubris, margine cyaneo; collari humerisque pilis albis inductis.

Zygæna achilleæ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 50, n. 6.

Zygæna loti, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 587, 3.

Zygæna fulvia? FAB., *Gen. Ins. Mant.*, p. 275, n. 1-2.

Sphinx viciæ, HUBN., *Sphing.*, tab. II, f. 11; text., S. 79, n. 8; *Sph. loti* (mas).

Sphinx bellidis, HUBN., *Sphing.*, tab. II, f. 10 (fœm.).

Sphinx triptolemus, HUBN., *Sphing.*, tab. XX, f. 96

(mas); text., *E.* 78, n. 6 (la chenille); larv., *B.*, a.-b.; f. 1., a.-b.

Sphinx loti, ILLIG. *N. Ausgs.*, dessp., 1, *B.*, S. 38, n. 3.

Sphinx de l'achillière, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCIX, f. 141, a.-d., p. 60.

Sphinx achilleæ, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXV, suppl. VII, f. 1, a. b, S. 189.

Sphinx achilleæ, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 21, n. 14; S. 121, n. 13.

Sphinx bellis, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 43, n. 15; S. 122, n. 14.

Sphinx serpylli, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 166, n. 13, 14, 6.

Sphinx scabiosæ, DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 111, n. 48.

Les premières ailes sont arrondies au sommet, d'un bleu moins foncé et un peu moins luisant que dans la *filipendulæ*, avec cinq taches rouges : deux à la base, deux au milieu, et une, beaucoup plus grande, solitaire et sécuriforme vers l'extrémité.

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, avec une légère bordure d'un bleu foncé qui se rétrécit à peine vers l'angle anal.

Le dessous des ailes supérieures est d'un bleu très-pâle, et les taches y sont légèrement confluentes.

Le dessous des inférieures ne diffère pas du dessus.

La frange des ailes de devant est d'un jaune roussâtre très-apparent.

Les antennes sont fortes et d'un noir bleu ; le corselet est bleu panaché de blanc , surtout au collier et aux épaulettes. Le corps est d'un bleu noir, et les pattes d'un jaune blanchâtre ou roussâtre, surtout antérieurement.

La femelle présente le même dessin que le mâle, mais elle est ordinairement d'un bleu grisâtre ou jaunâtre, avec le collier et les épaulettes plus garnis de poils blanchâtres.

Il n'est pas rare de trouver des individus de l'un et de l'autre sexe, mais surtout des femelles, chez qui la tache inférieure de la base est réunie avec l'inférieure du milieu de l'aile. Tel est l'individu que j'ai fait représenter pl. III, fig. 2. Hubner en a fait à tort trois espèces. Celui qu'il a appelé *sphinx bellis* se distingue en ce que la tache supérieure du milieu de l'aile est séparée en deux par une grosse nervure. Le *sphinx vicia* qu'il représente fig. 11 est une variété femelle dont la tache sécuriforme est plus petite que dans le commun des individus; il se rapproche beaucoup de l'espèce que j'ai nommée *janthina*. Enfin celui qu'il nomme *sphinx triptolemus* est le type de l'espèce.

La chenille, selon Hubner et Scriba, est moins raccourcie que la plupart de ses congénères; elle est d'un jaune verdâtre, couverte de poils fins et noirâtres, avec deux rangées de taches noires, disposées ainsi : une au commencement et l'autre à la fin de chaque segment : sur chaque anneau on remarque en outre un point jaune orangé; les stigmates sont noirs, ainsi que la

tête et les pattes écailleuses. Elle se nourrit sur le *lotus corniculatus*, les *trifolium*, l'*hippocrepis*, etc. Sa coque est ovoïde, blanchâtre, de la consistance de la coquille d'œuf.

Cette espèce éclot aux environs de Paris dans le mois de mai ; je soupçonne que dans le midi elle donne deux fois, car je l'ai prise à la fin de juillet dans nos départemens méridionaux. Elle est assez commune en France et en Allemagne.

ZYGÆNA JANTHINA. *Mihi*. Pl. VIII, fig. 7.

Z. Alis cœruleo-plumbeis, maculis quinque rubris, posteriore liturata; posticis rubris, margine tenuiore cyaneo.

Cette espèce, que j'avais d'abord confondue avec les variétés de l'*achilleæ*, me paraît réellement constituer une espèce particulière.

Elle est de la taille de l'*achilleæ*, et elle se rapproche beaucoup de la variété figurée par Hubner sous le nom de *sphinx vicia*. Ses premières ailes sont d'un bleu-bronzé peu brillant, avec une légère bordure d'un bleu foncé à l'extrémité, et cinq taches rouges disposées ainsi : deux oblongues à la base, deux orbiculaires au milieu, et une à l'extrémité, qui offre un petit prolongement oblique.

Les secondes ailes sont d'un rouge-carmin pâle, avec une légère bordure d'un bleu foncé, et de la même largeur dans tout son trajet.

Le dessous des premières ailes est d'un bleu-pâle luisant, lavé de rouge sur le milieu, ce qui fait paraître les taches un peu confluentes.

Le dessous des ailes postérieures ne diffère pas du dessus.

Le bord de la côte et la frange des ailes supérieures sont d'un jaune-roussâtre luisant, la frange des ailes inférieures est bleue.

Les yeux, la tête, les palpes, les antennes et l'abdomen sont d'un noir foncé, avec un reflet un peu bronzé. Le corselet est bleu, mélangé de quelques poils blancs.

Les pattes sont jaunâtres, luisantes antérieurement, et d'un jaune noirâtre postérieurement.

La femelle diffère du mâle, que nous venons de décrire, en ce qu'elle est un peu plus grande, que ses ailes supérieures sont d'un bleu un peu jaunâtre, et que son corselet est beaucoup plus mélangé de poils blanchâtres.

Elle se distingue, au premier coup d'œil, de la *meliloti* par ses ailes moins étroites et plus arrondies, et surtout par la bordure des inférieures, qui est moins large et nullement sinuée; et de l'*achilleæ*, par la forme de la tache postérieure.

J'ai pris cette espèce dans les montagnes sous-alpines du hourg d'Oysans; elle volait en assez grande quantité sur les fleurs de la *lavandula vera* et de l'*artemisia corymbosa*, avec la *sarpedon*, l'*achilleæ* et quelques individus de la *scabiosæ*. Je l'ai reçue depuis des Alpes de Provence.

La découverte de la chenille prouvera si j'ai eu tort ou raison d'en faire une espèce.

ZYGÆNA EXULANS. Pl. III, fig. 3.

Z. Alis anticis subdiaphanis, cyanescentibus, interdum venis albidis notatis, maculis quinque inæqualibus, subtilis concoloribus; posticis rubris, margine griseo-cyaneo: antennis subclavatis cyaneis; pedibus luteis; corpore pillosissimo.

Zygæna exulans, OCHS., *Schmitt. von Eur.*, t. II, p. 40, n. 9.

Sphinx exulans, HUBN., *Sphing.*, tab. XX, f. 101, (fœm.); tab. II, f. 12 (mas).

Sphinx exulans, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XLI, cont. XVI, fig. 1, 2.

Cette espèce est de la taille de l'*onobrychis*. Ses premières ailes sont un peu transparentes, d'un gris-verdâtre luisant, avec les nervures souvent blanchâtres, dans le mâle particulièrement; celles de la femelle sont souvent bleuâtres, sans veines blanches; mais, dans les deux sexes, la frange, ainsi que le bord interne, sont blancs. Outre cela, elles sont marquées de cinq taches rouges: deux oblongues à la base, dont celle de la côte moitié plus longue que l'autre, deux inégales vers le milieu, et une solitaire près de l'extrémité de l'aile.

Dans quelques individus, ces taches paraissent un peu lavées de blanchâtre sur le bord.

Le dessous des premières ailes est d'un gris un peu jaunâtre ou bleuâtre, et les taches y sont aussi distinctes qu'en dessus, quoique d'un rouge un peu plus pâle.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-carmin pâle de part et d'autre, avec une bordure du même ton que le fond des ailes supérieures. Cette bordure n'est que rudimentaire près de l'angle anal; mais elle s'élargit en gagnant l'angle externe.

Dans les individus qui sont veinés de blanc, le corselet et les épaulettes sont blanchâtres, et d'un bleu noirâtre dans ceux dont les premières ailes sont bleues. Dans l'un et l'autre, le collier est d'un blanc grisâtre.

Les antennes sont noires. Les pattes sont jaunes et le corps est extrêmement velu, surtout dans les femelles.

Cette espèce éclot au commencement du mois d'août; elle n'habite que les hautes montagnes des Pyrénées, de la Savoie, de la Suisse et du Tyrol. Il paraît que plus on la trouve haut, plus elle est blanchâtre.

Je l'ai prise, avec mon ami Alphonse de Brébisson, sur le sommet du Galibier; son vol est lourd, elle aime à se reposer sur le *phaca glacialis* et sur l'*achillæa nana*. J'en ai vu quelques individus pris dans les Pyrénées et dans les Alpes de la Styrie, qui ne diffèrent en rien de ceux de nos montagnes.

ZYGÆNA CYNARÆ. Pl. III, fig. 4.

Z. Alis anticis subrotundatis, subdiaphanis, virescentibus aut obsolete cærulescentibus, maculis quator rubris (interdum media et basali coadunatis); posticis rubris, margine cæruleo-grisescente; abdominis cingulo rubro; antennis nigricantibus, clavatis; thorace villosa, pedibus albidis.

Zygæna cynaræ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, *Sphinx cynaræ*, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXVII, p. 42, n. 10.

cont. XII, f. 2, 3, 4, fortf., S. 2.

Sphinx millefolii, ESP., tab. XLIII, cont. XVIII, f. 1, 2.

Sphinx cynaræ, HÜBN., *Sphing.*, tab. 17, f. 80 (fœm.), *Sphinx millefolii*, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 259, n. 13, 14.

Elle est un peu plus grande que l'*exulans*. Ses premières ailes sont arrondies à l'extrémité, un peu diaphanes, d'un bleu-pâle peu brillant, avec cinq taches rouges, savoir : deux à la base, oblongues et égales, deux inégales et arrondies au milieu, et une arrondie et solitaire, vers le bout de l'aile, tantôt plus grande et tantôt plus petite que les deux autres.

Le dessous de ces mêmes ailes est bleuâtre luisant, avec les mêmes taches qu'en dessus ; mais les deux du milieu tendent à se réunir avec celle de la base, tandis qu'en dessus elles sont éloignées et fort distinctes.

Les secondes ailes sont d'un rouge-carmin clair de part et d'autre, avec une bordure d'un bleu pâle, presque nulle près de l'angle anal, mais qui s'élargit en gagnant l'angle externe. La frange des ailes antérieures est un peu jaunâtre, celle des ailes postérieures se confond avec la bordure.

Le corselet est d'un bleu foncé, les épaulettes sont de la même couleur; le corps est d'un noir bleu, avec un anneau rouge passablement large, tant en dessus qu'en dessous.

Les pattes sont jaunâtres, principalement à leur partie antérieure.

Les antennes sont en massue et d'un bleu noir.

La femelle est un peu plus grande que le mâle; elle offre absolument le même dessin, mais l'anneau rouge est plus large. Sa couleur est ordinairement d'un bleu jaunâtre ou verdâtre, et ses ailes inférieures ont une bordure un peu moins large, comme dans l'individu que j'ai fait représenter, et qui a été pris dans les Abruzzes.

Dans quelques individus que m'a envoyés M. le baron Wimmer, l'anneau rouge n'est distinct qu'en dessus.

Cette espèce habite l'Autriche, la Hongrie, les environs de Dresde; M. Duponchel l'a prise dans les environs de Rome. Je ne sache pas qu'on l'ait encore trouvée en France.

Godart a donné, pl. XXII, fig. 9, sous le nom de *zygæna cynaræ*, une variété de la *sarpedon*. C'est une erreur qu'il est important de rectifier.

ZYGÆNA MELILOTI. Pl. III, fig. 5.

Z. Alis anticis sublanceolatis, subdiaphanis, nitidis, grisescenti-virescentibus vel cyanescentibus, maculis quinque rubris; posticis rubris, margine virescenti, nigro; antennis clavatis,

Zygæna meliloti, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 43.

Sphinx loti (mas), HUBN., *Sphing.*, tab. XVII, f. 82.

Sphinx meliloti, ESP., tab. XXXIX, cont. XIV, 1-8, fortif., S. 10.

Sphinx lonicerae (variet.), ESP., *Schmett.*, II, Th., tab. XXV, sup. VII, f. 3.

Sphinx viciae, BORKH., *Rhein. Magaz.*, 1, B, S. 638, n. 15.

Sphinx viciae, SCHRANK, ILLIG., FUES.

Cette espèce est un peu plus petite que l'*achilleæ*. Ses premières ailes sont étroites, un peu lancéolées, légèrement transparentes, d'un vert-bleuâtre luisant, avec cinq taches rouges disposées comme dans la *trifolii*; mais elle s'en distingue facilement par la coupe des ailes, qui sont beaucoup plus pointues, et par la tache du milieu qui avoisine la côte, qui est toujours oblongue et séparée.

Le dessous des ailes antérieures est d'un bleu-grisâtre pâle, avec les taches aussi distinctes qu'en dessus.

Les secondes ailes sont d'un rouge rose de part et d'autre, avec une bordure d'un bleu pâle, passablement

large, surtout près de l'angle externe, et un peu sinuée intérieurement.

Les antennes, les épaulettes et la trompe sont d'un noir bleu, le corps est d'un bleu-verdâtre luisant.

Les pattes sont un peu moins foncées et de couleur noire. La frange des ailes antérieures est un peu jaunâtre, très-peu distincte; celle des ailes postérieures se fond avec la bordure.

Les deux sexes se ressemblent parfaitement pour le dessin; mais j'ai vu des femelles dont le fond était d'un gris verdâtre. Il arrive quelquefois, mais très-rarement, que les taches se réunissent en une bande irrégulière.

La chenille, selon Esper, vit sur plusieurs sortes de trèfles ou autres petites légumineuses; elle est d'un vert glauque, pubescente, avec la tête et les premières pattes d'un brun noir; les autres sont de la couleur du corps; sur le dos, elle a une ligne blanche longitudinale; chaque incision est marquée d'un point jaune, surmonté par une petite tache noire. Le cocon est allongé, d'un jaune assez pâle. La chrysalide, suivant le même auteur, est d'un blanc jaunâtre, avec le dos et l'enveloppe des ailes d'un brun noirâtre.

Cette espèce éclot à la fin de juin ou au commencement de juillet; elle n'est pas très-rare dans certaines parties de l'Allemagne, telles que l'Autriche, la Franco-nie, la Prusse; mais elle est beaucoup plus rare en France: elle n'a encore été trouvée qu'en Alsace.

ZYGÆNA CUVIERI. *Mihi*. Pl. III, fig. 6.

Z. Alis anticis cyaneo-violaceis, maculis tribus latis, rubris; posticis rubris, margine latiori cyaneo; abdomine thoraceque nigris, hirsutis; collari cinguloque rubris.

Cette belle espèce est de la taille de l'*ephiates*. Ses premières ailes sont un peu arrondies, d'un bleu-indigo chatoyant, avec trois larges taches rouges disposées ainsi : la première, qui est à la base, s'étend depuis la côte jusqu'au bord interne ; celle du milieu est un peu moins grande, et paraît formée par la réunion de deux taches, dont la plus petite regarde la côte, et la plus grande le bord interne ; la dernière, ou celle de l'extrémité, est grande, irrégulière, et semble formée par la réunion de deux taches accolées.

Les secondes ailes sont d'un rouge tendre de part et d'autre, avec une bordure bleue assez large, et finissant en pointe avant l'angle anal.

Le dessous des ailes supérieures ne diffère du dessus que parce qu'il est plus pâle ; les taches ont la même disposition que sur la surface opposée.

Les antennes sont noires, et se terminent insensiblement en massue.

Le corps est très-velu et noir de part et d'autre, avec un anneau rouge visible en dessus et en dessous.

Le corselet est velu comme le corps, et séparé de la tête par un collier rouge très-remarquable.

Les pattes sont brunes.

Cette zygène a été trouvée aux environs d'Amaden, en Perse, par feu Olivier. M. Labillardière l'a aussi rapportée de la Syrie.

J'ai dédié cette nouvelle espèce à M. le baron Cuvier, dont le nom est si cher à tous ceux qui s'occupent des sciences naturelles.

ZYGÆNA TRIFOLII. Pl. III, fig. 7.

Z. Alis anticis cyaneis, maculis quinque rubris (duabus mediis confluentibus), subtus concoloribus; posticis rubris, margine latiori cyaneo; antennis clavatis; thorace abdomineque cyaneis; pedibus dilutioribus atris.

Zygæna trifolii, OCHS., *Schmett. von. Eur.*, t. II, p. 47.

Sphinx trifolii, ESP., *Schmett.*, II, tab. XXXIV, cont. IX, f. 45.

Sphinx trifolii, HUBN., *Sphing.*, pl. LXXX, n. 16.

Sphinx des prés, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCVII, f. 136, a.-e.

Sphinx trifolii, BORGH., *Eur. Schmett., Th.*, S. 26, n. 18.

Sphinx trifolii, DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 113, n. 54.

Sphinx pratorum, DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 114, n. 60.

Les ailes supérieures de cette espèce sont d'un bleu foncé, avec cinq taches rouges aussi distinctes en des-

sus qu'en dessous ; il y en a deux à la base, séparées seulement par une nervure, deux au milieu, ordinairement réunies. Dans tous les cas, on y distingue toujours une ramification de nervure qui est de la couleur du fond. Celle de ces deux taches qui regarde le bord externe est toujours moitié plus petite que l'autre. La dernière tache est solitaire vers le bout de l'aile; les deux de la base sont oblongues; les trois autres sont presque rondes. Dans quelques individus, il existe, en face de la tache solitaire du bout de l'aile, un très-petit point rouge ou rudiment d'une sixième tache.

Les secondes ailes sont d'un rouge-carmin de part et d'autre, avec une bordure bleue, large, paraissant sinuée à cause de la dépression qui existe au milieu des ailes : la base de ces mêmes ailes est rayonnée par quelques poils bleus.

La femelle ressemble au mâle. Dans quelques exemplaires, toutes les taches sont réunies en une bande irrégulière; mais on reconnaît toujours cette variété à la largeur de la frange et à la petitesse de la tache intermédiaire qui regarde la côte, et qui, quoiqu'elle fasse partie de la bande, se distingue par la nervure dont j'ai parlé plus haut.

Les antennes, la trompe, les épaulettes sont d'un bleu noir; le corps est d'un bleu luisant; les pattes et les yeux sont d'un noir brun.

La chenille vit sur le *lotus corniculatus*, le *trifolium procumbens*, l'*hippocrepis comosa*, etc.; elle est verte ou d'un jaune verdâtre plus ou moins clair, pubescente

comme ses congénères; elle a quatre lignes de points noirs, dont deux dorsales et les autres latérales; on remarque en outre sous le ventre un petit point noir sur chaque anneau. Le cocon est allongé, sillonné, et d'un jaune paille, avec la partie inférieure blanchâtre.

J'ai vu, dans les prairies humides des Alpes, des branches d'*hippophæ* pour ainsi dire couvertes par les coques de cette chenille.

Elle paraît quelque temps avant la *filipendulæ*; dans les montagnes je l'ai trouvée à la fin de juillet. Elle habite la France, le Piémont, la Hongrie, la Franconie, l'Autriche; elle est assez commune partout.

ZYGÆNA LONICERÆ. Pl. III, fig. 8.

Z. Alis anticis cyaneis aut virescenti-cyaneis, maculis quinque majoribus rubris, subtus concoloribus;; posticis rubris, margine cyaneo, subsinuato, et ad angulum analem decrescente; antennis clavatis, atris; pedibus dilutioribus, nigris.

Zygæna loti, FABR., *Ent. Syst.*, III, 1, 157, 5; *Zyg. fulvia*, *Mantissa*, t. II, 101, 3.

Zygæna loniceræ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 50.

Sphinx loniceræ, ESP., *Schmett.*, II, tab. XXIV, suppl. VI, 1, a.-b.

Sphinx loniceræ, HUBN., *Sphing.*, tab. II, f. 7; (la chenille) *Larr. Lepid.*, II, *Sphing.*, I, *Pap.*, B., c., f. 1, a.-b.

Sphinx des graminées, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCVIII, f. 158, a.-d.

Sphinx graminis, DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 115, n. 61.

Zygæna loniceræ, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, fig. 4, texte, p. 154.

Sphinx loniceræ, BORKH., *Schmett.*, II, *Th.*, S. 20, n. 15; S. 121, n. 12; S. 161, n. 15.

Elle est de la taille de la *filipendulæ*, avec laquelle elle a été quelquefois confondue.

Ses premières ailes sont d'un bleu foncé ou d'un vert-bleuâtre luisant, avec cinq taches rouges assez grosses, et aussi distinctes en dessous qu'en dessus : il y en a deux à la base qui sont ovales, allongées, et partagées par une nervure; deux autres inégales au milieu : celle qui regarde la côte est ovale, l'autre (qui regarde le côté interne) est moitié plus grande, et presque triangulaire; enfin, une solitaire et arrondie vers le bout de l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-carmin de part et d'autre, avec une bordure bleue assez large, sinuée intérieurement, et allant en décroissant de l'angle externe à l'angle anal. Outre cela, la base de ces mêmes ailes est rayonnée par des poils de la couleur du fond.

Les antennes sont noires; les pattes sont de la même couleur, mais un peu moins foncées; les épaulettes et le corps sont d'un bleu foncé. La variété à taches réunies en une seule bande irrégulière est assez rare.

La frange des quatre ailes est un peu plus pâle que la couleur du fond.

J'en ai trouvé en Normandie une variété chez laquelle les taches sont aussi petites, et même quelquefois plus petites que dans la *filipendulæ*. Il deviendrait très-difficile de la distinguer de la variété à cinq points de cette dernière, si l'on ne faisait attention à la forme et à la largeur de la bordure des ailes inférieures. J'ai obtenu cette variété de chenille, et je suis certain qu'elle se rapporte à la *lonicera* : c'est elle que j'ai cru devoir faire représenter.

La chenille vit sur plusieurs plantes de la famille des légumineuses, et particulièrement sur le *lotus corniculatus*, l'*hippocrepis comosa* (je ne l'ai jamais trouvée sur le chèvrefeuille); elle est de la taille de celle de la *filipendulæ*. Elle est d'un vert pomme, et elle a, sur chaque côté du corps, deux bandes noires formées de taches interrompues par les incisions : ces bandes s'étendent de la tête à l'anus, et l'inférieure est plus étroite. On remarque sur chaque anneau un point jaune placé entre les deux bandes; le corps est pubescent, comme dans toutes ses congénères.

La coque est allongée, en forme de bateau, et d'un jaune paille. On la trouve souvent attachée aux tiges des graminées.

Cette espèce paraît un peu plus tôt que la *filipendulæ*. On la trouve dans toute l'Europe septentrionale.

ZYGÆNA FILIPENDULÆ. Pl. IV. fig. 1.

Z. Alis anticis cyaneis aut viridibus, nitidis, fusco ciliatis, maculis sex rubris; posticis rubris; margine tenui nigro-cyaneo; abdomine haud cingulato; antennis clavatis.

Sphinx filipendulæ, LIN., FAB., SCOP., ILLIG., VIEWEG., PODA, SULZ., MULL., SCHÆFF., ILLIG., W-V.^a

Sphinx filipendulæ, HUBN., *Sphing.*, tab. V, f. 31 (œm.); text., S. 80, n. 15; (la chenille) *Larv.*, II, S. pap. b.-c., f. 1, c.-d.

Zygæna filipendulæ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 54, n. 14.

Zygæna filipendulæ, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, f. 2; text., 127.

Sphinx de la filipendule, ENGRAM., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCVII, f. 137, a. b. c. d. e. f.

Sphinx filipendulæ, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XVI, f. a.-e., S. 138; tab. XXXVI, cont. XI, f. 8, S. 233.

Le sphinx béliet, GEOFF., *Hist. des Ins.*, F, II, p. 88, n. 15.

Sphinx filipendulæ, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 12, 119, 160, n. 9.

VARIÉTÉ.

Sphinx chrysanthemi, HUBN., *Sphing.*, tab. III, f. 17.

Sphinx chrysanthemi, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 166, n. 21 - 22.

Esp., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXVII, cont. XII, f. 1, fortif., S. 1.

Les ailes supérieures sont d'un vert-bleu luisant, avec un reflet tantôt un peu doré, tantôt d'un bleu indigo. Sur ces mêmes ailes il y a six taches d'un rouge-carmin vif, disposées deux à deux, et confluentes en dessous. Les deux taches de la base sont ovales, un peu oblongues, les quatre autres sont plus ou moins arrondies et plus petites.

Il arrive quelquefois que les taches se réunissent en dessus, et forment une bande rouge irrégulière.

Les ailes inférieures sont d'un rouge carmin de part et d'autre, avec une bordure bleue, étroite et garnie d'une légère frange un peu plus claire. La frange des premières ailes est un peu roussâtre.

Le corps est d'un bleu luisant ou d'un vert bronzé. Les antennes sont d'un bleu foncé en dessus et noires en dessous. Les pattes sont d'un bleu noirâtre, avec la partie interne des jambes un peu plus pâle.

Les deux sexes se ressemblent ordinairement; il arrive cependant que l'on trouve accouplés ensemble des individus d'un bleu foncé avec d'autres d'un vert doré; mais ces variations dans la nuance se remarquent dans le mâle comme dans la femelle.

On trouve souvent une variété qui n'a que cinq taches rouges.

La variété figurée par Esper et Hubner sous le nom de *sphinx chrysanthemi* est très-remarquable. Au pre-

mier coup d'œil, on la prendrait pour une espèce très-différente; mais, en la regardant avec attention, on voit qu'elle ne se distingue du commun des individus que parce que les six taches, au lieu d'être rouges, sont brunes, ainsi que les ailes inférieures.

La chenille est jaune, pubescente, avec neuf taches sur chaque segment; la tête et les pattes écailleuses sont noires, de même que les stigmates; il y a en outre entre les pattes une rangée longitudinale de points noirs. Le cocon est allongé, sillonné ou plissé longitudinalement d'un jaune-pâle luisant. On trouve cette chenille, en mai et en juin, sur les trèfles et les petites légumineuses. L'insecte parfait éclot au bout de trois semaines.

Elle est commune par toute l'Europe, depuis la fin de juin jusqu'au commencement d'août.

ZYGÆNA ANGELICÆ. Pl. IV, fig. 2.

Z. Alis anticis cyaneis, maculis quinque rubris (sex in quibusdam), subtus confluentibus; posticis rubris, margine nigro; antennis apice luteis.

Zygæna angelicæ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 67, n. 18,

Zygæna angelicæ, HUBN., *Sphing.*

Cette espèce est difficile à déterminer; elle a de si grands rapports avec la *filipendulæ*, que j'avoue que, sans l'autorité d'Ochsenheimer, qui en a élevé la che-

nille aux environs de Dresde , et qui en a très-bien fait connaître l'histoire, je l'aurais à peine regardée comme une variété.

Ses premières ailes sont d'un bleu plus terne que dans la *filipendulæ* ; tantôt elles ont cinq taches rouges, tantôt six , disposées de la même manière que dans la *peucedani*. En dessous, ces taches sont confluentes.

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, avec une bordure noire un peu plus large que celle de la *filipendulæ*, et moins que celle de la *peucedani*.

Les antennes sont d'un bleu noir , avec l'extrémité de la massue jaunâtre. Le corselet et l'abdomen sont d'un bleu foncé, et les pattes sont noires.

La chenille, suivant Ochsenheimer , est de la taille et de la forme de la *peucedani*; elle est jaune, finement pointillée de noir, garnie de poils jaunes et de poils noirs; sur son dos, elle a deux séries de taches noires, qui, quand la chenille marche, deviennent interrompues et forment des triangles; la tête est noire, et les pattes écailleuses sont annelées de blanc et de noir; outre cela, on observe sur les côtés plusieurs petites taches noires. Le cocon est fusiforme, d'un jaune vif, et de la consistance du parchemin.

Cette espèce éclot en juillet; elle habite l'Autriche, la Hongrie et la Prusse. Probablement qu'elle se trouve aussi en France; mais elle n'y a pas encore été observée.

ZYGÆNA TRANSALPINA. Pl. IV, fig. 3.

Z. Alis anticis atro-cyaneis aut virescentibus, maculis sex rubris (sæpe connatis); posticis rubris, margine lato, sinuato, cyaneo; abdomine haud cingulato; antennis clavatis, nigro-cyaneis.

Zygæna transalpina, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 60, n. 15.

Sphinx transalpina, HUBN., tab. III, f. 15 (mas), f. 19 (fœm.), text., S. 81, n. 20.

Sphinx filipendulæ major, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XLI, cont. XVI, f. 4 (mas), fortf., S. 19.

Elle est la plus grande de toutes celles qui me sont connues; elle surpasse d'un tiers au moins la *filipendulæ*. Les ailes supérieures sont d'un vert-bleuâtre luisant ou d'un noir bleu, avec six taches d'un rouge carmin, disposées par paires, et souvent connées. Les deux taches de la base sont ovales, les quatre autres sont plus ou moins arrondies.

Le dessous de ces mêmes ailes est d'un bleu noir assez clair, et présente les mêmes taches que le dessus; seulement les deux basilaires, qui en dessus sont séparées par une grosse nervure, se confondent en dessous en une seule tache. Dans quelques individus de l'un et de l'autre sexe, il n'y a que cinq taches rouges.

Les ailes inférieures ont les deux surfaces d'un rouge carmin, avec une bordure d'un bleu noir, assez large, sinuée intérieurement et garnie d'une frange un peu plus foncée, que l'on voit aussi aux premières ailes.

Le corps est d'un vert bronzé ou d'un bleu-noir luisant.

Les antennes sont d'un bleu foncé en dessus, noirâtre en dessous.

Les pattes sont noires, et les cuisses un peu bronzées.

Elle habite la Sicile, l'Italie et les départemens les plus voisins du Piémont. M. Duponchel, entomologiste bien connu, et continuateur de l'ouvrage de Godart, l'a prise assez communément aux environs de Rome, dans les premiers jours de l'été. La chenille de cette espèce m'est inconnue.

Cette zygène se distingue de la *filipendulæ* par la bordure des ailes inférieures, qui est beaucoup plus large et d'un bleu noir, et par sa taille, qui est beaucoup plus grande. On ne pourra la confondre ni avec la *peucedani*, qui a un anneau rouge, ni avec l'*angelicæ*, qui a les antennes jaunâtres au sommet, et qui en outre n'a qu'une bordure légère aux ailes inférieures.

Dans l'individu décrit par Ochsenheimer, il paraît que les taches étaient confluentes en dessous et connées en dessus. Cette anomalie n'a rien d'extraordinaire : dans toutes les zygènes dont les taches sont réunies en dessus, elles sont souvent confluentes en dessous,

Quoique j'aie vu plusieurs individus de cette espèce, je n'en ai cependant pas rencontré qui présentassent ce caractère.

L'individu que j'ai fait représenter est une variété prise en Italie.

ZYGÆNA CHARON. Pl. IV, fig. 4.

Z. Alis anticis cyaneis nitidis, maculis sex minutis, rubris, nigro submarginatis; posticis rubris, margine latiori nigro-cyaneo; antennis subclavatis.

Sphinx charon, HUBN., *Sphing.*, tab. IV, f. 21 (mas).

Elle est de la taille de la *filipendulæ*. Ses premières ailes sont d'un bleu-foncé luisant, avec six taches rouges assez petites, savoir : deux oblongues à la base, deux vers le milieu, et deux à l'extrémité de l'aile.

Les secondes ailes sont d'un rouge-carmin foncé, avec une bordure assez large, fortement sinuée intérieurement et d'un bleu noir.

Le dessous des premières ailes est d'un noir bleuâtre, et les taches du dessus y sont très-distinctes, non confluentes; cependant, dans quelques individus, j'ai remarqué une légère trace rouge sur la nervure médiane, principalement vers l'extrémité, où elle confondait les deux taches du bout, quoiqu'en dessus elles fussent passablement éloignées.

La frange des quatre ailes est violâtre.

Les antennes sont entièrement d'un bleu-noir foncé, avec la pointe très-faiblement roussâtre.

Le corselet, l'abdomen et les pattes sont d'un vert bronzé.

Les deux sexes se ressemblent.

Ochsenheimer rapporte, avec doute à la vérité, le *sphinx charon* de Hubner à la *zygæna medicaginis* ; mais je crois, après avoir comparé un grand nombre d'individus de l'un et de l'autre sexe, qu'elles forment deux espèces distinctes.

Elle diffère de la *medicaginis* 1° par la bordure noire des ailes inférieures, qui est toujours moins large ; 2° par les antennes, qui sont moins sensiblement roussâtres à leur sommet ; 3° parce que la bordure des ailes inférieures s'élargit considérablement vers l'angle externe dans la *medicaginis*, tandis que dans la *z. charon* elle ne s'élargit pas ; 4° par l'époque de l'éclosion, qui est différente. Malheureusement je n'en connais pas la chenille, qui, en achevant de me convaincre, leverait toute espèce de doute.

Sa patrie est la Corse, l'Espagne, la Sicile et le Piémont. Elle paraît en été.

ZYGÆNA MEDICAGINIS. Pl. IV, fig. 5.

Z. Alis anticis cy aneo-virescentibus, maculis sex minoribus (interdum quinque), nigro submarginatis ; posticis rubris ; margine latissimo, nigro-violaceo ; antennis apice lutescentibus ; pedibus nigris, femoribus pallidioribus.

Zygæna medicaginis, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 61, n. 16.

Sphinx medicaginis, HUBN., *Sphing.*, tab. IV, f. 20 (mas?); text., S. 82, n. 21.

Sphinx transalpina, ESP., *Schmett.*, II, *Th.* tab. XVI, f., S. 142 u. 196.

Sphinx transalpina, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 15 u. 120, n. 10.

DE PRUN., *Lepid. Pedemont*, p. 98, n. 195.

Elle est de la taille de la *filipendulæ*; mais elle en diffère par beaucoup de caractères.

Les premières ailes, qui sont arrondies vers le bout, sont d'un vert-bleu très-luisant, avec six petites taches rouges de part et d'autre; en dessus, ces taches sont entourées d'un petit cercle noir, peu apparent dans certains individus; les deux de la base sont oblongues et d'égale longueur, les quatre autres sont arrondies. Dans un grand nombre, il n'y a que cinq taches; dans d'autres, la sixième est rudimentaire, et à peine apparente en dessus, tandis qu'elle est très-distincte en dessous.

Le dessous de ces mêmes ailes est de la même couleur que le dessus, mais d'un ton plus clair. Les taches du dessus y reparaissent sans se confondre.

Les secondes ailes sont d'un rouge carmin de part et d'autre, avec une très-large bordure d'un bleu-violet noir, fortement sinuée intérieurement; outre cela, les nervures de ces mêmes ailes sont dessinées en

bleu violet. La frange des quatre est d'un bleu-violet foncé.

Le collier, les épaulettes et le corps sont du même ton que les premières ailes.

Les antennes sont d'un bleu noir en dessus, et noires en dessous, avec la pointe roussâtre.

Le dessous du corps est bronzé.

Les pattes sont noires, avec la partie interne des cuisses et des jambes jaunâtre.

Cette belle espèce est propre au Piémont, à la Sicile, à la Calabre et aux États romains.

M. Duponchel a trouvé communément la chenille de cette zygène aux environs de Nice, sur les légumineuses; mais malheureusement il n'en a point pris la description; il se rappelle seulement que la coque est en bateau, plus raccourcie que celle de la *filipendulæ*, et qu'elle éclot au milieu du printemps.

J'ai vu des individus chez lesquels la bordure est tellement large qu'elle envahit la moitié des ailes postérieures, ce qui, au premier coup d'œil, pourrait les faire confondre avec la *z. stæchadis* de Borkhausen, ou *lavandulæ* de Hubner.

ZYGÆNA PEUCEDANI. Pl. IV, fig. 6.

Z. Alis anticis nigro-cyaneis aut virescentibus, maculis sex rubris, subtus confluentibus; posticis rubris, margine latiori, cyaneo; abdominis cingulorubro; antennis nigro-cyaneis, apice albicantibus; pedibus throaceque nigro-cyaneis.

Zygæna peucedani, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 70, n. 20.

Zygæna peucedani, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, f. 3; text., p. 130.

Sphinx peucedani, HUBN., *Sphing.*, tab. XVI, f. 75-76; text., S. 82, n. 22.

Sphinx du peucedan, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. XCVIII, f. 139, a.-e., p. 56; pl. CXXII, f. 138, e. (var.).

Zygæna filipendulæ (var.), FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 286, 1.

Sphinx peucedani, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXV, suppl. VII, f. 2, S. 191.

Sphinx peucedani, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 16, 120, 161, n. 11.

VARIÉTÉ PREMIÈRE.

Variet. Alis anticis cyaneis, maculis quinque rubris; posticis rubris, nigro marginatis; cingulo abdominis rubro.

Sphinx athamantæ, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXVII, cont. XII, f. 5, 6, fortf., S. 4.

Sphinx veronicæ, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 162, n. 13, 14, a.; S. 238.

VARIÉTÉ DEUXIÈME.

Variet. Alis anticis cyaneis, punctis sex flavis; posticis flavis, nigro-cyaneo marginatis; abdominis cingulo flavo.

Zygæna æacus, FAB., *Mant.*, t. II, 102, et *Ent. Syst.*, III, 1, 589, 9.

Sphinx æacus, HUBN., *Sphing.*, tab. III, f. 18; text., S. 82, n. 25.

Sphinx æacus, WIEN. VERZ., S. 45, fam. G, n. 8.

VARIÉTÉ TROISIÈME.

Variet. Alis anticis cyaneis, maculis binis baseos flavis, tribus disci albis; posticis flavis, macula alba limboque cyaneo; abdominis cingulo flavo.

Sphinx æaque, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. CII, f. 148, a.-b., p. 69.

Sphinx æacus, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXIII, cont. VIII, f. 1, S. 217.

Elle est un peu plus grande que la *filipendulæ*. Ses premières ailes sont, en dessus, d'un vert-bleu luisant, avec cinq ou six taches rouges : deux à la base, deux au milieu, et deux ou une seule vers l'extrémité. (Quand il y en a deux, l'inférieure est ordinairement la plus petite.)

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, avec une bordure noire assez large, sinuée intérieurement, et qui, dans certains individus, s'étend jusqu'au milieu de l'aile.

Le dessous des premières ailes est un peu plus pâle que le dessus, et les taches y reparaissent très-confuses. Le dessous des ailes postérieures ne diffère pas du dessus.

Le corps est d'un bleu noir ou d'un vert bronzé, avec le cinquième anneau rouge en dessus et en dessous.

Les pattes sont noires.

Les antennes sont de la couleur du corps, avec l'extrémité de la massue blanchâtre.

Cette espèce présente plusieurs variétés remarquables; c'est probablement ce qui a engagé Godart à y rapporter le *sphinx transalpina* de Hubner; ce qu'il n'eût certainement pas fait s'il eût eu la nature sous les yeux.

La première variété, ou *sphinx athamantæ*, ne diffère du commun des individus que parce qu'elle n'a que cinq taches rouges.

La seconde variété, *zygæna æacus* de Fabricius, ou *sphinx æacus* de Hubner, a toutes les taches des premières ailes, les deux surfaces des secondes, et le cinquième anneau de l'abdomen jaunes.

La troisième variété, ou *sphinx æacus* d'Esper et d'Engramelle, a cinq taches sur les ailes supérieures, dont deux jaunes à la base, et les trois autres blanches.

Les secondes ailes sont jaunes de part et d'autre, avec un gros point blanc vis-à-vis du sommet.

Le corps a aussi un anneau jaune.

Il arrive quelquefois, mais très-rarement, de trouver une variété accidentelle qui manque d'anneau rouge; mais on la reconnaît toujours par l'extrémité des antennes, qui est blanchâtre, et par la largeur de la bordure des ailes inférieures.

La chenille se trouve en mai et en juin sur les légumineuses herbacées; elle est un peu plus grosse que celle

de la *filipendula*. Elle est d'un jaune très-pâle, couverte de poils blanchâtres. La tête est noire, tachetée de blanc; les pattes écailleuses sont brunes, annelées de blanc. Sur son dos on aperçoit une ligne noirâtre, et sur chaque côté dix taches noires, composées chacune de deux autres taches, dont une au commencement et l'autre à la fin de chaque anneau, ce qui peut très-bien s'observer quand la chenille marche. Il y a en outre, sur chaque côté, deux raies de points noirs, qui forment une ligne non interrompue quand la chenille est en repos; la première de ces raies est au-dessus des stigmates, la seconde au-dessus des pattes.

La coque est allongée, fusiforme, sillonnée, et d'un blanc argentin. Esper a représenté cette chenille; mais il en a donné une figure très-peu exacte. Je ne l'ai jamais trouvée sur le *pucedan* ni sur aucune ombellifère.

Le papillon éclot en juillet; il se trouve en France, en Allemagne, en Italie, etc.

Les deux dernières variétés sont fort rares.

ZYGÆNA DORYCNII.

Z. Alis anticis viridibus, punctis sex coccineis; posticis coccineis, margine latissimo cyaneo; abdomine cingulo supra coccineo.

Zygæna dorycnii, Ochs., Schmett. von Eur., t. II, p. 69, n. 19.

N'ayant pu me procurer dans aucune collection, ni obtenir de mes correspondans, la véritable espèce dé-

crite sous le nom de *dorycnii* par Ochsenheimer, je suis forcé d'en donner la description d'après cet entomologiste.

Elle est plus petite que la *peucedani* ; à peu près de la taille de l'*hippocrepididis*. Les antennes et les pattes sont d'un noir bleu dans toute leur longueur. L'abdomen a vers l'extrémité un anneau rouge qui n'entoure le corps qu'en dessus dans le mâle ; mais chez la femelle on aperçoit en dessous quelques atomes rougeâtres dans la direction de l'anneau.

Les ailes supérieures sont d'un vert bronzé, comme dans la plupart des espèces, avec la frange d'un brun violâtre, et six taches d'un rouge vif : deux à la base, plus grandes en dessous qu'en dessus, deux au milieu et deux vers l'extrémité. Les quatre dernières sont à peu près égales et confluentes en dessous.

Les secondes ailes sont d'un rouge vif, avec une bordure d'un noir bleu, plus grande dans le mâle que dans la femelle.

Suivant Ochsenheimer, on la distingue de la *peucedani* 1° par les ailes plus courtes et plus arrondies ; 2° par les antennes d'un bleu noir jusqu'à l'extrémité ; 3° par l'anneau rouge de l'abdomen, qui n'est visible qu'en dessus ;

De la *filipendulæ*, par l'anneau rouge et par les taches plus petites ;

De l'*hippocrepididis*, par l'anneau rouge.

Il paraît que cette espèce est encore fort rare : on ne l'a trouvée jusqu'à présent que dans la Russie méridionale.

ZYGÆNA CONCINNA.

Z. Alis angustatis, anticis fusco virescentibus, punctis quinque rubris; posticis rubris, margine exteriori nigro; corpore nigro-virescente; palpis, thoracis maculis, ano pedibusque flavis; abdominis cingulo lato rubro (Dalman).

VARIÉTÉ PREMIÈRE.

Variet. Punctis flavis; segmentis ventralibus omnibus flavo marginatis.

VARIÉTÉ DEUXIÈME.

Variet. Alis anticis minus angustatis, punctis rubris; segmentis ventralibus anticis, flavo-punctatis, intermediis rubro marginatis.

DALM., *Anal. Ent.*, p. 49; *Lepid. Extr.*, n. 23.

Voici une espèce que je n'ai jamais vue en nature; ce que je vais en dire est extrait de l'*Analecta Entomologica* de M. Dalman.

Les antennes sont entièrement noires, un peu brillantes et en massue.

Les palpes sont jaunes, velus et comprimés; la trompe est longue et noire.

La tête et le corselet sont d'un noir-verdâtre brillant, avec les épaulettes et deux points jaunes en avant et en arrière des yeux; il y en a aussi un de la même couleur sur le collier.

Les pattes sont jaunes, avec une ligne noire sur les cuisses.

Le corps est de plusieurs couleurs : les quatre premiers anneaux sont d'un noir verdâtre, avec trois points jaunâtres, dont un assez petit sur le milieu et un autre sur les côtés ; les trois anneaux suivans sont rouges, avec un point noir triangulaire sur le milieu ; le huitième est d'un noir verdâtre, et le dernier, appelé anal, est jaune.

Les ailes supérieures sont proportionnellement plus étroites que dans nos espèces européennes, d'un brun-verdâtre peu brillant, avec cinq taches rouges ; celle de la base est allongée, et les quatre autres sont disposées deux par deux, comme dans la *filipendulæ*.

Les ailes postérieures sont rouges, avec une bordure noire assez large, finissant en pointe avant l'angle anal.

Le dessous des premières ailes est presque entièrement rouge par la confluence des taches.

M. Dalman en cite deux variétés :

La première est remarquable par les anneaux, qui sont largement bordés de jaune, excepté les intermédiaires, qui sont rouges sur les côtés.

La seconde variété a les ailes un peu moins étroites, et tout le rouge chez cette dernière est remplacé par du jaune, comme cela arrive quelquefois dans la variété *æacus* de la *peucedani*.

Cette espèce se trouve au cap de Bonne-Espérance.

ZYGÆNA HIPPOCREPIDIS. Pl. IV, fig 7.

Z. Alis anticis atro-cæruleis aut virescentibus, maculis sex cinnabarinis, subtus omnino confluentibus; posticis rubris, margine cyaneo; antennis clavatis, apice albis; abdomine haud cingulato.

Zygæna hippocrepidis, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 63, n. 17.

Sphinx loti, HUBN., *Sphing.*, tab. V, f. 32 (fœm.).

Sphinx hippocrepidis., HUBN., tab. XVII, f. 85 (mas).

Sphinx hippocrepidis (var. fœm.), HUBN., *Sphing.*, text., S. 79, 12; (la chenille), *Larv. Sphing.*, b. c., f. 2, a. b. c.

Sphinx astragali, BORKH., *Rhein. Magaz.*, 1, B, S. 631, n. 12.

Sphinx loti, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXV, cont. X, f. 1, S. 224.

Sphinx loti, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 28, n. 19; S. 125, n. 18.

Zygæna hippocrepidis, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXXII, n. 5, text., p. 136.

Sphinx loti? DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 115, n. 55.

Zygæna cytisi, GOD., pl. XXII, f. 6 (variet.).

Elle est plus petite d'un tiers que la *filipendulæ*. Ses premières ailes sont d'un bleu-foncé luisant, avec six taches d'un rouge miniacé, disposées deux par deux.

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, avec une bordure noire peu prononcée et un peu sinuée intérieurement. Toutes les ailes ont en outre une petite frange d'un bleu violâtre.

Le dessous des premières ailes est bleu; mais les taches y sont très-confluentes.

Les antennes sont d'un bleu noir, avec l'extrémité de la massue blanche.

Le corps est d'un bleu foncé, avec les pattes d'une couleur plus claire.

J'en ai vu une variété chez laquelle toutes les taches étaient réunies en une bande longitudinale, sinuée. On en trouve aussi, mais très-rarement, une légère variété qui n'a que cinq taches au lieu de six. Enfin, j'ai vu un individu chez lequel toute la couleur rouge était d'un rouge minium extrêmement pâle et presque jaunâtre.

C'est à cette espèce que l'on doit rapporter la *z. cytisi*, figurée par Godart pl. XXII, fig. 6. C'est une variété qui n'est pas très-commune; elle se distingue en ce que les deux taches postérieures sont unies de manière à former un angle peu ouvert, à peu près comme dans celle que j'ai nommée *oxytropis*, espèce qui est au reste toute différente, et dont les taches sont entourées de noir, comme dans la *rhadamanthus*. Je ne crois pas que l'on doive y rapporter le *sphinx cytisi* de Hubner; je pense, mais sans en être bien certain, que la figure qu'il en donne convient plutôt à l'*oxytropis*.

Cette zygène se distingue facilement de la *filipendula* par la couleur miniacée de ses taches rouges, par sa

taille beaucoup plus petite, et par ses antennes blanches au sommet.

Hubner donne, pl. XVII, fig. 83, une variété de cette espèce qui est fort remarquable; les taches des ailes supérieures sont blanchâtres sur un fond bleu, tandis que les ailes inférieures sont jaunes.

La chenille se trouve assez communément en mai et en juin; elle est verte, pubescente, avec les stigmates, la tête et les pattes écailleuses noirs. Sur chaque côté elle a une série de taches noires, dont chacune est coupée en deux par les incisions; au-dessus de ces taches elle a une ligne noire longitudinale, et au-dessous une bande jaune, qui s'étend, sans s'interrompre, depuis la tête jusqu'à l'anus.

Sa coque est jaune, fusiforme, comme celle de ses congénères.

L'insecte parfait éclot en juillet et en août, en France et en Allemagne. Il se trouve assez communément dans le centre de la France, mais il est rare aux environs de Paris.

ZYGÆNA ANTHYLLIDIS. *Mihi*. Pl. IV, fig. 8.

Z. Alis anticis virescentibus, maculis sex rubris; posticis rubris, margine tenui nigro; abdominis cingulo collarique rubris; antennis subclavatis.

Elle est de la taille de la *medicaginis*. Ses premières ailes sont d'un bleu verdâtre, avec six taches rouges,

disposées ainsi : deux oblongues à la base, dont celle qui avoisine la côte est moitié plus longue, et se termine en pointe; deux arrondies sur le milieu de l'aile, et deux plus grosses et rondes vers l'extrémité; outre cela, la plus grosse des deux postérieures et les deux du milieu sont légèrement bordées de blanc jaunâtre.

Les ailes inférieures sont d'un rouge carmin de part et d'autre, avec une bordure noire à peine sensible.

Le dessous des ailes antérieures est d'un bleu pâle, et laisse reparaître très-distinctement les taches du dessus, qui n'y sont nullement confluentes. Le bord de la côte est blanc, et les quatre ailes sont garnies d'une frange très-apparente d'un blanc un peu rousâtre.

Les antennes sont longues, grêles, à peine plus grosses vers l'extrémité.

Le collier est d'un rouge pâle, et il y a sur l'abdomen un anneau d'un rouge un peu plus foncé, qui n'entoure pas le corps en dessous.

Le corselet est d'un bleu verdâtre, avec les épaulettes mélangées de quelques poils blanchâtres.

Les pattes sont jaunes.

La femelle diffère très-peu du mâle; elle est un peu plus grande, et le fond de la couleur tire davantage sur le vert.

Cette espèce est rare; je n'en ai encore vu que deux individus. Ils avaient été recueillis dans l'Espagne méridionale.

ZYGÆNA CAFFRA. Pl. V, fig. 1.

Z. Alis anticis fuscis, punctis quinque sanguineis nigro cinctis; posticis rubris, margine fusco; humeris, orbiculis oculorum palpisque sanguineis; abdomine cingulo rubro.

Sphinx caffra, LIN., *Syst. Nat.*, II, 806, 37; *Mus. Lud. Ulr.*, 362.

Zygæna caffra, FAB., *Ent. Syst.*, t. III, p. 390, n. 13.

Sphinx caffra, GRAM., *Papill. Exotiq.*, 33, tab. CCCXCIV, f. E.

Le sphinx béliet brun à points rouges, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. C, f. 143.

Elle est de la taille de l'*hippocrepidis*. Ses premières ailes sont étroites d'un noir brun, avec cinq petites taches punctiformes, rouges et cerclées de noir, savoir : une solitaire et oblongue à la base, deux au milieu, et deux vers l'extrémité de l'aile.

Les ailes postérieures sont d'un rouge vif de part et d'autre, avec une bordure noire qui va en s'élargissant depuis l'angle anal jusqu'à l'angle externe.

Le dessous des premières ailes est noirâtre, avec les mêmes taches qu'en dessus; mais elles n'y sont point entourées de noir.

Les antennes sont grosses, en massue, et d'un bleu

noir. Les palpes, le tour des yeux, le collier et les épaulettes sont d'un rouge sanguin.

Le corselet est bleuâtre; l'abdomen est de cette dernière couleur, avec un anneau rouge.

Le dessous du corps, la partie interne des pattes et l'anus sont d'un rouge pâle.

Elle habite la Caffrerie, le pays des Hottentots et le cap de Bonne-Espérance.

Le père Engramelle, trompé sur l'*habitat* de cette zygène, l'a figurée à tort parmi les espèces européennes.

ZYGÆNA CORSICA. *Mihi*. Pl. V, fig. 2.

Z. Alis anticis cyaneis, subdiaphanis, maculis quinque rubris; posticis rubris; antennis clavatis.

Cette espèce est une des plus petites de toutes celles que je connais. Ses premières ailes sont d'un bleu ardoisé, légèrement transparentes, avec cinq taches rouges, savoir : deux à la base, deux au milieu et une solitaire vers le bout de l'aile.

Les secondes ailes sont d'un rouge tendre de part et d'autre, avec une petite frange bleuâtre.

Le dessous des premières ailes est d'un bleu grisâtre, et les taches du dessus y sont toutes confluentes.

Les antennes sont grosses, fortement en massue, et d'un bleu noir.

Le corselet et l'abdomen sont de la même couleur, tant en dessus qu'en dessous.

Les pattes sont d'un noir brun.

La femelle diffère très-peu du mâle ; seulement elle est un peu plus grande et d'une couleur qui tire quelquefois sur le verdâtre.

Cette petite zygène est encore peu répandue dans les collections ; on la trouve , au mois de juillet, dans les montagnes de l'île de Corse.

ZYGÆNA STOECHADIS. Pl. V, fig. 3.

Z. Alis omnibus concoloribus, cyaneis, micantibus; anticis maculis sex (vel quinque) sanguineis, nigro subcinctis; posticis puncto rubro basique rubro radiata; collari concolore.

Sphinx lavandulæ, HUBN., *Sphing.*, tab. IV, f. 24; n. text., S. 79, n. 11.

Sphinx stæchadis, BORKH., *Rhein. Magaz.*, I, B, S. 628, n. 7.

Zygæna stæchadis, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 83, n. 22.

Elle est de la taille de la *lavandulæ*, dont elle n'est peut-être qu'une variété locale. Ses premières ailes sont d'un bleu-verdâtre luisant, avec cinq taches rouges très-distinctes de part et d'autre, cerclées de noir en dessus, et assez petites. Il y en a deux à la base, deux au milieu et une vers l'extrémité. Le bord postérieur est légèrement noir et terminé par une frange blanchâtre.

Les secondes ailes sont d'un bleu foncé, avec une

large tache rouge, rayonnée à la base, et une autre petite tache arrondie et de la même couleur près de l'angle externe. La frange des quatre ailes est un peu blanchâtre.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus; mais les taches n'y sont pas bordées de noir. Le dessous des inférieures diffère du dessus en ce que la tache rouge de la base y est plus grande, et presque toujours confondue par une liture avec celle de l'angle externe.

Les antennes, les pattes et la tête sont d'un noir bleu, ainsi que le collier.

Le corps et le corselet sont de la même couleur; les épaulettes sont garnies de quelques poils blancs.

La femelle ne diffère pas sensiblement du mâle.

Il y a des individus qui ont six taches rouges aux ailes supérieures; d'autres ont les deux taches des ailes inférieures réunies par une petite liture.

Cette espèce se distingue aisément de la *lavandula* par l'absence du collier blanc et par la tache rouge de la base des inférieures, qui est beaucoup plus grande.

Elle habite le Piémont, l'Espagne et les îles d'Hyères.

ZYGÆNA LAVANDULÆ. Pl. V, fig. 4.

Z. Alis omnibus cæruleo-virescentibus, micantibus; anticeis utrinque maculis quinque rubris, nigro cinctis; posticis macula unica vel duabus rubris; collari albo; antennis clavatis nigro-cyaneis.

Zygæna lavandulæ, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 587, 4.

Zygæna lavandulæ, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 84, n. 23.

Zygæna lavandulæ, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, f. 10, tex. p., 144.

Sphinx spicæ, HUBN., *Sphing.*, tab. IV, f. 25 (mas); text., S. 79, n. 10.

Sphinx de la lavande, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. CI, f. 145, a. b.

Sphinx lavandulæ, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXIV, cont. IX, f. 2, S. 221.

Zygænalarandulæ, COQUEB., *Illustr. Iconog.*, Déc. I, tab. VII, f. 2.

Sphinx lavandulæ (de la lavande stécade), DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, tab. IV, f. 20, p. 114.

Zygæna lavandulæ, PETAG., *Instil. Entom.*, t. II, p. 509, n. 12.

Sphinx lavandulæ, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 11 et 119, n. 8.

Elle est un peu plus grande que la *filipendulæ*. Les ailes supérieures sont d'un vert-bleu très-luisant, avec cinq taches rouges, dont deux à la base, deux au milieu et une solitaire vers le bout. Toutes sont cerclées de noir. La frange des premières ailes est blanchâtre, très-visible.

Les secondes ailes sont du même ton que les supérieures, avec deux taches rouges inégales.

Le dessous des premières diffère du dessus, en ce que les taches n'y sont point bordées de noir.

Le dessous des inférieures est très-différent du des-

sus; au lieu des deux taches rouges, on y remarque une large tache rouge qui occupe tout le disque de l'aile. Leur frange est noirâtre.

Le corps est d'un vert-bleu bronzé, avec un collier blanc; les pattes et les antennes sont de la couleur du corps.

Les deux sexes se ressemblent.

Dans quelques individus, la base des secondes ailes est rayonnée de rouge jusqu'aux deux points dont j'ai parlé ci-dessus.

Cette zygène, l'une des plus jolies du genre, éclot en juillet, et se trouve assez communément dans la France la plus méridionale et en Espagne.

ZYGÆNA EPHIALTES. Pl. V, fig. 5-6.

Z. Alis anticis cyaneis aut atro-cyaneis, maculis quatuor disci albis, binis baseos rubris; posticis cyaneis, macula alba; abdominis cingulo rubro; antennis subbre-vibus clavatis, nigro-cyaneis.

Sphinx ephialtes, LIN., *Syst. Nat.*, I, 2, 806, 36.

Zygæna ephialtes, FAB., *Mant. et Syst. Entom.*

Zygæna coronillæ, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 588, 8.

Zygæna ephialtes, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t, II,

p. 77, n. 21.

Sphinx de la luzerne, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. C, f. 144, a. b., p. 63.

Sphinx ephialtes, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXII. f. 5, S. 148.

Sphinx falcata, WIEN VERZ., S. 45, fam. G, n. 6.

Sphinx ephialtes, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, Th., S. 10 n. 118, n. 7, 155, n. 6.

VARIÉTÉ PREMIÈRE.

Variet. Alis anticis atro-cæruleis, nitidis, maculis binis orbiculatis et puncto disci albis; ocello baseos rubro, intra circulum album, maculaque oblonsa incrassiore, margine rubra; posticis puncto unico albo, margine, pallidioribus; abdominis cingulo carmineo.

Sphinx falcata, HUBN., *Sphing.*, t. V, f. 55 (fœm.), text., S. 83; *Sphinx ephialtes*.

Zygæna ephialtes, PANZ., *Faun. Germ.*, 5, 20.

Sphinx medusa, PALL., *Reis. Anth. Z.*, I, Th., n. 67.

VARIÉTÉ DEUXIÈME.

Variet. Alis omnibus utrinque cærulescentibus nitidis, superioribus maculis quatuor disci albis, binis baseos luteis; inferioribus macula majora et adjacente minori albis; abdominis cingulo luteo.

Sphinx coronillæ, HUBN., *Sphing.*, tab. III, f. 15 (fœm.); text., S. 83, n. 26. *Ephialtes*, var.

Sphinx de la coronille, ENG., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. CI, f. 146, a. b. g. h., p. 66, 67.

Sphinx coronillæ, ESP., *Schmett.*, II, Th., tab. XXXIII, cont. VIII, f. 2, S. 218.

Zygæna coronillæ, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 588, 8. *Zygæna ephialtes* (var.), FAB., *Mont.*, t. II, 102, 6.

VARIÉTÉ TROISIÈME.

Variet. Alis omnibus atro-cæruleis, nitidis, utrinque concoloribus; anticis maculis disci tribus albis, binis basæos luteis; posticis macula unica alba; abdominis cingulo luteo.

Sphinx trigonellæ, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, S. 147, tab. XXXIII, cont. VIII, f. 3, 4; BORKH., LANG.

Sphinx de la coronille, ENGR., t. III, pl. CI, f. 146, c. d. e. f.; pl. CII, f. 147, a. b.

Elle est de la taille de la *lavandulæ*; ses premières ailes sont d'un noir-bleu foncé, avec six taches, dont quatre blanches et deux rouges; les deux de la base sont rouges, un peu oblongues; les deux du milieu sont blanches et inégales, ainsi que les deux qui avoisinent le bout de l'aile.

Le dessous de ces mêmes ailes est semblable au-dessus, mais les deux taches basilaires y reparaissent à peine, tandis que les autres sont aussi apparentes qu'en dessus.

Les ailes inférieures sont d'un noir bleu de part et d'autre, avec une seule tache blanche.

Les antennes, le corselet et les épaulettes, sont du même ton que le fond des ailes; l'abdomen est d'un bleu très-foncé, avec un anneau rouge,

La première variété, qui est le *sphinx falcata* de Hubner, se distingue de celui que je viens de décrire, par les deux taches de la base des premières ailes, qui

sont : la première, d'un rouge vif; la seconde, blanche, fortement lavée de rouge, surtout dans son milieu; et par la plus petite des taches intermédiaires, qui est rougeâtre dans quelques individus; l'abdomen est annelé de rouge, comme dans la précédente.

La seconde variété, qui est la *zygæna coronillæ* de Fabricius, diffère de l'espèce proprement dite, ou *sphinx ephialtes* de Linné, par les deux taches de la base, qui sont jaunes, au lieu d'être rouges; par l'anneau de l'abdomen, qui est aussi jaune, et par les ailes inférieures, qui ont une petite tache punctiforme à côté de celle qui est unique dans toutes les autres variétés.

Enfin, la troisième variété (la plus généralement répandue), qui est le *sphinx trigonellæ* d'Esper, et que j'ai fait représenter pl. V, fig. 6, n'a que cinq taches aux ailes supérieures, dont les deux de la base sont jaunes et les trois autres blanches; les ailes inférieures ont une seule tache, et l'abdomen est entouré d'un anneau jaune.

Outre ces variétés que je viens de signaler, il n'est pas très-rare d'en rencontrer plusieurs autres, qui sont des variétés de variétés : ainsi, par exemple, j'ai vu la première variété tantôt avec quatre taches blanches, tantôt avec trois. Je possède des individus de la troisième variété qui ont quatre taches blanches aux ailes supérieures; et il n'est donc pas étonnant que la plupart des auteurs, et Fabricius lui-même, aient fait quelques espèces de trop.

La chenille vit sur le *medicago falcata*, la *coronilla*

varia et plusieurs autres légumineuses. Elle a beaucoup de ressemblance avec celle de la *filipendulæ* pour le *facies*; elle est tantôt d'un jaune fauve, tantôt d'un jaune pâle ou même verdâtre, avec deux raies longitudinales de points noirs; ses poils sont fins et rares, sa tête et ses pattes écailleuses sont d'un noir luisant, tirant quelquefois sur le brun. La coque est allongée et d'un jaune paille. C'est vers la fin de juin que cette chenille est parvenue à toute sa grosseur.

Cette zygène éclot dans les mois de juillet et d'août; elle aime à se reposer sur la *scabiosa sylvatica*. On ne l'a point encore trouvée en France, mais elle habite plusieurs parties de l'Allemagne, l'Italie, le Piémont, le Val-d'Aost, la Russie, et même la Sibérie.

ZYGÆNA OXYTROPIS. *Mihi*. Pl. V, fig. 7.

Z. Alis anticis cyaneo-virescentibus, maculis sex miniaceis, nigro marginatis (duabus apicalibus connatis), subtus omnibus confluentibus; posticis miniaceis margine nigro; collari, humeris corporeque snbvillosis, nigris.

Sphinx cytisi, HUBN., *Sphing.*, tab IV, f. 26 (mas)?

Elle est de la taille de l'*hyppocrepidis*; ses premières ailes sont d'un bleu-ardoisé très-luisant, avec six taches d'un rouge minium, entourées par un cercle noir très-distinct; les deux de la base sont oblongues et d'égale longueur; les deux du milieu sont inégales; les deux de l'extrémité sont à peu près égales, connées, et forment, par leur réunion, un angle très-ouvert.

Le dessous de ces mêmes ailes est d'un bleu-grisâtre pâle, et les taches du dessus y sont confluentes.

Les ailes inférieures sont d'un rouge minium de part et d'autre, avec une bordure d'un bleu noir, plus large et plus foncée que dans la *rhadamanthus*, et une frange de la même couleur. La frange des ailes supérieures est blanchâtre.

Le corselet, les épaulettes et le corps, sont noirs en dessus et en dessous.

Les antennes sont grosses, d'un bleu-foncé luisant.

Ochsenheimer a rapporté à la *z. filipendulæ* le *sphinx cytisi* de Hubner; mais il serait possible qu'il se fût trompé. Je crois que la figure de Hubner, quoique mauvaise, pourrait appartenir à l'espèce que je viens de décrire. Quant à celle que Godart a donnée sous le même nom, je suis à peu près certain qu'elle appartient à l'*hippocrepidis*; mais ni l'un ni l'autre de ces auteurs n'a fait ressortir cette aréole noire qui entoure les taches, comme dans la *z. rhadamanthus*. De sorte qu'il est tout naturel de les regarder, dans l'état où elles sont exécutées, comme représentant des variétés de la *filipendulæ* ou de l'*hippocrepidis*, chez lesquelles j'ai observé, comme Ochsenheimer, que les deux taches du bout de l'aile étaient quelquefois connées.

Cette espèce habite le Piémont et l'Italie; elle est encore rare dans les collections. M. Duponchel l'a prise aux environs de Rome, et M. Passerini aux environs de Florence.

ZYGÆNA RHADAMANTHUS. Pl. V, fig. 8.

Z. Alis anticis cyaneo-virescentibus, maculis sex rubris, circulo atro marginatis : posticis rubris, margine cyaneo ; antennis brevibus, valde clavatis ; collari thoraceque pilis albis inductis.

Zygæna rhadamanthus, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 86, n. 24.

Zygæna rhadamanthus, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, n. 9; tex., S. 79, n. 9.

Sphinx rhadamanthus, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XL, cont. XV, f. 1, 2, fortf., S. 13.

BORKH., *Rhein. Magaz.*, I, B., S. 644, n. 22.

Elle est de la taille de l'*onobrychis*.

Le dessus des premières ailes est d'un bleu-ardoisé luisant, avec six taches rouges, d'égale grandeur, disposées deux par deux, et bordées de noir foncé, excepté la supérieure de la base et l'inférieure de l'extrémité de l'aile. Le bord postérieur est fortement liséré de noir, et se fond insensiblement avec la couleur de l'aile; la frange est d'un gris blanchâtre.

Le dessous de ces mêmes ailes est d'un bleu pâle; les taches du dessus y reparaissent, mais elles y sont confluentes et non bordées de noir.

Les ailes postérieures sont rouges de part et d'autre, avec une bordure d'un bleu noir, terminée par une frange brunâtre.

Les antennes sont grosses, courtes, fortement en massue, et d'un bleu noir. Les pattes sont jaunâtres; le corps est d'un noir bleu. Le corselet et le collier sont mélangés de poils bleuâtres et de poils blanchâtres.

Les deux sexes se ressemblent parfaitement.

J'ai vu une variété femelle chez qui les taches étaient confluentes en dessus.

Je ne connais pas la chenille de cette espèce, mais je suis porté à croire qu'elle se transforme en un cocon ovoïde, comme l'*onobrychis*.

Cette zygène éclot en été, et n'est pas très-rare dans les départemens les plus méridionaux de la France.

ZYGÆNA ONOBRYCHIS. Pl. V, fig. 1-2.

Z. Alis anticis viridi aut cyaneo-nitentibus, maculis sex rubris albo marginatis, postica transversa lunulata : posticis rubris margine nigro-cyaneo; collari humerisque albis; antennis clavatis; abdomine rubro cingulato vel immaculato.

Zygæna onobrychis, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 87, n. 25.

Zygæna onobrychis, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, n. 11, tex., p. 146.

Zygæna onobrychis, FAB., *Ent. Syst.*, t. III, 1, 390, 12.

Zygæna carniolica, FAB., *Mant.*, p. 102, n. 10, et FAB., *Gen. Ins. Mantis.*, p. 275, n. 5.

Sphinx carniolica, SCOP., *Ent. Carn.*, p. 189, n. 478.

Sphinx caffra, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XVII, f. 3, a. b., S. 152; tab. XLII, cont. XVII, f. 2, 3, 4. *Sphinx onobrychis*.

Sphinx de l'esparcette, ENGR., *Pap d'Eur.*, t. III, pl. XCIX, f. 148, a. h., p. 57.

Sphinx onobrychis, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 18, 120, 161, n. 12.

Sphinx meliloti, HUBN., *Sphing.* (mas), tab. VI, f. 38; text., S. 83, n. 27.

Sphinx hedysari, HUBN., *Sphing.* tab. VI, f. 36, (mas); tab. V, f. 35 (fœm.); (la chenille), *Larv. Sph.*, I, *Pap.*, b. a. c., f. 2, a. b.

Sphinx astragali, HUBN., *Sphing.*, tab. VI, f. 37 (fœm.); text., S. 84, 11, 29.

Zygæna onobrychis, PANZ., *Faun. Germ.*, 32, 23.

Zygæna œarniolica, ROSS., *Faun. Etrus.*, t. II, p. 167, n. 1,069.

Sphinx cruenta, PALL., *Reis.*, II, *Th.*, *Anh.*, n. 94.

Sphinx carniolica, VIEWEG, SCHW.

VARIÉTÉ PREMIÈRE.

Variet. Alis anticis cyaneis, nitidis, maculis quinque flavis, singulis albido marginatis, ultima lunari, inferioribus flavis.

Sphinx flaveola, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, t. XXXVI, cont. XI, f. 1, S. 229.

Sphinx flaveola, HUBN., *Sphing.*, t. III, f. 14 (fœm.).

Sphinx flaveola, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 31, n. 22, S. 124, n. 21.

VARIÉTÉ DEUXIÈME. (Forsan species diversa.)

Variet. Alis anticis nigro-cyaneis; maculis tribus magnis pallide rubris, flavo submarginatis; posticis rubris, nigro marginatis; collari humerisque albidis.

Sphinx sedi, HUBN., *Sphing.*, n. 89-156.

Sphinx sedi, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, Th., S. 165, n. 17, 18; *Rhein. Magaz.*, I, B., S. 647, n. 26.

Zygæna sedi, FAB., *Mant.*, t. II, p. 101, n. 4; *Cyanea*, *alis anticis maculis tribus connatis; posticis totis rubris. Ent. Syst.*, III, t. 588, 5.

Les premières ailes sont d'un verd-bleu luisant, avec six taches rouges ocellées, c'est-à-dire entourées de blanc, aussi-bien en dessous qu'en dessus; les deux premières sont oblongues et séparées par la nervure médiane; les trois suivantes sont arrondies, et la dernière, qui est vers l'extrémité de l'aile, est semi-lunaire.

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, avec le bord terminal d'un bleu noir et garni d'une frange violette, tandis qu'elle est blanchâtre aux premières ailes.

Le corps est bleu ou d'un vert bronzé, avec un collier et le bord des épaulettes blancs. Les antennes sont noires, avec la sommité un peu roussâtre. La partie antérieure des jambes est jaunâtre.

Les deux sexes ne présentent point de différence.

Cette espèce, extrêmement distincte, est une des plus jolies du genre. Elle présente plusieurs variétés, c'est ce qui est cause que Hubner en a fait à tort cinq espèces.

La plus rare et la plus remarquable est le *sphinx flaveola* d'Esper, que j'ai fait représenter pl. V, fig. 41. Elle se distingue de l'espèce proprement dite, en ce que les taches rouges sont remplacées par du jaune, et bordées de blanc; en ce que les ailes inférieures sont jaunes bordées de bleu noir, et enfin en ce que l'abdomen offre un anneau jaune.

Quant aux *sphinx meliloti*, *hedysari* et *astragali*, de Hubner, ce sont de bien petites variétés; elles ne diffèrent l'une de l'autre que par la vivacité des taches rouges, et par la bordure blanche de ces taches, qui est plus ou moins prononcée.

Je me suis assuré que l'anneau rouge, qui dans les autres espèces est un caractère assez peu variable, est fort inconstant dans cette espèce. Hubner ne regarde comme *onobrychis* que les individus munis d'un anneau rouge; mais s'il eût élevé beaucoup de chenilles, il aurait été convaincu, avec Ochsenheimer, que toutes ne forment qu'une seule espèce.

J'ai élevé plusieurs fois la chenille de cette zygène : elle est de la taille de celle de la *filipendulæ*. Elle est pubescente, d'un vert pâle, avec une raie blanchâtre sur le dos, et une série de taches noires triangulaires sur les côtés; immédiatement au-dessous de ces taches, on aperçoit une ligne plus claire qui porte une rangée de points jaunes. La tête et les pattes écailleuses sont d'un brun noirâtre; les stigmates sont noirs.

La coque est ovoïde, tantôt blanche, tantôt d'un jaune soufre, et de la consistance de la coquille d'œuf.

La chenille est assez facile à élever; on la trouve dans les derniers jours de mai, sur le sainfoin (*hedysarum onobrychis*), le *lotus corniculatus*, et sur plusieurs autres légumineuses; mais ce n'est qu'en juin qu'elle a acquis toute sa grosseur. L'insecte parfait éclot en juillet.

Cette espèce paraît se trouver dans toute l'Europe, quoique moins répandue que la *filipendulæ*. J'en ai vu un individu recueilli dans la Géorgie d'Amérique, qui ne diffère en rien de ceux que nous trouvons en Europe; j'en ai vu aussi plusieurs qui avaient été pris aux environs de Kislar, près de la mer Caspienne, et qui étaient entièrement semblables à ceux de France et d'Allemagne.

N. B. La *zygæna sedi*, de Fabricius, qui se trouve en Danemark, me paraît être seulement une variété locale ou accidentelle de la précédente, autant que j'ai pu en juger sur un seul individu venant de ce pays.

Ochsenheimer partageait aussi à peu près cette opinion. N'en connaissant pas la chenille, je vais dire en deux mots ce qui la distingue de l'*onobrychis*.

Elle a un peu le *facies* de l'*olivieri*.

Ses premières ailes n'offrent que trois grandes taches d'un rouge pâle, très-légèrement bordées de jaunâtre, formées par la réunion de trois autres. Le corps et les ailes inférieures sont comme dans l'*onobrychis*.

L'individu figuré par Hubner est beaucoup plus rouge que celui que j'ai vu, et la bordure légère qui existe autour des taches paraît être nulle dans celui qu'il a représenté.

ZYGÆNA OCCITANICA. Pl. VI, fig. 5.

Z. Alis anticis cyaneo-virescentibus, nitidis, maculis quinque rubris, albo valde marginatis, sexta transversa, alba, lunari; posticis ruberrimis, margine cyaneo; collari humerisque albidis; abdominis cingulo lato, ruberrimo; antennis clavatis.

Zygæna occitanica, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 95, n. 26.

Zygæna occitanica, GOD., *Pap. de France*, tom. III, pl. XXII, n. 12, text., p. 149.

Sphinx phacæ, HUBN., *Sphing.*, tab. XXII, f. 106 (mas), 107 (fœm.); text., S. 84, n. 31.

Sphinx occitanica, DEVILL., *Ent. Lin.*, t. II, p. 114, n. 59, tab. IV, f. 21 (*le languedocien*).

Zygæna occitanica, PETAG., *Inst. Ent.*, t. II, p. 509, n. 13.

Elle a beaucoup de ressemblance avec l'*onobrychis*, mais elle en est certainement distincte, 1° parce qu'elle n'a que cinq taches rouges, toutes beaucoup plus bordées de blanc que dans sa congénère; 2° parce que la sixième tache, qui est semi-lunaire, est toujours entièrement blanche; 3° parce que l'abdomen est toujours entouré en dessus d'un large anneau rouge.

Je ne connais point la chenille, mais on m'en a envoyé plusieurs fois la coque, attachée à des tiges de plantes herbacées. Elle est ovoïde, d'un jaune soufre, rarement blanche; ce qu'elle a surtout de remarquable,

c'est qu'elle se termine brusquement par deux pointes obtuses qui viennent s'appliquer contre la tige qui lui sert d'attache.

Cette zygène éclot en juillet et août. Elle habite le Languedoc, et particulièrement les environs de Montpellier, où elle est assez commune. Olivier l'a aussi trouvée en Syrie, et j'en ai vu un individu qui avait été pris en Barbarie.

ZYGÆNA OLIVIERI. *Mihi.* Pl. VI, fig. 4.

Z. Alis anticis cyaneis aut virescentibus, nitidis, maculis tribus rubris, suboscellatis : posticis rubris, margine tenuiore, cyaneo; antennis clavatis; collari, abdominisque cingulo rubris.

Cette belle espèce est de la taille de l'*onobrychis*; ses premières ailes sont bleues, avec trois taches rouges, disposées ainsi : la première, qui est triangulaire, occupe toute la base, et s'étend du bord externe au bord interne, elle est en outre séparée du fond par une petite ligne d'un blanc jaunâtre; celle du milieu paraît formée par la réunion de deux taches, dont la plus petite regarderait la côte : elle est entièrement cerclée de blanc jaunâtre; enfin la dernière est irrégulière et sécuriforme, très-légèrement entourée de jaunâtre, dans la partie qui regarde la base, tandis que, vers le sommet de l'aile, elle n'offre aucune bordure.

Les secondes ailes sont d'un rouge vif, avec une légère bordure bleuâtre ou violâtre.

Le dessous des ailes supérieures est d'un bleu très-pâle, lavé de jaunâtre vers la base, et laisse reparaître toutes les taches du dessus; mais ces dernières n'y présentent aucun vestige de la bordure, qui est si remarquable sur la surface opposée.

La frange des premières ailes est jaunâtre, celle des secondes est bleuâtre.

Les antennes sont d'un bleu noir, grêles à leur base, et fortement en massue à l'extrémité.

La tête et les palpes sont noirs, avec un collier rouge. Le corselet, les épaulettes et l'abdomen, sont d'un bleu foncé, avec un large anneau rouge, peu prononcé en dessous.

Je n'ai vu qu'un individu, unique de cette espèce; il a été trouvé en Syrie par M. Labillardière, l'un de nos premiers botanistes.

ZYGÆNA HILARIS. Pl. VI, fig. 5.

Z. Alis anticis nigro-cyaneis aut virescentibus, maculis quinque cinnabarinis, flavo marginatis, confluentibus; posticis cinnabarinis, margine sinuato cyaneo; collari humerisque albidis; abdomine haud cingulato.

Zygæna hilaris, OCHS., *Schmett. von Eur.*, tom. II, p. 101, n. 30.

Au premier coup d'œil, on confondrait cette zygène avec la *fausta*, dont cependant elle est extrêmement distincte. Ses premières ailes sont d'un bleu noir, avec cinq

taches d'un rouge cinabre , entourées de blanc jaunâtre, et confluentes par la bordure (jamais ou très-rarement les taches rouges sont confondues). La première tache, qui est celle de la base, est large et bordée inférieurement par un petit rebord de la couleur du fond de l'aile ; les trois du disque sont carrées, et disposées en triangle ; la dernière, qui est vers le bout, est transversale et semi-lunaire. Le bord interne de l'aile est jaunâtre.

Le dessous de ces mêmes ailes représente le dessin du dessus, avec le ton beaucoup plus pâle ; la bordure, qui entoure les taches, s'y trouve à peine retracée, mais assez, cependant, pour qu'elles soient confluentes.

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, un peu plus pâles que les ailes correspondantes de la *fausta*.

Les antennes et le corps sont d'un noir bleu ; les épaulettes et le collier sont blanchâtres ; les pattes sont d'un jaunâtre pâle.

Cette espèce paraît à la fin de juin ou au commencement de juillet ; elle aime les lieux boisés et un peu élevés. Jusqu'à présent, elle n'est pas très-commune dans les collections. Les premiers individus ont été rapportés du Portugal par M. le comte d'Hoffmansegg ; elle a aussi été retrouvée en Espagne. M. le comte de Saporita l'a découverte en Provence, et, en 1825, j'ai pris, dans le Dauphiné, une variété qui se distingue, en ce que le collier blanc est moins prononcé et interrompu dans son milieu.

Cette zygène se distingue de la *fausta*, 1° par l'ab-

sence de l'anneau rouge; 2° par le collier, qui est blanc au lieu d'être rouge; 3° par le corselet, qui n'a point de lignes blanches; 4° par l'anوس, qui est de la même couleur que le corps; 5° enfin par l'époque d'apparition, qui est différente.

ZYGÆNA FAUSTA. Pl. VI, fig. 6.

Z. Alis anticis cyaneis, maculis quinque cinnabarinis, confluentibus, flavo cinctis; posticis cinnabarinis, limbo sinuato, nigro; collari, ano, cinguloque cinnabarinis; pedibus lutescentibus, thorace albo lineato.

Sphinx fausta, LIN., *Syst. Nat.*, I, 2, 807, 42.

Zygæna fausta, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 397, 37.

Zygæna fausta, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 96, n. 27.

Sphinx fausta, HUBN., *Sphing.*, tab. V, f. 27 (œm.); text., S. 84, n. 32; (la chenille), *Larv. Lepid.*, *Sph.*, I, *Pap.*, B., a. b., f. 3, a.-d.

Sphinx de la bruyère, ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. C, f. 142, c. d., p. 61.

Sphinx béliér (variété), GEOFF., *Hist. des Insect.*, t. II, p. 89.

Sphinx fausta, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XVIII, f. 1, a. b., S. 156.

Zygæna fausta, GOD., *Pap. de France*, t. III, pl. XXII, n. 13, text., p. 150.

Sphinx fausta, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 50, n. 21, S. 124 u. 165, n. 20.

Sphinx fausta, WIEN. VERZ., ILLIG., SCHRANK, LANG., SULZ., FUES..

Les ailes supérieures sont d'un bleu noir, avec cinq taches d'un rouge cinabre vif, confluentes et légèrement bordées de jaune pâle. La première tache occupe toute la base de l'aile, les trois autres sont en triangle, et se confondent ainsi que la dernière, qui est transversale et semi-lunaire. Dans beaucoup d'individus, la tache de la base se lie par sa bordure avec les deux du milieu, tandis que dans d'autres elle en est séparée par un espace bleu assez grand, ou unie seulement vers la côte par une liture.

La frange est d'un blanc roussâtre. Le dessous de ces mêmes ailes est plus pâle, et on n'aperçoit point de bordure autour des taches, quoiqu'elles soient très-confluentes.

Les secondes ailes sont rouges de part et d'autre, bordées de bleu noir, avec une légère frange d'un bleu légèrement jaunâtre.

Le corps est d'un bleu noir, avec le collier, un large anneau à l'extrémité du dessus de l'abdomen, et les côtés de l'anüs rouges. Le corselet est bleuâtre, avec deux lignes blanchâtres. Les antennes sont grosses et d'un bleu noir, les pattes sont jaunâtres.

J'ai trouvé plusieurs fois la chenille, en mai, sur la *coronilla minima*, l'*ornithopus perpusillus*, et l'*hippocrepis comosa*. Elle est d'un vert clair, avec un collier rougeâtre ou orangé, séparé de la tête par une ligne blan-

che; les pattes écailleuses et la tête sont noires; les pattes membraneuses sont d'un jaune verdâtre. Elle a sur le dos une ligne brunâtre, et sur chaque côté une raie blanche qui porte, à toutes les incisions, un point noir au-dessus duquel est une tache jaune. Les stigmates sont noirs. Vers le milieu de juin, elle a acquis toute sa grosseur; elle forme une coque ronde et blanche comme un œuf; la chrysalide est d'un brun noirâtre, avec les enveloppes des ailes un peu plus foncées. Elle éclot dans les derniers jours de juillet ou dans les premiers jours d'août.

Cette zygène habite presque toute l'Europe méridionale et plusieurs parties du Nord; elle se plaît sur les collines élevées et exposées au soleil; elle aime beaucoup à se reposer sur les têtes des scabieuses et celles du *phyteuma orbicularis*.

Il y a quelques individus chez qui les taches rouges sont tellement confondues, que l'on croirait que le fond de la couleur est rouge et les taches bleues.

ZYGÆNA FAUSTINA.

Z. Alis anticis nigro-viridibus, maculis sex rubris confluentibus, luteo marginatis: posticis rubris, limbo æquali nigro; collari rubro, pedibus nigro-viridibus, cinguloque abdominis rubro, subtus non coeunte. (Ochs.).

Zygæna faustina, Ochs., Schmett. von Eur., tom. II, p. 99, n. 28.

N'ayant pu me procurer cette espèce dans aucune collection, je me suis décidé à en donner la description

d'après Ochsenheimer, qui le premier l'a fait connaître.

Cette zygène a été confondue avec la *fausta*, quoiqu'elle s'en distingue par des caractères tranchans. La taille, la forme, le dessin, sont à peu près de même, mais on la reconnaît aux caractères suivans :

1°. L'anneau rouge de l'abdomen n'est jamais fermé.

2°. Les côtés de l'anüs ne sont pas rouges.

3°. Les pieds sont d'un noir verdâtre.

4°. Les ailes supérieures sont d'un noir verdâtre, avec les taches d'un rouge plus vif; la bordure est plus claire, d'un jaune blanchâtre; les taches de la base ne sont jamais liées avec la paire du milieu par une liture au bord antérieur. Les lignes jaunes qui dans la *fausta* lient les taches, manquent dans celle-ci. Cependant la tache supérieure du milieu est bordée en haut par du jaune blanchâtre:

5°. Le bord antérieur est de la couleur du fond, avec la frange brunâtre.

6°. Les ailes postérieures sont plus étroites, plus allongées et moins arrondies; la bordure en est aussi plus étroite, et partout d'une égale largeur, avec une frange brune à peine distincte.

Elle habite le Portugal.

ZYGÆNA LÆTA. Pl. VI, fig. 7.

Z. Alis anticis cyaneis aut virescentibus, maculis confluentibus, rubro miniaceis, pallidulis, immarginatis; posticis miniaceis, margine nigro cyaneo; collari, humeris abdominisque cingulo latissimo, rubris.

Sphinx læta, HUBN., *Sphing.*, tab. VI, f. 34 et 35; n. text., S. 85, n. 33.

Zygæna læta, OCHS., *Schmett. von Eur.*, t. II, p. 106, n. 29.

Sphinx læta, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XLVI, cont. XXI, f. 2, fortif., S. 36.

Sphinx de la bruyère (variété), ENGR., *Pap. d'Eur.*, t. III, pl. C, f. 142, a. b., p. 61.

BORKH., *Rhein. Magaz.*, I, B., S. 646, n. 25.

Elle est de la taille de la *fausta* ; ses premières ailes sont bleuâtres, quelquefois un peu violâtres, et quelquefois verdâtres, avec la majeure partie de la surface couverte par un espace d'un rouge-minium très-clair, et un peu plus pâle vers l'extrémité. Sur ce grand espace, qui offre une petite échancrure vers l'angle externe et une un peu plus grande vers l'angle interne, on observe deux taches d'un bleu noir, l'une un peu au-delà de la base de l'aile, et une autre plus petite, et arrondie, vers le milieu. Le bord externe de ces mêmes ailes est bordé par un liseré d'un rose jaunâtre, auquel fait suite la frange, qui est d'un jaune rousâtre.

Les secondes ailes sont d'un rouge minium de part et d'autre, avec une bordure d'un bleu noir, assez prononcée, et allant en s'élargissant de l'angle anal à l'angle externe ; leur frange est bleuâtre.

Le dessous des ailes de devant ressemble au dessus, mais il est un peu plus pâle vers l'extrémité.

La tête et les antennes sont noires ; le collier et les épaulettes sont rouges ; le corps est d'un noir bleu, avec un large anneau rouge près de l'extrémité ; l'anüs est noir ou d'un bleu noirâtre ; les pattes sont comme dans la *fausta*.

Cette zygène est rare dans les collections. Elle habite la Hongrie et l'Autriche.

On pourrait, en quelque sorte, décrire cette espèce en disant que les ailes supérieures sont d'un rouge pâle, avec une bordure bleue à l'extrémité, et deux taches, de cette dernière couleur, sur leur milieu.

GENRE SYNTOMIS. (*Illig.*, *Lat.*, *Ochs.*)

Sphinx, LIN., ESP., HUBN., BORKH., SCOP.

Zygæna, FAB., *Ent. Syst.*

Amata, FAB., *Syst. Gloss.*

Palpi breves, cylindrici, obtusi, ultra frontem non ascendentes; antennæ graciles, fusiformes, nunquam pectinatae; lingua convoluta; calcares tibiæ posteriorum breves; alæ oblongæ, maculatæ.

Palpes très-courts, velus, obtus, cylindriques, ne s'élevant jamais au-delà du chaperon; antennes (1) longues, en fuseau, grêles, allongées, finissant en pointe très-obtuse; trompe longue, roulée en spirale; jambes postérieures munies d'ergots très-petits.

Ailes oblongues, allongées, noires ou bleuâtres, avec des taches d'un blanc ou d'un jaune transparent, disposées comme dans les zygènes; ailes inférieures beaucoup plus courtes que les supérieures, de la même couleur, et toujours avec des taches semblables à celles des premières ailes.

Corps allongé, jamais hérissé de poils, entouré par des anneaux jaunes ou rouges en nombre variable.

Chenilles garnies de petits tubercules hérissés de poils fasciculés et raides, se roulant à la manière des *cheilonides*, et se métamorphosant dans un tissu très-léger.

Chrysalide plus allongée que dans les zygènes.

(1) Toutes les espèces que je connais ont l'extrémité des antennes plus ou moins blanche.

Les syntomis ont à peu près les mœurs des zygènes : elles aiment à voltiger à l'ardeur du soleil, mais leur vol est plus long et moins lourd ; on les voit souvent voler en très-grand nombre autour des buissons.

On ne connaît qu'un seul lépidoptère de ce genre en Europe ; mais l'Afrique, l'Asie et la Nouvelle-Hollande en possèdent certainement un grand nombre. Quant à l'Amérique, je ne suis pas sûr qu'on y en ait jamais trouvé.

Ce genre habite de préférence les pays chauds de l'ancien continent, tandis que les zygènes préfèrent les pays tempérés où croissent les légumineuses herbacées.

SYNTOMIS PHEGEA. Pl. VI, fig. 8.

S. Alis omnibus nigro-cyaneis micantibus; anticis maculis sex, posticis duabus, diaphanis; abdomine cingulo flavo.

Sphinx phegea, LIN., *Syst. Nat.*, II, 805, 35.

Sphinx phegea, LIN., *Mus. Utr.*, p. 364, n. 24.

Zygæna phegea, FAB., *Mant.*, t. II, p. 101, n. 5.

Zygæna quercus, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 388, 6.

Sphinx phegea, HUBN., *Sphing.*, tab. XX, f. 99 et 100 (la chenille) ; *Larv. Lep.*, II, *Sphing.*, I, f. a. b.

Syntomis phegea, OCHS., *Schmett. von Eur.*, tom. II, p. 105, n. 1.

Syntomis phegea, GOD., *Lépid. de France*, Crép., I, pl. XXII, f. 14, text., p. 154.

Sphinx du pissenlit, ENGR., *Pap d'Eur.*, t. III, pl. CII, f. 147, c. d., p. 67.

Sphinx phegea, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XVII,
f. 1, 2, S. 144.

Sphinx phegea, DRUR., t. I, tab. XXV, f. 2.

Sphinx phegea, SCOP., *Ent. Carn.*, p. 190, n. 430.

Sphinx phegea, BORKH., *Eur. Schmett.*, II, *Th.*, S. 3,
116, 154, n. 1.

Zygæna phegea PETAG., *Inst. Ent.*, t. II, tab. VIII,
f. 3, p. 506.

ROSS., *Faun. Etr.*, t. II, p. 166, n. 1,068.

VARIÉTÉ PREMIÈRE.

*Variet. Alis omnibus atro-cæruleis; anticis maculis tri-
bus rotundatis striolaque transversa versus marginem
interiorem; posticis macula unica; cingulo flavo.*

HUBN., *Sphing.*, tab. V, f. 50

ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XLVII, cont. XXII,
f. 3, fortf., S. 48.

VARIÉTÉ DEUXIÈME.

*Variet. Alis omnibus concoloribus violaceis, singulis ma-
cula utrinque alba; cingulo flavo.*

Sphinx clelia, ESP., *Schmett.*, II, *Th.*, tab. XXXIV,
cont. IX, f. 1.

Sphinx du pissenlit (variété), ENGR., *Pap. d'Eur.*, t.
III, pl. CII, f. 147, e. f., p. 67.

Sphinx clelia, BORKH., *Rhein. Magaz.*, I, B., S.
626, n. 2.

ILLIG., *N. Ausg. des Wien. Verz.*, I, B., S. 46, Zus.

VARIÉTÉ TROISIÈME.

Variet. Alis omnibus concoloribus atro-cæruleis, immaculatis; cingulo flavo.

Sphinx iphimedeæ, Esp., Schmett., II, Th., tab. XLVII, cont. XXII, fortf., S. 49.

VARIÉTÉ QUATRIÈME.

Variet. Alis omnibus fenestratis, nigromarginatis, nervis atris; cingulo flavo.

Cette espèce est un peu plus grande que la *z. ephialtes*, avec laquelle on pourrait la confondre en la voyant voler.

Les ailes sont d'un bleu noirâtre ou verdâtre de part et d'autre, avec six taches blanches un peu transparentes aux supérieures, et deux seulement aux inférieures. Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus. La frange est noire, un peu moins foncée que le fond.

Le corps est de la couleur des ailes, avec le dessus du premier anneau et du cinquième, jaune. On remarque aussi, sur la poitrine, deux taches de cette couleur. Les pattes sont noires; les antennes sont d'un brun noirâtre, depuis leur base jusqu'au-delà du milieu, et ensuite blanchâtres jusqu'au bout.

La femelle est toujours d'un tiers plus grande que le mâle; son abdomen est plus gros, caractère d'ailleurs qui est propre à toutes les espèces de ce genre.

Cette espèce offre plusieurs variétés fort remarqua-

bles : la première est le *sph. phegeus* d'Esper, qui n'a que quatre taches blanches aux ailes antérieures et une aux inférieures.

La seconde, ou *sph. clelia* d'Esper et de Borkhausen, est d'un violet rougeâtre, avec une tache blanche sur chaque aile.

La troisième, ou *sph. iphimedeia* d'Esper, a les quatre ailes d'un bleu noir, sans aucune tache.

La quatrième variété, que j'ai eu occasion d'observer, a les ailes transparentes, avec les contours et les nervures d'un noir bleu.

Dans les trois premières variétés, c'est le fond qui a absorbé plus ou moins les taches; dans la dernière, ce sont les taches qui ont envahi la couleur du fond. Toutes ces variétés, et d'autres qu'on découvrira encore, se rapporteront aisément au type de l'espèce, par le caractère de l'anneau jauné sur le premier et le cinquième segments de l'abdomen.

La chenille est noire, avec de petits tubercules de la même couleur, sur lesquels sont implantés des poils fasciculés, brunâtres, raides et hérissés. La tête et les pattes sont d'un rouge brun. Cette chenille ressemble un peu à celle des *chelonias*, par ses mœurs. Elle vit sur le pissenlit, la scabieuse, et le *plantago lanceolata*. En captivité, selon Ochsenheimer, elle se nourrit très-bien avec les feuilles du *prunus padus*; elle file, sous les feuilles sèches et la mousse, un cocon blanc très-léger. La chrysalide est brune, avec les enveloppes des ailes et le second anneau du ventre jaunâtres; elle

écloît à la fin du printemps, plus tôt ou plus tard, suivant la chaleur de l'année.

Cette espèce est très-commune en Italie, en Sicile, dans le royaume de Naples, dans l'Archipel, etc. On la trouve aussi en Autriche, en Hongrie, en Dalmatie, en Piémont; Hasselquist et Olivier l'ont aussi observée en Perse. M. Vanderlinden m'a assuré l'avoir prise aux environs de Bruxelles, et M. Arsène Maille aux environs de Rouen.

SYNTOMIS SCHOENERRHI. *Mihi*. Pl. VII, fig. 1 (1).

S. Alis omnibus nigris nitidis; anticis maculis sex fenestratis, albis; posticis duabus; collari abdominisque cingulo flavis.

Elle est plus petite d'un tiers que la *phegea*; ses premières ailes sont noires, brillantes, chatoyant en bleu ou en verdâtre, avec six taches transparentes et inégales; une arrondie vers la base, deux plus grandes et carrées au milieu, et trois plus petites et oblongues, vers l'extrémité, dont celle du milieu est la moins apparente.

Les secondes ailes sont du même ton que les supérieures, avec une tache ronde, transparente et assez grande, près de leur base, et une autre très-petite vers l'angle externe.

Le dessous des quatre ailes est un peu moins foncé que le dessus.

(1) Dédicée à M. Schœnerrh de Skara, l'un des entomologistes les plus distingués.

Les antennes sont noires, avec l'extrémité blanche; les palpes, la tête et le corselet, sont d'un noir bleuâtre; le collier est jaune; sur chaque côté de la poitrine, il y a aussi deux taches de cette couleur. L'abdomen est bleuâtre, et séparé du corselet par un demi-cercle jaune; outre cela, il est entouré par un anneau entier de cette dernière couleur, vers son extrémité. Les pattes sont d'un noir brun.

Dans les mâles, les taches de l'extrémité des ailes supérieures sont plus allongées que dans les femelles; ils ont, du reste, les mêmes caractères.

Envoyée du Bengale par MM. Diard et Duvaucel.

SYNTOMIS CYSSEA. Pl. VII, fig. 2.

S. Alis omnibus atris, anticis maculis sex, posticis duabus albis, diaphanis; collari, cinguloque abdominis luteo-aurantiacis.

Sphinx cysseus, CR., *Pap. Exot.*, pl. CCCLV, f. B., p. 124.

Elle est plus petite que la *cerbera*; ses ailes sont noires, brillantes de part et d'autre, avec six taches blanches aux supérieures, savoir : une petite, arrondie à la base; deux plus grandes au milieu, et trois moins grandes, placées transversalement à l'extrémité. Parmi ces trois dernières, celle du milieu est beaucoup plus petite.

Les secondes ailes ont deux taches transparentes, comme celles des supérieures.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, mais il est d'un noir un peu moins foncé.

Les palpes et le collier sont d'un jaune orangé; la tête, le corselet et les pattes, sont noires. L'abdomen est noir en dessus, un peu blanchâtre en dessous, avec le premier et le cinquième anneaux cerclés de jaune orangé; les antennes sont noires, jusqu'au-delà du milieu, et blanchâtres ensuite, jusqu'à l'extrémité.

Je ne connais pas le mâle de cette espèce.

De la côte de Coromandel et du Bengale.

REMARQUE.

Cramer, dans son *Iconographie des Papillons exotiques*, a figuré, sous le nom de *sphinx imaon*, pl. CCXLVIII, f. E., un insecte qui ressemble beaucoup à une *syntomis*; mais comme il lui donne Surinam pour patrie, je n'oserais affirmer qu'il appartînt réellement à ce genre, 1° parce que, comme je l'ai dit en parlant de la *cerbera*, je ne suis pas convaincu que l'on trouve des vraies *syntomis* dans le Nouveau-Monde.

Voilà, au reste, sa description, d'après la figure qu'il en donne :

Elle est de la taille de la *phegea*; ses ailes sont noires de part et d'autre, avec cinq taches transparentes aux supérieures, dont deux oblongues et divergentes à la base, avec une autre très-petite au milieu de l'intervalle qui les sépare, et deux autres, vers l'extrémité, coupées longitudinalement chacune par une nervure.

Les secondes ailes ont à la base une seule tache transparente.

Les antennes sont filiformes, extrêmement grêles (1).

Les premier et cinquième anneaux de l'abdomen sont cerclés de jaune.

C'est à tort qu'Ochsenheimer, *Schmett. von Eur.*, tom. II, p. 111, dans une remarque à la suite de la *syntomis phegea*, rapporte au genre *syntomis* le *sph. atreus* de Cramer. Ce petit insecte a les antennes très-pectinées et vient se placer à côté du genre *charidea* de Dalman, ou *gloucopsis* de Latreille, et rentre évidemment dans ma tribu des *procrides*, qui fera suite à celle des *zygénides*.

SYNTOMIS GODARTII. Pl. VII, fig. 3 (2).

*S. Alis omnibus diaphanis, nervis margineque nigris ;
collari abdominisque cingulo flavis.*

Elle est un peu plus petite que la *cerbera*; ses premières ailes sont diaphanes, avec le pourtour et les nervures noirs, et une tache noirâtre triangulaire, formée par les nervures qui partent de l'extrémité de la cellule.

On pourrait aussi décrire cette espèce en disant qu'elle a les ailes noires, avec sept taches transparentes, c'est-à-dire, en regardant comme des taches particulières chaque espace diaphane compris entre les nervures.

(1) L'exiguité des antennes semblerait prouver qu'il n'a vu qu'un insecte sans antennes, car sur la même planche il donne la *zyg. caffra* avec des antennes semblables.

(2) Dédicée à la mémoire de feu Godart, mon maître et mon ami.

Les secondes ailes ont tout le disque transparent, avec la marge noire.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus. Le bord interne des ailes supérieures est en outre un peu concave.

La frange est brunâtre, peu distincte. Le corselet est d'un noir bleu, ainsi que la tête. Les palpes et le collier sont jaunes; l'abdomen est d'un bleu noirâtre, avec un anneau jaune vers son extrémité, et un demi-anneau de la même couleur vers sa base.

Les pattes sont brunes, plus claires antérieurement.

Le mâle a la bordure des quatre ailes et les nervures d'un noir plus intense que la femelle.

De la côte de Coromandel, du Bengale et des Moluques.

SYNTOMIS OCHSENHEIMERI. *Mihi*. Pl. VII, fig. 4.

S. Alis omnibus diaphanis nervis, margineque nigris; anticis macula nigra triangulari; collari, pectore et abdomine aurantiacis, segmentis ultimis nigris.

Elle a le port et la taille de la *godartii*; ses premières ailes sont transparentes, avec une bordure noire, sinuée intérieurement vers le sommet, mais surtout sur l'avant-dernière nervure, qui est près du bord interne, où elle offre une forte dent noire. On observe, en outre, sur le disque, une tache noire, triangulaire, formée par la réunion des nervures qui partent de la cellule discoïdale.

Le dessous de ces mêmes ailes ne diffère pas du dessus; seulement la bordure est peut-être d'un noir un peu moins foncé. Le bord interne des ailes est plus concave que dans la *godartii*.

Les ailes postérieures sont assez petites, transparentes, et bordées de noir. Leur dessous est en tout semblable à la surface opposée.

Les antennes sont grêles, noires, avec l'extrémité blanche; les palpes sont noirs. Le collier et la poitrine sont d'un rouge orangé. Le corselet est d'un noir bleu, avec les épaulettes un peu jaunâtres. L'abdomen est d'un jaune orangé en dessus et en dessous, avec les quatre derniers anneaux d'un noir-bleu foncé. Les pattes sont d'un jaune roussâtre.

Cette espèce habite le Bengale et l'île de Java.

SYNTOMIS LATREILLEI. *Mihi*. Pl. VII, fig. 5 (1).

S. Alis anticis nigris, cyaneo-micantibus, maculis quinque fenestratis; posticis nigro-cyaneis, macula fenestrata; thorace, segmentisque abdominis flavis.

Elle est de la taille de la *phegea*; ses premières ailes sont d'un noir bleu ou verdâtre, avec six taches transparentes, inégales: une à la base, deux au milieu, et trois autres vers l'extrémité; parmi ces trois dernières, celle du milieu est la plus petite, et ne semble séparée de l'inférieure que par une nervure.

(1) Dédinée au savant entomologiste Latreille.

Les secondes ailes sont de la couleur des supérieures, avec une seule tache transparente près de l'angle externe.

Le dessous des quatre ailes ne diffère en rien du dessus.

Le corselet et la base des premières ailes sont jaunes. L'abdomen et les épaulettes sont d'un noir bleuâtre ou verdâtre, avec six anneaux jaunes.

La tête est noire; les antennes brunes, avec l'extrémité blanche.

Les pattes sont brunes, un peu roussâtres dans leur partie antérieure.

La frange des quatre ailes est d'un brun verdâtre.

Le mâle de cette espèce a les taches un peu plus petites; il offre du reste tous les caractères propres à la femelle.

De Java, d'Amboine, et de la Chine.

SYNTOMIS CERBERA. Pl. VII, fig. 6.

S. Alis omnibus nigro-cæruleis; anticis sex, posticis duabus maculis fenestralis; abdomine cingulis sanguineis.

Sphinx cerbera, DRUR., t. II, pl. XXV, f. 2, p. 53.

Sphinx cerbera, CR., *Pap. Exot.*, pl. LXXXIII, fig. F.

Sphinx cerbera, HUBN., *Sphing.*, tab. XXIII, f. 110.

Sphinx cerbera, LIN., *Syst. Nat.*, I, 2, 806, 38.

LIN., *Mus. Lud. Utr.*, p. 363, n. 23.

Zygæna cerbera, FAB., *Ent. Syst.*, III, 1, 391, 16.
SULZ., *Abgek. Gesch.*, tab. XXIII, f. 110.

Elle est plus petite que la *phegea* ; ses premières ailes sont d'un bleu-noir luisant, avec six taches blanches transparentes et inégales : une à la base, deux plus grandes au milieu, et trois plus petites à l'extrémité, dont les deux placées vers l'angle interne ne sont séparées que par une forte nervure.

Les secondes ailes sont de la même couleur que les supérieures, avec une large tache transparente près de la base, et une autre arrondie et beaucoup plus petite vers l'extrémité.

Le dessous des quatre ailes ne diffère en rien du dessus.

La frange est bleuâtre, excepté à l'angle des ailes supérieures, où elle est d'un beau blanc. Les palpes, la tête, les épaulettes et le corselet, sont d'un noir bleu.

L'abdomen est verdâtre, avec trois et quelquefois quatre anneaux, d'un rouge sanguin, n'entourant le corps qu'en dessus ; la base de l'abdomen a de plus, en dessus, une espèce de fer à cheval du même rouge que les anneaux. La poitrine a deux taches d'un rouge sanguin, sur chaque côté.

Les pattes sont brunes ou noirâtres. Les antennes sont noires avec l'extrémité blanche.

Le mâle est d'un tiers plus petit que la femelle.

Cette *syntomis* habite le cap de Bonne-Espérance, la côte de Guinée, le Sénégal et beaucoup d'autres lieux

d'Afrique. M. Duvaucel l'a envoyée du Bengale. J'ai vu, dans la collection de M. Latreille, un individu noté comme venant du Brésil; mais je crains qu'il n'y ait eu une erreur, car je n'ai point encore vu d'insectes de ce genre recueillis en Amérique.

C'est aussi par erreur que Hubner a donné la figure de cette espèce parmi les lépidoptères européens.

SYNTOMIS PASSALIS.

S. Alis nigris, punctis fenestratis : anticarum sex, posticarum unico; abdominis segmentis alternatim cyaneis et sanguineis.

Zygæna passalis, FAB., *Ent. Syst.*, III. 391, 15.

N'ayant vu cette espèce dans aucune collection, je la décris d'après Fabricius. Elle est à peu près de la taille de la *phegea*; la tête est d'un noir bleu. Le corselet est bleu, avec une tache rousse sur le milieu; l'abdomen est cylindrique, avec six anneaux bleus, et cinq rouges. Les quatre ailes sont noires; les supérieures, dont la base est d'un jaune un peu doré, sont marquées de six taches blanches transparentes.

Les secondes ailes ont une seule tache blanche transparente.

Des Indes orientales.

Je lui trouve de si grands rapports avec la *creüsa*, que je suis porté à croire qu'elle n'en est qu'une variété.

SYNTOMIS CREÛSA. Pl. VII, fig. 7.

S. Alis omnibus nigro-cyaneis; anticis maculis sex fenestratis; posticis macula unicâ; humeris segmentisque abdominis rubris.

Sphinx creûsa, LIN., *Syst. Nat.*, p. 806, n. 39.

CLERCK., *Icon.*, tab. XLVI, f. 5.

Sphinx creûsa, CR., *Pap. Exot.*, pl. CCXLIII, f. F.

Elle est de la taille de la *phegea*; ses premières ailes sont d'un noir bleu, avec six taches blanches transparentes, et le bord interne bordé de roussâtre près de la base.

Les secondes sont du même ton que les supérieures, et offrent, vers leur extrémité, une tache blanche transparente assez petite.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, mais la bordure rouge des supérieures ne reparait pas en dessous. La frange est brune.

Le corselet est d'un noir bleu, avec les épaulettes bordées de rouge. L'abdomen est de la même couleur, et entrecoupé par six anneaux rouges, dont chaque est ponctué de rouge plus foncé.

La tête et les pattes sont brunes; les antennes sont noires avec l'extrémité blanchâtre.

De la côte de Coromandel et du Bengale.

SYNTOMIS THELEBUS.

S. Alis nigris : anticis maculis quinque , posticis brevissimis disco-hyalino ; abdomine flavo, nigro annulato (FAB.).

Zygæna thelebus, FAB., *Ent. Syst.*, III, 391, 19.

Je ne connais pas cette espèce; je la décris d'après Fabricius.

Elle est de la taille de la *cerbera* ; ses premières ailes, qui ont la base un peu jaunâtre, sont noires, avec cinq taches blanches demi-transparentes, et assez grandes.

Les secondes ailes sont très-courtes, du même ton que les supérieures, avec tout le disque blanc et transparent, comme dans la *godartii*.

La tête est jaune, avec les palpes noirs ; le collier est noir ; le corselet est jaune.

L'abdomen est jaune , avec six anneaux noirs.

Les pattes sont noires, avec l'extrémité blanchâtre.

Elle habite la Chine.

Appartient-elle bien à ce genre ?

SYNTOMIS ANNULATA. Pl. VII et VIII, fig. 8-2.

S. Alis anticis nigris, micantibus, maculis quinque luteis, subfenestratis ; posticis nigris , maculis duabus luteis, basali majore; collari, segmentisque abdominis alternim luteis.

Zygæna annulata, FAB., *Ent. Syst.*, III, 389, 11.

Elle est de la taille de la *phegea* ; ses premières ailes sont noires chatoyantes, avec cinq taches d'un jaune orangé (quelquefois un peu transparentes), irrégulières : l'une est à la base, et les autres sont disposées deux par deux ; mais les deux qui avoisinent le sommet sont séparées en deux par une nervure dans la femelle, tandis que, dans le mâle, la tache qui est tout-à-fait au sommet, étant beaucoup plus petite, n'est point partagée par la nervure.

Les secondes ailes sont noires, avec deux taches jaunes, dont une grande à la base, et une autre moins grande, vers l'extrémité, et divisée par une nervure.

Le dessous ne diffère du dessus qu'en ce que les taches y sont un tant soit peu plus pâles.

Les palpes et le collier sont d'un jaune orangé. La tête et le corselet sont noirs, de même que l'abdomen, qui est entrecoupé par six anneaux d'un jaune orangé. L'anus est terminé par des poils de cette dernière couleur, mais un peu plus pâles.

Les pattes sont noires ; les antennes, du noir bleu, avec l'extrémité blanche.

La frange des quatre ailes est d'un noir brun.

Outre la différence sexuelle que j'ai signalée ci-dessus, les mâles ont ordinairement les taches moins foncées, et celle de la base des ailes inférieures est beaucoup plus petite. Cependant, parmi le grand nombre d'exem-

plaires que j'ai eus sous les yeux, j'ai rencontré un grand individu mâle, venant de Timor, chez qui toutes les taches sont d'une couleur très-intense, avec celle de la base des inférieures fort grandes.

Cette espèce a été rapportée de Timor par Péron et Lesueur, et de la Nouvelle-Hollande par M. Durville, qui l'a prise abondamment aux environs de Port-Jackson. Ce dernier l'a aussi retrouvée à Dory.

SYNTOMIS FENESTRATA. Pl. VIII, fig. 1.

S. Alis omnibus nigris; anticis nervis aurantiacis maculisque quinque fenestratis; posticis maculis binis; thorace abdomineque aurantiacis, cingulis atris.

Sphinx fenestrata, DRUR., tom. II, pl. XXVIII, f. 5, text., p. 50.

Zygæna fenestrata, FAB., *Ent. Syst.*, III, 392, 20.

Elle est de la taille de la *phegea*; ses premières ailes sont noires, à reflet bleuâtre, avec les trois principales nervures orangées, et quatre taches transparentes et inégales, savoir : une grande à la base, coupée transversalement en deux par une espèce de tache noire, plus foncée que la teinte générale; une autre, cunéiforme ou en triangle très-allongé, remplit en partie la cellule; les deux autres sont vers l'extrémité, et coupées longitudinalement par une nervure noire.

Les secondes ailes sont noires, avec deux taches trans-

parentes, séparées par une forte nervure. Le dessous des quatre ailes est brun, avec les taches parfaitement semblables à celles de la surface opposée. La frange est brunâtre aux premières ailes, et un peu plus foncée aux secondes.

Les palpes, le collier, le corselet et l'abdomen, sont d'un jaune orangé. La tête est noire. Il y a sur les épaulettes une ligne, et sur le corselet, une tache cordiforme, de cette dernière couleur. L'abdomen est entrecoupé par six anneaux noirs, et a, de plus, la moitié d'un anneau noir à sa base en dessus.

La poitrine est marquée de jaune orangé; les pattes sont brunes, entrecoupées de jaune; les antennes sont noires, avec l'extrémité blanche.

De la Chine et des Philippines.

Fabricius cite, avec un point de doute, à la vérité, le *sphinx telebus* de Cramer comme synonyme; mais c'est un insecte qui appartient à la tribu des *procrides*.

SYNTOMIS POLYDAMON. Pl. VIII, fig. 3.

S. Alis omnibus nigris anticis; maculis novem, luteis, subdiaphanis; posticis maculis majoribus luteis; abdomine virescente, elongato.

Sphinx polydamon, CR., *Pap. Exot.*, pl. CCXXXVII, fig. B.

Cette espèce est un peu plus grande que l'*annulata*;

ses premières ailes sont larges, très-noires de part et d'autre, avec neuf taches jaunes demi-transparentes, et un peu lavées de blanchâtre ; celle de la base est petite, cunéiforme ; celle qui vient ensuite est arrondie ; celle qui est vers la côte, dans le milieu de l'aile, est quadrilatère ; les autres sont disposées parallèlement vers l'extrémité de l'aile.

Les secondes ailes sont noires, avec le disque presque entièrement jaune, et divisé en plusieurs tâches par les nervures.

Le dessous des quatre ailes présente le même dessin que le dessus, mais les taches y sont plus fortement lavées de blanc, et la couleur noire y est moins foncée. La frange est brune.

Le corselet et l'abdomen sont verdâtres, brillans, avec cinq anneaux d'un jaune orangé.

Les pattes sont brunes, les antennes noires, avec l'extrémité blanche.

Cette belle *syntomis* se distingue de toutes les autres espèces par son corps long et grêle, et par ses ailes larges ; elle habite la Cafrerie, le pays des Hottentots et le cap de Bonne-Espérance.

SYNTOMIS SPERBIUS.

S. Alis atris ; anticis maculis quinque, posticis unica fenestratis ; abdomine atro, fasciis duabus flavis ; fronte alba (FAB.).

Zygæna sperbius, FAB., *Ent. Syst.*, III, 392, 20.

Je n'ai vu de cette espèce qu'un individu tellement défectueux, que je n'ai pu le faire figurer; j'aime mieux la décrire, en m'aidant de Fabricius, que d'en donner une figure méconnaissable.

Elle est de la taille de la *cerbera*. Les premières ailes sont noires, luisantes, avec cinq taches blanches transparentes. Les secondes sont du même ton que les supérieures, avec une seule tache blanche et transparente. La tête est noire, avec le front blanchâtre. Le corselet est d'un noir un peu bleuâtre, avec le milieu jaune. Le corps est noir, avec un anneau à la base, et un autre sur le milieu, jaunes. L'anus est d'un blanc jaunâtre, et les antennes noires, avec le sommet blanc.

Le dessous ne diffère pas du dessus, autant que j'ai pu en juger sur le mauvais individu que je possède.

Elle habite l'île de Java et la Chine, d'après Fabricius.

SYNTOMIS HUBNERI. *Mihi*. Pl. VIII, fig. 4.

S. Alis omnibus nigris; anticis maculis quinque fenestratis, posticis duabus; collari, humeris segmentisque abdominis luteo-aurantiacis (minima).

Cette espèce est la plus petite de toutes celles qui me sont connues; son envergure égale à peine celle de la *z. fausta*. Ses premières ailes sont noires de part et

d'autre, avec cinq taches transparentes et inégales, dont une très-petite à la base, deux triangulaires au milieu, et deux oblongues à l'extrémité; ces deux dernières sont séparées chacune en deux parties égales par une nervure noire.

Les secondes ailes sont de la même couleur que les supérieures, avec deux taches transparentes, dont une, beaucoup plus grande, à la base, et une autre, beaucoup plus petite, vers l'extrémité.

Le dessous des quatre ailes est un peu plus clair que le dessus. La frange est d'un noir brun, peu distinct de la couleur du fond.

Les palpes, le collier et les épaulettes, sont d'un jaune orangé. La tête et le corselet sont noirs, avec une tache jaunâtre sur celui-ci. L'abdomen est noir, avec six anneaux entiers, et un demi-anneau à la base, d'un jaune orangé. L'anus est noirâtre.

Les pattes sont brunes; les antennes noires, avec leur extrémité blanchâtre.

La femelle diffère du mâle, en ce qu'elle a les taches des ailes supérieures plus grandes, en ce qu'aux ailes inférieures les deux taches sont réunies, et envahissent presque tout le disque; l'anus de cette dernière offre aussi quelques poils jaunâtres. Parmi les femelles que j'ai observées, toutes ne présentaient pas ce dernier caractère, ce qui me porte à croire que celles chez lesquelles il se rencontre sont une variété locale.

Elle se trouve à Amboine et à Java.

GENRE PSICHOTOE. *Mihi.*

Antennæ crassiusculæ, cylindricæ, medio subcrassiores ex articulis moniliformibus, distinctissimis, compositæ; palpi brevissimi, hirsuti oculos vix attingentes; abdomen complanatum, dilatatum : alæ horizontales, subnudæ; tibiæ calcares breves.

Antennes moniliformes, cylindriques, un peu plus épaisses au milieu, composées d'articles très-distincts. Palpes très-courts, poilus, à articles peu distincts, atteignant à peine les yeux; abdomen aplati, plus large à son extrémité; jambes munies d'ergots courts et coniques; ailes horizontales, demi-transparentes (port d'un *psyche*).

PSICHOTOE DUVAUCELII. *Mihi.*

P. Alis omnibus atris subdiaphanis; corpore hirsuto; scutello annuloque flavis.

Ce petit lépidoptère est à peine de la taille de la *z. fausta*. Ses quatre ailes sont noirâtres, presque diaphanes, avec les nervures très-distinctes, tant en dessus qu'en dessous. La base des premières ailes est un peu plus noire que le reste de leur surface.

Les palpes sont très-noirs, de même que les antennes, qui sont moniliformes, et qui paraissent légèrement velues, en les voyant de côté avec une forte loupe.

Le corselet est velu, d'un noir brun.

L'abdomen est velu, noir, avec une tache jaune à la base en dessus, et un anneau de la même couleur vers l'extrémité.

Le dessous ne diffère du dessus que par l'absence de la petite tache jaune qui existe en dessus à la base de l'abdomen.

Les deux sexes sont semblables, à l'exception que le mâle a l'abdomen plus velu. Ce petit insecte, au premier coup d'œil, serait facilement pris pour un *psyche*, si ses antennes étaient détruites.

Trouvé au Bengale par MM. Diard et Duvaucel.

1. *Pieris*

2. *Pieris*

3. *Pieris*

4. *Pieris*

5. *Pieris*

6. *Pieris*

7. *Pieris*

8. *Pieris*

9. *Pieris*

TABLE I

Physical Properties		Chemical Analysis	
Boiling point	100°C	Carbon	68.5%
Melting point	15°C	Hydrogen	11.5%
Density	0.81	Nitrogen	1.0%
Refractive index	1.42	Oxygen	1.0%
Viscosity	0.5 cP	Sulfur	0.5%
Surface tension	25 dyne/cm	Chlorine	0.5%
Heat of vaporization	10 kcal/mole	Fluorine	0.5%
Heat of fusion	2 kcal/mole	Iodine	0.5%
Heat of combustion	1000 kcal/mole	Bromine	0.5%
Heat of formation	-10 kcal/mole	Phosphorus	0.5%
Heat of polymerization	-5 kcal/mole	As	0.5%
Heat of solution	5 kcal/mole	Sb	0.5%
Heat of hydration	10 kcal/mole	Bi	0.5%
Heat of crystallization	2 kcal/mole	Pb	0.5%
Heat of sublimation	10 kcal/mole	Sn	0.5%
Heat of condensation	10 kcal/mole	Cu	0.5%
Heat of evaporation	10 kcal/mole	Zn	0.5%
Heat of liquefaction	10 kcal/mole	Fe	0.5%
Heat of solidification	2 kcal/mole	Ni	0.5%
Heat of melting	2 kcal/mole	Co	0.5%
Heat of vaporization	10 kcal/mole	Mn	0.5%
Heat of fusion	2 kcal/mole	Mg	0.5%
Heat of combustion	1000 kcal/mole	Al	0.5%
Heat of formation	-10 kcal/mole	Si	0.5%
Heat of polymerization	-5 kcal/mole	B	0.5%
Heat of solution	5 kcal/mole	Be	0.5%
Heat of hydration	10 kcal/mole	Li	0.5%
Heat of crystallization	2 kcal/mole	Na	0.5%
Heat of sublimation	10 kcal/mole	K	0.5%
Heat of condensation	10 kcal/mole	Rb	0.5%
Heat of evaporation	10 kcal/mole	Cs	0.5%
Heat of liquefaction	10 kcal/mole	Ba	0.5%
Heat of solidification	2 kcal/mole	Ca	0.5%
Heat of melting	2 kcal/mole	Sc	0.5%
Heat of vaporization	10 kcal/mole	Y	0.5%
Heat of fusion	2 kcal/mole	La	0.5%
Heat of combustion	1000 kcal/mole	Ce	0.5%
Heat of formation	-10 kcal/mole	Pr	0.5%
Heat of polymerization	-5 kcal/mole	Nd	0.5%
Heat of solution	5 kcal/mole	Pm	0.5%
Heat of hydration	10 kcal/mole	Sm	0.5%
Heat of crystallization	2 kcal/mole	Eu	0.5%
Heat of sublimation	10 kcal/mole	Gd	0.5%
Heat of condensation	10 kcal/mole	Tb	0.5%
Heat of evaporation	10 kcal/mole	Dy	0.5%
Heat of liquefaction	10 kcal/mole	Ho	0.5%
Heat of solidification	2 kcal/mole	Er	0.5%
Heat of melting	2 kcal/mole	Tm	0.5%
Heat of vaporization	10 kcal/mole	Yb	0.5%
Heat of fusion	2 kcal/mole	Lu	0.5%
Heat of combustion	1000 kcal/mole	Hf	0.5%
Heat of formation	-10 kcal/mole	Ta	0.5%
Heat of polymerization	-5 kcal/mole	W	0.5%
Heat of solution	5 kcal/mole	Re	0.5%
Heat of hydration	10 kcal/mole	Os	0.5%
Heat of crystallization	2 kcal/mole	Ir	0.5%
Heat of sublimation	10 kcal/mole	Pt	0.5%
Heat of condensation	10 kcal/mole	Au	0.5%
Heat of evaporation	10 kcal/mole	Hg	0.5%
Heat of liquefaction	10 kcal/mole	Tl	0.5%
Heat of solidification	2 kcal/mole	Pb	0.5%
Heat of melting	2 kcal/mole	Bi	0.5%
Heat of vaporization	10 kcal/mole	Po	0.5%
Heat of fusion	2 kcal/mole	At	0.5%
Heat of combustion	1000 kcal/mole	Ac	0.5%
Heat of formation	-10 kcal/mole	Th	0.5%
Heat of polymerization	-5 kcal/mole	Pa	0.5%
Heat of solution	5 kcal/mole	U	0.5%
Heat of hydration	10 kcal/mole	Np	0.5%
Heat of crystallization	2 kcal/mole	Pu	0.5%
Heat of sublimation	10 kcal/mole	Am	0.5%
Heat of condensation	10 kcal/mole	Cm	0.5%
Heat of evaporation	10 kcal/mole	Bk	0.5%
Heat of liquefaction	10 kcal/mole	Cf	0.5%
Heat of solidification	2 kcal/mole	Es	0.5%
Heat of melting	2 kcal/mole	Fm	0.5%
Heat of vaporization	10 kcal/mole	Md	0.5%
Heat of fusion	2 kcal/mole	No	0.5%
Heat of combustion	1000 kcal/mole	Lr	0.5%
Heat of formation	-10 kcal/mole		
Heat of polymerization	-5 kcal/mole		
Heat of solution	5 kcal/mole		
Heat of hydration	10 kcal/mole		
Heat of crystallization	2 kcal/mole		
Heat of sublimation	10 kcal/mole		
Heat of condensation	10 kcal/mole		
Heat of evaporation	10 kcal/mole		
Heat of liquefaction	10 kcal/mole		
Heat of solidification	2 kcal/mole		
Heat of melting	2 kcal/mole

P. Dumeril. Thresor

Plac. Sculpt.

1 <i>Cocytia</i> <i>Durvili</i> .	4 <i>Thyris</i> <i>Fenestrina</i> .
2 <i>Hecatesia</i> <i>Fenestrata</i> .	5 <i>Thyris</i> <i>Vitrina</i> .
3 <i>Ægocera</i> <i>Venulia</i> .	6 <i>Zygæna</i> <i>Erythrus</i> .
7 <i>Zygæna</i> <i>Minor</i> femelle.	

P. Dumenil Drexel.

P. Sculpit.

1 *Zygaena lathyri*.2 *Punctum*.3 *Briza*.4 *Pluto*.5 *Zygaena balearica*.6 *Scabiosa*.7 *Sarpedon* mâle.8 *Sarpedon* femelle.

P. Dumeril Diderot.

Plac. Nulpsit

1 *Zygaena Achilleae* femelle.2 *Achilleae* fem^{lle} (var).3 *Exulans*.4 *Cynarae* femelle.5 *Zygaena Meliloti* femelle.6 *Cuvieri* femelle.7 *Trifolii* mâle.8 *Lonicerae* femelle (var).

P. Dumenil Drexler.

Plée Sculpteur

1 *Zygæna Filipendulæ.*

5 *Zygæna Medicaginis.*

2 *Angelicæ.*

6 *Peucedani.*

3 *Transalpina fem. (var.).*

7 *Hippocrepidis.*

4 *Charon.*

8 *Anthyllidis femelle*

F. Dumeril D'arsé

Barrois Sculpt.

1. *Zygæna cyffra*.
2. *Corsica*.
3. *Stæchadis*.
4. *Lavandula*.

5. *Zygæna ephialtes* var. *falcata*.
6. *ephialtes* var. *trigonellæ*.
7. *Oxytropis*.
8. *Rhadamanthus*.

P. Damsel. Direct.

P. Damsel. Direct.

1 *Zygæna Onobrychis*.5 *Zygæna Hilaris*.2 *Onobrychis* (var. *Luteola*)6 *Fausta*.3 *Ocellannica*.7 *Læta*.4 *Olivieri*.8 *Syntomis Phœgea*.

P. Dumeril. Dessin.

P. de Sulpis.

1	<i>Syntomis Schönerrii</i> .	5	<i>Syntomis Latredlei</i> .
2	<i>Cyssea</i> .	6	<i>Cerbera</i> .
3	<i>Godarti</i> .	7	<i>Creusa</i> .
4	<i>Ochsenheimeri</i> .	8	<i>Annulata male</i> .

T. Duvauclii Duvauclii

Pl. 8.

1	<i>Syntomis fenestrata</i> .	4	<i>Syntomis hubneri</i> .
2	<i>Annulata</i> , fem ^{le} .	5	<i>Psychotoc duvaucelii</i> .
3	<i>Polydamon</i> .	6	Antenne de <i>Psychotoc</i> .
	7 <i>Zygana anthina</i> .		

12173

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

595.788636E

C001

ESSAI SUR UNE MONOGRAPHIE DES ZYGENIDES\$

3 0112 010060751