IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

**CIHM/ICMH
Microfiche
Series.**

**CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.**

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1985

Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- ☐ Coloured covers/
Couverture de couleur
- ☐ Covers damaged/
Couverture endommagée
- ☐ Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- ☐ Cover title missing/
Le titre de couverture manque
- ☐ Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur
- ☐ Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- ☐ Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur
- ☐ Bound with other material/
Relié avec d'autres documents
- ☒ Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distortion le long de la marge intérieure
- ☐ Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.
- ☒ Additional comments:
Commentaires supplémentaires: Les pages froissées peuvent causer de la distortion.

- ☐ Coloured pages/
Pages de couleur
- ☒ Pages damaged/
Pages endommagées
- ☐ Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées
- ☒ Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées
- ☐ Pages detached/
Pages détachées
- ☒ Showthrough/
Transparence
- ☐ Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression
- ☐ Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire
- ☐ Only edition available/
Seule édition disponible
- ☐ Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	14X	18X	22X	26X	30X
☐	☐	☒	☐	☐	☐
12X	16X	20X	24X	28X	32X

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

Seminary of Quebec
Library

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol → (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

e
étails
s du
modifier
r une
image

s

errata
to

pelure,
on à

32X

S

H

SUPPLÉMENT

À

L'HISTOIRE NATURELLE.

Tome Premier.

166

THE MUSEUM

OF THE HISTORY OF THE

ARTS AND SCIENCES

OF THE CITY OF LONDON

AND OF THE

GÉ

Serv

Par

J

&

S

c

DE

En Vbl. C. P. Descheneau

HISTOIRE NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,
servant de suite à la Théorie de la Terre;
& d'introduction à l'histoire
des Minéraux.

Par M. le Comte DE BUFFON, Intendant du
Jardin du Roi, de l'Académie Française,
& de celle des Sciences, &c.

SUPPLÉMENT, Tome Premier.

Séminaire de Québec

A PARIS
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXIV.

TABLE

De ce qui est contenu dans
ce Volume.

D. E. S. É L É M E N. S.

I.^{re} PARTIE. *D*E la Lumière , de
la Chaleur & du Feu.... page 1

II.^{me} PARTIE. *D*e l'Air , de l'Eau
& de la Terre 110

Réflexions sur la Loi de l'Attrac-
tion 177

Partie Expérimentale . . . 201

PREMIER MÉMOIRE. *Expériences*
sur le progrès de la chaleur dans
les corps 204

T A B L E.

SECOND MÉMOIRE. *Suite des*
Expériences sur le progrès de la
chaleur dans les différentes sub-
stances minérales 244

TABLE des Rapports du refroidis-
sment des différentes substances
minérales. 393

FIN de la Table.

HISTOIRE

ite des
ès de la
es sub-
• • 244
efroidif-
stances
• • 393

HISTOIRE NATURELLE.

INTRODUCTION

À
L'HISTOIRE DES MINÉRAUX.

DES ÉLÉMENTS.

PREMIÈRE PARTIE.
*De la LUMIÈRE, de la CHALEUR
& du FEU.*

LES PUISSANCES de la Nature ;
autant qu'elles nous sont connues, peuvent
se réduire à deux forces primitives, celle
qui cause la pesanteur, & celle qui produit
Supplément. Tome I.

A

HISTOIRE

2 Introduction à l'Histoire

la chaleur. La force d'impulsion leur est subordonnée, elle dépend de la première pour les effets particuliers, & tient à la seconde pour l'effet général; comme l'impulsion ne peut s'exercer qu'au moyen du ressort, & que le ressort n'agit qu'en vertu de la force qui rapproche les parties éloignées, il est clair que l'impulsion a besoin, pour opérer, du concours de l'attraction, car si la matière cessoit de s'attirer, si les corps perdoient leur cohérence, tout ressort ne seroit-il pas détruit, toute communication de mouvement interceptée, toute impulsion nulle? puisque, dans le fait (a), le mouvement ne se communique & ne peut se transmettre d'un corps à un autre que par l'élasticité; qu'enfin on peut démontrer qu'un corps parfaitement dur, c'est-à-dire absolument inflexible, seroit en même temps absolument immobile & tout-à-fait incapable de recevoir l'action d'un autre corps (b).

(a) Pour une plus grande intelligence, je prie mes Lecteurs de revoir la seconde partie de l'article de cet ouvrage, qui a pour titre: *De la Nature, seconde partie*.

(b) La communication du mouvement a toujours été regardée comme une vérité d'expérience, & les

des Minéraux, I.^{re} Partie. 3

L'attraction étant un effet général, constant & permanent, l'impulsion qui, dans la plupart des corps, est particulière, & n'est ni constante, ni permanente, en dépend

plus grands Mathématiciens se sont contentés d'en calculer les résultats dans les différentes circonstances, & nous ont donné sur cela des règles & des formules, où ils ont employé beaucoup d'art ; mais personne, ce me semble, n'a jusqu'ici considéré la nature intime du mouvement, & n'a tâché de se représenter & de présenter aux autres la manière physique dont le mouvement se transmet & passe d'un corps à un autre corps. On a prétendu que les corps durs pouvoient le recevoir comme les corps à ressort, & sur cette hypothèse dénuée de preuves, on a fondé des propositions & des calculs dont on a tiré une infinité de fausses conséquences. Car les corps supposés durs & parfaitement inflexibles, ne pourroient recevoir le mouvement. Pour le prouver, soit un globe parfaitement dur, c'est-à-dire inflexible dans toutes ses parties, chacune de ces parties ne pourra par conséquent être rapprochée ou éloignée de la partie voisine, sans quoi cela seroit contre la supposition ; donc, dans un globe parfaitement dur, les parties ne peuvent recevoir aucun déplacement, aucun changement, aucune action ; car si, elles recevoient une action, elles auroient une réaction, les corps ne pouvant réagir qu'en agissant. Puis donc que toutes les parties prises séparément ne peuvent recevoir aucune action, elles ne peuvent en communiquer ; la partie postérieure, qui est frappée la première, ne

4 *Introduction à l'Histoire*

donc comme un effet particulier dépend d'un effet général ; car au contraire, si toute impulsion étoit détruite, l'attraction subsisteroit & n'en agiroit pas moins, tandis que celle-ci venant à cesser, l'autre seroit non-seulement sans exercice, mais même sans existence ; c'est donc cette différence

pourra pas communiquer le mouvement à la partie antérieure, puisque cette partie postérieure, qui a été supposée inflexible, ne peut pas changer, eu égard aux autres parties ; donc il seroit impossible de communiquer aucun mouvement à un corps inflexible. Mais l'expérience nous apprend qu'on communique le mouvement à tous les corps ; donc tous les corps sont à ressort, donc il n'y a point de corps parfaitement durs & inflexibles dans la Nature. Un de mes amis (M. Guénéau de Montbeillard), homme d'un excellent esprit, m'a écrit à ce sujet dans les termes suivans. « De la supposition de l'immobilité absolue des corps absolument durs, il suit qu'il ne faudroit peut être qu'un pied cube de cette matière pour arrêter tout le mouvement de l'Univers connu : & si cette immobilité absolue étoit prouvée, il semble que ce n'est point assez de dire qu'il n'existe point de ces corps dans la Nature, & qu'on peut les traiter d'impossibles, & dire que la supposition de leur existence est absurde, car le mouvement provenant du ressort leur ayant été refusé, ils ne peuvent dès-lors être capables du mouvement provenant de l'attraction, qui est par l'hypothèse la cause du ressort. »

lier dépend
aire, si toute
raction sub-
oins, tandis
autre seroit
mais même
e différence

ment à la partie
ieure, qui a été
nger, eu égard
ossible de com-
corps inflexible.
n communique
c tous les corps
corps parfaite-
re. Un de mes
ard), homme
sujet dans les
de l'immobilité
rs, il suit qu'il
cube de cette
ement de l'U-
té absolue étoit
point assez de
ps dans la Na-
impossibles, &
istence est ab-
nant du ressort
ut des lors être
nt de l'attrac-
du ressort."

des Minéraux, I.^{re} Partie. 5

essentielle qui subordonne l'impulsion à l'attraction dans toute matière brute & purement passive.

Mais cette impulsion qui ne peut ni s'exercer ni se transmettre dans les corps bruts qu'au moyen du ressort, c'est-à-dire, du secours de la force d'attraction, dépend encore plus immédiatement, plus généralement de la force qui produit la chaleur, car c'est principalement par le moyen de la chaleur que l'impulsion pénètre dans les corps organisés, c'est par la chaleur qu'ils se forment, croissent & se développent. On peut rapporter à l'attraction seule tous les effets de la matière brute & à cette même force d'attraction jointe à celle de la chaleur, tous les phénomènes de la matière vive.

J'entends par matière vive, non-seulement tous les êtres qui vivent ou végètent, mais encore toutes les molécules organiques vivantes, dispersées & répandues dans les détrimens ou résidus des corps organisés; je comprends encore dans la matière vive celle de la lumière, du feu, de la chaleur, en un mot toute matière qui nous paroît être active par elle-même.

6 *Introduction à l'Histoire*

Or cette matière vive tend toujours vers le centre à la circonférence, au lieu que la matière brute tend au contraire de la circonférence au centre ; c'est une force expansive qui anime la matière vive, & c'est une force attractive à laquelle obéit la matière brute : quoique les directions de ces deux forces soient diamétralement opposées, l'action de chacune ne s'en exerce pas moins ; elles se balancent sans jamais se détruire, & de la combinaison de ces deux forces également actives résultent tous les phénomènes de l'Univers.

Mais, dira-t-on, vous réduisez toutes les puissances de la Nature à deux forces, l'une attractive & l'autre expansive, sans donner la cause ni de l'une ni de l'autre, & vous subordonnez à toutes deux l'impulsion qui est la seule force dont la cause nous soit connue & démontrée par le rapport de nos sens ; n'est-ce pas abandonner une idée claire, & y substituer deux hypothèses obscures ?

A cela je réponds que, ne connoissant rien que par comparaison, nous n'aurons jamais d'idée de ce qui produit un effet général, parce que cet effet appartenant à tout, on ne peut dès-lors le comparer à

rien. Demander quelle est la cause de la force attractive, c'est exiger qu'on nous dise la raison pourquoi toute la matière s'attire : or ne nous suffit-il pas de savoir que réellement toute la matière s'attire, & n'est-il pas aisé de concevoir que cet effet étant général, nous n'avons nul moyen de le comparer, & par conséquent nulle espérance d'en connoître jamais la cause ou la raison ? Si l'effet, au contraire, étoit particulier comme celui de l'attraction de l'aimant & du fer, on doit espérer d'en trouver la cause, parce qu'on peut le comparer à d'autres effets particuliers, ou le ramener à l'effet général. Ceux qui exigent qu'on leur donne la raison d'un effet général, ne connoissent ni l'étendue de la Nature ni les limites de l'esprit humain : demander pourquoi la matière est étendue, pesante, impénétrable, sont moins des questions que des propos mal conçus, & auxquels on ne doit aucune réponse. Il en est de même de toute propriété particulière lorsqu'elle est essentielle à la chose : demander, par exemple, pourquoi le rouge est rouge, seroit une interrogation puérile, à laquelle on ne doit pas répondre. Le

Philosophe est tout près de l'enfant lorsqu'il fait de semblables demandes, & autant on peut les pardonner à la curiosité non réfléchie du dernier, autant le premier doit les rejeter & les exclure de ses idées.

Puis donc que la force d'attraction & la force d'expansion sont deux effets généraux, on ne doit pas nous en demander les causes; il suffit qu'ils soient généraux & tous deux réels, tous deux bien constatés, pour que nous devions les prendre eux-mêmes pour causes des effets particuliers, & l'impulsion est un de ces effets qu'on ne doit pas regarder comme une cause générale connue ou démontrée par le rapport de nos sens, puisque nous avons prouvé que cette force d'impulsion ne peut exister ni agir qu'au moyen de l'attraction qui ne tombe point sous nos sens. Rien n'est plus évident, disent certains Philosophes, que la communication du mouvement par l'impulsion, il suffit qu'un corps en choque un autre pour que cet effet suive; mais, dans ce sens même, la cause de l'attraction n'est-elle pas encore plus évidente & bien plus générale, puisqu'il suffit d'abandonner un corps pour qu'il tombe & prenne du mouvement sans

choc? le mouvement appartient donc, dans tous les cas, encore plus à l'attraction qu'à l'impulsion.

Cette première réduction étant faite, il seroit peut-être possible d'en faire une seconde, & de ramener la puissance même de l'expansion à celle de l'attraction, en sorte que toutes les forces de la matière dépendroient d'une seule force primitive: du moins cette idée me paroîtroit bien digne de la sublime simplicité du plan sur lequel opère la Nature. Or ne pouvons-nous pas concevoir que cette attraction se change en répulsion toutes les fois que les corps s'approchent d'assez près pour éprouver un frottement ou un choc des uns contre les autres. L'impénétrabilité qu'on ne doit pas regarder comme une force, mais comme une résistance essentielle à la matière, ne permettant pas que deux corps puissent occuper le même espace, que doit-il arriver lorsque deux molécules, qui s'attirent d'autant plus puissamment qu'elles s'approchent de plus près, viennent tout-à-coup à se heurter? cette résistance invincible de l'impénétrabilité ne devient-elle pas alors une force

active, ou plutôt réactive, qui, dans le contact, repousse les corps avec autant de vitesse qu'ils en avoient acquis au moment de se toucher: & dès-lors la force expansive ne sera point une force particulière opposée à la force attractive, mais un effet qui en dérive, & qui se manifeste toutes les fois que les corps se choquent ou frottent les uns contre les autres.

J'avoue qu'il faut supposer dans chaque molécule de matière, dans chaque atome quelconque, un ressort parfait, pour concevoir clairement comment s'opère ce changement de l'attraction en répulsion; mais cela même nous est assez indiqué par des faits: plus la matière s'atténue & plus elle prend de ressort; la terre & l'eau, qui en sont les agrégats les plus grossiers, ont moins de ressort que l'air; & le feu qui est le plus subtil des élémens, est aussi celui qui a le plus de force expansive. Les plus petites molécules de la matière, les plus petits atomes que nous connoissons sont ceux de la lumière; & l'on sait qu'ils sont parfaitement élastiques, puisque l'angle sous lequel la lumière se réfléchit est toujours égal à celui sous lequel elle arrive: nous pouvons donc en inférer que

i, dans le
avec autant
acquis au
ors la force
ce particu-
ctive, mais
e manifeste
e choquent
utres.

ans chaque
que atome
pour con-
opère ce
répulsion;
ndiqué par
ue & plus
l'eau, qui
grossiers,
& le feu
s, est aussi
expansive.
a matière,
s connois-
& l'on fait
es, puisque
e réfléchir
quel elle
nferer que

des Minéraux, I.^{re} Partie. 11

toutes les parties constitutives de la matière en général sont à ressort parfait, & que ce ressort produit tous les effets de la force expansive, toutes les fois que les corps se heurtent ou se frottent en se rencontrant dans des directions opposées.

L'expérience me paroît parfaitement d'accord avec ces idées; nous ne connoissons d'autres moyens de produire du feu que par le choc ou le frottement des corps; car le feu que nous produisons par la réunion des rayons de la lumière, ou par l'application du feu déjà produit à des matières combustibles, n'a-t-il pas néanmoins la même origine à laquelle il faudra toujours remonter, puisqu'en supposant l'homme sans miroirs ardents & sans feu actuel, il n'aura d'autres moyens de produire le feu qu'en frottant ou choquant des corps solides les uns contre les autres (c)?

La force expansive pourroit donc bien n'être, dans le réel, que la réaction de la

(c) Le feu que produit quelquefois la fermentation des herbes empuées, celui qui se manifeste dans les effervescences, ne sont ni une exception qu'on puisse m'opposer, puisque cette réaction

12 Introduction à l'Histoire

force attractive ; réaction qui s'opère toutes les fois que les molécules primitives de la matière, toujours attirées les unes par les autres, arrivent à se toucher immédiatement ; car dès-lors il est nécessaire qu'elles soient repoussées avec autant de vitesse qu'elles en avoient acquis en direction contraire au moment du contact (*d*),

du feu par la fermentation & par l'effervescence, dépend, comme tout autre, de l'action du choc des parties de la matière, les unes contre les autres.

(*d*) Il est certain, me dira-t-on, que les molécules réjailliront après le contact, parce que leur vitesse à ce point, & qui leur est rendue par le ressort, est la somme des vitesses acquises dans tous les momens précédens, par l'effet continuel de l'attraction, & par conséquent doit l'emporter sur l'effort instantané de l'attraction dans le seul moment du contact. Mais ne sera-t-elle pas continuellement retardée, & enfin détruite, lorsqu'il y aura équilibre entre la somme des efforts de l'attraction avant le contact, & la somme des efforts de l'attraction après le contact ? Comme cette question pourroit faire naître des doutes ou laisser quelques nuages sur cet objet, qui par lui-même est difficile à saisir, je vais tâcher d'y satisfaire, en m'expliquant encore plus clairement. Je suppose deux molécules, ou, pour rendre l'image plus sensible, deux grosses masses de matière, telles que la Lune & la Terre, toutes deux douées d'un ressort parfait dans toutes

& lorsque ces molécules sont absolument libres de toute cohérence, & qu'elles

les parties de leur intérieur, qu'arriveroit-il à ces deux masses isolées de toute autre matière, si tout leur mouvement progressif étoit tout-à-coup arrêté, & qu'il ne restât à chacune d'elles que leur force d'attraction réciproque ? Il est clair que, dans cette supposition, la Lune & la Terre se précipiteroient l'une vers l'autre, avec une vitesse qui augmenteroit à chaque moment, dans la même raison que diminueroit le carré de leur distance. Les vitesses acquises seront donc immenses au point de contact, ou, si l'on veut, au moment de leur choc, & dès-lors ces deux corps, que nous avons supposés à ressort parfait, & libres de tous autres empêchemens, c'est-à-dire, entièrement isolés, réjailliront chacun, & s'éloigneront l'un de l'autre dans la direction opposée, & avec la même vitesse qu'ils avoient acquise au point du contact ; vitesse qui, quoique diminuée continuellement par leur attraction réciproque, ne laisseroit pas de les porter d'abord au même lieu d'où ils sont partis, mais encore infiniment plus loin, parce que la retardation du mouvement est ici en ordre inverse de celui de l'accélération, & que la vitesse acquise au point du choc étant immense, les efforts de l'attraction ne pourront la réduire à zéro qu'à une distance dont le carré seroit également immense ; en sorte que si le contact étoit absolu, & que la distance des deux corps qui se choquent, fût absolument nulle, ils s'éloigneroient l'un de l'autre jusqu'à une distance infinie ; & c'est à-peu-près ce que nous

14 *Introduction à l'Histoire*

n'obéissent qu'au seul mouvement produit par leur attraction, cette vitesse acquise est immense dans le point du contact. La chaleur, la lumière, le feu qui sont les grands effets de la force expansive, seront produits toutes les fois qu'artificiellement ou naturellement les corps seront divisés en parties très-petites, & qu'ils se rencontreront dans des directions opposées, & la chaleur sera d'autant plus sensible, la lumière d'autant plus vive, le feu d'autant plus violent que les molécules se seront précipitées les unes contre les autres, avec plus de vitesse par leur force d'attraction mutuelle.

De-là on doit conclure que toute matière peut devenir lumière, chaleur, feu; qu'il suffit que les molécules d'une substance quelconque se trouvent dans un état de liberté, c'est-à-dire, dans un état de division assez grande & de séparation, telle qu'elles puissent obéir sans obstacle à toute la force qui les attire les unes vers les autres;

voyons arriver à la lumière & au feu, dans le moment de l'inflammation des matières combustibles; car, dans l'instant même, elles lancent leur lumière à une très-grande distance, quoique les particules qui se sont converties en lumière fussent auparavant très-voisines les unes des autres.

nt produit
acquise est
ct. La cha-
les grands
nt produits
nt ou natu-
s en parties
eront dans
aleur sera
re d'autant
violent que
des les unes
vitesse par
e.

toute ma-
aleur, feu ;
une sub-
dans un état
un état de
ration, telle
acle à toute
s les autres ;

dans le mo-
combustibles ;
t leur lumière
les particules
nt auparavant

car, dès qu'elles se rencontreront, elles réagiront les unes contre les autres, & se fuiront en s'éloignant avec autant de vitesse qu'elles en avoient acquis au moment du contact, qu'on doit regarder comme un vrai choc ; puisque deux molécules, qui s'attirent mutuellement, ne peuvent se rencontrer qu'en direction contraire. Ainsi la lumière, la chaleur & le feu ne sont pas des matières particulières, des matières différentes de toute autre matière ; ce n'est toujours que la même matière qui n'a subi d'autre altération, d'autre modification, qu'une grande division de parties, & une direction de mouvement en sens contraire par l'effet du choc & de la réaction.

Ce qui prouve assez évidemment que cette matière du feu & de la lumière, n'est pas une substance différente de toute autre matière, c'est qu'elle conserve toutes les qualités essentielles, & même la plupart des attributs de la matière commune : 1.^o la lumière, quoique composée de particules presque infiniment petites, est néanmoins encore divisible, puisqu'avec le prisme on sépare les uns des autres les rayons, ou, pour parler plus clairement, les atomes

16 *Introduction à l'Histoire*

différemment colorés; 2.^o la lumière, quoique douée en apparence d'une qualité toute opposée à celle de la pesanteur, c'est-à-dire, d'une volatilité qu'on croiroit lui être essentielle, est néanmoins pesante comme toute autre matière, puisqu'elle fléchit toutes les fois qu'elle passe auprès des autres corps, & qu'elle se trouve à portée de leur sphère d'attraction; je dois même dire qu'elle est fort pesante, relativement à son volume qui est d'une petitesse extrême, puisque la vitesse immense avec laquelle la lumière se meut en ligne directe, ne l'empêche pas d'éprouver assez d'attraction près des autres corps, pour que sa direction s'incline & change d'une manière très-sensible à nos yeux; 3.^o la substance de la lumière n'est pas plus simple que celle de toute autre matière, puisqu'elle est composée de parties d'inégale pesanteur; que le rayon rouge est beaucoup plus pesant que le rayon violet, & qu'entre ces deux extrêmes elle contient une infinité de rayons intermédiaires, qui approchent plus ou moins de la pesanteur du rayon rouge ou de la légèreté du rayon violet: toutes ces conséquences dérivent nécessairement des

ère, quoi-
alité toute
est-à-dire,
être essen-
nime toute
toutes les
es corps,
ur sphère
qu'elle est
n volume
puisque la
a lumière
l'empêche
près des
tion s'in-
s-sensible
la lumière
de toute
nposée de
le rayon
t que le
deux ex-
de rayons
plus ou
rouge ou
toutes ces
ment des

des Minéraux, I.^{re} Partie. 17

phénomènes de l'inflexion de la lumière
& de la réfraction (e), qui, dans le réel,

(e) L'attraction universelle agit sur la lumière ; il ne faut, pour s'en convaincre, qu'examiner les cas extrêmes de la réfraction : lorsqu'un rayon de lumière passe à travers un crystal, sous un certain angle d'obliquité, la direction change tout-à-coup, & au lieu de continuer sa route, il rentre dans le crystal & se réfléchit. Si la lumière passe du verre dans le vide, toute la force de cette puissance s'exerce, & le rayon est contraint de rentrer & rentre dans le verre par un effet de son attraction que rien ne balance ; si la lumière passe du crystal dans l'air, l'attraction du crystal plus forte que celle de l'air, la ramène encore, mais avec moins de force, parce que cette attraction du verre est en partie détruite par celle de l'air qui agit en sens contraire sur le rayon de lumière ; si ce rayon passe du crystal dans l'eau, l'effet est bien moins sensible, le rayon rentre à peine, parce que l'attraction du crystal est presque toute détruite par celle de l'eau, qui s'oppose à son action ; enfin, si la lumière passe du crystal dans le crystal, comme les deux attractions sont égales, l'effet s'évanouit & le rayon continue sa route : d'autres expériences démontrent que cette puissance attractive, ou cette force réfringente, est toujours à très-peu près proportionnelle à la densité des matières transparentes, à l'exception des corps onctueux & sulfureux, dont la force réfringente est plus grande, parce que la lumière a plus d'analogie, plus de rapport de nature avec les matières inflammables qu'avec les autres matières.

18 *Introduction à l'Histoire*

n'est qu'une inflexion qui s'opère lorsque la lumière passe à travers les corps transparens ; 4.^o on peut démontrer que la lumière est massive & qu'elle agit, dans quelque cas, comme agissent tous les autres corps ; car, indépendamment de son effet ordinaire, qui est de briller à nos yeux, & de son action propre, toujours accompagnée d'éclat & souvent de chaleur, elle agit par sa masse lorsqu'on la condense en la réunissant, & elle agit au point de mettre en mouvement des corps

Mais s'il restoit quelque doute sur cette attraction de la lumière vers les corps, qu'on jette les yeux sur les inflexions que souffre un rayon, lorsqu'il passe fort près de la surface d'un corps ; un trait de lumière ne peut entrer par un très-petit trou, dans une chambre obscure, sans être puissamment attiré vers les bords du trou ; ce petit faisceau de rayons se divise, chaque rayon voisin de la circonférence du trou, se plie vers cette circonférence, & cette inflexion produit des franges colorées, des apparences constantes, qui sont l'effet de l'attraction de la lumière vers les corps voisins : il en est de même des rayons qui passent entre deux lames de couteaux ; les uns se plient vers la lame supérieure, les autres vers la lame inférieure ; il n'y a que ceux du milieu qui, souffrant une égale attraction des deux côtés, ne sont pas détournés, & suivent leur direction.

re lorsque
corps transf-
er que la
agit, dans
tous les
nment de
riller à nos
, toujours
t de cha-
rsqu'on la
lle agit au
des corps

tte attraction
tte les yeux
on, lorsqu'il
un trait de
it trou, dans
nment attiré
de rayons se
onférence du
& cette in-
s apparences
de la lumière
e des rayons
aux; les uns
autres vers la
u milieu qui,
ux côtés, ne
irection.

assez pesans placés au foyer d'un bon miroir ardent; elle fait tourner une aiguille sur un pivot placé à son foyer; elle pousse, déplace & chasse les feuilles d'or ou d'argent qu'on lui présente avant de les fondre, & même avant de les échauffer sensiblement. Cette action produite par la masse est la première & précède celle de la chaleur; elle s'opère entre la lumière condensée & les feuilles de métal, de la même façon qu'elle s'opère entre deux autres corps qui deviennent contigus, & par conséquent la lumière a encore cette propriété commune avec toute autre matière; 5.^o enfin on sera forcé de convenir que la lumière est un mixte, c'est-à-dire, une matière composée comme la matière commune, non-seulement de parties plus grosses & plus petites, plus ou moins pesantes, plus ou moins mobiles, mais encore différemment figurées; quiconque aura réfléchi sur les phénomènes que Newton appelle *les accès de facile réflexion & de facile transmission de la lumière*, & sur les effets de la double réfraction du crystal de roche, & du spath appelé crystal d'Islande, ne pourra s'empêcher de reconnoître que les atomes de la lumière ont plusieurs

20 Introduction à l'Histoire

côtés , plusieurs faces différentes , qui , selon qu'elles se présentent , produisent constamment des effets différens (f).

En voilà plus qu'il n'en faut pour démontrer que la lumière n'est pas une matière particulière ni différente de la matière commune , que son essence est la même , ses propriétés essentielles les mêmes ; qu'enfin elle n'en diffère que parce qu'elle a subi dans le point du contact la répulsion d'où provient sa volatilité. Et de la même manière que l'effet de la force d'attraction s'étend à l'infini , toujours en décroissant comme l'espace augmente , les effets de la répulsion s'étendent & décroissent de même , mais en ordre inverse ; en sorte que l'on peut appliquer à la force expansive tout ce que l'on fait de la force attractive ; ce sont pour la Nature deux

(f) Chaque rayon de lumière a deux côtés opposés , doués originairement d'une propriété d'où dépend la réfraction extraordinaire du crystal , & deux autres côtés opposés , qui n'ont pas cette propriété , *Optique* de Newton , *Question XXVI* , traduction de Coste. *Nota.* Cette propriété dont parle ici Newton , ne peut dépendre que de l'étendue ou de la figure de chacun des côtés des rayons , c'est-à-dire , des atomes de lumière. Voyez cet article en entier dans Newton.

es, qui,
roduisent
(f).
pour dé-
une ma-
la matière
même, ses
; qu'enfin
elle a subi
l'ion d'où
même ma-
l'attraction
décroissant
effets de
oissent de
; en sorte
ce expan-
la force
ture deux

deux côtés
ropriété d'où
crystal, &
as cette pro-
XXVI, tra-
é dont parle
de l'étendue
des rayons,
Voyez cet

des Minéraux, I.^{re} Partie. 21

instrumens de même espèce, ou plutôt ce n'est que le même instrument qu'elle manie dans deux sens opposés.

Toute matière deviendra lumière, dès que toute cohérence étant détruite, elle se trouvera divisée en molécules suffisamment petites, & que ces molécules étant en liberté, seront déterminées par leur attraction mutuelle à se précipiter les unes contre les autres; dans l'instant du choc la force répulsive s'exercera, les molécules se fuiront en tout sens avec une vitesse presque infinie, laquelle néanmoins n'est qu'égale à leur vitesse acquise au moment du contact: car la loi de l'attraction étant d'augmenter comme l'espace diminue, il est évident qu'au contact l'espace toujours proportionnel au carré de la distance devient nul, & que par conséquent la vitesse acquise en vertu de l'attraction, doit à ce point devenir presque infinie; cette vitesse seroit même infinie si le contact étoit immédiat, & par conséquent la distance entre les deux corps absolument nulle; mais, comme nous l'avons souvent répéré, il n'y a rien d'absolu, rien de parfait dans la Nature, & de même rien d'absolument grand, rien d'absolument petit, rien d'entièrement nul,

22 Introduction à l'Histoire

rien de vraiment infini, & tout ce que j'ai dit de la petitesse *infinie* des atomes qui constituent la lumière, de leur ressort *parfait*, de la distance *nulle* dans le moment du contact, ne doit s'entendre qu'avec restriction. Si l'on pouvoit douter de cette vérité métaphysique, il seroit possible d'en donner une démonstration physique, sans même nous écarter de notre sujet. Tout le monde sait que la lumière emploie environ sept minutes & demie de temps à venir du soleil jusqu'à nous ; supposant donc le soleil à trente-six millions de lieues, la lumière parcourt cette énorme distance en sept minutes & demie, ou ce qui revient au même (supposant son mouvement uniforme), quatre-vingts mille lieues en une seconde ; cette vitesse, quoique prodigieuse, est néanmoins bien éloignée d'être infinie, puisqu'elle est déterminable par les nombres ; elle cessera même de paroître prodigieuse lorsqu'on réfléchira que la Nature semble marcher en grand presque aussi vite qu'en petit ; il ne faut pour cela que supputer la célérité du mouvement des comètes à leur périhélie, ou même celle des planètes qui se meuvent le plus rapidement, & l'on verra que la vitesse

de ces masses immenses, quoique moindre, se peut néanmoins comparer d'assez près avec celle de nos atomes de lumière.

Et de même que toute matière peut se convertir en lumière par la division & la répulsion de ses parties excessivement divisées, lorsqu'elles éprouvent un choc des unes contre les autres; la lumière peut aussi se convertir en toute autre matière par l'addition de ses propres parties, accumulées par l'attraction des autres corps. Nous verrons dans la suite que tous les élémens sont convertibles; & si l'on a douté que la lumière, qui paroît être l'élément le plus simple, pût se convertir en substance solide, c'est que, d'une part, on n'a pas fait assez d'attention à tous les phénomènes, & que, d'autre part, on étoit dans le préjugé, qu'étant essentiellement volatile, elle ne pouvoit jamais devenir fixe. Mais n'avons-nous pas prouvé que la fixité & la volatilité dépendent de la même force attractive dans le premier cas, devenue répulsive dans le second; & dès-lors ne sommes-nous pas fondés à croire que ce changement de la matière fixe en lumière, & de la lumière en matière fixe, est une des plus fréquentes opérations de la Nature?

24 Introduction à l'Histoire

Après avoir montré que l'impulsion dépend de l'attraction, que la force expansive est la même que la force attractive devenue négative ; que la lumière, & à plus forte raison la chaleur & le feu ne sont que des manières d'être de la matière commune ; qu'il n'existe en un mot qu'une seule force & une seule matière toujours prête à s'attiter ou à se repousser suivant les circonstances ; recherchons comment avec ce seul ressort & ce seul sujet, la Nature peut varier ses œuvres à l'infini. Nous mettrons de la méthode dans cette recherche, & nous en présenterons les résultats avec plus de clarté, en nous abstenant de comparer d'abord les objets les plus éloignés, les plus opposés, comme le feu & l'eau, l'air & la terre, & en nous conduisant au contraire par les mêmes degrés, par les mêmes nuances douces que suit la Nature dans toutes ses démarches. Comparons donc les choses les plus voisines, & tâchons d'en saisir les différences, c'est-à-dire, les particularités, & de les présenter avec encore plus d'évidence que leurs généralités. Dans le point de vue général, la lumière, la chaleur & le feu ne font qu'un seul objet, mais dans

le

l'impulsion
force ex-
e attractive
ière, & à
le feu ne
de la ma-
en un mot
ule-matière
e repousser
e cherchons
& ce seul
ses œuvres
la méthode
s en présen-
e clarté, en
d'abord les
us opposés,
& la terre,
aire par les
es nuances
ns toutes les
les choses
en saisir les
rticularités,
e plus d'évi-
ns le point
chaleur &
, mais dans
en fait le

le point de vue particulier; ce sont trois
objets distincts, trois choses qui, quoi-
que se ressemblant par un grand nombre
de propriétés, diffèrent néanmoins par
un petit nombre d'autres propriétés assez
essentiellles, pour qu'on puisse les regarder
comme trois choses différentes, & qu'on
doive les comparer une à une.

Quelles sont d'abord les propriétés
communes de la lumière & du feu, quelles
sont aussi leurs propriétés différentes? La
lumière, dit-on, & le feu élémentaire ne
sont qu'une même chose, une seule subst-
tance: cela peut être, mais comme nous
n'avons pas encore d'idée nette du feu
élémentaire, abstenons-nous de prononcer
sur ce premier point. La lumière & le
feu, tel que nous les connoissons, ne
sont-ils pas au contraire deux choses
différentes, deux substances distinctes &
composées différemment? le feu est à la
vérité très-souvent lumineux, mais quel-
quefois aussi le feu existe sans aucune
apparence de lumière; le feu, soit lumi-
neux, soit obscur, n'existe jamais sans
une grande chaleur, tandis que la lumière
brille souvent avec éclat sans la moindre

Supplément. Tome I.

B

26 *Introduction à l'Histoire*

chaleur sensible. La lumière paroît être l'ouvrage de la Nature, le feu n'est que le produit de l'industrie de l'homme : la lumière subsiste, pour ainsi dire, par elle-même, & se trouve répandue dans les espaces immenses de l'Univers entier : le feu ne peut subsister qu'avec des alimens, & ne se trouve qu'en quelques points de l'espace où l'homme le conserve, & dans quelques endroits de la profondeur de la terre, où il se trouve également entretenu par des alimens convenables. La lumière, à la vérité, lorsqu'elle est condensée, réunie par l'art de l'homme, peut produire du feu ; mais ce n'est qu'autant qu'elle tombe sur des matières combustibles. La lumière n'est donc tout au plus, & dans ce seul cas, que le principe du feu, & non pas le feu ; ce principe même n'est pas immédiat, il en suppose un intermédiaire, & c'est celui de la chaleur qui paroît tenir encore de plus près que la lumière à l'essence du feu. Or la chaleur existe tout aussi souvent sans lumière que la lumière existe sans chaleur ; ces deux principes ne paroissent donc pas nécessairement liés ensemble ; leurs effets ne sont ni simultanés ni contemporains,

aroit être
n'est que
omme: la
par elle-
dans les
entier: le
s alimens,
s points de
e, & dans
deur de la
t entretenu
la lumière,
condensée,
ut produire
ant qu'elle
ustibles. La
us, & dans
du feu, &
même n'est
e un inter-
chaleur qui
près que la
la chaleur
lumière que
r; ces deux
nc pas né-
leurs effets
temporaires,

puisque, dans des certaines circonstances, on sent de la chaleur long-temps avant que la lumière paroisse, & que, dans d'autres circonstances, on voit de la lumière long-temps avant de sentir de la chaleur, & même sans en sentir aucune.

Dès-lors la chaleur n'est-elle pas une autre manière d'être, une modification de la matière, qui diffère à la vérité moins que toute autre de celle de la lumière, mais qu'on peut néanmoins considérer à part, & qu'on devroit concevoir encore plus aisément? Car la facilité plus ou moins grande que nous avons à concevoir les opérations différentes de la Nature, dépend de celle que nous avons d'y appliquer nos sens; lorsqu'un effet de la Nature tombe sous deux de nos sens, la vue & le toucher, nous croyons en avoir une pleine connoissance; un effet qui n'affecte que l'un ou l'autre de ces deux sens, nous paroît plus difficile à connoître, & dans ce cas, la facilité ou la difficulté d'en juger, dépend du degré de supériorité qui se trouve entre nos sens; la lumière que nous n'apercevons que par le sens de la vue (sens le plus fautif & le plus incomplet),

28 *Introduction à l'Histoire*

ne devrait pas nous être aussi-bien connue que la chaleur qui frappe le toucher, & affecte par conséquent le plus sûr de nos sens. Cependant il faut avouer qu'avec cet avantage, on a fait beaucoup moins de découvertes sur la nature de la chaleur que sur celle de la lumière, soit que l'homme saisisse mieux ce qu'il voit que ce qu'il sent, soit que la lumière se présentant ordinairement comme une substance distincte & différente de toutes les autres, elle a paru digne d'une considération particulière : au lieu que la chaleur dont l'effet est plus obscur, se présentant comme un objet moins isolé, moins simple, n'a pas été regardée comme une substance distincte, mais comme un attribut de la lumière & du feu.

Quand même cette opinion, qui fait de la chaleur un pur attribut, une simple qualité, se trouveroit fondée, il seroit toujours utile de considérer la chaleur en elle-même & par les effets qu'elle produit toute seule ; c'est-à-dire, lorsqu'elle nous paroît indépendante de la lumière & du feu. La première chose qui me frappe, & qui me paroît bien digne de remarque, c'est que le siège de la chaleur est tout

différent de celui de la lumière; celle-ci occupe & parcourt les espaces vides de l'Univers; la chaleur au contraire se trouve généralement répandue dans toute la matière solide. Le globe de la terre & toutes les matières dont il est composé, ont un degré de chaleur bien plus considérable qu'on ne pourroit l'imaginer. L'eau a son degré de chaleur qu'elle ne perd qu'en changeant son état; c'est-à-dire, en perdant sa fluidité; l'air a aussi sa chaleur, que nous appelons la température, qui varie beaucoup, mais qu'il ne perd jamais en entier, puisque son ressort subsiste même dans le plus grand froid; le feu a aussi ses différens degrés de chaleur, qui paroissent moins dépendre de sa nature propre que de celle des alimens qui le nourrissent. Ainsi toute la matière connue, est chaude, & dès-lors la chaleur est une affection bien plus générale que celle de la lumière.

La chaleur pénètre tous les corps qui lui sont exposés, & cela sans aucune exception, tandis qu'il n'y a que les corps transparens qui laissent passer la lumière, & qu'elle est arrêtée & en partie repoussée

30 *Introduction à l'Histoire*

par tous les corps opaques. La chaleur semble donc agir d'une manière bien plus générale & plus palpable que n'agit la lumière, & quoique les molécules de la chaleur soient excessivement petites, puisqu'elles pénètrent les corps les plus compacts, il me semble néanmoins que l'on peut démontrer qu'elles sont bien plus grosses que celles de la lumière; car on fait de la chaleur avec la lumière; en la réunissant en grande quantité; d'ailleurs la chaleur agissant sur le sens du toucher, il est nécessaire que son action soit proportionnée à la grossièreté de ce sens, comme la délicatesse des organes de la vue paroît l'être à l'extrême finesse des parties de la lumière: celles-ci se meuvent avec la plus grande vitesse, agissent dans l'instant à des distances immenses, tandis que celles de la chaleur n'ont qu'un mouvement progressif assez lent, qui ne paroît s'étendre qu'à de petits intervalles du corps dont elles émanent.

Le principe de toute chaleur paroît être l'attrition des corps; tout frottement, c'est-à-dire, tout mouvement en sens contraire entre des matières solides, produit de la chaleur, & si ce même effet n'arrive

La chaleur
e bien plus
agit la lu-
mieres de la
petites, puis-
plus com-
s que l'on
bien plus
e; car on
re; en la
l'ailleurs la
toucher, il
oit propor-
ns, comme
vue paroît
parties de
nt avec la
ans l'instant
s que celles
mouvement
paroît s'é-
s du corps
eur paroît
ttement,
t en sens
es, produit
et n'arrive

pas dans les fluides, c'est parce que leurs parties ne se touchent pas d'assez près pour pouvoir être frottées les unes contre les autres; & qu'ayant peu d'adhérence entre elles, leur résistance au choc des autres corps est trop foible pour que la chaleur puisse naître ou se manifester à un degré sensible; mais, dans ce cas, on voit souvent de la lumière produite par ce frottement d'un fluide, sans sentir de la chaleur. Tous les corps, soit en petit ou en grand volume, s'échauffent dès qu'ils se rencontrent en sens contraire: la chaleur est donc produite par le mouvement de toute matière palpable & d'un volume quelconque; au lieu que la production de la lumière, qui se fait aussi par le mouvement en sens contraire, suppose de plus la division de la matière en parties très-petites; & comme cette opération de la Nature est la même pour la production de la chaleur & celle de la lumière, que c'est le mouvement en sens contraire, la rencontre des corps, qui produisent l'un & l'autre, on doit en conclure que les atomes de la lumière sont solides par eux-mêmes, & qu'ils sont chauds au moment de leur

32 *Introduction à l'Histoire*

naissance ; mais on ne peut pas également assurer qu'ils conservent leur chaleur au même degré que leur lumière, ni qu'ils ne cessent pas d'être chauds, avant de cesser d'être lumineux. Des expériences familières paroissent indiquer que la chaleur de la lumière du soleil augmente en passant à travers une glace plane , quoique la quantité de la lumière soit diminuée considérablement par la réflexion qui se fait à la surface extérieure de la glace, & que la matière même du verre en retienne une certaine quantité. D'autres expériences plus recherchées (*g*), semblent prouver

(*g*) Un habile Physicien (M. de Saussure, citoyen de Genève) a bien voulu me communiquer le résultat des expériences qu'il a faites dans les montagnes, sur la différente chaleur des rayons du soleil, & je vais rapporter ici ses propres expressions. « J'ai fait faire, en mars 1767, cinq caisses » rectangulaires de verre blanc de Bohême, chacune » desquelles est la moitié d'un cube coupé parallèlement à sa base ; la première a un pied de » largeur en tout sens, sur six pouces de hauteur ; » la seconde dix pouces sur cinq, & ainsi de suite, » jusqu'à la cinquième qui a deux pouces sur un. » Toutes ces caisses sont ouvertes par le bas, & s'emboîtent les unes dans les autres sur une table » fort épaisse, de bois de poirier noirci, à laquelle » elles sont fixées. J'emploie sept thermomètres à

que la lumière augmente de chaleur à mesure qu'elle traverse une plus grande épaisseur de notre atmosphère.

cette expérience ; l'un suspendu en l'air & parfaitement isolé à côté des boîtes, & à la même distance du sol ; un autre posé sur la caisse extérieure en dehors de cette caisse, & à-peu-près au milieu ; le suivant posé de même sur la seconde caisse, & ainsi des autres, jusqu'au dernier qui est sous la cinquième caisse, & à demi-noyé dans le bois de la table.

Il faut observer que tous ces thermomètres sont de mercure, & que tous, excepté le dernier, ont la boule nue, & ne sont pas engagés comme les thermomètres ordinaires, dans une planche ou dans une boîte, dont le plus ou le moins d'aptitude à prendre & à conserver la chaleur, fait entièrement varier les résultats des expériences.

Tout cet appareil exposé au soleil, dans un lieu découvert, par exemple, sur le mur de clôture d'une grande terrasse ; je trouve que le thermomètre suspendu à l'air libre, monte le moins haut de tous ; que celui qui est sur la caisse extérieure, monte un peu plus haut ; ensuite celui qui est sur la seconde caisse, & ainsi des autres, en observant cependant que le thermomètre, qui est posé sur la cinquième caisse, monte plus haut que celui qui est sous elle & à demi-noyé dans le bois de la table : j'ai vu celui-là monter à 70 degrés de Réaumur (en plaçant le 0 à la congélation & le 80.^{me} degré à l'eau bouillante). Les fruits exposés à cette chaleur s'y cuisent & y rendent leur jus.

By

34 *Introduction à l'Histoire*

On fait de tout temps que la chaleur devient d'autant moindre ou le froid d'autant plus grand, qu'on s'élève plus haut dans les montagnes. Il est vrai que la chaleur, qui provient du globe entier de la terre, doit être moins sensible sur ces pointes avancées qu'elle ne l'est dans les plaines, mais cette cause n'est point du tout proportionnelle à l'effet; l'action de la chaleur qui émane du globe terrestre, ne pouvant diminuer qu'en raison du

» Quand cet appareil est exposé au soleil dès le
» matin, on observe communément la plus grande
» chaleur vers les deux heures & demie après midi,
» & lorsqu'on le retire des rayons du soleil, il em-
» ploie plusieurs heures à son entier refroidissement.
» J'ai fait porter ce même appareil sur une mon-
» tagne élevée d'environ cinq cents toises au-dessus
» du lieu où se faisoient ordinairement les expé-
» riences, & j'ai trouvé que le refroidissement causé
» par l'élévation agissoit beaucoup plus sur les ther-
» momètres suspendus à l'air libre, que sur ceux qui
» étoient enfermés dans les caisses de verre, quoique
» j'eusse eu soin de remplir les caisses de l'air même
» de la montagne, par égard pour la fausse hypo-
» thèse de ceux qui croient que le froid des mon-
» tagnes tient de la pureté de l'air qu'on y respire. »

Il seroit à désirer que M. de Saussure, de la sagacité duquel nous devons attendre d'excellentes choses, suivît encore plus loin ces expériences, & voulût bien en publier les résultats.

la chaleur
e froid d'au-
e plus haut
rai que la
e entier de
ble sur ces
est dans les
st point du
l'action de
e terrestre,
raison du

u soleil dès le
la plus grande
nie après midi,
le soleil, il em-
froidissement.
il sur une mon-
oises au-dessus
nent les expé-
lissement causé
as sur les ther-
e sur ceux qui
erre, quoique
de l'air même
a fausse hypo-
roid des mon-
y respire. »
austure, de fa-
e d'excellentes
xpériences, &

quarré de la distance, il ne paroît pas qu'à la hauteur d'une demi-lieue, qui n'est que la trois-millième partie du demi-diamètre du globe, dont le centre doit être pris pour le foyer de la chaleur; il ne paroît pas, dis-je, que cette différence, qui, dans cette supposition, n'est que d'une unité sur neuf millions, puisse produire une diminution de chaleur aussi considérable, à beaucoup près, que celle qu'on éprouve en s'élevant à cette hauteur; car le thermomètre y baisse dans tous les temps de l'année, jusqu'au point de la congélation de l'eau; la neige ou la glace subsistent aussi sur ces grandes montagnes à-peu-près à cette hauteur dans toutes les saisons: il n'est donc pas probable que cette grande différence de chaleur provienne uniquement de la différence de la chaleur de la terre: l'on en fera pleinement convaincu, si l'on fait attention qu'au haut des volcans, où la terre est plus chaude qu'en aucun autre endroit de la surface du globe, le froid de l'air est à très-peu-près le même que dans les autres montagnes à la même hauteur.

36 *Introduction à l'Histoire*

On pourroit donc penser que les atomes de la lumière, quoique très-chauds au moment de leur naissance & au sortir du soleil, se refroidissent beaucoup pendant les sept minutes & demie de temps que dure leur traversée du soleil à la terre, d'autant que la durée de la chaleur, ou, ce qui revient au même, le temps du refroidissement des corps étant en raison de leur diamètre, il sembleroit qu'il ne faut qu'un très-petit moment pour le refroidissement des atomes presque infiniment petits de la lumière; & cela seroit en effet s'ils étoient isolés; mais comme ils se succèdent presque immédiatement, & qu'ils se propagent en faisceaux d'autant plus serrés qu'ils sont plus près du lieu de leur origine, la chaleur que chaque atome perd, tombe sur les atomes voisins; & cette communication réciproque de la chaleur, qui s'évapore de chaque atome, entretient plus long-temps la chaleur générale de la lumière; & comme la direction constante est toujours en rayons divergens, que leur éloignement l'un de l'autre augmente comme l'espace qu'ils ont parcouru, & qu'en même temps la

les ato-
ès-chauds
au sortir
pendant
emps que
re, d'au-
u, ce qui
refroidis-
de leur
aut qu'un
différent
rits de la
ils étoient
t presque
agent en
u'ils sont
, la cha-
ombe sur
unication
rapore de
ng-temps
& comme
en rayons
r l'un de
ce qu'ils
temps la

chaleur qui part de chaque atome, comme centre, diminue aussi dans la même raison, il s'ensuit que l'action de la lumière des rayons solaires décroissant en raison inverse du quarré de la distance, celle de leur chaleur décroît en raison inverse du quarré-quarré de cette même distance.

Prenant donc pour unité le demi-diamètre du soleil, & supposant l'action de la lumière comme 1000, à la distance d'un demi-diamètre de la surface de cet astre, elle ne sera plus que comme $\frac{1000}{4}$ à la distance de deux demi-diamètres, que comme $\frac{1000}{9}$ à celle de trois demi-diamètres, comme $\frac{1000}{16}$ à la distance de quatre demi-diamètres; & enfin en arrivant à nous qui sommes éloignés du soleil de trente-six millions de lieues, c'est-à-dire, d'environ deux cents vingt-quatre de ses demi-diamètres, l'action de la lumière ne sera plus que comme $\frac{1000}{30625}$, c'est-à-dire, plus de cinquante mille fois plus foible qu'au sortir du soleil, & la chaleur de chaque atome de lumière étant aussi supposée 1000 au sortir du soleil, ne sera plus que comme $\frac{1000}{16}$, $\frac{1000}{81}$, $\frac{1000}{256}$ à la

38 *Introduction à l'Histoire*

distance successive de 1, 2, 3 demi-diamètres, & en arrivant à nous, comme $\frac{1000}{2561890625}$, c'est-à-dire, plus de deux mille cinq cents millions de fois plus foible qu'au sortir du soleil.

Quand même on ne voudroit pas admettre cette diminution de la chaleur de la lumière en raison du quarré-quarré de la distance au soleil, quoique cette estimation me paroisse fondée sur un raisonnement assez clair, il fera toujours vrai que la chaleur, dans sa propagation, diminue beaucoup plus que la lumière, au moins quant à l'impression qu'elles font l'une & l'autre sur nos sens. Qu'on excite une très-forte chaleur, qu'on allume un grand feu dans un point de l'espace, on ne le sentira qu'à une distance médiocre, au lieu qu'on en voit la lumière à de très-grandes distances; qu'on approche peu-à-peu la main d'un corps excessivement chaud, on s'apercevra, par la seule sensation, que la chaleur augmente beaucoup plus que l'espace ne diminue; car on se chauffe souvent avec plaisir à une distance qui ne diffère que de quel-

deux mille
plus foible

droit pas
chaleur de
quarré de
ette estima-
un raison-
jours vrai
opagation,
la lumière,
on qu'elles
sens. Qu'on
u'on allume
de l'espace,
istance mé-
la lumière à
n approche
ps excessi-
vra, par la
augmente
e diminue;
ec plaisir à
e de quel-

ques pouces de celle où l'on se brûleroit. Tout paroît donc nous indiquer que la chaleur diminue en plus grande raison que la lumière, à mesure que toutes deux s'éloignent du foyer dont elles partent.

Ainsi, l'on peut croire que les atomes de la lumière sont fort refroidis lorsqu'ils arrivent à la surface de notre atmosphère; mais qu'en traversant la grande épaisseur de cette masse transparente, ils y reprennent par le frottement une nouvelle chaleur. La vitesse infinie avec laquelle les particules de la lumière frôlent celles de l'air, doit produire une chaleur d'autant plus grande, que le frottement est plus multiplié; & c'est probablement par cette raison que la chaleur des rayons solaires se trouve, par l'expérience, beaucoup plus grande dans les couches inférieures de l'atmosphère, & que le froid de l'air paroît augmenter si considérablement à mesure qu'on s'élève. Peut-être aussi que comme la lumière ne prend de la chaleur qu'en se réunissant, il faut un grand nombre d'atomes de lumière pour constituer un seul atome de chaleur, & que c'est par cette raison, que la lumière foible de la lune, quoique frôlée dans

40 *Introduction à l'Histoire*

l'atmosphère, comme celle du soleil, ne prend aucun degré de chaleur sensible. Si, comme le dit M. Bouguer (*h*), l'intensité de la lumière du soleil à la surface de la terre, est trois cents mille fois plus grande que celle de la lumière de la lune, celle-ci ne peut qu'être presque absolument insensible, même en la réunissant au foyer des plus puissans miroirs ardents, qui ne peuvent la condenser qu'environ deux mille fois, dont ôtant la moitié pour la perte par la réflexion ou la réfraction, il ne reste qu'une trois-centième partie d'intensité au foyer du miroir. Or y a-t-il des thermomètres assez sensibles pour indiquer le degré de chaleur contenu dans une lumière trois cents fois plus foible que celle du soleil, & pourra-t-on faire des miroirs assez puissans pour la condenser davantage?

Ainsi, l'on ne doit pas inférer de tout ce que j'ai dit, que la lumière puisse exister sans aucune chaleur, mais seulement que les degrés de cette chaleur sont très-différens, selon les différentes

(*h*) Essai d'Optique sur la gradation de la lumière.

circonstances, & toujours insensibles lorsque la lumière est très-foible (*i*). La chaleur au contraire paroît exister habituellement, & même se faire sentir vivement sans lumière ; ce n'est ordinairement

(*i*) On pourroit même présumer que la lumière en elle-même est composée de parties plus ou moins chaudes ; le rayon rouge, dont les atomes sont bien plus massifs & probablement plus gros que ceux du rayon violet, doit en toutes circonstances conserver beaucoup plus de chaleur, & cette présomption me paroît assez fondée pour qu'on doive chercher à la constater par l'expérience ; il ne faut pour cela que recevoir au sortir du prisme une égale quantité de rayons rouges & de rayons violets, sur deux petits miroirs concaves ou deux lentilles réfringentes, & voir au thermomètre le résultat de la chaleur des uns & des autres.

Je me rappelle une autre expérience, qui semble démontrer que les atomes bleus de la lumière sont plus petits que ceux des autres couleurs ; c'est qu'en recevant sur une feuille très-mince d'or battu la lumière du soleil, elle se réfléchit toute, à l'exception des rayons bleus qui passent à travers la feuille d'or, & peignent d'un beau bleu le papier blanc qu'on met à quelque distance derrière la feuille d'or. Ces atomes bleus sont donc plus petits que les autres, puisqu'ils passent où les autres ne peuvent passer : mais je n'insiste pas sur les conséquences qu'on doit tirer de cette expérience, parce que cette couleur bleue produite en apparence par la feuille d'or, peut tenir au phénomène des ombres bleues, dont je parlerai dans un des Mémoires suivans.

42 *Introduction à l'Histoire*

que quand elle devient excessive que la lumière l'accompagne. Mais ce qui mettroit encore une différence bien essentielle entre ces deux modifications de la matière, c'est que la chaleur, qui pénètre tous les corps, ne paroît se fixer dans aucun, & ne s'y arrêter que peu de temps, au lieu que la lumière s'incorpore, s'amortit & s'éteint dans tous ceux qui ne la réfléchissent pas, ou qui ne la laissent pas passer librement. Faites chauffer à tous degrés des corps de toute sorte, tous perdront en assez peu de temps la chaleur acquise, tous reviendront au degré de la température générale, & n'auront par conséquent que la même chaleur qu'ils avoient auparavant. Recevez de même la lumière en plus ou moins grande quantité sur des corps noirs ou blancs, bruts ou polis, vous reconnoîtrez aisément que les uns l'admettent, les autres la repoussent, & qu'au lieu d'être affectés d'une manière uniforme, comme ils le sont par la chaleur, ils ne le sont que d'une manière relative à leur nature, à leur couleur, à leur poli; les noirs absorberont plus la lumière que les blancs, les bruts plus que les polis. Cette lumière une fois absorbée, reste fixe

essive que
is ce qui
bien essen-
tions de la
ui pénètre
fixer dans
e peu de
incorpore,
ux qui ne
la laissent
uffer à tous
orte, tous
la chaleur
egré de la
uront par
leur qu'ils
e même la
nde quan-
nes, bruts
ément que
repoussent,
ne manière
la chaleur,
e relative à
leur poli;
mière que
les polis.
e, reste fixe

& demeure dans les corps qui l'ont admise, elle ne reparoît plus, elle n'en sort pas comme le fait la chaleur; d'où l'on devoit conclure que les atomes de la lumière peuvent devenir parties constituant des corps en s'unissant à la matière qui les compose; au lieu que la chaleur ne se fixant pas, semble empêcher au contraire l'union de toutes les parties de la matière & n'agir que pour les tenir séparées.

Cependant il y a des cas où la chaleur se fixe à demeure dans les corps, & d'autres cas où la lumière qu'ils ont absorbée reparoît & en sort comme la chaleur. Les diamans, les autres pierres transparentes qui s'imbibent de la lumière du soleil; les pierres opaques, comme celle de Bologne qui, par la calcination, reçoivent les particules d'un feu brillant; tous les phosphores naturels rendent la lumière qu'ils ont absorbée, & cette restitution ou déperdition de lumière se fait successivement & avec le temps, à-peu-près comme se fait celle de la chaleur. Et peut-être la même chose arrive dans les corps opaques, en tout ou en partie. Quoi qu'il en soit, il paroît d'après tout

44 *Introduction à l'Histoire*

ce qui vient d'être dit, que l'on doit reconnoître deux sortes de chaleur, l'une lumineuse, dont le soleil est le foyer immense, & l'autre obscure, dont le grand réservoir est le globe terrestre. Notre corps, comme faisant partie du globe, participe à cette chaleur obscure; & c'est par cette raison qu'étant obscure par elle-même, c'est-à-dire, sans lumière, elle est encore obscure pour nous, parce que nous ne nous en apercevons par aucun de nos sens. Il en est de cette chaleur du globe comme de son mouvement, nous y sommes soumis, nous y participons sans le sentir & sans nous en douter. De-là il est arrivé que les Physiciens ont porté d'abord toutes leurs vues, toutes leurs recherches sur la chaleur du soleil, sans soupçonner qu'elle ne faisoit qu'une très-petite partie de celle que nous éprouvons réellement; mais ayant fait des instrumens pour reconnoître la différence de chaleur immédiate des rayons du soleil en été, à celle de ces mêmes rayons en hiver, ils ont trouvé, avec étonnement, que cette chaleur solaire est en été soixante-six fois plus grande qu'en hiver dans notre climat, & que

néanmoins la plus grande chaleur de notre été ne différerait que d'un septième du plus grand froid de notre hiver; d'où ils ont conclu, avec grande raison, qu'indépendamment de la chaleur que nous recevons du soleil, il en émane une autre du globe même de la terre, bien plus considérable, & dont celle du soleil n'est que le complément; en sorte qu'il est aujourd'hui démontré que cette chaleur, qui s'échappe de l'intérieur de la terre (*k*), est dans notre climat au moins vingt-neuf fois en été, & quatre cents fois en hiver plus grande que la chaleur qui nous vient du soleil; je dis au moins, car quelque exactitude que les Physiciens, & en particulier M. de Mairan, aient apporté dans ces recherches, quelque précision qu'ils aient pu mettre dans leurs observations & dans leur calcul, j'ai vu en les examinant, que le résultat pouvoit en être porté plus haut (*l*).

(*k*) Voyez l'Histoire de l'Académie des Sciences, année 1702, page 7; & le Mémoire de M. Amon-ton, page 155. — Les Mémoires de M. de Mairan, année 1710, page 104; année 1721, page 8; année 1765, page 143.

(*l*) Les Physiciens ont pris pour le degré du froid absolu mille degrés au-dessous de la congélation,

46 *Introduction à l'Histoire*

Cette grande chaleur, qui réside dans l'intérieur du globe, qui sans cesse en

il falloit plutôt le supposer de dix mille que de mille, car quoique je sois très-persuadé qu'il n'existe rien d'absolu dans la Nature, & que peut-être un froid de dix mille degrés n'existe que dans les espaces les plus éloignés de tout soleil ; cependant, comme il s'agit ici de prendre pour unité le plus grand froid possible, je l'aurois au moins supposé plus grand que celui dont nous pouvons produire la moitié ou les trois cinquièmes, car on a produit artificiellement cinq cents quatre-vingt-douze degrés de froid à Pétersbourg, le 6 Janvier 1760, le froid naturel étant de trente-un degrés au-dessous de la congélation ; & si l'on eût fait la même expérience en Sibérie, où le froid naturel est quelquefois de soixante-dix degrés, on eût produit un froid de plus de mille degrés ; car on a observé que le froid artificiel suivoit la même proportion que le froid naturel. Or $31 : 592 :: 70 : 1536 \frac{24}{11}$; il seroit donc possible de produire en Sibérie un froid de treize cents trente-six degrés au-dessous de la congélation ; donc le plus grand degré de froid possible doit être supposé bien au-delà de mille ou même de treize cents trente-six pour en faire l'unité, à laquelle on rapporte les degrés de la chaleur, tant solaire que terrestre, ce qui ne laissera pas d'en rendre la différence encore plus grande. — Une autre remarque que j'ai faite en examinant la construction de la table, dans laquelle M. de Mairan donne les rapports de la chaleur des émanations du globe terrestre à ceux de la chaleur solaire pour tous les climats de la terre, c'est qu'il n'a pas pensé ou qu'il a négligé

vide dans
cesse en

ue de mille,
n'existe rien
tre un froid
les espaces
ant, comme
s grand froi
us grand que
noitié ou les
ficiellement
de froid à
froid naturel
e la congéla-
ence en Si-
s de soixante-
de plus de
roid artificiel
l naturel. Or
donc possible
e treize cents
élation ; donc
t être supposé
e cents trente-
rapporte les
terrestre, ce
erence encore
que j'ai faite
ble, dans la-
pports de la
restre à ceux
limats de la
il a négligé

des Minéraux, I.^{re} Partie. 47

émane à l'extérieur, doit entrer comme
élément dans la combinaison de tous les

d'y faire entrer la considération de l'épaisseur du globe, plus grande sous l'équateur que sous les pôles. Cela néanmoins devoit être mis en compte, & auroit un peu changé les rapports qu'il donne pour chaque latitude. — Enfin une troisième remarque, & qui tient à la première, c'est qu'il dit (page 160) qu'ayant fait construire une machine, qui étoit comme un extrait de mes miroirs brûlans, & ayant fait tomber la lumière réfléchie du soleil sur des thermomètres, il avoit toujours trouvé que si un miroir plan avoit fait monter la liqueur, par exemple, de trois degrés, deux miroirs dont on réunissoit la lumière, la faisoient monter de six degrés, & trois miroirs de neuf degrés. Or il est aisé de sentir que ceci ne peut pas être généralement vrai, car la grandeur des degrés du thermomètre n'est fondée que sur la division en mille parties, & sur la supposition que mille degrés au-dessous de la congélation font le froid absolu ; & comme il s'en faut bien que ce terme soit celui du plus grand froid possible, il est nécessaire qu'une augmentation de chaleur double ou triple par la réunion de deux ou trois miroirs, élève la liqueur à des hauteurs différentes de celle des degrés du thermomètre, selon que l'expérience sera faite dans un temps plus ou moins chaud ; que celui où ces hauteurs s'accorderont le mieux ou différeront le moins, sera celui des jours chauds de l'été, & que les expériences ayant été faites sur la fin de Mai,

48 Introduction à l'Histoire

autres élémens. Si le soleil est le père de la Nature, cette chaleur de la terre en est la mère, & toutes deux se réunissent pour produire, entretenir, animer les êtres organisés, & pour travailler, assimiler, composer les substances inanimées. Cette chaleur intérieure du globe qui tend toujours du centre à la circonférence, & qui s'éloigne perpendiculairement de la surface de la terre, est à mon avis, un grand agent dans la Nature; l'on ne peut guère douter qu'elle n'ait la principale influence sur la perpendicularité de la tige des plantes, sur les Phénomènes de l'électricité, dont la principale cause est le frottement ou mouvement en sens contraire, sur les effets du magnétisme, &c. Mais, comme je ne prétends pas faire ici un

ce n'est que par hasard qu'elles ont donné le résultat des augmentations de chaleur par les miroirs, proportionnelles aux degrés de l'échelle du thermomètre. Mais j'abrège cette critique en renvoyant à ce que j'ai dit près de vingt ans avant ce Mémoire de M. de Mairan sur la construction d'un thermomètre réel, & la graduation par le moyen de mes miroirs brûlans. Voyez les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1747.

Traité

e père de
a terre en
réunissent
er les êtres
assimiler,
ées. Cette
qui tend
érence, &
ment de la
avis, un
on ne peut
principale
rité de la
omènes de
ause est
en sens con-
étifine, &c.
s faire ici un

onné le résultat
miroirs, pro-
le du thermo-
renvoyant à
t ce Mémoire
d'un thermo-
moyen de mes-
de l'Académie

Traité

Traité de Physique, je me bornerai aux effets de cette chaleur sur les autres éléments. Elle suffit seule, elle est même bien plus grande qu'il ne faut pour maintenir la raréfaction de l'air au degré que nous respirons; elle est plus que suffisante pour entretenir l'eau dans son état de liquidité, car on a descendu des thermomètres jusqu'à cent vingt brasses de profondeur (*m*), & les retirant promptement, on a vu que la température de l'eau y étoit à très-peu-près la même que dans l'intérieur de la terre à pareille profondeur, c'est-à-dire, de dix degrés deux tiers. Et comme l'eau la plus chaude monte toujours à la surface, & que le sel l'empêche de geler, on ne doit pas être surpris de ce qu'en général la mer ne gèle pas, & que les eaux douces ne gèlent que d'une certaine épaisseur, l'eau du fond restant toujours liquide, lors même qu'il fait le plus grand froid, & que les couches supérieures sont en glace de dix pieds d'épaisseur.

(*m*) Histoire physique de la mer, par M. le comte Marigli, page 16.

Supplément. Tome I. C

50 Introduction à l'Histoire

Mais la terre est celui de tous les élémens sur lequel cette chaleur intérieure a dû produire & produit encore les plus grands effets. On ne peut pas douter, après les preuves que j'en ai données *(n)*, que cette chaleur n'ait été originairement bien plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui; ainsi, on doit lui rapporter, comme à la cause première, toutes les sublimations, précipitations, agrégations, séparations; en un mot, tous les mouvemens qui se font faits & se font chaque jour dans l'intérieur du globe, & sur-tout dans la couche extérieure où nous avons pénétré, & dont la matière a été remuée par les agens de la Nature, ou par les mains de l'homme; car, à une ou peut-être deux lieues de profondeur, on ne peut guère présumer qu'il y ait eu des conversions de matière, ni qu'il s'y fasse encore des changemens réels: toute la masse du globe ayant été fondue, liquéfiée par le feu, l'intérieur n'est qu'un verre ou concret ou discret, dont la substance

(n.) Voyez, dans ces Ouvrages, l'article de la formation des Planètes; & ci-après, les articles des époques de la Nature.

des Minéraux, I.^{re} Partie. §. I.

simple ne peut recevoir aucune altération par la chaleur seule ; il n'y a donc que la couche supérieure & superficielle qui, étant exposée à l'action des causes extérieures, aura subi toutes les modifications que ces causes réunies à celle de la chaleur intérieure auront pu produire par leur action combinée, c'est-à-dire, toutes les modifications, toutes les différences, toutes les formes, en un mot, des substances minérales.

Le feu qui ne paroît être, à la première vue, qu'un composé de chaleur & de lumière, ne seroit-il pas encore une modification de la matière qu'on doit considérer à part, quoiqu'elle ne diffère pas essentiellement de l'une ou de l'autre, & encore moins des deux prises ensemble ; le feu n'existe jamais sans chaleur, mais il peut exister sans lumière. On verra, par mes expériences, que la chaleur seule & dénuée de toute apparence de lumière, peut produire les mêmes effets que le feu le plus violent. On voit aussi que la lumière seule, lorsqu'elle est réunie, produit les mêmes effets ; elle semble porter en elle-même une substance qui n'a pas

52 *Introduction à l'Histoire*

besoin d'aliment ; le feu ne peut subsister au contraire qu'en absorbant de l'air , & il devient d'autant plus violent qu'il en absorbe davantage, tandis que la lumière concentrée & reçue dans un vase purgé d'air, agit comme le feu dans l'air, & que la chaleur resserrée, retenue dans un espace clos, subsiste & même augmente avec une très-petite quantité d'alimens. La différence la plus générale entre le feu, la chaleur & la lumière, me paroît donc consister dans la quantité, & peut-être dans la qualité de leurs alimens.

L'air est le premier aliment du feu, les matières combustibles ne sont que le second ; j'entends par premier aliment celui qui est toujours nécessaire & sans lequel le feu ne pourroit faire aucun usage des autres. Des expériences connues de tous les Physiciens , nous démontrent qu'un petit point de feu , tel que celui d'une bougie placée dans un vase bien fermé, absorbe en peu de temps une grande quantité d'air , & qu'elle s'éteint aussitôt que la quantité ou la qualité de cet aliment lui manque. D'autres expériences bien connues des Chimistes prouvent

que les matières les plus combustibles, telles que les charbons ne se consomment pas dans des vaisseaux bien clos, quoiqu'exposés à l'action du plus grand feu. L'air est donc le premier, le véritable aliment du feu, & les matières combustibles ne peuvent lui en fournir que par le secours & la médiation de cet élément dont il est nécessaire, avant d'aller plus loin, que nous considérions ici quelques propriétés.

Nous avons dit que toute fluidité avoit la chaleur pour cause, & en comparant quelques fluides ensemble, nous voyons qu'il faut beaucoup plus de chaleur pour tenir le fer en fusion que l'or, beaucoup plus pour y tenir l'or que l'étain, beaucoup moins pour y tenir la cire, beaucoup moins pour y tenir l'eau, encore beaucoup moins pour y tenir l'esprit-de-vin, & enfin excessivement moins pour y tenir le mercure, puisqu'il ne perd sa fluidité qu'au cent quatre-vingt-septième degré au-dessous de celui où l'eau perd la sienne. Cette matière, le mercure, seroit donc le plus fluide des corps si l'air ne l'étoit encore plus. Or, que nous indique cette

54 *Introduction à l'Histoire*

fluidité plus grande dans l'air que dans aucune matière : il me semble qu'elle suppose le moindre degré possible d'adhérence entre les parties constituantes, ce qu'on peut concevoir en les supposant de figure à ne pouvoir se toucher qu'en un point. On pourroit croire aussi qu'étant douées de si peu d'énergie apparente, & de si peu d'attraction mutuelle des unes vers les autres, elles sont, par cette raison, moins massives & plus légères que celles de tous les autres corps : mais cela me paroît démenti par la comparaison du mercure, le plus fluide des corps après l'air, & dont néanmoins les parties constituantes paroissent être plus massives & plus pesantes que celles de toutes les autres matières, à l'exception de l'or. La plus ou moins grande fluidité n'indique donc pas que les parties du fluide soient plus ou moins pesantes, mais seulement que leur adhérence est d'autant moindre, leur union d'autant moins intime, & leur séparation d'autant plus aisée. S'il faut mille degrés de chaleur pour entretenir la fluidité de l'eau, il n'en faudra peut-être qu'un pour maintenir celle de l'air.

des Minéraux, I.^{re} Partie. 55

L'air est donc de toutes les matières connues, celle que la chaleur divise le plus facilement, celle dont les parties lui obéissent avec le moins de résistance, celle qu'elle met le plus aisément en mouvement expansif & contraire à celui de la force attractive. Ainsi, l'air est tout près de la nature du feu, dont la principale propriété consiste dans ce mouvement expansif ; & quoique l'air ne l'ait pas par lui-même , la plus petite particule de chaleur ou de feu suffisant pour le lui communiquer, on doit cesser d'être étonné de ce que l'air augmente si fort l'activité du feu, & de ce qu'il est si nécessaire à sa subsistance : car étant de toutes les substances celle qui prend le plus aisément le mouvement expansif, ce sera celle aussi que le feu entraînera, enlèvera de préférence à toute autre, ce sera celle qu'il s'appropriera le plus intimement, comme étant de la nature la plus voisine de la sienne ; & par conséquent l'air doit être du feu l'adminicule le plus puissant, l'aliment le plus convenable, l'ami le plus intime & le plus nécessaire,

Les matières combustibles, que l'on

regarde vulgairement comme les vrais alimens du feu, ne lui servent néanmoins, ne lui profitent en rien dès qu'elles sont privées du secours de l'air, le feu le plus violent ne les consume pas, & même ne leur cause aucune altération sensible, au lieu qu'avec de l'air, une seule étincelle de feu les embrase, & qu'à mesure qu'on fournit de l'air en plus ou moins grande quantité, le feu devient dans la même proportion plus vif, plus étendu, plus dévorant. De sorte qu'on peut mesurer la célérité ou la lenteur avec laquelle le feu consume les matières combustibles par la quantité plus ou moins grande de l'air qu'on lui fournit. Ces matières ne sont donc, pour le feu, que des alimens secondaires, qu'il ne peut s'approprier par lui-même, & dont il ne peut faire usage qu'autant que l'air s'y mêlant, les rapproche de la nature du feu, en les modifiant, & leur sert d'intermède pour les y réunir.

On pourra (ce me semble) concevoir clairement cette opération de la Nature, en considérant que le feu ne réside pas dans les corps d'une manière fixe, qu'il

n'y fait ordinairement qu'un séjour instantané, qu'étant toujours en mouvement expansif, il ne peut subsister dans cet état qu'avec les matières susceptibles de ce même mouvement, que l'air s'y prêtant avec toute facilité, la somme de ce mouvement devient plus grande, l'action du feu plus vive, & que dès-lors les parties les plus volatiles des matières combustibles, telles que les molécules aériennes, huileuses, &c. obéissant sans effort à ce mouvement expansif qui leur est communiqué, elles s'élèvent en vapeurs: que ces vapeurs se convertissent en flamme par le même secours de l'air extérieur; & qu'enfin tant qu'il subsiste dans les corps combustibles quelques parties capables de recevoir, par le secours de l'air, ce mouvement d'expansion, elles ne cessent de s'en séparer pour suivre l'air & le feu dans leur route, & par conséquent se consumer en s'évaporant avec eux.

Il y a de certaines matières, telles que le phosphore artificiel, le pyrophore, la poudre à canon qui paroissent à la première vue faire une exception à ce que

18 Introduction à l'Histoire

je viens de dire, car elles n'ont pas besoin pour s'enflammer & se consumer en entier, du secours d'un air renouvelé; leur combustion peut s'opérer dans les vaisseaux les mieux fermés; mais c'est par la raison que ces matières, qu'on doit regarder comme les plus combustibles de toutes, contiennent dans leur substance tout l'air nécessaire à leur combustion. Leur feu produit d'abord cet air & le consume à l'instant, &, comme il est en très-grande quantité dans ces matières, il suffit à leur pleine combustion qui dès-lors n'a pas besoin, comme toutes les autres, du secours d'un air étranger.

Cela semble nous indiquer que la différence la plus essentielle qu'il y ait entre les matières combustibles & celles qui ne le sont pas, c'est que celles-ci ne contiennent que peu ou point de ces matières légères, aériennes, huileuses, susceptibles du mouvement expansif, ou que si elles en contiennent, elles s'y trouvent fixées & retenues; en sorte que, quoique volatiles en elles-mêmes, elles ne peuvent exercer leur volatilité toutes

les fois que la force du feu n'est pas assez grande pour surmonter la force d'adhésion qui les retient unies aux parties fixes de la matière. On peut même dire que cette induction, qui se tire immédiatement de mes principes, se trouve confirmée par un grand nombre d'observations bien connues des Chimistes & des Physiciens; mais ce qui paroît l'être moins, & qui cependant en est une conséquence nécessaire, c'est que toute matière pourra devenir volatile dès que l'homme pourra augmenter assez la force expansive du feu, pour la rendre supérieure à la force attractive qui tient unies les parties de la matière, que nous appelons fixes; car, d'une part; il s'en faut bien que nous ayons un feu aussi fort que nous pourrions l'avoir par des miroirs mieux conçus que ceux dont on s'est servi jusqu'à ce jour, & d'autre côté, nous sommes assurés que la fixité n'est qu'une qualité relative; & qu'aucune matière n'est d'une fixité absolue ou invincible; puisque la chaleur dilate les corps les plus fixes. Or cette dilatation n'est-elle pas l'indice d'un commencement de séparation qu'on augmente

60 *Introduction à l'Histoire*

avec le degré de chaleur jusqu'à la fusion, & qu'avec une chaleur encore plus grande on augmenteroit jusqu'à la volatilisation?

La combustion suppose quelque chose de plus que la volatilisation, il suffit pour celle-ci que les parties de la matière soient assez divisées, assez séparées les unes des autres pour pouvoir être enlevées par celles de la chaleur; au lieu que, pour la combustion, il faut encore qu'elles soient d'une nature analogue à celle du feu, sans cela le mercure, qui est le plus fluide après l'air, seroit aussi le plus combustible, tandis que l'expérience nous démontre que quoique très-volatil il est incombustible. Or quelle est donc l'analogie ou plutôt le rapport de nature que peuvent avoir les matières combustibles avec le feu? La matière, en général, est composée de quatre substances principales, qu'on appelle *Éléments*; la terre, l'eau, l'air & le feu, entrent tous quatre en plus ou moins grande quantité dans la composition de toutes les matières particulières; celles où la terre & l'eau dominant seront fixes, & ne pourront devenir que volatiles par l'action de la chaleur; celles au contraire

qui contiennent beaucoup d'air & de feu, seront les seules vraiment combustibles. La grande difficulté qu'il y ait ici, c'est de concevoir nettement comment l'air & le feu, tous deux si volatils, peuvent se fixer & devenir parties constituantes de tous les corps, car nous prouverons que quoiqu'il y ait une plus grande quantité d'air & de feu fixes dans les matières combustibles, & qu'ils y soient combinés d'une manière différente que dans les autres matières, toutes néanmoins contiennent une quantité considérable de ces deux élémens; & que les matières les plus fixes & les moins combustibles, sont celles qui retiennent ces élémens fugitifs avec le plus de force. Le fameux Phlogistique des Chimistes (être de leur méthode plutôt que de la Nature), n'est pas un principe simple & identique, comme ils nous le présentent, c'est un composé, un produit de l'alliage, un résultat de la combinaison des deux élémens, de l'air & du feu fixés dans les corps. Sans nous arrêter donc sur les idées obscures & incomplètes, que pourroit nous fournir la considération de cet être

62 *Introduction à l'Histoire*

précaire, tenons-nous-en à celle de nos quatre élémens réels, auxquels les Chimistes, avec tous leur nouveaux principes, seront toujours forcés de revenir ultérieurement.

Nous voyons clairement que le feu en absorbant de l'air en détruit le ressort. Or il n'y a que deux manières de détruire un ressort ; la première, en le comprimant assez pour le rompre ; la seconde, en l'étendant assez pour qu'il soit sans effet. Ce n'est pas de la première manière dont le feu peut détruire le ressort de l'air, puisque le moindre degré de chaleur le raréfie, que cette raréfaction augmente avec elle, & que l'expérience nous apprend qu'à une très-forte chaleur, la raréfaction de l'air est si grande, qu'il occupe alors un espace treize fois plus étendu que celui de son volume ordinaire ; le ressort dès-lors en est d'autant plus foible ; & c'est dans cet état qu'il peut devenir fixe & s'unir sans résistance sous cette nouvelle forme avec les autres corps. On entend bien que cet air transformé & fixé, n'est point du tout le même que celui qui se trouve dispersé, disséminé dans la plupart

des matières, & qui conserve dans leurs pores la nature entière; celui-ci ne leur est que mêlé & non pas uni; il ne leur tient que par une très-foible adhérence, au lieu que l'autre leur est si étroitement attaché, si intimement incorporé, que souvent on ne peut l'en séparer.

Nous voyons de même que la lumière, en tombant sur les corps, n'est pas, à beaucoup près, entièrement réfléchie, qu'il en reste en grande quantité dans la petite épaisseur de la surface qu'elle frappe; que par conséquent elle y perd son mouvement, s'y éteint, s'y fixe & devient dès-lors partie constituante de tout ce qu'elle pénètre. Ajoutez à cet air, à cette lumière, transformés & fixés dans les corps, & qui peuvent être en quantité variable; ajoutez-y, dis-je, la quantité constante du feu que toutes les matières, de quelque espèce que ce soit, possèdent également: cette quantité constante de feu ou de chaleur actuelle du globe de la terre, dont la somme est bien plus grande que celle de la chaleur qui nous vient du soleil, me paroît être

64 Introduction à l'Histoire

non-seulement un des grands ressorts du mécanisme de la Nature, mais en même temps un élément dont toute la matière du globe est pénétrée; c'est le feu élémentaire qui, quoique toujours en mouvement expansif, doit par sa longue résidence dans la matière, & par son choc contre les parties fixes, s'unir, s'incorporer avec elles, & s'éteindre par parties comme le fait la lumière (o).

Si nous considérons plus particulièrement la nature des matières combustibles, nous verrons que toutes proviennent originellement des végétaux, des animaux, des êtres en un mot qui sont placés à la surface du globe que le soleil éclaire, chauffe & vivifie; les bois, les charbons,

(o) Ceci même pourroit se prouver par une expérience, qui mériteroit d'être poussée plus loin. J'ai recueilli sur un miroir ardent par réflexion une assez forte chaleur sans aucune lumière, au moyen d'une plaque de tôle mise entre le brasier & le miroir; une partie de la chaleur s'est réfléchie au foyer du miroir, tandis que tout le reste de la chaleur l'a pénétré; mais je n'ai pu m'assurer si l'augmentation de chaleur dans la matière du miroir n'étoit pas aussi grande que s'il n'en eût pas réfléchi.

Sorts du
n même
matière
feu élé-
en mou-
longue
par son
s'unir,
indre par
(o).

articulière-
combustibles,
nnent ori-
animaux,
placés à la
œil éclaire,
charbons,

ver par une
lée plus loin.
par réflexion
lumière, au
ntre le brasier
s'est réfléchi
e reste de la
a. m'assurer si
atière du mi-
n'en eût pas

des Minéraux, I.^{re} Partie. 65

les tourbes, les bitumes, les résines, les huiles, les graisses, les suifs qui sont les vraies matières combustibles, puisque toutes les autres ne le sont qu'autant qu'elles en contiennent, ne proviennent-ils pas tous des corps organisés ou de leurs détrimens? le bois & même le charbon ordinaire, les graisses, les huiles par expression, la cire & le suif ne sont que des substances extraites immédiatement des végétaux & des animaux; les tourbes, les charbons fossiles, les succins, les bitumes liquides ou concrets, sont des produits de leur mélange & de leur décomposition, dont les détrimens ultérieurs forment les soufres & les parties combustibles du fer, du zinc, des pyrites & de tous les minéraux que l'on peut enflammer. Je sens que cette dernière assertion ne sera pas admise, & pourra même être rejetée, sur-tout par ceux qui n'ont étudié la Nature que par la voie de la chimie; mais je les prie de considérer que leur méthode n'est pas celle de la Nature, qu'elle ne pourra le devenir ou même s'en approcher qu'autant qu'elle s'accordera avec la saine physique, autant qu'on

66 Introduction à l'Histoire

en bannira, non-seulement les expressions obscures & techniques, mais sur-tout les principes précaires, les êtres fictifs auxquels on fait jouer le plus grand rôle, sans néanmoins les connoître. Le soufre, *en chimie*, n'est que le composé de l'acide vitriolique & du phlogistique; quelle apparence y a-t-il donc qu'il puisse, comme les autres matières combustibles, tirer son origine du détriment des végétaux ou des animaux? A cela je réponds, même en admettant cette définition chimique, que l'acide vitriolique, & en général tous les acides, tous les alkalis sont moins des substances de la Nature que des produits de l'art. La Nature forme des sels & du soufre, elle emploie à leur composition, comme à celle de toutes les autres substances, les quatre élémens, beaucoup de terre & d'eau, un peu d'air & de feu entrent en quantité variable dans chaque différente substance saline; moins de terre & d'eau, & beaucoup plus d'air & de feu, semblent entrer dans la composition du soufre. Les sels & les soufres doivent donc être regardés comme des êtres de la Nature dont on extrait, par le secours

expressions
 r-tout les
 fictifs aux-
 grand rôle,
 Le soufre,
 de l'acide
 quelle ap-
 e, comme
 s, tirer son
 aux ou des
 même en
 nique, que
 ral tous les
 moins des
 des produits
 sels & du
 composition,
 autres sub-
 beaucoup de
 & de feu
 dans chaque
 oins de terre
 air & de feu,
 position du
 fres doivent
 des êtres de
 r le secours

des Minéraux, I.^{re} Partie. 67

de l'art de la chimie, & par le moyen du feu, les différens acides qu'ils contiennent; & puisque nous avons employé le feu, & par conséquent de l'air & des matières combustibles pour extraire ces acides, pouvons-nous douter qu'ils n'aient retenu, & qu'ils ne contiennent réellement des parties de matière combustible qui y seront entrées pendant l'extraction?

Le phlogistique est encore bien moins que l'acide un être naturel, ce ne seroit même qu'un être de raison, si on ne le regardoit pas comme un composé d'air & de feu devenu fixe & inhérent aux autres corps. Le soufre peut en effet contenir beaucoup de ce phlogistique, beaucoup aussi d'acide vitriolique; mais il a, comme toute autre matière, & sa terre & son eau; d'ailleurs son origine indique qu'il faut une grande quantité de matières combustibles pour sa production; il se trouve dans les volcans, & il semble que la Nature ne le produise que par effort & par le moyen du plus grand feu; tout concourt donc à nous prouver qu'il est de la même nature que les autres matières combustibles, & que par conséquent il

68 *Introduction à l'Histoire*

tire, comme elles, sa première origine du détriment des êtres organisés.

Mais je vais plus loin : les acides eux-mêmes viennent en grande partie de la décomposition des substances animales ou végétales, & contiennent en conséquence des principes de la combustion. Prenons pour exemple le salpêtre, ne doit-il pas son origine à ces matières ? n'est-il pas formé par la putréfaction des végétaux, ainsi que des urines & des excréments des animaux ? il me semble que l'expérience le démontre, puisqu'on ne cherche, on ne trouve le salpêtre que dans les habitations où l'homme & les animaux ont long-temps résidé ; & puisqu'il est immédiatement formé du détriment des substances animales & végétales, ne doit-il pas contenir une prodigieuse quantité d'air & de feu fixes ? aussi en contient-il beaucoup, & même beaucoup plus que le soufre, le charbon, l'huile, &c. Toutes ces matières combustibles ont besoin, comme nous l'avons dit, du secours de l'air pour brûler, & se consomment d'autant plus vite, qu'elles en reçoivent en plus grande quantité ; le salpêtre n'en a pas

besoin dès qu'il est mêlé avec quelques-unes de ces matières combustibles, il semble porter en lui-même le réservoir de tout l'air nécessaire à sa combustion : en le faisant détonner lentement, on le voit souffler son propre feu, comme le feroit un soufflet étranger ; en le renfermant le plus étroitement, son feu, loin de s'éteindre, n'en prend que plus de force & produit les explosions terribles, sur lesquelles sont fondés nos arts meurtriers. Cette combustion si prompte est en même temps si complète qu'il ne reste presque rien après l'inflammation, tandis que toutes les autres matières enflammées laissent des cendres ou d'autres résidus qui démontrent que leur combustion n'est pas entière, ou, ce qui revient au même, qu'elles contiennent un assez grand nombre de parties fixes, qui ne peuvent ni se brûler ni même se volatiliser. On peut de même démontrer que l'acide vitriolique contient aussi beaucoup d'air & de feu fixes, quoiqu'en moindre quantité que l'acide nitreux ; & dès-lors il tire, comme celui-ci, son origine de la même source, & le soufre

70 *Introduction à l'Histoire*

dans la composition duquel cet acide entre si abondamment, tire, des animaux & des végétaux, tous les principes de sa combustibilité.

Le phosphore artificiel, qui est le premier dans l'ordre des matières combustibles, & dont l'acide est différent de l'acide nitreux & de l'acide virriolique, ne se tire aussi que du règne animal, ou, si l'on veut, en partie du règne végétal élaboré dans les animaux, c'est-à-dire, des deux sources de toute matière combustible. Le phosphore s'enflamme de lui-même, c'est-à-dire, sans communication de matière ignée, sans frottement, sans autre addition que celle du contact de l'air : autre preuve de la nécessité de cet élément pour la combustion même d'une matière qui ne paroît être composée que du feu. Nous démontrerons dans la suite que l'air est contenu dans l'eau sous une forme moyenne, entre l'état d'élasticité & celui de fixité; le feu paroît être dans le phosphore à-peu-près dans ce même état moyen; car de même que l'air se dégage de l'eau dès que l'on diminue la pression de l'atmosphère, le

feu le dégage du phosphore lorsqu'on fait cesser la pression de l'eau, où l'on est obligé de le tenir submergé pour pouvoir le garder & empêcher son feu de s'exalter. Le phosphore semble contenir cet élément sous une forme obscure & condensée, & il paroît être pour le feu obscur ce qu'est le miroir ardent pour le feu lumineux, c'est-à-dire, un moyen de condensation.

Mais sans nous soutenir plus long-temps à la hauteur de ces considérations générales, auxquelles je pourrai revenir lorsqu'il sera nécessaire, suivons d'une manière plus directe & plus particulière l'examen du feu; tâchons de saisir ses effets, & de les présenter sous un point de vue plus fixe qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

L'action du feu, sur les différentes substances, dépend beaucoup de la manière dont on l'applique; & le produit de son action sur une même substance, paroîtra différent selon la façon dont il est administré. J'ai pensé qu'on devoit considérer le feu dans trois états différens, le premier relatif à sa vitesse, le second à son volume, & le troisième à sa masse;

72 *Introduction à l'Histoire*

sous chacun de ces points de vue, cet élément si simple, si uniforme en apparence, paroîtra, pour ainsi dire, un élément différent. On augmente la vitesse du feu sans en augmenter le volume apparent, toutes les fois que dans un espace donné & rempli de matières combustibles, on presse l'action & le développement du feu en augmentant la vitesse de l'air par des soufflets, des trompes, des ventilateurs, des tuyaux d'aspiration, &c. qui tous accélèrent plus ou moins la rapidité de l'air dirigé sur le feu; ce qui comprend, comme l'on voit, tous les instrumens, tous les fourneaux à vent, depuis les grands fourneaux de forges jusqu'à la lampe des émailleurs.

On augmente l'action du feu par son volume toutes les fois qu'on accumule une grande quantité de matières combustibles, & qu'on en fait rouler la chaleur & la flamme dans des fourneaux de réverbère; ce qui comprend, comme l'on fait, les fourneaux de nos manufactures de glaces, de crystal, de verre, de porcelaine, de poterie, & aussi ceux où l'on fond tous les métaux & les minéraux, à l'exception

des

l'exception
son volu
puisque
par des
qui porte
que la for
ouverture
neaux tire
puissamm
libre, ma
est très-pe
de la gra
les soufflet
accélère l'a
l'air autant
procédé, c
sa flamme

Il y a,
moyens d'a
qu'on veui
ou par son
seul par le
masse, c'est
miroir arde
miroir réfri
du soleil, o
allumé, on
Suppléme

l'exception du fer ; le feu agit ici par son volume, & n'a que sa propre vitesse puisqu'on n'en augmente pas la rapidité, par des soufflets ou d'autres instrumens qui portent l'air sur le feu. Il est vrai que la forme des *tisards*, c'est-à-dire des ouvertures principales, par où ces fourneaux tirent l'air, contribue à l'attirer plus puissamment qu'il ne le seroit en espace libre, mais cette augmentation de vitesse est très-peu considérable en comparaison de la grande rapidité que lui donnent les soufflets ; par ce dernier procédé, on accélère l'action du feu qu'on aiguise par l'air autant qu'il est possible ; par l'autre procédé, on l'augmente en concentrant sa flamme en grand volume.

Il y a, comme l'on voit, plusieurs moyens d'augmenter l'action du feu, soit qu'on veuille le faire agir par sa vitesse ou par son volume ; mais il n'y en a qu'un seul par lequel on puisse augmenter la masse, c'est de le réunir au foyer d'un miroir ardent. Lorsqu'on reçoit sur un miroir réfringent ou réflexif les rayons du soleil, ou même ceux d'un feu bien allumé, on les réunit dans un espace

74 *Introduction à l'Histoire*

d'autant moindre que le miroir est plus grand & le foyer plus court. Par exemple, avec un miroir de quatre pieds de diamètre & d'un pouce de foyer, il est clair que la quantité de lumière ou de feu, qui tombe sur le miroir de quatre pieds, se trouvant réunie dans l'espace d'un pouce, feroit deux mille trois cents quatre fois plus dense qu'elle ne l'étoit, si toute la matière incidente arrivoit sans perte à ce foyer. Nous verrons ailleurs ce qui s'en perd effectivement; mais il nous suffit ici de faire sentir que quand même cette perte feroit des deux tiers ou des trois quarts, la masse du feu concentré au foyer de ce miroir, sera toujours six ou sept cents fois plus dense qu'elle ne l'étoit à la surface du miroir. Ici, comme dans tous les autres cas, la masse accroît par la contraction du volume, & le feu dont on augmente ainsi la densité, a toutes les propriétés d'une masse de matière; car, indépendamment de l'action de la chaleur par laquelle il pénètre les corps, il les pousse & les déplace comme le feroit un corps solide en mouvement qui en choqueroit un autre. On pourra donc augmenter, par ce moyen, la densité ou

la masse du feu d'autant plus qu'on perfectionnera davantage la construction des miroirs ardens.

Or chacune de ces trois manières d'administrer le feu & d'en augmenter ou la vitesse, ou le volume, ou la masse, produit sur les mêmes substances des effets souvent très-différens; on calcine, par l'un de ces moyens, ce que l'on fond par l'autre; on volatilise par le dernier ce qui paroît réfractaire au premier; en sorte que la même matière donne des résultats si peu semblables, qu'on ne peut compter sur rien, à moins qu'on ne la travaille en même temps ou successivement par ces trois moyens ou procédés que nous venons d'indiquer; ce qui est une route plus longue, mais la seule qui puisse nous conduire à la connoissance exacte de tous les rapports que les diverses substances peuvent avoir avec l'élément du feu. Et de la même manière que je divise en trois procédés généraux l'administration de cet élément, je divise de même en trois classes toutes les matières que l'on peut soumettre à son action. Je mets à part, pour un moment, celles qui sont

purement combustibles, & qui proviennent immédiatement des animaux & des végétaux ; & je divise toutes les matières minérales en trois classes relativement à l'action du feu : la première est celle des matières, que cette action, long-temps continuée, rend plus légères, comme le fer ; la seconde, celle des matières que cette même action du feu rend plus pesantes, comme le plomb ; & la troisième classe est celle des matières sur lesquelles, comme sur l'or, cette action du feu ne paroît produire aucun effet sensible, puisqu'elle n'altère point leur pesanteur ; toutes les matières existantes & possibles, c'est-à-dire, toutes les substances simples & composées, seront nécessairement comprises dans l'une de ces trois classes. Ces expériences, par les trois procédés, qui ne sont pas difficiles à faire, & qui ne demandent que de l'exactitude & du temps, pourroient nous découvrir plusieurs choses utiles, & seroient très-nécessaires pour fonder sur des principes réels la théorie de la chimie ; cette belle science jusqu'à nos jours n'a porté que sur une nomenclature précaire, & sur des mots d'autant plus vagues, qu'ils sont plus généraux. Le feu

étant, pour ainsi dire, le seul instrument de cet art, & la nature n'étant point connue, non plus que ses rapports avec les autres corps, on ne fait ni ce qu'il y met ni ce qu'il en ôte, on travaille donc à l'aveugle, & l'on ne peut arriver qu'à des résultats obscurs que l'on rend encore plus obscurs en les érigeant en principes. Le phlogistique, le minéralisateur, l'acide, l'alkali, &c. ne sont que des termes créés par la méthode, dont les définitions sont adoptées par convention, & ne répondent à aucune idée claire & précise, ni même à aucun être réel. Tant que nous ne connoîtrons pas mieux la nature du feu, tant que nous ignorerons ce qu'il ôte ou donne aux matières qu'on soumet à son action, il ne sera pas possible de prononcer sur la nature de ces mêmes matières d'après les opérations de la chymie; puisque chaque matière à laquelle le feu ôte ou donne quelque chose, n'est plus la substance simple que l'on voudroit connoître, mais une matière composée & mêlée, ou dénaturée & changée par l'addition ou la soustraction d'autres matières que le feu en enlève ou y fait entrer.

78 *Introduction à l'Histoire*

Prenons pour exemple de cette addition & de cette soustraction, le plomb & le marbre; par la simple calcination, l'on augmente le poids du plomb de près d'un quart, & l'on diminue celui du marbre de près de moitié; il y a donc un quart de matière inconnue que le feu donne au premier, & une moitié d'autre matière également inconnue qu'il enlève au second. Tous les raisonnemens de la chimie ne nous ont pas démontré jusqu'ici, ce que c'est que cette matière donnée ou enlevée par le feu; & il est évident que lorsqu'on travaille sur le plomb & sur le marbre après leur calcination, ce ne sont plus ces matières simples que l'on traite, mais d'autres matières dénaturées & composées par l'action du feu. Ne seroit-il donc pas nécessaire, avant tout, de procéder d'après les vues que je viens d'indiquer, de voir d'abord sous un même coup d'œil toutes les matières que le feu ne change ni n'altère, ensuite celles que le feu détruit ou diminue, & enfin celles qu'il augmente & compose en s'incorporant avec elles?

Mais examinons de plus près la nature du feu considéré en lui-même. Puisque

c'est une substance matérielle, il doit être sujet à la loi générale, à laquelle toute matière est soumise, il est le moins pesant de tous les corps, mais cependant il pèse ; &, quoique ce que nous avons dit précédemment suffise pour le prouver évidemment, nous le démontrerons encore par des expériences palpables, & que tout le monde sera en état de répéter aisément. On pourroit d'abord soupçonner, par la pesanteur réciproque des astres, que le feu en grande masse est pesant ainsi que toute autre matière ; car les astres qui sont lumineux comme le soleil, dont toute la substance paroît être de feu, n'en exercent pas moins leur force d'attraction à l'égard des astres qui ne le sont pas : mais nous démontrerons que le feu même en très-petit volume est réellement pesant, qu'il obéit comme toute autre matière à la loi générale de la pesanteur, & que par conséquent il doit avoir, de même, des rapports d'affinités avec les autres corps ; en avoir plus ou moins avec telle ou telle substance, & n'en avoir que peu ou point du tout avec beaucoup d'autres. Toutes celles qu'il rendra plus pesantes comme

80 *Introduction à l'Histoire*

le plomb, seront celles avec lesquelles il aura le plus d'affinité, & en le supposant appliqué au même degré & pendant un temps égal, celles de ces matières qui gagneront le plus en pesanteur, seront aussi celles avec lesquelles cette affinité fera la plus grande. Un des effets de cette affinité dans chaque matière, est de retenir la substance même du feu, & de se l'incorporer, & cette incorporation suppose que non-seulement le feu perd sa chaleur & son élasticité, mais même tout son mouvement, puisqu'il se fixe dans ces corps & en devient partie constituante. Il y a donc lieu de croire qu'il en est du feu comme de l'air qui se trouve sous une forme fixe & concrète dans presque tous les corps, & l'on peut espérer qu'à l'exemple du docteur Hales (*p*), qui a su dégager cet air fixé dans tous les corps & en évaluer la quantité, il viendra quelque

(*p*) Le phosphore qui n'est, pour ainsi dire, qu'une matière ignée, une substance qui conserve & condense le feu, seroit le premier objet des expériences qu'il faudroit faire, pour traiter le feu comme M. Hales a traité l'air, & le premier instrument qu'il faudroit employer pour ce nouvel art.

jour un Physicien habile, qui trouvera les moyens de distraire le feu de toutes les matières où il se trouve sous une forme fixe ; mais il faut auparavant faire la table de ces matières , en établissant par l'expérience les différens rapports dans lesquels le feu se combine avec toutes les substances qui lui sont analogues , & se fixe en plus ou moins grande quantité , selon que ces substances ont plus ou moins de force pour le retenir.

Car il est évident que toutes les matières dont la pesanteur augmente par l'action du feu , sont douées d'une force attractive, telle que son effet est supérieur à celui de la force expansive , dont les particules du feu sont animées ; puisque celle-ci s'amortit & s'éteint , que son mouvement cesse , & que d'élastiques & fugitives qu'étoient ces particules ignées , elles deviennent fixes, solides & prennent une forme concrète. Ainsi, les matières qui augmentent de poids par le feu comme l'étain, le plomb, les fleurs de zinc, &c. & toutes les autres qu'on pourra découvrir, sont des substances qui, par leur affinité avec le feu, l'attirent & se l'incorporent.

82 *Introduction à l'Histoire*

Toutes les matières au contraire, qui, comme le fer, le cuivre, &c. deviennent plus légères à mesure qu'on les calcine, sont des substances dont la force attractive, relativement aux particules ignées, est moindre que la force expansive du feu; & c'est ce qui fait que le feu, au lieu de se fixer dans ces matières, en enlève au contraire, & en chasse les parties les moins liées qui ne peuvent résister à son impulsion. Enfin celles qui, comme l'or, la platine, l'argent, le grès, &c. ne perdent ni n'acquièrent par l'application du feu, & qu'il ne fait, pour ainsi dire, que traverser sans en rien enlever & sans y rien laisser, sont des substances qui, n'ayant aucune affinité avec le feu, & ne pouvant se joindre avec lui, ne peuvent par conséquent ni le retenir ni l'accompagner en se laissant enlever. Il est évident que les matières des deux premières classes, ont avec le feu un certain degré d'affinité, puisque celles de la seconde classe se chargent du feu qu'elles retiennent, & que le feu se charge de celles de la première classe & qu'il les emporte; au lieu que les matières de la troisième classe auxquelles il ne donne ni n'ôte

rien, n'ont aucun rapport d'affinité ou d'attraction avec lui, & sont, pour ainsi dire, indifférentes à son action, qui ne peut ni les détruire ni même les altérer.

Cette division de toutes les matières en trois classes relatives à l'action du feu, n'exclut pas la division plus particulière & moins absolue de toutes les matières en deux autres classes, qu'on a jusqu'ici regardées comme relatives à leur propre nature, qui, dit-on, est toujours vitrescible ou calcaire. Notre nouvelle division n'est qu'un point de vue plus élevé, sous lequel il faut les considérer pour tâcher d'en déduire la connoissance même de l'agent qu'on emploie par les différens rapports que le feu peut avoir avec toutes les substances auxquelles on l'applique; faute de comparer ou de combiner ces rapports, ainsi que les moyens qu'on emploie pour appliquer le feu, je vois qu'on tombe tous les jours dans des contradictions apparentes, & même dans des erreurs très-préjudiciables (q).

(q) Je vais en donner un exemple récent. Deux

84 Introduction à l'Histoire

On pourroit donc dire , avec les

habiles Chimistes (M.^{rs} Pott & d'Arcet), ont soumis un grand nombre de substances à l'action du feu ; le premier s'est servi d'un fourneau que je suis étonné que le second n'ait point entendu, puisque rien ne m'a paru si clair dans tout l'Ouvrage de M. Pott, & qu'il ne faut qu'un coup-d'œil sur la planche gravée de ce fourneau, pour reconnoître que, par sa construction, il peut, quoique sans soufflets, faire à-peu près autant d'effet que s'il en étoit garni ; car, au moyen des longs tuyaux qui sont adaptés au fourneau par le haut & par le bas, l'air y arrive & circule avec une rapidité d'autant plus grande que les tuyaux sont mieux proportionnés : ce sont des soufflets constans, & dont on peut augmenter l'effet à volonté. Cette construction est si bonne & si simple, que je ne puis concevoir que M. d'Arcet dise *que ce fourneau est un problème pour lui... qu'il est persuadé que M. Pott a dû se servir de soufflets, &c.* tandis qu'il est évident que son fourneau équivaut par sa construction à l'action des soufflets, & que par conséquent il n'avoit pas besoin d'y avoir recours ; que d'ailleurs ce fourneau est encore exempt du vice que M. d'Arcet reproche aux soufflets, dont il a raison de dire que *l'action alterne, sans cesse renaissante & expirante, jette du trouble & de l'inégalité sur celle du feu* ; ce qui ne peut arriver ici, puisque, par la construction du fourneau, l'on voit évidemment que le renouvellement de l'air est constant, & que son action ne renaît ni n'expire, mais est continue & toujours uniforme : ainsi, M. Pott a employé l'un des moyens dont on se doit servir pour appliquer le feu ; c'est-à-dire,

Naturalistes, que tout est vitrescible dans

un moyen par lequel, comme par les soufflets, on augmente la vitesse du feu, en le pressant incessamment par un air toujours renouvelé ; & toutes les fusions qu'il a faites par ce moyen, & dont j'ai répété quelques-unes, comme celle du grès, du quartz, &c. sont très-réelles, quoique M. d'Arcet les nie. Pourquoi les nie-t-il ? c'est que de son côté, au lieu d'employer, comme M. Pott, le premier de ces procédés généraux, c'est-à-dire, le feu par sa vitesse accélérée autant qu'il est possible par le mouvement rapide de l'air ; moyen par lequel il eût obtenu les mêmes résultats, il s'est servi du second procédé, & n'a employé que le feu en grand volume dans un fourneau, sans soufflets ou sans équivalent, dans lequel par conséquent le feu ne devoit pas produire les mêmes effets, mais devoit en donner d'autres, que par la même raison le premier procédé ne pouvoit pas produire ; ainsi, les contradictions entre les résultats de ces deux habiles Chimistes ne sont qu'apparentes & fondées sur deux erreurs évidentes. La première consiste à croire que le feu le plus violent est celui qui est en plus grand volume ; & la seconde, que l'on doit obtenir du feu violent les mêmes résultats, de quelque manière qu'on l'applique : cependant ces deux idées sont fausses ; la considération des vérités contraires est encore une des premières pierres qu'il faudroit poser aux fondemens de la Chimie ; car ne seroit-il pas très-nécessaire avant tout, & pour éviter de pareilles contradictions à l'avenir, que les Chimistes ne perdissent pas de vue qu'il y a trois moyens généraux & très-différens l'un de l'autre,

Photographic Sciences Corporation

**23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503**

1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
31.5
36.0
40.0
45.0
50.0
56.0
63.0
71.0
80.0
90.0
100.0

1.1
1.2
1.5
1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
31.5
36.0
40.0
45.0
50.0
56.0
63.0
71.0
80.0
90.0
100.0

la Nature, à l'exception de ce qui est

d'appliquer le feu violent ? Le premier , comme je l'ai dit , par lequel on n'emploie qu'un petit volume de feu , mais que l'on agite , aiguise , exalte au plus haut degré par la vitesse de l'air , soit par des soufflets , soit par un fourneau semblable à celui de M. Pott , qui tire l'air avec rapidité : on voit par l'effet de la lampe d'Emailleur qu'avec une quantité de feu presque infiniment petite , on fait de plus grands effets en petit que le fourneau de verrerie ne peut en faire en grand. Le second moyen est d'appliquer le feu , non pas en petit , mais en très-grande quantité , comme on le fait dans les fourneaux de porcelaine & de verrerie , où le feu n'est fort que par son volume , où son action est tranquille , & n'est pas exaltée par un renouvellement très-rapide de l'air. Le troisième moyen est d'appliquer le feu en très-petit volume , mais en augmentant sa masse & son intensité au point de le rendre plus fort que par le second moyen , & plus violent que par le premier ; & ce moyen de concentrer le feu & d'en augmenter la masse par les miroirs ardents , est encore le plus puissant de tous.

Or chacun de ces trois moyens doit fournir un certain nombre de résultats différens ; si , par le premier moyen , on fond & vitrifie telles & telles matières , il est très-possible que , par le second moyen , on ne puisse vitrifier ces mêmes matières , & qu'au contraire on en puisse fondre d'autres qui n'ont pu l'être par le premier moyen ; & enfin il est tout aussi possible que , par le troisième moyen , on obtienne encore plusieurs résultats semblables ou différens de ceux qu'ont fournis les deux premiers

calcaire ; que les quartz , les crystaux , les

moyens. Dès - lors un Chimiste qui , comme M. Pott , n'emploie que le premier moyen , doit se borner à donner les résultats fournis par ce moyen , faire , comme il l'a fait , l'énumération des matières qu'il a fondues , mais ne pas prononcer sur la non-fusibilité des autres , parce qu'elles peuvent l'être par le second ou le troisième moyen ; enfin ne pas dire affirmativement & exclusivement , en parlant de son fourneau , *qu'en une heure de temps , ou deux au plus , il met en fonte tout ce qui est fusible dans la Nature*. Et , par la même raison , un autre Chimiste qui , comme M. d'Arcet , ne s'est servi que du second moyen , tombe dans l'erreur , s'il se croit en contradiction avec celui qui ne s'est servi que du premier moyen , & cela parce qu'il n'a pu fondre plusieurs matières que l'autre a fait couler , & qu'au contraire il a mis en fusion d'autres matières que le premier n'avoit pu fondre ; car si l'un ou l'autre se fût avisé d'employer successivement les deux moyens , il auroit bien senti qu'il n'étoit point en contradiction avec lui-même & que la différence des résultats ne provenoit que de la différence des moyens employés. Que résulte-t-il donc de réel de tout ceci , sinon qu'il faut ajouter à la liste des matières fondues par M. Pott , celles de M. d'Arcet , & se souvenir seulement que , pour fondre les premières , il faut le premier moyen ; & le second pour fondre les autres ? Il n'y a par conséquent aucune contradiction entre les expériences de M. Pott & celles de M. d'Arcet , que je crois également bonnes ; mais tous deux , après cette conciliation , auroient encore tort de conclure qu'ils ont fondu par

88 *Introduction à l'Histoire*

pierres précieuses, les cailloux, les grès,

ces deux moyens tout ce qui est fusible dans la Nature, puisque l'on peut démontrer que par le troisième moyen, c'est-à-dire, par les miroirs ardens, on fond & vitrifie, on volatilise & même on brûle quelques matières qui leur ont également paru fixes & réfractai es au feu de leurs fourneaux. Je ne m'arrêterai pas sur plusieurs choses de détail, qui cependant mériteroient animadversion, parce qu'il est toujours utile de ne pas laisser germer des idées erronées ou des faits mal vus, & dont on peut tirer de fausses conséquences. M. d'Arcet dit qu'il a remarqué constamment que la flamme fait plus d'effet que le feu de charbon : oui sans doute, si ce feu n'est pas excité par le vent ; mais toutes les fois que le charbon ardent sera vivifié par un air rapide, il y aura de la flamme qui sera plus active, & produira de bien plus grands effets que la flamme tranquille. De même, lorsqu'il dit que les fourneaux donnent de la chaleur en raison de leur épaisseur, cela ne peut être vrai que dans le seul cas où les fourneaux étant supposés égaux, le feu qu'ils contiennent seroit en même temps animé par deux courans d'air, égaux en volume & en rapidité ; la violence du feu dépend presque en entier de cette rapidité du courant de l'air qui l'anime, je puis le démontrer par ma propre expérience : j'ai vu le grès que M. d'Arcet croit infusible couler & se couvrir d'émail par le moyen de deux bons soufflets, mais sans le secours d'aucun fourneau & à feu ouvert. L'effet des fourneaux épais n'est pas d'augmenter la chaleur, mais de la conserver, & ils la conservent d'autant plus long-temps qu'ils sont plus épais.

les granites, porphyres, agates, ardoises, gypses, argiles, les pierres ponce, les laves, les amiantes avec tous les métaux & autres minéraux, sont vitrifiables par le feu de nos fourneaux, ou par celui des miroirs ardents; tandis que les marbres, les albâtres, les pierres, les braies, les marnes, & les autres substances qui proviennent du détrimment des coquilles & des madrépores, ne peuvent se réduire en fusion par ces moyens. Cependant je suis persuadé que si l'on vient à bout d'augmenter encore la force des fourneaux, & sur-tout la puissance des miroirs ardents, on arrivera au point de faire fondre ces matières calcaires, qui paroissent être d'une nature différente de celle des autres; puisqu'il y a mille & mille raisons de croire qu'au fond, leur substance est la même, & que le verre est la base commune de toutes les matières terrestres.

Par les expériences que j'ai pu faire moi-même, pour comparer la force du feu selon qu'on emploie, ou sa vitesse, ou son volume, ou sa masse, j'ai trouvé que le feu des plus grands & des plus puissans fourneaux de verrerie, n'est qu'un

90 *Introduction à l'Histoire*

feu foible en comparaison de celui des fourneaux à soufflets, & que le feu produit au foyer d'un bon miroir ardent, est encore plus fort que celui des plus grands fourneaux de forge. J'ai tenu pendant trente-six heures, dans l'endroit le plus chaud du fourneau de Rouelle en Bourgogne, où l'on fait des glaces aussi grandes & aussi belles qu'à Saint-Gobin en Picardie, & où le feu est aussi violent; j'ai tenu, dis-je, pendant trente-six heures à ce feu; de la mine de fer, sans qu'elle se soit fondue, ni agglutinée, ni même altérée en aucune manière; tandis qu'en moins de douze heures cette mine coule en fonte dans les fourneaux de ma forge: ainsi, ce dernier feu est bien supérieur à l'autre. De même j'ai fondu ou valatilisé au miroir ardent plusieurs matières que, ni le feu des fourneaux de réverbère, ni celui des plus puissans soufflets n'avoit pu fondre, & je me suis convaincu que ce dernier moyen est le plus puissant de tous; mais je renvoie à la partie expérimentale de mon ouvrage, le détail de ces expériences importantes, dont je me contente d'indiquer ici le résultat général.

On croit vulgairement que la flamme est la partie la plus chaude du feu, cependant rien n'est plus mal fondé que cette opinion; car on peut démontrer le contraire par les expériences les plus aisées & les plus familières. Présentez à un feu de paille ou même à la flamme d'un fagot qu'on vient d'allumer, un linge pour le sécher ou le chauffer, il vous faudra le double & le triple du temps pour lui donner le degré de sécheresse ou de chaleur que vous lui donnerez en l'exposant à un brasier sans flamme, ou même à un poêle bien chaud. La flamme a été très-bien caractérisée par Newton, lorsqu'il l'a définie une fumée brûlante (*flamma est fumus candens*), & cette fumée ou vapeur qui brûle n'a jamais la même quantité, la même intensité de chaleur que le corps combustible duquel elle s'échappe; seulement, en s'élevant & s'étendant au loin, elle a la propriété de communiquer le feu, & de le porter plus loin que ne s'étend la chaleur du brasier, qui seule ne suffiroit pas pour le communiquer même de près.

Cette communication du feu mérite une

92 *Introduction à l'Histoire*

attention particulière. J'ai vu, après y avoir réfléchi, que, pour la bien entendre, il falloit s'aider, non-seulement des faits qui paroissent y avoir rapport, mais encore de quelques expériences nouvelles, dont le succès ne me paroît laisser aucun doute sur la manière dont se fait cette opération de la Nature. Qu'on reçoive dans un moule deux ou trois milliers de fer au sortir du fourneau, ce métal perd en peu de temps son incandescence, & cesse d'être rouge, après une heure ou deux, suivant l'épaisseur plus ou moins grande du lingot. Si, dans ce moment qu'il cesse de nous paroître rouge, on le tire du moule, les parties inférieures seront encore rouges, mais perdront cette couleur en peu de temps. Or, tant que le rouge subsiste, on pourra enflammer, allumer les matières combustibles qu'on appliquera sur ce lingot; mais, dès qu'il a perdu cet état d'incandescence, il y a des matières en grand nombre qu'il ne peut plus enflammer; & cependant la chaleur qu'il répand, est peut-être cent fois plus grande que celle d'un feu de paille qui néanmoins communiqueroit l'inflammation à toutes

ce
fla
ti
to
ser
pa
co
qu
pe
aff
fla
&
qu
de
ma
du
qui
J
rier
fixe
dan
d'u
une
—
(
par

ces matières; cela m'a fait penser que la flamme étant nécessaire à la communication du feu, il y avoit de la flamme dans toute incandescence: la couleur rouge semble en effet nous l'indiquer; mais, par l'habitude où l'on est de ne regarder comme flamme que cette matière légère qu'agite & qu'emporte l'air, on n'a pas pensé qu'il pouvoit y avoir de la flamme assez dense pour ne pas obéir comme la flamme commune à l'impulsion de l'air; & c'est ce que j'ai voulu vérifier par quelques expériences, en approchant par degrés de ligne & de demi-ligne, des matières combustibles, près de la surface du métal en incandescence & dans l'état qui suit l'incandescence (r):

Je suis donc convaincu que les matières incombustibles & même les plus fixes, telles que l'or & l'argent, sont, dans l'état d'incandescence, environnées d'une flamme dense qui ne s'étend qu'à une très-petite distance, & qui, pour

(r). Voyez le détail de ces expériences dans la partie expérimentale de cet Ouvrage.

94 *Introduction à l'Histoire*

ainsi dire, est attachée à leur surface ; & je conçois aisément que quand la flamme devient dense à un certain degré, elle cesse d'obéir à la fluctuation de l'air. Cette couleur blanche ou rouge, qui sort de tous les corps en incandescence & vient frapper nos yeux, est l'évaporation de cette flamme dense qui environne le corps en se renouvelant incessamment à sa surface ; & la lumière du soleil même n'est-elle pas l'évaporation de cette flamme dense dont brille sa surface avec si grand éclat ; cette lumière ne produit-elle pas, lorsqu'on la condense, les mêmes effets que la flamme la plus vive ? ne communique-t-elle pas le feu avec autant de promptitude & d'énergie ? ne résiste-t-elle pas comme notre flamme dense à l'impulsion de l'air ? ne suit-elle pas toujours une route directe, que le mouvement de l'air ne peut ni contrarier ni changer ? puisqu'en soufflant, comme je l'ai éprouvé, avec un fort soufflet sur le cône lumineux d'un miroir ardent, on ne diminue point du tout l'action de la lumière dont il est composé, & qu'on doit la regarder comme une

vi
to
be

se
pe
ell
ne
les
pu
ne
qu
ell
feu
em
niq
bie
de
gra
lum
& l

(
l'eau
l'éta
l'aito
cité
page

vraie flamme plus pure & plus dense que toutes les flammes de nos matières combustibles.

C'est donc par la lumière que le feu se communique, & la chaleur seule ne peut produire le même effet, que quand elle devient assez forte pour être lumineuse. Les métaux, les cailloux, les grès, les briques, les pierres calcaires, quel que puisse être leur degré différent de chaleur, ne pourront enflammer deux corps, que quand ils seront devenus lumineux. L'eau elle-même, cet élément destructeur du feu, & par lequel seul nous pouvons empêcher la communication, le communique néanmoins, lorsque dans un vaisseau bien fermé, tel que celui de la marmite de *Papin* (f), on la pénètre d'une assez grande quantité de feu pour la rendre lumineuse, & capable de fondre le plomb & l'étain; tandis que, quand elle n'est que

(f) Dans le *Digesteur* de *Papin*, la chaleur de l'eau est portée au point de fondre le plomb & l'étain qu'on y a suspendu avec du fil de fer ou de laiton. *Musschenbroek, Essais de physique, page 434, cité par M. de Mairan, Dissertation sur la glace, page 192.*

96 Introduction à l'Histoire

bouillante, loin de propager & de communiquer le feu, elle l'éteint sur-le-champ. Il est vrai que la chaleur seule suffit pour préparer & disposer les corps combustibles à l'inflammation, & les autres à l'incandescence ; la chaleur chasse des corps toutes les parties humides, c'est-à-dire, de l'eau, qui de toutes les matières, est celle qui s'oppose le plus à l'action du feu ; & ce qui est remarquable, c'est que cette même chaleur, qui dilate tous les corps, ne laisse pas de les durcir, en les séchant ; je l'ai reconnu cent fois, en examinant les pierres de mes grands fourneaux, sur-tout les pierres calcaires, elles prennent une augmentation de dureté, proportionnée au temps qu'elles ont éprouvé la chaleur ; celles, par exemple, des parois extérieures du fourneau, & qui ont reçu sans interruption, pendant cinq ou six mois de suite, quatre-vingts ou quatre-vingt-cinq degrés de chaleur constante, deviennent si dures, qu'on a de la peine à les entamer avec les instrumens ordinaires du tailleur de pierres ; on diroit qu'elles ont changé de qualité, quoique néanmoins elles la conservent à tous autres égards, car ces mêmes

(1)
compte
Su

mêmes pierres n'en font pas moins de la chaux comme les autres, lorsqu'on leur applique le degré de feu nécessaire à cette opération.

Ces pierres, devenues dures par la longue chaleur qu'elles ont éprouvée, deviennent en même-temps spécifiquement plus pesantes (1); de-là, j'ai cru devoir tirer une induction qui prouve, & même confirme pleinement, que la chaleur, quoique en apparence, toujours fugitive, & jamais stable dans les corps qu'elle pénètre, & dont elle semble constamment s'efforcer de sortir, y dépose néanmoins d'une manière très-stable, beaucoup de parties qui s'y fixent, & remplacent en quantité, même plus grande, les parties aqueuses & autres qu'elle en a chassées. Mais ce qui paroît contraire, ou du-moins très-difficile à concilier ici, c'est que cette même pierre calcaire qui devient spécifiquement plus pesante par l'action d'une chaleur modérée long-temps continuée, devient tout-à-coup plus légère de près

(1) Voyez sur cela les expériences dont je rends compte dans la partie expérimentale de cet Ouvrage.

98 *Introduction à l'Histoire*

d'une moitié de son poids , dès qu'on la soumet au grand feu nécessaire à sa calcination, & qu'elle perd en même temps, non-seulement toute la dureté qu'elle avoit acquise par l'action de la simple chaleur, mais même sa dureté naturelle, c'est-à-dire, la cohérence de ses parties constituantes; effet singulier, dont je renvoie l'explication à l'article suivant, où je traiterai de l'air, de l'eau & de la terre, parce qu'il me paroît tenir encore plus à la nature de ces trois élémens, qu'à celle de l'élément du feu.

Mais c'est ici le lieu de parler de la calcination prise généralement, elle est pour les corps fixes & incombustibles, ce qu'est la combustion pour les matières volatiles & inflammables; la calcination a besoin, comme la combustion, du secours de l'air, elle s'opère d'autant plus vite, qu'on lui fournit une plus grande quantité d'air; sans cela, le feu le plus violent ne peut rien calciner, rien enflammer que les matières qui contiennent en elles-mêmes, & qui fournissent, à mesure qu'elles brûlent ou se calcinent, tout l'air nécessaire à la combustion ou à la calcination des substances avec lesquelles on les mêle. Cette nécessité

du concours de l'air dans la calcination, comme dans la combustion, indique qu'il y a plus de choses communes entr'elles qu'on ne l'a soupçonné. L'application du feu est le principe de toutes deux, celle de l'air en est la cause seconde, & presque aussi nécessaire que la première; mais ces deux causes se combinent inégalement, selon qu'elles agissent en plus ou moins de temps, avec plus ou moins de force sur des substances différentes; il faut, pour en raisonner juste, se rappeler les effets de la calcination, & les comparer entr'eux, & avec ceux de la combustion.

La combustion s'opère promptement, & quelquefois se fait en un instant, la calcination est toujours plus lente, & quelquefois si longue qu'on la croit impossible: à mesure que les matières sont plus inflammables, & qu'on leur fournit plus d'air, la combustion s'en fait avec plus de rapidité; & par la raison inverse, à mesure que les matières sont plus incombustibles, la calcination s'en fait avec plus de lenteur. Et lorsque les parties constituantes d'une substance telle que l'or, sont non-seulement incombustibles,

100 *Introduction à l'Histoire*

mais paroissent si fixes qu'on ne peut les volatiliser, la calcination ne produit aucun effet, quelque violente qu'elle puisse être. On doit donc considérer la calcination & la combustion, comme des effets du même ordre, dont les deux extrêmes nous sont désignés par le phosphore, qui est le plus inflammable de tous les corps, & par l'or, qui de tous est le plus fixe & le moins combustible; toutes les substances comprises entre ces deux extrêmes, seront plus ou moins sujettes aux effets de la combustion ou de la calcination, selon qu'elles s'approcheront plus ou moins de ces deux extrêmes: de sorte que, dans les points milieux, il se trouvera des substances, qui éprouveront au feu combustion & calcination en degré presque égal; d'où nous pouvons conclure, sans craindre de nous tromper, que toute calcination est toujours accompagnée d'un peu de combustion, & que de même toute combustion est accompagnée d'un peu de calcination. Les cendres & les autres résidus des matières les plus combustibles, ne démontrent-ils pas que le feu a calciné toutes les parties qu'il n'a pas brûlées, & que par conséquent un

pe
be
fla
ma
pa
co
sé
bie
sur
on
I
les
jou
de
ou
le c
d'un
dès-
les
des
parc
que
la c
y sa
cela
sup
moi

peu de calcination se trouve ici avec beaucoup de combustion ? La petite flamme, qui s'élève de la plupart des matières qu'on calcine, ne démontre-t-elle pas de même, qu'il s'y fait un peu de combustion ? ainsi, nous ne devons pas séparer ces deux effets, si nous voulons bien saisir les résultats de l'action du feu sur les différentes substances auxquelles on l'applique.

Mais, dirat-on, la combustion détruit les corps, ou du-moins en diminue toujours le volume ou la masse, en raison de la quantité de matière qu'elle enlève ou consume ; la calcination fait souvent le contraire, & augmente la pesanteur d'un grand nombre de manières ; doit-on dès-lors considérer ces deux effets, dont les résultats sont si contraires, comme des effets du même ordre ? L'objection paroît fondée, & mérite réponse, d'autant que c'est ici le point le plus difficile de la question. Je crois néanmoins pouvoir y satisfaire pleinement. Considérons pour cela une matière dans laquelle nous supposerons moitié de parties fixes, & moitié de parties volatiles ou combustibles ;

102 *Introduction à l'Histoire*

il arrivera, par l'application du feu, que toutes ces parties, volatiles ou combustibles, seront enlevées ou brûlées, & par conséquent, séparées de la masse totale; dès-lors cette masse, ou quantité de matière, se trouvera diminuée de moitié, comme nous le voyons dans les pierres calcaires qui perdent au feu, près de la moitié de leur poids. Mais si l'on continue à appliquer le feu pendant un très-long-temps à cette moitié, toute composée de parties fines, n'est-il pas facile de concevoir que toute combustion, toute volatilisation étant cessées, cette matière, au-lieu de continuer à perdre de sa masse, doit au contraire en acquérir aux dépens de l'air & du feu, dont on ne cesse de la pénétrer; & celles qui, comme le plomb, ne perdent rien, mais gagnent par l'application du feu, sont des matières déjà calcinées, préparées par la Nature au degré où la combustion a cessé, & susceptibles, par conséquent, d'augmenter de pesanteur, dès les premiers instans de l'application du feu? Nous avons vu que la lumière s'amortit, & s'éteint à la surface de tous les corps qui ne la réfléchissent pas; nous avons vu que la chaleur, par sa longue résidence,

se
pén
aut
con
néce
ont
l'in
con
nat
de
des
d'ai
ma
d'e
brû
leu
bus
d'a
nat
qui
n'é
par
leu
leu
ma
vie
ou

se fixe en partie dans les matières qu'elle pénètre ; nous savons que l'air , presque aussi nécessaire à la calcination qu'à la combustion , & toujours d'autant plus nécessaire à la calcination que les matières ont plus de fixité , se fixe lui-même dans l'intérieur des corps ; & en devient partie constituante ; dès-lors n'est-il pas très-naturel de penser que cette augmentation de pesanteur ne vient que de l'addition des particules de lumière, de chaleur & d'air qui se sont enfin fixées & unies à une matière , contre laquelle elles ont fait tant d'efforts, sans pouvoir ni l'enlever , ni la brûler ? cela est si vrai , que quand on leur présente ensuite une substance combustible avec laquelle elles ont bien plus d'analogie , ou plutôt de conformité de nature , elles s'en saisissent avidement , quittent la matière fixe à laquelle elles n'étoient , pour ainsi dire , attachées que par force , reprennent , par conséquent , leur mouvement naturel , leur élasticité , leur volatilité , & partent toutes avec la matière combustible , à laquelle elles viennent de se joindre. Dès-lors le métal ou la matière calcinée , à laquelle vous

104 *Introduction à l'Histoire*

avez rendu ces parties volatiles qu'elle avoit perdues par sa combustion, reprend sa première forme, & sa pesanteur se trouve diminuée de toute la quantité des particules de feu & d'air qui s'étoient fixées, & qui viennent d'être enlevées par cette nouvelle combustion. Tout cela s'opère par la seule loi des affinités; & après ce qui vient d'être dit, il me semble qu'il n'y a pas plus de difficulté à concevoir comment la chaux d'un métal se réduit, que d'entendre comment il se précipite en dissolution; la cause est la même & les effets sont pareils. Un métal dissous par un acide, se précipite lorsqu'on présente à cet article une autre substance avec laquelle il a plus d'affinité, qu'avec le métal, l'acide le quitte alors & le laisse tomber; de même ce métal calciné, c'est-à-dire, chargé de parties d'air, de chaleur & de feu, qui s'étant fixées, le tiennent sous la forme d'une chaux, se précipitera, ou, si l'on veut, se réduira lorsqu'on présentera à ce feu & à cet air fixés, des matières combustibles, avec lesquelles ils ont bien plus d'affinité qu'avec le métal, qui reprendra sa première forme, dès qu'il sera débarrassé de cet air

& de ce feu superflus, & qu'il aura repris, aux dépens des matières combustibles qu'on lui présente, les parties volatiles qu'il avoit perdues.

Cette explication me paroît si simple & si claire, que je ne vois pas ce qu'on peut y opposer. L'obscurité de la chymie vient en grande partie de ce qu'on en a peu généralisé les principes, & qu'on ne les a pas réunis à ceux de la haute physique. Les Chymistes ont adopté les affinités sans les comprendre, c'est-à-dire, sans entendre le rapport de la cause à l'effet, qui néanmoins n'est autre que celui de l'attraction universelle; ils ont créé leur phlogistique, sans savoir ce que c'est, & cependant c'est de l'air & du feu fixes; ils ont formé, à mesure qu'ils en ont eu besoin, des êtres idéaux, des *minéralisateurs*, des *terres mercurielles*, des noms, des termes d'autant plus vagues, que l'acception en est plus générale. J'ose dire que M. Macquer (*u*) & M. de Morveaux (*x*), sont les premiers de nos

(*u*) Dictionnaire de Chymie. *Paris*, 1766.

(*x*) Digressions académiques. *Dijon*, 1772.

106 Introduction à l'Histoire

Chymistes qui aient commencé à parler françois (y). Cette science va donc naître, puisqu'on commence à la parler ; & on la parlera d'autant mieux , on l'entendra d'autant plus aisément , qu'on en bannira le plus de mots techniques , qu'on renoncera de meilleure foi à tous ces petits principes secondaires tirés de la méthode qu'on s'occupera davantage de les déduire des principes généraux de la mécanique rationnelle , qu'on cherchera avec plus de soin à les ramener aux loix de la Nature , & qu'on sacrifiera plus volontiers la commodité d'expliquer d'une manière précaire & selon l'art , les phénomènes de la composition ou de la décomposition des substances à la difficulté de les présenter pour tels qu'ils sont , c'est-à-dire , pour des effets particuliers dépendans d'effets plus généraux , qui sont les seules vraies

(y) Dans le moment même qu'on imprime ces feuilles, paroît l'Ouvrage de M. Baumé, qui a pour titre, *Chymie expérimentale & raisonnée*. L'Auteur, non-seulement y parle une langue intelligible, mais il s'y montre par-tout aussi bon Phylicien que grand Chymiste, & j'ai eu la satisfaction de voir que quelques-unes de ses idées générales s'accordent avec les miennes.

causes, les seuls principes réels auxquels on doit s'attacher, si l'on veut avancer la science de la philosophie naturelle.

Je crois avoir démontré (z) que toutes les petites loix des affinités chymiques, qui paroissent si variables, si différentes entr'elles, ne sont cependant pas autres que la loi générale de l'attraction commune à toute la matière; que cette grande loi, toujours constante, toujours la même, ne paroît varier que par son expression, qui ne peut pas être la même, lorsque la figure des corps entre comme un élément dans leur distance. Avec cette nouvelle clef, on pourra scruter les secrets les plus profonds de la Nature, on pourra parvenir à connoître la figure des parties primitives des différentes substances; assigner les loix & les degrés de leurs affinités; déterminer les formes qu'elles prendront en se réunissant, &c. Je crois de même avoir fait entendre comme l'impulsion dépend de l'attraction, & que, quoiqu'on puisse la considérer comme une force différente,

(z) Voyez, dans cet Ouvrage, l'article qui a pour titre, *de la Nature, seconde vue.*

108 *Introduction à l'Histoire*

elle n'est néanmoins qu'un effet particulier de cette force unique & générale. J'ai présenté la communication du mouvement comme impossible, autrement que par le ressort, d'où j'ai conclu que tous les corps de la Nature sont plus ou moins élastiques, & qu'il n'y en a aucun qui soit parfaitement dur, c'est-à-dire, entièrement privé de ressort, puisque tous sont susceptibles de recevoir du mouvement. J'ai tâché de faire connoître comment cette force unique pouvoit changer de direction, & d'attractive, devenir tout-à-coup répulsive. Et de ces grands principes, qui tous sont fondés sur la mécanique rationnelle, j'ai essayé de déduire les principales opérations de la Nature, telle que la production de la lumière, de la chaleur, du feu & de leur action sur les différentes substances : ce dernier objet, qui nous intéresse le plus, est un champ vaste, dont le défrichement suppose plus d'un siècle, & dont je n'ai pu cultiver qu'un espace médiocre, en remettant à des mains plus habiles ou plus laborieuses, les instrumens dont je me suis servi. Ces instrumens sont les trois moyens d'employer le feu par sa vitesse, par son volume & par sa masse,

en l'appliquant concurremment aux trois classes des substances , qui toutes , ou perdent , ou gagnent , ou ne perdent ni ne gagnent par l'application du feu. Les expériences que j'ai faites sur le refroidissement des corps , sur la pesanteur réelle du feu , sur la nature de la flamme , sur le progrès de la chaleur , sur sa communication , sa déperdition , sa concentration , sur sa violente action sans flamme , &c. sont encore autant d'instrumens , qui épargneront beaucoup de travail à ceux qui voudront s'en servir , & produiront une très-ample moisson de connoissances utiles.

DES ÉLÉMENTS.

SECONDE PARTIE,

De l'AIR, de l'EAU & de la TERRE.

NOUS AVONS vu que l'air est l'administrateur nécessaire & le premier aliment du feu, qui ne peut ni subsister, ni se propager, ni s'augmenter, qu'autant qu'il se l'assimile, le consomme ou l'emporte; tandis que de toutes les substances matérielles, l'air est au-contre celle qui paroît exister le plus indépendamment, & subsister le plus aisément, le plus constamment sans le secours ou la présence du feu; car, quoiqu'il ait habituellement la même chaleur à-peu-près que les autres matières, à la surface de la terre, il pourroit s'en passer, & il lui en faut infiniment moins qu'à toute autre, pour entretenir sa fluidité, puisque les froids les plus excessifs, soit naturels, soit artificiels, ne lui

fon
con
cap
feu
cice
seul
le
en
le r
élat
exp
son
qui
de
les
l'av
sépa
men
qu'i
titu
élat
rav
s'inc
fait
cell
ou
cha
peu

des Minéraux, II.^{de} Partie. 111

font rien perdre de sa nature ; que les condensations les plus fortes ne sont pas capables de rompre son ressort ; que le feu actif, ou plutôt actuellement en exercice sur les matières combustibles, est le seul agent qui puisse altérer sa nature, en le raréfiant, c'est-à-dire, en affoiblissant, en étendant son ressort jusqu'au point de le rendre sans effet, & de détruire ainsi son élasticité. Dans cet état de trop grande expansion & d'affoiblissement extrême de son ressort, & dans toutes les nuances qui précèdent cet état, l'air est capable de reprendre son élasticité, à mesure que les vapeurs des matières combustibles, qui l'avoient affoiblie, s'évaporeront & s'en sépareront. Mais si le ressort a été totalement affoibli, & si prodigieusement étendu, qu'il ne puisse plus se resserrer, ni se restituer, ayant perdu toute sa puissance élastique, l'air de volatil qu'il étoit auparavant, devient une substance fixe, qui s'incorpore avec les autres substances, & fait dès-lors partie constituante de toutes celles auxquelles il s'unit par le contact, ou dans lesquelles il pénètre à l'aide de la chaleur. Sous cette nouvelle forme, il ne peut plus abandonner le feu, que pour

112 *Introduction à l'Histoire*

s'unir comme matière fixe à d'autres matières fixes ; & s'il en reste quelques parties inséparables du feu , elles font dès-lors portion de cet élément , elles lui servent de base , & se déposent avec lui , dans les substances qu'ils échauffent & pénètrent ensemble. Cet effet , qui se manifeste dans toutes les calcinations , est d'autant plus sûr & d'autant plus sensible , que la chaleur est appliquée plus long-temps ; la combustion ne demande que peu de temps pour se faire même complètement , au lieu que toute calcination suppose beaucoup de temps ; il faut , pour l'accélérer , amener à la surface , c'est-à-dire , présenter successivement à l'air , les matières que l'on veut calciner , il faut les fondre ou les diviser en parties impalpables , pour qu'elles offrent à cet air plus de superficie ; il faut même se servir de soufflets , moins pour augmenter l'ardeur du feu , que pour établir un courant d'air sur la surface des matières , si l'on veut presser leur calcination ; & , pour la compléter avec tous ces moyens , il faut souvent beaucoup de temps (a) ; d'où l'on doit conclure

(a) Je ne fais si l'on ne calcineroit pas l'or ,

qu
de
ter
sou

soi
éla
cha
im
sur
pou
cet
cor
peu
mo
nou
que

non
penc
verre
mais
four
vaiss
spatu
nero
l'or
entre
bien
verre

des Minéraux, II.^{de} Partie. 113

qu'il faut aussi une assez longue résidence de l'air devenu fixe dans les substances terrestres, pour qu'il s'établisse à demeure sous cette nouvelle forme.

Mais il n'est pas nécessaire que le feu soit violent, pour faire perdre à l'air son élasticité; le plus petit feu, & même une chaleur très-médiocre, dès qu'elle est immédiatement & constamment appliquée sur une petite quantité d'air, suffisent pour en détruire le ressort, & pour que cet air sans ressort se fixe ensuite dans les corps, il ne faut qu'un peu plus ou un peu moins de temps, selon le plus ou moins d'affinité qu'il peut avoir sous cette nouvelle forme, avec les matières auxquelles il s'unit. La chaleur du corps des

non pas en le tenant comme Boyle ou Kunkel, pendant un très-long temps, dans un fourneau de verrerie, où la vitesse de l'air n'est pas grande, mais en le mettant près de la tuyère d'un bon fourneau à vent, & le tenant en fusion dans un vaisseau ouvert, où l'on plongeroit une petite spatule, qu'on ajusteroit de manière qu'elle tourneroit incessamment & remueroit continuellement l'or en fusion; car il n'y a pas de comparaison entre la force de ces feux, parce que l'air est ici bien plus accéléré que dans les fourneaux de verrerie.

114 Introduction à l'Histoire

animaux, & même des végétaux, est encore assez puissante pour produire cet effet : les degrés de chaleur sont différens dans les différens genres d'animaux, & à commencer par les oiseaux, qui sont les plus chauds de tous, on passe successivement aux quadrupèdes, à l'homme, aux cétacées qui le sont moins; aux reptiles, aux poissons, aux insectes qui le sont beaucoup moins; & enfin aux végétaux, dont la chaleur est si petite qu'elle a paru nulle aux Observateurs (*b*); quoiqu'elle soit très-réelle, & qu'elle surpasse en hiver, celle de l'atmosphère. J'ai observé, sur un grand nombre de gros arbres coupés dans un temps froid, que leur intérieur étoit

(*b*) “ Dans toutes les expériences que j’ai tentées
 ” (dit le docteur Martine), je n’ai pu découvrir
 ” qu’aucun des végétaux acquit en vertu du principe
 ” de vie, un degré de chaleur supérieur à celui du
 ” milieu environnant, & qui pût être distingué;
 ” au contraire, tous les animaux, quelque peu que
 ” leur vie soit animée, ont un degré de chaleur plus
 ” considérable que celui de l’air ou de l’eau où ils
 ” vivent. ” *Essais sur les thermomètres, article XXXVII, édition in-12. Paris, 1751.* — “ On ne découvre au
 ” toucher aucun degré de chaleur dans les plantes,
 ” soit dans leurs larmes, soit dans le cœur de leur
 ” tige. ” *Bacon, nov. Organ. II, 12.*

des Minéraux, II.^{de} Partie. 113

très-sensiblement chaud, & que cette chaleur duroit pendant plusieurs minutes après leur abattage : ce n'est pas le mouvement violent de la coignée, ou le frottement brusque & réitéré de la scie, qui produisent seuls cette chaleur ; car en fendant ensuite ce bois avec des coins, j'ai vu qu'il étoit chaud à deux ou trois pieds de distance de l'endroit où l'on avoit placé les coins, & que par conséquent il avoit un degré de chaleur assez sensible dans tout son intérieur. Cette chaleur n'est que très-médiocre, tant que l'arbre est jeune, & qu'il se porte bien ; mais, dès qu'il commence à vieillir, le cœur s'échauffe par la fermentation de la sève, qui n'y circule plus avec la même liberté ; cette partie du centre prend en s'échauffant une teinte rouge, qui est le premier indice du dépérissement de l'arbre & de la désorganisation du bois ; j'en ai manié des morceaux dans cet état, qui étoient aussi chauds que si on les eût fait chauffer au feu. Si les Observateurs n'ont pas trouvé qu'il y eût aucune différence entre la température de l'air & la chaleur des végétaux, c'est qu'ils ont fait leurs observations en mauvaise saison, & qu'ils n'ont

116 *Introduction à l'Histoire*

pas fait attention qu'en été la chaleur de l'air est aussi grande & plus grande que celle de l'intérieur d'un arbre ; tandis qu'en hiver, c'est tout le contraire : ils ne se sont pas souvenus que les racines ont constamment au - moins le degré de chaleur de la terre qui les environne , & que cette chaleur de l'intérieur de la terre , est pendant tout l'hiver considérablement plus grande que celle de l'air & de la surface de la terre refroidie par l'air : ils ne se sont pas rappellé que les rayons du soleil tombant trop vivement sur les feuilles & sur les autres parties délicates des végétaux , non-seulement les échauffent , mais les brûlent ; qu'ils échauffent de même à un très-grand degré l'écorce & le bois dont ils pénètrent la surface dans laquelle ils s'amortissent & se fixent : ils n'ont pas pensé que le mouvement seul de la sève, déjà chaude , est une cause nécessaire de chaleur , & que ce mouvement venant à augmenter par l'action du soleil ou d'une autre chaleur extérieure, celle des végétaux doit être d'autant plus grande, que le mouvement de leur sève est plus accéléré , &c. Je n'insiste si long - temps sur ce point qu'à

cau
pla
acc
cha
bru
qui
de
M
cha
avo
l'ac
calc
calc
mon
l'air
ceux
face
&
cell
elle
l'ani
fon
mur
du
cett
anim
rive
pou

des Minéraux, II.^{de} Partie. 117

cause de son importance, l'uniformité du plan de la Nature seroit violée, si, ayant accordé à tous les animaux un degré de chaleur supérieur à celui des matières brutes, elle l'avoit refusé aux végétaux qui, comme les animaux, ont leur espèce de vie.

Mais ici l'air contribue encore à la chaleur animale & vitale, comme nous avons vu plus haut qu'il contribuoit à l'action du feu dans la combustion & la calcination des matières combustibles & calcinables. Les animaux qui ont des poumons, & qui par conséquent respirent l'air, ont toujours plus de chaleur que ceux qui en sont privés; & plus la surface intérieure des poumons est étendue & ramifiée en plus grand nombre de cellules ou bronches, plus, en un mot, elle présente de superficie à l'air que l'animal tire par l'inspiration, plus aussi son sang devient chaud, & plus il communique de chaleur à toutes les parties du corps qu'il abreuve ou nourrit; & cette proportion a lieu dans tous les animaux connus. Les oiseaux ont, relativement au volume de leur corps, les poumons considérablement plus étendus

118 Introduction à l'Histoire

que l'homme ou les quadrupèdes ; les reptiles, même ceux qui ont de la voix, comme les grenouilles, n'ont, au lieu de poumons, qu'une simple vessie ; les insectes, qui n'ont que peu ou point de sang, ne pompent l'air que par quelques trachées, &c. Aussi en prenant le degré de la température de la terre pour terme de comparaison, j'ai vu que cette chaleur étant supposée de 10 degrés, celle des oiseaux étoit de près de 33 degrés, celle de quelques quadrupèdes de plus de $31\frac{1}{2}$ degrés, celle de l'homme de $30\frac{1}{2}$ ou 31 (c), tandis que celle des grenouilles

(c) " A mon thermomètre (dit le docteur Martine), où le terme de la congélation est marqué 32, j'ai trouvé que ma peau, par-tout où elle étoit bien couverte, élevoit le mercure aux degrés 96 ou 97 que l'urine nouvellement rendue & reçue dans un vase de la même température qu'elle, est à peine d'un degré plus chaude que la peau, & nous pouvons supposer qu'elle est à-peu-près au degré des viscères voisins. . . . Dans les quadrupèdes ordinaires, tels que les chiens, les chats, les brebis, les bœufs, les cochons, &c. la chaleur de la peau élève le thermomètre 4 ou 5 degrés plus haut que dans l'homme, & le porte aux degrés 100, 101, 102 ; & dans quelques-uns au degré 103, ou même un peu plus haut. . . . La chaleur des cétacées est égale à

n'est que de 15 ou 16, celle des poissons

celle des quadrupèdes. . . . J'ai trouvé que la « chaleur de la peau de veau marin étoit proche « du degré 102, & celle de la cavité de l'abdo- « men environ un degré plus haut. . . . Les oiseaux « sont les plus chauds de tous les animaux, & « surpassent de 3 ou 4 degrés les quadrupèdes, « suivant l'expérience que j'en ai faite moi-même « sur les canards, les oies, les poules, les pigeons, « les perdrix, les hirondelles; la boule du thermo- « mètre placée entre leurs cuisses, le mercure s'éle- « voit aux degrés 103, 104, 105, 106, 107. » Le même Observateur a reconnu que les chenilles n'avoient que très-peu de chaleur, environ 2 ou 3 degrés au-dessus de l'air dans lequel elles vivent. « Ainsi, dit-il, la classe des animaux froids est formée par toute la famille des insectes, hormis les « abeilles, qui font une exception singulière * « » J'ai trouvé, par des expériences fréquentes, que « la chaleur d'un essaim d'abeilles étoit le thermo-

* *Nota.* Je ne fais pas s'il faut faire une exception pour les abeilles, comme l'ont fait la plupart de nos Observateurs, qui prétendent que ces mouches ont autant de chaleur que les animaux qui respirent, parce que leur ruche est aussi chaude que le corps de ces animaux : il me semble que cette chaleur de l'intérieur de la ruche n'est point du tout la chaleur de chaque abeille ; mais la somme totale de la chaleur qui s'évapore des corps de neuf ou dix mille individus réunis dans cet espace où leur mouvement continuel doit l'augmenter encore, & en divisant cette somme générale de chaleur par la quantité particulière de chaleur qui s'évapore de chaque individu, on trouveroit peut-être que l'abeille n'a pas plus de chaleur qu'une autre mouche.

120 Introduction à l'Histoire

& des insectes de 11 ou 12, c'est-à-dire, la moindre de toutes, & à très-peu-près la même que celle des végétaux. Ainsi, le degré de chaleur dans l'homme & dans les animaux, dépend de la force

» mètre qui en étoit entouré au degré 97, chaleur
 » qui ne le cède point à la nôtre. La chaleur des
 » autres animaux d'une vie foible excède peu la
 » chaleur du milieu environnant, à peine distingue-
 » t-on quelque différence dans les moules & dans
 » les huîtres, très-peu dans les carrelets, les merlans,
 » les merlus, & autres poissons à ouïes, qui m'ont
 » tous paru avoir à peine un degré de plus que
 » l'eau de mer dans laquelle ils vivoient, & qui
 » étoit lors de mon observation au degré 41. Enfin
 » il n'y en a guère plus dans les poissons de
 » rivière, & quelques truites que j'ai examinées,
 » étoient au degré 62, pendant que l'eau de la
 » rivière étoit au degré 61. . . . Suivant le résultat
 » de plusieurs expériences, j'ai trouvé que les li-
 » maçons étoient de 2 degrés plus chauds que l'air.
 » Les grenouilles & les tortues de terre, n'ont paru
 » avoir quelque chose de plus, & environ 5 degrés
 » de plus que l'air qu'elles respiroient. . . . J'ai
 » aussi examiné la chaleur d'une carpe & celle
 » d'une anguille, & j'ai trouvé qu'elles excédoient à
 » peine la chaleur de l'eau où ces poissons vivoient,
 » & qui étoient au degré 54. » *Essais sur les ther-*
momètres, articles 38, 39, 40, 41, 44, 45,
46 & 47.

&

& c
 sou
 ent
 qu'i
 que
 prom
 cevo
 (don
 à ce
 Natu
 port
 feu d
 feu d
 de ce
 sans
 n'est
 Cepe
 & le
 élém
 que l
 dant
 de le
 que c
 fiant
 les b
 où il
 volun
 Su

& de l'étendue des poumons : ce sont les soufflets de la machine animale , ils en entretiennent & augmentent le feu selon qu'ils sont plus ou moins puissans , & que leur mouvement est plus ou moins prompt. La seule difficulté est de concevoir comment ces espèces de soufflets (dont la construction est aussi supérieure à celle de nos soufflets d'usage que la Nature est au-dessus de nos arts), peuvent porter l'air sur le feu qui nous anime ; feu dont le foyer paroît assez indéterminé , feu qu'on n'a pas même voulu qualifier de ce nom , parce qu'il est sans flamme , sans fumée apparente , & que la chaleur n'est que très-médiocre & assez uniforme. Cependant si l'on considère que la chaleur & le feu sont des effets & même des élémens du même ordre ; si l'on se rappelle que la chaleur raréfie l'air , & qu'en étendant son ressort elle peut l'affoiblir au point de le rendre sans effet , on pourra penser que cet air tiré par nos poumons s'y raréfiant beaucoup , doit perdre son ressort dans les bronches & dans les petites vésicules où il ne peut pénétrer qu'en très-petit volume , & en bulles dont le ressort ,

Supplément. Tome I.

F

122 Introduction à l'Histoire

déjà très-étendu, sera bientôt détruit par la chaleur du sang artériel & veineux : car ces vaisseaux du sang ne sont séparés des vésicules pulmonaires qui reçoivent l'air, que par des cloisons si minces, qu'elles laissent aisément passer cet air dans le sang, où il ne peut manquer de produire le même effet que sur le feu commun ; parce que le degré de chaleur de ce sang, est plus que suffisant pour détruire en entier l'élasticité des particules d'air, les fixer & les entraîner sous cette nouvelle forme dans toutes les voies de la circulation. Le feu du corps animal ne diffère du feu commun que du moins au plus, le degré de chaleur est moindre ; dès-lors il n'y a point de flamme, parce que les vapeurs qui s'élèvent & qui représentent la fumée de ce feu, n'ont pas assez de chaleur pour s'enflammer ou devenir ardentes, & qu'étant d'ailleurs mêlées de beaucoup de parties humides qu'elles enlèvent avec elles, ces vapeurs ou cette fumée ne peuvent ni s'allumer ni brûler (d), tous les autres effets sont

(d) J'ai fait une grande expérience au sujet de l'inflammation de la fumée, j'ai rempli de charbon

ab
—
fec
deu
pie
con
en l
plus
livre
& j'
conf
qui a
haut
quat
ture
qui a
rem
une p
des b
qu'on
d'abo
ceper
lorsqu
exam
sans y
la fu
mom
très-
les g
extér
encon
chaud
laissa

absolument les mêmes ; la respiration

sec & conservé à couvert depuis plus de six mois, deux de mes fourneaux, qui ont également quatorze pieds de hauteur, & qui ne diffèrent dans leur construction que par les proportions des dimensions en largeur, le premier contenant juste un tiers de plus que le second. J'ai rempli l'un avec douze cents livres de ce charbon, & l'autre avec huit cents livres, & j'ai adapté au plus grand un tuyau d'aspiration, construit avec un châssis de fer, garni de tôle, qui avoit treize pouces en quarré sur dix pieds de hauteur ; je lui avois donné treize pouces sur les quatre côtés, pour qu'il remplît exactement l'ouverture supérieure du fourneau, qui étoit quarrée, & qui avoit treize pouces $\frac{1}{2}$ de toutes faces ; avant de remplir ces fourneaux, on avoit préparé dans le bas une petite cavité en forme de voûte, soutenue par des bois secs, sous lesquels on mit le feu au moment qu'on commença de charger de charbon ; ce feu qui d'abord étoit vif, se ralentit à mesure qu'on chargeoit, cependant il subsista toujours sans s'éteindre, & lorsque les fourneaux furent remplis en entier, j'en examinai le progrès & le produit, sans le remuer & sans y rien ajouter ; pendant les six premières heures la fumée, qui avoit commencé de s'élever au moment qu'on avoit commencé de charger, étoit très-humide, ce que je reconnoissois aisément par les gouttes d'eau qui paroissoient sur les parties extérieures du tuyau d'aspiration, & ce tuyau n'étoit encore au bout de six heures que médiocrement chaud, car je pouvois le toucher aisément. On laissa le feu, le tuyau & les fourneaux pendant

F ij.

124 *Introduction à l'Histoire*
d'un petit animal absorbe autant d'air que

toute la nuit dans cet état ; la fumée continuant toujours, devint si abondante, si épaisse & si noire, que le lendemain en arrivant à mes forges, je crus qu'il y avoit un incendie. L'air étoit calme, & comme le vent ne dissipoit pas la fumée, elle enveloppoit les bâtimens & les déroboit à ma vue ; elle duroit déjà depuis vingt-six heures. J'allai à mes fourneaux, je trouvai que le feu, qui n'étoit allumé qu'à la partie du bas, n'avoit pas augmenté, qu'il se soutenoit au même degré ; mais la fumée, qui avoit donné de l'humidité dans les six premières heures, étoit devenue plus sèche, & paroissoit néanmoins toute aussi noire. Le tuyau d'aspiration ne pompoit pas davantage, il étoit seulement un peu plus chaud, & la fumée ne formoit plus de gouttes sur sa surface extérieure ; la cavité des fourneaux, qui avoit quatorze pieds de hauteur, se trouva vide au bout des vingt-six heures d'environ trois pieds ; je les fis remplir, l'un avec cinquante, & l'autre avec soixante-quinze livres de charbon, & je fis remettre tout de suite le tuyau d'aspiration qu'on avoit été obligé d'enlever pour charger. Cette augmentation d'aliment n'augmenta pas le feu ni même la fumée, elle ne changea rien à l'état précédent ; j'observai le tout pendant huit heures de suite, m'attendant à tout instant à voir paroître la flamme, & ne concevant pas pourquoi cette fumée d'un charbon si sec & si sèche elle-même, qu'elle ne déposoit pas la moindre humidité, ne s'enflammoit pas d'elle-même, après trente-quatre heures de feu toujours subsistant au bas des fourneaux ; je les abandonnai donc une seconde fois dans cet état ; & donnai ordre de

la
n'y
les
la r
ayan
bas
sans
étoit
petit
le pl
tion
char
résol
néce
pas e
l'exa
sèche
mais
cinq
pour
après
mêm
&, co
charb
de la
temp
de la
bien
puisc
les fo
mêm
four

ire
d'air que

des Minéraux, II.^{de} Partie. 125

la lumière d'une chandelle ; dans des

continuant
& si noire,
ges, je crus
calme, &
e, elle en-
ma vue ;
J'allai à mes
étoit allumé
té, qu'il se
e, qui avoit
res heures,
néanmoins
ne pompoit
plus chaud,
r sa surface
qui avoit
a vide au
rois pieds ;
l'autre avec
fis remettre
n avoit été
augmentation
e la fumée,
; j'observai
m'attendant
, & ne con-
arbon si sec
ofoit pas la
l'elle-même,
urs subsistant
i donc une
i ordre de

n'y pas toucher. Le jour suivant, douze heures après les trente-quatre, je trouvai le même brouillard épais, la même fumée noire couvrant mes bâtimens ; & ayant visité mes fourneaux, je vis que le feu d'en bas étoit toujours le même, la fumée la même & sans aucune humidité, & que la cavité des fourneaux étoit vide de trois pieds deux pouces dans le plus petit, & de deux pieds neuf pouces seulement dans le plus grand, auquel étoit adapté le tuyau d'aspiration, je le remplis avec soixante-six livres de charbon, & l'autre avec cinquante-quatre, & je résolus d'attendre aussi long-temps qu'il seroit nécessaire pour savoir si cette fumée ne viendrait pas enfin à s'enflammer ; je passai neuf heures à l'examiner de temps à autre ; elle étoit très-sèche, très-suffocante, très-sensiblement chaude, mais toujours noire & sans flamme au bout de cinquante-cinq heures. Dans cet état, je la laissai pour la troisième fois. Le jour suivant, treize heures après les cinquante-cinq, je la retrouvai encore de même, le charbon de mes fourneaux baissé de même ; & comme je réfléchissois sur cette consommation de charbon sans flamme, qui étoit d'environ moitié de la consommation qui s'en fait dans le même temps & dans les mêmes fourneaux, lorsqu'il y a de la flamme, je commençai à croire que je pourrois bien user beaucoup de charbon, sans avoir de flamme, puisque, depuis trois jours, on avoit chargé trois fois les fourneaux (car j'oubliois de dire que ce jour même on venoit de remplir la cavité vide du grand fourneau, avec quatre-vingts livres de charbon, &

126 *Introduction à l'Histoire*

vaisseaux fermés, de capacités égales, l'animal meurt en même temps que la chandelle s'éteint; rien ne peut démontrer plus évidemment que le feu de l'animal & celui de la chandelle, ou de toute autre matière combustible allumée, sont des feux non-seulement du même ordre, mais d'une seule & même nature auxquels le secours de l'air est également nécessaire; & qui tous deux se l'approprient de la même manière, l'absorbent comme aliment, l'entraînent dans leur route ou le

celle du petit avec soixante livres); je les laissai néanmoins fumer encore plus de cinq heures. Après avoir perdu l'espérance de voir cette fumée s'enflammer d'elle-même, je la vis tout d'un coup prendre feu, & faire une espèce d'explosion dans l'instant même qu'on lui présenta la flamme légère d'une poignée de paille; le tourbillon entier de la fumée s'enflamma jusqu'à huit à dix pieds de distance & autant de hauteur; la flamme pénétra la masse du charbon, & descendit dans le même moment jusqu'au bas du fourneau, & continua de brûler à la manière ordinaire; le charbon se consumoit une fois plus vite, quoique le feu d'en bas ne parût guère plus animé; mais je suis convaincu que mes fourneaux auroient éternellement fumé, si l'on n'eût pas allumé la fumée, & rien ne me prouva mieux que la flamme n'est que de la fumée qui brûle, & que la communication du feu ne peut se faire que par la flamme.

des Minéraux, II.^{de} Partie. 127

déposent sous une forme fixe dans les substances qu'ils pénètrent.

Les végétaux & la plupart des insectes n'ont, au lieu de poumons, que des tuyaux aspiratoires, des espèces de trachées par lesquelles ils ne laissent pas de pomper tout l'air qui leur est nécessaire; on le voit passer en bulles très-sensibles dans la sève de la vigne; il est non-seulement pompé par les racines, mais souvent même par les feuilles; il fait partie & partie très-essentielle de la nourriture du végétal qui dès-lors se l'assimile, le fixe & le conserve. Le petit degré de la chaleur végétale, joint à celui de la chaleur du soleil, suffit pour détruire le ressort de l'air contenu dans la sève, sur-tout lorsque cet air, qui n'a pu être admis dans le corps de la plante & arriver à la sève, qu'après avoir passé par des tuyaux très-serrés, se trouve divisé en particules presque infiniment petites, que le moindre degré de chaleur suffit pour rendre fixes. L'expérience confirme pleinement tout ce que je viens d'avancer; les matières animales & végétales contiennent toutes une très-grande quantité de cet air fixe; & c'est en quoi

F iv

128 *Introduction à l'Histoire*

consiste l'un des principes de leur inflammabilité; toutes les matières combustibles contiennent beaucoup d'air, tous les animaux & les végétaux, toutes leurs parties, tous leurs détrimens, toutes les matières qui en proviennent, toutes les substances où ces détrimens se trouvent mêlées, contiennent plus ou moins d'air fixe, & la plupart renferment aussi une certaine quantité d'air élastique. On ne peut douter de ces faits dont la certitude est acquise par les belles expériences du docteur Hales, & dont les Chymistes ne me paroissent pas avoir senti toute la valeur, car ils auroient reconnu, depuis long-temps, que l'air fixe doit jouer en grande partie le rôle de leur phlogistique, ils n'auroient pas adopté ce terme nouveau, qui ne répond à aucune idée précise, & ils n'en auroient pas fait la base de toutes leurs explications des phénomènes chimiques, ils ne l'auroient pas donné pour un être identique & toujours le même, puisqu'il est composé d'air & de feu, tantôt dans un état fixe, & tantôt dans celui de la plus grande volatilité. Et ceux d'entr'eux, qui ont regardé le phlogistique comme le produit du feu élémentaire ou de la

des Minéraux, II.^{de} Partie. 129

lumière, se sont moins éloignés de la vérité, parce que le feu ou la lumière produisent, par le secours de l'air, tous les effets du phlogistique.

Les minéraux qui, comme les soufres & les pyrites, contiennent dans leur substance, une quantité plus ou moins grande des détrimens ultérieurs des animaux & des végétaux, renferment dès lors des parties combustibles qui, comme toutes les autres, contiennent plus ou moins d'air fixe, mais toujours beaucoup moins que les substances purement animales ou végétales; on peut également leur enlever cet air fixe, par la combustion: on peut aussi le dégager, par le moyen de l'effervescence; &, dans les manières animales & végétales, on le dégage par la simple fermentation qui, comme la combustion, a toujours besoin d'air pour s'opérer. Ceci s'accorde si parfaitement avec l'expérience, que je ne crois pas devoir insister sur la preuve des faits. Je me contenterai d'observer que les soufres & les pyrites ne sont pas les seuls minéraux qu'on doive regarder comme combustibles, qu'il y en a beau-

130 Introduction à l'Histoire

coup d'autres dont je ne ferai point ici l'énumération, parce qu'il suffit de dire que leur degré de combustibilité dépend ordinairement de la quantité de soufre qu'ils contiennent. Tous les minéraux combustibles tirent donc originairement cette propriété, ou du mélange des parties animales & végétales qui sont incorporées avec eux, ou des particules de lumière, de chaleur & d'air, qui, par le laps de temps, se sont fixées dans leur intérieur. Rien, selon moi, n'est combustible, que ce qui a été formé par une chaleur douce, c'est-à-dire, par ces mêmes élémens combinés dans toutes les substances que le soleil éclaire & vivifie (e), ou dans celles

(e) Voici une observation qui semble démontrer que la lumière a plus d'affinité avec les substances combustibles qu'avec toutes les autres matières. On sait que la puissance réfractive des corps transparens est proportionnelle à leur densité; le verre plus dense que l'eau, a proportionnellement une plus grande force réfringente, & en augmentant la densité du verre & de l'eau, l'on augmente à mesure leur force de réfraction. Cette proportion s'observe dans toutes les matières transparentes, & qui sont en même temps inflammables. Mais les matières inflammables, telles que l'esprit de vin, les huiles transparentes, l'ambre, &c. ont une

des Minéraux, II.^{de} Partie. 131

que la chaleur intérieure de la terre forme & réunit.

C'est cette chaleur intérieure du globe de la terre, que l'on doit regarder comme le vrai feu élémentaire, & il faut le distinguer de celui du soleil, qui ne nous parvient qu'avec la lumière; tandis que l'autre, quoique bien plus considérable,

puissance réfringente plus grande que les autres; en sorte que l'attraction que ces matières exercent sur la lumière, & qui provient de leur masse ou densité, est considérablement augmentée par l'affinité particulière qu'elles ont avec la lumière. Si ce n'étoit pas, leur force réfringente seroit comme celle de toutes les autres matières, proportionnelle à leur densité; mais les matières inflammables attirent plus puissamment la lumière, & ce n'est que par cette raison qu'elles ont plus de puissance réfractive que les autres. Le diamant même ne fait pas une exception à cette loi; on doit le mettre au nombre des matières combustibles, on le brûle au miroir ardent; il a avec la lumière autant d'affinité que les matières inflammables, car sa puissance réfringente est plus grande qu'elle ne devroit l'être à proportion de sa densité. Il a en même temps la propriété de s'imbiber de la lumière & de la conserver assez long-temps; les phénomènes de sa réfraction doivent tenir en partie à ces propriétés.

Fvj.

132 Introduction à l'Histoire

n'est ordinairement que sous la forme d'une chaleur obscure , & que ce n'est que dans quelques circonstances , comme celles de l'électricité , qu'il prend de la lumière. Nous avons déjà dit que cette chaleur observée pendant un grand nombre d'années de suite , est trois ou quatre cens fois plus grande en hiver , & vingt-neuf fois plus grande en été dans notre climat , que la chaleur qui nous vient du soleil ; c'est une vérité qui peut paroître singulière , mais qui n'en est pas moins évidemment démontrée (f). Comme nous en avons parlé disertement , nous nous contenterons de remarquer ici , que cette chaleur constante , & toujours subsistante , entre , comme élément , dans toutes les combinaisons des autres élémens , & qu'elle est plus que suffisante , pour produire sur l'air , les mêmes effets que le feu actuel ou la chaleur animale ; que par conséquent cette chaleur intérieure de la terre , détruira l'élasticité de l'air , & le fixera

(f) Voyez le Mémoire de M. de Mairan , dans ceux de l'Académie Royale des Sciences , année 1765 , page 143.

toutes les fois qu'étant divisé en parties très-petites, il se trouvera saisi par cette chaleur, dans le sein de la terre; que, sous cette nouvelle forme, il entrera, comme partie fixe, dans un grand nombre de substances; lesquelles contiendront dès lors des particules d'air fixe & de chaleur fixe, qui sont les premiers principes de la combustibilité. Mais ils se trouveront en plus ou moins grande quantité dans les différentes substances, selon le degré d'affinité qu'ils auront avec elles; & ce degré dépendra beaucoup de la quantité que ces substances contiendront de parties animales & végétales, qui paroissent être la base de toute matière combustible; si elles y sont abondamment répandues, ou faiblement incorporées, on pourra toujours les dégager de ces substances, par le moyen de la combustion. La plupart des minéraux métalliques, & même des métaux, contiennent une assez grande quantité de parties combustibles; le zinc, l'antimoine, le fer, le cuivre, &c. brûlent & produisent une flamme évidente & très-vive; tant que dure la combustion de ces parties inflammables qu'ils contiennent.

134 *Introduction à l'Histoire*

Après quoi, si on continue le feu, la combustion finie, commence la calcination pendant laquelle il rentre dans ces matières de nouvelles parties d'air & de chaleur qui s'y fixent, & qu'on ne peut en dégager, qu'en leur présentant quelque matière combustible, avec laquelle ces parties d'air & de chaleur fixes, ont plus d'affinité qu'avec celles du minéral auxquelles en effet elles ne sont unies que par force, c'est-à-dire, par l'effort de la calcination. Il me semble que la conversion des substances métalliques en chaux, & leur réduction, pourront maintenant être très-clairement entendues, sans qu'il soit besoin de recourir à des principes secondaires, ou à des hypothèses arbitraires, pour leur explication. La réduction, comme je l'ai déjà innué, n'est, dans le réel, qu'une seconde combustion, par laquelle on dégage les parties d'air & de chaleur fixes, que la calcination avoit forcée d'entrer dans le métal, & de s'unir à la substance fixe, à laquelle on rend en même temps les parties volatiles & combustibles que la première action du feu lui avoit enlevées.

Après avoir présenté le grand rôle que l'air fixe joue dans les opérations les plus secrètes de la Nature, considérons-le pendant quelques instans, lorsque, sous la forme élastique, il réside dans les corps; ses effets sont alors aussi variables que les degrés de son élasticité; son action, quoique toujours la même, semble donner des produits différens dans les substances différentes. Pour en ramener la considération à un point de vue général, nous le comparerons avec l'eau & la terre, comme nous l'avons déjà comparé avec le feu; les résultats de cette comparaison entre les quatre élémens, s'appliqueront ensuite aisément à toutes les substances, de quelque nature qu'elles puissent être, puisque toutes ne sont composées que de ces quatre principes réels.

Le plus grand froid connu, ne peut détruire le ressort de l'air, & la moindre chaleur suffit pour cet effet, sur-tout lorsque ce fluide est divisé en parties très petites. Mais il faut observer qu'entre son état de fixité & celui de sa pleine élasticité, il y a toutes les nuances des états moyens, & que c'est presque toujours

136 *Introduction à l'Histoire*

dans quelques-uns de ces états moyens qu'il réside dans la terre & dans l'eau, ainsi que dans toutes les substances qui en sont composées; par exemple, on ne pourra pas douter que l'eau, qui nous paroît une substance si simple, ne contienne une certaine quantité d'air qui n'est ni fixe ni élastique, mais entre la fixité & l'élasticité, si l'on fait attention aux différens phénomènes qu'elle nous présente dans la congélation, dans son ébullition, dans sa résistance à toute compression, &c. car la Physique expérimentale nous démontre que l'eau est incompressible, au lieu de s'affaïsser & de rentrer en elle-même lorsqu'on la force par la presse, elle passe à travers les vaisseaux les plus solides & les plus épais: or, si l'air qu'elle contient en assez grande quantité y étoit dans son état de pleine élasticité, l'eau seroit compressible en raison de cette quantité d'air élastique qu'elle contiendrait & qui se comprime-roit. Donc l'air contenu dans l'eau n'y est pas simplement mêlé & n'y conserve pas sa forme élastique, mais y est plus intimement uni dans un état où son ressort ne

s'ex
néa
me
la
son
bul
pro
l'eau
spéc
plus
la se
l'eau
dan
nain
en r
état
pas
son
réta
la c
le r
gele
tien
bull
de
pan
pie

des Minéraux, II.^{de} Partie. 137

s'exerce plus d'une manière sensible ; & néanmoins ce ressort n'y est pas entièrement détruit ; car si l'on expose l'eau à la congélation, on voit cet air sortir de son intérieur & se réunir à sa surface en bulles élastiques ; ceci seul suffiroit pour prouver que l'air n'est pas contenu dans l'eau sous sa forme ordinaire, puisqu'étant spécifiquement huit cents cinquante fois plus léger, il seroit forcé d'en sortir par la seule nécessité de la prépondérance de l'eau ; il est donc évident que l'air contenu dans l'eau, n'y est pas dans son état ordinaire, c'est-à-dire, de pleine élasticité, & en même temps il est démontré que cet état dans lequel il réside dans l'eau n'est pas celui de sa plus grande fixité, où son ressort absolument détruit ne peut se rétablir que par la combustion, puisque la chaleur ou le froid peuvent également le rétablir ; il suffit de faire chauffer ou geler de l'eau pour que l'air qu'elle contient reprenne son élasticité & s'élève en bulles sensibles à sa surface, il s'en dégage de même lorsque l'eau cesse d'être pressée par le poids de l'atmosphère sous le récipient de la machine pneumatique ; il n'est

138 *Introduction à l'Histoire*

donc pas contenu dans l'eau sous une forme fixe, mais seulement dans un état moyen où il peut aisément reprendre son ressort ; il n'est pas simplement mêlé dans l'eau, puisqu'il ne peut y résider sous sa forme élastique, mais aussi il ne lui est pas intimement uni sous sa forme fixe, puisqu'il s'en sépare plus aisément que de toute autre matière.

On pourra m'objecter avec raison que le froid & le chaud n'ont jamais opéré de la même façon, que si l'une de ces causes rend à l'air son élasticité, l'autre doit la détruire, & j'avoue que, pour l'ordinaire, le froid & le chaud produisent des effets différens ; mais dans la substance particulière que nous considérons ces deux causes, quoique opposées, produisent le même effet ; on pourra le concevoir aisément en faisant attention à la chose même & au rapport de ses circonstances. L'on sait que l'eau soit gelée, soit bouillie, reprend l'air qu'elle avoit perdu dès qu'elle se liquéfie ou qu'elle se refroidit, le degré d'affinité de l'air avec l'eau dépend donc en grande partie de celui de sa température, ce degré, dans son état de liquidité, est à peu-

près le même que celui de la chaleur générale à la surface de la terre ; l'air avec lequel elle a beaucoup d'affinité la pénètre aussitôt qu'il est divisé en parties très-tenues , & le degré de la chaleur élémentaire & générale, suffit pour affoiblir le ressort de ces petites parties, au point de le rendre sans effet , tant que l'eau conserve cette température ; mais si le froid vient à la pénétrer, ou pour parler plus précisément, si ce degré de chaleur nécessaire à cet état de l'air vient à diminuer , alors son ressort, qui n'est pas entièrement détruit, se rétablira par le froid, & l'on verra les bulles élastiques s'élever à la surface de l'eau prête à se congeler. Si, au contraire, l'on augmente le degré de la température de l'eau par une chaleur extérieure, on en divise trop les parties intégrantes, on les rend volatiles, & l'air, qui ne leur étoit que foiblement uni, s'élève & s'échappe avec elles. Car il faut se rappeler que quoique l'eau prise en masse soit incompressible & sans aucun ressort, elle est très-élastique dès qu'elle est divisée ou réduite en petites parties ; & en ceci elle paroît être d'une nature

140 *Introduction à l'Histoire*

contraire à celle de l'air, qui n'est compressible qu'en masse & qui perd son ressort dès qu'il est trop divisé. Néanmoins l'air & l'eau ont beaucoup plus de rapports entr'eux que de propriétés opposées, & comme je suis très-persuadé que toute la matière est convertible, & que les quatre élémens peuvent se transformer, je serois porté à croire que l'eau peut se changer en air lorsqu'elle est assez raréfiée pour s'élever en vapeurs : car le ressort de la vapeur de l'eau est aussi & même plus puissant que le ressort de l'air ; on voit le prodigieux effet de cette puissance dans les pompes à feu, on voit la terrible explosion qu'elle produit lorsqu'on laisse tomber du métal fondu sur quelques gouttes d'eau ; & si l'on ne veut pas convenir avec moi que l'eau puisse dans cet état de vapeurs se transformer en air, on ne pourra du moins nier qu'elle n'en ait alors les principales propriétés.

L'expérience m'a même appris que la vapeur de l'eau peut entretenir & augmenter le feu comme le fait l'air ordinaire ; & cet air, que nous pourrions regarder comme pur, est toujours mêlé avec une

très-grande quantité d'eau ; mais il faut remarquer comme chose importante, que la proportion du mélange n'est pas, à beaucoup près, la même dans ces deux élémens ; l'on peut dire, en général, qu'il y a beaucoup moins d'air dans l'eau, que d'eau dans l'air ; seulement il faut considérer qu'il y a deux unités très-différentes, auxquelles on pourroit rapporter les termes de cette proportion ; ces deux unités sont le volume & la masse. Si on estime la quantité d'air contenue dans l'eau, par le volume, elle paroîtra nulle, puisque le volume de l'eau n'en est point du-tout augmenté ; & de même l'air plus ou moins humide ne nous paroît pas changer de volume, cela n'arrive que quand il est plus ou moins chaud ; ainsi, ce n'est point au volume qu'il faut rapporter cette proportion, c'est à la masse seule, c'est-à-dire, à la quantité réelle de matière dans l'un & l'autre de ces deux élémens, qu'on doit comparer celle de leur mélange, & l'on verra que l'air est beaucoup plus aqueux, que l'eau n'est aérienne, peut-être dans la proportion de la masse, c'est-à-dire, huit cens cinquante fois davantage.

142 Introduction à l'Histoire

Quoi qu'il en soit de cette estimation , qui est peut-être ou trop forte ou trop foible , nous pouvons en tirer l'induction que l'eau doit se changer plus aisément en air , que l'air ne peut se transformer en eau. Les parties de l'air , quoique susceptibles d'être extrêmement divisées, paroissent être plus grosses que celles de l'eau , puisque celle-ci passe à travers plusieurs filtres que l'air ne peut pénétrer ; puisque , quand elle est raréfiée par la chaleur , son volume , quoique fort augmenté , n'est qu'égal , ou un peu plus grand que celui des parties de l'air à la surface de la terre ; car les vapeurs de l'eau ne s'élèvent dans l'air qu'à une certaine hauteur ; enfin , puisque l'air semble s'imbiber d'eau comme une éponge , la contenir en grande quantité , & que le contenant est nécessairement plus grand que le contenu. Au reste , l'air qui s'imbibe si volontiers de l'eau , semble la rendre de même, lorsqu'on lui présente des sels ou d'autres substances avec lesquelles l'eau a encore plus d'affinité qu'avec lui. L'effet que les Chymistes appellent *défaillance* , & même celui des *efflorescences* ,

démontrent non-seulement qu'il y a une très-grande quantité d'eau contenue dans l'air, mais encore que cette eau n'y est attachée que par une simple affinité, qui cède aisément à une affinité plus grande, & qui même cesse d'agir, sans être combattue ou balancée par aucune autre affinité, mais par la seule raréfaction de l'air, puisqu'il se dégage de l'eau, dès qu'elle cesse d'être pressée par le poids de l'atmosphère, sous le récipient de la machine pneumatique.

Dans l'ordre de la conversion des éléments, il me semble que l'eau est pour l'air, ce que l'air est pour le feu, & que toutes les transformations de la Nature dépendent de celle-ci. L'air, comme aliment du feu, s'assimile avec lui, & se transforme en ce premier élément; l'eau raréfiée par la chaleur, se transforme en une espèce d'air capable d'alimenter le feu comme l'air ordinaire; ainsi, le feu a un double fonds de subsistance assurée; s'il consomme beaucoup d'air, il peut aussi en produire beaucoup par la raréfaction de l'eau, & réparer ainsi dans la masse de l'atmosphère toute la quantité qu'il en

144 *Introduction à l'Histoire*

détruit, tandis qu'ultérieurement il se convertit lui-même avec l'air en matière fixe dans les substances terrestres qu'il pénètre par sa chaleur ou par sa lumière.

Et de même que d'une part, l'eau se convertit en air ou en vapeurs aussi volatiles que l'air par sa raréfaction, elle se convertit en une substance solide par une espèce de condensation différente des condensations ordinaires. Tout fluide se raréfie par la chaleur, & se condense par le froid; l'eau suit elle-même cette loi commune, & se condense à mesure qu'elle refroidit; qu'on en remplisse un tube de verre jusqu'aux trois quarts, on la verra descendre à mesure que le froid augmente, & se condenser comme font tous les autres autres fluides; mais, quelque temps avant l'instant de la congélation, on la verra remonter au-dessus du point des trois quarts de la hauteur du tube, & s'y renfler encore considérablement, en se convertissant en glace. Mais si le tube est bien bouché, & parfaitement en repos, l'eau continuera de baisser, & ne se gèlera pas, quoique le degré de froid soit de 6, 8 ou 10 degrés au-dessous du terme de

de
on
Il
pré
phé
inte
chal
clos
quan
flam
qu'u
pas
gelée
remu
cules
extré
tube
ou le
& lu
l'infla
par la
fixe t
l'eau
repré
même
solide
serven
Sup

de la glace, & l'eau ne gèlera que quand on couvrira le tube ou qu'on le remuera. Il semble donc que la congélation nous présente d'une manière inverse les mêmes phénomènes que l'inflammation. Quelque intense, quelque grande que soit une chaleur renfermée dans un vaisseau bien clos, elle ne produira l'inflammation que quand elle touchera quelque matière enflammée; & de même à quelque degré qu'un fluide soit refroidi, il ne gèlera pas sans toucher quelque substance déjà gelée; & c'est ce qui arrive lorsqu'on remue ou débouche le tube; les particules de l'eau qui sont gelées dans l'air extérieur, ou dans l'air contenu dans le tube, viennent, lorsqu'on le débouche ou le remue, frapper la surface de l'eau & lui communiquent leur glace. Dans l'inflammation, l'air d'abord très-raréfié par la chaleur, perd de son volume & se fixe tout-à-coup; dans la congélation, l'eau d'abord condensée par le froid, reprend plus de volume & se fixe de même. Car la glace est une substance solide, plus légère que l'eau, & qui conserveroit sa solidité si le froid étoit toujours

146 Introduction à l'Histoire

le même. Et je suis porté à croire qu'on viendrait à bout de fixer le mercure à un moindre degré de froid en le sublimant en vapeurs dans un air très-froid. Je suis de même très-porté à croire que l'eau, qui ne doit sa liquidité qu'à la chaleur & qui la perd avec elle, deviendrait une substance d'autant plus solide & d'autant moins fusible, qu'elle éprouveroit plus fort & plus long-temps la rigueur du froid. On n'a pas fait assez d'expériences sur ce sujet important.

Mais sans nous arrêter à cette idée, c'est-à-dire, sans admettre ni sans exclure la possibilité de la conversion de la glace en matière infusible ou terre fixe & solide, passons à des vues plus étendues sur les moyens que la Nature emploie pour la transformation de l'eau. Le plus puissant de tous & le plus évident est le filtre animal; le corps des animaux à coquilles en se nourrissant des particules de l'eau, en travaille en même temps la substance au point de la dégrader; la coquille est certainement une substance terrestre, une vraie pierre, dont toutes les pierres que les Chymistes appellent calcaires & plusieurs

Il faut remarquer que

autres matières, tirent leur origine ; cette coquille paroît à la vérité, faire partie constitutive de l'animal qu'elle couvre, puisqu'elle se perpétue par la génération, & qu'on la voit dans les petits coquillages qui viennent de naître, comme dans ceux qui ont pris tout leur accroissement ; mais ce n'en est pas moins une substance terrestre, formée par la sécrétion ou l'exudation du corps de l'animal ; on la voit s'agrandir, s'épaissir par anneaux & par couches à mesure qu'il prend de la croissances ; & souvent cette matière pierreuse excède cinquante ou soixante fois la masse ou matière réelle du corps de l'animal qui la produit. Qu'on se représente pour un instant, le nombre des espèces de ces animaux à coquille, ou pour les tous comprendre, de ces animaux à transudation pierreuse, elles sont peut-être en plus grand nombre dans la mer, que ne l'est sur la terre le nombre des espèces d'insectes ; qu'on se représente ensuite leur prompt accroissement, leur prodigieuse multiplication, le peu de durée de leur vie, dont nous supposons néanmoins le terme moyen à dix

148 Introduction à l'Histoire

ans (g), qu'ensuite on considère qu'il faut multiplier par cinquante ou soixante le nombre presque immense de tous les individus de ce genre, pour se faire une idée de toute la matière pierreuse produite en dix ans ; qu'enfin on considère que ce bloc déjà si gros de matière pierreuse doit être augmenté d'autant de pareils blocs qu'il y a de fois dix dans tous les siècles qui se sont écoulés depuis le commencement du monde, & l'on se familiarisera avec cette idée ou plutôt cette vérité d'abord repoussante, que toutes nos collines, tous nos rochers de pierre calcaire, de marbre, de craie, &c. ne viennent originairement que de la dépouille de ces petits animaux. On n'en pourra douter à l'inspection des matières même, qui toutes contiennent encore des

(g) La plus longue vie des escargots ou gros limaçons terrestres, s'étend jusqu'à quatorze ans ; on peut présumer que les gros coquillages de mer vivent plus long-temps ; mais aussi les petits, & les très-petits, tels que ceux qui forment le corail, & tous les madrépores, vivent beaucoup moins de temps ; & c'est par cette raison que j'ai pris le terme moyen à dix ans.

coquilles ou des détrimens de coquilles très-aisément reconnoissables.

Les pierres calcaires ne sont donc en très-grande partie que de l'eau & de l'air contenus dans l'eau, transformés par le filtre animal; les sels, les bitumes, les huiles, les graisses de la mer n'entrent que pour peu ou pour rien dans la composition de la coquille; aussi la pierre calcaire ne contient-elle aucune de ces matières; cette pierre n'est que de l'eau transformée, jointe à quelque petite portion de terre vitrifiable & à une très-grande quantité d'air fixe, qui s'en dégage par la calcination. Cette opération produit les mêmes effets sur les coquilles qu'on prend dans la mer que sur les pierres qu'on tire des carrières, elles forment également de la chaux, dans laquelle on ne remarque d'autre différence que celle d'un peu plus ou d'un peu moins de qualité; la chaux faite avec des écailles d'huître ou d'autres coquilles, est plus foible que la chaux faite avec du marbre ou de la pierre dure; mais le procédé de la Nature est le même, les résultats de son opération les mêmes; les coquilles & les pierres perdent également

150 Introduction à l'Histoire

près de moitié de leur poids par l'action du feu dans la calcination ; l'eau qui a conservé sa nature en sort la première, après quoi l'air fixe se dégage, & ensuite l'eau fixe dont ces substances pierreuses sont composées, reprend sa première nature & s'élève en vapeurs poussées & rarifiées par le feu, il ne reste que les parties les plus fixes de cet air & de cette eau qui peut-être sont si fort unies entr'elles, & à la petite quantité de terre fixe de la pierre que le feu ne peut les séparer. La masse se trouve donc réduite de près de moitié, & se réduiroit peut-être encore plus si l'on donnoit un feu plus violent. Et ce qui me semble prouver évidemment que cette matière chassée hors de la pierre par le feu, n'est autre chose que de l'air & de l'eau, c'est la rapidité, l'avidité avec laquelle cette pierre calcinée reprend l'eau qu'on lui donne, & la force avec laquelle elle la tire de l'atmosphère lorsqu'on la lui refuse. La chaux, par son extinction ou dans l'air ou dans l'eau, reprend en grande partie la masse qu'elle avoit perdue par la calcination ; l'eau avec l'air qu'elle contient,

vien
ten
dès-
lant
pier
& c
solid
l'a c
A
qu'o
de l'
méd
toute
rapp
part,
ne p
males
semb
de la
volun
vante
car id
Ma
stance
soit
nous
très-p

des Minéraux, II.^{de} Partie. 151

vient remplacer l'eau & l'air qu'elle contenoit précédemment, la pierre reprend dès-lors sa première nature; car en mêlant sa chaux avec des détrimens d'autres pierres, on fait un mortier qui se durcit, & devient avec le temps une substance solide & pierreuse, comme celle dont on l'a composé.

Après cette exposition, je ne crois pas qu'on puisse donner de la transformation de l'eau en terre ou en pierre, par l'intermède des coquilles. Voilà donc d'une part, toutes les matières calcaires, dont on doit rapporter l'origine aux animaux, & d'autre part, toutes les matières combustibles qui ne proviennent que des substances animales ou végétales; elles occupent ensemble un assez grand espace à la surface de la terre, & l'on peut juger, par leur volume immense, combien la Nature vivante a travaillé pour la Nature morte, car ici le brut n'est que le mort.

Mais les matières calcaires & les substances combustibles, quelque grand qu'en soit le nombre, quelque immense que nous en paroisse le volume, ne font qu'une très-petite portion du globe de la terre,

152 *Introduction à l'Histoire*

dont le fonds principal & la majeure & très-majeure quantité consiste en une matière de la nature du verre ; matière qu'on doit regarder comme l'élément terrestre , à l'exclusion de toutes les autres substances auxquelles elle sert de base comme terre , lorsqu'elles se forment par le moyen, ou par le détriment des animaux, des végétaux , & par la transformation des autres élémens. Non-seulement cette matière première , qui est la vraie terre élémentaire , sert de base à toutes les autres substances , & en constitue les parties fixes ; mais elle est en même-temps le terme ultérieur auquel on peut les ramener & les réduire toutes. Avant de présenter les moyens que la Nature & l'Art peuvent employer pour opérer cette espèce de réduction de toute substance en verre , c'est-à-dire, en terre élémentaire, il est bon de rechercher si les moyens que nous avons indiqués , sont les seuls par lesquels l'eau puisse se transformer en substance solide ; il me semble que le filtre animal la convertissant en pierre , le filtre végétal peut également la transformer , lorsque toutes les circonstances se trouvent être les

mê
coq
cell
vie
tion
qu'u
trou
il pe
en sa
& un
la te
de b
petit
craint
pas l
lors
comp
en bo
ensuit
putré
des a
non-f
en pl
taux ;
des c
puiss
pour

des Minéraux, II.^{de} Partie. 153

mêmes ; la chaleur propre des animaux à coquille , étant un peu plus grande que celle des végétaux , & les organes de la vie plus puissans que ceux de la végétation , le végétal ne pourra produire qu'une petite quantité de pierres qu'on trouve assez souvent dans son fruit ; mais il peut convertir , & convertir réellement en sa substance , une grande quantité d'air , & une quantité encore plus grande d'eau ; la terre fixe qu'il s'approprie , & qui sert de base à ces deux élémens , est en si petite quantité , qu'on peut assurer , sans craindre de se tromper , qu'elle ne fait pas la centième partie de la masse ; dès-lors le végétal n'est presque entièrement composé que d'air & d'eau transformés en bois , substance solide , qui se réduit ensuite en terre , par la combustion ou la putréfaction. On doit dire la même chose des animaux , ils fixent & transforment non-seulement l'air & l'eau , mais le feu , en plus grande quantité que les végétaux ; il me paroît donc que les fonctions des corps organisés , sont l'un des plus puissans moyens que la Nature emploie pour la conversion des élémens. On peut

154. *Introduction à l'Histoire*

regarder chaque animal ou chaque végétal, comme un petit centre particulier de chaleur ou de feu qui s'approprie l'air & l'eau qui l'environnent, se les assimile pour végéter, ou pour se nourrir & vivre des productions de la terre, qui ne sont elles-mêmes, que de l'air & de l'eau précédemment fixés ; il s'approprie en même temps une petite quantité de terre, & recevant les impressions de la lumière & celles de la chaleur du soleil & du globe terrestre, il tourne en sa substance tous ces différens élémens, les travaille, les combine, les réunit, les oppose jusqu'à ce qu'ils aient subi la forme nécessaire à son développement, c'est-à-dire, à l'entretien de la vie & de l'accroissement de l'organisation, dont le moule une fois donné, modèle toute la matière qu'il admet, & de brute qu'elle étoit, la rend organisée.

L'eau qui s'unit si volontiers avec l'air, & qui entre avec lui en si grande quantité dans les corps organisés, s'unit aussi de préférence avec quelques matières solides, telles que les sels, & c'est souvent par leur moyen, qu'elle entre dans la composition.

des Minéraux, II.^{de} Partie. 155

des minéraux. Le sel, au premier coup-d'œil, ne paroît être qu'une terre dissoluble dans l'eau, & d'une saveur piquante; mais les Chymistes, en recherchant sa nature, ont très-bien reconnu qu'elle consiste principalement dans la réunion de ce qu'ils nomment le *principe terreux* & le *principe aqueux*; l'expérience de l'acide nitreux, qui ne laisse, après sa combustion, qu'un peu de terre & d'eau, leur a même fait penser que ce sel, & peut-être tous les autres sels, n'étoient absolument composés que de ces deux élémens; néanmoins il me paroît qu'on peut démontrer aisément que l'air & le feu entrent dans leur composition; puisque le nitre produit une grande quantité d'air dans la combustion, & que cet air fixe, suppose du feu fixe, qui s'en dégage en même-temps; que d'ailleurs toutes les explications qu'on donne de la dissolution, ne peuvent se soutenir, à moins qu'elles n'admettent deux forces opposées, l'une attractive & l'autre expansive, & par conséquent la présence des élémens de l'air & du feu, qui sont seuls doués de cette seconde force; qu'enfin ce seroit contre toute analogie, que le sel ne se

156 Introduction à l'Histoire

trouveroit composé que des deux élémens ; de la terre & de l'eau , tandis que toutes les autres substances sont composées des quatre élémens. Ainsi , l'on ne doit pas prendre à la rigueur , ce que les grands Chymistes, M.^{rs} Stahl & Macquer , ont dit à ce sujet ; les expériences de M. Hales démontrent que le vitriol & le sel marin contiennent beaucoup d'air fixe , que le nitre en contient encore beaucoup plus , & jusqu'à concurrence du huitième de son poids , & le sel de tartre encore plus. On peut donc assurer que l'air entre , comme principe , dans la composition de tous les sels ; & que , comme il ne peut se fixer dans aucune substance , qu'à l'aide de la chaleur ou du feu qui se fixent en même temps , ils doivent être comptés au nombre de leurs parties constitutives. Mais cela n'empêche pas que le sel ne doive aussi être regardé comme la substance moyenne entre la terre & l'eau , ces deux élémens entrent en proportion différente dans les différens sels ou substances salines , dont la variété & le nombre sont si grands , qu'on ne peut en faire l'énumération ; mais qui présentées géné-

rale
& c
il y
ces
& r
M
mél
réun
la t
dans
le se
prim
le p
rega
doit
& d
& m
d'une
on a
d'eau
mêm
une
moir
odeu
ment
expa
éma

des Minéraux, II.^{de} Partie. 157

ralement sous les dénominations d'acides & d'alkalis, nous montrent qu'en général, il y a plus de terre & moins d'eau dans ces derniers sels, & au contraire plus d'eau & moins de terre dans les premiers.

Néanmoins l'eau, quoique intimement mêlée dans les sels, n'y est ni fixée, ni réunie par une force assez grande pour la transformer en matière solide, comme dans la pierre calcaire; elle réside dans le sel ou dans son acide, sous la forme primitive, & l'acide le mieux concentré, le plus dépouillé d'eau, qu'on pourroit regarder ici comme de la terre liquide, ne doit cette liquidité qu'à la quantité de l'air & du feu qu'il contient; toute liquidité, & même toute fluidité, suppose la présence d'une certaine quantité de feu; & quand on attribueroit celle des acides à un reste d'eau qu'on ne peut en séparer, quand même on pourroit les réduire tous sous une forme concrète, il n'en seroit pas moins vrai que leurs saveurs, ainsi que les odeurs & les couleurs, ont toutes également pour principe celui de la force expansive, c'est-à-dire, la lumière & les émanations de la chaleur & du feu; car

158 *Introduction à l'Histoire*

il n'y a que ces principes actifs qui puissent agir sur nos sens , & les affecter d'une manière différente & diversifiée, selon les vapeurs ou particules des différentes substances qu'ils nous apportent & nous présentent ; c'est donc à ces principes qu'on doit rapporter non-seulement la liquidité des acides, mais aussi leur saveur. Une expérience que j'ai eu occasion de faire un grand nombre de fois, m'a pleinement convaincu que l'alkali est produit par le feu ; la chaux faite à la manière ordinaire & mise sur la langue, même avant d'être éteinte par l'air ou par l'eau, a une saveur qui indique déjà la présence d'une certaine quantité d'alkali. Si l'on continue le feu, cette chaux, qui a subi une plus longue calcination, devient plus piquante sur la langue, & celle que l'on tire des fourneaux de forges où la calcination dure cinq ou six mois de suite, l'est encore davantage. Or ce sel n'étoit pas contenu dans la pierre, avant sa calcination, il augmente en force ou en quantité, à mesure que le feu est appliqué plus violemment & plus long-temps à la pierre ; il est donc le produit immédiat

des Minéraux, II.^{de} Partie. 159

du feu & de l'air, qui se sont incorporés dans la substance pendant la calcination, & qui, par ce moyen, sont devenus parties fixes de cette pierre, de laquelle ils ont chassé la plus grande partie des molécules d'eau, liquides & solides qu'elle contenoit auparavant. Cela seul me paroît suffisant, pour prononcer que le feu est le principe de la formation de l'alkali minéral, & l'on doit en conclure, par analogie, que les autres alkalis doivent également leur formation à la chaleur constante de l'animal & du végétal dont on les tire.

A l'égard des acides, la démonstration de leur formation par le feu & l'air fixes, quoique moins immédiate que celle des alkalis, ne m'en paroît pas moins certaine : nous avons prouvé que le nitre & le phosphore tirent leur origine des matières végétales & animales, que le vitriol tire la sienne des pyrites, des soufres & des autres matières combustibles; on sait d'ailleurs que ces acides, soit vitrioliques, ou nitreux ou phosphoriques, contiennent toujours une certaine quantité d'alkali; on doit donc rapporter leur formation & leur saveur au même principe, & réduisant

160 *Introduction à l'Histoire*

tous les acides à un seul acide, & tous les alkalis à un seul alkali, ramener tous les sels à une origine commune, & ne regarder leurs différentes saveurs & leurs propriétés particulières & diverses, que comme le produit varié des différentes quantités de terre, d'eau, & sur-tout d'air & de feu fixes qui sont entrées dans leur composition. Ceux qui contiendront le plus de ces principes actifs d'air & de feu, seront ceux qui auront le plus de puissance & le plus de saveur. J'entends par puissance, la force dont les sels nous paroissent animés pour dissoudre les autres substances; on sait que la dissolution suppose la fluidité; qu'elle ne s'opère jamais entre deux matières sèches ou solides, & que par conséquent elle suppose aussi dans le dissolvant le principe de la fluidité, c'est-à-dire, le feu; la puissance du dissolvant sera donc d'autant plus grande, que, d'une part, il contiendra ce principe actif en plus grande quantité, & que, d'autre part, les parties aqueuses & torreuses auront plus d'affinité avec les parties de même espèce contenues dans les substances à dissoudre; &, comme les degrés d'affinité

dépendent absolument de la figure des parties intégrantes des corps, ils doivent, comme ces figures, varier à l'infini; on ne doit donc pas être surpris de l'action plus ou moins grande ou nulle de certains sels sur certaines substances, ni des effets contraires d'autres sels sur d'autres substances. Leur principe actif est le même, leur puissance pour dissoudre la même, mais elle demeure sans exercice, lorsque la substance qu'on lui présente repousse celle du dissolvant, ou n'a aucun degré d'affinité avec lui; tandis qu'au contraire, elle le saisit avidement toutes les fois qu'il se trouve assez de force d'affinité pour vaincre celle de la cohérence; c'est-à-dire, toutes les fois que les principes actifs contenus dans le dissolvant, sous la forme de l'air & du feu, se meuvent plus puissamment attirés par la puissance à dissoudre, qu'ils ne le sont par la terre & l'eau qu'il contient; car dès-lors ces principes actifs s'en séparent, se développent & pénètrent la substance qu'ils divisent & décomposent au point de la rendre susceptible, par cette division, d'obéir en liberté à toutes les forces attractives de la terre & de l'eau

162 Introduction à l'Histoire

contenues dans le dissolvant, & de s'unir avec elles assez intimement pour ne pouvoir en être séparées que par d'autres substances qui auroient avec ce même dissolvant, un degré encore plus grand d'affinité. Newton est le premier qui ait donné les affinités pour causes des précipitations chymiques; Stalh adoptant cette idée l'a transmise à tous les Chymistes, & il me paroît qu'elle est aujourd'hui universellement reçue comme une vérité dont on ne peut douter. Mais ni Newton ni Stalh ne se sont élevés au point de voir que toutes ces affinités en apparence si différentes entr'elles, ne sont au fond que les effets particuliers de la force générale de l'attraction universelle; &, faute de cette vue, leur théorie ne pouvoit être ni lumineuse ni complète, parce qu'ils étoient forcés de supposer autant de petites loix d'affinités différentes, qu'il y avoit de phénomènes différens; au lieu qu'il n'y a réellement qu'une seule loi d'affinité, loi qui est exactement la même que celle de l'attraction universelle; & que par conséquent l'explication de tous les phénomènes doit être déduite de cette seule & même cause.

des

Les
opérati
qu'ils
tances
que l'es
que c'e
sur ce
liquide
à dissol
dissolu
peuvent
seulem
solvant
remme
que les
pour t
autres
sont to
voir p
sels &
les con
position
peut p
nos art
il ne fa
& l'ea
plus

des Minéraux, II.^{de} Partie. 163

Les sels concourent donc à plusieurs opérations de la Nature par la puissance qu'ils ont de dissoudre les autres substances ; car , quoiqu'on dise vulgairement que l'eau dissout le sel , il est aisé de sentir que c'est une erreur d'expression fondée sur ce qu'on appelle communément le liquide , le *dissolvant* ; & le solide , le *corps à dissoudre* ; mais dans le réel , lorsqu'il y a dissolution , les deux corps sont actifs & peuvent être également appelés *dissolvans* ; seulement regardant le sel comme le dissolvant , le corps dissout peut-être indifféremment ou liquide ou solide ; & pourvu que les parties du sel soient assez divisées pour toucher immédiatement celles des autres substances , elles agiront & produiront tous les effets de la dissolution . On voit par-là combien l'action propre des sels & l'action de l'élément de l'eau qui les contient , doivent influencer sur la composition des matières minérales . La Nature peut produire par ce moyen tout ce que nos arts produisent par le moyen du feu ; il ne faut que du temps pour que les sels & l'eau opèrent sur les substances les plus compactes & les plus dures , la

164 *Introduction à l'Histoire*

division la plus complète & l'atténuation la plus grande de leurs parties ; ce qui les rend alors susceptibles de toutes les combinaisons possibles & capables de s'unir avec toutes les substances analogues , & de se séparer de toutes les autres. Mais ce temps , qui n'est rien pour la Nature , & qui ne lui manque pas , est de toutes les choses nécessaires celle qui nous manque le plus ; c'est faute de temps que nous ne pouvons imiter ses procédés ni suivre sa marche ; le plus grand de nos arts seroit donc l'art d'abréger le temps , c'est-à-dire , de faire en un jour ce qu'elle fait en un siècle : quelque vaine que paroisse cette prétention , il ne faut pas y renoncer : nous n'avons à la vérité ni les grandes forces ni le temps encore plus grand de la Nature , mais nous avons au - dessus d'elle la liberté de les employer comme il nous plaît ; notre volonté est une force qui commande à toutes les autres forces , lorsque nous la dirigeons avec intelligence. Ne sommes-nous pas venus à bout de créer à notre usage l'élément du feu qu'elle nous avoit caché ? ne l'avons-nous pas tiré des rayons qu'elle ne nous envoyoit

que pour nous éclairer? n'avons-nous pas, par ce même élément, trouvé le moyen d'abréger le temps en divisant les corps par une fusion aussi prompte que leur division seroit lente par tout autre moyen? &c.

Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la Nature ne puisse faire & ne fasse réellement, par le moyen de l'eau, tout ce que nous faisons par celui du feu. Pour le voir clairement, il faut considérer que la décomposition de toute substance ne pouvant se faire que par la division, plus cette division sera grande & plus la décomposition sera complète; le feu semble diviser, autant qu'il est possible, les matières qu'il met en fusion; cependant on peut douter si celles que l'eau & les acides tiennent en dissolution ne sont pas encore plus divisées, & les vapeurs que la chaleur élève, ne contiennent-elles pas des matières encore plus atténuées? Il se fait donc dans l'intérieur de la terre, au moyen de la chaleur qu'elle renferme & de l'eau qui s'y insinue, une infinité de sublimations, de distillations, de crySTALLISATIONS, d'agréations, de

disjonctions de toute espèce. Toutes les substances peuvent être avec le temps, composées & décomposées par ces moyens; l'eau peut les diviser & en atténuer les parties autant & plus que le feu lorsqu'il les fond; & ces parties atténuées, divisées à ce point, se joindront, se réuniront de la même manière que celles du métal fondu se réunissent en se refroidissant. Pour nous faire mieux entendre, arrêtons-nous un instant sur la cristallisation; cet effet dont les sels nous ont donné l'idée, ne s'opère jamais que quand une substance étant dégagée de toute autre substance se trouve très-divisée & soutenue par un fluide qui, n'ayant avec elle que peu ou point d'affinité, lui permet de se réunir & de former, en vertu de sa force d'attraction, des masses d'une figure à peu-près semblable à la figure de ses parties primitives; cette opération, qui suppose toutes les circonstances que je viens d'énoncer, peut se faire par l'intermède du feu aussi bien que par celui de l'eau, & se fait très-souvent par le concours des deux, parce que tout cela ne suppose ou n'exige qu'une division assez grande de la matière,

pour que
pour ainsi
réunissant,
or le feu p
qu'aucun a
sieurs substa
nous le dé
les amiante
ductions de
régulières,
gardées con

Et ce deg
cessaire à la c
celui de la p
ni réelle, pu
parties de l
grosses pou
comme tout
qu'à la seule
volumes ne
points, ne p
pulsive qu'
division ne
un contact
ce que l'on
vescences, d
& la lumière

des Minéraux , II.^{de} Partie. 167

pour que ses parties primitives puissent, pour ainsi dire, se trier & former, en se réunissant, des corps figurés comme elles : or le feu peut tout aussi-bien, & mieux qu'aucun autre dissolvant, amener plusieurs substances à cet état, & l'observation nous le démontre dans les régules, dans les amiantes, les basaltes, & autres productions du feu dont les figures sont régulières, & qui toutes doivent être regardées comme de vraies crystallisations.

Et ce degré de grande division, nécessaire à la crystallisation, n'est pas encore celui de la plus grande division possible ni réelle, puisque dans cet état les petites parties de la matière sont encore assez grosses pour constituer une masse qui, comme toutes les autres masses, n'obéit qu'à la seule force attractive, & dont les volumes ne se touchant que par des points, ne peuvent acquérir la force repulsive qu'une beaucoup plus grande division ne manqueroit pas d'opérer par un contact plus immédiat, & c'est aussi ce que l'on voit arriver dans les effervescences, où tout d'un coup la chaleur & la lumière sont produites par le mélange

168 *Introduction à l'Histoire*

de deux liqueurs froides. Ce degré de division de la matière est ici fort au-dessus du degré nécessaire à la cristallisation, & l'opération s'en fait aussi rapidement que l'autre s'exécute avec lenteur.

La lumière, la chaleur, le feu, l'air, l'eau, les sels, sont les degrés par lesquels nous venons de descendre du haut de l'échelle de la Nature à sa base qui est la terre fixe. Et ce sont en même temps les seuls principes que l'on doit admettre & combiner pour l'explication de tous les phénomènes. Ces principes sont réels, indépendans de toute hypothèse & de toute méthode; leur conversion, leur transformation est toute aussi réelle, puisqu'elle est démontrée par l'expérience. Il en est de même de l'élément de la terre, il peut se convertir en se volatilisant, & prendre la forme des autres élémens, comme ceux-ci prennent la sienne en se fixant. Mais de la même manière que les parties primitives du feu, de l'air ou de l'eau ne formeront jamais seules des corps ou des masses qu'on puisse regarder comme du feu, de l'air ou de l'eau purs; de même il me paroît très-inutile de chercher dans les matières terrestres

terrestres une substance de terre pure : la fixité, l'homogénéité, l'éclat transparent du diamant a ébloui les yeux de nos Chymistes lorsqu'ils ont donné cette pierre pour la terre élémentaire & pure ; on pourroit dire avec autant & aussi peu de fondement que c'est au contraire de l'eau pure dont toutes les parties se sont fixées pour composer une substance solide diaphane comme elle ; ces idées n'auroient pas été mises en avant , si l'on eût pensé que l'élément terreux n'a pas plus le privilège de la simplicité absolue que les autres élémens ; que même comme il est le plus fixe de tous, & par conséquent le plus constamment passif, il reçoit comme base toutes les impressions des autres ; il les attire, les admet dans son sein, s'unit, s'incorpore avec eux, les suit & se laisse entraîner par leur mouvement ; & par conséquent il n'est ni plus simple ni moins convertible que les autres. Ce ne sont jamais que les grandes masses qu'il faut considérer lorsqu'on veut définir la Nature ; les quatre élémens ont été bien saisis par les Philosophes, même les plus anciens ; le soleil, l'atmosphère, la mer & la terre

170 *Introduction à l'Histoire*

sont les grandes masses sur lesquelles ils les ont établis ; s'il existoit un astre de phlogistique, une atmosphère d'alkali, un océan d'acide, & des montagnes de diamant, on pourroit alors les regarder comme les principes généraux & réels de tous les corps ; mais ce ne sont au contraire que des substances particulières produites, comme toutes les autres, par la combinaison des véritables élémens.

Dans la grande masse de matière solide qui nous représente l'élément de la terre, la couche superficielle est la terre la moins pure ; toutes les matières déposées par la mer en forme de sédimens, toutes les pierres produites par les animaux à coquilles, toutes les substances composées par la combinaison des détrimens du règne animal & végétal ; toutes celles qui ont été altérées par le feu des volcans, ou sublimées par la chaleur intérieure du globe, sont des substances mixtes & transformées ; & quoiqu'elles composent de très-grandes masses, elles ne nous représentent pas assez purement l'élément de la Terre ; ce sont les matières vitrifiables dont la masse est mille & cent mille fois

p
au
de
ce
co
qu
les
mu
tiré
mar
peu
verr
repr
dég
qui s
matiè
notre
l'élé
ni od
dité ;
autres
Si
ment
substa
sont
plupa
sous r

plus considérable que celles de toutes ces autres substances, qui doivent être regardées comme le vrai fonds de cet élément; ce sont en même temps celles qui sont composées de la terre la plus fixe, celles qui sont les plus anciennes, & cependant les moins altérées; c'est de ce fonds commun dont toutes les autres substances ont tiré la base de leur solidité; car toute matière fixe, décomposée autant qu'elle peut l'être, se réduit ultérieurement en verre par la seule action du feu; elle reprend sa première nature lorsqu'on la dégage des matières fluides ou volatiles qui s'y étoient unies; & ce verre, ou matière vitrée qui compose la masse de notre globe, représente d'autant mieux l'élément de la terre, qu'il n'a ni couleur, ni odeur, ni saveur, ni liquidité, ni fluidité; qualités qui toutes proviennent des autres éléments ou leur appartiennent.

Si le verre n'est pas précisément l'élément de la terre, il en est au moins la substance la plus ancienne; les métaux sont plus récents & moins nobles; la plupart des autres minéraux se forment sous nos yeux; la Nature ne produit plus

172 *Introduction à l'Histoire*

de verre que dans les foyers particuliers de ses volcans, tandis que tous les jours elle forme d'autres substances par la combinaison du verre avec les autres élémens. Si nous voulons nous former une idée juste de ses procédés dans la formation des minéraux, il faut d'abord remonter à l'origine de la formation du globe, qui nous démontre qu'il a été fondu, liquéfié par le feu; considérer ensuite que de ce degré immense de chaleur il a passé successivement au degré de la chaleur actuelle; que, dans les premiers momens où la surface a commencé de prendre de la consistance, il a dû s'y former des inégalités, telles que nous en voyons sur la surface des matières fondues & refroidies; que les plus hautes montagnes toutes composées de matières vitrifiables, existent & datent de ce moment, qui est aussi celui de la séparation des grandes masses de l'air, de l'eau & de la terre; qu'ensuite pendant le long espace de temps que suppose le refroidissement, ou si l'on veut la diminution de la chaleur du globe au point de la température actuelle, il s'est fait dans ces mêmes montagnes, qui étoient les parties les plus

ex
un
d'a
rou
con
tou
cha
son
doit
des
trou
épar
terre
en v
avoir
qui c
a dû
parti
élevé
vides
moie
refro
du g
tières
noya
renfe
mine

des Minéraux, II.^{de} Partie. 173

exposées à l'action des causes extérieures, une infinité de fusions, de sublimations, d'agréations & de transformations de toute espèce par le feu de la terre, combiné avec la chaleur du soleil, & toutes les autres causes que cette grande chaleur rendoit plus actives qu'elles ne le sont aujourd'hui; que par conséquent on doit rapporter à cette date la formation des métaux & des minéraux que nous trouvons en grandes masses & en filons épais & continus. Le feu violent de la terre embrasée après avoir élevé & réduit en vapeurs tout ce qui étoit volatil, après avoir chassé de son intérieur les matières qui composent l'atmosphère & les mers, a dû sublimer, en même temps, toutes les parties les moins fixes de la terre, les élever & les déposer dans tous les espaces vides, dans toutes les fentes qui se formoient à la surface à mesure qu'elle se refroidissoit. Voilà l'origine & la gradation du gissement & de la formation des matières vitrifiables, qui toutes forment le noyau des plus grandes montagnes & renferment dans leurs fentes toutes les mines des métaux & des autres matières

174 *Introduction à l'Histoire*

que le feu a pu diviser, fondre & sublimer. Après ce premier établissement encore subsistant des matières vitrifiables & des minéraux en grande masse qu'on ne peut attribuer qu'à l'action du feu; l'eau qui jusqu'alors ne formoit avec l'air qu'un vaste volume de vapeurs, commença de prendre son état actuel dès que la superficie du globe fut assez refroidie pour ne la plus repousser & dissiper en vapeurs; elle se rassembla donc & couvrit la plus grande partie de la surface terrestre, sur laquelle se trouvant agitée par un mouvement continuel de flux & de reflux; par l'action des vents, par celle de la chaleur, elle commença d'agir sur les ouvrages du feu, elle altéra peu-à-peu la superficie des matières vitrifiables, elle en transporta les débris, les déposa en forme de sédiments, elle put nourrir les animaux à coquilles, elle ramassa leurs dépouilles, produisit les pierres calcaires, en forma des collines & des montagnes, qui se desséchant ensuite reçurent, dans leurs fentes, toutes les matières minérales qu'elle pouvoit dissoudre ou charier.

Pour établir une théorie générale sur la formation des minéraux, il faut donc

con
gra
pro
lor
leu
dét
l'ea
vol
rieu
fois
Ces
com
ne l
chac
guér
sur l
min
filon
se ra
miti
trou
en v
détr
stilla
en c
des r
nos r

des Minéraux, II.^{de} Partie. 175

commencer par distinguer avec la plus grande attention, 1.^o ceux qui ont été produits par le feu primitif de la terre, lorsqu'elle étoit encore brûlante de chaleur ; 2.^o ceux qui ont été formés du détriment des premiers par le moyen de l'eau ; & troisièmement ceux qui, dans les volcans ou dans d'autres incendies postérieurs au feu primitif, ont une seconde fois subi l'épreuve d'une violente chaleur. Ces trois objets sont très-distincts & comprennent tout le règne minéral ; en ne les perdant pas de vue, & y rapportant chaque substance minérale, on ne pourra guère se tromper sur son origine & même sur les degrés de sa formation. Toutes les mines, que l'on trouve en masses ou gros filons dans nos hautes montagnes, doivent se rapporter à la sublimation du feu primitif : toutes celles au contraire que l'on trouve en petites ramifications, en filets, en végétations n'ont été formées que du détriment des premières, entraîné par la stillation des eaux. On le voit évidemment en comparant, par exemple, la matière des mines de fer de Suède avec celle de nos mines de fer en grains ; celles-ci sont

176 *Introduction à l'Histoire*

Ouvrage immédiat de l'eau, & nous les voyons se former sous nos yeux, elles ne sont point attirables par l'aimant, elles ne contiennent point de soufre, & ne se trouvent que dispersées dans les terres; les autres sont toutes plus ou moins sulfureuses, toutes attirables par l'aimant, ce qui seul suppose qu'elles ont subi l'action du feu; elles sont disposées en grandes masses dures & solides; leur substance est mêlée d'une grande quantité d'albeste, autre indice de l'action du feu. Il en est de même des autres métaux, leur ancien fonds vient du feu, & toutes leurs grandes masses ont été réunies par son action; mais toutes leurs cristallisations, végétations, granulations, &c. sont dûes à des causes secondaires où l'eau a la plus grande part. Je borne ici mes réflexions sur la conversion des élémens, parce que ce seroit anticiper sur celles qu'exige en particulier chaque substance minérale, & qu'elles seront mieux placées dans les articles de l'Histoire Naturelle des minéraux.

L
orb
deu
de
dans
cont
certe
&, p
vers
à fon
La
regar
l'effe
été
form
cond
attra
comm
d'un
quarr
on m
deur

RÉFLEXIONS

Sur la loi de l'Attraction.

LE MOUVEMENT des Planètes dans leurs orbites, est un mouvement composé de deux forces : la première est une force de projection, dont l'effet s'exerceroit dans la tangente de l'orbite, si l'effet continu de la seconde cessoit un instant ; cette seconde force tend vers le Soleil, & par son effet, précipiteroit les Planètes vers le Soleil, si la première force venoit à son tour à cesser un seul instant.

La première de ces forces peut être regardée comme une impulsion, dont l'effet est uniforme & constant, & qui a été communiquée aux Planètes dès la formation du système planétaire : la seconde peut être considérée comme une attraction vers le Soleil, & se doit mesurer comme toutes les qualités qui partent d'un centre, par la raison inverse du carré de la distance, comme en effet on mesure les quantités de lumière, d'odeur, &c. & toutes les autres quantités.

H v

178 *Introduction à l'Histoire*

ou qualités qui se propagent en ligne droite, & se rapportent à un centre. Or il est certain que l'attraction se propage en ligne droite, puisqu'il n'y a rien de plus droit qu'un fil à plomb, & que, tombant perpendiculairement à la surface de la Terre, il tend directement au centre de la force, & ne s'éloigne que très-peu de la direction du rayon au centre. Donc on peut dire que la loi de l'attraction doit être la raison inverse du quarré de la distance, uniquement parce qu'elle part d'un centre, où qu'elle y tend, ce qui revient au même.

Mais comme ce raisonnement préliminaire, quelque bien fondé que je le croie, pourroit être contredit par les gens qui font peu de cas de la force des analogies, & qui ne sont accoutumés à se rendre qu'à des démonstrations mathématiques, Newton a cru qu'il valoit beaucoup mieux établir la loi de l'attraction par les phénomènes mêmes, que par toute autre voie, & il a en effet démontré géométriquement, que si plusieurs corps se meuvent dans des cercles concentriques, & que les quarrés des temps de leurs révolutions soient comme les cubes de

leurs distances à leur centre commun, les forces centripètes de ces corps sont réciproquement comme les quarrés des distances, & que si les corps se meuvent dans des orbites peu différentes d'un cercle, ces forces sont aussi réciproquement comme les quarrés des distances, pourvu que les apsidés de ces orbites soient immuables. Ainsi les forces par lesquelles les Planètes rendent aux centres ou aux foyers de leurs orbites, suivent en effet la loi du quarré de la distance; & la gravitation étant générale & universelle, la loi de cette gravitation est constamment celle de la raison inverse du quarré de la distance, & je ne crois pas que personne doute de la loi de Képler, & qu'on puisse nier que cela ne soit ainsi pour Mercure, pour Vénus, pour la Terre, pour Mars, pour Jupiter & pour Saturne, sur-tout en les considérant à part & comme ne pouvant se troubler les uns les autres, & en ne faisant attention qu'à leur mouvement autour du Soleil.

Toutes les fois donc qu'on ne considérera qu'une planète ou qu'un satellite, se mouvant dans son orbite autour du

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0 18.0 20.0 22.5 25.0 28.0 31.5 36.0 40.0 45.0 50.0 56.0 63.0 71.0 80.0 90.0 100.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

180 Introduction à l'Histoire

Soleil ou d'une autre Planète, ou qu'on n'aura que deux corps tous deux en mouvement, ou dont l'un est en repos & l'autre en mouvement, on pourra assurer que la loi de l'attraction suit exactement la raison inverse du carré de la distance, puisque, par toutes les observations, la loi de Kepler se trouve vraie, tant pour les planètes principales, que pour les satellites de Jupiter & de Saturne. Cependant on pourroit dès ici faire une objection tirée des mouvemens de la Lune, qui sont irréguliers au point que M. Halley l'appelle *Sidus contumax*, & principalement du mouvement de ses apsidés, qui ne sont pas immobiles comme le demande la supposition géométrique, sur laquelle est fondé le résultat qu'on a trouvé de la raison inverse du carré de la distance pour la mesure de la force d'attraction dans les planètes.

A cela il y a plusieurs manières de répondre; d'abord on pourroit dire que la loi s'observant généralement dans toutes les autres planètes avec exactitude, un seul phénomène où cette même exactitude ne se trouve pas, ne doit pas détruire cette

h
c
p
re
q
d
ca
ta
gr
le
pr
fon
est
app
rain
de
con
proj
aber
tion
inve
ista
omn
quid
sexa
ad tr
Edit
Rog

loi; on peut le regarder comme une exception dont on doit chercher la raison particulière. En second lieu, on pourroit répondre comme l'a fait M. Cotes, que quand même on accorderoit que la loi d'attraction n'est pas exactement dans ce cas en raison inverse du quarré de la distance, & que cette raison est un peu plus grande, cette différence peut s'estimer par le calcul, & qu'on trouvera qu'elle est presque insensible puisque la raison de la force centripète de la Lune qui de toutes est celle qui doit être la plus troublée, approche soixante fois plus près de la raison du quarré que de la raison du cube de la distance : *Responderi potest etiam si concedamus hunc motum eam diffimum exinde profectum quod vis centripeta proportio aberret aliquantulum à duplicatâ, aberrationem illam per computum mathematicum inveniri posse, & planè insensibilem esse; ista enim ratio vis centripeta Lunarum quæ omnium maximè turbari debet, paululùm quidem duplicatam superabit; ad hanc vero sexaginta ferè vicibus propius accedet quàm ad triplicatam. Sed verior erit responsio, &c.* Edit. præf. in edit. 2.^{am} Newton. Auctore Roger Cotes.

182 *Introduction à l'Histoire*

Et en troisième lieu, on doit répondre plus positivement, que ce mouvement des apsides ne vient point de ce que la loi d'attraction est un peu plus grande que dans la raison inverse du quarré de la distance, mais de ce qu'en effet le Soleil agit sur la Lune par une force d'attraction qui doit troubler son mouvement, & produire celui des apsides, & que par conséquent cela seul pourroit bien être la cause qui empêche la Lune de suivre exactement la règle de Képler. Newton a calculé, dans cette vue, les effets de cette force perturbatrice, & il a tiré de sa théorie les équations & les autres mouvemens de la Lune, avec une telle précision, qu'ils répondent très-exactement & à quelques secondes près, aux observations faites par les meilleurs Astronomes; mais pour ne parler que du mouvement des apsides, il fait sentir dès la XLV.^{me} proposition du premier Livre, que la progression de l'apogée de la Lune vient de l'action du Soleil; en sorte que jusqu'ici tout s'accorde, & sa théorie se trouve aussi vraie & aussi exacte dans tous les cas les plus compliqués, comme dans ceux qui le sont le moins.

Cependant un de nos grands Géomètres a prétendu (c) que la quantité absolue du mouvement de l'apogée, ne pouvoit pas se tirer de la théorie de la gravitation, telle qu'elle est établie par Newton, parce qu'en employant les loix de cette théorie, on trouve que ce mouvement ne devoit s'achever qu'en dix-huit ans, au lieu qu'il s'achève en neuf ans. Malgré l'autorité de cet habile Mathématicien, & les raisons qu'il a données pour soutenir son opinion, j'ai toujours été convaincu, comme je le suis encore aujourd'hui, que la théorie de Newton s'accorde avec les observations ; je n'entreprendrai pas ici de faire l'examen qui seroit nécessaire pour prouver qu'il n'est pas tombé dans l'erreur qu'on lui reproche, je trouve qu'il est plus court d'affirmer la loi de l'attraction telle qu'elle est, & de faire voir que la loi que M. Clairaut a voulu substituer à celle de Newton, n'est qu'une supposition qui implique contradiction.

Car, admettons pour un instant ce que

(c) M. Clairaut. Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1745.

184 Introduction à l'Histoire

M. Clairaut prétend avoir démontré que, par la théorie de l'attraction mutuelle, le mouvement des apsidés devroit se faire en dix-huit ans, au lieu de se faire en neuf ans, & souvenons-nous en même temps qu'à l'exception de ce phénomène, tous les autres, quelque compliqués qu'ils soient, s'accordent dans cette même théorie, très-exactement avec les observations; à en juger d'abord par les probabilités, cette théorie doit subsister, puisqu'il y a un nombre très-considérable de choses où elle s'accorde parfaitement avec la Nature, qu'il n'y a qu'un seul cas où elle en diffère, & qu'il est fort aisé de se tromper dans l'énumération des causes d'un seul phénomène particulier; il me paroît donc que la première idée qui doit se présenter, est qu'il faut chercher la raison particulière de ce phénomène singulier, & il me semble qu'on pourroit en imaginer quelque une; par exemple, si la force magnétique de la Terre pouvoit, comme le dit Newton, entrer dans le calcul, on trouveroit peut-être qu'elle influe sur le mouvement de la Lune, & qu'elle pourroit produire cette accélération dans le mouvement de l'apo-

gée
fau
pri
dun
pre
jour
ver
& e
seco
la fo
(
fond
paro
sujer
bles
ou p
inven
du q

1
x 2
que
çon d
ce n
expre
tant u
troisiè
pourr

gée, & c'est dans ce cas où en effet il faudroit employer deux termes pour exprimer la mesure des forces qui produisent le mouvement de la Lune. Le premier terme de l'expression seroit toujours celui de la loi de l'attraction universelle, c'est-à-dire, la raison inverse & exacte du quarré de la distance, & le second terme représenteroit la mesure de la force magnétique.

Cette supposition est sans doute mieux fondée que celle de M. Clairaut, qui me paroît beaucoup plus hypothétique, & sujette d'ailleurs à des difficultés invincibles: exprimer la loi d'attraction par deux ou plusieurs termes, ajouter à la raison inverse du quarré de la distance une fraction du quarré-quarré, au lieu de $\frac{1}{x^2}$ mettre

$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{m x^4}$ me paroît n'être autre chose que d'ajuster une expression de telle façon qu'elle corresponde à tous les cas; ce n'est plus une loi physique que cette expression représente; car, en se permettant une fois de mettre un second, un troisième, un quatrième terme, &c. on pourroit trouver une expression qui, dans

186 *Introduction à l'Histoire*

toutes les loix d'attraction , représenteroit les cas dont il s'agit , en l'ajustant en même temps aux mouvemens de l'apogée de la Lune & aux autres phénomènes ; & par conséquent cette supposition , si elle étoit admise , non-seulement anéantiroit la loi de l'attraction en raison inverse du quarré de la distance , mais même donneroit entrée à toutes les loix possibles & imaginables : une loi en Physique , n'est loi que parce que sa mesure est simple , & que l'échelle qui la représente est non-seulement toujours la même , mais encore qu'elle est unique , & qu'elle ne peut être représentée par une autre échelle ; or toutes les fois que l'échelle d'une loi ne sera pas représentée par un seul terme , cette simplicité & cette unité d'échelle , qui fait l'essence de la loi , ne subsiste plus , & par conséquent il n'y a plus aucune loi physique.

Comme ce dernier raisonnement pourroit paroître n'être que de la métaphysique , & qu'il y a peu de gens qui la sachent apprécier , je vais tâcher de le rendre sensible , en m'expliquant davantage. Je dis donc que toutes les fois qu'on voudra

d
établi
dimin
physi
n'emp
cette
de la
effet l
que
pouce
une t
l'expr
ces ch
le mē
de mē
lesque
De
donc
puisse
sa vari
mable
mesur
deux
qualité
termes
rentes
deux
sont e

des Minéraux, II.^{de} Partie. 187

établir par la loi sur l'augmentation ou la diminution d'une qualité ou d'une quantité physique, on est strictement assujetti à n'employer qu'un terme pour exprimer cette loi : ce terme est la représentation de la mesure qui doit varier, comme en effet la quantité à mesure varie ; en sorte que si la quantité, n'étant d'abord qu'un pouce, devient ensuite un pied, une aune, une toise, une lieue, &c. le terme qui l'exprime, devient successivement toutes ces choses, ou plutôt les représente dans le même ordre de grandeur, & il en est de même de toutes les autres raisons dans lesquelles une quantité peut varier.

De quelque façon que nous puissions donc supposer qu'une qualité physique puisse varier, comme cette qualité est une, sa variation sera simple & toujours exprimable par un seul terme, qui en sera la mesure ; &, dès qu'on voudra employer deux termes, on détruira l'unité de la qualité physique, parce que ces deux termes représenteront deux variations différentes dans la même qualité, c'est-à-dire, deux qualités au lieu d'une : deux termes sont en effet deux mesures, toutes deux

188 Introduction à l'Histoire

variables & inégalement variables, & dès-lors elles ne peuvent être appliquées à un sujet simple, à une seule qualité; & si on admet deux termes pour représenter l'effet de la force centrale d'un astre, il est nécessaire d'avouer qu'au lieu d'une force il y en a deux, dont l'une sera relative au premier terme, & l'autre relative au second terme; d'où l'on voit évidemment qu'il faut, dans le cas présent, que M. Clairaut admette nécessairement une autre force différente de l'attraction, s'il emploie deux termes pour représenter l'effet total de la force centrale d'une planète.

Je ne fais pas comment on peut imaginer qu'une loi physique, telle qu'est celle de l'attraction, puisse être exprimée par deux termes par rapport aux distances, car s'il y avoit, par exemple, une masse M dont la vertu attractive fût exprimée par $\frac{aa}{xx} + \frac{b}{x+}$, n'en résulteroit-il pas le même effet que si cette masse étoit composée de deux matières différentes, comme, par exemple, de $\frac{1}{2} M$, dont la loi d'attraction fût exprimée par $\frac{2aa}{xx}$ & de $\frac{1}{2} M$,

do
ab

fib
M.
sur
sim
sup
que
le p
con
bor
pou
que
le p
trou
don
men
la co
de l
fion
croi
qua
mor
caus
N

dont l'attraction fût $\frac{2b}{x^4}$? cela me paroît absurde.

Mais, indépendamment de ces impossibilités qu'implique la supposition de M. Clairaut, qui détruit aussi l'unité de loi sur laquelle est fondée la vérité & la belle simplicité du système du monde, cette supposition souffre bien d'autres difficultés que M. Clairaut devoit, ce me semble, se proposer avant que de l'admettre, & commencer au moins par examiner d'abord toutes les causes particulières qui pourroient produire le même effet. Je sens que si j'eusse résolu, comme M. Clairaut, le problème des trois corps, & que j'eusse trouvé que la théorie de la gravitation ne donne en effet que la moitié du mouvement de l'apogée, je n'en aurois pas tiré la conclusion qu'il en tire contre la loi de l'attraction; aussi est-ce cette conclusion que je contredis, & à laquelle je ne crois pas qu'on soit obligé de souscrire, quand même M. Clairaut auroit pu démontrer l'insuffisance de toutes les autres causes particulières.

Newton dit, page 547, tome III;

190 Introduction à l'Histoire

In his computationibus attractionem magneticam terra non consideravi, cujus itaque quantitas perparva est & ignoratur, si quando verò hac attractio investigari poterit, & mensura graduum in meridiano, ac longitudes pendulorum isochronorum in diversis parallelis, legeſque motuum maris & paralaxis Luna cum diametris apparentibus Solis & Luna ex phænomenis accuratiùs determinata fuerint, licebit calculum hunc omnem accuratiùs repetere. Ce passage ne prouve-t-il pas bien clairement que Newton n'a pas prétendu avoir fait l'énumération de toutes les causes particulières, & n'indique-t-il pas en effet que, si on trouve quelques différences avec sa théorie & les observations, cela peut venir de la force magnétique de la Terre ou de quelque autre cause secondaire, & par conséquent, si le mouvement des apsides ne s'accorde pas aussi exactement avec sa théorie que le reste, faudra-t-il pour cela ruiner sa théorie par le fondement, en changeant la loi générale de la gravitation? ou plutôt ne faudra-t-il pas attribuer à d'autres causes cette différence, qui ne se trouve que dans ce seul phénomène? M. Clairaut a

pro
de
qu
dev
réso
don
puy
je l'
un c
se po
à la
lique
on n
au li
A
raison
de M
que,
à la
trond
contr
& ave
loin,
dit, à
dire
rerois
l'atten

proposé une difficulté contre le système de Newton, mais ce n'est tout au plus qu'une difficulté qui ne doit ni ne peut devenir un principe; il faut chercher à la résoudre, & non pas en faire une théorie dont toutes les conséquences ne sont appuyées que sur un calcul; car, comme je l'ai dit, on peut tout représenter avec un calcul, & on ne réalise rien; & si on se permet de mettre un ou plusieurs termes à la suite de l'expression d'une loi physique, comme l'est celle de l'attraction, on ne nous donne plus que de l'arbitraire, au lieu de nous représenter la réalité.

Au reste, il me suffit d'avoir établi les raisons qui me font rejeter la supposition de M. Clairaut, celles que j'ai de croire que, bien loin qu'il ait pu donner atteinte à la loi de l'attraction, & renverser l'Astronomie physique, elle me paroît au contraire demeurer dans toute sa vigueur, & avoir des forces pour aller encore bien loin, & cela sans que je prétende avoir dit, à beaucoup près, tout ce qu'on peut dire sur cette matière, à laquelle je désirerois qu'on donnât, sans prévention, toute l'attention qu'il faut pour la bien juger.

A D D I T I O N.

JE ME SUIS BORNÉ à démontrer que la loi de l'attraction, par rapport à la distance, ne peut être exprimée que par un terme, & non pas deux ou plusieurs termes; que par conséquent l'expression que M. Clairaut a voulu substituer à la loi du quarré des distances, n'est qu'une supposition qui renferme une contradiction, c'est-là le seul point auquel je me suis attaché; mais, comme il paroît par sa réponse qu'il ne m'a pas assez entendu (*d*), je vais tâcher de rendre mes raisons plus intelligibles en les traduisant en calcul, ce sera la seule réplique que je ferai à sa réponse.

La loi de l'attraction, par rapport à la distance, ne peut pas être exprimée par deux termes.

I.^{re} DÉMONSTRATION.

SUPPOSONS que $\frac{1}{x^2} \pm \frac{1}{x^4}$ représente l'effet de cette force par rapport

(*d*) Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1745, pages 493, 529, 551, 577 & 580.

à la distance x , ou, ce qui revient au même, supposons que $\frac{1}{x^2} \pm \frac{1}{x^4}$ qui représente la force accélératrice, soit égale à une quantité donnée A pour une certaine distance; en résolvant cette équation, la racine x sera ou imaginaire, ou bien elle ira aux deux valeurs différentes: donc, à différentes distances, l'attraction seroit la même, ce qui est absurde: donc la loi de l'attraction, par rapport à la distance, ne peut pas être exprimée par deux termes. *Ce qu'il falloit démontrer.*

II.^{me} DÉMONSTRATION.

LA même expression $\frac{1}{x^2} \pm \frac{1}{x^4}$ si x devient très-grand, pourra se réduire à $\frac{1}{x^2}$, & si x devient très-petit, elle se réduira à $\pm \frac{1}{x^4}$, de sorte que si $\frac{1}{x^2} \pm \frac{1}{x^4} = \frac{1}{x^n}$ l'exposant n doit être un nombre compris entre 2 & 4, cependant ce même exposant n doit nécessairement renfermer 2, puisque la quantité d'attraction doit, de façon ou d'autre, être mesurée par la distance; cette expression prendra donc

Supplément. Tome I.

I

alors une forme comme $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} = \frac{1}{x^n}$,

ou $= \frac{1}{x+r}$; donc une quantité, qui doit être nécessairement un nombre compris entre 2 & 4, pourroit cependant devenir infinie, ce qui est absurde; donc l'attraction ne peut pas être exprimée par deux termes. *Ce qu'il falloit démontrer.*

On voit que les démonstrations seroient les mêmes contre toutes les expressions possibles qui seroient composées de plusieurs termes; donc la loi d'attraction ne peut être exprimée que par un seul terme.

SECONDE ADDITION.

JE NE VOULOIS rien ajouter à ce que j'ai dit au sujet de la loi de l'attraction, ni faire aucune réponse au nouvel écrit de M. Clairaut (e): mais comme je crois qu'il est utile pour les Sciences d'établir d'une manière certaine la proposition que j'ai avancée, savoir, que la loi de l'attraction, & même toute autre loi physique, ne peut jamais être exprimée que

(e) Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1745, pages 577 & 578.

par un seul terme, & qu'une nouvelle vérité de cette espèce, peut prévenir un grand nombre d'erreurs & de fausses applications dans les Sciences Physico-mathématiques, j'ai cherché plusieurs moyens de la démontrer.

On a vu, dans mon Mémoire, les raisons métaphysiques, par lesquelles j'établis que la mesure d'une qualité physique & générale dans la Nature est toujours simple; que la loi qui représente cette mesure ne peut donc jamais être composée; qu'elle n'est réellement que l'expression de l'effet simple d'une qualité simple; que l'on ne peut donc exprimer cette loi par deux termes, parce qu'une qualité qui est une, ne peut jamais avoir deux mesures. Ensuite, dans l'addition à ce Mémoire, j'ai prouvé démonstrativement cette même vérité par la réduction à l'absurde & par le calcul; ma démonstration est vraie, car il est certain en général que si l'on exprime la loi de l'attraction par une fonction de la distance, & que cette fonction soit composée de deux ou plusieurs termes, comme $\frac{1}{x^m} + \frac{1}{x^n} + \frac{1}{x^r}$, &c.

196 Introduction à l'Histoire

& que l'on égale cette fonction à une quantité constante A pour une certaine distance ; il est certain, dis-je, qu'en résolvant cette équation, la racine x aura des valeurs imaginaires dans tous les cas, & aussi des valeurs réelles, différentes dans presque tous les cas, & que ce n'est que dans quelques cas, comme dans celui de $\frac{1}{xx} + \frac{1}{x^4} = A$, où il y aura deux racines réelles égales, dont l'une sera positive & l'autre négative ; cette exception particulière ne détruit donc pas la vérité de ma démonstration, qui est pour une fonction quelconque ; car si en général l'expression de la loi d'attraction est $\frac{1}{xx} + mx^n$, l'exposant n ne peut pas être négatif & plus grand que 2, puisqu'alors la pesanteur deviendrait infinie dans le point de contact ; l'exposant n est donc nécessairement positif, & le coefficient m doit être négatif pour faire avancer l'apogée de la Lune ; par conséquent le cas particulier $\frac{1}{xx} + \frac{1}{x^4}$ ne peut jamais représenter la loi de la pesanteur : & si on se permet une fois d'exprimer cette loi

par une fonction de deux termes, pourquoi le second de ces termes seroit-il nécessairement positif? il y a, comme l'on voit, beaucoup de raisons pour que cela ne soit pas, & aucune raison pour que cela soit.

Dès le temps que M. Clairaut proposa, pour la première fois, de changer la loi de l'attraction & d'y ajouter un terme, j'avois senti l'absurdité qui résulteroit de cette supposition, & j'avois fait mes efforts pour la faire sentir aux autres; mais j'ai depuis trouvé une nouvelle manière de la démontrer, qui ne laissera, à ce que j'espère, aucun doute sur ce sujet important: voici mon raisonnement que j'ai abrégé autant qu'il m'a été possible.

Si la loi de l'attraction, ou telle autre loi physique que l'on voudra, pouvoit être exprimée par deux ou plusieurs termes, le premier terme étant, par exemple, $\frac{1}{xx}$, il seroit nécessaire que le second terme eût un coefficient indéterminé, & qu'il fût, par exemple, $\frac{1}{mx+1}$; & de même si cette loi étoit exprimée par trois termes, il y auroit deux coefficients indéterminés,

198 Introduction à l'Histoire

l'un au second, & l'autre au troisième terme, &c. dès-lors cette loi d'attraction, qui seroit exprimée par deux termes $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{m x^4}$, renfermeroit donc une quantité m qui entreroit nécessairement dans la mesure de la force.

Or je demande ce que c'est que ce coefficient m , il est clair qu'il ne dépend ni de la masse, ni de la distance; que ni l'une ni l'autre ne peuvent jamais donner la valeur, comment peut-on donc supposer qu'il y ait en effet une telle quantité physique; existe-t-il dans la Nature un coefficient comme un 4, un 5, un 6, &c. & n'y a-t-il pas de l'absurdité à supposer qu'un nombre puisse exister réellement ou qu'un coefficient puisse être une qualité essentielle à la matière? il faudroit pour cela qu'il y eût dans la Nature des phénomènes purement numériques & du même genre que ce coefficient m , sans cela il est impossible d'en déterminer la valeur, puisqu'une quantité quelconque ne peut jamais être mesurée que par une autre quantité de même genre; il faut donc que M. Clairaut

commence par nous prouver que les nombres sont des êtres réels actuellement existans dans la Nature, ou que les coefficients sont des qualités physiques, s'il veut que nous convenions avec lui que la loi d'attraction, ou toute autre loi physique, puisse être exprimée par deux ou plusieurs termes.

Si l'on veut une démonstration plus particulière, je crois qu'on peut en donner une qui sera à la portée de tout le monde, c'est que la loi de la raison inverse du carré de la distance, convient également à une sphère & à toutes les particules de matière dont cette sphère est composée. Le globe de la Terre exerce son attraction dans la raison inverse du carré de la distance; & toutes les particules de matière dont ce globe est composé, exercent aussi leur attraction dans cette même raison, comme Newton l'a démontré; mais si l'on exprime cette loi de l'attraction d'une sphère par deux termes, la loi de l'attraction des particules qui composent cette sphère, ne sera point la même que celle de la sphère; par conséquent cette loi composée de deux termes, ne sera pas

200 *Introduction à l'Histoire*

générale, ou plutôt ne sera jamais la loi de la Nature.

Les raisons métaphysiques, mathématiques & physiques s'accordent donc toutes à prouver que la loi de l'attraction ne peut être exprimée que par un seul terme, & jamais par deux ou plusieurs termes, c'est la proposition que j'ai avancée, & que j'avois à démontrer.

L
fun
de
min
con
cete
una
vell
recu
long
neu
vale
nou
des
de
conf
géné
vers

INTRODUCTION

À L'HISTOIRE DES MINÉRAUX.

PARTIE EXPÉRIMENTALE.

DEPUIS vingt-cinq ans que j'ai jeté sur le papier mes idées sur la théorie de la Terre, & sur la nature des matières minérales dont le globe est principalement composé, j'ai eu la satisfaction de voir cette théorie confirmée par le témoignage unanime des Navigateurs, & par de nouvelles observations que j'ai eu soin de recueillir; il m'est aussi venu, dans ce long espace de temps, quelques pensées neuves, dont j'ai cherché à constater la valeur & la réalité par des expériences; de nouveaux faits acquis par ces expériences, des rapports plus ou moins éloignés, tirés de ces mêmes faits, des réflexions en conséquence, le tout lié à mon système général, & dirigé par une vue constante vers les grands objets de la Nature; voilà

202 *Introduction à l'Histoire*

ce que je crois devoir présenter aujourd'hui à mes Lecteurs ; sur-tout à ceux qui, m'ayant honoré de leur suffrage, aiment assez l'Histoire naturelle, pour chercher avec moi les moyens de l'étendre & de l'approfondir.

Je commencerai par la partie expérimentale de mon travail, parce que c'est sur les résultats de mes expériences que j'ai fondé tous mes raisonnemens, & que les idées même les plus conjecturales, & qui pourroient paroître trop hasardées, ne laissent pas d'y tenir par des rapports qui seront plus ou moins sensibles à des yeux plus ou moins attentifs, plus ou moins exercés, mais qui n'échapperont pas à l'esprit de ceux qui savent évaluer la force des inductions, & apprécier la valeur des analogies.

Et comme il s'est écoulé bien des années depuis que j'ai commencé de publier mon ouvrage sur l'Histoire naturelle, & que le nombre des volumes s'est beaucoup augmenté, j'ai cru que, pour ne pas rendre mon livre trop à charge au public, je devois m'interdire la liberté d'en donner une nouvelle édition corrigée & augmentée ;

des Minéraux, II.^{de} Partie. 203

aussi, dans le grand nombre de réimpressions qui se sont faites de cet ouvrage, il n'y a pas eu un seul mot de changé. Pour ne pas rendre aujourd'hui toutes ces éditions superflues, j'ai pris le parti de mettre en deux ou trois volumes de supplément, les corrections, additions, développemens & explications que j'ai jugées nécessaires à l'intelligence des sujets que j'ai traités. Ces supplémens contiendront beaucoup de choses nouvelles & d'autres plus anciennes, dont quelques-unes ont été imprimées, soit dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, soit ailleurs, je les ai divisés par parties relatives aux différens objets de l'histoire de la Nature, & j'en ai formé plusieurs Mémoires qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres, mais que j'ai seulement rapprochés selon l'ordre des matières.

PREMIER MÉMOIRE.

Expériences sur le progrès de la chaleur dans les corps.

J'AI FAIT FAIRE dix boulets de fer forgé & battu :

	pouces.
Le premier d'un demi-pouce de diamètre.	$\frac{1}{2}$.
Le second d'un pouce.....	1.
Le troisième d'un pouce & demi.....	$1\frac{1}{2}$.
Le quatrième de deux pouces.....	2.
Le cinquième de deux pouces & demi...	$2\frac{1}{2}$.
Le sixième de trois pouces.....	3.
Le septième de trois pouces & demi...	$3\frac{1}{2}$.
Le huitième de quatre pouces.....	4.
Le neuvième de quatre pouces & demi...	$4\frac{1}{2}$.
Le dixième de cinq pouces.....	5.

Ce fer venoit de la forge de Chameçon, près Châtillon-sur-Seine, & comme tous les boulets ont été faits du fer de cette même forge, leurs poids se sont trouvés à très-peu-près proportionnels aux volumes.

Le boulet d'un demi-pouce pesoit 190 grains,
ou 2 gros 46 grains.

des Minéraux, Partie Exp. 205

Le boulet d'un pouce pesoit 1522 grains,
ou 2 onces 5 gros 10 grains.

Le boulet d'un pouce $\frac{1}{2}$ pesoit 5136 grains,
ou 8 onces 7 gros 24 grains.

Le boulet de 2 pouces pesoit 12173 grains,
ou 1 livre 5 onces 1 gros 5 grains.

Le boulet de 2 pouces $\frac{1}{2}$ pesoit 23781 grains,
ou 2 livres 9 onces 2 gros 21 grains.

Le boulet de trois pouces pesoit 41085 grains,
ou 4 livres 7 onces 2 gros 45 grains.

Le boulet de 3 pouces $\frac{1}{2}$ pesoit 65254 grains,
ou 7 livres 1 once 2 gros 22 grains.

Le boulet de quatre pouces 97388 grains,
ou 10 livres 9 onces 44 grains.

Le boulet de 4 pouces $\frac{1}{2}$ pesoit 138179 grains,
ou 14 livres 15 onces 7 gros 11 grains.

Le boulet de 5 pouces pesoit 190211 grains,
ou 20 livres 10 onces 1 gros 59 grains.

Tous ces poids ont été pris juste avec de très-bonnes balances, en faisant limber peu-à-peu ceux des boulets qui se sont trouvés un peu trop forts.

Avant de rapporter les expériences, j'observerai :

1.^o Que, pendant tout le temps qu'on les a faites, le thermomètre exposé à l'air libre étoit à la congélation ou à quelques

206 *Introduction à l'Histoire*

degrés au-dessous (a); mais qu'on a laissé refroidir les boulets dans une cave où le thermomètre étoit à-peu-près à dix degrés au-dessus de la congélation, c'est-à-dire au degré de la température des caves de l'Observatoire; & c'est ce degré que je prends ici pour celui de la température actuelle de la Terre.

2.^o J'ai cherché à saisir deux instans dans le refroidissement; le premier où les boulets cessent de brûler, c'est-à-dire, le moment où on pouvoit les toucher & les tenir avec la main pendant une seconde, sans se brûler; le second temps de ce refroidissement étoit celui où les boulets se sont trouvés refroidis jusqu'au point de la température actuelle, c'est-à-dire, à dix degrés au-dessus de la congélation. Et pour connoître le moment de ce refroidissement jusqu'à la température actuelle, on s'est servi d'autres boulets de comparaison de même matière & de mêmes diamètres qui n'avoient pas été chauffés, & que l'on touchoit en même temps que ceux qui avoient été chauffés. Par cet attouchement

(a) Division de Réaumur.

im
de
pou
ces
man
aisé
cile
plus
jug
tion
mei
ce q
semi
con
de b
à la
sen
qu'u
la p
plus
3.
ou d
à la
poli
& pl
brut
tous

des Minéraux, Partie Exp. 207

immédiat & simultané de la main ou des deux mains sur les deux boulets, on pouvoit juger assez bien du mouvement où ces boulets étoient également froids : cette manière simple est non-seulement plus aisée que le thermomètre qu'il eût été difficile d'appliquer ici, mais elle est encore plus précise, parce qu'il ne s'agit que de juger de l'égalité & non pas de la proportion de la chaleur, & que nos sens sont meilleurs juges que les instrumens de tout ce qui est absolument égal ou parfaitement semblable. Au reste, il est plus aisé de reconnoître l'instant où les boulets cessent de brûler que celui où ils se sont refroidis à la température actuelle, parce qu'une sensation vive est toujours plus précise qu'une sensation tempérée, attendu que la première nous affecte d'une manière plus forte.

3.^o Comme le plus ou le moins de poli ou de brut sur le même corps fait beaucoup à la sensation du toucher, & qu'un corps poli semble être plus froid s'il est froid, & plus chaud s'il est chaud, qu'un corps brut de même matière, quoiqu'ils le soient tous deux également, j'ai eu soin que les

208 Introduction à l'Histoire

boulets froids fussent bruts & semblables à ceux qui avoient été chauffés dont la surface étoit semée de petites éminences produites par l'action du feu.

EXPÉRIENCES.

I.

LE boulet d'un demi-pouce a été chauffé à blanc en 2 minutes.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 12 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle en 39 minutes.

II.

LE boulet d'un pouce a été chauffé à blanc en 5 minutes $\frac{1}{2}$.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 35 minutes $\frac{1}{2}$.

Refroidi au point de la température actuelle en 1 heure 33 minutes.

III.

LE boulet d'un pouce & demi a été chauffé à blanc en 9 minutes.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 58 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle en 2 heures 25 minutes.

des Minéraux, Partie Exp. 209

I V.

Le boulet de 2 pouces a été chauffé à blanc en 13 minutes.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 1 heure 20 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle en 3 heures 16 minutes.

V.

Le boulet de deux pouces & demi a été chauffé à blanc en 16 minutes.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en une heure 42 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle en 4 heures 30 minutes.

V I.

Le boulet de 3 pouces a été chauffé à blanc en 19 minutes $\frac{1}{2}$.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 2 heures 7 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle en 5 heures 8 minutes.

V I I.

Le boulet de 3 pouces & demi a été chauffé à blanc en 23 minutes $\frac{1}{2}$.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 2 heures 36 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle en 5 heures 56 minutes.

210 *Introduction à l'Histoire*

V I I I.

Le boulet de 4 pouces a été chauffé à blanc
en 27 minutes $\frac{1}{2}$.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la
main en 3 heures 2 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle
en 6 heures 55 minutes.

I X.

Le boulet de 4 pouces & demi a été
chauffé à blanc en 31 minutes.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la
main en 3 heures 25 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle
en 7 heures 46 minutes.

X.

Le boulet de 5 pouces a été chauffé à
blanc en 34 minutes.

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la
main en 3 heures 52 minutes.

Refroidi au point de la température actuelle
en 8 heures 42 minutes.

La différence la plus constante que
l'on puisse prendre entre chacun des ter-
mes qui expriment le temps du refroidis-
sement, depuis l'instant où l'on tire les
boulets du feu, jusqu'à celui où on peut
les toucher sans se brûler, se trouve être
de vingt-quatre minutes; car, en supposant

des Minéraux, Partie Exp. 211

chaque terme augmenté de vingt-quatre, on aura

12', 36', 60', 84', 108', 132', 156',
180', 204', 228'.

Et la suite des temps réels de ces refroidissemens trouvés par les expériences précédentes, est

12', 35' $\frac{1}{2}$ ', 58', 80', 102', 127', 156',
182', 205', 232'.

Ce qui approche de la première autant que l'expérience peut approcher du calcul.

De même la différence la plus constante que l'on puisse prendre entre chacun des termes du refroidissement jusqu'à la température actuelle, se trouve être de 54 minutes; car en supposant chaque terme augmenté de 54, on aura

39', 93', 147', 201', 255', 309', 363',
417', 471', 525'.

Et la suite des temps réels de ce refroidissement, trouvés par les expériences précédentes, est

39', 93', 145', 196', 248', 308', 356',
415', 466', 522'.

212 Introduction à l'Histoire

Ce qui approche aussi beaucoup de la première suite supposée.

J'ai fait une seconde & une troisième fois les mêmes expériences sur les mêmes boulets; mais j'ai vu que je ne pouvois compter que sur les premières, parce que je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on chauffoit les boulets, ils perdoient considérablement de leur poids; car

Le boulet d'un demi-pouce, après avoir été chauffé trois fois, avoit perdu environ la dix-huitième partie de son poids.

Le boulet d'un pouce, après avoir été chauffé trois fois, avoit perdu environ la seizième partie de son poids.

Le boulet d'un pouce & demi, après avoir été chauffé trois fois, avoit perdu la quinzième partie de son poids.

Le boulet de deux pouces, après avoir été chauffé trois fois, avoit perdu à-peu-près la quatorzième partie de son poids.

Le boulet de deux pouces & demi, après avoir été chauffé trois fois, avoit perdu à-peu-près la treizième partie de son poids.

Le boulet de trois pouces, après avoir été chauffé trois fois, avoit perdu à-peu-près la treizième partie de son poids.

Le boulet de trois pouces & demi, après

de

avoir été
un peu

Le boulet
chauffé
partie de

Le boulet
avoir été
peu plus
son poids

Le boulet
chauffé
la douzième
avant d'être
onces un

On

(a) J'ai
expérience
M. de M
ment R
suivante
plusieurs
trouvés
Après l'o
livres & t
On a vér
que plus
de volum
mille bru
calibre de
à-dire, un
pratique e

des Minéraux, Partie Exp. 213

avoir été chauffé trois fois, avoir perdu encore un peu plus de la treizième partie de son poids.

Le boulet de quatre pouces, après avoir été chauffé trois fois, avoir perdu la douzième partie & demie de son poids.

Le boulet de quatre pouces & demi, après avoir été chauffé trois fois, avoir perdu un peu plus de la douzième partie & demie de son poids.

Le boulet de cinq pouces, après avoir été chauffé trois fois, avoir perdu à très-peu-près la douzième partie de son poids, car il pesoit, avant d'avoir été chauffé, vingt livres dix onces un gros 59 grains (a).

On voit que cette perte sur chacun

(a) Je n'ai pas eu occasion de faire les mêmes expériences sur des boulets de fonte de fer ; mais M. de Montbeillard, Lieutenant-colonel du régiment Royal-Artillerie, m'a communiqué la note suivante qui y supplée parfaitement. On a pesé plusieurs boulets, avant de les chauffer, qui se sont trouvés du poids de vingt-sept livres & plus. Après l'opération, ils ont été réduits à vingt-quatre livres & un quart & vingt-quatre livres & demie. On a vérifié sur une grande quantité de boulets, que plus on les a chauffés & plus ils ont augmenté de volume & diminué de poids ; enfin sur quarante mille boulets chauffés & râpés pour les réduire au calibre des canons, on a perdu dix mille, c'est-à-dire, un quart, en sorte qu'à tous égards cette pratique est mauvaise.

214 *Introduction à l'Histoire*

des boulets est extrêmement considérable, & qu'elle paroît aller en augmentant, à mesure que les boulets sont plus gros, ce qui vient, à ce que je présume, de ce que l'on est obligé d'appliquer le feu violent d'autant plus long-tems, que les corps sont plus grands; mais en tout cette perte de poids, non-seulement est occasionnée par le détachement des parties de la surface qui se réduisent en scories, & qui tombent dans le feu; mais encore par une espèce de dessèchement ou de calcination intérieure qui diminue la pesanteur des parties constituantes du fer; en sorte qu'il paroît que le feu violent rend le fer spécifiquement plus léger à chaque fois qu'on le chauffe. Au reste, j'ai trouvé par des expériences ultérieures, que cette diminution de pesanteur varie beaucoup, selon la différente qualité du fer.

Ayant donc fait faire six nouveaux boulets, depuis un demi-pouce jusqu'à trois pouces de diamètre, & du même poids que les premiers, j'ai trouvé les mêmes progressions tant pour l'entrée que pour la sortie de la chaleur, & je me suis assuré que le fer s'échauffe & se

ret
l'ex
nair
G
tus
in a
aute
ratio
(ad
bient
pro
Idedq
aqua
latus
5000
quod
geatur
& opta
investi
Ne
expéri
me sui
ment
des vu
(b) E

des Minéraux, Partie Exp. 215

refroidit en effet comme je viens de l'exposer.

Un passage de Newton (b) a donné naissance à ces expériences.

Globus ferri candentis, digitum unum latus; calorem suum omnem spatio hora unius in aëre consistens, vix amitteret. Globus autem major calorem diutius conservaret in ratione diametri, propterea quod superficies (ad cuius mensuram per contactum aëris ambientis refrigeratur) in illa ratione minor est pro quantitate materiae suae calidae inclusae. Idedque globus ferri candentis huic terrae aqualis, id est, pedes plus minus 40000000 latus, diebus totidem & idcirco annis 50000, vix refrigesceret. Suspicio tamen quod duratio coloris ob causas latentes augeatur in minori ratione quam eam diametri; & optatim rationem veram per experimenta investigari.

Newton desiroit donc qu'on fît les expériences que je viens d'exposer, & je me suis déterminé à les tenter non-seulement parce que j'en avois besoin pour des vues semblables aux siennes, mais

(b) Princip. Mathém. Lond. 1726, page 509.

216 Introduction à l'Histoire

encore parce que j'ai cru m'appercevoir que ce grand homme pouvoit s'être trompé, en disant que la durée de la chaleur devoit n'augmenter, par l'effet des causes cachées, qu'en *moindre* raison que celle du diamètre; il m'a paru au contraire en y réfléchissant, que ces causes cachées ne pouvoient que rendre cette raison plus grande au lieu de la faire plus petite.

Il est certain, comme le dit Newton, qu'un globe plus grand, conserveroit sa chaleur plus long-temps qu'un plus petit en raison du diamètre, si on supposoit ces globes composés d'une matière parfaitement perméable à la chaleur; en sorte que la sortie de la chaleur fût absolument libre, & que les particules ignées ne trouvassent aucun obstacle qui pût les arrêter ni changer le cours de leur direction; ce n'est que dans cette supposition mathématique, que la durée de la chaleur seroit en effet en raison du diamètre; mais les causes cachées dont parle Newton, & dont les principales sont les obstacles qui résultent de la perméabilité non absolue, imparfaite & inégale de toute matière solide,

solide
la d
traire
mêm
que j
qui v
même
n'est
le mo
n'est q
d'un c
les édi
dans t
ma con
que Ne
ment le
dans la
d'Optriq
volum
plus lon
LONG-
qu'en rai
mètre)
parties s
un corps
(d) Tra
Supplé

des Minéraux, Partie Exp. 217

solide, au lieu de diminuer le temps de la durée de la chaleur, doivent au contraire l'augmenter; cela m'a paru si clair, même avant d'avoir tenté mes expériences, que je serois porté à croire que Newton, qui voyoit clair aussi jusque dans les choses même qu'il ne faisoit que soupçonner, n'est pas tombé dans cette erreur, & que le mot *minori ratione* au lieu de *majori*, n'est qu'une faute de sa main ou de celle d'un copiste, qui s'est glissée dans toutes les éditions de son ouvrage, du moins dans toutes celles que j'ai pu consulter: ma conjecture est d'autant mieux fondée, que Newton paroît dire ailleurs, précisément le contraire de ce qu'il dit ici; c'est dans la onzième question de son Traité d'Optique (d); « les corps d'un grand volume, dit-il, ne conservent-ils pas « plus long-temps (Nota. Ce mot *PLUS LONG-TEMPS*, ne peut signifier ici « qu'en raison plus grande que celle du diamètre) leur chaleur, parce que leurs « parties s'échauffent réciproquement? & « un corps vaste, dense & fixe, étant une «

(d) Traduction de Coste. *Chirurgia noli.*
Supplément. Tome I. K

218 Introduction à l'Histoire

« fois échauffé au-delà d'un certain degré,
 « ne peut-il pas jeter de la lumière en
 « telle abondance, que par l'émission &
 « la réaction de sa lumière, par les ré-
 « flexions & les réfractions de ses rayons
 « au-dedans de ses pores, il devienne
 « toujours plus chaud, jusqu'à ce qu'il
 « parvienne à un certain degré de chaleur
 « qui égale la chaleur du Soleil ? & le
 « Soleil & les Etoiles fixes, ne sont-ce
 « pas de vastes terres violemment échauf-
 « fées, dont la chaleur se conserve par la
 « grosseur de ces corps, & par l'action
 « & la réaction réciproque entr'eux & la
 « lumière qu'ils jettent, leurs parties étant
 « d'ailleurs empêchées de s'évaporer en
 « fumée, non-seulement par leur fixité,
 « mais encore par le vaste poids & la
 « grande densité des atmosphères qui pe-
 « sant de tous côtés, les compriment très-
 « fortement, & condensent les vapeurs &
 « les exhalaisons qui s'élèvent de ces
 « corps-là ! »

Par ce passage, on voit que Newton,
 non-seulement est ici de mon avis sur la
 durée de la chaleur qu'il suppose en
 raison plus grande que celle du diamètre,

m
 ce
 co
 pe
 (plei
 de
 emp
 poin
 raiso
 pour
 greffi

I,
 demi-p
 Ten
 posés d
 12', 2
 108' 1
 Tem
 trouvés
 12', 35
 182', 2
 Tem
 posés e

des Minéraux, Partie Exp. 219

mais encore qu'il renchérit beaucoup sur cette augmentation, en disant qu'un grand corps, par cela même qu'il est grand, peut augmenter sa chaleur.

Quoi qu'il en soit, l'expérience a pleinement confirmé ma pensée. La durée de la chaleur ou, si l'on veut, le temps employé au refroidissement du fer, n'est point en plus *petite*, mais en plus *grande* raison que celle du diamètre; il n'y a, pour s'en assurer, qu'à comparer les progressions suivantes.

D I A M È T R E S.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
demi-pouces.

Temps du premier refroidissement, supposés en raison du diamètre.

12', 24', 36', 48', 60', 72', 84', 96',
108' 120 minutes.

Temps réels de ce refroidissement, trouvés par l'expérience;

12', 35', $\frac{1}{2}$, 58', 80', 102', 127', 156',
182', 205', 232'.

Temps du second refroidissement, supposés en raison du diamètre.

K ij

220 Introduction à l'Histoire

39', 78', 117', 156', 195', 234', 273',
312', 351', 390'.

Temps réels de ce second refroidissement, trouvés par l'expérience ;

39', 93', 145', 196', 248', 308', 356',
415', 466', 522'.

On voit, en comparant ces progressions terme à terme, que dans tous les cas la durée de la chaleur, non-seulement n'est pas en raison plus petite que celle du diamètre, (comme il est écrit dans Newton), mais qu'au contraire cette durée est en raison considérablement plus grande.

Le docteur Martine, qui a fait un bon ouvrage sur les thermomètres, rapporte ce passage de Newton, & il dit qu'il avoit commencé de faire quelques expériences qu'il se proposoit de pousser plus loin ; qu'il croit que l'opinion de Newton est conforme à la vérité, & que les corps semblables conservent en effet la chaleur dans la proportion de leurs diamètres ; mais que quant au doute que Newton forme, si, dans les grands corps, cette proportion n'est pas moindre que celle des diamètres, il ne le croit pas suffisamment fondé. Le

do
ma
d'a
bla
cha
rap
ave
par
refr
port
cont
que
les co
remm
comm
perme
fluide
partie
culatio
expéri
à-peu-
refroid
rien co
corps
Mai
avec M
temps

des Minéraux, Partie Exp. 221

docteur Martine avoit raison à cet égard ; mais en même-temps il avoit tort de croire, d'après Newton, que tous les corps semblables solides ou fluides, conservent leur chaleur en raison de leurs diamètres ; il rapporte , à la vérité , des expériences faites avec de l'eau dans des vases de porcelaine , par lesquelles il trouve que les temps du refroidissement de l'eau sont presque proportionnels aux diamètres des vases qui la contiennent ; mais nous venons de voir que c'est par cette raison même que , dans les corps solides , la chose se passe différemment , car l'eau doit être regardée comme une matière presque entièrement perméable à la chaleur , puisque c'est un fluide homogène , & qu'aucune de ses parties ne peuvent faire obstacle à la circulation de la chaleur : ainsi , quoique les expériences du docteur Martine donnent à-peu-près la raison du diamètre pour le refroidissement de l'eau , on ne doit en rien conclure pour le refroidissement des corps solides.

Maintenant , si l'on vouloit chercher avec Newton , combien il faudroit de temps à un globe gtos comme la Terre ,

222 Introduction à l'Histoire

pour se refroidir, on trouveroit, d'après les expériences précédentes, qu'au lieu de cinquante mille ans qu'il assigne pour le temps du refroidissement de la Terre jusqu'à la température actuelle, il faudroit déjà quarante-deux mille neuf cents soixante-quatre ans & deux cents vingt-un jours pour la refroidir, seulement jusqu'au point où elle cesseroit de brûler, & quatre-vingt-seize mille six cents soixante-dix ans & cent trente-deux jours pour la refroidir à la température actuelle.

Car la suite des diamètres des globes étant

1, 2, 3, 4, 5..... N demi-pouces, celle des temps du refroidissement jusqu'à pouvoir toucher les globes sans se brûler, sera

12, 36, 60, 84, 108... 24 N-12 min.
Et le diamètre de la Terre étant de 2865 lieues, de 25 au degré, ou de 6537930 toises de 6 pieds.

En faisant la lieue de 2282 toises, ou de..... 39227580 pieds, ou de..... 941461920 demi-pouces;

No
I
ces
foix
jour
diss
seul
rouc
E
refro
actu
39'
Et c
demi
5083
quatr
dix an
temps
globe
la tem
Seu
du ref
encore
parce
ment n

des Minéraux, Partie Exp. 223

Nous avons $N = 941461920$ demi-pouc.

Et $24 N - 12 = 22595086068$ min.
c'est-à-dire quarante-deux mille neuf cents
soixante-quatre ans & deux cents vingt-un
jours pour le temps nécessaire au refroi-
dissement d'un globe gros comme la Terre,
seulement jusqu'au point de pouvoir le
toucher sans se brûler.

Et de même la suite des temps du
refroidissement jusqu'à la température
actuelle, sera

$39', 93', 147', 201', 255' \dots 54N - 15'.$

Et comme N est toujours $= 941461920$
demi-pouces, nous aurons $54N - 15 =$
 50838943662 minutes, c'est-à-dire,
quatre-vingt-seize mille six cents soixante-
dix ans & cent trente-deux jours pour le
temps nécessaire au refroidissement d'un
globe gros comme la Terre au point de
la température actuelle.

Seulement on pourroit croire que celui
du refroidissement de la Terre devroit
encore être considérablement augmenté,
parce que l'on imagine que le refroidisse-
ment ne s'opère que par le contact de l'air,

K iv

224. Introduction à l'Histoire

& qu'il y a une grande différence entre le temps du refroidissement dans l'air, & le temps du refroidissement dans le vide; & , comme l'on doit supposer que la terre & l'air se seroient en même temps refroidis dans le vide, on dira qu'il faut faire état de ce surplus de temps; mais il est aisé de faire voir que cette différence est très-peu considérable, car quoique la densité du milieu dans lequel un corps se refroidit, fasse quelque chose sur la durée du refroidissement; cet effet est bien moindre qu'on ne pourroit l'imaginer, puisque dans le mercure, qui est onze mille fois plus dense que l'air, il ne faut, pour refroidir les corps qu'on y plonge, qu'environ neuf fois autant de temps qu'il en faut pour produire le même refroidissement dans l'air.

La principale cause du refroidissement n'est donc pas le contact du milieu ambiant, mais la force expansive qui anime les parties de la chaleur & du feu, qui les chasse hors des corps où elles résident, & les pousse directement du centre à la circonférence.

En comparant, dans les expériences

pro
fer
néce
qu'
den
de
poin
envi
rem
de l
qu'il
tion
l'esti
Sole
1680
expo
que
la rec

(e)
demi-
moins
portion
raison
feu, la
à-coup
pouce
j'établi
y com

des Minéraux, Partie Exp. 225

précédentes, les temps employés à chauffer les globes de fer, avec les temps nécessaires pour les refroidir, on verra qu'il faut environ la sixième partie & demie du temps pour les chauffer à blanc; de ce qu'il en faut pour les refroidir au point de pouvoir les tenir à la main, & environ la quinzième partie & demie du temps qu'il faut pour les refroidir au point de la température actuelle (e); en sorte qu'il y a encore une très-grande correction à faire dans le texte de Newton, sur l'estime qu'il fait de la chaleur que le Soleil a communiqué à la Comète de 1680; car cette Comète n'ayant été exposée à la violente chaleur du Soleil que pendant un petit temps, elle n'a pu la recevoir qu'en proportion de ce temps,

(e) *Nota.* Le boulet d'un pouce & celui d'un demi-pouce sur-tout, ont été chauffés en bien moins de temps, & ne suivent point cette proportion de quinze & demi à un, & c'est par la raison qu'étant très-petits & placés dans un grand feu, la chaleur les pénétroit, pour ainsi dire, tout-à-coup; mais, à commencer par les boulets d'un pouce & demi de diamètre, la proportion que j'établis ici se trouve assez exacte pour qu'on puisse y compter.

226 Introduction à l'Histoire

& non pas en entier comme Newton paroît le supposer dans le passage que je vais rapporter :

Est calor Solis ut radiorum densitas, hoc est reciproce ut quadratum distantia locorum à Sole. Ideoque cum distantia cometa à centro Solis decemb. 8, ubi in perihelio versabatur, esset ad distantiam terra à centro Solis ut 6 ad 1000 circiter, calor Solis apud cometam eo tempore erat ad calorem Solis æstivi apud nos ut 1000000 ad 36, seu 28000 ad 1. Sed calor aquæ ebullientis est quasi triplò major quàm calor quem terra arrida concipit ad æstivum Solem ut expertus sum, &c. Calor ferri candentis (si rectè conjeçtor) quasi triplò vel quadruplò major quàm calor aquæ ebullientis; ideoque calor quem terra arida apud Cometam in perihelio versantem ex radiis solaribus concipere posset, quasi 2000 vicibus major quàm calor ferri candentis. Tanto autem calore vapores & exhalationes, omnisque materia volatilis statim consumi ac dissipari debuissent.

Cometa igitur in perihelio suo calorem immensum ad Solem concepit & calorem illum diutissimè conservare potest.

des Minéraux, Partie Exp. 227

Je remarquerai d'abord, que Newton fait ici la chaleur du fer rougi beaucoup moindre qu'elle n'est en effet, & qu'il le dit lui-même dans un Mémoire qui a pour titre; *Echelle de la chaleur*, & qu'il a publié dans les Transactions philosophiques de 1701, c'est-à-dire, plusieurs années après la publication de son *Livre des Principes*. On voit dans ce Mémoire qui est excellent, & qui renferme le germe de toutes les idées sur lesquelles on a depuis construit les thermomètres; on y voit, dis-je, que Newton, après des expériences très-exactes, fait la chaleur de l'eau bouillante trois fois plus grande que celle du Soleil d'été, celle de l'étain fondant six fois plus grande, celle du plomb fondant huit fois plus grande, celle du régule fondant douze fois plus grande, & celle d'un feu de cheminée ordinaire, seize ou dix-sept fois plus grande que celle du Soleil d'été; & de-là on ne peut s'empêcher de conclure que la chaleur du fer rougi à blanc ne soit encore bien plus grande, puisqu'il faut un feu constamment animé par le soufflet pour chauffer le fer à ce point.

228 Introduction à l'Histoire

Newton paroît lui-même le sentir, & donner à entendre que cette chaleur du fer rougi, paroît être sept ou huit fois plus grande que celle de l'eau bouillante; ainsi il faut, suivant Newton, lui-même, changer trois mots au passage précédent, & lire, *calor ferri candentis est quasi triplò (sepiuplò) vel quadruplò (octuplò) major quàm calor aquæ ebullientis; ideoque calor apud Cometam in perihelio versantem quasi 2000 (1000) vicibus major quàm calor ferri candentis*. Cela diminue de moitié la chaleur de cette Comète, comparée à celle du fer rougi à blanc.

Mais cette diminution, qui n'est que relative, n'est rien en elle-même ni rien en comparaison de la diminution réelle & très-grande qui résulte de notre première considération, il faudroit pour que la Comète eût reçu cette chaleur mille fois plus grande que celle du fer rougi qu'elle eût séjourné pendant un temps très-long dans le voisinage du Soleil, au lieu qu'elle n'a fait que passer très-rapidement, surtout à la plus petite distance, sur laquelle seule néanmoins Newton établit son calcul de comparaison. Elle étoit, le 8 décembre,

16
au
len
heu
elle
gran
que
Si
quan
à la
on p
juste
parai
moye
No
cette
fix he
étoit
tance
astre,
par ce
que la
prend
de mé
cens f
du po
cette

des Minéraux, Partie Exp. 229

1680 à $\frac{6}{1000}$ de la distance de la Terre au centre du Soleil ; mais la veille ou le lendemain , c'est-à-dire vingt-quatre heures avant & vingt-quatre heures après , elle étoit déjà à une distance six fois plus grande , & où la chaleur étoit par conséquent trente-six fois moindre.

Si l'on vouloit donc connoître la quantité de cette chaleur communiquée à la Comète par le Soleil , voici comment on pourroit faire cette estimation assez juste , & en faire en même temps la comparaison avec celle du fer ardent , au moyen de mes expériences.

Nous supposerons comme un fait que cette Comète a employé six cens soixante-six heures à descendre du point où elle étoit encore éloignée du Soleil d'une distance égale à celle de la Terre à cet astre , auquel point la Comète recevoit par conséquent une chaleur égale à celle que la Terre reçoit du Soleil , & que je prends ici pour l'unité ; nous supposerons de même que la Comète a employé six cens soixante-six autres heures à remonter du point le plus bas de son périhélie à cette même distance ; & , supposant aussi

230 Introduction à l'Histoire

son mouvement uniforme, on verra que la Comète étant au point le plus bas de son périhélie, c'est-à-dire, à $\frac{6}{1000}$ de distance de la Terre au Soleil, la chaleur qu'elle a reçue dans ce moment étoit vingt-sept mille sept cents soixante-seize fois plus grande que celle que reçoit la Terre : en donnant à ce moment une durée de 80 minutes, savoir, 40 minutes en descendant, & 40 minutes en montant, on aura :

A 6 de distance, 27776 de chaleur pendant 80 minutes.

A 7 de distance, 20408 de chaleur aussi pendant 80 minutes.

A 8 de distance, 15625 de chaleur toujours pendant 80', & ainsi de suite jusqu'à la distance 1000 où la chaleur est 1. En sommant toutes les chaleurs à chaque distance, on trouvera 363410 pour le total de la chaleur que la Comète a reçue du Soleil, tant en descendant qu'en remontant, qu'il faut multiplier par le temps, c'est-à-dire, par $\frac{4}{3}$ d'heure ; on aura donc 484547 qu'on divisera par 2000 qui représente la chaleur totale que la Terre a reçue dans ce même temps de

des Minéraux, Partie Exp. 231

1332 heures, puisque la distance est toujours 1000, & la chaleur toujours = 1; ainsi, l'on aura $242 \frac{547}{1000}$ pour la chaleur que la Comète a reçue de plus que la Terre pendant tout le temps de son périhélie, au lieu de 28000 comme Newton le suppose, parce qu'il ne prend que le point extrême, & ne fait nulle attention à la très-petite durée du temps.

Et encore faudroit-il diminuer cette chaleur $242 \frac{547}{1000}$, parce que la Comète parcourroit, par son accélération, d'autant plus de chemin dans le même temps qu'elle étoit plus près du Soleil.

Mais, en négligeant cette diminution, & en admettant que la Comète a en effet reçu une chaleur à-peu-près deux cens quarante-deux fois plus grande que celle de notre Soleil d'été, & par conséquent $17 \frac{2}{7}$ fois plus grande que celle du fer ardent, suivant l'estime de Newton, ou seulement dix fois plus grande suivant la correction qu'il faut faire à cette estime, on doit supposer que, pour donner une chaleur dix fois plus grande que celle du fer rougi, il faudroit dix fois plus de temps, c'est-à-dire, 13320 heures au

232 Introduction à l'Histoire

lieu de 1332. Par conséquent on peut comparer à la Comète un globe de fer qu'on auroit chauffé à un feu de forge pendant 13320 heures pour pouvoir le rougir à blanc.

Or on voit, par mes expériences, que la suite des temps nécessaires pour chauffer des globes dont les diamètres croissent, comme

1, 2, 3, 4, 5 n demi-pouces,
est à très-peu-près

2', 5' $\frac{1}{2}$, 9', 12' $\frac{1}{2}$, 16' . . . $\frac{7n-3}{2}$ min.

On aura donc $\frac{7n-3}{2} = 799200$ min.

D'où l'on tirera $n = 228342$ demi-pouces.

Ainsi, avec le feu de forge, on ne pourroit chauffer à blanc en 799200 min. ou 13320 heures qu'un globe dont le diamètre seroit de 228342 demi-pouces, & par conséquent il faudroit pour que toute la masse de la Comète soit échauffée au point du fer rougi à blanc pendant le peu de temps qu'elle a été exposée aux ardeurs du Soleil qu'elle n'eût eu que 228342 demi-pouces de diamètre, & supposer encore qu'elle eût été frappée

de
la lu
si on
néce
dans
forte
supp
aura
 $\frac{7n-3}{2}$
à dire
il en f
au lie
6269
gros c
raison
lieu d
ou 5
périhé
ans. A
proche
une ch
durabl
on ser
vue; le
sinage

des Minéraux, Partie Exp. 233

de tous côtés & en même temps par la lumière du Soleil. D'où il résulte que si on la suppose plus grande, il faut nécessairement supposer plus de temps dans la même raison de n à $\frac{7n-3}{2}$; en sorte, par exemple, que si l'on veut supposer la Comète égale à la Terre, on aura $n = 941461920$ demi-pouces, & $\frac{7n-3}{2} = 3295116718$ minutes, c'est-à-dire, qu'au lieu de 13320 heures, il en faudroit 54918612, ou, si l'on veut, au lieu d'un an 190 jours, il faudroit 6269 ans pour chauffer à blanc un globe gros comme la Terre; &, par la même raison, il faudroit que la Comète, au lieu de n'avoir séjourné que 1332 heures ou 55 jours 12 heures dans tout son périhélie, y eût demeuré pendant 392 ans. Ainsi les Comètes, lorsqu'elles approchent du Soleil, ne reçoivent pas une chaleur immense, ni très-long-temps durable, comme le dit Newton, & comme on seroit porté à le croire à la première vue; leur séjour est si court dans le voisinage de cet astre, que leur masse n'a

234 Introduction à l'Histoire

pas le temps de s'échauffer, & qu'il n'y a guère que la partie de la surface, exposée au Soleil, qui soit brûlée par ces instans de chaleur extrême, laquelle en calcinant & volatilissant la matière de cette surface, la chasse au - dehors en vapeurs & en poussière du côté opposé au Soleil; & ce qu'on appelle *la queue d'une Comète*, n'est autre chose que la lumière même du Soleil rendue sensible, comme dans une chambre obscure, par ces atomes que la chaleur pousse d'autant plus loin qu'elle est plus violente.

Mais une autre considération bien différente de celle-ci & encore plus importante, c'est que, pour appliquer le résultat de nos expériences & de notre calcul à la Comète & à la Terre, il faut les supposer composées de matières qui demanderoient autant de temps que le fer pour se refroidir; tandis que, dans le réel, les matières principales dont le globe terrestre est composé telles que les glaises, les grès, les pierres, &c. doivent se refroidir en bien moins de temps que le fer.

Pour me satisfaire sur cet objet, j'ai fait faire des globes de glaise & de grès,

d
& les
jusqu
que l
se so
tenir
ceux
huit
soixan
avec
boule
de de
trois
à 80
deux
trois
de 1
différen
moiti
du fe
J'ai
grès c
point
cinq
demi
de tro
ce qu
refroid

des Minéraux, Partie Exp. 235

& les ayant fait chauffer à la même forge jusqu'à les faire rougir à blanc, j'ai trouvé que les boulets de glaise de deux pouces, se sont refroidis au point de pouvoir les tenir dans la main en trente-huit minutes; ceux de deux pouces & demi en quarante-huit minutes, & ceux de trois pouces en soixante minutes, ce qui étant comparé avec le temps du refroidissement des boulets de fer de ces mêmes diamètres de deux pouces, deux pouces & demi & trois pouces, donne les rapports de 38 à 80 pour deux pouces, 48 à 102 pour deux pouces & demi, & 60 à 127 pour trois pouces, ce qui fait un peu moins de 1 à 2; en sorte que, pour le refroidissement de la glaise, il ne faut pas la moitié du temps qu'il faut pour celui du fer.

J'ai trouvé de même que les globes de grès de deux pouces se sont refroidis au point de les tenir dans la main en quarante-cinq minutes, ceux de deux pouces & demi en cinquante-huit minutes, & ceux de trois pouces en soixante-quinze minutes; ce qui étant comparé avec le temps du refroidissement des boulets de fer de ces

236 *Introduction à l'Histoire*

mêmes diamètres, donne les rapports de 46 à 80 pour deux pouces, de 58 à 102 pour deux pouces & demi, & de 75 à 127, pour trois pouces, ce qui fait à très-peu-près la raison de 9 à 5; en sorte que, pour le refroidissement du grès, il faut plus de la moitié du temps qu'il faut pour celui du fer.

J'observerai, au sujet de ces expériences, que les globes de glaise chauffés à feu blanc, ont perdu de leur pesanteur encore plus que les boulets de fer, & jusqu'à la neuvième ou dixième partie de leur poids; au lieu que le grès chauffé au même feu, ne perd presque rien du tout de son poids, quoique toute la surface se couvre d'émail & se réduise en verre. Comme ce petit fait m'a paru singulier, j'ai répété l'expérience plusieurs fois, en faisant même pousser le feu & le continuer plus longtemps que pour le fer; &, quoiqu'il ne fallût guère que le tiers du temps pour rougir le grès, de ce qu'il en falloit pour rougir le fer, je l'ai tenu à ce feu le double & le triple du temps, pour voir s'il perdrait davantage, & je n'ai trouvé que de très-légères diminutions; car le

glob
huir
gros
n'a p
qui
poid
qui p
gran
minu
quat
de t
once
chau
à-dir
perd
qui n
parti
petit
null
pur
car il
que j
lionn
se so
été
U
bien

des Minéraux, Partie Exp. 237

globe de deux pouces, chauffé pendant huit minutes, qui pesoit sept onces deux grostrente grains, avant d'être mis au feu, n'a perdu que quarante - un grains, ce qui ne fait pas la centième partie de son poids; celui de deux pouces & demi, qui pesoit quatorze onces deux gros huit grains, ayant été chauffé pendant douze minutes, n'a perdu que la cent cinquante-quatrième partie de son poids; & celui de trois pouces, qui pesoit vingt-quatre onces cinq gros treize grains, ayant été chauffé pendant dix-huit minutes, c'est-à-dire, à peu-près autant que le fer, n'a perdu que soixante-dix-huit grains, ce qui ne fait que la cent quatre-vingt-unième partie de son poids. Ces pertes sont si petites qu'on pourroit les regarder comme nulles, & assurer en général que le grès pur ne perd rien de sa pesanteur au feu; car il m'a paru que ces petites diminutions, que je viens de rapporter, ont été occasionnées par les parties ferrugineuses qui se sont trouvées dans ces grès, & qui ont été en partie détruites par le feu.

Une chose plus générale & qui mérite bien d'être remarquée, c'est que les durées

238 Introduction à l'Histoire

de la chaleur dans différentes matières exposées au même feu pendant un temps égal, sont toujours dans la même proportion, soit que le degré de chaleur soit plus grand ou plus petit; en sorte, par exemple, que si on chauffe le fer, le grès & la glaise à un feu violent, & tel qu'il faille quatre-vingts minutes pour refroidir le fer au point de pouvoir le toucher; quarante-six minutes pour refroidir le grès au même point, & trente-huit pour refroidir la glaise; & qu'à une chaleur moindre il ne faille, par exemple, que dix-huit minutes pour refroidir le fer à ce même point de pouvoir le toucher avec la main, il ne faudra proportionnellement qu'un peu plus de dix minutes pour refroidir le grès, & environ huit minutes & demie pour refroidir la glaise à ce même point.

J'ai fait de semblables expériences sur des globes de marbre, de pierre, de plomb & d'étain, à une chaleur telle seulement que l'étain commençoit à fondre, & j'ai trouvé que le fer se refroidissant en dix-huit minutes au point de pouvoir le tenir à la main, le marbre se refroidit au même point en douze minutes, la

pie
l'éta
(C
à le
gain
& p
mais
est e
à dir
fluid
il fau
refro
faut p
degr
netar
loppe
déper
la cha
ne pa
mots
J'ai
les co
leurs

(f)
pages
— Mu
969, &

des Minéraux, Partie Exp. 2 ; 9

Pierre en onze, le plomb en neuf, & l'étain en huit minutes.

Ce n'est donc pas proportionnellement à leur densité, comme on le croit vulgairement (*f*), que les corps reçoivent & perdent plus ou moins vite la chaleur ; mais dans un rapport bien différent & qui est en raison inverse de leur solidité, c'est-à-dire, de leur plus ou moins grande *non fluidité* ; en sorte qu'avec la même chaleur il faut moins de temps pour échauffer ou refroidir le fluide le plus dense, qu'il n'en faut pour échauffer ou refroidir au même degré le solide le moins dense. Je donnerai, dans les Mémoires suivans, le développement entier de ce principe duquel dépend toute la théorie du progrès de la chaleur : mais, pour que mon assertion ne paroisse pas vaine, voici en peu de mots le fondement de cette théorie.

J'ai trouvé, par la vue de l'esprit, que les corps qui s'échaufferoient en raison de leurs diamètres, ne pourroient être que

(*f*) Voyez la Chymie de Boërrhave. *Partie I.^{re}* pages 266 & 276, & aussi 160, 264 & 267. — Musschenbroek, *Essais de Physique*, pages 94 & 969, &c.

240 Introduction à l'Histoire

ceux qui seroient parfaitement perméables à la chaleur , & que ce seroient en même temps ceux qui s'échaufferoient ou se refroidiroient en moins de temps. Dès-lors j'ai pensé que les fluides dont toutes les parties ne se tiennent que par un foible lien , approchoient plus de cette perméabilité parfaite que les solides dont les parties ont beaucoup plus de cohésion que celles des fluides.

En conséquence j'ai fait des expériences par lesquelles j'ai trouvé qu'avec la même chaleur tous les fluides, quelque denses qu'ils soient, s'échauffent & se refroidissent plus promptement qu'aucun solide quelque léger qu'il soit ; en sorte , par exemple , que le mercure comparé avec le bois , s'échauffe beaucoup plus promptement que le bois , quoiqu'il soit quinze ou seize fois plus dense.

Cela m'a fait reconnoître que le progrès de la chaleur dans les corps , ne devoit , en aucun cas , se faire relativement à leur densité ; & en effet , j'ai trouvé par l'expérience que , tant dans les solides que dans les fluides , ce progrès se fait plutôt en raison de leur fluidité , ou si l'on veut

veut
C
cept
dans
dité
à la
volum
en p
c'est-à
volum
fois en
à-dire
lorsqu
n'est c
ploie i
tion qu
qu'elle
quemen
à la flu
inverse
grès de
corps ,
diffent
fluides
sont pl
constan
Et p
Supp

des Minéraux, Partie Exp. 241

veut en raison inverse de leur solidité.

Comme ce mot *solidité* a plusieurs acceptions, il faut voir nettement le sens dans lequel je l'emploie ici : *solide & solidité* se disent en Géométrie, relativement à la grandeur, & se prennent pour le volume du corps; *solidité* se dit souvent en Physique relativement à la densité, c'est-à-dire, à la masse contenue sous un volume donné; *solidité* se dit quelquefois encore relativement à la dureté, c'est-à-dire, à la résistance que font les corps lorsque nous voulons les entamer; or ce n'est dans aucun de ces sens, que j'emploie ici ce mot, mais dans une acception qui devoit être la première, parce qu'elle est la plus propre. J'entends uniquement par *solidité*, la qualité opposée à la fluidité, & je dis que c'est en raison inverse de cette qualité que se fait le progrès de la chaleur dans la plupart des corps, & qu'ils s'échauffent ou se refroidissent d'autant plus vite qu'ils sont plus fluides, & d'autant plus lentement qu'ils sont plus solides; toutes les autres circonstances étant égales d'ailleurs.

Et pour prouver que la solidité, prise
Supplément. Tome I. L

242 Introduction à l'Histoire

dans ce sens, est tout-à-fait indépendante de la densité, j'ai trouvé, par expérience, que des matières plus denses ou moins denses, s'échauffent & se refroidissent plus promptement que d'autres matières plus ou moins denses ; que, par exemple, l'or & le plomb, qui sont beaucoup plus denses que le fer & le cuivre, néanmoins s'échauffent & se refroidissent beaucoup plus vite, & que l'étain & le marbre, qui sont au contraire moins denses, s'échauffent & se refroidissent aussi beaucoup plus vite que le fer & le cuivre, & qu'il en est de même de plusieurs autres matières qui, quoique plus ou moins denses, s'échauffent & se refroidissent plus promptement que d'autres qui sont beaucoup moins denses ou plus denses ; en sorte que la densité n'est nullement relative à l'échelle du progrès de la chaleur dans les corps solides.

Et, pour le prouver de même dans les fluides, j'ai vu que le mercure, qui est treize ou quatorze fois plus dense que l'eau, néanmoins s'échauffe & se refroidit en moins de temps que l'eau ; & que l'esprit-de-vin, qui est moins dense que l'eau, s'échauffe & se refroidit aussi plus

vîte
le pr
tant
aucun
princ
en éte
à-dire
une m
De-là
connoi
dité da
fer à
sera da
temps
perdror
même d
tant plu
plus no
temps p
& la pe
ment à
tenté ce
bre de n
une tab
complète
possible
moire su

des Minéraux , Partie Exp. 243

vîte que l'eau ; en sorte que généralement le progrès de la chaleur dans les corps , tant pour l'entrée que pour la sortie , n'a aucun rapport à leur densité , & se fait principalement en raison de leur fluidité , en étendant la fluidité jusqu'au solide , c'est-à-dire , en regardant la solidité comme une *non-fluidité* , plus ou moins grande. De-là j'ai cru devoir conclure que l'on connoîtroit en effet le degré réel de fluidité dans les corps , en les faisant chauffer à la même chaleur ; car leur fluidité sera dans la même raison que celle du temps pendant lequel ils recevront & perdront cette chaleur ; & il en sera de même des corps solides ; ils seront d'autant plus solides , c'est-à-dire , d'autant plus *non-fluides* , qu'il leur faudra plus de temps pour recevoir cette même chaleur & la perdre : & cela presque généralement à ce que je présume ; car j'ai déjà tenté ces expériences sur un grand nombre de matières différentes , & j'en ai fait une table que j'ai tâché de rendre aussi complète & aussi exacte qu'il m'a été possible , & qu'on trouvera dans le Mémoire suivant.

SECOND MÉMOIRE.

*Suite des Expériences sur le progrès
de la chaleur dans les différentes
substances minérales.*

J'AI FAIT FAIRE un grand nombre de globes, tous d'un pouce de diamètre, le plus précisément qu'il a été possible, des matières suivantes, qui peuvent représenter ici à-peu-près le règne minéral.

Or le plus pur, affiné par les soins de M. Tillet ;
de l'Académie des Sciences, qui a fait travailler
ce globe à ma prière ,

	onces.	gros.	grains.
pèse.....	6.	2.	17.
Plomb, pèse.....	3.	6.	28.
Argent le plus pur, travaillé de même, pèse.....	3.	3.	22.
Bismuth, pèse.....	3.	0.	3.
Cuivre rouge, pèse.....	2.	7.	56.
Fer, pèse.....	2.	5.	10.
Étain, pèse.....	2.	3.	48.
Antimoine fondu, &c qui avoit des petites cavités à sa surface, pèse.....	2.	1.	34.

Zi
Én
Ma
Gr
Ma
bard,
Pie
Month
Gyp
appelé
Pier
tuaire,
près de
Cryl
peu tro
sieurs d
félures
que fan
d'un gr
Verr
Terr
mais tr
Ocro
Porc
Laurag
Crai

des Minéraux, Partie Exp. 245

	onces.	gros.	grains.
Zinc, pèse.....	2.	1.	2.
Émeril, pèse.....	1.	2.	24 $\frac{1}{2}$.
Marbre blanc, pèse.....	1.	0.	25.
Grès pur, pèse.....	0.	7.	24.
Marbre commun de Mont-			
bard, pèse.....	0.	7.	20.
Pierre calcaire dure & grise de			
Montbard, pèse.....	0.	7.	20.
Gyps blanc, improprement			
appelé <i>Albâtre</i> , pèse.....	0.	6.	36.
Pierre calcaire blanche, sta-			
tuaire, de la carrière d'Anières			
près de Dijon, pèse.....	0.	6.	36.
Cristal-de-roche, il étoit un			
peu trop petit, & il y avoit plu-			
sieurs défauts & quelques petites			
fêlures à sa surface ; je présume			
que sans cela il auroit pesé plus			
d'un gros de plus, il pèse.....	0.	6.	22.
Verre commun, pèse.....	0.	6.	21.
Terre glaise pure non cuite,			
mais très sèche, pèse.....	0.	6.	16.
Ocre, pèse.....	0.	5.	9.
Porcelaine de M. le comte de			
Lauragnais, pèse.....	0.	5.	2 $\frac{1}{2}$.
Craie blanche, pèse.....	0.	4.	49.

L iiij

246 Introduction à l'Histoire

Pierre ponce avec plusieurs
petites cavités à sa surface, pèse.. o. 1. 69.

Bois de cerisier, qui, quoique
plus léger que le chêne & la plu-
part des autres bois, est celui de-
tous qui s'altère le moins au feu,
pèse..... o. 1. 15.

Je dois avertir qu'il ne faut pas comp-
ter assez sur les poids rapportés dans cette
table, pour en conclure la pesanteur spé-
cifique exacte de chaque matière, car
quelque précaution que j'ai prise pour
rendre les globes égaux, comme il a fallu
employer des ouvriers de différens métiers,
les uns me les ont rendus trop gros &
les autres trop petits. On a diminué ceux
qui avoient plus d'un pouce de diamètre,
mais quelques-uns qui étoient un tant
soit peu trop petits, comme ceux de
crystal-de-roche, de verre & de porcelaine,
sont demeurés tels qu'ils étoient : j'ai seu-
lement rejeté ceux d'agate, de jaspe, de
porphyre & de jade, qui étoient sensible-
ment trop petits. Néanmoins ce degré
de précision de grosseur, très-difficile à
saisir, n'étoit pas absolument nécessaire,

onces. gros. grains.

car il
résult
Av
bes d
posé
quarr
de de
sions
rés, c
& se
temp
sur le
de te
froidi
moins
ces tr
qui et
& en
plus
que la
à-dire
les co
tionne
qui est
s'écha
moins
Comm

des Minéraux, Partie Exp. 247

car il ne pouvoit changer que très-peu le résultat de mes expériences.

Avant d'avoir commandé tous ces globes d'un pouce de diamètre, j'avois exposé à un même degré de feu, une masse quarrée de fer, & une autre de plomb de deux pouces dans routes leurs dimensions, & j'avois trouvé par des essais réitérés, que le plomb s'échauffoit plus vite & se refroidissoit en beaucoup moins de temps que le fer. Je fis la même épreuve sur le cuivre rouge; il faut aussi plus de temps pour l'échauffer & pour le refroidir, qu'il n'en faut pour le plomb & moins que pour le fer. En sorte que de ces trois matières, le fer me parut celle qui est la moins accessible à la chaleur, & en même temps celle qui la retient le plus long-temps. Ceci me fit connoître que la loi du progrès de la chaleur, c'est-à-dire, de son entrée & de sa sortie dans les corps, n'étoit point du tout proportionnelle à leur densité, puisque le plomb, qui est plus dense que le fer & le cuivre, s'échauffe néanmoins & se refroidit en moins de temps que ces deux autres métaux. Comme cet objet me parut important,

248 Introduction à l'Histoire

je fis faire mes petits globes, pour m'assurer plus exactement, sur un grand nombre de différentes matières, du progrès de la chaleur dans chacune. J'ai toujours placé les globes à un pouce de distance les uns des autres devant le même feu, ou dans le même four, deux ou trois, quatre ou cinq, &c. ensemble pendant le même temps avec un globe d'étain au milieu des autres. Dans la plupart des expériences, je les laissois exposés à la même action du feu, jusqu'à ce que le globe d'étain commençoit à fondre, & dans ce moment on les enlevoit tous ensemble, & on les posoit sur une table dans de petites cases préparées pour les recevoir; je les y laissois refroidir sans les bouger, en essayant assez souvent de les toucher, & au moment qu'ils commençoient à ne plus brûler les doigts, & que je pouvois les tenir dans ma main pendant une demi-seconde, je marquois le nombre des minutes qui s'étoient écoulées depuis qu'ils étoient retirés du feu: ensuite je les laissois tous refroidir au point de la température actuelle, dont je tâchois de

d
juger
de m
chauff
temps
De t
l'épre
fond
l'étain
sa vap
de co
matière
frotte
exige
se fon
le sou

P A
boule
chauff
refroid

*Refroidis
pendant*

Plomb
Cuivre

A

des Minéraux, Partie Exp. 249

juger par le moyen d'autres petits globes de même matière qui n'avoient pas été chauffés, & que je touchois en même temps que ceux qui se refroidissoient. De toutes les matières que j'ai mises à l'épreuve, il n'y a que le soufre qui fond à un moindre degré de chaleur que l'étain; &, malgré la mauvaise odeur de sa vapeur, je l'aurois pris pour terme de comparaison, mais comme c'est une matière friable & qui se diminue par le frottement, j'ai préféré l'étain, quoiqu'il exige près du double de chaleur pour se fondre, de celle qu'il faut pour fondre le soufre.

I.

P A R une première expérience, le boulet de plomb & le boulet de cuivre chauffés pendant le même temps, se sont refroidis dans l'ordre suivant.

<i>Refroidis à les tenir dans la main pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température actuelle.</i>
minutes.	minutes.
Plomb, en..... 8.	En..... 23.
Cuivre, en..... 12.	En..... 35.

I I.

A Y A N T fait chauffer ensemble, au

L v

250 Introduction à l'Histoire

même feu, des boulets de fer, de cuivre, de plomb, d'étain, de grès & de marbre de Montbard, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

	minutes.
Étain, en.....	6 $\frac{1}{2}$.
Plomb, en.....	8.
Grès, en.....	9.
Marbre commun, en....	10.
Cuivre, en.....	11 $\frac{1}{2}$.
Fer, en.....	13.

Refroidis à la température actuelle.

	minutes.
En.....	16.
En.....	17.
En.....	19.
En.....	21.
En.....	30.
En.....	38.

I I L

P A R une seconde expérience à un feu plus ardent & au point d'avoir fondu le boulet d'étain, les cinq autres boulets se sont refroidis dans les proportions suivantes:

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

	minutes.
Plomb, en....	10 $\frac{1}{2}$.
Grès, en....	12 $\frac{1}{2}$.
Marbre commun, en....	13 $\frac{1}{2}$.
Cuivre, en.....	19 $\frac{1}{2}$.
Fer, en.....	23 $\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

	minutes.
En.....	42.
En.....	46.
En.....	50.
En.....	51.
En.....	54.

des Minéraux, Partie Exp. 251

I V.

P A R une troisième expérience, à un degré de feu moindre que le précédent, les mêmes boulets avec un nouveau boulet d'étain, se sont refroidis dans l'ordre suivant.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

Refroidis à la température.

	minutes.
Étain, en.....	7 $\frac{1}{2}$.
Plomb, en.....	9 $\frac{1}{2}$.
Grès, en.....	10 $\frac{1}{2}$.
Marbre commun, en.....	12.
Cuivre, en.....	14.
Fer, en.....	17.

	minutes.
En.....	25.
En.....	35.
En.....	37.
En.....	39.
En.....	44.
En.....	50.

De ces expériences que j'ai faites avec autant de précision qu'il m'a été possible, on peut conclure :

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du cuivre au point de les tenir : $53 \frac{1}{2} : 45$, & au point de la température : $142 : 125$.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du premier refroidissement du marbre commun : $53 \frac{1}{2} : 35 \frac{1}{2}$, & au point de leur refroidissement entier : $142 : 110$.

Lvj

252 *Introduction à l'Histoire*

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du grès, au point de pouvoir les tenir :: $53 \frac{1}{2} : 32$, & :: $142 : 102 \frac{1}{2}$ pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du plomb, au point de les tenir :: $53 \frac{1}{2} : 27$, & :: $142 : 94 \frac{1}{2}$ pour leur entier refroidissement.

V.

COMME il n'y avoit que deux expériences pour la comparaison du fer à l'étain, j'ai voulu en faire une troisième dans laquelle l'étain s'est refroidi à le tenir dans la main en 8 minutes : & en entier, c'est-à-dire, à la température, en 32 minutes ; & le fer s'est refroidi à le tenir sur la main en 18 minutes, & refroidi en entier en 48 minutes ; au moyen de quoi la proportion trouvée par trois expériences, est :

1.^o Pour le premier refroidissement du fer comparé à celui de l'étain :: $48 : 22$, & :: $136 : 73$ pour leur entier refroidissement.

des Minéraux, Partie Exp. 253

2.^o Que les temps du refroidissement du cuivre, sont à ceux du refroidissement du marbre commun :: 45 : 35 $\frac{1}{2}$ pour le premier refroidissement, & :: 125 : 110 pour le refroidissement à la température.

3.^o Que les temps du refroidissement du cuivre sont à ceux du refroidissement du grès :: 45 : 33 pour le premier refroidissement, & :: 125 : 102 pour le refroidissement à la température actuelle.

4.^o Que les temps du refroidissement du cuivre sont à ceux du refroidissement du plomb :: 45 : 27 pour le premier refroidissement, & :: 125 : 94 $\frac{1}{2}$ pour le refroidissement entier.

V I.

COMME il n'y avoit, pour la comparaison du cuivre & de l'étain, que deux expériences, j'en ai fait une troisième, dans laquelle le cuivre s'est refroidi, à le tenir dans la main en 18 minutes, & en entier en 49 minutes ; & l'étain s'est refroidi au premier point en 8 $\frac{1}{2}$ minutes, & au dernier en 30 minutes ; d'où l'on peut conclure :

1.^o Que le temps du refroidissement

254 *Introduction à l'Histoire*

du cuivre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $43\frac{1}{2}$: $22\frac{1}{2}$, & :: 123 : 71 pour leur entier refroidissement.

2.^o On peut de même conclure des expériences précédentes, que le temps du refroidissement du marbre commun, est à celui du refroidissement du grès, au point de pouvoir les tenir :: $36\frac{1}{2}$: 32, & :: 110 : 102 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $36\frac{1}{2}$: 28, & :: 110 : $94\frac{1}{2}$ pour le refroidissement entier.

V I I.

COMME il n'y avoit pour la comparaison du marbre commun & de l'étain que deux expériences, j'en ai fait une troisième dans laquelle l'étain s'est refroidi, à le tenir dans la main en 9 minutes, & le marbre en 11 minutes; & l'étain s'est refroidi en entier en $22\frac{1}{2}$ minutes, & le marbre en 33 minutes. Ainsi, les temps du refroidissement du marbre, sont à ceux

des Mineraux, Partie Exp. 255

du refroidissement de l'étain, comme 33 est à $24\frac{1}{2}$ pour le premier refroidissement, & :: 93 : 64 pour le second refroidissement.

V I I I.

COMME il n'y avoit que deux expériences pour la comparaison du grès & du plomb avec l'étain, j'en ai fait une troisième en faisant chauffer ensemble ces trois boulets de grès, de plomb & d'étain qui se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.	minutes.	Refroidis à la température.	minutes.
Étain, en.....	$7\frac{1}{2}$.	En.....	23.
Plomb, en.....	$8\frac{1}{2}$.	En.....	27.
Grès, en.....	$10\frac{1}{2}$.	En.....	28.

Ainsi, on peut en conclure :

1.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $25\frac{1}{2}$: $21\frac{1}{2}$, & :: $79\frac{1}{2}$: 64 pour le refroidissement entier.

2.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement de l'étain,

256 Introduction à l'Histoire

au point de pouvoir les tenir :: $30 : 21 \frac{1}{2}$
& :: $84 : 64$ pour leur entier refroidissement :

3.^o De même on peut conclure, par les quatre expériences précédentes, que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $42 \frac{1}{2} : 35 \frac{1}{2}$, & :: $130 : 121 \frac{1}{2}$ pour leur entier refroidissement.

I X.

Dans un four chauffé au point de fondre l'étain, quoique toute la braïse & les cendres en eussent été retirées, j'ai fait placer sur un support de fer-blanc traversé de fil-de-fer, cinq boulets éloignés les uns des autres d'environ 9 lignes, après quoi on a fermé le four : & les ayant retirés au bout de 15 minutes, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant.

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>
minutes.	minutes.
Étain fondu par sa partie d'en bas, en. 8.	En.....24.
Argent, en.....14.	En.....40.

de
Refroid
un

Or, en
Cuivre
Fer, c

D
moins
boule
se son

Refroid
un

Étain,
Argen
Or, en
Cuivre
Fer, en

D
de ch
boule
tions

des Minéraux, Partie Exp. 257

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Or, en.....15.
Cuivre, en.....16½.
Fer, en.....18.

Refroidis à la température.

minutes.

En.....46.
En.....50.
En.....56.

X.

DANS le même four, mais à un moindre degré de chaleur, les mêmes boulets avec un autre boulet d'étain, se sont refroidis dans l'ordre suivant.

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Étain, en.....7.
Argent, en.....11.
Or, en.....12½.
Cuivre, en.....14.
Fer, en.....16½.

Refroidis à la température.

minutes.

En.....20.
En.....31.
En.....40.
En.....43.
En.....47.

X I.

DANS le même four & à un degré de chaleur encore moindre, les mêmes boulets se sont refroidis dans les proportions suivantes :

258 Introduction à l'Histoire

Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde

minutes.

Étain, en.....6.
Argent, en.....9.
Or, en.....9½.
Cuivre, en.....10.
Fer, en.....11.

Refroidis à la température:

minutes,

En.....17.
En.....26.
En.....28.
En.....31.
En.....35.

On doit conclure de ces expériences :

1.° Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du cuivre, au point de les tenir :: $11 + 16\frac{1}{2} + 18 : 10 + 14 + 16\frac{1}{2}$, ou :: $45\frac{1}{2} : 40\frac{1}{2}$ par les trois expériences présentes ; & comme ce rapport a été trouvé par les expériences précédentes, (*article IV*) :: $53\frac{1}{2} : 45$, on aura, en ajoutant ces temps, 99 à $85\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis du premier refroidissement du fer & du cuivre ; & pour le second, c'est-à-dire, pour le refroidissement entier, le rapport donné par les présentes expériences étant :: $35 + 47 + 56 : 31 + 43 + 50$, ou :: $138 : 24$, & :: $142 : 125$. Par les expériences précédentes (*art. IV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 280 à 249 pour le rapport

des Minéraux, Partie Exp. 259

encore plus précis du refroidissement entier du fer & du cuivre.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'or, au point de pouvoir les tenir :: $45\frac{1}{2}$: 37, & au point de la température :: 138 : 114.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir :: $45\frac{1}{2}$: 34, & au point de la température :: 138 : 97.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $45\frac{1}{2}$: 21 par les présentes expériences, & :: 24 : 11 par les expériences précédentes (*art. V*) : ainsi, l'on aura, en ajoutant ces temps, $69\frac{1}{2}$ à 32 pour le rapport encore plus précis de leur refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes étant :: 138 : 61, & par les expériences précédentes (*art. V*) :: 136 : 73 : on aura, en ajoutant ces temps, 274 à 134 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & de l'étain.

260 Introduction à l'Histoire

5.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui de l'or, au point de pouvoir les tenir :: $40\frac{1}{2}$: 37, & :: 124 : 114 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir :: $40\frac{1}{2}$: 34, & :: 124 : 97 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $40\frac{1}{2}$: 21 par les présentes expériences, & :: $43\frac{1}{2}$: $22\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. VI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 84 à $43\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant :: 124 : 61, & :: 123 : 71 par les expériences précédentes (*art. VI*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 247 à 132 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & de l'étain.

8.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de

de
l'arge
:: 37
refroi
9.^o
de l'o
l'étain
:: 37
entier
10.
de l'a
de l'é
:: 34
entier

Av
boule
uns d
fait d

Refroid

Antim
Bismu
Plomb
Zinc,
Emer

des Minéraux, Partie Exp. 261

l'argent, au point de pouvoir les tenir
 $:: 37 : 34$, & $:: 114 : 97$ pour leur entier
 refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement
 de l'or est à celui du refroidissement de
 l'étain, au point de pouvoir les tenir
 $:: 37 : 21$, & $:: 114 : 61$ pour leur
 entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement
 de l'argent est à celui du refroidissement
 de l'étain, au point de pouvoir les tenir
 $:: 34 : 21$, & $:: 97 : 61$ pour leur
 entier refroidissement.

X I I.

AYANT MIS dans le même four cinq
 boulers, placés dans le même & séparés les
 uns des autres, leur refroidissement s'est
 fait dans les proportions suivantes.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.	minutes.	Refroidis à la température.	minutes.
Antimoine, en....	$6\frac{1}{2}$.	En.....	25.
Bismuth, en.....	7.	En.....	26.
Plomb, en.....	8.	En.....	27.
Zinc, en.....	$10\frac{1}{2}$.	En.....	30.
Émeril, en.....	$11\frac{1}{2}$.	En.....	38.

262 Introduction à l'Histoire

X I I I.

AYANT RÉPÉTÉ cette expérience avec un degré de chaleur plus fort, & auquel l'étain & le bismuth se sont fondus, les autres boulets se sont refroidis dans la progression suivante.

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>
minutes.	minutes.
Antimoine, en.... $7\frac{1}{2}$.	En..... 28.
Plomb, en..... $9\frac{1}{2}$.	En..... 39.
Zinc, en..... 14.	En..... 44.
Émeril, en..... 16.	En..... 50.

X I V.

ON A PLACÉ, dans le même four & de la même manière, un autre boulet de bismuth, avec six autres boulets qui se sont refroidis dans la progression suivante.

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>
minutes.	minutes.
Antimoine, en... 6.	En..... 23.
Bismuth, en.... 6.	En..... 25.
Plomb, en..... $7\frac{1}{2}$.	En..... 28.
Argent, en..... $9\frac{1}{2}$.	En..... 30.
Zinc, en..... $10\frac{1}{2}$.	En..... 32.
Or, en, , , , , 11.	En..... 32.
Émeril, en, , , , , $1\frac{1}{2}$.	En..... 39.

des

AYA
les sept
dis dan

Refroidis
une

Antimoi
Bismuth
Plomb,
Argent,
Zinc, en
Or, en,
Émeril,

Tou
avec s
trois p
par le
pendan
boulets

1.
de l'én
de l'or
28
entier

des Minéraux, Partie Exp. 263

X V.

AYANT RÉPÉTÉ cette expérience avec les sept mêmes boulets, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Antimoine, en.... $6\frac{1}{2}$.
Bismuth, en.... $7\frac{1}{2}$.
Plomb, en.... $7\frac{1}{2}$.
Argent, en.... $11\frac{1}{2}$.
Zinc, en.,, $13\frac{1}{2}$.
Or, en.,, 14.
Émeril, en.... 15.

Refroidis à la température:

minutes.

En..... 23.
En..... 31.
En..... 29.
En..... 32.
En..... 38.
En..... 41.
En..... 44.

Toutes ces expériences ont été faites avec soin & en présence de deux ou trois personnes qui ont jugé comme moi par le tact, & en serrant dans la main, pendant une demi-seconde, les différens boulets; ainsi, l'on doit en conclure:

1.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'or, au point de pouvoir les tenir :: $28\frac{1}{2}$: 25, & :: 83 : 73 pour leur entier refroidissement,

264 Introduction à l'Histoire

2.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du zinc, au point de pouvoir les toucher :: $56 : 48 \frac{1}{2}$, & :: $171 : 144$ pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir :: $28 \frac{1}{2} : 21$, & :: $83 : 62$ pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du plomb, au point de les tenir :: $56 : 32 \frac{1}{2}$, & :: $171 : 123$ pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les tenir :: $40 : 20 \frac{1}{2}$, & :: $121 : 80$ pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: $55 : 26 \frac{1}{2}$, & à la température :: $171 : 99$.

7.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du zinc,

des

zinc, au
& :: 7
dissème

8.^o

de l'or
l'argent

:: 25

& :: 3

dentes

ajoutant

rappor

dissème

donné p

:: 73

expérien

on aura

: 159 p

entier r

9.^o

de l'or

plomb,

:: 25

entier r

10.^o

de l'or

bismut

Sup

des Minéraux, Partie Exp. 265

zinc, au point de les tenir :: 25 : 24,
& :: 73 : 70 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir :: 25 : 21 par les présentes expériences, & :: 37 : 34 par les expériences précédentes (*article XI*); ainsi, l'on aura, en ajoutant ces temps, 62 à 55 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant :: 73 : 62, & :: 114 : 97 par les expériences précédentes (*article XI*); on aura, en ajoutant ces temps, 187 : 159 pour le rapport plus précis de leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: 25 : 15, & :: 73 : 57 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir

Supplément. Tome I. M

266 Introduction à l'Histoire

:: 25 : $13 \frac{1}{2}$, & :: 73 : 56 pour leur entier refroidissement.

11.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 25 : $12 \frac{1}{2}$, & :: 73 : 46 pour leur entier refroidissement.

12.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir :: 24 : 21, & :: 70 : 62 pour leur entier refroidissement.

13.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $48 \frac{1}{2}$: $32 \frac{1}{2}$, & :: 144 : 123 pour leur entier refroidissement.

14.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: $34 \frac{1}{2}$: $20 \frac{1}{2}$, & :: 100 : 80 pour leur entier refroidissement.

15.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: $48 \frac{1}{2}$: $26 \frac{1}{2}$, & à la température :: 144 : 99.

16.^o Que le temps du refroidissement

de l'
du l
tenir
leur
17
de l'a
de l'
:: 2
entier
18
du pl
du bi
: 20
refroi
19
du pl
de l'a
:: 3
:: 12
20
du bi
de l'a
tenir
leur e
Je
toutes
ports

des Minéraux, Partie Exp. 267

de l'argent est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: 21 : 13 $\frac{1}{2}$, & :: 62 : 56 pour leur entier refroidissement.

17.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 21 : 12 $\frac{1}{2}$, & :: 62 : 46 pour leur entier refroidissement.

18.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les tenir :: 23 : 20 $\frac{1}{2}$, & :: 84 : 80 pour leur entier refroidissement.

19.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les toucher :: 32 $\frac{1}{2}$: 26 $\frac{1}{2}$, & à la température :: 123 : 99.

20.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: 20 $\frac{1}{2}$: 19, & :: 30 : 71 pour leur entier refroidissement.

Je dois observer qu'en général dans toutes ces expériences, les premiers rapports sont bien plus justes que les

268 Introduction à l'Histoire

derniers, parce qu'il est difficile de juger du refroidissement jusqu'à la température actuelle, & que cette température étant variable, les résultats doivent varier aussi; au lieu que le point du premier refroidissement peut être saisi assez juste par la sensation que produit sur la même main la chaleur du boulet, lorsqu'on peut le tenir ou le toucher pendant une demi-seconde.

X V I.

COMME il n'y avoit que deux expériences pour la comparaison de l'or avec l'émeril, le zinc, le plomb, le bismuth & l'antimoine; que le bismuth s'étoit fondu en entier, & que le plomb & l'antimoine étoient fort endommagés, je me suis servi d'autres boulets de bismuth, d'antimoine & de plomb, & j'ai fait une troisième expérience, en mettant ensemble dans le même four bien chauffé ces deux boulets; ils se sont refroidis dans l'ordre suivant.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Antimoine, en... 7.

Bismuth, en... 8.

Refroidis à la température.

minutes.

En... 27.

En... 29.

des Minéraux, Partie Exp. 269

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Plomb, en.....9.

Zinc, en.....12.

Or, en.....13.

Émeril, en.....13½.

Refroidis à la température.

minutes.

En.....33.

En.....37.

En.....42.

En.....48.

D'où l'on doit conclure, ainsi que des expériences *XIV* & *XV*. 1.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'or, au point de pouvoir les tenir :: 44 : 38, & au point de la température :: 131 : 115.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du zinc, au point de pouvoir les tenir :: $15\frac{1}{2}$: 12 ; mais le rapport trouvé par les expériences précédentes (*art. XV*) étant :: 56 : $48\frac{1}{2}$, on aura, en ajoutant ces temps, $71\frac{1}{2}$ à $60\frac{1}{2}$ pour leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport trouvé par l'expérience présente, étant :: 48 : 37, & par les expériences précédentes (*art. XV*) comme 171 à 144 ; ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 239 à 181 pour le rapport encore plus précis de l'entier

M iiij

270 Introduction à l'Histoire

refroidissement de l'émeril & du zinc.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $15\frac{1}{2}$: 9, mais le rapport trouvé par les expériences précédentes (*article XV*) étant : : 56 : $32\frac{1}{2}$; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $71\frac{1}{2}$ à $41\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience précédente, étant : : 48 : 33 ; & par les expériences précédentes (*article XV*) : : 171 : 123 ; on aura, en ajoutant ces temps, 239 à 156 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & du plomb.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: $15\frac{1}{2}$: 8 ; & par les expériences précédentes (*article XV*) : : 40 : $20\frac{1}{2}$, ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $55\frac{1}{2}$ à $28\frac{1}{2}$, pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant : : 48 : 29, &

de

:: 12
dentes
ces re
encor
ment

5.^o
de l'é
de l'a
tenir
par le
(*XV*)

ajouta
rappo
refroi
rappo
étant
les ex

on a
à 126
de l'e
de l'a

6.^o
de l'e
zinc,
: 36
refro

7.^o

des Mineraux, Partie Exp. 271

:: 121 : 80 par les expériences précédentes (*art. XV*); on aura, en ajoutant ces temps, 169 à 109 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & du bismuth.

5.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: $15 \frac{1}{2}$: 7, mais le rapport trouvé par les expériences précédentes (*article XV*) étant :: $56 : 26 \frac{1}{2}$; on aura, en ajoutant ces temps, $71 \frac{1}{2}$ à $33 \frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 48 : 27, & :: 171 : 99 par les expériences précédentes (*art. XV*); on aura, en ajoutant ces temps, 219 à 126 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & de l'antimoine.

6.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du zinc, au point de pouvoir les tenir :: 38 : 36, & :: 115 : 107 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement

272 Introduction à l'Histoire

de l'or est à celui du refroidissement du plomb, au point de les toucher :: 38 : 24, & à la température :: 115 : 90.

8.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: 38 : 21 $\frac{1}{2}$, & à la température :: 115 : 85.

9.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les toucher :: 38 : 19 $\frac{1}{2}$, & à la température :: 115 : 69.

10.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: 12 : 9. Mais le rapport trouvé par les expériences précédentes (*article XV*) étant :: 48 $\frac{1}{2}$: 32 $\frac{1}{2}$; on aura, en ajoutant ces temps, 60 $\frac{1}{2}$ à 41 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: 37 : 33, & par les expériences précédentes (*article XV*) :: 144 : 123; on aura, en ajoutant ces temps, 181

de

à 156
de l'e
plomb

11.^o
du zin
bismut
: 8 p
rappor
dentes

en ajo
28 $\frac{1}{2}$
premi
cond
présen

expéri
: 80 ;
137 à
précis
& du

12.
du zin
l'antin
: 7 p
comm
rience
: 26 $\frac{1}{2}$
60 $\frac{1}{2}$

des Minéraux, Partie Exp. 273

à 156 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du plomb.

11.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les toucher :: 12 : 8 par la présente expérience ; mais le rapport trouvé par les expériences précédentes (*art. XV*) est :: $34\frac{1}{2}$: $20\frac{1}{2}$; en ajoutant ces temps, on aura $46\frac{1}{2}$ à $28\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 37 : 29, & par les expériences précédentes (*art. XV*) :: 100 : 80 ; on aura, en ajoutant ces temps, 137 à 109 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du bismuth.

12.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'antimoine, pour pouvoir les tenir :: 12 : 7 par la présente expérience ; mais comme le rapport trouvé par les expériences précédentes (*art. XV*) est :: $48\frac{1}{2}$: $26\frac{1}{2}$; on aura, en ajoutant ces temps, $60\frac{1}{2}$ à $33\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus

M. V.

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.5
25.0
28.0
31.5
36.0
40.0
45.0
50.0
56.0
63.0
71.0
80.0
90.0
100.0

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.5
25.0
28.0
31.5
36.0
40.0
45.0
50.0
56.0
63.0
71.0
80.0
90.0
100.0

274 Introduction à l'Histoire

précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 37 : 27, & :: 144 : 99 par les expériences précédentes (*art. XV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 181 à 126 pour le rapport plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de l'antimoine.

13.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: 9 : 8 par l'expérience présente, & :: 23 : 20 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 32 à 28 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience étant :: 33 : 29, & :: 84 : 80 par les expériences précédentes (*art. XV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 117 à 109 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb & du bismuth.

14.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 9 : 7 par la présente expérience, &

des Minéraux, Partie Exp. 275

:: 32 $\frac{1}{2}$: 26 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 41, $\frac{1}{2}$ à 33 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: 33 : 27, & :: 123 : 99 par les expériences précédentes (*art. XV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 156 à 126 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb & de l'antimoine.

15.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: 8 : 7 par l'expérience présente, & :: 20 $\frac{1}{2}$: 19 par les expériences précédentes (*article XV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 28 $\frac{1}{2}$ à 26 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 29 : 27, & :: 80 : 71 par les expériences précédentes (*art. XV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 109 à 98 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du bismuth & de l'antimoine.

276 Introduction à l'Histoire

X V I I.

COMME il n'y avoit de même que deux expériences pour la comparaison de l'argent avec l'émeril, le zinc, le plomb, le bismuth & l'antimoine, j'en ai fait une troisième, en mettant dans le même four, qui s'étoit un peu refroidi, les six boulets ensemble, & après les en avoir tirés tous en même temps, comme on l'a toujours fait, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.	minutes.	Refroidis à la température.	minutes.
Antimoine, en...	6.	En.....	29.
Bismuth, en.....	7.	En.....	31.
Plomb, en.....	$8\frac{1}{4}$.	En.....	34.
Argent, en.....	$11\frac{1}{2}$.	En.....	36.
Zinc, en.....	$12\frac{1}{2}$.	En.....	39.
Émeril, en.....	$15\frac{1}{2}$.	En.....	47.

On doit conclure de cette expérience & de celles des articles XIV & XV.

1.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du zinc, au point de les tenir, par l'expérience présente :: $15\frac{1}{2}$: $12\frac{1}{2}$, & :: $71\frac{1}{2}$: $60\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes

des Minéraux, Partie Exp. 277

(art. XVI) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 83 à 73 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: 47 : 39, & par les expériences précédentes (article XVI) :: 239 : 181 ; on aura, en ajoutant ces temps, 286 à 220 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & du zinc.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'argent :: 44 : 32 $\frac{1}{2}$ au point de les tenir, & :: 130 : 98 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du plomb, au point de les tenir :: 15 $\frac{1}{2}$: 8 $\frac{1}{4}$ par l'expérience présente, & :: 71 $\frac{1}{2}$: 41 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (art. XVI) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 87 à 49 $\frac{3}{4}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: 47 : 34, & :: 239 : 156 par les

278 Introduction à l'Histoire

expériences précédentes (*article XVI*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 286 à 190 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & du plomb.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du bismuth , au point de pouvoir les tenir :: $15 \frac{1}{2} : 7$ par l'expérience présente , & :: $55 \frac{1}{2} : 28 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 71 à $35 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par l'expérience présente , étant :: $47 : 31$, & :: $169 : 109$ par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 216 à 140 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & du bismuth.

5.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'antimoine , au point de les tenir :: $15 \frac{1}{2} : 6$ par l'expérience présente , & :: $71 \frac{1}{2} : 33 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XVI*) ; ainsi , en

ajout
pour
mier
le rap
étant
précé
on a
155
de l'e
de l'a
6.^o
du zin
l'arge
: 32
refroi
7.^o
du zin
plomb
: 12
& :
précé
en ajo
le rap
refroi
rappo
étant
précé

des Mineraux, Partie Exp. 279

ajoutant ces temps, on aura 87 à $39 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: $47 : 29$, & par les expériences précédentes (*article XVI*) :: $219 : 126$; on aura, en ajoutant ces temps, 266 à 155 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & de l'antimoine.

6.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'argent, au point de les tenir :: $36 \frac{1}{2} : 32$; & :: $109 : 98$ pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $12 \frac{1}{2} : 8 \frac{1}{4}$ par l'expérience présente, & :: $60 \frac{1}{2} : 41 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 73 à $43 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: $39 : 33$, & par les expériences précédentes (*art. XVI*) :: $181 : 156$,

280 Introduction à l'Histoire

on aura , en ajoutant ces temps , 220 à 189 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du plomb.

8.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du bismuth , au point de pouvoir les tenir :: $12 \frac{1}{2}$: 7 par la présente expérience ; & :: $46 \frac{1}{2}$: $28 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 59 à $35 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par l'expérience présente étant :: 39 : 31 , & :: 137 : 109 par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 176 à 140 par le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du bismuth.

9.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'antimoine , au point de les tenir :: $12 \frac{1}{2}$: 6 par la présente expérience ; & :: $60 \frac{1}{2}$: 33 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 73 à $39 \frac{1}{2}$ pour le rapport

plus
ment
trouv
:: 3
expér
on au
155
de l'e
l'antim
10
de l'a
du pl
:: 32
entier
11
de l'a
du bi
: 20
refro
12
de l'a
de l'a
tenir
leur e
13
du pl
du bi

des Mineraux, Partie Exp. 281

plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport trouvé par l'expérience présente étant :: 39 : 29 , & :: 181 : 126 par les expériences précédentes (*article XVI*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 220 à 155 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de l'antimoine.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du plomb , au point de pouvoir les tenir :: $32 \frac{1}{2}$: $23 \frac{1}{4}$, & :: 98 : 90 pour leur entier refroidissement.

11.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du bismuth au point de les tenir :: $32 \frac{1}{2}$: $20 \frac{1}{2}$, & :: 98 : 87 pour leur entier refroidissement.

12.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement de l'antimoine , au point de pouvoir les tenir :: $32 \frac{1}{2}$: $18 \frac{1}{2}$, & :: 98 : 75 pour leur entier rétablissement.

13.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement du bismuth , au point de les tenir :: $8 \frac{1}{4}$

282 Introduction à l'Histoire

: 7 par la présente expérience, & :: 1 : 31
 : 28 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes
 (*art. XVI*); on aura, en ajoutant ces
 temps 40 $\frac{1}{4}$ à 35 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus
 précis de leur premier refroidissement;
 & pour le second, le rapport donné par
 l'expérience présente étant :: 34 : 31,
 & :: 117 : 109 par les expériences
 précédentes (*article XVI*); on aura,
 en ajoutant ces temps, 141 à 140
 pour le rapport encore plus précis de
 l'entier refroidissement du plomb & du
 bismuth.

14.^o Que le temps du refroidissement
 du plomb est à celui du refroidissement de
 l'antimoine, au point de pouvoir les tenir
 :: 8 $\frac{1}{4}$: 6 par l'expérience présente, & par
 les expériences précédentes (*art. XVI*)
 :: 41 $\frac{1}{2}$: 33 $\frac{1}{2}$; ainsi, on aura, en ajoutant
 ces temps, 49 $\frac{1}{4}$ à 39 $\frac{1}{2}$ pour le rapport
 plus précis de leur premier refroidisse-
 ment; & pour le second, le rapport
 donné par la présente expérience étant
 :: 34 : 29, & :: 156 : 126 par les ex-
 périences précédentes (*art. XVI*); on
 aura, en ajoutant ces temps, 190 à 155
 pour le rapport encore plus précis de

de

l'entier
 l'antim

15.

du bism

de l'an

tenir

& ::

dentes

ajouta

port p

dissme

donné

:: 31

expérie

on aur

127 po

de l'en

de l'an

ON

boulet

d'étau

en fair

se sont

Refroidis

une

Étain,

des Minéraux, Partie Exp. 283

l'entier refroidissement du plomb & de l'antimoine.

15.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: 7 : 6 par la présente expérience, & :: $28\frac{1}{2}$: 26 par les expériences précédentes (*article XVI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $35\frac{1}{2}$: 32 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné de la présente expérience étant :: 31 : 29, & :: 109 : 98 par les expériences précédentes (*article XVI*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 140 à 127 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du bismuth & de l'antimoine.

X V I I I.

ON A MIS dans le même four un boulet de verre, un nouveau boulet d'étain, un de cuivre & un de fer pour en faire une première comparaison, & ils se sont refroidis dans l'ordre suivant.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Étain, en..... 8.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 27.

284 Introduction à l'Histoire

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

	minutes.
Verre, en.....	8 $\frac{1}{2}$.
Cuivre, en.....	14.
Fer, en.....	16.

Refroidis à la température,

	minutes.
En.....	22.
En.....	42.
En.....	50.

X I X.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant.

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

	minutes.
Étain, en.....	7 $\frac{1}{2}$.
Verre, en.....	8.
Cuivre, en.....	12.
Fer, en.....	15.

Refroidis à la température,

	minutes.
En.....	21.
En.....	23.
En.....	36.
En.....	47.

X X.

PAR une troisième expérience, les boulets chauffés pendant un plus long temps, mais à une chaleur un peu moindre, se sont refroidis dans l'ordre suivant:

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

	minutes.
Étain, en.....	8 $\frac{1}{2}$.
Verre, en.....	9.
Cuivre, en.....	15.
Fer, en.....	17.

Refroidis à la température,

	minutes.
En.....	22.
En.....	24.
En.....	43.
En.....	46.

de

PA
rée, le
plus an
suivant

Refroidis
une

Étain,
Verre,
Cuivre,
Fer, en

Il ré
quatre

1.^o
du fer

cuivre,
par les

; 85 $\frac{1}{2}$
(article

ces ten
plus pr

ment;
par les

; 156;
(article

des Minéraux, Partie Exp. 285

X X I.

PAR une quatrième expérience répétée, les mêmes boulers chauffés à un feu plus ardent, se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Étain, en., 8 $\frac{1}{2}$.

Verre, en., 9.

Cuivre, en., 11 $\frac{1}{2}$.

Fer, en., 14.

Refroidis à la température.

minutes.

En., 25.

En., 25.

En., 35.

En., 43.

Il résulte de ces expériences répétées quatre fois ;

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du cuivre, au point de les tenir :: 62 : 52 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 99 : 85 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 161 à 138 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant :: 186 : 156, & par les expériences précédentes (*article XI*) :: 280 : 249 ; on aura,

286 Introduction à l'Histoire

en ajoutant ces temps, 466 à 405 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & du cuivre.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: $62 : 34\frac{1}{2}$, & :: $186 : 97$ pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $62 : 32\frac{1}{2}$ par les présentes expériences; & :: $69\frac{1}{2} : 32$ par les expériences précédentes (*art. XI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $132\frac{1}{2}$ à $64\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes étant :: $186 : 92$, & :: $274 : 134$ par les expériences précédentes (*article XI*); on aura, en ajoutant ces temps, 460 à 226 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & de l'étain.

4.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du verre au point de les tenir :: $51\frac{1}{2}$

: 34.
refroid

5.^o

du cu
de l'é

:: 52

senten

précéd

ajouta

rappor

semen

donné

:: 15

cédent

aura,

pour l

tier re

6.^o

du ven

l'étain,

& ::

diffem

ON

d'or, d

& de g

suivant

des Minéraux, Partie Exp. 287

: $34\frac{1}{2}$, & :: 157 : 97 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $52\frac{1}{2}$: $32\frac{1}{2}$ par les expériences présentes; & :: 84 : $43\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XI*); ainsi, on aura en ajoutant ces temps, $136\frac{1}{2}$ à 76 pour le rapport précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes étant :: 157 : 92, & par les expériences précédentes (*art. XI*) :: 246 : 132; on aura, en ajoutant ces temps, 304 à 224 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & de l'étain.

6.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: $24\frac{1}{2}$: $32\frac{1}{2}$, & :: 97 : 92 pour leur entier refroidissement.

X X I I.

ON A FAIT chauffer ensemble les boulets d'or, de verre, de porcelaine, de gyps & de grès, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

288 Introduction à l'Histoire

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Gyps, en..... 5.
Porcelaine, en... $8\frac{1}{2}$.
Verre, en..... 9.
Grès, en..... 10.
Or, en..... $14\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 14.
En..... 25.
En..... 26.
En..... 32.
En..... 45.

XXIII.

LA même expérience répétée sur les mêmes boulets, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Gyps, en..... 4.
Porcelaine, en... 7.
Verre, en..... $9\frac{1}{2}$.
Grès, en..... $9\frac{1}{2}$.
Or, en..... $13\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 13.
En..... 22.
En..... 24.
En..... 33.
En..... 41.

XXIV.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Gyps, en..... $2\frac{1}{2}$.
Porcelaine, en... $5\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 12.
En..... 19,

Refroidis

Refroidis

Verre
Grès
Or, e

II

1.°

de l'or
grès,
& ::
dissem

2.°

de l'or
verre,
& ::
dissem

3.°

de l'or
la porce
: 21,
refroid

4.°

de l'or
gyps, a
& ::
dissem

Supp

des Minéraux, Partie Exp. 289

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-l. mde.*

Refroidis à la température:

	minutes.		minutes.
Verre, en.....	8½.	En.....	20.
Grès, en.....	8½.	En.....	25.
Or, en.....	10.	En.....	32.

Il résulte de ces trois expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: 38 : 28, & :: 118 : 90 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: 38 : 27, & :: 118 : 70 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la porcelaine, au point de les tenir :: 38 : 21, & :: 118 : 66 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 38 : 12½, & :: 118 : 39 pour leur entier refroidissement.

Supplément. Tome I.

N

290 Introduction à l'Histoire

5.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: $28 \frac{1}{2}$: 27, & :: 90 : 70 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement de la porcelaine, au point de pouvoir les tenir :: $28 \frac{1}{2}$: 21, & :: 90 : 66 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: $28 \frac{1}{2}$: $12 \frac{1}{2}$, & :: 90 : 39 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la porcelaine, au point de les tenir :: 27 : 21, & :: 70 : 66 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 27 : $12 \frac{1}{2}$, & :: 70 : 39 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement

d
de la
semer
:: 21
entier

ON
d'argen
dure,
caire t

Refroidis à
une a

Pierre calca
en...
Pierre du
Marbre com
Marbre b
Argent, e

LA m
lets se fo

Refroidis à
une de

Pierre calca
en...
Pierre calca
en...

des Minéraux, Partie Exp. 291

de la porcelaine est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 21 : 12 $\frac{1}{2}$, & :: 66 : 39 pour leur entier refroidissement.

X X V.

ON A FAIT chauffer de même les boulets d'argent, de marbre commun, de pierre dure, de marbre blanc & de pierre calcaire tendre d'Anières, près de Dijon.

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température:</i>	<i>minutes.</i>
Pierre calcaire tendre,			
en.....	8.	En.....	25.
Pierre dure, en..	10.	En.....	34.
Marbre commun, en...	11.	En.....	35.
Marbre blanc, en..	12.	En.....	36.
Argent, en.....	13 $\frac{1}{2}$.	En.....	40.

X X V I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant;

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température:</i>	<i>minutes.</i>
Pierre calcaire tendre,			
en.....	9.	En.....	27.
Pierre calcaire dure,			
en....	11.	En.....	37.

N ij

292 Introduction à l'Histoire

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

	minutes.
Marbre commun, en...	13.
Marbre blanc, en...	14.
Argent, en.....	16.

Refroidis à la température.

	minutes.
En.....	40.
En.....	40.
En.....	43.

X X V I I.

LA même expérience répétée, les bou-
lets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde,*

	minutes.
Pierre calcaire tendre, en.....	9.
Pierre calcaire dure, en.....	10 $\frac{1}{2}$.
Marbre commun, en...	12 $\frac{1}{2}$.
Marbre blanc, en...	13 $\frac{1}{2}$.
Argent, en.....	16.

Refroidis à la température.

	minutes.
En.....	26.
En.....	36.
En.....	38.
En.....	39.
En.....	42.

Il résulte de ces trois expériences :

1.° Que le temps du refroidissement
de l'argent est à celui du refroidissement
du marbre blanc, au point de les tenir
:: $45 \frac{1}{2}$: $39 \frac{1}{2}$, & :: 125 : 115 pour
leur entier refroidissement.

2.° Que le temps du refroidissement
de l'argent est à celui du refroidissement du

marb

:: 45

entier

3.°

de l'ar

de la

:: 45

entier

4.°

l'argen

pierre

: 26,

refroid

5.°

du ma

disseme

de les

: 113

6.°

du mar

fement

les ten

: 107

7.°

du mar

disseme

des Minéraux, Partie Exp. 293

marbre commun, au point de les tenir
:: $45 \frac{1}{2} : 36 \frac{1}{2}$, & :: $125 : 113$ pour leur
entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement
de l'argent est à celui du refroidissement
de la pierre dure, au point de les tenir
:: $45 \frac{1}{2} : 31 \frac{1}{2}$, & :: $125 : 107$ pour leur
entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de
l'argent est à celui du refroidissement de la
pierre tendre, au point de les tenir :: $45 \frac{1}{2}$
: 26, & :: $125 : 78$ pour leur entier
refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement
du marbre blanc est à celui du refroidis-
sissement du marbre commun, au point
de les tenir :: $39 \frac{1}{2} : 36$, & :: 115
: 113 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement
du marbre blanc est à celui du refroidis-
sissement de la pierre dure, au point de
les tenir :: $39 \frac{1}{2} : 31 \frac{1}{2}$, & :: 115
: 107 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement
du marbre blanc est à celui du refroidis-
sissement de la pierre tendre, au point

294 Introduction à l'Histoire

de les tenir :: $39 \frac{1}{2} : 26$, & :: $115 : 78$
pour leur entier refroidissement.

8.° Que le temps du refroidissement
du marbre commun est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: $36 : 31 \frac{1}{2}$, & :: $113 : 109$
pour leur entier refroidissement.

9.° Que le temps du refroidissement
du marbre commun est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: $36 : 26$, & :: $113 : 78$
pour leur entier refroidissement.

10.° Que le temps du refroidissement
de la pierre dure est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: $31 \frac{1}{2} : 26$, & :: $107 : 78$
pour leur entier refroidissement.

X X V I I I.

ON A MIS dans le même four bien
chauffé, des boulets d'or, de marbre
blanc, de marbre commun, de pierre
dure & de pierre tendre, ils se sont
refroidis dans l'ordre suivant.

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>
minutes.	minutes.
Pierre calcaire tendre, en..... 9.	En..... 294

Refroidi
un
Marbre
Pierre
Marbre
Or, e

L A
moins
refroidi

Refroidi
un
Pierre ca
en..
Pierre
Marbre c
Marbre
Or, en

L A
troisième
feu pl
l'ordre

des Minéraux, Partie Exp. 291

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Marbre commun, en... $11\frac{1}{2}$.
Pierre dure, en... $11\frac{1}{2}$.
Marbre blanc, en. 13.
Or, en... $15\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 35.
En..... 35.
En..... 35.
En..... 45.

X X I X.

LA même expérience répétée à une
moindre chaleur, les boulets se sont
refroidis dans l'ordre suivant :

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Pierre calcaire tendre,
en..... 6.
Pierre dure, en.. 8.
Marbre commun, en... $9\frac{1}{2}$.
Marbre blanc, en. 10.
Or, en..... 12.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 19.
En..... 25.
En..... 26.
En..... 29.
En..... 37.

X X X.

LA même expérience répétée une
troisième fois, les boulets chauffés à un
feu plus ardent, ils se sont refroidis dans
l'ordre suivant :

N iv.

296 Introduction à l'Histoire

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

	minutes.
Pierre tendre, en.	7.
Pierre dure, en..	8.
Marbre commun, en...	$8\frac{1}{2}$.
Marbre blanc, en.	9.
Or, en.....	12.

Refroidis à la température.

	minutes.
En.....	20.
En.....	24.
En.....	20.
En.....	28.
En.....	35.

Il résulte de ces trois expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du marbre blanc, au point de les tenir :: $39\frac{1}{2}$: 32, & :: 117 : 92 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du marbre commun, au point de les tenir :: $39\frac{1}{2}$: $29\frac{1}{2}$, & :: 117 : 87 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: $39\frac{1}{2}$: $27\frac{1}{2}$, & :: 117 : 86 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir

de

:: 39
entier

5.^o

du ma

dissem

de les

pour l

6.^o

du ma

dissem

de les

: 84 p

7.^o

du ma

dissem

de les

pour le

8.^o

du man

dissem

les teni

pour le

9.^o

du man

dissem

de les t

pour le

des Minéraux, Partie Exp. 297

:: $39\frac{1}{2}$: 22, & :: 117 : 68 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du marbre commun, au point de les tenir :: 32 : 29, & :: 92 : 87 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: 32 : $27\frac{1}{2}$, & :: 92 : 84 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: 32 : 22, & :: 92 : 68 pour leur entier refroidissement.

8.^e Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: 29 : $27\frac{1}{2}$, & :: 87 : 84 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: 29 : 22, & :: 87 : 68 pour leur entier refroidissement.

N v.

298 Introduction à l'Histoire

10.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: $27\frac{1}{2} : 22$, & :: $84 : 68$ pour leur entier refroidissement.

X X X I

ON A MIS dans le même four les boulets d'argent, de grès, de verre, de porcelaine & de gyps, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température:</i>	<i>minutes.</i>
Gyps, en.....	3.	En.....	14.
Porcelaine, en...	$6\frac{1}{2}$.	En.....	17.
Verre, en.....	$8\frac{1}{2}$.	En.....	20.
Grès, en.....	9.	En.....	27.
Argent, en.....	$12\frac{1}{2}$.	En.....	35.

X X X I I.

L A même expérience répétée, & les boulets chauffés à une chaleur moindre, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidissement
Gyps.
Porcel.
Verre
Grès,
Argen

Refroidissement
dans

Refroidissement
à

Gyps,
Porcel
Verre,
Grès,
Argen

II

I.^o
de l'a
du g
: 26
refroi

des Minéraux, Partie Exp. 299

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Gyps, en..... 3.
Porcelaine, en... 7.
Verre, en..... $8\frac{1}{2}$.
Grès, en..... $9\frac{1}{2}$.
Argent, en..... 12.

Refroidis à la température:

minutes.

En..... 13.
En..... 19.
En..... 22.
En..... 26.
En..... 34.

X X X I I I.

LA même expérience répétée une troisième fois, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Gyps, en..... 3.
Porcelaine, en... 6.
Verre, en..... $7\frac{1}{2}$.
Grès, en..... 8.
Argent, en..... $11\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 12.
En..... 17.
En..... 20.
En..... 27.
En..... 34.

Il résulte de ces trois expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: 36 : 26 $\frac{1}{2}$, & :: 103 : 80 pour leur entier refroidissement.

N vj

300 Introduction à l'Histoire

2.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: 36 : 25, & :: 103 : 62 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement de la porcelaine, au point de les tenir :: 36 : 20, & :: 103 : 54 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 36 : 9, & :: 103 : 39 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: $26 \frac{1}{3}$: 25 par les expériences présentes, & :: $28 \frac{1}{2}$: 27 par les expériences précédentes (*art. XXIV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 55 à 52 pour le rapport encore plus précis de leur refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 80 : 62, & :: 90 : 70 par les expériences précédentes (*art. XXIV*) ; on aura, en ajou-

tant
port
froide

6.

du g
la po
:: 2
rien
rien

on
à 40
leur
secon
expér

: 66
(*art.*

temps
plus p
grès &

7.^o

du gr
gyps,
par le
: 12

(*art.*
ces te

des Minéraux, Partie Exp. 301

tant ces temps, 170 à 132 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & du verre.

6.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement de la porcelaine, au point de pouvoir les tenir : : $26 \frac{1}{2}$: $19 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & : : $28 \frac{1}{2}$: 21 par les expériences précédentes (*art. XXIV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 55 à $40 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant : : 80 : 54, : : 90 : 66 par les précédentes expériences (*art. XXIV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 270 à 120 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & de la porcelaine.

7.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir : : $26 \frac{1}{2}$: 9 par les expériences présentes, & : : $28 \frac{1}{2}$: $12 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XXIV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 55 à $21 \frac{1}{2}$ pour le rapport

302 Introduction à l'Histoire

plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience étant :: 88 : 39, & :: 90 : 39 par les expériences précédentes (*art. XXIV*); on aura, en ajoutant ces temps, 170 à 78 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & du gyps.

8.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la porcelaine, au point de les tenir :: 25 : 19 par les présentes expériences, & :: 27 : 21 par les expériences précédentes (*art. XXIV*); ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 52 à 40 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes étant :: 62 : 51, & :: 70 : 66 par les expériences précédentes (*art. XXIV*); on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 117 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de la porcelaine.

9.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 25

: 9
: 1
(*art.*
ajou
rapp
refr
rapp
rien
: 3
(*art.*
temp
plus
verre
10
de la
diffé
:: 1
& ::
céder
en aj
le ra
refro
rappo
étant
précé
on a
à 78

des Minéraux, Partie Exp. 303

: 9 par les présentes expériences, & :: 27
: $12 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes
(*art. XXIV*) ; ainsi, on aura, en
ajoutant ces temps, 52 à $21 \frac{1}{2}$ pour le
rapport encore plus précis de leur premier
refroidissement ; & pour le second, le
rapport donné par les présentes expé-
riences, étant :: 72 : 39, & :: 70
: 39 par les expériences précédentes
(*art. XXIV*) ; on aura, en ajoutant ces
temps, 132 à 78 pour le rapport encore
plus précis de l'entier refroidissement du
verre & du gyps.

10.^o Que le temps du refroidissement
de la porcelaine est à celui du refroidis-
sement du gyps, au point de les tenir
:: $19 \frac{1}{2}$: 9 par les présentes expériences,
& :: 21 : $12 \frac{1}{2}$ par les expériences pré-
cédentes (*art. XXIV*) ; ainsi, on aura,
en ajoutant ces temps, $40 \frac{1}{2}$ à $21 \frac{1}{2}$ pour
le rapport plus précis de leur premier
refroidissement ; & pour le second, le
rapport donné par l'expérience présente
étant :: 54 : 39, & par les expériences
précédentes (*art. XXIV*) :: 66 : 39 ;
on aura, en ajoutant ces temps, 120
à 78 pour le rapport encore plus précis

304 Introduction à l'Histoire

de l'entier refroidissement de la porcelaine
& du gyps.

X X X I V.

ON A MIS dans le même four les boulets
d'or, de craie blanche, d'ocre & de glaise,
ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Craie, en.....	6.	En.....	15.
Ocre, en.....	6½.	En.....	16.
Glaise, en.....	7.	En.....	18.
Or, en.....	12.	En.....	36.

X X X V.

LA même expérience répétée avec
les mêmes boulets & un boulet de plomb,
leur refroidissement s'est fait dans l'ordre
suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Craie, en.....	4.	En.....	11.
Ocre, en.....	5.	En.....	13.
Glaise, en.....	5½.	En.....	15.
Plomb, en.....	7.	En.....	18.
Or, en.....	9½.	En.....	29.

des Minéraux, Partie Exp. 305

Il résulte de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $9 \frac{1}{2} : 7$ par l'expérience présente, & :: $38 : 24$ par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $47 \frac{1}{2}$ à 31 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: $29 : 18$, & :: $115 : 90$ par les expériences précédentes (*art. XVI*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 144 à 108 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & du plomb.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la glaise, au point de les tenir :: $21 \frac{1}{2} : 12 \frac{1}{2}$, & :: $65 : 33$ pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: $21 \frac{1}{2} : 11 \frac{1}{2}$, & :: $65 : 29$ pour leur entier refroidissement.

306 Introduction à l'Histoire

4.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: $21 \frac{1}{2}$: 10, & :: 67 : 26 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de la glaïse, au point de pouvoir les tenir :: $7 : 5 \frac{1}{2}$, & :: 18 : 15 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir :: $7 : 5$, & :: 18 : 13 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: $7 : 4$, & :: 18 : 11 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la glaïse est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir :: $12 \frac{1}{2} : 11 \frac{1}{2}$, & :: 33 : 29 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement de la glaïse est à celui du refroidissement

de la
::
entie
10
de l'
de la
::
entie

O
lets d
ponc
chale
brûle
l'ordu

Refroi
un

Pierre
Bois,
Gyps,
Argen
Fer,

L

des Minéraux, Partie Exp. 307

de la craie, au point de pouvoir les tenir
 :: $12 \frac{1}{2} : 10$, & :: $33 : 26$ pour leur
 entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement
 de l'ocre est à celui du refroidissement
 de la craie, au point de pouvoir les tenir
 :: $11 \frac{1}{2} : 10$, & :: $29 : 26$ pour leur
 entier refroidissement.

X X X V I.

ON A MIS dans le même four les bou-
 lets de fer, d'argent, de gyps, de pierre
 ponce & de bois, mais à un degré de
 chaleur moindre, pour ne point faire
 brûler le bois, & ils se sont refroidis dans
 l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	minutes.	<i>Refroidis à la température:</i>	minutes.
Pierre ponce, en..	2.	En.....	5.
Bois, en.....	2.	En.....	6.
Gyps, en.....	$2 \frac{1}{2}$.	En.....	11.
Argent, en.....	10.	En.....	35.
Fer, en.....	13.	En.....	40.

X X X V I I.

LA même expérience répétée à une

308 Introduction à l'Histoire

moindre chaleur, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température actuelle.</i>
minutes.	minutes.
Pierre ponce, en... $1\frac{1}{2}$.	En..... 4.
Bois, en..... 1.	En..... 5.
Gyps, en..... $2\frac{1}{3}$.	En..... 9.
Argent, en..... 7.	En..... 24.
Fer, en..... $8\frac{1}{2}$.	En..... 31.

Il résulte de ces expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'argent au point de pouvoir les tenir :: $21\frac{1}{2} : 17$ par les présentes expériences, & :: $45\frac{1}{2} : 34$ par les expériences précédentes (*art. XI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 67 à 51 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 71 : 59, & :: 138 : 97 par les expériences précédentes (*art. XI*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 209 à 156 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & de l'argent.

des Minéraux, Partie Exp. 309

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: $21 \frac{1}{2}$: 5, & :: 71 : 20 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du bois, au point de pouvoir les tenir :: $21 \frac{1}{2}$: 4, & :: 71 : 11 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de la pierre ponce, au point de les tenir :: $21 \frac{1}{2}$: $3 \frac{1}{2}$, & :: 71 : 9 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 17 : 5, & :: 59 : 30 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du bois, au point de pouvoir les tenir :: 17 : 4, & :: 59 : 11 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement

310 Introduction à l'Histoire

de l'argent est à celui du refroidissement de la pierre ponce, au point de pouvoir les tenir :: $17 : 3\frac{1}{2}$ & :: $59 : 9$ pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement du gyps est à celui du refroidissement du bois, au point de pouvoir les tenir :: $5 : 4$, & :: $20 : 11$ pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement du gyps est à celui du refroidissement de la pierre ponce, au point de pouvoir les tenir :: $5 : 3\frac{1}{2}$, & :: $20 : 9$ pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement du bois est à celui du refroidissement de la pierre ponce, au point de les tenir :: $4 : 3\frac{1}{2}$, & :: $11 : 9$ pour leur entier refroidissement.

X X X V I I I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulets d'or, d'argent, de pierre tendre & de gyps, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

du

Refroidissement

Gyps,
Pierre
Argent
Or, en

Il r

1.^o

de l'or

l'argent

:: 18

& :: 6

cédente

en ajo

le rapp

refroid

rappor

étant :

les exp

on aur

à 201

de l'ent

l'argent

2.^o

de l'or

la pier

des Minéraux, Partie Exp. 311

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Gyps, en..... $4\frac{1}{2}$.
Pierre tendre, en. 12.
Argent, en..... 16.
Or, en..... 18.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 14.
En..... 27.
En..... 42.
En..... 47.

Il résulte de cette expérience :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir :: 18 : 16 par l'expérience présente, & :: 62 : 55 par les expériences précédentes (*art. XV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 98 à 71 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: 35 : 42, & :: 187 : 159 par les expériences précédentes (*art. XV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 234 à 201 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & de l'argent.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir

312 Introduction à l'Histoire

:: 18 : 12 , & :: 39 $\frac{1}{2}$: 23 par les expériences précédentes (*art. XXX*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 57 $\frac{1}{2}$ à 35 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par l'expérience présente , étant :: 47 : 27 , & par les expériences précédentes (*art. XXX*) , :: 117 : 68 ; on aura , en ajoutant ces temps , 164 à 95 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & de la pierre tendre.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du gyps , au point de les tenir :: 18 : 4 $\frac{1}{2}$, & :: 38 : 12 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XXIV*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 56 à 17 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par la présente expérience , étant :: 47 : 14 , & :: 118 : 39 par les expériences précédentes (*art. XXIV*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 165 à 53 pour le rapport encore plus précis de leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement
de

de l
de l
:: 1
& ::
céder
en aj
le rap
refroi
rappo
étant :
périen
on au
105 p
de l'er
de la p
5.^o
de l'an
du gy
:: 16
& ::
dentes
en ajou
le rapp
refroid
rapport
étant :
expérie
Supp

des Minéraux, Partie Exp. 313

de l'argent est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: 16 : 12 par la présente expérience, & :: 45 $\frac{1}{2}$: 26 par les expériences précédentes (*art. XXVII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 61 $\frac{1}{2}$ à 38 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 42 : 27, & :: 125 : 78 par les expériences précédentes (*art. XXVII*); on aura, en ajoutant ces temps, 167 à 105 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'argent & de la pierre tendre.

5.^e Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: 16 : 4 $\frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: 17 : 5 par les expériences précédentes (*art. XXXVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 33 à 9 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente étant :: 42 : 14, & :: 59 : 20 par les expériences précédentes (*art. XXXVI*);

Supplément. Tome I.

O

314 Introduction à l'Histoire

on aura, en ajoutant ces temps, 101 à 34 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'argent & du gyps.

6.^e Que le temps du refroidissement de la pierre tendre est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 12 : 4 $\frac{1}{2}$, & :: 72 : 14 pour leur entier refroidissement.

XXXIX.

AYANT FAIT chauffer pendant vingt minutes, c'est-à-dire, pendant un temps à-peu-près double de celui qu'on tenoit ordinairement les boulets au feu, qui étoit communément de dix minutes, les boulets de fer, de cuivre, de verre, de plomb & d'étain, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Étain, en.....	10.	En.....	25.
Plomb, en.....	11.	En.....	30.
Verre, en.....	12.	En.....	35.
Cuivre, en.....	16 $\frac{1}{2}$.	En.....	44.
Fer, en.....	20 $\frac{1}{2}$.	En.....	50.

fait
du
cuiv
:: 2
& ::
cède
ajou
le ra
refro
rappo
étant
expér
on au
à 449
de l'e
cuivre
2.^e
du fer
verre
:: 20
& ::
précéd
en ajo
rappor
refroid

des Minéraux, Partie Exp. 315

Il résulte de cette expérience, qui a été faite avec la plus grande précaution :

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du cuivre, au point de pouvoir les tenir :: $20 \frac{1}{2}$: $16 \frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: 161 : 138 par les expériences précédentes (*art. XXI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $181 \frac{1}{2}$ à $154 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 50 : 44 , & :: 466 : 405 par les expériences précédentes (*art. XXI*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 516 à 449 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & du cuivre.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du verre, au point de pouvoir les tenir :: $20 \frac{1}{2}$: 12 par l'expérience précédente, & :: 62 : $35 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XXI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $82 \frac{1}{2}$ à 46 pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le

O ij

à 34
is de
& du
ent de
idisse-
:: 12
entier

nt vingt
n temps
a tenoit
qui étoit
s boulets
plomb &
s l'ordre

température,
minutes.
.... 25.
.... 30.
.... 35.
.... 44.
.... 50.

316 Introduction à l'Histoire

rapport donné par l'expérience présente, étant :: 50 : 35, & :: 186 : 97 par les expériences précédentes (*art. XXI*); on aura, en ajoutant ces temps, 236 à 132 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & du verre.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $20\frac{1}{2}$: 11 par la présente expérience, & :: $53\frac{1}{2}$: $27\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. IV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 74 à 38 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 50 : 30, & :: 142 : $94\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. IV*); on aura, en ajoutant ces temps, 192 à $124\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & du plomb.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: $20\frac{1}{2}$: 10, & :: 131 : $64\frac{1}{2}$ par les

exp
ain
152
de
le s
rien
:: 4
dent
ces t
enco
ment
5.
du cu
du ve
: 12 p
: 34
(art.
ces te
plus p
ment
donné
:: 44
rience
aura,
pour l
l'entie
verre.

des Minéraux, Partie Exp. 317

expériences précédentes (*art. XXI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 152 à $74\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 50 : 25, & :: 460 : 226 par les expériences précédentes (*art. XXI*); on aura, en ajoutant ces temps, 510 à 251 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & de l'étain.

5.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: $16\frac{1}{2}$: 12 par la présente expérience, & :: $52\frac{1}{2}$: $34\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XXI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 69 à 46 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 44 : 35, & :: 157 : 97 par les expériences précédentes (*art. XXI*); on aura, en ajoutant ces temps, 201 à 132 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & du verre.

318 Introduction à l'Histoire

6.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du plomb, au point de les tenir :: $16\frac{1}{2}$: 11 par la présente expérience, & :: 45 : 27 par les expériences précédentes (*art. V*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $61\frac{1}{2}$ à 38 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 44 : 30, & :: 125 : $94\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. V*); on aura, en ajoutant ces temps, 169 à $124\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & du plomb.

7.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: $16\frac{1}{2}$: 10 par l'expérience présente, & :: $136\frac{1}{2}$: 76 par les expériences précédentes (*art. XXI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 153 à 86 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 44 : 25, & :: 304 : 224 par les expériences précédentes (*article XXI*); on aura,

des Minéraux, Partie Exp. 319

en ajoutant ces temps, 348 à 249 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & de l'étain.

8.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: 12 : 11, & :: 35 : 30 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 12 : 10 par la présente expérience, & :: $34\frac{1}{2}$: $32\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XXI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 46 à $42\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience, étant :: 35 : 25, & :: 97 : 92 par les expériences précédentes (*art. XXI*); on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 117 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de l'étain.

10.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 11 : 10 par la présente expérience, & :: $25\frac{1}{2}$

320 Introduction à l'Histoire

: 21 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (article VIII); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 36 $\frac{1}{2}$ à 31 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 30 : 25, & :: 79 $\frac{1}{2}$: 64 par les expériences précédentes (article VIII); on aura, en ajoutant ces temps, 109 $\frac{1}{2}$ à 89 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb & de l'étain.

X L.

AYANT MIS chauffer ensemble les boulets de cuivre, de zinc, de bismuth, d'étain & d'antimoine, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant:

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

	minutes.
Antimoine, en...	8.
Bismuth, en.....	8.
Étain, en.....	8 $\frac{1}{2}$.
Zinc, en.....	12.
Cuivre, en.....	14.

Refroidis à la température,

	minutes.
En.....	24.
En.....	23.
En.....	25.
En.....	30.
En.....	40.

X L I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant:

Refroidis

Antimoine
Bismuth
Étain
Zinc,
Cuivre

Il y

1.°

du cuivre

du zinc

& ::

différence

2.°

du cuivre

de l'étain

: 18

:: 15

dentes

en ajoutant

le rapport

refroidissement

rapport

étant

riences

:: 348

des Minéraux, Partie Exp. 321

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Antimoine, en... 8.
Bismuth, en.... 8.
Étain, en..... $9\frac{1}{2}$.
Zinc, en..... 12.
Cuivre, en..... 14.

Refroidis à la température.

minutes;

En..... 23.
En..... 24.
En..... 25.
En..... 38.
En..... 40.

Il résulte de ces deux expériences:

1.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du zinc, au point de les tenir :: 28 : 24, & :: 80 : 68 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 28 : 18 par les présentes expériences, & :: 153 : 86 par les expériences précédentes (*art. XXXIX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 181 à 104 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 80 : 47, & par les expériences précédentes (*article XXXIX*) :: 348 : 249; on aura, en ajoutant

O V

322 Introduction à l'Histoire

ces temps, 428 à 296 pour le rapport plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & de l'étain.

3.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: 28 : 16, & :: 80 : 47 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les tenir :: 28 : 16, & :: 80 : 47 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 24 : 18, & :: 68 : 47 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 24 : 16 par les présentes expériences, & :: 73 : 39 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XVII*); ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 97 à 55 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport

donn
:: 6
expé
on au
pour
l'enti
timoi
7.^o
du zi
bismu
:: 24
expéri
ainsi,
83 à
précis
& pou
la pré
& ::
cédent
ajouta
rappor
refroid
8.^o
de l'é
de l'an
: 16,
refroid

des Minéraux, Partie Exp. 323

donné par les expériences présentes, étant :: 68 : 47, & :: 220 : 155 par les expériences précédentes (*art. XVII*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 288 à 292 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de l'antimoine.

7.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: 24 : 16, & :: 59 : 35 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XVII*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 83 à 51 $\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 68 : 47, & :: 176 : 140 par les expériences précédentes (*article XVII*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 244 à 187 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du bismuth.

8.^o Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 18 : 16, & :: 50 : 47 pour leur entier refroidissement.

324 Introduction à l'Histoire

9.^o Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les tenir :: 18 : 16, & :: 50 : 47 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: 16 : 16 par la présente expérience, & :: 35 $\frac{1}{2}$: 32 par les expériences précédentes (*article XVII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 51 $\frac{1}{2}$ à 48 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 47 : 47, & par les expériences précédentes (*art. XVII*) :: 140 : 127; on aura, en ajoutant ces temps, 187 à 174 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du bismuth & de l'antimoine.

X. L I I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulers d'or, d'argent, de fer, d'émeril & de pierre dure, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant:

Refroidissement

Pierre
en,
Argen
Or, e
Émer
Fer, e

II

1.^o

du fe
l'ême
:: 17
entier

2.^o

du fe
au po
par l
: 37
(arti
ces re
plus
ment
par l
: 40
rience

des Minéraux, Partie Exp. 325

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.	minutes.	Refroidis à la température.	minutes.
Pierre calcaire dure ,			
en.....	11 $\frac{1}{4}$.	En.....	32.
Argent, en.....	13.	En.....	37.
Or, en.....	14.	En.....	40.
Émeril, en.....	15 $\frac{1}{2}$.	En.....	46.
Fer, en.....	17.	En.....	51.

Il résulte de cette expérience :

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'émeril, au point de pouvoir les tenir :: 17 : 15 $\frac{1}{2}$, & :: 51 : 46 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'or, au point de pouvoir les tenir :: 17 : 14 par la présente expérience, & :: 45 $\frac{1}{2}$: 37 par les expériences précédentes (*article XI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 62 $\frac{1}{2}$ à 51 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience étant :: 51 : 40, & :: 138 : 114 par les expériences précédentes (*article XI*); on aura,

326 Introduction à l'Histoire

en ajoutant ces temps, 189 à 154 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & de l'or.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de l'argent, au point de les tenir :: 17 : 13 par la présente expérience, & :: 67 : 51 par les expériences précédentes (*article XXXVII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 84 à 64 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 51 : 37, & :: 209 : 156 par les expériences précédentes (*art. XXXVII*); on aura, en ajoutant ces temps, 260 à 193 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & de l'argent.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: 17 : 11 $\frac{1}{4}$, & :: 51 : 52 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement

de l
::
& :
céd
en a
le r
prem
le r
rien
par
XV
177
préc
meri
6.
de l'
de l'a
:: 1
& : :
dente
ajout
port
del'é
le rap
étant
les ex
on a

des Minéraux, Partie Exp. 327

de l'or, au point de pouvoir les tenir
:: $15 \frac{1}{2}$: 14 par la présente expérience,
& :: 44 : 38 par les expériences précédentes (*article XVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $59 \frac{1}{2}$ à 52 pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 46 : 40, & :: 131 : 115 par les expériences précédentes (*article XVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 177 à 115 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & de l'or.

6.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'argent, au point de pouvoir les tenir
:: $15 \frac{1}{2}$: 13 par la présente expérience,
& :: 43 : $32 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XVII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $58 \frac{1}{2}$ à $45 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis du premier refroidissement de l'émeril & de l'argent; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 46 : 37, & :: 125 : 98 par les expériences précédentes (*art. XVII*); on aura, en ajoutant ces temps, 172

328 Introduction à l'Histoire

à 135 pour le rapport encore plus précis de leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: $15\frac{1}{2}$: 12, & :: 46 : 32 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'argent, au point de les tenir :: 14 : 13 par la présente expérience, & :: 80 : 71 par les expériences précédentes (*article XXXVIII*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 94 à 84 pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 40 : 37, & :: 234 : 201 par les expériences précédentes (*article XXXVIII*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 274 à 238 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & de l'argent.

9.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: 14 : 12 par la présente expérience, & :: $39\frac{1}{2}$: $27\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes

(art
ces t
plus
ment
donn
:: 40
rience
aura,
pour
l'entier
pierre
10
de l'a
de la
les te
rience
rience
ainsi,
 $58\frac{1}{2}$
précis
pour
l'expé
:: 12
dentes
ajouta
rapport
dissim

des Minéraux, Partie Exp. 329

(art. XXX); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $53 \frac{1}{2}$ à $39 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 40 : 32, & :: 117 : 86 par les expériences précédentes (article XXX); on aura, en ajoutant ces temps, 157 à 118 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & de la pierre dure.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de pouvoir les tenir :: 13 : 12 par la présente expérience; & :: $45 \frac{1}{2}$: $31 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (article XXVII); ainsi, en ajoutant ces temps, on aura, $58 \frac{1}{2}$ à $43 \frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 37 : 32, & :: 125 : 107 par les expériences précédentes (article XXVIII); on aura, en ajoutant ces temps, 162 à 139 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'argent & de la pierre dure.

330 Introduction à l'Histoire

X L I I I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulets de plomb, de fer, de marbre blanc, de grès, de pierre tendre, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Pierre calcaire tendre,			
en.....	6 $\frac{1}{2}$.	En.....	20.
Plomb, en.....	8.	En.....	29.
Grès, en.....	8 $\frac{1}{2}$.	En.....	29.
Marbre blanc, en.	10 $\frac{1}{2}$.	En.....	29.
Fer, en.....	15.	En.....	43.

X L I V.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Pierre calcaire tendre,			
en.....	7.	En.....	21.
Plomb, en.....	8.	En.....	28.
Grès, en.....	8 $\frac{1}{2}$.	En.....	28.
Marbre blanc, en.	10 $\frac{1}{2}$.	En.....	30.
Fer, en.....	16.	En.....	45.

ire

semble les
marbre
, ils se
:

température:
minutes,

... 20.
... 29.
... 29.
... 29.
... 43.

ée, les
l'ordre

température.
minutes,

... 21.
... 28.
... 28.
... 30.
... 45.

des Minéraux, Partie Exp. 331

Il résulte de ces deux expériences:

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du marbre blanc, au point de les tenir :: 31 : 21, & :: 88 : 59 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: 31 : 17 par la présente expérience, & :: $53\frac{1}{2}$: 32 par les expériences précédentes (*art. IV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $84\frac{1}{2}$ à 49 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 88 : 57, & :: 142 : $102\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article IV*); on aura, en ajoutant ces temps, 230 à $159\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & du grès.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: 31 : 16 par les expériences présentes, & :: 74 : 38 par les expériences précédentes (*article XXXIX*); ainsi, on aura,

332 Introduction à l'Histoire

en ajoutant ces temps, 105 à 54 pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 98 : 57, & :: 192 : 124 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXIX*); on aura, en ajoutant ces temps, 280 à 181 $\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du fer & du plomb.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de pouvoir les tenir :: 31 : 13, & :: 88 : 41 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: 21 : 17, & :: 59 : 57 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du plomb au point de les tenir :: 21 : 16, & :: 59 : 57 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement

du m
differ
au p
présen
les ex
ainsi
à 36
leur
secon
rienc
:: 9
dente
ajouta
rappo
refroi
pierre
8.^o
du gr
plomb
par le
: 35
(art.
ces t
plus
ment
par le
: 57

des Minéraux, Partie Exp. 333

du marbre blanc est à celui du refroidissement de la pierre calcaire tendre, au point de les tenir :: $21 : 13\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: $32 : 23$ par les expériences précédentes (*art. XXX*); ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 53 à $36\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: $59 : 41$, & :: $92 : 68$ par les expériences précédentes (*article XXX*); on aura, en ajoutant ces temps, 151 à 159 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du marbre blanc & de la pierre calcaire tendre.

8.^e Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du plomb, au point de les tenir :: $17 : 16$ par les expériences présentes, & :: $42\frac{1}{2} : 35\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. VIII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $59\frac{1}{2}$ à $51\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: $57 : 57$, & :: $130 : 121\frac{1}{2}$ par les expériences

334 Introduction à l'Histoire

précédentes (*art. VIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 187 à $178\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & du plomb.

9.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de pouvoir les tenir :: 17 : $13\frac{1}{2}$, & :: 57 : 41 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de les tenir :: 16 : $13\frac{1}{2}$, & :: 57 : 41 pour leur entier refroidissement.

X L V.

ON A FAIT chauffer ensemble les boulets de gyps, d'ocre, de craie, de glaise & de verre, & voici l'ordre dans lequel ils se sont refroidis.

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Gyps, en.....	$3\frac{1}{2}$.	En.....	15.
Ocre, en.....	$5\frac{1}{2}$.	En.....	16.
Craie, en.....	$5\frac{1}{2}$.	En.....	16.
Glaise, en.....	7.	En.....	18.
Verre, en.....	$8\frac{1}{2}$.	En.....	24.

L.
boul
suiva

Refroi
un

Gyps,
Ocre,
Craie,
Glaise,
Verre.

II
1.^o

du ve
de la
: $13\frac{1}{2}$
refroi

2.^o

du ve
de la
: 11,
refroi

3.^o

du ve
de l'oc

des Minéraux, Partie Exp. 335

X L V I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Gyps, en..... $3\frac{1}{2}$.
Ocre, en..... $5\frac{1}{2}$.
Craie, en..... $5\frac{1}{2}$.
Glaife, en..... $6\frac{1}{2}$.
Verre, en..... 8.

Refroidis à la température:

minutes.

En..... 14.
En..... 16.
En..... 16.
En..... 18.
En..... 22.

Il résulte de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la glaife, au point de les tenir :: $16\frac{1}{2}$: $13\frac{1}{2}$, & :: 46 : 36 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: $16\frac{1}{2}$: 11, & :: 46 : 32 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: $16\frac{1}{2}$

température.
minutes.
.... 15.
.... 16.
.... 16.
.... 18.
.... 24.

336 Introduction à l'Histoire

: 11, & :: 46 : 32 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: $16\frac{1}{2}$: 7 par la présente expérience, & :: 52 : $21\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXIII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $68\frac{1}{2}$ à $28\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 46 : 29, & :: 32 : 78 par les expériences précédentes (*article XXXIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 178 à 107 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & du gyps.

5.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: $13\frac{1}{2}$: 11 par la présente expérience, & :: $12\frac{1}{2}$: 10 par les expériences précédentes (*article XXXV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 26 à 21 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné

de

donné

:: 30

expérie

on aura

pour le

l'entier

la craie

6.8

de la gi

de l'ocr

: 11 pa

:: $12\frac{1}{2}$

cédenes

en ajout

le rappo

refroidiss

rappor

riences, é

par les ex

XXXV)

temps, 6

plus précis

la glaise &

7.8 Que

de la glai

du gyps,

Supplém

des Minéraux, Partie Exp. 337

donné par les présentes expériences, étant
:: 36 : 32, & :: 33 : 26 par les
expériences précédentes (*art. XXXV*);
on aura, en ajoutant ces temps, 69 à 58
pour le rapport encore plus précis de
l'entier refroidissement de la glaïse & de
la craie.

6.e Que le temps du refroidissement
de la glaïse est à celui du refroidissement
de l'ocre, au point de les tenir :: $13\frac{1}{2}$
: 11 par les présentes expériences, &
:: $12\frac{1}{2}$: $11\frac{1}{2}$ par les expériences pré-
cédentes (*art. XXXV*); ainsi, on aura,
en ajoutant ces temps, 26 à $22\frac{1}{2}$ pour
le rapport plus précis de leur premier
refroidissement; & pour le second, le
rapport donné par les présentes expé-
riences, étant :: 36 : 32, & :: 33 : 29
par les expériences précédentes (*article*
XXXV); on aura, en ajoutant ces
temps, 69 à 61 pour le rapport encore
plus précis de l'entier refroidissement de
la glaïse & de l'ocre.

7.8 Que le temps du refroidissement
de la glaïse est à celui du refroidissement
du gyps, au point de les tenir :: $13\frac{1}{2}$

Supplément. Tome I.

P

338 Introduction à l'Histoire

: 17 ; & :: 36 : 29 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la craie est à celui du refroidissement de l'ocre , au point de les tenir :: 11 : 11 par les présentes expériences , & :: 10 : 11 $\frac{1}{2}$ par les précédentes expériences (*article XXXV*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 21 à 22 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par les expériences présentes , étant :: 32 : 32 , & :: 26 : 29 par les expériences précédentes (*article XXXV*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 58 à 61 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la craie & de l'ocre.

9.^o Que le temps du refroidissement de la craie est à celui du refroidissement du gyps , au point de les tenir :: 11 : 7 , & :: 32 : 29 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'ocre est à celui du refroidissement du gyps au point de les tenir :: 11 : 7 ,

de
& ::
disseme

AVA
boulers
grès & d
dans l'o

Refroidis à
une des

Antimoine
Étain, en.
Grès, en.
Marbre bla
Zinc, en..

LA mē
lets se for

Refroidis à les
une demi-

Antimoine,
Étain, en..
Grès, en..
Marbre blan
Zinc, en..

des Minéraux, Partie Exp. 339

& :: 32 : 29 pour leur entier refroidissement.

X L V I I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulers de zinc, d'étain, d'antimoine, de grès & de marbre blanc, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>
minutes.	minutes.
Antimoine, en... 6.	En..... 16.
Étain, en..... 6½.	En..... 20.
Grès, en..... 8.	En..... 26.
Marbre blanc, en. 9½.	En..... 29.
Zinc, en..... 11½.	En..... 35.

X L V I I I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>
minutes.	minutes.
Antimoine, en... 5.	En..... 13.
Étain, en..... 6.	En..... 16.
Grès, en..... 7.	En..... 21.
Marbre blanc, en.. 8.	En..... 24.
Zinc, en..... 9½.	En..... 30.

P ij

340 Introduction à l'Histoire

Il résulte de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du marbre blanc, au point de les tenir :: 21 : 17 $\frac{1}{2}$, & :: 65 : 53 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: 21 : 15, & :: 65 : 47 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 21 : 12 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 24 : 18 par les expériences précédentes (*art. XLI*) ; ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 45 à 30 $\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 65 : 36, & par les expériences précédentes (*article XLI*) :: 68 : 47 ; on aura, en ajoutant ces temps, 133 à 83 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de l'étain.

de

4.^o

du zinc
l'antimoine

:: 11

:: 73

dentes

ces tem

rappor

dissleme

donné p

:: 65

expérien

on aura

184 pou

de l'enti

l'antimoi

5.^o Q

du marb

disslemen

les tenir

expérien

riences

ainsi, on

38 $\frac{1}{2}$ à 3

de leur

le second

sentes ex

des Minéraux, Partie Exp. 341

4.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 21 : 11 par les présentes expériences, & :: 73 : 39 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XVII*); ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 94 à 50 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 65 : 29, & :: 220 : 155 par les expériences précédentes (*article XVII*); on aura, en ajoutant ces temps, 285 à 184 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de l'antimoine.

5.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du grès, au point de pouvoir les tenir :: 17 $\frac{1}{2}$: 15 par les présentes expériences, & :: 21 : 17 par les expériences précédentes (*article XLIV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 38 $\frac{1}{2}$ à 32 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 53 : 47, &

342 Introduction à l'Histoire

:: 59 : 57 par les expériences précédentes (*article XLIV*) ; on aura , en ajoutant ces temps , 112 à 104 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du marbre blanc & du grès.

6.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement de l'étain , au point de les tenir :: $17\frac{1}{2}$: $12\frac{1}{2}$, & :: 53 : 36 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement de l'antimoine , au point de les tenir :: $17\frac{1}{2}$: 11 , & :: 53 : 36 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement de l'étain , au point de les tenir :: 15 : $12\frac{1}{2}$ par les présentes expériences , & :: 30 : $21\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. VIII*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 45 à 34 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par les présentes expériences , étant :: 47 : 36 , & :: 84 : 64 par les expériences précédentes (*article VIII*) ; on aura , en

de
ajouta
rapport
froidi
9.^o
du gr
l'antim
: 11 ,
refroid
10.
de l'é
de l'a
tenir
rience
précéd
en ajo
le rap
refroid
rapport
sentes
par les
on au
à 76
de l'é
l'antim

ON
de cui

des Minéraux, Partie Exp. 343

ajoutant ces temps, 131 à 100 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & de l'étain.

9.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: 15 : 11, & :: 47 : 29 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: $12 \frac{1}{2}$: 11 par les présentes expériences, & :: 18 : 16 par les expériences précédentes (*article XL*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $30 \frac{1}{2}$ à 27 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement : & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 36 : 29, & :: 47 : 47 par les expériences précédentes (*art. XL*); on aura, en ajoutant ces temps, 83 à 76 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'étain & de l'antimoine.

X L I X.

ON A FAIT chauffer ensemble les boulers de cuivre, d'émeril, de bismuth, de glaise

344 Introduction à l'Histoire

& d'ocre, & ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Ocre, en.....	6.	En.....	18.
Bismuth, en.....	7.	En.....	22.
Glaife, en.....	7.	En.....	23.
Cuivre, en.....	13.	En.....	36.
Émeril, en.....	15½.	En.....	43.

L.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Ocre, en.....	5½.	En.....	13.
Bismuth, en.....	6.	En.....	18.
Glaife, en.....	6.	En.....	19.
Cuivre, en.....	10.	En.....	30.
Émeril, en.....	11½.	En.....	38.

Il résulte de ces deux expériences :

1.º Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du cuivre, au point de les tenir :: 27

des Minéraux, Partie Exp. 345

dans : 23 , & :: 81 : 66 pour leur entier refroidissement.

2.^e Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de la glaïse au point de les tenir :: 27 : 13 , & :: 81 : 42 pour leur entier refroidissement.

3.^e Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du bismuth , au point de les tenir :: 27 : 13 par les présentes expériences , & :: 71 : $35\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XVII*) ; ainsi , on aura , en ajoutant ces temps , 98 à $48\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second , le rapport donné par les expériences présentes , étant :: 81 : 40 , & par les expériences précédentes (*article XVII*) :: 216 : 140 ; on aura , en ajoutant ces temps , 297 à 180 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & du bismuth.

4.^e Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'ocre , au point de les tenir :: 27

346 Introduction à l'Histoire

: $11\frac{1}{2}$, & :: 81 : 31 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de la glaise, du point de les tenir :: 23 : 13, & :: 66 : 42 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: 23 : 13 par les présentes expériences, & :: 28 : 16 par les expériences précédentes (*article XLI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 51 à 39 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant :: 66 : 40, & :: 80 : 47 par les expériences précédentes (*article XLI*); on aura, en ajoutant ces temps, 146 à 87 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & du bismuth.

7.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: 33

des

: $11\frac{1}{2}$;
refroid

8.^o
de la g
du bism
:: 13
entier

9.^o
de la g
de l'ocr
: $11\frac{1}{2}$
:: 26 :
dentes
en ajou
rapport
disseme
donné p
:: 42 :
riences
on aura
à 92 po
de l'ent
de l'ocr

10.^o
du bism
de l'ocr

des Minéraux, Partie Exp. 347

: $11\frac{1}{2}$; & :: 66 : 31 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement du bismuth, au point de pouvoir les tenir :: 13 : 13, & :: 42 : 41 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: 13 : $11\frac{1}{2}$ par les expériences présentes, & :: 26 : $22\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 39 à 34 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 42 : 31, & :: 69 : 61 par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 111 à 92 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise & de l'ocre.

10.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de l'ocre, pour pouvoir les tenir :: 13

348 Introduction à l'Histoire

: 11 $\frac{1}{2}$, & :: 32 : 31 pour leur entier refroidissement.

L I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulets de fer, de zinc, de bismuth, de glaïse & de craie, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Craie, en..... 6 $\frac{1}{2}$.

Bismuth, en.... 7.

Glaïse, en..... 8.

Zinc, en..... 15.

Fer, en..... 19.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 18.

En..... 19.

En..... 20.

En..... 25.

En..... 45.

L II.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.

minutes.

Craie, en..... 7.

Bismuth, en.... 7 $\frac{1}{2}$.

Glaïse, en..... 9.

Zinc, en..... 16.

Fer, en..... 21 $\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 20.

En..... 21.

En..... 24.

En..... 34.

En..... 53.

des Mineraux, Partie Exp. 349

On peut conclure de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du zinc, au point de les tenir :: $40 \frac{1}{2}$: 31, & :: 98 : 59 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les tenir :: $40 \frac{1}{2}$: $14 \frac{1}{2}$, & :: 98 : 40 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de la glaise, au point de les tenir :: $40 \frac{1}{2}$: 17, & :: 98 : 44 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement du fer est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: $40 \frac{1}{2}$: $12 \frac{1}{2}$, & :: 98 : 38 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du bismuth, au point de les tenir :: 31 : $14 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: $34 \frac{1}{2}$: 20 par les expériences précédentes

350 Introduction à l'Histoire

(*article XVI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $65\frac{1}{2}$ à 35 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 59 : 40, & :: 100 : 80 par les expériences précédentes (*article XV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 159 à 120 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du bismuth.

6.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de de la glaise, au point de les tenir :: 31 : 17, & :: 59 : 44 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: $31 : 12\frac{1}{2}$ & :: 59 : 38 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de la glaise, au point de les tenir :: $14\frac{1}{2}$: 17 par les présentes expériences, & :: 13 : 13 par les expériences précédentes (*article L*) ; ainsi, on aura, en ajoutant

de
ces te
plus pr
& pou
les exp
& ::
cédent
ces tem
plus p
bismut
9.^o
du bism
de la cr
: $13\frac{1}{2}$
refroid
10.^o
de la gl
de la c
: $13\frac{1}{2}$
:: 26 :
(*art. X*
ces ten
plus pr
ment ;
par les
: 38,
précède
en ajou

des Minéraux, Partie Exp. 351

ces temps , $27\frac{1}{2}$ à 30 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 40 : 44, & :: 41 : 42 par les expériences précédentes (*art. L*); on aura, en ajoutant ces temps, 81 à 86 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du bismuth & de la glaise.

9.^o Que le temps du refroidissement du bismuth est à celui du refroidissement de la craie , au point de les tenir :: $14\frac{1}{2}$: $13\frac{1}{2}$ & :: 40 : 38 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement de la craie , au point de les tenir :: 17 : $13\frac{1}{2}$, par les expériences présentes, & :: 26 : 21 par les expériences précédentes (*art. XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 43 à $34\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 44 : 38, & :: 69 : 58 par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 113 à 96 pour

352 Introduction à l'Histoire

le rapport encore plus précis de l'entier
refroidissement de la glaïse & de la craie.

L I I I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les
boulets d'émeril, de verre, de pierre cal-
caire dure & de bois, ils se sont refroidis
dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Bois, en.....	2 $\frac{1}{2}$.	En.....	1 $\frac{1}{2}$.
Verre, en.....	9 $\frac{1}{2}$.	En.....	28.
Grès, en.....	11.	En.....	34.
Pierre calcaire dure, en.....	12.	En.....	36.
Émeril, en.....	15.	En.....	47.

L I V.

LA même expérience répétée, les bou-
lets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Bois, en.....	2.	En.....	13.
Verre, en.....	7 $\frac{1}{2}$.	En.....	21.
Grès, en.....	8.	En.....	24.
Pierre dure, en...	8 $\frac{1}{2}$.	En.....	26.
Émeril, en.....	14.	En.....	42.

des Minéraux, Partie Exp. 353

Il résulte de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de la pierre dure, au point de les tenir :: 21 : 20 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 15 $\frac{1}{2}$: 12 par les expériences précédentes (*art. XLII*) ; ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 44 $\frac{1}{2}$ à 32 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 89 : 62, & :: 46 : 32 par les expériences précédentes (*art. XLII*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 125 à 94 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & de la pierre dure.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: 29 : 19, & :: 89 : 58 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: 29 : 17, & :: 89 : 49 pour leur entier refroidissement.

354 Introduction à l'Histoire

4.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: 19 : $4\frac{1}{2}$, & :: 89 : 28 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: $20\frac{1}{2}$: 19, & :: 62 : 58 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: $20\frac{1}{2}$: 17, & :: 62 : 49 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: $20\frac{1}{2}$: $4\frac{1}{2}$, & :: 62 : 28 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: 19 : 17 par les présentes expériences, & :: 55 : 52 par les expériences précédentes (*article XXXIII*); ainsi, on aura, en

des

ajoutant
rapport
dissimen
donné p
:: 58 :
expérien
on aura
à 181 p
de l'entrie
verre.

9.^o Q
du grès
bois, au
: $4\frac{1}{2}$, &
refroidiss

10.^o Q
du verre
du bois,
: $4\frac{1}{2}$,
refroidiss

A Y A
boulets
& de c
l'ordre

des Minéraux , Partie Exp. 355

ajoutant ces temps, 74 à 69 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 58 : 49 , & :: 170 : 132 par les expériences précédentes (*art. XXXIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 228 à 181 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & du verre.

9.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du bois, au point de pouvoir les tenir :: 15 : 4 $\frac{1}{2}$, & :: 58 : 28 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: 17 : 4 $\frac{1}{2}$, & :: 49 : 28 pour leur entier refroidissement.

L V.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulets d'or, d'étain, d'émeril, de gyps & de craie, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

356 Introduction à l'Histoire

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Gyps, en.....	5.
Craie, en.....	$7\frac{1}{2}$.
Étain, en.....	$11\frac{1}{2}$.
Or, en.....	16.
Émeril, en.....	20.

Refroidis à la température.

minutes.

En.....	15.
En.....	21.
En.....	30.
En.....	41.
En.....	49.

L V I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

*Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.*

minutes.

Gyps, en.....	4.
Grès, en.....	$6\frac{1}{2}$.
Étain, en.....	10.
Or, en.....	15.
Émeril, en.....	18.

Refroidis à la température.

minutes.

En.....	13.
En.....	18.
En.....	27.
En.....	40.
En.....	46.

On peut conclure de ces expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'or, au point de les tenir :: 38 : 31 par les expériences présentes, & :: 59 $\frac{1}{2}$: 52 par les expériences précédentes (art. XLII) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 97 $\frac{1}{2}$ à 83 pour le rapport

des

plus pré
& pour
les prése
& :: 16
cédentes
ajoutant
rapport
refroidi

2.^o (

de l'éme
de l'éta
: 21 $\frac{1}{2}$,
refroidi

3.^o (

de l'éme
de la cr
: 14, &
froidisse

4.^o (

de l'éme
du gyps
: 9, &
refroidi

5.^o (

de l'or
l'éta
par les

des Minéraux, Partie Exp. 357

plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 95 : 81, & :: 166 : 155 par les expériences précédentes (*article XLII*); on aura, en ajoutant ces temps, 261 à 236 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril & de l'or.

2.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 38 : 21 $\frac{1}{2}$, & :: 95 : 57 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: 38 : 14, & :: 95 : 39 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'émeril est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 38 : 9, & :: 95 : 28 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: 31 : 22 par les présentes expériences, & :: 37.

358 Introduction à l'Histoire

: 21 par les expériences précédentes (*article XI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 68 à 43 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 81 : 57, & :: 114 : 61 par les expériences précédentes (*article XI*); on aura, en ajoutant ces temps, 195 à 118 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & de l'étain.

6.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: 31 : 14 par les présentes expériences, & :: 27 $\frac{1}{2}$: 10 par les expériences précédentes (*art. XXXV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 52 $\frac{1}{2}$ à 24 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement, & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 81 : 39, & :: 65 : 26 par les expériences précédentes (*article XXXV*); on aura, en ajoutant ces temps, 146 à 65 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & de la craie.

des

7.^o Q
de l'or
gyps,
:: 31 :
& :: 56
cédentes
aura, en
pour le
premier
le rappo
riences,

: 53
(*article X*)
ces temp
encore p
ment de

8.^o Q
de l'étain
la craie,
& :: 57
dissément

9.^o Q
de l'étain
du gyps,
& :: 57
dissément

10.^o Q

des Minéraux, Partie Exp. 359

7.^o Que le temps du refroidissement de l'or est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: 31 : 9 par les présentes expériences, & :: 56 : 17 par les expériences précédentes (*article XXXVIII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 87 à 26 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 81 : 28, & :: 165 : 53 par les expériences précédentes (*article XXXVIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 246 à 81 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'or & du gyps.

8.^o Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidissement de la craie, au point de les tenir :: 22 : 14, & :: 57 : 39 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 22 : 9, & :: 57 : 28. pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement

360 Introduction à l'Histoire

de la craie est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: 14 : 9 par les présentes expériences, & :: 11 : 7 par les expériences précédentes (*art. XLVI*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 25 à 16 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 39 : 28, & :: 32 : 29 par les expériences précédentes (*article XLVI*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 71 à 57 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la craie & du gyps.

L V I I.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulets de marbre blanc, de marbre commun, de glaise, d'ocre & de bois, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Bois, en.....	2 $\frac{1}{2}$.	En.....	9.
Ocre, en.....	6 $\frac{1}{2}$.	En.....	19.
Glaise, en.....	7 $\frac{1}{2}$.	En.....	21.
Marbre commun, en...	10 $\frac{1}{2}$.	En.....	29.
Marbre blanc, en.	12.	En.....	34.

L V I I I.

de.

L A
lers se

Refroidis
une a

Bois, en.
Ocre, en.
Glaise, e
Marbre com
Marbre b

On p
riences :

1.°
du mar
dissimen
de pouv
présentes
par les
XXVII
temps, 6
précis de
pour le
présentes
& :: 11
précédent
Suppl

des Minéraux, Partie Exp. 361

L V I I I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Bois, en.....	3.	En.....	11.
Ocre, en.....	7.	En.....	20.
Glaife, en.....	8 $\frac{1}{2}$.	En.....	23.
Marbre commun, en...	12 $\frac{1}{2}$.	En.....	32.
Marbre blanc, en.	13.	En.....	36.

On peut conclure de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du marbre commun, au point de pouvoir les tenir :: 25 : 22 par les présentes expériences, & :: 39 $\frac{1}{2}$: 36 par les expériences précédentes (*article XXVII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 64 $\frac{1}{2}$ à 58 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 70 : 61, & :: 115 : 113 par les expériences précédentes (*article XXVII*); on aura,

Supplément. Tome I.

Q

362 Introduction à l'Histoire

en ajoutant ces temps, 185 à 174 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du marbre blanc & du marbre commun.

2.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement de la glaise, au point de pouvoir les tenir :: 25 : 16, & :: 70 : 44 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: 5 : 13 $\frac{1}{2}$, & :: 70 : 39 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: 25 : 5 $\frac{1}{2}$, & :: 70 : 20 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement de la glaise, au point de les tenir :: 22 : 16, & :: 61 : 44 pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir

des l

:: 22 :
entier ref

7.^o Qu
du marbre
dissément
:: 22 : 5
entier refr

8.^o Que
de la glaise
de l'ocre,
: 13 $\frac{1}{2}$ par
:: 12 $\frac{1}{2}$: 1

cédentes (an
en ajoutant
rapport plus
dissément; &
donné par le

:: 44 : 39
xpériences.

on aura; en
8 pour le
e l'entier re
e l'ocre.

9.^o Que
e la glaise e
u bois, au

des Minéraux, Partie Exp. 363

:: 22 : 13 $\frac{1}{2}$, & :: 61 : 39 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: 22 : 5 $\frac{1}{2}$, & :: 61 : 20 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: 16 : 13 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 12 $\frac{1}{2}$: 11 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 28 $\frac{1}{2}$ à 20 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant :: 44 : 39, & :: 33 : 29 par les expériences précédentes (*art. XXXV*); on aura, en ajoutant ces temps, 77 à 28 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise & de l'ocre.

9.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: 16

364 Introduction à l'Histoire

: 5 $\frac{1}{2}$, & :: 44 : 20 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'ocre est à celui du refroidissement du bois, au point de les tenir :: 13 $\frac{1}{2}$: 5 $\frac{1}{2}$, & :: 39 : 20 pour leur entier refroidissement.

L I X,

AYANT MIS chauffer ensemble les boulets d'argent, de verre, de glaïse d'ocre & de craie, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant;

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Craie, en.....	5 $\frac{1}{2}$.	En.....	16.
Ocre, en.....	6.	En.....	18.
Glaïse, en.....	8.	En.....	22.
Verre, en.....	9 $\frac{1}{2}$.	En.....	29.
Argent, en.....	12 $\frac{1}{2}$.	En.....	31.

L X.

LA même expérience répétée, les boulets chauffés plus long-temps, sont refroidis dans l'ordre suivant;

des

Refroidis à une de

Craie, en

Ocre, en..

Glaïse, en

Verre, en

Argent, en

On pe
riences :

1.^o Qu
de l'argen
du verre :
: 22 par
: 36 : 2
dentes (an
en ajoutan
le rapport
refroidisse
rapport do
riences et
: 62 par
(article X
ces temps
encore plu
ment de l

2.^o Qu

des Minéraux, Partie Exp. 369

Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.

minutes.

Craie, en..... 7.
Ocre, en..... $8\frac{1}{2}$.
Glaife, en..... $9\frac{1}{2}$.
Verre, en..... $12\frac{1}{2}$.
Argent, en..... $16\frac{1}{2}$.

Refroidis à la température:

minutes.

En..... 22.
En..... 25.
En..... 29.
En..... 38.
En..... 41.

On peut conclure de ces deux expériences :

1.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement du verre , au point de les tenir :: 29 : 22 par les présentes expériences , & :: 36 : 25 par les expériences précédentes (*art. XXXIII*) ; ainsi, on aura , en ajoutant ces temps , 65 à 47 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences étant :: 76 : 67, & :: 103 : 62 par les expériences précédentes (*article XXXIII*) ; on aura, en ajoutant ces temps , 179 à 129 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'argent & du verre.

2.^o Que le temps du refroidissement

Q iiij

366 Introduction à l'Histoire

de l'argent est à celui du refroidissement de la glaïse, au point de pouvoir les tenir :: 29 : 17 $\frac{1}{2}$, :: 76 : 51 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: 29 : 14 $\frac{1}{2}$, & :: 76 : 43 pour leur entier refroidissement.

4.^o Que le temps du refroidissement de l'argent est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: 29 : 12 $\frac{1}{2}$, & :: 76 : 38 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la glaïse, au point de pouvoir les tenir :: 22 : 17 $\frac{1}{2}$ par les expériences présentes, & :: 16 $\frac{1}{2}$: 13 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 38 $\frac{1}{2}$ à 31 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 67 : 51, & :: 46 : 36 par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant

des

cès temp
encore p
ment du

6.^o Qu
du verre
de l'ocre
:: 22 : 1
& :: 16

cédentes
en ajouta
le rappor
refroidisse
rapport c
riences, é
par les ex

XLVI);
113 à 75
précis de
& de l'ocr

7.^o Que
du verre
de la craie
:: 22 : 12
& :: 16 $\frac{1}{2}$
cédentes
en ajoutan
le rappor

des Minéraux, Partie Exp. 367

ces temps, 113 à 87 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de la glaïse.

6.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir :: 22 : 14 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 16 $\frac{1}{2}$: 11 par les expériences précédentes (*article XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 38 $\frac{1}{2}$ à 25 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 67 : 43, & :: 46 : 32 par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 113 à 75 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de l'ocre.

7.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: 22 : 12 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 16 $\frac{1}{2}$: 11 par les expériences précédentes (*article XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 38 $\frac{1}{2}$ à 23 $\frac{1}{2}$ pour le rapport encore plus précis de leur

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

18 20 22 25
E E E E E E E E

10 01
E E E E E E E E

368 Introduction à l'Histoire

premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 67 : 38, & :: 46 : 32 par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 113 à 70 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de la craie.

8.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: $17 \frac{1}{2}$: $14 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 26 : $22 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $43 \frac{1}{2}$ à 37 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 51 : 43, & :: 69 : 63 par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 120 à 104 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise & de l'ocre.

9.^o Que le temps du refroidissement de la glaise est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir

::
rien
préc
aura
pou
refr
rapp
rien
par
XLA
120
préc
glais
10
de l'
de la
:: 14
& ::
dente
en aj
le rap
refroi
rappo
rience
par le
XXX
72 à

des Minéraux, Partie Exp. 369

:: $17 \frac{1}{2} : 12 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: $26 : 21$ par les expériences précédentes (*article XLVI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $43 \frac{1}{2}$ à $33 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: $51 : 38$, & :: $69 : 58$ par les expériences précédentes (*article XLVI*); on aura, en ajoutant ces temps, 120 à 96 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaise & de la craie.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'ocre est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: $14 \frac{1}{2} : 12 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: $11 \frac{1}{2} : 10$ par les expériences précédentes (*article XXXV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 26 à $22 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: $43 : 38$, & :: $29 : 26$ par les précédentes expériences (*article XXXV*); on aura, en ajoutant ces temps, 72 à 64 pour le rapport encore plus

376 Introduction à l'Histoire

précis de l'entier refroidissement de l'ocre
& de la crâe.

L X I.

AYANT MIS chauffer ensemble à un grand degré de chaleur, les boulets de zinc, de bismuth, de marbre blanc, de grès & de gyps, le bismuth s'est fondu tout-à-coup, & il n'est resté que les quatre autres, qui se sont refroidis dans l'ordre suivant:

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.		Refroidis à la température.	
	minutes.		minutes.
Gyps, en.....	11.	En.....	28.
Grès, en.....	16.	En.....	42.
Marbre blanc, en.....	19.	En.....	50.
Zinc, en.....	23.	En.....	57.

L X I I.

LA même expérience répétée avec les quatre boulets ci-dessus & un boulet de plomb, à un feu moins ardent, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant.

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.		Refroidis à la température.	
	minutes.		minutes.
Gyps, en.....	4.	En.....	16.
Plomb, en.....	9.	En.....	28.

de

Refroidis à une

Grès, e
Marbre
Zinc, e

Oh
riences

r.°

du zinc
marbre
tenir ::

riences

précède

ajoutan

le rapp

premier

le rapp

sente, e

par les

XLVII

temps,

plus, pr

zinc &

2.°

du zinc

des Mineraux, Partie Exp. 371

Refroidis à les tenir pendant
une demi-seconde.

minutes.

Grès, en.... 10.

Marbre blanc, en. 12½.

Zinc, en.... 15.

Refroidis à la température.

minutes.

En..... 32.

En..... 36.

En..... 43.

On peut conclure de ces deux expériences :

1.º Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du marbre blanc, au point de pouvoir les tenir :: 38 : 31 ½ par les présentes expériences, & :: 21 : 17 ½ par les expériences précédentes (article XLVIII) ; ainsi, en ajoutant des temps on aura, 59 à 49 pour le rapport encore plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 100 : 86, & :: 65 : 53 par les expériences précédentes (article XLVIII) ; on aura, en ajoutant ces temps, 165 à 139, pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du marbre blanc.

2.º Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du

Qvj

372 Introduction à l'Histoire

grès, au point de les tenir :: 38 : 26
 par les présentes expériences, & :: 21
 : 115 par les expériences précédentes
 (*article XLVIII*) ; ainsi, on aura, en
 ajoutant ces temps, 59 à 41 pour le rapport
 plus précis de leur premier refroidisse-
 ment ; & pour le second, le rapport donné
 par les présentes expériences, étant :: 100
 : 74, & :: 65 : 47 par les expériences
 précédentes (*article XLVIII*) ; on aura,
 en ajoutant ces temps, 165 à 121 pour
 le rapport encore plus précis de l'entier
 refroidissement du zinc & du grès.

3.^o Que le temps du refroidissement
 du zinc est à celui du refroidissement du
 plomb, au point de pouvoir les tenir
 :: 15 : 9 $\frac{1}{2}$ par la présente expérience
 & :: 73 : 43 $\frac{3}{4}$ par les expériences pré-
 cédentes (*article XVII*) ; ainsi on aura,
 en ajoutant ces temps, 89 à 53 $\frac{1}{4}$ pour
 le rapport plus précis de leur premier
 refroidissement ; & pour le second, le
 rapport donné par l'expérience présente,
 étant :: 43 : 20, & :: 220 : 189 par
 les expériences précédentes (*art. XVII*) ;
 on aura, en ajoutant ces temps, 263 à
 209 pour le rapport encore plus précis

de l'
 plom
 4.
 du zi
 gyps
 & ::
 ment.
 5.
 du m
 dissen
 :: 31
 & ::
 cédent
 aura,
 pour l
 refroid
 rappor
 rience
 : 104
 (*articl*
 ces ten
 encore
 ment
 6.
 du mar
 ment

des Minéraux, Partie Exp. 373

de l'entier refroidissement du zinc & du plomb.

4.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: $38 : 15 \frac{1}{2}$ & :: $100 : 44$ pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du grès, au point de les tenir :: $31 \frac{1}{2} : 26$ par les présentes expériences, & :: $38 \frac{1}{2} : 32$ par les expériences précédentes (*article XLVIII*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 70 à 58 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: $86 : 74$, & :: $112 : 104$ par les expériences précédentes (*article XLVIII*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 198 à 178 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du marbre blanc & du grès.

6.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du plomb, au point de les tenir

374 Introduction à l'Histoire

12 $\frac{1}{2}$: 9 $\frac{1}{2}$, & :: 36 : 20 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du marbre blanc est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: 31 : 15 $\frac{1}{2}$, & :: 86 : 44 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: 10 : 9 $\frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: 59 : 51 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. XLIV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 69 $\frac{1}{2}$ à 61 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 32 : 20, & :: 187 : 178 par les expériences précédentes (*art. XLIV*); on aura, en ajoutant ces temps, 211 à 96 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & du plomb.

9.^o Que le temps du refroidissement du grès est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: 26 : 19 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences;

& ::
dente
en aj
rappo
diffen
donne
:: 74
rience
aura,
pour
tier r
10
du plo
du gy
:: 9
entier

AY
bouler
comm
oraie,
suivant

Refroidi
une
Craie, e
Antimo

des Minéraux, Partie Exp. 375

& :: 55 : 21 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXIII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 81 à 37 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 74 : 44, & :: 170 : 78 par les expériences précédentes (*art. XXXIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 244 à 122 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du grès & du gyps.

10.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement du gyps au point de pouvoir les tenir :: 9 $\frac{1}{2}$: 4 $\frac{1}{2}$; & :: 28 : 16 pour leur entier refroidissement.

LXIII.

AYANT FAIT chauffer ensemble les boulets de cuivre, d'antimoine, de marbre commun, de pierre calcaire tendre & de craie, il se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.		Refroidis à la température.	
	minutes.		minutes.
Craie, en.....	6 $\frac{1}{2}$.	En.....	29.
Antimoine, en..	7 $\frac{1}{2}$.	En.....	26.

376 Introduction à l'Histoire

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Pierre tendre, en, 7½.		En.....	26.
Marbre commun, en, 11½.		En.....	31.
Cuivre, en.....	16.	En.....	49.

L X I V.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>	<i>minutes.</i>	<i>Refroidis à la température.</i>	<i>minutes.</i>
Craie, en.....	5½.	En.....	18.
Antimoine, en...	6.	En.....	24.
Pierre tendre, en,	8.	En.....	23.
Marbre commun, en...	10.	En.....	29.
Cuivre, en.....	13½.	En.....	38.

On peut conclure de ces deux expériences :

1.º Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement du marbre commun, au point de pouvoir les tenir :: $29 \frac{1}{2} : 21 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: $45 : 35 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article V*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $74 \frac{1}{2}$ à 57

de
pour l
mier r
le rapp
rience
par les
on au
à 170
de l'en
marbre
2.º
du cuir
de la p
les ten
pour l
3.º
du cuir
de l'a
:: 29
riences
précéd
en ajo
le rap
refroid
rappor
sentes
par le
(XLI)

des Minéraux, Partie Exp. 377

pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 87 : 60, & :: 125 : 111 par les expériences précédentes (*art. V*); on aura, en ajoutant ces temps, 212 à 170 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & du marbre commun.

2.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de pouvoir les tenir :: $29 \frac{1}{2}$: $15 \frac{1}{2}$, & :: 87 : 49 pour leur entier refroidissement.

3.^o Que le temps du refroidissement du cuivre, est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: $29 \frac{1}{2}$: $13 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 28 : 16 par les expériences précédentes (*article XLI*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $57 \frac{1}{2}$ à $29 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 87 : 50, & :: 80 : 47 par les expériences précédentes (*article XLI*); on aura, en ajoutant ces temps,

378 Introduction d'l'Histoire

167 à 97 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du cuivre & de l'antimoine.

4.^o Que le temps du refroidissement du cuivre est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: 29 $\frac{1}{2}$: 121 & :: 87 : 38 pour leur entier refroidissement.

5.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de pouvoir les tenir :: 21 $\frac{1}{2}$: 14 par les expériences présentes, & :: 29 $\frac{1}{2}$: 231 par les expériences précédentes (article *XX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 50 $\frac{1}{2}$ à 37 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 60 : 49, & :: 87 : 68 par les expériences précédentes (article *XX*); on aura, en ajoutant ces temps, 147 à 117 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du marbre commun & de la pierre tendre.

6.^o Que le temps du refroidissement

des Minéraux, Partie Exp. 379

du marbre commun est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de les tenir :: $21 \frac{1}{2}$: $13 \frac{1}{2}$, & :: 60 : 50 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement du marbre commun est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: $21 \frac{1}{2}$: 12, & :: 60 : 38 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la pierre tendre est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: $14 : 13 \frac{1}{2}$, & :: 49 : 50 pour leur entier refroidissement.

9.^o Que le temps du refroidissement de la pierre tendre est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: 14 : 12, & :: 49 : 38 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement de l'antimoine est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: $13 \frac{1}{2}$: 12, & :: 50 : 38 pour leur entier refroidissement.

L X V.

AYANT FAIT chauffer ensemble les

380 Introduction à l'Histoire

boulets de plomb, d'étain, de verre, de pierre calcaire dure, d'ocre & de glaise, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.		Refroidis à la température.	
	minutes.		minutes.
Ocre, en.....	5.	En.....	16.
Glaise, en.....	$7\frac{1}{2}$.	En.....	20.
Étain, en.....	$8\frac{1}{2}$.	En.....	21.
Plomb, en.....	$9\frac{1}{2}$.	En.....	23.
Verre, en.....	10.	En.....	27.
Pierre dure, en...	$10\frac{1}{2}$.	En.....	29.

Il résulte de cette expérience :

1.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement du verre, au point de les tenir :: $10\frac{1}{2} : 10$ par la présente expérience, & :: $20\frac{1}{2} : 17$ par les expériences précédentes (*art. LIV*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 31 à 37 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: $29 : 27$, & :: $62 : 49$ par les expériences précédentes (*article LIV*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 91 à 76

des Minéraux, Partie Exp. 381

pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la pierre dure & du verre.

2.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: 10 : 9 $\frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: 12 : 11 par les expériences précédentes (*article XXXIX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 22 à 20 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par l'expérience présente, étant :: 27 : 23, & :: 35 : 30 par les expériences précédentes (*art. XXXIX*); on aura, en ajoutant ces temps, 62 à 53 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & du plomb,

3.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de l'étain, au point de pouvoir les tenir :: 10 : 8 $\frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: 46 : 42 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXIX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 56 à 51 pour le rapport plus précis de leur premier

382 Introduction à l'Histoire

refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 27 : 21, & par les expériences précédentes (*article XXXIX*) :: 132 : 117 ; on aura, en ajoutant ces temps, 159 à 138 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de l'étain.

4.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de la glaise, au point de pouvoir les tenir :: 10 : 7 $\frac{1}{2}$, & :: 38 $\frac{1}{2}$: 31 par les expériences précédentes (*article LX*) ; ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 48 $\frac{1}{2}$ à 38 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement ; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 27 : 20, & :: 113 : 87 par les expériences précédentes (*art. LX*) ; on aura, en ajoutant ces temps, 140 à 107 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de la glaise.

5.^o Que le temps du refroidissement du verre est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir :: 10 : 5 par les présentes expériences,

& :
préc
en a
le ra
refro
rappo
étant
précé
on au
pour
l'entie
l'ocre.
6.^o
de la
dissém
les ten
pour l
7.^o
de la p
ment
:: 10
entier r
8.^o
de la p
dissém
:: 10
entier r

des Minéraux, Partie, Exp. 383

& :: $38 \frac{1}{2}$: $25 \frac{1}{2}$, par les expériences précédentes (*article LX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $48 \frac{1}{2}$ à 30 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 27 : 16, & par les expériences précédentes (*article LX*) :: 113 : 75; on aura, en ajoutant ces temps, 140 à 91 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du verre & de l'ocre.

6.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement du plomb, au point de pouvoir les tenir :: $10 \frac{1}{2}$: $9 \frac{1}{2}$, & :: 29 : 23 pour leur entier refroidissement.

7.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: $10 \frac{1}{2}$: $8 \frac{1}{2}$, & :: 29 : 21 pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement de la glaise, au point de les tenir :: $10 \frac{1}{2}$: $7 \frac{1}{2}$, & :: 29 : 20 pour leur entier refroidissement.

384 Introduction à l'Histoire

9.^o Que le temps du refroidissement de la pierre dure est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: $10 \frac{1}{2}$: 5, & :: 29 : 16 pour leur entier refroidissement.

10.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'étain, au point de les tenir :: $9 \frac{1}{2}$: $8 \frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: $36 \frac{1}{2}$: $31 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXIX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 46 à 40 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 23 : 21, & :: 109 : 89 par les expériences précédentes (*art. XXXIX*); on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 110 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb & de l'étain.

11.^o Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de la glaise, au point de pouvoir les tenir :: $9 \frac{1}{2}$: $7 \frac{1}{2}$ par la présente expérience, & :: 7 : $5 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXV*); ainsi, on aura,

aura
pou
mier
le ra
rien
par k
XXX
41 à
précis
& de
12.
du plo
de l'oc
:: $9 \frac{1}{2}$
:: 7 :
(*article*)
ces tem
plus pr
ment ;
donné p
:: 23 :
riences
on aura
pour le
l'entier r
l'ocre.
L3.^o Q
Supple

des Minéraux, Partie Exp. 383

aura, en ajoutant ces temps, $16 \frac{1}{2}$ à 13 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 23 : 20, & :: 18 : 15 par les expériences précédentes (*article XXXV*); on aura, en ajoutant ces temps, 41 à 35 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb & de la glasse.

12.^e Que le temps du refroidissement du plomb est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir :: $9 \frac{1}{2}$: 5 par la présente expérience, & :: 7 : 5 par les expériences précédentes (*article XXXV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $16 \frac{1}{2}$ à 10 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 23 : 16, & :: 18 : 13 par les expériences précédentes (*article XXXV*); on aura, en ajoutant ces temps, 41 à 29 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du plomb & de l'ocre.

13.^e Que le temps du refroidissement
Supplément. Tome I.

R

386 Introduction à l'Histoire

de l'étain est à celui du refroidissement de la glaïse, au point de les tenir :: $8 \frac{1}{2}$: $7 \frac{1}{2}$ & :: 21 : 20 pour leur entier refroidissement.

14.^e Que le temps du refroidissement de l'étain est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de les tenir :: $8 \frac{1}{2}$: $7 \frac{1}{2}$ & :: 21 : 16 pour leur entier refroidissement.

15.^e Que le temps du refroidissement de la glaïse est à celui du refroidissement de l'ocre, au point de pouvoir les tenir :: $7 \frac{1}{2}$: 5 par la présente expérience, & :: $43 \frac{1}{2}$: 37 par les expériences précédentes (*article LX*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 50 à 42 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par la présente expérience, étant :: 20 : 16, & :: 120 : 104 par les expériences précédentes (*art. LX*); on aura, en ajoutant ces temps, 140 à 120 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la glaïse & de l'ocre.

L X V I

AYANT FAIT chauffer ensemble les

bou
calc
se s

Refr

Gyps
Craie
Antim
Pierre
Zinc,

L A
boulet
suivan

Refroidis
une

Gyps, e
Craie, e
Antimo
Pierre te
Zinc, en

On p
riences

des Minéraux, Partie Exp. 387

boulets de zinc, d'antimoine, de pierre calcaire tendre, de craie & de gyps, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>		<i>Refroidis à la température.</i>	
	minutes.		minutes.
Gyps, en.....	3½.	En.....	11.
Craie, en.....	5.	En.....	16.
Antimoine, en...	6.	En.....	22.
Pierre tendre, en.	7½.	En.....	23.
Zinc, en.....	14½.	En.....	29.

L X V I I.

LA même expérience répétée, les boulets se sont refroidis dans l'ordre suivant :

<i>Refroidis à les tenir pendant une demi-seconde.</i>		<i>Refroidis à la température.</i>	
	minutes.		minutes.
Gyps, en.....	3½.	En.....	12.
Craie, en.....	4½.	En.....	14.
Antimoine, en..	6.	En.....	20.
Pierre tendre, en.	8.	En.....	21.
Zinc, en.....	13½.	En.....	28.

On peut conclure de ces deux expériences :

R ij

388 Introduction à l'Histoire

1.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de la pierre tendre, au point de pouvoir les tenir :: 28 : 15 $\frac{1}{2}$, & :: 57 : 44 pour leur entier refroidissement.

2.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de l'antimoine, au point de pouvoir les tenir :: 28 : 12 par les présentes expériences, & :: 94 : 52 par les expériences précédentes (*article XLVIII*); ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 122 à 64 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 57 : 42, & :: 285 : 184 par les expériences précédentes (*article XLVIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 342 à 226 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de l'antimoine.

3.^o Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: 28 : 9 $\frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: 31 : 12 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article LII*); ainsi, on aura,

en a
le ra
refro
rappo
sente
par le
(*LII*)
116 à
précis
& de
4.^o
du zin
du gyp
:: 28
& :: 3
cédente
en ajou
rapport
disseme
donné p
:: 57 :
expérien
on aura
pour le
l'entier r
5.^o
de l'antim

des Minéraux, Partie Exp. 389

en ajoutant ces temps, 59 à 22 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 57 : 30, & :: 59 : 38 par les expériences précédentes (*article LII*); on aura, en ajoutant ces temps, 116 à 68 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & de la craie.

4.^e Que le temps du refroidissement du zinc est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: 28 : 7 par les présentes expériences, & :: 38 : 15 $\frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*art. LXII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, 66 à 22 $\frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 57 : 23, & :: 100 : 44 par les expériences précédentes (*article LXII*); on aura, en ajoutant ces temps, 157 à 67 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement du zinc & du gyps.

5.^e Que le temps du refroidissement de l'antimoine est à celui du refroidissement

390 Introduction à l'Histoire

de la pierre calcaire tendre, au point de les tenir :: $12 : 13 \frac{1}{2}$, & :: $42 : 44$ pour leur entier refroidissement.

6.^o Que le temps du refroidissement de l'antimoine est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir les tenir :: $12 : 9 \frac{1}{2}$ par les présentes expériences, & :: $13 \frac{1}{2} : 12$ par les expériences précédentes (*art. LXIV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $25 \frac{1}{2}$ à $21 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: $42 : 30$, & :: $50 : 38$ par les expériences précédentes (*article LXIV*); on aura, en ajoutant ces temps, 92 à 68 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de l'antimoine & de la craie.

7.^o Que le temps du refroidissement de l'antimoine est à celui du refroidissement du gyps, au point de pouvoir les tenir :: $12 : 7$, & :: $42 : 23$ pour leur entier refroidissement.

8.^o Que le temps du refroidissement de la pierre tendre est à celui du refroidissement de la craie, au point de pouvoir

les te
expé
rience
ainsi,
 $29 \frac{1}{2}$
de le
le sec
fentes
:: 49
(*art.*
temps
plus
la pié
 $9.$
de la
refroic
tenir :
rience
précéd
on au
à $11 \frac{1}{2}$
leur p
second
rience
:: 27
dentes
en ajou

des Minéraux, Partie Exp. 391

les tenir :: $15 \frac{1}{2}$: $9 \frac{1}{2}$, par les présentes expériences, & :: 14 : 12 par les expériences précédentes (*article LXIV*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $29 \frac{1}{2}$ à $21 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: 44 : 30 , & :: 49 : 38 par les expériences précédentes (*art. LXIV*); on aura, en ajoutant ces temps, 93 à 68 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la pierre tendre & de la craie.

9.^e Que le temps du refroidissement de la pierre calcaire tendre est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: $15 \frac{1}{2}$: 7 par les présentes expériences, & :: 12 : $4 \frac{1}{2}$ par les expériences précédentes (*article XXXVIII*); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $27 \frac{1}{2}$ à $11 \frac{1}{2}$ pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les expériences présentes, étant :: 44 : 23 , & :: 27 : 14 par les expériences précédentes (*article XXXVIII*); on aura, en ajoutant ces temps, 71 à 37 pour le

592 Introduction à l'Histoire

rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la pierre tendre & du gyps.

10.^e Que le temps du refroidissement de la craie est à celui du refroidissement du gyps, au point de les tenir :: $9\frac{1}{2} : 7$ par les présentes expériences, & :: $25 : 16$ par les expériences précédentes (art. LVI); ainsi, on aura, en ajoutant ces temps, $34\frac{1}{2}$ à 23 pour le rapport plus précis de leur premier refroidissement; & pour le second, le rapport donné par les présentes expériences, étant :: $30 : 23$, & :: $1071 : 57$ par les expériences précédentes (article LVI); on aura, en ajoutant ces temps, 102 à 80 pour le rapport encore plus précis de l'entier refroidissement de la craie & du gyps.

Je borne ici cette suite d'expériences assez longues à faire & fort ennuyeuses à lire; j'ai cru devoir les donner telles que je les ai faites à plusieurs reprises dans l'espace de six ans; si je m'étois contenté d'en additionner les résultats, j'aurois à la vérité abrégé le Mémoire, mais on n'auroit pas été en état de les répéter, & c'est cette considération qui

m'a
& le
lieu
faire
néanu
lation
tous,
coup
rences

Des r
diffé

Par &c.

des Minéraux, Partie Exp. 121

m'a fait préférer de donner l'énumération & le détail des expériences mêmes, au lieu d'une table abrégée, que j'aurois pu faire de leurs résultats accumulés. Je vais néanmoins donner par forme de récapitulation, la Table générale de ces rapports tous comparés à 10000, afin que, d'un coup d'œil, on puisse en saisir les différences.

T A B L E

*Des rapports du refroidissement des
différentes substances minérales.*

F E R.

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
{	Émeril.....	10000 à 9117—9020.
	Cuivre.....	10000 à 8512—8702.
	Or.....	10000 à 8160—8148.
	Zinc.....	10000 à 7654—6020.
	Argent.....	10000 à 7619—7423. 6804
	Marbre blanc.	10000 à 6774—6704.
Fe &....	Marbre com- mun.....	10000 à 6636—6746.

R v.

394 Introduction à l'Histoire

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
Pierre calcaire		
dure.....	10000 à	6617—6274.
Grès.....	10000 à	5796—6926.
Verre.....	10000 à	5576—5805.
Plomb.....	10000 à	5143—6482.
Étain.....	10000 à	4898—4921.
Pierre calcaire		
Fer.....	tendre.....	10000 à 4194—4659.
	Glaïse.....	10000 à 4198—4490.
	Bismuth.....	10000 à 3580—4081.
	Craie.....	10000 à 3086—3878.
	Gyps.....	10000 à 2325—2817.
	Bois.....	10000 à 1860—1549.
	Pierre ponce..	10000 à 1627—1268.

ÉMERIL.

Cuivre.....			10000 à	8519—8148.
Or.....			10000 à	8513—8560.
Zinc.....			10000 à	8390—7692.
Argent.....			10000 à	7458—7778—7895.
Cuivre &... Pierre calcaire				
dure.....			10000 à	7304—6963.
Grès.....			10000 à	6552—9517.
Verre.....			10000 à	5862—5506.
Plomb.....			10000 à	5718—6143.
Étain.....			10000 à	5658—6000.

des Minéraux, Partie Exp. 395

Entier
différent

—6274.
—6926.
—5805.
—6482.
—4921.
—4619.
—4490.
—4081.
—3878.
—2817.
—1549.
—1268.

—8148.
—8560.
—7692.
—7895.

—6963.
—9517.
—5506.
—6143.
—6000.

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
Glaise.....	10000 à	5185—5185.
Bismuth.....	10000 à	4949—6060.
Antimoine....	10000 à	4540—5827.
Ocre.....	10000 à	4259—3827.
Craie.....	10000 à	4684—4105.
Gyps.....	10000 à	4368—2947.
Bois.....	10000 à	3552—3146.

CUIVRE.

Or.....	10000 à	9136—9194.
Zinc.....	10000 à	8571—9250. 7610
Argent.....	10000 à	8395—7823.
Marbre com- mun.....	10000 à	7638—8019.
Grès.....	10000 à	7333—8160.
Verre.....	10000 à	6667—6567.
Plomb.....	10000 à	6179—7367.
Étain.....	10000 à	5746—6916.
Pierre calcaire tendre.....	10000 à	5168—5633.
Glaise.....	10000 à	5652—6363.
Bismuth.....	10000 à	5686—5959.
Antimoine....	10000 à	5130—5808.
Ocre.....	10000 à	5000—4697.
Craie.....	10000 à	4068—4368.

R vj

396: Introduction à l'Histoire

O R

	Presentes refroidissement.	Entier refroidissement.
Zinc.....	10000 à 9474	9304.
Argent.....	10000 à 8936	8686.
Marbre blanc:	10000 à 8101	7853.
Marbre com:	10000 à 7342	7435.
Pierre calcaire	10000 à 7383	7516.
dure.....	10000 à 7368	7627.
Gres.....	10000 à 7103	5932.
Verre.....	10000 à 6526	7500.
Plomb.....	10000 à 6324	6051.
Etaine.....	10000 à 6087	5811.
Pierre calcaire	10000 à 5814	5077.
sandre.....	10000 à 5658	7043.
Glaife.....	10000 à 5526	5593.
Bismuth.....	10000 à 5395	6348.
Porcelaine...	10000 à 5349	4462.
Antimoine...	10000 à 4571	4452.
Ocre.....	10000 à 2989	3293.
Craie.....		
Gyps.....		

Or &.....

Z I N C.

Argent.....	10000 à 8904	8990.
Marbre blanc:	10000 à 8305	8424.
Gres.....	10000 à 6949	7333.

Zinc &.....

Zinc

Argent

des Minéraux, Partie Exp. 397

	Pre-	Entier
	mier refroidissement.	refroidissement.
Plomb.....	10000 à	6051—7947.
Etain.....	10000 à	4940—6240.
Pierre calcaire.....		666
tendre.....	10000 à	5536—7719.
Gaïse.....	10000 à	4425—7458.
Bismuth.....	10000 à	4373—7547.
Antimoine.....	10000 à	4232—6608.
Craie.....	10000 à	4135—5862.
Gyps.....	10000 à	2618—4268.
		2298

Zinc &.....

ARGENT.

Marbre blanc.....	10000 à	8681—9200.
Marbre com-		
mun.....	10000 à	7912—9040.
Pierre calcaire		
dure.....	10000 à	7436—8580.
Grès.....	10000 à	7361—7767.
Verre.....	10000 à	7230—7212.
Argent &.....		
Plomb.....	10000 à	7154—9184.
Etain.....	10000 à	6176—6289.
Pierre calcaire		
tendre.....	10000 à	6178—6287.
Gaïse.....	10000 à	6034—6710.
Bismuth.....	10000 à	6308—8877.
Porcelaine.....	10000 à	5556—5242.

398 Introduction à l'histoire

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
Argent &	Antimoine... 10000 à 5692—7653.	
	Ocre... 10000 à 5000—5658.	
	Craie... 10000 à 4310—5000.	
	Gyps... 10000 à 2879—3366.	
	Bois... 10000 à 2353—1864.	
	Pierre ponce... 10000 à 2659—1525.	

MARBRE BLANC.

Marbre blanc & ...	Marbre com-	
	mun.....	10000 à 8992—9405.
	Pierre dure...	10000 à 8594—9130.
	Grès.....	10000 à 8286—8990.
	Plomb.....	10000 à 7604—5555.
	Étain.....	10000 à 7143—6792.
	Pierre calcaire	
	tendre.....	10000 à 6792—7218.
	Glaife.....	10000 à 6400—6286.
	Antimoine...	10000 à 6286—6792.
	Ocre.....	10000 à 5400—5571.
	Gyps.....	10000 à 4920—5116.
Bois.....	10000 à 2200—2857.	

MARBRE COMMUN.

Marbre commun &	Pierre dure... 10000 à 9483—9655.
	Grès... 10000 à 8767—9273.
	Plomb... 10000 à 7671—8590.

des Mines, Partie Exp. 399

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
Marbre commun &..	Étain.....	10000 à 7424—6666.
	Pierre tendre..	10000 à 7327—7959.
	Glaife.....	10000 à 7272—7213.
	Antimoine....	10000 à 6279—8333.
	Ocre.....	10000 à 6136—6393.
	Craie.....	10000 à 5581—6333.
	Bois.....	10000 à 2500—3279.

PIERRE CALCAIRE DURE.

Pierre dure &....	Grès.....	10000 à 9268—9355.
	Vérre.....	10000 à 8710—8352.
	Plomb.....	10000 à 8571—7931.
	Étain.....	10000 à 8095—7931.
	Pierre tendre.	10000 à 8190—8095.
	Glaife.....	10000 à 6190—6897.
	Ocre.....	10000 à 4762—5517.
	Bois.....	10000 à 2195—4516.

GRÈS.

Grès &....	Verre.....	10000 à 9324—7939.
	Plomb.....	10000 à 8561—8950.
	Étain.....	10000 à 7667—7633.
	Pierre tendre..	10000 à 7647—7193.
	Porcelaine....	10000 à 7364—7059.
	Antimoine....	10000 à 7333—6170.

400 Introduction à l'histoire

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
Grès &... ..	Gyps..... 10000 à 4568—5000.	
	Bois..... 10000 à 2368—4828.	

VERRE.

Verre &...	Plomb..... 10000 à 9318—8548.
	Étain..... 10000 à 9107—8679.
	Glaife..... 10000 à 7938—7643.
	Porcelaine... 10000 à 7692—8863.
	Ocre..... 10000 à 6289—6500.
	Craie..... 10000 à 6104—6195.
	Gyps.. 10000 à 4160—6011.
	Bois..... 10000 à 2647—5514.

PLOMB.

Plomb &...	Étain..... 10000 à 8695—8333.
	Pierre tendre. 10000 à 8437—7192.
	Glaife..... 10000 à 7878—8536.
	Bismuth..... 10000 à 8698—8750.
	Antimoine... 10000 à 8241—8201.
	Ocre..... 10000 à 6060—7073.
	Craie..... 10000 à 5714—6111.
	Gyps.... 10000 à 4736—5714.

ÉTAIN.

Étain &...	Glaife..... 10000 à 8823—9524.
	Bismuth..... 10000 à 8988—9400.

Étain

PI

Pie
tendre

Glaife 8

Bismuth

P
Porcelain

des Minéraux, Partie Exp. 401

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement
Craie &...	Antimoine....	10000 à 8710—9156.
	Ocre.....	10000 à 5882—7619.
	Craie.....	10000 à 6364—6842.
	Gyps.....	10000 à 4090—4912.

PIERRE CALCAIRE TENDRE.

Pierre tendre &...	Antimoine....	10000 à 7742—9145.
	Craie.....	10000 à 7288—7312.
	Gyps....	10000 à 4182—5211.

GLAISE.

Glaise &...	Bismuth.....	10000 à 8870—9419.
	Ocre.....	10000 à 8400—8571.
	Craie.....	10000 à 7701—8000.
	Gyps.....	10000 à 5185—8055.
	Bois.....	10000 à 3437—4545.

BISMUTH.

Bismuth &...	Antimoine....	10000 à 9349—9572.
	Ocre.....	10000 à 8846—7380.
	Craie.....	10000 à 8620—9500.

PORCELAINE.

Porcelaine & Gyps.	10000 à 5308—6500.
--------------------	--------------------

402 Introduction à l'Histoire

ANTIMOINE.

	Premier refroidissement.	Entier refroidissement.
Antimoine & Craie.....	10000 à	8431—7391.
Gyps.....	10000 à	5833—5476.

OCRE.

Ocre & Craie.....	10000 à	8654—8889.
Gyps.....	10000 à	6364—9062.
Bois.....	10000 à	4074—5128.

CRAIE.

Craie & gyps.....	10000 à	6667—7920.
-------------------	---------	------------

GYP S.

Gyps & Bois.....	10000 à	8000—5250.
Pierre ponce.....	10000 à	7000—4500.

BOIS.

Bois & pierre ponce.....	10000 à	8750—8182.
--------------------------	---------	------------

.. Quelque attention que j'aie donnée à mes expériences; quelque soin que j'aie pris pour en rendre les rapports plus exacts; j'avoue qu'il y a encore quelques imperfections dans cette Table qui les contient tous; mais ces défauts sont légers

& n
gén
aisé
étan
à l'e
rand
677
l'arg
moi
du p
plus
dans
prov
& d
mém
ceux
pu i
don
je vi
poss
de p
moi
serv
cali
être
d'all
n'ai

des Minéraux, Partie Exp. 403

& n'influent pas beaucoup sur les résultats généraux ; par exemple, on s'apercevra aisément que le rapport du zinc au plomb, étant de 10000 à 6051, celui du zinc à l'étain devrait être moindre de 6000, tandis qu'il se trouve dans la Table de 6777. Il en est de même de celui de l'argent au bismuth, qui devrait être moindre que de 6308 ; & encore de celui du plomb à la glaïse, qui devrait être de plus de 8000, & qui ne se trouve être dans la Table que de 7878, mais cela provient de ce que les boulets de plomb & de bismuth n'ont pas toujours été les mêmes, ils se sont fondus aussi-bien que ceux d'étain & d'antimoine, ce qui n'a pu manquer de produire des variations, dont les plus grandes sont les trois que je viens de remarquer. Il ne m'a pas été possible de faire mieux : les différens boulets de plomb, d'étain, de bismuth & d'antimoine dont je me suis successivement servi, étoient faits, à la vérité, sur le même calibre, mais la matière de chacun pouvoit être un peu différente, selon la quantité d'alliage du plomb & de l'étain ; car je n'ai eu de l'étain pur que pour les deux

404 *Introduction à l'Histoire*

premiers boulets : d'ailleurs il reste assez souvent une petite cavité dans ces boulets fondus, & ces petites causes suffisent pour produire les petites différences qu'on pourra remarquer dans ma Table.

Il en est de même du rapport de l'étain à l'ocre, qui devoit être de plus de 6000, & qui ne se trouve dans la Table que de 5882, parce que l'ocre étant une matière friable qui diminue par le frottement, j'ai été obligé de changer trois ou quatre fois les boulets d'ocre. J'avoue qu'en donnant à ces expériences le double du très-long temps que j'y ai employé, j'aurois pu parvenir à un plus grand degré de précision; mais je me flatte qu'il y en a suffisamment, pour qu'on soit convaincu de la vérité des résultats que l'on peut en tirer. Il n'y a guère que les personnes accoutumées à faire des expériences, qui sachent combien il est difficile de constater un seul fait de la Nature, par tous les moyens que l'art peut nous fournir; il faut joindre la patience au génie, & souvent cela ne suffit pas encore, il faut quelquefois renoncer, malgré soi, au degré de précision que l'on désireroit, parce que

cet
gra
ser
par
l'on
fair
pas
sem
des
&
mat
vari
A
exp
atten
en f
genn
I.
& m
vitro
calcu
les
pou
les
de
con
essa
gén

des Minéraux, Partie Exp. 405

cette précision en exigeroit une toute aussi grande dans toutes les mains dont on se sert, & demanderoit en même temps une parfaite égalité dans toutes les matières que l'on emploie ; aussi tout ce que l'on peut faire en Physique expérimentale, ne peut pas nous donner des résultats rigoureusement exacts, & ne peut aboutir qu'à des approximations plus ou moins grandes ; &, quand l'ordre général de ces approximations ne se dément que par de légères variations, on doit être satisfait.

Au reste, pour tirer de ces nombreuses expériences tout le fruit que l'on doit en attendre, il faut diviser les matières qui en font l'objet, en quatre classes ou genres différens.

1.^o Les métaux ; 2.^o les demi-métaux & minéraux métalliques ; 3.^o les substances vitrées & vitrescibles ; 4.^o les substances calcaires & calcinables. Comparer ensuite les matières de chaque genre entr'elles, pour tâcher de reconnoître la cause ou les causes de l'ordre que suit le progrès de la chaleur dans chacune ; & enfin comparer les genres même entr'eux, pour essayer d'en déduire quelques résultats généraux.

I.
L'ORDRE des six métaux, suivant leur densité, est étain, fer, cuivre, argent, plomb, or; tandis que l'ordre dans lequel ces métaux reçoivent & perdent la chaleur, est étain, plomb, argent, or, cuivre, fer, dans lequel il n'y a que l'étain qui conserve sa place.

Le progrès & la durée de la chaleur dans les métaux ne suit donc pas l'ordre de leur densité, si ce n'est pour l'étain qui, étant le moins dense de tous, est en même temps celui qui perd le plus tôt sa chaleur; mais l'ordre des cinq autres métaux nous démontre que c'est dans le rapport de leur fusibilité que tous reçoivent & perdent la chaleur, car le fer est plus difficile à fondre que le cuivre, le cuivre l'est plus que l'or, l'or plus que l'argent, l'argent plus que le plomb, & le plomb plus que l'étain; on doit donc en conclure, que ce n'est qu'un hasard si la densité & la fusibilité de l'étain se trouvent ici réunies pour le placer au dernier rang.

Cependant ce seroit trop s'avancer que de prétendre qu'on doit tout attribuer à la fusibilité, & rien du tout à la densité;

des Minéraux, Partie Exp. 407

la Nature ne se dépouille jamais d'une de ses propriétés en faveur d'une autre, d'une manière absolue ; c'est-à-dire, de façon que la première n'influe en rien sur la seconde, ainsi la densité peut bien entrer pour quelque chose dans le progrès de la chaleur ; mais au moins nous pouvons prononcer affirmativement que, dans les six métaux, elle n'y fait que très-peu, au lieu que la fusibilité y fait presque le tout.

Cette première vérité n'étoit connue ni des Chymistes ni des Physiciens, on n'autoit pas même imaginé que l'or, qui est plus de deux fois & demie plus dense que le fer, perd néanmoins la chaleur un demi-tiers plus vite. Il en est de même du plomb, de l'argent & du cuivre, qui tous sont plus denses que le fer, & qui, comme l'or, s'échauffent & se refroidissent plus promptement ; car, quoiqu'il ne soit question que du refroidissement dans ce second Mémoire, les expériences du Mémoire qui précède celui-ci, démontrent à n'en pouvoir douter, qu'il en est de l'entrée de la chaleur dans les corps comme de sa sortie, & que ceux qui la reçoivent

408 Introduction à l'Histoire

le plus vite, sont en même temps ceux qui la perdent plus tôt.

Si l'on réfléchit sur les principes réels de la densité & sur la cause de la fusibilité, on sentira que la densité dépend absolument de la quantité de matière que la Nature place dans un espace donné, que plus elle peut y en faire entrer, plus il y a de densité, & que l'or est, à cet égard, la substance qui de toutes contient le plus de matière relativement à son volume. C'est pour cette raison que l'on avoit cru jusqu'ici, qu'il falloit plus de temps pour échauffer ou refroidir l'or que les autres métaux; il est en effet assez naturel de penser que, contenant sous le même volume le double ou le triple de matière, il faudroit le double ou le triple du temps pour la pénétrer de chaleur, & cela seroit vrai si, dans toutes les substances, les parties constituantes étoient de la même figure, & en conséquence toutes arrangées de même. Mais, dans les unes comme dans les plus denses, les molécules de la matière sont probablement de figure assez régulière, pour ne pas laisser entr'elles de très-grands espaces vides; dans d'autres moins denses,

den
laiss
gran
cule
men
mille
plein
expé
mêm
coup
plein
Or
est la
chaleu
autres
que la
moins
la légèr
ration
plein;
bilité d
cohéren
massives
leur sép
total est
la chalen
elle se f
Suppl

des Minéraux, Partie Exp. 409

ceux
s réels
bilité,
abso-
que la
é, que
plus il
égard,
le plus
volume.
voir cru
ps pour
autres
de pen-
volume
ère, il
temps
a seroit
parties
figure,
ées de
e dans
matière
régulé
e très-
moins
enses,

denfes, leurs figures plus irrégulières ;
laissent des vides plus nombreux & plus
grands ; & , dans les plus légères , les molé-
cules étant en petit nombre & probable-
ment de figure très-irrégulière , il se trouve
mille & mille fois plus de vide que de
plein : car on peut démontrer , par d'autres
expériences , que le volume de la substance
même la plus dense , contient encore beau-
coup plus d'espace vide que de matière
pleine.

Or la principale cause de la fusibilité ;
est la facilité que les particules de la
chaleur trouvent à séparer les unes des
autres ces molécules de la matière pleine :
que la somme des vides en soit plus ou
moins grande , ce qui fait la densité ou
la légèreté , cela est indifférent à la sépa-
ration des molécules qui constituent le
plein ; & la plus ou moins grande fusi-
bilité dépend en entier de la force de
cohérence qui tient unies ces parties
massives , & s'oppose plus ou moins à
leur séparation. La dilatation du volume
total est le premier degré de l'action de
la chaleur , & dans les différens métaux ,
elle se fait dans le même ordre que la

Supplément. Tome I.

S

410 *Introduction à l'Histoire*

fusion de la masse qui s'opère par un plus grand degré de chaleur ou de feu. L'étain , qui de tous se fond le plus promptement , est aussi celui qui se dilate le plus vite , & le fer qui est de tous le plus difficile à fondre , est de même celui dont la dilatation est la plus lente.

D'après ces notions générales , qui paroissent claires , précises & fondées sur des expériences que rien ne peut démentir , on seroit porté à croire que la ductilité doit suivre l'ordre de la fusibilité , parce que la plus ou moins grande ductilité semble dépendre de la plus ou moins grande adhésion des parties dans chaque métal ; cependant cet ordre de la ductilité des métaux , paroît avoir autant de rapport à l'ordre de la densité qu'à celui de leur fusibilité. Je dirois volontiers qu'il est en raison composée des deux autres , mais ce n'est que par estime & par une présomption qui n'est peut-être pas assez fondée ; car il n'est pas aussi facile de déterminer au juste les différens degrés de la fusibilité que ceux de la densité ; & comme la ductilité participe des deux , & qu'elle varie suivant les circonstances ,

ne
co
aff
aff
rec
tra
rés
le
elle
nor
la d
plus
ne p
fins
de t
il fau
l'add
& d
quoin
comm
métal
suppo
la den
de la
percu
& de
qu'on

des Minéraux, Partie Exp. 411

nous n'avons pas encore acquis les connoissances nécessaires pour prononcer affirmativement sur ce sujet, qui est d'une assez grande importance pour mériter des recherches particulières. Le même métal traité à froid ou à chaud, donne des résultats tout différens : la malléabilité est le premier indice de la ductilité, mais elle ne nous donne néanmoins qu'une notion assez imparfaite du point auquel la ductilité peut s'étendre. Le plomb le plus souple, le plus malléable des métaux, ne peut se tirer à la filière en fils aussi fins que l'or, ou même que le fer, qui, de tous, est le moins malléable. D'ailleurs il faut aider la ductilité des métaux par l'addition du feu, sans quoi ils s'écrouissent, & deviennent cassans ; le fer même, quoique le plus robuste de tous, s'écrouit comme les autres ; ainsi, la ductilité d'un métal & l'étendue de continuité qu'il peut supporter, dépendent non-seulement de sa densité & de sa fusibilité, mais encore de la manière dont on le traite, de la percussion plus lente ou plus prompte, & de l'addition de chaleur ou de feu qu'on lui donne à propos.

S ij

412 Introduction à l'Histoire

I I.

MAINTENANT si nous comparons les substances qu'on appelle *semi-métaux* & *minéraux métalliques* qui manquent de ductilité, nous verrons que l'ordre de leur densité est, émeril, zinc, antimoine, bismuth, & que celui dans lequel ils reçoivent & perdent la chaleur est, antimoine, bismuth, zinc, émeril, ce qui ne suit en aucune façon l'ordre de leur densité, mais plutôt celui de leur fusibilité; l'émeril qui est un minéral ferrugineux, quoiqu'une fois moins dense que le bismuth, conserve la chaleur une fois plus long-temps; le zinc plus léger que l'antimoine & le bismuth, conserve aussi la chaleur beaucoup plus long-temps; l'antimoine & le bismuth la reçoivent & la gardent à peu-près également. Il en est donc des *semi-métaux* & des *minéraux métalliques* comme des métaux : le rapport dans lequel ils reçoivent & perdent la chaleur, est à peu-près le même que celui de leur fusibilité, & ne tient que très-peu ou point du tout à celui de leur densité.

Mais en joignant ensemble les six métaux

des Minéraux, Partie Exp. 413

& les quatre demi-métaux ou minéraux métalliques que j'ai soumis à l'épreuve, on verra que l'ordre des densités de ces dix substances minérales, est;

Émeril, zinc, antimoine, étain, fer, cuivre, bismuth, argent, plomb, or.

Et que l'ordre dans lequel ces substances s'échauffent & se refroidissent, est;

Antimoine, bismuth, étain, plomb, argent, zinc, or, cuivre, émeril, fer.

Dans lequel il y a deux choses qui ne paroissent pas bien d'accord avec l'ordre de la fusibilité :

1.^o L'antimoine qui devrait s'échauffer & se refroidir plus lentement que le plomb, puisqu'on a vu par les expériences de Newton, citées dans le Mémoire précédent, que l'antimoine demande pour se fondre, dix degrés de la même chaleur, dont il n'en faut que huit pour fondre le plomb; au lieu que, par mes expériences, il se trouve que l'antimoine s'échauffe & se refroidit plus vite que le plomb. Mais on observera que Newton s'est servi de régule d'antimoine, & que je n'ai employé dans mes expériences que de l'antimoine fondu; or le régule d'antimoine ou

414 *Introduction à l'Histoire*

l'antimoine naturel est bien plus difficile à fondre que l'antimoine qui a déjà subi une première fusion ; ainsi , cela ne fait point une exception à la règle. Au reste, j'ignore quel rapport il y auroit entre l'antimoine naturel ou régule d'antimoine & les autres matières que j'ai fait chauffer & refroidir ; mais je présume d'après l'expérience de Newton , qu'il s'échaufferoit & se refroidiroit plus lentement que le plomb.

2.^o L'on prétend que le zinc se fond bien plus aisément que l'argent, par conséquent il devroit se trouver avant l'argent dans l'ordre indiqué par mes expériences, si cet ordre étoit dans tous les cas relatif à celui de la fusibilité ; & j'avoue que ce demi-métal semble , au premier coup d'œil , faire une exception à cette loi que suivent tous les autres, mais il faut observer ; 1.^o que la différence donnée par mes expériences entre le zinc & l'argent est fort petite ; 2.^o que le petit globe d'argent dont je me suis servi , étoit de l'argent le plus pur , sans la moindre partie de cuivre, ni d'autre alliage , & l'argent pur doit se fondre plus aisément , & s'échauffer

pl
3.
été
mi
zin
cu
mo
re
j'an
qui
s'aff
cui
pos
aya
dan
rabi
eu l
mon
que
asse
un
dou
que
dans

(a
écoles

des Minéraux, Partie Exp. 415

plus vite que l'argent mêlé de cuivre :
3.^o quoique le petit globe de zinc m'ait
été donné par un de nos habiles Chy-
mistes (a), ce n'est peut-être pas du
zinc absolument pur & sans mélange de
cuivre, ou de quelqu'autre matière encore
moins fusible. Comme ce soupçon m'étoit
resté, après toutes mes expériences faites,
j'ai remis le globe de zinc à M. Rouelle
qui me l'avoit donné, en le priant de
s'assurer s'il ne contenoit pas du fer ou du
cuivre, ou quelqu'autre matière qui s'op-
poseroit à sa fusibilité. Les épreuves en
ayant été faites, M. Rouelle a trouvé
dans ce zinc une quantité assez considé-
rable de fer, ou safran de mars : j'ai donc
eu la satisfaction de voir que non-seulement
mon soupçon étoit bien fondé, mais encore
que mes expériences ont été faites avec
assez de précision pour faire reconnoître
un mélange dont il n'étoit pas aisé de se
douter : ainsi, le zinc suit aussi exactement
que les autres métaux & demi-métaux
dans le progrès de la chaleur l'ordre de

(a) M. Rouelle, Démonstrateur de Chymie aux
écoles du Jardin du Roi.

416 Introduction à l'Histoire

la fusibilité, & ne fait point une exception à la règle. On peut donc dire, en général, que le progrès de la chaleur dans les métaux, demi-métaux & minéraux métalliques, est en même raison, ou du moins en raison très-voisine de celle de leur fusibilité (b).

I I I.

LES MATIÈRES vitrescibles & vitrées que j'ai mises à l'épreuve, étant rangées suivant l'ordre de leur densité, sont :

Pierre ponce, porcelaine, ocre, glaise, verre, crystal-de-roche & grès; car je dois observer que quoique le crystal ne soit porté dans la table des poids de chaque

(b) *Nota.* Le globe de zinc sur lequel ont été faites toutes les expériences s'étant trouvé mêlé d'une portion de fer, j'ai été obligé de substituer dans la Table générale, aux premiers rapports, de nouveaux rapports que j'ai placés sous les autres, par exemple, le rapport du fer au zinc de 10000 à 7654 n'est pas le vrai rapport, & c'est celui de 10000 à 6804 écrit au-dessous qu'il faut adopter; il en est de même de toutes les autres corrections que j'ai faites d'un neuvième sur chaque nombre, parce que j'ai reconnu que la portion de fer contenue dans ce zinc, avoit diminué au moins d'un neuvième.

des Minéraux, Partie Exp. 417

matière que pour 6 gros 22 grains, il doit être supposé plus pesant d'environ 1 gros, parce qu'il étoit sensiblement trop petit, & c'est par cette raison que je l'ai exclu de la table générale des rapports, ayant rejeté toutes les expériences que j'ai faites avec ce globe trop petit. Néanmoins le résultat général s'accorde assez avec les autres, pour que je puisse le présenter. Voici donc l'ordre dans lequel ces différentes substances se sont refroidies.

Pierre ponce, ocre, porcelaine, glaise, verre, crystal & grès, qui, comme l'on voit, est le même que celui de la densité, car l'ocre ne se trouve ici avant la porcelaine que parce qu'étant une matière friable, il s'est diminué par le frottement qu'il a subi dans les expériences; & d'ailleurs sa densité diffère si peu de la porcelaine, qu'on peut les regarder comme égales.

Ainsi, la loi du progrès de la chaleur dans les matières vitrescibles & vitrées, est relative à l'ordre de leur densité, & n'a que peu ou point de rapport avec leur fusibilité, par la raison qu'il faut, pour fondre toutes ces substances, un degré presque égal du feu le plus violent, & que

418 *Introduction à l'Histoire*

les degrés particuliers de leur différente fusibilité sont si près les uns des autres , qu'on ne peut pas en faire un ordre composé de termes distincts. Ainsi , leur fusibilité presque égale , ne faisant qu'un terme , qui est l'extrême de cet ordre de fusibilité , on ne doit pas être étonné de ce que le progrès de la chaleur suit ici l'ordre de la densité , & que ces différentes substances qui toutes sont également difficiles à fondre , s'échauffent & se refroidissent plus lentement & plus vite , à proportion de la quantité de matière qu'elles contiennent.

On pourra m'objecter que le verre se fond plus aisément que la glaise , la porcelaine , l'ocre & la pierre ponce , qui , néanmoins s'échauffent & se refroidissent en moins de temps que le verre ; mais l'objection tombera lorsqu'on réfléchira qu'il faut , pour fondre le verre , un feu très-violent dont le degré est si éloigné des degrés de chaleur que reçoit le verre dans nos expériences sur le refroidissement , qu'il ne peut influer sur ceux-ci. D'ailleurs , en pulvérisant la glaise , la porcelaine , l'ocre & la pierre ponce , & leur donnant

de
do
il
for
de
reg
leur
cer
cha
por

L
l'or
C
bre
L
& se
pier
blan
que
ny e
un
calci
divi
l'effe

des Minéraux, Partie Exp. 419

des fondans analogues, comme l'on en donne au sable pour le convertir en verre; il est plus que probable qu'on feroit fondre toutes ces matières au même degré de feu, & que par conséquent on doit regarder comme égale ou presque égale leur résistance à la fusion, & c'est par cette raison que la loi du progrès de la chaleur dans ces matières, se trouve proportionnelle à l'ordre de leur densité.

I V.

LES MATIÈRES calcaires rangées suivant l'ordre de leur densité, sont :

Craie, pierre tendre, pierre dure, marbre commun, marbre blanc.

L'ordre dans lequel elles s'échauffent & se refroidissent, est craie, pierre tendre, pierre dure, marbre commun & marbre blanc, qui, comme l'on voit, est le même que celui de leur densité. La fusibilité n'y entre pour rien, parce qu'il faut d'abord un très-grand degré de feu pour les calciner, & que quoique la calcination en divise les parties, on ne doit en regarder l'effet que comme un premier degré de

420 *Introduction à l'Histoire*

fusion, & non pas comme une fusion complète; toute la puissance des meilleurs miroirs ardents suffit à peine pour l'opérer; j'ai fondu & réduit en une espèce de verre quelques-unes de ces matières calcaires au foyer d'un de mes miroirs, & je me suis convaincu que ces matières peuvent, comme toutes les autres, se réduire ultérieurement en verre, sans y employer aucun fondant, & seulement par la force d'un feu bien supérieur à celui de nos fourneaux. Par conséquent le terme commun de leur fusibilité est encore plus éloigné & plus extrême que celui des matières vitrées, & c'est par cette raison qu'elles suivent aussi plus exactement dans le progrès de la chaleur l'ordre de la densité.

Le gyps blanc, qu'on appelle improprement albâtre, est une matière qui se calcine comme tous les autres plâtres, à un degré de feu plus médiocre que celui qui est nécessaire pour la calcination des matières calcaires, aussi ne suit-il pas l'ordre de la densité dans le progrès de la chaleur qu'il reçoit ou qu'il perd; car, quoique beaucoup plus dense que la craie,

&
bla
mo
&
dén
plu
effe
Les
pou
mat
que
& se
A
le p
subst
près
facil
que
font
un d
grès
leur
Au
Roi,
toute
& mi
précé

des Minéraux, Partie Exp. 421

& un peu plus dense que la pierre calcaire blanche, il s'échauffe & se refroidit néanmoins bien plus promptement que l'une & l'autre de ces matières. Ceci nous démontre que la calcination & la fusion plus ou moins facile, produisent le même effet relativement au progrès de la chaleur. Les matières gypseuses ne demandent pas, pour se calciner, autant de feu que les matières calcaires, & c'est par cette raison que, quoique plus denses, elles s'échauffent & se refroidissent plus vite.

Ainsi on peut assurer, en général, que *le progrès de la chaleur dans toutes les substances minérales est toujours à très-peu près en raison de leur plus ou moins grande facilité à se calciner ou à se fondre; mais que quand leur calcination ou leur fusion sont également difficiles, & qu'elles exigent un degré de chaleur extrême, alors le progrès de la chaleur se fait suivant l'ordre de leur densité.*

Au reste, j'ai déposé au Cabinet du Roi, les globes d'or, d'argent & de toutes les autres substances métalliques & minérales qui ont servi aux expériences précédentes, afin de les rendre plus

422 *Introduction à l'Histoire, &c.*

authentiques , en mettant à portée de les vérifier, ceux qui voudroient douter de la vérité de leurs résultats , & de la conséquence générale que je viens d'en tirer.

FIN du Tome premier.

ire, &c.

ortée de
t douter
, & de
je viens

er.