INDEX BRYOLOGICUS

INDEX BRYOLOGICUS

SIVE

ENUMERATIO MUSCORUM HUCUSQUE COGNITORUM

ADJUNCTIS

SYNONYMIA DISTRIBUTIONEQUE GEOGRAPHICA

LOCUPLETISSIMIS

QUEM CONSCRIPSIT

E. G. PARIS

Socius corresp.

(Ex Actis Societatis Linnæanæ Burdigalensis).

PARISIIS

APUD PAUL KLINCKSIECK

52, rue des Écoles, 52

1894-98

MEMORIÆ

W. P. SCHIMPERI

BRYOLOGI PRÆSTANTISSIMI

AMICI MAGISTRIQUE DILECTISSIMI

HOC OPUS DICAT

AUCTOR.

NOMINA AUCTORUM ABBREVIATA

Abb. — Abbott.
 Adans. — Adanson.
 Afzel. — Afzelins.
 A. Br. — Alexandre Braun.
 All. — Allioni.
 Ångstr. — Ångstroem.
 Arn. — Arnell.
 Aubl. — Aublet.
 Aust. — Austin.

Bail. — Bailey.
 Bals. — Balsamo.
 Bell. — Bellard.
 Berggr. — Berggreen.
 Besch. — Bescherelle.
 Bland. — Blandow.
 Bonpl. — Bonpland.
 Bosw. — Boswell.
 Bott. — Bottini.
 Boul. — Boulay.
 Braithw. — Braithwaite.
 Breidl. — Breidler.
 Brid. — Bridel.
 Broth. — Brotherus.
 Br. et Sch. — Bruch et Schimper.
 Buxb. — Buxbaum.

Card. — Cardot.
 C. M. — Carl Müller.
 Curt. — Curtis.

DC. — De Candolle.
 De Not. — De Notaris.
 Desf. — Desfontaines.
 Desv. — Desvaux.
 Dicks. — Dickson.
 Dill. — Dillenius.
 Dy. et W. — Duby et Welwitsch.
 Dz. et Mk. — Dozy et Molkenboër.
 Drumm. — Drummond.
 DR. — Durieu de Maisonneuve.

Ehrh. — Ehrhardt.

Fehlm. — Fehlmann.
 Ferg. — Ferguson.
 Fisch. Ost. — Fischer Oster.
 Fior. Mazz. — Fiorini Mazzini.
 Fr. — Fries.
 Fürnr. — Fürnrohr.

Gaërtn. — Gaërtner.
 Garov. — Garovaglio.
 Geh. — Geheeb.
 Gmel. — Gmelin.
 Grev. — Greville.
 Griff. — Griffith.
 Groenw. — Groenwald.
 Gümb. — Gümbel.
 Grunn. — Grunner.

Hall. — Haller.
 Hpe. — Hampe.
 Hartm. — Hartmann.
 Harv. — Harvey.
 Hedw. — Hedwig.
 Hoffm. — Hoffmann.
 Holmgr. — Holmgreen.
 Hook. — Hooker.
 H. et T. — Hooker et Taylor.
 Hook. f. et Wils., H. f. et W. — Hooker
 filius et Wilson.
 H. et H. — Hoppe et Hornschuch.
 Hornsch. — Hornschuch.
 Humb. — Humboldt.
 Hüb. — Hübener.
 Huds. — Hudson.
 Husn. — Husnot.

Itzigs. — Itzigsohn.

Jaeg. — Jaeger.
 Jam. — James.
 Jur. — Juratzka.

Kindb. — Kindberg.
 Klinggr. — Klinggräff.
 Ky. — Kotschy.
 Kth. — Kunth.
 Kze. — Kunze.

Lac. — Lacoste (van der Sande).
 Lam. — Lamarck.
 Lesq. — Lesquereux.
 Limpr. — Limpricht.
 Lindb. — Lindberg.
 L. et A. — Linberg et Arnell.
 L. — Linnaeus.
 L. f. — Linnaeus filius.
 Ltz. — Lorentz.
 Ludw. — Ludwig.

- Mac. — Macoun.
 Mart. — Martius.
 Maxim. — Maximovicz.
 Menz. — Menzies.
 Mich. — Michaux.
 Mielichh. — Mielichhofer.
 Mitt. — Mitten.
 Mdo. — Molendo.
 Mont. — Montagne.
 Moug. et Nestl. — Mougéot et Nestler.
 Myr. — Myrin.

 Neck. — Necker.
 Nees ab Es. — Nees ab Esenbeck.
 N. et H. — Nees et Homschuch.

 Œd. — Œder.
 Ol. Ham. — Olaüs Hammer.

 P. B. — Palisot de Beauvois.
 Par. — Paris.
 Phil. — Philibert.
 Poir. — Poiret.
 Poll. — Pollich.

 Rab. — Rabenhorst.
 Rehm. — Rehmman.
 Reichdt. — Reichardt.
 Reinw. — Reinwald.
 Ren. — Renaud.
 R. et C. — Renaud et Cardot.
 Rich. — Richard.
 R. Br. — Robert Brown.
 Roehl. — Roehling.

 Sb. — Sauerbeck.
 Saut. — Sauter.
 Schleich. — Schleicher.
 Schrad. — Schrader.
 Schreb. — Schreber.
 Schum. — Schumann.
 Schwaegr. — Schwaegrichen.
 Scop. — Scopoli.

 Sendtn. — Sendtner.
 Sibth. — Sibthorp.
 Sm. — Smith.
 Spreng. — Sprengel.
 Spr. — Spruce.
 Sull. — Sullivant.
 S. et L. — Sullivant et Lesquereux.
 Sw. — Swartz.

 Tayl. — Taylor.
 Thunb. — Thunberg.
 Thw. et Mitt., T. et M. — Thwaites et Mitten.
 Tomm. — Tommasini.
 Turn. — Turner.

 Ung. — Unger.

 Vaill. — Vaillant.
 Vent. — Venturi.
 Vill. — Villars.
 Viv. — Viviani.

 Vahlenb. — Vahlenberg.
 W. Arn. — Walker Arnott.
 Wall. — Wallich.
 Warnst. — Warnstorf.
 Web. — Weber.
 W. et M. — Weber et Mohr.
 Weig. — Weigel.
 Weinm. — Weinmann.
 Welw. — Welwitsch.
 Wib. — Wibel.
 Wigg. — Wigger.
 Willd. — Willdenow.
 W. Sch. — Wilhelm Schimper.
 W. P. Sch. — Wilhelm Philippe Schimper.
 Wils. — Wilson.
 With. — Withering.

 Zenk. et Dietr., Z. et D. — Zenker et Dietrich.
 Zett. — Zetterstedt.

S I G N A

1. — Monoicus.
 2. — Dioicus.
 Syn. — Synoicus.
 ♂ — Flos masculus.
 ♀ — Flos feminaeus.

AD LECTOREM

Ubi editi fuerunt et *Bridelii* liber « BRYOLOGIA UNIVERSALIS », præcipueque ii, quorum alter « BRYOLOGIA EUROPÆA », cujus auctores *Bruchius*, *Gümbelius* ac *W. P. Schimperus*, alter *C. Mülleri* « SYNOPSIS MUSCORUM » inscribitur, herbariorum plurimi muscos investigandi studio sunt conati. Adde quod, fere eodem tempore, peregrinationes omnium spe celeriores, expeditioresque etiam ignotarum remotarumque regionum factæ fuerunt explorationes. Illa vero regionum quarum auctores, quos supra nominavimus, prope erant nescii, peragratio, magnum proventum attulit muscorum. Quorum quidem nescio an magis quam Bryologorum numerus creverit. Namque ut exemplum referamus :

Bryologia universalis constat ex.....	931 species.
Synopsis Muscorum.....	2364 »
<i>Jaegeri</i> et <i>Sauërbeckii</i> Adumbrationes	7442 »

Quamvis certum specierum, quas in hoc opere recensuri sumus, numerum referre non possimus, quia nobis exactam earum rationem diligenter asservare, usquedum hujus libri editionem confeceremus, propositum sit contendere, tamen audebimus illas species decem transire, ac prope duodecim millia explere numerum.

Quæ autem, quin omnes veræ sint, jure incerto habetur. Bryologi enim nimii, ut ipsi confessi sunt, quasdam species, quin imo genera in frustula condiderunt; et ipse *C. Müller*, eruditissimus vir, nunc Bryologorum venerandus antiquior, postea illam tam

prudentem legem nobis dedidicisse videtur, quam ab initio magna cum auctoritate tulerat (1). Quod si Bryologi species ex regionibus collectas, in quibus ista frustula reperta sunt, propius inspicunt, ac cum ex finitimis regionibus speciebus comparant, tum profecto illis ad genera, imo ad species antea constitutas postrema referre licebit. Ceterum, ut eadem illa repetamus quæ alias (2) diximus, ne spes quidem ulla Bryologiam processum efficere, nisi familiæ monographice describantur. Quæ vero plures sunt quam ut fieri non possit, ut Bryologus etiam solertissimus quemdam muscum vel alio nomine inscriptum, vel in varietate reponendum, cujus omnia ignorat quæ ei cum specie nota communia, quibusque ex forma typica pendeat, nonnunquam existimet novum. Hic igitur Bryologus, quum *Bryacearum*, *Hypnacearumque* familias supra mille amplecti species et fere totidem ad *Neckeracearum* familiam referri animadvertit, nonne eo deducitur ut, speciminibus collectis et permultis locis ac quam disjunctissimis consultis et exploratis, species esse jure eo nomine vocatas, et eas quæ falso id nomen sibi asseruerint, aut eximi posse, aut ex prioribus pendere ostendat? (3)

Primus vero *W. P. Schimperus* noster, ille clarissimus vir quo magistro usi sumus, quum in dies cresceret muscorum numerus, brevi necessitatem instare genera dilatandi, id est sub generis nomine sectiones amplectendi, quædam propria perspectissimaque præbentes, etiamque nova novarum specierum genera instituendo, intellexit. Quippè qui, in europæis *Acrocarpis*, non *Dicranellam* a *Dicrano*, *Bartramidulamque* a *Bartramia* genere modo dignosceret, verum etiam *Ångströmia*, *Campylosteleum*, etc., genera crearet. In *Pleurocarpis* quoque præcipueque in speciebus ad *Hypnum* genus pertinentibus, quarum copia Bryologi quasi premebantur, eas sectiones, de quibus nulla fere jam est controversa, *Amblystegium*, *Brachythecium*, *Hylocomium*, *Plagiothecium*, etc. constituit.

Attamen hæc nova Muscorum partitio, quum statim in Suecia, Norvegia, Britanniaque ac in Gallia benigne reciperetur, germa-

(1) « Quid est, cur auctores tam multi in specimina pessima species novas suas condant? » *C. M. Syn. II*, p. 508.

(2) Bull. de la Soc. bot. de Fr., 1892, p. 53; Revue bryol. 1892, p. 41.

(3) Cf. Aclouque in Revue scientifique 1894, II, p. 338 : *La notion de l'espèce chez les Muscinées*.

nicis Bryologis non placuit. Simul enim, eodemque tempore quo « BRYOLOGIÆ EUROPEÆ » volumen VI, edebatur « SYNOPSIS MUSCORUM » volumen II, quo in libro tantum aberat ut nova Muscorum genera poneret, ut contra multa a *Bridelio* antea constituta recideret, ac fere totam *Pleurocarporum* classem in *Neckera*, *Pilotrichum*, *Hookeria* et *Hypnum* generibus includeret; quam partitionem collegæ discipulique ejus, ut fieri solet, secuti sunt.

Ipsi autem, quum brevi specierum crescenti numero essent superati, quemadmodum inter generale specialeque interponerent sectionis nomen excogitaverunt (*Hampæus*, ni fallimur, primus hanc nomenclaturam aperuit). Sic scripserunt : *Lepidopilum* (*Eriopus*) *flexicaule* Hpe., vel (*Chryso*) *Hypnum loriforme* Hpe. Deinde cum sectionis ipsæ opplerentur, ut scriberent sunt perducti : *Hypnum* (*Mallacodium*, *Cuspidaria*) *extenuatum* C. M. Hac quidem nominum dispositione haud dubium est quin cuique speciei suam sectionem assignent; quid autem ei sit cum binaria nomenclatura, a quovis herbario petimus!

Quin etiam Bryologus qui, in generibus jam plurimis speciebus redundantibus, species antea in aliis probatissimisque generibus sepositas inscribit, quæque inter se fere omnino dissimillimæ sunt, ac quaedam tantum communia habent, ea necessitate constringitur, ne bis eadem appellatione utatur, ut speciale nomen mutet; quod in hanc opinionem adducit ut, dum novum pro nomine principi reponit, non aliqua cupiditate huic suum addendi fortasse caruerit (1)!

Quod ad prioritatis jus attinet, nos quidem omni ope et opera sumus adnisi, ut Cæsari quod Cæsaris est, id est, suum cuique redderemus. Non tamen ut opinionem nimis obsoletam *Lindbergii* teneamus. Quis enim non molestissime tulerit, quum modestos tum eruditos viros, qui species nunc in libris alieno nomine inscriptas ac signatas primi reperissent descripsissentque, eo honore omnino esse dejectos? Nos tamen existimavimus nullo modo fieri posse ut illa respuamus omniaque nomina mutemus; quæ enim si miscerentur, Bryologos ad implicatissimam confusionem redigerent.

(1) Cf. Lorentz in Bot. Zeit. 1866, p. 189 : *Ueber Synonymenunfug und Autoritaetspiraterie*.

Quamvis autem plurimam curam operamque maximam ad hunc INDICEM conficiendum adhibuerimus, quædam præterita profecto animadvertentur, quædam etiam errata reprehendentur. Ista impense petimus, ut nobis Bryologi patefaciant (quod quidem permagni scientiæ interest) ut in Appendice illa restituamus vel hac corrigamus, ut hoc opus quam minime sit imperfectum.

Quid jam denique restat, nisi ut (quod certe nobis miram quamdam suavitatem ac delectationem offert) gratias illis viris agamus, qui nobis libentissime operam suam attulerunt. Ex his primum *Em. Bescherelle* (*Parisiis*) numerari decet, qui non tantum consiliis acutissimis censuraque amicissima juvavit, sed etiam tam comiter nobiscum egit, ut librorum, quorum penuria præcipue in provinciis apparet, commemorationem præberet, speciminibusque sive criticis aut perraris donaret; *Brotherus* (*Helsingfors, Fennia*) quoque, *J. Cardot* (*Stenay, Gallia*), *de Poli* (*Parisiis*), *Dixon* (*Northampton, Anglia*), *Husnot* (*Cahan, Gallia*) nos et suis consiliis et suis operibus, librisque vel speciminibus adjuverunt. Cuique de nobis optime meritis gratiam referimus maximam.

AUCTOR.

DINARD (Ille-et-Vilaine, France), 7^{bris} 1894.

N. E. localities indicated in red

INDEX BRYOLOGICUS

Acamptodous *Duby, Choix de M. ex.* 1880, p. 9 (sect. v. subgen. LEPIDOPILI).

ACANTHOCLADIUM *Mitt. Austral. M.* p. 37 (= *Trismegistia*, spec. omn HYPNA ejusd. nom.).

ACANTHODIUM *Mitt. Sam. M.* p. 182.

deflexifolium *Mitt.* — *Sematophyllum*.

papillatum *Mitt.* — *Trichosteleum*.

rigidum *Mitt.* — *Sematophyllum complanatum*.

ACAULON *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 99; *Syn. I*, p. 21, et *II*, p. 519.

apiculatum *H. f. et W.* — *Sphærangium*.

apiculatum *H. f. et W.* var. *turgidum* *Mitt.* — *Sph. apiculatum* var. *turgidum*.

brisbanicum *C. M.* — *Sphærangium*.

capense *C. M.* — *Sphærangium*.

carniolicum *C. M.* — *Phascum*.

Floërkeanum *C. M.* — *Microbryum*.

Floërkeanum var. β *C. M.* — *Microbryum Floërkeanum* var. *badium*.

integrifolium *C. M.* — *Sphærangium*.

Lorentzi *C. M.* — *Sphærangium*.

mediterraneum *Limpr.* — *Sphærangium*.

minus *Jaeg.* — *Sphærangium muticum* var. *minus*.

muticum *C. M.* } *Sphærangium muticum* p.p.

 } *Sphærangium capense* p.p.

nanum *C. M.* — *Sphærangium*.

piligerum *Limpr.* — *Sphærangium muticum*, var. *cuspidatum*.

rufescens *Jaeg.* — *Sphærangium*.

triquetrum *C. M.* — *Sphærangium*.

triquetrum var. *Sull. et Lesq.* — *Sphærangium rufescens*.

Schimperianum *Sull.* — *Sphærangium*.

Sullivani *C. M.* — *Sphærangium*.

Uleanum C. M. — Sphærangium.
vesiculosum C. M. — Sphærangium.

Achrolepis Lindb. *Contr. ud fl. crypt. As. bor. or.* 1872, p. 276 (sect. MYURELLÆ, fors. gen. propr.).

ACIDODONTIUM Schwaegr *Suppl.* 11.

exaltatum Jaeg. — Bryum.
floresianum C. M. — Bryum.
Kunthii { Hsch. — Brachymenium systylium.
 { Schwaegr. — Bryum megalocarpum.
ramicola Jaeg. — Bryum.
rhamphostegium Jaeg. — Bryum.
seminerve H. f. et W. — Bryum.
Sprucei Jaeg. — Bryum.
subrotundum H. f. et W. — Bryum Taylori.

ACIRHYNCHUM Hpe. *in sched.*

cupressinum Hpe. — Rhaphidostegium sphaerotheca.

Acisphagnum C. M. *in Linn.* 1874, p. 548 (nom.) *et in Fl.* 1887, p. 404 (*Sph. cuspidata*).

Acocosphagnum C. M. *in Fl.* 1887, p. 405 (*Sph. sericea*).

Acoleos C. M. *in Linn.* 1874, p. 509 (sect. BARTRAMIÆ).

ACOSTA C. M. *in Linn.* 1848, p. 91.

cuspidata C. M. — Leucomium cuspidatifolium.
Meyeniana C. M. — Ectropothecium.
Swartzii C. M. — Ectropothecium subdenticulatum.

ACROCLADIUM Mitt. *M. austr. am.* pp. 22 et 531 (4 sp.).

Auberti (Schwaegr.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 175.

Hypnum Auberti Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 200; C. M. *Syn. II*, p. 262.

H. Stereodon Auberti Brid. *Bryol. univ. II*, p. 50.

Leskea nitens Brid. *Sp. M. II*, p. 556.

2. . — Afr.: Comor. magn., ins. Borbon., Franciæ.

auriculatum Mitt., p.p. { *Coelidium*.
 { *Coelidium chlamydophyllum*.

cuspidatum Lindb. — Hypnum.

mucronatum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 509.

Hypnum mucronatum C. M. *op. et l. cc.*

2. . — Afr.: C. B. Sp.

Phyllogonium Jaeg. — A. politum.

politum (Hook. f. et Wils.) Mitt. *M. austr. am.* p. 531.

A. *Phyllogonium* Jaeg. *Ad. II*, p. 509.

Hypnum Phyllogonium C. M. *Syn. II*, p. 262 (*fid. Mitt. l. c.*).

H. politum H. f. et W. *in Lond. Journ. of Bot.* 1844, p. 353 (Mitt.), p. 553 (C. M.) *et Fl. Antart. II*, p. 416, t. 154, f. 2; C. M. *op. cit.* p. 263.

Phyllogonium callichroum Mont. *in Ann. Sc. nat.* 1845, IV, p. 87.

2. Lignic, rupic., terr. hum. — Afr.: Ins. Kerguelen, C. B. Sp., Am. merid.: And. Nov.-Granat. et Quitens., Chile, Fuegia, ins. Eremitæ. Pac.: Austr., Nov.-Zel, Tasman.

trichocladium Bosw. *in Lond. Journ. of Bot.*, 1892, p. 99.

Ster. — Pac.: Austral.

ACROCRYPHÆA (1), Bryol. eur. V, Mon. Cryphaeae (9 sp.).

brachyodus Broth. in litt.

A. brevidens Broth. in Mosen M. Brasil n. 89.

— *Amer. mer.*: Minas Geraës.

caripensis Hpe. — *A. squarrosula*.

concavifolia (Griff.) Bryol. jav. II, p. 106.

A. javanica Bryol. eur. l. c.

Cryphaea concavifolia Mitt. M. Ind. or. p. 125.

Orthotrichum concavifolium Griff. Not. p. 400 et Ic. Pl. asiat II, t. 76, f. 3.

— *As.*: Nepal., Ceylan, Java, Celebes.

corymbosa β Hpe. — *A. squarrosula*.

corymbosula Par. et W. P. Sch. Mon. Cryph. ined.

— *Am. sept.*: Mexic.

ferruginea (Lindb.) Par. et W. P. Sch. l. c.

A. Gardneri Jaeg. Ad. II, p. 94.

Cryphaea ferruginea Lindb. mem. ab Angstr. in Oefv.... 1876, p. 31.

Cr. Gardneri Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859 et M. austr. am., p. 415.

Grimmia julacea Hsch. Fl. bras. p. 7, t. I, f. I, p.p.

— *Am. sept.*: Cuba. *Am. merid.*: And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.

Gardneri Jaeg. — *A. ferruginea*.

javanica Bryol. eur. — *A. concavifolia*.

julacea (Hsch.) W. P. Sch. mss.

Cryphaea julacea Mitt. M. austr. am. p. 415.

Cr. maynensis Tayl. in Spr. M. Amaz. n. 1279.

Grimmia julacea Hsch. l. c. p.p.

Pilotrichum julaceum C. M. Syn. II, p. 173 p.p.

— *Am. merid.*: Columb., And. Peruv., Brasil austr. or., Paraguay.

Exs.: Balansa Pl. parag. n. 1253.

« *var. costa-ricensis* Ren. et Card. mss.

— *Am. sept.*: Costa-Rica.

« *var. subsquarrosa* Broth. mss.

— *Am. merid.*: Brasil austr. or.

mexicana W. P. Sch. Mon. Cryph. ined.

Cryphaea Leiboldi C. M. in Linn. 1844, p. 680.

Pilotrichum julaceum C. M. Syn. II, p. 173 p.p.

— *Am. sept.*: Mexic.

paraguensis Besch. in Rev. bryol. 1885, et in Journ. de bot. 1891.

— *Am. merid.*: Paraguay.

Exs.: Balansa Pl. parag. n. 3628.

rubricaulis (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 95.

Cryphaea rubricaulis Mitt. M. austr. am. p. 415.

— *Am. merid.*: And. Quitens., Brasil. centr.

squarrosula W. P. Sch. Mon. Cryph. ined.

A. caripensis Hpe. Enum. M. Brasil., p. 38.

A. corymbosa β Hpe. in Krause M. Ecuador.

(1) Spec. omn. monoicae et, ut videtur, corticolae.

- Cryphaea caripensis* C. M. in *Linn.* 1847, p. 210.
Cr. filiformis C. M. in *op. et l. cc.*
Moritzia caripensis Hpe. *op. cit.* p. 82.
Pilotrichum filiforme β *squarrosulum* C. M. *Syn. II*, p. 169.
 — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : Venezuela.

ACROPORIUM Mitt. *M. austr. am.* p. 477 (sect. SEMATOPHYLLI) et *Sam.*
M. p. 182 (gen. propr.)
brevicuspdatum Mitt. — *Sematophyllum*.
lamprophyllum Mitt. — *Sematophyllum Mittenii*.
macrorhynchum Mitt. — *Sematophyllum*.

ACROSCHISMA Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of Bot.* 1844, pp. 536
 et 538 (2 sp.).
andensis Spr. — A. *Wilsoni*.

densifolia Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 289.
Andreaea densifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 7.
 — *As.* : Sikkim.

Wilsoni Hook. f. et Wils. *l. c.* et *Fl. Antaret. II*, p. 379, t. 151, f. 3.
A. andensis Spr. in *Proc. of the Linn. Soc.*
Andreaea Wilsoni C. M. *Syn. I*, p. 11 et *II*, p. 517.
 1. *Rupic.* ? — *Am. merid.* : And. Peruv., Fuegia, ins. *Eremit. Pac.* :
Ins. Auckland, Campbell.

Acrosphagnum C. M. in *Fl.* 1887, p. 405 (*Sph. mucronata*).

ACTINODONTIUM Schwägr. *Suppl. II*, II, I, p. 75, t. 174 (4 sp.).
ascendens Schwaegr. *op. et l. cc.*; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 756; C. M.
Syn. II, p. 74; *Bryol. jav. II*, p. 36, p. 159.
 1 ou *Syn.* — *As.* : M. Java.

hirsutum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 137.
 1. *Arbor.* — *Af.* : *Ins. Borbon.*
 « *var. ramosum* Besch. *op. et l. c.*
Ut et ubi typ.

rhapidostegum (C. M.) *Bryol. jav. II*, p. 37, t. 160.
Hookeria raphidostegum C. M. *Syn. II*, p. 677.
 1. (C. M.) 2 (*Bryol. jav.*). — *As.* : Java.

Sprucei (Mitt.) *Jaeg. Ad. II*, p. 229.
Lepidopilum Sprucei Mitt. *M. austr. am.* p. 370.
 2. *Silvic.* — *Am. merid.* : And. *Quitens.*

Acuminella C. M. *Syn. I*, p. 752 (sect. SCHLOTHEIMIÆ).

ADELOTHECIUM Mitt. *M. austr. am.* p. 391.
bogotensis Mitt. — *Hookeria*.

Adelphodon Lindb. *Contrib. ad Fl. crypt. As. bor. or.* p. 245 (sect.
 LESQUEREUXIÆ).

AEROBRYUM Dz et Mk. in *Nederl. Kruidk. Arch. II*, p. 279 (21 sp.).
Bauerae C. M. *mss.*
 — *Pac.* : Austral.
 « *var. gracilis* C. M. in *Geheeb Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.*
p. 11.
 — *Pac.* : *Nov. Guin. sept.*

capense (W. P. Sch.) C. M. in Linn. 1876, p. 262.

Meteorium capense W. P. Sch. mss.

Neckera capensis C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 165.

2? — Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 322.

« var. rupestris C. M. in Rehm. l. c. n. 322 b.

Ut et ubi typ.

capillicaule Ren. et Card. mss.

— Afr. : Madagascar.

Conferva C. M. in Linn. 1878-79, p. 492.

— Am. merid. : Venezuela.

crispicuspe Besch. in Journ. de bot. 1891.

— Afr. : Ins. Seychelles.

cymatocheilos (C. M.) Par.

Eriocladium cymatocheilos C. M. in Fl. 1890, p. 493.

Ster. Silvic. — Afr. : Kilima N'Djaro.

detrusum C. M. in Linn. 1876, p. 262 (nom.).

— Pac. : Nov. Caledon.

hokinense Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 74.

2. Fr. ign. Silvic. — As. : Yunnan.

integrifolium Besch. op. et l. cc.

2. Fr. ign. Silvic. — As. : Yunnan.

javanicum (Bryol. jav.) C. M. op. et l. cc.

Meteorium javanicum Bryol. jav. II, p. 87, t. 202.

2. — As. : Java.

lanosulum C. M. in Linn. 1876, p. 260.

2. Filicie. — Afr. : Ins. Anjouan.

lanosum Mitt. Sam. M. p. 170.

Meteorium lanosum Mitt. M. Ind. or. p. 90.

Meteorium longissimum Dz. et Mk. M. frond. ined. Arch. ind p. 159, t. 48? (fid. Mitt.).

Meteorium longissimum β terme Bryol. jav. II, p. 87, t. 202 (fid. Mitt.).

Meteorium vitianum Sull. ? (fid. Mitt.).

2. — As. : Hong-Kong, Sikkim, Ceylan, Sumatra.

longipendulum (C. M.) Par.

Eriocladium longipendulum C. M. in Dusen M. Camer. n. 35.

— Afr. : M. Cameroon.

longissimum (Dz. et Mk.) C. M. op. et l. cc.

Meteorium longissimum Dz. et Mk. op. et l. cc. (fid. Mitt.); Bryol. jav. l. c.

Neckera Dozyana C. M. Syn. II, pp. 141 et 672.

Neckera longissima Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1884, p. 313.

2. Arbor. — As. : Ins. Molucc., Borneo, Sumbawa, Java, Banca, Sumatra.

nanopteris (C. M.) Par.

Eriocladium nanopteris C. M. in Dusen M. Camer. n. 268.

— Afr. : M. Cameroon.

plumarium (*Hpe*) *Par.*

Eriocladium plumarium *Hpe. Enum. M. Brasil, p. 44.*

Ster. — *Am. merid.* : Brasil austr. or.

postratum *C. M. op. et l. cc.*

Neckera postratula *C. M. in Linn. 1874, p. 560.*

Ster. — *As.* : Ins. Philippin.

pseudo-capense *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 127.*

Meteorium capense *Angstr.*

2. Fr. ign. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciæ, Madagascar sept., Mayotte, Choa.

speciosum *Dz. et Mk. in Nederl. Kruidk. Arch. II, p. 79 et Bryol. jav. II, p. 83, t. 198.*

Meteorium speciosum *Mitt. M. Ind. or. p. 87.*

2. — *As.* : Khasia, Ceylan, Amboine.

striatum (*Mitt.*) *Par.*

Meteorium striatum *Mitt. Fl. vit. p. 395.*

Ster. Terr. — *Pac.* : Nov. Hebrid., Ins. austral.

subpiligerum (*Hpe.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 127.*

Neckera subpiligera *Hpe. in Linn. 1864, p. 217.*

Papillaria subpiligera *Besch. op. cit. p. 124.*

Fr. ign. — *Afr.* : Madagascar.

trachypterum (*C. M.*) *Par.*

Eriocladium trachypterum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 450.*

— *Afr.* : M. Cameroon.

vitianum (*Sull.*) *C. M. in Linn. 1876, p. 262.*

Meteorium vitianum *Sull. in. Am. Expl. Exp. 1859, p. 22, t. 21.*

— *Pac.* : Ins. Viti.

Wallichii (*D. C.*) *C. M. op. et l. cc.*

Hypnum Wallichii *Brid. Bryol. univ. II, p. 416.*

Meteorium Wallichii *Bryol. jav. II, p. 93, Mitt. M. Ind. or. p. 89.*

Neckera Wallichii *D. C. in hb. Brid.; C. M. Syn. II, p. 141.*

Ster. ? — *As.* : Japon., Nepal., Ind. temper. et tropic., Sumatra, Java.

AFZELIA *Ehrh. pl. Crypt. exs.*

cirrata *Ehrh.* — *Dicranoweisia.*

crispa *Ehrh.* — *Weisia viridula.*

heteromalla *Ehrh.* — *Leptotrichum.*

lanceolata *Ehrh.* — *Pottia.*

inclinata *Ehrh.* — *Distichium.*

pulvinata *Ehrh.* — *Grimmia.*

pusilla *Ehrh.* — *Seligeria.*

Aloidella *C. M. Syn. I, p. 202 (sect. POLYTRICHI); W. P. Sch. Syn. II ed. p. 188 (sect. BARBULAE).*

Aloina *C. M. op. cit. p. 596 (sect. BARBULAE).*

Aloma *C. M. in Dusen M. Camer. (sect. FISSIDENTIS).*

ALSIA *Sull. in Proced. Am. Acad. III, p. 185 et in M of U. St. S. Pac. Exp. p. 25, t. 25 (4 sp.).*

abietina (*Hook.*) *Sull. Ic. M. p. 115, t. 72 b.*; *Lesq. et Jam. Man. p. 279.*

A. Macounii *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club XVII, p. 275.*

Leptodon circinnatus *Sull. in Pac. R. Rep. IV, p. 189, t. I (mala).*

Neckera abietina *Hook. M. ex. t. 27; C. M. Syn. II, p. 142.*

Pilotrichum abietinum *Brid. Bryol. univ. II, p. 258.*

2. Arbor. — *Am. sept.*: Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Calif.

Eas.: *Mac. Canad. M. n. 462.*

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 400.

californica (*Hook. et Arn.*) *Sull. in Proc. Am. Acad. et M. of U. St. ll. cc.*; *Lesq. et Jam. Man., p. 280.*

Neckera californica *H. et Arn. in Beechey's Voy. 1841, p. 162; C. M. Syn. II, p. 117.*

2. Arbor. — *Am. sept.*: Vancouver, Washington, Calif.

Eas.: *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 398.*

« *var. flagellifera* *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 97.*

Ut typ. — *Am. sept.*: Calif.

circinnata *Sull. Ic. M. t. 72; Lesq. in Trans. of the Am. phil. Soc. XIII (nom.) (1).*

2. Arbor. — *Am. sept.*: Calif.

longipes *Sull. Ic. M. Suppl., p. 85, t. 63; Lesq. et Jam. Man. p. 280.*

2. Rupic. — *Am. sept.*: Calif.

Eas.: *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 399.*

Macounii *Kindb.* — *A. abietina.*

AMBLYODON *P. B. Prodr. p. 41, pp. (1 sp.). (2)*

dealbatus *P. B. l. c.; Bryol. eur. IV, t. 307; C. M. Syn. I, p. 127; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 496.*

Bryum dealbatum *Dicks. Fasc. II, pl. crypt. p. 8, t. 5; Drumm. M. bor. am. I ed., n. 249.*

Meesea dealbata *Hedw. Sp. M. p. 174, t. 41; Brid. Bryol. univ. II, p. 63.*

M. Macounii *Aust. in Bull. Torr. bot. Club, V, p. 22.*

1. et *Syn. Locis uligin., torfac., ad terr. et rup. humid.* — *Eur.*: *Reg. alpin. per zon. interm. et sept., rar. merid. As.*: *Caucas. Am. sept.*: *Sin. Hudson. Anticosti, Nov. Scotia, New Brunswick, Gaspes., M. Rupestr., Wisconsin, Colorado.*

Eas.: *Mac. Canad. M. n. 155.*

Rab. Bryoth. eur. n. 438.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 243.

minus *P. B.* — *Meesea uliginosa v. minor.*

stygium *P. B.* — *Cinclidium.*

uliginosus *P. B.* — *Meesea.*

Amblyophyllum *C. M. Syn. I, p. 286 (sect. BRYI).*

AMBLYSTEGIUM *Bryol. Eur. VI (57 sp.).*

adnatum (*Hedw.*) *Jaeg. Ad. II, p. 547.*

Hypnum adnatum. *Hedw. Sp. M. 248, t. 64; C. M. Syn. II, p. 339; Sull. Ic. M. p. 197, t. 121; Lesq. et Jam. Man. p. 375.*

H. Stereodon adnatus. *Brid. Bryol. univ. II, p. 191.*

Stereodon adnatus. *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 180.*

(1) In *Lesq. et Jam. Man.* non indicata. An eadem ac praecedens?

(2) *Conf. Lindb. in Oefv..... 1864, p. 599.*

1. Cortic. et rupic. — *As.* : Japon, *Am. sept.* : New Brunswick, Ontario, M. Rupestr., Montana, reg. sept. centr. et or.
Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 112, 115 (*Hypnum*).
 Mac. Canad. M. n. 322 p.p. 323 (Var.) (*Hypnum*).
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 521 (*Hypnum*).

« *var. gracile* (Sull.) Par.

Hypnum adnatum var. gracile Sull. M. bor. am. II ed., p. 86.

Ad rup. arenac. — *Am. sept.* : Ohio.

Exs. : Sull. et Lesq. l. c. n. 522 (*Hypnum*).

aduncum Lindb. — *Hypnum uncinatum*.

aduncum var. Blandowii Sanio. — *Hypnum aduncum*.

aduncum var. Hampei Sanio. — *Hypnum aduncum var. Hampei*.

aduncum var. legitimum Sanio. — *Hypnum Sendtneri*.

aduncum var. Schimperi Sanio. — *Hypnum aduncum var. Schimperi*.

afro, serpens C. M. in Dusen M. Camer. n. 867.

— *Afr.* : M. Cameroon.

alaskanum Lindb et Arn. — *Hypnum*.

ambiguum de Not. — *Hypnum*.

andinum Mitt. — *Hypnum*.

Anzianum de Not. — *A. Sprucei var. Anzianum*.

argillicola Lindb in Broth. Enum. M. Cauc. p. 102.

1. In argill. humid. — *As.* : Caucas. centr.

austro-fluviatile (C. M.) Par.

Hypnum austro-fluviatile C. M. Bryol. austr. Georg. p. 45.

Ster. Aquat. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

badium Lindb. — *Hypnum*.

badium x latifolium Arn. — *Hypnum badium x Wilsoni*.

brunneo-fuscum Lindb. et Arn. — *Hypnum*.

campicolum (C. M.) Par.

Hypnum campicolum C. M. in Linn. 1878-1879, p. 444.

1. Muric et terr. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

capillaceum Mitt. — *Hypnum*.

capillatum Mitt. — *Pseudo-Leskea*.

Cashii R. du Buysson Ess. II ed. p. 8.

1. Arenic — *Eur.* : Anglia (Lancashire).

chilense Ltz. in Bot. Leit. 1886, p. 188.

Ster. ? — *Am. merid.* : Valdivia.

chloropelma C. M. in. Hildebr. M. Madag. n. 2076.

— *Afr.* : Madagascar or.

chrysophyllum de Not. — *Hypnum*.

commutatum de Not. { *Hypnum*.
 Hypnum falcatum.

var. elegantulum de Not. — *Hypnum commutatum var. elegantulum*.

compactum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 554.

A. serratum Bryol. eur. VI (mon. p. 11) et Sull. M. of U. St. p. 782.

Hypnum compactum C. M. Syn. II, p. 408; Sull. Ic. M. p. 201, t. 123;
 Lesq. et Jam. Man, p. 375.

H. serpens var. compactum Hook in Drumm. M. bor. am. I ed., p. 188.

Stereodon compactus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 43.

1. Lignic, rupic. et terr. — *Am. sept.* : Terr. Nov., New Brunswick, Ontario, lac Huron, M. Rupestr., Washington, Montana, Nevada, Utah.

complanatulum Lindb. — *Hypnum aduncum* var. *complanatulum*.
compressum Mitt. — *Pseudo-Leskea*.

confervoides (*Brid.*) *Bryol. eur. VI* (mon. p. 6), t. 562; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 707; *R. du Buysson. Ess. II ed.*, p. 9.

Hypnum Conferva Schwaegr. Suppl. II, I, p. 158, t. 142.

H. confervoides *Brid. Sp. M. II*, p. 153; *C. M. Syn. II*, p. 142; *Mac. Canad. M.* p. 317.

H. Stereodon confervoides *Brid. Bryol. univ. II*, p. 583.

H. jungermannioides *Brid. op. cit.* p. 549.

Leskea confervoides *Spr. in Lond. Journ. of bot.* 1845, p. 182.

1. Ad. saxa præcip. calcar. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in subalp. passim. *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : New Brunswick, Ontario, M. Rupestr. Ohio, *Nov. Angl.*

Exs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 639, 774, 1295.

convolutifolium (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 549.

Hypnum convolutifolium *Hpe in Linn.* 1859-60, p. 641.

1. Lignic. — *Pac.* : Austral. or.

cordifolium de Not. — *Hypnum*.

curvicaule Lindb. — *Hypnum*.

curvipes *Bryol. eur. VI* (mon. p. 14), t. 569; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 717.

Hypnum riparium var. *curvipes* *R. du B. l. c.* p. 20.

1. In stagn. exsicc. — *Eur.* : Fennia? Palatin. *As.* : Jenissei, Caucas. (Tiflis). *Am. sept.* : Ottawa, Ontario.

decussatum Mitt. — *Hypnum*.

densum (*Milde*). *Lindb. M. Scand.* p. 32.

A. serpens var. *cryptarum* *Arnold in Rab. Bryoth. eur.* n. 841.

Brachythecium densum *Jur. l. c.* n. 995.

Hypnum densum *Milde Bryol. siles.* p. 360.

Rhynchostegium tenellum var. *brevifolium* *Lindb. in Rab. l. c.* n. 750.

- Ad rup. calcar. — *Eur.* : Suecia, Palatin. super., Francon., Austria inf., Catalaun.

dilatatum Lindb. — *Hypnum*.

dissitifolium *Kindb. in. Mac. Cat.* p. 220.

- 2? ♂ ign. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : Niagara, Owen Sound.

distantifolium *Kindb. in op. cit.* p. 222.

Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Terra Nov.

elodes Lindb. — *Hypnum*.

enerve *Bryol. eur. VI* (mon. p. 8) t. 563; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 709.

Stereodon enervis *Lindb. M. Scand.* p. 38.

1. Rupic. — *Eur.* : Norvegia (Dovre).

eugyrium Lindb. — *Hypnum*.

exannulatum de Not. — *Hypnum*.

falcatum Lindb. — *Hypnum*.

Falconeri *Mitt. in herb. of the late East Ind. Comp.* n. 656

— *As.* : Himalaya sept. occ.

fallaciosum Lindb. — *Hypnum polygamum*.
fallax Lindb. — *A. irriguum* var. *spinifolium*.

fenestratum Kindb in op. cit. p. 217.

A. tennifolium Kindb. in Ott. Nat. IV, p. 65.

Ster. Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Ontario.

filicinum de Not. — *Hypnum*.

var. *curvicaule* Mdo — *Hypnum curvicaule*.

var. *fallax* Lindb. — *A. irriguum* var. *spinifolium*.

var. *gracillimum* Sael. — *Hypnum filicinum* var. *gracillimum*.

finmarchicum (Ltz.) R. du Buysson op. cit. p. 18.

Hypnum finmarchicum Ltz in Hartm. Skand. Fl. X ed. pp. 20-21.

1. — *Eur.* : Finmarck.

fluitans Mitt. (1876). — *Hypnum austro-fluitans*.

fluitans de Not. — *Hypnum*.

var. *amphibium* Sanio. — *Hypnum fluitans* var. *amphibium*.

var. *aurantiacum* Sanio. — *Hypnum fluitans* var. *aurantiacum*.

var. *exannulatum* Lindb. — *Hypnum*.

var. *Rotae* Lindb et Arn. — *Hypnum exannulatum* var. *Rotae*.

fluitans x *aduncum* Lindb et Arn. — *Hypnum*.

fluviatile (Sw.) Bryol. eur. VI (mon. Supp. p. 1), t. 567; W. P. Sch. Syn. II ed p 713; R. du Buysson op. cit. p. 12.

Hypnum arhizon. Brid. Bryol. univ. p. 535.

H. caucasicum Brid. l. c.

H. diffusum Bland. in Brid. Sp. M. II, p. 243; Brid. op. cit. p. 538.

H. filicinum e *lanatum* Brid. op. cit. p. 531.

H. flagelliforme Brid. Sp. M. II, p. 240.

H. fluviatile Sw. M. Suec. p. 63 p. p.; Brid. Bryol. univ. II, p. 532; C. M. Syn. II, p. 420.

H. fluviatile β *flagelliforme* Brid. op. cit. p. 533.

H. lanatum Sterm. in Schrift. d. Gesellsch. d. Nat. hist. I, Heft II, p. 30.

H. luridum Sw. op. cit. p. 68.

H. palustre var. *fluviatile* Wahlenb. Fl. Suec.

H. Seligeri Brid. M. Rec. II, p. 67

H. Vallis Clausae Brid. Sp. M. II, p. 238 et Bryol. univ. II, p. 534 (1).

1. Ad saxa rivul. — *Eur.* : Reg. campestr. et mont. Scandin. German., Britann., Gall. sept., *Am. sept.* : Terr. Nov., New Brunswick, Gaspes., Ontario, New Jersey.

Exs. : Mac Canad. M. n. 446 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 1094.

“ var. *julaceum* R. du Buysson, op. et l. cc.

Ut et ubi typ. in *Eur.*

fluviatile Bryol. eur. — *A. irriguum*.

var. *irriguum* R. du Buyss. — *A. irriguum*.

Formianum D^{na} Fior. Mazz. — *Hypnum*.

fuegianum C. M. — *Hypnum*.

giganteum de Not. — *Hypnum*.

glaucum Lindb. — *Hypnum commutatum*.

var. *decipiens* L. — *Thuidium decipiens*.

var. *sulcatum* L. — *Hypnum sulcatum*.

gracile Jur. — *Pseudo-Leskea*.

(1) Fid. C. M. l. c.; cf. Renauld in *Rev. bryol*, 1885, p. 55.

Hausmanni de Not. in sched.; W. P. Sch. op. cit. p. 720.

A. riparium var. abbreviatum de Not. Epil. p. 147

l. Ad arbor. rad. et puteor. ductus. — Eur.: Austria, Tirol. merid.

homalostegium (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 547.

Hypnum homalostegium C. M. in Fl. 1873 (1).

Arbor. — Am. sept.: Alabama.

hygrophiloides W. P. Sch. in Savat. M. Jap. n. 715.

l? Terr. — As.: Japon.

hygrophilum W. P. Sch. et R. du Buyss. op. cc., p. p. 715 et 20.

A. saxatile W. P. Sch. Syn. I ed. pp. 595 et 700.

l. Ad terr. aren. humid. et saxa. — Eur.: Alsatia inf., Silesia.

« var. *limosum* W. P. Sch. et R. du Buyss. op. cc. pp. 716 et 21.

Hypnum hygrophilum Jur. in H. Müll. Wesfal. Laubm. et in Rab. Bryoth. eur. n. 649.

In stagn. exsicc. — Eur.: Siegburg, Carinth.

inflatum Lindb. et Arn. — *Hypnum*.

intermedium Lindb. — *Hypnum* Cossoni.

var. *revolvens* Sanio. — *Hypnum revolvens*.

var. *verum* Sanio. — *Hypnum* Cossoni.

intermedium x *vernicosum* Lindb et Arn. — *Hypnum* Cossoni-vernicosum.

irrigatum Lindb. — *Hypnum*.

irriguum (Hook. f. et Wils.) Bryol. eur. VI (mon. Supp. p. 1), t. 566;
W. P. Sch. op. cit. p. 712.

A. fluviatile Bryol. eur. VI (mon. p. 11), t. 566.

A. fluviatile var. *irriguum* R. du B. op. cit. p. 12.

Hypnum fluviatile Sw. M. Succ. p. 63, p. p.

H. irriguum H. f. et W. Bryol. brit. p. 361.

l. Ad saxa praecip. silic., mur. molend. irrigat. — Eur.: Fere tota, rarius in septentr. As.: Caucas. occ. Afr.: Alger. Am. sept.: Ontario, Montana, New Jersey, Virgin. occ.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 776.

var. *fallax* W. P. Sch. — *A. irriguum* var. *spinifolium*.

« var. *spinifolium* W. P. Sch. l. c.; R. du Buyss. op. cit. p. 13.

A. fallax Lindb. M. Scand p. 32

A. filicinum var. *fallax* Lindb. M. Scand. p. 35

A. irriguum var. *fallax* W. P. Sch. Syn. I ed., p. 594; Rab. Bryoth. eur. n. 342.

Hypnum fallax Brid. M. Rec. II, II, p. 66, t. 2, f. 1 (2).

H. filicinum var. *fallax* H. et T. Musc. brit. p. 109; Brid. Bryol. univ. II, p. 531? (2)

H. fluviatile C. M. Syn. II, p. 420 p. p.; Jam. in Proced. Acad. Philad. 1885, p. 447.

H. noterophilum Sull. M. of U. St. p. 78; Sull. et Lesq. M. bor. am I ed. n. 348.

Ad saxa praecip. calcar. saepius inund. — Eur.: Passim cum typ. As.: Jenissei sup., Caucas. occ. et cent. Afr.: Alger. Am. sept.: Lac. Super., Pensilv.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 321 (*Hypnum*).

(1) In Lesq. et Jam. Man. deest.

(2) Cf. W. P. Sch. l. c.

- var. *tenellum* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 594 et II ed. l. c.; R. du Buysson, op. cit. p. 13.
Ut et ubi typ. in Eur.

Juratzkanum W. P. Sch. op. cc. pp. 693 et 710.

A. *serpens* var. *Juratzkanum* R. du B. op. cit. p. 18.

A. *Yuratzkae* Kindb. in Mac. Can. p. 218.

Hypnum *Zuratzkae* Mac. Canad. M. n. 466.

1. Ad saxa humidiusc. — Eur. : Austria inf., Gall. austr. occ., Pyr As. : Caucas. Am. sept. : Ottawa, Ontario, Columb. brit.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 641.

Kneiffii Bryol. eur. — *Hypnum* *aduncum* var. *Kneiffii*.

Kochii Bryol. eur. VI (mon. p. 13), t. 568; W. P. Sch. Syn. II, ed. p. 716.

A. *riparium* var. *Kochii* R. du B. op. cit. p. 20.

A. *trichopodium* var. *Kochii* Lindb. et Arn.

1. Ad rad. Salic. et terr. humid. vel limos. — Eur. : Boruss. occ., Siles., Newmark, Westphal., Voges. As. : Amour. Am. sept. : Kansas.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 894, 895.

latifolium Lindb. et Arn. — *Hypnum* *Sendtneri* var. *Wilsoni*.

var. *jenissiense* Sanio. — *Hypnum* *Sendtneri* var. *jenissiense*.

leitense Mitt. — *Hypnum*.

leptophyllum W. P. Sch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1867, p. 260 et Syn. II ed., p. 719; R. du Buysson, op. cit. p. 15.

1. Lignic. et ad rup. humid. — Eur. : Austria super.

var. *cylindricum* R. du Buysson Ess. I ed., p. 18 et op. cit. p. 16.

Ubi typ. — Eur. : Gall. (Arvern., Delphinat.).

Lescurii (Sull.) Jaeg. Ad. II, p. 554.

Hypnum *Lescurii* Sull. M. of U. St. p. 79 et Ic. M. p. 203, t. 24; Lesq. et Jam. Man. p. 376.

1. Ad rup. madid. — Am. sept. : Reg. sept. et or.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed., n. 529 (*Hypnum*).

longeacuminatum Broth. mss.

— As. : Japon.

longicuspis Arn. — *Hypnum*.

longifolium Mitt. — *Hypnum*

longisetum W. P. Sch. — A. madeirense.

lucidum Jaeg. — *Plagiothecium*.

lycopodioides de Not. — *Hypnum*.

lycopodioides Lindb. et Arn. — *Hypnum* *vernicosum*.

var. *vernicosum* eor. — *Hypnum* *vernicosum*.

lycopodioides x *fluitans* eor. — *Hypnum*.

madeirense (Mitt) Jaeg. Ad. II, p. 549.

Hypnum *longisetum* W. P. Sch. in Mandon Pl. Mad. n. 43 (ex ips.!).

H. *madeirense* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 6.

1. Rupic. et terr. — Afr. : Ins. Canar., Madeir.

minutissimum (Sull. et Lesq.) Jaeg. Ad. II, p. 547.

Hypnum *minutissimum* Sull et Lesq. in Sull. Ic. M. p. 195, t. 120 et M. of U. St. p. 78; Lesq. et Jam. Man. p. 371.

2. Ad rup. et terr. humid. — Am. sept. : Ontario, M. Rupestr., Columb brit., Illinois, Ohio, New Jersey, Pensilv., etc.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 541 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 520 (*Hypnum*).

molle Lindb. — *Hypnum*.

var. *alpinum* Lindb. — *Hypnum alpinum*.

var. *Schimperi* Ltz. -- *Hypnum molle*. var. *Schimperi montanum* Lindb. — *Hypnum*.

Mülleri (*Hpe. et C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 555.

Hypnum Mülleri *Hpe et C. M. in Linn.* 1853, p. 504.

-- *Pac.*: Austral. or.

obtusulum (*Mitt*) *Jaeg. Ad. II*, p. 551.

Hypnum obtusulum *Mitt. M. Ind. or.* p. 82.

2? -- *As.*: Himalaya occ.

ochraceum Lindb. — *Hypnum*.

oligorhizon *Bryol. eur. VI* (mon. p. 13), t. 568; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 712.

A. varium *R. du Buysson Ess. II ed.*, p. 14.

A. varium β *oligorhizon* *Lindb. M. Scand.* p. 32.

1. Ad rup. molass. umbr. -- *Eur.*: Fennia, Bavar.

orbiculare (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 555.

Hypnum orbiculare *Hpe. in sched.*

-- *As.*: Sikkim.

Orsinianum de Not. — *Hypnum*.

orthocladon (*P. B.*) *Jaeg. op. et l. cc.* (1).

A. serpens var. *orthocladon* *Aust. M. Appal.*

Hypnum orthocladum *P. B. Prodr.* p. 67; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 537;

Sull. Ic. M. p. 199, t. 122; *Lesq. et Jam, Man.* p. 374.

H. serpens β *varium* *C. M. Syn. II*, p. 412 p.p.

1. Lignic., rupic. et terr. — *Am. sept.*: New Brunswick, Ontario, Washington, reg. sept., centr. et or.

Exs.: Drumm. M. bor. am. II ed. n. 138, 139, 142 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 337 p.p. (*Hypnum*).

Sull et Lesq. m. bor. Am. II ed. n. 526 (*Hypnum*).

orthothecioides Lindb. — *Hypnum uncinatum* var. *orthothecioides*

pachyrhizon Lindb. — *A. porphyrhizum*.

palustre Lindb. — *Hypnum*.

var. *subsphaericarpon* Lindb. — *H. palustre* var. *subsphaericarpon*.

pinnatulum *Rehm. M. Afr. austr.*

-- *Afr.*: C. B. Sp.?

polare Lindb. — *Hypnum*.

polygamum *Bryol. eur.* — *Hypnum*.

var. *brevicuspis* Lindb. — *Hypnum polygamum* var. *brevicuspis*.

var. *fallaciosum* Lindb. — *Hypnum polygamum*?

var. *minus* *Bryol. eur.* — *Hypnum polygamum* var. *minus*.

porphyrhizum (*Lindb.*) *W. P. Sch. op. cit.* p. 715.

A. pachyrhizon *Lindb. M. Scand.* p. 32.

A. radicale *Lindb. op. cit.* p. 32 et n. 21.

Hypnum porphyrhizum *Lindb. in Hartm. Skand. Fl. IX ed.* (2).

H. radicale *Lesq. et Jam. Man.* p. 373 p.p. (*fid. Mac. Cat.* p. 219)

Drumm. M. bor. am. I ed. n. 189.

(1) Cf. *A. radicale*.

(2) « Forsan id. ac. *A. hygrophilum*. » (Ren. et Card. in Bot. Gaz. XVII, p. 83.)

1. Lignic. — *Eur.*: Suec., Dania, Fennia. *Am. sept.*: Labrador, Anticosti, ins. Miquelon, Nov. Scot., New Brunswick, Ottawa, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, reg. sept. occ., M. Rupestr., Columb. brit., Kansas.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 319 (*Hypnum*).

protensum Lindb. — *Hypnum stellatum* var. *protensum*.

pseudo-stramineum Lindb. — *Hypnum*.

radicale (P. B.) *Bryol. eur. VI* (mon. p. 10), t. 565; W. P. Sch. op. cit. 711; R. du Buysson op. cit. p. 10; Lesq. et Jam. Man. p. 373 (p.p. fid. Mac. Cat. p. 219).

A. serpens var. *radicale* Aust. M. Appal.

A. varium Lindb. M. Scand. p. 32.

Hypnum debile Brid. Sp. M. II, p. 250 (1).

H. humile P. B. Prodr. p. 68 (1).

H. inordinatum Brid. Sp. M. II, p. 182 et *Bryol. univ. II*, p. 483 (1).

H. pachypoma Schwaegr. Suppl. I, II, p. 259 et Suppl. III, II, II, t. 287; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 538 (1).

H. radicale P. B. Pr. p. 68.

H. serpens β *varium* C. M. Syn. II, p. 412 p.p.

H. tenax Hedw. Sp. M. p. 277, t. 72; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 496 (1).

H. varium P. B. op. et l. cc. (1); Drumm. M. bor. am. II ed. n. 140, 141.

H. Stereodon radicalis Brid. op. cit. p. 651.

H. Stereodon varius Brid. op. cit. p. 652 (1).

Leskea varia Hedw. Sp. M. p. 216; t. 53, f. 15-20.

Stereodon varius Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 43.

1. Ad terr., lign. et arb. radic. in humid. — *Eur.*: Suec., Angl., Gall. sept. et or., Alsac., Hassia, Wesphal., Rhönggeb., Bavar., Austr. inf., Tirol., Ital. sup. As.: Jenissei med., Pers., Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Anticosti, ins. Miquelon, New Brunswick, Ottawa, Manitoba, Saskaschewan, Columb. brit., Washington, Idaho, Montana, reg. sept., centr., or. et merid. *Am. merid.*: And, Quitens.

Exs.: Drumm. M. bor. am. II ed., n. 143 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 320 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 640.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 524, 525 (*Hypnum*).

« var. *Lesquereuxii* (Ren. et Card.) Par.

A. radicale Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 224?

A. varium var. *radicale* R. et C. Fl. ins. Miquel. p. 53.

Ut typ. — *Am. sept.*: Ins. Miquelon.

radicale Lindb. — *A. porphyrizum*.

radicale Sull. et Lesq. — *A. radicale* var. *Lesquereuxii*?

revolvens de Not. — *Hypnum*.

Richardsoni Lindb. et Arn. — *Hypnum*.

var. *robustum* Lindb et Arn. — *Hypnum Richardsoni* var. *robustum*.

riparioides (Hpe.) Jaeg. Ad. II, 553.

Serpo-hypnum riparioides Hpe. Symb. 1870, p. 291.

1. Lignic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

riparium (L.) *Bryol. eur. VI* (mon. p. 14), t. 570; W. P. Sch., op. cit. p. 717; R. du Buysson op. cit. p. 18.

Fissidens Weberi Brid. M. Rec. II, I, p. 146.

(1) Forsan ad *A. orthocladon* referenda. — De Synonym. *A. radicalis* cf. Lindb. M. Scand. p. 32 et R. du Buysson in Rev. de Bot. IV, n. 42 et 43.

Hypnum aquaticum, flagellis et teretibus et pinnatis *Dill. Hist. M. p. 308, t. 40, f. 44.*

H. flexipes *Brid. Bryol. univ. II, p. 419.*

H. hornum *Web. Spic. Fl. Gött. p. 44?*

H. laxifolium *Brid. Sp. M. II, p. 94.*

H. oligophyllum *Brid. M. Rec. II, II, p. 181.*

H. palustre lutescens, etc. *Vill. Pl. Dauph. III, p. 918.*

H. palustre nigrescens *Vill. op. cit. p. 917.*

H. riparium *L. Sp. pl. 1595; Brid. Bryol. univ. II, p. 412; C. M. Syn. II, p. 321.*

H. riparium var. *homomallum*
H. riparium var. *oligophyllum* } *Brid. op. cit. p.p. 413-415.*
H. riparium var. *pallidum*

H. Siphon *P. B. Prodr. p. 70; Brid. op. cit. II, p. 391.*

H. uncinatum var. *plumosum* *Mac. Canad. M. n. 374.*

Skitophyllum Weberi *la Pyl. in Journ. bot. Desv. 1813, V, p. 62.*

Stereodon riparius *Mitt. op. et l. cc.*

1. Ad saxa, ligna fabref. et putresc., terr. humid. etc. — *Eur.* : Tota usq. in arctic. *As.* : Tibet. occ. *Afr.* : Alger., ins. Canar. *Am. sept.* : Groenland, Terr. Nov., New Brunswick, Ottawa, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, reg. sept. occ., Alberta, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, tota temperat., ins. Cuba.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 170 et II ed. n. 115 (Hypnum).*

Mac. Canad. M. n. 325 (Hypnum).

Rab. Bryoth. eur. n. 482.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 527 (Hypnum).

Un. Itin. 1864, n. 1.

« var. *abbreviatum* *Bryol. eur. l. c. t. 571; W. P. Sch. op. cit. p. 718*
 In siccior. — *Eur. et Am. sept.* : Hic illic c. typ.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. II ed. n. 116, 117 (Hypnum).*

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 528 (Hypnum).

var. *abbreviatum* de Not. — *A. Haussmanni.*

var. *curvipes* *R. de B.* — *A. curvipes.*

« var. *elongatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.; R. du Buysson op. cit. p. 19.*

In udis. — *Eur.* : Hic illic c. typ. *As.* : Japon.

Exs. : *Faurie Pl. Japon. n. 475.*

« var. *Felisii* *W. P. Sch. et R. du Buysson ll. cc.*

Ad arbor. rad. humid. — *Eur.* : Ut proceed.

« var. *flaccidum* (*Lesq. et Jam.*) *Par.*

Hypnum riparium var. *flaccidum* *L. et J. Man. p. 377.*

Paludic. et in stagnin. — *Am. sept.* : Reg. sept.

« var. *floridanum* *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 98*

A. riparium eor. in *Rev. bryol. 1893, p. 24.*

Lignic. et ad arbor. — *Am. sept.* : Florid., Ludovic.

« var. *fluitans* (*Lesq. et Jam.*) *Par.*

Hypnum riparium var. *fluitans* *Lesq. et J. l. c.*

Aquat. — *Am. sept.* : Ontario, lac. Super., Assiniboine, Columb. brit., reg. sept.

Exs. : *Mac. Canad. M. n. 326 (Hypnum).*

« var. *inundatum* *W. P. Sch. et R. du Buysson ll. cc.*

In stagnin. — *Eur.* : Hic illic c. typ.

var. *Kochii* *R. du B.* — *A. Kochii.*

« *var. longifolium* (Schultz). *W. P. Sch. et R. du Buysson ll. cc.*

Hypnum riparium Schultz *Fl. Starg.* p. 335.

H. riparium β *petrophilum* Brid. *Sp. M. II*, p. 115.

H. riparium δ *petrophilum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 414.

In humid. praecip. ad ligna robusta. — *Eur.*: Hic illic c. typ. *As.*:

Jeniss. sup. et. med. *Am. sept.*: Washington, ins. Vancouver.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 1095, 1294.

« *var. pratense* (Brid.) Par.

H. riparium var. pratense Brid. *Bryol. univ. II*, p. 415 (*forsan. spec. propr.*).

— *Am. sept.*: Terr. Nov.

« *var. serratum* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1889, p. 98.

Ad arbor. — *Am. sept.*: Kansas.

« *var. subsecundum* *Bryol. eur.*, *W. P. Sch. et R. du Buysson ll. cc.*

In siccior. — *Eur.*: Hic illic c. typ.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 483.

« *var. tennis* Jur. in Rab. *Bryoth. eur.* n. 1245.

Ad radic. Betul. in turfis. — *Eur.*: Salisburg.

« *var. trichopodium* (Schultz) *Bryol. eur.* *W. P. Sch. et R. du Buysson ll. cc.*

A. trichopodium Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, *II*, p. 115.

Hypnum trichopodium Schultz *Fl. Starg.* p. 324.

H. riparium var. trichopodium Brid. *Bryol. univ. II*, p. 415.

H. Schultzii Bland. *M. exs. fasc. III*, p. 150.

In prat. uligin. — *Eur.*: Hic illic c. typ.

rivicola (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 549.

Hypnum rivicola Mitt. *M. Ind. or.* p. 83.

l. — *As.*: Tibet occ.

rivulare Lindb. — *Hypnum alpestre*.

sarmentosum de Not. — *Hypnum*.

saxatile W. P. Sch. — *Hypnum hygrophilum*.

Schlotthaueri Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51 (*subsp. A serpentis*).

l. — *Am. sept.*: Yellowstone Park.

scorpioides Lindb. — *Hypnum*.

Sendtneri de Not. — *Hypnum*.

var. robustum Lindb. — *Hypnum Sendtneri var. robustum*.

serpens (L.) *Bryol. eur. VI* (*mon. p.* 9), t. 564; *W. P. Sch. et R. du Buysson op. cit. p.p.* 709 et 17.

Bryum repens Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1333.

Gymnostomum serpens Schrank *Baiers Fl. II*, p. 439.

Hypnum capillare Fröhl. in hb. Brid.

H. clavellatum Schrank *op. cit.* p. 431.

H. contextum Hedw. *Sp. M.* p. 278, t. 72.

H. intextum Voit. *M. Herbsp.* p. 106 et in Sturm. *Deutsch. Fl. II*, XI (*p.p.*).

H. repens Poll. *pl. Palat. III*, n. 1051, f. 11.

H. serpens L. *Sp. pl. II ed.*, p. 1596; *C. M. Syn II*, p. 411.

H. spinulosum Hedw. *op. cit.* p. 269, t. 69.

H. trichodes serpens, setis et capsulis longis erectis Dill. *Hist. M.* p. 329, t. 42, f. 64.

H. viride Lam. et D. C. *Fl. fr.* p. 536.

H. *Stereodon serpens* (incl. ? var. *aurantiacus*, *contextus*, *repens*, *spinulosus*, *viridis* (1), *brachyclados*, *byssoides*, *clavatus*, *crassinervius*, *falciformis*, *patentissimus*, *pensilvanicus*, *subtilis* (2), *crispabilis*, *cylindricus*, *excentricus*, *macrocarpus* (3), *Brid. Bryol. univ. II*, pp. 642-649).

Neckera repens Willd. *Prodr. fl. Berol. n.* 935.

Trichostomum repens Schrank *op. cit.* p. 450.

1. Ad saxa, lign. putresc., arb. rad., rarius ad terr. in toto fere terrar. orbe. — *Eur.* : Tota, rarius in calidior. et in arctic. *As.* : Tibet occ. *Afr.* : Alger., etc. *Am. sept.* : Grönland, Labrador, Canada tot., Columb. brit., reg. sept., centr., occ. et or. *Am. merid.* : And. Quitens et Peruv. *Pac.* : Nov. Zeland. sept.

Exs. : Drumm M. bor. am. 1 ed. n. 187 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 318 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 136 b, 777.

Sull. et Lesq. M. bor. am., II ed. n. 523 (*Hypnum*).

« var. β (*Hook. f. et Wils.*). *Par.*

Hypnum serpens var. β *H. f. et W. Fl. antarct. p.* 138 et *Handb. of N. Zeal. Fl. p.* 479.

— *Pac.* : Ins. Auckland.

« var. *Columbiae* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club, XVII, p.* 279 (Subspec.).

— *Am. sept.* : Columb. brit.

var. *cryptarum* Arnold. — A. *densum*.

var. *Juratzkanum* R. du B. — A. *Juratzkanum*.

« var. *major* R. du Buysson *op. et l. cc.*

Ad radices arb. — *Eur.* : Hic illic.

var. *orthocladon* Aust. — A. *densum*.

« var. *pinnatum* W. P. Sch. *op. cit. p.* 710.

Ad rup. arenac. — *Eur.* : Sudet.

var. *radicale* Aust. — A. *radicale*.

« var. *rigidiusculum* Lindb. et Arn. M. *As. bor.* 1890, II, . 113.

— *As.* : Jenissei med., Obi.

« var. *serrulatum* Breidl. in *Broth. Enum. M. Cauc. p.* 101.

— *As.* : Caucas.

« var. *tenuis* (Schrad.) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum tenue Schrad. *Crypt. Gew. n.* 81

H. *Stereodon serpens* var. *tenuis* *Brid. Bryol. univ. II, p.* 646.

Ad arbor. trunc. — *Eur.* : Reg. montana.

« var. *xanthodictyon* Kindb. in *Mac. Cat. p.* 218.

A. *serpens* * *lutescens* Kindb. mss.

Ad saxa madid. — *Am. sept.* : Anticosti.

serpens * *lutescens*. Kindb. — A. *serpens* var. *xanthodictyon*.

serratum *Bryol. Eur.* — A. *compactum*?

Smithii Lindb. — *Hypnum arcticum*.

sordidum Mitt. — *Hypnum*.

sparsifolium (Hpe.) Jaeg. *Ad. II, p.* 552.

Serpo-*Hypnum sparsifolium* Hpe. *Symb.* 1870, p. 290.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

(1) Ad syn. supradicta referenda.

(2) « Quarum plures hujus speciei non sunt. » (W. P. Sch. Syn. I ed. p. 592).

(3) Fid. Schumann Fl. Sael. II, p. 83.

sparsile (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 554.

Hypnum sparsile Mitt. M. Ind. or. p. 82.

1. — As. : Assam super.

speirophyllum Kindb. in Ott. Nat. IV, p. 64 et in Mac. Cat. p. 217.

2? Ster. Rupic. — Am. sept. : New Brunswick.

Sprucei (Br.) Bryol. eur. VI (mon. p. 5), t. 561; W. P. Sch. op. cit. p. 705; R. du Buysson op. cit. p. 5.

Hypnum confervoides H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. I ed., n. 190.

H. Jungermannia Hpe. in sched.

H. Sprucei Br. in C. M. Syn. II, p. 415.

Leskea Sprucei Br. in litt.; Spr. in Lond. Journ. of bot. 1845, IV, p. 180.

Stereodon Sprucei Lindb.

2. In rupib. umbr. humid. — Eur. : Spitzberg, ins. Ursor., reg. mont., subalp. et alp. Scandin., Britann., Alp., Pyren., Arvernicae. As. : Penins. Tschutschica, Jenissei, Obi, Caucas. centr. Am. sept. : Grönland, Gaspes., Ottawa, Ontar., reg. sept. occ., M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Idaho, Colorado, Nov. Mexic.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 315 (Hypnum)

Rab. Bryoth. eur. n. 348.

Un itin. 1864, n. 83; 1867, n. 16-24.

« var. Anzianum R. du Buysson op. cit. p. 7.

A. Anzianum de Not. Epil. p. 156.

— Eur. : Longobard.

stellatum Lindb. — Hypnum.

stramineum de Not. — Hypnum.

var. acutifolium Arn. — Hypnum stramineum var. acutifolium

var. apiculatum Arn. — Hypnum stramineum var. apiculatum.

var. patens Lindb. — Hypnum stramineum var. patens.

subcompactum C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 221.

Hypnum compactum Mac. Canad. M. n. 324.

1. Ad. rup. et arb. rad. — Am. sept. : Niagara, Columb. brit.

subenerve Bryol. eur. — Hypnum.

suboligophyllum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 555.

Hypnum suboligophyllum Hpe. in. sched.

— As. : Arracan.

subserpens W. P. Sch. in Savat. M. Jap. n. 709.

1. Ad terr. calcar. — As. : Japon.

subtile (Hedw.) Bryol. eur. VI (mon. p. 4), t. 561; W. P. Sch. et R. du Buysson op. cit. pp. 706 et 7.

Hypnum minimum, foliis ovato-lanceolatis, capitulis erectis, operculis conicis Hall. Stirp. helv. n. 1757.

H. subtile Hoffm. Deutsch Fl. II, p. 70; C. M. Syn. II, p. 415.

Leskea subtilis Hedw. M. frond. IV, p. 23, t. 9; Brid. Bryol. univ. II, p. 309.

Neckera subtilis Brid. M. Rec. II, II, p. 45.

1. Ad arb. silvat., praecip. Fagos, rar. ad saxa. — Eur. : Reg. montan. et subalp., rar. campestr.; deest in Britann. As. : Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Ottawa, Ontar., Nov. Angl.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 227 (Hypnum).

Mac. Canad. M. n. 316 (Hypnum).

Rab. Bryoth. eur. n. 775.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 519 (Hypnum).

tenuifolium Kindb. — A. fenestratum.

tenuissimum *Bryol. eur.* VI (mon. p. 7), t. 562; *W. P. Sch. et R. du Buysson op. cit.* pp. 707 et 7.

1. Cortic. — *Eur.*: Fennia, Bavaria (Monach.). *As.*: Tibet. occ.

tenuisetum Lindb. — *Hypnum*.

thuidioides *W. P. Sch. in Savat. M. Jap.* n. 720.

1. Terr. — *As.*: Japon.

tibetanum (Mitt.) Par.

Hypnum tibetanum Mitt. *M. Ind. or.* p. 83.

Ster. — *As.*: Tibet occ.

trichopodium Lindb. et Arn. — *A. riparium* var. *trichopodium*.

var. *Kochii* eor. — *A. Kochii*.

trifarium de Not. — *Hypnum*.

Tundrae Arn. — *Hypnum*.

turgescens Lindb. et Arn. — *Hypnum*.

uncinatum { de Not. — *Hypnum*.
Mitt. (1876). — *Hypnum austro-uncinatum*.

var. *drepanoides* Sanio. — *Hypnum uncinatum* var. *drepanoides*.

var. *plumulosum* Sanio. — *Hypnum uncinatum* var. *plumulosum*.

var. *suetum* Sanio. — *Hypnum uncinatum* var. *suetum*.

vacillans Sull. *Ic. M. suppl.* p. 96, t. 72.

Hypnum vacillans Lesq. et Jam. *Man.* p. 377.

1. Aquat. — *Am. sept.*: M. Alb., Ontario.

varium Lindb. — *A. radicale*.

varium R. du B. — *A. oligorhizon*.

var. *Lesquereuxii* R. et C. — *A. radicale* var. *Lesquereuxii*.

var. *oligorhizon* Lindb. — *A. oligorhizon*.

vernicosum Lindb. — *Hypnum*.

var. *gigas* Lindb. — *Hypnum vernicosum* var. *gigas*.

var. *lapponicum* Lindb. — *Hypnum vernicosum* var. *lapponicum*.

var. *majus* Lindb. — *Hypnum vernicosum* var. *majus*.

viridulum Lindb. — *Hypnum norvegicum*.

Wilsoni Lindb. — *Hypnum Sendtneri* var. *Wilsoni*.

var. *hamatum* Lindb. — *Hypnum hamifolium*.

Wollei Kindb. — *Leskea* (1).

Amblytropis Mitt. *M. austr. am.* p. 339 (sect. *HOOKERIÆ*).

Amphidiopsis C. M. in Linn. 1878-79, p. 332 (sect. *BARBULÆ*).

AMPHIDIUM Nees in Sturm *Fl. Germ.* II, p. 17; C. M. *Syn.* I, p. 667 et II, p. 636 (sect. *ZYGODONTIS*); *W. P. Sch. Coroll.* p. 39.

lapponicum *W. P. Sch.* — *Amphoridium*.

Mougeotii *W. P. Sch.* — *Amphoridium*.

pulvinatum Nees. — *Zygodon Forsteri*.

AMPHORIDIUM *W. P. Sch. Syn.* I ed. p. 247 et II ed. p. 293 (9 sp.).

africanum C. M. in Rehm. *M. Afr. austr.* n. 143.

Ster. — *Afr.*: Orange.

caespitosum Lesq. et Jam. *Man.* p. 160.

Didymodon caespitosus Mitt. in *Journ. of. the Linn. Soc.* VIII, p. 18.

Ster.? Rupic. — *Am. sept.*: Columb. brit., ins. Vancouver.

(1) In Enumer. Kindberg. nomina nuda :

A. brachypelmatum C. M. | *A. pachylomatum* C. M.

californicum (Hpe.) Lesq. et Jam. Man. p. 159.

A. Sullivantii Mac. Canad. M. n. 111.

Zygodon californicus Hpe. in Bot. Zeit. 1862, p. 361; Sull. Ic. M. Suppl. p. 47, t. 32.

2. Rupic. — *Am. sept.*: Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Calif.

canariense W. P. Sch. — *A. curvipes*.

curvipes (C. M.) Jaeg. Ad. p. 386.

A. canariense W. P. Sch. in Mandon Pl. Madeir. n. 13.

Anoetangium lapponicum Kze. in Holl. Pl. Madeir.

Zygodon curvipes C. M. Syn. I. p. 681.

2. Rupic. ? — *Afr.*: Madeir.

cyathicarpum (Mont.) Jaeg. Ad. I. p. 386.

Didymodon cyathicarpus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 70.

Gymnostomum linearifolium Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 42.

Syrhopodon tortuosus Hsch. in Linn. 1841, p. 117.

Zygodon cyathicarpus Mont. in Ann. sc. nat. 1845, p. 106 et Syll. p. 37; C. M. Syn. I, p. 682.

1. Terr. — *Afr.*: Abyssin., Kilima N'Djaro, M. Cameroon, C. B. Sp. *Am. sept.*: (fid. Handb. of the N. Zeal. Fl.). *Am. merid.*: M. Pichincha, Chile. *Pac.*: Nov. Zeland., Tasman.

gracile de Not. — *Zygodon*.

Kilima N'Djaricum (C. M.) Par.

Zygodon Kilima N'Djaricus C. M. in Fl. 1890, p. 482.

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

lapponicum (Hedw.) W. P. Sch. op. et ll. cc.

Amphidium lapponicum W. P. Sch. Coroll. p. 39.

Anoetangium lapponicum Brid. Sp. M. I, p. 40.

A. striatum Brid. op. cit. p. 25.

Bryum lapponicum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 10.

Cylicocarpus lapponicus Lindb. in Ofv... 1862.

Didymodon lapponicus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 18.

Gymnostomum lapponicum Hedw. M. frond. III, p. 10, t. 5.

G. striatum Brid. Bryol. univ I, p. 90.

Hedwigia lapponica Brid. M. Rec. II, p. 33.

Schistidium lapponicum Brid. Mant. M. p. 22.

Stereodon lapponicus Lindb. M. Scand. p. 38.

Zygodon lapponicus Bryol. eur. III (mon. p. 6), t. 206; C. M. Syn. I, p. 680.

1. In fissur. rup. — *Eur.*: Reg. subalp. usq. in supraalp.; Spitzberg. *As.*: Penins. Tschutschica, Caucas centr. *Am. sept.*: Grönland, Anticosti, Nov. Scotia, New Brunswick, Gaspes., lac. Super., M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Idaho, Wyoming, Calif., reg. sept.

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 28 (*Gymnostomum*).

Mac. Canad. M. n. 110.

Rab. Bryoth. eur. n. 522.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 171 (*Zygodon*).

Un itin. 1864, n. 43, 44; 1867, n. 90.

Mougeotii (Bryol. eur.) W. P. Sch. op. cc. pp. 248 et 294.

Amphidium Mougeotii W. P. Sch. Coroll. p. 40.

Anoetangium Mougeotii Lindb. M. Scand. p. 29.

Barbula Woodii W. P. Sch. (fid. Husn. Muscol. gall. p. 147).

Cylicocarpus Mougeotii Lindb. in Ofv... 1862.

Gymnostomum Mougeotii Br. mss.; Hüb. Muscol. germ p. 59.

Zygodon Mougeotii Bryol. eur. III (mon. p. 7), t. 206; C. M. Syn. I, 681 et II, p. 637.

2. In fissur. rup. - *Eur.* : Vulgatiss., rariss. fructif., copiose in Arvernia; Scotia, Salisburg., etc. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Idaho, Oregon, M. Alb., Pensilv.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 420.

Rab. Bryoth. eur. n. 523, b, c, d, 565.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 170 (*Zygodon*).

Un itin. 1864, n. 42.

Peckii Sull. — Anoectangium.

Sullivantii (C. M.) Lesq. et Jam. Man. p. 159.

Syrrophodon? excelsus Sull. M. Allegh. n. 170.

Zygodon Sullivantii C. M. Syn. I, p. 679; Sull. M. of U. St. p. 32 et Ic. M. I, p. 51, t. 32.

Ster. Arbor. et rupic. — *Am sept.* : Carolin. super.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 114 et II ed. n. 169 (*Zygodon*).

Sullivantii Mac. — A. californicum.

viridissimum de Not. — *Zygodon*.

AMPHORITHECA Hpe. in Ann. sc. nat. V, ser. III, p. 340.

- acidota* Jaeg. — Entosthodon.
andicola Jaeg. — Entosthodon.
angustifolia Jaeg. -- Entosthodon.
Balansae Jaeg. — Entosthodon.
Beccarii Hpe. — Entosthodon.
Bonplandii Hpe. — Entosthodon.
Buseana Jaeg. — Entosthodon.
clavellata Jaeg. — Entosthodon.
curviseta Jaeg. — Funaria.
diversinervis Jaeg. — Entosthodon.
Dozyana Jaeg. — Entosthodon.
ericetorum Jaeg. — Entosthodon.
fascicularis Jaeg. — Funaria.
Jamesoni Hpe. — Physcomitrium.
Lindigii Hpe. — Entosthodon.
longicollis Jaeg. — Entosthodon.
longiseta Jaeg. — Entosthodon.
lutescens Hpe. — Entosthodon.
nutans Jaeg. — Entosthodon.
obtusifolia Jaeg. — Entosthodon.
? pilifera Jaeg. — Entosthodon.
planifolia Jaeg. — Entosthodon.
pseudo-marginata Hpe. -- Entosthodon.
ramulosa Hpe. — Funaria.
riparia Angstr. — Funaria.
submarginata Jaeg. — Entosthodon.
undulata Hpe. — Entosthodon.
? Wallichii (1) Jaeg. — Entosthodon.

Ampullaria C. M. Syn. I, p. 143 (sect. SPLACHNI).

ANACALYTA Röhl. Moosgesch. Deutschl. I, p. 108; C. M. Syn. I, p. 547 et II, p. 621 (sect. POTTIÆ).

affinis Fürnr. — Pottia Starkeana var. brachyodus.

brachyodus Hpe. — Pottia.

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum :
 A papillosa C. M.

- caespitosa* N. et H. — Pottia.
caespitulosa Hpe. et C. M. — Pottia.
cucullata Hpe. — Pottia.
humillima Ångstr. — Pottia.
inclinata Nees. — Pottia.
lanceolata Röhl. — Pottia.
 var. *angustata* Bryol. eur. — Pottia *lanceolata* var. *angustata*.
 var. *sibirica* E. G. et G. G. Bor. — Pottia *latifolia*?
latifolia N. et H. — Pottia.
paraguensis Besch. — Pottia.
pilifera Br. — Pottia *latifolia* var. *pilifera*.
recurvirostris N. et H. — Didymodon *rubellus*.
reflexa Fürnr. — Gyroweisia.
rubella Hüb. — Didymodon *rubellus*.
Starkeana Br. — Pottia.
 var. *brachyodus* Br. eur. — Pottia *Starkeana* var. *brachyodus*.
stellatifolia Hpe. — Pottia.
subcaespitosa Hpe. — Pottia.
tophacea Br. — Trichostomum.
thraustophylla (1) Ångstr. — Pottia.

ANACAMPTODON Brid. Mant. M. p. 136, t. 2, f. 11 (4 sp.).

- cubensis* (Sull.) Mitt. *M. austr. am.* p. 540. (1869)
 A. maynensis Spr. *Cat.* p. 18. (1867?)
 Fabronia cubensis Sull. in *Proc. am. Acad.* 1861.
 1. Cortic. — *Am. sept.*: Cuba. *Am. merid.*: Amazon., And. Peruv.
fabronioides Welw. et Duby in *Mem. . . Genève* 1871, p. 2, t. 1, f. 5.
 1. Cortic. — *Afr.*: Angola.
Fortunei Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 152.
 — *As.*: Chin. or.
maynensis Spr. — *A. cubensis*.
pygmæus Bryol. jav. — Schwetschkea. (1854-71)
splachnoides (Froehl.) Brid. Mant. M. ll. cc. et *Bryol. univ.* II, p. 225;
 Bryol. eur. V, t. 453; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 586.
Campylodontium hypnoides Schwaegr. *Suppl.* III, I, I, t. 211.
Fabronia splachnoides C. M. *Syn.* II, pp. 38 et 662.
Neckera splachnoides Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 151, t. 82.
 1. Ad Fagos, var. *Abiet. putresc.* — *Eur.*: *Rar.*: *Voges.*, *Silva nigra*,
 Helvet., *Siles.*, *Bavar.*, *Ticin.*; deest in *Britann.* *As.*: *Caucas. occ.*
 Am. sept.: *Reg. or.*
 Eas.: *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 94 (*Neckera*).
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 379.

Anacamptophyllum C. M. *Syn.* II, p. 439 (subsect *HYPNI.*).

Anacamptosphagnum C. M. in *Linn.* 1875, p. 547 (nom., sect. *SPHAGNI.*).

ANACOLIA W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 421 (6 sp.)

- abyssinica* W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 514.
 Bartramia abyssinica C. M. *Syn.* I, p. 506.
 2. *Rupic.*? — *Afr.*: *Abyssin.*, *Choa.*

(1) In *Enumer. Kindberg.* nom. nuda:

A. apiculata Kindb. et C. M.
A. austro-afra C. M.

| *A. gracillima* C. M.

Baueri (Hpe.) Par.*Bartramia Menziesii* Turn. (fid. Lesq. et Jam.).*Glyphocarpa Baueri* Hpe. in Linn. 1859, p. 457.

2. Terr. — Am. sept. : M. Calif.

intertexta (W. P. Sch.) Jaeg. Ad. II, p. 699.*Bartramia intertexta* C. M. Syn. I, p. 503, p. p.*B. lamprocarpa* W. P. Sch. in hb. Mus. Par.*B. setifolia* Mitt. M. austr. am. p. 269, p. p.*Glyphocarpa intertexta* W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic., p. 58.

2. — Am. sept. : Mexic.

Menziesii (Turn.) Par.*Bartramia Menziesii* Turn. in Kon. et Sims. Ann. bot. I, p. 525, t. II, f. I; Brid. Bryol. univ. II, p. 48; C. M. Syn. I, p. 505; Lesq. et Jam. Man. p. 204.*Glyphocarpa Menziesii* Jaeg. Ad. I, p. 525.*Philonotis leiophylla* Kindb. mss.; Mac. Canad. M. n. 151.

2. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit., Alaska, ins. Vancouv., Washington, Idaho, Oregon, Calif.

Ews. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 260 (*Bartramia*).*setifolia* (Hook.) Jaeg. Ad. II, p. 699.*Bartramia intertexta* C. M. Syn. I, p. 503, p. p.*B. setifolia* Mitt. M. austr. am. p. 268.*Glyphocarpa setifolia* Jaeg. Ad. I, p. 525.*Gymnostomum setifolium* Hook. Ic. pl. rar. II, p. 135.

2. Rupic? — Am. merid. : And. Quit. et Peruv.

Webbii (Mont.) W. P. Sch. l. c.*Bartramia granatensis* W. P. Sch. Coroll, p. 85, n. 7.*B. Webbii* C. M. Syn. I, p. 504.*Glyphocarpus Webbii* Mont. in Ann. sc. nat. 1838, p. 56, n. 97 et Pl. cell. Can. p. 28, t. 2, f. 2; Syll. p. 29.

2. Terr. arid. — Eur. : Corsica, M. Granat. Afr. : Alger., Teneriff.

Ews. : Bourg. n. 603 et 1586 (*Glyphocarpa*).**Anasmagonium** Mitt. M. aust. am. p. 615 (sect. POGONATI).**Anastrephidium** Hpe. in Linn. 1876, p. 271 (sect. POROTRICH).**ANDREÄA** Ehrh. in Hann. Mag. 1778 (63 sp.).*acuminata* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, n. 64 et in Fl. Tasm. II, p. 161, t. 7, f. 2.*A. subappendiculata* C. M.?

Ster. Rupic.? — Afr. : Ins. Kerguelen. Pac. : Tasman.

acutifolia Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 535 et Fl.

Antarct. II, p. 396, t. 151, f. 2; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 400;

C. M. Syn. I, p. 7 et II, p. 516; Mitt. M. austr. am. p. 628.

— Afr. : Ins. Kerguelen. Am. sept. : Grönland (ster.).

Am. merid. : And Peruv.?, Fuegia, ins. Eremit., Maclov. Pac. :

N. Zel. sept., ins. Auckland, Campbell.

alpestris Bryol. eur. VI (mon. p. 16), t. 626; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 814.*A. petrophila* var. *alpestris* Thed. Obs. de enerv. Scand. sp. gen. Andreæ in Nya Bot. Notiz 1849.

1. Ad saxa hum. præcip. secus rivul. glacial. — Eur. : Scandin., Scot., summ. Alp. centr., Arvern., Longobard. Am. sept. : Grönland, Nova Scot.

alpestris var. Mitt. — *A. commutata*.

alpina Turn. M. *Hibern.*; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 728 p. p.; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 18) t. 628; *C. M. Syn. I*, p. 7 et *II*, p. 516; *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 819.

A. petrophila Ehrh. *Beitr. I*, p. 592 p. p.

Jungermannia alpina, surculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calycibus imbricatis *L. Sp. Pl.* p. 1601.

Lichenastrum alpinum atro-rubens teres. calycibus squamosis *Dill. Hist. M.* p. 506, t. 73, f. 39.

1. Saxa irror. in rivul. — *Eur.*: Alp. Cambrovall., *Hibern.*, *Scot.*; *Norveg.*, ins. *Finmarck.*; *Arvern.*, summ. Alp.

Exs.: *Rab. Bryoth. eur.* n. 851, 1154.

alpina Ångstr. — *A. obovata*.

alpina Brid., *W. et M.* — *A. petrophila*.

alpina Mitt. — *A. pseudo-alpina*.

var. β *Wahlenb.* — *A. obovata*.

ambigua Wils. — *A. commutata*.

angustata *Lindb. in Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 144.

1. — *Eur.*: *Stiria*.

appendiculata *W. P. Sch. in Bryol eur. VI* (mon. p. 5); *C. M. in Bot. Zeit.* 1864, p. 373; *Mitt. M. austr. am.* p. 629.

A. rupestris *H. f. et W. M. Antarct.*

Fr. ign. Rupic.? — *Am. merid.*: *C. Horn*, ins. *Eremit.*, *Fuegia*.

arachnoidea *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 220.

2. — *Am. merid.*: Alp. *Argent. subtrop.*

asperula *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 65.

— *Pac.*: Alp. *Austral.*

assimilis *C. M. in Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

2. — *As.*: *Penins. Tchutschica*.

aterrima *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 76 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 8.

2. *Rup. sicc.* — *Afr.*: Ins. *Kerguelen*.

Blyttii *Bryol. eur. VI* (mon. p. 25), t. 635; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 821.

A. perichaetialis *Zett. mon. Andr.* p. 26.

2. *Ad rup. juxtà niv.* — *Eur.*: Ins. *Parry*, *Ursorum*, *Spitzberg*. *Am. sept.*: *Grönland*.

Exs.: *Rab. Bryoth. eur.* n. 501 et b, 953.

borbonica *Besch. Fl. bryol Réunion etc.*, p. 187.

2? — *Afr.*: Ins. *Borbon*.

brevipes *Spr. in Proc. of the Linn. Soc.* 1859, p. 628; *Mitt. M. austr. am.*

Rupic. — *Am. merid.*: *And. Nov. Granat. et Peruv.*

commutata *C. M. in Bot. Zeit.* 1864, p. 373.

A. alpestris var. *Mitt. in hb. Ind. or.* n. 3.

A. ambigua *Wils. in Kew. journ. IX*, p. 289.

A. petrophila *Mitt. M. Ind. or.* p. 6.

2. — *As.*: *Sikkim*.

commutata *Limpr* (1). — *A. Huntii*.

(1) Cf. *Cardot in Rev. bryol.* 1884, p. 87.

- compacta* C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.
 1. — As.: Penins. Tschutschika.
- crassinervia* Br. in *Denkschr. Acad. zu Münch.* 1828; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 23), t. 633; C. M. *Syn.* I, p. 10; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 820.
 A. *crassinervia* β *Heinemanni* C. M. l. c.
 A. *Heinemanni* Hpe. et C. M. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 364, t. 2.
 1. Rup. madid. — *Eur.*: Norveg., Scot., Alp., Pyr. *Am. sept.*: Grönland, Nov. Anglia.
Exs.: Sull. et Lesq. M. bor. amer. II ed. n. 26.
- crassinervia* β *Heinemanni* C. M. — A. *crassinervia*.
- cuspidata* C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2.
 2. — As.: Penins. Tschutschika.
- densifolia* Mitt. — *Acroschisma*.
- falcata* *Bryol. eur.* VI (mon. p. 24), t. 634; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 821. (p. p. ?)
 A. *Rothii* β *papillosa* C. M. *Syn.* I, p. 9.
 1. Rup. madid. — *Eur.*: Scot?, Cambrovall., Hercyn?, Engadine, Pyr.
 & var. *heteromalla* *Lindb. M. Scand.* p. 31.
 Ut typ. — *Eur.*: Scand.
- falcata* Rab. — A. *Huntii*.
- Fauriei* *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, XVIII, p. 392.
 2. — As.: Japon.
Exs.: Faurie n. 138.
- filiformis* C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.
 Ster. — As.: Penins. Tschutschika.
- firma* C. M. in *Fl.* 1888, p. 406.
 Ster. In gramin. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.
- flabellata* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 176 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 9.
 2. Rup. sicc. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.
- fragilis* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 223.
 Fl. et fr. ign. — *Am. merid.*: Alp. Argentin. subtrop.
- frigida* var. *sudetica* *Limpr.* — A. *rupestris* var. *grimsulana*.
- Hartmanni* *Theod. Obs. de enerv. Scand. sp. gen. Andraëae in Nya Bot. Notiz*, 1849, p. 78, f. 1-17 et 23-26; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 19), t. 629; C. M. *Syn.* II, p. 516; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 815.
 1. Ad saxa rivul. juxta niv. — *Eur.*: Alp. Scand.
Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 605.
 var. *gracilis* *Zett.* — A. *Thedenii*
 var. *Thedenii* *Lindb.* — A. *Thedenii*.
- Heinemanni* Hpe. et C. M. — A. *crassinervia*.
- Huntii* *Limpr. Laubm. Deutschl.* p. 145.
 A. *commutata* ej. *Einige neue Art. und Form...* 1883, p. 221 et *Laubm. Deutschl.* p. 145.
 A. *falcata* Rab. *Bryoth. eur.* n. 1301 a et b (fid. *Limpr.*).
 1. Rupic. — *Eur.*: Norveg. occ., Britann., Harz, Bavar. *Am. sept.*: Ins. Vancouver.
- indica* *Mitt. M. Ind. or.* p. 6.
 — As.: Sikkim.

Karsteniana C. M. in Linn. 1874, p. 572.

A. petrophila Mitt. M. austr. am. p. 628?

2. — Am. merid. : M. Pichincha.

Kilima N'Djarica Par.

A. striata C. M. in Fl. 1888, p. 406.

Gramin. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Krauseana C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.

2. — As. : Penins. Tschutschica.

laxifolia Hook. f. et Wils. l. c. p. 536 et Fl. Antarct. II, p. 397, t. 151, f. 4; C. M. Syn. I, p. 8 et II, p. 517; Mitt. M. austr. amer. p. 629.

1. — Am. merid. : Ins. Eremit., Fuegia.

« var. minor C. M. l. c.

Cum typ.

Lorentziana C. M. in Linn. 1879-79, p. 221.

2. — Am. merid. : Alp. Argentin. subtrop.

Macounii Kindb. in Bull. Torr. bot. Club April. 1890 et in Mac. Cat. p. 10.

2. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit.

marginata Hook. f. et Wils. l. c. p. 535 et Fl. Antarct. II, p. 396, t. 151, f. 1; C. M. Syn. I, p. 7 et II, p. 516; Mitt. M. austr. amer. p. 629.

2. — Am. merid. : Ins. Eremit., Fuegia.

montana Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 64 et in Fl. Tasm. II, p. 161, t. 7, f. 1.

Ster. Rupic. — Pac. : Tasman.

mutabilis Hook. f. et Wils. l. c. p. 536 (α microphylla) et Fl. Antarct. I, p. 119, t. 57; C. M. Syn. I, p. 8 et II, p. 516; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 400.

— Am. merid. : Ins. Maclov. Pac. : Nov. Zel., ins. Auckland, Campbell.

« var. subsecunda C. M. l. c.

« var. uncinata C. M. l. c.

— Am. merid. : Ins. Maclov. (ambo).

nana C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 176 et in Forschungsreise... Bot. p. 9.

2. — Afr. : Ins. Kerguelen.

Naumanni C. M. ll. cc.

1. Rup. basalt. — Afr. : Ins. Kerguelen.

nitida Hook. f. et Wils. l. c. p. 535 et Fl. Antarct. I, p. 118, t. 57, f. 3; C. M. Syn. I, p. 6 et II, p. 515; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 400.

Rupic. — Pac. : Ins. Auckland, Tasman.

nivalis Hook. in. Trans. of Linn. Soc. X, p. 395, t. 31, f. 4; Brid. Bryol. univ. II, p. 732; Bryol. eur. VI (mon. p. 25), t. 636; C. M. Syn. I, p. 9; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 822.

2. Ad rup. aqua nival. irror. — Eur. : Alp. Scandin., Scot., Helvet., Pyr. Am. sept. : Oregon.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 259.

Un itin. 1864, n. 100.

« var. fuscescens Hook. l. c. f. 4 c, Lindb. M. Scand. p. 30, n. 406.

Ut typ. — Eur. : Lappon., Norveg.

obovata Thed. l. c. p. 78, t. 2; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 17) t. 627; C. M. Syn. II, p. 515; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 81.

A. alpina Ångstr. in. Fr. Summ. Veg. Scand. I, p. 97.

A. alpina var. β Wahlenb Fl. Suec. II ed., II, p. 809.

Jungermannia alpina, surculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calycibus imbricatis L. Sp. Pl. p. 1601 p. p.

1. Rupic. ad rivul. nival. — Eur.: Spitzberg, Alp. Scand. Am. sept.: Grönland.

« var. acuminata Lindb. in Foerteckn. öfv. M... till Spitzb. 1858, och 1861.

Ut typ. — Eur.: Spitzberg.

papillosa Lindb. in Öfv. af Vet. Ak. Forh. XXIII, p. 557 et in Hedwigia 1868, p. 109.

1. Rupic. — Eur.: Spitzberg. As.: Sibir. Am. sept.: Fret. Behring.

« var. brevifolia Berggr. M. Spetsb. n. 155 c.

Ut typ. — Eur.: Ins. Ursorum.

« var. gracilis Lindb. ll. cc.; Hedw. p. 110.

Ut typ. — Eur.: Spitzberg.

« var. latifolia Berggr. l. c. n. 155 b. et in K. Sv. Vet. Ak. Förh. XIII, n. 7. p. 93.

Ut typ. — Eur.: Ins. Parry, Spitzberg.

parallela C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 76 et in Forschungsreise... Bot. p. 8.

2. Rup. sicc. — Afr.: Ins. Kerguelen.

parvifolia C. M. in Fl. 1887, p. 219.

2. — Am. sept.: Alaska.

patens C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.

2. — As.: Penins. Tschutschica.

perichoetialis { Hook. f. — A. subulata var. perichoetialis.
Zett. — A. Blyttii.

petrophila Ehrh. Beitr. I, p. 592 (excl. syn.): *Bryol. eur.* VI (mon. p. 13) t. 623; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 812.

A. alpina W. et M. Bot. Taschb. t. II, f. 3-4; Brid. *Bryol. univ.* II p. 728.

A. rupestris Hedw. Sp. M. p. 47, t. 7, p. p.; C. M. Syn. I, p. 6; H. f. et W. Fl. Nov. Zel. II, p. 57 et Handb. of N. Zeal. Fl. p. 400.

Jungermannia alpina, surculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calycibus imbricatis L. Sp. Pl. p. 1601 p. p.

1. Rupic. — Eur.: E reg. campestr. montos. usque in alp. As.: Japon. ? Caucas. Am. sept.: Grönland, Labrador, Terr. Nov., ins. Miquelon, Nov. Scot., M. Alb., Ontario, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Idaho. Am. merid.: Summ. m. Pichincha (1), Fuegia. Pac.: N. Zel. sept., Tasman.

Exs.: Mac. Can. M. n. 16.

Rab. Bryoth. eur. n. 51, 1247.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 24.

Un itin. 1867, n. 117, 118.

« var. acuminata *Bryol. eur.* l. c. t. 624; W. P. Sch. l. c. p. 813.

Ut typ. — Eur.: Suecia (prov. Upland).

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 52, 369.

var. *alpestris* Thed. — A. *alpestris*.

« var. *alpicola* *Bryol. eur.* ll. cc.; W. P. Sch l. c.

(1) Cf. A. *Karsteniana*.

- Ut typ. — *Eur.*: Hercynia,
 « *var. flaccida* *Bryol. eur. ll. cc.*; *W. P. Sch. l. c.*
 Ut typ. — *Eur.*: Suecia (prov. Upland).
 « *var. gracilis* *Bryol. eur. ll. cc.*; *W. P. Sch. l. c.*
 Ut typ. — *Eur.*: Thuring.
 « *var. homomalla* *W. P. Sch. Syn. I ed., p. 661 et II ed. l. c.*
A. rupestris *W. et M. Bot. Taschenb. p. 384, t. II, f. 5-6; Brid. Bryol. univ. II. p. 726.*
 Ut typ. — *Eur.*: Septentr.
 « *var. pygmaea* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Ut typ. — *Eur.*: Alp. editor.
 « *var. robusta* *Bryol. eur. l. c. t. 625; W. P. Sch. l. c.*
 Ut typ. — *Eur.*: Voges.
 « *var. silvicola* *Bryol. eur. l. c. t. 624; W. P. Sch. l. c.*
 Ut typ. — *Eur.*: Silv. subalpin.
var. sparsifolia *Lindb. — A. sparsifolia.*
 « *var. squarrosula* *Bryol. eur. ll. cc.*; *W. P. Sch. l. c.*
 Ut typ. — *Eur.*: Suecia (prov. Upland).
petrophila *Ehrh. — A. alpina p. p.*
petrophila *Mitt* { *A. commutata.*
 A. Karsteniana?
planivervis *Lindb in Broth. Enum. M. Caucas. p. 94 (nomen).*
Rup. niv. — Eur.: Caucas. occid.
pseudo-alpina *C. M. in. Bot. Zeit. 1859, p. 248.*
A. alpina *Mitt. M. austr. am. p. 620.*
 2. — *Am. merid.*: C. Horn., ins. Eremit.
pseudo-subulata *C. M. — A. subulata var. rigida.*
regularis *C. M. Bryol. austr. Georg. p. 10.*
 1. — *Am. merid.*: Austr. Georg.
rigida *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 289; Mitt. M. Ind. or. p. 6.*
 — *As.*: Sikkim.
Rothii *Brid., C. M., W. et M. — A. rupestris.*
var. grimsulana *C. M. — A. rupestris var. grimsulana.*
var. hamata *Lindb. — A. rupestris var. hamata.*
var. papillosa *C. M. — A. falcata.*
rupestris *Hedw. Sp. M. p. 47, f. 2; Bryol. eur. VI (mon. p. 21) t. 631;*
W. P. Sch. Syn. II ed., p. 819.
A. Rothii *W. et M. Bot. Taschb. p. 386, t. II, f. 7, 8, 9; Brid. Bryol. univ. II, p. 730; C. M. Syn. I, p. 9.*
Jungermannia rupestris, foliis subulatis, secundis *L. Fl. Suec., p. 1045.*
Lichenastrum alpinum, nigricans, foliis capillaribus reflexis *Dill. Hist. M. p. 507, t. 73, f. 40 A (p. p.).*
 1. *Rupic. præcip. calcar. et in molib. errat. — Eur.*: E reg. campestr. montos. usque in subalpin. *Am. sept.*: Grönland, sin. Hudson, New-York, Georgia, Carol.
Exs.: *Rab. Bryoth. eur. n. 604.*
 Sull. et Lesq. M. bor. Amer. II ed. n. 25.
 « *var. capensis* *Rehm. M. Afr. austr. n. 430.*
 Ut typ. — *Afr.*: C. B. Sp.
 « *var. grimsulana* *Bryol. eur. l. c. t. 632; W. P. Sch. l. c.*
A. frigida *Hüb. var. sudetica* *Limpr. Einig. neue Art. und Form..., 1884.*
A. Rothii γ *grimsulana* *C. M. l. c.*

- Ad. rup. alp. madid. — *Eur.* : Suec., Scot., Alp. centr., Pyr.
 « *var. hamata* (Lindb.) Par.
A. Rothii var. hamata Lindb. *M. Scand.* p. 31 (nom.)
 Ut typ. — *Eur.* : Scandin.
 « *var. septentrionalis* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 Ad scopul. aprie. — *Eur.* : Norveg.
- rupestris* C. M. p. p. — *A. striata*.
rupestris C. M., Hedw. — *A. petrophila*.
rupestris H. f. et W. { *A. petrophila*.
 { *A. appendiculata*.
rupestris W. et M. — *A. petrophila var. homomalla*.
semi-squarrosa C. M. in. Linn. 1878-79, p. 222.
 Fr. ign. — *Am. merid.* : Alp. Argent. subtrop.
sparsifolia Zett. monog. p. 32; W. P. Sch. Coroll. p. 94 in adn. et op. cit.
A. rupestris var. sparsifolia Lindb. *M. Spetsb.* p. 559.
 l. Rupic. juxtà niv. — *Eur.* : Alp. Norveg., Ticin.
 « *var. sublaevis* Kindb. ined.
 — *Am. sept.* : Vancouver.
- squamata* C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungsreise... Bot. p. 10.
 2. Rup. sicc. et basalt. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- squarrosa* Mitt. *M. austr. am.* p. 629.
 — *Am. merid.* : And. Quit.
- striata* Mitt. l. c. p. 628.
A. rupestris C. M. Syn. I, p. 6 (quoad pl. Brasil.).
 — *Am. merid.* : And. Quit., Brasil. austr. or.
- striata* C. M. — *A. Kilima N'Djarica*.
- subappendiculata* C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 76 et in Forschungsreise... Bot., p. 8.
A. acuminata Mitt?
 Ster. Rup. sicc. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- subnervis* Hook. f. et Wils. in Lond. Jour. of bot. 1847, p. 289; C. M. Syn. I, p. 8; Mitt. *M. austr. am.* p. 630.
 — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- subulata* Harv. in Hook. Pl. rar. III, t. 201; C. M. Syn. I, p. 10.
 l. Rupic. — *Afr.* : C. B. Sp.
 « *var. perichaetialis* Harv. et Hook. ll. cc.
A. perichaetialis H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 533.
 Ut typ. — *Am. merid.* : Ins. Eremit., Maclov.
 « *var. rigida* Harv. et C. M. ll. cc.
A. pseudo-subulata C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 373.
A. subulata H. f. et W. Fl. Antarct. I, 119, t. 57, f. 1 et Handb. of N. Zeal. Fl. p. 400; Mitt. *M. austr. am.* p. 630.
 Ut typ. — *Am. merid.* : Ins. Eremit., Fuegia. Pac. : Austral., N. Zeland., Tasman., ins. Auckland, Campbell.
- subulata* H. f. et W. — *A. subulata var. rigida*.
- Thedenii* Bryol. eur. VI (mon. p. 20) t. 630; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 816.
A. Hartmanni β *gracilis* Zett. mon.?
A. Hartmanni var. Lindb. *M. Scand.* p. 31.
 l. Ad et in rivul. nival. — *Eur.* : Norveg. (Dovre).

turgescens W. P. Sch. in C. M. Syn. II, p. 515.

— Am. sept. : Summ. m. Orizaba, Nevado de Toluca.

viridis C. M. Bryol. austr. Georg. p. 10.

2. — Am. merid. : Austr. Georg.

vulcanica Ltz. Moosst. p. 156.

2. — Am. merid. : M. Ilinitza.

Willii C. M. op. cit. p. 11.

2. — Am. merid. : Austr. Georg.

ANGSTRÖMIA Bryol. eur. I (9 sp.)

acerosa Hpe. Prodr. fl. Nov. Granat. p. 355.

2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

andicola C. M. — A. julacea.

argentinica C. M. — Dicranella.

aulacocarpa C. M. — Dicranella.

austro-exigua C. M. — Dicranella.

banatica Hpe. — Dicranella heteromalla.

bella C. M. — Dicranella.

Beyrichiana Hpe. — Dicranella.

bicolor C. M. — Dicranella.

bogotensis Hpe. — Dicranella.

Borgeniana Hpe. — Dicranella.

brachyblepharis C. M. — Dicranella.

brevifolia Hpe. et Ltz. — Trichostomum Krauseanum.

callosa Hpe. — Dicranella.

Cameruniae C. M. — Dicranella.

campylophylla C. M. — Dicranella.

capituligera C. M. — Dicranella.

cerviculata C. M. — Dicranella.

clathrata C. M. — Dichodontium.

coarctata C. M. — Dicranella.

compacta C. M. — Dicranella.

consimilis Hpe. — Dicranella.

convoluta Hpe. — Dichodontium.

crassinervis Hpe. — Dicranella.

crispa C. M. — Dicranella.

curvata C. M. — Dicranella.

curviseta Hpe. — Campylopodium.

cylindrica C. M. — Trichodon.

cyrtodonta C. M. — Dicranella.

densa C. M. — Dicranella.

Dietrichiae C. M. — Dicranella.

ditissima Hpe. — Dicranella.

euchlora C. M. — Microdus.

euphoroclada C. M. — Campylopodium.

exigua C. M. — Microdus.

exigua Wils. — Microdus pomiformis.

Fendleri C. M. — Campylopodium.

Gayana (Mont.) C. M. Syn. I, p. 427; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 69; Mitt.

M. austr. am. p. 27.

Dicranum Gayanum Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 112 et in Gay Hist. Chil. Bot. crypt. t. 2, f. 3; Syll. p. 45.

2. Terr. — Am. merid. : Chil. austr.

Glaziowii Hpe. — Dicranella.

Grevilleana C. M. — Dicranella.

- Guilleminiana* C. M. — *Dicranella*.
heteromalla C. M. — *Dicranella*.
 var. *interrupta* C. M. — *Dicranella heteromalla* var. *interrupta*.
 var. *orthocarpa* C. M. — *Dicranella heteromalla* var. *orthocarpa*.
 var. *stricta* C. M. — *Dicranella heteromalla* var. *stricta*.
Hilariana C. M. — *Microdus*.
himalayana Jaeg. — *Dichodontium Hookeri*.
Hookeri C. M. — *Dichodontium Jamesoni*.
integra C. M. — *Microdus*.
julacea (Hook.) Mitt. *M. aust. am.* p. 27.
 A. *andicola* C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 189 et *Syn. I*, p. 428.
Gymnostomum julaceum Hook. *M. ex. t.* 42; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 92.
Illecebraria julacea Hpe. *Prodr. Fl. Nov. Gran.* p. 354.
 2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
Lamyi Boul. — *Leptotrichum vaginans* var. *brevifolium*.
Liebmanniana C. M. — *Dicranella*.
ligulifolia C. M. — *Dicranella*.
longipes (Somm.) *Bryol. eur. I*, t. 94; C. M. *Syn. I*, p. 426; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 69.
Dicranum julaceum H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. I ed.*, n. 100.
D. varium eor. l. c. n. 99 p p.
Weisia longipes Somm. *Suppl. ad Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 54, t. 1.
 2. Argill. aren. humid. — *Eur.* : Scandin., Engadine, Salisb., Pinzgow.
Am. sept. : Grönland, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit.
Eas. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1226.
 Un. itin. 1863, n. 8.
Lorentzi C. M. — *Dichodontium*
Mac-Leana Rehm. *M. Afr. austr.* n. 440.
 — *Afr.* : Transvaal.
maculata C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.
 2. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
Martiana Hpe. — *Microdus*.
microdonta C. M. — *Microdus Liebmanni*.
minuta Hpe. — *Microdus*.
muralis Hpe. — *Microdus*.
neo-caledonica C. M. — *Campylopodium*.
orientalis Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 154.
 Ster. — *As.* : Sikkim, Bhotan, Birma.
Pabstiana C. M. — *Dicranella*.
pellucida C. M. — *Dichodontium*.
 var. *fagimontana* C. M. — *Dichodontium pellucidum* var. *fagimontana*
 var. *serrata* C. M. — *Dichodontium pellucidum* var. *serrata*.
Perrottetii C. M. — *Dicranella*.
phascoides C. M. — *Campylopodium*.
Pilopogon C. M. — *Campylopodium*.
planinervia C. M. — *Dicranella*.
pusilla Hpe. — *Microdus*.
Reinwardti C. M. — *Dichodontium*.
rufescens C. M. — *Dicranella*.
rufipes C. M. — *Dichodontium*.
rufo-aurea Hpe. — *Dicranella*.
Sartorii C. M. — *Campylopodium*.
Sauteri C. M. — *Dicranella pumila*.
Schmidii C. M. — *Dicranella pumila*.
Schreberi C. M. — *Dicranella*.

squarrosa C. M. — Dicranella.

strumulosa Hpe. — Dicranella.

var. *minor* Hpe. — Dicranella *strumulosa* var. *minor*.

subcompressa Hpe. mss.; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 215.

2. Rupic. — Afr. : C. B. Sp.

subsubulata Hpe. — Dicranella.

subsulcata Hpe. — Dicranella.

subulata C. M. — Dicranella.

tenuirostris C. M. — Microdus.

tenuiseta C. M. — Dicranella.

tovariensis C. M. — Dicranella.

trematodontifolia C. M. — Dicranella.

tricuris C. M. — Dichodontium.

Trumpffii Hpe. — Dicranella.

vaginata C. M. — Dichodontium.

varia C. M. — Dicranella.

var. *tenuifolia* C. M. — Dicranella *varia* var. *tenuifolia*.

var. *Sull.* — Dicranella *chrysea*.

virens C. M. — Cynodontium.

var. *compacta* C. M. — Cynodontium *virens* var. *compacta*.

vulcanica C. M. *Syn. I*, p. 427.

Dicranum filiforme *Schwaegr. Suppl. II*, p. 72, t. 122.

D. *vulcanicum* *Brid. Bryol. univ. I*, p. 124.

Weisia vulcanica *Brid. Sp. M. I*, p. 124.

2. Rup. basalt. — Afr. : Ins. Bourbon, Madagascar. Am. sept. : Mexic., Jamaïc. Am. merid. : And Quitens.

Wahlenbergii C. M. — Cynodontium *virens* var. *Wahlenbergii* (1).

ANHYMENIUM *Griff. Not.* p. 471.

polycarpus *Griff.* — Rhegmatodon.

polysetus *Griff.* — Rhegmatodon *orthostegius* ?

ANICTANGIUM (Vid. *Aniectangium*)

ANISODON, *Bryol. eur. V* (2 sp.).

acutirostris *Bryol. eur.* — Clasmatodon *parvulus* var. *rupestris*.

Bertrami *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 506 ; *II ed.* p. 588.

A. *perpusillus* *Bryol. eur. V*, t. 452.

Clasmatodon *perpusillus* *Lindb. in. Journ. of the Linn. Soc. XIII*, p. 71.

Cl. *parvulus* *Husn. Muscol. gall.* p. 299.

Cl. *parvulus* var. *julacea* C. M. in *Linn.* 1875, p. 437.

Neckera perpusilla C. M. *Syn. II*, p. 666 (*excl. syn. Pterogonium perpusillum de Not.*).

1. Ad trunc. Pini silvestr. — Eur. : Saxon., Boruss.

ferrugineus *Lindb. in. sched.*

Clasmatodon *ferrugineus* *Jaeg. Ad. II*, p. 287.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

perpusillus *Bryol. eur.* — A. *Bertrami*.

ANISOSTICHIUM *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VI.*

Bakeri *Mitt.* — Epipterygium *Wrightii*.

pictum *Mitt.* — Webera.

Tozeri *Mitt.* — Webera.

(1) In Enum. Kindbergiana nomen nudum :

A. *brevipes* *Hpe.*

ANISOTHECIUM Mitt. *M. austr. am.* p. 39.

campylophyllum Mitt. — *Dichodontium*.

convolutum Mitt. — *Dichodontium*.

crispum Lindb. — *Dicranella* Schreberi.

Grevillei Lindb. — *Dicranella*.

humile Lindb. — *Dicranella varia* var. *tenella*.

Jamesoni Mitt. — *Dichodontium*.

planinervium Mitt. — *Dicranella*.

pycnoglossum Broth. — *Dicranella*.

rubrum Lindb. — *Dicranella varia*.

var. *obtusiusculum* Lindb. — *Dicranella varia* var. *obtusiuscula*.

squarrosum Lindb. — *Dicranella*.

ANODON Rabenh. *Deutsch. Krypt. Fl.*

pulvinatus Rab. — *Grimmia sphærica*.

ventricosus Rab. — *Grimmia anodon*.

ANODONTIUM Brid. *Sp. M. I*, p. 41.

prorepens Brid. — *Drummondia clavellata*.

ANODUS Bryol. Eur. I (1 sp.)

Donianus (Engl. Bot.) *Bryol. eur. I*, t. 109; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 124.

Gymnostomum Donianum Engl. Bot. t. 1582; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 66.

G. pusillum Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 22.

Seligeria Doniana C. M. *Syn. I*, p. 420 et *II*, p. 603.

1. Ad rup. aren. et calc. — *Eur.*: Norveg., Britann., German., Helvet., Jurass. As.: Jenissi super. *Am. sept.*: New York, Ontario, M. Rupestr.

ANÆCTANGIUM Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 33 (46 sp.)

acaule Röhl. — *Pharomitrium subsessile*.

aestivum Mitt. *M. austr. am.* p. 175.

A. euchloron Mitt. in *M. Jameson*.

— *Am. merid.*: And. Quitens.

aestivum Bryol. eur. — *A. compactum*.

afro compactum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 342.

— *Afr.*: M. Cameroon.

andinum Mitt. *l. c.* p. 177.

Rup. umbros. — *Am. merid.*: And. Quitens.

angustifolium Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1865, p. 2.

A. Knyi Jur. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 20.

A. Paivanum W. P. Sch. in *Mandon M. Madeir. n.* 2.

Rupic. — *Afr.*: Teneriffa.

apiculatum W. P. Sch. in *Besch. Pr. Bryol. mexic. p.* 16.

— *Am. sept.*: Mexic.

aquaticum Hedw. — *Cinclidotus aquaticus*.

borbonense Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 12

Terr. — *Afr.*: Ins. Bourbon.

Breutelianum Bryol. eur. — *A. euchloron*.

bulbosum Hedw. — *Cyatophorum*.

*caespiticiu*m Schwaegr. — *Stylostegium*.

callidum Mitt. *M. austr. am.* p. 177.

In stillicid. callid. — *Am. merid.*: And. Quitens.

ciliatum } C. M. — Hedwigia nivalis.
 } Hedw. — Hedwigia ciliata.

var. *rufescens* W. Arn. — Hedwigidium imberbe.
cirrosum Hedw. — Macromitrium.

clarum Mitt. *M. Ind. or.* p. 31.

A. compactum var. *Wils* in *Kew Journ. bot.* IX, p. 326.

2. — *As.* : Sikkim.

compactum *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 36, t. 11; Bryol. eur. (mon. p. t. 37; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 47.*

A. aestivum *Bryol. eur. l. c.*

Gymnostomum aestivum *Bryol. germ. p. 173, t. XI, f. 25.*

G. compactum *Schleich. Crypt. helv. II Centur., n. 7; Brid. Bryol. univ. I, p. 86.*

G. luteolum *Engl. Bot. t. 2201.*

G. tristichum *Wahlenb. Fl. Lapp. p. 303.*

Hedwigia aestiva *Hook. Fl. Brit.*

Pleurozygodon aestivus *Lindb. M. Scand. p. 29.*

Zygodon compactus *C. M. Syn. I, p. 683 et II, p. 637.*

2. In fissur. rup. madid. pæcip. micac. schistos. — *Eur.* : Reg. alp. tota, rarius in reg. subalp. et montana. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : Groenland. *Pac.* : N. Zeland (?)

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 123.

Un. itin. 1863, n. 5.

var. brevifolium *Jur. in sched. ; Milde Bryol. siles., p. 109.*

Ut typ. — *Eur.* : Sudet.

compactum var. *Wils.* — A. clarum.

condensatum *W. P. Sch. in Besch. Pr. Bryol. mexic. p. 16.*
 — *Am. sept.* : Mexic.

? coronatum *H. f. et W.* — Erpodium.

crassinervium Mitt. — A. pusillum.

crispulum *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 325.*

A. Thomsoni Mitt. *M. Ind. Or. p. 31.*

Tortula « T. paludosæ allied » *Wils. l. c. p. 322.*

2. — *As.* : Himalaya.

domingense *Schwaegr.* — Erpodium.

Duseni *C. M. in Dusen M. Camer. n. 157.*

— *Afr.* : M. Cameroon.

Erpodium domingense *Brid.* — Erpodium.

euchloron (*Schwaegr.*) Mitt. *M. austr. am. p. 176.*

A. Breutelium *Bryol. eur. I (mon. p. 6, nom) et Besch. Pr. Bryol. mexic. p. 16.*

A. tenellum Mitt. in *Jameson M. exs. et in Lond. Journ. of bot.*

Gymnostomum euchloron *Schwaegr. Suppl. II, II, p. 83, t. 176.*

G. guadeloupense *Spreng. Syst. veg. IV, I, p. 145.*

G. lamprocarpum *Mont. in Ann. Sc. nat. IX, 1838, p. 49 et Syll. p. 50.*

Zygodon pusillus *C. M. Syn. I, p. 684 et II p. 637.*

Zygodon tenellus Mitt. in *Lond. Journ. of bot. 1851, p. 56; C. M. Syn. II, p. 638.*

2. Terr. — *Am. sept.* : Mexic., Guadel., Martinic., Guatemala. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Æquat., And. Quitens.

euchloron Mitt. — A. aestivum.

eucollum *Besch.* — A. rufo-viride var. eucollum.

excelsum (*C. M.*) *Par.*

Zygodon excelsus *C. M. in Linn. 1878-79, p. 369.*

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtrop.
falcatum P. B. — *Cinclidotus aquaticus*.
ferrugineum Besch. in *Ann. Sc. nat.* 1893, p. 329.
 2 Rupic. — *As.* : M. Japon.
Exs. : Faurie n. 3543.
flaccidum de Not. { (*fid. C. M.*). — *Grimmia anodon*?
 { (*fid. Husn.*). — *Grimmia sphaerica*.
glauescens W. P. Sch. in *Besch. Pr. bryol. mexic.* p. 16.
 — *Am. sept.* : Mexic.
Hornschuchianum Funk in *Fl. vel Regensb. Bot. Zeit.* 1819, I, p. 83
 et 1820, II, p. 82; *Bryol. eur.* I (mon. p. 6) t. 38; W. P. Sch. *Syn.*
 II ed. p. 48.
Gymnostomum Hornschuchianum *Bryol. germ.* I, p. 76, t. II; *Brid.*
Bryol. univ. I, p. 88.
Molendia Hornschuchiana *Lindb. Utkast. nat. grupp.*..., p. 29.
Hedwigia Hornschuchiana *Hook. M. exot.* II, p. 3, t. 103.
Zygodon Hornschuchianus *C. M. Syn.* I, p. 685.
 2. Ad rupes cataract. — *Eur.* : Alp. Carinth., Rhaet.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 683, 1263.
Hornschuchianum { *Bryol. brit.* — *Trichostomum tophaceum* var. *terrestre*.
 { *Tayl.* — *Barbula cirrifolia*.
Humbloti Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 9.
 Ster. — *Afr.* : Comor magn.
Humboldti *Brid.* — *Harrisonia*.
hymenodontoides (*C. M.*). *Jaeg. Ad.* I, p. 9.
Zygodon hymenodontoides *C. M. in. Linn.* 1869-70, p. 40.
 Ster. Cortic. — *As.* : Ceylan.
imberbe { *Drumm.* — *Hedwigia ciliata* var. *viridis*.
 { *Hook et Tayl.* — *Hedwigidium*.
impressum *Hpe. in Linn.* 1874, p. 208.
 2. — *Afr.* : Madagasc.
indicum *Mont.* — *Braunia*.
Kilima N'Djaricum *Par.*
A. pusillum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 305.
 — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
Knyi *Jur.* — *A. angustifolium*.
lapponicum { *Hedw.* — *Amphoridium*.
 { *Kze.* — *Amphoridium curvipes*.
laxifolium (*Kze.*) *Par.*
A. tenerrimum *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 801.
Gymnostomum laxifolium *Kze. in Pöpp. Pl. Chil. III Coll.* 268 (53).
Zygodon tenerrimus *C. M. Syn.* I, p. 684.
 2. Cortic. et rupic. — *Am. merid.* : Chil. austr.
Lechlerianum W. P. Sch. in *Lechler Pl. Peruv. n.* 2720; *Mitt. M. austr.*
am. p. 177.
 2. Rupic. — *Am. merid.* : Peruv.
 « var. *laetior* *Hpe. in Fl.* 1865, p. 37.
C. typ.
Liebmanni W. P. Sch. in *Besch. Pr. bryol. mexic.* p. 15.
 — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

- mafatense *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, 1, p. 167.
— *Afr.* : Ins. Borbon.
- mamabolense *Rehm. M. Afr. austr. n.* 435.
Ster? — *Afr.* : Transvaal.
- Mandonianum *W. P. Sch. in Mandon M. Boliv. n.* 1606.
Zygodon linearis C. M. in Linn. 1878-79, p. 370.
2. Rupic? — *Am. merid.* : And. Boliv., Alp. Argentin. subtropic
- Mariei *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 13.
2. Fr. ign. Terr. — *Afr.* : Ins. Nossi-Be.
- Mougeotii* *Lindb. — Amphoridium.*
- obtusiusculis *Besch. in Ann. Sc. nat.* 1892, I, p. 49.
2. Silvic. — *As.* : Yunnan.
- Paivanum* *W. P. Sch. — A. angustifolium.*
parasiticum *Brid. — Calymperes.*
- paucidentatum *C. M. in Fl.* 1888, p. 413.
Ster. Gramin. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- Peckii *Sull. Jc. M. Suppl. p.* 38, t. 25 et in *Aust. M. Appal. n.* 64; *Lesq. et Jam. Man. p.* 55.
Amphoridium Peckii Sull. in R. Rep. of Univ. of St. of N. York 1869, p. 57.
Ster. Rupic. — *Am. sept.* : New-York.
- peruvianum *Sull. in Am. Expl. Exp.* 1859, t. 1; *Mitt. M. austr. am. p.* 177.
— *Am. merid.* : M. Chimborazo.
- ? planifolium *Hedw. Sp. M. p.* 44, t. 6; *Brid. Bryol. univ. II, p.* 167; *C. M. Syn. II, p.* 173 (1)
— *Pac.* : Ins. austral.
- porto-ricense *Spreng. — Philonotis tenella var. humilis.*
- pulvinatum *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 160.
Ster. — *As.* : Japon.
- pulvinatum *Röhl. — Grimmia sphaerica.*
- pusillum *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p.* 325.
A. crassinervium Mitt. M. Ind. or. p. 31.
Ster. — *As.* : Tibet occid.
- pusillum *Mitt. — A. Kilima N'Djaricum.*
- rhapidostegium *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 13.
— *Afr.* : Ins. Comor. magn.
- repens *Hook. — Gigaspermum.*
- Roylei *Mitt. M. Ind. or. p.* 30.
2. — *As.* : Himalaya occid.
- rufo-viride *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p.* 13.
— *Afr.* : Ins. Comor. magn.
- « var. eucollum *Besch. l. c.*
A. eucollum Besch. in Rev. bryol.
Cum typ.
- Schliephackei (*Limpr.*) *Par.*
Molendia linguefolia Lindb. in sched.
Pleuroweisia Schliephackei Limpr.
Rup. calcar. — *Eur.* : Alp. helvet. *As.* : Caucas. centr.

(1) « Verosimiliter Neckeracea ». (C. M. l. c.).

Schmidii Mitt. — *Oreoweisia*.

sciuroides Bals. et de Not. — *Braunia*.

secundum { Brid. — *Braunia*.
Mont. — *Braunia indica*.

Sendtnerianum *Bryol. eur. I* (mon. p. 7), t. 39; *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 49.

Molendoa Hornschuchii forma *Lindb. Uthast. nat. grupp...* p. 29.

M. Sendtneriana *Limpr. Deutschl. Laubm. I*, p. 250.

Zygodon Sendtnerianus *C. M. Syn. I*, p. 686.

2. *Rup. irror.* — *Eur.* : *Alp. centr. As.* : *Caucas.*

setosum Hedw. — *Cyrtopus*.

sordidum Mitt. *M. austr. am.* p. 176.

— *Am. merid.* : *M. Chimborazo*.

spathulatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 150.

— *Afr.* : *M. Cameroon*.

sphaericum Spreng. — *Physcomitrium*.

Stracheyanum Mitt. — *A. tortifolium*.

striatum { Brid. — *Amphoridium lapponicum*.
Wils. — *Hedwigia ciliata var. striata*.

subsessile Spreng. — *Pharomitrium*.

tenellum Mitt. — *A. euchloron*.

tenerimum *C. M.* — *A. laxifolium*.

tenuinerve (*Limpr.*) *Par.*

Molendo : *tenuinervis* *Limpr. Laubm. Deutschl.*, p. 258.

2. ♂ *ign. Lignic.* — *Eur.* : *Tirol*.

Thomsoni Mitt. — *A. crispulum*.

torquatum Brid. — *Helicophyllum*.

torquescens Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 160.

Ster. — *As.* : *Japon*.

tortifolium Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 326.

A. Stracheyanum Mitt. *M. Ind. or.* p. 31.

2. — *As.* : *Himalaya occid.*

trichodes *Schwaegr.* — *Brachyodus*.

viridatum (*C. M.*) *Par.*

Zygodon viridatus *C. M. in Fl.* 1890, p. 481.

Ster. — *Afr.* : *Kilima N'Djaro* (1).

ANOMOBRYUM *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 382.

abyssinicum *Jaeg.* — *Bryum filiforme var. abyssinicum*.

auratum *Jaeg.* — *Bryum*.

concinatum *Jaeg.* — *Bryum*.

cygnicollum *Jaeg.* — *Bryum climacodontium*.

filiforme *Husn.* — *Bryum*.

filiforme *Jaeg.* — *Bryum cymbifolium*.

var. juliforme *Husn.* — *Bryum juliforme*.

julaceum *W. P. Sch.* — *Bryum filiforme*.

var. ? abyssinicum *W. P. Sch.* — *Bryum filiforme var. ? abyssinicum*.

var. ? algerianum *W. P. Sch.* — *Bryum juliforme*.

var. ? concinatum *Zett.* — *Bryum julaceum*.

(1) In *Enum. Kindberg.* nomina nuda :

A. Eggersii *C. M.*

|

A. subpusillum *C. M.*

- var. ? *mexicanum* W. P. Sch. — *Bryum filiforme* var. *mexicanum*.
 var. ? *quitense* W. P. Sch. — *Bryum filiforme* var. ? *quitense*.
juliforme Solms Laub. — *Bryum*.
leptostomoides W. P. Sch. — *Bryum leptostomum*.
mexicanum Jaeg. — *Bryum filiforme* var. *mexicanum*.
nitidum Jaeg. — *Bryum*.
orbiculatum Jaeg. — *Bryum*.
procerrimum Rehm. — *Bryum*.
prostratum Besch. — *Bryum*.
 var. *minus* Besch. — *Bryum prostratum* var. *minus*.
quitense W. P. Sch. — *Bryum*.
Schmidii Jaeg. — *Bryum*.
semi-ovatum Jaeg. — *Bryum*.
sericeum de Lacr. — *Bryum leptostomum*.
spongiosum Jaeg. — *Bryum*.

Anomocladus Mitt. *M. austr. am.* p. 567 (sect. LESKEAE).

ANOMODON Hook et Tayl. *Muscol. brit.* (36 sp.).

abbreviatus Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 187.

A. brevisetus Broth. mss.

2. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 39, 827.

acutifolius Mitt. *M. Ind. or.* p. 126.

2. — *As.* : Himalaya occ., Japon.

Exs. : Faurie n. III, 116, 130, 241, 3523.

angustatus (Tayl.) Jaeg. *Ad. II*, p. 300.

Hypnum angustatum C. M. *Syn. II*, p. 472.

Leskea angustata Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 62.

Porotrichum insularum Mitt. *M. austr. am.* p. 464 ?

Arbor. — *Am. merid.* : Nov. Granat., Quito.

apiculatus *Bryol. eur.* V (nom.); W. P. Sch. *Syn. II ed.*, p. 601.

Hypnum Rügellii C. M. *Syn. II*, p. 473.

2. *Ad. arbor. et rup. in montos.* — *Eur.* : Sept. et med. : Suecia, Silesia, Rhöngeb, Austr. inf., Helvet. *As.* : Saghalien, Caucas. occ. et cent. *Am. sept.* : Ottawa, Ontar., rég. sept. et or.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 257.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1096.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 358.

attenuatus (Schreb.) Hüb. *Muscol. germ.* p. 562; *Bryol. eur.* V (mon. p. 4), t. 475; W. P. Sch. *op. cit.* p. 600.

Hypnum attenuatum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 100, n. 1073; C. M. *Syn. II*, pp. 473 et 691.

H. clavatum Bell. *App. ad Fl. Pedem.* p. 51.

H. fulvum Brid. *Sp. M. II*, p. 151.

H. repens, trichodes arboreum majus, caulibus ramosis Dill. *Hist. M.* p. 331, t. 42, f. 66 a-c.

Leskea attenuata Hedw. *M. frond. I*, p. 33, t. 12; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 317.

L. radicans Schrank *Baiers Fl. II*, p. 460.

2. *Ad arbor. rad. et viar. cav. marg.* — *Eur.* : Reg. campestr. et montos., excl. Britann. *As.* : Japon., Caucas. *Am. sept.* : Nov. Scotia, New Brunswick, Ottawa, Ontar., Columb. brit., reg. sept., centr., or. et merid. — *Pac.* : ? (hb. de Poli).

- Exs.* : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 226, II ed. n. 103 (*Hypnum*).
Mac. Canad. M. n. 255.
Rab. Bryoth. eur. n. 334.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 361.
- « *var. brevifolius Ren. et Card. in Bot. Centralbl.* 1890, p. 51.
Rupic? — *Am. sept.* : Indiana, Illinois, Wisconsin.
- attenuatus Sull.* — *A. Wrightii*.
brasiliensis Hpe. — *Myrinia*.
- brevinervis Broth. in Oefv.....* 1890, p.
Ster. Cortic. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).
- brevisetus Broth.* — *A. abbreviatus*.
- brunneo-sordidus C. M. in Rev. bryol.* 1892, p. 41 (*nom.*).
 — *As.* : Himalaya.
- californicus Lesq. in Mem. Calif. Acad. I,* p. 30; *Lesq. et Jam. Man.*
 p. 306.
Ster. — *Am. sept.* : Calif.
- cladorhizans Hüb.* — *Cylindrothecium*.
clavirameus Jaeg. — *Pseudo-Leskea*.
compressus Br. — *Cylindrothecium*.
- consanguineus (Mont.) Jaeg. Ad. II,* p. 301.
Hypnum consanguineum C. M. Syn. II, p. 472.
Leskea consanguinea Mitt. M. Ind. or. p. 131.
Pterogonium consanguineum Mont. in Ann. sc. nat. 1842, p. 249 et *Syll.*
 p. 21.
 2. — *As.* : Yunnan, M. Neilgherr.
- curtipendulus H. et T.* — *Antitrichia*.
- devolutus Mitt. M. Ind. or,* p. 127.
Ster. — *As.* : Japon., Chin. or., Hong-Kong, Himalaya.
- Eckloni Hpe. mss.; Jaeg. Ad. II,* p. 306.
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- exilis Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 309.
Ster. — *Afr.* : Natal.
- filiformis Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 308.
Ster. — *As.* : Ceylan.
- filivagus C. M. in Fl.* 1890, p. 495.
Ster. — *Afr.* : M. Aberdare.
- Filum Broth mss.*
Ster. — *As* : Japon.
- flexilis Hpe.* — *Papillaria*.
fragilis Wils. — *Leskea tristis*.
gracillimus Jaeg. — *Schwetschkea*.
Grateloupii Mont. — *Schwetschkea*.
- heteroideus Kindb. in Mac. Cat.* p. 172.
Leskea nervosa var. flagellifera Kindb. in Ott. Nat. IV, p. 62.
L. nigrescens Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVI, p. 97; *Mac. Canad.*
M. n. 395, et 252 p. p.
 2. *Ster. Ad saxa calcar. et rad. Acer.* — *Am. sept.* : Ottawa, Ontario,
 M. Rupestr.
- Huttonii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 309.
Ster. — *Pac.* : Nov. Zeland.

integerrimus Mitt. *M. Ind. or.* p. 126.

Ster. — *As.* : Nepal, Himalaya.

intricatus Hpe. — *Pylaisia*.

lagoënsis Hpe. *Symb.* 1870, p. 283.

1. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

Leikipiæ C. M. — *Pseudo-Leskea*.

leskeoides (W. P. Sch.) Par.

Hypnum leskeoides W. P. Sch. in *Drege Pl. Cap. n.* 8058; C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 787.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

longifolius (Schleich.) Hartm. *Skand. Fl. X ed.*, V, p. 339; *Bryol. eur.* V (mon. p. 3), t. 474; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 599.

Grimmia cylindracea W. et M. *Bot. Taschb.* p. 157.

Hypnum longifolium C. M. *Syn.* II, pp. 474 et 691.

Leskea longifolia Spr. *M. Pyr. exs. n.* 87.

Pterigynandrum longifolium Schleich. *Cent. IV Pl. helv. n.* 8.

Pt. nervosum β *cylindraceum* Roehl. *Deutsch. Fl. III*, p. 54.

Pt. nervosum β *longifolium* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 190.

Pt. plumulosum β *longifolium* Brid. *Mant. M.* p. 129.

2. Ad arbor., sax. et terr. lapid. — *Eur.* : Centr. et sept., in zon. intermed. et sept.; rar. fructif. — *As.* : Jenissei sup., Caucas. occ. et centr.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 474, 1036.

mexicanus Jaeg. — *Leskea*.

minor Fürnr. — *A. obtusifolius*.

mutabilis Mont. — *Lescurea striata*.

nervosus Hüb. — *Leskea*.

obscurus Jaeg. — *Leskea*.

obtusifolius Br. et Sch. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 163 et in *Lond. Journ. of bot.* 1843, p. 66; Sull. *Ic. M.* p. 119, t. 74; Lesq. et Jam. *Man. pp.* 305 et 419.

A. minor Fürnr. ; Lindb.

Hypnum stoloniferum P. B. *Prodr.* p. 70.

H. viticulosum β *brachycarpum* C. M. *Syn.* II, p. 473.

Isothecium minus Sull. in *Asa Gray Man. bot. U. St. I ed.*, p. 667, n. 6.

Neckera flaccida Brid. *Sp. M. II*, p. 37 et *Mant. M.* p. 139, n. 18 ?

Schwaeagr. Suppl. I, II, p. 154 ?

N. minor Sull. *M. Allegh. n.* 74 (an *P. B. Prodr.* p. 78 ? *fid. C. M. l. c.*).

N. viticulosa β *minor* Hedw. *Sp. M.* p. 209, t. 48, f. 6.-8; Brid. *Sp. M. II*, p. 37 et *Bryol. univ. II*, p. 233.

2. Cortic. — *As.* : Jenissei sup. *Am. sept.* : New Brunswick, Gaspes., Ontario, Niagara, reg. sept., centr. et occ.

Exs. : Mac. *Canad. M.* p. 256.

Sull. et Lesq. *bor. am. II ed. n.* 360.

obtusifolius Mac. — *A. platyphyllus*.

ovicarpus Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 366.

2. Cortic. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 736.

platyphyllus Kindb. *ined.*

A. obtusifolius Mac. *Canad. M. n.* 256 et *Cat. p.* 171.

2. Ad rad. arb. in silv. humid. — *Am. sept.* : Ottawa, Ontario.

pellucinervis (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 305.

Leskea pellucinervis Mitt. *M. Ind. or.* p. 130.

Ster. — As. : Himalaya occ.

planatus Mitt. *op. cit.* p. 126.

Ster. Filicic. — As. : Himalaya, Japon.

pseudo-attenuatus (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 304.

Hypnum pseudo-attenuatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 786.

l. — Afr. : C. B. Sp.

ramulosus Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 187.

Ster. — As. : Chin., Japon.

repens Hüb. — *Platygyrium*.

robustus Rehm. *M. Afr. austr. n.* 639 b.

Ster. — Afr. : Transvaal.

rostratus (Hedw.) W. P. Sch. *Syn. I ed.*, p. 488 et *II ed.*, p. 598.

Hypnum caturum P. B. *Prodr.* p. 62.

H. desmiphorum P. B. *op. cit.* p. 63.

H. flavens Mich.

H. imbricatum P. B. *op. cit.* p. 65.

H. julaceum, erectum sericeum repens, capsulis cylindraceis Dill. *Hist. M.* p. 322, t. 41, f. 58 c.

H. rostratum P. B. *Prodr.* p. 69; C. M. *Syn. II*, pp. 475 et 691.

H. sabinæfolium Brid. *Mant. M.* p. 166.

Lasia marginata Brid. *op. cit.* p. 133 et *Bryol. univers. II*, p. 203.

Leskea imbricatula Hedw. *Sp. M.* p. 224, t. 52.

L. rostrata Hedw. *op. cit.* p. 226, t. 55; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 303; *Bryol. eur. V* (mon. p. 4), t. 473.

Pterigynandrum crinitum Brid. *op. cit.* p. 192.

Pt. marginatum Rich. in Mich. *Fl. bor. Amer. II*, p. 292.

Pterogonium marginatum Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 168.

2. Ad arbor. rad. et saxa calcar. — Eur. : Steril! reg. inf. jugi alp. : Helvet., Pyren., Ital. super, Carniol., Austria. As. : Japon., Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, ins. Vancouver, reg. sept., centr., or. et merid.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 228 et II ed. n. 104 (*Hypnum*).

Faurie n. 6, 48, 49, 121.

Mac. *Canad. M.* n. 254.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 636.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 366.

stratosus Jaeg. — *Pseudo-Leskea*.

striatus Hüb. — *Lescuraea*.

β *saxicola* Hartm. — *Lescuraea striata* var. β *saxicola*.

subpilifer Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. III.

2. Cortic. — As. : Jénissei med.

Toccoae Sull. et Lesq. in Sull. *Ic. M.* p. 121, t. 76 A; Sull. *M. of U. St.* p. 58; Lesq. et Jam. *Man.* p. 306.

A. devolutus Mitt?

Ster. Rupic. — As. : Celebes, M. Javæ, Sumatræ. Am. sept. : Georg. sup.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 240 et II ed. n. 362.

tonkinensis Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 84.

Rup. — As. : Tonkin.

tristichus W. P. Sch. *mss*; Jaeg. *Ad. II*, p. 306.

— Afr. : C. B. Sp.

? *tristis* Sull. — *Leskea*.

viticulosus (L.) Hook. et Tayl. *Muscol. brit.* p. 79; *Bryol. eur.* V. (mon p. 5), t. 476; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 601.

Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus Dill *Hist. M.* p. 347, t. 39, f. 43.

H. viticulosum L. *Sp. pl.* p. 1592; C. M. *Syn.* II, pp. 472 et 690.

Leskea viticulosa Spr. *M. Pyr. exs.* n. 100.

L. vivipara Willd.

Neckera Schlechtendalii Picper de N. *Schlechtendalii* 1838, p. 9, t. 1.

N. viticulaeformis Picper op. cit. p. 8, t. 1.

N. viticulosa Hedw. *Fund. M.* p. 209, t. 48; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 231.

2. Ad saxa, mur. praepr. antiq., arb. annosior. — *Eur.*: Tota, arctic. except. *As.*: Chin., Jenissei sup., Nepal., Himalaya occ., Caucas., *As. min. Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Gaspes., Ottawa, Ontario, Niagara, Wisconsin.

Exs.: Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 102 (*Hypnum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 333.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 359.

Wrightii C. M. *mss.*

A. attenuatus Sull. in *Proced. Am. Acad.*..... 1861, p. 284.

2. *Rupic.* — *Am. sept.*: Cuba.

xanthophyllus Hpe. et Ltz. — *Lescuraea* (1).

Antennidens C. M. in *Linn.* 1875, p. 364 (sect. *FISSIDENTIS*, *CONOMITRII* sensu Müller.).

ANTITRICHIA *Brid. Mant. M.* p. 136 (3 sp.).

brasiliensis Hsch. — *Pilotrichum*.

californica Sull. et Lesq. in *Trans. of Am. Phil. Soc.* XIII, p. 357; Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 79, t. 59; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 577; Lesq. et *Jam. Man.* p. 291.

A. curtipendula Sull. in *Pac. R. Rep.* IV, p. 189.

A. curtipendula var. *hispanica* W. P. Sch. *Syn.* I ed., p. 477; C. M. *Syn.* II, p. 116.

2. Ad arbor., mur. et rup. — *Eur.*: Hispan. — *Afr.*: Alger. — *Am. sept.*: Columb. brit., Alaska, ins. Vancouver, Washington, Idaho, Oregon, Californ.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 246.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 357.

« var. *ambigua* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 59.

— *Am. sept.*: Oregon.

curtipendula (L.) *Brid. Bryol. univ.* II, p. 222; *Bryol. eur.* V, t. 469; W. P. Sch. op. cit. p. 576.

Anomodon curtipendulus H. et T. *Muscol. brit.* p. 79, t. 22.

Cyrtopus curtipendulus Spr. *M. Pyr. exs.* n. 113.

Hypnum curtipendulum L. *Sp. pl.* p. 1504.

H. dentatum, *curtipendulum* viticulis rigidis Dill. *Hist. M.*, p. 333, t. 43, f. 69.

H. montanum Lam.

Neckera curtipendula Hedw. *Sp. M.* p. 209; C. M. *Syn.* II, pp. 115 et 628.

N. hamulosa Vill. *Cat. meth.* p. 42.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

A. Mac-Leai Rehm.
pellicola C. M.

A. pseudo-tristis C. M.
Yokohamae C. M.

2. Ad. arbor. silvat. et rup. umbros. — *Eur.* : E reg. campestr. ad montan. zon. intermed. — *As.* : Caucas. occ. — *Afr.* : Ins. Canar., Alp. Abyssin., C. B. Sp. — *Am. sept.* : Grönland, Terr. Nov., ins. Miquelon, lac. Super., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Carol. sept. — *Am. merid.* : Patag.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 289 b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 355.

« *var. gigantea* Sull. et Lesq. l. c. n. 356; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 577; Lesq. et Jam. Man. p. 291;

Arbor. — *Am. sept.* : Columb. brit., Alaska, fret. Behring, ins. Vancouver, Sitka, Washington, Idaho, Calif.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 245.

var. hispanica W. P. Sch. — *A. californica*.

curtipendula Sull. — *A. californica*.

cuspidata Nees. — *Papillaria illecebra*.

tenella Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 27, et in Mac. Cat. p. 165

2. ♀ ign. Rupic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver (1).

Apalodictyon C. M. Syn. I, p. 291 (sect. BRYI).

APALODIUM Mitt. M. austr. am. p. 238.

australe Mitt. — *Orthodontium*.

pellucens Mitt. — *Orthodontium*.

APHANOREGMA Sull. in Asa Gray Man. bot. U. St. I ed., p. 647.

patens Lindb. — *Physcomitrella*.

patens var. *anomalum* Hpe. — *Physcomitrella Hampei*.

serratum Sull. — *Physcomitrium*.

APIOCARPIA Hüb. Muscol. germ. p. 154.

elongata Hüb. — *Mielichhoferia nitida* var. *elongata*.

Mielichhoferi Hüb. — *Mielichhoferia nitida* var. *elongata*.

APLODON R. Br. in Neu. Bot. Zeit. VII, Suppl. ad it. Parry. p. 299.

Wormskioldii R. Br. — *Splachnum*.

APODANTHUS la Pyl. in Journ. bot. Desv. V, p. 20, t. 33, f. 1.

aphyllus P. B. — *Splachnum luteum*.

Aporodictyon Lindb. M. Scand. p. 23 (sect. DICRANI).

APTYCHUS C. M. Syn. II, p. 325 (subsect. HYPNI, postea gen. propr.; spec. omn. RHAPHIDOSTEGIA (vel TRICHOSTOLEA?) ejud. nom.).

ARCHIDIUM Brid. Bryol. univ. I, p. 547 (26 sp.).

africanum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1885, p. 299.

1.

— *Afr.* : M. Usagara.

alternifolium (Dicks) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 28 et II ed. pp. 23 et 810.

A. phascoides Brid. Bryol. univ. I, p. 747; Bryol. eur. I, t. 8 et VI, t. 637 (ic. emend.); C. M. Syn. I, p. 13, p.p. et II, p. 517.

Phascum alternifolium, caulibus capsuliferis nanis, sterilibus altioribus erectis, foliis lanceolatis alternis Dicks. Fasc. I Pl. crypt. t. I.

Ph. Bruchii Spreng in Syst. veget. IV, p. 142.

Ph. globiferum Br. in Fl. 1825, p. 281, t. I.

(1) In Enumer. Kindberg, nomen nudum :

A. oligoclada Kindb.

1. In ericet. humid. — *Eur.* : Med. et merid., rar. septentr.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 402 et b.
- amplexicaule *C. M. in Linn.* 1880-82, p. 346.
 — *Am. merid.* : Uruguay.
- « var. brevistolonaceum *C. M. l. c. p.* 347.
 Ut et ubi typ.
- Arechavaletae *C. M. in Fl.* 1888, n. I.
 — *Am. merid.* : Monte-Video.
- brisbanicum *Broth. in Bail. Contr. Queensl. Fl. Bull. n. 7, p. 3 (nom.) et in Oefo...* 1893, p.
 1. Ad terr. humid. — *Pac.* : Austral or. (Queensland.)
- capense *Hsch. in Linn.* 1841, p. 135 ; *C. M. Syn. I, p. 13.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- chrysosporum *W. P. Sch. in sched. ; Jaeg. M. cleistoc. p. 9.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 426.
- crispulum *W. P. Sch. in Savatier M. Japon. n. 530.*
 2. — *As.* : Japon.
- Durieuuanum *W. P. Sch. in Jaeg. Ad. I, p. 6 ; Besch. Cat. M. Alger. p. 3.*
 — *Afr.* : Alger.
- Ecklonianum *Hpe. in sched. ; Jaeg. M. cleistoc. p. 9.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 425.
- ephemeroides *C. M. in Linn.* 1880-82, p. 345.
 — *Amer. merid.* : Uruguay.
- falcatum *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 429, b et d.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- Giberti *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 300.
 1. — *Am. merid.* : Monte-Video.
- Hallii *Aust. in Bull. Torr. bot. Club VI, p. 145.*
 1. — *Am. sept.* : Kansas, Texas.
- indicum *C. M. in Fl.* 1888, n. I.
 — *As.* : Birman.
- julaceum *C. M. in Linn.* 1880-82, p. 347.
 — *Am. merid.* : Uruguay.
- laterale *Br. in Fl.* 1846, p. 132 ; *C. M. Syn. I, p. 14.*
 1. — *Afr.* : C. B. Sp., Natal.
- Lescurii *Aust.* — *Pleuridium alternifolium var. robustum.*
- longifolium *Lesq. et Jam. Man. p. 50.*
Syn. — *Am. sept.* : Florid.
- Lorentzii *C. M. in Linn.* 1880-82, p. 343.
 — *Am. merid.* : Uruguay.
- ohioëense *Bryol. eur. I (mon. p. 3, nom.) ; Sull. Ic. M. p. 16, t. 7 ; C. M. Syn. II, p. 517.*
A. phascoides Sull. M. Allegh. exs. n. 213 ; C. M. Syn. I, p. 13 p.p. ; Drumm. M. bor. am. II ed. n. 12, 13.
 1. Terr. — *Am. sept.* : Canada or., New Jersey, New York, Pensilv., Ohio, Kansas, Alabama septentr.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 28, II ed. n. 35.

» *var. Donnellii* Lesq. et Jam. l. c.

Ut typ. — *Am. sept.* : Virgin., Florid.

phascoides Brid. — *A. alternifolium*.

phascoides Drumm. } *A. ohioëense*.
 } *A. tenerrimum*.

phascoides Sull. — *A. ohioëense*.

Ravenelii Aust. in *Bull. Torr. bot. Club* VI, p. 145.

Syn. — *Am. sept.* : Carolin. (ambo), Florid.

Rehmanni Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 300.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. n. 427.

sinense DR. in *Bull. Soc. bot. de Fr.* 1862, p. 61.

1. — *As.* : China or.

stolonaceum C. M. in *Fl.* 1888, n. I.

Syn ? — *Pac.* : Austral.

subulatum C. M. l. c.

— *Afr.* : C. B. Sp.

tenerrimum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 17.

A. phascoides Drumm. *M. bor. am.* II ed., n. II.

1. — *Am. sept.* : Ludovic.

ARCTOA *Bryol. eur.* I.

fulvella Br. eur. — *Dicranum*.

hyperborea Br. eur. — *Dicranum*.

Areodictyon C. M. *Syn.* I, p. 288 (sect. BRYI).

Areofissidens C. M. *Syn.* I, p. 46 (subsect. FISSIDENTIS).

Argyrobarbula C. M. *Syn.* I, p. 597 (sect. BARBULAE).

ARGYRO-BRYUM Hpe. in *Linn.* 1876, p. 312.

subrotundum Hpe. — *Bryum subrotundifolium*.

Argyrothrix C. M. in *Linn.* 1871-1873, p. 41. (sect. MACROMITRII).

ARRHENOPTERUM Hedw. *Sp. M.* p. 198, t. 46, f. 1-9.

heterostichum Hedw. — *Aulacomnium*.

turgidum Wahlenb. — *Aulacomnium*.

ARTHROCORMUS Dz. et Mk. *M. frond. ined.* *Archip. ind.* p. 75 (6 sp.)

africanus Broth in *Bot. Centralbl.* 1888, p. 85.

2. — *Afr.* : Madagascar.

asper Jaeg. — *Leucophanes*.

dentatus C. M. *M. Polyn.*, p. 58.

Octoblepharum dentatum Mitt. *Sam. M.*, p. 178.

2. — *Pac.* : Ins. Samoa.

Hookeri Hpe. — *Leucophanes cuspidatum* ? *glancum* ?

incrassatus (Mitt.) Par.

Octoblepharum incrassatum Mitt. *Fl. Vit.* p. 386.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

pulvinatus Dz. et Mk. *Prodr. Fl. bryol. Surinam.* p. 6, t. 2.

Octoblepharum pulvinatum Mitt. *M. austr. am.* p. 109.

2 Arbor. -- *Am. sept.* : Ins. S. Vincent. *Am. merid.* : Guian batav.,
Para, Nov. Granat.

Schimperi Dz. et Mk. l. c. p. 76, t. 27 et *Bryol. jav. I*, p. 25; C. M.
Syn. I, p. 85.

Leucophanes squarrosus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 764.

Mielichloferia Schimperi Dz. et Mk. in *Ann. Sc. nat.* 1844, *II*, p. 312.

M. trifaria eor. in hb. Lugdun. Batav.

2. Arbor. et terr. — As. : Ins. Philippin., Amboine, Borneo, Java.

subdentatus Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 476.

2. — *Pac.* : Nov. Guinea.

ASCHISMA Lindb. *Uthast. nat. grup....* p. 28.

carniolicum Lindb. — *Phascum*.

var. *speciosum* Limpr. — *Phascum carniolicum* var. *speciosum*.

ASCHISTODON Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, *IV*, p. 109.

conicus Mont. — *Leptotrichum*.

pinetorum Jaeg. — *Leptotrichum*.

Asteriscium C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 342 (sect. *BARBULAE*).

ASTOMIOPSIS C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 391.

amblyocarpa C. M. — *Pleuridiopsis*.

subulata C. M. — *Pleuridiopsis*.

ASTOMUM Hpe. in *Linn.* 1832, p.

alternifolium Hpe. — *Pleuridium*.

brachycaulon C. M. — *Pleuridium*.

Breutelianum Hpe. — *Pleuridium*.

crispum Hpe. — *Systegium*.

cylindricum Mitt. — *Tetrapterum australe* var. *cylindricum*.

denticulatum C. M. — *Pleuridium*.

globiferum C. M. — *Pleuridium*.

Krauseanum Hpe. — *Pleuridium exiguum*.

ludovicianum Sull. — *Systegium*.

Mittenii Bryol. eur. — *Systegium*.

multicapsulare Bryol. eur. — *Systegium*.

nervosum C. M. { *Pleuridium*.

{ *Pleuridium Robinsoni*.

nitidulum Bryol. eur? — *Systegium*.

var. *pygmaeum* Lesq. — *Systegium nitidulum* var. *pygmaeum*.

nitidum Bryol. eur. — *Pleuridium*.

Pappeanum C. M. — *Pleuridium*.

polycarpum Hpe. — *Systegium crispum*.

Robinsoni C. M. — *Pleuridium*.

rostellatum Bryol. eur. — *Hymenostomum*.

subacaule Jaeg. — *Hymenostomum*.

Sullivantii Bryol. eur. — *Systegium*.

subnervosum C. M. — *Pleuridium*.

viride C. M. — *Pleuridium*.

ASTRODONTIUM Schwaegr. *Suppl. II*, *I*, p. 128.

canariense Schwaegr. — *Leucodon*.

corsicum Jaeg. — *Leucodon*.

cryptotheca Besch. — *Leucodon*.

curvis ostre Besch. — *Leucodon*.

indicum Dz. et Mk. — *Clastobryum*.

secundum Besch. — *Leucodon*.

sericeum Jaeg. — *Leucodon*.
submersum Besch. — *Leucodon*.
tenue Besch. — *Leucodon*.

ASTROPHYLLUM *Lindb. M. Scand. p. 13.*

Blyttii Lindb. — *Mnium stellare*.
ciliare Lindb. — *Mnium*.
cinclidioides Lindb. — *Mnium*.
confertidens Lindb. et Arn. — *Mnium*.
curvatulum Lindb. — *Mnium*.
cuspidatum Lindb. — *Mnium affine*.
Drummondii Lindb. — *Mnium*.
heterophyllum Lindb. — *Mnium*.
hornum Lindb. — *Mnium*.
hymenophylloides Lindb. — *Mnium*.
immarginatum Lindb. — *Mnium*.
inclinatum Lindb. — *Mnium*.
lycopodioides Lindb. — *Mnium*.
magnirete Lindb. — *Mnium*.
marginatum Lindb. — *Mnium serratum*.
medium Lindb. — *Mnium*.
orthorhynchum Lindb. — *Mnium*.
punctatum Lindb. — *Mnium*.
pseudo-punctatum Lindb. — *Mnium subglobosum*.
riparium Lindb. — *Mnium*.
rostratum Lindb. — *Mnium*.
Seligeri Lindb. — *Mnium affine var. elatum*.
silvaticum Lindb. — *Mnium cuspidatum*.
spinosum Lindb. — *Mnium*.
 var. microcarpon Lindb. — *Mnium spinosum var. microcarpon*.
spinulosum Lindb. — *Mnium*.
stellare Lindb. — *Mnium*.
undulatum Lindb. — *Mnium*.

ATRACTYLOCARIUS *Mitt. M. austr. am. p. 71.*
Spec. omn. LEPTOTRICHA ejusd. nom.

ATRICHUM *P. B. Prodr. p. 42 (30 sp.). 1805*

androgynum (C. M.) *Jaeg. Ad. I, p. 703.*
Catharinea androgyna C. M. *Syn. I, p. 193.*
 1. — *Afr. : Transvaal, C. B. Sp.*
Exs. : Rehm, M. Afr. austr. n. 265, 571.
angustatum (*Brid.*) *Bryol. eur. IV (mon. p. 2), t. 411; W. P. Sch.*
 Syn. II ed., p. 528.
A. controversum *P. B. Prodr. p. 42.*
A. ligulatum *Mitt. in Kew Journ. bot. 1856, p. 262 ?.*
Bryum juniperi foliis rugosis, capsulis rectoribus *Dill. Hist. M. p. 362,*
 t. 46, f. 19.
Br. juniperifolium *Hoffm. Deutschl. Fl. II, p. 40, n. 37 in obs. ?*
Catharinea angustata *Brid. Bryol. univ. II, p. 105; C. M. Syn. I, p. 193.*
Polytrichum angustatum *Hook. M. ex. II, p. 5, t. 4; Brid. Sp. M. I, p. 78.*
P. controversum *Hedw. Sp. M. I, p. 98.*
P. cylindricum *Sw. in Mühlenb. Cat. pl. Amer. sept. p. 97 et Adnot. bot.*
 p. 171, n. 33.
P. ligulatum *Mitt. in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 453 ?*
P. undulatum β minus *Mich. Fl. bor. Amer. II, p. 295.*

2. Ad terr. arenac. in ericet. — *Eur.* : Rar. : Scandin., Britann., Europ. med., Pyren. As. : Japon., Caucas. occ. *Amer sept.* : Terr. Nova, New Brunswick, Ontario ; reg. sept., centr., or. et merid.
Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 68 (*Polytrichum*)
 Mac. Can. M. n. 215.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 314.
- anomalum* *Milde in Hedw.* 1869, p. 161.
 Ster. Rupic. — *Eur.* : Sudet.
- borbonicum* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 108.
 — *Afr.* : Ins. Borbon.
- controversum* P. B. — *A. angustatum*.
- crispulum* *W. P. Sch. in Savat. M. Jap. n. 530 ; Besch. in. Ann. Sc. nat.* 1893, p. 351.
 2. ♂ et fr. ign. — *As.* : Japon.
- crispum* (*Jam.*). *Sull. M. of U. St. p. 41 et Ic. M. p. 73, t. 46 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 530 ; Lesq. et Jam. Man. p. 257.*
A. laxifolium *Wils. mss. ; Rab. Bryoth. eur. n. 893.*
A. xanthopelma *Mac. Canad. M. n. 463.*
Catharinea crispa *Jam. in Journ. of Acad. Phil.* 1855, p. 445.
 2. Ad rip. gramin. rivul. inter saxa et rup. — *Eur.* : Britann. (ster.)
Am. sept. : New Jersey, Ontario, Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. p. 540.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 315.
 « var. *densifolium* (*Lindb.*) *Par.*
Catharinea crispa var. densifolia *Lindb. in Not.* 1867, p. 150.
 ♀ et fr. ign. — *Eur.* : Anglia (Cheshire).
- fertile* *Haw.* — *A. Haussknechtii*.
- flavisetum* (*Wils.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 150.*
Catharinea flaviseta *Wils. in sched. p.p.*
 — *As.* : Nepal., Himalaya.
- Haussknechtii* *Jur. et Milde in Verh. d. K. K. Zool. bot. Ges. in Wien,* 1870, p. 598.
A. fertile *Haw. in Hedwig.* 1889, p. 359.
A. undulatum β *attenuatum* *Holl. Moosfl. d. Ostrach Alp. in Ber. d. natur. Ver. in Augsburg,* 1887, p. 247.
Catharinea anomala *Bryhn in Bot. Not.* 1886, p. 157.
C. lateralis *Vaiz. in Ann. of bot. II, p. 69 (1).*
 1. Terr. — *Eur.* : Norveg. austr. or., Anglia, Bavar., Austr., Rossia.
As. : Jenissei, Talysch, Caucas. occ.
- hercynicum* P. B. — *Oligotrichum*.
- hirtellum* *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 168.
 2. In silvis. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- laevifolium* (*Lindb. et Arn.*) *Par.*
Catharinea laevifolia *Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 11.*
 Syn. — *As.* : Jenissei.
- laxifolium* *Wils.* — *A. crispum*.
- leiophyllum* *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 275 et in Mac. Cat. p. 148.*

(1) Cf. Hagen in *Rev. bryol.* 1891, p. 5.

2. Terr. in silv. humid. — *Am. sept.* : M. Selkirk, ins. Vancouver.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 217.

Lescurii Jam. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 33; *Lesq. et Jam. Man.* p. 257.

Oligotrichum Lescurii Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 191.

2. — *As.* : Japon. *Am. sept.* : Alaska, Sitka.

ligulatum Mitt. { *A. angustatum* ?
A. Mülleri ?

Mülleri (C. M. et Hpe.) Par.

A. ligulatum Mitt. in *Kew Journ. bot.* 1856, p. 262 ?

Catharinea Mülleri C. M. et Hpe. in *Linn.* 1853, p. 500.

2. — *Pac.* : Austral. fel., ins. Lord Howe; Tasman ?

Mülleri W. P. Sch. — *A. Schimperii*.

obtusulum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 717.

Catharinea obtusula C. M. in *Fl.* 1878, n. 6.

Syn. — *As.* : Himalaya bor. occ.

Erstedtianum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 605.

Catharinea Erstedtiana C. M. *Syn. II*, p. 558.

2. — *Am. sept.* : And. Cost. Ric.

var. *longifolium* (Lindb.) Par.

Catharinea Erstedtiana var. *longifolia* Lindb. in *Not...* 1867, p. 104, n. 155.

— *Am. sept.* : Honduras.

parallelum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 48, t. 8; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 54, t. 38; *Lesq. et Jam. Man.* p. 258.

Polytrichum undulatum Drumm. *M. bor. am. I ed.*, n. 286.

2. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : M. Rupestr. et Selkirk.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 426.

pastasanum Mitt. *M. austr. am.* p. 605.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

piriforme Jaeg. — *Psilopilum*.

planifolium (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 703.

Catharinea planifolia C. M. in *Bot. Zeit.* 1868, n. 47-48.

Terr. — *Am. merid.* : And. Valdiv.

polycarpum (C. M.) W. P. Sch. mss.

Catharinea Callibryon δ *brevilamellosa* C. M. *Syn. I*, p. 193.

C. polycarpa C. M. *l. c. II*, p. 558.

1. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Nov.

Granat et Quitens.

polyphyllum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 266 et 572.

— *Afr.* : Transvaal, Natal.

rigidum Ltz. *Moosst.* p. 157.

2 ? Ad terr. arenac. — *Am. merid.* : Valdiv.

rosulatum C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 148.

Ster. Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Schimperii Jaeg. *Ad. I*, p. 703.

A. Mülleri W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 62.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

Selwyni Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. 95.

2. In fissur. rup. — Am. sept. : M. Selkirk, Columb. brit., Idaho, Oregon.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 216.

subserratum Mitt. — A. undulatum var. subserratum.

subulirostrum W. P. Sch. in op. cit. p. 61.

2. — Am. sept. : Mexic. (Orizaba).

tenellum (Roehl.) Bryol. eur. IV (mon. p. 2), t. 412; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 529.

Bryum orthorhynchum Brid. Mant. M. p. 119.

Br. Polla orthorhyncha Brid. Bryol. univ. I, p. 691.

Catharinea tenella Roehl. in Ann. S. Wett. Ges. III, p. 234; Brid. op. cit. II, p. 104; C. M. Syn. I, p. 194.

C. undulata β minor Hüb. Muscol. germ. p. 517 (excl. syn.).

Mnium orthorhynchum Brid. Sp. M. III, p. 45.

M. serratum var. orthorhynchum Hüb. op. cit. p. 419.

Polytrichum undulatum var. Sw. M. Suec. p. 78.

P. undulatum β minus Funk Moostaschb. p. 70; Wahlenb. Fl. Lapp. p. 349.

P. undulatum β tenellum Wahlenb. Fl. Suec. II ed., II, p. 768.

2. In terr. arenos. limos. et stagn. exsicc. — Eur. : Scandin., Britann., Batav., German. septr., Voges.

Exs. : Un. itin. 1867, n. 87.

torquescens W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 62.

— Am. sept. : Mexic. (Orizaba).

undulatifforme Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 168.

2. Ad terram. — Am. sept. : Costa-Rica.

undulatum (L.) P. B. Prodr. p. 42; Bryol. eur. IV (mon. p. 8), t. 410; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 528.

Bryum phylliditiforme Neck. Meth. M. p. 203.

Br. Phylliditis folio rugoso acuto, capsulis incurvis Dill. Hist. M. p. 360, t. 46, f. 18.

Br. undulatum L. Sp. pl. 1532.

Callibryon polytrichoides Wigg. Fl. Werth. p. 290.

C. undulatum Zenk. et Dietr. M. Thur. Fasc. II, n. 41.

Catharinea Callibryon Ehrh. in Hannov. Mag. 1780, p. 934; C. M. Syn. I, p. 192.

C. Erhardtii Voit M. Herbis. p. 47.

C. undulata W. et M. Bot. Taschb. p. 216; Brid. Bryol. univ. II, p. 102.

Mnium undulatum L. jun. Meth. M. p. 364 (haud L. nec Neck., sed Sw., fid. Lindb.).

Oligotrichum undulatum Lam. et DC. Fl. fr. I, p. 292.

Polytrichum undulatum Hedw. M. frond. I, p. 43, t. 16 et 17.

1. In silv., virgult., mur. delaps. etc. — Eur. : Fere tota. As. : Japon., Chin., Cochinch., Pers., Caucas., As. min. Afr. : Alger., Madeir. Am. sept. : Terr. Nov., ins. Miquelon, M. Rupestr., Columb. brit., Washington, tota temperata.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 66, 67 (Polytrichum).

Faurie Pl. Japon. n. 10, 34, 171, 203, 276, 311, 3508.

Mac. Canad. M. n. 214.

Mandon Pl. Madeir. n. 26.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 313.

* var. abbreviatum Bryol. eur. l. c.

Bryum juniperifolium Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 40, n. 37 in obs.?

Catharinea Callibryon γ abbreviata C. M. l. c. p. 193.

C. undulata var. minor W. et M. op. cit. p. 287; Brid. Bryol. univ. II, p. 104.

Oligotrichum undulatum β minus *Lam. et DC. op. cit. III ed. II, p. 492*

Polytrichum controversum *Brid. M. Rec. II, p. 93, n. 71.*

P. undulatum β minus *Hedw. Stirp. crypt. I, p. 43 et Sp. M. p. 98.*

Ut et ubi typ. in *Eur.*

« *var. alte-cristatum* *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 58.*

— *Am. sept. : Pensilv., Montana, Oregon, Kansas.*

« *var. attenuatum* *Bryol. eur. l. c.*

Catharinea Callibryon β *attenuata* *C. M. l. c.*

Polytrichum undulatum *var. I H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 66.*

Ut et ubi typ. in *Eur. et Am. sept.*

var. attenuatum *Holl. — A. Haussknechtii.*

« *var. gracilisetum* *Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 351.*

— *As. : Japon.*

Exs. : Faurie n. 1367.

« *var. subserratum* (*Hook.*) *Par.*

A. subserratum *Mitt. M. Ind. or. p. 150.*

Catharinea Callibryon ϵ *subserrata* *C. M. l. c.*

C. subserrata *Lindb. in Not.... 1867, p. 104, n. 54.*

Polytrichum augustatum *Griff. Not. p. 486 p.p. ?*

P. undulatum *var. subserratum* *Hook. in Lond Journ. of bot. 1840, p. 3.*

— *As. : Nepal., Himalaya.*

Winteri *Besch. mss.; Jaeg. Ad. I. p. 706.*

— *Am. sept. : Mexic.*

xanthopelma (*C. M.*) *Lesq. et Jam. Man. p. 257.*

Catharinea xanthopelma *C. M. in Fl. 1873, p. 482.*

2. — *Am. sept. : Kansas, Texas, Ludovic.*

xanthopelma *Mac. — A. crispum* (1).

AULACOMITRIUM *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 161.*

calycinum *Mitt. — Macromitrium.*

humillimum *Mitt. — Macromitrium.*

AULACOMNIUM *Schwaegr. Suppl. III, I, I (8 sp.).*

acuminatum (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Sphaerocephalus acuminatus *L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 27.*

2. — *As. : Jenissei med.*

androgynum (*L.*) *Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 215; Bryol. eur. IV (mon. p.), t. 406; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 503.*

Bryum androgynum *Hedw. Sp. M. p. 178.*

Fusiconia androgyna *P. B. in Mem. Soc. Linn. Par. I, t. 7, f. 5.*

Gymnocephalus androgynus *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 87.*

Gymnocybe androgyna *Fr. St. agr. Femsj. p. 27.*

Hypnum androgynum *Schrank Baiers Fl. II, p. 469.*

Mnium androgynum *L. Sp. pl. II ed. p. 1574; Brid. Bryol. univ. II, p. 5;*

C. M. Syn. I, p. 170.

Mn. angustifolium *Neck. Meth. M. p. 234.*

Mn. perangustis et brevibus foliis *Dill. Hist. M. p. 230, t. 31, f. 1.*

Orthopyxis androgyna *P. B. Prodr. p. 78.*

(1) In *Enum. Kindb. nom. nud. :*

A. synoicum *C. M.*

2. Ad rup. quarz, terr., rad. arb. et trunc. putresc. in palud. — *Eur.* : Tota campestr. et montos. : fruct. frequentior. in zon. sept. *Am. sept.* : Terr. Nov., Nov. Scot., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Calif.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 78 (*Bryum*).

Mac. Canad. M. n. 207.

Rab. Bryoth. eur. n. 534, 1025.

Un. itin. 1864, n. 6.

chilense C. M. — Rhizogonium mnioides.

flexifolium H. f. et W. — Zygodon squarrosus.

Gaudichaudi Mitt. — Leptotheca.

heterostichum (*Hedw.*) *Bryol. eur. IV* (mon. p. 8), t. 403.

Arrhenopterum heterostichum *Hedw. Sp. M. p. 198, t. 46, f. 1-9.*

Bryum heteropterum pellucidum *Dill. Hist. M. p. 362, t. 45, f. 11.*

B. heterostichum *W. Arn. in Mem. Soc. hist. nat. Paris, II, p. 292.*

Hypnum heterostichum *W. et M. Ind. Mus. pl. crypt., 1803.*

Mnium arrhenopterum *Sm. in Trans. of the Linn. Soc. 1804, p. 263 p.p.*

Mn. heterostichum *Sw. in Mühl. Cat. pl. Am. sept. p. 94; Brid. Bryol. univ. II, p. 12; C. M. Syn. I, p. 169.*

Orthopyxis heterosticha *P. B. Prodr. p. 79.*

1. Ad terr. humid. — *As.* : Japon. *Am. sept.* : Ontario, reg. sept., centr., or. et merid.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 274 et II ed. n. 77 (*Arrhenopterum*).

Faurie Pl. Japon. n. 83, 163, 177, 221, 408, 3509.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 310.

« *var. humilis* (*C. M.*) *Par.*

Bryum membranaceum foliis membranaceis obtusis *Dill. Hist. M. p. 551, t. 85, f. 9.*

Mnium heterostichum var. humile *C. M. l. c. inter syn.*

Mn. membranaceum *Brid. M. Rec. II, III, p. 85 et Bryol. univ. II, p. 13.*

Orthopyxis heterosticha var. humilis *Lindb. de Mn. eur. p. 78.*

Ut et ubi typ.

marginatum (*Ångstr.*) *Jaeg. Ad. II, p. 715.*

Gymnocybe marginata *Ångstr. in Oefv.... 1876, n. 4, p. 20.*

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

palustre (*L.*) *Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 216; Bryol. eur. IV* (nom. p. 9), t. 405; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 504.*

Bryum inordinatum *Brid. Mant. M. p. 117,*

Br. palustre *Neck. Meth. M. p. 210.*

Br. ventricosum *Sibth. Fl. Oxon., p. 289.*

Gymnocephalus inordinatus *Brid. Sp. M. III, p. 3.*

G. palustris *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 87.*

Gymnocybe palustris *Fr. St. agr. Femsj. p. 27.*

G. palustris var. inordinata *Lindb. de Mn. eur. p. 87.*

Hypnum elodes *W. et M. Bot. Taschb. p. 282.*

H. palustre eor. Ind. Mus. pl. crypt., 1803.

Limnobryum palustre *Rab. Krypt. Fl. Sachs., I, p. 502.*

Mnium inordinatum *Brid. M. Rec. II, III, p. 76 et Bryol. univ. II, p. 7.*

Mn. majus, ramis longioribus bifurcatis *Dill. Hist. M. p. 233, t. 31, f. 3.*

Mn. palustre *L. Sp. pl. I ed., II, p. 1110; Brid. Bryol. univ. II, p. 7; C. M. Syn. I, p. 169.*

Mn. ramis brevibus inordinate progredientibus *Dill. op. cit. p. 239, t. 31, f. 8.*

Mn. reclinatum *Sm. in Act. Soc. Linn. VII, p. 262.*

Orthopyxis palustris *P. B. Prodr. p. 79.*

Sphaerocephalus palustris *Lindb. M. Scand. p. 14.*

2. In prat. palud. et silvat. uligin. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in subalp.; Spitzberg, Septem Ins., ins. Ursor. *As.* : Penins. Samoied., Jenissei, Obi, Kamschatka, Amour, Okhotsk, Caucas. occ., *Syr. Afr.* : Alger., Alp. Abyss. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, fret. Hudson et Kotzebue, Terr-Nov., ins. Miquelon, Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Athabasca, Saskatchewan., M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Sitka, Washington; reg. sept., centr., occ. et orient. *Pac.* : Tasman.

Exs. : Drumm M. bor. am. I ed. n. 242 (*Bryum*).

Mac. Canad. M. n. 208.

Rab. Bryoth. eur. n. 660.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 308.

« *var. alpestre* W. P. Sch. *Coroll. p.* 81 et *Syn. II ed. p.* 505.

Gymnocybe palustris ζ *alpestris* Lindb. l. c.

In turf. uligin. — *Eur.* : Helvet. (Grimsel). *Am. sept.* : Reg. montana.

« *var. congestum* Boulay in *Fl. ins. Miquelon*, p. 48.

— *Am. sept.* : Ins. Miquelon.

« *var. fasciculare* (Funk) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Gymnocybe palustris δ *fascicularis* Lindb. l. c.

Mnium fasciculare Funk in *Brid. Bryol. univ. II*, p. 733.

Mn. palustre var. fasciculare C. M. l. c.

In uligin. — *Eur.* : Alp. editior. *Am. sept.* : Reg. montana.

« *var. imbricatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Gymnocybe palustris γ *imbricata* Lindb. l. c.

Mnium palustre var. imbricatum C. M. l. c.

Ubi præced. in *Eur. Am. sept.* : Terra-Nov., Ontario, Columb. brit., ins. Vancouver.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 209.

« *var. laxifolium* Kindb. in *Mac. Cat. p.* 145.

Ad terr. humid. — *Am. sept.* : M. Selkirk.

« *var. polycephalum* (Brid.) Hüb. *Muscol. germ. p.* 313; *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Bryum androgynum β *prolixum* Roth *Fl. Germ. III*, p. 229.

B. palustre β *ramosum* Turn. *Muscol. Hib. p.* 113.

Gymnocybe palustris ε *ramosa* Lindb. l. c.

Limnobryum palustre var. polycephalum Rab. *op. cit. p.* 503.

Mnium majus, minus *ramosum*, capitulis pulverulentis crebrioribus Dill.

Hist. M. p. 235, t. 24, f. 4. 31

Mn. palustre β *flagelliferum* Mart. *Fl. crypt. Erlang. p.* 65.

Mn. palustre β *majus* Schwaegr. *Suppl. I, II, p.* 122.

Mn. palustre δ *polycephalum* C. M. l. c.

Mn. polycephalum Brid. *Mant. M. p.* 121 et *Bryol. univ. II*, p. 10.

Mn. prolixum Neck. *Meth. M. p.* 135.

Mn. ramosum Huds. *Fl. Angl. p.* 403.

Orthopyxis ramosa P. B. *Prodr. p.* 79.

In turf. depress. — *Eur.* : Præcip. sept. *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Terr-Nov., New Brunswick, Ontario, M. Rupestr., ins. Vancouver, reg. montana.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 210.

papillosum (C. M.) Lesq. et Jam. *Man. p.* 253.

Mnium papillosum C. M. in *Fl.* 1875, p. 93.

2. — *Am. sept.* : Colorado.

pentastichum Mont. — *Zygodon*.

turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. Suppl. II, I, I, p. 7; Bryol. eur. IV (mon. p.), t. 404; W. P. Sch. op. cit. p. 506.

Arrhenopterum turgidum Wahlenb. sec. W. et M. (fid. Brid. Bryol. univ. II, p. 11).

Bryum turgidum Sw. Summ. veg. Scand. p. 41.

Gymnocybe turgida Lindb. de Mn. eur. p. 85.

Hypnum illecebrum L. Fl. Suec. II ed., p. 399 et Fl. Lapp. p. 403.

H. turgidum Wahlenb. mss; W. et M. Ind. Mus. pl. crypt., 1803 (nom.)

Mnium arrhenopterum Sm. in Trans. of the Linn. Soc. 1804, p. 263 p.p.

Mn. turgidum Wahlenb. Fl. Lapp. p. 351, t. 27; Schwaegr. Suppl. I, II, p. 123, t. 77; Brid. Bryol. univ. II, p. 11; C. M. Syn. I, p. 171.

Sphaerocephalus turgidus Lindb. M. Scand. p. 14.

2. Ad terr. turf. vel in rup. irrig. — Eur.: Alp. reg. sept., rar. med.: Spitzberg, Septem Ins., ins. Ursor., Norveg., Lappon., Scot.; Anglia et Stiria (ster.). As.: Penins. Samoied. et Tschutschica, Taimyr, Jenissei, Obi, Ochotsk, Turkestan sept. Am. sept.: Groenland, Labrador, ins. Melville, fret. Baffin, Hudson, Kotzebue, Smith et Behring, lac. Super., Nov. Angl., M. Alb. et Adirondack.

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 243 (Bryum).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. p. 307.

Un. itin. 1867, n. 48.

« var. elongatum (Lindb. et Arn.) Par.

Sphaerocephalus turgidus var. elongatus Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 27.

— As.: Jenissei inf.

« var. proliferum Geheeb in Fl. 1879, p. 476.

— As.: Alatau.

venezuelanum Dz. et Mk. in Mitt. M. austr. am. p. 317.

Ster.

— Am. merid.: Venezuela.

AULACOPILUM Wils. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 90 (6 sp.).

abbreviatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 308, t. VD.

l. Filicie. — As.: Ind. or.

Balansae C. M. — A. paraguense.

glaucum Wils. l. c. p. 9; C. M. Syn. II, p. 186.

Ad arbor. — Afr.: Austral. (fid. Mitt.). Pac.: Nov. Zeland.

incanum Mitt. in op. et l. cc.

Ad arbor. — Afr.: Austral.

paraguense Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 18.

A. Balansae C. M. in Fl. 1887, p. 447.

l. Ad Aurant. — Am. merid.: Paraguay.

Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 3643.

trichophyllum Ångstr. mss.; C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 393.

l.

— Afr.: C. B. Sp.

tumidulum Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 307, t. VC.

l. Ad arbor. — As.: Ceylan.

Wildii Broth. — Wildia solmsiellacea.

AUSTINIA C. M. in Linn. 1875, p. 439 (1 sp.).

tenuinervis (Mitt.) C. M. l. c.

Clasmatodon parvulus Sull. in Proceed. Am. acad. 1861, p. 283 et in Wright Pl. Cub. n. 65.

Cl. trichelyma Sull. mss.

Hypnum tenuinerve Mitt. *M. austr. am.* p. 549.

1 ? Cortic. — *Am. sept.* : Cuba.

BARBULA Hedw. *Fund. M. II*, p. 92 (394 sp.).

abyssinica (de Not.) Par.

Tortula abyssinica de Not. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 22.

2 ? — *Afr.* : M. Abyssin.

aciphylla Bryol. eur. II (mon. p. 42), t. 165; *C. M. Syn. I*, p. 643; W. *P. Sch. Syn. II ed.* p. 228.

B. Enderesii Garovagl. *Bryol. austr.* p. 372 ?

B. norvegica Lindb. in *Oefv. Vet. Ak. Foerh.* 1863, p. 387.

Syntrichia aciphylla Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 142.

S. norvegica W. et M. in *Archiv. für die Syst. Naturg. t. V, f. a-i; Brid. Bryol. univ. I*, pp. 588 et 836.

S. norvegica var. *alpina* Wahlenb. *Fl. Carpat.* p. 338.

Tortula aciphylla Hartm. *Skand. Fl. V ed.* p. 381; de Not. *Epil.* p. 540 et *M. Ital. I*, p. 38, t. 16.

T. norvegica Wahlenb. mss.; Lindb. *M. Scand.* p. 20.

T. ruralis β *alpina* de Not. *Spec. de Tort. Ital. n.* 4.

2. Rupic. — *Eur.* : Reg. alpin. usque ad niv. æternas : ins. Ursorum, Lappon., Norveg., Alp. Helvet., Jurass., Tirol., Salisb., Sabaud., Pyren.; deest in Britann. As. : Jenissei, Caucas. *Am. sept.* : Groenland, Labrad., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit.

Ews. : Mac. Can. *M. n.* 479.

Un. itin. 1863, n. 6; 1867, n. 103.

aculeata Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 51; *C. M. Syn. II*, p. 632.

Tortula aculeata Mitt. *M. austr. am.* p. 173.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

aculeonervis C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 349.

Fl. et fr. ign.

— *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

acuminata Brid. — *B. agraria*.

acuta Brid. — *B. gracilis*.

aestiva Schultz. — *B. muralis* var. *aestiva*.

affinis Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 520.

B. pichinchensis Tayl. (fid. Mitt.).

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

afro-ruralis C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 114.

Ster.

— *Afr.* : C. B. Sp.

agraria (Sw.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 532 et 825; *C. M. Syn. I*, p. 604.

B. acuminata Brid. *M. Rec. II, I*, p. 208.

B. agraria β *acuminata* Brid. *Bryol. univ. l. c.*

B. conica Brid. *M. Rec. II, I*, p. 192.

B. domestica Brid. *Mant. M.* p. 89 et *Bryol. univ. I*, p. 536.

B. latifolia Brid. *Bryol. univ. l. c.*

B. pallens Brid. *l. c.*

B. stellata Brid. *Mant. M.* p. 88.

Bryum acuminatum Sw. *Prodr.* p. 139.

Br. agrarium Brid. *l. c.*

Br. stellatum Dicks. *Crypt. Fasc. IV*, p. 6 (excl. syn.)

Tortula agraria Sw. *Fl. Ind. occ. III*, p. 1763; Mitt. *M. austr. am.* p. 167.

T. decipiens Brid. *Spec. M. I*, p. 247.

T. pallens Brid. *l. c.* p. 246.

T. pellucida Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ.* p. 296.

T. stellata cor. *l. c.* p. 286.

1. Muric. et saxic. — *Am. sept.* : Florid., Apalachicola, Cuba, ins. S. Christoph., S. Thom., Jamaïc., Guadel. *Am. merid.* : Guian. *Exs.* : Drumm. M. bor. am. n. 64 (*Tortula*).
- albicuspis* Mitt. *M. Ind. or.* p. 35.
Ster. — *As.* : Sikkim.
- alexandrina* Ltz. *M. Ehrenb.* p. 32, tt. 6, f. 1-6 et 7, f. 7-20.
Ster. — *Afr.* : Ægypt. infer. (1).
- aloides* (Koch) *Fürnr. et Br. in Regensb. Bot. Zeit.* 1829, II, p. 598; *Bryol. eur. II* (mon. p. 15) t. 139; *C. M. Syn. I*, p. 596; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 191.
Bryum rigidum Dicks. *Dried. pl. n.* 47.
Tortula aloides de Not. *Syll.* p. 177 p.p.
T. rigida Sm. *Fl. brit. III*, p. 1249.
Trichostomum aloideum Koch in *Brid. Bryol. univ. I*, p. 816.
2. Muric. et terr. argill. — *Eur.* : Med. et merid.; Britann., ins. Melit. *As.* : Minor. *Afr.* : M. Sinaï, Alger., Canar. *Am. sept.* : Terra Nov. *Exs.* : Bourg. pl. Canar n. 286.
Rab. : *Bryoth. eur.* n. 786 et b.
- alpigena* Lindb. et Arn. — *Didymolon rubellus* var. *dentatus*.
- alpina* *Bryol. eur. II* (mon. p. 39) t. 163; *C. M. Syn. I*, p. 639; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 226.
Syntrichia alpina Jur. *Laubm. Oster. Ung.* p. 139.
Tortula alpina Wils. *Bryol. brit.* p. 134.
T. mucronifolia de Not. *Syll.* p. 171.
1. Muric. et rupic. — *Eur.* : Rar. : Alp. Tir., Salisb., Pinzgow., Rhœt. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : Columb brit. *Exs.* : *Rab. Bryoth. eur.* n. 460.
Un. itin. 1863, n. 26 et 27.
- » var. *inermis* W. P. *Sch. Syn. II ed.*, p. 226.
Ut typ. — *Eur.* : Austr. infer., Tirol., Longobard. *Exs.* : *Rab. Bryoth. eur.* n. 820.
- ambigua* *Bryol. eur. II* (mon. p. 14) t. 139; *C. M. Syn. I*, p. 596; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 190.
B. brevirostris *Fürnr. et Br. in Regensb. Bot. Zeit.* 1829, II, p. 599.
B. rigida Hedw. *M. frond. I*, p. 65, t. 25, f. 3 et 5 (p.p. *quoad ic. ! Conf. W. P. Sch. l. c.*); *Brid. Bryol. univ. I*, pp. 528 et 824 (*excl. syn. Schultz*).
Bryum ericaefolium Neck. *Meth.* p. 193.
Tortula aloides de Not. *Syll.* p. 177 p.p.
T. ambigua de Not. *M. ital. I*, p. 16, t. 2.
T. ericaefolia Lindb. *M. Scand.* p. 20.
T. rigida *Brid. Sp. M. I*, p. 16, t. 2.
2. *Locis denudat. argill.* — *Eur.* : Præcip. med. et merid.; Britann., ins. Melit. *As.* : Jénissei super., Persia, *As. min.* *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit., Illinois.
- amblyophylla* Jaeg. — *Pottia*.
- amœna* Schum. — *B. unguiculata*.
- amphidiacea* C. M. in *Linn.* 1874, p. 639.
B. glacialis Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 38?
Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
- amphidiifolia* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 332.
2. *Terr.* — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

(1) « An *Trichostomum nitidum* ? » Jaeg. Ad. II. p. 764.

amplexa Lesq. in *Trans. of Amer. Phil. Soc.* XIII, p. 5; *Lesq. et Jam. Man.* p. 118.

Tortula humilis Drumm. *M. bor. am.* I ed., n. 137.

2. *Rup. madid.* — *Am. sept.* : Canada, Oregon, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 140.

amplexifolia (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 272.

Tortula amplexifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 29.

2. — *As.* : Himalaya occid.

anacamptophylla C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 34.

Ster. — *Am. merid.* : Austro-Georg.

anostomosans C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 337.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

andicola (Mont.) C. M. *Syn. I*, p. 643.

Tortula andicola Mont. in *Ann. sc. nat.* 1838, p. 53 et *Syll.* p. 39; Mitt. *M. austr. am.* p. 170.

2. *Terr.* — *Am. merid.* : Summ. And. Columb.

angustata (Mitt.) *Bryol. jav. II.* p. 226.

Didymodon angustatus Jaeg. *Ad. I*, p. 215.

Tortula angustata Mitt. *M. Ind. or.* p. 28.

2. — *As.* : Ceylan, Java.

angustata Braithw. — *B. subulata* var. *angustata*.

angustifolia (Hook. et Grev.) C. M. *Syn. I*, p. 603.

B. tenuirostris Brid. *Bryol. univ. I*, p. 826.

Tortula angustifolia H. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. I*, p. 299, t. 12; Mitt. *l. c.* 30.

— *As.* : Nepal.

angustifolia Brid. — *B. inclinata*.

annulus C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 430.

1. *Arenic.* — *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

anomala Mitt. — *Trichostomum*.

antarctica Hpe. in *C. M. Syn. I*, p. 638.

Syntrichia princeps Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* p.p.

Tortula Mülleri H. f. et W. *Fl. Antarct.* p. 103 et *Fl. N. Zeal.* p. 71.

Syn. — *Am. merid.* : Ins. Maclov. Pac. : N. Zeland., Tasman.

apiculata Hpe. in *Linn.* 1861-1862, p. 519.

Tortula apiculata Mitt. *M. austr. am.* p. 153.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

apiculata Hedw. — *B. unguiculata* var. *apiculata*.

appressa (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 288.

Tortula appressa Mitt. *l. c.* p. 152.

2. — *Am. merid.* : Chile.

appressifolia (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 281.

Tortula appressifolia Mitt. *l. c.* p. 159.

— *Am. merid.* : And. Peruv.

aprica C. M. in *Linn.* 1875, p. 402.

2. *Fr. ign. Rupic.* — *Afr.* : M. mar. Erythraei.

arcuata Griff. — *B. comosa*.

arenacea Jaeg. — *Desmatodon*.

Arenae Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LIX et in *Miss. scient. Cap. Horn V, Bot.*, p. 269, t. 2. f. 8.

2. — *Am. merid.* : Fret. Magellan.

arenaria Griff. — *B. membranifolia*.

argentinica Par.

B. rubiginosa C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 433.

Ster. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic.

aristata Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss.*

— *Afr.* : Abyss.

aristata Brid. — *B. unguiculata*.

aristatula C. M. in *Jaeg. Ad. II*, p. 674.

Encalypta aristata Hpe. in *Linn.* 1871-73, p. 513.

Ster ? — *Pac.* : Austral (Nov. Valesia).

artocarpa Lesq. in *Trans. of Am. Phil. Soc. XIII*, p. 4; *Lesq. et Jam. Man.* p. 126.

2. Terr. — *Am. sept.* : Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed., n. 133.

asperifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 34.

Ster. — *As.* : Alatau, Sikkim.

Astoriensis Broth. in *Roell M. bor. am. exs.*

— *Am. sept.* : Washington.

atlantica { Besch. — *B. graminicolor*.
Brid. — *Eucladium verticillatum*.
W. P. Sch. — *B. orizabensis*.

atro-virens (Sm.) W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 194.

B. circinalis C. M. in *Linn.* 1884, p. 703.

B. nervosa Milde *Bryol. siles.*

Desmatodon nervosus *Bryol. eur. II (mon. p. 6) t. 132*; *Rab. Bryoth. eur. n. 830 et b, 871*; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 121 p.p.*

Desmatodon atro-virens *Jur. Laubm. Oester. Ung. p. 136.*

Didymodon capensis *Spreng. Syst. veget. IV, II, p. 323.*

D. nervosus *Hook. et Tayl. Musc. brit. I ed. p. 66, t. 20.*

Grimmia atro-virens *Sm. Engl. Bot. t. 2015.*

Tortula atro-virens *Lindb. Trichost. eur. p. 27.*

T. parvula *Hook. in Brid. Bryol. univ. I, p. 825.*

Trichostomum convolutum *Brid. Sp. M. p. 232 et Bryol. univ. I, p. 492*; *C. M. Syn. I, p. 590 et II, p. 629*; *Rab. Bryoth. eur. n. 871*; *Un. itin. 1863, p. 19.*

Tr. nervosum *Br. in Fr. Müller M. Sardin. et in Hüb. Musc. germ. p. 295.*

Tr. Schimperii *Mont. (fide Mitt.)*

Weisia nervosa *Hook. in Brid. Bryol. univ. I, p. 808 ?*

1. Muric. et in terr. argill. — *Eur.* : Anglia, vall. Rhenan., *Eur. merid. et occ. As.* : Caucas., Syria. *Afr.* : Alger., C. B. Sp. *Am. sept.* : Calif. *Am. merid.* : And. Chilens. *Pac.* : N. Zeland., Tasman.

var. *edentula* W. P. Sch. l. c.

Desmatodon nervosus β *edentulus* *Bryol. eur. l. c.*; *Sull. et Lesq. l. c. p.p.*

Ut typ. — *Eur.* : Ar noric. et Normann. marit., reg. merid. *Afr.* : C. B. Sp. *Am. sept.* : Calif. merid.

var. *robusta* W. P. Sch. — *B. revolvens*.

Australasiae (*Hook. et Grev.*) *Brid. Bryol. univ. I, p. 828*; *C. M. Syn. I, p. 619.*

B. Poeppigiana C. M. (*fid. Mitt. M. austr. am. p. 149.*)

B. rufiseta *Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 51.*

Tortula Australasiæ Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. I*, p. 301, t. 12; *Fl. N. Zeal. II*, p. 70.

T. fuscescens eor. *Fl. N. Zeal. II*, p. 73, t. 85, f. I.

Trichostomum Australasiæ Jaeg. *Ad. I*, p. 245.

2. — *Pac.*: Fret. reg. Georges, Austral., N. Zeland. sept., Tasman.

australis Par.

B. magellanica C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 349.

B. patagonica C. M. in *Fl.* 1885, p. 415.

Tortula Andersonii Ångstr. in *Oefv....* 1872, n. 4, p. 6.

2. Terr. aren. et cortic. — *Am. merid.*: Patagon., fret. Magellan., Fuegia.

Baileyi (Broth.) Par.

Tortula Baileyi Broth. in *Oefv. af Finka Vet. Soc. Foerh.* 1890, p.

2. Cortic. — *Pac.*: Austral. or. (Queensland).

basoutensis Rehm. — *Hyophila*.

Beccarii (Vent.) Jaeg. *Ad. I*, p. 203.

Pleurochate *Beccarii* Vent. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 14.

2. — *Afr.*: Abyss. sept.

Beecheyi Lesq. — *B. cylindrica*.

Berteroana C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 349.

2. — *Am. merid.*: Chil.

Bescherellei Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 673.

B. rigidula Besch. in *Prodr. bryol. mexic.* p. 36.

— *Am. sept.*: Mexic.

bicolor (*Bryol. eur.*) Lindb. *Bitr. till Moss. syn.* 1863 et in *Oefv. Vet. Ak. Foerh. XX*, p. 336; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 215.

Gymnostomum bicolor *Bryol. eur. II* (mon. p. 4) t. 29.

Pottia bicolor C. M. *Syn. I*, p. 563.

Tortula bicolor Lindb. *Trichost. eur.* p. 40.

2. Terr. hum. — *Eur.*: Alp. Salisb., Bavar., Rhaet., Tirol. *Pac.*: Tasman?

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 9 (*Gymnostomum*).

Un. itin. 1863, n. 1, 2, 3 (*Gymnostomum*).

Blyttü W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 208.

Fl. et fr. ign. — *Eur.*: Finmarck.

bogotensis Hpe. in *Ann. sc. nat. sér. V, III*, p. 349.

Tortula bogotensis Mitt. *M. austr. am.* p. 171.

2. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

bokkepoldiana Rehm. *M. Afr. austr.* n. 108.

— *Afr.*: C. B. Sp.

Bolanderi Lesq. in *Trans. of Amer. Phil. Soc. XIII*, p. 5; *Lesq. et Jam Man.* p. 118.

2. Rupic. — *Am. sept.*: Calif.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 139.

boliviana Par.

B. glaucescens W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1622.

— *Am. merid.*: And. Boliv.

- Bourgœana *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 35.*
— *Am. sept. : Mexic.*
- brachyachme *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 107.*
Ster? — *Afr. : C. B. Sp.*
- brachyangia *C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 59.*
2. Rupic. — *Am. sept. : Ins. Anticosti.*
- brachymenia (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I, p. 303.*
Tortula brachymenia Mitt. M. austr. am. p. 151.
2. — *Am. merid. : And. Quitens.*
- brachyphylla *Sull. in Bot. Pac. R. R. Survey (Whipple), p. 186, t. 2 (1856);*
Lesq. et Jam. Man. p. 123.
2. — *Am. sept. : Calif.*
Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 100^c et II ed. n. 135.
- « var. angustifolia *C. M. et Kindb. l. c. pp. 55 et 264.*
Ster. — *Am. sept. : Columb. brit.*
- brachyphylla } *Hpe. — B. Hampeana.*
 } *Sull. et Lesq. — B. purpurea.*
- brachypus *Brid. — B. unguiculata var. brachypus.*
- Brandisi *C. M. in Fl. 1878, n. 6.*
Desmatodon inermis Mitt. M. Ind. or. p. 37 ?
Syn. — *As. : Himalaya bor. occid.*
- Brebissoni *Brid. Bryol. univ. I, p. 834 ; W. P. Sch. Suppl. Bryol. eur. fasc. III-IV.*
B. cylindrica Wils. in Phytologist 1845, p. 282.
B. mucronata Brid. Sp. M. I, p. 268.
B. romana C. M. Bot. Zeit. 1856.
B. unguiculata var. latifolia de Bréb. M. de Norm. n. 104.
Cinclidotus Brebissoni Husn. Muscol. gall. p. 118.
C. riparius β terrestris Bryol. eur. III (mon. p. 10) t.
Desmatodon Brebissoni Jur. Laubm. Oester. Ung. p. 136.
D. dichotomus Brid. Bryol. univ. I, p. 823.
Didymodon Cinclidotus de Not. Spec. de Tortul. Ital. p. 45.
Gümbelia riparia β terrestris C. M. Syn. II, p. 651.
Racomitrium flavipes Brid. Bryol. univ. I, p. 224.
Tortula Brebissoni de Not. Epil. p. 547.
T. mucronata Lindb. Trichost. eur. p. 30.
Trichostomum flavipes Steud. Nomencl. crypt. p. 421.
2. Ad saxa humid. et rad. arbor. annosior. — *Eur. : Med. et occid.*
Anglia, Italia. Afr. : Alger.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 980.
- brevicaulis *Schwaegr. — B. fallax var. brevicaulis.*
- brevifolia } *Brid. — B. fallax var. brevifolia.*
 } *Lindb. — Trichostomum tophaceum.*
- brevipes *Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 12 ; Lesq. et Jam. Man. p. 119;*
2. Muric., terr. — *Am. sept. : Nevada occid., Calif.*
- brevirostris *Bryol. eur. II (mon. p. 16) t. 138 ; C. M. Syn. I, p. 597 (excl. in utroque syn. Hook. et Tayl.) ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 189.*
Syn. Terr. argillac. — *Eur. : Spitzberg., Scandin., Dania, Saxon., M. Cenis. As. : Jenissei. Am. sept. : Groenland, sin. Hudson, M. Rupestr.*
Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 136.
Mac. Canad. M. n. 72.
Rab. Bryoth. eur. n. 981.

brevirostris Fürnr. et Br. -- B. *ambigua*.

breviset Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 107; C. M. *Syn* I, p. 644.

* *Tortula breviseta* Mont. *Syll.* p. 39; Mitt. *M. austr. am.* p. 172.

2. Terr. — *Am. merid.* : Chile.

breviset Hpe. et C. M. — B. *brevisetacea*.

brevisetacea Jaeg. *Ad.* I, p. 299.

B. *breviset* Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 492.

2. — *Pac.* : Austral. or.

Brotheri (Lindb.) Par.

Mollia Brotheri Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 46.

2. Rup. calcar. — *As.* : *Caucas.* occ. et centr.

Buyssoni Philib. in *Rev. bryol.* 1886, p. 36 et in *Husn. Muscol. gall.* p. 117.

1. Rup. trachyt. — *Eur.* : M. Arvern.

caespitosa (Schwaegr.) Schultz *Rec. de Barb.* p. 9, t. XXXII, fig. 7; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 535; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 177 et II ed. p. 216.

B. *cirrata* Br. in *Fr. Müller M. Sardin.* (1829); *Bryol. eur.* II (mon. p. 24) t. 149.

B. *humilis* Hedw. *Sp. M.* p. 116, t. 25; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 537.

B. *Northiana* C. M. *Syn.* I, p. 602.

Bryum acaulon, foliis teneris confertis, capsulis conicis Dill. *Hist. M.* p. 389, t. 49, f. 56 (fid. Hedwig).

Mollia caespitosa Broth. *Enum. M. Caucas.* p. 48.

M. humilis Lindb.

Streblotrichum humile P. B. *Prodr.* p. 89.

Tortula caespitosa Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 120, t. 31.

T. *cirrata* Lag. in *Ann. sc. nat.* XIV.

T. *humilis* Brid. *Sp. M.* I, p. 248.

T. *intermedia* de Not. *Syll.* p. 181.

T. *Northiana* Grev. in *Trans. of the Linn. Soc.* XV, II, p. 342, t. 3, f. 4.

1. Ad terr. arenos. — *Eur.* : Merid. : Gall. austr., Sardin., Ital., Hispan. etc. *As.* : *Caucas.* *Afr.* : Alger., C. B. Sp. *Am. sept.* : Canada, Columb. brit. ; orient, centr. et merid. ; ins. Jamaic. *Am. merid.* : Brasil.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed., n. 65 (*Tortula*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1068.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 136.

« var. *abbreviata* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 38 (nom.).
— *Am. sept.* : Mexic.

« var. *angustifolia* Rehm. *M. Afr. austr.* n. 479.
— *Afr.* : C. B. Sp.

« var. *longiseta* (Hpe.) Par.

B. *cirrata* var. *longiseta* Hpe. *Symb.* 1870, p. 268.

— *Am. merid.* : Brasil. aequinoct.

calceolifolia Spr. mss.

Tortula calceolifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 157.

Terr. — *Am. merid.* : And. Quitens.

calobolax C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise...* Bot. p. 24.

Ster. Rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

« var. *angustinervia* C. M. l. c.

Ut typ. — *Afr.* : Eod. loc. (an stat. junior ?)

calycina *Schwaegr. Suppl. II, 1, p. 63, t. 119; Brid. Bryol. univ. I, pp. 541 et 828; C. M. Syn. I, p. 599.*

Tortula calycina *Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 291.*

T. flexuosa var. *Hook. M. ex?*

2. Arb. et terr. — *As. : Ind. or. (fid. H. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 174). Am. merid. : Chile. Pac. : Austral., N. Zeland, King's Isl., Tasman.*
« var. *brevicaulis* *Hpe. in Linn. 1856, p. 204 (nom.)*
— *Pac. : Austral. felix.*

calyculosa (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I, p. 266.*

Tortula calyculosa *Mitt. M. austr. am. p. 156.*

— *Am. merid. : And. Quitens.*

calymperifolia *C. M. — B. javanica.*

campylocarpa *Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 187; C. M. Syn. I, p. 619.*

Tortula campylocarpa *Mitt. l. c. p. 159.*

2. — *Am. sept. : Guatemala. Am. merid. : And. Quitens.*

cancellata *C. M. in Fl. 1873, p. 483.*

2. — *Am. sept. : Texas.*

canescens *Br. in Fr. Müller M. Sardin. (1829) : Bryol. eur. II (mon. p. 34) t. 158; C. M. Syn. I, p. 625 et II, p. 631; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 201.*

Desmatodon canescens *Jur. Laubm. Oester. Ung. p. 133.*

Tortula canescens *Mont. in Arch. de bot. I, p. 133, t. 4, f. 3 et Syll. p. 40.*

1. Loc. aprie. ad rad. arb., rup. et terr. — *Eur. : Occid. et merid. ; Anglia, vall. Rhen. As. : Caucas. Afr. : Alger.*
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 526, 788 et b.

caninervis (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I, p. 301.*

Syntrichia caninervis *Mitt. M. Ind. or., p. 39.*

Tortula ruralis var. *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 322.*

2 ? *Rupic?* — *As. : Tibet. occident.*

carnifolia *C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 52.*

2 ? *Ad rad. arb. et terr. — Am. sept. : Lac. Erie.*

catillum *C. M. in Linn. 1878-79, p. 329.*

2. — *Am. merid. : Alp. Argent. subtropic.*

cavifolia *W. P. Sch. Suppl. Bryol. eur. fasc. III-IV et Syn. II ed. p. 193.*

B. concava *W. P. Sch. in Fl. 1864, p. 210.*

Pottia cavifolia var. *barbuloides* *DR. in W. P. Sch. Syn. I ed. p. 122.*

Pottia cavifolia var. *gracilis* *Wils. Bryol. brit.; Rab. Bryoth. eur. n. 1051.*

Pterigoneuron lamellatum *Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 97.*

Tortula lamellata *Lindb. Trichost. eur. p. 23.*

1. *Ad mur. et terr. argill. silic. — Eur. : Britann., German. sept., Eur. media tota. As. : Caucas.*

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 819.

characodonta *C. M. in Linn. 1880-82, p. 431.*

2. — *Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.*

chimborazensis (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I, p. 296.*

Tortula chimborazensis *Mitt. M. austr. am. p. 163.*

2. — *Am. merid. : M. Chimborazo.*

chionostoma Vent. in *Rev. bryol.* 1885, p. 64.

Syn. Rup. serpent. — *Eur.* : M. Rosa.

chloronotos Br. in *Fr. Müller M. Sardin.* (1829) ; *Bryol. eur.* II (mon. p. 18) t. 141 ; *C. M. Syn.* I, p. 598 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 193.

Crossidium crassinerve Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 128.

Tortula chloronotos Broth. *Enum. M. Caucas.* p. 42.

T. crassinervia de Not. *Spec. de Tortul. Ital. n.* 15 et *Syll.* p. 176.

2. Muric. — *Eur.* : Rarior : Gall. austr., Sardin., ins. Melit. As. : Reg. transcaucas., Afghanistan. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Colorado. *Pac.* : N. Zeland. sept. (?)

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1272.

« *f. nivea* Besch. *Cat. M. Alger.*, p. 12.

Ut typ. — *Afr.* : Alger.

chloronotos Brid. — *B. membranifolia*.

chlorotricha (Broth. et Geh.) Par.

Tortula chlorotricha B. et G. in *Oefv.*... 1893, p.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

chrysopila C. M. in *Fl.* 1885, p. 415.

1. Ster. — *Am. merid.* : Fret. Magell., Fuegia.

chrysopoda C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 57.

2. Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit.

circinalis C. M. — *B. atro-virens*.

circinatula C. M. et Kindb. l. c. p. 56.

2. Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit.

cirrata { Brid. — *Dicranoweisia*.
{ Brid., *Bryol. eur.* — *B. caespitosa*.

cirrifolia W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 219.

Anoetangium Hornschuchianum Tayl. in *Wils. Bryol. brit.* p. 312.

B. hibernica Mitt.

2. Ad rup. h. mid. — *Eur.* : Hibern.

Closteri Aust. in *Coult. Bot. Gaz.* I, p. 29 et IV, p. 30 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 127.

Ster. — *Am. sept.* : New Jersey, Florid.

commutata Jur. in *Verh. der K. K. zool. bot. Gesells. in Wien.* 1874, p. 377 et *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 119.

B. convoluta Jur. et Ung. in *Ky. « die Insel Cypern. »*

B. convoluta var. *commutata* Husn. *Muscol. gall.* p. 108.

B. convoluta var. *densa* Milde *Bryol. siles* p. 116.

B. convoluta var. *sardoa* C. M. *Syn.* I, p. 615.

Trichostomum undatum W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 180.

2. Ad mur et rup. calcar. — *Eur.* : Westphal., Sardin., ins. Zante, Pyr. occid., Catalaun., ins. Balear. As. : Ins. Cypr.

comosa Dz. et Mk. *M. frond. ined. Arch. ind.* p. 46, t. 17 et *Bryol. jav.* I, p. 103 ; *C. M. Syn.* I, p. 610 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 35.

B. arcuata Griff. *Not.* p. 411 et *Ic. pl. asiat.* II, t. 79, f. I.

Trichostomum tortile Wils. in *Keew Journ. bot.* IX, p. 321.

2. Terr. calcar. — As. : Ins. Amboine, Nepal., Sikkim, Khasia, Singapore, Java.

concava W. P. Sch. — *B. cavifolia*.

confertifolia Mitt. — *Desmatodon*.

conica { Brid. — *B. agraria*.
Spreng. — *Ceratodon stenocarpus*.

conotricha C. M. in *Fl.* 1885, p. 416.

Syn. Lignic. — *Am. merid.* : Fuegia.

« *var. fagicola* C. M. l. c.

Arbor. — *Am. merid.* : Fuegia.

consanguinea (Thw. et Mitt.) Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 673.

Tortula consanguinea Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 300.

2. Terr. — As. : Ceylan.

constricta Mitt. *M. Ind. or.* p. 33.

Tortula vinealis var. Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 322.

2. — As. : Nepal., Sikkim.

contorta Hpe. in C. M. *Syn. I*, p. 629.

Tortula contorta Mitt. *M. austr. am.* p. 169.

— *Am. merid.* : Chile.

convoluta Hedw. *M. frond. I*, p. 86, t. 32 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 560 ;
Bryol. eur. II (mon. p. 29) t. 154 ; C. M. *Syn. I*, p. 614 ; W. P.
Sch. Syn. II ed. p. 214.

B. purpurea Agh. (fid. Hsch. in *Brid. l. c.*)

B. setacea Hedw. *Fund. M. II*, p. 92.

Bryum convolutum Dicks. *Crypt. fasc. II*, p. 6 p.p.

Br. setaceum Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 880.

Br. stellare, nitidum, pallidum, capsulis tenuissimis Dill. *Hist. M.* p. 381, t. 48, f. 41.

Hypnum setaceum Weiss *Crypt. Goett.* p. 206.

Mnium setaceum Poll. *Pl. Palat. III*, n. 985, f. 5 (ic. pessima).

Streblotrichum convolutum P. B. *Prodr. pp.* 27 et 89.

Tortula convoluta Schrad. *Spic. Fl. germ. I*, p. 66.

T. setosa P. B. l. c. p. 93.

2. Ad terr. nud. vel herbos. — *Eur.* : Tota. *As.* : Japon., Jenissei merid., *Caucas.* *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Canada, M. Rupestr., *Columb brit.*, ins. Vancouver, Wisconsin, Pensilv., Kansas, Calif., Alabama, etc.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* 1 ed. n. 138 (*Tortula*).

Faurie *Pl. Japon.* n. 167.

Mac. *Canad. M.* n. 76.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 323 et b.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 138.

« *var. obtusata* C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 265.

Rupic. — *Am. sept.* : Ontario.

convoluta { *Jur. et Ung.* — *B. commutata*.
var. *commutata* Husn. — *B. commutata*.
var. *densa* Milde. — *B. commutata*.
var. *sardoa* C. M. — *B. commutata*.

cordata Lindb. — *Didymodon*.

costa-ricensis Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 154.

2. Ad lapides. — *Am. sept.* : Costa-Rica.

costata (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 281.

Tortula costata Mitt. *M. austr. am.* p. 159.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

crassinervia Tayl. in Linn. 1853, p. 492 (nom.) ; Mitt. in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 447.

Syn. — Pac. : N. Zeland. centr.

crenata (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 289.

Tortula crenata Mitt. M. austr. am. p. 169.

2 ? — Am. merid. : And. Quitens.

crinita Schultz. — B. pilifera.

crispa Hedw. — Dicranella Schreberi.

crispata Hpe. — Streptopogon.

crispifolia (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 276.

Tortula crispifolia Mitt. in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 419.

— Pac. : N. Zeland. merid.

crispula Hpe. — B. subulifolia.

crocea { Brid. — B. paludosa.

{ var. *paludosa* Roehl. — B. paludosa.

Crügeri Sonder in C. M. Syn. I, p. 618 et II, p. 630 ; Lesq. et Jam. Man. p. 122.

Tortula Crügeri Mitt. M. austr. am. p. 150.

2. Terr. — Am. sept. : Florid. et Ludovic. (ster.) ; Cuba, ins. S. Vincent, Barbades. Am. merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, And. Quitens. et Peruv.

cucullatifolia C. M. in Linn. 1878-79, p. 331.

2. — Am. merid. : Alp. Argentin. Tucuman.

cucullifera (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 273.

Tortula cucullifera Mitt. l. c. p. 155.

2. — Am. merid. : And. Quitens. et Peruv.

cuneifolia (Dicks.) Brid. Bryol. univ. I, pp. 549 et 829 (excl. syn.) ; Bryol. eur. II (mon. p. 31) t. 156 ; C. M. Syn. I, p. 628 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 198.

B. Dicksoniana Schultz Nov. Act. XI, I, p. 224, t. 34, f. 33.

B. mutica Brid. Mant. M. p. 92.

B. Solmsii W. P. Sch. (fid. Husn. Muscol. gall, p. 101).

Bryum cuneifolium Dicks. Fasc. III. Pl. crypt. p. 7.

Br. humile, pilis carens, viride et pellucidum Dill. Hist. M. p. 356, t. 45, f. 15.

Desmatodon cuneifolius Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 133.

Tortula acuminata Brid. M. Recent. II, I, p. 188.

Tortula cuneifolia Roth Tent. Fl. Germ. III, I, p. 213.

T. mutica Brid. Sp. M. I, p. 251.

T. spathulaefolia de Not. Sp. de Tortul. ital. n. 10 et Syll. p. 174.

1. Muric. et in loc. humid. — Eur. : Occid. et merid. ; Britann. Afr. : Alger., Canar. Am. sept. : Calif.

Exs. : Bourgeau Pl. Can. n. 1130.

Rab. Bryoth. eur. n. 821 (*Tortula*) et 1072.

cuneifolia W. et M. — B. muralis var. aestiva.

curta Hedw. — Leptotrichum tortile var. pusillum.

curvipes C. M. in Linn. 1878-79, p. 344.

2. — Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.

curvirostris Lindb. — Gymnostomum.

var. *laeviuscula* Lindb. et Arn. — Gymnostomum curvirostre var. laeviusculum.

cuspidata (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 297.

Syntrichia princeps Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* p.p.

Tortula cuspidata *H. f. et W. Fl. Tasman. II*, p. 175, t. 172. f. 9.

Syn.

— *Pac.* : N. Zeland., Tasman.

cuspidata Schultz. — *B. unguiculata* var. *cuspidata*.

cuspidatissima C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 84 et in *Forchungsreise...* p. 42.

2.

— *Afr.* : Ins. Ascension.

cylindrica (*Tayl.*) *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 208.

B. Beecheyi Lesq. ; *Watson Bot. Calif. II*, p. 372.

B. vinealis var. *cylindrica* Boulay *M. Fr.* p. 430.

B. vinealis var. *flaccida* *Bryol. eur. II (mon. p. 24)* ; *Rab. Bryoth. eur.* n. 982 ; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed.* n. 131.

Tortula cylindrica Lindb. *Adnot. bryol.* 1865.

T. insulana de Not. *Spec. de Tortul. ital. n. 38 et Syll.* p. 180.

T. vinealis de Not. *Epil.* p. p.

Zygotrichia cylindrica Tayl. in *Mac-Kay Fl. hibern. II* p. 26.

2. Lignic. et ad terr. arenos. humid. — *Eur.* : Scandin., Britann., Voges., Sardin. *As.* : Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Columb. brit., fret. Behring, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Montana, Calif.

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 81 p.p.

Rub. Bryoth. eur. n. 982, 1274.

cylindrica { *Mac. p.p.* — *B. tortellifolia*.
Wils. — *B. Brebissoni*.
 var. *sinuosa* Husn. — *Didymodon*.
 var. *vinealis* Lindb. — *B. cylindrica*.

cylindrotheca (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 264.

Tortula cylindrotheca Mitt. *M. Ind. or.* p. 50.

Trichostomum bombayense Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 322.

2.

— *As.* : Sikkim.

danica Lge. — *B. pulvinata*.

decidua (*Mitt.*) *Par.*

Tortula decidua Mitt. *M. austr. am.* p. 171.

2. Arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

decidua C. M. — *B. uruguensis*.

declivium C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 425.

Fl. et fr. ign. Arenic. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos-Ayr.

decolorans Hpe. in *Ann. sc. nat. sér. V, III*, p. 348.

Tortula decolorans Mitt. *M. austr. am.* p. 149.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

decursivula Kindb. in *Mac. Cat.* p. 264.

Ster. Rupic. et terr. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

densifolia *Hook. f. et Wils.* in *London Journ. of bot.* 1844, p. 543; C. M. *Syn. I*, p. 631 et *II* p. 632.

2.

— *Am. merid.* : Ins. Maclov.

denticulata Wils. mss. ; Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 50 ; C. M. *Syn. II*, p. 631.

Tortula denticulata Mitt. *l. c.* p. 168.

2.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

depressa Sull. — *B. flagellaris*.

desertorum (Broth.) Par.

Tortula desertorum Broth. in *Bot. Centralbl.* 1888, n. 14.

2. *Arenic.* — *As.*: Transcasp.

deusta Brid. — *Didymodon luridus* (1).

Dicksoniana Schultz. — *B. cuneifolia*.

Dieckei Broth. in *Roell M. bor. am. exs.*

— *Am. sept.*: Washington.

dimorpha C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 102.

Ster. — *Afr.*: C. B. Sp.

dioritica C. M. in *Linn.* 1875, p. 402.

Ster. *Rupic.* — *As. M. orient. mar. Erythraei*.

domestica Brid. — *B. agraria*.

Donnellii (Aust.) Lesq. et Jam. *Man. p.* 128.

Tortula Donnellii Aust. in *Coult. Bot. Gaz. III*, p. 31.

1. *Terr.* — *Am. sept.*: Florid.

Drummondii (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 294.

B. fragilis Wils. in *Bryol. eur. VI*, t. 639; *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 219; *Un. itin.* 1863, n. 24.

Campylopus Hartmanni W. P. Sch. *mss.*; *C. et R. Hartm. in Thed. Nya bot. notis.* 1855, p. 48.

Didymodon fragilis H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. I ed.*, n. 127.

Mollia fragilis Lindb.

Tortula Drummondii Mitt. *M. Ind. or. p.* 27.

T. fragilis Wils. in *Lond. Journ. of bot. III*, p. 437.

T. tortuosa var. *inclinata* Drumm. *M. bor. am. I ed.*, n. 142.

Trichostomum fragile C. M. *Syn. I*, p. 586; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed.* n. 149.

2. In terr. uligin. et fissur. rup. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursorum, Scandin., Scot., Hibern., Alp. helvet., Rhönggeb., M. Pisan. *As.*: *Jenissei infer.*, *Caucas. occid. et centr.*, *Sikkim. Am. sept.*: *Groenland, lac. Super.*, *M. Rupestr. et Adirondack, New York, New Jersey.*

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 789.

« var. *setacea* R. Farneti *M. prov. Pavia*, 1891, p. 19.

Ster. *Rup. apric.* — *Eur.*: M. *Pavia* (1700^m).

dubia Brid. — *B. unguiculata*.

duriuscula (Wils.) Jaeg. *Ad. I*, p. 301.

Tortula duriuscula Mitt. *M. Ind. or. p.* 27.

Didymodon duriusculus Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 28.

2. — *As.*: Ceylan.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 120.

— *Afr.*: M. *Cameroon*.

Eglingii Schlieph. in *Fl.* 1887, p. 222.

2. — *Am. sept.*: Tennessee.

Ehrenbergiana C. M. *Syn. I*, p. 636.

2. — *Am. sept.*: Mexico.

(1) *B. diaphana* Brid. *Bryol. univ. I*, p. 577.

An *Grimmia*? (C. M. *Syn. I*, p. 645). Deleatur.

elata DR. et Mont. *Fl. Alg. ined.* ; C. M. *Syn.* I, p. 620.

Tortula elata Mont. *Syll.* p. 41.

2. *Rupic.* — *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Washington, Oregon, Calif.

elongata Wils. *mss.* ; Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 51 ; C. M. *Syn.* II, p. 630.

Tortula elongata Mitt. *M. austr. am.* p. 164.

2. — *Am. merid.* : Summ. M. Pichincha.

emarginata Dz. et Mk. *M. frond. ined.* *Arch. ind.* p. 50, t. 20 ; C. M. *Syn.* I, p. 626.

Tortula emarginata Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 160.

1. — *As.* : Japon.

Enderesii Garov. } — *B. flavipes* (Jur.)
— *B. aciphylla?* (W. P. Sch.)

ericetorum Brid. — *B. unguiculata var. patagonica.*

erosa Hpe. *mss.* ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 348.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

erubescens C. M. in *Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 14.

2. — *Afr.* : Abyss.

erythrodonta Tayl. — *Streptopogon.*

erythroneura W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.* ; *Jaeg. Ad.* I, p. 305.

— *Afr.* : C. B. Sp.

erythropoda W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 36.

— *Am. sept.* : Mexic.

enbryum C. M. in *Fl.* 1879, n. 24.

Ster. — *Afr.* : M. Kenia.

eucalyx W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.* ; *Jaeg. Ad.* I, p. 305.

— *Afr.* : C. B. Sp.

eutrichostomum C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 91.

— *Afr.* : C. B. Sp.

excavata (Mitt.) *Jaeg. Ad.* I, p. 275.

Tortula excavata Mitt. *M. austr. am.* p. 154.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

excurrens Broth. in *Bot. Centralbl.* 1888, n. 14.

2. *Rup. calcar.* — *As.* : Transcasp.

fallax Hedw. *M. frond.* I, p. 62, t. 24 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 556 ; *Bryol. eur.* II (mon. p. 23) t. 147 ; C. M. *Syn.* I, p. 616 ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 205.

B. fallax β *flavescens* *Brid. Bryol. univ.* l. c.

B. fallax γ *reflexa* *Brid. l. c.*

B. flavescens *Brid. Mant. M.* p. 92.

B. nervosa *Schultz Fl. Starg.* p. 305 (*excl. syn. Brid.*)

B. reflexa *Brid. Mant. M.* l. c.

Bryum fallax *Dicks. Fasc. III Pl. crypt.* p. 5.

Br. flavescens *Dicks. Fasc. II, p. 4, t. 4, f. 5.*

Br. imberbe *L. Mant. Pl. II, p. 309.*

Br. tenue, imberbe et pallidum, foliis crebrioribus *Dill. Hist. M.* p. 382, t. 48, f. 46.

Dicranum pellucidum *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 108 (fid. Kindb.)*

Mollia fallax *Schrank Baiers. Fl. II, p. 458.*

- Tortula fallax* Brid. *Sp. M. I*, p. 255.
T. flavescens Brid. *Sp. M. I*, p. 263.
T. imberbis Sm. *Fl. brit. III*, p. 1261.
T. reflexa Brid. *Sp. M. I*, p. 255.
2. Ad mur. et terr. humidiusc., feré ubique. — *Eur.* . In reg. campestr. vulgatiss. *As.* : Jenissei med. et infer., *Caucas.* *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Groenland, Canada tot., *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, ins. Vancouver, reg. sept., occid. et orient.
Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 139 (*Tortula*).
- « *var. brevicaulis* Bryol. *eur. et C. M. ll. cc.*
B. brevicaulis Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 126, t. 32 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 551.
Tortula brevicaulis var. γ Hook. et Grev. in Brewster *Edinb. Journ. I*, p. 300.
 Ut typ. — *Eur.* et *Am. sept.* : *C. typ.*
Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 129.
- « *var. brevifolia* Schultz *Rec. de Barbula* p. 20, t. 33, f. 21 B ; *Bryol. eur. et C. M. ll. cc.*
B. brevifolia Brid. *Bryol. univ. I*, p. 55.
Bryum brevifolium Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.*, p. 4.
Br. palustre, brevifolium, capsulis nigricantibus Dill. *Hist. M.* p. 377, t. 47, f. 39.
Tortula brevifolia Sm. *Fl. brit. III*, p. 1259.
 Ut typ. — *Eur.* : Septentr. *Am. sept.* : Passim.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1174.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 129 (false sub. *var. brevicauli*).
- fallax* Sull. — *B. subfallax*.
fallax { *var. flavescens* Brid. — *B. fallax*.
var. reflexa Brid. — *B. fallax* (fid. *C. M.*).
var. reflexa Brid. — *B. recurvifolia* (fid. *Lindb.*).
var. Turneri Brid. — *Didymodon rubellus*.
var. vinealis Hüb. — *B. vinealis*.
- fastigiata* Schultz. — *B. unguiculata var. fastigiata*.
Fendleri *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 483.
 2. — *Am. merid.* : Venezuela.
- ferruginea* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 37.
 — *Am. sept.* : Mexic.
- filaris* *C. M. Bryol. austr. Georg.* p. 33.
 Syn. *Rupic.* — *Am. merid.* : Austr. Georg.
- Fiorii* Vent. in *Rev. bryol.* 1885, p. 66.
 2. Coll. arenac. — *Eur.* : Ital. (Modena).
- flaccidiseta* Ltz. *Moosstud.* p. 161.
 2. — *Am. sept.* : Mexic.
- flagellaris* W. P. Sch. in *Ann. sc. nat. II sér. VI*, p. 146, t. 10 ; *C. M. Syn. I*, p. 642.
B. depressa Sull. in *U. St. Expl. Exped. (Wilkes)* 1859, p. 5.
Tortula flagellaris Mitt. *M. austr. am.* p. 150.
 2. — *Am. merid.* : Chile, fret. Magell.
- flavescens* (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 613.
B. fuscescens Wall. *Cat. n.* 7567.
Tortula flavescens H. et Gr. in Brewster *Edinb. Journ. I*, p. 297, t. 12 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 29.
 Terr. argill. — *As.* : Nepal.

flavescens Brid. — *B. fallax*.

flavipes *Bryol. eur. II* (mon. p. 30), t. 155; *C. M. Syn. I*, p. 621; *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 214.

B. Enderesii Garov. *Enum. M. Austr.* (fid. Jur.)

B. lutescens Laurer in sched.

Tortula flavipes Wils. *Bryol. brit.* p. 128.

2. Terr. humos. glareos. — *Eur.*: Alp. Bavar., Austr., Comens.: Francon.; deest in Britann. et in Scand.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 624, 790.

flexifolia Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 496.

2. Terr. — *Am. sept.*: S. Nevada Calif., Oregon.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 132.

flexifolia Mac. — *B. tortellifolia* (1).

fleximarginata Hpe. et *C. M.* in *Linn.* 1853, p. 493.

2. — *Pac.*: Austral. fel.

flexuosa Schultz *Rec. de Barbula* p. 16, t. 33; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 573; *C. M. Syn. I*, p. 609.

B. Hookeri Steud. *Nom. crypt.* p. 72.

Tortula flexuosa Hook. *M. ex. t.* 125.

— *Afr.*: C. B. Sp.

flexuosa Brid. — Cf. *B. flexifolia* ej. (1)

fontana *C. M. Bryol. austr. Georg.* p. 32.

Ster. Aquat. — *Am. merid.*: Austr. Georg.

fragilis Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 334; *C. M. Syn. I*, p. 634.

Tortula fragilis Mitt. *M. austr. am.* p. 172.

2? — *Am. merid.*: M. Pichincha.

fragilis { Wils. — *B. Drummondii*.
var. *setacea* R. Farneti. — *B. Drummondii* var. *fragilis*.

frigida *C. M. in Bot. Zeit.* 1858, p. 163.

2. Turfac. — *Am. merid.*: Summ. And. Peruv.

fuegiana (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 301.

Syntrichia fuegiana Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 71.

Tortula fuegiana Mitt. *M. austr. am.* p. 174.

2. Arenic. — *Afr.*: Ins. Kerguelen? (2) *Am. merid.*: Fret. Magell., Fuegia, ins. Maclov.

Funkiana Schultz. — *B. paludosa* var. *Funkiana*.

fusca *C. M. Syn. I*, p. 610.

Tortula fusca Mitt. *l. c.* p. 610.

2. — *Am. merid.*: Chil.

fusca *W. P. Sch.* — *B. Mandoni*.

(1) *flexifolia* *Brid. Bryol. univ. I*, p. 560.

B. flexuosa *Brid. Mant. M.* p. 93.

B. scoparia Schultz in *Nov. Act. Phys. Med. Acad. Caesar. XI*, II, p. 718.

Tortula flexuosa *Brid. Sp. M. I*, p. 256.

« An *Macromitrium*? » (*C. M. Syn. I*, p. 645,

(2) Cf. *B. semirubra*,

- fuscescens* Wall. — *B. flavescens*.
- fuscinervia* (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 275.
Tortula fuscinervia Mitt. *l. c.* p. 154.
 2. — *Am. merid.* : Ins. Chiloë.
- fusco-mucronata* Jaeg. — *Desmatodon*.
- fuscula* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 343.
 Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob. et
 subtropic.
- galeata* C. M. *l. c.* p. 330.
 Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Alp. Argentin Saltens.
- gangetica* C. M. in *op. cit.* 1871-73, p. 177.
 — *As.* : Bengal.
- geheebiopsis* C. M. — *Geheebia Mülleri*.
- geniculata* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 107 ; C. M. *Syn. I*, p. 620.
Tortula geniculata Mont. *Syll.* p. 39 ; Mitt. *op. cit.* p. 161.
 2. — *Am. merid.* : Chil.
- gigantea* Funk. — *Geheebia cataractarum*.
- glacialis* Kze. in *Poeppig Coll. pl. Chil. III*, n. 272 ; C. M. *Syn. I*, p. 634.
Tortula glacialis Mitt. *l. c.* p. 173.
 2. *Rupic.* — *Am. merid.* : And. Quitens et Chilens.
- glacialis* { Besch. — *B. amphidiacea* ?
 Br. et Sch. — *B. subspathulata*.
- glauescens* Hpe. in *Linn.* 1863, p. 128.
Tortula glauescens Mitt. *l. c.* p. 152.
 2 ? *Rupic.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- glauescens* W. P. Sch. — *B. boliviana*.
- Glaziowii* Sb. — *B. lurida*.
- goniospora* C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (nom.)
 — *Pac.* : Nov-Caledon.
- Goudotii* Hpe. in *Ann. sc. nat. V sér., III*, p. 350.
Tortula Goudotii Mitt. *l. c.* p. 171.
 2. *Arbor.* — *Am. merid.* : And. Nov. Gran.
- gracilenta* Mitt. *M. Ind. or.* p. 35.
Tortula flavescens var. *Wils.* in *Kew Journ. bot. IX*, p. 322.
 2. — *As.* : Himalaya occid.
- gracilenta* Hpe. — *B. lurida*.
- gracilescens* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 34.
 — *Am. sept.* : Mexic.
- graciliformis* W. P. Sch. in *op. cit.* p. 35.
 — *Am. sept.* : Mexic.
- gracilis* (Schleich.) Schwaegr. *Suppl. I*, 1, p. 125, t. 34 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 536 ; *Bryol. eur. II* (mon. p. 22) t. 145 ; C. M. *Syn. I*, p. 609 ; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 210.
B. acuta *Brid. l. c.* p. 554.
B. rectifolia *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 49.
Tortula acuta *Brid. Sp. M. I*, p. 265.

- T. gracilis* Schleich. *Cat. pl. helv.* p. 30.
T. rectifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 158.
2. In glareos. calc. et arenos. argill. — *Eur.* : Media et præcip. merid.
As. : Caucas. *Af.* : Alger. *Am. sept.* : M. Rupestr., Vermont, Calif.,
 Guatemala. *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.; Peruv.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 669.
 « *var. viridis* Bryol. eur., *C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*
- Tortula fallax* var. stricta de Not. *Spec. de Tortul. ital.* n. 26
T. viridis fallax var. Hook. et Grev. in *Edinb. Journ. of sc. I*, p. 300.
 Ut typ. — *Eur.* : Meridion. *Afr.* : Alger.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 818.
- var. squarrulosa* Kindb. — *B. subicmadophila.*
gracilis Sull. — *B. subulifolia.*
- graminicolor* *C. M. Syn. I*, p. 611.
B. atlantica *W. P. Sch. in sched. (fid. C. M.)*
Tortula graminicolor Mitt. *l. c.* p. 160.
2. Terr. — *Am. merid.* : Chile.
- graminicolor* Besch. — *B. orizabensis.*
- gregaria* (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 272.
Tortula apiculata Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 322.
T. gregaria Mitt. *M. Ind. or.*, p. 29.
Trichostomum brachyphyllum Wils. *l. c.* p. 321.
2. — *As.* : Nepal. or., Tibet.
- grimmiacea* *C. M. in Linn.* 1880-82, p. 427.
 2. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.
- grisea* (Jur.) Boul. *M. Fr.* p. 434.
B. membranifolia Garov. *Enum. M. Austr.* 1840, p. 14.
B. membranifolia var. *grisea* Vent. in *Husn. Musc. Gall.* p. 101.
Crossidium griseum Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 128.
Desmatodon griseas Jur. in *Verh. der K. K. zool. bot. Gesells. in Wien*,
 1864, p. 399.
Tortula squamigera var. *pottioidea* de Not.
1. Rup. dolomit. — *Eur.* : Helvet. occid., Tirol., Istria, Austr. inf.
As. : Transcaucas., Syria.
- Guepini* (Bryol. eur.) *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 197.
Desmatodon Guepini Bryol. eur. *II* (mon. p. 8) t. 133.
Trichostomum Guepini *C. M. Syn. I*, p. 590.
1. In terr. argill. et coll. schist. — *Eur.* : Rariss. : Gall. sept. (Lille),
 occid. (Andegav.) et merid. (le Vigan, Hyères). *Am. sept.* :
 Calif.
- Hampeana* Par.
B. brachyphylla Hpe. in *Linn.* 1859, p. 625.
 — *Pac.* : Austral. orient.
- hastata* Mitt. *l. c.* p. 34.
T. comosa ? Wils *l. c.*
2. — *As.* : Sikkim.
- Haussknechtii* Jur. et Milde *Beitr....* p. 593.
 2 ? Rupic. — *As.* : Persia austr.

Henrici *Rau in Bull. of the Washb. Coll. Lab. I* (1886), p. 172.
Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Kansas (1).

hibernica Mitt. — *B. cirrifolia*.

Hildebrandtii *C. M. in Linn.* 1876, p. 294.
Ster. — *Afr.* : Somal.

himantina *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 337.
2. — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 41.

Hookeri Steud. — *B. flexuosa*.

Hornschuchiana *Schultz Rec. de Barbula* p. 25, t. 33, f. 25; *Bryol. eur. II* (mon. p. 28) t. 148; *C. M. Syn. I*, p. 608; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 211.

B. revoluta *W. et M. Bot. Taschb.* p. 210.

B. revoluta β *Hornschuchiana* *Brid. Bryol. univ. I*, p. 572.

Tortula Hornschuchiana *de Not. Syll.* p. 179.

T. revoluta *Hook. et Tayl. Muscol. brit. I ed.*, p. 33, t. 12.

2. In loc. glareos. argill. — *Eur.* : Med. et merid.; *Dania. Afr.* : Alger, Choa.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 671.

horridifolia *C. M. et Kindb. in Mac. Cat.* p. 57.
Ster. Rup. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.

humida (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I.*, p. 282.
Tortula humida *Mitt. M. austr. am.* p. 162.
2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

humilis Hedw. — *B. caespitosa*.

Husnoti *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antil. fr.* p. 25.
1. Muric. — *Am. sept.* : Guadel., Martinic.
Exs. : Husn. n. 139.

hyalinotricha *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise....* p. 23.
Ster. Rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

hyperborea *Hook. in sched.*; *Jaeg. Ad. I*, p. 305.
— *Pac.* : Nov. Caled.

hyperborea { *R. Brown?* *Brid.* — *B. mucronifolia*.
Mont. — *B. magellanica*.

icmadophila *Bryol. eur. II* (mon. p.) t. 146; *C. M. Syn. I*, p. 614 et *II*, p. 630; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 211.
Tortula icmadophila *Lindb. Trichost. eur.* p. 41.

2. Ad rup. cataract. — *Eur.* : Norveg. (Dovre), Pingzgov., Arvern.
As. : Caucas.

Exs. : Un. itin. 1863, n. 22, 23.

inaequalifolia *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 49, t. XVD; *C. M. Syn. I*, p. 616.

Tortula inaequalifolia *Mitt. M. austr. am.* p. 153.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

incerta Schum. — *B. unguiculata*.

(1) « Probab. *Pharomitrium subsessile* ». (Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1892, p. 82.)

inclinans W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 55.

— Afr. : Ins. Franciae.

inclinata Schwaegr. *Suppl. I, I, p. 131, t. 33*; *Brid. Bryol. univ. I, p. 575*; *Bryol. eur. II (mon. p. 25) t. 150*; *C. M. Syn. I, p. 600*;
W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 217.*

B. angustifolia *Brid. l. c. p. 568.*

B. nervosa *Brid. Mant. M. p. 95.*

B. nervosa β inclinata *ej. l. c.*

Mollia inclinata *Lindb.*

M. tortuosa var. inclinata *Lindb.*

Tortula curvata *Schleich. in sched.*

T. inclinata *Hedw. f. in W. et M. Beitr. I, p. 123, t. 5.*

T. nervosa *Brid. Sp. M. I, p. 262 (excl. syn.)*

2. In glareos. et ad fluv. ripas. — *Eur.* : Med. (ster. in Scandin. et Britann.) — *As.* : Caucas. occ. et centr.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 421.

« f. acuminata R. Farneti M. prov. Pavia, 1891, p. 17.

Ut typ. — *Eur.* : Ital. super. (Pavia).

« var. brachypoda *Besch. Cat. M. Alger, p. 14.*

Ut typ. — *Afr.* : Alger.

« var. leptotheca *Brid. Bryol. univ. I, p. 833.*

T. inclinata β *Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 298.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

inclinatula C. M. et *Kindb. in Mac. Cat. p. 50.*

2. Terr. et aren. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 512.

incrassata *Lindb. in Broth. Enum. M. Cauc. p. 57.*

Ster. Ad. rup. trachyt. — *As.* : Caucas. centr.

indica *Brid.* — *Trichostomum orientale.*

inermis *Br. mss.* ; W. P. Sch. *Coroll. bryol. eur. p. 35 et Syn. II ed. p. 224*; *C. M. Syn. I, p. 624.*

B. subulata β inermis *Bryol. eur. II (mon. p. 3) tt. 161 p.p. et 167.*

Desmatodon inermis *Mitt. M. Ind. or p. 37.*

Syntrichia subulata γ inermis *Brid. Bryol. univ. I, p. 581.*

Tortula inermis *Mont. in Arch. de bot. I, p. 136, t. 4, f. 4 et Syll. p. 40.*

T. subulata var. inermis *Spr. in Ann. Mag. nat. hist. II ser., III, p. 376.*

1. Terr., muric. et in fissur. rup. — *Eur.* : Merid. : vall. Rhen., Gall. merid., Hispan. *As.* : Caucas. occid. et centr., Persia, Tibet. occid., *Afr.* : M. Sinaï, Alger. *Am. sept.* : Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 456.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n. 142.*

Un. itin. 1863, n. 25.

inflexa (*Duby*) *C. M. Syn. I, p. 605*; *Bryol. jav. I, p. 102, t. 82.*

Tortula inflexa *Duby in Moritszi Verz. d. Zolling. Pfl. p. 33.*

2. Ad terr. et sax. humid. — *As.* : Java.

insidiosa *Milde.* — B. rigidula.

intermedia W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 229.*

B. rupestris β ruralis *Bryol. eur. II (mon. p. 42)*; *C. M. Syn. I, p. 640*;

Rab. Bryoth. eur. n. 667, 1070.

Syntrichia intermedia *Brid. Bryol. univ. I, p. 586.*

S. montana *Nees in Fl. 1819, I, p. 301. (fid. Lindb. M. Sc.)*

Tortula intermedia *Berk. Handb. of brit. M. p. 251*; *Rab. l. c. n. 1016.*

- T. montana* Lindb. *M. Scand.* p. 20, n. 170.
T. ruralis var. I Spr. in *Ann. Mag. nat. hist. II ser., III*, p. 375.
T. ruralis δ *crinita* de Not. *Spec. de Tortul. ital. n. 5* et *M. Ital. I*, p. 36, t. 15.
T. ruralis β *minor* Wils. *Bryol. brit.* p. 134.
T. ruralis β *rupestris* Wils. *l. c. Suppl.*
 2. Ad rup. et in mur. calcar. — *Eur.* : Med. et merid. ; Suecia, Britann.
 As. : Minor, Caucas., Persia. *Afr.* : Alger., C. B. Sp. *Am. sept.* :
 Washington, Montana.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1016 b, 1069.
 « var. *calva* W. P. Sch. *l. c.*
 B. ruralis var. *calva* *Bryol. eur. l. c.*
 Ut typ. — *Eur.* : Suec. merid., Francon., Gall. orient.
 var. *pulvinata* Husn. — *B. pulvinata*.
inundata (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 270.
 Tortula inundata Mitt. *M. austr. am.* p. 161.
 2. Rupic. — *Am. merid.* : And. Quitens., Monte Video.
Itzigohnii Hpe. — *B. muralis*.
Jamesoni Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 48 ; *C. M. Syn. I*, p. 581.
 Didymodon Jamesoni Jaeg. *Ad. I*, p. 213.
 Tortula Jamesoni Mitt. *l. c.* p. 162.
 2. Loc. humid. — *Am. merid.* : And. Quitens et Boliv.
 Exs. : Mandon Pl. boliv. n. 1623.
javanica Dz. et Mk. *M. frond. ined. Arch. ind.* p. 47, t. 18 ; *Bryol. jav. I*,
 p. 101 ; *C. M. Syn. I*, p. 605.
 B. calymperifolia C. M. in *Linn.* 1844, p. 703.
 Desmatodon javanicus Mitt. *M. Ind. or.* p. 38.
 2. Terr. — *As.* : Nepal., Himalaya, Celebes, Java.
Jooriana C. M. in *Bull. Torr. bot. Club V*, p. 49 et in *Fl.* 1888, p. 77.
 B. Ravenelii Aust. ?
 2. Terr. argill. — *Am. sept.* : Carol. infer. ? Florid., Ludovic.
jugicola (Duby) Par.
 B. cirrata ? (*fid. Hpe. in Fl.* 1880, n. 21).
 Tortula jugicola Duby *Choix de M. exot.* 1880, p. 2, t. 3, f. 2.
 — *Am. merid.* : M. Brasil. austr. or.
juniperoidea C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 429.
 Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. sub-
 tropic.
khassiana (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 263.
 Tortula khassiana Mitt. *M. Ind. or.* p. 29.
 Ster. — *As.* : Khasia subtropic.
Knightii (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 281.
 Tortula caespitosa var. *Hook. f. et Wils. Fl. N. Zeal. II*, p. 70.
 Tortula Knightii Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 71 ; *Fl. Tas-*
 man. II, p. 174, t. 172, f. 11 ; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 420.
 — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.
Kunzeana C. M. in *Linn.* 1843, p. 586 et *Syn. I*, p. 630.
 Tortula Kunzeana Mitt. *M. austr. am.* p. 169.
 T. marginata Kze. in *Poeppig pl. Chil.* n. 19.
 2. Terr. — *Am. merid.* : Chil. austr.

Kurzii C. M. in Linn. 1872, p. 177.

2. — As. : Bengal. septentr.

laevigata (Mitt.) Jaeg. l. c. p. 274.

Tortula laevigata Mitt. l. c. p. 160.

— Am. merid. : And. Quitens.

laevipila (Brid.) Bryol. eur. II (mon. p. 40) t. 164; C. M. Syn. I, p. 638;
W. P. Sch. Syn. II ed. p. 226.

Syntrichia laevipila Brid. Mant. M. p. 38 et Bryol. univ. I, p. 586.

S. montana Nees in Regensb. Bot. Zeit. 1819, II, p. 301 (fid. C. M.).

S. ruralis var. laevipila Spreng. in Linn. Syst. veg. XVI ed., IV, I, p. 177.

Tortula laevipila Schwaegr. Suppl. II, I, p. 66, t. 120.

T. ruralis β laevipila Hook. et Tayl. Musc. brit. II ed. p. 56.

1. Ad arbor. et rup. calcar. — Eur. : Temperat. et calidior. ; Britann.

As. : Alger., Canar. Am. sept. : Ins. Vancouver, Nevada, Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 322 ; 822 (Tortula).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 143.

var. laevipilaeformis Husn. — B. laevipila var. meridionalis.

« var. meridionalis W. P. Sch. Syn. I ed. p. 699 et II ed. l. c.

B. meridionalis var. laevipilaeformis Husn. Musc. gall. p. 14.

T. meridionalis var. marginata Lindb. Trichost. eur. p. 37.

T. laevipilaeformis de Not. Epil. p. 541 et M. ital. p. 39, t. 17.

Ad Oleas. — Eur. : Mediterr. : Istria, Ital., Hispan.

var. pagorum Husn. — B. pagorum.

laevipila { Garov. — B. papillosa.
Hpe. — B. Preissiana.
Mac. — B. lato-excisa.

laeviuscula Kindb. in Mac. Cat. p. 265.

2 Rupic. — Am. sept. : M. Rupestr.

lamprocalyx C. M. Syn. I, p. 599.

2. — Am. merid. : Chile.

lanceolata { Hedw. — B. unguiculata var. obtusifolia.
Schum. — B. unguiculata.

latifolia (Br.) Bryol. eur. II (mon. p. 41), t. 164 ; C. M. Syn. I, p. 632 ;
W. P. Sch. Syn. II ed. p. 227.

Syntrichia laevipila β mutica Schultz Rec. de Barbula in Nov. Act. Leopold. Acad. XI, I, 1823, p. 230, t. 84, f. 4 B. ; Brid. Bryol. univ. I p. 236.

S. latifolia Br. in Brid. l. c.

S. ruralis γ latifolia Spreng. in L. Syst. veg. XVI ed., IV, I, p. 177.

Tortula latifolia Hartm. Skand. Fl. II ed., p. 322.

T. mutica Lindb. M. Scand. p. 20.

T. ruralis β latifolia Arn. in Mem. Soc. hist. nat. Paris, 1825, II, p. 286.

2 Ad arbor., ligna fabref., rar. rup. — Eur. : Britann., Gall. orient.,
vall. Rhen., Boruss., Saxon. Am. sept. : Oregon, Colorado, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 144.

latifolia Brid. — B. agraria.

lato-excisa C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 60.

B. laevipila Mac. Canad. M. n. 74 p.p.

2. Ad rad. arb. — Am. sept. : Ins. Vancouver.

latrobeana C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 358.

B. Preissiana Hpe. in Linn. 1874, p. 204.

2. — Pac. : M. Austral. fel.

Laureriana Ltz. Moosst. p. 161.

2. — Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 95.

Lechleri C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 229.

1. — Am. merid. : Fret. Magell.

Leikipiae C. M. in Fl. 1890, p. 480.

Ster. — Afr. : M. Kenia.

leptocarpa Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 35.

— Am. sept. : Mexic.

leptopyxis C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.

— As. : Penins. Tschutschica.

lepto-Syntrichia C. M. Bryol. austr. Georg. p. 34.

2. Loc. humid. — Am. merid. : Austr. Georg.

leptotheca W. P. Sch. in Savatier M. Jap. n. 230; Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 336.

2. — As. : Japon.

leptotricha C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 60.

2. Rupic. — Am. sept. : Manitoba.

leucocalyx Mont. in Ann. sc. nat. 1833, p. 53; C. M. Syn. I, p. 615.

Tortula leucocalyx Mont. in Gay Fl. Chil., Crypt. VII, p. 152 et Syll. p. 38; Mitt. M. austr. am. p. 153.

2. Terr. — Am. merid. : Chile.

leucochlora C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 84 et in Forschungsreise... p. 42.

Ster. — Afr. : Ins. Ascension.

leucostega C. M. Syn. I, p. 641.

2. — Afr. : C. B. Sp.

leucostoma R. Br. in Suppl. app. ad iter Parrayan. p. 298; C. M. Syn. I, p. 631.

Tortula leucostoma Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 294.

Zygotrichia leucostoma Brid. Bryol. univ. I, pp. 521 et 821.

— Am. sept. : Ins. Melville.

ligularis (Mitt.) Par.

Tortula ligularis Mitt. M. austr. am. p. 156.

2. — Am. merid. : M. Pichincha.

limbata Mitt. in Hook. Kew Journ. III, p. 354.

Gymnostomum Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 279; C. M. Syn II, p. 624.

Tortula limbata Mitt. M. austr. am. p. 168.

1. Terr. — Am. merid. : Summ. M. Pichincha.

limbata Lindb. — B. sublimbata.

Lindigiana Hpe. in litt.; Jaeg. Ad. I, p. 260.

Hyophila Lindigiana Hpe. in Ann. sc. nat. V ser. III, p. 343.

Weisia Lindigiana Mitt. l. c. p. 137.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

linearis Brid. Mant. M. p. 88 et Bryol. univ. I, p. 533; C. M. Syn. I, p. 608.

Tortula linearis Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1765; Mitt. l. c. p. 149.

2 ? Terr. calcar. — Am. sept. : Hispaniola. Am. merid. : Ins. Trinitat.

linearis Sull. — *B. navicularis*.

lingulata (Lindb.) Par.

Tortula lingulata Lindb. in *Rev. bryol.* 1880, p. 40.

2. Rup. et terr. aren. — *Eur.* : Scandin. (Livland.)

linoides Brid. — *B. unguiculata*.

lonchodonta C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 335.

2. Limic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

longifolia Griff. — *Didymodon*.

longipedunculata C. M. *Syn. I*, p. 630.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

longirostris Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser. III*, p. 345.

Tortula longirostris Mitt. l. c. p. 157.

1. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Lorentzi C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 346.

2. Limic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

lurida Hsch. *Fl. brasil.* p. 18 ; C. M. *Syn. I*, p. 608.

B. Glaziovii Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 672.

B. gracilentata Hpe. *Symb.* 1874, p. 484 et *Enum. M. Brasil.* p. 10.

Hyophila lurida Jaeg. *Ad. I*, p. 205.

Weisia lurida Mitt. l. c. p. 137.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

luri'a Lindb. — *Didymodon*.

luteola Mitt. — *B. pungens*.

lutescens Laurer. — *B. flavipes*.

Mac-Leana Rehm. *M. Afr. austr. n.* 482.

— *Afr.* : C. B. Sp.

macrocarpa Brid. — *B. subulata*?

macrogonia Besch. in *Journ. de bot.* 1894, p. 61.

2. — *Am. sept.* : Guadalup.

macrorhyncha Kindb. in *Mac. Cat.* p. 50.

2. Terr. — *Am. sept.* : Ontario.

magellanica (Mont.) C. M. in *Fl.* 1885, p. 116.

B. hyperborea Mont. *Voy. au Pôle sud*, p. 302 (*excl. syn.*).

Tortula magellanica Mont. *Syll.* p. 39.

magellanica C. M. (1862). — *B. australis*.

mallacophylla C. M. in *Linn.* 1875, p. 400.

Ster. Rupic. — *As.* : M. or. mar. Erythraei.

Mandoni Par.

B. fusca W. P. Sch. in *Mandon Pl. boliv. n.* 1624.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Manniae C. M. in *Fl.* 1887, p. 222.

— *Am. sept.* : Colorado.

marginata *Bryol. eur. II* (mon. p. 33), t. 158 ; C. M. *Syn. I*, p. 629 et *II*, p. 632 ; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 199.

B. pilifera Brid. *Mant. M.* p. 89.

B. subpilosa Brid. *Bryol. univ. I*, p. 534.

Desmatodon marginatus Mitt. *M. Ind. or.* p. 38.

Tortula acuminata Sic. *Fl. Ind. occ.* (1) (*sec. Mitt. M. austr. am.* p. 167.)

(1) Nec in Brid. *Bryol. univ.*, nec in C. M. *Syn.* *Tortula acuminata* Swartziana reperitur.

- T. caespitosa* Hook. et Grev. in *Edinb. Journ. of sc. I*, p. 296.
T. marginata Spr. in *Lond. Journ. of bot. IV*, p. 192.
1. Muric. et saxic. — *Eur.* : Anglia, ins. Wight, Galloprov., Corsic., Sardin., Lusit., ins. Melit. As. : Ins. Cypr., Ind. or. Afr. : Alger. *Am. sept.* : Washington, Calif., Virgin.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1015.
- Mauchii* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 109.
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- megalocarpa* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club XVI*, p. 92.
 2. Rupic. — *Am. sept.* : *M. Rupestr.*, Columb. brit., ins. Vancouver.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 79.
- melanocarpa* C. M. et Kindb. in *Mac. Cat. p.* 54.
 2. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.
- membranifolia* (Hook.) Schultz *Rec. de Barbula t.* 34, f. 35; *Bryol. eur. II* (mon. p. 17) t. 140; *C. M. Syn. I*, p. 597; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 192.
B. arenaria Griff. *Not. p.* 409 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 103, f. I.
B. chloronotos Brid. *Bryol. univ. I*, p. 539 (excl. syn. *B. chloronotos* Schultz); *Rab. Bryoth. eur. n.* 672.
B. squamigera Viv. in *Ann. bot. 1804, I, II*, p. 191.
Crossidium squamigerum Jur. *Laubm. Oesterr. Ung. p.* 127.
Desmatodon chloronotos Mitt. *M. Ind. or. p.* 38.
Tortula chloronotos Brid. *Sp. M. I*, p. 253.
T. membranifolia Hook. *M. exot. II*, t. 26.
T. squamigera de Not. *M. ital. I*, p. 20, t. 5.
1. Ad mur., rup. et coll. apric. — *Eur.* : Med. occid. et merid. : Vall. Ren., Lutet., Helvet. occid., Galloprov., Ital., Hispan. merid., Lusitan. As. : Minor, Caucas., Persia. *Afr.* : Penins. Sinaït., Alger. *Am. sept.* : *M. Rupestr.*, Colorado, Arizona occ.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 321, 417 et b.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 126.
 a var. *breviseta* Besch. *Cat. M. Alger. p.* 12.
 Ut typ. — *Afr.* : Alger.
- membranifolia* Garov. — *B. grisea*.
 var. *grisea* Vent. — *B. grisea*.
- mendozensis* (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 275.
Tortula mendozensis Mitt. *M. austr. am. p.* 154.
 2. — *Am. merid.* : And. Chilens.
- meruensis* C. M. in *Fl. 1890, p.* 480.
 Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- microcarpa* Schultz. — *B. unguiculata* var. *microcarpa*.
- minutirosula* C. M. in *Linn. 1878-79, p.* 349.
 Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.
- mniifolia* Sull. in *Proc. Am. Acad. 1861, p.* 277.
Tortula mniifolia Mitt. *l. c. p.* 167.
 2. Ad saxa irror. — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : And. Peru.
- mnioides* Schwaegr. — *Streptopogon*.
 var. *prostrata* C. M. — *Streptopogon mnioides* var. *prostrata*.
- mobilis* C. M. in *Linn. 1878-79, p.* 482.
 2. — *Am. merid.* : Venezuela.
- mollis* Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 467; *C. M. Syn I*, p. 637
 Syn. Ad rup. madid. — *Afr.* : Abyss.

montana (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 272.

Tortula montana Mitt. l. c. p. 156.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

montenegrina Breidl. et Szysz. — *Desmatodon*.

Moritziana C. M. in Linn. 1864, p. 604.

Ster. — *Am. merid.* : Venezuela.

mucronata Brid. — B. Brebissoni.

mucronifolia (Schwaegr.) Bryol. eur. II (mon. p. 38) t. 162 ; C. M. Syn. I, p. 624 et II, p. 631 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 225.

Desmatodon mucronifolius Mitt. M. Ind. or. p. 37.

Syntrichia mucronifolia Schultz Rec. de *Barbula*, p. 36, t. 34, f. 2 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 582.

Tortula mucronifolia Schwaegr. Suppl. I, I, p. 136, t. 34.

T. rosulata Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 322.

T. subulata Drumm. M. bor. am. I ed. n. 144.

T. subulata var. *laevifolia* Lindb. Trichost. eur. p. 33.

T. subulata var. *mucronifolia* Roehl. Deutschl. Fl. III, p. 78.

1. In fissur. rup. — *Eur.* : Spitzberg, Alp. Norveg., German., Helvet., Sabaud., Pyr. As. : Jenissei, Obi, penins. Tschutschica, Amour, Tibet. occ., Caucas., Talysch. *Am. sept.* : Groenland, Nov. Scotia, ins. Anticosti, Ontario, Idaho ; reg. sept., orient. et centr.

Exc. : Mac. Canad. M. n. 80.

Rab. Bryoth. eur. n. 527.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 141.

« *var. arctica* (Hook. et Grev.) Par.

Syntrichia hyperborea Brid. Bryol. univ. I, pp. 583 et 836.

S. mucronifolia R. Br. in Neu. Bot. Zeit. VII, Beil. p. 121 et in Parry's 1st. Voy. App. t. 148 (excl. syn. Schwaegr. et Wahlenb.)

Tortula mucronifolia Hook. in Parry's Voy. App.

Tortula mucronifolia β *arctica* Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 294.

Ut typ. — *Am. sept.* : Ins. Melville.

Mülleri (Br.) Bryol. eur. II (mon. p. 44) t. 168 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 232.

B. princeps C. M. Syn. I, p. 636.

Syntrichia Mülleri Br. in Fr. Müller M. Sard. et in Fl. 1829.

S. princeps Mitt. M. Ind. or. p. 39.

Tortula laevipila var. *Wils.* in Kew Journ. bot. IX, p. 323.

T. Mülleri ej. Bryol. brit. p. 134, t. 44.

T. princeps de Not. Spec. de Tortul. ital. n. I et in Mem. Acad. Torin. XL (1838) p. 288 ; Rab. Bryoth. eur. n. 326, 823.

Syn. Ad arb. trunc. et rup. — *Eur.* : Norveg. occ., Scot., Hibern., Galloprov., Corsic., Sardin., Grœcia, Ital. merid., Sicil., Hispan. merid. As. : Ins. Cypr., Sikkim. Afr. : Alger. *Am. sept.* : Columb. brit., Alaska, ins. Vancouver, Washington, Idaho, Oregon, Montana occ., Nevada, Calif. (ubi vulgatiss.). *Am. merid.* : Chile (?). *Pac.* : Tasman. (?)

Exc. : Mac. Canad. M. n. 83.

Rab. Bryoth. eur. n. 1207.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 147.

muralis (L.) Timm. Fl. Megapol. Prodr. p. 240 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 546 ; Bryol. eur. II (mon. p. 35) t. 159 ; C. M. Syn. I, p. 625 W. P. Sch. Syn. II ed. p. 205.

B. Itzigsohni Hpe. in Linn. 1843, p. 673.

- B. muralis* var. *goettingensis* *Brid. l. c.* p. 548.
Bryum murale *L. Sp. Pl. I ed., II, p. 1117.*
Br. pilosum *Gmel. Syst. nat. II, p. 1036.*
Br. subulatum β *Weiss Crypt. Goett. p. 189.*
Br. tegulare, humile, pilosum et incanum *Dill. Hist. M. p. 335, t. 45, f. 15.*
Desmatodon muralis *Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 134.*
Mnium murale *L. jun. Meth. M. p. 364.*
Mollia muralis *Schrank Prim. Fl. Salisb. n. 382.*
Tortula ambigua *Roehl Moosgesch. Deutschl. p. 389.*
T. goettingensis *Brid. M. Rec. II, I, p. 185.*
T. muralis *Hedw. Fund. M. II, p. 92.*
T. muralis β *goettingensis* *Brid. Sp. M. I, p. 251.*
T. pilosa *Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 66.*
 1. In mur., tect. tegul., ad lapid., rar. ad saxa, hic illic ad arb. rad.,
 nunquam in terra. — Per totum fere terrarum orbem.
Exs. : *Drumm. M. bor. am. II ed., n. 63 (Tortula).*
 Rab. Bryoth. eur. n. 231, 232, 564.
 Rehm. M. Afr. austr. n. 87.
 « var. *aestiva* *Schum. Pl. Sael. II, p. 42; Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*
 B. aestiva *Schultz Rec. de Barbula p. 31, t. 31, f. 32; Brid. Bryol. univ. I, p. 548.*
 B. cuneifolia *W. et M. Bot. Taschb. p. 207.*
 Mollia tegularis *Schrank Baier's Fl. II, p. 457.*
 Tortula aestiva *P. B. Prodr. p. 92.*
 T. muralis var. *aestiva* *Brid. Sp. M. I, p. 251.*
 In rup. fissur. praepr. silic., forma compacta in Alp. — *Eur.* : Pas-
 sim. *As.* : *Caucas.*
 Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 459.*
 « var. *brevipedunculata* *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 88.*
 — *Afr.* : *C. B. Sp.*
 var. *capensis* *Brid.* — *B. muralis* var. *incana* ?
 « var. *emarginata* *C. M. in Act. hort. Petrop. X, 1887.*
 — *As.* : *Caucas.*
 « var. *incana* *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*
 B. muralis var. *capensis* *Brid. Bryol. univ. I, p. 548 ?*
 Grimmia crassa *Spreng. Syst. veg. IV, II, p. 321.*
 Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 565 et b, 566.*
 In mur. calcar. sicc. — *Eur.* : *Med. et merid. Afr.* : *Ægypt. inf.,*
 Alger., C. B. Sp.
 « var. *obcordata* *W. P. Sch. l. c.*
 lisd. loc. ac proceed. — *Eur.* : *Galloprov., Hispan. merid.*
 « var. *rupestris* *Schultz Rec. de Barbula p. 29, t. 31, f. 293; Brid.*
 Bryol. univ. I, p. 548; Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 Ad rup. humid. et arb. putresc. — *Eur.* : *Frequens. As.* : *Caucas.*
 Afr. : *Alger.*
 Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 567, 666.*
muricola *C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 334.*
 Tortula muricola *Mitt. M. austr. am. p. 65.*
 2. *Muric.* — *Am. merid.* : *Brasil. austr. or.*
mutabilis *Baumg.* — *Dicranella Schreberi.*
mutica *Brid.* — *B. cuneifolia.*
nana *C. M. in Linn. 1875, p. 404.*
 2. *Fr. ign. Rupic.* — *As.* : *M. or. mar. Erythraei.*

napoana (de Not.) Jaeg: Ad. I, p. 286.

Tortula napoana de Not. in Mem. Acad. Torin. II ser., XVIII, p. 450.

— Am. merid. : Columb.

natalensis C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 104.

Ster. — Afr. : Natal.

navicularis (Mitt.) Par.

B. linearis Sull. in Proc. Am. Acad. 1861, p. 277.

Hyophila navicularis Jaeg. Ad. I, p. 206.

Weisia navicularis Mitt. op. c. p. 139.

— Am. sept. : Cuba.

nervosa { *Brid.* — *B. inclinata*.
 Milde. — *B. atro-virens*.
 Schultz. — *B. fallax*.

var. *inclinata* *Brid.* — *B. inclinata*.

nigrescens Mitt. M. Ind. or. p. 36.

Tortula fallax Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 322.

2. — As. : Sikkim.

nitida (Lindb.) Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 121 (1).

Tortula nitida Lindb. Trichost. europ. p. 45.

Trichostomum diffractum Mitt. in Seem. Journ. of bot. 1868, p. 98, t. 77, f. 5-6.

Tr. mutabile var. robustius Jur. in Unger et Ky. « die Insel Cypern. »

Tr. nitidum W. P. Sch. Syn. II ed. p. 179.

Ster. Rupic. — Eur. : Angl., Gibraltar, ins. Cypr. Afr. : Alger. Am. sept. : M. Rupestr.

Northiana C. M. — *B. caespitosa*.

norvegica Lindb. — *B. aciphylla*.

novo-granatensis Hpe. in Linn. 1861-62, p. 518.

Tortula novo-granatensis Mitt. M. austr. am. p. 158.

2. — Am. merid. : And. nov. Granat.

« var. gracilior Hpe. l. c. (2).

Ad iad. arb. — Am. merid. : C. typ.

oblongifolia W. P. Sch. — *B. Vahlia*.

obscura Mitt. M. Ind. or. p. 33.

2. — As. : Sikkim.

obscura Sull. — *B. Wrightii*.

obtusifolia (Schleich.) Schwaegr. Suppl. I, I, p. 129, t. 31; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 552 (excl. syn.); W. P. Sch. Syn. II ed. p. 196.

Desmatodon arenaceus Sull. et Lesq. (fid. Hagen in Rev. bryol 1891, p. 1).

D. flavicans Bryol. eur. II (mon. p. 7), t. 133.

D. obtusifolius Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 135.

Didymodon flavicans Funk in sched.

D. oblongifolius Hook. in Drumm. M. bor. am. I ed., n. 114.

Tortula humilis Hook. l. c. n. 137.

T. obtusifolia Schleich. Cat. pl. helv. p. 31.

Trichostomum flavicans C. M. Syn I, p. 591 et II, p. 629.

(1) Cf. Husn. Rev. Bryol. 1881, p. 49 et Philib. op. c. 1883, p. 77.

(2) « *B. teretiuseula* W. P. Sch. aemula : an spec. propria ? » Hpe. l. c.

1. Ad rup. praepr. calc. subhumid. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. Carinthiae, Helvetiae. *As.* : Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : M. Rupestr. et Wasatch, Wisconsin, Calif.
 « *var. brevifolia* W. P. Sch. l. c. p. 197.
Desmatodon flavicans β *obtusifolius* *Bryol. eur. l. c.*
 Ad rup. calcar. schist. — *Eur.* : Alp. Bern.
obtusifolia Schultz. — *B. unguiculata var. obtusifolia.*
obtusissima C. M. *Syn. I*, p. 640.
Tortua obtusissima Mitt. *M. austr. am.* p. 174.
2. — *Am. sept.* : Mexic.
- obtusula* Lindb. *M. Scand.* p. 22.
 2. Rup. calcar. — *Eur.* : Suecia.
- oenea* (*Didymodon* ?) C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 55.
 2. Ster. Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.
- olivacea* Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 37.
Tortula olivacea Mitt. l. c. p. 631.
 2. Terr. — *Am. sept.* : Mexic.
- orizabensis* C. M. in *Linn.* 1876, p. 63.
B. atlantica W. P. Sch. in *hb. Mus. Paris* (fid. Besch.).
B. graminicolor Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 37.
 Muric. — *Am. sept.* : Mexic.
- orthodonta* C. M. in *Bot. Zeit.* 1863, p. 57.
 2. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.
- ovata* Mitt. *M. Ind. or.* p. 36.
Didymodon ovatus Jaeg. *Ad. I*, p. 215.
 2. — *As.* : Sikkim.
- pachyloma* Broth. in *Oefv....* 1893, p.
 — *Pac.* : Nov. Guin.
- pagorum* Milde in *Bot. Zeit.* 1862, p. 459; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 231.
B. laevipila var. pagorum Husn. *Musc. gall.* p. 115.
T. laevipila var. propagulifera Lindb. *Trichost. eur.* p. 37.
T. pagorum de Not. Epil. p. 542.
 Fr. ign. Rup. micac. — *Eur.* : Tirol. merid. (Meran).
Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 458.
- pallens* Brid. — *B. agraria.*
- paludosa* Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 124, t. 30; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 562; *Bryol. eur. II* (mon. p. 21) t. 144; C. M. *Syn. I*, p. 607; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 212.
B. crocea Brid. *Mant. M.* p. 93.
B. crocea β *paludosa* Roehl *Deutsch. Fl. III*, p. 79.
Tortula crocea Brid. *Sp. M. I*, p. 257.
T. paludosa Hook. et Grev. in *Edinb. Journ. of Sc. I*, p. 301.
 2. In udis, praepr. calcar. — *Eur.* : Alp. Austr., Salisb., Bavar., rar. Helvet, Pyr., Ital. super.; deest in Scandin. et in Britann. *Afr.* : Alger.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 34 et b.

« var. *Funkiana* Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.

B. *Funkiana* Schultz Rec. de *Barbula* p. 26, t. 33, f. 26; Brid. Bryol. univ. I, pp. 512 et 828.

Tortula crocea β *humilis* Lindb. Trichost. eur. p. 39.

T. *Funkiana* Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 29.

Ut typ. — Eur. : lisd loc.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 258.

panduraefolia Hpe. et C. M. in Linn. 1853, p. 493.

2. — Pac. : Austral, fel.

papillinervis C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 60.

2. — Am. sept. : Labrador, Columb. brit.

papillosa (Wils.) C. M. Syn. I, p. 598 et II, p. 630; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 231.

B. *laevipila* Garov. Bryol. austr. p. 37.

B. *rotundifolia* Jens. Bryol. Dan. p. 110, t. 6, f. 30 f et g.

Syntrichia laevipila var. *Ahnf.* in Fr. Fl. Scand. p. 240.

S. *papillosa* Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 141.

Tortula papillosa Wils. mss. et Bryol. brit. p. 135, t. 44.

T. *rotundifolia* Hartm. Skand. Fl. V ed. p. 381; C. M. Syn. II, p. 632.

T. *ruralis* var. Hook. et Tayl. Musc. brit. II ed. p. 56.

2. Ster. — Ad arb. campestr. praepr. ambulacr. — Eur. : Vulgatiss.

Am. sept. : Reg. or. Am. merid. : And. Quitens., ins. Maclov.

Pac. : Austral., N. Zeland., Tasman. (c. fr. !) (1)

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 455, 785 et b, 915.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 127.

parvula Spreng. — B. *recurvata*.

patagonica (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 273.

Tortula patagonica Mitt. M. austr. am. p. 156.

— Am. merid. : Patagon.

patagonica C. M. — B. *australis*.

pellucida de Not. — B. *sublimbata*.

percarnosa C. M. in Linn. 1878-79, p. 347.

2. Terr. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

pernana C. M. in op. c. p. 338.

2. Limic. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

perpusilla C. M. in op. c. p. 348.

Fl. et fr. ign.

— Am. merid. : Argentin. subtropic.

perrevoluta C. M. in op. c. p. 334 (nom. emend. p. 486).

2.

— Am. merid. : Argentin. Cordob.

« var. *acutifolia* C. M. in op. c. p. 335.

lisd. loc. ac typ.

« var. *linearifolia* C. M. l. c.

lisd. loc.

peruviana (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 289.

Tortula peruviana Mitt. l. c. p. 169.

2.

— Am. merid. : Peruv.

(1) An eadem species? Cf. Mitt. in Lond. Journ. of bot. VIII, p. 259 et Lindb. Trichost. eur. p. 36.

pichinchensis *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 333; *C. M. Syn. I*, p. 628.

B. affinis *Hpe. in Linn.* 1861-1862, p. 520 (*fid. Mitt.*).

Tortula pichinchensis *Mitt. l. c.* p. 174.

2. *Cortic. et rupic.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

pilifera (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ.* p. 572; *C. M. Syn. I*, p. 641; *Bryol. jav. I*, p. 103, t. 83.

B. crinita *Schultz in Nov. Act. Leop. XII, I*, p. 226, t. 34.

Tortula pilifera *Hook. M. exot. t.* 12.

2. — *As.* : Manille, Java. *Afr.* : *C. B. Sp. Am. merid.* : Chile.

Exs. : *Rehm. M. Afr. austr. n.* 110 et 478.

« *var. aquatilis* *C. M. in Rehm. l. c. n.* 111.

— *Afr.* : *C. B. Sp.*

« *var. gracilis* *C. M. Syn. I*, p. 642.

— *As.* : Manille. *Afr.* : *C. B. Sp.*

« *var. sessilis* *C. M. in Rehm. l. c. n.* 113.

— *Afr.* : *C. B. Sp.*

pilifera *Brid.* — *B. marginata*.

platyneura *C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p.* 52.

Ster. Rup. humid. — *Am. sept.* : *Columb. brit.*

plebeja *C. M. in Linn.* 1830-82, p. 426.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : *Uruguay.*

Podocarpì *C. M. in op. c.* 1878-79, p. 352.

Fl. et fr. ign. Arbor. — *Am. merid.* : *Argentin, subtropic.*

Poeppigiana *C. M. in Linn.* 1843 et *Syn. I*, p. 606.

Tortula Australasiæ *Hook. (fid. Mitt.)*.

2. — *Am. merid.* : *Chile.*

porphyroneura *C. M. in Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 13.

2. — *Afr.* : *Abyssin.*

Preissiana *C. M. Syn. I*, p. 642.

B. laevipila *Hpe. in Preiss. pl. II*, p. 114, coll. n. 2467.

2. *Lignic.* — *Pac.* : *Austral.*

Preissiana *Hpe.* — *B. latrobeana*.

princeps *C. M.* — *B. Mülleri*.

prostrata *Mont.* — *Streptopogon mnioides var. prostrata*.

pruinosa (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 238.

Tortula pruinosa *Mitt. M. austr. am. p.* 152.

2. — *Am. merid.* : *And. Quitens.*

pseudo-caespitosa *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 339.

Syn. Terr. et rupic. — *Am. merid.* : *Argentin. Cordob.*

« *var. brachybasis* *C. M. op. c. p.* 340.

Terr. in silv. — *Am. merid.* : *Uruguay.*

« *var. pungens* *C. M. l. c.*

Arbor. — *Am. merid.* : *Argentin. subtropic.*

pseudo-gracilis *C. M. in Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 13.

2, — *Afr.* : *Abyss. sept.*

pseudo-pilifera *Hpe. et C. M. in Linn.* 1853, p. 493.
2. Fr. ign. — *Pac.* : Tasman.

pseudo-rigidula *Kindb. in Mac. Cat.* p. 264.

B. rigidula Mac. Canad. M. n. 412 p.p.

2. — *Am. sept.* : Columb. brit.

pulvinata *Jur. in Verh. d. K. K. bot. Ges. in Wien* 1863, p. 501 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 230.

B. danica Lge. Bryol. Bytr. bot. tidskr. Kjobenh. 1869.

B. intermedia var. pulvinata Husn. Muscol. gall. p. 117.

Syntrichia pulvinata Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 144.

Tortula danica Lindb. M. Scand. p. 20.

T. virescens de Not. Epil. p. 539 ?

2. rar. fructif. Ad arb. annosior., rup. aren., in tect. lign. — *Eur.* : Suecia, Dania, Austria inf., Rhoet., Ital. super., Bad., Wurtemberg.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 670, 787, 1121 et b, 1122.

pungens (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 672.

B. luteola Mitt. in Kew Misc. 1857, p. 258.

B. tasmanica Hpe. ?

Tortula pungens H. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 175, t. 172, f. 7.

2. Rupic. — *Pac.* : Austral., Tasman.

purpurea *C. M. in Fl.* 1875, p. 78.

B. brachyphylla Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 135 p.p.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Calif.

purpurea *Agh.* — *B. convoluta.*

pusilla (*Ångst.*) *C. M. in Fl.* 1885, p. 415.

Tortula pusilla Ångstr. in Oefv.... 1872, n. 4, p. 7.

2 ?

— *Am. merid.* : Fuegia austr.

pygmaea *C. M. in Fl.* 1888, p. 412.

Ster. Gramin. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

quitoensis *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 332 ; *C. M. Syn. I*, p. 627.

Tortula quitoensis Mitt. M. austr. am. p. 170.

2. Terr. et saxic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Raddei (*Broth.*) *Par.*

Tortula Raddei Broth. in Bot. Centralbl. 1888, n. 14.

2. Rup. calcar. — *As.* : Transcasp.

Raui *Aust. in Bull. Torr. bot. Club VI*, p. 43.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Texas.

rectifolia *Tayl.* — *B. gracilis.*

recurvata (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ. I*, pp. 530 et 825 ; *C. M. Syn. I*, p. 627.

B. parvula Spreng. Syst. veg. IV, I, p. 179.

Tortula recurvata Hook. M. ex. t. 130.

1. Terr. — *Afr.* : C. B. Sp. *Pac.* : Tasman.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 89.

« var. aristatula *C. M. in Rehm. l. c.* n. 90, 480.

Ut typ. — *Afr.* : C. B. Sp.

recurvifolia (Wils.) W. P. Sch. *Coroll. Bryol. eur. Suppl. (ad calcem)*.

B. fallax γ *reflexa* Brid. *Bryol. univ. I*, p. 556 (fid. Lindb.).

B. reflexa ej. *Mant. M.* p. 92 (fid. Lindb.)

Schistidium? *recurvifolium* Spr. in *Ann. Mag. nat. hist. II ser., III*, p. 491.

Tortula fallax var. *recurvifolia* Wils. *Bryol. brit.* p. 124.

Tortula recurvifolia Berk. *Handb. Brit. M.* p. 258; Lindb. *Trichost. eur.* p. 43.

2. Mur. et rup. calcar. — *Eur.*: Suecia, Britann., Juras., Helvet., Bavar. As.: Caucas. *Am. sept.*: New Jersey, Niagara, Colorado.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 324.

Un. itin. 1863, n. 9.

recurvifolia Mitt. — *Geheebia cataractarum*.

recurvipatula C. M. in *Linn.* 1880-1882, p. 424.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.*: Argentin. Cordob.

Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 101.

— *Afr.*: C. B. Sp.

reflexa Brid. { (fid. C. M.). — *B. fallax*.
(fid. Lindb.). — *B. recurvifolia*.

replicata Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 49, t. XVC; C. M. *Syn. I*, p. 623.

Tortula replicata Mitt. *M. austr. am.* p. 151.

2. Muric. — *Am. merid.*: And. Quitens.

reticularia C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 106.

Ster. — *Afr.*: C. B. Sp.

revoluta Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 127, t. 32; Brid. *Bryol. univ. I*, p. 571; *Bryol. eur. II* (mon. p. 27) t. 153; C. M. *Syn. I*, p. 621; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 213.

Tortula nervosa Engl. *Bot.* p. 2383.

T. revoluta Schrad. *Syst. Samml. Krypt. Gevaechs. I*, n. 12.

2. Muric. — *Eur.*: Copiosior in merid. quam in med., rar. in sept. As.: Persia. *Afr.*: Alger.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 43 a, 130, 422.

revoluta W. et M. — *B. Hornschuchiana*.

var. *Hornschuchiana* Brid. — *B. Hornschuchiana*.

revolvens W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 195.

B. atro-virens var. *robusta* ej. in *Husn. M. Gall. n.* 513 a.

Desmatodon revolvens Husn. *Musc. gall.* p. 96.

1. Ad mur. muscos. — *Eur.*: Monspel., Galloprov.

rhaetica Amam in *Rev. bryol.* 1889, pp. 54 et 90.

Ster. Ad terr. lapid. — *Eur.*: Alp. Rhaet.

rigida Schultz *Rec. de Barbula t.* 32, f. I; *Bryol. eur. II* (mon. p. 13) t. 137; C. M. *Syn. I*, p. 596; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 189.

Bryum stellatum Schreb. *Spic. Fl. Lips* p. 80.

Desmatodon rigidus Mitt. *M. Ind. or.* p. 38.

Tortula brevirostris Grev. *Scot. Crypt*; Hook. et Tayl. *Musc. brit. II ed.*, p. 53.

T. enervis eor. l. c. p. 52, t. suppl. 2.

T. rigida Schrad. *Spic. Fl. Germ.* p. 66; Brid. *Sp. M. I*, p. 24 (excl. syn.).

T. stellata Lindb. *Trichost. eur.* p. 24.

2. Ad mur. et rup. schist. calc. et aren. semi-decompos. — *Eur.* : Temper. et calidior. *As.* : Caucas., Tibet. occ. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Niagara, M. Rupestr., Colorado.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 325, 979.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 125.

« *var. mucronulata* Bryol. eur. et W. P. Sch. II, cc.

Ut. typ. — *Eur.* : Iisd. loc. *Am. sept.* : Calif. merid.

« *var. obtusa* (Jur.) Par.

Tortula rigida var. obtusa Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 126.

Limic. — *Eur.* Cum typ.

« *var. pilifera* Bryol. eur. et W. P. Sch. II, cc.

Tortula bifrons de Not. Sp. de Tortul. ital. n. 17 et Syll. n. 176.

Ut typ. — *Eur.* : Iisd. loc. *Am. sept.* : M. Rupestr.

rigida Brid. — B. ambigua.

rigidula (Hedw.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 206.

B. insidiosa Jur. et Milde in Hedw. 1867, p. 97; Rab. Bryoth. Eur. n. 1067.

B. spadicea Mitt. (fid. Lindb.).

Bryum Didymodon Gmel. Syst. nat. II, p. 1333.

Br. rigidulum Hoffm. Deutschl. Fl. II, p. 40.

Didymodon rigidulus Hedw. M. frond. III, p. 8, t. IV; Brid. Bryol. univ. I, p. 514.

D. spadicens Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 556.

D. Zetterstedtii (fid. Limpr. l. c.)

Tortula rigidula Lindb. Trichost. eur. p. 42.

Trichostomum rigidulum Sm. Fl. brit. III, p. 1288; Bryol. eur. II (mon. p. 10) t. 176; C. M. Syn. I, p. 570.

2. Ad mur. et rup. humid. et in tophac. — *Eur.* : Reg. campestr. et montan. præpr. subalp. *As.* : Jenissei med., Caucas. *Am. sept.* : Groenland, lac. Huron, Ontario, M. Rupestr., ins, Vancouver, Montana, Calif.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 121. (*Didymodon*.)

Rab. Bryoth. eur. n. 233, 376. (*Trichostomum*.)

Sull. et Lesq. M. bor. am. ed. n. 150 (*Trichostomum*.)

« *var. densa* W. P. Sch. l. c.

Desmatodon rupestris Funk in Brid. Bryol. univ. I, p. 822.

Tortula rigidula var. densa Lindb. Trich. eur. p. 42.

Trichostomum rigidulum var. densum Bryol. eur. l. c.

Ut typ. — *Eur.* : Præpr. in subalp.

Exs. : Rab. l. c. n. 430.

rigidula { Besch. — B. Bescherellei.
Mac. p.p. — B. pseudo-rigidula.

riparia C. M. in Linn. 1880-1882, p. 428.

2. Terr. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic.

robusta (Hook. et Grev.) Brid. Bryol. univ. I, p. 834; C. M. Syn. I, p. 635 et II, p. 632.

B. speciosa H. f. et W. in Lond. Journ. of. bot. 1844, p. 543.

Mnium punctulatum Brid. l. c. II, p. 734.

Tortula punctulata Mitt. M. austr. am. p. 175.

T. robusta H. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 209, t. 12; Fl. Antarct II, p. 409, t. 153, f. 2.

2. — *Am. merid.* : Terr. Magellan., ins. Eremitae, Maclov. Pac. : Austral. felix.

robustifolia C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 56.

B. *rubiginosa* Mac. *Canad. M. n.* 75.

Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.

romana C. M. — B. *Brebissoni*.

rotundata Lindb. et Arn. — *Didymodon*.

rotundo-emarginata C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 60.

2. — *Am. sept.* : ?

rotundifolia Jens. — B. *papillosa*.

rubella (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. I*, p. 297.

Syntrichia princeps Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. p.p.*

Tortula rubella H. f. et W. *Fl. Tasm. II*, p. 176, t. 172, f. 10.

1. — *Pac.* : Tasman.

rubella Mitt. — *Didymodon*.

var. *brevifolia* Lindb. et Arn. — *Didymodon rubella* var. *brevifolia*.

rubiginosa Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 27, t. 5 ; *Lesq.*
et *Jam. Man.* p. 126.

Pottia rubiginosa Wats. *Bot. Calif. II*, p. 362.

2. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Oregon.

rubiginosa { C. M. — B. *argentinica*.
Mac. — B. *robustifolia*.

rubra (Mitt.) Par.

Tortula robusta β H. f. et W. *Fl. Antarct. II*, p. 409.

T. *rubra* Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 419.

2. — *Am. merid.* : Ins. Maclov. *Pac.* : Austral.,
Nov. Zeland. med.

rubra Lindb. — *Didymodon*.

rufa W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 56.

2 ? — *Afr.* : Ins. *Franciae*.

rufa Jur. — *Didymodon*.

rufescens Hpe. in *Jaeg. Ad. I*, p. 279.

Rup. madid. — *Am. sept.* : Calif.

rufescens Mitt. — *Hyophila*.

rufipes W. P. Sch. in *Besch. Prodr. Fl. bryol. mexic.* p. 36.

— *Am. sept.* : — *Mexic.*

rufiseta Tayl. — B. *Australasiae*.

runcinata C. M. *Bryol austr. Georg.* p. 33.

2. Loc. humid. — *Am. merid.* : *Austro-Georg.*

ruraliformis Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1864, p. 335.

B. *ruralis* var. *arenicola* Braithw. *Brit. Moosfl.* p. 226.

2. Rupic. et terr. — *Eur.* : Anglia, Belg. et Gall, præpr. littor.

Am. sept. : Washington, Montana.

« f. *gigantea* R. Farneti M. *Prov. Pavia* 1891, p. 24.

Ut typ. — *Eur.* : Ital. sup. (M. Lesina).

ruralis (L.) Hedw. *Sp. M.* p. 121 ; *Bryol. eur. II* (mon. p. 42) t. 166 ;

C. M. *Syn. I*, p. 639.

Bryum rurale L. *Sp. Pl.* p. 1581.

Br. *rurale unguiculatum*, *hirsutum*, *elatus* et *ramosius* Dill. *Hist. M.*
p. 382, t. 45, f. 12.

- Hypnum rurale* Weiss. *Crypt. Goett.* p. 210.
Mnium rurale L. *jun. Meth. M.* p. 364.
Mollia ruralis Schrank *Prim. Fl. Salisb.* n. 831.
Syntrichia ruralis W. et M. *Bot. Taschb.* p. 215; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 584.
Tortula ruralis Schwaegr. *Suppl. I,* p. 121.
2. Ad arbor. annosior., rup., tecta stram., in camp. incult. etc. *Eur.* : De reg. campestr. ubi vulgatiss. usq. in subalp.; Spitzberg, Septem Insul. ins. Ursorum. *As.* : Jenissei, Taimyr, Amour, Alatau, Tibet. occ., Kurdistan., Persia, Caucas., *As. min.* *Afr.* : Alger, C. B. Sp. or. *Am. sept.* : Groenland; tota, præpr. ad litt. *Pacific. Pac.* : Austral. merid.
- Exs.* : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 143.
 Mac. *Canad. M.* n. 82.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 225, 1070, 1309.
 Rehm. *M. Afr. austr.* n. 477.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 145.
- var. arenicola* Braithw. — *B. ruraliformis*.
- « *var. californica* Sull. *M. bor. am.* II ed. p. 22.
Rupic. — *Am. sept.* : Calif.
Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 146.
- var. calva* Bryol. eur. — *B. intermedia var. calva*.
- « *var. densiretis* Vent. in *Rev. bryol.* 1890, pp. 51-52.
 — *Eur.* : Sardin.
- « *var. epilosa* Vent. *op. c.* pp. 50-52.
 — *Eur.* : Ital. sup. (Lugano).
- « *var. hirsuta* Vent. *op. et l. cc.*
 — *Eur.* : Sardin.
- var. rupestris* Bryol. eur. — *B. intermedia*.
- « *var. subintermedia* Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1892, p. 84.
 — *Am. sept.* : Arizona.
- « *var. virescens* Bertol. *Fl. Ital. crypt.* 217.
Tortula ruralis var. virescens de Not. *Syll.* p. 171.
T. virescens ej. M. Ital. I, p. 41, t. 18.
 Ut typus. — *Eur.* : Merid.
- ruricola* C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 381.
 1. Muric. — *Am. merid.* : Brasil.
- Sartorii* Jaeg. — *Desmatodon*.
Saussuriana Brid. — *Ceratodon purpureus*.
- Savatieri* Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LIX.
 1. — *Am. merid.* : Peruv.
- scabrinervis* C. M. *Syn. I,* p. 634.
Tortula scabrinervis Mitt. *M. austr. am.* p. 173.
2. Arbor. — *Am. merid.* : Chil. austr.
- Schmidii* C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 58.
Syntrichia Schmidii Mitt. *M. Ind. or.* p. 39.
2. Arbor. — *As.* : M. Neilgherr.
- Schnyderi* C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 434.
 2. — *Am. merid.* : Argentin. Patag.
- Schreberi* Brid. — *Dicranella*.

scleromitra Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 81.

2. In udis coctis. — As. : M. Tonkin.

sedifolia C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 327.

Fl. et fr. ign. — Am. merid. : Argent. Cordob.

semi-rubra C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise* p. 23.

Tortula fuegiana Mitt. in *Journ. of. the Linn. Soc.* 1876.

2. Ster. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.

semi-torta Sull. in *Pac. R. Rep.* IV, p. 186, t. 3; *Lesq. et Jam. Man.* p. 126.

2. — Am. sept. : Calif.

serripungens Ltz. et C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 35.

2. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

« var. *exesa* Ltz. et C. M. op. c. p. 351.

Ut typ. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

serrulata (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 833; C. M. *Syn.* I, p. 636.

Tortula serrulata H. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ.* I, p. 298, t. 12; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 419.

setacea Hedw. — B. convoluta.

sinuosa Jaeg. — Didymodon.

Solmsiana Hpe. — B. commutata.

Solmsii W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 200.

B. cuneifolia Brid. (fid. *Husn. Musc. gall.* p. 101).

I. Ad. rup. aren. semi-decomp. — Eur. : Lusitan. (Algarb.)

Somaliae C. M. in *Linn.* 1876, p. 294.

Ster. — Afr. : Somali.

sordida Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 80.

2. — As. : M. Tonkin.

spadicea Mitt. mss. ; Braithw. *Brit. Moosfl.* p. 266.

B. rigidula W. P. Sch. (fid. *Lindb.*) ; *Mac. Canad. M. n.* 412.

2. Terr. hum. — Am. sept. : Columb. brit.

sparsidens C. M. et *Kindb.* in *Mac. Cat.* p. 54.

2. Terr. — Am. sept. : Columb. brit.

spathulata Dz. et Mk. M. frond. ined. *Archip. ind.* p. 49, t. 12; *Bryol. jav.* I, p. 100 et II, p. 226; C. M. *Syn.* I, p. 604.

Desmatodon spathulatus Mitt. M. Ind. or. p. 39.

Gymnostomum spathulatum Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 2; *Hook. Ic. pl. rar.* t. 17.

Pottia Zollingeri C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 419.

Tortula spathulata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1891, p. 160.

2. Ad mur. et terr. calcar. — As. : Japon., Amboine, Sumatra, Java.

speciosa H. f. et W. — B. robusta.

spiralis W. P. Sch. in C. M. *Syn.* I, p. 622.

Tortula spiralis Mitt. M. austr. am. p. 151.

2. — Am. sept. : Mexic.

Sprengelii Schwaegr. — *Trichostomum Berteroanum*,

squamigera Viv. — B. membranifolia.

squarrosa *Brid. Bryol. univ. I, p. 833; Bryol. eur. II (mon p. 26); t. 152; C. M. Syn. I, p. 601; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 221.*

Pleurochaete squarrosa Lindb. Trichost. eur. p. 47.

Tortella squarrosa Limpr. Deutsch. Laubm. I, p. 607.

Tortula squarrosa de Not. Syll. p. 180 et M. ital. I, p. 61, t. 31.

2. In coll. sicc. et silv. arenac. — *Eur.* : Frequens per zon. merid., rar. et ster. in septentr. : Britann., vall. Rhen., Lutet., Galloprov., Sardin., Ital., Sicil., Hispan. As. : Yunnan, Himalaya occ., Persia. Caucas. Afr. : Alger. ; ins. Canar. ? Am. sept. : Rariss. : Tennessee, Texas.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 457 et b; 1275 (*Pleurochaete*).

Un. itin. 1863, n. 8.

« *var. nitida R. Farneti M. Prov. Pavia, 1891, p. 19.*

— *Eur.* : Ital. sup. (Pavia).

stellata *Brid.* — *B. agraria.*

stenocarpa *Hpe. in Ann. sc. nat. V sér., III, p. 346.*

Tortula stenocarpa Mitt. M. austr. am. p. 162.

1. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

stenophylla (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 263.

Tortula stenophylla Mitt. M. Ind. or. p. 28.

2. Arbor. — *As.* : Sikkim, M. Neilgherr.

stricta *Hedw.* — *B. unguiculata.*

subaristata Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 448; C. M. Syn. I, p. 644.

2. Arbor. — *Afr.* : Alp. Abyss.

subcalycina C. M. in Linn. 1867-68, p. 617.

2. — *Pac.* : Austral. or.

subcarnifolia C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 52.

1 ? Ad ter. et rad. arb. — *Am. sept.* : Lac. Erie.

subcernua W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 56 (nom.)

— *Afr.* : Ins. Franciæ.

subcuneifolia Kindb. mss.

— *Am. sept.* : Alaska.

subcylindrica Broth. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51 et in Roell M. bor. am. n. 329.

2. Fr. ign. — *Am. sept.* : Washington.

subduriuscula C. M. in Linn. 1874, p. 554.

2. — *As.* : Ins. Philippin.

subfallax C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 338; Lesq. et Jam. Man. p. 121.

B. fallax Sull. in Bot. Pac. R. R. Survey (Whipple). p. 186.

2. — *Am. sept.* : S. Nevada, Calif.

subgracilis C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 53.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

« *var. viridior Kindb. op. c. p. 263.*

Rupic. — *Am. sept.* : Lac. Ontario.

subiemadophila C. M. et Kindb. in op. c. p. 53.

B. gracilis var. squarrulosa Kindb. in Bull. Torr. Bot. Club XVII, p. 89,

2. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.

sublimbata (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 290.

B. limbata Lindb. in Oef. Vet. Ak. Foerh. 1863, p. 387.

Desmatodon limbatus Mitt. M. Ind. or. p. 38.

D. sublimbatus ej. op. c. p. 158 (correct. praecedentis).

Tortula limbata Lindb. Trichost. eur. p. 29.

T. pellucida de Not. M. ital. I, p. 26, t. 8.

2. — Eur. : Ital. infer., Hispan. merid. As. : Tibet. occ.

subnigra (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 283.

Tortula subnigra Mitt. M. austr. am. p. 164.

Ster. — Am. sept. : Mexic.

subpellucida Mitt. M. Ind. or. p. 35.

2. — As. : Himalaya occ., Tibet.

subpilosa Brid. — B. marginata.

subrevoluta Hpe. in Linn. 1864, p. 208.

Fr. ign. — Afr. : Madagascar.

subspathulata C. M. Syn. I, p. 633.

B. glacialis Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 491.

2. Ad rup. madid. — Afr. : Alp. Abyssin.

subspiralis Hpe. in F. v. Müller Anal. draw. of Austral. M. t. 2.

— Pac. : Austral.

subtorquata Hpe. et C. M. in Linn. 1853, p. 492.

— Pac. : Austral. or.

subulata (L.) P. B. Prodr. p. 43; Bryol. eur. II (mon. p. 36) t. 160;
C. M. Syn. I, p. 623; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 223.

B. macrocarpa Brid. Sp. M. I, p. 261? (1)

Bryum capsulis longis subulatis Dill. Hist. M. p. 350, t. 45, f. 10.

Br. subulatum L. Sp. Pl. p. 1581.

Desmatodon subulatus Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 138.

Mnium subulatum L. jun. Meth. M. p. 365.

Mollia subulata Schrank Prim. Fl. Salisb. n. 830.

Syntrichia alpina Brid. Mant. M. p. 97.

S. subulata Schultz Rec. de Barbula p. 34, t. 34, f. I A; Brid. Bryol.

univ. I, p. 579 et 835.

S. subulata β alpina Brid. ll. cc.

S. subulata var. macrocarpa ej. op. cit. p. 582? (1).

Tortula hercynica Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 65.

T. subulata Hedw. Fund. M. II, p. 92, t. 8, f. 38-40.

1. Ad agger. praepr. aren., arb. rad., muros, etc. — Eur. : Feré tota.
As. : Caucas. Afr. : Alger. Am. sept. : Canada occ., Manitoba,
M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, Montana, Arizona, Colorado,
Calif.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 144. (Tortula).

Rab. Bryoth. eur. n. 224 et b.

* var. angustata Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

B. angustata Braithw. British. Moos. Fl. p. 221.

Desmatodon subulatus var. angustatus Jur. l. c.

Ut typ. — Eur. : In subalp. et reg. merid. Am. sept. : Lac. Erie,
Ontario, M. Rupestr., Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 413.

var. inermis Bryol. eur. — B. inermis.

- « *var. integrifolia* Boul. *M. Fr.* p. 412.
— *Eur.* : Gall. merid., Ital. sup.
- « *var. longifolia* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 58.
Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.
- « *var. mucronata* R. *Farneti M. Prov. Pavia*, 1891, p. 22.
In gramin. — *Eur.* : Ital. sup. (M. Lesina).
- « *var. mutica* W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 224.
In calcar. — *Eur.* : Anglia, etc. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Passim.
- « *var. recurvo-marginata* Breidl. in *sched.* ; *Limpr. Deutschl. Laubm. I*,
p. 671.
Ut praeced. — *Eur.* : Stiria.
- « *var. subinermis* *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*
Ut praeced. — *Eur.* : Anglia, etc. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Passim.
- subulifolia* Sull. in *Proc. Am. Acad.* 1861, p. 277.
B. crispula Hpe. in *Jaeg. Ad. I*, p. 286 (1).
B. gracilis Sull. l. c.
Tortula subulifolia Sull. l. c.
Tortula subulifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 161.
2. Ad rup. irror. — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : Guian., And.
Quitens.
- subunguiculata* W. P. Sch. in *Savatier M. Jap. n.* 203 ; *Besch. in Ann.*
sc. nat. 1893, p. 337.
2. — *As.* : Japon.
- syrhodontoides* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 476.
— *Afr.* : Transvaal.
- tasmanica* Hpe. in *Linn.* 1852, p. 713.
B. pungens H. f. et W. ?
2. — *Pac.* : Tasman. (2)
- tenuirostris* Brid. — *B. angustifolia*.
- teretiuscula* W. P. Sch. in *C. M. Syn. I*, p. 614.
Tortula teretiuscula Mitt. *M. austr. am.* p. 160.
2. — *Am. sept.* : Mexic.
- tophacea* Mitt. — *Trichostomum*.
- thrausta* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 352.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- torquata* Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 50 ; *C. M. Syn. I*, p. 611 ;
Hook. f. et Wils Fl. N. Zeal. II, p. 70 et *Handb.* p. 419.
Tortula torquata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 70.
— *Pac.* : Austral., Nov. Zeland. sept., Tasman.
- torquescens* W. P. Sch. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 163.
2 ? — *Afr.* : C. B. Sp.

(1) Sec. Hpe. in *Jaeg. op. c.*, pp. 269 et 287, pl. Wright. Cubens. n. 32 est *B. subulifolia*, pl. n. 27 *B. crispula*. — Mitt. sub nomine *B. subulifoliae* n. 27 et 32 conjungit.

(2) *tenera* Brid. *Bryol. univ. I*, pp. 577 et 835.
Bryum tenerum Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 366
(excl. syn. Dill.)
Tortula tenera P. B. *Prodr.* 93.

Quid ? Deleatur.

tortellifolia C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 56.

B. cylindrica Mac. Canad. M. n. 81, p.p.

B. flexifolia ej. l. c. n. 399.

2. Rup. humid. et marit. — Am. sept. : Columb. brit., ins. Vancouver.

tortelloides C. M. in Linn. 1878-79, p. 337.

2. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

tortuosa (L.) Web. et Mohr Bot. Taschenb, p. 205; Brid. Bryol. univ. I, p. 574; Bryol. eur. II (mon. p. 26) t. 151; C. M. Syn. I, p. 601; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 218.

B. tortuosa var. incrassata Brid. op. c. p. 575.

Bryum cirratum, setis et capsulis longioribus Dill. Hist. M. p. 377, t. 48, f. 40.

Br. tortuosum L. Sp. Pl. p. 1583.

Hypnum tortuosum Web. Spic. Fl. Goett. p. 90.

Mnium tortuosum L. jun. Meth. M. p. 364.

Mollia tortuosa Schrank Prodr. Fl. Salisb.

Tortella tortuosa Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 604.

Tortula incrassata Brid. Sp. M. I, p. 264.

T. tortuosa Hedw. f. in W. et M. Beitr. I, p. 121, t. 4.

2. Ad terram et rup. praecip. calcar. — Eur. : Feré tota in reg. mont., subalp. et alp. As. : Jenissei, Caucas., Persia. Afr. : Alger. (ster.) Am. sept. : Groenland, Anticosti, Terr. Nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Gaspesia, New York, Pensilv., M. Alleghan., Niagara, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Idaho, Virgin. occ.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 141 (Tortula).

Mac. Canad. M. n. 77.

Rab. Bryoth. eur. n. 35, 1273.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 137.

Un. itin. 1867, n. 104.

« var. angustifolia Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 123.

Ut typ. — Eur. : Stiria, Salisb., Tirol.

« var. fragilifolia Jur. op. et l. cc.

Ster. Calcic. — Eur. : Hungar., Austr., Dalmat., Tirol., Gall. merid., Ital. sup.

var. incrassata Brid. — B. tortuosa.

« var. ? longifolia Ren. in Rev. bryol. 1882, p. 92.

— Eur. : Gall. merid., Ital. super.

transcaspica (Broth.) Par.

Tortula transcaspica Broth. in Bot. Centralbl. 1888, n. 14.

1. Calcar. — As. : Transcasp.

Trianae C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 578.

Tortula Trianae Mitt. M. austr. am. p. 172.

2. — Am. merid. : Nov. Granat.

trichostomacea C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 97 et 483.

— Afr. : C. B. Sp.

« var. chlorophyllosa C. M. l. c. n. 98.

— Afr. : C. B. Sp.

trichostomoides Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 38.

— Am. sept. : Mexic.

Turneri Brid. — Didymodon rubellus.

umbrosa C. M. in Linn. 1878-79, p. 340.

2. Muric. et terr. — Am. merid. : Argentin. Cordob. et subtropic.

uncinicomma *C. M. op. cit. p. 345.*

2. — *Am. merid. : Argentin. Cordob.*

unguiculata *Hedw. M. frond. I, p. 59, t. 23 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 563 ; Bryol. eur. II (mon. p. 19), t. 142 ; C. M. Syn. I, p. 612 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 203.*

B. amoena Schum. Fl. Sael. II, p. 48 ; Brid. op. c. p. 538.

B. aristata Brid. Mant. M. p. 92.

B. dubia ej. op. et l. cc.

B. incerta Schum. op. cit. p. 44.

B. lanceolata ej. op. cit. p. 4.

B. linoides Brid. Mant. M. p. 90 et Bryol. univ. I, p. 543.

B. stricta Hedw. Sp. M. p. 119, t. 26 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 540.

B. unguiculata var. aristata Brid. op. cit. p. 567.

B. unguiculata var. dubia ej. l. c.

Bryum aristatum Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 12, t. II, f. 7.

Br. barbatum Curt. Fl. Lond. fasc. IV, t. 65.

Br. linoides Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 8, t. VIII, f. 3.

Br. mucronulatum ej. op. cit. p. 3.

Br. unguiculatum Huds. Fl. Angl. I ed., p. 410.

Br. unguiculatum et barbatum, tenuius et stellatum Dill. Hist. M. p. 384, t. 48, f. 48.

Br. unguiculatum et barbatum, surculis in summitate crassioribus ej. op. cit. p. 383, t. 48, f. 47-49.

Dicranum laxum Brid. M. Recent. II, I, p. 175 (excl. syn.).

Mollia unguiculata Schrank Baiers. Fl. II, p. 457.

Orthopyxis aristata P. B. Prodr. p. 79.

Tortula amoena Brid. Sp. M. I, p. 249.

T. aristata Sm. Fl. brit. III, p. 1261.

T. barbata ej. op. cit. p. 1260.

T. decipiens Sibth. Fl. Oxon. p. 285.

T. dubia P. B. Prodr. p. 92.

T. fallax H. et Grev. in Edinb. Journ. of sc. I, p. 300.

T. humilis Turn. Musc. hibern. p. 45.

T. linoides Brid. Mant. M. p. 90 et Bryol. univ. p. 543.

T. mucronulata Sm. Fl. brit. III, p. 1250.

T. stricta Brid. Sp. M. I, p. 249.

T. unguiculata ej. op. cit. p. 258.

Trichostomum linoides ej. op. cit. p. 234.

2. In mur., rupib., camp., ad vias, etc. *Eur. : Tota, vulgatiss. As. : Jenissei med., Japon., Caucas. Afr. : Alger. Am. sept. : Canad. or., Columb. brit. ; fere tota.*

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 140, II ed. n. 62 (Tortula).

Mac. Canad. M. n. 73.

Rab. Bryoth. eur. n. 420.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 123.

« *var. apiculata Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

B. apiculata Hedw. Sp. M. p. 117, t. 26 ; Brid. Bryol. univ. I, pp. 560 et 831.

Tortula apiculata Brid. Sp. M. I, p. 259.

T. unguiculata var. apiculata Hook. et Tayl. Musc. brit. p. 30.

Trichostomum pensilvanicum Spreng. Syst. veg. IV, I, p. 170.

Loc. argillos.-calcar. — C. typo.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1310.

var. aristata Brid. — B. unguiculata.

« *var. brachypus C. M. l. c. p. 613.*

B. brachypus Brid. Bryol. univ. I, p. 551.

Tortula acuminata ej. Sp. M. I, p. 252.

Ut typ. — Eur. : Thuring., Catalaun.

- « *var. cuspidata* *Brid. Bryol. univ. I, p. 565; Bryol. eur. l. c. t. 143; C. M. op. cit. p. 613; W. P. Sch. op. cit. p. 204.*
B. cuspidata *Schultz Rec. de Barbula, p. 14, t. 32, f. 14 a.*
Bryum nervosum *Hoffm. Deutschl. Fl. II, p. 44.*
Tortula mucronulata *Sw. Disp. M. Suec. p. 40.*
Tortula mucronulata β *Turn. Musc. Hibern. p. 47.*
 Ut typ. — *Eur.* : Iisd. loc. *Afr.* : Alger.
- var. dubia* *Brid. — B. unguiculata.*
- « *var. fastigiata* *Bryol. eur. l. c.*
B. fastigiata *Schultz op. cit. t. 33; Brid. Bryol. univ. I, p. 551.*
 Ut. typ. — *Eur.* : Reg. alp.,
var. latifolia *de Breb. — B. Brebissonii.*
- « *var. microcarpa* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
B. microcarpa *Schultz op. et l. cc.; Brid. op. c. p. 561.*
 Ut et cum *var. apicul.*
- « *var. nitido-costata* *R. Farneti M. Prov. Pavia, 1891, p. 20.*
Rup. umbros. — Eur. : Ital. super.
- « *var. obtusifolia* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
B. lanceolata *Hedw. Sp. M. p. 119, t. 26; Brid. Bryol. univ. I, p. 568.*
B. obtusifolia *Schultz op. cit. t. 32.*
Tortula lanceolata *P. B. Prodr. p. 92; Brid. Sp. M. I, p. 260.*
 In agris. — *Eur.* : Rarior.
- « *var. patagonica* *C. M. in Linn. 1843, p. 583 et Syn. I, p. 613.*
B. ericetorum *Brid. M. Rec. II, I, p. 196.*
Bryum ericetorum *Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 5?*
Br. ruralis *facie, foliis minoribus et non pilosis Dill. Hist. M. p. 354, t. 45, f. 13.*
Syntrichia ericetorum *Brid. Bryol. univ. I, p. 588.*
Tortula ericetorum *Sm. Fl. brit. III, p. 1258.*
 Ut typ. — *Eur.* : Scotia? *Am. merid.* : Patagon.
- unguiculatula* *C. M. in Linn. 1878-79, p. 333.*
 2. — *Am. merid.* : Alp. *Argentin. subtropic.*
- uruguensis* *Par.*
B. decidua *C. M. in Linn. 1880-82, p. 427.*
 2. — *Am. merid.* : Uruguay.
- vaginata* *Lindb. in Act. Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 10^a 8^{bri} 1880 (nom.).*
 — *Eur.* : Suec. merid.
- Vahlia* *Schultz Rec. de Barbula p. 30, t. 34, f. 31; Brid. Bryol. univ. I, p. 545; Bryol. eur. II (mon. p. 33) t. 157; C. M. Syn. I, p. 626; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 199.*
B. oblongifolia *W. P. Sch. Coroll. Suppl. (ad calcem) et Syn. I ed. p. 185.*
Tortula extenuata *de Not. Sp. de Tortul. ital. n. 12 et Syll. p. 174.*
T. oblongifolia *Wils. Bryol. brit. p. 129, t. 43.*
Tortula Vahlia *ej. op. et l. cc.*
T. Vahlj β *subflaccida* *Lindb. Trichost. eur. p. 29.*
 1. In terr. argill. humidiusc. — *Eur.* : Hibern., Galloprov., Sardin.
Afr. : Alger., ins. Canar. *Am. sept.* : Columb. brit., Calif.
- « *var. minor* *Husn. Musc. gall. p. 102.*
 Ad rup. vulcan. — *Afr.* : Teneriffa.
- validinervia* *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 79 et in Forschungsreise Bot. p. 79.*
 2. Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

vinealis *Brid. Bryol. univ. I, p. 830; Bryol. eur. II (mon. p. 24) t. 148; C. M. Syn. I, p. 617; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 209.*

B. cylindrica var. vinealis Lindb.

B. fallax var. vinealis Hüb. Musc. germ. p. 327.

Tortula fallax var. vinealis de Not. Syll. p. 180.

T. vinealis Spr. in Lond. Journ. of Bot. IV, p. 194.

Weisia monoclados Brid. op. cit. p. 360.

2. In mur. atque terr. lapid., rar. in mur. — *Eur.*: Britann., German. sept. (steril!), vall. Rhen., Galloprov., Ital., ins. Melit. *As.*: Yunnan, Nepal., Kurdistan., Persia, *As. min. Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Terr. Nov., Ontario, Calif., Mexic.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 668, 784 et b, 1071, 1311.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.*, n. 130.

var. cylindrica Boul. } — *B. cylindrica.*

var. flaccida Bryol. eur. }

virescens Lesq. in Trans. Am. Phil. Soc. XIII, p. 4; Lesq. et Jam. Man. p. 124.

2. Rupic. — *Am. sept.*: Calif.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 134.

viridis W. P. Sch. in Rab. Bryoth. eur. n. 818.

— *Eur.*: Gall. merid.

vulcanica Ltz. Moosst. p. 161.

2. Rupic. — *Am. merid.*: And. Æquat.

Wallichii (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 296.

Desmatodon Wallichii Mitt. M. Ind. or. p. 38.

Trichostomum dentatum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 299 p.p.

2. — *As.*: Nepal., Sikkim.

Wildii Broth. in Oefv.... 1890.

2. Calcar. — *Pac.*: Austral. (Queensland).

Woodii W. P. Sch. Syn. II ed. p. 207.

Amphoridium Mougeoti W. P. Sch. (fid. Husn. Musc. gall. p. 147).

Trichostomum Woodii Husn. op. cit. p. 86.

Ster. Mur. humid. — *Eur.*: Hibern.

Wrightii Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 673.

B. obscura Sull. in Proc. Am. Acad. 1861.

Tortula obscura Mitt. M. austr. am. p. 150.

2. — *Am. sept.*: Cuba.

xanthocarpa C. M. in Linn. 1843 et Syn. I, p. 619.

2. — *Afr.*: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. *M. Afr. austr. n. 94 (1).*

(1) In Enumer. Kindberg. nomina nuda:

B. acrophylla C. M.
anæctangiacea C. M.
aristata C. M. (an B. aristata?)
aureola C. M.
brevipila Hpe. et C. M.
connivens Lindb.
Eggersii C. M.
exesa C. M. (an B. serripungens var. exesa?)
Fristedti C. M.
insulana de Not. (probab. B. cylindrica).
microglottis C. M.
murina C. M.

B. nivalis Spr.
pallido-virens C. M.
pallido-viridis C. M.
paramattana Mitt.
perlimbata Geh.
propinqua C. M.
punctulata Brid. (Quid?)
rubricaulis C. M.
subdecidua (C. M.) Kindb. (an B. uruguensis?)
subobscura (Sull.) Kindb. (an B. Wrightii?)
subrubiginosa (C. M.) Kindb. (an B. argentinica?)
Sullivanii C. M.

BARTRAMIA Hedw. M. fr. II, p. III, t. 40 (83 sp.)

abyssinica C. M. — Anacolia.

acerosa C. M. et Hpe. in Linn. 1856, p. 208.

B. papillata H. f. et W. (fid. Mitt.)

2. — Pac. : Austral. fel.

acicularis C. M. — Philonotis.

aciphylla Wils. — Breutelia.

acutissima C. M. — Philonotis.

affinis { Hook. — Philonotis.
Hsch. — Philonotis erythrocaulis.
Schwaegr. — Breutelia commutata.

afro-scoparia C. M. — Breutelia.

afro-stricta C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 203.

Ster. — Afr. : C. B. Sp.

afro-uncinata C. M. — Philonotis.

alpina Schleich. — B. Oederi.

alto-gracilis C. M. — Philonotis.

ambigua Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 103 et Syll. p. 28; C. M. Syn. I, p. 502.

2. Terr. et rupic. — Am. merid. : Peruv., Chile.

amblyoblata C. M. — Philonotis.

andina Mitt. — Philonotis.

androgyna Hpe. — Philonotis.

angulata Tayl. — Philonotis rufiflora.

angustata Wils. { — Philonotis angusta.
p.p. — Philonotis fontana var. falcata.

angustifolia Mitt. M. austr. am. p. 273.

B. longifolia ej. in Jameson M. exs.

— Am. merid. : And. Quitens.

angustissima C. M. — Philonotis.

anisotheციoides C. M. — Philonotis.

appressa H. f. et W. — Philonotis.

aprica C. M. in Linn. 1875, p. 397.

Syn., fr. ign. Rupic. — Afr. : Littus occ. mar. Erythraei.

arbusculacea C. M. — Philonotis.

aristata W. P. Sch. in Lechl. Pl. Chil. n. 834; C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 338.

Rup. madid. — Am. merid. : Valdiv.

aristata Mitt. — B. aristifolia.

aristifolia Jaeg. Ad. I, p. 533.

B. aristata Mitt. M. austr. am. p. 269.

2 ? Rupic. — Am. merid. : And. Quitens.

arcuata { Brid. — Breutelia.
Schwaegr. p.p. — Breutelia.
Schwaegr. — Breutelia tomentosa.

asperifolia C. M. Philonotis.

australis { Mitt. (M. austr. am.) — Conostomum.
Mitt. (1876). — Philonotis anisotheციoides ?
Mitt. (Handb.). — Philonotis.

- austro-arcuata* C. M. — Breutelia.
- austro-georgica* Par.
B. subpatens C. M. *Bryol. Austr. Georg.* p. 29.
 Syn. — *Am. merid.* : Austr. Georg.
- baginsensis* C. M. — Philonotis.
- Berteroana* C. M. — Philonotis.
 var. *flaccida* C. M. — Philonotis *Berteroana* var. *flaccida*.
- bogotensis* Hpe. — *B. flavicans*.
- Boulayi* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 177.
 — *Afr.* : Ins. Borboniæ.
- brachypus* Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 441 ; C. M. *Syn.* I, p. 497.
 Syn. — *Afr.* : M. Abyssin.
- Breutelii* W. P. Sch. in *Breut. M. Capens.* ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 162.
 2. — *Afr.* : C. B. Sp.
- brevifolia* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 737 ; C. M. *Syn.* II, p. 619.
B. Mülleri Mont. in C. M. *Syn.* I, p. 498 et *Syll.* p. 29 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 273.
B. patens Hook. in *Kth. Pl. Æquinoct.* p. 55.
B. potosica C. M. in *Linn.* 1847, p. 204 ; Hpe. *op. cit.* p. 76.
 2 ? — *Am. merid.* : Columb.
- brevifolia* W. P. Sch. — *B. Schimperii*.
- brevisetia* { Boul. — *B. ityphylla* var. *rigidula*.
 Lindb. — *B. ityphylla* var. *brevisetia*.
- Brownii* Brid. — Philonotis *affinis*.
- caespitosa* Wils. — Philonotis *fontana* var. *caespitosa*.
- calabrica* Lindb. — Philonotis *rigida* var. *gracilis*.
- calcareia* Bryol. eur. — Philonotis.
- Campylopus* W. P. Sch. in C. M. *Syn.* II, p. 619.
 — *Am. sept.* : M. Mexic.
- carinata* Mitt. — Breutelia.
- catenulata* Hpe. — Philonotis.
- chilensis* Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 186.
 2 ? Arenic ? — *Am. merid.* : Valdiv.
- chrysea* C. M. — Breutelia ?
- chrysura* C. M. — Glyphocarpus.
 var. *elongata* C. M. — Glyphocarpus *chrysurus* var. *elongata*.
 var. *nigrescens* C. M. — Glyphocarpus *chrysurus* var. *nigrescens*.
- circinulata* C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 105.
 2 ? Rupic. — *Am. merid.* : Columb. brit.
- commutata* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 153.
B. patens Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 55, t. 62 (*fid.* Mitt.).
 Syn. — *Afr.* : M. Cameroon.
- commutata* Hpe. — Breutelia.
- comorensis* C. M. — Philonotis.
- comosa* { Hpe. et C. M. — Glyphocarpus.
 Hook. f. — Breutelia.
- compacta* Hsch. — Glyphocarpus.
- condensata* Schwaegr. — *B. Oederi*.
- conostoma* Bryol. eur. — *Conostomum boreale*.
- consimilis* Hook. f. — Breutelia.

- costa-ricensis* C. M. *Syn.* II, p. 618.
 Syn. — *Am. sept.* : Costa-Rica.
- crassa* H. f. et W. — *Breutelia*.
- crassinervia* Mitt. in *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 447.
 Syn. *Silvic.* — *Pac.* : Nov. Zeland. med.
- crassinervis* Wils. p.p. — { *Philonotis calcarea.*
Philonotis fontana.
Philonotis lutea.
- crenatula* C. M. — *Philonotis*.
- crispa* Sw. — *B. pomiformis* var. *crispa*.
 var. *minor* W. et M. — *B. pomiformis*.
 var. *pomiformis* Lindb. — *B. pomiformis*.
- crispata* W. P. Sch. in *Savatier M. Japon. n.* 511; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 348.
 1. Ad arbor. excav. — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 55, 69, 162, 164, 3501.
- Cryptopodium* C. M. — *Cryptopodium bartramioides*.
- curvata* Hpe. — *Philonotis*.
- curvirostra* Mitt. — *Conostomum*.
- curvula* C. M. — *Philonotis*.
- cuspidatissima* C. M. — *Breutelia*.
- cygnaea* Mont. — *Bartramidula*.
- defecta* C. M. — *Philonotis*.
- defoliata* C. M. in *Linn.* 1864, p. 597.
 Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- dicranacea* C. M. — *Breutelia*.
- dicranoides* Wils. — *Philonotis longicolla*.
- didymocarpa* W. P. Sch. in *Mandon Pl. boliv. n.* 1669.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- diminutiva* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forschungsreise.....* p. 20.
 Syn. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- divaricata* { C. M. — *Breutelia Mülleri*.
 Hook. — *Breutelia*.
- Dregeana* C. M. — *Philonotis*.
- dumosa* Mitt. — *Breutelia*.
- elegantula* C. M. — *Philonotis*.
- elongata* Mitt. — *Prionodon*.
- erecta* Mitt. — *Bartramidula*.
- erythrocaulis* C. M. — *Philonotis*.
- exigua* Sull. — *Bartramidula*.
- falcata* Hook. — *Philonotis fontana* var. *falcata*.
- Fendleri* C. M. — *Bartramidula*.
- filiformis* Hsch. — *Philonotis tenella* var. *gracillima*.
- flavicans* Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 55 et *M. austr. am.* p. 270 ;
 C. M. *Syn.* II, p. 618.
B. bogotensis Hpe. in *Linn.* 1863, p. 142 et in *Ann. sc. nat. V ser., III,*
 p. 374.
 Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- flavicans* C. M. — *Philonotis*.
- fontana* Schwaegr. — { *Philonotis*.
Philonotis rigida.
Philonotis tenella var. *humilis*.

- var. *alpina* Bryol. eur. — *Philonotis fontana* var. *alpina*.
 var. *falcata* { Bryol. eur. — *Philonotis fontana* var. *falcata*.
 { Mont. — *Philonotis macrocarpa*?
 var. *marchica* H. et T. — *Philonotis marchica*?
fontanella Hpe. — *Philonotis*.
fontanoides Gill. et Grev. — *Philonotis*.
fragilis Mitt. — *B. papillata*.
fuscescens Ångstr. in Oefv..... 1876, n. 4, p. 18.
 2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
Gardneri C. M. — *Philonotis*.
gemmascens C. M. — *Philonotis*.
gigantea { Bory. — *Bartramia vulcanica*,
 { H. f. et W. — *Breutelia divaricata*.
gigantea Schwaegr. — *Breutelia*.
glauca Ltz. Moosst. p. 160.
 Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
glaucescens Hsch. — *Philonotis*.
glauco-viridis C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 105.
 1. Rup. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.
glomerata Wils. — *Philonotis*.
gnaphalea C. M. — *Breutelia*.
gonioclada Wils. — *Philonotis fontana* var. *falcata*.
gracilenta Hpe. — *Philonotis*.
gracilis Floërke. — *Bartramia* Æderi.
 var. *tomentosa* C. M. — *B. Æderi* var. *conlensata*.
graminicola C. M. — { *Philonotis*.
 { *Philonotis kerguelensis*.
granatensis W. P. Sch. — *Anacolia Webbii*.
grandis Geh. et Hpe. — *Breutelia*.
Griffithiana Wils. — { *Philonotis Griffithiana*.
 { *Philonotis imbricatula*.
Halleriana Hedw. *M. frond.* II, p. III ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 33 ;
 Bryol. eur. IV (mon. p. 14) t. 320 ; C. M. *Syn.* I, p. 425 ; W. P.
 Sch. Syn. II ed. p. 511.
 B. Mossmanniana C. M. (fid. Mitt.).
 B. norvegica Lindb. *M. Scand.* p. 15.
 Bryum Bartramia Gmel. *Syst. nat.* II, p. 1335.
 Br. foliis mollibus subulatis, setis brevissimis alaribus, capsulis ovatis
 Hall. *Hist. sc. Helv.* n. 1802, t. XLV, f. 8.
 Br. laterale Ehrh. *Crypt. exs.* n. 33.
 Br. norvegicum Æd. *Fl. Dan.* V, t. 538, f. 3.
 Br. pendulum Fl. Dan. V, t. 835, f. 3.
 Br. pomiforme var. I Scop. *Fl. Carn.* n. 1307.
 Br. pomiforme ß Halleri Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 878.
 Br. recurvum Wulf in Jacq. *Coll.* II, p. 224.
 Mnium laterale Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 54.
 Webera clandestina Hedw. *Fund. M.* II, p. 104, t. 6, f. 39.
 W. Halleriana ej. op. cit. p. 95.
 1. Ad rup. humid. umbr. — *Eur.* : Zon. sept. et med., rar. merid. reg.
 mont. usque in alp. As. : Alp. Yunnan, Himalaya, Caucas. Afr. :
 M. Cameroon (?) *Am. sept.* : M. Rupestr. — *Pac.* : Tasman?
 Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 239.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 235, 740.
Halleriana { H. f. et W. — *B. Mossmanniana*.
 { Mitt. — *B. magellanica*.

Hampeana C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 162.

Glyphocarpus asperrimus Hpe. in *Jaeg. Ad. I*, p. 512.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 200.

Hasskarliana Hpe. — *Breutelia*.

Henoni Duby. — *B. pomiformis* var. *crispa*.

hercynica Floërke. — *B. pomiformis* var. *crispa*.

heteromalla Brid. — *B. pomiformis* var. *crispa*.

hispida Mitt. — *Breutelia*.

Hookeri Wils. — *Philonotis longicollis*.

humilis Mitt. — *Glyphocarpus*.

Hymenodon C. M. — *Philonotis*.

incana Tayl. — *Breutelia*.

inclinata Hpe. et Ltz. — *Breutelia*.

incrassata C. M. — *Philonotis*.

incurva Hoppe. — *B. pomiformis* var. *crispa*.

inserta Sull. et Lesq. — *Glyphocarpus*.

integrifolia { Sull. — *Breutelia aureola* ?
Tayl. — *Breutelia*.

intermedia Hpe. — *Breutelia*.

intertexta C. M. p.p. — { *Anacolia*.
Anacolia setifolia.

ithyphylla Brid. *Mant. M. III*, p. 85 et *Bryol. univ. II*, p. 43 ; *Bryol. eur. IV*. (mon. p. II) t. 317 ; C. M. *Syn. I*, p. 493 ; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 510.

B. pomiformis Sw. *Disp. M. Suec.* p. 75.

Bryum alpinum viridissimum et majus, capitulis crassissimis Hall. *Enum. sc. Helv.* p. 109, t. III, f. 7.

Br. pomiforme L. *Sp. Pl.* p. 1580 p.p.

Br. pomiforme β majus Web. *Fl. Goett.* p. 20.

Syn. Ad terr. et in fiss. rup. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in supra-alp. præpr. zonæ septentr. ; S. Nevada. *As.* : Kamschatka, Jenissei inf., Caucas. *Am. sept.* : Arctic. et bor. : Groenland, Labrador, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Alaska, Sitka, ins. Vancouver, Washington, Idaho, Wyoming, Nevada, Oregon ; M. Adirondack, Pensilv., Terr. Nov., etc.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 238.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 234, 1209.

Sulliv. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 255.

Un. itin. 1867, n. 83.

* var. *Arenae* Besch. in *Miss. sc. Cap Horn, Bot. V*, p. 288.

— *Am. merid.* : Fret. Magellan.

* var. *breviseta* Husn. *Muscol. gall.* p. 266.

B. breviseta Lindb. M. nov. *Scand. in Not....* 1868, p. 255.

Ut typ. — *Eur.* : Finmark, Alp. centr. *Am. sept.* : Groenland, Behring.

* var. *rigidula* W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 510.

B. rigidula Boulay M. Fr.

Ut typ. — *Eur.* : Lappon., Alp. Norveg. *Am. sept.* : Groenland.

var. *subulata* Husn. - - *B. subulata*.

ithyphylloides W. P. Sch. in *Lechl. M. Chil.* n. 875 ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 229.

— *Am. sept.* : Mexic. (fid. Besch. *Prodr.* p. 57).

Am. merid. : Chil.

- jamaicensis* Mitt. — Breutelia.
Jamesoni Tayl. — Cryptopodium Hookeri.
javanica Dz. et Mk. in *Zoll. Syst. Verz.* pp. 24 et 50 et *Bryol. jav.* 1, p. 154, t. 123.
 2. — As. : Java.
Karsteniana C. M. — Breutelia ?
Kilima N'Djarica C. M. — Breutelia.
Krauseana C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2. 4.
 Syn. — As. : Penins. Tschutschica.
Krausei { Bryol. eur. — Glyphocarpus compactus.
 { C. M. — Bartramidula.
laete-virens Rehm. — Breutelia afro-scoparia.
laevisphaera Tayl. — Glyphocarpus.
lamprocarpa W. P. Sch. — Anacolia intertexta.
lanceolata Schrad. — B. *Æderi*.
laxissima C. M. — Philonotis.
Leikipiae C. M. in *Fl.* 1890, p. 479.
 Ster. : — Afr. : M. Aberdare.
leptodonta Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 369 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 58.
 1. vel Syn. — As. : Himalaya.
leucolomacea C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 28.
 2. In argillos. — Am. merid. : Austr. Georg.
Lindigii Mitt. — Bartramidula.
lineata C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 464.
 2 ? — Am. merid. : Venezuela.
longicollis Hpe. — Philonotis.
longifolia Hook. M. ex. t. 68 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 39 ; C. M. *Syn.* I, p. 498 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 273.
 Rup. granitic. — Am. merid. : And. Nov. Gran.
longifolia { Hsch. — B. Martiana.
 { Mitt. — B. angustifolia.
longiseta { Brid. — B. *Æderi*.
 { Rich. — Philonotis radicalis.
Lorentzi C. M. — Breutelia.
lutescens Mitt. — Cryptopodium.
macrocarpa { C. M. — Philonotis.
 { Hpe. — Breutelia tomentosa.
macrodictya C. M. — Philonotis.
macro-subulata C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2. 4.
 Syn. — As. : Penins. Tschutschica.
macrotheca Hpe. — Breutelia tomentosa.
magellanica Ångstr. in *Oefv.*.... 1872, n. 4, p. 8.
 B. Halleriana Mitt. l. c. p. 272.
 1. Ad rup. madid. — Am. merid. : Fuegia, in fret. Magellan.
magellanica Mitt. — Conostomum.
marchica { Schwaegr. - Philonotis.
 { Sull. — Philonotis Mühlenbergii.
marginalis Rehm. M. Afr. austr. n. 202.
 Ster. — Afr. : Orange.

Martiana Hpe. *Enum. M. Brasil*, p. 22 (nom.)

B. longifolia Hsch. *Fl. Brasil*, I, p. 40.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Matthewsii Mitt. *op. cit.* p. 273.

— *Am. merid.* : And. Quitens., Peruv.

Menziesii Turn. — Anacolia.

microbasis C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 409.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

microdonta Mitt. — Glyphocarpus.

microstoma Mitt. *op. cit.* p. 272.

— *Am. sept.* : Guatemala.

minuta Tayl. — Philonotis.

Mohriana C. M. — Philonotis.

mollis C. M. — Philonotis.

var. Wils. — Philonotis leptocarpa.

Moritziana Hpe. — Philonotis.

Mossmanniana C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 552.

B. Halleriana H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 88 et *Handb.* p. 446
(jure, fid. Mitt. !)

l. Arb. et rupic. — *Pac.* : N. Zel. sept. et med., Tasman.

Mühlenbergii Schwaegr. — Philonotis.

Mülleri Mont. — *B. brevifolia*.

nanothecia C. M. — Philonotis.

nevadensis C. M. — *B. thrausta*.

Niam-Niamiae C. M. — Philonotis.

nitida Wils. — } Philonotis.
 } Philonotis Turneriana.

Normanni Holmgr. — *B. pomiformis* var. *heterophylla*.

norvegica Lindb. — *B. Halleriana*.

obtusifolia Mitt. — Philonotis.

Øederi (Gunn.) Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 49, t. 59; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 46; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 12) t. 318; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 512.

B. alpina Schleich. *Cent.* IV, n. 17.

B. gracilis Floërke in *Schrad. bot. Journ.* 1799, II, p. 171; C. M. *Syn.* I, p. 508; *Drumm. M. bor. Am.* I ed. n. 240.

B. grandiflora Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 48, t. 50; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 48.

B. lanceolata Schrad.

B. longiseta Brid. *Mant.* p. 116.

B. Øederiana Sw. in *Schrad. Journ.* 1800, II, p. 81.

B. Øederi γ *longiseta* Brid. *op. et l. cc.*

B. pomiformis Sull. *M. Allegh.* n. 121.

B. subintegrifolia P. B. *Prodr.* p. 44.

Bryum lacerum Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 878.

Br. Øederi Gunn. *Fl. Norveg.* n. 1005.

Br. pomiforme β Øederi Vill. *op. et l. cc.* p. 879.

Mnium gracile Funk *Fasc. Crypt.* IV, p. 93.

Plagiopus Øederi Limpr. *Deutschl. Laubm.* II, p. 548.

Syn. Ad. rup. humid. præprim. calcar. — *Eur.* : Reg. mont. et subalp.

As. : Penins. Tschutschica, Amour, Japon., Jenissei med., Hima-

laya, Caucas. *Am. sept.* : Reg. sept. de Nov. Angl. ad M. Rupestr. ;

Canada, Columb. brit.

Ews. : Faurie Pl. Japon. n. 299.

Mac. Canad. M. n. 149.

Rab. Bryoth. eur. n. 132, 368 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 258.

var. *alpina* Schwaegr. — B. *Æderi* var. *condensata*.

« var. *condensata* Brid. Sp. M. III, p. 87 et Bryol. univ. II, p. 48.

B. *gracilis* β *tomentosa* C. M. Syn. I, p. 509.

B. *Æderi* β *alpina* Schwaegr. Suppl. I, II, p. 48.

B. *Æderi* var. *microcarpa* Kindb. Enum. Bryin. Dovr. p. 28.

B. *Æderi* var. *subnivalis* Mdo. Alg. Moosst. p. 82.

Plagiopus *Æderi* var. *condensata* Limpr. Deutschl. Laubm. II, p. 550 (1).

Pl. *serratus* Brid. Sp. M. III, p. 87 et Bryol. univ. I, p. 596; C. M. Syn. I, p. 511 (1).

In uligin. (Brid.) ; ad rup. apricas (Limpr.). — Eur. : Alp. Algov., Stir., Carinth., Tirol., Rhaet., Helvet.

« var. *glacialis* Mdo. in Un. itin. 1863, n. 20.

Rupic. — Eur. : Alp. Tirol.

var. *longiseta* Brid. — B. *Æderi*.

var. *microcarpa* Kindb. — B. *Æderi* var. *condensata*.

« var. *minor* Kindb. in Mac. Cat. p. 105.

Ad rup. madid. — Am. sept. : M. Rupestr., Columb. brit.

var. *subnivalis* Mdo. — B. *Æderi* var. *condensata*.

Æderiana Sw. — B. *Æderi*.

Oreadella C. M. Bryol. austr. Georg. p. 29.

Syn. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georg.

Osculatiana de Not. — *Philonotis*.

Pabstiana C. M. — *Philonotis*.

var. *plumosa* C. M. — *Philonotis* *Pabstiana* var. *plumosa*.

pallida Hpe. — *Philonotis*.

papillata Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. p. 89, t. 86, f. 4 et Handb. p. 447; Fl. Tasman. II, p. 195.

B. *acerosa* Hpe. (fid. Mitt.).

B. *fragilis* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. IV, p. 81 et Fl. Tasman. 196, t. 174, f. 8.

2. — Pac. : Austral., N. Zeland. sept. et med., Tasman.

patens Brid. Sp. M. III, p. 82 et Bryol. univ. p. 38 (excl. syn. Schwaegr. et Turn.). C. M. Syn. I, p. 494; Mitt. M. austr. am. p. 275.

B. *reticulata* P. B. Prodr. p. 44.

Syn. — Afr. : Ins. Kerguelen. Am. merid. : Terr. Magell., ins. Eremitae, Maclov.

patens { Hook. — B. *brevifolia*.
Schwaegr. (fid. C. M.). — B. *vulcanica*.
Schwaegr. (fid. Mitt.). — B. *commutata*.

patula Mitt. — *Bartramidula*.

(1) « Optandum est muscum hunc semel tantum lectum mox iterum reperiri. » C. M. l. c. (1849).

« Die Gattung *Plagiopus* wurde, wie das Original exemplar in Bridel's Herbar (Berliner botanisches Museum) zeigt, auf *Bartramia* *Æderi* var. β gegründet. » Limpr. op. cit, p. 548 (1893).

Pechuelii C. M. — *Philonotis*.

pendula { Hook. — *Breutelia*.
Mitt. (1876). — *Glyphocarpus chrysurus*?
Spreng. — *Breutelia Sieberi*.
Sull. — *Breutelia dumosa*?

penicillata C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 409.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos-Ayr.

pentasticha Brid. — *Conostomum australe*.

perpumila C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 411.

2. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic. Tucuman.

pinnata Hpe. — *Breutelia*.

polygastrica C. M. in *Linn.* 1874, p. 600.

Ster. — *Am. merid.* : Summ. And. Peruv.

polymorpha C. M. — *Philonotis*.

polytrichoides C. M. in *Linn.* 1874, p. 597.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

pomangium C. M. — *Philonotis*.

pomiformis (L.) Hedw. *Sp. M.* p. 164; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 39;
Bryol. eur. IV (mon. p. 13) t. 319; C. M. *Syn.* I, p. 499; W. P.
Sch. Syn. II ed. p. 511.

B. crispa β minor W. et M. *Bot. Taschb.* p. 272.

B. crispa var. *pomiformis* Lindb, M. *Scand.* p. 15.

B. vulgaris Lam. et DC. *Fl. fr.* I, p. 509.

Bryum capillaceum, capitulis sphaericis Dill. *Hist. M.* p. 339, t. 44, f. I.

Br. pomiforme L. *Sp. Pl.* p. 1580, p.p.

Mnium pomiforme L. *jun. Meth. M.* p. 364.

Webera pomiformis Hedw. *Fund. M.* II, p. 95.

1. Ad terr. lapid. et ad rup. præpr. aren. et granit. — *Eur.* : Reg. campestr. et montan. As. Amour, Japon., Kamschatka, Himalaya, Caucas. occ. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Columb. brit., Behring, Terra Nov. ; reg. borealis tota. *Am. merid.* : Fret. Magell., Fuegia.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 237.

Mac. *Can. M.* n. 150.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 174.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 257.

pomiformis { Sull. — *B. Cederi*.
Sw. — *B. ithyphylla*.

var. *elongata* Turn. — *B. pomiformis* var. *crispa*.

var. *major* H. et T. — *B. pomiformis* var. *crispa*.

« var. *crispa* *Bryol. eur.*, C. M. et W. P. *Sch. ll. cc.*

B. crispa Sw. *Disp. M. Suec.* p. 73; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 41.

B. Henoni Duby in *Mem. Soc. Genève* 1876, II, 2, f. 2 (*B. japonica* in tab.)

B. hercynica Floërke in *Schrad. Bot. Journ.* 1799, II, p. 71.

B. incurva Hoppe in *Sturm. Fl. Germ. crypt. fasc. VI.*

B. pomiformis β *elongata* Turn. *Ann. bot.* I, p. 1526.

B. pomiformis β *major* H. et T. *Muscol. brit.* p. 85.

Locis humidior. — *Eur.* : Reg. montan. super. vel in zona frigida.

As. : Unalaschka, Amour, Japon., Alp. Yunnan., Jenissei super.,
Caucas. Afr. : Alger. Am. sept. : Washington ; cum typo (1).
Eexs. : Rab. Bryoth. eur. n. 175.

« var. heteromalla (Brid.) C. M. l. c.

B. pomiformis Brid. l. c.

B. Normanni Holmgr. mss. ; Hartm. Skand. Fl. X ed. II, p. 47.

Ut. typ. — Eur. : Scandin. — Am. sept. : Sine loc. spec.

potosica Mont. in Ann. sc. nat. 1838, p. 56 et in d'Orbigny Voy. p. 95 ;
Syll. p. 29 ; C. M. Syn, I, p. 494.

Arb. et rupic. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitenses, Chile.

potosica C. M. et Hpe. — B. brevifolia.

Prabaktiana Dz. et Mk. — Philonotis secunda var. Prabaktiana.

praetenuis Wils. — Philonotis angusta.

pseudo-Cryptopodium C. M. in Linn. 1880-82, p. 412.

Fl. et fr. ign.

— Am. merid. : Alp. Argentin. subtro-

pic. Tucuman.

pseudo-fontana C. M. — Philonotis.

pseudo-mollis C. M. — Philonotis.

pusilla } C. M. — Bartramidula.

Hook. — Bartramidula exigua.

pyncocoleos C. M. Bryol. austr. Georg. p. 28.

Ster. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georg.

pygmaeola C. M. — Philonotis.

quadrata C. M. — Glyphocarpus.

radicalis P. B. — Philonotis.

var. H. f. et W. — Philonotis pallida.

var. plumulosa Ren. et Card. — Philonotis radicalis var. plumulosa.

recurvifolia Duby. — Campylopus penicillatus.

remotifolia H. f. et W. — Philonotis appressa.

reticulata P. B. — B. patens.

rigida Bals. et de Not. — Philonotis.

Rietmanniana Hpe. in Jaeg. Ad. I, p. 534.

— Pac. : Nov. Hebrid.

rigidissima W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1674.

— Am. merid. : And. Boliv.

robusta Hook. f. et Wils. Fl. Antarct., p. 133, t. 59, f. 4 : Handb. N.

Zeal. Fl. p. 447 ; C. M. Syn. I, p. 495 et II, p. 619.

2. Coll. humid. — Afr. : Ins. Kerguelen. Pac. : Ins. Auckland, Campbell.

robusta Sull. et Lesq. — B. Wilkesiana.

Roylei C. M. — Bartramidula.

rufescens Hpe. Symb. 1874, p. 491.

2.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

rufiflora Hsch. — Philonotis.

rupestris Mitt. — Breutelia.

rupta C. M. in Linn. 1880-82, p. 413.

Fl. et fr. ign.

— Am. merid. : Argentin. Cordob.

scabrida Schwaegr. — Philonotis uncinata.

scuriosula C. M. — Philonotis.

(1) In Mac. Catal. of Canadian Plants non indicata.

Schimperi C. M. *Syn.* II, p. 617.

B. brevifolia W. P. Sch. in *hb. Mus. Paris.*

Syn. — *Am. sept.* : Mexic.

Schmidiana C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 162.

Syn. — *As.* : M. Neilgherr.

scoparia Schwaegr. — { Breutelia.
Breutelia Sieberi.

secunda W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1671.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

sericea Hsch. — *Glyphocarpus.*

setifolia Mitt. p.p. — { Anacolia.
Anacolia intertexta.

Siebieri Hsch. — *Breutelia.*

simplex C. M. — *Philonotis.*

simplicissima C. M. — *Philonotis.*

Slateri Hpe. — *Philonotis.*

sparsifolia Hpe. — *Philonotis.*

speciosa Griff. — *Philonotis.*

Spielhausi C. M. in *Rehm. M. Afr. Austr.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

sphaerica Schwaegr. — *Philonotis.*

spiralis Hpe. — *Philonotis.*

squarrosa { Mitt. — *Breutelia.*
Turn. — *B. vulcanica?*

striata C. M. — *Philonotis.*

striatula Mitt. — *Philonotis.*

stricta *Brid. Mant. M. p.* 116 et *Bryol. univ. II, p.* 45 ; *Bryol. eur. IV*
(*mon. p.* 10), *t.* 316 ; C. M. *Syn. I, p.* 500 ; W. P. Sch. *Syn. II*
ed. p. 509.

B. strictifolia *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 54.

Syn. Ad terr. et rup. — *Eur.* : Zon. merid. et mediterr. ; *Britann.?*

As. : Unalaschka (?), *As. minor. Afr.* : Alger., Canar., Madeir.,

M. Cameroon. Am. sept. : Colorado, Calif. *Am. merid.* : Fret.

Magell. (?) Pac. : Austral. (Swan River).

Exs. : Bourgeau *Pl. Canar. n.* 1585.

Mandon M. Madeir. n. 25.

Rab. Bryoth. eur. n. 739 et b., 1208, 1288.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. p. 256.

stricta Schwaegr. — *Glyphocarpus compactus.*

strictae-affinis C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 337.

— *Afr.* : M. Cameroon.

strictifolia *Tayl.* — *B. stricta.*

strictula C. M. in *Fl.* 1888, p. 412.

Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

subarcuata C. M. — *Breutelia.*

subasperrima C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 199.

— *Afr.* : C. B. Sp.

subbrevifolia C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 464.

? — *Am. merid.* : Venezuela.

subdisticha Hpe. — *Breutelia.*

subexigua C. M. — Bartramidula
subgnaphalea C. M. — Breutelia
subintegrifolia P. B. — B. Oeder.

subithyphylla Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 58.
 Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

subolescens C. M. — Philonotis.

subpatens Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 375.
 Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Gran.

subpatens C. M. — B. austro-georgica.

subpellucida Mitt. *M. Ind. or.* p. 59.
 Syn. — *As.* : Himalaya.

subsessilis C. M. — Glyphocarpus laevisphaerus.

substricta W. P. Sch. *mss.* ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 162.
 2. — *Afr.* : C. B. Sp.

subtomentosa Hpe. — Breutelia.

subulata *Bryol. eur. IV (mon. Suppl. p. I)*, t. 315 ; C. M. *Syn. I*, p. 493 ;
 W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 508.

B. ithyphylla var. *subulata* Husn. *Musc. gall.* p. 266.

Weisia viridissima Brid. *Bryol. univ. I*, p. 364 ?

Syn. In fissur. rup. — *Eur.* : Summ. Alp. Rhaet., Carinth., Salzburg.
As. : Sikkim. *Am. sept.* : Alaska, Sitka, Colorado.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 173.

subulosa Griff. — Philonotis.

tahitensis C. M. — Philonotis.

tenella { C. M. — Philonotis.
 Wils. — Philonotis imbricatula.

var., Wils. — Philonotis heterophylla.

var. *erecta* C. M. — Philonotis glaucescens.

var. *gracillima* C. M. — Philonotis tenella var. *gracillima*.

var. *humilis* C. M. — Philonotis tenella var. *humilis*.

tenuicula Hpe. — Philonotis.

tenuis Tayl. — Philonotis.

thelioides C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

thrausta W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1673.

B. nevadensis C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 410.

2. — *Am. merid.* : And. Boliv., Alp. Argentin. sub-
 tropic.

tomentosa { C. M. — Breutelia.
 Schwaegr. — Breutelia gnaphalea.

Trianae Hpe. — Breutelia.

trichodonta C. M. — Philonotis.

tricolor C. M. — Philonotis.

Turneriana Schwaegr. — Philonotis.

uncinata { C. M. et W. — Philonotis Gardneri.
 Schwaegr. — Philonotis.

Wils. — Philonotis lutea.

vagans Mitt. — Philonotis.

vaginans Rehm. *M. Afr. austr. n.* 201 et 534.

Ster. — *Afr.* : Orange.

versifolia Hpe. — *Philonotis*.

viridissima C. M. — *Cryptopodium Hookeri*.

vulcanica Brid. *Bryol. univ.* II, p. 37; *C. M. Syn.* I, p. 497.

B. gigantea Bory Voy. en Afr. III, p. 96.

B. patens var. *Schwaegr. Suppl.* I, II, p. 55, t. 62.

B. squarrosa Turn. in König et Sims. *Ann. bot.* I, p. 329, t. 2, f. 2?

Syn. Rup. basalt. — Afr. : Ins. Borboniae.

vulgaris Lam. et DC. — *B. pomiformis*.

Wallisi C. M. — *Philonotis*.

Webbii C. M. — *Anacolia*.

Wilkesiana Par.

B. robusta Sull. in Wilkes *Expl. Exped.* p. 12; *C. M. in Fl.* 1885, p. 413.

— Am. merid. : Fuegia.

Willii C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 30.

Ster. Rupic. — Am. merid. : Austro-Georg.

Wilsoni C. M. — *Bartramidula*.

xantochaeta W. P. Sch. in Mandon *Pl. Boliv. n.* 1672.

— Am. merid. : And. Boliv. (1)

BARTRAMIDULA Bryol. eur. IV (15 sp.).

Breuteliana W. P. Sch. in Breutel *M. Capens.*

Glyphocarpus Breutelii Jaeg. *Ad.* I, p. 524?

— Afr. : C. B. Sp.

cernua Lindb. — *B. Wilsoni*.

curta (Hpe.) Par.

Glyphocarpus curtus Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 21.

Philonotula curta Hpe. *Symb.* 1874, p. 722.

Syn. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

cygnaea (Mont.) Jaeg. *Ad.* II, p. 698.

Bartramia cygnaea Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 102 et *Hist. Chil.*

Bot. crypt. t. 2, f. 2; *Syll.* p. 28; *C. M. Syn.* I, p. 479.

Glyphocarpus cygnaeus Jaeg. *Ad.* I, p. 523.

2. Palud. — Am. merid. : Chile.

erecta (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 598.

Bartramia erecta Mitt. *M. austr. am.* p. 255.

Glyphocarpus erectus Jaeg. *Ad.* I, p. 523.

1. Terr. — Am. merid. : And. Quitens.

exigua (Sull.) Jaeg. *Ad.* II, p. 698.

Bartramia exigua Sull. in U. St. *Expl. Exp.* p. II, t. 8.

B. pusilla Hook. *Journ. bot.* 1856, p. 316.

Glyphocarpus exiguus Jaeg. *Ad.* I, p. 522.

— Am. merid. : Cap. Horn.

Fendleri (C. M.) Par.

Bartramia Fendleri C. M. in Linn. 1878-79, p. 463.

Syn. — Am. merid. : Venezuela.

(1) In *Enum.* Kindberg. nom. nud. :

B. Mac Ivoriana C. M.
pygmaea C. M.

| *B. tecta* C. M.

Glaziovii (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 598.

Glyphocarpus Glaziovii Hpe. Symb. 1872, p. 48.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Krausei (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 598.

Bartramia Krausei C. M. in Linn. 1874, p. 595.

Glyphocarpus Krausei Jaeg. Ad. I, p. 523.

2. — *Am. merid.* : Valdiv.

Lindigii (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 698.

Bartramia Lindigii Mitt. M. austr. am. p. 255.

Glyphocarpus Lindigii Hpe. in Linn. 1861-62, p. 522.

Syn. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

mexicana W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 58.

Glyphocarpus mexicanus Jaeg. Ad. I, p. 522.

Syn. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

patula (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 698.

Bartramia patula Mitt. op. cit. p. 255.

Glyphocarpus patulus Jaeg. Ad. I, p. 522.

Syn. Terr. — *Am. sept.* : Guatemala.

pusilla (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 698.

Bartramia pusilla C. M. Syn. I, p. 480 et II, p. 616.

Glyphocarpus pusillus H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 545 et Fl. Tasman. II, t. 174, f. 2.

1. — *Pac.* : Tasman.

Roylei Bryol. eur. IV (mon. p. 2).

Bartramia Roylei C. M. Syn. I, p. 478.

Glyphocarpa Roylei Hook. f. in Hook. Ic. pl. rar. II, t. 194 et in Lond. Journ. of bot. 1841, II, p. 8.

Syn. — *As.* : Himalaya, M. Neilgherr.

subexigua (C. M.) Par.

Bartramia subexigua C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 79 et in Forschungsreise..... p. 21.

Philonotis appressa Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

Wilsoni Bryol. eur. IV, t. 327 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 516.

Bartramia cernua Lindb. in Oefv.... 1863, n. 7, p. 7.

B. Wilsoni C. M. Syn. I, p. 479.

Glyphocarpus? cernuus Wils. in Lond. Journ. of bot. 1841, p. 8 (nom.).

Glyphocarpus Wilsoni Jaeg. Ad. I, p. 521.

Syn. Ad terr. humos. — *Eur.* : Hibern., Scot., Cambrovall. *As.* :

Yunnan. *Afr.* : Ins. Fernando Po. *Am. sept.* : New Jersey ? (1)

BARTRAMIOPSIS Kindb. in Rev. bryol. 1894, p. 35.

Spec. omn. ATRICHA ejud. nom.

BECCARIA C. M. in Nuov. giorn. bot. ital. 1872. p. 11 (2 sp.)

elator C. M. l. c.

1. vel ps. 2. Terr. — *Afr.* : Abyss.

(1) Catal. Rau et Hervey ; cf. Lesq. et Jam. Man. p. 207.

minor *C. M. l. c.*

1. vel ps. 2. Rup. madid. — *Afr.*: Abyss.

BERGIA *Fürnr. in Bot. Zeit.* 1829, *Ergaenz. bl.* p. 26.

(Absque nom. spec.). *Entostodon Bergianus*.

BESCHERELLIA Duby in Bull. Soc. bot. Fr. 1873, p. 37, c. ic. (2 sp.).

brevifolia *Hpe. in Linn.* 1876, p. 317.

2. — *Pac.*: Austral. subtropic. or.

elegantissima *Duby l. c. c. ic.*

1. Cortic. — *Pac.*: Nov. Caledon.

BLINDIA Bryol. eur. II (24 sp.).

acuta (*Dicks.*) *Bryol. eur. II*, t. 114; *C. M. Syn. I*, p. 342 et *II*, p. 584;
W. P. Sch. Syn. II ed. p. 131.

Br. acutum *Dicks. Hb. sicc. f.* 17, p. 20.

Br. filiforme *Vill. Pl. Dauph. III*, p. 815.

Br. pilosum sphagni subulati facie *Dill. Hist. M.* p. 374, t. 47, f. 31.

Br. splachnoides *Dicks. Fasc. II Pl. crypt.*, p. 5.

Br. verticillatum *Lightf. Fl. Scot. II*, p. 733.

Br. verticillatum β *Huds. Fl. Angl.* p. 411.

Dicranum Seligeri *Brid. Bryol. univ. I*, p. 429 ?

D. splachnoides *ej. M. Rec. II, I*, p. 181.

Grimmia acuta *Sm. Fl. brit. III*, p. 192.

Gr. rupicola *W. et M. Reis. in Schwed.* p. 100, t. 2, f. 3.

Gr. schisti *Engl. Bot. t.* 1958.

Seligeria acuta *de Not. Epil.* p. 653.

Weisia acuta *Hedw. M. frond. III*, p. 85, t. 35; *Brid. Bryol. univ. I*,
p. 362.

Weisia acuta β *rupestris* *Brid. op. cit.* p. 363.

Weisia acuta γ *rupicola* *ej. l. c.*

W. fastigiata *Bryol. germ. II, II*, p. 120, t. 35, f. 31.

W. rupestris *Brid. Sp. M.* p. 72, t. 14.

2. Ad rup. granitic. vel schistos., nunquam calcar. — *Eur.*: E subalp.
usq. in supraalp. per tot. zon. interm. et septentr.; Island., Spitz-
berg. *As.*: *Caucas. Am. sept.*: *Groenland, M. Rupestr.*, *Columb.*
brit., ins. *Vancouver, Oregon, Terr. Nov., M. Alb., Catskill,*
New York, etc. Am. merid.: ins. *Eremit. (?)*

Exs.: *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 72 (*Weisia*).

Mac. Canad. M. n. 61.

Rab. Bryoth. eur. n. 31, 606.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 113.

* *var. arenacea* *Hpe. mss.*; *Jaeg. Ad. I*, p. 179.

Ut typ. — *Eur.*: *Hercyn., Alp. Algov.*

var. curviseta *Mitt.* — *Bl. curviseta.*

* *var. flexipes* *Ren. et Card. in Rev. bryol.* 1892, p. 79.

Ut typ. — *Am. sept.*: *Oregon.*

* *var. irrorata* *Pfeff. Bryogeogr. Stud.* p. 29; *Jaeg. Ad. I*, p. 179.

Ut typ. — *Eur.*: *Engadin.*

acuta *H. f. et W.* — *Bl. curviseta.*

antarctica *C. M.* — *Dicranoweisia.*

arcuata *Mitt. M. austr. am. p.* 55.

Ad. rup. madid. — *Am. merid.*: *Faegia, ins. Eremit.*

aschistodontoides C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* p. 1883, p. 78 et in *Forchungsreise....* p. 18.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

« *var. nigrescens* C. M. in *Forchungsreise....* l. c.

Cynodontium Hookeri Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876 ?

— Afr. : Ins. Kerguelen.

auriculata C. M. in *Fl.* 1885, p. 405.

1. Rupic. — Am. merid. : M. Fuegiæ.

austro-crispula C. M. — *Dicranoweisia*.

brevipes C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 24.

1. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georg.

caespiticia Lindb. — *Stylostegium*.

churuccana Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LVIII et in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot.* p. 266.

1. — Am. merid. : Terr. Magell.

cirrata C. M. — *Dicranoweisia*.

contecta C. M. — *Dicranoweisia*.

crispula C. M. — *Dicranoweisia*.

var. atrata C. M. — *Dicranoweisia var. atrata*.

curviseta Mitt. *M. austr. am.* p. 56.

Bl. acuta H. f. et W. *Fl. Antarct.* p. 8.

Bl. acuta *var. curviseta* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 68.

2. Ad rup. madid. — Afr. : Ins. Kerguelen. Am. merid. : And. Quintens., Fuegia, ins. Eremit., Maclov. Pac. : Tasman.

dicranellacea C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 26.

Ster. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georg.

dryptodontoides C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forchungsreise....* Bot. p. 18.

2. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.

grimmiacea C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 23.

1. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georg.

humilis C. M. in *Fl.* 1885, p. 404.

1. Rupic. — Am. merid. : M. Fuegiæ.

leptotrichacea C. M. in *op. cit.* p. 405.

2. Paludic. — Am. merid. : M. Fuegiæ.

« *var. strictiuscula* C. M. in *op. et l. cc.*

Ut et ubi typus.

lygopodina C. M. in *op. cit.* p. 406.

2. Ad rup. marit. — Am. merid. : Fuegia.

magellanica W. P. Sch. mss. ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 328.

— Am. merid. : Ins. Eremit.

microcarpa Mitt. — *Dicranoweisia kerguelensis*.

pulvinata C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forchungsreise....* p. 19.

Cynodontium conicum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876 ?

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

robusta Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 627.

— Pac. : Alp. Austral. felic.

Savatieriana C. M. in *Miss. sc. Cap Horn*, V, Bot. p. 267.

1. — *Am. merid.* : Terr. Magell.

seligerioides Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 64.

2. Ad rup. trachyt. — *As.* : *Caucas. centr.*

Sonsoniae C. M. in *Linn.* 1874, p. 593.

Ster. — *Am. meri.* : And. Nov. Granat.

sordida (Wils.) C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 349.

Campylopus sordidus Jaeg. *Ad. I*, p. 138.

Dicranum sordidum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 297 ; *Mitt. M. Ind.* or. p. 18.

— *As.* : *Nepal. or.*

stricta (Hook. f. et Wils.) C. M. *Syn.* I, p. 343, II, p. 585 et in *Forschungsreise...* Bot. p. 17 (*descriptio locupletissima*).

Leptotrichum strictum H. f. et W. *Fl. Tasm.* II, p. 177.

Weisia stricta H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 540 et *Fl. Antarct.* II, p. 404, t. 152, f. 4.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

Stylostegium C. M. — *Stylostegium caespitium*.

subinclinata C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 25.

1. Rupic. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

Taylori Hpe. — — *Syrhodon*.

tenuifolia (Hook. f. et Wils.) *Mitt. M. austr. am.* p. 59.

Dicranum tenuifolium H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 542 et *Fl. Antarct.* II, p. 407, t. 152, f. 7 ; C. M. *Syn.* I, p. 365 et II, p. 592.

— *Am. merid.* : *Fuegia*, ins. *Eremit.*

tortelloides C. M. — *Dicranoweisia*.

tortellifolia C. M. — *Dicranoweisia*.

trichodes Lindb. *mss.* ; *Philib. in Rev. bryol.* 1884, p. 90.

Dicranum rupestre W. et M. *Bot. Taschb.* pp. 185 et 469 ? (*fid. Lindb.*)

D. Seligeri Brid. *Bryol. univ.* I, p. 429 (*id.*).

2. Ad rup. secus torrent. — *Eur.* : *Anglia*, *Riesengeb.*, *M. Corsicae*, *Caucas* (1).

Blindiadelphus Lindb. *M. Scand.* p. 25 (sect. *SELIGERIAK*).

BRACHELYMA W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 557 (1 sp.)

subulatum W. P. Sch. *op. cit.* ; *Card. Mon.* p. 132.

Cryphaea inundata Nees in *Pflanz. Maxim. v. Wied.*, p. 27.

Dichelyma subulatum Myr. in *Act. reg. Acad. sc. Holm.* 1832, t. 7 B, f. 10-11 ; *Bryol. eur.* V (mon. p. 9) t. 431.

Fontinalis subulata P. B. *Prodr.* p. 158 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 661.

Neckera subulata C. M. *Syn.* II, p. 145.

2. Ad rup. et radic. arb. submers. — *Am. sept.* : *Illinois*, *Arkansas*, *Georg.*, *Ludovic.*

Exs. : *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 153 (*Fontinalis*).

(1) In *Enum. Kindberg.* nomina nuda :

Bl. madeirensis Geh.

Bl. pallidifolia C. M.

BRACHYDONTIUM Fürnr. in *Fl.* 1827, II, Beil. pp. 37 et 12.
trichodes Fürnr. — *Brachyodus*.

BRACHYMENIUM Hook. M. exot. III (110 sp.).

abyssinicum Br. et Sch. in W. Sch. M. Abys. II., n. 434.

Bryum abyssinicum C. M. Syn. I, p. 265.

Syn. — Afr. : M. Abyss.

acuminatum Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 19, f. 3 et in Lond. Journ. of bot. 1840, II, p. 10.

Br. cuspidatum Griff. Not. p. 442 et Ic. pl. asiat. t. 102, f. I.

Br. Harveyanum C. M. Syn. I, p. 313; Mitt. M. Ind. or. p. 68.

— As. : Penang, Khasia, M. Neilgherr.

angolense (Welw. et Duby) Par.

Bryum angolense W. et Dy. in Mem.... Genève 1870, p. 5, t. I, f. 4.

Arb. — Afr. : Angola.

angustatum W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 51.

— Am. sept. : Mexic.

atro-purpureum W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1661.

— Am. merid. : And. Boliv.

Barbae-Montis C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 165.

— Am. sept. : Costa-Rica.

Bordazii Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. Belg. 1890, I, p. 178.

Ster. Muric. — Am. sept. : Martinic.

Boigenianum Hpe. in Linn. 1874, p. 211.

2. — Afr. : Ins. Franciæ, Madagascar.

brachypelma C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 162.

2. — Am. sept. : Costa-Rica.

brevicaule (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 582.

Bryum brevicaule Hpe. in C. M. Syn. I, p. 323.

Br. nepalense Dz. et Mk. M. Arch. ind. p. 12 ?

1. — As. : Java.

bryoides Hook. — *Br. Weisia*.

capillare W. P. Sch. mss. et in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 50.

Br. capillifolium C. M. Syn. II, p. 578.

2. — Am. sept. : Mexic.

« *var. longicollis* Besch. op. et l. cc.

Ut et ubi typ.

capitulatum (Mitt.) Par.

Bryum capitulatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 306.

1. — Afr. : Usagara, Kilima N'Djaro, Madagascar,
 M. Cameroon.

cellulare (Hook.) Jaeg. Ad. I, p. 573.

Bryum cellulare Hook. in Schwaebr. Suppl. III, I, t. 214; C. M. Syn. I,
 p. 291; Mitt. M. Ind. or. p. 72.

Br. megalodictyon Sull. et Lesq. ?

2. — As. : Nepal.

cernuum *W. P. Sch. in Savatier M. Japon. n. 385.*

Br. japonense *Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 340.*

— *As. : Japon.*

ciliare Mont. — Br. leptostomoides.

clavariæforme (C. M.) *Jaeg. Ad. I, p. 581.*

Bryum clavariæforme C. M. in *Bot. Zeit. 1853, p. 24.*

2. — *As. : M. Neilgherr.*

clavulum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 165.*

1. — *As. : Japon.*

coarctatum (C. M.) *Bryol. jav. I, p. 140, t. 115.*

Bryum coarctatum C. M. *Syn. I, p. 312.*

2. Calcic. — *As. : Java. Pac. : Ins. Samoa, Tonga, Nov-Zeland., Nov. Caled.*

commutatum (C. M.) *Jaeg. Ad. I, p. 575.*

Bryum commutatum C. M. in *Bot. Zeit. 1858, p. 156.*

Br. dicranoides *W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. A, 10 (fil. C. M.).*

2. — *Afr. : Abyss.*

consimile (Mitt.) *Jaeg. Ad. I, p. 582.*

Bryum consimile Mitt. *M. austr. am. p. 281.*

2. — *Am. merid. : And. Quitens.*

crinitum Jaeg. — Br. systylium.

cristatum (C. M.) *Jaeg. Ad. I, p. 583.*

Bryum cristatum C. M. *Syn. II, p. 580.*

2. — *As. : Bombay.*

cuspidatum Griff. — Br. acuminatum.

dicranoides (Hsch.) *Jaeg. Ad. I, p. 575.*

Bryum dicranoides Hsch. in *Linn. 1841, p. 134 ; C. M. Syn. I, p. 309.*

2. Muric. et rupic. — *Afr. : C. B. Sp.*

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 219.

didymodontium (Mitt.) *Jaeg. Ad. I, p. 574.*

Bryum didymodontium Mitt. *M. austr. am. p. 289.*

2. — *Am. sept. : Mexic.*

ellipticum (Mitt.) *Jaeg. Ad. I, p. 575.*

Bryum ellipticum Mitt. *op. et l. cc.*

2. — *Am. merid. : Chil.*

eriophorum *Rehm. M. Afr. austr. n. 545.*

Ster. — *Afr. : Transvaal.*

erubescens (C. M.) *Par.*

Bryum erubescens C. M. in *Linn. 1880-82, p. 379.*

Fl. et fr. ign. — *Am. merid. : Argentin. tropic.*

eurychaelium *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 90.*

1 ? Terr. — *Afr. : Ins. Bourbon.*

exile (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. I, p. 139.*

Bryum exile Dz. et Mk. in *Ann. Sc. nat. 1810, p. 300 et M. frond. ined.*

Arch. ind. p. 13, t. 5 ; C. M. Syn. I, p. 311.

2. — *As. : Java. Sumatra.*

extenuatum (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 578.

Bryum extenuatum Mitt. M. Ind. or. p. 68.

Syn. — As. : Carnatic.

fabronioides (C. M.) Par.

Bryum fabronioides C. M. in Linn. 1878-79, p. 289.

2. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

filiforme } Griff. — Bryum cymbifolium.
 } Wils. p.p. — Bryum auratum.

flaccidisetum (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 576.

Bryum flaccidisetum C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 23.

2. — As. : M. Neilgherr.

flexifolium Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 452.

Bryum flexifolium C. M. Syn. I, p. 266.

2. — Afr. : Abyss., M. Cameroon.

fragile (C. M.) Jaeg. II, p. 703.

Bryum fragile C. M. in Linn. 1865, p. 378.

Ster. Filicic. — Afr. : Niam-Niam.

fusiferum (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 576.

Bryum fusiferum Mitt. M. austr. am. p. 290.

2. Terr. — Am. merid. : And. Quitens.

Gilliesii (Hook.) Jaeg. Ad. I, p. 574.

Br. orthodontioides ej. l. c.

Bryum Gilliesii Hook. Misc. I, 1830, p. 3, t. 2 ; C. M. Syn. I, p. 292 ;
 Mitt. op. cit. p. 288.

Br. orthodontioides C. M. op. cit. p. 293 (fid. Mitt.)

Pohlia Gilliesii Mont. in d'Orbigny Voy. Am. merid. VII, II, p. 93 et
 VII, p. 18.

Orthodontium julaceum Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 123, t. 188.

2. Limic. — Am. merid. : Amazon ; And. Chilens., Argentin. Cordob.

glaucum (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 582.

Bryum glaucum C. M. in Linn. 1869-70, p. 36.

1. — As. : Ceylan.

globirameum (C. M.) Par.

Bryum globirameum C. M. in op. cit. 1878-79, p. 478.

2. — Am. merid. : Venezuela.

globosum (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 574.

Bryum globosum Mitt. M. austr. am. p. 289.

2. — Am. merid. : And. Quitens.

Heribaudi Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1891, II, p. 187.

2 ? — Afr. : Ins. Borbon.

heteroneuron (Spr.) Jaeg. Ad. I, p. 581.

Bryum heteroneuron Spr. in Mitt. op. cit. p. 281.

2. Arbor. — Am. merid. : And. Quitens.

Hornschuchianum Mart. Ic. crypt. Brasil. XXXVI, t. 20, f. 4 et in Fl.
 Brasil. I, p. 36.

Bryum Hornschuchianum C. M. Syn. 1, p. 322 ; Mitt. op. cit. p. 281.

2. Terr. in silv. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

huillense (*Wehlc. et Duby*) *Jaeg. Ad. I*, p. 572.

Bryum huillense *W. et Dy. in Mem... Genève* 1870, p. 6, t. I, f. 5.

2. Arbor. — *Afr.* : Angola.

imbricatum *W. P. Sch. mss. et hb.*

Bryum imbricatifolium *C. M. Syn. II*, p. 578 ; *Mitt. op. cit.* p. 282.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

indicum (*Dz. et Mk.*) *Bryol. jav. I*, p. 141.

Bryum indicum *Dz. et Mk. M. frond. ined. Arch. ind.* p. 22, t. II ;
C. M. Syn. I, p. 313.

Syn. Calcic. — *As.* : Amboine, Java.

« *var. corrugatum* *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 213.

Saxic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

Jamesoni *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 282.

Bryum Jamesoni *C. M. Syn. II*, p. 580 ; *Mitt. op. cit.* p. 283.

Peromnium Jamesoni *Jaeg. Ad. I*, p. 584.

2. Arbor. — *Am. sept.* : Jamaïc. *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

japonense *Besch.* — *Br. cernuum.*

julaceum *Hsch. in Linn.* 1841, p. 133.

Bryum koratranum *C. M. Syn. I*, p. 324.

2. Arbor. — *Afr.* : C. B. Sp., Transvaal.

Exs. : *Rehm. M. Afr. austr. n.* 218 et 546

Klotzschyi (*C. M.*) *Par.*

Br. Sellowianum *Jaeg. Ad. I*, p. 578.

Bryum Klotzschyi *Mitt. op. cit.* p. 283.

Bryum Sellowianum *C. M. Syn. I*, p. 319.

Didymodon Klotzschyi *Schwaegr. Suppl. IV*, t. 340.

2. — *Am. merid.* : Brasil.

Krausei *Hpe. et Ltz. in Bot Zeit.* 1869.

Peromnium Krausei *Jaeg. Ad. I*, p. 585.

2. *Silvic.* — *Am. merid.* : Æquator.

lanceolatum *Hook. f. et Wils. Fl. Tasm. II*, p. 188, t. 173, f. 8.

1. — *Pac.* : Tasman.

leptostomoides *W. P. Sch. hb.*

Bryum ciliare *Mont. Syll.* p. 34.

Bryum leptostomoides *C. M. Syn. I*, p. 321 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 74.

2. — *As.* : M. Neilgherr., Madras.

leucostomum *Bryol. jav. I*, p. 142, t. 116.

2. *Saxic.* — *As.* : Java.

leucotrichum *C. M. in Linn.* 1875, p. 377.

Ster. — *Afr.* : Niam-Niam.

longifolium *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1662.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

longipedicellatum (*C. M.*) *Par.*

Bryum longipedicellatum *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 477.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

luteolum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 579.

Bryum luteolum *C. M. in Linn.* 1871, p. 625.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

macropoma (C. M.) Par.

Bryum macropoma C. M. in Linn. 1878-79, p. 290.

2. Cortic. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

madagassum Hpe. in Linn. 1864, p. 212.

2. — Afr. : Madagascar.

magellanicum (Sull.) Par.

Bryum magellanicum C. M. Syn. II, p. 579.

Peromnium magellanicum Sull. in Lond. Journ. of bot. 1850, p. 316.

Syn. — Am. merid. : Fuegia.

malachiticum (C. M.) Par.

Byrum malachiticum C. M. in Linn. 1880-83, p. 378.

2. Ad arbor. — Am. merid. : Argentin. Tucum. subtropic.

megalacrion (Schwaegr.) Jaeg. Ad. I, p. 578.

Bryum megalacrion Schwaegr. Suppl. II, p. 104; C. M. Syn. I, p. 312.

2. — Afr. : Ins. Franciæ.

melanothecium (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 576.

Bryum coarctatum Mitt. Sam. M. p. 177?

Bryum melanothecium C. M. M. Polyn. p. 62.

Syn. Muric. — Pac. : Ins. Samoa, Tonga.

mexicanum Mont. in Ann. sc. nat. 1838, IX, p. 54 et Syll. p. 54.

Bryum erectum Hook. in Kunth Syn. pl. aequin.?

Bryum mexicanum C. M. Syn. I, p. 252; Mitt. M. austr. am. p. 282.

Br. Webera erecta Brid. Bryol. univ. I, p. 626.

2. — Am. sept. : Mexic.

Meyenianum (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 175.

Bryum Meyenianum C. M. Syn. I, p. 296.

Mielichhoferia chilensis Hpe. in hb. reg. Berol.

Webera chilensis ej. in Linn. 1837, p. 278.

2. — Am. merid. : Chile.

micans (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 583.

Bryum micans Mitt. M. Ind. or. p. 68.

2. — As. : Ind. or.

microstomum Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 19, f. 4 et in Lond. Journ. of bot. 1840, II, p. 10.

Bryum microstomum C. M. Syn. I, p. 325.

— As. : Nepal.

mielichhoferioides C. M. in Nuov. giorn. bot. ital. p. 16.

2? — Afr. : Abyssin.

minutulum Hpe. in Bot. Zeit. 1870, p. 51.

2? Rupic. — Am. sept. : Mexic.

Molleri (C. M.) Par.

Bryum Molleri C. M. in Fl. 1886, p. 281.

2. — Afr. : Ins. S. Thomas.

murale W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 51.

2. — Am. sept. Mexic.

nepalense Hook. in Schwaegr. Suppl. II, II, p. 131, t. 135; Brid. Bryol. univ. I, p. 602.

Bryum brevicaule Hpe? (fid. Mitt.)

- Br. contortum *Griff. Not. p. 440 et Ic. pl. asiat. II, p. 100, f. 2.*
 Br. Hookeri *Spreng. Syst. veg. IV, p. 212; C. M. Syn. I, p. 323; Bryol. jav. I, p. 138, t. 114.*
 Br. nepalense *Mitt. M. Ind. or. p. 73.*
 1. Arb. et terr. — As. : Nepal., Borneo, Java, Sumatra.
- Nietneri (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 576.*
Bryum Nietneri C. M. in Linn. 1869-70, p. 37.
 2. — As. : Ceylan.
- nigrescens *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 91.*
 1. — Afr. : Madagascar.
- orthodontioides *Jaeg. — Br. Gilliesii.*
- orthopelma (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 703.*
Bryum orthopelma C. M. in Linn. 1864, p. 550.
 1. — As. : Ins. Philippin.
- ? ovatum *H. f. et W. — Leptotheca Gaudichaudi.*
- papillosum (*C. M.*) *Par.*
Bryum papillosum C. M. Syn. I, p. 326; Mitt. M. austr. am. p. 290.
 2. Saxic. et terr. — Am. sept. : Jamaic. Am. merid. : Venezuela, And. Nov. Granat. et Peruv.
- patulum *W. P. Sch. mss. et hb.*
Bryum patulum C. M. Syn. II, p. 579.
 1. Arbor. — Am. sept. : Mexic.
- pendulum *Mont. in Ann. sc. nat. XVI, p. 254 et Syll. p. 34.*
Bryum Montagneanum C. M. Syn. I, p. 225; Mitt. M. Ind. or. p. 69.
 2. Terr. in silv. — As. : M. Neilgherr.
- peraristatum (*C. M.*) *Par.*
Bryum peraristatum C. M. in Linn. 1878-79, p. 478.
 2. — Am. merid. : Venezuela.
- piriforme *W. P. Sch. in Jaeg. Ad. I, p. 577.*
 — Afr. : C. B. Sp.
- Pittieri *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 163.*
 1. — Am. sept. : And. Costa-Ricens.
- Preissianum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 575.*
Bryum Preissianum Hpe. Ic. M. t. 25; C. M. Syn. I, p. 310.
 2 ? Rupic. — Pac. : Austral.
- pulchellum *Hsch. Fl. Brasil. fasc. I, p. 36.*
Bryum Martianum C. M. Syn. I, p. 320; Mitt. M. austr. am. p. 283.
 2 ? Arbor. — Am. merid. : Brasil.
- pulchrum *Hook. Bot. Misc. 1830, I, p. 136, t. 38.*
Bryum pulchrum C. M. Syn. I, p. 324.
 2. Arbor? — Afr. : C. B. Sp., Natal, Transvaal.
Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 544, b. et c.
- radiculosum (*Schwaegr.*) *Par.*
Bryum Peromnium C. M. Syn. I, p. 321.
Br. radiculosum Mitt. op. cit. p. 283.
Peromnium radiculosum Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 250.
 2. Arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Regnellii Hpe. in *Linn.* 1849, p. 582.

Bryum Regnellii C. M. *Syn.* II, p. 581.

Streblopilum Regnellii Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 18.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

rostratum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 577.

Bryum rostratum C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 156.

Syn. Muric. — *As.* : Malabar.

rosulatum Besch. — *Rhodobryum*.

rugosum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 580.

Bryum rugosum C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 23 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 69.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

Salaminae (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 577.

Bryum Salaminae C. M. in *Linn.* 1874, p. 580.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Sellowianum Jaeg. — *Br. Klotzschyi*.

semperlaxum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 576.

Bryum semperlaxum C. M. in *Linn.* 1874, p. 582.

Syn. — *Pac.* : Austral. or.

smaragdinum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 577.

Bryum smaragdinum C. M. *Syn.* II, p. 576; *Mitt. M. austr. am.* p. 290 p.p.

2. — *Am. merid.* : And. Venezuel.

sordidissimum (C. M.) Par.

Bryum sordidissimum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 474.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

spathidophyllum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 90.

1. — *Afr.* : Ins. Borbon.

spathulifolium Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 164

2. Ad terr. in silv. — *Am. sept.* : Costa-Rica.

speirocladum C. M. in Besch. *op. cit.* p. 91.

2. — *Afr.* : Comor. magn.

spirale Besch. in *Journ. de bot.* 1891.

2. — *Am. merid.* : Paraguay.

spirifolium (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 581.

Bryum spirifolium C. M. in *Linn.* 1864, p. 623.

2. Ad arb. rad. — *Am. sept.* : Mexic.

splachnoides Harv. in Hook. *Ic. pl. rar. t.* 19, f. 2 et in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 10.

Bryum splachnoides C. M. *Syn.* I, p. 291.

— *As.* : Nepal., Yunnan.

stenopyxis C. M. in Rehm. *M. Afr. austr.* n. 220.

— *Afr.* : C. B. Sp.

stereoneuron C. M. in *Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 17.

2. — *Afr.* : Abyssin.

subcapillifolium (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 579.

Bryum subcapillifolium C. M. in *Linn.* 1874, p. 624.

2. Arbor. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

suberectum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 155.

1. — *Afr.* : Ins. Fernando Po.

subglobosum *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antil. fr.* p. 30.

Acidodontium subglobosum Jaeg. Ad. II, p. 703.

2. In terr. lapidos. — *Am. sept.* : Guadalup.

subrotundum *Tayl.* — *Bryum Taylori*.

subsmaragdinum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 577.

Bryum smaragdinum Mitt. in Spr. M. And. n. 355 et *M. austr. am.* p. 290
(*quoad pl. Quitensem*).

Br. subsmaragdinum C. M. in Linn. 1874, p. 581.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

subuliferum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 155.

1. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

systylium (*C. M.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 50.

Acidodontium Kunthii Hsch. in Deppe et Schiede M. Mexic.

Bryum crinitum Jaeg. Ad. I, p. 581.

Br. crinitum Mitt. in Lond. Journ. of bot. III, p. 56; *C. M. Syn. II*, p. 580.

Br. systylium C. M. Syn. I, p. 320; *Mitt. M. austr. am.* p. 280.

2. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Quitens.

tenellum *W. P. Sch. mss. et hb.*

Bryum tenellum C. M. Syn. II, p. 572.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

torquescens *W. P. Sch. in Q. Dillon et Petit Pl. Abyss.*

— *Afr.* Abyssin.

trachyticola (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 582.

Bryum trachyticola C. M. in Linn. 1874, p. 583.

2. Rupic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

velutinum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 583.

Bryum velutinum C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 33; *Mitt. M. Ind. or.* p. 73.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

Weisia Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 19, f. 1, et in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 10.

Bryum bryoides Hook. in Schwaegr. Suppl. III, II, p. 134, t. 135; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 603.

Br. exile Dz. et Mk. (fid. Mitt. M. Ind. or. p. 68).

Br. nepalense Spreng. Syst. veg. IV, p. 211; *C. M. Syn. I*, p. 311.

Br. Weisia C. M. Syn. I, p. 325; *Mitt. op. et l. cc.*

1. Terr. — *As.* : Nepal., Himalaya, Khasia, M. Neilgherr.

Welwitschii (Duby) Par.

Bryum Welwitschii Duby in Mém.... Genève 1870, t. 2, f. 3.

2. In spongios. — *Afr.* : Angola.

Wilsoni (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 574.

Bryum Wilsoni Mitt. in Lond. Journ. of bot. 1851, p. 55 et *M. austr. am.* p. 288; *C. M. Syn. II*, p. 582.

Webera Wilsoni Jaeg. op. cit. p. 588.

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Quitens. (1)

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

Br. clavigerum Mitt.
leptophyllum Br. et Sch.
Lefebvrei Besch.

Br. radiale C. M.
scabridens Mitt.
weisioides W. P. Sch.

BRACHYMITRIUM *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 44.

Jamesoni Tayl. — Tayloria.

BRACHYODON *Fürnr. in Regensb. Bot. Zeit.* 1827, II, Beil. I, p. 37 et II, p. 112.

trichodes Fürnr. — Brachyodus.

BRACHYODUS *Bryol. germ.* II, II, p. 5 (2 sp.)

flexisetus Hpe. in *Linn.* 1863, p. 132.

2. Ad saxa ripar. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

trichodes (*Web. et Mohr.*) *Bryol. germ.* II, II, p. 5; *Bryol. eur.* II, t. 115; *C. M. Syn.* I, p. 416; *W. P. Sch. Syn.* II, p. 132.

Anoectangium trichodes *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 33, t. 10.

Brachydontium trichodes *Fürnr. l. c.*

Brachyodus trichodes *ej. l. c.*

Grimmia trichodes *Engl. Bot. t.* 2563.

Gymnostomum Davallianum *Sm. in Schrad. Neu Journ.* I, p. 191 (1).

G. trichodes *W. et M. Bot. Taschb.* p. 85; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 58.

Weisia trichodes *H. et T. Musc. brit.* p. 45, t. 15.

1. Ad rup. aren., granit. et vulcan. humid., numquam calc. — *Eur.* : Reg. mont. zon. sept. et occid. ; copiose in Voges. et Silv. Nigr. ; Siles., Saxon., Etruria. As. : Caucas. *Am. sept.* : *Rariss.* : Maine (M. Washington).

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 454, 1003.

BRACHYPODIUM *Brid. Bryol. univ.* I, p. 147.

crispatum Brid. — *Ptychomitrium*.

parasiticum Brid. — *Calymperes*.

BRACHYSTELEUM *Rchb. Consp.* 34 ; *Endl. Gen.* n. 507.

australe Hpe. — *Ptychomitrium*.

brevifolium C. M. — *Ptychomitrium*.

crispatum { *Hsch.* — *Ptychomitrium*.
C. M. p.p. — *Ptychomitrium*.
C. M. p.p. — *Ptychomitrium nigricans*.

β *brachycarpum* Hsch. — *Ptychomitrium cucullatifolium*.

cucullatifolium C. M. — *Ptychomitrium*.

cylindraceum C. M. — *Ptychomitrium*.

Drummondii C. M. — *Glyphomitrium*.

emersum C. M. — *Ptychomitrium*.

glyphomitrioides C. M. — *Ptychomitrium pusillum*.

Hampeanum C. M. — *Ptychomitrium incurvum*.

Howeanum Hpe. — *Ptychomitrium*.

incurvum C. M. — *Ptychomitrium*.

indicum C. M. — *Ptychomitrium*.

isoskelos Duby. — *Ptychomitrium*.

lepidomitrium C. M. — *Ptychomitrium*.

ligulatum C. M. — *Ptychomitrium*.

Lindigii Hpe. — *Ptychomitrium*.

lineare C. M. — *Ptychomitrium*.

polyphyllum C. M. p.p. — { *Ptychomitrium*.
Ptychomitrium nigricans.

(1) Ad *Pottiam minutulam* fid. Lindb. referendum.

Reichenbachianum Itz. — *Ptychomitrium*.
Sellowianum C. M. — *Ptychomitrium*.
serratum C. M. — *Ptychomitrium*.
uruguense C. M. — *Ptychomitrium*.
vernicosum C. M. — *Ptychomitrium*.

BRACHYTHECIUM Bryol. eur. V (173 sp.)

acuminatum (Hedw.) Kindb. in Mac. Cat. p. 191.

Homalothecium acuminatum Jaeg. Ad. II. p. 375.

Hypnum acuminatum P. B. Prodr. p. 60; C. M. Syn. II, p. 334; Sull. Ic. M. p. 187, t. 116; Lesq. et Jam. Man. p. 336.

H. bryiforme Brid. M. Rec. II, II, p. 100.

H. erectum Drumm. M. bor. am. I ed., n. 224.

H. julaceum, erectum, *Bryi argentei* habitu Dill. Hist. M. p. 322, t. 41 A. B. D.

H. pulchrum Drumm. l. c. n. 180 p.p.

Isothecium bryiforme Brid. Bryol. univ. II, p. 365.

Leskea acuminata Hedw. Sp. M. p. 227, t. 56, f. 1-7; Brid. op. cit. p. 296.

L. Beyrichii Hpe. in Linn. 1839, p. 47 et Ic. M. t. 7.

L. imbricatula Hedw. Sp. M. p. 224, t. 2 (fid. Card.)

2. Ad rad. arb. et terr. — Am. sept. : Nov. Scotia, New Brunswick, Ontario, Assiniboine, reg. sept., or. et centr.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 282 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 330 (*Hypnum*).

« *var. rupincolum* (Hedw.) Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p. 17.

Hypnum acuminatum var. rupincolum Sull. et Lesq. l. c. n. 330 b; Lesq. et Jam. l. c.

H. rupincolum P. B. Prodr. p. 69.

Leskea rupicola Hedw. op. cit. p. 54; Brid. Bryol. univ. II, p. 302.

Rupic et terr. — Am. sept. : Cum typ.

« *var. setosum* (Hedw.) Ren. et Card. l. c.

Hypnum acuminatum var. setosum Sull. et Lesq. l. c. n. 330 c; Lesq. et Jam. l. c.

H. setosum P. B. op. et l. cc.

Leskea setosa Hedw. op. cit. p. 236, t. 57; Brid. op. et l. cc.

Lignic. — Am. sept. : Cum typ.

« *var. subalbicans* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 60.

Ad arbor. — Am. sept. : Florid., Ludovic.

acutum (Mitt.) Sull. Ic. M. Suppl. p. 99, t. 75.

Hypnum acutum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 32, t. 6; Lesq. et Jam. Man. p. 337.

H. Mildeanum W. P. Sch. (fid. Lindb. M. Scand. p. 35 et n. 99) (1).

2 (Mitt.); 1, rar. 2 (Lindb.).

— Eur. : Lappon., Suec.,

Fenn., Dan. Am. sept. : Fret. Hudson, Gaspes., Ontar., Columb. brit. ; Massachussets, Indiana, Illinois, Wisconsin.

afro-salebrosum C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 385.

— Afr. : Austral.

afro-velutinum C. M. l. c. n. 379.

— Afr. : Austral.

albicans (Neck.) Bryol. eur. VI (mon. p. 19), t. 553; W. P. Sch. Syn. II ed., n. 644.

Hypnum albicans Neck. Meth. M. p. 180; Brid. Bryol. univ. II, p. 492; C. M. Syn. II, p. 360.

(1) Cf. *Br. salebrosum var. palustre*.

- H. albicans* β *flavescens* *Brid. op. cit.* p. 494.
H. flavescens *Roth Fl. germ.* III, p. 303.
H. rivulare *Brid. M. Rec.* II, II, p. 177.
H. salebrosum *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 175 p.p.
H. sericeum, gracile, albicans, capsulis subrotundis *Dill. Hist. M.* p. 328, t. 42, f. 63.
Maschalocarpus *Weissmannianus* *Spreng. (fid. Brid.)* ?
Neckera albicans *Willd. Prodr. Fl. Berol.* n. 940.
Pterigynandrum cirrosum *Brid. Bryol. univ.* II, p. 184.
2. In graminos., ad later. viar. silvat. et tecta stramin. — *Eur.* :
 Septentr. et intermed., soepe ster.; in Britann. uberrime fructif.
As. : *Caucas. occ. Am. sept.* : *Groenland.*, *Terr. Nov.*, *Anticosti*,
New Brunswick, *Ontario*, *M. Rupestr.* et *Selkirk*, *Columb. brit.*,
 fret. *Behring.* ins. *Vancouver*, *Washington*, *Oregon*, *Montana*,
Wyoming, *Idaho*.
Exs. : *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 173 (*Hypnum*).
Mac. Canad. M. n. 285 p.p.
Rab. Bryoth. eur. n. 699.
- « *var. occidentale* *Ren. et Card. in Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.
 — *Am. sept.* : *Washington*, *Montana*.
- albulum* *Besch. mss.* ; *Jaeg. Ad. II*, p. 389.
Saxic. — *Am. sept.* : *Mexic.*
- ambiguum* *de Not. Epil.* p. 112.
Hypnum illecebrum piliferum *ej. Syll.* n. 29.
 ? *Scleropodium ambiguum* *Jaeg. Ad. II*, p. 410.
 — *Eur.* : *Sardin.*
- amœnum* *Milde in Hedwigia* 1869, p. 51.
Br. plumosum *var. homomallum* *Milde Bryol. siles.* p. 336.
 1. *Ad rupes quarz.* — *Eur.* : *Franconia*.
- Antipodium* *W. P. Sch. mss.* ; *Jaeg. Ad. II*, p. 409.
 — *Pac.* : *Nov. Zeland.*
- Arnoldianum* *Milde mss.* ; *Ltz. Moosst.* p. 120.
 — *Eur.* : *Alp. Carinth.*
- asperrimum* (*Mitt.*) *Kindb. in Mac. Cat.* p. 200.
Hypnumasperrimum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 33, t. 6.
 2. *Lignic. et terr.* — *Am. sept.* : *Columb. brit.*, *Washington*, ins.
Vancouver, *Idaho*, *Calif.*
- asperulum* (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 398.
Br. plumosum (*fid. Mitt.*)
Hypnumasperulum *Hpe. in Linn.* 1863, p. 159.
 1. *Ad rivul.* — *Am. merid.* : *And. Bogotens.*
- asprellum* *Jaeg.* — *Thelia*.
- atrotheca* (*Duby*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 153.
Hypnum atrotheca *Duby in Mém.... Genève*, 1876, p. 8, t. 3, f. 2 et in
Fl. 1877, n. 5.
Isopterygium atrotheca *Jaeg. Ad. II*, p. 499.
 1. *Rupic.* — *Afr.* : *Ins. Borbon.*, *Franciæ*, *Madagascar*.
- aureo-nitens* *Jaeg.* — *Meteorium*.
aureum *de Not.* — *Camptothecium*.
- auriculatum* (*Lindb.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 406.
Hypnum auriculatum *Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 250.
 2. — *As.* : *Saghalien.*

austro-alpinum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 403.

Hypnum austro-alpinum Hpe. in Linn. 1859, p. 640.

1. — *Pac.* : Alp. Austral. fel.

austro-glareosum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum austro-glareosum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et
in Forschungsreise.... Bot. p. 32.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

austro-salebrosum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum austro-salebrosum C. M. in op. cc. pp. 82 et 31.

H. salebrosum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

biventrosus (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 388.

Br. splendens Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. III.

Hypnum biventrosus C. M. in Bull. Torr. bot. Club V, p. 49 et in *Fl.*
LVIII, p. 90; *Lesq. et Jam. Man. p. 338.*

1. In silv. profund. — *Am. sept.* : Carolin. sup., Florid., Ludovic.

Blackburnianum *W. P. Sch. mss.*; *Jaeg. Ad. II*, p. 747.

— *Afr.* : Ins. Franciæ.

Bolanderi (*Lesq.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 390.

Hypnum Bolanderi Lesq. in Trans. of the Am. Phil. Soc. XIII, p. 12;
Lesq. et Jam. Man. p. 341.

2. Terr. — *Am. sept.* : Washington, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n. 502 (Hypnum).*

Borgenii (*Hpe.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 154.*

Sciuro-Hypnum Borgenii Hpe. in Linn. 1874, p. 220.

1. — *Afr.* : Madagascar.

brevinerve *Kindb* — *Plagiothecium brevi-pungens.*

brunneo-alare (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 387.

Hypnum brunneo-alare C. M. in Linn. 1876, p. 654.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

Buchanani (*Hook.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 407.

Hypnum Buchanani Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 320, t. 28,
f. 3; *C. M. Syn. II*, p. 362; *Mitt. M. Ind. or. p. 78.*

2. — *As.* : Nepal., Himalaya, Assam, M. Neilgherr.

Calerae (*C. M.*) *Par.*

Hypnum Calerae C. M. in Linn. 1876, p. 452.

2. Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

californicum *Jaeg.* — *Scleropodium.*

cameratum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 410.

Hypnum cameratum Mitt. op. et l. cc.

2. — *As.* : Nepal., Himalaya, Japon.

campestre (*Br.*) *Bryol. eur. VI (mon. p. 12)*, t. 545; *W. P. Sch. Syn. II*
ed. p. 634.

Hypnum campestre Br. in sched.

H. geniculatum Schleich. in sched.

H. rutabulum var. campestre C. M. Syn. II, p. 368.

1. In coll. et camp. gramin., agr. et silvat. sicc. — *Eur.*: Suec., Polon., Siles., Westphal., vall. Rhen., Bavar., Pyren. As.: Jenissei sup., Talysch, Kashmir, Caucas. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: New Brunswick, Nov. Angl., M. Alb., Idaho, Columb. brit., Colorado. *Pac.*: Tasman.
Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 1038.
- camptocladum *Besch. mss.*; *Jaeg. Ad. II*, p. 399.
 — *Am. sept.*: Mexic.
- chrysocladon (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 404.
Hypnum chrysocladon *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser.*, p. 341; *Mitt. M. austr. am.* p. 564.
 Ster. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
- ? cirrosum (*Schwaegr.*) *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 696 et *II ed.* p. 806 (1).
Hypnum cirrosum *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 214; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 495; *C. M. Syn. II*, p. 377.
H. piliferum var. *alpina* *Brid. Sp. M. II*, p. 187.
H. turgidum *Hartm. Skand. Fl. V ed.*, p. 328.
Rhynchostegium cirrosum *Mdo. M. Tirol. n.* 78.
2. fr. ignot. In fissur. rup. — *Eur.*: Summ. Alp. Scot., Tirol., Salisburg., Rhaetiae, etc. Pyren.; Spitzberg. As.: Taimyr, Caucas. centr. *Am. sept.*: Groenland.
Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 911, 1238.
 Un. itin. 1864, n. 72.
 var. *Funkii* *Jaeg.* — Br. *Funkii*.
 « var. *gracillimum* *Mdo. Moosst. a. d. Alg. Alp.* p. 93.
 — *Eur.*: Alp. Bavar., Tirol. merid.
- cladoneuron (*C. M.*) *Par.*
Camptothecium cladoneuron *Jaeg. Ad. II*, p. 382.
Hypnum cladoneuron *C. M. in Linn.* 1874, p. 652.
 2. — *Am. sept.*: Mexic.
- clinocarpum* *Jaeg.* — *Eurhynchium*.
- collinum (*Schleich.*) *Bryol. eur. VI (mon. p. 15)*, t. 548; *W. P. Sch. op. cit.* p. 647.
Hypnum collinum *Schleich. et Thom. in sched.*; *C. M. Syn. II*, p. 429.
1. Ad rup. terr. et in fissur. rup. — *Eur.*: Spitzberg, summ. Alp. Norveg., Helvet., Rhaet.; Pyren., Arvern. As.: Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Groenland, Terr. Nov., Athabasca, Assiniboine, M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Oregon, Nevada, Montana, Wyoming.
Exs.: Mac. Canad. M. n. 398. (*Hypnum*).
 Un. itin. 1863, n. 66, 67.
 « var. *saporense* *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 373.
 — As.: Japon.
Exs.: Faurie n. 124.
- coloradense (*Aust.*) *Ren. et Card. l. c.*
Hypnum coloradense *Aust. in Coult. Bot. Gaz. II*, p. 111; *Lesq. Jam. Man.* p. 412.
 Ster. — *Am. sept.*: Colorado.
- columbico-rutabulum *Kindb. in Mac. Cat.* p. 198.
 1. Lignic. — *Am. sept.*: Columb. brit.

1) Cf. Renauld in *Rev. bryol.* 1881, p. 34.

comtifolium (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 387.

Hypnum comtifolium C. M. in Linn. 1876, p. 653.

2. — Am. sept. : Mexic.

conostomum (Tayl.) Jaeg. Ad. II, p. 392.

Hypnum conostomum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 194; C. M. Syn. II, p. 364.

H. Taylori Mitt. M. austr. am. p. 560.

Syn. Terr. — Am. merid. : And. Quitens. et Boliv.

cuspidiferum (Mitt.) Jaeg. II, p. 410.

Hypnum cuspidiferum Mitt. M. Ind. or. p. 78.

2 ? — As. : Sikkim.

cylindricarpum (Mitt.) Par.

Hyocomium cylindricarpum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 178.

2 ? — As. : Alp. Bhotan.

cyrtophyllum Kindb. in Ott. Nat. IV. p. 63 et in Mac. Cat. p. 191 (subsp. *Br. acuminati*).

Ad ulmos in silv. — Am. sept. : Ontario.

declivum Jaeg. — Br. velutinum.

decurvans (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 410.

Hypnum decurvans Mitt. M. Ind. or. p. 78.

— As. : Himalaya occ., Sutledje.

densum Jur. — Amblystegium.

Dicksoni Rehm. M. Afr. austr. n. 383.

— Afr. : Natal.

digastrum C. M. et Kindb. in Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 190.

l. Rupic. — Am. sept. : New Brunswick, Ontario.

Donnellii (Aust.) Ren. et Card. l. c.

Hypnum Donnellii Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p. 162; Lesq. et Jam. Man. p. 338.

l. Lignic. — Am. sept. : Ontario, Florid.

Darieui de Not. — Orthothecium ?

duriusculum W. P. Sch. mss.

Hypnum duriusculum C. M. Syn. II, p. 426.

H. plumosum Mitt. M. austr. am. p. 565.

l. Ad rup. trachyt. — Am. sept. : Mexic.

Ehrenbergii Ltz. M. Ehrenb. p. 51, t. 13. f. 1-28.

Ster. — As. : Syria.

erythropyxis C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 382.

— Afr. : Natal.

erythrorhizon Bryol. eur. VI (mon. p. 14), t. 547; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 646 (1).

Hypnum erythrorhizon Hartm. Skand. Fl. VI ed.

l. Lignic. et saxic. — Eur. : Scandin., Fennia, Karel. As. : Jenissei med. et sup., Obi. Am. sept. : Washington.

var. Thedenii Lindb. — Br. Thedenii.

[1] Cf. Lindb. in Oefv.... 1879, p. 75, c. ic. (in lingua succica).

eupopuleum (C. M.) Par.

Hypnum eupopuleum C. M. in Linn. 1878-79, p. 500.

1. — Am. merid. : Venezuela.

euryblastum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 401.

Hypnum euryblastum C. M. in sched.

— As. : Sikkim.

eurydictyon (C. M.) Par.

Hypnum eurydictyon C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et in
Forchungreise..... Bot. p. 32.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

eustegium Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 375.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 3, 14.

Fendleri (Sull.) Jaeg. Ad. II, p. 393.

Hypnum Fendleri Sull. M. of U. St., p. 76 et Ic. M. p. 189, t. 117;
Lesq. et Jam. Man. p. 340.

H. velutinum δ microcarpum C. M. Syn. II, p. 400.

Leskea Fendleri Sull. in Mem. of the Am. Acad..... 1849, p. 169, t. I.

1. et syn. — Am. sept. : Nov. Mexic.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 334 et II ed. n. 501 (Hypnum).

Fitz-Geraldi (C. M.) Ren. et Card. l. c.

Hypnum Fitz-Geraldi C. M. in Fl. 1887, p. 224; Lesq. et Jam. Man. p. 370.

2. Ster. — Am. sept. : Florid.

flexiventrosus (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 387.

Hypnum flexiventrosus C. M. in Linn. 1876, p. 653.

Ster. — Am. sept. : Mexic.

frigidum (C. M.) Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 104.

Hypnum frigidum C. in Bot. Zeit. 1856, p. 456.

Syn. — Am. sept. : Mexic.

? Funkii (Hsch.) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 697 et II ed., p. 807.

Br. cirrosum var. Funkii Jaeg. Ad. II, p. 406.

Hypnum Funkii Hsch. in sched.; C. M. Syn. II, p. 429.

Rynchostegium Funkii de Not. Epil. p. 83.

1. (fid. C. M.) — Eur. : Salisb., Carinth., Tirol., Alp.

Delphinat., Ital. sup.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1042, 1192.

Geheebii Milde in Hedwig. 1869, p. 161; W. P. Sch. op. cit. p. 651.

2. Ad rup. basalt. umbr. — Eur. : Norveg., Siles., Bohem., Salisb.,
Rhöngeb., Baden.

Exs. : Un. itin. 1863, n. 71.

gemmaescens C. M. et Kindb. in Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 195.

1. Lignic. — Am. sept. : Columb. brit.

georgico-glareosum (C. M.) Par.

Hypnum georgico-glareosum C. M. Bryol. austr. Georg. p. 42.

Ster. Aquat. — Am. merid. : Austr. Georg.

glaciale Bryol. Eur. VI (mon. p. 11), t. 542; W. P. Sch. Syn. II ed.
p. 652.

1. Ad terr. et sax. humid. juxta niv. — Eur. : Ins. Ursor., summ.
Alp. Scotiae, Norveg., Helvet., Salisburg., Tirol.; Pyren. As. :
Tibet. occ. Am. sept. : Grönland.

- glareosum (Br.) *Bryol. eur.* VI (mon. p. 19), t. 552; *W. P. Sch. op. cit.* p. 644.
H. albicans var. *minuidunense* *Brid. Bryol. univ.* II, p. 494.
H. glareosum Br. in sched.; *C. M. Syn.* II, p. 361.
H. lutescens *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 174.
H. plumosum *Hedw. M. frond.* IV, p. 37, t. 15, p. p.
H. salebrosum *H. et Tayl. Muscol. brit.* p. 166, t. suppl. 5, p. p.
 2. In glareos. et gramin. — *Eur.* : Praecip. intermed., scepe ster.
As. : *Jenissei* inf., *Caucas. occ. et centr. Am. sept.* : *Columb. brit.*
- gloriosum (C. M.) *Par.*
Hypnum gloriosum *C. M. in Fl.* 1890, p. 498.
 Ster. — *Afr.* : *Kilima N'Djaro.*
- harpidioides *C. M. et Kindb. in Bidr.* p. 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 194.
 2. Ster. Lignic. — *Am. sept.* : *New Brunswick. Columb. brit.*
- helvolum (Mont.) *Jaeg. Ad.* II, p. 402.
Hypnum helvolum *Mitt. M. austr. am.* p. 564.
Leskea helvola *Mont. Syll.* p. 19.
 Cortic. — *Am. merid.* : *And. Quitens.*
- Hildebrandi (Lesq.) *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 98, t. 74.
Hypnum Hildebrandi *Lesq. in Mem. Calif. Acad.* I, p. 33; *Lesq. et Jam. Man.* p. 340.
 1. — *Am. sept.* : *Calif.*
- hirtipes *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1703.
 — *Am. merid.* : *And. Boliv.*
- Hofferi (Welw. et Duby) *Par.*
Hypnum Hofferi *W. et Dy. Choix de crypt.*.... 1871, p. 7, t. II, f. 2.
 1. Lignic. — *Afr.* : *Ins. S. Thom.*
- idahense *Ren. et Card. in Bot. Gaz.* 1890, p. 60, t. 9 c.
 1. — *Am. sept.* : *Idaho.*
- illecebrum de Not. — *Scleropodium.*
- implicatum (Hsch.) *Jaeg. Ad.* II, p. 388.
Hypnum implicatum *Hsch. in Mundt et Maire M. Capens.; C. M. Syn.* II, p. 362.
 2. — *Afr.* : *C. B. Sp.*
- Inandae *Rehm. M. Afr. austr. n.* 381.
 — *Afr.* : *Natal.*
- inconditum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 155.
 1. In gramin. humid. — *Afr.* : *Ins. Borbon.*
- jenissense (Lindb. et Arn.) *Par.*
Hypnum jenissense *L. et A. M. As. bor.* 1890, II, p. 133.
 2. Terr. in silvul. — *As.* : *Jenissei med.*
- jucundum de Not. *Epil.* p. 118; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 643.
 1. — *Eur.* : *Ital. (in Ossula super.)*
- julaceum *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1707 bis.
 — *Am. merid.* : *And. Boliv.*
- kamounense (Harv.) *Jaeg. Ad.* II, p. 410.
Hypnum kamounense *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 19 et in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 24, f. 10; *C. M. Syn.* II, p. 365; *Mitt. M. Ind.* or. p. 79.
 — *As.* : *Nepal.*

Kayseri *Geheeb in Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).
— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

Knysnae *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 387.
— *Afr.* : Austral.

Krausei (*C. M.*) *Par.*

Hypnum Krausei C. M. in Fl. 1887, p. 224.

1. — *Am. sept.* : Alaska.

kuroischicum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 373.

1. — *As.* : Japon.

Exs : Faurie n. 2; 12, 41 b, 95, 99.

laetum (*Brid.*) *Bryol. eur. VI (mon. p. 20); t.* 554; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 639.

Hypnum laetum Brid. Bryol. univ. II, p. 479.

H. luteolum C. M. Syn. II, p. 357.

H. salebrosum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 175 p.p.

2. Ad. saxa calcar. rupesq. basalt. — *Eur.* : Saxon., Bavar., Francon., Helvet. — *Am. sept.* : Labrador, Anticosti, Terr. Nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Washington, Montana, Idaho, reg. sept., centr., et or.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 122, 123 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 281 (*id.*).

Rab. Bryoth. eur. n. 544.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 488, 489, 490 (*Hypnum*).

« *var. dentatum (Lrsq. et Jam.) Par.*

Br. Sullivantii Bryol. eur. (mon. p. 21).

Hypnum laetum var. dentatum Lesq. et Jam. Man. p. 335.

H. salebrosum Sull. M. Allegh. n. 43.

Ut et ubi typ. in *Amer. sept.*

« *var. fallax Ren. et Card in Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

— *Am. sept.* : Indiana, Calif.

« *var. pseudo acuminatum eor. in op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : Indiana.

« *var. Roellii eor. in op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : Indiana.

laevifolium (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 745.

Hypnum laevifolium Mitt. M. austr. am. p. 565.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

laevisetum *Kind. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p.* 278 et in *Mac. Cat. p.* 193.

1. Lignic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

lamprocarpum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 387.

Hypnum lamprocarpum C. M. Syn. II, p. 359; *Bryol. jav. II, p.* 164, t. 263.

1. Arbor. (ad *Gnaphalium javanicum*). — *As.* : Java.

lamprochryseum *C. M. et Kindb. in Bidr. p.* 453 (nom.) et in *Mac. Cat. p.* 199.

1. Saxic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

? lapponicum *W. P. Sch. Syn. I ed. p.* 697 et *II ed. p.* 807.

Leucodon Lagurus Hook. var. borealis Wils.

Ster. In rivul. nivos. — *Eur.* : Lappon. Pitens.

latifolium (*Lindb.*) *Par.*

Hypnum latifolium Lindb. M. nonnull. Scand. in Medd. af Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn. 1879, p. 5 et M. Scand. p. 35, n. 98.

2. Ad. rup. madid. — *Eur.* : Lappon., Norveg., Alp. Vales. et Longobard. As. : Jenissei med. Am. sept. : Ins. Miquelon.

lepidopiloides (*C. M.*) *Par.*

Hypnum lepidopiloides C. M. in Linn. 1878-79, p. 450.

Ster. — *Am. merid.* : Argentina. Cordob.

lepturum (*Tayl.*) *Jaeg. Ad. II, p. 395.*

Hypnum lepturum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 64; C. M. Syn. II, p. 454.

Ster. — *Pac.* : Austral. or.

leskeifolium *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 373.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

leucoglaucom *C. M. et Kindb. in Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 198.*

1. Terr. — *Am. sept.* : New Brunswick.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 591.

ligusticum (*de Not.*) *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 692 et II ed. p. 642.*

Hypnum ligusticum de Not. mss.

1. In pascuis humid. — *Eur.* : Ligur., Neapol. *Afr.* : Alger.

longicuspdatum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 409.*

Hypnum longicuspdatum Mitt. M. Ind. or. p. 77.

2 ? — *As.* : Sikkim.

longidens (*C. M.*) *Par.*

Hypnum longidens C. M. in Fl. 1885, p. 427.

1. — *Am. merid.* : Fuegia.

lutescens *de Not.* — *Camptothecium.*

Mac-Owani *Rehm. M. Afr. austr. n. 380.*

— *Afr.* : Natal.

macrocomum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum macrocomum C. M. in Linn. 1878-79, p. 454.

1. — *Am. merid.* : Argentina. Salt.

« *var. robustius* (*C. M.*) *Par.*

Hypnum macrocomum var. robustius C. M. in op. cit. p. 455.

— *Am. merid.* : Argentina. subtropic.

mammilligerum *Kindb. in Mac. Cat. p. 192 (subsp. Br. salebrosi).*

1. Lignic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

melanangium *C. M. in Hildebr. M. Madag. n. 2078.*

— *Afr.* : Madagasc.

melanocarpum *Jaeg.* — *Br. oxyrhynchum.*

meridense (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 393.*

Hypnum meridense C. M. Syn. II, p. 433.

2 — *Am. merid.* : And. Venezuel.

micropus *Bryol. eur. VI (mon. p. 9), t. 540; W. P. Sch. op. cit. p. 650.*

1. Ad rup. micac. schistos. — *Eur.* : Helvet. (Grimsel).

- mirabundum *C. M. et Kindb. in Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 199.*
 1. Lignic. — *Am. sept.* : New Brunswick.
- molliculum (*Lindb.*) *Par.*
Hypnum molliculum Lindb. in Broth. Enum. M. Cauc. p. 112.
 2. Lignic. — *As.* : *Caucas. occ.*
- molliculum Reichdt. — Isopterygium.*
- moriense *Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 375.*
 2. Terr. — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 3510.
- nanopes *C. M. et Kindb. in Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 201.*
 1. Terr. — *Am. sept.* : *Columb. brit.*
Exs. : *Mac. Canad. M. n. 548.*
- nematogonium (*C. M.*) *Par.*
Hypnum nematogonium C. M. in Linn. 1878-79, p. 453.
 Ster. — *Am. merid.* : *Argentin. Cordob.*
- nigro-viride (*C. M.*) *Par.*
Hypnum nigro-viride C. M. in Fl. 1890, p. 498.
 Ster. — *Afr.* : *Kilima N'Djaro.*
- noësicum *Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 377.*
 2. — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 15 et 18 p.p., 56.
- Novae Angliae (*Sull. et Lesq.*) *Jaeg. Ad. II, p. 394.*
Hypnum Novae Angliae Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 338; Sull. M. U. St. p. 76 et Ic. M. p. 191, t. 118; Lesq. et Jam. Man. p. 344.
Scleropodium Novae Angliae Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 378.
 2. — *As.* : Japon. *Am. sept.* : *Canada (fid. Card.),*
Nov. Angl., ins. Miquelon, Wisconsin.
Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 507.*
 « *var. Delamarei Ren. et Card. Fl. Miquel. p. 50.*
 — *Am. sept.* : *Ins. Miquelon.*
- Novae Valesiae *Geheeb in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).*
 — *Pac.* : *Austral. or. (Nov. Vales.).*
- occidentale (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 392.*
Hypnum occidentale Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p. 314; Mitt. M. austr. am. p. 559.
 Saxic. — *Am. merid.* : *And. Nov. Granat. et Quitens.*
- œdipodium (*Mitt.*) *Kindb. in Mac. Cat. p. 197.*
Hypnum curtum Lindb. M. Scand. p. 35, n. 95?
H. œdipodium Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 35, t. 5; Lesq. et Jam. Man. p. 342.
 1. — *Am. sept.* : *Terr. Nov., New Brunswick, Ottawa,*
M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Montana.
Exs. : *Mac. Canad. M. p. 380, p.p. (Hypnum).*
- œdistegum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 410.*
Hypnum œdistegum C. M. Syn. II, p. 350.
H. plumosum Schwaegr. (fid. Mitt. M. Ind. or. p. 79).
H. pseudo-plumosum ? Mont. in Ann. sc. nat. 1842, Crypt. Neilgh. n. 12.
 1. — *As.* : *Yunnan, Himalaya, M. Neilgherr.*
- olympicum Jur. — Br. venustum.*

oxycladon (Brid.) Jaeg. Ad. II, p. 388.

Hypnum attenuatum Brid. Bryol. univ. II, p. 448.

H. oxycladon ej. Sp. M. II, p. 128; C. M. Syn. II, p. 360; Lesq. et Jam. Man. p. 411.

1. — Am. sept. : Pensilv.

oxyrhynchum (Dz. et Molk.) Jaeg. Ad. II, p. 387.

Br. melanocarpum Jaeg. Ad. II, p. 392.

Hypnum melanocarpum C. M. Syn. II, 433.

Hypnum oxyrhynchum Dz. et Mlk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 308; C. M. Syn. II, p. 451; Bryol. jav. II, p. 163, t. 262.

H. velutinum Duby in Pl. Zoll. n. 1809 et in Moritzi Syst. Verz. p. 131.

1. — As. : Java.

paradoxum (Hook. f. et Wils.) Besch. in Miss. sc. Cap Horn, V, Bot. p. 300.

Hypnum paradoxum H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 551 et Fl. Antarct. II, p. 419, t. 155, f. 2; C. M. Syn. II, p. 324 et in Fl. 1885, p. 426; Mitt. M. austr. am. p. 563.

1. Terr. — Afr. : Ins. Kerguelen. Am. merid. : Fuegia, ins. Eremit. Pac. : Austral., Nov. Zeland., Tasman.

platycladum C. M. et Ktndb. Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 195.

H. rutabulum Mac. Canad. M. n. 287 p.p.

2. Saxic. — Am. sept. : Ontario.

plicatum Bryol. eur. — Ptychodium.

plumeum C. M. in Dusen M. Camer. n. 297.

— Afr. : M. Cameroon.

plumosiforme W. P. Sch. mss.

Hypnum plumosiforme C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 171.

1. — Afr. : C. B. Sp.

plumosum (Sw.) Bryol. eur. V (mon. p. 4), t. 537; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 657.

Hypnum alpinum Sm. Fl. brit. III, p. 1330.

H. aquaticum Funk Moosst. p. 61, t. 44.

H. asperulum Brid. Sp. M. II, p. 169.

H. chrysostomum Rich. in Mich. Fl. Am. bor. p. 319; Brid. Mant. M. p. 173.

H. flagellare Hedw. Sp. M. p. 282, t. 73.

H. hygrophilum Brid. in sched.

H. laevisetum Crome in Magaz. d. Naturfr. V Jahrg. p. 78, t. 3, f. 5-13.

H. oedistegum C. M. (fid. Mitt. M. Ind. or. p. 79).

H. plumosum Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 225.

H. polyrhizon Brid. Sp. M. II, p. 176.

H. pseudo-plumosum Brid. Mant. M. p. 170 et Bryol. univ. II, p. 472; C. M. Syn. II, p. 350.

H. pseudo-plumosum β asperulum Brid. Bryol. univ. II, p. 475.

H. pseudo-plumosum γ polyrhizon ej. op. et l. cc.

H. pseudo-plumosum λ chrysostomum ej. op. cit. p. 489.

H. saxatile ej. M. Rec. II, II, p. 153.

H. secundum Mont. Syll. p. 9 (fid. Mitt. l. c.).

Leskea plumosa Sw. M. Suec. p. 66 (1).

1. Ad saxa, rup. et mur. irrigat., in et secus rivul. format. quarz. —
Eur. : Spitzberg; zon sept. et intermed., rar. merid. *As.* : Japon.,
 Saghalien, Jenissei super. et med., Nepal., Himalaya, Khasia,
 M. Neilgherr., Ceylan, Java, Caucas. occ. et centr. *Afr.* : Alger.,
 Madeir. *Am. sept.* : Terr. Nov., ins. Miquelon, Nov. Scot., New
 Brunswick, Gaspes., Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., reg. sept.,
 centr. et or. *Am. merid.* : And. Nov. Granat et Quitens. *Pac.* :
 Nov. Zeland.
- Exs.* : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 177 (*Hypnum*).
 Mac. Canad. M. n. 289 (*Hypnum*).
 Mandon Pl. Madeir. n. 39.
 Rab. Bryoth. eur. n. 449, 484, 1040.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 496 (*Hypnum*).
- « *var. homomallum Bryol. eur. l. c.*
 Ut et ubi typ. in *Eur. et Am. sept.* :
Exs. : Sull. et Lesq. l. c. n. 497, 498.
var. homomallum Milde. — Br. amænum.
var. reflexum Aust. — Br. populeum.
- Popfferi Welw. et Duby in *Memoires... Genève*, 1871, p. , t. 2.
 Lignic. — *Afr.* : Ins. S. Thom.
- populeum (*Hedw.*) *Bryol. eur. V (mon. p. 3), t. 535*; W. P. Sch. op.
cit. p. 656.
- Br. plumosum *var. reflexum Aust.*
Hypnum concinnum Hartm. Skand. Fl. V ed. p. 328.
H. erythropodium Brid. Sp. M. II, p. 281.
H. implexum Turn. Muscol. hib. p. 173, t. 16.
H. polysetum Bland. in sched.
H. populeum Hedw. Sp. M. p. 278, t. 70, f. 1-5; *Brid. Bryol. univ. II,*
p. 470; *C. M. Syn. II, p. 366.*
H. populeum γ erythropodium Brid. op. cit. p. 471.
H. populeum β nutans ej. op. et l. cc.
H. saxicola Voit in Sturm Deutsch. Fl. II, fasc. 12.
H. viride Lam. et DC. Fl. fr. I, p. 536.
1. Ad arbor. et saxa, rar. ad terr. — *Eur.* : Fere tota in reg. cam-
 pestr. *As.* : Japon., Jenissse sup., Caucas. *Am. sept.* : Ins. Mique-
 lon, reg. orient., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspesia, Ontario,
 M. Rupestr.
- Exs.* : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 176 (*Hypnum*).
 Faurie Pl. Japon. n. 4, 67, 96, 103.
 Mac. Canad M. n. 441 (*Hypnum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 700, 773, 1041, 1296.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 499 (*Hypnum*).
- « *var. angustifolium Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 376.*
 — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 206.
- « *var. attenuatum Bryol. eur. l. c. t. 736*; W. P. Sch. op. et l. cc.
 Ad arbor. — *Eur.* : Ubi typ. *As.* : Japon. *Afr.* : Alger.
Exs. : Faurie n. 41.
- « *var. kominaticum Besch. in op. et l. cc.*
 — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 38.
- « *var. longisetum Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 In umbros. humid. ad saxa et terr. — Ubi typ. in *Eur. et Am. sept.*
- « *var. majus Bryol. eur. et W. P. Sch. op. et ll. cc.*
 Ad saxa madid. — Ubi typ. in *Eur. et Am. sept.*

« *var. rufescens* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum petrophilum *Funk in sched.; Weinm. in Bull. Soc. imp. Moscou, 1845, p. 475; C. M. Syn. II, p. 402.*

Ad saxa quartz. in silvat. montos. — Eur. : Passim.

« *var. subfalcatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ad arbor. — Eur. : Ubi typ. Afr. : Alger. Am. merid. : Ubi typ.

praelongum *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1704.*

— Am. merid. : And. Boliv.

prasophyllum (*Hpe.*) *Jaeg. II, p. 394.*

Hypnum prasophyllum *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p. 315.*

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

procumbens (*Mitt.*) *Jaeg. II, p. 409.*

Hypnum procumbens *Mitt. M. Ind. or. p. 79.*

2. *— As. : Nepal., M. Neilgherr.*

pseudo-albicans *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 278 et in Mac. Cat. p. 194.*

Hypnum albicans *Mac. Canad. M. n. 235 p.p.*

Ster. Arenic. — Am. sept. : Ins. Vancouver.

pseudo-collinum *Kindb. in Mac. Cat. p. 196.*

1. *Ad puteum. — Am. sept. : New Brunswick.*

pseudo-laetum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 387.*

Hypnum laetum *Sull. in Proced..... 1861, p. 289.*

H. pseudo-laetum *C. M. mss.*

— Am. sept. : Cuba.

pseudo-populeum *W. P. Sch. mss.*

Hypnum pseudo-populeum *C. M. in Bot. Zeit. 1858. p. 170.*

2. *— Afr. : C. B. Sp.*

pseudo-rutabulum (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum pseudo-rutabulum *Hpe. in Linn. 1863, p. 160; Mitt. M. austr. am. p. 562.*

Lignic et terr. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens.

pseudo-Starkii *Ren. et Card. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.*

2. *— Am. sept. : Washington.*

pseudo-velutinum (*Hpe.*) *Jaeg. II, p. 391.*

Hypnum pseudo-velutinum *Hpe. in Bot. Zeit. 1858, p. 171.*

1. *— Afr. : C. B. Sp.*

reflexum (*Stark*) *Bryol. eur. V (mon. p. 8), t. 539; W. P. Sch. Syn. II, ed. p. 650.*

Hypnum grimsulanum *Bryol. eur. V (mon. p. II) in obs. (fid. C. M.).*

H. reflexum *Stark in W. et M. Bot. Taschb. pp. 306 et 476; Brid. Bryol. univ. II, 461; C. M. Syn. II, p. 448.*

H. subtenue *Jam. in Proced. Acad. Philad. 1855, p. 447.*

1. *Ad Fagor. debil. trunc. et ramul. — Eur. : Reg. montana sup. et subalp. As. : Saghalien, Amour, Jenissei med. et inf., Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. Nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Gaspes., Ontar., Manitoba, Columb. brit., Washington, New Hampshire, Maryland.*

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 121 (*Hypnum*).
 Mac. *Canad. M.* p. 286 (*id.*).
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 450.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 503 (*Hypnum*).
 Un. itin. 1863, n. 34.

« *var. pacificum* Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.
 — *Am. sept.* : Oregon.

rhynchostegioides C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 375.
 — *Afr.* : Austral.

rivulare (Br.) *Bryol. eur.* V (mon. p.), t. 546; W. P. Sch. *op. cit.* p. 655.

Camptothecium megaphilum Mac. *Canad. M.* n. 439.
Hypnum chrysostomum C. M. *Syn. II*, p. 368.
H. flavescens Brid. *Sp. M. II*, p. 185.
H. rivulare Br. in sched.
H. rutabulum Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 178.
H. rutabulum var. flavescens Brid. *Bryol. univ. II*, p. 488?
H. rutabulum var. laxifolium ej. l. c.
H. vagans Drumm. l. c. n. 166.

2. Ad scaturig. silvat., saxa et mur. irrigat. — *Eur.* : Ins. Urior.; reg. campestr. montos. *As.* : Jenissei sup., Caucas. occ. et centr. *Afr.* : Madeir. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, fret. Hudson et Kotzebue, ins. Miquelon, New Brunswick, Ontar., M. Selkirk, Columb. brit., Alaska, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Wyoming, Idaho. Kansas, Montana, Wisconsin, Pensilv.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 288 (*Hypnum*).
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 746.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 505 (*Hypnum*).
 Un. itin. 1863, n. 70.

« *var. obtusulum* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 201.

Br. *rivulare** *Novae Brunsviciae* ej. in *Ott. Nat. IV*, p. 3; Mac. *Canad. M.* n. 492.

Ad rup. madid. — *Am. sept.* : New Brunswick, Ontario, Columb. brit.

*rivulare** *Novae Brunsviciae* Kindb. — Br. *rivulare var. obtusulum*.

rivulariforme W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1705.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.

rivularioides (C. M.) Par.

Hypnum rivularioides C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 451.
 Ster. Lignic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

Roellii Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

2 ? ♂ et fr. ign. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

Rotaeantum de Not. *Epil.* p. 118; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 640.

1. Ad radic. arbor. — *Eur.* : Ital. super. (Bergam.).

ruginosum (Mitt.) Par.

Hyocomium ruginosum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 178.
 2 ? — *As.* : Simla, Japon.

rutabuliforme Kindb. in *Mac. Cat.* p. 198.

1. Saxic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

rutabulum (L.). *Bryol. eur.* V (mon. p. II), t. 543; W. P. Sch. *op. c.* p. 653.

H. crenulatum Sm. *Fl. brit. II*, p. 1289.

H. dentatum, vulgatissimum operculis obtusis *Dill. Hist. M. p.* 295, *t.* 38, *f.* 29.

H. rutabulum *L. Sp. pl. p.* 1590; *Brid. Bryol. univ. univ. II, p.* 485 (*incl. var. aureo-virens, crenulatum, exiguum, flaccidum, p.* 487); *C. M. Syn. II, p.* 367.

1. Ad saxa, terr. umbros., rad. arb. lignaque putresc. *Eur.* : Tota in reg. campestr. plan. et montos., praeter arct. *As.* : Japon., Jenissei sup., Kashmir, Himalaya et Tibet. occ., Pers., Caucas., Syr., M. Olymp. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Terr. Nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Ontario, ins. Vancouver, Washington, reg. sept., centr. et or. *Am. merid.* : And. Quitens. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Campbell.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 178, 179 (*Hypnum*).

Faurie *Pl. Japon. n.* 2, 3, 4.

Mac. *Canad. M. n.* 227 p.p. (*Hypnum*).

Rab. *Bryoth. eur. n.* 387.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 494 (*Hypnum*).

« *var. canadense* *Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p.* 19.

— *Am. sept.* : Ins. Miquel., Canada, Washington.

« *var. densum* *Bryol. eur. l. c. t.* 544; *W. P. Sch. op. cit. p.* 654.

In arb. trunc. semiputrid. — Hic illic cum typ. in *Eur. et Am. sept.*

var. explanatum Boeckm. — *Br. Starkii var. praelongum.*

« *var. flavescens* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

In gramin. ad terr. — Hic illic cum typ. in *Eur. et Am. sept.*

« *var. longisetum* (*Brid.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum rutabulum var. longisetum *Brid. Bryol. univ. II, p.* 487.

Ut et ubi praeced.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 495.

« *var. plumulosum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

In arb. trunc. semiputrid. — Hic illic cum typ. in *Eur. et Am. sept.*

« *var. robustum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ad rad. arb. silvat. et saxa umbr. — *Eur.* : C. typ. *As.* : Caucas. occ.

Am. sept. : C. typ.

Ryani *Kaurin in sched.; Philib. in Rev. bryol. 1859, p.* 59.

2.

— *Eur.* : Norveg. merid.

salebrosulum *C. M. mss.; Jaeg. Ad. II, p.* 405.

— *As.* : Japon.

salebrosum (*Hoffm.*) *Bryol. eur. V (mon. p.* 16), *t.* 549; *W. P. Sch. op. cit. p.* 641.

Hypnum fasciculatum *Lam. Encycl. meth. bot. III, p.* 177.

H. Lamarckii *Brid. Sp. M. II, p.* 256.

H. plumosum *Hedw. M. frond. IV. p.* 37, *t.* 15 p.p.; *Brid. Bryol. univ. II, p.* 475.

H. plumosum β *salebrosum* *C. M. Syn. II, p.* 359.

H. salebrosum *Hoffm. Deutsch. Fl. II, p.* 74; *Brid. op. cit. p.* 478.

H. salebrosum γ *apiculatum* *Brid. op. cit. p.* 478.

H. salebrosum δ *paraphysigerum* *ej. op. cit. p.* 479.

H. salebrosum β *Torreyanum* *ej. op. cit. p.* 478.

1. In terr. humos. silvat., ad saxa, rad. arb. et trunc. putresc. *Eur.* : Ins. Urior. : tota. *As.* : Japon., Amour, Saghalien, Obi, Jenissei, Himalaya et Tibet. occ., Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Groenland, Terr. Nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Assiniboine, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, fret. Kotzebuë, ins. Vancouver, reg. sept., occ., centr. et or.

- Exs. : Drumm. M. bor. am. 1 ed. n. 175 (*Hypnum*).
 Faurie Pl. Jap. n. 102, 167.
 Mac. Canad. M. n. 283 (*Hypnum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 350, 782.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 487 (*Hypnum*).
- « *var. arcticum* Berggr. M. Spetsb. n. 116 et in K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII, n. 7, p. 79.
 — Eur. : Ins. Parry, Spitzberg.
- « *var. cylindricum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 H. capillaceum Brid. Mant. M. p. 172 et Bryol. univ. II, p. 481.
 H. salebrosum β capillaceum W. et M. Bot. Taschb. p. 313.
 Ad arb. præcip. Popul. et Salic. semiputr. — Eur. : Cum typ. As. : Japon. Am. sept. : Cum typ.
 Exs. : Faur. Pl. Japon. n. 71, 75, 90.
- « *var. densum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 Ad arb. rad. et sax. umbrosa. — Eur. : Cum typ.
- « *var. flaccidum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 In terr. silvat. præcip. zon. sept. Eur.
- « *var. longisetum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 In salebros. et ad tecta stramin. — Passim cum typ. in Eur. et in Am. sept.
- « *var. palustre* W. P. Sch. Syn. II ed. p. 641.
 H. acutum Mitt. (fid. Lindb. M. Scand. p. 35 et n. 99).
 H. Mildeanum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 641.
 In humid. vel uligin. — Passim c. typ. in Eur. et Am. sept.
- « *var. parvicarpum* Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 373.
 — As. : Japon.
 Exs. : Faurie n. 182.
- « *var. rostratum* Besch. in op. et l. cc.
 — As. : Japon.
 Exs. : Faurie n. 193.
- « *var. texanum* (Aust.) Par.
 Br. texanum Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 44.
 Hypnum salebrosum *var. texanum* Lesq. et Jam. Man. p. 337.
 — Am. sept. : Texas.
- « *var. Thomasii* W. P. Sch. Coroll. p. 124.
 Hypnum capillaceum β Thomasii Brid. Bryol. univ. II, p. 482.
 H. Thomasii ej. Mant. M. p. 172.
 In loc. apricis. — Eur. : Hic illic.
- « *var. turgidum* (Lindb.) Par.
 Hypnum plumosum *var. turgidum* Linnb. M. As. bor. 1890, II, p. 136.
 — As. : Penins. Samoied., Jenissei inf.
- salicinum Bryol. eur. V (mon. p. 15), t. 548 ; W. P. Sch. op. cit. p.
 1. Ad salic. semiputrid. et arb. annosior. — Eur. : Vall. Rhen., Delphinat.
- scabrum (Mitt.) Besch. in hb. Mus. Paris.
 Hypnum scabrum Mitt. in hb. Griff. n. 700.
 — As. : Assam.

Schlosseri Jaeg. — *Rigodium*.
secundum Jaeg. — *Br. plumosum*.

sericeo-nitens (C. M.) Par.

Hypnum sericeo-nitens C. M. in *Fl.* 1885, p. 427.

l. *Rupic.* — *Am. merid.* : *Fuegia*.

serpentinum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 276.

— *Afr.* : *M. Cameroon*.

Spegazzinii (C. M.) Par.

Hypnum Spegazzinii C. M. in *Fl.* 1885, p. 428.

l. *Ad arbor.* — *Am. merid.* : *Fret. Magellan*.

splendens Aust. — *Br. biventrosus*.

spurio-acuminatum C. M. et *Kindb. Bidr.* p. 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 191.

l. *Lignic.* — *Am. sept.* : *Ontario*.

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 566.

spurio-rutabulum C. M. et *Kindb. op. cc. pp.* 453 (nom.) et 197.

l. *Ad. rad. arbor.* — *Am. sept.* : *Columb. brit.*

squalidissimum (C. M.) Par.

Hypnum squalidissimum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 452.

Ster. Rupic. — *Am. merid.* : *Argentin. Cordob.*

Starkii (Brid.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 10), t. 541 ; *W. P. Sch. Syn. II* ed., p. 651.

Hypnum Starkii Brid. *Mant. M.* p. 170 ; *C. M. Syn. II*, p. 432.

H. Stereodon Starkii Brid. *Bryol. univ. II*, p. 595.

l. (W. P. Sch.) ; syn. (C. M.). *Ad terr., lapid., rad. arb. et trunc. putresc. in silvat.* — *Eur.* : *Reg. montan. et subalp. per zon. sept. et intermed. As.* : *Amour, Jenissei sup., Caucas. occ. et centr. Am. sept.* : *Groenland, Terr. Nov., ins. Miquel., New Brunswick, Ontar., Nov. Angl., Pensilv.*

Exs. : *Mac. Canad. M.* p. 284 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 1039, 1188.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 504 (*Hypnum*).

Un. itin. 1867, n. 36.

var. *alpestre* *Bryol. eur.* — *Br. Starkii* var. *robustum*.

« var. *nipponense* (W. P. Sch.) *Besch. in Ann. sc. nat.*, p. 376.

Hypnum nipponense W. P. Sch. in *Savatier M. Japon.* n. 657.

— *As.* : *Japon*.

Exs. : *Faurie* n. 26, 190, 218.

« var. *praelongum* W. P. Sch. *Syn. I* ed. p. 541 et *II* ed. p. 652.

Br. rutabulum var. *explanatum* *Brockm. in Arch. Ver. Freund. Naturges Mechl.* 1870, p. 23.

Hypnum curtum *Lindb. M. nonnull. Scandin.* 1879, p. 5.

H. rutabulum var. *explanatum* *Brid. Bryol. univ. II*, p. 488.

Ut et ubi typ. in *Eur. As.* : *Jenissei sup.*

« var. *robustum* W. P. Sch. *Syn. ed. I*, p. 540 et *II* ed. l. c.

Br. Starkii var. *alpestre* *Bryol. Eur.* l. c.

Hypnum grimsulanum *Bryol. eur.* V, mon. p. 11 (fid. *Lindb.*).

Ut et ubi typ. in *Eur.*

stereopoma (Spr.) *Jaeg. Ad. II*, p. 393.

Hypnum stereopoma *Spr. in Mitt. M. austr. am.* p. 561.

Lignic et terr. — *Am. sept.* : Jamaïc. — *Am. merid.* : Venezuela.
And. Quitens. et Peruv.

subalbicans *de Not. Epil. p.* 118 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 645.

1. In silvis. — *Eur.* : Ital. super. (Taurinum).

subpilosum (*Hook. f. et Wils.*) *Par.*

Br. subplicatum *Jaeg. Ad. II*, p. 399.

Hypnum rutabulum var. *H. f. et W. Fl. Antarct. II*, p. 418.

H. subpilosum eor. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 553 et *Fl. Antarct. II*,
p. 418, t. 154, f. 4 ; *C. M. Syn. II*, p. 366.

H. subplicatum Hpe. in C. M. Syn. II, p. 363.

1. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitæ, Maclov.

subplicatum *Jaeg.* — Br. subpilosum.

subrutabulum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 398.

Hypnum subrutabulum *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 455.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

sulfureum (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Hypnum sulfureum *G. et Hpe. in Fl.* 1881.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Sullivantii *Bryol. eur.* — Br. laetum var. dentatum.

Tauriscorum *Mdo. in Fl.* 1866, p. 306 et 533.

— *Eur.* : Alp. German., Helvet., Vall. Tellin.

texanum *Aust.* — Br. salebrosum var. *texanum*.

Thedenii (*Hartm.*) *Bryol. eur. V (mon. p.* 18), t. 551 ; *W. P. Sch. op. cit.*
p. 645.

Hypnum erythrorhizon var. *Thedenii Lindb. M. Scand. p.* 36.

H. Thedenii Hartm. Skand. Fl. VI ed.

2. Ad saxa umbrosa. — *Eur.* : Suecia, Fennia. *As.* : Jenissei sup. *Am.*
sept. : New Hampshire.

trachypodioides *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1707.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

trachypodium (*Brid.*) *Bryol. eur. V. (mon. p.* 7), t. 547 ; *W. P. Sch.*
Syn. II ed. p. 649. (1)

Hypnum trachypodium *C. M. Syn. II*, p. 367.

Isothecium trachypodium *Brid. Bryol. univ. II*, p. 766.

1. In fissur. rup. — *Eur.* : Spitzberg, Alp. Norveg., Carinth., Rhaet.,
Tirol. ; Arvern. *As.* : Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Groenland.
Eas. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 633.

Un. itin. 1863, n. 68, 69.

truncatum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 374.

1. — *As.* : Japon.

Eas. : Faurie n. 161.

turgidum *Hartm. Skand. Fl. X ed. p.* 16.

— *Eur.* : Lapon., Scandin., Fennia. *Am. sept.* : Groenland,

M. Rupestr.

umbilicatum *Jur et Milde Beitr...* p. 600.

1. — *As.* : Kurdistan.

(1) Cf. Amann in *Rev. bryol.* 1889, p. 55.

utahense *Jam. in Bot. King Exped. p. 409.*

Hypnum utahense Lesq. et Jam. Man. p. 339.

Syn. Ad rup. arenac. — *Am. sept.* : Montana occ., Utah, Colorado.

vagans *Milde in Hedwig. 1869, p. 50 et Bryol. siles. p. 331.*

Syn. — *Eur.* : Westphal.

Valentini *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 154.*

Ster. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

vallium *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. p. 84.*

Br. asperrimum *L. et J. (fid. Jaeg. Ad. II, p. 398).*

Rupic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 506. (*Hypnum*).

vellereum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 406.*

Hypnum vellereum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 151.

2. — *Afr.* : Abyssin., M. Cameroon.

Exs. : Dusen M. Camer. n. 294.

velutinum (*L.*) *Bryol. eur V (mon. p. 5), t. 538 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 648.*

Br. declivum *Jaeg. Ad. II, p. 394.*

Hypnum declivum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 33, t. 6.

H. velutinum L. Sp. pl. 1595 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 457 ; C. M. Syn. II, p. 399.

H. velutinum, capsulis ovatis cernuis Dill. Hist. M. p. 326, t. 42, f. 61.

H. Stereodon Starkii β tenellus Brid. op. cit. p. 596 p.p.

Leskea velutina Schrank Baiers Fl. III, p. 461.

1. Ad saxa, terr., rad. arbor. et trunc. putresc. — *Eur.* : Tota, præter arctic. *As.* : Saghalien, Jenissei sup., Persia, Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : New Brunswick, Gaspesia, Vermont, New York, Ontario, Idaho, Columb. brit., Washington, Oregon.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 379 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 500 (*Hypnum*).

var. *condensatum* W. P. Sch. — Br. *velutinum* var. *sericeum*.

« var. *intricatum* (*Hedw.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum intricatum Hedw. M. frond. IV, p. 73, t. 28 ; Brid. op. cit. p. 461.

H. velutinum var. *intricatum* *Brid. op. cit. p. 459 ; C. M. Syn. II, p. 400.*

Ad terr. argill. et ad rup. — *Eur. et Afr.* : Hic illic.

« var. *praelongum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ad terr. silvat. arenac. — *Eur.* : C. typ.

« var. *sericeum* (*Funk*) *Par.*

Br. *olympicum* *Jur. ? (1)*

Br. *velutinum γ condensatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum sericeum Funk Moostaschb. p. 62, t. 44.

H. velutinum β sericeum *Brid. op. cit. p. 459 ; C. M. Syn. II, p. 400 (γ).*

Ad mur. delaps. et sax. aridiss. — *Eur.* : Præcip. zon. merid. ; Alp. Salzburg., Sierra Nevada.

venustum *de Not. Epil. Briol. ital. (2).*

Br. *olympicum* *Jur. in « die Insel Cypern » von Unger und Kotschy ; W. P. Sch. op. cit. p. 851.*

(1) Cf. Venturi in *Rev. bryol.* 1883, p. 64.

(2) Cf. Venturi in *Rev. bryol.* 1883, p. 61.

1 (*C. M.*) nec 2! (de Not.). Lignic. et ad rup. silic. — *Eur.* : Alp. Stir., Pyren. As. : M. Olymp., Cypr.

Villardi *Ren. et Card. in Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

1. — *Am. sept.* : Washington.

vineale *Milde in Bot. Zeit.* 1864, p. et in *Hedwig*, p. 30.
Muric. — *Eur.* : Tirol. merid.

? Weinmani (*Nees*) *Par.*

Hypnum Weinmani Nees mss.; *C. M. Syn. II*, p. 365.

Ad arbor. — *Eur.* : Russia or.

Wilkesianum Jaeg. — *Cylindrothecium* (1).

BRACHYTRICHUM *Roehl. in Ann. d. Wett. Gesells. III*, p. 194.

cupulatum ej. — *Orthotrichum*.

saxatile ej. — *Orthotrichum*.

BRAITHWAITEA *Lindb. in Act. Soc. Fenn. X*, 1872, p. 250 *tn adnot.*

nematosa *Jaeg.* — *Climacium sulcatum*.

sulcata *Lindb.* — *Climacium sulcatum*.

BRAUNFELSIA *Par.* (2 sp.).

enervis (*Dz. et Mk.*) *Par.*

Dicranum macrocalyx Bryol. jav. II, p. 225.

Eucamptodon macrocalyx C. M. Syn. I, p. 346.

Holomitrium enerve Dz. et Mk. M. frond. ined. Arch. ind. p. 8, t. 3.

Solmsia (2) *enervis Hpe. in Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 273.

— *As.* : Java.

scariosa (*Wils.*) *Par.*

Dicranum edentulum Mitt. M. Ind. or. p. 14.

D. scariosum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 294.

Eucamptodon edentulum C. M. in Linn. 1869-70, p. II.

Solmsia scariosa Hpe. in op. cit. p. 274.

2 ?

— *As.* : Borneo, Ceylan.

« *var. compacta* (*C. M.*) *Par.*

Eucamptodon edentulus var. compacta C. M. in Jaeg. Ad. I, p. 155.

Solmsia scariosa var. compacta Jaeg. op. cit. II, p. 652.

Ut et ubi typ.

BRAUNIA *Bryol. eur. III* (19 sp.).

alopecura *Limpr.* — *Br. sciuroides*.

Andrieuxii Ltz. Moost. p. 164.

1.

— *Am. sept.* : Mexic.

argentinea C. M. in Linn. 1880-82, p. 465.

1. Saxic. et terr. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

attenuata (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 88.

Hedwigia attenuata Mitt. M. Ind. or. p. 123.

2 ?

— *As.* : Himalaya occ.

(1) In Enumer. Kindberg. nomina nuda :

Br. amazonicum Mitt.

brevinerve Kindb.

filirameum C. M.

japonicum Mitt.

Br. malacobolax C. M.

myrticola Lindb.

semi-postratum C. M.

(2) Nom. generic. jam abusum.

californica Lesq. in *Trans. Am. Phil.* XIII, p. 8; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 41, t. 27; *Lesq. et Jam. Man.* p. 153.

1. Rupic. — *Am. sept.*: Columb. brit., ins. Vancouver, Idaho, reg. occid., M. Calif.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 109 p.p.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 226.

« *var. pilifera* Lesq. et *Jam. op. et l. cc.*

Hedwigia pilifera Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 45, t. 7.

Ut typ. — *Am. sept.*: Ins. Vancouver.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 109 p.p.

canescens W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1641.

Br. incana C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 377.

1. Cortic. — *Am. merid.*: And. Boliv., Argentin. subtropic.

cirrifolia (Wils.) Jaeg. *Ad.* II, p. 87.

Hedwigia cirrifolia Wils. in *Mitt. M. austr. am.* p. 406.

— *Am. merid.*: And. Quitens.

Delavaygi Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 71.

1 ? Cortic. — *As.*: Yunnan.

diaphana (C. M.) Jaeg. *Ad.* I, p. 88.

Neckera diaphana C. M. *Syn.* II, p. 105.

— *Afr.*: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. M. Afr. austr. n. 598 b.

entodonticarpa C. M. in *Fl.* 1890, p. 485.

— *Afr.*: M. Kenia.

exserta C. M. in *Linn.* 1878-78, p. 379.

1. Cortic. et rupic. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic

« *var. reflexifolia* C. M. in *op. cit.* p. 380.

Ut et c. typ.

Humboldti Hook. — *Harrisonia*.

incana C. M. — Br. *canescens*.

indica (Mont.) Par.

Anoetangium indicum Mont. in *sched.*

A. secundum ej. in *Ann. sc. nat.* 1842, n. 32.

Br. *macropelma* Jaeg. *Ad.* II, p. 87.

Hedwigia indica Mitt. *M. Ind. or.* p. 123.

Neckera macropelma C. M. *Syn.* II, p. 104.

1. Ad rup. basalt. — *As.*: M. Neilgherr.

Liebmanniana W. P. Sch. — *Hedwigidium*.

macropelma Jaeg. — Br. *indica*.

Mac-Owaniana Rehm. M. Afr. austr. n. 597.

Ster. — *Afr.*: Transvaal.

maritima C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 306.

— *Afr.*: C. B. Sp.

« *var. rufescens* C. M. l. c. n. 307 b.

— *Afr.*: C. B. Sp.

plicata (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 87.

Hedwigia plicata Mitt. *M. austr. am.* p. 406.

— *Am. merid.*: And. Quitens.; Boliv.

rhabdocarpa C. M. — Hedwigidium.

rupestris (Mitt.) Par.

Hedwigia rupestris Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 160.
1. — Afr. : Abyss., M. Cameroon.

Exs. : Dusen M. Cameroon n. 298.

Schimperiana Bryol. eur. III (mon. p. 3).

Harrisonia Schimperiana Hpe. in exc. ad H. squarrulosam in Ic. M. t. 19.
Hedwigia Schimperiana Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 464.
Neckera Schimperiana C. M. Syn. II, p. 104.

1. — Afr. : Abyssin., Choa, Kilima N'Djaro.

sciuroides (de Not.) Bryol. eur. III (mon. p. 3) t. 275; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 286.

Anoetangium sciuroides Bals. et de Not. Pugill. p. 23.

Br. alopecura Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 824.

Harrisonia sciuroides Rab. Deutschl. Fl. II, 3, p. 153.

Hedwigia sciuroides de Not. Syll. p. 95.

Leucodon alopecurus Brid. Mant. M. p. 135 et Bryol. univ. II, p. 214.

Neckera alopecura C. M. Syn. II, p. 104.

Schistidium nudum Schleich. Cent. pl. helv.

1. et syn. Ad rup. calcar. sicc. — Eur. : Helvet. et Tirol. merid., Pyr. Ital. merid.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 186, 509.

Un. itin. 1863, n. 41.

secunda Bryol. eur. l. c. (1).

Anoetangium secundum Brid. Bryol. univ. II, p. 165.

Harrisonia secunda Spreng. Syst. veg. IV, p. 145.

Hedwigia secunda Hook. M. ex. t. 46.

Neckera secunda C. M. Syn. II, p. 103.

1. Saxicol. — Afr. : Kilima N'Djaro. (?). Am. sept. : Mexic.

subsecunda W. P. Sch. in Jaeg. Ad. II, p. 86 (nom.).

— As. : M. Neilgherr.

teres C. M. — Hedwigidium.

BREUTELIA W. P. Sch. Coroll. p. 85 (56 sp.)

aciphylla (Wils.) Jaeg. Ad. I, p. 560.

Bartramia aciphylla Wils. mss. ; Mitt. in Hook. Kew Journ. III, p. 356
et M. austr. am. p. 266.

Ster. — Am. merid. : And. Quitens.

affinis Mitt. — Philonotis.

afro-scoparia (C. M.) Par.

Bartramia afro-scoparia C. M. in M. Capens. Mac-Owanianis.

B. laete-virens Rehm. M. Afr. austr. n. 206.

— Afr. : C. B. Sp.

angustifolia Rehm l. c. n. 538.

Ster. — Afr. : Transvaal.

(1) « An Br. indica, Schimperiana, sciuroides* et secunda varietates unius et ejusd. spec. ? » (Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 310.)

arcuata (Dicks.) W. P. Sch. op. et l. cc.

Bartramia arcuata Schwaegr. Suppl. I, II, p. 61, t. 62 (excl. syn. Sw.) et suppl. III, I, p. 240; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 35; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 15) t. 321; *C. M. Syn.* I, p. 487.

Br. chrysocoma Lindb. *M. Scand.* p. 15.

Hypnum chrysocomum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 12.

H. palustre erectum, coma lutea, basi nigricante *Dill. Hist. M.* p. 302, t. 39, f. 36.

Mnium arcuatum Dicks. op. cit. *Fasc. III*, p. 2, t. 7, f. 3.

Mn. chrysocomum Hedw. *Sp. M.* p. 74.

2. Ad rup. humid. — *Eur.* : Norveg., Britann., Helvet., Westphal.; Corsica (ster.)

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 172, 1165.

« *var. major* Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 60 (1).

Ut typ. — *Am. sept.* : Mexic.

aureola Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXVI et in *Miss. sc. Cap Horn*, V, *Bot.* p. 290, t. 4, f. 16.

Bartramia integrifolia Sull. in *Wilkes Expl. Exp.* p. 12.

Fr. ign.

— *Am. merid.* : Patagon. austr., terr. Magellan.

austro-arcuata (C. M.) Par.

Bartramia austro-arcuata C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 406.

Fl. et fr. ign. Rupic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

brachycoma Besch. in op. et ll. cc., p. 15.

Br. comosa ej. in *Fl.* 1885.

Fr. ign.

— *Am. merid.* : Patagon. austr.

Brittoniae Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* II, p. 161.

2. Ster.

— *Am. sept.* : Costa Rica.

carinata (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 557.

Bartramia carinata Mitt. *M. austr. am.* p. 266.

Ster.

— *Am. merid.* : And. Chilens.

chrysea (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 560.

Bartramia chrysea C. M. in *Linn.* 1874, p. 598.

Ster.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

chrysocoma Lindb. — *Br. arcuata*.

commutata (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 702.

Bartramia affinis Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 237 (fid. Hpe.).

B. commutata Hpe. in *Linn.* 1876, p. 307.

2.

— *Pac.* : Austral., Tasman.

comosa Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 82; *Fl. Tasman.* II, p. 195, t. 174, f. 7.

Bartramia comosa *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 449.

2. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zel. sept. et med., Tasman.

comosa Besch. — *Br. brachycoma*.

consimilis (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. I*, p. 559 (2).

Bartramia consimilis *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 449.

(1) « An. spec. propria ? » Besch. l. c.

(2) Cf. Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 83.

Hypnum consimile *H. f. et W. Fl. Antarct.* p. 137, t. 60, f. 4; *C. Syn. I*, p. 492 et *II*, p. 617.

Ster. — *Pac.* : Ins. Auckland.

crassa (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 555.

Bartramia crassa *H. f. et W. Fl. Tasm. II*, p. 194, t. 174, f. 5.

2. Rup. madid. — *Pac.* : Tasman.

cuspidatissima (*C. M.*) *Par.*

Bartramia cuspidatissima *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 408.

Fl. et fr. ign. Rupic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

deflexa *Wils.* — *Br. indica.*

dicranacea (*C. M.*) *Mitt. M. Ind. or.* p. 64.

Bartramia dicraceana *C. M. in Bot. Zeit.* 1853, p. 57.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

diffRACTA *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 153.

2. — *Afr.* : M. Cameroon.

divaricata *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 83.

B. divaricata *Fl. Tasm. II*, p. 105; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 449.

B. gigantea *H. f. et W. Fl. N. Zeal. II*, p. 90.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

dumosa *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 82.

Bartramia dumosa *ej. M. austr. am.* p. 267 (p.p. fid. *C. M.*).

B. pendula *Sull. in Wilkes Expl. Exped.* p. 122.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Am. merid.* : Ins. Chiloë, Chil., Fuegia, ins. Eremit.

elegans *Wright in Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 263.

— *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

Eugeniae *Ångstr. in Oefv* : 1872, n. 5, p. 120.

Br. intermedia *ej. prius.*

2. — *Pac.* : Taïti.

gigantea (*Schwaegr.*) *Bryol. jav.* 1, p. 160, t. 130.

Bartramia gigantea *Schwaegr. Suppl. II, II*, p. 30, t. 161; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 36; *C. M. Syn. I*, p. 489.

Dicranum giganteum *Brid. Sp. M. I*, p. 97.

Hypnum arundinifolium *Duby in Moritzi Verz. d. Zolling. Pfl.* p. 131.

2. Rupic. et et terr. — *As.* : Java. *Afr.* : Ins. Borbon.

gnaphalea (*P. B.*) *W. P. Sch. hb.*

Bartramia arcuata *Brid. Bryol. univ. II*, p. 35 p.p.

B. gnaphalea *C. M. Syn. I*, p. 489.

B. tomentosa *Schwaegr. Sp. M.* p. 97.

Hypnum ? *gnaphaleum* *P. B. Prodr.* p. 64.

2. Fr. ign. — *Afr.* : Ins. Borbon., M. Cameroon.

grandis (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Bartramia grandis *Geh. et Hpe in Fl.* 1881.

Prionodon robustus *Hpe. Symb.* 1872, p. 55 et *Enum. M. Brasil.* p. 48.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

Hariotiana *Besch. in Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXVII et in *Miss. sc.*

Cop Horn, V, Bot., p. 291, t. 4, f. 17.

Fr. ignot.

— *Am. merid.* : Terr. Magell., Fuegia, ins.

Eremitae.

Hasskarliana (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 561.

Bartramia Hasskarliana Hpe. in Fl. 1865, n. 37.

— *Am. merid.* : Peruv. or.

hispida (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 560.

Bartramia hispida Mitt. M. austr. am. p. 264.

— *Am. sept.* : Jamaïc.

incana (*Tayl.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 555.

Bartramia incana Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 189 ; *C. M. Syn. I*, p. 501 ; *Mitt. op. cit.* p. 263.

2? Saxic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

inclinata (*Hpe. et Ltz.*) *Jaeg. l. c.*

Bartramia inclinata Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit. 1869, p.

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Æquator.

indica *Mitt. M. Ind. or.* p. 64.

Br. deflexa (forma minor. fol. magis deflexis) *Wils. in sched.*

— *As.* : Himalaya, M. Neilgherr.

integrifolia (*Tayl.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 558.

Bartramia integrifolia Tayl. in op. cit. 1846, p. 55 ; *C. M. Syn. I*, p. 490 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 267.

2. Ad rup. irror. — *Am. merid.* : M. Pichincha, And. Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1679.

intermedia (*Hpe.*) *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 60.

Bartramia intermedia Hpe. Sp. nov. mexic. in Verh. d. K. K. Zool. bot. Ges. in Wien, 7^a April. 1869.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

intermedia Ångstr. — *Br. Eugeniae*.

jamaïcensis (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 558.

Bartramia jamaïcensis Mitt. op. cit. p. 265.

— *Am. sept.* : Jamaïc.

Karsteniana (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 560.

Bartramia Karsteniana C. M. in Linn. 1874, p. 599.

2. — *Am. merid.* : Nov. Granat ? (ster.), Æquator.

Kilima N'Djarica (*C. M.*) *Par.*

Bartramia Kilima N'Djarica C. M. in Fl. 1888, p. 411.

Ster. In graminos. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

Lorentzi (*C. M.*) *Par.*

Bartramia Lorentzi C. M. in Linn. 1880-82, p. 406.

Fl. et fr. ignot. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

luteola *C. M. in Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.)

— *Pac.* : Austral. (Nov. Valesia).

Mac-Leana *Rehm. M. Afr. austr. n.* 539.

Ster. — *Afr.* : Transvaal.

mniocarpa *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1677.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Mülleri *Jaeg. Ad. I*, p. 561.

Bartramia divaricata C. M. in Linn. 1864, p. 594.

Ster. — *Am. sept.* : Costa-Rica,

pendula (*Hook.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 558.

Bartramia pendula *Hook. M. ex. t.* 21; *C. M. Syn. I*, p. 491; *Fl. Tasm. II*, p. 194 p.p.; *Handb. of. N. Zeal. Fl.* p. 448.

Bryum pendulum *Brid. Mant. M.* p. 120.

Mnium pendulum *Sm. in Trans. of the Linn. Soc. VII*, p. 262.

Philonotis pendula *Brid. Bryol. univ. II*, p. 27.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen ? (1). *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitae. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Campbell.

pinnata (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 559.

Bartramia pinnata *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 373; *Mitt. M. austr. am.* p. 265.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

plicata *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 83.

Bartramia plicata *ej. M. austr. am.* p. 266.

Paludic. — *Am. merid.* : And. Chilens.

robusta (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 560.

Bartramia robusta *H. f. et W. Fl. Antarct. I*, p. 133, t. 59 et *Handb. N. Zeal. Fl.* p. 447; *C. M. Syn. I*, p. 495 et *II*, p. 619.

Ster. — *Am. merid.* : Fuegia. *Pac.* : Ins. Auckland, Campbell.

rupestris (*Mitt.*) *Jaeg. l. c.*

Bartramia rupestris *Mitt. op. et l. cc.*

♂ et fr. ign. Ad rup. maritim. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitae.

scoparia (*Schwaegr.*) *W. P. Sch. hb.*

241

Bartramia scoparia *Schwaegr. Suppl. III. I, II, t. 211*; *C. M. Syn. I*, p. 490.

2. — *Am. sept.* : Antill. gallic.

Sieberi (*Hsch.*) *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 83.

Bartramia pendula *Spreng. Syst. veg. IV, II*, p. 323.

B. scoparia *Schwaegr. Sp. M.* p. 98.

B. Sieberi *Hsch. in Sieb. M. Nov. Holl. n. 13*; *C. M. Syn. I*, p. 491; *Fl. Tasm. II*, p. 194, t. 174, f. 6 et *Handb. N. Zeal. Fl.* p. 449.

2. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland. sept. et merid., Tasman.

squarrosa (*Mitt.*) *Jaeg. l. c.*

Bartramia squarrosa *Mitt. M. austr. am.* p. 265.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subarcuata *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 60.

Bartramia subarcuata *C. M. Syn. II*, p. 617; *Mitt. op. cit.* p. 262.

2. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subdisticha (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 556.

Bartramia subdisticha *Hpe. Symb.* 1872, p. 50.

♂ et fr. ignot. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subgnaphalea (*C. M.*) *Par.*

Bartramia subgnaphalea *C. M. in Fl.* 1890, p. 480.

2. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

(1) Cf. *Glyphocarpus chrysurus*,

subtomentosa (*Hpe.*) *Jaeg. l. c.*

Bartramia subtomentosa *Hpe. Symb.* 1872, p. 49 et 1877, p. 723.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

tomentosa (*Sw.*) *W. P. Sch. hb.*

Bartramia arcuata *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 62.*

B. macrocarpa *Hpe. in Linn.* 1863, p. 141.

B. macrotheca *ej. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 373 (fid. Mitt.).*

B. tomentosa *C. M. Syn. I, p. 488.*

Bryum tomentosum *Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1837.*

Mnium tomentosum *ej. Prodr. p. 139.*

? *Philonotis tomentosa* *Brid. Bryol. univ. II, p. 26.*

2. — *Afr.* : Alp. Abyssin. (*fid. Jaeger*). *Am. sept.* :

Guadalup., Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat.,
Quitens. et Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1670 et 1699 bis.

Trianae (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 558.*

Bartramia Trianae *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 374.*

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Wainioi *Broth. in Bot. Centralbl.* 1888, p. 86.

2. — *Am. merid.* : Brasil. or.

yunnanensis *Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 63.

Ster. — *As.* : Yunnan (1).

BROTHERA *C. M. mss.* (3 sp.)

Ankarcronœ *C. M. mss.*

Lignic. — *As.* : Japon.

japonica *Broth. mss.*

Lignic. — *As.* : Japon.

Leana (*Sull.*) *C. M. mss.*

Campylopus Leanus *Sull. M. of U. St. p. 19 et Ic. M. p. 29, t. 18 ; Lesq.*
et Jam. Man. p. 78.

Dicranum albicans *Bryol. eur. (fid. Hpe. in Jaeg. Ad. II, p. 656).*

Leucophanes ? *Leanus Sull. M. Allegh. I ed. n. 172 ; C. M. Syn. I, p. 446.*

Syrhophodon Leanus *Sull. l. c. (fid. Lesq. et Jam. l. c.).*

2. Lignic. — *As.* : Simla, Japon. *Am. sept.* : Ohio, reg. centr.

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 94 (Campylopus).*

BRUCHIA *Schwaegr. Suppl. II, p. 91* (18 sp.)

amœna *C. M. in Fl.* 1888, n. 1.

1 ? — *Pac.* : Austral.

aurea *Besch. Not. M. Paraguay, p. 259.*

Br. ligulata *C. M. in Fl.* 1888, n. 1.

1. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1261 et 3658.

Beyrichiana *C. M.* — *Sporledera.*

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum :

Br. Lycopodium *C. M.*

Bolanderi Lesq. in *Mem. Calif. Acad. I*, p. 5; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 23, t. 14; *Lesq. et Jam. Man.* p. 46.

— *Am. sept.*: M. Calif.

brevicollis Lesq. et *Jam. Man.* p. 47.

Syn. — *Am. sept.*: Carolin. infer.

brevifolia Sull. *M. of U. St.* p. 17 et *Ic. M.* p. 25, t. 15; *Lesq. et Jam. Man.* p. 48.

Br. *vogesiaca* n. 2 *H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed.* n. 15 p.p.

1. Terr. arenos. — *Am. sept.*: Carolin. infer., Texas, Ludovic.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 44.

brevipes Hook. *Ic. pl. rar. III*, t. 231 p.p.; *Sull. Ic. M.* p. 24, t. 14 p.p.; *Lesq. et Jam. Man.* p. 48.

Br. *flexuosa* var. *minor* C. M. *Syn. I*, p. 20.

1. Terr. argill. arenac. — *Am. sept.*: Carolin., Virgin., Florid., Ludovic.

Exs.: Drumm. *M. bor. am. II ed.* n. 16.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 45.

brevipes Hook. p.p. — Br. *elegans*.

Caroliniae Aust. — Br. *Ravenelii* var. *mollis*.

curviseta Lesq. et *Jam. Man.* p. 47.

Br. *vogesiaca* n. 2 *H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed.* n. 15 p.p.

1. — *Am. sept.*: Ludovic.

Donnellii Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 144; *Lesq. et Jam. Man.* p. 48.

1. — *Am. sept.*: Florid.

Eckloniana C. M. — *Sporledera*.

elegans (Hsch.) Jaeg. *M. cleistoc.* p. 35.

Br. *brevipes* Hook. op. et l. cc. p.p.; C. M. *Syn. I*, p. 18.

Phascum elegans Hsch. in *Linn.* 1841, p. 114.

1. — Afr. — C. B. Sp.

exigua C. M. — *Pleuridium*.

flexuosa (Schwaegr.) C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, et *Syn. I*, p. 20; *Lesq. et Jam. Man.* p. 46.

Phascum flexuosum Schwaegr. *Suppl. II*, p. 101; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 38.

2. (C. M.); 1 vel syn. (Lesq. et J.) — *Am. sept.*: Reg. merid.

« var. *microcarpa* (Wils.) Lesq. et *Jam. l. c.*

Br. *microcarpa* Wils. mss.; *Drumm. M. bor. am. II ed.* n. 14.

Sporledera setifolia Jaeg. *M. cleistoc.* p. 35.

Ut et cum typ.

flexuosa Sull. — Br. *Sullivantii*.

var. *minor* C. M. — Br. *brevipes*.

var. *nigricans* Sull. — Br. *Sullivantii* var. *nigricans*.

Hallii Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, V, p. 21; *Lesq. et Jam. Man.* p. 47.
— *Am. sept.*: Texas.

Hampeana C. M. — *Sporledera*.

ligulata C. M. — Br. *aurea*.

longicollis Eaton in *Bull. Torr. bot. Club*, 1890, p. 100, t. 101.

1. — *Am. sept.*: New Hampshire.

microcarpa Wils. — *Br. flexuosa* var. *microcarpa*.
minuta Mitt. — *Sporledera*.
nigricans Aust. — *Br. Sullivantii* var. *nigricans*.
palustris C. M. — *Sporledera*.

Ravenelii Wils. mss.; *Sull. M. of U. St. p. 17 et Ic. M. p. 26, t. 16; Lesq. et Jam. Man. p. 49.*

Sporledera Ravenelii Jaeg. *M. cleistoc. p. 35.*

1. Terr. — *Am. sept. ; Carolin. inf.*

Exs. ; Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 43.

« var. *mollis* Lesq. et Jam. l. c.

Br. Carolinae Aust. in *Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 144.*

Ut typ. — *Am. sept. ; Florid.*

Rehmanni C. M. — *Sporledera*.

repens Hsch. — *Platygyrium*.

Schwaegrichenii Jaeg. — *Sporledera Hampeana*.

Sullivantii Aust. in *Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 143; Lesq. et Jam. Man. p. 46.*

Br. flexuosa Sull. *Ic. M. p. 22 (excl. descript.) t. 13.*

1. Terr. argillac. — *Am. sept. ; Reg. merid.*

« var. *nigricans* Lesq. et Jam l. c.

Br. flexuosa var. *nigricans* Sull. *M. of U. St. p. 17; Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 33.*

Br. nigricans Aust. in op. et l. cc.

Ut typ. — *Am. sept. ; Alabama.*

Exs. ; Sull. et Lesq. M. bor. am. ed. n. 42.

texana Aust. in op. c. V, p. 21.

1. — *Am. sept. ; Texas.*

trobasiana de Not. in *Hb. critt. ital. fasc. XXXVI et Epil. p. 729; W. P. Sch. Suppl. Bryol. eur. I-II, t. I et Syn. II ed. p. 29.*

1. In prat. arid. — *Eur. ; Stiria, Lac. major (Trobaso).*

uruguensis C. M. in Linn. 1878-79, p. 231.

2. — *Am. merid. ; Uruguay.*

vogesiaca Schwaegr. *Suppl. II, p. 91, t. 127; Bryol. eur. I, t. II; C. M. Syn. I, p. 20; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 28.*

Saproma vogesiacum Brid. *Bryol. univ. I, p. 53.*

Voitia vogesiaca Hsch. in Moug. et Nestl. *Stirp. crypt. Voges. rhen. fasc. VIII, n. 706.*

1. In decliv. gramin. humid. et in turf. — *Eur. ; Voges. (M. Hohnneck), Palatin. super., Salisburg.*

Exs. ; Rab. Bryoth. eur. n. 306, 1201.

vogesiaca n. 2. H. f. et W. p.p. $\left\{ \begin{array}{l} \text{— } Br. brevifolia. \\ \text{— } Br. curviseta. \end{array} \right.$

Whiteleggei C. M. — *Sporledera* (1).

BRYELLA Berk. *Handb. of Brit. M. 1863.*

recta Berk. — *Phascum*.

Bryotis C. M. in Linn. 1875, p. 380 (sect. **BRYI.**)

(1) In Enum. Kindb. nomen nudum :
Br. incana C. M.

BRYOXIPHIMUM (1) Mitt. M. austr. am. p. 580 (3 sp.)

mexicanum Besch. in op. et l. cc.

Br. norvegicum Mitt. M. austr. am. p. 580.

Eustichium norvegicum W. P. Sch. in M. Liebmann. Besch. Pr. bryol. mexic. p. 29.

♂ et fr. ign.

— Am. sept. : Mexic.

norvegicum (2) (Brid.) Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. XII, p. 580.

Eustichia norvegica C. M. Syn. I, p. 42; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 148.

Eustichium norvegicum Bryol. eur. III, t. 195.

Fissidens imbricatus Desv. in Brid. Bryol. univ. II, p. 674.

Phyllogonium Eustichia norvegicum Brid. l. c.

Ph. norvegicum Sull. Contrib. on Bryol. of N. Americ. c. ic.

2. Rupic. — Eur. : Norveg. ? Island. Am. sept. : de Ohio centr. ad Kentucky (ster.) ; Wisconsin (fert. !)

norvegicum { Mitt. — Br. mexicanum.
Bryol. eur. — Bryoxiphium.

Savatieri (Husn.) Mitt. M. and Hepatic. from Japan, 1891, p. 154.

Eustichia japonica Berggr. in Fl. 1881, p. 290 (fid. Geheeb in op. cit. 1883, n. 31).

E. norvegica W. P. Sch. in M. Savatier n. 148.

E. Savatieri Husn. Rev. bryol. V, p. 85.

2. Ad rup. madid. et in spelunc. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 72, 80, 192, 523, 818, 824, 3524, 8641.

BRYUM Dill. Hist. M. p. 338 emend. (560 sp.)

abbreviatum Hpe. Enum. M. Brasil. p. 31.

2?

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Abduanum Rota Cat. M. Bergom ; de Not. Epil. p. 754 (3).

Ad rup. et aren. humid. — Eur. : Ital. sup. (Vall. Tellina).

aberrans Hpe. Symb. 1877, p. 724.

Ster.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

abyssinicum C. M. — Brachymenium.

acanthoneuron Ångstr. in Oefv.... 1876, n. 4, p. 20.

Ster.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

acaulon { foliis teneris confertis, capsulis conicis Dill. — Barbula caes-
pitosa (fid. Hedw.).
heteromallum, setis longis pallidis Dill. — Leptotrichum pallidum.

aciculare L. — Rhacomitrium.

aciculariforme Hoffm. — Rhacomitrium sudeticum ?

aciphyllum Voit. — Mnium affine.

var., Voit. — Mnium cuspidatum.

acuminatum { Bryol. eur. — Webera.
Sw. — Barbula agraria.
Wils. — Webera himalayana.

var. arcuatum Bryol. eur. — Webera acuminata var. arcuata.

var. minus Bryol. eur. — Webera acuminata var. minor.

(1) Sub *Bryoziphio*, nom. a cl. Bescherelle in Journ. de bot. 1892, p. 180 correcto.

(2) Cf. G. Knight in Bull. of Torr. bot. Club, 7th 1883 et Rev. bryol. 1884, p. 15 (descript. fructus).

(3) Forsan Br. *Mühlenbeckii* (fid. Limpr.).

var. *polysetum* Bryol. eur. — *Webera acuminata* var. *polyseta*.
 var. *tenellum* Bryol. eur. — *Webera acuminata* var. *tenella*.

acutiusculum C. M. in *Fl.* 1887, p. 220.

2. — *Am. sept.* : Alaska.

acutum Lindb. in *Mitth. v. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 5^a Decembr. 1885, p. 239.

Br. *calophyllum* Berggr. *M. Spatsb. n.* 73.

Polyg. (Lindb.), 1 (Philib.) (1). Ad rip. aren. fluv. — *Eur.* : Lappon. ross., Norveg., Alp. Vales. As. : Jenissei inf. *Am. sept.* : Groenland.

acutum P. B. — Blindia.

aequabile C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 368.

Ster. Muric. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

aestivum L. — *Gymnostomum curvirostre*.

affine { Brid. — *Mnium*.
 Gmel. — *Orthotrichum*.
 Lindb. — Br. *cuspidatum*,

afro-alpinum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 248.

— *Afr.* : Orange.

afro-crudum C. M. — *Webera*.

afro-julaceum C. M. in *Dusen M. Cam. n.* 295.

— *Afr.* : M. Cameroon.

afro-littorale C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 88 et in *Forschungsreise....* p. 62.

Ad terr. humid. — *Afr.* : Monrovia, Lagos, M. Cameroon.

Exs. : Dusen, M. Camer. n. 81.

agrarium Sw. — *Barbula*.

albicans Mitt. { — *Webera*.
 (1876). — *Webera austro-albicans*.

var. *glaciale* C. M. — *Webera albicans* var. *glacialis*.

albidum { L. — *Octoblepharum*.
 et *glaucum*, *fragile majus* Dill. — *Leucobryum glaucum*.
 et *glaucum fragile minus* Dill. — *Leucobryum minus*.

albo-pulvinatum C. M. in *Fl.* 1886, p. 507.

Ster. — *Afr.* : Angola.

albulum Mitt. *M. Ind. or. p.* 69.

2 ? — As. : India.

algovicum Sendtn. — Br. *pendulum* var. *compactum*.

alpiniforme Kindb. in *Mac. Cat. p.* 271.

Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Ontario.

alpinulum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 97.

2. Ster. — *Afr.* : Ins. Nossi-Bé.

alpinum L. *Mant. M. II*, p. 309 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 663 ; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 76), t. 380 ; C. M. *Syn. I*, p. 235 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 440.

Br. *hypnoides pendulum sericeum*, coma insigni atro-rubente Dill. *Hist. M. p.* 394, t. 50, f. 64.

Br. pachypoma Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 364 p.p.

Br. teretiusculum Hook. in *Wall. Cat. n.* 7597; *Harv. in Lond. Journ. of bot. l. c.* p. 9 et *Ic. pl. rar. t.* 20, f. I (fid. *Mitt.*); *C. M. Syn. I*, p. 303.

Mnium alpinum L. *jun. Meth. M.* p. 366.

2. Ad rup. silic. madid. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in subalp. per zon. interm. et sept., raro merid. *As.* : Tibet. occ., Nepal., Himalaya, Khasia, M. Neilgherr., Caucas. *Afr.* : Madeir., M. Cameroon, Kilima N'Djaro. *Am. sept.* : Columb. brit., reg. or.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 364, 582.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 293.

« *var. angustifolium* Husn. *Muscol. gall.* p. 247.

Br. atlanticum Solms-Laub.

Ut typ. — *Eur.* : Gall. occ. et merid.

var. brevifolium Myr. — *Br. Mühlenbeckii*.

var. gemmiparum Husn. — *Br. gemmiparum*.

var. mediterraneum de Not. — *Br. gemmiparum*.

« *var. meridionale* W. P. Sch. *op. cit.* p. 441.

Præcip. ad rup. marit. — *Eur.* : Cornwall., Lusit. *Afr.* : Ins. Canar., Madeir.

« *var. viride* Husn. *l. c.*

Ut et cum typ.

alpinum { Vill. — *Br. Schleicheri*.
viridissimum et majus, capitulis crassissimis Hall. — *Bartramia*
ithyphylla.

alte-operculatum Besch. *op. cit.* p. 93.

2. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciæ.

alticaule C. M. — *Webera*.

var. robustior C. M. — *Webera alticaulis var. robustior*.

alto-roseum C. M. — *Rhodobryum*.

ambiguum Duby. — *Br. plumosum*.

Amblyodon C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 293.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin. Tucum.

amplirete Rehm. *M. Afr. austr.*

— *Afr.* : Orange.

amplirete C. M. — *Webera*.

ampullaceum, foliis { et ampullis angustioribus Dill. — *Tetraplodon*
mnioides *var. Brewerianus*.
serpylli pellucidis, collo crassiore Dill. — *Splach-*
num sphaericum.
thymi pellucidis, collo strictiore Dill. — *Splach-*
num ampullaceum.

andicola Hook. — *Rhodobryum*.

androgynum Hedw. — *Aulacomnium*.

β *prolixum* Roth. — *Aulacomnium palustre var. polycephalum*.

angolense W. et Duby. — *Brachymenium*.

angulosum Menz. — *Conostomum australe*.

angustifolium Brid. *Bryol. univ. I*, p. 685 ; *C. M. Syn. I*, p. 309 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 300.

2. — *Am. sept.* : Hispaniola.

angustifolium { Kaur. — *Br. saltense*.
W. P. Sch. — *Br. bolivianum*.

angustirete *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVI, p. 94.*

Syn. Terr. et rup. hum. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit.

annotinum { *Brid.* — *Mielichhoferia Jamesoni*.
Hedw. — *Webera*.
lanceolatum pellucidum, capsulis oblongis pendulis Dill. —
Webera annotina.
palustre, capsulis ventricosus pendulis Dill. — *Bryum*
pseudo-triquetrum ?

annulatum *Hook. f. et Wils. Fl. Antarct. I, p. 134, t. 60; C. M. Syn. I, p. 577; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 443.*

2. *Ad terr. argill.* — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., ins. Campbell.

anoectangiaceum *C. M. et Kindb. Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 130.*

1 ? *Ad rup. torrent.* — *Am. sept.* : Columb. brit., M. Rupestr.

Anomodon *Mont. in Ann. sc. nat. 1857, p. 151.*

2. — *Afr.* : Ins. S. Anton. cap. Viridis.

antarcticum *H. f. et W.* — *Webera*.

Antillarum *W. P. Sch.* — *Rhodobryum*.

apalodictyoides *C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 21; Mitt. M. Ind. or. p. 74.*

— *As.* : M. Neilgherr.

apiculatum *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 102, t. 72; C. M. Syn. I, p. 308; Mitt. M. austr. am. p. 301 (1).*

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or., Monte Video.

apiculatum { *Bryol. eur. (1839).* — *Br. marginatum*.
Dz. et Mk. — *Br. plumosum*.
Wils. — *Br. Mildeanum*.

apocarpum *L.* — *Grimmia*.

var. *aureum* *Retz.* — *Hedwigia ciliata*.

var. *incanum* *Flrh.* — *Hedwigia ciliata*.

var. β *L.* — *Hedwigia ciliata*.

apocaulon *Hoffm.* — *Grimmia apocarpa*.

appressum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1893, I, p. 116.*

2. — *Afr.* : Madagascar.

appressum *Wils.* — *Br. turbinatum*.

aptychoides *C. M.* — *Webera*.

aquaticum { *Gmel.* — *Cinclidotus*.
Hoffm. — *Dichodontium pellucidum*.

arachnoideum *C. M. in Fl. 1879, n. 24.*

Ster. — *Afr.* : M. Kenia.

archangelicum *Bryol. eur. IV (mon. p. I), t. 333; C. M. Syn. I, p. 271 et II, p. 569; W. P. Sch. op. cit. p. 416.*

Br. Tauriscorum *Limpr. in Schlesisch. Gesells. 1883, p. 241.*

Syn. Terr. — *Eur.* : Spitzberg, Mar. alb., Dovre, Alp. Carinth., Salsb., Stir., Helvet. (Gemmi). *As.* : Jénissei inf. *Am. sept.* : Ins. Sabine, Gaspes., M. Rupestr.

arctico $\times$ *pallens* *Philib.* — *Br. flavescens*.

(1) Cl. Mitt. procul dubio errat, quam in M. Ind. or., p. 70, *Br. apiculatum* Schw. ad *Br. nitens* Hook. ut syn. ducit.

arcticum (R. Br.) *Bryol. eur. IV* (mon. p. 2), t. 335; *C. M. Syn I*, p. 269; *W. P. Sch. op. cit.* p. 409.

Br. nutans var. *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 263 B.

Hemisynapsium arcticum *Brid. Bryol. univ. I*, p. 606.

Pohlia arctica R. Br. *Suppl. App. ad iter Parry*. p. 196.

Syn. Ad terr. humos. et in rup. fiss. humid. — *Eur.* : Spitzberg, Sept. Insul., ins. Ursor., Alp. Scandin., Tatra, Salisb., Stir., Julian., Carinth., Bavar., Austr. sup. et inf., Tirol., Helvet., Jurass.; deest in Britann. As. : Penins. Tschutschica, Jenissei. *Am. sept.* : Fret. Smith, ins. Melville, Groenland, Labrador, Gaspes., reg. sept. occ., M. Rupestr., M. Calif.

« var. helveticum (Phil.) *Husn. Muscol. gall.* p. 235.

Br. helveticum *Philib. in Rev. bryol.* 1886, p. 83.

Ut typ. — *Eur.* : Helvet.

arcticum Lindgr. — Br. Lindgrenii.

arcuatum *Limpr. Einig. neue Art....* 1883, p. 237 et *Laubm. Deutschl. II* p. 304.

Syn. Ad rup. madid. umbros. — *Eur.* : Norvegia.

ardonense *Breidl. in Oesterr. bot. Zeitschr.* 1889, n. 4.

1. — As. : Caucas.

Arenae C. M. in *Fl.* 1885, p. 402.

2. Paludic. — *Am. merid.* : Fret. Magell.

arenarium *Jur. Laubm. Oesterr. Ung.* p. 273.

Br. atro-purpureum *Garov. Enum.* p. 28.

Br. atro-purpureum var. arenarium *Husn. Muscol. gall.* p. 244.

2. Limic. — *Eur.* : Austria, Salisburg., Gall. centr. (Bourbonnais).

arenarium { C. M. — Br. Pootenianum.
Saut. — Br. Blindii.

areoblastum C. M. in *Fl.* 1886, p. 280.

2. Terr. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

argentatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 83 et in *Forschungsreise...* p. 41.

Ster. — *Afr.* : Ins. Ascension.

argenteum L. *Sp. pl.* p. 1586; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 657; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 78), t. 384; *C. M. Syn. I*, p. 314; *W. P. Sch. op. cit.* p. 448.

Br. pendulum, julaceum, argenteum et sericeum *Dill. Hist. M.* p. 392, t. 5.

Hypnum argenteum *Schrank Baiers Fl. II*, p. 469.

Mnium argenteum *Hoffm. Deutsch. Fl. II*, p. 51.

2. Ferè ubiq., except. arbor., per tot. fer. terrar. orbem, a Spitzb. et Groenl. ad terr. antarct.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 251.

Faurie *Pl. Japon.* n. 13, 89.

Mac. *Canad. M.* n. 177.

Mand. *Pl. Boliv.* n. 1663.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 92, 238.

Rehm. *M. Afr. austr.* n. 259.

W. Schimp. *M. Abyss.* n. 455.

var. argyrotichum Mitt. — Br. argyrotichum.

« var. australe C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 260.

— *Afr.* : Orange.

- var. *corrugatum* Besch. — Br. *corrugatum*.
- « var. *costa-ricense* Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 167.
Ad mur. et terr. — Am. sept. : Costa-Rica.
- « var. *lanatum* Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.
Br. *lanatum* Brid. op. cit. p. 660.
Mnium *lanatum* P. B. Prodr. p. 75.
In mont. editior. ut in reg. campestr. zon. merid. — Eur. : Alp. Tirol., etc. Afr., utraque Amer. et Austral.
Eas. : Mandon Pl. Boliv. n. 1664.
- « var. *majus* Schwaegr. Suppl. I, II, p. 88; Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.
Br. *argenteum* var. *muticum* Lindb. Spetsb. M. p. 546.
Br. *julaceum* Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 70, n. 2.
Loc. humidior. — Eur. et Am. sept. : Cum typ.
var. *muticum* Lindb. — Br. *argenteum* var. *majus*.
- « var. *submuticum* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 93.
In carbonar. — Afr. : Ins. Borbon.
- argentisetum* C. M. in Fl. 1890, p. 478.
Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.
- argutidens* Rehm. — Rhodobryum.
- argyreum* C. M. in Linn. 1880-83, p. 380.
2. — Am. merid. : Uruguay.
- argyrotrichum* C. M. in Linn. 1865, p. 385.
Br. *argenteum* var. *argyrotrichum* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 307.
Ster. Terr. — Afr. : Niam-Niam, Usagara.
- « var. *laxum* C. M. in op. et l. cc.
Ut typ. — Afr. : Niam-Niam.
- aristatum* Dicks. - *Barbula unguiculata*.
- Arnellii* Par.
Br. *flexisetum* Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 44.
Syn. Ad terr. humid. — As. : Jenissei inf.
- articulatum* Sendtn. — Br. *Funkii*.
- Aschersoni* C. M. in Fl. 1874, n. 31.
2. Ster. In foss. aquat. — Afr. : Oasis Dachel.
- aterrimum* C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 235.
— Afr. : C. B. Sp.
- atlanticum* Solms-Laub. — Br. *alpinum* var. *angustifolium*.
- atro-purpureum* Wahlenb. in Web. et Mohr Ind. Mus. Vid. Lapp. p. 360 ?
Bryol. eur. IV (mon. p. 73), t. 378; C. M. Syn. I, p. 306 et II, p. 576; W. P. Sch. op. cit. p. 438.
Br. *bicolor* Turn. Muscol. Hib. p. 121, t. II, f. 2 (an Dill. Hist. M. p. 397, t. 50, f. 66 f et g ?); Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 16 (fid. Lindb. M. Scand. p. 16).
Br. *carneum* β *atro-purpureum* Schwaegr. Sp. M. p. 67.
Br. *dichotomum* Wils. Bryol. brit. p. 244, t. 50; H f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 85.

Br. erythrocarpon *Brid. Bryol. univ. I, p. 654.*

Br. erythrocarpon β *bicolor* *ej. l. c. p. 655.*

Br. pulchellum *var. atro-purpureum* *Wahlenb Fl. Lapp. l. c.*

Mnium bicolor *P. B. Prodr. p. 74.*

2. *Muric. et terr., in arenos. marit. — Eur. : Zon. merid., rar. intermed., rariss. septentr. As. : Caucas., Syria. Afr. : M. Sinai, Alger., ins. Canar., Madeir. Am. sept. : Niagara, Tennessee, Nevada, Illinois, Pensilv., New York, Florid., Alabama. Pac. : Austral., Nov. Zeland.*

Ews. : Bourg. Pl. Can. n. 1152.

Rab. Bryoth. eur. n. 87, 240, 1217, 1332.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 291.

var. arenarium *Husn. — Br. arenarium.*

« *var. macrothecium* *Besch. Cat. M. Alger. p. 25.*

— Afr. : Alger.

atro-purpureum { *de Not. — Br. murale.*
 Garov. — Br. arenarium.

atro-sanguineum *C. M. in Linn. 1880-83, p. 386.*

2. *Muric. et terr. — Am. merid. : Argentin. subtropic.*

atro-virens *Vill. — Br. erythrocarpum.*

attenuatum { *Dicks ? Brid. (fid. C. M.) — Br. pallens var. abbreviatum.*
 Dicks ? (fid. Lindb.) — Entosthodon Templetoni.

Atwateriae *C. M. in Fl. 1873, p. 76 ; Lesq. et Jam. Man. p. 234.*

Br. Macounii *Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. 110.*

2. *Ad rup. humid. — Am. sept. : Ontario, Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Calif.*

Ews. : Mac. Canad. M. n. 176.

Auberti *Brid. Mant. M. p. 119 ; C. M. Syn. I, p. 262.*

Br. Polla Auberti *Brid. Bryol. univ. I, p. 711.*

Mnium Auberti *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 132, t. 80.*

Syn. — Afr. : Ins. Borbon., Franciæ.

Auberti { *Hsch. — Bryum schistoneuron var. decumbens.*
 Schwaegr. — Bryum schistoneuron var. densifolium.

auratum *Mitt. M. Ind. or. p. 67.*

Anomobryum auratum *Jaeg. Ad. I, p. 604.*

Brachymenium filiforme *Wils. in Kew Journ. bot. 1X, p. 363 p.p.*

2. *— As. : Nepal., Himalaya.*

aureum *Schreb. — Leptobryum piriforme.*

auricomum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 99.*

2. *— Afr. : Ins. Borboniæ.*

auriculatum *C. M. in Linn. 1875, p. 379.*

Ster. Terr. — Afr. : Niam-Niam.

australe *Hpe. Ic. M. t. 26 ; C. M. Syn. I, p. 285.*

2. *— Pac. : Austral. or.*

« *var. minus* *Hpe. in Linn. 1852, p. 714 (nom.)*

— Pac. : Austral.

austro-albicans *C. M. — Webera.*

austro-caespiticiu *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungsreise... p. 13.*

Syn. — Afr. : Ins. Kerguelen.

austro-crudum C. M. — Webera.

austro-elongatum C. M. — Webera.

austro-nutans C. M. (Ins. Kerg.) — Webera pseudo-nutans.

austro-polymorphum C. M. — Webera.

austro-turbinatum C. M. in Linn. 1880-83, p. 368.

Ster. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

autumnale Limpr. *Einig. neue Art...* 1883, p. 239 et *Laubm. Deutschl. II*, p. 312.

Syn. In aren. humid. — Eur. : Norveg.

Axel-Blyttii Kaurin in *Bot. Not.* 1889, n. 2; *Philib. in Rev. bryol.* 1889, p. 61.

1. — Eur. : Norveg. merid.

badium Br. in *Brid. Bryol. univ. I*, p. 850; *W. P. Sch. op. cit.* p. 444.

Br. caespiticiu C. M. *Syn. I*, p. 284 p.p.

Br. caespiticiu var. *badium* W. P. Sch. *Coroll.* p. 74.

Br. caespiticiu var. *gracillimu* *Bryol. eur. IV* (mon. p. 71), t. 375 B.

2. In arenos. humid. — Eur. : Zon intermed. As. : Caucas. occ. et centr.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 91, 1086, b et c.

Baenitzi C. M. in *Fl.* 1888, p. 417 (1).

Syn. — Eur. : Norveg. sept.

Baileyi Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV Suppl. (nom.) et in Oefv....* 1890, p.

2. In lapidos. — Pac. : Australia (Queensland).

balanocarpum Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 82.

1. Terr. — As. : Tonkin.

baldense Vent. in *de Not. Epil. et in Rev. bryol.* 1881, p. 31.

2. Ad rivul. — Eur. : M. Baldo, Valesia.

barbatum Curt. — *Barbula unguiculata*.

barbulaceum C. M. in Linn. 1875, p. 389.

Br. coronatu Wils. in *Gardn. M. Brasil.* n. 35; C. M. *Syn. I*, p. 307 p. 1.

2. — Am. merid. : Brasil.

Barnesi Wood in *W. P. Sch. op. cit.* p. 471 (2).

Br. argenteu L. (fid. *Braithw. Brit. Mossfl. II*, p. 176).

Ster. In coll. arenac. — Eur. : Anglia (Westmoreland).

Baroni Mitt. mss. : C. H. Wright *M. Madag.* p. 5.

— Afr. : Madagascar.

Bartramia { Gmel. — *Bartramia Halleriana*.
Schwaegr. — *Cryptopodium Bartramia*.

bartramioides Rehm. *M. Afr. austr.* n. 257.

— Afr. : Orange.

bartramioides Hook. — *Cryptopodium bartramioides*.

bartramiopsis C. M. in Linn. 1880-83, p. 372.

Ster. — Am. merid. : Uruguay.

Baueri Hpe. in Linn. 1859-60, p. 457.

— Am. sept. : Sierra Nevada Calif.

(1) Forsan *Br. subglobosum* Schlieph. (fid. *Limpr. op. cit.* p. 356).

(2) *Br. lacustre* forma *bubilligera* (*Limpr. op. cit.* p. 317).

Bescherellei Jaeg. *Ad. I*, p. 627.

Br. erythrocarpoides W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 214.
Syn. — *Pac.* : Nov. Caledon.

Bescherellei Ren. et Card. — Br. Rodriguezii.

Beyrichianum C. M. p.p. } — *Rhodobryum* Beyrichianum.
 } — *Rhodobryum* Swartzianum.

bicolor C. M. in *Fl.* 1890, p. 476.

2. In palud. edit. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

bicolor } Dicks. — Br. erythrocarpum (fid. Milde).
 } Turn. — Br. atro-purpureum.

Biddlecomiae Aust. in *Coult. Bot. Gaz. II*, p. 110; *Lesq. et Jam. Man.*
p. 226.

Syn. — *Am. sept.* : Colorado.

Bigelowii Sull. — Webera.

Billardieri Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 115, t. 76; *Brid. Bryol. univ. I*,
p. 667; C. M. *Syn. I*, p. 253.

B. rufescens H. f. et W. ? (f. Mitt.)

Ad arbor. et rup. humid. — *Pac.* : M. Austral., Nov. Belg., Tas-
man., ins. Lord Howe.

Billardieri Bryol. eur. — Br. provinciale.

bimoideum de Not. *Epil.* p. 383.

— *Eur.* : Vall. Tellin.

bimum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 83; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 678; *Bryol.*
eur. IV (mon. p. 50), t. 363; C. M. *Syn. I*, p. 257; W. P. Sch. *op.*
cit. p. 430.

Br. hybridum Br. in sched.

Br. pseudo-triquetrum *Brid. l. c.* p. 676 et auct. alior., p.p. (1).

Br. turbinatum *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 266.

Syn. In prat. uligin. et ad rup. madid. — *Eur.* : Reg. campestr. et
montan., rar. alp. zon. septr. et interm.; ins. Melit. As. : Amour,
Caucas. *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Am. sept.* : Franz Joseph Fjord,
Terr. Nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, lac.
Sup., Manitoba, Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Ore-
gon, Nevada, Illinois, Wisconsin., Kansas, reg. centr. et or. *Am.*
merid. : And. Nov. Granat. et Quitens. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

Eas. : Mac. *Canad. M. n.* 170.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 239, 833, 932, 1027.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 278.

« var. angustifolium *Kindb. in Mac. Cat.* p. 123.

Rupic. — *Am. sept.* : Ontario.

« var. atrotheca *Ren. et Card. in Bot. Gaz.* 1894, p. 238.

— *Am. sept.* : Terr. nov.

var. cuspidatum *Bryol. eur.* — Br. cuspidatum.

« var. longicollum *Warnst. Moosfl. Prov. Brandeb.* p. 52.

— *Eur.* : Brandebourg.

« var. obtusi-operculatum *Warnst. l. c.*

— *Eur.* : Brandeb.

« var. subnivale *Mdo. Alg. Alp.* p. 78.

— *Eur.* : Alp. Algov.

(1) De synonym. antiq. cf. C. M. l. c.

bimo aff. Wils. — Br. pseudo-triquetrum.

bipartitum Dicks. — *Ceratodon purpureum*.

blandum Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 546 et *Fl. Antarct. I*, p. 134, t. 60; *C. M. Syn. I*, p. 318 et *II*, p. 577; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 441.

2. Paludic. — *Pac.*: Nov. Zeland. sept. et med., ins. Campbell.

“ *var. luridum* Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* p. 190.

— *Pac.*: Nov. Zeland., ins. austral.

Blindii Bryol. eur. IV (mon. suppl. p. II), t. 383; *C. M. Syn. I*, p. 298; *W. P. Sch. l. c.* p. 447.

Argyrobryum Blindii Kindb. *Art. d. Laubm. Schw. u. Norveg.* p. 78.

Br. *arenarium* Saut. in *Fl. Salzb. III*, p. 46.

Br. *Funkii* var? Bryol. eur. mon. Bryi, p. 77.

Br. *Funkii* var. *subspheericum* W. P. Sch. in *Husn. Muscol. gall.* p. 243.

2. In terr. arenos. v. argill. aren. et tophac. — *Eur.*: Alp. Rhaet., Pinzgov., Salisburg., Stir., Carinth., Helvet. *Am. sept.*: M. Rupestr. et Selkirk.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 502.

Rab. Bryoth. eur. n. 1088, 1333.

Un itin. 1863, n. 25.

var. Payoti Husn. — Br. *Payoti*.

Boissieri de Not. — *Webera longicolla*.

Bolanderi Lesq. — *Webera longicolla*.

bolivianum Par.

Br. *angustifolium* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1605.

— *Am. merid.*: And. Boliv.

Bommanssonii Lindb. in *Mitth. v. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 1884, p. 183.

— *Eur.*: Fennia.

boreale Schwaegr. — Br. *pallescent* var. *boreale*.

Botterii C. M. in *Linn.* 1874, p. 622.

2. Lignic. — *Am. sept.*: Mexic.

brachydontium Hpe. — *Webera*.

brachymeniopsis C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 301.

2. — *Am. merid.*: Argentin. Tucuman.

brachyneuron Kindb. in *Ott. Nat. V*, p. 180.

Syn. — *Am. sept.*: Fret. Behring.

brachyphyllum Mitt. *M. austr. am.* p. 302.

2. — *Am. merid.*: And. Quitens.

brasiliense Hpe. *Symb.* 1877, p. 725.

2. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

brevicaule W. P. Sch. mss.; *Mitt. op. cit.* p. 303.

Br. *Liebmannianum* C. M. *Syn. II*, p. 573.

2. — *Am. sept.*: Mexic.

brevicaule { Hpe. — *Brachymenium*.
Hpe. (pl. Austr.) — *Bryum curtum*.
Vill. — *Grimmia commutata*.

brevicoma Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 31.

2. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

breviflorum Gmel. — *Ceratodon purpurens*.

brevifolium Dicks. } — *Barbula fallax* var. *brevifolia*.
 } — *Trichostomum tophaceum* var. *brevifolium*.

Bridelianum C. M. — *Webera*.

Brownianum Dicks. — *Tetrodontium*.

Brownii *Bryol. eur. IV* (mon. suppl. p. 3), t. 337; *C. M. Syn. I*, p. 273;
W. P. Sch. op. cit. p. 411.

Hemisynapsium bryoides *Brid. Bryol. univ. I*, pp. 605 et 840.

Pohlia bryoides *R. Br. App. ad iter Parrey.* p. 196.

Syn. In aren. scœp. inund. terraq. turfac. — *Eur.*: Alp. Norveg. *Am. sept.*: Franz Joseph Fjord, ins. Melville, Labrador, Terr. nov., *M. Rupestr.*

brunnescens } *Ren.* — *Br. torquescens* form. *monoica*.
 } *Schleich.* — *Br. subrotundum*.

bulbiferum Neck. — *Phascum cuspidatum*.

bulbifolium *Lindb. in Not. ur Saells. pr. Faun. et Fl. Fenn. Foerh.* 1873
et in Rev. Bryol. 1887, p. 63.

Syn. In argill. et arenos. humid. — *Eur.*: Lappon. Tornens.

bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis piriformibus nutantibus *Dill.* — *Funaria hygrometrica*.

bulbillicaule *C. M. in Fl.* 1879, n. 24.

Ster. — *Afr.*: *M. Kenia*.

bulbilliferum *Rehm. M. Afr. austr. n* 252.

— *Afr.*: *C. B. Sp.*

bulbillinum *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 384.

2. *Saxic.* — *Am. merid.*: *Argentin. Tucuman.*

bulbillosum *Mont. in Ann. sc. nat. XVI, II*, p. 268 *et Syll. p.* 33; *C. M. Syn. I*, p. 301.

Br. dichotomum (*fid. Mitt.*)

2? — *Am. merid.*: *Brasil. austr. or.*

bullatum *C. M. in Fl.* 1887, p. 221.

2. — *Am. sept.*: *Alaska.*

bullosum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 44.

— *Afr.*: *M. Cameroon.*

caesium *Vill.* — *Leptotrichum glaucum*.

caespitiforme *de Not.* — *Br. subrotundum*.

caespiticiu *L. Sp. pl. p.* 1586; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 669; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 70), t. 374; *C. M. Syn. I*, p. 284 p.p.; *W. P. Sch. op. cit.* p. 443.

Br. flaccidum *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 85?

Br. pachypoma *Wils. in Kew Journ. of bot. IX*, p. 364.

Br. pendulum ovatum caespiticiu et pilosum, seta bicolori *Dill. hist. M. p.* 396, t. 50, f. 66.

Hypnum caespiticiu *W. et M. Bot. Taschb. p.* 283.

Mnium caespiticiu *Brid. M. Rec. II, III*, p. 96.

2. *Ad mur., sax. et terr.* — *Eur.*: *Vulgatiss. As.*: *Jenissei med., Obi, Taimyr, Jakoutsk, Saghalien, Kashmir, Himalaya occ., Khasia, Caucas., As. min. Afr.*: *Occid. et merid. Am. sep.*: *Tota, a Groenland et Columb brit. ad Florid. et Ludovic. Pac.*: *Ins. Sandwic., Nov. Zeland., Tasman.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 178.

Rab. Bryoth. eur. n. 90.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 288.

var. *badium* Bryol. eur. — Br. *badium*.

var. *comense* Husn. — Br. *comense*.

« var. *crinitum* Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* II, p. 191.
— Pac. : Tasman.

var. *gracillimum* Bryol. eur. — Br. *badium*.

« var. *imbricatum* Bryol. eur. l. c. t. 37 ; W. P. Sch. l. c.

Br. *caespiticius* var. *Kunzei* Warnst. *Moosfl. Prov. Brand.* p. 53.

Br. *Kuntzii* H. et H. in *Fl.* 1819, I, p. 90 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 661.

Br. *tectorum* de Not. in sched ; *Jaeg. Ad.* I, p. 170.

In muris aprie. sicc. — Eur. : Cum typ.

var. *Kunzii* Warnst. — Br. *caespiticius* var. *imbricatum*.

« var. *subrotundum* Weinm. in *Lin lb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 40.

— As. : Fret. Sinjawin.

var. *warneum* Schwaegr. — Br. *warneum*.

var., H. et T. — Br. *lacustre*.

var. *hemisphaericum*.

var. *nigricans*.

var. *rupestre*.

var. *subsphaericarpon*.

var. *tenerum*.

Brid. — Br. *caespiticius* ?

caespiticius { C. M. p.p. — Br. *badium*.
Drumm. — Br. *pendulum*.
Hsch. — Br. *congestum*.
Schwaegr. — Br. *cirratum*.
Schwaegr. — Br. *uliginosum*.
Wils. — Br. *subrotundum*.
Wils. — Br. *tibetanum*.

calcareum Vent. in *Rev. bryol.* 1880, p. 26.

1. In tophac. — Eur. : Tirol. (Alp. Trent., 2050 m. alt.).

calcareum Dicks. — *Seligeria*.

californicum Sull. in *Bot. Pac. R. R. Survey (Whipple)* p. 188, t. 6 ;

Lesq. et Jam. *Man.* p. 237.

2. Terr. — Am. sept. : Calif.

callistomum Philib. in *Rev. bryol.* 1885, p. 76.

Syn. — Eur. : Norveg.

callistomum Dicks. — *Dicranella varia* var. *collistoma*.

calobolax C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2. 4.

2. — As. : Penins. Tschutschica.

calophyllum R. Br. *Suppl. App. ad iter Parry*, p. 196 ; C. M. *Syn.* I, p. 287 et II, p. 571 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 424.

Br. *intricatum* Brid. *Bryol. univ.* I, p. 680.

Br. *latifolium* Bryol. eur. IV (mon. p. 19), t. 330 ; C. M. *Syn.* I, p. 286.

Br. *pallens* var. *Wils.* in *Kew Journ. bot.* IX, p. 366.

Cladodium calophyllum Brid. l. c. p. 622.

Pohlia calophylla Schwaegr. *Sp. M.* p. 75.

P. latifolia Br. in sched.

Weisia fornicata Brid. l. c. p. 365.

Syn. Ad terr. aren. humid. v. marit. et glareos. — *Eur.* : Spitzberg, Suec., Boruss. sept., Angl., vall. Rhen. *As.* : Penins. Tschutschica, Jenissei inf., Tibet. occ. *Am. sept.* : Groenland, ins. Melville, reg. sept., Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 876, 930.

« *var. procerum* Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 46.
— *As.* : Jenissei infer.

calopyxis C. M. — Webera.

calycinum Sw. Holomitrium.

calyptra extensorii forma, minus Dill. — *Encalypta vulgaris*.

campestre Lindb. — Br. juliforme.

campylocarpum Limpr. in *LXI Jahrb. d. Schles. Ges.* 1883, p. 218 et
Laubm. Deutschl. II, p. 326.

1. — *Eur.* : Norveg.

campylopodoides C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (*nom.*).
— *Afr.* : Ins. Franciæ.

campylothecium Tayl. — *Rhodobryum*.

canariense Brid. *Mant. M.* p. 118 et *Bryol. univ.* I, p. 672; W. P. Sch.
op. cit. p. 453.

2. Rupic. — *Eur.* : Lusit. (Algarb.) *Afr.* : Ins. Canar.

canariense { C. M. p.p. — Br. Mundtii.
Bryol. eur. — Br. provinciale.

var. provinciale Husn. — Br. provinciale.

candicans Tayl. in *Mitt. M. austr. am.* p. 303.

2. Rupic. — *Am. merid.* : Amazon., And. Quitens.

candidum C. M. in *Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 18.

2. — *Afr.* : Abyss.

candidum fragile, foliis recurvis Dill. — *Leucobryum candidum*.

canescens { Hoffm. — *Rhacomitrium*.
Vill. — *Tetraplodon mnioides var. Brewerianus*.

capillaceum Gmel. — *Distichium*.

capillaceum Hull. { — *Ulota Bruchii*?
— *Ulota crispa*?
— *Ulota crispula*?

— *breve, pallide et laete virens, capsulis ovatis* Dill. — *Weisia viridula*.

— *capsulis sphaericis* Dill. — *Bartramia pomiformis*.

capillare L. *Sp. pl. ed. II*, p. 1586 p.p.; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 665;
Bryol. eur. IV (*mon.* p. 60), t. 368; C. M. *Syn.* I, p. 281; W. P.
Sch. Syn. II ed. p. 449.

Br. foliis latiusculis congestis, capsulis longis aut autibus Dill. *Hist. M.*
p. 398, t. 50, f. 67.

Br. squalidum Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 889, t. 54.

Hypnum capillare W. et M. *Bot. Taschb.* p. 286.

Mnium capillare L. *Syst. veget.* p. 947.

2. Mur., saxic., lignic. et terr. per totum feré terrar. orb.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 179.

Rab. Bryoth. eur. n. 98, 839, 1029.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 285.

var. affine Brid. — Br. cuspidatum.

var. angustatum Boul. — Br. capillare *var. flaccidum*.

- « *var. brevicuspidatum* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 131.
Terr. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.
Ecs. : *Mac. Canad.* M. n. 180.
- « *var. capense* C. M. l. c.
— *Afr.* : C. B. Sp.
Ecs. : *Rehm. M. Afr. austr.* n. 232.
var. corsicum Brid. — *Br. Donianum*.
- « *var. carinthiaeum* *Bryol. eur. l. c. t.* 369 ; *W. P. Sch. op. cit.*
Br. capillare var. compactum C. M. l. c. (*excl. syn.* *Br. Ferchelii*).
Ut typ. — *Eur.* : Alp. Carinth. As. : *Caucas. occ.*
var. cochlearifolium *Bryol. eur.* — *Br. elegans*.
var. compactum C. M. — *Br. capillare var. carinthiacum*.
- « *var. cuspidatum* *W. P. Sch. Coroll.* p. 74.
Br. capillare var. macrocarpum *Hüb. Muscol. germ.* p. 442.
Br. capillare var. majus *Bryol. eur. l. c.*
Ut et cum typ. in *Eur. et Am. sept.*
Ecs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 673.
? *var. cymbifolium* H. f. et W. — *Br. cavum*.
- « *var. domingense* C. M. l. c.
Br. domingense C. M. in *Linn.* 1843, p. 594.
Br. flaccidum *Brid. l. c. p.* 667.
Br. tomentosum *Brid. l. c. p.* 648.
— *Am. sept.* : *Hispaniola*.
var. elegans *Husn.* — *Br. elegans*.
- « *var. Ferchelii* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
Br. elegans var. Ferchelii *Breidl. Laubm. Steierm.* p. 132.
Br. Ferchelii *Funk in Brid. Bryol. univ. I,* p. 847.
Br. Funkii var. Ferchelii *Schwaegr. Sp. M.* p. 69.
Ad mur. et rup. in subalp. et alp. præcip. calcar. — *Eur. et Am. sept.*
- « *var. flaccidum* *Bryol. eur. l. c.*
Br. capillare var. angustatum *Boul. M. Est Fr.* p. 396.
Terr. et lignic. in loc. umbros. — *Eur. et Am. sept.*
var. laete-virens *Hüb.* — *Br. elegans*.
var. macrocarpum *Hüb.* — *Br. capillare var. cuspidatum*.
var. majus *Bryol. eur.* — *Br. capillare var. cuspidatum*.
- « *var. meridionale* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
Br. ligusticum *de Not. Epil.* p. 395.
Ad mur. et terr. petros. zon. merid. — *Eur. et Am. sept.*
var. obconium *Husn.* — *Br. obconicum*.
- « *var. platyloma* *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 371 et *II ed. l. c.*
Br. platyloma *Schwaegr. Suppl. I, II,* p. 116, t. 76 ; *Brid. Bryol. univ. I,*
p. 668.
Ad mur. et rup. zon. merid. — *Eur. et Afr.* : *Alger*.
var. torquescens *Husn.* — *Br. torquescens*.
var. triste *Limpr.* — *Br. triste*.
var., L. et J. — *Br. sanguilentum*.
capillareoides C. M. in *Breutel M. Capens.*
— *Afr.* : C. B. Sp.

capillifolium C. M. — *Brachymenium capillare*.

capillisetum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 382.

2. In aren. rivul. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

capitellatum C. M. et *Kindb.* in *Mac. Cat.* p. 127.

Br. *miniaturum* *Mac. Canad. M. n.* 175 p.p.

Ster. Ad fossas. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

capitulatum Mitt. — *Brachymenium*.

capsulis longis subulatis Dill. — *Barbula subulata*.

carinatum Boulay. — *Webera cucullata* var. *carinata*.

carneum { Drumm. — *Webera albicans*.
L. — *Webera carnea*.

var. *atro-purpureum* Schwaegr. — *Br. atro-purpureum*.

var. *pulchellum* { Drumm. — *Webera Drummondii*.
H. et T. — *Webera pulchella*.

catenulatum W. P. Sch. op. cit. p. 471.

Ster. — *Eur.* : Scotia.

catillum C. M. in *Jaeg. Ad. II*, p. 707 (nom.).

— *As.* : Japon.

cavifolium W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 32.

Ster. — *Am. sept.* : Guadalup.

cavum C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 94 et *Syn. I*, p. 23; *Mitt. M. austr. am.* p. 308.

Br. *capillare* ? var. *cymbifolium* H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 145.

2. Ad murr. et terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or., Montevideo.

cellulare Hook. — *Brachymenium*.

Celsii L. — *Ceratodon purpurens*.

ceramiocarpum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 476.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

cernuum { Brid. — *Br. lacustre*.
Bryol eur. — *Br. pendulum*.
Lindb. — *Br. uliginosum*.
Wils. — *Br. subrotundum*.

cerviculatum Dicks. — *Dicranella*.

chalarhodon C. M. — *Rhodobryum*.

chilense Reichdt. in *Novara Exp. Bot. I*, p. 175, t. 30.

Arbor. — *Am. merid.* : Chile.

chryseum Mitt. op. cit. p. 304.

2. — *Am. merid.* : Guatemala.

chrysoblastum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 477.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

chrysoneuron C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 549; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 443.

Br. *duriusculum* H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 84.

2. Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland sept. et med.

ciliare Grev. — *Mnium*.

ciliatum Dicks. — *Hedwigia*.

cinclidioides C. M. — *Mnium*.

cirratum Hoppe et Hseh. in *Fl.* 1819, p. 70; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 672; *Bryol. eur.* IV (mon. suppl. p. 8), t. 357; *C. M. Syn.* I, p. 278 et II, p. 570; *W. P. Sch. op. cit.* p. 429.

Br. caespiticiu Schwaegr. *Sp. M.* p. 59.

Br. intermedium β *cirratum* *Bryol. eur.* IV (mon. p. 475).

Br. paradoxu β *cirratum* *Jur. Laubm. Oesterr. Ung.* p. 267.

Syn. In humid. subuligin. — *Eur.*: Spitzberg, Mar. alb., Alp. Scandin., German., Helvet., Stir., etc. *As.*: Jenissei, Luristan, Caucas., *As. minor.* *Am. sept.* Groenland, Terr. Nov. ? ins. Miquelon, Gaspes., Columb. brit, Washington, Wyoming, Colorado, M. Calif.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 837, 971, 1028.

Un. itin. 1867, n. 55, 64.

var. *cuspidatum* Husn. — *Br. cuspidatum*.

* var. *megalosporu* *Kindb. in Mac. Cat.* p. 122.

Ad rup. humid. — *Am. sept.*: Columb. brit.

<i>cirratu</i>	{	Gmel. — <i>Dicranoweisia</i> .
		et <i>stellatu</i> , <i>tenuioribus foliis</i> Dill. — <i>Dicranoweisia</i> .
		<i>setis et capsulis brevioribus et pluribus</i> Dill. — <i>Cynodontium polycarpu</i> (fid. <i>C. M.</i>).
		<i>setis et capsulis brevioribus et pluribus</i> Dill. — <i>Dicranella cirrata</i> (fid. <i>C. M.</i>).
		<i>setis et capsulis brevioribus et pluribus</i> Dill. — <i>Ptychomitrium polyphyllu</i> (fid. <i>W. P. Sch.</i>)
		<i>setis et capsulis longioribus</i> Dill. — <i>Barbula tortuosa</i> .

cirriferu (de Not.) *Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 317.

Pohlia cirrifera de Not. *Mant. n.* 9 et *Syll. n.* 138.

Syn. Ad rivul. glacial. — *Eur.*: Simplon; Helvet. ?

clathratu *Amom in Rev. bryol.* 1889, p. 89.

2. Ad rivul. — *Eur.*: Rhaet.

clavaeforme Hpe. — *Webera*.

clavariaeforme *C. M.* — *Brachymenium*.

clavatu (*W. P. Sch.*) *C. M. Syn.* I, p. 292; *Mitt. M. austr. am.* p. 307.

Pohlia clavata *W. P. Sch. in Ann. sc. nat. II ser., VI,* p. 148, t. 2.

2. — *Am. merid.*: Chile.

clavatu *H. f. et W.* — *Br. curvicollu*.

clavicaule *C. M. in Fl.* 1875, n. 34-35.

2? *Ster.* — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

claviger *Kaurin in Rev. bryol.* 1884, p. 48 (nom.).

— *Eur.*: Norveg. ?

Climacodontium *Par.*

Anomobryu cygnicollu *Jaeg. Ad. I,* p. 603.

Br. cygnicollu *C. M. in Bot. Zeit.* 1848 (1).

Climacodontium cygnicollu *Hpe. in Jaeg. Ad. II,* p. 713.

— *Afr.*: Abyss.

<i>coarctatu</i>	{	<i>C. M.</i> — <i>Brachymenium</i> .
		<i>Mitt.</i> — <i>Brachymenium melanotheciu</i> ?
		<i>Schultz.</i> — <i>Webera nutans</i> .

(1) *Sec. Jaeg. l. c.*; in *Syn. deest.*

cognatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 69.

Syn. — As.: Ceylan.

coloratum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 296.

2. Arenic. — *Am. merid.*; Bolivia.

comatum Besch. — *Rhodobryum*.

? *Combae de Not. Cron. d. briol. ital. Comm. II, n. 32 et Epil. p. 409.*

Br. Geheebii C. M. (*fid. de Not.*) (1).

Ster. — *Eur.*: M. Sardin. centr., Helvet. (Aargau, quoad Br. Geheebii).

comense W. P. Sch. *op. cit.* p. 444 (2).

Br. caespiticius var. comense Husn. *Muscol. gall.* p. 242.

Br. caespiticius forma Vent. et Bott. *Enum. n. 317 in adn.*

Br. imbricatum de Not. *Epil.* p. 402.

Br. Philiberti Amann in *Rev. bryol.* 1889, p. 87.

2. Muric. — *Eur.*: Ital. super. (Como), Helvet., Alp. Rhaet.; Pyren. (ster.).

Commersonii { *Brid.* — *Rhodobryum*.
Wils. — *Rhodobryum roseum*.
affin, Wils. — *Rhodobryum roseum*.

commutatum C. M. — *Brachymenium*.

compactulum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 383.

Ster. Rupic.? — *Am. merid.*: Argentin. Cordob.

compactum Dicks. — *Webera carnea*.

compressidens C. M. *Syn. I*, p. 290.

Pohlia turbinata Schwaegr. *Suppl. II, II, II*, p. 150, t. 194.

2. In argill. et ad rup. madid. — As.: Nepal., ins. Bali.

compressulum C. M. in *Fl.* 1888, p. 409.

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

concavum Mitt. *M. austr. am.* p. 309.

2. — *Am. merid.*: And. Quitens.

concinatum Spr. *M. Pyr. n. 121 et in Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849, p. 155, n. 141; C. M. *Syn. II*, p. 575; W. P. Sch. *op. cit.* p. 468.

Anomobryum concinatum Lindb. *Man. M. I*, p. 44.

A. julaceum var. concinatum Zett. *M. Pyr.* p. 34.

Br. filiforme ♂ concinatum Boul. *M. Fr. I*, p. 294.

Br. julaceum var. concinatum Wils. *Bryol. brit.* p. 246.

Br. nimbigerum Tayl. *mss.*; Hartm. *Skand. Fl. VIII ed.* p. 367, n. 48.

2. Ad rup. madid. — *Eur.*: Alp. Scandin., Salisb., Stir., Carinth., Austr. inf., Frioul, Tirol., Helvet., Bavar., Pyren. As.: Caucas. *Am. sept.*: Groenland, M. Catskill.

condensatum Hpe. *mss.*; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 55.
— *Afr.*: C. B. Sp.

confertum Limpr. *Laubm. Deutschl.* p. 362.

Syn. fr. ign. — *Eur.*: Alp. Stir.

congestum Mitt. *op. cit.* p. 309.

Br. caespiticius Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 44.

2. Terr. — *Am. merid.*: And. Quitens., Brasil.

(1) Cf. Geheeb in *Rev. bryol.* 1886, p. 22.

(2) Cf. Philibert in *Rev. bryol.* 1889, p. 36 et *Ann. l. c.* p. 52.

conicum *Hsch. op. cit. p. 43; C. M. Syn. I, p. 301; Mitt. op. cit. p. 299.*

Br. Funkii *Schwaegr. Sp. M. p. 69?*

2. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

conicum *Dz. et Mk. — Rhodobryum Decaisnei.*

conoideum *Dicks. — Zygodon.*

consimile *Mitt. — Brachymenium.*

constrictum *Br. — Br. Klinggraeffii.*

contextum *H. et H. — Br. pallescens var. contextum.*

contortum { *Griff. — Brachymenium nepalense.*
 { *Wulf. — Encalypta streptocarpa.*

controversum *Hoffm. — Weisia viridula.*

convolutaceum *C. M. in Linn. 1875, p. 388.*

Br. coronatum *Hpe. Prodr. Fl. Nov. Gran. p. 50.*

2. — *Am. merid. : Nova Granat.*

convolutum *Dicks. — Barbula.*

Corbieri *Philib. in Rev. bryol. 1887, p. 23.*

Syn. In turfis. — *Eur. : Normann. marit.*

cordylocarpum *C. M. in Rev. bryol. 1877, p. 43 (nom.).*

— *Afr. : C. B. Sp.*

coronatum *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 103, t. 71; Brid. Bryol. univ. I, p. 650; C. M. Syn. I, p. 307; Bryol. jav. I, p. 145, t. 118.*

2. Calcic. — *As. : Nepal. ? Amboine, ins. Banca, Java, Ceylan. Afr. : Usagara. Am. sept. : Cuba, Jamaïc., Hispaniola, Florid. ; Guadal. ? Am. merid. : Guian., Peruv. Pac. : Nov. Caledon.*

var. *doliolum* *Jaeg. — Br. doliolum.*

var. *minus* *Hpe. — Br. pachytheca.*

* var. *orientale* *Hpe. in Nuov. giorn. bot. ital. 1872, p. 281.*

— *As. : Bornéo.*

var., *Wils. — Br. nitens.*

coronatum { *Besch. — Br. Hogbergii.*
 { *C. M. p.p. — Br. Phallus.*
 { *Hpe. — Br. convolutaceum.*
 { *Hpe. et Ltz. — Br. gracilifolium.*
 { *H. f. et W. — Br. curtum ?*
 { *Wils. — Br. barbulaceum.*

corrugatum *Hpe. Symb. 1870, p. 276.*

Br. argenteum var. *corrugatum* *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 53.*

Br. argenteum β *lanatum* *Hsch. Fl. Brasil. I, p.*

2. — *Afr. : Ins. Mayotte. Am. sept. et merid. : Tropic.*

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1259.

Marie M. Mad. n. 217.

* var. *niveum* *Hpe. Symb. 1872, p. 52.*

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

crassinervium *Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 186.*

2. *Rupic. — Am. merid. : Valdivia.*

crassinervium *Besch. — Br. Pancheri.*

crassirameum *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 57, t. 8 B.*

2. — *Am. sept. : Oregon.*

crassum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* p. 86, t. 86, f. 1 et *Handb.* p. 442.

2. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

creberrimum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 54; *C. M. Syn.* I, p. 283; *Handb. N. Zeal. Fl.* p. 442.

2. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland.

cribrosum Hoffm. — *Coscinodon pulvinatus*.

crinitum Mitt. — *Brachymenium systylium*.

crispatum Dicks. — *Rhabdoweisia denticulata*.

crispum { Hoffm. — *Ulota*.
Schreb. — *Dicranella Schreberi*.

cristatum C. M. — *Brachymenium*.

crudoides Sull. et Lesq. — *Webera*.

crudum { Mitt. (M. a. a.) — *Webera synoica-cruda*?
Mitt. (1876). — *Webera austro-cruda*.
Schreb. — *Webera*.

Crügeri Hpe. in *C. M. Syn.* I, p. 300 et II, p. 574; Mitt. *M. austr. am.* p. 298.

Br. Landsbergii Dz. et Mk. *Prodr. Fl. Surin.* p. 40, t. 4.

Br. ovalifolium Sull. in *Proced. Am. Acad.* 1861.

2. Ad rup. et terr. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaïc., ins. S. Vincent.
Am. merid. : Ins. Trinitat, Venezuela, Guian. batav., Amaz.,
And. Quitens. et Peruv.

cubitale Dicks. — *Br. pseudo-triquetrum*.

cucullatum Schwaegr. — *Webera*.

Culmannii Limpr. *Laubm. Deutschl.* p. 357.

Syn. — *Eur.* : Helvet. (Gemmi).

cuneifolium Dicks. — *Barbula*.

cupulatum C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 149.

2? — *Pac.* : Austral. fel.

curtum Par.

Br. brevicaule Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 518.

Br. coronatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* p. ?

1. — *Pac.* : Austral.

curvicollum Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 442.

Br. clavatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. Fl.* II, p. 84, t. 85, f. 2.

2. Terr. — *Afr.* : Ins. Tristan d'Acunha. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

« *var. extenuatum* Mitt. *op. cit.*

— *Pac.* : Nov. Zeland.

« *var. γ* Mitt. *op. cit.*

Ut præced.

cuspidatum W. P. Sch. *op. cit.* p. 430.

Br. affine Lindb. *M. Scand.* p. 16.

Br. bimum var. cuspidatum Bryol. eur. IV (mon. p. 50).

Br. capillare γ affine Brid. *Bryol. univ.* I, p. 848.

Br. cirratum var. cuspidatum Husn. *Muscol. gall.* p. 248.

Br. paradoxum Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 266.

Pohlia paradoxa Hüb. *Muscol. germ.* p. 479.

Webera affinis Br. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 848.

Syn. Ad mur. et rup. humidiusc. — *Eur.* : Zon. sept. et intermed.
As. : Caucas. *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Washington, Oregon,
Montana, Idaho, Wisconsin, Illinois.

« *var. obtusiusculum* (Lindb. et Arn.) Par.

Br. affine *var. obtusiusculum* L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 43.

Ut typ. — As. : Jenissei inf.

cuspidatum { Drumm., Turn. — *Mnium*.
Gmel. — *Pottia lanceolata*.
Schreb. — *Mnium affine*.
Wils. p.p. — *Br. Thomsoni*.
Wils. — *Br. turbinatum*.

cyclophyllum (Schwaegr.) Bryol. eur. IV (mon. p. 63), t. 70 ; C. M. Syn. I, p. 287 et II, p. 571 ; W. P. Sch. op. cit. p. 455.

Br. obtusifolium Turn. M. Hib. p. 116, t. II, f. I ; Brid. Bryol. univ. I, p. 639 ? ejusd. hb. ! (fid. C. M.)

Br. tortifolium Brid. op. cit. p. 844.

Mnium cyclophyllum Schwaegr. Suppl. II, II, p. 160, t. 194.

2. In terr. palud. stagn. exscic. et rup. madid. — Eur. : Suec., Dania mer., Boruss. occ., Siles., Belg. sept., Voges., Silva Nigra, Francon., Bavar., Jurass. As. : Jenissei inf. Am. sept. : Fret. Smith, Groenland, Niagara, M. Rupestr., Pensilv.

Eas. : Mac. Canad. M. n. 538.

Rab. Bryoth. eur. n. 444.

Un. itin. 1864, n. 38.

cygnicollum C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 156.

Syn. — Am. merid. : Summ. And. Chilens.

cygnicollum C. M. (1848). — Br. Climacodontium.

cylindricum { Dicks. — *Webera elongata*.
Mont. — *Webera cylindrica*.

cymbifolium Lindb. Man. M. I, p. 45.

Anomobryum filiforme Jaeg. Ad. 1, p. 604.

Brachymenium filiforme Griff. Not. p. 443 et Ic. pl. asiat. II, t. 102, f. 2

Bryum filiforme Mitt. M. Ind. or. p. 67.

2. — As. : Nepal., Himalaya, Khasia, Java.

cymbuliforme Card. — *Webera cucullata var. carinata*.

dalachanicum Jur. et Milde Beitr.... p. 596.

2. — As. : Kurdistan., Persia.

Daviesii Dicks. — *Glyphomitrium*

dealbatum Dicks., Drumm. — *Amblyodon*.

Decaisnei Dz. et Mk. — *Rhodobryum*.

decipiens Brid — *Webera annotina*.

decurrens C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 751.

Ster. — Afr. : C. B Sp.

delicatulum { Hedw. — *Webera carnea*.
Wils. — *Webera delicatula*.

demissum Hook. — *Zieria*.

dendroides { L. j. — *Mniodendron comosum*.

Web. — *Mnium undulatum*.

polycephalum, *phyllitidis folio undulato pellucido*, *thecis ovatis pendulis* Dill. — *Mnium undulatum*.

denticulatum Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 273.

2. — Am. sept. : Alberta, M. Selkirk.

dentiferum Hpe. Symb. 1877, p. 726.

Syn. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

depressum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 663.

— Afr. : M. Cameroon.

diaphanum { Gmel. — *Orthotrichum*.
Web. — *Tetraxis pellucida*.

dichotomum Hedw. *Sp. M.* p. 183, t. 42; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 646;
C. M. *Syn.* I, p. 304; Mitt. *M. austr. am.* p. 301.

Br. bulbillosum Mont. (fid. Mitt. l. c.)

Mnium *dichotomum* P. B. *Prodr.* p. 74.

2. Ad terr. et saxa. — Am. merid. : And. Quitens., Monte Video.

dichotomum Wils. ; H. f. et W. — Br. atropurpureum.

dicranoides { Hsch. — *Brachymenium*.
W. P. Sch. — *Brachymenium commutatum*.

Didymodon { Gmel. — *Barbula rigidula*.
Hoffm. — *Leptotrichum tortile* var. pusillum.

didymodontium Mitt. — *Brachymenium*.

dissolutinerve C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 376.

Ster. Terr. — Am. merid. : Uruguay.

distans Wils. — Br. turbinatum.

doliolum Duby in *Moritz Syst. Verz.* p. 133; C. M. *Syn.* II, p. 304.

Br. coronatum var. *doliolum* Jaeg. *Ad.* I, p. 617.

1. Terr. — As. : Java.

domingense { C. M. — Br. capillare var. domingense.
Steud. — *Rhodobryum Antillarum*.

Donianum Grev. in *Trans. of the Linn. Soc.* XV, II, p. 345, t. 3, f. 6;
W. P. Sch. *Coroll.* p. 75 et *Syn.* II ed. p. 454.

Br. capillare var. corsicum *Brid. Bryol. univ.* I, p. 849.

Br. insulare de Not. *Spic.* p. 7 et *Syll.* p. 128.

Br. Mülleri Spr. in *M. Pyr.* n. 138 et in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849,
n. 160.

Br. platyloma *Bryol. eur.* IV (mon. p. 59), t. 366; C. M. *Syn.* I, p. 282
et II, p. 571.

2. In rup. et ad terr. glareos. — Eur. : Angl., Galloprov., Corsica,
Sardin., Ital., Dalmat., ins. Ionic., Melit., Balear.; Algarb.
Afr. : Alger., Madeir., ins. Canar.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1280.

Donianum Kindb. — Br. heteroneuron.

dovrense W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 413.

Syn. Ad terr. humid. vel. turfos — Eur. : Alp. Norveg. (Dovre).

Drummondii C. M. — *Webera*.

Duriei W. P. Sch. mss; *Besch. Cat. M. Alger*, p. 24.

2. Terr. — Afr. : Alger.

duriusculum W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. N. Caled.* p. 214.

2. — Pac. : Nov. Caledon.

duriusculum H. f. et W. — Br. chrysoneuron.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 772.

— Afr. : M. Cameroon.

Duvalii Voit in *Sturm. Deutsch. Fl. crypt. Fasc. II*; *Brid. Bryol. univ.* I,
p. 679; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 64), t. 371; C. M. *Syn.* I, p. 269;
W. P. Sch. op. cit. p. 458.

Br. Sphagni *Brid. Bryol. univ.* I, p. 852.

Br. ventricosum var. *Schwaegr. Sp. M. p. 54.*

Br. Weigelii *Spreng. Mant. pr. add. p. 55 (fid. Limpr. Laubm. Deutschl. p. 429.*

Mnium Duvalii *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 126, t. 179.*

2. Ad scaturig. et in pratis uligin. — *Eur.* : Norveg., Fennia, German., Bohem., Tatra, Stir., Bavar., Scotia, Voges., Gall. centr. (Arvernia). *As.* : Jenissei sup., Obi, Caucas. *Am. sept.* : Fret. Smith., Labrador, Terr. Nov., ins. Miquelon, Nov. Scot., Gaspes., Ottawa, Athabasca, M. Rupestr. et Selkirk, Nov. Angl., Washington, Oregon, Calif., Nov. Mexic.

Ews. : Mac. Canad. M. n. 182.

Rab. Bryoth. eur. n. 835 et b, 1284.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 286.

« var. gaspeanum *Kindb. in Mac. Cat. p. 272.*

Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Gaspes.

« var. lato-decurrens *C. M. et Kindb. op. cit. p. 132.*

Br. lato-decurrens *Mac. Canad. M. n. 487.*

Ad terr. humid. — *Am. sept.* : M. Selkirk, Columb. brit.

duvalioides Itz. — Br. pseudo-triquetrum var. flaccidum.

Eatoni Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876.

Syn.

— *Afr.* : Ins. Kerguelen.

Ecklonianum C. M. — Webera.

Edwardsianum C. M. et *Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 120.*

Br. warneum *Mac. Canad. M. n. 383.*

1. Ad terr. aren. humid. — *Am. sept.* : New Brunswick.

Ehrenbergianum C. M. — Rhodobryum.

elegans *Nees ab Es. in Brid. Bryol. univ. I, p. 849 ; W. P. Sch. op. cit. p. 452.*

Br. capillare var. cochlearifolium *Brid. l. c. p. 666, Bryol. eur. IV (mon. p. 61), t. 367 ; C. M. Syn. I, p. 281 p.p.*

Br. capillare var. elegans *Husn. Muscol. gall. p. 241.*

Br. capillare var. laete virens *Hüb. Muscol. germ. p. 442.*

2. In rup. fiss. humid. — *Eur.* : Westphal., Riesengeb., Tatra, Austr. inf., Salisb., Stir., Alp. Algov., Carinth., Tirol., Jurass., Helvet., Sabaud, Rhaet., Alp. Bavar. *Am. sept.* : Gaspes., ins. Miquelon.

elegans { Grev. — Br. pallens var. speciosum.

{ Vent. et Bot. p.p. — Br. Vemturii.

var. carinthiacum *Breidl.* — Br. capillare var. carinthiacum.

var. *Ferchellii* *Breidl.* — Br. capillare var. *Ferchellii*.

elegantulum *Ltz. Moost p. 157.*

2.

— *Am. merid.* : Valdiv.

ellipsifolium C. M. in *Fl.* 1890, p. 477.

Ster.

— *Afr.* : Kilima N'Djaro.

ellipticum { *Brid.* — Mnium punctatum.

{ Mitt. — Brachymenium.

{ Dicks. — Webera.

{ Drumm. — Webera cruda.

elongatum { Dz. et Mk. — Webera leptocarpa.

{ Hoffm. — Rhacomitrium canescens var. ericoides.

{ Mitt. (1876). — Webera austro-elongata.

- var. *alpinum* Bryol. eur. — *Webera longicolla*.
 var. *longicollum* H. et T. — *Webera longicolla*.
 var. *macrocarpum* Bryol. eur. — *Webera elongata* var. *macrocarpa*.
elwendicum Fehln. in *Hedwigia*, 1887, p. 116.
 Syn. Rupic. — As. : M. Elwend.
emergens C. M. — *Webera* ?
Emodi C. M. in *Jaeg. Ad. I*, p. 613 (nom.).
 — As. : Sikkim.
encalyptaceum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 366.
 Ster. — Am. merid. : Uruguay.
erectis capitulis brevibus, foliis reflexis Dill. — *Dicranella squarrosa*.
erectum Hook. — *Brachymenium mexicanum* ?
ericetorum } Dicks. — *Barbula unguiculata* var. *ericetorum*.
 } Neck. — *Pleuridium subulatum*.
ericaefolium Neck. — *Barbula ambigua*.
ericoides Dicks. — *Rhacomitrium canescens* var. *ericoides*.
erubescens Kindb. in *Mac. Cat.* p. 118.
 2. Ad ligna fabref. — Am. sept. : M. Rupestr.
erubescens C. M. — *Brachymenium*.
erythrinum Mitt. *M. Ind. or.* p. 70.
 Br. *pachypoma* Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 364 p.p.
 2. — As. : Sikkim.
erythrocarpoides Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 495.
 2. — Pac. : Austral. or.
erythrocarpoides W. P. Sch. — Br. *Bescherellei*.
erythrocarpum *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 100, t. 70 ; *Bryol. eur.* IV
 (mon. p. 72), t. 376 ; C. M. *Syn. I*, p. 297 ; W. P. Sch. *op. cit.*
 p. 436.
 Br. *atro-virens* Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 878.
 Br. *bicolor* Dicks. *Fasc. IV pl. crypt.* p. 16 (fid. *Milde Bryol. Siles.* p. 213).
 Br. *Morisii* Br. in *F. Müll. M. Sardin.*
 Br. *sanguineum* Brid. *Mant. M.* p. 118 et *Bryol. univ. I*, p. 671.
 2. In terr. aren. ericet. et ad viar. — Eur. : Reg. campestr. montos.
 Afr. : Alger. Am. sept. : Alabama, Calif. Am. merid. : And. Quitens.
 Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 471.
 var. *australis* Hpe. — Br. *suberythrocarpum*.
 var. *bicolor* Brid. — Br. *atro-purpureum*.
 var. *murorum* W. P. Sch. — Br. *murale*.
 « var. *radiculosum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Br. *radiculosum* Brid. *Sp. M. III*, p. 18 et *op. cit.* p. 655.
 Ut et cum typ. in *Eur* et *Afr.*
 var. *turfaceum* W. P. Sch. — Br. *Klinggraeffii*.
erythrocaule Hpe. — *Webera*.
erythrocaulon Brid. — *Rhodobryum*.
erythrocephalum C. M. — *Rhodobryum*.
erythroneuron Mitt. *M. austr. am.* p. 312.
 2. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens.
erythrophylloides Kindb. in *Mac. Cat.* p. 272.
 Ster. — Am. sept. : Alberta.

erythrophyllum *Kindb. op. cit. p. 131.*

Ster. Paludic. — *Am. sept.* : Nov. Scot., Ontario, Columb. brit., fret. Behring.

erythrostegeum *C. M. in Fl. 1886, p. 279.*

2. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

erythrotropis *C. M. in Linn. 1875, p. 383.*

2. Ster. Ad arb. — *Afr.* : Niam-Niam.

eurystomum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. Belg. 1891, II, p. 188.*

2. Muric. — *Afr.* : Ins. Borbon.

exaltatum *Spr. in Mitt. op. cit. p. 285.*

Acidodontium exaltatum *Jaeg. Ad. I, p. 572.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.

excurrens *Lindb. in Bot. Notiz. 1886, p. 99.*

Br. versicolor *Kaur. in op. cit. 1885, p. 161.*

2. In aren. humid. — *Eur.* : Norveg.

exiguum creberrimis capsulis rubris *Dill.* { f. A-E. — *Pottia Wilsoni.*
f. F-K. — *Pottia truncata.*

exile *Dz. et Mk.* — *Brachymenium.*

eximium *Mitt. in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 440.*

Ster. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med.

exstans *Mitt. M. Ind. or. p. 72.*

Syn. — *As.* : Tibet. occ.

exstinctorium { L. — *Encalypta vulgaris.*
forma majus et ramosum *Dill.* — *Encalypta ciliata.*

extenuatum *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 57, t. 8 A.*

2. — *Am. sept.* : Oregon.

extenuatum *Mitt.* — *Brachymenium.*

Fabronia *C. M. in Linn. 1880-83, p. 387.*

Ster. Terr. — *Am. merid.* : Argentin. temperat.

fabronioides *C. M.* — *Brachymenium.*

fallax *Milde in Rab. Bryoth. eur. n. 242 c. diagn. ; W. P. Sch. op. cit. p. 426.*

Br. lacustre β alpinum *Bryol. eur. IV (mon. p. 16), t. 332 β ; C. M. Syn. I, p. 268.*

Br. pallens β fallax *Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 287.*

2. Loc. arenos. et ad rivul. — *Eur.* : Norveg., Westphal., Siles., Salisb., Carinth., Alp. Bavar., Helvet., Gall. centr. (Arvern.), Pyren. *Am. sept.* : Fret. Behring.

* var. baldense (*Vent.*) *Limpr. Laubm. Deutschl. p. 331.*

Br. baldense *Vent. mss. ; de Not. Epil. p. 381.*

Br. pallens var. baldense *Vent. et Bot. En. critt. p. 31.*

In sabulos. humid. — *Eur.* : Tirol., Helvet.

fallax *Dicks.* — *Barbula.*

fasciculare { *Dicks.* — *Funaria.*
Hoffm. — *Rhacomitrium.*

fasciculatum *Dicks.* { — *Eucladium verticillatum.*
— *Gymnostomum curvirostre.*

Fendleri C. M. in Linn. 1878-79, p. 475.

2. — Am. merid. : Venezuela.

Ferchelii Funk. — Br. capillare var. *Ferchelii*.

ferrugineum Jungh. — *Mniodendron divaricatum*.

filiforme Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 16 ; W. P. Sch. op. cit. p. 465.

Anomobryum filiforme Husn. Muscol. gall. p. 222.

A. julaceum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 382.

Br. julaceum Sm. Fl. brit. III, p. 1357 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 659 ;

Bryol. eur. IV (mon. p. 79), t. 382 ; C. M. Syn. I, p. 315 et II, p. 577.

Webera julacea de Not. Epil. p. 416.

2. Ad rup. irrigat. — Eur. : Norveg. (ster. !), Britann., Alp. Stir., Carinth., Salisburg., Tirol., Helvet., Vall. Tellin., Delphinat., Pyren. Afr. : M. Cameroon. Am. sept. : Costa-Rica. Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil., Montevid.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 243, 363, 974, 1219.

Un. itin. 1863, n. 49.

« var. abyssinicum (W. P. Sch.) Par.

Anomobryum abyssinicum Jaeg. Ad. I, p. 602.

A. julaceum var. ? abyssinicum W. P. Sch. Syn. I ed., p. 303 (nom.).

— Afr. : M. Abyssin.

var. *concinatum* Boul. — *Bryum*.

« var. mexicanum (W. P. Sch.) Par.

Anomobryum mexicanum Jaeg. l. c. p. 603.

A. julaceum var. ? mexicanum W. P. Sch. l. c.

— Am. sept. : Mexic. or.

var. *neapolitanum* Boul. — Br. juliforme.

var. *sericeum* Boul. — Br. leptostomum.

filiforme } Mitt. — Br. cymbilifolium.
Will. — *Blindia acuta*.

filinerve Mitt. M. austr. am. p. 305.

2. Lignic. — Am. merid. : And. Quitens.

filum W. P. Sch. Syn. II ed. p. 470.

Ster. Ad rivul. — Eur. : Alp. Sabaud. (M. Blanc.).

flaccidisetum C. M. — *Brachymenium*.

flaccidum } Brid. — Br. capillare var. *domingense*.
H. f. et W. — Br. caespitium.

flaccum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 332 ; Mitt. M. Ind. or. p. 72.

2 ?

— As. : Sikkim.

flagellare } Brid. — Br. warneum.
Dicks. — *Dicranum*.

flagellicoma C. M. in Linn. 1880-83, p. 369.

Ster.

— Am. merid. : Argentin. subtropic.

flavescens Kindb. Enum. Bryin. Dovr. in Christiania Vid. Sels. Forh. 1888, n. 6.

Br. arctico × *pallens* Philib. in Rev. bryol. 1889, p. 62.

2.

— Eur. : Norveg.

flavescens Dicks. { — *Barbula fallax*.
(fid. Wils. in W. P. Sch.). — *Dichodontium pellucidum*
var. *serratum*.

flavidulum C. M. in Jaeg. Ad. I, p. 653 (nom.)

— As. : Birman.

flexifolium { C. M. — Brachymenium.
Dicks. — Didymodon.

flexisetum Mitt. M. austr. am. p. 295.

1 vel syn. Paludic. — Am. merid. : And. Quitens.

flexisetum Arn. — Br. Arnellii.

flexuosum Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p. 152 ; Lesq. et Jam. Man. p. 227.

2? Arenic. — Am. sept. : Columb. brit.

flexuosum { C. M. — Webera.
L. p.p. — Campylopus.
L. p.p. — Campylopus torfacens.

floresianum (C. M.) Par.

Acidodontium floresianum C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 162.

2. — Am. sept. : And. Costa Ricens.

floridanum Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p. 4.

— Am. sept. : Florida.

fluminale C. M. — Rhodobryum.

foliis { lanceolatis falcatis, setis alaribus, capsula ovata inclinata Hall. —
Timmia megapolitana.
latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus Dill. — Br. capil-
lare.
mollibus subulatis, setis brevissimis alaribus, capsulis ovatis
Hall. — Bartramia Halleriana.

fontanum Sw. — Philonotis.

Forsteri Dicks. — Zygodon.

fragile { C. M. — Brachymenium.
Dicks. — Campylopus.

Froudei Kindb. in Ott. Natur. V, p. 180.

Syn. — Am. sept. : Fret. Behring.

fulvellum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 330 ; Mitt. M. Ind. or. p. 69.

2. — As. : Sikkim.

fulvellum { Dicks. — Dicranum.
Wils. p.p. — Br. lacustre.

funarioides Brid. — Funaria calcarea.

Funkii Schwaegr. Suppl. I, II, p. 89, t. 69 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 660 ;
Bryol. eur. IV (mon. p. 77), t. 382 ; C. M. Syn. I, p. 305 ; W. P.
Sch. op. cit. p. 446.

Br. articulata Sendtn. in sched. ? (fid. C. M. Syn. I, p. 305).

Br. Geheebii C. M. (1).

Br. julaceum Funk Fasc. crypt. IX, n. 194.

2. Ad terr. argill. aren. et mur. delaps. — Eur. : Transilv., Hungar.,
Bohem., Siles., Sudet., Boruss., Westphal., Harz, Austr. sup.,
Bavar., Francon., Tirol., Helvet., vall. Rhen., Pyren. As. : Jenissei
med., Caucas.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 345.

(1) Fid. Milde in Hedwigia 1870, p. 48 ; cf. Geheeb in Rev. bryol. 1886, p. 22.

- var. *Ferchellii* Schwaegr. — Br. capillare var. *Ferchellii*.
 « var. tenue *Husn. Muscol. gall. p. 242.*
 Br. tenue *Ravaud in Bull. Soc. bot. Fr. 1867, p. 260.*
 Ut typ. — *Eur.* : Delphinat.
 var. ? *Bryol. eur.* — Br. *Blindii*.
Funkii Schwaegr. — Br. conicum ?
fuscescens *Rota Cat. M. Bergom. ; de Not. Epil. p. 753.*
 Ad terr. aren. — *Eur.* : Ital. super. (vall. Tellin.).
fuscescens Spr. — Br. torquescens f. monoica.
fuscum *Lindb. in Bot. Notiz. 1864, p. 67.*
 Syn. In aren. humid. — *Eur.* : Fennia.
fusiferum Mitt. — Brachymenium.
gambirense C. M. in *Linn. 1871-73, p. 148.*
 2. — *Pac.* : Austral. fel.
gamophyllum C. M. op. cit. 1880-1883, p. 270.
 Ster. — *Am. merid.* : And. Boliv.
Gardneri Mitt. — Br. Pabstianum.
Garovaglii de Not. *Cron. d. briol. ital. in Comm. II et Epil. p. 400 ;*
W. P. Sch. op. cit. p. 445.
 2. (fid. de Not.) ; syn! (fid. Limpr.). — *Eur.* : Vall. Tell., M. Stelvio.
Gaudichaudi Spreng. — Leptotheca.
Gayanum Mont. in C. M. *Syn. I, p. 267 et Syll. p. 33 ; Mitt. M. austr.*
am. p. 294.
 Syn. — *Am. merid.* : Chile.
gedeanum *Bryol. jav. I, p. 547, t. 120.*
 Br. pallescens *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 23.*
 2. Ad arbor. — *As.* : M. Java.
Geheebii C. M. } — Br. Combæ (fid. de Not.).
 } — Br. Funckii (fid. Milde).
gelidum Hagen. — Webera Schimper.
gemmaceolum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungs-*
reise... p. 13.
 2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
gemmatum C. M. in *Fl. 1885, p. 401.*
 2. Paludic. — *Am. merid.* : Fuegia austr.
gemmiparum de Not. *Cron. d. briol. ital. in Comm. II, n. 28 ; W. P. Sch.*
op. cit. p. 442.
 Br. alpinum var. *gemmiparum* *Husn. Muscol. gall. p. 247.*
 Br. alpinum mediterraneum de Not. *Syll. n. 162.*
 Br. laxifolium *Lindb in Oefv... 1867-68, p. 4.*
 Br. muticum *Lange Toskanske M. in Bot. Tidskr. Kjoebenh. 1868.*
 Br. *Notarisii* Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc. 1863, p. 3.*
Mielichhoferia crassinervia *Jur. in Bot. Zeit. 1866. pp. 20-78.*
 2. Loc. calcar. et in rivul. alv. — *Eur.* : Anglia, vall. Rhen., Belg.,
 Galloprov., Sardin., Etruria, Graec. *As.* : Caucas. (Tiflis). *Afr.*
 Alger., Madeir.
geniculatum *Brid. Bryol. univ. I, p. 842 ; C. M. Syn. I, p. 276.*
 Br. Webera geniculata *Brid. l. c.*
 — *Eur.* : Tirol.

Gerwigii Limpr. *Laubm. Deutschl.* p. 419.

Hypnum Gerwigii C. M. mss.; *Jack in Mitth. d. badisch. bot. Ver.* 1891.

Ster. Ad rup. calcar. — *Eur.*: Helvet. (Schaffhausen.)

giganteum Hook. — *Rhodobryum*.

Gilliesii Hook. — *Brachymenium*.

glaciale Schleich. — *Webera albicans* var. *glacialis*.

glaucescens Dicks. — *Leptotrichum*.

glanco-viride C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 374.

Ster. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.

glaucum { C. M. — *Brachymenium*.
L. — *Leucobryum*.

globirameum C. M. — *Brachymenium*.

globirhodon C. M. — *Rhodobryum*.

globosum Lindb. in *Oefv.... XXIII*, p. 546.

Br. mammillatum var. *globosum* Berggr. M. *Spetsb. n.* 74 b el in K. Sv. *Vet. Ak. Handl.* 1875, p. 63.

2. (fid. Lindb.); syn! (fid. Limpr.) — *Eur.*: Spitzberg. *As.*: Jenissei inf.

globosum Mitt. — *Brachymenium*.

Goudotii Hpe. — *Rhodobryum*.

gracile Schleich. — *Webera commutata* var. *gracilis*.

gracilescens C. M. — *Bryum schistoneuron*.

var. *decumbens* C. M. — *Bryum schistoneuron* var. *decumbens*.

var. *densifolium* C. M. — *Bryum schistoneuron* var. *densifolium*.

gracilifolium C. M. in *Linn.* 1875, p. 390.

Br. coronatum Hpe. et Ltz. in *Krause M. Ecuad. Bot. Zeit.* 1868, p. 812.

2. Terr. — *Am. merid.*: And. Æquat.

gracilisetum Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 44; C. M. *Syn. I*, p. 339; Mitt. M. *austr. am.* p. 299.

? Terr. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Graeffeanum C. M. — *Rhodobryum*.

Graefianum Schlieph. in *Fl.* 1885, n. 19, t. VI.

Syn. Rupic. — *Eur.*: Helvet. (Via mala).

grammophyllum C. M. — *Webera*.

grammothecium C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 15 (nom.).

— *Afr.*: Ins. Comor.

grandifolium C. M. — *Rhodobryum*.

Griffithianum Dicks. — *Ædipodium*.

Haamii Rehm. M. *Afr. austr.*

— *Afr.*: Orange.

haematocarpum C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 125.

2. Ad rup. humid. — *Am. sept.*: Columb. brit.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 555 p.p.

haematoneuron C. M. in *Nuov. giorn. bot. ital.* 1872, p. 17.

2. — *Afr.*: Abyssin.

haematophyllum Kindb. in *Mac. Cat.* p. 118.

2. Ad rup. humid. — *Am. sept.*: Anticosti, M. Rupestr.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 555 p.p.

Hageni *Limpr. Laubm. Deutschl. p. 335.*

Syn. Rupic. — *Eur.* : Norveg. occ.

Haistii *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 449.*

2. In mur. vinear. — *Eur.* : Helvet. occ. (Neufchâtel).

Hallerianum Neck. — *Diphysicum foliosum.*

hamipilum *C. M. in Linn. 1880-83, p. 381.*

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Tucuman.

hammatocaulon *C. M. in Dusen M. Camer. n. 159.*

— *Afr.* : M. Cameroon.

Harveyanum *C. M.* — *Brachymenium acuminatum.*

Heimii *Gmel.* — *Pottia.*

helveticum *Philib.* — *Br. arcticum var. helveticum.*

hemisphaericarpon *C. M. Syn. II, p. 576.*

2. — *As.* : Nepal., Himalaya.

Hendersoni *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 44, t. 7 c.*

2 ♂ ign. — *Am. sept.* : Oregon, Calif.

heteromallum *Dill.* — *Dicranella.*

heteroneuron *C. M. et Kindb. in Bidr. p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 130 (subsp. Bryii capill.).*

Br. Donianum Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 273.

Br. obconicum Kindb. l. c. p. 274 ; Mac. Canad. M. n. 181.

Br. provinciale Mac. l. c. n. 171.

2. Rupic. et terr. — *Am. sept.* : Ontario, Columb. brit., ins. Vancouver.

« *var. brevicuspidatum Kindb. in Mac. Cat. p. 131.*

Lignic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

Exs. : *Mac. Canad. M. n. 180.*

heteroneuron *Spr.* — *Brachymenium.*

heterophyllum *Hook.* — *Mnium.*

heteropterum pellucidum *Dill.* — *Aulacomnium heterostichum.*

heterostichum { *Arn.* — *Aulacomnium heterostichum.*
 { *Hoffm.* — *Rhacomitrium.*

Hieronimi *C. M.* — *Rhodobryum.*

Hogbergii *C. M. in Linn. 1875, p. 391.*

Br. coronatum Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 51.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

Holmgrenii *Lindb. M. Scand. p. 17.*

Syn. — *Eur.* : Lappon.

Hookeri *Spreng.* — *Brachymenium nepalense.*

Hornschuchianum *C. M.* — *Brachymenium.*

hornum *Sw.* — *Mnium.*

huillense *W. et Duby.* — *Brachymenium.*

humidulum *Sull. in Proced. Am. Acad... 1859, p. 278.*

2. Ad terr. humid. — *Afr.* : C. B. Sp.

humile { *Mont.* — *Orthodontium.*

 { *pilis carens, viride et pellucidum* *Dill.* — *Barbula cuneifolia.*

hybridum *Br.* — *Br. bimum.*

hydrophilum *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, p. 95.*

Ster. Ad scaturig. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

hygrometricum Neck. — *Funaria*.

hymenophylloides Hartm. — *Mnium*.

hyperboreum Gunn. — *Dicranum*.

hypnoides { L. — *Rhacomitrium lanuginosum*.
Schreb. — *Rhacomitrium canescens*.
alpinum, setis et capsulis exiguis Dill. — *Rhacomitrium microcarpum*.
alpinum, operculis obtusis Dill. — *Rhacomitrium sudeticum*.
aquaticum, calyptris nigris acutis Dill. — *Rhacomitrium protensum*.
ericæ facie, capsulis barbatis, alpinum Dill. — *Rhacomitrium canescens var. ericoides*.
et hirsutæ virescens, fasciculare, alpinum Dill. — *Rhacomitrium fasciculare*.
hirsutæ canescens, vulgare Dill. — *Rhacomitrium canescens*.
hirsutæ canescens, vulgare Dill. — *Rhacomitrium heterostichum*.
pendulum, sericeum, coma insigni atro-rubente Dill. — *Bryum alpinum*.
polycephalum, lanuginosum, montanum Dill. — *Rhacomitrium lanuginosum*.

var. *barbatum* Retz. — *Rhacomitrium canescens var. ericoides*.

var. *microcarpum* Retz. — *Rhacomitrium microcarpum*.

var. *obtusum* Retz. — *Rhacomitrium sudeticum*.

var. *pilosum* Retz. — *Rhacomitrium canescens*.

var. *vireecens* Retz. — *Rhacomitrium fasciculare*.

var. α Neck. — *Rhacomitrium canescens*.

var. β L. — *Rhacomitrium canescens*.

var. γ L. — *Rhacomitrium canescens var. ericoides*.

var. γ Huds. — *Rhacomitrium microcarpum*.

var. δ Huds. — *Rhacomitrium sudeticum*.

var. η Huds. — *Rhacomitrium protensum*.

imberbe L. — *Barbula fallax*.

imbricatifolium C. M. — *Brachymenium*.

imbricatulum C. M. *Syn. II*, p. 575.

2. — *As.* : Himalaya.

imbricatum (*Schwægr.*) *Bryol. eur. IV* (*mon.* p. 29), t. 340; *C. M. Syn. I*, p. 303; *W. P. Sch. op. cit.* p. 418 (1).

Br. marginatum *Brid. Bryol. univ. I*, p. 849.

Pohlia imbricata *Schwægr. Suppl. I, II*, p. 71, t. 64.

Syn. — *Eur.* : *Rariss.* ; *Alp. Helvet.*, *Carinth.*, *Salisburg.*

imbricatum de Not. — *Br. comense*.

immarginatum *Broth. in Bail. Contrib. Queensl. Fl. Bull.* 13, p. 21 (*nom.*)
et in Oefv.... 1893, p.

2. ♂ ign. *Ad terr. arenos.* — *Pac.* : *Austral. or.* (*Queensland*).

immersum *Dicks.* — *Campylopus flexuosus*.

inaequale *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 342; *C. M. Syn. I*, p. 302.
— *Pac.* : *Austral. or.*

(1) Cf. Philibert in *Rev. bryol.* 1889, p. 36, *Aman l. c.* p. 58 et *Limpr. Laubm. Deutschl.* p. 328.

- inclinans* Dicks. — *Cynodontium polycarpum* var. *strumiferum*.
- inclinatum* (Sw.) *Bryol. eur. IV* (mon. p. 17), t. 334 (p.p.) ; *C. M. Syn. I*, p. 269 p.p. ; *W. P. Sch. Syn. II* ed. p. 419.
Cladodium inclinatum *Brid. Bryol. univ. I*, p. 621.
Hypnum intermedium *W. et M. Bot. Taschb.* p. 482 (p.p., fid. *C. M.*).
Leskea inclinata *eor. op. cit.* p. 244.
Mnium intermedium var. *Roehl. Deutsch. Fl. III*, p. 93.
Pohlia inclinata *Sw. M. Suec. pp.* 45 et 96, t. 5, f. 11.
Syn. Ad sax., mur., lign., terr. turf. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. ad subalp. in zon. temper. *As.* : Penins. Tschutschica, Jenissei inf., Himalaya (var.), Pers., Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Fret. Hudson et Kotzbuë, Groenland, ins. Miquelon, Gaspes., Nov. Scot., M. Rupestr., Alaska, fret. Behring, reg. occ. et or.
Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 381.
Rab. Bryoth. eur. n. 329, 1026, 1087.
 « var. *gracile* *Lindb. in Oefv...* p. 547.
 — *Eur.* : Spitzberg. *Am. sept.* : Groenland.
- inclinatum* { *Bryol. eur. p.p.* — *Br. longisetum*.
 { *Dicks.* — *Distichium*.
- inclusum* *C. M. in Fl.* 1890, p. 477.
 In gramin. edit. — *Afr.* : Ins. Mayotte.
Exs. : *Mar. n.* 77 p.p.
- incurvifolium* *C. M. in Bot. Zeit.* 1851, p. 549 (1).
 2. *Rupic.* — *Pac.* : Nov. Zeland.
- incurvum* *Huds.* — *Oligotrichum hercynicum*.
- indicum* *Dz. et Mk.* — *Brachymenium*.
- inflatum* *Philib. in Rev. bryol.* 1886, p. 81.
Syn. — *Eur.* : Norvegia.
- inflexum* *C. M.* — *Webera*.
- inordinatum* *Brid.* — *Aulacomnium palustre*.
- insulare* *de Not.* — *Br. Donianum*.
- integridens* *C. M.* — *Webera*.
- integrifolium* *Rehm.* — *Rhodobryum leucothrix*.
- intermedium* (*Web. et Mohr*) *Brid. Mant. M. p.* 120 ; *Bryol. eur. IV* mon. p. 47), t. 356 ; *C. M. Syn. I*, p. 278 ; *W. P. Sch. op. cit.* p. 428.
Br. occidentale *Mac. Canad. M. n.* 390.
Br. pallescens *Schwaegr. Sp. M. p.* 61.
Br. turbinatum var. *H. et T. Musc. brit. p.* 122.
Br. Webera intermedia *Brid. Bryol. univ. I*, p. 632.
Hypnum intermedium *W. et M. Bot. Taschb.* p. 283, t. X, f. 6.
Mnium intermedium *Ludw. Cent. M. I*, n. 81.
Pohlia intermedia *Brid. M. Rec. II, III*, p. 144, t. 2, f. 12.
Webera intermedia *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 67, t. 75 (ic. part. ad *Br. uliginosum* pertin.).
Syn. Ad sax. et terr. aren. — *Eur.* : Britann., Voges., Suec., Siles., Austria. *As.* : Jenissei, Himalaya (var.). *Am. sept.* : Groenland, fret. Hudson, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Ontario, Alberta, Athabasca, Manitoba, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, reg. sept., or. et centr. *Pac.* : Nov. Zeland. ? Tasman.
Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 169.
Rab. Bryoth. eur. n. 88, 874, 1030, 1212.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 277.

(1) Species dubia ! (Handb. p. 444).

- var. *cirratum* Bryol. eur. — Bryum.
- « var. *Limprichtii* Warnst. *Moosfl. Prov. Brandenb.* p. 52.
In arenos. — Eur. : Brandeb.
- « var. *subcylindricum* Limpr. *Laubm. Deutschl.* p. 351.
Ut et ubi praeced.
- interruptinervium* C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 15 (nom.)
— Afr. : Ins. Comor.
- interruptum* Dicks. — *Philonotis fontana*.
- intricatum* Brid. — *Bryum calophyllum*.
- Isleanum* Besch. *Not. M. des I. St-Paul et Amsterd.* p. 3.
2. — Afr. : Ins. S. Paul et Amsterdam.
- iteratum* Par.
Br. *macropelma* C. M. in *Linn.* 1872, p. 149.
2. — Pac. : Austral. or.
- Jackii* C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 348.
2. Terr. — Eur. : Summ. Alp. Carinth.
- Jamesoni* Tayl. — *Brachymenium*.

julaceum	{	Funk. — Br. <i>Funkii</i> .
		Kunth. — Br. <i>semi-ovatum</i> .
		Schrad. — Br. <i>argenteum</i> var. <i>majus</i> .
		Sm. — Br. <i>filiforme</i> .
- var. *concinnum* Wils. — Br. *julaceum*.
- juliforme* (Solms-Laub.) W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 465.
Anomobryum filiforme var. *juliforme* Husn. *Muscoll. gall.* p. 222.
A. julaceum var. ? *algerianum* W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 383.
A. juliforme Solms. *Laub. Tent. bryogeogr. Algarv...* 1867.
Br. *campestre* Lindb. *Man. M. I.* 1870, p. 41.
Br. *filiforme* var. *neapolitanum* Boul. *M. Fr. I.* p. 293.
Webera neapolitana de Not. *Epil.* p. 417 (1869).
2. Ad terr. humid. et subturfac. — Eur. : Norveg. occ., Armor. c.
marit., Algarb., Corsic., Etrur., Neap. Afr. : Alger., Madeir.
- Junghunianum* Hpe. in *Bryol. jav. I.* p. 146, t. 119.
Br. *pachythea* Dz. et Mk. in *Pl. Jungh. I.* p. 323.
2. — As. : M. Java.
- juniperi foliis rugosis, capsulis rectoribus* Dill. — *Atrichum angustatum*.
- juniperifolium* Hffm. — { *Atrichum angustatum* ?
{ *Atrichum undulatum* var. *abbreviatum* ?
- Juratzkae* Milde *Beitr...* p. 596.
2. — As. : Persia.
- Kaernbachii* C. M. in *Act. hort. Petrop.* 1887, fasc. I.
2. — As. : Caucas. (Batoum).
- Kaurini* Philib. in *Rev. bryol.* 1886, p. 21.
1. (1). — Eur. : Norveg.
- Kaurinianum* Warnst. in *Hedwig.* 1882, n. 2.
Syn. *Rupic.* — Eur. : Norveg. sept. (Dovre).
- Keniae* C. M. in *Fl.* 1890, p. 475.
Ster. — Afr. : M. Aberdare, Kenia.

(1) Sec. Limpr. *Laubm. Deutschl. II.* p. 296, synoicum nec a *Br. arctico* diversum.

kerguelense Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876.

1. — Afr. : Ins. Kerguelen.

Kiaeri Lindb. M. Scand. p. 41 et n. 100 b.

2. In schist. micac. desaggr. — Eur. : Rar. : Norveg.

Kindbergii Philib. in Rev. bryol. 1885, p. 83.

Syn. — Eur. : Norveg., Helvet. (Vales.).

Klinggraeffii W. P. Sch. op. cit. p. 436.

Br. constrictum Br. ined. (fid. Husn. Muscol. gall. p. 245).

Br. erythrocarpum δ turfaceum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 363.

Br. macrostomum Jur. in Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1867, p. 542 et in Rab. Bryoth. eur. n. 1085.

Br. punilum Saut. in sched.

2. In terr. aren. vel. turf. humid. — Eur. : Scandin., Boruss. Siles., Salisburg., Galic., Austr. inf., Morav., Hungar., Stir., Carinth., Bavar., Tirol., Helvet., Palatin.

Klotzschii Mitt. — Brachymenium.

Knowltoni Barnes in Bot. Gaz. 1889, p. 44.

Polyg. Rupic. — Am. sept. : Terra nov.

koratranum C. M. — Brachymenium julaceum.

Korbianum C. M. — Webera.

Kunzii H. et H. — Bryum caespiticiu var. imbricatum.

labradorenses Philib. in Rev. bryol. 1887, p. 55 et 1889, p. 61.

Polyg. — Eur. : Lappon., Dovre. Am. sept. : Labrador.

laceratum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 99.

2. Terr. — Afr. : Ins. Borbon.

« var. comorense Besch. l. c.

Ut typ. — Afr. : Comor. magn.

lacerum Vill. — Bartramia Oederi.

lacustre Bland in Brid. Mant. M. p. 120 ; Bryol. eur. IV (mon. p. 16), t. 332 ; C. M. Syn. I, p. 268 ; W. P. Sch. op. cit. p. 422.

Br. caespiticiu var. H. et T. Muscol. brit. p. 121.

Br. cernuum Brid. Bryol. univ. I, p. 851.

Br. fulvellum Wils. in Kew Journ. bot. I, p. 330.

Br. Webera lacustris Brid. op. cit. p. 637.

Hypnum lacustre W. et M. Bot. Taschb. p. 285.

Mnium lacustre Bland. Fasc. M. III, n. 132 et in Sturm. Fl. germ. crypt. fasc. X.

Pohlia lacustris Hüb. Muscol. germ. p. 483.

Syn. In gramin. aren. udis. — Eur. : Spitzberg. ins. Ursor., Suec., Boruss. sept., Ducat. Megapol., vall. Rhen., Anglia. As. : Amour, Sikkim. Am. sept. : Ins. Kotzebue, Groenland, Alaska.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 332, 969.

var. alpinum Bryol. eur. — Br. fallax.

« var. norvegicum Limpr. in LXI Jahresb. d. Schles. Ges. f. Vaterl. Cult. 1884.

— Eur. : Dovre.

laete-nitens C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 94.

Ster. — Afr. : Ins. Franciæ.

laetum Lindb. — Br. oblongum.

laevigatum Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 546 et *Fl. Antarct. I*, p. 134, t. 60; *C. M. Syn. I*, p. 319 et *II*, p. 577; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 440.

2. — *Am. merid.*: Ins. Eremit., Maclov., Fuegia. *Pac.*: Nov. Zeland. med. et merid.

lamprocarpum C. M. — Zieria.

lamprocomum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 292.

— *Am. merid.*: Argentin. Tucum.

lamprostegum C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 22; *Mitt. M. Ind. or.* p. 71.

2. — *As.*: M. Neilgherr.

lanatum Brid. — *Br. argenteum* var. *lanatum*.

lanceolatum { Dicks. — Pottiia.
pellucidum, capsulis subrotundis, pedicellis carneis Dill. —
Webera carnea.

Landsbergii Dz. et Mk. — *Br. Crügeri*.

lanuginosum Hoffm. — *Rhacomitrium*.

lapponicum Dicks. — *Amphoridium*.

laticeps C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 295.

Ster. Limic. — *Am. merid.*: Argentin. Cordob.

latifolium Lindb. in *Medd. af Soc. pro Faun. et Fl. Fenn.* 1879, V.

2. Ster. — *Eur.*: Lappon., Norveg., Alp. Bergam. *Am. sept.*: Ins. Miquelon.

latifolium { Brid. — *Br. Schleicheri* var. *latifolium*.
Bryol. eur. — *Br. calophyllum*.
Dz. et Mk. — *Br. Marattii*.

lato-decurrens Mac. — *Br. Duvalii* var. *lato-decurrens*.

laxifolium Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 216.

2. Paludic. — *Pac.*: Nov. Caledon.

laxifolium Lindb. — *Br. gemmiparum*.

laxiroseum C. M. — *Rhodobryum*.

laxum Reichdt. — *Webera nutans*.

Lechleri C. M. — *Bryum andicola*.

leptoareoblastum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 71.

— *Afr.*: M. Cameroon.

leptoblepharon C. M. — *Webera*.

leptocladon Sull. — *Zieria*.

Leptodontium Mitt. — *Webera*.

leptoloma C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 478.

2. — *Am. merid.*: Venezuela.

leptophyllum Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. II*, n. 451 et 460; *C. M. Syn. I*, p. 273.

1. Ad arbor. — *Afr.*: Abyss.

leptorozeum C. M. — *Rhodobryum*.

leptospeiron C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 95.

2. — *Afr.*: Ins. Franciæ, Comor. magn.

leptostomoides C. M. — *Brachymenium*.

leptostomum W. P. Sch. *Syn. II ed.*, p. 467.

Anomobryum leptostomoides ej. in *Husn. M. Gall. n.* 271 et in *Rab. Bryoth. eur. n.* 1218.

- A. sericeum* de Lac. mss.; Husn. *Muscol. gall.* p. 223.
Br. filiforme γ *sericeum* Boul. *M. Fr. I*, p. 293.
2. In rup. humid. — *Eur.* : Alp. Rhaet., M. Dore Arvernicae.
- leptothecium* Tayl. — *Rhodobryum*.
leptothrix C. M. — *Rhodobryum*.
- leptotorques* C. M. in Dusen *M. Camer. n.* 208.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- leptotrichaceum* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 256.
 — *Afr.* : Orange.
- Lescurianum* Sull. — *Webera*.
- leucomalatum* C. M. et Kindb. in *Bidr. p.* 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 123.
 Syn. Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit.
Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 543.
- leucophyllum* Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind. p.* 15, t. 6; C. M. *Syn. I*, p. 315; *Bryol. jav. I*, p. 148.
 2. Terr. — *As.* : Java.
- leucurum* C. M. in *Linn. 1878-1879, p.* 479.
 2. — *Am. merid.* : Venezuela.
- Leveilleanum* Dz. et Mk. — *Br. plumosum*.
Liebmanni W. P. Sch. — *Rhodobryum*.
Liebmannianum C. M. — *Br. brevicaulis*.
ligulatum Schreb. — *Mnium undulatum*.
limbatum C. M. — *Webera*.
- Limprichtii* Kaurin in *Bot. Not. 1885, p.* 87.
 Polyg. Ad. rup. madid. — *Eur.* : Norveg. (Dovre).
- Lindbergii* Kaur. in *Bot. Notiz. 1886, p.* 129.
 1. — *Eur.* : Norveg. occid.
- Lindgrenii* W. P. Sch. *Syn. II ed. p.* 412.
Br. arcticum Lindgr. *M. Suec. n.* 60.
 Syn. Terr. — *Eur.* : Suec. merid.
- Lindigianum* Hpe. — *Rhodobryum*.
- linearifolium* C. M. in *Linn. 1880-83, p.* 365.
 Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.
- linoides* Dicks. — *Barbula unguiculata*.
- Lisæ* de Not. *Epil. p.* 383; W. P. Sch. *op. cit. p.* 457.
 2. (de Not.); syn ! (Limpr.). — *Eur.* : M. Pedemont.
- lonchocaulon* C. M. in *Fl. 1875, p.* 93.
 Syn. — *Am. sept.* : Colorado.
- longicollum* Sw. } — *Webera cruda* var. minor?
 } — *Webera*.
- longifolium* { C. M. et Hpe. — *Webera*.
 { Dicks. — *Dicranum falcatum*.
 { Dicks. — *Dicranum*.
- longipedicellatum* C. M. — *Brachymenium*.
- longirostrum* { Brid. — *Mnium rostratum*.
 { Griff. — *Mnium rostratum* var. *rhynchophorum*

longisetum Bland. *Fasc. V M. et in Brid. Bryol. univ. I*, p. 673; W. P. Sch. *op. cit.* p. 420.

Br. *inclinatum* Bryol. eur. IV (mon. p. 17), t. 334 p.p.; C. M. Syn. I, p. 269 p.p.

Br. *turbinatum* var. H. et T. *Musc. brit.* p. 122.

Br. *Willdenowii* Jur. in Rab. *Bryoth. eur.* n. 973.

Meesea nutans Willd. *Prodr. fl. Berol.* n. 983.

Pohlia longiseta Hüb. *Muscol. germ.* p. 480.

Syn. In prat. palud. — Eur.: German. sept., Wurtemb., Bavar.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 97, 966.

Un. itin. 1864, n. 89, 90.

Lorentzii W. P. Sch. *op. cit.* p. 413.

Syn. In terr. turf. et sphagnet. — Eur.: Norveg. (1).

Lorentzianum C. M. *Rhodobryum*.

luoidum { Dna E. G. Britt. — *Mnium*.
James. — *Webera cruda*.

Ludwigii { Brid. — *Webera commutata*.
Spreng. — *Webera*.

var. *gracile* Bryol. eur. — *Webera commutata* var. *gracilis*.

luridum Ruthe in *Verh. d. bot. Ver. Brandenb.* 1867; W. P. Sch. *op. cit.* p. 410.

Syn. In cav. arenos. — Eur.: German. sept. (Neomark.) (1).

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 1089.

luteolum C. M. — *Brachymenium*.

lutescens Dicks. — *Rhacomitrium fasciculare*.

lycopodiiforme Schleich. — *Philonotis fontana*.

lycopodioides { Hook. — *Mnium*.
Sw. — *Syrrhopodon*.

maceratum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 385.

2. — Am. merid.: Argentin. subtropic.

Macounii Aust. — Br. *Atwateriæ*.

macrantherum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise...* p. 14.

Br. *pendulum* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876.

Syn. — Afr.: Ins. Kerguelen.

macrocarpum Hedw. — *Leptostomum*.

macropelma C. M. Syn. I, p. 275.

2. — Am. merid.: Chil. austr.

macropelma C. M. — Br. *iteratum*.

macropoma C. M. — *Brachymenium*

macrorhodon C. M. — *Rhodobryum*.

macrostomum Jur. — Br. *Klinggræffii*.

magellanicum C. M. — *Brachymenium*.

malachiticum C. M. — *Brachymenium*.

mammillatum Lindb. in *Hartm. Skand. Fl. IX ed. II*, p. 36, n. 28; W. P. Sch. *op. cit.* p. 417.

1. Ad ripas aren. fluv. et in aren. marit. — Eur.: Ins. Ursor., Aland, Gothland.

var. *globosum* Berggr. — Br. *globosum*.

mammilligerum *Kindb. in Mac. Cat. p. 122 (subsp. Br. inclinati).*

Syn. Ad rup. humid. — *Am. sept. : M. Rupestr.*

mancum C. M. — *Webera?*

Marattii *Wils. Bryol. brit. App. 9, t. 32, f. b. ; Bryol. eur. IV (mon. suppl. p. 60), t. 640 ; W. P. Sch. op. cit. p. 423.*

Br. latifolium *Dz. et Mk. Prodr. fl. batav.*

1. In aren. humid. et ad rip. turf. — *Eur. : Scot., Anglia, Neerland., ins. Aland et Gothland, Suec., Dania, Boruss. marit.*

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 731, 1334.

Martianum *Roth. — Philonotis marchica.*

marginale *Dicks. — Dicranella crispa.*

marginatum *Bryol. eur. IV (mon. p. 74), t. 379 (sub Br. apiculato) ; C. M. Syn. I, p. 297 ; W. P. Sch. op. cit. p. 437.*

2. Ad rup. aren. — *Eur. : Prope Bipontem Voges. semel lectum (W. P. Sch. l. c.) ; pr. « Bar sur Seine » et Andegav. Galliae (C. M.).*

marginatum { *Brid. — Br. imbricatum.*
Brid. — Webera Tozeri.
Dicks. — Mnium serratum.

var. orthorhynchum *Hartm. — Mnium serratum.*

var., Drumm. — Mnium inclinatum.

Mariei *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 94.*

2. Ad cement. calc. — *Afr. : Ins. Nossi-Bé.*

Martianum C. M. — *Brachymenium pulchellum.*

maynense *Spr. in Mitt. M. austr. am. p. 312.*

2. Ad lign. saxaq. inund. — *Am merid. : Ins. Trinitat., And. Quitens, et Peruv.*

medianum *Mitt. — Rhodobryum.*

medium *Vill. — Cynodontium polycarpum.*

meeseoides *Kindb. in Bull. Tor. bot. Club, 1889, p. 95.*

2. Ad rup. humid. — *Am. sept. : Anticosti, Gaspes., M. Rupestr. et Selkirk, ins. Vancouver.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 187.

megalacrion *Schwaegr. — Brachymenium.*

megalocarpum *Hook. in Kunth Syn. pl. Æquin, p. 59 ; C. M. Syn. I, p. 264 ; Mitt. op. cit. p. 286.*

Acidodontium Kunthii *Schwaegr. Suppl. II, II, p. 152, t. 196.*

Megalangium Kunthii *Brid. Bryol. univ. II, p. 29, t. suppl. 3 (in ic. sub Macrothecio).*

2. Ad arbor. — *Am. merid. : And. Nov. Granat et Quitens.*

megalodictyon *Sull. in Proced. Am. Acad... 1859, p. 279.*

Br. cellulare *Hook.?*

2. Muric. — *As. : Ins. Loo-Choo.*

megalostegium *Sull. — Rhodobryum.*

melanodon *Brid. — Webera carnea.*

melanothecium C. M. — *Brachymenium.*

melvilleanum C. M. *Syn. I, p. 267.*

Ptychostomum pulchellum *R. Br. App. ad iter Parray. p. 197 et in Brid. Bryol. univ. I, p. 601.*

— *Am. sept. : Ins. Melville.*

membranaceum, *foliis membranaceis obtusis* Dill. — *Aulacomnium heterostichum* var. *humile*.

Menziesii Hook. — *Rhizogonium*.

meruerse C. M. in *Fl.* 1890, p. 475.

2. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

mexicanum C. M. — *Brachymenium*.

Meyenianum C. M. — *Brachymenium*.

micans Limpr. *Einig. neue. Art.* 1883, p. 236 et *Laubm. Deutschl.* II, p. 303.

Polyg. Ad terr. turf. — *Eur.* : Norveg.

micans Mitt. — *Brachymenium*.

microblastum C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

2. — *As.* : Penins. Tschutschica.

microcarpum (Hsch.) C. M. *Syn.* I, p. 294 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 300.

Cladodium microcarpum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 30.

Pohlia microcarpa Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 38.

2. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

microcarpum Gmel. — *Rhacomitrium*.

microcephalum C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 134.

2. Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

microchaeton Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 342 ; *Mitt. op. cit.* p. 298.

2? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

micro-erythrocarpum C. M. et Kindb. *ll. cc. pp.* 454 et 124.

Br. murale *Mac. Canad. M. n.* 186.

2. In aren. humid. — *Am. merid.* : Ins. Vancouver.

microglobum C. M. et Kindb. *ll. cc. p.* 454 et 129.

2. Terr. — *Am. sept.* : Ontario.

micro-laevigatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise...* p. 12.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

micron C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 372.

2. — *Am. merid.* : Argentin.

micro-pendulum C. M. in *op. cit.* 1878-79, p. 476.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

micro-pendulum C. M. — Br. nano-pendulum.

microrhodon C. M. — *Rhodobryum*.

microstegium *Bryol. eur. IV (mon. suppl. p. 7), t. 362* ; C. M. *Syn.* I, p. 279 ; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 433.

Syn. Terr. — *Eur.* : Alp. Norveg., Tirol., Helvet. *Am. sept.* : Groenland, Labrador.

microstomum } C. M. — *Brachymenium*.

 } Dicks. — *Hymenostomum*.

microtheca C. M. *Syn.* I, p. 314.

2. — *As.* : Manilla.

Mildeanum Jur. in *Verh. d. Zool. bot. Ges. in Wien*, 1862, p. 967; W. P. Sch. op. cit. p. 446.

Br. rubrum *Milde mss.*; *Ltz. Bryol. Notizb.* p. 46.

2. Ad terr. humid. et mur. — *Eur.*: Siles., Sudet., Bohem., Hungar., Austr. inf. et super., Salisb., Stir., Carinth., Carniole, Bavar., Helvet., Westphal., Belg., Rhönggeb., Francon., Tirol., Delphinat. As.: Caucas. *Eæss.*: Rab. *Bryoth. eur.* n. 476.

miniaturum Lesq. in *Mem. Calif. Acad.* I, p. 23; *Lesq. et Jam. Man.* p. 233.

2. Ad rup. humid. — *Am. sept.*: Columb. brit., Calif.

miniaturum Mac. — Br. capitellatum.

minusculum C. M. in *Fl.* 1885, p. 400.

2. Paludic. — *Am. merid.*: Fuegia austr.

minutirete C. M. in *Fl.* 1888, p. 409.

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

minuti-rosatum C. M. — Rhodobryum.

minutulum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mex.* p. 53.

2. — *Am. sept.*: Mexic.

minutum { Dicks. — Pottia Starkeana.
Gmel. — Seligeria pusilla.

mirabile C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

Syn. — *As.*: Penins. Tschutschica.

mnioides { Gmel. — Leptobryum piriforme.
Wils. — Mnium subglobosum.

mniopsis C. M. — Rhodobryum.

Moei W. P. Sch. op. cit. p. 417; *Philib. in Rev. bryol.* 1886, p. 20.

Syn. — *Eur.*: Alp. Norveg.

Mohrii Lesq. in *Bull. Torr. bot. Club.* 1874, p. 50 (1).

— *Am. sept.*: Ludovic.

Molleri C. M. — Brachymenium.

moniliforme C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 240 a.

— *Afr.*: M. Cameroon.

Montagneanum C. M. — Brachymenium pendulum.

montanum { Œd. — Distichium capillaceum.
hemiheterophyllum, operculis acutis Dill. — Rhacomitrium
aciculare.

Morisii Br. — Br. erythrocarpum.

mucronatum Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 442.

Hermaphr. Terr. — *Pac.*: Nov. Zeland.

mucronulatum Dicks. — Barbula unguiculata.

Mühlenbeckii *Bryol. eur.* IV (mon. suppl. p. II), t. 381; C. M. *Syn.* I, p. 286; W. P. Sch. op. cit. p. 441.

Br. alpinum var. brevifolium Myr. *Coroll. fl. Upsal.* p. 68.

Br. Raui Aust. in *Coult. Bot. Gaz.* II, p. 110.

2. Ad rup. madid.; calcar. fugit. — *Eur.*: Scandin., Riesengeb., Gesenke, Tatra, Salisb., Stir., Tirol., Helvet., Carinth. As.: Caucas. *Am. sept.*: Groenland, Terr. nov., Wyoming, Oregon, Washington, Nov. Mexic.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 94, 472.

Mülleri Spr. — Br. Donianum.

multicaule *Tayl.* in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 342; *C. M. Syn.* I, p. 302.

— *Pac.* : Austral. or.

multiflorum C. M. — Webera.

Mundtii C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 206.

Br. canariense *ej. Syn.* I, p. 253 p.p.

2. Ad arbor. — *Afr.* : C. B. Sp.

« *var. flaccidum* C. M. in *op. et loc. cit.*
Ut et cum typ.

murale Wils. in *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 437.

Br. atro-purpureum *de Not. Epil.* p. 399.

Br. erythrocarpum *var. murorum* W. P. Sch. *Coroll.* p. 73.

Br. murorum Wils. in *Ltz. Bryol. Notizb.* p. 46.

2. Ad cement. calcar. mur. — *Eur.* : Britann., vall. Rhen., Gall.,
Helvet. occ. As. : Caucas. *Afr.* : Alger., Madeir.

Exs. : Mandon M. Madeir. n. 21.

Rab. Bryoth. eur. n. 674, 1083.

murale { Mac. — Br. micro-erythrocarpum.
L. — *Barbula muralis*.

murmanicum Broth. in *Act. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* VI, n. 4, p. 58.
Syn. Arenic. — *Eur.* : Lappon. Murman.

murorum Wils. — Br. murale.

muticum Lange. — Br. gemmiparum.

Myurella C. M. in *Linn.* 1875, p. 380.

Ster. Terr. — *Afr.* : Dar Fertit.

Myurella C. M. — Br. myurelloides.

myurelloides Par.

Br. *Myurella* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 314.

— *Afr.* : M. Cameroon.

nanocoma C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 365.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

nano-pendulum *ej. in op. cit.* p. 363.

Br. micro-pendulum *ej. in op. cit.* 1878-79, p. 294.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin. Tucuman.

nanopyxis *ej. in Hildebr. M. Madag.* n. 2059.

— *Afr.* : Ins. Nossi-Be.

nanorhodon C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 90.

Ster. — *Afr.* : Ins. Française.

nano-torquescens C. M. in *Fl.* 1890, p. 476.

Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

nanum larignis foliis albis Dill. — *Octoblepharum albidum*.

naviculare Hpe. *Symb.* 1877, p. 724.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

naviculare Ren. et Card. — *Webera cucullata* *var. carinata*.

neilgherriense { Mont. — Rhodobryum.
 { Mont. (fid. Mitt.) — Mnium rostratum *var.* ramosum.
 { *affine* Wils. — Rhodobryum roseum.

neodamense Itzigs. in *Fl.* 1841, p. 360; *C. M. Syn.* I, p. 258; W. P. Sch. *Syn.* II ed., p. 460.

Br. pseudo-triquetrum *var.* cavifolium W. P. Sch. *Coroll.* p. 76.

2. In uligin. — *Eur.* : Spitzberg, Scandin., German. sept., Britann., Neerland., vall. Rhen., Pyren.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 877, 929, 972.

var. ovatum Lindb. et Arn. — Bryum ovatum.

nepalense { Dz. et Mk. — Brachymenium brevicaule?
 { Mitt. — Brachymenium.
 { Spreng. — Brachymenium Weisia.

nervosum Hoffm. — Barbula unguiculata *var.* cuspidata.

nevadense C. M. — Webera.

Nietneri C. M. — Brachymenium.

nigrescens Vill. — Rhacomitrium protensum.

nigricans { Crome. — Br. caespiticius.
 { Dicks. — Br. turbinatum.

nimbigerum Tayl. — Br. concinnatum.

nigritum Dicks. — Catoscopium.

nitens Hook. in Wall. *Cat. n.* 7592 et *Ic. pl. rar. t.* 20, f. 6; Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 9; *C. M. Syn.* I, p. 339; Mitt. *M. Ind. or.* p. 70 (1).

Br. coronatum *var.* Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 333.

Br. pachypoma Mont. (fid. Mitt.).

2. — *As.* : Nepal., Ceylan, Java.

nitidulum Lindb. in *Oefv...* XXIII, 1866, p. 545.

Syn. — *Eur.* : Spitzberg, Scandin. *Am. sept.* : Groenland.

var. teres Berggr. — Br. teres.

nitidum Mitt. *op. cit.* p. 67.

Anomobryum nitidum Jaeg. *Ad. I.* p. 604.

2. — *As.* : Himalaya, Ceylan.

nivale C. M. *Syn.* I, p. 262.

Hermaphr. — *Am. merid.* : Summ. And. Chil. austr.

norvegicum Œd. — Bartramia Halleriana.

Notarisii Mitt. — Br. gemmiparum.

nudicaule Lesq. -- Webera.

nudum Dicks. — Discelium.

nutans { H. f. et W. — Webera clavaeformis?
 { Mitt. — Webera sphagnadelphus?
 { Mitt. (1876). — Webera pseudo-nutans.
 { Schreb. — Webera.

var. bicolor Bryol. eur. — Webera nutans *var.* bicolor.

var. caespitosum Bryol. eur. — Webera nutans *var.* caespitosa.

var. longisetum Bryol. eur. — Webera nutans *var.* longiseta.

var. minus Kth. — Mielichhoferia longiseta.

var. subdenticulatum Bryol. eur. — Webera nutans *var.* sudenticulata.

var., Drumm. — Br. arcticum.

(1) Cf. *Br. apiculatum* Schwaegr.

- obconicum *Hsch. mss.*; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 59), t. 367; *C. M. Syn. I*, p. 282 et *II*, p. 571; *W. P. Sch. op. cit.* p. 451.
 Br. capillare var. obconicum *Hüb. Muscol. germ.* p. 442.
2. Ad mur. et rup. aren. — *Eur.*: Angl., vall. Rhen., Hercyn., Pyren. *Am. sept.*: Colorado, Calif., Florid. *Pac.*: Austral., Nov. Zeland., Tasman.
- « *f. longipes Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, 1, p. 66.
 Terr. — *As.*: Yunnan.
- obconicum* { *Kindb., Mac.* — Br. heteroneuron.
 Sulliv. — Br. sanguilentum.
- obliquum C. M. Bryol. austr. Georg.* p. 17.
 2. — *Am. merid.*: Austr. Georg.
- oblongum Lindb. in Mitth. v. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 3^a Xbris 1881
 et in *Rev. bryol.* 1886, p. 33.
 Br. lætum *Lindb. l. c.* 3^a Febr. 1883.
 2. Terr. — *Eur.*: Scandin. *As.*: Jenissei med.
- obovatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 4.
 2. Terr. — *Afr.*: Madeir.
- obtusifolium Lindb. in Oefv...* 1866, p. 544.
 2. Ster. — *Eur.*: Spitzb., Septem Ins., ins. Parry, Ursor. *As.*: Penins. Samojed., Jenissei inf. *Am. sept.*: Groenland, fret. Behring.
- obtusifolium* { *Turn.* — Br. cyclophyllum.
 Vill. — *Webera cucullata.*
- obtusum Dicks.* — *Entosthodon ericetorum.*
- occidentale Sull. in Bot. Pac. R. R. Survey (Whipple), p.* 188, t. 7;
Lesq. et Jam Man. p. 236.
 2. Rupic. et terr. — *Am. sept.*: Calif.
- occidentale Mac.* — Br. intermedium.
 var., *Sull. et Lesq.* — Br. sanguilentum.
- ochropyxis C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 233.
 — *Afr.*: C. B. Sp.
- octoblepharis Gmel.* — *Octoblepharum albidum.*
Æderi Günn. — *Bartramia (Æderi.*
- œlandicum Philib. in Rev. bryol.* 1887, p. 9.
 1. In aren. marit. — *Eur.*: Ins. *Æland.*
- oeneum Blytt in Bryol. eur IV* (mon. suppl. p. 4), t. 338; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 427.
 Br. rutilans *C. M. Syn. I*, p. 274.
 2. In rup. fissur. humid. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Parry, Ursor., Alp. Norveg., Finmark. *Am. sept.*: Fret. Smith, ins. Sabine.
- « var. gracilescens *W. P. Sch. op. cit.*
 Ut typ. — *Eur.*: Alp. Norveg., Finmark.
- Erstedtianum C. M.* — *Webera.*
- oligochloron C. M. et Kindb. in Bidr.* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 129.
 Ster. Rupic. — *Am. sept.*: Columb. brit.
Exs.: *Mac. Canad. M. n.* 554.
- oncophorum Hpe. Symb.* 1877, p. 726.
 2? — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

ontariense Kindb. — *Rhodobryum*.

opdalense Limpr. *Einig. neue Art...* 1883, p. 238 et *Laubm. Deutschl. II*, p. 310.

Hermaphr. In aren. humid. — *Eur.* : Norvegia.

orbiculare pulvinatum, *hirsutie canescens*, *capsulis immersis* Dill. — *Grimmia pulvinata*.

orbiculatum Mitt. *M. austr. am.* p. 306.

Anomobryum orbiculatum Jaeg. *Ad. I*, p. 604.

Ster. Terr. — *Am. merid.* : *M. Pichincha*.

oreganum Sull. *M. Wilkes Exp.* p. 10, t. 7; *Lesq. et Jam. Man.* p. 230.
Syn. vel. polyg. — *Am. sept.* : Oregon.

origanum Bosw. (1). — *Br. Wesleyi*.

orthocladon Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 589; *C. M. Syn. I*, p. 318
2. — *Afr.* : Abyss.

orthodontioides C. M. — *Br. Gilliesii*.

orthodontum P. B. — *Dissodon borbonicus*.

orthopelma C. M. — *Brachymenium*.

orthophyllum Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser. II*, p. 90.
2. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

Exs. : Marie, n. 9.

orthorhynchum Brid. — *Atrichum tenellum*.

Orthotheciellae C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 78 et in *Forschungsreise...* p. 15.

Syn. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

Osculatianum de Not. in *Mem. Acad. Torin...* II ser. XVIII, p. 442.
— *Am. merid.* : Columb.

ovale Hoffm. — *Grimmia coramutata*.

ovalifolium Sull. — *Br. Crügeri*

ovatum Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 291.

Br. neodamense var. *ovatum* Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 34.

Br. pseudo-triquetrum δ *cavifolium* Saut. *Fl. d. Herzogth Salzburg.* III, p. 47.

2. Paludic. — *Eur.* : Salzburg., Stir. As. : Jenissei inf.

ovatum Dicks. — *Pottia cavifolia*.

Pabstianum C. M. in *Bot. Zeit.* 1852, p. 751.

Br. Gardneri Mitt. in *Hooker's Journ. of bot.* 1856, t. XI B et *M. austr. am.* p. 296.

Syn. Terr. — *Am. merid.* : And. Peruv., Brasil. austr. or.

<i>pachypoma</i>	{	Mont. — <i>Br. plumosum</i> .
		Mont. (fid. Mitt.). — <i>Br. nitens</i> .
		Wils. p.p. — <i>Br. alpinum</i> .
		Wils. p.p. — <i>Br. caespitium</i> .
		Wils. p.p. — <i>Br. erythrinum</i> .

pachythea C. M. *Syn. I*, p. 307 p.p.

Br. coronatum β minus Hpe. in *Preiss Pl. N. Holl.* p. 117.

2. — *Pac.* : Austral. occ., Nov. Zeland., Tasman.

(1) Ob nimiam similitudinem cum praeced. nomen mutatum.

- « *var. inflatum* Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm. II*, p. 191.
— *Pac.* : Austral., Nov. Zeland.

pachytheca } C. M. p.p. — Br. pseudo-pachytheca.
Dz. et Mk. — Br. Junghunianum.

pallens Sw. *M. Suec. pp.* 47 et 93, t. 4, f. 12; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 642;
Bryol. eur. IV (mon. p. 68), t. 373; C. M. *Syn. I*, p. 256; W. P.
Sch. Syn. II ed. p. 456.

Br. *turbinatum* H. et T. *Musc. brit.* p. 122 p.p.

Br. *turbinatum var. pallens* Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 267.

Hypnum pallens W. et M. *Bot. Taschb.* p. 286.

Mnium gracile Schleich. *Cent. II Pl. helv.*, p. 46.

Mnium pallens P. B. *Prodr.* p. 147.

Pohlia pallens Brid. *M. Rec. II, III*, p. 145.

2. Ad scatur., terr. saxaq. humid. — *Eur.* : E reg. campestr. montos.
usq. in alp. *As.* : Caucas., Jenissei. *Am. sept.* : Groenland, Gas-
pes., Ontario, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., ins. Vancou-
ver, Oregon, Wyoming, New Hampshire, M. Adirondack. *Am.*
merid. : And. Quitens.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 89 b, 583, 878 a, b, c, e, 928, 1213.

- « *var. abbreviatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*

Br. *attenuatum* Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 8, t. 10, f. 8? *Brid. op. cit.*
p. 638 (*quoad pl. Sudetorum*).

Orthopyxis attenuata P. B. *Prodr.* p. 45.

Ut typ. — *Eur.* : Reg. alp.

- « *var. angustifolium* Breidl. *Laubm. Steierm.* p. 134.

Br. *triste* Jur. *Laubm.* p. 287.

Ad terr. et rup. calcar. — *Eur.* : Austr. inf., Stiria.

- « *var. arcuatum* W. P. *Sch. Syn. I ed.* p. 377.

Cynodontium cernuum Schleich. *Cent. III Pl. helvet. n.* 9.

Ptychostomum cernuum Hüb. *Muscol. germ.* p. 493.

In depressis. — *Eur.* : Neerland.

var. baldense Vent. et Bott. — Br. *fallax var. baldense*.

- « *var. brevisetum* Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 36.

— *As.* : Jenissei inf.

var. fallax Jur. — Br. *fallax*.

var. microstoma *Bryol. eur.* — Br. *pallens var. speciosum*.

- « *var. œnodes* Limpr. in *LXI Jahresb. d. Schles. Ges. f. Vaterl.*
Cult. 1884.

— *Eur.* : Norveg. (Dovre).

- « *var. speciosum* (Voit) W. P. *Sch. Syn. I ed.* p. 377 et II ed. l. c.

Br. *elegans* Grev. in *Trans. of the Linn. Soc. XV*, p. 344, t. 3, f. 5?

Br. *pallens var. microstoma* *Bryol. eur. l. c.*

Br. *speciosum* Voit in *Sturm. Fl. germ. crypt. Fasc. XIV*; *Brid. Bryol.*
univ. I, p. 666.

Ut typ. — *Eur.* : Reg. alp.

- « *var. vulturienne* de Not. in *Piccone M. Ligur. n.* 161.

— *Eur.* : Liguria.

var., Wils. — Br. *calophyllum*.

pallescent Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 107, t. 75; *Brid. Bryol. univ. I*,
p. 645; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 51), t. 359; C. M. *Syn. I*, p. 279
et II, p. 570; W. P. *Sch. op. cit.* p. 433.

Br. *turbinatum* Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 266 p.p.

1. Ad mur. et rup. aren. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in alp. *As.* : Kamschatka, Amour, Jenissei, Himalaya (var.), *Caucas.* *Afr.* : M. Cameroon. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Terr. nov. ? ins. Miquelon, New Brunswick, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Utah, Colorado, Calif., reg. sept.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 177.

Rab. Bryoth. eur. n. 241 et b, 273, 537.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 279.

Un. itin. 1884, n. 132.

« *var. boreale* *Bryol. eur. l. c. t. 360* ; *W. P. Sch. op. cit. p. 434.*

Br. boreale *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 96, t. 69* ; *Brid. op. cit. p. 643.*

Ut typ. — *Eur.* : Reg. alp.

« *var. contextum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Br. contextum *H. et H. in Bot. Zeit. 1819, p. 91* ; *Brid. l. c. p. 646.*

Ut typ. — *Eur.* : Spitzberg, Scand. *As.* : Jenissei. *Am. sept.* : Groenland.

« *var. flexisetum* *Limpr. in op. cit.*

— *Eur.* : Norveg.

var. intermedium *Schwaegr.* — Br. intermedium.

« *var. laxifolium* *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 274.*

In silv. humid. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

« *var. longifolium* *Kindb. l. c.*

In aren. humid. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

var. subrotundum *Bryol. eur.* — Br. longifolium.

pallescent { *Dz. et Mk.* — Br. gedeanum.
 { *Schwaegr.* — Br. intermedium.

pallidisetum *Brid.* — *Webera carnea.*

? *palmifolium* *Brid.* — *Conomitrium.*

pallidum *Schreb.* — *Leptotrichum pallidum.*

paludicola *W. P. Sh. op. cit. p. 415.*

Syn. (I in adnot.). In uligin. — *Eur.* : Alp. Norveg.

paludosum *L.* — *Seligeria pusilla.*

β *viridulum* *Web.* — *Weisia viridula.*

palustre { *Brid.* — *Didymodon rubellus.*
 { *Dicks.* — *Dicranella squarrosa.*
 { *L.* — *Gymnostomum curvirostre.*
 { *Sw.* — *Aulacomnium.*
 { *aestivum* *Confervae facie* *Dill.* — *Gymnostomum curvirostre.*
 { *brevifolium capsulis nigricantibus* *Dill.* — *Barbula fallax* var.
 { *brevifolia.*
 { *complicatum, rubens, capsulis turbinalis pendulis* *Dill.* —
 { *Br. turbinatum.*
 { *pellucidum, capsulis et foliis brevibus recurvis* *Dill.* — *Dichodontium pellucidum.*
 { *scopis teretibus stellatis, vertice multifidis* *Dill.* — *Philonotis fontana.*

var. ramosum *Turn.* — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum.*

Pancheri *Jaeg. Ad. I, p. 639.*

Br. crassinervium *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 215.*

2. Ad terr. ferrug. — *Pac.* : Nov. Caled.

papillosum { C. M. — Brachymenium.
Dicks. — Ceratodon purpureus.

Pappeanum C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 752 et 1859, p. 206.

1. — Afr. : C. B. Sp.

« var. humile C. M. in op. cit. p. 206.

Ubi typ.

paradoxum Schwaegr. *Suppl. III*, I, I, t. 224; C. M. *Syn. I*, p. 290;
Mitt. *M. Ind. or.* p. 74.

1. — As. : Nepal.

paradoxum Jur. — Br. cuspidatum.

var. *cirratum* Jur. — Br. cuspidatum var. *cirratum*.

paraguense Besch. *Not. M. Parag.* p. 264.

2. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1225.

parasiticum Sw. — Calymperes.

parvulum Dicks. — Dicranella cerviculata var. pusilla.

parvum surculis et setis geminatis Dill. — Ceratodon purpureus.

patens { Dicks. — Rhacomitrium.
Wils. — Rhodobryum rigidum.

patulum C. M. — Brachymenium.

paucifolium { Dicks. — Seligeria subcernua (fid. Lindb.).
Dicks. — Gyroweisia tenuis (fid. W. P. Sch.).
Mitt. — Webera.

paulense C. M. in *Forschungsreise...* p. 39 (nom.).

— Afr. : Ins. S. Paul.

Payoti W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 470.

Br. *Blindii* var. *Payoti* Husn. *Muscol. gall.* p. 243.

Ster. Secus rivul. — Eur. : Alp. Sabaud. (M. Blanc).

pellucens Hook. — Orthodontium.

pellucidum { Abb. — Tetraxis.
L. — Dichodontium.

β L. — Dicranella squarrosa.

pendulinum Hpe in *Lin.* 1874, p. 214.

2. — Afr. : Madagascar.

pendulum (Hsch.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 70 et *Syn. II ed.* p. 414.

Br. caespitium Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 265 p.p.

Br. cernuum Bryol. eur. IV (mon. p. 14), t. 331; C. M. *Syn. I*, p. 266.

Cynodon cernuus Brid. *Mant. M.* p. 99.

Cynodontium cernuum Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 110.

Cynodontium cernuum Hedw. *Sp. M.* p. 58, t. 9.

Didymodon cernuus Sw. *M. Suec.* p. 29, t. I, f. 9 (fid. Brid.).

Ptychostomum cernuum Hsch. in *Fl.* 1822, *Syll. I*, p. 64; Brid. *Bryol.*

univ. I, p. 600.

Pt. pendulum Hsch. *l. c.*; Brid. *l. c.* p. 539.

Pt. radiculosum Brid. *l. c.* p. 838.

Pt. radiculosum var. spadicum Brid. *l. c.* p. 837?

Swartzia cernua Poir.

Sw. radiculosa Hedw. in *hb.* DC.

Syn. Ad mur., sax. et terr. — Eur. : E reg. campestr. usq. in alp.

As. : Saghalien, Amour, Himalaya, Caucas. Afr. : Alger? Am.

sept. : Fret. Smith, Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov.,

New Brunswick, Ottawa, Manitoba, M. Rupestr., Wyoming,

Columb. brit., fret. Behring, temper. tota.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 167.

Rab. Bryoth. eur. n. 443, 836 et b, 1118 et b, 1398.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 262.

« *var. angustatum* Ren. in Husn. M. Gall. n. 667 et Muscol. gall. p. 235.
Ad mur. — Eur. : Pyren. (Tarbes).

« *var. compactum* (Hsch.) W. P. Sch. Coroll. p. 70 et op. cit. p. 415.

Br. algovicum Sendtn. in C. M. Syn. II, p. 569.

Ptychostomum compactum Hsch. l. c. p. 22; Brid. Bryol. univ. I, pp. 598 et 837.

Pt. caespiticiu Brid. l. c. p. 837.

Rupic. — Eur. : In summ. Alp.

pendulum { Brid. — Breutelia.
Ehrh. — Leptobryum piriforme.
Fl. dan. — Bartramia Halleriana.
Mitt. (1876). — Br. macrantherum.
foliis variis pellucidis, thecis ovatis Dill. — Mnium affine et
cuspidatum.
hornum molle, foliis et lanceolatis et gramineis Dill. —
Webera cruda.
julaceum argenteum et sericeum Dill. — Br. argenteum.
ovatum caespiticiu et pilosum, seta bicolori Dill. — Br.
caespiticiu.
serpylli folio longiore pellucido, thecis oblongis cuspidatis
Dill. — Mnium rostratum.
serpylli folio rotundiore pellucido, thecis ovatis Dill. —
Mnium punctatum.

penicillatum Hpe. in Linn. 1874, p. 215

2.

— Afr. : Madagascar.

pennatum With. — Schistotega osmundacea.

pensilvanicum Brid. — Mnium serratum *var. apiculatum*?

peraristatum C. M. — Brachymenium.

percurrentinerve Kindb. in Bull. Torr. bot. Club. XVII, p. 274.

Ster. Ad rup. irror. — Am. sept. : Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 505.

perimbricatum C. M. in Dusen M. Camer. n. 362.

— Afr. : M. Cameroon.

Peromnium C. M. — Brachymenium radiculosum.

pertenu Besch. in Journ. de bot. 1894, p. 60.

2. Terr. — Am. sept. : Guadalup.

pertriste C. M. in Linn. 1878-79, p. 297 (sub *Br. tristi*, nom. correctum.)

Calcic? — Am. merid. : Argentin subtropic.

Pfefferi de Not. Epil. p. 409.

Ad rup. granitic. — Eur. : Ital. super. (Vall. Tellina).

Phallus C. M. in Linn. 1875, p. 392.

Br. coronatum ej. Syn. I, p. 307 p.p. ; Mitt. M. austr. am. p. 321.

2.

— Am. merid. : Chile.

phascoides Jaeg. — Diphyscium foliosum.

Philiberti Aman. — Br. comense.

Philippianum C. M. in Linn. 1844, p. 701 et Syn. I, p. 772.

Hermaphr.

— Am. merid. : Chile.

philonotum C. M. — Webber.

Philonotula Hpe. in *Hildebr. M. Madag. n.* 2136.
— Afr. : Madagascar.

phyllitidifolium Neck. — *Atrichum undulatum*.

Phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis incurvis Dill. — *Atrichum undulatum*.

physcomitrioides C. M. in *Jaeg. Ad. II*, p. 710.
— As. : Japon.

piliferum Br. et Sch. in W. Sch. M. *Abyss.*
— Afr. : Abyss.

piliferum { Dicks. — *Desmatodon latifolius* var. *brevicaulis* (fid. C. M.).
Dicks. — *Pottia latifolia* var. *pilifera* (fid. W. P. Sch.).

pilosum { Gmel. — *Barbula muralis*.
molle, setis intortis Dill. { — *Campylopus flexuosus* (fid. C. M.).
— *Dicranodontium longirostre* (fid. W. P. Sch.).
sphagni subulati facie Dill. — *Blindia acuta*.
verticillatum Dill. — *Eucladium*.

piriforme { Hedw. — *Leptobryum*.
L. — *Physcomitrium*.

plagiopodium W. P. Sch. in C. M. *Syn. II*, p. 572.
2. — Am. sept. : Mexic.

planifolium Kindb. *Art. d. Laubm. Schwed. u. Norveg.* p. 75.
Syn. — Eur. : Norveg. (Dovre).

planiusculum Lindb. et Arn. M. *As. bor.* 1890, II, p. 38.
2. Terr. — As. : Jenissei med.

platyloma { Bryol. eur. — Br. *Donianum*.
Schwaegr. — Br. *capillare* var. *platyloma*.

platyphylloides C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 298.
2. Limic. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

platyphyllum C. M. *Syn. I*, p. 291.
Pohlia platyphylla Schwaegr. *Suppl. IV*, p. 324.
2. Rupic. — Am. merid. : And. Chil. austr.

plumosum Dz. et Mk. M. *frond. ined. Archip. ind.* p. 16, t. 7; *Bryol. jav. I*, p. 143, t. 117.

Br. *ambiguum* Duby in *Moritszi Syst. Verz.* p. 132; C. M. *Syn. I*, p. 294.

Br. *apiculatum* Dz. et Mk. M. *frond. ined. Archip. ind.* p. 24, t. 8.

Br. *Leveilleum* eor. op. cit. p. 16.

Br. *pachypoma* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 104; C. M. *Syn. I*, p. 299.

Br. *plumosum* γ *Leveilleum* *Bryol. jav. l. c.*

2. Terr. — As. : Tonkin, Java, Sumatra.

α var. *elongatum* *Bryol. jav. l. c.* p. 144.

Ut typ. — As. : Java.

var. *Leveilleum* *Bryol. jav.* — Br. *plumosum*.

α var. *majus* Hpe. in *Bryol. jav. l. c.*

— As. : Java.

pohliaeforme W. P. Sch. in *Besch. Prodr. Fl. mexic.* p. 54.
2. — Am. sept. : Mexic.

pohliaeforme Brid. — Br. *subrotundum*.

polycarpon Hoffm. — *Cynodontium polycarpum*.

polycarpum Mitt. — *Webera*.

polychaete C. M. in *Dusen M. Camer.* p. 343.

— Afr. : M. Cameroon.

polygamum Hpe. *Symb.* 1870, p. 275.

Hermaphr.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

polymorphum { Bryol. eur. — *Webera*.
C. M. — *Webera acuminata* var. minor.
C. M. — *Webera acuminata* var. polyseta.
Neck. — *Mnium affine*.

var. *affine* Bryol. eur. — *Webera polymorpha* var. *affinis*.

var. *brachycarpum* Bryol. eur. — *Webera polymorpha* var. *brachycarpa*.

var. *gracile* Bryol. eur. — *Webera polymorpha* var. *gracilis*.

var. *strictum* Bryol. eur. — *Webera polymorpha* var. *stricta*.

polyphyllum Dicks. — *Ptychomitrium*.

polytrichoides palustre, *setis longioribus rubris sericeis* Dill. — *Ceratodon purpurens*.

polytrichoideum C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 206.

2. Rupic. — Afr. : C. B. Sp.

pomiforme L. p.p. { — *Bartramia*.
— *Bartramia ithyphylla*.

var. *Halleri* Vill. — *Bartramia Halleriana*.

var. *majus* Web. — *Bartramia ithyphylla*.

var. *Æderi* Vill. — *Bartramia Æderi*.

var. 1, Scop. — *Bartramia Halleriana*.

Pomoniae C. M. in *Linn.* 1876, p. 244.

2. Terr. — Afr. : Ins. Anjouan.

pootenianum Par.

Br. arenarium C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

2 vel syn. — As. : Penins. Tschutschica.

porphyroloma C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 250.

— Afr. : C. B. Sp.

porphyroneuron C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 22 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 70.

2.

— As. : M. Neilgherr., Java, Sumatra.

pottiaefolium C. M. in *Linn.* 1875, p. 382.

Syn. Terr. — As. : M. orient. mar. Erythraei.

praemorso-obtusum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 321.

— Afr. : M. Cameroon.

Preissianum Hpe. — *Brachymenium*.

procerrimum (Rehm.) Par.

Anomobryum procerrimum Rehm. *M. Afr. austr.* n. 540.

Mielichhoferia procerrima Rehm. l. c. n. 219.

Ster.

— Afr. : C. B. Sp., Transvaal.

procerum W. P. Sch. — *Rhodobryum*.

proliferum Mitt. *M. austr. am.* p. 311.

2.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

prostratum C. M. *Syn. I.* p. 317 ; *Mitt. op. cit.* p. 306.

2. Saxic. — Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens et Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1667.

« *var. minus* (*Besch.*) *Par.*

Anomobryum prostratum var. minus *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 56.*

— *Am. sept.* : *Mexic.*

provinciale *Philib. in W. P. Sch. Syn. II ed. p. 432.*

Br. Billardieri *Bryol. eur. IV (mon. p. 58), t. 336.*

Br. canariense *W. P. Sch. Syn. I ed., p. 374.*

Br. canariense var. provinciale *Husn. Muscol. gall. p. 239,*

Syn. In pinet., suberet. et ad tumul. formic. — Eur. : Angl., Gallo-prov., Istria, Dalmat., Etrur., Roma. Afr. : Alger. Am. sept. : Florid., Calif.

provinciale *Mac. — Br. heteroneuron.*

pseudo-Acidodontium *C. M. in Linn. 1880-83, p. 364.*

2. — *Am. merid.* : *Argentin. subtropic.*

pseudo-capillare *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 31.*

2. — *Am. sept.* : *Martinic.*

pseudo-Funkii *Anzi Enum. M. Longob. p. 20.*

— *Eur. : Ital. super. (Vall. Tellina).*

pseudo-giganteum *C. M. — Rhodobryum.*

pseudo-Kunzei *Limpr. Laubm. Deutschl. p. 359.*

Syn. — Eur. : Helvet. (Vales.).

pseudo-marginatum *Geh. et Hpe. — Rhodobryum.*

pseudo-micron *C. M. in Linn. 1880-83, p. 373.*

Ster. — Am. merid. : *Argentin. temperat.*

pseudo-pachytheca *C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 207.*

Br. pachytheca ej. Syn. I, p. 307 p.p.

2. — *As. : India.*

pseudo-torquescens *C. M. in op. cit. 1858, p. 155.*

Br. torquescens *W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss. II, n. 30.*

Hermaphr. — Afr. : Alp. Abyss.

pseudo-triquetrum *Hedw. Sp. M. p. 190; Brid. Bryol. univ. I, p. 676*

p. p. ; Bryol. eur. IV (mon. p. 54), t. 364; C. M. Syn. I, p. 258;

W. P. Sch. Syn. II ed. p. 459 (1).

Br. annotinum palustre capsulis ventricosus pendulis *Dill. Hist. M. p. 404, t. 51, f. 12.*

Br. bimo affine *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 366.*

Br. cubitale *Dicks. Fasc. II Pl. crypt. t. 5; Brid. op. cit. p. 677 p.p.*

Br. subobliquum *Lindgr. in Bot. Not. 1842, p. 118.*

Br. ventricosum *Dicks. Fasc. I, p. 4.*

Hypnum boreale *W. et M. Bot. Taschb. p. 287 (? fid. W. P. Sch.).*

Mnium pseudo-triquetrum *Hedw. M. frond. III, p. 19, t. 7 p.p.*

2. *Ad terr. humid., in uligin. et ad rup. madid. — Eur. : E reg. campestr. usq. in alp. : Spitzberg, ins. Ursorum. As. : Jenissei, Obi, Tibet. occ., Caucas. Afr. : Alger. Am. sept. : Groenland, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Ottawa, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Wyoming, Montana, tota temper.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 183.

Rab. Bryoth. eur. n. 95, 271 et b, 1279.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II, p. 281.

(1) De synonym. antiquior. cf. *C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*

var. *cavifolium* { Saut. — Br. ovatum.
W. P. Sch. — Br. neodamense.

« var. *compactum* W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 376 et op. cit., p. 460.*
— *Eur.* : Ad rup. marit. Norvegiae et in summ. Alp. As. :
Jenissei.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1278.
Un. itin. 1863, n. 24.

« var. *flaccidum* W. P. Sch. *Coroll. p. 76 et Syn. I ed. l. c.*
Br. *duvalioides* Itz. mss. ; Rab. *Deutsch. Krypt. Fl. I ed. II, p. 214.*
In uligin. aquos. — *Eur.* : Neomark.

« var. *gracilescens* W. P. Sch. *ll. cc.*
Ut praeced. — *Eur.* : Rhaet., Suec., etc. As. : Jenissei. Am. sept. :
Washington, Wisconsin.

« var. *hyalodontium* C. M. et Kindb. in *Mac. Cat. p. 133.*
Ad rup. humid. — Am. sept. : M. Rupestr.

« var. *polytrichoides* Corbière in *Husn. Muscol. gall. p. 250.*
Marit. — *Eur.* : Normannia.

pseudo-triquetum Brid. p.p. — Br. *bimum.*
ptychothecium Besch. — *Rhodobryum.*

Puiggarii Geh. et Hpe. in *Fl. 1881.*

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

pulchellum { Hedw. — Webera.
Sull. — Webera Lescuriana.

var. *atro-purpureum* Wahlenb. — Br. *atro-purpureum.*

pulchrum C. M. — *Brachymenium.*

pulvinatum { C. M. — Webera.
L. — *Grimmia.*

pumilum { Saut. — Br. *Klingraeffii.*
Wils. p.p. — Br. *subrotundum.*

punctatum { Drumm. — *Mnium subglobosum.*
Schreb. — *Mnium.*

pungens Tayl. in *Lond. Journ. of bot. 1846, p. 342 ; C. M. Syn. I, p. 302 ;*
Mitt. M. austr. am. p. 304.
— Am. merid. : M. *Pichincha.*

purpurascens (R. Br.) *Bryol. eur. IV (mon. suppl. p. 2), t. 336 ; C. M.*
Syn. I, p. 270 et II p. 569 ; W. P. Sch. op. cit. p. 410.

Hemisynapsium arcticum β *purpurascens* Brid. *Bryol. univ. I, p. 606.*

Pohlia arctica β *purpurascens* Schwaegr. *Sp. M. p. 74.*

P. purpurascens R. Br. *Suppl. App. ad iter Parry. p. 197.*

Syn. In humid. et spongios. — *Eur.* : Lappon., Alp. Norveg. As. :
Jenissei inf. Am. sept. : Ins. Melville, Groenland, Labrador, fret.
Smith, M. Rupestr., Columb. brit.

Exs. : Un. itin. 1867, n. 63 ?

purpuratum C. M. in *Linn. 1880-83, p. 370.*

2 ? — Am. merid. : Argentin. subtropic.

purpureo-nigrum Duby in *Mem... Genève, 1875, p. II, t. I, f. 3.*
2. — A. : Madagascar.

purpureum Philib. in *Rev. bryol. 1886, p. 24.*
2. — *Eur.* : Norveg.

purpureum Neck. — *Ceratodon purpurens*.

pusillum { Broth. — *Rhodobryum*.
Gmel. — *Leptotrichum tortile* var. *pusillum*.
Hedw. — *Pottia cavifolia*.
Hoffm. — *Seligeria*.

pynoderium *Limpr. in LXI Jahresb. d. Schles. Ges. für Vaterl. Cult.*
1884, p. 217.

1. In aren. — *Eur.* : Norveg. (Dovre).

pynopsis C. M. — *Rhodobryum*.

pygmaeo-alpinum C. M. et *Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac.*
Cat. p. 126.

Ster. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : M. ins. Vancouver.

pygmaeum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungs-*
reise.... p. 12 (1).

Ster. Ad rup. sicc. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

pyrothecium Hpe. et C. M. — *Rhodobryum*.

pyrothrix C. M. in *Linn. 1880-1883, p. 307.*

Ster. — *Am. merid.* : Uruguay.

Quintasii Broth. — *Rhodobryum*.

quitense (W. P. Sch.) *Par.*

Anomobryum quitense W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n. 1664 bis.*

— *Am. merid.* : And. Boliv.

radicale C. M. in *Hildebr. M. Madag. n. 2115.*

— *Afr.* : Madagascar.

« var. *leptoradiale* C. M. l. c. n. 2118.

Ubi typ.

radians P. B. — *Entosthodon*.

radicale *Rehm. M. Afr. austr.*

— *Afr.* : Orange.

radiculosum (*Schwaegr.*) *Mitt. M. austr. am. p. 284.*

Br. *Peromnium* C. M. *Syn. I, p. 321.*

Peromnium radiculosum *Schwaegr. Suppl. III, I, t. 250.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

radiculosum *Brid.* — *Br. erythrocarpum* var. *radiculosum*.

ramicola *Spr. in Mitt. op. cit. p. 286.*

Acidodontium ramicola *Jaeg. Ad. I, p. 572.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.

ramosum *Mitt.* — *Mnium rostratum* var. *ramosum*.

Rau Aust. - - *Br. Mühlenbeckii*.

reclinatum, foliis falcatis scoparum effigie *Dill.* { — *Dicranum majus*.
— *Dicranum scoparium*.

recurvatum *Hoffm.* — *Seligeria recurvata*.

(1) « An *Bryum* ? An *Mielichhoferia* ? » C. M. l. c.

recurvifolium Tayl. in *Edinb. Trans. of the Linn. Soc.* 1845, II, 1; C. M. *Syn.* I, p. 340.

Ster. — Eur. : Hibern.

recurvirostrum { Dicks. — *Didymodon rubellus*.
Gmel. — *Gymnostomum curvirostre*.

recurvulum Mitt. *M. Ind. or.* p. 74.

2. — As. : Nepal.

recurvum Wulf. — *Bartramia Halleriana*.

reflexulum C. M. in *Jaeg. Ad.* II, p. 709 (*nom.*)

— As. : Sikkim.

Regnelii C. M. — *Brachymenium*.

Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 234.

— Afr. : C. B. Sp.

Remelii C. M. in *Fl.* 1874, n. 31.

Ster. Muric. — Afr. : Ægypt. super.

remotifolium Hpe. in *Linn.* 1863, p. 131.

2. Terr. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

repens Gmel. — *Amblystegium serpens*.

restitutum de Not. *Epil.* p. 408 ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 469.

Ster. In pascuis. — Eur. : Ital. sup. (agr. Comens.)

reticulatum Dicks. — *Dissodon Froehlichianus*.

revolutum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 291.

2. Ad rup. gneiss. — Am. merid. : Argentin. Tucuman.

Reyeri Breidl. in *Rev. bryol.* 1888, p. 35.

Ster. — Eur. : Pustherthal.

rhaeticum Rota *Cat. M. Bergom.* ; de Not. *Epil.* p. 754.

— Eur. : M. Ital. super.

rhamphostegium (Hpe.) Par.

Acidodontium rhamphostegium Jaeg. *Ad.* I, p. 571.

Cladodium rhamphostegium Hpe. in *Ann. sc. nat.* V ser., IV, p. 339.

2. Ad arbor. ? — Am. merid. : And. Nov. Granat.

rhodocladon Berggr. in sched. (1).

— Am. sept. : Groenland sept.

rhyariocaulon C. M. in *Fl.* 1886, p. 507.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. Fernando Po.

rigescens Wils. — *Webera*.

rigidulum Dicks. — *Barbula*.

rigidum { C. M. — *Rhodobryum*.
Huds. — *Barbula aloides*.

rivale C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 300.

2. Ad aren. rivul. — Am. merid. : Argentin. subtropic. Tucuman et Jujuiens.

rivulare Hoffm. — *Rhacomitrium protensum*.

robustum C. M. — *Rhodobryum* ?

robustum Hpe. — *Rhodobryum* ?

Rodriguezii Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.*, 1893, I, p. 129.

Br. erythrocarpoides eor. in op. cit. 1891, II, p. 188.

2. — Afr. : Ins. Borbon.

Roellii Philib. in *Rev. bryol.* 1890, p. 56.

Polyg. — Am. sept. : Washington.

Roscheri Ltz. *Moost.* p. 157.

2. In sabulos. — Afr. : Zanzibar.

roseolum C. M. — *Rhodobryum*.

roseum { Mitt. — *Rhodobryum* minuti-rosatum.
Schreb. — *Rhodobryum*.
W. Arn. — *Rhodobryum* Beyrichianum.

var. *brachycarpum* Wright. — *Rhodobryum* *roseum* var. *brachycarpum*.

rostratum { C. M. — *Brachymenium*.
Schrab. — *Mnium*.

rosulatum C. M. — *Rhodobryum*.

rosulatum C. M. — *Rhodobryum*.

rosulicoma Ren. et Card. — *Rhodobryum*.

rubellum { Brid. — *Webera* carnea.
Hoffm. — *Didymodon*.

rubens Mitt. in *Hook. Journ. of bot.* 1856, p. 232 (1) et *M. Ind. or.* p. 69.

2. — Eur. : Temperat. As. : Temperat. ; Sikkim,
Assam. Am. sept. : Temperat.

rubicundulum C. M. et Kindb. in *Bidrag (nom.)* p. 454 et in *Mac. Cat.* 129.

2. Rupic. ad nives aet. — Am. sept. : M. Selkirk.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 519.

rubicundum C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 207.

— Afr. : Cap. virid.

rubiginosum Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* II, p. 190, t. 173, f. 9.

2. Ster. — Pac. : Tasman.

rubrifolium W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 32.

2. — Am. sept. : Guadalup.

rubro-costatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 83 et in *Forschungsreise...* p. 40.

Ster. — Afr. : Ins. Ascension.

rubrum Huds. — *Dicranella* varia.

rufescens Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* II, p. 192, t. 174, f. I et *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 439.

Br. *Billardieri* Schwaegr. ? (f. Mitt.).

2. — Pac. : Tasman.

« var. *brevifolium* H. f. et W. ll. cc.

— Pac. : Tasman.

« var. *mammillatum* eor. ll. cc.

— Pac. : Tasman.

rufescens Dicks. — *Dicranella*.

(1) Quid ? Cf. Limpr. Laubm. Deutschl, p. 390.

rufinerve C. M. in *Linn.* 1874, p. 549.

2. — *As.* : *Ins. Philippin.*

rufo-limbato *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 165.

2. — *Am. sept.* : *And. Costa-Ricens.*

rufo-nitens *Hpe. Symb.* 1877, p. 725.

Ster. — *Am. merid.* : *Brasil. austr. or.*

rufum *Fergus. mss.* ; *Limpr. Laubm. Deutschl.* p. 296.

Syn. — *Eur.* : *Anglia.*

rugosum { C. M. — *Brachymenium.*
Hoffm. — *Dicranum undulatum.*

rupeum Neck. — *Leptobryum piriforme.*

rurale { L. — *Barbula.*
unguiculatum, hirsutum elatius et ramosius. Dill. — *Barbula*
ruralis.

ruralis facie, foliis minoribus et non pilosis Dill. — *Barbula unguiculata*
var. patagonica.

rutilans { Brid. — *Webera* ?
Bryol. eur. — *Webera Schimper.*
C. M. — *Bryum aeneum.*

Salaminae C. M. — *Brachymenium.*

salinum *Hagen in sched.* ; *Limpr. Laubm. Deutschl.* p. 334.

Syn. In arenos. marit. — *Eur.* : *Norveg. occ.*

saltense *Par.*

Br. angustifolium *Kaurin in Bot. Notiz.* 1887, p. 113. c. ic.

1. — *Eur.* : *Norveg. sept.*

Sandii Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 21, t. 10 ; C. M.

Syn. I, p. 300 ; Bryol. jav. I. p. 145.

1 et hermaphr. — *As.* : *Java.*

sanguineum Brid. — *Br. erythrocarpum.*

sanguilentum *Ren. et Card. mss.*

Br. capillare var. *Lesq. et Jam. Man.* p. 236.

Br. obconicum *Sull. M. bor. am. I ed. n. 187 b.*

Br. occidentale var. obconicum *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed.*
n. 283, 284.

2. Lignic. — *Am. sept.* : *Calif.*

saprophilum C. M. — *Rhodobryum.*

Sartorii W. P. Sch. — *Rhodobryum.*

Sauteri *Bryol. eur. IV (mon. suppl. p. 10), t. 377 ; C. M. Syn. I, p. 280 ;*

W. P. Sch. op. cit. p. 435.

1. Ad terr. aren. humid. — *Eur.* : *Salisburg., Vall. Tell. super. As.*
Caucas.

Sawyeri *Ren. et Card. in Bot. Gaz.* 1889, p. 95, t. XIII C.

2 ? Arenic. et lignic. — *Am. sept.* : *Florid., Ludovic.*

scabridens Mitt. — *Webera.*

Schimper C. M. — *Webera.*

schisti (Ed. — *Cynodontium.*

schistoneuron (*Kze.*) *Par.*

Br. gracilescens C. M. *Syn. I, p. 261.*

Mnium schistoneuron *Kze. in Poeppig Pl. Chil. n. 231.*

2. — *Am. merid.* : *Peruvia.*

« *var. decumbens* (C. M.) Par.

Br. Auberti Hsch. Fl. Brasil. p. 45, t. 2, f. I.

Br. gracilescens *var. decumbens* C. M. l. c.

— Am. merid. : And. Quitens., Brasil. austr. or.

« *var. densifolium* (Brid.) Par.

Br. Auberti Schwaegr. Sp. M. p. 54 et Suppl. II, II, II, p. 195.

Br. densifolium Mitt. M. austr. am. p. 313.

Br. gracilescens *var. densifolium* C. M. l. c.

Br. Polla densifolia Brid. Bryol. univ. I, p. 855.

— Am. merid. : And. Quitens. et Peruv., Brasil. austr. or.

schizotrichum C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 241.

?

— Afr. : C. B. Sp.

Schleicheri Schwaegr. Suppl. I, II, p. 113, t. 73 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 683 ; W. P. Sch. op. cit. p. 462.

Br. alpinum Vill. Pl. Dauph. III, p. 889.

Br. turbinatum H. et T. Musc. brit. p. 122.

Br. turbinatum β gracilescens Bryol. eur. IV (mon. p. 65, t. 372 β).

Br. turbinatum β praelongum de Not. Epil. p. 379 ; C. M. Syn. I, p. 259.

Mnium Schleicheri Brid. Sp. M. III, p. 60.

2. Ad scaturig. — Eur. : Reg. subalp. et alp. zon. central. ; Pyren., Sierra Nevada. As. : Tibet. occ., Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Groenland, M. Rupestr. et Selkirk, Utah, Calif.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 264.

Mac. Canad. M. n. 516.

« *var. angustatum* W. P. Sch. op. cit. p. 463.

Ut et cum typ. in Eur. — Afr. : Alger. Am. sept. : Nevada.

« *var. latifolium* W. P. Sch. l. c.

Br. latifolium Brid. Mant. p. 120.

Br. Schleicheri Schwaegr. Suppl. I, II, p. 113, t. 73 (fid. Husn. Muscol. gall. p. 252.)

Br. turbinatum *var. latifolium* Bryol. eur. l. c. t. 372 γ .

Br. Polla latifolia Brid. Bryol. univ. I, p. 713.

Mnium latifolium Schwaegr. Suppl. I, II, p. 138.

Ad rivul. frigid. — Eur. : Ins. Ursorum, Shetland, Sierra Nevada ; Alp. omn. As. : Himalaya, Pers., Caucas., penins. Sinaït. Am. sept. : Groenland, Utah, Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 622, 967.

Schleicheri Schwaegr. { (Sp. M. fid. C. M.). — Webera albicans *var. glacialis*.
(Suppl. fid. Husn.). — Bryum albicans *var. latifolium*.

Schmidii C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 24 ; Mitt. M. Ind. or. p. 68.

Anomobryum Schmidii Jaeg. Ad. I, p. 602.

2.

— As. : M. Neilgherr.

Schnyderi C. M. in Linn. 1880-83, p. 362.

1. Loc. humid. — Am. merid. : Argentin. Buenos-Ayr.

Schweinfurthii C. M. in op. cit. 1875, p. 386.

2. Terr. — Afr. : Djour.

scoparium L. — Dicranum.

secundum Gmel. — Rhacomitrium heterostichum.

Sellowianum C. M. — Brachymenium Klotzschyi.

semi-limbatum *Kiaer in Borgen M. Madag. n. 13.*
— *Afr.* : Madagascar centr.

semi-marginatum *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 341 ; Mitt. M. austr. am. p. 296.*

Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

seminerve (*Hook. f. et Wils.*) *C. M. Syn. I, p. 264 ; Mitt. op. cit. p. 285.*
Acidodontium seminerve H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 451, t. 16 J.

2. Ad arbor. ? — *Am. sept.* : Jamaïc. *Am. merid.* : And. Quitens.

semi-ovatum *Brid. Bryol. univ. I, p. 846 ; C. M. Syn. I, p. 316 ; Mitt. op. cit. p. 305.*

Anomobryum semi-ovatum Jaeg. Ad. I, p. 602.

Br. julaceum Kth. Syn. pl. Æquin. p. 56.

2. Ad terr. et sax. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

semi-reticulatum *C. M. in Linn. 1878-79, p. 301 et 1889-83, p. 377.*
Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Salt.

semi-rubrum *C. M. in Linn. 1875, p. 385.*
Ster. Terr. — *Afr.* : Niam-Niam.

semi-vacuum Vill. — Orthotrichum affine.
semperlaxum C. M. — Brachymenium.

senopyxis *C. M. in Linn. 1880-83, p. 363.*
2. Terr. — *Am. merid.* : Uruguay.

sericeum *Mitt. op. cit. p. 305.*
2. Saxic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

sericeum { *Hpe. et C. M. — Leptobryum.*
Huds. — Cynodontium virens.

serotinum *Lindb. M. Scand p. 17.*
Syn. Arenic. — *Eur.* : Suec., Fennia. *As.* : Jenissei inf.

serpyllifolium { *Sw. — Mnium punctatum.*
pellucidum, capsulis piriformibus Dill. (fig. A-K). —
Funaria fascicularis.
pellucidum, capsulis piriformibus Dill. (fig. L.) — Phys-
comitrium piriforme.

var. *undulatum* *Huds. — Mnium.*

var. β *Huds. — Mnium rostratum.*

var. γ *Huds. — Mnium cuspidatum.*

serratum *Schrad. ?* { — *Mnium?*
— *Mnium orthorhynchum.*

setaceum { *Jacq. — Seligeria recurvata.*
Vill. — Barbula.

var. β *Huds. — Didymodon rubellus.*

sibiricum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 37.
2. Terr. — *As.* : Jenissei med.

silvaticum *Gmel.* { — *Ulota Bruchii?*
— *Ulota crispa?*
— *Ulota crispula?*

simplex { *Kindb. — Mnium lucidum.*
L. — Dicranella varia var. tenella.

- smaragdinum* { C. M. — Brachymenium.
 Mitt. p.p. — Brachymenium subsmaragdinum.
- soboliferum* Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 51; C. M. Syn. I, p. 340; Mitt. M. austr. am. p. 309.
 2. — Am. merid. : And. Quitens.
- socorrense* (Hpe.) Mitt. op. cit. p. 295.
 Cladodium socorrense Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 338.
 2. Saxic. — Am. merid. : And. Nov. Granat et Quitens.
- sollyanum* Griff. — Rhodobryum giganteum.
- sordidissimum* C. M. — Brachymenium.
- sordidum* Hpe. in op. cit. p. 341; Mitt. op. cit. p. 306.
 2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- spathulosifolium* C. M. — Rhodobryum.
- spec?* Wils. — Rhodobryum roseum.
- speciosum* { Mitt. — Leptotheca?
 Voit. — Br. pallens.
- spectabile* C. M. — Webera.
- Spegazzinii* C. M. in Fl. 1885, p. 400.
 Syn. Ad terr. et rup. humid. — Am. merid. : Fuegia austral.
- speirocladum* C. M. in Rev. bryol. 1877, p. 15 (nom.).
 — Afr. : Ins. Comor.
- sphaericarpon* Sw. — Philonotis.
- sphagnadelphus* C. M. — Webera.
- Sphagni* { Brid. — Br. Duvalii.
 C. M. p.p. — Webera sphagnicola.
- sphagnicola* Bryol. eur. — Webera sphagnicola.
- sphagnoides* Jacq. — Hedwigia ciliata.
- spinidens* Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1893, I, p. 117.
 2. — Afr. : Madagascar.
- spinosum* { Drumm. — Mnium spinulosum.
 Voit. — Mnium.
- spirifolium* C. M. — Brachymenium.
- splachnobryoides* C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungsreise... p. 13.
 Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- splachnoides* { C. M. — Brachymenium.
 Dicks. — Blindia acuta.
- splachnoideum* C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungsreise... p. 13.
 Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- spongiosum* Welw. et Duby in Mem... Genève, 1870, p. 4, t. 1, f. 3.
 Anomobryum spongiosum Jaeg. Ad. I, p. 603.
 Ster. Rupic. — Afr. : Angola.
- Sprucei* Mitt. M. austr. am. p. 285.
 Acidodontium Sprucei Jaeg. Ad. I, p. 572.
 2. Arboric. ? — Am. merid. : And. Quitens.
- spurium* Dicks. — Dicranum ?
- squalidum* Vill. — Bryum capillare.

squarripilum C. M. in *Fl.* 1886, p. 280.

Ster. Terr. — Afr. : Ins. S. Thom.

squarrosus L. Drumm. — Paludella.

Starkeanum Hoffm. — Pottia

Roth. — Mnium.

stellare { *hornum silvarum, capsulis magnis nutantibus* Dill. — Mnium
hornum.

lacustre, foliis rubris capillaceis Dill. — Didymodon rubellus.

nitidum, pallidum, capsulis tenuissimis Dill. — Barbula convo-
luta.

roseum majus, capsulis ovatis pendulis Dill. — Rhodobryum
roseum.

roseum, pendulum minus, capsulis et setis longioribus Dill. —
Mnium stellare.

stellatum { Dicks. — Barbula agraria.

Lam. et DC. (fid. Brid.). — Mnium stellare.

Lam. et DC. (fid. Lindb.). — Mnium hornum.

Schreb. — Barbula rigida.

stelligerum Dicks. — Gymnostomum curvirostrum.

stenocarpum Limpr. in *LXI Jahresb. d. Schles. Ges. f. Vaterl. Cult.* 1884,
p. 219 et *Laubm. Deutschl. II*, p. 292.

1. — Eur. : Norveg. (Dovre).

stenopyxis C. M. in *Linn.* 1878-1879, p. 480.

2. — Am. merid. : Venezuela.

stenotrichum C. M. in *Fl.* 1887, p. 219.

Syn. — Am. sept. : Alaska.

Stirtoni W. P. Sch. Syn. II ed. p. 470.

2; ♂ et fr. ign. — Eur. : M. Scotiae.

striatum L. — Orthotrichum leiocarpon.

var. δ L. { — Ulota Bruchii?
— Ulota crispa?
— Ulota crispula?

strictum Dicks. — Ceratodon purpureus.

strigosum Wils. in *Kew Journ. bot.* p. 369.

Br. Wightii Mitt. M. Ind. or. p. 74.

— As. : M. Neilgherr., Ceylan.

strumiferum Dicks. — Cynodontium polycarpum *var. strumiferum*

styrticum Ren. — Br. torquescens f. mongica.

subaeneum Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 494.

2. — Pac. : Austral. fel.

subapiculatum Hpe. Symb. 1872, p. 51.

1. — Am. merid. : Brasil, austr. or.

subareoblastum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 115 a.

— Afr. : M. Cameroon.

subargenteum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 213.

2. — Afr. : Madagascar.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1277.

subatropurpureum C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 147.

2. — Pac. : Austral. or.

subcapillifolium C. M. — Brachymenium.

- subcurvatum* Mitt. — Webera.
subenerve Brid. — *Eriopus remotifolius* ?
suberythrocarpon C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 407.
 Br. *erythrocarpon* var. *australis* Hpe. in *Pl. Preiss. Nov. Holl.*
 2. — *Pac.* : Austral.
subglobosum Schlieph. in *Fl. LXXI*, p. 176.
 Syn. In fiss. rup. — *Eur.* : Helvet. (Albula).
subobliquum Lindgr. — Br. *pseudo-triquetrum*.
subobtusifolium C. M. in *Centralbl. n.* 2-4.
 2. — *As.* : Penins. Tschutschica.
subpachypoma Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 518.
 2 ? — *Pac.* : Austral. fel.
subpilosum Mitt. *M. austr. am.* p. 307.
 2. — *Am. merid.* : And. Quitens. ; Peruv.
subpurpurascens Kindb. in *Mac. Cat.* p. 119.
 2. Terr. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. p. 593.
subroseum Besch. — *Rhodobryum*.
subrotundifolium Jaeg. *Ad. II*, p. 707.
Argyro-Bryum subrotundum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 312.
 Ster. — *Pac.* : Austral. or.
subrotundum Brid. *Mant. M.* p. 118 et *Bryol. univ. I*, p. 673 ; *Bryol. eur. IV* (mon. suppl. p. 9), t. 361 ; C. M. *Syn. I*, p. 275 ; W. P. *Sch. Syn. II ed.* p. 434.
 Br. *brunnescens* Schleich. in sched.
 Br. *caespitiforme* de Not. *Epil.* p. 398 ?
 Br. *caespitium* Wils. in *Kew Journ. bot.* p. 331.
 Br. *cernuum* ej. l. c.
 Br. *pallens* ♂ *subrotundum* *Bryol. eur. IV* (mon. p. 53), t. 360 ♂
 Br. *pohliaeforme* Brid. *Bryol. univ. I*, p. 687.
 Br. *pumilum* Wils. l. c.
 1. Ad terr. humos. et in rup. fiss. — *Eur.* : Alp. Norveg., Sudet., Salisb., Stir., Austria super., Carinth., Tirol., Helvet. *As.* : Jenissei inf., Himalaya. *Am. sept.* : Groenland, Columb. brit., Wyoming, Colorado, Calif.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 458.
subrotundum Mitt. — Br. *Taylori*.
subsmaragdinum C. M. — *Brachymenium*.
subturbinatum C. M. — Br. *turbinatum* var. *imbricatum*.
subulatum L. — *Barbula*.
 var. ♂ Weiss. — *Barbula muralis*.
Swarzianum C. M. — *Rhodobryum*.
Sullivanii C. M. mss. ; Broth. in *Oefv...* 1893, p. .
 2 ; ♂ ign. — *Pac.* : Austral. (Victoria).
synoico-caespitium C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 128.
 Syn. Ad terr. aren. — *Am. sept.* : Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 513.
synoico-crudum C. M. — Webera.
syntrichioides C. M. — *Rhodobryum*.

syriacum *Ltz. M. Ehrenb* p. 45, t. XII.

Webera sacra *ej.* (fid. *Jur. et Milde Beitr...* p. 597).

W. sinaïtica *ej. pl.* ♂ (forsan ! fid. iisd.).

2 ? — *As. : Pers., Caucas., Taurus, Syr.*

sysphinctum *Limpr. Eimige neue Art...* 1883, p. 240 et *Laubm. Deutschl.* II, p. 352.

Syn. In aren. humid. — *Eur. : Norveg.*

systylium C. M. — *Brachymenium*.

Taitae C. M. in *Fl.* 1879, n. 24.

Ster. — *Afr. : M. Kenia.*

tasmanicum *Hpe. in Linn.* 1852, p. 714.

Syn. — *Pac. : Tasman.*

tauriscorum *Limpr.* — *Br. archangelicum*.

Taylori C. M. *Syn. I*, p. 264.

Acidodontium subrotundum *H. f. et W. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 451, t. 164.

Brachymenium subrotundum *Tayl. in op. cit.* p. 56.

Bryum subrotundum *Mitt. M. austr. am.* p. 287.

2. Ad arbor. — *Am. merid. : And. Quitens.*

tectorum de Not. — *Br. caespiticiu var. imbricatum.*

tegulare, humile, pilosum et incanum *Dill.* — *Barbula muralis.*

tenellum C. M. — *Brachymenium.*

Teneriffae *Hpe. mss. : C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 12.

2. — *Afr. : Ins. Teneriff.*

tenerum *Vill.* — *Barbula.*

tenue { *Dicks.* — *Ceratodon purpurens.*
Ravaud. — *Br. Funkii var. tenue.*
imberbe et pallidum, foliis crebrioribus *Dill.* — *Barbula fallax.*
stellatum, setis purpureis *Dill.* — *Ceratodon purpureus.*

tenuicaule *Mont. in Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 104 et *Syll.* p. 32; *C. M. Syn. I*, p. 293; *Mitt. M. austr. am.* p. 307.

2. — *Am. merid. : Chil.*

tenuifolium *H. f. et W.* — *Webera?*

tenuissimum *Tayl.* — *Eccremidium arcuatum.*

terebellum *Hpe. in Linn.* 1863, p. 130; *Mitt. op. cit.* p. 311.

Hermaphr. (*Hpe.*) 2 (*Mitt.*). *Terr.* — *And. merid. : And. Nov. Granat. et Boliv.*

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1666.

teres *Lindb. in Oefv...* 1866, p. 545.

Br. nitidulum var. teres *Berggr. M. Spetsb. n.* 76 b.

1. *Terr.* — *Eur. : Spitzberg, ins. Ursor. Am. sept. : Franz Joseph Fjord, ins. Sabine.*

teretiunculum *Hook.* — *Br. alpinum.*

terminale C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 30².

2. — *Am. merid. : Argentin. Tucum.*

tetragonum *Dicks.* — *Conostomum boreale.*

Thomsoni *Mitt. M. Ind. or.* p. 73.

Br. cuspidatum *Wils. in Kew Journ. bot. IX*, p. 364.

2. — *As. : Tibet. occ.*

tibetanum *Mitt. op. cit. p. 72.*

Br. caespiticium *Wils. op. cit. p. 332.*

1. — As. : Tibet. occ.

tomentosum { *Brid. — Br. capillare var. domingense.*
Sw. — *Breutelia.*

tophaceum *DR. et Mont. in Ann. sc. nat. XII, p. 319 et Mont. Syll. p. 33;*
C. M. Syn. II, p. 574.

2. Ad rivul. — *Afr. : Alger.*

torquescens *Bryol. eur. IV (mon. p. 49), t. 358 ; C. M. Syn. I, p. 277 ;*
W. P. Sch. op. cit. p. 431.

Br. capillare *var. torquescens* *Husn. Muscol. gall. p. 240.*

Syn. Ad terr. lapidos., mur. et rup. — Eur. : Suec., Angl., Hibern.,
vall. Rhen., Helvet. occ., zona merid. As. : Himalaya occ., Kash-
mir, Pers., Caucas., As. min. Afr. : Alger., ins. Canar., Madeir.,
Transvaal, C. B. Sp. Am. sept. : Nov. Scot? Gaspes. ? Nevada,
Texas, Calif. Am. merid. : Ins. Chiloë, Montevideo. Pac. : Austral.,
Nov. Zeland., Tasman.

Exs. : Mandon M. Mad. n. 20 bis.

Rab. Bryoth. eur. n. 331, 875, 933.

Rehm. M. Afr. austr. n. 560.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 280.

« *var. brevifolium* *Lindb. in Bolet. d. Soc. Broter. 1839, VII.*
— *Eur. : Lusitan.*

« *var. gracile* *Besch Cat. M. Alger. p. 24.*
— *Afr. : Alger.*

« *f. monoica* *Spr. M. Pyr. n. 134 et in Edinb. Trans. 1850, III, p. 158.*

Br. brunnescens *Ren. in Rev. bryol. 1883, p. 81.*

Br. fuscescens *Spr. in Edinb. Trans. l. c.*

Br. styrticum *Ren. in op. cit. p. 82.*

1. — *Eur. : Pyren.*

torquescens *W. P. Sch. — Br. pseudo-torquescens.*

tortifolium *Brid. — Br. cyclophyllum.*

tortuosum *L. — Barbula.*

Tozeri *Grev. — Webera.*

trachyticola *C. M. — Brachymenium.*

trematodonteum *C. M. — Webera.*

trichodes { *Drumm. — Meesea uliginosa var. alpina.*
Hedw. — Webera nutans.
L. — Meesea uliginosa.
acaulon palustre minimum, setis et capsulis oblongis *Dill.*
— *Ceratodon purpurens.*
acaulon palustre minimum, setis et capsulis brevissimis *Dill.*
— *Seligeria pusilla.*
aureum capitulis piriformibus nutantibus *Dill. — Lepto-*
bryum piriforme.
aureum capsulis incurvis obtusis in setis longis *Dill. —*
Meesea uliginosa.
capsulis rubris cernuis *Dill. — Dicranella varia.*
laete virens capitulis cernuis oblongis *Dill. — Webera*
nutans.

var. longiseta *Drumm. — Meesea uliginosa.*

var. minor *Drumm. — Meesea uliginosa var. minor.*

trifarium Gmel. — *Didymodon luridus*.

triquetrum Drumm. — *Meesea Albertini*.

triste de Not. Cron. briol. ital. et Epil. p. 393; W. P. Sch. op. cit. p. 457.

Br. capillare var. triste Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 377.

2. Ad saxa granit. madid. — Eur.: Alp. Rhaet., Ital. sup. (pr. lac. Major.).

triste C. M. — Br. pertriste.

truncatulum { Ehrh. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.
L. — *Pottia truncata*.

truncatum Gmel. — *Pottia truncata*.

truncorum { Brid. — *Rhodobryum*.
H. f. et W. — *Rhodobryum leptothecium*.
H. f. et W. — *Rhodobryum subtomentosum*?
W. P. Sch. — *Rhodobryum Lechleri*.
Wils. — *Mnium rostratum* var. *ramosum*.

Tryoni Broth. in Oefv... 1893, p.

2. ♂ ign. — Pac.: Austral. or. (Queensland).

turbinatum (Hedw.) Schwaegr. Suppl. I, II, p. 109; Brid. Bryol. univ. I, p. 681; Bryol. eur. IV (mon. p. 65), t. 372 (excl. var. γ); C. M. Syn. I, p. 259; W. P. Sch. op. cit. p. 461.

Pr. appressum Wils. in Kew Journ. bot. p. 365.

Br. cuspidatum ej. p. 364 p.p.

Br. distans ej. l. c.

Br. nigricans Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 15, t. II, f. 10; Brid. op. cit. p. 682.

Br. palustre complicatum rubens, capsulis turbinatis pendulis Dill. Hist. M. p. 406, t. 51, f. 74.

Br. turbinatum var. nigricans H. et T. Musc. brit. p. 122.

Hypnum turbinatum W. et M. Bot. Taschb. p. 282.

Mnium nigricans Brid. M. Rec. II, III, p. 90.

Mn. turbinatum Hedw. M. frond. III, p. 22, t. 8.

2. In loc. aren., glareos. et turfis. — Eur.: Ex Ital. super. usq. in Scand. As.: Tibet. occ., Kurdistan., Caucas. occ. et centr., Syr., Arab. Petr. Am. sept.: Groenland, Gaspes., Ontario, Athabasca, Columb. brit., ins. Vancouver, Utah. Am. merid.: And. Quittens.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 96, 675, 970, 1278.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., p. 287.

var. *gracilescens* Bryol. eur. — Br. Schleicheri.

« var. *gracilifolium* Besch. Cat. M. Alger. p. 26.

— Afr.: Alger.

« var. *imbricatum* W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss. II, n. 46.

Br. subturbinatum C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 155.

— Afr.: Alp. Abyss.

var. *latifolium* Bryol. eur. — Br. Schleicheri var. *latifolium*.

var. *minus* Kth. — *Mielichhoferia Jamesoni*.

var. *nigricans* H. et T. — Br. turbinatum.

var. *pallens* Drumm. { (fid. C. M.). — Br. uliginosum.
{ (fid. Kindb.). — Br. pallens.

var. *praelongum* C. M. — Br. Schleicheri.

var., H. et T. — Br. intermedium.

var., eor. — Br. longisetum.

var., Schwaegr. — Br. versicolor.

- turbinatum* { Drumm. — Br. bimum.
Drumm. p.p. — Br. pallescens.
H. et Tayl. — Br. pallens.
eor. — Br. Schleicheri.
- turbinitiforme* W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss.
— Afr. : Abyss.
- turgidum* Sw. — Aulacomnium.
- uliginosum* (Br.) Bryol. eur. IV (mon. p. 18), t. 335 ; C. M. Syn. I,
p. 271 ; W. P. Sch. op. cit. p. 425.
Br. caespitium syn. Schwaegr. Sp. M. p. 60.
Br. cernuum Lindb. M. Scand. p. 16.
Br. turbinatum var. pallens Drumm. M. bor. am. I ed. n. 267 (fid. C. M.).
Cladodium uliginosum Brid. Bryol. univ. I, p. 841.
Cynodontium cernuum Hedw. Sp. M. p. 58, t. 9 (fid. Limpr.).
Didymodon cernuus Sw. M. Suec. p. 29, t. I, f. 9 (fid. Lindb. l. c.).
Pohlia uliginosa Br. in sched.
- Syn. Loc. uligin. et ad rivul. — Eur. : Suec., Boruss. sept., Dania
merid., Hanovr., Harz, Westphal., Siles., Rhoengeb., Hassia,
Salisb., Hungar., Austr. inf., Tirol., Alp. Rhaet., Angl., Normann.,
vall. Rhen., Gall. centr. (Morvan). As. : Amour, Saghalien, Cau-
cas. Am. sept. : Labrador, Anticosti, Terr. nov., New Brunswick,
Gaspes., lac. Super., Columb. brit., Wyoming, Montana, reg. sept.,
occ. et or.
- Exs. : Mac. Canad M. n. 168.
Rab. Bryoth. eur. n. 274, 931.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 263.
- * var. rivale Limpr. in LXI Jahresb. d. Schles. Ges. f. Vaterl. Cult.
1884, p. 224 et Laubm. Deutschl. II, p. 325.
- Arenic. — Eur. : Norveg. (Dovre).
- Umbraculum* Burch. — Rhodobryum.
- undulatum* { L. — Atsichum.
Roth. — Mnium.
- unguiculatum* { Huds. — Barbula.
et barbatum surculis in summitate crassioribus Dill. —
Barbula unguiculata.
et barbatum tenuius et stellatum crassioribus Dill. —
Barbula unguiculata.
- unilaterale* Gmel. — Leptotrichum homomallum.
- urnigerum* Neck. — Pogonatum.
- utriculatum* C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2. 4.
Syn. — As. : Penins. Tschutschica.
- vagans* H. f. et W. — Philonotis.
- Valdiviae* Ltz. Moost. p. 157.
2. — Am. merid. : Valdiv.
- Valenciae* C. M. in Linn. 1878-79, p. 479.
2. — Am. merid. : Venezuela.
- validinervium* C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungs-
reise... p. 15.
Syn. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- validius* Hpe. Enum. M. Brasil. p. 32.
2. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

vancouveriense Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1889, p. 95.

2. Ad decliv. humid. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 457.

varians C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et in *Forschungsreise...* p. 60.

Br. varium H. f. et W. ?

2. Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

« *var. mucronatum* C. M. l. c.

Ut et cum typ.

varium Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 85, t. 85, f. 4 et *Handb.* p. 444.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

velutinum C. M. — *Brachymenium*.

ventricosum { Dicks. — *Bryum pseudo-triquetrum*.
Sibth. — *Aulacomnium palustre*.

var., Schwaegr. — Br. Duvalii.

Venturii C. M. in *de Not. Epil.* p. 408 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 469.

Br. elegans Vent. et Rott. *Enum.* p. 35 p.p.

Fl. et fr. ignot. In irrig. editor. — *Eur.* : Tirol. merid.

veronense de Not. *Epil.* p. 409 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 469.

Br. claviger et virescens (fid. *Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 418).

Fl. et fr. ignot. In aren. Athesis. — *Eur.* : Ital. super. (Verona).

versicolor A. Br. in *Bryol. eur.* IV (mon. p. 75), t. 379 ; C. M. *Syn.* I, p. 308 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 439.

Br. turbinatum var. Schwaegr. *Sp. M.* p. 56 (fid. C. M.).

2. In aren. ad fluv. rip. — *Eur.* : Westphal., vall. Rheo., Helvet., Tirol. merid., Salzburg., Stiria. Carinth., Austr., Pedem *Am. sept.* : Florid.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 330, 934.

versicolor Kaurin. — Br. excurrens.

verticillatum { Dicks. — *Gymnostomum curvirostre*.
Hpe. — *Rhodobryum*.
Lightf. — *Blindia acuta*.
L. — *Eucladium*.

var. β Huds. — *Blindia acuta*.

vinosulum Besch. in *Ann. sc. nat.* VII ser., II, p. 91.

Ster. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

Exs. : Mar. n. 264.

virens { Dicks. — *Weisia viridula*.
Sw. — *Cynodontium*.

virescens Kindb. in *Rev. bryol.* 1884, p. 22.

Argyrobryum virescens ej. *Laubm. Schwed. et Norv.* p. 78.

Br. claviger et veronense (fid. *Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 418).

Fl. et fr. ignot. Saxic. in rivul. — *Eur.* : Norveg.

viridans Wils. (1) { Br. inclinatum var.
Br. intermedium var.
Br. pendulum.

(1) Cl. Mitt. (*M. Ind. or.* p. 71) has tres spec. ad unam, contra fere omn. bryolog. sententiam, reducens, cui earum nom. *Bryi viridantis* imposuit cl. Wilson mihi latet.

viridatum C. M. — *Webera*.

viride Philib. in *Rev. bryol.* 1886, p. 25.
Syn. — *Eur.* : Norveg.

viridescens Welw. et Duby in *Mem...* Genève, 1870, p. 4, t. II, f. 2.
1. In prat. — *Afr.* : Angola.

viridissimum Dicks. — *Zygodon*.

viridulum { Dicks. — *Fissidens exilis*.
L. — *Weisia*.

Wagneri C. M. *Syn.* II, p. 570.
2. — *Am. merid.* : Columb.

Wahlenbergii Schwaegr. — *Webera albicans*.
var. *glaciale* Bryol. eur. — *Webera albicans* var. *glacialis*.

warneum Bland. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 675; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 20), t. 340; C. M. *Syn.* I, p. 272; W. P. Sch. *op. cit.* p. 425.

Br. caespitium β *warneum* Schwaegr. *Suppl.* III, I, II, p. 109.

Br. flagellare *Brid. Mant. M.* p. 118.

Hypnum caespitium W. et M. *Bot. Tasch.* p. 285 p.p.

Pohlia cirrifera de Not. *Mant. M.* n. 9.

P. warenensis Schwaegr. *Suppl.* III, I, p. 2, t. 236.

1. rar. syn. In udis aren. et limos. — *Eur.* : Suec., Angl., German. sept., Siles., Hungar., Ital. super. As. : Himalaya occ. *Am. sept.* : Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 623, 834 et b, 1084.

Un. itin. 1867, n. 105.

warneum Mac. — Br. *Edwardsianum*.

Weigeli Spreng. — *Webera commutata*.

Weisia { C. M. — *Brachymenium*.

{ Dicks. — *Leptotrichum homomallum*.

Welwitschii Duby. — *Brachymenium*.

Wesleyi Par.

Br. *origanum* Bosw. in *Lond. Journ. of bot.* Febr. 1880 et in *Rev. bryol.* 1880, p. 45.

Ster. — *Eur.* : Anglia (Teesdale).

Wightii Mitt. — *Rhodobryum strigosum*.

Willdenowii Jur. — Br. *longisetum*.

Wilsoni Mitt. — *Brachymenium*.

Wrightii Sull. in *Proced. Am. Acad...* 1859, p. 278.

1 vel. syn. — *Am. sept.* : Fret. Behring.

Wrightii Mitt. — *Leptotheca*.

Zierii Dicks., Drumm. — *Zieria julacea*.

Zollingeri { Duby. — *Rhodobryum*.
Wils. — *Rhodobryum roseum*.

zonatifforme Par.

Br. *zonatum* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 340.

— *Afr.* : M. Cameroon.

zonatum W. P. Sch. *op. cit.* p. 472.

Ster. In humid. — *Eur.* : Norveg. sept.

zonatum C. M. — Br. *zonatifforme*.

zygodontoides C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 83 et in Forschungsreise, .. Bot. p. 40.

2. — Afr. : Ins. Ascension (1).

BRYUM POLLA Adans. ; Brid. Bryol. univ. I, p. 688.

affinis Schwaegr. — Mnium.

Auberti Schwaegr. — Bryum.

binervis Brid. — Lepidopilum polytrichoides.

Commersoni Schwaegr. — Rhodobryum.

cruda L. — Webera.

cuspidata L. — Mnium.

cylindrica Hsch. — Mnium ? (Cf. Brid. l. c. p. 712).

elliptica Brid. — Mnium punctatum.

erythrocaulon Schwaegr. — Rhodobryum.

heterophylla Hook. — Mnium.

horna L. — Mnium.

latifolia Schwaegr. — Bryum Schleicheri var. latifolium.

ligulata Schreb. — Mnium undulatum.

lycopodioides Schwaegr. — Mnium.

orthorhynch Brid. — Atrichum tenellum.

punctata Brid. — Mnium.

rosea L. — Rhodobryum.

β *dominghensis* Brid. — Rhodobryum Antillarum.

γ *gigantea* Schwaegr. — Rhodobryum giganteum.

rostrata Schrad. — Mnium.

serrata Schrad. — Mnium.

β *pensilvanica* Brid. — Mnium serratum var. apiculatum ?

spinosa Voit p.p. { — Mnium.
— Mnium affine.

stellaris Reich. — Mnium

subenervis Schwaegr. — Eriopus remotifolius.

truncorum Brid. — Rhodobryum.

Umbraculum Burch. — Rhodobryum.

BRYUM WEBERA Brid. Bryol. univ. I, p. 264.

alpina H. et H. — Webera longicolla.

β *brachycarpa* Hsch. — Webera longicolla.

bicolor H. et H. — Webera nutans var. bicolor.

caespitosa eor. — Webera nutans var. caespitosa.

erecta Kth. — Brachymenium mexicanum.

fasciculata H. et H. — Webera nutans.

flexuosa Brid. — Webera Brideliana.

geniculata Brid. — Bryum.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

Br. afro-turbinatum Rehm.
arcuatum H. f. et Wils. (nom.
mutandum ? Cf. n° 30).
aulacomnioides C. M.
austro-triste C. M.
capensi-argenteum C. M.
Fusijame C. M.
gracili-torquescens C. M.
homalobolax C. M. et Kindb.
leucothrix C. M.
lonchopyxis C. M.
longinerve Lindb.

Br. Massabieae C. M.
pervirens C. M.
pseudo-sclerodictyon C. M.
pulchellum H. f. et W.
subaterrimum Rehm.
subcrispatum C. M.
subcrispatum C. M.
subleptosphaeroideum C. M.
subleptothecium C. M. (an Rhodobryum ?)
uremiocarpum C. M.
viridulum C. M.

- grimsulana* Brid. — *Webera longicolla*.
intermedia Brid. — *Bryum*.
lacustris W. et M. — *Bryum*.
longicolla Brid. — *Webera*.
longiseta Brid. — *Webera nutans* var. *longiseta*.
macrocarpa H. et H. — *Webera elongata* var. *macrocarpa*.
nutans Brid. — *Webera*.
 β *minor* Brid. — *Mielichhoferia longiseta*.
pendula Hsch. — *Webera nutans* var. *subdenticulata*.
piriformis L. — *Leptobryum*.
subdenticulata Brid. — *Webera nutans* var. *subdenticulata*.

BUXBAUMIA Hall. Hist. stirp. Helvet. II, p. 83, n. 27 (5 sp.).

aphylla Hall. l. c.; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 5 et Suppl. p. 4), t. 427 et VI, t. 641; C. M. Syn. I, p. 151; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 549.

B. caulescens Schmid. Diss. de Buxb. p. 25, n. I, c. ic.

B. vulgaris Brid. *Bryol. univ.* I, p. 329.

Hippopodium aphyllum Fabr. Prim. Fl. Butisb. p. 31; Roehl. Deutsch. Fl. II ed., III, p. 120.

Muscus capillaceus, *aphyllus*, capitulo crasso bivalvi Buxb. Cent. II, p. 18, t. 4; Dill. Hist. M. p. 477, t. 58, f. 5.

Saccophorus aphyllus P. B. Prodr. pp. 30 et 87.

2. In ericet. — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in alp. per zon. intermed. As.: Volga, Jenissei sup., Amour. Am. sept.: Nov. Scot., Quebec, Nov. Angl., Massachussets, Columb. brit.

Exs.: Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 331.

aphylla Schwaegr. p.p. — *B. indusiata*.

var. *indusiata* Wahlenb. — *B. indusiata*.

var. *viridis* Moug. et Nestl. — *B. indusiata*.

caulescens Schmid. — *B. aphylla*.

foliosa L. — *Diphyscium*.

indusiata Brid. *Bryol. univ.* I, p. 331; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 6 et Suppl. p. 5), t. 428 et VI, t. 641; C. M. Syn. I, p. 152 et II, p. 553; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 550.

B. aphylla Schwaegr. in L. Sp. pl. V ed., V, II, p. 24, n. I p.p.

B. aphylla var. *indusiata* Wahlenb. Fl. Suec. II ed., II, p. 760.

B. aphylla var. *viridis* Moug. et Nestl. in DC. Fl. fr., III ed., V, p. 227, n. 1323 et Stirp. crypt. Voges. Rhen. n. 724.

2. Lignic. — *Eur.*: Ut praecedens: sporadica. As.: Caucas. Am. sept.: Columb. brit.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 110 b.

javanica C. M. Syn. I, p. 152; *Bryol. jav.* I, p. 34, t. 24 (1).

1. Lignic. et rupic. — As.: Java.

Piperi Best. in Bull. Torr. bot. Club, 1893, p. 116.

2. Lignic. — Am. sept.: Washington, Idaho.

sessilis Schmid. — *Diphyscium foliosum*.

tasmanica Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 96.

— *Pac.*: Tasman.

vulgaris Brid. — *B. aphylla*.

(1) Cf. W. P. Sch. Syn. II ed. p. 550.

Cacodon Lindb. in *Mitth. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 9^{bri} 1882 (subgen. Pohliae = WEBERA).

CALLIBRYON Zenk. et Dietr. *M. Thur. fasc. XI, n. 41.*
polytrichoides Wieb. — *Atrichum undulatum.*
undulatum Z. et D. — *Atrichum undulatum.*

CALLICOSTA C. M. in *Linn.* 1848, p. 187.
affinis C. M. — *Pilotrichum.*
bipinnata C. M. — *Pilotrichum.*
composita C. M. — *Pilotrichum.*
delicatula Besch. — *Pilotrichum.*
evanescens C. M. — *Pilotrichum bipinnatum var. evanescens.*
filiformis C. M. — *Hookeria.*
hypnoides C. M. — *Pilotrichum.*

CALLICOSTELLA C. M. *Syn. II, p. 216* (sect. *HOOKERIAE, postea gen. propr.*).
abrupta Mitt. — *Hookeria.*
africana Mitt. — *Hookeria.*
apophysata Mitt. — *Hookeria.*
Ascensionis Mitt. — *Hookeria.*
aspera Mitt. — *Hookeria.*
asprella Mitt. — *Hookeria.*
Beccariana Mitt. — *Hookeria.*
Belangeriana Mitt. — *Hookeria.*
Beyrichiana Mitt. — *Hookeria.*
bisexualis Mitt. — *Hookeria.*
caldensis Mitt. — *Hookeria.*
Campbelliana Mitt. — *Hookeria.*
chionophylla C. M. — *Hookeria.*
ciliata Jaeg. — *Hookeria.*
crenata Jaeg. — *Hookeria.*
cruceana Jaeg. — *Hookeria.*
cuspidatissima Jaeg. — *Hookeria.*
daltonioides Jaeg. — *Schizomitrium.*
depressa Jaeg. — *Hookeria.*
depressula Jaeg. — *Hookeria.*
disticha Angstr. — *Hookeria.*
filescens Jaeg. — *Hookeria.*
Herminieri Jaeg. — *Hookeria.*
heterophylla Angstr. — *Hookeria.*
Hornschuchiana Jaeg. — *Hookeria.*
hypnacea Jaeg. — *Hookeria.*
lacerans Jaeg. — *Hookeria.*
Leprieurii Jaeg. — *Schizomitrium.*
leptocladula C. M. — *Hookeria.*
longipedunculata Jaeg. — *Hookeria.*
lorifolia Jaeg. — *Hookeria.*
Martiana Jaeg. — *Hookeria.*
Merkelii Jaeg. — *Hookeria.*
microcarpa Jaeg. — *Hookeria.*
mollis Jaeg. — *Hookeria.*
obliqua Jaeg. — *Schizomitrium.*
oblongifolia Jaeg. — *Hookeria.*
obscura Jaeg. — *Schizomitrium.*
Ørstedtiana Jaeg. — *Hookeria.*
pallida Jaeg. — *Hookeria.*

- papillata* } C. M. — Hookeria.
 } Mitt. (Sam. M.). — Hookeria oblongifolia.
pellucida Jaeg. — Hookeria
Prabaktiana Bryol. jav. — Hookeria.
pycnoptera C. M. — Hookeria.
radicans Jaeg. — Hookeria.
rivularis Jaeg. — Hookeria.
rufescens Jaeg. — Hookeria.
saxatilis Jaeg. — Hookeria.
scabriseta Jaeg. — Hookeria.
scabriuscula Jaeg. — Hookeria.
strumulosa Jaeg. — Hookeria.
Taylori Jaeg. — Hookeria.
tristis Rehm. — Hookeria.

Calliargon Lesq. et Jam. Man. p. 404 (subgen. HYPNI).

CALOMNION Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II (2 sp.).

denticulatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. X, p. 192.

Arbor. — Pac. : Ins. Samoa.

laetum Hook. f. et Wils. op. cit. t. 87, f. 5 et Handb. N. Zeal. Fl. p. 490.

Gymnostomum (Eucladon) complanatum eor. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 538; C. M. Syn. I, p. 190.

2. Filicie. et lignic. — Pac. : Nov. Zeland. sept. et med.

CALYMPERES Sw. Jahrb. d. Gewaechsk. von Sprengel, Schrad. und Link, 1818, t. 1, f. 1 (95 sp.).

aeruginosum Hpe. mss.; Lac. Sp. nov. M. Arch. ind. p. 7, t. 5 A.

2. Ster. Arbor. — As. : Ins. Philippin., Celebes.

africanum (Mitt.) Par.

Thyridium africanum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 303.

Ster. — Afr. : M. Usagara.

Afzelii Schwaegr. Suppl. II, II, p. 3, t. 1 p.p.; Brid. Bryol. univ. II, p. 86; C. M. Syn. I, p. 523.

C. Palisoti Schwaegr. Suppl. I, I, p. 334 p.p.

Dicranum ustulatum Brid. op. cit. I, p. 458.

2. Arbor. — Afr. : Sierra Leone, ins. Principis.

var. *moluccense* Brid. — C. moluccense.

albo-vaginatatum W. Arn. — Syrrhopodon.

androgynum Mont. — Syrrhopodon rigidus.

arcuatum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 85 et in Forschungsreise..., p. 51.

Ster. Arbor. — Pac. : Nov. Guinea.

Ascensionis C. M. in op. cit. pp. 84 et 42.

Ster. — Afr. : Ins. Ascension.

asperum C. M. in Dusen M. Camer. n. 400.

— Afr. : M. Cameroon.

asterigerum ej. l. c. n. 82.

— Afr. : M. Cameroon.

asteristylum ej. l. c. n. 751.

— Afr. : M. Cameroon.

- Beccarii *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 279.
— *As.* : Borneo (1).
- Borgeni *Kiaër in Borgen M. Mad.*
— *Afr.* : Madagascar.
- brachypelma *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 85.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- campylopodioides *C. M. l. c. n.* 151.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- caudatum *C. M. in Fl.* 1879, n. 24.
Ster. — *Afr.* : M. Kenia.
- chamaelonteum *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86.
— *Pac.* : Nov. Guinea.
- « var. nanum *C. M. in op. et l. cc.*
Arbor. — *Pac.* : Nov. Hannovria.
- chlorosum *Hpe. Enum. M. Brasil. p.* 6.
Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- chrysoblastum *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 88 et in *Forschungsreise...* p. 63.
Ster. Terr. humid. — *Afr.* : Monrovia.
- constrictum *Sull. in Wilkes Exped. p.* 6, t. 3, f. A.
Thyridium constrictum Mitt. Sam. M. p. 188.
Arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- couguiense *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p.* 206.
2 ? Cortic. — *Pac.* : Nov. Caledon.
- crassilimbatum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 18.
Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- crassinerve (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I, p.* 329.
Codonoblepharum crassinerve C. M. Polyn. p. 67.
Thyridium crassinerve Mitt. in Proc. of the Linn. Soc. 1868, p. 189.
Arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- ? crispum *Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p.* 151.
Syrrhopodon ? crispus ej. in op. cit. II, p. 109.
Ster. — *Am. sept.* : Florid.
- cristatum *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. p.* 278.
— *As.* : Borneo.
- croceum (*Mitt.*) *C. M. M. Polyn. p.* 63.
Syrrhopodon croceus Mitt. M. Ind. or. p. 41.
S. glanco-virens Mitt. Sam. M. p. 75.
Ster. Arbor. — *As.* : Ins. Labuan, Singapore, ins. Banca, Java, Sumatra. *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.
- Crügeri *C. M. Syn. I, p.* 527 ; *Mitt. M. austr. am. p.* 128.
2. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.
- decolorans *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 58.
2. — *Afr.* : Ins. Mayotte, Sanct. Maria de Madag.

(1) *Berterii Spreng. in Neue Entdeck. III, p. I; C. M. Syn. I, p.* 528. — Deleatur.

denticulatum *C. M.* in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise...* p. 52.

2. Arbor. — *Pac.* : Nov. Guinea.

disciforme *C. M.* in *Linn.* 1848, p. 183 et *Syn.* 1, p. 525 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 126.

Arbor. — *Am. sept.* : Florid. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Surinam.

Donnellii Aust. — *C. Richardi* var. *Donnellii*.

Dozyanum *Mitt. M. Ind. or.* p. 42.

C. moluccense *Bryol. jav. I*, p. 47, t. 38 (1).

2. — *As.* : Ind. or., Java.

Dozyanum *Mitt.* (Sam. M.) — *C. obliquatum*.

Duseni *C. M.* in *Dusen M. Camer. n.* 917.

— *Afr.* : M. Cameroon.

erosum *C. M.* in *Linn.* 1848, p. 182 et *Syn.* I, p. 524 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 127.

2. Arbor. — *Am. merid.* : Amazon., Surinam.

fasciculatum { *Dz. et Mk.* — *C. moluccense*.
 { *Mitt.* — *Syrrhopodon*.

var. *heterophyllum* *Dz. et Mk.* — *C. moluccense* var. *heterophyllum*.

Gardneri Hook. — *Syrrhopodon*.

Glaziovii *Hpe. Symb.* 1877, p. 716.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Graeffeanum *C. M. M. Polyn.* p. 64.

2. Arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.

Guildingii Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ.* III, p. 223 ; *C. M. Syn.* I, p. 528 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 128.

Arbor. — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent, Guadalup.

Hampei *Bryol. jav. I*, p. 48, t. 39 et II, p. 223.

2. Arbor. et rupic. — *As.* : Java, Banca, Timor.

Hildebrandti *C. M.* in *Linn.* 1876, p. 246.

Ster. Cortic. — *Afr.* : Ins. Anjouan.

hispidum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* II, p. 14

2. — *Afr.* : Madagascar, ins. S. Maria.

Hobsoni Grev. — *Syrrhopodon*.

inaequifolium *C. M.* in *Bot. Zeit.* 1864, p. 348.

Ster. — *As.* : Poulo-Penang.

incurvatum *C. M. M. Polyn.* p. 64.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa

integrifolium *C. M.* in *Fl.* 1886, p. 514.

Arbor. — *Afr.* : Kiulu.

intra-limbatum *C. M.* in *op. cit.* p. 513.

2. Muscic. — *Afr.* : Mossamedes.

Isleanum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 56.

2. Arbor. — *Afr.* : Ins. Seychelles, Nossi-Be.

(1) Cf. *Bryol. jav.* II, p. 223.

- Kaernbachii* Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1893, p. 477.
Ster. — Pac. : Nov. Guinea.
- Kennedyanum* Hpe. in Linn. 1876, p. 303.
Ster. — Pac. : Austral.
- Kurzianum* Hpe. in Fl. 1878, n. 6.
— As. : Ins. Andaman.
- lanceolatum* Hpe. Enum. M. Brasil. p. 6.
Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- latifolium* Hpe. in Pl. Preiss. p. 116 ; C. M. Syn. I, p. 525.
2 ? — Pac. : Austral. occid.
- leucocoleos* C. M. in Dusen M. Camer. n. 76.
— Afr. : M. Cameroon.
- leucomitrium* C. M. in Fl. 1886, p. 512.
2. Arbor. — Afr. : Niger.
- ligulare* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 303.
— Afr. : M. Usagara.
- Lindigii* Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 342 ; Mitt. M. austr. am.
p. 127.
Arbor. — Am. merid. : Nov. Granat.
- linealifolium* C. M. l. c. n. 756.
— Afr. : M. Cameroon.
- linearifolium* C. M. M. Polyn. p. 65.
Ster. — Pac. : Ins. Samoa.
- lonchophyllum* Schwaegr. Suppl. I, II, p. 133, t. 98 ; Brid. Bryol.
univ. II, p. 88 (excl. syn. C. Palisoti) ; C. M. Syn. I, p. 526 ;
Mitt. M. austr. am. p. 129.
2. Arbor. — Am. sept. : Guadalup. Am. merid. : Ins. Trinitat., Guian.
gall., Amazon., Brasil. austr. or.
- longifolium* Mitt. — C. Motleyi.
- loreum* Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. 7, t. 4 C.
2. Ster. — As. : Borneo.
- lorifolium* Mitt. Sam. M. p. 173.
2 ? Filic. — As. : Borneo. Pac. : Ins. Fidji, Samoa.
" var. neo-caledonicum Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 207.
Silvic. — Pac. : Nov. Caled.
- Malimbae* C. M. in Fl. 1886, p. 513.
2. — Afr. : Gabon.
- Mariei* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 57.
2. — Afr. : Ins. Nossi-Be.
- megamitrium* C. M. in Dusen M. Camer. n. 495.
— Afr. : M. Cameroon.
- microblastum* C. M. l. c. n. 807.
— Afr. : M. Cameroon.
- moluccense* Schwaegr. Suppl. II, II, p. 99, t. 127 ; C. M. Syn. I, p. 523 ;
Bryol. jav. I, p. 47, t. 37.
C. Afzelii β moluccense Brid. Bryol. univ. II, p. 87.
C. fasciculatum Bryol. jav. I, p. 50, t. 41 et II, p. 223 (fid. Mitt.).

2. Lignic. — As. : Hong-Kong, Amboine, Celebes, ins. Labuan, Rauwack, Ceram ; Singapore, Java, Banca.
- « *var. heterophyllum* Par.
C. fasciculatum var. heterophyllum *Bryol. jav. II*, p. 223.
 — As. : Java.
- Motleyi* Mitt. in *Bryol. jav. I*, p. 48, t. 38.
C. longifolium *ej. in Journ. of the Linn. Soc.* 1868, p. 173.
 2. — As. : Ins. Labuan, Borneo.
- Mülleri* Mitt. — Syrrhopodon.
- nanum* C. M. in *Linn.* 1875, p. 398.
 Ster. — Afr. : Monbottou.
- Nietneri* C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 348.
 — As. : Ceylan.
- Nossi-Combae* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 57.
 Fr. ign. — Afr. : Ins. Mayotte, Nossi-Comba.
Exs. : Marie n. 230.
- obliquatum* C. M. M. *Polyn.* p. 65.
C. Dozyanum Mitt. *Sam. M.* p. 172.
 Ster. Arbor. — Pac. : Ins. Samoa, Tonga, Nov. Guinea.
- pachyloma* Hpe. in *Linn.* 1876, p. 247.
 Fr. ign. — Afr. : Ins. Anjouan.
- pachyneuron* C. M. M. *Polyn.* p. 65.
 Ster. — Pac. : Ins. Samoa, Tonga.
- Palisoti* Schwaegr. p.p. } *C. Afzelii.*
 } *C. Richardi.*
- Pandani* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et in *Forschungsreise...* p. 58.
 2. Ad Pandanos. — As. : Amboine.
- parasiticum* (Sw.) Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ.* I, p. 131 ;
 Mitt. *M. austr. am.* p. 127.
Anoetangium parasiticum Brid. *Sp. M. I*, p. 270.
Brachypodium ? parasiticum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 149 ; *C. M. Syn. I*,
 p. 750.
Bryum parasiticum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 139.
Encalypta parasitica Sw. *Fl. Ind. occ. III*, p. 1739.
Glyphomitrium parasiticum Brid. *Mant. M.* p. 31.
Weisia parasitica Mohr in *Koen. et Sims. Ann. bot. II*, p. 545.
 Arbor. — Am. sept. : Hispaniola, Am. merid. : And. Quitens.
- platyloma* Mitt. *M. austr. am.* p. 128.
 — Am. merid. : Guian. brit.
- porrectum* Mitt. *Sam. M.* p. 172.
 Ster. Lignic. — Pac. : Ins. Samoa.
- Principis* Broth. in *Bot. da Soc. Broter. VIII*, 1899.
 2. Fr. ign. Arbor. — Afr. : Ins. Princip.
- pungens* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1833, p. 87 et in *Forschungsreise...*
 p. 57.
 Ster. Arbor. — As. : Amboine.
- Quintasi* Broth. in *Bot. da Soc. Broter. VIII*, 1899.
 2. Arbor. — Afr. : Ins. S. Thomas.

Rabenhorsti *Hpe. et C. M. in Fl.* 1886, p. 512.

2. — *Afr.* : Sin. Guineens.

repens C. M. — Syrrhopodon.

rhyperiophyllum C. M. *in Fl.* 1883, p. 512.

2. Arbor. — *Afr.* : Niger.

Richardi C. M. *Syn. I*, p. 524 et *II*, p. 620 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 127.

C. Palisoti *Schwaegr. Suppl. I, I*, p. 334 p.p.

2. Arbor. — *Am. sept.* : Florid., ins. S. Vincent., Guadalup. *Am. merid.* : Guian., Amazon., Brasil austr. or., ins. Fernando Noronha.

« var. *Donnellii* Lesq. et *Jam. Man.* p. 184.

C. *Donnellii* *Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV*, p. 151.

C. *Richardi* *ej. M. Appal. Suppl. n.* 489.

— *Am. sept.* : Florid.

Richardi *Aust.* — C. *Richardi* var. *Donnellii*.

rotundatum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1894, p.

2? Cortic. — *Pac.* : Tahiti.

rupestre C. M. *in Dusen M. Camer. n.* 53.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Sanctae Mariae *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 58.

Ster. — *Afr.* : S. Mar. de Madagasc.

« var. *mayottensis* *Besch. in Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 89.

Ster. — *Afr.* Ins. Mayotte.

Exs. : Marie n. 214.

saxatile C. M. *in Dusen M. Camer. n.* 94.

— *Afr.* : M. Cameroon.

scaberrimum *Broth. in Oefv...* 1893.

2. Cortic. — *Pac.* : Nov. Guinea.

secundulum C. M. *l. c. n.* 154.

— *Afr.* : M. Cameroon.

semi-liberum *Mitt. M. Ind. or.* p. 41.

2. Arbor. — *As.* : Penins. Malacc.

semi-marginatum C. M. *in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et *in Forschungsreise... Bot.* p. 57.

Ster. Arbor. — *As.* : Amboine.

serratum A. Br. *in C. M. Syn. I*, p. 527 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 41 ; *Bryol. jav. I*, p. 49, t. 40 et *II*, p. 223.

1. Filicic. — *As.* : Hong-Kong, Celebes, ins. Labuan, Borneo, Java, Ceylan. *Pac.* : Ins. Samoa.

setosum C. M. *M. Polyn.* p. 64.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

stylophyllum C. M. *in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 85 et *in Forschungsreise... Bot.* p. 51.

Ster. Arbor. — *Pac.* : Nov. Guin.

subdisciforme C. M. *in Dusen M. Camer. n.* 500.

— *Afr.* : M. Cameroon.

taitense *Mith.* — Syrrhopodon.

tenellifolium *ej. l. c. n.* 432.

— *Afr.* : M. Cameroon.

tenellum *ej. l. c. n.* 419.

— *Afr.* : M. Cameroon.

tenerum *C. M. in Linn.* 1871-73, p. 174.

Ster. Arbor. — *As.* : Calcutta.

tenuifolium Sull. — Syrrhopodon.

thomeanum *C. M. in Fl.* 1886, p. 286.

Ster. Muscic. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

Welwitschii *Duby in Mem...* Geneve, 1871, p. 20, t. 4, f. 8.

Ster. Ad rad. arbor. secus rivul. — *Afr.* : Angola.

Wulfschlaegeli *Ltz. Moost.* p. 160.

Ster. — *Am. sept.* : Haïti. *Am. merid.* : Guian.

batav. (1).

CALYMPERIDIUM *Bryol. jav. I*, p. 51.

Mülleri *Bryol. jav.* — Syrrhopodon.

Calympersopsis *C. M. in Dusen M. Camer.* (sect. CALYMPERIDIS).

Calyptoporus *Lindb. M. Scand.* p. 28 (sect. ORTHOTRICH).

CALYPTOTHECIUM *Mitt. Sam. M.* p. 190 (*gen. propr.*) et *M. austr. am.* p. 427 (sect. PTEROBRYI).

africanum *Mitt.* — Trachyloma.

praelongum. — Neckera Eugeniae.

CAMPTOCHÆTE *Reichdt. in Novara Exped. Bot. I*, p. 190 (7 sp.).

angustata (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 214.

Isothecium angustatum *Hook. f. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 465.

Ptilocladus angustatus *Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 278.

Stereodon angustatus *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 88.

2?

— *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med.

Arbuscula (*Hook.*) *Jaeg. l. c.*

Hookeria Arbuscula *Sm. in Trans. of the Linn. Soc. IX*, p. 280, t. 23.

Hypnum Arbuscula *Hook. M. ex. II*, p. 20, t. 112; *C. M. Syn. II*, p. 228.

Isothecium Arbuscula *Brid. Bryol. univ. II*, p. 372.

Ptilocladus Arbuscula *Lindb. l. c.*

Thamniella ? *Arbuscula* *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 240.

2.

— *Pac.* : N. Zeland., Tasman.

deflexa (*Wils.*) *Jaeg. op. cit.* p. 313.

Hypnum deflexum *Wils. in Stephens. M. N. Zeland.*; *C. M. Syn. II*, p. 680.

Isothecium Arbuscula β *deflexa* *Handb. of the N. Zeal. Fl. l. c.*

Ptilocladus deflexus *Lindb. l. c.*

Stereodon deflexus *Mitt. l. c.*

2. Arbor. et terr. — *Pac.* : Austral. felix, Nov. Hebrid., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

C. bahiense *C. M.*

C. Bodeni *C. M.*

| *C. Garciae* *Mitt.*

excavata (Tayl.) Jaeg. l. c. p. 214.

Hypnum excavatum Tayl. in *Phytolog.* 1844, p. 1095; *C. M. Syn.* II, p. 229.
2? — *Pac.* : Austral., ins. Five.

gracilis (Hook. f. et Wils.) Par.

Hypnum gracilescens C. M. *Syn.* II, p. 271.

H. gracile H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 553 et *Fl. Antarct.* I, p. 140.

H. micans eor. op. cit. II, p. 421?

Isothecium gracile eor. *Fl. N. Zeal.* II, p. 106, et *Fl. Tasm.* II, p. 205.

Microthamnium gracile Jaeg. *Ad.* II, p. 492.

Ptilocladus gracilis Lindb. l. c.

Stereodon gracilis Mitt. l. c.

2. Ad rup. madid. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland.

pulvinata (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad.* II, p. 213.

Hypnum pulvinatum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 155;
C. M. Syn. II, p. 500.

Isothecium pulvinatum eor. *Fl. N. Zeal.* II, p. 105, t. 88, f. 5 et *Handb.* p. 465.

Ptilocladus pulvinatus Lindb. l. c.

Thamniella ? *pulvinata* Besch. l. c.

— *Pac.* : Nov. Zel. sept.

ramulosa (Mitt.) Jaeg. l. c.

Isothecium ramulosum Mitt. in *Handb. of the Zeal. Fl.* p. 465.

Ptilocladus ramulosus Lind. l. c.

Arbor. — *Pac.* : Nov. Zeland., ins. Chatham. (1).

CAMPTOTHECIUM Bryol. eur. V (14 sp.).

alsioides Kindb. in *Pittonia*, 1892, p. 243.

— *Am. sept.* : Calif.

Amesiae Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1888, p. 202, t. 20.

2. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver,
Washington, Oregon, Calif.

arenarium (Lesq.) Jaeg. l. c.

Hypnum arenarium Lesq. in *Trans. Am. Phil. Soc.* XIII, p. 13; *Lesq. et Jam. Man.* p. 333.

2. Arenic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 512 (*Hypnum*).

aureum (Lag.) Bryol. eur. VI (mon. p. 7), t. 559; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 636.

Brachythecium aureum de Not. *Epil.*

Hypnum aureseens C. M. *Syn.* II, p. 371.

H. aureum Lag. in *Ann. d. Cienc. nat.* n. 14; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 469.

Isothecium aureum Spr. in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849, et *M. Pyr.* n. 85.

2. Loc. sicc. et ad rup. arid. — *Eur.* : Galloprov., Etrur., Sardin.,
Pyren., Hispan. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Hispaniola (fid. Brid.),
ins. Vancouver.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 689.

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum;
C. dendroclada C. M.

cladoneuron Jaeg. — *Brachythecium*.

dolosum Ren. et Card. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51 (subsp. *C. cenei*).
— *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Washington,
Idaho.

fulgescens Mitt. in Bot. Zeit. 1878, p. 170.

Lignic. — *Am. sept.* : M. Selkirk, Columb. brit.

hamatidens Kindb. — *C. Nuttallii*.

lutescens (Huds.) Bryol. eur. VI (mon. p. 6), t. 558; W. P. Sch. op. cit.
p. 635).

Brachythecium lutescens de Not. Epil.

Climacium lutescens Voit M. Herbisp. p. 79.

Hypnum cassubicum Scop. Fl. Carn. II ed., p. 1327.

H. lutescens Huds. Fl. Angl. p. 421; Brid. Bryol. univ. II, p. 466;
C. M. Syn. II, p. 370.

H. myosuroides Lag. Ann. d. Cienc. nat. n. 24.

H. myosuroides β *praelongum* Web. Spicil. Fl. Goett. p. 95.

H. sericeum, surculis longioribus et teretioribus, capsulis incurvis Dill.
Hist. M. p. 325, t. 42, f. 60.

H. sericeum β *praelongum* Weiss Crypt. Goett. p. 255.

H. strigosum β *ramosum* Neck. Meth. M. p. 180.

Isothecium lutescens Spr. in Ann. and Mag. of nat. hist. 1849, et M. Pyr.
n. 88.

Leskea longifolia Ehrh. Crypt. exs. n. 281.

Neckera lutescens Willd. Prodr. fl. Berol. n. 939.

2. In petros. sicc. et ad silvar. marg. — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Boreal.,
Caucas. occ., Taurus Cilic. *Am. sept.* : Fret. Behring et Kotzebue,
Columb. brit., Alaska, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho,
Calif.

Exs. : Kotschy It. Cilic. n. 440.

« *var. occidentale* Ren. et Card. l. c.

— *Am. sept.* : Washington.

megaptilum Sull. Ic. M. Suppl. p. 102, t. 78.

Hypnum megaptilum Lesq. et Jam. Man. p. 334.

2. Terr. in silv. conifer. — *Am. sept.* : Oregon, Idaho.

megaptilum Mac. — *Brachythecium rivulare*.

nevadense (Lesq.) Par.

Homalothecium nevadense Ren. et Card.

Hypnum nevadense Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 33; Lesq. et Jam.
Man. p. 332.

H. pseudo-sericeum Mac. Canad. M. n. 435.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Nevada, Calif.

var. subulatum Ren. et Card. — *Homalothecium sericeoides*.

nitens (Schreb.) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 530 et II ed. p. 637.

Hypnum insigne Mohl et Schlecht. in Bot. Zeit. 1861, p. ; Milde in
Rab. Bryoth. eur. n. 489 et b.

H. nitens Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 92; *C. M. Syn.* II, p. 381; Bryol.
eur. VI (mon. p. 53), t. 622.

H. palustre, erectum, trichodes, ramulis crebris luteo et rufo viridibus
Dill. Hist. M. p. 303, t. 39, f. 37.

H. trichodes Pall. Fl. Palat. n. 1047.

H. Stereodon nitens Brid. Bryol. univ. II, p. 560.

Neckera nitens Moench Pl. Marp. p. 738.

2. In pratis palud. et turfis. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in alpin., praecip. zon. septentr. : Spitzberg, ins. Ursor. *As.* : Amour, Jenissei, Taimyr, Ochotsk. *Am. sept.* : Groenland, fret. Hudson et Kotzebuë, ins. Melville, Anticosti, Terr. nov., Ottawa, Ontar., Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, reg. sept. et centr.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 172 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 278 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 764 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 486 (*Hypnum*).

Nuttallii (Wils.) *Bryol. eur.* VI (mon. p. 6).

C. hamatidens *Kindb. in Mac. Cat. p. 189 (fid. Ren. et Card.)*.

Hypnum hamatidens Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVI, p. 97.

H. Nuttallii *Wils. Bryol. brit. pp. 334 et 339 ; Sull. Ic. M. p. 211, t. 128 ; Lesq. et Jam. Man. p. 332.*

H. pinnatifidum *Mac. Canad. M. n. 280.*

Leskea californica Hpe. in Linn. 1860, p. 460.

L. campylocarpa *Hpe. in sched.*

2. Ad arbor. et rup. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Oregon, Idaho, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 514 (*Hypnum*).

α *var. tenue (Kindb.) Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p. 16.*

C. hamatidens *var. tenue Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 277.*

Ad rup. vertical. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 392 (*Hypnum*).

oeneum (Mitt.) *Jaeg. Ad. II, p. 381.*

Hypnum oeneum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 31, t. 5 ; Lesq. et Jam. Man. p. 331.

2. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Sierra Nevada.

pinnatifidum (Sull. et Lesq.) *Jaeg. Ad. II, p. 383.*

Hypnum pinnatifidum Sull. Ic. M. Suppl. p. 101, t. 77 ; Lesq. et Jam. Man. p. 333.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 513 (*Hypnum*).

pseudo-lutescens (Hpe.) *Jaeg. Ad. II, p. 381.*

Hypnum pseudo-lutescens Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p. 314 ; Mitt. M. austr. am. p. 564.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Campyliadelphus *Lindb. M. Scand. p. 32 (sect. HYPNI).*

CAMPYLIUM *Sull. M. and Hepat. of U. St. p. 677 ; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 599 (sect. HYPNI, gen. propr. nonnull.).*

Halleri Lindb. — Hypnum.

hispidulum Mitt. — Hypnum.

var. Sommerfeldti Lindb. — Hypnum Sommerfeldti.

CAMPYLOCHÆTIUM *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 24.*

mexicanum Besch. — Campylopodium.

CAMPYLODONTIUM *Schwaegr. Suppl. III, I, I.*

drepanioides Ren. et Card. — Entodon.

flavescens Bryol. jav. — *Fabronia*.
hypnoi 'es Schwaegr. — *Anacamptodon splachnoides*.
onustum Jaeg. — *Entodon*.
Regnellianum Jaeg. — *Entodon*.
striatum Dz. et Mk. — *Fabronia flavescens*.

Campylodryptodon W. P. Sch. Syn. I ed. p. 226 (sect. RHACOMITRUM).

Campylophyllum W. P. Sch. Syn. II ed. p. 721 (subgen. HYPNI).

CAMPYLOPODIUM C. M. Syn. I, p. 429 (subgen. ÅNGSTROEMIAE). (12 sp.)

curvisetum (Hpe.) Par.

Ångstroemia *curviseta* Hpe. Prodr. Fl. Nov. Granat. p. 19.

Dicranella *curviseta* Mitt. M. austr. am. p. 38.

— Am. merid. ; And. Nov. Granat.

cygnœum (Ångstr.) Par.

Dicranella *cygnœa* Ångstr. in Oefv... 1878, n. 5, p. 47.

2. — Afr. : Ins. S. Helen.

euphorocladum (C. M.) Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 189.

Ångstroemia *euphoroclada* C. M. Syn. I, p. 429.

Campylopus *euphorocladus* Bryol. jav. I, p. 79, t. 66.

Dicranella *euphoroclada* Jaeg. Ad. II, p. 637.

Didymodon *grimmiioides* Duby in Moritzi Verz. d. Zolling. Pfl. p. 134 ?

D. *medius* ej. l. c. ?

2. Rupic. et terr. — As. : Java.

var. β *squarrosus* Besch. — C. neo-caledonicum.

Fendleri (C. M.) Par.

Ångstroemia *Fendleri* C. M. in Linn. 1878-79, p. 470.

Dicranella *Fendleri* Jaeg. Ad. II, p. 637.

2. — Am. merid. ; Venezuela.

khazianum (Griff.) Par.

Campylopus *tenuis* Wils. in sched. et in Kew Journ. bot. IX, p. 296.

Dicranella *khaziana* Jaeg. Ad. II, p. 637.

Dicranum *khazianum* Griff. Not. p. 418 et Ic. pl. asiat. II, p. 94, f. 2.

Leptotrichum *khazianum* Mitt. M. Ind. or. p. 8.

2 ? — As. : Sikkim, Khasia, Ceylan.

mexicanum Besch. in litt.

Campylochaetium *mexicanum* ej. Prodr. bryol. mexic. p. 24.

Dicranella *mexicana* Jaeg. Ad. II, p. 637.

— Am. sept. ; Mexic.

neo-caledonicum (C. M.) Par.

Ångstroemia *neo-caledonica* C. M. mss.

C. *euphorocladum* var. *squarrosus* Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 189.

Dicranella *neo-caledonica* Jaeg. Ad II, p. 637.

Terr. argill. — Pac. : Nov. Caled.

phascoides (C. M.) Par.

Ångstroemia *phascoides* C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 39 ; Mitt. M. Ind. or.

p. 8.

Dicranella *phascoides* Jaeg. Ad. II, p. 637.

2. — As. : M. Neilgherr.

Pilopogon (C. M.) Par.*Angstroemia Pilopogon* C. M. in *Linn.* 1874, p. 630.*Dicranella Pilopogon* Jaeg. *Ad. II*, p. 637.2. — *Am. sept.* : Mexic.*Sartorii* (C. M.) Par.*Angstroemia Sartorii* C. M. in *op. cit.* p. 629.*Dicranella Sartorii* Jaeg. *Ad. II*, p. 637.2. — *Am. sept.* : Mexic.*taïtense* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1894, p.1. In argill. — *Pac.* : Taïti.*trichophyllum* (Mitt.) Par.*Dicranella trichophylla* Mitt. *Fl. Vit.* p. 386.*Leptotrichum trichophyllum* Mitt. in *Seem. Bonpl.* 1861, p. 3662. — *Pac.* : Ins. Viti, Ovalau.**CAMPYLOPUS** Brid. Mant. M. p. 71 (349 sp.) (1).*abyssinicus* de Not. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 21.— *Afr.* : M. Abyssin.*abyssinicus* W. P. Sch. — *C. subflexuosus*.*acervatus* Mitt. *M. austr. am.* p. 87.— *Am. merid.* : Absque loco.*acrocaulon* (C. M.) Par.*Dicranum acrocaulon* C. M. in *Fl.* 1888, p. 410.Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.*acuminatus* Mitt. *M. austr. am.* p. 90.*Dicranum acuminatum* C. M. in *Fl.* 1885, p. 409.Ster. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremit.*adustus* de Not. *Epil.* p. 649; W. P. Sch. *Syn. II ed* p. 107.Ster. — *Eur.* : Ital. sup. (ad Verbanum).*aemulans* (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 148.*Thysanomitrium aemulans* Hpe. *Symb.* 1870, p. 273.Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.*aethiops* Welw. et Duby in *Mem... Genève* 1870, p. 7, t. 3, f. 2.Ster. — *Afr.* : Angola.*afro-concolor* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 653.— *Afr.* : M. Cameroon.*albescens* (C. M.) Par.*Dicranum albescens* C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 36; Mitt. *M. Ind. or.* p. 16.— *As.* : M. Neilgherr.*alopecurus* (C. M.) Par.*Dicranum alopecurum* C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 401.Arbor. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.*alpicola* Jaeg. — *C. torfaceus* var. *alpicola*.*alpinus* W. P. Sch. — *Dicranodontium longirostre*.

(1) Species omnes dioicae.

altissimus (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 645.

Dicranum altissimum C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

amabilis (C. M.) Par.

Dicranum amabile C. M. in Linn. 1880-82, p. 399.

Arbor. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

ampliretis C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 60.

Ster. — Afr. : C. B. Sp. (Montagu).

Anderssonii (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 140.

Dicranum Anderssonii C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 169.

- - Am. merid. : Ins. Gallapagos.

Ångstroemii Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 38.

C. aureo-nitens Angstr. in Oefv... 1873, p. 43.

— Afr. : Ins. Franciae.

angustiretis (Aust.) Lesq. et Jam. Man. p. 80.

Dicranum angustirete Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p. 150.

— Am. sept. : Florid. merid.

annotinus Mitt. M. austr. am. p. 80.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

appressifolius Mitt. in Handb. N. Zeal. Fl. p. 414.

C. clavatus H. f. et W. Fl. N. Zeal. II, p. 69 p.p.

— Afr. : Ins. Kerguelen. Pac. : Nov. Zeland.

Arbogasti Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1891, II, p. 183.

Ster. Aren. — Afr. : Madagascar.

artocarpus (Hsch.) Mitt. M. austr. am. p. 87.

Dicranum artocarpum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 12 ; C. M. Syn. I, p. 398.

D. stenocarpum C. M. in op. cit. p. 404 (fid. Mitt.).

— Am. merid. : Venezuela, Brasil. austr. or., Monte-Video.

artocarpus Mitt. p.p. — C. crispicoma.

arcuatus Lac. mss. ; C. H. Wright M. Mad. p. 4.

— Afr. : Madagascar.

Arduennae Lib. — C. fragilis.

arenicola (C. M.) Mitt. op. cit. p. 77.

Dicranum arenicola C. M. in Bot. Zeit. 1885, p. 762.

In aren. marit. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

areodictyon (C. M.) Mitt. op. cit. p. 85.

Dicranum areodictyon C. M. Syn. I, p. 394.

Lignic. — Am. sept. : Guatemala. Am. merid. : And. Columb., Nov. Granat., Quitens. et Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1612.

α var. gracilescens W. P. Sch. in Mandon l. c. n. 1613.

— Am. merid. : And. Boliv.

Arizonae Besch. mss.

— Am. sept. : Arizona.

- asperifolius* Mitt. *op. cit.* p. 79.
Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens et Chilens.
- atro-lutens* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 63.
Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.
- atro-sordidus* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 347.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- atro-virens* de Not. — C. *longipilus*.
var. *adustus* Husn. — C. *longipilus*.
var. *falcata* Braithw. — C. *longipilus* var. *falcata*.
- attenuatus* W. P. Sch. mss.; *Jaeg. Ad. I*, p. 148.
— *Am. sept.* : Jamaïc ?
- aureo-nitens* (C. M.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 38.
C. *introflexus* Brid. *Bryol. univ. I*, p. 472 p.p.
Dicranum *aureo-nitens* C. M. *Syn. I*, p. 406.
— *Afr.* : Ins. Bourbonnæ.
- aureo-nitens* Ångstr. — C. *Ångstroemii*.
- aureo-viridis* W. P. Sch. mss.; *Jaeg. Ad. I*, p. 139
— *Afr.* : C. B. Sp.
- aureus* *Bryol. jav. I*, p. 80, t. 67.
Arbor. — As. : Java, ins. Nicobar.
- aurificus* (C. M.) Par.
Dicranum *aurificum* C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 329.
Ster. — *Am. merid.* : Uruguay.
- « var. *flavescens* (C. M.) Par.
Dicranum *aurificum* var. *flavescens* C. M. l. c.
Ut et cum typ.
- australiensis* Duby in *Mem... Genève*, 1869, p. 9, t. 4, f. I.
— *Pac.* : Austral.
- austro-alpinus* (C. M.) Par.
Dicranum *austro-alpinum* C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 398.
Ster. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic. Tucuman.
- Balansaeanus* *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 199.
Arbor. in silv. — *Pac.* : Nov. Caledon.
- bartramiaceus* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.*
Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.
- Bertereoanns* Duby in *Mem... Genève*, 1875, p. 12, t. I, f. 4.
C. *introflexus* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1835.
Silvic. — *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez.
- Beyrichianus* Duby *Choix de crypt. ex.* 1869, p. 9, t. I, f. 3.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- « var. *elatus* (1) (Hpe.) Par.
Dicranum *Beyrichianum* var. *elatus* Hpe. *Symb.* 1877, p. 719.
Ut et cum typ.

(1) False « *polysetus* ». *Jaeg. Ad. II*, 760.

bicolor (*Hsch.*) *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 415.

Dicranum bicolor *Hsch. in Sieber M. exs. n. 9; C. M. Syn. I, p. 392; Fl. N. Zeal. II, p. 69.*

— *Pac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman.

bicolor *Besch.* — *C. pachycomus.*

Blumii *Bryol. jav.* — *C. Dozyanus.*

Boivinianus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 32.*

— *Afr.* : Ins. Franciae.

Boryanus *Besch. op. cit. p. 31.*

— *Afr.* : Ins. Borboniae.

brachymastyx *C. M. in Besch. op. cit. p. 36.*

Fr. ign. — *Afr.* : Ins. Franciae.

brachymitrius (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Dicranum brachymitrium *Geh. et Hpe. in Fl. 1881.*

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

brachyphyllus *Wils. in sched.*

Dicranum brachyphyllum *Mitt. in Lond. journ. of bot. 1851, p. 52 et M. austr. am. p. 81; C. M. Syn. II, p. 597.*

— *Am. merid.* : And. Quitens.

brachyphyllus *C. M.* — *C. subbrachyphyllus.*

brevifolius *W. P. Sch. Suppl. ad Bryol. eur. I-II et Syn. II ed., p. 106.*

C. subulatus *ej. in Rab. Bryoth. eur. n. 451.*

Orthopus subulatus *Wulfsb. in Christiania Vid. Selsk. Forh. 1875, p. 351 (1).*

Fr. ign. Ad rup. granitic. — *Eur.* : Belgia, Stir., Carinth., Bavar., Tirol. merid., Helvet., Simplon, Gall. centr.

« *var. elongatus* *Bosw. in the Naturalist. 1883, p. 28.*

In uligin. — *Eur.* : Anglia.

brevifolius *de Not.* — *C. Mildei.*

brevipilus *Bryol. eur. I (mon. p. 6) t. 92; W. P. Sch. Suppl. ad Bryol. eur. I-II, t. 2 et Syn. II ed. p. 106.*

Dicranum brevipilum *C. M. Syn. I, p. 412.*

♂ et *fr. ign. In ericet. et subturfac.* — *Eur.* : Dania, Westphalia, Neerland., Britann., Gall. centr. et occ. *Afr.* : Alger.

Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 577.*

« *var. Molkenboeri* (*Lac. mss.*) *Milde Bryol. siles. p. 79; Jaeg. Ad. I, p. 142.*

Ut typ. — *Eur.* : Neerland.

brevis *Rehm. M. Afr. austr. n. 44.*

Ster. — *Afr.* : C. B. Sp. (Stinkwater).

Cacti (*C. M.*) *Par.*

Dicranum Cacti *C. M. in Linn. 1880-82, p. 403.*

— *Am. merid.* : Uruguay.

caespiticius *Brid.* — *Grimmia sulcata.*

caespitosus *Jaeg.* — *Dicranodontium.*

(1) Cf. *Lindb. M. Scand. p. 25, n. 268.*

Cailleae Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. I, p. 114.

Ster. Ad terr. argill. — Afr. : Nossi-Comba.

caldensis Ångstr. in Oefv... 1876, n. 4, p. 5.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

calymperidictyon (Geh. et Hpe.) Par.

Dicranum calymperidictyon Geh. et Hpe. in Fl. 1881, p.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Cambouei Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1891, II, p. 182.

Ster. Terr. argill. — Afr. : Madagascar.

canaliculatus (Geh. et Hpe.) Par.

Dicranum canaliculatum Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil. p. 20.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

canescens W. P. Sch. in Lechler Pl. ins. Maclov. n. 90 (1).

Dicranum canescens C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 220.

— Am. merid. : Ins. Maclov.

capensis W. P. Sch. — *C. lepidophyllus*.

capillaceus (Brid.) Par.

Dicranum capillaceum Brid. Bryol. univ. I, p. 460; C. M. Syn. I, p. 396.

— Afr. : Madagascar.

capillaceus H. f. et W. — *C. Holomitrium*.

capillatus Hook. f. et Wils. Fl. Tasm. II, p. 172, t. 172, f. 4.

— Pac. : Austral.

capitiflorus Mont. Syll. p. 42.

Dicranum capitiflorum C. M. Syn. II, p. 598.

— Afr. : Ins. Borbon.

« *var. pachycomus* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 34.

Arbor. — Afr. : Ins. Franciae.

caracasanus (C. M.) Par.

Dicranum Richardi C. M. Syn. I, p. 413 p.p.

Thysanomitrium caracasenum ej. in Linn. 1878-79, p. 471.

— Am. merid. : Venezuela.

carassensis (Broth.) Par.

Thysanomitrium carassense Broth. in Act. Soc. sc. Fenn. 1891, n. 5.

Ster. Terr. — Am. merid. : Minas Geraës.

catharractitis C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 64.

Ster.

— Afr. : C. B. Sp.

caudatus (C. M.) Bryol. jav. I, p. 78, t. 65.

C. flexuosus Mont. in Ann. sc. nat. 1842, Crypt. Neilgherr. n. 52.

Dicranum caudatum C. M. Syn. I, p. 401; Mitt. M. Ind. or. p. 18.

— As. : M. Neilgherr., Java.

cavifolius Mitt. M. austr. am. p. 87.

— Am. merid. : And. Quitens.

chalarobasens C. M. in Dusen M. Camer. n. 262.

— Afr. : M. Cameroon.

(1) Cf. *C. introflexus*.

chilensis de Not. in Mitt. *M. austr. am.* p. 85.

Ster. — *Am. merid.* : Chile.

chionophilus (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 81.

Dicranum chionophilum C. M. *Syn. I*, p. 398.

— *Am. merid.* : And. Columb. et Nov. Granat.

chlorophyllosus (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 132.

Dicranum chlorophyllosum C. M. *Syn. I*, p. 395.

Ster. — *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 46 et 446.

« *var. compactus* C. M. in Rehm. *l. c. n.* 49.

— *Afr.* : C. B. Sp.

« *var. rivularis* C. M. *l. c. n.* 48.

— *Afr.* : C. B. Sp.

« *var. tristis* C. M. *l. c. n.* 47.

— *Afr.* : C. B. Sp.

chlorotrichus C. M. *l. c. n.* 53 et 449.

— *Afr.* : C. B. Sp., Natal.

Chrismari (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 88.

Dicranum Chrismari C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 761.

— *Am. sept.* : Mexic.

chryseolus C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 37.

— *Afr.* : Comor. magn.

chrysodictyon (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 78.

Dicranum chrysodictyon Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., V*, p. 338.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

cirratus Hsch. — *Cynodontium gracilescens var. inflexa*.

Civa Ltz. *Moosst.* p. 159 (1).

Ster. — *As.* : India.

clavatus (R. Br.) Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 69 p.p.

Dicranum clavatum R. Br. in *Schwaegr. Suppl. III, II, I. t.* 255 ; C. M. *Syn. I*, p. 412.

D. pudicum Hsch. in *Sieber M. N. Holl. n.* 24 p.p. (*fid. Mitt.*).

— *Afr.* : Ins. S. Paul, Pac. : Austral., Nov. Zeland., Tasman.

clavatus { H. f. et W. p p. — C. appressifolius.
H. f. et W. pp. — C. insititius.
Rehm. — C. pseudo-clavatus.

comatulus Besch. *Not. M. des I. St-Paul et Amsterdam*, p. 4.

Ster. — *Afr.* : Ins. Amsterdam.

comatus Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg. II*, p. 183.

Ster. Silv. — *Afr.* : Madagascar, ins. Sancta Maria.

comosus (Hsch. et Reinw.) *Bryol. jav. I*, p. 75, t. 63.

Dicranum comosum *Schwaegr. Suppl. II, II, II, p.* 114, 181 ; C. M. *Syn. I*, p. 397.

(1) « Forsan *C. nodiflori* forma ster. » Ltz.

Sphaerothecium comosum Hpe. in *Ann. sc. not. V ser., III*, p. 361; Mitt. *op. cit.* p. 38.

Thysanomitrium comosum Hsch. et Reinw. in *Nov. Act. Leop. XIV, II*, *Suppl.* p. 706, t. 39, f. c.

Th. phascoides Hpe. in *Linn.* 1863, p. 136.

Terr. — As. : Java. Am. merid. : And. Nov. Granat.

« *var. elatius* (Mitt.) Par.

Sphaerothecium var. elatius Mitt. l. c.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

compactus Wils. p.p. — *C. Goughii*.

concolor (Hook.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 476; Mitt. *op. cit.* p. 82.

Dicranum concolor Hook. *M. ex.* p. 10, t. 138; *C. M. Syn. I*, p. 391.

D. Jamesoni Hook. *Ice. pl. rar.* t. 179; *C. M. l. c.*

Lignic. — Am. merid. : And. Columb. et Nov. Granat.

contortus Brid. — *Grimmia*.

controversus (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 649.

Dicranum controversum Hpe. *Symb.* 1872, p. 42.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

crassinervis Wils. — *Dicranum albicans*.

crassissimus Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LVIII et in *Miss. sc.*

Cap Horn, V, Bot., p. 265, t. 2, f. 7.

Ster. — Am. merid. : Patagon occ.

crateris Besch. *Fl. Bryol. Réunion, etc.*, p. 39.

Ster. Ad rupes vulcan? — Afr. : Ins. Bourbon (1).

Crishna Ltz. *Moosst.* p. 159 (2).

Ster. — As. : India.

crispicoma (C. M.) Par.

C. arctocarpus Mitt. *op. cit.* p. 87 p.p.

Dicranum arctocarpum C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

Ster. — Am. merid. : Venezuela.

cubensis Sull. — *C. filifolius*.

Cummingii Duby in *Mem... Geneve*, 1869, p. 11, t. II, f. 3.

— Am. merid. : Chile.

curvifolius Brid. — *Grimmia commutata*.

cuspidatus (Hsch.) Mitt. *op. cit.* p. 90.

Dicranum cuspidatum Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 13; *C. M. Syn. I*, p. 414.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

cygnæus (Hedw.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 475; Mitt. *op. cit.* p. 76.

Dicranum cygnæum Hedw. *Sp. M.* p. 148, t. 37; *C. M. Syn. I*, p. 388.

— Am. sept. : Hispaniola.

densifolius Ångstr. in *Oefv...* 1872, n. 4, p. 18.

— Pac. : Ins. Sandwic.

(1) *cribrosus* Brid. *Mant. M.* p. 76. $\left\{ \begin{array}{l} \text{— } \textit{Grimmia leucophaea} \\ \text{— } \textit{Grimmia trichophylla} \end{array} \right\}$ Deleatur.

Cf. *C. M. Syn. I*, p. 810 et *Dryptodon cribrosus*.

(2) « Forsan *C. erythrognaphalo* nimis aff. ». Ltz.

densus Bryol. eur. — *C. fragilis*.

var. *fragilis* Wils. — *C. fragilis*.

destructilis (*C. M.*) Jaeg. *Ad. I*, p. 134.

Dicranum destructile *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 220.

Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

detonsus (*Hpe.*) Par.

Dicranum detonsum *Hpe. in Fl.* 1881, p.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

dichotomus Brid. Mant. M. p. 77. — Cf. *Dryptodon dichotomus*.

dicranelloides Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. Belg. 1890, I, p. 171.

C. perpusillus Mitt. ?

Ster. Terr. argill. — *Afr.* : Madagascar.

dictycion (false; *dictyon*) Jaeg. — *Dicranodontium*.

Didrichsenii (*C. M.*) Jaeg. *Ad. I*, p. 128.

Dicranum Didrichsenii *C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 329.

Ster. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

Didymodon Jaeg. — *Dicranodontium*.

Dietrichiae (*C. M.*) Par.

Dicranum Dietrichiae *C. M. M. Polyn.* p. 62.

Ster. — *Pac.* : Ins. Tonga.

discriminatus (*Hpe.*) Par.

Dicranum discriminatum *Hpe. Symb.* 1877, p. 718.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

dissitus *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 264.

— *Afr.* : M. Cameroon.

ditrichoides Broth. in Act. Soc. sc. Fenn. 1891, n. 5.

Ster. Terr. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

divaricatus (*Mitt.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 645.

Dicranum divaricatum Mith. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 149.

Ster. — *Afr.* : Ins. Princip.

divisus (*Geh. et Hpe.*) Par.

Dicranum divisum *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881, p.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

dolosus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 32.

Terr. — *Afr.* : Ins. Borbon.

Donnellii (*Aust.*) Lesq. et Jam. Man. p. 79.

Dicranum Donnellii Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p. 150.

D. subleucogaster ej. M. Appal. exs. Suppl. I, n. 470.

Ster. — *Am. sept.* : Florid. merid.

Dozyanus (*C. M.*) Jaeg. *Ad. I*, p. 122.

C. Blumii Bryol. jav. I, p. 81, t. 68.

Dicranum clavatum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 298.

D. Dozyanus *C. M. Syn. I*, p. 385.

D. ericetorum Mitt. M. Ind. or. p. 20 p.p.

Trichostomum Blumii Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 316.

Arbor. et rupic. — *As.* : Sikkim, Assam, M. Neilgherr, Ceylan, Java,

Borneo. *Pac.* : Ins. Societat.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 304.

— Afr. : M. Cameroon.

Echernieri Besch. *Fl. Bryol. Réunion, etc.* p. 35.

Dicranum arcuatum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 463 p.p. ; C. M. *Syn. I*, p. 388 p.p.

Ster. Loc. cavis humid. et aquatic. — Afr. : Ins. Borbon.

echinatus Rehm. *M. Afr. austr. n.* 67.

Ster. — Afr. : C. B. Sp.

« var. leucobasis Rehm. *l. c. n.* 71.

— Afr. : C. B. Sp. (Montagu).

« var. turgescens Rehm. *l. c. n.* 69.

— Afr. : C. B. Sp. (Campo-Bay).

« var. umbrosus Rehm. *l. c. n.* 72.

— Afr. : C. B. Sp. (Knysma).

« var. Vallis Gratiae Rehm. *l. c. n.* 70.

— Afr. : C. B. Sp. (Montagu).

ellipticus Brid. — *Rhacomitrium*.

elongatus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 815.

Dicranum Grateloupii C. M. *Syn. I*, p. 387 et *II*, p. 596.

♂ et fr. ign. — Eur. : Gall. austr. occ.

erectus (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 89.

C. strictus C. M. in *Linn.* 1847, p. 207.

Dicranum erectum C. M. *Syn. I*, p. 408.

Thysanomitrium inflexum Hpe. in *Linn.* 1847, p. 74.

— Am. merid. : Venezuela, Columb.

ericoides (Griff.) Jaeg. *Ad. I*, 128.

Dicranum ericoides Griff. *Not.* p. 420 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 18.

— As. : Nepal, Khasia.

erythrocaulon Broth. in *Boll. da Soc. Broter.* 1890.

Ster. — Afr. : Ins. S. Thomas.

erythrodontius (Hpe.) Par.

Dicranum erythrodontium Hpe. *Symb.* 1877, p. 720.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

erythroglyphalon (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 143.

Dicranum erythroglyphalon C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 37 ; Mitt. *op. cit.* p. 21.

— As. : M. Neilgherr.

erythropoma Duby in *Mem... Geneve*, 1869, p. 10, t. 3, f. 2.

— Pac. : Austral.

euphorocladus Bryol. jav. — *Campylopodium*.

exalaris (Hpe.) Par.

Dicranum exalare Hpe. *Symb.* 1877, p. 721.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

exaltatus (C. M.) Par.

Dicranum exaltatum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 472.

Ster. — Am. merid. : Venezuela.

- exasperatus *Brid. Bryol. univ. I, p. 493; Bryol. jav. I, p. 83, t. 69.*
Dicranum exasperatum C. M. Syn. I, p. 384.
Thysanomitrium exasperatum Nees in Act. Acad. nat. Leop. XI, II, p. 134, t. 15, f. 2, a-e.
Trichostomum exasperatum Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 112, t. 184.
 — *As. : Ceylan, M. Java. Pac. : Ins. Hawai, Kau.*
- eximius *Reichdt in Exp. Novara 1870, p. 167, t. 28.*
C. introflexus Mitt. Fl. Vit. p. 385.
 — *Afr. : Ins. S. Paul. Pac. : Nov. Caledon.*
- exustus *Mitt. M. austr. am. p. 83.*
 — *Am. merid. : And. Peruv.*
- falcifolius *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. XIV, p. 78.*
 — *Afr. : Ins. S^t Paul.*
- Fendleri (*C. M.*) *Par.*
Dicranum Fendleri C. M. in Linn. 1878-79, p. 472.
 — *Am. merid. : Venezuela.*
- flescens *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1890, I, p. 169.*
Lignic. — Afr. : Madagascar.
- filicaulis (*Hpe.*) *Mitt. M. austr. am. p. 74.*
Dicranum filicaule Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., V. p. 337.
Silvic. int. musc. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- filifolius (*Hsch.*) *Mitt. M. op. cit. p. 76.*
C. cubensis Sull. in Proc. Am. Acad. August. 1861.
C. Mülleri Ltz.
Dicranum filifolium Hsch. Fl. Brasil. I, p. 12; C. M. Syn. I, p. 403.
Lignic. — Am. sept. : Cuba, Porto Rico. Am. merid. : Brasil. austr. or.
- fimbriatus *Mitt. op. cit. p. 88.*
Arbor. — Am. merid. : And. Quitens.
- flaccidus *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1893, II, p. 11.*
Ster. In sphagnet. — Afr. : Madagascar.
- flagellaceus (*C. M.*) *Mitt. op. cit. p. 77.*
Dicranum flagellaceum C. M. Syn. II, p. 597.
Ster. — Am. sept. : Mexic.
- flagelliferus (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 127.*
Dicranum flagelliferum C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 35; Mitt. M. Ind or. p. 18.
 — *As. : Summ. M. Neilgherr.*
- Flageyi *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1893, II, p. 12.*
In silv. — Afr. : Madagascar.
- flavescens *Rehm. M. Afr. austr. n. 445.*
 — *Afr. : Transvaal.*
- flavicoma *C. M. in Dusen M. Camer. n. 299.*
 — *Afr. : M. Cameroon.*
- flavissimus (*C. M.*) *Par.*
Dicranum flavissimum C. M. in Fl. 1885, p. 409.
Ster. — Am. merid. : Fuegia.

flexifolius (Hsch.) *Bryol. jav. I*, p. 76.

Dicranum flexifolium Hsch. in *Schwaegr. Suppl. II, II, II*, p. 115, t. 185; *C. M. Syn. I*, p. 399.

D. flexuosum Hsch. in *Nov. Act. Leop. XIV, II, Suppl.* p. 703?

— *As.* : Java.

flexuosus (L.) *Brid. Bryol. univ. I*, p. 469 p.p.; *Bryol. eur. I* (mon. p. 3) t. 89; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 102.

Bryum flexuosum L. *Sp. Pl.* p. 1583 p.p.

Br. immersum Dicks. *Pl. crypt. Fasc. IV*, p. 13.

Br. pilosum molle, setis intortis *Dill. Hist. M.* p. 373, t. 47, f. 33 F. G.

Dicranum flexuosum Hedw. *Sp. M.* p. 146, t. 38, f. 1-6 p.p.; *C. M. Syn. I*, p. 400.

D. palustre la Pyl. in *Brid. op. cit. I*, p. 814 (fid. *C. M.*)

Thysanomitrium flexuosum W. Arn. *Disp. M.* p. 33 (excl. var.).

Weisia immersa *Brid. Sp. M. I*, p. 124.

Ad terr. et saxa silic. — *Eur.* : Reg. campestr. montos. silvat. ; copios. in Vogeso et Silva Nigra. *Afr.* : Alger. ; *Abyssin. Pac.* : Austral. fel.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 85, 576, 976.

W. Schimp. Un. itin. n. 456.

var. *major* Boul. — *C. flexuosus* var. *zonatus*.

« var. *pachyneuros* Mdo. *Moost. a. d. Algov. Alp.* 1865.

Ut typ. — *Eur.* : Alp. Alg., Bavar.

« var. *zonatus* (Mdo.) *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 391.

C. flexuosus β *major* Boul. *M. Fr.* p. 511.

C. zonatus Mdo. *Bayern's Laubm.* p. 53.

Ut typ. — *Eur.* : Bavar.

flexuosus { *Brid. p.p.* — *C. torfaceus*.
Mont. — *C. caudatus*.
Sull. — *Dicranodontium Millspaughii*.

fragilis (Dicks.) *Bryol. eur. I* (mon. p. 4) t. 90; *W. P. Sch. l. c.*

Bryum fragile Dicks. *Pl. crypt. Fasc. III*, p. 5.

C. Arduennae Libert in *Pl. exs. crypt. Arduenn.*

C. densus *Bryol. eur. l. c.* p. 6 et t. 93.

C. densus β *fragilis* Wils. *Bryol. brit.*

C. fragilis var. *densus* Wulfsb. in *Christiania Vid. Selsk. Forh* 1875?

C. penicillatus Rog. in *Brid. Bryol. univ. I*, p. 478.

Dicranum densum Funk. *cent. n.* 634.

D. Funkii *C. M. Syn. I*, p. 392 et *II*, p. 598.

D. flexuosum β *fragile* Turn. *Muscol. hib.* p. 74.

D. Schleicheri *C. M. Syn. I*, p. 393.

In fissur. rup. arenac. et granitic. — *Eur.* : Britann., Voges., Silva Nigra, Hercyn., Francon., Helvet. occid. ? *As.* : Caucas., M Neilgherr. *Afr.* : Madeira.

Exs. : Mandon *Pl. Madeir.* n. 4.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 504.

var. *densus* Wulfsb. — *C. fragilis*?

friabilis (Hpe.) *Jaeg. Ad. I*, p. 136.

Dicranum friabile Hpe. *mss.* ; *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 220.

— *Am. sept.* : Costa Rica.

frigidus Lesq. in *Port. et Coult. Fl. of Colorado*, p. 155; *Lesq. et Jam. Man.* p. 79.

Ster.

— *Am. sept.* : Summ. M. Colorado.

funalis Brid. — *Grimmia*.

fuscatus Besch. in *Journ. de Bot.* 1891, p.

Ster. — *Am. merid.* : Monte Video.

fusco-croceus (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 646.

Dicranum fusco-croceum Hpe. *Symb.* 1872, p. 45.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Gardneri (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 83.

Dicranum flexuosum var. *Vils. in Gardn. M. Brasil.* n. 20.

D. Gardneri C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 379.

Rupic. — *Am. merid.* : Brasil.

Gaudichaudii Besch. in *Journ. de Bot.* 1891, p.

Ster. — *Am. merid.* : Chile.

geniculatus Ångstr. in *Oefv.* 1872, n. 4, p. 18.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

giganteus Sull. — *C. penicillatus*.

Glaziovii (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 649.

Dicranum Glaziovii Hpe. *Symb.* 1874, p. 488.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Goughii (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 128.

C. compactus Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 297 p.p.

Dicranum Goughii Mitt. *M. Ind. or.* p. 17.

— *As.* : Nepal., Sikkim, Khasia, M. Neilgherr.,
Ceylan.

gracilicaulis (Mitt.) *M. austr. am.* p. 83.

Terr. — *Am. sept.* : Florid. merid. : *Am. merid.* : Amazon., And.
Peruv.

gracilis (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 131.

Dicranum gracile Mitt. *M. Ind. or.* p. 17.

D. sericeum Wils. in *op. et l. cc.*

— *As.* : Sikkim.

grimmiioides (C. M.) Par.

Dicranum grimmiioides C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 397.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

griseus (Hsch.) Jaeg. *Ad. I*, p. 147.

Dicranum griseum C. M. *Syn. I*, p. 406.

Thysanomitrium griseum Hsch. *Fl. Brasil, I*, p. 16.

— *Am. merid.* : Monte Video.

guadalupensis Mitt. *M. austr. am.* p. 77.

Dicranum guadalupense Brid. *Bryol. univ. I*, p. 463 ; *C. M. Syn. I*, p. 386.

♀ et fr. ign. — *Am. sept.* : Guadalup.

Hallii Lesq. in *Port. et Coult. Fl. of Color.* p. 155 ; *Lesq. et Jam.*
Man. p. 79.

Ster. — *Am. sept.* : Summ. M. Colorado.

Hartmanni W. P. Sch. — *Barbula Drummondii*.

hawaianus (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 140. (*false hawaicus*).

Dicranum hawaianum C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 328.

Ster. — *Pac.* : Ins. Hawai.

helenicus (C. M.) Jaeg. I, p. 135.

C. Sanctae Helene W. P. Sch. in sched.

Dicranum *helenicum* C. M. Syn. II, p. 599.

Filicie. — Afr. : Ins. S. Helena.

Hellerianus (Hpe.) Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 23.

Dicranum *Hellerianum* Hpe. Sp. M. nov. Mexic. in Verh. d. K. K. zool. bot. Gesells. in Wien, 7^a April. 1869.

Ster. — Am. sept. : Mexic.

hemitrichius (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 648.

Dicranum *hemitrichium* C. M. in Linn. 1874, p. 553.

Ster. — As. : Ins. Philippin.

Henrici Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1888, p. 197, t. 14.

Ster. — Am. sept. : Kansas.

Heribaudi Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1890, I, p. 168.

— Afr. : Madagascar.

heterophyllus Mitt. M. austr. am. p. 77.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

heterostachys Hpe. in Fl. 1865, n. 37.

— Am. merid. : And. Peruv.

Hildebrandtii (C. M.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 32.

Dicranum *Hildebrandtii* C. M. in Linn. 1876, p. 236.

Humic. — Afr. : Ins. Anjouan.

hispidus Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1890, I, p. 171.

Ster. Terr. argill. silic. — Afr. : Madagascar.

Hoehneli (C. M.) Par.

Dicranum *Hoehneli* C. M. in Fl. 1890, p. 473.

Ster. — Afr. : Kilima-N'Djaro.

Holomitrium (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 135.

C. capillaceus H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 543.

Dicranum *Holomitrium* C. M. Syn. I, p. 389.

— Pac. : Nov. Zeland.

Hoffmanni Ren. et Card. — Dicranum.

horridus Welw. et Duby in Mem... Genève, 1870, c. ic.

— Afr. : Angola, Loanda.

humifugus (C. M.) Par.

Dicranum *humifugum* C. M. in Linn. 1880-82.

Lignic. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

humilis Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 110 et Syll. p. 43 ; Mitt. M. austr. am. p. 76.

Dicranum *humile* C. M. Syn. I, p. 384.

Lignic. — Am. merid. : Brasil.

hygrometricus Rehm. M. Afr. austr. n. 59.

Ster. — Afr. : Orange.

Imandae Rehm. l. c. n. 43.

Ster. — Afr. : Natal.

incrassatus (Kze.) C. M. in Linn. 1844, p. 686; Mitt. op. cit. p. 89.

Dicranum incrassatum Kze. in Poepp. Pl. Chil. n. 22; C. M. Syn. I, p. 408.

— Afr. : Chile.

insititius Hook. f. et Wils. Fl. Tasm. II, p. 172, t. 172, f. 3.

C. clavatus eor. p.p. (fid. Mitt.).

— Pac. : Tasman.

intermedius Wils. — *Dicranodontium longirostre*.

interruptulus C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 36.

Ster. — Afr. : Ins. Franciae.

introflexus (Hedw.) Mitt. op. cit. p. 84; Duby Choix de crypt. ex. 1875, p. 13, t. I, f. 5 (1).

C. leucotrichus Sull. et Lesq. in Sull. Ic. M. p. 28, t. 17 et M. bor. am. II ed. n. 92.

D. introflexum Hedw. Sp. M. p. 147, t. 29; C. M. Syn. I, p. 405.

Rupic. — Am. sept. : Alabama. Am. merid. : Monte Video, ins. Maclov. Pac. : Austral. or., Nov. Zeland, Tasman., ins. Auckland, Campbell.

introflexus { Brid. p.p. — *C. aureo-nitens*.
Mitt. — *C. eximius*.
Mont. — *C. Berteroanus*.

involutus (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 122.

Dicranum involutum C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 34; Mitt. M. Ind. or. p. 18.

— As. : M. Neilgherr.

irregularis Ltz. — *Leptotrichum homomallum* var. *zonatum*.

jamaicensis Mitt. M. austr. am. p. 82.

— Am. sept. : Jamaïc.

japonicus Broth. mss.

Ster. Rupic. — As. : Japon.

Johannis Meyeri (C. M.) Par.

Dicranum Joannis Meyeri C. M. in Fl. 1888, p. 410.

Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Joinvillianus (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 646.

Dicranum Joinvillianum Hpe. Symb. 1872, p. 45.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Jucrangae Rehm. M. Afr. austr. n. 42.

Ster. — Afr. : Natal.

(1) Cl. Mitten (l. c.) huic speciei « very variable in external appearance » synonym. sequent. ducit :

C. griseus Hsch.

C. lamellatus Mont.

C. lutescens W. P. Sch.

C. polytrichoides de Not.

C. xanthophyllus Mont.

Dicranum leptocephalum C. M.

D. truncatum C. M.

Et forsan : *C. canescens* W. P. Sch. et *C. capensis* ej.

julaceus (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 648.

Dicranum julaceum Hpe. *Symb.* 1872, p. 46.

♂ et fr. ign. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

julaceus Rehm. — *C. pseudo-julaceus*.

Krauseanus (Hpe. et Ltz.) Par.

Dicranum areodictyon Hpe. et Ltz. in Krause *M. Ecuador*.

D. Krauseanum eor. in Bot. Zeit. 1869, p.

Rupic. et sphagnic. — *Am. merid.* : And. Æquator.

laete-virens (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 128.

Dicranum laete-virens C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 12.

Ster. — *Afr.* : Ins. Canar.

laetus (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 121.

Dicranum laetum Mitt. *M. Ind. or.* p. 19.

Arbor. et rupic. — *As.* : Khasia.

laevigatus W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 23.

Dicranum laevigatum C. M. *Syn. II*, p. 601.

— *Am. sept.* : Mexic.

laevigatus Brid. — *Grimmia leucophaea*.

laevis Tayl. in *Lond. Journ. of. bot.* 1846, p. 47 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 91.

Dicranum laeve C. M. *Syn. I*, p. 409.

Pilopogon piliferus Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, p. 362 (*ex ips. in litt. ad Besch. !*).

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat., M. Chimborazo et Pichincha.

lamellatus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1838, IX, p. 52 et in d'Orbigny *Voy.* p. 90 ; *Syll.* p. 43.

C. introflexus Mitt. (*fid. ipsi*).

Dicranum lamellatum C. M. *Syn. I*, p. 411.

Terr. — *Am. merid.* : Peruv.

lamellicosta W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 23.

Dicranum lamellicosta C. M. *Syn. II*, p. 60.

— *Am. sept.* : Mexic.

lamprodictyon (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 78.

Dicranum lamprodictyon Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, V, p. 131.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

laniger Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, LVI et in *Miss. sc. Cap Horn*, V, *Bot.* p. 262.

Dicranum laniger C. M. in *Fl.* 1885, p. 410.

Ster. — *Am. merid.* : Fuegia, ins Eremit.

latinervis (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 130.

Dicranum latinerve Mitt. *M. Ind. or.* p. 17.

— *As.* : Nepal. or., Sikkim, M. Neilgherr., Ceylan.

latitextus Lac. *Sp. nov. M. Archip. ind.* p. 10, t. 7 A.

— *As.* : Java.

Leanus Sull. — *Brothera*.

Lechleri W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Chil.*

Arbor. et terr. — *Am. merid.* : Valdiv,

- lepidophyllus (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 139.
C. capensis W. P. Sch. in *Breut. M. Capens.*
Dicranum lepidophyllum C. M. *Syn. I*, p. 407.
D. pudicum Hsch. in *Drege M. Capens.*
— *Afr.* : C. B. Sp.
Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 66.
- leptocephalus (C. M.) Jaeg. *l. c.*
Terr. — *Pac.* : Austral. *felix*, Nov. Zeland.
- leptodus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, *IV*, p. 111 et in *Gay Hist. Chil. Bot. crypt. t.* 3, *f.* 2; *Syll. p.* 43; *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 68; *Mitt. M. austr. am. p.* 91.
Trichostomum leptodus Mitt. in *Handb. N. Zeal. Fl. p.* 416.
— *Am. merid.* : And. *Quitens.*, Chile, Patagon. *Pac.* :
Nov. Zeland, ins. Auckland.
- leptodus Mont. p.p. — C. Richardi.
- leucochlorus (C. M.) Par.
Dicranum leucochlorum C. M. in *Fl.* 1888, p. 411.
Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- leucogaster (C. M.) Mitt. *M. austr. am. p.* 75.
Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
Dicranum filiforme Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*
D. leucogaster C. M. *Syn. I*, p. 387.
- leucotrichus Sull. et Lesq. — C. introflexus.
- Liebmanni W. P. Sch. *hb.*
Dicranum Liebmanni C. M. *Syn. II*, p. 601.
— *Am. sept.* : Mexic.
- lonchoclados C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 38.
Fr. ign. — *Rupic.* — *Afr.* . Ins. *Franciae*.
- longescens C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 40.
Ster. — *Afr.* : C. B. Sp. (*Knysma*).
- α *var. firmus* C. M. *l. c. n.* 41.
Ut et ubi praeced.
- longifolius W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 35.
Cecalyphum fasciatum P. B. *Prodr. p.* 51 ?
Dicranum arcuatum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 463 p.p. ; C. M. *Syn. I*,
p. 368 p.p.
Ster. — *Afr.* : Ins. *Borbon. Pac.* : Ins. *austral. (fid. P. B.)*.
- longipilus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 477 p.p. ; *Bryol. eur. Suppl. I-II* ; W.
P. Sch. Syn. II ed. p. 104.
C. atro-virens de Not. *Epil. p.* 221 ; *Bryol. eur. I, mon. p.* 5, *t.* 92.
Dicranum atro-virens C. M. *Syn. I*, p. 414 et *II*, p. 603.
D. ericetorum Mitt. *M. Ind. or. p.* 20 p.p.
D. flexuosum γ *piliferum* Turn. *Muscol. hib. p.* 74, *t.* V, *f.* 2.
Ster. (1) *Rupic.* — *Eur.* : Norveg. *occ.*, *Britann.*, *Ital. super.*, *Pyr.*
Afr. : M. *Cameroon (fid. Mitt.)*.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 262, 312, 505 et b, 938.

(1) *Fid. W. P. Sch. l. c.* ; non ! *fid. Limpr. Laubm. Deutschl. I, p.* 399.

« *var. falcata* (*Braithw.*) *Par.*

C. atro-virens var. falcatum *Braithw. in Husn. Muscol. gall. p. 46.*

Ut et ubi typ.

longipilus *Brid. p.p. — C. polytrichoides.*

Lorentzi C. M. in Linn. 1880-83, p. 404.

Fl. et fr. ign.

— *Am. merid. : Alp. Argentin. sub-*

tropic.

luridus W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 24.

Ster.

— *Am. sept. : Mexic. (Orizaba).*

lutescens W. P. Sch. in Besch. op. et l. cc.

Dicranum lutescens C. M. Syn. II, p. 602.

— *Am. sept. : Mexic.*

luteus (C. M.) Par.

Thysanomitrium luteum C. M. in Linn. 1878-79, p. 470.

— *Am. merid. : Venezuela.*

Mac-Leanus Rehm. M. Afr. austr. n. 447.

— *Afr. : Transvaal.*

macrophyllus (Kze.) Mitt. M. austr. am. p. 80.

Dicranum filifolium C. M. in Linn. 1844, p. 691 p.p.

Dicranum macrophyllum Kze. in Poepp. Coll. III, n. 231 ; C. M. Syn. I, p. 402.

— *Am. merid. : Peruv.*

macrotis C. M. in Dusen. M. Camer. n. 699.

— *Afr. : M. Cameroon.*

madecassus Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 33.

— *Afr. : Madagascar.*

Mandoni W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1610.

— *Am. merid. : And. Boliv.*

Marilacii Rehm. M. Afr. austr. n. 65.

Ster.

— *Afr. : C. B. Sp. (Montagu).*

matarensis Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 35.

Ster.

— *Afr. : Ins. Borbon.*

megalotus Besch. Not. M. des I. S. Paul et Amsterdam, p. 2.

Ster.

— *Afr. : Ins. S. Paul.*

micans Wulfsb. in Christiania Vid. Selsk. Forh. 1875 et in Rev. bryol. 1885, p. 15.

Rupic. — Eur. : Norveg.

microstomus Mitt. — C. porphyreodictyon.

Mildei Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 396.

C. brevitoliis de Not. Epil. p. 650 et in Erbar. critt. ital. n. 1412.

C. brevifolius forma Milde in Bot. Zeit. 1870, p. 450.

Ster. Terr. — Eur. : Ticin., lac. Major.

minor Besch. op. cit. p. 4.

— *Afr. : Ins. Amsterdam.*

minutus Lindb. in Ångstr. Prim. lin. p. 5 (nom.).

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

Mittenii (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 137.

D. erectum Mitt. in Lond. Journ. of bot. 1851, p. 53.

D. Mittenii C. M. Syn. II, p. 600.

— Am. merid. : And. Quitens. et Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1608.

mollis C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 36.

Ster. — Afr. : Natal.

montanus Welw. et Duby in Mem... Genève 1870, p. 7, t. 3, f. I.

Ster. Lignic et rupic. — Afr. : Angola.

Mülleri { Jaeg. — C. Richardi.
Jur. — C. torfaceus var. fragilis,
Ltz. — C. filifolius.

multicapsularis W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1611.

— Am. merid. : And. Boliv.

Nadaudianus Besch. in Ann. sc. nat. 1894, p.

Ad terr. et rhizom. Pteridis. — Pac. : Taïti.

nano-phyllus C. M. in Dusen M. Camer. n. 305.

— Afr. : M. Cameroon.

nano-tenax C. M. in Jaeg. Ad. II, 761.

Ster. — Afr. : Zouloulouland.

nanus C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 804 p. p.

Dicranum flexuosum var. Hsch. in Linn. 1841, p. 124.

D. nanum C. M. Syn. I, p. 383 p.p. et in Bot. Zeit. 1859, p. 189.

— Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 34.

nanus Bryol. jav. — C. subnanus.

natalensis Rehm. M. Afr. austr. n. 51.

Ster. — Afr. : Natal.

Naumanni (C. M.) Par.

Dicranum Naumanni C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 84 et in
Forschungsreise... p. 41.

Ster. — Afr. : Ins. Ascension.

nepalensis (Brid.) Jaeg. Ad. I, p. 120.

? Dicranum nepalense C. M. Syn. I, p. 384.

? Didymodon nepalensis Brid. Bryol. univ. I, p. 82.

Ster. — As. : Nepal.

Nietneri (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 136.

Dicranum latinerve Mitt. M. Ind. or. p. 17 p.p. ? (fid. C. M.)

D. Nietneri C. M. in Linn. 1869-70, p. 35.

Ster. — As. : Ceylan.

nigrescens (Miti.) Jaeg. Ad. I, p. 121.

Dicranum Dozyanum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 298.

D. exasperatum Griff. Not. p. 421 et Ic. pl. asiat. t. 94, f. I.

D. nigrescens Mitt. M. Ind. or. p. 10.

Rupic. — As. : Japon. ? Hong-Kong ? Sikkim, Khasia, Assam, Ceylan.

nigrescens Duby. — C. Richardi.

nilghiriensis (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 130.

Dicranum nilghiriense Mitt. op. v. p. 16.

D. nivale C. M. *Syn. I*, p. 393 p.p.

D. Perrottetii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1843, p. 241 p.p.

— As. : M. Neilgherr.

nitidus Dz. et Mk. *frond. ined. Arch. ind.* p. 139, t. 43.

C. uncinatus Bryol. jav. *I*, p. 78 p.p.

Dicranum nitidum Dz. et Mk. *Pl. Jungh. I*, p. 330 ; *Mitt. op. cit.* p. 16.

— As. : Borneo, Java, Ceylan.

nivalis Brid. *Bryol. univ. I*, p. 477.

Dicranum nivale C. M. *Syn. I*, p. 393 p.p. ; *Mitt. op. cit.* p. 16.

Weisia nivalis Brid. *Mant. M.* p. 48.

— Afr. : Ins. Borbon., M. Cameroon.

nodiflorus (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 144.

Dicranum nodiflorum C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 38 ; *Mitt. op. cit.* p. 21.

Ster.

— As. : M. Neilgherr.

nudus (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 125.

Dicranum nudum Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 630.

— Pac. : Austral. or.

obscurus Ångstr. in *Oefv...* 1873, n. 5, p. 119.

— Pac. : Taïti.

occultus Mitt. *M. austr. am.* p. 86.

Lignic. — Am. merid. : Brasil, austr. or.

ochrodictyon Ångstr. in *Oefv...* 1873, n. 5, p. 146.

— Afr. : Ins. S. Helena.

Ørstedtianus (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 81.

Dicranum Ørstedtianum C. M. *Syn. II*, p. 596.

Ster.

— Am. sept. : And. Costa Ricens.

orthocomus Besch in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LVII et in *Miss. sc.*

Cap Horn, V, Bot. p. 263, t. 2, f. 5.

Dicranum orthocomum C. M. in *Fl.* 1885, p. 409.

Ster.

— Am. merid. : Fuegia.

ovatus Brid. — *Grimmia commutata*.

pachycomus Besch. in *litt.*

C. bicolor ej. *Prodr. bryol. mexic* p. 22.

— Am. sept. : Mexic.

pallescent Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 32.

— Afr. : Ins. Borbon.

pallidus H. f. et W. p.p. — *C. torquatus*.

paradoxus Wils. in *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 108.

Ster. Terr. humos. torfac. — Eur. : Anglia, Belgia.

patens Brid. — *Rhacomitrium*.

pauper (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 74.

Dicranum pauper Hpe. in *Linn.* 1863, p. 137.

Terr. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

« *var. minus* (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 133.

Dicranum pauper var. minus Hpe. *l. c.*

Ut et ubi typ.

penicillatus (*Hsch.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 146.

Bartramia recurvifolia *Duby Choix de M. ex 1880*, p. 2, t. 3 (*fid Hpe. in Fl. 1880*, n. 21).

Campylopus giganteus *Sull. in Proc. Am. Acad. August. 1861*.

Dicranum concolor *C. M. in Bot. Zeit. 1844*, p. 709.

D. lamellinerve *ej. Syn. I*, p. 390; *Mitt. op. cit.* p. 81.

D. penicillatum *Hsch. Fl. Brasil. p. 13*; *C. M. op. cit.* p. 415.

— *Am. sept.* : Cuba, Jamaïc. *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

penicillatus *Rog.* — *C. fragilis*.

perincanus (*C. M.*) *Par.*

Dicranum perincanum *C. M. in Fl. 1885*, p. 410.

Terr. — *Am. merid.* : Fuegia.

perpusillus *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886*, p. 301.

C. dicranelloides *Ren. et Card. ?*

— *Afr.* : Ougogo.

Pes Funariae (*C. M.*) *Par.*

Thysonomitrium Pes Funariae *C. M. in Linn. 1884*, p. 551.

— *As.* : Ins. Philippin.

pilifer *Brid.* — *C. polytrichoides*.

pilosissimus *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 24*.

Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

piriformis *Schultz.* — *C. torfacens*.

var. Mülleri *Braithw.* — *C. torfacens var. fragilis*.

platyneuron (*Hpe.*) *Par.*

Dicranum platyneuron *Hpe. Symb. 1874*, p. 489.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

poasensis *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892*, I, p. 148.

— *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

polyanthus *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 199*.

Humic. in silv. — *Nov. Caledon.*

polytrichoides *de Not. Syll. M. p. 222*; *Bryol. eur. Suppl. I-II*, t. 4;

W. P. Sch. Syn. II ed p. 104.

C. longipilus *Brid. Bryol. univ. I*, p. 477; *p.p.*; *Bryol. eur. I* (*mon. p. 6 t. 93*).

C. pilifer *Brid. Mant. M. p. 72*.

Dicranum flexuosum var. piliferum *Turn. Musc. Hib. p. 74, t. V, f. 2 p.p.*

D. longipilum *C. M. Syn. I*, p. 411.

Saxic. et torfac. — *Eur.* : Hibern., Anglia, *Eur. occid. et merid. (ubi hucusque semper sterile)*; *Lusitan. (c. fr. ! fid. Venturi in Rev. bryol 1881, p. 19)*. *Afr.* : Alger., Madeir.

Exs. : Mandon Pl. Madeir. n. 4 bis.

Rab. Bryoth. eur. n. 507 et b, 1060.

« *var. Daldiniarius* *Jaeg. Ad. I*, p. 145.

Ut typ. — *Eur.* : Ital. super. (ad lac. Major.).

« *var. elongatus* *C. M. l. c.*

Ut typ. — *Eur.* : Gall. occid. (Andegav.).

« *var. vaporarius* *Jaeg. l. c.*

C. vaporarius *Roll. Erb. critt. n. 1210*.

Ut typ. — *Eur.* : Ital. (ins. Inarimes).

porphyreocaulis (C. M.) Par.

Dicranum porphyrocacaulon C. M. in Linn. 1880-1883, p. 472.

— Am. merid. : Venezuela.

porphyreodictyon (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 75.

C. microstomus Mitt. in Spr. Cat.

C. tenuissimus Sull. in Proc. Am. Acad. 1861.

Dicranum arctocarpum C. M. in Linn. 1847, p. 205.

D. porphyreodictyon ej. Syn. I, p. 395.

Thysanomitrium arctocarpum β Moritzianum Hpe. in Linn. 1847, p. 75.

Lignic., saxic. et terr. — Am. sept. : Cuba, Jamaïc. Am. merid. : Ins.

Trinitat., Columb., Nov. Granat., Brasil. tropic., And. Peruv.

praemorsus (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 140.

Dicranum praemorsum C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 337.

Ster. — Pac. : Ins. Hawai.

procerus (C. M.) Par.

Dicranum procerum C. M. in Fl. 1890, p. 472.

Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.

proliferus (C. M.) Mitt. op. cit. p. 85.

Dicranum proliferum C. M. Syn. II, p. 602.

Ster. — Am. merid. : Venezuela.

propinquus (Hpe.) Mitt. op. cit. p. 75.

Dicranum propinquum Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 367.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

pseudo-filifolius (C. M.) Par.

Dicranum pseudo-filifolium C. M. in Linn. 1878-79, p. 471.

— Am. merid. : Venezuela.

pseudo-julaceus Par.

C. julaceus Rehm. M. Afr. austr. n. 58.

Ster. — Afr. : Orange.

pseudo-nanus (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 120.

Dicranum pseudo-nanum C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 190.

— As. : Java.

pteroneuron (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 121.

Dicranum pteroneuron C. M. in Linn. 1869-70, p. 34.

Ster. — As. : Ceylan.

pudicus (Hsch.) Jaeg. Ad. I, p. 139.

Dicranum pudicum Hsch. in Sieb. M. Nov. Holl. n. 24 p. p. ; C. M. Syn. I, p. 407.

$\varnothing$ et fr. ign. — Pac. : Austral. or.

Puiggarii (Geh. et Hpe.) Par.

Dicranum Puiggarii Geh. et Hpe. in Fl. 1881, p.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

pulvinatus Rehm. M. Afr. austr. n. 62.

Ster. — Afr. : C. B. Sp. (Stinkwater).

pulvinatus Brid. — Grimmia.

var. tenuis Wahlenb. — Grimmia Mühlenbeckii.

purpurascens Ltz. Moost. p. 118.

Ster. — Afr. : C. B. Sp.

pusillus *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 21.*
— *Am. sept. : Mexic.*

Quintasii *Broth. in Bol. da Soc. Berter. 1890.*
Ster. — *Afr. : Ins. S. Thomas.*

Rabenii *Ltz. Moost. p. 158.*
— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

Rauei *Aust. — Dicranum Mühlenbeckii.*

reconditus (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 648.*

Sphaerothecium reconditum T. et M. in Journ. of the Linn. Soc. 1872,
p. 204.

— *As. : Ceylan.*

rectisetus (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 649.*

Dicranum rectisetum Hpe. Symb. 1874, p. 487.

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

recurvus (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 122.*

Dicranum recurvum Mitt. M. Ind. or. p. 20.

— *As. : M. Neilgherr.*

reduncus (*Hsch. et Reinw.*) *Bryol. jav. I, p. 75, t. 62.*

Dicranum Auberti Bel. Voy. Ind. p. 104.

D. concolor Nees et Bl. in Nov. Act. Leop. XI, I, p. 133, t. 16.

D. reduncum H. et R. ibid. XIV, II, Suppl. p. 703; C. M. Syn. I, p. 396
et II, p. 599; Mitt. op. cit. p. 18.

D. sinuosum Brid. Bryol. univ. I, p. 427, p.p.

Terr. — As. : Ceylan, Java.

Richardi Brid. Bryol. univ. I, p. 474; Mitt. M. austr. am. p. 90.

C. leptodus Mont. p.p.

C. Mülleri Jaeg. Ad. I, p. 146.

C. nigrescens Duby Choix de Crypt. ex. 1867, t. I, f. I.

Dicranum Richardi C. M. Syn. I, p. 413.

Thysanomitrium Mülleri Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 363.

Th. Richardi Schwaegr. Suppl. II, I, p. 61, t. 118.

Rupic. et terr. — Am. sept. : Costa Rica, Guadalup. Am. merid.

And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv. ; Chile.

rigidiusculus (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 136.*

Dicranum rigidiusculum Hpe. Symb. 1870, p. 272.

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

rigidus (*Hsch.*) *Jaeg. Ad. I, p. 147.*

Dicranum rigidum C. M. Syn. I, p. 409.

Thysanomitrium rigidum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 15.

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

ripicolus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 38.*

Ster. — *Afr. : Ins. Borbon.*

rosulatus (*Hpe.*) *Mitt. op. cit. p. 79.*

Dicranum rosulatum Hpe. in Linn. 1863, p. 139.

Terr. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

rugosus *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 198.*

Arbor. in silv. — Pac. : Nov. Caled.

Robillardi Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 34.

Ster. — *Afr. : Ins. Franciaë, Nossi-Be.*

- Saddleanus *Besch. in Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, *LVIII et in Miss. sc. Cap Horn*, V, Bot. p. 264, t. 2, f. 6.
 Dicranum Saddleanum *C. M. in Fl.* 1885, p. 407.
 Ster. — *Am. merid.* : Fuegia.
- Sancti Caroli *Besch. in Journ. de Bot.* 1891, p.
 — *Am. merid.* : Chile austr.
- Sauteri *Mdo. in sched.* ; *Jaeg. Ad. I*, p. 129.
C. Schimperi (fid. Limpr. Deutschl. Laubm. p. 381).
 — *Eur.* : Alp. Austriae.
- savannarum (*C. M.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 85.
 Dicranum savannarum *C. M. Syn. II*, p. 596.
 Ster. Terr. — *Am. merid.* : Guian. batav.
- saxicola *Brid.* — *Campylosteleum*.
- scabrellus *Mitt. op. cit.* p. 86.
 — *Am. merid.* : Brasil.
- Schemkei *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 39.
 Ster. — *Afr.* : C. B. Sp. (Montagu).
- Schimperi *Milde in Bot. Zeit.* 1864, *Beil.* p. 13 ; *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 658, *II ed.* p. 107.
C. subulatus var. Schimperi Husn. Muscol. gall. p. 43.
 Ad rup. humid. — *Eur.* : Ins. Shetland, Scot., Scandin., Salisb., Stir., Carinth., Alp. Algov., Tirol., Alp. Pyr. As. : Caucas. *Am. sept.* : Groenland.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. p. 658, 1113.
- Schmidii (*C. M.*) *Jaeg. I*, p. 143.
 Dicranum Schmidii *C. M. in Bot. Zeit* 1853, p. 37 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 21.
 — *As.* : M. Neilgherr.
- Schwaegrichenii *Duby in Mem...* Genève, 1869, p. 10, t. IV, f. 2.
C. trachyblepharon C. M. ?
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Schwartzii *Bryol. eur. Suppl. I-II*, t. I ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 105.
 Ster. Ad rup. irror. — *Eur.* : Norveg. occid., Hibern., Scot., Rhaet., Tirol., Salisb.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 935.
- sciuroides *Welw. et Duby in Mem...* Genève, 1870, p. 6, t. XI, f. 4.
 Ster. Rupic. — *Afr.* : Angola.
- scottianus *Brid.* — *Dicranum*.
- Sellowianus (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 649.
 Dicranum Sellowianum *Hpe. Symb.* 1872, p. 43.
 Thysanomitrium scabrisetum *ej. Ic. M. t.* 23 B.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- semidorsus *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 45.
 Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.
- serratus *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. II*, t. 7 B.
 — *As.* : Ins. Banca.
- setaceo-rigidus (*Hpe.*) *Par.*
 Dicranum setaceo-rigidum *Hpe. Symb.* 1877, p. 721.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

- setifolius Wils. *Bryol. brit. II ed. p. 89, t. 40*; *Bryol. eur. Suppl. III-IV t. 6*; W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 106*.
 Ster. Ad rup. et in turfis. — *Eur.*: Hibern., ins. Skye.
Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n. 1059*.
- Shawi Wils. in W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 851*.
 Fl. et fr. ign. — *Eur.*: Ins. Hebrid.
- « *var. hamata* W. P. Sch. *l. c.*
 Ut et ubi typ.
- smaragdinus (Brid.) Jaeg. *Ad. I, p. 136*.
 Dicranum smaragdinum C. M. *Syn. I, p. 401*.
 Didymon smaragdinus Brid. *Bryol. univ. I, p. 819*.
 Ster. — *Afr.*: Ins. Ascension.
- sordidus Jaeg. — India.
- Spegazzinii (C. M.) Par.
 Dicranum Spegazzinii C. M. in *Fl. 1885, p. 410*.
 Ster. In prat. turfis. — *Am. merid.*: Fuegia.
- Sprucei Mitt. *M. austr. am. p. 81*.
 — *Am. merid.*: Amazon.
- squalidus Brid. — *Rhacomitrium lanuginosum var. squalida*.
- stenocarpus (Hpe.) Jaeg. *Ad. I, p. 138*.
 C. arctocarpus Mitt. *op. cit. p. 87 p.p.*
 Dicranum stenocarpum C. M. *Syn. II, p. 600*.
 D. stenopus ej. *op. cit. I, p. 401 (excl. syn. Thysanomitrio scabriseto)*.
 Thysanomitrium stenocarpum Hpe. *l. c. M. t. 23 A.*
 — *Am. merid.*: Monte Video.
- stenopelma C. M. in Rehm. *M. Afr. austr. n. 52*.
 — *Afr.*: C. B. Sp.
- stramineus (Mitt.) Jaeg. *Ad. I, p. 546*.
 Dicranum stramineum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 143*.
 — *Afr.*: M. Cameroon.
Exs.: Dusen M. Camer. n. 349.
- strictifolius Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn. 1891, n. 5*.
 Ster. Arbor? — *Am. merid.*: Minas Geraes.
- strictus W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 23*.
 Ster. — *Am. sept.*: Mexic.
- strictus C. M. — C. erectus.
- subarctocarpus (Hpe.) Par.
 Dicranum subarctocarpum Hpe. *Symb. 1877, p. 719*.
 — *Am. merid.*: Brasil, austr. or.
- subbartramiaceus C. M. in Rehm. *M. Afr. austr. n. 55*.
 Ster. — *Afr.*: C. B. Sp.
- subbrachyphyllus Par.
 C. brachyphyllus C. M. in Dusen M. Camer. n. 655.
 — *Afr.*: M. Cameroon.
- subconcolor (Hpe.) Mitt. *M. austr. am. p. 86*.
 Dicranum subconcolor Hpe. in *Linn. 1863, p. 138*.
 Terr. — *Am. merid.*: Anl. Nov. Granat.

- subcuspidatus (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 145
Dicranum subcuspidatum *Hpe. Symb.* 1870, p. 273.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subexasperatus (*C. M.*) *Par.*
Dicranum subexasperatum *C. M. in Linn.* 1874, p. 169.
 — *As.* : *M. ins.* Phillippin.
- subfalcatus (*Hsch.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 146.
Dicranum subfalcatum *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. 13 ; *C. M. Syn. I*, p. 415.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil.
- subflexuosus *Par.*
C. abyssinicus *W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss.*
 — *Afr.* : Abyssin.
- subgriseus (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 648.
Dicranum subgriseum *Hpe. Symb.* 1872, p. 47.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subincrassatus (*Hpe.*) *Jaeg. l. c.*
Dicranum subincrassatum *Hpe. l. c.*
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subleucogaster (*C. M.*) *Lesq. et Jam. Man.* p. 79.
Dicranum subleucogaster *C. M. in Bull. Torr. bot. Club, V*, p. 50.
 Ster. Terr. argill. humid. — *Am. sept.* : Alabama.
- subluteus (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 121.
Dicranum subluteum *Mitt. M. Ind. or.* p. 19.
 Ster. — *As.* : Ind. or., penins. Malacc.
- subnanus (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 119.
C. flexuosum *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind.* p. 138 ?
C. nanus *Bryol. jav. I*, p. 74, t. 61.
Dicranum nanum *C. M. Syn. I*, p. 384 p.p.
D. subnanum *ej. in Bot. Zeit.* p. 190.
 — *As.* : Java, ins. Sundaëns., Borneo. *Pac.* : Ins.
 Sandwic., Nov. Caledon.
- subpolyanthus (*C. M.*) *Par.*
Dicranum subpolyanthum *C. M. in Rev. bryol.* 1887, p. 51 (nom.)
 — *Pac.* : Nov. Caledon.
- subproliferus *C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 149.
 In silvis. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.
- subreconditus (*Geh. et Hpe.*) *Par.*
Dicranum subreconditum *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881, p.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subsecundus *Lindb. mss.* ; *Ångstr. in Oefv...* 1876, n. 4, p. 5.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subtorquatus *C. M. in Rev. bryol.* 1876, p. 3 (nom.)
 — *Pac.* : Austral. (Nova Valesia).
- subtricolor *Ltz. Moost.* p. 159.
 Ster. — *As.* : India.
- subulatus *W. P. Sch.* — *C. brevifolius*.
 var. *Schimperi* *Husn.* — *C. brevifolius* var. *Schimperi*.

subulifolius *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 297.

— *As.* : Ceylan.

surinamensis *C. M. in Linn.* 1848, p. 186.

Dicranum surinamense *ej. Syn. I*, p. 386.

♂ et fr. ign. *Terr.* — *Am. merid.* : Guian. batav.

tallulensis *Sull. et Lesq. in Sull. Ic. M.* p. 27, t. 17; *Lesq. et Jam. Man.* p. 78.

Ster. Ad rup. irror. — *Am. sept.* : Georgia.

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am.* I ed. n. 73 b, II ed. n. 93.

tenax *Rehm. M. Afr. austr. n.* 54.

Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.

tenuissimus *Sull.* — *C. porphyreodictyon.*

terebrifolius (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 649.

Dicranum terebrifolium *C. M. in Linn.* 1874, p. 593.

Ster. — *Am. merid.* : M. Pichincha.

tenuis *Wils.* — *Campylopodium khasianum.*

Thwaitesii (*Mitt.*) *Par.*

Dicranum Thwaitesii *Mitt. M. Ind. or.* p. 19.

Ster. — *As.* : Ceylan.

torfaceus *Bryol. eur. I* (mon. p. 4) t. 91; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 103.

Bryum flexuosum *L. Sp. pl.* p. 1593 p.p.

C. flexuosus *Brid. Bryol. univ. I*, p. 469 p.p.

C. piriformis *Schultz Fl. Starg. Suppl.* p. 73; *Brid. l. c.* p. 471.

Dicranum flexuosum var. *Schultz op. cit.* p. 298.

D. pinetorum *Griff. Not. p.* 419 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 94, f. 3.

D. torfaceum *C. M. Syn. I*, p. 399.

Thysanomitrium piriforme *Rab. Deutschl. krypt. Fl. II, III*, p. 140.

In turfis. — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Khasia.

Exs. : *Rab. Bryol. eur.* n. 506.

« *var. alpicola* (*Jaeg.*) *Par.*

C. alpicola *Jaeg. Ad. I*, p. 96.

C. torfaceus *W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss. II coll.*, n. 12.

Cephalogonium densum *W. P. Sch. in Jaeg. Ad. II*, p. 650?

Dicranum alpicolum *C. M. in Bot. Zeit.* 1858, p. 161.

— *Afr.* : Summ. Alp. Abyssin.

« *var. fragilis* *Jur. Laubm. Oesterr. Ung.* p. 56.

C. Mülleri *ej. in sched.*; *Milde Bryol. siles.* p. 77.

C. piriformis β *Mülleri Braithw. Brit. Moosfl.* p. 128.

Ut typ. — *Eur.* : Westphal.

torfaceus *W. P. Sch.* — *C. torfaceus* *var. alpicola.*

torquatus *Mitt. Fl. Tasm.* p. 173.

C. pallidus *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 68, t. 84, f. 3 p.p.; *Handb.* p. 414.

Dicranum flexuosum *C. M. in Adnot. ad M. Mossmann. in Bot. Zeit.* 1851, p. 551 (*fid. Mitt.*).

D. torfaceum *Mitt. in Hook. Kew Misc.* 1856, p. 257.

D. torquatum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 69.

Ster. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman., ins.

Campbell.

trachyblepharon (*C. M.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 80.

C. Schwaegrichenii *Duby?*

Dicranum concolor *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. II.

D. trachyblepharon *C. M. Syn. I*, p. 389.

— *Am. merid.* : Brasil.

trachythecius (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 127.)

Dicranum trachythecium C. M. in Linn. 1869-70, p. 33.

— As. : Ceylan.

transvaaliensis Rehm. M. Afr. austr. n. 450.

Ster. — Afr. : Transvaal.

trichodes Ltz. Moosst. p. 159.

Ster. — Afr. : Orange, C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 56 et b.

tricolor (C. M.) Par.

Dicranum tricolor C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 36 ; Mitt. M. Ind. or. p. 21.

As. : M. Neilgherr.

truncatus C. M. in Linn. 1844, p. 687.

C. xanthophyllus Mont. in Ann. sc. nat. 1845, p. III, et in Gay Hist.

Chil. Bot. crypt. t. 4, f. 2 ; Syll. p. 43.

Dicranum truncatum C. M. Syn. I, p. 410.

— Am. merid. : Chile austr. Pac. : Nov. Zeland.

umbellatus W. Arn. Disp. p. 34.

Trichostomum umbellatum Schwaegr. in Freycinet Voy. Bot., p. 224.

— Pac. : Ins. Hawaï.

uncinatus Bryol. jav. p.p. } — C. nitidus.
 } — Dicranodontium.

Valentini Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 37.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

Vernieri Duby in Mem... Genève, 1875, p. 12, t. 2, f. 5.

Arbor. — Pac. : Taïti.

verrucosus Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 200.

— Pac. : Nov. Caledon.

verticillatus (Hpe.) Par.

Dicranum verticillatum Hpe. Enum. M. Brasil. p. 19.

— Am. merid. : Monte Video.

villicaulis (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 645.

Dicranum villicaule Hpe. Symb. 1872, p. 44.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or

virescens Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 36.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

virginicus Lesq. et Jam. Man. p. 80.

Dicranum virginicum Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p. 150.

Ster. — Am. sept. : Virgin. occid.

viridatulus C. M. in Dusen M. Camer. n. 132.

— Afr. : M. Cameroon.

viridis Sull. et Lesq. — Dicranum.

Vitzliputzli Ltz. Moost. p. 158.

— Am. sept. : Mexic.

Walkeri (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 133.

Dicranum Walkeri Mitt. M. Ind. or. p. 18.

— As. : Ceylan.

Wallisii *Sb. in Jaeg. Ad. II*, p. 646.

Dicranum purpurascens *C. M. in Linn.* 1874, p. 552.
Ster. — *As.* : Ins. Philippin.

Wawreanus *Reichdt. Beitr...* p. 565.
Terr. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

Weddelii *Besch. in Journ. de bot.* 1891, p.
Ster. — *Am. merid.* : Peruv.

Widgrenii (*C. M.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 88.
Dicranum Widgrenii *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 418.
— *Am. merid.* : Brasil.

xanthophyllus Mont. — *C. truncatus*.

Zollingerianus (*C. M.*) *Bryol. jav. I*, p. 77, t. 64.
Dicranum Zollingerianum *C. M. Syn. II*, p. 599.
Rupic. — *As.* : Java, Sumbawa.

zonatus Mdo. — *C. flexuosus var. zonatus*.

zygodonticarpus (*C. M.*) *Par.*
Dicranum zygodonticarpum *C. M. in Linn.* 1879-80, p. 471.
— *Am. merid.* : Venezuela (1).

CAMPYLOSTELEUM *Bryol. eur. II* (3 sp.)

americanum Solms. — *C. saxicola*.

saxicola (*Web. et Mohr.*) *Bryol. eur. II* (mon. p. 3), t. 116; *C. M. Syn.*
I, p. 417 et *II*, p. 603; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 133.

Campylopus saxicola *Brid. Mant. M.* p. 72.

Campylosteleum americanum Solms *in Jaeg. Ad. I*, p. 176.

Dicranum saxicola *W. et M. Bot. Taschb.* p. 167.

Dryptodon saxicola *Brid. Bryol. univ. I*, p. 770.

Grimmia geniculata *Schwaegr. Suppl. I, I*, p. 82, t. 22; *Brid. op. c.* p. 189.

Gr. saxicola *H. et T. Muscol. brit. II ed.* p. 87, t. 13.

Ptychomitrium geniculatum *Hpe. in Fl.* 1837.

Trichostomum saxicola *Hsch. in Spreng. Syst. veg. IV*, p. 171.

Weisia saxicola *Brid. Mant. M.* p. 38.

1. Ad saxa aren. et granit. humid. — *Eur.* : Hibern., Anglia; media
valde sporadice : Galic., Bohem., Saxon., Austr. sup. et inf., Siles.,
German., vall. Rhen., Tirol., Helvet.; Ital. (Como); in Scand.
deest *Am. sept.* : Ins. Prince Edouard, Massachussets, Kentucky.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 415, 613.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.*, n. 114.

strictum Solms *Laub. Tent. bryol. geogr. Algarv.* p. 42; *W. P. Sch.*
Syn. II ed. p. 134.

Weisia Welwitschii *W. P. Sch. l. c.* p. 52.

1. In fissur. rup. granit. — *Eur.* : Lusitania (pr. Mouchique Algarb.)

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

C. convolutus *Angstr.*

C. ericetorum *Mitt. (forsan C.*
Dozyanus).

C. latifolius *Rehm.*

C. latipilis *C. M.*

C. leucobasis *C. M.*

C. madeirensis *Geh.*

C. pycnangius *C. M.*

C. rectipilis *C. M.*

C. rigescens *C. M.*

C. subchlorophyllus *C. M.*

C. subclavatus (*Rehm.*) (an *C. pseudo-*
clavatus?)

C. substygicus *C. M.*

C. Woolsi *C. M.*

venezuelianum Dz. et Mk. *Prodr. fl. bryol. Surinam*, p. 38, t. 5.
2. — *Am. merid.* : Venezuela.

Capillidium C. M. in *Linn.* 1878-79 (sect. AEROBRYI).

Carpoëcia Vent. in *Rev. bryol.* 1881, p. 20 (sect. CAMPYLOPODIS).

Catagonium C. M. in *Fl.* 1885, p. 425 (sect. HYPNI).

Catenularia C. M. in *op. cit.* p. 411 (sect. PHILONOTIDIS.)

CATHARINEA Ehrh. *Beitr.* I, p. 178.

Abriaquiae C. M. — Polytrichadelphus.

aloides Roehl. — Pogonatum.

alpina Roehl. — Pogonatum.

androgyna C. M. — Atrichum.

angustata Brid. — Atrichum.

anomala Bryhn. — Atrichum Haussknechtii.

antarctica C. M. — Psilopilum.

aristata Hpe. — Polytrichadelphus.

Arnoldi Hpe. — Polytrichadelphus.

Australasiae Hpe. — Polytrichadelphus.

callibryon Ehrh. — Atrichum undulatum.

bogotensis Hpe. — Atrichum.

canaliculata C. M. — Oligotrichum.

ciliata C. M. — Polytrichadelphus.

compressa C. M. — Psilopilum.

crispa Jam. — Atrichum.

β *densifolia* Lindb. — Atrichum crispum var. densifolia.

dendroides Hpe. — Polytrichadelphus.

Dixoni Braithw. — Polytrichum gracile.

Ehrhardti Voit. — Atrichum undulatum.

erosa Hpe. — Oligotrichum.

flaviseta Wils. p.p. — Atrichum.

glabrata Hook. — Psilopilum arcticum.

gymnostoma C. M. — Psilopilum arcticum.

Haussknechtii Broth. — Atrichum.

hercynica Ehrh. — Oligotrichum.

β *sancta* Brid. — Oligotrichum hercynicum ?

innovans C. M. — Polytrichadelphus.

intermedia Bel. — Pogonatum Belangeri.

javanica Hpe. — Oligotrichum hercynicum ?

laevifolia Lindb. et Arn. — Atrichum.

laevigata Brid. — Psilopilum arcticum.

lateralis Valz. — Atrichum Haussknechtii.

magellanica } Brid. — Polytrichadelphus.

 } C. M. (Syn. 11, p. 560). — Polytrichadelphus semi-angulatus.

Molinae C. M. — Oligotrichum.

Mülleri C. M. et Hpe. — Atrichum.

nana Roehl. — Pogonatum.

Nietneri C. M. — Oligotrichum.

obtusata C. M. — Atrichum.

Erstedtiana C. M. — Atrichum.

piriformis Hpe. — Psilopilum.

planifolia C. M. — Atrichum.

polycarpa W. P. Sch. — Atrichum.

pseudo-polytrichum Raddi. — Polytrichadelphus magellanicus.

- pulverulenta* Roehl. — Pogonatum urnigerum.
Riedeliana Hpe. — Oligotrichum.
sancta Brid. — Oligotrichum hereynicum?
semi-angulata Hpe. — Polytrichadelphus.
semi-lamellata Hpe. — Oligotrichum.
squamosa C. M. — Polytrichadelphus.
subserrata Lindb. — Atrichum undulatum *var.* subserrata.
sudetica Presl. — Oligotrichum hereynicum.
tapes C. M. — Psilopilum.
tenella Roehl. — Atrichum.
tenuirostris Brid. — Oligotrichum.
tschutschica C. M. — Psilopilum.
Trianae C. M. — Polytrichadelphus.
trichodon C. M. — Psilopilum.
undulata Roehl. — Atrichum.
var. abbreviata C. M. — Atrichum undulatum *var.* abbreviata.
var. attenuata C. M. — Atrichum undulatum *var.* attenuata.
var. brevilamellosa C. M. — Atrichum polycarpum.
var. minor { Hüb. — Atrichum tenellum.
 { W. et M. — Atrichum undulatum *var.* abbreviata.
var. subserrata C. M. — Atrichum undulatum *var.* abbreviata.
Valenciae C. M. — Polytrichadelphus.
xanthopelma C. M. — Atrichum.

Catharinella C. M. *Syn. I*, p. 213 (sect. POLYTRICHI).

CATHAROMNIUM Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 119.
ciliatum H. f. et W. — Hypoterygium.

CATOSCOPIUM Brid. *Mant. M. I*, p. 368 (1 sp.).

Martianum Hüb. — Oreas.

nigritum (Hedw.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 368; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 4), t. 313; C. M. *Syn. I*, p. 510; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 498.

Bryum nigritum Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 9.

Grimmia nigrita Sm. *Fl. brit. III*, p. 1195.

Weisia nigrita Hedw. *M. frond. III*, p. 97, t. 39; *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 73.

2. In ericet. turf. et fissur. rup. — *Eur.* : Sporad. in zon. intermed., capiosiss. in Alp. reg. septent. et arct. : Spitzberg, ins. Ursorum, Norveg., Neerland., Anglia. *As.* : Jenissei infer. *Am. sept.* : Groenland., sin. Hudson, Terra nov., lac. Super., Huron, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 154.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 128.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 249.

Un itin. 1863, n. 51; 1867, n. 86.

CECALYPHUM P. B. *Prodr.* p. 50.

calycinum P. B. — Holomitrium

condensatum P. B. — Dieranum spurium.

cylindraceum P. B. — Holomitrium vaginatum.

dichotomum P. B. — Dieranum.

fasciatum P. B. — Campylopus longifolius?

longirostratum P. B. — Dieranum scoparium.

multiflorum P. B. — Cynodontium polycarpum.

perichaetiale P. B. — Holomitrium.

- sciuroides* P. B. — *Leucodon*.
scoparium P. B. — *Dicranum*.
scrofulosum P. B. — *Dicranum falcatum*.
 ? *semi-completum* P. B. — *Conomitrium Hedwigii*.
spurium P. B. — *Dicranum*.
strumiferum P. B. — *Cynodontium polycarpum* var. *strumiferum*.
tortile P. B. — *Ptychomitrium polyphyllum*.
undulatum P. B. — *Dicranum Schraderi*.

CEPHALOGONIUM W. P. Sch. in *Jaeg. Ad. II*, p. 650.

densum W. P. Sch. — *Campylopus torfaceus* var. *alpicola*?

CEPHALOTRICHUM Br. et Sch. in W. Sch. *M. Abyss. et Bryol. eur. IV*.

oligodus Br. et Sch. — *Pogonatum*.

simense Eor. — *Pogonatum*.

CERATODON Brid. *Bryol. univ. I*, p. 480 (18 sp.).

amblyocalyx C. M. — *C. purpureus* var. *amblyocalyx*.

brasiliensis Hpe. *Symb.* 1872, p. 39.

2. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

calycinus Hpe. in *Reichdt. Exp. Novara*.

C. purpureus Mitt. *Fl. Vit.*, p. 385.

— *Afr.* : Ins. S. Paul.

capensis W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

Pottia ceratodonteia C. M.?

— *Afr.* : C. B. Sp.

chloropus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 486; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 136.

Cheilothela chloropus Lindb. in *Ulk. till...* 1878.

Dicranum chloropus Brid. *Mant. M.* p. 70 (*emend.*).

Didymodon ictericus de Not. *Spic.* p. 13.

Trichostomum strictum *Bryol. eur. II* (*mon. p.*), t. 177; C. M.

Syn. I, p. 576.

2. Terr. — *Eur.* : Galloprov., Sardin., Etrur., Roma. *Afr.* : Alger.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 1258.

condensatus W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

Leptotrichum Vallis Gratiae Hpe. in *sched.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

conicus Lindb. — *Trichostomum*.

convolutus *Reichdt. in Novara Exp., Bot. I*, p. 171.

C. purpureus H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 75.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

corralensis Jaeg. — *Zygodon*.

corsicus *Bryol. eur. II* (*mon. p.*) t. 191; C. M. *Syn. II*, p. 633.

2. Loc. steril. — *Eur.* : Galloprov., Corsic., Sardin., Algarb. *Afr.* :

C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 122.

crassinervis Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 187.

2. Terr. — *Am. merid.* : Valdiv. *Pac.* : Tasman.

cylindricus *Bryol. eur.* — *Trichodon*.

dimorphus *Philib. in Rev. bryol.* 1888, p. 28.

2. Muric. — *Eur.*: Alp. Vales., Simplon.

heterophyllus *Kindb. in Mac. Cat.* p. 261.

2. Terr. — *Am. sept.*: Fret. Behring.

javanicus Dz. et Mk. — *C. purpureus*.

kerguelensis *C. M. in Forschungsreise...* p. 3 (nom.).

— *Afr.*: Ins. Kerguelen.

minor *Aust. in Coult. Bot. Gaz. II*, p. 89; *Lesq. et Jam. Man.* p. 92.

2. Terr. humid. — *Am. sept.*: Columb. brit., ins. Vancouver.

novo-granatensis *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III*, p.

— *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

oblongus *Lindb. in Oefv...* 1866, p. 554.

Trichodon oblongus *ej. Trichost. eur.* p. 15.

Trichostomum cylindricum *ej. in Oefv...* XVIII, p. 190, n. 18.

2. — *Eur.*: Spitzberg.

perichaetialis *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 30 (nom.)

— *Am. sept.*: Mexic.

purpureus (L.) *Brid. Bryol. univ. I*, p. 480 (incl. var. $\beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta$?);

Bryol. eur. II (mon. p. 5), t. 189 et 190; *C. M. Syn. I*, p. 646; *W.*

P. Sch. Syn. II ed. p. 632.

Barbula Saussuriana *Brid. Mant. M.* p. 94.

Bryum basiflorum *Gmel. Syst. nat. II*, p. 1332.

Br. bipartitum *Dicks. Fasc. II Pl. crypt.* p. 7.

Br. Celsii *L. Sp. pl.* p. 1585.

Br. papillosum *Dicks. Fasc. IV Pl. crypt.* p. 12, t. XI, f. 5.

Br. parvum surculis et setis geminatis *Dill. Hist. M.* p. 385, t. 49, f. 50.

Br. polytrichoides palustre, setis longioribus rubris sericeis *ej. op. cit.* p. 387, t. 49, f. 52.

Br. purpureum *Neck. Meth. M.* p. 211.

Br. strictum *Dicks. op. cit.* p. 13.

Br. tenue *ej. Fasc. III Pl. crypt.* p. 8.

Br. tenue, stellatum, setis purpureis *Dill. op. cit.* p. 386, t. 49, f. 51.

Br. trichodes acaulon minimum setis et capsulis oblongis *ej. op. cit.* p. 388 t. 49, f. 54.

Ceratodon javanicus *Dz. et Mk. Pl. Jungh. I*, p. 337.

Dicranum bipartitum *Sm. Fl. brit. III*, p. 1218.

D. Celsii *Hedw. Sp. M.* p. 149, t. 33, f. 1-4.

D. intermedium *ej. op. cit.* p. 138, t. 31, f. 1-6.

D. longisetum *Brid. M. Rec. II, I*, p. 66.

D. palustre *ej. op. cit.* p. 174.

D. purpurascens *Hedw. op. cit.* p. 137, t. 35, f. 1-7.

D. purpureum *ej. op. cit.* p. 136, t. 36.

D. strictum *Sm. op. et l. cc.*

Didymodon papillosus *Brid. Sp. M. I*, p. 160.

D. purpureus *H. et T. Muscol. brit.* p. 65, t. 20; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 116.

Fuscina purpurea *Schrank Baiers. Fl. II*, p. 453.

Mnium purpureum *L. Sp. pl.* p. 1571.

Tortula Saussuriana *Brid. M. Rec. II, I*, p. 203.

Trichostomum basiflorum *Schrank op. cit.* p. 449.

Tr. krintjingianum *Dz. et Mk. in Zoll. Syst. Verz.* p.p. 25 et 31.

Tr. papillosum *Sm. op. cit.* p. 1238.

Tr. purpureum *de Not. Epil.*

Tr. tortum *Schrank op. et l. cc.*

2. In ericet., agger., ad mur., etc. — Per totam orb. fere terrar.: a Spitzberg, ins. Urior. et Groenland. ad reg. antarct.

Exs. : Bourgeau Pl. Can. n. 1128.
 Faurie Pl. Japon. n. 167, 169, 3520.
 Mac. Canad. M. n. 56.
 Rab. Bryoth. eur. n. 463.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 159.

- « *var. amblyocalyx* C. M. in *Fl.* 1885, p. 417.
C. amblyocalyx ej. in *Ångstr. Prim. lin.* p. 50.
C. purpureus Ångstr. in *Fregate Eugenie...* p. 6.
 Ut typ. — *Am. merid.* : Terr. Magellan.
- « *var. aristatus* Aust. M. *Appal.* n. 17 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 92.
Arenic. — *Am. sept.* : New Jersey.
- « *var. brevidens* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 51.
 — *Afr.* : Ins. Franciae.
- « *var. brevifolius* Milde in *Bot. Zeit.* 1862, p. 460.
 Ut. typ. — *Eur.* : German. merid.
- « *var. flavisetus* Limp. *Deutschl. Laubm.* p. 487.
 Ut typ. — *Eur.* : Stiria, Tirol.
- « *var. Graeffii* (Schlieph.) Limpr. l. c.
C. Graeffii Schlieph. mss.
Didymodon cuspidatus W. P. Sch. mss. ; *Milde Bryol. sil.* p. 119.
 Ut typ. — *Eur.* : Alp. Helvet.
- « *var. obtusifolius* Limpr. l. c.
 Ut typ. — *Eur.* : Stiria.
- « *var. xanthopus* Sull. M. bor. am. II ed. p. 29 ; *Lesq. et Jam. Man.* l. c.
 Terr. et rup. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Calif.
Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 160.

purpureus { Ångstr. — *C. purpureus* *var. amblyocalyx*.
 H. f. et W. — *C. convolutus*.
 Mitt. — *C. calycinus*.
 Wils. — *Trichostomum tophaceum*.

var. palustris Mont. — *C. stenocarpus*.

stenocarpus *Bryol. eur. II* (mon. p. 4, nom.) ; *C. M. Syn. I*, p. 617.

Barbula conica Spreng. *Syst. veg. IV, II*, p. 323.

C. purpureus *var. palustris* Mont. in *M. Neilgherr.* n. 57.

Didymodon stenocarpus Mitt. *M. Ind. or.* p. 24.

2. *Rupic. et terr.* — *As.* : Bhotan, *M. Neilgherr.* *Afr.* : Ins. Borbo-
 nae, Madagascar sept. *Am. sept.* : Mexic., And. Costa Ricens.
Am. merid. : Columb. *Pac.* : Tasman.

stenocarpus ? Wils. — *Trichostomum tophaceum*.

venezuelensis C. M. in *Linn.* p. 481.

— *Am. merid.* : Venezuela.

xanthocarpus Hsch. — *Trichostomum*.

Caratodontium C. M. in *Forchungsreise...* p. 38 (sect. ORTHOTRICH).

Chætomitriella C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 85 (sect. HYPN).

CHÆTOMITRIUM Dz. et Mk. *M. Archip. ind.* (27 sp. .

acanthocarpum *Bryol. jav. II*, p. 53, t. 173.

2.

— *As.* : Ins. Ceram.

- borbonicum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 145.*
 1. Lignic. — *Afr.* : Ins. Bourbonnæ.
- callichroum *Besch. Fl. bryol. Nov. Caledon. p. 228.*
 — *Pac.* : Nov. Caledon.
- cataractarum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 145.*
 2? — *Afr.* : Ins. Nossi-Be.
- ciliatum *Bryol. jav. II, p. 46, t. 168.*
 2. — *As.* : Java.
- comorense *Hpe. in Linn. 1876, p. 253.*
 Lignic. — *Afr.* : Ins. Anjouan.
- confertum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 317.*
 — *As.* : Ceylan.
- cygnœum *C. M. in Geheeb Neue Beitr. zur. Moosfl. v. Neu Guin., p. 6, t. 4.*
 2. — *Pac.* : Nov. Guin. merid.
- Deplanchei* Duby. — *Holoblepharum.*
- depressum *Mitt. Sam. M. p. 190.*
 Arb. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- Duseni *C. M. in Dusen M. Camer. n. 421.*
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- elegans *Geheeb op. cit. p. 6, t. 5.*
 2. — *Pac.* : Nov. Guin. merid.
- elongatum *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 119, t. 38 et Bryol. jav. II, p. 43.*
Hookeria elongata eor. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 305; C. M. Syn. II, p. 213.
 2. Arbor. — *As.* : Ins. Boeroe Molucc., Borneo, Java.
- fimbriatum *Bryol. jav. II, p. 48.*
Hypnum fimbriatum C. M. Syn. II, p. 402.
Leskea fimbriata Dz. et Mk. M. frond. ined. Arch. ind. p. 177, t. 58.
 2. — *As.* : Amboine, Borneo. *Pac.* : Nov. Guinea.
- frondosum *Mitt. Sam. M. p. 189.*
 Arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- Hookeri* Jaeg. — *Hypnum.*
- horridulum *Bryol. jav. II, p. 40, t. 167.*
 2. — *As.* : Java.
- lanceolatum *Bryol. jav. II, p. 49, t. 170.*
 — *As.* : Java.
- leptopoma (*Schwaegr.*) *Bryol. jav. II, p. 52.*
Holoblepharum leptopoma Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 113, t. 36.
Hookeria leptopoma C. M. Syn. II, pp. 215 et 618.
Hypnum leptopoma Schwaegr. Suppl. IV., p. 323.
Stereodon venustus Mitt. M. Ind. or. p. 114.
 2. Lignic. — *As.* : Java.
- muricatum *Bryol. jav. II, p. 51, t. 172.*
 2. — *As.* : Java.

nematosum *Broth. in Bail. Syn. of the Queensland Fl. IV Suppl. p. 99*
(*nom.*) et in *Oesv...* 1890, p.

2. Ster. Cortic. — *Pac. : Austral. (Queensland).*

obscurum *Bryol. jav. II, p. 50.*

2 — *As. : M. Java.*

orthorhynchum *Bryol. jav. II, p. 45.*

Holoblepharum orthorhynchum Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind.
p. 114, t. 37.

Hookeria orthorhyncha eor. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 305; C. M. Syn.
II, p. 214.

2. Cortic. — *As. : Borneo, Java, Sumatra.*

papillifolium *Bryol. jav. II, p. 50, t. 171.*

2. — *As. : Java.*

philippinense (*Mont.*) *Bryol. jav. II, p. 44, t. 166.*

Hookeria philippinensis Mont. in Lond. Journ. of bot. 1845, p. 11 et Syll.
p. 15; C. M. Syn. II, p. 213.

2. Arbor. — *As. : Ins. Philippin., Ceram, Java.*

rugifolium Mitt. — Holoblepharum.

speciosum Mitt. — Holoblepharum.

taïtense Sull. in Am. Expl. Exp. 1859, p. 22, t. 23.

— *Pac. : Ins. Societat., Taïti.*

torquescens Bryol. jav. II, p. 47, t. 169.

2. Arbor. — *As. : Ins. Ceram, Java.*

volutum Mitt. M. Ind. or. p. 115.

Cortic. — *As. : Ceylan.*

Vrieseanum Bryol. jav. II, p. 54, t. 174.

2. Silv. — *As. : Ins. Ceram.*

CHÆTEPHORA *Brid. Mant. M. p. 148.*

cristata *Brid. — Eriopus.*

incurva *Hsch. — Hookeria.*

Langsdorffii *Hook. — Hookeria.*

orthotrichoides *Raddi. — Macromitrium filiforme ?*

pendula *Hook. — Hookeria.*

Perrini *Spreng. — Lepidopilum polytrichoides.*

CHÆTEPHORA ERIOPUS *Brid. Bryol. univ. II, p. 339.*

cristatus *Brid. — Eriopus.*

Chasmocalyx *Lindb. M. Scand. p. 30 (sect. ANDREAE).*

Cheilothela *Lindb. in Utk. till., 1878 (sect. CERATODONTIS = C. chloropus).*

CHIONOSTOMUM *C. M. in Linn. 1870-71, p. 21.*

glauco-virens (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 338.

Stereodon glauco-virens Mitt. M. Ind. or. p. 103.

1. — *As. : Assam super.*

rostratum (Griff.) C. M. in c.p. et l. cc.

Neckera rostrata Griff. Not. p. 456 et Ic. pl. asiat. II, t. 87, f. I.

Stereodon rostratus Mitt. op. cit. p. 102.

1. Cortic. — *As. : Khasia, Ceylan.*

Chorisodontium Mitt. *M. austr. am.* p. 61 (sect. DIORANI).

Chrysoblastia C. M. in Linn. 1878-79, p. 438 (sect. HYPNI).

CHRYSOBRYUM Lindb.

micans Lindb. — Hypnum.

CHRYSO-HYPNUM Hpe. *Moosbild.* p. 19.

Spec. omn. non indicatae sunt MICROTHAMNIA ejusd. nom.

camptorhynchum Hpe. — Microthamnium Widgrenii.

CINCLIDIUM Sw. in Schrad. Bot. Journ. 1801, p. 25, t. 2 (4 sp.).

arcticum W. P. Sch. *Coroll.* p. 80 et *Syn. II ed.* p. 494; C. M. *Syn. I*, p. 154.

Mnium Cinclidium arcticum *Bryol. eur. IV (mon. supp. p. 1), t. 386.*

2. Paludic. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursorum, Scand. sept. (Dovre).

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 975.

hymenophyllum Lindb. — Mnium.

latifolium Lindb. in *Hedwig.* 1877, p. 77.

2. — *As.*: Jenissei infer.

stygium Sw. l. c.; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 714; C. M. *Syn. I*, p. 153; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 492.

Amblyodon stygius P. B. *Prodr.* p. 41.

Cinclidium subrotundum Mac. *Canad. M.* n. 206.

Meesea stygia *Brid. M. Rec. II, III*, p. 175.

Mnium Cinclidium stygium *Bryol. eur. IV (mon. p. 17), t. 385.*

Syn. Paludic. — *Eur.*: Scand., Anglia, German. sept., Belgia, Rhaet., Stir., Salisb., Alp. Helv. et Gall. *As.*: Kamschatka (an praecedens?). *Am. sept.*: Groenland., Labrador, Anticosti, Nov. Scotia.

Exs.: Drumm. *M. bor. am. ed.* n. 272 p.p.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 105, 1020, 1220.

Un. itin. 1863, n. 50.

subrotundum Lindb. *de Mniac.* 1867, p. 73; W. P. Sch. *Syn. II*, p. 494.

Syn. Paludic. — *Eur.*: Mar. Album, Lapon., Norveg. *As.*: Jenissei infer. *Am. sept.*: Groenland., Labrador; Terra nov.?

CINCLIDOTUS P. B. *Prodr.* p. 28 (3 sp.).

aquaticus (L.) *Bryol. eur. II (mon. p. 8), t. 276*; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 237.

Anoectangium aquaticum *Hedw. Sp. M.* p. 41.

A. falcatum P. B. *Prodr.* p. 42.

Bryum aquaticum *Gmel. Syst. nat. II*, p. 1331.

Fontinalis capillacea *Scop. Fl. Carn. II ed.* n. 1287.

Gümbelia aquatica C. M. *Syn. II*, p. 652.

Gymnostomum aquaticum *Brid. Mant. M.* p. 19 et *Bryol. univ. I*, p. 93.

Harrisonia aquatica *Spreng. Syst. veg. XVI, IV ed. I*, p. 145.

Hedwigia aquatica *Hedw. M. frond. III*, p. 29, t. XI.

Hypnum aquaticum *Jaeg. Fl. Austr. Cat. III*, p. 48, t. 290.

H. aquaticum nigricans, foliis angustis falcatis *Dill. Hist. M.* p. 334, t. 43, f. 70.

H. nigricans *Vill. Pl. Dauph. III*, p. 904.

Muscus squamosus aquaticus *Mich. Nov. gen.* p. 115, n. 100.

Sekra aquatica *Lindb. M. Scand.* p. 23.

2. Ad rup. et sax. calcar. in rivul. — *Eur.* : Med. et merid. : deest in Scandin., Britan., German. sept. *Afr.* : Alger.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 214 et b, 1133.

« *var. falcatus* (Kindb.) Par.

C. falcatus Kindb. in *Rev. bryol.* 1887, p. 43 et in *Malpighia*, 1891, p. 560.

Ut typ. — *Eur.* : Montenegro, Bosnia, Graec.

Brebissoni Husn. — *Barbula*.

falcatus Kindb. — *C. aquaticus var. falcatus*.

fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. *Prodr.* p. 52; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 229; *Bryol. eur.* III (mon. p. 9), t. 277; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 236.

C. minor Lindb. *Trichost. eur.* p. 31.

Fontinalis alpina Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 2, t. 4, f. I.

F. erecta Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 919.

F. minor L. *Sp. pl.* p. 1572.

F. triangularis minor, *carinata e cymis fructifera* Dill. *Hist. M.* p. 252, t. 32, f. 2.

Gümbelia fontinaloides C. M. *Syn.* II, p. 652.

Hypnum antipyreticum β minus Neck. *Meth. M.* p. 152.

Fontinalis alpina Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 2, t. 4, f. I.

H. fontinaloides Lam. *Encycl. meth. bot.* III, p. 164.

Rhacomitrium fontinaloides Brid. *Mant. M.* p. 80.

Sekra minor Lindb. *M. Scand.* p. 23.

Trematodon fontinaloides Roehl. *Fl. Germ.* III, p. 65.

Trichostomum fontinaloides Hedw. *M. frond.* III, p. 36, t. 14.

2. Ut praecedens. — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Tibet. occ., Luristan., *Caucas.* *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Ontario (ster.!).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 133, 216, 1134, 1230 (forma), 1231.

Un. itin. 1863, n. 29.

« *var. Lorentzianus* Mdo. Bayer. *Laubm.* p. 115; *Ltz. in Bot. Zeit.* 1869, p. 553.

Scouleria ? *Geheebii* de Not. *Epil.* p. 755.

Ut typ. — *Eur.* : Os Elbae, Rhoengeb., Bade, Helvet.

minor Lindb. — *C. fontinaloides*.

riparius (Host.) *Bryol. eur.* III (mon. p. 10), t. 278; W. P. Sch. *op. cit.* p. 235.

Gümbelia riparia C. M. *Syn.* II, p. 651.

Gymnostomum riparium Host. *Syn. fl. Austr.* p. 563.

Rhacomitrium riparium Brid. *Mant. M.* p. 80 et *Bryol. univ.* I, p. 223.

Trichostomum aquaticum Schleich. *Cent. pl. Helv.* n. 20.

Tr. nigricans Brid. *Sp. M.* I, p. 242.

Tr. riparium W. et M. *Bot. Taschb.* p. 120.

2. Ad sax. et ligna in rivul. reg. campestr. et subalp. — *Eur.* : Gall., Helvet., Austria, Tirol.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 215.

var. terrestris *Bryol. eur.* — *Barbula Brebissonii*.

CLADODIUM Brid. *Bryol. univ.* I, p. 620.

Spec. omn. *BRYA* ejusd. nom.

CLADOMNION Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 96 (6 sp.).

ericoides (Hook.) H. f. et W. *op. cit.* p. 99 et *Handb.* p. 458.

Hypnum ericoides C. M. *Syn.* II, p. 458.

Leskea ericoides Hook. *M. ex. t.* 28; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 293.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland.

gracile (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 535.

Leskea distans Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 95 et *Syll.* p. 18.

Leucodon gracilis Hpe. *Ic. M. t.* 18.

Neckera Poeppigiana C. M. *Syn. II*, p. 115.

2. Cortic. — *Am. merid.* : *Chil. austr.*

Müllerianum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II.* p. 130.

Glyphothecium Müllerianum Hpe. in *Linn.* 1859, p. 637.

Filicic. — *Pac.* : *Austral. felix.*

octangulum (C. M.) *Bryol. jav. II*, pp. 105 et 228, t. 216.

Leskea sciuroides Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 178.

Neckera octangula C. M. *Syn. II*, p. 668.

2. Lignic. — *As.* : *Java.*

pallens Lac. *Sp. nov. Archip. ind.* p. 12.

2. — *As.* : *Java.*

sciuroides (Hook.) H. f. et W. *op. cit.* p. 100.

Leskea sciuroides Hook. *M. ex. t.* 175 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 286.

Neckera glyphotheca C. M. *Syn. II*, p. 669.

Stereodon sciuroides Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 89.

2. Cortic. — *Pac.* : *Austral. felix*, *Nov. Zeland.*, *Tasman.*

setosum H. f. et W. — *Cyrtopus.*

CLADOPANTHUS Dz. et Mk. *M. Arch. ind.*

pilifer Dz. et Mk. — *Leucobryum.*

Claopodium Lesq. et Jam. *Man.* p. 327 (subgen. *HYPNI* = *THUIDIUM*).

CLASMATODON Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1842, p. 421, t. 25 (2 sp.).

Bertrami Lindb. — *Anisodon.*

ferrugineus Jaeg. — *Anisodon.*

parvulus (Hpe.) Sull. *M. of U. St.* p. 60 et *Ic. M.* p. 126, t. 79 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 297.

Cl. pusillus H. f. et W. *l. c. et in Drumm. M. bor. am. II ed. n.* 80.

Hypnum parvulum C. M. *Syn. II*, p. 409.

Leskea parvula Hpe. in *Linn.* 1839, p. 46.

Pterogonium marginatum? Schwein *mem. in Bryol. eur. V* (mon. p. 4).

Rhegmatoxon parvulus Hpe. *Ic. M. t.* 14.

1. Arbor. — *Am. sept.* : *Reg. merid.*

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed. n.* 246 et *II ed. n.* 368.

« *var. rupestris* Sull. et Lesq. *l. c. n.* 246.

Anisodon acutirostris *Bryol. eur. V* (mon. p. 4).

Ad rup. irror. — *Am. sept.* : *Reg. merid.*

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 369.

parvulus { *Husn.* — *Anisodon Bertrami.*
Sull. (*M. Wright.*). — *Austinia tenuinervis.*
var. julacea C. M. — *Anisodon Bertrami.*

pellucidus Hpe. *Symb.* 1874, p. 152.

1. — *Am. merid.* : *Brasil. austr. or.*

perpusillus Lindb. — *Habrodon Notarisii.*

pusillus H. f. et W. — *Cl. parvulus.*

trichelyma Sull. — *Austinia tenuinervis.*

CLASTOBRYUM Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* (1 sp.).

indicum Dz. et Mk. *op. cit.* p. 43, t. 16; *Bryol. jav. II*, p. 129.

Astrodonium indicum eor. in Ann. sc. nat. 1844, *II*, p. 299.

Neckera Clastobryum C. M. Syn. II, p. 91.

1. Cortic. et terr. — As. : Borneo, Java.

CLEISTOSTOMA Brid. *Bryol. univ. I*, p. 153 (1 sp.).

albo-vaginatium Schwaegr. — Syrrhopodon.

ambiguum Brid. *op. cit.* p. 154; *Mitt. M. Ind. or.* p. 125.

Neckera ambigua C. M. Syn. II, p. 107.

Pterogonium ambiguum Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 310, t. 26, f. 4.

2? Cortic. — As. : Nepal.

Gardneri Schwaegr. — Syrrhopodon.

? *incompletum* Schwaegr. — Syrrhopodon.

involutum Schwaegr. — Syrrhopodon.

Taylori Schwaegr. — Syrrhopodon.

Climacio-pterobryum C. M. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1878, p. 65 (sect. PTEROBRYELLAE).**CLIMACODONTIUM** Hpe. in *Jaeg. Ad. II*, p. 713.

cygnicollum Hpe. — *Bryum climacodontium*.

CLIMACIUM Web. et Mohr *Reise in Schwed.* p. 96 (6 sp.).

americanum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 273; *Sull. Ic. M.* p. 151, t. 97; *Lesq. et Jam. Man.* p. 314.

Neckera dendroides β *americana C. M. Syn. II*, p. 122.

2. Lignic. — *Am. sept.* : Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, M. Rupestr., reg. sept., centr., or. et merid.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 231, II ed. n. 120.

Mac. Canad. M. p. 265.

Sulliv. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 408.

« *var. Kindbergii Ren. et Card. in Bot. Gaz.* 1890, p. 59.

— *Am. sept.* : Indiana, Massachussets, Ludovic.

dendroides (L.) Web. et Mohr. l. c. et in Bot. Taschb. p. 252, t. 10, f. 2; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 271; *Bryol. eur. V*, t. 437; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.*

Cl. europaeum P. B. Mem. Soc. Linn. Par. I, t. 9, f. 8.

Hypnum dendroides L. Sp. pl. p. 1593.

H. dendroides sericeum setis et capsulis longioribus erectis Dill. Hist. M. p. 213, t. 40, f. 48.

Leskea dendroides Hedw. Sp. M. p. 228.

Neckera dendroides Brid. M. Rec. II, II, p. 15; *C. M. Syn. II*, p. 121.

2. In prat. udis, ad marg. fossar. et ped. muror. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in montan. *As.* : Japon., Jenissei, Obi, Caucas., occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland., Terr. nov., ins. Miquel., New Brunswick, Gaspesia, Ontario, Columb. brit., New York, M. Alb., Wisconsin, Minnesota, Idaho, Washington, Kansas, Calif.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed., n. 230.

Faurie Pl. Japon. n. 6.

Mac. Canad. M. n. 264.

« *var. inundatum* Mdo.

Subaquat. — *Eur.* : Bavaria.

« *var. oregonense* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 59.

— *Am. sept.* : Oregon.

europaeum P. B. — Cl. dendroides.

japonicum Lindb. in *Act. Soc. Fenn.* 1872, p. 2 2.

Hypnum dendroides Thbg. *Fl. jap.* p. 363 ?

Pterobryum imbricatum Duby in *Mémoires... Genève*, XXVI, p. 6, t. I, f I.

2.

— *As.* : Tibet. or., Japon.

Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 157, 243, 691, 1485.

Savatier *ibid.* n. 627.

lutescens Voit. — *Camptothecium*.

neckeroides Brid. — *Porotrichum dendroides*.

ramulosum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 364.

Neckera ramulosa Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 160.

— *Afr.* : M. Cameroon.

ruthenicum (Weinm.) Lindb. *op. cit.* p. 248 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 77, t. 58 ; *Lesq. et Jam. l. c.*

Hypnodendron Savatieri W. P. Sch. in *Savat. M. Jap.* n. 828.

Hypnum ruthenicum Weinm. in *Bull. Soc. imp. Moscou*, 1845, II, p. 485, n. 34 ; *C. M. Syn. II*, p. 503.

H. spectabile H. f. et W. in *Wils. Bryol. brit.* p. 382, n. 58 in obs. (1855).

2.

— *As.* : Japon., Saghalien. *Am. sept.* : Ins. Sitka,

Vancouver, Alaska, fret. Behring.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 821.

sulcatum (Hook.) Brid. *Bryol. univ.* II, p. 274.

Braithwaitea nematosa Jaeg. *Ad. II*, p. 365.

Br. sulcata Lindb. in *op. cit.* p. 250 in adn.

Dendro-Leskea sulcata Hpe. in sched.

Isothecium sulcatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 101 et *Handb.* p. 464.

Leskea sulcata Hook. *M. ex. t.* 164.

Neckera sulcata C. M. *Syn. II*, p. 122.

Pilotrichum nematosum ej. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 273 et in *Linn.* 1867-68, p. 614 (1).

2 ?

— *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland. med. et merid.

Climacocaulon C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 329 (sect. BARBULAE).

CODONOBLEPHARUM Schwaegr. *Suppl. II*, p. 142, t. 137.

acutifolium Jaeg. — *Zygodon*.

brevicolle Jaeg. — *Zygodon*.

crassinerve C. M. — *Calymperes*.

fasciculatum Bryol. jav. — *Syrrhopodon*.

linguiforme Jaeg. — *Zygodon*.

luteum C. M. — *Syrrhopodon*.

Menziesii Schwaegr. — *Zygodon*.

neglectum Jaeg. — *Zygodon*.

obtusifolium Schwaegr. — *Zygodon*.

papillatum Schwaegr. — *Zygodon*.

peruvianum Schwaegr. — *Zygodon*.

(1) Cf. C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 157.

- pungens* Schwaegr. — Zygodon.
subfasciculatum Hpe. — Syrrhopodon.
subluteum C. M. — Syrrhopodon.
Schwagrichenii Jaeg. — Zygodon.
uncinatum Jaeg. — Zygodon.
undulatum Dz. et Mk. — Syrrhopodon Codonoplepharum.

CÆLIDIUM Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. p. 110 (subgen. HYPNI);
 Reichdt. in Novara Exp. Bot. I, p. 391 (gen. propr.) (9 sp.).

- apertum* Jaeg. — Ectropothecium inflectens.
 var. *condensatum* Jaeg. — Ectropothecium inflectens var. *condensatum*.

auriculatum (Mont.) Jaeg. Ad. II, p. 318.

- Acrocladium auriculatum* Mitt. M. austr. am. p. 532 p.p.
Hypnum auriculatum Mont. Voy. au Pôle Sud, Crypt. p. 331, t. 20, f. 3
 et Syll. p. 8; C. M. Syn. II, p. 373.
Plagiothecium magellanicum W. P. Sch. in hb. Mus. Paris.
 Rupic. et terr. — Am. merid.; Patagon. austr., terr. Magellan.,
 Fuegia.

chlamytophyllum (H. f. et W.) Jaeg. Ad. II, p. 384.

- Acrocladium auriculatum* Mitt. l. c. p.p.
Hypnum acrocladium H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 552 et
 Fl. Antarct. I, p. 139, t. 61; C. M. Syn. II, p. 374.
Stereodon auriculatus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 88.
 1. In silv. humid. — Am. merid.; Fuegia? (ex Handb. of N. Zeal. Fl.).
 Pac.; Nov. Zeland. sept. et med., Tasman., ins. Campbell.

chlorocladum (C. M.) Par.

- Hypnum chlorocladum* C. M. in Linn. 1867-68, p. 622.
 2? — Pac.; Austral. or.

clandestinum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. l. c.

- Hypnum clandestinum* H. f. et W. Fl. Tasm. II, p. 201; Fl. of the N.
 Zeal. III, t. 90, f. 3 et Handb. p. 480.
Lembophyllum clandestinum Lindb. Contrib. ad Fl. bryol. As. bor. or.
 1872, p. 277 (in adn.).
 1. In silv. humid. — Pac.; Austral., Nov. Zeland. med., Tasman.

cochlearifolium (Schwaegr.) Jaeg. l. c. p. 383.

- Hypnum cochlearifolium* Schwaegr. Suppl. I, II, p. 221, t. 88; C. M.
 Syn. II, p. 373; H. f. et W. Fl. Tasm. II, p. 211, Fl. of the N. Zeal.
 II, p. 111 et Handb. p. 480.
H. flexile Hook. M. ex. t. 110.
Isothecium flexile Brid. Bryol. univ. II, p. 361 p.p.
Lembophyllum cochlearifolium Lindb. l. c.
Stereodon cochlearifolius Mitt. l. c.
 2. Rupic. — Am. merid.; Ins. Chiloë. Pac.; Austral. or., Nov. Zeland.
 sept. et med., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

« var. *minus* (Hpe.) Par.

- Hypnum cochlearifolium* var. *minus* Hpe. in Linn. 1852, p. 715 (nom.).
 Ut typ.? — Pac.; Tasman.

divulsum (Hook. f. et Wils.) Par.

- Hypnum divulsum* H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 556; Fl.
 of the N. Zeal. II, p. 111, t. 90, f. 4 et Handb. p. 481; C. M. Syn. II,
 p. 466.

Lembophyllum divulgum Lindb. *l. c.*
Thamniella divulsa Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 240.

2. Terr. humid. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.

inflatum (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 384.

Hypnum inflatum *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 111, t. 90, f. 5 et *Handb.* p. 481.

Ster. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med.

porotrichoides (*Besch.*) *Par.*

Thamniella porotrichoides Besch. *l. c.*

2. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Caledon.

vagum (*Hsch.*) *Par.*

Hypnum vagum *Hsch. in Sieb. M. Nov. Holl. n. 23; C. M. Syn. II*, p. 466.

Lembophyllum vagum Lindb. *l. c.*

Rigodium vagum *Reichdt. in Novara Exp. Bot. I*, p. 188.

Thamniella vaga Besch. *l. c.*

2. — *Pac.* : Austral., Tasman.; Nov. Zel. sept. ?

Comatosphagnum *C. M. in Fl.* 1887 p. 404 (Sph. subsecunda).

Comatulina *C. M. Syn. II*, p. 503 (subgen. HYPNI = MNIODENDRON).

Cometium *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 302 (sect. MACROMITRII).

Complanaria *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 409 (sect. POROTRICHII)

COMPLANATO-HYPNUM *Hpe. Symb.* 1877, p. 732.

leptostegium *Hpe.* — *Stereophyllum*.

CONOMITRIUM *Mont. in Ann. sc. nat.* 1837, p. 250 (22 sp.)

acutifolium Lindb. — *Fissidens Lindbergii*.

aggestum Besch. — *Fissidens*.

amoenum *C. M.* — *Fissidens*.

amphibium *C. M. in Linn.* 1875, p. 356.

Octodiceras amphibium *Jaeg. Ad. II*, p. 52.

Ster. — *Afr.* : Niam-Niam.

anguste-limbatum *Jaeg.* — *Fissidens*.

assimile *Hpe.* — *Fissidens*.

asterodontium *C. M.* — *Fissidens*.

Beccarii *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 290.

Octodiceras Beccarii *Jaeg. Ad. II*, p. 52.

1. — *As.* : Borneo.

bengalense *Hpe.* — *Fissidens*.

Berterii *Mont. in Ann. sc. nat.* 1838, p. 250; *C. M. Syn. II*, p. 521.

Fissidens Berterii *C. M. Syn. I*, p. 45.

Octodiceras Berterii *Jaeg. Ad. II*, p. 51.

1. Ad saxa in scaturig. — *Am. merid.* : Chile.

bi-areolatum *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 466.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

borbonicum C. M. — *C. palmifolium*.

brachypus Jaeg. — *Fissidens*.

Braunii C. M. — *Fissidens*.

Bryum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 834.

— *Afr.* : M. Cameroon.

capense C. M. *Syn. II*, p. 524.

Fissidens *Berterii* ej. *Syn. I*, p. 45 p.p. ; *Mitt. M. austr. am.* p. 584.

Octodiceras capense *Jaeg. l. c.*

Fl. et fr. ign. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : *Rehm M. Afr. austr. n.* 581.

« *var. nigrescens* *Rehm. l. c. n.* 278 et 582.

— *Afr.* : Orange, Transvaal.

caripense Hpe. et C. M. — *Fissidens*.

cylindraceum Jaeg. — *Fissidens*.

desertorum C. M. — *Fissidens*.

Dillenii (*la Pyl.*) *Mont. l. c.* ; *C. M. l. c.*

Fissidens Dillenii C. M. *Syn. n.* p. 45.

F. parvus *Mitt. l. c.*

F. semi-completus *Hedw. Stirp. crypt. III*, p. 34, t. B p.p.

Fontinalis parva, foliis lanceolatis *Dül. Hist. M.* p. 259, t. 33. f. 4.

Octodiceras Dillenii *Brid. Bryol. univ. II*, p. 667.

Skitophyllum Dillenii *la Pyl. in Desv. Journ. bot.* 1813, V, p. 52, t. 31.

1. — *Am. merid.* : Chil., Patagon., ins. Provident.

Pac. : Austral., Nov. Zeland.

diplopus Jaeg. — *Fissidens*.

erosulum C. M. — *Fissidens*.

faniense Besch. — *Fissidens*.

Glaziowii Hpe. — *Fissidens*.

gracile Hpe. — *Fissidens*.

granulatum Hpe. et Geh. — *Fissidens*.

gumangense C. M. — *Fissidens*.

Hallianum *Sull. et Lesq. in Aust. M. Appal. n.* 108 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 43, t. 28 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 90.

Octodiceras Hallianum *Jaeg. l. c. p.* 52.

1. Lignic. in puteis et rupic. — *Am. sept.* : New Jersey, New York, Illinois, Idaho, Florid.

Hallianum Mac. — *C. Julianum*.

Hedwigii *Mont. l. c.*

Cecalyphum ? *semi-completum* *P. B. Prodr.* p. 57.

Fissidens Hedwigii C. M. *Syn. I*, p. 45.

F. semi-completus *Hedw. l. c. t.* 13 p.p. ; *Mitt. l. c. p.* 583.

Octodiceras fissidentoides *Brid. Bryol. univ. II*, p. 676.

O. Hedwigii *Jaeg. l. c. p.* 50.

Skitophyllum semi-completum *la Pyl. l. c.*

1. — *Am. merid.* : Chile.

hians Hpe. — *Fissidens*.

hyalinum C. M. — *Fissidens*.

Hydropogon (*Spr.*) *Par.*

Fissidens Hydropogon *Spr. in Mitt. l. c. p.* 585.

Octodiceros Hydropogon *Jaeg. l. c. p.* 51.

1. — *Am. merid.* : And. Quitens.

immersum (Mitt.) Par.

Fissidens immersus Mitt. l. c. p. 584.

Octodiceras immersum Jaeg. l. c.

— *Am. merid.* : Brasil, tropic.

inaequale Jaeg. — *Fissidens*.

inclinatulum C. M. — *Fissidens*.

inflatum C. M. — *Fissidens*.

intra-marginatum Hpe. — *Fissidens*.

Julianum (Savi) Mont. l. c. ; C. M. Syn. II, p. 524 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 122.

C. Hallianum Mac. Canad. M. n. 54.

Fissidens debilis Schwaegr. Suppl. 1, II, p. 11 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 706.

F. Julianus W. P. Sch. in Regensb. Bot. Zeit. 1838, I, p. 271 ; C. M. Syn. I, p. 44.

F. semi-completus Drumm. M. bor. am. II ed. n. 44.

Fontinalis Juliana Savi in Poll. Fl. Veron. III, p. 385.

Muscus pinnatus aquaticus ramosissimus, *Linariae foliis*... Micheli Gen. p. 114.

Octodiceras fontanum Lindb. Bidrag... p. 23.

O. Julianum Brid. l. c. II, p. 678 ; Bryol. eur. I, t. 108.

Skitophyllum fontanum la Pyl. l. c.

Sk. Julianum Lindb. M. Scand. p. 13.

1. Ad saxa in rivul. et ad pariet. lapid. fontium. — *Eur.* : Temperat. et calidior. passim ; deest in Britann. Afr. : Alger. ; C. B. Sp. ? *Am. sept.* : Ontario, M. Rupestr., Calif., reg. orient., centr. et merid.

Exs. : Rab Bryoth. eur. n. I a-c, 1290.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 112.

« *var. mexicanum* W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 27.

Conomitrium Julianum C. M. in Bot. Zeit. 1860.

Fissidens Julianus Mitt. M. austr. am. p. 584.

Octodiceras Julianum Jaeg. l. c. p. 50.

Ster. — *Am. sept.* : Mexique.

laxifolium C. M. — *Fissidens*.

Lindigii Hpe. — *Fissidens*.

Mariei Besch. Fl. Bryol. Réunion, etc. p. 47.

2. Humic. — *Afr.* : Ins. Nossi-Be.

Metzgeria C. M. — *Fissidens*.

mexicanum C. M. — *C. Julianum var. mexicanum*.

microcarpum Jaeg. — *Fissidens*.

molle C. M. in Linn. 1878-79, p. 247.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Uruguay.

Mülleri Hpe. in Linn. 1856, p. 214 et 1859, p. 644.

Octodiceras Mülleri Jaeg. l. c. p. 51.

1. — *Pac.* : Austral, felix.

osmundioides C. M. — *Fissidens*.

palmatum C. M. — *Fissidens*.

palmifolium Besch. l. c.

? *Bryum palmifolium* Brid. Bryol. univ. I, p. 687 ; C. M. Syn. I, p. 341.

C. borbonicum C. M. in Bot. Zeit. 1864.

Mnium palmifolium P. B. Prodr. p. 76.

Octodiceras borbonicum Jaeg. l. c. p. 50.

Ster. ? Aquat. — *Afr.* : Ins. Borbon.

palustre C. M. — Fissidens.
Pechuelli C. M. — Fissidens.
pellucidum C. M. — Fissidens.
perfoliatum C. M. — Fissidens.
perpusillum C. M. — Fissidens australiensis.
polycarpum Besch. in Journ. de Bot. 1891 p.
 — Am. merid. : Paraguay.

psatyrocheilon Schlieph. — Fissidens.
pseudo-serratum C. M. — Fissidens.
Puiggarii Hpe. et Geh. — Fissidens.
radicans C. M. — Fissidens.
reflexum Jaeg. — Fissidens.
reticulosum C. M. — Fissidens.
rubiginosum Hpe. — Fissidens.
sanguineo-nerve C. M. — Fissidens.
Schweinfurthii C. M. — Fissidens.

scleromitrium Besch. l. c.

1. — Afr. : Madagascar.

semi-limbatum Schlieph. — Fissidens Pabstii.
semi-obscureum C. M. — Fissidens.

serratum C. M. { — Fissidens.
 — Fissidens pseudo-serratus.
 — Fissidens Wilsoni.

sinense Rab. Bryoth. eur. n. 1212.
 — As. : Cochinchin.

smaragdinum Ltz. et C. M. in Linn. 1879-80, p. 248.

Fl. et fr. ign. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

splachnifolium C. M. — Fissidens.

stissotheca C. M. Syn. II, p. 525.

Fissidens stissotheca Hpe. mss. in C. M. l. c.

1. — Am. merid. : Brasil. austr.

subpalmatum { Hpe. (Jaeg. p. 762). — Fissidens evadiinervis.
 { Jaeg. p. 41. — Fissidens.

subulatum Jaeg. — Fissidens.

trachelyma (Sull.) C. M. in Linn. 1878-79, p. 466.

Fissidens trachelyma Sull. mss.

2. — Am. merid. : Venezuela.

Ulna C. M. — Fissidens.

undatum C. M. — Fissidens.

vitreum C. M. — Fissidens.

Wrightii Jaeg. — Fissidens flexinervis (1).

CONOSTOMUM Sw. in Schrad. Neu Bot. Journ. I, III, p. 14, t. 5 (8 sp.).

æquatoriale W. P. Sch. in Mandon. Pl. Boliv. n. 1681.

— Am. merid. : And. Boliv.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

C. monandrum L. (?)

C. subnigrescens (C. M.).

C. Wilsoni C. M.

arcticum Sw. — *C. boreale*.

australe Sw. *l. c.* p. 31, t. 6; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 152; *C. M. Syn.* I, p. 470; *Fl. Antarct.* p. 132; *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 87; *Handb.* p. 411; *Fl. Tasman.* II, p. 196.

Bartramia australis Mitt. *M. austr. am.* p. 287.

B. pentasticha Brid. *M. Rec.* II, III, p. 134, t. I, f. 8.

Bryum angulosum Menz. (*fid. Brid. Bryol. univ. l. c.*).

C. pentastichum Lindb. in *Oefv...* 1863 et *Bidrag.* p. 8.

Philonotis australis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 81.

Weisia pentasticha Hedw. in *Brid. Bryol. univ. l. c.*

1. *Rupic.* — *Afr.* : Ins. Kerguelen ? (1). *Am. merid.* : And. Quitens., terr. Magellan., Fuegia, ins. Maclov., *Eremitae. Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Tasman., ins. Auckland et Campbell.

boreale Sw. *l. c.* p. 24, t. 5; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 150; *C. M. Syn.* I, p. 469 et II, p. 615; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 514.

Bartramia conostoma Bryol. eur. IV (mon. p. 16), t. 322.

Bryum tetragonum Dicks. *Fasc. Pl. crypt.* II, p. 8, t. 4, f. 9.

C. arcticum Sw. in *Brid. Sp. M.* I, p. 127.

C. tetragonum Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 8.

Grimmia conostoma Sm. *Fl. brit.* p. 1169.

2. *Terr. humid.* — *Eur.* : Spitzberg, ins. Urzorum, summ. Alp. præcip. reg. septentr. *As.* : Jenissei infer., penins. Samojed. et Tschutsch., Kamschatka. *Am. sept.* : Præcip. arctic. : Groenland., ins. Sabine, fret. Kotzebuë et Smith, *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, Alaska, ins. Vancouver, Gaspesia, *M. Alb. et Adirondack*, Terra nov.

Ews. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 53.

Mac. *Canad. M.* n. 205.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1271.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 261.

Un. itin. 1867, n. 85.

curvirostre (Mitt.) Par.

Bartramia curvirostris Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 81.

— *Pac.* : Austral. (Victoria).

magellanicum Sull. in *Hook. Journ. of bot.* 1850, p. 316; *C. M. Syn.* II, p. 615.

Bartramia magellanica Mitt. *M. austr. am.* p. 268.

1. *Fr. ign.* Ad rup. madid. — *Am. merid.* : Fuegia.

parvulum Hpe. — *C. pusillum*.

pentastichum Lindb. — *C. australe*.

pusillum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 88, t. 86, f. 2 et *Handb.* p. 445.

C. parvulum Hpe. in *Linn.* 1856, p. 207.

Philonotis pusilla Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 81.

1 (Mitt.) 2 (Hpe.). Ad rup. madid. — *Pac.* : Alp. Austral. or., N. Zeland. sept. et med., Tasman.

rhynchostegium C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 27.

2. *Paludic.* — *Am. merid.* : Austr. Georg.

speirostichum C. M. in *Linn.* 1874, p. 594.

Ster. — *Am. merid.* : M. Pichincha.

(1) Cf. *Philonotis anisothecioides*,

tetragonum Lindb. — *C. boreale*.
variegatum Brid. — *Weisia zonata* (1).

COSCINODON Spreng. Einleit. in d. Stud. d. Krypt. Gewaechse, 1804, p. 281 (6 sp.).

aciphyllus Brid. — *Pottia lanceolata* var. *aciphylla*.

connatus Brid. — *Pottia lanceolata*.

cribrosus Spr. — *C. pulvinatus*.

elongatus Brid. — *Eucladium verticillatum*.

Hookeri Hpe. — *Grimmia calyptrata*.

humilis Milde in Bot. Zeit. 1864, Beil. p. 13; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 288.

2. Ad rup. silic. — Eur. : Tirol. merid., Engadine, Pyren.

lanceolatus Brid. — *Pottia lanceolata*.

latifolius Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 99.

1. — As. : *Jenissei* super.

longirostris { Brid. — *Microdus*.
 { Hsch. — *Microdus exiguus*.

nudus Brid. — *Discelium*.

pallidisetus Brid. — *Microdus*.

Persoonii Hpe. — *C. pulvinatus*.

pilifer Hpe. — *Pottia lanceolata* var. *pilifera*.

plagiopus Spreng. — *Grimmia plagiopodia*.

pullulans Brid. — *Trichostomum tenue*.

pulvinatus Spreng. l. c. ; Bryol. eur. III (mon. p. 3), t. 230 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 287.

Bryum cribrosum Hoffm. Deutschl. Fl. II, p. 31.

C. cribrosus Spr. in Ann. and Mag. of nat. hist. p. 188 ; C. M. Syn. I, p. 765.

C. Persoonii Hpe. in Fl. 1837, p. 280

Grimmia cribrosa Hedw. M. frond. III, p. 73, t. 31 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 174.

2. Ad rup. humid. — Eur. : Per totam sporadice, except. Britann. As. : Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Columb. brit., Alaska, Idaho.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 127, 1317.

« var. *subperforatus* Philib. in Rev. bryol. 1880, p. 43.

Ut typ. — Eur. : Gall. centr. (Ardèche).

Raui (Aust.) Lesq. et Jam. Man. p. 155.

Grimmia Raui Aust. in Bull. Torr. bot. Club VI, p. 46.

1. — Am. sept. : Colorado, Minnesota.

Renauldi Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 41, t. 6 B.

1. — Am. sept. : Colorado, Kansas.

verticillatus Brid. — *Eucladium*.

Wrightii (Aust.) Sull. M. of U. St. p. 38, t. 4 et Ic. M. p. 71, t. 45 ; Lesq. et Jam. l. c.

Grimmia Wrightii Aust. l. c.

1. Rupic. — Am. sept. : Colorado, Kansas, Texas, Nov. Mexic.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 132, II ed. n. 197.

(1) In Enum. Kindberg, nomen nudum ;
C. Lorentzi C. M.

Crassidicranum *Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 370* (sect. DICRANI).

Cratoneurum *Sull. ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 739* (subgen. HYPNI).

CROSSIDIUM *Jur. Laubm. Osterr. Ung. p. 127.*

crassinerve Jur. — *Barbula chloronotos*.

griseum Jur. — *Barbula*.

squamigerum Jur. — *Barbula membranifolia*.

CROSSOMITRIUM C. M. in Linn. 1874, p. 611 (11 sp.).

Crügeri C. M. l. c.

Hookeria Patrisiae *ej. Syn. II, p. 198, p.p.*

2. Cortic. — *Am. sept. : Antill. Am. merid. : Ins. Trinitat.*

epiphyllum (*Mitt.*) C. M. *op. cit. p. 613.*

Lepidopilum epiphyllum *Mitt. M. austr. am. p. 370.*

2. Ad fol. emort. — *Am. merid. : And. Quitens.*

fontanum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 242.*

Lepidopilum fontanum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 4.*

Ster. — *Afr. : Madeira.*

Herminieri (*W. P. Sch.*) *Jaeg. op. cit. p. 241.*

Lepidopilum Herminieri *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 54.*

Fr. ign. — *Am. sept. : Guadalup.*

Erstedtianum C. M. in *Fl. 1875, n. 34-35.*

Ster. — *Am. sept. : Costa Rica.*

Patrisiae (*Brid.*) C. M. in Linn. 1874, p. 612 p.p.

Hypnum Patrisiae *Brid. Bryol. univ. II, p. 539 (1).*

2. Cortic. — *Am. merid. : Guian. gall.*

Sellowii C. M. l. c.

Hookeria Patrisiae *Hpe. Ic. M. t. I ; C. M. Syn. II, p. 198 p.p.*

2. Ad fol. emort. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

Splitgerberi (*Mont.*) C. M. l. c. p. 613 (2).

Hookeria Splitgerberi *Mont. Syll. p. 14.*

Lepidopilum Splitgerberi *Mitt. M. austr. am. p. 370.*

Fl. et fr. ign. Ad fol. emort. — *Am. merid. : Guian. batav.*

Spruceanum C. M. l. c.

Lepidopilum Patrisiae *Mitt. op. cit. pp. 369-370 p.p.*

2. — *Am. merid. : And. Quitens.*

subepiphyllum (*Besch.*) *Jaeg. Ad. II, p. 241.*

Lepidopilum subepiphyllum *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 54.*

Fr. ign. — *Am. sept. : Guadalup.*

Wallisii C. M. in *Fl. 1875, n. 34-35.*

Ster. — *Am. merid. : Nov. Granat.*

(1) Cf. C. M. l. c.

(2) « An *Cr. Patrisiae* verum ? ». C. M. l. c.

CRYPHÆA Brid. Mant. M. p. 139 (71 sp.) (1).

acuminata Hook. f. et Wils. Fl. Nov. Zeal. p. 102, t. 28, f. 4 et Handb. p. 461.

— Pac. : Nov. Zeland. sept.

affinis Mitt. — Cr. ramosa.

apiculata Bryol. eur. V (mon. p. 5) ; C. M. Syn. II, p. 675 ; W. P. Sch. et Par. Mon. Cryph. ined.

Cr. cuspidata W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 69.

— Am. sept. : Mexic.

apiculata Mitt. — Cr. Mittenii.

arborea Lindb. — Cr. heteromalla.

attenuata Bryol. eur. l. c. ; C. M. op. cit. p. 674 ; W. P. Sch. et Par. op. cit. ; W. P. Sch. in Besch. op. cit. p. 72.

Cr. patens Hpe. in hb. Schlechtendalano ! C. M. in Linn. 1844, p. 679 p.p.

Cr. protensa C. M. in hb. Schlecht. !

— Am. sept. : Mexic., Orizaba.

Aurantiorum C. M. in Linn. 1880-82, p. 469.

— Am. merid. : Argentin. Buenos Ayr.

Balansae C. M. — Cr. guarapensis.

Blumeniana Hpe. Enum. M. Brasil. p. 38.

— Am. merid. : Brasil.

boliviana W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1688 et Mon. Cryph. ined.

— Am. merid. : And. Boliv.

brasiliensis Hpe. — Cr. filiformis.

Breuteliana W. P. Sch. in Breutel M. Capens. et op. cit.

— Afr. : C. B. Sp. (Montagne Pass).

brevidens C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).

— Pac. : Austral. (Nov. Vales.).

brevipila Mitt. M. austr. am. p. 413.

— Am. merid. : M. Chimborazo.

caldensis Ångstr. in Oefv... 1876, n. 4, p. 31.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

calomiera Broth. in litt.

Cr. gracilis ej. in Mosen Pl. Brasil. n. 88.

— Am. merid. : Brasil.

caripensis C. M. — Acrocryphaea squarrosula.

concavifolia Mitt. — Acrocryphaea.

consimilis Mont. in Ann. sc. nat. 1845, p. 100 et Syll. p. 25.

Pilotrichum consimile C. M. Syn. II, p. 166.

— Am. merid. : Chile austr.

consimilis H. f. et W. — Cr. parvula.

crenulata Mitt. — Cyptodon ?

cuspidata Sull. in U. St. Expl. Exped. t. 23 A ; W. P. Sch. et Par. op. cit.

— Am. merid. : Chile.

(1) Species omnes monoicae et, ut videtur, corticolae.

- cuspidata* { Hpe. — Cr. Lindigiana.
 { W. P. Sch. — Cr. apiculata.
decurrens Mitt. — Cr. patens var. decurrens.
dentata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 311.
 — Afr. : M. Usagara.
dilatata H. f. et W. — Cyrtodon.
Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 675.
 — Afr. : M. Cameroon.
evanescens C. M. in *Ule Pl. Brasil. n.* 733 et 903.
 — Am. merid. : Brasil.
exigua (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 95.
Pilotrichum exiguum C. M. *Syn. II*, p. 166.
 — Afr. : C. B. Sp., Transvaal.
Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 315 et 600.
fasciculata Duby in *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p.* 221.
Dendropogon fasciculatus Jaeg. *Ad. II*, p. 103.
 — Pac. : Nov. Caled.
fasciculosa Mitt. *M. austr. am. p.* 411.
 — Am. merid. : And. Quitens.
ferruginea { Lindb. — Acrocryphaea.
 { Mitt. — Dendropogon.
filiformis Brid. *Bryol. univ. II*, p. 252 ; W. P. Sch. et Par. *op. cit.*
Cr. brasiliensis Hpe. in sched.
Daltonia filiformis W. Arn. *Disp. p.* 54.
Fontinalis filiformis Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ. p.* 138.
Hypnum filiforme Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1340.
Neckera filiformis Hedw. *M. frond. III*, p. 41, t. 16.
Pilotrichum filiforme P. B. *Prodr. p.* 83 ; C. M. *Syn. II*, p. 169.
 — Am. sept. : Mexic., Guatemala, Cuba, S. Doming.
 Am. merid. : Venezuela, Columb., Brasil.
filiformis { Hsch. — Cr. Schiedeana.
 { Sull. — Cr. glomerata.
furcinervis C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 467.
 — Am. merid. : Argentin. subtropic.
Gardneri Mitt. — Acrocryphaea ferruginea.
glomerata Brgol. *eur. l. c.* ; Lesq. et Jam. *Man. p.* 276.
C. filiformis Sull. *M. Allegh. n.* 81.
Pilotrichum heteromallum γ filiforme C. M. *Syn. II*, p. 168.
 — Am. sept. : Ohio, Georg., Carol. utraq., Ludovic., etc.
Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 347.
 « var. pendula (Lesq. et Jam.) Par.
Cryphaea pendula L. et J. in *Proced. Am. Acad. XIV*, p. 138 et *Man.*
p. 276.
Daltonia heteromalla var. Drumm. *M. bor. am. II ed., n.* 99.
 Ad Tillandsiam. etc. — Am. sept. : Georg. Florid., Ludovic.
Gorveana Mont. — Dendrocryphaea.
gracilis Mitt. *Fl. Vit. p.* 393.
 — Pac. : Ins. Fidji, Samoa.

gracilis Broth. — *Cr. calomicra*.

guarapensis Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 18 (nom.).

Cr. Balansae C. M. mss.

— *Am. merid.* : Paraguay.

Ews. : Balansa Pl. Parag. n. 3629.

helictophylla { *Ångstr.* — *Papillaria Ångstroemii*.
 Mont. — *Meteorium*.
 Wils. — *Lindigia imponderosa*.

Henscheni C. M. mss. ; *Ångstr.* in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 29.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

heteromalla (*Hedw.*) *Brid. Mant. M.* p. 139 et *Bryol. univ. II*, p. 250 ;
Bryol. eur. V, t. 438 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 561.

Cr. arborea *Lindb.* in *Oefv...* 1863, p. 392, n. 15.

Cr. vermicularis *Brid. Bryol. univ. II*, p. 253 ?

Daltonia heteromalla *H. et T. Musc. brit.* p. 81, t. 22.

Fontinalis secunda *L. jun. Meth. M.* p. 368.

Grimmia arborea *Schrank Bayers. Fl. II*, p. 445.

Hypnum heteromalum *Gmel. Syst. nat.* p. 1340.

H. polycephalum *Neck. Meth. M.* p. 190.

Neckera heteromalla *Hedw. M. frond. III*, p. 38, t. 15.

Phascum repens *With. Bot. Arrang.* p. 785.

Pilotrichum arboreum *P. B. Prodr.* p. 37.

P. heteromallum *Fürnr. in Fl. X, II, Beil. I*, p. 82 ; *C. M. Syn. II*,
 p. 167 (excl. var. β).

Sphagnum arboreum *Huds. Fl. angl. I ed.* p. 396 ; *L. Sp. pl. II ed., II*,
 p. 1570.

Sph. heteromallum, polycephalum *Dill. Hist. M.* p. 248, t. 32, f. 6.

Ad Oleas, Popul., Ulmos, etc. — *Eur.* : Britann., Neerland., vall.
 Rhen., occid. et merid. *Afr.* : Alger.

Ews. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 684 et b.

var. *aquatica* de Not. — *Cr. heteromalla* var. *aquatilis*.

« var. *aquatilis* *Wils. Bryol. brit.* p. 420 ; *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 420
 et *II ed. l. c.*

Cr. heteromalla var. *aquatica* de Not. *Epil.* p. 208 in obs.

Cr. heteromalla var. *Lamyi* *Boulay Fl. crypt. de l'Est*, p. 356.

Cr. Lamyi C. M. in *Linn.* 1844, p. 680.

Daltonia Lamyana *Mont. in Ann. Sc. nat. ser. II, VI*, p. 327, t. 18 et
Syll. p. 22.

Pilotrichum heteromallum β *aquatile* C. M. op. et l. cc.

Ad arb., rup. et sax. ab aqua fluit. superfusa. — *Eur.* : Angl. merid.,
 Gall. occid., Lusitan., Etruria.

heterophylla *Brid.* — *Neckera*.

indica *Mitt.* — *Asia*.

intermedia C. M. in *Linn.* 1847, p. 212.

Pilotrichum intermedium *ej. Syn. II*, p. 171.

— *Am. sept.* : Mexic.

? *inundata* *Nees in Pl. Maxim. v. Wied*, p. 27 ; *Sull. M. of U. St.*
 p. 56 (1).

Aquat. — *Am. sept.* : Illinois.

(1) « E descriptione pauperrima nil aliud nisi *Dichelyma capillaceum* vel *subulatum* videtur. » *Lesq. et Jam. Man.* p. 413.

Jamesoni Tayl. in *Lond. Journ. of Bot.* 1848, p. 192.

Pilotrichum Jamesoni C. M. *Syn.* II, p. 172.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

Lamyi C. M. — *Cr. heteromalla* var. *aquatis.*

latifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 411.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

laxifolia Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 310.

— *Afr.* : M. Usagara.

Lechleri C. M. — *Dendrocryphaea.*

Leiboldti C. M. — *Acrocryphaea mexicana.*

leiophylla *Bryol. eur.* V (mon p. 5) ; C. M. *Syn.* II, p. 674 ; W. P. Sch. et Par. *Mon. Cryph. ined.* (1).

— *Am. sept.* : Mexic.

leptoclada Sull. in *Proced. of the Amer. Acad.*... 1861, p. 283.

Ster. — *Am. sept.* : Cuba.

leptophylla W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined.* ; *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 70 (excl. syn. *Cr. leiophylla*).

— *Am. sept.* : Mexic.

leptopteris C. M. in *Ule Pl. Brasil.* n. 71.

— *Am. merid.* : Brasil.

Lindigiana W. P. Sch. et Par. *Mon. Cryph. ined.*

Cr. cuspidata Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, ser. V, IV, p. 353.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

longifolia W. P. Sch. — *Cr. nitidula* var. *longifolia.*

Lorentziana C. M. in *Linn.* 1880-1882, p. 468.

— *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

lutescens W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined.*

— *Am. sept.* : Mexic.

madagassa C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 210.

— *Afr.* : Madagascar.

maynensis Tayl. — *Acrocryphaea julacea.*

microcarpa W. P. Sch. — *Cr. nitidula.*

microcyathea Jaeg. — *Hedwigia.*

Mittenii Jaeg. *Ad.* II, p. 96.

Cr. apiculata Mitt. *M. austr. am.* p. 411.

— *Am. sept.* : Ins. Gorgone.

Moseni Broth. in *Mosen Pl. Brasil.* n. 87 a.

— *Am. merid.* : Brasil (Minas Geraës).

Mülleriana W. P. Sch. — *Cr. Sartorii.*

nanoclada Ångstr. *Prim. lin.* p. 30.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

nervosa (Hook. f. et Wils.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 5) ; Lesq. et Jam. *Man.* p. 277.

Daltonia nervosa H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1842, II, p. 420, t. 24 et in *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 100 ; Sull. *Id. M.* p. 109, t. 68.

Pilotrichum nervosum C. M. *Syn.* II, p. 169.

— *Am. sept.* : Alabama, Ludovic.

- nitens W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n. 1689 et Mon. Cryph. ined.*
— *Am. merid.* : And. Boliv.
- nitidula W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined. et in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 69.*
Cr. microcarpa ej. in sched.
— *Am. sept.* : Mexic., And. Costa Ricens.
- « *var. longifolia* W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined.*
Cr. longifolia ej. in sched.
— *Am. sept.* : Mexic.
- novo-granatensis Hpe. in *Ann. sc. nat. 1865, V ser., IV, p. 352*; W. P. Sch. et Par. *Mon. Cryph. ined.*
— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- orbifolia Besch. in *Journ. de bot. 1891, p.*
— *Am. merid.* : Monte Video.
- orizabensis W. P. Sch. — *Cr. subsimplex.*
- ovalifolia (C. M.) Jaeg. *Ad. II, p. 98.*
Pilotrichum ovalifolium C. M. in *Bot. Zeit. 1851, p. 564.*
Filicic. — *Pac.* : Austral. (Queensland).
- pachycarpa W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined. et in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 71.*
— *Am. sept.* : Mexic.
- paraguensis Besch. in *Bal. Pl. Parag. n. 3628.*
— *Am. merid.* : Paraguay.
- parvula Mitt. in *Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 460.*
Cr. consimilis H. f. et W. *Fl. N. Zeal. II, p. 101 et Fl. Tasman. II, p. 204.*
— *Pac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman.
- patens Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic. (excl. syn. Hypnum patens Hook.)*; W. P. Sch. et Par. *Mon. Cryph. ined.*; Mitt. *M. austr. am. p. 413.*
Pilotrichum Deppii (nomen mutatum) C. M. *Syn. II, p. 674.*
P. patens ej. op. cit. p. 171.
— *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Quitens.
- « *var. decurrens* (C. M.) W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined.*
Cr. decurrens Mitt. op. cit. p. 414.
Pilotrichum decurrens C. M. op. cit. p. 172.
— *Am. sept.* : Mexic.
- patens Hpe. — *Cr. attenuata.*
- pendula Lesq. et Jam. — *Cr. glomerata var. pendula.*
- pilifera Tayl. in *Spruce M. Amaz. et And. n. 1287*; Mitt. op. cit. p. 412.
— *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Quitens. et Boliv.
- pinnata *Bryol. Eur. V (mon. p. 5, nom.)*; C. M. *Syn. II, p. 675*; W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 70.*
— *Am. sept.* : Mexic.
- plicata Nees. — *Garovaglia.*
- polycarpa W. P. Sch. *Mon. Cryph. ined. et in Besch. op. cit. p. 71.*
— *Am. sept.* : Mexic.

protensa Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. II, n. 487.

Pilotrichum protensum C. M. Syn. II, p. 170 ? (1).

— Afr. : Abyss.

pulchella Par. et W. P. Sch. Mon. Cryph. ined.

Cr. tenella Mitt. M. austr. am. p. 414.

— Am. merid. : Chile.

Raddiana (Brid.) Hpe. Enum. M. Brasil. p. 39 (nom.).

Hypnum Raddianum Brid. Bryol. univ. II, p. 511 ; C. M. Syn. II, p. 510.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

ramosa Wils. in Spruce M. Amaz. et And. n. 1284 b.

Cr. affinis Mitt. in sched.

— Am. merid. : And. Quitens.

Ravenelii Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. 89 ; Lesq. et Jam. Man. p. 277 (2).

— Am. sept. : Georg.

reticulata Besch. op. cit. p. 69.

— Am. sept. : Mexic.

rhacomitrioides C. M. in Linn. 1880-82, p. 466.

— Am. merid. : Argentin. Tucuman.

« *var. gracilis* ej. in op. et l. cc.

Ut et ubi typ.

rubricaulis Mitt. — *Acrocryphaea*.

rufescens C. M. — *Dendropogon*.

Rutenbergii C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 210.

— Afr. : Madagascar.

Sartorii W. P. Sch. Mon. Cryph. ined. et in Besch. op. cit. p. 72.

Cr. Mülleriana ej. in sched.

— Am. sept. : Mexic.

scariosa C. M. in Fl. 1890, p. 486.

Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Schiedeana (C. M.) Mitt. op. cit. p. 413.

Cr. filiformis Hsch. in Deppe et Schiede M. Mexic.

Pilotrichum Schiedeana C. M. Syn. II, p. 167.

— Am. sept. : Mexic.

Schleinitziana (*Dendropogon*) C. M. — *Dendropogon* ?

sphaerocarpa Brid. Bryol. univ. II, p. 251 ; Mitt. M. Ind. or. p. 125.

Neckera sphaerocarpa Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 312, t. 27, f. I.

Pilotrichum sphaerocarpum C. M. Syn. II, p. 170.

— As. : Nepal., Himalaya.

squarrulosa Hpe. — *Cyrtodon*.

subintegra Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, II, p. 105.

— Afr. : Madagascar.

(1) *Peristomium simplex* ! nec duplex, ut ait C. M.

(2) « Probabiliter *Leptodon*. » Lesq. et Jam. l. c.

subsimplex W. P. Sch. Mon. Cryph. ined.

Cr. orizabensis ej. in sched. et in Besch. (Cr. Orizabae) op. cit. p. 70.

« var. congesta W. P. Sch. et Par. Mon. Cryph. ined.

Ut et ubi typ.

tasmanica Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 90; Hook. f. et Wils. Fl. Tasman. II, p. 204, t. 175, f. 9 (ic. pessima!) et Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 462.

Rupic. — Pac. : Nov. Zeland., Tasman.

tenella Hsch. in Sieb. M. Nov. Holl.

Neckera tenella Schwaegr. Suppl. II, II, t. 198.

Pilotrichum tenellum C. M. Syn. II, p. 166.

— Pac. : Austral.

tenella Mitt. — Cr. pulchella.

tenuissima H. f. et W. — Meteorium.

vermicularis Brid. — Cr. heteromalla ?

vitiana C. M. — Dendropogon Schleinitzianus.

Welwitschii Duby in Mem... Geneve, XXI, p. 3, t. 2, f. I.

Ad Coffeam arabicam et Diospyr. — Afr. : Angola, M. Usagara, Kilima N'Djaro, Madagascar.

viridissima C. M. in Wild Pl. Austral. n. 465.

— Pac. : Austral. (Queensland.).

Cryphæadelphus C. M. Syn. M. II, p. 144 (subsect. NECKERAE).

CRYPHIDIUM Mitt. M. austr. am. p. 457 (sect. NECKERAE) ; Jaeg. Ad. II, p. 178 (propr. gen.)

leucocoleum Jaeg. — Neckera.

CRYPTANGIUM C. M. in Linn. 1843, p. 599 (1 sp.).

gymnostomum (Bryol. eur.) Card. mon. p. 41.

Cr. Schomburgkii C. M. in Linn. 1843, p. 599.

Fontinalis gymnostoma Bryol. eur. V (mon. p. 4), t.

Hydropogon gymnostomum Mitt. M. austr. am. p. 449.

Pilotrichum gymnostomum C. M. Syn. II, p. 152.

l. Aquat. — Am. merid. : Guian. angl.

CRYPTOCARPON Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 502.

apiculatum eor. — Cryptocarpus.

CRYPTOCARPUS Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 37 (3 sp.)

apiculatus eor. l. c. t. 15 ; C. M. Syn. I, p. 718 ; Bryol. jav. I, p. 110 et II, p. 226.

Cryptocarpus apiculatus eor. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 502.

Macromitrium brachiatum Hook. f. et Wils. in Hook. Ic. pl. rar. 1845, t. 746 B.

Syn. Ad arbor. — As. : Ins. Philippin., Amboine, Borneo, Java, Sumatra.

cymosus Mitt. in Fl. Vit. p. 381.

— Pac. : Nov. Caledon.

marginatulus C. M. mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 93 (nom.).

— As. : Birman.

CRYPTOGONIUM *Lindb. in Oefv.... 1873, p. 603.*

cylindricum Lindb. — Phyllogonium.

CRYPTOPODIA *Roehl. Deutsch. Fl. III, p. 82.*

pennata Roehl. — Neckera.

CRYPTOPODIUM *Brid. Bryol. univ. II, p. 30 (5 spec.).*

Bartramia Schwaegr. — Cr. *bartramioides*.

bartramioides (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ. II, p. 31; Hook. f. et Wils. Fl. of the Nov. Zel. II, p. 88 et Handb. p. 446.*

Bartramia Cryptopodium C. M. *Syn. II, p. 507.*

Bryum Bartramia Schwaegr. *Suppl. II, II, p. 25, t. 160.*

Br. bartramioides *Hook. M. ex. t. 18.*

Cr. Bartramia Schwaegr. *Sp. M. p. 90.*

2. — *Pac. : Ins. Sandwic., Nov. Zeland.*

bartramioides Ångstr. — *Rhizogonium strictum.*

capillare *Hpe. Symb. 1874, in adn. n° 47 (nom.).*

2. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

Hookeri *Hpe. in Linn. 1847, p. 75.*

Bartramia Jamesoni *Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 334; C. M. Syn. I, p. 500 et II, p. 619. Mitt. M. austr. am. p. 269.*

B. viridissima C. M. *op. cit. I, p. 496.*

Leucodon bartramioides *Hook. Ic. pl. rar. I, t. 71.*

Syn. Ad arbor. — Am. sept. : Jamaïc. Am. merid. : Columb., And. Nov. Granat. et Quitens.

« *var. borbonicum* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 102.*
— *Afr. : Ins. Borbon?*

lutescens (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 538.*

Bartramia lutescens *Hpe. in Ann. sc. nat. III ser., p. 339; Mitt. l. c.*

— *Am. merid. : And. Nov. Granat.*

piligerum *Hpe. Symb. 1874, n. 47.*

2. *Ster.* — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

CRYPTOTHECA *Hsch. in Deppe et Schiede M. Mexic.*

Species omn. PTEROBRYA ejusd. nom.

CTENIDIUM *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 631 (subgen. HYPNI); Mitt. M. austr. am. (gen. propr.).*

Species omn. non indicatae sunt HYPNA ejusd. nom.

Berthelotianum Mitt. — *Hylocomium.*

Ctenium *W. P. Sch. l. c. (subgen. HYPNI).*

Cupressina *C. M. Syn. M. II, p. 289 (sect. HYPNI).*

Cupressinadelphus *C. M. Syn. II, p. 215 (subsect. HOOKERIAE).*

CYATOPHORUM *P. Beauv. Prodr. p. 52 (10 spec.).*

Adiantum (*Griff.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 147; Bryol. jav. II, p. 4, t. 134.*

Neckera Adiantum *Griff. Ic. pl. asiat. II, t. 85, f. 2?*

2. — *As. : Sikkim, Khasia, M. Java.*

bulbosum (*Hedw.*) *C. M. Syn.* II, p. 54.

Anoetangium bulbosum Hedw. Sp. M. p. 43, t. 6.

C. pennatum Brid. Bryol. univ. II, p. 722.

C. pteridioides P. B. Prodr. p. 52.

Hookeria pennata Sm. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 277; *Hook. M. ex. t.* 163.

Leskea pennata Labill. Pl. Nov. Holl. II, p. 106, t. 253.

Pterygophyllum pennatum Brid. Mant. p. 154.

— *Pac.* : Austral. fel., Nov. Zeland., ins. Auckland.

« *var. apiculatum Hook. f. et Wils. Handb. N. Zeal. Fl.* p. 490.

— *Pac.* : Nov. Zeland. med.

« *var. minus eor. Fl. Antarct. I,* p. 143, t. 62, f. 3.

— *Pac.* : Tasman, ins. Auckland.

densirete Broth. in Oefv... 1893, p.

2. *Ad arbor.* — *Pac.* : Tasman.

Hookerianum (Griff.) Mitt. op. et l. cc.

Neckera Hookeriana Griff. Ic. pl. asiat. II, t. 84, f. 2 A.

— *As.* : Sikkim, Khasia.

intermedium Mitt. op. cit. p. 148.

Ster. — *As.* : Himalaya occ.

parvifolium Bryol. jav. II, p. 5, t. 135.

2. *Ster?* — *As.* : M. Jaya.

pennatum Brid. — *C. bulbosum.*

pteridioides P. B. — *C. bulbosum.*

splendidissimum (Mont.) Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 188.

Hookeria speciosissima Schwaegr. t. 328 (*fid. Mitt.*).

H. splendidissima Mont. in Ann. sc. nat. II ser., IV, p. 96 et in *d'Orbigny Voy. Amer. VII, Crypt.* p. 110; *C. M. Syn. II,* p. 203.

Lamprophyllum splendidissimum W. P. Sch. Coroll. p. 101.

Lepidopilum splendidissimum Mitt. M. austr. am. p. 378.

2. *Cortic.* — *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez, Chile, Valdivia.

sublimbatum Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 309.

Ster. — *As.* : Ceylan.

taïtense Besch. in Ann. sc. nat. 1894, p.

2. *Cortic?* — *Pac.* : Taïti.

tenerum Bryol. jav. II, p. 6, t. 136.

Hookeria spinosa Dz. et Mk. in Zoll. Syst. Verz. p. 26.

2. *Ster.?* — *As.* : Ins. Bima, Sumatra.

CYCLODICTYON *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 163 (postea sect. *HOOKERIAE*).

laetevirens Mitt. — *Hookeria.*

CYLICOCARPUS *Lindb. in Oefv...* 1862.

lapponicus Lindb. — *Amphoridium.*

Mongeotii Lindb. — *Amphoridium.*

CYLINDROTHECIUM *Bryol. eur. V* (107 spec.).

abbreviatum Bryol. eur. V (*mon. p.* , *nomen*); *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 93.

Entodon abbreviatus Jaeg. Ad. II, p. 356.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

aciculare (*C. M. et Kindb.*) *Par.*

Entodon acicularis *C. M. et K. in Bidrag p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 176.*

Ster. Rupic.

— *Am. sept.* : Ontario.

amplirete *Wright.* — *Lepidopilum.*

angustifolium (*Mitt.*) *Par.*

Entodon angustifolius *Jaeg. Ad. II, p. 353.*

Stereodon angustifolius *Mitt. M. Ind. or. p. 106.*

Ster.

— *As.* : Tonkin, Sikkim.

angustifolium *Besch.* — *C. Hahnianum.*

argyraeum *Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 19 et in Journ. de bot. 1891, p.*

Entodon denticulatus *C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57.*

l. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.

Ews. : Bal. n. 3678.

attenuatum (*Mitt.*) *Par.*

Entodon attenuatus *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 179.*

l.

— *As.* : Japon.

Eas. : Faurie n. 122, 213.

aurescens (*Hpe.*) *W. P. Sch. in op. cit. p. 96.*

Entodon aurescens *Hpe. in Ann. sc. nat. 1865, p. 369.*

Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba). *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

« *var. major* *Besch. in sched.*

Ut et ubi typ. in *Am. sept.*

aureum (*Hook.*) *Par.*

Entodon aureus *Jaeg. Ad. II, p. 743.*

Leskea aurea *Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, II, p. 16.*

Neckera aurea *C. M. Syn. II, p. 86.*

Platygyrium aureum *Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 743.*

Pleuropus densus *Griff. Not. p. 467 et Ic. pl. asiat. II, t. 89, f. 1, t. 90, f. 2 et in Calcutta Journ. nat. hist. III, t. 17.*

Pterigynandrum aureum *Brid. Bryol. univ. II, p. 180.*

Pterogonium aureum *Hook. M. ex. t. 147.*

Stereodon aureus *Mitt. M. Ind. or. p. 94.*

l.

— *As.* : Nepal., Himalaya, Khasia.

Bandongiae (*C. M.*) *Bryol. jav. II, p. 127, t. 230.*

Neckera Bandongiae *C. M. Syn. II, p. 665.*

l. Ad arbor. — *As.* : Celebes, Java, Sumatra.

Batangae (*C. M.*) *Par.*

Entodon Batangae *C. M. in Dusen M. Camer. n. 682.*

— *Afr.* : M. Cameroon.

Beyrichii (*Schwaegr.*) *Par.*

Entodon Beyrichii *C. M. in Linn. 1844, p. 701 ; Mitt. M. austr. am. p. 525.*

Neckera Beyrichii *Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 162, t. 197 ; C. M. Syn. II, p. 66.*

l. Ad arbor. — *Am. sept.* : Nicaragua. *Am. merid.* : Peruv., Brasil (1).

(1) Quid *Cylindrothecium breve* *W. P. Sch. a cl. Ragazzi in Choa lectum* (Cf. *R. Pirotta in Annuar. del R. Istit. bot. di Roma, 1893, V, fasc. II*) ?

brevipes W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 94.

Entodon brevipes Jaeg. *Ad. II*, p. 356.

l. — *Am. sept.* : Mexic.

brevirostre *Bryol. eur.* V (mon p. , nomen) ; W. P. Sch. in *op. cit.* p. 93.

Entodon brevirostris Jaeg. *Ad. II*, p. 355.

— *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

brevisetum (*Hook. f. et Wils.*) *Bryol. eur.* V (mon. p. 4) ; *Sull. M. of U. St.* p. 65 et *Ic. M.* p. 150, t. 96 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 311.

Entodon brevisetus Jaeg. *Ad. II*, p. 357.

Neckera breviseta H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1842, p. 419, t. 24 ; *C. M. Syn. II*, p. 70.

l. Lignic. — *Am. sept.* : Terr. nov., New Brunswick, reg. sept. et centr.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 95 (*Neckera*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 391.

caliginosum (*Mitt.*) *Par.*

Entodon caliginosus Jaeg. *Ad. II*, p. 351.

Stereodon caliginosus Mitt. *M. Ind. or.* p. 108.

l. — *As.* : Nepal. or.

Cameruniae (*C. M.*) *Par.*

Entodon Cameruniae C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 220.

— *Afr.* : M. Cameroon.

cernuum (*C. M.*) *Par.*

Entodon cernuus Jaeg. *Ad. II*, p. 361.

Neckera cernua C. M. *Syn. II*, p. 364.

l. — *As.* : Java.

Challengeri *Par.*

Entodon abbreviatus Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 179 ; *Faurie Pl. Japon.* n. 122 et 213.

l. Lignic. — *As.* : Japon.

cladorhizans (*Hedw.*) W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 514 et *II ed.* p. 625.

Anomodon cladorhizans Hüb. *Muscol. germ.* p. 557.

C. Schleicheri *Bryol. eur.* V (mon. p. 5), t. 468 (*ic. sub* *Entod. europ.*).

Entodon cladorhizans C. M. in *Linn.* 1844, p. 707.

E. Schleicheri Lindb. *M. Scand.* p. 39.

E. transilvanicus Demetr. in *Hedw.* 1884, p. 81 (1).

Hypnum cladorhizans Poir.

Neckera cladorhizans Hedw. *Sp. M.* p. 207, t. 47 ; *Bryol. univ.* II, p. 229 ; *C. M. Syn. II*, p. 70.

l. Ad mur., rup., saxa et (*in Amer.*) rad. arb. — *Eur.* : In vall. tract. alp. zon. interm. : Voges., Silv. Nigr., Helvet., Ital. super., Austr. inf., etc. ; deest in Scand. , Britann. et Germann. sept. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : New Brunswick, Ottawa, Ontar., reg. sept., or., centr. et merid.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed., n. 160 p.p. et II ed. n. 96 (*Neckera*).

Mac. Canad. M. n. 263.

Rab. Bryoth. eur. n. 343 et b, 767.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 386.

Un itin. 1863, n. 33.

(1) Cf. Demeter in *Rev. bryol.* 1885, p. 85.

columnare (*Schwaegr.*) *Par.*

Entodon columnaris Mitt. *M. austr. am.* p. 528.

E. Schwaegrichenii C. M. in *Linn.* 1844, p. 705.

Neckera columnaris *Schwaegr. Suppl. IV*, p. 319; *C. M. Syn. II*, p. 62.

1. — *Am. merid.* : Brasil.

comes (*Griff.*) *Par.*

Entodon comes *Jaeg. Ad. II*, p. 360.

Neckera comes *Griff. Not. p.* 458 *et Ic. pl. asiat. t.* 86, *f.* 2.

Stereodon comes Mitt. *M. Ind. or.* p. 109.

— *As.* : Himalaya, Khasia, Ceylan.

complanatum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 95.

Entodon complanatus *Jaeg. Ad. II*, p. 349.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

complicatum (C. M.) *Par.*

Entodon complicatus Mitt. *M. austr. am.* p. 525.

E. myurus *Hpe. in Linn.* 1847, p. 82 ?

Neckera complicata C. M. *Syn. II*, pp. 66 et 665.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

compressum (*Hedw.*) *Bryol. eur. V* (mon. p. 4) ; *Sulliv. M. of U. St.* p. 64 *et Ic. M.* p. 147, *t.* 93 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 312.

Anomodon compressus *Br. mss.*

Entodon compressus C. M. in *Linn.* 1844, p. 707.

Hypnum Mühlenbergii P. B. *Prodr.* p. 66.

H. pensilvanicum *Poir. Encycl. bot. Suppl. III*, p. 707.

Isothecium compressum *Hpe. mss.* ; *Sull. in A. Gray Man. bot. of U. St. I ed.* p. 667.

Leskea compressa *Hedw. Sp. M.* p. 232, *t.* 56 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 287.

Neckera compressa C. M. *Syn. II*, p. 66.

1. Ad arbor. — *As.* : Jenissei sup., Japon. *Am. sept.* : de Pensilv. ad Missouri ; Ohio, reg. merid.

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.* 388.

concinnum (*de Not.*) W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 515 *et II ed.* p. 626.

C. Montagnei *Bryol. eur. V* (mon. p. 6), *t.* 469.

Entodon insidiosus *Spr. in Ann. and Magaz. of nat. Hist.* 1849 *et M. Pyren. n.* 102.

E. Montagnei C. M. in *Linn.* 1844, p. 708.

E. orthocarpus *Lindb. M. Scand.* p. 39.

Hypnum concinnum *de Not. Mant. n.* 18 *et Syll. M. ital.* p. 45.

H. orthocarpum la Pyl. in Brid. Bryol. univ. II, p. 422.

H. paradoxum *Mont. in sched.*

H. Schreberi γ *orthocarpum* *Brid. op. et l. cc.*

Isothecium insidiosum *Mont. in Ann. sc. nat.* 1843, p. 352, *t.* 15 *et Syll.* p. 18.

Neckera orthocarpa C. M. *Syn. II*, p. 69.

2. In pratis sicc., ad agger. et in steril., etc. — *Eur.* : Fere tota, praecip. in calcar., rariss. fructif. *As.* : Jenissei sup. et med., Persia, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Colorado.

cupressiforme (*Hpe.*) *Par.*

Entodon cupressiformis *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 372 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 530.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

curvatum (*Griff.*) *Par.*

Entodon curvatus *Jaeg. Ad. II*, p. 359.

Neckera curvata *Griff. Not. p.* 451 *et Ic. pl. asiat. II*, *t.* 86, *f.* I.

Ad rup. torrent. — *As.* : Khasia.

Daemeli (*C. M.*) *Par.*

Entodon Daemeli *C. M. in sched.*

— *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

Delavayi (*Besch.*) *Par.*

Entodon Delavayi *Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, *I*, p. 87.

l. Saxic. — *As.* : Yunnan.

« *var. rufulum (Besch.) Par.*

Entodon Delavayi *var. rufulus Besch. op. cit.* p. 88.

Ut et ubi typ.

Demetrii *Ren. et Card. in Rev. bryol.* 1893, p. 14 (*nom.*) (1).

— *Am. sept.* : Missouri.

distanis (*C. M.*) *Par.*

Entodon distans *Mitt. M. austr. am.* p. 527.

E. Hampeanus C. M. in Linn. 1847, p. 214.

Neckera distans ej. Syn. II, p. 61.

l. — *Am. merid.* : Venezuela.

Dregeanum (*Hsch.*) *Par.*

Entodon Dregeanus *C. M. in Linn.* 1844, p. 706.

Neckera Dregeana Hsch. in eod. op. 1841, p. 139 ; *C. M. Syn. II*, p. 63.

l. — *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.

Exs. : *Rehm. M. Afr. austr. n.* 648 b.

« *var. imbricatum Rehm. M. Afr. austr. n.* 330 et 649 b.

Entodon enervis *ej. in Rev. bryol.* 1878, p. 71 (*nom.*).

— *Afr.* : Transvaal, Natal.

Drummondii *Bryol. eur.* V (*mon. p.* 4, *nom.*) ; *Sull. M. of U. St. p.* 64 et
Ic. M. p. 148, *t.* 94 ; *Lesq. et Jam. Man. p.* 312.

C. Regelianum Bryol. eur. l. c.

Entodon Drummondii *Jaeg. Ad. II*, p. 348.

Neckera cladorhizans H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed. n. 96.

Lignic. et saxic. — *Am. sept.* : Reg. merid.

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.* 390.

Drummondii Mac. p.p. { — *C. Macounii.*
 { — *Hypnum subflaccum.*

erythropus (*Mitt.*) *Par.*

Entodon erythropus *Mitt. M. austr. am.* p. 525.

l. — *Am. merid.* : And. Quitens.

? expallens (*C. M. et Kindb.*) *Par.*

Entodon (*Rhaphidostegium* ?) expallens *C. M. et K. in Mac. Cat. p.* 177.

Ster. Paludic. in silv. — *Am. sept.* : Summ. M. Rupestr.

Felicis (*Ren. et Card.*) *Par.*

Entodon Felicis *R. et C. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, *II*, p. 108.

— *Afr.* : Madagasc.

flavescens (*Schwaegr.*) *Par.*

Entodon flavescens *Jaeg. Ad. II*, p. 359 (*excl. syn. Hook.*).

Neckera coarctata C. M. Syn. II, p. 69 p.p. (*fid. Mitt. M. Ind. or.*
p. 108).

(1) An varietas *C. cladorhizantis* ?

N. flavescens Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 116, t. 141; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 234.

Stereodon Schwaegrichenii Mitt. *op. et l. cc.*

1. — *As.* : Nepal.

flavo-virens (C. M.) Par.

Entodon flavo-virens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 426.

— *Am. merid.* : M. Argentin. subtropic.

« *var. flagellaceus* (C. M.) Par.

Entodon flavo-virens var. flagellaceus C. M. l. c.

Ubi typ.

floridanum Duby in *Fl.* 1875, p. 284 et *Choix de crypt. ex.* 1875, p. 10, t. 2, f. 4.

Entodon floridanus Jaeg. *Ad. II*, p. 349.

— *Am. sept.* : Florid.

fulvo-nitens (Mitt.) Par.

Entodon fulvo-nitens Jaeg. *Ad. II*, p. 360.

Stereodon fulvo-nitens Mitt. *M. Ind. or.* p. 109.

Ster. — *As.* : Nepal.

geminidens Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 152.

1. Terr. — *Afr.* : Ins. Borbon.

gracile Ångstr. in *Oefv...* 1876, p. 45.

Entodon gracilis Jaeg. *Ad. II*, p. 352.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

gracilescens Bryol. eur. — C. *Sullivantii*.

gracilisetum (Hpe.) Par.

Entodon gracilisetus Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 368; Mitt. *M. austr. am.* p. 529.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Griffithii (Mitt.) Par.

Entodon Griffithii Jaeg. *Ad. II*, p. 359.

Stereodon Griffithii Mitt. *M. Ind. or.* p. 108.

1. — *As.* : Assam super., Yunnan.

guinense Ångstr. — *Trichosteleum*.

Hahnianum (Jaeg.) Par.

C. angustifolium Besch. in sched.

Entodon Hahnianus Jaeg. *Ad.* p. 356.

— *Am. sept.* : Mexic.

Hampeanum (C. M.) Par.

Entodon Hampeanus C. M. in *Linn.* 1844, p. 705; Mitt. *M. austr. am.* p. 526.

Neckera Hampeana ej. *Syn. II*, p. 60.

1. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Quito s.

Hartmanni (C. M.) Par.

Entodon Hartmanni C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 43 (nom.).

— *Pac.* : Austral. or. (Queensland.).

incurvatum (Hsch.) Par.

Entodon incurvatus Mitt. *M. austr. am.* p. 531.

Neckera incurvata Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 53; C. M. *Syn. II*, p. 320.

— *Am. merid.* : Brasil.

Jamesoni (Tayl.) Par.

Entodon Jamesoni Mitt. *op. cit.* p. 528.

E. lutescens Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 370 (*fid. Mitt. l. c.*).

E. polycarpus Hpe. *l. c.* (*fid. Mitt. l. c.*).

Neckera leptocarpa H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 452, t. 15 L; *C. M. Syn. II*, p. 61.

Pterogonium Jamesoni Tayl. in *Lond. Journ. of bot. l. c.* p. 59.

1 ? Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

japonicum (C. M.) Par.

Entodon japonicus C. M. *mss.* ; *Jaeg. Ad. II*, p. 357.

— *As.* : Japon.

laetum (Mitt.) Par.

Entodon laetus *Jaeg. Ad. II*, p. 361.

Neckera laeta Griff. *Not. p.* 459 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 87, f. 7.

Stereodon laetus Mitt. *M. Ind. or. p.* 107.

1. — *As.* : Khasia.

Lindbergii (Hpe.) Par.

Entodon Lindbergii Hpe. *Symb. p.* 274.

E. subenervis *Jaeg. Ad. II*, p. 354.

1. Ad arbor. et rup. — *Am. merid.* : Brasil.

longifolium (C. M.) Par.

Entodon longifolius *Jaeg. Ad. II*, p. 361.

Neckera longifolia C. M. *Syn. II*, p. 60.

1 ? — *As.* : Bombay.

luridum (Griff.) Par.

Entodon luridus *Jaeg. Ad. II*, p. 360.

Neckera lurida Griff. *Not. p.* 452.

Stereodon luridus Mitt. *M. Ind. or. p.* 109.

Rupic. — *As.* : Khasia.

lutescens (Hpe.) Par.

Entodon Jamesoni (*fid. Mitt. M. austr. am. p.* 528).

E. lutescens Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 370.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Mac-Kaviense (C. M.) Par.

Entodon Mac-Kaviensis C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 155.

1. — *Pac.* : Austral. or.

Macounii (C. M. et Kindb.) Par.

C. Drummondii Mac. *Canad. M. n.* 436 p.p.

Entodon Macounii C. M. et K. in *Bidr. p.* 454 (*nom.*) et in *Mac. Cat. p.* 177.

2. Terr. — *Am. sept.* : Ontario.

macropodium (Hedw.) Par.

Entodon macropodus C. M. in *Linn.* 1844, p. 707 ; *Mitt. M. austr. am. p.* 526.

Neckera macropoda Hedw. *M. frond. III*, p. 55, t. 23 ; *C. M. Syn. II*, p. 59.

N. Distichia macropoda Brid. *Bryol. univ. II*, p. 248.

1 ? Ad arbor. — *Am. sept.* : Jamaïc., Cuba. *Am. merid.* : Venezuela, Nov. Granat, Brasil.

madagassum (C. M.) Par.

Entodon madagassus C. M. in *Abhandl. Brem. VII*, p. 211.

1. — *Afr.* : Madagascar.

Mandoni W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1693.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

mechoacanam (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 96.

Entodon mechoacanus Jaeg. *Ad. II*, p. 356.

Neckera mechoacana C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 766.

l. — *Am. sept.* : Mexic.

micropodon (Besch.) Par.

Entodon micropodus Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 87.

l. — *As.* : Yunnan.

Montagnei Bryol. eur. — C. concinnum.

Motelayi Besch. in *Journ. de bot.* 1891, p.

l. Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.

Mühlenbergii Bryol. eur. — C. seductrix.

myosurella (C. M.) Par.

Entodon myosurella C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia.).

myurum (Schwaegr.) Par.

Entodon myurus Jaeg. *Ad. II*, p. 360.

Neckera myura Schwaegr. *Suppl. III*, I, I, t. 217; C. M. *Syn. II*, p. 67.

Pterigynandrum myurum Brid. *Bryol. univ. II*, pp. 176 et 750.

Pterogonium myurum Hook. *M. ex. t.* 148.

Stereodon Gardneri Mitt. *M. Ind. or.* p. 107.

l. — *As.* : Nepal., Himalaya.

« var. hokinense (Besch.) Par.

Entodon myurus var. hokinensis Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 86.

In silv. — *As.* : Yunnan.

natalense (Rehm.) Par.

Entodon natalensis Rehm. *M. Afr. austr. n.* 331.

— *Afr.* : Natal.

neglectum (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 97.

Entodon neglectus Mitt. *M. austr. am.* p. 527.

Leskea sciuroides Hsch. in *Deppe M. Mexic.*

Neckera neglecta C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 437.

l. — *Am. sept.* : Mexic.

N'goloae (C. M.) Par.

Entodon N'goloae C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 679.

— *Afr.* : M. Cameroon.

nitens W. P. Sch. in Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 95.

Entodon nitens Jaeg. *Ad. II*, p. 345.

l. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba, Cordoba).

Novae Valesiae (Hpe.) Par.

Entodon Novae Valesiae Hpe. *mss.* ; Jaeg. *Ad. II*, p. 744.

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

orizabanum W. P. Sch. in *op. et l. cc.*

Entodon orizabanus Jaeg. *Ad. II*, p. 349.

l. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

pallescens (C. M.) Par.

Entodon macropodus C. M. in *Linn.* 1847, p. 214.

E. pallescens Mitt. *M. austr. am.* p. 526.

Neckera pallescens C. M. *Syn. II*, p. 63.

1. — *Am. sept.* : Jamaïc. *Am. merid.* : Venezuela,
And. Quitens.

pallidisetum (Mitt.) Par.

Entodon pallidisetus Mitt. *op. et l. cc.*

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

pallidum (Mitt.) Besch. *Fl. bryol. Nov. Caledon.* p. 236.

Entodon pallidus Mitt. *Fl. Vit.* p. 398.

In silv. ad *Corallia* emerg. — *Afr.* : Ins. S. Paul. *Pac.* : Ins. Taïti,
Nov. Hibern., Nov. Hebrid., Nov. Caledon., ins. Lord Howe.

Pancherianum Besch. *op. cit.* p. 235.

1. Ad terr. argill. — *Pac.* : Nov. Caledon.

platygyrioides (C. M.) Par.

Entodon platygyrioides C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 431.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

plicatum (C. M.) Par.

Entodon plicatus C. M. in *Linn.* 1844, p. 706.

Isothecium Beyrichii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1842, M. Neilgherr. n. 19.

Neckera plicata C. M. *Syn. II*, p. 60.

Pterogonium aureum Griff. *Not.* p. 449.

Stereodon plicatus Mitt. *M. Ind. or.* p. 106.

1. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia, Assam, Madras,
M. Neilgherr., Ceylan.

polycarpum (Hpe.) W. P. Sch. in Besch. *Prodr. bryol. exic.* p. 93.

Entodon Jamesoni (fid. Mitt. *M. austr. am.* p. 528).

E. polycarpus Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, p. 370.

— *Am. sept.* : Mexic. And. Costa Ric. *Am. merid.* : And.
Nov. Granat.

propinquum (Hpe.) Par.

Entodon propinquus Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, p. 369; Mitt. *M. austr. am.* p. 530.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

prorepens (Mitt.) Par.

Entodon prorepens Jaeg. *Ad. II*, p. 360.

Stereodon prorepens Mitt. *M. Ind. or.* p. 107.

1. — As. : Nepal, Assam.

pseudo-seductrix (C. M.) Par.

Entodon pseudo-seductrix Jaeg. *Ad. II*, p. 358.

Neckera pseudo-seductrix C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 230.

1. — *Afr.* : Ins. Cap. Viridis.

pulchellum (Griff.) Par.

Entodon pulchellus Jaeg. *Ad. II*, p. 360.

Neckera pulchella Griff. *Not.* p. 453 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 87, f. 6.

Stereodon pulchellus Mitt. *op. cit.* p. 109.

In silv. — As. : Khasia.

ramosissimum (Hpe.) Par.

Entodon ramosissimus Hpe. in *op. cit.* p. 371; Mitt. *op. cit.* p. 529.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

ramulosum (Mitt.) Par.

Entodon ramulosus Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 179.

E. subcompressus Broth. in sched.

2. — As. : Japon.

repens de Not. — Platygyrium.

rubicundum Wils. in sched.

Entodon rubicundus Jaeg. Ad. II, p. 351.

Neckera coarctata C. M. Syn. II, p. 69 p.p. (fid. Mitt. M. Ind. or. p. 108).

N. flavescens Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 314, t. 27, f. 2;
Brid. Bryol. univ. II, p. 234.

Stereodon rubicundus Mitt. op. et l. cc.

1. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia.

Rugelianum Bryol. eur. — C. Drummondii.

Rutenbergii (C. M.) Par.

Entodon Rutenbergii C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 211.

1. — Afr. Madagascar.

scabridens (Lindb.) Par.

Entodon scabridens Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 253.

1. — As. : Saghalien.

Schimperi (Hpe.) Par.

Entodon abyssinicus Jaeg. Ad. II, p. 359.

E. Schimperi Hpe. in Linn. 1847, p. 83.

Leptohymenium julaceum Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 423.

Neckera abyssinica C. M. Syn. II, p. 71.

Stereodon abyssinicus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 157.

1. Ad arbor. — Afr. : Abyssin., Choa, M. Cameroon.

Schleicheri Bryol. eur. — C. cladorhizans.

Schlimianum (C. M.) Par.

Entodon Schlimianus C. M. in sched.

— Am. merid. : Nov. Granat.

seductrix (Hedw.) Sull. M. of U. St. p. 64 et Ic. M. p. 145, t. 92.

C. Mühlenbergii Bryol. eur. V (mon. p. 4).

Entodon seductrix C. M. in Linn. 1847, p. 214.

Neckera cladorhizans Drumm. M. bor. am. I ed. n. 160 p.p.

N. seductrix Hedw. Sp. M. p. 208, t. 47; Brid. Bryol. univ. II, p. 131;

C. M. Syn. II, p. 72 (incl. β gracilis).

Pterigynandrum carolinianum Brid. op. cit. p. 184.

Pt. obtusifolium ej. op. cit. p. 182.

Pterogonium carolinianum Schwaegr. Suppl. I, I, p. 108.

1. Lignic. — Am. sept. : Ontario, Washington, Idaho, Wyoming,
reg. sept., centr. or. et merid.

serrulatum (Mitt.) Par.

Entodon serrulatus Mitt. M. austr. am. p. 632.

— Am. merid. : Guatemala.

Solanderi Ångstr. in Oefv... 1873, n. 5, p. 122.

Entodon Solanderi Jaeg. Ad. II, p. 358.

1 ? Lignic. — Pac. : Taïti.

splendidulum (Hpe.) Par.

Entodon splendidulus Hpe. Symb. 1870, p. 274.

1. Terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

stenocarpum *Bryol. eur.* V (mon. p. 4, nom.) ; *W. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 94.

Entodon stenocarpus *Jaeg. Ad. II*, p. 356.

Isothecium stenocarpum *W. P. Sch. in hb. Mus. Paris.*

— *Am. sept.* : Mexic.

stramineum *Besch. Fl. bryol. Nouv. Caled.* p. 236.

Entodon stramineus *Jaeg. Ad. II*, p. 357.

1. In silv. — *Pac.* : Nov. Caledon.

suberythropus (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 427.

1. Ad mur. et terr. — *Am. merid.* : And. Boliv., Argentin. subtropic.

« *var. complanatum* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. complanatum *C. M. in op. cit.* p. 428.

Ut typ. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

« *var. ellipticum* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. ellipticum *C. M. in op. et l. cc.*

Ut et ubi praeced.

« *var. flaccidum* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. flaccidus *C. M. in op. cit.* p. 430.

Ut et ubi praeced.

« *var. gracillimum* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. gracillimum *C. M. in op. et l. cc.*

Ad arbor. et rup. — Ubi praeced.

« *var. lutescens* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. lutescens *C. M. in op. et l. cc.*

Ut et ubi prim. var.

« *var. microtheca* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. microtheca *C. M. in op. et l. cc.*

Ut et ubi praeced.

« *var. myosuroides* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. myosuroides *C. M. in op. cit.* p. 429.

Ut et ubi praeced.

« *var. rufulum* (*C. M.*) *Par.*

Entodon suberythropus var. rufulum *C. M. in op. et l. cc.*

Ut et ubi praeced.

subsecundum *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 96.

Entodon subsecundus *Jaeg. Ad. II*, p. 351.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

Sullivantii *Bryol. eur.* V (mon. p. 4, nom.) ; *Sull. M. of U. St.* p. 64 et *Ic. M.* p. 149, t. 95.

C. gracilescens *Bryol. eur.* l. c.

Entodon Sullivantii *Lindb. Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or.* p. 233.

Leskea compressa *Sull. M. Allegh. n.* 64.

Neckera Sullivantii *C. M. Syn. II*, p. 65.

1. Saxic. in silv. — *As.* : Japon. *Am. sept.* : Tennessee, Carol. infer.

Ews. : *Sull. et Lesq. M. bor. am.* 11 ed. n. 389.

tenellum *W. P. Sch. in sched.*

Entodon tenellus *Jaeg. Ad. II, p. 350.*

— *Am. sept. : Mexic.*

Thomsoni (*Mitt.*) *Par.*

Entodon Thomsoni *Jaeg. Ad. II, p. 360.*

Stereodon Thomsoni *Mitt. M. Ind. or. p. 107.*

1. — *As. : Himalaya occ.*

Toowomba (*C. M.*) *Par.*

Entodon Toowomba *C. M. in Rev. bryol. 1877, p. 43 (nom.).*

— *Pac. : Austral. or. (Queensland).*

truncatum (*C. M.*) *Par.*

Entodon truncatus *Mitt. M. austr. am. p. 528.*

Neckera truncata *C. M. Syn. II, p. 62.*

1. — *Am. merid. : Chile.*

truncorum (*Mitt.*) *Par.*

Entodon truncorum *Mitt. in Hook. f. Handb. of N. Zeal. Fl. p. 467.*

— *Pac. : Nov. Zeland.*

? turgidum *Ångstr. in Oefv... 1873, n. 5, p. 124.*

? Entodon turgidus *Jaeg. Ad. II, p. 358.*

Ster. — *Pac. : Taïti.*

virens (*Hook. f. et Wils.*) *Par.*

Entodon fissidens *C. M. in Bot. Zeit. 1844, p. 740.*

E. virens Mitt. M. austr. am. p. 527.

Neckera virens H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 158 ; C. M. Syn. II, p. 64.

1. *Rupic.* — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

viride *Duby in Mem... Genève, 1869, p. 14, t. 4, f. 3.*

Entodon viridis *Jaeg. Ad. II, p. 345.*

1. *Ad arbor.* — *Am. sept. : Mexic.*

Wagneri (*Ltz.*) *Par.*

Entodon Wagneri *Ltz. Moost. p. 164.*

1. *Rupic.* — *Am. merid. : M. Pichincha.*

Wilkesianum (*Sull.*) *Par.*

Entodon Wilkesianus *Reichdt. Beitr. p. 581.*

Hypnum Wilkesianum Sull. in Proced... 1854.

— *Pac. : Ins. Hawaï, S. Vincent (1).*

CYMBARIA *Tayl. in Lond. Journ. of bot. VII, p. 190.*

Jamesoni Tayl. — *Eustichia longirostris.*

CYNODON *Brid. Mant. M. p. 99 et Bryol. univ. I, p. 500.*

cernuus *Brid.* — *Bryum pendulum.*

inclinatus *Brid.* — *Distichium.*

latifolius *Brid.* — *Desmatodon cernuus.*

luridus *Brid.* — *Didymodon.*

proscriptus *Brid.* — *Leptotrichum.*

(1) De nomin. nudis in *Enum. Kindberg. cf. gen. Entodon.*

Cynodontiella Limpr. *Laubm. Deutschl. I*, p. 281 (sect. CYNODONTII).

CYNODONTIUM Brid. *Sp. M. I*, p. 155 (12 sp.)

alpestre Lindb. ? (1) ; Milde. — *C. gracilescens* var. *alpestre*.

brevipes (Lindb.) Par.

Oncophorus brevipes Lindb. *M. Scand.* p. 27 (nom.).

— *Eur.* : Suecia, Fennia.

Bruntoni Bryol. eur. — *Dicranoweisia*.

canadense Mitt. — *Dichodontium*.

capillaceum Schwaegr. — *Distichium*.

cernuum { Schleich. — *Br. pallens* var. *arcuatum*.

{ Schwaegr. — *Br. pendulum*.

cirratum Kindb. — *C. gracilescens* var. *inflexum*.

conicum Mitt. (1876). — *Blindia pulvinata*.

crassirete Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 4.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

crispifolium (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 634.

Didymodon crispifolius Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 148.

Oncophorus crispifolius Lindb. in *Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or.* p. 229.

1. — *As.* : Japon.

decumbens (Thw. et Mitt.) Jaeg. *l. c.*

Dicranum decumbens Thw. et M. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 296.

2. — *As.* : Ceylan.

debile Jaeg. p.p. { — *Dicranella Beyrichiana*.
— *Microdus exiguus*.
— *M. Martianus*.

fallax Limpr. — *C. gracilescens* var. *alpestre*.

flexicaule Schwaegr. — *Leptotrichum*.

glaucescens (Lindb. et Arn.) Par.

Oncophorus glaucescens L. et A. M. *As. bor.* 1890, II, p. 93.

1. Terr. — *As.* : Jenissei inf., Amour.

gracilescens (Web. et Mohr) Bryol. eur. I (mon. p. 13), tt. 45 et 46 ; W. *P. Sch. Syn. II* ed. p. 62.

Dicranum alpestre β majus Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 339.

D. gracilescens W. et M. *Bot. Taschb.* p. 184 ; Brid. *Bryol. univ. I*, p. 441.

D. mixtum de Not. *Mant. n.* 52 et *Syll.* p. 210.

D. polycarpum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 295.

D. polycarpum β *gracilescens* C. M. *Syn. II*, p. 591.

Diobelon gracilescens Hpe. *Fl. Hercyn.*

Oncophorus gracilescens Lindb. *M. Scand.* p. 27.

1. In fissur. rup. — *Eur.* : Reg. subalp. rarius alp. *As.* : Amour, Sikkim, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, M. Alb., Adirondack et Rupestr.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 462, 1261.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 57.

« *var. alpestre* (Wahlenb.) W. Sch. op. et l. c.

C. alpestre Milde Bryol. siles. p. 51, Lindb. in Limpr. op. c. p. 283 ?

C. fallax Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 287.

C. gracilescens Un. crypt. 1863, n. 6.

C. gracilescens γ *tenellum* Bryol. eur. l. c.

C. tenellum Limpr. Krypt. v. Schles. I, p. 425.

C. torquescens Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 288.

Dicranum alpestre Wahlenb. Fl. Lapp. p. 309; Brid. Bryol. univ. I, p. 442.

D. polycarpum δ *tenellum* C. M. l. c.

D. torquescens Br. in M. Un. itin. 1828.

? *Diobelon alpestre* Hpe. Fl. Hercyn.

Oncophorus alpestris Lindb. M. Scand. p. 227.

O. nigricans Kindb. in Bot. Not. 1882, p. 146 et Laubm. Schwed. p. 143.

O. obtusatus Lindb. in Meddel... III, p. 192.

O. torquescens Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 92.

Ut typ. — Eur. : Scandin., Bohem., Hercyn., Rhaet., Tirol., Helvet.
As. : Amour, penins. Tschutsch., Jenissei inf. Am. sept. : Groenland., M. Rupestr.

var. curvisetum Bryol. eur. — *C. gracilescens var. inflexum*.

« *var. inflexum* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 61 et II ed. p. 62.

Campylopus cirratus Hsch. in Brid. Bryol. univ. I, p. 479.

Cynodontium cirratum Kindb. Laubm. Schwed. p. 102.

C. gracilescens β *curvisetum* Bryol. eur. l. c.

Dicranum gracilescens δ *pusillum* Pfeff. Bryol. Stud. p. 17.

D. polycarpum γ *curvisetum* C. M. l. c.

Dryptodon Campylopus Brid. op. cit. p. 773.

Oncophorus cirratus Lindb. M. Scand. p. 27.

Ut typ. — Eur. : Ubi typ. Am. sept. : Reg. or.

var. tenellum Bryol. eur. — *C. gracilescens var. alpestre*.

gracilescens Un. crypt. — *C. gracilescens var. alpestre*.

Hookeri Mitt. (1876). — *Blindia aschistodontoides var. nigrescens* ?

inclinatum Hedw. — *Distichium*.

latifolium Schwaegr. — *Desmatodon cernuus*.

longirostrum Mart. — *Dicranodontium*.

polycarpum (Ehrh.) W. P. Sch. Coroll. p. 12 et Syn. II ed. p. 63.

Bryum cirratum setis et capsulis brevioribus et pluribus Dill. Hist. M. p. 278, t. 48, f. 41.

Br. medium Vill. Pl. Dauph. III, p. 78.

Br. polycarpum Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 37.

Cecalyphum multiflorum P. B. Prodr. p. 51.

Dicranum polycarpum Ehrh. Dec. n. 84; Bryol. eur. I (mon. p. 14), t. 47; C. M. Syn. II, p. 591.

D. scottianum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 107.

Didymodon Jenneri W. P. Sch. mss.; Howie in Trans. Edinb. bot. Soc. 1868, p. 198 (fid. Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 290).

Diobelon polycarpum Hpe. Fl. Hercyn.

Fissidem polycarpus Hedw. M. frond. II, p. 85, t. 31.

Oncophorus polycarpus Brid. Bryol. univ. I, p. 397.

O. strumifer β *substrumosus* ej. op. cit. p. 396.

1. In rup. silic. fissur. humid. — Eur. : E reg. campestr. montos. usq. in alp.; Spitzberg, ins. Ursor. As. : Japon. (form.), Amour, Caucas. or. Am. sept. : Groenland., Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Ontario, lac. Super., Columb. brit., Alaska, reg. sept. or.; Vancouver, Washington, Idaho, Wyoming.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 21 p.p.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 58.

« *var. strumiferum* (W. et M.) W. P. Sch. *ll. cc.*

Bryum inclinans Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt. p. II, t. 11, f. 9.*

Br. strumiferum ej. *Fasc. III, p. 8.*

Cecalyphum strumiferum P. B. *Prodr. p. 52.*

Cynodontium strumiferum de Not. *Epil. p. 280.*

Dicranum gibbosum Brid. *Sp. M. I, p. 225.*

D. polycarpum β *strumiferum* *Bryol. eur. I (mon. p. 14), t. 47 β .*

D. strumiferum W. et M. *Bot. Taschb. p. 181; C. M. Syn. II, p. 592; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 107.*

Diobelon strumiferum Hpe. *Fl. Hercyn.*

Fissidens strumifer Hedw. *M. frond. II, p. 88, t. 32.*

Hypnum strumosum Gmel. *Syst. nat. II, p. 1339.*

Oncophorus strumifer Brid. *Bryol. univ. I, p. 395.*

Ut typ. — *Eur.* : Hic illic c. typ. *As.* : Fret. Sinjawin, Amour, Jenissei med. et inf., *Caucas. occ. Am. sept.* : Groenland., Labrador, Ontario, M. Rupestr., *Columb. brit., ins. Vancouver, lac. Super., Minnesota.*

Exs. : Mac. *Canad. M. n. 21 p.p.*

Rab. *Bryoth. eur. n. 261.*

« *var. tenellum* W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 63.*

In reg. montos. hic illic in *Eur.*

Schisti (Æd.) *Lindb. de Tortula p. 230; W. P. Sch. op. cit. p. 61.*

Bryum Schisti Æd. *Fl. Dan. t. 538?*

Dicranum splachnoides Brid. *M. Rec. II, I, p. 81.*

Grimmia Schisti Sm. *Fl. brit. III, p. 1185.*

Oncophorus Schisti *Lindb. M. Scand. p. 27.*

Rhabdoweisia Schisti *Bryol. eur. I (mon. p. 5), t. 43.*

Weisia Schisti Brid. *Mant. M. p. 39 et Bryol. univ. I, p. 339; C. M. Syn. I, p. 650.*

W. striata β *minor* H. et T. *Muscol. brit. p. 45, t. 15 p.p.*

1. In rup. praepr. schistos. fissur. — *Eur.* : Anglia (rid. C. M.); Scandin., Harz?, Siles. inf., Bohem., Transilv., Salisburg., Stir. merid., Tirol., Engad., Helvet. *As.* : Jenissei sup. *Am. sept.* : Groenland., Terr. nov., M. Rupestr.

serrulatum Jur. — *Oreweisia.*

strumiferum de Not. — *C. polycarpum var. strumiferum.*

strumulosum C. M. et *Kindb. in Mac. Cat. p. 16 (nom.).*

— *Am. sept.* : M. Rupestr.

subalpestre *Kindb. in Mac. Cat. pp. 17 et 257.*

C. gracilescens Mac. *Canad. M. n. 20.*

Dicranum gracilescens Aust. *M. Appal. n. 467.*

D. polycarpum *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 103 p.p.*

Rupic. — *Am. sept.* : Labrador, Gaspes., lac. Huron, Super.

tenellum Limpr. { — *C. gracilescens var. alpestre.*
torquescens ej. }

trifarium Brid. — *Didymodon luridus.*

virens (Hedw.) W. P. Sch. *Coroll. p. 12 et Syn. II ed. p. 64.*

Ångstroemia virens C. M. *Syn. II, p. 609.*

Bryum sericeum Huds. *Fl. Angl. p. 487.*

Br. virens Sw. *Nov. act. Ups. IV, p. 241.*

Dicranum strumiferum Wils. in *Kew Journ. bot. IX, p. 295.*

D. virens Hedw. *M. frond. III, p. 77, t. 32; Bryol. eur. I (mon. p. 15), t. 48.*

Diobelon virens Hpe. *Fl. Hercyn.*

Leptotrichum virens Mitt. *M. Ind. or. p. 11.*

Oncophorus virens Brid. *Bryol. univ. I, p. 399.*

1. Ad terr., sax. lignaq. putrid. secus rivul. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor., Septem Ins. ; Alp. omnes. *As.* : Kamschatka, penins. Tschutschica, Saghalien, Jenissei, Ochotsk, Tibet. occ., Caucas. *Am. sept.* : Groenland., Labrador, fret. Smith et Hudson, Terr. nov., Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Colorado. *Exs.* : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 106 (*Dicranum*).
 Mac. Canad. M. n. 22.
 Rab. Bryoth. eur. n. 48, 411 a-c.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 59.
- « *var. arcticum* Berggr. *M. et Hep. Speetsb. p.* 35.
 — *Eur.* : Spitzberg, ins. Parry.
- « *var. compactum* W. P. Sch. *ll. cc.*
Angstroemia virens var. compacta C. M. l. c.
Dicranum Homanni Beck. in *Hartm. Skand. Fl. IV ed. p.* 384.
D. virens δ *compactum* Bryol. eur. l. c. t. 49.
 Ut typ. — *Eur.* : Summ. Alp. : Norveg., Vall. Tell., etc. *Am. sept.* : Groenland., Labrador, Anticosti, Gaspes., Ontar., M. Alb. et Rupestr., Calif.
- « *var. fragile* Berggr. in *K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII, n. 7, p.* 35 et *M. Speetsb. n. 5 b.*
 Ster. — *Eur.* : Spitzberg.
- « *var. serratum* W. P. Sch. *ll. cc.*
Dicranum virens var. serratum Bryol. eur. l. c.
 Ad cataract. et secus rivul. frigid. — *Eur.* : Helvet., Tirol. *Am. sept.* : Fret. Smith, Anticosti, Gaspes., M. Selkirk et Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Oregon.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 488.
 Un. itin. 1863, n. 7.
- « *var. Wahlenbergii* (Hüb.) W. P. Sch. *ll. cc.*
Angstroemia Wahlenbergii C. M. l. c. p. 610.
C. Wahlenbergii C. Hartm. *Fl. Skand. X ed. p.* 113.
Dicranum compactum Funk in sched.
D. microcarpum Hook. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 105.
D. Richardsoni ej. l. c. n. 104.
D. virens *Wahlenb. Fl. Lapp. p.* 338 p.p.
D. virens β *Wahlenbergii* Hüb. *Muscol. germ. p.* 231 ; *Bryol. eur. l. c.*
Leptotrichum Wahlenbergii Mitt. *M. Ind. or. p.* 12.
Oncophorus strumifer var. fuscescens Weinm. in *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 92 ?
O. Wahlenbergii Brid. *Bryol. univ. I, p.* 400.
 Ut typ. — *Eur.* : Spitzberg, Scand., Alp. Sabaud. *As.* : Kamschatka, penins. Samojed. et Tschutschica, Amour, Saghalien, Obi, Jenissei, Japon., Alp. Yunnan, Sikkim, Caucas. occ. *Am. sept.* : Groenland., Labrador, fret. Smith et Behring, Anticosti, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, Manitoba, M. Rupestr., Alaska.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 23.
 Rab. Bryoth. eur. n. 260, 862, 1223.
- Wahlenbergii* Hartm. — *C. virens var. Wahlenbergii.*

CYNONTIDIUM P. B. Prodr. p. 52.

- affine* Mitt. — *Leptotrichum.*
amœnum Thw. et Mitt. — *Leptotrichum.*
australe Mitt. — *Lophiodon strictus.*

- bogotense* Hpe. — *Leptotrichum pallidum* var. *strictum*.
capillaceum } Hedw. — *Distichium*.
 } Mitt. — *Distichium setifolium*.
cernuum Hedw. — *Bryum pendulum*.
conicum Mitt. — *Leptotrichum*.
crinale Mitt. — *Leptotrichum*.
elongatum Mitt. — *Trichostomum*.
gracile Mitt. — *Leptotrichum*.
Hookeri Mitt. — *Leptotrichum*.
hyalinum Mitt. — *Leptotrichum*.
inclinatum Hedw. — *Distichium*.
rufescens Mitt. — *Leptotrichum*.
strictum Mitt. — *Leptotrichum pallidum* var. *strictum*.
Trematodon P. B. — *Trematodon longicollis*.
trifarium Hedw. — *Didymodon luridus*.

Cyphoma Hook. f. et Wils. *Fl. Tasman.* p. 200 (sect. POLYTRICHI).

CYPTODON (1) Par. et W. P. Sch. *Mon. Cryphaeac. ined.* (4 sp.) (2).

? *crenulatus* (Mitt.) Par.

Cryphaea crenulata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* p. 1859, p. 90.

Dendropogon crenulatus Jaeg. *Ad. II*, p. 103.

— *Pac.* : Austral. (Victoria).

dilatatus (Hook. f. et Wils.) Par. et W. P. Sch. *op. cit.*

Cryphaea dilatata H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* p. 102, t. 88, f. 2.

l. *Rupic.* — *Pac.* : Nov. Zeland.

Mülleri (Hpe.) Par. et W. P. Sch. *op. cit.*

• *Dendropogon Mülleri* Hpe. in *Linn.* 1856, p. 212.

l. — *Pac.* : Austral. *felix*.

squarrosulus (Hpe.) Par. et W. P. Sch. *op. cit.*

Cryphaea squarrosula Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 636.

Dendropogon squarrosulus Jaeg. *Ad. II*, p. 103.

l. — *Pac.* : Austral. *felix*.

CYRTODON R. Br. *Suppl. ad it. Parry.*

splachnoides ej. — *Dissodon*.

CYRTO-HYPNUM Hpe. *Moosb.* p. 20.

Spec. omn. *THUIDIA* ejusd. nom.

CYRTOPUS Brid. *Bryol. univ.* II, p. 235 (sect. NECKERÆ); Hook. f. *Handb. of the N. Zeal. Fl.* (gen. propr.) (3 spec.).

bescherellioides C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

cryphaeoides C. M. M. *Polyn. p.*

Ster. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Viti.

curtipendulus Spr. — *Antitrichia*.

(1) De κυπτω (procumbo) et ὀδούς (dens), propter dentes (coriaceos) vivos made-
 factosve peristomii orificium capsulae fere horizontaliter obtegentes.

(2) Species omn. monoicae et, ut videtur, subaquaticae.

setosus (*Hedw.*) *Hook. f. Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 461.

Anoetangium setosum Hedw. Sp. M. p. 43, t. I, f. 4-6.

Cladomnium setosum H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 100.

Neckera setosa Hook. M. ex. t. 7; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 235.

Pilotrichum setosum C. M. Syn. II, p. 162.

Spiridens setosus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. IV, p. 89.

2. — *Am. merid.* : (fid. *Handb.*) *Pac.* : Ins. Sandwic., Nov. Zeland., Tasman.

taïtensis W. P. Sch. — Garovaglia.

DALTONIA *Hook. et Tayl. Muscol. brit. I*, p. 80 (50 spec.).

affinis W. Arn. — *Pilotrichum*.

androgyna *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881.

1. vel syn. ? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

angustifolia *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind.* p. 31, t. 13; *C. M. Syn. II*, pp. 18 et 660; *Bryol. jav. II*, p. 30.

1. Ad arbor. et terr. — *As.* : Borneo, Java.

apiculata *Mitt. M. Ind. or.* p. 145.

1 ? — *As.* : Nepal.

aristata *Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 49.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil.

bilimbata *Hpe. in Linn.* 1863, p. 151; *Mitt. M. austr. am.* p. 400.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

binervis *Hpe.* — *Lepidopilum daltoniaceum*.

bipinnata W. Arn. — *Pilotrichum*.

brasiliensis *Mitt. M. austr. am.* p. 399.

1 vel syn. ? — *Am. merid.* : Brasil. or.

brevipedunculata *Mitt. M. Ind. or.* p. 146.

1 vel syn. ? — *As.* Bombay.

composita W. Arn. — *Pilotrichum*.

compressa *Mitt. M. austr. am.* p. 400.

1 vel syn. Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

contorta *C. M. Syn. II*, p. 660; *Bryol. jav. II*, p. 32, t. 155.

1. — *As.* : Java, Ceylan.

crispata *Bryol. eur. V (nom.)*; W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 84.

— *Am. sept.* : Mexic.

cucullata *Hpe. in Linn.* 1863, p. 151.

1. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

disticha W. Arn. — *Neckera*.

Duseni *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 776.

— *Afr.* : M. Cameroon.

elegantula W. P. Sch. *hb.*; C. H. Wright *M. Madag.* p. 6 (nom.)

— *Afr.* : Madagascar.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-1879, p. 491.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

filamentosa W. Arn. — *Meteorium*.

filiformis W. Arn. — *Cryphaea*.

flexifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 146.

1. — *As.* : Nepal., Ceylan.

fuscescens W. Arn. — *Papillaria*.

gracilis Mitt. *M. austr. am.* p. 402.

1 vel syn. ? Cortic. et foliic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Hampeana Geh. in *Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 50 et in *Rev. bryol.* 1879, p. 67.

1. — *Am. merid.* : Brasil.

heteromalla H. et T. — *Cryphaea*.

var. H. f. et W. — *Cryphaea glomerata* var. *pendula*.

heterophylla W. Arn. — *Neckera*.

hypnoides W. Arn. — *Pilotrichum*.

imbricata Spreng. — *Pilotrichella versicolor*.

intermedia W. Arn. — *Neckera*.

irrorata Mitt. *M. austr. am.* p. 399.

1 vel syn. Lignic. et ad saxa irror. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Jamesoni Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 283 ; *C. M. Syn. II*, p. 19 ; Mitt. *op. cit.* p. 401.

1. — *Am. merid.* : Summ. M. Pichincha.

Lamyana Mont. — *Cryphaea heteromalla* var. *aquatilis*.

latimarginata Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 136.

Syn. — *Afr.* : Ins. Bourboniae.

Leucoloma Hpe. *Symb.* 1874, p. 502.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Lindigiana Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, p. 363.

Ad rup. madid. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

longifolia Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 284 ; *C. M. Syn. II*, p. 19 ; Mitt. *op. cit.* p. 399.

1. — *Am. merid.* : And. Quitens.

longinervis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 163.

1. — *Afr.* : Ins. Fernando Po.

longipedunculata C. M. *Syn. II*, p. 18 ; *Bryol. jav. II*, p. 31, t. 154.

1. — *As.* : Borneo, M. Java.

lorifolia C. M. in *Fl.* 1875, n. 34 et 35.

Ster. Cortic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

macrotheca Mitt. *M. austr. am.* p. 402.

1 vel syn. ? — *Am. merid.* : M. Chimborazo.

madagassa W. P. Sch. *hb.* ; C. H. Wright *M. Madag.* p. 6 (nom.).

— *Afr.* : Madagascar.

marginata Mitt. *M. Ind. or.* p. 145.

1. Cortic. — *As.* : Khasia.

minor Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 136.

— *Afr.* : Ins. Bourbon.

mucronata Bryol. jav. II, p. 32, t. 156.

Syn. — As. : Java.

nervosa (Hook. f. et Wils.) Hpe. in C. M. Syn. II, pp. 17 et 660 ; Handb. Fl. N. Zeal. p. 496.

D. Novae Zeelandiae Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 95.

Hookeria nervosa H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 549 et Fl. Antarct. I, p. 142, t. 61.

1. Ad ramul. arb. — Pac. : Nov. Zeland. sept., ins. Auckland.

nervosa H. f. et W. — Cryphaea.

Novae Zeelandiae Mitt. — D. nervosa.

ocanniana C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.

Syn. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

ovalis Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 66 ; C. M. Syn. II, p. 19 ; Mitt. M. austr. am. p. 401.

1. Ad arbor. — Am. merid. : And. Quitens.

patula Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 163.

1. — Afr. : Ins. Fernando Po, M. Usagara, Kilima N'Djaro.

pennata W. Arn. — Neckera.

peruviana Mitt. M. austr. am. p. 401.

1 vel syn. — Am. merid. : And. Peruv.

polytrichoides W. Arn. — Lepidopilum.

pulvinata Mitt. op. cit. p. 398.

1. vel syn. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

pusilla Hook. f. et Wils. Fl. Tasman. II, p. 221, t. 177, f. 5.

1. Lignic. et ad fontes. — Pac. : Tasman.

reticulata C. M. in Linn. 1869-70, p. 20.

1. — As. : Ceylan.

robusta Ångstr. in Oefv... 1873, n. 5, p. 117.

1. — Am. merid. : Ins. Gallapagos.

scaberula Mitt. M. Ind. or. p. 146.

1. — As. : Ceylan.

scabriseta W. Arn. — Lepidopilum.

semi-torta Mitt. op. et l. cc.

1. Cortic. — As. : Sikkim.

splachnoides (Sm.) Hook. et Tayl. Muscol. brit. I ed., p. 90, tt. 3 et 22 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 255 ; C. M. Syn. II, pp. 17 et 660 ; Bryol. eur. V, t. 449 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 579.

Hookeria splachnoides Hook. Engl. Fl. V, I, p. 74 et Fl. Hibern. II, p. 37.

Neckera splachnoides Engl. bot. t. 2564 (excl. syn. Schwaegr.).

1 et syn. Ad rup. humid. umbros., rar. ad arb. — Eur. : Hibern. Afr. : Madeir., ins. Fernando Po. Am. sept. : Mexic. ; Antill. (fid. W. P. Sch. l. c.).

stenoloma Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 136.

1 vel syn. ? — Afr. : Ins. Borbon.

stenophylla Mitt. M. austr. am. p. 402.

1 vel syn. ? — Am. merid. : And. Quitens

strictifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 146.

1 et syn. — As. : Ceylan, Java.

tenella Broth. in *Act. Soc. Fenn.* 1891, n. 5.

1. — Am. merid. : Minas Geraës.

tenuifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 402.

1 vel Syn. Ad arbor. — Am. merid. : And. Quitens.

trachyodonta Mitt. *op. cit.* p. 400.

1 vel syn. Cortic. — Am. merid. : And. Quitens.

undulata W. Arn. — Neckera.

Wallisi C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

1. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

DASYMITRIUM Lindb. in *Lond. Journ. of bot.* 1864, p.

Spec. omn. non indicatae sunt **MACROMITRIA** ejusd. nom.

? *villosum* Jaeg. — Drummondia.

DAWSONIA Rob. Br. in *Trans. of the Linn. Soc.* X, p. 316, t. 23, f. (4 spec.).

appressa Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 635.

Rupic. — Pac. : Austral. or.

longiseta Hpe. in *op. cit.* p. 634.

— Pac. : Austral. or.

polytrichoides R. Br. in *op. et l. cc.* ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 156 ; *C. M. Syn.* I, p. 226.

Triplocoma polytrichoides la Pyl. in *Desv. Journ. bot.* 1813, p. 7.

2. — Pac. : Austral. or., Nov. Zeland.

superba Grev. in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1847, p. 226, t. 12 ; *C. M. Syn.* I, p. 226.

Polytrichum longifolium *Bryol. eur.* IV (mon. p. 2, nom.) ?

2. — Pac. : Austral., Nov. Zeland. sept. et med , Tasman. (1)

DECODON C. M. mss. (2 spec.).

brasiliensis (Broth.) C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

1. Lignic. — Am. merid. : Minas Geraës.

transvaaliensis C. M. in *op. et l. cc.* (nom.).

— Afr. : Transvaal.

DENDROCRYPHÆA Par. et W. P. Sch. Mon. Cryphæac. ined. (2 spec.).

Gorveana (Mont.) Par. et W. P. Sch. *op. cit.*

Cryphaea Gorveana Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 99 et in *Gay Hist. Chil. Bot. crypt.* t. 5, f. 3 ; *Syll.* p. 24.

Dendropogon Gorveanus Jaeg. *Ad.* II, p. 103.

Pilotrichum Gorveanum C. M. *Syn.* II, p. 175.

1. — Am. merid. : Chile.

(1) In Enumer. Kindberg, nomina nuda :

D. altissima Geh.

| D. intermedia C. M.

Lechleri (C. M.) Par. et W. P. Sch. op. cit.

Cryphaea Gorveana W. P. Sch. in Lechler Pl. Chil. n. 474.

Cr. Lechleri C. M. mss.

D. ramosissima Par. et W. P. Sch. prius.

l. — Am. sept. : Guadalup. (??) Am. merid. : Valdivia.

ramosissima Par. et W. P. Sch. — D. Lechleri.

Dendrodium C. M. in Dusen M. Camer. (sect. POROTRICHUM).

Dendroglossophyllum C. M. Syn. II, p. 223 (sect. HOOKERIAE).

DENDRO-HYPNUM Hpe. Moosb. p. 21.

Beccarii ej. — Hypnodendron.

Leichhardtii ej. — ? Ptychomium.

praenitens ej. — Pterobryella.

DENDRO-LESKEA Hpe. in Bot. Zeit. 1869, n. 28 ?

Krauseana Hpe. — Porotrichum.

Dendroligotrichum C. M. Syn. I, p. 99 et II, p. 559 (sect. POLYTRICHUM sensu Müller.).

DENDROPOGON W. P. Sch. in Bot. Zeit. 1843, p. 377, t. I (4 spec.).

capensis ej. — Papillaria africana.

crenulatus Jaeg. — Cyptodon?

? dentatus Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 170.

Ster. ♂ ign. Ad arbor. et rup. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 4482.

« var. filiformis Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 357.

— As. : Japon.

Exs. : Savatier n. 618.

fasciculatus Jaeg. — Cryphaea.

? ferrugineus (Mitt.) Par.

Cryphaea ferruginea Mitt. M. Ind. or. p. 125.

Ster. — As. : M. Neilgherr.

Gorveyanus Jaeg. — Dendrocryphaea.

helictophyllum Jaeg. — Meteorium.

Mülleri Hpe. — Cyptodon.

rufescens W. P. Sch. in Bot. Zeit. l. c. et Mon. Cryph. ined.

Cryphaea rufescens C. M. in Linn. 1844, p. 682; Mitt. M. austr. am. p. 416.

Pilotrichum rufescens C. M. Syn. II, p. 176.

l. Ad arbor. — Am. sept. : Mexic., ins. S. Thomas.

? Schleinitzianus (C. M.) Par.

Cryphaea (Dendropogon) Schleinitziana C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 84.

Ster. ?

— Pac. : Ins. Fidji, Tonga.

squarrulosus Jaeg. — Cyptodon.

DERMATODON Hüb. *Muscol. germ.* p. 109.

affinis Hüb. — *Pottia Starkeana* var. *brachyodus*.

cernuus Hüb. — *Desmatodon*.

caespitosus Hüb. — *Pottia*.

Funkii Hüb. — *Pottia latifolia* var. *pilifera*.

lanceolatus Hüb. — *Pottia*.

latifolius Hüb. — *Pottia*.

Starkii Hüb. — *Pottia*.

DESMATODON Brid. *Mant. M.* p. 86 et *Bryol. univ.* I, p. 523 (26 spec.).

adustus Mitt. — *Pottia brachypus*.

amblyophyllus Mont. in *Ann. sc. nat.* IV, p. 108 et *Syll.* p. 41.

Tortula platyphylla Mitt. *M. austr. am.* p. 167.

Trichostomum amblyophyllum C. M. *Syn.* I, p. 592.

2. Terr. — *Am. merid.* : Chile.

arenaceus Sull. *M. of U. St.* p. 28 et *Id. M.* p. 45, t. 29; *Lesq. et Jam. Man.* p. 111.

Barbula arenacea Jaeg. *Ad.* II, p. 671.

B. obtusifolia Schwaegr. (fid. Hagen in *Rev. bryol.* 1891, p. 1).

D. ohioensis W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 159.

Pseudo 2. *Rupic.* — *Eur.* : Norvegia. *Am. sept.* : Ohio, Kansas, reg. centr.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed., n. 93 et II ed., n. 120.

atro-virens Jur. — *Barbula*.

bogoticus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 12.

2. — *Afr.* : Abyssin.

Brebissoni Jur. — *Barbula*.

brevicaulis Brid. — *D. latifolius* var. *brevicaulis*.

bulbosus de Not. — *Pottia latifolia*.

caespitosus de Not. — *Pottia*.

camptothecius Kindb. in *Mac. Cat.* p. 48.

1. *Rup. marit.* — *Am. sept.* : Gaspesia.

canescens Jur. — *Barbula*.

cernuus (Hüb.) *Bryol. eur.* II (mon. p. 8), t. 134; *W. P. Sch.* II ed. p. 186.

Cynodon latifolius Brid. *Bryol. univ.* I, p. 502.

Cynodontium latifolium Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 110, t. 28.

Dermatodon cernuus Hüb. *Muscol. germ.* p. 117.

Desmatodon inclinatus Sendtn. in *Regensb. Denkschr.* 1841, p. 144.

Didymodon latifolius Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 313, t. 20.

Tortula cernua Lindb. *M. Scand.* p. 20.

Trichostomum cernuum Lindb. *Trichost. eur.* p. 14.

Tr. inclinatum C. M. *Syn.* I, p. 593.

1. In rup. fissur. et ad mur. humid. — *Eur.* : Scandin., Sudet., Tirol., Carinth., Helvet., Salisb., Stir., Alp. Bavar. As. : Tibet. occid. *Am. sept.* : Groenland., Anticosti, New Brunswick, reg. sept. occid., M. Rupestr., Columb. brit., Nevada.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 71.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 168, 957.

« var. *xanthopus* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 48.

Terr. — *Am. sept.* : Manitoba.

chloronotos Mitt. — *Barbula*.

confertifolius (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 252.

Barbula confertifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 36.

Ster. — *As.* : Nepal.

corticola W. P. Sch. in W. Sch. *M. Abyss.*

— *Afr.* : Abyssin.

cuneifolius Jur. — *Barbula*.

curtus Brid. — *Leptotrichum tortile* var. *pusilla*.

dichotomus Brid. — *Barbula Brebissonii*.

eucalypttratus Limpr. — *D. latifolius* var. *glacialis*.

flavicans Bryol. eur. — *Barbula obtusifolia*.

var. *obtusifolius* Bryol. eur. — *Barbula obtusifolia* var. *brevifolia*.

flexifolius Hpe. — *Didymodon*.

fusco-mucronatum (C. M.) Par.

Barbula fusco-mucronata Jaeg. *Ad. II*, p. 671.

Trichostomum fusco-mucronatum C. M. in *Linn.* 1876, p. 295.

Ster. Terr. — *Afr.* : Somali.

Garberi Lesq. et Jam. *Man.* p. 112.

Pseudo 2. — *Am. sept.* : Florid.

glacialis Funk. — *D. latifolius* var. *glacialis*.

gracilis Anzi *Enum. M. Longobard. sup. in Rev. bryol.* 1876, p. 62.

D. latifolius var. *brevicaulis* (fid. Limpr.).

1. Ad mur. calcar. — *Eur.* : Ital. super. (Bormio).

griseus Jur. — *Barbula*.

Guepini Bryol. eur. — *Barbula*.

Güntheri Sendtn. — *D. latifolius*.

inermis Mitt. { — *Barbula Brandisi* ? (fid. C. M.).
— *Barbula* (fid. Jur.).

inclinatus Sendtn. — *D. cernuus*.

involutus Mitt. — *Hyophila*.

javanicus Mitt. — *Barbula*.

lanceolatus de Not. — *Pottia*.

laterum W. P. Sch. — *D. plinthobius*.

latifolius (Hedw.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 524; *Bryol. eur. II* (mon. p. 5),
t. 129; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 184.

D. Güntheri Sendtn. in sched.; C. M. *Syn. I*, p. 588.

D. latifolius γ *lutescens* Brid. op. cit. p. 525.

Dicranum lanceolatum Schleich. *Cent. IV Pl. helv. n.* 12.

D. latifolium Hedw. *M. frond. I*, p. 89, t. 33; *Drumm. M. bor. am. I* ed.
n. 109 (fid. Kindb.).

Mnium latifolium Gmel. *Syst. nat. XIII* ed., II, p. 1328.

Swartzia pilifera Brid. in Schrad. *Journ.* 1800, p. 289.

Tortula latifolia Lindb. *M. Scand.* p. 20.

Trichostomum latifolium Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 145; C. M. *Syn. I*,
p. 588 (1).

1. Ad terr. humid. usq. ad niv. ætern. — *Eur.* : Spitzberg, reg. alp. et
subalp.; desideratur in Britann. *As.* : Talysch, Kamschatka, Sik-
kim, Caucas. *Am. sept.* : Groënland, Labrador, Columb. brit.,
M. Rupestr., reg. sept. occ., Washington, Oregon, Colorado,
Nevada, Calif.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 69 p.p.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 1264.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II* ed. n. 122.

(1) De synonym. antiquior. cf. W. P. Sch. l. c.

« *var. brevicaulis* W. P. Sch. *op. cit.* p. 185.

Bryum piliferum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt. t. II, f. I.*

D. gracilis Anzi (*fid. Limpr. op. cit.* p. 650).

D. brevicaulis Brid. *Mant. M.* p. 87 (*excl. syn.*) et *Bryol. univ. I.* p. 525 p.p.

Dicranum latifolium β *piliferum* H. et T. *Muscol. brit.* p. 22.

Trichostomum piliferum Sm. *Fl. brit. III*, p. 1245 (*fid. C. M.*; non ! *fid. Lindb. Trichost. eur.* p. 14; *sed. : Hüb. Muscol. germ.* p. 293, *excl. syn.*).

Ut et cum typ.

« *var. glacialis* (Funk) W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 157 et *II ed.* p. 185.

D. latifolius Funk in Brid. *Bryol. univ. I*, p. 822.

D. latifolius β *muticus* Brid. *op. cit.* p. 525; *Bryol. eur. l. c. t.* 130.

D. spathulatus Hartm. in Fries *Summ. veg.* p. 94.

Dicranum latifolium Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 342; *Drumm. l. c.* (*fid. C. M.*).

Didymodon apiculatus α W. Arn. in *Mem. Soc. hist. nat. Paris, II*, p. 283.

D. pilifer β *spathulatus* Wahlenb. *Fl. Suec. I ed. II*, p. 755.

D. spathulatus de Not. in *Mem. Acad. Torin.* 1836, p. 233.

D. Theobaldi Pfeff. (*fid. Limpr. op. cit.* p. 649).

Tortula eucalyptrata Lindb. in *Bot. Notis.* 1886, p. 100 (*fid. Limpr. op. cit.* p. 650).

Tortula latifolia β *mutica* Lindb. *M. Scand.* p. 20.

Trichostomum Hoppeanum Schultz in *Syll. Ratisb.* 1828, p. 40.

Tr. latifolium β *muticum* C. M. *l. c.*

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *As.* : *Caucas.* *Am. sept.* : *M. Rupestr.*

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 253.

var. lutescens Brid. — *Desmatodon latifolius*.

var. muticus Brid. — *Desmatodon latifolius var. glacialis*.

Laureri (Schultz) *Bryol. eur. II* (*mon. p.* 9), *t.* 135; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 187.

Didymodon Blyttii Hartm. *Skand. Fl. IV ed.* p. 381.

D. nitens Liebm. in *Fl. Dan. Suppl. I*, p. 12, *t.* 50.

Tortula bryoides Hook. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 135.

T. Laureri Lindb. *Trichost. eur.* p. 35.

Trichostomum latifolium β *Laureri* Hüb. *Muscol. germ.* p. 292.

Tr. Laureri Schultz in *Bot. Zeit.* 1827, p. 163; *C. M. Syn. I*, p. 594.

1. Ad terr. humos. — *Eur.* : *Rar.* : Spitzberg, Alp. Norveg., Carinth., Salisb., Stir., Bavar., Algov., Tirol., Helvet. *Am. sept.* : Groenland., *M. Rupestr.*, ins. Vancouver, Colorado.

Laureri Wils. — *D. Thomsonii*.

leucostomus Berggr. — *D. obliquus*.

limbatus Mitt. — *Barbula sublimbata*.

longirostris (Griff.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 37.

Hymenostylium longirostre Griff. *Not.* p. 395 et *Ic. pl. asiat. II*, *t.* 95, *f.* 3.

Lignic. — *As.* : Khasia.

marginatus Mitt. — *Barbula*.

montenegrinus (Breidl. et Szycz.) Par.

Barbula montenegrina Br. et S. in *Mem. Acad. Cracov. XIX.*

— *Eur.* : Montenegro.

mucronifolius Mitt. — *Barbula*.

neo-mexicanus Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed. n.* 95; *Lesq. et Jam. Man.* p. 113.

1. Terr. — *Am. sept.* : Texas.

Exs. : Sull. et Lesq. *l. c. II ed. n.* 124.

nitens Liebm. — *D. Laureri*.

obliquus *Bryol. eur. II* (mon. p. 10), t. 136; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 187.

Barbula leucostoma *R. Br.* (fid. *Berggr. in K. Sv. Vet. Akad. Handl.*, XIII, n. 7, p. 46).

D. leucostomus *Berggr. M. Speetsb. n.* 34.

D. obliquus β *apiculatus* } *Lindb. in Oefv...* XXIII, p. 553.

D. obliquus γ *muticus*

D. suberectus *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 651.

Tortula suberecta *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 145.

Trichostomum obliquum *C. M. Syn. I*, p. 594 et *II*, p. 629.

1. *Ad terr. humos.* — *Eur.* : *Rariss.* : *Alp. Norv. g.*, *Carinth.*, *Salisb.*, *Stir.*, *Bavar. et Algov.*, *Tirol.*, *Helvet. As.* : *Penins. Tschutsch. Am. sept.* : *Ins. Sabine*, *M. Rupestr.*

var. apiculatus *Lindb.* } -- *D. obliquus.*
var. muticus *Lindb.*

obtusifolius *W. P. Sch.* — *Barbula*.

ohioensis *W. P. Sch.* — *D. arenaceus*.

plinthobius *Sull. M. of U. St. p.* 28, t. 2 et *Ic. M. p.* 47, t. 30; *Lesq. et Jam. Man. p.* 112.

D. laterum *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 159.

2. *Ad mur. argill.* — *Am. sept.* : *Pensilv.*, *Tennessee*, *Texas.*, *Carol. infer.*, *Georgia*, *Ludovic.* ; *Kansas* ?

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n.* 94 et *II ed. n.* 123.

Porteri *Jam. et Aust. M. Appal. n.* 123; *Sull. Ic. M. Suppl. p.* 36, t. 23; *Lesq. et Jam. Man. p.* 112.

2. *Rupic.* — *Am. sept.* : *Lac. Erie*, *Niagara*, *New York*, *Pensilv.*

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 70.

recurvus (*Griff.*) *Mitt. M. Ind. or. p.* 37.

Gymnostomum recurvum *Griff. Not. p.* 97 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 92, f. 2 (1).

Tortula cacuminata *Wils. in Kew Journ. bot. IX*, p. 322.

2 ? — *As.* : *Sikkim*.

reflexidens (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 257.

Trichostomum reflexidens *Hpe. in Linn.* 1859-60, p. 625.

— *Pac.* : *Austral. or.*

revolvens *Husn.* — *Barbula*.

rigidus *Mitt.* — *Barbula*.

rupestris *Funk.* — *Barbula rigidula var. densa*.

Sartorii (*C. M.*) *Par.*

Barbula Sartorii *Jaeg. Ad. II*, p. 671.

Trichostomum Sartorii *C. M. in Linn.* 1874, p. 637.

— *Am. sept.* : *Mexic.*

Schimperi (*Mont.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 252.

Barbula atro-virens *W. P. Sch. (fid. Mitt.)*.

Trichostomum Schimperi *Mont. in Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 103 et in *Gay. Hist. Chil. Bot. crypt. t. 2, f. I*; *Syll. p.* 38; *C. M. Syn. I*, p. 592.

2. *Terr.* — *Am. merid.* : *Chile*.

(1) *Jam a cl. Mitt. (op. c. p. 33) Barbulae rufescenti ut syn. datum.*

spathulatus } Hartm. — *Desmatodon latifolius* var. *glacialis*.
 } Mitt. — *Barbula*.

Starkii de Not. — *Pottia*.

suberectus Limpr. — *D. obliquus*.

sublimbatus Mitt. — *Barbula*.

subtorquescens C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 48.

1. Terr. — *Am. sept.* : *Gaspesia*.

Exs. : *Mac. Canad.* M. n. 69 p.p.

subulatus Jur. — *Barbula*.

var. *angustata* Jur. — *Barbula subulata* var. *angustata*.

systylius *Bryol. eur.* II (mon. p.), t. 131 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 185.

Anacalypta latifolia β *pilifera* Hook. in *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 70 (fid. Wils.).

Tortula systylia Lindb. *M. Scand.* p. 20.

Trichostomum systylium C. M. *Syn.* I, p. 589.

1. In terr. arenac. humos. — *Eur.* : *Norveg.*, *Alp. Salisb.*, *Stir.*, *Carinth.*, *Bavar. et Algov.*, *Tirol.*, *Helvet.* *As.* : *Caucas.* *Am. sept.* : *Groenland.*, *Manitoba*, *M. Rupestr.*, *Colorado*, *Calif.*

Exs. : *Mac. Canad.* M. n. 71 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 598.

Thomsonii (C. M.) *Jaeg. Ad.* I, p. 254.

D. Laureri Wils. in *hb. Ind. or.* n. 273 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 37.

Trichostomum Thomsonii C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 359.

1. — *As.* : *Himalaya*, *Tibet. occ.*

tonkinensis Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1893, p. 80.

Ad rhizom. Filic. — *As.* : *Tonkin.*

Wallichii Mitt. — *Barbula*.

DESMOSTOMUM Hsch. in *Linn.* 1841, p. 116.

absque nom. spec. — *Entosthodon Bergianus*.

Dialytrichia *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 222 (subgen. *BARBULAE*).

Diaphanophyllum Lindb. in *Oefv...* 1862 (sect. *LEPTOTRICHIA*).

DICHELYMA Myr. in *Act. Acad. reg. sc. Holm.* 1832 (6 spec.).

antarcticum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 82 et in *Forschungsreise...* n. 31.

Ster. *Ad lapid. in aquosis.* — *Afr.* : *Ins. Kerguelen.*

capillaceum (Dicks.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 7), t. 436 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 558. *Card. Mon.* p. 135.

D. capillaceum β *subulifolium* *Bryol. eur.* V (mon. p. 8), t. 435 β 1, 2, 2 α .

D. pallescens Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 346.

Fontinalis capillacea Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 1 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 660.

F. capillacea *calycibus styli instar cuspidatis* Dill. *Hist. M.* p. 260, t. 33, f. 5.

F. falcata Hpe. in *Linn.* 1839, p. 45.

Neckera capillacea C. M. *Syn.* II, p. 144.

2. *Ad lapid. et ligna in rivul. et stagn.* — *Eur.* : *Scotia (ster.)*, *Suecia*, *Dania*, *Brandebourg.*, *Siles.* *Am. sept.* : *New Brunswick*, *Ontario*, *New Jersey*, *Pensilv.*, *Nov. Angl.*, *New York.*

Exs. : Aust. M. Appal. n. 252.

Drumm. M. bor. am. I ed. n. 234 p.p. (*Fontinalis*).

Rab. Bryoth. eur. n. 778.

Sull. M. Allegh. n. 151.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 345, 346.

« *var. elongatum* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 160.

Ut typ. — *Am. sept.* : Lac. Super.

capillaceum } Bryol. eur. pp. — D. pallescens.
C. M. — D. uncinatum.

var. subulifolium Bryol. eur. — D. capillaceum.

cylindricarpum Aust. — D. uncinatum *var. cylindricarpum*.

? *distichum* Myr. — *Fontinalis*.

falcatum (*Hedw.*) Myr. in *op. cit.* p. 274, t. 6 ; *Bryol. eur.* V (mon. p. 6), t. 433 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 557 ; *Card. Mon.* p. 135.

Fontinalis capillacea L. *Fl. Suec.* n. 982.

F. falcata *Hedw.* M. frond. III, p. 57, t. 24.

Neckera falcata C. M. *Syn.* II, p. 143.

2. Ad saxa fluvior., rivul. et stagn. — *Eur.* : Island., Lappon., Scandin., Fennia, Brandebourg, Sudet., Transsylv. As. : *Jenissei* sup. *Am. sept.* : M. Adirondack, Alb. et Castkill.

Exs. : Husn. M. Gall. n. 736.

Limpr. Bryoth. siles. n. 34.

Rab. Bryoth. eur. n. 628, 779, 1132.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 229 b, II ed. n. 343.

Un. itin. 1867, n. 33.

longinerve Kindb. — *Hypnum*.

Novæ Brunsviciæ Mac. — D. obtusulum.

obtusulum Kindb. in *Mac. Cat.* p. 159.

D. *Novæ Brunsviciæ* Mac. *Canad. M.* p. 534.

D. pallescens (*fid. Cardot in Rev. Bryol.* 1893, p. 10).

2. In stagn. — *Am. sept.* : New Brunswick.

pallescens *Bryol. eur.* V, *Suppl.* p. I, t. 435 : *Card. Mon.* p. 142.

D. capillaceum Myr. in *op. cit.* t. 7 A ; *Bryol. eur.* V, t. 435 (*excl.* β 1, 2, 2 α).

Fontinalis capillacea Hook. in *Drumm. M. bor. Am.* I ed. n. 234 p.p.

Neckera leucoclada C. M. *Syn.* II, p. 144.

2. Ad rad. arbor. in stagn. — *Am. sept.* : New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Massachussets, New York, Pensilv.

Exs. : Aust. Appal. M. *Suppl.* I, n. 525.

Mac. *Canad. M.* n. 235.

pallescens Sull. et Lesq. — D. capillaceum.

subulatum Myr. — *Brachelyma*.

Swartzii Lindb. — *Hypnum fluitans var. serratum*. *Swartzii*

uncinatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 44, t. 8 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 273 ; *Card. Mon.* p. 137.

D. capillaceum C. M. in *Roell M. Amer.* n. 90, 1201, 1203, 1204 et 1530.

2. Ut praeced. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Wyoming.

Exs. : Leib. M. from Kootnai (Idaho) n. 81.

Mac. *Canad. M.* n. 234.

« *var. cylindricarpum* (Aust.) *Card. Mon.* p. 139.

D. cylindricarpum Aust. in *Bot. Gaz.* II, p. 111 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 274.

Ut typ. — *Am. sept.* : Washington, Oregon, Idaho ; Texas ? Columb. brit.
Exs. : Roell M. Am. n. n. 1202.

DICHODONTIUM W. P. Sch. Coroll. p. 12 (18 spec.).

canadense (Mitt.) Lesq. et Jam. Man. p. 621.

Cynodontium canadense Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 17.

Dicranella Schreberi var. *occidentalis* Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 344.

Leptotrichum canadense Jaeg. Ad. I, p. 236.

2. — *Am. sept.* : Columb. brit., Oregon.

clathratum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. I, p. 86.

Ångstroemia clathrata C. M. Syn. II, p. 608.

Dicranella clathrata H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 65.

Dicranum clathratum eor. in Lond. Journ. of Bot. 1844, p. 542 et Handb. of N. Zeal. Fl. p. 411.

2. Ad rup. irror. — *Pac.* : Nov. Zeland.

convolutum (Hpe.) Par.

Ångstroemia convoluta Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 336.

Anisothecium convolutum Mitt. M. austr. am. p. 40.

Dicranella convoluta Jaeg. Ad. I, p. 85.

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

elegans (Duby) Jaeg. Ad. II, p. 634.

Dicranum elegans Duby in Mem... Genève 1869, t. 1, f. 1.

2. — *Am. merid.* : Chile.

ferrugineum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. l. c. p. 635.

Dicranum ferrugineum H. f. et W. Fl. Tasm. p. 171, t. 172, f. I.

2. Terr. — *Pac.* : Tasman.

flavescens Lindb. — *D. pellucidum* var. *serratum*.

Hookeri (Wils.) Par.

Dicranella himalayana Jaeg. Ad. I, p. 84.

Didymodon vaginatus Hook. in Lond. Journ. of bot. 1840, II, p. 5 et Ic. pl. rar. t. 18 ; C. M. Syn. I, p. 462.

Leptotrichum himalayanum Mitt. M. Ind. or. p. 12.

Symblepharis dilatata Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 293 p.p.

S. Hookeri ej. in op. cit. p. 292.

— *As.* : Himalaya, Sikkim.

Jamesoni (Tayl.) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 66.

Ångstroemia Hookeri C. M. Syn. II, p. 607.

Anisothecium Jamesoni Mitt. op. c. p. 39.

Dicranum Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 281.

D. vaginatum H. f. et W. in sched. Antarct.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen, *Am. merid.* : Ins. Eremitae.

Exs. : Lechler Pl. Magell. n. 1016.

Krausei (Ltz.) Jaeg. Ad. I, p. 68.

Dicranella Krausei Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 86.

2, Rupic. — *Am. merid.* : Valdiv.

Lorentzi (C. M.), Par.

Ångstroemia Lorentzi C. M. in Linn. 1880-1883, p. 389.

2. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic.

olympicum *Ren. et Card. in Rev. bryol.* 1892, p. 74.

2. — *Am. sept.* : Washington.

Paludella Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1885, p. LVI et in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot.* p. 257, t. I, f. 4.

2. — *Am. merid.* : Archip. Magellan.

pellucidum (L.) W. P. Sch. Coroll. p. 12 et *Syn. II ed.* p. 66.

Angstroemia pellucida C. M. Syn. II, p. 606.

Bryum aquaticum Hoffm. Fl. Germ. II, n. 35.

Br. palustre, pellucidum, capsulis et foliis brevibus recurvis Dill. Hist. M. p. 364, t. 46, f. 23.

Br. pellucidum L. Sp. pl. p. 1583.

Dicranum aquaticum Ehrh. Dec. n. 216.

D. pellucidum Hedw. Sp. M. p. 142 ; *Brid. Bryol. univ. I,* p. 349 ; *Bryol. eur. I (mon. p. 16), t.* 50-51.

D. Rogeri Brid. Sp. M. I, p. 195.

Didymodon Woodii W. P. Sch. in Braithw. Brit. Moosfl. p. 162 (*fid. Limpr. op. cit.* p. 298).

Diobelon pellucidus Hpe. Fl. Hercyn.

Mnium pellucens Gmel. Syst. nat. II, p. 1328.

Tridontium pellucidum Lindb. in Oefv... 1834, p. 230.

2. Ad saxa humida, rar. in terr. — *Eur.* : Reg. montana zon. interm., rar. septentr. ; ins. Ursorum. *As.* : Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland., M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, New Brunswick, Gaspesia, Terr. nov., Ontario, Oregon, fret. Behring.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 451.

Rab. Bryoth. eur. n. 77, 425, 1260.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 96.

« *var. americanum Lesq. in Lesq. et Jam. Man.* p. 62.

Ut typ. — *Am. sept.* : New Jersey, New York, Vermont

« *var. fagimontanum (Brid.) W. P. Sch. ll. cc.*

Angstroemia pellucida β *fagimontana C. M. l. c.*

Dicranum pellucidum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 108.

D. pellucidum β *fagimontanum Brid. Sp. M. I,* p. 192 et *Bryol. univ., I,* p. 441 ; *Bryol. eur. l. c.*

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. — *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : M. Rupestr.

« *var. Lamyi Husn. Muscol. gall.* p. 19.

D. pellucidum var. serratum Lamy in Husn. M. Gall. n. 303.

Ut typ. — *Eur.* : Gall. centr.

var. Mildei Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 300.

Ster. — *Eur.* : Harz ? Tirol., Lungau. *As.* : Caucas. centr.

« *var. serratum W. P. Sch. ll. cc. (1).*

Angstroemia pellucida var. serrata C. M. l. c.

Bryum flavescens Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 4, t. 4, f. 6 (*fid. Wils.*).

Br. lineare ej. Fasc. III, p. 6, t. 8, f. 2 (*fid. Wils.*).

D. flavescens Lindb. M. Scand. p. 27.

Dicranum flavescens H. et T. Muscol. brit. p. 55, t. 17.

D. gracilescens β *flavescens Brid. Bryol. univ. I,* p. 442.

D. lineare ej. l. c. p. 446.

D. pellucidum var. serratum Bryol. eur. l. c.

Trichostomum lineare Brid. Mant. M. p. 84.

(1) Cf. *Rev. bryol.* 1892, pp. 9 et 19.

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *Am. sept.* : Labrador, Columb. brit., ins. Vancouver, Idaho, Oregon, Washington, Montana.
Eas. : Mac. Canad. M. n. 402.

Reinwardti (*Dz. et Mk.*) *Bryol. jav. I*, p. 85.

Ångstroemia Reinwardti *C. M. Syn. I*, p. 437.
 Dicranum Reinwardti *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II*, p. 303.
 Gyrophyllum Reinwardti *eor. M. frond. ined. Arch. ind. t. 45*.
 Leptotrichum Reinwardti *Mitt. M. Ind. or. p. 12*.
 Symblepharis breviseta *Wils. in Kew Journ. bot. IX*, p. 293.
S. dilatata ej. l. c.
S. Reinwardti Bryol. jav. II, p. 225.

1. — *As.* : Sikkim, Java, Borneo.

? rufipes (*C. M.*) *Par.*

Ångstroemia rufipes *C. M. in Linn. 1880-83*, p. 388.
 2. — *Am. merid.* : Argentin. Tucuman.

squarrosus *W. P. Sch.* — *Dicranella*.

subclathratum (*Ltz.*) *Par.*

Dicranella subclathrata Ltz. Moosst. p. 159.
 2. — *Am. merid.* : Valdiv.

tasmanicum (*Hook.*) *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 66*.

Dicranum tasmanicum Hook. f. Handb. of N. Zeal. Fl. p. 410.
Didymodon tasmanicus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 70.
Tridontium tasmanicum Hook. f. Ic. pl. rar. III, t. 148 et Fl. of the N. Zeal. II, p. 65 ; *C. M. Syn. I*, p. 648 et *II*, p. 633.
 2. Ad rup. irror. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

tricuris (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 68.

Ångstroemia tricuris *C. M. in Linn. 1867-68*, p. 616.
 — *Pac.* : Austral. or.

vaginatum (*Hook.*) *Jaeg. I*, p. 67 (1).

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
 Ångstroemia vaginata *C. M. Syn. II*, p. 608.
 Anisothecium vaginatum *Mitt. M. austr. am. p. 39*.
Dicranum vaginatum Hook. M. ex. t. 141 p.p. ; Brid. Bryol. univ. I, p. 465.
 2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

Dichotomaria *C. M. Syn. II*, p. 164 (subsect. *PILOTRICHI*).

DICKSONIA *Ehrh. Crypt. Dec. n. 65*.

pusilla Ehrh. — *Schistostega osmundacea*.

DICNEMON (2) *Schwaegr. Suppl. II, II, I*, p. 72 (10 spec.).

Banksii C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 161.
 — *Pac.* : Ins. Taïti.

calycinum (*Hook.*) *Schwaegr. l. c. ; Brid. Bryol. univ. II*, p. 215 ; *C. M. Syn. I*, p. 347 ; *Handb. of N. Zeal. Fl. p. 409*.

Hollia myrmecodes Sieb. in Fl. 1826, p. 223.
Leucodon calycinus Hook. M. ex. II, p. 12, t. 17.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland.

(1) Cf. Duby in *Mem...* Genève 1869, pp. 4-5.

(2) De nomine cf. *Lindb. in Oefv...* 1864, p. 602

connivens Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 190.

Cortic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

cuspidatus Besch. *op. cit.* p. 191.

— *Pac.* : Nov. Caledon.

enervis C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (*nom.*).

— *Pac.* : Austral. (Nov. Valesia).

obsoletinervis Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 496.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

Pancheri Besch. *op. cit.* p. 193.

2. Lignic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

« *var. sericeus* Besch. *l. c.*

Ubi praeced.

planifolius Besch. *op. et l. cc.*

Terr. ferrugin. — *Pac.* : Nov. Caledon.

rugosus (Hook.) Schwaegr. *l. c.* p. 127; *Brid. Bryol. univ.* 1, p. 216;

C. M. *Syn.* 1, p. 347.

Leucodon rugosus Hook. *M. ex.* II, p. 12, t. 20.

1. — *Pac.* : Austral.

rugosus ? Mont. — *Trachypus*.

spathoideus (Duby) Besch. *op. cit.* p. 191.

Synodontia spathoidea Duby *mss.*

Lignic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

DICNEMONELLA Hpe. in sched.

Sieberiana Hpe. — *Leucoloma*.

DICRANELLA W. P. Sch. *Coroll.* p. 13 (112 spec.).

abruptifolia C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 25.

— *Afr.* : C. B. Sp.

affinis Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, pp. 3-4.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

amplexans (Mitt.) Jaeg. *Ad.* I, p. 80.

Leptotrichum amplexans Mitt. *M. Ind. or.* p. 9.

1. — *As.* : Nepal.

angustifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 35.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

argentinica (C. M.) Par.

Ångstroemia argentinica C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 308.

2 ? Rupic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

ascensionica Mitt. in *Melliss's S. Helena*, 1875, p. 357.

— *Afr.* : Ins. Ascension.

asperula C. M. *mss.*; Jaeg. *Ad.* II, p. 638.

— *As.* : Sikkim.

attenuata Wils. — *Dicranodontium*.

aulacocarpa (Mont.) Mitt. *op. cit.* p. 36.

Ångstroemia aulacocarpa C. M. *Syn.* I, p. 431.

Dicranum aulacocarpum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 113 et *Syll.*

p. 45.

2. — *Am. merid.* : Chile, ins. Chiloë.

barbensis Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 145.

2. Terr. in silv. — Am. sept. : Costa Rica.

Belangeriana Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 9.

2. Terr. calcar. — Am. sept. : Martinic.

bella (C. M.) Par.

Angstroemia bella C. M. in Dusen M. Camer. n. 881.

— Afr. : M. Cameroon.

Beyrichiana Hpe. Enum. M. Brasil. p. 14.

Angstroemia Beyrichiana ej. Symb. 1872, p. 40.

Cynodontium debile Jaeg. Ad. p.p. (excl. syn. Schwaegr., C. M. et Mitt., ic., exs. et loc. insul.).

Dicranum parvulum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 14 p.p.

2? — Am. merid. : Brasil. austr. or.

bicolor (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 90.

Angstroemia bicolor C. M. Syn. I, p. 44.

Dicranum densum ej. in Linn. 1847, I, p. 206.

D. densum β minus Hpe. ibid. II, p. 73.

2. — Am. merid. : And. Columb.

bogotensis (Hpe.) Mitt. M. austr. am. p. 37.

Angstroemia bogotensis Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 357.

2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

borbonica Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 18.

2? — Afr. : Ins. Borbon.

Borgeniana (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 88.

Angstroemia Borgeniana Hpe. in Bot. Zeit. 1870, p. 33.

2. — Afr. : Natal.

brachyblepharis (C. M.) Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 19.

Angstroemia brachyblepharis C. M. Syn. I, p. 435.

Dicranum curvatum Hsch. in M. Deppe et Schiede.

2. — Am. sept. : Mexic.

caespitans Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 9.

2. — Am. sept. : Guadalup.

caldensis Angstr. in Oefv... 1876, n. 4, pp. 3-4.

2. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

callosa (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 81.

Angstroemia callosa Hpe. in Linn. 1863, p. 134.

2. Terr. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Boliv.

Exs. : Mandon, Pl. Boliv. n. 1607.

Cameruniae (C. M.) Par.

Angstroemia Cameruniae C. M. in Dusen M. Camer. n. 7.

— Afr. : M. Cameroon.

campylophylla (Tayl.) Jaeg. Ad. I, p. 86.

Angstroemia campylophylla C. M. Syn. II, p. 608.

Anisothecium campylophyllum Mitt. M. austr. am. p. 40.

Dicranum campylophyllum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 281;

H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 65 et Handb. p. 411.

2. — Am. merid. : And. Quitens. Pac. : Nov. Zeland. sept.

capituligera (C. M.) Par.

Ångstroemia capituligera C. M. in Linn. 1878-79, p. 308.

2. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

caucasica C. M. in Act. Hort. Petrop. 1887. f. 1.

1. — Eur. : Batoum.

cerviculata (Hedw.) W. P. Sch. Coroll. p. 13 et Syn. II ed. p. 73.

Ångstroemia cerviculata C. M. Syn. I, p. 430.

Bryum cerviculatum Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 7.

D. hybrida Sanio in Milde Bryol. Siles. p. 58 (fid. Jur.)

Dicranum cerviculatum Hedw. M. frond. III, p. 89, t. 37 b ; Bryol. eur. I (mon. p.) t. 56.

D. flavidum Schwaegr. Suppl. I, I, p. 192, t. 45.

Oncophorus cerviculatus Brid. Bryol. univ. I, p. 391.

O. flavidus ej. op. cit. p. 392.

2. In turf. — Eur. : E. reg. campestr. usq. in alp. As. : Penins.

Tschutschica, Kamschatka, Otchosc, Obi, Jenissei inf. Am. sept. :

Groenland, Labrador, New Brunswick, ins. Miquelon, Columb. brit.,

M. Rupestr. et Selkirk, Ohio, M. Alb.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 65. (Dicranum)

Mac. Canad. M. n. 476.

Rab. Bryoth. eur. n. 269, 1003 et b.

« var. pusilla (Hedw.) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 72 et II ed. l. c.

Bryum parvulum Dicks. op. c. p. 3.

Br. uncinatum ej. op. cit. Fasc. IV, p. 11, t. II, f. 8.

Dicranum cerviculatum β pusillum W. et M. Bot. Taschb. p. 193

D. parvulum Dicks. op. cit. Fasc. III, p. 3.

D. pusillum Hedw. M. frond. II, p. 80, t. 29, f. 13.

D. uncinatum Sm. Fl. brit. p. 1207.

Mnium pusillum Gmel. Syst. nat. II, p. 1528.

Oncophorus cerviculatus β uncinatus Brid. op. cit. p. 392.

O. pusillus ej. op. cit. p. 390.

Ut et ubi typ.

cerviculatula Kindb. mss.

— Am. sept. : Labrador, fret. Hudson.

chrysea C. M. in sched. ; Jaeg. Ad. I, p. 83.

Ångstroemia varia var. Sull. in Wright M. Cubens. n. 37.

Anisothecium varium Mitt. M. austr. am. p. 40.

2? — Am. sept. : Cuba.

clathrata H. f. et W. — Dichodontium.

coarctata (C. M.) Bryol. jav. I, p. 84, t. 70.

Ångstroemia coarctata C. M. Syn. I, p. 431.

2. Terr. — As. : Java.

compacta W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 19.

Angstroemia compacta C. M. Syn. II, p. 696.

2. — Am. sept. : Mexic.

condensata Ångstr. in Oefv.... 1873, n. 5, p. 148.

2. — Afr. : Ins. S. Helena.

consimilis (Hpe.) Mitt. M. austr. am. p. 32.

Ångstroemia consimilis Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 336.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

convoluta Jaeg. — *Dichodontium*.

crassinervis (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 87.

Ängstroemia crassinervis Hpe. in *Linn.* 1863, p. 133.

Dicranella heteromalla (fid. Mitt.)

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

crinalis Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881, p.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

crispa (Hedw.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 13 et *Syn. II ed.* p. 70.

Ängstroemia crispa C. M. *Syn. I*, p. 439.

Bryum marginale Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 8.

Dicranum crispum Hedw. *M. frond. II*, p. 91, t. 33; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 451; *Bryol. eur. I* (mon. p. 20), t. 55.

Hypnum crispatum Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1340.

1. Terr. arenos. humid. — *Eur.* : Spitzberg, Scandin., Anglia, Boruss, Siles., Galic., Saxon., Tatra, Harz, Francon., Hercyn., Westphal., Luxemb., Taunus, Helvet., Engad., Stir., Carinth., Vall. Tellin., Tirol., Salisburg. *As.* : Jenissei med. et inf. *Am. sept.* : Groenland, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Alaska, fret. Kotzebue, Idaho.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 101 (*Dicranum*).

Mac. *Canad. M.* n. 504.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 49.

curvata (Hedw.) W. P. Sch. *Coroll. l. c.* et *Syn. II*, p. 76.

Ängstroemia curvata C. M. *Syn. I*, p. 431.

D. subulata var. *curvata* Rab. *Kryptfl. v. Sachsen, I*, p. 421.

Dicranum curvatum Hedw. *Sp. M.* p. 132, t. 31; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 425; *Bryol. eur. I* (mon. p. 24), t. 61.

D. heteromallum var. *curvatum* Hook. et Tayl. *Muscol. brit.*

D. subulatum β *curvatum* Hüb. *Muscol. germ.* p. 259.

2. Ad rup. arenac. humid. — *Eur.* : Rar. : Voges., Silva Nigr., Hercyn., Gall. centr. (Arvernica). *Am. sept.* : Ferrar. : Pensilv., M. Alb.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 413, 1002.

curviseta Mitt. — *Campylopodium*.

cygncea Ängstr. — *Campylopodium*.

cyrtodonta (C. M.) Par.

Ängstroemia cyrtodonta C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et in *Forschungsreise...* p. 61.

2. Terr. argill. hum. — *Pac.* : Nov. Zeland.

debilis Lesq. et Jam. — *Microdus*.

decipiens Milde in *Bot. Zeit.* 1864, *Beibl.* (1).

In lapidos. — *Eur.* : Tirol. merid.

Dietrichiae (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 85.

Ängstroemia Dietrichiae C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 617.

2. — *Pac.* : Austral. or.

ditissima (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 34.

Ängstroemia ditissima Hpe. in *Linn.* 1863, p. 134.

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

- divaricata (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 80.
 Dicranum cerviculatum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 296.
 D. subulatum Griff. *Not.* p. 417.
 Leptotrichum divaricatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 9.
 2. — As. : Khasia.
- Duchassaingii W. P. Sch. — Microdus longirostris.
 edentata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 295.
 — As. : Ceylan.
- elata W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Peruv.* n. 2280; Mitt. *M. austr. am.* p. 33.
 1. Rupic. — Am. merid. : Amazon., And. Quitens. ; Peruv.
 eustegia Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. 95 et 1894, p. 77.
 2. Terr. — As. : Tonkin.
- exigua Hpe. — Microdus.
- falcularia C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 333.
 — Afr. : M. Cameroon.
- fallax Wils. — D. varia var. tenuifolia.
- Fitz-Geraldii Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1888, p. 197, t. 13 et *M. bor. exs.* n. 156.
 2. — Am. sept. : Ohio, Florid.
- flaccidiseta Mitt. — Microdus.
- flava Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 7.
 2. — Am. sept. : Martinic.
- flavipes Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 18.
 2. — Afr. : Ins. Borbon.
- fusca Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.
 2. Terr. — Am. merid. : Minas Geraës.
- glauca Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 189.
 2. Terr. humid. — Pac. : Nov. Caledon.
- Glaziovii Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 14.
 Ångstroemia Glaziovii ej. *Symb.* 1877, p. 717.
 Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- graciliramea Rehm. *M. Afr. austr.* n. 441.
 — Afr. : Natal.
- gracillima (Mitt.) Par.
 Anisothecium gracillimum Mitt. in *Trans. of the New. Zeal. Inst.* 1893, p. 287.
 2. Terr. — Pac. : Nov. Zeland.
- Grevilleana (Brid.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 13 et *Syn. II ed.* p. 71.
 Ångstroemia Grevilleana C. M. *Syn. I*, p. 439.
 Anisothecium Grevillei Lindb. *M. Scand.* p. 26.
 Dicranum Grevilleanum *Bryol. eur. I (mon. p. 19), t. 54.*
 D. Schreberi var. Grevilleana Brid. *Bryol. univ. I*, p. 450.
 D. Schreberianum Grev. *Scot. crypt. fasc. 22, t. 116; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 97.*
 1. Terr. argill. humidiusc. — Eur. : Spitzberg, reg. mont. et subalp. Scandin., Scot., Tirol., Carinth., Stir., Helvet., Jurass., Rhœt., Salisb., Austr., Bavar., Alp. Algov., Etruriae ; Ticin. ? As. : Jeniss. sup. et med., Caucas. occ. Am. sept. : Sin. Hudson, Anticosti, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 482.

Rab. Bryoth. eur. n. 267, 1222.

Griffithii (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 80.

Dicranum Khasianum A majus Griff. Not. p. 418.

Leptotrichum Griffithii Mitt. M. Ind. or. p. 9.

2. Ad rup. madid. — As. : Khasia.

guadalupensis Mitt. M. austr. am. p. 37.

— Am. sept. : Guadalup.

guadalupensis W. P. Sch. — D. stenocarpa.

Guilleminiana (Mont.) Hpe. Enum. M. Brasil. p. 14.

Ångstroemia Guilleminiana C. M. Syn. I, p. 440.

Dicranum Guilleminianum Mont. in Ann. sc. nat. 1841, p. 267 et Syll. p. 44.

D. sulcatum C. M. in Bot. Zeit. 1844, p. 709 et 1845, p. 93.

2. Rupic. et terr. — Am. sept. : Guadalup. Am. merid. : Brasil. austr. or.

Herminieri Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 6.

2. — Am. sept. : Guadalup.

heteromalla (L.) W. P. Sch. Coroll, p. 13 et Syn. II ed. p. 77.

Ångstroemia banatica Hpe. mss. ; Jur. Laubmfl. Oesterr. Ung. p. 34.

Å. crassinervis ej. (fid. Mitt.).

Å. heteromalla C. M. Syn. I, p. 432.

Bryum heteromallum Dill. Hist. M. p. 275, t. 47, f. 37.

Br. pilosum interruptum ej. op. cit. p. 376, t. 47, f. 38.

Br. Weisia Hffm. Deutschl. Fl. p. 33.

Dicranum heteromallum Hedw. M. frond. I, p. 68, t. 26 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 423 ; Bryol. eur. I (mon. p. 25), t. 62.

D. interruptum Brid. op. cit. p. 438.

Fuscina heteromalla Schrank Baiers Fl. II, p. 454.

Hypnum heteromallum Web. Spic. Fl. Goett. p. 72.

Leptotrichum heteromallum Mitt. M. Ind. or. p. 11.

Mnium heteromallum Gmel. Syst. nat. II, p. 1320.

2. Ad terr. denudat. et rup. aren. — Eur. : Vulg. in reg. campestr. et mont. As. : Saghalien, Amour, Japon., Sikkim, Caucas. Am. sept. : Nov. Scotia, New Brunswick, ins. Miquelon, Terra nov., Gaspes., Ontario, Columb. brit., Alaska, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Wisconsin, Illinois, Indiana, temperat. tot.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 95, 96 et II ed. n. 51 (Dicranum).

Mac. Canad. M. n. 29.

Rab. Bryoth. eur. n. 73 et b, 265 b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. r. 67.

« var. curvipes Lindb. Contr. ad fl. crypt. As. bor. or. p. 243.

— As. : Saghalien.

« var. interrupta W. P. Sch. ll. cc.

Ångstroemia heteromalla var. interrupta C. M. l. c.

Dicranum caducum Brid. op. cit. I, 425.

D. heteromallum var. interruptum W. et M. Bot. Taschb. I, p. 121 ; Bryol. eur. l. c.

D. interruptum Hedw. Sp. M. p. 129, t. 29.

Ut et cum typ. in Eur. et in Am. sept.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 809, 1001 (fid. Limpr.).

« var. orthocarpa (Hedw.) Par.

Ångstroemia heteromalla var. orthocarpa C. M. l. c.

Dicranum heteromallum var. 2 Sull. M. Allegh. n. 166.

D. orthocarpum Hedw. Sp. M. p. 134, t. 30.

Ut et cum typ. in Eur. et in Am. sept. ; As. : Caucas.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 53.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 68.

« *var.* *orthophylla* Lesq. et Jam. Man. p. 67.

Ut et cum typ. in *Am. sept.*

« *var.* *Pittieri* Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 145.
In silvat. humid. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

var. *saxicola* H. M. — *D. heteromalla var. sericea*.

« *var.* *sericea* W. P. Sch. Syn. II ed. p. 78.

D. heteromalla var. saxicola H. Müll. Westfal. Laubm. n. 415.

Dicranodontium sericeum Bryol. eur. Suppl. fasc. I, II.

Ad rup. arenac. — *Eur.* : Voges., Westphal., Riesengeb., Gall.
centr. (Fontainebleau c. fr.!).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 809, 1001 (*fid. Limpr.*).

« *var.* *stricta* W. P. Sch. Coroll. et Syn. II ed. II. cc.

Ångstroemia heteromalla var. stricta C. M. Syn. l. c.

Dicranum heteromallum var. strictum Bryol. eur. l. c.

Ut et ubi typ.

Hilariana Mitt. — *Microdus*.

himalayana Jaeg. — *Dichodontium Hookeri*.

homomalla Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 10.

2. — *Am. sept.* : Antill. gall.

Howei Ren. et Card. ined.

— *Am. sept.* : Calif.

humilis Ruthe. — *D. varia var. tenella*.

hybrida Sanio. — *D. cerviculata*.

Krausei Ltz. — *Dichodontium*.

Kunzeana Mitt. — *Microdus tenuis*.

Langloisii Ren. et Card. in Bot. Gaz. p. 39, f. 5 A.

2. Terr. — *Am. sept.* : Ludovic.

laxiretis Ren. et Card. ined.

— *Am. sept.* : Ludovic.

lenta Wils. — *D. Schreberi var. elata*.

leptorhyncha Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. belg. 1892, I, p. 145.

2. Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Costa Rica.

leptotrichoides Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1894, p. 238.

2. Terr. — *Am. sept.* : Ludovic., Alabama.

Levieri C. M. in Broth. En. M. Cauc. p. 67.

2. — *As.* : Caucas. occ.

Liebmänniana Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 19.

Ångstroemia Liebmänniana C. M. Syn. II, p. 605.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

ligulifolia (C. M.) Par.

Ångstroemia ligulifolia C. M. in Fl. 1886, p. 507.

2. Limic. — *Afr.* : Old Calabar.

Lindigiana Mitt. — *Microdus*.

longirostris Mitt. — *Microdus*.

luteola Mitt. M. austr. am. p. 33.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Mac-Leana Rehm. *M. Afr. austr. n.* 442.

— *Afr.* : Transvaal.

microdonta Mitt. — *Microdus Liebmanni*.

mollicula (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 85.

Dicranum patulum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 295 p.p.

Leptotrichum molliculum Mitt. *M. Ind. or. p. II*.

2. — *As.* : Himalaya.

Mülleri W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 19.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

muralis (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 33.

Ångstroemia muralis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 357.

1. *Muric.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

nitida Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. *Terr. aren.* — *Am. merid.* : Minas Geraës.

nodicoma C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 336.

— *Afr.* : M. Cameroon.

obscura Sull. et Lesq. in *Proc. Am. Acad.* 1859, p. 277.

2. *Terr.* — *As.* : Hong-Kong.

Pabstiana (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 90.

Ångstroemia Pabstiana C. M. in *Bot Zeit.* 1857, p. 380.

2. *Ad terr. humid.* — *Am. merid.* : Brasil.

parvula Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1889, n. 4.

2. *Terr.* — *Am. sept.* : M. Rupestr.

patula (Wils.) Jaeg. *Ad. I*, p. 85.

Dicranum patulum Wils. *l. c.* p.p.

Leptotrichum patulum Mitt. *M. Ind. or. p. II*.

2? — *As.* : Sikkim.

Perrottetii (Mont.) Mitt. *M. austr. am.* p. 35.

Ångstroemia Perrottetii C. M. *Syn. I*, p. 434.

Dicranum Perrottetii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1843, p. 241 et *Syll.* p. 44.

D. sclerocarpum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 291, t. 2
(*fid. C. M.*).

2. — *Am. sept.* : Antill. gall. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Nov. Granat.

pertenella C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 460.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Pervilleana Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 19.

2. — *Afr.* : Madagascar, S. Maria.

planinervia (Tayl.) Jaeg. *Ad. I*, p. 80.

Ångstroemia planinervia C. M. *Syn. II*, p. 605.

Anisothecium planinervium Mitt. *M. austr. am.* p. 40.

Dicranum planinervium Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 281.

— *Am. merid.* : M. Pichincha.

polaris Kindb. *mss.*

2. — *Am. sept.* : Alaska, mar. Behring.

Polii Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* I, p. 113.

— *Afr.* : Nossi Combe.

Puiggarii Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881, p.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

pumila Saut. *Fl. v. Salzburg*, III, p. 22.

Ängstroemia Sauteri C. M. *Syn.* I, p. 430.

Dicranum falcatum var. *pumilum* Limpr. *Deutschl. Laubm.* p. 340.

D. pumilum Saut. in *Fl.* 1839, I, p. 264.

1. Ad rup. irror. — *Eur.* : Alp. Salzburg., Rhaet. et Bavar., Tatra.

pynoglossa (Broth.) Par.

Anisothecium pynoglossum Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl.* III
Suppl. p. 95 (nom.) et in *Oefv...* 1890.

2. Terr. argill. — *Pac.* : Austral. (Queensland).

pyrrhotricha Besch. *Not. M. des I. S. Paul et d'Amsterdam*, p. 2.

— *Afr.* : Ins. S. Paul.

remotifolia Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 11.

2. Ster. — *Am. sept.* : Guadalup.

rufescens (Turn.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 13 et *Syn.* II ed. p. 75.

Ängstroemia rufescens C. M. *Syn.* I, p. 436.

Anisothecium rufescens Lindb. *M. Scand.* p. 26.

Bryum rufescens Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 6, t. 8, f. I.

Dicranum carneum Bland. in *Sturm Deutsch. Fl.* II, fasc. II.

D. curvatum Schultz Suppl. *Fl. Starg.* p. 71.

D. rufescens Turn. *Muscol. Hib.* p. 66; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 437;
Bryol. eur. (mon. p. 22), t. 66.

D. varium β *rufescens* Brid. *Mant. M.* p. 62.

2. Terr. argill. et subaren. humid. — *Eur.* : Reg. campestr. zon. interm.,
rar. sept. As. : Japon., Caucas. occ. *Am. sept.* : New Brunswick,
Ontario, Columb. brit., Washington, Oregon; tota sept. et centr.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 27.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 266 et b.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 64.

rufo-aurea (Hpe.) Jaeg. *Ad.* I, p. 83.

Ängstroemia rufo-aurea Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 627.

2. — *Pac.* : Alp. Austral. or.

Sartorii Jaeg. — *Campylopodium*.

Schmidii (C. M.) Jaeg. *Ad.* I, p. 89.

Ängstroemia Schmidii C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 39.

1. — *As.* : M. Neilgherr.

Schreberi (Sw.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 13 et *Syn.* II ed. p. 72.

Ängstroemia Schreberi C. M. *Syn.* I, p. 438.

Anisothecium crispum Lindb. *M. Scand.* p. 26.

Barbula crispa Hedw. *Fund. M.* II, p. 92.

B. mutabilis Baumg. *Fl. Lips.* n. 1263.

B. Schreberi Brid. *M. Rec.* II. I, p. 207.

Bryum crispum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 79.

Dicranum recognitum Roehl. *Moosg. Deutsch.* p. 377.

D. Schreberi Sw. *M. Suec.* pp. 37 et 88, t. II, f. 6; *Brid. Bryol. univ.* I,
p. 449; *Bryol. eur.* I (mon. p. 18), t. 53.

2. Terr. argill. et aren. humid. — *Eur.* : Reg. campestr. zon. interm.
et septentr. As. : Jenissei, Obi, Kamschatka; Caucas. *Am. sept.* :
Sin. Hudson, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., Washington,
M. Adirondack, Alb., Nov. Angliae; Pensilv., etc. *Pac.* : Nov.
Zeland.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 97 (*Dicranum*).
Rab. Bryoth. eur. n. 1112.

« *var. elata* W. P. Sch. *Syn. l. c.*

D. lenta Wils. *mss.*; Braithw. in *Journ. of bot.* 1871, p. 289.

loc. uligin. — *Eur.* : Anglia (ster.); Suecia, Rhoengeb. *Am. sept.* : Washington.

Exs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 74.

« *var. occidentalis* Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI. p. 344 (1); Lesq. et Jam. *Man.* p. 65.

Ut typ. — *Am. sept.* : Oregon.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 495.

« *var. robusta* Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 61.

Ut et ubi typ. in *Am. sept.*

secunda Lindb. — *D. subulata*.

var. brachycarpa Lindb. — *D. subulata var. brachycarpa*.

setifera (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 80.

Leptotrichum setiferum Mitt. *M. Ind. or.* p. 11.

2. — *As.* : Sikkim, Assam.

simplex Brockm. — *D. varia* γ *tenella*.

sinuosa Wils. — *Didymodon*.

spiralis (Mitt.) Par.

Leptotrichum spirale Mitt. *op. cit.* p. 158.

2. — *As.* : Himalaya or.

squarrosa (Schrad.) W. P. Sch. *Syn. ed. I*, p. 71 et *ed. II*, p. 72.

Ångstroemia squarrosa C. M. *Syn. I*, p. 438.

Anisothecium squarrosus Lindb. *M. Scand.* p. 26.

Bryum erectis capitulis brevibus, foliis inflexis Dill. *Hist. M.* p. 305, t. 46, f. 34.

Br. palustre Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 11.

Br. pellucidum β L. *Sp. pl.* p. 1583.

Dichodontium squarrosus W. P. Sch. *Coroll.* p. 13.

Dicranum squarrosus Schrad. *Journ. bot.* V, p. 68; *Bryol. eur. I* (mon. p. 17), t. 52.

Diobelon squarrosus Hpe. *Fl. Hercyn.*

Oncophorus squarrosus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 404.

2. In terra saxos. humid. et prat. uligin. — *Eur.* : Reg. mont. et subalp. zon. intermed. et sept. — *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : Groenland, Anticosti, New Brunswick, M. Selkirk, Alaska, Columb. brit.

Exs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 943.

« *var. frigida* Ltz. *Moosst.* p. 85.

Ad stagn. nival. — *Eur.* : Helv., Tirol.

stenocarpa Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 8.

D. guadalupensis W. P. Sch. in *Husn. M. Antill. fr.* n. 128.

2. *Ad terr. saxos. et calcar.* — *Am. sept.* : Antill. gall.

(1) Jam *Dichodontio Canadensi* ut syn. imposit. (*Man.* p. 62).

- « *var. minor* Besch. l. c.
 Ut typ. — *Am. sept.* : Martinic.
- stricta* W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 77 (1).*
 2. — *Eur.* : Lappon.
- strumulosa* (Hpe.) Jaeg. *Ad. I, p. 81.*
Angstroemia strumulosa Hpe. in *Linn.* 1863, p. 133.
 2. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- « *var. minor* (Hpe.) Jaeg. l. c.
Angstroemia strumulosa var. minor Hpe. l. c.
 Ut typ. — *Am. merid.* : Summa Cordillier.
- subclathrata* Ltz. — *Dichodontium.*
- subcompressa* W. P. Sch. in *sched.* ; Jaeg. *Ad. I, p. 91.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- subinclinata* Ltz. *Moosst. p. 160.*
 2. Terr. — *Am. sept.* : Panama.
- subsubulata* (Hpe.) Jaeg. *Ad. I, p. 79.*
Angstroemia subsubulata Hpe. mss. ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 162.
 2. — *Afr.* : C. B. Sp.
- subsulcata* Hpe. *Enum. M. Brasil. p. 54.*
Angstroemia subsulcata ej. *Symb.* 1872, p. 42.
 2 ? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subulata* (Hedw.) W. P. Sch. *Coroll. p. 13 et Syn. II ed. p. 75.*
Angstroemia subulata C. M. *Syn. I, p. 433.*
D. secunda Lindb. *M. Scand. n. 26.*
Dicranum heteromallum β minus *Wahlenb. Fl. Lapp. p. 340.*
D. secundum Sw. *Act. Holm.* 1795, p. 244.
D. subulatum Hedw. *Sp. M. p. 128, t. 31* ; *Brid. Bryol. univ. I, p. 426* ;
Bryol. eur. I (mon. p. 23), t. 60.
D. sudeticum Schwaegr. *Suppl. I, I, p. 175, t. 45.*
 2. Ad terr. humid. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. ; Spitzberg. As. :
 Jenissei, Saghalien, Amour. *Am. sept.* : Groenland, Gaspes., New
 Brunswick, M. Rupestr. et Selkirk, Columb brit., fret. Behring,
 reg. occid. et or., Idaho, Oregon.
Eas. : Drumm. *M. bor. am. I ed. n. 98 (Dicranum).*
 Mac. *Canad. M. n. 28.*
 Rab. *Bryoth. eur. n. 414.*
 Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n. 66.*
- « *var. brachycarpa* (Lindb.) Par.
D. secunda var. brachycarpa Lindb. l. c.
 Ut typ. — *Eur.* : Norvegia, Suecia. As. : Caucas. occ.
var. curvata Rab. — *D. curvata.*
- tenuiseta* (C. M.) Par.
Angstroemia tenuiseta C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (nom.)
 — *Pac.* : Nov. Caledon.
- Tonduzii* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 144.
 2. Terr. — *Am. sept.* : Costa Rica.

(1) *Dicrani Starkii* forma, fid. Lindb. in *Act. Soc. pr. Fl. et Faun.* 2^a April, 1881.

tovariensis (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 90.

Ängstroemia tovariensis C. M. Syn. I, p. 443.

Dicranum Perrottetii ej. in Linn. 1847, I, p. 206.

2. — Am. merid. : Columb., Venezuela.

trematodontifolia (C. M.) Par.

Ängstroemia trematodontifolia C. M. in Linn. 1874, p. 630.

— Am. sept. : Mexic.

trichodontoidea C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 3 (nom.)

— Pac. : Austral. (Nov. Vales.).

trichophylla Mitt. — Campylopodium.

Trumpffii (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 91.

Ängstroemia Trumpffii Hpe. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 215.

2. — Am. merid. : And. Venezuel.

varia (Hedw.) W. P. Sch. Coroll. p. 13 et Syn. II ed. p. 74.

Ängstroemia varia C. M. Syn. I, p. 435.

Anisothecium rubrum Lindb. M. Scand. p. 26.

Bryum rubrum Huds. Fl. Angl. I ed., p. 413.

Br. trichodes capsulis rubris cernuis Dill. Hist. M. p. 390, t. 50, f. 59.

Dicranum rigidulum Sw. M. Suec. p. 89, t. 3.

D. rubrum Boulay M. Fr. p. 505.

D. varium Hedw. M. frond. II, p. 95, t. 34 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 435 ; Bryol. eur. I (mon. p. 20), t. 57-58.

D. varium α viride H. et T. Muscol. brit. II ed., p. 107, t. 17 p.p. ; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 99 p.p. et II ed. n. 50.

2. In terr. argill. arenac. humidiusc. — Eur. : In reg. campestr. vulgariss. As. : Jenissei, Obi, Persia, Caucas., Syria, etc. Am. sept. : Canada or., Athabasca, M. Rupestr., Montana, Illinois, reg. or. et centr.

Ews. : Mac. Canad. M. n. 26.

Rab. Bryoth. eur. n. 72.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed n. 63.

« var. callistoma W. P. Sch. ll. cc.

Bryum callistomum Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 5, t. 8, f. 10.

Dicranum callistomum Brid. Sp. M. I, p. 187.

D. varium var. callistoma Bryol. eur. l. c.

Ut et cum typ. in Eur.

Ews. : Rab. Bryoth. eur. n. 268.

« f. irrigata H. Müll. Westfal. Laubm. n. 417.

Ad rup. schist. irrigat. — Eur. : Westphal.

« var. obtusifolia Berggr. M. et Hepat. Spetsb. p. 36 et M. Spetsb. n. 9.

Ut typ. — Eur. : Spitzberg.

« var. obtusiuscula (Lindb.) Par.

Anisothecium rubrum var. obtusiusculum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 85.

— As. : Jenissei inf.

« var. tenella W. P. Sch. ll. cc.

Anisothecium humile Lindb.

Bryum simplex L. Sp. Pl. p. 1587.

Dicranella humilis Ruthe in Hedwigia 1873, p. 147.

D. simplex Brockm. Laubm. Mecklenb. p. 62.

Dicranum laxifolium Brid. Bryol. univ. I, p. 431.

D. varium var. *tenellum* *Bryol. eur. l. c.*

Fuscina simplex *Schrank Bayers Fl. II, p. 453.*

Ut typ. ♂ et fr. ign. — *Eur.* : Fennia, Germania. *As.* : Ross. or.,
Jenissei inf.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 1321.*

« *var. tenuifolia* *W. P. Sch. ll. cc.*

Ångstroemia varia var. *tenuifolia* *C. M. l. c.*

D. fallax *Wils. mss.; Braithw. in Journ. of bot. 1870, p. 327, t. 109, f. 3.*

Dicranum varium var. *tenuifolia* *Bryol. eur. l. c.*

D. tenuifolium *Br. in F. Müller M. Sardin.*

Ut typ. — *Eur.* : Anglia, reg. merid. *Afr.* : Alger.

villicaulis *Hpe. in sched.; Jaeg. Ad. II, p. 638 (1).*

— *As.* : Sikkim.

Dicranobryum *C. M. Syn. I, p. 309* (subsect. *BRYI*).

DICRANODONTIUM *Bryol. eur., 1* (15 spec.).

aristatum *Bryol. eur. Suppl. I-II; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 99.*

D. longirostre var. *aristatum* *Jur. Laubm. Osterr. Ung, p. 52.*

D. longirostre var. *intermedium* *Milde in Hedwig, 1870, p. 414.*

D. lutescens *W. P. Sch. mss.; Mdo. Bayer. Laubm. p. 49.*

Didymodon aristatus *Lindb. M. Scand. p. 25.*

2. *Ad rup. silic.* — *Eur.* : Norveg. occ., Boruss. or., Sudetes, Alp.
Carinth., Salisburg.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 318.*

« *var. scoticum* *W. P. Sch. l. c. p. 100.*

D. asperulum *Wils. p.p. (fid. Jaeg. Ad. II, p. 644).*

Didymodon asperulus *Lindb.*

Ad. rup. aren. — *Eur.* : Scotia.

asperulum *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 296 p.p.*

Campylopus asperulus *Kindb. Laubm. Schw. et Norv. p. 88?*

D. aristatum var. *scoticum* (*fid. Jaeg. l. c.*)

Dicranum asperulum *Mitt. M. Ind. or. p. 22.*

— *Eur.* : Scotia. *As.* : Sikkim, Alp. Yunnan.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 940.*

asperulum *Wils. p.p.* — $\left\{ \begin{array}{l} \textit{D. aristatum var. scoticum?} \\ \textit{D. caespitosum.} \\ \textit{D. uncinatum.} \end{array} \right.$

attenuatum *Wils. l. c. p. 297.*

Dicranum attenuatum *Mitt. op. et l. cc.*

2. — *As.* : Sikkim.

caespitosum (*Mitt.*) *Par.*

Campylopus caespitosus *Jaeg. Ad. I, p. 138.*

D. asperulum *Wils. l. c. p.p.*

Dicranum caespitosum *Mitt. op. et l. cc.*

2. — *As.* : Sikkim.

circinatum (*Wils.*) *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 99.*

Campylopus uncinatus *Kindb. Laubm. Schwed et Norveg. p. 88.*

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum :

D. tenax *C. M.*

- D. longirostre* var. *circinatum* Milde in Bot. Zeit. 1870, p. 414.
Dicranum circinatum Wils. Bryol. brit. II ed. p. 76; Bryol. eur. Suppl. I-II.
D. comptum W. P. Sch. (fid. Limpr.).
Didymodon uncinatus Lindb.

2. In decliv. herbos. — Eur.: Norveg. occ., Scot., Sudet., Alp., Rhaet.

dicticyon (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 644.

- Campylopus dicticyon* ej. Ad. I, p. 138.
Dicranum dicticyon Mitt. op. cit. p. 21.
D. uncinatum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 21.
 2. — As.: Sikkim.

Didymodon (Griff.) Par.

- Campylopus Didymodon* Jaeg. Ad. I, p. 138.
Dicranum Didymodon Griff. in Calcutta Journ. nat. hist. II, p. 99; Mitt. op. et l. cc.
D. relaxum Wils. in op. cit. p. 294.
Didymodon dicranoides Griff. Not. p. 435 et Ic. pl. asiat. II, t. 82, f. 2.
 — As.: Khasia.

dimorphum Mitt. mss.

— As.: Bhotan.

flexipes Mitt. mss.; Hook. f. Handb. Fl. N. Zeal. p. 413.

- Dicranum proscriptum* H. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 67.
 2. — Pac.: Nov. Zeland. sept.

« var. β }
 « var. γ } Hook. f. l. c.

Ut et cum typ.

leptodrepanium C. M. in Dusen M. Camer. n. 348.
 Afr.: M. Cameroon.

lineare Mitt. mss.; Hook. f. Handb. Fl. N. Zeal. p. 413.

1. — Pac.: Nov. Zeland. med.

longirostre (Web. et Mohr) Bryol. eur. I (mon. p. 2), t. 88.

- Bryum pilosum molle*, setis intortis Dill. Hist. M. p. 373, t. 47, f. A-E.
Campylopus alpinus Bryol. eur. Suppl. fasc. I-II (1).
C. denudatus Kindb. Laubm. Schwed. et Norveg. p. 87.
Cynodontium longirostre Mart. Fl. Erlang. crypt. p. 94.
Dicranum denudatum Brid. Sp. M. I, p. 403 et II, p. 600.
D. flexuosum Brid. M. Rec. II, I, p. 163.
Didymodon denudatus Lindb. M. Scand. p. 25.
D. longirostris W. et M. Bot. Taschb. p. 155; Brid. Bryol. univ. I, p. 512.
Trichostomum longirostre Hartm. Skand. Fl.

2. Lignic., rupic. et in turf. — Eur.: Reg. campestr., mont. et subalp.
 As.: Temperat.: Caucas. Am. sept.: New Brunswick, M. Allegh.,
 Ohio, reg. or.
 Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 799, 936, 937.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 90.

« var. *alpinum* (W. P. Sch.) Milde in Bot. Zeit. 1870, p. 414.

- Campylopus alpinus* W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. I-II, t. 5; Rab. Bryoth. eur. n. 936 a et b, 937.
C. intermedius Wils. mss.
C. pachyneuros Mdo. Moosst. p. 63.

In turfis. — *Eur.* : Riensengeb., Fichtelgeb., Alp. Algov., Helvet.
 var. *aristatum* Jur., Milde. — *D. aristatum*.
 var. *circinatum* Milde. — *D. circinatum*.

« var. *fulgidum* Milde. in op. et l. cc.

Ad rup. arenac. — *Eur.* : Silesia.

var. *intermedium* Milde. — *D. aristatum*.

« var. *montanum* Milde in op. et l. cc.

Ad cataract. et stagn. — *Eur.* : Riesengeb.

var. *subalpinum* Milde. — *Dicranum longifolium* var. *subalpinum*.

lutescens W. P. Sch. — *D. aristatum*.

Millspaughii D^{na} E. G. Britt. in *Millsp. Prel. Cat. of the Fl. of W. Virg.* p. 488.

Campylopus flexuosus Sull.

— *Am. sept.* : Virgin. occid.

nitidum Jam. — *Dicranum longifolium* var. *plumosum*.

perfalcatum C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

robustum Seq. — *Dicranoweisia*.

sericeum Bryol. eur. Suppl. — *Dicranella heteromalla* var. *sericea*.

uncinatum (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 644 (1).

Campylopus uncinatus Bryol. jav. I, p. 78 p.p.

D. asperulum Wils. l. c. p.p.

Dicranum uncinatum C. M. *Syn. I*, p. 404.

Thysanomitrium uncinatum Harv. in *Hook. Ic. pl. rar. t. 22 et in Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 6.

2. Ad rup. madid. — *As.* : Nepal., Himalaya, Khasia, Assam, Java.

uncinatum C. M. mss. ; *Jaeg. Ad. II*, p. 645.

— *As.* : Japonia.

virginicum D^{na} E. G. Britt. in *Millsp. op. et l. cit.*

— *Am. sept.* : Virgin. occ.

DICRANOWEISIA Lindb. M. Scand. (20 spec.)

alpina (Mitt.) Par.

Holomitrium alpinum Mitt. *M. Ind. or.* p. 25.

Weisia indica Wils. in *Kew Journ. of bot.* IX, p. 291 p.p.

— *As.* : Sikkim.

antarctica (C. M.) Par.

Blindia antarctica C. M. *Syn. I*, p. 344 et II, p. 584.

Dicranum antarcticum Mitt. *M. austr. am.* p. 63.

Weisia crispula H. f. et W. *Fl. antarct. I*, p. 127, t. 58, f. 2; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 404.

1. Rupic. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitae. *Pac.* : Ins. Campbell.

austro-crispula (C. M.) Par.

Blindia austro-crispula C. M. in *Fl.* 1885, p. 404.

1. Rupic. — *Am. merid.* : Fuegia.

(1) Cl. Mitt. *M. Ind. or.* p. 21 in una et ead. spec. *Dicranod. asperulum*, *circinatum* et *uncinatum* conjungit.

Bruntoni (Sm.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 56.

Cynodontium Bruntoni Bryol. eur. I (mon. p. 3), t. 44.

Dicranum Bruntoni Engl. Bot. t. 2509; C. M. Syn. II, p. 590.

D. polycarpum H. et T. Muscol. brit. I ed., p. 57.

Didymodon Bruntoni eor. II ed., p. 117, t. suppl. 4.

D. obscurus Kaulf. in Sturm Deutsch. Fl. crypt. fasc. 16; Brid. Bryol. univ. I, p. 516.

Diobelon Bruntoni Hpe. Fl. Hercyn.

Onchophorus Bruntoni Lindb. M. Scand. p. 27.

Oreoweisia Bruntoni Milde Bryol. sil. p. 54.

Trichostomum obscurum de Not. Syll. p. 194.

Weisia Bruntoni ej. Epil. p. 597.

l. In fiss. rup. silic. — Eur.: Suecia., Britann., Sudetes, Voges., Silv. Nigr., Hercyn., Thuring., Pyr., Gall. centr., Ital. sup., Hispan.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 412 (Cynodontium).

cirrata (Hedw.) Lindb. M. Scand. p. 25; W. P. Sch. op. cit. p. 55.

Afzelia cirrata Ehrh. in litt.

Barbula cirrata Brid. M. Rec. II, I, p. 203.

Blindia cirrata C. M. Syn. II, p. 585.

Bryum cirratum Gmel. Syst. nat. II, p. 1631.

Br. cirratum et stellatum tenuioribus foliis Dill. Hist. M. p. 379, t. 48, f. 42 (? W. P. Sch.).

Dicranum cirratum Timm. Prodr. Fl. Megap. p. 783.

Encalypta cirrata Sw. M. Suec. p. 25.

Grimmia cirrata Sm. Fl. brit. III, p. 1189.

Gr. Dicksoni Brid. M. Rec. II, I, p. 72.

Gymnostomum cirratum Schrank Baiers Fl. II, p. 436.

Hypnum cirratum Weis Crypt. Goett. p. 207.

Leersia cirrata Willd. Prodr. fl. Berol. p. 902.

Mnium cirratum L. Sp. pl. p. 1576 (? W. P. Sch.).

Tortula cirrata Clairv. Man. p. 315.

Weisia cirrata Hedw. Sp. M. p. 69, t. 12; Brid. Bryol. univ. I, p. 343; Bryol. eur. I (mon. p. 9), t. 25.

W. Dicksoni Brid. M. Rec. II, I, p. 72.

l. Lignic., rupic. et ad tecta stramin. — Eur.: Med. et sept.: nunquam in Alp. As.: Caucas. Afr.: Alger. Am. sept.: Columb. brit., Washington, ins. Vancouver, Oregon, Wyoming, Illinois, Calif. Pac.: Tasman.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 19.

Rab. Bryoth. eur. n. 106, 366, 808 (Weisia).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 48.

compacta (Schleich.) W. P. Sch. op. cit. p. 53.

D. crispula var. compacta Lindb. M. Scand. p. 25.

Grimmia compacta Schleich. Pl. helv. exs.

Weisia atro-virens Bryol. Germ. II, II, p. 56, t. 29.

W. compacta Brid. Mant. M. p. 42 et Bryol. univ. I, p. 345; Bryol. eur. I (mon. p. 8), t. 24; C. M. Syn. I, p. 654.

W. condensata Brid. Mant. M. p. 41.

l. Ad rup. aren. et schistos. — Eur.: Rara: Summ. Alp. Norveg., Carinth., Salisburg., Tirol., Helvet.

contecta (Hook. f. et Wils.) Par.

Blindia contecta C. M. Syn. I, p. 344 et II, p. 584.

Weisia contecta H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 540; Fl. Antarct. I, p. 127, t. 58; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 405.

2? — Afr.: Ins. Kerguelen. Am. merid.: Fret.

Magell. Pac.: Ins. Campbell.

crispula (Hedw.) Lindb. l. c.; W. P. Sch. op. cit. p. 54.

Blindia crispula C. M. Syn. II, p. 584.

Grimmia crispula Sm. *Fl. brit.* III, p. 1192.

Holomitrium crispulum Mitt. *M. Ind. or.* p. 25.

Weisia cirrata β *crispula* Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 303.

W. crispula Hedw. *Sp. M.* p. 68, t. 12; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 346;
Bryol. eur. I (mon. p. 9), t. 26.

W. falcata *Bryol. germ.* II, p. 71, t. 31, f. 10.

1. Ad. rup., rariss. calcar. — *Eur.* : E reg. mont. usq. in alp. super. :
Spitzberg, ins. Ursorum. As. : Penins. Tschutschica, Kamschatka,
Jenissei, Sikkim, Caucas. Afr. : Alger. Am. sept. : Groenland,
Labrador, fret. Smith, Gaspesia, M. Rupestr. et Selkirk, [Columb.
brit., Oregon, Utah, Idaho, Calif.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 69 (*Weisia*).

Mac. *Canad. M.* n. 477.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 793 (*Weisia*).

« *var. atrata* W. P. Sch. l. c.

Blindia crispula *var. atrata* C. M. l. c.

Weisia crispula *var. atrata* *Bryol. eur.* l. c.

W. crispula β *nigrescens* { *Byrol. germ.* II, p. 67, t. 30, f. 15-16.

W. crispula γ *atrata*

Ad nives. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursorum, summ. Alp.

var. compacta Lindb. — *Dicranoweisia*.

cryptodon (Mont.) Par.

Dicranum cryptodon Mitt. *M. austr. am.* p. 63.

Weisia cryptodon Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 120 et *Syll.* p. 49;
C. M. Syn. I, p. 652.

1. — *Am. merid.* : Chil. austr.

fastigiata (Tayl.) Par.

Dicranum fastigiatum Tayl. in Mitt. op. et l. cc.

Rupic. — *Am. merid.* : Summ. M. Pichincha.

indica (Wils.) Par.

Holomitrium indicum Mitt. *M. Ind. or.* p. 24.

Leptotrichum indicum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 321.

Weisia indica ej. in op. cit. p. 292 p.p.

1. — As. : Sikkim.

inermis (Mitt.) Par.

Dicranum inerme Mitt. op. cit. p. 63.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

kerguelensis Par.

Blindia microcarpa Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876 (1).

1. — Afr. : Ins. Kerguelen.

microcarpa (Hook. f. et Wils.) Par.

Holomitrium cirratum Mitt. op. cit. 1859, p. 70.

Weisia microcarpa H. f. et W. *Fl. Tasman.* II, p. 166, t. 171, f. 5.

1. — Pac. : Tasman.

microdonta W. P. Sch. — *Microdus Liebmanni*.

? *obliqua* Kindb. in Mac. *Cat.* p. 256 (nom.).

1. Rupic. — *Am. sept.* : Fret. Behring, M. Selkirk.

pallidifolia (C. M.) Par.

Blindia pallidifolia C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 25

1. Rupic. — *Am. merid.* : Austr. Georgia.

riparia (Hpe.) Par.

Weisia riparia Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 626.

— *Pac.* : Austral. felix.

robusta (Seq.) Venturi in *Rev. bryol.* 1882, p. 61.

Dicranodontium robustum Sequeira in *Rev. d. Soc. de Instruct. d. Porto Xbri* 1881.

1. — *Eur.* : Lusitan. (Porto).

tortelloides (C. M.) Par.

Blindia tortelloides C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 78 et in *Forchungsreise...* p. 18.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

tortifolia (Hook. f. et Wils.) Par.

Blindia tortifolia C. M. *Syn.* I, p. 343 et II, p. 584.

Weisia tortifolia H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 540 et *Fl. Antarct.* II, p. 404, t. 152, f. 5.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

DICRANUM Hedw. *Fund. M.* II, p. 91 (179 spec).

acanthoneuron C. M. in *Fl.* 1890, p. 474.

Ster. In gramin. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

aciculare Hedw. — *Rhacomitrium*.

β *fluitans* Turn. — *Rhacomitrium protensum*.

γ Turn. — *Rhacomitrium microcarpum*.

aciphyllum Hook. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 541 et *Fl. Antarct.* II, p. 405, t. 52, f. 3; C. M. *Syn.* I, p. 378 et II, p. 594; *Mitt. M. austr. am.* p. 64.

2. Lignic. et terr. — *Am. merid.* : Patagon. austr., Archip. Magell. ins. Maclov.

acrocaulon C. M. — *Campylopus*.

acuminatum C. M. — *Campylopus*.

adiantoides Sw. — *Fissidens*.

aduncum Hpe. — *Leucoloma*.

affine Funk. — *Dicranum Schraderi*.

albescens C. M. — *Campylopus*.

aggregatum Brid. — *Ptychomitrium polyphyllum*.

albicans *Bryol. eur.* I (mon. p.), t. 73; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 87.

Campylopus albescens *Kindb. Laubm. Schwed. et Norveg.* p. 86.

C. crassinervis Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 297.

C. Leanus (fid. Hpe. in *Jaeg. Ad.* II, p. 656; cf. *Brothera Leanus*).

Dicranum enerve Thed. in *Hartm. Skand. Fl.* V ed., p. 393; C. M. *Syn.* II, p. 594 (1).

D. Kasbeckianum Kolenati in sched.

D. stramineum *Lindb.*

2. Ad terr. humos. et in fiss. rup. reg. alp. et supraalp. — *Eur.* : Lappon., Scandin., Transilv., Tatra, Alp. Salzburg., Stir., Carinth.,

(1) *Lindb. M. Scand.* p. 23 n. 234 in adn.

Austr. sup., Carniol., Alp. Bavar. et Algov., Tirol., Rhæet., Helvet., Vall. Tellin. As.: Sikkim, Caucas. *Am. sept.*: Groenland, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Colorado.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 404.

Rab. Bryoth. eur. n. 264, 620, 1111.

Un. itin. 1863, n. 12.

« *var. denticulatum* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 261.

Rupic. — *Am. sept.*: M. Rupestr. et Selkirk.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 589.

albicans Schwaegr. — *Leucobryum longifolium*

albidum Brid. — *Leucobryum minus*.

albulum Sull. — *Leucoloma*.

alopecurus C. M. — *Campylopus*.

alpestre Wahlenb. — *Cynodontium gracilescens var. alpestre*.

var. majus Wahlenb. — *Cynodontium gracilescens*.

alpicolum C. M. — *Campylopus torfacens var. alpicola*.

altissimum C. M. — *Campylopus*.

amabile C. M. — *Campylopus*

ambiguum Hedw. — *Trematodon*.

Andersonii Wichura in *Fl.* 1859, n. 27; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 689 (1).

1. — *Eur.*: Lappon.

Anderssonii C. M. — *Campylopus*.

Andrieuxii Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 20.

1. — *Am. sept.*: Mexic.

angustifolium Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* p. 170, t. 172, f. 2.

Ster. — *Pac.*: Tasman.

angustifolium Kindb. — *D. Kindbergii*.

angustinerve Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 68; *Fl. Tasm.* p. 170, t. 171, f. 9.

2. Lignic. — *Pac.*: Tasman.

angustirete Aust. — *Campylopus*.

angustum Lindb. in *Mitth. v. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 6^a 9^{bri} 1880 et in *Rev. bryol.* 1882, p. 83.

2. vel pseudo-I. Paludic. — *Eur.*: Lappon., Fennia. As.: Penins. Samoied., Jenissei med. et inf.

antarcticum Mitt. — *Dicranoweisia*.

aquaticum { Brid. — *Rhacomitrium protensum*.
Ehrh. — *Dichodontium pellucidum*.

arcticum *Bryol. eur. Suppl. fasc. III-IV*; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 93.

D. glaciale Berggr. in *Bidr. till. Skand. bryol.* 1866 et in *Hedwigia* 1868, p. 25.

D. molle Wils. *Bryol. brit.* p. 75 (ut syn.).

D. Starkei var. molle ej. op. cit. p. 74.

1. Ad nives. — *Eur.*: Spitzberg, septem Ins., ins. Ursorum, Scand. ; Scot. (ster.). As.: Penins. Tschutschica. *Am. sept.*: Groenland, Labrador, fret. Behring.

- arctocœoides C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forchungsreise...* p. 19.
 1. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- arctocarpon } C. M. — Campylopus porphyreodictyon.
 } Hsch. — Campylopus.
- arcuatum } Brid. p.p. — Campylopus Echernieri.
 } Brid. p.p. — Campylopus longipilus.
 } Schleich. — Rhacomitrium patens.
- arenicolum C. M. — Campylopus.
- areodictyon } C. M. — Campylopus.
 } Hpe. et Ltz. — Campylopus Krauseanus.
- argutum Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 516.
 2? — Pac. : Austral. (Nov. Valesia).
- argyrocaulon C. M. in *Linn.* p. 588.
 Ster. Paludic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- aristatum Wils. — Dicranodontium circinatum.
- asperrimum C. M. — Leucoloma.
- asperulum Mitt. — Dicranodontium.
- asplenoides Sw. — Fissidens.
- assimile Hpe. *l.c.* M. t. 24 ; C. M. *Syn.* I, p. 362 ; *Bryol. jav.* I, p. 66, t. 54.
 D. polysetum β assimile Dz. et Mk. M. frond. ined. *Archip. ind.* p. 145.
 2. Arbor. — As. : Borneo, M. Java.
- assimile Mitt. — D. crispifolium.
- atratum Geh. in *Fl.* 1879, p. 473.
 Ster. — As. : Os flum. Obi.
- atro-virens C. M. — Campylopus longipilus.
- attenuatum Mitt. — Dicranodontium.
- Auberti Bel. — Campylopus reduncus.
- aulacocarpum Mont. — Dicranella.
- aureo-nitens C. M. — Campylopus.
- aurificum C. M. — Campylopus.
 var. *flavescens* C. M. — Campylopus aurificus var. *flavescens*.
- australe Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LV et in *Miss. sc. Cap Horn*, V, Bot. p. 260, t. I, f. 2.
 Ster. — Am. merid. : Terr. Magellan.
- austro-alpinum C. M. — Campylopus.
- austro-georgicum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 22.
 Ster. Rupic. — Am. merid. : Austro-Georg.
- Bambergeri W. P. Sch. — D. spadiceum.
- bartramiioides Broth in *Oefv...* 1893.
 2. — Pac. : Ins. Lord Howe.
- Bergeri Bland. — D. Schraderi.
- Berterianum Brid. — Syrrhopodon Berteroanus.
- Beyrichii Duby. — Campylopus.
 var. *elatus* Hpe. — Campylopus Beyrichii var. *elatus*.
- bicolor Hsch. — Campylopus.
- Billardieri Schwaegr. *Suppl.* II, p. 70, t. 121 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 401 ; C. M. *Syn.* I, p. 368 ; Mitt. M. austr. am. p. 66.
 Onchophorus Billardieri Brid. op. et l. cc. (1)

(1) Cf. Duby in *Memoires...* Genève, 1869, pp. 6-8.

Lignic.— *Am. merid.*: Peruv., Chile., ins. Juan Fernandez, Maclov.
Pac.: Austral., Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

« *var. duriusculum* Hook. *Fl. Antarct. I*, p. 129.

Ut typ. — *Pac.*: Ins. Auckland, Campbell.

Billardieri { Besch. — D. Pancheri.
 { C. M. p.p. — D. commutatum.
 { Wils. — D. gymnostomum.

bipartitum Sm. — *Ceratodon purpureus*.

biplicatum Hpe. — *Leucoloma*.

blindioides Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 51.

1. — *As.*: Alp. Yunnan.

Blumii Nees ab Es. in *Nov. Act. Leop. XI*, I, p. 131, t. 15; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 453; *C. M. Syn. I*, p. 379; *Bryol. jav. I*, p. 71, t. 58.

2. Arbor. — *As.*: Ceylan, M. Java.

Blyttii *Bryol. eur. I* (mon. p. 26), t. 63; *C. M. Syn. I*, p. 364; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 81.

Bryum Schisti Günn. *Fl. Norveg. II*, p. 138.

D. Schisti Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1871, p. 11.

D. Sendtneri var. *Flot. mss.* (fid. *Limpr.*); *Milde Bryol. Sil.* p. 61.

1. Ad rup. granitic., micac. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Parry, Ursorum, Britann., Norveg., Dania, Riesengeb., Tatra, Alp. Salisb., Helvet., Tirol., Stir., Silv. nigr., Voges. Gall. centr. (Arvernica). *Am. sept.*: Groenland, Anticosti, M. Selkirk, Columb. brit., ins. Vancouver, Nov. Anglia, M. Alb., Idaho.

Exs.: Mac. *Canad. M. n.* 32.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 1004, 1170.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 69.

Bonjeani C. M. — *D. palustre*.

var. *alatum* Barnes. — *D. palustre* var. *alatum*.

var. *atratum* Pfeiff. — *D. palustre* var. *atratum*.

var. *calcareum* Braithw. — *D. palustre* var. *calcareum*.

var. *juniperifolium* Braithw. — *D. palustre* var. *juniperifolium*.

var. *polycladum* C. M. — *D. palustre* var. *polycladum*.

var. *Roellii* Barnes. — *D. palustre* var. *Roellii*.

var. *Schlotthaueri* Barnes. — *D. palustre* var. *Schlotthaueri*.

Boryanum { H. f. et W. — *D. kerguelense*.
 { Schwaegr. — *D. dichotomum*.

brachycaulon Kindb. in *Mac. Cat.* p. 34.

D. spurium Mac. *Canad. M. n.* 46 p.p.

1 ? Ad rup. humid. — *Am. sept.*: Nova Scotia.

brachymitrium Geh. et Hpe. — *Campylopus*.

brachypelma C. M. *Syn. II*, p. 595; *Bryol. jav. I*, p. 69, t. 56.

2. — *As.*: Java. *Pac.*: Nov. Zeland (?)

brachypelma C. M. (*Bot. Zeit.*). — *D. kaiparense*.

brachyphyllum { Hsch. — *Leucobryum candidum*.
 { Mitt. — *Campylopus*.

Braunii C. M. in *Bryol. jav. I*, p. 69, t. 57.

D. dicarpum Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 141.

2. Arbor. — *As.*: Java, Sumatra.

brevifolium Lindb. *M. Scand.* p. 24.

D. congestum ± *cirratum* W. P. Sch. *Coroll.* p. 16.

D. dipteroneuron C. M. in *Fl.* 1887, p. 221.

D. fuscescens & *cirratum* W. P. Sch. *Syn. 1 ed.* p. 88 (*fid. Lindb.*).

D. Hostianum Schwaegr. ?

D. Mühlenbeckii var. *alpinum* Jur. *Laubmfl. Oesterr. Ung.* p. 46 ?

D. Mühlenbeckii β *brevifolium* Lindb. *Bot. Not.* 1865.

2. — *Eur.* : Lappon., Scandin., Fennia. *As.* : Jenissei inf., Caucas. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, sin. Hudson, M. Rupestr., Columb. brit., Alaska.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 588.

brevifolium Schleich. in hb. DC. — Cf. *Dryptodon*.

brevipilum C. M. — *Campylopus*.

brevisetum Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 302; C. M. *Syn. 1*, p. 375; *Bryol. jav. 1*, p. 68.

Didymodon brachypus Hpe. in sched.

Megalostylium brevisetum Dz. et Mk. M. *frond. ined. Archip. ind.* p. 146, t. 44.

2. *Cortic.* — *As.* : Ceylan, M. Java. *Pac.* : Nov. Caledon. ?

« var. *argenteum* *Bryol. jav. II*, p. 225.

Ut typ. — *As.* : Java.

brevisetum { *Brid.* — *Leucoloma bifidum*.
 Wils. — *Dicranum subreflexifolium*.

Bridelianum C. M. — *Leucoloma serrulatum*.

Bruntoni Engl. *Bot.* — *Dicranoweisia*.

bryoides { *Roth.* — *Fissidens*.
 Sw. — *Fissidens exilis*.
 Sw. — *Fissidens osmundioides*.

α *H. et T.* — *Fissidens osmundioides*.

β *eor.* — *Fissidens incurvus*.

var. *minus* Turn. — *Fissidens exilis*.

bullatum Sommerf. — *Pottia latifolia* var. *pilifera*.

Cacti C. M. — *Campylopus*.

caducum Brid. — *Dicranella heteromalla* var. *interrupta*.

caesium Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 155.

D. subscoparium W. P. Sch. in *Savatier M. Jap. n° 91*.

Ster. — *As.* : Japon.

caespitans W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 20.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

caespitosum Mitt. — *Dicranodontium*.

caespitulans C. M. — *Leucoloma*.

callistomum Brid. — *Dicranella varia* var. *callistoma*.

calycinum { *Brid.* — *Holomitrium vaginatum*.
 Sw. — *Holomitrium*.

calymperidictyon Geh. et Hpe. — *Campylopus*.

campylophyllum Tayl. — *Dichodontium*.

canadense Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 87.

1. *Terr.* — *Am. sept.* : Columb. brit.

canaliculatum Geh. et Hpe. — *Campylopus*.

canariense Hpe. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 11.

Arbor. — *Afr.* : Ins. Canariens.

candidum Brid. — *Leucobryum*.

canescens C. M. — *Campylopus*.

capillaceum Brid. — *Campylopus*.

capitiflorum C. M. — *Campylopus*.

carneum Bland. — *Dicranella rufescens*.

caudatum C. M. — *Campylopus*.

Celsii Hedw. — *Ceratodon purpureus*.

cerviculatum { Hedw. — *Dicranella*.
Wils. p.p. — *Dicranella divaricata*.
Wils. p.p. — *Dicranella decipiens*.

β *pusillum* W. et M. — *Dicranella cerviculata* var. *pusilla*.

chionophilum C. M. — *Campylopus*.

chlorocladum C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (nom.).
— *Pac.* : Austral. (Nov. Valesia).

chlorophyllosum C. M. — *Campylopus*.

chloropus Brid. — *Ceratodon*.

Chrismari C. M. — *Campylopus*.

chryseo-basilare C. M. — *Leucoloma*.

chrysodictyon Hpe. — *Campylopus*.

circinatum { Brid. — *Syrrophodon*.
Wils. — *Dicranodontium*.

cirratum Timm. — *Dicranoweisia*.

cirrifolium W. P. Sch. mss. ; C. M. in *Fl.* 1885, p. 409.

Terr. — *Am. merid.* : Fret. Magellan.

clathratum H. f. et W. — *Dichodontium*.

clavatum { R. Br. — *Campylopus*.
Wils. — *Campylopus Dozyanus*.

Columbiae Kind. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 86.

2. Terr. in silv. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.

Commersonianum C. M. — *Leucoloma bifidum*.

commutatum Hpe. mss. ; *Jaeg. Ad. II*, p. 759.

D. Billardieri C. M. p.p. (quoad pl. *Capens.*).

— *Afr.* : C. B. Sp.

comosum Schwaegr. — *Campylopus*.

compactum Funk. — *Cynodontium virens* var. *Wahlenbergii*.

comptum W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 97.

Dicranodontium circinatum W. P. Sch. (fid. *Limpr.*).

Ster. — *Eur.* : Pinzgovia.

concolor { C. M. (Bot. Zeit.) — *Campylopus penicillatus*.
Hook. — *Campylopus*.
Hsch. — *Campylopus trachyblepharum*.
Nees et Bl. — *Campylopus reduncus*.

condensatum Hedw. p.p. — { D. Mühlenbeckii.
D. sabuletorum.
D. scoparium.

confine C. M. et Hpe. in *Linn.* 1856, p. 206.

— *Pac.* : Austral. felix.

congestiforme C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 29.

2. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.

congestum Brid. p.p. — { D. fuscescens.
D. fuscescens var. longirostre (pro max. part.).

var. *cirratum* W. P. Sch. — *D. brevifolium*.

var. *flexicaule* Bryol. eur. — *D. fuscescens* var. *flexicaule*.

var. *longirostre* Bryol. eur. — *D. fuscescens* var. *longirostre*.

var. *robustum* Bryol. eur. — *D. fuscescens* var. *robustum*.

var. *rupestre* Röhl. — *D. fuscescens*.

consobrinum Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 39, t. 5 B.
Syn. — Am. sept. : Minnesota.

contortum Wahlenb. — *Grimmia*.

controversum Hpe. — *Campylopus*.

convolutum Hpe. in C. M. Syn. I, p. 358 et II, p. 589.
— As. : Siber. transbaical.

crispicoma C. M. — *Campylopus*.

crispifolium C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 349.

D. assimile Mitt. M. Ind. or. p. 15.

D. scoparium var. Wils. in hb. Ind. or. n. 50 et 68.

— As. : Himalaya, Madras, Alp. Yunnan.

α var. *leptothecium* Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 52.
— As. : Alp. Yunnan.

crispo-falcatum W. P. Sch. in Savatier M. Japon. n. 81 a ; Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 331.

3. — As. : Japon.

crispulum C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 27.

2. Lignic. — Am. sept. : Columb. brit., ins. Vancouver.

crispum Hedw. — *Dicranella*.

cristatum Wils. — *D. lorifolium*.

Crügerianum C. M. — *Leucoloma*.

cryptocarpum C. M. — *Leucoloma*.

cryptodon Mitt. — *Dicranoweisia*.

cuneifolium Hpe. — *Leucoloma*.

curvatum { Hedw. — *Dicranella*.
Hsch. — *Dicranella brachyblepharis*.
Schultz. — *Dicranella rufescens*.

curvifolium Schleich. — *D. Starkii*.

cuspidatum { Griff. — *D. fragile*.
Hsch. — *Campylopus*.

cygnæum Hedw. — *Campylopus*.

cylindræum Brid. — *Holomitrium vaginatum*.

cylindricum W. et M. — *Trichodon*.

cylindrothecium Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 157.
— As. : Japon.

decipiens Mitt. M. Ind. or. p. 16.

D. cerviculatum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 296.

D. lubricum ej. in op. cit. p. 297.

Ster ? — As. : Sikkim, Khasia.

debile H. f. et W. — *Microdus*.

decumbens Thw. et Mitt. — *Cynodontium*.

deflexicaulon C. M. in Linn. 1874, p. 589.

Ster. Paludic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

Delavayi Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 51.

2. — As. : Alp. Yunnan.

densum { C. M. — *Dicranella bicolor*.
Funk. — *Campylopus fragilis*.
Hook. — *Microdus*.

β minus Hpe. — *Dicranella bicolor*.

denudatum Brid. — *Dicranodontium longirostre*.

Deplanchei Duby *Choix de crypt. ex.* 1869, p. 2, t. 2, f. 1.
2. — *Pac.* : Nov. Caledon.

destructile C. M. — *Campylopus*.

detonsum Geh. et Hpe. — *Campylopus*.

diaphanoneuron Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 515.
— *Pac.* : Austral. felix.

dicarpum Hsch. in *Sieb. M. Nov. Holl. n.* 10; *C. M. Syn.* I, p. 363 et II, p. 590; *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal.* II, p. 66.

D. leucolomoides C. M. (*fid. Mitt.*).

D. subaggregatum R. Br. in *Schwaegr. Suppl.* III, II, I, t. 251.

1. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman., ins.
Banks.

« *var. spinosum* *Hook. f. et Wils. Fl. Tasm.* p. 169.

— *Pac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman.

dicarpum Dz. et Mk. — *D. Braunii*.

dichelymoides C. M. — *Leucoloma*.

dichotomum *Brid. Mant. M.* p. 55; *C. M. Syn.* I, p. 362 et II, p. 590 (1).

Cecalyphum dichotomum P. B. *Prodr.* p. 51.

D. Boryanum *Schwaegr. Suppl.* II, I, p. 71, t. 121.

Oncophorus dichotomus *Brid. Bryol. univ.* I, p. 401.

2. — *Afr.* : Kilima N'Djaro, ins. Borbon., Madagas-
car.

dichotomum P. B. (p. 53). — Cf. *Dryptodon*.

dicticyon Mitt. — *Dicranodontium*.

Didrichseni C. M. — *Campylopus*.

Didymodon Griff. — *Dicranodontium*.

Dietrichiae C. M. — *Campylopus*.

Dillenii Tayl. — *D. scoparium*.

diminutum *Brid.* — *Sematophyllum subulatum* ?

dipteroneuron C. M. — *D. brevifolium*.

discriminatum Hpe. — *Campylopus*.

divaricatum Mitt. — *Campylopus*.

dives C. M. in *Bryol. jav.* I, p. 72, t. 59.

2. — *As.* : Java.

divisum Geh. et Hpe. — *Campylopus*.

Donnellii Aust. — *Campylopus*.

Dozyanum { C. M. — *Campylopus*.

{ Wils. — *Campylopus nigrescens*.

drepanocladium C. M. — *Leucoloma*.

Drummondii C. M. *Syn.* I, p. 356 p.p.; *Sull. M. of U. St.* p. 23 et *Id. M. Suppl.* p. 48, t. 33; *Lesq. et Jam. Man.* p. 76.

D. Starkii var. *major* *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 84.

D. undulatum var. *Drumm.* l. c. n. 86.

2. In pinet. — *Am. sept.* : Ontario, M. Rupestr. or., Nov. Anglia, New Jersey, New York.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 47.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 88.

« *var. trachyneuron* *Kindb. in Mac. Cat.* p. 34.

Ut typ. — *Am. sept.* : Ontario.

(1) Cf. Duby in *Mémoires...* Genève 1869, pp. 6-8.

Drummondii C. M. pp. — *D. elatum*.
durum Lag. — *Grimmia commutata*.
ecaudatum C. M. — *Leucoloma*.
Eckloni Ltz. — *Leucoloma*.
edentulum Mitt. — *Braunfelsia*.

elatum Lindb. *Adnot. bryol. et M. Scand.* p. 24; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 96.

D. Drummondii C. M. *Syn.* I, p. 356 p.p.

D. robustum Blytt in *Bryol. eur.* I (mon. p. 43), t. 84.

2. In silvat. humid. — *Eur.* : Lappon., Norveg.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1063.

elegans Duby. — *Dichodontium*.

ellipticum Turn. — *Rhacomitrium*.

elongatum Schwaegr. *Suppl.* I, 1, p. 71, t. 43; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 429; *Bryol. eur.* I (mon. p. 35), t. 76; *C. M. Syn.* I, p. 365; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 88.

D. Macounii Aust. in *Coult. Bot. Gaz.* II, p. 96.

2. Ad rup. humid. — *Eur.* Spitzberg, ins. Ursorum, omn. Alp. passim.
As. : Jenissei, os flum. Obi. *Am. sept.* : Groenland. Labrador, sin. Hudson, fret. Smith, ins. Miquelon, Terra Nov., lac. Super., *M. Rupestr.*, fret. Kotzebue, ins. Vancouver, M. Alb.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 91.

Mac. Canad. *M.* n. 592.

Rab. Bryoth. eur. n. 263, 733.

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 79.

var. *minor* Drumm. — *D. strictum*.

* var. *orthocarpum* *Bryol. eur.*, *C. M.* et *W. P. Sch.* ll. cc.

D. groenlandicum *Brid. Bryol. univ.* I, p. 460 (incl. v. β secundum ?)

D. labradoricum *C. M.* (fid. *Limpr. et plurim. auct.*)

D. Sphagni *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 337; *Brid. op. c.* p. 461. (excl. syn. *Dill.*).

Gymnostomum aestivum *Brid. Sp. M.* I, p. 38 (excl. syn. omn.).

G. curvirostrum *Roehl Ann. Wett. Ges.* I, p. 28.

Hypnum alpinum *Neck. Meth. M.* p. 190.

Sphagnum alpinum *L. Sp. pl.* p. 1570.

In turfac. — *Eur.* : Reg. alp. zon. septentr. *Am. sept.* : Groenland.

enerve Thed. — *D. albicans*.

erectum { *C. M.* — *Campylopus*.
 { Mitt. — *Campylopus Mittenii*.

ericetorum Mitt. p.p. — { *Campylopus Dozyanus*.
 { *Campylopus longipilus*.

ericoides Griff. — *Campylopus*.

erythrodontium *Hpe. mss.* ; *C. M.* in *Bot. Zeit*, 1862, p. 11.
 — *Afr.* Teneriffa.

erythrognaphalon *C. M.* — *Campylopus*.

erythropodium *Hpe.* — *Campylopus*.

euchlorum Mont. — *Microdus*.

eurydictyon *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 333.

Ster. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 13.

exalare *Hpe.* — *Campylopus*.

exaltatum *C. M.* — *Campylopus*.

exasperatum } C. M. — Campylopus.
 } Griff. — Campylopus nigrescens.
fagimontanum Brid. — D. fuscescens ?

falcatum Hedw. *Sp. M.* p. 150, t. 32; *Bryol. eur. I* (mon. p. 22), t. 65;
 C. M. *Syn. I*, p. 363; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 81.

Bryum longifolium Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 7.

Cecalyphum scrofulosum P. B. *Prodr.* p. 51.

D. Sendtneri Flot. mss. (fid. C. M.).

Oncophorus falcatus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 393.

1. Ad rup. et terr. — *Eur.*: Reg. alp. et supraalp. zon. intermed. et sept.: Scotia, Pyr. Am. sept.: M. Rupestr., Oregon, reg. orient.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 942, 934.

« *var. Hendersoni* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 39.

Ut typ. — Am. sept.: Oregon.

var. pumilum Limpr. — *Dicranella*.

« *var. setaceum* Husn. *M. Gall. n.* 506 et *Muscol. gall.* p. 28.

Ut typ. — *Eur.*: Pyren.

falcatum Schrad. — *D. Schraderi*.

falcifolium Hook. — *Drepanophyllum fulvum*.

fasciatum Hedw. *Sp. M.* p. 127, t. 23; Brid. *Bryol. univ. I*, p. 432
 (excl. syn. P. B.); C. M. *Syn. I*, p. 371; Hook. f. et Wils. *Fl. of the*
N. Zeal. II, p. 66 et *Håndb.* p. 412.

— *Pac.*: Nov. Zeland.

fasciatum Spreng. — *Leucoloma Sprengelianum*.

fastigiatum } Schultz. — *D. Schraderi*.
 } Tayl. — *Dicranoweisia*.

Fendleri C. M. — Campylopus.

ferrugineum H. f. et W. — *Dichodontium*.

filicaule Hpe. — Campylopus.

filifolium } C. M. p.p. — Campylopus macrophyllus.
 } Hsch. — Campylopus.

filiforme } Hsch. — Campylopus leucogaster.
 } Schwaegr. — *Angstroemia vulcanica*.

flaccidissimum C. M. in *Linn.* 1874, p. 584.

Ster. Paludic. — Am. merid.: And. Nov. Granat.

flagellaceum C. M. — Campylopus.

flagellare Hedw. *M. frond. III*, p. 1, t. 1; Brid. *Bryol. univ. I*, p. 422;
Bryol. eur. I (mon. p. 30), t. 68; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 84.

Bryum flagellare Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 6.

D. scoparium var. flagellare H. et T. *Muscol. brit.* p. 58.

D. strictum Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 81.

2. Lignic. — *Eur.*: Reg. campestr. et mont. zon. intermed. et sept.:
 deest in Britann. As.: Jenissei sup., Obi, Amour, Japon., Caucas.
 Afr.: Ins. Canar. Am. sept.: New Brunswick, Ontario, Manitoba,
 lac. Super., Columb. brit., Indiana, reg. sept. et orient.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 35.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 82 et b, 864, 985, 1169.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 72.

« *var. compactum* Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 42.

Ut typ. — *Eur.*: German.

« *var. subfluitans* Aust. in *Bull. Torr. bot. Club, VI*, p. 344.

In lacunos. rup. — Am. sept.: New York (ster!).

- flagellare* { Engl. Bot. — *D. scottianum*.
 Funk. — *D. longifolium*.
flagelliferum C. M. — *Campylopus*.
flavescens H. et T. — *Dichodontium pellucidum* var. *serratum*
flavidum Schwaegr. — *Dicranella cerviculata*.
flavissimum C. M. — *Campylopus*.
flexicaule Brid. — *D. fuscescens* var. *flexicaule*.
flexifolium { Hook. — *Trichostomum laxifolium*.
 Hsch. — *Campylopus*.
flexuosum { Brid. — *Dicranodontium longirostre*.
 C. M. p.p. — *Campylopus torquatus*.
 Hedw. — *Campylopus*.
 Hsch. — *Campylopus flexifolius* ?
 β *fragile* Turn. — *Campylopus fragilis*.
 var. *piliferum* Turn. - - } *Campylopus longipilus*.
 } *Campylopus polytrichoides*.
 var. Hsch. — *Campylopus nanus*.
 var. Schultz. — *Campylopus torfaceus*.
 var. Wils. — *Campylopus Gardneri*.

fragile Hook. *M. exot.* II, p. 10, t. 134; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 419;
C. M. Syn. I, p. 377; *Mitt. M. Ind. or.* p. 15.

D. cuspidatum Griff. *Not.* p. 416 et *Ic. pl. asiat.* II, t. 91, f. 4.

In pinet. — As. : Nepal., Khasia.

fragile Hedw. — *D. spurium*.

fragilifolium Lindb. in *Bryol. eur. Suppl. fasc. III-IV, Dier. t. II*;
W. P. Sch. Syn. II, p. 91.

2. Lignic. et ad terr. turf. — *Eur.* : Lappon., Norveg. As. : Jenissei
 med. et sup., os fl. Obi. *Am. sept.* : Lac. Super., reg. sept. occid.,
 ins. Vancouver.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 41.

Rab. Bryoth. eur. n. 619.

friabile Hpe. — *Campylopus*.

frigidum C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 219; *Mitt. M. austr. am* p. 67.

D. validum Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 522 (*fid. Mitt.*)

Lignic. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens. *Am. merid.* : And. Vene-
 zuel., Nov. Granat. et Quitens.

fulvastrum Besch. *Not. M. der. I. St-Paul et d'Amsterdam*, p. 4.

Ster. — *Afr.* : Ins. Amsterdam.

fulvellum (Dicks.) Sm. *Fl. brit.* p. 1209; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 813;
C. M. Syn. I, p. 371 et II, p. 593; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 78.

Arctoa fulvella *Bryol. eur.* I, mon. p. 45, t. 86.

Blindia fulvella Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norveg.* p. 95.

Bryum fulvellum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 10, t. XI, f. 1.

D. Moerchii Hsch. in *Fl.* 1825, I, p. 78 (*fid. Limpr.*).

D. rupestre W. et M. *Bot. Taschb.* pp. 185 et 469 (*fid. Brid.*).

D. Seligeri *Brid. op. cit.* p. 429 (? C. M.).

Weisia acuta H. et T. *Muscol. brit.* p. 48 (*fid. Brid.*).

W. flexuosa *Bryol. germ.* II, p. 121, t. 35.

1. Ad terr. humid. et in fiss. rup. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Parry, Island.,
 Lappon., Norveg., Fennia, Scot., Anglia, Tatra, Sudet., Alp. Salisb.,
 Stir., Carinth., Tirol., Helvet., Rhaet., Ticin., Pyren. *Am. sept.* :
 Groenland, Nov. Anglia, New York, Oregon.

Exs. . Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 89.

fulvellum Grev. p.p. — *D. hyperboreum*.

fulvum Hook. *M. ex. t.* 149; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 85.

Campylopus fulvus Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norv. p.* 81.

D. interruptum Bryol. eur. I (mon. p. 30), t. 69; *C. M. Syn. I, p.* 380.

Syrhopodon? Razi Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 74.

2. Ad saxa aren. vel granit. — Eur.: Voges., Silv. Nigr., Helvet., Tirol mer., Bavar., Carinth., Stir., Austr.; Pyren. (fid. C. M.). Am. sept.: Nov. Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, reg. sept. et orient.

Exs.: Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 49.

Mac. *Canad. M. n.* 37.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 508, 983.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 73.

Funkii C. M. — *Campylopus fragilis*.

fuscens Turn. *Muscol. Hib. p.* 60, t. 5; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 89.

D. congestum Brid. *Mant. M. p.* 57 et *Bryol. univ. I, p.* 418; *Bryol. eur. I (mon. p.* 36), t. 77; *C. M. Syn. I, p.* 360 et *II, p.* 590; *Mac. Can. M. n.* 408.

D. congestum var. *rupestre* Rab. *Deutsch. Kryptfl. II, III, p.* 146.

D. fagimontanum Brid. *Bryol. univ. I, p.* 419?

D. Kinlayanum W. P. Sch. (fid. *Limpr.*).

D. rupestre Brid. *op. cit. p.* 419.

D. scoparium β *fuscens* H. et T. *Muscol. brit. p.* 58.

D. scoparium var. *rupestre* Roehl. *Deutsch. Fl. III, p.* 66.

D. Sendtneri *Limpr. Laubm. Deutschl. I, p.* 360.

2. Lignic. et rupic. — Eur.: E reg. montan. usq. in alp.; Spitzberg, ins. Parry, Ursorum. As.: Jenissei, Obi, Altaï, Amour, Saghalien, Japon., Caucas. Am. sept.: Groenland, Labrador, Terr. Nov., ins. Miquelon, Anticosti, New Brunswick, Nov. Scotia, Gaspésie, Ontario, Athabasca, Manitoba, lac. Super., M. Rupestr., Columb. brit., Sitka, ins. Vancouver, Washington, Idaho, Oregon, etc.; Calif. (rar.).

Exs.: Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 82.

Mac. *Canad. M. n.* 39.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 865.

« *var. angustifolium* W. P. Sch. *Syn. II ed. p.* 90.

Ut typ. in reg. subalp. Eur. et Am. sept.

var. apenninum de Not. — *D. fuscens* var. *robustum*.

« *var. brevirostre* Kindb. in *Mac. Cat. p.* 30.

Ut typ. — Am. sept.: Ontario, Columb. brit.

var. cirratum W. P. Sch. — *D. brevifolium*.

var. compactum Stirt. — *D. fuscens* var. *flexicaule*.

« *var. falcifolium* Braithw. *Brit. Mossfl. I, p.* 153.

Ad radic. Pinor. vetust. — Eur.: Anglia, Germ. sept.

« *var. flexicaule* W. P. Sch. *Syn. I ed. p.* 88 et *II ed. p.* 90.

D. fuscens var. *compactum* Stirt. in *Journ. de Bot.* 1871, p. 289.

D. congestum var. *flexicaule* *Bryol. eur. l.c.*

D. flexicaule Brid. *Bryol. univ. I, p.* 421.

Lignic. et ad terr. humos. — Eur.: Reg. Pini Pumilionis et Rhododendri. As.: Jenissei sup., Caucas. Am. sept.: C. typ.

« *var. longirostre* W. P. Sch. *ll. cc.*

D. congestum Brid. *op. cit. pr. max. p.*

D. congestum var. *longirostre* *Bryol. eur. l.c.*

D. longirostre Schwaegr. *Suppl. I, I, p. 421*,

Ut typ. — *Eur.* : Reg. subalp. ; in Jurass. et Alp. vulgatiss. *Am. sept.* :
Cum typ.

« *var. remotum* Lindb. *M. Scand. p. 23*.

Ut typ. — *Eur.* : Suecia, Fennia.

« *var. robustum* W. P. Sch. *l. c. p. 88*.

D. apenninum de Not. *Epil. p. 622*.

Rupic. — *Eur.* : Reg. alp. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, reg
mont. sept.

Eas. : Rab. Bryoth. eur. n. 1172.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n. 80*.

fusco-croceum Hpe. — *Campylopus*.

Gardneri C. M. — *Campylopus*.

Gayanum Mont. — *Angstroemia*.

gibbosum Brid. — *Cynodontium polycarpum var. strumiferum*.

giganteum Brid. — *Breutelia*.

glaciale Berggr. — *D. arcticum*.

glaucum Hedw. — *Leucobryum*.

β *albidum* } Brid. — *Leucobryum sediforme*.
W. et M. — *Leucobryum minus*.

γ *sanctum* Brid. — *Leucobryum*.

Glaziovii Hpe. — *Campylopus*.

Goeppertianum Sendtn. — *D. scoparium var. orthophyllum*.

Goudotii Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III, p. 365*.

2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Goughii Mitt. — *Campylopus*.

gracile Mitt. — *Campylopus*.

gracilescens W. et M. — *Cynodontium*.

β *flavescens* Brid. — *Dichodontium pellucidum var. serratum*.

δ *pusillum* Pfeiff. — *Cynodontium gracilescens var. inflexum*.

Graeffeanum C. M. *M. Polyn. p. 62*.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

Grateloupii C. M. — *Campylopus elongatus*.

Grevilleanum Bryol. eur. — *Dicranella*.

grimmioides C. M. — *Campylopus*.

griseum C. M. — *Campylopus*.

groënlandicum { Brid. — *D. elongatum var. orthocarpum*.
C. M. — *D. labradoricum*.

guadalupense Brid. — *Campylopus*.

Guilleminianum Mont. — *Dicranella*.

gymnostomum Mitt. *M. Ind. or. p. 14 (1)*.

D. Billardieri Wils. in *Kew Journ. bot. IX, p. 295*.

D. rugulosum ej. in *op. cit. p. 294*.

2. — *As.* : Himalaya.

« *var. hokinense* Besch. in *Ann. sc. nat. 1892, I, p. 51*.

— *As.* : Alp. Yunnan.

hamulosum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 156*.

2. — *As.* : Japon.

(1) An sensu Hampei propr. genus « *Dicranopsis* ? »

Harioti C. M. in *Fl.* 1885, p. 408.

Ster. — *Am. merid.* : Fuegia.

havaianum C. M. — *Campylopus*.

helenicum C. M. — *Campylopus*.

Hellerianum Hpe. — *Campylopus*.

hemitrichium C. M. — *Campylopus*.

heteromallum Hedw. — *Dicranella*.

var. 2 Sull. — *Dicranella* var. *orthocarpa*.

var. *curvatum* H. et T. — *Dicranella* *curvata*.

var. *interruptum* Bryol. eur. — *Dicranella* *heteromalla* var. *interrupta*.

β minus Wahlenb. — *Dicranella* *subulata*.

var. *strictum* Bryol. eur. — *Dicranella* *heteromalla* var. *stricta*.

Hilarianum Mont. — *Microdus*.

Hildebrandti C. M. — *Campylopus*.

himalayanum Mitt. op. cit. p. 14.

D. *scariosum* Wils. in op. cit. p. 294.

2 ? — *As.* : Himalaya.

Hoffmanni C. M. in *Linn.* 1874, p. 592.

Campylopus *Hoffmanni* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 147.

Ster. Paludic. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

Hoehneli C. M. — *Campylopus*.

Holomitrium C. M. — *Campylopus*.

Homanni Boeck. — *Cynodontium* *virens* var. *compactum*.

Hookeri W. P. Sch. — *D. robustum*.

Hostianum Schwaegr. — { *D. brevifolium* ? (fid. Lindb.)
D. montanum (fid. Limpr.).
D. Mühlenbeckii ? (fid. W. P. Sch.).
D. scottianum ? (fid. C. M.).

Howellii Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1889, p. 93, t. 12 B.

— *Am. sept.* : Washington, Oregon.

humifugum C. M. — *Campylopus*.

humile C. M. — *Campylopus*.

hyperboreum (Günn.) Sm. *Fl. brit.* III, p. 1277 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 458 ; C. M. *Syn.* I, p. 372 ; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 78 et II ed. p. 79.

Arctoa hyperborea Bryol. eur. I (mon. p. 5), t. 87.

Bryum hyperboreum Günn. *Fl. Norveg.* n. 1060.

D. fulvellum Grev. *Scot. Fl.* IV, t. 188 p.p.

l. Ad rup. sicc. — *Eur.* : Lappon., Alp. Norveg. *Am. sept.* ; Groenland, Oregon.

Exs : Rab. Bryoth. eur. n. 986.

* var. *papillosum* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1889, p. 91.

— *Am. sept.* : Groenland.

hyperboreum Engl. Bot. — *Gymnostomum* *curvirostre*.

imponens Mont. in *Ann. sc. nat.* 1841, p. 241 et *Syll.* p. 44 ; C. M. *Syn.* I, p. 366 et II, p. 592 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 65.

D. involutifolium Sull. in *Kew Journ. bot.* II, p. 316.

Ster. — *Am. merid.* : Patag. austr., terr. Magell.

incanum Hook. — *Leucoloma*.

incrassatum Hpe. — *Campylopus*.

incurvum W. et M. — Fissidens.

inermis Mitt. — Dicranoweisia.

innovans C. M. — Microdus Hilarianus.

insigne C. M. — Leucoloma.

intermedium { Crome. — D. Schraderi.
Hedw. — Ceratodon purpureus.

interruptum { Brid. — Dicranella heteromalla.
Bryol. eur. — D. fulvum.
Hedw. — Dicranella heteromalla var. interrupta.

introflexum Sull. — Campylopus.

involutifolium Sull. — D. imponens.

involutum Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. 9, t. 6 A.
2. Ster. — As. : Borneo.

involutum C. M. — Campylopus.

Jamesoni { Hook. — Campylopus concolor.
Tayl. — Dichodontium.

japonicum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 155.
— As. : Japon.

« var. aomoriense Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 332.
Ster. — As. : Japon.
Exs. : Faurie n. 565.

Johannis Meyeri C. M. — Campylopus.

Johnstoni Mitt. op. cit. 1886, p. 300.
Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Joinvillianum Hpe. — Campylopus.

jubulatum W. P. Sch. mss.; Jaeg. Ad. I, p. 92.
— Am. sept. : Labrador.

julaceum { Hpe. — Campylopus.
H. f. et W. — Angstroemia longipes.

juniperifolium Sendtn. — D. palustre var. juniperifolium.

juniperoideum { Brid. — Leucobryum.
Hsch. — Leucobryum clavatum.

kaiparensis Par.

D. brachypelma C. M. in Bot. Zeit. 1851, p. 550 (1).

D. Menziesii Tayl. (fid. Mitt.).

2. Lignic. et rupic. — Pac. : Nov. Zeland.

Kasbeckianum Kolen. — D. albicans.

kerguelensis C. M. Syn. I, p. 370.

D. Boryanum H. f. et W. in sched. M. Antarct.

— Afr. : Ins. Kerguelen.

khasianum Griff. — Campylodontium.

A. majus Griff. — Dicranella Griffithii.

Kindbergii Par.

D. angustifolium Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 86.

Ster. Ad rup. humid. — Am. sept. : Columb. brit., fret. Behring, ins.
Vancouver.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 409.

Kinlayanum W. P. Sch. in *Un. itin.* 1865.

D. fuscescens W. P. Sch. (*fid. Limpr.*).

— *Eur.* : M. Scotiae.

Krauseanum Hpe. et Ltz. — *Campylopus*.

Kroneanum C. M. in *Rev. bryol.* 1881, p. 26 (nom.).

— *Pac.* : Tasman.

labradoricum C. M. *Syn. I*, p. 366.

D. groenlandicum C. M. in *sched.*

D. tenuinerve Zett. in *K. Sv. Vet. Akad. Handl.* 1876, n. 13.

2. — *Eur.* : Finmarck. *As.* : Penins. Tschutschica, Jenissei inf. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, fret. Hudson, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquelon.

laete-virens C. M. — *Campylopus*.

laetum Mitt. — *Campylopus*.

laeve C. M. — *Campylopus*.

laevigatum C. M. — *Campylopus*.

lamellatum C. M. — *Campylopus*.

lamellicosta C. M. — *Campylopus*.

lamellinerve C. M. — *Campylopus penicillatus*.

lamprodictyon Hpe. — *Campylopus*.

lanceolatum Schleich. — *Desmatodon latifolius*.

lanigerum C. M. — *Campylopus*

latifolium { Hedw. — *Desmatodon*.
Hook. — *Desmatodon latifolius var. glacialis*.
Turn. — *Pottia lanceolata*.

var. piliferum H. et T. — *Desmatodon latifolius var. brevicaulis*.

latinerve Mitt. — { *Campylopus*.
 Campylopus Nietneri ?

laxifolium Brid. — *Dicranella varia var. tenella*.

laxum Brid. — *Barbula unguiculata*.

Leichardti Hpe. — *Leucoloma*.

leioneuron Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVI, p. 92.

2. Ster. Silv. humid. — *Am. sept.* : Anticosti.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 44 p.p.

lepidophyllum C. M. — *Campylopus*.

leptocaulis C. M. *mss.* ; *Jaeg Ad. II*, p. 641.

— *As.* : Sikkim.

leptocephalum C. M. — *Campylopus*.

leucobasis C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 30.

2. Ad rad. arb. — *Am. sept.* : M. Selkirk, Columb. brit.

leucochloron C. M. — *Campylopus*.

leucogaster C. M. — *Campylopus*.

leucophyllum Hpe. *mss.* ; *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind.* p. 10, t. 6 B.

2. Ster. — *As.* : Java, Sumatra.

leucolomoides C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 549.

D. dicarpum Hsch. (*fid. Mitt.*).

2. Arbor. et rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

leucopterum C. M. in *Fl.* 1885, p. 407.

2. Terr. — *Am. merid.* : Fuegia.

« *var. onchophoriopsis* C. M. *op. cit.* p. 468.

Terr. — *Am. merid.* : *Fuegia austr. or.*

Liebmanni C. M. — *Campylopus*.

lineare Brid. — *Dichodontium pellucidum var. serratum*.

longicollum Brid. — *Trematodon*.

longifolium Hedw. *M. frond.* III, p. 24, t. 9; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 430; *Bryol. eur.* I (mon. p. 32), t. 72; C. M. *Syn.* I, p. 374; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 86.

Bryum longifolium Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 7.

Campylopus longifolius Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norveg.* p. 87.

D. flagellare Funk *Fasc. crypt II*, n. 35.

2. *Ad Fagos et saxa.* — *Eur.* : Reg. subalp.; in montan. et Britann. steril. *As.* : *Jenissei sup.*, *Saghalien*, *Caucas.* *Am. sept.* : *Greenland*, *lac. Super.*, *M. Rupestr.* et *Selkirk*, *ins. Miquelon*, *reg. orient.* *Exs.* : *Rab. Bryoth. eur.* n. 81, 939.

« *var. compactum* Ren. et Card. *Fl. Miquelon.*

— *Am. sept.* : *Ins. Miquelon.*

« *var. hamatum* Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 43.

— *Eur.* : *Alp.*, *Sudet.*, *Boehmerwald*, etc.

« *var. plumosum* Lesq. et Jam. *Man.* p. 71.

Dicranodontium nitidum Jam. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 34.

— *Am. sept.* : *New Hampshire.*

« *var. strictius* Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 344.

In *lacun. rup.* — *Am. sept.* : *New-York.*

« *var. subalpinum* Milde *Bryol. Siles.* p. 68.

Dicranodontium longirostre ej. in *Bot. Zeit.* 1870, p. 714.

Ad rup. sicc. — *Eur.* : Reg. subalp., *Westphal.*, *Thuring.*, *Harz.* *Sudet.*, etc.

longipilum C. M. — *Campylopus polytrichoides*.

longirostratum Hedw. — *D. spurium*.

longirostre Schwaegr. — *D. fuscescens var. longirostre*.

longisetum Hook. *M. ex.* t. 129; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 428; C. M. *Syn.* I, p. 372; *Mitt. M. austr. am.* p. 68.

D. macrodon Hpe. in *Ann. sc. nat. V sér.*, III, p. 366.

1. *Arbor.* — *Am. merid.* : *And. Venezuel.*, *Columb.*, *Nov. Granat.* et *Quitens.*; *Brasil.*

longisetum Brid. — *Ceratodon purpureus*.

lophoneuron C. M. *Syn.* II, p. 589.

— *Am. sept.* : *Mexic.*

lorifolium Mitt. *M. Ind. or.* p. 15.

D. cristatum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 295.

D. scoparium Griff. *Not.* p. 417 et *Ic. pl. asiat.* II, t. 82, f. 3; Wils. l. c.

2. — *As.* : *Kashmir*, *Nepal.*, *Khasia.*

lubricum Wils. — *D. decipiens*.

lutescens C. M. — *Campylopus*.

? *lycopodioides* Sw. — *Syrhodon*.

Macounii Aust. — *D. elongatum*.

macrocalyx Bryol. jav. — *Braunfelsia enervis*.

macrodon } Hpe. — *D. longisetum*.

Hook. — *Leucoloma*.

macrophyllum Kze. — *Campylopus*.

macropus Kze. in *Poepp. pl. Chil. III*, n. 271; *C. M. Syn. I*, p. 374.

2. Lignic. et rupic. — *Am. merid.*: *Chil. austr.*

majus Turn. *Muscol. Hib.* p. 59; *Bryol. eur. I* (mon. p. 43), t. 85; *C. M. Syn. I*, p. 360 et *II*, p. 590; *W. P. Sch. Syn. II* ed. p. 92.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie *Dill. Hist. M.* p. 357, t. 46, f. 16 D.

D. polysetum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 413 p.p.

D. scoparium T. Tayl. in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1843, p. 113.

D. scoparium var. α H. et T. *Muscol. brit.* p. 58, t. 18, f. dextr.?

D. scoparium β majus W. et M. *Bot. Taschb.* p. 174.

2. In silvatic. — *Eur.*: Zon. intermed. et septentr. *As.*: *Jenissei*, *Saghaliën*, *Amour*. *Caucas. Am. sept.*: *Ins. Miquelon*, *Anticosti*, *Nov. Scotia*, *Gaspes.*, *Ontario*, *ins. Vancouver*, *Sitka*, *Washington*.

Exs.: *Mac. Canad. M.* n. 44 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 654.

var. *Savatieri* Besch. — *D. Savatieri*.

Martianum Hsch. — *Leucobryum*.

megalophyllum { *Brid. p.p.* (fid. Besch.). — *Leucobryum Boryanum*.
Mont. — *Leucobryum neilgherriense*.
Raddi (fid. Mitt.). — *Leucobryum giganteum*.
Raddi (fid. C. M.). — *Leucobryum longifolium*.

Menziezi Tayl. in *Phytol. I*, p. 1093; *Hook. f. et Wils. Fl. Antarct. I*, p. 128, t. 58 et *Handb.* p. 412; *C. M. Syn. II*, p. 593 (1).

D. kaiparense (fid. Mitt.).

Arbor. — *Am. merid.*: *Chile. Pac.*: *Austral. or.*, *Nov. Zeland.*, *ins Auckland*, *Norfolk*; *Polynes.*

* var. *rigidum* *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 170.
— *Nov. Zeland.*

mexicanum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 20.

2? — *Am. sept.*: *Mexic.*

microcarpum { *Hook.* — *Cynodontium virens* var. *Wahlenbergii*.
Schrad. — *Rhacomitrium*.

microdus Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 186.

2. — *Am. merid.*: *Valdiv.*

microdus Kze. — *Microdus Liebmanni*.

miquelonense Ren. et Card. *Fl. Miquel.* p. 42 et in *Bot. Gaz.* 1889, p. 89, t. XLID; *M. am. bor.* n. 7.

Ster. Rupic. et terr. — *Am. sept.*: *Ins. Miquelon*.

Mittenii C. M. — *Campylopus*.

mixtum de Not. — *Cynodontium gracilescens*.

Molkenboëri *Bryol. jav. II*, p. 225.

Holomitrium dicranoides Dz. et Mh. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 9, t. 4 et *Bryol. jav. I*, p. 87.

2? Ad rad. arbor. — *As.*: *Java*.

molle { C. M. — *Leucoloma*.
Wils. — *D. arcticum*.

[1] Cf. Duby in *Memoires...* Genève 1869, p. 8.

montanum *Hedw. Sp. M. p. 145, t. 35; Brid. Bryol. univ. I, p. 454; Bryol. eur. I (mon. p. 29), t. 67; C. M. Syn. I, p. 379; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 82.*

D. Hostianum Schwaegr. Suppl. I, I, p. 177 (fid. Limpr.).

D. scottianum var. montanum Hook. et T. Muscol. brit. p. 56.

Weisia truncicola de Not. Epil. p. 598.

2. Lignic. et ad trunc. conifer. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in subalp., zon. merid. calidior. except. *As.* : Jenissei inf. et med., Obi, Caucas. *Am. sept.* : Terra nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Nov. Scotia, Gaspesia, lac. Super. et Huron, Manitoba, M. Rupestr., New York, reg. septr.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 34.

Rab. Bryoth. eur. n. 109, 798.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 71.

« *var. flaccidum Wulfsb. in Christiania Vid. Sels. Forh. 1875 et in Rev. bryol. 1885, p. 15.*

— *Eur.* : Norveg.

Moerkianum (fid. C. M.). } Hsch. — *D. fulvellum.*
Moerkii (fid. Limpr.). }

Mühlenbeckii Bryol. eur. I (mon. p. 38), t. 78; C. M. Syn. I, p. 370 et II, p. 592; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 90.

Campylopus Rauei Aust. in Coult. Bot. Gaz. I, p. 28.

D. condensatum Hedw. Sp. M. p. 139, t. 34; (fid. Card. in litt. ?) Brid. Bryol. univ. I, p. 421 ?

D. Hostianum Schwaegr. Suppl. I, p. 177 excl. syn. ? (W. P. Sch.). (1)

D. scottianum Pokorný Vorarb. z. Kryptfl. v. Unt. Oesterr. p. 105.

2. Lignic., ad rup. et terr. lapid. — *Eur.* : Spitzberg, Septem Ins., Ursorum, penins. Kola, Suec., Sudet., Francon., Rhæt., Helvet. occ., Tirol. merid. *As.* : Jenissei sup., Caucas. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, fret. Smith, Ontario, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Nov. Mexic.; Wyoming?

Exs. : Mac. Canad. M. n. 481.

Rab. Bryoth. eur. n. 527 b, 529, 866 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 81.

Un. itin. 1863, 13 ? 14.

var. alpinum Pfeff. — D. brevifolium.

var. brevifolium Lindb. — D. brevifolium.

var. neglectum Pfeff. — D. spadiceum.

multisulcatum Duby in Memoires... Genève 1869, t. I, f. 2.

Ster. — Am. merid. : Brasil.

nanum C. M. p.p. — } *Campylopus.*
 } *Campylopus pseudo-nanus.*

Naumannii C. M. — *Campylopus.*

neglectum Jur. — *D. spadiceum.*

? *nepalense* C. M. — *Campylopus.*

nervifolium Schleich. — *D. Starkii.*

Nietneri C. M. — *Campylopus.*

nigrescens Mitt. — *Campylopus.*

nigricaule Ångstr. in Oefv... 1872, n. 4, p. 6.

D. kerguelense forma (fid. C. M.).

— *Am. merid. : Archip. Magellan.*

(1) Cf. Lindb. M. Scand. p. 24.

nilgherriense Mitt. — *Campylopus nilgherriensis*

nipponense Besch. — *D. rufescens*.

nitidum Mitt. — *Campylopus*.

nivale C. M. p.p. — } *Campylopus nilgherriensis*.
 } *Campylopus*.

nodiflorum C. M. — *Campylopus*.

Novæ Hollandiæ Hsch. — *Hookeria aurea*.

nudum Hpe. — *Campylopus*.

obliquatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 148.

2. Cortic. — *Afr.* : Ins. Fernando Po.

oceanicum C. M. — *Leucoloma tenuifolium*.

Erstedtianum C. M. — *Campylopus*.

orthocarpon Brid. — *Dicranella varia* var. *orthocarpa*.

orthocomum C. M. — *Campylopus*.

osmundioides Sw. — *Fissidens*.

ovale Hedw. — — *Grimmia commutata*.

ovatum { Funk. — *Grimmia ovata*.

 { Hedw. — *Grimmia commutata*.

pallescens Wils. — *Leucoloma Zeyheri*.

pallidum { C. M. — *D. scoparium* var. *pallidum*.

 { Bryol. eur. — *D. sabuletorum*.

 { W. et M. — *Ditrichum*.

palmatum Sw. — *Fissidens*.

palustre la Pyl. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 814; *Bryol. eur.* I (mon. p. 39), t. 79; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 94.

D. Bonjeani de Not. *Syll.* p. 213; C. M. *Syn.* I, p. 369.

D. scoparium Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 295 p.p.

D. undulatum Auct. anglor.

! rar. 2. In turfac. — *Eur.* : In reg. campestr. et mont. zon. interm. et septr. ; Spitzberg. *As.* : *Jenissei med.*, *Obi*, *Himalaya*, *Caucas.*
Am. sept. : *Groenland*, *Terr. Nov.*, ins. *Miquelon*, *Ontario*, *Manitoba*, *Columb. brit.*, ins. *Vancouver*, *Sitka*, *Washington*, *Idaho*, *Wyoming*, *Wisconsin*, *Ohio*, *Pensilv.*

Exs. : *Mac. Canad.* M. n. 409.

Rab. Bryoth. eur. n. 416, 861 a et b, 1062.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 83.

* var. *alatum* (*Barnes*) *Par.*

D. Bonjeani var. *alatum* *Barnes* in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

— *Am. sept.* : *Illinois*.

var. *atratum* (*Pfeff.*) *Par.*

D. Bonjeani var. *atratum* *Pfeff. Bryol. Stud.* p. 23.

— *Eur.* : *Alp. Rhaet.*

* var. *Brewerianum* *Lesq.* in *Mem. Calif. Acad.* I, p. 7 et in *Lesq. et Jam. Man.* p. 75.

— *Am. sept.* : *M. Calif.*

* var. *calcareum* (*Braithw.*) *Par.*

D. Bonjeani var. *calcareum* *Braithw. Mossfl.* p. 150, t. 21.

— *Eur.* : *Cum typo.*

* var. *juniperifolium* (*Sendtn.*) *Par.*

D. Bonjeani var. *juniperifolium* *Braithw. Brit. Mossfl.* p. 149.

D. juniperifolium Sendtn. in *Fl.* 1840, I, p. 59 et in *Denkschrift d. K. bot. Ges. zu Regensb.* III, p. 144.

— *Eur.* : Spitzberg, Scandin., German. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : Groenland.

« *var. polycladum* Bryol. eur. l. c.

D. Bonjeani var. polycladum C. M. l. c.

— *Eur.* : In turfac. planitiei.

« *var. Roellii* (Barnes) Par.

D. Bonjeani var. Roellii Barnes in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

« *var. Schlotthaueri* (Barnes) Par.

D. Bonjeani var. Schlotthaueri Barnes in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Washington, Oregon, Wyoming, Idaho.

palustre { Brid. — *Ceratodon purpureus*.
la Pyl. — *Campylopus flexuosus* (sec. C. M. Syn. I, p. 401).

Pancheri C. M. in hb. Mus. Paris.

D. Billardieri Besch. in *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 198.

Lignic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

paramicolum C. M. in *Linn.* 1874, p. 591.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

parvulum { Dicks. — *Dicranella cerviculata var. pusilla*.
Hsch. p.p. — { *Dicranella Beyrichiana*.
 Microdus Martianus.

var. H. f. et W. — *Microdus Hilarianus*.

patens Sm. — *Rhacomitrium*.

patulum Wils. p.p. — { *Dicranella*.
 Dicranella mollicula.

pauperum Hpe. — *Campylopus*.

var. minus Hpe. — *Campylopus pauper var. minus*.

pellucidum { Drumm. — *Barbula fallax* (fid. Kindb.).
Hedw. — *Dichodontium*.

β *fagimontanum* Brid. — *Dichodontium pellucidum var. fagimontanum*.

γ *serratum* Bryol. eur. — *Dichodontium pellucidum var. serratum*.

var. Sw. — *Trichostomum tophaceum*.

penicillatum Hsch. — *Campylopus*.

perincanum C. M. — *Campylopus*.

Perrottetii { C. M. — *Dicranella tovariensis*.
Mont. p.p. — *Dicranella*.
Mont. p.p. — *Campylopus neilgherriensis*.

phascoides Hook. — *Garckeia*.

? *phascoideum* P. B. — *Grimmia apocarpa*.

piliferum Schleich. — *Grimmia alpestris*.

pinetorum Griff. — *Campylopus torfaceus*.

piriforme Brid. — *Campylopus torfacens*.

Pittieri Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 146.

1. Lignic. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

planinervium Tayl. — *Dicranella*.

plano-alare C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 31.

2. Ster. ? Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit.

platyloma Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 196.

Cortic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

platyneuron Hpe. — *Campylopus*.

plicatum Lac. *Sp. nov. M. Archip. ind. p. 9, t. 6 B.*

2. — *As. : Java.*

polycarpum { Ehrh. — *Cynodontium*.
H. et T. — *Dicranoweisia Bruntoni*.
Wils. — *Cynodontium gracilescens*.

var. *curvisetum* C. M. — *Cynodontium gracilescens var. inflexum*.

var. *gracilescens* C. M. — *Cynodontium gracilescens*.

var. *strumiferum* Bryol. eur. — *Cynodontium polycarpum var. strumiferum*.

var. *tenellum* C. M. — *Cynodontium gracilescens var. alpestre*.

polymorphum Duby. — *D. reflexum*.

polyphyllum Sm. — *Ptychomitrium*.

polypodioides Sw. — *Fissidens*.

polysetum Hpe. in *Linn.* 1859, p. 629.

2. *Rupic.* — *Pac. : Austral. felix.*

polysetum { Brid. — *D. majus*.
Sw. — *D. undulatum*.

var. *assimile* Dz. et Mk. — *D. assimile*.

porphyrocaule C. M. — *Campylopus*.

porphyreodictyon C. M. — *Campylopus*.

praemorsum C. M. — *Campylopus*.

procerum C. M. — *Campylopus*.

proliferum C. M. — *Campylopus*.

propinquum Hpe. — *Campylopus*.

proscriptum H. f. et W. — *Dicranodontium flexipes*.

pseudo-filifolium C. M. — *Campylopus*.

pseudo-leucoloma C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 397.

Ster. — *Am. merid. : Argentin. Patagon.*

pseudo-nanum C. M. — *Campylopus*.

pteroneuron C. M. — *Campylopus*.

pudicum { Hsch. (M. Drege). — *Campylopus lepidophyllus*.

{ Hsch. (M. Sieber p.p.). — *Campylopus*.

{ Hsch. (M. Sieber p.p.). — *Campylopus clavatus*.

pulvinatum Schwaegr. — *Grimmia*.

var. *argentatum* Turn. — *Grimmia pulvinata var. longipila*.

pumilum Mitt. *M. austr. am. p. 64.*

— *Am. merid. : Fuegia, ins. Eremitae.*

pumilum { C. M. — *Leucoloma*.

{ Sant. — *Dicranella*.

punctulatum Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 628.

— *Pac. : Alp. Austral. or.*

pungens H. f. et W. — { *D. robustum var. pungens*.

var. *lucidum* Mitt. — {

purpurascens { C. M. — *Campylopus Wallisii*.

{ Hedw. — *Ceratodon purpureus*.

purpureum Hedw. — *Ceratodon purpureus*.

pusillum Hedw. — *Dicranella cerviculata var. pusilla*.

ramulosum Mitt. *M. austr. am. p. 64.*

1. — *Am. merid. : Fuegia, ins. Eremitae.*

recognitum Roehl. — *Dicranella Schreberi*.

- rectisetum* Hpe. — *Campylopus*.
recurvatum Schultz. — *D. scoparium* var. *recurvatum*.
recurvum Mitt. — *Campylopus*.
reduncum } Duby. — *D. reflexum*.
 } Hsch. et Reinw. — *Campylopus*.
reflexifolium C. M. *Syn.* I, p. 382; *Bryol. jav.* I, p. 72, t. 60.
 2. — As. : Java.
reflexifolium Mitt. — *D. subreflexifolium*.
reflexisetum C. M. in *Linn.* 1874, p. 586.
 2. Paludic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
reflexum C. M. *Syn.* I, p. 373; *Bryol. jav.* I, p. 67, t. 55 (1).
 D. polymorphum Duby in *Pl. Jav. Zolling. Coll.* n. 2101.
 D. reduncum ej. l. c.
 2. Arbor. — As. : Java.
Reinwardti Dz. et Mk. — *Dichodontium*.
relaxum Wils. — *Dicranodontium Didymodon*.
rhabdocarpum Sull. in *Mem. Am. Acad.* IV, 1849, p. 172, t. 3; C. M. *Syn.* II, p. 594; *Lesq. et Jam. Man.* p. 73.
 2. Arbor. — Am. sept. : M. Rupestr., Arizona, Nov. Mexic.
 Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II, p. 82.
Richardi C. M. — } *Campylopus*.
 } *Campylopus caracasanus*.
Richardsoni Hook. — *Cynodontium virens* var. *Wahlenbergii*.
rigens Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LVI et in *Miss. sc. Cap Horn*,
 V, *Bot.* p. 258, t. I, f. 3.
 — Am. merid. : Patagon. austr.
rigidiusculum Hpe. — *Campylopus*.
rigidulum Sw. — *Dicranella varia* var. *tenella*.
rigidum C. M. — *Campylopus*.
robustum Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 542 et *Fl.*
 Antarct. II, p. 406, t. 152, f. 3; C. M. *Syn.* I, p. 361 et II, p. 590;
 Mitt. M. austr. am. p. 66.
 D. Hookeri W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Magell.*
 2 ? — Am. merid. : Chil., fret. Magell., Fuegia, ins.
 Eremitae. Pac. : Austral., Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland et
 Campbell.
 « var. *pungens* Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* p. 412.
 D. pungens H. f. et W. in *Lond...* p. 541 et *Fl. Antarct.* I, p. 129, t. 59,
 f. I; C. M. *Syn.* I, p. 367 et II, p. 592.
 D. pungens var. *lucidum* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876.
 — Afr. : Ins. Kerguelen. Am. merid. : Cum typ.
 (Chil. excepto). *Pac.* : Cum typ.
robustum Bryol. eur. — *D. elatum*.
Rogeri Brid. — *Dichodontium pellucidum*.
rosulatum Hpe. — *Campylopus*.
rufescens W. P. Sch. in *Savatier M. Jap.* n. 89.
 D. nipponense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 332.
 — As. Japon.
 Exs. : Faurie n. 86, 567.

(1) Cf. Duby, *Mémoires...* Genève 1869, p. 65.

« *var. lacustre* (Besch.) Par.

D. nipponense var. lacustre Besch. l. c.

— As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 3504.

« *var. mucronatum* (Besch.) Par.

D. nipponense var. mucronatum Besch. l. c.

— As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 216.

rufescens Turn. — *Dicranella*.

rufifolium Besch. in *Ann. sc. nat.* 1894, p. 16.

2. Ad terr. in silv. — *Pac.* : Ins. Marquises.

rugosum { *Brid.* — *D. undulatum*.
 Kindb. — *D. Schraderi*.

var. rugulosum Kindb. — *D. Schraderi*.

rugulosum Wils. — *D. gymnostomum*.

rupestre { *Brid.* — *D. fuscescens*.
 W. et M. — *D. fulvellum* (fid. *Brid.*).
 W. et M. — *Blindia trichodes* (fid. *Lindb.*).

Rutenbergii C. M. — *Leucoloma*.

sabuletorum Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1889, p. 91, t. 12 A et M. *bor. am. n. 9*.

Cecalyphum condensatum P. B. *Prodr.* p. 50 ?

D. condensatum Hedw. *Sp. M.* p. 139, t. 34 p.p. (fid. Card. ex autops.);

Brid. Bryol. univ. I, p. 421.

D. pallidum *Bryol. eur. I* (mon. p. 39).

D. spurium var. condensatum Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed. n. 686, II ed. n. 85, 86; Lesq. et Jam. Man. p. 76*.

1. rar. 2. In sabulos. — *Am. septent.* : Reg. merid.

Saddleanum C. M. — *Campylopus*.

sanctum Nees. — *Leucobryum*.

sandwichense Sull. in *U. St. Expl. Exp.* 1859, p. 3.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

« *var. condensatum* Sull. l. c.

Ut et cum typ.

« *var. elongatum* Sull. l. c.

Ut et cum typ.

Sauteri *Bryol. eur. I* (mon. p. 33), t. 71; *C. M. Syn. I*, p. 375 et *II*, p. 594; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 87*.

Campylopus Sauteri Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norveg. p. 87*.

D. longifolium var. (fid. Boulay M. Fr.).

2. Ad *Fagos* et rup. — *Eur.* : Tatra, Beskid., Boehmerwald, Francon., Alp. Austr., Bavar. et Algov., Silva Nigr., Helvet., Rhaet., Alp. Julien., Apenn. tosc., Pyr. centr. As. : Caucas.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 75 et b.*

« *var. curvulum* Lindb. mss.; Braithwa. *Brit. Mossfl. p. 158, t. 24*.

Ut typ. — *Eur.* : Scandin.?, Anglia, Gall. centr.

« *var. pachytrichum* Kindb. in *Mac. Cat. p. 260*.

Ad ramul. subinund. — *Am. septent.* : Columb. brit.

Savannarum C. M. — *Campylopus*.

Savatieri W. P. Sch. in *Savatier M. Japon. n. 512*.

D. majus var. Savatieri Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 333.

2.

— As. : Japon.

saxicola W. et M. — *Campylosteleum*.

Schisti Lindb. — *D. Blyttii*.

scariosum Wils. p.p. } *Braunfelsia*.
 } *D. himalayanum*.

Schleicheri C. M. — *Campylopus fragilis*.

Schmidii C. M. — *Campylopus fragilis*.

Schraderi *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 66, t. 61; Bryol. eur. I (mon. p. 40), t. 80; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 95.*

Cecalyphum undulatum P. B. *Prodr. p. 52.*

D. affine *Funk Fasc. crypt. VI, n. 136.*

D. Bergeri *Bland. M. frond. exs. III, n. 114; C. M. Syn. I, p. 357.*

D. falcatum *Schrad. in Schleich. Crypt. helv. n. 15.*

D. fastigiatum *Schultz Fl. Starg. p. 300.*

D. intermedium *Crome Samml. Crypt. Gew. n. 66, p. 21.*

D. rugosum *Kindb. in Ottawa Naturalist, IV, p. 61.*

D. rugosum var. rugulosum *ej. l. c.*

D. undulatum *Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 59; Brid. Bryol. univ. I, p. 415.*

Hypnum scoparium β *Web. Spic. Fl. Goett. p. 72.*

1 rar. 2. Loc. uliginos. — *Eur.* : Reg. mont. et subalp. *As.* : Jenissei, Obi, Amour, Sikkim. *Am. sept.* : Groenland, Terr. Nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Anticosti, Ontario, Manitoba, M. Rupestr. et Selkirk, fret. Kotzebue, Columb. brit., Wisconsin, reg. sept. et orient.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. I ed. n. 87, 88.*

Mac. Canad. M. n. 45.

Rab. Bryoth. eur. n. 79 et b, 1171.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 84.

α var. acutifolium *Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 79.*

— *As.* : Jenissei inf.

Schreberi Hedw. — *Dicranella*.

var. Grevilleanum *Brid. — Dicranella Grevilleana.*

Schreberianum *Grev. — Dicranella Grevilleana.*

Schwaneckeanum *Hpe. in Linn. 1852, p. 361.*

Ster. Arbor. — Am. sept. : Porto Rico.

sciuroides *Sw. — Leucodon.*

sclerocarpum *H. f. et W. — Dicranella Perrottetii? (fid. C. M.).*

scopareolum *C. M. in Linn. 1876, p. 238.*

Ster. — *Afr.* : Madagascar, ins. Anjouan.

scoparioides *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 20.*

2? — *Am. sept. : Mexic.*

scoparium (L.) *Hedw. Fund. M. II, p. 92, t. 8, f. 41-42; Brid. Bryol. univ. I, p. 410; Bryol. eur. I (mon. p. 34), t. 74-75; C. M. Syn. I, p. 359 et II, p. 589; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 91.*

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie *Dill. Hist. M. p. 357, t. 46, f. 16 A. B. C.*

Br. scoparium *L. Sp. pl. p. 1582.*

Cecalyphum scoparium *P. B. Prodr. p. 51.*

D. condensatum *Hedw. Sp. M. p. 139, t. 34, p.p. (fid. Card. ex autops.).*

D. Dillenii *T. Tayl. in Ann. and Mag. of nat. Hist. 1843, p. 113 et in Bot. Zeit. 1843, p. 695.*

D. scoparium var. crispulum *de Not. Syll.*

D. scoparium var. reflectens *Brid. l. c. p. 412.*

Fuscina scoparia var. reflectens *Schrank Baiers Fl. II, p. 452.*

Hypnum scoparium var. reflectens *Weiss Crypt. Goett. p. 71.*

Mnium scoparium var. reflectens *Gmel. Syst. nat. II, p. 1328.*

2. Ubique, rarius ad terr. — *Eur.* : Vulgatiss. *As.* : Septentr. tota, Japon., *Caucas.* *Am. sept.* : Arctic., septentr. et temper.
Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 80.
 Mac. *Canad. M.* n. 42.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 83, 530, 734, 868.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* n. 75, 78.
- « *var. alpestre* Hüb. *Muscol. germ.* p. 236.
D. spadiceum Zett. (*fid. Husn. Muscol. gall.* p. 35).
 Ad tecta stramin. — *Eur.* : Sudet., *Pyren.* *As.* : Altaï.
- « *var. compactum* Ren. et Card. *Fl. Miquel.* p. 44 ; *Boulay M. Fr.* p. 484.
 — *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
var. crispulum de Not. — *D. scoparium*.
- « *var. curvulum* Brid. l. c. ; *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Ad saxa sicc. — *Eur.* : Reg. alpestr. *Am. sept.* : Washington, Oregon.
var. flagellare H. et T. — *D. flagellare*.
- « *var. flexicaule* Ren. et Card. *op. et l. cc.*
 In turf. — *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
var. fuscescens H. et T. — *D. fuscescens*.
- « *var. integrifolium* Lindb. in *Oefv...* XXXIII, p. 555.
D. spadiceum Zett. (*fid. Limpr. Deutschl. Laubm.* p. 353.)
 — *Eur.* : Spitzberg. *Am. sept.* : Groënland.
var. majus W. et M. — *D. majus*.
- « *var. orthophyllum* Brid. *Sp. M. I*, p. 173 et l. c. p. 412 ; *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
D. Goeppertianum Sendtn. *mss.* ; *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 352.
 — *Eur.* : Loc. humidior. *Am. sept.* : Vancouver.
- « *var. pallidum* Lesq. et Jam. *Man.* p. 74.
D. pallidum C. M. *Syn. I*, p. 359 et *II*, p. 590.
D. scoparium Sull. *M. Allegh. n.* 155 (*fid. C. M.*).
D. scoparium var. Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 61 et *II ed. n.* 77
 — *Am. sept.* : Reg. orient.
- « *var. paludosum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 In turf. — *Eur.* : Passim. *Am. sept.* : Reg. orient. ; Washington.
- « *var. polycarpum* Breidl. in *sched.* ; *Limpr. l. c.*
 — *Eur.* : C. typ.
- « *var. recurvatum* Brid. et *Bryol. eur. ll. cc.*
D. recurvatum Schultz *Fl. Starg.* p. 295.
 Ad rup. umbros. humid. — *Eur.* : Passim. *Am. sept.* : Vancouver.
var. rupestre Roehl. — *D. fuscescens*.
- « *var. rupicolum* H. Müll. *Westf. Laubm.* n. 211.
 — *Eur.* : C. typ.
- « *var. scopariiforme* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVI, p. 92.
 Lignic. et terr. — *Am. sept.* : New Brunswick, Nov. Scot., Ontario,
 M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Terr. Nov.
Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 43.
- « *var. squarrosum* Lesq. et Jam. l. c.
D. scoparium var. Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 60 et *II ed. n.* 76.
 Ad rup. granitic. — *Am. sept.* : M. Allegh., Pensilv., etc. reg. orient.

var. *spadiceum* Ren. et Card. — *D. spadiceum*.

« var. *sulcatum* Ren. et Card. *op. cit.*, t. XII c.

Lignic. et in turfac. — *Am. sept.* : Ins. Miquelon.

« var. *tectorum* H. Müll. l. c. n. 412 ; *Limpr. l. c.*
— *Eur.* : C. typ.

« var. *turfosum* Milde *Bryol. siles.* p. 71.

In turfac. — *Eur.* : Passim.

« var. *Venturii* Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 156.

D. scoparium var. *paludosum* (fid. *Limpr.*).

— *As.* : Japon.

scoparium { Griff. — *D. lorifolium*.
Tayl. — *D. majus*.
Sull. — *D. majus* var. *pallidum*.
Wils. — *D. lorifolium*.
Wils. p.p. — *D. palustre*.

var. α H. et T. — *D. majus*.

var. Sull. et Lesq. — *D. majus*. var. *squarrosus*.

var. Wils. — *D. crispifolium*.

var. *atratum* Brid. —

var. *condensatum* Brid. —

var. *convolutum* Brid. —

var. *fastigiatum* Brid. —

D. scoparii formae ?

scottianum Turn. *Muscol. Hib.* p. 75, t. 6, f. 1 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 455 ; *Bryol. eur.* I (mon. p. 31), t. 70 ; *C. M. Syn.* I, p. 381 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 85.

Bryum cirratum, setis et capsulis longioribus *Dill. Hist. M.* p. 377, t. 48, f. 40 E-H. (fid. *Lindb.*).

Campylopus scottianus *Brid. Mant. M.* p. 72.

D. flagellare *Engl. Bot.* t. 1977 ; *ibid.* t. 1391 ?

D. Hostianum *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 177, t. 44 (fid. *C. M.*) ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 457.

2. Ad rup. granit. — *Eur.* : Britann., Normann., Helvet., Austr. inf. et Alp. Jul. (fid. *C. M.*). *Afr.* : Ins. Canar., Madeir.

Exs. : Mandon M. Madeir. n. 3.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 941.

scottianum { Drumm. — *Cynodontium polycarpum*.
Pok. — *D. Mühlenbeckii*.

var. *montanum* H. et T. — *D. Mühlenbeckii*.

secundum Sw. — *Dicranella subulata*.

Seligeri Brid. — { *Blindia acuta* ?
Blindia trichodes ? (fid. *Lindb.*).
D. fulvellum ? (fid. *C. M.*).

Sellowianum Hpe. — *Campylopus*.

Sellowii Hsch. — *Microdus Hilarianus*.

Sendtneri *Limpr. Deutschl. Laubm.* p. 360.

2. ♂ ign. Rupic. — *Eur.* : Sudet.

Sendtneri v. Flot. — { *D. falcatum* (fid. *C. M.*).
D. Blyttii (fid. *Limpr.*).

sericeum { Hsch. — *Ditrichum homomallum* var. *zonatum*.
Wils. — *Campylopus gracilis*.

setaceo-rigidum Hpe. — *Campylopus*.

setosum Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 541 ; *Fl. Antarct.* I, p. 129, t. 158 et *Handb. N. Zeal. Fl.* p. 412 ; *C. M. Syn.* I, p. 368 et II, p. 592.

- Lignic. et terr. — *Am. merid.* : Chil., fret. Magell. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland, Campbell.
- « *var. attenuatum* *Fl. Antarct. l. c.*
— *Pac.* : Cum typ.
- Sieberianum* Hsch. — *Leucoloma*.
- simplex* Hedw. — *D. varia var. tenella*.
- sinuosum* Brid. p.p. — { *Leucoloma*.
 Campylopus reduncus.
- smaragdinum* C. M. — *Campylopus reduncus*.
- sordide-viride* C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (*nom.*).
— *Pac.* : Austral. (Nov. Valesia).
- sordidum* Wils. — *Blindia*.
- spadiceum* Zett. *M. Pyr. p.* 70 et in *K. Sv. Vet. Akad. Handl.* 1876.
D. Bambergeri W. P. Sch. mss.
D. Mühlenbeckii var. neglectum Pfeff. *Bryol. Stud. p.* 23.
D. neglectum Jur. mss.; *Milde in Bot. Zeit.* 1864 (*fid. Kindb. in Mac. Cat.* 260).
D. scoparium var. alpestre (*fid. Husnot. Muscol. gall. p.* 35).
D. scoparium var. integrifolium (*fid. Limpr.*).
D. scoparium var. spadiceum Ren. et Card. *Fl. Miquelon, p.* 44.
D. spurium Garov. *Enum. p.* 17.
Rupic. — *Eur.* : Finmark., *Pyr.*, summ. Alp. centr. *As.* : Jenissei, Caucas. *Am. septent.* : Ins. Miquelon, M. Rupestr.
Eæss. : Mac. Canad. M. v. 537.
- speciosum* Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 291, t. II;
C. M. Syn. I, p. 378; *Mitt. M. austr. am. p.* 65.
2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- speciosum* Saut. — *Geheebia cataractarum*.
- spectabile* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1609.
— *Am. merid.* : And. Boliv.
- Spegazzinii* C. M. — *Campylopus*.
- speirophyllum* Mont. in *Voy. Bonite, Crypt. p.* 27 et *Syll. p.* 45; *C. M. Syn. II, p.* 595.
— *Pac.* : Ins. Sandwic.
- Sphagni* Wahlenb. — *D. elongatum var. orthocarpum*.
- spiripes* C. M. in *Linn.* 1874, p. 585.
1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- splachnoides* Brid. — { *Blindia acuta*.
 Cynodontium Schisti.
- Spengelium* C. M. — *Leucoloma*.
- spurium* Hedw. *M. frond. II, p.* 32, t. 30; *Brid. Bryol. univ. I, p.* 416;
Bryol. eur. I (mon. p. 41), t. 81; *C. M. Syn. I, p.* 356; W. P. Sch. *Syn. II ed. p.* 96.
Bryum spurium Dicks. *Fasc. IV, Pl. crypt. p.* 13?
Cecalyphum longirostratum P. B. *Prodr. p.* 51.
C. spurium ej. l. c.
D. fragile Brid. *Mant. M. p.* 55.
D. longirostratum ej. l. c.
Mnium spurium Gmel. *Syst. nat. II, p.* 1328.
Oncophorus conglomeratus Brid. *Bryol. univ. I, p.* 405.
O. fragilis ej. op. cit. p. 403.
O. longirostris ej. op. et l. cc.

1 rar. 2. In pinet. et ericet., rar. turf. — *Eur.* : Reg. intermed. et septentr. *Am. sept.* : Nov. Scot., Gaspes., Ontario, lac. Super.
Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 90 et II ed. n. 47.
 Mac. *Canad. M.* n. 46 p.p.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 84, 1325.

spurium Garov. — *D. spadiceum*.

var. *condensatum* Lesq. et Jam. — *D. sabuletorum*.

squarrosulum C. M. — *Leucoloma*.

squarrosus Schrad. — *Dicranella*.

Starkii Web. et Mohr *Bot. Taschb.* p. 189; *Bryol. eur.* I (mon. p. 27), t. 64; *C. M. Syn.* I, p. 364; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 80.

D. curvifolium Schleich. *Cent. Pl. helvet.* IV, n. 14.

D. nervifolium ej. (nom. errone. in *Brid. et Schwaegr.*) (1).

Oncophorus Starkii *Brid. Bryol. univ.* I, p. 394.

1. Ad rup. et terr. præcip. granit. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. (ubi vulgatiss.); Spitzberg, ins. Ursor. *As.* : *Caucas.* *Am. sept.* : Labrador, Groenland, fret. Smith, Terr. Nov., Gaspes., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Idaho, M. Alb., reg. or.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 83.

Mac. *Canad. M.* n. 30.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 869.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 70.

var. *major* Drumm. — *D. Drummondii*.

var. *molle* Wils. — *D. arcticum*.

stellatum *Brid.* — *Leptodontium*.

stenocarpum C. M. — *Campylopus*.

stenodictyon Kindb. — *Monocranum*.

stenopus (erratum !) C. M. — *Campylopus stenocarpus* !

stramineum { *Lindb.* — *D. albicans*.
 { *Mitt.* — *Campylopus*.

striatulum *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 156.

Ster. — *As.* : Japon.

strictulum C. M. in *Linn.* 1874, p. 587.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

strictum *Schleich. Cent. III Pl. helv.* n. 26; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 459; *Bryol. eur.* I (mon. p. 28), t. 66; *C. M. Syn.* I, p. 376; *W. P. Sch. Syn.* II, ed. p.

D. elongatum var. minor *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 81.

2. Lignic. et ad rad. arbor., rar. terr. — *Eur.* : Rar. : Brandeb., Salisb., Stir., Carniol., Tirol., Valesia, M. Sempione, Bosnia, Alp. Sabaud., Gall. centr. (Arvernica), Pyr. centr.; M. Pind. Thessaliae (C. M.). *Am. sept.* : New Brunswick, lac. Super., Manitoba, Athabasca, Columb. brit., fret. Behring, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Montana, Idaho, M. Calif.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 33.

strictum { *Drumm.* — *D. flagellare*.
 { *Sm.* — *Ceratodon purpureus*.

strigulosum C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* p. 147.

1. Lignic. — *Am. sept.* : And. Costa-Ricens.

(1) Cf. *Limpr. Laubm. Deutschl.* I, p. 342.

- strumiferum* { C. M. — *Cynodontium polycarpum* var. *strumiferum*.
Wils. — *Cynodontium virens*.
- Stuhlmanni* Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 177.
2. — *Afr.* : Tropic. or. (reg. lacustr.).
- ? *stygium* Brid. *Bryol. univ.* I, p. 444; C. M. *Syn.* I, p. 645 (1).
Ster. — *Eur.* : Alp. Delphinat.
- subaggregatum* R. Br. — *D. dicarpon*.
subarctocarpum Hpe. — *Campylopus*.
subbasilare Drumm. — *Fissidens*.
subconcolor Hpe. — *Campylopus*.
- subconfine* Besch. *Not. M. des I. S. Paul et d'Amsterdam*, p. 4.
Ster. — *Afr.* : Ins. Amsterdam.
- subcuspidatum* Hpe. — *Campylopus*.
- suberectum* Hpe. in *Linn.* 1859, p. 629.
— *Pac.* : Austral. felix.
- subexasperatum* C. M. — *Campylopus*.
subfalcatum Hsch. — *Campylopus*.
subgriseum Hpe. — *Campylopus*.
subimmarginatum C. M. — *Leucoloma*.
subincrassatum Hpe. — *Campylopus*.
- sublencogaster* { Aust. — *Campylopus* *Donnellii*.
C. M. — *Campylopus*.
- subluteum* Mitt. — *Campylopus*.
subnanum C. M. — *Campylopus*.
- subpalustre* C. M. et *Kindb.* in *Mac. Cat.* p. 33.
1 rar. 2. *Rupic.* et terr. — *Am. sept.* : Columb. brit., M. *Rupestr.*
- subpolyanthus* C. M. — *Campylopus*.
- subpungens* Hpe. in *Linn.* 1859, p. 629.
— *Pac.* : Austral. felix.
- subreconditum* Geh. et Hpe. — *Campylopus*.
- subreflexifolium* C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 349.
D. brevisetum Wils. in *hb. Ind. or. n.* 53.
D. reflexifolium Mitt. *M. Ind. or. p.* 15.
— *As.* : Khasia, Assam.
- subscoparium* W. P. Sch. — *D. cœsium*.
- subulatum* { Griff. — *Dicranella divaricata*.
Hedw. — *Dicranella*.
Roehl. — *Rhacomitrium protensum*.
var. *curvatum* Rab. — *Dicranella curvata*.
- subulifolium* *Kindb.* in *Bull. Torr. bot. Club*, XVI, p. 87.
Lignic. — *Am. sept.* : Reg. sept. occid., ins. Vancouver.
- sudeticum* Schwaegr. — *Dicranella subulata*.
- sulcatum* *Kindb.* in *op. et l. cc.*
2. Lignic. et terr. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.
Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 406.
- sulcatum* C. M. — *Dicranella Guilleminiana*.

(1) In *Bryol. eur.* et W. P. Sch. *Syn.* deest ; spec. dubia.

Sumichrasti Duby in *Memoires.... Genève*, 1869, t. 3, f. I.
— *Am. sept.* : Mexic.

surinamense C. M. — *Campylopus*.

tabulare Rehm. *M. Afr. austr. n.* 32.
— *Afr.* : C. B. Sp.

tamarindifolium Turn. — *Fissidens incurvus* var. *tamarindifolius*.
tasmanicum H. f. — *Dichodontium*.

taxifolium Sw. — *Fissidens*.

tenui-cuspidatum C. M. *Bryol. austr. Georg. p.* 23.
Ster. In graminos. — *Am. merid.* : Austro-Georg.

tenuifolium { Brid. — *Dicranella varia* var. *tenuifolia*.
H. f. et W. — *Blindia*.

tenuinerve Zett. in *K. Sv. Vet. Ak. Handl.* 1876.

D. labradoricum (fid. *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 77).
— *Eur.* : Finmark. *Am. sept.* : Ins. Miquelon.

tenuirostre Kze. — *Microdus*.

thraustum { Hpe. — *Leucoloma*.
W. P. Sch. — *D. viride*.

terebrifolium C. M. — *Campylopus*.

Thwaitesii Mitt. — *Campylopus*.

torquatum Mitt. — *Campylopus*.

torquescens Br. — *Cynodontium gracilescens* var. *alpestre*.

torule W. et M. — *Ditrichum*.

? *tortuosum* Hpe. in *Linn.* 1852, p. 361.

Ster. Terr. — *Am. sept.* : Ins. Porto-Rico.

trachyblepharum C. M. — *Campylopus*.

trachythecium C. M. — *Campylopus*.

trichodes Wils. *M. brit. n.* 77.

— *Eur.* : Britann. (sine loc. spec.).

trichophyllum Hpe. in *Linn.* 1871-73, p. 515.

— *Pac.* : Ins. Chatham.

trichopodon Mitt. mss. ; *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* p. 411.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

tricolor C. M. — *Campylopus*.

truncatum C. M. — *Campylopus*.

truncorum W. P. Sch. in *Lechler pl. Chil. n.* 612.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Valdiv.

Tundrae *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 82.

2. Ad. terr. humid. — *As.* : Jenissei inf.

turfaceum { C. M. — *Campylopus*.
Mitt. — *Campylopus torquatus*.

uncinatum { C. M. — *Dicranodontium*.
Sm. — *Dicranella cerviculata* var. *pusilla*.
Wils. — *Dicranodontium dicticyon*.

undulatum Voit *M. Herb. p.* 39; *Bryol. eur. I* (mon. p.), t. 82, 83; C.
M. Syn. I, p. 355; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 97.

Bryum rugosum Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 39.

D. polysetum Sic. *M. Suec. pp.* 34 et 87, t. 3, f. 5; Brid. *Bryol. univ. I*,
p. 413 p.p.

D. rugosum Brid. op. cit. p. 414.

- 1 rar. 2. Loc. humid. — *Eur.* : Reg. campestr. et mont. ; deest in
 Britann. *As.* : Jenissei, Obi, Kamschatka, Caucas. *Am. sept.* : Ins.
 Miquelon, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Columb. brit., ins.
 Vancouver, reg. orient.
Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 85.
 Mac. *Canad. M.* n. 48.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 80, 867.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 87.
- « *var. laevigatum C. M. in Act. hort. Petrop.*
 — *As.* : Caucas.
- undulatum* { *Auct. angl.* — *D. palustre.*
 { *Schrad.* — *D. Schraderi.*
var. Drumm. — *D. Drummondii.*
- undulifolium C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 32.*
 2. *Terr.* — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.
- ustulatum* *Brid.* — *Calymperes Afzelii.*
- vaginatium* { *Hook.* — *Dichodontium.*
 { *H. f. et W.* — *Dichodontium Jamesoni.*
- validum Hpe. in Linn. 1861-1862, p. 522.*
D. frigidum C. M. (fid. Mitt.).
 2. *In silv.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- varium* { *Drumm. p.p.* — *Ångstroemia longipes.*
 { *Hedw.* — *Dicranella.*
var. rufescens *Brid.* — *Dicranella rufescens.*
var. tenuifolium *Bryol. eur.* — *Dicranella varia var. tenuifolia.*
var. viride *H. et T.* — *Dicranella varia.*
- Venturii de Not. Epil. p. 616.*
D. scoparium var. paludosum (fid. Limpr.).
In palud. mont. — *Eur.* : Scot., Angl., Cambrovall., Ital.
- verticillatum Hpe.* — *Campylopus.*
- vesiculare Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 337.*
 2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- villicaule Hpe.* — *Campylopus.*
- virens* { *Hedw.* — *Cynodontium.*
 { *Wahlenb.* — *Cynodontium virens var. Wahlenbergii.*
- virginicum Aust.* — *Campylopus.*
- viride (Sull. et Lesq.) Lindb. in Hedwigia, 1863, p. 70 ; Bryol. eur. Suppl.*
III-IV, Dier. t. I ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 83 ; Lesq. et Jam. Man.
p. 69.
Campylopus viridis Sull. M. of U. St. p. 103 et Ic. M. p. 28, t. 17 ; Sull.
et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 72.
D. thraustum W. P. Sch. mss.
 2. *Arbor.* — *Eur.* : Fennia, German., Austria, Salisb., Stir., Carinth.,
 Carniol., Tirol., Helvet., Bavar., Silva Nigra, Voges., Ital. super.
As. : Caucas. *Am. sept.* : *Terr. nov.*, New Brunswick, Ontario,
M. Rupestr. ; a Nov. Angl. usq. ad Ohion.
Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 35.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 735 et b, 1061, 1110, 1326.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 91.
- « *var. irroratum Mdo. Bayer's Laubm. p. 40.*
 — *Enr.* : Alp. Bavar.

viridissimum Sm. — Zygodon.

viridulum { Sm. — Fissidens exilis.
Sw. — Fissidens bryoides.

vulcanicum Brid. — Angstroemia.

Walkeri Mitt. — Campylopus.

Wallisii C. M. in Linn. 1874, p. 590.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Widgrenii C. M. — Campylopus.

xanthodon Hedw. — Weisia viridula.

xanthophyllum Mont. — Campylopus truncatus.

Zeyheri C. M. — Leucoloma.

Zollingerianum C. M. — Campylopus.

zygodonticarpum C. M. — Campylopus (1).

DIDYMODON Hedw. M. frond. III, p. 8 et II, p. 72. (40 spec.).

abyssinicus W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss.

— *Afr.* : Abyss.

acutifolius Jaeg. — Leptodontium.

aeruginosus Hook. — Ditrichum glaucum *var.* brevipedunculatum.

aggregatus Jaeg. — Leptodontium.

alpigenus Jur. — D. rubellus *var.* dentatus.

angustatus Jaeg. — Barbula.

apiculatus *var.* α W. Arn. — Desmatodon latifolius *var.* glacialis.

Anomodon de Not. Epil. p. 564 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 161.

D. rubellus (*fid. Limpr. Deutschl. Laubm.* p. 545).

Trichostomum Anomodon Bals. et de Not. Syll. p. 191 ; C. M. Syn. II, p. 625.

Syn. Ad vias. — *Eur.* : Ital. (Neapol.).

aristatus Lindb. — Diceranodontium.

asperulus Lindb. — Diceranodontium asperulum *var.* scoticum.

aureus de Not. — Ditrichum subulatum.

Baden-Powellii Kindb. in Ottawa Naturalist, V, p. 179.

2. — *Am. sept.* : Fret. Behring.

Benthami Arn. — Trichostomum mutabile.

Blyttii Hartm. — Desmatodon Laureri.

bombayensis (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 216.

Tortula bombayensis Mitt. M. Ind. or. p. 28.

Trichostomum bombayense C. M. Syn. II, p. 628.

2. — *As.* : Bombay.

brachydontius Wils. — Trichostomum mutabile.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

D. albo-alare C. M.
arcuatipes C. M.
arenarium Ren. et Card.
blindiaceum C. M.
callocaulon C. M.
chiloëse C. M.
chryso-drepanium C. M.
cylindropyxis C. M.
exile C. M.

D. helvolum C. M.
nano-caespitosum C. M.
orthopyxis Schlieph. et C. M.
pallicum C. M.
Pilopogon C. M.
pseudo-australe C. M.
pseudo-truncorum C. M.
subsetosum C. M.
subtenuifolium Schlieph. et C. M.

- brachypus* Hpe. — *Dicranum brevisetum*.
brasiliensis Jaeg. — *Leptodontium*.
brevisetus Jaeg. — *Leptodontium*.
Bruntoni H. et T. — *Dicranoweisia*.
bulbosus Hartm. — *Pottia latifolia*.
bullatus Hartm. — *Pottia latifolia* var. *pilifera*.
caespitosus Mitt. — *Amphoridium*.
calyptratus Tayl. — *D. cylindricus*.
Camusi Husn. — *Diphyscium foliosum* var. *acutifolium*.
canadensis Kindb. in *Mac. Cat.* p. 44.
 2. Rupic. — *Am. sept.* : M. Rupestr.
capensis Spreng. — *Barbula atro-virens*.
capillaceus W. et M. — *Distichium*.
cernuus Sw. — { *Bryum pendulum* (fid. Brid.).
 Bryum uliginosum (fid. Lindb.).
Cinclidotus de Not. — *Barbula Brebissonii*.
cirrifolius { Harv. — *Distichium capillaceum*.
 Jaeg. — *Leptodontium*.
 Mont. — *Ditrichum plicatum*.
citrinus Jaeg. — *Leptodontium*.
cordatus Jur. in *Bot. Zeit.* 1864 et 1866, p. 177, c. ic. ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 162.
Barbula cordata Lindb.
Trichostomum cordatum Milde *Bryol. Sil.* p. 103.
 2. ♂ et fr. ign. Muric. — *Eur.* : Helvet. or., Saxon. occ., Thuring.,
 Rhoengeb., Würtemb., Austria. inf., Hungar., Stir., Siles., Etruria.
 As. : Caucas.
 Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 923, 959 et b.
crenulatus Mitt. — *Rhabdoweisia*.
crinalis Tayl. — *Ditrichum*.
crispifolius Mitt. — *Cynodontium*.
crispulus Wils. (fid. C. M.). — { *Trichostomum mutabile*.
 Trichostomum.
cuspidatus (*Bryol. jav.*) Jaeg. *Ad. I*, p. 216.
Trichostomum cuspidatum *Bryol. jav. I*, p. 96, t. 78.
 2. Arbor. — As. : M. Java.
cuspidatus W. P. Sch. — *Ceratodon purpurens* var. *Graefii*.
cyathicarpus Mitt. — *Amphoridium*.
cylindricus (Br.) *Bryol. eur. II* (mon. p. 5), t. 187 ; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 164.
D. calyptratus Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 188 ; C. M. *Syn. I*, p. 462.
D. longifolius Griff. *Not.* p. 433 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 80, f. 4.
D. tenuirostris Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1841, p. 376.
Mollia tenuirostris Lindb. *M. Scand.* p. 21.
Tortula cylindrica Mitt. *M. Ind. or.* p. 28.
T. tenuirostris Mitt. *M. austr. am.* p. 148.
Trichostomum cylindricum C. M. *Syn. I*, p. 586 et *II*, p. 627.
Tr. tenuirostre Lindb. *Trichost. Eur.* p. 15.
Weisia cirrata var. *cylindrica* Hüb. *Muscol. germ.* p. 127.
W. cylindrica Br. in *Bryol. germ. II, II.* p. 58, t. 29 ; Brid. *Bryol. univ. I*, p. 806.
W. tenuirostris H. et T. *Muscol. brit. II ed.* p. 83, *Suppl.* 3.
 2. Ad rup. et saxa granit. ; calcar. fugit. — *Eur.* : Norveg. occ., Britann., Palat., Voges., Silva Nigr., Thuring., Sudet., Salisburg., Stir., Ital. As. : Nepal., Sikkim, Khasia, Ceylan. *Am. sept.* : Groen-

land, ins. Miquelon, Ontario, M. Alb., Allegh., Catskill; Pensilv.
Am. merid. : And. Quitens.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1266.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 1266.

« *var. Daldinianus de Not. Epil. p. 165 ; W. P. Sch. l. c. p. 165.*
Ut typ. — *Eur.* : Scotia, Ital. sup. (lac. Major.).

« *var. gemmiparus W. P. Sch. l. c.*
Lignic. — *Eur.* : Alsatia.

« *var. Holtii Braithw. Brit. Mossfl. p. 248.*
 — *Eur.* : Britann.

« *var. irriguus Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 571.*
Ster. In rivul. — *Eur.* : Riesengeb.

« *var. robustus W. P. Sch. l. c.*
Ut typ. — *Eur.* : Britann.

cylindricus Wahlenb. — *Trichodon.*

densifolius Mitt. — *Leptodontium.*

dentatus { *Jur.* — *Didymodon rubellus var. dentatus.*
 { *Mitt.* — *Leptodontium.*

denticulatus W. P. Sch. — *Philonotis fontana.*

denudatus Lindb. — *Dicranodontium longirostre.*

dicranoides Griff. — *Dicranodontium Didymodon.*

distans Jaeg. — *D. leptocarpus.*

distichus { *Brid.* — *Distichium capillaceum var. brevifolium.*
 { *Schwaegr.* — *Eustichia longirostris.*

duriusculus Wils. — *Barbula.*

epunctatus Jaeg. — *Leptodontium.*

erubescens Mitt. in *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. p. 421.*

1. — *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Pac.* : Nov. Zeland. med.

filesceus Jaeg. — *Leptodontium.*

flavicans Funk. — *Barbula obtusifolia.*

flexicaulis Brid. — *Ditrichum.*

flexifolius (Dicks.) *Hook. et Tayl. Muscol. brit. II ed. p. 45, t. 20 ; Bryol.*
eur. II (mon. p. 6), t. 188 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 163.

Bryum flexifolium Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 5, t. 7, f. 9.

Desmatodon flexifolius Hpe. Veget. cell. Coll. n. 112.

Leptodontium flexifolium ej. in Linn. 1847, II, p. 70.

Trichostomum flexifolium Sm. Fl. brit. III, p. 1246 ; Brid. Bryol. ; univ.
I, p. 499 ; C. M. Syn. I, p. 577 et II, p. 625.

Zygotrichia cylindrica Tayl. in Mac-Kay Fl. Hibern. p. 26 (fid. C. M.).

2. In lapidos. et turf. exust., ad tecta stramin. — *Eur.* : Britann.

(copiose) ; rar. in Normann., Hercynia, Westphal., Luxemb.,

Voges. ; Hassia sup. et Palat. (ster.) ; Helvet. ? Lusitan. (fid.

C. M.). *Afr.* : M. Cameroon, ins. Fernando Po.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 662, 1265.

« *var. gemmiferus W. P. Sch. l. c.*

Ut typ. — *Eur.* : Anglia, Normann.

fontanus Rehm. *M. Afr. austr. n. 82.*

Ster. — *Afr.* : Natal.

fragilis H. f. et Wils. — *Barbula Drummondii.*

giganteus Jur. — *Geheebia cataractarum.*

glacialis H. f. et W. — *Ditrichum.*

glauescens W. et M. — *Ditrichum.*

- gracilis* { Hook. — Pilopogon.
 W. P. Sch. — Zygodon.
grimmii Duby. — Campylopodium euphorocladum.
Hendersoni Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 40, t. 5 c.
 2. In fiss. rup. — Am. sept. : Oregon.
heteromallus H. et T. — Ditrichum.
homomallus Hedw. — Ditrichum.
ictericus de Not. — Ceratodon chloropus.
inclinatus Sw. — Distichium.
insularis Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 204.
 2. Terr. — Pac. : Nov. Caled.
interruptus Mitt. — Trichostomum.
Jamesoni Jaeg. — Barbula.
Jenneri W. P. Sch. — Cynodontium polycarpum (fid. Limpr.).
Klotzschyi Schwaegr. — Brachymenium Sellowianum.
Knysmæ Rehm. M. Afr. austr.
 — Afr. : C. B. Sp.
Lamyi W. P. Sch. Syn. II ed. p. 163.
 Trichostomum Lamyanum ej. in Boulâv Fl. crypt. Est Fr.
 2. Ad rup. trachyt. — Eur. : Gall. centr. (M. Dore Arvernise).
lapponicus Mitt. — Amphoridium.
latifolius Wahlenb. — Desmatodon cernuus.
laxifolius Mitt. — Oreoweisia.
leptocarpus Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. II, n. 462.
 D. distans Jaeg. Ad. I, p. 213.
 Trichostomum distans Hpe. in C. M. Syn. I, p. 582.
 1. Paludic. — Afr. : M. Abyssin.
longicaulis Jaeg. — Leptodontium.
longifolius (Griff.) Jaeg. Ad. I, p. 214.
 Barbula longifolia Griff. Not. p. 410 et Ic. pl. asiat. II, t. 79, f. II.
 Tortula longifolia Mitt. M. Ind. or. p. 28.
 — As. : Khasia.
longifolius { Griff. — D. cylindricus.
 H. f. et W. (in sched.). — Ditrichum Hookeri.
 H. f. et W. (Fl. N. Zeal.). — Lophiodon strictus.
 var. *penicillatus* eor. — Lophiodon strictus.
 var. *tenuiflorus* eor. — Ditrichum hyalinum.
longirostris W. et M. — Dicranodontium.
luridus Hsch. in Spreng. Syst. Veget. IV, p. 173 ; Bryol. eur. II (mon. p. 4), t. 186 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 161.
 Barbula deusta Brid. Bryol. univ. I, p. 553.
 B. lurida Lindb. M. Scand. p. 22.
 B. trifaria Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. I, Suppl. p. 36.
 Bryum trifarium Gmel. Syst. nat. II, p. 1331.
 Cynodon luridus Brid. Br. univ. I, p. 818.
 Cynodontium trifarium ej. Sp. M. I, p. 157.
 Cynodontium trifarium Hedw. Sp. M. I, p. 57.
 D. trifarius Sw. M. Suec. p. 28 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 508 ; Drumm.
 M. bor. am. I ed. n. 120.
 Swartzia trifaria Hedw. M. frond. II, p. 76, t. 28.
 Trichostomum linoides Engl. Bot. t. 2295.
 Tr. luridum Spr. in Ann. and Mag. nat. hist. II, III ser., 1849.

Tr. trifarium Sm. *Fl. brit. III*, p. 1235 (*fid. C. M. ; non ! fid. Lindb. Trich. Eur. p. 16*) ; *C. M. Syn. I*, p. 574.

2. In terr. argill. arenac. et ad rup. aren. — *Eur. : Passim. As. : Caucas., Persia. Afr. : Alger. Am. sept. : Niagara, M. Rupestr., lac. Erie, Minnesota.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 64.

Rab. Bryoth. eur. n. 661 et b.

« *var. cuspidatus* W. P. Sch. *l. c.*

Muric. — Eur. : Hassia. Am. sept. : Passim.

« *var. intermedius* Ruthe in Warnst. *Moosfl. Prov. Brandenb. p. 40 (1).*

Muric. — Eur. : Brandeb.

luteolus Jaeg. — *Leptodontium.*

luteus Tayl. — *Leptodontium.*

Macromitrium W. P. Sch. — *Trichostomum* *Bescherellei.*

medius Duby. — *Campylopodium euphorocladum.*

megalocarpus Arn. — *Mielichloferia Jamesoni.*

mexicanus Besch. *Prodr. bryol. mexic. p. 28.*

1. — *Am. sept. : Mexic.*

Mildei W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 166 (2).*

Ster. Rupic. — Eur. : Silesia.

mollis W. P. Sch. *op. cit. p. 167.*

Ster. Terr. — Eur. : Alp. Sabaud. (M. Blanc).

Neesii Mitt. *M. Ind. or. p. 23.*

Trichostomum Neesii *Bryol. jav. II, p. 225.*

2. — *As. : M. Java.*

nepalensis Brid. — *Campylopus ?*

nervosus H. et T. — *Barbula atro-virens.*

oblongifolius Hook. — *Barbula obtusifolia.*

obscurus Kaulf. — *Dicranoweisia Bruntoni.*

oeneus W. P. Sch. in Besch. *Prodr. bryol. mexic. p. 28.*

Tortula oenea Mitt. *M. austr. am. p. 162.*

Trichostomum oeneum *C. M. Syn. II, p. 628.*

Syn. — Am. sept. : Mexic., Guatemala.

ovatus Jaeg. — *Barbula.*

pallidus P. B. — *Ditrichum.*

papillatus Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot. 1844, p. 544 ; Fl. of the N. Zeal. II, p. 73, t. 85, f. 2 et Handb. p. 421 ; C. M. Syn. I, p. 686.*

— *Afr. : Austral. (ex Handb.). Pac. : Austral., Nov.*

Zeland.

? *papillatus* Preiss. — *Zygodon Preissianus.*

papillosus { *Brid. — Ceratodon purpurens.*
 { *Jaeg. — Leptodontium.*

perichaetialis Griff. — *Holomitrium Griffithianum.*

? *pichinchensis* Tayl. — *Zygodon.*

pilifer β *spathulatus* Wahlenb. — *Desmatodon latifolius var. glacialis.*

(1) Cf. W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 161 et Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 551.*

(2) Sec. Limpr. *Barbula unguiculata* ♂

plicatus Mont. — *Ditrichum*.

polycephalus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 108 et *Syll.* p. 50; C. M. *Syn.* I, p. 462.

2. *Arenic.* — *Am. merid.* : *Chil. austr.*

pomiformis Griff. — *Microdus*.

purpureus H. et T. — *Ceratodon*.

pusillus Hedw. — *Ditrichum tortile* var. *pusillum*.

radicosus Mitt. — *Leptodontium*.

recurvifolius Tayl. in *Wils. Bryol. brit.* p. 110, t. 41; W. P. Sch. *op. cit.* p. 165.

Ster. Ad terr. et rup. humid. — *Eur.* : *Hibern.*, *Scot.*, ins. *Shetland*, *Vales.* ? lac. *Major* (1).

rigidulus Hedw. — *Barbula*.

β *trifarius* Hartm. — *Trichostomum crispulum* var. *angustifolium*.

rotundatus (Lindb. et Arn.) Par.

Barbula rotundata Lindb. et Arn. *M. as. bor.* 1890, II, p. 172.

Syn. Terr. — *As.* : *Jenissei* inf.

rubellus (Roth) *Bryol. eur.* II (mon. p. 3), t. 185; W. P. Sch. *op. cit.* p. 161.

Anacalypta recurvirostris *Bryol. germ.* II, II, p. 151, t. 37.

A. rubella Hüb. *Muscol. germ.* p. 119.

Barbula fallax δ *Turneri* *Brid. Bryol. univ.* I, p. 559.

B. rubella Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1869, p. 162.

B. Turneri *Brid. Mant. M.* p. 93.

Bryum palustre ej. *M. Rec.* II, III, p. 35.

Br. recurvirostrum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt. n.* 7.

Br. rubellus Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 33.

Br. setaceum β *Huds. Fl. Angl.* p. 482.

Br. stellare, lacustre, foliis rubris capillaceis *Dill. Hist. M.* p. 382, t. 48, f. 45.

Grimmia curvirostra W. et M. *Bot. Taschb.* p. 135.

Gr. recurvirostra Sm. *Fl. brit.* III, p. 190.

Gr. rubella Roth. *Tent. fl. Germ.* III, I, p. 147.

Tortula lacustris P. B. *Prodr.* p. 92.

T. unguiculata Turn. *Muscol. Hib.* p. 47.

Trichostomum recurvirostre Lindb. *de Tortul. et cet. Trich.* p. 226.

Tr. rubellum Rab. *Deutsch. Krypt.* II, p. 115; C. M. *Syn.* I, p. 581.

Weisia curvirostra *Brid. Bryol. univ.* I, p. 347 (incl. var. β *revoluta* et γ *lacustris*); *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 71.

W. recurvirostra Hedw. *M. frond.* I, p. 19, t. 7 (fid. W. P. Sch.; non ! fid. Lindb. *Trichost. Eur.* p. 16).

W. revoluta Schleich. *Cat.* 1821.

W. rubella Roehl. *Moosgesch. Deutsch.* p. 142.

l vel syn. — Ad mur., rup. saxa et terr. — *Eur.* : *Vulgatiss.*; *Spitzberg.* *As.* : *Jenissei*, *Kamschatka*, *Amour*, penins. *Tschutschica*, *Tibet occ.*, *Persia*, *Caucas.*, *Taurus.* *Afr.* : *Alger.*, *Abyssin.* *Am. sept.* : *Groenland*, *Canada tot.*, *Columb. brit.*, ins. *Vancouver*, zon. *temperat. tota.*

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 63.

Rab. Bryoth. eur. n. 375 et b, 860, 1033.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 157.

“ var. *brevifolius* (Lindb. et Arn.) Par.

(1) Fid. Jaeg. *Ad.* I, p. 212, sed erratim, ex confus. cum *D. Daldiniano* !

Barbula rubella var. *brevifolia* Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 71.

— *As.* : *Jenissei* inf.

« var. *dentatus* (Jur.) W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 131 et II ed. l. c.

Barbula alpigena Lindb. et Arn. *op. cit.* p. 72.

D. alpigenus Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 98.

D. dentatus ej. *in sched.*

Trichostomum alpigenum Vent. *in sched.*

Ad rad. arb. et in lapid. — *Eur.* : Tirol., Salzburg. *As.* : *Penins.* Tschutschica.

var. *cavernarum* Mdo. — *D. ruber*.

ruber Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 99 (1).

Barbula rubra Lindb.

D. rubellus var. *cavernarum* Mdo. *in Fl.* 1864, p. 564.

2. *Rupic.* — *Eur.* : *Stir.*, *Carinth.*, *Tirol.*, *Alp. Vales.* *As.* : *Caucas.*

rufus Ltz. *Moost.* p. 88; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 168.

Barbula rufa Jur. *op. cit.* p. 113.

2. ♂ et fr. ign. In fiss. rup. — *Eur.* : *Alp. Sabaud.*; *Carinth.*, *Alp. Salzburg. Am. sept.* : *Groenland.*

Exs. : *Rab. Bryoth. europ.* n. 621.

sinuosus (Wils.) W. P. Sch. *op. cit.* p. 166.

Barbula cylindrica var. *sinuosa* Husnot *Muscol. gall.* p. 166.

B. sinuosa Jaeg. *Ad. I*, p. 286.

Dicranella sinuosa Wils. *mss.*

Trichostomum sinuosum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 240.

Ster. Muric. et terr. — *Eur.* : *Anglia*, *Gall. aept. or.* *As.* : *Caucas.*

smaragdinus Brid. — *Campylopus*

spadiceus Limpr. — *Barbula rigidula*.

spathulatus de Not. — *Desmatodon latifolius* var. *glacialis*.

sphagnifolius Arn. — *Leucobryum cuspidatum* (an : *glaucum*?)

splachnifolius Hook. — *Splachnobryum obtusum*.

squarrosus { Brid. — *Leptodontium epunctatum*.

{ Hook. — *Leptodontium*.

stellatus Jaeg. — *Leptodontium*.

stenocarpus Mitt. — *Ceratodon*.

stiriacus Jur. *mss.* ; Husn. *Muscol. gall.* p. 81.

— *Eur.* : *Alp. Stir.*

? *subalpinus* Jaeg. — *Trichostomum*.

subcirrifolius Jaeg. — *Leptodontium*.

subdenticulatus Jaeg. — *Leptodontium*.

subulatus { Br. — *Ditrichum*.

{ Schk. — *Distichium capillaceum* var. *brevifolium*.

subulirostris W. P. Sch. *in W. Sch. M. Abyss. n.* 1339.

— *Afr.* : *Abyssin.*

sulfureus Jaeg. — *Leptodontium*.

var. *panamense* Jaeg. — *Leptodontium sulfureum* var. *panamense*.

? *syntrichioides* C. M. *in Jaeg. Ad. I*, p. 209.

Trichostomum syntrichoides C. M. *in Linn.* 1874, p. 602.

Ster. Paludic. — *Am. merid.* : *And. Nov. Granat.*

(1) Cf. Philibert in *Rev. bryol.* 1885, p. 89.

tasmanicus Mitt. — *Dichodontium*.

? *tenellus* Hedw. *f. in hb. DC. et in Brid. Bryol. univ. I, p. 821; C. M. Syn. I, p. 463.*

Absque patria.

tenuifolius Jaeg. — *Leptodontium*.

tenuirostris Wils. — *D. cylindricum*.

Theobaldi Pfeff. in *Jahrb. d. Naturf. Ges. Graubünd. 1868, p. 83 et in Bryogeog. Stud. a. d. Rhaet. Alp. 1869, p. 31.*

Desmatodon latifolius var. glacialis (fid. *Limpr. Deutschl. Laubm. p. 649*).

— *Eur.* : Helvet. (Rheinwald Gletscher).

Therioti Corbière in *Rev. bryol. 1874, p. 88.*

Fl. et fr. ign. Ad lapid. in rivul. — *Eur.* : Pyren.

tophaceus Jaeg. — *Trichostomum*.

tortilis Arn. — *Ditrichum*.

Tortula Harv. — *Ptychomitrium*.

tricolor Bals. et de Not. — *Trichostomum flavo-virens*.

trifarius } H. et T. — *Trichostomum tophaceum*.
 } Sw. — *D. luridus*.

ulocalyx Jaeg. — *Leptodontium*.

uncinatus Lindb. — *Dicranodontium circinnatum*.

vaginatus Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind. p. 134, t. 42; Bryol. jav. I, t. 98.*

— *As.* : Sumatra.

vaginatus Hook. — *Dichodontium*.

validus *Limpr. Deutschl. Laubm. p. 557.*

2. ♂ et fr. ign. Ad rup. calcar. — *Eur.* : Tirol., Carinth.

Wallisii C. M. *mss.*; *Jaeg. Ad. I, p. 210.*

— *Am. merid.* : Nov. Granat.

Woodii W. P. Sch. — *Dichodontium pellucidum*.

Zetterstedti W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 167.*

Barbula rigidula (fid. *Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 556*).

Ster. Rupic? — *Eur.* : Suecia.

DIMERODONTIUM Mitt. *M. austr. am. p. 540 (8 spec.).*

acuminatum C. M. in *Linn. 1878-79, p. 398.*

1. Arb. in inund.? — *Am. merid.* : Uruguay.

africanum C. M. in *Rev. bryol. 1878, p. 72 (nom.).*

— *Afr.* : Austral.

aurescens C. M. in *Linn. 1878-79, p. 398.*

1. — *Am. merid.* : Uruguay.

Balansae C. M. in *Besch. Not. M. Paraguay, p. 227.*

1. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. M. Parag. n. 1207.

chlorophyllosum C. M. in *Linn. 1878-79, p. 397.*

1. — *Am. merid.* : Uruguay.

mendozense Mitt. *op. cit. p. 541.*

Arbor. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob., Monte Video, And. Chilens.

pellucidum (*Hook.*) *Mitt. op. cit.* p. 540.

Hypnum Sclerodontium *C. M. Syn.* II, p. 476.

Leskea pellucida *Hook. mss.*

Sclerodontium pellucidum *Schwaegr. Suppl.* III, II, II, t. 292.

1. — *Am. merid.* : And. Chilens.

Schnyderi *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 471.

1. Arbor. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

DIOBELON *Hpe. Fl. Hercyn.*

? *alpestre* *Hpe.* — *Cynodontium gracilescens* var. *alpestre*.

Bruntoni *Hpe.* — *Dicranoweisia*.

gracilescens *Hpe.* — *Cynodontium*.

pellucidum *Hpe.* — *Dichodontium*.

polycarpum *Hpe.* — *Cynodontium*.

squarrosum *Hpe.* — *Dicranella*.

strumiferum *Hpe.* — *Cynodontium polycarpum* var. *strumiferum*.

virens *Hpe.* — *Cynodontium*.

DIPHYSCIUM *Mohr. Obs. bot.* p. 34; *Web. et Mohr Bot. Taschb.* 1807, p. 377, t. II, f. I (11 spec.).

auriculatum *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 220.

Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Caledon.

fasciculatum *Mitt. M. Ind. or.* p. 150.

— *As.* : Ceylan.

Fendleri *C. M. in Finn.* 1878-79, p. 468.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

foliosum (*L.*) *Mohr l. c.*; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 326; *Bryol. eur.* IV, t. 428 et VI, t. 641; *C. M. Syn.* I, p. 812; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 547.

Bryum Hallerianum *Neck. Meth. M.* p. 233.

Br. phascoides *Jacq. Coll.* II, p. 220.

Buxbaumia foliosa *L. Syst. veg.* XIV ed. p. 925.

B. sessilis *Schmid. Diss. de Buxbaum. c. ic.*

D. foliosum β *dominghense* *Brid. Bryol. univ.* II, p. 740 (*fid. C. M.*).

D. sessile *Lindb. in Oefv....* 1863, p. 3953, n. 18.

Hymenopogon heterophyllum *P. B. Prodr.* p. 80.

Phascum Halleri *O. F. Müll. Act. Holm.* 1764, c. ic.

Ph. Hallerianum *Poll. Fl. Pal.* III, n. 974.

Ph. maximum *Lightf. Fl. Scot.* II, p. 693.

Ph. montanum *Huds. Fl. Angl.* II, p. 466.

Ph. subulatum *Æd. Fl. Dan.* II, fasc. V, p. 2, n. 249 p.p.

Ph. subulatum β *Huds. Fl. Angl.* I ed. p. 397.

Sphagnum acaulon, maximum, foliis in centro ciliaribus *Hall. in Dill. Hist. M.* p. 253, t. 32, f. 13.

Webera Diphyscium *Ehrh. Hann. Mag.* 1779, p. 257 et *Beitr.* I, p. 177.

W. sessilis *Lindb. in Oefv....* XX, p. 393.

2. Ad rup. et terr. muscos. — *Eur.* : E reg. mont. usq. in alp. *As.* :

Caucas. occ. Am. sept. : Nov. Scotia. Ontario.

Exs. : *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 74.

Mac. Canad. M. n. 226.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. p. 332.

« var. *acutifolium* *Lindb.*

Didymodon Camusi *Husn. Muscol. gall.* p. 80.

Ut typ. — *Eur.* : Scandin., Gall. sept.

Exs. : *Husn. M. Gall.* n. 275,

var. *dominghense* Brid. — *D. foliosum*.

fulvifolium Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 193.

— *As.* : Japon.

involutum Mitt. *M. Ind. or.* p. 149.

— *As.* : Khasia, Ceylan.

longifolium Griff. *Not.* p. 390 et *lc. pl. asiat.* III, t. 96 ; *C. M. Syn.* I, p. 812.

Rupic. — *As.* : Khasia, Ceylan.

mucronifolium Mitt. in *Bryol. jav.* I, p. 35, t. 26.

1. Ad rup. humid. — *As.* : Ins. Labouan, Borneo.

peruvianum Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 622.

2. — *Am. merid.* : And. Peruv.

rupestre Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 340 ; *Bryol. jav.* I, p. 34, t. 25.

1. Ad rup. humid. — *As.* : Ins. Labouan, Borneo, M. Java.

sessile Lindb. — *D. foliosum*.

submarginatum Mitt. *Fl. Vit.*, p. 403.

Ster. — *Pac.* : Ins. Viti.

DIPLOCOMIUM Brid. *Mant. M.* p. 122, t. 2, f. 14 et *Bryol. univ.* II, p. 65.

hexastichum Fk. — *Meesea Albertini*.

longisetum { *Brid. p.p.* — *Meesea Albertini*.
 Brid. p.p. — *Meesea tristicha*.
 Mong. et Nestl. — *Meesea tristicha*.

tristichum Sk. — *Meesea tristicha*.

DIPLOSTICHUM Mont. *Fl. Chil.* VII, p. 67 et *Syll.* p. 27.

longirostre Mont. — *Eustichia*.

DISCELIUM Brid. *Bryol. univ.* I, p. 365 (1 spec.).

nudum (Dicks.) Brid. *op. cit.* p. 366 ; *Bryol. eur.* III, t. 297 ; *C. M. Syn.* I, p. 812 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 372.

Bryum nudum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 7, t. 10, f. 15.

Coscinodon nudus Brid. *Mant. M.* p. 48.

Grimmia nuda Sm. *Fl. Brit.* III, p. 1197.

Weisia incarnata Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 66, t. 18.

W. nuda H. et T. *Muscol. brit.* p. 43, t. 14.

W. rosea Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 325.

2. Ad terr. argill. humid. — *Eur.* : Scandin., Scot., Angl., Gall. septr., Silesia. *As.* : Saghalien, Jenissei med. *Am. sept.* : Perrar. : Illinois. *Ews.* : Rab. *Bryoth. eur.* n. 659, 1031, 1268.

DISCOPHYLLUM Mitt. *Sam. M.* p. 191 (*gen. propr.*) et *M. austr. am.* p. 396 (sect. *DISTICHOPHYLLI*).

flavescens Mitt. — *Distichophyllum*.

DISSODON Grev. et Arn. in *Ann. Soc. Linn.* 1826, p. 229 (23 spec.).

andinus W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1642.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

bolivianus W. P. Sch. *l. c.* n. 1643.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

borbonicus (*Bory*) *Par.*

Bryum orthodontum *P. B. Prodr.* p. 48.

D. serratus *C. M. Syn. I*, p. 141 p.p.

Orthodon borbonicus *Bory mss.*; *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 83.

O. serratus *Bory in Schwaegr. Suppl. II*, p. 23, t. 106; *Brid. Sp. M. I*, p. 86.

Tayloria Boryana *Mitt. M. Ind. or.* p. 57.

2. Terr. — *Afr.*: Ins. Borbon., Madagascar septr., M. Cameroon.

calophyllus *C. M. in Bot. Zeit.* 1851, p. 546.

Eremodon robustus *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 93, t. 87, f. 2 et *Handb.* p. 452.

Arbor. et terr. — *Pac.*: Nov. Zeland. sept., Tasman.

Cameruniae *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 256 a.

— *Afr.*: M. Cameroon.

cuspidatus *C. M.* — *D. octoblepharum*.

Froehlichianus (*Hedw.*) *Grev. et Arn. Tent. meth. M.* p. 122; *Bryol. eur. III* (mon. p. 3) t. 282; *C. M. Syn. I*, p. 138; *W. P. Sch. Syn. II* ed. p. 357.

Bryum reticulatum *Dicks. Fasc. II Pl. crypt.* p. 4, t. 4, f. 6.

Splachnum Froehlichianum *Hedw. M. Frond. III*, p. 99, t. 40; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 244.

Spl. punctatum *Brid. Sp. M. I*, p. 149.

Spl. reticulatum *Sw. Disp. M. Suec.* p. 24.

Hermaphr. vel. polyg. Ad terr. humos. et in fiss. rup. — *Eur.*: Reg. alp. usq. ad nives aeternas; deest in Britann. As.: Caucas. centr. Am. sept.: Groenland, M. Rupestr.

Exs.: *Drumm. M. bor. am. I* ed. n. 44, 45 (*Splachnum*).

Mac. Canad. M. n. 138.

Rab. Bryoth. eur. n. 158.

Hornschuchii *Grev. et Arn. l. c.*; *Bryol. eur. III* (mon. p. 7), t. 281; *C. M. Syn. I*, p. 137; *W. P. Sch. Syn. II* ed. p. 356.

Systylium splachnoides *Hsch. Comment. de Voitia et Systyl.* p. 19, t. 2 et *Bot. Zeit.* 1820, p. 176 c. ic.; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 264; *Drumm. M. bor. am. I* ed. n. 46.

1. Ut praeced. — *Eur.*: Summ. Alp. Carinth., Salisb., Stir., Tirol. Am. sept.: M. Rupestr., Oregon, Colorado.

imbricatus (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 472.

Tayloria imbricata *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 305.

1. — As.: Ceylan.

indicus (*Mitt.*) *C. M. in Fl.* 1874, p.

Octoblepharum serratum *Hook. M. ex. II*, p. 5, t. 136 (excl. syn.).

Tayloria indica *Mitt. M. Ind. or.* p. 57.

— As.: Nepal., Himalaya. *Afr.*: Madagascar.

Isleanus (*Besch.*) *Par.*

Orthodon Isleanus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 85.

O. serratus *Brid. Bryol. univ. I*, p. 232 p.p.

Splachnum squarrosum *Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX*, p. 308, t. 26, f. 2?

2. — As.: Nepal. *Afr.*: Ins. Borbon.

Jacquemontii *Bryol. eur. III* (mon. p. 6, nom.); *C. M. Syn. I*, p. 139.

Tayloria Jacquemontii *Mitt. op. et l. cc.*

1. — As.: Himalaya occ.

madagassus *C. M. in Jaeg. Ad. II, p. 767.*

— *Afr.* : Madagascar.

magellanicus *Hpe in C. M. Syn. II, p. 551.*

Eremodon magellanicus *Brid. Bryol. univ. I, p. 236; C. M. Syn. I, p. 148.*

Splachnum magellanicum *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 47, t. 14.*

Tayloria magellanica *Mitt. M. austr. am. p. 251.*

Ad rup. humid. — Pac. : Terr. Magellan.

marginatus *C. M. in Fl. 1874, n. 18.*

D. serratus *ej. Syn. I, p. 141 p.p.*

2. — *As.* : Nepal., Sikkim.

octoblepharum (*Hook.*) *Par.*

D. cuspidatus *C. M. Syn. I, p. 142 et II, p. 550.*

Splachnum octoblepharum *Hook. M. ex. t. 167.*

2. *Lignic. — Pac.* : Austral. or., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

plagiopus (*Mont.*) *C. M. Syn. II, p. 551.*

Eremodon octoblepharis *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 94 et Hand. p. 452.*

Splachnum octoblepharum β *H. f. et W. in sched. M. antarct.*

Spl. plagiopus *Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 121 et Syll. p. 51; C. M. Syn. I, p. 143.*

1 (*Mont.*). 2 (*C. M.*). — *Pac.* : Austral. or., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

* *var. major* (*H. f. et W.*) *Jaeg. Ad. I, p. 472.*

Eremodon octoblepharis var. major *H. f. et W. Fl. Antarct 123, t. 57, f. 4 et Fl. of the N. Zeal. et Handb. ll. cc.*

Arb. et rupic. — Pac. : Tasman., ins. Auckland, Campbell.

* *var. minor* *C. M. et Hpe. in Linn. 1853, p. 491 (nom.).*

— *Pac.* : Austral.

* *var. piriformis* (*H. f. et W.*) *Jaeg. l. c.*

Eremodon octoblepharis var. piriformis *H. f. et W. ll. cc.*

Ut praeced.

plagiopus *Ångstr. — Hymenocleiston magellanicum?*

purpurascens (*Hook. f. et Wils.*) *C. M. Syn. II, p. 550.*

Eremodon purpurascens *Hook. f. Handb. of N. Zeal. Fl. p. 452.*

Splachnum purpurascens *H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 529 et Fl. Antarct. I, p. 123, t. 57; C. M. Syn. I, p. 142.*

2. — *Pac.* : Ins. Auckland, Campbell.

rotundifolius { *C. M.* — *Splachnobryum obtusum.*
 { *Sull.* — *Splachnobryum Wrightii.*

scabrisetus (*Hook.*) *Grev. et Arn. l. c.; C. M. Syn. I, p. 140.*

Splachnum scabrisetum *Hook. M. ex. I, p. 6, t. 32; Brid. Bryol. univ. I, p. 245.*

Tayloria scabriseta *Mitt. M. austr. am. p. 250.*

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

Schmidii *C. M. in Fl. 1874, n. 18.*

D. serratus *ej. in sched.*

2. — *As.* : M. Neilgherr.

serratus C. M. p.p. — { *D. borbonicus*.
 D. marginatus.
 D. Schmidii.

splachnoides (Thunb.) Grev. et Arn. op. cit. t. 13, n. 39-44; *Bryol. eur. III* (mon. p. 10), t. 283; C. M. Syn. I, p. 139; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 358.

Cyrtodon splachnoides R. Br. in Parry's first Voy. Ver. bot. Schrift I, p. 442.

Eremodon splachnoides Brid. *Bryol. univ.* I, p. 234.

Grimmia splachnoides Engl. Bot. t. 2164.

Splachnum lingulatum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 4, t. 10, f. 6.

Tayloria lingulata Lindb. M. Scand. p. 19.

Weisia splachnoides Thunb. in Schwaegr. Suppl. I, I, p. 63, t. 17.

W. turbinata Drumm. M. bor. am. I ed. n. 64.

Hermaphr. vel polyg. In gramin. uligin. — Eur.: Reg. alp. zon. intermed. et sept.; in alp. Norvegiae vulgatiss. As.: Jeniss. med. Am. sept.: Groenland, sin. Hudson, Gaspesia, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 815.

Un. itin. 1863, n. 18, 47.

subglaber (Griff.) C. M. in Fl. 1874, n. 18.

Orthodon subglaber Griff. Not. p. 399 et Ic. pl. Asiat. II, t. 76, f. 2.

Tayloria subglabra Mitt. M. Ind. or. p. 57.

2. Arbor. et rupic. — As.: Khasia, Ceylan, alp. Yunnan.

tenellus C. M. l. c.

Tayloria tenella Mitt. l. c.

1? — As.: Himalaya occ.

thomeanus (Broth.) Par.

Orthodon thomeanus Broth. in Bol. da Soc. Broter. VIII, 1890, p.

2. Arbor. — Afr.: Ins. S. Thom. (1).

DISTICHIA C. M. in Fl. 1890, p. 489.

afro-Victoriae C. M. — Neckera.

platyantha C. M. — Neckera.

DISTICHIUM Bryol. eur. I (8 spec.).

austro-Georgicum C. M. Bryol. austr. Georg. p. 12.

Ster. — Am. merid.: Austr. Georgia.

austro-inclinatum C. M. in Linn. 1880-83, p. 396.

1. — Am. merid.: Alp. Argentin. temperat.

capillaceum (L.) Bryol. eur. II (mon. p. 4), t. 193; C. M. Syn. I, p. 40; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 146.

Bryum capillaceum Gmel. Syst. nat. II, p. 1332.

Br. montanum (Ed. Fl. Dan. t. 1000, f. 1.

Cynodontium capillaceum Schwaegr. Suppl. I, I, p. 114.

Cynodontium capillaceum Hedw. Sp. M. p. 57.

Didymodon capillaceus W. et M. Bot. Taschb. p. 155; Brid. Bryol. univ. I, p. 504.

D. cirrifolius Harv. in Lond. Journ. of Bot. 1840, II, p. 5 et in Hook. Ic. pl. rar. t. 18; C. M. Syn. I, p. 462.

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum:

D. Novae Valesiae C. M.

Leptotrichum capillaceum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 67.

Mnium capillaceum L. *Fl. Lapp.*

Swartzia capillacea Hedw. *M. frond. II*, p. 72, t. 26.

Sw. montana Lindb. *M. Scand.* p. 26.

Trichostomum capillaceum Sm. *Fl. brit. III*, p. 1236.

1. In rup. fiss. — *Eur.* : Spitzberg, vall. Rhen., omn. Alp. — *As.* : Penins. Samoied. et Tschutschica, Jenissei, Amour, Kamschatka, Alp. Yunnan, Nepal., Sikkim, Tibet., Caucas. *Afr.* : Alger., Abyssin., M. Cameroon. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, sin. Huds., Gaspesia, New Brunswick, Terra nov., Anticosti, lac. Super., Niagara, Manitoba, Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, fret. Kotzebue, Washington, Idaho, Nov. Anglia, reg. sept. et orient. *Pac.* : Tasman.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 122, 123 (*Didymodon*).

Mac. *Canad. M.* n. 57.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 37 et b, 377, 531, 1109.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 161.

W. Sch. *M. Abyss. II Coll.* n. 454, 473.

* *var. brevifolium* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Didymodon distichus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 507.

D. subulatus Schk. *Deutsch. M.* p. 63, t. 28.

Ut typ. — *Eur.* : Spitzberg, summ. Alp. *Am. sept.* : Groenland.

capillaceum H. f. et W. — *Lophiodon strictus*.

inclinatum (Hedw.) *Bryol. eur. II* (mon. p. 5), t. 194 ; *C. M. l. c. p.* 41 ;

W. P. Sch. l. c. p. 147.

Afzelia inclinata Ehrh. *Crypt.* 193.

Bryum inclinatum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 9.

Cynodon inclinatus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 501.

Cynodontium inclinatum Hedw. *Sp. M. I*, p. 155.

Cynodontium inclinatum ej. *l. c. p.* 58.

Didymodon inclinatus Sw. *Disp. M. Suec.* p. 28.

Grimmia inclinata Sm. *Fl. brit. III*, p. 1193.

Leptotrichum inclinatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 10.

Swartzia inclinata Hedw. *M. Frond. II*, p. 74, t. 27.

Trichostomum (?) *scitulum* Aust. in *Coult. Bot. Gaz. I*, p. 29 ?

1. In rup. fiss. irror. et terr. uligin. — *Eur.* : Spitzberg, omm. Alp. *As.* : Penins. Tschutschica, Taymir, Jenissei, Tibet, Sikkim, Caucas. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov., Gaspes., lac. Super., M. Rupestr., Montana, Wyoming, Colorado, Nevada, Nov. Anglia.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 124 (*Didymodon*).

Mac. *Canad. M.* n. 58.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 741.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 162.

* *var. tenue* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ut typ. — *Eur.* : Reg. alp.

kilima n'djaricum C. M. in *Fl.* 1890, p. 471.

Ster.

— *Afr.* : Kilima N'Djaro.

Lorentzi C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 395.

1.

— *Am. merid.* : Alp. Argentin. Catamarca.

Macounii C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 40.

Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 490.

setifolium *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 396.

Cynontodium capillaceum Mitt. *M. austr. am.* p. 41 (*fid. C. M.*).
1. — *Am. merid.* : And. Quitens.

DISTICHOPHYLLUM Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 99
(39 spec.).

acuminatum *Bryol. jav. II*, p. 26, t. 150.

Mniadelphus acuminatus Jaeg. *Ad. II*, p. 228.

Syn. — *As.* : *M. Java.*

andicola Sp. — *Mniadelphus.*

aristatum Geh. et Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 54.

Syn. — *Am. merid.* : *Brasil.*

auratum Mitt. — *Mniadelphus.*

Beccarii (*C. M.*) Par.

Mniadelphus Beccarii *C. M. in Rev. bryol.* 1881, p. 26.

— *Pac.* : *Tasman.*

capillatum Mitt. in *Proc. of the Linn. Soc. of N. S. Wales*, 1882, I, p. 100

— *Pac.* : *Nov. Hebrid. (Aneitum).*

ceylanicum (*Mitt.*) Par.

Mniadelphus ceylanicus Mitt. *M. Ind. or.* p. 145.

Ster. — *As.* : *Ceylan.*

cristatum Dz. et Mk. — *Eriopus remotifolius.*

cubense Mitt. — *Mniadelphus.*

cuspidatum Dz. et Mk. *op. cit.* p. 101, t. 33 ; *Bryol. jav. II*, p. 19.

Hookeria cuspidata eor. in *Ann. sc. nat. III ser.*, 1844, II, p. 305.

Mniadelphus cuspidatus *C. M. Syn. II*, p. 26.

2. *Cortic.* — *As.* : *Java, Sumatra. Pac.* : *Ins. Societat.*

Dicksoni (*Hook.*) Mitt. *M. austr. am.* p. 396.

Hookeria Dicksoni Hook. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 549.

Mniadelphus Dicksoni *C. M. Syn. II*, p. 25.

2. — *Am. merid.* : *Fuegia, ins. Eremitae, Maclov.*

elongatum Mitt. — *Mniadelphus.*

Eremitae (*C. M.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 227.

D. procumbens Mitt. *op. et l. cc.*

Mniadelphus Eremitae *C. M. in Fl.* 1885, p. 423.

1. — *Am. merid.* : *Fuegia, ins. Eremitae.*

fasciculatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 71.

1. — *Afr.* : *Ins. Marion.*

flaccidum Mitt. — *Mniadelphus.*

flavescens (*Mitt.*) Par.

Discophyllum flavescens Mitt. *Sam. M.* p. 191.

Mniadelphus flavescens *C. M. M. Polyn.* p. 79.

Ster. — *Pac.* : *Ins. Fidji.*

Freycineti (*Schwaegr.*) Mitt. *Fl. Vit.* p. 392.

Hookeria Freycineti Mont. in *Voy. Bonite, Bot. I*, p. 296 et *Syll.* p. 15.

Hypnum Freycineti *Schwaegr. Suppl. III, II*, t. 279 ; *C. M. Syn. I*, p. 168.

- Mniadelphus Freycineti* C. M. Syn. II, p. 26.
Mnium giganteum Schwaegr. in Freyc. Itin. per orbem, I, p. 227.
 Ster. — Pac. : Ins. Sandwic.
- Griffithii* (Mitt.) Par.
Hookeria pulchella Griff. Not. p. 476 ; Ic. pl. asiat. II, t. 99, f. 3.
Mniadelphus Griffithii Mitt. M. Ind. or. p. 145.
 1. — As. : Nepal., Khasia.
- gracile* Ångstr. Prim. lin. p. 29.
Mniadelphus gracilis Jaeg. Ad. II, p. 224.
 Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- heterophyllum* (Wils.) Par.
Mniadelphus heterophyllus Wils. in sched. ; Mitt. op. cit. p. 144.
 2? Ster. — As. : Sikkim.
- humifusum* (Wils.) Par.
Mniadelphus humifusus Wils. in sched. ; Mitt. op. et l. cc.
 2? Ster. — As. : Himalaya occ.
- imbricatum* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1877, p. 71.
 — Afr. : Ins. Marion.
- jungermannii* (C. M.) Bryol. jav. II, p. 22.
Mniadelphus jungermannii C. M. Syn. II, p. 600.
 2. — As. : Java.
- limbatulum* (C. M.) Par.
Mniadelphus limbatulus C. M. M. Polyn. p. 78.
 1. — Pac. : M. ins. Fidji.
- limpidum* Thw. et Mitt. — *Mniadelphus*.
- longicuspes* Broth. in Oef... 1893.
 1. — Pac. : Ins. Lord Howe.
- Mariei* Besch. in Rev. bryol. 1891, p. 77.
 1. — Am. sept. : Guadalup.
- mascarenicum* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 135.
 Syn. — Afr. : Ins. Mascaren.
- Mittenii* Bryol. jav. II, p. 25, t. 149.
Mniadelphus spathulatus Mitt. M. Ind. or. p. 144.
 1 et syn. Arbor. — As. : Ceylan, Java. Pac. : Nov. Caledon.
- molle* Besch. in Miss. sc. cap Horn, V, Bot. p. 296.
 Ster. — Am. merid. : Fuegia.
- ? *monofarium* Geh. et Hpe. in Fl. 1881.
 Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- Montagneanum* (C. M.) Bryol. jav. II, p. 23, t. 151.
Hookeria mniifolia Mont. Crypt. Neilgherr. n. 21 in Ann. sc. nat. 1842
 et Syll. p. 15.
Mniadelphus Montagneanus C. M. Syn. II, p. 22 ; Mitt. M. Ind. or. p. 145.
 1. Ad rad. frutic. — As. : M. Neilgherr.
- mucronatum* Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 311.
Mniadelphus mucronatus Jaeg. Ad. II, p. 228.
 Syn. — As. : Ceylan.

Nadeaudii Besch. in *Ann. sc. nat.* 1894, I, p. 43.

2 ? Cortic. — *Pac.* : Taïti.

nanum (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. II*, p. 21, t. 148.

Mniadelphus nanus Dz. et Mk. in *Zolling. Syst. Verz.* p. 26.

2. Arbor. — *As.* : Java, Sumbawa.

nigricans Besch. in *Miss. sc. Cap Horn*, V, Bot. p. 296.

Ster. — *Am. merid.* : Fuegia.

nigricaule Mitt. in *Bryol. jav. II*, p. 19, t. 147.

Mniadelphus nigricaulis Jaeg. l. c.

— *As.* : M. Java.

obovatum (Griff.) Par.

Hookeria obovata Griff. *Not.* p. 474 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 99, f. I.

Mniadelphus obovatus Mitt. *M. Ind. or.* p. 144.

2 ? — *As.* : Khasia.

Palmarum Mitt. — *Mniadelphus*.

paradoxum (Mont.) Mitt. *Fl. Vit.* p. 392.

Hookeria paradoxa Mont. in *Voy. Bonite, Bot.* p. 596 et *Syll.* p. 15.

Mniadelphus paradoxus C. M. *Syn. II*, p. 24.

2 ? Cortic. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

patagonicum Besch. *op. cit.* p. 295.

Ster. — *Am. merid.* : Patag. austr.

procumbens Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 163.

1. — *Afr.* : Ins. Fernando Po.

procumbens Mitt. (pl. amer.). — D. Eremitae.

pungens Mitt. — *Mniadelphus*.

pusillum Mitt. — *Mniadelphus*.

spathulatus Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 103, t. 34 et 35 A ;
Bryol. jav. II, p. 24.

Hookeria seminervis Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 93 et *Syll.* p. 16.

H. spathulata Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 305.

Mniadelphus spathulatus C. M. *Syn. II*, pp. 24 et 661.

2. Lignic. — *As.* : Java, Sumatra, Sumbawa.

taïtense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1894, I, p. 43.

Syn. Ad terr. humid. — *Pac.* : Taïti.

tortile *Bryol. jav. II*, p. 127, t. 152.

Mniadelphus tortilis Jaeg. *Ad. II*, p. 228.

2. Ad fol. emort. — *As.* : Ins. Banca, Java.

undulatum *Bryol. jav. II*, p. 28, t. 153.

Mniadelphus undulatus Jaeg. *Ad. II*, p. 226.

1. Arbor. — *As.* : Java.

vitianum (Sull.) Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 227.

Mniadelphus vitianus Sull. in *Proced. Am. Acad.* 1854 et in *Exp. Wilkes* 1854, p. 24, t. 24.

2 rar. 1. Cortic. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa, Nov. Caledon.

DITRICHUM Timm. *Fl. Megapol.* (1870) p. 177 (57 spec.).

affine (C. M.) Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Cynontodium affine Mitt. *M. austr. am.* p. 42.

Diaphanophyllum setosum Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 605.

Leptotrichum (1) affine *C. M.* in *Bot. Zeit.* 1847, p. 825 et *Syn. I*, p. 452.

Trichostomum setosum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 73, t. 84, f. 6.

1. Terr. — *Am. merid.* : Valdiv., ins. Juan Fernandez, Patagon.
Pac. : Austral., Nov. Zeland.

ambiguum Best in *Bull. Torr. bot. Club*, 1893, p.

2. Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Washington.

amoenum (Thw. et Mitt.) Par.

Cynodontium amoenum Jaeg. *Ad. II*, p. 634.

Cynodontium amoenum T. et M. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 296.

1. Terr. — *As.* : Ceylan.

apophysatum Hpe. in sched. ; Jaeg. *op. cit.* p. 662.

— *As.* : Sikkim.

arcticum (W. P. Sch.) Par.

Leptotrichum arcticum W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 142.

L. vaginans Un. *crypt. itin.* 1868, in sched.

2. Ad terr. arenos. humid. — *Eur.* : Alp. Norveg. septentr.

astomoides Limpr. *Laubm. Deutschl. I*, p. 511.

D. pallidum × *Pleuridium subulatum* Breidl. in litt.

1. In dumet. — *Eur.* : Stiria.

auriculatum (Mitt.) Par.

Atractylocarpus auriculatus Mitt. in sched.

— *As.* : Bhotan.

bolivianum (W. P. Sch.) Par.

Leptotrichum bolivianum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Bol. n.* 1621.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Boryanum (C. M.) Hpe. in *Fl. pp.* 181-182.

Diaphanophyllum Boryanum Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 605.

Leptotrichum Boryanum C. M. *Syn. I*, p. 452; *Bryol. jav. I*, p. 94, t. 76.

Trichostomum difficile Duby in *Monitzi Verz. d. Zolling. Pfl.* p. 134.

Tr. longifolium Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 136.

Tr. pallidum Brid. *hb.*; Dz. et Mk. *op. cit.* p. 135.

2. Ad terr. et lapid. in silv. — *As.* : Borneo, Java. *Afr.* : Ins. Borbon.,
Franciae, Madagascar.

“ *var. robustum* (Besch.) Par.

Leptotrichum Boryanum var. robustum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caledon.*
p. 205.

Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Caledon.

brachycarpum Hpe. in *Linn.* 1871-73, p. 514.

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

Breidleri Limpr. *Laubm. Deutschl. I*, p. 508.

Sporledera palustris × *Ditrichum pallidum* Breidl. *mss.*

1. Ad rivul. — *Eur.* : Stiria.

brevifolium (Kindb.) Par.

Leptotrichum brevifolium Kindb. in *Mac. Cat.* p. 46 (*subsp. D. flexicaulis*).

2. Rupic. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

(1) Nomen jam abusum. *Leptotrichum* Hpe. in *Linn.* 1847, p. 74; *Leptotrichum*
Corda *lc. Fung. V*, p. 51, t. II, f. 16 (1842), genus *Fungorum*.

capense (C. M.) Par.

Leptotrichum capense C. M. *Syn. I*, p. 453.

1. — *Afr.* : C. B. Sp., Transvaal, Natal.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 84, 464 et b (*Leptotrichum*).

« var. Vallis Gratiae (C. M.) Par.

Leptotrichum capense var. *Vallis Gratiae* C. M. in *Rehm. l. c.* n. 1885.

— *Afr.* : C. B. Sp.

capillifolium (W. P. Sch.) Par.

Leptotrichum capillifolium W. P. Sch. *hb.*; *Jaeg. Ad. I*, p. 236.

— *Am. sept.* : Mexic.

conicum (Mont.) Par.

Aschistodon conicus Mont. in *Ann. Sc. nat.* 1845, *IV*, p. 109 et *Syll.* p. 42.

Cynontodium conicum Mitt. *M. austr. am.* p. 44.

Leptotrichum Montagnei C. M. *Syn. I*, p. 448.

2. Ad arbor. ? — *Afr.* : Ins. Kerguelen ? (1). *Am. merid.* : Chile, ins. Chiloë.

costa-ricense (C. M.) Hpe. in *Fl.* 1867, p. 181-182.

Leptotrichum costa-ricense C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 161.

2. — *Am. sept.* : Costa Rica.

crinale (Tayl.) Par.

Cynontodium crinale Mitt. *M. austr. am.* p. 44.

Didymodon crinalis Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 280.

Leptotrichum crinale Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 53; C. M. *Syn. II*, p. 612.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

cylindricarpum (C. M.) Par.

Leptotrichum cylindricarpum C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 551.

2. Rupic. — *Pac.* : Tasman.

divaricatum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 155; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 336 (*descript. locuplet*).

— *As.* : Japon.

dolichopodon (Rehm.) Par.

Leptotrichum dolichopodon Rehm. *M. Afr. austr.* n. 86.

— *Afr.* : Orange.

ferrugineum (Mitt.) Par.

Leptotrichum ferrugineum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 61.

2. Terr. — *Pac.* : Tasman.

flexicaule (Schwaegr.) Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Cynodontium flexicaule Schwaegr. *Suppl. I*, p. 113, t. 29.

Diaphanophyllum flexicaule Lindb. in *Oefv.* 1863, p. 605.

Didymodon flexicaulis Brid. *Bryol. univ. I*, p. 506.

Leptotrichum flexicaule Hpe. in *Linn.* 1847, p. 74; C. M. *Syn. I*, p. 449; W. P. Sch. *Syn. I* ed. p. 144 et *II* ed. p. 142.

Trichostomum flexicaule *Bryol. eur. II* (mon. p. 15), t. 180.

2. Ad rup. et in terr. lapid. calcar. - - *Eur.* : E reg. montan usq. in subalp.; Spitzberg., ins. Ursor. *As.* : Jenissei, Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Groenland, Anticosti, Nov. Scotia, M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, Montana.

(1) Cf. *Blindia pulvinata*.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 125, 126 (*Leptotrichum*).
Mac. Canad. M. n. 66 (*Leptotrichum*).
Rab. Bryoth. eur. n. 423 et b, 961, 1307 (*Leptotrichum*).

» *var. densum* (W. P. Sch.) Par.

Leptotrichum flexicaule var. densum W. P. Sch. *Syn. I et II ed.* ll. cc.

Ut typ. — *Eur.* : Reg. sept. *Am. sept.* : *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*,
 Alaska.

flexifolium Hpe. — *Trichostomum laxifolium*.

glaciale (Hook. f. et Wils.) Par.

Didymodon ? glacialis H. f. et W. *Fl. antarct. II*, p. 408, t. 152, f. 6.

Leptotrichum glaciale C. M. *Syn. II*, p. 611.

Ster.

— *Am. merid.* : *Ins. Cockburn*.

glaucescens (Sw.) Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Bryum caesium Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 879.

Br. glaucescens Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 10.

Diaphanophyllum glaucescens Lindb. in *Oefv....* 1863, p. 695.

Didymodon glaucescens W. et M. *Bot. Taschb.* p. 158; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 513.

Leptotrichum glaucescens Hpe. in *Linn.* 1847, p. 74; W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 146 et *II ed.* p. 145.

Saelania coesia Lindb. *Utk. nat. grupp. bladn.* p. 35.

Trichostomum glaucescens Sw. in *Hedw. M. frond. III*, p. 91, t. 37 B ;
Bryol. eur. II (mon. p. 18), t. 184; C. M. *Syn. I*, p. 569.

1. In gramin., ad mur. et in fiss. rup. — *Eur.* : Alp. et subalp., in
Norveg. montan. ; hic illic in Alp. Scot. ; Spitzberg. *As.* : *Jenissei*,
Caucas. occ. et centr. Am. sept. : *Groenland*, fret. *Hudson*, *Labrador*,
Gaspes., *Ontario*, *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, *mar. Behring*,
Vermont, lac. *Super.*, *Minnesota*.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 117 (*Didymodon*).

Mac. Canad. M. n. 168 (*Leptotrichum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 627 (*Leptotrichum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 156 (*Leptotrichum*).

« *var. brevipedunculatum* (C. M.) Par.

Didymodon aeruginosus Hook. in *Brid. Bryol. univ. I*, p. 516.

Leptotrichum glaucescens var. brevipedunculatum C. M. l. c. p. 570.

Ut et cum typ.

gracile (Mitt. Par).

Cynontodium gracile Mitt. *M. austr. am.* p. 43.

Leptotrichum gracile ej. in *Kew Journ. bot. III*, p. 353.

L. neurophyllum Spr. *Cat.*

2. *Saxic.* — *Am. merid.* : *And. Quitens*.

homomallum (Hedw.) Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Alzelia homomalla Ehrb. *Pl. crypt. exs. n.* 173.

Bryum unilaterale Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1335.

Br. Weisia Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 5.

Diaphanophyllum homomallum Lindb. in *Oefv....* 1863, p. 605.

Didymodon heteromallus H. et T. *Muscol. brit.* p. 68, t. 20 ; *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 119.

D. homomallus Hedw. *Sp. M.* p. 105, t. 23 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 510.

Grimmia heteromalla W. et M. *Bot. Taschb.* p. 137.

Gr. homomalla Sm. *Fl. brit. III*, p. 1194.

Gymnostomum homomallum *Brid. Bryol. univ. I*, p. 757.

Leptotrichum homomallum Hpe. in *Linn.* 1847, p. 74 ; C. M. *Syn. I*,
 p. 453 et *II*, p. 612 ; W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 143 et *II ed.* p. 141.

Trichostomum homomallum *Bryol. eur. II* (mon. p. 16), t. 181.

Weisia homomalla Hedw. *Stirp. crypt. I*, p. 22, t. 8 ; *Brid. op. cit.* p. 361.

2. In terr. aren. et subargill. — *Eur.* : Tota, calidiss. et frigidiss. except. *Am. sept.* : M. Rupestr., Washington, M. Alb., reg. sept. et or.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 424, 663 (*Leptotrichum*).

« *var. zonatum* Lindb. *M. Scand.* p. 26 p.p.

Campylopus irregularis Ltz. in *Verh. d. zool. bot. Gesells. in Wien*, 1867, p. 683, t. 22.

Dicranum sericeum Hsch. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 364.

Ditrichum zonatum Limpr. *Laubm. Deutschl.* I, p. 495.

Leptotrichum Molendianum Ltz. in *op. et l. cc.*

L. homomallum β *zonatum* Vent. et Bott. *Enum. cr.* p. 15.

L. zonatum Ltz. in *Fl.* 1869.

Weisia zonata Brid. *op. et l. cc.*

Ut typ., sed rarius. — *Eur.* : Scandin., Harz, Bohem., Alp. Stir., Salisb., Carinth., Helvet., Longobard., Pyr. or. (1).

homomallum β *zonatum* Lindb. p.p. — *D. vaginans* var. *nivale*.

Hookeri (C. M.) Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Cynodontium Hookeri Mitt. *M. austr. am.* p. 42.

Diaphanophyllum longifolium Lindb. in *Oefv....* 1863, p. 605.

Didymodon longifolius H. f. et W. in *sched.*

Leptotrichum Hookeri C. M. *Syn.* I, p. 450.

1. — *Am. merid.* : Fuegia, fret. Magell., ins. Eremitae.

hyalinum (Mitt.) Par.

Cynodontium hyalinum Mitt. *M. austr. am.* p. 43.

Didymodon longifolius β *tenuifolius* H. f. et W. *Crypt. antarct.* p. 102.

Leptotrichum hyalinum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859.

2. Terr. — *Am. merid.* : Fuegia, cap. Horn, ins. Eremitae, Maclov.

Knappii (Jur.) Limpr. *Laubm. Deutschl.* I, p. 508.

Leptotrichum Knappii Jur. in *Verh. d. Zool. bot. Gesells. in Wien*, 1866, pp. 67 et 486.

1. In silv. subalp. — *Eur.* : Hungaria.

laxissimum (Mitt.) Par.

Leptotrichum laxissimum Mitt. *M. Ind. or.* p. 10.

Trichostomum delicatulum Wils. p.p. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 321.

— *As.* : Sikkim.

leptocarpum Hpe. in *op. et l. cc.*

Leptotrichum leptocarpum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 30.

1. Cortic. — *Am. sept.* : Mexic.

leptorhynchum Hpe. in *op. et l. cc.*

Leptotrichum leptorhynchum W. P. Sch. hb. ; Jaeg. *Ad.* I, p. 236 et II, p. 763.

— *Afr.* : Madagascar.

longisetum (Ltz.) Hpe. in *op. et l. cc.*

Leptotrichum longisetum Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 186.

1. Rupic. — *Am. merid.* : Valdiv., Patagon. austr., fret. Magell.

Mac-Leanum (Rehm.) Par.

Leptotrichum Mac-Leanum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 465.

— *Afr.* : Transvaal.

(1) Cf. Limpr. l. c.

madagassum (*Ren. et Card.*) *Par.*

Leptotrichum madagassum *R. et C. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, II, p. 184 et *M. Masc. Mad.* n. 208.

1. In terr. argill. — *Afr.* : Madagascar.

mexicanum *Hpe. in op. et l. cc.*

Atractylocarpus mexicanus *Mitt. M. austr. am.* p. 71 p.p. ?

Leptotrichum mexicanum *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 30.

1. Terr. — *Am. sept.* : Mexic.

Mittenii (*Besch.*) *Par.*

Atractylocarpus mexicanus *Mitt. op. et l. cc.*

Leptotrichum Mittenii *Besch. op. cit.* p. 31.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

montanum (*Leib.*) *Par.*

Leptotrichum montanum *Leib. in Bull. Torr. bot. Club*, 1893, p. 112.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Idaho.

Oldfieldi (*Mitt.*) *Par.*

Leptotrichum Oldfieldi *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 67.

1. Terr. — *Pac.* : Tasman.

pallidum (*Schreb.*) *Hpe. in op. et l. cc.*

Bryum acaulon heteromallum, setis longis pallidis *Dill. Hist. M.* p. 389, t. 49, f. 57.

Br. pallidum *Schreb. Spic. fl. Lips.* p. 80.

Cynodontium bogotense *Hpe. in Linn.* 1864, p. 135 et in *Ann. sc. nat. V ser.*, III, p. 360.

C. strictum *Mitt. M. austr. am.* p. 42.

Diaphanophyllum pallidum *Lindb. in Oefv.* 1863, p. 605.

Dicranum pallidum *W. et M. Bot. Tasch.* p. 196.

Didymodon pallidus *P. B. Prodr.* p. 56.

Leptotrichum pallidum *Hpe. in Linn.* 1847, 74 ; *C. M. Syn.* I, p. 451 ; *W. P. Sch. Syn.* I ed. p. 146 et II ed. p. 147.

Trichostomum pallidum *Hedw. Stirp. crypt.* p. 71, t. 27 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 489 ; *Bryol. eur.* II (mon. p. 18), t. 183.

Tr. pallidum β *strictum* *Schwagr. Suppl. II*, I, p. 77, t. 123.

Tr. strictum *Sw. Fl. Ind. occ.* III, p. 1781.

1. Ad terr. silvat. argill. — *Eur.* : Reg. campestr. zon. interm. et subseptentr. ; deest in *Britann. As.* : Japon., China or., *Caucas. occ.* *Afr.* : Madagascar. *Am. sept.* : Ontario, temperata tota, Jamaïc. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Exs. : *Drum.* *M. bor. am.* II ed. n. 56 (*Leptotrichum*).

Mac. Canad. M. n. 67 (*Leptotrichum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 167, 664, 1262 (*Leptotrichum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 155 (*Leptotrichum*).

pallidum $\times$ *Pleuridium subulatum* *Breidl.* — *D. astomoïdes*.

paulense *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

pinetorum (*C. M.*) *Par.*

Aschistodon pinetorum *Jaeg. Ad. II*, p. 662.

Leptotrichum pinetorum *C. M. in Linn.* 1874, p. 627.

Lignic. — *Am. sept.* : Mexic.

plagiacron (*C. M.*) *Par.*

Leptotrichum plagiacron *C. M. in Linn.* 1871-73, p. 169.

1. — *As.* : Ins. Philippin.

plicatum (Mont.) Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 273.

Didymodon plicatus Mont. *Syll.* p. 49.

D. cirrifolius ej. in *Crypt. Nilgherr. Ann. sc. nat.* 1842, n. 56.

Leptotrichum plicatum C. M. *Syn. I*, p. 446.

1. In silv. — As.: M. Neilgherr., Ceylan.

plumosum (C. M.) Par.

Leptotrichum plumosum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 470.

1. — Am. merid.: Venezuela.

praealtum (Mitt.) Par.

Leptotrichum praealtum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 66.

2. — Am. merid.: Patagon. austr.

proscriptum (Hsch.) Par.

Cynodon proscriptus Hsch. in *Hor. phys. Berol.* p. 60, t. 12; *Brid. Bryol. unic. I*, p. 517.

Leptotrichum Hornchuchii C. M. *Syn. I*, p. 450.

2. — Afr.: Ins. S. Helena.

pusillum Hpe. — *D. tortile*.

rufescens Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Cynodontium rufescens Mitt. *M. austr. am.* p. 44.

Leptotrichum rufescens Hpe. in *Linn.* 1862, p. 521.

2. — Am. merid.: And. Nov. Granat.

Schimperi (Lesq.) Par.

Leptotrichum Schimperi Lesq. in *Mem. of the Calif. Acad. I*, p. 9; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 37, t. 24; *Lesq. et Jam. Man.* p. 108.

1. — Am. sept.: Oregon, M. Calif.

strictum Hpe. — *Lophiodon*.

subflexuosum (W. P. Sch.) Par.

Leptotrichum subflexuosum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1620.

— Am. merid.: And. Boliv.

subrufescens Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

1. Terr. — Am. merid.: Brasil. (Minas Geraës).

subulatum Hpe. in *Fl.* 1867, pp. 181-182.

Diaphanophyllum subulatum Lindb. in *Oefv....* 1863, p. 605.

Didymodon aureus de Not. *Syll.* p. 199.

D. subulatus Br. in *Salzm. Pl. Tingit. et in de Not. l. c.*

Leptotrichum subulatum Hpe. in *Linn.* 1847, p. 74; C. M. *Syn. I*, p. 448 et *II*, p. 611; W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 145 et *II ed.* p. 143.

Trichostomum subulatum *Bryol. eur. II* (mon. p. 17), t. 182.

1. Ad terr. denud. et viar. latera. — Eur.: Zon. merid.: Combrevall., Gall. merid., Corsic., Sardin., Sicil., Algarb. Afr.: Septentr.

tenue Hpe. — *Trichostomum*.

tenuisetum (C. M.) Par.

Leptotrichum tenuisetum C. M. in *Journ. of bot.* 1877, p. 228 (nom).

Lignic. — Am. sept.: Costa Rica.

tomentosum (Kindb.) Par.

Leptotrichum tomentosum Kindb. *mss.*

Ster. — Am. sept.: Alaska.

tortile (Schr.) Lindb. *M. Scand.* p. 26.

Diaphanophyllum tortile Lindb. in *Oefv....* 1863, p. 605.

- Dicranum tortile* W. et M. Bot. Taschb. p. 198, t. 7, f. 12-13.
Didymodon tortilis W. Arn. Dispos. p. 37.
Ditrichum pusillum Hpe. in Fl. 1867, pp. 181-182.
Leptotrichum tortile C. M. Syn. I, p. 454; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 142 et II ed. p. 139.
Mnium tortile Gmel. Syst. nat. II, p. 1328.
Trichostomum tortile Schrad. Syst. Samml. crypt. Gewaechse n. 49; Brid. Bryol. univ. I, p. 488; Bryol. eur. II (mon. p. 14), t. 179.
 2. Ad viar. margin. — Eur.: Reg. campestr. montan. As.: Nepal., Sikkim, Caucas. Afr.: Alger. Am. sept.: Fret. Hudson, Labrador, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, lac. Super., reg. sept., or. et centr.
Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 118 (*Didymodon*) et II ed. n. 57? (*Leptotrichum*).
 Mac. Canad. M. n. 65 (*Leptotrichum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 43 b, 872 et b (*Leptotrichum*).
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 152 (*Leptotrichum*).
 « *var. pusillum* (Timm.) Lindb. M. Scand. p. 26.
Barbula curta Hedw. M. frond. III, p. 75, t. 31.
Bryum Didymodon Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 43.
Br. pusillum Gmel. Syst. nat. II, p. 1333.
Desmatodon curtus Brid. Bryol. univ. I, p. 526.
Didymodon pusillus Hedw. Sp. M. p. 104; Brid. op. cit. p. 509.
Ditrichum pusillum Timm. Prodr. fl. Megapol n. 777.
Leptotrichum tortile var. pusillum C. M. (excl. syn. Sull.) et W. P. Sch. II. cc.
Tortula curta Sw. M. Suec. p. 41.
Trichostomum pusillum Hedw. M. frond. I, p. 78, t. 28, ff. 2, 4, 9, 10 (fid. C. M. l. c.).
Tr. tenue Hedw. (fid. Ren. et Card.).
Tr. tortile var. pusillum Bryol. eur. l. c.
 Ad saxa et terr. argill. — Eur.: Passim c. typ. As.: Jenissei super. Am. sept.: Pensilv., Indiana.
Exs.: Drumm. M. bor. am. II ed. n. 59 (*Leptotrichum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 947 (*Leptotrichum*).
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 153 (*Leptotrichum*).
tortipes (Mitt.) Par.
Leptotrichum tortipes Mitt. M. Ind. or. p. 10.
Trichostomum delicatulum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 321 p.p.
 1. — As.: Sikkim.
vaginans (Sull.) Hpe. in Fl. 1867, pp. 181-182.
Diaphanophyllum vaginans Lindb. in Oefv.... 1863, p. 605.
Leptotrichum avimontanum W. P. Sch. in sched.
L. homomallum β strictum ej. Syn. I ed. p. 144.
L. vaginans ej. Syn. II ed. p. 140.
Trichostomum homomallum β densum Bryol. eur. II (mon. p. 16).
Tr. pusillum Hedw. M. frond. I, p. 78, t. 28, ff. 2, 4, 9, 10 (fid. W. P. Sch.); Drumm. M. bor. am. I ed. n. 60, 61.
Tr. vaginans Sull. M. Allegh. n. 176 et Ic. M. I, p. 43, t. 28; Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 104.
 2. Ad terr. humid. arenac. et turf. — Eur.: Hassia, Westphal., Voges., Hercyn., Francon. Am. sept.: New Brunswick, reg. or. et centr.
Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 824, 1322 (*Leptotrichum*).
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 154 p.p. (*Leptotrichum*).
 « *var. brevifolium* (Grav.) Par.
Angstroemia Lamyi Boulay M. E. Fr. p. 553.

Leptotrichum vaginans var. *brevifolium* Gravet in Husn. Muscol. gall. p. 62.

« var. *nivale* (C. M.) Par.

D. homomallum β *zonatum* Lindb. M. Scand. p. 26 et in Braithw. Brit. Mossfl. p. 100 p.p. (fid. Limpr.).

D. nivale Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 498.

Leptotrichum glaciale Jur. mss.; Pfeff. Bryol. Stud. p. 33.

L. nivale C. M. Syn. II, p. 611.

L. tenue β *glaciale* W. P. Sch. Coroll. p. 29.

L. vaginans β *glaciale* W. P. Sch. Syn. II ed. p. 140.

L. vaginans β *nivalis* Jur. Laubmfl. Oesterr. Ung. p. 78.

Trichostomum tenue var. *glaciale* Bryol. eur. II (mon. p. 13).

Ut typ. — Eur. : Alp. Helvet.; Salzburg. ? Am. sept. : New Brunswick.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 58 (*Leptotrichum*).

Mac. Canad. M. n. 386 (*Leptotrichum*).

Vallis-Gratiae Hpe. — *Ceratodon condensatus*.

zonatum Limpr. — *D. homomallum* var. *zonatum* (1).

Divaricatella C. M. in Dusen M. Camer. (sect. *ANGSTROEMIAE*).

Dolichomitria Lindb. Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or. p. 231 (sect. *ISOTHECII*).

DOLICOTHECA Lindb. Man. M. II, p. 417.

repens Lindb. — *Hypnum repens*.

Doliolidium C. M. in Linn. 1875, p. 388 (subsect. *BRYI*).

DORCADIUM Lindb.

Spec. omn. non indicatae *ORTHOTRICHIA* ejusd. nom.

affine β *fastigiatum* Lindb. — *Orthotrichum fastigiatum*.

pallidum Lindb. et Arn. — *Orthotrichum pallens* var. *parva*.

striatum Lindb. — *Orthotrichum leiocarpum*.

DOZYA Lac. in Miq. Ann. Mus. bot. Lugd. Batav. II, p. 296 (1 spec.).

japonica Lac. t. c.

— As. : China, Japon.

Drepanium W. P. Sch. Syn. I ed. p. 618 (sect. *HYPNI*).

Drepanocladus C. M. Syn. II, p. 321 (subsect. *HYPNI* = **Harpidium** W. P. Sch.).

DREPANO-HYPNUM Hpe. Moosb. p. 19.

Spec. omn. *HYPNA* ejusd. nom.

Drepanophyllaria C. M. Syn. II, p. 418 (subsect. *HYPNI*).

(1) In Enum. Kindb. nom. nud. (sub *Leptotricho*) ;
D. Baileyi (C. M.) Par.

DREPANOPHYLLUM Rich. in Hook. M. ex. II p. 3, t. 14 (1820)
(2 spec.) (1).

fulvum Rich. l. c.; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 669; *C. M. Syn. I*, p. 39;
Mitt. M. austr. am. p. 318.

Dicranum falcifolium Hook. M. ex. I, t. 82.

Fissidens falcifolius Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 9.

2. Lignic. et rupic. — Afr.: Ins. Borbon.? Am. sept.: Hispaniola.
Am. merid.: Guian. batav., Amazon.

oppositifolium Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 305.
Ster. — As.: Ceylan.

ramulinum Spr. — *Mniomalia viridis*.

semi-limbatum Mitt. — *Mniomalia*.

viride Mitt. — *Mniomalia*.

DRUMMONDIA Hook. in Drumm. M. bor. am. I ed. (1841) n. 62 (3 spec.) (2).

brevifolia Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 325.

Dr. Thomsoni Mitt. *M. Ind. or.* p. 46.

1. Rupic. — As.: Tibet, occ.

* var. tapintzensis (Besch.) Par.

Dr. Thomsoni var. tapintzensis Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 57.

Arbor. — As.: Alp. Yunnan.

clavellata Hook. l. c.; *Sull. Ic. M.* p. 52, t. 33; *C. M. Syn. I*, p. 687;
Lesq. et Jam. Man. p. 160.

Anodontium prorepens Brid. *Sp. M. I*, p. 41.

Gymnostomum prorepens Hedw. *Sp. M.* p. 35, t. 3, f. I-4.

Hypnum clavellatum parvum, repens, setis brevibus Dill. *Hist. M.* p. 551,
t. 85, f. 17.

Leiotheca clavellata Brid. *Bryol. univ. I*, p. 728.

Macromitrium clavellatum Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 139.

Orthotrichum clavellatum H. et Gr. in *Brewster Edinb. Journ. I*, p. 114,
t. 4.

2. Arbor. — As.: Japon. Am. sept.: Ontario, Carol., Maryl., Virgin.,
etc.

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 62, II ed. n. 81.

Mac. Canad. M. n. 525.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 194.

* var. canadensis Kindb. in *Mac. Cat.* p. 160.

Arbor. — Am. sept.: Lac. Erie.

Thomsoni Mitt. — Dr. brevifolia.

var. tapintzensis Besch. — Dr. brevifolia var. tapintzensis.

? villosa Besch. *Fl. bryol. N. Caled.* p. 207.

Dasymitrium villosum Jaeg. *Ad. II*, p. 687.

2? Cortic. — Pac.: Nov. Caledon. (2).

DRYPTODON Brid. *Bryol. univ. I*, p. 191.

Spec. omn. non indicatae GRIMMÆ ejusd. nom.

[1] Nomen jam abusum. *Drepanophyllum* Wib. 1799 (*Umbelliferae*), sed
nunc ut syn. gen. *Falcaria* acceptum.

[2] Nomen jam abusum. *Drummondia* DC. Prodr. IV, p. 50, 1830 (*Saxifrageae*),
sed nunc ut syn. gen. *Mitellopsis* acceptum.

[3] In Enum. Kindb. nomen nudum:
Dr. oppositifolia C. M.

- brevifolius* Brid. — *Grimmia pulvinata* ?
caespiticius Brid. — *Grimmia sulcata* (! C. M.; ? W. P. Sch.).
β muticus Brid. — ?
Campylopus Brid. — *Cynodontium gracilescens* var. *inflexum*.
carnosus Brid. — *Rhacomitrium heterostichum*.
cribrosus Brid. — *Grimmia leucophaea* et *trichophylla*. — Delend.
crispulus H. f. et W. — *Rhacomitrium*.
crispus Brid. — *Ditrichum capense*.
curvifolius Brid. — *Grimmia commutata*.
dichotomus Brid. — { *Campylopus dichotomus* Brid. *M. M.* p. 77 } Delend.
 { *Dicranum dichotomum* P. B. *Prodr.* p. 53 }
ellipticus Brid. — *Rhacomitrium*.
fontinaloides Brid. — *Hydropogon*.
incurvus Brid. — *Grimmia elatior*.
obtusus Brid. p.p. { — *Grimmia orbicularis*.
 — *Grimmia pulvinata* var. *obtusa*.
ovatus Brid. — *Grimmia commutata*.
patens Brid. — *Rhacomitrium*.
pulvinatus *β argentatus* Brid. — *Grimmia pulvinata* var. *longipila* ?
γ alpestris Brid. — *Grimmia pulvinata*.
rupestris H. f. et W. — *Rhacomitrium*.
saxicola Brid. — *Campylosteleum*.
Schultzii { Brid. — *Grimmia*.
 { Hartm. — *Grimmia Mühlenbeckii*.
spiralis Brid. — *Grimmia funalis*.
sudeticum Brid. — *Rhacomitrium*.

DUSENIA Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 195.

incrassata Broth. — *Forstroemia*.

ECCREMIDIUM Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 450
 (2 spec.).

arcuatum H. f. et W. l. c.; C. M. Syn. I, p. 435.

Bryum tenuissimum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 52.
Schistidium arcuatum H. f. et W. in Hook. Ic. pl. rar. t. 738 A.

— Pac. : Austral. or.

pulchellum H. f. et W., C. M. ll. cc.

Schistidium pulchellum H. f. et W. in Hook. op. cit. t. 738 B.

— Pac. : Austral. or.

Eccremothecium Mitt. M. austr. am. p. 294 (subsect. BRYI).

ECHINODIUM Jur. in Bot. Zeit. 1866, p. 20.

Spec. omn. non indicatae sunt SCIAROMIA ejusd. nom.

madeirense Jur. — *Sciaromium spinosum*.

Paivanum Jaeg. — *Sciaromium prolixum*.

ECTROPOTHECIUM Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1868 (160 spec.).

acinacifolium (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 532.

Hypnum acinacifolium Hpe. in C. M. Syn. II, p. 329.

H. sandwichense Hook. et Arn. (fid. Mitt.).

l. Arbor. — Pac. : Nov. Zeland.

aeruginosum (C. M.) Mitt. op. cit. p. 513.

Hypnum aeruginosum C. M. Syn. II, p. 304.

1. — Am. merid.: Venezuela, Amazon., And. Quitens. et Peruv.

albo-viride Ren. in Rev. bryol. 1889, p. 85.

1. — Afr.: Madagascar.

« var. rufulum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1893, I, p. 125.
Cum typo.

amabile Hpe. in sched.; Mitt. op. et l. cc.

Hypnum subimponens Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 321.

- Ster. — Am. merid.: And. Quitens.

amphibolum Spr. in Mitt. op. et l. cc.

Arb. et rupic. — Am. sept.: Cuba, Guadalup. Am. merid.: Ins. Trinitat., Amazon., And. Quitens. et Peruv., Brasil.

angusto-textum (Geh.) Par.

Hypnum angusto-textum Geh. Neue Beitr. zur. Moosfl. v. N. Guinea, p. 8.

- Ster. — Pac.: Nov. Guin. mer.

apiculatum (Hsch.) Mitt. op. cit. p. 512.

Hypnum apiculatum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 87; C. M. Syn. II, p. 305.

1. — Am. sept.: Jamaïc. Am. merid.: And. Nov. Granat., Brasil. or.

arcuatum (Sull.) Mitt. Fl. Vit. p. 400.

Hypnum arcuatum Sull. in Proc. Am. Acad.... 1854.

- Arbor. — Pac.: Ins. Sandwic.

australe (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 524.

Hypnum australe C. M. Syn. II, p. 302.

H. limatum H. f. et W. Fl. Antarct. Suppl. II, p. 545 et Fl. Tasman. II, p. 113.

H. Terrae-Novae var. australe eor. Fl. Antarct. I, p. 142, t. 61.

2. Lignic. — Pac.: Austral., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

Ayresii W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 178.

1. Saxic. — Afr.: Ins. Franciae.

baliense (Bryol. jav.) Jaeg. Ad. II, p. 532.

Hypnum baliense Bryol. jav. II, p. 228.

Sauloma baliensis ibid. p. 110, t. 220.

1. — As.: Java, ins. Bali.

Bescherellii Ren. in Rev. bryol. 1888, p. 89.

1. — Afr.: Ins. Franciae.

Boivini (C. M.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 178.

Hypnum Boivini C. M. in Rev. bryol. 1877, p. 14.

1. — Afr.: Ins. Mayotte.

brachystelium (Hpe.) Par.

Hypnum brachystelium Hpe. Enum. M. Brasil p. 67.

Syn. Cortic — Am. merid.: Brasil. austr. or.

brachytheciopsis (C. M.) Par.

Hypnum brachytheciopsis C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 85 et in Forschungsreise.... p. 47.

1 ? — Pac. : Nov. Hannov.

brevifalcatum (C. M.) Kindb. Enum. Bryin. ex.

Hypnum brevifalcatum C. M. in Fl. 1886, p. 284.

Ster. Arbor. — Afr. : Ins. S. Thomas.

brevisetum (Hsch.) Mitt. M. austr. am. p. 515.

Hypnum brevisetum Hsch. op. cit. I, p. 78 ; C. M. Syn. II, p. 286.

1. Cortic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

bryifolium (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 533.

Hypnum bryifolium C. M. in Angstr. Prim. lin. p. 52.

H. inflectens Angstr. in Oefv.... 1872, p. 125.

— Pac. : Taïti.

bryocarpum (C. M.) Par.

Vesicularia bryocarpa C. M. in Dusen M. Camer. n. 311.

— Afr. : M. Cameroon.

Buitenzorgi (Bel.) Jaeg. Ad. II, p. 524 (1).

Hypnum Buitenzorgi Bel. Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p. 94, t. 2, f. I ; C. M. Syn. II, p. 302 ; Bryol. jav. II, p. 199, t. 298.

Stereodon Buitenzorgi Mitt. M. Ind. or. p. 99.

2. — As. : Amboine, Ceram, Java, Sumatra, Ceylan.

callichroides (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 524.

Hypnum callichroides C. M. in Linn. 1874, p. 562.

Ster. — As. : Ins. Philippin.

calodictyon (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 535.

Hypnum calodictyon C. M. M. Polyn. p. 80.

1. — Pac. : Ins. Samoa.

« var. glauca (C. M.) Jaeg. l. c.

Hypnum calodictyon var. glaucum C. M. l. c.

— Pac. : Ins. Samoa.

campanulatum Mitt. M. austr. am. p. 512.

— Am. merid. : Nov. Granat.

campylosciadium (C. M.) Par.

Vesicularia campylosciadium C. M. in Dusen M. Camer. n. 366.

— Afr. : M. Cameroon.

capillisetum (C. M.) Kindb. op. cit.

Hypnum capillisetum C. M. in Fl. 1886, p. 521.

1. Rupic. — Afr. : Angola.

Chamissonis (Hsch.) Jaeg. Ad. II, p. 528.

Hypnum Chamissonis Hsch. Hor. phys. Berol. p. 66, t. 13 ; C. M. Syn. II, p. 305 ; Bryol. jav. II, p. 198, t. 297.

H. Stereodon Chamissonis Brid. Bryol. univ. II, p. 617.

1. Cortic. — As. : Borneo, ins. Banca, Radak.

(1) « An *Hypnum Drepanium* ? » Jaeg. l. c.

Chenagoni Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. Belg.* 1893, I, p. 125.
Ster. — Afr. : Madagascar.

chloroticum Besch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1887, p. 99.

1. Ad rad. abor. secus rivul. vel submers. — As. : Tonkin.

« *var. dong-hamense* Besch. l. c.

Rupic. — As. : Tonkin.

clandestinum (Lindb.) Ångstr. *Prim. lin.* p. 43.

Hypnum clandestinum Lindb. mss.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

codonopyxis (C. M.) Par.

Hypnum codonopyxis C. M. in *Fl.* 1886, p. 518.

1. Arbor. — Afr. : Ins. Fernando Po.

compressifolium (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 524.

Stereodon compressifolius Mitt. *M. Ind. or.* p. 99.

2 ?

— As. : Khasia, Assam super.

conostegum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 519.

Hypnum conostegum C. M. *Syn. II*, p. 242.

Leskea (Omalia) *rutilans* β *porto-ricensis* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 332.

1.

— Am. sept. : Cuba, Porto-Rico.

contractum (Lac.) Jaeg. *Ad. II*, p. 532.

Hypnum contractum Lac. *Sp. nov. M. Archip. ind.* 1872, p. 12, t. 7 C.

1.

— As. : M. Java.

crassicaule Mitt. *op. cit.* p. 517.

Hypnum Montagnei Sull. in *Proced. Am. Acad.*

— Am. sept. : Cuba.

crassirameum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 126.

Ster.

— Afr. : Madagascar.

crassireticulatum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 535.

Hypnum crassireticulatum Hpe. in sched.

— As. : Ind. or. (Yonnah).

cristato-pinnatum W. P. Sch. in Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 85.

1.

— Am. sept. : Guadalup.

cubense (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 514.

Hypnum cubense C. M. *Syn. II*, p. 267.

Leskea adnata Schwaegr. in Poepp. *M. Cub.*

1. Cortic. — Am. sept. : Cuba.

cupressoides (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 511.

Hypnum cupressoides C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 109 et *Syn. II*, p. 303.

H. cyparissoides Wils. in *Gardn. M. Brasil. n.* 111.

1.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

curvulum Mitt. mss.; C. H. Wright *M. Madag. n.* 7 (nom.).

— Afr. : Madagascar centr.

cygnicollum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 523.

Stereodon cygnicollus Mitt. *M. Ind. or.* p. 100.

1.

— As. : Sikkim.

cylindricum (Hsch.) Mitt. *M. austr. am.* p. 516.

Hypnum Estrellae C. M. *Syn. II*, p. 275.

Leskea cylindrica Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 73.

2? Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

cyparissioides (Hsch.) Mitt. *op. cit.* p. 512.

Hypnum cyparissioides Hsch. *op. cit.* p. 88 ; C. M. *Syn. II*, p. 304.

1. — *Am. merid.* : Brasil. or.

cyperoides (Hook.) Jaeg. *Ad. II*, p. 523.

Hypnum cyperoides Hook. in *Wall. Cat. n.* 7653 ; *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, *II*, p. 19 et in *Hook. Ic. pl. rar. I*, t. 23, f. 5 ; C. M. *Syn. II*, p. 288 ; *Bryol. jav. II*, p. 195, t. 294.

Stereodon cyperoides Mitt. *M. Ind. or.* p. 99.

1? — *As.* : Celebes, Java, Sumatra, Ceylan, Nepal.

dealbatum (Hsch. et Reinw.) Jaeg. *Ad. II*, p. 528.

Hypnum dealbatum Hsch. et Reinw. in *Nov. Act. Acad. Cæsar. Leop. Carol. XIV, II, Suppl.* p. 279 ; C. M. *Syn. II*, p. 306 ; *Bryol. jav. II*, p. 194, t. 293.

H. ochron Schwaegr. *Suppl. III, II*, t. 285.

1. — *As.* : Borneo, Java, Sumatra.

distichellum (C. M.) Kindb. *op. cit.*

Hypnum distichellum C. M. in *Th. Saves M. Nov. Caled. n.* 21.

— *Pac.* : Nov. Caledon.

diffusum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 524.

Stereodon diffusus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 157.

2. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po, Principis.

Dozyanum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 531.

Hypnum Dozyanum C. M. *Syn. II*, p. 276 ; *Bryol. jav. II*, p. 147, t. 245.

H. verrucosum Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 309.

2. — *As.* : Java.

Drepanopyllum Broth. in *Bol. da Soc. Brot.* 1890.

Ster. Lignic. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

Dubyanum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 536.

Hypnum Dubyanum C. M. *Syn. II*, p. 241 ; *Bryol. jav. II*, p. 182, t. 280.

H. reticulatum Duby in *Pl. Zolling. n.* 1580.

1. Arbor. — *As.* : Amboine, ins. Banca, Java.

eleganti-pinnatum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 526.

Hypnum eleganti-pinnatum C. M. in *Linn.* 1874, p. 564.

1. — *As.* : M. ins. Philippin.

eurycladium Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 86.

2? Ster. — *Am. sept.* : Guadalup.

eurymitrium Besch. *op. cit.* p. 85.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

exiguum (Geh. et Hpe.) Par.

Hypnum exiguum G. et H. *Enum. M. Brasil.* p. 68.

1. — *Am. merid.* : Brasil. or.

? falciforme (Dz. et Mk.) Jaeg. *Ad. II*, p. 522 (1).

(1) « An *Hypnum*, *Drepanium* seu *pseudo-Chaetomitrium* ? » Jaeg. l. c.

Hypnum falciforme Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, IV, p. 306; C. M. *Syn.* II, p. 299; *Bryol. jav.* II, p. 203, t. 302.

1 (C. M.) 2 (*Bryol. jav.*). — As. : Celebes, Borneo, Java, Sumatra.

ferrugineum (C. M.) *Jaeg. Ad.* II, p. 525.

Hypnum ferrugineum C. M. in *Linn.* 1874, p. 561.

Ster. — As. : Ins. Philippin.

flavo-viride *Mitt. M. austr. am.* p. 518.

— Am. sept. : Cuba.

fuscescens *Mitt.* — E. *inflectens*.

var. *condensatum* *Jaeg.* — E. *inflectens* var. *condensatum*.

galerulatum (*Dub.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 180.

Hypnum galerulatum *Duby Choix de M. in Mem.... Genève*, 1877, p. 7, t. 2, f. 4 (*excl. b. et e. quæ ad Brachytecium atro-theam pertin?*).

1. — Afr. : Ins. Franciae.

glaucinum *Besch. Not. M. Paraguay*, p. 271.

1. — Am. merid. : Paraguay.

Ecs. : Rab. n. 1198, 1271.

glaucissimum (C. M.) *Besch. Fl. bryol Réunion, etc.* p. 180.

Hypnum glaucissimum C. M. in *Linn.* 1876, p. 276.

— Afr. : Ins. Anjouan.

glauculum *Broth. in Bol. da Soc. Brot.* 1890.

1. Arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.

globithea (C. M.) *Mitt. op. cit.* p. 512.

Hypnum globithea C. M. *Syn.* II, p. 300.

1. — Am. sept. : Cuba, Jamaïc., Guadalup. Am. merid. : Venezuela, And. Nov. Granat et Quitens.

golungense (*Welw. et Duby*) *Jaeg. Ad.* II, p. 538.

Hypnum golungense W. et D. in *Mem.... Genève*, 1881, p. 8, t. 2, f. 4.

1. Ad rup. humid. — Afr. : Angola.

gracilicaule (*Lac.*) *Jaeg. Ad.* II, p. 524.

Hypnum gracilicaule *Lac. in sched?*

— As. : Java.

gracilisetum (*Hsch. et Reinw.*) *Mitt. Fl. Vit.* p. 400.

Hypnum gracilisetum H. et R. in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. Carol.* XIV, II, *Suppl.* p. 727; C. M. *Syn.* II, p. 312; *Bryol. jav.* II, p. 192, t. 191.

H. *mundulum* *Sull. in Proced. Am. Acad.* 1854.

Isopterygium gracilisetum *Jaeg. Ad.* II, p. 499.

1. — As. : Celebes, Borneo, M. Java. Pac. : Ins. Sandwic.

gracillimum (*Hsch.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 596.

Hypnum gracillimum *Hsch. Fl. Brasil.* I, p. 78; C. M. *Syn.* II, p. 278.

1. — As. : Brasil. or.

graminicolor (*Ångstr.*) *Jaeg. Ad.* II, p. 534.

Hypnum graminicolor *Ångstr. in Oefv...* 1872, n. 4, p. 15

Ster. — Pac. : Ins. Sandwic.

(1) * Forsan *E. dealbati* var. * C. M. l. c.

hapalyptrum (C. M.) Par.*Hypnum hapalyptrum* C. M. in *Fl.* 1886, p. 519.

Ster. — Afr. : Gabon.

hookerioides (C. M.) Mitt. op. cit. p. 516.*Hookeria hypnoides* Hsch. op. cit. p. 67.*Hypnum hookerioides* C. M. *Syn. II*, p. 342.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

hygrobium Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 179.

— Afr. : Ins. Borbon.

ichnotocladum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 523.*Hypnum ichnotocladum* C. M. *Syn. II*, p. 301 ; *Bryol. jav. II*, p. 197, t. 296.*Stereodon ichnotocladus* Mitt. *M. Ind. or.* p. 99.

2. — As. : Sikkim, Sumatra, Java, Borneo, Celebes, Amboine.

incubans (Hsch. et Reinw.) Jaeg. *Ad. II*, p. 528.*Hypnum incubans* H. et R. op. cit. p. 730 ; C. M. *Syn. II*, p. 306 (1) ; *Bryol. jav. II*, p. 195.

1. — As. : Java.

inflectens (Brid.) Jaeg. *Ad. II*, p. 532.*Coelidium apertum* Jaeg. op. cit. p. 384.*E. fuscescens* Mitt. *Sam. M.* p. 180.*Hypnum apertum* Sull. in *Exped. Wilkes* 1859, *M.* p. 18, t. 16, f. A.*H. fuscescens* Hook. et Arn. in *Capt. Beechey's Voy. bot.* 1841, p. 76, t. 19 ; C. M. *Syn. II*, p. 341.*H. inflectens* C. M. l. c. p. 239.*H. loxocarpum* Angstr. in *Oefv...* 1872, n. 5, p. 126.*Leskea Omalia inflectens* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 331.

1 ? Ad arbor. et rup. humid. — Pac. : Ins. Samoa, Societat., Viti, Taïti, Nov. Caledon., ins. Admiral.

« *var. condensatum* (Jaeg.) Par.*Coelidium apertum var. condensatum* Jaeg. l. c.*E. fuscescens var. condensatum* Jaeg. *Ad. II*, p. 533.

— Pac. : Ins. Sandwic.

intorquatum (Dz. et Mk.) Jaeg. *Ad. II*, p. 521 (1).*Hypnum intorquatum* Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, IV, p. 307 ; C. M. *Syn. II*, p. 300 ; *Bryol. jav. II*, p. 202, t. 301.

2. — As. : Ins. Ternate, Halmaheira, Ceram, Java, Sumatra.

ischyropteris (C. M.) Par.*Vesicularia ischyropteris* C. M. in *Dusen M. Camer. n. I.*

— Afr. : M. Cameroon.

Kurzii (*Bryol. jav.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 536.*Hypnum Kurzii* *Bryol. jav. II*, p. 183, t. 281.

1. Arbor. — As. : Ins. Banca.

laevifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 517.

1. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

(1) « An *Hypnum*, *Drepanium* seu *pseudo-Chaetomitrium* ? ; Jaeg. l. c.

- laevigatum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 320.
1. — *As.* : Ceylan, Tonkin.
- lamprophyllum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 530.
Hypnum lamprophyllum Hpe. Symb. 1874, p. 517.
1. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- latifolium (*Tayl.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 522.
Hypnum latifolium Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 196; *C. M. Syn. II*, p. 288.
2? — *Am. merid.* : And. Quitens.
- laxum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 530.
Hypnum laxum Hpe. Symb. 1874, p. 516.
1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- leiophyllum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 532.
Stereodon leiophyllus Mitt. M. Ind. or. p. 101.
1. — *As.* : Ceylan.
- Lepervanchei *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 179.
1. Lignic. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- leucocladium *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 86.
1. Ad lapid. et terr. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.
- leucoflavum (*C. M.*) *Par.*
Vesicularia leucoflava C. M. in Dusen M. Camer. n. 110.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- longisetum *W. P. Sch. op. cit.* p. 84.
1. Terr. — *Am. sept.* : Guadalup.
- longo-fluitans (*C. M.*) *Par.*
Vesicularia longo-fluitans C. M. in Dusen M. Camer. n. 494.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- loricatifolium (*C. M.*) *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 480.
Hypnum loricatifolium C. M. mss.
1. — *Pac.* : Nov. Guinea.
- Luzoniae (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 524.
Hypnum Luzoniae C. M. in Linn. 1874, p. 563.
2. — *As.* : M. ins. Philippin.
- macrobolax (*C. M.*) *Kindb. op. cit.*
Hypnum macrobolax C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 86 et in *Forschungsreise....* p. 55.
Ster. Arbor. — *Pac.* : Nov. Guinea.
- malacoblastum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 526.
Hypnum malacoblastum C. M. M. Polyn. p. 82.
— *Pac.* : Ins. Samoa.
- mayumbense *Besch. in Journ. de bot.* 1894, p. 61.
1? — *Afr.* : Congo gall. (Brazzaville).
- Meyenianum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 532.
Acosta Meyeniana C. M. in Linn. 1848, p. 194.
Hookeria Meyeniana Hpe. Ic. M. t. 3.
Hypnum Meyenianum ej. in C. M. Syn. II, p. 233.
— *As.* : Manille.

micropyxis Broth. in *Mitth. aus d. deutsch. Schutzgeb.* 1893, III, p. 5 (nom.).

— Afr. : Togo.

mollicellum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 524.

Stereodon mollicellus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 157.

2. — Afr. : M. Cameroon.

Montagnei (Bel.) Jaeg. *Ad. II*, p. 533.

Hypnum Montagnei C. M. *Syn. II*, p. 234 ; *Bryol. jav. II*, p. 181, t. 279 ;
Mont. in *Hist. Cuba, Crypt.* p. 530, t. 20, f. I.

Pterygophyllum Montagnei Bel. *Voy. Ind. or.* 1835, *Bot. II*, *Crypt.* p. 85, t. 9, f. I.

1. — As. : Amboine, Borneo, Java, Sumatra.

monumentorum (Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 523.

Hypnum monumentorum Duby in *Moritzii Verz. d. Zoll. Pfl.* p. 132 ;
C. M. *Syn. II*, p. 301 ; *Bryol. jav. II*, p. 196, t. 295.

1. Ad tumulos. — As. : Ins. Banca, Java, Sumatra.

Moritzii (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 526.

Hypnum Moritzii C. M. *Syn. II*, p. 303 ; *Bryol. jav. II*, p. 200, t. 299.
H. venustum Duby *op. cit.* p. 131.

Syn. — As. : Celebes, Borneo, Banca, Sumbawa,
Java.

? *mundum* (C. M.) Par.

Hypnum mundum C. M. in *Hildebr. M. Mad. n.* 2077.

— Afr. : Madagascar or.

mycostelium (Hpe.) Par.

Hypnum mycostelium Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 70.

1. Lignic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

nanocarpum (C. M.) Par.

Hypnum nanocarpum C. M. in *Verh. d. bot. Ver. Brandenb.* 1890, p. 67.

— Afr. : Tropic. occid.

nano-crista-castrensis (C. M.) Kindb. *op. cit.*

Hypnum nano-crista-castrensis C. M. in *Hildebr. M. Mad. n.* 2127.

— Afr. : Madagascar.

Novarae (Reichdt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 531.

Hypnum Novarae Reichdt. in *Novara Exped. Bot. I*, p. 192, t. 33 et in
Hedwigia, 1868, n. 12.

Arbor. — Pac. : Taïti.

nutans (Nees) Jaeg. *Ad. II*, p. 536.

Hypnum nutans Nees in C. M. *Syn. II*, p. 240 ; *Bryol. jav. II*, p. 186,
t. 284.

1. Ad lapid. — As. : Java.

omepetense (Sull. et Lesq.) Mitt. *M. austr. am.* p. 515.

Hypnum omepetense S. et L. in *Proced. Am. Acad.* 1859, p. 281.

1. Cortic. — Am. sept. : Nicaragua.

oreadelphum (C. M.) Par.

Vesicularia oreadelpha C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 255.

— Afr. : M. Cameroon.

oxyodon (*Welw. et Duby*) *Jaeg. Ad. II*, p. 537.

Hypnum oxyodon *W. et D. in Mémoires.... Genève*, 1871, p. 8, t. 3, f. 7.

1. Arbor. — *Afr.* : Angola.

pacificum *Mitt. Sam. M.* p. 180.

Hypnum pacificum *C. M. M. Polyn.* p. 81.

1 (*Mitt.*) ; polyg. (*C. M.*).

— *Pac.* : Ins. Samoa, Nov.

Hebrid., Nov. Caledon.

Pailloti *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 124.

2. — *Afr.* : Madagascar.

paulense (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Hypnum paulense *G. et H. in Fl.* 1891, p.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

perangustum (*C. M.*) *Kindb. op. cit.*

Hypnum perangustum *C. M. in Rev. bryol.* 1887, p. 57 (*nom.*)

— *Pac.* : Nov. Caledon.

perpallidum (*C. M.*) *Par.*

Vesicularia perpallida *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 707.

— *Afr.* : M. Cameroon.

perviride (*Ångstr.*) *Par.*

Hypnum perviride *Ångstr. in Oefv....* 1872, n. 4, p. 15 (*sub* *H. graminicolori*; *cf. err. op. cit.* 1873 p. 151).

Ster. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

plano-falcatulum *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 481.

Ster. Cortic. — *Pac.* : Nov. Guinea.

plumulum *Mitt. M. austr. am.* p. 513.

Hypnum cupressoides *Sull. in Proceed. Am. Acad.*

1. Lignic. — *Am. sept.* : Cuba.

polyandrum (*Ångstr.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 524.

Hypnum polyandrum *Ångstr. in Oefv....* 1873, n. 5, p. 129.

— *Pac.* : Taïti.

* *var. fulvo-virens* *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc.*

polypterum *Mitt. op. cit.* p. 514.

Ster. — *Am. sept.* : Jamaïc., Guadalup.

pynodontium (*C. M.*) *Par.*

Hypnum pynodontium *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 85 *et in Forschungsreise....* p. 47.

1. Arbor. — *Pac.* : Nov. Hannov.

regulare (*C. M.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 174.

Hypnum regulare *C. M. Syn. II*, p. 307.

H. Stereodon cupressiforme ζ *regulare* *Brid. Bryol. univ. II*, p. 609.

2. Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

* *var. minus* *Ren. in Rev. bryol.* 1889, p. 85.

— *Afr.* : Ins. Franciaë.

reticulatum (*Dz. et Mk.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 535.

Hypnum reticulatum *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat.* 1844, IV, p. 309; *C. M. Syn. II*, p. 236; *Bryol. jav. II*, p. 185, t. 283.

- Stereodon reticulatus* Mitt. *M. Ind. or.* p. 101.
 1. — *As.* : Nepal., Sikkim, Khasia, Sumatra, Java, Celebes. *Pac.* : Nov. Caledon.
- robuste-pinnatum* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 538.
Hypnum robuste-pinnatum Hpe. *in sched.*
 — *As.* : Birmania.
- Rodriguezii* Ren. et Card. *in Bull. Soc. roy. Belg.* 1890, I, p. 185.
 1. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- rostellatum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 522.
Stereodon rostellatus Mitt. *op. cit.* p. 100.
 2. — *As.* : Nepal.
- rufulum* Ren. et Card.
 — *Afr.* : Madagascar.
- rutilans* (Brid.) Mitt. *M. austr. am.* p. 519.
Hypnum rutilans C. M. *Syn. II*, p. 234.
Leskea Omalia rutilans Brid. *Bryol. univ. II*, p. 332.
 2 ? — *Am. sept.* : Porto-Rico. *Am. merid.* : Venezuela, Brasil. *austr. or.*, Paraguay.
- sandwichense* (Hook. et Arn.) Mitt. *Fl. Vit.* p. 400.
Hypnum acinacifolium Hpe. (*fid. Mitt.*).
H. sandwichense Hook. et Arn. *Bot. of Capt. Beechey's Voy.* 1841. p. 109;
C. M. Syn. II, p. 319; *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 113.
Plagiothecium sandwichense Jaeg. *Ad. II*, p. 520.
 1. Arbor. — *Pac.* : Ins. Sandwic., Sansov, Kermadec, Nov. Zeland. sept., ins. Lord Howe.
- sarcoblastum* (C. M.) Par.
Vesicularia sarcoblasta C. M. *in Dusen M. Canar. n.* 108.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- Savaicum* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 525.
Hypnum Savaicum C. M. *M. Polyn.* p. 82.
 Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- ? *scaturiginum* (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 181.
Hypnum scaturiginum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 418; *C. M. Syn. II*, p. 236; *Bryol. jav. II*, p. 180, t. 278.
Stereodon scaturiginus Mitt. *in Journ. of the Linn. Soc.* 1863. p. 157.
 1. Submers. — *As.* : Java. *Afr.* : Ins. Borbon., Rodriguez, Fernando-Po, Principis.
- Seychellarum* Besch. *op. cit.* p. 177.
 2 ? — *Afr.* : Ins. Seychell.
- sigmangium* (C. M.) Par.
Vesicularia sigmangia C. M. *in Dusen M. Camer. n. a* 6.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- Slateri* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 534.
Hypnum Slateri Hpe. *in Linn.* 1876, p. 321.
 — *Pac.* : Austral. or.
- sodale* (Sull.) Mitt. *Sam. M.* p. 180 (1).

(1) « An *Hypnum-Drepanium* ? » Jaeg. l. c.

- Hypnum calpaecarpum* *Angstr. in Oefv....* 1872, n. 5, p. 128.
H. molluscoides *Sull. in Proced. Am. Acad.* 1853 et *notul. ej. in Am. Expl. Exp.* p. 15.
H. sodale *ej. in Exped. Wilkes* 1859, M. p. 15, t. 12, f. B.
 — *Pac.* : Ins. Marquis., Societat., Samoa, Taïti.

Soyauxii (C. M.) *Par.*

Hypnum Soyauxii C. M. in *Fl.* 1886, p. 519.

1. — *Afr.* : Gabon.

? *sparsipilum* (*Bryol. jav.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 522.

Hypnum sparsipilum *Bryol. jav. II*, p. 201, t. 300.

2. Arbor. — *As.* : M. Java.

sphærocarpon (C. M.) *Besch. op. cit.* p. 180.

Hypnum sphærocarpon C. M. *Syn. II*, p. 238.

Leucomium sphærocarpon *Jaeg. Ad. II*, p. 540.

1. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae, Nossi-Be, Nossi-Comba, Galega.

splendidulum (*Hsch.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 516.

Hypnum splendidulum *Hsch. op. cit.* p. 78; C. M. *Syn. II*, p. 283.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

stramineolum (C. M.) *Jaeg. Ad. II*, p. 533.

Hypnum stramineolum C. M. *M. Polyn.* p. 81.

- Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

subbrevisetum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 529.

Hypnum subbrevisetum *Hpe. Symb.* 1874, p. 515.

- 2? Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subdenticulatum (C. M.) *Mitt. M. austr. am.* p. 518.

Acosta Swartzii C. M. in *Linn.* 1848, p. 191.

Hypnum subdenticulatum *ej. Syn. II*, p. 242.

1. Lignic. — *Am. sept.* : Jamaïc, Porto-Rico. *Am. merid.* : Venezuela, ins. Trinitat., Guian., Brasil. austr. or., And. Peruv.

subnerve *Mitt. in Philos. Trans. of the Roy. Soc.* 1879 (*extra vol.*), p. 393.

- Ster. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

sublimatum (*Ltz.*) *Par.*

Hypnum limatum *H. f. et W.?*

H. sublimatum *Ltz. in Bot. Zeit.* 1866, p. 188.

- *Am. merid.* : Chile.

subretusum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 321.

- 2? — *As.* : Ceylan.

subsphaericum C. M. in *Bull. Soc. roy. Belg.* 1894, II, p. 134 et in *Ren.*

M. Masc. Mad. n. 141.

1. — *Afr.* : Ins. Borbon.

subsarcoblastum (C. M.) *Par.*

Vesicularia subsarcoblasta C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 826.

- *Afr.* : M. Cameroon.

suburceolatum (*Hpe. et Ltz.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 529.

Hypnum suburceolatum *Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit.* 1868, n. 48 et 1869, n. 28.

1. Lignicol. — *Am. merid.* : And. Æquator.

- subulosum *Mitt. in Philos. Trans. of the Roy. Soc.* 1879 (*extra vol.*) p. 394.
Ster. Ad rup. argill. secus torrent. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.
- succosum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 536.
Stereodon succosus *Mitt. M. Ind. or.* p. 101.
l. — *As.* : Nepal or.
- sulfureo-flavum (*C. M.*) *Par.*
Vesicularia sulfureo-flava C. M. in Dusen M. Camer. n. 8.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- surinamense (*Dz. et Mk.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 537.
Hypnum surinamense Dz. et Mk. Prodr. bryol. Surinam. p. 25, t. 14.
l. Arbor. — *Am. merid.* : Guian. batav.
- taïtense (*Ångstr.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 535.
Hypnum taïtense Ångstr. in Oefv.... 1873, n. 5, p. 125.
l. — *Pac.* : Taïti.
- tenaci-insertum (*C. M.*) *Par.*
Hypnum tenaci-insertum C. M. in Fl. 1886, p. 518.
l. — *Afr.* : Gabon.
- tenuatipes (*C. M.*) *Par.*
Hypnum tenuatipes C. M. in op. cit. p. 520.
l. Terr. — *Afr.* : Old Calabar.
- terrestre (*C. M.*) *Par.*
Hypnum terrestre C. M. in op. et l. cc.
l. Terr. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po.
- Tholloni *Besch. in Journ. de bot.* 1894, p. 60.
l. — *Afr.* : Congo gall. (Brazzaville).
- tonkinense *Besch. in Journ. de Bot.* 1890, p.
— *As.* : Tonkin.
- tophigerum *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 480.
Ster. — *Pac.* : Nov. Guinea.
- trinitense (*C. M.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 514.
Hypnum trinitense C. M. Syn. II, p. 284.
l. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.
- triviale (*C. M.*) *Kindb. op. cit.*
Hypnum triviale C. M. in Fl. 1886, p. 521.
Terr. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po.
- truncatulum (*C. M.*) *Mitt. op. cit.* p. 517.
Hypnum truncatulum C. M. Syn. II, p. 263.
Trichosteleum truncatulum Jaeg. Ad. II, p. 481.
Syn. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.
- ? tuberculatum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 532 (1).
Stereodon tuberculatus Mitt. M. Ind. or. p. 101.
l. — *As.* : Ceylan.

(1) • An *Hypnum-Ctenidium* ? » *Jaeg. l. c.*

tutuillum (Sull.) Mitt. Sam. M. p. 180 (1).

Hypnum tutuillum Sull. in Exped. Wilkes, 1859, M. p. 15, t. 10, f. A.

2? Arbor. — Pac.: Ins. Samoa, Viti.

urceolatum (Hsch.) Mitt. M. austr. am. p. 515.

Hypnum urceolatum Hsch. op. cit. p. 87, t. 4; C. M. Syn. II, p. 240.

1. — Am. merid.: Brasil. austr. or.

Valentini Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 176.

2. — Afr.: Ins. Borbon.

« var. minus Ren. in Rev. bryol. 1889, p. 85.

— Afr.: Ins. Franciae.

verrucosum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 536.

Hypnum verrucosum Hpe. Ic. M. t. 10; C. M. Syn. II, p. 237; Bryol. jav. II, p. 190, t. 289.

1. Arbor. et calcic. — As.: Java, Sumatra.

vesiculare (Schwaegr.) Mitt. op. cit. p. 518.

Hookeria Poeppigiana Hpe. Ic. M. t. 4.

H. praelonga W. Arn. Disp. M. p. 56.

Hypnum Poeppigianum Hpe. in C. M. Syn. II, p. 235.

H. vesiculare Schwaegr. Suppl. II, II, t. 199; C. M. op. et l. cc.

1. — Am. sept.: Jamaïc. Am. merid.: And. Nov.

Granat. et Peruv.

? viridulum (Brid.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 181.

Hypnum viridulum Brid. Mant. M. p. 179; C. M. Syn. II, p. 307.

H. Stereodon leptorhynchum β viridulum Brid. Bryol. univ. II, p. 622.

— Afr.: Ins. Borbon.

Wainioi Broth. in Act. Soc. sc. Fenn. 1891, n. 5.

1. In terr. argill. — Am. merid.: Minas Geraës.

Zollingeri (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 536.

Hypnum Zollingeri C. M. Syn. II, p. 241; Bryol. jav. II, p. 189, t. 288.

1. Ad arb., sax. madid. et terr. humid. — As.: Amboine, Celebes, Java (2).

Elodium Lesq. et Jam. Man. p. 329 (subgen. HYPNI = H. (THUIDIUM Nob.) paludosum).

ENCALYPTA Schreb. Gen. Pl. p. 1643 (32 spec.) (3).

affinis Hedw. f. } (fid. Lindb.). — E. apophysata.

affinis Schwaegr. } (fid. W. P. Sch.). — E. rhabdocarpa.

affinis Schwaegr. — E. commutata.

alaskana Kindb. in Mac. Cat. p. 269.

1. Terr. — Am. sept.: Frel. Behring.

alpina Wahlenb. — E. commutata.

(1) « An Hypnum-Drepanium? » Jaeg. op. c. p. 525.

(2) In Enum Kindberg. nomina nuda:

E. mammosulum (C. M.) | E. semi-globosum (C. M.).
reflectifolium (C. M.)

(3) De gen. Encalypta cf. Lindb. Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or. pp. 268-269 in adn.

apophysata *Bryol. Germ. II, p. 42, t. 15; Bryol. eur. III (mon. p. II), t. 201; C. M. Syn. I, p. 518; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 344.*

E. affinis Hedw. f. in W. et M. Beitr. zur. Naturk. I, p. 121, t. 4 (fid. de Not., Lindb., etc.).

E. cylindrica Bryol. germ. II, p. 52.

Leersia affinis Lindb. M. Scand. p. 20.

1. Ad terr. et in fiss. rup. — *Eur.*: Summ. Alp. Scandin., Sudet., Salisb., Stir., Carinth., Tirol., Ticin., Helvet., Gall. As.: Jenissei inf., Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: *M. Rupestr.*

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 816.

aristata Hpe. — *Barbula aristatula.*

var. c Rab. — *E. microphylla.*

asperifolia Mitt. *M. austr. am. p. 181.*

1. Saxic. — *Am. merid.*: And. Quitens. et Peruv.

australis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 72; Fl. Tasman. II, p. 423; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 422.*

1. — *Am. merid.*: Ins. Chiloë. *Pac.*: Austral., Nov. Zeland., Tasman.

borealis Kindb. — *E. Macounii.*

brevicolla Br. in *sched. Un. itin. 1829; Bryol. eur. VI, t. 637; C. M. Syn. I, p. 619; W. P. Sch. op. cit. p. 346.*

E. longicolla var. *brevicolla* *Bryol. eur. III (mon. p. 12), t. 202, f. β.*
Leersia brevicolla Lindb. l. c.

1. — *Eur.*: Rariss.; Alp. Scandin., Lappon.

Exs.: Un. itin. 1867, n. 91 (*E. ciliatae immixt.*).

capillata Schk. — *E. commutata.*

caucasica Rupr. in *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 1846, p. 521; C. M. Syn. I, p. 522.*

E. commutata (fid Lindb.).

1. — *As.*: Caucas. centr.

ciliata Hedw. *Sp. M. p. 6; Bryol. eur. III (mon. p. 10), t. 300; C. M. Syn. I, p. 517; W. P. Sch. op. cit. p. 343.*

Bryum caule folioso calyptra cylindrica longe aristata Hall. *Stirp. helv. III, t. 45, f. 3.*

Br. ciliare Gmel. *Syst. nat. II, p. 1332.*

Br. extensorium forma majus et ramosum Dill. *Hist. M. p. 350, t. 45, f. 9.*

E. clausa Wallr. *Fl. Germ. crypt. I, p. 125.*

E. elongata Funk in *Brid. Bryol. univ. I, p. 787.*

E. fimbriata Brid. *op. cit. p. 145.*

E. fimbriata var. *elongata* ej. *op. cit. p. 787.*

E. laciniata Lindb. *Contr. ad fl. crypt. As. bor. or. p. 269.*

Leersia ciliata Hedw. *M. frond. I, p. 49, t. 19.*

L. extensoria β Leyss. *Fl. Hall. n. 1053.*

L. fimbriata Brid. *M. Rec. II, I, p. 53.*

L. laciniata Hedw. *op. cit. II, p. 103.*

1. In rup. fissur. et muror. interst. — *Eur.*: *E. reg. mont. usq. in alp.*
As.: Jenissei med., Amour, Himalaya occ., Caucas. *Afr.*: Alg., Abyss., C. B. *Sp. Am. sept.*: *M. Rupestr.*, litt. *Pacif.*, Idaho, Montana, Minnesota, Nov. Angl. (1).

Exs.: Mac. *Canad. M. n. 132.*

Rab. Bryoth. eur. n. 489, 1270.

(1) Cf. Kindberg in Mac. Cat. p. 94.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 165.

W. Sch. *M. Abyss.* n. 430, 470 (*f. gymnostoma*).

« *var. microstoma* (Bals. et de Not.) *Bryol. eur. l. c. f.* 16-21; W. P. Sch. *op. cit.* p. 344.

E. microstoma Bals. et de Not. *Pug.* p. 18 et *Syll.* p. 269; C. M. *Syn. I.* p. 514.

Ut typ. — *Eur.*: Summ. Alp. Stir., Salisb., Carinth., Tirol., Helvet. As.: Caucas. occ. et centr.

var. rhabdocarpa H. et T. — *E. rhabdocarpa*.

« *var. sibirica* Weinm. in *Bull. Soc. imp. nat. Moscou*, 1845, p. 448, n. 2; Lindb. *Contrib. ad Fl. crypt. As. bor. or.* 1872, p. 268.

Leersia sibirica Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, p. 64.

Ut typ. — As.: Sibiria (Irkoutsch.).

ciliata Hoppe. — *E. streptocarpa*.

cirrata Sw. — *Dicranoweisia*.

clausa Wallr. — *E. ciliata*.

coarctata Mitt. *M. austr. am.* p. 181.

l. — *Am. merid.*: Summ. Pichincha.

commutata *Bryol. germ. II*, p. 46, t. 15; *Bryol. eur. III* (mon. p. 8), t. 198; C. M. *Syn. I*, p. 513; W. P. Sch. *op. cit.* p. 340.

E. affinis (1) *Schwaegr. Suppl. I, I*, p. 68, t. 16; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 143; *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 49.

E. alpina (1) *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 312.

E. capillata *Schkuhr Deutsch. M.* p. 46, t. 20.

E. fimbriata β *alpina* H. et T. *Muscol. brit.* p. 35.

E. lacera de Not. *Mant. n.* 66 et *Syll.* p. 268; C. M. *Syn. II*, p. 514.

Leersia alpina Lindb. l. c.

l. Ad terr. et in fiss. rup. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursorum, summ.

Alp. zon. intermed. et sept.; *Jurass.* — As.: Jenissei inf., Tibet occ.

Am. sept.: M. *Rupestr.*, Alaska, Nevada, Colorado, Idaho.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 69.

corniculata *Wahlenb.* — *Trichostomum*.

contorta Lindb. — *E. streptocarpa*.

crispata *Schwaegr.* — *Ptychomitrium*.

cucullata C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 96.

E. rhabdocarpa *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 52.

l. Terr. — *Am. sept.*: Columb. brit.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 491.

cuspidata Br. et Sch. in W. Sch. *M. Abyss.* n. 492 b; C. M. *Syn. I*, p. 515.

l. — M. *Abyss.*

cylindrica *Bryol. germ.* — *E. apophysata*.

Daviesii Sm. — *Glyphomitrium*.

elongata Funk. — *E. ciliata*.

emersa C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 354.

2? — *Am. merid.*: *Argentin. subtrop.*

extinctoria Sw. — *E. vulgaris*.

(1) Cf. W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 285 et *II ed.*, p. 341.

filiformis Roth. -- *Pterigynandrum*.

fimbriata Brid. — *E. ciliata*.

var. *alpina* H. et T. — *E. commutata*.

var. *elongata* Brid. — *E. ciliata*.

gracilis Roth. — *Pterogonium*.

grandis Sw. — *E. streptocarpa*.

intermedia Jur. Beitr.... p. 595.

1. — As. : Kurdistan.

lacera Ren. et Card. in Rev. bryol. 1892, p. 91.

— Am. sept. : Oregon.

lacera de Not. — *E. commutata*.

laciniata Lindb. — *E. ciliata*.

laevigata Br. — *E. vulgaris* var. *mutica*.

lanceolata Hedw. — *Pottia*.

leiocarpa Kindb. in Bull. Torr. bot. Club., XVII, p. 273.

1. Rupic. — Am. sept. : Alp. Columb. brit.

leiomitria C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 94.

E. rhabdocarpa var. *leiomitria* Kindb. in Ott. Natur. IV, p. 61.

1. Rupic. — Am. sept. : Athabasca.

leptodon { Hpe. — *E. rhabdocarpa*.
Br. — *E. vulgaris*.

var. *extinctoria* Lindb. — *E. vulgaris*.

? *ligulata* Spr. — *Scopelophila*.

longicolla Bryol. eur. III (mon. p. 12), 202; C. M. Syn. I, p. 518; W. P. Sch. op. cit. p. 345.

1. Terr. — Eur. : Alp. Norveg., Carinth., Tirol., Jurass., Helvet., Car-niol., Bavar.

Exs. : Un. itin. 1873, n. 46.

var. *brevicolla* Bryol. eur. — *E. brevicolla*.

longipes Mitt. — *E. procera*.

Macounii Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. 97.

E. borealis Kindb.

E. ciliata Drumm. M. bor. am. I ed. n. 50.

1. Rupic. — Am. sept. : Groenland, New Brunswick, Gaspes., Onta-rio, lac. Erie, Super., Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., fret. Behring, ins. Vancouver.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 133.

mexicana C. M. Syn. I, p. 516.

1. — Am. sept. : Mexico.

microphylla Bryol. germ. II, p. 44, t. 14; C. M. Syn. I, p. 517 (1).

E. apophysata var. *c.* Rab. Deutsch. Kryptfl. II, III, p. 171.

E. rhabdocarpa forma ? Lindb. Contrib. ad Fl. crypt. As. bor. or. p. 269, in adn.

1. — Eur. : Tirol.

microstoma Bals. et de Not. — *E. ciliata* var. *microstoma*.

Novae Valesiae Hpe. in Linn. 1871-73, p. 513.

— Pac. : Austral. or.

(1) Cf. Limpr. Laumb. Deutschl. I, p. 117.

obtusifolia Funk. — *E. vulgaris* var. *mutica*.

Orsinii de Not. — *E. vulgaris*.

parasitica Sw. — *Calymperes*.

pilifera Funk. — *E. vulgaris* var. *pilifera*.

procera Br. in sched. *Un. itin.* 1829 et in *Denkschr. Akad. zu München*, 1828, p. 283, t. II; *Bryol. eur.* III (mon. p. 14), t. 205; *C. M. Syn.* I, p. 521; *W. P. Sch. op. cit.* p. 346.

E. longipes Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 29, t. 5; *Mac. Canad. M.* n. 474.

E. streptocarpa Hook. in *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 48.

Leersia procera Lindb. *M. Scand.* p. 20.

1. In rup. fissur. humid. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursorum, Norveg., Dania. *As.*: Jenissei med. et infer. *Am. sept.*: Groenland, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit.

Exs.: *Mac. Canad. M.* 565.

rhabdocarpa Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 56, t. 17; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 142; *Bryol. eur.* III (mon. p. 13), t. 204; *C. M. Syn.* I, p. 520; *W. P. Sch. op. cit.* p. 342.

E. affinis Hedw. f. in *W. et M. Beitr.* I, p. 121, t. 4 (fid. *W. P. Sch.*).

E. ciliata β *rhabdocarpa* H. et T. *Muscol. brit.* p. 35.

E. leptodon Hpe. in sched.

E. rhabdocarpa β *leptodon* Lindb. in *Oefv....* XXIII, p. 551.

E. streptocarpa Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 312.

E. vulgaris var. *elongata* Milde *Bryol. Siles.* p. 182.

E. Wimmeriana Sendtn. mss.; *Milde Bryol. Siles.* p. 182 (fid. *Limpr.*).

Leersia rhabdocarpa Lindb. *M. Scand.* p. 20 (1).

L. vulgaris β *alpina* Brid. *M. Rec.* II, I, p. 53.

1. Ad terr. et in fiss. rup. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursorum; in subalp. et alp. zon. intermed. et sept. *As.*: Penins. Tschutschica, Jeniss. med. et inf., Tibet occ., Kurdistan, Pers., Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Groenland, Gaspes., Alberta, M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, Washington, Colorado, Idaho, Nevada, Montana.

Exs.: *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 51.

Mac. Canad. M. n. 131.

Rab. Bryoth. eur. n. 70, 427, 535, 1306.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 166.

Un. itin. 1867, n. 92, 93.

« var. *gymnostoma* (Lindb. et Arn.) Par.

Leersia rhabdocarpa var. *gymnostoma* L. et A. M. *As. bor.* 1890, II, p. 63.

— *As.*: Jenissei inf.

« var. *microstoma* Breidl. in sched. et in *Limpr. Laubm. Deutschl.* I, p. 115.

Ad rup. calcar. — *Eur.*: Alp. Stir.

rhabdocarpa Drumm. — *E. cucullata*.

var. *leiomitria* Kindb. — *E. leiomitria*.

var. *leptodon* Lindb. — *E. rhabdocarpa*.

var. *pilifera* Schwaegr. — *E. spathulata*.

forma? Lindb. — *E. microphylla*.

sandwichensis Sull. *Am. Expl. Exped.* 1859, p. 6.

1.

— *Pac.*: Ins. Sandwic.

(1) Cf. Lindb. l. c. n. 162 in adnot.

Selwyni Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. 109.

Leersia Selwyni D^{na} E. G. Britt. in Bull. Torr. bot. Club, 1891, p. 50.

1. Rupic. — Am. sept.: Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Idaho.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 134.

spathulata C. M. Syn. I, p. 519 (1).

E. rhabdocarpa β pilifera Schwaegr. in Wilk. M. Hispan.

Leersia spathulata Lindb. M. Scand. p. 20.

1. Ad mur et rup. — Eur.: Transilv., Stiria, Tirol., alp. Hispan.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 1163.

spathulata Mac. — *E. subspathulata*.

squarrosa Brid. — *Leptodontium epunctatum*.

streptocarpa Hedw. Sp. M. p. 62, t. 10; Brid. Bryol. univ. I, p. 44; Bryol. eur. III (mon. p. 15), t. 204; C. M. Syn. I, p. 521; W. P. Sch. op. cit. p. 347.

Bryum ciliare Dicks. Fasc. IV Pl. Crypt. p. 16.

Br. contortum Wulf in Jacq. Coll. II, p. 236.

E. ciliata Hoppe in Sturm Deutsch. Fl. II, III.

E. contorta Lindb. in Oefv.... 1863, n. 7.

E. grandis Sw. in Schrad. Bot. Journ. II, p. 172.

Hypnum saxatile erectum ramulis teretibus foliis subrotundis saturate viridibus Dill. Hist. M. p. 385, t. 43, f. 71.

Leersia contorta Lindb. M. Scand. p. 20.

Streptocarpus contortus Schwaegr. in Hpe. Fl. Hercyn.

2. Ad mur., saxa, rupes. — Eur.: E reg. campestr. usq. in alp. zon. interm., rar. sept. As.: Jenissei med., Caucas. occ. et centr. Am. sept.: Ontario, M. Rupestr., Allegh., New Jersey, Pensilv., Calif.

Exs.: Mac. Canad. M. p. 135.

Rab. Bryoth. eur. n. 68.

streptocarpa } Hook. — *E. procera*.
} Wahlenb. — *E. rhabdocarpa*.

subspathulata C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 93.

E. spathulata Mac. Canad. M. n. 421.

1. Terr. — Am. sept.: Columb. brit.

tasmanica Hpe. in Linn. 1853, p. 491.

E. vulgaris ej. op. cit. 1852, p. 713.

1. — Pac.: Austral.

tibetana Mitt. M. Ind. or. p. 42.

1. — As.: Tibet occ.

trachymitria Rip. — *E. vulgaris* var. *trachymitria*.

vernica W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1626.

— Am. merid.: And. Boliv.

vulgaris Hedw. Sp. M. p. 60; Brid. Bryol. univ. I, p. 139; Bryol. eur. III (mon. p. 9), t. 198; C. M. Syn. I, p. 516; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 341.

Bryum calyptra extinatorii forma minus Dill. Hist. M. p. 249, t. 45, f. 8.

Br. extitorium L. Sp. Pl. p. 158 p.p.

E. extintoria Sw. M. Suec. p. 24.

E. leptodon Br. in sched. (f. peristom.).

E. leptodon var. *extinctoria* Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn., 1872, p. 268.

E. Orsinii de Not. Syll. p. 267.

E. vulgaris β *apiculata* Brid. Bryol. univ. I, p. 541.

Leersia extinctoria Leyss. Fl. Hall. n. 1053.

L. marginata Hedw. Fund. M. II, p. 103.

L. vulgaris ej. M. frond. I, p. 46, t. 18.

Mnium extinctorium L. f. Meth. M. p. 365.

1. Ad terram et mur. — Eur. : Reg. campestr., zon frigidiss. except. As. : Lac. Baikal, Tibet occ., Caucas. occ. et centr., Persia, Mesopot., As. min. Afr. : Alger., C. B. Sp. Am. sept. : Terr. nov., Ontario, Alaska, M. Rupestr., Oregon, Idaho, Montana, Nov. Angl., Calif. Pac. : Tasman.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 70, 254, 427, 964.

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 167.

var. *apiculata* Brid. — *E. vulgaris*.

« var. *elongata* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

In fiss. rup. calcar. — Eur. : Jura helvet. et germ. Am. sept. : Passim.

var. *elongata* Milde. — *E. rhabdocarpa*.

« var. *mutica* Brid. Mant. M. p. 28 et Bryol. univ. l. c.

E. laevigata Br. mss. ; Bryol. germ. II, I, p. 35, t. 14, f. I.

E. mutica β *obtusa* Bryol. germ. II, I, p. 35.

Ut typ. — Eur. : Cum typ. As. : Caucas. (Tiflis). Am. sept. : Passim : Colorado, Idaho, etc. Pac. : Tasman.

var. *obtusa* Bryol. eur. — *E. vulgaris* var. *mutica*.

« var. *pilifera* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

E. pilifera Funk in Brid. Bryol. univ. I, p. 141.

Leersia extinctoria β *pilifera* Lindb. M. Scand. p. 20.

Ad mur. calcar. — Eur. : Passim; Ross. or. Am. sept. : Passim; Idaho, Washington, etc.

« var. *trachymitria* (Rip.) Husnot Muscol. gall. p. 197.

E. trachymitria Ripart in Rev. bryol. 1877, p. 51.

— Eur. : Gall. centr.

Wimmeriana Sendtn. — *E. rhabdocarpa* (1).

ENDOTRICHELLA C. M. in Linn. 1871-73, p. 156 (9 spec.).

angustifolia (Mitt.) C. M. M. Polyn. p. 75.

Garovaglia angustifolia Mitt. Sam. M. p. 170.

— Pac. : Absque loc. spec.

Campbelliana Hpe. in Linn. 1874, p. 665.

Garovaglia Campbelliana Jaeg. Ad. II, p. 137.

2. — Pac. : Nov. Hebrid. (Aneitum).

Dietrichiae C. M. in Linn. 1872, p. 155.

2. — Pac. : Austral. or.

Graeffeana C. M. M. Polyn. p. 174.

Endotrichum elegans Sull. in Exped. Wilkes, p. 20?

2. — Pac. : Ins. Fidji.

(1) In Enum. Kindberg. nom. nudum :
E. brevipes C. M.

lepidula C. M. in *Linn.* 1872, p. 157.

Ster. — *Pac.* : Austral. sept. or.

moluccensis Jaeg. — Garovaglia.

Novae Hannoverae C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 84 et in *Forschungsreise....* p. 46.

Ster. Arbor. — *Pac.* : Nov. Hannoveria.

pulchra Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc. of N. S. Wales.* 1882, p. 105.

— *Pac.* : Nov. Guinea.

samoana C. M. *Polyn.* p. 73.

Garovaglia samoana Mitt. *Sam. M.* p. 167.

2. — *Pac.* : Ins. Samoa.

Wallisii C. M. *op. cit.* p. 74.

2. — *As.* : Ins. Philippin.

ENDOTRICHUM *Bryol. jav. II.*

Species omn. non indicatae sunt GAROVAGLIAE ejusd. nom.

ceylonicum Jaeg. — Pterobryum.

crassicaule Jaeg. — Pterobryum.

densum } Dz. et Mk. — Garovaglia plicata.
Sull. — Garovaglia Powellii?

elegans Sull. — Endotrichella Graeffeana?

japonicum Besch. — *Ædicladium*.

ENTODON C. M. in *Bot. Zeit.* 1844, p. 740 (emend.) (4 spec.).

Spec. omn. non indicatae sunt CYLINDROTHECIA ejusd. nom.

abbreviatus Mitt. — *Cylindrothecium* Challengeri.

abyssinicus Jaeg. — *Cylindrothecium* Schimper.

angustifolius Besch. — *Cylindrothecium* Hahnianum.

argentinus C. M. — *Erythrodontium*.

compressus C. M. — *Cylindrothecium* concinnum.

consanguineus Mitt. — *Erythrodontium*.

densus Mitt. — *Erythrodontium*.

denticulatus C. M. — *Cylindrothecium* argyraeum.

drepanioides (Ren. et Card.) Par.

Campylodontium drepanioides R. et C. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, p. 201.

2? ♂ ign. Ad ramul. — *Am. sept.* : Costa Rica.

enervis Rehm. — *Cylindrothecium* Dregeanum var. imbricatum.

Engleri Broth. — *Erythrodontium*.

europaeus Bryol. eur. (in tabula). — *Cylindrothecium* cladorhizans.

fissidens C. M. — *Cylindrothecium* virens.

Hampeanus C. M. p.p. } *Cylindrothecium*.
} *Cylindrothecium* distans.

insidiosus Spr. — *Cylindrothecium* concinnum.

macropodus C. M. p.p. — } *Cylindrothecium*.
} *Cylindrothecium* pallesceas.

Montagnei C. M. — *Cylindrothecium* concinnum.

myurus Hpe. — *Cylindrothecium* complicatum?

onustus (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 523.

Campylodontium onustus Jaeg. *Ad. II.* p. 344.

Mesodon onustus Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, p. 366.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat et Peruv.

orthocarpus Lindb. — *Cylindrothecium concinnum*.

palatinus Lindb. — *Platygyrium repens*.

pallidissimus C. M. — *Erythrodontium*.

perjulacens C. M. — *Erythrodontium*.

plicatus Hpe. — *E. Regnellianus*.

? *Puiggarii* Geh. et Hpe. mss.; *Jaeg. Ad. II*, p. 775.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Regnellianus (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 523.

Campylodontium Regnellianum *Jaeg. Ad. II*, p. 344.

E. plicatus Hpe. in *Linn.* 1849, p. 582.

Neckera Regnelliana C. M. *Syn. II*, p. 168.

l. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

rotundifolius C. M. — *Erythrodontium*.

rupestris C. M. — *Erythrodontium cylindricaule* var. *rupestris*.

Schleicheri Lindb. — *Cylindrothecium cladorhizans*.

Schwaegrichenii C. M. — *Cylindrothecium columnare*.

squarrosus Mitt. — *Erythrodontium*.

teres Mitt. — *Erythrodontium*.

transsilvanicus Demet. — *Cylindrothecium cladorhizans*.

ENTOPOGON C. M. mss.

cylindricus C. M. — *Eriodon conostomus*.

ENTOSTHODON Schwaegr. Suppl. II, I, p. 44 (emend.) (75 spec.).

acidotus (Tayl.) C. M. *Syn. II*, p. 547; Mitt. *M. austr. am.* p. 245.

Amphoritheca acidotus *Jaeg. Ad. I*, p. 497.

Gymnostomum acidotum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 279.

l. — *Am. merid.* : And. Quitens.

acutifolius Hpe. mss.; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 198.

l. — *Am. merid.* : And. Venezuel.

Amblyodon W. P. Sch. in W. Sch. *M. Abyss.*

— *Afr.* : Abyssin.

ampliretis Rehm. — *E. marginatus*.

andicola Mitt. *op. cit.* p. 244.

Amphoritheca andicola *Jaeg. l. c.*

— *Am. merid.* : And. Quitens.

angustifolius Jur. et Milde *Beitr....* p. 595.

Amphoritheca angustifolia *Jaeg. l. c.*

— *As.* : Kurdistan.

antarcticus C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise...* p. 10.

— *Afr.* : Ins. Kerguelen.

apiculatus W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1646.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

apophysatus (Tayl.) Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 80.

E. Taylora C. M. *Syn. I*, p. 122.

Gymnostomum apophysatum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 43.

Physcomitrium apophysatum Wils. *ibid.* p. 448; H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. Fl. II*, p. 91, t. 86, f. 6 et *Handb.* p. 451.

— *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

aristatus (Broth.) Par.

Funaria aristata Broth. in *Oefv.*.... 1893.

1. Terr. — Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).

Balansae Besch. Not. M. Paraguay, p. 263.

Amphoritheca Balansae Jaeg. Ad. II, p. 696.

Terr. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1226, 1227, 1228, 1233.

Beccarii (Hpe.) Par.

Amphoritheca Beccarii Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 273.

2. — As. : Ceylan.

Bergianus Bryol. eur. III (mon. p. 4) ; C. M. Syn. I, p. 126 et II, p. 458.

Bergia (absque nom. spec.) Fürnr. in *Bot. Zeit.* 1829, *Erganz. Bl.* p. 20.

Dermostomum (id.) Hsch. in *Linn.* 1841, p. 116.

Physcomitrium E. Bergianum C. M. in *Linn.* 1844, p. 696.

Weisia Bergiana Hsch. in *Hor. Phys. Berol.* p. 59, t. 12.

— Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 172.

Bolanderi Lesq. in *Trans. of the Am. Phil. Soc.* XIII, p. 10; *Sull. Ic.*

M. Suppl. p. 28, t. 17; *Lesq. et Jam. Man.* p. 199.

1. In terr. argill. — Am. sept. : Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 236.

Bonplandi (Brid.) Mitt. M. austr. am. p. 245.

Amphoritheca Bonplandi Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 5.

Gymnostomum Physcomitrium Bonplandi Brid. *Bryol. univ.* I, p. 101.

Physcomitrium Bonplandi C. M. Syn. I, p. 118.

Terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or., Chile.

borbonicus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 87.

1. Terr. — Afr. : Ins. Bourboniae.

brachyodus Mont. — E. Mathewsi var. integrifolius.

Buseanus Bryol. jav. I, p. 31, t. 22; Mitt. M. Ind. or. p. 54.

Amphoritheca Buseana Jaeg. Ad. I, p. 496.

Entostodon flavescens Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 329.

— As. : M. Neilgherries, Ceylan.

var. *robustior* Bryol. jav. -- E. Dozyanus.

chiloënsis Mitt. M. austr. am. p. 245.

— Am. merid. : Ins. Chiloë.

chlorophyllosus Rehm. M. Afr. austr. n. 522.

— Afr. : C. B. Sp.

clavaeformis Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 490.

— Pac. : Austral. or.

clavellatus Mitt. op. cit. p. 244.

Amphorithera clavellata Jaeg. l. c. p. 498.

— Am. merid. : Montevideo.

commutatus DR. et Mont. in *Fl. Alg.* t. 35, f. 3 et *Syll.* p. 31 ; C. M. Syn. II, p. 548.

Funaria commutata Lindb. in *Notiz.*

Terr. in coll. — Eur. : Neap. Afr. : Alger.

Curnowii Dav. — E. ericetorum.

? *curvi-apiculatus* C. M. in *Fl.* 1874, n. 31.

E. pallescens fol. latior. *Ltz.* ?

1. Muric. — *Afr.* : *Ægypt.* sup.

curvipes C. M. *Syn.* I, p. 123 et II, p. 548.

Physcomitrium E. curvipes ej. in *Linn.* 1844, p. 697.

— *Afr.* : Alp. Abyss., M. Cameroon.

« *var. robustior* C. M. *Syn.* II, cc.

Funaria radians Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 450.

— *Afr.* : Abyss.

curvisetus C. M. — *Funaria*.

diversinervis C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 20 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 55.

Amphoritheca diversinervis Jaeg. *Ad.* I, p. 498.

1. — *As.* : M. Neilgherr.

Dozyanus C. M. in *Bot. Zeit.* 1853 (1).

Aphanorhegma Dozyanum Jaeg. *Ad.* II, p. 696.

E. Buseanus β *robustior* *Bryol. jav.* I, p. 31, t. 22.

1. — *As.* : Java.

Drummondii Sull. *M. of U. St.* p. 51, t. 4 et *Id. M.* p. 91, t. 55 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 199.

E. obtusifolius H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 36.

Funaria Drummondii Lindb. *Manip. M.* I, p. 62.

1. Ad terr. argill. — *Am. sept.* : *Rar.* : *Carol. mer.*, Alabama inf., *Ludovic.*

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 156 b et II ed. n. 235.

Duriei Mont. *Fl. Alg.* t. 35, f. 4 et *Syll.* p. 30 ; C. M. *Syn.* II, p. 547.

1. Ad rup. calc. humid. — *Afr.* : *Alger.*

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1056.

ericetorum (*Bals. et de Not.*) C. M. *Syn.* I, p. 122 et II, p. 547 ; W. P. *Sch. Syn.* II ed. p. 378.

Amphoritheca ericetorum Jaeg. *Ad.* I, p. 496.

Bryum obtusum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 5, t. 4, f. 7.

E. Curnovii Dav. in Lindb. *Man. M.* I, p. 59 in *adn. (nom.)* et p. 66 (*ut syn.*)

E. obtusum Lindb. in *Oefv.* 1864, p. 221 (*in obs.*).

Funaria obtusa ej. *Man. M.* I, p. 65.

Gymnostomum affine Hüb. *Muscol. germ.* p. 42 p.p.

G. Bonplandi Behgr. in *Reg. Bot. Zeit.* 1836, I, p. III.

G. dubium Brid. *M. Rec.* II, I, p. 42.

G. ericetorum *Bals. et de Not. Pug.* p. 27.

G. fasciculare Hook. et Tayl. *M. brit.* p. 23, t. 7.

G. Heimii β *obtusum* Hook. *Muscol. brit.* p. 12.

G. obtusum Hedw. *Sp. M.* p. 34, t. 2, f. I-3 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 73.

Physcomitrium Bonplandi de Not. *Syll.* p. 283.

Ph. ericetorum *Bryol. eur.* III (*mon.* p. 13), t. 300.

1. In ericet. — *Eur.* : *Reg. campestr. zon. interm. et merid.* *Afr.* : *Alger.*

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 22, 428, 655, 1391.

« *var. Ahnfeldti* W. P. *Sch. Syn.* I ed. p. 317 et II ed. l. c.

Gymnostomum ericetorum Fr. *Novit. et in Hartm. Skand. Fl.* III ed. p. 263.

(1) *Fid.* Jaeg. *Ad.* I, p. 500 ; non inveni.

Hymenostomum ericetorum Grev. mss. ; *Fr. St. agr. Femsj.* p. 100.
Physcomitrium ericetorum Hartm. *Skand. Fl. IV* ed., p. 365.

Ut typ. — *Eur.* : Scandin. (Smolandia).

« *var. longifolia* W. P. Sch. l. c.

Ut typ. — *Eur.* : Palat., Alsat., Gall. mer. occ., Sardin.

« *var. Notarisii* W. P. Sch. l. c.

E. Notarisii ej. in *de Not. Epil.* p. 455.

Ut typ. — *Eur.* : Liguria.

enrystomus Mitt. *M. austr. am.* p. 245.

— *Am. merid.* : And. Quitens. ; Peruv.

fascicularis C. M. — *Funaria*.

flavescens Wils. — *E. Buseanus*.

flexisetus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 263.

l. Limic. — *Am. merid.* : Argentin. subtrop.

gracilis Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 91, t. 86, f. 7 et
Handb. p. 451.

— *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

Hildebrandti C. M. in *Fl.* 1879, p. 379.

— *Afr.* : M. Kenia, Kilima N'djaro.

Holstii (Broth.) Par.

Funaria Holstii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 187.

l. — *Afr.* : Usambara.

Husnoti W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 29.

Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Martinic.

italicus Rota Cat. M. Bergom. ; *de Not. Epil.* p. 753.

In argill. — *Eur.* : Ital. super.

japonicus Lindb. — *Physcomitrium*.

javanicus Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 321 ; *Bryol. jav.* 1, p. 33, t. 24.

l. Terr. — *As.* : Java.

Krausei Besch. in *Journ. de Bot.* 1894, p. 44, t. I, fig. 5-8.

l. — *Afr.* : Teneriffa.

latifolius Hook. — *E. Mathewsii* var. *latifolius*.

laxus H. f. et W. — *Physcomitrium*.

Lepervanchei Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 87.

— *Afr.* : Ins. Borbon.

limbatus C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 155.

E. submarginatus W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

Lindigii (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 243.

Amphoritheca Lindigii Hpe. in *Ann. Sc. nat. V*, ser. III, p. 341.

Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

longicollis Mitt. op. cit. p. 244.

Amphoritheca longicollis Jaeg. *Ad. I*, p. 498.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

longicollis W. P. Sch. — *E. Rottleri*.

- longisetus* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 48.
Amphoritheca longiseta Jaeg. *Ad. I*, p. 499.
 — *Am. sept.* : Mexic.
- lutescens* (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 245.
Amphoritheca lutescens Hpe. *op. cit.* p. 339.
 l. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- Mandoni* W. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1625.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- marginatulus* C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 204.
 — *Afr.* : Madagascar.
- marginatus* C. M. *Syn. I*, p. 125 et *II*, p. 548.
E. ampliretis Rehm. *M. Afr. austr.* n. 174.
 — *Afr.* : C. B. Sp., Natal.
Ews. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 520.
- Mathewsii* Hook. *Ic. pl. rar. IV*, 1841, t. 245 B; C. M. *Syn. I*, p. 124;
 Mitt. *op. et l. cc.*
Physcomitrium E. Mathewsii C. M. in *Linn.* 1844, p. 697.
 Ad terr. humid. — *Am. merid.* : Peruv.
- « *var. integer* C. M. *Syn. I*, l. c. et *II*, p. 548.
E. brachyodus Mont. in *sched. et in Fl. Chil.*
Funaria Fontanesii *Bryol. eur. III* (mon. p. 5), et C. M. *Syn. I*, p. 112
 (quoad pl. Chil.).
 Ut typ. — *Am. merid.* : Chile.
- « *var. latifolius* C. M. *ll. c.c.*
E. latifolius Hook. l. c. t. 245 c.
Physcomitrium E. Mathewsii C. M. l. c.
 — *Am. merid.* : Peruv.
- mauritanus* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 87.
Syn. Terr. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- micropyxis* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 175.
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- minimus* Husn. — *Splachnobryum Wrightii*.
- Mittenii* *Bryol. jav. I*, p. 32, t. 23.
Meesea Mittenii C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. (fid. Jaeg. *Ad. I*, p. 517).
 l. — *As.* : Java.
- Mustaphae* Trabut *Atl. Fl. d'Alg. et in Rev. bryol.* 1881, p. 13.
 Ad rup. calcar. — *Afr.* : Alger.
- niloticus* W. P. Sch. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 747; *Ltz. M. Ehrenb.* p. 38,
 t. 8, f. 3.
 Terr. — *Afr.* : Ægypt. inf.
- Notarisii* W. P. Sch. — *E. ericetorum* var. *Notarisii*.
- noumeanus* *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 212.
 — *Pac.* : Nov. Caled.
- nutans* (Wils.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 55.
Amphoritheca nutans Jaeg. *Ad. I*, p. 499.
Physcomitrium nutans Wils. in *Kew Journ. bot.* I, p. 329.
 — *As.* : Penjab.

obtusifolius Hook. *Ic. pl. rar. t. 245 A*; *C. M. Syn. I, p. 125 et II, p. 548*;
Mitt. M. austr. am. p. 244.

Amphoritheca obtusifolia Jaeg. *Ad. I, p. 498.*

Physcomitrium E. obtusifolium C. M. in *Linn. 1844, p. 697.*

— *Am. merid.* : Peruv.

obtusifolius H. f. et W. — *E. Drummondii.*

obtus Lindb. — *E. ericetorum.*

orthocarpus Jaeg. — *Funaria.*

pallescens Jur. in *Ung. et Ky. « die Insel Cypern » p. 70.*

— *Eur.* : Ins. Zante. *As.* : Ins. Cypr. *Afr.* : Ægypt.

inf.

papillosus C. M. in *Linn. 1880-83, p. 358.*

— *Am. merid.* : Argentin. Tucum.

pellucidus C. M. in *Bot. Zeit. 1855, p. 747.*

I. — *Am. sept.* : Martinic.

Perrottetii (Mont.) Mitt. *M. Ind. or. p. 55.*

Physcomitrium ? Perrottetii Mont. in *Ann. sc. nat. 1841, p. 256 et Syll.*
p. 30; *C. M. Syn. I, p. 117.*

Terr. — *As.* : M. Neilgherr. *Pac.* : Nov. Zeland.

pilifer Mitt. *op. et l. cc.*

? *Amphoritheca pilifera* Jaeg. *Ad. II, p. 696.*

— *As.* : Tibet occ.

phycomitrioides Mitt. — *Funaria.*

plagiothecius C. M. in *Linn. 1878-79, p. 261.*

Ster. — *Am. merid.* : Uruguay.

planifolius Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 304.*

Amphoritheca planifolia Jaeg. *Ad. I, p. 497.*

I. — *As.* : Ceylan.

productus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 80*; *Fl. Tasm. II,*
p. 197, t. 175, f. I.

I. Terr. — *Pac.* : Tasman.

pseudo-marginatus (Hpe.) Mitt. *M. austr. am. p. 243.*

Amphoritheca pseudo-marginata Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III, p. 310.*

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Puiggarii Geh. et Hpe. in *Fl. 1881, p.*

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

radians (Hedw.) C. M. *Syn. I, p. 122 et II, p. 548.*

Bryum radians P. B. *Prodr. p. 49.*

Eremodon radians Brid. *Bryol. univ. I, p. 236.*

Weisia radians Hedw. *Op. posth. p. 73, t. 13.*

— *Pac.* : Ins. austral., Tasman.

rhizomaticus C. M. in *Linn. 1878-79, p. 262.*

I. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. Tucuman.

rhomboideus Shaw in Rehm. *M. Afr. austr. n. 523 et b.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

Rottleri (Schwaegr.) C. M. *Syn. I, p. 121.*

E. longicollis W. P. Sch. in Breutel *M. Capens.*

Gymnostomum Rottleri Schwaegr. *Suppl. I, I, p. 24, t. 3.*

Physcomitrium Rottleri Hpe. in *Linn.* 1844, p. 696
Rottleria gymnostomoides Brid. *Bryol. univ.* I, p. 105.
 2. Muric. — As. : Tranquebar. Af. : C. B. Sp.

rupestris Brid. — E. Templetoni.

submarginatus C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 20.

Amphoritheca submarginata Jaeg. *Ad.* I, p. 495.

1. — As. : M. Neilgherr.

submarginatus W. P. Sch. — E. limbatus.

Taylori C. M. — E. apophysatus.

Templetoni (Hook.) *Schwaegr. Suppl.* II, I, p. 44, t. 113; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 879; *Bryol. eur.* III (mon. p. 3), t. 302; C. M. *Syn.* I, p. 124 et II, p. 548; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 379.

Bryum attenuatum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 8; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 638 p.p. (fid. Lindb.).

Entosthodon rupestris Brid. *Bryol. univ.* I, p. 379 (int. syn.).

Eremodon longicollis ej. l. c. p. 234.

Funaria attenuata Lindb. *Man. M.* I, p. 63.

F. Fontanesii Bals. et de Not. *Prodr. Fl. Mediol.* p. 32.

F. Templetoni Engl. *Bot.* t. 2524.

Gymnostomum Physcomitrium latifolium Thom. in *Brid.* l. c. p. 760.

G. piriforme Brid. *Sp. M.* I, p. 27 p.p.

Orthopyxis ? *attenuata* P. B. *Prodr.* p. 79 (fid. Lindb.).

Physcomitrium Entosthodon Templetoni C. M. in *Linn.* 1844, p. 696.

Ph. latifolium Brid. *Bryol. univ.* II, p. 815.

Ph. Soleirolii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1857.

Splachnum Juressi *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 55; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 263; C. M. *Syn.* I, p. 148.

Weisia longicollis Link, mss.; *Brid. Mant. M.* p. 45.

W. Templetoni Hook. in *Curt. Fl. Lond.* II ed., c. ic.; *H. et T. Muscol. brit.* p. 42, t. 14.

1. Ad terr. humid. et in rup. fiss. — Eur. : Britann., zon. merid. As. : M. Sinaï. Afr. : Alger., Ægypt., Teneriff., Madeir., ins. Azor. Am. sept. : Calif.

Exs. : Mandon Pl. Mad. n. 17.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 508.

Trumffii C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 198.

1. — Am. merid. : And. Venezuel.

undulatus (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 243.

Amphoritheca undulata Hpe. in *Ann. sc. nat.* V ser., III, p. 340.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

usambaricus (Broth.) Par.

Funaria usambarica Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 187.

1. — Afr. : Usambara.

Wallichii Mitt. *M. Ind. or.* p. 55.

? *Amphoritheca Wallichii* Jaeg. *Ad.* II, p. 696.

Weisia Templetoni Griff. *Not.* p. 406 et *Ic. pl. asiat.* II, t. 78, f. 11.

— As. : Nepal., Khasia (1).

ENTOSTHYMENIUM Brid. *Bryol. univ.* I, p. 761 (1 spec.).

mucronifolium Br. — *Pottia lanceolata* var. *angustata*.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

E. ampullaceus C. M.

E. Frietzei Geh.

E. Sullivani C. M.

E. varius Mitt.

tristichum *Brid. l. c.*; *C. M. Syn. II*, p. 635.

2 ? — *Eur.*: Gall. austr. occ. (1).

EPHEMERELLA *C. M. Syn. I*, p. 34 (5 spec.).

caldensis *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 197.

Phascum caldense *Lindb. in Oefv.* . . 1863.

1. Paludic. — *Am. merid.*: Brasil. or.

Flotowiana (*Funk*) *Bryol. eur. Suppl. fasc. I-II*, t. I; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 10.

Ephemerum cohaerens *Bryol. eur. I* (mon. p. 6), t. I p.p.; *C. M. Syn. I*, p. 32 p.p.

E. cohaerens γ *Flotowianum* *Hpe. in Fl.* 1837, p. 285.

E. Flotowianum *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 168.

Phascum Flotowianum *Fk. in Brid. Bryol. univ. I*, p. 754.

2. In terra subaren. — *Eur.*: Brandenburg.

pachycarpa *C. M.* — *E. recurvifolia*.

recurvifolia (*Dicks.*) *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 7 et *II ed.* p. 9.

E. pachycarpa *C. M. Syn. I*, p. 34 et *II*, p. 522.

Ephemerum pachycarpum *Hpe. in Fl.* 1837, p. 285; *Bryol. eur. I* (mon. p. 8), t. 2.

E. recurvifolium *Hpe. l. c. excl. sp. in ej. Veget. cell. Germ. sept.* . . . n. 42 ad *Physcomitrellam patentem* pertin. (*C. M. l. c.*).

E. stenophyllum *Voit in Sturm. Deutsch. Fl. II*, Heft. 14 (fid. *Lindb. Trich. eur.* p. 3).

Phascum crassinervium *Grev. Scot. crypt. Fl.*

Ph. Dicksoni *Brid. Mant. M.* p. 7.

Ph. pachycarpum *Schwaegr. Suppl. I*, I, p. 4, t. 2 (? fid. *W. P. Sch.*).

Ph. patens β *recurvifolium* *Sm. Fl. brit. III*, p. 1180.

Ph. recurvifolium *Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. I*, t. 10, f. 2; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 31.

Physidium pachycarpum *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 101.

2. Ad terr. argill. — *Eur.*: Fenn., Angl., Gall., German., Etrur.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 1053.

Rehmanni *C. M. in Fl.* 1888, n. 1.

— *Afr.*: C. B. Sp.

verrucosa *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 187.

1 vel 2. Ad terr. humid. — *Pac.*: Nov. Caled.

EPHEMERUM *Hpe. in Fl.* 1837, p. 285 (24 spec.).

æquinoctiale *Spr. in Mitt. M. austr. am.* p. 239; *Jaeg. M. cleist.* p. 41. Terr. — *Am. merid.*: Amazon.

æthiopicum *Welw. et Duby in Mémoires... Genève*, 1871, p. 19, t. 3, f. 8. 2. Ad terr. humid. — *Afr.*: Angola.

Austini *Sull. mss.*

Micromitrium Austini *Aust. M. Appal. n.* 45; *Sull. Ic. M. Suppl. p.* 21, t. 12; *Lesq. et Jam. Man.* p. 37.

Syn. Ad terr. humid. — *Am. sept.*: New Jersey.

capense *C. M. in Fl.* 1888, n. 1.

— *Afr.*: C. B. Sp.

(1) « In herbario Bridelii non observavimus ». *C. M. l. c.*

- cohaerens (*Hedw.*) *Hpe. in Fl.* 1837, p. 285; *Bryol. eur. I* (mon. p. 6), t. 1 p.p.; *C. M. Syn. I*, p. 32 p.p.; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 4; *Jaeg. M. cleist.* p. 41.
Phascum cohaerens Hedw. Sp. M. p. 25, t. 1, f. 1-6; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 29.
 2. In terr. arenac. argill. humid. — *Eur.*: Vall. Rhen., Thuring., Siles., Hungar., Bohem., Austr., Carniole, Istria, Gall. centr. *Am. sept.*: Reg. or.
Exs.: Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 4. (*Phascum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 160, 1101.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 29.
 α *var. heterophyllum Bryol. eur. l. c.*
 Phascum heterophyllum de Not. Spic. p. 23 et *Syll.* p. 313.
 Ut typ. — *Eur.*: Pedemont.
cohaerens Bryol. eur. p.p. — *Ephemerella Flotowniana*.
 var. Flotowianum Hpe. — *Ephemerella*.
conicum C. M. in Linn. 1878-79, p. 233 et 1880-83, p. 349.
 2? — *Am. merid.*: Paraguay.
conicum Besch. — *E. homomallum*.
crassinervium (Schwaegr.) C. M. Syn. I, p. 33; *Sull. Ic. M.* p. 17, t. 8; *Jaeg. M. cleist.* p. 43.
 Phascum crassinervium Schwaegr. Suppl. I, p. 4, t. 2; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 32; *Sull. M. of. U. St.* p. 14.
 Pseud. 2. In terr. argill. humid. — *Am. sept.*: Reg. centr. et or.
 Exs.: Drumm. *M. bor. am. II ed.* n. 3.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 28 p.p.
crassinervium Hpe. — *E. stenophyllum*.
cristatum C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 101 et *Syn. I*, p. 321; *Jaeg. M. cleist.* p. 44.
 Phascum cristatum H. f. et W. in Hook. Ic. pl. rar. t. 737 a et Fl. Tasm. II, p. 163.
 1. — *Pac.*: Austral. or., Tasman.
fimbriatum C. M. in Linn. 1871-73, p. 145.
 1. — *Pac.*: Austral. or.
Flotowianum Limpr. — *Ephemerella*.
homomallum C. M. in Fl. 1888, n. 1.
 E. conicum Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 17.
 Terr. — *Am. merid.*: Paraguay.
 Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 3621.
hystrix Lindb. Manip. M. II, p. 411.
 Phascum serratum var. angustifolium Drumm. M. bor. am. II ed. n. 2, p.p.
 Pseudo 2. *Terr.* — *Am. sept.*: Ludovicia.
intermedium Mitt. — *E. serratum var. intermedium*.
ligulatum C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57.
 — *Am. merid.*: Paraguay.
 Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 3708.
longifolium W. P. Sch. Syn. II ed. n. 6; *Jaeg. M. cleist.* p. 43.
 — *Afr.*: Alger.
longifolium Phil. — *E. tenerum var. Philiberti*.

minutissimum Lindb. — *E. serratum* var. *angustifolium*.

novale Mitt. — *E. serratum* var. *angustifolium*.

pachycarpum Hpe. — *Ephemerella recurvifolia*.

pallidum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 5 (nom.); Jaeg. M. cleist. p. 42.

E. stenophyllum Lesq. et Jam. Man. p. 39 p.p.

— Am. sept. : Ohio.

papillosum Aust. M. Appal. n. 50; Sull. Ic. M. Suppl. p. 19, t. 10; Lesq. et Jam. Man. p. 38.

Pseud. 2. Terr. et rupic. — Am. sept. : New Jersey, Kansas.

patens Hpe. — *Physcomitrella*.

Pechuelii C. M. in Fl. 1886, p. 502.

2. — Afr. : Stanley Pool.

Philiberti Besch. — *E. tenerum* var. *Philiberti*.

recurvifolium Hpe. pp. — $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ephemerella.} \\ \text{Physcomitrella patens.} \end{array} \right.$

Rutheanum W. P. Sch. Syn. II ed. p. 6; Jaeg. M. cleist. p. 41.

E. serratum var. *Rutheanum* Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 5.

Pseud. 2. Terr. ulig. — Eur. : Brandenburg, Gall. or. (Burgondia).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1251.

serratum (Schreb.) Hpe. in Linn. 1837, p. 285; Bryol. eur. I (mon. p. 6), t. I; C. M. Syn. I, p. 31 et II, p. 521; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 3; Jaeg. M. cleist. p. 39.

Phascum confervoidis Brid. M. Rec. II, I, p. 12.

Ph. *serratum* Schreb. de Phasco p. 9, t. 2; Brid. Bryol. univ. I, pp. 28 et 754.

Ph. *serratum* β *stoloniferum* H. et T. Muscol. brit. p. 5.

Ph. *stoloniferum* Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. I, t. 7, f. I; Brid. op. cit. p. 50.

Ph. *velutinum* Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 20.

Pseud. 2. Ad terr. aren. et argill. humid. — Eur. : Reg. campestr. Am. sept. : New Jersey, New York, Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 159 et b.

« var. *angustifolium* Bryol. eur. l. c.

E. minutissimum Lindb. Man. M. II, p. 411.

E. novale Mitt.

Phascum serratum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 10.

Ut typ. — Eur. : Praepr. merid. Amer. sept. : Gaspesia, Massachus. Saaskatchewan.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 465.

« var. *intermedium* Husn. Muscol. gall. p. 208.

E. intermedium Mitt. in Braithw. Brit. Mossfl. p. 184.

E. intermedium var. *praecox* Walt. et Mdo. Laubm. Oberfr. p. 89.

E. tenuinerve Lindb. mss.

Ut et cum typ.

var. *praecox* Walt. et Mdo. — *E. serratum* var. *intermedium*.

var. *Rutheanum* Jur. — *E. Rutheanum*.

« var. *subulatum* Boul. Musc. Fr. p. 577.

Ut typ. — Eur. : Gallia.

var. *tenerum* Hpe. — *E. tenerum*.

sessile Bryol. eur. — *E. stenophyllum*.

var. *stenophyllum* Bryol. eur. — *E. stenophyllum* var. *brevifolium*.

spinulosum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 6; Jaeg. M. cleist. p. 43; Lesq. et Jam. Man. p. 38.

Phascum crassinervium var. (?) Sull. M. of U. St. p. 14.

Ph. serratum β *angustifolium* H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed. n. 2 p.p.

Pseud. 2. Ad terr. argill. humid. — Am. sept. : Reg. centr. et merid.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 28 p.p.

stellatum Philib. in Rev. bryol. 1879, p. 62; Husn. Muscol. gall. n. 208.

2. — Eur. : Gall. or. (Burgondia).

stenophyllum (Voit) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 5 et II ed. p. 6; Jaeg. M. cleist. p. 42.

E. crassinervium Hpe. in Fl. 1837, p. 885 et 1847, p. 101; C. M. Syn. I, p. 33.

E. sessile Bryol. eur. I (mon. p. 7), t. 2; C. M. Syn. I, l. c. et II, p. 522.

Phascum stenophyllum Voit in Sturm Deutsch. Fl. II, Heft 14 (fid. W. P. Sch.); Brid. Bryol. univ. I, p. 30.

Pseud. 2. In terr. argill. humid. — Eur. : Angl., Palatin., German., Helvet. occ., Sardin.; Austria infer. ? Stiria ? Am. sept. : New Jersey, Ohio.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed., n. 3.

« var. *brevifolium* W. P. Sch. ll. cc.

E. sessile var. *stenophyllum* Bryol. eur. l. c.

Ut et cum typ.

stenophyllum Lesq. et Jam. p.p. — *E. pallidum*.

synoicum James in Trans. of the Am. Phil. Soc. 1865, p. 106; Jaeg. M. cleist. p. 41.

Micromitrium synoicum Aust. M. Appal. n. 46; Sull. Ic. M. Suppl. p. 22, t. 13; Lesq. et Jam. Man. p. 37.

Syn. Ad terr. argill. — Am. sept. : New Jersey.

tenerum (Br.) Hpe. in Fl. 1837, p. 285; Bryol. eur. I (mon. p. 4), t. 1; C. M. Syn. I, p. 31 et II, p. 521; Jaeg. M. cleist. p. 40.

E. serratum var. *tenerum* Hpe. in Fl. 1837, p. 285.

Micromitrium megalosporum Aust. M. Appal. II, n. 47; Sull. Ic. M. Suppl. p. 20, t. II; Lesq. et Jam. Man. p. 37.

Nanomitrium tenerum Lindb. Manip. M. II, p. 409.

Phascum tenerum Br. in litt. ad Breutel.

l. Limic. — Eur. : Lusatia, Luxembourg ? Am. sept. : New Jersey.

« var. *Philiberti* Husn. Muscol. gall. p. 208.

E. longifolium Philib. in Rev. bryol. 1878, p. 48.

E. Philiberti Besch. ibid. 1881, p. 48.

E. tenerum Philib. ibid. 1878, p. 26.

tenerum Philib. — *E. tenerum* var. *Philiberti*.

tenuinerve Lindb. — *E. serratum* var. *intermedium*.

Wrightii C. M. in Linn. 1880-83, p. 351.

— Am. sept. : Cuba.

EPIPTERYGIUM Lindb. in Oefv. af K. Vet. Akad. Foerh. 1863, p. 599. (6 spec.).

Duseni C. M. in Dusen M. Camer. n. 12.

— Afr. : M. Cameroon.

immarginatum Mitt. M. austr. am. p. 319.

— Am. sept. : Guatemala.

jamaïcense Lindb. in *op. c.* p. 603.

2. — *Am. sept.* : Jamaïc.

orbifolium C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 473.

— *Am. sept.* : Venezuela.

Polakowskyi C. M. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 229 (*nom.*).

In *udis.* — *Am. sept.* : Costa Rica.

rigidum Lindb. — Webera.

Tozeri Lindb. — Webera.

Wrightii (Sull.) Lindb. in *op. cit.* p. 604; *Mitt. op. et l. cit.* p.p. (1).

Anisostichium Bakeri Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VII, p. 119.

Mnium Wrightii Sull. in *Proced. Am. Acad.* 1861.

2. — *Am. sept.* : Cuba.

EREMODON Brid. *Bryol. univ.* I, p. 233.

longicollis Brid. — *Entosthodon Templetoni*.

magellanicus Brid. — *Dissodon*.

octoblepharis N. et H. — *Dissodon plagiopus*.

var. *major* eor. — *Dissodon plagiopus* var. *major*.

var. *piriformis* eor. — *Dissodon plagiopus* var. *piriformis*.

purpurascens H. f. — *Dissodon*.

radians Brid. — *Entosthodon*.

robustus H. f. et W. — *Dissodon calophyllus*.

Rudolphianus Nees. — *Tayloria*.

spathulatus H. f. et W. — *Tayloria*.

splachnoides Brid. — *Dissodon*.

Wormskioldii Brid. — *Splachnum*.

ERIOCLADIUM C. M. in *Linn.* 1874, p. 561 (sect. *NECKERÆ*, postea *gen. propr.*).

Spec. omn. non indicatae sunt *ÆROBRYA* ejusd. nom.

comorense Hpe. — *Æ. lanosulum*.

ERIODON Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 98 et *Syll.* p. 12 (3 spec.).

conostomus Mont. l. c. et *Hist. Chil. Bot. crypt.* t. 5, f. 2.

Entopogon cylindricus C. M. in *sched.*

Hypnum conostomum Mitt. *M. austr. am.* p. 550.

Neekera Eriodon C. M. *Syn. II*, p. 85.

l. Arbor. — *Am. merid.* : Chil., ins. Chiloë.

Mittenii Jaeg. — *Helicodontium*.

radicalis Spr. *Cat.* p. 20.

Hypnum Sprucei Mitt. *op. et l. cc.*

l. ? Arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.

salicicola (Spr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 388.

Hypnum salicicola Spr. in *Mitt. op. cit.* p. 551.

H. salicinum ej. *Cat.* p. 21.

(1) « An idem ac *E. jamaïcense* ? » Lindb. l. c.

ERIOPUS Brid. Bryol. univ. II, p. 339 (15 spec.).

albescens (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 774.

Lepidopilum albescens Hpe. Symb. 1877, p. 729.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

apiculatus (Hook. f. et Wils.) Mitt. op. cit. p. 393; Jaeg. Ad. II, p. 243.

Hookeria apiculata H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 549 et Fl. Antart. II, p. 421, t. 155; C. M. Syn. II, p. 203.

Pterygophyllum apiculatum Jaeg. op. cit. p. 246.

2. — Am. merid. : Fuegia, ins. Eremitae. Pac. : Nov. Zeland., Tasman.

asplenioides (Brid.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 140.

Hookeria asplenioides W. Arn. Disp. M. p. 56; C. M. Syn. II, p. 202.

Pterygophyllum asplenioides Brid. Mant. M. p. 351 et Bryol. univ. II, p. 345.

2? — Afr. : Ins. Borbon.

Bonianus Besch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1894, p. 83.

Ster. Cortic. et rupic. — As. : Tonkin.

cristatus (Hedw.) Jaeg. Ad. II, p. 242.

Choetophora cristata Brid. Bryol. univ. II, p. 339.

Hookeria cristata W. Arn. Disp. M. p. 56; C. M. Syn. II, p. 205; Handb. of N. Zeal. Fl. p. 496.

Leskea cristata Hedw. Sp. M. p. 211, t. 49

2. Arbor. — Pac. : Nov. Zeland sept. et med.

deflexus C. M. in Linn. 1874, p. 609.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

flexicaulis (Hpe.) Par.

Lepidopilum flexicaule Hpe. Symb. 1874, p. 503.

2? — Am. merid. : Brasil. austr. or.

flexicollis (Mitt.) Jeeg. Ad. II, p. 242.

Hookeria flexicollis Mitt. in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 496.

2? Ad rup. humid. — Pac. : Nov. Zeland. med.

fragilis C. M. in Linn. 1876, p. 254.

Ster. — Afr. : Ins. Anjouan.

Jelineki C. M. M. Polyn. p. 78.

Hookeria cristata Reichdt. in Novara Exped. Bot. I, p. 185.

Ster. — Pac. : Nov. Zeland., ins. Auckland.

lucidus Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 311.

— As. : Ceylan.

Mniadelphus Spr. in Mitt. M. austr. am. p. 392.

1. — Am. merid. : And. Quitens.

nutans (Hpe.) Mitt. op. cit. p. 392.

Lepidopilum nutans Hpe. in Linn. 1863, p. 153.

2. Arbor. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

remotifolius C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 828.

Bryum Polla subnervis Brid. Bryol. univ. II, p. 712.

Br. subnerve ej. Mant. M. p. 120?

Distichophyllum cristatum Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. Ind. p. 104, t. 35 B.

Hookeria cristata Hsch. et Reinw. in Nov. Act. Acad. Coes. Leop. Carol. XIV, Suppl. p. 718, t. 40.

H. remotifolia C. M. Syn. II, p. 207.

Mnium subenerve Schwaegr. I, II, p. 138, t. 79?

2. Ad lapid. et terr. — As. : Borneo, M. Java, Sumatra.

setigerus Mitt. op. et l. cc.

Mitrapoma ciliatum Duby Choix de M. ex. 1880, p. 5, t. II, f. I (fid. Hpe. in Fl. 1880, n. 21).

1. Lignic. — Am. merid. : Brasil. austr. or. (1).

ERPODIOPSIS C. M. in Fl. 1890, p. 470 (1 spec.).

Kilima N'Djarica C. M. in op. et l. cc.

Ster. In gramin. editor. — Afr. : Kilima N'Djaro.

ERPODIUM Brid. Bryol. univ. II, p. 167 (22 spec.).

Balansae C. M. in Fl. 1887, p. 449.

E. coronatum Besch. in Rev. bryol 1885, p. 18 et in Bal. M. Parag. n. 3645 a.

1. Ad Aurant. — Am. merid. : Paraguay.

Beccarii C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 18.

Aulacopilum Beccarii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. XIII, p. 308.

1. — Afr. : M. Abyss.

Bellii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 307, t. 5, f. B.

1. Cortic. — As. : Ceylan.

brasiliense C. M. — *E. coronatum*.

ceylanicum Thw. et M. — *Solmsiella*.

chlorophyllosum C. M. in Linn. 1878-79, p. 382.

1. Cortic. in silv. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

coronatum (Hook. f. et Wils.) Mitt. M. austr. am. p. 403.

Anoetangium ? *coronatum* H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 150.

E. brasiliense C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 90.

Pilotrichum coronatum ej. Syn. II, p. 184.

1. Cortic. — Am. merid. : Guayaquil, Brasil.

coronatum { Besch. — *E. Balansae*.
W. P. Sch. — *E. Schimper*.

diversifolium (Ångstr.) Par.

Pilotrichum diversifolium Ångstr. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 392.

1. — Am. sept. : Mexic.

domingense (Brid.) C. M. in Bot. Zeit. 1843, p. 773.

Anoetangium domingense Schwaegr. Suppl. III, II, I, t. 267.

A. E. domingense Brid. Bryol. univ. II, p. 167.

Pilotrichum domingense C. M. Syn. II, p. 184.

1. Cortic. — Am. sept. : Hispaniola.

exsertum Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 18 et in Journ. de Bot. 1891, p.

1. — Am. merid. : Paraguay.

(1) In Enum. Kindb. nomen nudum :
E. Zurni Schlieph. et C. M.

Glaziovii Hpe. *Symb.* 1872, p. 54.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

grossirete C. M. in *Verh. d. K. K. zool. bot. Gesell. in Wien*, XLIII, pp. 13-14.

— *Afr.* : Reg. Zambeziana.

Hanningtoni Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 313.

1. Ad *Adansoniam digit.* — *Afr.* : Lac. Nyanza.

Hodgkinsoniae Hpe. et C. M. in *Fl.* 1887, p. 448.

1. — *Pac.* : Austral. (Nov. Vales. austr.).

Holstii Broth. in *Engler's Bot Jahrb.* 1894, p. 215.

1. — *Afr.* : Usambara.

japonicum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 314.

1? — *As.* : Japon.

Johannis Meyeri C. M. in *Fl.* 1890, p. 486.

1. Cortic. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

lanceolatum Besch. — *E. paraguayense*.

Lorentzianum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 384.

1. Cortic. in silv. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

Mangiferae C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 178.

Ster. — *As.* : Bengal. sept.

Mengharthii C. M. in *Verh. d. K. K. Gesell. in Wien*, XLIII, pp. 13-14.

— *Afr.* : Reg. Zambeziana.

paraguayense Besch. *Not. M. Paraguay*, p. 265.

E. lanceolatum ej. in *Rev. Bryol.* 1885, p. 18 et in *Bal. Pl. Par.* n. 3644.

Cortic. — *Am. mer.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1214.

Perrottetii (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 90.

Leptangium Perrottetii Mont. *Syll.* p. 26.

Pilotrichum Perrottetii C. M. *Syn. II*, p. 185.

Schistidium Perrottetii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1838, p. 51.

1? Terr. — *Afr.* : Senegal.

Schimperi C. M. in *Fl.* 1887, p. 449.

E. coronatum W. P. Sch. in *W. Sch. M. Abyss.*

— *Afr.* : Abyss.

Schweinfurthii C. M. in *Linn.* 1875, p. 412.

2. Cortic. — *Afr.* : Bongo.

sinense Vent. — *Venturiella*.

Erythrocarpidium C. M. in *Linn.* 1876, p. 244 (nom., subsect. BRYI).

ERYTHRODONTIUM Hpe. *Symb.* 1870, p. 279 ; C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 434 (sect. ENTODONTIS) (10 spec.).

argentinum C. M. *l. c.*

Entodon argentinus ej. in *op. cit.* p. 432.

1. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

brasiliense (Hpe.) C. M. in op. cit. p. 434.

Leptohymenium brasiliense Jaeg. Ad. II, p. 345.

Pterigynandrum brasiliense Hpe. Symb. 1870, p. 280.

1. Arbor. — Am. merid.: Brasil. austr. or.

consanguineum (Hpe.) C. M. in op. cit. p. 340.

Entodon consanguineus Mitt. M. austr. am. p. 524.

Leptohymenium consanguineum Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 372.

— Am. merid.: And. Nov. Granat. et Quitens.

cylindricaule C. M. in op. cit. p. 434.

Leptohymenium cylindricaule Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 101.

L. longisetum Hpe. in Linn. 1847, p. 83.

Neckera cylindricaulis C. M. Syn. II, pp. 100 et 667.

N. julacea ej. in Linn. 1847, p. 214 p.p.

N. longiseta Hsch. in Deppe et Schiede M. Mexic. n. 1086.

1. Cortic. et saxic. — Am. sept.: Mexic., Costa Rica. Am. merid.: Venezuela, Nov. Granat.

« var. rupestre (Hpe.) Par.

Entodon rupestris C. M. in Linn. 1878-79, p. 434.

Leptohymenium cylindricaule var. rupestre Hpe. in Ann. sc. nat. 1865, IV, p. 373.

— Am. merid.: And. Nov. Granat.

densum (Hook.) C. M. in op. cit. p. 434.

Entodon densus Mitt. M. austr. am. p. 531.

Hypnum brachycladon W. Arn. Disp. M. p. 61.

H. densum C. M. Syn. II, p. 335.

Leskea densa Hook. in Kunth Pl. Æquin. I, p. 61; Brid. Bryol. univ. II, p. 299.

2. Saxic. — Am. sept.: Mexic. Am. merid.: And. Quitens.

Engleri (Broth.) Par.

Entodon Engleri Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 204.

1. Cortic. — Afr.: Kilima N'Djaro, Usambara.

julaceum (Hook. ?) C. M. in op. cit. p. 435.

Neckera julacea Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 255; C. M. Syn. II, p. 101.

Pterogonium julaceum Hook. in Schwaegr. l.c. (fid. C. M. !)

1. — As.: Nepal., Himalaya, Khasia, M. Neilgherr., Ceylan, Tonkin.

juliforme (Mitt.) Par.

Pterogonium julaceum Hook. in Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 255 (fid. Mitt!).

Pt. squarrosus Griff. Ic. pl. Asiat. II, t. 98.

Stereodon juliformis Mitt. M. Ind. or. p. 92.

1. — As.: Nepal., Sikkim, Khasia, Assam sup., M. Neilgherr., Tonkin, Yunnan.

latifolium (Angstr.) C. M. in op. cit. p. 434.

Leptohymenium latifolium Jaeg. Ad. II, p. 346.

Pterigynandrum latifolium Angstr. in Oefv.... 1876, p. 45 (nom.).

Ad rup. vulcan. — Am. sept.: Honduras.

longisetum (Hook.) C. M. in op. et l. cc.

Isothecium longisetum W. P. Sch. in sched.

Leptohymenium longisetum Besch. Prodr. Bryol. mexic. p. 101.

Neckera longiseta Hook. *M. ex. t.* 43; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 228;
C. M. Syn. II, p. 99.

l. Cortic., lignic. et saxic. — *Am. sept.*: Mexic. *Am. merid.*: And.
 Nov. Granat. et Quitens., Brasil.

pallidissimum C. M. in op. et l. cc.

Entodon pallidissimus C. M. in Linn. 1878-79, p. 494.

Ster. — *Am. merid.*: Venezuela.

perjulaceum (C. M.) Par.

Entodon perjulaceus C. M. in Dusen M. Camer. n. 674.

— *Afr.*: M. Cameroon.

rotundifolium (C. M.) Par.

Entodon rotundifolius C. M. in Fl. 1890, p. 494.

Pterogonium gracile Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 316? (*fid.*
C. M.).

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro, Usambara, reg.
 lacustr.

Schweinfurthii C. M. in Linn. 1878-79, p. 434.

Leptohymenium Schweinfurthii Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 743.

Pterigynandrum Schweinfurthii C. M. in Linn. 1875, p. 451.

l. Ad arbor. — *Afr.*: Niam-Niam.

squarrosus C. M. in op. et l. cc.

Entodon squarrosus Mitt. M. austr. am. p. 524.

Leptohymenium julaceum Hpe. in Linn. 1847, p. 83.

L. squarrosus Jaeg. Ad. II, p. 345.

Neckera julacea C. M. in Linn. 1847, p. 214.

N. squarrosus ej. Syn. II, p. 100.

l. Ad arbor. — *Am. merid.*: Venezuela, And. Nov. Granat et Qui-
 tens., Brasil. austr. or.

« var. *griseum* Besch. Not. M. Parag. n. 268.

— *Am. merid.*: Paraguay.

Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 1262.

squarrulosus (Mont.) C. M. in op. et l. cc.

Neckera squarrulosa C. M. Syn. II, p. 101.

Platygyrium julaceum Bryol. eur. V (mon. p. 4, nom.); *Bryol. jav. II*,
 p. 187, t. 217.

Pl. squarrulosus Jaeg. Ad. II, p. 343.

Pterogonium squarrulosum Mont. in Lond. Journ. of bot. 1845, p. 9 et
 Syll. p. 21.

l. Ad arbor. et sax. — *As.*: Ins. Philippin., Celebes, Java, Sumatra.

subjulaceum C. M. in op. et l. cc.

Platygyrium subjulaceum Jaeg. Ad. II, p. 342.

Pterigynandrum subjulaceum C. M. in Linn. 1875, p. 453.

l. Ad arbor. — *Afr.*: Niam-Niam, regio lacustr.

teres C. M. in op. et l. cc.

Entodon teres Mitt. M. austr. am. p. 524.

Leptohymenium julaceum Besch. Prodr. bryol. Mexic. p. 102 (*ex ips.!*).

L. teres Jaeg. Ad. II, p. 173.

Neckera teres C. M. Syn. II, p. 98 p.p.

l. — *Am. sept.*: Mexic.

Warmingii Hpe. Symb. 1870, p. 279.

Leptohymenium Warmingii Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 743.

Pterogoniella Warmingii Jaeg. l. c. p. 114.

l. Ad arbor. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Erythrophyllum *Lindb. de Tortul. p. 213* (sect. DIDYMODONTIS).

ESENBECKIA *Brid. Bryol. univ. II, p. 753.*

cuspidata Mitt. — Garovaglia setigera.

plicata Brid. — Garovaglia.

Euamblystegium *Lindb. M. Scand. p. 32* (AMBLYSTEGIA VERA)

Euandreaea *Lindb. op. cit. p. 31* (sect. ANDREAEEAE).

Euangstroemia *C. M. Syn. I, p. 426* (ANGSTROEMIAE VERA).

Euarchidium *C. M. in Linn. 1880-83, p. 345* (sect. ARCHIDI).

Euaulacomnium *Mitt. M. austr. am. p. 317* (AULACOMNIA VERA).

Eubarbula *C. M. Syn. I, p. 623* (sect. BARBULAE).

Eubartramia *C. M. Syn. I, p. 499* (sect. BARTRAMIAE).

Eublindia *Lindb. M. Scand. p. 25* (BLINDIAE VERA).

Eubraunia *C. M. in Fl. 1890, p. 485* (BRAUNIAE VERA).

Eubruchia *C. M. Syn. I, p. 20* (sect. BRUCHIAE).

Eubryum *C. M. Syn. I, p. 252* (sect. BRYI).

Eubuxbaumia *Lindb. M. Scand. p. 12* (BUXBAUMIAE VERA).

Eucalymperes *C. M. Syn. I, p. 526* (sect. CALYMPERIDIS).

EUCAMPTODON *Mont. in Ann. sc. nat. 1845, p. 120, t. 14, f. 3 et Syll. p. 46* (5 spec.).

Balansæanus *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 195.*

— *Pac.* : Nov. Caledon.

ciliatus *Besch. op. et l. cc.*

— *Pac.* : Nov. Caledon.

edentulus *C. M.* — *Braunfelsia squarrosa.*

var. *compactus* *C. M.* — *Braunfelsia squarrosa* var. *compacta.*

macrocalyx *C. M.* — *Braunfelsia enervis.*

Mülleri *Hpe. et C. M. in Linn. 1869-70, p. 513.*

2. — *Pac.* : Austral. or. (Victoria).

perichaetialis *Mont. op. cit. C. M. Syn. I, p. 346.*

1. Terr. — *Am. merid.* : *Chil. austr.*

piliferus *Mitt.* — *Holomitrium.*

squarrosus *Besch. op. cit. p. 194.*

— *Pac.* : Nov. Caledon.

EUCLADIUM *Bryol. eur. I* (2 spec.).

irroratum (*Mitt.*) *Par.*

Weisia irrorata *Mitt. in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 403.*

— *Pac.* : Nov. Zeland. sept.

verticillatum (*L.*) *Bryol. eur. I* (mon. p. 3), t. 40; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 45.*

Barbula atlantica *Brid. Bryol. univ. I, p. 559.*

Bryum fasciculatum *Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 3.*

Br. pilosum verticillatum *Dill. Hist. M. p. 374, t. 47, f. 35.*

Br. verticillatum *L. Sp. pl. p. 1595* (? *W. P. Sch.*).

Coscinonon elongatus *Brid. l. c. p. 376.*

C. verticillatus *ej. l. c. p. 374.*

Grimmia fragilis *W. et M. Archiv. p. 129, t. 4, f. 4.*

Gr. verticillata *eor. Bot. Taschb. p. 129.*

Hymenostylium verticillatum *Mitt. M. Ind. or. p. 32.*

Mollia verticillata *Lindb. M. Scand. p. 21.*

Tortula atlantica Brid. *Sp. M.* p. 255.

T. verticillata Mitt. in *Voy. H. M. S. Challenger*, II, p. 89.

Trimatium tophaceum Froehl. in *hb. Brid.*

Weisia gypsacea Schleich. *Cat. pl. Helvet.* 1807, p. 31.

W. verticillata Brid. *Sp. M.* I, p. 656.

2. Ad mur. et rup. calcar. irror. — *Eur.*: Temperat. tota. *As.*: Kurdistan., Caucas., *As. min.* *Afr.*: Ægypt., Alger., Tenerif., Madeir. *Am. sept.*: Terr. nov., Columb. brit., Calif., ins. Bermud.

Ess.: Rab. Bryoth. eur. n. 21 et b, 1157, 1305.

« *var. angustifolium* Lindb. *Trichost. Eur.* p. 22.

Ut typ. — *Eur.*: Hispan. austr. (Granata). *Afr.*: Tenerif.

var. angustifolium Jur. — *E. verticillatum var. dalmaticum*.

« *var. clinotheca* Besch. *Cat. M. Alger.* p. 5.

Ut typ. — *Afr.*: Alger.

« *var. dalmaticum* Par.

E. verticillatum var. angustifolium Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 17.

Ut typ. — *Eur.*: Dalmatia.

« *var. inundatum* R. Farneti *M. d. Prov. Pavia*, 1891.

Loc. inundat. — *Eur.*: Ital. super.

« *var. penicilliforme* ej. l. c.

Ad rup. — *Eur.*: Ital. super.

« *var. setaceum* W. P. Sch. in *Mandon M. Mad.* n. 6.

— *Afr.*: Madeira.

Eucryphæa C. M. *Syn. M.* II, p. 165 (subsect. PILOTRICHI).

Eudichelyma ej. op. cit. p. 143 (subsect. NECKERÆ).

Eudicranum Mitt. *M. austr. am.* p. 67 (sect. DICRANI).

Euditrichum Lindb. *M. Scand.* p. 26 (sect. DITRICHI).

Euentosthodon Mitt. op. cit. p. 245 (sect. ENTOSTHODONTIS).

Euerpodium Mitt. op. cit. p. 403 (sect. ERPODII).

Eufabronia C. M. op. cit. p. 31 (sect. FABRONIÆ).

Eufissidens C. M. op. cit. I, p. 50 (sect. FISSIDENTIS).

Eufunaria Lindb. op. cit. p. 18 (sect. FUNARIÆ).

EUGLOSSOPHYLLUM C. M. *Syn.* II, p. 231 (subsect. HYPNI); *Hpe. Symb.* 1870, p. 277, gen. propr.

brevipes Hpe. — *Stereophyllum*.

radiculosum Hpe. — *Stereophyllum rhamphostegium*.

Eugrimmia C. M. *Syn.* I, p. 783 (sect. GRIMMIÆ).

Eugümbelia C. M. *Syn.* II, p. 650 (sect. GÜMBELIÆ).

Eugymnostomum W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 39 (sect. GYMNOSTOMI).

Euhedwigia Lindb. *M. Scand.* p. 39 (HEDWIGIÆ VERAÆ).

Euhookeria C. M. op. cit. p. 187 (sect. HOOKERIÆ).

Euhylocomium Lindb. op. cit. p. 36 (sect. HYLOCOMI).

Euhypnella C. M. op. cit. II, p. 211 (subsect. HOOKERIÆ).

Euhypopterygium C. M. op. cit. p. 3 (HYPOPTERYGIA VERA).

Euisopterygium Lindb. op. cit. p. 39 (sect. PLAGIOTHECI).

Euisothecium Lindb. op. cit. p. 36 (= *I. myurum*).

Eulepidopilum Mitt. *M. austr. am.* p. 373 (sect. LEPIDOPILI).

Euleucobryum Mitt. op. cit. p. 110 (sect. LEUCOBRYI).

Euleskea Lindb. op. cit. p. 32 (sect. LESKEÆ).

Euleucodon C. M. op. cit. p. 107 (sect. NECKERÆ).

- Eumacromitrium** *C. M. op. cit. I, p. 723* (sect. MACHOMITRII).
Eumnium *C. M. op. cit. p. 155* (MNIA VERA).
Euneckera *C. M. op. cit. II, p. 41* (sect. NECKERAE).
Euoligotrichum *Lindb. op. cit. p. 12* (OLIGOTRICHIA VERA).
Euomalia *C. M. op. cit. p. 243* (sect. HYPNI).
Euoncophorus *Lindb. op. cit. p. 27* (sect. CYNODONTII).
Euorthotrichum *C. M. op. cit. I, p. 694* (sect. ORTHOTRICHII).
Euphilonotis *Mitt. op. cit. p. 256* (PHILONOTIDES VERA).
Euplagiothecium *Lindb. Animadv. p. 26* (sect. PLAGIOTHECII).
Eupleuridium *Lindb. M. Scand. p. 27* (PLEURIDIA VERA).
Eupogonatum *Mitt. op. cit. p. 613* (sect. POGONATI).
Eupolytrichum *C. M. op. cit. p. 17* (POLYTRICHIA VERA).
Eupottia *C. M. p. 550* (sect. POTTIAE).
Eupterobryella *C. M. in Bull. Soc. bot. Fr. 1878, p. 65* (sect. PTERO-BRYELLAE).

EUPTYCHIUM *W. P. Sch. in Mem. Acad. Dresde, 1865* (3 spec.).

mucronatum *Hpe. in Linn. 1874, p. 666.*

2. — *Pac.* : Ins. Lord Howe.

neo-Caledonicum *W. P. Sch. op. cit.*

Garovaglia cuspidata *Mitt. ? (fid. Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1867 p. 170).*

2. *Ad arbor. rad.* — *Pac.* : Nov. Caledon.

robustum *Hpe. in Linn. 1874, p. 667.*

— *Pac.* : Ins. Lord Howe.

Eurhizogonium *Mitt. M. austr. am. p. 328* (sect. RHIZOGONII).

Eurhynchiopsis *Kindb. Check-List.... p. 73* (sect. BRACHYTHECII).

EURHYNCHIUM *Bryol. eur. V* (74 spec.).

abbreviatum (*Turn.*) *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 674.*

E. praelongum ε *abbreviatum* *Bryol. eur. (mon. p. 8), t. 525.*

E. Schleicheri *Hartm. Skand. Fl. X^e ed.*

Hypnum abbreviatum *Turn. Muscol. brit. p. 160.*

H. praelongum β *abbreviatum* *Brid. Sp. M. p. 103 et Bryol. univ. II p. 401.*

H. Schleicheri *Hedw. f. in W. et M. Beitr. I, p. 128, t. 7 (1).*

2. *Ad terr. silvat. praepr. argill.* — *Eur.* : Gall. occid., Palatin., Westphal., Silv. nigr., Hercyn.

? *acicladium* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 155.*

1. — *Afr.* : Ins. Borbon.

acuticuspis *Jaeg.* — *Isothecium.*

afro-myosuroides *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 369.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

afro-strigosum *C. M. l. c. n. 364.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

androgynum *W. P. Sch.* — *E. speciosum.*

anomalum (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum anomalum *Hpe. in Linn.* 1863, p. 162.

2? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

apiculigerum (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Hypnum apiculigerum *L. et A. M. As. bor.* 1890, II, p. 132.

2. Lignic. — *As.* : *Jenissei* inf.

asperrimum *Jaeg.* — *Brachythecium.*

austrinum (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II,* p. 422.

Hypnum austrinum *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II,* p. 188, t. 89, f. 4 et *Handb.* p. 477.

1. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman.

Bigelowii *Jaeg.* — *Thamnium.*

Boscii (*Schwaegr.*) *Jaeg. Ad. II,* p. 427.

Hypnum Boscii *Schwaegr. Suppl. I, II,* p. 223; *Brid. Bryol. univ. II,* p. 420; *C. M. Syn. II,* p. 375; *Sull. Ic. M.* p. 167, t. 106; *Lesq. et Jam. Man.* p. 352.

H. cupressiforme rotundius, vel illecebrae aemulum *Dill. Hist. M.* p. 311, t. 40, f. 46 c.

H. illecebrum *Hedw. Sp. M.* p. 252, t. 66, f. 1-2; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 192.

H. illecebrum β americanum *Brid. Sp. M. II,* p. 126.

H. tumidiusculum *Lam.*

2. Ad rup. et terr. — *Am. sept.* : Ontario? Reg. orient., centr. et merid.

Exs. : *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 132 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 435 (*Hypnum*).

brevirostre *Rehm. M. Afr. austr. n.* 366.

— *Afr.* : Natal.

Brewerianum *Jaeg.* — *Isothecium.*

canariense (*Hpe. et C. M.*) *Jaeg. Ad. II,* p. 417.

Hypnum canariense *Hpe. et C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 13.

Ster. — *Afr.* : Tenerif.

Cardoti (*Kindb.*) *Par.*

Isothecium Cardoti *Kindb. in Mac. Cat. pp.* 203 et 275.

1. — *Am. sept.* : Columb. brit., Vancouver, Washington, Oregon.

cavifolium *Rehm. M. Afr. austr. n.* 654 et b, 655 b.

— *Afr.* : Transvaal, Natal.

circinatum (*Brid.*) *Bryol. eur. V (mon. p. 4), t.* 521; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 665.

Hypnum circinatum *Brid. Mant. M.* p. 165; *C. M. Syn. II,* p. 479.

H. distans *Brid. Sp. M. II,* p. 109 et *Bryol. univ. II,* p. 409.

H. Grevillei *Rab. Deutsch. Krypt. II,* p. 291.

H. Leskea *Grev. in Trans. of the Linn. Soc. II,* p. 342, t. 3, f. 4.

H. mediterraneum *Sendtn. in Bot. Zeit.* 1848, n. 5.

H. strigosum β circinatum *Brid. Bryol. univ. II,* p. 447.

Leskea circinata *Jaeg. Ad. II,* p. 298.

Rhynchostegium circinatum *de Not. Epil.*

2. vel ps. 1. In apric. ad terr., rup. calcar. et mur. — *Eur.* : Zon. merid. praecip. marit.; *Britann. (ster.)*. *As.* : *As. min.*, *Pers. Afr.* : Alger.

Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n.* 846.

« *var. deflexifolium* Boulay. *M. Fr.* p. 114.

Hypnum circinatum var. inundatum ej. in *Husn. M. Gall.* n. 579.

H. deflexifolium Solms-Laub.

Scorpiurium rivale W. P. Sch. (*fid. Boul., Husn., etc.*).

Ad lapid. et saxa secus torrent. — *Eur.* : Gall. occid. et merid.

var. rivale Besch. — *Scorpiurium*.

cirrosum Mdo. — *E. Vaucheri* β *julaceum*.

clinocarpum (Tayl.) Par.

Brachythecium clinocarpum Jaeg. *Ad. II*, p. 393.

E. Regnellii ej. *l. c.* p. 422.

E. rugisetum ej. *l. c.* p. 424.

Hypnum clinocarpum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 194 ; *C. M. Syn. II*, p. 355.

H. longipes Lindb. in sched.

H. Regnellii Hpe. in *C. M. Syn. II*, p. 447 et *Enum. M. Brasil.* p. 71 (*fid. Mitt.*).

H. remotifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 556.

H. rugisetum Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, p. 342 ? (*fid. Mitt.*).

Syn. Ad terr. et saxa. — *Am. merid.* : Venezuela, Guian., And. Quittens., Brasil. or.

colpophyllum Sull. *lc. M. Suppl.* p. 95, t. 71.

Hypnum colpophyllum ej. *mss.* ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 352.

— *Am. sept.* : Washington ? Calif.

« *var. flagelliforme* Barnes in *Bot. Gaz.* 1891, p. 207.

— *Am. sept.* : Calif.

compressulum Jaeg. — *Tripterocladium*.

confertum Milde. — *Rhynchostegium*.

var. Daldinianum Husn. — *Rhynchostegium confertum var. Daldinianum*.

var. Delognei Husn. — *Rhynchostegium confertum*.

cordatum Jaeg. — *E. hians*.

corralense (Ltz.) Jaeg. *Ad. II*, p. 417.

Hypnum corralense Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 189.

2 ? Muric. — *Am. merid.* : Valdivia.

crassinervium (Tayl.) *Bryol. eur.* V (*mon.* p. 14), t. 529 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 669.

Hypnum crassinervium Tayl. in *Mackay Fl. Hibern.* II, p. 43 ; *C. M. Syn. II*, p. 371.

Rhynchostegium crassinervium de Not. *Epil.*

2 vel ps. 1. Ad saxa umbr. — *Eur.* : Zon. intermed. tota, rar. septentr. vel merid. As. : Caucas. occ. et centr. Afr. : Alger.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 335, 478.

Un. itin. 1863, n. 76.

« *var. laxorete* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 207 (*vel nov. sp. ?*).

♀ et fr. ign. Terr. in silv. — *Am. sept.* : Columb. brit.

curvisetum Husn. — *Rhynchostegium*.

cygnisetum Jaeg. — *Ptychomium*.

Dawsoni Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 279.

2 ? Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.

demissum Milde. — *Rhaphidostegium*.

depressum Milde. — *Rhynchostegium*.

devexum (Bosw.) Par.

- Hypnum devexum* Bosw. in *Journ. of bot.* 1892, p. 99.
 — *Pac.* : Austral. or.
- distans* (Lindb.) Par.
E. praelongum W. P. Sch. p.p. (fid. Lindb.).
Hypnum distans Lindb. *M. Scand.* p. 34 et n. 74 (in adn.).
 2. — *Eur.* : Suecia, Fennia, Ross. or. *As.* : Jenissei
 sup., Obi.
- diversifolium* Bryol. eur. V(mon. p. 4), t. 520; W. P. Sch. op. cit. p. 664 (1).
Hypnum diversifolium Schleich. p.p.
H. strigosum var. *diversifolium* Lindb. *M. Scand.* p. 34.
Leskea fasciculosa Hedw. *Sp. M.* p. 217, t. 14 (fid. Card.).
 2. Ad terr. lapidos. — *Eur.* : Spitzberg, Alp. Norveg. (Dovre). *As.* :
 Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, Ottawa, lac. Super.,
 reg. sept. occ., Columb. brit., Washington, Calif., New Jersey,
 Ohio, Wisconsin, Montana.
Exs. : Mac. Canad. *M.* n. 500.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 432.
- dumosum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 412.
Hypnum dumosum Mitt. *M. Ind. or.* p. 80.
 2. — *As.* : Sikkim.
- encalyptratum* W. P. Sch. in *Lechler M. Antarct.*
 Terr. — *Am. merid.* : Fret. Magellan.
- euchloron* (Br.) Jur. et Milde *Beitr....* p. 601.
Hypnum euchloron Br. in *C. M. Syn. II*, p. 464.
 2. — *As.* : Caucas., litt. Caspic., Persia.
- exasperatum* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 427.
Hypnum exasperatum Hpe. in *Linn.* 1863, p. 162.
H. praelongum L. (fid. Mitt. *M. austr. am.* p. 557).
 Rupic. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : Guian. batav., And. Nov.
 Granat. et Quitens., Peruv.
- germanicum* Grebe. — *E. Vaucheri* var. *germanicum*.
- graminicolor* (Brid.) Par.
E. Sullivantii Jaeg. *Ad. II*, p. 420.
Hypnum graminicolor Brid. *Sp. M. II*, p. 254 et *Bryol. univ. II*, p. 455;
C. M. Syn. II, p. 263.
H. praelongum var. *Sull. M. Allegh. n.* 44.
H. Sullivantii R. Spr. in *Gray's Man. of bot.* 1848; *C. M. op. cit.* p. 430;
Sull. M. of U. St. p. 69 et *Ic. M.* p. 165, t. 105; *Lesq. et Jam. Man.*
p. 353; *Mac. Canad. M.* n. 296; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed.*
n. 430 (fid. Card. in litt. ex autops. spec. Hedwig.).
Trichosteleum graminicolor Jaeg. *Ad. II*, p. 481.
 2. Terr. — *Am. sept.* : Nov. Scot., New Brunswick, Gaspesia, Onta-
 rio, Pensilv., reg. centr., Florid.; Terra nov.?
 « var. *Holzingeri* (Ren. et Card.) Par.
E. Sullivantii var. *Holzingeri* R. et C. in *Bot. Gaz.* 1893, p. 239.
 — *Am. sept.* : Washington Columbiae.
- hians* (Hedw.) Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1892, p. 84.
E. cordatum Jaeg. *Ad. II*, p. 424.
Hypnum cordatum Harv. in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 24, f. 9 (2); *C. M.*
Syn. II, p. 451.

(1) Cf. Aman in *Rev. bryol.* 1889, p. 91.

(2) Cf. *Meteorium cordatum*.

H. hians Hedw. *Sp. M.* p. 272, t. 270; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 456;
Sull. M. of U. St. p. 69 et *Id. M.* p. 163, t. 104; *Lesq. et Jam.* p. 354.
H. praelongum C. M. *Syn.* II, p. 446 p.p.
Pterigynandrum apiculatum *Brid. M. Rec. Suppl.* I, p. 137 et *Bryol univ.* II, p. 19.

2. Ad terr. humid. umbros. — *Eur.* : (fid. Mitt.). *As.* : Japon., Nepal., Himalaya, Tibet. occ., Khasia, Caucas. occ. *Am. sept.* : Nov. Scot., New Brunswick, Virgin. occ., Ottawa, Columb. brit.
Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 134 (*Hypnum*).
 Mac. *Canad. M.* n. 442 p.p. (*Hypnum*).
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 428 (*Hypnum*).

« *var. pachyneuron* (Lindb.) Par.

Hypnum hians var. pachyneuron Lindb. *M. Scand.* p. 34 et n. 73 in adn.
 — *Eur.* : Suecia.

histrion Mdo. — *E. Vaucheri* β julaceum.

integrifolium W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1702.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.

Juratzkanum R. Farneti. — *Amblystegium*.

laevisetum Geheeb in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).
 — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

laxifolium Jaeg. — *Thuidium*.

leucocladulum Jaeg. — *Tripterocladium*.

longifolium (Mitt.) Par.

Hypnum longifolium Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 183.
 Ster. — *As.* : Japon.

? *macrostegium* (Sull. et Lesq.) Jaeg. *Ad.* II, p. 428.

Hypnum macrostegium Sull. et Lesq. in *Proced...* 1859, p. 280.
 2. Terr. — *As.* : Japon.

megapolitanum Milde. — *Rhynchostegium*.

var. meridionale Milde. — *Rhynchostegium megapolitanum var. meridionale*.

mexicanum Besch. — *Microthamnium*.

murale Milde. — *Rhynchostegium*.

Mülleri Rehm. *M. Afr. austr.* n. 363.

— *Afr.* : C. B. Sp.

muriculatum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad.* II, p. 417.

Hypnum muriculatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 108, t. 89, f. 3 et *Handb.* p. 477.

1. — *Pac.* : Ins. Norfolk, Nov. Zeland., Tasman.

« *var. β* (Hook. f. et Wils.) Par.

Hypnum muriculatum var. β eor. ll. cc.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

myosuroides (L.) W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 549 et II ed. p. 632.

Hypnum myosuroides L. *Sp. pl.* p. 1596; C. M. *Syn.* II, p. 499.
H. myosuroides tenuius, capitulis nutantibus Dill. *Hist. M.* p. 317, t. 41, f. 51.

H. myosurum Schrad. *Syst. Samml. Crypt. Gew.* I, p. 17, n. 79.

H. tenuius Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 904.

Isothecium myosuroides Brid. *Bryol. univ.* II, p. 369; *Bryol. eur.* V (mon. p.), t. 534.

Leskea myosuroides Roth Tent. Fl. Germ. I, p. 464.

Rhynchostegium myosuroides de Not. Epil.

2 vel ps. l. Ad arbor. rad., terr. et saxa proepr. arenac. et granit. —
Eur.: Fere tota. Afr.: Alger., ins. Canar. Am. sept.: Terr. nov.,
Nov. Scot., M. Alb., Columb. brit., ins. Vancouver, Oregon,
Washington, Calif.

Exs.: Bourg. Pl. Canar. n. 616.

Mac. Canad. M. n. 291 p.p. (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 481, 766 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 424 (*Hypnum*).

« *subsp. hylocomioides* (Kindb.) Par.

Isothecium myosuroides subsp. hylocomioides Kindb.

Lignic. — Am. sept.: Vancouver.

novo-caledonicum (C. M.) Par.

Hypnum novo-caledonicum C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57 (nom.).

— Pac.: Nov. Caledon.

oreganum (Sull.) Jaeg. Ad. II, p. 427.

Hypnum Douglasii Hook. mss. (Ad. Mitt. in Proceed. of the Linn. Soc. 1864, p. 36).

H. *oreganum* Sull. in Mem. of the Am. Acad.... 1849, p. 172 et in M. U. S. S. Pac. Expl. (Wilkes), p. 16, t. 13; C. M. Syn. II, p. 450; Lesq. et Jam. Man. p. 355.

2. Lignic. — Am. sept.: Columb. brit, ins. Vancouver, Washington, Oregon.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 298 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 434 (*Hypnum*).

orientale (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 412.

Stereodon orientalis Mitt. M. Ind. or. p. 111.

2. — As.: Assam.

ovalifolium Rehm. M. Afr. austr. n. 658.

Ster. — Afr.: Transvaal.

pendulum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 424.

Hypnum denticulatum exiguum, pendulum, atro-virens Dill. Hist. M. p. 332, t. 43, f. 67.

H. *pendulum* C. M. Syn. II, p. 467.

Isothecium pendulum Brid. Bryol. univ. II, p. 765.

Ad arbor. — Am. merid.: Patagon.

penicillatum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 412.

Stereodon penicillatus Mitt. M. Ind. or. p. 112.

2. — As.: Sikkim.

Perraldieri W. P. Sch. in hb. Mus. Paris.

— Afr.: Ins. Canar.

piliferum (Schreb.) Bryol. eur. V (mon. p. 16), t. 531; W. P. Sch. op. cit. p. 671.

Hypnum cassubicum Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 10.

H. *piliferum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 91; Brid. Bryol. univ. II, p. 489; C. M. Syn. II, p. 369.

H. *rutabulum* β *piliferum* Leyss. Fl. Hall. n. 1084.

Rhynchostegium piliferum de Not. Epil.

2 vel ps. l. Ad agger., in prat. et fruticet. — Eur.: Zona interm., passim. As.: Jenissei sup., Caucas. Am. sept.: Groenland, Terr. nov., New Brunswick, reg. sept.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 339.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 429 (*Hypnum*).

polystictum (Mitt.) Par.

Hypnum polystictum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 183.

2. Ad arbor. — As. : Japon.

praelongum (L.) Bryol. eur. V (mon. p. 8), t. 524 ; W. P. Sch. op. cit. p. 673.

Hypnum Clarionis Lam. et DC. Fl. fr. I, p. 320.

H. *praelongum* L. Sp. pl. p. 1591 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 401 ; C. M. Syn. II. p. 446.

H. *praelongum* ϵ *Clarionis* Brid. Sp. M. II, p. 103.

Rhynchostegium praelongum de Not. Epil.

2. Lignic. ; ad terr. et fol. emort. — Eur. : Tota, arctica except. As. : Japon., Kurdistan., Batoum. Afr. : Alger., ins. S. Helena. Am. sept. : New Brunswick, Indiana, Illinois, Minnesota, Ludovic., Mexic. Am. merid. : Surinam, And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 480, 698, 1097.

var. *abbreviatum* Bryol. eur. — E. *abbreviatum*.

« var. *atro-virens* (Sw.) Bryol. eur. l. c. t. 525 et W. P. Sch. l. c.

E. *Swartzii* R. Farneti in Atti dell. Istit. bot. della R. Univ. di Pavia, 1893.

H. *praelongum* Sw. M. Suec. p. 65.

H. *praelongum* δ *atro-virens* Brid. Bryol. univ. II, p. 402 p.p.

H. *praelongum* β *scariosum* C. M. l. c. p.p.

H. *scabrum* Koch. in hb. DC. (fid. Brid. l. c.).

H. *Swartzii* Turn. Muscol. Hibern. p. 151, t. 14.

Ut typ. — Eur. : Zon. intermed. et sept. Ital. super. As. : Jenissei med. et sup., Caucas. occ. et centr. Afr. : Alger., Madeir., ins. Azor.

var. *meridionale* Boul. — E. *praelongum* var. *rigidum*.

var. *pumilum* Bryol. eur. — E. *pumilum*.

« var. *rigidum* Boulay M. Fr. p. 103.

E. *praelongum* var. *meridionale* ej. in Husn. M. Gall. n. 480.

Ad terr. calcar. umbr. — Eur. : Gallia, praepr. merid.

pseudo-piliferum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 421.

Hypnum pseudo-piliferum Hpe. in Ann. sc. nat. 1865, p. 324.

2. Saxic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

pseudo-serrulatum Kindb. — *Rhynchostegium*.

pseudo-striatum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 417.

Hypnum pseudo-striatum C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 458.

Stereodon pseudo-striatus Mitt. M. Ind. or. p. 114.

— As. : Nepal.

pseudo-Teesdalii Jaeg. — *Rhynchostegium*.

pumilum (Wils.) W. P. Sch. Coroll. bryol. eur. p. 119 et op. cit. p. 675.

E. *praelongum* β *pumilum* Bryol. eur. V (mon. p. 8), t. 525.

H. *pallidirostrum* A. Br. in Brid. Bryol. univ. II, p. 767 ; C. M. Syn. II. p. 413.

H. *praelongum* var. *pallidirostrum* Brid. l. c.

H. *pumilum* Wils. Engl. Bot. Suppl. t. 2942.

H. *Swartzii* β *minus* Turn. Muscol. Hib. p. 151.

2. Ad terr. et saxa arenac. umbr. — Eur. : Hibern., Angl., Normann., Westphal., Ligur., Etrur., Pyren. Afr. : Madeir.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 479, 1237.

Regnelii Jaeg. — *E. clinocarpum*.

remotifolium (Grev.) Jaeg. *Ad. II*, p. 422 p.p.

Hypnum asperipes Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 85 et in *Fl. Tasm. II*, p. 209, t. 176, f. 4.

H. remotifolium Grev. mss.; *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 108 (fid. Jaeg. l. c.) et *Handb.* p. 477.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

revelstokense Kindb. — *Rhynchostegium*.

rigidissimum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 413.

Hypnum rigidissimum C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 16.

Ster. — *As.* : Ceylan.

rotundifolium Milde. — *Rhynchostegium*.

rugisetum Jaeg. — *E. clinocarpum*.

rusciforme Milde. — *Rhynchostegium*.

Savatieri W. P. Sch. mss.; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 378.

2. — *As.* : Japon.

Exs. : Savatier n. 476 b, 672.

« *var. abbreviata* Besch. l. c.

Ubi typ.

Exs. : Savatier, n. 672 b.

« *var. proluxa* Besch. l. c.

Ubi typ.

Exs. : Savatier n. 677 p.p.

scabrisetum (Schwaegr.) Par.

Hypnum scabrisetum Schwaegr. *Suppl. III, II, II*, t. 281; *C. M. Syn. II*, p. 250; *Mitt. M. Ind. or.* p. 80.

Leskea remotifolia Hook. mss. (fid. C. M. ! non ! fid. Mitt. l. c. pp. 80 et 135).

Thuidium remotifolium Jaeg. *Ad. II*, p. 740 (1).

1. — *As.* : Nepal. (?), Sikkim ; Assam sup. (?)

scariosissimum C. M. mss.; Jaeg. *Ad. II*, p. 418.

— *As.* : Japon.

Schleicheri Hartm. — *E. abbreviatum*.

scleropus *Bryol. eur. V* (mon. p. 11), t. 527; *W. P. Sch. op. cit.* p. 673.

2. Ad rup. granit. umbros. — *Eur.* : Voges. super. : rariss.

semi-asperum (*Brachythecium* ?) C. M. et Kindb. in *Bidr.* 454 et in *Mac. Cat.* p. 207.

1. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 507.

semi-tortum (Mitt.) Par.

Hypnum semi-tortum Mitt. *M. austr. am.* p. 556.

2? Ster. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

serrulatum Kindb. — *Rhynchostegium*.

subsp. *eriense* Kindb. — *Rhynchostegium serrulatum subsp. eriense*.

subsp. *hispidifolium* Kindb. — *Rhynchostegium serrulatum subsp. hispidifolium*.

Shawii Rehm. *M. Afr. austr. n.* 656 b.

— *Afr.* : Natal.

(1) « An *Brachythecium* ? » Jaeg. l. c. p. 755.

speciosum (Brid.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 672.

E. androgynum W. P. Sch. Coroll. p. 119.

Hypnum androgynum Wils. mss.

H. fontium Brid. Bryol. univ. II, p. 417?

H. praelongum β *scariosum* C. M. Syn. II, p. 417 p.p.

H. praelongum var. *speciosum* Brid. Bryol. univ. II, p. 403.

H. riparioides var. *speciosum* Schwaegr. Suppl. I, II, p. 196.

H. speciosum Brid. Mant. M. p. 156.

Rhynchostegium androgynum Bryol. eur. V (mon. p.), t. 527.

Syn. Ad rad. arb. et saxa in aquosis. — Eur.: Angl., Voges. super., German. sept., Helvet., Gall. merid., Lusit. Afr.: Ins. Canar.? (*H. fontium*).

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 389, 1098.

spiculiferum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 413.

Hypnum spiculiferum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 34.

Isothecium spiculiferum Kindb. in Mac. Cat. p. 204.

2. — Am. sept.: Columb. brit., ins. Vancouver, Washington.

spiculosum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 422.

Hypnum spiculosum Mitt. in op. cit. 1863, p. 156.

1. Ad arbor. — Afr.: M. Cameroon.

spinulaenerve Kiaer in Borgen M. Madag. n. 48.

— Afr.: Madagasc. centr.

Sprengelii (C. M.) Jaeg. II, p. 414.

Hypnum Sprengelii C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 785.

2. Saxic. — Afr.: C. B. Sp.

Stokesii (Turn.) Bryol. eur. V (mon. p. 10), t. 526; W. P. Sch. op. cit. p. 677.

Hypnum Fulgeriense la Pyl. in hb. Brid.

H. hians Mac. Canad. M. n. 442 p.p.

H. Ludwigii Brid. in sched.

H. orthorhynchum ej. Sp. M. II, p. 106.

H. praelongum Turn. Muscol. Hibern. p. 160.

H. praelongum var. *orthorhynchum* Brid. Bryol. univ. II, p. 403.

H. praelongum γ *Stokesii* ej. op. cit. p. 401.

H. pseudo-delicatulum Raddi in Opusc. sc. di Bolon. II, p. 360.

H. repens, triangularibus parvis foliis, *praelongum* Dill. Hist. M. p. 278, t. 35, f. 15.

H. rigidiusculum Bland. M. exs. Fasc. V, n. 230.

H. Stokesii Turn. l. c. p. 159; C. M. Syn. II, p. 448.

2. Ad rup. et saxa secus rivul. in umbros. — Eur.: Fere tota. As.: Caucas. (Tiflis). Afr.: Alger., Teneriff., Madeir., ins. Azor. Am. sept.: Terr. nov., Idaho, Oregon, Washington, ins. Vancouver, Columb. brit.

Exs.: Bourg. Pl. Canar. n. 1580 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 297 (*Hypnum*).

Mandon Pl. Madeir. n. 41.

Rab. Bryoth. eur. n. 677 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 433 (*Hypnum*).

stoloniferum (Hook.) Jaeg. Ad. II, p. 412.

Hypnum myosuroides β *stoloniferum* C. M. Syn. II, p. 500.

H. stoloniferum Hook. M. ex. t. 74.

Isothecium stoloniferum Brid. Bryol. univ. II, p. 371.

2. Ad arbor. et rup. — Am. sept.: De Alaska ad Calif.; Idaho, Indiana.

Exs.: Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 425.

striatellum W. P. Sch. — *Rigodium Lechleri*.

striatulum (Spr.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 5), t. 522; W. P. Sch. *op. cit.* p. 665.

H. filescens Brid. *Sp. M.* II, p. 170; *C. M. Syn.* II, p. 462 p.p.

H. praelongum & *filescens* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 402.

H. striatulum Spr. *M. Pyr.* n. 12 et in *Ann. and Mag. nat. hist.* 1849; *M. Pyr.* n. 79.

Rhynchostegium striatulum de Not. *Epil.*

2 vel ps. 1. Ad rup. calcar., mur. delaps., terr. argill. et arb. — *Eur.*: Reg. merid., rar. interm.: *Hibern.*, *Angl.*, *Gall. centr.* (Lutet.) et merid., *Pyren.*, *Corsic.*, *Sardin.*, ins. *Melit.*, *Bavar.*, *Francon.*, *Westphal.* *As.*: *Caucas. occ.* *Afr.*: *Alger.*

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 388.

Un. itin. 1863, n. 75.

* *var. cavernarum* Mdo.

— *Eur.*: *Gall. merid.*

striatum (Schreb.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 6), t. 525; W. P. Sch. *op. cit.* p. 666.

Hypnum Adiantum Neck. *Meth. M.* p. 181.

H. elasticum Brid. *Sp. M.* II, p. 256.

H. longirostrum Ehrh. *Pl. crypt. exs.* n. 75; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 502.

H. rutabulum β *cuspidatum* Web. *Spic. Fl. Goett.* p. 92.

H. striatum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 91; *C. M. Syn.* II, p. 460.

H. unguiculatum La Tour *Chlor. Lugd.* p. 33; Schleich. in sched.

H. vulgare dentatum, operculis cuspidatis Dill. *Hist. M.* p. 297, t. 38, f. 30 B.

Pleurozium striatum Kindb. *Check List...* p. 19.

Rhynchostegium striatum de Not. *Epil.*

2 vel ps. 1. Ad terr. in silv. — *Eur.*: Fere tota, arctic. except., in reg. campestr. et mont. *As.*: *Caucas.* *Afr.*: *Alger.*

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 356 et b.

* *var. meridionale* *Bryol. eur.* et W. P. Sch. *ll. cc.*

Hypnum filescens *C. M. Syn.* II, p. 462 p.p.

H. Hildebrandti Garov. *mss.*

H. longirostre var. Durieui Mitt. in *Godman's Nat. hist. of Azores*, p. 310.

H. meridionale W. P. Sch. *mss.*

H. striatum var. Durieui Mont. in *DR. M. Astur.*

Rhynchostegium striatum de Not. *Epil.*

Ut typ., praecip. in Pinetis. — *Eur.*: *Zon. merid.* *Afr.*: *Alger.*, *Madeir.*, ins. *Azores.*

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 337, 905.

strigosum (Hoffm.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 2), t. 519; W. P. Sch. *op. cit.* p. 662 (1).

Hypnum abbreviatum Schleich. *Cent. IV*, n. 25.

H. pulchellum Hedw. *Sp. M.* p. 265, t. 68.

H. serrulatum Hsch. in Brid. *Bryol. univ.* II, p. 390 p.p.

H. strigosum Hoffm. *Deutsch. Fl.* p. 76; Brid. *op. cit.* p. 446; *C. M. Syn.* II, p. 428.

H. substrigosum Mac. *Canad. M.* n. 449 p.p.

H. thuringicum Brid. *M. Rec.* II, II, p. 99, t. 3, f. 2.

H. velutinoides Voit *M. Herbip.* p. 99.

Leskea fasciculosa Hedw. *Sp. M.* p. 217, t. 54 (fid. *C. M.*); Brid. *Bryol. univ.* II, p. 305.

Rhynchostegium strigosum de Not. *Epil.*

2 vel ps. 1. Ad terr. umbros., rup. arborumque rad. — *Eur.*: *Reg. cam-*

(1) Cf. Renauld et Cardot in *Bot. Gaz.* 1889, t. XIV B.

pestr. et mont. zon. interm. et sept. As. : Groenland, Anticosti, Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Manitoba, M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, Washington, Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, reg. sept., or. et centr. Am. merid. : Chile?

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 183 et II ed. n. 131 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 745.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 431 (*Hypnum*).

Un. itin. 1863, n. 37.

* *var. Barnesi* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 97, t. XIV B.
— Am. sept. : Idaho, Washington.

* *var. fallax* Ren. et Card. in op. et l. cc. et M. bor. am. n. 116.
— Am. sept. : Washington, Idaho, Montana.

* *var. imbricatum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

Hypnum praecox Sw. in Hedw. Sp. M. p. 249, t. 65.

H. *Stereodon praecox* Brid. Bryol. univ. II, p. 589.

H. *strigosum* β *praecox* Lindb. M. Scand. p. 34.

In loc. sicc. glareos. — Eur. : Suec., German. sept., Vales., Ital. super. As. : Jenissei inf. et sup., Obi. Afr. : Alger.

subdenticulatum W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1701.
— Am. merid. : And. Boliv.

suberectum (Mitt.) Jaeg. II. p. 421.

Hypnum suberectum Mitt. M. austr. am. p. 562.

Leucodon scabrisetus Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 282 ? (fid. Mitt.).

Neckera scabriseta C. M. Syn. II, p. 114 ? (id.).

— Am. merid. : And. Quitens.

subintegrifolium Kindb. — *Rhynchostegium*.

subscabridum Kindb.

H. *Sullivantii* Mac. Cat. p. 206 et Canad. M. n. 296.

Ps. I v. 2. Rupic. — Am. sept. : Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario.

subsquarrosulum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 415.

Hypnum subsquarrosulum Hpe. in sched. ; C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 171.
2. — Afr. : C. B. Sp.

substrigosum Kindb. in Bidr. p. 452 (nom.) et in Mac. Cat. p. 205.

Hypnum substrigosum Mac. Canad. M. n. 449 p.p.

1. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit.

Sullivantii Jaeg. — E. graminicolor.

var. Holzingeri Ren. et Card. — E. graminicolor *var. Holzingeri*.

Swartzii R. Farneti. — E. *praelongum var. atro-virens*.

Teesdalii (Sm.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 676.

Hypnum intricatum Dicks. Fasc. II Pl. Crypt. p. 10 (excl. syn. Engl. Bot. t. 202).

H. *pachyneuron* Tayl. mss. ; Wils. Bryol. brit. 350 (ut syn.).

H. *Teesdalii* Sm. Fl. brit. III, p. 1291 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 416 ; C. M. Syn. II, p. 400.

1. Ad saxa humida umbr. — Eur. : Suec., Angl., Hibern., Gall. centr. (Lutet.) As. : Caucas. occ. Afr. : Alger.

Teesdalii Milde. — *Rhynchostegium curvisetum*.

teesdaliioides Jaeg. — *Rhynchostegium*.

tenellum Milde. — *Rhynchostegium*.

- Tommasinii* Husn. — *E. Vaucheri*.
 var. *fagineum* H. Müll. — *E. Vaucheri* var. *tenuicaule*.
trichocladon (*Bryol. jav.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 412.
Hypnum trichocladon *Bryol. jav. II*, p. 155, t. 254.
 2. — As. : Ins. Celebes, Ceram, Java.
uliginosum Warnst. in *Abhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb.* 1885.
 — Eur. : Brandebourg.
Vaucheri *Bryol. eur. V* (mon. p. 15), t. 530 ; *W. P. Sch. op. cit.* p. 670.
E. Tommasinii Husn. *Muscol. gall.* p. 338.
Hypnum Tommasinii Sendtn. mss.
H. Vaucheri *W. P. Sch. mss.* ; *C. M. Syn. II*, pp. 372 et 687.
 2. Ad rup. et saxa calcar. umbros. — Eur. : Westphal., Jurass., Silva nigr., Francon., Alp. Jul., Austr. inf., Pyren., etc. ; deest in Britann. et in Ital. Am. sept. : Gaspes., M. Rupestr., Columb. brit., fret. Behring.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 13 b, 338, 758, 1185.
 Un. itin. 1863, n. 77, 70, 91.
 « var. *germanicum* (*Grebe*) *Par.*
E. germanicum *Grebe in Hedwig.* 1894, p. 339.
 Ad rad. *Fagor.* et saxa. — Eur. : Westphal.
 « var. *julaceum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*
Brachythecium cirrosum *W. P. Sch. (fid. Husn.).*
E. cirrosum *Mdo. in sched. et in Litz. Moost.* p. 95.
E. histrio *ej. Bayern's Laubm.* p. 224.
Myurium herjedalicum *W. P. Sch. (fid. Husn.).*
 Ut typ. — Eur. : Alp. Helvet., Bavar.
Exs. : Un. itin. 1863, n. 78.
 « var. *tenuicaule* (*Spr.*) *Par.*
E. Tommasinii var. *fagineum* *H. Müll. mss.* ; *Husn. Muscol. gall.* p. 338.
Hypnum tenuicaule *Spr. in Ann. and Mag. nat. hist.* 1849 ; *M. Pyr.* n. 72 (*fid. Husn. op. cit.* p. 437) ; *C. M. Syn. II*, p. 416.
H. Tommasinii var. *fagineum* *Boulay M. Fr.* p. 409.
 Ad arb. vetust. necnon saxa. — Eur. : Voges., Jurass., Arvern., Alp., Pyren.
velutinoides (*Br.*) *Bryol. eur. V* (mon. p. 12), t. 528 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 668.
Hypnum filiforme *C. M. Syn. II*, p. 370.
H. Flotownianum *Sendtn. in Regensb. Denkschr.* 1841.
H. Reichenbachianum *Hüb. in Bot. Zeit.* 1847. n. 41 c. ic.
H. velutinoides *Br. in sched.* 1836.
Rhynchostegium Locarnense *de Not. Epil. ?*
 2 vel ps. 1. Ad saxa aren. et rup. argill. schist. — Eur. : Norveg.
 German. sept., vall. Rhen. ; Ital. super. ? As. : Persia, Caucas. occ.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 635.
Welwitschii Husn. — *Rhaphidostegium* (1).

Eurybrochis *Ren. et Cord. in Bot. Gaz. XV*, p. 60 (sect. HETEROCLADIUM).
Eurystomum *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. p. 92 et Fl. Tasm. II*, p. 178 (sect. HEDWIGIÆ sensu *H. f. et W.* = GIGASPERMUM *Lindb.*).

(1) In *Enum. Kindberg.* nomina nuda :
E. dives *C. M.* | *E. Mac Leai* *Rehm.*
Krausei *C. M.* (an *Brachythecium Krausei* ?).

Euschistophyllum *Lindb. M. Scand. p. 13* (FISSIDENTES VERI).

Euschlotheimia *Mitt. M. austr. am. p. 222* (sect. SCHLOTHEIMIAE).

Euseligeria *C. M. Syn. I, p. 418* (sect. SELIGERIAE).

EUSTICHIA *C. M. Syn. I, p. 41* emend. (1 spec.).

Jamesoni *C. M.* — *E. longirostris*.

japonica *Berggr.* — *Bryoxiphium Savatieri*.

longirostris (*Brid.*) *C. M. Syn. I, p. 42 et II, p. 523*.

Cymbaria Jamesoni *Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 190*.

Didymodon distichus *Schwaegr. Suppl. II, t. 183* (sub *D. compresso*).

Diplostichum longirostre *Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 116 et Syll. p. 27*.

E. Jamesoni *C. M. Syn. II, p. 523*.

Fissidens Eustichium *Rehm. M. Afr. austr. n. 279*.

Phyllogonium E. longirostris *Brid. Bryol. univ. II, p. 674*.

Pterigynaudrum longirostre *Brid. op. cit. p. 195*.

2. *Lignic. et terr.* — *Afr.* : *Ins. Tristan d'Acunha, Orange, C. B. Sp., Madagasc., ins. Borbon. Am. merid. : And. Quitens.*

norvegica *C. M.* — *Bryoxiphium*.

Savatieri *Husn.* — *Bryoxiphium* (1).

EUSTICHIMUM *Bryol. eur. III*.

norvegicum { *Bryol. eur.* — *Bryoxiphium*.
 { *Besch., W. P. Sch.* — *Bryoxiphium mexicanum*.

Eusyrrhopodon *C. M. Syn. I, p. 540* (sect. SYRRHOPODONTIS).

Eutetraplodon *Lindb. M. Scand. p. 19* (sect. TETRAPLODONTIS).

Eutrichostomum *C. M. Syn. I, p. 581* (sect. TRICHOSTOMI).

Eutrichum *W. P. Sch. Coroll. p. 28* (subgen. TRICHOSTOMI).

Euwebera *Limpr. Deutsch. Laubm. II, p. 248* (sect. WEBERAE).

Euweisia *C. M. Syn. I, p. 651* (sect. WEISIAE).

EUZYGODON *C. M. Syn. I, p. 671* (sect. ZYGODONTIS); *Jur. Laubm. Osterr. Ung. p. 191* (gen. propr.).

Sendtneri *Jur.* — *Zygodon*.

FIEDLERIA *Rab. Deutsch. Krypt. II, p. 98*.

subsessilis *Rab.* — *Pharomitrium*.

FABRONIA *Raddi in Att. dell. Acad. d. Scienz. di Siena, IX, p. 230* (76 spec.).

abyssinica *C. M. Syn. II, p. 35*.

F. macroblepharis *Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 466 et 477*.

1. *Rupic.* — *Afr.* : *Abyssin.*

andina *Mitt. M. austr. am. p. 538*.

1. — *Am. merid. : And. Quitens., ins. Chiloe.*

angolensis *Welw. et Duby in Mém.... Genève, 1871, p. 1, t. 1, f. 2*.

1. *Ad Lichen. et rad. arb.* — *Afr.* : *Angola*.

(1) In *Enum. Kindberg.* nomen nudum :
Diplostichum Lorentzi *C. M.*

- argentinica* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 387.
1. Cortic. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.
- aureo-nitens* Rehm. *M. Afr. austr.* n. 628.
— *Afr.*: C. B. Sp. or.
- australis* Hook. *M. ex. t.* 160; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 171; *C. M. Syn.* II, p. 37; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 456.
1. — *Pac.*: Fret. reg. Georges, Nov. Zeland. sept.
- Balansae* Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 18 et in *Journ. de bot.* 1891, p. 1.
— *Am. merid.*: Paraguay.
Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 3656.
- basilaris* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 390.
Syn. vel polyg. Terr. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.
- Beccarii* Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 275.
1. Cortic. — *Am. merid.*: Ceylan.
- Breutelii* Hpe. *mss.*; *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 247.
2? — *Afr.*: C. B. Sp.
- Cameruniae* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 166.
— *Afr.*: M. Cameroon.
- Camponi* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, p. 107.
1. Ad arbor. — *Afr.*: Madagascar.
- caroliniana* Sull. et Lesq. — F. Ravenelii.
- ciliaris* Brid. — F. octoblepharis.
- condensata* W. P. Sch. *mss.*; *Jaeg. Ad. II.* p. 284.
— *Afr.*: Abyssin.
- crassiretis* Ren. et Card. in *op. cit.* 1894, II, p. 128.
2. In silv. — *Afr.*: Madagascar.
- cubensis* Sull. — *Anacamptodon*.
- curvirostra* Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 304 et *M. frond. ined.*
Archip. ind. p. 7, t. 21; *C. M. Syn.* II, p. 36; *Bryol jav.* II, p. 130.
1. Cortic. — *As.*: Java.
- densifolia* Rehm. *M. Afr. austr.* n. 348.
— *Afr.*: Austral.
- dentata* W. P. Sch. *hb.*
F. polycarpa var. patens Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 87.
1. — *Am. sept.*: Mexic. (M. Orizaba).
- denticulata* W. P. Sch. *mss.*; *Jaeg. Ad. II.* p. 284.
— *Am. sept.*: Mexic.
- Donnellii* Aust. in *Coult. Bot. Gaz.* II, p. 111; *Lesq. et Jam. Man* p. 295.
Ad *Quercus*. — *Am. sept.*: Florida.
- Duseni* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 249.
— *Afr.*: M. Cameroon.
- Eckloniana* Hpe. *mss.*; *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 247.
1. — *Afr.*: C. B. Sp.
- fastigiata* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, II, p. 106.
1. — *Afr.*: Madagascar.

flavescens (Hook.) Par.

Campylodontium flavescens Bryol. jav. II, p. 128.

C. striatum Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 301 et M. frond. ined. Archip. ind. p. 123, t. 39.

F. striata C. M. Syn. II, p. 139.

Neckera flavescens C. M. Syn. II, p. 68 (fid. Bryol. jav.).

Pterigynandrum flavescens Brid. Bryol. univ. II, p. 193.

Pterogonium flavescens Hook. M. ex. II, t. 155.

Stereodon flavescens Mitt. M. Ind. or. p. 93.

1. — As. : Nepal., Himalaya, Khasia, Ceylan, Java

flavinervis C. M. in Linn. 1876, p. 645.

F. polycarpa Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 87.

Ad arbor. et mur. — Am. sept. : Mexic.

Gardneriana C. M. Syn. II, p. 34.

F. macroblepharis ej. in Bot. Zeit. 1845, p. 107.

F. polycarpa Wils. in M. Gardner. (etiam Hook. M. ex. t. 3 fid. Mitt.)

1. — Am. merid. : Brasil. or.

Goughii Mitt. M. Ind. or. p. 75.

F. secunda C. M. in Schmidt M. Neelgherr.

1. — As. : M. Neelgherr., Ceylan.

gracilicarpa Hpe. mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 284.

— Am. merid. : Columb.

grandifolia C. M. in Dusen M. Camer. n. 316.

— Afr. : M. Cameroon.

guarapiensis Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 18 et in Journ de bot. 1891, p.

1. Cortic. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3681 p.p.

Gueinzii Hpe. mss. ; C. M. Syn. II, p. 37.

2. — Afr. : C. B. Sp.

gymnostoma Sull. et Lesq. in Sull. Ic. M. p. 136, t. 86 ; Lesq. et Jam. Man. p. 294.

1. — Am. sept. : Nov. Mexic.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 378.

Hampeana Sonder in Hpe. Ic. M. t. 13 ; C. M. Syn. II, p. 34.

F. incana Tayl. in Lond. Journ. of bot. p. 1846, p. 58.

F. tomentosa H. f. et W. in Hook. Ic. pl. rar. t. 739 c.

1. Cortic. — Am. sept. : Mexic. (fid. Besch.) ? Pac. : Austral. occ et or.

hypnoides Rehm. M. Afr. austr. n. 629.

— Afr. : Transvaal.

imbricata Hpe. Symb. 1877, p. 728.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

incana Tayl. — *F. Hampeana*.

jamaicensis Ltz. Moosst p. 163.

1. — Am. sept. : Jamaic.

Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 197 ; C. M. Syn. II, p. 33 ; Mitt. M. austr. am. p. 538.

1. Cortic. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. n. 1256.

- julacea* Besch. Not. Parag. p. 265.
 1. Cortic. — Am. merid. : Paraguay.
 Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1256.
- jungermannioides* Brid. — F. Persoonii.
- latidens* Duby Choix de crypt. ex.... 1869, p. 12, t. 2, f. 4.
 1. — Am. merid. : Chile.
- Leikipiae* C. M. in Fl. 1890, p. 487.
 1. — Afr. : M. Aberdare.
- Leveilleana* (Bryol. jav.) Jaeg. Ad. II, p. 283.
Hypnum Leveilleanum Bryol. jav. II, p. 165, t. 264.
 1. — As. : Java.
- Lindigiana* Hpe. in Linn. 1861-62, p. 226 ; Mitt. M. austr. am. p. 538.
 1. Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- longidens* Duby op. cit. 1867, p. 12, t. 4, f. I ; Mitt. op. cit. p. 539.
 1. Cortic. — Am. merid. : Patagon. austr.
- longipila* Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 208.
 1. Cortic. — Afr. : Usambara.
- Lorentzi* C. M. in Linn. 1878-79, p. 389.
 1. Cortic. — Am. merid. : Argentin. Cordob.
- macroblepharis* Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 247 ; C. M. Syn. II, p. 32 ;
 Mitt. op. et l. cc.
 1. Lignic. — Am. merid. : Brasil.
- macroblepharis* } Br. et Sch. — F. abyssinica.
 } C. M. — F. Gardneriana.
- major* de Not. — F. octoblepharis.
- minuta* Mitt. M. Ind. or. p. 76.
 1. — As. : Himalaya occ.
- minutissima* Duby op. cit. 1880, t. 11, f. 2.
 F. andina ? (fid. Hpe. in Fl. 1880, n. 21).
 — Am. merid. : Chile.
- Niam-Niamiae* C. M. in Linn. 1875, p. 428.
 Ster. Cortic. — Afr. : Niam-Niam.
- Nietneri* C. M. in Linn. 1869-70, p. 18.
 1. — As. : Ceylan.
- nivalis* Mont. in Ann. sc. nat. 1838, p. 57, c. ic. ; in d'Orbigny Voy. Am.
 merid. p. 107, t. 3, f. 3 et Syll. p. 22 ; C. M. Syn. II, p. 35.
 2. Terr. — Am. merid. : And. Quitens., summ. And. Boliv.
- octoblepharis* (Schleich.) Schwaegr. Suppl. I, II, p. 333, t. 99 ; Bryol.
 eur. V (mon. p. 4), t. 451 ; C. M. Syn. II, p. 33 ; W. P. Sch. Syn. II
 ed. p. 584.
 F. ciliaris Brid. Bryol. univ. II, p. 171.
 F. major de Not. Syll. M. p. 85.
 F. pusilla Schwaegr. op. cit. p. 337.
 F. pusilla β Bryol. eur. l. c.
 Hypnum ciliare Brid. Sp. M. II, p. 155.
 Pterogonium octoblephare Schleich. Crypt. Helv. exs.
 1. Ad mur. et saxa. — Eur. : Gall. occid., Helvet. et Tirol. merid.,
 zon. merid. ; deest in Britann. As. : Kurdistan., Caucas. occ. et
 centr. Am. sept. : Illinois, Kansas.
 Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 468.

palmicola C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 392.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Uruguay.

patentissima C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 19.

1. — *As.* : Ceylan.

Persoonii Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 339, t. 99; C. M. *Syn.* II, p. 33.

F. *jungermannii* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 169.

Hypnum coronopifolium P. B. in *hb.* Brid.

1. Lignic. — *Afr.* : Ins. S. Thomas, Borbon., Francia.

physcomitriocarpa C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 393.

1. Terr. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

pilifera Hsch. in *Linn.* 1841, p. 136; C. M. *Syn.* II, p. 35.

1. Cortic. — *Afr.* : C. B. Sp.

pilifera C. M. p.p. — F. *Vallis Gratiae*.

pilifolia C. M. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 229 (nom.).

Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica.

Podocarpi C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 388.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

polycarpa Hook. *M. ex.* II, p. 3, t. 3; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 172;

C. M. *Syn.* II, p. 37.

1. Ad arbor. et saxa. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat. et Peruv., Brasil., Montevideo.

polycarpa { Besch. — F. *flavinervis*.
Br. et Sch. — F. *Schimperiana*.
Wils. — F. *Gardneriana*,

var. *patens* Besch. — F. *dentata*.

pusilla Raddi *Att. d. Acad. d. Scienz. di Siena*, IX, p. 230; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 170; C. M. *Syn.* II, p. 31; *Bryol. eur.* V (mon. p. 3), t. 450 (excl. fig. 6 ad F. *octoblepharem* pertin.) ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 584.

Grimmia inconspicua Bertol. *Amoen.* p. 53.

1. Ad arbor., rar. ad saxa. — *Eur.* : Helvet. occ.; zon. merid.; deest in Britann. *Afr.* : Alger., Madeir. *Am. sept.* : Columb. brit., Minnesota, Calif. inf., Nov. Mexic.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 508.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 687, 1181, 1264.

« var. *ciliata* Lesq. et Jam. *Man.* p. 294.

F. *Schimperiana* de Not. *Epil.* p.p. 226 et 228 (1).

— *Am. sept.* : Calif., Nov. Mexic.

pusilla Schwaegr. — F. *octoblepharis*.

var. β *Bryol. eur.* — F. *octoblepharis*.

Ravenelii Sull. *M. of U. St.* p. 61, t. 4 et *Ic. M.* p. 135, t. 85; Lesq. et Jam. *Man.* p. 292.

F. *caroliniana* Sull. *M. of U. St.* p. 62; Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 253.

1. Lignic et rupic. — *Am. sept.* : Carolin. inf., Florida.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 252 et II ed. n. 376, 377.

- Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 347.
— Afr. : C. B. Sp.
- « var. *julacea* *Rehm. l. c. n.* 627.
— Afr. : Natal.
- Schimperiana *Hpe. mss.*
F. abyssinica C. M. p.p.
F. polycarpa *Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n.* 443.
l. — Afr. : Abyssin.
- Schimperiana* de Not. — F. pusilla var. ciliata.
- Schmidii C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 558; *Mitt. M. Ind. or.* p. 76.
l. — As. : M. Neilgherr.
- Schweinfurthi C. M. in *Linn.* 1875, p. 426.
l. Terr. — Afr. : M. occid. mar. Erythraei.
- Scottiae C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 620.
l. — Pac. : Austral. or.
- secunda *Mont. in Ann. sc. nat.* 1842, p. 251 et *Syll. p.* 22; C. M. *Syn. II*,
p. 36; *Mitt. op. cit.* p. 76.
l. Cortic. — As. : M. Neilgherr., Ceylan, Java.
- secunda C. M. — F. Goughii.
- ? Sendtneri W. P. *Sch. Syn. II ed.* p. 585.
Fl. et fr. ign. Cortic. — Eur. : Istria.
- seriola C. M. — Ischyrodon.
- socotrana *Mitt. in Trans. of the roy. Soc. of Edinb.* 1887, p. 335.
Ster. — Afr. : Ins. Socotora.
- splachnoides C. M. — Anacamptodon.
- striata C. M. — F. flavescens.
- subpolycarpa C. M. in *Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 48.
— Am. merid. : Brasil. austr. or.
- Tayloriana *Hpe. in Linn.* 1869-70, p. 522.
l. — Pac. : Austral. or.
- tomentosa H. f. et W. — F. Hampeana.
- uruguensis C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 391.
l. Cortic. — Am. merid. : Uruguay.
- Vallis-Gratiae *Hpe. mss.*; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 247.
F. pilifera C. M. *Syn. II*, p. 35 p.p.
l. — Afr. : C. B. Sp.
- Wrightii *Sull. M. of U. St. p.* 61 et *Ic. M. p.* 132, t. 84; *Lesq. et Jam. Man.* p. 295.
l. — Am. sept. : Texas.
Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed.* n. 251.
- Wulfschlaegelii *Ltz. Moost.* p. 163.
l. — Am. sept. : Jamaic.
- Zollingeri C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 368; *Bryol. jav. II*, p. 131.
l. Filic. — As. : Java (1).

(1) In *Enumer. Kindberg. nomina nuda* :

F. Baileyi C. M.

brachyodonta C. M.

F. obtuso-acuminata C. M.

FABRONIELLA Ltz. mss. (1 spec.).

Krausei Ltz. mss. ; C. M. in Linn. 1873, p. 442 (nom.).

— Am. merid. : Chile.

FAURIELLA (1) Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 363 (1 spec.).

lepidoziaea Besch. l. c.

2. Cortic. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 24, 113, 199, 564.

FISSIDENS Hedw. Fund. M. II, p. 91 (424 spec.).

abbreviatus Mitt. Fl. Vit. p. 385.

1.

— Pac. : Ins. Raoul.

? acacioides Brid. Bryol. univ. II, p. 705; C. M. Syn. I, p. 71 et II, p. 535 (2).

Hypnum acacioides L. Sp. pl. p. 1588.

Skitophyllum acacioides La Pyl. in Desv. Journ. bot. 1813, p. 45, t. 35, f. 7.

— Am. merid. : Patagon.

acutifolius Mitt. M. Ind. or. p. 137.

Ster.

— As. : Assam super.

acutus Jaeg. Ad. II, p. 9.

F. pungens Sull. in Proced. Am. Acad. 1859, p. 276.

1. Rupic. — As. : Hong-Kong.

adelphinus Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 344.

1. In graminos. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 17, 184, 197.

adiantoides (L.) Hedw. M. frond. III, p. 62, t. 26; Brid. Bryol. univ. II, p. 702; Bryol. eur. I (mon. p. 10), t. 105; C. M. Syn. I, p. 51 p.p. et II, p. 529; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 119.

Dicranum adiantoides Sw. M. Suec. p. 31; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 110.

F. major Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. XXI, p. 550.

F. taxifolius β Wahlenb. Fl. Lapp. p. 332.

Hypnum adiantoides L. Sp. pl. p. 1588.

H. taxiforme palustre majus et erectum Dill. Hist. M. p. 264, t. 34, f. 3.

Skitophyllum adiantoides la Pyl. op. cit. p. 55, t. 36.

1. vel 2. Terr. in turfis., ad rad. arbor. et mur. — Eur. : Reg. campestr. tota. As. : Japon., Hong-Kong. Afr. : Alger. Am. sept. : Terr. nov., New Brunswick, Anticosti, Gaspesia, Nov. Scotia, Ontario, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Montana, Calif. reg. sept. et or. Pac. : Nov. Zeland., Tasman.

Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 62, 92.

Mac. Canad. M. n. 52.

Rab. Bryoth. eur. n. 257, b et c, 828 et b.

* var. brachyphyllus Kindb. in Mac. Cat. p. 37.

Ut typ. — Am. sept. : Ontario.

* var. immarginatus Lindb.

— Am. sept. : Canada, Idaho.

(1) * A ce genre doivent probablement se rattacher les *Heterocladium tenue* et *leucotrichum* Mitt. du Japon, qui ne sauraient être maintenus dans le genre *Heterocladium* tel qu'il est circonscrit dans le *Bryologia europaea.* » Besch. l. c.

(2) * Planta dubia, forsan *Drepanophyllum.* » C. M. l. c.

- adiantoides* { C. M. pp. — F. polyphyllus.
 { Mitt. (fid. Limpr.). — F. decipiens.
 var. *marginatus* Brid. — F. decipiens (fid. Jur.).
 var. *rupestris* Limpr. — F. decipiens.
 var. *Savatieri* Besch. — F. Savatieri.
 var. *tener* Mdo. — F. decipiens.
- aeruginosus* Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 62, t. 83, f. 5 et *Handb.* p. 408.
 1. — Pac. : Nov. Zeland. sept.
- aggestus* (Besch.) Par.
Conomitrium aggestum Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 79.
 2? In agger. — As. : Tonkin.
- alexandrinus* Ltz. *M. Ehrenb.* p. 17, t. 1 et 2.
 F. cyprius (fid. Limpr.).
 Syn. — Afr. : Ægypt. inf.
- algarvicus* Solms Laubach. *Tent. bryol. geog. Algarv.* p. 41 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 115.
 F. incurvus var. *algarvicus* Husn. *Fl. N. O.* p. 54.
 F. pusillus var. *algarvicus* Roul. *Fl. de l'E.*, p. 529.
 2. In argill. humid. — Eur. : Armoric., Normann., Pyren., or., Algarv.
- alomoides* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 505.
 — Afr. : M. Cameroon.
- amœnus* C. M. in *Bot. Zeit.* p. 38 et *Syn. I*, p. 66 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 589.
Conomitrium amœnum ej. *Syn. II*, p. 527.
 2. — Am. merid. : Venezuela.
- androgynus* Br. in *Fl.* 1846, p. 134 ; C. M. *Syn. I*, p. 57 et *II*, p. 532.
 — Afr. : C. B. Sp.*
- angolensis* Welw. et Duby in *Mém.... Genève*, 1870, t. 4, f. 6.
 2. Arenic. — Afr. : Angola.
- anguste-limbatus* Mitt. *op. cit.* p. 601.
Conomitrium anguste-limbatus Jaeg. *Ad. II*, p. 42.
 1. Terr. — Am. merid. : Brasil.
- angustifolius* Sull. in *Proced. Am. Acad.* 1861, p. 275 ; *Mitt. op. cit.* p. 598.
 1. Terr. — Am. sept. : Cuba. Am. merid. : Ins. Trinitat.
- angustus* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 324.
 Ster. — As. : Ceylan.
- anomalus* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1841, p. 267 et *Syll.* p. 3 ; C. M. *Syn. I*, p. 53 et *II*, p. 529 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 137.
 F. cryptotheca *Bryol. jav.* p. 7, t. 6.
 F. neckeroides *Griff. Not.* p. 426 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 83, f. I.
 2. — As. : Sikkim, Khasia, M. Neilgherr., Ceylan, Java.
- Antrophyi* C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 31.
 Ster. Filicic. — As. : Ceylan.
- aporrocheilos* C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 167.
 Ster. — Am. merid. : Venezuela.
- Arbogasti* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 13.
 2? — Afr. : S. Maria de Madagasc.

arboreus *Broth. in Oefv....* 1890, p.

1. Cortic. — *Pac.* : Austral. (Queensland).

arcuatus *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p.* 202.

1. — *Pac.* : Nov. Caledon. (Ins. Pinor.).

Archeri *F. v. Müll. in sched. ; Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p.* 93 (nom).

— *Pac.* : Austral. ? Tasman. ?

areolatus *Griff. Not. p.* 428 et *lc. pl. asiat. II, p.* 83, t. 2 ; *Mitt. op. cit. p.* 138.

F. polypodioides var. *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p.* 294.

— *As.* : Sikkim, Khasia, Ava.

Arnoldi *Ruthe in Hedw. 1870, p.* 77.

2. Ad rup. in alv. fluvior. — *Eur.* : Thuring., Bavar., os Elbae.

asperisetus *Lac. Sp. nov. M. Archip. Ind. p.* 2, t. 1 B.

1. — *As.* : Celebes.

asplenioides *Hedw. M. frond. III, p.* 65, t. 28 ; *Brid. Bryol. univ. II, p.* 697 ; *C. M. Syn. I, p.* 69 et *II, p.* 528 ; *Mitt. M. austr. am. p.* 591.

Dicranum asplenioides Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1770.

F. turbinatus Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 90 ; *C. M. Syn. II, p.* 532.

Hypnum asplenioides Sw. Prodr. p. 140.

Skitophyllum asplenioides la Pyl. op. cit. p. 47, t. 36, f. 8-9.

2. Rupic. et terr. — *Afr.* : Ins. Tristan d'Acunha. *Am. sept.* : Jamaïc. *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv. ; ins. Juan Fernandez. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

asplenioides { *Brid. p.p., Hsch. — F. Thunbergii.*
 { *Mitt. p.p. — F. flabellatus.*

var. *polyphyllus Wils. — F. polyphyllus.*

var. *serrulatus Wils. — F. serrulatus.*

assimilis (*Hpe.*) *Par.*

Conomitrium assimile Hpe. Symb. 1877, p. 738.

2 ? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Asterodontium (*C. M.*) *Mitt. op. cit. p.* 587.

Conomitrium Asterodontium C. M. Syn. II, p. 527.

2. Terr. — *Am. merid.* : Brasil.

atro-viridis *Besch. in Ann. sc. nat. VII ser., II, p.* 86.

Terr. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

auriculatus *C. M. in Linn. 1871-73, p.* 166.

Ster. — *As.* : Bengal. sept.

α var. *aquatica ej. op. cit. p.* 167.

Ad saxa irror. — *As.* : Cum typ.

australiensis *Jaeg. Enum. Fiss. p.* 24.

Conomitrium perpusillum C. M. et Hpe. in Linn. 1855-56, p. 214 et 1859-60, p. 645.

F. tenellus H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. ? (fid. Hpe.).

2. In turf. — *Pac.* : Austral. fel., Tasman.

austro-africanus *Par.*

F. pseudo-rufescens Rehm. M. Afr. austr. n. 589.

Ster. — *Afr.* : Orange.

axilliflorus *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p.* 325.

— *As.* : Ceylan.

- Balansaeanus* Besch. Not. M. Parag. p. 260.
Syn. Ad puteos. — Am. merid. : Paraguay.
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1241.
- « *var. limosus* Besch. op. cit. p. 261.
Ad terr. — Am. merid. : Paraguay.
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1245.
- Bambergeri* W. P. Sch. op. cit. p. 115.
2 (W. P. Sch.) ; polyg. (Limpr.). Ad terr. aren. micac. — Eur. : Tirol.
merid. Am. sept. : Kansas, Ludovic.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 656.
- Barbae montis* C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 152.
2. Ad lapid. rivul. — Am. sept. : Costa Rica.
- basicarpus* C. M. in Engler's Bot. Jahrb. p. et in Forschungsreise...
p. 62.
1. Ad terr. humid. — Afr. : Monrovia.
- basilaris* Hpe. et C. M. in Linn. 1853, p. 501.
2. — Pac. : Austral. or.
- Beckettii* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 325.
Terr. — As. : Ceylan.
- bengalensis* (Hpe.) Par.
Conomitrium bengalense Hpe. in Jaeg. Ad. II, p. 47.
In Bambuset. — As. : Calcutta.
- Berterii* C. M. p. p. — { Conomitrium.
Conomitrium capense.
- bicolor* Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 322.
Terr. — As. : Ceylan.
- biformis* Mitt. M. Ind. or. p. 141.
F. viridulus Wils. op. cit. p. 294.
2 ? — As. : Ceylan.
- bifrons* W. P. Sch. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 198.
2 ? — Afr. : C. B. Sp.
- Bloxami* Wils. — F. exilis.
- bogosicus* C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 10.
2. — Afr. : Abyss.
- Boivinianus* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 43.
Ster. — Afr. : Comor. magn.
- « *var. longifolius* Besch. l. c.
— Afr. : Usambara, ins. Borbon.
- Bonvaleti* W. P. Sch. et Par. in Rab. Bryoth. eur. n. 945.
F. taxifolius var. Bonvaleti Besch. Cat. M. Alger. p. 7.
1. Ad terr. in dumet. — Eur. : Sardin. Afr. : Alger.
- Borgenii* Hpe. in Bot. Zeit. 1870, p. 36.
2. — Afr. : Natal.
- Boryanus* Besch. op. cit. p. 43.
2 ? Ster. — Afr. : Ins. Borbon.
- Bourgaeanus* Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 26.
2. — Am. sept. : Mexic.

brachypus Mitt. *M. austr. am.* p. 590.

Conomitrium brachypus Jaeg. *Ad. II*, p. 44.

Filicic. — *Am. merid.* : Amazon.

Braunii Bryol. jav. *I*, p. *I*.

Conomitrium Braunii C. M. *Syn. II*, p. 527.

2. Terr. — *As.* : Java.

Breutelii W. P. Sch. mss. ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 198.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

brevifolius Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 61, t. 83, f. 4 et *Handb.* p. 408 ; Mitt. *op. cit.* p. 596.

2. — *Afr.* : Austral. *Am. merid.* : (fid. *Handb.*!).

Pac. : Nov. Zeland., Tasman.

« *var. floribundus* eor. *Fl. Tasm. II*, p. 167.

— *Pac.* : Tasman.

brevifrons Mitt. in *Philos. Trans. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.*), p. 396.

Ad rup. argill. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

brevipes Besch. in *Journ. de bot.* 1891, p.

1. Arbor. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3698.

Brotheri Par.

F. leptophyllus Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 182.

2. Terr. — *Afr.* : Togo.

bryodictyon Besch. in *Rev. bryol.* 1891, p. 50.

2. — *Am. sept.* : Guadalup.

bryoides (L.) Hedw. *M. frond. III*, p. 67, t. 29 (*excl. f.* 10) ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 686 ; *Bryol. eur. I* (*mon. p.* 8), t. 101 ; C. M. *Syn. I*, p. 58 et *II*, p. 529 (*excl. syn. F. exilis*) ; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 111.

Dicranum bryoides Roth *Tent. fl. germ. III*, p. 181 ; *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 113 et *II ed. n.* 39 et 40.

D. viridulum Sw. *M. Suec. pp.* 31 et 84, t. 2, f. 3.

F. viridulus Wahlenb. *Fl. Carpath. p.* 342 et *Fl. Lapp. p.* 331 (1).

Fucina bryoides Schrank *Baiers Fl. II*, p. 451.

Hypnum bryoides L. *Sp. pl.* p. 1588.

H. taxiforme exiguum versus extremitatem capsuligerum Dill. *Hist. M.* p. 262, t. 34, f. I.

Schistophyllum viridulum Lindb. *M. Scand. p.* 13.

Skitophyllum bryoides la Pyl. *op. cit.* p. 42, t. 35.

1. Terr. in loc. umbros. — *Eur.* : Reg. campestr. *As.* : *Jenissei med.* et sup., *Obi*, *Himalaya occ.*, *Khasia*, *Bengal.*, *Caucas. centr.* *Afr.* : *Ins. Canar.*, *Madeir.*, *M. Cameroon.* *Am. sept.* : *Ontario*, *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, *ins. Vancouver*, *Idaho*, *reg. or. Pac.* : *Nov. Zeland.*

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 49.

Mand. Pl. Mad. n. 5 bis.

Rab. Bryoth. eur. n. 767 et b, 827.

« *var. caespitans* W. P. Sch. *l. c.*

F. Curnowii Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1885, p. 554.

Ad rupes cataract. — *Eur.* : *Cambrovall.* *Afr.* : *Teneriffa.* *Am. sept.* :

New Hampshire. *Pac.* : *Austral.* (*Nov. Valesia.*)

Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n.* 826.

- var. *exilis* Roehl. — *F. exilis*.
 var. *Hedwigii* Limpr. — *F. exilis*.
 « var. *impar* Mitt. in *op. et l. cc.*
 — *Eur.* : Hibern. As. : Sibir. Am. sept. : Canada.
 var. *inconstans* Ruthe. — *F. inconstans*.
 var. *intermedius* Ruthe. — *F. exilis*.
 var. *rivularis* Spr. — *F. rivularis*.
 var. Hffm. — *F. exilis* (1).
bryoides { C. M. p.p. — *F. exilis*.
 H. f. et W. — *F. minutulus*.
 Roehl. — *F. osmundioides*.
Büttneri Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 181.
 1. Terr. — *Afr.* : Togo.
caespitosus Hpe. in *Jaeg. Ad. II*, p. 39 (*nom.*).
 — *Am. sept.* : Calif.
calcicolus C. M. in *Linn.* 1876, p. 290.
 Saxic. — *Afr.* : Somali.
caldensis Ångstr. *Prim. lin.* p. 47.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr.
calodictyon Broth. in *Oefv....* 1890, p.
 2. Terr. — *Pac.* : Austral. (Queensland).
caloglottis C. M. in *Fl.* 1888, p. 407.
 Ster. In gramin. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
Cameruniae C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 123.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
campyloneuros C. M. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1892, p. 295.
 2 ? Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.
Campylopus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 116 et *Syll.* p. 4 ; C. M. *Syn. I*, p. 66 et *II*, p. 528 ; *Mitt. op. cit.* p. 592.
 1. Terr. — *Am. merid.* : Chil. austr.
capitatus Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 547 ; C. M. *Syn. I*, p. et *II*, p. 533.
 1. — *Pac.* : Nov. Zeland.
caripensis (Hpe. et C. M.) Par.
Conomitrium caripense Hpe. et C. M. in *Linn.* 1874, p. 574.
 1. — *Am. merid.* : And. Venezuel.
cellulosus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 319.
 Ster. — *Afr.* : M. Usagara.
ceylonensis Dz. et Mh. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 304 ; C. M. *Syn. I*, p. 59, et *II*, p. 532 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 141 ; *Bryol. jav. I*, p. 2, t. 3.
F. incurvus var. *Wils. op. cit.* p. 294.
 2. — *As.* : Himalaya, M. Neilgherr., Ceylan.
chioneuros C. M. in *Linn.* 1871-93, p. 167.
 Ster. — *Afr.* : Ins. S. Helena.

(1) In M. As. bor. 1890, II, p. 14, cl. Lindberg enumerat variet. : *impar* (*F. impar* Mitt. ?), *subimpar*, *varium* et *intermedium*, a numero et situ androëciorum et attheridiarum constitutas.

chrysopoma C. M. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 227 (nom.).

Terr. — *Am. sept.* : Costa Rica.

circinalis Mitt. *op. cit.* p. 138.

Ster. — *As.* : Ava.

circinans W. P. Sch. in *sched.* ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 340 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 586.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

clavipes Sull. in *Proced. Am. Acad.*.... 1861, p. 57 ;

Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Cuba.

Closteri Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, V, p. 21 ; Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 44, t. 29 ; Lesq. et Jam. *Man.* p. 81.

1. Terr. — *Am. sept.* : New Jersey.

collinus Mitt. — *F. decipiens*.

comorensis C. M. in *Linn.* 1877 p. 233.

Ster. Terr. — *Afr.* : Ins. Mayotte, Nossi-Be.

« *var. acuminatus* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 42.

— *Afr.* : Ins. Mayotte, Nossi-Comba.

corneus Hpe. in *Jaeg. II*, p. 39.

— *As.* : Birmania.

corticola W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 17 ; Besch. in *Rev. bryol.* 1891, p. 52.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

costa-ricensis Besch. in *Bull. hb. Boissier*, 1894, p. 390.

2. In humid. — *Am. sept.* : Costa-Rica.

crassicollis Besch. in *Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 51.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup, Martinic.

crassinervis Lac. *Sp. nov. M. Archip. Ind.* p. 3, t. 2 A.

2. Terr. — *As.* : Borneo, ins. Banca, Java.

crassinervis Thw. et Mitt. — *F. Mittenii*.

crassipes Wils. in *Bryol. eur. I* (mon. p.), t. 100 ; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 113.

F. fontanus W. P. Sch. in *Spr. M. Pyr. n.* 316.

F. incurvus γ *crassipes* W. P. Sch. *Syn. I* ed. p. 104.

F. incurvus *var. fontanus* C. M. *Syn. I*, p. 59 et *II*, p. 530 ; *Bryol. eur.* (mon. p. 6), t. 99, f. β.

F. viridulus β *fontanus* Braithw. *Brit. Moosfl.* p. 71 (p.p. fid. Limpr.).

F. viridulus *var. major* Wils. *Bryol. brit.*, p. 303, t. 53 γ.

Schistophyllum crassipes Lindb. *M. Scand.* p. 13.

1. Ad rup. irror. — *Eur.* : Fere tota. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Absque loco (*Jaeg. Enum. Fissid.* p. 77).

Ews. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 311, 469.

« *var. curtus* Ruthe mss. ; Limpr. *Deutschl. Laubm.* p. 441.

-- *Eur.* : Saxon.

« *var. rufipes* W. P. Sch. *Syn II* ed. p. 113.

F. hydrophilus *Jaeg. Enum. Fissid.* p. 20 et *Ad. II*, p. 27.

F. incurvus δ *fontanus* W. P. Sch. *Syn. I* ed. p. 105.

F. Mildeanus ej. in *Rab. Bryoth. eur. n.* 470.

F. rufipes *Jaeg. op. et ll. cc.*

- Ad rupes submers. — *Eur.* : Jurass. gall., Helvet., Bavar., Tirol., Austr. super., Salisb.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 311 b, 470.
 « *var.* Philiberti *Besch. Cat. M. Alger. p. 7.*
 — *Afr.* : Alger.
- crassipes* Lechl. — *F. rigidulus.*
- crenulatus* Mitt. *M. Ind. or. p. 140.*
 1. — *As.* : Nepal.
- crispus* Mont. in *d'Orbigny Voy. VIII, Crypt. p. 97* ; in *Ann. des sc. nat. 1837, p. 37 et Syll. p. 4* ; *C. M. Syn. I, p. 61 et II, p. 532* ; Mitt. *M. austr. am p. 600.*
 Ad terr. arenos. — *Am. merid.* : Corrientes.
- cristatus* Wils. in *Kew Journ. bot. IX, p. 294* ; Mitt. *M. Ind. or. p. 137.*
F. decipiens (fid. Limpr.).
 2. — *As.* : Khasia, Java.
- ? *cryptarum* C. M. in *Linn. 1875, p. 352.*
 2 ? Ster. Loc. humid. — *Afr.* : Bongo.
- cryptotheca* Dz. et Mk. — *F. anomalus.*
Curnowii Mitt. — *F. bryoides var. caespitans.*
- curvatus* Hsch. in *Linn. 1841, p. 148* ; *C. M. Syn. I, p. 59 et II, p. 532.*
 2 ? Muric. — *Afr.* : C. B. Sp.
- curvifolius* Mitt. in *M. herb. Hook. 1860, p. 55, t. 6, f. 14.*
 2 ? Terr. — *Afr.* : Niger.
- cuspidatulus* Sull. — *F. elegans.*
- cuspidatus* C. M. in *Linn. 1843, p. 558* ; *Syn. I, p. 48 et II, p. 530.*
 2. Terr. — *Afr.* : C. B. Sp.
- cylindraceus* Mitt. *M. austr. am. p. 590.*
Conomitrium cylindraceum Jaeg. *Ad. II, p. 144.*
 — *Am. merid.* : M. Chimborazo.
- cyprius* Jur. in *Unger et Ky. « die Ins. Cypern » p. 167.*
F. alexandrinus Ltz. }
F. pusillus W. P. Sch. p.p. } (fid. Limpr.).
 Polyg. Terr. calcar. — *Eur.* : Etrur., ins. Melit. *As.* : Ins. Cypr.
- daltoniaefolius* C. M. *M. Pol. p. 59.*
 Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- Danckelmanni* C. M. in *Fl. 1886, p. 505.*
 Ster. Arbor. — *Afr.* : Sinus Guineens.
- Darntyi* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 46.*
 2. Ad terr. humid. — *Afr.* : Ins. Franciæ.
- dasyphus* Welw. et Duby in *Mém... Genève, 1870, t. 4, f. 2.*
 2. In argill. reg. mont. — *Afr.* : Angola.
- dealbatus* Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II, p. 63, t. 84, f. 2 et Handb. p. 407.*
 2. Ad rup. madid. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.
- debilis* { *Schwaegr.* — *Conomitrium Julianum.*
 { *Wils.* — *F. diversifolius.*

decipiens de Not. *Epil.* p. 479; *Sulliv. Ic. M. Suppl.* p. 46, t. 31; W. P. *Sch. Syn. II ed.* p. 118 (1).

F. adiantoides Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1885, p. 550 (fid. *Limpr.*).

F. adiantoides β *marginatus* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 704 (fid. *Jur.*).

F. adiantoides var. *rupestris* *Limpr. Kryptfl. von Schles. I*, p. 187.

F. adiantoides var. *tener* Mdo. *Laubm. Oberfr.* p. 110.

F. collinus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1885, p. 550.

F. dubius P. B. *Prodr.* p. 57; *Brid. Sp. M. I*, p. 169.

F. rupestris Wils. *M. brit. n.* 311.

Schistophyllum decipiens *Lindb. M. Scand.* p. 13.

Skitophyllum adiantoides β *marginatus* P. B. *op. cit.* p. 55, t. 36, f. 15.

2. Ad terr. et rup. præpr. calcar. — *Eur.*: Fere tota. *As.*: Saghalien, Caucas. *Am. sept.*: Gaspes., Ontario, lac. Super., reg. or. et merid.

Exs.: Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 41.

Mac. *Canad. M. n.* 400.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 825.

decursivus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 245.

Ster. *Rupic.* in silv. — *Am. merid.*: Argentin. Cordob.

delicatulus Ångstr. in *Oefv....* 1872, n. 4, p. 20 (2).

Ster. — *Pac.*: Ins. Sandwic., Austral. or. (Nov. Vales.).

densiretis Sull. in *Proced. Am. Acad. ..* 1861; Mitt. *M. austr. am.* p. 595.

Terr. — *Am. sept.*: Cuba.

denticulatus { Mont. — *F. Wilsoni*.
Willd. — *Plagiothecium*.

desertorum (C. M.) Par.

Conomitrium desertorum C. M. in *Linn.* 1875, p. 368.

1. *Paludic.* — *Afr.*: Djour.

dicarpos Brid. — *F. osmundioides*.

Dietrichiæ C. M. in *Linn.* 1874, p. 146.

2. — *Pac.*: Austral. or.

Dillenii { C. M. — *Conomitrium*.
Mitt. — *Conomitrium Müllerii*.

dimorphus C. M. *Syn. II*, p. 533; Mitt. *op. cit.* p. 596.

2. *Saxic.* — *Am. merid.*: Brasil.

diplodus Mitt. *op. cit.* p. 589.

Conomitrium diplodus Jaeg. *Ad. II*, p. 44

2? *Arbor.* — *Am. merid.*: And. Quitens.

discolor Wils. in *Kew Journ. bot IX*, p. 294; Mitt. *M. Ind. or.* p. 139.

2. — *As.*: Ceylan.

dissitifolius Sull. in *Proced. Am. Acad....* 1861, p. 275; Mitt. *M. austr. am.* p. 600 (3).

2. *Rupic.* — *Am. merid.*: Cuba.

(1) Cf. Philibert in *Rev. bryol.* 1883, p. 65.

(2) Bis indicat. in Jaeg. *Adumbr. II*, p. 4, n. 20 et p. 7, n. 41.

F. gracilescens Ångstr. (*op. et cit.* n. 42) non reperitur in *Oefv.*

(3) « La Pylaie's fig. of his *Skitoph. longifolium* gives a fair idea of *F. dissitifolius*. » Mitt. l. c.

- distichellus *Besch. in Journ. de bot.* 1891, p.
2. — *Am. merid.* : Monte Video.
- diversifolius *Mitt. M. Ind. or.* p. 140.
F. debilis *Wils. in Kew Journ. bot.* IX, p. 140.
2? — *As.* : Himalaya, Bhotan.
- divisus *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III,* p. 332.
— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- domincensis *Brid.* — *Neckera duplicata.*
- dongensis *Besch. in Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 79.
1. Ad limos. in spelunc. — *As.* : Tonkin.
- Donnellii *Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV,* p. 151 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 85.
2. Ad rad. *Cupress.* in palud. — *Am. sept.* : Florida.
- dubius *P. B.* — *F. decipiens.*
- Dubyanus *Jaeg. Ad. II,* p. 23.
F. macrophyllus *Duby in Mém.... Genève* 1870, t. 3, f. 3.
1. Ad terr. umbros. — *Afr.* : Angola.
- Duseni *C. M. in Dusen. M. Camer. n.* 211.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- elamellosus *C. M. et Hpe. in Linn.* 1856, p. 214.
2. — *Pac.* : Austral.
- elegans *Brid. Bryol. univ. II,* p. 691 ; *C. M. Syn. II,* p. 534 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 595.
F. cuspidatulus *Sull. in Proced. Am. Acad...* 1861.
Skitophyllum elegans *la Pyl. op. cit.* p. 43, t. f. 18.
1 (Mitt.) 2? (C. M.). — *Am. sept.* : Cuba, Jamaïc.,
Haïti, ins. Tabago. *Am. merid.* : Amazon, And. Peruv.
- ellipticus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 43.
Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- elongatus *Mitt. M. Ind. or.* p. 139.
F. n° 10 *Griff. Not.* p. 431.
Ster. Cortic. — *As.* : Khasia.
- erosulus (C. M.) *Par.*
Conomitrium erosulum C. M. in Linn. 1875, p. 367.
2. Saxic. — *Afr.* : Niam-Niam.
- Eustichium* *Rehm.* — *Eustichium longiroste.*
- evadiinervis *Par.*
Conomitrium subpalmatum Hpe. Symb. 1877, p. 737.
2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- exasperatus *Ren. et Card. in Bull. soc. roy. bot. Belg.* 1892, II, p. 102.
1. Arbor. — *Afr.* : Madagascar.
- excavatus *Besch. in Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 52.
2. — *Am. sept.* : Guadalup.
- exiguus *Sull. in Mem. of the Am. Acad...* 1846, III, p. 60, t. 2 ; *M. Allegh.* p. 44 ; *Ic. M.* p. 36, t. 23 et *M. of U. St.* pp. 24 et 103 ;
C. M. Syn. I, p. 64 et *II,* p. 531 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 84.
F. incurvus var. exiguus *Aust. M. Appal. n.* 103.

2. Ad saxa irror. — *Am. sept.* : Ontario, Columb. brit., reg. centr., or. et merid., Colorado.

Exs. : Sull. M. Allegh. n. 182.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 100.

exilis Hedw. *Sp. M.* I, 152, t. 38 : *Brid. Bryol. univ.* II, p. 683 ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 111.

Bryum viridulum Dicks. *Fasc. I Pl. crypt.* p. 3, t. 1, f. 5.

Dicranum bryoides Sw. *Act. Holm.* 1795, p. 240 (non *M. Suec.*).

Dicranum bryoides var. minus Turn. *Muscol. Hib.* p. 57.

D. viridulum Sm. *Fl. brit.* III, p. 1280.

Fl. Bloxami Wils. in *Lond. Journ. bot.* IV, 1845, t. 9 A ; *Bryol. eur.* I (mon. p.), t. 100 ; *C. M. Syn.* I, p. 66 et II, p. 531.

F. bryoides *C. M. Syn.* I, p. 58 p.p.

F. bryoides var. *Hoffm. Deutsch. Fl.* II in add.

F. bryoides var. *exilis* Roehl. *Deutsch. Fl.* III, p. 76.

F. bryoides var. *gymnandrus* Ruthe.

F. bryoides var. *Hedwigii* Limpr. *Deutschl. Laubm.* p. 429 (1).

F. bryoides var. *intermedius* Ruthe in *Rab. Bryoth. eur.* n. 1160.

Grimmia viridula Roth *Fl. Germ.* III, p. 141.

Hypnum bryoides var. *Poll. Fl. Pal.* III, p. 123.

Skitophyllum exile la Pyl. *op. cit.* p. 34, t. 38, f. 1.

Weisia viridula Roth. *Fl. Germ.* I, p. 456 ?

1. Ad terr. umbros. et sax. aren. humid. — *Eur.* : Reg. campestr. zon. interm. et sept. : Spitzberg, Rossia orient.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 356, 1107.

» *f. integra* Limpr. *Laubm. Deutschl.* I, p. 448.

F. Lylei Wils. in *Braithw. Brit. Moosfl.* p. 68.

F. pusillus var. *integra* ej. *Bryol. brit.* p. 304.

F. sepincola Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1885, p. 555.

— *Eur.* : Anglia.

falcatus Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1894, p. 237, t. XXI, f. B.

Ster. Lignic. — *Am. sept.* : Ludovic.

falcatus Lindb. in *Ångstr. Prim. lin.* p. 49.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

falcatus Wils. — *F. silvaticus*.

falcifolius Schwaegr. — *Drepanophyllum fulvum*.

faniensis (Besch.) Par.

Conomitrium faniense Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 78.

1. — *As.* : Tonkin.

fasciculatus Hsch. in *Linn.* 1841, p. 155 ; *C. M. Syn.* I, p. 67 et II, p. 528.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 241 b.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 465.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

ferrugineus C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p.

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

filicinus Bryol. jav. — *F. nobilis*.

firminusculus Besch. in *Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 53.

1. Terr. — *Am. sept.* : Guadalup.

firmus Mitt. *M. Ind. or.* p. 139.

2 ? — *As.* : Ceylan.

(1) Cf. Limpr. l. c.

firmus Lindb. — *F. Henriquezi*.

fissicaulis C. M. M. *Pol.* p. 59.

Ster. — *Pac.* : Ins. Fidji.

flabellatus Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 91, t. 2, f. 2; C. M. *Syn.* I, p. 62 et II, p. 534.

F. asplenoides Mitt. *M. austr. am.* p. 591 p.p.

2. Terr. — *Afr.* : Ins. Canar., Madeir., Azor. (fid. Mitt.). *Am. merid.* : Brasil.

flabellulum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 324.

— *As.* : Ceylan.

flaccidus Mitt. in *M. hb. Hook.* 1860, p. 56, t. 6, f. 18.

2? Ad rup. argill. — *Afr.* : Niger, ins. Rodriguez.

flaccidus C. M. — *F. irawadensis*.

flagellaris Lindb. — *Leucodon*.

flavifrons Besch. in *Rev. bryol.* 1891, p.p. 50 et 54.

2? Ster. Terr. — *Am. sept.* : Guadalup.

flavinervis Mitt. *M. austr. am.* p. 592.

1? Cortic. et lignic. — *Am. merid.* : Amazon., Nov. Granat.

flavo-limbatus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 44.

2. Ad rup. humid. — *Afr.* : Ins. Borbon.

flexifrons Besch. in *Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 51.

2. Terr. — *Am. sept.* : Guadalup.

flexinervis Mitt. *op. cit.* p. 588.

Conpmitrium Wrightii Jaeg. *Ad.* II, p. 47.

F. rufulus Sull. in *Proced. Am. Acad.*.... 1861.

F. Wrightii Jaeg. *Enum. Fiss.* p. 12.

1? Cortic., lignic. et terr. — *Am. merid.* : Orinoc., Amazon., Nov. Granat., And. Peruv.

floridanus Lesq. et Jam. *Man.* p. 83.

1. — *Am. sept.* : Florida.

fontanus W. P. Sch. — *F. crassipes*.

fossicolus C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 354.

— *Am. merid.* : Argentin. Buen. Ayres.

fratris Par.

F. papillosus Lindb. in *Ångstr. Prim. lin.* p. 48.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

fusco-viridis Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 323.

Cortic. — *As.* : Ceylan.

Garberi Lesq. et Jam. in *Proced. Am. Acad.* XIV, p. 37 et *Man.* p. 86.

Syn. ? vel 2? Cortic. — *Am. sept.* : Florida, Ludovic.

Gardneri Mitt. *op. cit.* p. 593.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil.

Geheebii C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 242.

2. — *Am. merid.* : Uruguay.

geminiflorus Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 316; *Bryol. jav.* I, p. 10, t. 9.

2. — *As.* : Borneo, Java, Sumatra.

genunervis C. M. *Syn.* I, p. 70 et II, p. 535; Mitt. *op. cit.* p. 592.

Ster. — *Am. merid.* : Venezuela.

Gladiolus Mitt. in *M. hb. Hooker*, 1860, p. 51, t. 6, f. 16.

2? — *Afr.* : Intertrop.

glaucescens Hsch. in *Linn.* 1841, p. 154 ; *C. M. Syn.* I, p. 51 et II, p. 528.

F. mucronatus W. P. Sch. (*fid. Hpe.*).

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 283.

« *var. crispus* C. M. in *Rehm. l. c.* n. 286.

— *Afr.* : Ibid.

var. crispulus Rehm. — *F. lanceolatus*.

« *var. mahorensis* Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 86.

— *Afr.* : Ins. Mayotte.

« *var. minor* C. M. in *Rehm. l. c.* n. 284.

— *Afr.* : C. B. Sp. ? (Rondebosch).

var. natalensis Rehm. — *F. natalensis*.

glaucifrons Besch. in *Journ. de Bot.* 1891, p.

2. Terr. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. n. 3697.

glaucissimus Welw. et Duby in *Mém.... Genève*, 1870, t. 3, f. 4.

2. Speluncic. — *Afr.* : Angola.

« *var. minor eor. l. c.*

— *Afr.* : Ibid.

glaucopteris C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 99.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Glaziovii (Hpe.) Par.

Conomitrium Glaziovii Hpe. *Symb.* 1874, p. 526.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

glossophyllus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 236.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

« *var. brevifolius* C. M. *l. c.* p. 237.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

gracilescens Ångstr. — (cf. *F. delicatulus* (*in adn.*)).

gracilis (Hpe.) Par.

Conomitrium gracile Hpe. *mss.* ; *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 197.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

gracilis Brid. — *F. incurvus*.

grandifrons Brid. *Mant. M.* p. 191 et *Bryol. univ.* II, p. 701 ; *Bryol. eur.* (*mon. p.* 11), t. 106 ; *C. M. Syn.* I, p. 46 et II, p. 528 ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 121.

H. palmiforme Ram.

Skitophyllum congestum la Pyl. *op. cit.* p. 57, t. 39, f. 16.

2. (1) Ad rup. calcar. irror. vel submers. — *Eur.* : Gall. occ. et centr., vall. Rhen., Pyren. As. : Tibet occ. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Niagara, Alberta, M. Rupestr., New York, Ohio, Illinois, Missouri, Idaho, Oregon, Nevada, Calif.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 53.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 63, 946.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 111.

(1) Cf. Bechin in *Rev. bryol.* 1884, p. 30 (descript. ♂) et *Limpr. Laubm. Deutschl.* I, p. 456 (descript. fruct.).

grandifrons Wils. — *F. subgrandifrons*.

var. *strictus* Besch. — *F. insignis*.

granulatus (Geh. et Hpe.) Par.

Conomitrium granulatum Geh. et Hpe. in *Jaeg. Ad. II*, p. 762.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

grossiretis C. M. in *Linn.* 1875, p. 356.

Ster. Loc. humid. — *Afr.* : Monbottou.

guadalupensis W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 19 ; *Besch. in Rev. bryol.* 1891, p. 54.

2. Ad saxa in riv. — *Am. sept.* : Guadalup.

guarapensis Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 17 et in *Journ. de Bot.* 1891, p.

F. stenocarpus C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57.

Terr. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3699.

Gueinzii C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 168.

Syn. — *Afr.* : C. B. Sp.

guianensis Mont. in *Ann. sc. nat.* 1840, p. 340 et *Syll.* p. 5 ; C. M. *Syn. II*, p. 534 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 587.

2? Cortic. — *Am. merid.* : Guian. gall.

gumangensis (C. M.) Par.

Conomitrium gumangense C. M. in *Linn.* 1875, p. 366.

2. Ad *Lycopod.* — *Af.* : Niam-Niam.

gymnandrus Buze in *M. Neerl. n.* 77 et *Ann. Soc. bot. Neerl.* ; W. P. *Sch. op. cit.* p. 114.

F. bryoides var. *gymnandrus* Ruthe in *Hedwig.* 1870, p. 178.

1. Ad rivul. — *Eur.* : Neerland., vall. Rhen., Helvet., Tirol, Carinth., Stir., Austr. inf., Siles.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1106.

Hallii Aust. in *Coult. Bot. Gaz. II*, p. 67 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 85.

2. — *Am. sept.* : Texas.

hamatus Hpe. in *Jaeg. Ad. II*, p. 40 (nom.).

— *As.* : M. Java.

Hasskarlii Jaeg. *op. cit.* p. 5.

F. pachyloma Lac. *Sp. nov. M. Archip. ind.* p. 3, t. I D.

2. Lignic. ? — *As.* : M. Java.

Hedwigii C. M. — *Conomitrium*.

helenicus Mitt. in *Melliss's S. Helena*, p. 366, t. 56 a, fig. 1, 2, 3.

1. — *Afr.* : Ins. S. Helena.

helictocaulos C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 341.

F. Schimperii W. P. Sch. in *W. Sch. M. Abyssin.*

1. Rupic. — *Afr.* : Alp. Abyssin.

hemiloma Besch. in *Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 52.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

* var. *atro-virens* Besch. l. c.

— *Am. sept.* : Ibid.

Henriquezi Par.

F. firmus Lindb. in *Bol. da Soc. Broter.* 1889, p. (nom.).

— *Eur.* : Lusitan. (Coïmbre).

hians (*Hpe.*) Par.

Conomitrium hians Hpe. mss.; *C. M. in Forschungsreise...* p. 62 (nom).

— *Afr.* : Lagos.

Hildebrandti *C. M. in Linn.* 1876, p. 291.

Ster. — *Afr.* : Somali.

Holleanus *Bryol. jav. I*, p. 4. t. 4.

1 et 2. — *As.* : Java.

holomitrius Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1880, p. 358 et in *Rev. bryol.* 1881, p. 53.

F. pusillus (fid. *Limpr.*).

1. Terr. aren. — *Eur.* : Pyren. centr.

Holstii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 181.

2. Terr. — *Afr.* : Usambara.

horizonticarpus *C. M. in Fl.* 1886, p. 504.

2. — *Afr.* : Kuilu.

Hornschuchii Mont. in *Ann. sc. nat. XIV*; in *Lond. Journ. of bot.* 1845, p. 196 et *Syll.* p. 4; *C. M. Syn. I*, p. 54 et *II*, p. 532; *Mitt. M. austr. am.* p. 593.

F. serrulatus Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 91, t. 2.

1. — *Am. merid.* : Guian., Para, Brasil. austr., Paraguay.

hyalinus Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* III, p. 89, t. 2; *Sull. M. of U. St.* p. 24 et *lc. M.* p. 34, t. 31; *C. M. Syn. I*, p. 47; *Lesq. et Jam. Man.* p. 84.

Conomitrium hyalinum *C. M. Syn. II*, p. 525.

2. Ad terr. et rup. humid. — *Am. sept.* : Perrar. : Ohio, Pensilv. *Exc.* : *Sull. M. Allegh.* n. 180.

hydrophilus Jaeg. — *F. crassipes* var. *rufipes*.

Hydropogon Spr. — *Conomitrium*.

Hymenodon Besch. in *Ann. sc. nat. VII*, p. 85.

2. Lignic. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

hyophilus Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 92.

1. — *Pac.* : Austral. or.

imbricatus Desv. — *Bryoxiphium norvegicum*.

immersus { Lindb. — *Leucodon*.

{ Mitt. — *Conomitrium*.

impar Mitt. — *F. bryoides* var. *impar*.

inaequalis Mitt. *op. cit.* p. 589.

Conomitrium inaequale Jaeg. *Ad. II*, p. 40.

1? — *Am. merid.* : Amazon.

inclinatulus (*C. M.*) Par.

Conomitrium inclinatulum *C. M. in Fl.* 1886, p. 503.

1. — *Afr.* : Old Calabar.

inconspicuus Mitt. *M. Sam.* p. 185.

1. Filicic. — *Pac.* : Ins. Samoa.

inconstans W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 114.

F. bryoides var. *inconstans* Ruthe in *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 430.

F. incurvus var. *inconstans* Husn. *Muscol. gall.* p. 50.

F. synoicus Sull. *M. of U. St.* p. 103.

1. Terr. — *Eur.* : Anglia, Boruss. or., Tirol. *Am. sept.* : Texas.

incrassatus Sull. in *Proced. Am. Acad.*.... 1859, p. 276.

2. Rupic. — *As.* : Hong Kong, Macao.

incurvus (Web. et Mohr) Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 5 et *I*, t. 49; *Bryol. eur. I* (mon. p. 6), t. 99; *C. M. Syn. I*, p. 58 et *II*, p. 529; W. P. Sch. *op. cit.* p. 112.

Dicranum bryoides β Hook. et Tayl. *Muscol. brit.* p. 49.

D. incurvum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 162.

F. gracilis Brid. *Bryol. univ. II*, p. 700.

F. sardous de Not. *Épil.* p. 486.

F. viridulus var. *Wils. Bryol. brit.* p. 303, t. 53 ϵ .

Skitophyllum gracile la Pyl. *op. cit.* p. 37, t. 36.

Sk. incurvum *ej. op. cit.* p. 37, t. 35, f. 2.

1. Ad terr. argill. — *Eur.* : Fere tota; Spitzberg. *As.* : Mesopot., Caucas. occ. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Groenland, Ontario, ins. Vancouver, reg. or., centr. et merid. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman. *Exs.* : Mac. Canad. *M. n.* 50 p.p.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 310 et b.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II* ed. n. 104.

var. *algarvicus* Husn. — *F. algarvicus*.

“ var. *brevifolius* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1889, p. 94.

Terr. in silv. — *Am. sept.* : Ludovic.

var. *crassipes* W. P. Sch. — *F. crassipes*.

var. *exiguus* Aust. — *F. exiguus*.

var. *fontanus* } *C. M.* — *F. crassipes*.

W. P. Sch. — *F. crassipes* β *rufipes*.

var. *inconstans* Husn. — *F. inconstans*.

var. *minutulus* Aust. — *F. minutulus*.

var. *pusillus* W. P. Sch. — *F. pusillus*.

var. β Braithw. — *F. incurvus* var. *tamarindifolius*.

var. *Wils.* } (*Kew Journ.*). — *F. ceylonensis*.

} (*Fl. Tasm.*). — *F. pungens*.

“ var. *tamarindifolius* (Brid.) Husn. *Muscol. gall.* p. 50.

Dicranum tamarindifolium Tusn. *Muscol. Hib.* p. 552.

Fissidens incurvus β Braithw. *Brit. Moosfl.* p. 69.

F. tamarindifolius Brid. *Bryol. univ. II*, p. 684.

F. trichomanoides Wils. in Braithw. *Brit. Moosfl.* p. 70.

Skitophyllum tamarindifolium la Pyl. *op. cit.* p. 37.

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *Am. sept.* : Ottawa, reg. sept. occ., Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. *M. n.* 406.

indistinctus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 238.

1. Limic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

“ var. *major* C. M. l. c.

Muric. — *Am. merid.* : Ibid.

inflatus (C. M.) Par.

Conomitrium inflatum C. M. in *Linn.* 1875, p. 375.

2. Terr. — *Afr.* : Bongo.

insignis W. P. Sch. in *hb. Hpe.*; C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 339; Mitt. *M. austr. am.* p. 586.

F. grandifrons var. *strictus* Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 27.

Ster. — *Am. sept.*: Mexic.

integerrimus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 94; *Fl. Tasm.* II, p. 168, t. 171, f. 8.

2? — *Pac.*: Tasman.

intermedius C. M. *Syn.* I, p. 56 et II, p. 530; Mitt. *op. cit.* p. 594.

1. — *Am. merid.*: Guian. batav.

intra-limbatus Ruthe in *Hedwig.* 1870, p. 177.

1. — *Eur.*: Lusitan. merid.

intra-marginatus (Hpe.) W. P. Sch. *hb.*; Mitt. *op. cit.* p. 594.

Conomitrium intra-marginatum Hpe. in *Linn.* 1862, p. 531.

1 (Mitt.) 2 (Hpe.). — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

involutus Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 294; Mitt. *M. Ind. or.* p. 138.

— *As.*: Sikkim.

irawaddensis Par.

F. flaccidus C. M. in *Jaeg. Ad.* II, p. 40 (nom.).

— *As.*: Birman., Pegu.

ischyro-bryoides C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 290.

— *Afr.*: C. R. Sp.

japonicus Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 313; *Bryol. jav.* I, p. 9, t. 8.

2. — *As.*: Japon., Hong-Kong.

Exs.: Faurie n. 63, 740, 816.

javanicus *Bryol. jav.* — *F. silvaticus*.

Kaernbachii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 476.

1. Cortic. — *Pac.*: Nov. Guinea.

Kerianus C. M. *mss.*; Broth. in *Oefv. af Finskra Vet.-Soc. Foerh.* 1895, p. 53.

2. — *Pac.*: Austral. or. (Queensland).

Kriegeri W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 201.

2. Arbor. — *Pac.*: Nov. Caledon.

laxus Sull. in *Proced. Am. Acad.*... 1859, p. 276.

2. — *As.*: Hong-Kong.

Lechleri Hpe. — *F. rigidulus*.

Lefebvrei Besch. in *Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 53.

1. — *Am. sept.*: Guadalup.

lepidopiloides C. M. in *Linn.* 1875, p. 353.

1. Loc. humid. — *Afr.*: Djour. Niam-Niam.

leptocheilos C. M. in *Linn.* 1876, p. 290.

Ster. Terr. — *Afr.*: Somali.

leptophyllus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1840 et *Syll.* p. 5; C. M. *Syn.* II, p. 530; Mitt. *M. austr. am.* p. 587.

2. Terr. — *Am. merid.*: Guian. gall.

leptophyllus Broth. — *F. Brotheri*.

leucocinctus Hpe. in *Linn.* 1874, p. 222.

Ster. — *Afr.*: Madagascar.

liliputanus C. M. in *Linn.* 1875, p. 354.

2. Ster. Terr. — Afr. : N'Gama sept.

limbatus Sull. in *Bot. Pac. R. R. Surv.* (Whipple) p. 185, t. I ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 82.

1. Terr. — Am. sept. : Ins. Vancouver, Oregon, Idaho, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 105.

Lindbergii Mitt. *op. cit.* p. 602.

Conomitrium acutifolium Lindb. in sched. ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 347.

♂ et fr. ign.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Lindigii (Hpe.) Par.

Conomitrium Lindigii Hpe. in *Linn.* 1862, p. 532.

1. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

linealis Bryol. eur. I (mon. p. 12), t. 6 ; C. M. Syn. I, 46 et II, p. 528.

1. — Afr. : C. B. Sp.

lineari-limbatus C. M. in *Fl.* 1890, p. 471.

Ster. — Afr. : M. Kenia.

linearis Brid. Bryol. univ. II, p. 71 et II, p. 532.

Ster. — Pac. : Australia.

lonchothecius C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 239.

2. Arbor. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

longifolius Brid. Bryol. univ. II, p. 682 ; C. M. Syn. I, p. 65 et II, p. 534 ; Mitt. *op. cit.* p. 599.

2? — Am. merid. : Hispaniola.

longipedicellatus C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

1. Terr. — Am. merid. : Minas Geraës.

longipes Welw. et Duby in *Mém.... Genève*, 1870, t. 4, f. 3.

2. Rupic. — Afr. : Angola.

longisetus Griff. *Not.* p. 425 et *Ic. pl. asiat.* II, p. 81, f. 4 ; Mitt. *M. Ind.* or. p. 141.

1. — As. : Assam super.

Loscosianus Jur. in *Hedwig.* 1867, n. 10.

— Eur. : Arragon.

luridus Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 172.

2? — Afr. : Madagascar.

lusitanicus Par.

F. Welwitschii W. P. Sch. Syn. II ed., p. 120.

♂ et fr. ign. Terr. in silv. — Eur. : Lusitan.

luteo-viridis Lindb. in *Angstr. Prim. lin.*

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Lylei Wils. — F. exilis f. integra.

maceratus Mitt. in *Trans. and. Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 91.

— Pac. : Austral. or.

Mac-Leanus Rehm. *M. Afr. austr.* n. 583.

— Afr. : C. B. Sp. or.

macro-bryoides C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 243.

2. — Am. merid. : Uruguay subtropic.

macrodon Hpe. in *Linn.* 1859, p. 645.

1. Terr. — Pac. : Austral. or.

macrophyllus Mitt. *M. austr. am.* p. 600.

— *Am. merid.*: Ins. Trinitat., And. Quitens. et Peruv.

macrophyllus Duby. — F. Dubyanus.

macropus Hpe. in Linn. 1859, p. 645.

1. In turf. — *Pac.*: Austral. felix.

madecassus W. P. Sch. mss.; *C. M. in Bot. Zeit.* 1864, p. 340.

2. — *Afr.*: Madagascar.

majus Mitt. — F. adiantoides.

mammillosus C. M. in Linn. 1875, p. 349.

Ster. Loc. humid. — *Afr.*: Dar Fertit.

mangarevensis Mont. in *Voy. au Pôle Sud., Crypt.* p. 344; in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 113 et *Syll.* p. 4; *C. M. Syn.* I, p. 62 et II, p. 534.

2? ♂ ign. Rupic. et cortic. — *Pac.*: Archip. Gambier, Taïti.

« var. taïtensis Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.*, p. 22.

Cortic. — *Pac.*: Taïti.

marginatus W. P. Sch. mss.; *C. M. in Bot. Zeit.* 1858, p. 154.

2. — *Afr.*: C. B. Sp.

martinicae Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 18 et in *Rev. bryol.* 1891, p. 55.

Ster. Terr. — *Am. sept.*: Martinic.

maschalanthus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 11 et *Syll.* p. 3; *C. M. Syn.* I, p. 53 et II, p. 528; Mitt. *op. cit.* p. 591.

2. Terr. — *Am. merid.*: Chil. austr.

megalotis W. P. Sch. mss.; *C. M. in Bot. Zeit.* 1858, p. 154.

Rupic. — *Afr.*: C. B. Sp.

Metzgeria (C. M.) Par.

Conomitrium Metzgeria C. M. in Linn. 1875, p. 358.

Polydiopsis Metzgeria Jaeg. *Ad. II*, p. 48.

Ster. Subaquat. — *Afr.*: Monbottou.

mexicanus Mitt. — Conomitrium Julianum var. mexicanum.

microcarpus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 162.

Conomitrium microcarpum Jaeg. *Ad. II*, p. 41.

1. Lignic. — *Afr.*: Tropic. littor.

microcladus Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 324.

— *As.*: Ceylan.

Mildeanus W. P. Sch. — F. crassipes var. rufipes.

minutulus Sull. in *Mem. Acad... Nov. ser. III*, p. 58, t. 2 A; *M. Allegh.* p. 44; *M. of U. St.* p. 24 et *Id. M.* p. 37, t. 24; *C. M. Syn.* I, p. 56 et II, p. 530; Lesq. et Jam. *Man.* p. 85.

F. bryoides H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. II ed.* n. 39 et 40.

F. incurvus var. minutulus Aust. *M. Appal.* n. 102.

F. pusillus var. madidus Spr. in *Journ. of Bot.* 1880, p. 361.

1 et 2. Ad rup. humid. in silv. — *Eur.*: Normann. marit. *Am. sept.*:

Nov. Scotia. Ontario, ins. Vancouver, Calif., reg. or.

Exs.: Sull. *M. Allegh.* n. 183.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 101.

minutulus Sull. — F. monandrus.

var. Sull. — F. repandus?

minutus Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 323.
Cortic. — As. : Ceylan.

Mittenii Par.

F. crassinervis Thw. et Mitt. op. et l. cc.
— As. : Ceylan.

Moenkemayeri C. M. in Fl. 1886, p. 504.

1. — Afr. : Ins. Fernando-Po.

mollis Mitt. M. austr. am. p. 600.

2. — Am. sept. : Jamaïc.

monandrus Mitt. op. cit. p. 598.

F. minutulus Sull. in Proced. Am. Acad... 1881.

1. — Am. sept. : Cuba.

Moritzianus C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 340; Mitt. op. cit. p. 594.

1. — Am. merid. : Venezuela.

mucronatus W. P. Sch. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 154.

F. glaucescens Hsch. (fid. Hpe.).

2. — Afr. : C. B. Sp.

Mülleri Mitt. — Conomitrium.

multiflorus Thw. et Mitt. op. cit. p. 325.

— As. : Ceylan.

muriculatus Spr. in Mitt. M. austr. am. p. 593.

Lignic. — Am. merid. : Amazon., And. Quitens.

Nadeaudii Besch. in Ann. sc. nat. 1894, p.

2 ? Terr. secus torrent. — Pac. : Taïti

natalensis Rehm. M. Afr. austr. n. 593 et c.

F. glaucescens var. *natalensis* ej. l. c. n. 285.

— Afr. : Natal, Transvaal.

neckeroides Griff. — *F. anomalus*.

nematopteris C. M. in Dusen M. Camer. n. 200.

— Afr. : M. Cameroon.

neo-caledonicus Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 201.

1. Terr. — Pac. : Nov. Caledon.

nigricans W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 18.

2. Terr. — Am. sept. : Guadalup.

nobilis Griff. Not. p. 427 et Ic. Pl. asiat. II, t. 83, f. 3; Mitt. M. Ind. or. p. 137.

F. filicinus Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 304; C. M. Syn. I, p. 70 et II, p. 529; Bryol. jav. I, p. 8, t. 7.

2. Ster. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia, Ceylan, Java, Hong-Kong.

nossianus Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 45.

2. — Afr. : Ins. Nossi-Be.

Novae hollandiae Brid. — Rhizogonium.

n. 9 Griff. — *F. obscurus*.

n. 10 Griff. — *F. elongatus*.

oblongifolius Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of Bot. 1844, p. 547;

Fl. of the N. Zeal. II, p. 62, t. 83, f. 8 et Handb. p. 407; C. M. Syn. I, p. 62 et II, p. 531.

1. Ad rup. madid. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

obscurus *Mitt. op. cit. p. 138.*

F. n. 9 Griff. Not. p. 430.

Ster. Ad. rup. irror. — *As.* : Khasia.

obscurus *Mitt.* — *F. subobscurus.*

obsoletidens *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 44.*

1. Ad lapid. et terr. — *Afr.* : Usambara, ins. Mayotte, Nossi-Be.

obtusatus *Hpe. Symb. 1872, p. 59.*

Ad rup. humid. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

obtusifolius *Wils. in Lond. Journ. of bot. 1845, IV, p. 196, t. IX B; Sull. M. of U. St. p. 24 et Ic. M. p. 35, t. 22; C. M. Syn. I, p. 64 et II, p. 531; Lesq. et Jam. Man. p. 86.*

2. Rupic. — *Am. sept.* : Pensilv., Ohio, Missouri, Illinois, Colorado, Kansas, Texas, Ludovic.

Exs. : *Sull. M. Allegh. n. 181.*

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 99.

« *var. kansanus Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 40.*

— *Am. sept.* : Kansas.

odontoloma *C. M. in Linn. 1878-79, p. 242.*

Ster. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic.

Erstedtianus *C. M. Syn. II, p. 529; Mitt. M. austr. am. p. 586.*

2. — *Am. sept.* : Costa Rica.

opacifolius *Mitt. in M. herb. Hook. 1860, p. 54, t. 5, f. II.*

1. — *Afr.* : Niger, Natal.

Orrii (*Lindb.*) *Par.*

Schistophyllum Orrii Lindb. in Rev. bryol. 1880, p. 97.

1. Terr. limos. aren. — *Eur.* : Hibern. or.

osmundioides (*Sw.*) *Hedw. Sp. M. p. 153, t. 30; Brid. Bryol. univ. II, p. 689; Bryol. eur. I (mon. p. 8), t. 103; C. M. Syn. I, p. 60; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 116.*

Conomitrium osmundioides C. M. l. c. II, p. 526.

Dicranum bryoides Sw. M. Suec. p. 32.

Dicranum bryoides α *elongatum H. et T. Muscol. brit. p. 49.*

D. osmundioides Sw. Act. Holm. 1795, p. 240.

F. bryoides Roehl. Deutsch. Fl. III, p. 77.

F. dicarpos Brid. op. cit. p. 698.

Hypnum asplenioides Dicks. Fasc. II Pl. Crypt. p. 10, t. 5, f. 5 (excl. Syn. Sw.).

H. bryoides Ehrh. Crypt. n. 124.

Osmundula fissidentoides Rab. Krypt. Fl. Sachs. I, p. 609.

Skitophyllum osmundioides la Pyl. op. cit. p. 38, t. 25, f. 5.

2. In uligin. et turf. — *Eur.* : Reg. subalp., rar. mont.; Spitzberg. *As.* : Jeniss. med. et inf. *Am. sept.* : Groenland, Anticosti, New Brunswick, Nov. Scotia, Gaspes., Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, reg. or. et centr., Terra nov.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 112 (Dicranum).*

Mac. Canad. M. n. 51.

Rab. Bryoth. eur. n. 358 b, c, 863 a, b, c.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 109.

« *var. microcarpus* *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*
 Ut typ. — *Eur.* : Alp. Helvet., Pinzgov.
Exs. : Un. itin. 1863, n. 5.

ovatus *Brid. Bryol. univ. II, p. 696; C. M. Syn. I, p. 70 et II, p. 528.*
Ster. Rupic. in rivul. — Afr. : Ins. Borbon., Franciae.

« *var. elatior* *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 115 et M. Masc.-Mad. n. 111.*
 — *Afr.* : Ins. Borbon.

« *var. planifolius* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 42.*
 — *Afr.* : Ins. Nossi-Be.

Pabstii *Jaeg. Enum. Fissid. p. 23.*

Conomitrium semi-limbatus *Schlieph. in Bot. Zeit. 1885, p. 423.*

1. *Terr. — Am. merid.* : Brasil. austr. or.

pachyloma *C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 341.*

Ster. — Afr. : Alp. Abyss.

pachyloma *Lac. — F. Hasskarlii.*

pacificus *Ångstr. in Oefv... 1872. n. 4, p. 21.*

2. — *Pac.* : Ins. Sandwic, Austral. or. (Nov. Vales.).

pallidicaulis *Mitt. in Godman's Nat. hist. of Azores, p. 314.*

F. taxifolius *Bourg. Pl. Canar. exs.*

1. — *Afr.* : Ins. Madeir., Ténerif.

pallidinervis *Mitt. M. austr. am. p. 592.*

1? — *Am. merid.* : And. Peruv.

pallidus *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. p. 62, t. 83, f. 7 et Handb. p. 407.*

2. ♂ ign. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept., Tasman.

palmatulus *Besch. in Rev. bryol. 1891, p. 50.*

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

palmatus (*Sw.*) *Hedw. M. frond. III, p. 69, t. 30 A; C. M. Syn. I, p. 48; Mitt. op. cit. p. 599.*

Conomitrium palmatum *C. M. Syn. II, p. 526.*

Dicranum palmatum *Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1714.*

Hypnum palmatum *ej. Prodr. p. 141.*

Skitophyllum palmatum *P. B. op. cit. p. 36, t. 35, f. 6; Brid. Bryol. univ. II, p. 680.*

1 (Mitt.). 2 (C. M.) (1). *Arbor. — Am. sept.* : Jamaïc., ins. S. Thomas.

palustris *C. M. in Forschungsreise... p. 62.*

Conomitrium palustre *ej. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 88.*

1. *Paludic. — Afr.* : Monrovia.

papillosus *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. 1, f. I A.*

Syn. Lignic. — As. : M. Java.

papillosus { *Lindb. — F. fratris.*
 { *Thw. et Mitt. — F. Thwaitesianus.*

(1) « The male flower is described as terminal on a separate plant in C. M. l. c.; and probably, as in many other instances in the genus, it is variable in its position ». (*Mitt. l. c.*).

- papulans* Besch. in *Rev. bryol.* 1891, pp. 50 et 51.
2. Arbor. — Am. sept. : Guadalup.
- Parkii* Mitt. in *M. herb. Hook.* 1860, p. 56, t. 6, f. 19.
2 ? — Afr. : Tropic. inter.
- parvus* Mitt. — *Conomitrium Dillenii*.
- patens* Wahlenb. — *Rhacomitrium*.
- paucifolius* Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 200.
2. — Pac. : Nov. Caled.
- pauperculus* A. Howe in *Erythea*, 1894, p. 97 c. ic.
2. Terr. hum. — Am. sept. : Calif.
- pauperrimus* C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 213.
Ster. — Pac. : Australia.
- Pechuelii* (C. M.) Par.
Conomitrium Pechuelii C. M. in *Fl.* 1886, p. 503.
Ster. In aren. humid. — Afr. : Congo infer.
- pellucidus* Hsch. in *Linn.* 1841, p. 145 ; C. M. *Syn.* I, p. 47 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 588.
Conomitrium pellucidum C. M. *Syn.* II, p. 525.
— Am. merid. : Surinam.
- pellucidus* Ångstr. — F. Widgrenii.
- pendulus* Lindb. et Arn. — *Leucodon*.
- pennatulus* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 325.
Terr. — As. : Ceylan.
- perangustus* C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (nom.).
— Pac. : Nov. Caledon.
- perfoliatus* (C. M.) Par.
Conomitrium perfoliatum C. M. in *Linn.* 1875, p. 374.
2. Terr. — Afr. : Djour.
- perpusillus* Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 294 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 141.
2. — As. : Ceylan.
- persicus* Ruthe in *Jur. et Milde Beitr...* p. 591.
— As. : Persia.
- petrophilus* Sull. in *Proced. Am. Acad...* 1861, p. 276 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 587.
Rupic. — Am. sept. : Cuba.
- plagiothecioides* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 241.
Ster. — Am. merid. : Argentin. subtropic.
- planicaulis* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 335.
— As. : Japon.
Exs. : Faurie n. 162 et 194.
- planifrons* Besch. in *Ann. sc. nat.* VII ser., II, p. 85.
Terr. — Afr. : Ins Mayotte.
- « *var. corticeus* Besch. l. c. p. 86.
Cortic. — Afr. : Ibid.
- platybryoides* C. M. in *Fl.* 1886, p. 505.
Syn. Terr. — Afr. : Old Calabar.

- plumosus *Hsch. in Linn.* 1841, p. 151 ; *C. M. Syn.* I, p. 68 et II, p. 528.
 2. — *Afr.* : C. B. Sp.
Ews. : Rehm. *M. Afr. austr.* p. 280.
- Plumula *Thw. et Mitt. in op. et l. cc.*
 — *As.* : Ceylan.
- polycarpus *Hedw.* — *Cynodontium.*
- polyphyllus *Wils. in Bryol. eur.* I (mon. p.), t. 107 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 121 (1).
F. adiantoides *C. M. Syn.* I, p. 51 p.p.
F. asplenioides var. polyphyllus *Wils. Bryol. brit.* p. 306.
 2. Ad rup. humid. — *Eur.* : Hibern., Cambrovall., Pyren.
Ews. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 944.
- polypodioides (*Sw.*) *Hedw. M. frond.* III, p. 63, t. 27 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 695 ; *Sull. Ic. M.* p. 42, t. 27 ; *C. M. Syn.* I, p. 52 et II, p. 529 ; *Mitt. op. cit.* p. 595 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 88.
Dicranum polypodioides *Sw. Fl. Ind. occ.* III, p. 1772.
Hypnum polypodioides *ej. Prodr.* p. 140.
Skitophyllum polypodioides *la Pyl. op. cit.* p. 45, t. 35, f. 10.
 2. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Georgia sup., Florida, Ludovic., Mexic., Antill. gall., Cuba, Jamaic., Haïti. *Am. merid.* : Columb., Venezuela, Æquat.
Ews. : *Sull. et Lesq. M. bor. am.* I ed. n. 27, II ed. n. 110.
 var. *Wils.* — *F. areolatus.*
- porrectus *Mitt. in M. hb. Hook.* 1860, p. 56, t. 6, f. 17.
 Ster. Ad rup. madid. — *Afr.* : Niger.
- prionocheilos *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 245.
 Ster. — *Am. merid.* : Uruguay.
- prionodes *Mont. in Ann. sc. nat. II ser., III, t. 3, f. 1 et Syll.* p. 5 ; *C. M. Syn.* I, p. 67 et II, p. 534 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 590.
 2. — *Am. merid.* : Guian. gall., And. Quitens. et Peruv.
- procumbens *Mitt. in Philos. Trans. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.*), p. 393.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.
- psatyrocheilon (*Schlieph.*) *Mitt. op. cit.* p. 597.
Conomitrium psatyrocheilon *Schl. in Bot. Zeit.* 1855, p. 421.
 2. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.
- pseudo-bryoides *Schlieph. in op. et l. cc.* ; *Mitt. op. et l. cc.*
 2. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- pseudo-limbatus *Vent. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 10.
 2. — *Afr.* : Abyss.
- pseudo-rufescens *C. M. in Fl.* 1879, n. 24.
 2. — *Afr.* : M. Kenia.
- pseudo-rufescens *Rehm.* — *F. austro-africanus.*
- pseudo-serratus (*C. M.*) *Jaeg. Enum. Fissid.* p. 24
Conomitrium pseudo-serratum *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 197 p.p.

(1) Cf. Boulay in *Rev. bryol.* 1885, p. 50.

C. serratum *ej. Syn. M. II*, p. 527 p.p.
Fissidens serratus *ej. l. c. I*, p. 65 p.p.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

pugionifolius *C. M. in Linn.* 1875, p. 351.

Ster. Terr. — *Afr.* : Niam-Niam.

Puiggarii (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Conomitrium Puiggarii *Hpe. et Geh. in Jaeg.* 1878, p. 69.

— *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

pulchellus *Mitt. M. Ind. or.* p. 140.

1. — *As.* : Sikkim.

pulcher *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 429.

— *Afr.* : M. Cameroon.

pulvinatus *Hedw.* — *Grimmia*.

var. *africanus* *Hedw.* — *Grimmia pulvinata* var. *obtusa*.

punctatus *Hpe. in Jaeg. Ad. II*, p. 39 (*nom.*).

— *Pac.* : Australia (Nov. Valesia).

punctulatus *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. 2, t. I C.*

1. — *As.* : Ins. Saparoa.

pungens *Hpe. et C. M. in Linn.* 1853, p. 502.

F. incurvus var. *Wils. in Fl. Tasm. II*, p. 167.

2. — *Pac.* : Austral. or.

pungens *Sull.* — *F. acutus*.

pusillus *Wils. in W. P. Sch. Syn. II*, p. 113 (1).

F. incurvus *Mac. Canad. M. n.* 50 p.p.

F. incurvus var. *pusillus* *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 104.

F. synanthus *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1885, p. 550.

F. viridulus β *pusillus* *Wils. Bryol. brit.* p. 303.

Schistophyllum pusillum *Lindb. M. Scand.* p. 13.

2 vel syn. Ad terr. calcar. aren. — *Eur.* : Anglia, Westphalia; Galloprov., Corsica, etc. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Ontario.

var. *algarvicus* *Boul.* — *F. algarvicus*.

« var. *fallax* *Limpr. Deutschl. Laubm.* p. 438.

1. *Rupic.* — *Eur.* : Helvet., German. tota.

« var. *irriguus* *Limpr. op. cit.* p. 437.

2. *Rupic.* — *Eur.* : Silesia.

var. *Lylei* *Wils.* — *F. exilis* f. *integra*.

var. *madidus* *Spr.* — *F. minutulus*.

pynoglossus *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 246.

Ster. Terr. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

pynophyllus *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 293 et 584.

— *Afr.* : C. B. Sp., Transvaal.

pygmaeus *Hsch. in Linn.* 1841, p. 147; *C. M. Syn. I*, p. 63 et *II*, p. 531.

2? *Muric.* — *Afr.* : C. B. Sp.

pygmaeus *Tayl.* — *F. Taylori*.

radicans *Mont. in Ann. sc. nat.* 1840, p. 345 et *Syll.* p. 6; *Mitt. M. austr. am.* p. 587.

Conomitrium radicans C. M. *Syn.* II, p. 526.

1. Arbor. — *Am. merid.* : Guian. gall., Para.

ramiger C. M. *in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1892, p. 294.

1. Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

ramulosus *Mitt. in M. Hb. Hook.* 1860, p. 54, t. 5, f. 12.

2? — *Afr.* : Niger.

Ravenelii *Sull. in Mem. of the Am. Acad...* 1849, p. 171, t. 2; *M. of U. St.* p. 24 et *Id. M.* p. 39, t. 25; C. M. *Syn.* II, p. 533; *Lesq. et Jam. Mau.* p. 85.

2. Terr. argill. humid. — *Am. sept.* : Carol. ambo, Florida, Ludovic.

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am.* II ed. n. 102.

reclinatulus C. M. *in M. Polakowskyani et in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 153.

2. Terr. et lignic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

reflexus *Hpe. in Linn.* 1874, p. 221.

Conomitrium reflexum *Jaeg. Ad.* II, p. 43.

— *Afr.* : Madagascar.

Rehmanni C. M. — F. lanceolatus.

remotifolius C. M. *Syn.* I, p. 60 et II, p. 530.

— *Afr.* : C. B. Sp., Transvaal.

Exs. : *Rehm. M. Afr. austr.* n. 590, 591.

repandus *Wils. in Kew Journ. bot.* III; *Mitt. op. cit.* p. 601.

F. minutulus var. *Sull. in Proced. Am. Acad...* 1861, p. 274?

2. Arbor., rupic. et terr. — *Am. sept.* : Cuba? *Am. merid.* : Amazon., And. Quitens.

reticulosus W. P. Sch. *mss.*; *Mitt. op. cit.* p. 603.

Conomitrium reticulosum C. M. *Syn.* II, p. 525.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

revolvens W. P. Sch. *in Mandon Pl. Boliv.* n. 1614.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

rigidulus *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal.* p. 61, t. 83, f. 3; *Mitt. op. cit.* p. 602.

F. crassipes *Lechl. Pl. Chil.* n. 1460.

F. *Lechleri* *Hpe. in Bot. Zeit.* 1864, p. 340.

2. Ad rup. madid. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens. *Pac.* : Alp. Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

riparius *Aman in Rev. bryol.* 1889, p. 54.

Ster. Ad rivul. — *Eur.* : Alp. Rhaet.

ripensis *Mitt. in M. hb. Hook.* 1860, p. 55, t. 6, f. 15.

Ster. Ad rup. madid. — *Afr.* : Niger.

rivularis *Bryol. eur.* I (mon. p.), t. 102; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 114.

F. bryoides var. *rivularis* *Spr. M. Pyr.* n. 318 et *in Trans. Edinb. Bot. Soc...* III, II, p. 193.

1. Ad. rup. irror. — *Eur.* : Luxembourg, Pyren.

rubiginosus (Hpe.) Par.

Conomitrium rubiginosum Hpe. *Symb.* 1874, p. 526.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

rufescens Hsch. in *Linn.* 1841, p. 153 ; *C. M. Syn.* I, p. 54 et II, p. 532.

1 ? — *Afr.* : Usambara, Natal, C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* 291, b, c, d, 587.

« *var. orthopyxis* Rehm. *l. c. n.* 291 e, 588.

— *Afr.* : C. B. Sp.

rufipes W. P. Sch. — *F. crassipes var. rufipes.*

rufulus *Bryol. eur.* I (mon. p.) t, 102.

F. ventricosus Lesq. (fid. *D^a E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club* 1889, p. 107).

1. Ad. rup. cataract. — *Eur.* : Vall. Rhen. med., Tirol., Bavar., Austr. sup., Stir., Salisb., Morav. *Am. sept.* : Oregon, Idaho, Calif.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 108, 357 et b, 469, 1105.

rufulus Sull. — *F. flexinervis.*

rupestris Wils. — *F. decipiens.*

samoanus *C. M. M. Polyn.* p. 59.

Ster. Terr. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.

sanguineo-nervis (*C. M.*) Par.

Conomitrium sanguineo-nerve *C. M. in Linn.* 1875, p. 371.

2 ? *Terr.* — *Afr.* : Dar Fertit.

sarcophyllus *C. M. in Dusen M. Camer. n. a* 13.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Sardagnae Vent. in *Rev. bryol.* 1883, p. 93.

2 vel pseudo-1. — *Eur.* : Sardin. merid.

sardous de Not. — *F. incurvus.*

Savatieri W. P. Sch. in *Savatier M. Japon. n.* 119.

F. adiantoides var. Savatieri Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 335.

— *As.* : Japon.

scabrisetus Mitt. *Sam. M.* p. 184.

1. — *Pac.* : Ins. Samoa.

scalaris Mitt. *M. austr. am.* p. 596.

F. brevifolius H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* p. 61 in *adn.* (fid. Mitt. *l. c.*).

1. — *Am. merid.* : M. Chimborazo, And. Chilens.
Pac. : Nov. Zeland. ? Tasman ?

scariosus Mitt. *op. cit.* p. 599.

1. *Terr.* — *Am. merid.* : And. Peruv.

Schimperi W. P. Sch. — *F. helictocaulos.*

Schmidii *C. M. in Bot. Zeit.* 1853, p. 18 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 141.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

Schweinfurthii (*C. M.*) Par.

Conomitrium Schweinfurthii *C. M. in Linn.* 1875, p. 369.

2. Ad *Lycopod.* — *Afr.* : Niam-Niam.

sciophyllus Mitt. in *M. hb. Hook.* 1860, p. 55, t. 6, f. 13.

1. — *Afr.* : Tropic. interior.

sciuroides Hedw. — *Leucodon*.

semi-completus { Drumm. — *Conomitrium Julianum*.
Hedw. p.p. } — *Conomitrium Dillenii*.
— *Conomitrium Hedwigii*.

semi-limbatus C. M. et Hpe. in Linn. 1853, p. 591.
2. — Pac. : Austral. or.

semi-marginatus C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 38; Syn. I, p. 55 et II, p. 532; Mitt. M. austr. am. p. 593.
Syn. Terr. — Am. merid. : Columb.

semi-obscurus (C. M.) Par.

Conomitrium semi-obscurum C. M. in Linn. 1875, p. 376.
2. Terr. — Afr. : Niam-Niam.

sepincola Mitt. — *F. exilis* f. *integra*.

sericeus Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 181.
2. Terr. — Afr. : Usambara.

serratus C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 804 et Syn. I, p. 65 p.p.; Bryol. jav. I, p. I p.p.
Conomitrium serratum ej. Syn. II, p. 527 p.p. et in Bot. Zeit. 1859, p. 197 p.p.
1. Lignic. — As. : M. Java.

serratus { C. M. p.p. — *F. pseudo-serratus*.
C. M. p.p. — *F. Wilsoni*.

serrulatus Brid. Sp. M. I, p. 170 et Bryol. univ. II, p. 704; Bryol. eur. VI, t. 638; C. M. Syn. I, p. 69 et II, p. 529.

F. asplenioides var. *serrulatus* Wils. Bryol. brit.
F. Langei de Not. Epil.

2. Ad terr. umbros. et rup. — Eur. : Cambrovall., Armoric., Galloprov., Ligur., Etrur., Pyren., Lusit. Afr. : Alger., Tenerif., Madeir., ins. Azor.
Eas. : Mandon M. Mad. n. 5.

« var. *africanus* Besch. Cat. M. Alger, p. 7.
Ut typ. — Afr. : Alger.

serrulatus Hsch. — *F. Hornschuchii*.

sigmocarpus C. M. in Dusen M. Camer. n. 433.
— Afr. : M. Cameroon.

silvaticus Griff. Not. p. 429 et Ic. pl. Asiat. II, t. 81, f. 1; Mitt. M. Ind. p. 138.

F. falcatus Wils. in adn. ad *F. pallidum* in Fl. of the N. Zeal. II, p. 62.
F. javanicus Bryol. jav. t. 3.

— As. : Himalaya, Khasia, Madras.

simensis W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss. Coll. II, n. 38; C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 341.
2? — Afr. : Alp. Abyssin.

similiretis Sull. in Proced. Am. Acad... 1861, p. ; Mitt. M. austr. am. p. 590.
Rupic. — Am. sept. : Cuba.

socialis C. M. in Linn. 1869-70, p. 31.
Ster. — As. : Ceylan.

Somaliae C. M. in *Linn.* 1876, p. 289.

Ster. Terr. — *Afr.* : Somali.

sphagnifolius Sull. in *Proced. Am. Acad.*.... 1861, p. 275 ; *Mitt. op. cit.* p. 591.

2. Terr. — *Am. sept.* : Cuba.

splachnifolius Hsch. in *Linn.* 1841, p. 145 ; C. M. *Syn.* I, p. 46.

Conomitrium splachnifolium C. M. *op. c.* II, p. 525.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. *Afr. austr.* n. 295, 586.

splachnoides Broth. in *Bail. Contr. Queensl. Fl. Bull.* 13, p. 21 (*nom.*)
et in *Oef...* 1893, p. .

2. Terr. — *Pac.* : Austral. (Queensland.).

Splitgerberianus Dz. et Mk. *Prodr. Fl. Surin.* p. 4, t. I ; *Mitt. op. cit.* p. 595.

1. (Mitt.) 2 (Dz et Mk.). Terr. — *Am. merid.* : Guian. batav., Amazon.

stenocarpus C. M. — *F. guarapensis*.

stenophyllus Ångstr. *Prim. lin.* p. 47.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

? *stenopteryx* Besch. in *Rev. bryol.* 1791, pp. 50 et 54.

1. Ster. — *Am. sept.* : Guadalup.

stenosemus W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1615.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

stipitatus Ångstr. *Prim. lin.* p. 47.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or.

stissotheca Mitt. — *Conomitrium*.

stolonaceus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 244.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

strictus Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* II, p. 167, t. 171, f. 7.

1. — *Pac.* : Tasman.

strumifer Hedw. — *Cynodontium polycarpum* var. *strumifer*.

subbasilaris Hedw. *Sp. M.* p. 155, t. 39 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 694 ;

C. M. *Syn.* I, p. 50 et II, n. 529 ; Sull. *M. of U. St.* p. 25 et *lc. M.* p. 41, t. 26 ; Lesq. et Jam. *Man.* p. 88.

Dicranum subbasilare Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. III et II, n. 42.

Skitophyllum subbasilare la Pyl. *op. cit.* p. 62, t. 35.

2. Arbor. et terr. — *Am. sept.* : Ontario, Wisconsin, reg. sept. et centr.

Exs. : Sull. *M. Allegh.* n. 184.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 107.

subcrenatus W. P. Sch. in C. M. *Syn.* II, p. 531 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 588.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

subcrispus Besch. *Not. M. Paraguay*, p. 260.

2? In herbos. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. *Pl. Parag.* n. 1202.

subglaucissimus Broth. in *Bol. da Soc. Broter.* 1890, p. .

2. Terr. — *Afr.* : Ins. Princip., S. Thom., Togo.

subgrandifrons C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 339.

F. grandifrons Wils. in *hb. Ind. or. n.* 629 et 632; *Mitt. M. Ind. or.* p. 138.

Ster. — As.: Tibet occ.

subimmarginatus Philib. in *Rev. bryol.* 1884, p. 56 et in *Husn. Muscol. gall.* p. 48.

1. Terr. — Eur.: Perrar.: Galloprov.

submarginatus Br. in *Fl.* 1846, p. 133; C. M. *Syn.* I, p. 56 et II, p. 530.

1. — Afr.: Natal.

subobscurus Par.

F. obscurus Mitt. *op. cit.* p. 139.

2. — As.: Ceylan.

subpalmatus C. M. in *Linn.* 1872, p. 164.

Conomitrium subpalmatum Jaeg. *Ad. II.* p. 41.

2. — As.: Bengal. sept.

subulatus Mitt. *M. austr. am.* p. 589.

Conomitrium subulatum Jaeg. *Ad. II.* p. 43.

1? — Am. merid.: Amazon.

synanthus Mitt. — F. pusillus.

synoicus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 240.

Syn. — Am. merid.: Argentin. subtropic.

synoicus Sull. — F. inconstans.

tamarindifolius Brid. — F. incurvus var. tamarindifolius.

taxifolius (L.) Hedw. *Sp. M.* p. 155, t. 39; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 692; *Bryol. eur. (mon. p.)*, t. 104; C. M. *Syn.* I, p. 50 et II, p. 529; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 118.

Dicranum taxifolium Sw. *M. Suec.* p. 31.

Fuscina taxifolia Schrank *Baiers Fl.* II, p. 451.

Hypnum taxifolium L. *Sp. pl.* p. 1587.

H. taxifolium minus basi capsulifera Dill. *Hist. M.* p. 263, t. 34, f. 2.

Skitophyllum taxifolium la Pyl. *op. cit.* p. 60, t. 35.

1. Ad terr. argill. umbr. — Eur.: Regio campestr. As.: Nepal., Khasia, Persia, Caucas. Afr.: Ins. Canar., Madeir.; ins. Mascaren.

(? fid. C. M.) Am. sept.: Tota.

Exs.: Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 43.

Faurie *Pl. Jap.* n. 617, 1494.

Mandon *M. Madeir.* n. 5 bis.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 64, 829, 1058.

Savatier *M. Jap.* n. 119 p.p.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 106.

α var. Langloisii Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1892, p. 78.

— Am. sept.: Ludovic.

taxifolius Bourg. — F. pallidicaulis.

var. β Wahlenb. — F. adiantoides.

var. Bonvaleti Besch. — F. Bonvaleti.

Taylori C. M. *Syn.* I, p. 65 et II, p. 531.

F. pygmaeus Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 66.

1. Terr. — Pac.: Austral. or., Tasman.

tenellus Hook. f. et Wils. in *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 61, t. 171, f. 6.

F. australiensis? (fid. Hpe.).

1. — *Pac.*: Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

Teneriffae Hpe. in *Jaeg. Ad.* II, p. 39 (nom.).

— *Afr.*: Tenerif.

tenerrimus C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

Syn. Lignic. — *Am. merid.*: Minas Geraës.

tenuifolius Mitt. *M. austr. am.* p. 596.

1. — *Am. merid.*: And. Peruv.

tequendamensis Mitt. *op. cit.* p. 601.

2? — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

teraicola C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 164.

2? — *As.*: Bengal. sept.

terminiflorus Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 322.

2. — *As.*: Ceylan.

texanus Lesq. in *hb. Sull.* 1850 et in *Lesq. et Jam. Man.* p. 86.

2. — *Am. sept.*: Texas.

Teysmannianus Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 317; *Bryol. jav.* I, p. 6, II, p. 221, t. 5.

1. — *As.*: Borneo, ins. Banca, Java.

Thunbergii Brid. *Bryol. univ.* II, p. 699; C. M. *Syn.* I, p. 72; Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 607.

F. asplenioides Brid. *Sp. M.* I, p. 169 p.p.; Hsch. in *Linn.* p. 157.

Hypnum asplenioides Thunb. *Prodr. Fl. Cap.* II, p. 175.

2 ♂ et fr. ign. — *Afr.*: C. B. Sp.

Thwaitesii Par.

F. papillosus Thw. et Mitt. in *op. cit.* p. 323.

1. — *As.*: Ceylan.

titalayanus C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 165.

1. — *As.*: Bengal. sept.

« *var. elatior* C. M. l. c. p. 166.

— *As.*: Ibid.

tortilis Hpe. et C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 340; Mitt. *M. austr. am.* p. 597.

2. — *Am. sept.*: Mexic.

tortuosus Geh. et Hpe. in *Rev. bryol.* 1881, p. 27.

Ster. Ad saxa irror.? — *Pac.*: Tasman.

trachelyma Sull. — *Conomitrium*.

trichomanoides Wils. — *F. incurvus* var. *tamarindifolius*.

trinitensis Hpe. in *Jaeg. Ad.* II, p. 39 (nom.).

— *Am. merid.*: Ins. Trinitat.

turbinatus Tayl. — *F. asplenioides*.

Ulna (C. M.) Par.

Conomitrium Ulna C. M. *Linn.* 1875, p. 372.

2. Terr. — *Afr.*: Dar Fertil.

uncinatus Angstr. *Prim. lin.* p. 48.

Ster. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

undatus (C. M.) Par.

Conomitrium undatum C. M. in *Linn.* 1875, p. 362.

2. Ad saxa inund. — Afr. : Dongo, Djour.

undifolius C. M. in *Fl.* 1888, p. 407.

Ster. In graminos. — Afr. : Kilima N'Djaro.

usambaricus Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 182.

2. Terr. — Afr. : Usambara.

validicostatus Sull. in *Linn.* 1878-79, p. 465.

2. — Am. merid. : Venezuela.

ventricosus Lesq. in *Mem. Calif. Acad.* I, p. 7 ; Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 45, t. 30 ; Lesq. et Jam. *Man.* p. 84.

F. rufulus W. P. Sch. (*Dna E. G. Britton*).

1. Ad rup. inund. — Am. sept. : Oregon, Idaho, Calif.

victoralis Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 92.

Ster. — Pac. : Austral. or. et sept. occ.

virens Thwa. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 324.

— As. : Ceylan.

viridulus { *Wahlenb.* — *F. bryoides*.
Wils. p.p. — *F. biformis*.
Wils. p.p. — *F. incurvus*.

var. *fontanus* Braithw. — *F. crassipes* p.p.

var. *major* Wils. — *F. crassipes*.

var. *pusillus* Wils. — *F. pusillus*.

vitreus (C. M.) Par.

Conomitrium vitreum C. M. in *Jaeg. Ad. II*, p. 43 (*nom*).

— Am. merid. : Ins. Trinitat.

vittatus Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm. II*, p. 167, t. 171, f. 6.

— Pac. : Austral. or., Tasman.

Vogelianus Mitt. in *M. hb. Hook.* 1860, p. 54, t. 5, f. 10.

1. — Afr. : Niger, ins. Rodriguez.

Wallisii C. M. in *Linn.* 1874, p. 574.

Ster. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

Weberi Brid. — *Amblystegium riparium*.

Weirii Mitt. *M. austr. am.* p. 602.

2? Arbor. — Am. merid. : Brasil.

Welwitschii Duby in *Mém... Genève*, 1870, p. 8, t. 2, f. 5.

2. Lignic. et rupic. — Afr. : Angola.

Welwitschii W. P. Sch. — *F. lusitanicus*.

Widgrenii Par.

F. pellucidus Ångstr. *Prim. lin.* p. 49.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or

Wildii Broth. in *Oefv...* 1890, p.

2. Terr. — Pac. : Australia (Queensland).

Wilsoni Mont. mss.

Conomitrium serratum C. M. *Syn. II*, p. 527 p p.

F. denticulatus Mont. in *M. Neilgherr*.

F. serratus C. M. *Syn. I*, p. 65 p.p.; *Mitt. M. Ind. or.* p. 140; *Bryol. jav. I*, p. I p.p.

2. — *As.*: M. Neilgherr.

Wrightii Jaeg. — *F. flexinervis*.

yunnanensis Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, *I*, p. 53.

2. *Terr.* — *As.*: Alp. Yunnan.

Zippelianus *Bryol. jav. I*, p. 2 et *II*, p. 221, t. 2.

2. *Ad rivul.* — *As.*: Hong-Kong, Java, Sumatra.

Zollingeri Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, *IV*, p. 114 et *Syll.* p. 3; C. M. *Syn. I*, p. 47 et *II*, p. 529; *Bryol. jav. I*, p. 221, t. I.

Syn. Ad terr. turf. — *As.*: Java.

« *var. major* Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 200.

Speluncic. — *Pac.*: Nov. Caledon. (1).

Flabellaria C. M. *Syn. II*, p. 497 (subsect. *HYPNI*).

FLORIBUNDARIA C. M. in *Linn.* 1876, p. 267 (sect. *PAPILLARIAE*, postea *gen. propr.*).

Spec. omn. PAPILLARIAE ejusd. nom.

FONTINALIS L. et omn. tere. auct.; *Card. Monog.* (40 spec.).

abyssinica W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 556.

— *Afr.*: M. Abyss.

albicans Web. — *Hedwigia ciliata*.

alpina Dicks. — *Cinclidotus fontinaloides*.

androgyna Ruthe. — *F. hypnoides*.

antipyretica L. *Sp. pl. II ed.* p. 1571; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 655; *Bryol. eur. V (mon. p. 4)*, t. 429; W. P. Sch. *op. cit.* p. 552; *Card. Mon. p. 48*.

F. triangularis, major, complicata, e foliorum alis capsulifera Dill. *Hist. M. p. 254, t. 33, f. I (fid. W. P. Sch.)*.

F. trifaria Voit M. *Herbip. p. 125*.

Hypnum antipyreticum Neck. *Meth. M. p. 191*.

Pilotrichum antipyreticum C. M. *Syn. II*, p. 148.

2. *Ad rad. arbor. et sax. in aq. fluent.* — *Eur.*: Tota. *As.*: Jénissei sup., *Caucas. occ. et centr.* *Afr.*: Alger., *Tunet. Am. sept.*: Groenland, Anticosti, *Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Ontar., Columb. brit., Oregon, Wyoming., Calif.*

Exs.: Drumm. M. *bor. am. I ed. n. 232*.

Mac. *Canad. M. n. 227 p.p.*

Rab. *Bryoth. eur. n. 431*.

Sull. et Lesq. M. *bor. am. II ed., n. 323*.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda:

F. afro-asplenioides C. M.

gracilescens Ångstr. (Cf. *F. delicatulus*).

Mac-Owani C. M.

malaco-bryoides ej. (An *F.*

macro-bryoides ?).

F. platygyrioides C. M.

polycarpus Besch. (delend., Besch. in litt. !)

stolonifer Rehm.

undato-decurrens C. M.

varians Besch. (ut suprâ !)

antipyretica Erb. critt. ital. — *F. hypnoides*.

var. *alpestris* Milde. — *F. Heldreichii* ?

var. *ambigua* Card. — *F. Kindbergii*

var. *arvernica* Husn. — *F. arvernica*.

« var. *californica* Card. Mon. p. 54.

F. californica Sull. in *Pac. R. Rep. IV*, p. 189.

In rivul. mont. — *Am. sept.*: Calif.

var. *crassa* Mdo. — *F. Heldreichii*.

var. *cuspidata* C. M. — *F. Kindbergii*.

« var. *gigantea* Sull. *Ic. M. p. 106, t. 66*; *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 552; *Card. Mon. p. 52*.

F. Eatoni Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed. n. 224 c.* (fid. *L. et I.*).

F. gigantea Sull. *l. c. n. 224*.

In aquis minus frig. lentiusq. fluent. — *Eur.*: Hic illic, rarior. typ.

Am. sept.: Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick,

Ontario, Columb. brit., ins. Vancouver, New Jersey, New York.

Exs.: Aust. M. Appal. n. 243.

Mac. Canad. M. n. 228.

var. *minor* Brid. — $\left\{ \begin{array}{l} \text{F. antipyretica var. gracilis (fid. Lindb.).} \\ \text{F. squamosa (fid. C. M.).} \end{array} \right.$

« var. *gracilis* (Lindb.) *W. P. Sch. op. et l. cc.*; *Card. Mon. p. 56*.

F. antipyretica ♂ *minor* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 657 (f. *Lindb. l. c.*).

F. gracilis Lindb. in *Not. ur Saellsk pr. Faun et Fl. Fenn Foerhandl.* 1868 et in *Hedwig.* 1867, p. 39.

F. subglobosa Wils. *mss.* 1869.

In rivis et rivul. frigid. — *Eur.*: Fere tota: Oural, Lapon., Scandin.,

Scot., Boruss., Riesengeb., Bohem, Salisb., Carinth., Francon.,

Alsat., Luxemb., Bade, Tirol., Bavar., Hercyn., Rhoengeb., Helvet.,

Alp. Sabaud., Ital., Dalmat.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 1229.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n. 335*.

var. *Heldreichii* Geh. — *F. Heldreichii*.

« var. *latifolia* Milde *Bryol. sil. p. 276*.

Ster. In stagnis. — *Eur.*: Borussia.

« var. *laxa* Milde *op. et l. cc.*

Ster. In stagn. et font. — *Eur.*: Siles., Boruss. occ., Hambourg, Bade (1).

« var. *montana* H. Müll. *Westf. Laubm. n. 378 et in Verhandl. d. nat. Ver. d. Rheinl. XXIV Jahrg., III Folge, IV Band, p. 138*.

Ster. In montos. — *Eur.*: Westphal.

« var. *oreganensis* Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1888, p. 71; *Card. Mon. p. 54*.

Ad rad. arbor. in palud. — *As.*: Jenissei inf. *Am. sept.*: Oregon.

var. *purpurascens* C. M. — *F. Kindbergii*.

« var. *rigens* Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51; *Card. Mon. p. 55*.

— *Am. sept.*: Ins. Vancouver, Washington, Victoria.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 227 p.p.

Roell M. Am. n. 83, 453.

(1) « Forsan spec. propria ». (*Limpr. Laubm. Deutschl. II*, p. 656).

« *var. rufescens* Besch. Cat. M. Alger p. 30; Card. Mon. p. 53.

— Afr.: Kabyl. or.

var. Sull. et Lesq. — F. neo-mexicana.

apocarpa L. jun. — *Grimmia*.

arduennensis Gravet. — F. squamosa.

arvernica Ren. in Rev. bryol. 1888, p. 69; Card. Mon. p. 57.

F. antipyretica *var. arvernica* Husn. Muscol. gall. p. 286.

1. (Card.) 2 (Limpr.) ♂ ign. — Eur.: Gall. centr. (Arvernica), Ticin.? Istria? (1).

baltica (Limpr.) v. Klinggr. Leberm. u. Laubm. W. u. O. Preuss. p. 230.

F. dalecarlica *var. baltica* Limpr. in Schrift d. Naturf. Ges. z. Danzig, 1883, N. F., VI Band, I Heft..

Syn. Ad arb. et saxa subinund. — Eur.: Norveg.? Boruss. occid.

biformis Sull. M. of U. St. p. 54 p.p. et Ic. M. p. 99, tt. 59 et 60; Lesq. et Jam. Man. p. 270; Card. Mon. p. 72.

F. disticha *var. Sull.* M. Allegh. n. 191 et 192.

Pilotrichum distichum C. M. Syn. II. p. 150.

P. sphagnifolium ej. l. c.

— Am. sept.: Ohio, Wisconsin.

Exs.: Aust. M. Appal. n. 245.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 226, 226 b (f. *vernalis*) et 226 c (f. *aestivalis*) et II ed. n. 337 (f. *vernalis*) et 338 (f. *aestivalis*).

bogotensis Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 351; Card. Mon. p. 89.
Ster. — Am. merid.: And. Nov. Granat.; Peruv.?

Bovei Card. Mon. p. 110.

F. fasciculata Herb. Hort. bot. Bruxelles et hb. Boissier.

Ster. — Afr.: Alger.

californica Sull. — F. antipyretica *var. californica*.

capillacea { *calyoibus styli instar cuspidatis* Dill. — *Dichelyma capillaceum*.
Dicks. — *Dichelyma capillaceum*.
Hook. — *Dichelyma pallescens*.
L. — *Dichelyma falcatum*?
Scop. — *Cinclidotus aquaticus*.

Caravaeana R. Farnetti in Att. dell' Istit. bot. della R. Univ. d. Pavia, 1893, p. 10, t. 14.

Ster. — Eur.: Ital. super.

Cardoti Ren. in Card. Tabl. meth. in Rev. bryol. 1891, pp. 83 et 86; Card. Mon. p. 95.

2. ♂ ign. In rivul. — Am. sept.: Virginia.

chrysophylla Card. Tabl. meth. in op. cit. pp. 82 et 84, et Mon. p. 17.
2. — Am. sept.: Washington.

crispa Sw. — *Neckera undulata*.

dalecarlica (Bryol. eur. V (mon. p. 7), t. 431; W. P. Sch. Syn. II, p. 554; Card. Mon. p. 86.

F. squamosa Auct. Scand. pr. max. part.; Sull. M. of U. St. p. 54; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 233.

F. squamosa *var. dalecalica* Husn. Muscol. gall. p. 237.

F. squamosa var. *Sull. M. Allegh. n. 189.*

Pilotrichum dalecarlicum *C. M. Syn. II, p. 149.*

2. In rivul. — *Eur.* : Lappon., Scand., Fennia. *Am. sept.* : Groenland, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Ontario, Athabasca, Nov. Angl., Virgin., Carol. sept.

Exs. : Aust. M. Appal. n. 251.

Husnot M. Gall. n. 674 (e Suec.).

Mac. Canad. M. n. 230.

Rab. Bryoth. eur. n. 1179.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 229 et II ed. n. 342.

var. *baltica* Limpr. — *F. baltica.*

« var. *gracilescens* Warnst. mss. ; *Card. Mon. p. 88.*

F. microphylla *W. P. Sch. mss. ; v. Klinggr. Topog. Fl. W. Preuss. p. 112.*

F. seriata *ej. Leberm. u. Laubm. W. u. O. Preuss. p. 229.*

Ster. In stagn. — *Eur.* : Boruss. occ. *Am. sept.* : Canada.

Exs. : Mac. Can. M. n. 231.

« var. *Macounii* *Card. in Rev. bryol. 1893, p. 9.*

— *Am. sept.* : Reg. sept. occ.

Delamarei *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 96, t. 14 A ; Card. Mon. p. 84.*

F. squamosa *eor. Fl. Ins. Miquelon, p. 49.*

2. ♂ ign. — *Am. sept.* : Ins. Miquel. ; New Jersey ?

Exs. : Cardot M. bor. am. n. 72.

dichelymoides *Lindb. in Oefv.... 1869, p. 76 ; Card. Mon. p. 122.*

2 rariss. 1. Ad frutic. et rup. submers. — *Eur.* : Fennia (lac. Piojaervi).

Am. sept. : Minnesota.

Exs. : Broth. M. Fenn. n. 24.

dichelymoides *Arn. et Nordst. — F. gothica.*

disticha *Hook. f. et Wils. in Drumm. M. bor. am. II ed. n. 151 ; Sull.*

M. of U. St. p. 54 et Ic. M. p. 103, tt. 63 et 65 ; Lesq. et Jam. Man. p. 272 ; Card. Mon. p. 77.

? *Dichelyma distichum* *Myr. in Act. reg. Acad. Holm. 1832.*

Pilotrichum distichum *C. M. Syn. II, p. 150 p.p.*

2. In rivul. — *Am. sept.* : Ludovic., Alabama.

Exs. : Sull. M. Allegh. n. 190, 192.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 227 et II ed., n. 339 pp.

disticha { *Sull. et Lesq. p.p. — F. filiformis.*

{ *Sw. — Neckera disticha.*

var. *tenuior* *Sull. — F. filiformis.*

var. *Sull. — F. biformis.*

var. *Sull. — F. dalecarlica.*

Duriei *W. P. Sch. Syn. II ed. n. 555 ; Card. Mon. p. 111.*

F. hypnoides var. *Duriei* *Husn. Musc. gall. p. 287.*

2. In font. frigid. et ad lac. — *Eur.* : Gall. merid., Sardin., Ital. super. et centr., ins. Minorc., Hispan. centr., Algarb., Graecia. *Afr.* :

Alger., Maroc. *Am. sept.* : Calif.

Eatoni *Sull.* { (fid. *Card.*). — *F. Novae Angliae* var. *Eatoni.*

{ (fid. *L. et J.*). — *F. antipyretica* var. *gigantea.*

erecta *Vill. — Cinclidotus fontinaloides.*

falcata { *Hpe. — Dichelyma capillaceum.*

{ *Hedw. — Dichelyma falcatum.*

fasciculata Lindb. in *Oefv...* 1869, p. 76; *Card. Mon.* p. 108.

F. fascicularis W. P. Sch. II ed. p. 555; *Besch. Cat. M. Alger.* p. 30.
Ster. — *Afr.* : Alger.

fasciculata Hb. Boiss. et Bruxel. — *F. Bovei*.

fascicularis W. P. Sch., *Besch.* — *F. fasciculata*.

flicina Sw. — *Pterobryum*.

filiformis Sull. et Lesq. in *Lesq. et Jam. Man.* p. 271; *Card. Mon.* p. 124.

F. disticha eor. *M. bor. am.* II ed. n. 339

F. disticha var. *tenuior* Sull. *Id. M.* p. 103, t. 64.

2. In stagnin. — *Am. sept.* : Kentucky, Missouri, Illinois, Ludovic.
Exs. : Aust. M. Appal. n. 250.

« var. *tenuifolia* *Card. Mon.* p. 126.

In lac. — *Am. sept.* : Ludovic.

filiformis Sw. — *Cryphaea*.

flaccida Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1888, p. 201, t. 19; *Card. Mon.* p. 118.

F. Lescurii Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 340 p.p.

2. Ad arbor. submers. in stagn. — *Am. sept.* : Columb. brit., reg. or.,
Alabama, Ludovic.

« var. ? vel sp. nov. ? *Card. Mon.* pp. 120 et 147.

— *Am. sept.* : Ohio, Missouri.

fluitans Lam. — *Hypnum*.

Frostii Sull. — *F. Lescurii* var. *ramosior*.

gigantea Sull. — *F. antipyretica* var. *gigantea*.

gothica Card. et Arn. in *Rev. bryol.* 1891, p. 87; *Card. Mon.* p. 71.

F. dichelymoides Arn. et Nordstedt in sched.

2. ♀ et fr. ign. — *Eur.* : Suec. merid.

gracilis Lindb. — *F. antipyretica* var. *gracilis*.

gymnostoma Br. eur. — *Hydropogonella*.

Heldreichii C. M. in *Heldr. It. Thess.* n. 38; *Kindb. in Rev. bryol.* 1887,
p. 53; *Card. Mon.* p. 69 (1).

F. antipyretica var. *alpestris* Milde *Bryol. siles.* p. 276 ?

F. antipyretica var. *Heldreichii* Geh. in *Fl.* 1886, n. 22.

F. antipyretica β *crassa* Mdo. et Ltz. *Beitr.* p. 21 (2).

Ster. In rivul. — *Eur.* : Gall. centr. (Arvern.), Thessal.

Exs. : Heldr. Herb. Graec. norm. n. 1000.

heterophylla Lour. — *Neckera*.

Howei Aust. — *F. Novae Angliae* var. *Howei*.

Howellii Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1888, p. 200, t. 18; *Card. Mon.* p. 66.

2. Ad rad. arbor. in palud. — *Am. sept.* : Washington, Oregon.

Exs. : Roell M. Am. n. 207.

hypnoides Hartm. *Skand. Fl.* IV ed. p. 434; *Bryol. eur.* V (mon. p. 8),
t. 432; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 556; *Card. Mon.* p. 98.

? *F. androgyna* Ruthe in *Hedwig.* 1872, p. 166 et in *Rab. Bryoth. eur.*
n. 1292.

F. antipyretica Erbar. *Critt. ital.* n. 1103.

(1) Cf. Geheeb in *Fl.* 1886, n. 22.

(2) Cf. Limpr. Laubm. *Deutschl.* II, pp. 654 et 656.

F. hypnoides var. *Ravaui* Card. *Tabl. syn.* p. 83.

F. Ravaui Hy in *Mem. Soc. Agric. sc. et arts d'Angers*, 1882 et in *Husnot M. Gall.* n. 776.

F. squamosa β *tenella* Bryol. eur. l. c.

Pilotrichum Stroembackii C. M. *Syn.* II, p. 150.

2 (syn. in *F. androgyna*). Ad trunc. et ramul. in stagn. — *Eur.* : Suec., ins. Aland, Fennia, Dania, Boruss. sept., Saxon., Austr., Carniol., Ital. sup., Gall. occ. (Armoric.) ; deest. in Britann. As. : Jenissei sup., Obi. *Am. sept.* : Assiniboine, Manitoba, Saskatchewan, Columb. brit., ins. Vancouver, Montana, Wyoming, Illinois.

Exs. : Broth. M. Fennia n. 199.

Mac. Canad. M. n. 232.

Rab. Bryoth. eur. n. 629, 1228, 1313.

Roell M. Am. n. 1432 ad 1434, 1554, 1582, 1583.

hypnoides Sw. — *Pilotrichum*.

var. *Durieu* Husn. — *F. Durieu*.

« var. *pungens* v. *Klinggr. Leberm. und Laubm. W. et O. Preuss.* p. 228. In paludos. — *Eur.* : Boruss.

« var. *ramosa* R. Farnetti in *Att. d. Istit. bot. d. R. Univ. di Pavia*, 1893, p. 9, t. 14, f. 1-8.

— *Eur.* : Ital. super.

var. *Ravaui* Card. — *F. hypnoides*.

involuta Ren. et Card. *hb.* ; Card. *Tabl. meth. in Rev. bryol.* 1891, pp. 83 et 86 et *Mon.* p. 96.

F. Leseurii var. ? *cymbifolia* Aust. M. *Appol.* n. 248 p.p. ?

F. squamosa Drumm. M. *bor. am.* II ed. n. 152.

Ster. Ad rad. arb. secus rivul. — *Am. sept.* : New Jersey, Ludovic. ; Florid. ?

Exs. : Cardot M. *bor. am.* n. 186.

islandica Card. *Tabl. meth. in Rev. bryol.* 1891, pp. 82 et 84 et *Mon.* p. 70.

Ster. — *Eur.* : Island.

juliana Savi. — *Conomitrium*.

Kindbergii Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 58, t. IX A ; Card. *Mon.* p. 62.

F. antipyretica var. *ambigua* Card. *Tabl. meth. l. c.* p. 82.

F. antipyretica var. *cuspidata* C. M. in *Roell M. Am.*

F. antipyretica var. *purpurascens* ej. l. c.

F. neo-mexicana var. *robusta* C. M. *mss.* ; *Roell in Hedw.* 1893, p. 205.

F. subbiformis Ren. et Card. *mss.*

2. In stagn. et palud. — *Eur.* : Gall. sept. or. (Ardenne) ? Ital. sept. ? *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, reg. sept. occ., Washington, Oregon, Idaho.

Exs. : Leiberg M. fr. Kootenai-Idaho, n. 85.

Mac. Canad. M. n. 233.

Roell M. Am. n. 84 ad 87, 89 p.p., 665 ad 668, 821 ad 823, 1196, 1197, 1200.

Langloisii Card. *Tabl. meth. in Rev. bryol.* 1891, pp. 84 et 86 et *Mon.* p. 126.

Ster. Ad ligna putresc. in stagn. — *Am. sept.* : Ludovic.

Leseurii Sull. M. of U. St. p. 54 et *lc. M.* p. 101 (excl. var. γ), t. 61 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 271 pp. ; Card. *Mon.* p. 125.

2. Ad rup. irror. — *Am. sept.* : Ontario, Alaska, Nov. Angl., reg. or. ; Idaho ?

Exs. : Mac. Canad. M. n. 231 p.p.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 228 et II ed. n. 340 p.p.

« *var. ramosior* Sull. Ic. M. p. 101, t. 62 ; Card. Mon. p. 117.

F. Frostii Sull. mss.

F. Sullivantii Lesq. et Jam. Man. p. 271.

In rivul. — *Am. sept.* : New Hampshire.

Lescurii { Aust. — F. Novae Angliae.
S. et L. p.p. — F. flaccida.

var. cymbifolia Aust. — F. Novae Angliae.

var. gracilescens Sull. — F. Sullivantii.

var. D^{na} E. G. Britt. — F. tenella.

longifolia C. Jensen in Bot. Not. 1885, p. 83 ; Card. Mon. p. 106.

Ster. — *Eur.* : Island.

maritima C. M. in Fl. 1887, p. 225 ; Card. Mon. p. 61.

2. — *Am. sept.* : Fret. S. Juan de Fuca.

mercediana Lesq. — F. neo-mexicana.

microdonta Ren. in Card. Mon. p. 120.

F. Sullivantii Card. Tabl. meth. in Rev. bryol. 1891, pp. 83 et 85.

2. ♂ ign. — *Am. sept.* : New Jersey.

microphylla W. P. Sch. — F. dalecarlica *var. gracilescens.*

minor L. — Cinclidotus fontinaloides.

mollis C. M. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51 ; Card. Mon. p. 90.

2. — *Am. sept.* : Washington, ad oras Columbiae.

Exs. : Roell M. Am. n. 292.

neo-mexicana Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 224 b. ; Sull. Ic. M.

Suppl. p. 76, t. 57 ; Lesq. et Jam. p. 269 ; Card. Mon. p. 59.

F. antipyretica *var.* Sull. et Lesq. l. c. II ed. n. 334.

F. mercediana Lesq. in Proced. Calif. Acad. I, p. 28.

2. In rivul. montan. — *Am. sept.* : Columb. brit., M. Rupestr., ins.
Vancouver, Washington, Idaho, Montana, Colorado, Calif., Nov.
Mexic.

Exs. : Aust. M. Appal. n. 251 b.

Mac. Canad. M. n. 229.

« *var. columbica* Card. Mon. p. 61.

— *Am. sept.* : Columb. brit., Washington, Idaho,
Calif.

Exs. : Roell M. Am. n. 661 p.p. et 1125.

var. robusta C. M. — F. Kindbergii.

nitida Lindb. et Arn. M. As. bor. 1899, II, p. 161 ; Card. Mon. p. 103.

2. Ad rup. et Salic. in rivul. — As. : Jenissei, Obi. *Am. sept.* : Columb.
brit., Manitoba, Ontar.

Novae Angliae Sull. M. of U. St. p. 104 et Ic. M. p. 105, t. 65 ; Lesq. et
Jam. Man. p. 270 ; Card. Mon. p. 91.

F. Lescurii Aust. M. Appal. n. 246 et 247.

F. Lescurii *var. cymbifolia* ej. l. c. n. 248.

2. — *Am. sept.* : Terr. nov., Nov. Scot., Nov. Angl.,
New York, Pensilv., New Jersey, Ohio, Virgin.

Exs. : Aust. M. Appal. n. 244.

Cardot M. bor. am. n. 185.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 225 et II ed. n. 336.

« var. *Eatoni* (Sull.) Card. in Rev. bryol. 1893, p. 9.

? F. *Eatoni* Sull. in Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 224 c.

— Am. sept.: New Hampshire.

« var. *Howei* (Aust.) Card. in op. et l. cc.

F. *Howei* Aust. mss..

— Am. sept.: New York.

parva, foliis lanceolatis Dill. — *Conomitrium Dillenii*.

pennata { Huds. — *Neckera pumila*.
L. — *Neckera*.

Ravaui Hy. — F. *hypnoides*.

Renauldi Card. — F. *Sullivantii*.

secunda L. jun. — *Cryphaea heteromalla*.

seriata Lindb. in Act. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn. 1881 et in Rev. bryol. 1882, p. 85; Card. Mon. p. 107.

2. ♂ ign. Ad saxa in flumin. — Eur.: Scandin., Helvet. (Genov.).

seriata v. Klinggr. — F. *dalecarlica* var. *gracilescens*.

sparsifolia Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 659.

2. ♂ ign. — Eur.: Alp. Norveg.

squamosa L. Sp. pl. p. 1571; Brid. Bryol. univ. II, p. 657; Bryol. eur. V (Mon. p. 6), t. 430; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 554; Card. Mon. p. 80.

F. *antipyretica* β minor Brid. op. et l. cc. (fid. C. M.).

F. *squamosa* tenuis sericea, atro-virens Dill. Hist. M. p. 259, t. 33, f. 3.

F. *arduennensis* Gravet in Piré Nouv. rech. bryol. fasc. IV.

Hymn. squamosum Neck. Meth. M. p. 192.

Pilotrichum squamosum C. M. Syn. II, p. 149.

2. In rivul. frigid. — Eur.: Norveg. occ.; reg. mont. occ. et centr. usque ad Pyr.; in Carinth., Salisb., Tirol. et Helvet. deest.; Longobard, Corsica; Lusit.? Afr.: Alger.

Exs.: Billot Fl. Gall. et Germ. exs. n. 587.

de Brebiss. M. de Normand. n. 52.

Durieu Pl. select. Hisp. Lusit. sect. I, Asturicae, n. 144

Gravet Bryoth. belg. n. 231 (f. *latifolia*) et 334.

Husnot M. Gall. n. 88 et 775 (f. *latifolia*).

Limpricht Bryoth. siles. n. 33.

Rab. Bryoth. eur. n. 432, 630, 631 (pl. mascula sub v.

β *tenella* W. P. Sch.), 927 (f. *latifolia*) et 1314.

Wils. M. Brit. n. 443.

« var. *Curnovii* Card. Mon. p. 84.

F. *squamosa* Rab. Bryoth. eur. n. 926.

— Eur.: Angl. (Cambrovall., Derbyshire).

squamosa { Auct. scand. p. max. part; Sull.; Drumm. — F. *dalecarlica*.
Drumm. — F. *involuta*.
Rab. — F. *involuta* var. *Curnovii*.
Ren. et Card. — F. *Delamarei*.
tenuis sericea, atro-virens Dill. — F. *squamosa*.

var. *dalecarlica* Husn. — F. *dalecarlica*.

β *tenella* Bryol. eur. — F. *hypnoides*.

subbiformis Ren. et Card. — F. *Kindbergii*.

subglobosa Wils. — F. *antipyretica* var. *gracilis*.

Sullivantii Lindb. in Oefv... 1869, p. 77; Card. Mon. p. 76.

F. *Lescurii* var. *gracilescens* Sull. Ic. M. p. 101.

F. *Renauldi* Card. Tabl. meth. in Rev. bryol. 1891, pp. 82 et 85.

2. Ad rad. arb. in palud. — *Am. sept.* : New Jersey, Pensilv.

Exs. : Aust. M. Appal. n. 249 et Suppl. I, n. 524 ?

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 341.

Sullivantii { Card. — *F. microdonta*.
L. et J. — *F. Lescurii* var. *ramosior*.
subulata P. B. — *Brachelyma*.

tenella Card. *Tabl. meth. in Rev. bryol.* 1891, pp. 83 et 85 et *Mon.* p. 105.

F. Lescurii var. *Dna* E. G. Britton in *Leib. M. Kootenai. Idaho* n. 137.

2. ♂ ign. Ad arbor. rupesq. granit. subm. — *Am. sept.* : Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 432.

Roell M. Am. n. 1242 p.p.

tenuissima Borsczow in *Rupr. Fl. bor. ural.* p. 44.

— *Eur.* : Petchora.

triangularis { *major complicata, et foliorum alis capsulifera* Dill. —
Cinclidotus fontinaloides (*fid. C. M.*).
major complicata, et foliorum alis capsulifera Dill. —
F. antipyretica (*fid. W. P. Sch.*).

trifaria Voit. — *F. antipyretica*.

FORSTROEMIA Lindb. in Oefv... 1869, p. 75.

australis (C. M.) Par.

Lasia (1) *australis* C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 620.

1. — *Pac.* : Austral. or.

« *var. stricta* (C. M.) Par.

Lasia australis var. *stricta* C. M. in *op. cit.* p. 621.

Ubi typ.

Borgenii (C. M.) Par.

Lasia Borgenii C. M. in *Borgen M. Madag.* n. 24.

— *Afr.* : Madagascar.

coronata (Mont.) Par.

Lasia coronata C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 424.

Leptodon coronatus Mont. in *d'Orbigny Voy. Bot. crypt.* p. 108 et *Syll.* p. 25.

Leucodon coronatus Mitt. *M. austr. am.* p. 409.

Neckera coronata C. M. *Syn. II*, p. 94.

1. — *Am. merid.* : Corrientes.

« *var. tenuis* (C. M.) Par.

Lasia coronata var. *tenuis* C. M. in *Bal. Pl. Parag.* n. 3669.

— *Am. merid.* : Paraguay.

flagellacea (C. M.) Par.

Lasia flagellacea C. M. in *Fl.* 1890, p. 487.

— *Afr.* : M. Aberdare.

fruticella (Mitt.) Par.

Lasia fruticella Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 173.

— *As.* : Japon.

(1) Nomen jam abusum : *Lasia* (genus *Aroidearum*) Lour. *Fl. Cochinch.* (1790 ; *Brid. Mant. M.* (1819).

geniculata (Mitt.) Par.*Lasia geniculata* Jaeg. *Ad. II*, p. 108.*Leucodon geniculatus* Mitt. *M. austr. am.* p. 409.Cortic. — *Am. sept.* : Jamaïc. *Am. merid.* : Amazon., And. Peruv.,
Brasil. austr. or.*incrassata* (Broth.) Par.*Dusenian incrassata* Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 195.1. — *Afr.* : Usambara.*indica* (Mont.) Par.*Cryphaea indica* Mitt. *M. Ind. or.* p. 125.*Lasia indica* Jaeg. *Ad. II*, p. 108.*Neckera indica* C. M. *Syn. II*, p. 94.*Pterogonium indicum* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1842, p. 250 et *Syll.* p. 21.2. Cortic. — *As.* : Himalaya occ., M. Neilgherr.*japonica* (Besch.) Par.*Lasia japonica* Besch. in *Ann. sc. nat.* p. 356.2. — *As.* : Japon.*Exs.* : Faurie n. 51, 127, 240, 273, 970.*nitida* Lindb. — *Leptodon*.*occulta* (Besch.) Par.*Lasia occulta* Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 18 et in *Journ. de bot.* 1891.Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.*Exs.* : Bal. Pl. Parag. n. 3663.*ohioënsis* Lindb. — *Leptodon*.*paraguensis* (Besch.) Par.*Lasia paraguensis* Besch. *Note M. Parag.* p. 266.Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.*Exs.* : Bal. Pl. Parag. n. 1252.*producta* (Hsch.) Par.*Lasia producta* Jaeg. *op. et l. cc.**Neckera producta* Hsch. in *M. Capens. a Mundt et Maire lect.* ; C. M.
Syn. II, p. 94.*Pterogonium productum* Hsch. in *Linn.* 1841, p. 138.1. — *Afr.* : C. B. Sp.*Exs.* : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 317.*Schimperi* (Wils.) Par.*Lasia Schimperi* Wils. in *hb. Mus. Paris.*— *Am. sept.* : Ind. occid. (sine loco spec.).*sinensis* (Besch.) Par.*Lasia sinensis* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 72.1. — *As.* : Alp. Yunnan.*subcoronata* (Besch.) Par.*Lasia subcoronata* Besch. *Note M. Parag.* p. 266.1. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.*Exs.* : Bal. Pl. Parag. n. 1252.*var. patens* (Besch.) Par.*Lasia subcoronata var. patens* Besch. *op. et l. cc.*

Ut et ubi typ.

subproducta (C. M.) Par.

Lasia subproducta C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 43 (nom.).

— *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

trichomitria (Hedw.) Lindb. in *Oefv...* 1862, p. 605.

Hypnum micropodon Brid. *M. Rec.* II, II, p. 151.

H. myosuroides, setis brevissimis Dill. *Hist. M.* p. 551, t. 85, f. 18.

H. Saladinianum Neck. *Meth.* p. 483.

Lasia trichomitria P. B. *Prodr.* pp. 25 et 72; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 201.

Leptodon trichomitrius Mohr. l. cit.; Sull. *M. Allegh.* n. 88 et Ic. *M.* p. 112, t. 71; Lesq. et Jam. *Man.* p. 278.

Neckera trichomitria C. M. *Syn.* II, p. 116.

Pterigynandrum trichomitrium Hedw. *Sp. M.* p. 82, t. 16.

Pterogonium trichomitrium Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 107; Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 78 et II ed. n. 92.

l. Cortic. — *As.* : Japon. *Am. sept.* : Ontario, Niagara, reg. sept., centr., et merid.

Exs. : Faurie n. 46, 217, 242.

Mac. *Canad. M.* n. 236.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 352.

« *var. immersa* Lindb. l. c.

Leptodon immersus Sull. *M. of U. St.* p. 57; Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 234.

L. trichomitrius var. immersus Sull. *Ic. M.* p. 112.

Ut typ. — *Am. sept.* : Reg. merid.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 353.

« *var. irrigua* (Ren.) Par.

Leptodon trichomitrius var. irriguus Ren. in Lesq. et Jam. op. et l. cc.

Ad rup. madid. — *Am. sept.* : Florida (1).

FUNARIA Schreb. *Gen. pl.* n. 1650 (64 spec.).

abyssinica W. P. Sch. in W. Sch. *M. Abyss.* n. 1029.

— *Afr.* : Abyssin.

acaulis Hpe. — *F. glabra*.

acicularis C. M. in *Fl.* 1886, p. 279.

l. Terr. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

aequidens Lindb. in Broth. *Enum. M. Caucas.* p. 32.

l. Ad terr. calcar. — *As.* : Caucas. centr.

americana Lindb. — *F. Mühlenbergii*.

androgyna Brid. — *F. hygrometrica*.

angustifolia Brid. — *F. hygrometrica*.

annulata Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 48.

— *Am. sept.* : Mexic.

anomala Jur. in Ung. et Ky. « die Ins. Cypern » 1885, p. 170.

— *As.* : Ins. Cypr., Syr., Taurus, Mesopotam., Pers.

austr. *Afr.* : Ægypt. inf.

aristata Broth. — *Entosthodon*.

(1) In *Enum.* Kindberg. nom. nudum :

Lasia cuspidata C. M.

aristatula C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 254.

1. Rupic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

attenuata Lindb. — *Entosthodon Templetonii*.

Berteroana Hpe. mss. ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 327.

F. Fontanesii *Bryol. eur.* III (mon. p. 5) p.p.

1. Terr. — *Am. merid.* : Chile.

Beyrichii Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 5.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

bogosica C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 16.

2. — *Afr.* : Alp. Abyss.

boliviana W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1647.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

calcarea Wahlenb. in *Nov. Act. Holm.* 1806, t. 4, f. 2 ; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 320 et II ed. p. 382.

Bryum funarioides Brid. *Mant. M.* p. 120 et *Bryol. univ.* II, p. 55.

F. dentata Crome *Samml. deutsch. Laubm.* II Nachl. n. 12.

F. hibernica Hook. in *Curt. Fl. Lond.* II ed. p. 371, c. ic. ; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 56 ; *Bryol. eur.* III (mon. p. 7), t. 304 ; C. M. *Syn.* I, p. 110 et II, p. 543.

F. mediterranea Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 398 et 1864, p. 598.

F. Mühlenbergii Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 78, t. 66 (*quoad pl. Eur.*) ; Brid. *op. cit.* p. 55 et 739 p.p. ; *Bryol. eur.* III (mon. p. 6), t. 303 ; C. M. *Syn.* I, p. 109 et II, p. 543 p.p. ; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 236.

1. Ad rup. et mur. — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Himalaya occ. ? Mesopot., *Syr.* *Caucas.*, etc. *Afr.* : Septentr. tota. *Am. sept.* : M. Rupestr., Utah, Calif.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 308 et b, 812, 1164, 1203.

var. *convexa* Husn. — F. *convexa*.

« var. *flaccida* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 320 et II ed. p. 383.

F. Mühlenbergii var. *flaccida* *Bryol. eur.* l. c.

Ut et cum typ.

« var. *occidentalis* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 43, t. 6 c.
— *Am. sept.* : Oregon.

« var. *patula* W. P. Sch. *ll. cc.*

F. Fontanesii Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 80, t. 66 p.p. ; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 56 p.p.

F. laxissima C. M. *Syn.* II, p. 541.

F. Mühlenbergii β *patula* *Bryol. eur.* et C. M. *ll. cc.* p.p.

F. neglecta de Not. mss.

F. Schwaegrichenii Mdo. *Bay. Laubm.* p. 105.

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *Afr.* : Alger. *Am. merid.* : Brasil. ? (fid. Bridel.).

californica Sull. *lc. M. Suppl.* p. 29, t. 18 ; *Lesq. et Jam.* p. 201.

1. Ad terr. argill. — *Am. sept.* : Oregon, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 238.

calvescens Schwaegr. — F. *hygrometrica* var. *calvescens*.

Campylopus Brid. — F. *hygrometrica*.

commutata Lindb. — *Entosthodon*.

connivens C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 747 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 56.

F. *hygrometrica* Mont. in *Perrottet M. Neilgherr.* n. 42 ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 19.

1. — *As.* : M. Neilgherr., Yunnan.

convexa Spr. *M. Pyr. n.* 149 et in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849, n. 197; *C. M. Syn. II*, p. 541; *W. P. Sch. Coroll. p.* 62 et *Syn. II ed. p.* 383.

F. calcarea var. convexa Husn. *Muscol. gall. p.* 217.

F. serrata Bryol. eur. III (mon. p. 8), t. 304; *C. M. Syn. I*, p. III (excl. syn. P. B).

l. Ad terr. humid. — *Eur.*: Gall. merid., Sardin., Hispan., Roma. As.: Minor. Afr.: Alger., Madeir.

Exs.: Mandon M. Madeir. n. 18.

Rab. Bryoth. eur. n. 409, 813.

convoluta Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 455; *Lesq. et Jam. Man. p.* 202.

Terr. — *Am. sept.*: Sierra Nevada Calif.

crispula Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm. II*, p. 198, t. 175, f. 2.

F. radians Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 80.

l. Rupic. — *Pac.*: Tasman.

curviseta (Schwaegr.) Milde Bryol. Sil. p. 196; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 382.

Amphoritheca curviseta Jaeg. *Ad. II*, p. 696.

Entosthodon curvisetus *C. M. Syn. I*, p. 121; *W. P. Sch. Coroll. p.* 61.

Gymnostomum curvatum Dna F. Mazz. *Spec. bryol. Rom. I ed. p.* 4.

G. curvisetum Schwaegr. *Suppl. II, I*, p. 17, t. 105.

G. Physcomitrium curvisetum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 103.

Physcomitrium curvisetum Bryol. eur. III (mon. p. 10), t. 301.

l. Ad terr. humid. — *Eur.*: Normann., Francon., reg. merid. Afr.: Alger., ins. Canar.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 429, 1032, 1392.

cuspidata Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 91, t. 86, f. 3 et *Handb. p.* 450.

— *Pac.*: Nov. Zeland. sept.

dentata Crome. — *F. calcarea*.

Drummondii Lindb. — *Entosthodon*.

Duriei *W. P. Sch. mss.*; *Besch. Cat. M. Alg. p.* 23.

l. Terr. — *Afr.*: Alger.

erectiuscula Mitt. *M. austr. am. p.* 247.

— *Am. merid.*: And. Chil.

fascicularis (Dicks.) *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 381.

Amphorithera fascicularis Hpe. *Fl. Fl. Hercyn.*

Bryum fasciculare Dicks. *Fasc. III Pl. crypt. p.* 3, t. 7.

Br. serpyllifolium, pellucidum, capsulis piriformibus Dill. *Hist. M. p.* 345, t. 44, f. 6 A-K.

Entosthodon fascicularis *C. M. Syn. I*, p. 120; *W. P. Sch. Coroll. p.* 61.

Gymnostomum fasciculare Hedw. *Sp. M. p.* 38, t. 4, f. 5-8.

G. Physcomitrium fasciculare Brid. *Bryol. univ. I*, p. 101.

Physcomitrium fasciculare Furrn. in *Fl.* 1829, II, *Ergaenz. Bl. p.* 9; *Bryol. eur. III* (mon. p. 13), t. 301 et 637.

l. Ad terr. argill. humid. — *Eur.*: Sporad. per tot., arctic. except. As.: Alger.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 55, 270, 355 et b, 890.

« *var. minor* de Not. *Epil. p.* 453.

Ut typ. — *Eur.*: Sardin.

flavicans Rich. in *Mich. Pl. bor. am. II*, p. 303; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 54; *C. M. Syn. I*, p. 108; *Sull. M. of U. St. p.* 50 et *Ic. M. p.* 87, t. 53; *Lesq. et Jam. Man. p.* 202.

Strephedum flavicans P. B. *Prodr. pp.* 25 et 89.

1. Ad terr. argill. humid. — Afr.: Abyssin. Am. sept.: Centr. et merid.

Exs.: Schimp. M. Abyss. n. 444.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 158 et II ed. n. 240.

* *var. humilis* Schwaegr. *Suppl. I, II, p. 75, t. 65 (spec. duo ad dextr. tab.)*; C. M. l. c.

Ut typ. — Am. sept.: Cum typ.

Fontanesii Schwaegr. *Suppl. I, II, p. 80, t. 66*; *Brid. Bryol. univ. II, pp. 56 et 739*; C. M. *Syn. I, p. 112 p.p. et II, p. 541*.

1. Terr. — Afr.: Ægypt., ins. Canar., Madeir.

Fontanesii { Bals. et de Not. — Entosthodon Templetoni.
Bryol. eur. p.p. — F. Berteroana.
Bryol. eur. et C. M. pp. — Entosthodon Mathewsii *var. integer*.
Schwaegr. p.p. — F. calcarea *var. patula*.
fuegiana C. M. — F. hygrometrica *var. fuegiana*.

glabra Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 57; C. M. *Syn. I, p. 112 et II, p. 542*; Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II, p. 91 et Handb. p. 450*.

F. acaulis Hpe. in *Linn.* 1860, p. 624.

F. radians Mitt. in *Kew Journ. bot.* VIII, p. 259.

Weisia radians Hedw. *Sp. M. p. 73, t. XIII, f. 1-4?*

— Pac.: Austral. or., Nov. Zeland., Nov. Caled.,

Tasman.

gracilescens W. P. Sch. *mss.*; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 154.

— Afr.: C. B. Sp.

hibernica Hook. — F. calcarea.

hybrida Ruthe *mss.*; *Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 200*.

Entosthodon fascicularis ♀ × F. hygrometrica ♂ *ej. l. c.*

Funaria??? Bayrh. *Uebers. d. M... des Taunus*, p. 18.

Terr. — Eur.: Taunus.

hygrometrica (L.) Hedw. *Sp. M. p. 112*; *Brid. Bryol. univ. II, p. 51 et 738*; *Bryol. eur. III (mon. p. 8), t. 305*; C. M. *Syn. I, p. 107*; W. P. Sch. *Syn. II ed. p.*

Bryum bulbiforme, aureum, calyptra quadrangulati, capsulis piriformibus nutantibus Dill. *Hist. M. p. 407, t. 52, f. 75*.

Br. hygrometricum Neck. *Meth. M. p. 221*.

F. androgyna Brid. *op. cit. p. 58*.

F. angustifolia *ej. op. et l. cc.*

F. Campylopus *ej. op. cit. p. 739*.

F. ramificans *ej. op. cit. p. 738*.

Kœlreuteria hygrometrica Hedw. *Fund. M. I, t. 5, f. 21-26; II, p. 95, t. 3, f. II: t. 5, f. 25-26; t. 6, f. 27 et t. 10, f. 58-61*.

Mnium hygrometricum L. *Spl. pl. p. 1575*.

Strephedium hygrometricum P. B. *Prodr. p. 89*.

1. Ubique, per fere tot. terrar. orbem.

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 235.

Mac. Canad. M. n. 148.

Mandon, M. Madeir. n. 19.

Rab. Bryoth. eur. n. 309.

Rehm. M. Afr. austr. n. 526 et b, 527.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 241.

* *var. arctica* Berggr. M. *Spetsb. n. 58 et in K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII, n. 7, p. 57*.

— Eur.: Spitzberg. As.: Jenissei. Am. sept.:

Groenland.

« *var. calvescens* Bryol. Eur. l. c. p. 9 f. γ.

F. calvescens Schwaegr. Suppl. I, II, p. 77, t. 65; Brid. op. cit. p. 53 et 739; C. M. l. c.; Bryol. jav. I, p. 31.

— Eur.: Zon. merid. As.: Intertropic. Afr.: Ins. Canar., Abyss., reg. lacustr., Cameroon, Kilima N'Djaro, ins. Amsterdam. Am. sept.: New Brunswick, reg. centr., merid. et tropic. Am. merid.: Reg. tropic. et subtropic.

Exs.: Bal. Pl. Paraguay n. 1242, 1243, 1244.

Drumm. M. bor. am. II ed. n. 75.

Schimp. M. Abyss. n. 463.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 242.

« *var. crispa* C. M. l. c.

— Am. merid.: Chil.

« *var. fuegiana* (C. M.) Besch. in Miss. sc. Cap Horn, Bot. V, p. 284.

F. fuegiana C. M. in Fl. 1885, p. 396.

— Am. merid.: Fuegia.

« *var. mauritiana* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 88.

In Carbonet. — Afr.: Ins. Franciae.

« *var. patula* Bryol. eur. et C. M. ll. cc.

F. Ravenelii Aust. in Coult. Bot. Gaz. I, p. 29.

— Eur. et Am. sept.: Locis calidior.

« *var. planifolia* Rehm. M. Afr. austr. n. 528.

— Afr.: Natal.

hygrometrica Mont. — *F. connivens*.

hygrometricoides W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1648.

— Am. merid.: And. Boliv.

incompleta C. M. in Linn. 1878-79, p. 253.

l. — Am. merid.: Alp. Argentin. subtropic.

Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 189; C. M. Syn. II, p. 540; Mitt. M. austr. am. p. 247.

— Am. merid.: And. Quitens.

jujuiensis C. M. in Linn. 1878-79, p. 256.

l. Muric. et terr. — Am. merid.: Argentin. subtropic.

laevis Mitt. M. austr. am. p. 248.

Terr. — Am. merid.: And. Quitens. et Peruv.

laxissima C. M. — *F. calcarea* var. *patula*.

leptopoda Griff. Not. p. 437; Mitt. M. Ind. or. p. 56.

F. nepalensis C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 748.

— As.: Nepal., Khasia, Java.

« *var. gemmacea* Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 61.

Terr. — As.: Alp. Yunnan.

linearidens C. M. in Linn. 1878-79, p. 252.

l. — Am. merid.: Argentin. subtropic.

lonchopelma C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 181 et 525.

— Afr.: C. B. Sp., Transvaal.

Lorentzi C. M. in Linn. 1878-79, p. 256.

Syn. — Am. merid.: Argentin. Cordob.

mediterranea Lindb. — *F. calcarea*.

meeseacea C. M. in *op. cit.* 1880-83, p. 357.

— *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

megalostoma Mitt. *M. austr. am.* p. 246.

— *Am. merid.* : And. Peruv.

mexicana Duby in *Mém... Genève*, 1869, p. 12, t. II, f. 2.

2. — *Am. sept.* : Mexic. or.

microstoma Bryol. eur. III (*mon.* p. 9) t. 306 ; C. M. Syn. I, p. 106.

1. In glareos. humid. et ad rup. quartz. — *Eur.* : Angl. Normann., Helvet., Rhaet., Tirol., Bavar., Carinth., Engad., Boruss. or., Delphinat., Galloprov., Ital. super.

mucronata Hartm. in *Fries Summ. veg. Scand.* p. 88 ; C. M. Syn. I, p. 112 (*nom.*).

— *Eur.* : Norvegia.

Mühlenbergii Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 78, t. 66 pp. ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 55 p.p. ; C. M. Syn. I, p. 109 (omnes quoad pl. americ.) ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 201.

F. americana Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 398 et 1864, p. 597.

— *As.* : Himalaya occ. (*fid. Mitt. M. Ind. or.* p. 56 ; *an potius F. calcarea?*). *Am. sept.* : Pensilv.

Mühlenbergii Bryol. eur., Drumm. — F. calcarea.

var. flaccida Bryol. eur. — F. calcarea var. flaccida.

var. patula Bryol. eur. — F. calcarea var. patula.

neglecta de Not. — F. calcarea var. neglecta.

nepalensis C. M. — F. leptopoda.

obtusa Lindb. — Entosthodon ericetorum.

obtusata W. P. Sch. in C. M. Syn. II, p. 540.

— *Am. sept.* : Mexic.

obtusifolia Weissm. *Syll. M.* p. 438 ; C. M. Syn. I, p. 108.

— *As.* : Sibiria (fret. Sinjawin.).

orizabensis C. M. in *Linn.* 1874, p. 621.

Terr. calc. — *Am. sept.* : Mexic.

orthocarpa Mitt. *M. Ind. or.* p. 56.

Entosthodon orthocarpus Jaeg. *Ad. I*, p. 501.

1. — *As.* : Tibet occ.

pallescens W. P. Sch. in W. Sch. *M. Abyss.*

— *Afr.* : Abyss.

papillata Hpe. in *Linn.* 1876, p. 302.

1. — *Pac.* : Austral. or.

physcomitrioides Mont. in *Ann. sc. nat.* 1841, p. 253 et *Syll.* p. 38 ; C. M. Syn. I, p. 111 p.p. et II, p. 543.

Entosthodon physcomitrioides Mitt. *M. Ind. or.* p. 55.

1. — *As.* : M. Neilgherr.

physcomitrioides C. M. p.p. — F. subnuda.

plagiostoma C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 748.

1. Arenic. — *Afr.* : C. B. Sp.

pulchella Philib. in *Rev. bryol.* 1884, p. 41 et in *Husn. Muscol gall.* p. 217.

Syn., rar. 1. Muric. — *Eur.* : Gall. centr. (Ardèche).

pulchricolor C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 251.

1. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

radians { Br. et Sch. — *Entosthodon curvipes* var. *robustior*.
Mitt. (Linn. Soc.). — *F. crispula*.
Mitt. (Kew Journ.). — *F. glabra*,
ramificans Brid. — *F. hygrometrica*.

ramulosa (Hpe.) Par.

Amphoritheca ramulosa Hpe. *Symb.* p. 1874, p. 480.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Ravenelii Aust. — *F. hygrometrica* var. *patula*.

riparia Lindb. *Manip. M.* I, 1870, p. 58.

Amphoritheca riparia Ångstr. *Prim. lin.* p. 16.

1. In aren. humid. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Sartorii C. M. in *Linn.* 1874, p. 620.

— *Am. sept.* : Mexic.

saxicola Hpe. — *Thiemea Hampeana*.

Schnyderi C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 356.

Muric. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

serrata P. B. in Brid. *Mant. M.* p. 124 et *Bryol. univ.* II, p. 124;
C. M. *Syn.* II, p. 542; Sull. *lc. M.* p. 89, t. 54; Lesq. et Jam. *Man.*
p. 201.

1. Ad terr. argill. et rup. aren. humid. — *Am. sept.* : Reg. merid.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 76.

Sull. *M. Allegh.* I ed., n. 126.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 239.

serrata Bryol. eur. — *F. convexa*.

Smithhurstii Broth. et Geh. — *Entosthodon*.

sorotensis P. Sch. in Mandon *Pl. Boliv.* n. 1647 bis.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

spathulata W. P. Sch. in Breutel *M. capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

sphaerocarpa C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 546.

1. Ad rup. marit. — *Pac.* : Austral. felix, Tasman., ins. Lord Howe.

suberecta Mitt. *M. austr. am.* p. 248.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

subleptopoda Hpe. in *Linn.* 1874, p. 207.

— *Afr.* : Madagascar.

subnuda Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 57; C. M. *Syn.* II, p. 542.

F. physcomitrioides C. M. *Syn.* I, p. 111 p.p.

— *Pac.* : Austral. or.

tasmanica Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 490; F. v. Müller *Austral.*
M. t. 1.

— *Pac.* : Tasman.

Templetoni Engl. Bot. — *Entosthodon*.

tenella C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 248.

1. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

usambarica Broth. — *Entosthodon* (1).

FUSCINA Schrank *Baiers Tl. II.*

bryoides Schr. — *Fissidens*.
glauca Schr. — *Leucobryum*.
heteromalla Schr. — *Dicranella*.
purpurea Schr. — *Ceratodon*.
sciuroides Schrank. — *Leucodon*.
scoparia Schr. — *Dicranum*.
simplex Schr. — *Dicranella varia* var. *tenella*.
taxifolia Schr. — *Fissidens*.
trichomanoides Schr. — *Homalia*.

FUSICONIA P. B. in *Mém. Soc. Linn. Par. I, t. 7, f. 5.*

androgyna P. B. — *Aulacomnium*.

GAGEA Raddi *Nuov. Raccolt.*

compacta R. — *Zygodon Forsteri*?

GARCKEA C. M. in *Bot. Zeit* 1845, p. 865 (4 spec.).

Bescherellei C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 51.

2. — *Afr.*: Ins. Borbon., Mayotte, Nossi-Be.

Hildebrandti C. M. in *Fl.* 1886, p. 510 et in *Hildebr. M. Mad. n.* 2061.

2. — *Afr.*: Ins. Nossi-Be.

Mœnkemeyeri C. M. in *op. cit.* p. 509.

2. *Terr.* — *Afr.*: Old Calabar.

phascoides (Hook.) C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 865 et *Syn. I, p.* 424;

Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 180, t. 59; *Mitt. M. Ind. or.* p. 8; *Bryol. jav. I, p.* 92.

Dicranum phascoides Hook. *Misc. bot.* 1830, I, p. 39, t. 21.

Grimmia comosa Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 304.

Gr. flexuosa Griff. *Not. p.* 412 et *Ic. pl. asiat. II, p.* 79, f. 3.

Weisia flexuosa Hpe. in sched.

2. *Terr.* — *As.*: Penins. ind., Pegou, Sumatra, Java, penins. Malay.,
 Tonkin or.

" var. *gracilis* C. M. in *Jaeg. Ad. I, p.* 226.

— *As.*: Arracan.

GAROVAGLIA Endl. *Gen. n.* 590 (31 spec.).

acuminata (Hook.) Par.

Endotrichum acuminatum Jaeg. *Ad. II, p.* 131.

Meteorium acuminatum Mitt. *M. Ind. or. p.* 86.

Neckera acuminata Hook. *M. ex. t.* 151; *Brid. Bryol. univ. II, p.* 236;
 C. M. *Syn. II, p.* 95.

2?

— *As.*: Nepal., Himalaya, Khasia.

angustifolia Mitt. — *Endotrichella*.

(1) In *Enum. Kindb.* nomina nuda:

F. cuspidatissima C. M.

subserrata (Rehm.).

Taylori Lindb. (an *Entosthodon apophysatus*?).

aristata *Bryol. jav. II*, p. 80, t. 195.

Endotrichum aristatum *Jaeg. Ad. II*, p. 135,

2. Arbor. — *As.* : Borneo, ins. Bima.

Aurantium (*C. M.*) *Par.*

Endotrichum Aurantium *Jaeg. Ad. II*, p. 136.

Pilotrichum Aurantium *C. M. in Linn.* 1869-70, p. 26.

Ster. — *As.* : Ceylan.

austro-caledonica *Besch. Fl. bryol. Nov. Cal.* p. 226.

Endotrichum austro-caledonicum *Jaeg. Ad. II*, p. 135.

— *Pac.* : Nov. Caledon.

Bauerlenii (*Geh.*) *Par.*

Endotrichum Bauerlenii *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. N. Guin.*, p. 4.

Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. littor.

brisbanica (*C. M.*) *Par.*

Endotrichum brisbanicum *C. M. in Rev. bryol.* 1878, p. 59 (*nom.*).

— *Pac.* : Australia or. (Queensland).

Campbelliana *Jaeg.* — *Endotrichella*.

carinata *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 314.

Endotrichum carinatum *Jaeg. Ad. II*, p. 136.

— *As.* : Bhotan.

compressa *Mitt. in op. et l. cc.*

Endotrichum compressum *Jaeg. Ad. II*, p. 135.

— *As.* : Borneo.

cuspidata *Mitt.* — *G. setigera*.

densifolia *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 310.

Endotrichum densifolium *Jaeg. l. c.*

— *As.* : Ceylan.

Dietrichiae *Mitt.* — *Endotrichella*.

Duseni *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 289.

— *Afr.* : M. Cameroon.

elegans (*Dz. et Mk.*) *Hpe. mss.* ; *Bryol. jav. II*, p. 81.

Endotrichum elegans *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat.* 1844, p. 303 et *M. frond.*
ined. Archip. ind. I, t. 2.

Pilotrichum elegans *C. M. Syn. II*, pp. 159 et 674.

2. Arbor. — *As.* : Ins. Bima, M. Java, Sumatra.

flexipes (*Mitt.*) *Par.*

Endotrichum flexipes *Jaeg. Ad. II*, p. 137.

Meteorium flexipes *Mitt. M. Ind. or.* p. 85.

— *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.

Foulkesiana (*Mitt.*) *Par.*

Endotrichum Foulkesianum *Jaeg. l. c.*

Meteorium Foulkesianum *Mitt. l. c.*

2 — *As.* : M. Neilgherr.

frondosa (*Mitt.*) *Par.*

Endotrichum frondosum *Jaeg. l. c.*

Meteorium frondosum *Mitt. op. cit.* p. 86.

2. — *As.* : Ceylan.

hamata (C. M.) Par.

Endotrichum hamatum Jaeg. Ad. II, p. 136.

Pilotrichum hamatum C. M. in Linn. 1869-70, p. 26.

Ster. — As. : Ceylan.

laevifolia Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 313.

Endotrichum laevifolium Jaeg. Ad. II, p. 135.

— As. : Ceylan.

lanceolata (Wright) Par.

Endotrichum lanceolatum Wright in Lond. Journ. of bot. 1892, p. 263.

— As. : Borneo.

lepida Mitt. — *Endotrichella*.

moluccensis Bryol. jav. II, p. 82, t. 196.

Endotrichella moluccensis Jaeg. Ad. II, p. 134.

2. Arbor. in silv. — As. : Ins. Ceram.

mucronata Mitt. — *Euptychium*.

Mülleri (Hpe.) Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 80.

Endotrichum Mülleri Hpe. in Linn. 1876, p. 318.

2. — Pac. : Austral. tropic. or.

nematosa (C. M.) Par.

Endotrichum nematosum Jaeg. Ad. II, p. 726.

Meteorium nematosum C. M. in Fl. 1878, n. 6.

Ster. — As. : Pegou.

obtusifolia Thw. et Mitt. in op. et l. cc.

Endotrichum obtusifolium Jaeg. Ad. II, p. 135.

— As. : Ceylan.

patentissima Hpe. in Linn. 1874, p. 219.

Endotrichum patentissimum C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 209.

2. — Afr. : Madagascar.

* *var. brevis* (C. M.) Par.

Endotichum patentissimum var. brevis C. M. l. c.

— Afr. : Madagascar.

plicata (Nees) Endl. Gen. p. 57, n. 590 ; Bryol. jav. II, p. 29.

Cryphaea plicata Nees mss.

Endotrichum densum Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 303 et M. frond. ined. Archip. ind. I, t. I.

E. plicatum Jaeg. Ad. II, p. 135.

Esenbeckia plicata Brid. Bryol. univ. II, p. 754.

Meteorium plicatum Mitt. M. Ind. or. p. 84.

Neckera plicata Schwaegr. Suppl. III, II, I, t. 268.

Pilotrichum plicatum C. M. Syn. II, p. 158.

2. Cortic. — As. : Himalaya or., Sumatra, Java, ins. Ceram.

Powellii Mitt. Sam. M. p. 169.

Endotrichum densum Sull. in Exped. Wilkes, p. 20 ?

E. Powellii Jaeg. Ad. II, p. 136.

Pilotrichum Powellii C. M. M. Polyn. p. 75.

Arbor. — Pac. : Ins. Samoa.

robusta Mitt. — *Euptychium*.

samoana Mitt. — *Endotrichella*.

scabriuscula (Mitt.) Par.Endotrichum scabriusculum *Jaeg. Ad. II, p. 137.*Meteorium scabrisculum *Mitt. M. Ind. or. p. 85.*2. — *As.* : M. Concan, Ceylan.**Schmidii (C. M.) Par.**Endotrichum Schmidii *Jaeg. Ad. II, p. 138.*Meteorium Schmidii *Mitt. op. cit. p. 91.*Neckera Schmidii *C. M. in Bot. Zeit. 1854, p. 571.*2. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.**sciuroides Mitt. — Cladomnium.****setigera (Sull.) Mitt. Fl. Vit. p. 396.**Endotrichum setigerum *Sull. in Exped. Wilkes, p. 20, t. 18 B.*Euptychium cuspidatum *Mitt. in F. von Müller's Fragm. Phyt. Austral. XI, Suppl. p. 114.*E. neo-caledonicum *W. P. Sch. ? (fid. Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1867, p. 170).*G. cuspidata *Mitt. in Lond. Journ. of bot. 1856, p. 263.*Meteorium setigerum *ej. in Bonplandia, 1861, p. 366.*Pilotrichum setigerum *Sull. in Proced. Am. Acad. Januar. 1854.*— *Pac.* : Ins. Fidji, Austral. (Queensland, Victoria).**simplex C. M. in Dusen M. Camer. n. 444.**— *Afr.* : M. Cameroon.**taïtensis Besch. in Ann. sc. nat. 1894, p.**Cyrtopus taïtensis *W. P. Sch. in sched.*2. Ad arbor. — *Pac.* : Taïti.**tortifolia Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 314.**Endotrichum tortifolium *Jaeg. Ad. II, p. 136.*— *As.* : Borneo.**Wightii (Mitt.) Par.**Endotrichum Wightii *Jaeg. Ad. II, p. 137.*Meteorium Wightii *Mitt. M. Ind. or. p. 85.*— *As.* : Nepal., Rangoon.**Gasterogrimmia W. P. Sch. Syn. II ed. p. 202 (subgen. GRIMMIAE).****GEHEEBIA W. P. Sch. Syn. II ed. p. 233 (2 spec.).****cataractarum W. P. Sch. l. c.**Barbula gigantea *Funk in sched.*B. nivalis *Jaeg. Ad. I, p. 279 (fid. A. Gepp).*B. recurvifolia *Mitt. M. Ind. or. p. 34.*B. robusta *Sendtn. in sched. ; Rab. Deutsch. krypt. Fl. II, III, p. 116.*B. squarrosa *Ltz. Beitr. p. 13.*Dicranum speciosum *Saut. mss. ; Rab. op. et l. cc.*Didymodon giganteus *Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 102.*G. gigantea *Boulay Musc. Fr. p. 395.*Grimmia gigantea *W. P. Sch. Syn. I ed., p. 695.*Schistidium apocarpum *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 323.*Tortula fallax *ej. in op. cit. p. 322.*T. gigantea *Lindb. Trichost. Eur. p. 42.*T. vinealis var. glacialis *Spr. M. Pyr. n. 185.*Trichostomum rubellum β spectabile *Rab. op. et l. cc.*2. ♂ et fr. ign. Ad rup. irror. cataract. — *Eur.* : Hibern. ? Scot., Vales., Tatra, Bavar., Alp., Pyren. *As.* : Sikkim., Tibet.*Exs.* : Rab. Bryoth. eur. n. 317, 1126.

Un. itin. 1863, n. 39.

gigantea Boul. — *G. cataractarum*.

Mülleri Par.

Barbula geheebiopsis C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise...* p. 23.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

GENTHIA Bayrh. in *Jahresber. d. Ver. f. Naturk. in Herzogt. Nassau*, 1849, Heft V, p. 2.

patens B. — *Physcomitrella*.

GEORGIA Ehrh. in *Hannov. Mag.* 1780, p. 931.

Browniana C. M. — *Tetrodontium*

var. *repanda* Lindb. — *Tetrodontium repandum*.

geniculata Lindb. — *Tetraxis*.

Mnemosymon Ehrh. — *Tetraxis pellucida*.

pellucida Rab. — *Tetraxis*.

repanda C. M. — *Tetrodontium*.

GIGASPERMUM Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 599 (4 spec.).

Breutelii (C. M.) Par.

Leptangium Breutelii Jaeg. *Ad. II*, p. 71.

Physcomitrium Breutelii C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 749.

l. — Afr. : C. B. Sp.

imbricatum (Mitt.) Par.

Leptangium imbricatum Mitt. *M. austr. am.* p. 240

Terr. — Am. merid. : Brasil., Montevideo.

repens (Hook.) Lindb. in *op. et l. cc.*

Anoetangium repens Hook. *M. ex.* p. 8, t. 106.

Hedwigia repens H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 92 et *Handb.* p. 424 ; *Fl. Tasm. II*, p. 178.

Physcomitrium repens C. M. *Syn. II*, p. 544.

Schistidium repens Brid. *Bryol. univ. I*, p. 120.

l. Terr. — Pac. : Austral. occ. et or., Nov. Zeland., Tasman.

tumidum (Mitt.) Lindb. in *op. et l. cc.*

Leptangium tumidum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 66.

— Pac. : Tasman.

Girgensohnia Lindb. *Contr. ad fl. crypt. As. bor. or.* 1872, p. 249 (sect. CLIMACH).

GLAUCODIPSIS K. Sch.

frigida K. Sch. — *Leucobryum glaucum*.

GLOSSOPHYLLUM C. M. *Syn. II*, p. 229 (sect. HYPNI) ; *Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 59, (gen. propr.).

Spec. omn. STEREOPHYLLA ejusd. nom.

GLYPHOCARPUS (sub GLYPHOCARPA) R. Br. in *Ann. Soc. Linn. Lond. XII*, p. 575 (18 spec.).

abyssinicus Jaeg. — *Anacolia*.

aristarius C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 184 et b
— *Afr.* : C. B. Sp.

« *var. plumosus* C. M. l. c. n. 185.
— *Afr.* : Natal.

asperrimus Hpe. — *Bartramia Hampeana*.

Baueri Hpe. — *Anacolia*.

Breutelii Jaeg. — *Bartramidula Breuteliana* ?

capensis R. Br. — *Gl. sericeus*.

cernuus Wils. — *Bartramidula Wilsoni*.

chrysurus (C. M.) Par.

Bartramia chrysura C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forschungsreise...* p. 19.

B. pendula Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876 ?

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

« *var. elongata* (C. M.) Par.

Bartramia chrysura var. elongata C. M. l. c.

— *Afr.* : Cum typ.

« *var. nigrescens* (C. M.) Par.

Bartramia chrysura var. nigrescens C. M. l. c.

— *Afr.* : Ibid.

comosus (Hpe. et C. M.) Hpe. in *Jaeg. Ad. I*, p. 526.

Bartramia comosa Hpe. et C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 221.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : *Rehm. M. Afr. austr. n.* 188.

compactus (Hsch.) Jaeg. *Ad. I*, p. 523.

Bartramia compacta Hsch. *Hor. Phys. Berol.* p. 63, t. 13; *C. M. Syn. I*, p. 501.

B. Krausei Bryol. eur. IV (mon. p. 10), t.

B. stricta Schwaegr. *Sp. M.* p. 104.

Arb. et terr. — *Afr.* : C. B. Sp.

curtus Hpe. — *Bartramidula*.

cygnæus Jaeg. — *Bartramidula*.

erectus Hpe. in *Linn.* 1876, p. 305.

Bartramidula Hampei Mitt in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. Victoria*, 1883, p. 68.

— *Pac.* : Austral. or.

exiguus Jaeg. — *Bartramidula*.

Glaziovii Hpe. — *Bartramidula*.

humilis (Mitt.) Jaeg. l. c.

Bartramia humilis Mitt. *M. austr. am.* p. 270.

Phascum Jamesoni Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 187; *C. M. Syn. II*, p. 518.

Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

humilis Rehm. — *Gl. Mac-Leanus*.

Hymenodon C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 186.

— *Afr.* : C. B. Sp.

insertus (Sull.) Jaeg. *Ad. I*, p. 524.

Bartramia inserta Sull. in *Proceed. Am. Acad.* 1859, p. 279.

2. *Ad rup. vertic. humid.* — *Afr.* : C. B. Sp.

intertextus W. P. Sch. — *Anacolia*.

Krausei Jaeg. — *Bartramidula*.

laevisphaerus (Tayl.) Par.

Bartramia laevisphaera C. M. Syn. I, p. 506.

B. subsessilis Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 334; C. M. op. c. p. 507; Mitt. M. austr. am. p. 268.

Gl. *laevisphaerus* Tayl. in op. cit. 1846, p. 56; Jaeg. Ad. I, p. 526.

Gl. *subsessilis* Jaeg. Ad. I, p. 524.

Gl. *Taylori* Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser...*, III, p. 370.

2? — *Am. merid.*: And. Nov. Granat. et Quitens.

Lindigii Hpe. — *Bartramidula*.

Mac-Leanus Par.

Gl. *humilis* Rehm. M. Afr. austr. n. 530.

— *Afr.*: C. B. Sp. or.

marionensis Mitt. in *Voy. H. M. S. Challenger, Bot.* IV, p. 199.

Bartramia quadrata ej. in *Journ. of the Linn. Soc.* XV, p. 70.

Ster. Rupic. — *Afr.*: Ins. Marion.

Menziesii Jaeg. — *Anacolia*.

mexicana Jaeg. — *Anacolia*.

microdonta (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 527.

Bartramia microdonta Mitt. M. austr. am. p. 263.

Ad rup. humid. — *Am. merid.*: Brasil.

patulus Jaeg. — *Bartramidula*.

pseudo-comosus Rehm. M. Afr. austr. n. 190.

— *Afr.*: Orange.

pusillus H. f. et W. — *Bartramidula*.

quadratus (Hook.) Brid. *Bryol. univ.* II, p. 92.

Bartramia quadrata C. M. Syn. I, p. 503.

Gymnostomum quadratum Hook. M. ex. t. 122.

2. Ad rup. madid. — *Afr.*: C. B. Sp.

Roylei Hook. — *Bartramidula*.

rostratus Hpe. in sched.

— *Pac.*: Alp. Austral.

Scioanus Brizzi in *Annuar. d. roy. Istit. bot. d. Roma*, 1893, V. fasc. 2.

1? Ad terr. humid. — *Afr.*: Lit. occ. mar. Erythr.

sericeus (Hsch.) Jaeg. Ad. I, p. 524.

Bartramia sericea Hsch. in *Hor. Phys. Berol.* p. 63, t. 13; C. M. Syn. I, p. 502.

Gl. *capensis* R. Br. in *Trans. of the Linn. Soc.* XII, p. 575; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 91.

Gymnostomum capense Hook. M. ex. t. 165.

Syn. Arbor. — *Afr.*: C. B. Sp.

setifolius Jaeg. — *Anacolia*.

strumosus Hpe. in *Linn.* 1863, p. 139.

Syn. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

subsessilis Jaeg. — Gl. *laevisphaerus*.

Taylori Hpe. — Gl. *laevisphaerus*.

Webbii Mont. — *Anacolia* (1).

GLYPHOMITRIUM Brid. Mant. M. p. 31 et Bryol. univ. I, p. 267 (5 spec.).

Omn. spec. non indicatae *PTYCHOMITRIA* ejusd. nom.

canadense Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 21; Lesq. et Jam. Man. p. 158.

l. — Am. sept.: Columb. brit.

Daviesii (Dicks.) Brid. op. et ll. cc.; Bryol. eur. III (mon. p. 3), t. 230; C. M. Syn. I, p. 766; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 292.

Bryum Daviesii Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 3, t. 7, f. 6.

Encalypta Daviesii Sm. Fl. brit. III, p. 1188.

Griffithia Daviesii R. Br. in Trans. of the Linn. Soc. XII, II, p. 375.

Grimmia Daviesii Turn. Muscol. Hib. p. 24.

l. Ad rup. marit., præcip. basalt. et granit. — Eur.: Britann., Norveg. occ.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 1161.

Drummondii (Hook. f. et Wils.) W. P. Sch. op. et l. cc. (nom.).

Brachysteleum Drummondii C. M. Syn. I, p. 770.

Grimmia Drummondii H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1842, III, p. 90. t. 3 et IV, p. 422, t. 25 B.

Ptychomitrium Drummondii Sull. M. of U. St. p. 36 et Ic. M. p. 65, t. 40; Lesq. et Jam. Man p. 157.

l. Arbor. — Am. sept.: Tennessee, Virgin. merid.

Exs.: Drumm. M. bor. am. II ed. n. 30.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 196.

Krausei W. P. Sch. in Breut. M. Capens.

— Afr.: C. B. Sp.

latifolium Broth. in Oefv. af Finska Vet.-Soc. Foerh. 1895, p. 58.

Ster. Rupic. — Pac.: Tasman.

parasiticum Brid. — *Calymperes*.

pulvinare Mitt. — *Ptychomitrium nigricans*.

rugosum Mitt. — *Ptychomitrium nigricans*.

saxicola Mitt. — *Campylosteleum*.

serratum Mitt. } (pl. Am.). — *Ptychomitrium*.
 } (pl. Tasm.). — *Ptychomitrium Mittenii*.

GLYPHOTHECIUM Hpe. in Linn. 1859, p. 637?

Müllerianum Hpe. — *Cladomnium*.

Gomphoneuron C. M. in Linn. 1888-79, p. 310 (sect. *POTTIAE*).

GONIOBRYUM Lindb. in Oefv... 1864, p. 606.

? *reticulatum* Lindb. — *Rhizogonium*.

subbasilare Lindb. — *Rhizogonium*.

(1) In Enum. Kindb. nomina nuda:

Gl. pilulifer C. M.

subhumilis (Rehm.) (an Gl. Mac-Leanus?).

GONIOMITRIUM *H. f. et W. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 142, t. 3.

acuminatum *H. f. et W.* — *Physcomitrium Goniomitrium*.

enerve eor. — *Physcomitrium*.

Goniostoma *Mitt. M. austr. am. p.* 198 (sect. MACROMITRII).

Gracilaria *C. M. Syn. I, p.* 751 (sect. SCHLOTHEIMIAE).

GRIFFITHIA *R. Br. in Trans. of the Linn. Soc. XII, II, p.* 375.

Daviesii *R. Br.* — *Glyphomitrium*.

GRIMMIA *Ehrh. Beitr. I, p.* 176 (193 spec.).

abyssinica *Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n.* 435.

Gümbelia abyssinica *Hpe. in Bot. Zeit.* 1846, p. 24; *C. M. Syn. I, p.* 772.

1 (Mitt.). 2 (C. M.). — *Afr.*: Abyss., M. Cameroon.

acicularis *C. M.* — *Rhacomitrium*.

aciphylla *W. et M.* — *Pottia lanceolata* var. *aciphylla*.

acuta *Sm.* — *Blindia*.

aethiopica *C. M. in Bot. Zeit.* 1855, p. 755.

Gr. Hoffmanni *ej. Syn. I, p.* 780 p.p.

Schistidium pulvinatum *Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss.*

1. *Rupic.* — *Afr.*: Summ. Alp. Abyssin.

affinis { *Bryol. germ.* — *Gr. ovata* var. *affinis*.
 Lindb. — *Rhacomitrium heterostichum* var. *alopecurum*.

var. *macrocarpa* *Bryol. germ.* — *Gr. ovata* var. *affinis*.

var. *ramosissima* *Bryol. germ.* — *Gr. ovata* var. *affinis*.

africana { *de Not.* — *Gr. orbicularis*.
 Hpe. — *Gr. pygmaea*.

Agassizii (*Sull. et Lesq.*) *Lesq. et Jam. Man. p.* 136.

Schistidium Agassizii *S. et L. in Sull. M. of U. St. p.* 104.

1. *Ad rup. irror.* — *Am. sept.*: Ontario, lac. Super.

Ews.: *Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n.* 137 et II ed. n. 203.

albida *Spreng.* — *Gr. campestris*.

alpestris *Schleich. Cent. II pl. Helv. n.* 13; *Bryol. eur. III (mon. p.* 27),
 t. 251; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 265.

Dicranum piliferum *Schleich. l. c. n.* 12.

Dryptodon pulvinatus γ *alpestris* *Brid. Bryol. univ. I, p.* 198.

Gr. lamellosa *C. M. in Bot. Zeit.* 1854, p. 318.

Gr. Ungerii *Jur. (fid. Jaeg. Ad. II, p.* 765).

Gümbelia alpestris *Hpe. in Bot. Zeit.* 1846, p. 124; *C. M. Syn. I, p.* 772.

Trichostomum pulvinatum β *alpestris* *W. et M. Bot. Taschb. p.* 110.

2. *Ad mur. et rup. sicc.* — *Eur.*: Alp. omn., calcar except. *As.*:
 Caucas. occ. et centr. Am. sept.: *Gaspes.*, M. *Rupestr.* et *Selkirk*,
 Columb. brit., *Oregon*, *Utah*.

Ews.: *Mac. Canad. M. n.* 414.

* var. *subimberbis* *Berggr. in K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII, n.* 7, p. 49.

Gr. arctica *C. M.?*

Gr. sulcata β *subimberbis* *Lindb. in Oefv... XXIII, p.* 552.

Ut typ. — *Eur.*: *Spitzberg. Am. sept.*: *Groenland*.

« *var. sinaitica* Ren. et Card. in Bull. hb. Boissier, 1894, p. 33.
— As. : M. Sinaï.

anomala Hpe. in W. P. Sch. op. cit. p. 270.
Ster. Rupic. — Eur. : Valesia, Algov.

apiculata Hsch. in Fl. I, p. 85 et II, p. 443; Brid. Bryol. univ. I, p. 186;
Bryol. eur. III (mon. p. 13), t. 241; C. M. Syn. I, p. 791; W. P.
Sch. op. cit. p. 250.

1. Ad rup. silic. humid. — Eur. : Alp. Norveg., Salisb., Rhaet., Tatra,
Stir., Carinth., Tirol., Sabaud. (Mont Blanc); Voges. ? Helvet.

apocarpa (L.) Hedw. M. frond. I, p. 104, t. 39; Brid. Bryol. univ. I,
p. 167; C. M. Syn. I, p. 776; W. P. Sch. Coroll. p. 45 et op. cit.
p. 242.

Bryum apocarpum L. Sp. Pl. p. 1579.

Br. apocaulon Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 30.

Dicranum ? phascoideum P. B. Prodr. p. 54; Brid. Bryol. univ. I,
p. 467 ?

Fontinalis apocarpa L. jun. Meth. M. p. 366.

Gr. apocarpa β apocaulos Brid. op. cit. p. 169.

Gr. apocarpa ξ floribunda *ibid.* p. 170.

Gr. apocarpa *var. stricta* Drumm. M. bor. am. I ed. n. 55.

Gr. apocaulos DC. Fl. fr. I, p. 458.

Gr. fasciculata Brid. Mant. M. p. 33.

Gr. fusca Bryol. germ. II, I, p. 120, t. 19 p.p.

Gr. polyodon Ehrh. Beitr. p. 169.

Gr. robusta Bryol. germ. II, I, p. 120, t. 20.

Gr. strigosa Brid. Bryol. univ. I, p. 171.

Gr. Torreyana *ibid.* p. 172.

Schistidium apocarpum Bryol. eur. III (mon. p.), t. 233.

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis Dill. Hist. M.

p. 243, t. 32, f. 4.
1. In mur., sax., tectis, etc., rar. ad arb. in toto fere terr. orb., tropic.
except. — Eur. : Spitzberg, ins. Parry, Ursor, etc. As. : Obi,
Jeniss., Japon., Caucas. Syr., etc. Afr. : Alger., C. B. Sp., ins.
Kerguelen, etc. Am. sept. : Groenland, Labrador, fret. Behring,
tota extratropic. Am. merid. : Ins. Eremit, fret. Magellan. Pac. :
Austral. or., Nov. Zeland., Tasman, Taïti.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 85.

Rab. Bryoth. eur. n. 280, 840.

Rehm. M. Afr. austr. 131, 494 b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 198.

« *var. alpicola* (Sw.) Hook. in Tayl. Musc. brit. p. 87; W. P. Sch.
II, cc.

Gr. alpicola Sw. M. Suec. pp. 27 et 81, t. I, f. I; Brid. Bryol. univ. I,
p. 165.

Gr. alpicola β helvetica Brid. Mant. M. p. 33 et op. cit. p. 166.

Gr. helvetica Schk. Deutsch. M. p. 48, t. 21.

Schistidium alpicola Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 707.

Sch. apocarpum *var. alpicola* Bryol. eur. l. c. t. 234.

Ad rivul. zon. sept. — Eur. : Spitzberg, ins. Ursorum, etc. Am. sept. :
Groenland, Alaska.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1255.

var. apocaulos Brid. — Gr. apocarpa.

var. atro-fusca Husn. — Gr. atro-fusca.

« *var. auresiana* Besch. Cat. M. Alger. p. 16.

Ut typ. — Afr. : Alger. (M. Aurès).

var. conferta C. M. — Gr. conferta.

- « *var. filiformis* Lindb. in *Oefv.... XXIII*, p. 552.
Gr. tenera Zett. *M. et Hepat. Finmarck in Oefv...* 1870 et in *Rev. bryol.* 1876, p. 95 (1).
 — *Eur.* : Spitzberg. *Am. sept.* : Groenland.
var. floribunda Brid. — *Gr. apocarpa*.
- « *var. gracilis* (Schleich.) Schk. *Deutsch. M.* p. 47, t. 21, f. 3; *C. M. et W. P. Sch.* ll. cc.
Gr. apocarpa var. Schleicheri Brid. *Mant. M.* p. 33 et *Bryol. unic.* I, p. 169.
Gr. apocarpa var. stricta Mitt. *M. Ind. or.* p. 43.
Gr. gracilis Schleich. *Cent. III Crypt. Helv. n.* 14; *Brid. op. cit.* p. 170.
Gr. Schleicheri Spreng. *Einleit. in d. Stud. d. Krypt. Gew.* p. 277, t. 7, f. 59.
Gr. stricta Turn. *Muscol. Hib.* p. 20, t. 2, f. I.
Gr. trichodon Brid. *op. cit.* p. 171.
Schistidium apocarpum var. gracile *Bryol. l. et t. cc.*
Sch. gracile Limpr. *Deutschl. Laubm.* I, p. 705.
Ut typ. — *Eur.* : Reg. mont. et subalp., præcip. calc. *As.* : Himalaya, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : New Brunswick, Gaspes., lac. Super., *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, Oregon, Idaho, Calif., Terr. nov., reg. or.
Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 86.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 199.
 Un. itin. 1867, n. 94.
- « *var. latifolia* Berggr. *M. Spetsb. n.* 41 c et in *K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII*, n. 7, p. 48.
Rupic. — *Eur.* : Spitzberg, Scandin. sept. *Am. sept.* : Groenland.
var. mutica H. f. et W. — *Gr. mutica*.
var. pilifera Brid. — *Gr. pilifera*.
var. platyphylla Lindb. — *Gr. platyphylla*.
var. pruinosa Husn. — *Gr. pruinosa*.
- « *var. pumila* W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 243.
Ut typ. — *Eur.* : Alp. præcip. zon. septentr..
- « *var. rivularis* (Schwaegr.) Schk. *l. c. f. m. n.*; *C. M. (excl. syn.) et W. P. Sch.* ll. cc.
Gr. apocarpa Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 54.
Gr. rivularis Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 96, t. 23; *Brid. Bryol. unic.* I, p. 166.
Schistidium apocarpum var. rivulare *Bryol. eur. l. et t. cc.*
Ad rivul. in sax. scæp. submers. — *Eur.* : Passim. *Am. sept.* : Groenland, sin. Hudson, New Brunswick, Gaspes., lac. Super., reg. sept. occ., *M. Rupestr.*, *Columb.*, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Wyoming, reg. sept.
Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 87.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 857.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 200.
var. Schleicheri Brid. — *Gr. apocarpa var. gracilis*.
- « *var. stricta* *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 132.
 — *Afr.* : Orange.
var. stricta } Drumm. — *Gr. apocarpa*.
 } Mitt. — *Gr. apocarpa var. gracilis*.
var. H. f. et W. — *Gr. amblyophylla*.

(1) Cf. Geheeb in *Rev. bryol.* 1879, p. 15.

- apocarpa* { Drumm. — *Gr. apocarpa* var. *rivularis*.
 Mitt. (1876). — *Gr. serrato-mucronata*.
apocaulos DC. — *Gr. apocarpa*.
apophysata Hpe. in *Jaeg. Ad. I*, p. 344 (nom.).
 — As. : Sikkim.
aquatica C. M. — *Rhacomitrium protensum*.
arborea Schrank. — *Cryphaea heteromalla*.
arctica C. M. in *Koldewey's Nord-Pol. Exp.* p. 73.
Gr. sulcata β *subimberbis* Lindb. ?
 — Eur. : Kaiser Franz Joseph's Fjord.
arcuata de Not. — *Rhacomitrium patens*.
arcuatifolia Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1889, p. 93.
 Ster. Rupic. — Am. sept. : Ins. Vancouver.
arenaria Hpe. — *Gr. curvula*.
argyrotricha C. M. in *Fl.* 1890, p. 485.
 Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.
Arizonae Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1892, p. 85.
 2. — Am. sept. : Arizona.
arvernica Philib. — *Gr. plagiopodia* var. *arvernica*.
asperula Sanio. — *Gr. elatior* var. *asperula*.
aterrima C. M. — *Rhacomitrium*.
atrata Mielich. et Hsch. in *Bot. Zeit.* II, p. 85; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 184; *Bryol. eur.* III (mon. p. 30), t. 261; C. M. *Syn.* I. p. 803; W. P. Sch. op. cit. p. 269.
Dryptodon atratus Limpr. *Deutschl. Laubm.* I, p. 791.
 2. Ad rup. schist. et talcac. humid. — Eur. : Norveg. (ster.), Nordland., Scot., Cambrovall., Pyren., Alp. Salisb., Stir., Carinth., Tirol., Helvet.; Sabaud. (Mont Blanc) ?
atrata Drumm. — *Gr. unicolor*.
atricha C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 65.
 1. Ad rup. decompos. — Am. sept. : Columb. brit.
atro-fusca W. P. Sch. op. cit. p. 240.
Gr. apocarpa var. *atro-fusca* Husn. *Muscol. gall.* p. 123.
Schistidium atro-fuscum Limpr. *Deutschl. Laubm.* I, p. 713.
 1. Rupic. — Eur. : Helvet. (M. Rigghi), Tirol., Stir., Salisburg.
atro-virens Sm. — *Barbula*.
aurasia Besch. *Cat. M. Alger.* p. 17.
 — Afr. : Alger. (M. Aurès).
austro-leucophaea Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LX et in *Miss. sc. Cap Horn*, V, Bot. p. 271.
 — Am. merid. : Fuegia.
austro-patens C. M. — *Rhacomitrium austro-georgicum*.
basaltica Mitt. in *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 425.
 1. Ad rup. basalt. — Pac. : Nov. Zeland. med.
bifrons de Not. *Cron. d. Briol. ital. et Epil.* p. 702.
 — Eur. : M. Sardin. centr.
bohémica Schk. — *Gr. Doniana*.

catenulata W. et M. — Pseudo-Leskea.

caucasica C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 421.

2. — As. : Caucas.

cavifolia Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 103.

2. Ad rup. granit. — As. : Jenissei sup.

cernua Bryol. germ. — Gr. funalis.

chloroblasta Kindb. in *Mac. Cat.* p. 64.

Gr. coscinodontes *ej.* in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 271.

1. Ad rup. sicc. — Am. sept. : Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 416.

chlorocarpa Mitt. — Rhacomitrium.

chrysoblasta C. M. — Rhacomitrium.

chrysoneura C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise...* p. 25.

1. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.

cinclidodonteia C. M. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

1. Ad rup. irror. — Am. sept. : Washington.

cirrata Sm. — Dicranoweisia.

coloradensis Aust. in *Coult. Bot. Gaz.* II, p. 109; *Lesq. et Jam. Man.* p. 143.

1. — Am. sept. : Colorado.

commutata Hüb. *Muscol. germ.* p. 185; *Bryol. eur.* III (mon. p. 25), t. 256; W. P. Sch. *op. cit.* p. 263.

Bryum brevicaule Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 871.

Br. ovale Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 35.

Campylopus curvifolius Brid. *Mant. M.* p. 78.

C. ovatus *ej.* *op. cit.* p. 76.

Dicranum durum Lag. *Ann. d. Cienc. nat.* IV, p. 177.

D. ovale Hedw. *Sp. M.* p. 140.

D. ovatum *ej.* M. *frond.* III, p. 81, t. 31.

Dryptodon curvifolius Brid. *Bryol. univ.* I, p. 201.

Dr. ovatus *ej.* *op. cit.* p. 202.

Gr. elliptica Funk *Moostachb.* p. 16, t. II.

Gr. incana ♂ Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 323 (quoad n. 281).

Gr. ovalis Lindb. M. *Scand.* p. 30.

Gr. ovata H. et T. *Muscol. brit.* p. 39, t. 13.

Gümbelia elliptica Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 124.

G. ovalis C. M. *Syn.* I, p. 774.

Trichostomum ovatum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 110.

2. Ad rup. quartz. et porphyr. sicciss. — Eur. : Reg. campestr. et mont. infer., arctic. except. As. : Kashmir, Himalaya, Tibet, Kurdistan., Pers., Caucas. Af. : Alger., Madeir. Am. sept. : M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, Wisconsin, Calif.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 509.

Mandon M. *Mad.* n. 8 bis.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 560, 680, 1129, 1320.

commutata { Mac. p.p. — Gr. ovata.

{ Wils. — Gr. khasiana.

comosa Dz. et Mk. — *Garckea phascoides*.

compacta Schleich. — *Dicranoweisia*.

conferruminata Wallr. in *Linna.* 1840, p. 683; C. M. *Syn.* I, p. 809.

Ster.

— Eur. : Hércyn.

conferta Funk *Moostaschb.* p. 18, t. 12; W. P. Sch. *Coroll.* p. 45 et *op. cit.* p. 239.

Gr. apocarpa δ *conferta* C. M. *Syn.* I, p. 777.

Gr. fusca *Bryol. germ.* II, I, p. 120, t. 19 p.p.

Gr. glacialis *eor.* p. 119.

Gr. latifolia *Brid. Bryol. univ.* I, p. 162.

Schistidium confertum *Bryol. eur.* III (mon. p. 7), t. 232.

1. *Rupic.* — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in alp. *As.*: Pers., Caucas. occ. et centr. *Afr.*: Abyss. *Am. sept.*: Anticosti, Nov. Scot., New Brunswick, Gaspesia, Ontario, Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Idaho, Wyoming, reg. sept. et or.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 84.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 562.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 201.

« *var. compacta* Lesq. et Jam. *Man.* p. 135.

Ut typ. — *Am. sept.*: Lac. Super.

« *var. obtusifolia* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 200 et II ed. p. 240.

Ut typ. — *Eur.*: Loc. umbros. humidior. *Am. sept.*: M. Rupestr., Idaho, reg. sept. or.

Exs.: Sull. et Lesq. l. c. n. 202.

var. pruinosa Braithw. — *Gr. pruinosa*.

« *var. urceolaris* (*Bryol. germ.*) W. P. Sch. *ll. cc.*

Gr. urceolaris *Bryol. germ.* II, I, p. 121.

Ut et cum *proced.* in *Eur.*

comata Kaulf. — *Pottia lanceolata*.

conostoma Sm. — *Conostomum boreale*.

consobrina Kze. in *Poepp. Pl. Chil.*; C. M. *Syn.* I, p. 785.

2. — *Am. merid.*: And. Chil. austr.

contermina C. M. — *Rhacomitrium*.

contorta (Wahlenb.) W. P. Sch. *ll. cc. pp.* 209 et 252.

Campylopus contortus *Brid. Mant. M.* p. 74.

Dicranum contortum Wahlenb. *Fl. Carpath.* p. 348, t. 4.

Dryptodon contortus *Brid. Bryol. univ.* I, p. 199.

Gr. incurva *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 90, t. 97; C. M. *Syn.* I, p. 788.

Gr. uncinata Kaulf. in *Sturm Deutsch. Fl. crypt. fasc.* 15; *Bryol. eur.* III (mon. p. 19), t. 248.

2. Ad saxa silic. — *Eur.*: Spitzberg, Lappon., Norveg. or., Scot., German. centr., Sudet., Carpath., Voges., Arvern., Pyren., Larium. *As.*: Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Groenland, Columb. brit., Calif.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 1205.

controversa W. et M. — *Weisia viridula*.

convoluta C. M. — *Rhacomitrium*.

coscinodontes Kindb. — *Gr. chrysoblata*.

Cossoni Besch. *Cat. M. Alger*, p. 18.

— *Afr.*: Alger.

crassa C. M. in *Jaeg. Ad.* I p. 360.

— *Afr.*: C. B. Sp.

crassa Spreng. — *Barbula muralis var. incana*.

crassifolia Lindb. in *Broth. Enum. M. Cauc.* p. 84.

Ster. Ad rup. calcar. — *As.*: Caucas. occ.

crassinervia (C. M.) Par.

Gr. maritima Mac. *Canad. M.* n. 88.

Gümbelia *crassinervia* C. M. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

1. — *Am. sept.*: Columb. brit., fret. Behring, ins. Vancouver.

cribrosa Hedw. — *Coscinodon pulvinatus*.

crinita Brid. *Mant. M.* p. 32 et *Bryol. univ. I*, p. 163; *Bryol. eur. III* (mon. p. 10), t. 237; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 246.

Gümbelia *crinita* Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 124; C. M. *Syn. I*, p. 771.

Gymnostomum decipiens W. et M. *Bot. Taschb.* p. 79.

1. In cemento calc. mur. — *Eur.*: Præcip. merid. — *Afr.*: Alger. *Exs.*: Rab. *Bryoth. eur.* n. 50, 511.

α *var. elongata* W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 205 et *II*, p. 247.

Gr. capillata de Not. *Mant. M. ad Fl. Pedem.* p. 40.

Ad mur. humidior. — *Eur.*: Gall. merid., Sardin. *Afr.*: Alger.

var. Garov. — Gr. *tergestina*.

crinito × *leucophaea* Card. in *Rev. bryol.* 1890, p. 18.

Ad rup. granit. — *Eur.*: Gall. centr. (Arvern.).

crispa Roth. — *Weisia viridula*.

crispata { Hook. — *Ptychomitrium*.
Roth. — *Rhabdoweisia fugax*.

crispatula Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 499.

2. Ad saxa irror. — *Pac.*: Austral. or.

crispipila C. M. — *Rhacomitrium*.

crispula { C. M. — *Rhacomitrium*.
Sm. — *Dicranoweisia*.

cucullatifolia Mitt. — *Rhacomitrium*.

cupularis C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise...* p. 26.

1. Rupic. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

curvirostris W. et M. — *Didymodon rubellus*.

curvula *Bryol. eur. III* (mon. p. II), t. 238; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 249.

Gr. *arenaria* Hpe. in *Linn.* 1835-36, p. 404; C. M. *Syn. I*, p. 784.

Gr. *incurva* Schleich. in sched.

Gr. *Zahlbrückneri* Garov. *Bryol. austr.* p. 26.

1. Ad rup. schist. et aren. — *Eur.*: Hercyn., Carinth., Tirol., Helvet. Gall. occ., Pyr., Ital. super.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 614.

curvula Husn. (*M. Gall.*). — Gr. *orbicularis var. longipila*.

cyathocarpa (Hpe.) Par.

Gümbelia *cyathocarpa* Hpe. in *Linn.* 1874, p. 515.

2. Ripar. videtur. — *Pac.*: Austral. or.

cygnicolla Tayl. — Gr. *pulvinata var. obtusa*.

cylindrica { Bryol. germ. — Gr. *ovata var. cylindrica*.
C. M. — *Rhacomitrium*.
W. et M. — *Anomodon longifolius*.

Daviesii Turn. — *Glyphomitrium*.

decipiens Lindb. — Gr. *Schultzii*.

densa Kindb. — Gr. *depilata*.

defoliata C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise...* p. 29.

Ster. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.

depilata *Kindb. in Mac. Cat.* p. 69.

Gr. densa ej. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 271.

2. Rupic. — Am. sept. : Ins. Vancouver.

depilis C. M. *Syn. I*, p. 778.

1. — Afr. : C. B. Sp.

depressa C. M. in *Fl.* 1885, p. 421.

2. Cortic. et lignic. — Am. merid. : Fuegia.

« var. terrestris C. M. l. c.

In glareos. marit. — Am. merid. : Ibid.

Dicksoni Sm. — *Dicranoweisia cirrata*.

didyma Mont. — *Rhacomitrium*.

Doniana Sm. *Fl. brit. III*, p. 1198 ; W. P. Sch. *Coroll.* p. 48 et op. cit. p. 259.

Gr. bohémica Schk. in *Brid. Bryol. univ. I*, p. 176.

Gr. obtusa Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 88, t. 25 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 174 ; *Bryol. eur. III* (mon. p. 20), t. 249 ; C. M. *Syn. I*, p. 796.

1. Ad rup. quartz. — Eur. : E reg. mont. super. usq. in supraalp. praecip. zon. interm. et sept. : Spitzberg. As. : Penins. Tschutschica, Kamschatka, Caucas. or. Am. sept. : Alberta, Washington, Idaho, M. Alb.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 271 et b, 858, 1316.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* 11 ed. n. 216.

« var. curviseta Lesq. et Jam. *Man.* p. 142.

— Am. sept. : M. Cascade, Calif.

« var. elongata W. P. Sch. *ll. cc.*

Gr. obtusa var. elongata *Bryol. eur.* l. c.

Ut et cum typ. in *Eur.*

« var. sudetica W. P. Sch. *ll. cc.*

Gr. *Doniana* *Brid. op. cit.* p. 175.

Gr. obtusa var. sudetica *Bryol. eur.* l. c.

Gr. *Doniana* Schwaegr. l. c. p. 87.

Ut et cum typ. in *Eur.*

Doniana *Brid.* — Gr. *Doniana* var. sudetica.

Drummondii H. f. et W. — *Glyphomitrium*.

dura C. M. — *Rhacomitrium*.

Duseni (C. M.) *Par.*

Gümbelia Duseni C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 320.

— Afr. : M. Cameroon.

Eckloni *Spreng. Syst. veg. IV, II*, p. 321 ; C. M. *Syn. I*, p. 787.

1. Saxic. — Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 133, 491.

elatio *Bryol. eur. III* (mon. p. 17), t. 245 ; C. M. *Syn. I*, p. 798 ; W. P. Sch. op. cit. p. 258.

Dryptodon incurvus *Brid. Bryol. univ. I*, p. 194.

Gr. funalis var. robusta de Not. *Syll. et Epil.*

Rhacomitrium incurvum *Hüb. Muscol. germ.* p. 201.

Trichostomum funale *Hsch. Crypt. Cent. I*, Dec. 4.

Tr. incurvum ej. in *Fl.* 1819, p. 89.

2. Ad rup. quartz. — *Eur.*: Scandin., Alp. Helvet., German., Pyren.; deest in Britann., Voges., Silva Nigra. *As.*: Obi, Alatau, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Groënland, M. Rupestr.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 618 et b.

Un. itin. 1863, n. 34.

elliptica { C. M. — Rhacomitrium.
Funk. — Gr. commutata.

elongata Kaulf. in Sturm Deutschl. Fl. crypt. II, p. 15; Brid. Bryol. univ. I, p. 179; Bryol. eur. III (mon. p. 28), t. 259; C. M. Syn. I, p. 792; W. P. Sch. op. cit. p. 268.

Gr. orientalis Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 323.

Gr. sessitana Rab. Bryoth. eur. n. 117.

2. Ad rup. humid. — *Eur.*: Scot., Alp. Norveg., Stir., Rhœt., Sabaud. (M. Blanc), Vall. Tell., Tirol. merid. *As.*: Sikkim, Caucas. occ. *Am. sept.*: Groenland.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 616.

« var. patula Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.

Ad rup. sicc. — *Eur.*: Alp. Tirol.

emersa C. M. — Rhacomitrium.

ericoides { Brid. — Rhacomitrium microcarpon.
Lindb. — Rhacomitrium canescens var. ericoides.

var. canescens Lindb. — Rhacomitrium canescens.

var. robusta Lindb. et Arn. — Rhacomitrium canescens var. robusta.

falcata Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 540 et in Fl. antarct. II, p. 400, t. 151, f. 8; C. M. Syn. I, p. 782 et II, p. 655.

2. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

fascicularis C. M. — Rhacomitrium.

fasciculata Brid. — { Gr. apocarpa.
Orthotrichum.

filiformis W. et M. — Pterigynandrum.

flaccida { Lindb. — Gr. sphaerica.
Royle. — Oreoweisia laxifolia.

flexicaulis C. M. in Linn. 1880-83, p. 454.

1. — *Am. merid.*: Alp. Argentin. subtropic.

flexifolia Hpe. in Linn. 1859-60, p. 632.

— *Pac.*: Austral. or.

flexipilis Lindb. in Broth. Enum. M. Cauc. p. 92.

1. Ad saxa silic. — *As.*: Caucas. centr.

flexiseta W. P. Sch. in Jardin Enum. p. 19 (nom.).

— *Am. sept.*: Calif. (S. Francisco).

flexuosa Griff. — Garckea phascoides.

fontinaloides Hook. — Hydropogon.

Forsteri Sm. — Zygodon.

fragilis W. P. Sch. Syn. II ed. p. 257.

2. Ad rup. granit. — *Eur.*: Lusitan.

fragilis W. et M. — Eucladium verticillatum.

frondosa Jam. in Bull. U. Stat. nat. Mus. III, p. 25.

— *Afr.*: Ins. Kerguelen.

fuliginosa W. P. Sch. in C. M. Syn. I, p. 778.

2. — *Am. sept.*: Mexic. (M. Orizaba).

funalis (Schwaegr.) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 211 et II ed. p. 254.

Campylopus funalis Brid. Mant. M. p. 75.

Dryptodon funalis ej. op. cit. p. 193.

Dr. spiralis ej. Bryol. univ. I, p. 771.

Gr. cernua Bryol. germ. II, I, p. 174, t. 24.

Gr. spiralis H. et T. in Druvnm. M. Scot. V, 2, n. 29; Bryol. eur. III (mon. p. 14), t. 242; C. M. Syn. I, p. 789.

Rhacomitrium funale Hüb. Muscol. germ. p. 200.

Trichostomum funale Schwaegr. Suppl. I, I, p. 150, t. 37.

Tr. patens β funalis H. et T. Muscol. brit. p. 60.

2. Ad rup. silic. — Eur.: Reg. subalp. et alp. As.: Alatan, Caucas. Afr.: Alger., ins. Canar. Am. sept.: Fret. Smith, Wyoming. Pac.: Tasman.

Exs.: Bourg. Pl. Canar. n. 232.

Rab. Bryoth. eur. n. 466.

Un. itin. 1863, n. 30, 31.

« var. epilosa Zett. Grimm. et Andr. exs. n. 11 et Rev. Grimm. Scand. p. 74.

Gr. imberbis Kindb.

Ut typ. — Eur.: Scandin., Riesengeb., Salisb., Stir.

« var. laxa W. P. Sch. ll. cc.

Ut typ. — Vall. Tellin.

var. robusta de Not. — Gr. elatior.

funalis { Bryol. eur. — Gr. Schultzii.
Wils. { — Gr. inflectens.
 { — Gr. nepalensis.

fusca Bryol. germ. p.p. — { Gr. apocarpa.
 { Gr. conferta.

fuscescens Mitt. — Rhacomitrium.

fusco-lutea Hook. M. ex. II, p. 9, t. 63; Brid. Bryol. univ. I, p. 188; C. M. Syn. I, p. 790.

1. — Am. sept.: Mexic.

Ganderi Limpr. Einig. neue Art. in LXI Jahresb. d. Schl. Gesells. p. 215.

1. Ad rup. schistos. — Eur.: Tirol., Pinzgov. (1).

geniculata Schwaegr. — Campylosteleum saxicola.

genuflexa C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 81 et in Forschungsreise... p. 29.

2. Aquat. ? — Afr.: Ins. Kerguelen.

Giberti Mitt. M. austr. am. p. 100.

— Am. merid.: Brasil., Monte Video.

gigantea W. P. Sch. — Geheebia cataractarum.

glacialis { Bryol. germ. — Gr. conferta.
 { C. M. — Rhacomitrium.

glyphomitrioides Bals. et de Not. — Ptychomitrium pusillum.

gracilis Schleich. — Gr. apocarpa var. gracilis.

Haliakalae Reichdt. Beitr. p. 567.

Ster. Ad rup. vulcan. — Pac.: Ins. Hawai.

hamulosa Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 14; Lesq. et Jam. Man p. 139.

2. In sabul. — Am. sept.: Calif.

(1) Gebhardi Spreng. in Steud. Nom. crypt. p. 189, in Syst. veg. omissa, et in ej. herbar. defic. — ? Deleatur. (C. M. Syn. I, p. 810).

Hartmani W. P. Sch. Syn. I ed. p. 214 et II ed. p. 258.

Dryptodon Hartmanni Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 789.

Gr. incurva Hartm. Skand. Fl. VI ed., p. 407.

Gr. montenegrina Breidl. et Szysz. in Mem. Acad. Cracov. XIX.

2. Rariss. fructif. Ad saxa quarz. umbros. Eur. : Reg. montan. As. :
Caucas. occ. et centr.

Ess. : Rab. Bryoth. eur. n. 465 a, b, c, 510, 682 a, b.

Hausmanniana de Not. Cron. in Comment. II, p. 101 et Epil. p. 694.

1. — Eur. : Tirol. (Bautzen).

helvetica Schleich. — Gr. apocarpa var. alpicola.

Hendersoni Ren. et Card. in Rev. bryol. 1892, p. 86.

— Am. sept. : Oregon.

heteromalla W. et M. — Leptotrichum homomallum.

heterophylla Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 271 (nom.) et in
Mac. Cat. p. 64.

1. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit.

heterosticha C. M. — Rhacomitrium.

var. alopecura C. M. — Rhacomitrium heterostichum var. alopecurum.

var. gracilescens C. M. — Rhacomitrium heterostichum var. gracilescens.

himalayana Mitt. — Rhacomitrium.

Hoffmanni C. M. p.p. } — Gr. aethiopica.
 } — Gr. sphaerica.

Holleri Mdo. in Fl. 1867, p. 40; W. P. Sch. op. cit. p. 250.

1. Ad rup. gneiss. — Eur. : Alp. Helvet., Salisburg., Carinth., Tirol.

homomalla Sm. — Leptotrichum.

Hookeri Drumm. — Ptychomitrium incurvum.

humilis Mitt. M. austr. am. p. 100.

1. — Am. merid. : Patag. austr.

hyalino-cuspidata C. M. — Rhacomitrium.

hypnoides Lindb. — Rhacomitrium lanuginosum.

imberbis Kze. hb.; C. M. Syn. I, p. 788.

2. Rupic. — Am. sept. : Mexic. Am. merid. : Chil. austr.

imberbis Kindb. — Gr. funalis var. epilosa.

immergens C. M. in Fl. 1890, p. 483.

Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.

immerso-leucophaea (C. M.) Par.

Gümbelia immerso-leucophaea C. M. Bryol. austr. Georg. p. 41.

2. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georg.

incana ♂ Wils. — Gr. commutata.

inclinata Sm. — Distichium.

inconspicua Bert. — Fabronia pusilla.

incurva { Bryol. eur. — Gr. Mühlenbeckii.
 { Hartm. — Gr. Hartmanni.
 { Mühlenb. — Ptychomitrium.
 { Schleich. — Gr. curvula.
 { Schwaegr. — Gr. contorta.

inflectens Mitt. M. Ind. or. p. 43.

Gr. funalis Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 323.

1. — As. : Nepal.

insularis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 73.

1. — *Afr.* : Ins. Heard, Kerguelen.

integridens C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 460.

2. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic. Tucum.

intermedia Ferg. — Gr. *Ungeri*?

khasiana Mitt. *op. cit.* p. 45.

Gr. *commutata* Wils. *op. cit.* p. 324.

Ster. — *As.* : Khasia.

Jacquini Garov. — Gr. *sulcata*.

Jamesii Aust. — Gr. *montana* var. *truncata*.

japonica Dz. et Mk. — *Rhacomitrium*.

julacea Hsch. — *Acrocryphaea*.

Kidderi James in *Bull. U. St. nat. Mus.* III, p. 25.

— *Afr.* : Ins. Kerguelen.

laevidens Broth. *Enum. M. Cauc.* p. 88.

1. Ad saxa silic. — *Am. merid.* : Caucas. occ.

laevigata { Brid. — Gr. *leucophaea*.
Mitt. — *Rhacomitrium*.

lamellosa C. M. — Gr. *alpestris*.

lamprocarpa C. M. — *Rhacomitrium*.

lanceolata W. et M. — *Pottia*.

lanuginosa { C. M. — *Rhacomitrium*.
Mitt. (1876). — *Rhacomitrium chrysoblastum*.

latifolia { Brid. — Gr. *conferta*.
W. et M. — *Pottia*.
Zett. (fid. Ren. et Card.). — Gr. *platyphylla*.

laxa C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 801.

Gümbelia laxa ej. *Syn.* I, p. 771 et II, p. 649.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

laxifolia Hook. — *Oreoweisia*.

Leibergii Par.

Gr. *pachyphylla* Lindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1893, p. 113.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Idaho.

leiocarpa Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 44; Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 498.

Gr. *leucophaea* β *subrotunda* Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 449;
C. M. *Syn.* I, p. 794.

2. — *Pac.* : Austral. or.

leucophaea Grev. in *Trans. of the Linn. Soc.* IV, t. 6, et *Scot. crypt. Fl.* t. 284; *Bryol. eur.* III (mon. p. 23), t. 257; C. M. *Syn.* I, p. 794;
W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 261.

Campylopus laevigatus Brid. *Mant. M.* p. 76.

Dryptodon leucophaeus ej. *Bryol. univ.* I, p. 773.

Gr. *campestris* Burch. in *Hook. M. ex. t.* 129 p.p.; Lindb. *M. Scand.* p. 30.

Gr. *laevigata* Brid. *op. cit.* p. 183.

Gr. *(Ertzeniana)* Schultz in *Syll. Ratisb.* 1828, p. 134.

Gr. *subfusca* Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 323.

2. Ad rup. granit., porphyr. et quartz. — *Eur.* : Reg. *campestr. mont.*
zon. *præcip. merid.* *As.* : Khasia, Pers., Caucas. *Afr.* : *Mediterr.*

ins. Canar., Kilima N'Djaro, C. B. Sp. Am. sept.: Reg. orient., centr. et merid., Washington, Oregon, Montana, Wisconsin, Idaho, Kansas, Calif., etc. Pac.: Tasman., Austral. or.

Exs.: Bourg. Pl. Canar. n. 26.

Drumm. M. bor. am. II ed. n. 31.

Rab. Bryoth. eur. n. 185, 920, 1329, 1382.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 212.

var. *epilosa* Warnst. — Gr. leucophaea var. *latifolia*.

* var. *latifolia* Limpr. Bryoth. siles. n. 163 et Laubm. Deutschl. I, p. 742.

Gr. leucophaea var. *epilosa* Warnst. Moosfl. prov. Brandenb. p. 47.

Rupic. — Eur.: Brandenburg, Riesengeb.

leucophaea { C. M. p.p. — Gr. campestris.
Hsch. — Gr. Schiedeana.
W. P. Sch. — Gr. subleucophaea.

var. *subrotunda* Wils. — Gr. leiocarpa.

leucophaeola C. M. in Linn. 1880-83, p. 456.

2. — Am. merid.: Alp. Argentin. Tucuman.

Lisae de Not. — Gr. trichophylla var. *meridionalis*.

longirostris Hook. M. ex. t. 62; Brid. Bryol. univ. I, p. 182; C. M. Syn. I, p. 795; Mitt. M. austr. am. p. 101.

Gr. peruviana Sull. in U. St. Expl. Exped. 1859, p. 8, t. 5.

1. Saxic. — Am. merid.: And. Peruv. et Boliv.

Exs.: Mandon Pl. Boliv. n. 1631.

Lorentziana (C. M.) Par.

Gümbelia *Lorentziana* C. M. in Linn. 1880-83, p. 450.

1. — Am. merid.: Argentin. Tucum. subtropic.

Lubdomedae Rab. — Gr. subtumida.

lurida Wils. { — Gr. ovata.
— Gr. ovata var. *affinis*.

Mac Leana Rehm. M. Afr. austr. n. 493.

— Afr.: C. B. Sp. or.

macrotheca Mitt. M. Ind. or. p. 44.

Gr. oblonga Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 323.

1. — As.: Sikkim.

mammillaris Poech. — Gr. orbicularis.

Manniae C. M. in Fl. 1887, p. 223.

2. Ad rup. sicc. — Am. sept.: Columb. brit., Calif.

maritima Turn. Muscol. Hib. p. 23, t. 3; Brid. Bryol. univ. I, p. 164; C. M. Syn. I, p. 781; W. P. Sch. Coroll. p. 46 et Syn. II ed. p. 244.

Gr. alpicola β *maritima* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 320.

Gr. rigida Brid. op. cit. p. 768.

Schistidium *maritimum* Bryol. eur. III (mon. p. 10), t. 235.

1. Ad scopul. silic. marit. — Eur.: Ins. Urior., Scandin., Britann., Armoric. Am. sept.: Terr. nov., ins. Miquelon, Massachusetts.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 183, 1081.

maritima Mac. — Gr. crassinervia.

membranacea Mitt. — Rhacomitrium.

microcarpa C. M. p. p. { — Rhacomitrium.
— Rhacomitrium sudeticum.

micromitria W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1632.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

microtricha C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 70.

1 et 2. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

minuta C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise...* p. 30.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

minutifolia C. M. in *op. cc. pp.* 81 et 27.

Ster. Rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

mollis *Bryol. eur.* III (mon. p.), t. 253 ; C. M. *Syn.* II, p. 656 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 266.

Gr. orthotrichoides Hartm. *Skand. Fl.* V ed., p. 378.

2. Ad rup. et sax. humid. — *Eur.* : Lappon., Alp. Norveg. *Am. sept.* : Groenland.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 464, 512.

Un. itin. 1863, n. 38.

« *var. aquatica* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 222 et II ed. l. c.

In lacun. rup. et ad rivul. niv. — *Eur.* : Alp. Norveg., Val. Tell., Rhaet., summ. Pyr., Sierra Nevada. *As.* : Caucas. occ.

Exs. : Un itin. 1863, n. 37.

montana (Hpe.) *Bryol. eur.* III (mon. p. 26), t. 250 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 264.

Gümbelia montana Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 124 ; C. M. *Syn.* I, p. 774.

2. Ad rup. aren. granit. et porphyr. — *Eur.* : Scand., Westphal., Hassia, Tatra, Stiria, Carinth., Tirol., Helvet., Vall. Rhen., Gall. occ. *Am. sept.* : Groenland, M. Rupestr., Columb. brit., Oregon, Montana, Wyoming, Idaho, Nevada, M. Calif.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 509.

Rab. Bryoth. eur. n. 183, 563, 1318.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 215.

« *var. brachyodon* (Aust.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 145.

Gr. brachyodon Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 45.

Ut typ. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Idaho.

« *var. truncata* Lesq. et Jam. l. c.

Gr. Jamesii Aust. l. c.

Gr. orbicularis James in *Bot. King's Exped.* p. 403.

Ut typ. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

montenegrina Breidl. et Szysz. — Gr. Hartmani.

Mühlenbeckii W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 212 et II ed. p. 255.

Campylopus pulvinatus var. tenuis Wahlenb. *Fl. Suec.* I ed., p. 748 et II, p. 776.

Dryptodon Schultzii Hartm. *Skand. Fl.* IV ed. p. 373, n. 4 (p.p. ? fid. Lindb.).

Gr. incurva *Bryol. eur.* III (mon. p. 15), t. 243 ; Hartm. *Skand. Fl.* V, VI et VII ed. p.p.

Gr. Hartmani W. P. Sch. *Coroll.* p. 47 p.p. (fid. Lindb.).

Gr. rugulosa Lindgr. in sched. et Lindbl. in *Bot. Not.* 1845, p. 88 (sine diagn.).

Gr. trichophylla Hartm. *Skand. Fl.* V-IX ed. p.p. ?

Gr. trichophylla var. *Mühlenbeckii* Husn. *Muscol. gall.* p. 135.

Gr. trichophylla var. *septentrionalis* W. P. Sch. *Coroll.* p. 47 et *Syn.* I ed. p. 213.

2. Ad rup. aren. et granit. — *Eur.*: Reg. mont. et subalp.: Scand. med., Tirol., Voges., Alp. *Am. sept.*: Terr. nov., M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, M. Calif.

Ews.: Rab. Bryoth. eur. n. 1012, 1206.

Un. itin. 1863, n. 15?, 32, 33.

Mühlenbergii P. B. — *Ptychomitrium incurvum*.

mutabilis Opitz. — *Lescuraea striata*.

mutica Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 631.

Gr. apocarpa β *mutica* H. f. et W. *Fl. N. Zeal.*?

— *Pac.*: Austral. or. (1).

neilgherriensis C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 62; *Mitt. M. Ind. or.* p. 44.

Gr. ovata *Mont.* in *M. Neilgh.* n. 54?

2. — *As.*: M. Neilgherr.

nepalensis *Mitt.* op. cit. p. 46.

Gr. funalis *Wils.* in *Kew Journ. bot.* IX, p. 323.

1. — *As.*: Nepal. or.

Nevii C. M. — *Rhacomitrium*.

nigricans Lam. et DC. — Gr. ovata.

nigrita { C. M. — *Rhacomitrium*.
Sm. — *Catoscopium*.

nigro-viridis H. et T. — Gr. apocarpa.

nivalis Kindb. — Gr. tenerrima.

nuda Turn. — *Discelium*.

n° 3 *Griff. Not.* p. 413. — *Bartramia*?

nutans *Br.* in *Fl.* 1829, p. 391.

— *As.*: Minor (Smyrn.).

obliqua *Bryol. germ.* — Gr. ovata var. *obliqua*.

oblonga { Schrank. — *Orthotrichum leiocarpum*.
Wils. — Gr. macrotheca.

obtusa { Brid. — Gr. plagiopodia.
Lindb. — *Rhacomitrium sudeticum*.
Schwaegr. — Gr. *Donniana*.

var. *elongata* *Bryol. eur.* — Gr. *Donniana* var. *elongata*.

var. *sudetica* *Bryol. eur.* — Gr. *Donniana* var. *sudetica*.

obtusata (*Hpe. et C. M.*) *Par.*

Gümbelia obtusata *Hpe. et C. M.* in *Linn.* 1853, p. 497.

1. — *Pac.*: Austral. felix.

obtusolinealis C. M. in *Fl.* 1890, p. 484.

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

occulta C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 38.

1. — *Am. merid.*: Austr. Georg.

ochracea C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise.* p. 30.

Gr. chlorocarpa *Mitt.*?

1. Rupic. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

Ertzeniana *Schultz.* — Gr. *leucophaea*.

(1) *nana* *Schleich.* in *Steud. Nom. crypt.* p. 189; C. M. *Syn.* I, p. 810. — ? *Deleatur.*

Olneyi Sull. *M. of U. St. p.* 37 et *Id. M. p.* 67, t. 42; *Lesq. et Jam. Man. p.* 142.
 2. Rupic. — *Am. sept.*: Ontario, Kansas, reg. or.
Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 141 et II ed. n. 209.

orbicularis *Bryol. eur. III (mon. p.* 13), t. 240; *W. P. Sch. op. cit. p.* 247.

Dryptodon obtusus Brid. *Bryol. univ. I, p.* 198 p.p.

Gr. africana de Not. Syll.

Gr. mammillaris Poech in *M. Bohem.*

Gümbelia orbicularis C. M. *Syn. I, p.* 775.

1. Ad mur. calcar. — *Eur.*: Reg. med. et merid. As.: Persia, Caucas.,
 As. minor. *Afr.*: Alger.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 316, 513, 1319.

« var. africana Besch. *Cat. M. Alger. p.* 17.

Ut typ. — *Afr.*: Alger.

« var. longipila Husn. *Muscol. gall. p.* 134.

Gr. curvula ej. *M. Gall. n.* 217.

Ut typ. — *Eur.*: Gall. sept. occ.

« var. Therioti Corbière in *Rev. bryol.* 1890, p. 21.

Ut typ. — *Eur.*: Gall. (Le Mans).

orbicularis James. — Gr. montana var. truncata.

orientalis Wils. — Gr. elongata.

ornithopodioides W. et M. — *Pterogonium gracile.*

orthotrichacea C. M. — *Rhacomitrium.*

orthotrichoides Hartm. — Gr. mollis.

ovalis Lindb. — Gr. commutata.

ovata Web. et Mohr *It. Suec. p.* 132, t. 2, f. 4; *Brid. Bryol. univ. I,*
p. 176; *Bryol. eur. III (mon. p.* 21), t. 54; *C. M. Syn. I, p.* 796;
W. P. Sch. op. cit. p. 260.

Dicranum ovatum Funk *Fasc. IV Crypt. n.* 86.

Gr. commutata Mac. *Canad. M. n.* 94 p.p.

Gr. lurida Wils. in *Kew Journ. bot. IX, p.* 44 p.p.

Gr. nigricans Lam. et DC. *Syn. Fl. Gall. n.* 1215? *Brid. op. cit. p.* 178.

Gr. patens *Bryol. germ. II, I, p.* 148, t. 21.

Gr. sciuroides *Ibid. p.* 155, t. 22.

Gümbelia bogotensis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser. III, p.* 375 et in *Linn.*
 1863. p. 143.

1. Saxic. — *Eur.*: E reg. montan. usq. in supraalp. As.: Penins.
 Tschutschica, Jenin. sup., Alp. Yunnan, Khasia, Sikkim, M.
 Neilgherr., Ceylan, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Groenland,
 Labrador, Ontario, lac. Super., M. Rupestr., Columb. brit., Idaho,
 Nevada occ., M. New Jersey, Guatemala. *Am. merid.*: And. Nov.
 Granat. et Quitens.

Exs.: Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 59.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 216, 1082.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 213.

« var. affinis (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur. l. c. t.* 255; *C. M. l. c.*; *W.*
P. Sch. l. c., p. 261.

Gr. affinis *Bryol. germ. II, I, p.* 142, t. 21; *Brid., op. cit. p.* 178.

Gr. affinis var. macrocarpa *ibid.*

Gr. affinis var. ramosissima *ibid.*

Gr. canescens Schleich. *Catal. pl. Helv.* 1807, n. 29.

Gr. lurida Wils. in *sched. n.* 285 p.p.

Gr. ovata γ canescens *Brid. op. cit. p.* 177.

Loc. irrig. — *Eur.*: Passim. As.: Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*:
 M. Rupestr., Nov. Mexic.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 214.

- « *var. cylindrica* (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur.*, *C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*
Gr. cylindrica Bryol. germ. l. c. p. 161, t. 23.
Locis umbr. vall. alp. in Eur.
- « *var. obliqua* (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur.*, *C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*
Gr. obliqua ibid. p. 153, t. 22; Brid. op. cit. p. 180.
Loc. sicciss., ventos. in Eur.
- « *var. subturbinata* *Brid. op. cit. p. 177.*
 — *As. : Kamschatka.*
- ovata* { *H. et T. — Gr. commutata.*
Mont. — Gr. neilgherriensis ?
Schrank. — Orthotrichum anomalum.
var. canescens *Brid. — Gr. ovata var. affinis.*
- pachyloma* *Mont. — Sciaromium.*
- pachyneurula* *C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 65.*
Ster. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit.
- pachyphylla* *C. M. in Fl. 1885, p. 422.*
 2. *Rupic. — Am. merid. : M. Fuegiae.*
- pachyphylla* *Leib. — Gr. Leibergii.*
- Panschii* *C. M. in Koldewey's Nord-Pol. Exped. p. 72.*
 — *Am. sept. : Ins. Sabine.*
- papillosa* *Kindb. — Gr. elatior. var. asperula.*
- parasitica* *Voit. — Seligeria recurvata.*
- patagonica* *Mitt. — Scouleria.*
- patens* { *Bryol. eur. — Rhacomitrium.*
Bryol. germ. — Gr. ovata.
- pensilvanica* *Schwaegr. — Gr. pilifera.*
- peruviana* *Sull. — Gr. longirostris.*
- Philibertiana* *D^{na} E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1891, p. 51.*
 2. *Ad rup. quartz. — Am. sept. : Idaho.*
- phyllantha* *Lindb. in Broth. Enum. M. Cauc. p. 83.*
Ster. Rupic. — As. : Caucas. occ.
- pilifera* *P. B. Prodr. p. 58; Brid. Bryol. univ. I, p. 173; C. M. Syn. I, p. 271.*
Gr. apocarpa β pilifera *Brid. Sp. M. I, p. 97.*
Gr. pensilvanica *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 21, t. 45; Sull. M. of U. St. p. 37 et Ic. M. p. 68, t. 43; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 56; Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 138 et II ed. n. 210.*
Weisia pilifera *Roehl. in Ann. Wett. Ges. p. 113.*
 2. *Rupic. — Am. sept. : Niagara, reg. or. et centr.*
- plagiopodia* *Hedw. Sp. M. p. 78, t. 15; Brid. Bryol. univ. I, p. 162; Bryol. eur. III (mon. p. 9), t. 236; C. M. Syn. I, p. 779; W. P. Sch. op. cit. p. 246.*
Coscinodon plagiopus *Spreng.*
Gr. obtusa *Brid. in Schrad. Journ. IV, p. 276.*
Gr. plagiopus *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 95.*
 1. *Ad rup. arenac. — Eur. : German. (vall. Saalae); Pyren. (fid. C. M.); deest. in Britann. et in Gall. As. : Caucas. Am. sept. : Alberta, Columb. brit., M. Rupestr., Missouri.*
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 126.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 204.

« *var. arvernica* Husn. *Muscol. gall.* p. 125.

Gr. arvernica Philib. in *Rev. bryol.* 1882, p. 24.

Muric. — *Eur.* : Gall. centr. (Arvernica).

« *var. pilifera* Lesq. et Jam. *Man.* p. 138.

Gr. Brandegei Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 45?

Ad rup. sicc. — *Am. sept.* : Columb. brit., Colorado, Missouri.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 511.

plagiopus Schwaegr. — *Gr. plagiopodia*.

platyphylla Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 20; Lesq. et Jam. *Man.* p. 136.

Gr. apocarpa var. platyphylla Lindb. in *Meddel...* 1886, p. 253.

Schistidium latifolium Zett. *Rev. Grimm.* p. 53 (fid. *Limpr., Ren. et Card.*).

1. — *Eur.* : Norveg., Tatra. *As.* : Jenissei. *Am.*

sept. : Fret. Davis, M. Rupestr.

plicata Opitz. — *Lescuraea striata*.

polyodon Ehrh. — *Gr. apocarpa*.

? *pomiformis* Brid. — *Syrhopodon*.

praemorsa (C. M.) Par.

Gümbelia praemorsa C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 452.

1. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. Catamarca.

procera Bals. et de Not. — *Rhacomitrium sudeticum*.

procumbens Mitt. in *Trans. and. Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 56.

Gümbelia procumbens F. v. Müller, *Frag. Phyt. Austral.* XI, Suppl. p. 114.

2. — *Pac.* : Austral. (Victoria).

prolifera C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 67.

Ster. — *Am. sept.* : Columb. brit.

pruinosa Wils. in *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 241.

Gr. apocarpa var. pruinosa Husn. *Muscol. gall.* p. 123.

Gr. conferta var. pruinosa Braithw. *Brit. Mossfl.*

1. Ad rup. basalt. — *Eur.* : Scotia. *Am. sept.* : Idaho.

pseudo-patens C. M. — *Rhacomitrium*.

pullulans Spreng. — *Trichostomum tenue*.

pulvinata (L.) Hook. et Tayl. *Muscol. brit.* p. 38, t. 13; *Bryol. eur.* III (mon. p. 12), t. 239; C. M. *Syn.* I, p. 783; W. P. Sch. op. cit. p. 248.

Afzelia pulvinata Ehrh. *Crypt.* p. 163.

Bryum orbiculare, pulvinatum, hirsutiae canescens, capsulis immersis Dill. *Hist. M.* p. 395, t. 50, f. 65.

Br. pulvinatum L. *Sp. pl.* p. 1586.

Campylopus pulvinatus Brid. *Mant. M.* p. 75.

Dicranum pulvinatum Schwaegr. *Suppl. I, I, t.* 189.

Dryptodon pulvinatus Brid. *Bryol. univ.* I, p. 196.

Fissidens pulvinatus Hedw. *Sp. M.* t. 58, f. 40.

Leersia pulvinata Hedw. *Fund. M.* I, t. 10, f. 65.

Trichostomum pulvinatum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 109.

1. In mur., tect., sax., rar. ad arb. — *Eur.* : Vulgatriss., arctic. except. *As.* : Pers., Caucas. occ. et centr. *Afr.* : Alger., ins. Azor., Abyss. *Am. sept.* : Columb. brit., Washington, Montana, Utah, Nevada, Idaho, Arizona, Calif. *Pac.* : Alp. Austral., Nov. Zeland., Tasman.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 90.

Rab. Bryoth. eur. n. 319 b, 1257.

W. Sch. M. Abyss. n. 465.

var. *africana* H. f. et W. — Gr. *pulvinata* var. *obtusa*.

« var. *asphaltica* Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 113.

— Afr.: Palaestina.

« var. *longipila* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 206 et II ed. p. 249.

Dicranum pulvinatum var. argentatum Turn. Musc. Hib. p. 78, t. 3, f. I?

Dryptodon pulvinatus var. argentatus Brid. op. cit. p. 197?

Præcip. calcic. — Eur.: Reg. sept., Stiria.

« var. *obtusa* (Brid.) Bryol. eur. l. c.; C. M. et W. P. Sch. II, cc.

Dryptodon obtusus Brid. op. cit. p. 198 p.p.

Fissidens pulvinatus β africanus Hedw. Sp. M. p. 159, t. 40.

Gr. cygnicolla Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 449.

Gr. pulvinata var. africana H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 75.

Ad saxa arenac. — Eur.: Cum typ. Afr.: Austral. Am. sept.: Columb. brit., Oregon, Idaho. Pac.: Austral., Nov. Zeland., Tasman.

« var. *viridis* W. P. Sch. Syn. I et II ed. II, cc.

Loc. humid.? — Eur.: Gall. centr. (Limoges), Luxembourg, Neu-mark.

pulvinatula C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 81 et in Forschungsreise... p. 27.

1. Rupic. — Afr.: Ins. Kerguelen.

pusilla Schrad. — Seligeria.

pygmaea C. M. Syn. I, p. 787.

Gr. africana Hpe. in Pl. Preiss. ed. Lehmann II, p. 116.

Gr. trichophylla var. australis ej. in Preiss. M. exs.

1. Rupic. — Pac.: Austral., Tasman.

quadricruris C. M. in Linn. 1880-83, p. 462.

1.

— Am. merid.: Argentin. subtropic. (1).

ramulosa Lindb. — Rhacomitrium microcarpum.

Rau Aust. — Coscinodon.

recurvata Hedw. — Seligeria.

recurvirostris Sm. — Didymodon rubellus.

redunca Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 323; Mitt. M. Ind. or. p. 43.

2?

— As.: Sikkim.

reflexidens C. M. Syn. I, p. 795; Mitt. M. austr. am. p. 101.

2.

— Am. merid.: Chil. austr.

? *retorta* Wils. — Hyophila rufescens.

rhapidostega C. M. in Linn. 1880-83, p. 459.

1.

— Am. merid.: Alp. Argent. Salt. subtropic.

rigida Brid. — Gr. maritima.

rivularis Schwaegr. — Gr. apocarpa var. rivularis.

robusta } Bryol. germ. — Gr. apocarpa.

} Ferg. — Gr. Schultzii.

(1) *ramosa* Schleich. in Steud. Nom. crypt. p. 189; C. M. Syn. I, p. 810. — ? Deleatur.

- rubella* Roth. — *Didymodon*.
- rufa* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise...* p. 27.
2. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- rugulosa* Lindgr. — Gr. *Mühlenbeckii*.
- rupestris* C. M. — *Rhacomitrium*.
- rupicola* W. et M. — *Blindia acuta*.
- sarcocalyx* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 271 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 66.
2. Rupic. — Am. merid. : Columb. brit.
- sardoa* de Not. — Gr. *trichophylla* var. *meridionalis*.
- saxatilis* Mitt. op. cit. p. 97.
Ad saxa aquat. — Am. merid. : And. Quitens.
- saxicola* H. et T. — *Campylosteleum*.
- Schiedeana* C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 765.
Gr. *leucophaea* Hsch. in *Deppe et Sch. M. Mexic.*
— Am. sept. : Mexic.
- Schimper* Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 584 ; C. M. *Syn.* I, p. 792.
2. — Afr. : Abyss.
- Schisti* { Engl. Bot. — *Blindia acuta*.
 { Sm. { (fid. C. M.). — *Cynodontium*.
 (fid. Limpr.). — *Dicranum fulvellum*.
- Schleicheri* Spreng. — Gr. *apocarpa* var. *gracilis*.
- Schubartiana* Ltz. — *Oreas Martiana*.
- Schultzii* (Brid.) Wils. *Bryol. brit.* p. 157, t. 44 ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 251.
Dryptodon Schultzii Brid. *Bryol. univ.* I, p. 199.
Gr. *decipiens* Lindb. in *Hartm. Skand. Fl.* VIII ed. p. 386.
Gr. *funalis* *Bryol. eur.* III (mon. p. 17), t. 247 ; C. M. *Syn.* I, p. 799.
Gr. *robusta* Ferg. mss. ; Braithw. in *Lond. Journ. of bot.* 1872, p. 196, t. 124.
Trichostomum decipiens Schultze. *Fl. Starg.* p. 70.
1. Ad saxa silic. — Eur. : Reg. campestr. montos. et montan., rar. subalpin. Afr. : Alger.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 561, 1256 et b.
- sciuroides* *Bryol. germ.* — Gr. *ovata*.
- Scouleri* C. M. — *Scouleria aquatica*.
- Seligeri* W. et M. — *Seligeria pusilla*.
- serrato-mucronata* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise...* p. 26.
Gr. *apocarpa* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876, n. 84?
1. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- sessitana* de Not. *Epil.* p. 704 (1).
Gr. *alpestris hybrida* Chalubinski Grimm. *Tatr.* p. 68 p.p.
Gr. *anceps* Boul. M. *Fr.* I, p. 271.
1. Rupic. — Eur. : Tatra, Salisb., Tirol., Helvet., Alp. Sabaud. (M. Blanc), Pedemont. As. : Caucas. occ. et centr.

sessitana Rab. — Gr. elongata.
silvatica Willd. — Ulota crispa.

sinaica (Hpe.) Bryol. eur. III (mon. p. 11).

Gümbelia sinaica Hpe. (1) in Bot. Zeit. 1846, p. 124; C. M. Syn. I, p. 772.

1. — As.: Persia. Afr.: M. Sinai.

speciosa C. M. — Rhacomitrium.

sphaerica W. P. Sch. Stirp. norm. 1844 et op. cit. p. 239.

Anodon pulvinatus Rab. Deutsch. Krypt. Fl.

Anoetangium flaccidum de Not. in Mem. Acad. Tor. 1836, p. 251.

A. pulvinatum Rochl. in Ann. Wett. Ges. II, p. 207.

Gr. flaccida Lindb. M. Scand. p. 30.

Gr. Hoffmanni C. M. Syn. I, p. 780.

Gymnostomum pulvinatum Hedw. Sp. M. p. 36, t. 3.

Schistidium pulvinatum Brid. Bryol. univ. I, p. 114; Bryol. eur. III (mon. p. 6, t. 231).

1. Ad rup. basalt. et silic. — Eur.: E reg. campestr. montos. usq. in subalp. in zon. intermed. As.: Caucas. occ. et centr. Afr.: Alger., Abyss. Am. sept.: Canada.

spiralis H. et T. — Gr. funalis.

splachnoides { Engl. Bot. — Dissodon.
 { Sm. — Tayloria tenuis.

Starkeana W. et M. — Pottia.

Stirtoni W. P. Sch. op. cit. p. 270.

Ster. Ad rup. basalt. — Eur.: Scot.

stolonifera C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 81 et in Forschungsreise... p. 28.

1. Rupic. — Afr.: Ins. Kerguelen.

streptophylla Sull. in Am. Expl. Exp. 1859, p. 8, t. 6.

1. — Am. merid.: And. Peruv.

streptophylla Kindb. — Gr. tortifolia.

striata { Hedw. — Orthotrichum leiocarpum.
 { W. et M. — Rhabdoweisia fugax.

stricta Turn. — Gr. apocarpa var. gracilis.

strictifolia Mitt. — Rhacomitrium.

strigosa Brid. — Gr. apocarpa.

stylostegia C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 80 et in Forschungsreise... p. 25.

1. Rupic. — Afr.: Ins. Kerguelen.

subcrispipila C. M. — Rhacomitrium.

subfusca Wils. — Gr. leucophaea.

subincurva Aust. in Coult. Bot. Gaz. III, p. 31; Lesq. et Jam. Man. p. 135.

Ster. — Am. sept.: ?

sublamprocarpa C. M. — Rhacomitrium.

subleucophaea C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 164.

Gr. leucophaea W. P. Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 472.

2. — Afr.: Abyss.

sublurida Stirt. — Rhacomitrium heterostichum var. slopecurum.

(1) Ex Hpe. ips. forsan forma depauper. Gr. leucophaeae.

subnigrita C. M. — *Rhacomitrium*.

suborthotrichacea C. M. — *Rhacomitrium*.

subovata W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1634.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

« *var. laevipila* ej. *l. c. n.* 1635.

— *Am. merid.* : Ibid.

subsecunda Mitt. — *Rhacomitrium*.

subsquarrosa Wils. in W. P. Sch. *Syn. II ed. p.* 270.

Ster. Ad rup. basalt. — *Eur.* : Scotia.

subsulcata Limpr. *Deutschl. Laubm. p.* 757.

Gr. alpestris Rab. *Bryoth. eur. n.* 1127.

Gr. alpestris hybrida Chalubinski Grimm. *Tatr. p.* 68 p.p.

1. Ad rup. silic. — *Eur.* : Norveg., Tatra, Stiria, Tirol. As. : Caucas., occ. et centr.

subtumida W. P. Sch. in *Jaeg. Ad. I, p.* 353.

Gr. Lubdomedae Rab. *Bryoth. eur. n.* 510.

2. Ad rup. aren. — *Eur.* : Transilvan.

sudetica Schwaegr. — Gr. *Donniana* var. *sudetica*.

sulcata Saut. in *Fl.* 1841, *I, p.* 39; *Bryol. eur. III (mon. p. 27), t.* 252; W. P. Sch. *op. cit. p.* 265.

Campylopus caespiticius Brid. *Mant. p.* 77.

Dryptodon caespiticius ej. *Bryol. univ. I, p.* 200 (! *fid. C. M.*; *vix, fid. W. P. Sch.*).

Gr. alpestris mutica de Not. *Syll. n.* 325.

Gr. caespiticia Jur. *Laubm. Oesterr. Ung. p.* 172.

Gr. Jacquini Garov. *Bryol. austr. exc.* 1840, *p.* 25 et *Cat. di alc. crittog.* 1837, *pp.* 7 et 25.

Gümbelia caespiticia C. M. *Syn. I, p.* 773.

2. In rup. schist. semidecomp. — *Eur.* : Alp. Salisb., Tatra, Morav., Stir., Carinth., Vall. Tell., Sabaud., Helvet., Arvern., Pyren. As. : Taimyr, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland.

var. *subimberbis* Lindb. — Gr. alpestris var. *subimberbis*.

sulcipila C. M. — *Rhacomitrium*.

sundaica Mitt. — *Rhacomitrium*.

symphyodonta C. M. } — *Rhacomitrium*.

} — *Rhacomitrium nigrum* (fid. Mitt.).

syntrichiacea C. M. *Bryol. austr. Georg. p.* 39.

Ster. Rupic. — *Am. merid.* : Austro-Georg.

tenella (C. M.) Par.

Gümbelia tenella C. M. in *Bot. Centralbl.* 1890, *n.* 51.

2. Ad rup. sicc. — *Am. merid.* : Columb. brit., Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 501.

tenera Zett. — Gr. *apocarpa* var. *filiformis*.

tenerrima Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, *p.* 40, *t.* 6 A.

Gr. nivalis Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club, XVII, p.* 271; *Mac. Canad. M. n.* 415.

1. ♂ ign. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit., Idaho.

tenuicaulis Hpe. (?) in *Jaeg. Ad. I, p.* 350.

— *Am. merid.* : Chile.

teretinervis *Limpr. Einig. neue Art...* p. 13.

? *Schistidium teretinerve* *ej. Deutschl. Laubm. I*, p. 717.

2. ♂ et fr. ign. Ad rup. calc. umbr. — *Eur.*: Austria super, Stir., Tirol., Helvet.

tergestina *Tomm. in Bryol. eur. III (mon. p. 24), t. 258; C. M. Syn. I*, p. 794; *W. P. Sch. op. cit.* p. 262.

Gr. crinita var. *Garov. M. Com. Dec. VII*.

2. Ad rup. calc. umbr. — *Eur.*: Wurtemb., Galloprov., Tirol., Tatra, Siles., Morav., Salisb., Stir., Helv., Istria, Austria sup. As.: Tibet occ.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 184, 370.

Un. itin. 1863, n. 35, 36.

tergestina × orbicularis *Philib. in Husn. Muscol. gall.* p. 127.

— *Eur.*: Galloprov.

torquata *Grev. Scot. crypt. Fl. n. 40, t. 199; W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 210 et *II ed.* p. 253; *Braithw. Brit. Moossfl. XI*, t. 47 E. (1).

Dryptodon torquatus *Brid. Bryol. univ. I*, p. 772.

Gr. torta *Bryol. germ. II, I*, p. 279, t. 24.

Zygodon torquatus *Liebm. in Wickstroem Jahresb. Deutsch. v. Beilschm., f. 1839-42, p. 430 (excl. fruct. ad Amphoridium lapponicum pertin.); C. M. Syn. I*, p. 682.

2. Ad rup. praerupt. — *Eur.*: Reg. subalp. et alp. zon. intermed. et septentr.: Spitzberg. *Am. sept.*: Groenland, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, fret. Behring, Washington, Idaho (c. fr.!), Wyoming (c. fr.!).

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed., n. 58.

Mac. Canad. M. n. 91.

Rab. Bryoth. eur. n. 277, 617, 1128.

Un. itin. 1867, n. 95.

Torreyana *Brid.* — Gr. apocarpa.

torta *Bryol. germ.* — Gr. torquata.

tortifolia *Kindb. in Mac. Cat.* p. 68.

Gr. streptophylla *ej. in Bot. Notis. 1881, pp. 184-187 et in Rev. bryol. 1884, p. 13.*

2. Rupic. — *Eur.*: Norveg. *Am. sept.*: Columb. brit.

tortuosa *Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 540 et Fl. Antarct. II*, p. 400, t. 151, f. 7; *C. M. Syn. I*, p. 782.

2. — *Am. merid.*: Ins. Maclov.

trichodes *Engl. Bot.* — *Brachyodus*.

trichodon *Brid.* — Gr. apocarpa var. gracilis.

trichophylla *Grev. Scot. crypt. Fl. II*, t. 100; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 188; *Bryol. eur. III (mon. p. 16), t. 244 (excl. syn. Gr. Schultzii); C. M. Syn. I*, p. 785 (id.); *W. P. Sch. op. cit. n. 256.*

Dryptodon trichophyllus *Brid. op. cit.* p. 771.

Gr. californica *Mac. Canad. M. n. 93.*

2. Ad saxa arenac. et granit. — *Eur.*: Reg. campestr. montos. et montan. zon. intermed. *As.*: Minor. *Afr.*: Alger., Madeir. *Am. sept.*: M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Calif. *Pac.*: Nov. Zeland., Tasman.

(1) Cf. Dna E. G. Britton in *Rev. bryol. 1889, pp. 38 et 61, et in Bull. Torr. bot. Club, 1889, pp. 106-111, c. ic. fructus.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 92.

Rab. Bryoth. eur. n. 681 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 207, 208.

var. *australis* Hpe. — Gr. *pygmaea*.

« var. *lusitanica* W. P. Sch. op. cit. p. 257.

Ad rup. granit. — Eur. : Lusitan.

« var. *meridionalis* Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. II. cc.

Gr. *ancistroides* Mont. Syll. p. 35; C. M. Syn. I, p. 786.

Gr. *Lisae* de Not. Epil. p. 15 et Syll. p. 241; C. M. l. c.

Gr. *sardca* de Not. et C. M. II. cc.

Ut typ. — Eur. : Merid., insul. et peninsul. As. : Caucas. or. Afr. :

Alger. Am. sept. : Calif.

var. *Mühlenbeckii* Husn. — Gr. *Mühlenbeckii*.

var. *septentrionalis* W. P. Sch. — Gr. *Mühlenbeckii*.

trichophylloidea W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1633.

— Am. merid. : And. Boliv.

trifaria W. et M. — *Seligeria tristicha*.

triformis de Not. Cron. briol. ital. in Comm. II, p. 102 et Epil. p. 707;

W. P. Sch. op. cit. p. 242.

1. In praerupt. umbros. — Eur. : Ital. sup. (pr. Sessitem).

tristicha Schwaegr. — *Seligeria*.

uncinata Kaulf. — Gr. *contorta*.

Ungeri Jur. in Ung. et Ky. « die Ins. Cypern » p. 160; W. P. Sch. op. cit. p. 853.

Gr. *alpestris* Schleich. (fid. Jaeg. Ad. II, p. 765).

Gr. *alpestris* var. *Ungeri* Husn. Muscol. gall. p. 129.

Gr. *anceps* Boulay M. Fr. p. 371 ? (fid. W. P. Sch.).

Gr. *intermedia* Ferg. in Braithw. Brit. Mossfl. II, p. 26 (ad Gr. *alpestris* refertam) ?

1. In rup. aphanit. — Eur. : Scotia, Alp. Stir., Tirol., Pedemont. (M. Blanc, quoad Gr. *ancipitem*). As. : Cypr.

unicolor Grev. Scot. crypt. Fl. II, p. 123; Brid. Bryol. univ. I, p. 182; Bryol. eur. III (mon. p. 29), t. 260; C. M. Syn. I, p. 793; W. P. Sch. op. cit. p. 268.

Gr. *atrata* Drumm. M. bor. am. I ed., n. 57.

2. Ad rup. humid. — Eur. : Scandin., Angl., Rhaet., Salisburg., Stiria, Tirol., Helvet., Alp. Sabaud. (M. Blanc); Hercyn. (ster.). Am. sept. : Lac. Super., Columb. brit., M. Alb. et Rupestr., Minnesota.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 95.

Rab. Bryoth. eur. n. 615.

unicurris C. M. in Linn. 1880-83, p. 463.

2. — Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.

urceolaris Bryol. germ. — Gr. *conferta* var. *urceolaris*.

urnulacea C. M. Bryol. austr. Georg. p. 37.

1. Rupic. — Am. merid. : Austro-Georg.

varia Mitt. — *Rhacomitrium* (1).

(1) *ventricosa* Schleich. in Steud. Nom. crypt. p. 189; C. M. Syn. I, p. 810. — Deleatur.

vernicosula C. M. in *Linn.* 1880-85, p. 458.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

verticillata W. et M. — *Eucladium*.

viridula Roth. { (fid. Brid.). — *Fissidens exilis*.
(fid. Limpr.). — *Weisia*.

vulcanica Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 63.

Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.

Watsoni Lesq. et Jam. *Man.* p. 140.

Gr. *ancistroides* Lesq. in *Mem. Calif. Acad. I*, p. 13.

2. *Rupic.* — *Am. sept.* : Calif.

Willii C. M. — *Rhacomitrium*.

Wrightii Aust. — *Coscinodon*.

Zahlbrückneri Garov. — Gr. *curvula*.

zygodontoides C. M. — *Rhacomitrium* (1).

GUMBELIA Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 124.

Spec. omn. non indicatae GRIMMIÆ ejusd. nom.

aquatica C. M. — *Cinclidotus*.

austro-leucophaea C. M. — *Grimmia*.

bogotensis Hpe. — Gr. *ovata*.

caespiticia C. M. — Gr. *sulcata*.

elliptica Hpe. — *Grimmia commutata*.

fontinaloides C. M. — *Cinclidotus*.

ovalis C. M. — *Grimmia commutata*.

riparia C. M. — *Cinclidotus*.

β *terrestris* C. M. — *Barbula Brebissonii*.

Scouleri C. M. — *Scouleria aquatica*.

GYMNOCEPHALUS Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 87.

androgynus Schw. — *Aulacomnium*.

conoidens Schw. — *Zygodon Forsteri*.

inordinatus Brid. — *Aulacomnium palustre*.

palustris Schwaegr. — *Aulacomnium*.

GYMNOCYBE Fr. *St. agr. Femsj.* p. 27.

androgyna Fr. — *Aulacomnium*.

marginata Ångstr. — *Aulacomnium*.

palustris Fr. — *Aulacomnium*.

var. *alpestris* Lindb. — *Aulacomnium palustre* var. *alpestris*.

var. *fascicularis* Lindb. — *Aulacomnium palustre* var. *fascicularis*.

var. *imbricata* Lindb. — *Aulacomnium palustre* var. *imbricata*.

var. *inordinata* Lindb. — *Aulacomnium palustre* var. *inordinata*.

var. *ramosa* Lindb. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephale*.

turgida Lindb. — *Aulacomnium*.

GYMNOPIIUM W. P. Sch. *hb.*

dendroides W. P. Sch. — *Polytrichadelphus*.

magellanicum W. P. Sch. — *Polytrichadelphus*.

(1) In Enum. Kindb. nomina nuda :

Gr. *Boschbergiana* C. M.

exannulata Lindb.

leptotricha C. M.

leucophaeoides C. M.

Gr. *minutula* C. M.

subovata C. M. (nom. mutan-
dum ; cf. n. 159).

Gymnoporus *Lindb. M. Scand. p. 28* (sect. ORTHOTRICH).

GYMNOSTOMUM *Hedw. Fund. M. II, p. 87, t. 7, f. 31* (37 spec.).

acaule W. et M. — *Pharomitrium subsessile*.

acidotum Tayl. — *Entosthodon*.

acuminatum Schleich. — *Physcomitrium*.

aeruginosum { Bryol. germ. — *G. curvirostre*.
Sm. — *G. rupestre*.

aestivum { Brid. — *Dicranum elongatum* var. *orthocarpum*.
Bryol. germ. — *Anoetangium compactum*.

affine { Bryol. germ. — *Pottia Heimii*.
Hüb. — *Entosthodon ericetorum*.

Ahnfeldti Fr. — *Entosthodon ericetorum* var. *Ahnfeldti*.

amblyophyllum Hook. — *Pottia*.

antarcticum Ångstr. — *Pottia magellanica*.

apophysatum Tayl. — *Entosthodon*.

aquaticum Bryol. germ. — *Cinclidotus*.

articulatum Bryol. germ. — *G. rupestre* var. *stelligerum*.

aurantiacum (Mitt.) Par.

G. xanthocarpum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 291.

Hymenostylium aurantiacum Mitt. *M. Ind. or.* p. 32.

2. — As. : Sikkim, Tibet occ.

bahiense Duby. — *G. Jam-soni*.

Barbula { H. f. et W. — *Hyophila Wilsoni*.
Preiss. — *Trematodon vaginatus*.
Schwaegr. — *Hyophila*.

bicolor Bryol. eur. — *Barbula*.

blandum H. f. et W. — *Hyophila*.

Bonplandi { Brid. — *Physcomitrium*.
Buchgr. — *Entosthodon ericetorum*.

Breutelii Br. et Sch. in sched.

G. ligulatum Hook. ? (fid. Jaeg.).

Hymenostomum cylindricum Bryol. eur. I (mon. p. 3, nom.) ?

Weisia Breutelii C. M. Syn. I, p. 664.

1. — Am. sept. : Ins. S. Thom.

brevicaule Tayl. — *Pottia*.

brevisetum Bryol. germ. — *G. rupestre* var. *pallidisetum*.

Brownei Par.

G. longirostrum R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 300.

Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

caespiticiu W. et M. — *Stylostegium*.

calcareum Bryol. germ. I, p. 153, t. 10 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 65 ;
Bryol. eur. I (mon. p. 6), t. 32 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 40.

G. calcareum var. *gracillimum* Bryol. eur. l. c.

G. gracillimum Bryol. germ. I, p. 149, t. 10.

G. tortile Drumm. M. Bor. am. I ed. n. 23.

Hymenostylium calcareum Mitt. M. Ind. or. p. 33.

Mollia calcarea Lindb. in Braithw. Moosfl. I, p. 239.

Mollia calcarea var. *gracillima* ej.

Trichostomum calcareum ej. Trichost. Eur. p. 19.

Trichostomum calcareum var. *gracillimum* ej. l. c.

Weisia calcarea C. M. Syn. I, p. 659.

2. Ad mur. et rup. calcar. — Eur. : Reg. merid. et part. merid. zon. interm. ; Helvetia, Salisburg., Italia, Hispania, etc. As. : Jenissei

sup., Tibet occ., Caucas, As. min. *Afr.* : Alger., ins. Azor., Tristan d'Acunha. *Am. sept.* : Terra nova, Nov. Scotia, Niagara, lac. Winnipeg, etc. *Am. merid.* : And Quitens. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

Ews. : Rab. Bryoth. eur. n. 62, 351 et b, 1155 et b.

α *var. brevifolium* W. P. Sch. *Syn. I ed.*, p. 40 et II, p. 41.

G. viridulum Bryol. eur. l. c. t. 31; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 66?

Ut typ. — *Eur.* : Galloprov., Bosnia. *Am. sept.* : Ontario.

var. gracillimum Bryol. eur. — *G. calcareum*.

α *var. intermedium* W. P. Sch. *op. cit.*

G. calcareum γ *viridulum* Bryol. eur. l. c. in *descript. et t.* 32 γ (*excl. Syn. Brid. de G. viridulo*).

Mollia calcarea var. viridula Lindb.

Weisia calcarea var. viridula C. M. l. c. (*excl. ut supra*).

Ut typ. — *Eur.* : Galloprov., Sardin. As. : Caucas.

α *var. perpusillum* Sull. in *Pac. R. Rep. IV*, p. 185; *Lesq. et Jam. Man.* p. 53.

Ad terr. argill. — *Am. sept.* : Calif.

α *var. tenellum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

Weisia calcarea var. tenella C. M. l. c.

Ut typ. — *Eur.* : Gall. centr. (Mende).

var. viridulum Bryol. eur. — *G. calcareum var. intermedium*.

canescens Schrank. — *Rhacomitrium*.

capense Hook. — *Glyphocarpus sericeus*.

carbunculoides de Not. — *Pottia caespitosa*.

ceratodonteum (C. M.) Par.

Ceratodon capense W. P. Sch. ?

Pottia ceratodonteum C. M. *Syn. I*, p. 564.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

ciliatum Roth. — *Hedwigia*.

cirratum Schrank. — *Dicranoweisia*.

chloropus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 11.

2. Terr. — *Afr.* : Ins. Bourboniae.

circumscissum Roehl. — *Pottia truncata*.

Clintoni Aust. — *G. rupestre*.

Combae de Not. — *Pottia Wilsoni*.

commutatum Mitt. — *G. curvirostre*.

compactum Schleich. — *Anoetangium*.

complanatum (Eucladon) H. f. et W. — *Calomnium laetum*.

condensatum Voit. — *Hymenostomum tortile*.

conicum Schwaegr. — *Pottia Starkeana var. brachyodus*.

crispatum W. P. Sch. — *Hymenostomum*.

cucullatum Jaeg. — *Hymenostomum*.

curvatum D^{ns} F. Mazz. — *Funaria curviseta*.

curvirostrum (Ehrh.) Hedw. *M. frond. II*, p. 88, t. 34; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 84; *Bryol. eur. I* (mon. p. 8), tt. 35 et 33; W. P. Sch. *op. cit.* p. 43.

Barbula curvirostra Lindb. *M. Scand.*

Bryum aestivum L. *Sp. pl.* p. 1585.

Br. curvirostrum Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1334.

Br. fasciculatum Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.*

Br. palustre, aestivum, confervae facie Dill. *Hist. M.* p. 273, t. 47, f. 38.

Br. palustre, *L. Syst. veg.* p. 948.

Br. stelligerum *Dicks. Fasc. III Pl. crypt.* p. 3, t. 3, f. 4.

Br. verticillatum *ej. hb. sicc. Fasc. V, n. 19.*

Dicranum hyperboreum *Engl. Bot. t. 2552.*

G. aeruginosum *Bryol. germ.* p. 160, t. 10, f. 19; *Brid. l. c.* p. 89 p.p.

G. stelligerum *Sm. Fl. brit. III, p. 1164 et Engl. Bot. t. 2202; Brid. op. c.* p. 89 p.p.

Hymenostylium commutatum *Mitt. M. Ind. or.* p. 32.

H. curvirostrum *Mitt. op. et l. cc.*

Pottia curvirostra *Ehrh. Pl. crypt.* p. 93.

Weisia curvirostris *C. M. Syn. I, p. 658.*

2. *Ad rup. calc. et moles tophac.* — *Eur.*: Spitzberg, reg. subalp. tota. *As.*: Himalaya, vall. Indus, Tibet occ., Khasia, Caucas. *Am. sept.*: Anticosti, Gaspes., Ontario, Niagara, reg. sept. occ., M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, Minnesota, reg. centr. et or.

Exs.: *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 25, 26.

Mac. Canad. M. n. 17.

Rab. Bryoth. eur. n. 1252, 1253.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 52, 53.

Un. itin 1853, n. 4.

« *var. cataractarum* *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 43 et II ed. p. 44.*

G. curvirostre β *pomiforme* *Bryol. eur. l. c.*

G. pomiforme *Bryol. germ. I, p. 158, t. 10 ex p. ? Brid. l. c. p. 79.*

Weisia curvirostris β *pomiformis* *C. M. l. c.*

Ad rup. schist. et granit. Alp. — *Eur.*: Norvegia (Dovre), Tirol, Valesia, Pyren., etc.

Exs.: *Rab. Bryoth. eur.* n. 60, 399.

« *var. laeviusculum* (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Barbula curvirostris var. laeviuscula *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 74.

— *As.*: *Jenissei inf.*

« *var. microcarpon* (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. II, cc.*

G. microcarpon *Bryol. germ. l. c. p. 161, t. 10; Brid. l. c. p. 81.*

Weisia curvirostris γ *microcarpa* *C. M. l. c.*

Ut et ubi *var. cataractarum.*

« *var. pallidisetum* (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. II, cc.*

G. brevisetum *Bryol. germ. l. c. p. 164, t. 10; Brid. l. c. p. 82.*

G. pallidisetum *Bryol. germ. l. c. p. 166, t. II; Brid. l. c. p. 83.*

Weisia curvirostris var. pallidiseta *C. M. l. c.*

Ut et ubi *proceed.*

Exs.: *Rab. Bryoth. eur.* n. 725.

« *var. scabrum* *Lindb. M. Scand. p. 22.*

— *Eur.*: *Reg. alp.*

var. pomiforme *Bryol. eur.* — *G. curvirostre var. cataractarum.*

curvirostrum *Roehl.* — *Dicranum elongatum var. orthocarpum.*

curvisetum *Schwaegr.* — *Funaria.*

cuspidatum *Roehl.* — *Pottia truncata.*

cylindricum *Hook.* — *Hyophila.*

Davallianum *Sm.* — *Brachyodus trichodes.*

decipiens *W. et M.* — *Grimmia crinita.*

dilatatum *P. B.* — *Physcomitrium turbinatum.*

Donianum *Engl. Bot.* — *Anodus.*

dubium *Brid.* — *Entosthodon ericetorum.*

edentulum *Jaeg.* — *Hymenostomum.*

ericetorum Bals. et de Not. — *Entosthodon*.

erythrostomum Brid. — *G. rupestre*.

euchlorum { Schwaegr. — *Anoetangium*.
Zeyh. — *Hyophila Zeyheri*.

eurystomum Nees. — *Physcomitrium*.

var. *subpatula* Lindb. et Arn. — *Physcomitrium eurystomum* var. *subpatula*.

fasciculare { Hedw. — *Funaria*.
H. et T. — *Entosthodon ericetorum*.

foliosum Roehl. in *Ann. Vett. Ges. II*, p. 129; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 95; *C. M. Syn. I*, p. 565.

— *Eur.*: Suecia.

gracile { Hook. — *Leptostomum*.
Mossm. — *Leptostomum flexipile*.

gracillimum Bryol. germ. — *G. calcareum*.

Griffithianum Sm. — *Ædipodium*.

guadelupense Spreng. — *Anoetangium euchloron*.

Hedwigia W. et M. — *Hedwigia ciliata*.

Heimii { Drumm. var. 1, 2, 3; Hedw. — *Pottia*.
Timm. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.

β *obtusum* Hook. — *Entosthodon ericetorum*.

homomallum Brid. — *Leptotrichum*.

Hornschuchianum { Bryol. germ. — *Anoetangium*.
Bryol. germ. pp. — *Anoetangium Sendtnerianum*.

hymenostomoides Poech. — *Hymenostomum tortile*.

imberbe Engl. Bot. — *Hedwigidium*.

immersum Sull. — *Physcomitrium*.

inclinans Hook. — *Leptostomum*.

inconspicuum (Griff.) Par.

Hymenostylium inconspicuum Griff. Not. p. 394; Mitt. *M. Ind. or.* p. 33.

Rupic. — As.: Khasia.

incurvans W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 15.

Ster. — *Am. sept.*: Mexic.

inflexum Tayl. — *Pottia*.

intermedium Turn. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.

involutum { Hook. — *Hyophila*.
Mont. — *Hyophila Leprieurii*.

irretitum Brid. — *Gyroweisia reflexa*.

Jamesoni W. Arn. in *Wern. Trans. V*, p. 200 et *Disp. M.*, p. 10; *C. M. Syn. I*, p. 119.

G. bahiense Duby in *Mem... Genève*, f. 5, a, b, c (fid. Hpe.).

Weisia Jamesoni Mitt. *M. austr. am.* p. 132.

2? — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Jamesoni Tayl. — *Barbula limbata*.

japonicum Hedw. — *Physcomitrium*.

javanicum Nees. — *Hyophila*.

julaceum Hook. — *Ångstroemia andicola*.

Kunzeanum (C. M.) Par.

G. longirostre Kze. in *Poepp. Pl. Chil. Coll. III*, n. 230.

(1) *flaccidum* Brid. *Bryol. univ. I*, p. 86; *C. M. Syn. I*, p. 565? Quid? Delendum.

Pottia Kunzeana C. M. Syn. II, p. 624.
P. longirostris ej. Syn. I, p. 562 (error. corr.).
Weisia longirostris Mitt. M. austr. am. p. 134.

2. — Am. merid. : Chile austr.

Kurzianum Hpe. in sched. ; Jaeg. Ad. II, p. 631.
 — As. : Sikkim.

lamprocarpum Mont. — *Anoetangium euchloron*.
lapponicum Hedw. — *Amphoridium*.
latifolium Hook. — *Physcomitrium Hookeri*.
laxifolium Kze. — *Anoetangium tenerrimum*.
Leptostomum Hook. — *Leptostomum erectum*.

Lessonii Besch. in Journ. de Bot. 1891. p.
 — Afr. : Ins. Ascens.

ligulatum R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1893, p. 299.
 Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

ligulatum Hook. — *G. Breuteli*.
linearifolium Tayl. — *Amphoridium cyathicarpum*.
longifolium Schleich. — *Physcomitrium piriforme*.

longirostre Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. II, n. 475.
Pottia longirostris Hpe. in C. M. Syn. I, p. 552.
 1. — Afr. : M. Abyssin.

longirostre Kze. — *G. Kunzeanum*.
longirostrum R. Br. — *G. Brownii* (1).
luteolum Engl. Bot. — *Anoetangium compactum*.
magnocarpum R. Br. — *G. megalocarpum*.

marginatum Kze. in Poepp. Pl. Chil.

Weisia Kunzeana C. M. Syn. I, p. 656.

2. — Am. merid. : Chile.

megalocarpum Par.

G. magnocarpum R. Br. in Trans. of the Zeal. Inst. 1893, p. 300 (nom. male institutum).

Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

Menziesii Hook. — *Leptostomum*.

micaceum Schlecht. — *Hymenostomum*.

microcarpon Bryol. germ. — *G. curvirostrum* var. *microcarpon*.

microstomum Hedw. — *Hymenostomum*.

var. *brachycarpum* W. P. Sch. — *Hymenostomum microstomum* var. *brachycarpum*.

var. *brevirostre* Jaeg. — *Hymenostomum microstomum* var. *brevirostre*.

var. *elatum* Jaeg. — *Hymenostomum microstomum* var. *elatum*.

var. *obliquum* Jaeg. — *Hymenostomum microstomum* var. *obliquum*.

var. *Schultz.* — *Weisia mucronata*.

minutulum Schwaegr. — *Pottia*.

Mosis Jur. et Milde. — *Gyroweisia*.

Mougeoti Br. — *Amphoridium*.

murale W. P. Sch. — *Hymenostomum*.

niloticum Del. — *Physcomitrium*.

obtusatum Rehm. M. Afr. austr. n. 436.

Ster. — Afr. : Transvaal.

(1) Ob mimiam similit. cum praeced. nom. mutatum.

- obtusifolium* R. Br. — *Pottia Heimii* var. *arctica*.
obtusum Hedw. — *Entosthodon ericetorum*.
Orbignyanum Mont. — *Physcomitrium*.
orizabanum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 15.
 2. — *Am. sept.* : Mexic.
osmundaceum Hoffm. — *Schistostega*.
ovatum Hedw. — *Pottia cavifolia*.
 var. *epilosum* Bryol. germ. — *Pottia cavifolia* var. *epilosa*.
 var. *gracile* H. et T. — *Pottia cavifolia* var. *gracilis*.
 var. *incanum* Bryol. germ. — *Pottia cavifolia* var. *incana*.
 var. *oblongum* Brid. — *Pottia cavifolia* var. *oblonga*.
Pabstianum (C. M.) Par.
 Weisia Pabstiana C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 382.
 W. viridula (fid. Mitt. *M. austr. am.* p. 133).
 2. limic. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.
pachyloma Mont. — *Sciaromium*.
pallidisetum Bryol. germ. — *G. curvirostrum* var. *pallidisetum*.
Pancherianum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 188.
 Hymenostomum Pancherianum Jaeg. *Ad. II*, p. 630.
 1. Terr. — *Pac.* : Nov. Caledon.
paucifolium Engl. Bot. } (sec. C. M.) — *Gyroweisia tenuis*.
 } (sec. Lindb.) — *Seligeria subcernua*.
pennatum Hedw. — *Schistostega osmundacea*.
phascoides Drumm. — *Systegium Drummondii*.
piriforme } Brid. p.p. — *Entosthodon Templetoni*.
 } Hedw. — *Physcomitrium*.
juvenile Voit. — *Pyramidula tetragona*.
platyphyllum Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, Apr. 1889.
 2. Ad rup. irror. — *Am. sept.* : Columb. brit.
pomiforme Bryol. germ. — *G. curvirostre* var. *cataractarum*.
prorepens Hedw. — *Drummondia clavellata*.
pulchellum Griff. — *Physcomitrium*.
pulvinatum } Hedw. — *Grimmia sphaerica*.
 } Lag. — *Pottia cavifolia*.
pusillum } Drumm. — *Anodus Donianus*.
 } Hedw. — *Pottia cavifolia*.
 var. *oblongum* Hedw. — *Pottia cavifolia*.
pygmaeum R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 298.
 Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.
quadratum Hook. — *Glyphocarpus*.
Rauanum Aust. — *Weisia viridula* var. *gymnostoma*.
recurvum Griff. } — *Desmatodon*.
 } — *Hyophila rufescens*.
reflexum Brid. — *Pottia Starkeana* var. *brachyodus*.
repandum Griff. — *Physcomitrium*.
rigescens Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 447.
 Weisia rigescens C. M. *Syn. I*, p. 659.
 2. Rupic. — *Afr.* : M. Abyss.
riparium Host. — *Cinclidotus*.
rostellatum W. P. Sch. — *Hymenostomum*.
Rottleri Schwaegr. — *Entosthodon*.

- rufescens* { Hook. — *Hyophila*.
Schultz. — *Pottia minutula* var. *rufescens*.
- rupestre* *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 31, t. 11*; *Brid. Bryol. univ. I, p. 77*;
Bryol. eur. I (mon. p. 7), tt. 33 et 34; *W. P. Sch. op. cit. p. 42*.
G. aeruginosum *Sm. Fl. brit. III, p. 1163 et Engl. Bot. t. 2200*; *Brid. Bryol. univ. I, p. 80 p.p.*
G. Clintoni *Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 42*.
G. erythrostomum *Brid. op. c. p. 85*.
Mollia aeruginosa *Lindb. M. Scand. p. 21*.
Trichostomum aeruginosum *ej. Trichost Eur. p. 19*.
Weisia rupestris *C. M. Syn. I, p. 657*.
2. In fissur. rup. granit. et schistos. — *Eur.*: Reg. subalp. et alp. a Lappon. usq. ad Hispan. merid. *As.*: *Jenissei sup., Caucas. Afr.*: *Ins. Canar. Am. sept.*: *labrador, Terr. nov., lac. Super., Niagara, M. Rupestr., Columb. brit., Idaho, reg. or.*
Exs.: *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 24, et II ed. n. 21.*
Mac. Canad. M. n. 18.
Rab. Bryoth. eur. n. 406.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 50.
- « *var. compactum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
Weisia rupestris δ *compacta* *C. M. l. c.*
Ut typ. — Eur.: *Alp. Scandin., Helvet., etc.*
Exs.: *Rab. Bryoth. eur. n. 604.*
- « *var. ramosissimum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
Weisia rupestris var. *ramosissima* *C. M. l. c.*
- « *var. rigidum* *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 42.*
Ad rup. tophac. irror. — Eur.: *Lac. Lemman.*
- « *var. stelligerum* (*Schk.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
G. articulatum *Schkuhr op. cit. p. 29, t. 10, f. c.; Bryol. germ. I, p. 156, t. 10, f. 17; Brid. l. c. p. 78.*
G. stelligerum *Bryol. germ. I, p. 68, t. 11.*
G. tophaceum *Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 42.*
Weisia rupestris γ *stelligera* *C. M. l. c.*
Ad cataract. in calcar. — Eur.: *Helvet., Rhaet., Salzburg., etc.*
Am. sept.: *Gaspes., Texas.*
var. *Sull.* — *G. stillicidiorum.*
- rutilans* *Hedw.* — *Weisia mucronata.*
- scaturiginosum* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 12.*
Ad rup. aquat. vel submers. — Afr.: *Ins. Borbon.*
- Schimperi* *Mdo.* — *Hymenostomum tortile* var. *alpinum.*
- secundum* (*C. M.*) *Par.*
Hymenostylium secundum *C. M. in Linn. 1876, p. 299.*
Ster. Ad terr. calc. vel humos. — Afr.: *Somali.*
- senocarpum* *Jaeg.* — *Hymenostomum.*
- sepincola* *Sk.* — *Hymenostomum microstomum* var. *brevirostre.*
- serpens* *Schrank.* — *Amblystegium.*
- setifolium* *Hook.* — *Anacolia.*
- simplicissimum* *Brid. Bryol. univ. I, p. 67*; *C. M. Syn. I, p. 564.*
Sphagnum simplicissimum *Loureir Fl. Cochinch. II, p. 839.*
Cortic. et muric. — As.: *Cochinchina (1),*

solivagum Green. — *Pottia Wilsoni*.

socotranum (Mitt.) Par.

Weisia socotrana Mitt. in *Trans. of the Soc. of Edinb.* 1887, p. 331.
2. — *Afr.* : Ins. Socotora.

spathulatum { Harv. — *Barbula*.
Hsch. — *Physcomitrium spathulatum* var. *brevicaule*.

sphaericum { Roehl. — *Physcomitrium eurystomum*.
Schwaegr. — *Physcomitrium*.

var. Bryol. germ. { *Physcomitrium acuminatum*?
Physcomitrium eurystomum?

splachnoideum Hook. — *Physcomitrium turbinatum*.

squarrosus Wils. — *Hymenostomum*.

stelligerum { Bryol. germ. — *G. rupestre* var. *stelligerum*.
Sm. — *G. curvirostrum*.

Stevensii R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 299.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

stillicidiorum (Mitt.) Par.

G. rupestre var. *Sull.* in *Proced. Am. Acad.*... 1861.

Weisia stillicidiorum Mitt. *M. austr. am.* p. 134.

2. *Rupic.* et terr. — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : And. Quitens.

striatum Brid. — *Amphoridium lapponicum*.

subsessile Schwaegr. — *Pharomitrium*.

subulatum Brid. — *Stylostegium caespitium*.

systylium Funk. — *Pottia heimii*.

tenue Schrad. — *Gyroweisia*.

tetragonum Schwaegr. — *Pyramidula*.

tophaceum Aust. — *G. rupestre* var. *stelligerum*.

tortile { Drumm. — *G. calcareum*.
Schwaegr. — *Hymenostomum*.

var. *subcylindricum* Jaeg. — *Hymenostomum tortile* var. *subcylindricum*.

tortipes Hook. — *Physcomitrium australe*.

Tortula Schwaegr. — *Hyophila*.

trafoiense W. P. Sch. — *Weisia mucronata*.

trichodes W. et M. — *Brachyodus*.

tristichum Wahlenb. — *Anoetangium compactum*.

truncatulum Hedw. — *Pottia truncata*.

var. β Hoffm. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.

truncatum { Hedw. — *Pottia truncata*.
Roehl. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.
W. et M. — *Pottia minutula* var. *rufescens*.

var. *majus* Wahlenb., W. et M. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.

var. *minimum* Voit. — *Pottia minutula*.

turbinatum Rich. — *Physcomitrium Hookeri*.

umbrosum Jaeg. — *Hymenostomum*.

venezuelensis (C. M.) Par.

Weisia venezuelensis C. M. in *Lin.* 1878-79, p. 480.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

viridissimum H. et T. — *Zygodon*.

viridulum Brid. — *G. calcareum* var. *brevifolium*.

vernicosum Hook. — *Pottia*.

wainakariense R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 299.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Wilsoni Hook. { — *Pottia crinita*.
— *Pottia*.

Wimmerianum Sendtn. — *Weisia*.

Wrightii R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 300.
Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

xanthocarpum Hook. *M. ex.* II, t. 153.

Hymenostylium xanthocarpum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 82.

Pottia xanthocarpa C. M. *Syn.* I, p. 563.

2. — *As.* : Nepal. *Afr.* : M. Abyssin.

xanthocarpum Wils. — *G. aurantiacum*.

yemense C. M. in *Hedw.* 1891, p. 219 (*nom.*).

— *As.* : M. Yemen (1).

GYMNOSTOMUM PHYSCOMITRIUM Brid. *Bryol. univ.* I, p. 97.

Bonplandi Brid. — *Entosthodon*.

curvisetum Brid. — *Funaria*.

fasciculare Brid. — *Funaria*.

β *Schultzii* Bryol. germ. — *Funaria fascicularis*.

latifolium Thomas. — *Entosthodon Templetoni*.

piriforme Brid. — *Physcomitrium*.

sphaericum Brid. — *Physcomitrium*.

splachnoideum Brid. — *Physcomitrium turbinatum*.

tortipes Brid. — *Physcomitrium turbinatum* var. *tortipes*.

turbinatum Brid. — *Physcomitrium turbinatum*.

Gymnotrematodon C. M. in *Hedw.* 1895, p. 118 (*nom.*, sect. *TREMATODONTIS*).

Gymnoweisia W. P. Sch. I ed., p. 37 (subgen. *GYMNOSTOMI*).

GYROPHYLLUM Dz. et Mk. *M. frond.* Archip. ind.

Reinwardti Dz. et Mk. — *Dichodontium*.

GYROWEISIA W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 38 (8 spec.).

acutifolia Philib. in *Rev. bryol.* 1882, p. 3 et in *Husn. Muscol. gall.* p. 8.

2. Ad rup. calcar. — *Eur.* : Helvet. or.

Aronis (Ltz.) Par.

Trichostomum Aronis Ltz. *M. Ehrenb.* p. 29, t. 5, f. 1-9 et t. 6, f. 10-21.

Ster. — *Afr.* : M. Sinaï.

Hildebrandti (C. M.) Par.

Weisia Hildebrandti C. M. in *Linn.* 1876, p. 298.

Ster. — *Afr.* : Somali.

Mosis (Ltz.) Par.

Gymnostomum Mosis Jur. et Milde *Beitr...* p. 590.

Trichostomum Mosis Ltz. l. c. p. 28, t. 3, f. 1-7 et 4, f. 8-22.

2. — *As.* : Pers. austr. *Afr.* : M. Sinaï.

reflexa (Brid.) W. P. Sch. *op. cit.* p. 39.

Anacalypta reflexa Fourn. in *Fl.* 1829, II, *Erganz.* p. 25.

(1) In *Enum. Kindb.* *nom. nudum* :
G. lingulatum Rehm.

Gymnostomum irretitum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 758.

Trichostomum reflexum Lindb. *Trichost. Eur.* p. 20.

Weisia reflexa Brid. *op. cit.* p. 355; *Bryol. eur.* I (mon. p. 7), t. 24; *C. M. Syn.* I, p. 654.

Weisiodon reflexus W. P. Sch. *Coroll.* p. 9.

2. Ad rup. calcar. — *Eur.*: Gall. merid. *Afr.*: Alger.

Rohlfiana (C. M.) Par.

? *Weisia Rohlfiana* C. M. in *Fl.* 1874, n. 31.

Ster. Muric. — *Afr.*: Ægypt. super.

tenuis (Schr.) W. P. Sch. *op. cit.* p. 38.

Bryum paucifolium Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 7, t. 11, f. 3 (f. W. P. Sch.).

Gymnostomum paucifolium Engl. *Bot. t.* 2806 (f. C. M.).

G. tenuis Schrad. *Coll. Pl. crypt.* n. 31; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 64; *Bryol. eur.* I (mon. p. 5), t. 30.

Mollia tenuis Lindb. *M. Scand.* p. 21.

Trichostomum reflexum β *gymnostomum* Lindb. *Trichost. Eur.* p. 20.

Weisia tenuis C. M. *Syn.* I, p. 660.

2. Ad mur. et rup. aren. et aren. calc. — *Eur.*: Media et reg. merid. part. septentr. *Am. sept.*: Ontario, lac. Winnipeg.

Exs.: Drumt. M. bor. am. I ed. n. 21 (*Weisia*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 61, 405, 738.

Un. itin. 1863, n. 1, 2, 3.

* *var. badia* Limpr. *Deutschl. Laubm.* p. 236.

Rupic. — *Eur.*: Voges., Bade, Helvet., Salisburg.

tophicola (C. M.) Par.

Weisia tophicola C. M. in *Linn.* 1876, p. 297.

Ster. — *Afr.*: Somali.

HABRODON W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 505 (2 spec.).

nicaensis de Not. *Epil.* p. 224; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 588 (1).

Ster. Ad *Oleas* vetustas semel lectum. — *Eur.*: Gall. austr. or.

Notarisii W. P. Sch. *op. cit.* p. 587 et *Bryol. eur. Suppl. fasc. III-IV*, t. I.

Clasmatodon perpusillus Lindb. in *Journ. of the Linn. Soc.* XIII, p. 70.

H. perpusillus Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 401.

Pterogonium perpusillum de Not. *Spic.* p. 12 et *Syll. M.* p. 84.

Pt? subnerve Spr. in *Trans. of the bot. Soc. of Edinb.* 1849, III, p. 150.

2. Cortic. — *Eur.*: Norveg. occ., Scot., Angl., Gall. centr., Sardin., Ligur., ins. lac. Major., Iusit. — *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Ohio centr. (ster.).

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 903, 1080.

perpusillus Lindb. — *H. Notarisii*.

Sendtneri Ltz. — *Fabronia*.

HAMPEELLA C. M. in *Bot. Centralbl.* 1881, n. 37 (1 spec.).

Kurzii C. M. l. c.

1.

— *As.*: Java.

[1] Verosimil. var. *H. Notarisii* (W. P. Sch. l. c.). « In herb. de Notaris deest. » (Husnot, *Muscol. gall.* p. 298).

Haplocladium C. M. in Linn. 1878-79, p. 459 (subsect. HYPNI).

Haplodon Lindb. M. Scand. p. 18 (cf. APLODON).

HAPLODONTIUM Hpe. in Ann. sc. nat. 1865, V ser., p. 336.

Spec. omn. MIELICHHOFERIAE ejusd. nom.

HAPLOHYMENIUM Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 310 (2 spec.).

abbreviatum W. P. Sch. hb.

Leskea abbreviata ej. in W. Sch. M. Abyss.

— Afr.: Abyss.

densum W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 89.

l. — Am. sept.: Mexic.

Sieboldi Dz. et Mk. — Leskea tristis.

Harpidium Sull.; W. P. Sch. Syn. I, p. 604 (subgen. HYPNI = **Drepacnocladius** C. M.).

HARPOPHYLLUM Spr. Cat.

aureum Spr. — Hookeria.

HARRISONIA (1) Spreng. Syst. veg. IV, I, p. 145 (1827).

Spec. omn. non indicatae sunt RHACOCARPI ejusd. nom.

aquatica Spreng. — Cinclidotus.

emersa C. M. et Hpe. — Hedwigidium.

glyphocarpa Hpe. — Hedwigidium.

rhabdocarpa Hpe. — Hedwigidium.

Schimperiaana Hpe. — Braunia.

secunda Spreng. — Braunia.

squarrosula Hpe. — Hedwigidium.

HEDWIGIA Ehrh. Hannov. Mag. 1781, n. 69, p. 109 (10 spec.).

aestiva Hook. — Anoectangium.

albicans Lindb. — H. ciliata.

anodon Ehrh. — H. ciliata.

apocarpa Leyss. — H. ciliata.

aquatica Hedw. — Cinclidotus.

attenuata Mitt. — Braunia.

ciliata (Dicks.) Ehrh. in op. et l. cc.; Bryol. eur. III, tt. 272-273; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 283.

Aniectangium ciliatum Hedw. Sp. M. p. 40; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 29.

Bryum apocarpum β L. Sp. pl. p. 1579.

Br. apocarpum var. aureum Retz. Prodr. Fl. Sc. n. 1216.

Br. apocarpum β incanum Ehrh. in op. cit. 1780, p. 136.

Br. ciliatum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 6.

Br. sphagnoides Jacq. Coll. II, p. 222.

Fontinalis albicans Web. Spic. Fl. Goett. p. 38.

Gymnostomum ciliatum Roth. Fl. Germ. III, I, p. 129.

G. Hedwigia W. et M. Bot. Taschb. p. 78.

H. albicans Lindb. M. Scand. p. 40.

H. anodon Ehrh. Beitr. 1789, I, p. 187.

(1) Nom. jam abusum: *Harrisonia* R. Br. mss. (1825); Adr. de Juss. in Mém. Mus. Paris, XII, p. 517, t. 28, f. 47 (*Simarubeae*); etc.

- H. apocarpa* Leyss. *Fl. holl. n.* 1049.
H. diaphana P. B. *Prodr.* p. 60.
H. integrifolia ej. l. c.
Hedwigidium ciliatum Hartm. *Skand. Fl.* VI ed.
Pilotrichum ciliatum C. M. *Syn.* II, p. 164.
Schistidium ciliatum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 116.
Sphagnum nodosum, hirsutie incanescens Dill. *Hist. M.* p. 246, t. 32, f. 5.
 l. Ad. rup. aren. et granit. — *Eur.* : Reg. campestr. et montan. *As.* :
 Jenissei sup., Alatau, Japon., Nepal., Caucas. *Afr.* : Alger., Madeir.,
 Teneriff., Madagascar. *Am. sept.* : Groenland, Terr. nov., ab
 Atlantico ad Pacif.; ins. Vancouver. *Am. merid.* : And. Nov.
 Granat. et Quitens. *Pac.* : Austral. fel., Nov. Zeland., Tasman.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 106.
 Rab. Bryoth. eur. n. 514.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 224, 225.
 « *var. leucophaea* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Ut typ. — *Eur.* : Zon. merid. *Am. sept.* : Ubi typ.
 Exs. : Mac. Canad. M. n. 107.
 Rab. Bryoth. eur. n. 679.
 « *var. secunda* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Pilotrichum ciliatum var. secundum C. M. l. c.
 Ad rup. umbros. — *Eur.* : Ubi typ. *Am. sept.* : Ontario, etc.
 « *var. striata* (Wils.) *Bryol. eur. l. c. t.* 273 et *W. P. Sch. l. c.*
 Anoetangium striatum Wils. in Hook. *Engl. Fl.* p. 12.
 Pilotrichum ciliatum var. striatum C. M. l. c.
 Ad rup. granit. — *Eur.* : Hibern., Angl.
 « *var. viridis* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Anoetangium imberbe Drumm. M. bor. am. I ed. n. 30.
 Ad rup. umbros. — *Eur.* : Ubi typ. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Gaspes.,
 Nov. Scot., Ontario, Manitoba, etc.
 Exs. : Mac. Canad. M. n. 108.
 Rab. Bryoth. eur. n. 678.
ciliata Mitt. — *H. Johannis Meyeri.*
 var. ? Jaeg. — *H. Juratskae.*
cirrifolia Wils. — *Braunia.*
decalvata Mitt. — *Rhacocarpus imberbis.*
diaphana P. B. — *H. ciliata.*
Emodica Hpe. in *Fl.* 1878, n. 6.
 l. — *As.* : Himalaya.
Hornschuchiana Hook. — *Anoetangium.*
Humboldti Hook. — *Rhacocarpus.*
 β *australis* H. f. et W. — *Rhacocarpus australis.*
imberbis Mitt. — *Hedwigidium rhabdocarpum.*
imberbis Sp. — *Hedwigidium.*
indica Mitt. — *Braunia.*
integrifolia P. B. — *H. ciliata.*
Johannis Meyeri C. M. in *Fl.* 1888, p. 415.
 H. ciliata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 310.
 l. In gramin. edit. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
Juratskae C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (nom.).
 H. ciliata var. ? Jaeg. Ad. II, p. 722.
 — *Pac.* : Austral. (Nov. Valesia).
lapponica Brid. — *Amphoridium.*

Mac-Owaniana C. M. in *Fl.* 1888, p. 415 (nom.) et *Rehm. M. Afr. austr. n.* 596 b.

l. ? Ad rup. basalt. — *Afr.* : C. B. Sp.

microcyathea (C. M.) Par.

Cryphaea microcyathea Jaeg. *Ad. II*, p. 98.

H. ciliata (fid. Mitt.).

Pilotrichum microcyatheum C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 564.

l. Rupic. — *Pac.* : Austral. or., Tasman.

nivalis (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 405.

Anoetangium ciliatum C. M. in *Linn.* 1846, I, p. 199.

Pilotrichum nivale ej. *Syn. II*, p. 165.

Schistidium ciliatum Hpe. in *Linn.* 1847, II, p. 70.

l. — *Am. merid.* : Venezuela.

orbiculata Mitt. — *Rhacocarpus*.

pilifera Mitt. — *Braunia californica* var. pilifera.

plicata Mitt. — *Braunia*.

repens H. f. et W. — *Gigaspermum*.

rupestris Mitt. — *Braunia*.

Schimperia Br. et Sch. — *Braunia*.

Schmidtii Hook. — *Leucodon canariensis*.

sciuroides de Not. — *Braunia*.

secunda Hook. — *Braunia*.

serricola C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 78.

— *Am. merid.* : Brasil, subtropic. or.

subnuda Kindb. in *Mac. Cat.* p. 78 (subsp. *H. ciliatae*).

l. Rupic. — *Am. sept.* : Ontario.

subrevoluta (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 40.

Pilotrichum subrevolutum C. M. *Syn. II*, p. 165.

l. Rupic. — *Am. sept.* : Mexic.

HEDWIGIDIUM Bryol. eur. III (9 spec.).

ciliatum Hartm. — *Hedwigia*.

Drummondii (Tayl.) Jaeg. *Ad. II*, p. 89.

H. imberbe (fid. Mitt.).

Neckera Drummondii C. M. *Syn. II*, p. 106.

Schistidium Drummondii Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 37.

l ? — *Pac.* : Austral. or.

emersum (C. M. et Hpe.) Jaeg. l. c.

Harrisonia emersa C. M. et Hpe. in *Linn.* 1853, p. 502.

Hedwigidium imberbe ? (fid. Mitt.).

l. — *Pac.* : Austral. or.

glyphocarpum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 772.

Harrisonia glyphocarpa Hpe. *Symb.* 1877, p. 727.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

imberbe (Sm.) Bryol. eur. III, t. 274 et W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 284.

Anoetangium ciliatum var. rufescens W. Arn. *Disp. M.* p. 11.

A. imberbe H. et T. *Muscol. brit.* p. 14, t. 6.

Gymnostomum imberbe Engl. *Bot.* t. 2237.

Hedwigia imberbis Spr. *M. Pyr. n.* 338 et in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* 1849, p. 187.

Neckera imberbis C. M. *Syn. II*, p. 105.

Schistidium imberbis Bryol. germ. I, p. 99, t. 8; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 118 (incl. var. β atro-virens et γ gracile).

I et Syn. Rupic. — *Eur.* : Norveg. occ., Finmarck, Angl., Hibern., Voges. sup., Pyren. As. : Ceylan (?). *Afr.* : M. Cameroon. *Pac.* : Tasman.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 921.

Liebmannianum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 239 (nom.).

Braunia Liebmanniana W. P. Sch. prius.; Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 41.

Neckera Liebmanniana C. M. Syn. II, p. 668.

Hermaphr. — *Am. sept.* : Mexic.

rhabdocarpum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 772.

Braunia rhabdocarpa C. M. in Linn. 1878-79, p. 378.

Harrisonia rhabdocarpa Hpe. Prodr. Fl. N. Gran. p. 68.

Hedwigia imberbis Mitt. M. austr. am. p. 405.

l. Rupic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Quitens. et Boliv.; Argentin. subtropic.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1638.

Serrae C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 79.

— *Am. merid.* : Brasil. subtropic. or.

squarrosulum (Hpe.) Bryol. eur. III (mon. Brauniae, p. 3).

Harrisonia squarrosula Hpe. Ic. M. t. 19.

Neckera sphaerocarpa C. M. Syn. II, p. 105.

l. — *Am. sept.* : Mexic., Guatemala.

teres (C. M.) Par.

Braunia teres C. M. in Fl. 1888, p. 415.

l. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

Helicoblepharum Spr. in Mitt. M. Austr. am. p. 371 (sect. LEPIDOPILI).

HELICODONTIUM Schwaegr. Suppl. III, II, II (13 spec.).

applanatum (Thw. et Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 292.

Hypnum applanatum Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1861, p. 321.

l. — *As.* : Ceylan.

capillare (Sw.) Besch. Not. M. Parag. p. 268.

Hypnum capillare Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 141; C. M. Syn. II, p. 410; Mitt. M. austr. am. p. 548.

H. furcatum Brid. Sp. M. II, p. 151.

H. porto-ricense Balb. in sched.

Leskea capillaris Hedw. M. frond. IV, p. 25, t. 10; Brid. Bryol. univ. II, p. 308.

L. minutula Brid. Sp. M. II, p. 69.

l ? Ad arbor. et rup. — *Am. sept.* : Mexic., Jamaic., Hispaniola, Porto-Rico, Cuba. *Am. merid.* : Brasil. austr. or., Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1208.

Clarazii (Duby) Par.

Hypnum Clarazii Duby Choix de Crypt..., 1867, p. 14, c. ic.

? Rudia Clarazii Jaeg. Ad. II, p. 293.

l ? Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr., Uruguay.

exilissimum (Sull.) Jaeg. Ad. II, p. 291.

Hypnum exilissimum Sull. in Proced. Am. Acad... 1861, p. 286; Mitt. M. austr. am. p. 549.

Rhynchostegium exilissimum Jaeg. Ad. II, p. 430.

i. Cortic. — *Am. sept.* : Cuba.

Fabronia Schwaegr. — *Microthamnium*.

laevisetum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 292.

Hypnum laevisetum Mitt. *op. cit.* p. 550.

1 ? — *Am. merid.* : And. Quitens.

lanceolatum (Hpe. et C. M.) Par.

Hypnum lanceolatum C. M. *Syn. II*, p. 411.

Leskea lanceolata Hpe. et C. M. in *Linn.* 1844, p. 702.

1. In silv. — *Afr.* : C. B. S.

leptodontium (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 291.

Hypnum leptodontium Mitt. *op. cit.* p. 548.

1 ? — *Am. merid.* : And. Peruv.

Mittenii (Spr.) Par.

Eriopus Mittenii Jaeg. *Ad. II*, p. 338.

Hypnum Mittenii Spr. *Cat.* p. 21 et in Mitt. *op. cit.* p. 551.

1 ? Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

oblique-rostratum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 291.

Hypnum oblique-rostratum Mitt. *op. cit.* p. 548.

1 ? Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

pervirens (C. M.) Par.

Hypnum pervirens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 456.

1. In silv. — *Am. merid.* : Argentin. Urug.

pervirens Besch. — *H. tenuirostre*.

pseudo-Limnobium (C. M.) Par.

Hypnum pseudo-Limnobium C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 482.

1. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos-Ayr.

pulvinatum Lindb. — *Myrinia*.

seminerve Schwaegr. *Suppl. III, II, II, in indice.*

Hypnum seminerve C. M. *Syn. II*, p. 244.

Juratzkaea seminervis Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 188.

Leskea seminervis Kze. in *Poepp. Pl. Chil. I*, n. 273.

Stereophyllum seminerve Mitt. *M. austr. am.* p. 542.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile, Valdiv.

tenuirostre Schwaeg. *op. et l. cc.*, t. 293.

Hypnum Helicodontium C. M. *Syn. II*, p. 689.

H. tenuirostre ej. *op. cit.* p. 411.

Leskea tenuirostris Hook. in sched.

Myrinia tenuirostris Ltz. in *op. et l. cc.*

1. Ad arb. saxaq. inund. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Peruv. et Chil., Brasil. austr. or., Paraguay.

« *var. paraguayaricense* (C. M.) Par.

H. pervirens Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 18 et in *Bal. Pl. Parag.* n. 3687.

Hypnum tenuirostre *var. paraguayaricense* C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57.

— *Am. merid.* : Paraguay.

HELICOPHYLLUM Brid. *Bryol. univ.* II, p. 771 (2 spec.).

australe Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 524.

Powellia involutifolia (fid. Mitt).

2. — *Pac.* : Austral. fel.

torquatum *Brid. op. et l. cc.* ; *C. M. Syn. II*, p. 15 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 331.

Anoetangium torquatum Hook. M. ex. t. 41.

Schistidium torquatum Brid. op. cit. I, p. 121.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Porto-Rico, Jamaïc., Cuba. *Am. merid.* : Amazon., Brasil austr. or., And. Peruv.

Heliconema *Mitt. M. austr. am.* p. 112 (sect. SYRRHOPODONTIS).

Helicopogon *Mitt. op. cit.* p. 150 (sect. BARBULAE).

Hemicampylus *Mitt. op. cit.* p. 66 (sect. DICRANI).

HEMIRAGIS *Brid. Bryol. univ. II*, p. 334 (sect. LESKEAE) ; *Besch. gen. propr.*

Spec. omn. non indicatae HOOKERIAE ejusd. nom.

striata *Besch.* — *H. aurea.*

HEMISYNAPSIUM *Brid. Bryol. univ. II*, p. 604.

arcticum *Brid.* — *Bryum.*

β *purpurascens* *Brid.* — *Bryum purpurascens.*

bryoides *Brid.* — *Bryum Brownii.*

HEMITHECA *Lindb. mss.*, 1879, et in *Braithw. Sphagn.* pp. 30 et 35.

cyclophylla *Lindb.* — *Sphagnum.*

Pylaeai *Lindb.* — *Sphagnum.*

Henicodium *C. M. in Linn.* 1875, p. 470 (sect. HYPNI sensu Müll.).

HENNEDIA *R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1892, p. 286 (1)
(vid. HENNEDIELLA).

HENNEDIELLA *Par.* (3 spec.).

intermedia (*R. Br.*) *Par.*

Hennedia intermedia R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1892, p. 286.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

macrophylla (*R. Br.*) *Par.*

Hennedia macrophylla R. Br. in op. et l. cc.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

microphylla (*R. Br.*) *Par.*

Hennedia microphylla R. Br. in op. et l. cc.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

HENONIELLA *Duby in Mém...* Genève, 1876, p. 3 (1 spec.).

japonica *Duby in op. et l. cc., t. 2, f. I.*

Ptychomitrium Wilsoni Sull. et Lesq. ? (fid. Mitt.).

Terr. — *As.* : Japon.

(1) Nomen jam abusum : *Hennedya* Harv., 1860 (*Algae*).

Herpetineuron C. M. in *Fl.* 1890, p. 495 (sect. ANOMODONTIS).

HETEROCLADIUM Bryol. eur. V (11 spec.).

aberrans Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 59, t. IX B.

H. homœopterum C. M. et Kindb. in *Mac. Canad. M.* n. 484.

♂ ign. Cortic. et rupic. — Am. sept.: Columb. brit., Washington, Idaho.

dimorphum (Brid.) Bryol. eur. V (mon. p. 3), t. 479; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 606.

H. squarrosulum Lindb. *M. Scand.* p. 37.

Hypnum dimorphum Brid. *Mant. M.* p. 163.

H. squarrosulum Voit *M. Herbip.* p. 100.

H. Stereodon dimorphus Brid. *Mant. M.* p. 165 et Bryol. univ. II, p. 581.

2. Saxic. et terr. — Eur.: Fere tota, capiosior in silv. alp. As.: Caucas. centr. Am. sept.: Groenland, Nov. Scot., New Brunswick, Terr. nov., M. Alb., Idaho, Washington. Am. merid.: And. Quittens.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 993.

Un. itin. 1863, n. 60.

frallaniopsis C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 183.

2. Cortic. inter Hepatic. — Am. sept.: New Brunswick.

gastrodes (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad.* II, p. 312.

Hypnum gastrodes W. et D. in *Mém... Geneve*, 1871, p. 15, t. 5, f. 1.

2. Ad arbor. et rup. — Afr.: Angola.

heteropterum (Spr.) Bryol. eur. V (mon. p. 4), t. 480; W. P. Sch. *op. cit.* p. 607.

Hypnum catenulatum H. et T. *Muscol. brit.* II ed., p. 160; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 450 p.p.; Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 219.

H. heteropterum Spr. *M. Pyr.* n. 56 et in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* 1849, *M. Pyr.* n. 15; C. M. *Syn.* II, p. 437.

Leptohymenium heteropterum Hüb. *Muscol. germ.* p. 553.

Pterigynandrum heteropterum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 176 (quoad sp. *Voges., fid. C. M.; non! fid. W. P. Sch.*).

Pterogonium heteropterum Br. in *Schwaegr. Suppl.* III, I, I, t. 210.

2. Rupic. — Eur.: Britann., German. sept., Hercyn., Sudet., *Voges., Silv. Nigr., Tirol., Helvet., Pyren.* As.: Penins. Tschutschica. Am. sept.: Groenland, Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Idaho, Oregon.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 267.

Rab. Bryoth. eur. n. 539, 643.

Un. itin. 1863, n. 59.

« var. fallax Milde *Bryol. Siles.* p. 269.

H. heteropterum var. cavernarum Mdo.

Ut et ubi præced. in Eur.

homœopterum C. M. et K. — H. aberrans.

implexum Kze. — Rigodium.

Kurrii Bryol. eur. V (mon. p. 5), t. 480 et W. P. Sch. *op. cit.* p. 608.

1. Terr. — Eur.: Alp. Norveg. (Dovre).

Lechleri W. P. Sch. — Rigodium.

leucotrichum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 176.

Ster.

— As.: Japon.

mexicanum W. P. Sch. — *Pseudo-Leskea praelonga*.
papillosum Lindb. — *Leskea*.

procurrens (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 312 (1).

Pterogonium procurrens Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 37, t. 7.

2. *Ad rup. humid.* — *Am. sept.*: M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit. *Ews.*: Mac. Canad. M. n. 498.

prolixum W. P. Sch. — *Rigodium*.

squarrosulum Lindb. — *H. dimorphum*.

subintegrum Mitt. *M. Ind. or.* p. 135.

Ster. — *As.*: Himalaya occ.

tenue Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 176.

2. — *As.*: Japon.

vancouveriense Kindb. in *Mac Cat.* p. 183.

Thuidium vancouveriense ej. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 277.

2. *Rupic.* — *Am. sept.*: Ins. Vancouver, Washington.

Heterodiotyon W. P. Sch. *Coroll.* p. 77 (subgen. *BRYI* = *ANOMOBRYUM*).

HETEROPHYLLIUM W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 629 (subgen. *HYPNI*); *Kindb.*
Chek-List of Eur. and N. Amer. M. p. 72 (gen. propr.).

nemorosum Kindb. — *Hypnum*.

HETEROPHYLLUM C. M. in *Dusen M. Camer.*

Spec. omn. sunt RHAPHIDOSTEGIA ejusd. nom.

HILDEBRANDTIELLA C. M. in *Linn.* 1876, p. 257 (9 spec.).

Cameruniae C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 115.

— *Afr.*: M. Cameroon.

cuspidans Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 91.

2. — *Afr.*: Ins. Mayotte.

endotrichelloides C. M. in *Linn.* 1876, p. 257.

Cortic. — *Afr.*: Ins. Anjouan.

Holstii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 195.

2. *Cortic.* — *Afr.*: Usambara.

longiseta Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, II, p. 189.

2? — *Afr.*: Madagascar.

pachyclada Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 123; Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 195 (*descript. locupletior*).

2? — *Afr.*: Usambara, ins. Borbon., Franciae.

perpinnata Broth. in *op. cit.* p. 196.

2. ♂ et fr. ign. *Secus rivul.* — *Afr.*: Cameroon.

puccinigera C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (*nom.*).

— *Afr.*: Ins. Franciae.

(1) False *H. procumbens*.

thomeana Broth. in *Bol. d. Soc. Brot.* VIII, 1890 (1).
Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.

Himantocladium Mitt. *Sam. M.* p. 168 (sect. NECKERAE).

Himantophyllum ej. op. cit. p. 173 (sect. CALYMPERIDIS = EUCALYMPERES C. M.).

HIPPOPODIUM Fabric. *Fl. Ratisb.* p. 31.

aphyllum ej. — Buxbaumia.

HOLLIA Sieb. in *Fl.* 1826, p. 223.

myrmecodes ej. — Dicnemon calycinum.

HOLMGRENIA Lindb. in *Oefv...* 1862 (spec. omn. ORTHOTHECIA europ.).

HOLOBLEPHARUM Dz. et Mk. *M. frond. ined.* Archip. ind. p. 113 (3 spec.).

Deplanchei (Duby) Besch. *Fl. bryol. Nov. Caledon.* p. 227.

Chætomitrium Deplanchei Duby mss.

2. Ad ramos arb. — Pac. : Nov. Caledon.

leptopoma Dz. et Mk. — Hookeria.

orthorhynchum eor. — Chætomitrium.

rugifolium Sull. in *Am. Expl. Exped.* 1859, p. 23, t. 22.

Chætomitrium rugifolium Mitt. *Fl. Vit.* p. 392.

2. Ad arbor. — Pac. : Ins. Ovalan, Viti, Salomon.

speciosum Sull. in op. et l. cc., t. 21.

Chætomitrium speciosum Mitt. op. et l. cc.

— Pac. : Ins. Samoa.

Holodontium Mitt. *M. austr. am.* p. 63 (sect. DICRANI).

HOLOMITRIUM Brid. *Bryol. univ.* I (sub OLOMITRIO) (35 spec.).

acutum Wright in *Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 263.

— Afr. : Zambez. or.

alpinum Mitt. — Dicranoweisia.

antennatum Mitt. *M. austr. am.* p. 59.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

arboreum ej. op. cit. p. 58.

— Am. merid. : And. Quitens. et Peruv.

borbonicum Hpe. in Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 40.

H. vaginatum Brid. op. cit. p. 227 p.p.

— Afr. : Madagasc., ins. Borbon., Franciae.

calycinum (Sw.) Mitt. op. cit. p. 58.

Bryum calycinum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 139.

Cecalyphum calycinum P. B. *Prodr.* p. 50.

Dicranum calycinum Sw. *Fl. Ind. occ. III*, p. 1768.

Weisia calycina Hedw. *Sp. M.* p. 70, t. 14.

1. — Am. sept. : Jamaïc.

(1) In Enum. Kindberg. nom. nud. :
H. madagassa C. M.

- « *var. gracilis* (Hpe.) Par.
H. crispulum Mart. in *Fl. crypt. Brasil.* p. 53, t. 18, f. 2; Hsch. *Fl. Bras.* p. 35; C. M. *Syn.* I, p. 350.
H. calycinum var. gracilis Hpe. *Symb.* 1874, p. 487.
H. Sellowii Mitt. *op. cit.* p. 59.
Weisia Sellowii Schwaegr. *Suppl.* IV, p. 309.
 Cortic. et rupic. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat et Quitens., Brasil.
capense C. M. in *Rehin. M. Afr. austr. n.* 73.
 — *Afr.*: C. B. Sp.
cirratum Mitt. — *Dicranoweisia microcarpa*.
comorense C. M. in *Linn.* 1876, p. 236.
 Lignic. — *Afr.*: Ins. Anjouan.
crispulum { Mart. — *H. calycinum var. gracilis*.
 Mitt. — *Dicranoweisia*.
 Sull. — *H. marginatum*.
 var. gracilis Hpe. — *H. calycinum var. gracilis*.
dicranoides Dz. et Mk. — *Dicranum Molkenboeri*.
Dietrichiae C. M. in *Linn.* 1874, p. 149.
 1. — *Pac.*: Austral. or.
enerve Dz. et Mk. — *Braunfelsia*.
flagellare C. M. *mss.*; Jaeg. *Ad. II*, p. 761.
 Ster. — *Afr.*: Madagascar.
flexuosum Mitt. *M. austr. am.* p. 57.
 — *Am. merid.*: And. Quitens.
Glaziowii Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881, p. .
 — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.
Griffithianum Mitt. *M. Ind. or.* p. 24.
 Didymodon perichæetialis Griff. *Not.* p. 431 et *Ic. pl. asiat. t.* 80, f. 1
 Symblepharis densifolia Wils. in *Kew journ. bot.* IX, p. 292.
 2? — *As.*: Assam, Khasia.
hamatum C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 112.
 — *Afr.*: Madagascar (Diego Suarez).
Hildebrandtii C. M. in *Hildebr. M. Madag. n.* 2099.
 — *Afr.*: Madagascar.
indicum Mitt. — *Dicranoweisia*.
javanicum *Bryol. jav. I*, p. 86, t. 71.
 2. — *As.*: Java.
Lehmanni Besch. in *Journ. de bot.* 1894, p.
 — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
longifolium Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser. III*, p. 364.
 — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
lutescens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 473.
 1. — *Am. merid.*: Venezuela.
marginatum Mitt. *M. austr. am.* p. 57.
 H. crispulum Sull. in *Proced. Am. Acad.*, Aug. 1861.
 — *Am. sept.*: Cuba.
Moritzianum Hpe. in *Linn.* 1847, p. 70.
 — *Am. merid.*: Columb.

Mülleri *Hpe. in Linn.* 1869-70, p. 514.

— *Pac.* : Austral. (Victoria).

Novae Valesiae *C. M. in Rev. bryol.* 1876, p. 3 (nom).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

Olfersianum *Hsch. Fl. Brasil.* p. 18; *C. M. Syn. I*, p. 349.

l. — *Am. merid.* : Brasil.

paraguense *Besch. in Journ. de Bot.* 1891, p.

Ad rup. vulcanic. — *Am. merid.* : Paraguay.

perichaetiale (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ. I*, p. 227; *C. M. Syn. I*, p. 351.

Cecalyphum perichaetiale *P. B. Prodr.* p. 51.

Sprucea perichaetialis *H. f. et W. in sched. M. Antarct. I*, p. 128.

Symblepharis perichaetialis *Wils. in Fl. of the N. Zeal.* p. 60.

Trichostomum perichaetiale *Hook. M. ex. I*, t. 73 et *II*, p. 11.

l. — *Afr.* : Ins. Franciae (*fid. Handb. of N. Zeal. Fl.*).

Pac. : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman., ins. Campbell.

piliferum (*Mitt.*) *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 15.

Eucamptodon piliferus *Mitt. M. austr. am.* p. 69.

Cortic. — *Am. sept.* : Guadalup., ins. S. Margarit. *Am. merid.*

Ins. Trinitat.

proliferum *Mitt. op. cit.* p. 61.

— *Am. merid.* : Brasil. tropic.

pulchellum *Mitt. op. cit.* p. 60.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

pumilum *Mitt. mss.*

Symblepharis pumila *Mitt. in Hook. Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 405.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland. med.

Sellowii *Mitt.* — *H. calycinum* var. *gracilis*.

serratum (*W. P. Sch.*) *C. M. Syn. II*, p. 587.

Cecalyphum serratum *W. P. Sch. mss.*

Leptodontium brevisetum *Mitt. M. austr. am.* p. 50?

— *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

terebellatum *C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, *I*, p. 151.

l. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

tortuosum *Mitt. M. austr. am.* p. 58.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

undulatum *Mitt. op. cit.* p. 59.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

vaginatum (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ. I*, p. 227; *C. M. Syn. I*, p. 350.

Cecalyphum cylindraceum *P. B. Prodr.* p. 51.

Dicranum calycinum *Brid. op. cit.* p. 452 (*excl. syn.*).

D. cylindraceum *ej. op. cit.* p. 458.

Trichostomum vaginatum *Hook. M. ex. I*, t. 64, *II*, p. 11.

Weisia vaginans *Brid. op. cit.* p. 807.

l. Arbor. — *Afr.* : Usambara, ins. Borbon., Franciae, C. B. Sp. *Pac.* : Taïti.

« var. *obtusifolium* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 40.

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

vaginatum *Brid. p.p.* — *H. borbonicum*.

Wrightii Sull. in *Proced. Am. Acad.*... 1861, p. 279; Mitt. *M. austr. am.* p. 61.

— *Am. sept.*: Cuba.

HOMALIA Bryol. eur. V (sub OMALIA) (53 spec.).

ankaratrensis Kiaër in *Borgen M. Madag. n.* 38.

— *Afr.*: Madagasc. centr.

arcuata Bryöl. jav. II, p. 56, t. 176.

2.

— *As.*: Ins. Halmaheira Molluc., Sumatra.

auriculata Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 115, t. 92, f. 4 et *Handb.* p. 483.

Ster. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Zeland. sept.

australasica C. M. in Ångstr. *Prim. lin.* p. 51.

H. intermedia Ångstr. in *Oefv.*... 1872, n. 4, p. 17.

Porotrichum dendroides (fid. Mitt. in *Proc. of the roy. Soc.* 1879 (*extra vol.*), p. 101).

2.

— *Pac.*: Ins. Hawai (Honolulu).

Besseri Lobarz. — Neckera Sendtneriana.

bibrachiata (C. M.) Par.

Hypnum bibrachiatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise...* Bot. p. 54.

— *Pac.*: Nov. Guinea.

complanata de Not. — Neckera.

defoliata (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 201.

Hypnum defoliatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1869, p.

Ster. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

densa Boswell in *Journ. of bot.* 1892, p. 98.

2.

— *Pac.*: Ins. Oahu.

dentata (Griff.) Jaeg. *Ad. II*, p. 202.

Neckera dentata Griff. *Not.* p. 463 et *Ic. pl. asiat.*, t. 88, f. 2; Mitt. *M. Ind. or.* p. 119.

— *As.*: Assam.

elongata Welw. et Duby in *Mém.*... Genève, 1871, p. 5, t. 2, f. 3.

2. Lignic. — *Afr.*: Angola.

erosifolia C. M. mss.; Jaeg. *Ad. II*, p. 203.

— *As.*: Pegu.

exigua Bryöl. jav. II, p. 55, t. 175.

2.

— *As.*: Celebes, Borneo, Java, Sumatra, Tonkin.

Afr.: Ins. Franciae. *Pac.*: Taïti.

falcifolia Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 115, t. 92, f. 1 et *Handb.* p. 483.

Hypnum falcifolium eor. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 554; C. M. *Syn. II*, p. 230.

2.

— *Pac.*: Nov. Zeland. sept., Tasman.

flabellata (Dicks.) Bryöl. jav. II, p. 58, t. 178.

Hookeria flabellata Sm. in *Trans. of the Linn. Soc. IX*, p. 280, t. 23, f. 2.

Hypnum flabellatum Dicks. in *hb. L. jun.*; C. M. *Syn. II*, p. 225.

Leskea Omalia flabellata Brid. *Bryöl. unic. II*, p. 325.

Neckera flabellata Mitt. *M. Ind. or.* p. 118.

Porotrichum flabellatum ej. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 175.

2. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan, Japon., Ternate, ins. Halmaheira et Saporaea Molucc., Borneo, penins. Malay., Java, Sumatra.

glabella (Sw.) Mitt. *M. austr. am.* p. 458.

Hypnum glabellum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 140.

Leskea glabella Hedw. *Sp. M.* p. 235, t. 59.

Neckera Distichia glabella Brid. *Bryol. univ.* II, p. 242.

N. glabella Sw. *Fl. Ind. occ.* III, p. 1782 ; *C. M. Syn.* II, p. 44.

N. patagonica Brid. *M. Rec.* II, II, p. 4 ?

Pilotrichum patagonicum P. B. *Prodr.* p. 83 ?

Sphagnum pennatum, planum Dill. *Hist. M.* p. 249, . 32, f. 7 (! *fid. Brid. ; ?? fid. C. M.*).

Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Jamaic.

glossophylla (Mitt.) Jaeg. II, p. 198.

Neckera glossophylla Mitt. *M. Ind. or.* p. 119.

- Ster. — *As.* : Sikkim, Khasia.

Goughiana (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 200.

Neckera Goughiana Mitt. *op. cit.* p. 120.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

gracilis Jam. in *Rep. Reg. N. York Univ.* 1869, p. 57 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 82, t. 25 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 285.

- ♀ et fr. ign. — *Am. sept.* : M. Adirondack et Catskill.

Hookeriana *Bryol. jav.* II, p. 57, t. 177.

Neckera Hookeriana Mitt. *op. cit.* p. 118.

2. — *As.* : Sikkim, Khasia, ins. Bali.

intermedia Ångstr. — *H. australasica*.

Jamesii W. P. Sch. *Coroll.* p. 100 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 285.

1. — *Am. sept.* : M. Alb. et Catskill, Pensilv.
Exc. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 397.

javanica (C. M.) *Bryol. jav.* II, p. 54.

Neckera dendroides Hsch. et Reinw. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop.* XIV, II, *Suppl.* p. 714.

N. javanica C. M. *Syn.* II, p. 41.

2. — *As.* : Japon. ? Java, Ceylan.

laxiretis (C. M.) Jaeg. *Ad.* II, p. 203.

Hypnum laxirete C. M. in *Bot. Zeit.* 1869, p.

Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Æquator.

lentula Wils. in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* 1847, p. 379 ; *C. M. Syn.* II, p. 46 (1).

Ster. Ad arbor. — *Am. sept.* : Jamaic.

ligulaefolia (Mitt.) *Bryol. jav.* II, p. 59, t. 179.

Neckera ligulaefolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 119.

2. Ad arbor. — *As.* : Ceylan, Sumatra, Java.

linguaefolia Welw. et Duby in *Mém... Genève*, 1871, p. 7, t. 3, f. 6.

1. Ad arbor. — *Afr.* : Angola.

(1) In Mitt. *M. austr. am.* deest ; an *H. glabella* ?

lusitanica W. P. Sch. *Coroll.* p. 101 et *Syn.* II ed. p. 572.

H. trichomanoides Rab. *Bryoth. eur.* n. 467.

1. Ad rup. irror., rarius ad arb. — *Eur.*: Gall. merid., Catalaun., Lusit., Etrur., Istria. *Afr.*: Alger.

Macounii C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 163.

H. obtusata Lesq. et Jam. *Man.* p. 285; *Mac. Canad. M.* n. 243.

H. trichomanoides eor. *ll. cc.*, p. 285 et n. 242.

Hypnum trichomanoides Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 171.

1. Cortic., rupic. et terr. — *Am. sept.*: Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, lac. Super., Columb. brit., ins. Vancouver.

microdendron (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 200.

Hookeria? *microdendron* Mont. in *Voyage Bonite, Crypt.* p. 150, f. 3 et *Syll.* p. 15.

Hypnum microdendron C. M. *Syn. M. II*, p. 231.

2. Ster. Ad arbor. — *As.*: Cochinchin.

Mohriana (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 202.

Neckera Mohriana C. M. in *Linn.* 1876, p. 646.

Ster. Cortic. in silv. — *Am. sept.*: Mexic.

Montagneana (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 203.

Hookeria longissima Mont in sched.

Hypnum Montagneanum C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 436.

2. Arbor. — *As.*: Yunnan, M. Neilgherr.

nitidula Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* p. 155; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 360 (descript. fruct.).

1. — *As.*: Japon.

Exs.: Faurie n. 307.

oblongifolia Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 115, t. 91, f. 6 et *Handb.* n. 483.

Hookeria punctata var. *oblongifolia* eor. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 550; *C. M. Syn. II*, p. 28.

2. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Zeland. sept.

obtusata (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 201.

Neckera obtusata Mitt. *M. Ind. or.* p. 118.

1. — *As.*: Tibet. occ.

obtusata Lesq. et Jam. -- *H. Macounii*.

Pabstiana W. P. Sch. *hb.*

Neckera Pabstiana C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 766.

1. Ad arbor. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

paraguensis Besch. — *Stereophyllum*.

pendula W. P. Sch. — *Porotrichum piniforme*.

penduliramea (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 202.

Neckera penduliramea C. M. in *Linn.* 1876, p. 647.

Ster. Ad rup. trachyt. irror. — *Am. sept.*: Mexic.

Pourretiana Roumeg. — *Neckera Sendtneriana*.

praelonga Reichdt. *Beitr.* p. 573.

2. Ster. — *Pac.*: Ins. Sandwic.

pseudo-exigua Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.*, p. 42.

Ster. Cortic et rupic. — *Pac.*: Taïti.

pulchella Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 114, t. 91, f. 5 et *Handb.* p. 483.

Hookeria punctata eor. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 550; *C. M. Syn.* II, p. 28.

2. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Zeland. sept. et med., ins. Norfolk, Tasman.

pusilla Bryol. jav. II, p. 56, t. 176.

Ster. — *As.*: Ins. Ceram.

rectifolia (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 203.

Neckera rectifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 119.

2. — *As.*: Khasia.

rotundata (Hpe.) Jaeg. *Ad.* II, p. 201.

Hypnum rotundatum Hpe. in sched.

— *As.*: Birman.

rotundifolia W. P. Sch. — *Neckera Sendtneriana* var. *rotundifolia*.

Sakontala Ltz. *Moosst.* p. 166.

Ster. — *As.*: India.

scalpellifolia (Mitt.) Bryol. jav. II, p. 60, t. 180.

Neckera scalpellifolia Mitt. op. cit. p. 119.

Porotrichum scalpellifolium ej. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 175.

2. Ad arbor. — *As.*: Japon., Tonkin, Amboine, Ternate, ins. Ceram,

Halmaheira et Saparaea Molucc., Borneo, Java, Sumatra, Ceylan.

Exs.: Savat. Pl. Japon. n. 568.

Sendtneriana W. P. Sch. — *Neckera*.

spathulaefolia (C. M.) Jaeg. *Ad.* II, p. 198.

Hypnum spathulaefolium C. M. *Syn. M.* II, p. 231.

Neckera spathulaefolia Mitt. op. cit. p. 118.

2. — *As.*: India.

Stracheyana (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 213.

Neckera Stracheyana Mitt. *M. Ind. or.* p. 118.

— *As.*: Himalaya.

subexigua C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (nom.).

— *Afr.*: Ins. Franciae.

subrecta (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 200.

Neckera subrecta Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 7.

1. Inter musc. — *Afr.*: Madeir.

Targioniana Gough mss.

Neckera Targioniana Mitt. op. cit. p. 117.

2. — *As.*: M. Neilgherr., Yunnan.

trichomanoides (Schreb.) Bryol. eur V (mon. p. 3), t. 446; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 571.

Fuscina trichomanoides Schrank *Baïers Fl.* II, p. 451.

Hypnum complanatum β obtusum Ehrh. *Hannov. Mag.* 1870, p. 237.

H. pennatum, *trichomanoides*, *splendens*, *ramosum* Dill. *Hist. M.* p. 269, t. 34, f. 8.

H. trichomanoides Schrb. *Spic. Fl. Lips.* p. 88; *C. M. Syn.* II, pp. 229 et 681.

Leskea trichomanoides Hedw. *Sp. M.* 232.

L. Omalia trichomanoides Brid. *Bryol. univ.* II, p. 329.

Neckera trichomanoides Hartm. *Skand. Fl.* V ed. p. 338.

1. Ad arbor. trunc. et rad., terr. et sax. in silv. — *Eur.*: Med., rar. sept. vel. merid. *As.*: Jenissei sup., Caucas. occ. et centr.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 71 b.

trichomanoides } Lesq. et Jam. — *H. Macounii*.
 } Rab. exs. — *H. lusitanica*.

truncata *Welw. et Duby in Mém... Genève, 1871, p. 6, t. 3, f. 5.*

1. Ad rup. umbros. — *Afr.*: Angola.

Valentini *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 133.*

2. — *Afr.*: Ins. Borbon., Franciae.

variifolia *Welw. et Duby in op. cit. p. 5, t. 4, f. 5.*

Ster. Ad rup. madid. — *Afr.*: Angola.

Webbiana (*Mont.*) *W. P. Sch. Coroll. p. 101.*

Hookeria Webbiana *Mont. in Hist. Il. Canar. p. 12, t. I, f. I et Syll. p. 16.*

Hypnum Webbiana *C. M. Syn. II, p. 230.*

1. In silv.; cortic.? — *Afr.*: Ins. Teneriff.

Wrightii *Sull. M. of U. St. p. 65.*

Hypnum Wrightii *Sull. Ic. M. p. 209, t. 127; Lesq. et Jam. Man. p. 411.*

1. Ad arbor. — *Am. sept.*: Texas, Nov. Mexic.

Exs.: Sulliv. et Lesq. *M. bor. am. I ed. n. 269 et II ed. n. 536.*

Zetterstedti *Jaeg. — Sauloma.*

Homalocarpus *Mitt. M. austr. am. p. 85* (sect. *CAMPYLOPODIS*).

HOMALOTHECIUM *Bryol. eur. V* (23 spec.).

acuminatum *Jaeg. — Brachythecium.*

algerianum *Besch. Cat. M. Alger. p. 35.*

— *Afr.*: Alger.

Boivinianum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 152.*

— *Afr.*: Comor. magn.

Bonplandii (*Hook.*) *Jaeg. II, p. 379.*

Hookeria leskeoides *Hook. M. ex. t. 55 p.p.*

Hypnum Bonplandii *C. M. Syn. II, p. 463; Mitt. M. austr. am. p. 558.*

H. pseudo-salebrosum *Hpe. (fid. Mitt. l. c.).*

Leskea Bonplandii *Hook in Kth. Syn. Pl. Æquin. I, p. 61; Brid. Bryol. univ. II, p. 318.*

2. Rupic. — *Afr.*: Ins. Tristan d'Acunha, C. B. Sp. Am. merid.; And. Nov. Granat. et Quitens.; Peruv.

caucasicum (*Lindb.*) *Par.*

Hypnum caucasicum *Linnb. in Broth. Enum. M. Caucas. p. 117.*

2. Ad arbor. et rup. — *As.*: Caucas.

congestum (*Sw.*) *Jaeg. Ad. II, p. 377.*

Hypnum congestum *Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 142; C. M. Syn. II, p. 358; Mitt. M. austr. am. p. 559.*

Leskea congesta *Brid. Bryol. univ. II, p. 323 p.p.*

2. Ad arbor. — *Am. sept.*: Jamaic., ins. Montserrat. *Am. merid.*: Guian. bat.

corticola *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club XVII, p. 276 et in Mac. Cat. pp. 175 et 274.*

1. Rupic. — *Am. sept.*: Ins. Vancouver.

? decorum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 746.

Hypnum decorum Mitt. M. Ind. or. p. 77.

Leskea longirostris Schwaegr. t. 290 A (fld. Mitt.; deest in C. M. Syn.).

— As. : Nepal.

fallax Philib. in W. P. Sch. Syn. II ed. p. 644.

2. Ad sax. et terr. petros. calc. — Eur. : Gall. occ., Galloprov.

fulgenscens (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 375.

Hypnum fulgenscens Mitt. in M. Douglas et in Bot. Zeit. 1858, p. 170.

2. — Am. sept. : Columb. brit.

? incompletum (Griff.) Jaeg. Ad. II, p. 746.

Hypnum incompletum Mitt. M. Ind. or. p. 77.

Leskea incompleta Griff. Not. p. 478 et Ic. pl. asiat. II, t. 102, f. 3.

— As. : Assam.

? laevisetum (Sande. Lac.) Par.

Hypnum laevisetum S. Lac. in Miq. Ann. Mus. bot. Lugd. Batav. II, p. 298, t. 186, f. I.

2. — As. : Japon.

laeviusculum Jaeg. — H. neckeroides.

luteolum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 379.

Hypnum luteolum Mitt. M. austr. am. p. 558.

— Am. sept. : Ins. S. Vincent.

? macrostegium (Sull. et Lesq.) Par.

Hypnum macrostegium S. et L. in Proced. Am. Acad... IV, p. 280.

— As. : Japon.

Mandoni Mitt. in Goodman's Nat. hist. of the Azores, 1870, p. 311 (1).

H. sericeum var. madeirense W. P. Sch. hb.

H. sericeum var. meridionale ej. in Mandon Pl. Mad. n. 36 et 37.

2. — Afr. : Madeir.

? neckeroides (Griff.) Par.

H. laeviusculum Jaeg. Ad. II, p. 745.

Hypnum laeviusculum Mitt. M. Ind. or. p. 76.

Pterogonium neckeroides Griff. Not. p. 450 et Ic. pl. asiat. II, t. 98, f. 3.

Ad arbor. — As. : Khasia.

nevadense Ren. et Card. — Camptothecium.

var. subulatum eor. — H. sericeoides.

Nuttallii Jaeg. — Camptothecium.

Philippeanum (Spr.) Bryol. eur. V (mon. p. 3), t. 457; W. P. Sch. Syn. II ed. n. 633.

Hypnum Philippeanum C. M. Syn. II, p. 356.

Isothecium Philippeanum Spr. M. Pyr. n. 77 et in Ann. and Mag. of nat. Hist. 1849, M. Pyr. n. 88.

2. Ad rup. et sax. umbrosa, praecip. calcar. — Eur. : Jurass. helvet. et germ., Alp. Sabaud., Austr., Siles., Ital. sup., Pyren. As. : Caucas. occ. et centr. Afr. : Alger.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 344, 487, 1190.

Un. itin. 1863, n. 65.

(1) Cf. Geheeb in Fl. 1886, n. 22.

pseudo-sericeum (C. M.) Lesq. et Jam. Man. p. 310.

Hypnum pseudo-sericeum C. M. in Fl. 1875, p. 89.

2. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit., Oregon, Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 435.

sciureum (Mitt.) Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 372.

Hypnum sciureum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 184.

— As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 162 p.p.

sericeoides C. M. et Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 175.

Camptothecium nevadense var. subulatum Ren. et Card. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.

Hypnum Brittoni Mitt. mss.

2. Ster. Ad rup. granit. — Am. sept. : Columb. brit., Washington, Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 496.

sericeum (L.) Bryol. eur V (mon. p. 3), t. 456 ; W. P. Sch. op. et l. cc.

Hypnum sericeum L. Sp. pl. p. 1595 ; C. M. Syn. II, p. 356.

H. vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis Dill. Hist. M. p. 325, t. 42, f. 59

Isothecium sericeum Spr. M. Pyr. n. 76.

Leskea sericea Hedw. M. frond. IV, p. 43, t. 17 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 295.

Neckera sericea Hedw. Fund. M. II, p. 93.

2. Ad arbor. et mur., rar. rup. — Eur. : Fere tota, in intermed. et merid. vulgatiss. As. : Caucas., Kurdistan., Pers. Afr. : Alger., ins. Canar., Madeir. Am. sept. : M. Rupestr., ins. Vancouver.

Exs. : Bourg, Pl. Canar. n. 1584.

Drumm. M. bor. am. I ed. n. 169 (Hypnum).

Mac. Canad. M. n. 549.

Rab. Bryoth. eur. n. 446.

var. madeirense W. P. Sch. — H. Mandoni.

var. meridionale W. P. Sch. — H. Mandoni.

« var. tenellum Lge. in Bot. Tidskr. 1867-68, p. 248.

— Eur. : Belgia.

subcapillatum (Hedw.) Sull. M. of U. St. p. 63, t. 5 et Ic. M. p. 141, t. 90.

Hypnum subcapillatum C. M. Syn. II, p. 352.

Lasia subcapillata Brid. Bryol. univ. II, p. 202.

Pterigynandrum subcapillatum Hedw. Sp. M. p. 83, t. 16, f. 9-12.

Pterogonium decumbens Schwaegr. Suppl. II, I, p. 32, t. 110.

Pt. subcapillatum ej. Suppl. I, I, p. 107.

1. Cortic. in silv. — Am. sept. : Reg. or. et centr.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 88 (Hypnum).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 384.

tenerrimum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 377.

Hypnum tenerrimum C. M. in Bot. Zeit. 1856.

Rhynchostegium tenerrimum Jaeg. Ad. II, p. 429.

1. Filicic. — Am. sept. : Guatemala.

tokiadense (Mitt.) Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 372 (descript. fruct.).

Hypnum tokiadense Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 184.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 64, 84, 117, 125, 213, 1428, 3512.

Homomallia C. M. Syn. II, p. 425 (subsect. HYPNI).

Homomallium W. P. Sch. Syn. I ed. p. 616 (subgen. HYPNI).

HOOKERIA Sm. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 275 (234 spec).

abrupta (Mitt.) Par.

Callicostella abrupta Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 61.

Hypnella abrupta Jaeg. Ad. II, p. 269.

2. — Afr. : Ins. Fernando-Po.

acicularifolia C. M. in Dusen M. Camer. n. 245.

— Afr. : M. Cameroon.

acicularis Mitt. M. austr. am. p. 354.

Hookeriopsis acicularis Jaeg. Ad. II, p. 263.

— Am. sept. : Guatemala, Jamaic.

acuminata Mitt. op. cit. p. 357.

Hookeriopsis acuminata Jaeg. Ad. II, p. 265.

2. — Am. merid. : And. Quitens.

acutifolia { Hook. — *Pterygophyllum*.
Sull. — H. ? *Sullivantii*.

adnata H. f. et W. — *Mniadelphus*.

var. Sull. — *Mniadelphus cubensis*.

adunca Mitt. op. cit. p. 362.

Hookeriopsis adunca Jaeg. Ad. p. 267.

Lignic. — Am. merid. : And. Quitens.

aeruginosa Mitt. op. cit. p. 346.

2. Lignic. — Am. merid. : And. Quitens. et Peruv.

affinis { C. M. — *Lepidopilum*.
W. Arn. — H. *depressa*.

africana (Mitt.) Par.

Callicostella africana Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. XXXIII, p. 53, t. 5, f. 9.

Syn. — Afr. : Ins. Fernando-Po, Niger. inf.

albata C. M. Syn. II, p. 191 ; Mitt. op. cit. p. 343.

1 ? — Am. merid. : Ins. Trinit.

albicans (Sw.) Hook. Muscol. brit. 1818, p. 90 ; C. M. Syn. II, p. 189 ;
Mitt. op. et l. cc.

Hypnum albens Gmel. Syst. nat. II, p. 1343.

H. *albicans* Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 140.

H. *pallidum* Brid. M. Rec. II, II, p. 127.

Leskea albicans Hedw. Sp. M. p. 218, t. 54 ; Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1811.

Pterygophyllum albicans Brid. Bryol. univ. II, p. 349 p.p.

1 ? — Am. sept. : Mexic., Jamaic. Am. merid. : Ins.

Trinitat, And. Nov. Granat. et Quitens.

albicans Tayl. — H. *laete virens*.

albicaulis W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 58.

Ster. — Am. sept. : Guadalup.

amblyophylla H. f. et W. — *Mniadelphus*.

ancistroides Mont. — *Meteorium*.

angolensis W. et Duby. — *Lepidopilum*.

anomala C. M. — *Pterygophyllum*.

Antillarum Mitt. — *Pilotrichidium*.

apiculata Sande Lac. in Miq. Ann. Mus. bot. Lugd. Batav. II, p. 296 ;

Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. t. 52 (sine nom., diagn. aut loc. natal.).

— As. : Japon.

apiculata H. f. et W. — Eriopus.

apophysata Hpe. *Symb.* 1874, p. 514.

Callicostella apophysata Jaeg. *Ad. II*, p. 256.

Syn. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Araucariae C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 157.

Ad terr. humid. in silv. — *Am. merid.* : Brasil. subtropic. or.

Arbuscula Sm. — *Camptochaete*.

arcuata Bryol. jav. *II*, p. 56, t. 176.

— *As.* : Ins. Halmaheira, Sumatra.

Ascensionis C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 84 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 42.

Ster. — *Afr.* : Ins. Ascension.

aspera Mitt. *M. austr. am.* p. 352.

Callicostella aspera Jaeg. *Ad. II*, p. 258.

Lignic. — *Am. merid.* : Venezuela, Amazon., Guayaquil, And. Quitens.

asplenioides } W. Arn. — Eriopus.

 } *nervo subcontinuo* Mont. — *Pterygophyllum Orbignyanum*.

asprella Hpe. *Symb.* 1877, p. 730.

Callicostella asprella Jaeg. *Ad. II*, p. 774.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

atro-virens Col. — *Pterygophyllum*.

attenuata C. M. in *op. cc. pp.* 88 et 63.

Ad arbor. — *Afr.* : Monrovia.

Auberti (P. B.) C. M. *Syn. II*, p. 190.

Neckera Auberti Brid. *Sp. M. II*, p. 28.

Pterygophyllum albicans ej. *Bryol. univ. II*, p. 349 p. p.

Rhacopilum Auberti P. B. *Prodr.* p. 87.

1 ? Saxic. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.

aurea (Lam.) Mitt. *op. cit.* p. 348.

Dicranum Novae Hollandiae Hsch. in *Sieb. M. exs. n.* 7.

Harpophyllum aureum Spr. *Catal.* ; Husnot *M. Antill. n.* 187.

Hemiragis striata Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 68.

Hypnum aureum Lam. *Encycl. meth. bot. III*, p. 172 ; C. M. *Syn. II*, p. 386.

H. congestum Hedw. *Sp. M.* p. 283, t. 74, f. 4-7.

H. phryscophyllum W. Arn. *Dispos.*

Leskea congesta Brid. *Bryol. univ. II*, p. 323.

L. striata Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 180, t. 86.

L. Hemiragis striata Brid. *op. cit.* p. 334.

Mnium aureum P. B. *Prodr.* p. 74.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica, Guadalup. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., And. Quitens.

aureo-purpurea Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881, p.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Baileyi Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV, Suppl.* p. 98 (nom.) et in *Oefv...* 1890, p.

Syn. Lignic. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

Beccariana Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 282.

Callicostella Beccariana Jaeg. *Ad. II*, p. 259.

1. Ad arbor. — *As.* : Borneo.

Belangeriana Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 59.

Callicostella Belangeriana Jaeg. *Ad. II*, p. 257.

Syn. — *Am. sept.*: Martinic.

Bernouillii W. P. Sch. *mss.*; Jaeg. *Ad. II*, p. 734.

— *Am. sept.*: Guatemala

Bescherellei Par.

H. rugulosa Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 229.

1. Terr. — *Pac.*: Nov. Caledon.

Beyrichiana Hpe. *Symb.* 1872, p. 57.

Callicostella Beyrichiana Jaeg. *Ad. II*, p. 261.

H. Langsdorffii Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 61 p.p.

2. Ad arbor. et rup. humid. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

bicolor W. P. Sch. in Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 58.

— *Am. sept.*: Guadalup.

bisexualis Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 230.

Callicostella bisexualis Jaeg. *Ad. II*, p. 260.

1. vel syn. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Caledon.

blanda Ltz. *Moosst.* p. 166.

1. — *Am. sept.*: Jamaic.

Blumeana C. M. *Syn. II*, p. 676.

Pterygophyllum Blumeana *Bryol. jav. II*, p. 38, t. 161.

Syn. — *As.*: M. Java, Sumatra occ.

bogotensis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, p. 303.

Adelothecium bogotense Mitt. *M. austr. am.* p. 391.

2. — *Am. sept.*: Cuba, Jamaic. *Am. merid.*: And.

Nov. Granat, Brasil. tropic.

bombonasica Mitt. *op. cit.* p. 342.

Syn. — *Am. merid.*: And. Quitens.

borbonica Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 142.

1? — *Afr.*: Ins. Borbon.

« *f. inundata* Besch. *l. c.*

Aquat.? — *Afr.*: Ins. Borbon.

Breuteliana Hpe. *mss.*; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 247.

2? — *Afr.*: C. B. Sp.

breviseta Hpe. *Symb.* 1877, p. 730.

Hookeriopsis breviseta Jaeg. *Ad. II*, p. 774.

2? — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

brunnescens W. P. Sch. — *Pilotrichidium*.

caespitosa Mitt. *M. austr. am.* p. 347.

2? — *Am. merid.*: And. Quitens.

caldensis Ångstr. *Prim. lin.* p. 25.

Callicortella caldensis Jaeg. *Ad. II*, p. 261.

Syn. — *Am. merid.*: Brasil.

californica W. P. Sch. in *Jardin Enum.* p. 20 (*nom.*).

— *Am. sept.*: Calif. (ins. Cervorum).

callicostata C. M. — *Pilotrichidium*.

Campbelliana Hpe. in *Linn.* 1874, p. 668.

Callicostella *Campbelliana* Jaeg. *Ad. II*, p. 260.

1. — *Pac.* : Nov. Hebrid.

capillata Mitt. *M. austr. am.* p. 341.

Lignic. — *Am. merid.* : Nov. Granat., And. Quitens.

castanea Mitt. *op. et l. cc.*

2? — *Am. merid.* : And. Quitens.

cavifolia Mitt. *op. cit.* p. 361.

Hookeriopsis cavifolia Jaeg. *Ad. II*, p. 267.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

ceylanica Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 310.

1 et syn. — *As.* : Ceylan.

cheiloneura C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 415.

— *Afr.* : M. Cameroon.

chimborazensis Mitt. *M. austr. am.* p. 346.

2. — *Am. merid.* : M. Chimborazo.

chionophylla (C. M.) Par.

Callicostella chionophylla C. M. in *Fl.* 1886, p. 282.

Ad arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

chlorina Besch. *Fl. Bryol. Taïti, etc.* p. 45.

2? Cortic. — *Pac.* : Nuka-Hiva.

chloroneura Tayl. — *Lepidopilum*.

ciliata W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 87.

Callicostella ciliata Jaeg. *Ad. II*, p. 259.

— *Am. sept.* : Mexic.

cirrifolia W. Arn. — *Rhaphidostegium*.

cirrosa Hpe. *Symb.* 1874, p. 512.

Hookeriopsis cirrosa Jaeg. *Ad. II*, p. 268.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

commutata Par.

H. leptorhyncha Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 68 (1).

2? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

complanata Hpe. — *Pterygophyllum*.

confusa Par.

H. heterophylla Geh. et Hpe. in *litt. ad. Jaeg.* 1878-79, *Ad. II*, p. 774.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

constricta C. M. in *Fl.* 1886, p. 515.

Terr. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po.

contortifolia Mont. — *Mniadelphus*.

convallium C. M. — *Lepidopilum*.

convoluta Spreng. — *Leptodon Smithii*.

corcovadensis Reichdt. in *Novara Exped. Bot. I*, p. 186, t. 36.

Hookeriopsis corcovadensis Jaeg. *Ad. II*, p. 263.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

(1) « In herbar. Beyrichiano non asservata. Stirps dubia. » Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 65.

corticola C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 85.

Ad truncos arb. — *Am. merid.* : Brasil. subtropic. or.

crenata Mitt. *M. austr. am. p.* 351.

H. Merkelii Sull. in *Proced. Am. Acad...* 1861, p. 286.

Syn. — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent, Cuba.

crispa C. M. in *Bot.* 1855, p. 768 ; *Mitt. op. cit. p.* 354.

H. undata C. M. *Syn. II*, p. 209.

Hookeriopsis *crispa* Jaeg. *Ad. II*, p. 262.

1. Ad arbor. *Am. sept.* : And. Costa Ric. *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil austr. or.

crispula H. f. et W. — Mniadelphus.

cristata { Dz. et Mk. — Eriopus remotifolius.
Reichdt. — Eriopus Jelinckii.
W. Arn. — Eriopus.

Cruceana Duby *Choix de crypt. ex...* 1867, p. 12, t. 4 ; *Mitt. op. cit. p.* 349.

Callicostella *Cruceana* Jaeg. *Ad. II*, p. 257.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Florida (ster.) ; Mexic.

Crügeriana C. M. *Syn. II*, p. 208 ; *Mitt. op. cit. p.* 355.

Hookeriopsis *Crügeriana* Jaeg. *Ad. II*, p. 263.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Ins. Barbad. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Amazon., And. Peruv.

« *var. dimorpha* C. M. *l. c.*

— *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

cupressiformis C. M. — H. leptorhyncha.

curvifolia Mitt. *op. cit. p.* 362.

Hookeriopsis *curvifolia* Jaeg. *Ad. II*, p. 267.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

cuspidata C. M. *Syn. II*, p. 189 ; *Mitt. op. cit. p.* 344.

Hookeriopsis *cuspidata* Jaeg. *Ad. II*, p. 263.

1. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil. austr. or.

cuspidata { Dz. et Mk. — Distichophyllum.
Mitt. — H. quitensis.

cuspidatissima Hpe. *Symb.* 1874, p. 514.

Callicostella *cuspidatissima* Jaeg. *Ad. II*, p. 260.

Ster. — *Am. merid.* : Æquator.

cymbifolia Hpe. in *Linn.* 1852, p. 362 ; *Mitt. op. cit. p.* 344.

Hypnella *cymbifolia* Jaeg. *Ad. II*, p. 269.

Syn. Lignic. — *Am. sept.* : Guadalup., Cuba, Porto-Rico.

debilis Sull. — Leucomium.

Deppeana C. M. — Lepidopilum.

denticulata Mitt. *op. cit. p.* 347.

Ad saxa irror. — *Am. sept.* : Guadalup. ? Martinic. ? *Am. merid.* : And. Peruv.

denticulata H. f. et W. — Pterygophyllum.

var. latifolia C. M. — Pterygophyllum *denticulatum var. latifolia.*

depressa (Sw.) Hook. et Tayl. *Muscol. brit.* p. 90; *C. M. Syn.* II, p. 218.

Callicostella depressa Jaeg. *Ad.* II, p. 256.

H. affinis W. Arn. in *Trans. of Wern. Soc.* V et *Disp.* p. 56.

Hypnum depressum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 141.

H. guadalupense Spreng. in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 351.

Leskea depressa Hedw. *Sp. M.* p. 215, t. 53.

Pterygophyllum depressum Brid. *op. cit.* p. 351.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.? Cuba, Hispaniola,
Jamaic., Porto Rico.

depressula C. M. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 59.

Callicostella depressula Jaeg. *Ad.* II, p. 256.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

diaphana W. Arn. — *Lepidopilum*.

Dicksoni Hook. — *Distichophyllum*.

diffusa Wils. in *Mitt. M. austr. am.* p. 354.

Hookeriopsis diffusa Jaeg. *II*, p. 263.

— *Am. merid.* : Panama.

disticha (Ångstr.) Par.

Callicostella disticha Ångstr. in *Oefv.*, 1873, n. 5, p. 150.

2. — *Afr.* : Ins. S. Jose.

divaricata Mitt. — *Lepidopilum*.

diversifolia Mitt. *op. cit.* p. 364.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

elongata Dz. et Mk. — *Chaetomitrium*.

erectiuscula { C. M. — *Lepidopilum Krauseanum*.
Tayl. — *Lepidopilum*.

erythrochaete W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 66.

Hypnella erythrochaete Jaeg. *Ad.* II, p. 270.

2? — *Am. sept.* : Guadalup.

exigua Mitt. *op. cit.* p. 358.

Hookeriopsis exigua Jaeg. *Ad.* II, p. 265.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

falcata Hook. *M. ex. t.* 14; *C. M. Syn.* II, p. 216; *Mitt. op. cit.* p. 361.

Hookeriopsis falcata Jaeg. *Ad.* II, p. 267.

Pterygophyllum falcatum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 353.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup. *Am. merid.* : Venezuela, And.
Nov. Granat. et Quitens.

falcatula W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 63.

Hookeriopsis falcatula Jaeg. *Ad.* II, p. 267.

1. — *Am. sept.* : And. Costa Ric., Guadalup.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 495.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

filescens W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 61.

Ster. — *Am. sept.* : Guadalup.

fliculaeformis Sm. — *Hypopterygium*.

filiformis Hook. in *Spreng. Syst. Veg.* IV, p. 197; *C. M. Syn.* II, p. 212;
Mitt. op. cit. p. 365.

Callicostella filiformis C. M. in *Linn.* 1848, p. 189.

Hypnella filiformis Jaeg. *Ad. II*, p. 271.

1? — *Am. sept.* : Guadalup., ins. S. Vincent.

fissidentella Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 143.

In silvic. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

fissidentoides Hook. f. et Wils. in Hook. *Ic. pl. rar. t.* 739; C. M. *Syn. II*, p. 217; Mitt. *op. cit.* p. 357.

Hookeriopsis fissidentoides Jaeg. *Ad. II*, p. 265.

— *Am. sept.* : Jamaic.

flabellata Sm. — *Homalia*.

flaccida H. f. et W. — *Mniadelphus*.

flava Col. — *Pterygophyllum*.

flavescens Hook. et Grev. in Brewster *Edinb. Journ. II*, p. 296, t. 5. f. 1;

C. M. *Syn. II*, p. 211.

Hypnella flavescens Jaeg. *Ad. II*, p. 211.

1. — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent.

flexicollis Mitt. — *Eriopus*.

flexifolia C. M. — *Lepidopilum*.

flexilis Sm. — *Pilotrichella*.

flexuosa Mitt. — *Mniadelphus*.

fluminensis Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Freycineti Mont. — *Distichophyllum*.

fridrichsthaliana (Reichdt.) Par.

Hemiragis fridrichsthaliana Reichdt. *Beitr.* p. 579 (in *adn.*).

— *Am. sept.* : Guatemala.

gemmacea Mitt. *M. austr. am.* p. 340.

2. Ster. Lignic. et ad rup. irror. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

gigantea Hsch. — *H. Parkeriana*.

glandulifera Hpe. in Linn. 1863, p. 156.

Hookeriopsis glandulifera Jaeg. *Ad. II*, p. 266.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Glaziowii Hpe. *Symb.* 1874, p. 508.

Hookeriopsis Glaziovii Jaeg. *Ad. II*, p. 264.

Syn. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

gracilis Mitt. *op. cit.* p. 360.

Hookeriopsis gracilis Jaeg. *Ad.* p. 266.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

Graeffeana C. M. *M. Polyn.* p. 77.

1. — *Pac.* : Ins. Fidji.

Grevilleana { Griff. — *Pterygophyllum acutifolium*.
Tayl. — *Lepidopilum*.

guadalupensis (Brid.) C. M. *Syn. II*, p. 212; Mitt. *op. cit.* p. 359.

Hookeriopsis guadalupensis Jaeg. *Ad. II*, p. 266.

Hypnum guadalupense Brid. *Bryol. univ. II*, p. 395.

H. repens H. et Grev. in Brewster *Edinb. Journ. II*, p. 231, f. 5.

1 vel syn. — *Am. sept.* : Guadalup., ins. S. Vincent.

« var. *longifolia* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 64.

— *Am. sept.* : Martinic.

Hahniana Besch. op. cit. p. 60.

1 vel syn. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

hepaticæfolia Jaeg. — *Pterygophyllum*.

Herminieri W. P. Sch. in Besch. op. cit. p. 59.

Callicostella Herminieri Jaeg. Ad. II, p. 257.

— *Am. sept.* : Guadalup.

var. *rubella* Besch. — *H. rubella*.

heterophylla (Ångstr.) Par.

Callicostella heterophylla Ångstr. in Oefv... 1873, n. 5, p. 150.

2. — *Afr.* : Ins. S. Jose.

heterophylla Geh. et Hpe. — *H. confusa*.

Hildebrandtii C. M. in Linn. 1876, p. 251.

1. — *Afr.* : Ins. Comor.

hispidula Mitt. op. cit. p. 339.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Hornschuchiana Hpe. Symb. 1874, p. 509.

Callicostella Hornschuchiana Jaeg. Ad. p. 260.

H. Langsdorffii Hsch. Fl. Brasil. I. p. 61 p.p.

2? Ad saxa madid. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Hornschuchiana Hpe. (lc.). — *H. microcarpa*.

hospitans W. P. Sch. in Besch. op. cit. p. 62.

Hookeriopsis hospitans Jag. Ad. II, p. 265.

2. Ad folia emort. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

humilis Mitt. op. cit. p. 342.

Ad saxa irror. — *Am. merid.* : Nov. Granat., And Peruv.

hyalina W. P. Sch. in Besch. op. cit. p. 57.

— *Am. sept.* : Guadalup.

hyaloblasta C. M. in Dusen M. Camer. n. 110.

— *Afr.* : M. Cameroon.

hypnacea C. M. in Bot. Zeit 1856, p. 421 ; Mitt. op. cit. p. 363.

H. repens Hsch. Fl. Brasil. I, p. 68.

H. variabilis ej. in sched.

Hookeriopsis hypnacea Jaeg. Ad. II, p. 268.

1 et syn. — Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.

hypniformis Besch. op. cit. p. 63.

Hookeriopsis hypniformis Jaeg. Ad. II, p. 266.

2? Rupic. — *Am. sept.* : Guadalup.

hypnoides Hsch. — *Ectropothecium hookerioides*.

incurva Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. II, p. 231 ; C. M.

Syn. II, p. 192 ; Mitt. op. cit. p. 350.

Chaetophora incurva Hsch. in Hor. phys. Berol. p. 65, t. 13 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 336.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Venezuela, Brasil. or., And. Peruv., Chile.

incurva Dz. et Mk. — *Lepidopilum Sumatrae*.

intermedia C. M. — *Lepidopilum*.

iporangeana *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Jagiana *C. M. Syn. II, p. 191; Mitt. op. cit. p. 343.*

Ster. — *Am. merid.* : Venezuela.

Jardini *W. P. Sch. — H. oblongifolia.*

Karsteniana *Broth. et Geh. in Oefv...* 1893, p.

Syn. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

Krauseana *Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit.* 1869, p.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Æquator.

lacerans *C. M. in Linn.* 1876, p. 250.

Callicostella lacerans Jaeg. Ad. II, p. 260.

— *Afr.* : Usambara, ins. Anjouan, Mayotte.

« *var. aequilenta Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 144.*

— *Afr.* : Ins. Nossi-Comba.

« *var. nossiana Besch. op. et l. cc.*

— *Afr.* : Ins. Nossi-Comba.

laete-virens *Hook. et Tayl. Muscol. brit. I ed., p. 89, t. 27; C. M. Syn. II, p. 187; Bryol. eur. V, t. 447; W. P. Sch. Syn. II ed. n. 581.*

Cyclodictyon laete-virens Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 163.

H. albicans Tayl. Fl. Hibern. II, p. 36.

Pterygophyllum laete-virens Brid. Bryol. univ. II, p. 350.

1. Ad rup. humid. — *Eur.* : Hibern. *Afr.* : Madeir., ins. Fernando Po.

Exs. : Mandon Pl. Madeir. n. 34.

Rab. Bryoth. eur. n. 586.

laevinervis (*Ren. et Card.*) *Par.*

Hookeriopsis laevinervis R. et C. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 196.

2 ? In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica.

laeviuscula (*Mitt.*) *Par.*

Callicostella laeviuscula Mitt. in Philos. Trans. of the roy. Soc. 1879 (extra-vol.), p. 392, t. 37 B.

Syn. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

Langsdorffii *Hook. M. ex. t. 121; C. M. Syn. II, p. 193; Mitt. M. austr. am. p. 356 (1).*

Chatophora Langsdorffii Brid. Bryol. univ. II, p. 337.

Hookeriopsis Langsdorffii Jaeg. Ad. II, p. 264.

Syn. Ad rup. irror. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Langsdorffii { *Hsch. p.p. — H. Beyrichiana.*
Hsch. p.p. — H. Hornschuchiana.
Schwaegr. — H. Schwaegrichenii.

latifolia *Mitt. M. austr. am. p. 345.*

Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.

latifolia *C. M. — Lepidopilum.*

? *Le Duceana Mont. in Voy. Bonite p. 292 et Syll. p. 13.*

1. Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

Le Duceana *Mont. p.p. — Rhaphidostegium Duisabonae var. Le Duceanum.*

(1) Cf. Duby Choix de M. ex. 1890, p. 10, t. I, f. 3 et *Hpe. in Fl.* 1880, n. 21.

leiophylla Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 66.

Hookeriopsis leiophylla Jaeg. *Ad. II*, p. 268.

2. *Rupic.* — *Am. sept.* : Martinic.

? *lepida* Mitt. in *Trans. and. Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 78.

Ster. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

leptocladula (C. M.) Par.

Callicostella leptocladula C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 47.

— *Afr.* : M. Cameroon.

leptopoma C. M. — *Chaetomitrium*.

leptorhyncha Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. II*, p. 228, t. 5 ;

C. M. *Syn. II*, p. 213 ; Mitt. *op. cit.* p. 365.

H. cupressiformis C. M. *l. c.* p. 215.

Hypnella leptorhyncha Jaeg. *Ad. II*, p. 270.

2 ? — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent. *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

leptorhyncha Hsch. — *H. commutata*.

leskeoides Hook. — *Homalothecium Bonplandi*.

Liebmanni W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 86.

Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

limbata Hpe. *Symb.* 1874, p. 507.

H. sarmentosa Duby *Choix de M. ex.* 1880, p. 9, t. I, f. I (fid. Hpe. in *Fl.* 1880, n. 21).

Syn. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Lindbergii (Par).

H. viridissima Lindb. *mss.* ; Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 25.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Lindenbergii Hpe. — *Lepidopilum uticamundianum* ?

Lindigiana Hpe. in *Linn.* 1863, p. 156 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 340.

l. *Ad arbor.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

α *var. flaccida* Hpe. in *op. et l. cc.*

Ut et ubi typ.

longipedunculata C. M. *Syn. II*, p. 221 ; Mitt. *op. cit.* p. 352.

Callicostella longipedunculata Jaeg. *Ad. II*, p. 258.

Syn. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

longissima Mont. — *Neckera Montagneana*.

Lorentzi C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 474.

— *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic. Tucuman.

lorifolia Hpe. *Symb.* 1874, p. 510.

Callicostella lorifolia Jaeg. *Ad. II*, p. 260.

Syn. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

loriformis Hpe. et Ltz. — *H. pendula*.

lucens Sm. — *Pterygophyllum*.

var. acuminata C. M. — *Pterygophyllum acuminatum*.

luteo-rufescens Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 67.

2 ? Ster. *Ad arbor.* — *Am. sept.* : Martinic.

- luteo-viridis *Besch. in Rev. bryol.* 1885, p. 19 et in *Journ. de bot.* 1891, p. Syn. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3638.
- macropyxis *Rehm. M. Afr. austr. n.* 339.
 — *Afr.* : Natal.
- marginata *Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 60 ; *C. M. Syn. II*, p. 188 ; *Mitt. op. cit.* p. 341.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Martiana *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. 63, t. 3 ; *C. M. Syn. II*, p. 219 ; *Mitt. op. cit.* p. 349.
Callicostella Martiana Jaeg. Ad. II, p. 255.
 1 (*C. M.*) ; *Syn. (Mitt.)*. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- melanotheca *Duby in Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p.* 230.
 1. — *Pac.* : Nov. Caledon.
- membranacea *C. M.* — *Lepidopilum*.
- Merkelii *Hsch. op. cit. p.* 62 ; *C. M. Syn. II*, p. 218 ; *Mitt. op. et l. cc.*
Callicostella Merkelii Jaeg. Ad. II, p. 255.
Syn. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Merkelii Sull.* — *H. crenata*.
- Meyeniana Hpe.* — *Ectropothecium*.
- microcarpa *Hsch. op. et l. cc.* ; *C. M. Syn. II*, p. 217 ; *Mitt. op. cit. p.* 350.
Callicostella microcarpa Jaeg. Ad. II, p. 257.
H. Hornschuchiana Hpe. Ic. M. (in contextu H. Poeppigianae).
Pilotrichum obtusifolium Brid. Bryol. univ. II, p. 860.
 1. Ad arbor. et sax. irror. — *Am. merid.* : Amazon., Brasil. austr. or.
- ? *microdendron* *Mont.* — *Homalia*.
- Minarum *Ångstr. in Oefv...* 1876, n. 4, p. 25.
 1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- minor *ej. in op. et l. cc.*
 2? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Mittenii Jaeg.* — *H. tenella*.
- nniacea *C. M.* — *Pterygophyllum*.
- nniifolia { *Hsch.* — *Mniadelphus Hornschuchii*.
 { *Mont.* — *Distichophyllum Montagneanum*.
- ? mollis *Wils. in Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 283 ; *C. M. Syn. II*, p. 222.
 — *Am. merid.* : Brasil.
- Mülleri *C. M.* — *Lepidopilum*.
- natalensis *Rehm. M. Afr. austr. n.* 622.
Pterygophyllum natalense ej. l. c. n. 338.
 — *Afr.* : Natal.
- nervosa *H. f. et Wils.* — *Daltonia*.
- nigella *eor.* — *Pterygophyllum*.
- nitens *Hsch. op. cit. p.* 65 ; *C. M. Syn. II*, p. 193 ; *Mitt. op. cit. p.* 357.
Hookeriopsis nitens Jaeg. Ad. II, p. 193.
 2? Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

nitida Mitt. *op. cit.* p. 348.

Stenodictyon nitidum Jaeg. *Ad. II*, p. 262.

• 2. — *Am. merid.*: And. Quitens.

nivalis C. M. *Syn. II*, p. 188; Mitt. *op. cit.* p. 346.

2? — *Am. merid.*: Venezuela, And. Nov. Granat.

nivea C. M. — *Lepidopilum*.

nouka-hivensis Besch. *Fl. bryol. Taiti, etc.* p. 45.

H. pallens W. P. Sch. in *Jard. Enum.* p. 20 (*nom.*).

Syn. Cortic. — *Pac.*: Nouka-Hiva.

obliqua Hpe. — *Schizomitrium*.

oblongifolia Sull. in *Proced. Am. Acad.*... *Januar.* 1854.

Callicostella papillata Mitt. *Sam. M.* p. 190.

H. papillata Sull. in *Wilkes Exped.* p. 23.

Schizomitrium papillatum ej. *l. c.*

Syn. Terr. et ad filic. putresc. — *Pac.*: Ins. Fidji, Samoa, Taïti, Nuka-Hiva.

obovata Griff. — *Distichophyllum*.

obscura Mont. — *Pterygophyllum*.

obscurifolia Mitt. *op. cit.* p. 342.

2. — *Am. merid.*: And. Quitens.

obtusifolia Harv. — *Stereophyllum indicum*.

Ørstedtiana C. M. *Syn. II*, p. 679; Mitt. *op. cit.* p. 351.

Callicostella Ørstedtiana Jaeg. *Ad. II*, p. 258.

Syn. — *Am. sept.*: Costa Rica.

Olfersiana Hsch. *op. cit.* p. 61, t. 3; C. M. *Syn. II*, p. 188; Mitt. *op. cit.* p. 344.

1. — *Am. sept.*: Jamaic. *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Orbignyana Mont. — *Pterygophyllum*.

ornans (Reichdt.) Par.

Hemiragis ornans Reichdt. *Beitr.* p. 577.

Ster. Filicie. — *Pac.*: Ins. Sandwic.

orthorhyncha Dz. et Mk. — *Chaetomitrium*.

ovata Mitt. *op. cit.* p. 339.

Ster. Ad rup. irror. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

pallens Mitt. *op. cit.* p. 345.

2? *Lignic.* — *Am. merid.*: Amazon.

pallens W. P. Sch. — *H. nouka-hivensis*.

pallescent Hook. *M. ex. t.* 38; C. M. *Syn. II*, p. 211; Mitt. *op. cit.* p. 363.

Hypnella pallescens Jaeg. *Ad. II*, p. 269.

Pterygophyllum pallescens Brid. *Bryol. univ. II*, p. 351.

1. *Cortic. et Lignic.* — *Am. merid.*: Orinoc., Amazon., And. Quitens.

pallida Hsch. *op. cit.* p. 64; C. M. *Syn. II*, p. 221; Mitt. *op. cit.* p. 351.

Callicostella pallida Jaeg. *Ad. II*, p. 257.

H. scabriseta Schwaegr. *Suppl. III, II, I, t.* 275.

H. Weigeliana C. M. in *Linn.* 1848, p. 190.

Syn. Ad arbor. et sax. irror. — *Am. merid.*: Panama, ins. Trinitat.,

Guian. bat., Amazon., Brasil. or., And. Quitens.

pallidifolia Mitt. in *Melliss. S. Helena* 1875, p. 362.

1. In gramin. — *Afr.*: Ins. S. Helena.

pandurifolia Mitt. *op. cit.* p. 345.

Ster. — *Am. merid.*: And. Peruv.

papillata Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 93 et *Syll.* p. 13; C. M. *Syn. II*, pp. 219 et 678.

Callicostella papillata Mitt. *M. Ind. or.* p. 136; *Bryol. jav. II*, p. 39, t. 162.

Syn. Cortic. et lignic. — *As.*: Bengal., Sumatra, Java, Borneo. *Pac.*: Ins. Fidji, Taïti, Samoa, Nov. Caledon.

papillata { Sull. — *H. oblongifolia*.
Tayl. — *H. Taylori*.

Pappeana Hpe. *Ic. M. t.* 2; C. M. *Syn. II*, p. 194.

Hookeriopsis Pappeana Jaeg. *Ad. II*, p. 264.

1. Ad arbor. — *Afr.*: C. B. Sp.

paradoxa Mont. — *Distichophyllum*.

paraguensis C. M. — *H. subdepressa*.

Parkeriana Hook. in *Spreng. Syst. veg.* IV, p. 197; C. M. *Syn. II*, p. 194; Mitt. *op. cit.* p. 356.

H. gigantea Hsch. *op. cit.* p. 67; C. M. *Syn. II*, p. 209.

Hookeriopsis gigantea Jaeg. *Ad. II*, p. 263.

H. Parkeriana ej. l. c. p. 264.

2. Ad arbor. — *Am. merid.*: Guian. bat., Amazon.

parvifolia Tayl. — *Stereophyllum*.

Patrisiae { C. M. p.p. — *Crossomitrium Crügeri*.
Hpe. — *Crossomitrium Sellowii*.

paupera C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise...* *Bot.* p. 54.

2. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Guinea.

pellucida Mitt. *M. austr. am.* p. 353.

Callicostella pellucida Jaeg. *Ad. II*, p. 259.

2? Lignic. — *Am. merid.*: Amazon.

pendula Hook. *M. ex. t.* 53; C. M. *Syn. II*, p. 210; Mitt. *op. cit.* p. 365.

Chaetophora pendula Brid. *Bryol. univ. II*, p. 338.

H. loriformis Hpe. et Ltz. in *Krause M. Ecuador exs.*

Hookeriopsis pendula Jaeg. *Ad. II*, p. 268.

2? Lignic. — *Am. merid.*: And. Quitens.

pennata Sm. — *Cyatophorum bulbosum*.

pernutans C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 496.

1. — *Am. merid.*: Venezuela.

Perrini Spreng. — *Lepidopilum polytrichoides*.

philippinensis Mort. — *Chaetomitrium*.

Philonotula C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 496.

2. — *Am. merid.*: Venezuela.

pilifera Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 160; C. M. *Syn. II*, p. 210; Mitt. *op. cit.* p. 364.

Hypnella pilifera Jaeg. *Ad. II*, p. 270.

1. Lignic. et ad sax. irror. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat. et Quitens., Parana, Brasil. austr. or.

planuscula Hpe. *Symb.* 1874, p. 511.

Hookeriopsis planuscula Jaeg. *Ad. II*, p. 268.

1. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

plumicaulis C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 496.

1. — *Am. merid.*: Venezuela.

polytrichoides Spreng. — *Lepidopilum*.

Poeppigiana Hpe. — *Ectropothecium vesiculare*.

prabaktiana C. M. *Syn. II*, p. 678.

Callicostella prabaktiana *Bryol. jav. II*, p. 40. t. 163.

Syn. Ad terr. et rup. trachyt. — *As.*: Borneo, Java.

praelonga W. Arn. — *Ectropothecium vesiculare*.

prasiophylla Besch. in *Journ. de Bot.* 1894, p.

1. — *Am. sept.*: Guadalup.

Preussii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 201.

Syn. — *Afr.*: Cameroon.

prostrata Harv. — *Stereophyllum*? *tavoyense*.

pseudo-pilifera Hpe. in *Linn.* 1852, p. 362.

Hypnella pseudo-pilifera Jaeg. *Ad. II*, p. 270.

Ad arbor. — *Am. sept.*: Porto-Rico.

pterygophylloides Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 478.

Syn. — *Pac.*: Nov. Guinea.

Puiggarii Geh. et Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 62.

Syn. — *Am. merid.*: Brasil.

pulchella { Griff. — *Distichophyllum Griffithii*.
H. f. et W. — *Mniadelphus*.

punctata H. f. et W. — *Homalia pulchella*.

var. *oblongifolia* eor. — *Homalia oblongifolia*.

pycnoptera (C. M.) Par.

Callicostella pycnoptera C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 921.

— *Afr.*: M. Cameroon.

quadrifaria Hook. — *Mniadelphus*.

Quintasii Broth. in *Bol. d. Soc. Brot. VIII*, 1890.

Syn. — *Afr.*: Ins. S. Thom.

quitensis Par.

H. cuspidata Mitt. *M. austr. am.* p. 355.

Ad arbor. — *Am. merid.*: And. Quitens.

radicans Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 60.

Callicostella radicans Jaeg. *Ad. II*, p. 257.

1. — *Am. sept.*: Martinic.

radiculosa { Hook. — *Stereophyllum*.
Hsch. — *Stereophyllum odontocalyx*.

Regnellii C. M. mss.; Ångstr. in *Oef.* 1876, n. 4, p. 22.

Syn. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

remotifolia C. M. — *Eriopus*.

repens Hsch. — *H. hypnacea*.

rhapidostega C. M. — *Actinodontium*.

rigida W. Arn. *Disp. M.* p. 56 ; *C. M. Syn. II*, p. 222.

Hypnum rigidum Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 189.

Lepidopilum polytrichoides ? (*fid. Mitt.*).

Pterygophyllum rigidum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 348.

— *Am. merid.* : ?

riparia Mitt. *op. cit.* p. 345.

Ster. Terr. — *Am. merid.* : And. Quitens.

rivularis Mitt. *op. cit.* p. 353.

Ad sax. irror. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

Robillardi C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (*nom.*).

— *Afr.* : Ins. Franciae.

robusta { H. f. et W. (*Fl. Antarct. et N. Zel.*). — *Pterygophyllum*.
eor. (*Fl. Tasman.*). — *Pterygophyllum Hookeri*.

rorida Hpe. in *Linn* 1863, p. 155 ; Mitt. *op. cit.* p. 344.

Rupic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

rotulata Sm. — *Hypopterygium*.

rotundifolia H. f. et W. — *Mniadelphus*.

rubella W. P. Sch. *herb.*

H. *Herminieri* var. *rubella* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 59.

Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup.

rubriseta Mitt. *op. cit.* p. 341.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

rufa W. P. Sch. in Besch. *op. cit.* p. 62.

Hookeriopsis rufa Jaeg. *Ad. II*, p. 267.

2 ? Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup.

rufescens Mitt. *op. cit.* p. 352.

Callicostella rufescens Jaeg. *Ad. II*, p. 259.

— *Am. merid.* : Guian. bat., Amazon.

rugulosa Mitt. *op. cit.* p. 358.

Hookeriopsis rugulosa Jaeg. *Ad. II*, p. 265.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

rugulosa Besch. — H. *Bescherellei*.

Salaziae Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 143.

Syn. Lignic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

sandwicensis Reichdt. *Beitr.* p. 576.

1. Ad rup. madid. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

sarmentosa Duby. — H. *limbata*.

saxatilis Mitt. *op. cit.* p. 352.

Callicostella saxatilis Jaeg. *Ad. II*, p. 258.

Ad lapid. et rad. inund. — *Am. merid.* : And. Quitens.

scabrella Mitt. *op. cit.* p. 362.

Hookeriopsis scabrella Jaeg. *Ad. II*, p. 267.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

scabriseta Hook. *M. ex. t.* 52 ; *C. M. Syn. II*, p. 220 ; Mitt. *op. cit.* p. 353.

Callicostella scabriseta Jaeg. *Ad. II*, p. 254.

Lepidopilum binerve Brid. *Bryol. univ. II*, p. 269.

2 ? Ad saxa irror. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Caripens.

scabriseta Schwaegr. — *H. pallida*.

scabriuscula C. M. in *Linn.* 1848, p. 191 et *Syn. II*, p. 221; *Mitt. op. cit.* p. 351.

Callicostella scabriuscula Jaeg. *Ad. II*, p. 258.

Syn. — *Am. merid.*: Chile.

Schwaegrichenii Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 64.

H. Langsdorffii Schwaegr. *Suppl. II*, t. 162 (*excl. calyptra*).

Syn. — *Am. merid.*: Brasil, austr. or.

secunda Griff. — *Lepidopilum*.

Sellowiana Hpe. *Symb.* 1874, p. 513.

l. — *Am. merid.*: Brasil, austr. or.

Sellowii Hsch. — *Microthamnium*.

seminervis Mont. — *Distichophyllum* *spathulatum*.

serrata Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 26.

Hookeriopsis serrata Jaeg. *Ad. II*, p. 268.

— *Am. merid.*: Brasil, austr. or.

setosa Mitt *op. cit.* p. 339.

— *Am. merid.*: And. Quitens.

sexfaria Col. — *Pterygophyllum*.

seychellensis Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 144.

Syn. *Secus rivul.* — *Afr.*: Ins. Seychelles.

shillicatensis Spr. in *Mitt. op. cit.* p. 344.

Syn. *Ad sax. et fol. emort.* — *Am. merid.*: And. Quitens. et Peruv.

sinuata Mitt. *op. cit.* p. 358.

Hookeriopsis sinuata Jaeg. *Ad. II*, p. 265.

Ster. — *Am. merid.*: And. Quitens.

sinuosa H. f. et W. — *Mniadelphus*.

spathulata Dz. et Mk. — *Distichophyllum*.

speciosissima Schwaegr. — *Cyatophorum* *splendidissimum*?

spinosa C. M. — *Lepidopilum*.

splachnoides { Hook. — *Daltonia*.

{ Schleich. — *Tayloria*.

splendidissima Mont. — *Cyatophorum*.

Splitbergeri Mont. — *Crossomitrium*.

squarrosula (W. P. Sch.) Par.

Ctenodontium squarrosulum W. P. Sch. *herb.*

Hookeriopsis squarrosula Jaeg. *Ad. II*, p. 269.

— *Afr.*: Ins. Borbon.

strumosa Hsch. — *Leucomium*.

strumulosa Hpe. et Ltz. in *Bot. Zeit.* 1869, p. .

Callicostella strumulosa Jaeg. *Ad. II*, p. 259.

2? *In silv.* — *Am. merid.*: Æquator.

subaurescens Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.

l. — *Am. merid.*: Brasil, austr. or.

subdepressa Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 19 et in *Journ. de bot.* 1891, p. .

H. paraguensis C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57.

1. — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3689.
- subenervis* Hpe. — *Lepidopilum*.
- subfalcata* Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 305; *Mitt. op. cit.* p. 360.
Hookeriopsis subfalcata Jaeg. *Ad. II*, p. 266.
 Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- subfissidentoides* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 61.
Hookeriopsis subfissidentoides Jaeg. *Ad. II*, p. 265.
2. — *Am. sept.* : Guadalup.
- sublimbata* C. M. *Syn. II*, p. 191; *Mitt. op. cit.* p. 343.
 1. — *Am. merid.* : Chile.
- submarginata* Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 24.
 1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- submicrocarpa* Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subnitens* eor. in *op. et l. cc.*
 2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subrotunda* Hpe. — *Pterygophyllum*.
- subsecunda* Mitt. *op. cit.* p. 358.
Hookeriopsis subsecunda Jaeg. *Ad. II*, p. 265.
 2. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- subserrulata* Col. — *Mniadelphus*.
- ? *Sullivantii* C. M. in *Lesq. et Jam. Man.* p. 293.
H. acutifolia Sull. *M. of U. St.* p. 66.
 Ster. — *Am. sept.* : Perrar.; Ohio centr., M. Alleghan., Carol. sept., Calif.
- surinamensis* C. M. — *Lepidopilum*.
- ? *Swartzii* Schwaegr. *Suppl. III, II, II, t.* 276; *C. M. Syn. II*, p. 200.
 1. — *Am. sept.* : Jamaic.
- tamariscina* Sm. p.p. — *Hypopterygium*.
- ? *Taylori* C. M. *Syn. II*, p. 222.
Callicostella Taylori Jaeg. *Ad. II*, p. 261.
H. papillata Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 283.
 Cortic. et lignic. — *Am. sept.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- tenella* Mitt. *op. cit.* p. 342.
H. Mittenii Jaeg. *Ad. II*, p. 253.
 2 ? — *Am. merid.* : And. Quitens.
- tenella* H. f. et W. — *Sauloma*.
- tenera* Hpe. *Symb.* 1874, p. 511.
Hookeriopsis tenera Jaeg. *Ad. II*, p. 268.
 1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- tenuicuspis* Mitt. *op. cit.* p. 347.
Stenodesmus tenuicuspis Jaeg. *Ad. II*, p. 262.
 2 ? — *Am. merid.* : And. Quitens.

tenuifolia Mitt. *op. cit.* p. 359.

Hookeriopsis tenuifolia Jaeg. *Ad. II*, p. 265.

Syn. — *Am. merid.* : Brasil. tropic.

tenuis Mitt. *op. cit.* p. 355.

Hookeriopsis tenuis Jaeg. *Ad. II*, p. 264.

— *Am. merid.* : And. Peruv.

terrestris Mitt. *op. cit.* p. 356.

Hookeriopsis terrestris Jaeg. *l. c.*

2 ? Terr. — *Am. merid.* : And. Peruv.

thomeana Broth. in *Bol. d. Soc. Brot.* VIII, 1890.

Syn. Lignic. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

tomentosa Grev. — *Rhacopilum*.

var. *subintegrifolia* W. Arn. — *Rhacopilum cuspidigerum*.

tristis (Rehm.) Par.

Callicostella tristis Rehm. *M. Afr. austr. n.* 342.

— *Afr.* : Natal.

uliginosa C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 476.

— *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

ulophylla Besch. in *Journ. de bot.* 1894, p.

2. Ad terr. humid — *Am. sept.* : Guadalup.

undata (Hedw.) C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 782.

Hookeriopsis undata Jaeg. *Ad. II*, p. 263.

Hypnum undatum P. B. *Prodr.* p. 72.

Leskea undata Hedw. *Sp. M.* p. 214, t. 52.

Pterygophyllum undatum Rrid. *Bryol. univ. II*, p. 353.

1. — *Am. sept.* : Jamaic., Porto Rico.

undata C. M. — *H. crispa*.

usambarica Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 202.

Syn. Lignic. — *Afr.* : Usambara.

utacumundiana Mont. — *Lepidopilum*.

vaga Mitt. *op. cit.* p. 360.

Hookeriopsis vaga Jaeg. *Ad. II*, p. 266.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

Vallis-Gratiae Hpe. *mss.* ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 169.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. n. 341.

variabilis Hsch. in *hb. Hook.* ; Mitt. *op. cit.* p. 359.

Hookeriopsis variabilis Jaeg. *Ad. II*, p. 266.

1. vel syn. Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.

variabilis Hsch. — *H. hypnacea*.

varians Sull. in *Proced. Am. Acad.*... 1861 ; Mitt. *op. cit.* p. 346.

Polyg. Lignic. — *Am. sept.* : Florid., Cuba.

var. Sull. — *Pilotrichidium Antillarum*.

velutina Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 528 ; Mitt. *op. cit.* p. 343.

Hookeriopsis velutina Jaeg. *Ad. II*, p. 257.

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

verrucosa Hpe. *Symb.* 1872, p. 58.

Hypnella verrucosa Jaeg. *Ad. II*, p. 269.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

versicolor W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 64.

Hookeriopsis versicolor Jaeg. *Ad. II*, p. 266.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

versicolor Mitt. — *Lepidopilum*.

Vescoana Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.* p. 44.

1 et syn. *Cortic.* — *Pac.* : Taïti.

vesicularia C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 69.

— *Afr.* : M. Cameroon.

vesiculata C. M. *M. Polyn.* p. 76.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

vesiculosa C. M. *Syn. II*, p. 190.

Hypnum vesiculosum Brid. *Sp. M. II*, p. 100.

Pterygophyllum albicans ej. *Bryol. univ. II*, p. 319 p.p.

1 ? — *Afr.* : Usambara, ins. Borbon.

viridissima Mitt. *op. cit.* p. 362.

Hookeriopsis viridissima Jaeg. *Ad. II*, p. 267.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

viridissima Lindb. — *H. Lindbergii*.

viridula Mitt. *op. cit.* p. 345.

Ster. — *Am. merid.* : And. Peruv.

Wainioi Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

Webbiana Mont. — *Homalia*.

Weigeliana C. M. — *H. pallida*.

Wrightii Sull. et Lesq. in *Proced. Am. Acad...* 1859, p. 281 ; Mitt. *op. cit.* p. 365.

Hookeriopsis Wrightii Jaeg. *Ad. II*, p. 270.

2. — *Am. sept.* : Nicaragua.

Zettersdtedti C. M. — *Sauloma* (1).

HOOKERIOPSIS Besch. in *Ann. sc. nat.* 1876 (subgen. *HOOKERIAE*) ; Jaeg. *Ad. II*, p. 262 (gen. propr.).

Omnes *HOOKERIOPSISIDEÆ* non indicatae sunt *HOOKERIAE* ejusd. nom.

gigantea Jaeg. — *H. Prabaktiana*.

Hydrofissidens C. M. *Syn. I*, p. 44 (sect. *FISSIDENTIS* = *CONOMITRIUM*).

HYDROGONIUM C. M. in *Linn.* 1876, p. 297 (sect. *TRICHOSTOMI*) ; Jaeg. *Ad. II*, p. 669 (gen. propr.).

Bolleanum Jaeg. — *Meesea*.

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

H. Berteroi C. M.

flava Col.

| *H. pseudo-obscura* C. M.

Ehrenbergii Jaeg. — *Trichostomum*.
fontanum Jaeg. — *Trichostomum*.
mediterraneum Fitz. G. et Broth. — *Trichostomum Ehrenbergii*.

HYDROPOGON Brid. *Bryol. univ.* I, p. 769.

brevinerve Hpe. — *H. fontinaloides*.

fontinaloides (*Hook.*) Brid. *l. c.* p. 770; *Card. Mon.* p. 38.

Dryptodon fontinaloides Brid. *Bryol. univ.* I, p. 205.

Grimmia fontinaloides Hook. *M. ex. t.* 2 p.p.

H. brevinerve Hpe. *Addit...* (fid. *Card. Mon.* p. 145).

Pilotrichum fontinaloides C. M. *Syn. II*, p. 151.

l. Ad arbor. et rup. submers. — *Am. merid.*: Orinoc., Cassiquiare, Amazon.

gymnostomum Mitt. — *Hydropogonella*.

HYDROPOGONELLA Card. in litt. ad Le Jolis in *Rev. bryol.* 1895, p. 18 (1 spec.).

gymnostoma (*Bryol. eur.*) Card. in litt.

Cryptangium (l) *gymnostomum* Card. *Mon.* p. 41.

Cr. Schomburgkii C. M. in *Linn.* 1843, p. 599.

Fontinalis gymnostoma *Bryol. eur.* V (mon. p. 45).

Hydropogon gymnostomum Mitt. *M. austr. am.* p. 449.

Pilotrichum gymnostomum C. M. *Syn. II*, p. 152.

l. Aquat. — *Am. merid.*: Guian. angl.

Hygrohypnum Lindb. *M. Scand.* p. 33 (sect. HYPNI = LIMNOBIUM).

HYLOCOMIUM *Bryol. eur.* V-VI (22 spec.).

alaskanum Kindb. — *Hypnum*.

Ankarcronae Broth. *mss.*

Ster. — *As.*: Japon.

bartramiophilum (C. M.) Par.

Hycomiella bartramiophila Kindb. *Enum. Bryin.*

Hypnum bartramiophilum C. M. in *Fl.* 1890, p. 497.

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

Berthelotianum (Mont.) Geheeb in *Fl.* 1886, n. 22.

Ctenidium Berthelotianum Mitt. in *Godman's Nat. hist. of Azores*, 1870.

Eurhynchium Berthelotianum Jaeg. *Ad. II*, p. 427.

Hypnum Berthelotianum Mont. in *Hist. des I. Canar.*, p. 4, t. I, f. 2 et *Syll.* p. 8; C. M. *Syn. II*, p. 375.

H. Hochstetteri W. P. Sch. in *Seubert Fl. Azor.* p. 14?

Ad arbor. — *Afr.*: Madeir., Teneriffa, ins. Azores.

brevirostrum (Ehrh.) *Bryol. eur.* VI (mon. p. 10), t. 493; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 801.

Hypnum brevirostrum Ehrh. *M. exs. n.* 85; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 506; C. M. *Syn. II*, p. 459.

H. brevirostrum β interruptum Brid. *Mant. M.* p. 175 et *Bryol. univ.* II, p. 508.

[1] Nomen jam abusum; *Cryptangium* Schrad. ex Nees in Mart. *Fl. Brasil.* 1842 (*Cyperaceæ*); in *Indice* p. 302 ut syn. modo servandum.

- H. erectum* Raddi *Sp. nov. aut rar. crypt.* p. 6, t. 2.
H. interruptum Brid. *M. Rec. II, II*, p. 156, t. V, f. I et *Sp. M. II*, p. 194.
H. rutabulum β brevirostrum *ej. M. Rec. II, II*, p. 162.
H. rutabulum var. *Sm. Fl. brit. III*, p. 1320.
H. triquetum β brevirostrum *Poll. Fl. Ver. III*, p. 357.
H. triquetum β minus *W. et M. Bot. Taschb.* p. 534.
Pleurozium brevirostrum *Kindb. Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.

2. Ad sax., rup. et arbor. radic. — *Eur.*: Temperat., in silv. montos.
As.: Japon. *Afr.*: Alger., ins. Borbon. *Am. sept.*: Ins. Miquel.,
 Nov. Scot., Gaspes., Ontar., Pensilv., New Jersey, M. Alleghan.
Exs.: Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 135. (*Hypnum*).
 Mac. Canad. *M. n.* 373 (*Hypnum*).
 Rab. *Bryoth. eur. n.* 391.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 418 (*Hypnum*).

calvescens Jaeg. — *H. squarrosum* var. subpinnatum.

cavifolium Sande Lac. in *Miq. Ann. mus. bot. Lugd. Bat. II*, p. 373.
 Ad arbor. — *As.*: Japon.

Ehrenbergianum (C. M.) *Besch. Prodr. bryol. mexic. p.* 111.

Hypnum Ehrenbergianum C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 408.

Pleurozium Ehrenbergianum Mitt. *M. austr. am. p.* 537.

2. — *Am. sept.*: Mexic.

fimbriatum *Bryol. eur.* — *H. Oakesii*.

Flemmingii Aust. — *H. robustum*

Forstenii (*Bryol. jav.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 615.

Hypnum Forstenii *Bryol. jav. II*, p. 153, t. 251.

2. Fr. ign. — *As.*: Celebes.

himalayanum (Mitt.) *Jaeg. Ad. II*, p. 612.

Stereodon himalayanus Mitt. *M. Ind. or. p.* 113.

— *As.*: Nepal., Sikkim, Japon.

incompletum Spr. — *Microthamnium*.

japonicum W. P. Sch. in *Savat. M. Japon. n.* 798 b; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 390.

2. — *As.*: Japon.

loreum (L.) *Bryol. VI (mon. p. 7)*, t. 490; W. P. Sch. *op. cit. p.* 804.

Hypnum heterophyllum Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 66.

H. loreum L. *Sp. pl. p.* 1593; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 515; C. M. *Syn. II*, p. 442.

H. loreum β heterophyllum Brid. *op. cit. p.* 517.

H. loreum montanum, capsulis subrotundis Dill. *Hist. M. p.* 305, t. 39, f. 40.

H. squarrosum β loreum Web. *Spic. Fl. Goett. p.* 70.

2. Terr. et ad rad. arb., in ericet. — *Eur.*: Fere tota, in silvat. montos. *Am. sept.*: Ins. Miquel., Terr. nov., Nov. Scot., M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, Sitka, Vancouver, Washington, Oregon, Idaho.

Exs.: Mac. Canad. *M. n.* 372 (*Hypnum*).

macrocarpum (Hsch.) Par.

H. paraphysale Jaeg. *Ad. II*, p. 614.

Hypnum discriminatum Mont. in C. M. *Syn. II*, p. 452 et *Syll. p.* 10 (*fid. Mitt. M. Ind. or. p.* 113).

H. macrocarpum Hsch. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV. II, Suppl. p.* 725; C. M. *Syn. II*, p. 438; *Bryol. jav. II*, p. 152, t. 250.

H. paraphysale C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 572 (*fid. Mitt. l.c.*).

Microthamnium discriminatum Jaeg. *Ad. II*, p. 417.

M. macrocarpum ej. l. c.

Stereodon macrocarpus Mitt. l. c.

2. — As.: Nepal., Himalaya, Khasia, Assam, M. Neilgherr., Malabar, Ceylan, Sumatra, Java, Borneo, Amboine.

Mertensii (Weinm.) Jaeg. *Ad. II*, p. 616.

Hypnum Mertensii Weinm. in *Bull. Soc. imp. Moscou*, 1845, p. 488 ;
C. M. *Syn. II*, p. 439.

— As.: Sibiria.

Oakesii (Sull.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 139 et *op. cit.* p. 800.

H. fimbriatum Bryol. eur. VI (mon. p. 7, t. 489.

H. pyrenaicum Lindb. *M. Scand.* p. 37 ; *Mac. Canad. M. n.* 369.

Hypnum fimbriatum Hartm. *Skand. Fl. V ed.*, p. 330 ; C. M. *Syn. II*,
p. 465.

H. Oakesii Sull. in *Gray Man. of bot.* p. 673 et in *Mem. Am. Acad...* IV,
p. 173, t. 5 ; C. M. l. c. p. 461.

H. pyrenaicum Spr. *M. Pyr. n.* 4 et in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* 1849,
M. Pyr. n. 6, t. 12 ; C. M. l. c. p. 456.

Pleurozium pyrenaicum Kindb. *Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.

2. In silv. et dumetos. alp. — Eur.: Scotia, Norveg., Sudet., Rhoen-
geb., Salisburg., Stir., Bavar., Tirol., Helvet., Jurass., Pyren.
As.: Jenissei inf., Caucas. occ. et centr. Am. sept.: New Bruns-
wick, M. Alb., Ontar., Columb. brit.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 638.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 421 (*Hypnum*).

Un. itin. 1863, n. 97 et 98 ; 1866, n. 3 ; 1867, n. 6.

« *var. cuspidatum* (Lindb. et Arn.) Par.

H. pyrenaicum var. cuspidatum L. et A. *M. As. bor.* 1890, II, p. 142.

— As.: Jenissei inf.

paludosum Jaeg. — *Thuidium*.

paraphysale Jaeg. — *H. macrocarpum*.

parietinum Lindb. — *Hypnum Schreberi*.

var. elongatum Lindb. — *Hypnum Schreberi var. elongatum*.

var. laevigatum Lindb. — *Hypnum Schreberi var. laevigatum*.

proliferum Lindb. — *H. splendens*.

var. obtusifolium Geh. — *H. splendens var. obtusifolium*.

pyrenaicum Lindb. — *H. Oakesii*.

var. cuspidatum L. et A. — *H. Oakesii var. cuspidatum*.

robustum (Hook.) Kindb. in *Mac. Cat.* p. 250.

H. Flemmingii Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, V, p. 24.

Hypnum Flemmingii Lesq. et Jam *Man.* p. 410.

H. robustum Hook. in *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 199.

2. Terr. — Am. sept.: M. Rupestr., Columb. brit., Vancouver,
Washington, Oregon.

Exs.: *Mac. Canad. M. n.* 342 (*Hypnum*).

rugosum de Not. — *Hypnum*.

? *Rutenbergii* (C. M.) Par.

Hypnum Rutenbergii C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 213.

Ster. — Afr.: Madagascar.

Schreberi de Not. — *Hypnum*.

splendens (Hedw.) Bryol. eur. VI (mon. p. 5), t. 487 ; W. P. Sch. *op. cit.*
p. 798.

H. proliferum Lindb. *M. Scand.* p. 37.

Hypnum filicinum, Tamarisci foliis majoribus splendentibus *Dill. Hist. M.* p. 274, t. 35, f. 13.

H. parietinum *L. Sp. pl.* p. 1590.

H. pinnatum *Lam. Encycl. meth. bot. III*, p. 168.

H. proliferum *L. Mant.* p. 507.

H. splendens *Hedw. Sp. M.* p. 262, t. 67; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 435; *C. M. Syn. II*, p. 457.

Pleuroziopsis prolifera *Kindb. Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.

2. Ad terr. et rad. arb. in silvat. montos. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Parry, Ussor., tota. *As.*: Japon., Amour, penins. Samoied., Obi, Jenissei, Ochotsk, Caucas. *Afr.*: Alger., Canar., ins. S. Helena (indig.?). *Am. sept.*: Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquel., ab Atlant. ad Pacif. et fret. Behring, zon. merid. except.

Exs.: *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 218 et II ed. n. 136 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 367 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 419 (*Hypnum*).

« *var. compactum* (*Lesq. et Jam.*) *Par.*

Hypnum splendens var. compactum *L. et J. Man.* p. 407.

— *Am. sept.*: Labrador.

« *var. obtusifolium* (*Geh.*) *Par.*

H. proliferum var. obtusifolium *Geh. in Fl.* 1879, p. 477.

— *As.*: Altaï.

squarrosum (*L.*) *Bryol. eur. VI* (mon. p. 9), t. 492; *W. P. Sch. op. cit.* p. 802.

Hypnum repens, triangularibus foliis reflexis, majus *Dill. Hist. M.* p. 303, t. 39, f. 38.

H. scorpioides *Timm. Prodr. Fl. Megap. n.* 825.

H. squarrosum *L. Sp. pl.* p. 1693; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 511; *C. M. Syn. II*, p. 443.

2. In gramin. umbros. et in silv. — *Eur.*: Spitzberg, fere tota. *As.*: Japon., Jenissei. *Afr.*: Ins. Azor. (ster.). *Am. sept.*: Groenland, Anticosti, Terr. nov., Nov. Scot., Columb. brit., fret. Behring, Sitka, Oregon, Idaho, M. Alleghan., Pensilv.

Exs.: *Mac. Canad. M.* n. 370 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 138 b, 845.

« *var. subpinnatum* (*Lindb.*) *W. P. Sch. op. cit.* p. 803.

H. calvescens *Jaeg. Ad. II*, p. 614.

H. subpinnatum *Lindb. in Not. in ur Saellsk. pro Faun...* 1868, p. 271 et in *Hedwig.* 1867, p. 41.

Hypnum brevirostre *Hartm. Skand. Fl. I ed.* p. 330 p.p.

H. calvescens *Wils. Bryol. brit.* p. 337; *Mac. Canad. M.* n. 450.

H. subpinnatum *Lindb. in Hartm. Skand. Fl. IX ed. II*, p. 13, n. 76 (1864).

Pleurozium calvescens *Kindb. Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.

Ut typ. — *Eur.*: Britann., Scandin., German. *As.*: Japon., Saghalien, Jenissei sup. *Am. sept.*: Nov. Scot., New Brunswick.

Exs.: *Rab. Bryoth. eur.* n. 138 p.p., 1043.

submacrocarpum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 497.

Hypnum submacrocarpum *Hpe. in sched.*

— *As.*: Sikkim.

subpinnatum *Lindb.* — *H. squarrosum var. subpinnatum.*

triquetrum (*L.*) *Bryol. eur. VI* (mon. p. 8), t. 491; *W. P. Sch. op. cit.* p. 803.

Hypnum sagittaefolium *Voit. M. Herbip.* p. 97.

H. triquetrum L. *Sp. pl.* p. 1589; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 508; *C. M. Syn.* II, p. 444.

H. vulgare, triangulum, maximum et pallidum Dill. *Hist. M.* p. 293, t. 38, f. 28.

Pleuroziopsis triquetra Kindb. *Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.

2. Terr. in silv. — *Eur.*: Vulgatiss. *As.*: Japon., Amour, Saghalien, Jenissei, Obi, Caucas. *Am. sept.*: Anticosti, ins. Miquel., ab Atlant. ad Pacif. et fret. Behring, reg. sept., occ. et or.

Exs.: Drumm. *M. bor. am.* I ed., n. 182 (*Hypnum*).

Mac. *Canad. M.* n. 371 (*Hypnum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 392.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed., n. 417 (*Hypnum*).

« *var. californicum* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 61.

Ut typ. — *Am. sept.*: Washington, Calif.

umbratum (Ehrh.) *Bryol. eur.* VI (mon. p. 6), t. 488; *W. P. Sch. op. cit.* p. 799.

Hypnum proliferum β *umbratum* Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 373.

H. umbratum Ehrh. *Crypt. exs.* n. 66; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 433; *C. M. Syn.* II, p. 457.

Pleurozium umbratum Kindb. *Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.

2. Ad sax., rup. et rad. arb. in silvat. — *Eur.*: Reg. montan. et subalp. *As.*: Japon., Caucas. occ. *Am. sept.*: Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scotia, New Brunswick, Gaspes., M. Adirondack et Catskill, reg. sept. et or.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 368 p.p. (*Hypnum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1185.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed., n. 420 (*Hypnum*).

Un. itin. 1863, n. 99.

umbratum Mac. p.p. — *Hypnum alaskanum*.

varians Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 182.

Ster. — *As.*: Japon.

yunnanense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 93.

2. In silv: — *As.*: Yunnan (1).

HYLOMNIUM Spr. Cat.

frondiforme Spr. — *Prionodon lycopodioides*.

Hylotapis Spr. Cat. p. 10 et in *Mitt. M. austr. am.* p. 363 (subsect. *HOO-KERIAE*).

HYMENOCLEISTON Duby in Mem... Genève, 1875 (1 spec.).

magellanicum Duby in *op. cit.* p. 8, t. 2, f. 1.

Dissodon plagiopus Ångstr. in *Oef...* 1872, n. 4?

Rupic. — *Am. merid.*: Patagon. austr., terr. Magellan.

« *var. edenensis* Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXV.

— *Am. merid.*: Patagon. occid.

HYMENODON Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 548 (5 spec).

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum :
H. plicatum Mitt.

aeruginosus (Hook. f. et Wils.) C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 804 et Syn. I, p. 179.

Rhizogonium *aeruginosum* H. f. et W. in op. cit. fasc. Mart.

2. Filicic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

angustifolius Sande Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. 8, t. 5 B.

2. Ster. Ad arbor. — As. : Celebes.

ovatus C. M. — Leptotheca Gaudichaudii.

piliferus Hook. f. Wils. in op. et l. cc. ; C. M. Syn. I, p. 179.

Rhizogonium *piliferum* H. f. et W. in op. cit. p. 538.

2. Ad *Cyatheam dealbat.* — Pac. : Austral. (Victoria), Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.

sericeus (Dz. et Mk.) C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 803 et Syn. I, p. 118; Bryol. jav. II, p. 3.

Mielicchoferia *sericea* Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 312 et M. frond. ined. Archip. ind. p. 85, t. 39.

2. Lignic. — As. : Borneo, Java.

sphaerothecus Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 218.

2. Filicic. — Pac. : Nov. Caledon (1).

HYMENOSTOMUM R. Br. in Trans. of the Linn. Soc. XII, II, p. 573 (29 spec.).

abyssinicum W. P. Sch. herb.

— Afr. : Abyssin.

Ahnfeldti Grev. — Entosthodon *ericetorum* var. *Ahnfeldti*.

argentinum (C. M.) Par.

Weisia *argentina* C. M. in Linn. 1878-79, p. 352.

2. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

Balansaeum Besch. Not. M. Parag. p. 259.

Phascum *recurvirostrum* C. M. in Fl. 1888, n. I.

Ad terr. humid. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1197, 1280, 3657.

brachycarpum Bryol. germ. — H. *microstomum* var. *brachycarpum*

brachypelma (C. M.) Par.

Weisia *brachypelma* C. M. in Fl. 1879, n. 24.

2. — Afr. : M. Kenia.

Cameruniae C. M. in Dusen M. Camer. n. 286.

— Afr. : M. Cameroon.

contortum Kze. — Hyophila.

crispatum Bryol. germ. I, p. 205, t. 12 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 80 ; Bryol. eur. I (mon. p. 6), t. 19 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 36.

Gymnostomum *crispatum* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 36.

H. Müllerii Br. in Bot. Zeit. 1829, p. 387.

Weisia *crispata* C. M. Syn. I, p. 662.

1. Ad terr. argill. calcar. — Eur. : Galloprov., Sardin., Istr., Dalmat.

(1) In Enum. Kindberg. nomen nudum :
H. *helvolus* C. M.

crispatum de Not. — *H. microstomum*.

cucullatum (C. M.) Par.

Gymnostomum cucullatum Jaeg. Ad. II, p. 278.

Weisia cucullata C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 163.

1. — Afr. : C. B. Sp.

cylindricum Bryol. eur. — *Gymnostomum Breutelii*.

edentulum (Mitt.) Besch. in Bull. Soc. bot. fr. 1887, p. 95.

Gymnostomum edentulum Jaeg. Ad. I, p. 277.

Weisia edentula Mitt. M. Ind. or. p. 27.

1. Ad terr. et mur. — As. : Tonkin, Madras, Ceylan.

fasciculatum Hpe. Symb. 1872, p. 39.

2. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

involutifolium C. M. — *Hyophila*.

? *lineaefolium* (C. M.) Par.

Weisia lineaefolia C. M. in Linn. 1875, p. 406.

Terr. — Afr. : Dar Fertit.

micaceum (Schlecht.) Hpe. Symb. 1874, p. 485.

Gymnostomum micaceum Schlecht. in Linn. 1835, p. 443.

H. subglobosum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 6.

Weisia micacea C. M. Syn. I, p. 662.

2. Terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

microstomum (Hedw.) R. Br. in Trans. of the Linn. Soc. XII, II, p. 578 ;

Brid. Bryol. univ. II, p. 77 ; Bryol. eur. I (mon. p.), t. 16 ;

W. P. Sch. op. cit. p. 34.

Bryum microstomum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 9.

Gymnostomum microstomum Hedw. M. frond. III, p. 71, t. 30 ; W. P.

Sch. Syn. I ed. p. 34.

H. crispatum de Not. Epil. p. 607.

Mollia microstoma Lindb. M. Scand. p. 22.

Simophyllum microstomum ej. Rev. crit. ic. Fl. dan. p. 74.

Weisia microstoma C. M. Syn. I, p. 660.

1. Ad terr. argill. arenac. — Eur. : Tota. As. : Caucas. Afr. : Alger.

Am. sept. : (fid. Jaeg. Ad. I, p. 38, sin. loc.).

« *var. brachycarpon* (Bryol. germ.) Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

H. microstomum Bryol. germ. I, p. 196, t. 12 ; Brid. op. cit. p. 76.

H. planifolium Sendtn. in Fl. 1841, p. 143 ; C. M. Syn. II, p. 634.

Gymnostomum microstomum var. brachycarpon V. P. Sch. Syn. I ed. l. c.

Weisia brachycarpa Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 9.

Weisia microstoma var. brachycarpa C. M. Syn. I, p. 660.

Ut et cum typ. in Eur.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 859.

« *var. brevirostre* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

Gymnostomum microstomum var. brevirostre Jaeg. Ad. I, p. 278.

G. sepincola Funk. in Brid. op. cit. p. 74.

Weisia microstoma var. brevirostris C. M. l. c.

Ut et cum typ. in Eur.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 832.

« *var. elatum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.

Gymnostomum microstomum var. elatum Jaeg. l. c.

Weisia microstoma var. elata C. M. l. c.

Ut et cum typ. in Eur.

var. mutilatum Hüb. — *H. rostellatum*.

- « *var. obliquum* (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
Gymnostomum microstomum var. obliquum Jaeg. l. c.
H. obliquum Bryol. germ. I, p. 194, t. 12; Brid. op. cit. p. 75.
Mollia microstoma var. obliqua Braithw. Brit. Mossfl. I, p. 234.
Weisia microstoma var. obliqua C. M. l. c.

Ut et cum typ. in *Eur.* :

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 307, 407.

microstomum Aust. — *Weisia viridula var. gymnostoma.*
Mülleri Br. — *H. crispatum.*

murale Spr. *M. Pyr. n. 236; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 37.*

Gymnostomum murale W. P. Sch. Syn. I ed. p. 37.

Mollia Wimmeriana var. subgymnostoma L Impr.

Weisia Wimmeriana C. M. Syn. II, p. 633 p.p.

Syn. Muric. — *Eur.* : Gall. merid. occ. (S. Marie d'Oleron). *As.* :
 Caucas. (Imeretia).

obliquum { *Bryol. germ.* — *H. microstomum var. obliquum.*
 Wils. — *H. rostellatum.*

obtusifolium C. M. — *Hyophila blanda.*

Paucherianum Jaeg. — *Gymnostomum.*

? *perpusillum* (C. M.) Par.

Phascum perpusillum C. M. in Linn. 1811-73, p. 145.

— *Pac.* : Austral. or.

phascoides Wils. — *H. rostellatum.*

planifolium Sendtn. — *H. microstanum var. brachycarpum.*

pulicare Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc. p. 11.*

Weisia pulicaris ej. in Rev. bryol. 1877, p.

2. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

rostellatum (*Brid.*) *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 33.*

Astomum rostellatum Bryol. eur. I (mon. p. 13), t. 12.

? *A. rostratum Hpe. in Fl. 1837, p. 285.*

Gymnostomum rostellatum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 33.

H. microstomum β mutilatum Hüb. Muscol. germ. p. 67.

H. obliquum Wils. Engl. Bot. Suppl. t. 2831.

H. rostellatum Wils. in Bryol. eur. (mon. p.), t. 15

Kleioweisia rostellata Bayerhof. in Jahrber. d. Ver. f. Naturk. ins Herzogth. Nassau, 1849, V, p. 3.

Mollia rostellata Lindb. M. Scand. p. 43.

Phascum rostellatum Brid. Mant. M. p. 11 et Bryol. univ. I, p. 46;
C. M. Syn. I, p. 24 et II, p. 520.

Systegium rostellatum Boulay M. E. Fr. p. 586.

Weisia phascoides C. M. Syn. II, p. 634.

W. rostellata Lindb. de Tort.

1. In argillos. humid. — *Eur.* : Reg. campestr., sporad.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 162.

rutilans Bryol. germ. — *Weisia mucronata.*

subacaule (*Mitt.*) Par.

Astomum subacaulon Jaeg. M. Cleistor. p. 13.

Systegium subacaulon Mitt. in Spr. Cat. M. Amaz. et And. n. 240.

Weisia subacaulis ej. M. austr. am. p. 131.

Ad. terr. humid. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Boliv.

semi-involutum (C. M.) Par.

Weisia semi-involuta C. M. in Linn. 1880-83, p. 438.

— *Am. merid.* : Argentin. tropic.

senocarpum (C. M.) Par.

Gymnostomum senocarpum Jaeg. Ad. I, p. 280.

Weisia senocarpa C. M. Syn. II, p. 633.

2. — Am. merid. : And. Costa-Ric.

squarrosum Bryol. germ. I, p. 193, t. 12 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 74 ;
Bryol. eur. I (mon. p. 5), t. 7 ; W. P. Sch. op. cit. p. 34.

Gymnostomum squarrosum Wils. Bryol. brit. p. 43, t. 38 ; W. P. Sch.
Syn. I ed. p. 34.

Mollia squarrosa Lindb. M. Scand. p. 22.

Systegium squarrosum Boulay M. Fr. p. 560.

Weisia squarrosa C. M. Syn. I, p. 663.

1. Ad terr. argillos. — Eur. : Dania, Anglia merid., Palatin., Siles.,
Boruss., Austr. inf., Gall. occid.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 24,404.

striatum Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil. p. 12.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

subglobosum { Bryol. germ. — Weisia viridula.
Hsch. — H. micaceum.

submicaceum (C. M.) Par.

Weisia submicacea C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 127.

— Am. merid. : Brasil. subtropic. or.

subrostellatum W. P. Sch. in hb. DR. ; Besch. Cat. M. Alger. p. 4.

— Afr. : Alger.

Termitidarum (C. M.) Par.

Weisia Termitidarum C. M. in Linn. 1875, p. 405.

2. Terr. — Afr. : N'Gama sept.

tortile (Schwaegr.) Bryol. eur. I (mon. p. 6), t. 15 ; W. P. Sch. op. cit.
p. 35.

Gymnostomum condensatum Voit. M. Herbip. p. 14.

G. hymenostomoides Poech. M. Bohem.

G. tortile Schwaegr. Suppl. I, I, p. 29, t. 10 ; Brid. Bryol. univ. II,
p. 74 ; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 35.

Mollia condensa Lindb. de Tort. p. 230.

M. tortilis Braithw. Brit. Mossfl. I, p. 235.

Weisia involuta Brid. op. cit. p. 336 ?

W. tortilis C. M. Syn. I, p. 661.

1. Ad mur. et in fissur. rup. pracip. calcar. — Eur. : Zon. merid.,
reg. calidior. zon. interm., rar. in zon. sept. As. Caucas. Afr. :
Alger ; austral. (fid. Handb. of N. Zeal. Fl.), Pac. : Nov. Zeland.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 408.

* var. alpinum W. P. Sch. op. cit. p. 36.

Gymnostomum Schimperii Mdo. in sched. 1864 et Moosst. in d. Alg.
Alp. p. 58.

Ut typ. — Eur. : Scandin., Dania, Alp. Bavar.

* var. subcylindricum Bryol. eur. l. c. t. 19 et W. P. Sch. l. c.

Gymnostomum tortile var. subcylindricum Jaeg. Ad. I, p. 278.

Ut typ. — Eur. : Reg. merid.

umbrosum (Mitt.) Par.

Gymnostomum umbrosum Jaeg. Ad. I, p. 280.

Weisia umbrosa Mitt. M. austr. am. p. 133.

2 ? Rupic. et terr. — Am. merid. : And. Quitens. et Peruv.

unguiculatum *Philib. in W. P. Sch. Syn. II ed. p. 37.*

Trichostomum mutabile var. unguiculatum Husn. Muscol. gall. p. 87.

1. Ad terr. lapid. et in fissur. rup. calcar. — *Eur.*: Galloprovincia.

urceolare *Hpe. Enum. M. Brasil, p. 12.*

Hyophila urceolaris ej. Symb. 1870, p. 269.

Terr. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Vallis-Gratiae Hpe. in sched. ; Jaeg. Ad. II, p. 631.

— *Afr.*: C. B. Sp. (1).

HYMENOSTYLIUM *Brid. Bryol. univ. II, p. 81.*

Spec. omn. non. indicatae sunt *GYMNOSTOMA* ejusd. nom.

commutatum Mitt. — *Gymnostomum curvirostre.*

Mulleri Br. — *Trichostomum mutabile.*

vernicosum Mit. — *Pottia.*

verticillatum Mitt. — *Eucladium.*

HYOCOMIELLA *C. M. in Fl. 1890, p. 437 (sect. HYPNI); Kindb. Enum. Bryin. (gen. propr.).*

bartramiophila Kindb. — *Hylocomium.*

HYOCOMIUM *Bryol. eur. VI (1 spec.).*

capillifolium Mitt. — *Hypnum.*

cylindricarpum Mitt. — *Brachythecium.*

exaltatum Mitt. — *Hypnum.*

flagellare (Dicks.) Bryol. eur. VI, t. 532; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 660.

Hypnum armoricum *Brid. Bryol. univ. II, p. 525.*

Hypnum flagellare Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 12; C. M. Syn. II, p. 436.

Hypnum pseudo-commutatum La Pyl. in hb. Bridel.

Pleurozium flagellare Kindb Check-List of Eur. a. N. Amer. M. p. 19.

2. Ad. rup. quartz. irror. secus rivul. et cataract. — *Eur.*: Norveg. occ., Britann., Armoric., Voges., Silva Nigr., Bavar., Pyren.

ruginosum Mitt. — *Brachythecium.*

HYOPHILA *Brid. Bryol. univ. I, p. 760 (63 spec.).*

acutiuscula Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 183.

2. Ster. Terr. — *Afr.*: Usambara.

agoyanensis Jaeg. — *Scopelophila.*

anoectangioides C. M. in Dusen M. Camer. n. 97.

— *Afr.*: M. Cameroon.

arborea (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 205.

Weisia arborea Mitt. *M. austr. am. p. 138.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.*: Brasil.

assimilis Broth. in Hedwig. 1895, p. 125.

Cortic. — *Am. merid.*: Brasil. or. (Goyaz).

baginsensis C. M. in Linn. 1875, p. 399.

Ster. Rupic. — *Afr.*: Niam-Niam.

(1) In Enumer. Kindberg. nom. nud.:
H. Pabstii C. M.

bahiensis (C. M.) Jaeg. l. c.

Pottia bahiensis C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 764.

2. — Am. merid. : Bahia.

Barbula (Schwaegr.) Hpe in Bot. Zeit. 1846, p. 267.

Gymnostomum Barbula Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 77, t. 751.

Pottia Barbula C. M. Syn. I, p. 558.

Tortula melanocarpa Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1877, p. 60 (fid. ips. in Voy. of H. S. M. Challenger, Bot. II, p. 885).

Weisia Barbula Mitt. M. austr. am. p. 135.

2. Rupic. — Am. sept. : Florid., Cuba.

bassoutensis Rehm. M. Afr. austr. n. 458.

Barbula bassoutensis ej. l. c. n. 100.

— Afr. : Bassoutoland, C. B. Sp.

" var. tenella ej. l. c. n. 459.

— Afr. : C. B. Sp.

Bescherellei C. M. — Trichostomum.

blanda (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. I, p. 200.

Gymnostomum blandum H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 151.

Hymenostomum obtusifolium C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 91.

H. Gardneri Hpe. in Bot. Zeit. 1846, p. 267.

Pottia blanda C. M. Syn. I, p. 558.

Weisia blanda Mitt. M. austr. am. p. 138.

2. Rupic. — Am. merid. : Brasil.

brevifolia Hpe. Enum. M. Brasil. p. 8.

Ster. — Am. merid. : Brasil. or.

Cameruniae C. M. in Dusen M. Camer. n. 22.

— Afr. : M. Cameroon.

caripensis Hpe. — H. involutifolia.

Cataractae (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 206.

Weisia Cataractae Mitt. M. austr. am. p. 135.

Rupic. — Am. merid. : And. Quitens.

circinata (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 205.

Pottia circinata C. M. in Linn. 1869-70, p. 38.

Tortula cylindrica Mitt. M. Ind. or. p. 28 p.p. ? (fid. C. M. l. c.).

Ster. — As. : Ceylan.

compacta (Welw. et Duby) Jaeg. Ad. I, p. 203.

Pottia compacta W. et D. in Mém... Genève, 1870, p. 11, t. 3, f. 5.

Terr. arenac. ad Termitid. conos. — Afr. : Angola.

contermina (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 204.

Pottia contermina C. M. Syn. II, p. 623.

Weisia contermina Mitt. M. austr. am. p. 135.

2. — Am. sept. : Costa Rica.

contorta (Kze.) Jaeg. Ad. I, p. 204.

Hymenostomum contortum Kze. in Fl. 1830, II, p. 373.

Pottia Hollii C. M. Syn. I, p. 561.

2. Rupic. — Afr. : Madeir.

crenulata C. M. in Dusen M. Camer. n. 111.

— Afr. : M. Cameroon.

cylindrica (Hook.) Jaeg. Ad. I, p. 204.

Gymnostomum cylindricum Hook. in Lond. Journ. of bot. 1840, II, p. 2 et Ic. pl. rar. t. 17.

Hyophila Harveyana Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 267.

Pottia cylindrica C. M. *Syn. I*, p. 562.

2. — As. : Nepal.

Gardneri Hpe. — *H. blanda*.

Gardneriana C. M. — *H. obtusifolia*.

goyasensis Broth. in *Hedwig.* 1895, p. 124.

1. Terr. — Am. merid. : Brasil, or. (Goyaz.).

gymnostomoides (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad. I*, p. 202.

Pottia gymnostomoides W. et D. in *Mém... Genève*, 1870, p. 12, t. 4, f. 4.

Rupic. — Afr. : Angola.

Harveyana Hpe. — *H. cylindrica*.

Holstii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 183.

2. Ster. — Afr. : Usambara.

Hookeri Hpe. — *H. involuta*.

incurva (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 205.

Weisia incurva Mitt. *M. austr. am.* p. 138.

— Am. sept. : Guatemala.

involuta (Hook.) Jaeg. *Ad. I*, p. 202.

Desmatodon involutus Mitt. *M. Ind. or.* p. 39.

Gymnostomum involutum Hook. *M. ex. t.* 154; *Brid. Bryol. unic. I*, p. 75.

H. Hookeri Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 267.

Pottia involuta C. M. *Syn. I*, p. 560.

2. — As. : Nepal.

involutifolia (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 203.

Hymenostomum involutifolium C. M. in *Linn.* 1847, p. 198.

Hyophila caripensis Hpe. in *op. cit.* p. 68.

Pottia involutifolia C. M. *Syn. I*, p. 560.

Weisia involutifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 136.

2. — Am. merid. : Venezuela.

javanica Brid. *Bryol. univ. I*, p. 761.

Gymnostomum javanicum Nees in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. XI, I*, p. 129, t. 14; f. 2; *Brid. op. cit.* p. 757.

Pottia javanica C. M. *Syn. I*, p. 560; *Bryol. jav. I*, p. 64, t. 52.

Rottleria javanica Brid. *op. cit.* p. 106.

1 (Bryol. jav.). 2 (C. M.) — As. : Java.

laxiretis Broth. in *Hedwig.* p. 1895, p. 124.

1. Rupic. — Am. merid. : Brasil, or. (Goyaz.).

Leprieurii (Mont.) Par.

Gymnostomum involutum Mont. in *Ann. sc. nat. XIV, II*, p. 350.

Pottia Leprieurii ej. *Syll.* p. 50.

Weisia Leprieurii Mitt. *op. cit.* p. 137.

Ad arbor. — Am. merid. : Guian.

Lindigii Jaeg. — *Barbula Lindigiana*.

loxorhyncha Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 9.

H. rubiginosa Hpe?

Syrrophodon loxorhynchus Ångstr. in *sched.*

Rupic. in silv. — Am. merid. : Brasil, austr. or.

lurida Jaeg. — *Barbula*.

Martinicae Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 174.

Ster. Muric. — Am. sept. : Martinic.

melanostoma (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 205.

Weisia melanostoma Mitt. *M. austr. am.* p. 138.

2. Arenic. et cortic. — *Am. merid.* : Amazon.

Micholitzii Broth. in *Oef...* 1893, p. 28.

2. — *Pac.* : Nov. Guinea.

minutissima (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 206.

Weisia minutissima Mitt. *op. et l. cc.*

Lignic. — *Am. merid.* : Brasil.

Mülleri (Duby) Par.

Pottia Mülleri Duby in *Mém... Genève*, p. 20, t. I, f. 4.

2. Terr. — *As.* : Malabar.

navicularis Jaeg. — Barbula.

Niam-Niamiae C. M. in *Linn.* 1875, p. 400.

Ster. — *Afr.* : Niam-Niam.

obtusifolia (C. M.) Par.

Gymnostomum Barbula H. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.*, 1844, p. 151.

H. Wilsoni Hpe. in *Bot. Zeit.* 1846, p. 267.

Pottia obtusifolia C. M. *Syn. I*, p. 559 (sub P. Gardneriana, err. in indice correct).

Weisia obtusifolia ej. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 91; Mitt. *op. cit.* p. 139.

2. — *Am. merid.* : Brasil.

Erstedtiana (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 201.

Pottia Erstedtiana C. M. *Syn. II*, p. 622.

Weisia Erstedtiana Mitt. *op. cit.* p. 136.

2. — *Am. sept.* : Nicaragua.

ovalifolia Hpe. *Symb.* 1874, p. 481.

Pottia ovalifolia ej. *op. cit.* 1872, p. 36.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

papillinervis (Ltz.) Jaeg. *Ad. I*, p. 205.

Pottia papillinervis Ltz. *Moosst.* p. 160.

Ster. — *Afr.* : Zanzibar.

perannulata Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, p. 60.

2. — *As.* : Sikkim.

phyalothecia C. M. — Lepidopilum.

plicata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 304.

1. Terr. — *Afr.* : M. Usagara.

Polakowskyi C. M. — Lepidopilum.

Poeppigiana (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Pottia Poeppigiana C. M. *Syn. I*, p. 562.

Weisia Poeppigiana Mitt. *op. cit.* p. 137.

2. — *Am. merid.* : Chile austr.

Potieri Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 53.

Terr. — *Afr.* : Usambara, ins. Borbon., Nossi-Be.

var. denticulata Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 183.

Rupic. — *Afr.* : Usambara.

punctulata (Mitt.) Par.

Weisia punctulata Mitt. in *Trans. of the roy. Soc. of Edinb.* 1887, p. 132.

— *Afr.* : Ins. Socotora.

pygmaea C. M. mss.

— As. : Birman. super.

Regnellii C. M. mss.; Ångstr. Prim. lin. p. 8.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Roscheri (Ltz.) Jaeg. Ad. I, p. 200.

Pottia Roscheri Ltz. Moosst. p. 160.

Weisia Roscheri Mitt. in Philos. Trans. of the roy. Soc. 1879 (extr. vol.), p. 389.

Ster. — Afr. : Zanzibar, ins. Rodriguez.

rubiginosa Hpe. Enum. M. Brasil. p. 8.

H. loxorhyncha Ångstr?

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

rufescens (Hook.) Jaeg. Ad. I, p. 204.

Barbula rufescens Mitt. M. Ind. or. p. 33.

Grimmia? remota Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 323.

Gymnostomum recurvum Griff. Not. p. 397 et Ic. pl. asiat. II, t. 92, f. 2.

G. rufescens Hook. in Schwaegr. Suppl. III, II, I, t. 206.

Pottia rufescens C. M. Syn. I, p. 561.

2. — As. : Nepal.

samoana Mitt. Sam. M. p. 193.

Pottia samoana C. M. M. Polyn. p. 68.

Ster. — Pac. : Ins. Samoa, Tonga.

Somaliae C. M. in Linn. 1876, p. 293.

Ster. — Afr. : Somali.

spathulata (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 200.

Pottia spathulata C. M. Syn. I, p. 559.

2. — As. : Nepal., Himalaya occ.

subcontermina Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 154.

2. Ad muros. — Am. sept. : Costa-Rica.

Tortula (Schwaegr.) Hpe. in Bot. Zeit. 1846, p. 267.

Gymnostomum Tortula Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 78, t. 17.

Pottia Tortula C. M. Syn. I, p. 559.

Weisia Tortula Mitt. M. austr. am. p. 13 (excl. pl. cubens.).

2. Saxic. — Am. sept. : Jamaic., ins. Carribb. Am. merid. : Nov. Granat., Amazon., And. Quitens. et Peruv., Brasil.

var. brasiliensis Hpe. — H. variegata.

Uleana Broth. in Hedwig. 1895, p. 125.

1. Rupic. — Am. merid. : Brasil. or. (Goyaz).

urceolaris Hpe. — Hymenostomum.

usambarica Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 183.

Ster. Terr. — Afr. : Usambara.

Vallis-Gratiae Hpe. mss.; Jaeg. Ad. II, p. 665.

— Afr. : C. B. Sp.

variegata Ångstr. Prim. lin. p. 8.

H. Tortula β brasiliensis Hpe. Symb. 1874, p. 481.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Victoriae C. M. in Dusen M. Camer. n. 312.

— Afr. : M. Cameroon.

vitiana (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 665.

Pottia vitiana C. M. M. Polyn. p. 68.

Ster. — Pac. : Ins. Fidji.

Wagneri (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 203.

Pottia Wagneri C. M. Syn. II, p. 623.

Weisia Wagneri Mitt. M. austr. am. p. 139.

— Am. merid. : Columb.

Warmingii Hpe. Symb. 1870, p. 269.

Lignic. et terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

* var. *angustifolia* Broth. in Hedwig. 1895, p. 124.

Cortic. — Am. merid. : Brasil. or. (Goyaz).

Wilsoni Hpe. — H. obtusifolia.

Wrightii (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 201.

Pottia Tortula Sull. in Wright M. Cubens. n. 2.

P. Wrightii C. M. hb.

Weisia Tortula Mitt. op. cit. p. 135 (quoad loc. nat. Cub.).

2. Rupic. — Am. sept. : Cuba.

Zeyheri (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 203.

Gymnostomum euchlorum Zeyh. Pl. Capens. n. 480.

Pottia Zeyheri Hpe. in C. M. Syn. I, p. 561.

2. — Afr. : C. B. Sp. (1).

Hyophiladelphus C. M. Syn. I, p. 604 (sect. BARBULAE).

Hyophilidium C. M. Syn. I, p. 528 (sect. SYRRHOPODONTIS).

Hyophilina ej. l. c. p. 523 (sect. CALYMPERIDIS).

HYPNELLA C. M. Syn. II, p. 208 (sect. HOOKERIAE); Jaeg. Ad. II (gen. propr.).

HYPNELLEAE omnes sunt HOOKERIAE ejusd. nomin.

Hypnidium W. P. Sch. Syn. I ed. p. 640 (subgen. HYPNI).

HYPNODENDRON C. M. Syn. II, p. 496 (sect. HYPNI); Lindb. in Bryol. jav. II p. 132 (gen. præpr.) (25 spec.).

arborescens (Mitt.) Lindb. in op. cit. p. 133, t. 232.

Trachyloma arborescens Mitt. M. Ind. or. p. 91.

2. — As. : Ceylan, Sumatra, Java.

* *arborescens* Mitt. (Sam. M.). — H. subspininervium.

Archeri (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 623.

Isothecium Archeri H. f. et W. Fl. Tasm. 11, p. 206, t. 175, f. 3.

Trachyloma Archeri Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 86.

2. — Pac. : Tasman.

arcuatum Mitt. — H. spininervium var. *arcuatum*.

Beccarii (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 622.

Dendro-Hypnum Beccarii Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 284.

2. — As. : Borneo.

(1) In Enum. Kindb. nom. nud. :

H. angustifolia C. M.
macrocarpa W. P. Sch.

H. pugionifolia C. M.
robusta Lindb.

Chalmessii Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc. of N. S. Wales*, 1882, p. 193.
— *Pac.* : Nov. Guinea.

Colensoi Mitt. — *Mniodendron comatum*.
comosum Mitt. — *Mniodendron*.

fusco-aciculare C. M. in *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.*
p. 10, t. 8.
2. — *Pac.* : Nov. Guinea merid.

fusco-mucronatum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 624.

Hypnum fusco-mucronatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 393.
2. — *As.* : Ins. Philippin.

Graëffeanum Jaeg. — *H. vitiense*.

Junghunii (C. M.) Lindb. in *Oef...* 1861, p. 74 et in *Bryol. jav. II*, p. ,
t. 531.

Hypnum Junghunii C. M. *Syn. II*, pp. 506 et 693.
H. Reinwardti Hsch. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV, Suppl. II*, p. 722
p.p., t. 41, f. (♂) a. 1 b.
2. — *As.* : Sumatra, M. Java.

Kerrii (Mitt.) Par.

Isothecium Kerrii Hook. f. *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 466.
Sciadocladus Kerrii Jaeg. *Ad. II*, p. 625.
Trachyloma Kerrii Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 86.
— *Pac.* : Nov. Zeland.

Krausei (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 624.

Hypnum Krausei C. M. in *Linn.* 1874, p. 619.
2. Saxic. — *Am. merid.* : Chile.

marginatum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. l. c.

Hypnum limbatum Sull.?
H. marginatum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 554; C. M.
Syn. II, pp. 508.
Isothecium marginatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 106, t. 89,
f. 2 et *Handb.* p. 466.
— *Pac.* : Nov. Zeland.

Menziezii (Hook.) Par.

Hypnum Menziezii Hook. *M. ex.* p. 19, t. 33; C. M. *Syn. II*, pp. 506
et 693.
Isothecium Menziezii Brid. *Bryol. univ. II*, p. 376; H. f. et W. *Fl. of the*
N. Zeal. II, p. 105 et *Handb.* p. 465.
Sciadocladus Menziezii Jaeg. *Ad. II*, p. 625.
Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

microstictum Mitt. *M. austr. am.* p. 566.

2. — *Am. merid.* : Chile.

Milnei Mitt. — *Mniodendron*.

Naumanni (C. M.) Far.

Hypnum Naumanni C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 83 et in *For-*
chungsreise... Bot. p. 38.

Ster. In silvis. — *Am. merid.* : Fret. Magellan., Fuegia.

palmaeum Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc. of N. S. Wales*, 1882, p. 103.
— *Pac.* ? Absque loco.

praenitens Mitt. — *Pterobryella*.

Reinwardti (Hsch.) Lindb. in *Bryol. jav. II*, p. 135, t. 233.

Hypnum orthocarpum Nees in sched.

- H. Reinwardti* Hsch. in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. XIV, II, Suppl.* p. 722 p.p., t. 41, f. a (except. I b.); *Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 223* (except. figg. 2, 7, 9); *C. M. Syn. II, p. 505.*
Phaenicobryum Reinwardti Lindb. in *Oefv...* 1861, p. 374.
Trachyloma Reinwardti Mitt. *M. Ind. or.* p. 91 (in obs.).
2. — As.: Malabar, Sumatra, Java, Borneo, Ceram, Celebes. *Pac.*: Ins. Fidji, Samoa.
- rigidum* Mitt. *Fl. Vit.* p. 401.
 Ster. — *Pac.*: Nov. Hebrid. (Aneitum).
- samoanum* Mitt. *Sam. M.* p. 192.
 Ster. Cortic. et rupic. — *Pac.*: Ins. Samoa.
- Sieberi* Mitt. — *Mniodendron.*
- speciosissimum* Mitt. p.p. { — *Pterobryella longifrons.*
 { — *Pterobryella.*
- spininervium* (Hook.) Jaeg. *Ad. II, p. 623.*
Hypnum spininervium Hook. *M. ex. t. 29*; *Brid. Bryol. univ. II, p. 396*; *C. M. Syn. II, pp. 507 et 693.*
Isothecium spininervium H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II, p. 105, Handb. p. 466 et Fl. Tasm. II, p. 206.*
 2. Rupic. et terr. — *Am. merid.*: Valdivia. *Pac.*: Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.
- a *var. arcuatum* (H. f. et W.) Par.
H. arcuatum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 90.
Isothecium spininervium var. arcuatum H. f. et W. l. c.
Trachyloma arcuatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 86.
- splendidum* Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 245.
Sciadocladus splendidum Jaeg. *Ad. II, p. 625.*
 2. Ad terr. humid. — *Pac.*: Nov. Caled.
- stipitatum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II, p. 624.*
Trachyloma stipitatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 156.
 Ster. ? — *Afr.*: Ins. Fernando Po.
- subarborescens* C. M. in *Geheeb Neue Beitr. zur Moosfl. v. N. Guin.* p. 10.
 2. — *Pac.*: Nov. Guin. merid.
- subspininervium* (C. M.) Jaeg. *Ad. II, p. 623.*
Braithwaitea arborescens Mitt. in *Proceed. of the Linn. Soc.* 1879 (extr. vol.), p. 101.
H. arborescens ej. *Sam. M.* p. 190.
Hypnum Reinwardti Sull. in *Wilkes Exped. ?*
H. subspininervium C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 782.
Trachyloma arborescens Mitt. in *Bonpland.* 1861, p. 366.
 Lignic. — *Pac.*: Ins. Fidji, Samoa, Nov. Hebrid. (Aneitum).
- tricostatum* (Sull.) Jaeg. *Ad. II, p. 624.*
Hypnum tricostatum Sull. in *U. St. Expl. Exped. Wilkes*, p. 13, t. 9.
 — *Par.*: Ins. Sandwic.
- Vescoanum* Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.*, p. 56.
Hypnum spininerve Sull. in *Exped. Wilkes.*
 2. Terr. — *Pac.*: Taïti.
- vitiense* Mitt. *Fl. Vit.* p. 401.
H. Graëffeanum Jaeg. *Ad. II, p. 621.*

Hypnum Graeffeanum C. M. *M. Polyn.* p. 90.

Trachyloma Junghunii Mitt. in *Bonpland.* 1861, p. 366.

Ster. — *Pac.* : Ins. Fidji (1).

Hypnolepidopilum C. M. in *Linn.* 1876, p. 252 (sect. *LEPIDOPILI*).

HYPNUM Dill. *Hist. M.* p. 261 (emend. sensu Schimperiano) (322 spec.).

abbreviatum { Hedw. — *Rhynchostegium murale*.
Schleich. — *Eurhynchium strigosum*.
Turn. — *Eurhynchium*.

abietinum L. — *Thuidium*.

var. *minor* Hook. { — *Thuidium gracile* (fid. C. M.).
— *Thuidium scitum* (teste Kindb.).

var. *paludosum* Wahlenb. — *Thuidium Blandowii*.

acacioides L. — *Fissidens*.

acanthoneuron Schwaegr. — *Rhizogonium Menziesii*.

acanthophyllum Mont. — *Rhynchostegium*.

aciculare { Brid. — *Ptychomnium*.
H. f. et W. p.p. — *Ptychomnium cygnisetum*.
Scop. — *Rhacomitrium*.

var. *aquaticum* Web. — *Rhacomitrium protensum*.

aciculatum C. M. — *Lindigia*.

acinacifolium Hpe. — *Ectropothecium*.

aciphyllum W. et M. — *Mnium affine*.

acistrostegium Sull. — *Rhaphidostegium*.

acrophyllum Hpe. — *Leucomium*.

acrorhizon Hsch. — *Microthamnium*.

acuminatum P. B. — *Brachythecium*.

var. *rupincolum* Sull. — *Brachythecium acuminatum* var. *rupincolum*.

var. *setosum* Sull. — *Brachythecium acuminatum* var. *setosum*.

acuminulatum Hsch. — *Taxithelium planum* var. *acuminulatum*.

acuticuspis Mitt. — *Isothecium*.

acutifolium H. f. et W. — *Rhynchostegium*.

acutum Mitt. — *Brachythecium*.

adiantoides L. — *Fissidens*.

Adiantum Neck. — *Eurhynchium striatum*.

admistum Sull. — *Rhaphidostegium microcarpon* var. *anisocarpon*.

adnatum { Hedw. — *Amblystegium*.
Turn. — *H. palustre*.

var. *gracile* S. et L. — *Amblystegium adnatum* var. *gracile*.

var. *Mac.* — *Amblystegium adnatum*

adscendens (Lindb.) Jaeg. *Ad. II*, p. 592.

Stereodon adscendens Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 251.

2. *Lignic.* — *As.* : *Amour, Saghalien.*

adpersum Hpe. — *Sematophyllum*.

aduncoides C. M. *Syn. II*, p. 295.

H. Stereodon cupressiforme ♀ *aduncoides* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 612.

Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.

aduncum Hedw. *M. frond. IV*, p. 62, t. 24 (excl. syn. L.); *Bryol. eur. VI* (mon p. 35), t. 604; *W. P. Sch. Suppl. Bryol. eur. fasc.*

(1) In *Enum.* Kindb. nom. nuda :

H. Helmsii C. M.

leiopyxis C. M.

| *planifrons* C. M.

III-IV (*Hypnum*), t. I et Syn. (1) II ed. p. 727; C. M. Syn. II, p. 323.

Amblystegium aduncum α *Blandowii* Sanio in *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II (2).

H. aduncum α *Blandowii* ej. *Beschr.* p. 25.

H. flavescens Schleich. *Cent. IV Crypt. helv. n.* 34 (fid. *Brid.*).

H. longisetum ej. l. c. n. 33 (fid. C. M.).

H. palustre erectum summitatibus *aduncis* Dill. *Hist. M.* p. 292, t. 37, f. 26.

H. psilocaulon Card. in *Rev. bryol.* 1883, p. 55.

H. Stereodon aduncus *Brid. Bryol. univ.* II, p. 623.

H. Stereodon aduncus δ *longipes* ej. *op. cit.* p. 625.

Neckera adunca Willd. *Prodr. Fl. Berol. n.* 937.

2. In turfos. — *Eur.*: E. planitie usq. in reg. mont. super. zon. intermed. et sept. *As.*: *Penins. Tchutschica, Taimyr, Ienissei sup. et med., Caucas. Afr.*: *Alger. Am. sept.*: *Groenland, Labrador, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., reg. sept. occ., centr. et or.*

Exs.: *Sull. et Lesq. M. bor. am.* II ed. n. 466.

Un. itin. 1864, n. 91, 92, 101.

« *var. aquaticum* Sanio in *Bot. Centralbl.* 1880.

Submers. — *Eur.*: *Boruss. or., Gall. or.*

« *var. asturicum* Ren. in *Husn. Muscol. gall.* p. 372.

In paludosis salsis. — *Eur.*: *Hispan. (Astur.)*.

« *var. attenuatum* Boulay *M. Fr.* II, p. 61.

In turfos? — *Eur.*: *Gall. Am. sept.*: *Montana.*

var. Blandowii Sanio. — *H. aduncum*.

« *var. complanatum* (*Lindb.*) *Par.*

Amblystegium complanatum *Lindb. M. Scand.* p. 33

Ut typ. — *Eur.*: *Fennia.*

« *f. falcata* Ren. in *op. cit.* p. 369.

— *Eur.*: *Gall. centr. Am. sept.*: *Montana.*

« *var. filiforme* (*Berggr.*) *Par.*

H. Kneiffii *var. filiforme* *Berggr. M. Spetsb. n.* 126 et in *K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII, n. 7, p. 83.*

Terr. — *Eur.*: *Spitzberg, ins. Ursor. Am. sept.*: *Fret. Bell?*

var. filiforme Ren. et Card. — *H. aduncum* *var. Roellii.*

« *var. flexile* Ren. in *op. cit.* p. 373.

— *Eur.*: *Gall. centr. et occ. Am. sept.*: *Indiana, ins. Vancouver.*

var. giganteum *Bryol. eur.* — *H. hamifolium.*

« *var. gracilescens* *Bryol. eur. l. c. t.* 605 β ; *W. P. Sch. op. et l. cc.*

H. Kneiffii *var. gracilescens* *Kindb. in Mac. Cat. p. 226.*

In uligin. — *Eur.*: *Gall., Hercyn. As.*: *Obi. Am. sept.*: *Columb. brit., Pensilv., Wisconsin, Montana, Wyoming.*

(1) « Plura ab auct. relata syn., quam maxime incerta, omitto. » *W. P. Sch. I ed. p. 606.*

(2) Cf. « Beschreibung der Harpidieen, welche namentlich von Dr. Arnell während der Schwedischen Expedition nach Sibirien in J. 1876 gesammelt wurden. » in « Bidrag till K. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. X, n. I. Stockholm, 1885, p.p. 1-60, » von Dr. Sanio.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 447.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 316 b et II ed. n. 467.

var. *hamatum* Bryol. eur. — *H. hamifolium*.

« var. *Hampei* Sanio *Beschr.* p. 29.

Amblystegium aduncum var. *Hampei* Sanio l. c. (1).

— *Eur.* : Ross. or. *As.* : Jenissei, Obi.

« var. *intermedium* W. P. Sch. *Suppl. Bryol. eur. fasc. III-IV* (Hypnum), t. I. f. 1-8 et op. et l. cc.

Ut et ubi typ. in *Eur.* et *Am. sept.* *As.* : Jenissei inf.

« var. *intermedium-laxum* (Sanio) Par.

Amblystegium aduncum var. *intermedium-laxum* San. l. c.

— *As.* : Jenissei sup. et med.

« var. *inundatum* W. P. Sch. in *Rab. Bryoth. eur. n. 917*.

H. vernicosum (fid. Ren.).

Aquat. — *Eur.* : Palatinat.

« var. *Kindbergii* Par.

H. Kneiffii var. *laxum* *Kindb. in Mac. Cat. p. 226*.

In paludos. — *Am. sept.* : Ottawa.

« var. *Kneiffii* W. P. Sch. op. cit. p. 727.

Amblystegium Kneiffii *Bryol. eur. VI (mon. p. 17). t. 573*.

H. aduncum *Mac. Canad. M. n. 332*; *Kindb. l. c.*

H. Kneiffii W. P. Sch. *Coroll. p. 135*.

Stereodon Kneiffii Mitt.

Ad foss. marg. et in foss. exsicc. — *Eur.* : Passim, semel fert. (Argentorati) lect. *As.* : Talysch. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Hic illic. *Pac.* : Nov. Zeland. ?

Exs. : Mac. Canad. M. n. 333.

Rab. Bryoth. eur. n. 692, b, c, d, e, 898, 1243.

« var. *laxifolium* Sanio in op. cit. p. 9.

In turfos. — *Eur.* : Germ. sept.

« var. *laxum* *Milde Bryol. siles. p. 351 et in Rab. Bryoth. eur. n. 546, 1198*.

— *Eur.* : Gall., Belg., Westphal., Siles., Salisburg.

As. : Jenissei. *Am. sept.* : Hic illic.

var. *molle* Sanio. — *H. Sendtneri* var. *Wilsoni*.

var. *molle bineroe* Sanio. — *H. longicuspis*.

var. *molle* †† *jeniseiense* Sanio. — *H. Sendtneri* var. *molle jeniseiense*.

« var. *paternum* Sanio.

In argill. — *Eur.* : Gall. or.

« f. *penna* Sanio in op. cit. p. 10.

In udis argill. — *Eur.* : Gall. or.

« var. *platyphyllum* (Kindb.) Par.

H. Kneiffii var. *platyphyllum* *Kindb. l. c.*

Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Ottawa.

(1) Cl. Sanio enumerat formas sequentes : *densum-julaceum*, *densum-sciurum*, *percurrans*, *tenue* (an *tenue* Bryol. eur. ?), *tenue-densum*, *tenue-filiforme*, *tenue-robustius*.

- « *var. polycarpum* (Bland.) Bryol. eur. l. c. t. 605 γ; W. P. Sch. op. et l. cc.
H. polycarpum Bland. in Sturm Deutsch. Fl. crypt. Fasc. XIV; Brid. Bryol. univ. II, p. 771.
 In terr. arenos. et uligin. subexsicc. — Eur. : Gall. centr. et occ., Belgia, Boruss. As. : Jenissei. Am. sept. : Montana.
 Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 400, 692 f.
var. pseudo-stramineum Ren. et Card. — H.
- « *var. pungens* H. Müll. in Limpr. Bryoth. sil. n. 286; Milde Bryol. siles.
 — Eur. : Gall., Boruss. sept., Siles. As. : Jenissei. Am. sept. : Wyoming.
- « *var. rectifolium* (Kindb.) Par.
H. Kneiffii var. rectifolium Kindb. in Mac. Cat. l. c.
 Ad rup. madid. — Am. sept. : Ottawa.
- « *var. Roellii* Par.
H. aduncum var. filiforme Ren. et Card. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.
 — Am. sept. : Wisconsin, Idaho.
var. rugosum H. et T. — *H. lycopodioides*.
- « *var. Schimperii* Sanio Besch. p. 41.
Amblystegium aduncum var. Schimperii ej. in Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II.
H. capillifolium Warnst. (f. Ren.).
 — As. : Jenissei sup.
- « *var. strictum* (Berggr.) Par.
H. Kneiffii var. strictum Berggr. ll. cc. n. 126 et p. 82.
 Terr. — Eur. : Spitzberg. Am. sept. : Groenland.
- « *var. subalpinum* Milde Bryol. siles. p. 351.
 — Eur. : Riesengeb.
- « *var. tenue* Bryol. eur. l. c. t. 605 δ; W. P. Sch. op. et l. cc.
 — Eur. : Gall. occ., Helvet., Magn. Ducat. Megapol., Fennia. Am. sept. : Montana, Idaho, Wisconsin, Washington.
- « *f. turficola* Ren. in op. et l. cc.
 In turfos. — Eur. : German. sept.
- aduncum* Drumm. — *H. vernicosum*.
aeruginosum C. M. — *Ectropothecium*.
- affine* Hook in Kunth Syn. pl. Equinoct. p. 64; Brid. Bryol. univ. II, p. 424; C. M. Syn. II, p. 256.
Steorodon affinis Mitt. M. austr. am. p. 533.
 1. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- affine* { Besch. — *H. Mohrianum*.
 Crome. — *Thuidium Blandowii*.
 Hoffm. — *H. filicinum*.
 Sommerf. — *H. Sommerfeldti*.
- africanum* W. et Dy. — *Thamnium*.
afro-acuminatulum C. M. — *Taxithelium*.
afro-cupressiforme C. M. in Borgen M. Mad. n. 67.
 — Afr. : Madagascar centr.

afro-demissum C. M. — *Rhaphidostegium*.

afro-glareosum Broth. — *Brachythecium*.

afro-molluscum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 130.

— *Afr.* : M. Cameroon.

afro-purum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 403.

— *Afr.* : Orange.

aggregatum Mitt. — *Isothecium*.

agnatum Hpe. — *Rhaphidostegium*.

Alaguetae C. M. — *Rigodium*.

alamazautrense Kiaer *ined.*

— *Afr.* : Madagascar.

» *var. Berthioei* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 128.

In silv. — *Afr.* : Madagascar.

Alaskae Kindb. *ined.*

2. — *Am. sept.* : Alaska.

alaskanum Lesq. et Jam. in *Proced. Am. Acad...* XIV, p. 139 et *Man.* p. 405.

Amblystegium alaskanum Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 127.

Hylocomium alaskanum Kindb. in *Mac. Cat.* p. 248.

Hylocomium umbratum Mac. *Canad. M. n.* 368 p.p.

Pleuroziopsis alaskana Kindb. *Check-List of Eur. a. N. Amer M. p.* 19).

2. *Ster. Terr.* — *As.* : *Penins. Tschutschica. Am. sept.* : *Saskatchewan,*

Columb. brit., Alaska, Unalaschka.

albens Gmel. — *Hookeria albicans*.

albescens Schwaegr. — *Isopterygium*.

albicans { Neck. — *Brachythecium*.

{ Sw. — *Hookeria*.

var. flavescens Brid. — *Brachythecium albicans*.

var. minnidunense Brid. — *Brachythecium glareosum*.

albulum C. M. — *Plagiothecium micans*.

var. fulvum L. et J. — *Plagiothecium micans var. fulvum*.

var. Sull. — *Plagiothecium micans var. ursorum*.

alleghaniense C. M. — *Thamnium*.

Alleni L. et J. — *Thuidium*.

alopescuroides { Hook. — *Thamnium*.

{ Lam. — *Isothecium myurum*.

var. hibernicum Hook. — *Rhynchostegium rusciforme*.

alopecurum { L. — *Thamnium*.

{ Mont. — *Thamnium Schmidii*.

alpestre Sw. *M. Suec. p.* 63 (*non tabula !*) ; *W. P. Sch. Syn. I ed. p.* 774.

Amblystegium rivulare Lindb.

H. molle C. M. *Syn. II, p.* 431 p.p.

H. rupestre Schleich. *Cent. II Crypt. helv. n.* 47 (*teste* Brid.).

H. Stereodon alpestris Brid. *Bryol. univ. II, p.* 571.

H. Stereodon mollis ej. *op. cit. p.* 578 (*excl. syn. Dicks*).

Limnobia alpestre *Bryol. eur. VI (mon. p. 4), t. 577 (except. f. 1 et 16, quae ad H. dilatatum pertinent).*

1. Ad rivul. frigidior. saxa silic. — *Eur.* : *Spitzberg, ins. Ursor.,*

Scandin., Alp. Carinth., Tirol. merid., etc.; desider. in Britann.

As. : *Jenissei inf. Am. sept.* : *Groenland, M. Rupestr.*

Exs. : *Mac. Canad M. n.* 396.

Rab. Bryoth. eur. n. 913.

alpestre { Grev. — *H. arcticum*.

{ Sw. (Ic!) — *H. alpinum*.

alpinum W. P. Sch. Syn. II ed. p. 777.

H. alpestre Sw. M. Suec. t. 6, f. 15 (non descriptio!).

Limnobia molle Bryol. eur. VI, t. 576 (non descriptio!).

1. Ad rivul. — Eur.: Scandin., Alp. Helvet. et Sabaud. (M. Blanc).

alpinum { Neck. — Dicranum elongatum var. orthocarpon.
Sm. — Brachythecium plumosum (1).

alto-pungens C. M. — Sematophyllum.

aluminicolum C. M. Syn. II, p. 291.

Stereodon aluminicola Mitt. M. austr. am. p. 534.

1. In spelunc. — Am. sept.: Mexic.

ambiguum (de Not.) Jaeg. Ad. II, p. 569.

Amblystegium ambiguum de Not. Epil. p. 144.

H. Notarisii Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 597.

Limnobia ambiguum de Not. Epil. p. 163.

L. palustre ej. in Erbar. critt. ital. n. 906.

Ad rivul. — Eur.: Longobard., Apennin. Ligustic.

ambiguum { Harv. — Ectropothecium cyperoides.
Schr. — H. revolvens (2).

amblyacron C. M. — Rhynchostegium.

amblyostegum Wils. in sched.

Stereodon amblyostegus Mitt. M. Ind. or. p. 97.

2. — As.: Sikkim.

amblyostomum C. M. — Thuidium.

var. *attenuatifolium* C. M. — Thuidium amblyostomum var. *attenuatifolium*.

var. *paludicolum* C. M. — Thuidium amblyostomum var. *paludicolum*.

amblystegiocarpum C. M. — Rhaphidostegium.

ancœnum { Hedw. — Rhaphidostegium.
Hook. } — Rhaphidostegium recurvans.
 } — H. pratense.

amplexicaule Rehm. M. Afr. austr. n. 122.

— Afr.: Natal.

anceps Bryol. jav. — Rhynchostegium.

andicolum Hook. — Microthamnium.

andinum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 568.

Amblystegium andinum Mitt. M. austr. am. p. 568.

In uligin. — Am. merid.: And. Quitens.

andinum Hpe. — Plagiothecium andicola.

Andrieuxii C. M. — Rozea.

androgynum { Schrank. — Aulacomnium.
Wils. — Eurhynchium speciosum.

andungense W. et Dy. — Rhaphidostegium.

var. *major* W. et Dy. — Rhaphidostegium andungense var. *major*.

aneurodictyon C. M. — Leucomium.

aneuron Duby. — Sematophyllum.

angustatum C. M. — Anomodon.

(1) *alternans* Brid. Bryol. univ. II, p. 542; C. M. Syn. II, p. 508. — Ex Australia. Quid? Delendum.

(2) *ambiguum* Vill. Pl. Dauph. III, p. 904; Brid. Bryol. univ. II, p. 545; C. M. Syn. II, p. 509. Fid. Brid. *Brachythecium populeum*. — Delendum.

- angusticymbium* C. M. — Rhaphidostegium
angustifolium Hpe. et C. M. — Pseudo-Leskea.
angustissimum C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 212.
 — *Afr.* : Madagascar.
angusto-textum Geh. — Ectropothecium.
anisophyllum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 119.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
annotinum W. et M. — Webera annotina.
anomalum Hpe. — Eurhynchium.
anotis Rehm. M. *Afr. austr.* n. 413 et b.
 H. crassicaule ej. l. c. n. 414 (*H. anotidis forma palustris, robusta*).
 — *Afr.* : C. B. Sp., Natal.
antarcticum C. M. — Plagiothecium.
antipyreticum Neek. — Fontinalis.
 var. *minus* Neck. — Cinclidotus fontinaloides.
aoratum Duby { (fid. Besch.). — Isopterygium intortum?
 (fid. Jaeg.). — Trichosteleum.
apertum Sull. — Ectropothecium inflectens.
apiculatum { Hartm. — Myurella.
 Hsch. — Ectropothecium.
apiculigerum L. et A. — Eurhynchium.
apocladum Mitt. — Isothecium.
applanatum Thw. et Mitt. — Helicodontium.
appressum { Brid. — Pylaisia intricata.
 Hsch. — Papillaria.
aptychopsis C. M. — Plagiothecium.
 Funk. — Brachythecium plumosum.
 Hpe. — Rhynchostegium.
 Jaeg. — Cinclidotus.
 Poll. — Rhynchostegium rusciforme var. inundatum.
aquaticum { *flagellis et teretibus et pinnatis* Dill. — Amblystegium ripa-
 rium.
 nigricans, foliis angustis falcatis Dill. — Cinclidotus aqua-
 ticus.
 prolixum, foliis ovatis Dill. — Rhynchostegium rusciforme
 var. prolixum.
aquatile Mart. — *H. palustre*.
aquicolum C. M. — Sematophyllum.
arabicum C. M. in *Hedwig.* 1891, p. 219 (nom.).
 — *As.* : M. Yemens.
Arabs C. M. in op. et l. cc. (nom.).
 — *As.* : M. Yemens.
Araucarieti C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 93.
 2. — *Am. merid.* : Brasil subtropic. or.
Araucariobryum ej. l. c. n. 72.
 2. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil subtropic. or.
arborescens C. M. — Rigodium Lechleri.
arboreum sciuroides Dill. — Leucodon sciuroides.
Arbuscula { Brid. — Thamnum alopecurum.
 Hook. — Camptochaete.
 P. B. — Hypopterygium Thouini?
arbusculans C. M. — Thamnum.

- arcticum *Sommerf. Suppl. ad Wahlenb. Fl. Lapp. p. 65, t. 2; C. M. Syn. II, p. 432; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 638 et II ed. p. 779.*
Amblystegium Smithii Lindb. M. Scand. p. 33.
H. alpestre Grev. Scot. crypt. Fl. t. 282.
H. Smithii Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. p. 277 (in adn.).
Leskea Smithii Sw. in Liljeb. Sv. Fl. III ed., p. 549, n. 6.
Limnobia arctica Bryol. eur. VI (mon. p. 6), t. 578.
Stereodon arcticum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 42.
 1. Ad saxa rivul. — *Eur. : Scot., Scandin., Sudet., Stir., Tirol., Alp. Rhaet., Pyren. Am. sept. : Groenland, New Jersey, Gaspes., Ontar., M. Selkirk et Rupestr., Columb. brit., Idaho.*
Exs. : Mac. Canad. M. n. 358.
Rab. Bryoth. eur. n. 648, 912.
 var. C. M. — *Rhynchostegium obtusifolium.*
arcuatiforme Kindb. in Mac. Cat. p. 238.
 2? ♂ ign. Terr. — *Am. sept. : Ontario.*
arcuatum Lindb. in Act. K. Vet. Ak. Holm. 1861, p. 371; W. P. Sch. op. cit. p. 758.
H. curvifolium C. M. Syn. II, p. 213 p.p.
H. Lindbergii Mitt.
H. Patientia Lindb. in Milde Bryol. siles.
H. pratense β hamatum W. P. Sch. Syn. I ed. p. 628.
Stereodon arcuatus Lindb.
 2. Ad terr. in gramin. et ad foss. marg. — *Eur. : E reg. campestr. usq. in alp., rariss. fructif. As. : Japon., Amour, Jenissei, Obi, Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Groenland, Terr. nov., Miquel., New Brunswick, Pensilv., Wisconsin, Indiana, Montana, Florid.*
Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 155, 3502 b.
Rab. Bryoth. eur. n. 476, 743.
Un. itin. 1867, n. 8.
 « var. americanum *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 99.*
Arenic. et lignic. — Am. sept. : Ladovicia.
 « var. demissum *W. P. Sch. op. et l. cc.*
Ut typ. — Eur. : Austria inf. Am. sept. : Maryland, Idaho.
 « var. elatum *W. P. Sch. op. et l. cc.*
Ut typ. — Eur. : Scandin., Ducat. Badens., Bavar., Pyren., etc. Am. sept. : Miquelon.
 « var. flaccidum *de Not. Epil. p. 180.*
Ut et ubi typ. in Eur.
 « var. fluitans *de Not. l. c.*
Aquat. — Eur. : Ubi typ.
arcuatum } *Hedw. — Rhacopilum.*
 } *Sull. — Ectropothecium.*
arenarium *Lesq. — Camptothecium.*
argentatum *Mitt. — Struckia.*
argenteum Rehm. M. Afr. austr. n. 673.
 — *Afr. : Natal.*
argenteum Schrank. — Bryum.
argentinum C. M. — Rigodium.
argute-serratum C. M. — Microthamnium Sellowii.
argyroleucon C. M. in Borgen M. Mad. n. 46.
 — *Afr. : Madagascar centr.*
arhrizon *Brid. — Amblystegium fluviatile.*

- aristatum* { H. f. et W. — Rhynchostegium.
 Sull. — Sciaromium hispidum.
armoricum Brid. — Hyocomium flagellare.
arquifolium Bryol. jav. — Isopterygium.
arrectum { Mitt. — Rhaphidostegium Welwitschii?
 Vill. — H. chrysophyllum.
arundinifolium Duby. — Breutelia gigantea.
Arzobispae C. M. — Thuidium.
asperipes Mitt. — Eurhynchium remotifolium.
asperisetum C. M. — Rhynchostegium.
asperrimum Mitt. — Brachythecium.
asperulum { Brid. — Brachythecium plumosum.
 Hpe. — Brachythecium.
asplenoides { Dicks. — Fissidens osmundioides.
 Sw. — Fissidens.
 Thbg. — Fissidens Thunbergii.
asprellum Schwaegr. — Thelia.
assurgens Sull. et L. — Thuidium?
athrocladum Mitt. — Brachythecium.
atlanticum Desf. — Rhynchostegium rusciforme var. lutescens.
attenuatum { Brid. — Brachythecium oxycladon.
 Schreb. — Anomodon.
atro-virens { Sm. — Pseudo-Leskea.
 Sw. — Eurhynchium praelongum var. atro-virens.
Auberti Schwaegr. — Acrocladium.
aureolum Hpe. — Rhaphidostegium.
 var. minus Hpe. — Rhaphidostegium aureolum var. minus.
aureo-nitens Hook. — Meteorium.
aureo-sulfureum C. M. — Rhaphidostegium.
aurescens C. M. — Camptothecium aureum.
aureum { Lag. — Camptothecium aureum.
 Lam. — Hookeria.
auriculatum { Lindb. — Brachythecium.
 Mont. — Lembophyllum.
aurifolium (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 594.
 Ctenidium aurifolium Mitt. M. austr. am. p. 509.
 Ster. — Am. merid. : Brasil. tropic.
australe C. M. — Ectropothecium.
austrinum H. f. et W. — Eurhynchium.
austro-aduncum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et in For-
 chungsreise... Bot. p. 33.
 Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.
austro-alpinum Hpe. — Brachythecium.
austro-catenulatum C. M. — Pseudo-Leskea.
austro-fluitans C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et in Forchungs-
 reise... Bot. p. 34.
 Amblystegium fluitans Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876.
 H. fluitans H. f. et W. M. Antart.
 2. — Afr. : Ins. Kerguelen.
austro-fluviatile C. M. — Amblystegium.
austro-glareosum C. M. — Brachythecium.
austro-montanum Hpe. — Rhynchostegium.
austro-pulchellum C. M. — Plagiothecium.
austro-pusillum C. M. — Isopterygium.

austro-salebrosum C. M. — *Brachythecium*.

austro-serpens C. M. — *Thuidium*.

austro-stramineum C. M. *Bryol. austr. Georg. p. 43.*

Ster. Paludic. — *Am. merid.*: Austr. Georg.

« *var. gracillimum* *ej. l. c.*

Ut et ubi typ.

« *var. subfluitans* *ej. l. c. p. 44.*

Ut et ubi typ.

austro-uncinatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et in Forschungsreise... Bot. p. 34.*

Amblystegium uncinatum Mitt. in *op. cit.*

1. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

badense A. Br. — *H. Haldanianum*.

badium Hartm. *Skand. Fl. V ed. p. 332*; W. P. Sch. *op. cit. p. 795.*

Amblystegium badium Lindb. *M. Scand. p. 33.*

2. In paludos. et ad rup. irror. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor., Alp.

Scandin. As.: *Jenissei inf. Am. sept.*: Groenland, Labrador.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n. 1300.*

badio × *Wilsoni* Sanio *Beschr. p. 52.*

Amblystegium badium × *latifolium* Arn. *M. As. bor. 1890, II, p. 122.*

Ster. — *Jenissei inf.*

baliense Bryol. jav. — *Ectropothecium*.

Bambergeri W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 698 et II ed. p. 763.*

H. circulare Jaeg. *Ad. II, p. 580.*

Stereodon circularis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 42.*

St. *Bambergeri* Lindb. *M. Scand. p. 38.*

2 ♂ et fr. ign. Ad terr. humidiusc. praepr. calc. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor., Alp. Scot., Scandin., Helvet., Tirol., Rhaet., Salisburg., Stir. *Am. sept.*: Ins. Beechey, canal. Wellington, Groenland.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n. 908.*

Un itin. 1863, n. 92, 93.

« *var. flexuosum* Berggr.

Stereodon Bambergeri var. *flexuosus* Lindb. *M. Scand. p. 38.*

— *Eur.*: Norvegia.

bancanum Bryol. jav. — *Isopterygium*.

Barbeyi Ren. et Card. in *Bull. herb. Boissier 1894, p. 32.*

2? Paludic. — *Am. merid.*: And Boliv.

Exs.: Mandon, Pl. Boliv. n. 1712 bis.

bartramiocarpum C. M. — *Trichosteleum*.

bartramiophilum C. M. — *Hylocomium*.

Basilaniae C. M. — *Trichosteleum*.

bavaricum Voit. — *Thuidium minutulum*.

Bergenense Aust. — *H. chrysophyllum* var. *tenellum*.

Berthelotianum Mont. — *Hylocomium*.

Berteroanum Mont. — *Rhynchostegium*.

Beskeanum C. M. — *Rhynchostegium*.

Beyrichii } Hsch. — *Rhaphidostegium*.

Wright. — *Rhaphidostegium sericifolium*.

bibrachiatum C. M. — *Homalia*.

bicolor *Belang. Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p. 92, t. 10, f. 2; C. M. Syn. II, p. 407.*

Ad arbor. rad. -- *Afr. : Ins. Borbon.*

bifarium Hook. — *Rhizogonium.*

bifidum Brid. — *Leucoloma.*

Bigelowii Sull. — *Thamnium.*

bistrumosum C. M. — *Trichosteleum.*

biventrosum C. M. — *Brachythecium.*

Blandowii W. et M. — *Thuidium.*

blandum Lyell. — *Scleropodium illecebrum.*

blepharophyllum C. M. — *Thuidium.*

Blyttii *Bryol. eur. VI (mon. p. 16), t. 586; W. P. Sch. op. cit. p. 747.*

Stereodon incurvatus β *Blyttii* *Lindb. M. Scand. p. 38.*

1. Ad sax. umbrosa. — *Eur. : Norveg. merid.*

bogasicum V. d. B. et Lac. — *Sematophyllum?*

Boivini C. M. — *Ectropothecium.*

Bolanderi Lesq. — *Brachythecium.*

bolivianum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n. 1708.*

— *Am. merid. : And. Boliv.*

Bonplandii { C. M. — *Homalothecium.*
Mitt. — *Orthothecium neilgherriense var. ceylanicum.*

borbonicum { C. M. — *Trichosteleum.*
Besch., Mitt. — *Sematophyllum Pickeringii.*

boreale W. et M. — *Bryum pseudo-triquetrum.*

Borrerianum Spr. — *Plagiothecium elegans.*

? *Boryanum* *Brid. Bryol. univ. II, p. 393; C. M. Syn. II, p. 245.*

— *Afr. : Ins. Borbon.*

Boschii Dz. et Mk. — *Trichosteleum.*

Boscii Schwaegr. — *Eurhynchium.*

Boswellii Geh. — *Rhaphidostegium.*

Bottinii Breidl. — *Plagiothecium.*

Bourgaeum { Mitt. — *Rhynchostegium.*
Sb. — *H. plicatile.*

brachiatum Mitt. in *Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 472.*

— *Pac. : Nov. Zeland. bor. et med.*

brachycarpum (Mitt.) *Par.*

Stereodon brachycarpus Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 181.*

1. — *As. : Japon.*

brachycarpum Hpe. — *Rhaphidostegium.*

brachycladon W. Arn. — *Erythrodontium densum.*

brachycladulum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 486.*

— *Afr. : M. Cameroon.*

brachyneuron C. M. — *Isopterygium.*

brachypelma C. M. -- *Rhaphidostegium.*

brachypodium C. M. — *Rigodium.*

brachypoma Schwaegr. — *Rhaphidostegium subsimplex.*

brachypterum Hsch. — *Rhynchostegium.*

brachypus Hpe. — *Rhaphidostegium.*

brachypyxis C. M. — *Thuidium.*

brachystelium C. M. — *Ectropothecium.*

brachytheciopsis C. M. — *Ectropothecium.*

- bracteatum* C. M. — Rhaphidostegium.
Brandegei Aust. — Rhynchostegium.
Brandisi C. M. — Thuidium.
brasiliense Hpe. — Plagiothecium subaequans.
Braunii C. M. — Sematophyllum.
 var. *oxyporon* Bryol. Jav. — Sematophyllum *Braunii* var. *oxyporon*.
Breidleri Jur. — H. Richardsoni.
brevicuspdatum C. M. — Sematophyllum.
brevifalcatum C. M. — Ectropothecium.
brevifolium Lindb. in Oefv... XXIII, p. 54.
 H. lycopodioides var. *brevifolium* Berggr. M. Spetsb. n. 127 et in K. Sv.
 Vet. Ak. Handl. XIII, n. 7, p. 83.
 Ster. Terr. — Eur.: Spitzberg, ins. Ursor. Am. sept.: Groenland.
brevifolium Rehm. — H. natalense.
brevimucronatum C. M. — Rhaphidostegium.
brevipes C. M. — Stereophyllum.
brevirostrum } Ehrh. — Hylocomium.
 } Hartm. p.p. — Hylocomium squarrosum var. subpinnatum.
 var. *interruptum* Brid. — Hylocomium brevirostre.
brevisetulum C. M. — Sematophyllum.
brevisetum Hsch. — Ectropothecium.
Brewerianum Lesq. — Isothecium.
 var. *lutescens* L. et J. — Isothecium *Brewerianum* var. *lutescens*.
 var. Sull. — Isothecium *Brewerianum* var. *lutescens*.
Brittoni Mitt. — Homalothecium sericeoides.
Bruchii Dz. et Mk. — Sematophyllum.
brunneo-alare C. M. — Brachythecium.
brunneo-fuscum C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.
 Amblystegium *brunneo-fuscum* L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 127.
 Ster. — As.: Penins. Tschutschica.
bryifolium C. M. — Ectropothecium.
bryiforme Brid. — Brachythecium acuminatum.
bryoides } Ehrh. — Fissidens osmundioides.
 } L. — Fissidens bryoides (1).
 var. Poll. — Fissidens exilis.
Buchanani Hook. — Brachythecium.
Buitenzorgii Bel. — Ectropothecium.
buluense Broth. — Rhynchostegium.
bunodicarpum C. M. — Trichosteleum.
Büttnerianum C. M. in Verhandl. d. bot. Ver. Prov. Brandenburg. 1890,
 p. 67.
 — Afr.: Tropic. occid.
byssicaule C. M. — Isopterygium.
byssirameum C. M. et Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 223.
 Ster. Lignic. — Am. sept.: Ontario.
Cacti C. M. — Isopterygium.
cacticolum C. M. — Rhynchostegium.
caespitans C. M. — Scleropodium caespitosum.
caespiticiu W. et M } — Bryum.
 } — Bryum Warneum.

(1) *bryoides* Vill. Pl. Dauph. III, p. 91; C. M. II, p. 509. — An *Rhacomitrium microcarpum*? Delendum.

- caespitosum* { C. M. p.p. — Rhaphidostegium galipense.
 Sull. — Rhaphidostegium lamprophyllum.
 Sw. — Rhaphidostegium.
 Wils. — Scleropodium.
filamentosum, minimum subflexum Dill. — Thuidium gracile var. lancastriense.
- calderense* Sull. — Sematophyllum.
Calerae C. M. — Brachythecium.
californicum Lesq. — Scleropodium.
callichroides C. M. — Ectropothecium.
- callichroum* C. M. *Syn. II*, p. 294; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 27), t. 596; *W. P. Sch. op. cit.* p. 753.
H. hamulosum Wils. *Bryol. brit.*
H. micranthum ej. mss.
H. Stereodon callichroum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 631.
2. Ad rup. humid. et terr. lapidos. — *Eur.*: Reg. montan. super. et subalp.: Spitzberg, ins. Parry; Scand. ? Alp. Scot., Angl.; Voges., Silv. Nigr., Helvet., Sudet., Salisburg., Pyren. As.: Jenissei inf., Caucas. occ. et centr. *Am. sept.*: Groenland, Nov. Scot.
Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 347.
Un. itin. 1863, n. 89.
- « var. laete-viride *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 624 et *II ed.* p. 754.
 Ad rup. irror. — *Eur.*: Alp. Delphinat., Austr. sup.
- callidioides* C. M. — Rhaphidostegium.
- callidum* { Mont. — Rhaphidostegium.
 Wright. — Rhaphidostegium xylophilum.
- calodictyon* C. M. — Ectropothecium.
 var. *glauca* C. M. — Ectropothecium calodictyon var. *glauca*.
- caloosiense* Aust. — Rhynchostegium?
- calpaecarpum* Ångstr. — Ectropothecium sodale.
- calvescens* Wils. — Hylocomium squarrosum var. subpinnatum.
- calyptratum* Sull. — Thuidium.
- cameratum* Mitt. — Brachythecium.
- campestre* Br. — Brachythecium.
- campicolum* C. M. — Amblystegium.
- campylocarpum* C. M. — Rhynchostegium.
- canadense* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club, XVII*, p. 280, in *Mac. Cat.* p. 236 et *Canad. M. n.* 314.
 2. Lignic. — *Am. sept.*: Terr. nov., summ. M. Rupestr., Alaska.
- canariense* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 584.
H. subcupressiforme *W. P. Sch. in Mandon M. Madeir. n.* 46.
H. uncinulatum *Jur. in Bot. Zeit.* 1866, p. 21.
Stereodon canariensis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 5.
 2. — *Eur.*: Hibern. *Afr.*: Ins. Canar., Madeira, Azor.
- canariense* { Brid. — Leucodon.
 Hpe. et C. M. — Eurhynchium.
- candidum* C. M. — Isopterygium.
- candidulum* C. M. — Isopterygium.
- canescens* Web. — Rhacomitrium lanuginosum.
 var. *ericoides* Web. — Rhacomitrium canescens var. *ericoides*.
 var. *hirsutum* Weiss. — Rhacomitrium lanuginosum.
 var. *pilosum* Weiss. — Rhacomitrium canescens.
- caperatum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 585.
Stereodon caperatus Mitt. *M. Ind. or.* p. 97.
 2. — *As.*: Himalaya occ.

capillaceum W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Peruv. n.* 3101.

Amblystegium capillaceum Mitt. *M. austr. am.* p. 570.

Ster. In uligin. — *Am. merid.* : And. Peruv.

capillaceum { Brid. — Brachythecium salebrosum var. cylindricum.
Vill. — H. Juliani.

var. *Thomasii* Brid. — Brachythecium salebrosum var. *Thomasii*.

capillare { Froehl. — Amblystegium serpens.
Sw. — Helicodontium.
W. et M. — Bryum.

capillifolium (Mitt.) Par.

Hyocomium capillifolium Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 177.

— *As.* : Japon.

capillifolium Warnst. — H. fluitans var. capillifolium.

capillipes Bryol. jav. — Isopterygium.

capillisetum C. M. — Ectropothecium.

carantae C. M. — Thuidium (1).

carneum W. et M. — Webera.

carolinianum C. M. — Rhaphidostegium demissum var. carolinianum.

casuarinum C. M. — Thuidium.

cassubicum { Dicks. — Eurhynchium piliferum.
Scop. — Camptothecium lutescens.

cataractarum C. M. — Thuidium?

cataractitis C. M. — Rhaphidostegium.

catenatum Vill. — Pseudo-Leskea catenulata?

catenulatum { Brid. — Pseudo-Leskea.
H. et T. — Heterocladium dimorphum.

catillum C. M. — Rhaphidostegium.

caturum P. B. — Anomodon rostratus.

caucasicum { Brid. — Amblystegium fluviatile.
Lindb. — Homalothecium.

caudatum Bryol. jav. — Sematophyllum.

caudiforme C. M. — Microthamnium.

caulibus prostratis, foliis lanceolatis reflexis, operculo conico Hall. —
H. Halleri.

cavifolium C. M. — Rhaphidostegium.

celatum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 590.

Leskea polyantha Harv., excl. fig. in *Hook. Ic. pl. rar. t.* 23, f. 3, quae
fol. St. aurei repraesentat (fid. Mitt. *M. Ind. or.* p. 99).

Stereodon celatus Mitt. *op. et l. cc.*

Ster.

— *As.* : Nepal.

celebicum Bryol. jav. — Rhynchostegium.

cerviculatum H. f. et W. — Rhaphidostegium.

ceylonense Hpe. — Rhaphidostegium.

chalarocladum C. M. — Pseudo-Leskea.

Chamissonis Hsch. — Ectropothecium.

chimborazense Mitt. in *Spr. Cat.* p. 15 et *exs. n.* 1032.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

chinense Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 754.

H. oblongifolium Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.* 1859, p. 279.

l.

— *As.* : Hong-Kong.

(1) *carinatum* Scop. *Fl. Carn.* II ed. n. 1307; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 544;
C. M. *Syn.* II, p. 508. — Forsan *Platygyrium repens*, fid. Brid. — Delendum.

chlamydophyllum H. f. et W. --- *Lembophyllum*.

chlorizans W. et Dy. — *Microthamnium*.

chlorochroum Jur. in *Un. itin.* 1863, n. 88.

Ad terr. calcar. argill. — *Eur.* : Alp. Bavar.

chlorocladum C. M. — *Lembophyllum*.

chlorophyllum Hsch. — *Stereophyllum*.

chloropsis C. M. — *Thuidium*.

chloropterum C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 231.

H. Novae Angliae *Mac. Canad. M.* n. 440.

1. Ad rup. et terr. umbr. — *Am. sept.* : Terr. nov., New Brunswick.

chloropterum C. M. — *Trichosteleum*.

chlorosum Hpe. — *Isopterygium*.

Chrismari C. M. — *Plagiothecium*.

chryseum Schwaegr. — *Orthothecium*.

chrysocladon Hpe. — *Brachythecium*.

chrysocomum Dicks. — *Breutelia arcuata*.

chrysogaster C. M. *Syn. II*, p. 295.

H. cupressiforme H. f. et W. *Fl. antarct.* p. 141.

H. patule eor. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 112, t. 90, f. 6 et *Handb.* p. 495 ;
Fl. Tasman. II, p. 212.

Stereodon chrysogaster Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 87.

2. Lignic. — *Pac.* : Tasman., ins. Auckland.

chrysophylloides { C. M. p.p. — *Plagiothecium Mühlenbeckii* var. *chrysophylloides*.
C. M. pp. — *Orthothecium intricatum*.
Hpe. — *Rhynchostegium*.

chrysophyllum Brid. *M. Rec. II*, II, p. 84, t. 2, f. 2 ; C. M. *Syn. II*, p. 435 ; W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 602 et *II ed.* p. 724.

Amblystegium chrysophyllum de Not.

H. arrectum Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 903.

H. fragile Brid. *Sp. M. II*, p. 198 et *Bryol. univ. II*, p. 597.

H. Halleri β majus Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 375.

H. polymorphum H. et T. *Muscol. brit.* p. 107, t. 26 ; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 13), t. 583.

H. squarrosulum Brid. *M. Rec. II*, II, p. 149, t. 4, f. 2.

H. stellatum var. *chrysophyllum* Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 185.

H. stellatum β minus W. et M. *Bot. Taschb.* p. 352.

H. *Stereodon chrysophyllum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 598.

H. *Stereodon chrysophyllum* β squarrosulus ej. op. cit. p. 599.

2. Ad rup. humid. praecip. calc., rar. ad terr. — *Eur.* : Reg. campestr. et mont., praecip. zon. sept. As. : Japon., Jenissei, Obi, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., reg. sept., or., centr., merid.

Exs. : Faurie *Pl. Jap.* n. 85.

Mac. Canad. M. n. 329.

Rab. Bryoth. eur. n. 493, 791.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II, p. 716.

Un itin. 1864, n. 86.

var. *subnivale* Mdo. — H. *Preverianum*.

« var. *tenellum* W. P. Sch. *ll. cc.*

H. *Bergenense* Aust. *M. Appal.* n. 391.

- H. polymorphum* β *chrysophyllum* *Bryol. eur. l. c.*
H. polymorphum *var. minus* *Sull. M. bor. am. II ed., p. 86?*
In siccior. — *Eur.* : Ubi typ. *Am. sept.* : Pensilv., Montana, Florida.
Exs. : Drumm. *M. bor. am. II ed. n. 145, 146.*
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 557.
- chrysostegum* C. M. — *Rhaphidostegium.*
chrysostomum { C. M. — *Brachythecium rivulare.*
Rich. — *Brachythecium plumosum.*
ciliare Brid. — *Fabronia octoblepharis.*
cincinnatum { Brot. — *Pterogonium gracile.*
Santi. — *Leptodon Smithii.*
- circinale* *Hook. M. ex. t. 107; C. M. Syn. II, p. 318.*
H. Stereodon circinalis *Brid. Bryol. univ. II, p. 621.*
Stereodon circinalis *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 181.*
1 (*Sull. et Lesq.*); 2 (*Ren. et Card.*) *Cortic. et lignic.* — *Eur.* : *Hibern.*
As. : Japon. *Am. sept.* : *Columb. brit.*, Alaska, Vancouver, fret. Kot-
zebuë, Washington, Oregon. *Am. sept.* : *Chile, ins. Juan Fernandez.*
Exs. : *Mac. Canad. M. n. 347 p.p.*
- circinale* *Mac. p.p., Sull. et Lesq. — H. Sequoieti.*
circinans *W. P. Sch. — Isothecium myurum var. circinans.*
circinatum *W. P. Sch. in Savat. M. Japon. n. 99; Besch. in Ann. sc.*
nat. 1893, p. 389.
2? — *As.* : Japon.
- circinicaule* C. M. — *Rhaphidostegium.*
circinatum *Brid. — Eurhynchium.*
var. inundatum *Boul. — Scorpiurium rivale.*
- ? *circinulatum* *W. P. Sch. in Jardin Enum. p. 20 (nom.).*
— *Pac.* : Taïti.
- circulare* *Jaeg. — H. Bambergeri.*
- circulifolium* *C. M. et Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 242.*
Ster. Ad rup. madid. — Am. sept. : New Brunswick.
- cirratum* { *Brid. — Macromitrium cirrosum.*
Weiss. — *Dicranoweisia.*
cirriferum *Spreng. — Meteorium patulum.*
cirrifolium { *Schwaegr. — Papillaria.*
Schwaegr. — *Rhaphidostegium.*
- cirroso-revolvans* *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1708 p.p.*
— *Am. merid.* : And. Boliv.
- cirrosum* { *Schwaegr. — Brachythecium.*
Sw. — *Macromitrium.*
citrinum *Hpe. — Sematophyllum.*
cladoneuron C. M. — *Brachythecium.*
cladorhizans *Poir. — Cylindrothecium.*
clandestinum { *H. f. et W. — Lembophyllum.*
Lindb. — *Ectropothecium.*
Clarazii *Duby. — Helicodontium.*
clarescens *Wils. — Microthamnium.*
Clarionis *Lam. et DC. — Eurhynchium praelongum.*
clavatum *Bell. — Anomodon attenuatus.*
clavellatum { *Hedw. — Rhynchostegium confertum.*
L. — *Rhynchostegium murale.*
Schränk. — *Amblystegium serpens.*
parvum, repens, setis brevibus *Dill. — Drummondia.*

clavirameum C. M. — *Pseudo-Leskea*.

var. *denudatum* C. M. — *Pseudo-Leskea claviramea* var. *denudata*.

clinocarpum Tayl. — *Eurhynchium*.

Closteri Aust. — *H. molle*.

cochlearifolium Schwaegr. — *Lembophyllum*.

condonopyxis C. M. — *Ectropothecium*.

colpophyllum Mdo. — *H. Vaucheri* var. *colpophyllum*.

collatum H. f. et W. — *Rhynchostegium tenuifolium*.

var. *laxifolium* eor. — *Rhynchostegium tenuifolium* var. *laxifolium*.

var. *minus* eor. — *Rhynchostegium tenuifolium* var. *minus*.

var. δ eor. — *Rhynchostegium tenuifolium* var.

collinum Schleich. — *Brachythecium*.

coloradense Aust. in *Coult. Bot. Gaz. II*, p. 111.

Ster. — *Am. sept.* : Colorado.

colpophyllum Sull. — *Eurhynchium*.

Columbiae Kindb. in *Mac. Cat.* p. 224.

Amblystegium serpens *Columbiae* ej. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 279.

2. *Lignic.* — *Am. sept.* : Columb. brit.

columbico-palustre C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (nom.) in *Mac. Cat.* p. 241 et *Canad. M. n.* 493.

1. *Rupic.* — *Am. sept.* : Columb. brit.

columbicum C. M. — *Leskea gracillima*.

coma lutescente, extremitatibus stellatis Dill. — *H. stellatum*.

comatum C. M. — *Mniodendron*.

commixtum C. M. — *Leucomium*.

commutatum Hedw. *M. frond.* IV, p. 68, t. 26; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 523; *C. M. Syn.* II, p. 422; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 38), t. 607; *W. P. Sch. op. cit.* p. 741.

Amblystegium glaucum Lindb.

A. commutatum de Not. *Epil.*

H. diastrophyllum Sw. *M. Suec.* p. 58.

H. filicinum Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 987.

H. glaucum Lam. et DC. *Syn. fl. gall.* p. 108.

H. repens filicinum crispum Dill. *Hist. M.* p. 282, p. 36, f. 19 A-F.

H. vitellinum Brid. *op. cit.* p. 769.

2. *Locis aquos. calcar.* — *Eur.* : E reg. campestr. montos. usq. in mont. super. As. : Japon., Kamschatka, Himalaya et Tibet. occ., Kashmir, Kurdistan., Caucas., Assyri., Syr. *Am. sept.* : New Brunswick, New York, Ontario, Columb. brit., M. Rupestr., Colorado, Calif.

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 448.

Rab. Bryoth. eur. n. 349, 744.

var. *condensatum* Wils. — *H. falcatum*.

« var. *elegantulum* (de Not.) Jaeg. *Ad. II*, p. 574.

Ut et ubi typ.

var. *falcatum* C. M. — *H. falcatum*.

var. *fluctuans* Bryol. eur. — *H. falcatum* var. *virescens*.

« var. *sulcatum* Lindb.

— *Eur.* : Spitzberg. *Am. sept.* : Groenland.

Comorze C. M. — *Rhynchostegium*.

comosum { C. M. p.p. — *Mniodendron Kroneanum*.
Hsch. — *Mniodendron Sieberi*.
La Bill. — *Mniodendron*.
Mossm. — *Mniodendron comatum*.
Vill. — *H. stellatum*.

compactum { C. M. — *Amblystegium*.
Mac. p.p. — *Amblystegium subcompactum*.

complanatulum C. M. — *Sematophyllum*.

complanatum L. — *Neckera*.

β obtusum Ehrh. — *Homalia trichomanoides*.

complanum Mitt. — *Rhynchostegium*.

complexum (Mitt.) Lesq. et Jam. Man. p. 396.

Stereodon complexus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 41.

2. Rupic. — Am. sept. : New Brunswick, Columb. brit.

compositum Sw. — *Pilotrichum*.

compressifolium Mitt. — *Rhynchostegium*.

compressulum { Besch. — *H. subcompressulum*.
C. M. — *Eurhynchium*.

compressum { Brid. — *H. filicinum*.
Roth. — *H. molluscum*.
Schreb. — *H. Schreberi*.
Schultz. — *H. cupressiforme*.

comtifolium C. M. — *Brachythecium*.

concavifolium H. f. et W. — *Rhaphidostegium circinale*.

concauum Hook. — *Taxithelium planum*.

conchophyllum Tayl. — *Rhynchostegium*.

concinnum { de Not. — *Cylindrothecium*.
Hartm. — *Brachythecium populeum*.
Wils. — *Myuroclada*.

condensatum W. P. Sch. Syn. I. ed. p. 698 et II ed. p. 761.

Ster. — Eur. : Scandin., summ. Alp. Bavar.,

Helv., etc.

Exs. : Un. itin. 1867, n. 17.

confertum { Dicks. — *Rhynchostegium*.
Engl. Bot. — *Rhynchostegium murale*.
P. B. — *Hypnum polyanthos*.

var. *depressum* Brid. — *Rhynchostegium*.

var. *majus* H. f. et W. — *Rhynchostegium tenuifolium*.

var. *megapolitanum* Br. — *Rhynchostegium*.

var. *rotundifolium* Brid. — *Rhynchostegium*.

Conferva Schwaegr. — *Amblystegium confervoides*.

confervoides { Brid. — *Amblystegium*.
H. f. et W. — *Amblystegium Sprucei*.

confine (Mitt.) Par.

Stereodon confinis Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 181.

1. Ad arbor. — As. : Alp. Bhotan.

conflatum C. M. et Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 230.

H. fluitans Mac. Canad. M. n. 366 pp.

H. Sendtneri ej. l. c. n. 334 p.p.

2. Paludic. — Am. sept. : Labrador, Ontario, Columb. brit.

confluens C. M. — *Sciaromium*.

congestum { Hedw. — *Hookeria aurea*.
Sw. — *Homalothecium*.
Wils. — *Pseudo-Leskea*.

- congruens* Hpe. — *Rhaphidostegium*.
conostegum C. M. — *Ectropothecium*.
conostomum { Mitt. — *Eriodon*.
 { Tayl. — *Brachythecium*.
consanguineum { C. M. — *Anomodon*.
 { Hpe. — *Sematophyllum*.
consimile H. f. et W. — *Breutelina*.
conspissatum { eor. — *Sciaromium*.
 { Sull. — *Sciaromium confluens*?
conspurcatum Brid. — *H. filicinum* var. *trichodes*.
constrictum C. M. — *Rhaphidostegium*.
conterminum C. M. — *Rhaphidostegium affine*.
contextum { Hedw. — *Amblystegium serpens*.
 { Schleich. — *Plagiothecium nitidulum*.
contiguum { H. f. et W. — *Rhaphidostegium crassiusculum*.
 { Nees. — *H. uncinatum*.
contorte-operculatum C. M. — *Stereophyllum*.
contortulum Wils. — *Thuidium*.
contractum Lac. — *Ectropothecium*.
controversum Wils. — *H. falcatum*.
Cooleyianum Spreng. — *H. Haldanianum*.
convolutifolium Hpe. — *Rhynchostegium*.
convolutum Bryol. jav. — — *Sematophyllum*.
cordatum Harv. { (fid. Mitt. M. Ind. or. p. 89). — *Eurhynchium hians*.
 { (fid. Mitt. M. Ind. or. p. 88). — *Meteorium*.
cordifolium Hedw. M. frond. IV, p. 97, t. 37; C. M. Syn. II, p. 379;
 Bryol. eur. VI (non. p. 47), t. 615; W. P. Sch. op. cit. p. 785.
Amblystegium cordifolium de Not. Epil. p. 136.
H. crassum Schumacher. Pl. Saeland. II, p. 80.
H. cuspidatum β *bicolor* Turn. Musc. hibern. p. 176. 7
H. fontanum Schleich. Cent. II Crypt. helv. n. 53.
H. phyllorhizans P. B. Prodr. p. 67?
 1. In pratis uligin. et foss. aquos. — Eur.: Rar.: zon. intermed., rar.
 sept. vel merid. As.: Amour, Jenissei. Am. sept.: Groenland, Labra-
 dor, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Ottawa, Ontar., lac.
 Super., M. Rupestr., Washington, Oregon, reg. sept., or., centr.
Exs.: Mac. Canad. M. n. 361.
 Rab. Bryoth. eur. n. 498.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 457.
 Un. itin. 1864, n. 21, 22.
 « *var. compactum* C. M. l. c. p. 380.
H. cordifolium Drumm. M. bor. am. I ed., n. 209 (fid. C. M.).
 Ut typ. — Am. sept.: (conf. *H. giganteum*).
var. stenodictyon Bryol. eur. — *H. giganteum*.
cordifolium { Drumm. (fid. C. M.). — *H. cordifolium var. compactum*.
 { Drumm. (fid. Kindb. et Mitt.). — *H. giganteum*.
 { pler. Auct. Suec. — *H. giganteum*.
cordovense C. M. — *Isopterygium*.
coronopifolium P. B. — *Fabronia Persoonii*.
corralense Ltz. — *Eurhynchium*.
Cossoni W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. III-IV (*Hypnum*), t. 5 et Syn. II
 ed. p. 730 (1).
Amblystegium intermedium Lindb. M. Scand. p. 33; Sanio in Lindb. et
 Arn. M. bor. Am. 1890, II, p. 117.

- H. intermedium* *ej. in Hartn. Skand. Fl. X ed.*
H. revolvens *var. Cossoni et intermedium* *Ren. in Husn. Musc. gall. pp.*
 391-392, t. 112, f. 5 a, 7, 8, 12 et 13.
H. revolvens *var. intermedium* *Lesq. et Jam. Man. p. 384.*
H. vernicosum *Lindb. (fid. Milde Bryol. siles.).*

2. In uligin. et turfis. — *Eur.* : Gall. centr., sept. et or., Pyr., Belg.,
 Rhaet., Tirol., Bavar., Salisb. *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : Groen-
 land, lac. Super., M. Rupestr., New York.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 338.

Cossoni × *vernicosum* *Par.*

Amblystegium intermedio-vernicosum *Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890,*
II, p. 122.

H. intermedium × *vernicosum* *Samio.*

— *As.* : *Jenissei* inf.

crassicaule *Rehm.* — *H. anotis.*

crassicollum *Tayl.* — *Taxithelium planum.*

crassinervium *Tayl.* — *Eurhynchium.*

crassireticulatum *Hpe.* — *Ectropothecium.*

crassiusculum { *Brid.* — *Rhaphidostegium.*
 H. f. et W. — *Rhaphidostegium microcarpum.*

crassum { *La Tour.* — *Scleropodium illecebrum.*
 Schumach. { *H. cordifolium?*
 H. scorpioides.

crenulatum *Sch.* — *Brachythecium rutabulum.*

creperum *Wils. in sched.*

Stereodon creperus *Mitt. M. Ind. or. p. 98.*

1. — *As.* : *Sikkim.*

crinale *Schleich.* — *H. fertile.*

crinitifolium *C. M.* — *Leucomium.*

crinitum *Hook f. et Wils. in Lond. Journ. of. bot. 1844, p. 555 et Fl.*
Tasman. II, p. 215 (1).

H. extenuatum *C. M. Syn. II, p. 391 p.p.*

2. Ad arbor. — *As.* : *Borneo. Pac.* : *Austral. or., Nov. Zeland.,*
Tasman., ins. Auekland.

crispatulum *Hook.* — *Trachypus.*

crispatum *Gmel.* — *Dicranella crispa.*

crispifolium *Hook.* — *Thuidium.*

crispo-hamosum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 59.*

— *Afr.* : *M. Cameroon.*

crispulifolium *C. M.* — *Rhaphidostegium.*

crispum { *L.* — *Neckera.*
 cupressiforme, foliis aduncis *Dill.* — *H. cupressiforme.*

Crista-castrense *L. Sp. pl. p. 1591 (excl. syn. Dill.); Brid. Bryol.*
univ. II, p. 517; C. M. Syn. II, p. 296; Bryol. eur. VI (mon. p. 30),
t. 599; W. P. Sch. op. cit. p. 770.

H. Hedwigii *Lam. et DC. Fl. fr. n. 1348?*

H. scalare *Zenk. et Dietr. M. Thuring. n. 26.*

Ptilium Crista-castrense *de Not. Briol. ital. p. 101.*

Stereodon Crista-castrensis *Mitt. M. Ind. or. p. 96.*

2. Ad. terr. musc. praecip. silv. aceros. — *Eur.* : *Reg. mont. et subalp.,*

(1) Cf. *Hpe. in Linn. 1853, p. 504.*

rar. campestr. zon. interm. et sept. As. : Japon., Ochotsk, Yunnan, Amour, Saghalien, Jenissei, Obi, Sikkim, Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Labrador, Anticosti, Terr. nov., Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontar., Manitoba, Saskatchewan, M. Selkirk et Rupestr., Columb. brit., reg. sept. et or.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 212.

Faurie Pl. Japon. n. 832.

Mac. Canad. M. n. 343.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 470.

Un. itin. 1864, n. 68, 69.

Crista castrense Roth. — *H. molluscum*.

cristula Kindb. — *H. subimponens* var. *cristula*.

crithmifolium Hpe. — *Rhaphidostegium tequedamense*.

crudum W. et M. — *Webera*.

Ctenium W. P. Sch. in *Savat. M. Jap. n. 770^a*; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 389.

Ster. — As. : Japon.

cubense C. M. — *Ectropothecium*.

cucullatifolium Hpe. — *Rhaphidostegium*.

cucullatum Mitt. — *Rhychostegium*.

cucullifolium P. B. — *Ptychomnion aciculare*.

cuculligerum Lac. — *Sematophyllum*.

cultelliforme Sull. — *Stereophyllum*.

cupressetorum Brid. — *Rhaphidostegium recurvans*.

cupressiforme L. *Sp. pl.* 1592; *C. M. Syn. II. p. 289*; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 25), t. 594; *W. P. Sch. op. cit. p. 755*.

H. compressum Schultz *Prodr. Fl. Starg. n. 898*.

H. crispum cupressiforme, foliis aduncis *Dill. Hist. M. p. 287, t. 37, f. 23*.

H. decipiens Hoffm. *Deutsch. Fl. p. 73*.

H. fastigiatum Wieb. *Fl. Werth, p. 301*.

H. filicinum, sericeum, molle et pallidum, mucronibus aduncis *Dill. Hist. M. p. 286, t. 36, f. 22*.

H. homomallum Bert. *Pl. rar. Ital. Dec. IV, n. 13*.

H. nitens Timm. *Prodr. Fl. Megap. n. 828*.

H. repens, crispum cupressiforme, minus, foliis magis confertis *Dill. Cat. p. 217*.

H. tenuifolium Schleich. in sched.

H. Stereodon cupressiformis Brid. *Bryol. univ. II, p. 605* (incl. var. *chrysocomus*, *complanatus*, *conicus*, *corruscans*, *decipiens*, *fragilis*; *leucanthemum*? *plumosus*, *striatus*, *tenuifolius* pp. 608-612).

Neckera cupressiformis Willd. *Prodr. Fl. Berol. n. 936*.

2. Ad arbor., mur., rup. et sax., in tect. et ad terr. per tot. orb. fere terr., alpin. et arctic. vel antarct. except., vulgatiss.

Exs. : Bourgeau Pl. Canar. n. 1591.

Mac. Canad. M. n. 351.

Rab. Bryoth. eur. n. 415, b, 763, b, c.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 472.

« var. *brevisetum* W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 626 et II ed. p. 756*.

Ad ligna fabrecata. — Eur. et Am. sept. : Cum typ.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 963 e.

var. *complanatum* Hpe. — *H. pratense*.

« var. *compressum* (Brid.) Par.

Stereodon cupressiformis var. *compressus* Brid. l. c. p. 608.

— Afr. : Ins. Azor., Canar., Madeir.

« var. *elatum* *Bryol. eur. l. c. t. 595*; *W. P. Sch. op. et l. cc.*

- In ericet. humid. praecip. arenac. — *Eur.* et *Am. sept.* : Hic illic.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 763 d, 918.
- « *var. ericetorum Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 In ericetis ad terr. — *Eur.* : Hic illic. *Afr.* : Alger.; ins. Borbon. ? *Am. sept.* : Hic. illic.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 763 f.
- « *var. filiforme (Brid.) Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
H. cupressiforme var. tenue H. et T. Muscol. brit. p. 113 ?
H. extenuatum Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 63.
H. repens, crispum, cupressiforme, minus et foliolis minus confertis Dill. Cat. Giess. p. 216.
H. Stereodon cupressiformis var. filiformis Brid. Sp. M. p. 216 et op. cit. p. 609.
 Ad arbor. silvat. trunc. vel ramul. — *Eur.* : Hic illic. *As.* : Jenissei sup. *Am. sept.* : Hic illic. *Pac.* : Tasman.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 496.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. p. 473.*
var. foliis angustioribus Hook. — H. pallescens.
var. julaceum Zett. — H. Vaucheri var. julaceum.
- « *var. lacunosum (Brid.) Par.*
H. lacunosum Wieb. Fl. Werth. p. 209.
H. Stereodon cupressiformis var. lacunosus Brid. Bryol. univ. II, p. 610.
Stereodon cupressiformis var. lacunosus Mitt. M. austr. am. p. 531.
 Ad terr. — *Eur.* : Dania, German., Francon. *Am. sept.* : And. Quitens.
- « *var. Lauri (Brid.) Par.*
H. Stereodon cupressiformis var. Lauri Brid. op. c. p. 609.
 Ad *Laurum canar.* — *Afr.* : Ins. Azor., Canar., Madeir.
- « *var. longirostre Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
 Ad arb. rad. in silv. campestr. — *Eur.* et *Am. sept.* : Hic illic.
- « *var. longisetum (Brid.) Par.*
H. Stereodon cupressiformis var. longisetus Brid. op. cit. p. 611.
 — *Afr.* : Ins. Azor., Canar., Madeir.
- « *var. mamillatum (Brid.) Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
H. Stereodon cupressiformis var. mamillatus Brid. Sp. M. p. 215 et op. cit. p. 608.
 Ad arbor. rad. et in sax. — *Eur.* et *Am. sept.* : Hic illic.
var. minus H. f. et W. } — H. Mossmannianum.
var. Mossmanni Mitt. }
- « *var. pseudo-imponens R. Farneti in Atti dell'Institut. bot. della R. univ. di Pavia, 1893.*
 — *Eur.* : Ital. super.
- « *var. pyrenaicum Ren. in Fl. Miquel. p. 55.*
 — *Eur.* : Pyren. *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
- « *var. resupinatum (Wils.) W. P. Sch. Coroll. p. 133 et op. cit. p. 757.*
H. multiflorum Tayl. Fl. Hibern. Mackay II, p. 46 (fid. W. P. Sch.).
H. polyanthos Engl. Bot. t. 1664.
H. resupinatum Wils. Bryol. brit. p. 398.
 Ad arbor. et sax. arenac. — *Eur.* : Hibern., Angl., Ital. super.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 900, 1050.
- « *var. subjulaceum Mdo.*
Stereodon cupressiformis var. subjulaceus Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 149.
 — *Eur.* : Alp. Bavar. ? *As.* : Jenissei sup.

« *var. tectorum* (Brid.) *Bryol. eur. l. c. t.* 595; *W. P. Sch. op. et l. cc.*
H. myosuroides, *sericeum*, *tenuius*, *capsulis erectis* *Dill. Hist. M. p.* 318,
t. 41, *f.* 93.

H. nigro-viride *Turn. Muscol. Hibern. p.* 541.

H. Stereodon cupressiformis var. nigro-viridis *Brid. op. cit. p.* 611.

H. Stereodon cupressiformis var. tectorum *ej. op. cit. p.* 612.

*Ad mur. et tecta. — Eur. : Ubi typ. Afr. : Ins. Borbon. ? Am. sept. :
 Ubi typ.*

var. tenue *H. et T. — H. cupressiforme var. filiforme.*

« *var. uncinatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ad arbor. et lign. fabref. sicca. — Eur. et Am. sept. : Hic illic.

var. Bals et de Not. — H. Haldanianum.

var. Hook. — H. fastigiatum.

var. Hsch. — Rhaphidostegium Gueinzii.

Hook. (fid. C. M.). — H. imponens.

Hook. (fid. Kindb.). — H. hamulosum.

H. f. et W. — H. chrysogaster.

cupressiforme { *rotundius vel illecebrae aemulum* *Dill. —* { *Eurhynchium*
Boscii.
Scleropodium
illecebrum.
tenuius et compressum *Dill. — H. Schreberi.*
vulgare, foliis obtusis *Dill. — H. purum.*

cupressoides { *C. M. — Ectropothecium.*
Sull. — Ectropothecium plumulum.
W. P. Sch. — H. Lechleri.

curlandicum *Brid. — H. Schreberi.*

curtipendulum *L. — Antitrichia.*

curtum *Lindb. — Brachythecium Starkii var. praelongum.*

curvatum *Fl. Suec. — Isothecium myurum.*

curvicaule *Jur. in Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien., 1864, p.* 103; *W. P. Sch. op. cit. p.* 806 (1).

Amblystegium curvicaule *Lindb. M. Scand. p.* 32.

A. filicinum var. curvicaule *Mdo. Bayern's Laubm. p.* 238.

Limnobium curvicaule *de Not. Epil. p.* 164.

*Fl. et fr. ign. — Eur. : Spitzberg, ins. Ursor., Alp. Jul., Bavar.,
 Rhœt., Salisburg., Austria.*

curvicollum *C. M. — Isopterygium.*

curviculatum *H. f. et W. — Rhaphidostegium.*

curvifolium *Hedw. Sp. M. p.* 285, *t.* 75; *Sull. M. of U. St. p.* 74 et *Ic. M. p.* 183, *t.* 114.

H. Stereodon curvifolius *Brid. Bryol. univ. II, p.* 613.

Stereodon curvifolius *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p.* 181.

2. *Lignic. — As. : Japon. Am. sept. : Terr. nov., ins. Miquel., Nov.
 Scot., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontar., Columb. brit., reg.
 sept., centr. et or.*

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 197 et *II ed. n.* 148.

Faurie Pl. Jap. n. 32, 1422, 1423 (ster.).

Mac. Canad. M. n. 353.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 480, 481.

curvifolium { *C. M. p.p. } — H. arcuatum.*
Itzigh. — H. pratense.

curvirostrum Brid. — *H. Haldanianum*.

curvirostre C. M. — *Rhaphidostegium*.

curvisetum Brid. — *Rhynchostegium*.

var. *longinerve* Lindb. — *Rhynchostegium curvisetum* var. *longinerve*.

curvulum Harv. — *Rhaphidostegium propinquum*.

cuspidatifolium C. M. — *Leucomium*.

cuspidatulum C. M. — *Rhaphidostegium*.

cuspidatum L. *Sp. pl.* 1595; C. M. *Syn.* II, p. 383; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 51), t. 619; W. P. Sch. *op. cit.* p. 789.

Acrocladium cuspidatum Lindb. *M. Scand.* p. 39.

H. flexile Brid. *Bryol. univ.* II, p. 417.

H. heterophyllum Hüb. *Muscol. germ.* p. 633.

H. palustre extremitatibus cuspidatis et pungentibus Dill. *Hist. M.* p. 300, t. 39, f. 34.

H. Stereodon cuspidatus Brid. *op. cit.* p. 562.

2. In gramin. humid. et foss. prator. — *Eur.*: Vulgatiss. in reg. campestr. et montos. *As.*: Japon., Jenissei, Obi, Caucas. centr., *Syr. Afr.*: Alger., ins. Azores. *Am. sept.*: Terr. nov., ins. Miquel., New Brunswick, Columb. brit., Vancouver, Washington, Wyoming, reg. sept. et or.

Exs.: Faurie *Pl. Jap.* n. 91.

Mac. *Canad. M.* n. 385.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 507.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. p. 454.

var. *bicolor* Turn. — *H. cordifolium*.

var. *inerme* Weiss. — *H. Schreberi*.

* var. *pungens* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 644 et II ed. l. c.

In aquos. — *Eur.*: Bavar., Salzburg.

* var. *submersum* R. Farneti in *Atti dell'Istit. bot. della R. univ. di Pavia*, 1893.

— *Eur.*: Ital. super.

cuspidatum Schrank. — *Mnium affine*.

cuspidiferum Mitt. — *Brachythecium*.

cuspidigerum Schwaegr. — *Rhacopilum*.

cyathothecium C. M. — *Trichosteleum*

cyclophyllum Mdo. in *Un. itin.* 1863, n. 95.

Ad terr. petros. subhumid. — *Eur.*: Tirol.

cygnisetum C. M. — *Ptychomnion*.

cylindricarpum C. M. — *Rhaphidostegium*.

cylindricum { Br. — *H. Haldanianum*.

{ Hsch. et Reinw. — *Rhaphidostegium leptocarpon*.

{ Dz. et Mk. — *Thuidium*.

cymbifolium { Duby. — *Thuidium Meyenianum*.

{ Sull. — *Thuidium hawaiense*.

cyparioides Brid. — *Rhaphidostegium*.

cyparissoides { Hsch. — *Ectropothecium*.

{ Wils. — *Ectropothecium cupressoides*.

cyperoides Hook. — *Ectropothecium*.

daltonioides W. P. Sch. — *Sematophyllum Pickeringii*.

Danckelmanni C. M. — *Rhaphidostegium*.

dealbatum Hsch. et Reinw. — *Ectropothecium*.

decipiens { Hoffm. — *H. cupressiforme*.

{ Kindb. — *Thuidium*.

declivum Mitt. — *Brachythecium velutinum*.

decolorans W. et Dy. — *Thamnium*.

decorum Mitt. — Homalothecium.

decrescens Bryol. jav. II, p. 168, t. 266 (1).

2. Ster. — As. : Celebes.

decumbens Wils. — Rhaphidostegium.

decurrens Sull. in *Proced. of the Am. Acad...* 1859 et in U. St. Expl. Exped. Wilkes, p. 14, t. 14.

— Pac. : Ins. Sandwic.

decursivulum C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 220.

H. Sommerfeldti Mac. Canad. M. n. 514 p.p.

Ster. Lignic. — Am. sept. : Terra nov., M. Selkirk.

decurvans Mitt. — Brachythecium.

debile { Brid. — Amblystegium radicale.
C. M. — Leucomium.

decussatum Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 110, t. 90, f. 2 et Fl. Tasm. II, p. 211.

Amblystegium decussatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876.

2. — Afr. : Ins. Kerguelen, Marion. Pac. : Nov.

Zeland. sept. et med., Tasmar.

deflexifolium Solms-Laub. Tent. bryogeogr. Algarv. ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 714.

♂ et fr. ign. Ad mol. granit. irror. — Eur. : Algarb.

deflexum Wils. — Camptochaete.

defoliatum C. M. — Homalia.

delicatulum { C. M. — Thuidium tamariscinum.
Hedw. — Thuidium.
Hsch. — Thuidium aequatoriale.
L. — Thuidium recognitum.

delicatum Ehrh. — Thuidium tamariscinum.

delitescens Boul. — H. mollusum var. squarrosulum.

demissum { de Not. — Rhaphidostegium.

Mac. — Rhaphidostegium recurvans.

Sull. — Rhaphidostegium demissum var. carolinianum.

var. carolinianum L. et J. — Rhaphidostegium demissum var. carolinianum.

var. marylandicum eor. — Rhaphidostegium demissum var. marylandicum.

var. Sull. — Rhaphidostegium demissum var. marylandicum.

var. Sull. et Lesq. — Rhaphidostegium demissum var. carolinianum.

dendroides { L. — Climacium.

Thbg. — Climacium japonicum ?

obscurius, setis et capsulis brevioribus subnutantibus Dill. —

Thamnium alopecurum.

sericeum setis et capsulis longioribus erectis Dill. — Climacium dendroides.

densifolium { Brid. — Ptychomnion.

Spreng. — Rhaphidostegium caespitosum.

densum { C. M. — Erythrodontium.

Milde. — Amblystegium.

Sw. — Prionodon.

dentatum, { *curtipendulum*, *viticulis rigidis* Dill. — *Antitrichia curtipendula*.
vulgatissimum, *operculis obtusis* Dill. — *Brachythecium rutabulum*.

? *denticulatum* P. B. *Prodr.* p. 81.
 — Afr. : Ins. Borbon.

denticulatum { C. M. — *Plagiothecium silvaticum*.
 L. — *Plagiothecium*.
pinnatum, *pinnulis duplicibus recurvis* Dill. — *Plagiothecium denticulatum*.
pinnulatum, *pinnulis rarioribus simplicibus* Dill. — *Plagiothecium silvaticum*.
exiguum, *pendulum*, *atro-virens* Dill. — *Eurhynchium pendulum*.

var. *Donianum* Hook. — *Plagiothecium piliferum*.

var. *laetum* Lindb. — *Plagiothecium*.

var. *obtusifolium* Turn. — *Plagiothecium denticulatum* var. *obtusifolium*.

var. *piliferum* Wahlenb. — *Plagiothecium*.

var. *silvaticum* Turn. — *Plagiothecium*.

denticulosum Mitt. — *Thuidium*.

dentiferum Hpe. — *Rhynchostegium*.

deplanatum Sull. — *Rhynchostegium*.

depressulum C. M. in *Fl.* 1875, p. 91.

H. hamulosum ? Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 478.

Lignic. — Am. sept. : M. Alb.

depressum { Br. — *Rhynchostegium*.
 Sull. et Lesq. — *Rhynchostegium geophilum*.
 Sw. — *Hookeria*.

desmiocladum C. M. — *Pseudo-Leskea*.

desmiphorum P. B. — *Anomodon rostratus*.

devexum Bosw. — *Eurhynchium* ?

diaphanum Sw. — *Lepilopilum*.

diastrophyllum { Lam. et DC. — *H. lycopodioides*.
 Sw. — *H. commutatum*.

Dicksoni Gmel. — *Neckera pumila*.

dicladum C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 784.

Ster. — Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 416.

Dieckei Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51

2. ♂ ign. — Am. sept. : Washington, Oregon.

diffusum Bland. — *Amblystegium fluviale*.

dilatatum Wils. in *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 776 (1).

Amblystegium dilatatum Lindb. *M. Scand.* p. 33.

H. molle Wils. *Bryol. brit. p.p.* ; C. M. *Syn.* II, p. 431 p.p. ; Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 194 ; Rab. *Bryoth. eur.* n. 899.

Limnobium molle *Bryol. eur.* VI (mon. p. 5), t. 577 (except. f. 2 quæ ad H. alpestre pertinet).

1. In rivul. frigid. sax. inund. — Eur. : E reg. montan. usq. in alp. ;

(1) De syn. cf. W. P. Sch. l. c.

rarius in Britann. As. : Jénissei sup. Am. sept. : Groenland, Ontar.,
lac. Super., M. Selkirk et Rupestr., Idaho, reg. or.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 577.

diminutivum Hpe. — Microthamnium.

dimorphum C. M. p.p. { — Pseudo Leskea tectorum.
β *tectorum* Rab. }

discriminatum Mont. — Hylocomium macrocarpum.

disparifolium Tayl. — Microthamnium substriatum?

dispersum Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.*... 1859, p. 279 (1).
1. Ad terr. arid. — As. : Japon., ins. Loo-Choo.

dissolutum Sull. — Rhaphidostegium galipense.

distans { Brid. — Eurhynchium circinatum.
Lindb. — Eurhynchium.

distichellum C. M. — Ectropothecium.

distichophyllum Hpe. — Trichosteleum.

distichum Sw. — Rhizogonium.

distratum Hpe. — Rhynchostegium.

divaricatissimum C. M. in *Linn.* 1876, p. 657.

Cortic in silv. — Am. sept. : Mexic.

divaricatulum C. M. — Rhaphidostegium.

divaricatum Hsch. et Reinw. — Mniodendron.

diversifolium L. et J. — Eurhynchium.

diversiforme Mitt. — Isothecium.

divulsum H. f. et W. — Lembophyllum.

djurenses C. M. — Thuidium.

dolomiticum Milde *Crypt. fl. Tir.* n. 101 et in *Bot. Zeit.* 1864, Anh.
p. 21; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 762.

H. fastigiatum var. *dolomiticum* Mdo. *M. Tir.* n. 46.

Ster. Ad saxa calc., rar. gneiss. v. micac. — Eur. : Alp. Helvet.,
Rhaet., Tirol. merid.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 695.

dolosum de Not. *Epil.* p. 170.

— Eur. : Ital.

Donianum { Mitt. p.p. — Plagiothecium magellanicum?
Sm. — Plagiothecium denticulatum var. obtusifolium.

Donnellii Aust. — Brachythecium (2).

Douglasii Hook. (fid. Mitt.). — Eurhynchium oreganum.

Dozyanum C. M. — Ectropothecium.

Draytoni Sull. — Isopterygium.

Dregei C. M. — Rhaphidostegium.

drepanocladioides C. M. — Rhynchostegium.

drepanophyllum C. M. — H. semi-revolutum?

Drummondii Tayl. — Rhaphidostegium homomallum.

dubium Brid. — H. filicinum var. trichodes.

Dubyanum C. M. — Ectropothecium.

Duisabonae C. M. — Rhaphidostegium.

dumosum Mitt. — Eurhynchium.

duplicatum Schwaegr. — Neckera.

Duriaei Mont. — Orthothecium?

(1) « An Thuidium ? » Jaeg. Ad. II, p. 609.

(2) *dorsale* Brid. Bryol. univ. II, p. 543; C. M. *Syn.* II, p. 508. — Ex Andibus.
Quid ? Delendum.

duriusculum C. M. — *Brachythecium*.
eccremocarpum C. M. — *Thuidium*.
Ehrenbergianum C. M. — *Hylocomium*.
elachistos Duby. — *Rhynchostegium*.

Elaeis C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 371.
 — *Afr.* : M. Cameroon.

elasticum Brid. — *Eurhynchium striatum*.

elatulum C. M. — *Porotrichum*.

elegans { Ehrh. — *H. purum*.
 { Hook. — *Plagiothecium*.

var. *collinum* Wils. — *Plagiothecium elegans*.

eleganti-pinnatum C. M. — *Ectropothecium*.

elegantissimum C. M. — *Porotrichum*.

elegantulum Hook. — *Microthamnium*.

elodes Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1845, IV, p. 174; C. M. *Syn. II*, p. 434; W. P. Sch. *Coroll. p.* 130 et *Syn. II ed. n.* 723.

Amblystegium elodes Lindb. *M. Scand. p.* 32.

H. polymorphum Tayl. *Fl. Hibern.*

Stereodon polymorphus Mitt. *M. Ind. or. p.* 115.

2. Loc. uligin. ad rad. arb., etc. — *Eur.* : *Hibern.*, *Angl.* ; *Eur. med.* : *Alsat.*, *Suec.*, *Siles.*, etc. *As.* : *Himalaya occ.*

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 395.

« var. *hamulosum* W. P. Sch. *Syn. II ed. p.* 724.

Praecip. ad sax. — *Eur.* : *Alsat.*, etc.

Elodes W. et M. — *Aulacomnium palustre*.

elusum Mitt. — *Rhynchostegium*.

emarginatum Schleich. — *Leskea tristis*.

erectiusculum S. et Lesq. — *Pylaisia*?

erectum { Drumm. — *Brachythecium acuminatum*.
 { Lesq. et Jam. — *Thuidium*.
 { Raddi. — *Hylocomium brevirostrum*.
 { non ramosum spinarum halecum aemulum Dill. — *Rhizogonium spiniforme*.
 { vel fluitans, foliis oblongis angustis peracutis Dill. — *H. fluitans*.

ericetorum Brid. — *Trachypus* (?) *serrulatus*.

ericoides C. M. — *Cladomnium*.

erythrocaule (Mitt.) Jaeg. *Ad. II, p.* 586.

Stereodon erythrocaulis Mitt. *M. Ind. or. p.* 97.

2 ? — *As.* : *Sikkim*.

erythrocaulon Ångstr. — *Sematophyllum*.

erythropodium { Brid. — *Brachythecium populeum*.
 { C. M. — *Microthamnium elegantulum*.
 { Hpe. — *Sematophyllum*.

erythrorhizon C. M. — *Brachythecium*.

var. *Thedenii* Lindb. — *Brachythecium Thedenii*.

esmeraldicum C. M. — *Rhaphidostegium microcladon*.

Estrellae C. M. — *Ectropothecium cylindricum*.

euchloron Br. — *Eurhynchium*.

Eudorae Sull. — *Isopterygium*.

eugyrium W. P. Sch. *Syn. I ed. p.* 639 et *II ed. n.* 781.

Amblystegium eugyrium Lindb. *M. Scand. p.* 33.

Limnobia eugyrium *Bryol. eur. VI (mon. Suppl. p. I), t.* 579.

1. Ad sax, irror, rivul. et cataract. — *Eur.* : *Silva nigr.*, *Helvet. occ.*

Am. sept. : Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick,
Nov. Angl., New York, M. Rupestr.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 535.
Rab. Bryoth. eur. n. 650.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 450.
Un. itin. 1868, n. 28.

» *var. Mackayi* W. P. Sch. Syn. II ed. p. 782.
Ut typ. — *Eur.* : Suecia merid., Britann., Gall. centr. *Am. sept.* : Ten-
nessee.

« *var. miquelonense* Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p. 28.
— *Am. sept.* : Ins. Miquelon.

eupopuleum C. M. — Brachythecium.

euryblaston C. M. — Brachythecium.

euryodictyon C. M. — Brachythecium.

eutryphaeum C. M. — Isopterygium.

exaltatum (Mitt.) Par.

Hyocomium exaltatum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 177.

— *As.* : Japon.

exannulatum Bryol. eur. VI (mon. p. 34), t. 602 ; W. P. Sch. op. cit.
p. 733 (1).

Amblystegium exannulatum de Not. Briol. ital. p. 142.

A. fluitans var. exannulatum Lindb. M. Scand.

2. In pratis uligin. et ad stagn. marginem. — *Eur.* : Spitzberg, ins.
Ursor. ; a Lappon. usq. ad Ital. super., e reg. campestr. usq. in alp.
As. : Japon., Jenissei, Caucas. occ. *Am. sept.* : Groenland, fret.
Hudson, Labrador, Terr. nov., ins. Miquel, M. Catskill, Ontario,
M. Selkirk, Columb. brit., reg. sept., occid., centr. et or.

Exs. : Faurie M. Jap. n. 837.

Mac. Canad. M. n. 382.

Rab. Bryoth. eur. n. 774, 849, 796 et b, 916.

Un. itin. 1864, n. 28, 62.

var. alpicola de Not. — *H. exannulatum var. purpurascens.*

« *var. brachydictyon* Ren. in Husn. Muscol. gall. p. 385, t. 110, f. 10-11.

H. fluitans Θ alpinum ej. in Revue bryol. 1881, p.

In turf. alp. — *Eur.* : Voges., Pyren., Alp., Tirol.

var. Cochleae Aust. — *H. fluitans var. Swartzii.*

« *var. falcifolium* Ren. in op. cit. p. 387, t. 111, f. 4-5.

In turfosis. — *Eur.* : Gall., praepr. alp. : Belg. *Am. sept.* : Montana,
Wyoming.

« *f. fontinaloides* Ren. in op. et l. cc.

— *Eur.* : Pyren.

« *var. glaciale* Ren. in op. et l. cc.

Ad nives deliquesc. — *Eur.* : Pyren.

« *f. gracilescens* Ren. in op. et l. cc.

— *Eur.* : Armoric., Voges.

var. immersum Aust. — *H. fluitans var. Swartzii.*

(1) Cf. Sanio, Beschreibung der Harpidieen... Jenissei : formae *acutum*, *acutum-assimile*, *acutum-orthophyllum*, *paludosum*, *typicum*, *typicum-cuspidatum*, *typicum-fumigatum*, *typicum-purpurascens* (pp. 8-15).

- « *f. inundata* Ren. in op. cit. p. 388.
— Eur.: Gall. (Arvernica).
- « *var. irrigatum* Ren. in op. cit. p. 386.
Ad nives deliquesc. — Eur.: Pyren., Riesengeb.
var. orthophyllum Milde. — *H. exannulatum var. Rotae*.
- « *var. pinnatum* Bryol. eur. t. 604 p.p.: Boulay M. Fr. II, p. 62; Ren. in op. cit. p. 385, t. 110, f. 7, 8, 9, 16.
— Eur.: Gall., Belg. Am. sept.: Ins. Miquel.
- « *var. purpurascens* W. P. Sch. op. cit. p. 734.
H. exannulatum var. alpicola de Not. Epil.
In aquis stagn. et in turfis. Alp. — Eur.: Voges., Helvet., Rhaet., Stir., Sudet. As.: Jenissei infer.
- « *f. Renauldi* Sanio in Hedwig. 1887; Ren. in op. cit. p. 386, t. 110, f. 4.
— Eur.: Pyren.
- « *var. Rotae* Pfeff. Bryogeog. Stud. d. Rhæt. Alp.; W. P. Sch. op. et l. cc.
H. exannulatum var. orthophyllum Milde Bryol. siles.
H. exannulatum var. serratum ej. l. c.
H. Rotae de Not. Epil.
H. stenophyllum Wils. mss. (fid. W. P. Sch.).
In aquis stagn. — Eur.: Reg. subalp. et alp. As.: Jenissei inf.
Eas.: Rabenh. Bryoth. eur. n. 1100.
var. serratum Milde. — *H. exannulatum var. Rotae*.
- « *f. viridis* Boul. M. Fr. p. 63; Ren. in op. cit. p. 388, t. 111, p. 7.
— Eur.: Gall. or., Belg.
- exasperatum* Hpe. — Eurhynchium.
- excavatum* Tayl. — Camptochaete.
- exiguum* { Bland. — Rhynchostegium tenellum.
Geh. et Hpe. — Ectropothecium (1).
- exilissimum* Sull. — Helicodontium.
- ? *eximium* Sull. et Lesq. in Proced. of the Am. Acad... 1859, p. 281.
Lignic. — As.: Ins. Bonin.
- expallescens* C. M. — Rhynchostegium.
- expansum* Tayl. { (fid. Mitt.). — Porotrichum.
(fid. Wils.). — Porotrichum longirostre.
- extenuatum* Brid. Bryol. univ. II, p. 484; C. M. Syn. II, p. 391 p.p.;
Hook. f. et Wils. Fl. Tasman. II, p. 214 et Handb. of N. Zeal. Fl.
p. 481.
Acanthocladium extenuatum Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc.
of Victoria, 1883, p. 85.
H. crinitum H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 114, t. 91, f. 4.
H. glaucescens Hsch. in Sieber M. Austral.
Rhynchostegium glaucescens Mitt. in op. cit. p. 89.
2. Ad arbor. — Pac.: Austral. or., Nov. Zeland., Tasman., ins.
Auckland.
- extenuatum* { C. M. p.p. — *H. crinitum*,
Hoffm. — *H. cupressiforme var. filiforme*.
- extricatum* Hoffm. — *H. filicinum*.
- Fabronia* Hook. — *Microthamnium*.

(1) Cf. Hpe. in Linnaea 1853, p. 504.

fabroniadelphus C. M. — Rhynchostegium.

fabroniaefolium C. M. — Pylaisia subdenticulata.

falcatum Brid. *Sp. M.* II, p. 212 et *Bryol. univ.* II, p. 526; W. P. Sch. *op. cit.* p. 742.

Amblystegium falcatum Lindb. *M. Scand.* p. 33.

A. commutatum de Not. *Epil.* p. p.p.

H. commutatum var. condensatum Wils. *Bryol. brit.*

H. commutatum β falcatum C. M. *Syn.* II, p. 423; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 38), t. 608.

H. controversum Wils. *mss.*

2. Loc. aquos. calcar., ad font. et rivul. — *Eur.*: E reg. montan. usq. in alp. *As.*: Persia, Caucas. occ. et centr. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Labrador, Terr. nov., M. Rupestr., Columb. brit., Colorado.

Exs.: Mac. Can. M. p. 340.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 742 et b, 897.

« var. gracilescens W. P. Sch. *l. c.*

Ut typ. — *Eur.*: Alp. usq. ad niv.

« var. microphyllum Kindb. in Mac. *Cat.* p. 232.

— *Am. sept.*: Terr. nov.

« var. pachyneuron W. P. Sch. *l. c.*

Ad sax. calcar. rivul. — *Eur.*: Reg. subalp. et alp.

« var. virescens W. P. Sch. *l. c.*

H. commutatum γ fluctuans *Bryol. eur.* *l. c.* t. 608; Rab. *Bryoth. eur.* n. 495.

H. irrigatum (*fid. Husn. Muscol. gall.* p. 396).

H. virescens Boul. *M. Fr.*

2. fruct. rariss. Ut praeced. — *Eur.*: Reg. montan. usq. in alp.

falcifolium C. M. — Homalia.

falciforme Dz. et Mk. — Ectropothecium?

fallaciosum Jur. — H. polygamum var. fallaciosum.

fallax Brid. — Amblystegium irriguum var. spiniforme (1).

fasciculatum { Lam. — Brachythecium salebrosum.
Sw. — Porotrichum.

fastigiatum (Brid.) C. M. *Syn.* II, p. 298; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 19), t. 589; W. P. Sch. *op. cit.* p. 749.

H. cupressiforme var. conicum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 610.

H. cupressiforme var. crispatisimum ej. *op. cit.* p. 610.

H. cupressiforme var. fragile ej. *op. cit.* p. 611.

H. cupressiforme var. hamulosum ej. *op. cit.* p. 610.

H. cupressiforme var. Hook. in Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 206.

H. hamulosum Froehl. in sched.

H. mamillatum Funk in sched.

H. Stereodon fastigiatus Brid. *op. c.* p. 620.

1. Ad rup. praecip. silic.-calcar. — *Eur.*: Scand., Alp. German. et Helvet.: desider. in Britann. *As.*: Penins. Tschutschica (2). *Am. sept.*: Groenland, Ontar., M. Rupestr.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 398, 696.

Un. itin. 1863, n. 86.

fastigiatum Wieb. — H. cupressiforme.

var. dolomiticum Mdo. — H. dolomiticum.

var. Ravaudi Husn. — H. Ravaudi.

(1) Cf. W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 713.

(2) « An potius *H. recurvatum*? » Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II.

faulense Reichdt. — Thuidium.
Fendleri Sull. — Brachythecium.
ferricolum C. M. — Thuidium.
ferrugineum C. M. — Ectropothecium.

fertile Sendtn. in *Denkschr. d. bot. Ges. z. Regensb.* III, p. 147; C. M. *Syn.* II, pp. 293 et 685; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 22), t. 591; W. P. *Sch. op. cit.* p. 751.

H. crinale Schleich. in sched.
 Stereodon fertilis Lindb.

1. In trunc. deject. aceros. putresc. — *Eur.*: Voges., Silva nigr., Helvet., Bavar., Tirol., Alp. Salzburg. et Austr., Francon., Sudet. As.: Japon., Caucas. centr. Am. sept.: Anticosti, New Brunswick, Gaspes., Ontar., Columb. brit., reg. sept.

Exs.: Faurie Pl. Jap. n. 244, 3514.
 Mac. Canad. M. n. 346 p.p.
 Rab. Bryoth. eur. n. 1241.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 479.

filamentosum Bert. — Pseudo Leskea atro-virens.

var. *brachycladon* C. M. — Pseudo Leskea atro-virens var. *brachyclada*.

var. *papillosum* C. M. — Pseudo Leskea atro-virens var. *papillosa*.
 var. *tenuis* C. M. — Pseudo Leskea.

filescens } Brid. — Eurhynchium striatulum.
 } C. M. p.p. — Eurhynchium striatum var. meridionale.
filiciforme Huds. — Pylaisia polyantha.

filicinum L. *Sp. pl.* p. 1590? *Brid. Bryol. univ.* II, p. 527; C. M. *Syn.* II, p. 419; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 40), t. 609; W. P. *Sch. op. cit.* p. 740.

Amblystegium filicinum de Not.
 H. affine Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 61.
 H. compressum Brid. M. *Rec.* II, II, p. 58.
 H. extricatum Hoffm. *op. cit.* p. 62.
 H. filicinum γ pendulum Brid. *op. cit.* p. 532.
 H. filicinum η pinnatum ej. *op. cit.* p. 532.
 H. flaccidum Schleich. in sched.
 H. glareosum ej. l. c.
 H. polycarpum Voit in Sturm. *Deutschl. Fl. crypt. Fasc.* IV.
 H. prolixum Vill. Pl. Dauph. III, p. 914.

2. Ad sax., mur., terr. et lign. madid. in aquos. calcar. — *Eur.*: Spitzberg, reg. campestr. et montan. As.: Japon., Yunnan, Saghalien, Ochotsk, Jenissei, Himalaya et Tibet. occ., Luristan., Kurdistan., Syr. Afr.: Alger. Am. sept.: Fret. Hudson, Anticosti, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Athabasca, Assiniboine, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., Vancouver, Washington, Calif., reg. sept., centr., or. *Pac.*: Nov. Zeland.

Exs.: Faurie Pl. Jap. n. 181, 3507.
 Mac. Canad. M. n. 339.
 Rab. Bryoth. eur. n. 998 et b, 1047.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 469.
 Un itin. 1867, n. 22.

* var. *aciculinum* C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 231.
 Ad rup. madid. — Am. sept.: Columb. brit.

* var. *elatum* W. P. *Sch. op. et l. cc.*
 In spongios. — *Eur.*: Alp. Salzburg. Am. sept.: Hic illic.

- var. *fallax* H. et T. — *Amblystegium irriguum* var. *spiniforme* (1).
- « var. *filiforme* Berggr. M. Spetsb. n. 136 b et in K. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII, n. 7, p. 87.
Aquat. — Eur. : Ins. Ursor.
- « var. *floridanum* Ren. in Lesq. et Jam. Man. p. 387.
— Am. sept. : Florida.
- « var. *gracilescens* (Bland.) Brid. op. cit. p. 531 ; W. P. Sch. op. et l. cc.
H. *gracilescens* Bland. in Brid. Sp. M. II, p. 211.
Ad rup. minus humid. — Eur. et Am. sept. : Cum typ.
- « var. *gracillimum* (Sael.) Par.
Amblystegium filicinum var. *gracillimum* Sael. in Act. Soc. pr. F. et Fl. Fenn. VI, n. 4 (M. Lapp. Kolaensis).
— Eur. : Karelia.
- var. *lanatum* Brid. — *Amblystegium fluviatile*.
- var. *pendulum* }
var. *pinnatum* } Brid. — H. *filicinum*.
- « var. *supra-alpinum* Mdo. Allg. Moosst. 1865, p. 102.
— Eur. : Alp. Algov.
- « var. *tenue* Berggr. ll. cc. n. 136 c.
Rupic. — Eur. : Spitzberg, ins. Ursor.
- « var. *trichodes* Brid. l. c. p. 529 ; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 614 et II ed. l. c.
H. *conspurcatum* Brid. in sched.
H. *dubium* Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 10 ; Brid. M. Rec. II, p. 61.
H. *repens*, *filicinum trichodes palustre* Dill. Hist. M. p. 286, t. 36, f. 21.
H. *rubrum* Vill. Pl. Dauph. III, p. 897.
Ad scaturig. herbos., terr. et saxa. — Eur. et Am. sept. : Ubi typ.
- filicinum* { Vill. — H. *commutatum*.
Cristam castrensem repraesentans Dill. — H. *molluscum*.
sericeum, molle et pallidum, mucronibus aduncis Dill. —
H. *cupressiforme*.
Tamarisci foliis majoribus splendidibus Dill. — *Hylocomium splendens*.
Tamarisci foliis minimis non splendidibus, setis capsulisque brevioribus Dill. — *Thuidium delicatulum*.
Tamarisci foliis minoribus non splendidibus Dill. — Th. *tamariscinum*.
- filiculaeforme* P. B. — *Hypopterygium*.
- filidens* C. M. — *Microthamnium elegantulum*.
- filifolium* L. — *Pylaisia polyantha*.
- filiforme* { C. M. — *Eurhynchium velutinoides*.
Gmel. — *Cryphaea*.
Huds. — *Pylaisia polyantha*.
Timm. — *Pterigynandrum*.
Vill. — *Pseudo-Leskea atro-virens*.
- filum* C. M. — *Pseudo-Leskea* ?
- fimbriatum* { C. M. — *Chaetomitrium*.
Hartm. — *Hylocomium Oakesii*.

(1) Cf. W. P. Sch. Syn. II ed., p. 713.
H. *trichodes* Brid. Sp. M. II, p. 236.

- finitimum* Hpe. — Rhynchostegium.
finmarchicum Ltz. — Amblystegium.
Fissidens C. M. — Rhynchostegium.
fissidentoides { Brid. — Rhizogonium Novae Hollandiae.
 { Broth. — Rhynchostegium.
Fitz-Geraldi { C. M. — Brachythecium.
 { Ren. — Plagiothecium.
flabellatum Dicks. — Homalia.
flaccens Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 92.
 2. Ster. In silv. — As. : Yunnan.
flaccidifolium C. M. — Rhaphidostegium.
flaccidulum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 676.
 Ster. — Afr. : C. B. Sp.
flaccidum { Schleich. — H. filicinum.
 { S. et L. — Isopterygium.
flaccum C. M. et Kindb. in *Bidr. p.* 454 (*nom.*) et in *Mac. Cat. p.* 240.
 Ster. lignic. v. rupic. — Am. sept. : New Brunswick, Ontario (1).
 { Dicks. — Hyocomium.
flagellare { Gmel. — H. Halleri.
 { Hedw. — Brachythecium plumosum.
 { *saxatile, capsulis gracilibus* Dill. — Rhynchostegium rusci-
 forme var. *lutescens*.
flagelliferum Hpe. — Porotrichum.
flagelliforme Brid. — Amblystegium fluviatile.
flagellis instar caudae vulpinae Dill. — Leucodon canariensis.
flavens Mich. — Anomodon rostratus.
flavescens { Brid. — Brachythecium rivulare.
 { Roth. — Brachythecium albicans.
 { Schleich. — H. aduncum.
 { Wils. — Rhynchostegium demissum.
flavo-nitens C. M. — Stereophyllum leucostegum.
Flemmingii L. et J. — H. robustum.
flexile { Brid. — H. cuspidatum.
 { Hook. — Lembophyllum cochlearifolium.
 { Sw. — Pilotrichella.
flexipes Brid. — Amblystegium riparium.
flexiventrosus C. M. — Brachythecium.
flexuosus Berggr. in *Bot. Not.* 1872 et in *Rev. bryol.* 1884, p. 94.
 2. — Eur. : Norveg. sept. (Tromsøe).
flexuosum Sull. — Leucomium.
floribundum C. M. — Papillaria.
floridum Tayl. (fid. Mitt.). — Porotrichum longirostre.
Flotoxonianum Sendtn. { (fid. C. M.). — Eurhynchium velutinoides.
 { (fid. W. P. Sch.). — H. pallens.
fluitans L. *Fl. Suec.* 1074 ; C. M. *Syn. II*, p. 323 ; *Bryol. eur. VI* (*mon.*
 p. 33), t. 602 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 734 (2).
 Amblystegium fluitans de Not.
 Fontinalis fluitans Lam. *Fl. fr. I.* p. 640.

(1) *flagellare* Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 910 ; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 547 ; C. M. *Syn. II*, p. 509. « An *Anomodon viticulosus* ? vel *A. attenuatus* ? » C. M. l. c. — Delendum.

(2) Cf. Sanio *Beschreib. d. Harpidien...* p. 8.

- H. erectum* vel *fluitans*, foliis oblongis angustis peracutis *Dill. Hist. M.* p. 299, t. 38.
- H. Stereodon fluitans* *Brid. Bryol. univ. II*, p. 626 « *et parte maxima quoque varietates sequentes.* » *C. M. l. c.*
1. In prat. spong. et aq. stagn. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor. : fere tota. *As.* : Septentr. *Afr.* : Ins. Azores, Orange, ins. Kerguelen. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, lac. Super., M. Selkirk, Columb. brit., reg. sept., occ., centr. et or. *Am. merid.* : Ins. Eremit. *Pac.* : Tasman., ins. Campbell.
- Exs.* : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 203, 204.
Mac. Canad. M. n. 336 p.p.
Rab. Bryoth. eur. n. 1044.
Rehm. M. Afr. austr. n. 399 et b.
Un. itin. 1864, n. 62, 77 ; 1867, n. 26.
- « *var. alpinum* *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 611 ; *Ren. in Husn. Muscol. gall.* p. 383, t. 110, fig. 1.
 — *Eur.* : Suecia.
Exs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 1045.
- « *var. amphibium* *Sanio Besch.* p. 14.
Amblystegium fluitans var. amphibium *San. in L. et A. M. As. bor.* 1890, *II*, p. 117 (1).
 — *As.* : Jenissei med. et inf.
- « *var. Arnellii* *Sanio Besch.* p. 15 ; *Ren. in Husn. Muscol. gall.* p. 384, t. 110.
Ster. — *Eur.* : Suecia.
- « *var. aurantiacum* (*San*). *Par.*
Amblystegium fluitans var. aurantiacum *San. in Hedwig.* 1867, p. et *l. c.* (2).
 — *As.* : Jenissei super.
- « *var. Brotheri* *Sanio in Hedwig.* 1887.
 — *Eur.* : Fennia.
- « *var. capillifolium* (*Warnst*). *Ren. et Card. in Rev. bryol.* 1893, p. 25.
Dichelyma longinerve *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club*, XVI, p. 97 et in *Mac. Canad. M.* n. 391.
H. capillifolium *Warnst in Bot. Zeit.* 1877, p. 78 ; *Ren. in Husn. Muscol. gall.* p. 376.
H. longinerve *Kindb. in Mac. Cat.* p. 239.
Ster. In stagn. exsicc. — *Eur.* : German., Suecia. *As.* : Siberia.
Am. sept. : Columb. brit., Vancouver, Washington, Idaho.
- f. condensata* *Sanio.* — *H. fluitans f. terrestris.*
- « *var. Delamarei* *Ren. et Card. in Husn. op. cit.* p. 384, t. 109.
H. fluitans var. stenophyllum eor. M. Am. sept. n. 133.
 1. — *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
- « *var. elatum* *Ren. et Arn. in Husn. op. cit.* p. 381, t. 113, f. 12.
 1. — *Eur.* : Suecia.
- « *var. falcatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*
H. Stereodon falcatus γ *aduncoides* *Brid. op. cit.* p. 628 ?

(1) Forma : *paludosum*.(2) Forma : *alpinum-pennulosum*.

- In udis. — *Eur.* : Reg. mont., subalp. et zon. sept. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, hic illic ubi typ.
- « *var. gracile* Boulay *M. Fr.* p. 63.
In turfis. — *Eur.* : Gall. occ. et centr.
- « *var. hemineuron* Ren. et Card. in *Husn. op. cit.* p. 388, t. 113.
Ster. — *Am. sept.* : Labrador.
- « *var. Holleri* Sanio in *Bot. Centralbl.* 1880.
Ster. — *Eur.* : Suecia ? German. ; Belg. ?
- « *var. Jamesii* Lesq. et Jam. *Man.* p. 384.
— *Am. sept.* : M. Alb.
- « *var. Jeanbernati* Ren. in *Rev. bryol.* 1879, p. 1.
— *Eur.* : Pyren. *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
- « *var. laculosum* (C. M.) Par.
H. laculosum C. M. in *Fl.* 1885, p. 425.
Ster. Subaquat. — *Am. merid.* : Fuegia.
- « *var. Lindbergii* (Sanio) Par.
H. capillifolium var. Lindbergii Sanio ; Ren. *Husn. Muscol. gall.* p. 376.
— *Eur.* : Suecia ?
- « *var. longifolium* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 400.
— *Afr.* : Orange.
var. pseudo-stramineum Milde. — *Hypnum.*
var. serratum Lindb. — *H. fluitans var. Swartzii.*
- « *var. Payoti* Ren. in *op. c.* p. 381.
Ster. In lacunis. — *Eur.* : Alp. Sabaud. (M. Blanc.).
- « *var. procerum* Ren. et Arn. in *op. cit.* p. 383, t. 110.
Ster. — *Eur.* : Suecia.
- « *var. setiforme* Ren. in *op. cit.* p. 382.
Ster. — *Eur.* : Gall. occ. (Normann.).
- « *var. stenophyllum* (Wils.) Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 25(1).
H. stenophyllum Wils. *mss.* ?
— *Eur.* : Hic illic. *Am. sept.* : Ins. Miquel.
- « *var. submersum* W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 609 et *II ed. l. c.*
In stagn. praesert. prator. turfis. — *Eur.* et *Am. sept.* : Ubi typ.
- « *var. Swartzii* (Lindb.) Ren. et Card. *l. c.* (2).
Dichelyma Swartzii Lindb. in *Hartm. Skand. Fl. VIII ed.*
H. exannulatum var. Cochleae Aust. in *Coult. Bot. Gaz. II*, p. 111.
H. exannulatum var. immersum ej. *l. c.*
H. fluitans var. serratum Lindb. in *Hartm. Skand. Fl. IX ed.* p. 18.
Ster. — *Eur.* : Scandin. *Am. sept.* : New Jersey, Calif.
- « *var. tenellum* Ren. et Card. *Fl. ins. Miquel.* p. 54.
— *Eur.* : Pyr. *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
- » *f. terrestris* Sanio ; Ren. in *op. cit.* p. 381.
H. fluitans f. condensata San. et Ren. in *op. et l. cc.*
— *Am. sept.* : Ins. Miquelon.

(1) Cf. *H. exannulatum* v. *Rotae*.

(2) Cf. W. P. Sch. *Syn. II*, ed. p. 559 et Lesq. et Jam. *Man.* p. 275.

« *var. tricolor* Sanio; *Ren. in op. cit. p. 383, t. 110, fig. 2.*
— *Eur. : Suecia (Smaeland).*

fluitans { *Mac. p.p. — H. conflatum.*
 { *Mitt. — H. austro-fluitans.*

fluitans × *aduncum* Sanio *Beschr. p. 47 (1).*

Amblystegium fluitans × *aduncum* *L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 122.*
1 v. 2. — Jenissei med. et inf.

fluminense Hpe. — *Rudia.*

fluviale { *Sw. — Amblystegium.*
 { *Turn. — H. palustre.*

var. flagelliforme { *Brid. — Amblystegium fluviale.*
 { *Sw. p.p. — Amblystegium irriguum.*

foliis rusciformibus, capsulis subrotundis Dill. — *Rhynchostegium rusciforme.*

fontanum { *Schleich. — H. cordifolium.*
 { *Schranck. — Philonotis.*

fontinaleum *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 187.*

2. Ad saxa madida. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

fontinaliopsis *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et in Forschungsreise.... Bot. p. 34.*

Ster. Aquat. — Afr. : Ins. Kerguelen.

fontinaloides (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 569.

Amblystegium fontinaloides *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 87.*

Drepano-Hypnum fontinaloides *Hpe. in Linn. 1871-73, p. 518.*

Ster. — Pac. : Austral. or. (Nov. Valesia).

fontinaloides *Lam.* { *(fid. C. M.). — Cinclidotus.*
 { *(fid. Limpr.). — Neckera pumila.*

fontium *Brid. — Eurhynchium speciosum?*

formianum *W. P. Sch. op. cit. p. 741 (2).*

Amblystegium formianum *Dan Fior. Mazz. in Att. d. Acad. Pontif. d. nuovi Lincei, 1874, c. ic.*

H. Vallis Clausae *Brid. Bryol. univ. II, p. 534 (fid. Renauld).*

2. In aquis rapid. fluent. — Eur. : Ital. (Neapol.).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1293.

Forstenii *Bryol. jav. — Hylocomium.*

fragile { *Brid. — H. chrysophyllum.*
 { *C. M. — Anomodon.*

fragilirostrum *Hpe. — Rhaphidostegium.*

Freuchenianum *Hsch. in Fl. 1825, p. 78 ; C. M. Syn. II, p. 324.*

— *Eur. : Islandia.*

Freycineti *Schwaegr. — Distichophyllum.*

frigidum *C. M. — Brachythecium.*

frondicola *C. M. — Rhynchostegium.*

Frontinoae *C. M. — Thuidium.*

frullaniadelphus *C. M. — Rhaphidostegium.*

fuciforme *Brid. — Thuidium.*

(1) *Formae : alpinum, exannulatum, paludosum, vulgare.*

(2) *Cf. Geheeb in Hedwig. 1874, p. et Renauld in Rev. bryol. 1885, p. 55.*

fuegianum (Mitt.) C. M. in *Fl.* 1885, p. 426.

Amblystegium fuegianum Mitt. *M. austr. am.* p. 570.

— *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitae.

fulgens Sw. — Phyllogonium.

fulgeriense la Pyl. — Eurhynchium Stokesii.

fulgenscens Mitt. — Homalothecium.

Funkii Hsch. — Brachythecium.

fulvastrum Hook. — Thuidium.

fulvum { Brid. — Anomodon attenuatus.

{ C. M. — Stereophyllum.

{ H. f. et W. — Plagiothecium micans var. fulvum.

furcatum Brid. — Helicodontium capillare.

furfurosum H. f. et W. p.p. { — Thuidium fulvastrum.

{ — Thuidium.

fuscescens H. et Arn. — Ectropothecium inflectens.

fusco-caule C. M. — Trichosteleum.

fusco-mucronatum C. M. — Hypnodendron.

fuscum Schleich. — H. scorpioides.

galerulatum Duby. — Ectropothecium.

galipense C. M. — Rhaphidostegium.

Gardnerianum C. M. — Stereophyllum leucostegum.

gastrodes W. et Dy. — Heterocladium.

Gaudichaudi Mont. — Rhynchostegium.

Gayanum Sull. — Thuidium gracile.

gedeanum C. M. — Sematophyllum.

geminum L. et J. — Plagiothecium.

geniculatum Schleich. — Brachythecium campestre.

geophilum L. et J. — Rhynchostegium.

georgico-antarcticum C. M. — Plagiothecium.

georgico-glareosum C. M. — Brachythecium.

georgico-uncinatum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 44.

Ster. Paludic. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

Gerwigii C. M. — Bryum.

gibbosulum C. M. — Rhaphidostegium.

giganteum W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 642 et *II ed.* p. 787.

Amblystegium giganteum de Not. *Briol. ital.* p. 135.

H. cordifolium Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 209 (fid. Kindb. et Mitt.) et plerumq. auct. Suec.

H. cordifolium var. stenodictyon *Bryol. eur. VI* (mon. p. 47).

Stereodon giganteus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 42.

2. In turfis, profund. uligin. et ad rip. rivul. — *Eur.* : Spitzberg, ins.

Ursor. ; reg. campestr. zon. intermed. et sept. As. : Jenissei. *Am.*

sept. : Groenland, Anticosti, New Brunswick, New York, Pensilv.,

Ottawa, Ontar., Manitoba, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb.

brit., Vancouver, Washington, Montana, Idaho, Wisconsin.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 362.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 549 et b, 762 et b.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 458 et 468.

Un. itin. 1863, n. 94; 1866, n. 65 et 86.

* var. labradorensis Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1894, p. 240.

— *Am. sept.* : Labrador.

giganteum Sull. et Lesq. — H. hamifolium (fid. Ren.).

glabellum Sw. — Homalia.

glareosum { Br. — Brachythecium.

{ Schleich. — H. filicinum.

glaucescens Hsch. — *H. extenuatum*.

glaucissimum C. M. — *Ectropothecium*.

glaucocarpum Reinw. in *Schwaegr. Suppl. III, I, p. 2, t. 228*; C. M. *Syn. II, p. 441*; *Bryol. jav. II, p. 148, t. 246*.

Hookeria leptopoma C. M. *Syn. II, p. 215* (*fid. Mitt., quae tamen ab auct. dioica dicitur*).

H. retroflexum Hook. in *Wall. Cat. n. 7656*; *Harv. in Lond. Journ. of bot. II, p. 19 et in Hook. Ic. pl. rar. I, t. 23; f. 6*; C. M. l. c. p. 287.

H. venustum Hsch. et Reinw. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV, II, Suppl. p. 726, t. 41*.

Stereodon glaucocarpus Mitt. *M. Ind. or. p. 115*.

1. — As.: Sikkim, Java.

glauco-virescens C. M. — *Rhynchostegium*.

glauco-viride Mitt. — *Sciaromium*.

glaucum { Lam. et DC. — *H. commutatum*.
Weiss. — *Leucobryum*.

Glaziovii Hpe. — *Rhaphidostegium*.

globipyxis C. M. — *Rhynchostegium*.

globithecium C. M. — *Ectropothecium*.

glossoides *Bryol. jav. II, p. 146, t. 243*.

2. — As.: Java.

gloriosum C. M. — *Brachythecium*.

gnaphaleum P. B. — *Breutelia*.

golungense W. et Dy. — *Ectropothecium*.

Gottscheanum C. M. — *Trichosteleum*.

Goulardi W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 778*.

1. In rivul. frigid. — *Eur.*: Norveg. (Dovre), Pyren. (Maladetta).
Am. sept.: Anticosti, Gaspes.

Goulardi Mac. — *H. torrentis*.

gracile { Br. et Sch. — *Thuidium*.
H. f. et W. — *Camptochaete*.
L. — *Pterogonium*.
Weim. — *Myurella Careyana*.
ornithopodioides Dill. — *Pterogonium*.

var. *lancastricense* Sull. — *Thuidium gracile* var. *lancastricense*.

var. *Ravenelii* Sull. — *Thuidium gracile* var. *Ravenelii*.

gracilescens { Bland. — *H. filicinum* var. *gracilescens*.
C. M. — *Camptochaete gracilis*.
P. B. — *Leskea obscura*.

gracilicaule { *Bryol. jav.* — *Sematophyllum*.
S. Lac. — *Ectropothecium*.

gracilirameum C. M. in *Rev. bryol. 1878, p. 59 (nom.)*.
— *Afr.*: Ins. Franciae.

gracilisetum Hsch. et Reinw. — *Ectropothecium*.

gracillimum Hsch. — *Ectropothecium*.

Graeffeanum C. M. — *Hypnodendron*.

graminicolor { Ångstr. — *Ectropothecium*.
Brid. — *Trichosteleum*.

granulatum Hpe. — *Thuidium*.

gratum { Brid. p.p. } — *Thuidium*.
P. B. — *Thuidium involvens*.
P. B. — *Thuidium*.

Grevillei Rab. — *Eurhynchium circinnatum*.

- grimsulanum* W. P. Sch. { (fid. C. M.). — *Brachythecium reflexum*.
(fid. Lindb.). — *Brachythecium Starkii* var.
robustum.
- guadalupense* { Brid. — *Hookeria*.
Spreng. — *Hookeria depressa*.
- Gueinzii* Hpe. — *Rhaphidostegium*.
var. *prostrata* C. M. — *Rhaphidostegium Gueinzii* var. *prostrata*.
- guinense* C. M. — *Trichosteleum*.
- gymnopodium* C. M. — *Porotrichum*.
- hakoniense* Mitt. — *Ptychodium*.
- Haldanianum* Grev. in *Ann. of the Lyc. of Nat. hist. of New-York*,
1825, p. 275, t. 23; C. M. *Syn. II*, p. 254; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 23),
t. 592; W. P. Sch. *op. cit.* p. 765.
- H. badense* A. Br. mss.
- H. Cooleyana* Spreng. 1833 (fid. Sull.).
- H. cupressiforme* var. *Bals. et de Not. M. Mediol.* 1834, II, n. 29.
- H. curvirostrum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 482.
- H. cylindricum* Br. in *Rab. Deutsch. Krypt. Fl. II*, p. 273.
- H. pulchrum* Hook. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 180 p.p.
- Leskea badensis* A. Br. mss.
- Stereodon Haldanei* Lindb. *M. Scand.* p. 38.
- l. Ad terr. silvat. argill. et lign. putresc. — *Eur.*: Scandin., Fenn.,
Neerland., Westphal., Magn. Ducat. Bad., Siles., Salisburg.,
Ital. super. As.: Japon., Jenissei sup., Obi, Caucas. occ. et centr.
Am. sept.: Nov. Scot., Brunswick, Ottawa, Ontar., reg. sept.,
centr. et or.
- Exs.*: *Drumm. M. bor. am. II ed. n.* 114.
Faurie Pl. Japon. n. 1, 27, 28, 29, 33, 101, 173 b, 188, 190, 191;
207, 208, 219, 3504, 3505.
Mac. *Canad. M. n.* 355.
Rab. *Bryoth. eur. n.* 346 et b.
Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 482.
- " var. *Roellii* Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.
— *Am. sept.*: Indiana.
- Halleri* L. jun. *Meth. M. p.* 375; C. M. *Syn. II*, p. 440; *Bryol. eur. VI*
(mon. p. 11), t. 581; W. P. Sch. *op. cit.* p. 721.
- Campylium Halleri* Lindb. *M. Scand.* p. 38.
- H. caulibus prostratis, foliis lanceolatis reflexis, operculo conico* Hall. *Hist.*
stirp. Helv. n. 1734.
- H. flagellare* Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1346.
- H. Stereodon Halleri* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 603.
- Leskea flagellaris* Schrank *Baiers Fl. II*, p. 462.
- l. Ad rup. et sax. praecip. calcar. — *Eur.*: Reg. montan. et subalp.,
deest in Voges., Silv. nigr., Hercyn.
- Exs.*: Rab. *Bryoth. eur. n.* 499, 756, 999.
Un. itin. 1863, n. 42; 1867, n. 11.
- Halleri* { *Drumm.* — *H. Macounii*.
Timm. — *H. molluscum*.
var. *majus* Wahlenb. — *H. chrysophyllum*.
var. *H. f. et W.* — *H. hispidulum*.
- hamatidens* Kindb. — *Camptothecium Nutallii*.
- hamatum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 572.
- Stereodon hamatus* Mitt. *M. austr. am. p.* 533.
- l. Cortic. — *Am. sept.*: Guatemala. *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
et Quitens.

hamatum Dz. et Mk. — *Trichosteleum*.

var. *semi-mammillosum* C. M. — *Trichosteleum hamatum* var. *semi-mammillosum*.

hamifolium W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 732.

Amblystegium Wilsoni var. β *hamatum* Lindb. *M. Scand.* p. 33.

H. aduncum var. *giganteum* *Bryol. eur. VI* (mon. p. 35), t. 606.

H. aduncum var. *hamatum* *Bryol. eur. l. c.*

H. giganteum Sull. et Lesq. *M. bor. am. I* ed. n. 316 et *II* ed. n. 468 (fid. Ren.).

H. lycopodioides (subsp. *Wilsoni*) var. *americanum* Ren. in *Husn. Muscol. gall.* p. 370.

H. lycopodioides (subsp. *Wilsoni*) var. *hamatum* Ren. in op. et l. cc.

Ster. In prat. spongios. — *Eur.*: Suec., Fenn., Ducat. Megap., Angl., Alsat., Belg., Helvet. occ., Regiomont. *Am. sept.*: Minnesota, Wisconsin, Nov. Angl.

Hampeanum C. M. — *Rhaphidostegium circinale*.

* *hamulosum* *Bryol. eur. VI* (mon. p. 20), t. 590; W. P. Sch. op. cit. p. 752.

H. cupressiforme Drumm. *M. bor. am. I* ed. n. 205 (fid. Kindb.).

H. cupressiforme var. *crispatissimum* (Brid.) Br. It. pl. Norveg. un. itin. 1828.

Stereodon hamulosus Lindb. *M. Scand.* p. 38.

l. Ad rup. humid. — *Eur.*: Spitzberg, Scandin., Scot., Alp. Salisburg., Carinth., Bavar., Rhaet. *Am. sept.*: Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov., Gaspes., M. Rupestr., Washington.

Exs: Rab. *Bryoth. eur.* n. 491.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II* ed. n. 478?

* var. *sikkimense* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 78. Ster. — As.: Sikkim.

hamulosum { Froehl. — *H. fastigiatum*.
Sull. — *H. depressulum*?
Wils. — *H. callichroum*.

hapolypetrum C. M. — *Ectropothecium*.

haplohymenium Harv. — *Thuidium*.

hastatum { C. M. — *Thuidium*.
Duby. — *Philonotis laxissima*.
Hpe. — *Thuidium Stuartii*.

hastile (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 594.

Stereodon hastilis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 153.

— As.: Japon.

Hedwigii Lam. et DC. — *H. Crista castrensis*.

Helicodontium C. M. — *Helicodontium tenuirostre*.

helvolum Mitt. — *Brachythecium*.

Henoni Duby *Choix de crypt. ex.* 1876, p. 11, t. I, f. 5 et in *Fl.* 1877, p. 93

? *Rhaphidostegium Henoni* Jaeg. *Ad. II*, p. 474.

Stereodon Henoni Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 181.

Muric. — As.: Japon.

herbaceum Mitt. — *Rhynchostegium*.

herjedalicum Hartm. — *Myurium*.

hermaphroditum C. M. — *Sematophyllum*.

herpetium C. M. — *Trichosteleum*.

heterochlorum Wils. mss.; Hpe Moosb. p. 19 (nom.).

— ?

heteromallum { Gmel. — *Cryphaea*.
Wib. — *Dicranella*.

- Hoffm.* — *Hylocomium loreum*.
Hüb. — *H. cuspidatum*.
Neck. — *H. palustre*.
Poir. — *Neckera*.
heterophyllum { *aquaticum, polycephalum* Dill. — *Leskea polycarpa*
 var. paludosa.
 aquaticum, polycephalum repens Dill. — *H. palustre*.
heteropterum Spr. — *Heterocladium*.
heterostachys Hpe. — *Microthamnium*.
heterostichum W. et M. — *Aulacomnium*.
Heufleri Jur. — *H. revolutum*.
 var. Villardi Ren. et Card. — *H. revolutum var. Villardi*.
hexastichum Schwaegr. — *Pilotrichella*.
hians Hedw. — *Eurhynchium*.
Hildebrandtii { C. M. — *Thamnium*.
 Garov. — *Eurhynchium striatum var. meridionale*.
Hillebrandi Lesq. — *Brachythecium*.
hillianum Hpe. — *Leucomium*.
hirtellum C. M. — *Thelia*.
 var. furcatum C. M. — *Thelia asprella*.
hispidulum Brid. *Sp. M. II*, p. 198; C. M. *Syn. II*, p. 440; Lesq. et Jam.
 Man. p. 378.
Campylium hispidulum Mitt. *M. austr. am. p. 631*.
H. Halleri var. ? *H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed. n. 147*.
H. Stereodon stellatus ♂ *hispidulus* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 603.
 1. Ad arbor. — *Am. sept.*: Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes.,
 Ottawa, Ontar., Alberta, Columb. brit., Montana, reg. sept., centr.,
 or.; Guadalup. *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
 Exc.: Mac. Canad. *M. p. 327*.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. p. 518*.
hispidum H. f. et W. — *Sciaromium*.
Hochstetteri W. P. Sch. — *Hyolocomium Berthelotianum*.
Hofferi W. et Dy. — *Brachythecium*.
Hoehneli C. M. in *Fl.* 1890, p. 497.
 Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro, M. Aberdare.
Holstii Broth. — *Rhynchostegium*.
homaliocaulon C. M. — *Rhynchostegium*.
homalostegium C. M. — *Amblystegium*.
homomallum { Bert. — *H. cupressiforme*.
 C. M. — *Rhaphidostegium*.
Hookeri (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 274.
 Chaetomitrium Hookeri ej. l. c. p. 558.
 Stereodon Hookeri Mitt. *M. Ind. or. p. 114*.
 2. — *As.*: Sikkim.
hookerioides C. M. — *Ectropothecium*.
Hornschuchii { Dz. et Mk. — *H. pseudo-tanytrichum*.
 Hpe. — *Trichosteleum ambiguum*.
hornum { W. et M. — *Amblystegium riparium*.
 Wib. — *Mnium*.
hospitans Hpe. — *Isopterygium*.
Howeanum C. M. — *Plagiothecium*.
huitomalconum C. M. — *Rhynchostegium*.
humile { Harv. — *Rhaphidostegium*.
 P. B. — *Amblystegium radicale*.
humillimum Mitt. — *Rhynchostegium*.

Husnoti W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 88.

— *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

hyalinum Reinw. — *Sematophyllum*.

hydrophilum C. M. — *Ectropothecium*.

hygrophilum { Brid. — *Brachythecium plumosum*.

{ Jur. — *Amblystegium plumosum var. limosum*.

hydropteryx K. Sch. — *Rhynchostegium rusciforme*.

ichnotocladum C. M. — *Ectropothecium*.

illecebrinum W. P. Sch. — *Myuroclada concinna*.

{ Hedw. — *Eurhynchium Boscii*.

illecebrum { L. p.p. { — *Aulacomnium turgidum*.

{ — *H. purum*.

{ — *Scleropodium*.

{ Schultz. — *H. trifarium*.

var. *americanum* Brid. — *Eurhynchium Boscii*.

var. *piliferum* de Not. — *Brachythecium ambiguum*.

var. *Tourrettii* Brid. — *Scleropodium illecebrum*.

imbricatulum P. B. — *Anomodon rostratus*.

imbricatum P. B. — *Pilotrichella*.

implexum { Brid. — *Pseudo-Leskea atro-virens*.

{ C. M. — *Rigodium*.

{ Turn. — *Brachythecium populeum*.

implicatum C. M. — *Brachythecium*.

imponens Hedw. *Sp. M.* 290, t. 77; *C. M. Syn. II*, p. 291; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 28), t. 597; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 754.

H. cupressiforme Hook. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 205 (fid. C. M.).

H. imponens β *chrysocytus* C. M. l. c. p. 292.

H. Stereodon imponens Brid. *Bryol. univ. II*, p. 618.

H. St. Terræ Novæ ej. l. c. p. 619.

Stereodon imponens Mitt. *M. Ind. or.* p. 96.

2. Lignic., ad terr. et sax. quarcos. et ad rad. arb. — *Eur.* : Suec., Boruss. sept., Neerland., Voges., Gall. occ. merid. As. : Japon.?, Kashmir, Sikkim. *Am. sept.* : Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Ottawa, Ontar., Columb. brit., Vancouver, reg. sept. et centr.

Exs : Mac. *Canad. M. n.* 348.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 644, 1046, 1246.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* 475.

imponens Jam. — *H. Watsoni*.

var. *chrysocytus* C. M. — *H. imponens*.

inaequirameum C. M. — *Sciaromium*.

inclinatum Mitt. — *Rhynchostegium*.

incompletum Mitt. — *Homalothecium*?

inconspicuum Hsch. — *Raphidostegium*.

incubans Hsch. et Reinw. — *Ectropothecium*.

incurvatum Schrad. *Crypt. Gew. n.* 80; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 451; *C. M. Syn. II*, p. 416; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 15), t. 585; W. P. Sch. *op. cit.* p. 746.

H. incurvatum β *leskioides* Brid. *op. cit.* p. 453.

H. incurvatum γ *Swartzii ej. l. c.*

H. leskeoides ej. Sp. M. II, p. 177.

H. plumosum Sw. in *Act. Holm.*

H. Swartzii Brid. *op. cit.* p. 178.

Leskea plumosa Sw. *M. Suec.* p. 69.

Plagiothecium incurvum de Not. *Epil.*

Stereodon incurvatus Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 181.

1. In sax. et mur. umbros. — *Eur.* : Reg. campestr. montos. *As.* : Japon., Jenissei sup., Caucas. *Am. sept.* : Terr. nov. ? (fid. C. M.).
Ecs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1114.

incurvatum P. B. — *Pseudo-Leskea atro-virens*.
 var. *leskioides* Brid. — *H. incurvatum*.
 var. *Swartzii* Brid. — *H. incurvatum*.

incurvum Hpe. — *Rhaphidostegium*.

indicum C. M. — *Stereophyllum*.

inerme { Mitt. — *Rhynchostegium*.
 { Schrank. — *H. Schreberi* (1).

inflatum C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

Amblystegium inflatum *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 127.
 Ster. — *As.* : Penins. Tschutschica.

inflatum H. f. et W. — *Lembophyllum*.

inflectens { Ångstr. — *Ectropothecium bryifolium*.
 { C. M. — *Ectropothecium*.

inflexirameum C. M. in *sched.* ; *Jaeg. Ad. II*, p. 607.
 — *As.* : Japon.

inflexum Harv. — *Platygyrium*.

inordinatum Brid. — *Amblystegium radicale*.

insigne Milde. — *Camptothecium nitens*.

instratum Brid. — *Trichosteleum*.

insulosum Sull. — *Rhaphidostegium*.

intermedium { Hpe. — *Thuidium Arzobispae*.
 { Lindb. { — *H. Cossoni*.
 { — *H. vernicosum* ?
 { W. et M. (p. 283). — *Bryum intermedium*.
 { W. et M. (p. 482). — *Bryum inclinatum*.
 { × *vernicosum* San. — *H. Cossoni* × *vernicosum*.

interruptum Brid. — *Hylocomium brevirostrum*.

intertextum { Brid. — *H. palustre* var. *julaceum*.
 { Mühlenb. — *Thuidium scitum*.
 { Voit. — *Rhynchostegium rotundifolium*.

intextum Voit. p.p. { — *Amblystegium serpens*.
 { — *H. palustre* var. *julaceum*.

intorquatum Dz. et Mk. — *Ectropothecium*.

intorto-plicatum Lobarz. in *Haiding. Naturw. Abh. I*, p. 58; C. M. *Syn.* II, p. 296.
 Ster. — *Eur.* : Podolia.

intortum P. B. — *Isopterygium*.

intricatum { C. M. — *Pylaisia*.
 { Dicks. — *Eurhynchium Teesdalii*.
 { Hedw. — *Brachythecium velutinum* var. *intricatum*.
 { Vill. — *H. inextricatum*.

inundatum { Brid. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *inundatum*.
 { Dicks. — *Leskea polyantha* var. *paludosa*.

investe Mitt. — *Thuidium*.

involoens P. B. — *Thuidium*.

irrepens Duby. — *Rhaphidostegium*.

(1) *inextricatum* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 548; C. M. *Syn.* II, p. 509.

H. intricatum Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 914.

"An *Rhynchostegium confertum*? An *Eurhynchium praelongum*?"
 Brid. l. c. — Delendum.

irrigatum Zett. *M. Pyr.* p. 48 et in *K. Sv. Akad. Handl.* V, n. 10.

Amblystegium irrigatum Lindb.

H. napaeum Limpr.

— *Eur.* : *Pyren.*, *Ital.* super. *As.* : *Caucas.*

irriguum H. f. et W. — *Amblystegium*.

irroratum C. M. — *Orthothecium*?

isocladon Bryol. jav. — *Trichosteleum*.

Jacquemonti Br. et Sch. — *Thuidium*.

Jacquini Garov. — *Rhynchostegium curvisetum*.

jamaicense Gmel. — *Neckera undulata*.

Jamesii } Aust. — *H. uncinatum* var. fragile.

 } L. et J. — *Rhaphidostegium*.

Jamesoni Tayl. — *Microthamnium*.

javanicum Bel. — *Rhynchostegium*.

jenissiense L. et A. — *Brachythecium*.

Jolliffii Hook. f. — *Rhaphidostegium*.

 } C. M. p. p. — *Myurella apiculata*.

 } L. — *Leucodon*.

 } Vill. — *Myurella*.

julaceum } *erectum sericeum repens, capsulis cylindraceis* Dill. —
 Anomodon rostratus.

 } *Bryi argentei habitu* Dill. — *Brachytecium acuminatum*.

 } *perichætio setas paene aequante* Dill. — *Leucodon julaceus* (1).

Jungermannia Hpe. — *Amblystegium Sprucei*.

jungermanniioides Brid. — *Amblystegium confervoides*.

Junghunii C. M. — *Hypnodendron*.

hamonense Harv. — *Brachythecium*.

Kegelianum C. M. — *Rhaphidostegium*.

var. *tenuis* C. M. — *Rhaphidostegium Kegelianum* var. *tenuis*.

Kiskii C. M. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1883, p. 294.

Arbor. — *Pac.* : *Nov. Zeland.*

Kneiffii W. P. Sch. — *H. aduncum* var. *Kneiffii*.

var. *filiforme* Berggr. — *H. aduncum* var. *filiforme*.

var. *gracilescens* Kindb. — *H. aduncum* var. *gracilescens*.

var. *laxum* Kindb. — *H. aduncum* var. *Kindbergii*.

var. *platyphyllum* Kindb. — *H. aduncum* var. *platyphyllum*.

var. *rectifolium* Kindb. — *H. aduncum* var. *rectifolium*.

var. *strictum* Berggr. — *H. aduncum* var. *strictum*.

Knuthei Rehm. *M. Afr. austr.* n. 670.

Ster.

— *Afr.* : *Transvaal*.

Korthalsii } Dz. et Mk. — *Mniodendron*.

 } eor. — *Sematophyllum lancifolium*.

krakammae C. M. — *Rhaphidostegium*.

Krausei C. M. } — *Brachythecium*.

 } — *Hypnodendron*.

kroneanum C. M. — *Mniodendron*.

Kuilui C. M. — *Trichosteleum*.

kuripanum Dz. et Mk. — *Thuidium Meyenianum*.

Kurzii S. Lac. — *Ectropothecium*.

(1) *Juliani* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 545; C. M. *Syn.* II, p. 509.

H. capillaceum Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 907.

† An *Heterocladium dimorphum*? Brid. l. c. — *Delendum*.

lacerulum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 559.

Stereodon lacerulus Mitt. *M. Ind. or.* p. 115.

1. — *As.* : *Ind. or.* (sine loc. spec.).

laculo um C. M. — *H. fluitans* var. *laculosum*.

lacunosum Wieb. — *H. cupressiforme*.

lacustre W. et M. — *Bryum*.

laete-virens Sm. — *Rhynchostegium confertum*.

laetum { Brid. — *Brachythecium*.

{ Sull. — *Brachythecium pseudo-laetum*.

var. *dentatum* L. et J. — *Brachythecium laetum* var. *dentatum*.

laevifolium Mitt. — *Brachythecium*.

laevisetum { Crome. — *Brachythecium plumosum*.

{ Mitt. — *Helicodontium*.

{ S. Lac. — *Homalothecium*.

laeviusculum { Hook. f. — *Thuidium*.

{ Mitt. — *Homalothecium neckeroides*.

Lamarckii Brid. — *Brachythecium salebrosum*.

lamasicum Spr. — *Rhynchostegium*.

lamprocarpum C. M. — *Brachythecium*.

lamprophyllum { C. M. — *Sematophyllum Mittenii*.

{ Hpe. — *Ectropothecium*.

lamprostachys Hpe. — *Plagiothecium*.

lanatum Sterm. — *Amblystegium fluviatile*.

lanceolatum C. M. — *Helicodontium*.

lancifolium C. M. — *Sematophyllum*.

lancifrons Hpe. — *Porotrichum*.

Langsdorffii Hook. — *Microthamnium*.

laricinum { Hook. } — *Hypopterygium*.

{ H. f. et W. — *Hypopterygium scutellatum*.

{ Wils. — *Hypopterygium didictyon*.

{ Thuidium Blandowii.

lasiomitrium C. M. — *Thuidium plumulosum*.

latebricola { Lindb. — *Plagiothecium*.

{ Mac. p. p. } — *Plagiothecium decursivifolium*.

{ } — *Plagiothecium passaicense*.

laterculi C. M. — *Thuidium* ?

latifolium { Lindb. — *Brachythecium*.

{ Tayl. — *Ectropothecium*.

lato-caespitosum C. M. in *Hildebr. M. Mad. n.* 2074.

— *Afr.* : Madagasc. merid.

Laureri Funk. — *Rhynchostegium* ?

laxatum Mitt. — *Rhynchostegium*.

laxe-patulum L. et J. — *Rhaphidostegium delicatulum*.

laxifolium { Brid. — *Amblystegium riparium*.

{ Schwaegr. — *Thuidium*.

laxirete C. M. — *Homalia*.

laxo-pinnatum Brid. — *Rhynchostegium curvisetum*.

laxum Hpe. — *Ectropothecium* (1).

Lechleri C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 455.

H. cupressoides W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Chil. n.* 619.

Stereodon Lechleri Mitt. *M. austr. am.* p. 619.

2. — *Am. merid.* : Valdiv., ins. Juan Fernandez.

(1) *laxum* P. B. Prodr. p. 65; C. M. Syn. II, p. 509.

H. Stereodon laxus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 653.

* *Rhacopilum quoddam!* C. M. l. c. — Delendum.

Lecoultriae Duby. — *Rhaphidostegium Duisabonae* var. *rigidiusculum*.
Leibergii D^{na} E. G. Br. — *Thamnium*.

leitense (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 568.

Amblystegium leitense Mitt. *M. austr. am.* p. 571.

Ster. Paludic. — *Am. sept.*: Guatemala. *Am. merid.*: And. Quitens.

Lejolisii Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 108.

2. Cortic. — *Am. sept.*: Mexic. (Mejico, Oajaca).

lentum Mitt. — *Isothecium*.

lepidopiloides C. M. — *Brachythecium*.

lepidum Wils. *in sched.*

Stereodon lepidus Mitt. *M. Ind. or.* p. 98.

2? — *As.*: Sikkim.

Lepineanum W. P. Sch. — *Trichostoleum Vernieri*.

leptoblastum C. M. — *Isopterygium*.

leptocarpon Schwaegr. — *Rhaphidostegium*.

leptochaeton { Schwaegr. — *Rhaphidostegium*.
 { Wils. — *Rhaphidostegium caespitosum*?

leptocladum C. M. — *Thuidium*.

leptodontium Mitt. — *Helicodontium*.

leptomerocarpon C. M. — *Rhynchostegium*.

leptomiton C. M. — *Isopterygium*.

leptopoma Schwaegr. — *Hookeria*.

leptorhynchoides Mont. — *Rhaphidostegium*.

leptorhynchum { Brid. { — *Rhaphidostegium*.
 { — *Rhaphidostegium cyparioides*.
 { H. f. et W. — *Rhaphidostegium leucocytus*.

var. β Fl. Antarct. — *Rhaphidostegium cerviculatum*.

lepturum Tayl. — *Brachythecium*.

Lescurii Sull. — *Amblystegium*.

Leskea Grev. — *Eurhynchium circinnatum*.

leskeoides { Brid. — *H. incurvatum*.
 { W. P. Sch. — *Anomodon*.

leucochloron (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 588.

Stereodon leucochloron Mitt. *in Trans. and Proced. of the roy. soc. of Victoria*, 1883, p. 87.

Drepano-Hypnum leucochloron Hpe. *in Linn.* 1874, p. 669.

1. Ad arbor. et terr. — *Pac.*: Ins. Lord Howe.

leucocladulum C. M. — *Tripterocladium*.

leucocytus C. M. — *Rhaphidostegium*.

leuconeuron Sull. — *Thuidium*.

leucophanes Hpe. — *Isopterygium*.

leucophyllum Hpe. — *Isopterygium*.

leucostegum C. M. — *Stereophyllum*.

leucostomum Hpe. — *Rhaphidostegium*.

leucotrichum Tayl. — *Pilotrichella*.

Leveilleanum Bryol. jav. — *Fabronia*.

lignicola Mitt. — *Isopterygium*.

Ligularia C. M. *in Dusen M. Camer. n.* 336.

— *Afr.*: M. Cameroon.

ligulatum { C. M. — *Stereophyllum*.
 { W. et M. — *Mnium undulatum*.

ligusticum de Not. — *Brachythecium*.

lilliputanum Mont. — *Rhaphidostegium*.

- limatum* H. f. et W. — *Ectropothecium australe*.
limbatulum C. M. — *Sciaromium*.
limbatum Sull. — *Sciaromium*.
Lindbergii { Bryol. jav. — *Trichosteleum*.
 Mitt. — *H. arcuatum*.
Lindigii Hpe. — *Rhaphidostegium*.
lithophilum { H. f. et W. — *Rhaphidostegium secundifolium*.
 Hsch. (Fl. Bras.) — *Rhaphidostegium loxense* var. *lithophilum*.
 Hsch. (M. Capens.) — *Rhaphidostegium sphaerotheca*.
littorale Hpe. — *Rhaphidostegium*.
littoreum de Not. — *Rhynchostegium curvisetum*.
livens Schwaegr. — *Pilotrichella*.
Llanosii Duby in *Mém... Genève*, 1876, p. 10, t. III, f. 1 et in *Fl.* 1877, n. 5.
 Cortic. — As.: Ins. Philippin.
lonchopelma C. M. — *Isopterygium*.
lonchophyllum Mont. — *Pterogoniella*.
lonchopyxis C. M. — *Thuidium*.
longicaule Bryol. jav. — *Sematophyllum*.
longicollum W. et M. — *Webera*.
longiscupidatum Mitt. — *Brachythecium*.
longicuspis (Arn.). *Par*
 Amblystegium longicuspe Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 123.
 H. aduncum δ molle binerve San. in *Bihang...* p. 38 et in *Hedwig.* 1887.
 2? Paludic. — As.: *Jenissei* infer.
longiflorum P. B. — *H. longisetum*.
longifolium (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 568.
 Amblystegium longifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 571.
 Ster. — *Am. merid.*: Ins. Maclov.
longifolium { C. M. — *Anomodon*.
 Mitt. — *Eurhynchium*.
 Schultz. — *Amblystegium riparium* var. *longifolium*.
 var. *petrophilum* Brid. — *Amblystegium riparium* var. *petrophilum*.
longifrons C. M. — *Pterobryella*.
longinerve { Duby. — *Sematophyllum*.
 Kindb. — *H. fluitans* var. *capillifolium*.
longipes Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 388.
 H. longisetum W. P. Sch. in *Savat. M. Jap. n.* 724.
 2. — As.: Japon.
longipes Lindb. — *Eurhynchium clinocarpum*.
longirostratum C. M. — *Rhaphidostegium*.
longirostrum Ehrh. — *Eurhynchium striatum*.
longisetum { Schleich. — *H. aduncum*.
 W. P. Sch. — *H. longipes* (1).
longissimum Raddi. — *Meteorium*.
Lorentzianum Mdo. in *Ltz. Moost.* 1864, p. 119; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 767.
 1. Ad terr. argill. calc. in decliv. silvat. — *Eur.*: Savar. super.
 Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 488.

(1) *longisetum* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 542; C. M. *Syn.* II, p. 508.

H. longiflorum P. B. *Prodr.* p. 65.

* Forsan *Amblystegii serpentis* var. α . Brid. l. c. — Delendum.

- loreum* { L. — *Hylocomium*.
montanum, capsulis subrotundis Dill. — *Hylocomium loreum*.
 var. *heterophyllum* Brid. — *Hylocomium loreum*.
loricalycinum C. M. — *Thuidium*.
loriforme Hpe. — *Microthamnium*.
loxense Hook. — *Rhaphidostegium*.
 γ *rivulare* C. M. — *Rhaphidostegium loxense* var. *lithophilum*.
loxocarpum Ångstr. — *Ectropothecium inflectens*.
lucens L. — *Pterygophyllum*.
lucidulum H. f. et W. — *Plagiothecium*.
lucidum eor. — *Plagiothecium*.
Ludwigianum Spreng. — *Rhynchostegium confertum*.
Ludwigii Brid. — *Eurhynchium Stockesii*.
luridum { Hedw. — *H. palustre*.
 { Sw. — *Amblystegium fluviatile*.
lusitanicum W. P. Sch. op. cit. p. 781.
 Ster. In rivul. — *Eur.* : Lusitan.
luteolum { C. M. — *Brachythecium laetum*.
 { Mitt. — *Homalothecium*.
luteo-nitens { Ren. et Card. — *Plagiothecium*.
 { W. et Dy. — *Rhynchostegium*.
lutescens { Drumm. — *Brachythecium glareosum*.
 { Huds. — *Camptothecium*.
 { *crispum, Lycopodii facie* Dill. — *H. rugosum*.
luxurians { Dz. et Mk. — *Sematophyllum*.
 { Duby. — *Sematophyllum pycnophyllum*.
Luzoniae C. M. — *Ectropothecium*.
lychnites (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 562.
Stereodon lychnites Mitt. M. Ind. or. p. 114.
 2. — *As.* : Khasia, M. Neilgherr., Ceylan.
lycopodioides Schwaegr. Suppl. I, II, p. 300; C. M. Syn. II, p. 423;
Bryol. eur. VI (mon. p. 45), t. 613-614; W. P. Sch. op. cit. p. 732.
Amblystegium lycopodioides de Not. Briol. ital. p. 138.
H. aduncum var. *rugosum* H. et T. Muscol. brit. p. 111.
H. diastrophyllum Lam. et DC. Fl. fr. I, p. 528.
H. rugosum W. et M. Bot. Taschb. p. 362.
H. scorpioides Schultz Fl. Starg. n. 923.
H. Stereodon lycopodioides Brid. Bryol. univ. II, p. 632 (excl. syn. Dill.).
 2. In pratis spongios. — *Eur.* : Reg. campestr. zon. intermed. et sept., montan. et subalp. zon. merid. *As.* : Jenissei sup. et med. (1).
Am. sept. : Groenland.
Eas. : Rab. Bryoth. eur. n. 752, 914, 1200.
 var. *americanum* Ren. — *H. hamifolium*.
 var. *brevifolium* Berggr. — *H. brevifolium*.
 var. *hamatum* Ren. — *H. hamifolium*.
 var. *miquelonense* R. et C. — *H. scorpioides* var. *miquelonense*.
 subsp. *Wilsoni* Ren. — *H. Sendtneri* var. *Wilsoni*.
lycopodioides × *fluitans* San. Besch. p. 50.
Amblystegium lycopodioides × *fluitans* L. et A. M. *As. bor.* 1890, II, p. 122.
 2. — *Eur.* : Lappon. *As.* : Jenissei med.

(1) Formae : *genuinum*, *lapponicum*, *lapponicum-Sahlbergii*, *majus*, *majus-Holleri*. (Sanio in L. et Arn. l. c.).

Mac-Leanum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 677.

Ster. — *Afr.* : Transvaal.

Macounii Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, p. 279 et in *Mac. Cat.* p. 224.

H. Halleri Drumm. *M. bor. am. I ed.*, p. 191.

1. Terr. — *Am. sept.* : *M. Rupestr.*

macroblepharum W. P. Sch. — *Microthamnium*.

macrobolax C. M. — *Ectropothecium*.

macrocarpon Hsch. — *Hylocomium*.

macrocomum C. M. — *Brachythecium*.

var. *robustius* C. M. — *Brachythecium macrocomum var. robustius*.

macrodontium Hsch. — *Microthamnium*.

macrogynum Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 91.

2. Ad rup. madid. in silv. — *As.* : Yunnan.

macrorhynchum Hsch. — *Rhaphidostegium*.

macrostegium S. et L. — *Eurhynchium* ?

macrotheca C. M. — *Porotrichum macrocarpum*.

madagassum C. M. — *Trichosteleum*.

maderense Mitt. — *Amblystegium*.

? *magellanicum* P. B. *Prodr.* p. 66 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 541 ; C. M. *Syn.* II, p. 27 (1).

— *Am. merid.* : Fret. Magellan.

mahahaicum C. M. — *Porotrichum*.

Mailusiae C. M. — *Rhaphidostegium*.

malacoblastum C. M. — *Ectropothecium*.

malacobolum C. M. — *Microthamnium*.

malacodes (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 594.

Ctenidium malacodes Mitt. *M. austr. am.* p. 509.

Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

mammillatum Funk. — *H. fastigiatum*.

mammosum C. M. — *Trichosteleum*.

Mandoni W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1711.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

marginatum { *H. f. et W.* — *Hypnodendron*.

{ *W. et M.* — *Mnium serratum*.

maritimum C. M. — *Rhaphidostegium*.

Martianum { Ltz. — *Trichosteleum*.

{ Sendtn. — *Thuidium minutulum*.

marylandicum C. M. — *Rhaphidostegium demissum var. marylandicum*.

mascarenicum C. M. — *Thuidium*.

mauritianum Bel. *Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt.* p. 93, t. 10, f. 3 ; C. M. *Syn.* II, p. 407.

Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Franciae.

Maximovickzii Borsz. — *Myuroclada concinna*.

M'Bangae C. M. — *Isopterygium*.

mediterraneum Sendtn. — *Eurhynchium circinatum*.

medium Dicks. — *Leskea polycarpa*.

megapelma C. M. — *Rhynchostegium*.

(1) « Verosimiliter *Mniadelphus* », C. M. l. c.

megapolitanum { Bland. — Rhynchostegium.
H. f. et W., Hpe. — Rhynchostegium tenuifolium.
Hsch. — Rhynchostegium Beskeanum.
Hsch. — Rhynchostegium leptomerocarpon.

megaptilon Sull. — Camptothecium.

megasporium Duby. — Rhaphidostegium.

melanocarpum C. M. — Brachythecium oxyrhynchum.

menadense Bryol. jav. — Rhynchostegium.

Menziesii Hook. — Hypnodendron.

meridense C. M. — Brachythecium.

meridionale W. P. Sch. — Eurhynchium striatum *var.* meridionale.

Mertensii Weimm. — Hylocomium.

mexicanum Mitt. in sched. ; Jaeg. Ad. II, p. 562.

— Am. sept. : Mexic.

Meyenianum Hpe. { — Ectropothecium.
— Thuidium.

micans Wils. in Hook. Fl. brit. V, II, p. 86; C. M. Syn. II, p. 290; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 784.

Chrysobryum micans Lindb. in Sull. Ic. M. Suppl. p. 91, t. 67.

H. Novae Cesareae Aust. in Lesq. et Jam. Man. p. 356 et M. Appal. n. 440.

Rhaphidostegium Novae Cesareae Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p. 21.

Rhynchostegium Novae Cesareae Aust. in Coult. Bot. Gaz. I, p. 30.

Stereodon micans Mitt. M. Ind. or. p. 114.

2. ♂ et fr. ign. Ad rup. et sax. irror., praecip. ad catar. — Eur. :

Britann. As. : Sikkim. Am. sept. : New Jersey, Pensilv.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 545.

micans { H. f. et W. — Camptochaete gracilis.
Sw. — Plagiothecium.

micranthum Wils. — H. callichroum.

microcarpoides C. M. — Rhaphidostegium.

microcarpum { C. M. — Rhaphidostegium.
Duby. — Rhaphidostegium saproxylophilum.
Hedw. — Mniadelphus.
Hook. — Trichosteleum brachypelma.
Hsch. — Trichosteleum ambiguum.

var. Sull. — Rhaphidostegium microcarpum *var.* anisocarpon.

microcladum { C. M. — Thuidium.
Dz. et Mk. — Trichosteleum.
Hpe. (fid. C. M.). — Trichosteleum Kurzii.
Tayl. — Rhaphidostegium.

microcranthum P. B. — Mniadelphus microcarpus.

microdendron C. M. — Homalia.

microphyllum { Hsch. — Pseudo-Leskea muricola.
Mühlenb. — Thuidium gracile.
Sw. — Pseudo-Leskea.

micropodon Brid. — Leptodon trichomitrium.

micropyxis C. M. — Rhaphidostegium.

microthamnioides C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 189.

In silv. paludos. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

microthamnioides C. M. (Abh. Brem.) — Trichosteleum.

microtheca C. M. — Pterogoniella.

microvagum C. M. — Lembophyllum.

Mildeanum W. P. Sch. { Brachythecium acutum.
Brachythecium salebrosum *var.* palustre.

- minimum* { P. B. — *Rhaphidostegium microcarpum*.
 foliis ovato-lanceolatis, capitulis erectis, operculis conicis
 Hall. — *Amblystegium subtile*.
minusculum Wils. — *Thuidium*.
minutirameum C. M. — *Isopterygium*.
minutissimum S. et L. — *Amblystegium*.
minutulum { Hedw. — *Thuidium*.
 Hsch. — *Thuidium Schiedeanum*.
 Hsch. — *Thuidium versicolor*.
minutum Mitt. — *Rhegmatodon*.
Miquelii Bryol. jav. — *Isopterygium*.
miradoricum C. M. — *Isopterygium*.
Mittenii Spr. — *Helicodontium*.
mixtum C. M. — *Porotrichum*.
mnioides { Hook. — *Rhizogonium*.
 Schwaegr. — *Rhizogonium sublasilare*.
Moenkemeyeri C. M. — *Thamnium*.
Mohrianum C. M. in Linn. 1874, p. 656.
 H. affine Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 108.
 1. Lignic. — Am. sept. : Mexic.
Molendoanum W. P. Sch. op. cit. p. 739.
 2. Ad rup. schist. calc. — Eur. : Salzburg. infer.
Molkenboërianum C. M. — *Rhaphidostegium*.
molle Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 11, t. 5, f. 8 ; W. P. Sch. op. cit.
 p. 775 (1).
Amblystegium molle Lindb. M. Scand. p. 33
 H. Closteri Aust. M. Appal. n. 429.
 1. Ad sax. rivul. alp. — Eur. : Spitzberg, Alp. Scot., Sabaud.
 (M. Blanc.). Am. sept. : Groënland, Carol. sup., Virgin. occ., Ore-
 gon.
 Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 451.
 « var. *Schimperianum* (Ltz.) W. P. Sch. l.c.
Amblystegium Schimperianum var. *Schimperianum* Lindb. l.c.
 H. *Schimperianum* Ltz. Moosst. p. 123, t. 5.
Limnobia Schimperianum de Not. Epil. p. 160.
 In font. frigid. — Eur. : Lappon., Tirol., Alp. Sabaud. (M. Blanc.).
molle { C. M. p.p. { — H. alpestre.
 — H. dilatatum.
 Wils. — H. dilatatum.
Molleri C. M. — *Thamnium*.
molliculum { Lindb. — *Brachythecium*.
 Sull. — *Isopterygium*.
molluscoides Sull. — *Ectropothecium sodale*.
molluscum Hedw. M. frond. IV, p. 56, t. 22; Brid. Bryol. univ. II,
 p. 519; C. M. Syn. II, p. 297; Bryol. eur. VI (mon. p. 29), t. 598;
 W. P. Sch. op. cit. p. 769.
Ctenidium molluscum Lindb. M. Scand. p. 38.
 H. compressum Roth Fl. Germ. III, p. 286.
 H. *Crista castrensis* ej. op. cit. p. 282.

(1) « Descriptio *H. mollis* in C. M. Syn. II, p. 431, part. ab *H. dilatato*, part. ab *H. alpestri* desumpta videtur. » W. P. Sch. l. c.

H. filicinum cristum castrensem repraesentans *Dill. Hist. M. p. 254 p.p., t. 36, f. 20 A-B.*

H. Halleri *Timm. Prodr. fl. Megap. n. 829.*

H. Timmii *Brid. M. Rec. II, II, p. 123.*

H. Stereodon subrectifolius *ej. Bryol. univ. II, p. 619.*

2. Ad arb. rad., rup. et sax. praepr. calc. — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in subalp. *As.*: Kamschatka, Caucas. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, reg. sept. et or.

Exs.: *Mac. Canad. M. n. 344.*

Rab. Bryoth. eur. n. 1244.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II, p. 471.

« *var. condensatum* *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Ad terr. silvat. — *Eur.*: Ut typ. *Am. sept.*: Reg. sept. et or.

Exs.: *Drumm. M. bor. am. II ed. n. 149?*

Rab. Bryoth. eur. n. 492.

« *var. erectum* *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Ad terr. arenos. vel humos. humidiusc. — *Eur.*: Gall. merid. (Massilia), etc. *Am. sept.*: Ut praeced.

« *var. gracile* *Boul. M. Fr.; Husn. Muscol. gall. p. 409.*

Ut et ubi typ.

« *var. squarrosulum* *Boul. et Husn. ll. cc.*

H. delitescens *Boul. prius.*

Ut et ubi typ.

Monbuttoviae *C. M.* — *Plagiothecium.*

moniliforme *Wahlenb.* — *Myurella julacea.*

var. apiculatum *Somm.* — *Myurella apiculata.*

monoicum *Bryol. jav.* — *Sematophyllum.*

Montagnei { *C. M.* — *Ectropothecium.*

{ *Sull.* — *Ectropothecium crassicaule.*

montanum *Wils. mss.; Sull. M. of U. St. p. 72 et Ic. M. p. 181, t. 113; James in Proced. of the Acad. sc. Philad. 1855; W. P. Sch. op. cit. p. 780.*

Amblystegium montanum *Lindb. M. Scand. p. 33.*

H. rivulorum *S. et L. in Sull. M. of U. St. l. c.*

1. Ad rup. madid. — *Eur.*: Norveg. merid. *Am. sept.*: Terr. nov., M. Alb., Ontario.

Exs.: *Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 306 et II ed. n. 453.*

montanum *Lam.* — *Antitrichia curtispindula.*

monumentorum *Duby.* — *Ectropothecium.*

Moorei *Broth.* — *Rhynchostegium.*

Moorii *Rehm. M. Afr. austr. n. 396.*

— *Afr.*: Austral.

morense *Schleich.* — *Leucodon sciuroides var. morensis.*

Morettii *Garov.* — *Ptychodium plicatum.*

Moritzii { *C. M.* — *Ectropothecium.*

{ *Duby.* — *Rhacopilum spectabile.*

Moseri *Kindb. in Ott. Natur. IV, p. 65 et in Mac. Cat. p. 229.*

1. Ad *Populos.* — *Am. sept.*: Terr. nov., New Brunswick.

mosquitense *Brid.* — *Isothecium myurum.*

Mossmannianum *C. M. in Bot. Zeit. 1851, p. 565.*

H. cupressiforme var. minus *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 111 et Fl. Tasm. II, p. 212.*

Stereodon cupressiformis var. *Mossmannianus* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 83.

1. Cortic. et lignic. — *Pac.*: Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

? *Mougeotianum* A. Rich. in *Fl. Nov. Zeel.* p. 57; *C. M. Syn.* II, p. 13 (1).

Rhacopilum Mougeotianum Jaeg. Ad. II, p. 60.

— *Pac.*: Nov. Zeland.

mucidum C. M. — *Microthamnium*.

mucronatum { C. M. — *Acrocladium*.

{ P. B. — *Rhacopilum tomentosum*.

Mühlenbeckii Hartm. — *Plagiothecium*.

Mühlenbergense P. B. — *H. stellatum*.

Mühlenbergii P. B. — *Cylindrothecium compressum*.

Mülleri { C. M. — *Rhynchostegium*.

{ Hpe. — *Amblystegium*.

? *multiflorum* *Schwaegr. Suppl.* I, II, p. 202; *C. M. Syn.* II, p. 320.

Leskea multiflora Brid. *Bryol. univ.* II, p. 291.

Ster. Terr. — *Afr.*: Ins. Borbon.

multiflorum { P. B. — *Leskea polycarpa*.

{ Tayl. { (fid. C. M.). — *Pylaisia heteromalla*.

{ (fid. W. P. Sch.) — *H. cupressiforme* var. *resupinatum*.

mundemonense Hpe. — *Rhaphidostegium*.

mundulum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 112, t. 91 f. I et *Handb.* p. 476.

1. — *Pac.*: Nov. Zeland.

mundulum Sull. — *Ectropothecium gracilisetum*.

mundum C. M. — *Ectropothecium*?

murale Hedw. — *Rhynchostegium*.

muricatum { C. M. — *Thuidium Pamperum*.

{ Hpe. — *Thuidium*.

muricolum C. M. — *Thuidium*.

muriculatum H. f. et W. — *Eurhynchium*.

mutabile Brid. — *Lescuraea striata*.

muticum Sw. — *H. Schreberi*.

mycostelium Hpe. — *Ectropothecium*.

Hedw. — *Isothecium myurum*.

Lag. — *Camptothecium lutescens*.

L. — *Eurhynchium*.

brevius et crassius, capsulis cernuis Dill. — *Rhynchostegium murale*.

myosuroides { *crassius, capsulis erectis* Dill. — *Isothecium myurum*.

sericeum, tenuius, capsulis erectis Dill. — *H. cupressiforme* var. *tectorum*.

setis brevissimis Dill. — *Förstroemia trichomitrium*.

tenuius, capsulis nutantibus Dill. — *Eurhynchium myosuroides*.

var. *filiforme* Web. — *Pylaisia polyantha*.

var. *praelongum* Web. — *Camptothecium lutescens*.

var. *stoloniferum* C. M. — *Eurhynchium*.

var. Huds. — *Rhynchostegium murale*.

myosurum { Gmel. — *Isothecium myurum*.

{ Schrad. — *Eurhynchium myosuroides*.

(1) « An *Hypopterygium*? » C. M. l. c.

myurum Poll. — Isothecium.

nabambissense C. M. — Thuidium.

nano-Crista-castrense C. M. — Ectropothecium.

nano-globeum C. M. — Isopterygium.

nano-operculatum C. M. — Microthamnium.

nano-pennatum Broth. — Rhynchostegium.

nano-polymorphum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 498.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

nanopyxis C. M. — Rhaphidostegium.

nanothecium C. M. — Rhaphidostegium.

nanum C. M. — Rhaphidostegium (1).

napaeum Limpr. — H. irrigatum.

napoanum de Not. in *Mem. Acad...* Torino, II ser., XVIII, p. 438 c. ic.

— *Am. merid.* : Columb.

natalense Par.

H. brevifolium *Rehm.* M. Afr. austr. n. 675 b.

Ster. — *Afr.* : Natal.

Naumanni C. M. } Hypnodendron.
Thuidium.

naviculare Brid. — Phyllogonium viscosum.

Neckera } Schwaegr. — Thamnum neckeroides.
W. P. Sch. — Porotrichum Valdiviae.

neckeraceum C. M. — Rhaphidostegium.

neckeraceforme Hpe. — Porotrichum.

neckeroides { Hook. (fid. C. M.). — Thamnum.
H. f. et W. — Thamnum alleghaniense.
Mac. — Thamnum alopecurum.

neckeroidium Mont. — Porotrichum insularum.

neelgheriense } C. M. — Orthothecium.
Bryol. jav. — Orthothecium Celebesiae.

var. *ceylanicum* C. M. — Orthothecium celebesiae var. *ceylanicum*.

neglectum C. M. — H. palustre var. *julaceum*.

Nelsoni (Broth.) Par.

Stereodon *Nelsoni* Broth. in *Æfv. of Finska Vet. — Soc. Foerh.* 1895, p. 70.

2. ♂ ign. Lignic. — *Pac.* : Tasman.

nematocaulon C. M. — Rhaphidostegium.

nematogonium C. M. — Brachythecium.

nemorosum Koch in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 422; C. M. *Syn.* II, p. 255;
Bryol. eur. VI (mon. p. 24), t. 593; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 766.

H. subrectifolium *Sull.* M. Allegh. n. 15.

Stereodon *nemorosus* *Lindb.*

2. Lignic. — *Eur.* : Palatin., Bavar. As. : Caucas. occ. *Am.*
sept. : New Brunswick, Carol. sept., Mexic.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 483.

nepalense } Br. p.p. — Trichosteleum turgidellum.
Schwaegr. — Trichosteleum.

nervatulum C. M. — Isopterygium.

(1) *nanum* Vill. Pl. Dauph. III, p. 915; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 549; C. M. *Syn.* II, p. 509. — Quid? Delendum.

- nervosum* { C. M. — Leskea.
Hook. — Pseudo-Leskea prionophylla.
nevadense Lesq. — Camptothecium.
Niam-Niamiae C. M. — Trichosteleum ?

nictans Wils. in sched.

Stereodon *nictans* Mitt. *M. Ind. or.* p. 98.

1. — As. : Sikkim.

Nietnerianum C. M. — Sematophyllum.

nlgrescens Sw. — Papillaria.

nigricans { Hpe. — Pilotrichella flexilis.
Hook. — Pilotrichella.
Vill. — Cinclidotus aquaticus.

nigricaule Brid. — Rhaphidostegium ?

nigro-viride { C. M. — Brachythecium.
Turn. — H. cupressiforme var. *tectorum*.

nitens { Schreb. — Camptothecium.

Timm. — H. cupressiforme.

nitidulum Wahlenb. — Plagiothecium.

nitidum (Hook. f. et Wils.) C. M. *Syn. II*, p. 382.

Leskea nitida H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 551 et *Fl. Antarct. II*, p. 416, t. 154, f. 6.

Stereodon *nitidus* Mitt. *M. austr. am.* p. 535.

2 ? — Am. merid. : Fuegia, ins. Eremit. et Stat.

nitidum Wahlenb. — Plagiothecium *nitidulum*.

nitrophilum Spr. *Cat.* p. 20 et *exs. n.* 1428.

-- Am. merid. : And. Quitens.

nivale Ltz. *Moosst.* 1864, p. 122, t. 5, f. B.; W. P. Sch. *op. cit.* p. 794.

2. Inter lapid. aq. nival. irror. — Eur. : Alp. Carinth.

nodiflorum Wils. — H. polygamum.

norfolkianum C. M. — Isopterygium.

norvegicum W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 637 et *II ed.* p. 778.

Amblystegium viridulum Lindb. *M. Scand.* p. 33.

H. *viridulum* Hartm. *Skand. Fl. V ed.* p. 324; C. M. *Syn. II*, p. 417.

Limnobia *norvegicum* Bryol. eur. VI (mon. p. 6), t. 576.

1. In rivul. — Eur. : Lapon., Norveg. As. : Jenissei inf. Am. sept. : Groenland.

Notarisii { Boul. — Thuidium decipiens.

Sb. — H. ambiguum.

noterophilum S. et L. — Amblystegium irriguum var. spiniforme.

Novae Angliae { Mac. — H. chloropterum.

S. et L. — Brachythecium.

Novae Cesaree Aust. — H. micans.

Novarae Reichdt. — Ectropothecium ?

novo-caledonicum C. M. — Eurhynchium.

novo-granatense Hpe. — Plagiothecium.

novo-guineense Geh. — Trichosteleum.

nubigena (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 603.

Stereodon *nubigena* Mitt. *M. Ind. or.* p. 109.

Ster. — As. : Sikkim.

nudicaule Schwaegr. — Leucodon domingensis.

? nuka-hivense W. P. Sch. in *Jardin Enum.* p. 20 (nom.).

Microthamnium macroblepharum? (fid. Besch.).

— *Pac.*: Nouka-Hiva.

nutans { Nees. — *Ectropothecium*.
W. et M. — *Webera*.

Nuttalii Wils. — *Camptothecium*.

Oakesii Sull. — *Hylocomium*.

obliquerostratum Mitt. — *Helicodontium*.

obliquifolium C. M. — *Rhaphidostegium galipense*.

oblongifolium Hpe. in *Linn.* 1859, p. 641.

Amblystegium oblongifolium Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1893, p. 87.

Ster. Aquat. — *Pac.*: Austral. or., Tasman.

oblongifolium S. et L. — *H. chinense*.

obscurum { Brid. — *Rhynchostegium curvisetum* var. *longinerve*?
C. M. — *Leskea obscura*.

obtusatum Wahlenb. — *Plagiothecium denticulatum* var. *obtusifolium*.

obtusifolium Hpe. et C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 457.

1. *Ad arbor.* — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

obtusifolium { Brid. — *Plagiothecium denticulatum* var. *obtusifolium*.
Dicks. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *inundatum*.
Hook. — *Rhynchostegium*.

obtusum Vill. — *H. stramineum*.

obtusulum Mitt. — *Amblystegium*.

occidentale Sull. et Lesq. in *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 105, t. 81 (1).

Ad arbor. — *Am. sept.*: Oregon.

occidentale Hpe. — *Brachythecium*.

ochraceum Turn. hb. et in Wils. *Bryol. brit.* p. 400; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 639 et II ed. p. 782.

Amblystegium ochraceum Lindb. *M. Scand.* p. 33.

Limnobia ochraceum *Bryol. eur.* VI (mon. *Suppl.* p. 2), t. 580.

Stereodon ochraceus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 42.

2. *Ad sax. et rup. irror. riv. frigid.* — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor.; e reg. mont. usq. in subalp. per tot. zon. interm. et sept., rariss. fructif. *As.*: Jenissei, Caucas. occ. *Am. sept.*: Groenland, fret. Davis, sin. Hudson, Labrador, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, lac. Super., Saskatchewan, M. Alb., Allegh., Catskill et Selkirk, Columb. brit., Alaska, Sitka, Washington, Oregon, Wyoming, reg. sept. et or.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 360.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 693, b et c, 844.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 452.

Un. itin. 1867, n. 9.

« var. *flaccidum* Milde.

— *Eur.*: Siles? *Am. sept.*: Washington, Oregon,

Montana.

ochron Schwaegr. — *Ectropothecium dealbatum*.

octodiceroideus C. M. — *Taxithelium*.

odontocalyx C. M. — *Stereophyllum*.

(1) « *An Pterigynandrum?* » Jaeg. *Ad.* II.

oedipodium Mitt. — Brachythecium.

oedistegum C. M. — Brachythecium.

oeneum Mitt. — Camptothecium.

Oldhami (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 595.

Stereodon Oldhami Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 154.

2. *Rupic.* — *As.* : Japon.

Olfersii Hsch. — Rhaphidostegium.

omalosekos W. et Dy. — Stereophyllum.

opacodon Sull. in *Proced. of the Am. Acad...* 1854 et in *U. St. Expl. Exped. Wilkes*, p. 14, t. 11.

— *Pac.* : Ins. Hawai.

orbiculare Hpe. — Amblystegium.

orbiculatum Mitt. — Pseudo-Leskea.

oreganum Sull. — Eurhynchium.

Ornellanum Mdo. *Moosst.* p. 109 (*fid. Jaeg. Ad. II*, p. 605) et *Bayern's Laubm.* p. 267.

Scleropodium Ornellanum Mdo. in *Ltz. Bryol. Notizb.* p. 69.

— *Eur.* : Alp. Algov., Tirol. merid.

omithopodioides { *Fl. Dan.* — *Isothecium myurum*.
Huds. — *Pterogonium gracile*.
L. — *Rhacopilum tomentosum*.
Scop. — *Neckera complanata*.

? *Orsinianum* (*de Not.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 566.

Amblystegium Orsinianum *de Not. Epil.* p. 141.

— *Eur.* : Apennin.

orthocarpon { Ångstr. — *Plagiothecium piliferum*.
Hsch. — *Plagiothecium orthocarpum*.
la Pyl. — *Cylindrothecium concinnum*.
Nees. — *Hypnodendron Reinwardti*.

orthocladon P. B. — Amblystegium.

orthorhynchum Brid. — Eurhynchium Stokesii.

orthothecioides Kindb. — *H. uncinatum* var. *orthothecioides*.

orthothecium { C. M. — *Trichosteleum*.
Schwaegr. — *Pylaisia secunda*.

oxycladon Brid. — Brachythecium.

oxyodon W. et Dy. — Ectropothecium.

oxypoma Schwaegr. — Microthamnium.

oxyrhynchum Dz. et Mk. — Brachythecium.

pachyneuron Tayl. — Eurhynchium Teesdalii.

pachypoma Schwaegr. — Amblystegium radicale

pachythecium Hpe. — Microthamnium.

pacificum C. M. — Ectropothecium.

Paivanum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Madeir.* n. 45.

— *Afr.* : Madeir.

palanense C. M. — Trichosteleum.

palatinum Neck. — Pterogonium gracile.

paleatum Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 286.

— *As.* : Borneo.

pallens W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Magell.* ; C. M. in *Fl.* 1885, p. 429.

Lignic. — *Am. merid.* : Patagon. austr. ? , Fuegia.

pallens W. et M. — Bryum.

pallescens (Hedw.) P. B. Prodr. p. 67.

H. cupressiforme var. *foliis angustioribus* Drumm. M. bor. am. I ed. n. 206 et 207.

H. pelitnochron Lobarz. in Haiding. Naturw. Abh. 1847, I, p. 51.

H. recurvans Brid. Bryol. univ. II, p. 614.

H. reptile Rich. in Mich. Fl. Am. bor. II, p. 315; Brid. op. cit. p. 525; C. M. Syn. II, p. 290; Bryol. eur. VI (mon. p. 18), t. 587; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 748.

Leskea hispidula Brid. Sp. M. p. 79.

L. pallescens Hedw. Sp. M. p. 219, t. 55, f. 1-6; Brid. op. cit. p. 319.

Stereodon pallescens Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1873, p. 254.

St. reptilis Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 180.

1 (false 2 in C. M.). Cortic., lignic. et rupic. — Eur.: Scand., Fenn., Dania, Boruss. occ., Francon., Thuring., Hercyn., Alp. Helvet., Tirol., Salisburg., Ross. or.; deest in Britann. As.: Japon., Jenissei super., Persia. Am. sept.: Vulg.: ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontar., lac. Super., Manitoba, Athabasca, Assiniboine, Columb. brit., reg. sept. et or.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 345.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 477.

Un. itin. 1864, p. 94.

« var. *protuberans* (Brid.) Par.

H. pallescens Bryol. eur. VI (mon. p. 17), t. 586; W. P. Sch. op. cit. p. 747.

H. reptile var. *protuberans* Lesq. et Jam. Man. p. 390.

H. Stereodon pallescens Brid. Bryol. univ. II, p. 612.

Stereodon pallescens var. *protuberans* Lindb. l. c.

1. Ad arb., praesert. Acer., lignic., rarius saxic. — Eur.: Silva nigr., Thuring., Hercyn., Sudet. As.: Saghalien, Jenissei sup., Caucas. occ. Am. sept.: New Brunswick, Gaspes.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 1196.

« var. *subjulaceum* (W. P. Sch.) Par.

H. perichaetiale Bryol. eur. VI (mon. p. 18), t. 588.

H. reptile var. *subjulaceum* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 619 et II ed. l. c.

Stereodon pallescens var. *perichaetialis* Lindb. l. c.

Rupic. — Eur.: Scand.

pallescens (1) } W. Arn. — Microthamnium.
Bryol. eur. — *H. pallescens* var. *protuberans*.

pallidifolium Mitt. — Rhynchostegium.

pallidirostrum A. Br. — Eurhynchium pumilum.

pallidius Hpe. — Rhynchostegium.

pallidum } Brid. — Hookeria albicans.

Hook. — Microthamnium reptans.

palmatum Sw. — Fissidens.

Paludella W. et M. — Paludella squarrosa.

paludosum } W. Arn. — Leskea polycarpa var. *paludosa*.
Sull. — Thuidium.

palustre L. Sp. pl. p. 1593; C. M. Syn. II, p. 424; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 634 et II ed. p. 772.

Amblystegium palustre Lindb. M. Scand. p. 33.

H. adnatum Turn. Muscol. Hibern. p. 165.

H. aquatile Mart. Fl. Erlang. crypt. p. 19, t. I, f. 4.

(1) *pallescens* Vill. Pl. Dauph. III, p. 909; Brid. Bryol. univ. II, p. 546; C. M. Syn. II, p. 509.

« An *Hylocomium brevirostre*? » Brid. l. c. — Delendum.

- H. fluviatile* Turn. op. cit.
H. heterophyllum Neck. Meth. M. p. 168.
H. heterophyllum aquaticum polycephalum repens Dill. Hist. M. p. 932, t. 37, f. 27 A.
H. luridum Hedw. M. frond. IV, p. 99, t. 38.
H. palustre γ *aquatile* C. M. l. c.
H. Stereodon palustris Brid. Bryol. univ. II, p. 639.
H. Stereodon palustris β *aquatilis* ej. l. c.
H. Stereodon palustris γ *ferrugineus* ej. l. c.
Limnobium palustre Bryol. eur. VI (mon. p. 2), t. 574.
Neckera palustris Willd. Prodr. fl. Berol. n. 943.
Stereodon palustris Mitt. M. Ind. or. p. 98.

l. Ad lign. et sax. secus rivul. mont. — *Eur.* : Tota. As. : Jenissei, Tibet. occ., Cauc. occ. et centr. *Am. sept.* : Anticosti, New Brunswick, Gaspes., Ontar., lac. Super., Assiniboine, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Idaho, New Jersey, Vermont, New York.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 195.

Mac. Canad. M. n. 356.

var. *fluviatile* Sw. — *Amblystegium*.

« var. *hamulosum* W. P. Sch. op. et l. cc.

Limnobium palustre var. *hamulosum* Bryol. eur. l. c. t. 575.

Ad lign. irror. — *Eur.* : In alpin. *Am. sept.* : M. Alb. et Rupestr., Utah.

« var. *julaceum* (Brid.) W. P. Sch. op. et l. cc.

H. intertextum Brid. Mant. M. p. 167.

H. intextum Voit. M. Herbip. p. 106.

H. neglectum C. M. Syn. II, p. 347.

H. ruderales var. *intricatum* Brid. Sp. M. II (in add.).

H. Stereodon intextus ej. Bryol. univ. II, p. 584.

H. St. neglectus ej. op. cit. p. 564?

Leskea palustris ej. Sp. M. II, p. 68 et Bryol. univ. II, p. 304.

Limnobium palustre ε *julaceum* Bryol. eur. l. c.

An rup. et sax. silic. saep. inund. — *Eur.* : Reg. montan. et subalp.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 393.

« var. *laxum* W. P. Sch. op. et l. cc.

Limnobium palustre var. *laxum* Bryol. eur. l. c.

Ut et ubi praeced.

var. *polare* Husn. — *H. polare*.

« var. *subsphaericarpon* (Schleich.) W. P. Sch. op. et l. cc.

Amblystegium palustre var. *subsphaericarpon* Lindb. l. c.

H. sphaerocarpon Spreng. Syst. veg. IV, p. 201.

H. subsphaericarpon Schleich. Cent. II Pl. Helv. n. 46.

H. Stereodon subsphaericarpon Brid. Bryol. univ. II, p. 641.

Limnobium palustre var. *subsphaericarpon* Bryol. eur. l. c.

Ad rup. irror. praecip. cataract. — *Eur.* : Reg. subalp. As. : Caucas. occ. et centr.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 550.

Un. itin. 1863, n. 40.

« var. *tenellum* W. P. Sch. Syn. II ed. p. 773.

H. Roësei ej. Coroll. p. 131.

Ad rup. granitic. — *Eur.* : Thuring.

- W. et M. — Aulacomnium.*
lutescens, etc. } Vill. — Amblystegium riparium ?
nigrescens, etc. }
erectum, coma lutea, basi nigricante Dill. — Brentelia
arcuata.
erectum, summitatibus aduncis Dill. (fid. C. M.). — H. adun-
cum.
erectum, summitatibus aduncis Dill. (fid. C. M. et W. P.
Sch.). — H. cuspidatum.
erectum trichodes, ramulis crebris, luteo et rufo-virentibus
glabris Dill. — Camptothecium nitens.
extremitatibus cuspidatis et pungentibus Dill. — H. cuspi-
datum.

- Pampae C. M. — Rhynchostegium.*
panduraefolium C. M. — Porotrichum.
papillatum } Harv. — Trichosteleum.
} Sull. — Trichosteleum stigmatosum.
papillosissimum Hpe. — Rhaphidostegium.
papillosum Hsch. — Trichosteleum.
paradoxum } H. f. et W. — Brachythecium.
} Mont. — Cyandrothecium concinnum.
paraphysale } C. M. — Hylocomium macrocarpum.
} Hpe. — Microthamnium.
paramattense Hpe. et C. M. — Rhynchostegium.
parietinum } L. — Hylocomium splendens.
} L. — H. Schreberi.
} Murr. — Thuidium tamariscinum.
var. elongatum Lindb. — H. Schreberi var. elongatum.
var. laevigatum Lindb. — H. Schreberi var. laevigatum.
parvifolium C. M. — Thuidium involvens.
parvulum C. M. — Clasmatomodon.
passaicense L. et J. — Plagiothecium.
patale H. f. et W. — H. chrysogaster.
patens Hook. — Meteorium.
Patientia Lindb. — H. arcuatum.
Patrisiae Brid. — Crossomitrium.
patulum } C. M. — Meteorium tovariense.
} Hpe. — Rhynchostegium.
} Sw. — Meteorium.
paulense Geh. et Hpe. — Ectropothecium.
pauperum C. M. — Thuidium.
Pechueli C. M. — Rhaphidostegium ?
Peckii Aust. — H. aduncum var. plumulosum.
pectinatum Mitt. — Rhynchostegium.
pedunculatum (Mitt.) Par.

Acanthocladium pedunculatum Mitt. in Proc. of the Linn. Soc. of N. S.
Wales, 1882, p. 102.

— Pac. : Nov. Hebrid. (Aneitum).

- pelitnochoon Lob. — H. pallescens.*
pellucidum } Dz. et Mk. — Rhynchostegium javanicum.
} Wils. — H. vernicosum.
pendulinum Besch. — Microthamnium.
pendulum Rehm. M. Afr. austr. n. 404.
— Afr. : C. B. Sp.
pendulum } C. M. — Eurhynchium.
} P. B. — Pilotrichella mollis.

- pennaeforme* Thbg. — Hypopterygium.
 Dicks. — Neckera pumila.
 Hall. — Neckera.
aquaticum lucens, longis latisque foliis Dill. — Pterygophyllum lucens.
compressum et splendens, capsulis ovatis Dill. — Neckera complanata.
ornithopodioides, pinnulis pellucidis Dill. — Rhacopilum tomentosum.
pennatum *trichomanoides, splendens, ramosum* Dill. — Homalia trichomanoides.
undulatum crispum, setis et capsulis brevibus Dill. — Neckera crispa.
undulatum crispum, setis et capsulis brevibus var. minor N. pumila.
undulatum, Lycopodii instar sparsum Dill. — Plagiothecium undulatum.
pensilvanicum Poir. — Cyllindrothecium compressum.
pentastichum W. Arn. — Pilotrichella imbricata.
perangustum C. M. — Ectropothecium.
percircinale C. M. — Rhaphidostegium.
perichaetiale Bryol. eur. — H. pallescens var. subjulaceum.
perintricatum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 293.*
 — Afr. : M. Cameroon.
perplanicaule C. M. l. c. n. 704.
 — Afr. : M. Cameroon.
perscissum C. M. — Thuidium.
persistens C. M. — Thuidium.
perspicuum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 582.
 Stereodon perspicuus Mitt. M. Ind. or. p. 96.
 1. — As. : Sikkim.
perspicuum Hpe. — Microthamnium thelistegum.
 var. *molle* Hpe. — Microthamnium thelistegum var. *molle*.
 var. *teres* Hpe. — Microthamnium thelistegum var. *teres*.
peruvianum Mont. — Stereophyllum.
Pervilleanum W. P. Sch. — Rhaphidostegium.
pervirens C. M. — Helicodontium.
perciride Angstr. — Ectropothecium.
petraeum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 668.*
 — Afr. : M. Cameroon.
petraeum Boul. — H. procerrimum.
petrophilum Weinm. — Brachythecium populeum var. *rufescens*.
Philippianum C. M. — Homalothecium.
philippinense Duby. — Rhynchostegium.
phleoides Desv. — Pilotrichella.
phaeniceum C. M. — Rhaphidostegium.
phryscophyllum W. Arn. — Hookeria aurea.
Phyllogonium C. M. — Acrocladium politum.
phyllorhizans P. B. — H. cordifolium.
physaophyllos W. et Dy. — Isothecium.
Pickeringii Sull. — Sematophyllum.
piliferum Schreb. — Eurhynchium.
 var. *alpina* Brid. — Brachythecium cirrosum.
pilosulum Mitt. — Leptohymenium.

- pinetorum* Jaeg. — *Rozea pterogonioides*.
piniforme C. M. — *Porotrichum*.
pinnatifidum { Mac. — *Camptothecium Nuttallii*.
 Sull. — *Camptothecium*.
pinnatulum Hpe. — *Thuidium*.
pinnatum Lam. — *Hylocomium splendens*.
pinnicaule C. M. — *Rhynchostegium*.
piriforme W. et M. — *Leptobryum*.
planifolium Brid. { (fid. C. M.) — *Plagiothecium silesiacum*.
 (fid. Lindb.) — *Plagiothecium elegans*.
planiusculum Mitt. — *Rhynchostegium*.
planum Brid. — *Taxithelium*.
 var. acuminulatum C. M. — *Taxithelium planum var. acuminulatum*.
 var. flavescens Brid. — *Taxithelium planum var. flavescens*.
 var. instratum Schwaegr. — *Trichosteleum*.
platyacron C. M. — *Sematophyllum*.
plicatile (Mitt.) Lesq. et Jam. Man. p. 394 (1).
 H. Bourgaeum Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 525.
 Stereodon plicatilis Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 40.
 2. Rupic. — Am. sept. : Fret. Davis, Alberta, Saskatchewan. M.
 Rupestr., Columb. brit., Montana, Calif.
 Exs. : Mac. Canad. M. n. 342.
plicatulum (Lindb.) Jaeg. Ad. II, p. 580.
 Stereodon plicatulus Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 254.
 2. Lignic. — As. : Amour, Saghalien, Jenissei med. et inf.
plicatum Schleich. — *Ptychodium*.
plintophilum C. M. — *Microthamnium*.
plumaeforme Wils. in Lond. Journ. of. bot. 1848, p. 277, t. 10 ; C. M. Syn. II, p. 297.
 H. Rodgersianum Sull. et Lesq. in Proced. of the Am. Acad... 1859, p. 280 (fid. Mitt.).
 Stereodon plumaeformis Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1864, p. 154.
 2. Ad. rup. et terr. — As. : Japon., ins. Loo-Choo, Chin. or.
plumosiforme W. P. Sch. *Brachythecium*.
 { Brid., C. M. — *Brachythecium salebrosum*.
plumosum { Hedw. p.p. } *Brachythecium glareosum*.
 { Mitt. p.p. — *Brachythecium salebrosum*.
 { Mitt. p.p. — *Brachythecium duriusculum*.
 Schwaegr. — *Brachythecium*.
 Sull. — *Brachythecium tarapense*.
 Sw. — *H. incurvatum*.
 « *var. salebrosum* { C. M. — *Brachythecium*.
 C. M. — *Brachythecium oedistegum* (fid. Mitt.).
 « *var. turgidum* Lindb. — *Brachythecium salebrosum var. turgidum*.
Plumularia C. M. — *Trichosteleum*.
plumulosum { Dz. et Mk. — *Thuidium*.
 { C. M. p.p. — *Thuidium Meyenianum*.
 { C. M. ? — *Thuidium trachypodium*.
pohliaecarpum S. et L. — *Isopterygium*.
polare Lindb. in Oefv... XIII, p. 350 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 780.
 Amblystegium polare Lindb. M. Scand. p. 33.

(1) Cf. *H. Watsoni*.

H. palustre var. *polare* Husn. *Musc. gall.* p. 411, t. 119, f. 13.

Ster. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor., Lappon.,
Finmarck., Alp. gall., Pyren. *Am. sept.* : Groenland.

politum H. f. et W. — *Acrocladium*.

polyandrum Ångstr. — *Ectropothecium*.

polyanthos (1) Engl. Bot. — *H. cupressiforme* var. *resupinatum*.

polyanthum Schreb. — *Pylaisia polyantha*.

var. *pallidifolium* C. M. — *Pylaisia heteromalla*.

polycarpum { Bland. { — *H. aduncum* var. *polycarpum*.
 { — *H. filicinum*.
 Hoffm. — *Leskea*.

var. *exile* C. M. — *Leskea polycarpa* var. *exilis*.

polycephalum Neck. — *Cryphaea heteromalla*.

polychaeton *Bryol. jav.* II, p. 154, t. 253.

2. — *As.* : M. Java.

polygamum W. P. Sch. *Coroll.* p. 131 et *op. cit.* p. 726.

Amblystegium polygamum *Bryol. eur.* VI (mon. p.), t. 572.

H. nodiflorum Wils. mss.

H. stagnatum ej. mss.

H. stellatum Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 184 p.p.

Syn. In prat. uligin. inq. aren. aquos. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor.,
reg. sept. et intermed. *As.* : Japon., Jenissei inf. et med. *Am. sept.* :
Groenland, Labrador, Terr. nov., ins. Miquel., Massachus., New
Jersey, Ontar., Wisconsin, Washington, Columb. brit. *Pac.* : Nov.
Zeland.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 755, 1000.

Savatier. Pl. Jap. n. 715 p.p.

Un. itin. 1867, n. 15.

“ var. *brevicuspis* (Lindb.) Par.

Amblystegium polygamum var. *brevicuspis* Lindb. in Broth. *Enum. M.*
Cauc. p. 104.

— *As.* : Caucas.

“ var. *fallaciosum* (Jur.) Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 25.

Amblystegium fallaciosum Lindb. l. c.

H. fallaciosum Jur. in Rab. *Bryoth. eur.* n. 647.

— *Eur.* : Ubi typ. *Am. sept.* : Wyoming.

“ var. *longinerve* Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

— *Am. sept.* : Vancouver.

“ var. *minus* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 404 et II ed. l. c.

Amblystegium polygamum var. *minus* *Bryol. eur.* l. c.

Ut et ubi typ. in *Eur.*

polymorphum { H. et T. — *H. chrysophyllum*
 { Turn. — *H. Elodes*.
 { Wils. — *H. Sommerfeldti*.

var. *chrysophyllum* *Bryol. eur.* — *H. chrysophyllum* var. *tenellum*.

var. *minus* Sull. — *H. chrysophyllum* var. *tenellum*?

polypodioides Sw. — *Fissidens*.

polyrhizon Brid. — *Brachythecium plumosum*.

polysetum Bland. — *Brachythecium populeum*.

(1) *polyanthos* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 541 ; C. M. *Syn.* II, p. 508.

H. confertum P. B. *Prodr.* p. 62.

Quid ? Delendum.

- polystictum* } H. f. et W. — Taxithelium.
 } Mitt. — Eurhynchium.
polytrichoides Hedw. — Lepidopilum.
Poeppigianum Hpe. — Ectropothecium vesiculare.
populeum } Drumm. — Brachythecium reflexum.
 } Hedw. — Brachythecium.
 var. *erythropodium* Brid. — Brachythecium populeum.
 var. *nutans* Brid. — Brachythecium populeum.
Porotrichum C. M. — Porotrichum longirostre.
porphyrhizon Lindb. — Amblystegium.
porrectirameum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 3.*
 — *Afr.* : M. Cameroon.
porrigens Wils. — Thuidium scitum.
porto-ricense Balb. — Helicodontium capillare.
Powellianum C. M. — Trichosteleum samoanum.
praecox Sw. — Eurhynchium strigosum var. imbricatum.
praegracile (Mitt.) Jaeg. *Ad. II, p. 595.*
Ctenidium praegracile Mitt. *M. austr. am. p. 510.*
 — *Am. merid.* : And. Quitens.
praelongum { C. M. p.p. — Eurhynchium hians.
 } L. — Eurhynchium.
 } Turn. — Eurhynchium Stokesii.
 var. *abbreviatum* Brid. — Eurhynchium.
 var. *atro-virens* Brid. — Eurhynchium praelongum var. atro-virens.
 var. *Clarionis* Brid. — Eurhynchium praelongum.
 var. *filescens* Brid. — Eurhynchium striatulum.
 var. *orthorhynchum* Brid. — Eurhynchium Stokesii.
 var. *pallidirostrum* Brid. — Eurhynchium pumilum.
 var. *scariosum* C. M. p.p. { — Eurhynchium praelongum var. atrovi-
 } rens.
 } — Eurhynchium speciosum.
 var. *speciosum* Brid. — Eurhynchium speciosum.
 var. *Stokesii* Brid. — Eurhynchium.
 var. *Sull.* — Eurhynchium Sullivantii.
prasophyllum Hpe. — Brachythecium.
pratense Koch in *Brid. Bryol. univ. II, p. 769* ; *Bryol. eur. VI (mon.*
p. 43), t. 611 ; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 759.*
H. amœnum Hook. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 196 p.p.*
H. cupressiforme var. *complanatum* Hpe. *Veg. cell. Hercyn. exs. n. 96.*
H. curvifolium C. M. *II, p. 293 p.p.*
Isopterygium pratense Lindb. *M. Scand. p. 39.*
 2. vel ps. 1. In pratis uligin. — *Eur.* : Spitzberg, Lappon., Scandin.,
 German. fere tota, Siles., vall. Rhen. ; ♀ deest in Brit. As. : Japon.
Am. sept. : Groenland, Terr. nov., *Nov. Angl.*, New Jersey, Pen-
 silv., New Brunswick, Minnesota, Columb. brit, Vancouver,
 Indiana, Illinois, Wisconsin, Florid.
Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 178 p.p., 214.
 Mac. Canad. M. n. 354.
 Rab. Bryoth. eur. n. 394, 761, 1049.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 484.
 var. *hamatum* W. P. Sch. — *H. arcuatum.*
Preverianum Saut. in *sched.* ; *Jaeg. Ad. II, p. 560.*
H. chrysophyllum var. *subnivale* Mdo. *Moosst. p. 99.*
 — *Eur.* : Alp. Algov., Carinth., Salisburg.

- Preussii* Broth. — *Brachythecium*.
prionophyllum C. M. — *Pseudo-Leskea*.
pristocalyx C. M. — *Thuidium*.
procerrimum Mdo. in *Fl.* 1866 (*nom.*); W. P. Sch. *op. cit.* p. 764.
Ctenidium procerrimum Lindb.
H. petraeum Boul.
 2. Ad sax. praecip. calcar. — *Eur.*: Norveg. (Dovre), Alp. Helv., Tirol., Rhaet., Stir. As.: *Caucas. centr.*
Ex.: Rab. Bryoth. eur. n. 907.
procerum C. M. — *Sematophyllum*.
procumbens Mitt. — *Brachythecium*.
proliferum { Drumm. — *Thuidium delicatulum*.
 { L. — *Thuidium tamariscinum*.
 { L. — *Hylocomium splendens*.
 « var. *compactum* { Drumm. (fid. Kindb.) — *Thuidium recognitum*.
 { Drumm. (fid. Mitt.) — *Thuidium quadrifarum*.
 « var. *umbratum* Wahlenb. — *Hylocomium*.
prolixum { Dicks. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *prolixum*.
 { Vill. — *H. filicinum*.
propinquum Harv. — *Rhaphidostegium*.
proreptile C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 217.
 — *Afr.*: M. Cameroon.
prostratum { C. M. — *Stereophyllum tavoyense*.
 { Dz. et Mk. — *Trichosteleum*.
protensum (W. P. Sch.) Par.
Limnobia protensum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1710.
 — *Am. merid.*: And. Boliv.
protensum { Brid. — *H. stellatum* var. *protensum*.
 { Rich. — *Thuidium delicatulum*.
protractulum C. M. — *Microthamnium*.
pseudo-amœnum Bel. — *Trichosteleum*.
pseudo-arcticum Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club. XVII*, p. 280 et in *Mac. Cat.* p. 242.
 1. Ad lapid. in rivul. — *Am. sept.*: Columb. brit.
pseudo-attenuatum C. M. — *Anomodon*.
pseudo-brachythecium (C. M.) Par.
Heterophyllum pseudo-brachythecium C. M. in *Dusen M. Camer. n.* A 8.
 — *Afr.*: M. Cameroon.
pseudo-callidum C. M. — *Rhaphidostegium xylophilum*.
pseudo-commutatum la Pyl. — *Hyocomium flagellare*.
pseudo-confertum C. M. — *Rhynchostegium*.
pseudo-cupressiforme C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 13.
 2. Lignic. — *Afr.*: Madeir., Teneriff.
pseudo-delicatulum { C. M. — *Thuidium*.
 { Raddi. — *Eurhynchium Stokesii*.
pseudo-Drepanium C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (*nom.*) et in *Mac. Cat.* p. 240.
 2. Ster. Lignic. — *Am. sept.*: Ontario.
pseudo-fastigiatum C. M. et Kindb. in *op. cc.* pp. 424 et 235.
 2. Ad rad. arb. — *Am. sept.*: Ontario, Columb. brit.

pseudo-homomallum C. M. — *Pylaisia* ?

pseudo-involvens C. M. — *Thuidium*.

pseudo-laetum C. M. — *Brachythecium*.

pseudo-lutescens Hpe. — *Camptothecium*.

pseudo-montanum *Kindb. in Mac. Cat. p. 243.*

1. *Rupic.* — *Am. sept.* : Ontario.

Exs. : *Mac. Canad. M. n. 539.*

pseudo-murale Hpe. — *Rhynchostegium*.

pseudo-piliferum Hpe. — *Eurhynchium*.

pseudo-planum Hpe. — *Trichosteleum*.

pseudo-plumosum { *Brid.* — *Brachythecium plumosum*.

{ *C. M. p.p.* — *Thelia asprella*.

{ *Mont.* — *Brachythecium cœdistegum* ?

var. asperulum *Brid.* — *Brachythecium plumosum*.

var. polyrhizon *Brid.* — *Brachythecium plumosum*.

pseudo-populeum *W. P. Sch.* — *Brachythecium*.

pseudo-pratense *Kindb. in Mac. Cat. p. 239.*

2. *Lignic.* — *Am. sept.* : Ontario.

pseudo-protensum C. M. — *Thuidium*

pseudo-recognitum Hpe. — *Thuidium acuminatum*.

pseudo-reptans C. M. — *Microthamnium*.

pseudo-rufescens Hpe. — *Sematophyllum*.

pseudo-rutabulum Hpe. — *Brachythecium*.

pseudo-salebrosum Hpe. — *Homalothecium Bonplandii*.

pseudo-sericeum { *C. M.* — *Homalothecium*.

{ *Mac.* — *Camptothecium nevadense*.

pseudo-silesiacum *L. et J.* — *Plagiothecium*.

pseudo-stramineum *C. M. mss.* ; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 736.*

Amblystegium pseudo-stramineum *Lindb. M. Scand. p. 33.*

H. aduncum var. pseudo-stramineum *Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893.*

H. fluitans var. pseudo-stramineum *Milde Bryol. Siles.*

H. sudeticum *W. P. Sch. mss.*

1. In palud. silvat. — *Eur.* : *Scandin.*, *Sudet.*, *Saxon.*, *Gall. centr.*
(*Arvern.*). *Am. sept.* : *Wyoming.*

Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 848.*

pseudo-stramineum Hpe. — *H. stramineoides*.

pseudo-striatum C. M. — *Eurhynchium*.

pseudo-tanytrichum *Bryol. jav. II, p. 150, t. 248.*

H. Hornschuchii *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 307.*

2. In silv. — *As.* : *M. Java.*

pseudo-Teesdalii Hpe. — *Rhynchostegium*.

pseudo-triste C. M. — *Leskea*.

pseudo-uncinatum Hpe. in *Linn. 1859, p. 639.*

H. uncinatum (*fid. Mit.*).

— *Pac.* : *Alp. Austral. fel.*

pseudo-velutinum Hpe. — *Brachythecium*.

psilocaulon *Card.* — *H. aduncum*.

pterogonioides C. M. — *Rozea*.

ptychocarpon *Schwaegr.* — *Ptychomium*.

pubescens *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 113, t. 91, f. 3 et*
Handb. p. 475.

2.

— *Pac.* : *Nov. Zeland.*

- Puiggarii* Geh. et Hpe. — *Microthamnium*.
pulchellum { Brid. — *Plagiothecium nitidulum*.
 Br. et Sch. — *Plagiothecium Mühlenbeckii*.
 Dicks. — *Plagiothecium*.
 Hedw. — *Eurhynchium strigosum*.
 Mac. p.p. — *Plagiothecium piliferum*.
 var. *nitidulum* L. et J. — *Plagiothecium nitidulum*.
pulchrum { Drumm. p.p. — *Brachythecium acuminatum*.
 Hook. — *Hypnum Haldanianum*.
pulvinale Hpe. — *Rhaphidostegium*.
pulvinatum H. f. et W. — *Camptochaete*.
pumilum { Gmel. — *Neckera*.
 Wils. — *Eurhynchium*.
punctatulum C. M. — *Rhaphidostegium*.
punctatum Schrank. — *Mnium*.
punctulatum { Bals. et de Not. — *Thuidium*.
 Harv. — *Trichosteleum*.
pungens Hedw. — *Sematophyllum*.
pungifolium Hpe. — *Sematophyllum*.
purpureum Geh. et Hpe. — *Thuidium*.
purum L. *Sp. pl.* p. 1594; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 425; *C. M. Syn.* II, p. 379; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 52), t. 379; *W. P. Sch. op. cit.* p. 791.
H. cupressiforme, vulgare, foliis obtusis *Dill. Hist. M.* p. 309, t. 40, f. 45.
H. elegans *Ehrh. Crypt. exs. n.* 242.
H. illecebrum L. *Fl. Suec. n.* 1032.
H. purum β *illecebrum* *Brid. M. Rec.* II, II, p. 91 et *Bryol. univ.* II, p. 427; *C. M. l. c.*
Pleurozium purum *Kindb. Check-List of Eur. a. N. Amer. M.* p. 19.
 2. Terr. in umbros., ad marg. silv. — *Eur.*: Reg. campestr. tota.
As.: Japon., Caucas. centr. et or. *Afr.*: Alger., ins. S. Helen.
 (indig. ?), ins. Azores. — *Am. sept.*: Ins. Miquelon.
Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 494.
purum *Ehrh.* — *H. Schreberi*.
 var. *illecebrum* *Brid.* — *H. purum*.
 var. β *Huds.* — *H. Schreberi*.
pusillum *Hsch.* — *Trichosteleum*.
pynodontium C. M. — *Ectropothecium*.
pynophyllum C. M. — *Sematophyllum*.
pynopteron C. M. — *Plagiothecium*.
pynothecium C. M. *in sched.*; *Jaeg. Ad.* II, p. 585.
 — *As.*: Sikkim.
pygmaeum (1) { C. M. — *Isopterygium tenerum*.
 Sull. — *Thuidium*.
pyrenaicum *Spr.* — *Hylocomium Oakesii*.
pyrrhophyllum C. M. — *Rhaphidostegium fulvum*.
quadrangulare *Schwaegr.* — *Pilotrichella longipes*.
quitense *Mitt.* — *Pilotrichella*.
Rabenhorsti *Mdo. in sched.* 1864 (2).
 — *Eur.*: Tirol. merid.
Raddianum *Brid.* — *Cryphaea*.

(1) *pygmaeum* *Vill. Pl. Dauph.* III, p. 909; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 546; *C. M. Syn.* II, p. 509.

* An *Leskea nervosa*? » *Brid. l. c.* — *Delendum*.

(2) * An *H. revolvantis* var.? » *Jaeg. l. c.*

? radiatum *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 204; C. M. Syn. II, p. 250.*

Isothecium radiatum *Brid. Bryol. univ. II, p. 358.*

— *Afr.* : Ins. Borbon.

radicale { *Drumm.* — *Amblystegium porphyron.*
 Hsch. — *Rhynchostegium tenuifolium.*
 P. B. — *Amblystegium radicale.*

radicans *Brid.* — *Isopterygium.*

radicosum *Mitt.* — *Pseudo-Leskea congesta.*

radiculosulum *C. M.* — *Stereophyllum.*

radiculosum *C. M.* — *Stereophyllum.*

ramicola *Hpe.* — *Sematophyllum.*

ramulosum *C. H.* — *Thuidium.*

Ravaudi *Boulay Fl. crypt. de l'Est... 1872, p.* ; *W. P. Sch. op. cit. p. 763.*

H. fastigiatum var. *Ravaudi* *Husn. Muscol. gall. p. 400, t. 115, ff. 1-8.*

2. *Rupic.* — *Eur.* : Alp. Delphinat.

recognitum { *Hpe.* — *Thuidium hastatum.*
 Hedw. — *Thuidium.*
 Wils. p.p. — *Thuidium quadrifarum.*

recurvans { *Brid.* — *H. pallescens.*
 Schwaegr. — *Rhaphidostegium.*

var. *Sull.* — *Rhaphidostegium.*

recurvatum (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Stereodon recurvatus *L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 149.*

1. — *As.* : *Jenissei.*

recurvulum (*Hpe.*) *Par.*

Orontobryum recurvulum *Hpe. in sched.*

— *As.* : *Bhotan.*

reduncum *W. P. Sch. in Lechler Pl. Peruv. n. 3103 et 3108.*

Ctenidium reduncum *Mitt. M. austr. p. 509.*

Ster. — *Am. merid.* : *And. Peruv.*

reflexum { *C. M. p.p.* — *Pseudo-Leskea congesta.*
 W. et M. — *Brachythecium.*

Regnellii *Hpe.* — *Eurhynchium clinocarpum.*

regulare *C. M.* — *Ectropothecium.*

Reichenbachianum *Ltz. Moosst. p. 167.*

1. — *Am. sept.* : *Mexic.*

Reichenbachianum *Hüb.* — *Eurhynchium velutinoides.*

Reichhardtii *Rehm. M. Afr. austr. n. 402.*

— *Afr.* : *Austr.*

Reinwardti { *C. M.* — *Hypnodendron.*
 Sull. — *Hypnodendron subspininervium.*

relaxum *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 110, t. 90, f. 1 et*
Handb. p. 479.

2. — *Pac.* : *Nov. Zeland. sept. et med.*

remotifolium { *H. f. et W. (fid. Jaeg.).* — *Eurhynchium asperifolium.*
 Grev. — *Thuidium.*
 Mitt. — *Eurhynchium clinocarpum.*

Renauldi *Kindb. in Bidr. p. 452 (nom.) et in Mac. Cat. p. 238.*

2. *Rupic. et terr.* — *Am. sept.* : *Terr. nov., New Brunswick, Gaspes.,*
Ontar., Columb. brit.

renitens Wils. in sched.

Stereodon renitens Mitt. M. Ind. or. p. 94.

1. Cortic. — As.: Sikkim.

Hook. et Grev. — Hookeria guadalupensis.

(fid. Bryol. eur.). — Plagiothecium silesiacum.

Poll. (fid. C. M.). — Amblystegium serpens.

(fid. Lindb.). gen. monotyp. — **Dolichotheca**.

crispum, cupressiforme, minus et foliolis magis confertis Dill. --

H. cupressiforme.

crispum, cupressiforme, minus et foliolis minus confertis Dill. —

H. cupressiforme var. filiforme.

repens { *filicinum crispum* Dill. — H. commutatum.

filicinum plumosum Dill. — Brachythecium salebrosum.

filicinum trichodes palustre Dill. — H. filicinum var. trichodes.

triangularibus parvis foliis, praelongum Dill. — Eurhynchium Stokesii.

triangularibus foliis reflexis, majus Dill. — Hylocomium squarrosum.

trichodes, arboreum majus, cauliculis ramosis Dill. — Anomodon attenuatus.

replicatum Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 279.

1. — As.: Ceylan.

reptans { C. M. p.p. — Microthamnium andicola.

Hsch. — Microthamnium thelistegum.

Sw. — Microthamnium.

reptile Rich. — H. pallescens.

var. *protuberans* L. et J. — H. pallescens var. *protuberans*.

var. *subjulaceum* W. P. Sch. — H. pallescens var. *subjulaceum*.

reptiliforme de Not. Epil. p. 162.

— Eur.: Alp. centr. (M. S. Bernard. min.).

restitutum Hpe. — Rhaphidostegium.

resupinatum { Tayl. — Pylaisia heteromalla.

Wils. — H. cupressiforme var. *resupinatum*.

reticulatum { Dz. et Mk. — Ectropothecium.

Duby. — Ectropothecium Dubyanum.

H. f. et W. — Rhizogonium.

retroflexum Hook. — H. glaucocarpum.

revolutum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 585.

H. Heufleri Jur. in Abh. K.K. zool. bot. Ges. in Wien, 1861; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 760; Rab. Bryoth. eur. n. 694, 909, 1199; Un. it n. 1863, n. 47, 49.

H. Watsoni (fid. Austin).

Stereodon revolutus Mitt. M. Ind. or. p. 97.

Ster. Lignic. et rupic., in silv. abiegn. et betul. — Eur.: Spitzberg,

Scandin., Alp. Transilv., Carinth., Tirol. merid., Rhaet., Vall. Tel-

lin., Alp. Delphinat., Pyren. As.: Alatau, Caucas., Tibet. occ.

Am. sept.: Groenland, M. Rupestr., Wyoming, Montana.

* var. Villardi Ren. et Card. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.

Ad rup. humid. — Am. sept.: Montana.

revolvens Sw. M. Suec. p. 38, t. 7, f. 14; C. M. Syn. II, p. 323 (excl. syn. Hartm.); Bryol. eur. VI (mon. p. 32), t. 601; W. P. Sch. op. cit. p. 736.

Amblystegium revolvens de Not. Briol. ital. p. 140.

A. intermedium β *revolvens* Sanio in *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 118 (1).

H. ambiguum Schrad. (fid. C. M.; cf. *Brid. op. cit.* pp. 603 et 624).

H. Stereodon aduncus ε *revolvens* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 625.

1. In paludib. profund. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor., zon. septentr. tota; reg. montan., subalp. et alp. zon. intermed.; in Alp. merid. sterile. *As.* : Penins. Samoied. et Tschutschica, Jenissei, verosim. artica tota. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, Gaspes., lac. Super., M. Rupestr., Alaska, Ohio sept. *Am. merid.* : Antart. (fid. C. M.).

Ews. : Mac. Canad. M. n. 387.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 996.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 464 (*H. intermedium* Lindb. fid. Ren.).

Un. itin. 1864, n. 61; 1867, n. 30.

var. *intermedium* L. et J. — *H. Cossoni*.

rhapidorhynchum C. M. — *Rhynchostegium*.

rhapidostegum C. M. — *Thuidium*.

rhizophyllum C. M. — *Trichosteleum*.

Rhizophoreti C. M. — *Trichosteleum*.

Richardi Schwaegr. — *Rhapidostegium subsimplex*.

Richardsoni (Mitt.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 404.

Amblystegium Richardsoni Lindb. *M. Scand.* p. 34.

H. Breidleri Jur. in *Hedwig.* 1875, p. 182; *W. P. Sch. op. cit.* p. 786.

H. trifarium Drumm. *M. bor. am.* I ed. p. 211.

Stereodon Richardsoni Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 42.

1. Paludic. — *Eur.* : Norveg. sept., Alp. Stir. *As.* : Jenissei. *Am. sept.* : Groenland, New Brunswick, Ontario, Saskatchewan.

« var. *robustum* (Lindb. et Arn.) Par.

Amblystegium Richardsoni var. *robustum* L. et A. *M. As. bor.* 1890, II, p. 125.

— *As.* : Jenissei infer.

rigidissimum C. M. — *Eurhynchium*.

rigidiusculum Bland. — *Eurhynchium Stokesii*.

rigidulum Br. — *Rhynchostegium curvisetum*.

rigidum } Hsch. et Reinw. — *Sematophyllum*.
 } Schwaegr. — *Hookeria*.

var. *Braunianum* Bryol. jav. — *Sematophyllum rigidum* var. *Braunianum*.

var. *convolutum* Bryol. jav. — *Sematophyllum rigidum* var. *convolutum*.

riparioides Hedw. — *Rhynchostegium rusciforme*.

var. *speciosum* Schwaegr. — *Eurhynchium*.

riparium L. — *Amblystegium*.

var. *homomallum*

var. *oligophyllum*

var. *pallidum*

var. *trichopodium* Brid. — *Amblystegium riparium* var. *trichopodium*.

var. Schwaegr. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *longinerve*?

ripicolum C. M. in sched.; Jaeg. *Ad.* II, p. 753.

— *As.* : Sikkim.

rivale Hpe. — *Rhynchostegium*.

rivicola Mitt. — *Amblystegium*.

(1) Formae : *brunneum*, *fuscum*, *violascens*.

- rivulare* { Brid. — *Brachythecium albicans*.
 Br. — *Brachythecium*.
 Ehrh. — *Rhynchostegium rusciforme*.
 var. *Novae Brunsviciae* Kindb. — *Brachythecium rivulare* var. *obtusulum*.
rivularioides C. M. — *Brachythecium*.
rivulorum S. et L. — *H. montanum*.
Robillardii Duby. — *Leucomium*.
robuste-pinnatum Hpe. — *Ectropothecium*.
robustum Hook. — *Hylocomium*.
Rodgersianum S. et L. — *H. plumaeforme*?
Roëseanum Hpe. — *Plagiothecium*.
Roësii W. P. Sch. — *H. palustre* var. *tenellum*.
roseum W. et M. — *Rhodobryum*.
rostratum { C. M. — *Anomodon*.
 W. et M. — *Mnium*.
Rotae de Not. — *H. exannulatum* var. *Rotae*.
rotulatum P. B. — *Hypopterygium*.
rotundatum Hpe. — *Homalia*.
rotundifolium { Dicks. — *Rhynchostegium confertum*.
 Scop. — *Rhynchostegium*.
rotundifrondeum C. M. — *Porotrichum*.
Royae Aust. — *Rhynchostegium* (1).
rubrum Vill. — *H. filicinum* var. *trichodes*.
ruderales C. M. — *Stereophyllum*.
 var. *intricatum* Brid. — *H. palustre* var. *julaceum*.
rufescens { Dicks. — *Orthothecium*.
 H. f. et W. — *Orthothecium chryseum*.
rufo-chryseum W. P. Sch. in *Savat. M. Jap. n.* 724; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 387.
 2. — As.: Japon.
Rügelii C. M. — *Anomodon apiculatus*.
rugisetum { Hpe. — *Eurhynchium clinocarpum*?
 Hpe. (mss., fid. C. M.) — *Trichosteleum*.
rugosum Ehrh. *Dec. n.* 291 (an L.?); C. M. *Syn. II*, p. 423; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 41), t. 610; W. P. Sch. *op. cit.* p. 745.
Hylocomium rugosum de Not. *Epil.*
H. lutescens crispum, *Lycopodii facie* Dill. *Hist. M.* p. 289, t. 37, f. 24 A.B.D.
H. rugulosum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 363; *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 198.
H. Stereodon rugosus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 633.
Rhytidium rugosum Kindb. *Laubm. Schw. und Norweg.*
 2. In apric. praecip. argill. et turfis. montan. exsicc., ad tecta stram.
 Eur.: Fere tota, rariss. fructif. As.: Yunnan, Amour, Ochotsk, Taimyr, Jenissei, Caucas. Am. sept.: Groenland, Labrador, sin. Hudson, Ontar., lac. Super., M. Rupestr., reg. sept.
 Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 485.
 Un. itin. 1867, n. 3.
rugosum W. et M. — *H. lycopodioides*.
rugulosum eor. — *H. rugosum*.
rupestre Schleich. — *H. alpestre*.
rupincolum P. B. — *Brachythecium acuminatum* var. *rupincolum*.
rurale Weiss. — *Barbula*.

(1) *rubricaule* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 542; C. M. *Syn. II*, p. 503.
 Ex ins. Melville. — Quid? Delendum?

- ruscifolium* Neck. }
 var. *rotundifolium* Sm. } — *Rhynchostegium rusciforme*.
rusciforme Weiss. }
 var. *alopescuroides* Brid. }
 var. *atlanticum* Brid. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *lutescens*.
 var. *flaccidum* } Brid. — *Rhynchostegium rusciforme*.
 var. *fontanum* }
 var. *inundatum* Brid. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *inundatum*.
 var. *longisetum* Brid. — *Rhynchostegium rusciforme*.
 var. *prolixum* Brid. — *Rhynchostegium rusciforme* var. *prolixum*.
 var. *rotundifolium* Brid. — *Rhynchostegium rusciforme*.
rutabuloides Brid. — *Rhynchostegium curvisetum*.
rutabulum { Drumm. — *Brachythecium rivulare*.
 { L. — *Brachythecium*.
 { Mac. — *Brachythecium platycladum*.
 var. *aureo-nitens* Brid. — *Brachythecium rutabulum*.
 var. *brevirostre* Brid. — *Hylocomium*.
 var. *campestre* C. M. — *Brachythecium*.
 var. *chrysostomum* Brid. — *Brachythecium plumosum*.
 var. *crenulaum* Brid. — *Brachythecium rutabulum*.
 var. *cuspidatum* Web. — *Eurhynchium striatum*.
 var. *explanatum* Brid. { (fid. C. M.). — *Brachythecium rutabulum*.
 { (fid. Lindb.). — *Brachythecium Starkii* var. *praelongum*.
 var. *exiguum* } Brid. — *Brachythecium rutabulum*.
 var. *flaccidum* }
 var. *flavescens* Brid? Hpe. } — *Brachythecium rivulare*.
 var. *laxifolium* Brid. }
 var. *longisetum* Brid. — *Brachythecium rivulare* var. *longisetum*.
 var. *piliferum* Leyss. — *Eurhynchium*.
 var. *ruscifolium* Web. } — *Rhynchostegium rusciforme*.
 var. *rusciforme* Lightf. }
 var. *tenerimum* Brid. — *Rhynchostegium curvisetum*.
 var. *virens* Turn. } — *Rhynchostegium rusciforme*.
 var. ♂ Huds. }
 var. ♂ H. f. et W. — *Brachythecium subpilosum*.
 var. Sm. — *Hylocomium brevirostrum*.

Rutenbergii C. M. — *Hylocomium*?

ruthenicum Weinm. — *Climacium*.

rutilans { C. M. — *Ectropothecium*.
 { Wils. — *Plagiothecium pulchellum*.

sabinaefolium Brid. — *Anomodon rostratus*.

sagittae-folium Voit. — *Hylocomium triquetrum*.

Saladinianum Neck. — *Forstroemia trichomitria*.

salaense Hpe. — *Rhaphidostegium*.

salebrosum { Drumm. p.p. } — *Brachythecium albicans*.
 { } — *Brachythecium laetum*.
 { Hoffm. — *Brachythecium*.
 { H. et T. — *Brachythecium glareosum*.
 { Sull. — *Brachythecium laetum* var. *dentatum*.

var. *apiculatum* Brid. — *Brachythecium salebrosum*.

var. *capillaceum* W. et M. — *Brachythecium salebrosum* var. *cylindricum*.

var. *paraphysigerum* Brid. — *Brachythecium salebrosum*.

var. *texanum* L. et J. — *Brachythecium salebrosum* var. *texanum*.

var. *Torreyanum* Brid. — *Brachythecium salebrosum*.

salicicola Spr. — *Eriodon*.

- salicinum* Spr. — *Eriodon salicicola*.
Salleanum Besch. — *Microthamnium*.
samoanum { C. M. — *Thuidium*.
 Mitt. — *Trichosteleum*.
sandwichense H. et W. Arn. — *Ectropothecium*.
saprobolax C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 186.
 lignic. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.
saproxylophilum C. M. — *Rhaphidostegium*.
sarmentosum *Wahlenb. Fl. Lapp. p.* 380 ; *Bryol. VI (mon. p.* 48), *t.* 619 ;
W. P. Sch. op. cit. p. 788.
Amblystegium sarmentosum de Not. Briol. ital. p. 135.
H. stramineum var. Sull. et L. M. bor. am. I ed. n. 311 b.
H. trifarium β *sarmentosum Rab. Deutsch. Krypt. Fl. II, p.* 290.
H. Stereodon stellatus $\pm$ *Terrae Novae Brid. Bryol. univ. II, p.* 603.
 2. In uligin. — *Eur.* : Alp. et subalp. reg. intern. et sept. : Spitzberg, Septem Insul., ins. Ursor., Scot., Cambrovall., Hibern., Sudet., Alp. omn. As. : Penins. Samojed. et Tschutschica, Jenissei inf. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, Terra nov., New Brunswick, Nov. Angl.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 363 p.p.
 Rab. Bryoth. eur. n. 760.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 461.
Sauteri *W. P. Sch. mss.* ; *C. M. Syn. II, p.* 685 ; *Bryol. eur. VI (mon. p.* 21), *t.* 685 ; *W. P. Sch. op. cit. p.* 750.
Stereodon fastigiatus β *Sauteri Lindb. M. Scand. p.* 38.
 1. Ad rup. calc. v. dolomit. madid. — *Eur.* : Norveg., Austr. inf., Salisburg., Francon., Tirol., Rhaet.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 500.
 Un itin. 1863, n. 87.
savaicum C. M. — *Ectropothecium*.
Savesianum C. M. — *Sematophyllum*.
saxatile { *Brid.* — *Brachythecium plumosum*.
 H. f. et W. — *Stereophyllum leucostegum*.
erectum ramulis teretibus, foliis subrotundis saturate viridibus
Dill. — *Encalypta streptocarpa*.
saxetorum *Mitt. M. Ind. or. p.* 84.
 1. — *As.* : ?
saxicola Voit. — *Brachythecium populeum*.
scaberulum Mont. — *Trichosteleum hamatum*.
scabrellum *Bryol. jav.* — *Sematophyllum*.
scabrifolium H. f. et W. — *Philonotis appressa*.
scabrisetum *Schwaegr.* — *Eurhynchium*.
scabrum { *Koch.* — *Eurhynchium praelongum var. atro-virens*.
 Mitt. — *Brachythecium*.
scalare { *A. Br.* — *Sematophyllum*.
 Zenk et Dietr. — *H. Crista castrensis*.
scariosifolium C. M. in *Act. Hort. Petrop. X, 1867, f.* 1.
Stereodon scariosifolius Broth. Enum. M. Cauc. p. 126.
 1. Ad arbor. — *Eur.* : Batoum.
scariosum Tayl. — *Rhynchostegium*.
scaturiginum *Brid.* — *Ectropothecium*.
Schiedeanum C. M. — *Thuidium*.

Schimperi Br. — *Rhynchostegium demissum*.

Schimperianum { Br. — *H. imponens*.
Ltz. — *H. molle* var. *Schimperianum*.

schistocalyx { C. M. — *Thuidium*.
Sull. — *Thuidium subinvolvens*.

sciureum Mitt. — *Homalothecium*.

Schlagintweitii Sendtn. — *Orthothecium* ?

Schleicheri { de Not. — *Rhynchostegium curvisetum*.
Hedw. f. — *Eurhynchium abbreviatum*.

var. *curvisetum* Schwaegr. — *Rhynchostegium*.

var. *obscurum* Brid. — *Rhynchostegium curvisetum* var. *longinerve* ?

Schlimii C. M. — *Rhaphidostegium*.

Schlosseri Sendtn. — *Rigodium*.

Schmidii C. M. — *Thamnium*.

Schraderi C. M. — *Plagiothecium*.

Schreberi Willd. *Prodr. fl. Berol. n.* 955 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 420 ;
C. M. *Syn. II*, p. 384 ; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 52), t. 620 ; W. P.
Sch. op. cit. p. 790.

Hylocomium parietinum Lindb. *M. Scand.* p. 37.

H. Schreberi de Not. *Briol. Ital.* p. 92.

Hypnum compressum Schreb. *Spic. fl. Lips.* p. 96.

H. cupressiforme tenuius et compressum Dill. *Hist. M.* p. 312, t. 40, f. 47.

H. curlandicum Brid. *Mant. M.* p. 160.

H. cuspidatum β *inerme* Weiss *Crypt. Goett.* p. 253.

H. inerme Schrank *Prim. Fl. Salisb. n.* 845.

H. muticum Sw. *M. Suec.* p. 60.

H. parietinum L. *Fl. Suec. n.* 1020.

H. purum Ehrh. *Crypt. exs. n.* 311.

H. purum β *Huds. Fl. Angl.* p. 504.

H. Schreberi β *curlandicum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 421.

Pleurozium Schreberi Mitt. *M. austr. am.* p. 537.

Stereodon Schreberi ej. *M. Ind. or.* p. 110.

2. In ericet., turfos., silvat., etc. — *Eur.* : Vulgatiss. ; Spitzberg. *As.* :
Japon., Yunnan, Sikkim (ster.), Caucas. *Am. sept.* : Groenland,
Labrador, Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Gas-
pes., Ontar., Manitoba, Saskatchewan ; *Columb. brit.*, Alaska,
Sitka ; sept. et temper. tot., merid. except. *Am. merid.* : And. Nov.
Granat. et Quitens.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 208.

Faurie *Pl. Japon.* n. 565, 835.

Mac. *Canad. M.* n. 364.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 455, 456.

var. *curlandicum* Brid. — *H. Schreberi*.

« var. *elongatum* (Lindb.) Par.

Hylocomium parietinum var. *elongatum* Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872,
pp. 251-252.

— *As.* : Amour, Saghalien.

« f. *longiramea* Besch. *Fl. bryol. Japon.* p. 390.

Ster. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie, n. 835.

« var. *laevigatum* (Lindb.) Par.

Hylocomium parietinum var. *laevigatum* Lindb. in *op. et l. cc.*

— *As.* : Amour, Saghalien.

var. *orthocarpum* Brid. — *Cylindrothecium concinnum*.

Schultzii Bland. — *Amblystegium riparium* var. *trichopodium*.

- Schwaneckeanum* C. M. — *Rhaphidostegium*.
Schweinfurthii C. M. — *Taxithelium*.
scitulum Aust. — *Plagiothecium latebricola* ?
scitum P. B. — *Thuidium*.
 var. *æstivale* Aust. — *Thuidium scitum* var. *æstivale*.
sciuroides L. — *Leucodon*.
scoparium W. et M. — *Dicranum*.
 var. β eor. — *Dicranum Schraderi*.
Sclerodontium C. M. — *Dimerodontium pellucidum*.
scorpioides L. *Sp. pl.* p. 1592; C. M. *Syn.* II, p. 418; *Bryöl. eur.* VI
 (mon. p. 44), t. 612; W. P. Sch. *op. cit.* p. 796.
Amblystegium scorpioides Lindb. *M. Scand.* p. 33.
H. crassum Schum. *Pl. Sael.* II, p. 84.
H. fuscum Schleich. *Cent. IV Pl. Helv.* n. 24.
H. scorpioides, palustre, magnum, *Lycopodii instar sparsum* Dill. *Hist.*
 M. p. 290, t. 37, f. 25.
H. squarrosum Timm. *Prodr. fl. Megap.* p. 827.
H. Stereodon scorpioides Brid. *Bryol. univ.* II, p. 637.
 2. In turfis. uligin. — *Eur.* : E planit. usq. in reg. mont. zon. interm.
 et sept. : Spitzberg. *As.* : Penins. Tschutschica. *Am. sept.* : Groen-
 land., Island., Labrador, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquel., Ontario,
 M. Rupestr., Ohio.
Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 200.
 Mac. *Canad. M.* n. 366.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 10 c, 771.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 459.
 Un. itin. 1864, n. 79, 80.
 « var. *julaceum* Sanio in *Bot. Centralbl.* 1880.
 Absque loco spec.
 « var. *miquelonense* Ren. et Card. in *Husn. Muscol. gall.* p. 394, t. 113, f. 2.
 H. lycopodioides var. *miquelonense* eor. *Fl. Miquelon*, p. 53.
 — *Am. sept.* : Ins. Miquelon.
scorpioides { Schultz. — *H. lycopodioides*.
 Timm. — *Hylocomium squarrosum*.
 palustre, magnum, Lycopodii instar sparsum Dill. — *H. scor-*
 pioides.
Scorpiurus Mont. — *Rhaphidostegium*.
scutellatum Tayl. — *Hypopterygium Tamarisci*.
secundifolium C. M. — *Rhaphidostegium*.
secundum Mont. (fid Mitt.). — *Brachythecium plumosum*.
selenithecium C. M. — *Trichosteleum*.
Seligeri { Brid. — *Amblystegium fluviatile*.
 C. M. — *Plagiothecium silesiacum*.
 Sw. p.p. — *Plagiothecium Mühlenbeckii*.
Sellowii { C. M. — *Rhynchostegium campylocarpum*.
 Hsch. — *Rhynchostegium*.
semense C. M. — *Pseudo-Leskea*.
semi-mammillosum C. M. — *Trichosteleum*.
semi-nerve C. M. — *Helicodontium*.
semi-revolutum C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 784.
 H. drepanophyllum ej. *Syn.* II, p. 319 ?
 2 ? — *Afr.* : C. B. Sp.
 Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 412.
semi-tortulum C. M. { — *Rhynchostegium*.
 — *Thuidium*.

semi-tortum { Mitt. (M. a.). — *Rhynchostegium*.
 { Mitt. (M. l.or). — *Rhynchostegium Hookeri*.

Sendtneri W. P. Sch. *Bryol. eur. Suppl. III-IV* (Hypnum) t. II et op. cit. p. 730.

Amblystegium aduncum β *legitimum* Sanio in L. et A. M. As. bor. 1890, II. A. *Sendtneri* de Not. *Epil.*

2. In turfac. et prat. uligin. — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in subalp., ab Ital. super. usq. ni Lappon. As.: *Jenissei* med. et inf. *Am. sept.*: Terr. nov., New Brunswick, Ottawa, Ontario, Manitoba, M. Rupestr., Columb. brit., Wisconsin.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 384 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 646, 757, 850.

Un. itin. 1864, n. 81, 97.

« *var. gracilescens* Sanio in Bot. Centralbl. 1880.

— *Eur.*: German. or.

« *var. Flageyi* (Ren.) Par.

Hypnum Wilsoni var. Flageyi Ren. in Husn. Muscol. gall. p. 395, t. 113.

In turf. editor. — *Eur.*: Jurass.

« *var. jenisseiense* (San.) Par.

Amblystegium latifolium var. jenisseiense Lindb. et Arn. op. cit. p. 120.

H. aduncum δ molle $\dagger\dagger$ *jenisseiense* San. *Bryol. Fragm. in Hedwig*, 1887.

— As.: *Jenissei* inf.

« *var. occidentale* (R. et C.) Par.

H. Wilsoni var. occidentale Ren. et Card. in Husn. Muscol. gall. p. 394, t. 111, f. 9, 10, 11.

— *Am. sept.*: Idaho, Montana.

« *var. robustum* (Lindb.) Par.

Amblystegium Sendtneri var. robustum Lindb. M. Scand. p. 33.

— *Eur.*: Suecia.

« *var. triviale* Sanio in Bot. Centralbl. 1880, p. 18.

— *Eur.*: Angl., Gall. or., German. sept.

« *var. vulgare* ej. in op. cit. p. 15.

In paludos. — *Eur.*: Gall. or.

« *var. Wilsoni* W. P. Sch. op. et ll. cc. t. 3.

Amblystegium latifolium L. et A. op. et ll. cc.; Ren. in op. cit. p. 395, t. 113, f. 5.

A. *Wilsoni* Lindb. M. Scand. p. 33.

H. aduncum δ molle Sanio *Beschr...* p. 36 et *Bryol. Fragm. II*, in *Hedwig*, 1887.

H. Wilsoni Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 25.

H. lycopodioides subsp. Wilsoni Ren. in Husn. Muscol. gall. p. 375.

In uligin. saep. inund. — *Eur.*: Angl., Boruss., etc. As.: *Jenissei* inf. *Am. sept.*: New Jersey.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 915.

Sendtneri Mac. — *H. conflatum*.

Sendtnerianum C. M. — *Plagiothecium pulchellum*.

senodictyon C. M. — *Rhynchostegium*.

sentosum Sull. — *Trichosteleum* (1).

(1) *sepultum* Vill. Pl. Dauph..., p. 912; Brid. *Bryol. univ.* II p. 547; C. M. Syn. II, p. 509.

« An *H. stramineum*? » Brid. l. c. — *Delendum*,

Sequoiæ C. M. in *Fl.* 1875, p. 91; *Lesq. et Jam. Man.* p. 392 (1).

H. circinale S. et L. M. bor. am. II ed. n. 474; *Mac. Canad. M.* n. 347 p.p.

Cortic. — *Am. sept.*: Terr. nov. (? Card.); Columb. brit., Alaska, Sitka, Vancouver, Calif.

Funk. — *Brachythecium velutinum* var. *sericeum*.
 L. — *Homalothecium*.
sericeum { *gracile, albicans, capsulis subrotundis* Dill. — *Brachythecium albicans*.
ramosius et tenuius, capsulis acuminatis Dill. — *Pylaisia polyantha*.
surculis longioribus et teretioribus, capsulis incurvis Dill. — *Camptothecium lutescens*

var. *praelongum* Weiss. — *Camptothecium lutescens*.

seriolum Hpe. — *Ischyrodon*.

serpens L. — *Amblystegium* (2).

var. *compactum* H. f. et W. — *Amblystegium*.

var. *varium* C. M. pp. — *Amblystegium* { *orthocladon*.
radicale.

serratum { P. B. — *Microthamnium*.
 W. et M. — *Mnium*.

serrulatum { Hedw. — *Rhynchostegium*.
 Hsch. { — *Rhynchostegium huitomalcum*.
 — *Eurhynchium strigosum*.
 Sull. — *Rhynchostegium frondicola*.
 Turn. — *Rhynchostegium confertum*.

setaceum Weiss. — *Barbula convoluta*.

setigerum P. B. — *Hypopterygium commutatum*.

setosum P. B. — *Brachythecium acuminatum* var. *setosum*.

sibiricum C. M. — *Myurella Careyana*.

Sieberi C. M. — *Mniodendron*.

Sigmatella C. M. — *Thuidium*.

sigmatodontium C. M. — *Sematophyllum*.

var. *elongatum* Bryol. jav. — *Sematophyllum sigmatodontium* var. *elongatum*.

silesiacum { H. f. et W. — *Plagiothecium pseudo-silesiacum*.
 W. et M. — *Plagiothecium*.

silesianum { Hook. { (fid. C. M.). — *Plagiothecium Mühlenbeckii*.
 { (fid. Kindb.). — *Plagiothecium*.
 P. B. — *Plagiothecium silesiacum*.

silvaticum L. — *Plagiothecium*.

similans Bryol. jav. II, p. 147, t. 244.

2. Ad arbor. — As.: M. Java.

simodense Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad...* 1859, p. 280 (3).

2. — As.: Japon.

Sipho P. B. — *Amblystegium riparium*.

siphæthea C. M. — *Thuidium*.

Slateri Hpe. — *Ectropothecium*.

Smallii S. et L. — *Isopterygium*.

Smithii { Dicks. — *Leptodon*.
 { Lindb. — *H. arcticum*.

(1) Cf. Cardot in *Rev. bryol.* 1890, p. 18.

(2) De varietatibus Bridelii cf. W. P. Sch. *Syn.* II ed., p. 710.

(3) « *An Microthamnium?* » Jaeg. *Ad.* II, p. 610.

sodale Sull. — *Ectropothecium*.

solitarium Brid. — *Jaegerina*.

solutum Tayl. — *Rigodium*.

Sommerfeldti Myr. in Vet. Ak. Arsb. Stockh. 1831, p. 328 et in Hartm. Handb. i Skand. Fl. V ed. p. 331; Bryol. eur. VI (mon. p. 12), t. 582; W. P. Sch. op. cit. p. 722.

Campylium hispidulum var. *Sommerfeldti* Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872.

H. affine Sommerf. Fl. Lapp. Suppl.

H. subalpinum Spr. in sched.

H. polymorphum (Hedw.) (1) Wils. Bryol. brit.

H. stellatum β *polymorphum* Myr. Coroll. p. 32; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 186.

H. stellatum β *tenellum* C. M. Syn. II, p. 435.

H. Stereodon stellatus β *polymorphus* Brid. Bryol. univ. II, p. 602.

l. Ad arb. rad., ad sax. viar. cavar., arces vetust. et ped. mur. antiquor. — Eur.: Tota, in reg. campestr. et montos. As.: Amour, Jenissei, Obi, Caucas. Am. sept.: Sin. Hudson, New Brunswick, Ottawa, Ontar., Columb. brit., Mexic.

Ers.: Mac. Canad. M. n. 328.

Rab. Bryoth. eur. n. 396.

Un. itin. 1867, n. 29.

« var. *stellulatum* W. P. Sch. op. cit. p. 723.

Ut typ. — Eur.: Suecia.

Sommerfeldti Mac. — *H. decursivulum*.

sordidum C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 457.

Amblystegium sordidum Mitt. M. austr. am. p. 571.

Ster. — Am. sept.: Mexic.

Soyauxi C. M. — *Ectropothecium*.

sparsifolium Rehm. M. Afr. austr. n. 398.

— Afr.: Orange.

sparsifolium Hpe. — *Porotrichum sparsiflorum*.

sparsile Mitt. — *Amblystegium*.

sparsipilum Bryol. jav. — *Ectropothecium*.

sparsirameum Geh. et Hpe. — *Rhynchostegium*.

sparsum H. f. et W. — *Thuidium*.

spathulaefolium C. M. — *Homalia*.

speciosissimum Sull. — *Pterobryella*.

speciosum } Brid. — *Eurhynchium*.

 } C. M. — *Hypopterygium Thouini*.

spectabile H. f. et W. — *Climacium ruthenicum*.

Spegazzinii C. M. — *Brachythecium*.

sphacelatum Duby. — *Trichosteleum*.

sphaerocarpum } C. M. — *Ectropothecium*.

 } Spreng. — *H. palustre* var. *subsphaericarpon*.

sphaerotheca C. M. — *Rhaphidostegium*.

spiculiferum } Mac. p.p. — *Eurhynchium stoloniferum*.

 } Mitt. — *Isohecium*.

spiculosum } Hpe. — *Sematophyllum*.

 } Mitt. — *Eurhynchium*.

spiniforme } H. f. et W. — *Rhizogonium Hookeri*.

 } L. — *Rhizogonium*.

(1) Cf. W. P. Sch. Syn. I ed. p. 602 et II ed. p. 725.

spininerve Sull. — *Hypnodendron Vescoanum*.

spininervium Hook. — *Hypnodendron*.

spinosum Sibth. — *Isothecium myurum*?

spinulosum Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.*, 1859, p. 280.

1. — *As.* : Japon.

spinulosum Hedw. — *Amblystegium serpens*.

spirale C. M. — *Trichosteleum papillosum*.

spiripes C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 582.

Stereodon spiripes Mitt. *M. austr. am.* p. 534.

1. — *Am. merid.* : Nov. Granat.

? *splanchnifolium* Brid. *Sp. M. II*, p. 161 (1).

— *Afr.* : Ins. Borbon.

splendens Hedw. — *Hylocomium*.

splendidulum Hsch. — *Ectropothecium*.

Sprengelii C. M. — *Eurhynchium*.

Sprucei } Br. — *Amblystegium*.

 } Mitt. — *Eriodon radicalis*.

squalidissimum C. M. — *Brachythecium*.

squamosum Neck. — *Fontinalis*.

squamulosum C. M. — *Microthamnium*.

squarrosulum } Brid. — *H. chrysophyllum*.

 } Voit. — *Heterocladium dimorphum*.

squarrosum } L. — *Hylocomium*.

 } Timm. — *H. scorpioides*.

var. *loreum* Web. — *Hylocomium*.

stagnatum Wils. — *H. polygamum*.

Starkii Brid. — *Brachythecium*.

stellare W. et M. — *Mnium*.

stellatifolium Hpe. — *Thuidium*.

stellatum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 92; *C. M. Syn. II*, p. 435; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 11), t. 584; *W. P. Sch. op. cit.* p. 725.

Amblystegium stellatum Lindb. *M. Scand.* p. 32.

H. coma lutescente, extremitatibus stellatis Dill. *Hist. M.* p. 302, t. 39, f. 35.

H. comosum Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 904.

H. Mühlenbergense P. B. *Prodr.* p. 66.

H. Stereodon stellatus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 600.

2. In prat. uligin. et terr. spong. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor. ; reg. campestr. et mont., rar. alp. *As.* : Penins. Samojed., Taimyr, Jenissei, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, fret. Hudson, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquel., Gaspes., Ontar., lac. Super., Manitoba, Assiniboine, Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., reg. sept., centr. et or.

Exs. : Mac. Canad. *M. n.* 330.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 759.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II*, p. 515.

var. *chrysophyllum* Drumm. } — *H. chrysophyllum*.

var. *minus* W. et M.

« var. *protensum* Roehl. *Deutsch. Fl. III*, p. 103; *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*

Amblystegium protensum Lindb. *l. c.*

(1) Nec in *Bryol. univ.* nec in *C. M. Syn.* nec in *Besch. Fl. bryol.* Réunion, etc. memoratur.

H. protensum Brid. *M. Rec. II, II*, p. 85, t. 2, f. 3.

H. Stereodon stellatus β *protensus* ej. *Bryol. univ. II*, p. 602.

Ad sax. madid. praecip. calc. — *Eur.*: Reg. montan. *As.*: Jenissei, Caucas. centr. *Am. sept.*: Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., New York.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 331.

Rab. Bryoth. eur. n. 497.

var. *polymorphum* Myr. — *H. Sommerfeldti*.

« var. *subdecursivulum* Kindb. in Mac. Cat. p. 225.

Ster. Paludic. — *Am. sept.*: Ontario.

var. *tenellum* C. M. — *H. Sommerfeldti*.

« var. *virens* de Not. *Epil.* p. 171.

Ut et ubi typ.

stellulatum (Mitt.) Par.

Ctenidium stellulatum Mitt. *Fl. Vit.* p. 399.

— *Pac.*: Ins. Societat.

stenocarpum C. M. — *Sematophyllum*.

stenophyllum Wils. } (fid. Card.). — *H. fluitans* var. *stenophyllum*.
 } (fid. W. P. Sch.). — *H. exannulatum* var. *Rotae*.

stenopyxidium C. M. — *Rhaphidostegium*.

stenosekos W. et Dy. — *Isopterygium*.

stephomichos eor. — *Leucomium*.

stereopoma Spr. — *Brachythecium*.

sticticolum C. M. — *Rhaphidostegium*.

stigmatophyllum Hpe. — *Microthamnium*.

stigmatosum C. M. — *Trichosteleum*.

stissophyllum Hpe. — *Trichosteleum*.

Stokesii Turn. — *Eurhynchium*.

stoloniferum } Hook. — *Eurhynchium*.

 } P. B. — *Anomodon obtusifolius*.

stramineolum C. M. — *Ectropothecium*.

stramineoides Sb. in Jaeg. *Ad. II*, p. 754.

H. pseudo-stramineum Hpe. in Linn. 1871-73, p. 518.

Rhynchostegium pseudo-stramineum Mitt. in Trans. and Proceed. of the
 roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 88.

Ster. — *Pac.*: Austral. or. (Nov. Vales.).

stramineum Dicks. *Fasc. II*, *Pl. crypt.* p. 6, t. 1, f. 9; C. M. *Syn. II*,
 p. 378; *Bryol. eur. VI* (mon. p. 49), t. 617; W. P. Sch. *op. cit.* p. 792.

Amblystegium stramineum de Not. *Briol. ital.* p. 137.

H. obtusum Vill. *Pl. Dauph. III*, n. 912.

H. Stereodon stramineus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 568.

2. In prat. uligin. et turf. aquos. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor.;
 a Lappon. usq. ad Ital. super. *As.*: Jenissei. *Am. sept.*: Groenland,
 Labrador, fret. Hudson, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquel., New
 Brunswick, M. Alb., Pensilv., Ottawa, M. Selkirk, Columb. brit.

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. p. 210.

Mac. Canad. M. p. 473.

Rab. Bryoth. eur. n. 645 et b, 847.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II, n. 460.

Un. itin. 1863, n. 96; 1864, n. 36.

« var. *acutifolium* (Arn.) Par.

Amblystegium stramineum var. *acutifolium* Arn. M. *As. bor.* 1890, II, p. 129.

— *As.*: Jenissei inf.

« *var. apiculatum* (Arn.) Par.

Amblystegium stramineum var. apiculatum Arn. *op. et l. cc.*

— As. : *Jenissei* inf.

« *var. compactum* Milde. *Bryol. Sil.* p. 370.

— Eur. : German., Gall. Am. sept. : Groenland.

« *var. exiguum* Ren. *Fl. Miquel*, p. 57.

— Eur. : Gall. Am. sept. : Ins. Miquel.

« *var. laxifolium* C. M. in *Deutsch. Nord-Pol. Exped.*

— Eur. : ? Am. sept. : Groenland.

« *var. patens* (Lindb.) Par.

Amblystegium stramineum var. patens Lindb. *M. Scand.* p. 34 et Adn. n. 62.

In fossis turfac. — Eur. : Fennia.

« *var. procerum* Aman in *Rev. bryol.* 1889, p. 91.

Ad rup. gneiss. humid. — Eur. : Alp. Rhaet.

var. β Schwaegr. — *H. trifarium*.

var. Sull. — *H. lycopodioides*.

Strangei Mitt. et F. v. Müller in *Proced. of the Linn. Soc.* 1879 (*extr. vol.*), p.

Acanthocladium Strangei eor. in *Proced. of the Linn. Soc. of N. S. Wales*, p. 102.

— Pac. : Nov. Caledon. (ins. Pinorum).

strangulatum Hpe. — *Rhaphidostegium*.

var. prostrata Hpe. — *Rhaphidostegium strangulatum var. prostrata*.

stratum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 837.

— Afr. : M. Cameroon.

strepsiphyllum Mont. — *Sematophyllum*.

var. densum Bryol. jav. — *Sematophyllum strepsiphyllum var. densum*.

striatellum C. M. — *Plagiothecium Mühlenbeckii*.

striatulum Spr. — *Eurhynchium*.

striatum Schreb. — *Eurhynchium*.

var. Durieui Mont. — *Eurhynchium striatum var. meridionale*.

strigosum { Hoffm. — *Eurhynchium*.

{ Neck. — *Pylaisia polyantha*.

var. circinatum Brid. — *Eurhynchium*.

var. diversifolium Lindb. — *Eurhynchium*.

var. ramosum Neck. — *Camptothecium lutescens*.

strumiferum Hpe. — *Rhynchostegium*.

strumosum { C. M. — *Leucomium*.

{ Gmel. — *Cynodontium polycarpum var. strumiferum*.

Struthiopteris Schwaegr. — *Hypopterygium*.

Stuartii C. M. — *Thuidium*.

subacutifolium C. M. — *Rhynchostegium*.

subaequans Hpe. — *Plagiothecium*.

subalbidum S. et L. — *Isopterygium*.

subalpinum Spr. — *H. Sommerfeldti*.

subbasilare { Hook. — *Rhizogonium*.

{ Schwaegr. — *Rhizogonium mnioides*.

subbrachycarpum Hpe. — *Rhaphidostegium*.

subbrevisetum Hpe. — *Ectropothecium*.

subcampaniforme Geb. et Hpe. — *Microthamnium*.

subcapillatum C. M. — *Homalothecium*.

subcapillisetum C. M. in *Dusen M. Camer. n. a* 17.

— Afr. : M. Cameroon.

subchrysophyllum Anzi *Enum. M. Longob. sup., mem. in Rev. bryol.* 1876, p. 63.

Ster.

— Eur. : Etrur. (M. Pisan).

subcircinale Ltz. — Rhaphidostegium.

subclavatum Hpe. — Rhynchostegium tenuifolium.

subcompressiforme C. M. mss. ; *Jaeg. Ad. II, p.* 593.

— Afr. : Teneriffa.

subcompressulum Par.

H. compressulum *Besch. Not. M. des I. S. Paul et Amsterd.* 1875, p. 5.

Ster.

— Afr. : Ins. Amsterdam.

subcompressum (Br. et Sch.) C. M. *Syn. II, p.* 253.

Leskea subcompressa Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. Coll. II, n.* 581 b.

2.

— Afr. : Abyss.

subconfertum C. M. — Rhynchostegium.

subcupressiforme W. P. Sch. — H. canariense.

subcurvicollum C. M. — Isopterygium.

subdelicatulum Hpe. — Thuidium.

subdenticulatum C. M. — Ectropothecium.

subdiminutivum Geh. et Hpe. — Microthamnium.

subenerve W. P. Sch. *Syn. I ed. p.* 634 et *II ed. p.* 772.

Amblystegium subenerve *Bryol. eur. VI (mon. p. 8), t.* 563.

1. Ad sax. humidiusc. — Eur. : M. Pinifer., Tirol., Gastunia.

subenerve Hpe. et C. M. — Rhynchostegium.

suberectum } Hpe. — Thuidium.

suberectum } Mitt. — Eurhynchium.

subfalcatum L. et J. — Plagiothecium.

subflaccum C. M. et *Kindb. in Bidr. p.* 454 (nom.) et in *Mac. Cat. p.* 249.

Cylindrothecium Drummondii *Mac. Canad. M. n.* 436 p.p.

2. Ster. Terr. — Am. sept. : Ontario.

subflavum H. f. et W. — *Stereophyllum leucostegum*.

subgranulatum Geh. et Hpe. — Thuidium.

subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus Dill. — *Anomodon viticulosus*.

subhomallum C. M. — *Pylaisia*.

subhumile C. M. — Rhaphidostegium.

subimponens *Lesq. in Trans. of the Am. Phil. Soc. XIII, p.* 14; *Sull. Ic.*

M. Suppl. p. 103, t. 79; *Lesq. et Jam. Man. p.* 393.*

Stereodon plumifer Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc.* 1864, p. 41, t. 7.

2. Rupic. — Am. sept. : Terr. nov., New Brunswick (? Card.);

Columb. brit., Vancouver, Washington, Idaho sept., Oregon, Calif.

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 349.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 476.

« var. cristula *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, p.* 280 et in *Mac. Cat. p.* 237.

H. cristula ej. *Enum. Bryin. exot.* 1888.

Rupic. in *Quercet.* — Am. sept. : Vancouver.

subimponens Hpe. — *Ectropothecium amabile*.

- subincurvans* W. P. Sch. in Breutel M. Capens.
 — Afr. : C. B. Sp.
- sublimatum* Ltz. — Ectropothecium.
- submacrocarpum* Hpe. — Hylocomium.
- submacrodontium* Geh. et Hpe. — Microthamnium.
- submammosulum* C. M. — Isopterygium.
- submicrotheca* C. M. — Pterogoniella.
- submolluscum* Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 93.
 1. Silvic. — As. : Yunnan.
- subnemorosum* C. M. in sched. ; Jaeg. Ad. II, p. 592.
 — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- subnitidum* Hpe. in Ann. sc. nat. ser. V, 1866, p. 341.
 — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- subnudum* C. M. — Thuidium.
 var. C. M. — Thuidium subnudum var.
- subobscurum* Hpe. — Microthamnium.
- suboligophyllum* Hpe. — Amblystegium.
- subperspicuum* C. M. — Microthamnium.
- subpilosum* H. f. et W. — Brachythecium.
- subpinnatum* } Hpe. — Thuidium.
 } Lindb. — Hylocomium squarrosum var. subpinnatum.
- subplicatum* Hpe. — Brachythecium subpilosum.
- subplumaeforme* C. M. in sched. ; Jaeg. Ad. II, p. 595.
 — As. : Japon.
- subpungens* C. M. — Sematophyllum.
- subpynophyllum* C. M. — Sematophyllum.
- subrectifolium* Sull. — H. nemorosum.
- subrhinophyllum* C. M. — Trichosteleum.
- subrotundum* Hpe. — Rhynchostegium.
- subrusciforme* C. M. — Rhynchostegium.
- subrutabulum* C. M. — Brachythecium.
- subscabriselutum* C. M. — Trichosteleum.
- subscabrum* C. M. — Rhaphidostegium.
- subsecundum* W. Arn. — Rhaphidostegium caespitosum.
- subserratum* C. M. — Thamnum subseriatum.
- subserrulatum* C. M. — Rhynchostegium.
- subsimplex* } Hedw. — Rhaphidostegium.
 } Sull. — Plagiothecium micans.
- subsphaericarpon* Schleich. — H. palustre var. subsphaericarpon.
- subspininervium* C. M. — Hypnodendron.
- subsquarrosulum* Hpe. — Eurhynchium.
- substigmatosum* C. M. — Trichosteleum.
- substrigosum* Mac. p.p. — Eurhynchium strigosum.
- substrumulosum* } Hpe. — Rhaphidostegium Welwitschii.
 } W. P. Sch. — Rhynchostegium surrectum.
- subsulcatum* W. P. Sch. — H. sulcatum var. subsulcatum.
- subtamariscinum* Hpe. — Thuidium.
- subtenue* Jam. — Brachythecium reflexum.
- subtile* Hoffm. — Amblystegium.
- subtricostatum* C. M. — Sciaromium.
- subulatulum* C. M. — Trichosteleum.
- subulatum* Hpe. — Sematophyllum.
- suburceolatum* Hpe. et Ltz. — Ectropothecium.
- subverrucosum* Geh. — Isopterygium.
- subvolvatum* C. M. — Microthamnium.

succedaneum H. f. et W. — Rhaphidostegium.

sudeticum W. P. Sch. — H. pseudo-stramineum.

suecicum Hartm. — Thedenia.

sulcatum W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 699 et II ed. p. 744.*

Amblystegium glaucum *var. sulcatum* Lindb. *M. Scand. p. 32.*

2. Ad sax. et terr. umbr. vel humidiusc. — *Eur.* : E reg. subalp. usq. in alp. super.

Exs. : Un. itin. 1863, n. 84.

« *var. subsulcatum* W. P. Sch. *Syn. II ed. l. c.*

H. subsulcatum *ej. Syn. I ed. l. c.* ; *Rab. Bryoth. eur. n. 910, 997* ; Un. itin. 1863, n. 85.

Ut et ubi typ.

sulfureum Geh. et Hpe. — Brachythecium.

Sullivantiae { Lindb., Spr. — Plagiothecium Roëseanum ?
Sull. — Plagiothecium.

Sullivantii Spr. — Eurhynchium. *graminicolor*

sumatranum *Bryol. jav. II, p. 149, t. 247.*

1 vel syn. — As. : Sumatra.

superbum C. M. — Porotrichum.

surculare (Mitt.) Jaeg. *Ad. II, p. 608.*

Stereodon surcularis Mitt. *M. Ind. or. p. 112.*

2 ? — As. : Khasia.

surinamense Dz. et Mk. — Ectropothecium.

surrectum Mitt. — Rhynchostegium.

Swartzii { Brid. — H. incurvatum.

{ Turn. — Eurhynchium praelongum *var. atro-virens.*

var. minus Turn. — Eurhynchium pumilum.

symmetricum R. et C. — H. uncinatum *subsp. symmetricum.*

tabescens C. M. — Trichosteleum.

tahitense Ångstr. — Ectropothecium.

tamariscellum C. M. — Thuidium.

Tamarisci Sw. p.p. } — Hypoterygium.

} — Hypopterygium commutatum.

tamariscifolium Neck. — Thuidium tamariscinum.

var. β Neck. — Thuidium recognitum.

tamariscinum { Brid. p.p. — Thuidium mascarenicum.

{ C. M. — Thuidium recognitum.

{ Hedw. — Thuidium.

{ Hsch. — Thuidium aequinoctiale.

{ Sull. — Thuidium delicatulum.

var. delicatulum { Brid. } — Thuidium delicatulum ?

{ } — Thuidium Antillarum ?

{ Mont. — Thuidium blepharophyllum.

var. protensum Brid. — Thuidium delicatulum.

var. recognitum Brid. — Thuidium.

var. tenerrimum Brid. — Thuidium Antillarum ?

tanytrichum Mont. in *Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 88 et Syll. p. 9* ; C. M.

Syn. II, p. 391 ; *Bryol. jav. II, p. 151, t. 249.*

Stereodon tanytrichus Mitt. *M. Ind. or. p. 112.*

2. — As. : Sikkim, Java.

tanytrichum Duby. — Ectropothecium procerum.

tavoyense Hook. — Stereophyllum.

- taxifolium* { L. — Fissidens.
 minus, *basi capsulifera* Dill. — Fissidens.
 Brid. — Isopterygium.
taxiforme { *exiguum, versus extremitatem capsuligerum* Dill. — Fissi-
 dens bryoides.
palustre, majus et erectum capsuligerum Dill. — Fissi-
 dens adiantoides.
Taylori Mitt. — Brachythecium conostomum.
Teesdalii { C. M. p.p. { — Eurhynchium.
 — Rhynchostegium curvisetum.
 Hüb. — Rhynchostegium curvisetum.
 Sm. — Eurhynchium.
 var. Wils. — Rhynchostegium curvisetum.
tenaci-insertum C. M. — Ectropothecium.
tenax { Drumm. p.p. { — Pseudo-Leskea congesta.
 — Pseudo-Leskea congesta var. gracilis.
 Hedw. — Amblystegium radicale.
tenellum { Dicks. — Rhynchostegium.
 Schwaegr. — Rhynchostegium curvisetum.
Teneriffae { Bourg. exs — Rhynchostegium Bourgeoisianum.
 Mont. — Rhynchostegium curvisetum.
tenerrimum C. M. — Homalothecium.
tenerum { H. f. et W. — Plagiothecium micans.
 Sw. — Isopterygium.
tenuatipes C. M. — Ectropothecium.
tenue { C. M. — Leptohymenium.
 Schrad. — Amblystegium serpens var. tenue.
tenuicaule Spr. — Eurhynchium Vaucheri var. fagineum.
tenuifolium { Hedw. — Rhynchostegium.
 Schleich. — H. cupressiforme.
tenuinerve Mitt. — Austinia.
tenui-pinnatum C. M. — Brachythecium.
tenuirostre { C. M. — Helicodontium.
 Hook. — Rhaphidostegium.
 var. C. M. — Helicodontium tenuirostre var.
tenuisetum (Lindb.) Par.
Amblystegium tenuisetum Lindb. M. Scand. p. 32.
 — Eur. : Suecia (Stockholm).
tenuisetum Sull. — Taxithelium.
tenuius Vill. — Eurhynchium myosuroides (1).
tequedamense Hpe. — Rhaphidostegium.
Ternstroemiae Brid. — Pilotrichella.
Terrae novae var. *australe* H. f. et W. — Ectropothecium australe.
terrestre { Aubl. — Pilotrichella quinquefaria ?
 C. M. — Ectropothecium.
tetragonum Sw. — Pilotrichella.
Teysmanni Bryol. jav. — Isopterygium.
Thedenii Hartm. — Brachythecium.
thelidictyon S. et L. — Rhaphidostegium.
thelipodium C. M. — Sematophyllum pungens.
theliporum C. M. — Sematopyllum.

(1) *tenuissimum* Vill. Pl. Dauph. p. 905 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 546 ; C. M. Syn. II, p. 509.

* An *Amblystegium confervoides* ? An *Pterigynandrum filiforme* ? » Brid. l. c. — Delendum.

- var. *Kochii* Lindb. — *Amblystegium*.
- trichomanoides* } Drumm. — *Homalia Macounii*.
 } Schreb. — *Homalia*.
- trichostegum* C. M. — *Rhaphidostegium*.
- tricostatum* Sull. — *Hypnodendron*.
- trifarium* Web. et Mohr. *Schw. Reis. p.* 177, *t.* 2, *f.* 2 a-d; *C. M. Syn. II*, *p.* 381; *Bryol. eur. VI* (*mon. p.* 50), *t.* 618; *W. P. Sch. op. cit. p.* 793.
Amblystegium trifarium de Not. Briol ital. p. 137.
H. illecebrum Schultz Fl. Starg. p. 318 (*excl. syn. Brid. H. uliginosum*).
H. stramineum β foliis latioribus *Schwaegr. Suppl. I, II, p.* 212, *t.* 89.
H. uliginosum Schleich. Cent. III Pl. Helv. n. 54?
H. Stereodon trifarius Brid. Bryol. univ. II, p. 567.
2. In turfac. profund. — *Eur.*: Reg. montan. et subalp. zon. interm., planit. German. septentr., reg. campestr. Scandin. *As.*: Ochotsk, Jenissei. *Am. sept.*: Groenland, Ontario, lac. Huron, M. Rupestr., Columb. brit., Ohio.
Exs.: Mac. Canad. M. n. 365.
 Rab. Bryoth. eur. n. 751.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II, p. 462.
- trifarium* Drumm. — *H. Richardsoni*.
 var. *sarmentosum* Rab. — *H. trifarium*.
- trinitense* C. M. — *Ectropothecium*.
- triquetrum* L — *Hylocomium*.
 var. *brevirostre* Poll. — *Hylocomium*.
 var. *minus* W. et M. — *Hylocomium brevirostre*.
- trismegistum* Mont. — *Mniodendron Khortalsii*.
- triste* C. M. — *Leskea*.
- triviale* C. M. — *Ectropothecium*.
- trochelophyllum* Hpe. — *Trichosteleum*.
- truncatulum* C. M. — *Trichosteleum*.
- tuloferum* Hpe. — *Rhaphidostegium*.
- tumidiusculum* Lam. } — *Eurhynchium Boscii*.
 } — *Isothecium myurum*.
- Tundrae (Arn.) Par.
Amblystegium Tundrac Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 128.
2. Paludic. — *As.*: Jenissei infer.
- tunguraguanum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II, p.* 584.
Stereodon tunguraguanus Mitt. M. austr. am. p. 534.
2. — *Am. merid.*: And. Quitens.
- turbinatum* W. et M. — *Bryum*.
- turfaceum* Lindb. — *Plagiothecium*.
- turgescens* W. P. Sch. *Syn. I ed. p.* 647 et *II ed. p.* 794.
Amblystegium turgescens L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 122.
- ♂ et fr. ign. In paludos. et ad rip. lacuum. — *Eur.*: Spitzberg. ins. Ursor., Scandin., Salisburg., Stir., Helvet., Alp. Bavar., Tirol. *As.*: Jenissei inf. *Am. sept.* Groenland, fret. Davis, M. Rupestr. et Selkirk. *Am. merid.*: And. Boliv.
- Exs.*: Mac. Canad. M. n. 483.
 Mandon Pl. Boliv. n. 1709.
 Rab. Bryoth. eur. n. 490.
- var. *tenue* Berggr. *M. Spetsb. n.* 151 b et in *K. Sv. Vet. Ak. Handl. n.* 7, *p.* 91.
 — *Eur.*: Ins. Ursor.

turgidellum C. M. — *Trichosteleum*.

turgidicaule C. M. — *Stereophyllum guarapense*.

turgidum { Dz. et Mk. — *Sematophyllum*.
Hartm. — *Brachythecium cirrosum*.
Wahlenb. — *Aulacomnium*.

tutuillum Sull. — *Ectropothecium*.

ulicon Tayl. — *Rhynchostegium*.

uliginosum Schleich. — *H. trifarium*?

umbilicatum C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).

Isopterygium umbilicatum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria* 1883, p. 86.

— *Pac.*: Austral. or. (Nov. Vales.).

umbilicatum C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 623.

1. — *Pac.*: Austral. or.

« *var. protractum* C. M. l. c.

— *Pac.*: Austral. or.

umbratum Ehrh. — *Hylocomium*.

umbrosum Hook. f. — *Sciaromium*.

uncinatum Hedw. *M. frond.* IV, p. 65, t. 25; C. M. *Syn.* II, p. 322; *Bryol. eur.* VI (mon. p. 31), t. 600; W. P. Sch. *op. cit.* p. 738.

Amblystegium aduncum Lindb. *M. Scand.* p. 33.

A. uncinatum de Not. *Epil.*

A. uncinatum α *suetum* San. in *L. et A. M. As. bor.* 1890, II, p. 118 (1).

H. contiguum Nees in *Hüb. Muscol. germ.* p. 676.

H. Stereodon uncinatus Brid. *Bryol. univ.* II, p. 629.

H. Stereodon uncinatus β *bicolor* ej. *op. et l. cc.*

Leskea Deinbollii Sw. (*fid. Hartm. Skand. Fl.* V ed. p. 332).

1. Lignic., v. in udis petros. et sec. rivul. lapidos. — *Eur.*: Spitzberg, Septem Ins., ins. Ursor.; e reg. montan. infer. usq. in alp. vulgattiss. *As.*: Japon., Kamschatka, Amour, Saghalien, Ochotsk, penins. Samojed., Jenissei, Obi, Altaï sinens., Sikkim, Caucas. *Afr.*: Ins. Kerguelen. *Am. sept.*: Groenland, Labrador, fret. Hudson; ab Anticosti, Terr. nov. et ins. Miquel. ad mar. Behring et fret. Kotzebue; tota, merid. except. *Am. merid.*: And. Quitens., reg. antarct.

Pac.: Nov. Zeland, fret. reg. Georges, Austral. (Victoria).

Eas.: Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 202.

Faurie *Pl. Jap.* n. 1055.

Mac. *Canad. M.* n. 335.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 792, 1195, 1242.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed., n. 463.

Un. itin. 1864, n. 12.

« *var. abbreviatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

In udis alp. — *Eur. et Am. sept.*: Ubi typ.

« *f. alpina* Ren. in *Husn. Muscol. gall.* p. 379.

Terr. — *Eur.*: Alp., Pyren.

« *var. drepanoides* (San.) Par.

Amblystegium uncinatum var. drepanoides San. in *op. et l. cc.*

— *As.*: Jenissei sup.

(1) Formae: *medium*, *medium-fuscellum*, *plumosum* (an *var. plumosum* W. P. Sch.?).

- « *var. fragile* Lesq. et Jam. Man. p. 383.
H. Jamesii Aust. in Coult. Bot. Gaz. II, p. 142.
Ut et ubi typ. in Am. sept.
- « *var. gracilescens* Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.
Ad terr. in uligin. — Eur. et Am. sept. : Reg. alp. ; ins. Miquelon,
Labrador.
- « *var. gracillimum* Berggr. M. Spetsb. n. 134 c et in K. Sv. Vet. Ak.
Handl. XIII, n. 7, p. 86.
Rupic. — Eur. : Spitzberg, ins. Ursor.
- « *var. micropterum* Kind. in Mac. Cat. p. 229.
— Am. sept. : Labrador.
- « *var. orthothecioides* Lindb. in Oefv..., p. 540.
Amblystegium orthothecioides ej. M. Scand. p. 33.
Rupic. — Eur. : Spitzberg, Septem Ins., ins. Ursor, Lappon. kolaëns.,
Scandin. sept., Fennia. As. : Siber. Am. sept. : Groenland, Labra-
dor, ins. Miquel.
- « *var. plumosum* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 612 et II ed. l. c.
Ad lign. madid. et sax. — Eur. et Am. sept. : Ubi typ.
Exs. : Mac. Canad M. n. 374.
Rab. Bryoth. eur. n. 548.
- var. plumosum* Mac. — Amblystegium riparium.
- « *var. plumulosum* Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.
Amblystegium uncinatum *var. plumulosum* San. in op. et l. cc. (1).
H. Peckii Aust. in Rep. Reg. Univ. of St. of New-York, XXV, p. 71.
Ad arb. trunc. et ramul. — Eur. et Am. sept. : Ubi typ.
Exs. : Un. itin. 1864, n. 56.
- « *var. subestriatum* Kindb. in op. et l. cc.
Terr. — Am. sept. : New Brunswick, Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 376.
- « *var. subjulaceum* Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.
Secus rivul. — Eur. et Am. sept. : In alpin. frigidior.
- « *var. subsulcatum* Warnst. in Hedwig. 1887, Heft II.
— Am. sept. : Groenland.
- « *subsp. symmetricum* Ren. et Card. in Bot. Gaz. XIV, p. 99.
Terr. — Am. sept. : Idaho, Montana, Oregon, Washington, ins. Van-
couver.
- uncinulatum* Jur. — H. canariense.
- undatum* { P. B. — Hookeria.
 { Schrank. — Plagiothecium undulatum.
- undulatum* { L. — Plagiothecium.
 { Schrank. — Mnium.
- unguiculatum* { H. f. et W. — Thuidium furfurosum.
 { La Tour. — Eurhynchium striatum.
- unicostatum* C. M. et Kindb. in Bidr. p. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 224.
2. — Am. sept. : New Brunswick, Ottawa, Ontario.
- upoloviense* C. M. — Sematophyllum macrohynchum.
- urceolatum* Hsch. — Ectropothecium.

(1) Formae : *implexum*, *tenuis*.

utahense L. et J. — *Brachythecium*.

vacillans eor. — *Amblystegium*.

vagans { Drumm. — *Brachythecium rivulare*.
Harv. — *Rhynchostegium*.

vagum Hsch. — *Lembophyllum*.

Vaillantii Thuill. — *Scleropodium illecebrum*.

Valdiviae C. M. — *Porotrichum*.

var. *pallidum* Ltz. — *Porotrichum Valdiviae* var. *pallidum*.

Vallis-clausae Brid. — *Amblystegium fluviatile*.

varieflexum Hpe. — *Microthamnium*.

variegatum W. et Dy. — *Taxithelium*.

varium { H. f. et W. — *Thuidium gracile*.
P. B., Drumm. — *Amblystegium radicale*.

Vaucheri Lesq. *Cat. M. suiss.*, p. 48; *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 697 et *II ed.* p. 765.

Stereodon cupressiformis var. *Vaucheri* L. et A. M. *As. bor.* 1890, *II*, p. 148.

St. Vaucheri Lindb. *M. Scand.* p. 38.

Ster. — *Eur.*: Ins. Ursor.; Alp. calc.: M. Chasseron Jurass., M. Righi Helvet., etc. *As.*: Jeniss. sup. et inf., Obi, Alatau, Caucas. *Am. sept.*: Montana.

« var. *cœlophyllum* Mdo. *Moosst. aus d. Allg. Alp.* p. 107.

H. cœlophyllum ej. in Ltz. *Moosst.* p. 146.

— *Eur.*: Alp. Algov., Tirol.

« var. *davoense* Aman in *Rev. bryol.* 1889, p. 91.

Ad rup. dolomit. — *Eur.*: Alp. Rhaet.

« var. *julaceum* Husn. *Muscol. gall.* p. 406.

Hypnum cupressiforme var. *julaceum* Zett.

Stereodon cupressiformis var. *julaceus* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 608?

— *Eur.*: Scandin.; Alp.? Pyren.?

Vaucheri W. P. Sch. — *Eurhynchium*.

vellereum Mitt. — *Brachythecium*.

velutinoides { Br. — *Eurhynchium*.
Voit. — *Eurhynchium strigosum*.

velutinum { Duby. — *Brachythecium oxyrhynchum*.
L. — *Brachythecium*.

{ *capsulis ovatis cernuis* Dill. — *Brachythecium*.

var. *intricatum* Brid. — *Brachythecium velutinum* var. *intricatum*.

var. *microcarpon* C. M. — *Brachythecium Fendleri*.

var. *murale* Neck. — *Rhynchostegium*.

var. *sericeum* Brid. — *Brachythecium velutinum* var. *sericeum*.

var. *Poll.* — *Pylaisia polyantha*.

ventrifolium C. M. — *Trichosteleum*.

venustum { de Not. — *Brachythecium olympicum*.

{ Duby. — *Ectropothecium Moritzii*.

{ Hsch. et Reinw. — *H. glaucocarpum*.

vernicosum Lindb. in *Hartm. Skand. Fl. VIII ed.*, 1861; *W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. III-IV*, t. (*Hypnum*) 4 et *Syn. II ed.* p. 729.

Amblystegium lycopodioides β *vernicosum* L. et A. M. *As. bor. II*, p. 121.

A. vernicosum Lindb. *M. Scand.* p. 33.

H. Cossoni (f. d. L. et J.).

H. aduncum Drumm. *M. bor. am. ed. I*, n. 201.

H. intermedium Lindb. in *Hartm. op. cit. X ed.*?

H. pellucidum Wils. mss. 1860.

2. In prat. et turfis. — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor.; ab Ital. super. usq. in zon. arct., et reg. campestr. usq. in subalp., in illa frequentius. *As.*: Jenissei inf. *Am. sept.*: Groenland, Anticosti, New Brunswick, New-York, Pensilv., lac. Super, Saskatchewan, Columb. brit., Vancouver.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 384.

Rab. Bryoth. eur. n. 547, 1197 b.

Un. itin. 1864, n. 84, 102.

« *var. gigas* (Lindb.) Par.

Amblystegium vernicosum var. gigas Lindb. l. c.

— *Eur.*: Suecia, Fennia.

« *var. lapponicum* (Norr.) Par.

Amblystegium vernicosum var. lapponicum Norr.; Lindb. l. c.

— *Eur.*: Lappon., Fennia.

« *var. majus* (Lindb.) Par.; *Ren. in Husn. Musc. gall. p. 391, t. 112, f. 3.*

Amblystegium vernicosum var. majus Lindb. l. c.

— *Eur.*: Rar.: Suecia. *As.*: Siberia.

Vernieri Duby. — *Trichosteleum*.

verrucosum { Dz. et Mk. — *Ectropothecium Dozyanum*.

{ Hpe. — *Ectropothecium*.

verruculosum C. M. — *Isopterygium*.

versicolor C. M. — *Thuidium*.

vesiculare Schwaegr. — *Ectropothecium*.

vesiculosum Brid. — *Hookeria*.

virens Sw. — *Rhynchostegium rusciforme*.

virescens Boul. — *H. falcatum var. virescens*.

viride { Lam. — *Brachythecium populeum*.

{ Lam. et DC. — *Amblystegium serpens*.

viride-factum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 365*.

— *Afr.*: M. Cameroon.

viridulum { Brid. } (M. M.). — *Ectropothecium*.

{ (Sp. M.). — *Stereophyllum ruderale*.

{ Hartm. — *H. norvegicum*.

viscidulum Hpe. — *Microthamnium*.

vitellinum Brid. — *H. commutatum*.

viticulosum L. — *Anomodon*.

var. brachycarpon C. M. — *Anomodon obtusifolius*.

viviparum Neck. — *Isothecium myurum*.

volvatum Hpe. — *Microthamnium*.

Vriesei Dz. et Mk. — *Rhynchostegium*.

dentatum, operculis cuspidatis Dill. — *Eurhynchium striatum*.

vulgare { *sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis* Dill. — *Homalothecium sericeum*.

{ *triangulum, maximum et pallidum* Dill. — *Hylocomium triquetrum*.

Waghornei Kindb. in *Mac. Cat. p. 234*.

1?

— *Am. sept.*: Terr. nov.

Wahlenbergii W. et M. — *Webera albicans*.

Wallichii { Brid. — *Aerobryum*.

{ Hook. — *Pseudo-Leskea*.

Wallisi C. M. — *Mniodendron*.

Walterianum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 584.

Drepano-Hypnum Walterianum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 322.

Isopterygium Walterianum Mitt. in *Trans. and. Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 86.

Stereodon Walterianus ej. in *op. cit.* p. 87.

— *Pac.* : Austral. or. (Victoria).

Watsoni Lesq. et Jam. in *Proceed. of the Am. Acad.* p. 138 et *Man.* p. 386.

H. Heufleri (fid. Aust. in *Bull. Torr. bot. Club.* VII, p. 6).

H. imponens Jam. in *Bot. King Exped.* p. 410.

H. plicatile (fid. Aust. in *op. et l. cc.*).

2. Rupic. — *Am. sept.* : Utah.

Webbianum C. M. — Homalia.

Weinmanni Nees. — Brachythecium ?

Whippleanum Sull. — Thuidium.

Whightii Mitt. — Stereophyllum.

Wilkesianum Sull. — Cylindrothecium.

Wilsoni Ren. et Card. — H. Sendtneri var. Wilsoni.

var. Flageyi Ren. — H. Sendtneri var. Flageyi.

var. occidentale R. et C. — H. Sendtneri var. occidentale.

Wissgrillii Garov. *Bryol. Austr.* p. 79 ; *C. M. Syn. II*, p. 408.

Ad sax. irror. — *Eur.* : Austria infer.

Wolkensii Broth. — Rhynchostegium.

Wrightii Sull. — Homalia (1).

Zeyheri Spreng. — Rhynchostegium,

Zemliae Jens. in *Kindb. Enum. Bryin.*

— *Eur.* : Spitzberg, Nov. Zemlia. *Am. sept.* : Groenland.

Zierii W. et M. — Plagiobryum julaceum.

Zippelii Dz. et Mk. — Pseudo-Leskea.

Zollingeri C. M. — Ectropothecium.

Zuratskæ Mac. (errat !). — Amblystegium Juratzkanum.

n. 8048 Drege. — Rhaphidostegium Dregei. (2).

HYPNUM STEREODON Brid. *Bryol. univ. II*, p. 550 (vid. STEREODON).

HYPOPTERYGIUM Brid. *Bryol. univ. II*, p. 709 (78 spec.).

apiculatum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 309.

2. — *As.* : Ceylan.

Arbuscula Brid. — H. Thouini.

arcuatum C. M. — Rhacopilum.

argentinum Ltz. in *Linn.* 1878-79, p. 404.

1. Ad arbor. et tetr. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic., Paraguay.

(1) *xerampelinum* Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 902 ; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 544 ; *C. M. Syn. II*, p. 508.

« An *H. aduncum* ? » Brid. l. c. — Delendum.

(2) In *Enum. Kindb.* nom. nud. :

H. Filicinella C. M.

Hampei Kindb.

Helmsi C. M.

Kiaeri C. M.

nigritellum.

H. nivescens C. M.

polymorphoides C. M.

plumulatum C. M.

reflectifolium C. M.

submolliculum (an Isopterygium ? C. M.)

- aristatum *Bryol. jav. II*, p. 12, t. 141.
1. fr. ign. — As. : Java.
- Balantii C. M. in *Fl. Marchica*, 1891-93.
Filicic. — Pac. : Nov. Zeland? (in horto ad Balantium quoddam lectum).
- brasiliense Sull. — H. Tamarisci.
- brevifolium *Broth. in Bol. d. Soc. Brot. VIII*, 1890.
2. — Afr. : Ins. S. Thom.
- Cameruniae C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 38.
— Afr. : Cameroon.
- Camponi Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, *II*, p. 136.
Ster. — Afr. : Madagascar.
- capense W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*
— Afr. : C. B. Sp.
- ceylanicum Mitt. — H. tenellum.
- Chamaedrys *Bryol. jav. II*, p. 10, t. 139.
2. fr. ign. Ad arbor. — As. : M. Java.
- ciliatum (*Hedw.*) *Brid. Bryol. univ. II*, p. 710; C. M. *Syn. II*, p. 6.
Catharomnium ciliatum *H. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 119.
Pterigynandrum ciliatum *Hedw. Sp. M.* p. 84, t. 17.
Pterogonium ciliatum *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 108.
2. — Pac. : Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.
- Colensoi Par.
H. flaccidum *Colenso in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1888, p. 44.
— Pac. : Nov. Zeland.
- commutatum C. M. *Syn. II*, pp. 6 et 659.
Hypnum setigerum *P. B. Prodr.* p. 70.
H. Tamarisci *Sw. Fl. Ind. occ. III*, p. 1825 (quoad pl. Pacif.).
H. setosum *Wils. in sched.*
H. tamariscinum *Brid. op. cit.* p. 715 p.p.; *Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 488.
Leskea tamariscina *Hedw. Sp. M.* p. 212, t. 51 (excl. spec. Jamaicae).
2. — Pac. : Nov. Zeland., ins. Auckland.
- concinnum (*Hook.*) *Brid. op. cit.* p. 714; C. M. *Syn. II*, p. 6.
Leskea concinna *Hook. M. ex. t.* 34.
2. Rupic. — Am. merid. : Chile. Pac. : Austral. or., Nov. Zeland. sept. et med., ins. Auckland.
- convolutaceum C. M. — Rhacopilum.
- debile *Reichdt. in Novara Exped. Bot. I*, p. 194, t. 35.
Rupic. in silv. — Pac. : Taïti.
- didictyon C. M. *Syn. II*, p. 9.
Hypnum laricinum *H. f. et Wils. in sched. antarct.*
2. Ad arbor. — Am. merid. : Chile, Fuegia, ins. Eremitae.
- discolor Mitt. in *Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 488.
2. — Pac. : Nov. Zeland. sept., Austral. or (Queensland).
- falcatum C. M. in *Fl.* 1886, p. 514.
H. laricinum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 164.
1. Terr. — Afr. : Ins. Fernando-Po, S. Thom.

Fauriei Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 391.

1. — As. : Japon.

filiculaeforme (Hedw.) Brid. op. cit. p. 712; C. M. Syn. II, pp. 5 et 659.

Hookeria filiculaeformis Sm. in *Trans. of the Linn. Soc.* IX, p. 278.

Hypnum filiculaeformae P. B. Prodr. p. 64.

Leskea filiculaeformis Hedw. Sp. M. p. 212, t. 50.

Pterygophyllum filiculaeforme Brid. Mant. M. p. 151.

2. Ad arbor. — Pac. : Nov. Zeland. sept. et med.

flaccidum Mitt. Fl. Vit. p. 390.

Ster. — Pac. : (sine loc. spec.).

flaccidum Col. — H. Colensoi.

flavescens Hpe. in *Linn.* 1847, p. 95; C. M. Syn. II, p. 659.

H. nivale C. M. l. c. p. 9; Mitt. M. austr. am. p. 331.

H. serrulatum Lindb. mss.; Angstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 21.

H. silvaticum Mitt. M. austr. am. p. 329.

H. tamariscinum C. M. in *Linn.* 1847, p. 213.

1 (Mitt.); 2? (C. M.). Ad arbor. et rup. — Am. merid. : And. Venezuel. et Peruv.; Brasil.

flavo-limbato C. M. Syn. II, p. 10; Mitt. M. Ind. or. p. 148.

2. — As. : Nepal., Khasia.

flexisetum Hpe. in *Krause M. Valdiv.*

Ad arbor. — Am. merid. : Valdivia.

glaucum Sull. — H. Smithianum.

grandi-stipulaceum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 99.

Ster. Lignic. — Afr. : Madagascar.

hemiloma C. M. in *Linn.* 1876, p. 256.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan.

Hildebrandti C. M. in *Hildebr. M. Madag.* n. 2094.

— Afr. : Madagascar merid.

humile Mitt. in *Bryol. jav.* II, p. 15, t. 143.

1. — As. : M. Java.

incrassato-limbato C. M. Syn. II, p. 8; Mitt. M. austr. am. p. 331.

2. Ad arbor. et saxa humid. — Am. sept. : Mexic. Am. merid. : Brasil. or.

japonicum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 155.

Syn. — As. : Japon.

javanicum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 66.

H. Struthiopteris Bryol. jav. II, p. 8, t. 137.

Lopidium javanicum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 672.

2. — As. : Sumatra, Java.

laricinum (Hook.) Brid. op. cit. p. 714 p.p.; C. M. Syn. II, p. 7 p.p.

Hypnum laricinum Hook. M. ex. t. 35 (excl. spec. Andin.).

2. — Afr. : Ins. Fernando-Po, Usagara, Usambara,

reg. lacustr., C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 298.

laricinum { Angstr. } — H. mauritianum.
 { Brid. p.p. }
 { Mitt. — H. falcatum.

- Lehmannii* Besch. in *Journ. de bot.* 1894, p.
 1. Lignic. — *Am. merid.*: And. Quitens.
limbatulum C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 27.
 H. *Struthiopteris* Mitt. *M. Ind. or.* p. 149?
 Ster. — *As.*: Ceylan.
longirostrum W. P. Sch. in *Pervillé M. Mad.* n. 805.
 — *Afr.*: Madagascar.
lutescens Hsch. in *Linn.* 1841, p. 144; C. M. *Syn. II*, p. 11.
 — *Afr.*: C. B. Sp.
macrorhynchum Ångstr. in *Oefv...* 1876, p. 21.
 1. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.
marginatum Colenso in *Trans. of the N. Zeal. Inst.*, 1888, p. 44.
 — *Pac.*: Nov. Zeland.
mauritianum Hpe. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 186.
 H. *laricinum* Brid. *op. cit.* p. 714 p.p.; C. M. *Syn. II*, p. 7 p.p.; Ångstr.
 in *Oefv...* 1872, n. 5, p. 143.
 2. — *Afr.*: Ins. Franciae.
 « *var. nanum* Besch. *op. et l. cc.*
 — *Afr.*: Ins. Franciae.
monoicum Hpe. *Symb.* 1874, p. 527.
 1. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.
Mülleri Hpe. in *Linn.* 1856, p. 215.
Pterobryum Mülleri Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 81.
 2. — *Pac.*: Austral. fel., ins. Lord Howe.
Nadeaudianum Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.*, p. 58.
 1. In argill. vulcan. — *Pac.*: Taïti.
nanum C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (*nom.*).
 — *Afr.*: Ins. Franciae.
nematosum C. M. *M. Polyn.* p. 80.
 2. — *Pac.*: Austral. or. (Nov. Valesia).
nivale C. M. — H. *flavescens*.
neo-caledonicum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 222.
 1. Ad rup. humid. — *Pac.*: Nov. Caled.
norfolkianum C. M. *mss.*; Jaeg. *Ad. II*, p. 64 (*nom.*).
 — *Pac.*: Ins. Norfolk.
nossi-beanum C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 15 (*nom.*).
 — *Afr.*: Ins. Comores.
Novae Seelandiae C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 562.
 H. *Smithianum* H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 118 (*fid. Mitt.*).
 2. Ad arbor. — *Pac.*: Austral. fel., Nov. Zeland., Tasman.
 « *var. chilensis* Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 187.
 — *Am. merid.*: Valdivia.
oceanicum Mitt. in *Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 487.
 1. — *Pac.*: Ins. Kermadec, Norfolk, Raoul.
pallens Mitt. — H. *Struthiopteris*.

pennaeforme *Hsch. in Linn. 1841, p. 143; Brid. op. cit. p. 717? C. M. Syn. II, p. 10.*

Hypnum pennaeforme Thbg. Prodr. Fl. Capens. II, p. 175.

1. Rupic. — *Afr. : C. B. Sp.*

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 301.

pinnatum (*Hpe.*) *Jæg. Ad. II, p. 66.*

Lopidium pinnatum Hpe. in Linn. 1874, p. 672.

2. — *Pac. : Austral. or.*

Pirottæ Brizzi in Ann. d. real. Istit. bot. d. Roma, 1893, fasc. II.

2. Ad terr. humid. — *Afr. : Litt. occ. mar. Erythraei.*

planatum *C. M. in F. v. Müller's Fragm. phyt. Austr. XI, p. 115.*

— *Pac. : Austral. or. (Queensland).*

plumarium *Mitt. M. austr. am. p. 329.*

Lopidium plumarium Hpe. Enum. M. Brasil. p. 90.

1. Ad arbor. et rup. humid. — *Am. merid. : Brasil., ins. Chiloë. Pac. : Ins. Auckland.*

pseudo-Tamarisci *C. M. in Linn. 1876, p. 645.*

H. Tamarisci Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 111.

1. Lignic., ad arbor. et sax. in silv. humid. — *Am. sept. : Mexic.*

rigidulum *Mitt. M. austr. am. p. 329.*

1. Ad arbor. — *Am. sept. : And. Costa Ric. Am. merid. : And. Nov. Granat.*

rotulatum (*Hedw.*) *Brid. op. cit. p. 713; C. M. Syn. II, p. 9.*

Hookeria rotulata Sm. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 279.

Hypnum rotulatum P. B. Prodr. p. 69.

Leskea rotulata Hedw. Sp. M. p. 213, t. 5.

Pterygophyllum rotulatum Brid. Mant. M. p. 151.

1 (*Handb.*) ; 2 (*Brid.*). — *Pac. : Nov. Zeland. sept.*

rotulatum { *H. f. et W. — H. viridulum.*
 Mont. — H. tenellum.

Schmidii C. M. — Rhacopilum.

Scottiae C. M. in Linn. 1867-68, p. 619.

H. discolor (fid. Mitt.).

2. — *Pac. : Austral. or. subtropic.*

scutellatum *C. M. Syn. II, p. 7.*

Hypnum laricinum Hook. M. ex. t. 35 (spec. Capens. in tab. 34 delin. excl.).

2? — *Am. merid. : Nov. Granat. et And. Quitens.*

semi-globosum *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 153.*

Ad saxa irror. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

semi-marginatum *C. M. M. Polyn, p. 80.*

2? — *Pac. : Ins. Fidji, Samoa.*

serrulatum Lindb. — H. flavescens.

setosum Wils. — H. commutatum.

silvaticum Mitt. — H. flavescens.

sinicum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 169.

2? — *As. : Hong-Kong.*

Smithianum Hook. f. et Wils. Fl. Tasman. II, p. 217.

H. glaucum Sull. in U. St. Expl. Exped. p. 26.

H. Smithianum var. β H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 118.

2. Ad arbor. secus rivul. — *Pac.* : Nov. Zeland., Austral. (Victoria), Tasman.

var. β H. f. et W. — H. Smithianum.

spectabile C. M. — Rhacopilum.

sphaerocarpum F. Ren. in *Rev. bryol.* 1889, p. 88.

1. — *Afr.* : Ins. Franciae.

strumiferum C. M. — Rhacopilum.

Struthiopteris Brid. op. cit. p. 716; C. M. Syn. II, p. 4.

Hypnum *Struthiopteris* Schwaegr. Suppl. I, II, p. 182.

Hypopterygium pallens Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 76.

Lopidium pallens H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 119.

1. Ad arbor. et filic. — *As.* : M. Neilgherr. ; Ceylan ? *Afr.* : Ins. Bourbon. *Pac.* : Ins. Fidji (fid. Mitt.), Austral. or., Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.

Struthiopteris { *Bryol. jav.* — H. javanicum.
Mitt. — H. limbatum ?

subhumile Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 27.

— *Afr.* : Madagascar (Diego Suarez).

subtrichoclados Broth. in *Bol. d. Soc. Brot.* VIII, 1890.

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thom., Usambara.

tahitense Ångstr. in *Oefv...* 1873, n. 5, p. 121.

Ster. — *Pac.* : Taïti.

Tamarisci (Sw.) Brid. op. cit. p. 715 p.p. ; C. M. Syn. II, p. 8; Mitt. M. austr. am. p. 330.

Hookeria tamariscina Sm. in *Trans. of the Linn. Soc.* IX, p. 279 p.p.

Hypnum scutellatum Tayl. (fid. Mitt. l. c.).

H. Tamarisci Sw. *Fl. Ind. occ.* III, p. 1825 (excl. spec. ins. Franciae et Mar. Pacif.).

H. brasiliense Sull. in *U. St. Expl. Exped.* p. 26, t. 26.

Leskea tamariscina Hedw. M. frond. p. 212, t. 51.

Pterygophyllum jungermannioides Brid. Mant. M. p. 154.

Pt. tamariscinum ej. l. c. p.p.

1. Rupic. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaic. *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

Tamarisci Besch. — H. pseudo-Tamarisci.

tamariscinum { Brid. p.p. } — H. commutatum.
C. M. — H. torulosum.

tenellum C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 557; *Bryol. jav.* II, p. 13, t. 142.

H. ceylanicum Mitt. M. Ind. or. p. 148.

H. rotulatum Mont. M. Neilgherr. n. 3.

1 (*Bryol. jav.*) ; 2 (C. M.). Ad arbor. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.

Thouini (Schwaegr.) Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, III, p. 86; in *Hist. d. Chil. Bot. crypt.* t. 2, f. 4 et *Syll.* p. 1; C. M. Syn. II, p. 4.

Hypnum Arbuscula P. B. Prodr. p. 61 ?

H. Thouini Schwaegr. Suppl. III, II, II, t. 289.

H. Arbuscula Brid. op. cit. p. 717.

H. speciosum C. M. in *Linn.* 1844, p. 683.

2. — *Am. merid.* : Ins. Chiloë, Chile, Patagon. austr., terr. Magellan.

tibetanum Mitt. M. Ind. or. p. 148.

1. — *As.* : Tibet occ.

tomentosum C. M. — *Rhacopilum*.

torulosum W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 185.

H. tamariscinum Brid. *op. cit.* p. 715 p.p.

1. Ad arbor. et rup. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae, Madagasc. sept.

« *var. Kameruniae* Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 217.

— *Afr.* : M. Cameroon.

« *var. nossi-beanum* Besch. *op. et l. cc.*

— *Afr.* : Ins. Nossi-Be.

trichocladon *Bryol. jav. II*, p. 9, t. 138.

2. Ad arbor. — *As.* : Ins. Halmaheira Molucc., Java.

uliginosum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 470.

Ster. Paludic. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos-Ayr.

viridissimum C. M. in *Linn.* 1876, p. 255.

Ad arbor. — *Afr.* : Usambara, ins. Anjouan.

viridulum Mitt. in *Hook. f. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 487.

H. rotulatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. Fl. II*, p. 118.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Austral. or.
(Queensland), Victoria.

Vriesei *Bryol. jav. II*, p. 11, t. 140.

2. fr. ign. — *As.* : Ins. Ceram.

vulcanicum Colenso in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1888, p. 43.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

ILLECEBRARIA Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, V ser., III.

julacea Hpe. — *Angstroemia*.

Illecebrina C. M. mss. (sect. HYPNI).

ISCHYRODON C. M. in *Linn.* 1875, p. 443 (3 spec.).

leptocladus Rehm. *M. Afr. austr. n.* 633.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Rehmanni C. M. in *Rehm. l. c. n.* 91.

— *Afr.* : C. B. Sp.

seriolus (Hpe.) C. M. in *Linn. l. c.*

Fabronia seriola ej. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 367.

Hypnum seriolum Hpe. in *M. Ecklon.*

1. Saxic. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 351 et b.

« *var. albicans* C. M. in *Rehm. l. c. n.* 352.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Isocarpus Mitt. *M. austr. am. p.* 63 (sect. DICRANI).

ISOCLADUS Lindb. in *Oefv...* 1862, p. 134.

macrophyllus Lindb. — *Sphagnum*.

Iso Irepanium Mitt. *M. austr. am. p.* 363 (sect. LEPIDOPILI).

ISOPTERYGIUM ej. op. cit. p. 497 (93 spec.).

acuminatum Bosw. in *Journ. of bot.* 1892, p. 99.

— *Pac.* : Tasman.

affusum Mitt. *M. austr. am.* p. 499.

Ster.

— *Am. merid.* : Amazon., Brasil.

albescens (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 499.

Hypnum albescens Schwaegr. *Suppl. III, I, I, II*, t. 226 ; *C. M. Syn. II*, p. 279.

Stereodon albescens Mitt. *M. Ind. or.* p. 104.

1. — *As.* : Nepal., Khasia, M. Neilgherr., Java, Borneo, Celebes.

album Jaeg. — *Plagiothecium micans*.

Anderssonii (Ångstr.) Par.

Plagiothecium Anderssonii Ångstr. in *Oefv...* 1872, n. 4, p. 15.

1.

— *Pac.* : Ins. Sandwic. (Honolulu).

anomalum Broth. in *Mitth. aus d. deutsch. Schutzgeb.* 1893, III (nom).

— *Afr.* : Togo.

argentatum Broth. in op. et l. cc. (nom.).

— *Afr.* : Togo.

argyroleucon C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 173 ; *Ren. in Rev. bryol.* 1889, p. 84 *descript. fruct.*.

1.

— *Afr.* : Ins. Franciaie.

argyroleucon Ren. et Card. (M. Masc. Mad.). — *Taxithelium argyrophyl- lum*.

arquifolium (*Bryol. jav.*) Par.

Hypnum arquifolium *Bryol. jav. II*, p. 186, t. 284.

2. ♀ et fr. ign.

— *As.* : Amboine, Java.

assamicum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 498.

Stereodon assamicus Mitt. *M. Ind. or.* p. 104.

1.

— *As.* : Assam.

atrotheca Jaeg. — *Brachythecium*.

austro-pusillum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 501.

Hypnum austro-pusillum C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 159.

1.

— *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

? *bancanum* (*Bryol. jav.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 508.

Hypnum bancanum *Bryol. jav. II*, p. 188, t. 286.

1. In silv. — *As.* : Ins. Banca.

Boivini Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 175.

Microthamnium Boivini W. P. Sch. in *Jaeg. Ad. ?*

1.

— *Afr.* : S. Maria de Madagascar.

Borreri Lindb. — *Plagiothecium elegans*.

brachyneuron (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 498.

Hypnum brachyneuron C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 109 et *Syn. II*, p. 278.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

byssicaule (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 502.

Hypnum byssicaule C. M. *M. Polyn.* p. 86.

1. Ad littus. — *Pac.* : Ins. Samoa.

byssicladus (C. M.) Par.

Taxicaulis byssicladus C. M. in Dusen M. Camer. n. 128.

— Afr. : M. Cameroon.

Cacti (C. M.) Par.

Hypnum Cacti C. M. in Linn. 1878-79, p. 437.

1. — Am. merid. : Argentin, Urug.

Cameruniae C. M. in Dusen M. Camer. n. 684.

— Afr. : M. Cameroon.

candidulum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 501.

Hypnum candidulum C. M. in Linn. 1875, p. 460.

Ster. Rupic. — Afr. : Niam-Niam.

candidum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 503.

Hypnum candidum C. M. in Linn. 1867-68, p. 624.

1. — Pac. : Austral. or.

? capillipes (Bryol. jav.) Jaeg. Ad. p. 508.

Hypnum capillipes Bryol. jav. II, pp. 188 et 228, t. 287.

1. — As. : Java, Sumatra.

chlorosum (Hpe.) Par.

Hypnum chlorosum Hpe. in Fl. p. 1881.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Chrismari (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 500.

Hypnum Chrismari C. M. Syn. II, p. 682.

Plagiothecium Chrismari Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 107.

1. — Am. sept. : Mexic.

chryseolum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 173.

1. — Afr. : Ins. Borbon.

clerophilum Besch. in Journ. de bot. 1890, p.

1. Arenic. — As. : Tonkin.

Combae Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 173.

1. — Afr. : Ins. Nossi-Comba.

compressicaule (C. M.) Par.

Taxicaulis compressicaulis C. M. in Dusen M. Camer. n. 758.

— Afr. : M. Cameroon.

conangium (C. M.) Par.

Taxicaulis conangius C. M. in Dusen M. Camer. n. 872.

— Afr. : M. Cameroon.

cordovense (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 502

Hypnum cordovense C. M. in Linn. 1874, p. 651.

1. Lignic. in silv. — Am. sept. : Mexic.

curvicollum (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 498.

Hypnum curvicollum C. M. Syn. II, p. 684.

1. Cortic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

delicatulum Jaeg. — Rhaphidostegium.

densifolium Lindb. — Rhynchostegium.

var. concavum Broth. — Rhynchostegium densifolium var. concavum.

deplanatum Mitt. — Rhynchostegium.

depressum Mitt. — Rhynchostegium.

distichaceum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 505.

Stereodon distichaceus Mitt. *M. Ind. or.* p. 105.

1. — *As.*: Nepal., Himalaya occ.

Draytoni (Sull.) Jaeg. *Ad. II*, p. 508.

Hypnum Draytoni Sull. in *Proced. of the Am. Acad.* 1854.

— *Pac.*: Ins. Sandwic.

elegans Lindb. — *Plagiothecium*.

erythrangium (C. M.) Par.

Taxitaulis erythrangius C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 763.

— *Afr.*: M. Cameroon.

Eudorae (Sull.) Jaeg. *l. c.*

Hypnum Eudorae Sull. in *op. et l. cc.*

— *Pac.*: Ins. Sandwic.

? *eutrypherum* (C. M.) Par.

Hypnum eutrypherum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 497.

1. — *Am. merid.*: Venezuela.

flaccidum (Sull. et Lesq.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 176.

Hypnum flaccidum S. et L.

1. *Terr.* — *As.*: Japon.

fuegianum Besch. — *Plagiothecium magellanicum*.

gemmigerum (C. M.) Par.

Taxicaulis gemmigerus C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 43.

— *Afr.*: M. Cameroon.

geophilum Jaeg. — *Rhynchostegium*.

gibbosulum Jaeg. — *Rhaphidostegium*.

gracilisetum Jaeg. — *Ectropothecium*.

guarapense Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 19 (nom.) et in *Journ. de bot.* 1891, p.

1. *Cortic.* — *Am. merid.*: Paraguay.

Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 3619.

Herminieri W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 82.

1. In rivul. — *Am. sept.*: Guadalup.

hospitans (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 560.

Hypnum hospitans Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, V, 1866, p. 313.

1. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

intortum (P. B.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 175.

Hypnum aoratum Duby in *Mém. Genève?* (fid. Besch. *l. c.*) (1).

H. intortum P. B. *Prodr.* p. 65; *C. M. Syn. II*, p. 398.

Isothecium intortum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 383.

2. ? Ad arbor. et terr. — *Afr.*: Ins. Franciae.

* *var. Chenagoni* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 126.

— *Afr.*: Madagascar.

Ivoreanum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 505.

Stereodon Ivoreanus Mitt. *M. Ind. or.* p. 105.

Ster. — *As.*: Nepal, M. Neilgherr.

(1) Cf. *Trichosteleum aoratum*.

Jamesii Jaeg. — *Rhaphidostegium*.

leiotheca Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 134.
1. — *Afr.* : Ins. Borbon.

leptoblastum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 174.
Hypnum leptoblastum C. M. 'n *Linn.* 1876, p. 280.
1. — *Afr.* : Ins. Anjouan.

leptomiton (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 502.
Hypnum leptomiton C. M. in *Linn.* 1874, p. 652.
1. — *Am. sept.* : Guatemala.

lepturum (C. M.) Par.
Taxicaulis lepturus C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 248.
— *Afr.* : M. Cameroon

leuco-glaucum (C. M.) Par.
Taxicaulis leuco-glaucus C. M. l. c. n. 848.
— *Afr.* : M. Cameroon.

leucophanes (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 505.
Hypnum leucophanes Hpe. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 169.
1. — *Afr.* : C. B. Sp.

leucophyllum (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 499.
Hypnum leucophyllum Hpe. in *C. M. Syn. II*, p. 280.
1. Cortic. — *Am. merid.* : Chile.

lignicola (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 498.
Hypnum lignicola Mitt. in *Hook. Journ. of bot.* 1856, p. 355.
Stereodon lignicola Mitt. *M. Ind. or.* p. 104.
1. Lignic. — *As.* : Pegu.

lonchopelma (C. M.) Jaeg. l. c.
Hypnum lonchopelma C. M. *M. Polyn.* p. 87.
1. — *Pac.* : Ins. Samoa.

longithea (Mitt.) Jaeg. l. c.
Stereodon longithea Mitt. *op. et l. cc.*
2. Lignic. — *As.* : Sikkim.

ma-coense Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1887, p. 99.
1. Lignic. — *As.* : Tonkin.

M'Bangae (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 501.
Hypnum M'Bangae C. M. in *Linn.* 1875, p. 460.
1. Cortic. — *Afr.* : Niam-Niam.

microplumula (C. M.) Par.
Taxicaulis microplumula C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 922.
— *Afr.* : M. Cameroon.

minutirameum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 500.
Hypnum minutirameum C. M. *Syn. II*, p. 689; *Bryol. jav. II*, p. 191, t. 290.
1. Rupic. — *As.* : Java, ins. Banca, Borneo.
« var. *tonkinense* Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 85.
Ad rad. arb. — *As.* : Tonkin.

Miquelii (*Bryol. jav.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 509.

Hypnum Miquelii Bryol. jav. II, p. 187, t. 285.

Syn. In silvis. — *As.* : Sumatra, M. Java, ins. Banca, Borneo.

miradoricum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 502.

Hypnum miradoricum C. M. in Linn. 1876, p. 650.

l. Ad arbor. in silv. — *Am. sept.* : Mexic.

molliculum (*Sull.*) *Mitt. Fl. Vit.* p. 399.

Hypnum molliculum Sull. in U. St. Expl. Exped. Wilkes, p. 14, t. II et in *Proced. of the Am. Acad.*, 1854.

l. Lignic. — *Pac.* : Ins. Sandwic., Fidji, Kermadec, Raoul, lord Howe.

Müllerianum *Jaeg.* — *Plagiothecium*.

nanoglobum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum nanoglobum C. M. in Fl. 1886, p. 284.

l. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

nematocaulon *Jaeg.* — *Rhaphidostegium*.

nervatulum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum nervatulum C. M. M. Polyn. p. 87.

l. — *Pac.* : Ins. Samoa.

nitidum *Lindb.* — *Plagiothecium*.

var. *pulchellum* *Lindb.* — *Plagiothecium pulchellum*.

nivescens (*C. M.*) *Par.*

Hypnum nivescens C. M. in Dusen M. Camer. n. A 10.

— *Afr.* : M. Cameroon.

norfolkianum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 501.

l. molliculum (*fid. Mitt.*).

Hypnum nitidulum Hpe. in Linn. Neue Folge, p. 254.

H. norfolkianum *C. M. in Linn.* 1871-73, p. 160.

l. — *Pac.* : Ins. Norfolk.

ochrangium (*C. M.*) *Par.*

Taxicaulis ochrangius C. M. in Dusen M. Camer. n. 355.

— *Afr.* : M. Cameroon.

pallido-imbricatum (*C. M.*) *Par.*

Taxicaulis pallido-imbricatus C. M. l. c. n. 876.

— *Afr.* : M. Cameroon.

pallidulum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 498.

Stereodon pallidulus Mitt. M. Ind. or. p. 105.

l. Terr. — *As.* : Himalaya occ.

planissimum *Mitt. M. austr. am.* p. 498.

Ster.

— *Am. sept.* : Jamaïc. *Am. merid.* : And. Qui-

tens.

plano-squarrosus (*C. M.*) *Par.*

Taxicaulis plano-squarrosus C. M. in Dusen M. Camer. n. 696.

— *Afr.* : M. Cameroon.

plumirameum (*C. M.*) *Par.*

Taxicaulis plumiramens C. M. l. c. n. 683.

— *Afr.* : M. Cameroon.

pohliaecarpum (Sull. et Lesq.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 176.

Hypnum pohliaecarpum S. et L.

2. Terr. — As. : Japon.

prasiellum Besch. in *Journ. de bot.* 1894, p. 60.

1. — Afr. : Congo gall. (Brazzaville).

pratense Lindb. — *Hypnum*.

pulchellum Jaeg. — *Plagiothecium*.

radicans (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 175.

Hypnum radicans Brid. *Mant. M.* p. 184 ; *C. M. Syn. II*, p. 281.

Leskea serrulata Brid. *Bryol. univ. II*, p. 763.

— Afr. : Ins. Bourbon. ?

ramivagum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 797.

— Afr. : M. Cameroon.

repens Lindb. — *Plagiothecium silesiacum*.

robustum Broth. in *Bot. Centralbl.* 1888, n. 87.

2. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

saporense Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 96.

Ad arbor. — Afr. : Ins. Mayotte.

Smallii (Sull. et Lesq.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 176.

Hypnum Smallii S. et L. in *Proced. of the Am. Acad.* 1859, p. 281.

2. Lignic. — As. : Japon., ins. Bonin.

stenosekos (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 503.

Hypnum stenosekos W. et D. in *Mém... Genève*, 1871, p. 14, t. I, f. 2.

1. Ad arbor. — Afr. : Angola.

? *streptopodium* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 83.

1. — Am. sept. : Guadalup.

subalbidum (Sull. et Lesq.) Mitt. in *op. et l. cc.*

Hypnum subalbidum S. et L. in *op. et l. cc.*

1. Lignic. — As. : Japon., ins. Bonin.

subdepressum Jaeg. — *Rhaphidostegium*.

subfalcatum Jaeg. — *Plagiothecium*.

subcurvicollum (C. M.) Par.

Hypnum subcurvicollum C. M. in *Ule Bryoth. bras. n.* 87.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

subleptoblastum C. M. in Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 174.

1. Lignic. — Afr. : Ins. Mayotte, Nossi-Comba.

submammosulum (C. M.) Par.

Hypnum submammosulum C. M. in *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. d. Neu Guin.* p. 8, t. 7.

1. Ad arbor. — Pac. : Nov. Guin. merid.

submicrothecium Mitt. — *Pterogoniella submicrotheca*.

subtenerum Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 19 et in *Journ. de bot.* 1891.

1. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3686.

subverrucosum (Geh.) Par.

Hypnum subverrucosum Geh. *Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guinea*, p. 9.

1. Ad arbor. — Pac. : Nov. Guin. merid.

taxiforme (Brid.) Jaeg. Ad. II, p. 502.

Hypnum taxiforme Brid. Bryol. univ. II, p. 392; C. M. Syn. II, p. 281.

2. Terr. — Afr. : Sierra Leone.

taxirameum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 505.

Stereodon taxirameus Mitt. M. Ind. or. p. 105.

2? — As. : Himalaya, Khasia, Assam, Ceylan.

tenerifolium Mitt. M. austr. am. p. 499.

1. — Am. merid. : Amazon.

tenerum (Sw.) Mitt. op. et l. cc.

Hypnum pygmaeum C. M. Syn. II, p. 288.

H. tenerum Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1817; C. M. l. c. p. 397.

Isothecium tenerum Brid. Bryol. univ. II, p. 385.

Leskea pygmaea Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 197.

1. Ad arbor. — Am. sept. : Ludovic., ins. Bermud., Antill. omn.

Am. merid. : Nov. Granat., Amazon., And. Quitens. et Peruv.

Textori (Sande-Lac.) Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 176.

Rhynchostegium Textori S. Lac. in Miq. Ann. Mus. bot. Lugd. Bat. II, p. 299.

— As. : Japon.

Teysmanni (Bryol. jav.) Jaeg. Ad. II, p. 499.

Hypnum Teysmanni Bryol. jav. II, p. 192, t. 290.

2. — As. : Sumatra.

trichocaulis (C. M.) Par.

Taxicaulis trichocaulis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1891, p. 601 (nom.).

Ster. — As. : Birman. super.

turfaceum Lindb. — *Plagiothecium*.

umbilicatum Mitt. — *Hypnum*.

verruculosum (C. M.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 174.

Hypnum verruculosum C. M. in Linn. 1876, p. 278.

Cortic. — Afr. : Ins. Anjouan.

virenti-rameum (C. M.) Par.

Taxicaulis virenti-rameus C. M. in Dusen M. Camer. n 771.

— Afr. : M. Cameroon.

Yokoskæ Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 386.

1. — As. : Japon.

Exs. : Savatier n. 683 p.p.

Walterianum Mitt. — *Hypnum* (1).

ISOTHECIUM Brid. Bryol. univ. II, p. 355 (13 spec.).

acuticuspis (Mitt.) Kindb. in Mac. Cat. p. 204.

Eurhynchium acuticuspis Jaeg. Ad. II, p. 413.

Hypnum acuticuspis Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 34; Lesq. et Jam. Man. p. 349.

(1) In Enum. Kindberg. nom. nud. :

I. *Baileyi* C. M.
concauum Lindb.

I. *fissidentifolium* C. M.
nervatocaulon C. M.

1. *myosuroides subsp. brevinerve* Kindb.
 2. — *Am. sept.* : Columb. brit., Terr. nov.
- aggregatum* (Mitt.) Kindb. in op. et l. cc.
Eurhynchium aggregatum Jaeg. Ad. II, p. 360.
Hypnum aggregatum Mitt. in op. cit. p. 35, t. 6; *Lesq. et Jam. Man.* p. 350.
 2. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.
- alopecurum* Brid. — *Thamnium*.
amœnum Brid. — *Rhaphidostegium*.
Andrieuxii Mont. — *Rosea*.
angustatum Mitt. — *Camptochaete*.
apiculatum Hüb. — *Myurella*.
- apocladum* (Mitt.) Kindb. in op. et l. cc.
Eurhynchium apocladum Jaeg. Ad. II, p. 376.
Hypnum apocladum Mitt. in op. et l. cc.; *Lesq. et Jam. l. c.*
 2. — *Am. sept.* : Litt. sept. occid.
- Arbuscula* Brid. — *Camptochaete*.
 var. *deflexa* H. f. — *Camptochaete deflexa*.
Archeri H. f. et W. — *Hypnodendron*.
aureum Spr. — *Camptothecium*.
Beyrichii Mont. — *Cylindrothecium plicatum*.
bifarium Brid. — *Rhizogonium*.
- brachycladon* Kindb. in *Rev. bryol.* 1895, p. 82.
 Ster. Ad rupes humidas. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.
- Brewerianum* (Lesq.) Kindb. in op. et l. cc.
Eurhynchium Brewerianum Jaeg. Ad. II, p. 413.
Hypnum Brewerianum Lesq. in *Trans. of the Am. Phil. Soc.* XIII, p. 12;
Lesq. et Jam. Man. p. 319.
 2. Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Washington,
 Oregon, Nevada, Calif.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 294 p.p. (*Hypnum*).
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 426 (*Hypnum*).
 « var. *lutescens* (Sull.) Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 20.
Hypnum Brewerianum var. *lutescens* Lesq. et Jam. l. c.
H. Brewerianum var. Sull. M. bor. am. p. 71.
 Ut et cum typ.
Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 427 (*Hypnum*).
- bryiforme* Brid. — *Brachythecium acuminatum*.
Buchanani Brid. — *Papillaria*.
- Cardoti* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club.* XVII, p. 278 (nom.).
 2. Cortic. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.
- catenulatum* Hüb. — *Pseudo-Leskea catenulata*.
chryseum Spr. — *Orthothecium*.
circinans Saut. — *I. myurum* var. *circinans*.
Colensoi H. f. et W. — *Mniodendron comatum*.
comatum eor. — *Mniodendron*.
comosum Brid. — *Mniodendron*.
compressum Hpe. — *Cylindrothecium*.
crassiusculum { Bourg. — *Rhaphidostegium auricomum*.
 { Brid. p.p. — *Rhaphidostegium*.
crispifolium Brid. — *Thuidium*.
cymbifolium Lindb. — *Porotrichum*.

diversiforme (Mitt.) Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 371.

Hypnum diversiforme Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 185.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 217.

elegans Brid. — Plagiothecium.

flexile Brid. p. p. { (fid. Besch.). — Pilotrichella Mascarenae.
(fid. C. M.). — Pilotrichella flexilis.
(fid. C. M.). — Lembophyllum cochlearifolium.
(fid. Hpe.). — Pilotrichella Billardieri.

gracile H. f. et W. — Camptochaete.

hakkodense Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 371.

1. Ad arbor. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 826.

hexastichum Brid. — Pilotrichella.

Holtii Kindb. — Eurhynchium myosuroides var. rivulare.

homomallum Spr. — Orthothecium intricatum.

Howei Kindb. in Rev. bryol. 1895, p. 82.

Lignic. — Am. sept. : Calif.

imbricatum Brid. — Pilotrichella versicolor.

insidiosum Mont. — Cyandrothecium concinnum.

intermedium Thiele. — Porotrichum Thieleanum.

intortum Brid. — Isopterygium.

intricatum Boul. — Orthothecium.

julaceum Brid. — Myurella.

var. *atratum* Brid. — Myurella julacea.

Kerrii Hook. — Hypnodendron.

laxifolium Brid. — Thuidium.

lentum (Mitt.) Kindb. in Mac. Cat. p. 203.

Eurhynchium lentum Jaeg. Ad. II, p. 376.

Hypnum lentum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 36.

H. stoloniferum Mac. Canad. M. n. 292 p.p.

2. Ad arbor. — Am. sept. : Litt. sept. occ. ; ins. Vancouver.

leptochaeton Brid. — Rhaphidostegium.

livens Brid. — Pilotrichella.

longisetum W. P. Sch. — Erythrodontium.

lutescens Spr. — Camptothecium.

marginatum H. f. et W. — Hypnodendron.

Menziesii Brid. — Hypnodendron.

minus Sull. — Anomodon obtusifolius.

molle Mitt. — Pilotrichella.

moniliforme Hüb. — Myurella julacea.

mutabile Spr. — Lescuraea striata.

 Brid. — Eurhynchium.
myosuroides { subsp. *brevinerve* Kindb. — I. acuticuspis.
 subsp. *hylocomioides* Kindb. — Eurhynchium myosuroides
 var. *hylocomioides*.

myurellum Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 269 et in Mac. Cat. p. 204.

2. Lignic. — Am. sept. : Columb. brit., ins. Vancouver.

myurum (Poll.) Brid. Bryol. univ. II, p. 367 ; Bryol. eur. V (mon. p.), t. 533 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 629.

Hypnum alopecuroides Lam. Encycl. meth. bot.

H. curvatum Sw Fl. Suec. 1798, p. 64.

H. mosquitense Brid. Sp. M. II, p. 147.

H. myosuroides Hedw. *M. frond.* IV, p. 20, t. 8.

H. myosuroides var. β L. *Sp. pl.* p. 1130.

H. myosuroides, crassius, capsulis erectis Dill. *Hist. M.* p. 316, t. 41, f. 50.

H. myosuron Gmel. *Syst. nat.* II, p. 1346.

H. myurum Poll. *Pal. III* (1777), n. 1054; *Brid. Mant. M.* p. 164; *C. M. Syn.* II, p. 498.

H. ornithopodioides Fl. Dzn.

H. spinosum Sibth. ?

H. vagum Neck. in *Act. Acad. Theod.-palat.* II, p. 453.

H. viviparum Neck. *Fl. Gall. Belg.* II, p. 475.

I. myurum β *mosquitense* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 369 (*patria suspect.* !)

I. viviparum Lindb. *M. Scand.* p. 36.

Leskea curvata Voit *M. Herbip.* p. 72.

L. incurvata Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 368.

L. myosuroides Hedw. *Fund. M.* II, p. 93.

L. myura Boul. *M. Est Fr.* p. 326.

L. prolifera Lumnitz *Fl. Posen*, n. 1069.

L. vivipara Timm. *Prodr. Fl. Megap.* n. 808.

2. Ad rad. arbor., saxa rupesq. granit. et arenac. — *Eur.* : Reg. campestr. *As.* : Caucas. *Afr.* : Alger.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 190, 485.

« *var. circinans* (Saut.) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum circinans W. P. Sch. *mss.* ; *C. M. Syn.* II, p. 500.

I. circinans Saut. in *Regensb. Diar. bot.* 1850, p. 444.

Ut typ. — *Eur.* : Salzburg.

« *var. elongatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hand raro ad terr. in silv. et ericet. — *Eur.* : Ubi typ.

var. filesceus Ren. — *Eurhynchium myosuroides var. cavernarum.*

« *var. gracilius* Besch. *Cat. M. Alger*, p. 34.

Rupic. — *Afr.* : Alger.

f. humilis Gravet. — *Eurhynchium myosuroides var. cavernarum*

var. mosquitense Brid. — *I. myurum.*

var. rivulare Holt. — *Eurhynchium myosuroides var. rivulare.*

« *var. robustum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ut typ. — *Eur.* : Reg. mont. et subalp.

« *var. scabridum* *Limpr. Laubm. Deutschl.* III, p. 42.

Ad rupes gneiss. — *Eur.* : Stiria.

« *var. tumidiusculum* (Lam.) Hüb. *Muscol. germ.* p. 603.

H. myosuroides var. crassum Web. *Spic. fl. Goett* p. 94.

H. tumidiusculum Lam. *Syn. fl. Gall.* p. 109.

Ad rup. argill. et calcar. — *Eur.* : Stiria.

« *var. vermiculare* Mdo. *Moosst. Alg. Alp.* p. 88.

Ad rup. humid. — *Eur.* : Alp. Algov.

neckeroides Brid. — *Thamnium.*

neilgheriense Mont. — *Orthothecium.*

nigricans Brid. — *Pilotrichella.*

obtusatulum Kindb. — *Eurhynchium.*

ornithopodioides Boul. — *Pterogonium gracile.*

orthocarpum Brid. — *Plagiothecium.*

pallidum Brid. — *Microthamnium reptans.*

pandum H. f. et W. — *Thamnium.*

patens Brid. — *Meteorium.*

pendulum Brid. — *Eurhynchium.*

pentastichum { Brid. — *Pilotrichella imbricata.*

{ C. M. — *Pilotrichella quinquefaria.*

Philippianum Spr. — *Homalothecium*.

physaophyllos (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 366.

Hypnum physaophyllos W. et D. in *Mém... Genève*, 1871, p. 10, t. 4, f. 2.
2. Ad arbor. et terr. — *Afr.* : Angola.

polyanthum Spr. — *Pylaisaea*.

pulvinatum H. f. et W. — *Camptochaete*.

pumilum H. f. et W. — *Thamnium*.

radiatum Brid. — *Hypnum*.

radicans Brid. — *Papillaria nigrescens*.

ramulosum Mitt. — *Camptochaete*.

repens Spr. — *Platygyrium*.

Richardi Brid. — *Rhaphidostegium subsimplex*.

rufescens Hüb. — *Orthothecium*.

var. *chryseon* Hüb. — *Orthothecium chryseum*.

Schleicheri Spr. — *Cylindrothecium cladorhizans*.

sericeum Spr. — *Homalothecium*.

β *fallax* Boul. — *Homalothecium fallax*.

Sieberi H. f. et W. — *Mniodendron*.

spiculiferum Mitt. — *Eurhynchium*.

spininervium H. f. et W. — *Hypnodendron*.

stenocarpum W. P. Sch. — *Cylindrothecium*.

stoloniferum Brid. — *Eurhynchium*.

striatum Spr. — *Lescuraea*.

β *saxicola* Boul. — *Lescuraea striata* var. *saxicola*.

strictum Boul. — *Orthothecium*.

subseriatum Lindb. — *Thamnium Sandei*.

subsimplex Brid. p.p. — *Rhaphidostegium*.

sulcatum H. f. et W. — *Climacium*.

tenerum Brid. — *Isopterygium*.

tenuifolium Brid. — *Rhynchostegium*.

tetragonum Brid. — *Pilotrichella*.

var. *piligerum* Mont. — *Meteorium longissimum*.

tetrastichum Brid. — *Pilotrichella longipes*?

Thunbergii Brid. — *Pilotrichella*.

trachypodium Brid. — *Brachythecium*.

trichophorum Mont. — *Pilotrichella*.

viviparum Lindb. — *I. myurum*.

JÆGERINA C. M. in Linn. 1876, p. 274 (5 spec.).

flagellifera C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 1.

— *Afr.* : Ins. Comores.

formosa Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 122.

Ster. Ad rad. arb. — *Afr.* : Ins. Borbon.

Robillardii C. M. in Besch. *op. et l. cc.*

Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.

solitaria (Brid.) Besch. *op. cit.* p. 120.

Hypnum solitarium Brid. *Mant. M.* p. 184 et *Bryol. univ. II*, p. 540.

Pilotrichum solitarium C. M. *Syn. II*, p. 163.

2. Ad rad et trunc. arb. — *Afr.* : Ins. Borbon, Franciae.

* var. *nossi-beana* Besch. *op. cit.* p. 121.

— *Afr.* : Ins. Nossi-Be, Madagascar sept.

° var. *ramosa* ej. *l. c.*

— Ins. Borbon.

stolonifera C. M. in Linn. 1876, p. 274.

Pilotrichum stoloniferum ej. in Bot. Zeit. 1862.

2. Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan, Mayotte.

« var. clavata C. M. in op. et l. cc.

Ut typ. — Afr. : Ins. Anjouan.

JUNGERMANNIA Dill. ; L. Sp. 1662.

alpina, *surculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calycibus imbricatis* L. — { *Andreaea alpina* p.p.
Andreaea obovata p.p.
Andreaea petrophila p.p.
rupestris foliis subulatis secundis L. — *Andreaea rupestris*.

JURATZKAA Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 188.

semi-nervis Ltz. — *Helicodontium*.

KLEIOWEISIA Bayerh. in Jahresb. d. Ver. für Naturk. in Herzogth. Nassau, 1849, V, p. 3.

rostellata Bayerh. — *Hymenostomum*.

KÆLREUTERA Hedw. Fund. M. I.

hygrometrica Hedw. — *Funaria*.

KRAUSEELLA C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4 (1) (1 spec.).

tschutschica C. M. l. c.

Tetraplodon Müllerii Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 61.

T. tschutschicus Lindb. in Rev. bryol. 1884, p. 19.

1. — As. : Penins. Tschutsch.

LAMPROPHYLLUM W. P. Sch. Coroll. p. 101 (*Cyatophorum splendidissimum*); Lindb. in Oefv., 1867.

Spec. omn. (*Lindbergiarae*) WEBERAE sunt ejusd. nom.

LASIA Brid. Mant. M. p. 133.

Spec. omn. non indicatae sunt FORSTROEMLÆ ejusd. nom.

acicularis Spreng. — *Macromitrium filiforme*.

marginata Brid. — *Anomodon rostratus*.

ohioensis Jaeg. — *Leptodon*.

orthotrichoides Raddi. — *Macromitrium filiforme*.

Smithii Brid. — *Leptodon*.

subcapillata Brid. — *Homalothecium*.

trichomitrium Brid. — *Leptodon*.

LEERSIA Hedw. Fund. M. II, p. 88.

affinis L. — *Encalypta apophysata*.

alpina Lindb. — *Encalypta commutata*.

brevicollis Lindb. — *Encalypta*.

ciliata Hedw. — *Encalypta*.

cirrata Willd. — *Dicranoweisia*.

contorta L. — *Encalypta streptocarpa*.

cuspidata Schrank. — *Pottia lanceolata*.

extinctoria Leyss. — *Encalypta vulgaris*.

var. *pilifera* Lindb. — *Encalypta vulgaris* var. *pilifera*.

var. β Leyss. — *Encalypta ciliata*.

(1) Cf. Lindb. in Rev. bryol. 1884, p. 19.

- fimbriata* Brid. — *Encalypta ciliata*.
laciniata Hedw. — *Encalypta ciliata*.
lanceolata Hedw. — *Pottia*.
marginata Hedw. — *Encalypta vulgaris*.
procera L. — *Encalypta*.
pulvinata Hedw. — *Grimmia*.
rhabdocarpa Lindb. — *Encalypta*.
 var. *gymnostoma* L. et A. — *Encalypta rhabdocarpa* var. *gymnostoma*.
Selwyni D^{na} E. G. Britton. — *Encalypta*.
sibirica L. et A. — *Encalypta ciliata* var. *sibirica*.
spathulata Lindb. — *Encalypta*.
vulgaris Hedw. — *Encalypta*.
 β *alpina* Hedw. — *Encalypta rhabdocarpa*.

- Leiocystis** Lindb. *M. Scand.* p. 27 (sect. CYNODONTII).
Leiodon Lindb. *M. Scand.* p. 12 (sect. POLYTRICHI=POGONATUM).
Leiogonium C. M. M. *Polyn.* p. 69 (sect. PHYLLOGONII).
Leiolecythis C. M. in *Linn.* 1874, p. 620 (nom., sect. FUNARIAE).
Leiomela Mitt. *M. austr. am.* p. 268 (subsect. BARTRAMIAE).

LEIOMITRIUM Mitt. in *Phil. Trans. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.*), p. 390.
plicatum Mitt. — *Orthotrichum*.

- Leiodicranum** Limpr. *Laubm. Deutschl. I*, p. 366 (sect. DICRANI).
Leionotus C. M. M. *Polyn.* p. 57 (sect. LEUCOPHANIS).
Leiophyllum C. M. *Syn. II*, p. 41 (sect. NECKERAE).
Leiopodium Kindb. *Check-List. of Eur. and N. Am.* M. p. 22 (sect. EURHYNCHII sensu Kindb.).

LEIOSTOMA Mitt. in *Proced. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.* p. 99), *antea*
M. austr. am. p. 201, sect. MACROMITRII).
 Spec. omn. MACROMITRIA ejusd. nom.

LEIOTHECA Brid. *Bryol. univ. I*, p. 304.
 Spec. omn. non indicatae sunt MACROMITRIA ejusd. nom.
clavellata Brid. — *Drummondia*.

LEMBOPHYLLUM Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 277 (10 spec.).

auriculatum (Mont.) Par.

Acrocladium auriculatum Mitt. *M. austr. am.* p. 532 p.p.

Coelidium (1) *auriculatum* Jaeg. *Ad. II*, p. 318.

Hypnum auriculatum Mont. *Voy. au Pôle Sud, Crypt.* p. 331, t. 20, f. 3
 et *Syll.* p. 8; C. M. *Syn. II*, p. 273.

Plagiothecium magellanicum W. P. Sch. in *hb. Mus. Paris*.

Rupic. et terr. — *Am. merid.* : Patagon. austr., terr. Magell.,
Fuegia. Pac. : Nov. Zeland.

chlamydoephyllum (Hook. f. et Wils.) Par.

Acrocladium auriculatum Mitt. *op. et l. cc.* p.p.

Coelidium chlamydoephyllum Jaeg. *op. cit.* p. 384.

Hypnum chlamydoephyllum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844,
 p. 552 et *Fl. Antarct. I*, p. 139, t. 61; C. M. *Syn. II*, p. 374.

Stereodon auriculatus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 88.

[1] Nomen jam abusum. *Coelidium* Vogel in *Linn.* 1839, p. 472 (*Leguminosae*);
 Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 110 (1855); Reichdt. in *Reise d. Freg.*
Novara (1870). In *Indice*, p. 272, ut syn. modo servandum.

1. In silv. humid. — *Am. merid.* : Fuegia? (*fid. Handb. of N. Zeal. Fl.*) *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Austral. (Victoria), Tasman., ins. Campbell.

chlorocladon (C. M.) Par.

Camptochaete ramulosa (*fid. Mitt.*).

Hypnum chlorocladum C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 622.

- 2? — *Pac.* : Austral. (Victoria).

clandestinum (*Hook. f. et Wils.*) *Lindb. Contrib. ad Fl. bryol. As. bor. or.* 1872, p. 277 (*in adn.*).

Coelidium clandestinum *Jaeg. l. c.*

Hypnum clandestinum *H. f. et W. Fl. Tasm. II*, p. 201; *Fl. of the N. Zeal. III*, t. 90, f. 3 et *Handb.* p. 480.

Porotrichum clandestinum *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84.

1. In silv. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland. med., Austral. (Victoria), Tasman.

cochlearifolium (*Schwaegr.*) *Lindb. l. c.*

Coelidium cochlearifolium *Jaeg. op. cit.* p. 383.

Hypnum cochlearifolium *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 221, t. 88; C. M. *Syn. II*, p. 373; *H. f. et W. Fl. Tasm. II*, p. 211, *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 111 et *Handb.* p. 480.

H. flexile *Hook. M. ex. t.* 110.

Isothecium cochlearifolium *Mitt. in Hook. Journ. of bot.* 1856, p. 264.

I. flexile *Brid. Bryol. univ. II*, p. 361 p.p.

Porotrichum cochlearifolium *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, p. 84.

Stereodon cochlearifolius *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 88.

2. Rupic. — *Am. merid.* : Ins. Chiloë. *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Austral. (Victoria), Tasman, ins. Auckland, Campbell.

« *var. minus* (*Hpe.*) Par.

Hypnum cochlearifolium var. minus *Hpe in Linn.* 1872, p. 75 (*nom.*).

Ut typ.? — *Pac.* : Tasman.

divulsum (*Hook. f. et Wils.*) *Lindb. in op. et l. cc.*

Hypnum divulsum *H. f. et W. in Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 556; *Fl. of the N. Zeal. II*, p. III, t. 90, f. 4 et *Handb.* p. 481; C. M. *Syn. II*, p. 466.

Porotrichum divulsum *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84.

Thamniella divulsa *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 240.

2. Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Austral. (Victoria), Tasman.

inflatum (*Hook. f. et Wils.*) Par.

Coelidium inflatum *Jaeg. Ad. II*, p. 384.

Hypnum inflatum *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 111, t. 90, f. 5 et *Handb.* p. 481.

Ster. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med.

micro-vagum (C. M.) Par.

Hypnum micro-vagum C. M. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 275.

Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

porotrichoides (*Besch.*) Par.

Thamniella porotrichoides *Besch. op. et l. cc.*

2. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Caledon.

vagum (*Hsch.*) *Lindb. in op. et l. cc.*

Hypnum vagum *Hsch. in Sieber M. Nov. Holl. n.* 23; C. M. *Syn. II*, p. 466.

Porotrichum vagum Mitt. in op. et l. cc.

Rigodium vagum Reichdt. in *Reise d. Freg. Novara, Bot., I*, p. 188.

Thamniella vaga Besch. op. et l. cc.

2. — *Pac.*: Nov. Zeland. sept.?, Austral. or., Tasman.

LEPIDOPILUM Brid. Bryol. univ. II, p. 267. (129 spec.).

acutum Mitt. *M. austr. am.* p. 379.

2? — *Am. merid.*: And. Quitens.

affine C. M. in Linn. 1848, p. 192.

Hookeria affinis ej. *Syn. II*, p. 199.

— *Am. merid.*: Guian. batav.

albescens Hpe. — *Eriopus*.

amplirete (Sull.) Mitt. op. cit. p. 382.

Cylindrothecium amplirete Sull. in *Proced. of the Am Acad.*, 1861, p. 284
et in *Wright M. Cubens*, n. 72.

Ster. — *Am. sept.*: Cuba.

anceps Mitt. op. cit. p. 378.

Ad arbor. — *Am. merid.*: And. Quitens.

angolense (Welw. et Duby) Jaeg.

Hookeria angolensis W. et D. in *Mém... Genève*, 1871, p. 18, t. 5, f. 5.

Lepidopilum versicolor Mitt. ? (1)

2. Ad terr. humos. — *Afr.*: Angola.

angustifrons Hpe. in Linn. 1863, p. 153; Mitt. op. cit. p. 384.

1. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

Antillarum Mitt. op. cit. p. 377.

Syn. — *Am. sept.*: Martinic., ins. S. Vincent, Barbades.

apophysatum Hpe. in Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 85.

1. Ad arbor. — *Am. sept.*: Mexic.

arcuatum Mitt. op. cit. p. 374.

1. — *Am. merid.*: And. Quitens.

armatum Mitt. op. cit. p. 380.

— *Am. merid.*: And. Quitens.

aureo-fulvum C. M. in Linn. 1878-79, p. 495.

1. — *Am. merid.*: Venezuela.

aureo-purpureum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 94.

— *Am. merid.*: Brasil. subtropic. or.

aurescens ej. in op. cit. p. 435.

Ster. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.

aurifolium Mitt. op. cit. p. 371.

2. Ad arbor. — *Am. merid.*: And. Quitens.

australe Broth. in *Oefv.*, 1890, p.

2. Ad arbor. — *Pac.*: Austral. or. (Queensland).

binerve Brid. — *Hookeria scabriseta*.

(1) Cf. Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 309.

- brachychaete* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 457.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- brevifolium* Mitt. *op. cit.* p. 385.
Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- brevipes* Mitt. *op. cit.* p. 376.
— *Am. merid.* : And. Peruv.
- brunneolum* C. M. in *Linn.* 1876, p. 139.
Ster. — *Afr.* : Ins. Anjouan.
- caespitosum* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 138.
2? In silvis. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- callochroum* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 258 a.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- calvum* Mitt. *op. cit.* p. 377.
— *Am. merid.* : And. Peruv.
- caudatum* C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.
2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- caviusculum* Mitt. *op. cit.* p. 383.
— *Am. merid.* : And. Quitens.
- chloroneuron* (Tayl.) Mitt. *op. cit.* p. 385.
Hookeria chloroneura Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 61; C. M. *Syn. II*, p. 197.
— *Am. merid.* : M. Chimborazo et Pichincha.
- chloroneuron* Hpe. et Ltz. — L. Krauseanum.
- cladorhizans* Besch. in *Marie M. Guadalup. n.* 43 et in *Journ. de bot.* 1894, p. 63.
1. Cortic. — *Am. sept.* : Guadalup.
- contignum* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 193.
2? Ster. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- convallium* (Brid.) Mitt. *op. cit.* p. 377.
Hookeria convallium C. M. *Syn. II*, p. 200.
Pterygophyllum convallium Brid. *Bryol. univ. II*, p. 354.
— *Am. merid.* : « In convallibus Andium. »
- cubense* Sull. in *Proced. of the Am. Acad...* 1861; Mitt. *op. cit.* p. 384.
2? — *Am. sept.* : Cuba.
- curvifolium* Mitt. *op. cit.* p. 374.
— *Am. merid.* : And. Quitens.
- cuspidans* Mitt. *op. cit.* p. 378.
2? — *Am. merid.* : And. Quitens.
- daltoniaceum* Hpe. in *Linn.* 1863, p. 152; Mitt. *op. cit.* p. 371.
Daltonia binervis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 364.
Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- daltonioides* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 56.
1. Ad ramul. fructic. — *Am. sept.* : Guadalup.
- Darntyi* ej. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 140.
1. Ad arbor. annosior. — *Afr.* : Ins. Franciaë.
- Decaisnei* Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 84.
1. — *Am. sept.* : Mexic.

- Deppeanum (C. M.) Besch. op. et l. cc.
 Hookeria Deppeana C. M. Syn. II, p. 196.
 Lepidopilum subnerve Hsch. in Deppe M. Mexic.
 1. — Am. sept. : Mexic.
- devexum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 159.
 1. — Afr. : M. Cameroon.
- diaphanum (Sw.) Mitt. M. austr. am. p. 382.
 Hookeria diaphana W. Arn. Dispos. M. p. 56 ; C. M. Syn. II, p. 199.
 Hypnum diaphanum Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 140.
 Pterygophyllum diaphanum Brid. Bryol. univ. II, p. 345.
 — Am. sept. : Jamaic.
- divaricatum (Dz. et Mk.) Mitt. op. cit. p. 379.
 Hookeria divaricata D. et M. Prodr. fl. bryol. Surin. p. 49, t. 13.
 — Am. sept. : Venezuela.
- diversifolium Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 127.
 Ster. — Afr. : Madagasc. (Diego-Suarez).
- Dusen C. M. in Dusen M. Camer. n. 40 ; Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 201 (descriptio).
 1. — Afr. : M. Cameroon.
- epiphyllum Mitt. — Crossomitrium.
- erectiusculum (Tayl.) Mitt. op. cit. p. 371.
 Hookeria erectiuscula Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 60.
 — Am. merid. : And. Quitens. et Chilens.
- erubescens C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.
 2? — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- excelsum C. M. in op. et l. cc.
 2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- falcatum C. M. in Linn. 1876, p. 648.
 Ster. Ad arbor. in silv. — Am. sept. : Mexic.
- flaccidissimum Besch. in Marie M. Guadalup.
 — Am. sept. : Guadalup.
- flavescens Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil. p. 52.
 Puiggaria splendens Duby Choix de M. ex. 1880, p. 8, t. II, f. 4 (fid. Hpe. in Fl. 1880, n. 21).
 — Am. merid. : Brasil.
- flexicaule Hpe. — Eriopus.
- flexifolium (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 375 p.p.
 Hookeria flexifolia C. M. Syn. II, p. 206.
 Neckera biductulosa Schwaegr. Suppl. I, II, p. 155.
 Pilotrichum biductulosum P. B. Prodr. p. 82 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 266.
 2? Ad arbor. — Am. merid. : Ins. Trinitat., Guian., Amazon., And. Quitens. et Peruv.
- flexifolium Mitt. p.p — L. subflexifolium.
- flexuosum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 139.
 1. — Afr. : Ins. Borbon.
- floresianum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 194.
 1. In silv. — Am. sept. : Costa-Rica.

- fontanum* Mitt. — *Crossomitrium*.
- frondosum* Mitt. *op. cit.* p. 381.
— *Am. merid.* : Nov. Granat.
- fruticolum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 74.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- furcatum* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 310.
— *As.* : Ceylan.
- fuscidulum* Mitt. *M. austr. am.* p. 372.
2. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- ? *genuflexum* C. M. in *Linn.* 1876, p. 648.
Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
- Glaziovii* Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 50.
1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- goniothecium* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 49.
— *Am. merid.* : Venezuela.
- gracile* Mitt. *op. cit.* p. 377.
2? — *Am. merid.* : And. Quitens.
- Grevilleanum* (Tayl.) Mitt. *op. cit.* p. 381 p.p.
Hookeria Grevilleana Tayl. in *Lond. Journ. of bot* 1846, p. 60; C. M. *Syn. II*, p. 196.
Ad arbor. et saxa. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Guian., And. Quitens. et Peruv.
- Grevilleanum* Mitt. p.p. { — *L. Mittenii*.
— *L. obtusulum*.
- Hanningtoni* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 309.
1. — *Afr.* : M. Usagara.
- Herminieri* W. P. Sch. — *Crossomitrium*.
- Humbloti* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 128.
Ster. — *Afr.* : Magn. Comor.
- imbricatifolium* Mitt. *M. austr. am.* p. 372.
Ster. Saxic. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.
- inflexum* Mitt. *op. cit.* p. 375.
2? — *Am. merid.* : And. Quitens.
- integerrimum* Mitt. *op. cit.* p. 382.
— *Am. merid.* : And. Quitens.
- intermedium* (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 377.
Hookeria intermedia C. M. *Syn. II*, p. 195.
1. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.
- Isleanum* Besch. *Fl. bryol. Reunion, etc.* p. 138.
1. Ad gramina? — *Afr.* : Ins. Borbon.
- Krauseanum* C. M. in *Linn.* 1874, p. 608.
Hookeria erectifolia ej. *Syn. II*, p. 197.
L. chloroneuron Hpe. et Ltz. in *Bot. Zeit* 1868, p. 816.
2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Æquator.
- laete-nitens* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 194.
2? — *Am. sept.* : Costa Rica.
- laevisetum* Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 51.
1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

- Laskii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 309.
 1. Ad arbor. — Afr. : M. Usagara.
- latifolium (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 180.
 Hookeria latifolia C. M. Syn. II, p. 199.
 Ster. — Am. merid. : Ins. Trinitat.
- leiomitrium C. M. in Linn. 1878-79, p. 495.
 1. — Am. merid. : Venezuela.
- leiopus C. M. in Dusen M. Camer. n. 358.
 — Afr. : M. Cameroon.
- livens Besch. in Bull. hb. Boissier, 1894, p. 396.
 2? Ignic. — Am. sept. : And. Costa Ric.
- longicuspes C. M. in Ule Bryoth Brasil. n. 172.
 Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- longifolium Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 365; Mitt. op. cit. p. 384.
 — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- lorifolium Hpe. Symb. 1874, p. 504.
 L. loriforme ej. Enum. M. Brasil, p. 51.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- loriforme Hpe. — L. lorifolium.
- macropus Bryol. jav. II, p. 41, t. 164.
 1. Aquat. — As. : M. Java.
- maculatum C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.
 Ster. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- membranaceum (C. M.) Mitt. op. cit. p. 369.
 Hookeria membranacea C. M. Syn. II, p. 200.
 2? Ster. — Am. sept. : Barbades. Am. merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, And. Quitens.
- Mittenii C. M. in Linn. 1874, p. 607.
 L. Grevilleanum Mitt. op. cit. p. 381 p.p.
 2. — Am. merid. : Amazon.
- nniaceum C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.
 2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- Mohrianum C. M. in Linn. 1876, p. 649.
 L. Sartorii ej. in sched.
 L. subenerve Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 84?
 Ad arbor. in silv. — Am. sept. : Mexic.
- monilidontium Hpe. Symb. 1874, p. 504.
 1. Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- Moseni Broth. in Bihang till K. Sv. vet. Akad. Handl. n. 1895, n. 3.
 2. Ad saxa humida. — Am. merid. : Brasil. or.
- Mülleri Hpe. in Linn. 1847, p. 84.
 Hookeria Mülleri C. M. Syn. II, p. 195.
 L. subenerve ej. in Linn. 1847, p. 214.
 1. Ad arbor. et fol. emort. — Am. merid. : Venezuela, And. Nov. Granat. et Quitens.
- muricatulum C. M. in Dusen M. Camer. n. 678.
 — Afr. : M. Cameroon.

nitidum *Besch. Prodr. bryol. Mexic. p. 85.*

— *Am. sept.* : Mexic.

niveum (*C. M.*) *Par.*

Hookeria nivea C. M. in Fl. 1886, p. 281.

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

nudum *Mitt. op. cit. p. 376.*

— *Am. merid.* : M. Chimborazo.

nutans *Hpe.* — *Eriopus.*

oblongifolium *Mitt. op. cit. p. 383.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. or.

obtusulum *C. M. in Linn. 1874, p. 606.*

L. Grevilleum Mitt. op. cit. p. 381 p.p.

2. Ad arbor. et sax. — *Am. merid.* : Brasil. aequinoct.

ovalifolium (*Duby*) *Par.*

Puiggaria ovalifolia Duby Choix de M. ex. 1880, p. 8, t. 3, f. 4.

Ad arbor. — Brasil. austr. or.

Patrisiae *Mitt. p.p.* — *Crossomitrium Spruceanum.*

pectinatum *Mitt. op. cit. p. 381.*

2 ? — *Am. merid.* : And. Quitens.

pergracile *C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.*

1. Filicic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

phyalothecium (*C. M.*) *Par.*

Hookeria phyalothecia C. M. in Journ. of Bot. 1877, p. 229 (nom.).

Cortic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

phyllorhizum *Mitt. op. cit. p. 385.*

— *Am. sept.* : Cuba.

piliferum *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 85.*

2. Cortic. — *Am. sept.* : Mexic.

platyphyllum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 192.*

1. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica.

Polakowskyi (*C. M.*) *Par.*

Hookeria Polakowskyi C. M. in Journ. of Bot. 1877, p. 229 (nom.).

Cortic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

polytrichoides (*Hedw.*) *Brid. Bryol. univ. II, p. 269; Mitt. op. cit. p. 373.*

Chaetophora Perrini Brid. op. cit. p. 336 ?

Daltonia polytrichoides W. Arn. Disp. M. p. 55.

Hookeria Perrini Spreng. in Neu. Entdeck. III, p. 4.

H. polytrichoides ej. Syst. veg. IV, p. 197; C. M. Syn. II, p. 205.

H. rigida W. Arn. ? (fid. Mitt.).

Hypnum polytrichoides Hedw. Sp. M. p. 244, t. 61.

Neckera polytrichoides Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 231.

Orthotrichum polytrichoides Brid. M. Rec. p. 244, t. 61.

Pilotrichum polytrichoides ej. Mant. M. p. 140.

Polla binervis ej. Bryol. univ. I, p. 856.

Syn. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica, Jamaic., Hispaniola,

Porto Rico, Antill. gall. *Am. merid.* : Venezuela, Amazon., And.

Nov. Granat., Quitens., Peruv. et Chilens.

* var. costa-ricense *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, p. 192.*

- In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- « *var. pellucens* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr. p.* 57.
— *Am. sept.* : Guadalup.
- pumilum Mitt. *op. cit. p.* 381.
— *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.
- purpurascens W. P. Sch. in Besch. *op. cit. p.* 55.
2. — *Am. sept.* : Guadalup.
- purpuratum Mitt. *M. Ind. or. p.* 116.
1. — *As.* : Sikkim, Ceylan.
- radicale Mitt. *M. austr. am. p.* 378.
2. Filicie. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic. *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- robustum Mitt. *op. cit. p.* 385.
— *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- Sartorii C. M. — L. Mohrianum.
- secundum (Griff.) Mitt. *M. Ind. or. p.* 116.
Hookeria secunda Griff. *Not. p.* 477 et *Ic. Pl. Asiat. II, t.* 99, *f.* 2.
1. — *As.* : Khasia, Ceylan.
- semi-laeve Mitt. *M. austr. am. p.* 385.
2. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : Panama, And. Quitens.
- spinosum (C. M.). Jaeg. *Ad. II, p.* 232.
Hookeria spinosa C. M. *Syn. II, p.* 677.
— *As.* : Java.
- splendidissimum Mitt. — Cyatophorum.
- Splitgerberi Mitt. — Crossomitrium.
- Sprucei Mitt. — Actinodontium.
- stillicidiorum Mitt. *op. cit. p.* 373.
2? Ster. Ad saxa irror. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- streptogoneum C. M. in Dusen *M. Camer. n.* 107.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- subaurifolium Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.
Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subdivaricatum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. Belg.* 1894, *I, p.* 195.
2? — *Am. sept.* : Costa Rica.
- subnerve Brid. *Bryol. univ. II, p.* 268 ; Mitt. *op. cit. p.* 383.
Daltonia scabriseta W. Arn. *Disp. M. p.* 54.
Hookeria subnervis Hpe. in *Linn.* 1848, *p.* 84 ; C. M. *Syn. II, p.* 196.
Neckera scabriseta Schwaegr. *Suppl. I, II, p.* 153, *t.* 82.
Pilotrichum scabrisetum Brid. *Mant. M. p.* 141.
1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic.? Porto-Rico, Antill. gall. *Am. merid.* : Venezuela, Columb., Guian. gall., And. Quitens.
- subnerve { Besch. — L. Mohrianum ?
C. M. — L. Mülleri.
Hsch. — L. Deppeanum.
- subepiphyllum Besch. — Crossomitrium.

subflexifolium *C. M. in Linn.* 1874, p. 605.

L. flexifolium Mitt. *op. cit.* p. 375 p. p.

2. — *Am. merid.* : Amazon.

subfuscum Mitt. *op. cit.* p. 376.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Amazon., Brasil.

subpolytrichoides *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 495.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

subsubulatum *Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 51.

Puiggaria elegans *Duby Choix de M. ex.* 1880, p. 7, t. 3, f. I.

— *Am. merid.* : Brasil.

subulatum Mitt. *op. cit.* p. 380.

— *Am. merid.* : Brasil. or.

sumatranum *Bryol. jav. II*, p. 42, t. 165.

Hookeria incurva *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind.* p. 109.

1. Ad arbor. — *As.* : M. Sumatra.

surinamense *C. M. in Linn.* 1848, p. 193.

Hookeria surinamensis *ej. Syn. II*, p. 207.

Syn. ? Ad arbor. — *Am. merid.* : Guian. batav.

tenuifolium Mitt. *op. cit.* p. 382.

Ster. — *Am. merid.* : M. Chimborazo.

Thwaitesianum Mitt. *M. Ind. or.* p. 116.

1. — *As.* : Ceylan.

tortifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 374.

2. Ad saxa irror. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

undulatum *Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit.* 1869.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Aequator.

utacamundianum (*Mont.*) Mitt. *M. Ind. or.* p. 116.

Hookeria Lindenbergii *Hpe. in Linn.* 1847, p. 85.

H. utacamundiana *Mont. in Ann. sc. nat.* 1842, p. 247 et *Syll.* p. 13;
C. M. Syn. II, p. 197.

2. In silvis. — *As.* : M. Neilgherr.

venustum *Toyl. mss.* ; Mitt. *M. austr. am.* p. 371.

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.

versicolor Mitt. *in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 159.

Hookeria versicolor *ej. in op. cit.* 1886, p. 309.

L. angolense *W. et D. (fid. Mitt. l. c.)*.

1. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po, Kilima N'Djaro.

Wallisii *C. M. in Fl.* 1875, n. 34-35.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. (1).

LEPTANGIUM *Mont. mss.* ; Mitt. *M. austr. am.* p. 239.

Spec. omn. non indicatae sunt GIGASPERMA ejusd. nom.

Perrottetii *Mont.* — *Erpodium*.

(1) In *Enumer. Kindberg.* nom. nud. :

L. Swartzii *W. P. Sch.*

LEPTOBARBULA W. P. Sch. Syn. II ed. p. 181 (3 spec.).

berica W. P. Sch. l. c. (1).

Didymodon tenuis de Not. Syll. n. 268.

Leptotrichum bericum de Not. Cron. briol. ital. I, p. 14.

L. tenue W. P. Sch. Syn. I ed. (quoad pl. ital.), C. M. Syn. I, p. 447
(p.p. et excl. syn. Hedw. et Brid.) et II, p. 611; Mac. Canad. M. n. 486.

Trichostomum bericum de Not. Epil. p. 509.

Tr. tenue Bryol. eur. II (mon. p. 13), t. 171.

2. Saxic. — Eur.: Normannia, Ital. super. et merid., ins. Minore.
Am. sept.: Columb. brit.

meridionalis W. P. Sch. op. cit. p. 182.

Trichostomum bericum Husn. Muscol. gall. p. 91 p.p.

2. Ad sax. calcar. — Eur.: Galloprov.

Winteri W. P. Sch. op. cit. p. 183.

Trichostomum bericum Husn. op. et l. cc. p.p.

2. Ad rup. calcar. — Eur.: Vall. fl. Sarre (Mondorf).

Leptobryella C. M. in Bull. Soc. bot. Fr. 1878, p. 66 (sect. PTERO-BRYELLAE).**LEPTOBRYUM** W. P. Sch. Coroll. p. 64 (2 spec.).

minus Philib. — *L. piriforme* var. *minus*.

piriforme (Hedw.) W. P. Sch. Coroll. p. 64 et Syn. II ed. p. 390.

Bryum aureum Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 81.

Br. mnioides Gmel. Syst. nat. II, p. 1330.

Br. pendulum Ehrh. Crypt. exs. n. 163.

Br. piriforme Hedw. Hist. M. I, t. 3, f. 12; Bryol. eur. IV (mon. p. 45),
t. 335; C. M. Syn. I, p. 330; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 271.

Br. rupeum Neck. Meth. M. p. 220.

Br. trichodes aureum capitulis piriformibus nutantibus Dill. Hist. M. p. 391,
t. 50, f. 60.

Br. Webera piriformis Brid. Bryol. univ. I, p. 631.

Hypnum piriforme W. et M. Bot. Taschb. p. 274.

Mnium piriforme L. Sp. pl. p. 1576.

Webera piriformis Hedw. M. frond. I, p. 5, t. 3.

Syn. Ad mur., rup., terr. arenac. et turfis. in umbros. — Eur.: A reg.
campestr. usq. in alp.: Spitzberg. As.: Japon., penins. Samoied.
et Tschutschica, Obi, Jenissei, Ochotsk, Tibet occ., Caucas. Am.
sept.: Groenland, Labrador, Anticosti; ab Atlantic. ad Pacif.; Van-
couver. Am. merid.: And. Quitens., Brasil. subtropic. or. Pac.:
Nov. Zeland. Tasman.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 159.

Rab. Bryoth. eur. 93 et b. 1282.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II, p. 276.

* var. *antarcticum* C. M. in Fl. 1885, p. 403.

— Am. merid.: Fuegia.

* var. *fuegianum* ej. in Forschungsreise... Bot. p. 37.

— Am. merid.: Fuegia.

* var. *Hübnerianum* Rab. Kryptfl. v. Sachs. I, p. 483, Limpr. Deutschl.
Laubm. II, p. 217.

Ad stagn. — Eur.: Saxon.

(1) *L. berica* = *L. meridionalis* (fid. Philib. in Rev. bryol. 1882, p. 17) = *L. Win-
teri* (fid. Limpricht Laubm. Deutschl. I, p.p. 596-599).

« *var. minus* Husn. *Muscol. gall.* p. 221.

L. minus Philib. *M. Gall.* n. 768.

— *Eur.* : Valesia

sericeum (Hpe. et C. M.) Par.

Bryum sericeum Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 494.

— *Pac.* : Tasman.

Leptocalpe Mitt. *M. austr. am.* p. 403 (sect. *ERPODII*).

LEPTOCHLÆNA Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 105 (4 spec.).

chilensis Mont. *l. c.* p. 106 et in *Gay Hist. Chil. Bot. crypt.* t. 4, f. 1;
Syll. p. 35; *C. M. Syn.* I, p. 237.

Mielichhoferia chilensis Mitt. *M. austr. am.* p. 324.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile.

graciliseta Hpe. in *Linn.* 1863, p. 130.

Mielichhoferia graciliseta Mitt. *op. et l. cc.*

Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

microdonta Mitt. in *F. v. Müller's Fragm. Phyt. austr.* XI, *Suppl.* 1881,
p. 114.

Mielichhoferia microdonta Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of*
Victoria, 1883, p. 73 (nom.).

— *Pac.* : Alp. Austral. or., Victoria, Tasman.

Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 216, 543 et b.

— *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.

Leptodictyon W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 595 (subgen. *AMBLYSTEGII*).

LEPTODON Mohr. *Obs.* p. 27 (13 spec.).

Beccarii C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 19.

2. — *Afr.* : Abyssin.

Boryanus W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 464 et II ed. p. 562 (nom.) et in
Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 118.

Ster. Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

circinatus Sull. — *Alsia abietina*.

coronatus C. M. — *Lasia*.

flexuosus (Harv.) Jaeg. *Ad.* II, p. 106.

Neckera camptoclada Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, II,
p. 73.

N. flexuosa Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 14 et in *Hook. Ic. pl.*
rar. t. 21, f. 3; *C. M. Syn.* II, p. 119.

2. — *As.* : Nepal., Himalaya, Calcutta, Bhotan.

floridanus Lindb. *Krit. Grausk. Moss. Dill.* p. 53.

1. — *Am. sept.* : Florida.

immersus Sull. — *L. trichomitrium var. immersus*.

japonicus Besch. *mss.*

— *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 51, 127, 240, 770, 2731.

longisetus Mont. *Hist. des I. Canar. p. 20 et Syll. p. 25.*

Neckera longipedunculata C. M. Syn. II, p. 119.

2. — Afr. : Teneriff.

Exs. : Bourg. Pl. Canar. n. 620.

« *var. flagellifera* ej. l. c.

— Afr. : Ins. Canar.

mollis Rehm. M. Afr. austr. n. 602 b.

— Afr. : Transvaal.

nitidus (Lindb.) Sull. Ic. M. Suppl. p. 80, t. 60 ; *Lesq. et Jam. Man. p. 279.*

Forstroemia nitida Lindb. in *Oefv...* 1869, p. 73.

Lasia nitida Jaeg. Ad. II, p. 107.

Neckera Macounii Sull. *Canad. Nat. II ser., II, pp. 79 et 397.*

l. Cortic. — Am. sept. : Ontario.

ohioensis Sull. M. Allegh. n. 89 et Ic. M. p. 114, t. 72 ; *Lesq. et Jam. Man. p. 278.*

Forstroemia ohioensis Lindb. in *op. cit.* p. 75.

Lasia ohioensis Jaeg. Ad. II, p. 108.

Neckera ohioensis C. M. Syn. II, p. 93.

l. Cortic. — Am. sept. : Ohio.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 354.

Pluvini (Brid.) Jaeg. Ad. II, p. 106.

Neckera Pluvini Brid. in *Steud. Nomencl. crypt. p. 295.*

Pilotrichum Pluvini ej. *Bryol. univ. II, p. 260.*

procumbens (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 107.

Neckera procumbens C. M. Syn. II, p. 80.

Trachypus procumbens Mitt. M. Ind. or. p. 127.

2. — As. : Bombay, Malabar.

rigidulus (Wils.) Jaeg. l. c.

Neckera rigidula Wils. in *sched.* ; Mitt. *op. cit.* p. 120.

2. — As. : Kashmir.

Smithii Mohr. *Observ. p. 27* ; *Brid. Bryol. univ. II, p. 197* ; *Bryol. eur. V, t. 439* ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 562.

Hookeria convoluta Spreng. *Syst. veg. IV, II, p. 324.*

Hypnum circinatum Santi *Viagg. p. 209, t. 6.*

H. Smithii Dicks. *Fasc. II Pl. crypt p. 10, t. 5, f. 4.*

Lasia Smithii Brid. *Mant. M. p. 123.*

Neckera bipinnata Schleich. *Crypt. Helvet. Cent. IV, n. 22.*

N. Smithii C. M. Syn. II, pp. 118 et 669.

Orthotrichum Smithii Brid. *M. Rec. II, II, p. 33.*

Pilotrichum Smithii P. B. *Prodr. p. 83.*

Polytrichum Smithii Hull. 249.

Pterigynandrum Smithii Brid. *Sp. M. p. 140.*

Pterogonium Smithii Sw. in *Schrad. Journ. II, p. 173.*

2. Ad sax., mur. et praepr. arb. annosior. — Eur. : Reg. occ. et merid. As. : Caucas. occ. Afr. : Sept. et austr., ins. Canar., Kilima N'Djaro. Am. merid. : Chile, ins. Juan Fernandez. Pac. : Nov. Zeland.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 240, 528, 688, 992, 1240 et b, 1423.*

Rehm. M. Afr. austr. n. 316 et b.

(1) In *Enumer. Kindberg. nom. nud.* :
L. filiformis W. P. Sch.

trichomitrium Mohr. — *Forstroemia*.

var. *immersus* Sull. — *Forstroemia trichomitrium* var. *immersa*.

var. *irriguus* Ren. — *Forstroemia trichomitrium* var. *irrigua*.

LEPTODONTIUM Hpe. in Linn. 1847, p. 70 (35 spec.).

acutifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 51.

Didymodon acutifolius Jaeg. *Ad. I*, p. 209.

Rupic. — *Am. sept.* : Guatemala. *Am. merid.* : And. Quitens.

aggregatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 829.

Didymodon aggregatus Jaeg. *Ad. I*, p. 210.

Trichostomum aggregatum C. M. *Syn. I*, p. 580 ; *Bryol. jav. I*, p. 98, t. 80.

2. — *As.* : Java.

arachnoideum C. M. in Linn. 1878-79, p. 324.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

armatum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 466.

— *Afr.* : Transvaal.

« var. *brevifolium* ej. *l. c. n.* 467.

— *Afr.* : Transvaal.

brasiliense Mitt. *M. austr. am.* p. 52.

Didymodon brasiliensis Jaeg. *Ad. I*, p. 207.

Ster. Cortic. et rupic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

braunioides C. M. in Linn. 1878-79, p. 325.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

brevirostrum Mitt. — *Holomitrium serratum*.

brevisetum Mitt. *op. cit.* p. 59.

Didymodon brevisetus Jaeg. *Ad. I*, p. 208.

— *Am. sept.* : Mexic.

canadense Kindb. in *Mac. Cat.* p. 45.

2. Ad lapid. in rival. — *Am. sept.* : Ontario.

capituligerum C. M. in *op. cit.* p. 323.

Ster. Lignic., ad rup., terr. et tecta. — *Am. merid.* : Argentin. Cor-
dob. et subtropic.

cirrifolium Mitt. *op. cit.* p. 52.

Didymodon cirrifolius Jaeg. *Ad. I*, p. 208.

Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.

citrinum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 10.

Didymodon citrinum Jaeg. *Ad. I*, p. 209.

Trichostomum citrinum Hpe. *Symb.* 1872, p. 37.

densifolium Mitt. *op. et l. cc.*

Didymodon densifolius ej. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 53 ; C. M.
Syn. II, p. 627.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

dentatum (Wils.) Par.

Didymodon dentatus Mitt. *M. Ind. or.* p. 23.

Trichostomum dentatum Wils. in *Kew bot. Journ.* IX, p. 299 p.p.

Ster. Ad arbor. — *As.* : Sikkim.

epunctatum (C. M.) Par.

Didymodon epunctatus Jaeg. *Ad. I*, p. 210.

Encalypta squarrosa Brid. *Sp. M. I*, p. 93.

Neckera viticulosoides P. B. *Prodr.* p. 78.

Trichostomum epunctatum C. M. *Syn. I*, p. 579.

Tr. squarrosus Brid. *Bryol. univ. I*, p. 498 (*excl. syn. Hook.*).

2. Terr. — Afr. : Usambara, ins. Borbon., Madagascar sept.

“ *var. paludosum* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, *I*, p. 115.

In sphagnet. — Afr. : Madagascar.

filescens (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 50.

Didymodon filescens Jaeg. *l. c.*

Trichostomum filescens Hpe. in *Linn.* 1863, p. 28.

2. Ad tecta stramin. — Am. merid. : And. Noy. Granat.

flexifolium Hpe. — *Didymodon*.

gemmascens Mitt. — *Didymodon flexifolius* β *gemmiferus*.

Johannis Meyeri C. M. in *Fl.* 1888, p. 412.

Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro.

longicaule Mitt. *M. austr. am.* p. 52.

Didymodon longicaulis Jaeg. *Ad. I*, p. 209.

Ster. — Am. merid. : M. Pichincha.

luteolum (Besch.) Par.

Didymodon luteolus Jaeg. *Ad. I*, p. 210.

Trichostomum luteolum Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 34.

Ster. — Am. sept. : Mexic.

luteum (Tayl.) Mitt. *op. cit.* p. 50.

Didymodon luteus Tayl. in *Lond. Journ. of. bot.* 1846, p. 48.

Trichostomum luteum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., V*, p. 294.

Tr. ulocalyx ? C. M. *Syn. I*, p. 578.

— Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens. et

Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1616.

matucamense Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LVIII.

Ster. — Am. merid. : Peruv.

papillosum Hpe. in *Fl.* 1865, n. 37.

Didymodon papillosus Jaeg. *Ad. I*, p. 208.

Ad rivul. — Am. merid. : Peruv. or.

papillatum H. et W. — *Zygodon Preissianus*.

pseudo-sulfureum (C. M.) Par.

Trichostomum pseudo-sulfureum C. M. in *Journ. of Bot.* 1877, p. 228 (*nom.*).

Cortic. — Am. sept. : Costa Rica.

Quennoae C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 322.

2. Ad arbor. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

radicosum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 301.

Didymodon radicosus ej. in *op. cit.* 1863, p. 149.

— Afr. : M. Cameroon, Usagara, Kilima N'Djaro.

Exs. : Dusen M. Camer. n. 279.

recurvifolium Lindb. — *Didymodon*.

rhacomitrioides Ltz. et C. M. in Linn. 1878-79, p. 321.

1 et 2. Rupic. et terr. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

squarrosus (Hook.) Par.

Didymodon squarrosus Hook. M. ex. t. 150.

Trichostomum squarrosus Schwaegr. Suppl. II, I, p. 78, t. 113; Brid.

Bryol. univ. I, p. 498 p.p.; C. M. Syn. I, p. 578.

2. — *As.* : Nepal., Sikkim, Khasia. *Afr.* : Abyss.

Exs. : W. Schimp. Pl. Abyss. n. 818.

stellatum (Brid.) Par.

Dicranum stellatum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 413.

Didymodon stellatus Jaeg. Ad. I, p. 210.

Trichostomum stellatum C. M. Syn. I, p. 579.

2. Ad terr. humid. — *Afr.* : Ins. Borbon. *Am. sept.* : Mexic.

stiriacum Limpr. — *Didymodon*.

subalpinum { de Not., Lindb. — *Trichostomum*.

{ Ltz. — *Dichodontium pellucidum* var. *serratum* (fid. Limpr.).

subcirrifolium (C. M.) Par.

Didymodon subcirrifolius Jaeg. Ad. I, p. 208.

Trichostomum subcirrifolium C. M. in Linn. 1874, p. 601.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subdenticulatum (C. M.) Par.

Didymodon subdenticulatus Jaeg. Ad. I, p. 207.

Trichostomum subdenticulatum C. M. Syn. II, p. 626; *Bryol. jav.* I, p. 97, t. 79.

2. — *As.* : Java.

subgracile Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 153.

Ster. — *Am. sept.* : Costa Rica.

sulfureum (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 51.

Didymodon sulfureus Jaeg. Ad. I, p. 208.

Trichostomum sulfureum C. M. Syn. II, p. 626.

2. — *Am. sept.* : Nicaragua.

« var. *panamense* Ltz. Moosst. p. 161.

Didymodon sulfureus var. *panamensis* Jaeg. l. c.

— *Am. sept.* : Panama.

transvaaliense Par.

Trichostomum sulfureum Rehm. M. Afr. austr. n. 471.

— *Afr.* : Transvaal.

tenuifolium (C. M.) Par.

Didymodon tenuifolius Jaeg. Ad. I, p. 209.

Trichostomum tenuifolium C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 229.

Ster. — *As.* : Java.

ulocalyx (C. M.) Mitt. op. et l. cc.

Didymodon ulocalyx Jaeg. Ad. I, p. 208.

Trichostomum squarrosus Hsch. in Deppe et Schiede M. Mexic.

Tr. *ulocalyx* C. M. Syn. I, p. 578.

2. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Qui-

tens,

zygodontoides C. M. in Linn. 1878-79, p. 326.

Ster. Ad arbor. ? — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. (1).

LEPTOHYMENIUM Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 246 (23 spec.).

affine W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 102.

1. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

Ahnfeldti Ångstr. — *Heterocladium heteropterum*.

Barteri (Mitt.) Par.

Stereodon Barteri Mitt. in M. hb. Hook. 1860, p. 51, t. 5, f. 2.

1. Cortic. — *Afr.* : Niger inf.

bicolor (*Lindb.*) Jaeg. Ad. II, p. 346.

Pterigynandrum bicolor Lindb. mss.

Pt. squarrosum Hpe. Symb. 1870, p. 281 et Enum. M. Brasil. p. 57.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Bonplandi Besch. op. et l. cc. (nom.).

— *Am. sept.* : Mexic.

brachycladon (*Brid.*) Jaeg. Ad. II, p. 347.

Neckera brachyclada C. M. Syn. II, p. 88.

Pterigynandrum brachycladon Brid. Bryol. univ. II, p. 185 (excl. syn.

Pterog. decumbente Schwaegr.).

Pterogonium ascendens Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 243 (cum perist. simpl. false observato fid. C. M. l. c.).

1. Lignic. — *Am. sept.* : Massachusetts, Pensilv.

? *brachystegium* Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 85.

1. Silvic. — *As.* : Yunnan.

brasiliense Jaeg. — *Erythrodontium*.

Breutelii W. P. Sch. mss.

Neckera Breutelii C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 165.

— *Afr.* : C. B. Sp.

consanguineum Hpe. — *Erythrodontium*.

cristatum Hpe. — *Pterigynandrum filiforme* var. *cristatum*.

cylindricaule Besch. — *Erythrodontium*.

var. *rupestris* Hpe. — *Erythrodontium cylindrocaule* var. *rupestris*.

dentatum Schwaegr. Suppl. IV, p. 332.

Neckera dentata C. M. Syn. II, p. 88.

Pleuropus dentatus Griff. in Schwaegr. l. c.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

duplicato-serratum Hpe. — *Pterogonium gracile* var. *duplicato-serratum*

elajochloron Lobarz. — *Pterigynandrum filiforme* var. *heteropterum*.

fabronioides C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 151.

Pterigynandrum fabronioides ej. in Rev. bryol. 1876, p. 59.

Ster. Rupic. — *Afr.* : Usambara, ins. Franciae, Nossi-Comba.

(1) In Enumer. Kindberg. nom. nud. :

L. chiloense C. M.

laxifolium Hook.

lutescens Tayl. (an *Didymodon luteus* ?).

procumbens C. M.

L. pumilum C. M.

pungens Mitt.

repens C. M.

syntrichioides C. M. (cf. *Didymodon*).

Wallisii C. M. (cf. *Didymodon*).

Ferrieri *Marie in Ann. sc. nat. VII ser., II, p. 95.*

♂ et fr. ign. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

filiforme Hüb. — *Pterigynandrum*.

var. *alpestre* Rab. — *Pterigynandrum filiforme var. heteropterum*.

gracile Rab. — *Pterogonium*.

heteropterum Rab. { (fid. C. M.). — *Heterocladium*.
(fid. Lindb.). — *Pterigynandrum filiforme var. heteropterum*.

hirtellum Schwaegr. — *Thelia*.

hokinense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 82.

2. Ad arbor. et saxa. — *As.* : Yunnan.

julaceum { Besch. — *Erythrodontium teres*.
Br. et Sch. — *Cylindrothecium Schimperii*.
Hpe. — *Erythrodontium squarrosum*.

latifolium Jaeg. — *Erythrodontium*.

longisetaceum (C. M.) Jaeg. *Ad. II, p. 345.*

Neckera longisetacea C. M. *Syn. II, p. 86.*

1. — *As.* : Bombay.

longisetum Hpe. — *Erythrodontium cylindricaule*.

loriferum (Lindb.) Jaeg. *Ad. II, p. 346.*

Pterigynandrum loriferum Lindb. *mss.* ; Ångstr. in *Oefv....* 1876, p. 45.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

microphyllum Schwaegr. — *Thuidium Haplohymenium*.

myuroides W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 101.*

Neckera teres C. M. *Syn. II, p. 98 p.p.*

1 ? — *Am. sept.* : Mexic.

nattougense (Hpe.) Jaeg. *Ad. II, p. 345.*

Leskea nattougensis Hpe. in *sched.*

— *As.* : Birman.

oblongifolium Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 74.

Ster. — *As.* : Sikkim.

? *patulum* W. P. Sch. in *op. cit. p. 102.*

1. — *Am. sept.* : Mexic.

pilosulum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II, p. 345.*

Hypnum pilosulum Jaeg. *op. cit. p. 608.*

Stereoson pilosulus Mitt. *M. Ind. or. p. 113.*

2. — *As.* : Khasia, Assam super.

procumbens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 482.

Ster. — *Am. merid.* : Venezuela.

psilurum (Mitt.) Jaeg. *l. c.*

Stereodon psilurus Mitt. *M. Ind. or. p. 112.*

Ster. — *As.* : Nepal. or.

repens Hpe. — *Platygyrium*.

Schweinfurthii Sb. — *Erythrodontium*.

squarrosum Jaeg. — *Erythrodontium*.

stramineum (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Neckera straminea C. M. *Syn. II, p. 99.*

Platygyrium stramineum Sb. in *Jaeg. Ad. II, p. 743.*

2. — *As.* : Nepal. *Afr.* : Abyssin.

striatum A. Br. — *Lescuraea*.

tenuis (Hook.) *Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 246 c.*

Hypnum tenue C. M. *Syn. II, p. 452.*

Neckera tenuis Hook. in *Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 315, t. 27, f. 3.*

Pterigynandrum tenue Brid. *Bryol. univ. II, p. 187.*

Pterogonium tenue *Schwaegr. Suppl. II, I, p. 30, t. 108.*

Stereodon tenuis Mitt. *M. Ind. or. p. 114.*

2. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia, Bhotan.

teres Jaeg. — *Erythrodontium*.

Warmingii Sb. — *Erythrodontium*.

Leptoneura *Limpr. Deutschl. Laubm. I, p. 166* (sect. EPHEMERI).

Leptopogon Mitt. *M. austr. am. p. 157* (sect. BARBULÆ).

LEPTORHYNCHO-HYPNUM *Hpe. in Linn. 1876.*

glauco-viride ej. — *Rhaphidostegium*

Leptophascum C. M. in *Fl. 1888, n. 1* (sect. PHASCI).

Leptostomopsis ej. in *op. cit. 1890, p. 475* (sect. BRYI).

LEPTOSTOMUM R. Br. in *Trans. of the Linn. Soc. X, p. 130, t. 2, f. 2. (8 spec.).*

densum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 305.*

— As. : Ceylan.

erectum R. Br. in *op. cit. p. 323*; Brid. *Bryol. univ. I, p. 125*; C. M. *Syn. I, p. 187.*

Gymnostomum Leptostomum Hook. *M. ex. II, p. 2, t. 169.*

1. Rupic. — Pac. : Austral. or. extratopic.

flexipile C. M. in *Bot. Zeit. 1851, p. 547.*

Gymnostomum gracile Mossm. *M. exs. n. 725.*

L. inclinans R. Br. (*fid. Mitt.*).

2. Rupic. — Pac. : Austral. fel., Nov. Zeland., Tasman.

gracile R. Br. in *op. cit. p. 321*; Brid. *op. cit. p. 127*; C. M. *Syn. II, p. 187*; *Handb. of N. Zeal. Fl. p. 435.*

Gymnostomum gracile Hook. *M. ex. II, p. 2, t. 22.*

2. — Pac. : Nov. Zeland., ins. Campbell.

inclinans R. Br. in *op. cit. p. 302*; Brid. *op. cit. p. 126*; C. M. *Syn. I, p. 185.*

Gymnostomum inclinans Hook. *M. ex. II, p. 2, t. 168.*

L. flexipile C. M. (*fid. Mitt.*).

2. Rupic. in silv. paludos. — Pac. : Nov. Zeland., Alp. Austral. et Tasman. occid.

« *var. longiseta* Hpe. in *Linn. 1856, p. 207 (nom.).*

Ut typ. — Pac. : Austral. fel.

macrocarpum (Hedw.) R. Br. in *op. cit. p. 322*; Brid. *op. cit. p. 125*; C. M. *Syn. II, p. 186.*

Bryum macrocarpum Hedw. *M. frond. III, p. 28, t. 10.*

Orthopyxis macrocarpa P. B. *Prodr. p. 79.*

2. Ad arbor. et rup. — Pac. : Taiti, Austral., ins. Norfolk, Nov. Zeland., Tasman.

Menziesii (Hook.) Rob. Br. in op. cit. p. 321; Brid. op. cit. p. 128; C. M. Syn. I, p. 186.

Gymnostomum Menziesii Hook. M. ex. II, p. 2, t. 5.

2. Ad arbor. — Am. merid. : Cap Horn, Fuegia, ins. Eremit., Staaten. *pusillum* H. f. et W. — *Mielichhoferia*.

splachnoides Hook. et Arn. in Capt. Beechey's Voy. p. 53; C. M. Syn. I, p. 185.

L. sulcinerve Kze in Poepp. Pl. Chil. III, n. 52 (269).

2. Ad arbor. et rup. — Am. merid. : Chile, Valdiv., ins. Chiloë.

squarrosus Tayl. — *Zygodon*.

sulcinerve Kze. — *L. splachnoides*.

LEPTOTHECA Schwaegr. Suppl. II, II, p. 135, t. 137 (4 spec.).

Gaudichaudii Schwaegr. op. et l. cc.; Brid. Bryol. univ. I, p. 838; C. M. Syn. I, p. 183.

Aulacomnium Gaudichaudii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 94.

Brachymenium ? *ovatum* H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 545

et Fl. Antarct. II, p. 412, t. 153, f. 4; C. M. Syn. I, p. 180.

Bryum Gaudichaudii Spreng. Syst. veg. IV, p. 212.

Hymenodon ovatus C. M. Syn. II, p. 557.

2 vel syn. Terr. — Am. merid. : Ins. Maclov. Pac. : Austral. or. (Nov. Valesia, Victoria), Nov. Zeland., Tasman.

speciosa Hook. f. et Wils. in Hook. Ic. pl. rar. t. 748; C. M. Syn. I, p. 184 et II, p. 557.

Brachymenium Jamesoni Tayl. (fid. Mitt. M. austr. am. p. 283).

Bryum speciosum Mitt. in Lond. Journ. of bot. 1851, p. 56?

2. — Am. sept. : Jamaic.

Spegazzinii C. M. in Fl. 1885, p. 398.

Ster. — Am. merid. : Fuegia.

Wrightii Sull. in Proced. Am. Acad.... V, p. 281.

Pteromnium Wrightii Jaeg. Ad. I, p. 585.

Ps. 1. Lignic. — Am. sept. : Florida, Cuba, ins. S. Vincent.

LEPTOTRICHUM Hpe. in Linn. 1847, p. 74.

Spec. omn. non indicatae sunt DITRICHIA ejusd. nom.

amplexans Mitt. — *Dicranella*.

australe Mitt. — *Lophiodon strictus*.

avimontanum W. P. Sch. — *Ditrichum vaginans*.

bericum de Not. — *Leptobarbula*.

canadense Jaeg. — *Dichodontium*.

capillaceum Mitt. — *Distichium*.

cylindricum Husn. — *Trichodon*.

dicranelloides C. M. — *Trichostomum*.

divaricatum Mitt. — *Dicranella*.

elongatum Jaeg. — *Trichostomum*.

ferrugineum Mitt. — *Ditrichum brachycarpum*.

flaccidulum Mitt. — *Microdus*.

flexifolium Hpe. — *Trichostomum laxifolium*.

glaciale Jur. — *Ditrichum vaginans* var. *nivale*.

Griffithii Mitt. — *Dicranella*.

himalayanum Mitt. — *Dichodontium Hookeri*.

- Hornschuchii* C. M. — *Ditrichum proscriptum*.
inclinatum Mitt. — *Distichium*.
Khasianum Mitt. — *Campylopodium*.
Kunzeanum C. M. — *Microdus tenuis*.
longirostre C. M. — *Microdus*.
Molendianum Ltz. — *Ditrichum homomallum var. zonatum*.
molliculum Mitt. — *Dicranella*.
Montagnei C. M. — *Ditrichum conicum*.
Mülleri Hpe. — *Lophiodon*.
neurophyllum Spr. — *Ditrichum gracile*.
nitidulum Mitt. — *Microdus*.
nivale C. M. — *Ditrichum vaginans var. nivale*.
patulum Mitt. — *Dicranella*.
pomiforme Mitt. — *Microdus*.
pusillum Hpe. — *Ditrichum tortile*.
Reinwardti Mitt. — *Dichodontium*.
setiferum Mitt. — *Dicranella*.
spirate Mitt. — *Dicranella*.
tenuis { Bryol. eur. — *Leptobarbula berica*.
 { C. M. p.p. — *Trichostomum*.
 var. *glaciale* W. P. Sch. — *Ditrichum vaginans var. nivale*
tortuosum Wils. — *Dicranoweisia indica*.
trichophyllum Mitt. — *Dicranella*.
vaginans Un. crypt. itin. — *Ditrichum arcticum*.
Vallis Gratiae Hpe. — *Ceratodon condensatus*.
virens Mitt. — *Cynodontium*.
Wahlenbergii Mitt. — *Cynodontium virens var. Wahlenbergii*.
zonatum Ltz. — *Ditrichum homomallum var. zonatum*.

LEPYRODON Hpe. in Ann. sc. nat. 1865 (12 spec.).

australis Hpe. in sched.

Leucodon australe Jaeg. Ad. II, p. 124.

— Pac. : Nov. Zeland.

capensis Rehm. M. Afr. austr.

— Afr. : C. B. Sp.

glaucus (C. M.) Par.

Leucodon glaucus Jaeg. l. c.

Neckera glauca C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 230.

2. Ad arbor. — Am. merid. : Chile.

implexus (Kze.) Par.

Leucodon hexastichus Mont. in Ann. sc. nat. 1845, p. 101 et Syll. p. 24.

L. implexus Kze. in Poëpp. Coll. pl. Chill. III, n. 274.

L. Kunzeanus C. M. in Linn. 1844, p. 697.

Neckera implexa C. M. Syn. II, p. 93.

2. — Am. merid. : Chile. Pac. : Nov. Zeland.

Lagurus (Hook.) Mitt. M. austr. am. p. 421.

Leucodon Lagurus Hook. M. ex. t. 126; Brid. Bryol. univ. II, p. 211.

Neckera Lagura C. M. Syn. II, p. 96.

Stereodon Lagurus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 88.

2. Ad arbor. — Am. merid. : And. Chilens., fret. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae. Pac. : Alp. Austral. or., Tasman., ins. Campbell.

mauritanus Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 120.

2. — Afr. : Ins. Franciae.

parvulus *Mitt. M. austr. am. p. 422.*

Leucodon parvulus Jaeg. Ad. II, p. 122.

Terr. — *Am. merid.* : Chile, ins. Juan Fernandez, Mas a Fuero.

? perplexus *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1895, I, p. 66.*
2? — *As.* : Sikkim.

rigidus *Bryol. jav. II, p. 104, t. 215.*

Ad arbor. — *As.* : Sumatra.

suborthostichus (*C. M.*) *Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 187.*

• *Leucodon tomentosus C. M. in Linn. 1847, p. 210.*

Neckera suborthosticha ej. Syn. II, p. 112.

Leucodon suborthostichus Jaeg. Ad. II, p. 123.

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens., Valdiv.

tomentosus (*Hook.*) *Mitt. op. et l. cc.*

Leucodon tomentosus Hook. M. ex. t. 37; Brid. Bryol. univ. II, p. 212.

Neckera tomentosa C. M. Syn. II, p. 111.

2? Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat, Quitens. et Peruv.;
Chile, Brasil. austr. or.

trichophyllus (*Sw.*) *Mitt. op. et l. cc.*

Hypnum trichophyllum Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 141.

Leucodon trichophyllum Jaeg. op. cit. p. 122.

Muscus terrestris, repens, major, ramulis circa extremitatem conglomeratis, foliolis multis et minimis caulem ambientibus Sloane Cat. Jam. p. 12.

Neckera trichophylla Brid. Bryol. univ. II, p. 227; C. M. Syn. II, p. 111.

2. — *Am. sept.* : Jamaic., Guadalup. *Am. merid.* :
Ins. Trinitat., Venezuela.

« *f. robustior Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 50.*

Meteorium sericeum W. P. Sch. in Husn. M. Antill. n. 183.

Lignic. — *Am. sept.* : Guadalup.

LESCURÆA *Bryol. eur. V (4 spec.).*

filamentosa Lindb. — *Pseudo-Leskea atro-virens var. filamentosa.*

var. subcatenulata Sael. — *Pseudo-Leskea atro-virens var. subcatenulata*

var. subnitidula Lindb. — *Pseudo-Leskea atro-virens var. subnitidula.*

imperfecta C. M. et Kindb. in Bidr. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 170.

2. Ad terr. et rad. arb. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 89.

insignis de Not. — *L. striata var. saxicola?*

mutabilis Lindb. — *L. striata.*

patens Lindb. — *Pseudo-Leskea patens.*

plicata Lindb. — *Ptychodium.*

rigidula Kindb. — *Leskea nervosa.*

robusta Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 245.*

2. — *As.* : Saghalien.

saxicola Milde. — *L. striata var. saxicola.*

striata (Schwaegr.) Bryol. eur. V, t. 459; W. P. Sch. Syn. II ed, p. 620.

Anomodon mutabilis Mont. *Hist. d. I. Canar. p. 17.*

A. striatus Hüb. *Muscol. germ. p. 559.*

Grimmia mutabilis Opitz.

Gr. plicata Opitz.

Hypnum mutabile Brid. *Sp. M. II, p. 156.*

- Isothecium mutabile* Spr. *M. Pyr. n.* 93.
I. striatum ej. l. c. et in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849.
Leptohymenium striatum A. Braun in sched.
L. mutabilis Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 247.
Leskea bulbifera Froehl. in *Brid. op. et l. cc.* (fld. C. M.).
L. mutabilis Boul. *M. E. Fr.* p. 325.
Maschalocarpus striatus Spreng. *Syst. veg.* IV, I, p. 158.
Neckera striata C. M. *Syn.* II, p. 81.
Pterigynandrum mutabile Brid. *Bryol. univ.* II, p. 190.
Pt. striatum Duby *Bot. gall.* p. 563.
Pterogonium striatum Schwaegr. *Suppl. I, I,* p. 103, t. 27.
 2. Ad arbor. humilior. praecip. Fagorum frutices. — *Eur.* : In mont. editior. et subalp. zon. interm. atque merid., rar. sept. *As.* : Caucas. occ. *Afr.* : Alger., ins. Canar. *Am. sept.* : (Fid. Jaeg. *Ad.* II, p. 340, sin. loc.).
Exs. : Un. itin. 1867, n. 135.
 « *var. saxicola* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.* ; *Ltz. et Mdo. Moosst.* pp. 144, 147-149.
Anomodon striatus var. saxicola Hartm. *Skand. Fl. VIII ed.* p. 351 (non II ed., p. 26).
Isothecium striatum β *saxicola* Boul. *M. Fr.* p. 143.
L. insignis de Not. *Epil.* p. 216? (in adnot.).
L. saxicola Milde *Bryol. Siles.* p. 288.
Leskea atro-virens ? Lindb. in *Th. Fries Bot. Not.* 1865, p. 74 in adn.
Saxic. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. zon. sept. *As.* : Jenissei med., Caucas. occ. et centr.
Exs. : Un. itin. 1863, p. 63, 64.
xanthophylla (Hpe. et Ltz.) Jaeg. *Ad.* II, p. 360.
Anomodon xanthophyllus Hpe. et Ltz. in *Krause M. Ecuador.*
Sciuro-Leskea xanthophylla eor. in *Bot. Zeit.* 1869
 1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Aequator.

LESKEA Hedw. *Fund. M.* II, p. 93, t. X, fig. 62-65 (32 spec.).

- abbreviata* W. P. Sch. — *Haplophymenium*.
aciculata Tayl. — *Lindigia*.
acidodon Mont. — *Rhegmatodon*.
acuminata Hedw. — *Brachythecium*.
adnata } Rich. — *Rhaphidostegium microcarpon*.
 } Schwaegr. — *Ectropothecium cubense*.
affinis Hsch. — *Rhaphidostegium*.
albicans Hedw. — *Hookeria*.
 ? *algarvica* W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 597.
 Ster. Ad terr. arid. in castanet. — *Eur.* : Lusitan. (*Algarb.*).
ambigua Schwaegr. — *Trichosteleum*.
amblyocarpa Hpe. — ? *Platygyrium*.
andicola Brid. — *Microthamnium*.
angustata Tayl. — *Anomodon*.
 ? *angustifolia* Toyl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 379 ; *C. M. Syn. II*, p. 680.
 Ster. Ad arbor. — *Am. sept.* : Jamaic.
apophysata Hsch. — *Rhynchostegium*.
arcuata Brid. — *Rhaphidostegium recurvans*.
asprella Bryol. eur. — *Thelia*.
assimilis Mitt. — *Thuidium*.
atro-virens Hartm. — *Pseudo-Leskea*.

? *atro-virens* Lindb. — *Lescurea striata* var. *saxicola*.
attenuata Hedw. — *Anomodon*.
aurea Harv. — *Cylindrothecium*.

Austini Sull. *Ic. M. Suppl. p. 81, t. 61; Lesq. et Jam. Man. p. 303.*

1. Ad arbor. et rup. — *Am. sept.*: New Jersey, Illinois, Minnesota, Kansas.

badensis A. Br. — *Hypnum Haldanianum*.
Beyrichii Hpe. — *Brachythecium acuminatum*.
binervula Mdo. — *Orthothecium*.
blepharophylla Mitt. — *Thuidium*.
Bonplandii Hook. — *Homalothecium*.
borbonica Belang. — *Trichosteleum*.
brachyclados Schwaegr. — *Pseudo-Leskea atro-virens* var. *brachyclados*.

Breutelii W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.*: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. *M. Afr. austr. n. 357.*

bulbifera Froëhl. { — *Lescurea striata* (fid. C. M.).
 { — *L. nervosa* (fid. Limpr.).

caespitosa { Brid. — *Rhaphidostegium Kegelianum* var. *tenue*.
 { Hedw. — *Rhaphidostegium*.

var. *adunca* Hpe. — *Rhaphidostegium microcarpum*.

var. *subsquarrosa* Brid. — *Rhaphidostegium Kegelianum* var. *tenue*.

californica Hpe. — *Camptothecium Nuttallii*.

campylocarpa Hpe. — *Camptothecium Nuttallii*.

capillaris Hedw. — *Helicodontium*.

capillata Mitt. — *Pseudo-Leskea*.

Cardoti Kindb. — *L. obscura*.

carnifolia C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n. 358.*

— *Afr.*: C. B. Sp.

catenulata Lindb. — *Pseudo-Leskea*.

var. *rupestris* Bryhn. — *L. rupestris*.

cavifolia Wils. — *Rhaphidostegium*.

chlorina W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.*: C. B. Sp.

chrysea Hartm. — *Orthothecium*.

circinalis Hpe. — *Rhaphidostegium*.

cirrifolia Schwaegr. — *Rhaphidostegium*.

complanata Hedw. — *Neckera*.

compressa { Hedw. — *Cylindrothecium*.

{ Sull. — *Cylindrothecium Sullivantii*.

concinna Hook. — *Hypopterygium*.

confervoides Spr. — *Amblystegium*.

congesta Brid. p. p. { — *Hookeria aurea*.

{ — *Homalothecium*.

consanguinea Mont. — *Anomodon*.

constricta Brid. — *Rhaphidostegium*.

contortula Mitt. — *Thuidium*.

crispa Schrank. { — *Neckera*.

{ — *Plagiothecium undulatum*.

cristata Hedw. — *Eriopus*.

curvata Voit. — *Isothecium myurum*.

curvirostris Harv. — *Rhaphidostegium*.

cylindrica { Brid. — *Pterigynandrum filiforme*.

{ Hsch. — *Ectropothecium*.

cymbifolia Mitt. — Thuidium.

cyrtophylla Kindb. in Mac. Cat. p. 169.

2. Rupic. — Am. sept. : Manitoba.

decurvata Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1864, p. 154.

2. Rupic. — As. : Japon.

Deinbollii Sw. — Hypnum uncinatum.

dendroides Hedw. — Climacium.

densa Hook. — Erythrodontium.

denticulata Sull. M. Allegh. n. 62, M. of U. St. p. 59 et Ic. M. p. 125
t. 78 ; Lesq. et Jam. Man. p. 302.

Hypnum fabroniæfolium C. M. Syn. II, p. 271.

2. Ad rad. arb. — Am. sept. : New Brunswick, reg. centr. et merid.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 245.

denticulata { Sull. p.p. — Pylaesia subdenticulata.
Timm. — Plagiothecium.

depressa Hedw. — Hookeria.

distans { Jaeg. — Eurhynchium circinnatum.
Mont. — Cladomnion gracile.

Duisabonae Mont. — Rhaphidostegium.

elongata W. et M. — Webera.

ericoides { Dz. et Mk. — Sauloma hamata.
Hook. — Cladomnion.

exilis Schwaegr. — L. polycarpa var. exilis.

extensa Spreng. — L. nervosa.

Fabronia Hook. — Microthamnium.

falcata Dz. et Mk. — Rhaphidostegium Molkenboëri.

fallax Rehm. M. Afr. austr. n. 635.

— Afr. : Transvaal.

« var. robusta ej. l. c. n. 636.

— Afr. : Transvaal.

fasciculosa Hedw. { (fid. C. M.). — Eurhynchium strigosum.
(fid. Card.). — Eurhynchium diversifolium.

Fendleri Sull. — Brachythecium.

filamentosa Kindb. — Pseudo-Leskea atro-virens var. filamentosa.

filiculaeformis Hedw. — Hypopterygium.

filiformis Sibth. — Pylaesia polyantha.

fimbriata Dz. et Mk. — Chaetomitrium.

flaccidu Brid. — Plagiothecium denticulatum.

flagellaris Schrank. — Hypnum Halleri.

flexilis { Hedw. — Pilotrichella.
Hook. — Papillaria Buchanani.
Hsch. — Papillaria illecebra.

var. pentasticha Brid. — Pilotrichella imbricata.

floribunda Dz. et Mk. — Papillaria.

fragilis H. f. et W. — Leskea tristis.

Froëlichii Brid. — Pseudo-Leskea catenulata.

fuegiana Besch. in Miss. sc. Cap Horn, V, Bot. p. 298.

Ster.

— Am. merid. : Fuegia.

fulva { Harv. — Stereophyllum.

Hsch. — Rhaphidostegium.

fulvastra Mitt. — Thuidium.

? *Gayana* Mont. — Ptychomnion ptychocarpum.

- glabella* Hedw. — Homalia.
glauca Mitt. — Thuidium.
gracilescens Hedw. *Sp. M.* p. 222, t. 56.
 Hypnum *gracilescens* P. B. *Pr.* p. 64.
 Leskea *obscura* Lesq. et Jam. *Man.* p. 301 p.p.
 1. Ad rad. arbor. inund. — *Am. sept.* : Pensilv., reg. merid.
gracilis Mitt. — Thuidium.
gracillima Mitt. — Schwetschkea.
grandiretis Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 97
 1. Fr. ign. Cortic. — *As.* : Caucas. centr.
gymnopoda Tayl. — Porotrichum.
hamosa Ångstr. — Plagiothecium denticulatum.
Haplohymenium Mitt. — Thuidium.
hastata Mitt. — Thuidium.
Hedwigii Wils. — Rhaphidostegium.
helvola Mont. — Brachythecium.
heteroclados W. P. Sch. — Meteorium dielados.
heterophylla Hsch. — Papillaria illecebra.
hispida Mitt. — Sciaromium.
hispidula Brid. — Hypnum pallescens.
homomalla Hpe. — Rhaphidostegium.
Hookeri Mitt. — Thuidium.
imbricata Hook. f. et Wils. *Fl. Tasman. II*, p. 202, t. 175, f. 3.
 Cryphaea *imbricata* Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 80.
 1. Rupic. — *Pac.* : Tasman.
imbricatula Hedw. { (fid. C. M.). — Anomodon rostratus.
 (fid. Card.). — Brachythecium acuminatum.
imponderosa Tayl. — Lindigia.
inclinata W. et M. — Bryum.
incompleta Griff. — Homalothecium?
incrassata Lindb. in *Broth. Enum. M. Cauc.* p. 96.
 2. Cortic. — *As.* : Caucas. occ. et centr.
incurvata { Hedw. — Pseudo-Leskea atro-virens.
 Myr. — Anomodon longifolius.
 Wahlenb. — Isothecium myurum.
 var. *brachyclados* Brid. — Pseudo-Leskea atro-virens var. *brachyclados*.
 var. *simplex*
 var. *subserulata* } Brid. — Pseudo-Leskea atro-virens.
 var. *Thomasii*
intricata { Hartm. — Orthothecium.
 Mitt. — Thuidium.
 var. *suberecta* C. Hartm. — Orthothecium striatum.
investis Mitt. — Thuidium.
involvens Hedw. — Thuidium.
irrorata Sendtn. — Orthothecium intricatum.
julacea { Brid. — Hypnum palustre var. *julacea*.
 Schwaegr. — Myurella.
Kegeliana C. M. — Rhaphidostegium.
 var. *tenuis* Hpe. — Rhaphidostegium Kegelianum var. *tenuis*.
lata Bryol. eur. Wils. — Plagiothecium.
laevifolia Mitt. — Pseudo-Leskea.
laeviuscula Mitt. — Thuidium.
lanceolata Hpe. et C. M. — Helicodontium.

lapponica Lindb. — *Orthothecium chryseum* f. *lapponica*.
latebricola Wils. — *Plagiothecium*. (See p. 742.)

latifolia Lindb. in *Broth. Enum. M. Cauc.* p. 97.
 1. Ster. Ad rup. calcar. — As. : Caucas. occ.

laxifolia Hook. — *Thuidium*.

leucostega Brid. — *Stereophyllum*.

longifolia } Ehrh. — *Camptothecium lutescens*.
 } Spr. — *Anomodon*.

longirostris Brid. — *Rhaphidostegium longirostratum*.

lucens Lam. et DC. — *Pterygophyllum*.

Ludwigiana Brid. — *Rhynchostegium confertum*.

marchica Willd. — *Philonotis*.

maritima Hook. — *Rhaphidostegium*.

mauritiana Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 146.
 1. — Afr. : Ins. Franciae.

mexicana Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 89.

Anomodon mexicanus Jaeg. *Ad. II*, p. 300.

Cortic. — Am. sept. : Mexic.

microcarpa } Brid. — *Rhaphidostegium*.
 } W. P. Sch. — *L. obscura*.

microphylla } Hook. — *Thuidium Haplohymenium*.
 } Mitt. } — *Pseudo-Leskea*.
 } — *Thuidium cataractarum*.

? *Mildeana* de Not. — *Pseudo-Leskea tectorum*.

minuscule Mitt. — *Thuidium*.

minutula Brid. — *Helicodontium capillare*.

mitrata Dz. et Mk. — *Rhegmatodon rufus*.

mollis Hedw. — *Pilotrichella*.

moniliformis Wils. — *Myurella julacea*.

Moseri Kindb. mss.

♂ ign.

— Am. sept. : New Brunswick.

multiflora Brid. — *Hypnum*.

mutabilis Boul. — *Lescuraea striata*.

myosuroides } Hartm. — *Isothecium*
 } Hedw. — *Isothecium myurum*.
 } Roth. — *Eurhynchium*.

myura Boul. — *Isothecium*.

nattongensis Hpe. — *Leptohymenium*.

nervosa (Schwaegr.) Myr. *Coroll.* p. 52; *Bryol. eur.* V (mon p. 4),
 t. 472; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 595.

Anomodon nervosus Hüb. *Muscol. germ.* p. 561.

A. rigidulus Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norw.* p. II.

Grimmia cylindracea W. et M. *Bot. Taschb.* p. 157.

Hypnum nervosum C. M. *Syn. II*, pp. 470 et 690.

Lescuraea rigidula Kindb. *Enum. Bryin.* p. 23.

Leskea bulbifera Froehl. in *Brid. Sp. M. II*, p. 61 (fid. Limpr.).

L. extensa Spreng. *Nov. pl. Cent. n.* 86.

L. norvegica Sommerf. *Suppl. ad Fl. Lapp.*

Maschalocarpus nervosus Spreng. *Syst. veg. IV*, I, p. 158.

Pterigynandrum nervosum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 189.

Pterogonium nervosum Schwaegr. *Suppl. I*, I, p. 102, t. 28.

2. Cortic. — Eur. : Ex Alp. reg. infer. usq. ad arbor. limit. As. :
 Caucas. Am. sept. : Labrador, Terr. Nov., New Brunswick, Gas-
 pes., Ottawa, Ontar., Manitoba, reg. sept. occ., M. Rupestr.,
 Columb. brit., M. Alb.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 89.

Mac. Canad. M. n. 252 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 445 et b, 1187.

var. *flagellifera* Kindb. — *Anomodon heteroideus*.

var. *rupestris* Hartm. — *L. rupestris*.

« var. *sibirica* Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 109.

— As. : *Jenissei med.*

nervosa Sull. — *L. obscura*.

nigeriana Mitt. — *Thuidium*.

nigrescens Kindb. — *Anomodon heteroideus*.

nitens Brid. — *Acrocladium Auberti*.

nitida H. f. et W. — *Hypnum*.

nitidula Wahlenb. — *Plagiothecium*.

norvegica Sommerf. — *L. nervosa*.

Novae-Hollandiae Schwaegr. — *Rhizogonium*.

obscura Hedw. Sp. M. p. 223, t. 37 (et p.p. in hb.) ; Brid. Bryol. univ. II, p. 300 ; Sull. Ic. M. p. 123, t. 77 ; Lesq. et Lam. Man. p. 301.

Anomodon obscurus Jaeg. Ad. II, p. 300.

Hypnum obscurum P. B. Prodr. p. 67 ; C. M. Syn. II, p. 470.

L. Cardoti Kindb. in Rev. bryol. 1895, p. 83.

L. microcarpa W. P. Sch. in Sull. M. of U. St. p. 59.

L. nervosa Sull. M. Allegh. n. 69.

l. Ad radices arb. inund. — As. : Japon. Am. sept. : Pensilv., Ludovic.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 105, 106.

Faurie Pl. Japon. n. 183.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 365 p.p.

~~*obscura nervosa*~~ Hedw. p.p. (hb.). — *L. gracilescens*.

obscuriuscula Mitt. — *Pseudo-Leskea*.

ornithopodioides Brid. — *Rhacopilum tomentosum*.

paleacea Wils. — *Plagiothecium*

pallescens Hedw. — *Hypnum*.

pallida Schwaegr. — *Microthamnium*.

paludosa Hedw. — *L. polycarpa* var. *paludosa*.

var. *polycarpa* Hartm. — *L. polycarpa*.

palustris Brid. — *L. polycarpa* var. *paludosa*.

papillosa (*Pseudo-Leskea* ?) Lindb. in Bot. Not. 1872 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 597.

Heterocladium papillosum Lindb. M. Scand. p. 37.

Ster. — Eur. : Lapp. Tornens. As. : *Jenissei sup.*

parvula Hpe. — *Clasmatodon*.

patens { Hsch. — *Sematophyllum pungens*.

{ Lindb. — *Pseudo-Leskea*.

pellucida Hook. — *Dimerodontium*.

pellucinervis Mitt. — *Anomodon*.

pennata Labill. — *Cyatophorum bulbosum*.

? *pentasticha* Hsch. — *Pilotrichella quinquefaria*.

Philippeana Boul. — *Homalothecium*.

pilifera Sw. — *Plagiothecium*.

plumaria Mitt. M. austr. am. p. 568.

l. Cortic. — Am. merid. : And. Quitens.

plumosa Sw. { *Brachythecium*.

{ *Hypnum incurvatum*.

Polenburi Lobarz. in Haiding. Naturw. Abh. 1847, p. 55 ; C. M. Syn. II, p. 481.

Ster. lignic. — Eur. : M. Beskides.

polyanthos { Harv. — *Hypnum celatum*.
Hedw. — *Pylaisaea*.

var. *paludosa* Bryhn. — *Thedenia suecica*.

var. *sericeola* Brid. — *Orthothecium intricatum*.

var. Sull. — *Rhynchostegium cylindricarpum*.

polycarpa Ehrh. *Crypt. exs. n.* 96; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 314; *Bryol. eur. V* (mon. p. 2), t. 470; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 594.

Hypnum medium Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 12; *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 213.

H. multiflorum P. B. *Prodr.* p. 66.

H. polycarpum Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 67; *C. M. Syn. II*, pp. 469 et 690.

H. trichodes, capsulis oblongis setis brevioribus *Dill. Hist. M.* p. 331, t. 42, f. 65.

L. paludosa var. *polycarpa* Hartm. *Skand. Fl. V ed.* p. 337.

l. Lignic. — *Eur.*: Vulgatiss. *As.* Amour, Jenissei, Obi, Caucas. *Am. sept.*: New Brunswick, Ottawa, Ontar., lac. Super., Columb. brit., temperata tota.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 251.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 782 et b.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 364.

Un itin. 1867, n. 7.

“ var. *exilis* (Schwaegr.) *Milde Bryol. Siles.* p. 260.

Hypnum polycarpum var. *exilis* C. M. l. c.

L. exilis Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 174, t. 85 (1); *Stark. in Brid. Mant. M.* p. 145 et *Bryol. univ. II*, p. 306.

L. polycarpa var. *tenella* *Bryol. eur. l. c.* fig. 3

Ut typ. — *Eur.*: Locis siccior.

var. *gigantea* Ltz. — *L. polycarpa* var. *paludosa*?

“ var. *paludosa* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Hypnum heterophyllum, aquaticum, polycephalum *Dill. Hist. M.* p. 293, t. 37, f. 27 B?

H. inundatum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 17.

H. paludosum W. Arn. *Disp.* p. 66.

H. palustre Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 64.

L. paludosa Hedw. *M. Frond. IV*, p. 2, t. I; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 315.

L. palustris Brid. *M. Rec. II, II*, p. 38

L. polycarpa var. *gigantea* Ltz. *Moost.* p. 103?

Ad rad. arb. sæpius inund. — *Eur.*: Passim. *As.*: Amour. *Am. sept.*: Washington, Oregon, Idaho.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 381, 783.

var. *tenella* *Bryol. eur.* — *L. polycarpa* var. *exilis*.

polyclada Tayl. — *Thuidium*.

prionophylla *Bryol. jav.* — *Pseudo-Leskea*.

pristocalyx Mitt. — *Thuidium*.

prolifera Lumnitz. — *Isothecium myurum*.

prolixa Mitt. — *Sciaromium*?

prostrata Tayl. — *Plagiothecium elegans*.

pseudo-tristis (C. M.) *Jaeg. Ad. II.* p. 298.

Hypnum pseudo-triste C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 786.

Ster.

— *Afr.*: C. B. Sp.

pteroconioides Harv. — *Rozea*.

(1) Cf. *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 488 et *II ed.* p. 596.

- pulchella* { Hedw. — Plagiothecium.
 Kaulf. — Hypnum pallescens.
pulvinata Wahlenb. — Myrinia.
pungens Sw. — Sematophyllum.
pusilla Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 188.
 2. Cortic. — As. : Japon.
pygmaea { Dz. et Mk. — Schwetschkea.
 Tayl. — Isopterygium tenerum.
radicans Schrank. — Anomodon attenuatus.
ramentosa Mitt. — Thuidium.
ramuligera Mitt. — Pseudo-Leskea.
ramusculosa Mitt. — Thuidium.
recurvans Mich. — Rhaphidostegium.
remotifolia { C. M. — Pilotrichella.
 Hook. — Eurhynchium scabrisetum.
 Lindb. — Pseudo-Leskea.
repens Hartm. — Platygyrium.
rostrata Hedw. — Anomodon.
rotulata Hedw. — Hypopterygium.
rubricaulis Tayl. — Zygodon Preissianus.
 ? *rufa* Reinw. et Hsch. — Rhegmatodon.
rufescens Schwaegr. — Orthothecium.
 var. *chrysea* Brid. — Orthothecium chryseum.
rupestris Berggr. in *Bidr. till Skand. bryol.* p. 9.
 L. catenulata var. *rupestris* Bryhn in *Norsk. Mag. naturw.* 1891.
 L. nervosa (fid. Limpr.).
 L. nervosa β *rupestris* Hartm. *Skand. Fl.* II ed. 10, p. 38.
 Pseudo-Leskea *rupestris* Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norw.* p. 6.
 Rupic. — Eur. : Alp. Norveg. (Dovre).
rupicola Hedw. — Brachythecium acuminatum var. *rupicola*.
Saviana de Not. { (fid. C. M.). — Pseudo-Leskea atro-virens var. *Saviana*.
 (fid. Limpr.). — Pseudo-Leskea atro-virens var. *brachy-*
 clados.
sciuroides { Dz. — et Mk. — Cladomnion octangulum.
 Hook. — Cladomnion.
 Hornsch. — Cylindrothecium neglectum.
scopula Mitt. — Pseudo-Leskea.
secunda Hook. — Pylaisaea.
Seligeri Brid. — Plagiothecium silesiacum.
seminervis Kze. — Helicodontium.
sericea Hedw. — Homalothecium.
serrulata Brid. — Isopterygium radicans.
setigera Mitt. — Sciaromium.
setosa Hedw. — Brachythecium acuminatum var. *setosa*.
Smithii Sw. — Hypnum arcticum.
sparsifolia Mitt. — Thuidium.
spinosa Mitt. — Sciaromium.
splendens Web. — Pylaisaea polyantha.
Sprucei Br. — Amblystegium.
squarrosa Mich. — Rhaphidostegium recurvans.
straminea Hsch. et Reinw. p. p. { — Sematophyllum hermaphroditum.
 — Sematophyllum gedeanum.
stratosa Mitt. — Pseudo-Leskea.
striata Schwaegr. — Hookeria aurea.
striatella Brid. — Plagiothecium Mühlenbeckii.
stricta Ltz. — Orthothecium.

subcompressa Br. et Sch. — Hypnum.
subenervis Schwaegr. — Myrinia pulvinata.
subfalcata Mitt. — Thuidium.

subobtusifolia C. M. et Kind. in *Bidr.* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 169.
 1. Ad arbor. subinund. — *Am. sept.* : Columb. brit.
Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 533.

subpinnata Brid. { — Rhaphidostegium Kegelianum var. tenue.
 { — Taxithelium planum.

subrufa Wils. — Orthothecium intricatum.

subtilis Hedw. — Amblystegium.

subulacea Mitt. — Pseudo-Leskea.

sulcata Hook. — Climacium.

superba Tayl. — Porotrichum.

tamariscella Mitt. — Thuidium.

tamariscina { Hedw. p.p. { — Hypopterygium commutatum.
 { W. P. Sch. — Hypopterygium Tamarisci.
 { — Thuidium orthocarpum.

tectorum Lindb. — Pseudo-Leskea.

tenuirostris { Br. et Sch. — Rhynchostegium cylindricarpum.
 { Hook. — Helicodontium.

teretiuscula Mitt. *M. austr. am.* p. 567.

1. — *Am. merid.* : And. Quitens.

trichomanoides Hedw. — Homalia.

tristis Cesati in *de Not. Syll.* p. 67 ; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 596.

Anomodon fragilis Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1818, p. 275, t. 10.

A. ? tristis Sull. *M. and Hepat. of U. St.* 1856.

Haplohymenium Sieboldi Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 310 et *M. frond. ined. Archip. Ind.* p. 121 t. 40.

Hypnum emarginatum Schleich. in sched.

H. fragile C. M. *Syn. II*, p. 471.

H. triste ej. op. cit. p. 478.

L. fragilis H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. II ed.* n. 101.

Neckera Sieboldi C. M. op. cit. p. 81.

2. Cortic. — *Eur.* : Rhaet., Tirol. merid., Ital. super. As. : Japon., China or., Himalaya et Tibet occ., Nepal. *Am. sept.* : A Montreal usq. ad Ludovic.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 922.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 363.

umbrosa Mitt. — Sciaromium.

undata Hedw. — Hookeria.

varia Hedw. — Amblystegium radicale.

velutina Schrank. — Brachythecium.

viticulosa Spr. — Anomodon.

vivipara { Timm. — Isothecium myurem.

{ Willd. — Anomodon viticulosus.

Wallichii Mitt. — Pseudo-Leskea.

Wollei Aust. in *Bull. Torr. bot. Club V*, p. 22 ; Lesq. et Jam. *Man.* p. 304.

Amblystegium Wollei Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 24.

Ster.

— *Am. sept.* : Niagara, lac. Super.

LESKEELLA Limpr. *Laubm. Deutschl. II*, pp. 747 et 756 (subgen. LESKEÆ).

LESKIA Hedw. *Fund. M. II*, p. 98, t. 10, f. 62-63 = LESKEÆ.

LESKIA HEMIRAGIS *Brid. Bryol. univ. II, pp. 334 et 764.*

striata Brid. — *Hookeria aurea*.

LESKIA OMALIA *Brid. Bryol. univ. II, pp. 325 et 764.*

complanata Brid. — *Neckera*.

cymbifolia Brid. — *Taxithelium planum*.

decomposita Brid. — *Porotrichum*.

flabellata Brid. — *Homalia*.

inflectens Brid. — *Ectropothecium*.

involvens Brid. — *Thuidium*.

leucostega Brid. — *Stereophyllum*.

ornithopodioides Brid. — *Rhacopilum tomentosum*.

rutilans Brid. — *Ectropothecium*.

var. *porto-ricensis* Brid. — *Ectropothecium conostegum*.

trichomanoides Brid. — *Homalia*.

LESQUEREUXIA *Lindb. Contr. ad fl. crypt. As. bor. or. 1872, pp. 245-247*
= *LESCURÆA*.

Leucoblastia *C. M. in Linn. 1878-79, p. 438 (subsect. HYPNI).*

Leucobryella *C. M. in Linn. 1874, p. 556 (sect. SYRRHOPODONTIS).*

LEUCOBRYUM *Hpe. in Linn. 1839, p. 42 (74 spec.).*

aduncum *Bryol. jav. I, p. 13 et II, p. 221, t. 11; Mitt. M. Ind. or. p. 26.*

L. brachyphyllum *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 293.*

2. — *As. : Nepal., Sumatra, Java, ins. Banca, Penang,*
Malacca, Borneo.

afro-glaucum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 259.*

— *Afr. : M. Cameroon.*

albidum (Brid.) Lindb. mss.

Bryum albidum et glaucum, fragile, minus, foliis erectis, setis oblongis
Dill. Hist. M. p. 546, t. 83, f. 8.

Dicranum albidum *Brid. Mant. M. p. 67.*

D. glaucum β *albidum* *W. et M. in Brid. Bryol. univ. I, p. 409.*

L. minus *Sull. M. of U. St. p. 24; Lesq. et Jam. Man. p. 91 (1).*

2. *Lignic. et terr. in palud. — Am. sept. : New Jersey, Ohio.*

angustifolium *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 293.*

L. Bowringii *Mitt. M. Ind. or. p. 26.*

— *As. : Hong-Kong, Khasia, Ceylan, Sumatra.*

angustum *Hpe. Symb. 1870, p. 270.*

Ster. — Am. merid. : Brasil, austr. or.

Antillarum *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 16.*

Ster. ? — Am. sept. : Guadalup.

« *f. crispula* *Besch. l. c.*

— *Am. sept. : Martinic.*

argentanicum *C. M. in Linn. 1878-79, p. 249.*

Ster. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

auriculatum *C. M. in Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin. p. 2.*

Ster. — Pac. : Nov. Guin. merid.

(1) Cf. D^{na} E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1892, p. 91.

Boivinianum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 48.

Ster. Ad rup. umbros. — Afr. : S. Maria de Madagasc.

boninense Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.*... 1859.

2. — As. : Ins. Bonin.

Boryanum Besch. *op. cit.* p. 47.

Dicranum megalophyllum Brid. *Mant. M.* p. 67 p.p.

Sphagnum iridans Brid. *Sp. M. I.* p. 20 p.p.

Sph. javanense P. B. *Prodr.* p. 88 pp.

? *Sph. javense* Brid. *Bryol. univ. I.* p. 19 p.p.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

Boweringii Mitt. — L. *angustifolium*.

brachyphyllum { Hpe. — L. *candidum*.
Wils. — L. *aduncum*.

Cameruniae C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 67.

— Afr. : M. Cameroon.

candidum (Brid.) Jaeg. *Ad. I.* p. 158.

Bryum candidum fragile foliis recurvis Dill. *Hist. M.* p. 364, t. 46, f. 22.

Dicranum brachyphyllum Hsch. in *Sieb. M. Nov. Holland.*

D. candidum Brid. *Bryol. univ. I.* p. 409.

L. brachyphyllum Hpe. in *Linn.* 1839, p. 42; *C. M. Syn. I.* p. 76 (1).

2. — Pac. : Austral. or., Nov.-Zeland., Tasman.

« *var. major* Jaeg. *Ad. I.* p. 159.

— Pac. : Austral. felix.

chlorophyllosum C. M. *Syn. II.* p. 535; *Bryol. jav. I.* p. 12, t. 10.

Syrhodon rigidus Duby in *Zolling. Pfl. n.* 3370.

1. — As. : Celebes, Sumbawa.

Cladopanthus C. M. — L. *piliferum*.

clavatum Hpe. *Symb.* 1877, p. 716.

Dicranum juniperoideum Hsch. *Fl. Brasil. I.* p. 10.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

comorense C. M. in *Linn.* 1876, p. 235.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan, S. Maria de Madagasc.

conocladulum C. M. *mss.*

— Pac. : Austral. or. (Queensland).

conocladum Besch. *Fl. Nov. Caled.* p. 202.

— Pac. : Nov. Caledon.

« *var. repens* ej. l. c.

— Pac. : Nov. Caledon.

crispum C. M. *Syn. I.* p. 78.

L. Martianum Hpe. in *Linn.* 187, p. 67.

L. tenuifolium Sull. in *Proced. of the Am. Acad.*... 1861, p. 279.

ter. — Am. sept. : Guadalup., Cuba, Jamaic. Am.

merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, Nova Granat., Brasil., Peruv.

cucullatum Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 180.

Ster. Lignic. — Afr. : Usambara.

falcatum C. M. — L. *javense*.

var. hawaiense Reichdt. — L. *javense var. hawaiense*.

(1) « *Var. β* Schwaegr. *Suppl. II, II.* p. 119, t. 187 B forsan spec. propr. » C. M. l. c.

flavo-mucronatum C. M. in Linn. 1878-79, p. 464.

2. — Am. merid. : Venezuela.

giganteum C. M. Syn. I, p. 79 et II, p. 536.

Dicranum megalophyllum Raddi Critt. Brasil. p. 3 (fid. Hpe. et Mitt.).

L. longifolium Hpe. in Linn. 1847, p. 68.

L. robustum Sull. in Proced. of the Am. Acad... 1861, p. 279.

Ster. Lignic. et terr. — Am. merid. : Venezuela, And. Columb., Brasil. austr. or.

“ var. tenuifolium C. M. in Linn. 1878-79, p. 464.

Ut typ. — Am. merid. : Venezuela.

glaucum (Linn.) W. P. Sch. Coroll. p. 19 et Syn. II ed. p. 109.

Bryum albidum et glaucum, fragile majus, foliis erectis, setis brevioribus
Dill. Hist. M. p. 362, t. 46, f. 20.

Br. glaucum L. Sp. pl. p. 1582.

Dicranum glaucum Hedw. Sp. M. p. 135; Brid. Bryol. univ. I, p.p. 407 et 811.

Fuscina glauca Eckrank Bayers Fl. II, p. 457.

Glaucodipsis frigida K. Sch. Mooslob. p. 16.

Hypnum glaucum Weiss Crypt. Goett. p. 208.

L. vulgare Hpe. in Linn. 1839, p. 42; C. M. Syn. I, p. 74.

Mnium glaucum Gmel. Syst. nat.

Oncophorus glaucus Bryol. eur. t. 97-98.

2. In silvat. et ericet. subhumid. — Eur. : Tota, merid. calidior. et arct. glacial. except. As. : Caucas. Afr. : Canar., Madeir. Am. sept. : Terr. nov., ins. Miquelon, Nov. Scot., New Brunswick, Ottawa, Ontar., Gaspes., fret. Behring, reg. centr. et or.; Jamaic.? Am. merid. : And. Nov. Granat.? Venezuela? Brasil.? Pac. : Ins. Hawai (fid. Mitt.).

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 45, 46.

• Mac. Canad. M. n. 55.

Rab. Bryoth. eur. n. 32.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 97.

goyazense Broth. in Hedwig. 1895, p. 118.

2. Ster. Rupic. — Am. merid. : Brasil. or. (Goyaz).

guadalupense Lindb. in Oefv... 1864, p. 608.

Ster. — Am. sept. : Guadalup.

Gueinzii C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 74 et 454.

Ster. — Afr. : Transvaal, C. B. Sp.

heterodictyon Besch. in Journ. de bot. 1891.

2. — Afr. : Madagascar.

Hollianum Dz. et Mk. in Pl. Jungh. p. 319; Bryol. jav. I, p. 17 et II, p. 222, t. 13.

Ster. — As. : Sumatra, Java, Borneo, Tonkin.

homalophyllum Broth. in Bol. d. Soc. Brot. VIII, 1890.

Ster. — Afr. : Ins. S. Thom.

Isleanum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 48.

L. juniperoideum? (ex ips!).

Ster. — Afr. : Ins. Bourbon.

javense (Brid.) Mitt. M. Ind. or. p. 25.

L. falcatum C. M. Syn. I, p. 79; Bryol. jav. I, p. 15, t. 14,

Sphagnum javanense P. B. Prodr. p. 88 p.p.

Sph. javense Brid. Bryol. univ. I, p. 19; Schwaegr. Suppl. II, I, p. 4, t. 102.

Ster. Lignic. — As. : Nepal., Khasia, Ceylan, Sumatra, Java, ins. Banca, penins. Malay., Borneo, Hong-Kong, Tonkin, Japon. *Pac.* : Ins. Sandwic.

* *var. hawaiense* (Reichdt). *Par.*

L. falcatum var. javense Reichdt. *Beitr.* p. 567.

Lignic. in silv. — *Pac.* : Ins. Hawaï.

juniperoideum (Brid.) C. M. in *Linn.* 1844, p. 689 et *Syn.* I, p. 78.

Dicranum juniperoideum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 409.

Ster. — *Afr.* : Ins. Canar., Azor., Madeir. ; Borbon.
(fid. Brid.).

laeve Mitt. *miss.* ; C. H. Wright *M. Mad.* p. 4 (nom).
— *Afr.* : Madagascar.

laminatum Mitt. in *Bonplandia*, 1861, p. 366.

Ster. — *Pac.* : Ins. Fidji.

leucophanoides C. M. in *Fl.* 1886, p. 279.

Ster. Ad. arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

longifolium Hpe. in *Linn.* 1839, p. 42 ; C. M. *Syn.* I, p. 77.

Dicranum albicans Schwaegr. *Suppl.* II, II, p. 122, t. 186.

D. megalophyllum Raddi *Critt. Brasil.* p. 3 (fid. C. M.).

Sphagnum iridans Brid. *Sp. M.* I, p. 20.

? *Sph. macrophyllum* ej. *Bryol. univ.* p. 753.

2. Ad arbor. rup. et terr. — *Am. sept.* : And. Costa. Ricens., Jamaic.,
Guadalup. — *Am. merid.* : Æquat., Brasil. austr. or., And. Peruv.

longifolium Hpe. (*Linn.* 1847). — *L. giganteum*.

Mac-Leanum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 455.

Ster. — *Afr.* : Transvaal.

madagassum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 49.

Ster. — *Afr.* : Madagasc.

madagassum C. M. — *L. Rutenbergianum*.

Martianum (Hsch.) Hpe. in *Linn.* 1839, p. 42 ; C. M. *Syn.* I, p. 76.

Dicranum Martianum Hsch. *Fl. Brasil.* p. 11.

2. Terr. et lignic., rar. rupic. — *Am. sept.* : Guadalup., Porto Rico.
Am. merid. : And. Nov. Granat., Venezuela, Guian., Amazon.,
Brasil. or. *Pac.* : Nov. Caledon.

Martianum Hpe. — *L. crispum*.

mauritianum C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (nom.).

— *Afr.* : Ins. Franciae.

microcarpum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 464.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

microcarpum C. M. — *L. papuense*.

minus Hpe. in *Linn.* 1844, p. 42.

L. vulgare β *minus* C. M. *Syn.* I, p. 75.

L. sediforme Lesq. et Jam. *Man.* p. 91 (1).

2. In paludosis. — *Am. sept.* : Florid., Ludovic.

var. sediforme Ren. et Card — *L. minus*.

(1) Cf. Dna E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1892, pp. 189-191.

molle C. M. mss.

— Afr. : Madagascar.

molliculum Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 180.

Ster. — Afr. : Usambara.

mucronifolium A. Br. in C. M. Syn. II, p. 536; Bryol. jav. I, p. 18.

Ster. — As. : Java.

Naumanni C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 85 et in Forschungsreise.... Bot. p. 51.

Ster. Ad arbor. — Pac. : Nov. Guinea.

neilgherrense C. M. in Bot. Zeit. 1854, p. 556.

Dicranum megalophyllum Mont. in Perrottet M. Neilgh.

2. — As. : M. Neilgherr.

neilghiriense Mitt. — L. triviale.

neo-caledonicum Duby in Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 203.

— Pac. : Nov. Caledon.

obtusifolium C. M. — Schistomitrium.

papuense Par.

L. microcarpum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 85 et in Forschungsreise... Bot. p. 50.

2. Ad arbor. — Pac. : Nov. Guinea.

pentastichum Bryol. jav. I, p. 16, t. 15.

2. — As. : Java.

Perrotti Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 112 et M. Masc. Mad. n. 11.

Ster. In silv. — Afr. : Ins. Franciae, Madagasc.

phyllanthum Lindb. — Leucophaanes Gardnerianum.

piliferum (Dz. et Mk.) Jaeg. Ad. I, p. 163 (1).

Cladopanthus piliferus Dz. et Mk. M frond. ined. Archip. ined. p. 80, t. 28; Bryol. jav. I, p. 18, t. 13.

L. Cladopanthus C. M. Syn. I. p. 78.

2. Ad arbor. — As. : Java.

pungens C. M. M. Polyn. p. 56.

Ster. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa.

Rehmanni C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 75.

Ster. — Afr. : C. B. Sp.

robustum Sull. — L. giganteum.

retractum Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 334.

L. sanctum W. P. Sch. in Savatier M. Jap. n. 109.

— As. : Japon.

rugosum Mitt. Sam. M. p. 192.

Ster. Ad arbor. — Pac. : Ins. Samoa.

Rutenbergianum Besch. in litt.

L. madagassum C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 204.

— Afr. : Madagascar.

(1) « An Schistomitrium? aut gen. propr. « Cladopanthus » restituendum? »
Jaeg. Ad. II, p. 654.

sanctum (*Brid.*) *Hpe. in Linn.* 1839, p. 42; *C. M. Syn.* I, p. 77; *Bryol. jav.* I, p. 14, t. 12.

Dicranum glaucum γ *sanctum* *Brid. Bryol. univ.* I, p. 811.

D. sanctum *Nees in Schwaegr. Suppl.* II, II, p. 121, t. 186.

Octoblepharum sanctum *Mitt. in Proceed. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.*) p. 99.

2. Ad mur. sepulcror. — *As.* : Nepal., Sumatra, Java, Singapore, ins. Banca, Borneo, Celebes, Japon. *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa, Nov. Hebrid.

sanctum *W. P. Sch.* — *L. retractum.*

scabrum *Sande Lac. in Mig. Ann. mus. bot. Lugdun. Batav.* II, p. 292.
— *As.* : Japon., Hong-Kong.

sediforme *C. M. Syn.* I, p. 75.

Dicranum glaucum β *albidum* *Brid. in hb. reg. Berol.*

L. minus *var. sediforme* *Ren. et Card. in Rev. bryol.* 1892, p. 79.

2. — *Am. sept.* : Florid., Ludovic.

sediforme *Lesq. et J.* — *L. minus.*

Seemanni *Mitt. Fl. vit.* p. 387.

Ster. — *Pac.* : Ins. Sandwic. (Oahu).

selaginoides *C. M. mss.* ; *Jaeg. Ad.* II, p. 762; *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 179 (*descriptio*).

Ster. *Paludic.* — *Afr.* : Reg. lacustr., Madagascar.

sericeum *Broth. in sched.*

— *As.* : Archip. Ind. or.

sordidum *Ångstr. in Oefv....* 1876, n. 4, p. 7.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

speirostichum *C. M. in Rev. bryol.* 1876, p. 3 (*nom.*).

L. Teysmannianum *forma* (*fid. Hpe.*).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

squarrosulum *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Ak.* 1895, n. 3.

Ster. *Lignic. et terr.* — *Am. merid.* : Brasil. or.

stenophyllum *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 204.

— *Pac.* : Nov. Caledon.

subchlorophyllosum *Hpe. in Linn.* 1876, p. 304.

— *Pac.* : Austral. or.

subulatum *Hpe. in Linn.* 1852, p. 359.

Terr. — *Am. sept.* : Cuba, Porto Rico.

tahitense *Ångstr. in Oefv....* 1873, n. 5, p. 118.

Ster. *Lignic. et terr.* — *Pac.* : Ins. Taïti.

tenuifolium *Sall.* — *L. crispum.*

Teysmannianum *Bryol. jav.* I, p. 16, t. 15.

Ster. — *As.* : Java. *Pac.* Austral. or. (Nov. Vales.) ?

triviale *C. M. in Linn.* 1869-70, p. 30.

L. neilgherriense *Mitt. M. Ind. or.* p. 26 (*fid. C. M.*).

L. vulgare *Wils. in Kew Journ. bot.* IX, p. 293.

Ster. — *As.* : Khasia ?, Sikkim, Calcutta.

vulgare { Hpe. — *L. glaucum*.
 Wils. — *L. triviale*.
β minus C. M. — *L. minus*.

Widgrenianum Ångstr. in *Oefv.*.... 1876, n. 4, p. 6.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Wightii Mitt. *M. Ind. or.* p. 25.
 — *As.* : Madras (1).

LEUCODON Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. I et II, I, p. 82, t. 125 (32 spec.)

Alopecurus Brid. — *Braunia sciuroides*.

Arbuscula Welw. et Duby in *Mém...* Genève, 1871, p. 4, t. I.
 Ster. Cortic. — *Afr.* : Angola.

assimilis (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 121.
 Neckera assimilis C. M. *Syn. II*, p. 92.
 2. Cortic. — *Afr.* : C. B. Sp.
 Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 319 b et 605 b.
 « *var. gracilis* C. M. in *Rehm. l. c.* n. 320.
 — *Afr.* : C. B. Sp.

australis Jaeg. — *Lepyrodon*.
bartramiioides Hook. — *Cryptopodium Hookeri*.
Beccarii C. M. — *L. Dracaenae*.

brachypus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 211 ; *Sull. Ic. M.* p. 111, t. 70;
 Lesq. et Jam. Man. p. 288.
 Neckera brachypus C. M. *Syn. II*, p. 108.
 2. Ad arbor. et rup. — *Am. sept.* : Nov. Scot., Gaspes., Ontar., reg. or.
 Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 351.

calycinus Hook. — *Dicnemon*.

canariensis Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 3.
 Astrodontium canariense ej. *Suppl. II, I*, p. 128, t. 134 ; *Brid. Bryol.*
 univ. II, p. 229.
 Hedwigia Schmidtii Hook. *M. ex. t.* 170.
 Hypnum canariense Brid. *M. Rec. II, II*, p. 145.
 H. flagellis instar caudae vulpinae Dill. *Hist. M.* p. 306, t. 39, f. 41.
 Neckera canariensis Brid. *Sp. M. II*, p. 109.
 Plaubelia canariensis Brid. *mss.*
 2. Cortic. — *Afr.* : Ins. Canar., Madeir., ins. Azor.
 Exs. : Bourg. *Pl. Can.* n. 1587.
 Husnot *M. Can.* n. 121.
 Mandon *Pl. Madeir.* n. 32.

capensis W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*
 L. assimilis C. M. (*fid. Hpe.*).
 — *Afr.* : C. B. Sp.

coronatus Mitt. — *Lasia*.

(1) In Enum. Kindberg. nom. nud. :

L. Baileyi C. M.
Eggersii C. M.
interruptum C. M.

L. laticaula C. M.
spinidorsum C. M.
subcandidum C. M.

corsicus W. P. Sch. in *Ltz. Bryol. Not.* p. 59.

Astrodonium corsicum Jaeg. *Ad. II*, p. 117.

— *Eur.* : Corsica.

cryptotheca Hpe. *Ic. M. t.* 17.

Astrodonium cryptotheca Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 73.

Neckera cryptotheca C. M. *Syn. II*, p. 109.

— *Am. sept.* : Mexic.

curvirostris Hpe. *Ic. M. t.* 16.

Astrodonium curvirostre Besch. *op. cit.* p. 74.

Neckera curvirostris C. M. *Syn. II*, p. 108.

2.

— *Am. sept.* : Mexic.

domingensis (Spreng.) Mitt. *M. austr. am.* p. 409.

Hypnum nudicaule Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 223, *ex Hispaniola* ?

Neckera domingensis Spreng. in *Brid. Bryol. univ. II*, p. 259 ; C. M. *Syn. II*, p. 95.

Pilotrichum flagelliferum Brid. *op. et l. cc.*

Pterigynandrum nudicaule ej. *op. cit.* p. 182.

2.

— *Am. sept.* : Costa Rica, Cuba, S. Doming.,

Barbades. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Venezuela, And. Peruv.,

Brasil.

Dracaenae Vent. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, I, p. 20.

L. Beccarii C. M. in *Linn.* 1875, p. 450.

2. Cortic. — *Afr.* : Abyssin.

flagellaris (Lindb.) Broth. *Enum. M. Cauc.* p. 138.

Fissidens flagellaris Lindb. *l. c.*

2. Ster. Cortic. — *As.* : Caucas. occ.

geniculatus Mitt. — *Lasia*.

glaucus Jaeg. — *Lepyrodon*.

gracilis Hpe. — *Cladomnium*.

hexastichus Mont. — *Lepyrodon implexus*.

immersus Lindb. in *Oefv...*, 1869, p. 72.

Fissidens immersus ej. in *Broth. Enum. M. Cauc.*

L. caucasicus Jur. et Milde *Beitr...* p. 599.

L. Stevenii C. M. in *Act. Hort. Petrop. f. I.*

2. Ad arbor. et rup. — *As.* : Caucas., Talysch, M. Ararat.

implexus Kze. — *Lepyrodon*.

involutaceus Jaeg. — *Ædicladium*.

julaceus (L.) Sull. *Ic. M.* p. 110, t. 69 et *M. Allegh. n.* 87 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 288.

Hypnum julaceum L. *Sp. pl.* p. 1596.

H. julaceum perichaetio setas paene aequante Dill. *Hist. M.* p. 321, t. 41, f. 56.

Neckera pseudalopecura C. M. *Syn. II*, p. 92.

Pterigynandrum julaceum Hedw. *M. frond. IV*, p. 51, t. 20 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 181.

Pterogonium julaceum Schwaegr. *Suppl. I, I*, t. 100.

2. Cortic. — *Am. sept.* : Reg. or., centr. et merid.

Ews : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 91.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 350.

Kunzeanus C. M. — *Lepyrodon implexus*.

laevifolius Broth. mss.

Ster. Cortic. — As. : Japon.

Lagurus Hook. — Lepyrodon.

var. *borealis* { Lindb. — Orthothecium chryseum f. lapponica.
Wils. — Myurium Hebridarum.

madagascariensis Brid. — Pilotrichella.

morensis Schwaegr. — Leucodon sciuroides var. *morensis*.

nitidus Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 99, t. 87, f. 4 et Handb. p. 457.

Stereodon Lyallii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. IV, II, p. 89.

Ad arbor. — Pac. : Nov. Zeland. sept. et med.

orientalis (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 121.

Neckera orientalis C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 437.

Ster. — As. : India (sine loco spec.).

pacificus W. P. Sch. in Jardin Enum. p. 20 (nom.); Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 33 (descript.).

Cortic. — Pac. : Nouka-Hiva.

pallidus Hook. — Leucoloma Sieberianum.

parvulus Jaeg. — Lepyrodon.

pendulus Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 273.

Fissidens pendulus Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 162.

2. — As. : Amour.

piriformis C. M. in sched.

— As. : Japon. centr.

Pohlii Schwaegr. Suppl. III, I, I. t. 232.

Neckera Pohlii C. M. Syn. II, p. 114.

Pterobryum Pohlii Mitt. M. austr. am. p. 426.

2. — Am. merid. : Brasil.

rigidus Bryol. jav. II, p. 104, t. 215.

1. Cortic. — As. : Sumatra.

rufescens Hsch. et Reinw. — Oedocladium.

rugosus Hook. — Dicnemon.

Rutenbergii C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 210.

— Afr. : Madagasc.

sapporensis Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 360.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 114, 239, 1428 (f. *gracilis*), 3531.

scabrissetus Tayl. — Eurhynchium suberectum.

Schweinfurthii C. M. in Linn. 1875, p. 447.

2. Cortic. — Afr. : M. occ. mar. Erythraei.

sciuroides (L.) Schwaegr. Suppl. I, II, p. 1 et II, I, p. 82, t. 125; Brid. Bryol. univ. II, p. 208; Bryol. eur. V, t. 468; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 574.

Cecalyphum sciuroides P. B. Prodr. p. 51.

Dicranum sciuroides Sw. M. Suec. p. 32.

Fissidens sciuroides Hedw. Sp. M. p. 161.

Fuscina sciuroides Schrank Baiers Fl. II, p. 452.

Hypnum arboreum, sciuroides Dill. Hist. M. p. 309, t. 41, f. 54.

H. sciuroides L. Sp. pl. p. 1596.

- Neckera sciuroides* C. M. *Syn. II*, pp. 107 et 668.
Pterigynandrum sciuroides Brid. *Sp. M. I*, p. 134.
Pterogonium sciuroides Turn. *Muscol. Hib.* p. 32.
Trichostomum sciuroides W. et M. *Bot. Taschb.* p. 132.
2. Ad arbor., praecip. *Querc.* — *Eur.*: Tota, frigid. except. *As.*:
Jenissei sup., *Caucas.* occ. et centr., *Kurdistan*; *Kashmir* (ster.).
Afr.: *Alger.* *Am. sept.*: *New Brunswick*, *Gaspes.*, *Ottawa*, *Ontar.*,
New-York.
- Exs.*: *Mac. Canad. M.* n. 237.
Rab. Bryoth. eur. n. 137, 1191.
- « *var. morensis* (*Schwaegr.*) *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*
Hypnum morense *Schleich. in sched.*
L. morensis *Schwaegr. l. c.*; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 210.
Neckera sciuroides β *cylindrocarpa* C. M. *Syn. II*, p. 108.
 Ut typ. — *Eur.*: *Scotia*, *Anglia*, *Helvet.*, reg. merid. tota. *Afr.*: *Alger.*,
ins. Canar., *Madeir.*
Exs.: *Bourg, Pl. Canar.* n. 1588.
- secundus* (*Harv.*) *Mitt. M. Ind. or.* p. 124.
Astrodontium secundum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, *I*, p. 73.
Neckera Harveyana C. M. *Syn. II*, p. 110.
N. stricta *ej. l. c.* p. 112.
Sclerodontium secundum *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 11 et in
Hook. Ic. pl. rar. t. 21, f. I.
Scl. strictum *ej. II. cc., f. 2.*
 2? *Cortic.* — *As.*: *Nepal.*, *Himalaya* et *Tibet occ.*, *Alp. Yunnan.*, *Japon.*
- sekistos* *Welw. et Duby in Mém..... Genève*, 1871, p. 3.
 2. *Cortic.* — *Afr.*: *Angola.*
- sericeus* *Hsch. in Mundt et Maire M. Capens.*
Astrodontium sericeum *Jaeg. Ad. II*, p. 117.
Neckera sericea C. M. *Syn. II*, p. 113.
 2. *Cortic.* — *Afr.*: *Transvaal*, *C. B. Sp.*
Exs.: *Rehm. M. Afr. austr.* n. 321, 604.
- Stevenii* C. M. — *L. immersus.*
- submersus* *Hpe. mss.*; *Jaeg. l. c.*
Astrodontium submersum *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 74.
 2? — *Am. sept.*: *Mexic.*
- suborthostichus* *Jaeg.* — *Lepyrodon.*
- subsericeus* C. M. in *Rev. bryol.* 1877, n. *I* (nom.).
 — *Afr.*: *Ins. Comores.*
- tenuis* *W. P. Sch. hb.*
Astrodontium tenue *Besch. l. c.*
Ster. — *Am. sept.*: *Mexic.*
- tomentosus* } C. M. — *Lepyrodon suborthostichus.*
 } *Hook.* — *Lepyrodon.*
- Thomsoni* *Mitt. M. Ind. or.* p. 124.
 1. — *As.*: *Himalaya occ.*
- trichophyllus* *Jaeg.* — *Lepyrodon* (1).

(1) In *Enum. Kindberg.* nom. nudum:
L. spurio-secundus C. M.

LEUCODONIOPSIS Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 177 (2 spec.).

Horeana eor. in op. cit. 1895, p. 66.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or.

plicata eor. in op. cit. 1894, I, p. 177.

Ster. Cortic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

LEUCOLEPIS Lindb. de Mn. europ. p. 80.

acanthoneura Lindb. — *Rhizogonium Menziezii*.

LEUCOLOMA Brid. Bryol. univ. II, p. 218 (85 spec.).

acutum Mitt. mss. ; C. H. Wright M. Madag. p. 3 (nom.).

— *Afr.* : Madagascar.

aduncum (Hpe.) Par.

Dicranum aduncum Hpe. Enum. M. Brasil. p. 16.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

albo-cinctum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, II, p. 100 et M. Masc. Mad. n. 158.

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

album (Sull.) Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 12.

Dicranum album Sull. M. Cubens. p. 278.

Poecilophyllum album Mitt. M. austr. am. p. 93.

Arbor. et lignic. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaic., Guadalup., ins. S. Vincent.

amblyacron C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 25.

Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.

ambreanum Ren. et Card. in op. cit. 1891, II, p. 181 et M. Masc. Mad. n. 4.

Ster. Lignic. — *Afr.* : Madagascar.

amœne-virens Mitt. M. Ind. or. p. 13.

Rupic. — *As.* : Khasia, Madras, Ceylan.

angustifolium Brid. — *L. bifidum* ?

Arbuscula C. M. in Jaeg. Ad. II, p. 760 (nom.).

— *Afr.* : Madagascar.

asperrimum (C. M.) Par.

Dicranum asperrimum C. M. in Linn. 1878-79, p. 472.

— *Am. merid.* : Venezuela.

austro-scoparium C. M. in sched. ; Broth. in Oefv. of Finska Vet.-Soc. Foerh. 1895, p. 48.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

bifidum Brid. Bryol. univ. II, p. 218.

Dicranum brevisetum ej. l. c. p. 467.

D. Commersonianum C. M. Syn. I, p. 353.

Hypnum bifidum Brid. M. Rec. II, II, p. 51, t. I, f. 4.

L. bifidum ej. Bryol. univ. II, p. 752 ?

Trichostomum bifidum ej. Mant. M. p. 54.

Tr. *Leucoloma* Schwaegr. Suppl. II, I, p. 76, t. 122.

2 ? Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Bourbon., Franciae, Madagascar.

« *var. orthothecioides* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 22.

L. Crepini Ren. et Card. in op. cit. 1892, II, p. 102.

Ster. Terr. — Afr. : Ins. Franciae.

biplicatum (Hpe.) Par.

Dicranum biplicatum Hpe. *Symb.* 1877, p. 717.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

birmense C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601 (nom.).

— As. : Birman. super.

Boivinianum Besch. op. cit. p. 28.

2. — Afr. : Ins. Anjouan.

caespitulans (C. M.) Besch. op. cit. p. 24.

Dicranum caespitulans C. M. in Linn. 1876, p. 240.

Ster. — Afr. : Ins. Anjouan, Mayotte.

caldense C. M. mss. ; Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 6.

Ster. Cortic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

candidulum C. M. in Besch. op. cit. p. 26.

Ster. — Afr. : Ins. Franciae.

Catharinae C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 115.

Cortic. et rupic. — Am. merid. : Brasil. subtropic. or.

chryso-basilare (C. M.) Besch. op. et l. cc.

Dicranum chryso-basilare C. M. in Linn. 1876, p. 238.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan.

« *var. gracilicaulon* Besch. l. c.

Dicranum chryso-basilare *var. gracilicaulon* C. M. l. c.

— Afr. : Ins. Anjouan.

cinclidiontoides Besch. op. cit. p. 22.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

clavinerve C. M. in *Oefv....* 1893.

2. Rupic. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

Crepini Ren. et Card. — L. bifidum *var. orthothecioides*.

Crügerianum (C. M.) Par.

Dicranum Crügerianum C. M. *Syn. II*, p. 188.

Poecilophyllum Crügerianum Mitt. *M. austr. am.* p. 92.

2. — Am. merid. : Ins. Trinitat.

cryptocarpum (C. M.) Par.

Dicranum cryptocarpum C. M. in Linn. 1874, p. 626.

— Am. sept. : Mexic.

cuneifolium (Hpe.) Par.

Dicranum cuneifolium Hpe. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 206.

— Afr. : Madagascar.

decolor Wright in *Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 263.

— Afr. : Zanzibar.

dichelymoides (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 22.

Dicranum dichelymoides C. M. in Linn. 1876, p. 240.

Ster. — Afr. : Ins. Anjouan, Madagascar.

drepanocladium (C. M.) Par.

Dicranum drepanocladium C. M. in *Fl.* 1890, p. 473.

Ster. In gramin. edit. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Dubyanum Besch. op. cit. p. 28.

Ster. — Afr. : Ins. Franciae.

ecaudatum (C. M.) Par.

Dicranum ecaudatum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 473.

— Am. merid. : Venezuela.

Eckloni (Ltz.) Jaeg. Ad.

Dicranum Eckloni Ltz. *Moosst.* p. 158.

Ster. — Afr. : C. B. Sp.

Fraseri (Mitt.) Par.

Dicnemonella Fraseri Mitt. in F. v. Müller's *Fragm. Phyt. austral.* XI, p. 114.

Sclerodontium Fraseri Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 54.

— Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).

fuscifolium Besch. op. cit. p. 27.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

gracilescens Broth. in *Bol. da Soc. Brot.* 1890.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.

Grandidieri Ren. et Card. in op. cit. 1892, II, p. 101 et M. Masc. Mad. n. 167.

Ster. — Afr. : Madagascar.

Hildebrandti C. M. in *Hildebr. M. Mad.* n. 2122.

— Afr. : Madagascar.

holomitrioides C. M. in *Jaeg. Ad.* II, p. 760 (nom.).

— Afr. : Madagascar.

Holstii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 178.

2. Ster. Cortic. — Afr. : Usambara.

incanum (Hook. f.) Mitt. mss.

Dicranum incanum H. f. *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 410.

— Pac. : Nov. Zeland.

insigne (C. M.) Par.

Dicranum insigne C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 33.

Ster. — As. : Ceylan.

Isleanum Besch. in litt.

L. secundifolium ej. op. cit. p. 25.

Ster. — Afr. : Ins. Seychelles.

Leichardti (Hpe.) Par.

Dicranum Leichardti Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 514.

Poecilophyllum Leichardti Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 54.

2 — Pac. : Austral. or.

Lepervanchei Besch. op. cit. p. 23.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

lucinerve Mitt. mss.

Lignic. — As. : Tonkin

macrodon (*Hook.*) *Par.*

Dicranum macrodon Hook. Ic. pl. rar. t. 349; C. M. Syn. I, p. 377.

Poecilophyllum macrodon Mitt. M. austr. am. p. 93.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

Mariei Besch. in Journ. de bot. 1891, p.

2. — *Am. sept.* : Guadalup.

molle (C. M.) Mitt. M. Ind. or. p. 13.

Dicrauum molle C. M. Syn. I, p. 354; Bryol. jav. I, p. 65, t. 53, f. 1-6.

Syrhopodon prolifer Duby in Moritzi Verz. p. 137 (fid. Bryol. jav.) (1).

2. Ad arbor. — *As.* : Hong-Kong, ins. Ceram, Sumbawa, M. Java, Sumatra.

mollissimum Mitt. M. austr. am. p. 91.

Lignic. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens.

Moseni Broth. in Bihang till Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895, n. 3.

Ster. Rupic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

nitens (Thw. et Mitt.) Par.

Poecilophyllum nitens Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 297.

Ster. Ad arbor. — *As.* : Ceylan.

pallescens Jaeg. — L. Zeyheri.

persecundum C. M. in Besch. op. cit. p. 26.

Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.

Prionodon Besch. op. cit. p. 29.

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.

procumbens (Mitt.) Par.

Poecilophyllum procumbens Mitt. M. austr. am. p. 94.

Lignic. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat. et Peruv.

pumilum (C. M.) Par.

Dicranum pumilum C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 206.

— *Afr.* : Madagascar.

rectum Lac. mss. ; C. H. Wright M. Mad. p. 4.

— *Afr.* : Madagascar.

Rehmanni C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 29, 29 b, 443.

— *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.

Riedlei Besch. in Journ. de bot. 1891.

2. — *Am. sept.* : Ins. S. Thomas.

rugescens C. M. in Rev. bryol. 1878, p. 69 (nom.).

— *Afr.* : Austral.

Rutenbergii (C. M.) Par.

Dicranum Rutenbergii C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 205.

— *Afr.* : Madagascar.

Sanctae Mariae Besch. op. cit. p. 23.

Ad arbor. in silv. primaev. — *Afr.* : Madagascar, ins. S. Maria.

secundifolium Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 148.

2. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

(1) Cf. Duby in Mém., Genève, 1869, p. 6.

secundifolium Besch. — L. Isleanum.

serratum Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV Suppl.* p. 95 (nom.)
et in *Oefv...* 1890.

2. Cortic. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

serrulatum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 752.

Dicranum Bridelianum *C. M. Syn.* I, p. 354.

Poecilophyllum serrulatum Mitt. *M. austr. am.* p. 93.

2. — *Am. sept.* : Antill. gall., Hispaniola, Porto-Rico.

seychellense Besch. *op. cit.* p. 22.

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Irs. Seychelles.

Sieberianum (Hsch.) Par.

Dicnemonella Sieberiana Hpe. in sched.

Dicranum Sieberianum Hsch. in Sieb. *M. Nov. Holl. n.* 16 ; *C. M. Syn.* I,
p. 352 et II, p. 588.

Leucodon pallidus Hook. *M. ex. II*, p. 12, t. 172.

Neckera pallida *C. M. Syn.* II, p. 113.

Sclerodontium pallidum Schwaegr. *Suppl. II*, I, p. 124, t. 134.

Lignic. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

« var. β Hook. f. *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 410.

Ad rup. madid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

sinuosulum *C. M. in Besch. l. c.*

Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.

sinuosum (Brid.) Besch. *l. c.* p. 27.

Dicranum sinuosum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 427 p.p. ; *C. M. Syn.* I,
p. 354.

Trichostomum ferrugineum Brid. *Mant. M.* p. 83.

Tr. longifolium ej. *Bryol. univ.* I, p. 496 (incl. var. β humile).

— *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.

« var. setifolium Besch. *l. c.*

— *Afr.* : Ins. Borbon.

Sprengelianum (*C. M.*) Par.

Dicranum fasciatum Spreng. *Syst. veg. IV*, II, p. 322.

D. Sprengelianum *C. M. Syn.* I, p. 353.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 30.

squarrosulum (*C. M.*) Par.

Dicranum squarrosulum *C. M. in Abhandl. Brem. VII*, p. 206.

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

subbiplicatum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg. II*, 1894, p. 109.

2 ?

— *Afr.* : Ins. Borbon., Diego Suarez.

subcaespitulans Besch. *op. cit.* p. 25.

Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.

subchrysobasilare *C. M. in Jaeg. Ad. II*, p. 760 (nom.).

— *Afr.* : Madagascar.

subimmarginatum (*C. M.*) Par.

Dicranum subimmarginatum *C. M. Syn.* II, p. 589.

Poecilophyllum subimmarginatum Mitt. *M. austr. am.* p. 94.

2 ?

— *Am. sept.* : Costa-Rica.

- subintegrum *Broth. in Bail. Syn. of Queensl. Fl. IV Suppl. p. 96 (nom.) et in Oefv.... 1890.*
 2. ♂ et fr. ign. Ad arbor. — *Pac.* : Austral. or. (Queensl.)
- subsecundifolium *Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 177.*
 2. Ster. — *Afr.* : Usambara.
- Talazaccii *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1895, I, p. 58.*
 — *Afr.* : Madagascar.
- Taylori Mitt. — Syrrhopodon.
- tenerum Mitt. *M. Ind. or. p. 13.*
 — *As.* : Ceylan, penins. Malay.
- tenuifolium Mitt. *Sam. M. p. 192.*
Dicranum oceanicum C. M. M. Polyn. p. 62.
 Ster. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa, Nov. Caledon.
- terricola *Broth. in op. cit. p. 178.*
 2. Ster. Terr. — *Afr.* : Usambara.
- Therioti *Ren. et Card. in op. et l. cc.*
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or.
- thraustum (*Hpe.*) *Besch. op. cit. p. 39.*
Dicranum thraustum Hpe. in Linn. 1874, p. 209.
 Ster. — *Afr.* : Madagascar.
- Thuretii *Besch. op. cit. p. 24.*
 — *Afr.* : Madagascar.
- tortellum (Mitt.) *Par.*
Poecilophyllum tortellum Mitt. M. austr. am. p. 94.
 — *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Orénoc., Amazon.
- triforme (Mitt.) *Par.*
Poecilophyllum triforme Mitt. op. cit. p. 94.
 Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- vincentinum (Mitt.) *Par.*
Poecilophyllum vincentinum Mitt. op. cit. p. 93.
 Ster. — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent. *Am. merid.* :
 Ins. Trinitat.
- Woodii *Rehm. et Mac-Lea in Rehm. M. Afr. austr. n. 444.*
 Ster. — *Afr.* : Transvaal.
- zanzibarense *Besch. in Journ. de bot. 1891.*
 Ster. — *Afr.* : Zanzibar.
- Zeyheri (*C. M.*) *Par.*
Dicranum pallescens Wils. in Breutel M. Capens.
 * *D. Zeyheri C. M. Syn. I, p. 353.*
Leucoloma pallescens Jaeg. Ad.
Weisia nov. sp. Zeyher Pl. Capens. n. 496.
 2? — *Afr.* : C. B. Sp. (1).

(1) In Enum. Kindberg. nomina nuda :

L. Eggersii *C. M.*

Fraseri *C. M. (an potius : Mitt.?)*

onchophorellum *C. M.*

L. saudwicense *Angstr.*
 selaginoides *C. M.*

LEUCOMIUM Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. X, p. 181 (23 spec.).

acrophyllum (*Hpe.*) Mitt. *M. austr. am.* p. 501.

Hypnum acrophyllum *Hpe.* in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 325.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

aneurodictyon (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 539.

Hypnum aneurodictyon *C. M. Syn. II*, p. 681 ; *Bryol. jav. II*, p. 184, t. 282 (*excl. f. 21*).

2. — *As.* : Borneo, Java, Sumatra.

attenuatum Mitt. *op. cit.* p. 503.

— *Am. sept.* : Ins. S. Vincent.

commixtum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum commixtum *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1882, p. 88 et in *Forschungsreise...* p. 64.

2. Ad arbor. — *Afr.* : Monrovia.

compressum Mitt. *op. cit.* p. 502.

Lignic. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Amazon., And. Peruv.

contractile Mitt. *op. cit.* p. 502.

2 ? Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

crinitifolium (*C. M.*) Mitt. *op. cit.* p. 501.

Hypnum crinitifolium *C. M. Syn. II*, p. 237.

2 — *Am. merid.* : And. Chilens.

cuspidatifolium (*C. M.*) Mitt. *op. et l. cc.*

Acosta cuspidata *C. M. in Linn.* 1848, p. 192.

Hypnum cuspidatifolium *ej. Syn. II*, p. 237.

L. cuspidatum *Jaeg. Ad. II*, p. 539.

2. Lignic. — *Am. merid.* : Guian. batav.

cuspidatum *Jaeg.* — *L. cuspidatifolium*.

debile (*Sull.*) Mitt. *Sam. M.* p. 181.

Pookeria debilis *Sull. in Proced. Am. Acad...* Januar. 1854 et in *Exped. Wilkes, M.* p. 23, t. 21.

Hypnum debile *C. M. M. Polyn.* p. 81.

Pterygophyllum debile *Jaeg. Ad. II*, p. 248.

1 et syn. Lignic. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa, Nuka-Hiva, Nov. Caled.

flexuosum (*Sull.*) Mitt. *M. austr. am.* p. 501.

Hypnum flexuosum *Sull. in Proced. Am. Acad...* 1861.

2. — *Am. sept.* : Cuba.

Hillianum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 539.

Ectropothecium Hillianum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 87.

Hypnum Hillianum *Hpe. in Linn.* 1876, p. 322.

Ster. — *Pac.* : Austral.

lignicola *Spr. in Mitt. op. cit.* p. 503.

Cortic. et lignic. — *Am. merid.* : Amazon., And. Peruv., Brasil. austr. or.

limpidum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 320.

Syn. — *As.* : Ceylan.

mahorense *Besch. in Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 97.

1. Terr. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

- Mariei Besch. in Journ. de bot.* 1894, p.
 2? Cortic. — *Am. sept.* : Guadalup.
Moseni Broth. in Bihang till Sv. Vet. Akad. Handl. 1895, n. 3.
 1. Ad rup. et terr. secus rivul. — *Am. merid.* : Brasil. or.
perglaucum C. M. in Dusen M. Camer. n. 93.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
perpellucidum C. M. l. c. n. 457.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
Robillardi (Duby) Jaeg. Ad. II, p. 540.
Hypnum Robillardi Duby in Mém... Genève, 1876, p. 9, t. 11 f. 6 et in
Fl. 1877, n. 5.
 1. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Franciae.
scabrum Besch. in Marie M. Guadalup. n. 540 bis et 662.
 2? Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup.
serratum Besch. in Journ. de bot. 1894 p.
Syn. Lignic. — Am. sept. : Guadalup.
strephomischos (Welw. et Duby) Jaeg. l. c.
Hypnum strephomischos W. et D. in Mém... Genève, 1871, p. 10, t. I, f. 6.
Lignic. — Afr. : Angola.
strumosum (Hsch.) Mitt. op. cit. p. 502.
Hookeria strumosa Hsch. Fl. Brasil. I, p. 69.
Hypnum strumosum C. M. Syn. II, p. 238.
Syn. Cortic., lignic. et saxic. — Am. merid. : Amazon., Brasil. austr. or.

LEUCOPHANES Brid. Bryol. univ. I, p. 763 (36 spec.).

- albescens C. M. in Bot. Zeit.* 1864, p. 347.
 Ster. — *As.* : Celebes, Poulo-Pinang, M. Java. *Fac.* :
 Nov. Guin.
albo-nitens C. M. M. Polyn. p. 58.
 Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.
angustifolium Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 113.
 Ster. Lignic. — *Afr.* : Ins. Bourboniae.
asperum (Mitt.) C. M. M. Polyn. p. 57.
Arthrocnemum asper Jaeg. Ad. II, p. 168.
Octoblepharum asperum Mitt. Sam. M. p. 178.
 Ster. — Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.
australe Broth. in Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV Suppl. p. 96 (nom.)
et in Oefv... 1890, p.
 2. ♂ et fr. ign. Ad arbor. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).
blepharioides W. P. Sch. in Jardin Enum. p. 20 (nom.).
 — *Pac.* : Nouka-Hiva.
Blumii C. M. Syn. II, p. 537; *Bryol. jav. I, p.* 24, t. 16.
 2. — *As.* : Java.
calymperaceum C. M. in Dusen M. Camer. n. 57.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
Cameruniae C. M. l. c. n. 117.
 — *Afr.* : M. Cameroon.

candidum (Hsch.) Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 602; *Bryol. jav. I*, p. 24, t. 16.

L. Reinwardtianum C. M. *Syn. I*, p. 82.

Syrrhopodon candidus Hsch. in *Nov. Act. Acad. Léop. XIV, II, Suppl.* p. 701, t. 39, f. b.

2. — As.: Ins. Philipp., Celebes, Amboine, Borneo, ins. Saparoea, Banca, Singapore, Java, Sumatra, Ceylan. *Pac.*: Nov. Guin.

compactum Broth. in sched.

— As.: Archip. Ind. or.

cuspidatum C. M. — L. *glaucum*.

densifolium Mitt. in *Bonpl.* 1861, p. 366.

Octoblepharum densifolium ej. *Fl. Vit.* p. 387.

— *Pac.*: Ins. Fidji, Admiral.

fragile Brid. *Bryol. univ. I*, p. 765; C. M. *Syn. I*, p. 83.

— *Pac.*: Ins. Ualan (Sandwic.?).

Gardnerianum C. M. — *Ochrobryum*.

glaucum (Schwaegr.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 25.

Arthracormus Hookeri Hpe. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 922.

Didymodon sphagnifolius? W. Arn.

L. *cuspidatum* C. M. *Syn. I*, p. 83; *Bryol. jav. I*, p. 25.

Syrrhopodon glaucus Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 103, t. 181.

2. — As.: Nepal.? ins. Rauwack Molucc. *Pac.*: Ins. Mariann.

guadalupense Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 608.

2. — *Am. sept.*: Guadalup.

Hildebrandti C. M. in *Linn.* 1876, p. 234.

Ad arb., poepr. filic. — *Afr.*: Ins. Borbon., Francia, Anjouan, S. Maria.

hispidulum (Mitt.) C. M. *M. Polyn.* p. 57.

Octoblepharum hispidulum Mitt. *Sam. M.* p. 178.

Ster. — As.: M. Java.

Korthalsii Dz. et Mk. — L. *octoblepharioides*.

? *Leznum* Sull. — *Brothera*.

minutum C. M. in *Geh. Neue Beitr. z. Moosfl. v. Neu Guin.* p. 2.

Ster. — *Pac.*: Nov. Guin. marit.

Molleri C. M. in *Fl.* 1886, p. 285.

Ster. — *Afr.*: Ins. S. Thom.

nukahivense Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.* p. 20.

Syrrhopodon speciosus W. P. Sch. in *Jard. Enum.* p. 19.

Rupic. — *Pac.*: Nuka-Hiva.

obtusatulum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 706.

— *Afr.*: M. Cameroon.

octoblepharioides Brid. *Bryol. univ. I*, p. 763; C. M. *Syn.* I, p. 82; *Bryol. jav. I*, p. 25.

L. *Korthalsii* Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 65, t. 23.

Octoblepharum octoblepharioides Mitt. in *Voy. H. M. S. Challenger, Bot. III*, p. 259.

Syrrhopodon octoblepharis Nees in *Schwaegr. Suppl. IV*, t. 311 a.

2. Cortic. — As.: Nepal., Amboine, Borneo, ins. Banca, M. Java, Sarawak, Sumatra. *Pac.*: Nov. Guin., Nuka-Hiva, ins. Admiral.

papillosum (Mitt.) C. M. M. *Polyn.* p. 57.

Octoblepharum papillosum Mitt. *Sam. M.* p. 179.

Ster. — As. : M. Java.

pucciniferum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 85 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 49.

Ster. Ad *Pandan.* et *Cycad.* — Pac. : Ins. Anachoret.

Radula Jaeg. — *Octoblepharum*.

recurvum (Mitt.) C. M. M. *Polyn.* p. 57.

Octoblepharum recurvum Mitt. *Sam. M.* p. 179.

2. Ad arbor. — Pac. : Ins. Samoa.

Reinwardtianum C. M. — *L. candidum*.

Rodriguezii C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 113, et in *Ren. et Card. M. Masc. Mad. exs. n.* 110.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

scabrum (Mitt.) C. M. M. *Polyn.* p. 57.

Octoblepharum scabrum Mitt. *Sam. M.* p. 178.

Ster. — Pac. : Ins. Samoa.

Seychellarum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 49.

2. Afr. : Ins. Seychelles.

smaragdinum (Mitt.) Par.

Octoblepharum smaragdinum Mitt. in *Bonpl.* 1861, p. 366.

Ster. — Pac. : Ins. Fidji, Admiral.

sordidum C. M. in *Engler's bot. Jahrb.* 1883, p. 85 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 50.

Ster. Ad arbor. — Pac. : Nov. Guin.

speciosum C. M. — *Schistomitrium*.

? *sphagnoides* Welw. et Duby in *Mém.... Genève*, 1871, p. 19.

Ster. In spongios. inter. rup. — Afr. : Angola.

squarrosus Brid. — *Arthrocnemum Schimperii*.

subglaucescens C. M. in sched.

— As. : Timorlaut.

Tetensi C. M. M. *Polyn.* p. 57.

Ster. — Pac. : Ins. Pelew.

unguiculatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 150.

Ster. — Afr. : Ins. Principis.

vitianum C. M. M. *Polyn.* p. 58.

Ster. — Pac. : Ins. Fidji.

LICHENASTRUM Dill.

alpinum { *atro-rubens* Dill. — *Andraea alpina*.
 nigricans Dill. — *Andraea rupestris*.

Ligularia C. M. *Syn. M. I.* p. 754 (sect. SCHLOTHEIMIAE)

Ligulina C. M. in *Dusen M. Camer.* (sect. HYPNI).

LIMBELL C. M. in *Fl.* 1885, p. 429 ? (sect. HYPNI), postea gen. propr. =

SCIAROMIUM.

Spec. omn. SCIAROMIA ejusd. nom.

Limnobiella C. M. in Linn. 1875, p. 465 (sect. HYPNI).

Limnobiopsis ej. in Linn. 1878-79, p. 443 (sect. HYPNI).

LIMNOBIUM Bryol. eur. V, gen. propr.; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 633.
(sect. HYPNI.) (1)

Spec. omnes non indicatae sunt HYPNA ejusd. nom.

ambiguum de Not. — Hypnum alpestre.

palustre de Not. — Hypnum ambiguum.

Schimperianum de Not. — Hypnum molle var. Schimperianum.

LIMNOBRYUM Rab. Krypt. Fl. Sachs. I, p. 502.

palustre Rab. — Aulacomnium.

var. *polycephalum* Rab. — Aulacomnium palustre var. polycephalum.

LINDIGIA Hpe. in Linn. 1861-62, p. 527 (13 spec.).

aciculata (Tayl.) Jaeg. Ad. II, p. 378.

Hypnum aciculatum C. M. Syn. II, p. 224.

Leskea aciculata Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 339.

Lindigia hypnoides Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 377 (ex ips!).

Meteorium aciculatum Mitt. M. austr. am. p. 448.

l. Ad arbor. — Am. merid.; And. Quitens. et Peruv.

Cameruniae C. M. in Dusen M. Camer. n. 32.

— Afr.; M. Cameroon.

capillacea (Hsch.) Hpe. Enum. M. Brasil. p. 58.

Meteorium capillaceum Jaeg. Ad. II, p. 155.

Pilotrichum capillaceum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 58; C. M. Syn. II, p. 157.

Ad rad. arbor. — Am. merid.; Brasil. austr. or.

curtipes Hpe. in Linn. 1861-62, p. 528.

L. pilotrichelloides Jaeg. l. c.

l. Ad arbor. — Am. merid.; And. Nov. Granat.

curtipes Jaeg. — L. imponderosa.

debilis (Wils.) Jaeg. l. c. p. 379.

Meteorium debile Wils. mss.; Mitt. in Kew Journ. bot... p. 352 et M. austr. am. p. 448.

l. Ad arbor. — Am. merid.; And. Quitens.

densiretis Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p.

l. Ad arbor. — Am. merid.; And. Equator.

Hildebrandti C. M. in Hildebr. M. Mad. n. 2112.

— Afr.; Madagascar.

hypnoides Hpe. — L. aciculata.

imponderosa (Tayl.) Jaeg. l. c. p. 378.

Cryphaea helictophylla Wils. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 463.

Leskea imponderosa Tayl. ibid. p. 62.

L. curtipes Jaeg. l. c.

L. pilotrichelloides Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p. 376 (ex ips!)

Meteorium imponderosum Mitt. op. cit. p. 442.

Pilotrichum imponderosum C. M. Syn. II, p. 174.

Ster. — Am. sept.; Mexic., Panama. Am. merid.;
Venezuela, And. Quitens.

(1) Cf. Renauld in Rev. Bryol. 1883, p. 41.

Lorentzi C. M. in Linn. 1878-79, p. 399.

1. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

macrotheca Jaeg. — *Porotrichum macrocarpum*.

paupera C. M. in Ule *Bryoth. brasil* n. 70.

— Am. merid. : Brasil subtropic or.

pilotrichelloides { Jaeg. — L. *curtipes*.
Hpe. — L. *imponderosa*.

subvaginata C. M. in Dusen M. *Camer. n.* 774.

— Afr. : M. Cameroon.

tenella Hpe. in Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 104.

1 — Am. sept. : Mexic. (M. Orizaba).

trichomitria C. M. in Linn. 1878-79, p. 491.

1. — Am. merid. : Venezuela (1).

LOPHIODON Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 543
(2 spec.).

Mülleri (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 175.

Ditrichum Mülleri Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 50.

Leptotrichum Mülleri Hpe. in Linn. 1856, p. 206.

1. — Pac. : M. Austral. fel.

strictus Hook. f. et Wils. l. c. et *Fl. Antarct. I*, p. 130, t. 59, f. 2 ;
C. M. *Syn. I*, p. 457 et *II*, p. 613.

Cynontodium australe Mitt. *M. austr. am.* p. 42.

Didymodon longifolius H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 72.

Didymodon longifolius var. *penicillatus* eor *Fl. Antarct. Crypt.* p. 102.

Distichium capillaceum eor. *Fl. of the N. Zeal.*

Ditrichum australe Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1882, p. 51.

D. strictum Hpe. in *Fl.* 1867, p. 181-182.

Leptotrichum australe Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 66.

Trichostomum australe H. f. et W. *Fl. Tasm. II*, p. 177.

1. — Afr. : Ins. Kerguelen, Marion. Am. merid. :
Chimborazo, Fuegia, ins. Maclov. Pac. : Nov. Zeland., Tasman.,
ins. Auckland, Campbell.

LOPIDIUM H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 119.

Spec. omn. non indicatae sunt **HYPOPTERYGIA** ejusd. nom.

pallens H. f. et W. — *Hypopterygium Struthiopteris*.

LORENTZIA Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 288.

longirostris Hpe. — *Thuidium velatum*.

LORENTZIELLA C. M. in Linn. 1878-79, p. 229 (5 spec.).

Giberti C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

Syn. Terr. — Am. merid. : Monte Video.

glaucula C. M. in Linn. l. c.

Syn. vel androg. Terr. — Am. merid. : Argentin. Urug.

(1) In Enumer. Kindb. nomen nudum :

L. *papillipes* C. M.

globiceps C. M. in op. cit. p. 231.

2? Terr. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

paraguensis Besch. Not. M. Parag. p. 259

In herbos. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1258.

uruguensis C. M. mem. a Besch. l. c.

— *Am. merid.* : Uruguay.

LYELLIA R. Br. in Trans. of the Linn. Soc. XII, II, p. 561 (2 spec.).

? *bifurcata* Bel. Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p. 99 ; C. M. Syn. I, p. 228 ;

Mitt. M. Ind. or. p. 153 (1).

Ster.

— *As.* : Sikkim, M. Ghates.

crispa R. Br. l. c. p. 562 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 227 ; Mitt. l. c.

2.

— *As.* : Nepal., Sikkim, Bhotan, Alp. Yunnan.

MACOUNIA Kindb. Enum. Bryin. ex. 1888.

sciuroides K. — *Pseudo-Leskea*.

Macrobryum C. M. in Linn. 1880-83, p. 353 (sect. ACAULON. = SPHERANGIUM ?)

MACROCOMA Hsch. in hb. Kunzeano, gen. propr. ; C. M. Syn. I, p. 720 (sect. MACROMITRII).

elegans Hsch. — *Macromitrium lycopodioides*.

MACROHYMENIUM C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 825.

Spec. omn. non indicatae sunt RHEGMATODONTES ejusd. nom.

cuspidatum Mitt. — *Rhegmatodon* ?

rufum C. M. p. p. — $\left\{ \begin{array}{l} \text{Rhegmatodon acidodon.} \\ \text{Rhegmatodon.} \end{array} \right.$

Macromidium C. M. in Linn. 1878-79, p. 380 (sect. BRAUNIAE).

MACROMITRIUM Brid. Mant. M. p. 132 et Bryol. univ. I, p. 306. (311 spec.).

abyssinicum C. M. Syn. I, p. 722.

M. lycopodioides Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 431.

2 ?

— *Afr.* : Abyssin.

aciculare Brid. Mant. M. p. 132 et Bryol. univ. I, p. 307 ; C. M. Syn. I, p. 744.

Lasia acicularis Spreng. in Steud. Nom. Crypt.

Leiotheca acicularis Brid. Bryol. univ. I, p. 730.

Orthotrichum aciculare Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 114.

O. breve P. B. Prodr. p. 80.

O. pallidum ej. l. c. p. 81.

Schlotheimia acicularis Brid. Sp. M. II, p. 21.

Trichostomum arbustorum ej. op. cit. I, p. 241.

2.

— *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae, Rodriguez.

aciculare C. M. (M. Brasil). — *M. filicaule*.

acuminatum C. M. — *Schlotheimia*.

(1) « Forsan sp. *Pogonati* quaedam. » (Mitt. l. c.).

- acutifolium* Brid. — *M. longirostre*.
- acutirameum* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 62.
Ster. — Afr. : Ins. Tristan d'Acunha.
- adstrictum* Angstr. — *M. owahiense*.
- amœnum* Hsch. in *Sieb. M. Nov. Holl.* ; *C. M. Syn.* 1, p. 740.
2. — Pac. : Austral.
- anacamptophyllum* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 371.
1. Terr. et ad arb. ? — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.
- angulatum* Mitt. *Sam. M.* p. 167.
2? Ad arbor. — Pac. : Ins. Samoa.
- angulosum* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 300.
— As. : Ceylan.
- angustifolium* Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 16 et *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 311 ; *C. M. Syn.* I, p. 743 ; *Bryol. jav.* 1, p. 119, t. 97 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 53.
2. — As. : Amboine, Borneo, Java, Sumatra.
- apiculatum* (Hook.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 311 ; *C. M. Syn.* 1, p. 727 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 203.
Leiotheca apiculata Brid. *op. cit.* pp. 734 et 796.
M. longirostre Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*
M. macrostomum Schwaegr. *Suppl.* II, II, II, t. 190.
Orthotrichum apiculatum Hook. *M. ex.* p. 13, t. 45.
2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Guatemala, Costa Rica. *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.
- apiculatum* C. M. — *M. brevipes*.
- appendiculatum* (R. et C.) Par.
Colaochaetium appendiculatum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 120 et *M. Masc. Mad. n.* 218.
Ster. — Afr. : Madagasc. (Diego Suarez).
- appressifolium* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 302.
M. orthostichum *Bryol. jav. (fid. Mitt.)*.
— As. : Java.
- Archeri* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 78 et in *Fl. Tasman.* II, p. 183, t. 173, f. 6.
M. linearifolium (fid. Mitt.).
2. Cortic. — Pac. : Austral. or., Tasman.
- argutum* Hpe. in *Linn.* 1849, p. 581 ; *C. M. Syn.* II, p. 647.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- aristatum* Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.*, p. 432.
Ster. — Pac. : Nov. Zeland. sept.
- asperulum* Mitt. in *Fl. Tasman.* II, p. 376 ; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 429.
M. fimbriatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 77.
M. microphyllum *eor. op. cit.* p.p. 79-80 p.p.
Ad arbor. — Pac. : Nov. Zeland., Tasman.
- assamicum* (Griff.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 50.
Orthotrichum assamicum Griff. *Not.* p. 402 et *Ic. Pl. asiat.* II, t. 77, f. 11.
Cortic. — As. : Assam super.
- astroideum* Mitt. in *Trans. of the roy. Soc. (extr. vol.)* p. 389
— Afr. : Ins. Rodriguez.

- atrum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 306.
— Afr. : M. Cameroon.
- attenuatum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser. IV*, p. 329.
2. Ad arbor. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- aurescens Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 633.
— Pac. : Austral. or.
- anreum C. M. in *Bot. Zeit.* p. 580.
2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- Baileyi Mitt in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 63.
— Pac. : Austral. or. (Queensland).
- barbense Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 157.
1. — Am. sept. : Costa-Rica.
- Beecheyanum Mitt. *Sam. M.* p. 167.
Lignic. — Pac. : Ins. Samoa.
- Belangeri C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 374.
— Afr. : Ins. Borbon.
- Blumei Nees in *Schwaegr. Suppl. IV*, t. 316; C. M. *Syn. I*, p. 735; *Bryol. jav. I*, p. 112, t. 89.
Leiotheca Blumei Duby in *Moritz Verz.* p. 155.
Schlobheimia teres Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 314.
2. Ad arbor. — As. : Borneo, M. Java, Sumatra.
- Boivini C. M. — M. rufescens.
- brachiatum H. f. et W. — *Cryptocarpus apiculatus*.
- brachycarpum Mitt. *M. austr. am.* p. 204.
— Am. merid. : And. Peruv.
- brachypodium C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 778.
Leiotheca brachypoda Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc.* 1879 (extra-vol.), p. 99.
2. — Pac. : Ins. Pinorum.
- brachyrhynchum (Schwaegr.) W. P. Sch. in C. M. *Syn. I*, p. 745.
M. punctatum H. et Gr. (fid. Mitt. *M. austr. am.* p. 212).
M. viticulosum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 738.
Schlotheimia brachyrhyncha Schwaegr. *Suppl. II, II, I*, p. 53, t. 168; *Brid. l. c.* p. 800.
Schl. viticulosa Raddi Critt. *Brasil.* p. 4.
2. Saxic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- brasiliense Mitt. *M. austr. am.* p. 197.
1. Cortic. — Am. merid. : Brasil.
- Braunii C. M. *Syn. II*, p. 643; *Bryol. jav. I*, p. 117, t. 94.
2. — As. : Java.
- brevipes C. M. *Syn. I*, p. 728; Mitt. *op. cit.* p. 202.
M. apiculatum ej. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 525.
Orthotrichum elegans Hsch. in *M. Sieber n.* 21.
2. — Am. sept. : Antill. gall., Porto-Rico. — Am. merid. : Ins. Trinitat.
- brevisetaceum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 663.
Ad arbor. — Pac. : Ins. Lord Howe.
- brevisetum Mitt. *Fl. Vit.* p. 379.
— Pac. : Ins. Oahu.

Brownei C. M. — *Schlotheimia*.

caducipilum Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 605.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland.

cœspitans C. M. — *M. confusum*.

caldense Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 12.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

calocalyx C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 208.

2? — *Afr.* : Madagascar.

calvescens Bryol. jav. I, p. 125, t. 103.

2. — *As.* : Java.

calycinum Mitt. *M. Ind. or.* p. 49.

Aulacomitrium calycinum ej. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 161.

M. parvulum Wils. in *Keiv Journ. bot.* IX, p. 327.

1. — *As.* : Japon., Ceylan.

calymperoides Mitt. in *Hook. Journ. of bot.* 1856, p. 354 et *M. Ind. or.* p. 50.

2? Ad arbor. — *As.* : Penins. Malay.

capillicaule C. M. in *Ule Bryoth. Brasil.* n. 135.

Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

carinatum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 64.

— *Pac.* : Absque loco (Austral. vel Tasman.).

catharinense Par.

M. prolongatum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 134.

Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

celebense Par.

M. reflexifolium Lac. *Sp. nov. M. Archip. ind.* p. 8, tt. 5-6.

2. — *As.* : Celebes.

ceylanicum Mitt. *op. cit.* p. 52.

M. tersum Wils. in *op. cit.* p. 328.

2? — *As.* : Ceylan.

Chamissonis C. M. — *Schlotheimia*.

chimbrazense Spr. — *Micromitrium*.

cirrosum (Hedw.) Brid. *Bryol. univ.* I, pp. 316, 738 et 798 ; *C. M. Syn.* I, p. 732 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 205.

Anoetangium cirrosum Hedw. *Sp. M.* p. 42, t. 5.

Hypnum cirratum Brid. *M. Rec.* II, II, p. 185.

H. cirrosum Sw. *Prodr.* p. 142.

Neckera cirrosa ej. *Fl. Ind. occ.* III, p. 1802.

Orthotrichum cirrosum Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ.* I, p. 130.

Schlotheimia cirrosa Schwaegr. *Suppl.* III, I, I, t. 201.

2. Ad arbor. et rup. — *Am. sept.* : Panama, Cuba, Jamaic., Porto-Rico, Antill. gall. *Am. merid.* : Columb., Brasil. occ. et austr. or.

cirrosum Duby. — *M. elongatum*.

clavatum W. P. Sch. in *Jaeg. Ad.* I, p. 417 (nom.).

— *Am. sept.* : Guadalup.

clavellatum { Kze. — *Drummondia obtusifolia*.
Schwaegr. — *Drummondia*.

- comatum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 163.
— As. : Japon.
- concinnum Mitt. in *Bryol. jav.* I, p. 132, t. 110.
2. — A. : Java.
- confusum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 305.
M. caespitans C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 159.
M. lycopodioides ej. l. c. n. 165 b. et 166.
M. tenue var. brachypus ej. l. c. n. 162.
2. — Afr. : Natal, C. B. Sp.
Eas. : *Rehm. M. Afr. austr. n.* 159.
- constrictum Hpe. et Ltz. in *Bot. Zeit.* 1869, p.
Ad arbor. — Am. merid. : And. Æquator.
- contextum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 331 ; Mitt. M. austr. am.
p. 207.
Ad arbor. — Am. merid. : Nov. Granat.
- contortum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 301.
— As. : Ceylan.
- corrugatum Wils. — M. sulcatum.
- crassiusculum Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 187.
2? Ad rup. marit. — Am. merid. : Valdivia.
- crenulatum Hpe. in *Linn.* 1863, p. 145 ; Mitt. op. cit. p. 213.
2. Ad arbor. — Am. sept. : And. Costa Ric. Am. merid. : And. Nov.
Granat.
- crispatulum Mitt. op. cit. p. 210.
— Am. merid. : And. Quitens.
- cuspidatum Hpe. Ic. M. t. 20 ; C. M. Syn. I, p. 731 ; *Bryol. jav.* I, p. 115,
t. 92.
M. elongatum Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 311.
2. — As. : Borneo, Java, Sumatra.
- cylindricum Mitt. op. cit. p. 210.
— Am. merid. : M. Chimborazo.
- Damellii C. M. in *Rev. bryol.* 1877, p. 43 (nom.).
— Pac. : Austral. or. (Queensland).
- dawsoniaemitrium C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 160.
— Afr. : C. B. Sp.
- densum Mitt. M. Ind. or. p. 51.
2? — As. : Nepal.
- denudatum Jaeg. Ad. I, p. 424.
M. Mülleri W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. Mexic.* p. 45.
1. — Am. sept. : Mexic. (Orizaba).
- diaphanum C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 151.
1. — Pac. : Austral. or. (Queensland.).
- Didymodon Schwaegr. *Suppl. II, II, II*, p. 138, t. 190 ; C. M. Syn. I,
p. 741 ; Mitt. M. austr. am. p. 201.
1. Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil.
austr. or.
- divaricatum Mitt. op. cit. p. 217.
— Am. merid. : And. Quitens.

- diversifolium* Broth. in Hedwig. 1895, p. 126.
 2. Cortic. — Am. merid. : Brasil. or. (Goyaz).
domingense Jaeg. Ad. I, p. 427.
 M. insularum Mitt. op. cit. p. 200.
 — Am. sept. : Guadalup., S. Doming.
Doeringianum Hpe. Enum. M. Brasil. p. 24.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or.
Dregei Hsch. in Linn. 1841, p. 131 ; C. M. Syn. I, p. 721.
 1. — Afr. : Kilima N'Djaro, Transvaal, C. B. Sp.
 Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 158, 509.
Dregei Sull. — M. Sullivantii.
Drummondii Hpe. — Ulota.
dubium W. P. Sch. in C. M. Syn. I, p. 723 ; Mitt. op. cit. p. 207.
 — Am. sept. : Antill., S. Christoph.
Durandi Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 159.
 2? ♂ ign. — Am. sept. : Costa-Rica.
Duseni C. M. in Dusen. M. Camer. n. 73.
 — Afr. : M. Cameroon.
elegans Duby Choix de Crypt. ex. 1867, p. 6, c. ic.
 — Afr. : C. B. Sp.
ellipticum Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 274.
 2. — As. : Ceylan.
elongatum Dz. et Mk. in Zolling. Syst. Verz. p. 25 ; Bryol. jav. I, p. 116,
 t. 93.
 M. cirrosum Duby in Moritzi Cat. p. 135.
 2. — As. : M. Java.
elongatum Dz. et Mk. (Ann. sc. nat.). — M. cuspidatum.
erosulum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 78 ; Handb. of N.
 Zeal. Fl. p. 431.
 M. microstomum H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 79 p.p.
 2? — Pac. : Nov. Zeland.
exsertum Broth. in Oefv., 1893.
 2. — Pac. : Austral. austr. or.
Eucalyptorum C. M. et Hpe. in Linn. 1853, p. 500 et 1856, p. 10.
 M. microphyllum (fid. Mitt.).
 1. Lignic. — Pac. : Austral. or. (Victoria), Tasman.
falciculatum C. M. in Linn. 1874, p. 558.
 2. — As. : Ins. Philippin.
fasciculare Mitt. M. Ind. or. p. 51.
 M. Reinwardti Wils. in Kew Journ. bot. p. 327.
 1. — As. : Ceylan.
Fendleri C. M. in Linn. 1878-79, p. 486.
 2. — Am. merid. : Venezuela.
ferrugineum C. M. — Schlotheimia.
filicaule C. M. Syn. I, p. 745 ; Mitt. M. austr. am. p. 199.
 M. aciculare ej. in Gardn. M. Brasil. n. 53 b.
 2. — Am. merid. : Brasil. austr. or., Chile.

filiforme (*Hook. et Grev.*) *Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 61, t. 171*;
C. M. Syn. I, p. 720; *Mitt. op. cit. p. 197.*

Chaetophora orthotrichoides *Brid. Bryol. univ. II, p. 339?*

Lasia orthotrichoides *Raddi in sched.*

Leiotheca filiformis *Brid. op. cit. I, pp. 727 et 795.*

Orthotrichum filiforme *H. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 116, t. 4.*

1. Cortic. in silv. — *Am. merid.*: Brasil. austr., Chile.

fimbriatum (*P. B.*) *Schwaegr. Suppl. II, I, p. 37, t. 111*; *C. M. Syn. I, p. 739.*

M. uncinatum *Brid. Bryol. univ. I, pp. 308, 735 et 797.*

Orthotrichum fimbriatum *P. B. Prodr. p. 80.*

Weisia uncinata *Brid. Mant. M. p. 42.*

Ad arbor. — *Afr.*: Ins. Tristan d'Acunha? Borbon., Franciæ;

Madagascar sept. *Am. sept.*: Porto-Rico (fid. Duby).

« *var. chloromitrium* *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 71.*

Ut typ. — *Afr.*: Ins. Franciæ.

fimbriatum *H. f. et W.* — *M. asperulum.*

Fitz-Geraldi *Lesq. et Jam. Man. p. 178.*

1. Cortic. — *Am. sept.*: Florida.

flexuosum *Mitt. op. cit. p. 208.*

— *Am. merid.*: And. Quitens.

flexuosum *W. P. Sch.* — *M. Schimper.*

fragile *Mitt.* — *Micromitrium.*

fragilifolium *Lindb. in Ångstr. Prim. lin. p. 11 (nom.).*

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

frigidum *C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 579.*

1. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

frondosum *Mitt. op. cit. p. 217.*

— *Am. merid.*: And. Quitens.

fulvum *Mitt. M. Ind. or. p. 52.*

2. — *As.*: Ceylan.

funicaule *W. P. Sch. in Besch. op. cit. p. 71.*

1. Ad arbor. — *Afr.*: Ins. Franciæ.

fuscescens *Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 129, t. 191*; *C. M. Syn. I, p. 748.*

— *Pac.*: Ins. Mariann.

galipense *C. M. Syn. II, p. 643*; *Mitt. M. austr. am. p. 213.*

2. Cortic. — *Am. merid.*: And. Venezuel.

Geheebii *C. M. in Linn. 1876, p. 308.*

— *Pac.*: Austral. or. (Nov. Valesia).

Giesbreghtii *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 44.*

1. — *Am. sept.*: Mexic.

« *var. brevifolium* *Besch. l. c.*

— *Am. sept.*: Mexic. (Orizaba).

glaucum *Mitt. Sam. M. p. 167.*

2? Cortic. — *Pac.*: Ins. Samoa.

Glaziovii *Hpe. Symb. 1874, p. 493.*

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

- globirameum C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 779.
Ster. — *Pac* : Nov. Hibernia.
- goniopodium Mitt. *M. austr. am.* p. 198.
Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. tropic.
- goniorhynchum Mitt. — *Micromitrium*.
var. *glaucescens* C. M. — *Micromitrium goniorhynchum* var. *glaucescens*.
- gracile (Hook.) *Schwaegr. Suppl. II, II, p. 39, t. 112*; *Brid. Bryol. univ. I, p. 315*; C. M. *Syn. I, p. 733*; *Fl. of the N. Zeal. II, p. 78 et Handb. p. 429*.
Leiotheca gracilis Brid. *op. cit.* p. 730.
M. Mossmannianum C. M. (*fid. Mitt.*).
Orthotrichum gracile Hook. *M. ex. p. 13, t. 27*.
2? Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- gracile C. M. — *Schlotheimia*.
- guatemalense C. M. *Syn. II, p. 644*; *Mitt. M. austr. am. p. 214*.
2. — *Am. sept.* : Guatemala.
- gymnostomum Sull. et Lesq. in *Proced. Am. Acad...* 1859, p. 278. (1)
Dasymitrium gymnostomum Lindb. *Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or.* p. 229.
2. Cortic. et rupic. — *As.* : Japon., China.
Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 4483.
- Harioti Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXI et in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot. p. 278, t. 3, f. 12*.
Ster. — *Am. merid.* : Fuegia.
- Hectori Mitt. in *Handb. N. Zeal. Fl. p. 430*.
— *Pac.* : Nov. Zeland.
- hemitrichodes *Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 136, t. 193*; C. M. *Syn. I, p. 736*; *Fl. of the N. Zeal. II, p. 79 et Handb. p. 431*.
M. Sieberi *Schwaegr. in litt. ad Hook. et in sched.*
2. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland.
- Hildebrandtii C. M. in *Linn.* 1876, p. 76.
Lignic. — *Afr.* : Ins. Anjouan.
- hispidulum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 302.
Ad arbor. — *As.* : Ceylan.
- Hornschuchii Hpe. *Symb.* 1870, p. 274.
M. microstomum Hsch. *Fl. Brasil. I, p. 21*.
1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- humile *Bryol. jav. I, p. 128, t. 106*.
2. — *As.* : M. Java.
- humillimum (Mitt.) Par.
Aulacomitrium humillimum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 161.
— *As.* : Japon.
- Husnoti W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 26*.
Ad arbor. — *Am. sept.* : Martinic.
- hyalinum Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, n. 185.
2. — *Afr.* : Usambara.

(1) "An proprium genus sensu Hampei? ". *Jaeg. Ad. II, p. 697*.

hymenostomum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 120 et *Syll.* p. 31;
C. M. Syn. I, p. 723; Mitt. *M. austr. am.* p. 204.
 2. — *Am. merid.*: Chile austr., Fuegia, Cap Horn.

immersum C. M. — *Schlotheimia tecta*.

incurvifolium (Hook. et Grev.) Schwaegr. *Suppl.* II, II, II, p. 144; *C. M. Syn.* I, p. 750; *Bryol. jav.* I, p. 174; *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 779 et *Handb.* p. 431.

Ad arbor. — *As.*: Ins. Ternate. *Pac.*: Tahiti, ins. Pitcairn, etc.,
 fret. reg. Georges; Nov. Zeland.?

incurvifolium Mont. { — *M. subtile*.
 { — *M. uncinatum*?

incurvum (Lindb.) Par.

Dasymitrium incurvum Lindb. in *Seem. Journ. of bot.* 1864, p. 385.
M. japonicum C. M. *Syn.* I, p. 740.

— *As.*: Japon., Tonkin, China.

insularum Sull. et Lesq. in *Proced. Am. Acad.*... 1859, p. 278.
 2. Ad arbor. — *As.*: Japon.

insularum Mitt. — *M. domingense*.

intermedium Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*
 1883, p. 63.

— *Pac.*: Austral. or. (Queensland).

intortifolium Hpe. mss.; *C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 362.
 — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

involutifolium (Hook. et Grev.) Schwaegr. *Suppl.* II, II, II, p. 144;
C. M. Syn. I, p. 749.

Leiotheca involutifolia Brid. *Bryol. univ.* I, p. 733.

Orthotrichum involutifolium H. et Gr. in *Brewster Edinb. journ.* I, p. 117,
 t. 5.

— *Pac.*: Fret. reg. Georges, Nov. Zeland.

involutifolium Mont. — *M. Schmidii*.

involutum Mitt. mss.; *C. H. Wright M. Mad.* p. 6.
 — *Afr.*: Madagascar.

jamaicense Mitt. *M. austr. am.* p. 209.
 — *Am. sept.*: Jamaic.

Jamesoni C. M. — *Schlotheimia*.

japonicum Dz. et Mh. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 311.

M. spathulare Mitt. *M. Ind. or.* p. 50.

2? — *As.*: Madras, Ceylan.

japonicum C. M. — *M. incurvum*.

javanicum *Bryol. jav.* I, p. 123, t. 101.
 2. — *As.*: Java.

julaceum C. M. — *Schlotheimia*.

Kegelianum C. M. — *Schlotheimia*.

Krausei Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 187.

1. Ad arbor. — *Am. merid.*: Valdivia.

laevifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 203.

— *Am. merid.*: Venezuela, Guian.

- laevisetum *Mitt. op. cit. p. 214.*
 — *Am. merid.* : And. Quitens., Brasil.
- lamprocarpum *C. M. in M. Polakowskyani et in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892. I, p. 158.*
 2? ♂ ign. — *Am. sept.* : Costa-Rica.
- laxo-torquatum *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 74.*
 Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- laxum *C. M.* — *Schlotheimia*.
- Leiboldtii *Hpe. in Bot. Zeit. 1870, p. 50.*
 1. — *Am. sept.* : Mexic.
- Leprieurii *Mont. in Ann. sc. nat. I ser., XIV, p. 347, t. 20 et Syll. p. 32 ; C. M. Syn. I, p. 724 ; Mitt. op. cit. p. 200.*
 Ad arbor. — *Am. merid.* : Guian. gall.
- leptophyllum *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 46.*
 1. — *Am. sept.* : Mexic.
- levatum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. p. 152.*
 2. Cortic. et rupic. — *Afr.* : M. Cameroon.
- liberum *Mitt. M. austr. am. p. 214.*
 — *Am. merid.* : And. Quitens.
- ligulare *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 78 et Handb. of N. Zeal. Fl. p. 430.*
M. weissoides (fid. Mitt.).
 2? — *Pac.* : Nov. Zeland., Austral. or. (Queensland).
- liliputanum *C. M. in Fl. 1890, p. 483.*
 Ster. — *Afr.* : M. Aberdare.
- linearifolium *C. M. in Linn. 1871-73, p. 154.*
 2? — *Pac.* : Austral. or.
- linearifolium *C. M.* — *Schlotheimia longifolia*.
- longicaule *C. M. Syn. I, p. 742 ; Bryol. jav. I, p. 119, t. 96.*
 2. — *As.* : Java.
- longifolium (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ. I, pp. 309 et 738 ; C. M. Syn. I, p. 737 ; Mitt. M. austr. am. p. 210.*
M. oblongum Mitt. op. cit. p. 211.
M. scabrisetum Wils. in Trans. of the Linn. Soc. XX, p. 163 ; C. M. Syn. II, p. 647 (fid. Mitt.).
Orthotrichum longifolium Hook. M. ex. p. 13, t. 44.
Schlotheimia longifolia Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 201.
Schl. oblonga Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 46.
 2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : Columb., And. Nov. Granat., Quitens. et Boliv. ; ins. Gallapagos ? Brasil. austr. or. *Exs.* : Mandon Pl. Boliv. n. 1655.
- * *var. brevifolium C. M. l. c.*
 Ut typ. — *Am. merid.* : Columb.
- * *var. viridissimum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy bot. Belg. 1892, I, p. 156.*
 Ut typ. — *Am. sept.* : Costa-Rica.
- longifolium *Wils.* — *M. sulcatum*.

longipes (Hook.) Schwaegr. *Suppl.* II, II, p. 147, t. 139; *Brid. Bryol. univ.* I, pp. 317 et 737; *C. M. Syn.* I, p. 729.

Orthotrichum longipes Hook. *M. ex.* p. 13, t. 24.

2? Ad arbor. ? — *Pac.* : Nov. Zeland., ins. Norfolk, Tasman.

longipilum A. Br. in *C. M. Syn.* II, p. 642; *Bryol. jav.* I, p. 114, t. 91.
2. — *As.* : Java.

longirostre (Hook.) Schwaegr. *Suppl.* II, I, p. 38, t. 112; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 310; *C. M. Syn.* I, p. 729; *Mitt. op. cit.* p. 212; *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 78 et *Handb.* p. 429.

M. acutifolium *Brid. op. cit.* p. 735.

M. Paccivanum de Not. (*fid. Handb. l. c.*).

Orthotrichum acutifolium Hook. et Grew. in *Brewster Edinb. Journ.* I, p. 118, t. 5.

O. longirostre Hook. *M. ex.* p. 13, t. 25.

2? — *Am. merid.* : Chile, ins. Chiloë. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland, Campbell, Chatam.

longirostre Hsch. — *M. apiculatum*.

lycopodioides (Burch.) Schwaegr. *Suppl.* II, II, II, p. 141, t. 193; *C. M. Syn.* I, p. 721.

Macrocoma elegans Hsch. in sched.

Maschalocarpus Ecklonii Spreng. *Syst. veg.* IV, II, p. 321.

Orthotrichum lycopodioides Burch. *Cat. geogr. pl. Afr. austr. extratr.* n. 5144-47.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 165 pp., 513 b.

lycopodioides } *C. M. p.p.* — *M. confusum*.
 } Br. et Sch. — *M. abyssinicum*.

macrocarpum *C. M.* in *Journ. of Bot.* 1877, p. 229 (*nom.*).
Cortic. — *Am. sept.* : Costa-Rica.

macropelma *C. M.* in *Bot. Zeit.* 1856, p. 420.

2? — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 167.

Mac Leai (Rehm.) Par.

Dasymitrium Mac Leai Rehm. *M. Afr. austr.* n. 508.

— *Afr.* : Transvaal.

macrorhynchum Mitt. in *Bryol. jav.* I, p. 133, t. 111.

2. *Filicie.* — *As.* : Java.

macrostomum Schwaegr. — *M. apiculatum*.

macrothele *C. M.* in *Bot. Zeit.* 1848, p. 766 et *Syn.* I, p. 742; *Mitt. op. cit.* p. 212.

2. — *Am. merid.* : Columb., And. Peruv.

Mannii Jaeg. *Ad.* I, p. 425.

M. Menziesii Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 152.

2. — *Afr.* : Sierra Leone, ins. Fernando-Po, Principis.

Martianum *C. M.* — *Schlotheimia*.

mauritianum Schwaegr. *Suppl.* II, II, II, p. 127; *C. M. Syn.* I, p. 726;
Fl. of the N. Zeal. II, p. 79 et *Handb.* p. 430.

— *Afr.* : Usambara, ins. Franciae, Madagascar. *Pac.* :
Nov. Zeland. sept.

- megapterum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 508.
— Afr. : M. Cameroon.
- Menziezii C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 361.
— Pac. : Taïti.
- Menziezii Mitt. — M. Mannii.
- mexicanum Mitt. *op. cit.* p. 198.
1. — Am. sept. : Mexic.
- microcarpon C. M. *Syn. I*, p. 727; Mitt. *M. austr. am.* p. 202.
2. — Am. merid. : Chile.
- microphyllum (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 737; C. M. *Syn. I*, p. 721.
Orthotrichum microphyllum H. et Gr. in *Brewster Edinb. Journ. I*, p. 121, t. 6.
1. Cortic. — Afr. : Ins. S. Helena, Transvaal., C. B. Sp. Am. merid. : Austr. (*fid. Fl. Tasman.* p. 184). Pac. : N. Zeland. merid., Tasman., Austral. (Victoria).
Ecs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 510.
- microphyllum { H. f. et W. p.p. — M. asperulum.
Mont. — M. squarrosulum?
- microstomum (Hook. et Grev.) Schwaegr. *Suppl. II, II, II*, p. 130; C. M. *Syn. I*, p. 727; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 431.
Leiotheca microstoma Brid. *Bryol. univ. I*, p. 729.
Orthotrichum microstomum H. et Gr. in *Brewster Edinb. Journ. I*, p. 114, t. 4.
— Pac. : Ins. Sandwic., Austral. fel., Tasman.; Nov. Zeland.?
- microstomum { H. f. et W. p.p. — M. erosulum.
Hsch. — M. Hornschuchii.
- microtheca Mitt. *M. austr. am.* p. 208.
— Am. merid. : And. Quitens.
- minutum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 303.
— As. : Java.
- Miquelii Mitt. in *Bryol. jav. I*, p. 130, t. 108.
2. — As. : Java.
- Moorcroftii (Hook. et Grev.) Schwaegr. *Suppl. II, II, I*, p. 167, t. 172; C. M. *Syn. I*, p. 736; Mitt. *M. Ind. or.* p. 50.
Leiotheca Moorcroftii Brid. *Bryol. univ. I*, pp. 727 et 795.
M. pileatum Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 327.
M. tortuosum *ej. l. c.*
Orthotrichum Moorcroftii H. et Gr. in *op. cit.* p. 116, t. 4.
2. Ad arbor. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia, Birman. super.
- Moseni Broth. in *Bilang till K. Sv. Vet. Akad.* 1895, n. 3.
2. Cortic. — Am. merid. : Brasil. or.
- Mossmannianum C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 561.
M. gracile Hook. (*fid. Mitt.*).
— Pac. : Nov. Zeland.
- mucronatulum C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (*nom.*).
— Pac. : Nov. Caled.
- mucronifolium (Hook. et Grev.) Schwaegr. *Suppl. II, II, I*, p. 61, t. 170; C. M. *Syn. I*, p. 746; Mitt. *M. austr. am.* p. 202.
Leiotheca mucronifolia Brid. *Bryol. univ. I*, pp. 729 et 795.

Orthotrichum mucronifolium H. et Gr. in op. cit. I, p. 116, t. 4.

1. Rupic. — *Am. sept.* : Florida, Cuba, Antill. gall., Jamaïc., ins. S. Vincent., Barbades. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Guian., Amazon., Brasil. or.

Mülleri Hpe. in Linn. 1859-60, p. 634.

M. pusillum Mitt. ?

— *Pac.* : Austral. or.

Mülleri W. P. Sch. — *M. denudatum*.

Müllerianum Mitt. — *M. uncinatum*.

neelgheriense C. M. — *M. sulcatum*.

negrense Mitt. op. cit. p. 208.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Amazon.

neo-caledonicum Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 211.

— *Pac.* : Nov. Caledon.

nepalense (Hook. et Grev.) Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 134, t. 192;

C. M. Syn. I, p. 725; Mitt. M. Ind. or. p. 50.

Leiotheca nepalensis Brid. Bryol. univ. I, p. 732.

Orthotrichum nepalense H. et Gr. in op. cit. p. 117, t. 4.

2. Cortic. — *As.* : Nepal., Sikkim, penins. Malay., ins. Philipp., Hong-Kong, Alp. Yunnan.

Nietneri C. M. in Linn. 1869-70, p. 39.

Ster. — *As.* : Ceylan.

nigrescens Kze. — *Ptychomitrium nigricans*.

nigricans Mitt. M. Ind. or. p. 53.

2? Ad arbor. — *As.* : Coorg, Ceylan.

nitidum Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, fasc. Mart. ;

C. M. Syn. I, p. 735; Mitt. M. austr. am. p. 199.

1 (Mitt.) 2 (C. M.). Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

noumeanum Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 208.

Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Caledon.

Novae Valesiae C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 3 (nom.).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

oblongum Mitt. — *M. longifolium*.

obtusum Mitt. op. cit. p. 201.

— *Am. merid.* : Guian., Amazon.

ochraceum (Dz. et Mk.) C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 544 et Syn. I, p. 732; Bryol. jav. I, p. 118 et, t. 95.

Schlotheimia ochracea Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 314.

2. — *As.* : M. Java, Sumatra.

orthophyllum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 79 et Handb. of N. Zeal. Fl. p. 430.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland.

orthostichum Nees in Schwaegr. Suppl. IV, t. 316; C. M. Syn. I, p. 745; Bryol. jav. I, p. 129 et II, p. 226, t. 107.

2. — *As.* : Celebes, ins. Bali, M. Java.

Osculatianum de Not. in Mitt. M. austr. am. p. 216.

— *Am. merid.* : Guian., And. Quitens.

Ottonis C. M. — *Schlotheimia*.

ovale *Mitt. op. cit.* p. 209.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

owaihense *C. M. in Bot. Zeit.* 1864, p. 359.

M. adstrictum *Ångstr. in Oefv...* 1872, n. 4, p. 19.

M. Reinwardti *Sull. in Wilkes Exped. Bot. M.* p. 7?

1.

— *Pac.* : Ins. Oahu (Sandwic.), Societat., Taïti.

pacificum *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 209.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Caledon.

Paccivanum de Not. — *M. longirostre*.

paraphysatum *Mitt. op. cit.* p. 198.

1.

— *Am. merid.* : And. Quitens., ins. Chiloë.

parvulum *Wils.* — *M. calycinum*.

paucidens *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 487.

2.

— *Am. merid.* : Venezuela.

pellucidum *Mitt. op. cit.* p. 203.

Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Amazon.

penicillatum *Mitt. op. cit.* p. 217.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

pentastichum *C. M. in Linn.* 1848 et *Syn. I*, p. 731 ; *Mitt. op. cit.* p. 209.

2.

— *Am. sept.* : Mexic., Jamaïc., ins. Gorgona,

Tabago, *Am. merid.* : Guian. batav., M. Chimborazo.

peraristatum *Broth. in Oefv....* 1893.

2. Ad ramul. arb. — *Pac.* : Ins. Lord Howe.

perichaetiale (*Hook. et Grev.*) *C. M. in Bot. Zeit.* 1845, p. 544 et *Syn. I*, p. 733 ; *Mitt. op. cit.* p. 216.

Leiotheca perichaetialis *Brid. Bryol. univ. I*, p. 731.

M. truncatum *C. M.* (fid. *Mitt.*)

Orthotrichum perichaetiale *H. et Grev. in op. cit.* p. 127, t. 6.

Schlotheimia perichaetialis *Schwaegr. Suppl. II, II, I*, p. 56, t. 169.

2?

— *Am. sept.* : Antill. gall., Porto-Rico, ins.

S. Vincent *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

perpusillum *C. M. in Linn.* 1876, p. 640.

— *Am. sept.* : Mexic.

Perrottetii *C. M. Syn. I*, p. 721 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 49.

M. tenue *Mont. M. Neelgher.*

1.

— *As.* : Sikkim, M. Neelgher., Ceylan.

phyllorhizans *C. M. in Besch. Not. M. Parag.* p. 262.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 59, 1237, 1240.

pileatum *Wils.* — *M. Moorcroftii*.

piliferum *Schwaegr. Suppl. II, II, I*, p. 66, t. 172 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 597 ; *C. M. Syn. I*, p. 730

Orthotrichum piliferum *W. Arn. Disp. M.* p. 16.

Ulota pilifera *Nees in Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. XVI, Suppl. II*, 1843, p. 477.

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Sandwic. ; Nov. Zeland. ?

piriforme *C. M. Syn. II*, p. 645 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 206.

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Venezuela.

plano-caespitosum C. M. in Linn. 1874, p. 560.

2. — As. : Ins. Philippin.

Poeppigii Duby Choix de crypt. ex. 1867, p. 5, c. ic.

2. — Am. merid. : And. Chilens.

Powellii Mitt. Sam. M. p. 168.

Ad arbor. — Pac. : Ins. Samoa.

praelongum Mitt. M. austr. am. p. 207.

— Am. sept. : Jamaic., Dominic., ins. S. Vincent,
S. Christoph.

productinerve C. M. in Dusen M. Camer. n. 662.

— Afr. : M. Cameroon.

progressum Hpe. Symb. 1877, p. 723.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

proliferum Mitt. op. cit. p. 217.

— Am. merid. : And. Nov. Granat., Brasil. tropic.

prolongatum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 162.

— As. : Japon.

prolongatum C. M. — M. catharinense.

prorepens (Hook.) Swaegr. Suppl. II, II, I, p. 62, t. 171 ; C. M. Syn. I,
p. 725 ; Fl. of the N. Zeal. II, p. 79 et Handb. p. 431.

Leiotheca prorepens Brid. Bryol. univ. I, pp. 305, 727, 795.

Orthotrichum prorepens Hook. M. ex. p. 12, t. 120.

2 ? — Pac. : Austral., ins. Norfolk, Nov. Zeland.

pseudo-fimbriatum. Hpe. Symb. 1874, p. 494.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

ptychomitrioides Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 208 (1).

2 — Pac. : Nov. Caledon.

Puccinianum de Not. in Jaeg. Ad., I, p. 426 (nom.).

— Am. merid. : Columb.

pulchellum (Hsch.) Brid. Bryol. univ. I, pp. 313 et 737 ; C. M. Syn. I,
p. 722.

Orthotrichum Hornschuchii H. et Grev. in op. cit. p. 129, t. 6.

Schlotheimia pulchella Hsch. in Hor. phys. Berol. p. 61, t. 12.

2 ? Cortic. — Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 164.

pulchrum Besch. op. cit. p. 210.

2 ? — Pac. : Nov. Caledon.

? punctatum (Hook et Grev.) Brid. Bryol. univ. I, p. 739 ; C. M. Syn. I,
p. 748 ; Mitt. M. austr. am. p. 211.

Orthotrichum punctatum H. et Gr. in op. cit. p. 119, t. 5.

— Am. merid. : Columb., Nov. Granat., And. Qui-
tens. et Peruv., Brasil.

pungens Mitt. in Bryol. jav. I, p. 122, t. 99.

2. — As. : Java.

(1) « An proprium genus *Ptychomitriella Balansae* ? (Jaeg. Ad. II, p. 638).

pusillum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 78; *Fl. Tasm.* II, p. 183, t. 173, f. 5.

M. Mülleri Hpe. ?

2? *Rupic.* — *Pac.* : Tasman.

quinquefarium Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 26; *C. M. Syn.* I, p. 748; Mitt. *M. austr. am.* p. 218.

— *Am. merid.* : Brasil.

ramentosum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 301.

— *As.* : Ceylan.

ramosissimum Mitt. *op. cit.* p. 205.

M. undulatum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, IV, p. 332.

Ster.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

recurvifolium (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 740; *C. M. Syn.* I, p. 750; *Bryol. jav.* I, p. 135; *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 78.

— *As.* : Java. *Pac.* : Nov. Zeland.

reflexifolium Mitt. *op. cit.* p. 211.

— *Am. sept.* : Guatemala.

reflexifolium Lac. — *M. celebense.*

Regnellii Hpe. in *C. M. Syn.* I, p. 738; Mitt. *op. cit.* p. 210.

2. *Cortic. et rupic.* — *Am. merid.* : Brasil. or.

Rehmanni (C. M.) Par.

Dasymitrium Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 157.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Reinwardti Schwaegr. *Suppl.* II, II, I, p. 69, t. 173; *C. M. Syn.* I, p. 735; *Bryol. jav.* I, p. 126, t. 104.

Leiotheca Reinwardti Brid. *Bryol. univ.* I, p. 796.

1. *Ad arbor.* — *As.* : Borneo, Java. *Pac.* : Ins. Societ., Taïti, Tasman.

Reinwardti { Sull. — *M. owaïhense* ?
Wils. — *M. fasciculare.*
Zoll. p.p. — *M. salakanum.*

repandum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et in *Forschungsreise...* Bot. p. 60.

2. *Ad arbor.* — *Pac.* : Austral. (Queensland).

retusulum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 486.

2.

— *Am. merid.* : Venezuela.

retusum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 79, t. 85, f. 86 et *Handb.* p. 432.

— *Pac.* : Nov. Zeland. sept.

rhabdocarpum Mitt. *M. austr. am.* p. 199; *Lesq. et Jam. Man.* p. 179.

1.

— *Am. sept.* : Florid. *Am. merid.* : And. Quitens.

rhapidophyllum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 487.

2.

— *Am. merid.* : Venezuela.

rhizomatosum C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 72.

Secus rivul. — *Afr.* : Nossi-Be.

Richardi Schwaegr. *Suppl.* II, II, I, p. 70, t. 173; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 798; *C. M. Syn.* I, p. 740; Mitt. *op. cit.* p. 200.

2. *Ad arbor.* — *Am. merid.* : Guian., Brasil. austr. or.

rufescens *Besch. op. cit. p. 74.*

M. Boivini C. M. in Rev. bryol.

2. Cortic. — *Afr. : Ins. Borbon., Comor. magna, Madagascar sept. rugifolium C. M. in Dusen M. Camer. n. 263.*

— *Afr. : M. Cameroon.*

rugifolium C. M. — Schlotheimia.

rugulosum Angstr. in Oefv... 1876, n. 4, p. 12.

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

Runcinatella C. M. in Linn. 1878-79, p. 488.

1. — *Am. merid. : Venezuela.*

rupestre Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1864, p. 150.

Dasymitrium rupestre Lindb. Contrib. ad fl. crypt. As. bor. p. 229.

2. Rupic. — *As. : Japon.*

Saddleanum Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1885, p. LXI et in Miss. sc. Cap Horn, V, Bot., p. 279, t. 3, f. 13.

Ster. — *Am. merid. : Fuegia.*

salakanum C. M. Syn. II, p. 646 ; Bryol. jav. I, p. 121, t. 98.

M. Reinwardti Zoll. Coll. n. 1742 b. p.p.

1. Ad arbor. — *As. : M. Java.*

« *var. majus Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 210.*

Ut typ. — *Pac. : Nov. Caledon.*

Sanctae Mariae Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 120 et M. Masc. Mad. n. 217.

— *Afr. : Ins. S. Maria Madag.*

sarcotrichum C. M. in Dusen M. Camer. n. 233.

— *Afr. : M. Cameroon.*

Sartorii C. M. in Linn. 1876, p. 641.

Ad arbor. — *Am. sept. : Mexic.*

« *var. gracilescens C. M. l. c.*

Ut et ubi typ.

« *var. robustius C. M. l. c.*

Ibid.

Savatieri Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 25.

2. Cortic. — *Pac. : Taïti.*

saxatile Mitt. M. austr. am. p. 200.

Saxic. — *Am. merid. : Ins. Juan Fernandez.*

scabrisetum Wils. in Trans. of the Linn. Soc. XX, p. 163 ; C.M. Syn. II, p. 647.

M. longifolium Hook. (fid. Mitt.).

— *Am. merid. : Ins. Gallapagos.*

Schaalianum C. M. in Jaeg. Ad. II, p. 689 (nom.).

— *As. : Japon.*

Schimperi Jaeg. Ad. I, p. 407.

M. flexuosum W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 45.

— *Am. sept. : Mexic. (Orizaba).*

Schmidii C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 61 ; Mitt. M. Ind. or. p. 51.

M. involutifolium Mont. M. Neelgherr.

2. — *As. M. Neelgherr., Ceylan.*

- Schwaneckeanum* Hpe. in *Linn.* 1852, p. 360.
Ad arbor. — *Am. sept.* : Ins. Porto Rico.
- scleropelma* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 157.
2. Cortic. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.
- scleropodium* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 69.
1? — *Afr.* : Ins. Borbon.
- scoparium* Mitt. *M. austr. am.* p. 206.
— *Am. sept.* : Jamaic., Martinic. *Am. merid.* : Ins. Trinitat.
- Scottiae* C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 618.
1. — *Pac.* : Austral. or., Tasman.
- secundum* C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 420.
Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.
Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 168.
- Seemanni* Mitt. *M. Ind. or.* p. 51.
2. — *As.* : Ind. or., Ceylan. *Afr.* : Ins. S. Helena.
- semi-diaphanum* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 19 et *M. Masc. Mad.* n. 172.
Ster. — *Afr.* : Madagascar.
- semi-hispidum* C. M. in *Dusen. M. Camer.* n. 855.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- semi-nudum* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 303.
— *As.* : Ceylan.
- semi-pellucidum* Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 311 ; C. M. *Syn.* I, p. 743 ; *Bryol. jav.* I, p. 127, t. 105.
2. Ad arbor. — *As.* : Borneo. *Pac.* : Nov. Guinea, ins. Anachoret.
- Semperi* C. M. in *Linn.* 1874, p. 559.
2. — *As.* : Ins. Philippin.
- serpens* (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 736 ; C. M. *Syn.* I, p. 739.
Orthotrichum serpens H. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ.* I, p. 119, t. 5.
2. Ad arbor. — *Afr.* : C. B. Sp.
- serpens* Mont. — *M. sulcatum*.
- serricolum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 21.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- serrulatum* Mitt. *M. austr. am.* p. 215.
— *Am. merid.* : And. Quitens.
- serrulatum* C. M. — *M. venezuelense*.
Sieberi Schwaegr. — *M. hemitrichoides*.
- sinuatum* C. M. — *Schlotheimia*.
- sordide-virens* C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 153.
2. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).
- Soulae* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, II, p. 186 et *M. Masc. Mad.* n. 215.
2? — *Afr.* : Madagascar.
- spathulare* Mitt. — *M. japonicum*.
- speirostichum* C. M. *M. Polyn.* p. 68.
2. — *Pac.* : Ins. Samoa.

spirale *Hpe. mss.* ; *Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 63.

— *Pac.* : Absque loco (Austral. vel Tasman.).

Sprengelii C. M. — *Schlotheimia*.

squarrosus C. M. *M. Polyn.* p. 68.

— *Am. merid.* : Quito.

squarrosulum C. M. *in Bot. Zeit.* 1853, p. 61 ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 49.

M. microphyllum *Mont. in Perrot. M. Neelgherr. n.* 58 ?

1. — *As.* : *M. Neelgherr.*

stellulatum (*Hook. et Gr.*) *Brid. Bryol. univ. pp.* 314 et 741 ; C. M. *Syn. I*, p. 747 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 204.

M. Swainsoni *H. f. et W. in Gardn. M. Brasil. n.* 60.

M. xanthocarpum *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. 26.

Orthotrichum stellulatum *H. et Grev. in op. cit.* p. 119.

Schlotheimia stellulata *Hsch. in Hor. phys. Berol.* p. 61, t. 12.

2. — *Am. merid.* : Orinoc., Brasil.

stenophyllum *Mitt. op. cit.* p. 215.

— *Am. sept.* : Jamaic.

stolonigerum C. M. *in Linn.* 1878-79, p. 489.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

stratosum *Mitt. op. cit.* p. 199.

1. — *Am. sept.* : Jamaic.

striatum *Mitt. in Bryol. jav. I*, p. 134.

2. — *As.* : *M. Borneo.*

subcirrosum C. M. *in Bot. Zeit.* 1862, p. 373.

2. *Ad rup. trachyt.* — *Am. sept.* : Costa Rica.

sublaeve *Mitt. M. austr. am.* p. 208.

— *Am. merid.* : And, Quitens.

submucronifolium *Hpe. et C. M. in Linn.* 1853, p. 499.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

subnitidum C. M. *in Linn.* 1878-79, p. 488.

1. — *Am. merid.* : Venezuela.

subpungens *Hpe. in Linn.* 1876, p. 249.

Lignic. — *Afr.* : Ins. Anjouan.

subscabrum *Mitt. op. cit.* p. 215.

— *Am. merid.* : And, Quitens.

subtile *Schwaegr. Suppl. II, II, II*, p. 140, t. 192 ; C. M. *Syn. I*, p. 744.

M. incurvifolium *Mont. in Voy. au Pôle Sud.*

2. — *Pac.* : Taïti, ins. Eimeo.

subtortum (*Hook. et Grev.*) *Schwaegr. op. cit.* p. 145 ; C. M. *Syn. I*, p. 750.

Leiotheca subtorta *Brid. Bryol. univ. I*, p. 734.

Orthotrichum subtortum *H. et Grev. in op. cit.* p. 117, t. 5.

— *As.* : Ind. or. *Afr.* : Madagascar.

subulatum *Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 64.

— *Pac.* : Austral. or. (Victoria).

subuligerum *Bryol. jav. I*, p. 124, t. 102.

2. — *As.* : Celebes, M. Java.

sulcatum (Hook. et Grev.) Brid. Bryol. univ. I, pp. 319 et 738; C. M. Syn. I, p. 738; Fl. of the N. Zeal. II, p. 77 et Handb. p. 428.

M. corrugatum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 328.

M. longifolium ej. l. c.

M. neelgheriense C. M. Syn. I, p. 737.

M. serpens Mont. M. Neelgher.

Orthotrichum sulcatum H. et Gr. op. cit. p. 129.

Schlotheimia sulcata Hook. M. ex. p. 14, t. 156.

2. Ad arbor. — As. : Nepal., Khasia, M. Neelgherr., Bombay, Madras, Ceylan, penins. Malay., Borneo. Pac. : Nov. Zeland.

« var. lutescens C. M. in Jaeg. Ad. I, p. 425.

Ubi?

Sullivantii C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 361; Lesq. et Jam. Man. p. 178, t. 2.

M. Dregei Sull. M. of U. St. p. 35 et Ic. M. p. 59, t. 37.

1. Ad arbor. — Am. sept. : Georgia.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 128, et II ed. n. 193.

Sumichrasti Duby Choix de Crypt. 1867, p. 7, t. 3, f. 1; Mitt. M. austr. am. p. 203.

2. Cortic. — Am. sept. : Mexic.

Swainsoni (Hook.) Brid. Bryol. univ. I, p. 318; C. M. Syn. I, p. 747; Mitt. op. cit. p. 205.

Leiotheca Swainsoni Brid. op. cit. p. 730.

Orthotrichum Swainsoni Hook. M. ex. p. 13, t. 127.

2. Ad arbor. — Am. sept. : Cuba. Am. merid. : Nov. Granat., Brasil.

Swainsoni H. f. et W. — M. stellulatum.

tasmanicum Broth. in Oefv. of Finska Vet. Soc. Foerh. 1895, p. 60.

1. Lignic. — Pac. : Tasman.

tenax C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 83 et in Forschungsreise... p. 38.

2. Ad frutic. Ericae. — Am. merid. : Fret. Magell.

tenerum Kze. — Ptychomitrium nigricans.

tenue (Hook. et Grev.) Brid. Bryol. univ. I, p. 740; C. M. Syn. I, p. 720.

Maschalocarpus declinatus Spreng. Syst. veg. IV, I, p. 158.

Orthotrichum tenue H. et Grev. in op. cit. p. 120, t. 5.

— Afr. : Transvaal, Natal, ins. Borbon.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 161 et 511.

var. brachypus C. M. — M. confusum.

« var. brevirameum Rehm. M. Afr. austr. n. 512.

— Afr. : Transvaal.

« var. leptocladum C. M. in Rehm. l. c. n. 163.

— Afr. : C. B. Sp.

tenue Mont. — M. Perrottetii.

tersum Wils. — M. ceylanicum.

thraustophyllum C. M. in Dusen M. Camer. n. 152.

— Afr. : M. Cameroon.

Tocaremae Hpe. in Linn. 1861-62, p. 524; Mitt. op. cit. p. 206.

2. Ad arbor. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

tomentosum *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 21; C. M. Syn. I, p. 734; Mitt. op. cit. p. 204 (1).*

2. — *Am. sept. : Mexic. Am. merid. : Monte Video.*

Tonduzii *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, I, p. 154.*

1. — *Am. sept. : Costa Rica.*

tongense *Sull. in Am. Expl. Exped. p. 7, t. 5.*

Leiostoma tongense Mitt. in Proced. of the Linn. Soc. 1879 (extra vol.), p. 99.

— *Pac. : Ins. Tonga, Lord Howe, Nov. Caledon. (ins. Pinorum).*

tortuosum *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. Mexic. p. 45.*

— *Am. sept. : Mexic.*

tortuosum *Wils. — M. Moorcroftii.*

torulosum *Mitt. M. Ind. or. p. 53.*

2? — *As. : Ceylan.*

trachypodium *Mitt. M. austr. am. p. 213.*

— *Am. merid. : And. Quitens.*

Trianae *C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 580.*

2. — *Am. merid. : And. Nov. Granat.*

trichomitrium *C. M. — Schlotheimia.*

trichophyllum *Mitt. op. cit. p. 207.*

— *Am. merid. : And. Quitens.*

truncatum *C. M. — M. perichaetiale.*

tumidulum *Mitt. op. cit. p. 201.*

Cortic., rar. saxic. — Am. merid. : And. Peruv.

turgidum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 274.*

— *Afr. : M. Cameroon.*

tylostomum *Mitt. — Micromitrium.*

ulophyllum *Mitt. op. cit. p. 206.*

— *Am. merid. : And. Quitens.*

Ulota *W. P. Sch. in Breutel M. Capens.*

— *Afr. : C. B. Sp.*

uncinatum *C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 62.*

M. incurvifolium Mont. in Perrot. M. Neelgher. n. 61 ?

M. Müllerianum Mitt. M. Ind. or. p. 51.

2. — *As. : M. Neilgherr. Afr. : C. B. Sp.*

uncinatum *Brid. — M. fimbriatum.*

undatifolium *C. M. in Fl. 1886, p. 278.*

2. *Ad arb. — Afr. : Ins. S. Thom.*

undulatum (*Hook. et Grev.*) *Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 137; C. M. Syn. I, p. 749; Bryol. jav. I, p. 134.*

Leiotheca undulata Brid. Bryol. univ. I, p. 733.

Orthotrichum undulatum H. et Grev. in op. cit. p. 117, t. 4.

— *As. : Ins. Ternate.*

(1) « An propr. gen. : *Brachymitrium tomentosum* ? » (*Hpe., das Moosbild, p. 8).*

undulatum Hpe. — *M. ramosissimum*.

urceolatum C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 208.
2. — *Afr.* : Madagascar.

urceolatum (Hook.) *Schwaeagr. Suppl.* II, II, II, p. 123, t. 189; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 312; C. M. *Syn.* I, p. 726.

Leiotheca urceolata *Brid. op. cit.* p. 730.

Orthotrichum urceolatum *Hook. M. ex.* II, p. 13, t. 124.

2. — *Afr.* : Ins. S. Helena, Madagascar.

venezuelense Par.

M. serrulatum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 490.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

vernicosum W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 28.
— *Am. sept.* : Guadalup.

virescens C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 15.
2? — *Afr.* : Abyssin.

viridissimum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria* 1883, p. 64.
— *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

viticulosum Brid. — *M. brachyrhynchum*.

Wagnerianum C. M. *Syn.* II, p. 642; Mitt. *op. cit.* p. 202.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Jamaic. *Am. merid.* : And. Venezuel., Guian.

Weymouthii Broth. in *Oefv. of Finska Vet.-Soc. Foerh.* 1895, p. 50.
Ad ligna et ramul. *Myrtac.* — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

weisioides C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 153.
1. — *Pac.* : Austral. or.

Whiteleggei Broth. et Geh. in *op. et l. cc.*
— *Pac.* : Austral. or. (Queensland, Nov. Vales.).

xanthocarpum Hsch. — *M. stellulatum*.

Yuleanum Broth. et Geh. in *op. cit.* p. 58.
2. Ad ramul. arbor. — *Pac.* : Nov. Guinea.

Zippelii *Bryol. jav.* I, p. 123, t. 100.
2. — *As.* : Amboine.

Zollingeri Mitt. in *Bryol. jav.* I, p. 113, t. 90.
2. — *As.* : Java (1).

Malacosphagnum C. M. in *Fl.* 1887, p. 404 (*Sph. rigida*).

Mallacodium C. M. *Syn.* II, p. 320 (sect. *HYPNI*).

MASCHALANTHUS Sch. *Fl. Starg.* p. 356.
filiformis Sch. — *Pterigynandrum*.

(1) In Enum. Kindb. nomina nuda :

M. bifasciculatum C. M.
caloblastum C. M.
caloblastoides C. M.
cylindromitrium C. M.
dimorphum C. M.
Hahnii C. M.
Hartmanni C. M.

M. lonchomitrium C. M.
macromioides C. M.
Savesii C. M.
subserrulatum (C. M.) (an *M. venezuelense* ?).
vittatum C. M.

MASCHALOCARPUS Spreng. *Einleit.* p. 279.*argentatus* Hpe. — *Struckia argyreola*.*declinatus* Spreng. — *Macromitrium tenue*.*Eckloni* Spreng. — *Macromitrium lycopodioides*.*filiformis* Spruce. — *Pterigynandrum*.*gracilis* Spreng. — *Pterogonium*.*intricatus* Spreng. — *Pylaisia*.*nervosus* Spreng. — *Leskea*.*repens* Spreng. — *Platygyrium*.*striatus* Spreng. — *Lescuraea*.*Weinmannianus* Spreng. — *Brachythecium albicans*.**MEESEA** Hedw. *Fund. M.* II, t. 9, f. 56-57 (sub **MEESIA**). (10 spec.).Albertini *Bryol. eur.* IV (mon. p. 7), t. 310; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 500.*Bryum triquetrum* Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 244.*Diplocomium hexastichum* Funk *Moostaschb.* p. 43, t. 27 et in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 68.*Meesea hexagoma* Albert. mss. in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 68; *C. M. Syn.* I, p. 466.1. In turfos. — *Eur.*: Neomark, Siles., magn. Ducat. Badens., Bavar. *Am. sept.*: Fret. Smith., Saskatchewan.*Ews.*: Un itin. 1864, n. 54.*alpina* Funk. — *M. uliginosa* var. *alpina*.*angustifolia* Brid. — *M. uliginosa*.*austro-georgica* *C. M. Bryol. austr. Georg.* p. 31.*Ster. Aquat.* — *Am. merid.*: Austr. Georgia.*Bolleana* *C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 338.*Hydrogonium Bolleanum* Jaeg. *Ad.* II, p. 669.*Ster. Ad rup.* (humid. ?) — *Afr.*: Ins. Cap. Viridis S. Nicolas.

Un itin. 1864, n. 73.

var. *angustifolia* Rab. — *M. uliginosa* var. *alpina*.« var. *minor* Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 82; *Bryol. eur.*, *C. M. et W. P. Sch.* II. cc.*Amblyodon minor* *P. B. Prodr.* p. 41.*Bryum trichodes* var. *minor* Drumm. *M. bor. am.* I ed., n. 246.*M. minor* *Brid. op. cit.* p. 62.Ut typ. — *Eur.*: In alp. et supraalp.: Spitzberg., ins. Parry, etc.*Am. sept.*: Groenland, Ontario, *M. Rupestr.*, *M. Alb.**curviseta* Schwaegr. — *Webera polymorpha* var. *brachycarpa*.*dealbata* Hedw. — *Amblyodon*.*demissa* H. et H. — *Plagiobryum*.*hexagona* Alb. — *M. Albertini*.*longiseta* Hedw. *M. frond.* I, p. 36, tt. 21 et 22; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 6), t. 309; *C. M. Syn.* I, p. 465; *W. P. Sch. op. cit.* p. 500.*Amblyodon longisetus* *P. B. Prodr.* p. 41.*Diplocomium longisetum* *Brid. op. cit.* p. 66 p.p. (1).*Syn.* In turfos. profund. — *Eur.*: Reg. campestr. et montan., rar. alp. per zon. intermed. et septentr. *As.*: Jenissei. *Am. sept.*: Ins.Sabine, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Ohio, *Nov. Anglia*.(1) « Synonyma cœtera incerta, quum planta cum *M. tristicha* simili persaepe commutata sit. » *C. M.* l. c.

Insert after

M. uliginosa
p. 794

- Exs.* : Rab. Bryoth. eur. n. 362, 1336.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 244, 245.
 Un. itin. 1867, n. 49.
- longiseto triquetra* Lindb. et Arn. — *M. longiseto* × *tristicha*.
longiseto × *tristicha* (Lindb. et Arn.) Par.
M. longiseto × *triquetra* Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 30.
 Syn. vel dict. — *As.* : *Jenissei* inf.
- Macounii* Aust. — *Amblyodon dealbatus*.
macrantha Mitt. — *M. Mülleri*.
minor Brid. — *M. uliginosa* var. *minor*.
Mittenii C. M. — *Entosthodon*.
- Mülleri* C. M. et Hpe. in Linn. 1856, p. 208.
M. macrantha Mitt. in *Kew Journ. bot.* VIII, p. 260; *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 444.
 2. In sphagnet. — *Pac.* : Alp. Austral. merid. or., Nov. Zeland. merid.
- nutans* Willd. — *Bryum longisetum*.
stricta Brid. — *M. uliginosa* var. *alpina*.
stygia Brid. — *Cinclidium*.
trichodes Spruce — *M. uliginosa*.
- tristicha* (Funk) *Bryol. eur.* IV (mon. p. 8), t. 311; *C. M. Syn.* I, p. 664; *W. P. Sch. op. cit.* p. 501.
Bryum triquetrum Hook. et Tayl. *Muscol. brit.*, I ed. t. 28.
Diplocomium longisetum Brid. *op. cit.* p. 66 p.p.
D. tristicha Funk *Moostaschb.* p. 43, t. 27.
M. triquetra Ångstr. in *Nov. Act. Soc. Upsal.* 1844, p. 357.
Mnium triquetrum L. *Sp.* p. 1578.
 2. In turfis. profund. — *Eur.* : Reg. campestr. et mont. super. zon. interm. et septentr. : Spitzberg, ins. Ursorum; deest in Britann. *As.* : *Jenissei*. *Am. sept.* : Groenland, Anticosti, Ontario, M. Ruperstr., Columb. brit., Washington, Idaho, New Jersey.
Exs. : *Mac. Canad.* M. n. 157.
 Rab. Bryoth. eur. n. 736 et c.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 246.
 Un. itin. 1867, n. 40, 41, 42.
- “ var. *gigantea* Sanio in *Hedwig.* n. 3.
 Submersa. — *Eur.* : Boruss. or.
- “ var. *timmioides* Sanio in *op. et. l. cc.*
 Ad rip. lac. — *Eur.* : Borussia.
- triquetra* Ångstr. — *M. tristicha*.
- tschutschica* C. M. in *Bot. Centralbl.* 1889, n. 2-4.
 Ster. In palud. — *As.* : Penins. *Tschutschica*.
- uliginosa* Hedw. *M. frond.* I, p. I, tt. 1 et 2; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 60; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 5), t. 308; *C. M. Syn.* I, p. 465; *W. P. Sch. op. cit.* p. 499.
Amblyodon uliginosus P. B. *Prodr.* p. 41.
Bryum trichodes L. *Sp. M.* p. 1385.
B. trichodes var. *longiseta* Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 247.
B. trichodes aureum, capsulis incurvis obtusis in setis longis Dill. *Hist. M.* p. 389, t. 49, f. 58.
Hypnum trichodes Web. *Spic. Fl. Germ.* p. 87.
M. trichodes Spr. in *Ann. and Mag. of nat. hist.* II, III ser., p. 369.

Mnium uliginosum Gmel. *Syst. nat.* p. 1329.

Mn. trichodes L. *jun. Meth. M.* p. 367.

Webera trichodes Hedw. *Fund. M. II*, p. 95.

Polyg. Ad terr. uligin. et rup. irrig. — *Eur.* : Reg. campestr. *As.* : Kamschatka, penins. Tschutschica, Jenissei inf., Sikkim, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, Gaspes., Nov. Scot., Ontario, Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit., Minnesota, etc. : reg. or. et centr.

Exs. : Mac. Canad. *M. n.* 156.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 100, 439, 737.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 247.

Un. itin. 1864, n. 76 ; 1867, n. 35.

« *var. alpina* *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. II. cc.*

Bryum trichodes Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 245.

M. uliginosa Funk in *Bot. Zeit.* 1825, p. 274.

M. angustifolia Brid. *op. cit.* p. 62.

M. stricta ej. *op. cit.* p. 61.

M. uliginosa var. angustifolia Rab. *Deutsch. Krypt. II, III*, p. 195.

Ut typ. — *Eur.* : In subalp. et alp.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 440.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 248.

vagans C. M. — *Philonotis*.

MEGALOSTYLIUM Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind. brevisetum* eor. — *Dicranum*.

MEIOTHECIUM Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1868.

Spec. omn. non indicatae sunt *PTEROGONIELLÆ* ejusd. nom.

Fabronia Besch. — *Pterogoniopsis*.

MERCEYA W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 852.

latifolia Kindb. — *Scopelophila*.

ligulata Spr. (1) — *Scopelophila*.

MESOCHÆTE Lindb. in *Oefv...* 1869, p. 70.

undulata Lindb. — *Rhizogonium*.

MESODON Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 366.

onustus Hpe. — *Entodon*.

? **MESOTUS** Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 462 (2 spec.).

acutus Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 52.

Inter *Sphaerophora*. — *Pac.* : Austral., Tasman.

celatus Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl. l. c.*

Stiticola. — *Pac.* : Nov. Zeland, med.

METEORIUM Brid. *Bryol. univ. II*, p. 264 (80 spec.).

aciculatum Mitt. — *Lindigia*.

acuminatum Mitt. — *Garovaglia*.

(1) In *Enum. Kindb. nom. nudum* :
M. acutiuscula Lindb.

- aeruginosum* Mitt. — Papillaria.
- ? *ambiguum* (Hsch.) Mitt. *M. austr. am.* p. 446.
Pilotrichum ambiguum Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 59; *C. M. Syn. II*, p. 157.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- amblyacis* Mitt. — Papillaria.
- ancistrodes* (Mont.) Par.
Hookeria ancistrodes Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 676, in *Hist. Chil. Bot. crypt. t. 4, f. 4 et Syll.* p. 14.
Meteorium genuflexum Mitt. *op. cit.* p. 436.
Pilotrichum genuflexum C. M. *Syn. II*, p. 152.
 2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile.
- ancistrodes* Ren. et Card. — *M. himalayense*.
- appressum* Mitt. — Papillaria.
- atro-luteum* Jaeg. — Papillaria.
- attenuatum* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 316.
 Ster. — *As.* : Ceylan.
- aureo-nitens* (Hook.) Par.
Brachythecium aureo-nitens Jaeg. *Ad. II*, p. 407.
Hypnum aureo-nitens Hook. in *Schwaegr. Suppl. III*, 1, I, t. 221 : *C. M. Syn. II*, p. 377.
M. auro-nitens Mitt. *M. Ind. or.* p. 91.
 — *As.* : Nepal., Sikkim, Khasia, M. Neilgherr.
- aureum* (Griff.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 89; *Bryol. jav. I*, p. 91, t. 206.
Neckera aurea Griff. *Not. p. 459 et Ic. pl. asiat. II*, t. 87, f. 11.
Trachypodium filamentosum W. P. Sch. in *Savat. M. Japon. n. 627 (ferma)*.
 2. — *As.* : Himalaya, Khasia, M. Java, Japon.
- auro-nitens* } Mitt. (*M. I. or.*). — *M. aureo-nitens*.
 } Mitt. (*M. a. am.*). — *M. Hornschuchii*.
- ? *Balansaeum* Besch. in *Journ. de bot.* 1890, p. .
 Ster. — *As.* : Tonkin.
- barbipendulum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n. 65*.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- biforme* C. M. — *Pilotrichella*.
- Billardieri* Mitt. — *Pilotrichella*.
- biplicatum* Mitt. — *Pterobryum*.
- brasiliense* Sull. — *M. longissimum*.
- brevisetum* Mitt. *M. austr. am.* p. 447.
 — *Am. merid.* : And. Quitens.
- capense* } Ångstr. — *Aërobryum pseudo-capense*.
 } W. P. Sch. — *Aërobryum*.
- capillaceum* Mitt. — *Lindigia*.
- capillare* Mitt. — Papillaria.
- cerinum* H. f. et W. — Papillaria.
- commutatum* Mitt. *M. Ind. or.* p. 89.
 — *As.* : Sikkim.
- compressum* Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 83.
 Ster. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).
- consanguineum* Hpe. — Papillaria.

consimile Mitt. — Pilotrichella.

convolvens Mitt. *op. cit.* p. 90.

— As. : Malabar, Ceylan.

cordatum (Harv.) Mitt. *op. cit.* p. 88.

Hypnum cordatum Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 20 et in Hook.
 Ic. pl. rar. t. 24, f. 9; *C. M. Syn. II*, p. 451.

— As. : Nepal., Khasia.

crassicaule { Bryol. jav. — Pterobryum.
Mitt. — Pterobryum ceylanicum.

crinitum Mitt. — Pilotrichella.

cubense Mitt. — Pilotrichella.

cuspidiferum Tayl. — Papillaria kermadecensis.

debile Wils. — Lindigia.

denticulatum Mitt. — Papillaria.

Deppii Mitt. — Papillaria.

dicladioides C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).

— Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).

diclados W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 83.

Leskea heteroclados ej. in *Hb. Museum Paris.*

Ster.

— Am. sept. : Mexic.

dimorphum Mitt. — Pilotrichella.

divergens Mitt. *M. Ind. or.* p. 87.

Ster.

— As. : Himalaya subtropic.

diversifolium Besch. *op. cit.* p. 82.

2. Cortic. — Am. sept. : Mexic. (Cordoba).

Eavesianum Mitt. — Papillaria.

elongatum Mitt. — Pilotrichella.

enerve Thw. et Mitt. in *op. cit.* p. 317.

Ster.

— As. : Ceylan.

erinaceum Spr. — Pilotrichella crinita.

Eurbynchium C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 165.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

excavatum Mitt. — Pilotrichella.

filamentosum (Hook.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 91.

Daltonia filamentosa W. Arn. *Disp. M.* p. 55.

Neckera filamentosa Hook. *M. ex. t.* 158.

Pilotrichum filamentosum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 264; *C. M. Syn. II*,
p. 153.

Ad arbor. — As. : Nepal., Sikkim, M. Neilgherr., Java.

filescens (Schwaegr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 153.

Neckera filescens Schwaegr. in sched.

Pilotrichum filescens Duby *Choix de crypt. ex.* 1869, p. 13, t. 3, f. 3.

Ster. Ad arbor. — Am. sept. : Mexic.

Filicis C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 164.

Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

filiferum Mitt. — Pilotrichella.

Filipendula H. f. et W. — Papillaria.

flaccidum Mitt. — Papillaria.

flammeum Mitt. *op. cit.* p. 88.

2 ? — As. : Sikkim.

flexicaule H. f. et W. — Papillaria.

flexile Mitt. — Pilotrichella.

flexipes Mitt. — Garovaglia.

flexipilum Lindb. *mss.* ; Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 39.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

floribundum { Dz. et Mk. — Papillaria.
Sull. — Papillaria aeruginosa?

Foulkesianum Mitt. — Garovaglia.

frondosum Mitt. — Garovaglia.

fulvum Mitt. — Papillaria.

funale Mitt. — Pilotrichella.

fuscens Bryol. jav. — Papillaria.

fusco-viride Mitt. — Papillaria.

genuflexum Mitt. — M. ancistrodes.

guadalupense W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 44.

2. Ster. — Am. sept. : Guadalup.

guianense Mont. *Syll.* p. 24 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 430.

— Am. merid. : Guian.

Harveyi Bryol. jav. — Papillaria semi-torta.

helictophyllum (Mont.) Mitt. *Fl. Vit.* p. 395.

Cryphaea helictophylla Mont. in *Voy. au pôle Sud, Crypt.* p. 322 et
Syll. p. 25.

Dendropogon helictophyllus Jacq. *Ad. II*, p. 102.

Pilotrichum helictophyllum C. M. *Syn. II*, p. 174.

2. Ad arbor. — Pac. : Taiti, Nuka-Hiva.

helictophyllum Sull. — M. intricatum?

Henscheni C. M. *mss.* ; Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 38.

Ster. In aren. humid. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

hexastichum Mitt. — Pilotrichella.

himalayense Par.

M. ancistrodes Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 72.

Ster. — As. : Sikkim, Bhotan.

hispidum Mitt. — Trachypus.

Hornschuchii Par.

M. auro-nitens Mitt. *M. austr. am.* p. 446 (*descript fruct. in Ångstr.*
Pr. lin. p. 37).

Pilotrichum auro-nitens Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 59 ; C. M. *Syn. II*, p. 156.

2. — Am. merid. : Brasil. tropic.

Hookeri Mitt. *M. Ind. or.* p. 86.

— As. : Sikkim, Khasia, Alp. Yunnan.

Hookeri Mitt. (l. c. p. 89). — Papillaria sparsa.

Husnoti W. P. Sch. — Porotrichum insularum.

illecebrum Mitt. — Papillaria.

imbricatum Mitt. — Pilotrichella.

implanatum Mitt. *M. austr. am.* p. 445.

2 ? Arbor. et rupic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

imponderosum Mitt. — Lindigia.

infuscatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 91.

— As. : Sikkim.

inordinatum Mitt. — Pilotrichella.

intricatum Mitt. *Sam. M.* p. 171, t. 5 A.

M. helictophyllum Sull. in *Wilkes Exped.* p. 22?

Trachypus helictophyllus Mitt. in *Bonpl.* 1861, p. 366.

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.

involutifolium Mitt. — Pilotrichella.

javanicum Lac. — Aërobryum.

hermadecense Mitt. — Papillaria.

Kurzii *Bryol. jav.* II, p. 89, t. 204.

2. — As. : M. Java.

laevifolium Mitt. — Pilotrichella.

lanosum Mitt. — Aërobryum.

leuconeuron Dz. et Mk. — Papillaria.

leucotrichum Mitt. — Pilotrichella.

limbatum Mitt. — Papillaria flavo-limbata.

livens Mitt. Pilotrichella.

longebarbatum Mitt. — Pilotrichella.

longissimum (*Raddi*) Mitt. *M. austr. am.* p. 436.

Hypnum longissimum Raddi Critt. *Brasil.* 9; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 510.

Isothodium tetragonum var. *piligerum* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1839, p. 54?

M. brasiliense Sull. in *Am. Expl. Exped.* p. 21, t. 19.

Neckera longissima C. M. *Syn.* II, p. 130.

Pilotrichum cirrifolium Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 60.

P. longissimum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 4.

Ad arbor. — *Am. merid.* : *Brasil.* or.

longissimum { *Bryol. jav.* — Aërobryum.
Dz. et Mk. { — Aërobryum ?
— Aërobryum lanosum ?
var. *tenuis* *Bryol. jav.* — Aërobryum.

Lorentzi C. M. in *Linn.* 1874-79, p. 420.

2. — *Am. merid.* : *Argentin.* subtropic.

luteo-nigrum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 171.

— *Am. merid.* : *Brasil.* austr. or.

macranthum Dz. et Mk. — Pilotrichella nigricans.

macrocarpum Mitt. *op. cit.* p. 437.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And Peruv.

mauiense Sull. — Pilotrichella

membranaceum Mitt. — Pilotrichella.

mexicanum Mitt. — Pterobryum cochlearifolium.

molle Mitt. — Pilotrichella Cumingii.

nematosum C. M. — Garovaglia.

nigrescens { Dz. et Mk. — Papillaria leuconeura.
Mitt. — Papillaria.

nigricans Mitt. — Pilotrichella.

nitens H. f. et W. — Pilotrichella.

nitidum (*Wils.*) Mitt. *M. Ind. or.* p. 87.

Pilotrichum nitidum Wils. in sched.

— As. : Sikkim, Khasia.

nitidum Sull. — Pilotrichella inordinata.

Erstedtianum Mitt. — Papillaria.

- onustum Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 445.
 2? Rupic. — *Am. merid.* : And. Peruv.
- orbifolium Mitt. — Pilotrichella cochlearifolia.
 pachygaster Mitt. — Pilotrichella.
- patens (Hook.) Mitt. *op. et l. cc.*
 Hypnum patens Hook. *M. ex. t.* 56.
 Isothecium patens Brid. *Bryol. univ. II*, p. 364.
 Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- patulum (Sw.) W. P. Sch. in M. Lherminier.
 Hypnum cirriferum Spreng. in Brid. *op. cit.* p. 410.
 H. patulum Sw. *Prodr.* p. 140; Brid. *op. cit.* p. 514.
 Pilotrichum patulum Brid. *op. cit.* pp. 544 et 771; C. M. *Syn. II*, p. 155.
 2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., And. Costa Ric., Cuba, Jamaic., Hispaniola, Antill. gall. *Am. merid.* : Guian., Amazon., And. Quitens. et Peruv.
- pendulum Sull. *M. of U. St.* p. 81 et 1c. *M.* p. 117, t. 73; Lesq. et Jam. *Man.* p. 286.
 2? ♂ ign. Ad arbor. — *Am. sept.* : Ludovic. occid.
- penicillatum Dz. et Mk. *Prodr. fl. bryol. Surin.* p. 45, t. II.
 2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Venezuela.
- pensile Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 172.
 Ster. — *As.* : Japon.
- peruvianum Mitt. — Pilotrichella.
- phaeum Mitt. — M. reclinatum.
- phymatodes Besch. in *Journ. de bot.* 1890, p. .
 2. Ad fol. emortua. — *As.* : Tonkin.
- piligerum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 170.
 — Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- polytrichum Dz. et Mk. — Papillaria.
- prolixum Bosw. in *Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 97.
 1? — *Pac.* : Austral. (Nov. Vales.).
- pseudo-patulum C. M. mss.; Angstr. in *Oefv...* 1879, n. 4, pp. 39-40.
 2? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Puiggarii (Geh. et Hpe.) Par.
 Pilotrichum Puiggarii G. et Hpe. in *Fl.* 1881.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- punctulatum (C. M.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 91.
 Pilotrichum punctulatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 571.
 2, Ster. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.
- pusillum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* p. 101, t. 88, f. I et *Handb.* p. 460.
 — *Pac.* : Nov. Zeland. sept.
- quinquefarium Mitt. — Pilotrichella.
- quitense Mitt. — Pilotrichella.
- reclinatum (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 87.
 M. phaeum Mitt. *op. et l. cc.*; *Bryol. jav. II*, p. 86, t. 201.
 Pilotrichum phaeum Wils. in *sched.*
 P. reclinatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 572.
 2. — *As.* : Sikkim, M. Neilgherr., Ceylan, Java, Celebes.

recurvifolium (Hsch.) Mitt. *M. austr. am.* p. 444.

Neckera patula Schwaegr. *Suppl. II, II, I*, p. 45, t. 165 (excl. syn. Hedw. et Sw.).

Pilotrichum patulum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 759 (excl. syn. Hedw.).

P. recurvifolium Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 58; *C. M. Syn. II*, p. 155.

2? Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil.

Reginae Mitt. — *Papillaria*.

remotifolium Mitt. — *Pilotrichella*.

retrorsum Mitt. — *Papillaria*.

rigens Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, *I*, p. 71.

Ster. — *As.* : Sikkim.

rigidum Mitt. — *Pilotrichella*.

rotundifolium Mitt. *op. cit.* p. 437.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil.

rufifolium Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 316.

1. — *As.* : Ceylan.

rugulosum Ångstr. in *Oefv...* 1876 n. 4, p. 38.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

rutilans *Bryol. jav. II*, p. 90, t. 205.

2. Ad arbor. — *As.* : Java, Sumatra.

sarmentosum Mitt. — *Papillaria*.

scabriusculum Mitt. — *Garovaglia*.

scariosum Ltz. *Moosst.* p. 165.

Ster. — *Am. sept.* : Panama.

Schmidii Mitt. — *Garovaglia*.

semi-tortum *Bryol. jav.* — *Papillaria*.

sericeum W. P. Sch. — *Lepyrodon trichophyllus* var. robustior.

serrulatum Mitt. — *Trachypus*?

setigerum Mitt. — *Garovaglia*.

sinuatum Mitt. — *Pilotrichella*.

solutum Mitt. *M. Ind. or.* p. 88.

Ster. — *As.* : Sikkim.

sparsum Mitt. — *Papillaria*.

speciosum Mitt. — *Aërobryum*.

spiculatum Mitt. — *Pilotrichella*.

squarrosus (Hook.) Mitt. *op. cit.* p. 87; *Bryol. jav. II*, p. 85, t. 200.

Neckera squarrosa Hook. in *Wall. Cat. n.* 7619; *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 14 et in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 22, f. 3.

Pilotrichum squarrosus *C. M. Syn. II*, p. 154.

2. Ad ramul. arb. — *As.* : Nepal., Himalaya, Khasia, Pegu, M. Neilgherr., Madras, Ceylan, Sumatra, Java, penins. Malay.

“ var. *brevifolium* *C. M.* in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601 (nom.).

Ster. — *As.* : Birman. super.

stellatum Ltz. *Moosst.* p. 165.

Ster. — *Am. sept.* : Jamaic. *Am. merid.* : Guian.

Batav.

Stevensii Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, *I*, p. 72.

Ster. — *As.* : Sikkim.

- sticticum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 147.
 Pilotrichum sticticum C. M. in *Linn.* 1874, p. 614.
 Ster. Lichenicol. — *Am. merid.* : Nov. Granat.
- stramineum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 446.
 Pilotrichum stramineum C. M. *Syn. II*, p. 157.
 Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile.
- striatulum Mitt. — Aërobryum.
- striatum Lindb. in *Oefv....* 1864, p. 603.
 2. — *Am. merid.* : Valdivia.
- subambiguum (Hpe.) Par.
 Pilotrichum subambiguum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 46.
 2. Ster. Cortic., lignic. et terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- sublivens Besch. — Pilotrichella.
- subulifolium W. P. Sch. — Papillaria.
- tenue W. P. Sch. in Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 82.
 Ster. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba, Cordoba).
- tenuissimum (Hook. f. et Wils.) Mitt. *op. cit.* p. 447.
 Cryphaea tenuissima H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 453, t. 15 E.
 Pilotrichum tenuissimum C. M. *Syn. II*, p. 174.
 2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- teres Mitt. — Papillaria.
- Ternstroemiae Mitt. — Pilotrichella.
- tetragonum Mitt. — Pilotrichella.
- Thunbergii Mitt. — Pilotrichella.
- tortipile Mitt. — Pilotrichella.
- tovariense (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 444.
 Hypnum patulum C. M. in *Linn.* 1847, p. 92.
 Pilotrichum recurvifolium Hpe. *op. et l. cc.*
 P. tovariense C. M. *Syn. II*, p. 156.
 2. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens.
- trichophoroides Mitt. — Pilotrichella.
- trichophorum Sull. — Pilotrichella cubensis.
- tumido-aureum C. M. in Jaeg. *Ad. II*, p. 148 (nom.).
 — *As.* : Sikkim.
- tumidum (Dicks.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 86 ; *Bryol. jav. II*, p. 85, t. 199.
 Neckera tumida Dicks. *mss. in Hook. M. ex. adnot.* t. 158.
 Pilotrichum tumidum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 265 ; C. M. *Syn. II*, p. 153.
 2. Filicie. — *As.* : Nepal. (fid. C. M.), Madras, Ceylan, Sumatra, M. Java, ins. Ceram, Sarapæa, Celebes.
- turgescens Mitt. — Pilotrichella.
- ustulatum Bosw. in *Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 98.
 Ster. — *As.* : Ceylan.
- vaginans (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 150.
 Neckera vaginans W. et D. in *Mém... Genève*, 1871, p. 4, t. 3, f. I.
 Ster. Ad ramul. *Coffeae arab.* — *Afr.* : Angola.
- versicolor Mitt. — Pilotrichella.
- viride Mitt. — Pilotrichella.

viridulum Mitt. — Papillaria.

vitianum Sull. — Aërobryum.

vulcanicum Mitt. *Fl. Vit.* p. 395.

Ster. — *Pac.* : Ins. Hawai.

Wagneri Ltz. *Moosst.* p. 165.

2. — *Am. sept.* : Panama.

Wallichii Mitt. — Aërobryum.

Welwitschii (Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 147.

Neckera Welwitschii Duby in *Mém.... Genève*, 1871, t. 3, f. 2.

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Angola.

Widgrenianum (Ångstr.) Mitt. *M. austr. am.* p. 446.

Neckera cordata Hsch. in *Sellow M. Brasil.*

Pilotrichum Widgrenianum Ångstr. mss., et *Prim. lin.* p. 38 (descript. locuplet.) ; *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 438.

Ster. Cortic. et lignic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

Wightii Mitt. — Garovaglia (1).

METEORIDIUM C. M. *Syn. II*, p. 672 (primum subsect. *NECKERAE*, postea *gen. propr.*).

remotifolium C. M. — *Pilotrichella*.

METZLERIA W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 100 (1 spec.).

alpina ej. l. c.

Atractylocarpus alpinus Lindb. in *Uth. till etc.*

Metzleriella alpina Limpr. *Laubm. Deutschl.*

1. In terr. humos. turf. — *Eur.* : Norveg. occ., Alp. Helvet. (Faulhorn, Sustenpass), Stir., Tirol.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1315.

METZLERIELLA Limpr. *Laubm. Deutschl.* (= **METZLERIA**).

MICROBRYUM W. P. Sch. *Syn. I* ed. p. 10 (2 spec.).

Floërkeanum (Web. et Mohr) W. P. Sch. l. c.

Acaulon Floërkeanum C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 99 et *Syn. I*, p. 21, II, p. 519 ; W. P. Sch. *Coroll.* p. 4.

Phascum Floërkeanum W. et M. *Bot. Taschb.* pp. 70 et 451 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 26 ; *Bryol. eur. I* (mon. p. 8), t. 2.

Ph. minutum Roehl. in *Ann. d. Wett. Ges. I*, p. 185.

1. In argill. denudat. humid. — *Eur.* : Præcip. media. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Perrar. : Illinois (semel lect.), Kansas.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1102.

« *var. badium* W. P. Sch. l. c.

Acaulon Floërkeanum β *badium* C. M. l. c.

Phascum badium Voit *M. Herbisp.* p. 7 ; *Brid. op. cit.* p. 27.

Ph. Floërkeanum Voit in *Sturm Fl. Crypt. II*, p. 14.

Ph. Floërkeanum var. badium *Brid. Mant. M.* p. 5.

Ut et ubi typ. in *Eur.*

(1) In Enumer. Kindb. nomina nuda :

M. disciflorum Geh. et Hpe.
horridum Mitt.
patentissimum C. M.

M. revolutum Lindb.
sulfureum W. P. Sch.

- « *var. Henrici* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 91.
In arenos. — Am. sept. : Kansas.

Uleanum (C. M.) Par.

Acaulon Uleanum C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 2.

1. Terr. — Am. merid. : Brasil, subtropic. or.

Microcalpe Spr. Cat. ; Mitt. M. austr. am. p. 494 (sect. SEMATHOPHYLLI = RHAPHIDOSTEGIUM).

Microcarpidium C. M. in Linn. 1876, p. 282 (subsect. HYPNI = RHAPHIDOSTEGIUM p. max. p.).

MICRODUS W. P. Sch. in hb. Mus. Paris (35 spec.).

afro-exiguus (C. M.) Par.

Dicranella afro-exigua C. M. in Dusen M. Camer. n. b.

— Afr. : M. Cameroon.

apiculatus (Dz. et Mk.) Par.

Seligeria apiculata Dz. et Mk. in Zoll. Syst. Verz. I, p. 24 ; Bryol. jav. I, p. 91, t. 75.

2. — As. : Java.

austro-exiguus (C. M.) Par.

Angstroemia austro-exigua C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57.

— Pac. : Nov. Caledon.

crispulus Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 5.

2. — Am. sept. : Guadalup. vel Martinic.

debilis (Hook. f. et Wils.) Besch. in hb. Mus. Paris.

Dicranella debilis Lesq. et Jam. Man. p. 66 ; Mitt. M. austr. am. p. 30 p.p.

Dicranum debile H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 51, II ed. n. 51 et 52 ; Sull. M. of U. St. p. 21 et Ic. M. p. 33, t. 20.

2. Terr. — Am. sept. : de Carol. merid. ad Florid. ; Cuba.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 62.

densus (Hook.) Besch. in hb. Mus. Paris.

Dicranella densa Mitt. op. cit. p. 36.

Dicranum densum Hook. M. exot. t. 140 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 464 ; C. M. Syn. I, p. 445.

2. Rupic. — Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv.

euchlorus (Mont.) Besch. l. c.

Angstroemia euchlora C. M. Syn. I, p. 442.

Dicranella euchlora Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 186 ; Mitt. op. cit. p. 35.

Dicranum euchlorum Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 112 et Syll. p. 45.

1. Rupic. et lignic. — Am. merid. : Chile.

exiguus (Schwaegr.) Besch. l. c.

Angstroemia exigua C. M. Syn. I, p. 444.

Coscinodon longirostris Hsch. Fl. Brasil. I, p. 9.

Cynodontium debile Jaeg. Ad. p.p. (excl. syn. Hsch.).

Dicranella exigua Mitt. M. austr. am. p. 30.

Weisia exigua Schwaegr. Suppl. II, II, II, t. 179.

2. Ad rup. et terr. — Am. sept. : Cuba, ins. S. Vincent. Am. merid. : Ins. Trinitat., Amazon., And. Quitens. et Peruv., Brasil. austr. or.

flaccidulus (Mitt.) Besch. l. c.

Dicranella flaccidula Mitt. Sam. M. p. 177.

Leptotrichum flaccidulum ej. in Bonpl. 1861, p. 365.

Seligeria flaccidula C. M. in Jaeg. Ad. II, p. 659.

— Pac. : Ins. Samoa, Viti.

globicarpus (C. M.) Par.

Seligeria globicarpa C. M. in Linn. 1878-79, p. 659.

2. — Am. merid. : Venezuela.

Hilarianus (Mont.) Besch. l. c.

Angstroemia Hilariana C. M. Syn. I, p. 442.

Dicranella Hilariana Mitt. op. cit. p. 31.

Dicranum Hilarianum Mont. in Ann. sc. nat. 1839, p. 52, t. I, f. 2 et Syll. p. 44.

D. innovans C. M. in Bot. Zeit. 1844, p. 709.

D. parvulum var. *H. f. et W.* in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 151.

D. Sellowii Hsch. Fl. Brasil. I, p. 14.

2. Terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or., Monte Video.

infuscatus (Thw. et Mitt.) Par.

Dicranella infusca T. et M. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 295.

1. — As. : Ceylan.

integer (C. M.) Par.

Angstroemia integra C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 777.

2. — Pac. : Ins. Fidji.

Liebmanni W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 18.

Angstroemia microdonta C. M. Syn. II, p. 606.

Dicranoweisia microdonta W. P. Sch. in sched. olim.

Dicranum microdus Kze. in hb. Mus. Paris.

2. Ad terr. argill. — Am. sept. : Mexic.

limosus Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 16.

1. Ad terr. et in sabulos. — Afr. : Ins. Mayotte, Nossi Be, Madagascar.

Lindigianus (Hpe.) Besch. in hb. Mus. Paris.

Dicranella Lindigiana Mitt. M. austr. am. p. 30.

Seligeria Lindigiana Hpe. in Ann. sc. nat. N. ser. III, p. 353.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

linearifolius (Hsch.) Par.

Seligeria linearifolia C. M. Syn. II, p. 604 ; Bryol. jav. I, p. 92.

Weisia linearifolia Hsch. in Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 92, t. 179.

2. — As. : Java.

longirostris (Schwaegr.) W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 13.

Coscinodon longirostris Brid. Bryol. univ. I, p. 376.

Dicranella Duchassaingii W. P. Sch. in Husn. M. Antill. n. 124.

D. longirostris Mitt. op. cit. p. 30.

Leptotrichum longirostre C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 806.

Seligeria longirostris ej. Syn. I, p. 421.

Trematodon longirostris Schwaegr. Suppl. I, p. 343.

Weisia Belangeriana Mont. hb. (Mus. Paris).

W. longirostris Schwaegr. Suppl. II, I, p. 54, t. 117.

2. Rupic. — Am. sept. : Mexic. (Orizaba), Guadalup. Am. merid. Brasil.

lutarius Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 16.

— Afr. : Ins. Borbon.

Martianus (Hpe.) Besch. l. c.

Angstroemia Martiana Hpe. *Symb.* 1872, p. 41.

Cynodontium debile Jaeg. *Ad. p.p.* (excl. syn. Schwaegr., C. M. et Mitt. loc. insul., ic. et exs.).

Dicranella Martiana Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 14.

Dicranum parvulum Hsch. *Fl. Brasil. I.* p. 14 p.p.

2. Ad terr. argill. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

minutus (Hpe.) Besch. op. cit. p. 17.

Angstroemia minuta Hpe. in *Linn.* 1874, p. 209.

— Afr. : Madagascar.

Miqueliana (Mont.) Besch. in hb. Mus. Paris.

Seligeria Miqueliana C. M. *Syn. I.* p. 423 ; *Bryol. jav. I.* p. 90, t. 74.

Weisia macrorhyncha Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 117 et *Syll.* p. 48.

W. Miqueliana ej. ll. cc. pp. 118 et 48.

2. In terr. argillos. — As. : Borneo, Java, ins. Banca.

nitidulus (Mitt.) Par.

Leptotrichum nitidulum Mitt. in *M. herb. Hook. et in Trans. of the Linn. Soc.* XXIII (1860), p. 51, t. 5, f. 1.

2. Terr. — Afr. : Niger.

ovatus Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 18.

2. — Am. sept. : Mexic.

pallens (Hook. f. et Wils.) Par.

Seligeria pallens C. M. *Syn. I.* p. 423.

Weisia pallens H. f. et W. in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 739 A.

2? — Pac. : Austral. or.

pallidisetus (Schwaegr.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 17.

Coscinodon pallidisetus Brid. *Bryol. univ. I.* p. 377.

Seligeria pallidiseta C. M. *Syn. I.* p. 422.

Weisia pallidiseta Schwaegr. *Suppl. II.* p. 54, t. 117.

2. — Afr. : Madagascar.

paraguensis Besch. in *Journ. de bot.* 1890, p.

2. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3661.

pomiformis (Griff.) Besch. in hb. Mus. Paris.

Angstroemia exigua Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 296.

Dicranella pomiformis Jaeg. *Ad. I.* p. 76.

Didymodon pomiformis Griff. (Not. p. 431 et *Ic. pl. asiat.* II, t. 80, f. 3.

Leptotrichum pomiforme Mitt. *M. Ind. or.* p. 8.

2. Rupic. et ad terr. argill. — As. : Himalaya or., Khasia, Ceylan.

pseudo-debilis (C. M.) Par.

Angstroemia pseudo-debilis C. M. in *Journ. of bot.* 1877, p. (nom. v.)

— Am. sept. : Costa-Rica.

pusillus (Hpe.) Besch. l. c.

Angstroemia pusilla Hpe. in *Ann. sc. nat.* V ser., III, p. 358.

Dicranella pusilla Mitt. *M. austr. am.* p. 31.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

rostratus (C. M.) Besch. l. c.

Seligeria rostrata C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 469.

2. — Am. merid. : Venezuela.

Sartorii W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 18.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

subangulatus (Mitt.) *Besch. in hb. Mus. Paris.*

Dicranella subangulata Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 296.

2. — *As.* : Ceylan.

tenuirostris (Kze.) *Besch. l. c.*

Angstroemia tenuirostris C. M. *Syn. I.* p. 441.

Dicranella tenuirostris Mitt. *M. austr. am.* p. 30.

Dicranum tenuirostre Kze. in *Poepp. Pl. Chil. III*, n. 232 et in *Schwaegr. Suppl. IV*, p. 308.

2. — *Am. merid.* : Guian.

tenuis (Kze.) *Par.*

Dicranella Kunzeana Mitt. *op. cit.* p. 34.

Leptotrichum Kunzeanum C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 806.

Seligeria Kunzeana C. M. *Syn. I*, p. 421 et *II*, p. 604.

Weisia tenuis Kze. in *Poepp. Pl. Chil. IV*, n. 230.

2. — *Am. sept.* : Costa-Rica. *Am. merid.* : Peruv., Chile.

MICROMITRIUM W. P. Sch. herb. (6 spec.).

brevicaule *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 211.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Caled.

chimborazense (Spr.) *Jaeg. Ad. I*, p. 435.

Macromitrium chimborazense Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 218.

— *Am. merid.* : M. Chimborazo.

fragile (Mitt.) *Jaeg. l. c.*

Macromitrium fragile Mitt. *op. et l. cc.*

♂ et fr. ign. — *Am. sept.* : Guadalup. *Am. merid.* : Amazon.

goniorhynchum (Dz. et Mk.) *Jaeg. l. c.*

Macromitrium goniorhynchum Mitt. *M. Ind. or.* p. 53; *Bryol. jav. I*, p. 111, t. 88.

Schlotheimia goniorhyncha Dz. et Mk. in *Pl. Jungh. I*, p. 358.

2. Cortic. — *As.* : Khasia, Sumatra, Java, Celebes.

« *var. glaucescens* (C. M.) *Par.*

Macromitrium goniorhynchum var. glaucescens C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 39.

— *As.* : Ceylan.

Schlumbergeri W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 47.

— *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

tylostomum (Mitt.) *Jaeg. l. c.*

Macromitrium tylostomum Mitt. in *Bryol. jav. I*, p. 131, t. 109.

2. — *As.* : Java.

MICROMITRIUM Aust. M. Appal.

Austini Aust. — *Ephemerum*.

megalosporum Aust. — *Ephemerum tenerum*.

synoicum Aust. — *Ephemerum*.

MICROPOMA *Lindb. in Notiz.*

niloticum Lindb. — *Physcomitrium*.

MICROSTEGIUM *Lindb. in Oefv.... 1864, p. 593.*

niloticum Lindb. — *Physcomitrium*.

MICROTHAMNIUM Mitt. *M. austr. am. p. 503 (88 spec.).*

acrorhizon (*Hsch.*) *Jaeg. Ad. II, p. 494.*

Hypnum acrorhizon *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 75; C. M. Syn. II, p. 274.*

l. *Ad arbor. et saxa.* — *Am. merid. : Brasil. or.*

afro-elegantulum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 283.*

— *Afr. : M. Cameroon.*

andicola (*Hook.*) Mitt. *op. cit. p. 506 p.p.*

Hypnum andicola *Hook. M. ex. t. 83 p.p.*

H. reptans *C. M. Syn. II, p. 268 p.p.*

Leskea andicola *Brid. Bryol. univ. II, p. 297.*

l ? — *Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens.*

andicola Mitt. *p.p.* — *M. volvatum.*

ankeriense *Kiaër in Borgen M. Mad. n. 62.*

— *Afr. : Madagascar.*

Aptychella *Broth. in Bihang till Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895, n. 3.*

l. *Cortic.* — *Am. merid. : Brasil. or.*

? *argillicola* *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 133*

et M. Masc. Mad. n. 241.

Ster. In terra argill. — *Afr. : Madagasc. centr.*

atro-viride *Besch. in Journ. de bot. 1894, p.*

l. *Cortic.* — *Am. sept. : And. Costa Ric.*

aureum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 171.*

l. *Cortic.* — *Afr. : Ins. Borbon.*

Bescherellei *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 132*

et M. Masc. Mad. n. 239.

Ster. Terr. secus rivul. — *Afr. : Ins. Borbon.*

Bessoni *Ren. et Card. in op. cit. 1893, I, p. 123 et M. Masc. Mad. n. 235.*

Ster. — *Afr. : Madagascar.*

brachycarpum *Ren. et Card. in op. cit. 1894, II, p. 132 et M. Masc. Mad. n. 240.*

— *Afr. : Madagascar (Betzile).*

brachysteliophilum *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 68.*

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

brachythecioides *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1895, I, p. 77.*

Ster. — *As. : Sikkim.*

breviusculum Mitt. *op. cit. p. 506.*

l ? — *Am. merid. : And. Quitens.*

byssicomum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 214.*

— *Afr. : M. Cameroon.*

campaniforme (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 493.*

Chryso-Hypnum campaniforme *Hpe. Symb. 1870, p. 281.*

l. *Cortic.* — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

camptorhynchum Jaeg. — *M. Widgrenii*.

caudiforme (C. M.) Par.

Hypnum caudiforme C. M. in *Fl.* 1886, p. 524.

Ster. — Afr. : Mossamedes.

chlorizans (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 491.

Hypnum chlorizans W. et D. in *Mém.... Genève*, 1871, p. 13, t. 4, f. 6.

2. Ad rivul. in silv. — Afr. : Angola.

clarescens (Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 496.

Hypnum clarescens Wils. in sched.

Stereodon clarescens Mitt. *M. Ind. or.* p. 100.

2. — As. : Himalaya occ.

decurvans Lindb. — *M. substriatum*.

diminutivum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 492.

Hypnum diminutivum Hpe. in *Linn.* 1847, p. 86 ; *C. M. Syn. II*, p. 270.

1. Lignic. — Am. merid. : Venezuela.

discriminatum Jaeg. — *Hylocomium macrocarpum*.

disparifolium Jaeg. — *M. substriatum* ?

elegantulum (Hook.) Mitt. *M. austr. am.* p. 504.

Hypnum elegantulum Hook. *M. ex. t.* 84 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 411 ;

C. M. Syn. II, p. 267.

H. erythropodium C. M. in *Bot. Zeit.* 1844, p. 742.

H. filidens ej. l. c. (1).

2. Cortic., lignic. et saxic. — Am. sept. : Mexic., Guadalup. Am. merid. : Venezuela, Amazon., Brasil. austr. or.

epruinatum C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 69.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

eurystomum Besch. *Not. M. Parag.* p. 269.

1. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1199, 1209, 1278.

expallescens (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 491.

Chryso-Hypnum expallescens Hpe. *Symb.* 1870, p. 278.

2. Cortic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Fabronia (Hook.) Jaeg. *Ad. II*, p. 492

Helicodontium Fabronia Schwaegr. *Suppl. III, II, II, t.* 294.

Hypnum Fabronia Hook. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, *II*, p. 17 ; *C. M. Syn. II*, p. 270.

Leskea Fabronia Hook. l. c.

Stereodon Fabronia Mitt. *M. Ind. or.* p. 99.

2. — As. : Nepal., Sumatra.

flavidum Ångstr. — *M. simorhynchum*.

flexile Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, *I*, p. 185.

Ster. — Afr. : Madagascar.

frondosum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 495.

Stereodon frondosus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 158.

1. — Afr. : Ins. Fernando-Po.

(1) Cf. Mitt. op. cit. p. 505.

- fruticellum (Mitt.) Jaeg. l. c.
 Stereodon fruticellus Mitt. in op. et l. cc.
 l. — Ins. Fernando-Po.
- glabrifolium (C. M.) Par.
 Hypnum glabrifolium C. M. in Fl. 1890, p. 496.
 Ster. — Afr. : Kilima N'Djaro, Usambara.
- gracile Jaeg. — Camptochaete.
- heterostachys (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 496.
 Hypnum heterostachys Hpe. Symb. 1872, p. 519.
 l. Cortic., lignic. et terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- humile Besch. Not. M. Parag. p. 269.
 l. ? — Am. merid. : Paraguay.
 Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1215.
- incompletum (Spr.) Jaeg. Ad. II, p. 493.
 Hyocomium incompletum Spr. Cat. p. 17.
 — Am. merid. : And. Quitens. et Peruv.
- Jamesoni (Tayl.) Mitt. M. austr. am. p. 508.
 Hypnum Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 63 ; C. M. Syn. II, p. 454.
 Cortic. — Am. merid. : And. Quitens.
- Langsdorffii (Hook.) Mitt. op. cit. p. 507.
 Hypnum Langsdorffii Hook. in Kth. Syn. pl. Æquat. I, p. 62 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 391 ; C. M. Syn. II, p. 259.
 Cortic. et lignic. — Am. merid. : Orinoc., Nov. Granat., And. Quitens., Brasil.
- Lehmannii Besch. in Journ. de bot. 1894, p.
 l. Cortic. — Am. sept. : And. Costa Ric.
- leptoreptans Broth. in Boll. d. Soc. Brot. VIII, 1890.
 l. Ad arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.
- lepto-squarrosum C. M. in Dusen M. Camer. n. 840.
 — Afr. : M. Cameroon.
- limosum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 172.
 l. Ad terr. arenos. humid. — Afr. : Ins. Borbon.
- loriforme (Hpe.) Mitt. op. cit. p. 508.
 Hypnum loriforme Hpe. in Linn. 1863, p. 160.
 Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- macroblepharum (W. P. Sch.) Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 51.
 Hypnum macroblepharum W. P. Sch. in Jardin Enum. p. 20 (nom.).
 l. Cortic. et rupic. in humid. — Pac. : Nuka-Hiva.
- macrocarpum Jaeg. — Hylocomium.
- macrodontium (Hsch.) Mitt. M. austr. am. p. 507.
 Hypnum macrodontium Hsch. Fl. Brasil. I, p. 82 ; C. M. Syn. II, p. 276.
 l. — Am. merid. : Brasil. or.
- madagassum Besch. op. cit. p. 171.
 l. — Afr. : Madagascar sept. occ.

malacobolum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 497.

Hypnum malacobolum C. M. *Syn. II*, p. 689; *Bryol. jav. II*, p. 154, t. 252.

2. — *As.*: Borneo, ins. Ceram, Ternate, Celebes, Java, Sumatra.

mexicanum (Besch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 592.

Eurhynchium mexicanum Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 104.

1. — *Am. sept.*: Mexic. (Orizaba).

mollissimum C. M. in *Hildebr. M. Mad. n.* 2081.

— *Afr.*: Madagascar.

mucidum (C. M.) Par.

Hypnum mucidum C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (nom.).

— *Fac.*: Nov. Caledon.

nano-operculatum (C. M.) Par.

Hypnum nano-operculatum C. M. in *op. et l. cc.* (nom.).

— *Pac.*: Nov. Caled.

nervosum Kiaër in *Borgen M. Mad. n.* 61.

— *Afr.*: Madagascar centr.

oxypoma (Schwaegr.) Mitt. *M. austr. am.* p. 505 (1).

Hypnum oxypoma Schwaegr. *Suppl. III, II, I*, t. 259; C. M. *Syn. II*, p. 453.

1. — *Am. merid.*: And. Peruv.

oxystegum Spr. in *Mitt. op. et l. cc.*

— *Am. merid.*: And. Peruv.

pachythecium (Hpe.) Par.

Hypnum pachythecium Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 72.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Palmarum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 470.

— *Afr.*: M. Cameroon.

paraphysale (Hpe.) Par.

Hypnum paraphysale Hpe. *l. c.* p. 75.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

patens (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 472.

Chryso-Hypnum patens Hpe. in *Bot. Zeit.* 1870, p. 35.

1. — *Afr.*: Natal.

pendulinum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 490.

Chryso-Hypnum pendulinum Hpe. in *op. cit.* p. 52.

Hypnum pendulinum Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 109.

1. — *Am. sept.*: Mexic. (Vera-Cruz).

perspicuum Jaeg. — M. thelistegum.

plinthophilum (C. M.) Par.

Hypnum plinthophilum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 438.

1. — *Am. merid.*: Uruguay.

(1) « An ab *M. elegantulo* diversum ? ». Mitt. *l. c.*

- prionacis C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 224.
— Afr. : M. Cameroon.
- protractulum (C. M.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 172.
Hypnum protractulum C. M. in *Linn.* 1876, p. 277.
Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan.
- pruinatum *Angstr. mss.* ; C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 181.
Co tic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- pseudo-reptans (C. M.) *Jaeg. Ad. II,* p. 494.
Hypnum pseudo-reptans C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 439.
1. — Afr. : C. B. Sp.
Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 418.
- Puiggarii (*Geh. et Hpe.*) *Par.*
Hypnum Puiggarii G. et H. *Enum. M. Brasil.* p. 74.
1. Lignic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- pumilum *Jaeg.* — *Thamnum*.
- reptans (*Sw.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 506.
Hypnum pallescens W. Arn. in *Brid. Bryol. univ. II,* p. 386.
H. pallidum *Hook. in Kunth Syn. pl. Aequat. I,* p. 62.
H. reptans *Sw. Fl. Ind. occ. II,* p. 1819 ; *Brid. op. cit.* p. 448 ; C. M. *Syn. II,* p. 268.
Isothecium pallidum *Brid. op. cit.* p. 386.
Leskea pallida *Schwaegr. Suppl. III, II, II,* t. 291.
1. Lignic. et terr. — Am. sept. : Cuba, Jamaïc., Guadalup., Martinic.
Am. merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, And Quitens. ; Peruv.,
Brasil.
- « var. squarrosulum *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 88.
— Am. sept. : Guadalup.
- rhapidostegioides *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 205.
1. — Afr. : Usambara.
- « var. pallidum *Broth. in op. et l. cc.*
Cum typo.
- « var. viride *Broth. in op. et l. cc.*
Cum typo.
- Salleum *Besch. in litt.*
Hypnum Salleum *ej. Prodr. bryol. mexic.* p. 109.
2. — Am. sept. : Mexic. (Cordoba).
- saprodelphus C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 499.
— Afr. : M. Cameroon.
- Sellowii (*Hsch.*) *Mitt. op. cit.* p. 507.
Hookeria Sellowii *Hsch. Fl. Brasil. I,* p. 66.
Hypnum argute-serratum C. M. *Syn. II,* p. 242.
1. — Am. merid. : Brasil.
- serratum (P. B.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 170.
Hypnum serratum P. B. *Prodr.* p. 70 ; *Brid. Bryol. univ. II,* p. 504 ;
C. M. *Syn. II,* p. 453.
1. Saxic. — Afr. : Ins. Borbon.
- serrula (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II,* p. 497.
Stereodon serrula *Mitt. M. Ind. or.* p. 114.
Ster. Ad filices. — As. : Himalaya.

simorhynchum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 494.

Chryso-Hypnum simorhynchum Hpe. Symb. 1870, p. 279 et Enum. M. Brasil. p. 72.

M. flavidum Ångstr. Prim. lin. p. 43.

l. Lignic. et rupic. — Am. merid. : Brasil. or.

squamulosum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 490.

Hypnum squamulosum C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 440.

l. — Afr. : C. B. Sp.

stigmatophyllum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 493.

Hypnum stigmatophyllum Hpe. in sched.

— As. : Sikkim.

Stuhlmanni Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 205.

l. Fr. ign. — Afr. : Regio lacustr.

subcampaniforme (Geh. et Hpe.) Par.

Hypnum subcampaniforme Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil. p. 73.

l. — Am. merid. : Brasil.

subdiminutivum (Geh. et Hpe.) Par.

Hypnum subdiminutivum G. et H. l. c. p. 75.

l. Cortic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

subelegantum Broth. in Boll. d. Soc. Brot. VIII, 1890.

l. Lignic. — Afr. : Ins. S. Thom.

submacrocarpum Jaeg. — Hylocomium.

submacrodontium (Geh. et Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 775.

Hypnum submacrodontium G. et H. l. c. p. 72.

l. — Am. merid. : Brasil. or.

subobscurum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 490.

Hypnum subobscurum Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 318.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

subperspicuum (C. M.) Par.

Hypnum subperspicuum C. M. in Linn. 1878-79, p. 497.

l. — Am. merid. : Venezuela.

substriatum Mitt. M. austr. am p. 504.

Hypnum disparifolium Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 195 et C. M. Syn. II, p. 439 ?

M. decurvans Lindb. (fid. Ångstr. Prim. lin. p. 43).

M. disparifolium Jaeg. Ad. II, p. 496 ?

2? Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens. ; Brasil. or.

subvolvatum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 493.

Hypnum subvolvatum C. M. in sched.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

tamarisciforme (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 775.

Rhizo-Hypnum tamarisciforme Hpe. Symb. 1877, p. 734.

l. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

thelistegum (C. M.) Mitt. op. cit. p. 504.

Hypnum perspicuum Hpe. in Linn. 1861-62, p. 529 (fid. Mitt. l. c.).

H. reptans Hsch. in Deppe et Schiede M. Mexic. n. 1094.

H. thelistegum C. M. Syn. II, p. 269.

M. perspicuum Jaeg. *Ad. II*, p. 490.

l. Cortic. — *Am. sept.* : Mexic., Cuba, Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, Amazon., Nov. Granat., And. Quitens. et Peruv., Brasil.

« *var. molle* (Hpe.) Par.

H. perspicuum var. molle Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 317.

Ut typ. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

« *var. teres* (Hpe.) Par.

H. perspicuum var. teres Hpe. l. c.

Ut et ubi praeced.

trichostegium C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 694.

— *Afr.* : M. Cameroon.

varieflexum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 496.

Hypnum varieflexum Hpe. in *sched.*

— *As.* : Pegu.

versipoma (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 775.

Rhizo-Hypnum versipoma Hpe. *Symb.* 1877, p. 733.

l. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

viscidulum (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 507.

Hypnum viscidulum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 319.

Cortic. — *Am. sept.* : Guatemala. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

volvatum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 493.

Hypnum volvatum Hpe. in *op. et l. cc.*

M. andicola Mitt. *p.p.* (fid. Hpe.).

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Widgrenii Ångstr. *Prim. lin.* p. 43.

Chryso-Hypnum camptorhynchum Hpe. *Symb.* 1870, p. 280 et *Enum. M. Brasil.* p. 72.

M. camptorhynchum Jaeg. *Ad. II*, p. 494.

l. Cortic. et lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or (1).

MICROTHECIUM W. P. Sch. in Jaeg. *Ad.*

Boivini ej. — *Isopterygium*.

Micro-Thuidium Kindb. *Check-list of Eur. and N. Amer. M.* p. 20.

Microweisia W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 49 (subgen. WEISIAE).

MIELICHHOFERIA Bryol. germ. II, p. 179 (59 spec.).

acuminata C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 278.

Syn. ? — *Am. merid.* : M. Argentin. Tucum.

andina Sull. in *U. St. Expl. Exp.* 1859, p. II, t. 8.

Syn. ? — *Am. merid.* : And. Boliv. et Peruv.

Ews. : Mandon, *Pl. Bol. n.* 1651 bis.

argentifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 325.

Haplodontium argentifolium Jaeg. *Ad. I*, p. 568.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

(1) In *Enum.* Kindb. nomina nuda :

M. longo-reptans C. M.

| *M. pseudo-elegans* C. M.

auriseta C. M. in Linn. 1878-79, p. 270.

Syn. — *Am. merid.* : M. Argentin. Tucum.

« *var. alpina* C. M. l. c. p. 271.

Ut et ubi typ.

australis Hpe. in Linn. 1859-60, p. 626.

2. — *Pac.* : Alp. Austral. or.

austro-Georgica C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 17.

Syn. — *Am. merid.* : Austr.-Georg.

basilaris Br. et Sch. in W. Sch. M. *Abyss.* n. 440; C. M. *Syn.* I, p. 230.

Syn. — *Afr.* : Alp. Abyss., M. Cameroon.

bogotensis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 335.*

Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

boliviana W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1649.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Breutelii W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

brevicaulis Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 8, t. I, f. 2; C. M. *Syn.* I, p. 234.

Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Brasil.

austr. or., Chile, Monte-Video.

campylocarpa (Hook. et Arn.) Mitt. *op. cit.* p. 322.

M. *campylothea* C. M. *Syn.* I, p. 231.

Pohlia minor Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mex.* n. 1078 p.p.

Weisia campylocarpa Hook. et Arn. *Ic. pl. rar.* t. 186.

Syn. — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba). *Am. merid.* :

And. Peruv.

campylocarpa { Mitt. (1876). — M. kerguelensis.
W. P. Sch. { — M. Mandoni.
— M. Schimper.

campylothea C. M. — M. *campylocarpa*.

caucasica W. P. Sch. in *Broth. Enum. M. Cauc.* p. 31.

Syn. *Spelunic.* — *As.* : Daghestan.

chilensis { Hpe. — *Brachymenium Meyenianum*.
Mitt. — *Leptochlaena*.

clavata Br. et Sch. in W. Sch. M. *Abyss.* n. 474; C. M. *Syn.* I, p. 232.

M. *pallucida* Hpe. *Ic. M. Dec. III*, t. 27.

Weisia reticulata Hook. *Bot. Misc.* I, 1830, p. 121, t. 29.

2. — *Afr.* : Abyss., C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. *Afr. austr.* n. 208.

clavellata Mitt. *op. cit.* p. 321.

Syn. ? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

coarctata C. M. in Linn. 1878-79, p. 276.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin.

crassinervia Jur. — *Bryum gemmiparum*.

cuspidifera Kindb. in *Mac. Cat.* p. 110.

2. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

cygnicolla W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1651

— *Am. merid.* : And. Boliv.

- defecta* Sanio. — *Webera erecta*.
- demissa* C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 155.
2. — *Am. merid.* : Chile.
- densifolia* Ångstr. in *Oefv...* 1873, n. 5, p. 139.
2. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- diplodonta* Mitt. *op. cit.* p. 325.
Haplodontium dipodontum Jaeg. *Ad. I*, p. 568.
2. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- Eckloni* Hsch. in *Linn.* 1841, p. 118 ; C. M. *Syn. I*, p. 230.
Oreas capensis Br. in *Coll. Zeyher*.
Schizhymenium bryoides Harv. in *Hook. Ic. pl. rar. III*, t. 202.
Syn. Terr. — *Afr.* : C. B. Sp. *Pac.* : Austral. or. (Victoria), Tasman.
- elongata* Bryol. germ. — *M. nitida var. elongata*.
erecta Kindb. — *Webera*.
graciliseta Mitt. — *Leptochlaena*.
- himalayana* Mitt. *M. Ind. or.* p. 65.
2. — *As.* : Himalaya occ.
- humipetens* (C. M.) Par.
Haplodontium humipetens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 284.
Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Salt.
- hymenostoma* Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 469 ; C. M. *Syn. I*, p. 229.
Syn. — *Afr.* : Alp. Abyss.
- immersidens* C. M. in *Linn.* p. 270.
— *Am. merid.* : M. Argentin.
- Jamesoni* Tzyl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, IV, p. 331 ; C. M. *Syn. I*, p. 233 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 324.
Bryum annotinum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 848.
Br. turbinatum β minus Kth. *Syn. pl. Æquin. I*, p. 57.
Didymodon megalocarpus W. Arn. *Disp. M.* p. 36.
Haplodontium Jamesoni Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 336.
H. megalocarpum Jaeg. *Ad. I*, p. 568.
M. megalocarpa Mitt. *op. cit.* p. 325.
Splachnum turbinatum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 780.
Syn. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., M. Pichincha.
- kerguelensis* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise.... Bot.* p. 12.
M. campylocarpa Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876.
1 et *syn. Rupic.* — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- leptoclada* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 274.
Syn. — *Am. merid.* : Argentin. Salt.
- Lindigii* Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 520 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 323.
Syn. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- longiseta* C. M. *Syn. I*, p. 236 ; Mitt. *op. cit.* p. 321.
Bryum nutans β minus Kth. *Syn. pl. Æquin. I*, p. 58.
Syn. — *Am. merid.* : And. Quitens., ins. Juan Fernandez.
- longiseta* Mitt. (*Handb.* p. 437). — *M. tenuiseta*.

Lorentziana C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 273.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin. sept.

macrocarpa (Hook.) Br. et Sch. in *Lond. Journ. of bot.* 1843, II, p. 665.

M. nitida var. *macrocarpa* C. M. Syn. I, p. 235.

Weisia macrocarpa Hook. in *Drumm. M. bor. am.* n. 74.

2. *Rupic.* — *Am. sept.* : *M. Rupestr.*, Mexic.

Mandoni Par.

M. campylocarpa W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1654.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

megalocarpa Mitt. — *M. Jamesoni*.

microdonta Mitt. — *Leptochlaena*.

micropoma C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 267.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin. Tucum.

« var. *brunnescens* C. M. op. cit. p. 268.

Ut et ubi typ.

microstoma Hpe. — *M. pusilla*.

nana (Tayl.) C. M. Syn. II, p. 565 ; Mitt. op. cit. p. 321.

Schishymenium nanum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 191.

2 ? — *Am. merid.* : And. Quitens.

nitida *Bryol. germ.* II, p. 183, t. 41 ; *Bryol. eur.* IV, t. 328 ; C. M. Syn. I, p. 234 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 386.

Apiocarpia Mielichhoferi Hüb. *Muscol. germ.* p. 154.

Oreas Mielichhoferi Brid. *Bryol. univ.* I, p. 381.

Weisia Mielichhoferiana Funk in H. et H. *Crypt. Cent.* I, dec. IV et in *Bot. Zeit.* 1819, p. 86.

2. Ad rup. micac., talcos., etc. — *Eur.* : Alp. Salisb., Tirol., Helvet., rar. Scand. ; *Pyren. As.* : *Caucas. occ. et centr.*

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1331.

« var. *asperula* Breidl. *Laubm. Steierm.* p. 18.

Ut typ. — *Eur.* : Stir., Carinth., Tirol.

« var. *elongata* *Bryol. eur.* t. 329 ; C. M. l. c. p. 235 ; W. P. Sch. op. cit. p. 387.

Apiocarpia elongata Hüb. l. c. p. 155.

M. elongata *Bryol. germ.* l. c. p. 186, t. 41, f. 2

Oreas elongata Brid. op. cit. II, p. 382.

Weisia elongata Hook. *M. ex.* II, t. 102.

W. Mielichhoferiana β *elongata* Schwaegr. *Suppl.* II, I, p. 47, t. 114.

Ut typ. — *Eur.* : Alp. Salisb., Gall. centr. (Arvern.), *Pyren.*

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 675.

« var. *gracilis* *Bryol. eur.*, C. M. et W. P. Sch. ll. cc.

Ut typ. — *Eur.* : Scotia (semel lect. et ster.), Alp. Salisb. ; Etrur. (?)

« var. *intermedia* *Bryol. eur.*, C. M. et W. P. Sch. ll. cc.

Ut typ. — *Eur.* : Norveg., Alp. Salisb., Vall. Tell., Arvern., *Pyren.*

var. *macrocarpa* C. M. — *M. macrocarpa*.

ochracea C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 275.

Syn. Terr. — *Am. merid.* : M. Argentin. Tucum.

ovalis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 154.

2. — *Afr.* : M. Cameroon.

Pampae C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 361.

— *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

pectinata C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

pernana (C. M.) Par.

Haplodontium pernanum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 282.

2. — *Am. merid.* : M. Argentin. Tucuman.

« var. robustior (C. M.) Par.

Haplodontium pernanum var. robustior C. M. in *op. cit.* p. 283.

Ut et ubi typ.

pellucida Hpe. — M. clavata.

plenrogyna Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 117 et *Syll.* p. 35 ; C. M.

Syn. I, p. 233 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 323.

Syn. — *Am. merid.* : Chil. austr.

plumosa C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 328.

Ster. — *Am. merid.* : And. Peruv.

pohlioidea C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 271.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin. sept.

punctulata Mitt. *op. cit.* p. 322.

Syn. ? — *Am. merid.* : And. Quitens.

pusilla (Hook. f. et Wils.) Mitt. *op. cit.* p. 321.

Leptostomum pusillum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, III, p. 154 ; C. M. *Syn.* I, p. 188.

M. microstoma Hpe. in *Ann. sc. nat.* V ser., IV, p. 325.

Syn. ? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Brasil.

austr. or.

rigidula W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1652.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

sanguinolenta (C. M.) Par.

Haplodontium sanguinolentum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 281.

2. — *Am. merid. sept.* : Argentin. sept.

Schiedeana C. M. *Syn.* I, p. 230 ; Mitt. *op. cit.* p. 320.

Pohlia minor Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.* n. 1078 p.p.

Syn. — *Am. sept.* : Mexic.

Schimperi Besch. in litt.

M. campylocarpa W. P. Sch. in *W. Sch. M. Abyss.* n. 1027.

— *Afr.* : Abyssin.

Schimperi Dz. et Mk. — Arthrocorpus.

Schmidii C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 20.

Syn. — *As.* : M. Neilgherr.

sericea W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1653.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

sericea Dz. et Mk. — Hymenodon.

seriola (C. M.) Par.

Haplodontium seriolum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 284.

Ster. — *Am. merid.* : And. Boliv.

serridens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 268.

Syn. — *Am. merid.* : M. Argentin. Salt. et Tucum.

Spegazzinii C. M. in *Fl.* 1885, p. 399.

Syn. Rupic. — *Am. merid.* : Fuegia.

subobliqua Hpe. in *Bot. Zeit.* 1869.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

tenuiseta Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 750.

M. longiseta ej. in op. cit. p. 437.

1. — *Afr.* : Ins. Marion. *Pac.* : Alp. Nov. Zeland.
med.

trifaria Dz. et Mk. — *Arthrocormus Schimper.*

Vallis Gratiae Hpe. mss.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. *Afr. austr.* n. 542 (1).

MILDELLA Limpr. *Deutschl. Laubm.* I, p. 191.

bryoides Limpr. — *Phascum.*

MITRAPOMA Duby *Choix de Crypt. ex.* 1880, p. 4.

ciliatum Duby. — *Eriopus setigerus.*

MITTENIA Lindb. in *Oefv. Vet. Ak. Foerh.* 1862, p. 606 (1 spec.).

Plumula (Mitt.) Lindb. in op. et l. cc.

Mniopsis (2) Plumula Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1856, p. 94; *H. f.*
et *W. Fl. Tasman.* II, p. 187, t. 173, f. 7.

2. Lignic. — *Pac.* : Tasman.

MNIADELPHUS C. M. in *Bot. Zeit.* 1847 et in *Linn.* 1848, p. 196
(30 spec.).

acuminatus Jaeg. — *Distichophyllum.*

adnatus (*Hook. f. et Wils.*) Jaeg. *Ad.* II, p. 225.

Hookeria adnata H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.* p. 123, t. 93, f. 4 et
Handb. p. 494.

1. Ad fol. emort. et *Trichoman.* — *Pac.* : Nov. Zeland. sept.

amblyophyllum (*Hook. f. et Wils.*) Jaeg. l. c. p. 224.

Distichophyllum amblyophyllum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy.*
Soc. of Victoria, 1883, p. 71.

Hookeria amblyophylla H. f. et W. op. cit. p. 3.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.

andicola (Spr.) Jaeg. l. c. p. 222.

Distichophyllum andicola Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 395.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : And. Quit. et Peruv.

apiculatum Mitt. — *Eriopus.*

(1) In Enumer. Kindb. nomen nudum :

M. Tofiana C. M.

(2) Nom. jam abusum : *Mniopsis* (gen. *Hepaticarum*) Dumort. *Comm. bot.*
p. 114 (1882) ; (gen. *Podostemmarum*) Mart. et Zucc. *Nov. gen. et spec. Brasil.*
I, p. 3 (1824).

auratus C. M. *Syn. II*, p. 26.

Distichophyllum auratum Mitt. *op. cit.* p. 396.

2. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

Beccarii C. M. — *Distichophyllum*.

ceylanicus Mitt. — *Distichophyllum*.

contortifolius (Mont.) C. M. *Syn. II*, p. 23.

Hookeria contortifolia Mont. in *Ann. sc. nat.* 1843, p. 240 et *Syll.* p. 15.

Ster. — *Pac.* : Ins. : Sandwic.

crispulus (Hook. f. et Wils.) C. M. *Syn. II*, p. 25.

Distichophyllum crispulum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria* 1883, p. 77.

Hookeria crispula H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 550 ; *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 122, t. 93, f. 2 et *Handb.* p. 493.

— *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland.

cubensis (Mitt.) C. M. in *Jaeg. Ad. II*, p. 222.

Distichophyllum cubense Mitt. *op. cit.* p. 395.

Hookeria adnata var. Sull. in *Proceed. Am. Acad.*, 1861, p. 285.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Cuba.

cuspidatus C. M. — *Distichophyllum*.

Dicksoni C. M. — *Distichophyllum*.

Dusenii C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 70.

— *Afr.* : M. Cameroon.

elongatus (Mitt.) *Jaeg. l. c.*

Distichophyllum elongatum Mitt. *op. cit.* p. 395.

1. Ster. Ad rup. irror. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

flaccidus (Hook. f. et Wils.) Hpe. in C. M. *Syn. II*, pp. 22 et 661.

Distichophyllum flaccidum Mitt. *op. et l. cc.*

Hookeria flaccida H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 549 et *Fl. Antarct. II*, p. 422, t. 155, f. 5.

2. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitae.

flavescens C. M. — *Distichophyllum*.

flexuosus (Mitt.) *Jaeg. Ad. II*, p. 225.

Hookeria flexuosa Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 494.

— *Pac.* : Nov. Zeland. med.

Freycineti C. M. — *Distichophyllum*.

Geheebii Hpe. mss. ; *Jaeg. Ad. II*, p. 773.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

gracilis Jaeg. — *Distichophyllum*.

Graeffeae C. M. *M. Polyn.* p. 79.

1. — *Pac.* : Ins. Fidji.

Griffithii Mitt. — *Distichophyllum*.

heterophyllum Wils. — *Distichophyllum*.

Hornschuchii C. M. *Syn. II*, p. 22.

Hookeria mniifolia Hsch. in *Linn.* 1841, p. 141.

2 ? Lignic. — *Afr.* : C. B. Sp.

humifusus Wils. — *Distichophyllum* ?

jungermannioides C. M. — *Distichophyllum* ?

Krausei Ltz. *Moosst.* p. 163.

2? Ad rup. irror. — *Am. merid.* : Valdivia.

limbatulus C. M. — *Distichophyllum*.

limpidus (Thw. et Mitt.) Par.

Distichophyllum limpidum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 311.

Ster. — *As.* : Ceylan.

microcarpus (Hedw.) C. M. *Syn.* II, p. 20.

Distichophyllum microcarpum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 77.

Hypnum microcarpum Hedw. *Sp. M.* p. 214, t. 59.

H. microcranthum P. B. *Prodr.* p. 66.

Pterygophyllum microcarpum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 242.

2. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

Montagneanus C. M. — *Distichophyllum*.

mucronatus Jaeg. — *Distichophyllum*.

nanus Dz. et Mk. — *Distichophyllum*

obovatus Mitt. — *Distichophyllum*.

Palmarum (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 222.

Distichophyllum Palmarum Mitt. *op. cit.* p. 394.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

paradoxus C. M. — *Distichophyllum*.

parvulus W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 53.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

procumbens C. M. — *Distichophyllum Eremitae*.

pulchellus (Hook. f. et Wils.) Hpe. in C. M. *Syn.* II, p. 23.

Distichophyllum pulchellum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 77.

Hookeria pulchella H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 548 ; *Fl. Antarct. I*, p. 142, t. 62 ; *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 122, t. 92, f. 8 et *Handb.* p. 494.

Mniodictyon pulchellum W. P. Sch *herb.*

2. Ad rup. aquatic. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland, penins. Banks.

pungens (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 222.

Distichophyllum pungens Mitt. *M. austr. am.* p. 394.

1. Rupic. — *Am. merid.* And. Peruv.

pusillus (Mitt.) Jaeg. *l. c.*

Distichophyllum pusillum Mitt. *op. et l. cc.*

1. Ad filic. — *Am. merid.* : Nov. Granat.

quadrifarius (Hook.) C. M. *Syn.* II, p. 21.

Hookeria quadrifaria Hook. *M. ex.* t. 119 ; *Schwaegr. Suppl. II, II, I*, p. 32, t. 162.

Pterygophyllum quadrifarium Brid. *Bryol. univ.* II, p. 347.

2. Rupic. et terr. in silv. — *Pac.* : Nov. Zeland.

rotundifolius (Hook. f. et Wils.) C. M. *Syn.* II, p. 21.

Hookeria rotundifolia H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 122, t. 93, f. 1 et *Handb.* p. 493.

2. Lignic. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med.

semiserrulatus (Col.) Par.

Hookeria semiserrulata Colenso in *Trans. of the N. Zcal. Inst.* 1888, p. 45

— *Pac.* : Nov. Zeland.

sinuosus (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 224.

Distichophyllum sinuosum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 77.

Hookeria sinuosa H. f. et W. *Fl. Tasman. II*, p. 219, t. 177, f. 3 et *Handb* p. 494.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

spathulatus { C. M. — *Distichophyllum*.
Mitt. — *Distichophyllum Mittenii*.

succulentus Mitt. *M. Ind. or.* p. 145.

2? Ster. — *As.* : M. Neilgherr.

tortilis Jaeg. — *Distichophyllum*.

undulatus Jaeg. — *Distichophyllum*.

vitianus C. M. — *Distichophyllum*.

Wallisii C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

Ster. Filicie. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

wawreanus Reichdt. *Beitr.* p. 575.

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

Zürnii C. M. et Schlieph. mss.

— *Pac.* : Ins. Auckland. (1).

MNIOBRYUM W. P. Sch. in *Bryol. eur. conspect. subgen. Bryi* ;

Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 272, gen. propr.

Spec. omnes sunt WEBERÆ ejusd. nom.

MNIODENDRON Lindb. in *Oefv....* 1861, p. 375 (17 spec.).

aristinerve Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 322.

— *As.* : Borneo.

brevifolium Reichdt. in *Novara Exped. Bot.* p. 189, t. 34.

— *Pac.* : Ins. Soulou, Nov. Zeland.

camptotheca Duby in *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 213.

2. Terr. in silv. — *Pac.* : Nov. Caled. merid.

Colensoi Besch. - - Mn. comatum.

comatum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 620.

Hypnodendron Colensoi Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 90.

Hypnum comatum C. M. *Syn. II*, p. 692.

H. comosum Mossm. *M. Nov. Zeland. n.* 720.

Isothecium Colensoi H. f. et W. *Fl. Tasm. II*, p. 207, t. 176, f. I.

1. comatum Hook. f. *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 467.

Mn. *Colensoi* Besch. *Fl. bryol. N. Caled.* p. 244.

2. Ad arbor. et rup. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

(1) In Enum. Kindb. nomina nuda :

Mn. aristatus C. M.

Baileyi C. M.

bogotensis Hpe.

Mn. Hahnii C. M.

monofarius Geh. et Hpe.

nigricaulis Mitt.

comosum (*la Bill.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 619.

Bryum dendroides Sw. Meth. M. p. 34, t. 1, f. 2.

Hypnodendron comosum Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 20.

Hypnum comosum la Bill. Pl. Nov. Holl. II, p. 107, t. 253, f. 2; *C. M. Syn. II*, p. 503.

Isothecium comosum Brid. Bryol. univ. II, p. 374.

Mnium dendroides P. B. Prodr. p. 74.

2. Ad rup. aquat. — *Pac.* : Austral. or., Tasman., ins. Campbell.

deltoideum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 321.

Ster. — *As.* : Ceylan.

divaricatum (*Hsch. et Reinw.*) *Lindb. in Oefv....* 1861, p. 375; *Bryol. jav. II*, p. 136, t. 234 p.p.

Bryum ferrugineum Jungh. in Tijdschr. voor nat. Gesch. en Phys. 1840, p. 293.

Hypnum divaricatum Hsch. et Reinw. in Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. XIV. II, Suppl. p. 723, t. 40; *C. M. Syn. II*, p. 505.

2. — *As.* : Celebes, Borneo, Java, Sumatra. *Pac.* : Nov. Caled. ?

Hellwigii *Broth. in Engler's Bot. Jahrb. XVI*, p. 29.

2. — *Pac.* : Nov. Guinea.

humile *Lindb. in Bryol. jav. II*, p. 138, t. 235.

2. ♀ et fr. ign. — *As.* : Celebes.

Korthalsii (*Dz. et Mk.*) *Bryol. jav. II*, p. 139, t. 236.

Hypnum Korthalsii Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, *II*, p. 307; *C. M. Syn. II*, p. 497.

H. trismegistum Mont. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 633 et in *Ann. sc. nat.* 1845, *IV*, p. 87.

2. — *As.* : Japon., ins. Ceram, Batjan, M. Java, Sumatra.

kroneanum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 620.

Hypnum comosum C. M. Syn. II, p. 503 (*quoad loc. ins. Auckland*).

H. kroneanum ej. in Rev. Bryol. 1877, p. 53.

2? Ster. — *Pac.* : Ins. Auckland.

microloma *Mitt. mss.; Geh. in Fl.* 1886, n. 22.

— *Pac.* : Ins. Soulou.

Milnei *Mitt. in Proceed. of the Linn. Soc. of N. S. Wales*, 1882, p. 103.

Hypnodendron Milnei Mitt. Fl. Vit. p. 401.

Ster. — *Pac.* : Ins. Nov. Hebrid. (Aneitum.).

Sieberi (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 619.

Hypnodendron Sieberi Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 90.

Hypnum comosum Hsch. in Sieber M. Nov. Holl. n. 4.

H. Sieberi C. M. Syn. II, p. 504.

Isothecium Sieberi H. f. et W. Fl. Tasm. II, p. 296.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.), Nov. Zeland., ins. Auckland.

tahiticum *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc.*, p. 55.

2. Terr. — *Pac.* : Taïti.

Wallisii (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 621.

Hypnum Wallisii C. M. in *Linn.* 1874, p. 571.

2. — As.: M. ins. Philippin. (1).

MNIODICTYON W. P. Sch. *herb.*
pulchellum W. — Mniadelphus.

Mniolepidopilum C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35 (sect. LEPIDOPILI).

MNIOMALIA C. M. M. Polyn. p. 60 (4 spec.).

Bernouillii C. M. in *Forchungsreise... Bot.* p. 44 (nom.).

Ster. — Am. sept.: Guatemala.

Naumanni C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 84 et in *Forchungsreise... Bot.* p. 43.

Ster. — Pac.: Nov. Hannov.

semi-limbata (Mitt.) C. M. M. Polyn. p. 60.

Drepanophyllum semi-limbatum Mitt. *Sam. M.* p. 194, t. VI E.

Ster. — Pac.: Ins. Samoa.

viridis (Mitt.) C. M. *op. cit.* p. 61.

Drepanophyllum ramulinum Spr. *M. And. et Amaz.* n. 555.

Dr. viride Mitt. *M. austr. am.* p. 318.

Ster. — Am. merid.: And. Quitens., Brasil. aequin.

MNIOPSIS Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 94.

Plumula Mitt. — *Mittenia*.

MNIUM Dill., L. emend. (67 spec.).

aciculare Gmel. — *Rhacomitrium*.

acutum Lindb. — *Mn. Trichomanes*.

aculeatum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 167.

Mn. japonicum Lindb. (*fid. Besch.*).

2. — As.: Japon.

affine Bland. *M. exs. fasc. III*, n. 153; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 30), t. 397; C. M. *Syn. I*, p. 159; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 476.

Astrophyllum cuspidatum Lindb. *M. Scand.* p. 14.

Bryum aciphyllum Voit in *Sturm Deutsch. Fl. II*, p. 12 (*excl. var.*).

Bryum affine Brid. *Mant. M.* p. 119; *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 256.

Br. cuspidatum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 84.

Br. pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis Dill. *Hist. M.* p. 413, t. 53, f. 79 K. L. M.

Br. polymorphum Neck. *Meth. M.* p. 218.

Br. Polla affinis Brid. *Bryol. univ. I*, p. 704.

Br. Polla spinosa ej. *op. cit.* p. 701 p.p.

Hypnum aciphyllum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 295 p.p.

H. cuspidatum Schrank *Baïers Fl. II*, p. 471.

Mn. cuspidatum Neck. in *Act. Ac. Th. Palat. II*, p. 444.

Mn. cuspidatum β affine Roehl. *Deutsch. Fl. III*, p. 97.

Mn. cuspidatum β Hedw. *Sp. M.* p. 193, t. 45, f. 7.

Mn. serpyllifolium β *cuspidatum* L. *Sp. Pl.* p. 1577.

(1) In Enum. Kindb. nomen nudum:

Mn. brevifolium Mitt. (nom. mutandum; cf. n. 2).

Mn. serpyllifolium var. 2 *Scop. Fl. Carn. II ed., II, p. 314 p.p.*

Mn. serpyllifolium β *rotundifolium* *Lam. Fl. fr. I ed. I, p. 48.*

Muscus squamosus foliis latis subrotundis *Tournef.*

Polla affinis *Brid. op. cit. p. 817.*

P. spinosa *ej. op. et l. cc. p.p.*

2. In silvat. et dumet. ad terr. humidiusc. — *Eur.*: Reg. camp. et montana. *As.*: Japon., penins. Samojed., Jenissei, Obi, Ochotsk. *Caucas. occ. et or.* *Afr.*: Alger., Madeir., Teneriff. *Am. sept.*: Groenland, fret. Smith, Terr. nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Nov. Scot., Gaspes., Ontario, Manitoba, Columb. brit., Sitka, Washington, temperata tota.

Exs.: Faurie Pl. Japon. n. 165.

Mac. Canad. M. n. 193.

Rab. Bryoth. eur. n. 328.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 301.

Un. itin. 1867, n. 45.

var. *ciliare* C. M. — *Mnium ciliare*.

« var. *elatum* *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*

Astrophyllum Seligeri *Lindb. M. Scand p. 14.*

Mn. insigne *Mitt. in Hook. Journ. of bot. 1856, p. 230; Sull. Ic. M. Suppl. p. 53, t. 37.*

Mn. Seligeri *Jur. mss.*

In uligin. — *Eur.*: Passim; *Scandin.* *As.*: Japon., *Caucas. occ.*, *Syria. Am. sept.*: Ins. Miquelon, Ontario, Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Minnesota, Kansas, reg. occ.

Ex.: Drumm. M. bor. am. II ed. n. 79.

Faurie Pl. Japon. n. 175.

Mac. Canad. M. n. 194.

Rab. Bryoth. eur. n. 1120 a et b, 1283.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 302.

Un. itin. 1869, n. 44.

« var. *humile* *Milde Bryol. sil. p. 226.*

In silv. *Abiet.* — *Eur.*: Baden.

« var. *integrifolium* *Lindb. in Oefv.... 1867, n. 6.*

Mn. cuspidatum var. *integrifolium* *ej. de Mn. Europ. p. 65.*

— *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor., Alp. Scandin.; Silesia (♂).

« var. *intermedium* *Kindb. in Mac. Cat. p. 139.*

Mn. medium robustum *ej. in Bull. Torr. Bot. Club, XVII, p. 274.*

Ad terr. et rup. humid. — ~~Eur.~~: New Brunswick, Columb. brit., ins. Vancouver.

var. *medium* *Husn.* — *Mnium medium*.

« var. *rugicum* *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*

Astrophyllum rugicum *Kindb. Arten Laubm. Schwed. und Norweg. p. 61.*

Mn. insigne β *pumilum* *Lindb. de Mn. Europ. p. 66.*

Mn. paludosum *Warnst. Moosfl. Prov. Brandenb. p. 56.*

Mn. rugicum *Laur. in Bot. Zeit. 1827, I, p. 292.*

Loc. siccior. frigidior. — *Eur.*: Passim. *Am. sept.*: Fret. Smith, Ontario, temperat.

Exs.: Drumm. M. bor. am. II ed. n. 80.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 303.

affine Sull. — *Mn. Drummondii*.

albicans Wahlenb. -- Webera.

alpinum L. jun. — Bryum.

ambiguum H. Müll. — Mn. riparium.

annotinum L. — Webera.

androgynum L. — Aulacomnium.

angustifolium Neck. — Aulacomnium androgynum.

arcuatum Broth. *Enum. M. Caucas. p. 12.*

— As. : Japon.

arcuatum Dicks. — Breutelia.

argenteum Hoffm. — Bryum.

Arrhenopterum Sm. p. p. } — Aulacomnium heterostichum.
— Aulacomnium turgidum.

Auberti Schwaegr. — Bryum.

aureum P. B. — Hookeria.

β *majus* Web. — Webera nutans.

australe Besch. — Mn. undulatum var. australe.

Beyrichianum Hsch. — Rhodobryum.

bicolor P. B. — Bryum atro-purpureum.

bifarium C. M. — Rhizogonium.

Blyttii Bryol. eur. — Mn. stellare.

caespiticium Brid. — Bryum.

capillaceum L. — Distichium.

capillare L. — Bryum.

carneum L. jun. — Webera.

chloroloma C. M. in *Linn. p. 1880-83, p. 360.*

— Am. merid. : Argentin. subtropic.

chrysocomum Hedw. — Breutelia arcuata.

ciliare W. P. Sch. op. cit. p. 477.

Astrophyllum ciliare Lindb. *M. Scand. p. 14.*

Bryum ciliare Grev. in *Ann. of the Lye. Nov. Eborac. 1825, p. 275, t. 23.*

Mn. affine var. *ciliare* C. M. *Syn. I, p. 159.*

Mn. cuspidatum γ *ciliare* Lindb. *de Mn. Europ. p. 65.*

2. Ad terr. arenos. humid. — Eur. : Suecia. As. : Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Montreal, Albany (*fid. C. M.*), Tennessee (*fid. W. P. Sch.*) (1).

cinclidioides Blytt in *Hüb. Musc. germ. p. 416; Bryol. eur. IV (mon. p. 34), t. 402; W. P. Sch. op. cit. p. 488.*

Astrophyllum cinclidioides Lindb. *M. Scand. p. 13.*

Bryum cinclidioides C. M. *Syn. I, p. 250.*

2. In prat. udis et in palud. profund. — Eur. : Scandin. Dania, Scot., Angl., Silva nigra, Borussia. occ., Hassia, Saxon., Alp. Stir., Salisb., Engad., M. Cenis. As. : Jenissei, Obi. Am. sept. : Groenland, New Brunswick, Nov. Angl., Ontario, ins. Vancouver.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 436 a et b, 1019.*

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. p. 295.*

Un. itin. 1867, n. 77.

cirratum L. — Dicranoweisia.

Commersonii Schwaegr. — Rhodobryum.

(1) Nec in Lesq. et Jam. Man., nec in Mac. Cat. indicatum.

confertidens (Lindb. et Arn.) Par.

Astrophyllum confertidens L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 17 (1).

— As. : Jenissei.

conoideum Sm. — *Zygodon*.

coriaceum Griff. Not. p. 445 et Ic. pl. asiat. II, t. 91, f. 3; Mitt. M. Ind. or. p. 143.

Syn. Rupic. — As. : Khasia.

crispatum W. P. Sch. — *Rhizogonium microphyllum*.

crispum Mitt. — *Orthomnium*.

crudum { Hedw. — *Webera*.
Lightf. — *Mn. serratum*.

curvatulum (Lindb.) Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 477.

Astrophyllum curvatulum Lindb. M. Scand. p. 14 et in Mitth. v. Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 1881, 2 a April (2).

A. medium subsp. *curvatulum* Kindb. Arten d. Laubm. Schwed. und Norw. p. 60.

— Eur. : Lappon. Lul. As. : Jenissei inf.

cuspidatum Hedw. Sp. M. p. 192, t. 45, ff. 5-7 (excl. v. β); Bryol. eur. IV (mon. p. 29), t. 396; C. M. Syn. I, p. 160; W. P. Sch. op. cit. p. 475.

Astrophyllum silvaticum Lindb. M. Scand. p. 14.

Bryum aciphyllum var. *Voit* in Sturm Deutsch. Fl. II, p. 12.

Br. *cuspidatum* Turn. M. Hibern. Spic. p. 131.

Br. *pendulum*, foliis variis pellucidis, thecis ovatis Dill. Hist. M. p. 413, t. 53, f. 79 A. B. C.

Br. *serpyllifolium* var. γ Huds. Fl. Angl. p. 492.

Br. *Polla cuspidata* Brid. Bryol. univ. I, p. 702.

Hypnum aciphyllum W. et M. Böt. Taschb. p. 295 (excl. syn. Mn. affine Bland.).

Mn. *serpyllifolium* var. *cuspidatum* L. Sp. pl. I ed., II, p. 1113; Lam. Fl. fr. I ed., I, p. 40.

Mn. *silvaticum* Lindb. de Mn. Europ. p. 59.

Polla cuspidata Brid. op. cit. p. 817.

Syn. Lignic., rupic. et terr. in silvat. — Per tot. orb. terr. (C. M.),

Eur. : Vulgatiss. As. : Japon., Amour, Jenissei, Obi, Talysch.

Himalaya occ., Caucas. occ. et centr. Am. sept. : Terr. nov., ins.

Miquelon, de New Brunswick ad Columb. brit., temperat. tota.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 833, 3513.

Mac. Canad. M. n. 189.

Rab. Bryoth. eur. n. 102, 435 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 300.

var. β Hedw. — Mn. affine.

var. *affine* Roëhl. — Mn. affine.

var. *ciliare* Lindb. — Mn. *ciliare*.

var. *integrifolium* Lindb. — Mn. affine var. *integrifolium*.

* var. *tenellum* Kindb. in Mac. Cat. p. 136.

Terr. — Am. sept. : New Brunswick.

cuspidatum { Neck. — Mn. affine.

{ Wils. — Mn. *Trichomanes*.

cyclophyllum Schwaegr. — *Bryum*.

cylindricum { Hoffm. — *Mnium rostratum*.

{ Hsch. — *Mnium*? (Cf. Brid. Bryol. univ. I, p. 172).

(1) Ut videtur subsp. *Mn. undulati*.

(2) * Forsan *M. medio* nimis aff. » Lindb.

- decrescens* W. P. Sch. in *Savatier M. Japon. n. 476 a*; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 344.
 Ster. — As. : Japon.
- decurrens* C. M. et *Kindb. in Bidr. p. 455 (nom.) et in Mac. Cat. p. 140.*
 2. *Rupic.* — Am. sept. : Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 517.
- dendroides* P. B. — *Mniodendron comosum.*
- dichotomum* P. B. — *Bryum.*
- dilatatum* Wils. in *Kew Journ. bot. IX, p. 368*; *Mitt. M. Ind. or. p. 143.*
 — As. : Khasia.
- dimorphum* C. M. in *Linn. 1878-79, p. 467.*
 2. — Am. merid. : Venezuela.
- distichum* C. M. — *Rhizogonium.*
- domingense* Brid. — *Rhodobryum Antillarum.*
- Drummondii* Br. et Sch. in *Lond. Journ. of bot. 1843, II, p. 440*; C. M. *Syn. I, p. 157*; W. P. Sch. *op. cit. p. 478*; *Sull. M. of U. St. p. 47 et Ic. M. p. 83, t. 51.*
Astrophyllum Drummondii Lindb. M. Scand. p. 14.
Bryum affine Wils. in Hook. Journ. bot. 1841, p. 440.
Br. spinosum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 257 (cum Mn. spinuloso).
Mn. affine Sull. M. Allegh. p. 26, n. 92 p.p.
Syn., rar. I. Terr. in silv. humid. — Eur. : Karelia rossica, Livon., Siles. super. As. : Jenissei. Am. sept. : New Brunswick, Nov. Scot., Gaspes., Ontario, Manitoba, M. Rupestr., Columb. brit., Oregon, M. Alb., New Hampshire, reg. sept. et or.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 191.
Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 199 et II ed. n. 299.
- Duvalii* Schwaegr. — *Bryum.*
- Eckloni* C. M. in *Bot. Zeit. 1855, p. 749.*
Syn. — Afr. : C. B. Sp., Natal.
Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 261.
- ellipticum* { *Brid. — Mn. punctatum.*
 { *Hoffm. — Mn. rostratum.*
- erythrocaulon* Schwaegr. — *Rhodobryum.*
- extinctorium* L. f. — *Eucalypta vulgaris.*
- fasciculare* Funk. — *Aulacomnium palustre var. fasciculare.*
- Fillionii* Saut. — *Mn. serratum var. Fillionii.*
- flagellare* Lindb. — *Rhizogonium.*
- fontanum* L. — *Philonotis.*
- giganteum* { *Schwaegr. — Distichophyllum Freycineti.*
 { *Schwaegr. p.p. — Rhodobryum truncorum.*
- glabrescens* *Kindb. ined.*
 — Am. sept. : Columb. brit., Alaska, Sitka, Vancouver.
- glaciale* Schleich. — *Webera albicans var. glacialis.*
- glaucum* Gmel. — *Leucobryum.*
- gracile* { *Funk. — Bartramia (Ederi.*
 { *Schleich. — Bryum pallens.*
- Græffeanum* C. M. — *Rhizogonium.*
- grandifolium* Tayl. p.p. { — *Rhodobryum Antillarum.*
 { — *Rhodobryum.*
- heteromallum* Gmel. — *Dicranella.*

heterophyllum (*Hook.*) *Schwaeagr. Suppl. II, II, p. 22, t. 159; C. M. Syn. I, p. 164; Mitt. op. cit. p. 143.*

Astrophyllum heterophyllum Lindb. in Notiz... IX, p. 52.

Bryum heterophyllum Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 318, t. 27, f. 4 et Ic. pl. var. t. 20, f. 2.

Br. Polla heterophylla Brid Bryol. univ. I, pp. 690 et 853.

2. — *As. : Caucas. occ. et centr., Nepal., Himalaya. Am. sept. : (Fid. Bryol. Eur. IV, mon. p. 24 sin. loc.).*

heterostichum *Brid. — Aulacomnium.*

var. *humilis* *C. M. — Aulacomnium heterostichum var. humilis.*

Hildebrandtii C. M. in Hildebr. M. Mad. n. 2109.

— *Afr. : Madagascar centr.*

Hookeri C. M. — Rhizogonium.

hornum L. Sp. pl. ed. II, p. 112; Hedw. Sp. M. p. 188; Bryol. eur. IV (mon. p. 22), t. 390; C. M. Syn. I, p. 165; W. P. Sch. op. cit. p. 491.

Astrophyllum hornum Lindb. M. Scand. p. 14.

Bryum hornum Huds. Fl. Angl. I ed., p. 415.

Br. stellare hornum silvarum, capsulis magnis nutantibus Dill. Hist. M. p. 402, t. 51, f. 71.

Br. stellatum Lam. et DC. Fl. fr. III ed., II, p. 507.

Br. Polla herna Brid. Bryol. univ. I, p. 695.

Hypnum hornum W. et M. Bot. Taschb. p. 293.

Mn. hornum var. sublaeve Milde in Flora, 1870 (♂ Mn. horni).

Mn. hornum α serratifolium Weiss Pl. crypt. fl. Goett. p. 149.

Mn. stellatum Lam. Fl. fr. I ed., p. 39.

Polla herna Brid. op. cit. p. 817.

2. *Ad rup. et terr. humid. in silv. — Eur. : Reg. campestr., præcip. arenac. et granitic. Afr. : Alger. Am. sept. : Terr. nov., ins. Miquelon, Anticosti, Nov. Scotia, New Brunswick, Ontario, M. Nov. Angliae, Pensilv., Carol. sept.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 195.

Rab. Bryoth. eur. n. 38 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 296.

Un. itin. 1867, n. 43.

var. *integrifolium* }
var. *serratifolium* } *Weiss. ? (1).*

hygrometricum L. — Funaria.

hymenophylloides Hüb. Muscol. germ. p. 416; Bryol. eur. IV (mon. p. 37), t. 399; C. M. Syn. I, p. 156; W. P. Sch. op. cit. p. 490.

Astrophyllum hymenophylloides Lindb. M. Scand. p. 14.

Bryum hymenophylloides Hartm. Skand. Fl. III ed., p. 292.

2. ♂ et fr. ign. *Ad terr. et ad rup. humid. — Eur. : Norveg., Alp. Carinth., Stir., Tirol., Rhœt., Helvet. As. : Jenissei. Am. sept. : Groenland, Labrador, New York, M. Rupestr.*

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 978.

Un. itin. 1863, n. 26.

hymenophyllum Bryol. eur. IV (mon. p. 5), t. 399; C. M. Syn. I, p. 157.

Cinclidium ? hymenophyllum Lindb. de Mn. Eur. p. 75.

2. ♀ et fr. ign. *Ad terr. et in rup. fissur. — Eur. : Spitzberg, Norveg., Lapon. As. : Jenissei inf. Am. sept. : Groenland, Labrador, Nov. Scot., M. Rupestr.*

Exs. : Un. itin. 1867, n. 41, 42.

(1) Cf. *Brid. Sp. M. III, p. 48 in obs.*

immarginatum (Lindb.) Broth. *Enum. M. Caucas.* p. 12.

Astrophyllum immarginatum Lindb. *in sched.*

2. Fr. ign. — As. : Caucas.

inclinatum Lindb. *de Mn. Europ.* p. 48 (1).

Astrophyllum inclinatum Lindb. *M. Scand.* p. 14.

A. orthorhynchum var. *inclinatum* Kindb. *Art. d. Laubm. Schwed. und Norw.*, p. 62.

Bryum marginatum var. *Drumm.* *M. bor. am. I ed.* n. 259.

Mn. orthorhynchum var. *tenellum* W. P. Sch. *op. et l. cc.*

2. Ad arb. et rup. — Eur. : Lapon. Pitens., Norveg. Am. sept. : Ontario, M. Rupestr., Columb. brit.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 551.

inordinatum Brid. — *Aulacomnium palustre*.

insigne Mitt. — *Mn. affine* var. *elatum*.

var. *pumilum* Lindb. — *Mn. affine* var. *rugicum*.

integrifolium Brid. — ? (2).

integrum *Bryol. jav. I*, p. 153, t. 122.

2. Arbor. et aquat. — As. : Japon., Sumatra.

intermedium Ludw. — *Bryum intermedium*.

var. *Roehl.* — *Br. inclinatum*.

japonicum Lindb. *in Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 226.

Mn. aculeatum Mitt. (*fid. Besch.*).

2. — As. : Japon. (ins. Nippon).

Exs. : Faurie n. 405, 408.

japonicum W. P. Sch. — *Mn. trichomanes*.

kilima n'djaricum C. M. *in Fl.* 1888, p. 407.

Mn. rostratum Mitt. *in Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 307.

Ster. In gramin. — Afr. : Kilima N'Djaro.

lacustre Bland. — *Bryum*.

lanatum P. B. — *Bryum argenteum* var. *lanatum*.

laterale Hoffm. — *Bartramia Halleriana*.

latifolium { Gmel. — *Desmatodon*.

{ Schwaegr. — *Bryum Schleicheri* var. *latifolium*.

ligulatum Brid. — *Mn. undulatum*.

Lindigii Hpe. — *Rhizogonium*.

longirostrum Brid. — *Mn. rostratum*.

lucidum Dna E. G. Britt. *in Bull. of Torr. bot. Club*, 1890, p. 2.

Br. simplex Kindb

Mn. Roellii Broth. *in Bot. Centralbl.* 1890, n. 52.

Mn. simplex Kindb. *in Rev. bryol.* 1895, p. 22.

2. Ad rivul. glacial. — Am. sept. : Washington, Oregon.

lycopodioides (Hook.) Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 24, t. 160; *Bryol. eur.*

IV (mon. p.), t. 392; C. M. *Syn. I*, p. 164 et *II*, p. 554; W. P.

Sch. *op. cit.* p. 484.

Astrophyllum lycopodioides Lindb. *M. Scand.* p. 14.

Bryum lycopodioides Hook. *in Lond. Journ. of bot.* 1840, *II*, p. 11.

Br. Polla lycopodioides Brid. *Bryol. univ. I*, p. 853.

Mn. orthorhynchum var. *lycopodioides* Husn. *Muscol. gall.* p. 255.

(1) Cf. Philibert *in Rev. bryol.* 1895, p. 76.

(2) Cf. Brid. *Sp. M. III*, p. 48 in obs.

Polla lycopodioides Brid. *op. cit.* II, p. 817.

2. In silv. acer. — *Eur.* : Fennia, Alp. Salisburg., Julian., Helvet.;
Pyr. As. : Nepal.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 248.

lycopodioides { Lesq. et Jam. — Mn. pseudo-lycopodioides.
Mitt. p.p. — Mn. Thomsoni.

macro-ciliare C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 455 (nom.).

Syn. Rupic. et ad terr. humid. — *Am. sept.* : Ontario, Columb. brit.

madagascariense Kiaër in *Borgen M. Mad.* n. 16.

— *Afr.* : Madagascar centr.

magnirete (Lindb. et Arn.) Par.

Astrophyllum magnirete L. et A. M. As. bor. II, p. 21.

2. — As. : Ienissei infer.

majus { ramis longioribus bifurcatis Dill. — *Aulacomnium palustre*.
minus ramosum, capitulis pulverulentis crebrioribus Dill. —
Aulacomnium palustre var. *polycephalum*.

marchicum Hedw. — *Philonotis*.

marginatum P. B. — Mn. serratum.

var. *apiculatum* Lindb. — Mn. serratum var. *apiculatum*.

var. *integrifolium* Lesq. — Mn. serratum var. *integrifolium*.

var. *riparium* Husn. — Mn. *riparium*.

Maximoviczii Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 224.

2. — As. : Japon. (ins. Nippon).

medium Bryol. eur. IV (mon. p. 32), t. 398 ; C. M. Syn. I, p. 160 et II,
p. 554 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 477.

Astrophyllum medium Lindb. M. Scand. p. 14.

Mn affine var. *medium* Husn. *Muscol. gall.* p. 254.

Syn. In uligin. et ad scaturig. silv. — *Eur.* : Spitzberg, Suecia, M.
Pinifer, Bohem., Morav., Hercyn., Stir., Salisb., Tirol., Voges.,
Helvet., Alp. Jurass., Pyr., etc. As. : Jenissei, Sikkim, Caucas.
occ. et or. *Am. sept.* : New Brunswick, Massachussets, New York,
New Jersey, M. Wasatch, Idaho, Oregon, Washington, ins. Van-
couver, Columb. brit.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1166.

medium * *robustum* Kindb. — Mn. *insigne* var. *intermedium*.

megapolitanum { Gmel. — *Timmia*.
P. B. — *Timmia austriaca*.

membranaceum Brid. — *Aulacomnium heterostichum* var. *humile*.

Menziesii C. M. — *Rhizogonium*.

microphyllum Dz. et Mk. — *Rhizogonium*.

minutulum Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 346.

2? — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 3515 p.p.

murale L. jun. — *Barbula*.

Neevii C. M. — Mn. *venustum*.

Niagarae Kindb. in *Mac. Cat.* p. 141.

Syn. Terr. — *Am. sept.* : Niagara.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 581.

Nietneri C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 32.

Mn. *rhynchophorum* Mitt. M. Ind. or. *quoad* pl. *Ceylan.* ? (fid. C. M. l. c.).

Syn. — As. : Ceylan.

nigricans Brid. — *Bryum turbinatum*.

Novae Hollandiae C. M. — *Rhizogonium*.

Novae Vallesiae C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).

Mn. rostratum (*fid. Mitt.*).

— *Pac.*: Austral. or. (Nov. Valles.).

nutans P. B. — Webera.

orthorhynchum *Bryol. eur. IV* (mon p. 25), t. 391; *C. M. Syn. I*, p. 163.

Astrophyllum orthorhynchum Lindb. *M. Scand.* p. 14.

Bryum marginatum β *orthorhynchum* Hartm. Skand. Fl. IV ed., p. 405.

Br. serratum Schrad. *Spic. fl. germ.* I, p. 71?

Br. Polla orthorhyncha Brid. Bryol. univ. I, p. 691 (fid. Limpr.).

Mn. serratum Schrad. in Gmel. Syst. nat. XIII ed., II, II, p. 1330 ?

Mn. serratum * orthorhynchum Hartm. Skand. Fl. V ed., p. 345.

Mn. serratum penninum de Not. Syll. n. 175.

Mn. serratum β tenerius *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 129, t. 78.*

2. Ad terr. silvat. et in fissur. rup. — *Eur.* : E reg. subalp. inf usq. in reg. alp. sup. ; Spitzberg ; Britann. (ster.). *As.* : Japon., Jenissei med., Saghalien, Tibet occ., Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Pensilv., M. Rupestr., Columb. brit., Colorado.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 219.

Mac. Canad. M. n. 479 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 39.

Un. itin. 1867, n. 46.

^a var. nivale Pfeff. Bryol. Stud. p. 61.

In fiss. rup. schist. — *Eur.* : Helvet.

orthorhynchum { Brid. — *Atrichum tenellum*.
Lindb. — *Mn. riparium*.
Mac. p.p. { — *Mn. lycopodioides*.
 { — *Mn. stellare*.

var. *lycopodioides* Husn. — Mn. *lycopodioides*.

var. *tenellum* W. P. Sch. — Mn. *inclinatum*.

osmundaceum Dicks. — *Schistostega*.

pallens P. B. — Bryum.

palmifolium P. B. — Conomitrium.

paludosum Warnst. in *Abhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb.* 1885.
— *Eur.* : Borussia (Brandenb.).

paludosum } L. jun. — Seligeria pusilla.
palustre } Warnst. — Mn. affine var. rugicum.

palustre L. — Aulacomnium.

var. *fasciculare* C. M. — *Aulacomnium palustre* var. *fasciculare*.

var. *flagelliferum* Mart. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum*.

var. *imbricatum* C. M. — *Aulacomnium palustre* var. *imbricatum*.

var. *majus* Schwaegr. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum*.

var. *polycephalum* C. M. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum*.

papillosum C. M. — *Aulacomnium*.

paramattense C. M. — Rhizogonium.

1. Lignia. *Parvulum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 168.*

1. Lignic. — As. : Simla.

pellucens Gmel. — *Dichodontium pellucidum*.
pellucidum L.

pellucidum L. — *Tetraphis*.
pendulum S.

pendulum Sm. — Breutelia.

pensilvanicum Brid. — Mn. serratum var. apiculatum?

perangustis et brevibus foliis Dill. — *Aulacomnium andrhumogon*,
piriforme L. — *Leptobryum*.

Pohlia Hffm. — *Webera elongata*.

polycephalum Brid. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum*.

polycarpum C. M. — *Rhizogonium mnioides*.

polytrichoides L.

var. α L. — *Pogonatum nanum*.

var. β L. — *Pogonatum aloides*.

var. γ L. — *Pogonatum pensilvanicum*.

var. *longifructu* Ehrh. — *Pogonatum aloides*.

var. *rotundifructu* Ehr. — *Pogonatum nanum*.

ponaiforme L. jun. — *Bartramia*.

piliferum Gmel. — *Rhodobryum roseum*.

prolixum Neck. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum*.

pseudo-lycopodioides C. M. et Kindb. in *Bidr.* 455 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 140.

Mn. *lycopodioides* Lesq. et Jam. Man. p. 246; Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 298.

Mn. *orthorhynchum* Mac. Canad. M. n. 471.

2. Ad terr. et rad. arbor. — Am. sept.: Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., M. Rupestr., Columb. brit., Nov. Angl., reg. or.

pseudo-punctatum Br. et Sch. — Mn. *subglobosum*.

pseudo-triquetrum Hedw. — *Bryum*.

pulchellum P. B. — *Webera*.

punctatum Hedw. Sp. M. p. 193; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 19), t. 387; C. M. Syn. I, p. 155; W. P. Sch l. c. p. 489.

Astrophyllum punctatum Lindb. M. Scand. p. 14.

Bryum ellipticum Brid. Mant. M. p. 119.

Br. *pendulum serpylli folio rotundiore pellucido, thecis ovatis* Dill. Hist. M. p. 416, t. 53, f. 81 A-D.

Bryum punctatum Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 85; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 253, 254 et 272 p.p.

Br. *serpyllifolium* Neck. Meth. M. p. 216.

Br. *serpyllifolium* α *punctatum* Huds. Fl. angl. I ed. p. 417.

Br. *Polla elliptica* Brid. Bryol. univ. I, p. 765.

Br. *Polla punctata* ej. op. cit. p. 706.

Hypnum punctatum Schrank Prim. Fl. Salisb. n. 847.

Mn. *ellipticum* Brid. Sp. M. III, p. 53.

Mn. *reticulatum* Mitt. (p. Besch.).

M. *serpyllifolium* Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. II, p. 444.

M. *serpyllifolium* α *punctatum* L. Sp. pl. I ed. p. 1113.

Polla punctata Brid. Bryol. univ. II, p. 817.

2. Ad rup. humid. et secus riv.: calcar. fugit. — Eur.: Reg. campestr. montos., rar. alp. As.: Japon., Saghalien, Amour, Jenissei, Obi, Sikkim, Caucas. Afr.: Temperat. (?); litt. oce. mar. Erythr. Am. sept.: Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquelon, Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, Unalaska, Sitka, ins. Vancouver, ins. reg. Charlotte, Washington, reg. sept. et or.

Exs.: Faurie Pl. Japon. n. 106, 830.

Mac. Canad. M. n. 200.

Rab. Bryoth. eur. n. 327 a et b.

Savatier Pl. Japon. n. 489, 518.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 294.

Un. itin. 1864, n. 66.

var. 2 With. — Mn. *rostratum*.

- « *var. elatum* W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 398 et II ed. l. c.*
 In uligin. — *Eur* : Passim. *Am. sept.* : Ins. Miquelon, etc.
var. subglobosum Hpe. — *Mn. subglobosum*.

punctulatum Brid. — *Barbula robusta*.

purpureum L. — *Ceratodon*.

pusillum Gmel. — *Dicranella cerviculata var. pusilla*.

radiatum Wils. — *Rhizogonium microphyllum*.

ramis brevibus inordinate progredientibus Dill. — *Aulacomnium palustre*.

ramosum } Hook. — *Mn. rostratum var. ramosum*.

 } Huds. — *Aulacomnium palustre var. polycephalum*.

reclinatum Sm. — *Aulacomnium palustre*.

reticulatum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 168.

Mn. punctatum Hedw. (*fid. Besch*).

2. — *As.* : Japon.

rhynchophorum { Hook. — *Mn. rostratum var. rhynchophorum*.
 Mitt. — *Mn. Nietneri*?
 Wils. p.p. — *Mn. succulentum*.

rigidum Hsch. — *Rhodobryum*.

riparium Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 30 (*in obs.*); W. P. Sch. *op. cit.* p. 484.

Astrophyllum riparium Lindb. *M. Scand.* p. 14.

Mn. ambiguum H. Müll. in *Verh. d. Naturalist. Ver. d. Rheinl. und Westfal.* : *Milde Bryol. sil.* p. 229.

Mn. marginatum var. riparium Husn. *Muscol. gall.* p. 256.

Mn. orthorhynchum Lindb. in *Oefv.*, 1861, p. 276.

Mn. serratum var. dioicum H. Müll. *Westfal. Laubm.* n. 323.

2. Ad rivul. — *Eur.* : Angl., Belg., Westphal., Bhoengeb., Neomarch., Morav., Saxon., Austria inf., Stir., Salisb., Hungar., Tirol., Helvet., etc. *As.* : *Jenissei med.*, *Caucas. centr.*

rhynchomitrium C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 58.

Terr. — *Am. merid.* : *Brasil. austr. or.*

Roelli Broth. — *Mn. lucidum*.

roseum Hedw. — *Rhodobryum*.

rostratum (Schrad.) Schwaegr. *Suppl. I, II, p. 136, t. 79; Bryol. eur. IV (mon. p. 27), t. 395; C. M. Syn. I, p. 158 et II, p. 554.*

Astrophyllum rostratum Lindb. *M. Scand.* p. 13.

Bryum longirostrum Brid. *Mant. M.* p. 119.

Br. pendulum serpylli folio longiore pellucido, thecis oblongis cuspidatis Dill. *Hist. M.* p. 415, t. 53, f. 80, A. B. C.

Br. punctatum var. 2 Hull *Brit. Fl. II, p. 166.*

Br. rostratum Schrad. *Spic. fl. germ.* p. 72.

Br. serpyllifolium β Huds. *Fl. Angl.* p. 492.

Br. Polla rostrata Brid. *Bryol. univ. I, p. 700.*

Hypnum rostratum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 296.

Mn. cylindricum Hoffm. *Deutsch. Fl.* p. 52.

Mn. ellipticum ej. l. c.

Mn. longirostrum Brid. *Sp. M. III, p. 51.*

Mn. punctatum var. 2 With. *Bot. arrang. brit. pl. IV ed., III, p. 806.*

Mn. serpyllifolium β *rostratum* Wahlenb. *Fl. Suec. I ed., p. 723.*

Polla rostrata Brid. *Bryol. univ. II, p. 817.*

Syn. In umbros. ad sax. humida et in mur. delaps. musc. per omn. terr. orb. tam frigidior. quam calidiss.

Exs. : Mac. Canad. M. p. 192.
 Mandon Pl. Boliv. n. 1668.
 Rab. Bryoth. eur. n. 250.
 Savatier Pl. Japon. n. 486.

« *var. americanum* Hpe. *Symb.* 1874, p. 500.

Mn. rostratum Mitt. *M. austr. am.* p. 319.

Terr. et lignic. — *Am. sept.* : *Æquinort.* *Am. merid.* : Venezuela,
 And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil.

« *var. ramosum* C. M. l. c.

Br. ramosum Mitt. *M. Ind. or.* p. 75.

Br. neelgheriense Mont. (*fid. Mitt. l. c.*).

Br. truncorum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 366.

Mn. ramosum Hook. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 11 et *Ic. pl.*
var. t. 20, f. 2.

— *As.* : Nepal., M. Neilgherr. (?), Ceylan.

« *var. rhynchophorum* C. M. l. c.

Bryum longirostrum Griff. *Not.* p. 447 et *Ic. pl. asiat.* II, t. 91, f. 2.

Mn. rhynchophorum Hook. l. c. f. 3.

Mn. rhynchophorum var. minutum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot.*
Belg. 1895, I, p. 63 (*forma minor*).

— *As.* : Nepal., Himalaya, Khasia, M. Neilgherr.,
 Ceylan, Penang, Yunnan. *Pac.* : Nov. Zeland.

var. spinosum Roehl. — *Mn. spinosum*.

rostratum { Mitt. } — *Mn. rostratum var. americanum*,
 { Wils. } — *Mn. kilima n'djaricum* ?
 — *Mn. Trichomanes*.

rubellum P. B. — *Webera carnea*.

rugicum Laur. — *Mn. affine var. rugicum*.

rurale L. jun. — *Barbula ruralis*.

sapporense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 345.

2. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 172.

saxicolum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 42.

— *Afr.* : M. Cameroon.

schistoneuron Kze. — *Rhodobryum gracilescens*.

Schleicheri Brid. — *Bryum*.

scoparium Gmel. — *Dicranum*.

Seligeri Jur. — *Mn. affine var. elatum*.

serpyllifolium Neck. — *Mn. punctatum*.

var. cuspidatum Lam. { — *Mn. punctatum*,
 { — *Mn. affine*.

var. punctatum L. — *Mn. punctatum*.

var. rostratum Wahlenb. — *Mn. rostratum*.

var. rotundifolium Lam. — *Mn. affine*.

var. undulatum Lam. — *Mn. undulatum*.

var. 2 Scop. — *Mn. affine*.

serpylli foliis tenuibus pellucidis Dill. { — *Mn. stellare* (*fid. Limpr.*),
 { — *Tetraphis pellucida* (*fid. C.M.*).

serratum Schrad. in *Gmel. Syst. nat.* XIII ed., II, II, p. 1330; Brid.
Sp. M. II, p. 44; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 24), t. 391; *C. M. Syn.* I,
 p. 153; *W. P. Sch. op. cit.* p. 481.

Astrophyllum marginatum Lindb. *M. Scand.* p. 14.

Bryum marginatum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 9, t. 5, f. I.

Br. serratum Schrad. *Spic. Fl. germ.* p. 71 ex p. ?

- Br. Polla serrata *Brid. Bryol. univ. I, p. 689.*
 Hypnum marginatum *W. et M. Bot. Taschb. p. 292.*
 H. serratum *W. et M. Ind. Mus. pl. crypt. (1803).*
 Mn. crudum *Lightf. Fl. Scot. II, p. 712.*
 Mn. marginatum *P. B. Prodr. p. 75.*
 Syn. Ad terr. lapid. et in rup. fiss. in dumet. — *Eur.*: Passim; Spitzberg. *As.*: Jenissei, Obi, Sikkim, Khasia, Caucas. *Am. sept.*: Anticosti, Gaspes., Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Wyoming, reg. sept. et or.
Exs.: Mac. Canad. M. n. 196.
 Rab. Bryoth. eur. n. 536, 1167.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 297.
- « *var. apiculatum (Lindb.) Par.*
 Bryum pensilvanicum *Brid. Mant. M. p. 119?*
 Br. Polla serrata *var. pensilvanica ej. Bryol. univ. I, p. 690?*
 Mn. marginatum *var. apiculatum Lindb. de Mn. Europ. p. 47.*
 Mn. pensilvanicum *Brid. Sp. M. III, p. 45?*
 — *Eur.*: Suecia. *Am. sept.*: Pensilv.?
- var. dioicum C. M. — Mn. riparium.*
- « *var. Fillionii (Saut.) Pfeff. Bryol. Stud. p. 60.*
 Mn. Fillionii *Sauter in Fl. 1867, p. 475.*
 Ut typ. — *Eur.*: Helvet., Rhaet.
- « *var. integrifolium (Lindb.) Par.*
 Mn. marginatum *var. integrifolium Lindb. l. c.*
 — *Eur.*: Suecia.
- « *var. Macounii Kindb. in Mac. Cat. p. 139.*
 — *Am. sept.*: New Brunswick.
- « *var. orthorhynchum* } *Hartm. — Mn. orthorhynchum.*
 } *Hüb. — Atrichum tenellum.*
var. penninum de Not. — Mn. orthorhynchum.
var. tenerius Schwaegr. — Mn. orthorhynchum.
- setaceum* } *Ehrh. — Barbula convoluta.*
 } *L. — Trematodon ambiguus.*
- setosum C. M. — Rhizogonium.*
silvaticum Lindb. — Mn. cuspidatum.
simplex Kindb. — Mn. lucidum.
- spathulatum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 166.*
 2. — *As.*: Japon.
- spathulatum Hsch. — Rhodobryum umbraculum.*
speciosissimum W. P. Sch. — Mn. speciosum.
- speciosum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 166.*
 Mn. speciosissimum *W. P. Sch. in Savatier M. Japon. n. 516, 948, 2430*
 — *As.*: Japon.
- sphaericarpum Hedw. — Philonotis.*
sphaericum Sw. — Philonotis sphaericarpa.
spiniforme C. M. — Rhizogonium.
- spinosum (Voit) Schwaegr. Suppl. I, II, p. 130, t. 78; Bryol. eur. IV*
(mon. p. 26), t. 393; C. M. Syn. I, p. 162 et II, p. 554; W. P. Sch. op.
cit. p. 483.
Astrophyllum spinosum Lindb. M. Scand. p. 14.
Bryum spinosum Voit in Sturm Fl. germ. crypt. XI, t. 16.
 Br. Polla spinosa *Brid. Bryol. univ. I, p. 701 p.p.*

Mn. rostratum β spinosum *Roehl. Deutsch. Fl. III*, p. 96.

Polla spinosa *Brid. op. cit. II*, p. 817.

2. In silv. acer. et pinet. — *Eur.* : E reg. montan. usq. in alp. *As.* : Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : M. Rupestr. centr.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 40 et b, 437, 473, 1168.

« var. microcarpon (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Astrophyllum spinosum var. microcarpum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, *II*, p. 23.

— *As.* : *Jenissei* sup.

spinulosum *Bryol. eur. IV (mon. Supp. p. 4)*, t. 394; *C. M. Syn. I*, p. 162 et *II*, p. 554; *W. P. Sch. op. cit. p. 486*.

Astrophyllum spinulosum Lindb.

Bryum spinosum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 257 p.p.

Syn. Ad terr. silvat. — Eur. : Sudet., Morav., Francon., Thuring., Helvet., Tirol., Alp., Pyren. *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : New Brunswick, Nov. Scot., Gaspes., Ontario, Manitoba, Columb. brit., Washington, Idaho, Nova Angl., reg. or.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 198.

Rab. Bryoth. eur. n. 249 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., p. 304.

spurium Gmel. — *Dicranum*.

squarrosus L. f. — *Paludella*.

stellare *Reich. Fl. Maino-Franc. II*, p. 125; *Hedw. Sp. M. p. 191*, t. 40, f. 1-4; *Bryol. eur. IV (mon. p. 33)*, t. 399; *C. M. Syn. I*, p. 166; *W. P. Sch. op. cit. p. 487*.

Astrophyllum Blyttii Lindb. M. Scand. p. 14.

A. stellare ej. l. c.

Bryum stellare Roth. Fl. germ. III, p. 240.

Br. stellare roseum pendulum minus, capsulis et setis longioribus *Dill. Hist. M. p. 413*, t. 52, f. 78.

Br. stellatum *Lam. et DC. Fl. fr. I*, p. 507 (*fid. Brid.*).

Br. Polla stellaris *Brid. Bryol. univ. I*, p. 691.

Hypnum stellare W. et M. Bot. Taschb. p. 294.

Mn. Blyttii *Bryol. eur. IV (mon. Supp. p. 6)*, t. 400; *C. M. Syn. I*, p. 151; *Rab. Bryoth. eur. n. 103*.

Mn. orthorhynchum *Mac. Canad. M. n. 471 p.p.*

Mn. Serpylli foliis tenuibus pellucidis *Dill. Hist. M. p. 232*, t. 31, f. 2 A (*fid. Limpr.*).

2. In dumet., rarius in mont. quartz. quam in calcar. — *Eur.* : Spitzberg, Norveg., Scot., Angl., Belg., Gall., Jurass., Alp., etc. *As.* : Japon., Amour, *Jenissei*, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : New Brunswick, Gaspes., Ontario, M. Rupestr., reg. sept. et or.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 77.

Mac. Canad. M. n. 199.

Rab. Bryoth. eur. n. 977.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 305.

stellatum Lam. — Mn. hornum.

striatulum *Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891*, p. 167.

2. — *As.* : Japon.

subbasilare C. M. — *Rhizogonium*.

subnerve *Schwaegr. — Eriopus remotifolius?*

subglobosum *Bryol. eur. IV (mon. Supp. p. 3)*, t. 388; *C. M. Syn. I*, p. 56; *W. P. Sch. op. cit. p. 490*.

Astrophyllum pseudo-punctatum Lindb. M. Scand. p. 13.

- Bryum mnioides* Wils. in *Lond. Journ. of bot.* III, p. 42.
Cinclidium stygium Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 272 p.p.
Mn. punctatum ej. *ibid.* n. 253.
Mn. punctatum var. *subglobosum* Hpe. in *litt.*
Mn. pseudo-punctatum Br. et Sch. in *Obs. crit. ad Drumm. et in Lond. Journ. of bot.* II, p. 669.
 Syn. In *turfos.* editor. — *Eur.* : Scandin., Angl., Hercyn., Neerland., Westphal., Helvet., Alp. Stir., Tatra, Voges. As. : *Jenissei.* *Am. sept.* : Groenland, ins. Sabine, lac. Super. et Athabasca, M. Rupestr., Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 201.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 247, 730.
 Un. itin. 1864, n. 55
subinclinatum Philib. in *Rev. bryol.* 1895, p. 40.
 2. Ad terr. silic. secus rivul. — *Eur.* : Alp. Galloprovinciae
subulatum L. jun. — *Barbula.*
succulentum Mitt. *M. Ind. or.* p. 143.
Mn. rhynchophorum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 367 p.p.
 Syn. — *As.* : Nepal. or., Khasia, Assam ; Java ?
tenerrimum C. M. in *Jaeg. Ad. I.* p. 67 (nom.).
 — *As.* : Sikkim.
Thomsoni W. P. Sch. *Syn.* II ed., p. 485.
Mn. lycopodioides Mitt. *M. Ind. or.* p. 142 ; *Lindb. de Mn. europ.* p. 52.
 2. — *As.* : Sikkim, Tibet occ., Yunnan, Japon.
Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 164, 1496.
Timmia Hoffm. — *Timmia megapolitana.*
tomentosum Sw. — *Breutelina.*
tortile } Brid. — *Ptychomitrium polyphyllum.*
 } Gmel. — *Ditrichum.*
tortuosum L. jun. — *Barbula.*
trichodes L. jun. — *Meesea uliginosa.*
Trichomanes Mitt. in *Hook. Journ. of bot.* 1856, p. 231.
Mn. acutum Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 227.
Mn. cuspidatum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 367.
Mn. japonicum W. P. Sch. in *Savat. M. Japon.*
Mn. rostratum Wils. in *op. cit.* p. 368.
 2. Ad terr. humid. — *As.* : Himalaya occ., Japon., China (ins. Pih-Quan).
Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 7, 30, 97, 833, 3513.
trichomitrium Mitt. — *Orthomnium.*
triquetrum L. — *Meesea tristicha.*
truncorum Brid. — *Rhodobryum.*
turbinatum Hedw. — *Bryum.*
 β *Ludwigii* Roehl. — *Webera Ludwigii.*
turgidum Wahlenb. — *Aulacomnium.*
uliginosum Gmel. — *Meesea.*
umbraculum Schwaegr. — *Rhodobryum.*
umbratile Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 30 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 51, t. 35 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 246.
 2. Ad terr. et sax. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 520.
undulatum (L.) Hedw. *Sp. M.* p. 195 ; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 20), t. 389 ;
 C. M. *Syn.* I, p. 161 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 479.
 Astrophyllum undulatum Lindb. *M. Scand.* p. 13.

- Bryum dendroides* Web. *Spic. Fl. Goett.* p. 117.
Bryum dendroides, polycephalum, phyllitidis folio undulato, pellucido, thecis ovatis pendulis Dill. *Hist. M.* p. 410, t. 52, f. 76 A-E.
Br. ligulatum Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 84.
Br. serpyllifolium γ undulatum Huds. *Fl. Angl.* p. 417.
Br. undulatum Roth *Fl. Germ. III, I*, p. 249.
Br. Polla ligulata Brid. *Bryol. univ. I*, p. 708.
Hypnum ligulatum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 298.
H. undulatum Schrank *Baiers Fl. II*, p. 474.
Mn. ligulatum Willd. *Prodr. Fl. Berol.* p. 334.
Mn. serpyllifolium δ undulatum L. *Sp. Pl. II ed.*
Polla ligulata Brid. *op. cit. II*, p. 817.
Polytrichum undatum Schrank *Prim. fl. Salisb. n.* 825.
 2. In umbros. humid. — *Eur.* : Tota, arctic. except. *As.* : Ins. Nippon, Talysch, Sikkim., Caucas. occ. et centr., *Syr. Afr.* : Alger., Ténérif., Madeir., ins. Azor., C. B. Sp., ins. Borbon.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 41.

« *var. australe* (Besch.) Par.

- Mn. australe* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 100.
 — *Afr.* : Teneriff., ins. Borbon.

undulatum L. jun. — *Atrichum*.
Vallis-Graviae Hpe. — *Rhizogonium*.

- venustum* Mitt. in *Kew Journ. bot.* 1856, p. 231, t. 12 B; Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 52, t. 36; Lesq. et Jam. *Man.* p. 242.
Mn. Neevii C. M. in *Fl.* 1873, p. 480; Lesq. et Jam. *Man. l.c.*
Syn. In rup. fiss. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Montana.
Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 190.

- vesicatum* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 345.
 2. — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 1339.

viridulum Sw. — *Weisia*.

- voxense* Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 82.
Ster. Cortic. — *As.* : Tonkin.

Wrightii Sull. — *Eipterygium*.
Zierii P. B. — *Plagiobryum julaceum* (1).

MNIUM CINCLIDIUM *Bryol. eur. IV.*

- arcticum* *Bryol. eur.* — *Cinclidium*.
Stygium *Bryol. eur.* — *Cinclidium*.

MOENKEMEYERIA C. M. in *Fl.* 1886, p. 506 (2 spec.).

- mirabilis* C. M. *l. c.*
Syn. Terr. — *Afr.* : Old Calabar.
Wainionis C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.
Syn. Lignic. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

(1) In *Enum. Kindb. nom. nuda* :

Mn. Novae Zelandiae C. M. | *Mn. pellitum* C. M.

MOLENDIA Lindb. in *Utkast till en nat. grupp. of Eur. blzdm.* p. 29.

Spec. omn. non indicatae sunt ANÆCTANGIA ejusd. nom.

linguefolia Lindb. — *Anoetangium Schliephackeanum*.

MOLLIA Schrank *Fl. Salisb.* p. 832.

aeruginosa Lindb. — *Gymnostomum rupestre*.

brachydontia Lindb. — *Trichostomum mutabile*.

Brotheri Lindb. — *Barbula*.

caespitosa Broth. — *Barbula*.

calcareo Lindb. — *Gymnostomum*.

var. *gracillima* Lindb. — *Gymnostomum calcareum*.

var. *viridula* Lindb. — *Gymnostomum calcareum* var. *intermedium*.

condensa Lindb. — *Hymenostomum tortile*.

connivens Lindb. — *Trichostomum*.

corniculata L. et A. — *Trichostomum*.

crispa Lindb. — *Systegium*.

crispula Lindb. — *Trichostomum*.

var. *viridula* Lindb. — *Trichostomum crispulum* var. *angustifolium*.

fallax Schrank. — *Barbula*.

flavo-virens Lindb. — *Trichostomum*.

fragilis Lindb. — *Barbula Drummondii*.

humilis Lindb. — *Barbula caespitosa*.

inclinata Lindb. — *Barbula*.

littoralis Braithw. — *Trichostomum*.

microstoma Braithw. — *Hymenostomum*.

var. *obliqua* Braithw. — *Hymenostomum microstomum* var. *obliquum*.

muralis Schrank. — *Barbula*.

ruralis Schrank. — *Barbula*.

rutilans Lindb. — *Weisia mucronata*.

squarrosa Lindb. — *Hymenostomum*.

subulata Schrank. — *Barbula*.

tegularis Schrank. — *Barbula muralis* var. *aestiva*.

tenuirostris Lindb. — *Didymodon cylindricus*.

tenuis Lindb. — *Gyroweisia*.

tortilis Braithw. — *Hymenostomum*.

tortuosa Schrank. — *Barbula*.

var. *inclinata* Lindb. — *Barbula inclinata*.

unguiculata Schrank. — *Barbula*.

verticillata Lindb. — *Eucladium*.

viridula Lindb. — *Weisia*.

var. *brevifolia* Lindb. — *Weisia viridula* var. *brevifolia*.

var. *gymnostoma* Lindb. — *Weisia viridula* var. *gymnostoma*.

Wimmeriana Lindb. — *Weisia*.

var. *subgymnostomoides* Limpr. — *Hymenostomum tortile*.

MONOSCHISMA Duby *Choix de Crypt. ex.* 1867, p. 4.

viride Duby. — *Papillaria Dubyana*.

MONOCRANUM C. M. in *Mac. Cat.* p. 35 (nom.), (2 spec.).

diceranoides C. M. l. c. (nom.).

— *Am. merid.* : *Valdivia*.

stenodictyon Kindb. l. c.

Diceranum stenodictyon Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVI, p. 92.

Ster. Ad terr. silvat. — *Am. sept.* : *Columb. brit.*

Helvet. As. : Jenissei med. et inf. Afr. : Alger. ?? Am. sept. :
Groenland, Columb. brit., M. Uintah.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1232.
Un itin. 1863, n. 58 ; 1867, n. 5.

var. *ciliata* Chalub. — M. Careyana.

Careyana Sull. M. of U. St. pp. 61 et 81, t. 5 et Ic. M. p. 131, t. 83 ;
Lesq. et Jam. Man. p. 300, t. 6.

Hypnum gracile Weinm. in Bull. Soc. imp. nat. Moscou, 1845, II, p. 492 ;
C. M. Syn. II, p. 418.

H. sibiricum C. M. Syn. II, p. 418.

M. apiculata var. *ciliata* Chalub. Enum. M. frond. Tatr. p. 115.

M. gracilis Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 276 (in obs.).

M. julacea var. *aspera* Lindb. in Meddel. of Soc. Fauna et Fl. Fenn.
1876, Heft. I.

2. In fissur. rup. calcar. — Eur. : Rossia sept., Tatra, alp. Stir.,
Carniole. As. : Jenissei med. Am. sept. : Anticosti, Nov. Scot., New
Brunswick, Ontario, lac. Super., Nov. Angl., New York, Pensilv.,
Minnesota, Carol. sept.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 250.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 250 et II ed. n. 373.

concinna Lindb. — Myuroclada.

julacea (Vill.) Bryol. eur. V (mon. p. 3), t. 560 ; W. P. Sch. op. et l. cc.

Hypnum julaceum Vill. Pl. Dauph. III, p. 909 ; C. M. Syn. II, p. 465
(excl. syn. Hartm. et Hub.) p.p.

H. moniliforme Wahlenb. Fl. Lapp. p. 376, t. 24 ; Drumm. M. bor. am.
I ed. n. 220.

Isothecium julaceum Brid. Bryol. univ. II, p. 365 (incl. β atratum).

L. moniliforme Hüb. Muscol. germ. p. 597.

Leskea julacea Schwaegr. in Schultes Reise auf d. Glockner, II, p. 363.

L. moniliformis Wils. Bryol. brit. p. 328, t. 24.

Pterigynandrum fragile Schleich. Cent. IV, n. 6.

Pterogonium rotundifolium Engl. Bot. t. 2525.

2. Ad terr. petros. et in fiss. rup. humid. — Eur. : Spitzberg, Scandin.,
Angl., Sudet., Tatra, Salisb., Stir., Carinth., Alp. Bavar. et Julian.,
Tirol., Helvet., vall. Rhen. med., Arvern., Delphinat. As. : Jenis-
sei med. et infer. Am. sept. : Groenland, Labrador, Terr. nov.,
Anticosti, New Brunswick, Gaspes., Ontario, Manitoba, Athabasca,
M. Rupestr., Oregon, Minnesota, Nov. Angl., New York.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 249.

Rab. Bryoth. eur. n. 685.

Un. itin. 1867, n. 2.

var. *aspera* Lindb. — M. Careyana.

* var. *gracilis* Kindb. Läubm. Schwed. u. Norw. p. 8.

♂ et fr. ign. — Eur. : Norveg. (Dovre).

* var. *scabrifolia* Lindb. M. Scand. p. 37.

— Eur. : Fennia.

tenerrima Lindb. — M. apiculata.

MYURIUM W. P. Sch. Syn. I ed. p. 69 (2 spec.).

Hebridarum W. P. Sch. l. c. p. 696 et ed. II, p. 808.

Leucodon Lagurus var. borealis Wils. Bryol. brit. p. 311, t. 6.

2. Ad rup. icror. — Eur. : Ins. Hebrid. (ster.). Afr. : Ins. Canar. ;
Madeir. (c. fr. !).

? herjedalicum W. P. Sch. *ll. cc.*

Eurhynchium cirrosum (*fid. Husn.*).

Hypnum ? herjedalicum Hartm. *Fl. Skand. IX ed. p. 9.*

Ster. — *Eur. : Scandin. (1).*

MYUROCLADA Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 379 (1 spec.).

concinna (Wils.) Besch. *l. c.*

Hypnum concinnum Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 277, n. 42, t. 10 C; C. M. *Syn. II*, p. 374.

H. illecebrinum W. P. Sch. in Savatier *M. Japon.*

H. Maximowiczii Borozczow in *Max. Prim. fl. Amur.* p. 467.

Myurella concinna Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 275.

2. — *As. : Japon., ins. Chiusan, Amour, Jenissei sup.*

Exs. : Faurie, Pl. Jap. n. 5, 10, 43, 299 p.p., 740, 1497, 3508.

Savatier n. 791.

Nanocarpidium C. M. in *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.* p. 5 (sect. NECKERAE).

NANOMITRIUM Lindb. *Man. M. II.*

tenerum Lindb. — Ephemereum.

NECKERA Hedw. *Fund. M. II*, p. 93 (158 spec.).

abietina Hook. — Alsia.

abyssinica *Bryol. eur. V (mon. p. , nom.).*

N. remota β laxa Br. et Sch. in W. Sch. *M. Abyss. n. 425.*

— *Afr. : Abyssin., litt. occ. mar. Erythr.*

abyssinica C. M. — *Cylindrothecium Schimper.*

acuminata Hook. — Garovaglia.

acutata Mitt. *M. Ind. or. p. 121.*

1. — *As. : Khasia.*

acutifolia (Brid.) C. M. *Syn. II*, p. 48.

N. Distichia acutifolia Brid. *Bryol. univ. II*, p. 757.

Ster. Ad sax. irror. — *Afr. : Ins. Borbon.*

« var. antitrichioides Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc. p. 133.*

— *Afr. : Ins. Borbon.*

Adiantum Griff. — *Cyatophorum ?*

adunca Willd. — Hypnum.

aequalifolia C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 569; Mitt. *M. Ind. or. p. 120*

1. — *As. : M. Neilgherr.*

affinis Hook. — *Pilotrichum.*

africana *Bryol. eur. V (mon. p. nom.).*

— *Afr. : C. B. Sp. ?*

africana C. M. — *Papillaria.*

albicans Willd. — *Brachythecium.*

alopecura C. M. — *Braunia sciuroides*

alopecuroides Mitt. — *Thamnium.*

(1) In *Enum. Kindberg. nom. nud. :*
M. Krausei C. M.

- amazonica* Mitt. *M. austr. am.* p. 452.
 Syn. — *Am. merid.*: Amazon.
- ambigua* C. M. — *Cleistostoma*.
amblyacis C. M. — *Papillaria*.
- amblyoglossa* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 409.
 1. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.
ampullacea C. M. — *Pilotrichella*.
- anacamptolepis* C. M. *Syn.* II, p. 663; *Bryol. jav.* II, p. 67, t. 186.
 2. Ad arbor. — *As.*: Sumatra, Java.
- andamana* (C. M.) Par.
Distichia andamana C. M. in *Fl.* 1878, n. 6.
 2. — *As.*: Ins. Andaman.
- Anderssonii* C. M. — *Pilotrichella*.
- andina* Mitt. *M. austr. am.* p. 457.
 — *Am. merid.*: And. Quitens.
- angusta* C. M. — *Symphyodon*.
- angustifolia* C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 828 et *Syn.* II, p. 52; Mitt. op. cit. p. 454.
 1. — *Am. sept.*: Mexic.
- applanatula* C. M. — *Cylindrothecium*.
appressa C. M. — *Papillaria*.
apterychodes Schlieph. — *Pterogoniella*.
- Arbuscula* Hpe. in *Fl.* 1878, n. 6.
 Syn. — *As.*: Penang.
- Arbusculum* Lindb. — *Porotrichum*.
- arcuans* Mitt. — *Thamnium*.
- argentinica* Ltz. in *Linn.* 1878-79, p. 411.
 1. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.
- Ascensionis* Besch. in *Journ. de bot.* 1891, p.
 Syn. — *Afr.*: Ins. Ascension.
- assimilis* C. M. — *Leucodon*.
atro-lutea C. M. — *Papillaria*.
Auberti Brid. — *Hookeria*.
- aurea* { C. M. — *Cylindrothecium*.
 Griff. — *Meteorium*.
- aurescens* Hpe. in *Linn.* 1856, p. 212.
 Ster. — *Pac.*: Austral. or.
- australasica* C. M. — *Porotrichum dendroides*.
Avellanadae C. M. — *Pilotrichella*.
- Bauerlenii* Geh. *Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.* p. 4, t. 2.
 Syn. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Guinea merid.
- Balfouriana* C. M. — *Spiridens*.
Bandongiae C. M. — *Cylindrothecium*.
- Reccariana* Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 282.
 Ster. — *As.*: Borneo.
- Berteroana* W. P. Sch. mss.; Mitt. *M. austr. am.* p. 454.
 — *Am. merid.*: Chile.

- Besseri* Jur. — Neckera Sendtneriana.
 var. *costata* R. Farneti. }
 f. *tenella* Lindb. } — Neckera Sendtneriana var. *rotundifolia*.
 var. *rotundifolia* Husn. }
- Beyrichii* Schwaegr. — Cylindrothecium.
- bicolorata* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 85 et in *Forschungsreise...* Bot. p. 47.
 Ster. Ad arbor. — Pac. : Nov. Hannover.
- biductulosa* Schwaegr. — Lepidopilum flexifolium.
- biformis* Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 40.
 Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- Billardieri* Hpe. — Pilotrichella.
- bipinnata* { Schleich. — Leptodon Smithii.
 { Schwaegr. — Pilotrichum.
- birmensis* Hpe. in *Fl.* 1878, n. 6.
 2. Ster. — As. : Birman.
- blanda* Harv. — Papillaria.
- bogotensis* Mitt. *M. austr. am.* p. 454.
 Ad arbor. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- Roiviniana* C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 130.
 Ster. — Afr. : Ins. Nossi-Be.
- Bolleana* C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 230.
 2. — Afr. : Ins. Cap. Viridis.
- Borgeniana* Kiaër in *Borgen M. Madag.* n. 131, 144.
 — Afr. : Madagasc. centr. et or.
- Boryana* C. M. — Pterogoniella.
- brachyclada* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 75.
 2. In silvis. — As. : Yunnan.
- brachyclada* C. M. — Leptohymenium.
- brachypus* C. M. — Leucodon.
- brasiliensis* Bryol. eur. V (mon. p. , nom.).
 — Am. merid. : Brasil.
- brasiliensis* C. M. — Pilotrichum.
- Breutelii* C. M. — Leptohymenium.
- brevinervis* Broth. in *Bihang till Sv. Vet. Akad. Handl.* 1895, n. 3.
 1. Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. or.
- breviramea* C. M. — Pilotrichella.
- brevirostris* Griff. — ? Pylaisaea.
- brevisetia* H. f. et W. — Cylindrothecium.
- breviuscula* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 242.
 — Afr. : M. Cameroon.
- Buchanani* C. M. — Papillaria.
- caldensis* Lindb. mss. ; Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 40.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- « var. *paulensis* Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- californica* Hook. et Arn. — Alsia.

camptoclada Ren. et Card. — *Leptodon flexuosus*.
canariensis Brid. — *Leucodon*.

capensis *Bryol. eur.* V (mon. p. , nom.).
 — *Afr.* : C. B. Sp.

Ews. : Rehm. M. Afr. austr. n. 327.

capensis C. M. — *Aërobryum*.

capillacea { C. M. — *Dichelyma*.
 Griff. — ? *Pylaisaea*.

capillaris C. M. — *Papillaria*.

capilliramea C. M. — *Papillaria*.

celebesica C. M. in *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.* p. 6.
 — *As.* : Celebes.

cephalonica *Jur. in Ung. et Ky. « die Insel Cypern. »*

N. pennata var. *cephalonica* W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 565.

2. — *Eur.* : Ins. Cephalon. *Afr.* : Ins. Canar., Ma-
 deir.

cernua C. M. — *Cylindrothecium*.

characea C. M. — *Pilotrichella*.

var. *nigrescens* C. M. — *Pilotrichella characea* var. *nigrescens*.

var. *tenuis* C. M. — *Pilotrichella characea* var. *tenuis*.

chilensis W. P. Sch. in *Ann. sc. nat. II ser., VI*, p. 147, t. 9 ; C. M.
Syn. II, p. 56 ; Mitt. M. austr. am. p. 457.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile.

chilensis Mitt. p.p. — *N. Novae Granatae*.

chlorocaulis C. M. *Syn. II*, p. 663 ; Mitt. op. cit. p. 454.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

chlorocaulis Sull. — *N. oligocarpa*.

chrysoclada C. M. — *Papillaria*.

chrysoneura Hpe. — *Pilotrichella*.

cirrifolia C. M. — *Papillaria*.

cirrosa Sw. — *Macromitrium*.

cladorhizans { C. M. — *Cylindrothecium*.

{ H. f. et W. — *Cylindrothecium Drummondii*.

Clastobryum C. M. — *Clastobryum indicum*.

coarctata C. M. p p. { *Cylindrothecium flavescens*.

{ *Cylindrothecium rubicundum*.

cochlearifolia C. M. — *Pilotrichella*.

columnaris Schwaegr. — *Cylindrothecium*.

comes Griff. — *Cylindrothecium*.

commutata C. M. — *Pterogoniella*.

Comorae C. M. in *Linn.* 1876, p. 268.

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Reg. lacustr., Usambara, ins. Anjouan,
 Mayotte, Madagasc., ins. Borbon., Franciae.

complanata (L.) Hüb. *Muscol. germ.* p. 576 ; *Bryol. eur.* V (mon. p. 9),
 t. 444 ; C. M. *Syn. II*, pp. 43 et 662 ; W. P. Sch. *Syn. II ed.*
 p. 569.

Homalia complanata de Not. *Epil.* p. 199.

Hypnum complanatum L. *Sp. pl.* p. 1588.

H. ornithopodioides Scop. *Fl. Carn.* p. 150.

H. pennatum, compressum et splendens, capsulis ovatis Dill. *Hist. M.*
 p. 268, t. 34, f. 7.

Leskea complanata Hedw. *Fund. M. II*, p. 93, t. 10, f. 62-65.

L. Omalia complanata Brid. *Bryol. univ. II*, p. 327.

2. Ad arbor. silvat., rar. ad saxa. — *Eur.* : Tota. *As.* : Caucas., Persia. *Afr.* : Alger., ins. Canar. *Am. sept.* : Labrador, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick., Nov. Angl., Pensilv., Tennessee.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 378, 379, 380, 609.
 Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 396.

var. *falcata* Warnst. — *N. complanata* var. *secunda*.
 var. *foliis obtusis* Rab. — *N. Sendtneriana*.

« var. *longifolia* W. P. Sch. *Coroll. p.* 100 et *Syn. II ed. l. c.*
 Ster. In silv. umbros. — *Eur.* : Norveg. merid., German.
 var. *obtusa* Lindb. — *N. Sendtneriana*.

« var. *secunda* Gravet 1884.

N. complanata var. *falcata* Warnst. in *Hedwig*, 1885.

Ad rup. calc. soli exposit. — *Eur.* : Med. et or.

« var. *tenella* W. P. Sch. *ll. cc.*

N. tenella Kindb. *Laubm. Schwed. und Norw. p.* 5.

Ster. Ad rup. calc. umbros. et in spelunc. — *Eur.* : Suecia, German.

complicata C. M. — *Cylindrothecium*.

composita Hedw — *Pilotrichum*.

var. β Schwaegr. — *Pilotrichum affine*.

compressa C. M. — *Cylindrothecium*.

consimilis Hpe. — *Pilotrichella*.

convoluta Dz. et Mx. — *Pterobryum*.

? *cordata* Hook. in *Wall. Cat. n.* 7623 et *Ic. pl. rar. t.* 22 ; *descript. in Lond. Journ. of bot.* 1840, *p.* 15 ; *C. M. Syn. II, p.* 158.
 — *As.* : Nepal.

cordata Hsch. — *Meteorium Widgrenianum*.

coronata C. M. — *Lasia*.

crassa Hsch. — *Prionodon densus*.

crassicaulis C. M. — *Pterobryum*.

crenulata { C. M. — *N. loriformis*.
 { Harv. — ? *Pterobryum crenulatum*.

crinita Griff. *Not. p.* 464 et *Ic. pl. asiat. II, t.* 84, *f.* I ; *Mitt. M. Ind. or. p.* 120.

l. Rupic. — *As.* : Ceylan, Assam, Tonkin.

crinita Sull — *Pilotrichella*.

crispa (L.) Hedw. *Fund. M. II, p.* 93, *t.* 14, *f.* 47-48 ; *Bryol. eur. V (mon. p.* 9), *t.* 443 ; *C. M. Syn. II, pp.* 54 et 664 ; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 568.

Hypnum crispum L. *Sp. pl. p.* 1589.

H. pennatum undulatum crispum, setis et capsulis brevibus *Dill. Hist. M. p.* 273, *t.* 36 *f.* 12 A.

Leskea crispa Schrank *Prim. fl. Salisb. p.* 835.

N. Disuchia crispa Brid. *Bryol. univ. II, p.* 246.

2. Ad arbor. silvat. et rup. umbr. praecip. calcar. — *Eur.* : Reg. montos. silvat. tota. *As.* : Caucas. occ. et centr. *Afr.* : Ins. Canar., Madeir. *Am. merid.* : And. Quitens. ? (1).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 143 a et b.

« var. *falcata* Boulay *M. Fr. II, p.* 181.

Ad rup. sicc. — *Eur.* : Ubi typ.

- « var. *subplana* Warnst. mss.
— Eur. : Belgium.
- crispatula* Hook. — Trachypus.
- crispula* Bryol. jav. II, p. 66, t. 184.
2. Ad arbor. — As. : Nepal., Sumatra, Java.
- cryptotheca* C. M. — Leucodon.
- Cumingii* C. M. — Pilotrichella.
- cupressiformis* Willd. — Hypnum.
- curtipendula* Hedw. — Antitrichia.
- curvata* Griff. — Cylindrothecium.
- curvirostris* { C. M. — Leucodon.
Schwaegr. — Rhaphidostegium neckeraceum.
- cuspidifera* Tayl. — Papillaria.
- cyathipoma* C. M. — Pilotrichella.
- cyclophylla* C. M. Syn. II, p. 664; Bryol. jav. II, p. 67, t. 185.
2? — As. : Java, Sumbawa.
- ? *cylindracea* Mont. — Pterobryum.
- cylindricaulis* C. M. — Erythrodontium.
- cymbifolia* C. M. — Pilotrichella.
- decipiens* W. et M. — Pterigynandrum filiforme var. heteropterum.
- decolorans* Hpe. — Pilotrichella pseudo-imbricata.
- decomposita* C. M. — Porotrichum.
- densa* Wils. — Prionodon.
- denticulata* C. M. — Papillaria.
- dendroides* { Brid. — Climacium.
Hook. — Porotrichum.
Hsch. — Homalia javanica.
Mont. — Porotrichum leucocaulon ?
- β *americanum* C. M. — Climacium americanum.
- dentata* { C. M. — Leptohymenium.
Griff. — Homalia.
- Deppii* Hsch. — Papillaria.
- diaphana* C. M. — Braunia.
- dimorpha* C. M. — Pilotrichella.
- distans* C. M. — Cylindrothecium.
- disticha* Hedw. M. frond. III, p. 58, t. 22; Mitt. M. austr. am.
p. 451.
Daltonia disticha W. Arn. Disp. p. 54.
Fontinalis disticha Sw. Pr. fl. Ind. occ. p. 138.
N. Distichia retusa Brid. Bryol. univ. II, p. 243.
Pilotrichum distichum P. B. Prodr. p. 83; C. M. Syn. II, p. 46.
P. truncatum P. B. l. c.
Syn. Ad arbor. et saxa. — Afr. : Ins. Fernando-Po, Benin, Togo.
Am. sept. : Florid., Mexic., Costa Rica, Antill. fere omn. Am.
merid. : Amazon., Nov. Granat. Peruv., Chile, Brasil. or.
- diversicoma* Hpe. — Papillaria.
- domingensis* Spreng. — Leucodon.
- Douglasii* Hook. Bot. Misc. I, p. 131, t. 35; C. M. Syn. II, p. 55; Lesq.
et Jam. Man. p. 283.
2. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit., Alaska, Vanconver, Washing-
ton, Oregon, Idaho, Calif.
Exs. : Mac. Canad. M. p. 241.
Sull. et Lesq. M. bor. am. p. 394.

« *var. Macounii* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 275 et in *Mac. Cat.* p. 163.

N. Douglasii ej. *Enum. Bryin. exot.*

Ad arbor. et sax. — *Am. sept.* : Columb. brit., ins. Vancouver.

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 389.

Dozyana C. M. — *Aërobryum longissimum*.

Dregeana Hsch. — *Cylindrothecium*.

Drummondii C. M. — *Hedwigidium*.

Dubyana Hpe. — *Papillaria*.

duplicata (Schwaegr.) Par.

Fissidens domincensis Brid. *Bryol. univ.* II, p. 707.

Hypnum duplicatum Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 198 et *III, II, II*, t. 279 ;

C. M. Syn. II, p. 585 (1).

Pterobryum duplicatum Mitt. *M. austr. am.* p. 427.

Ad arbor. — *Am. sept.* : S. Doming. *Am. merid.* : Nov. Granat.,
And. Quitens. et Peruv., Brasil. or.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 105.

— *Afr.* : M. Camerooon.

Eavesiana Hpe. — *Papillaria*.

efructifera Griff. — *Thamnium alopecaroides*.

Ehrenbergii C. M. *Syn. II*, p. 51.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

elegans Jur. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 120.

N. intermedia (fid. Mitt. in *Godman's Nat. hist. of the Azores*, p. 305 ; sed
dioica!).

2. Ad *Laurum canariens.* — *Afr.* : Madeir.

elegantula Griff. — *N. exserta*.

Eriodon C. M. — *Eriodon conostomus*.

eucarpa W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1690.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Eugeniae Lindb. — *N. taïtensis*.

exserta Hook. in *Schwaegr. Suppl. III, I, II*, t. 244 ; *C. M. Syn. II*,
p. 53 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 120.

N. elegantula Griff. *Not. p.* 464 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 83, f. 5 ?

1. In fruticet. humid. — *As.* : Nepal., Sikkim, penins. Malay.

extans Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser. II*, p. 93.

1. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

falcata C. M. — *Dichelyma*.

falcifolia Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 184.

Ster. In silv. — *Am. sept.* : And. Costa-Ricens.

filamentosa Hook. — *Meteorium*.

filescens Schwaegr. — *Meteorium*.

filicina Hedw. — *Pterobryum*.

filifera C. M. — *Pilotrichella*.

filiformis } C. M. — *Pterigynandrum*.
Hedw. — *Cryphaea*.

timbriata Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 13 et in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 21, f. 4; *C. M. Syn.* II, p. 47; *Mitt. op. cit.* p. 122.
2. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia.

flabellata { Hpe. — *Porotrichum* variabile.
Mitt. — *Homalia*.

flaccida *C. M. Syn.* II, p. 54; *Bryol. jav.* II, p. 63.
1. — As. : Ceylan, Java.

flaccida { Brid. — *Anomodon obtusifolius*?
Dz. et Mk. — *N. loriformis*.
Mitt. — *N. Graeffeana*?

flagellacea Mitt. — *Porotrichum*.

flavescens { Hook. — *Cylindrothecium rubicundum*.
Schwaegr. — *Cylindrothecium*.

flavo-limbata *C. M.* et Hpe. — *Pilotrichella*.

flexilis *C. M.* — *Pilotrichella*.

flexuosa Harv. — *Leptodon*.

floribunda *C. M.* — *Papillaria*.

var. *minor* *C. M.* — *Papillaria floribunda* var. *minor*.

? *floridana* Aust. — *Pilotrichella*.

fontinaloides Lindb. — *N. pumila*.

β *Philippei* Lindb. — *N. pumila* var. *Philippeana*.

foveolata Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* XXIII, t. 5, f. 5 et *M. austr.* am, p. 453.

Pilotrichum toveolatum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 44.

P. undulatum *P. B. Prodr.* p. 83 (fid. Mitt. l. c.).

— Afr. : Occid. tropic. (sine loc. spec.). Am.
merid. : Brasil. austr. or.

fruticosa Mitt. — *Porotrichum*.

funalis *C. M.* — *Pilotrichella*.

funiformis *C. M.* — *Pilotrichella cuspidigera*.

fuscescens { *C. M.* — *Pterogoniella*.

{ Hook. — *Papillaria*.

fusco-viridis *C. M.* — *Papillaria*.

Gennati Rota mss. in *de Not. Epil.* p. 775.

N. jurassica? (fid. *Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 702).

Ster. — Eur. : Ital. (Piazzatorre).

glabella Sw. — *Homalia*.

glauca *C. M.* — *Lepyrodon*.

glossophylla Mitt. — *Homalia*.

glyphotheca *C. M.* — *Cladomnium sciuroides*.

Goughiana Mitt. — *Homalia*.

gracilentia *Bryol. jav.* II, p. 62, t. 182.

2. Ad arbor. — As. : Sumatra, Java, Borneo, Ceram, Celebes. Pac.:
Ins. Samoa, Admiral.

gracilis *C. M.* — *Pterogonium*.

gracillima Tayl. — *Schwetschkea*.

Graeffeana *C. M. M. Polyn.* p. 72.

N. flaccida Mitt. in *Bonpland* 1861, p. 366?

Syn. — Pac. : Ins. Fidji.

Grateloupii *C. M.* — *Schwetschkea*.

guianensis Mont. — *Pilotrichella*.

- hamata* C. M. — Sauloma.
Hampeana C. M. — Cylindrothecium.
hamulosa Vill. — Antitrichia curtispindula.
Harveyana C. M. — Leucodon secundus.
heteromalla Hedw. — Cryphaca.
heterophylla Brid. *Sp. M. II*, p. 32; *C. M. Syn. II*, p. 58.
 Cryphaea heterophylla Brid. *Bryol. univ. II*, p. 352.
 Daltonia heterophylla W. Arn. *Disp. M.* p. 54.
 Fontinalis heterophylla Lour. *Fl. Cochinch. II*, p. 841.
 Hypnum heterophyllum Poir.
 Pilotrichum heterophyllum P. B. *Prodr.* p. 83.
 — As. : Cochinch.
hexasticha C. M. — Pilotrichella.
Hildebrandtii Reichdt. *Beitr.* p. 172.
 Ster. Speluncic. — Pac. : Ins. Sandwic.
himalayana Mitt. *M. Ind. or.* p. 121.
 Ster. — As. : Sikkim.
hispida C. M. — Pilotrichella.
Hoehnelii C. M. in *Fl.* 1890, p. 489.
 Ster. — Afr. : M. Aberdare.
Hookeri Dz. et Mk. — N. plumula.
hookeriacea C. M. in *Dusen M. Camer. n. r.*
 — Afr. : M. Cameroon.
Hookeriana { Griff. — Cyatophorum.
 { Mitt. — Homalia.
Hornschuchiana C. M. *Syn. II*, p. 51.
 N. pennata Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mex. n.* 1090.
 1. — Am. sept. : Mexic.
Humboldti C. M. — Rhacocarpus.
humilis Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 174.
 1. Ad arbor. — As. : Japon.
hygrometrica C. M. — Wardia.
hymenodonteia C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 564.
 N. pennata Wils. in *Fl. Tasm. II*, p. 204.
 1. Ad arbor. — Pac. : Nov. Zeland., Tasman.
hypnoides { Hedw. — Pilotrichum.
 { Hook. — Pilotrichum rugifolium.
illecebra C. M. — Pilotrichella.
illecebrina C. M. — Pilotrichella.
imberbis C. M. — Hedwigidium.
imbricata { Hsch. — Pilotrichella rigida.
 { Schwaegr. } — Pilotrichella.
 — Pilotrichella versicolor.
 var. *brachypoda* Mont. — Pilotrichella guianensis.
imbricatula C. M. — Pilotrichella.
incurvata Hsch. — Cylindrothecium.
implana Mitt. *Sam. M.* p. 169.
 2. Ad arbor. — Pac. : Ins. Samoa.
implexa C. M. — Lepyrodon.

- indica* C. M. — Iasia.
- inermis* C. M. — Rhacocarpus.
- intermedia* *Brid. Mant. M. p. 137; C. M. Syn. II, p. 49.*
Daltonia intermedia W. Arn. *Disp. p. 54.*
N. Distichia intermedia *Brid. Bryol. univ. II, p. 241.*
 1. Ad arbor. — Afr. : Ins. Canar., Madeir..
Exs. : Husnot M. Canar. n. 147.
Mandon Pl. Madeir. n. 30.
 « var. *laevigata* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Madeir. n. 31.*
 — Afr. : Madeir.
- Jagori* C. M. — Sauloma.
- Jamesoni* *Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 59; C. M. Syn. II, p. 56; Mitt. M. austr. am. p. 456.*
 — Am. merid. : Nov. Granat., And. Quitens., Chile.
- javanica* C. M. — Homalia.
- julacea* { C. M. p.p. { — *Erythrodontium cylindricaulis.*
 { — *Erythrodontium squarrosus.*
 { Schwaegr. — *Erythrodontium.*
- jurassica* *Aman in sched. ; Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 701.*
 Ster. Ad rup. calcar. humid. — Eur. : Jurass. (M. Chasseron).
- kealeensis* *Reichdt. Beitr. p. 571.*
 Ster. Rupic. in silv. — Pac. : Ins. Sandwic.
- Kegeliana* C. M. — Pilotrichella.
- hermadecensis* C. M. — Papillaria.
- Khorthalsiana* Dz. et Mk. — Porotrichum.
- Kurzii* *Hpe. mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 183.*
 — As. : Birman.
- laevigata* *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. p. 103, t. 88, f. 3 et Handb. p. 463.*
 — Pac. : Nov. Zeland. med.
- Lagura* C. M. — Lepyrodon.
- lancifolia* Harv. — Sematophyllum.
- latifolia* Lindb. — Papillaria.
- laxa* C. M. — Schwetschkea ?
- Leichardti* *Hpe. in Linn. 1869-70, p. 520.*
 1. — Pac. : Austral. or. (Nov. Valesia).
- leiophylla* C. M. — N. Sendtneriana.
- Lepineana* *Mont. in Ann. sc. nat. 1848, p. 107 et Syll. p. 23; C. M. Syn. II, p. 49; Bryol. jav. II, p. 61, t. 181.*
N. undulata *Mont. in Voy. au pôle S. Crypt. p. 218 p.p.*
 2. Ad arbor. et rupic. — As. : Celebes, Halmaheira, Ceram, M. Java, Sumatra; Tonkin ? Afr. : Ins. Franciae (ster. : var. ?, vel sp. nov.?)
Rodriguez. Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Taïti, Arch. Gambier, Nov. Guin. sept.
- leptocarpa* H. f. et W. — *Cylindrothecium Jamesoni.*
- leptophylla* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p 76.*
 1. — Am. sept. : Mexic. (Orizaba).
- leptotheca* *Mitt. in Hook. Journ. of bot. 1856, p. 263.*
 1. Ad arbor. — Pac. : Austral. (Victoria).

leucocaulon C. M. — Porotrichum.

leuoclada C. M. — Dichelyma pallescens.

leucocolea Mitt. *M. austr. am.* p. 457.

— *Am. merid.* : Monte-Video.

leucocytus C. M. — Sauloma microcarpa.

leuconeura C. M. — Papillaria.

Liebmanni W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 76.

— *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

Liebmanniana C. M. — Hedwigidium.

ligulaefolia Mitt. — Homalia.

Lindigii Hpe. in *Linn.* 1863, p. 149 ; *Mitt. op. cit.* p. 455.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guatemala ? *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

lingulata Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 173.

Ster. — *As.* : Japon.

lineolata C. M. — Sauloma.

livens C. M. — Pilotrichella.

longe-barbata Hpe. — Pilotrichella.

longe-exserta Hpe. in *Fl.* 1878, n. 6.

1. — *As.* : Sikkim.

longifolia C. M. — Cyandrothecium.

longipedunculata C. M. — Leptodon longisetus.

longipes C. M. — Pilotrichella.

longirostris Hook. — Porotrichum.

longiseta } C. M. — Erythrodontium.

 } Hsch. — Erythrodontium cylindricaulis.

longisetacea C. M. — Leptohymenium.

longissima } C. M. — Meteorium.

 } Dz. et Mk. — Aërobryum.

longiuscula C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 241.

— *Afr.* : M. Cameroon.

loriformis *Bryol. jav.* II, p. 63, t. 183.

N. crenulata C. M. in *Bot. Zeit.* 1849, p. 231.

N. flaccida Dz. et Mk. in *Zolling. Verz.* I, p. 26.

N. undulata Duby in *Moritz Cat.*

2. — *As.* : Celebes, Ceram, ins. Banca, M. Java.

Pac. : Ins. Fidji, Samoa.

Ludoviciae C. M. — Pilotrichella.

lurida Griff. — Cyandrothecium.

luteo-virens Tayl. — Prionodon.

lutescens Willd. — Camptothecium.

Mac-Leana Rehm. *M. Afr. austr.* n. 616.

Ster. — *Afr.* : Transvaal.

Macounii } Kindb. — *N. Douglasii* var. *Macounii*.

 } Sull. — Leptodon nitidus.

macrocarpa } Brid. — Porotrichum.

 } C. M. — Sauloma microcarpa.

macropelma C. M. — Braunia indica.

macropoda Hedw. — Cyandrothecium.

madagascariensis C. M. — Pterogoniella.

- madecassa* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc* p. 130.
2? — *Afr.* : Madagasc., ins. Borbon.
- Moenkemeyeri* C. M. — *Pilotrichella*.
- Mariei* Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 93.
Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Mayotte.
- mascarena* C. M. — *Pilotrichella*.
- mechoacana* C. M. — *Cylindrothecium*.
- mediterranea* Philib. — *N. turgida* ?
- Menziesii* Hook. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 162 ; *C. M. Syn. II*, pp. 48 et 663 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 282.
2. Ad arb. et rup. — *Am. sept.* : *M. Rupestr.* et Selkirk, Columb. brit., Alaska, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Calif.
Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 238.
Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 395.
- « *var. amblyclada* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 162.
N. oligocarpa *Mac. Canad. M. n.* 240 p.p.
Ster. Rupic. — *Am. sept.* : *M. Rupestr.*
- « *var. limnobioides* Ren. et Card. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.
— *Am. sept.* : Oregon.
- Menziesii* W. P. Sch. — *N. turgida*.
- mexicana* *Bryol. eur. V (mon. p. nom.)*.
— *Am. sept.* : Mexic.
- microcarpa* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p.* 77.
1. — *Am. sept.* : Mexic.
- minor* Sull. — *Anomodon obtusifolius*.
- Miqueliana* C. M. — *Papillaria polytricha*.
- Mohriana* C. M. — *Homalia*.
- mollis* C. M. — *Pilotrichella*.
- mollusca* Mitt. *M. austr. am. p.* 455.
1. Rupic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- Montagneana* C. M. — *Homalia*.
- Moritzii* Hpe. in *Linn.* 1847, p. 91 ; *C. M. Syn. II*, p. 48.
2. — *Am. merid.* : Venezuela.
- mucronata* *Bryol. jav. II*, p. 68, t. 187.
2. — *As.* : Sumatra, M. Java, Borneo, Ceram, Celebes, Pac. : Ins. Samoa, Nov. Guinea.
- myura* Schwaegr. — *Cylindrothecium*.
- nano-disticha* Geh. *Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin. p.* 4, t. 3 B.
1. Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Guinea merid.
- natalensis* Rehm. *M. Afr. austr.*
— *Afr.* : Natal.
- neglecta* C. M. — *Cylindrothecium*.
- Nietneri* C. M. — *Trachypus*.
- nigrescens* Schwaegr. — *Papillaria*.
var. brevifolia Hpe. — *Papillaria nigrescens var. brevifolia*.
var. illecebra C. M. — *Papillaria nigrescens var. illecebra*.
- nigricans* Nees. — *Pilotrichella*.

nitens W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 78.
2. Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

nitens Moench. — *Camptothecium*.
nodicaulis C. M. — ? *Trachypus*.

Novae Granatae C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 581.

N. chilensis Mitt. *M. austr. am.* p. 457 p.p.

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

obliquifolia Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 56 ; *C. M. Syn. II*, p. 57 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 458.
Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

obtusata Mont. in *Ann. sc. nat.* 1843, p. 240 et *Syll.* p. 23 ; *C. M. Syn. II*, p. 58.

Ster. Ad arbor. — *As.* : Cochinch.

obtusata Mitt. — *Homalia*.

obtusifolia Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 193 ; *C. M. Syn. II*, p. 49 ; Mitt. *op. cit.* p. 456.

2. ? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

octangula C. M. — *Cladomnium*.

octodicerus C. M. — *Papillaria*.

Erstedtiana C. M. — *Papillaria*.

ohioensis C. M. — *Leptodon*.

oligocarpa *Bryol. eur.* V (mon. p. 7), t. 441 ; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 566.

N. chlorocaulis Sull. *M. exs. I ed.* n. 268.

N. pennata β *tenera* C. M. *Syn. II.* pp. 50 et 663.

N. pumila *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 367, n. 653.

1. In fissur. rup. vel later. occult. — *Eur.* : Scandin., Fennia, Tirol.
As. : Jénissei sup. et med. *Am. sept.* : New Brunswick, Ontario,
lac. Super., *M. Rupestr.*, *M. Alb.*, Nov. Mexic.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 240 p.p.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1034.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* p. 393.

Un. itin. 1863, n. 54, 55.

oligocarpa Mac. p.p. — *N. Menziesii* var. *amblyclada*.

Orbignyana Ltz. *Moosst.* p. 164.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

orientalis C. M. — *Leucodon*.

orthocarpa C. M. — *Cylindrothecium concinnum*.

orthorhyncha *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 77.

1. In silvis. — *Am. sept.* : Mexic.

Osculatiana de Not. in *Acad... di Torino, II ser.*, XVIII, p. 440 c. ic.
— *Am. merid.* : Columb.

oxyphylla Mitt. in *hb. Kew.*

— *As.* : Bhotan.

Pabstiana C. M. — *Homalia*.

pachycarpa W. F. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 76.

— *Am. sept.* : Mexic.

pachygaster C. M. — *Pilotrichella*.

var. *gracilis* C. M. — *Pilotrichella pachygaster* var. *gracilis*.

- pallescens* C. M. — *Cylindrothecium*.
pallida C. M. — *Leucoloma Sieberianum*.
palustris Willd. — *Hypnum*.
panduraefolia C. M. — *Pilotrichella*.
Parishiana Mitt. *M. Ind. or.* p. 121.
 Syn. ? — *As.* : Moulmein.
parvula Mitt. — *Thamnium*.
patagonica Brid. — *Homalia glabella* ?
patula Schwaegr. p.p. — *Pilotrichum recurvifolium*.
Pechuelii C. M. — *Porotrichum*.
penduliramea C. M. — *Homalia*.
pennata (Hall.) Hedw. *M. frond.* III, p. 47, t. 19; *Bryol. eur.* V (mon. p. 6), t. 440; *C. M. Syn.* II, pp. 50 et 673; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 565.
Cryptopodia pennata Roehl. *Deutsch. Fl.* III, p. 82.
Daltonia pennata W. Arn. *Disp.* p. 54.
Fontinalis pennata L. *Sp. pl.* p. 1371. 15
Hypnum pennatum Hall. *Stirp. helvet. n.* 1297, t. 45, f. 2.
N. Distichia pennata Brid. *Bryol. univ.* II, p. 238.
Pilotrichum pennatum P. B. *Prodr.* p. 83.
Sphagnum pennatum, undulatum, vagina squamosa Dill. *Hist. M.* p. 250, t. 32, f. 9.
Weisia pennata Schrank *Baiers Fl.* II, p. 445.
 1. *Ad arbor. silvat. trunc.* — *Eur.* : *Reg. montosa infer.* *As.* : *Amour, Jenissei sup., Japon, Yunnan, Caucas. occ. Afr.* : *Ins. Canar., Fernando-Po, C. B. Sp.* — *Am. sept.* : *Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Manitoba. Pac.* : *Nov. Zeland (1), Tasman.*
Exs. : *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 161.
 Mac. Canad. M. p. 239.
 Rab. Bryoth. eur. n. 291 a et b, 1035.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 392.
 var. *cephalonica* W. P. Sch. — *N. cephalonica*.
 « var. *tasmanica* Hpe. in *Linn.* 1852, p. 715.
 N. hymenodonta (fid. Mitt.).
 — *Pac.* : *Tasman.*
pennata Wils. — *N. hymenodonta*.
 var. *tenera* C. M. — *N. oligocarpa*.
perichaetialis Hpe. — *Papillaria*.
perpusilla C. M. — *Anisodon Bertrami*.
Perrottetii C. M. — *Symphyodon*.
Pervilleana Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 131.
 Ster. Secus rivul. — *Afr.* : *Ins. Nossi-Phale.*
peterantha C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 162 (*subsp.* *N. oligocarpae*).
 1. *Rupic.* — *Am. sept.* : *M. Rupestr.*
Philippeana Bryol. eur. — *N. pumila* var. *Philippeana*.
phleoides C. M. — *Pilotrichella*.
phyllogonioides Sull. in *Proced. of the Am. Acad....* 1854 et in *U. St. Expl. Exped. Wilkes*, p. 20, t. 17.
 — *As.* : *Ins. Philippin. (Luzon).*
phyllogonioides C. M. — *Pilotrichella*.

(1) Fid. Fl. Tasmanica ; in Handb. of N. Zeal. Fl. non indicata.

planifolia { Hedw. — *Trachyloma*.
Hook. — *Trachyloma Menziesii*.
Reinw. et Hsch. — *Trachyloma indicum*.

platyantha (C. M.) *Par.*

Distichia platyantha C. M. in *Fl.* 1890, p. 1890, p. 489.

1. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

plicaeifolia C. M. — *Pilotrichella*.

plicata { C. M. — *Cylindrothecium*.
Schwaegr. — *Garovaglia*.

plumosa Reinw. et Hsch. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol.* XIV, II, p. 716; C. M. *Syn.* II, p. 146; *Bryol. jav.* II, p. 69.

Ster. — *As.* : Java.

Plumula (Nees) C. M. *Syn.* II, p. 53.

N. Hookeri Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 313.

Pilotrichum Hookeri eor. M. *frond. ined. Archip. ind.* p. 135, t. 47.

P. *Plumula* Nees ab Es. in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 759.

Syn. Ad arbor. et rup. — *As.* : Sumatra, Java, Borneo. *Pac.* : Nov. Caledon.

Pluvini Brid. — *Leptodon*.

Pohlîi C. M. — *Leucodon*.

Polakowskyi C. M. in *Journ. of Bot.* 1877, p. 229 (nom.).

Ad arbor. vetust. — *Am. sept.* : Costa Rica.

polyclada C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 114.

2. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

polytrichoides Schwaegr. — *Lepidopilum*.

Poeppigiana C. M. — *Cladomnium gracile*.

porodictyon Ren. el Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 180.

Ster. *Ad arbor.* — *Am. sept.* : Haïti.

? *praelonga* Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 187.

Ster. — *Am. merid.* : Valdiv.

praemollis C. M. — *Ædicladium rufescens*.

prionacis C. M. in *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. N. Guin.* p. 5, t. 3 A.

2. — *Pac.* : Nov. Guinea merid.

procumbens C. M. — *Leptodon*.

producta Hsch. — *Lasia*.

prostratula C. M. — *Aërobryum*.

pseudalopecura C. M. — *Leucodon julaceus*.

pseudo-crispa Rehm. M. *Afr. austr.* n. 328.

— *Afr.* : Natal.

pseudillecebra C. M. — *Papillaria*.

pseudo-imbricata C. M. — *Pilotrichella*.

pseudo-seductrix C. M. — *Cylindrothecium*.

pterops Rehm. — *Porotrichum*.

Puiggarii Geh. et Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 40.

1. — *Am. merid.* : Brasil.

pulchella { C. M. p.p. — *Pterogoniella commutata*.
Griff. — *Cylindrothecium*.

pulvinata C. M. — *Myrimia*.

pumila Hedw. M. *frond.* III, p. 49, t. 20; *Bryol. eur.* V (mon. p. 9), t. 442; C. M. *Syn.* II, pp. 56 et 664; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 567.

- Fontinalis pennata Huds. *Fl. Angl.* p. 468.
 Hypnum Dicksoni Gmel. *Syst. nat.* p. 1342.
 H. fontinaloides Lam. *Encycl. meth.* III, p. 164 (fid. Limpr.).
 H. pennatum Dicks. *Fasc. I Pl. crypt.* p. 6.
 H. pennatum undulatus crispum, setis et capsulis brevibus var. minor
 Dill. *Hist. M.* p. 273, t. 36, f. 12 B.
 H. pumilum Gmel. *l. c.* p. 1341.
 N. fontinaloides Lindb. *M. Scand.* p. 40.
 N. Distichia pumila Brid. *Bryol. univ.* II, p. 244.
 Pilotrichum pumilum P. B. *Prodr.* p. 83.
 2. Ad arbor. præcip. Conifer., rar. rup. — Eur.: Zon. intermed., rar.
 merid.: Norveg. occ. Afr.: Ins. Canar. Am. sept.: ? (1)
 Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 748 a et b, 1139 (forma), 1239.

« var. Philippeana Milde *Bryol. siles.* p. 282.

- N. fontinaloides var. Philippei Lindb. *M. Scand.* p. 40.
 N. Philippeana *Bryol. eur.* V (mon. p. 11), t. 445; C. M. *Syn.* II, p. 664.
 N. pumila var. pilifera Jur. in Rab. *Bryoth. eur.* n. 749.
 Ut typ. — Eur.: Rarior: Normann., Voges., Rhoengeb., Würtenb.,
 Silva nigr., Westphal., Brandeb., Siles., Bavar., Pyren.

pumila { Hsch. — N. urnigera.
 { Wahlenb. — N. oligocarpa.

pusilla Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 177.

Ad arbor. — As.: Japon.

pygmaea Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 24 et
M. Masc. Mad. n. 186.

Ster. — Afr.: Madagascar (Diego-Suarez).

pygmaea Dz. et Mk. — Schwetschkea.

quinquefaria C. M. — Pilotrichella.

ramulosa Mitt. — ? Climacium.

rectifolia Mitt. — Homalia.

recurvula (C. M.) Par.

Trachyloma recurvulum C. M. in *Bail. Syn. of the Queensland Fl.* IV
Suppl. p. 98 (nom.), t. 21, f. I; et in *Oefv.* 1893.

2? — Pac.: Austral. or. (Queensland).

Reginae Hpe. — Papillaria.

Reynelliana C. M. — Entodon.

Reinwardti C. M. — Spiridens.

remota Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss.*; C. M. *Syn.* II, p. 51.

1.

— Afr.: M. Cameroon, Abyss., litt. or. mar. Erythr.

var. laxa Br. et Sch. — N. abyssinica.

remotifolia Hsch. — Pilotrichella.

repens C. M. — Platygyrium.

retrorsa C. M. — Papillaria.

rigida C. M. — Pilotrichella.

rigidula Wils. — Leptodon.

rivalis Mitt. — Thamnum pumilum.

rostrata Griff. — Chionostomum.

rotundifolia Hartm. — N. Sendtneriana var. rotundifolia.

rufescens C. M. — Pilotrichella leucotricha.

rugulosa Mitt. *M. Ind. or.* p. 121.

Syn. ?

— As.: Ceylan.

(1) Fid. Br. et Sch. a Drummond collecta; auctoribus americanis ignota.

- Sanctæ Catharinæ C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 83.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- scabridens C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 828 et *Syn. II*, p. 51.
1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile austr., Valdiv.
- scabriseta } C. M. — Eurhynchium suberectum.
 } Schwaegr. — Lepidopilum subenerve.
- scalpellifolia Mitt. — Homalia.
- Schlechtendalii Piep. — Anomodon viticulosus.
- Schimperia C. M. — Braunia.
- Schmidii } C. M. — Pilotrichella.
 } Mitt. — Thamnium.
- Schnyderi C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 472.
— *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ay.
- Scioana Brizzi in *Ann. del R. Istit. bot. di Roma*, V, fasc. 2, 1893.
— *Afr.* : Litt. occ. mar. Erythraei.
- ? sciuroides Hpe. *Enum. Brasil.* p. 43.
Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- sciuroides C. M. — Leucodon.
 β cylindracea C. M. — Leucodon sciuroides var. morensis.
- Scottiae C. M. — Papillaria.
- scrobiculata Nees ab Es. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. XVI*,
 Suppl. II, 1843, p. 478 ; C. M. *Syn. II*, p. 53.
1. — *As.* : Manilla.
- secunda C. M. — Braunia.
- seductrix Hedw. — Cylindrothecium.
- semi-torta C. M. — Papillaria.
- Semperiana Hpe. mss.; C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 381.
Ster. — *As.* : Ins. Mindanao.
- Sendtneriana *Bryol. eur.* V (mon. p. 10), t. 445 ; W. P. Sch. *Syn. II* ed.
p. 569.
Homalia Pourretiana Roumeg. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1870, p. 444.
N. Besseri Jur. *Laubm. Osterr. Ung.* p. 365.
N. complanata var. foliis obtusis Rab. *Bryoth. eur. n.* 379.
N. complanata var. obtusa Lindb. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1870, p. 467.
N. leiophylla Gumbel in C. M. *Syn. II*, pp. 44 et 662.
Omalia Besseri Lobarz. in *Haiding. Naturw. Abhandl.* I, p. 48 ? C. M.
 Syn. II, p. 45.
O. Sendtneriana W. P. Sch. *Coroll.* p. 100.
2. Ad arbor. trunc et praepr. ad rup. calcar. — *Eur.* : Hungar.,
 Bohem., Carinth., Austr. inf., Salisb., Stir., Bavar., Tirol., Francon.,
 Tergest. Etrur. *As.* : Persia, Caucas. occ. et centr.
 Ess. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 610 (var.).
- « var. costata (R. Farneti) Par.
 N. Besseri var. costata R. F. in *Atti dell'Istit. bot. della R. univ. di*
 Pavia, 1893.
 — *Eur.* : Ital. super.
- « var. rotundifolia W. P. Sch. *op. cit.* p. 570.
 N. Besseri var. rotundifolia Husn. *Muscol. gall.* p. 292.
 N. Besseri forma tenella Lindb. *Bidr. till Mooss. Syn.* p. 22.
 N. rotundifolia Hartm. *Skand. Fl. III* ed. p. 368 ; W. P. Sch. *Syn. I* ed.
 p. 474.
 N. Sendtneriana tenella Mdo. in *Ltz. Moosst.* p. 102.
 Omalia rotundifolia W. P. Sch. *Coroll.* p. 101.
 Ut typ. — *Eur.* : Suecia, Carinth., Tirol. merid.

- var. *tenella* Mdo. — *N. Sendtneriana* var. *rotundifolia*.
- sericea* { C. M. — *Leucodon*.
Froëhl. — *Platygyrium repens*.
Hedw. — *Homalothecium*.
- serpens* Willd. — *Amblystegium*.
- serrulata* Brid. — *Trachypus*.
- setosa* Hook. — *Cyrtopus*.
- Sieboldi* C. M. — *Leskea tristis*.
- sinuata* C. M. — *Pilotrichella*.
- Smithii* C. M. — *Leptodon*.
- spathulaefolia* Mitt. — *Homalia*.
- spectabilis* Griff. — *Pterobryum crenulatum*.
- sphaerocarpa* { C. M. — *Hedwigidium squarrulosum*.
Hook. — *Cryphaea*.
- splachnoides* { Engl. Bot. — *Daltonia*.
Schwaegr. — *Anacamptodon*.
- splendens* Hsch. et Reinw. — *Pterobryum*.
- Spruceana* Mitt. *M. austr. am.* p. 456.
— *Am. merid.* : And Quitens.
- spurio-truncata* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 706.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- squarrosa* { C. M. — *Erythrodontium*.
Hook. — *Meteorium*.
- squarrulosa* C. M. — *Erythrodontium*.
- Stracheyana* Mitt. — *Homalia*.
- straminea* { C. M. — *Leptohymenium*.
Hsch. — *Rhaphidostegium circinale*.
- striata* C. M. — *Lescurea*.
- stricta* C. M. — *Leucodon secundus*.
- subacutifolia* Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881, p. .
Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subdisticha* Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 92.
— *Afr.* : Ins. Mayotte.
- subimbricata* Hpe. — *Pilotrichella*.
- subintegra* Lindb. — *Papillaria*.
- suborthosticha* C. M. — *Lepyrodon*.
- subpiligera* Hpe. — *Aërobryum*.
- subrecta* Mitt. — *Homalia*.
- subremota* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 281.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- subrugulosa* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 77.
Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
- subseriata* { Dz. et Mk. — *Thamnium Sandei*.
Hook. — *Thamnium subserratum*.
- subserrata* Hook., Mitt. — *Thamnium subserratum*.
- subsphaericarpa* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1691.
— *Am. merid.* : And. Boliv.
- substriata* Hpe. — *Porotrichum*.
- subtilis* Brid. — *Amblystegium*.
- subtruncata* Broth. in *Mitth. aus d. deutsch. Schutzgeb.* 1893, III.
— *Afr.* : Togo.
- subulata* C. M. — *Brachelyma*.

- subuliformis* Reinw. et Hsch. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. XI 7, p. 715; C. M. Syn. II, p. 146; Bryol. jav. II, p. 69.
 Ster. — As. : Java.
- sulcata* C. M. — Climacium.
Sullivantii C. M. — Cylindrothecium.
- sundaënsis* C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 436.
 1. — As. : Java.
- taitensis* W. P. Sch. in Hb. Mus. Paris (1850).
Calypsothecium praelongum Mitt. Sam. M. p. 190 (1868).
 N. Eugeniae Lindb. in Reichdt. Voy. Novara, 1870 (nom.).
 2. Ad arbor. — Pac. : Taïti, ins. Fidji, Samoa, Nov. Caledon.
- Targioniana* Mitt. — Homalia.
- tasmanica* Bryol. eur. V (mon. p. nom.).
 — Pac. : Tasman.
- tenax* C. M. — Pilotrichella.
- tenella* { C. M. — Pilotrichella.
 Kindb. — N. complanata var. tenella.
 Schwaegr. — Cryphaea.
- tenera* Hsch. Fl. Brasil. I, p. 56; C. M. Syn. II, p. 58; Mitt. M. austr. am. p. 455.
 Ster. — Am. merid. : Brasil. austr.
- tenuis* { C. M. — Pilotrichella.
 Hook. — Leptohyemium myuroides.
- teretiusecula* C. M. — Cylindrothecium.
- Ternstroemiae* C. M. — Pilotrichella.
- tetragona* C. M. — Pilotrichella.
- tomentosa* C. M. — Lepyrodon.
- torta* Sw. — Schlotheimia torquata.
- tortipilis* C. M. — Pilotrichella.
- Trachyloma* C. M. — Trachyloma Menziesii.
- Trachypus* C. M. — Trachypus bicolor.
- trichoblepharis* W. P. Sch. in Lechl. M. Chil. n. 818.
 — Am. merid. : Chile.
- trichoclada* C. M. — Hypnum.
- trichomanoides* Hartm. — Homalia.
- trichomitrium* C. M. — Forstroemia.
- trichophora* W. P. Sch. in Krause M. Chil.
 Ad arbor. — Am. merid. : Valdivia.
- trichophora* C. M. — Pilotrichella.
- trichophoroides* Hpe. — Pilotrichella.
- trichophylla* Brid. — Lepyrodon.
- tricostata* Sull. — Sciaromium.
- truncata* C. M. — Cylindrothecium.
- tumida* Dicks. — Meteorium.
- turgescens* C. M. — Pilotrichella.
- turgida* Jur. in Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien, 1861, p. 414;
 W. P. Sch. Syn. II ed., p. 570.
 N. mediterranea Philib. in Rev. bryol. 1880, p. 81.
 N. Menziesii W. P. Sch. Coroll. p. 100 et op. cit. p. 566 (fid. Husn.).
 2. Ad arb. vetust. et rup. umbros. — Eur. Rhoengeb., Fichtelgeb., Thuring., Alp. Sabaud. (M. Blanc), Galloprov. (c. fr. !), Ital., ins. Cephalon, et Leucate. Afr. : Alger.

- turgidula* C. M. — Pilotrichella.
 var. *tristis* C. M. — Pilotrichella *turgidula* var. *tristis*.
ulophylla W. et M. — Ulota *crispa*.
undulata (P. B.) Hedw. *M. frond. III*, p. 51, t. 21; *Mitt. M. austr. am.* p. 452.
Daltonia undulata W. Arn. *Disp.* p. 54.
Fontinalis crispa Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 138.
Hypnum jamaicense Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1341.
N. Distichia undulata Brid. *Bryol. univ. II*, p. 241.
Neckeropsis undulata Reichdt. in *Voy. Novara, Bot. I*, p. 181.
Pilotrichum undulatum P. B. *Prodr.* p. 83; *C. M. Syn. II*, p. 147.
Sphagnum pennatum, *undulatum* vagina pilosa Dill. *Hist. M.* p. 294, t. 32, f. 8.
 Syn. Ad arbor. — *Am. sept.* : Florida, Mexic., Antill. fere omn., inter-tropic. *Am. merid.* : Inter-tropic. ; Paraguay ; Patagon. ? *Pac.* : Ins. Mariann. ?
undulata } Duby. — *N. loriformis*.
 } Mont. — *M. Lepineana*.
urceolata C. M. — Pterogoniella.
urnigera C. M. *Syn. II*, p. 57; *Mitt. op. cit.* p. 455.
N. pumila Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.* p. 1089.
 1. — *Am. sept.* : Mexic.
uroclada Mitt. *M. Ind. or.* p. 122.
 2. — *As.* : Birmania.
uruguensis C. M. in *Linn.* 1888-79, p. 412.
 1. — *Am. merid.* : Uruguay.
Urvilleana C. M. *Syn. II*, p. 52.
N. Distichia pennata β *denticulata* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 240.
 — *Pac.* : Taïti (??) ; ins. Carolin. (Oalau).
vaginans W. et Dy. — Meteorium.
Valentiniana Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 132.
 — *Afr.* : Ins. Borbon.
versicolor C. M. — Pilotrichella.
Villae Ricæ Besch. *Not. M. Parag.* p. 265.
 Ad arbor. — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Balansa Pl. Parag. n. 1254.
virens H. f. et W. — Cylindrothecium.
viridis C. M. — Pilotrichella.
viridula Mitt. — Papillaria.
viticulæformis Piep. — Anomodon *viticulosus*.
viticulosa Hedw. — Anomodon *viticulosus*.
 β *minor* Hedw. — Anomodon *obtusifolius*.
viticulosoides P. B. — Leptodontium *epunctatum*.
vulpina Mont. — Pterogoniella.
Wallichii DC. — Aërobryum.
Welwitschii Dy. — Meteorium.
yesoana Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 358.
 1. — *As.* : Japon.
Exs. : Faurie n. 47, 128, 823, 3516 (1).

(1) In Enum. Kindberg. nom. nuda :

N. Balansæ C. M. (Neckeropsis).
Dillenii Lindb.
Fristedti C. M.

N. Hodgkinsoniæ C. M.
laeviuscula Geh.
subsecunda Lindb.

NECKERA DISTICHIA *Brid. Bryol. univ. II, p. 238.*
 Spec. omn. non indicatae sunt NECKERÆ ejusd. nom.
glabella Brid. — Homalia.
macropoda Brid. — Cylindrothecium.
pennata β *denticulata* Brid. — Neckera Urvilleana.
retusa Brid. — Neckera disticha.

NECKEROPSIS *Reichdt. in Novara Exp., Bot. I, p. 181.*
undulata Reichdt. — Neckera.

NOTARISIA *Hpe. in Linn. 1837, p. 379.*
capensis Hpe. — Ptychomitrium crispatum.
italica Hpe. — Ptychomitrium pusillum.
virginica Hpe. — Ptychomitrium incurvum.

OCHROBRYUM *Mitt. Musc. austr. am. p. 107 (5 spec.).*

Gardnerianum (C. M.) *Mitt. op. cit. p. 108.*

Leucophanes Gardnerianum C. M. *Syn. I, p. 85.*

L. phyllanthum *Lindb.*

Schistomitrium Gardnerianum *Mitt. in Kew Journ. bot. VIII, p. 356,*
t. 12 et M. Ind. or. p. 26.

— As. : Nepal. ? Khasia, Madras, penins. Malay.,
 Hong-Kong, Japon. *Am. sept.* : Mexic. ; Costa Rica ? *Am. merid.* :
 Amazon., Brasil.

Kurzianum *Hpe. in sched.*

— As. : Pegu.

obtusifolium (C. M.) *Mitt. in op. et l. cc. (1).*

Leucobryum obtusifolium C. M. *in Bot. Zeit. 1857, p. 577.*

Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

? *Rutenbergii* C. M. *in Abhandl. Brem. VII, p. 204.*

— Afr. : Madagascar.

subulatum *Hpe. mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 655.*

— As. : Birmania.

OCTOBLEPHARUM *Hedw. M. frond. III, p. 15, t. 6 (18 spec.).*

albidum *Hedw. M. frond. III, p. 15, t. 6 ; C. M. Syn. I, p. 86 ; Bryol.*
jav. I, p. 27.

Bryum albidum L. *Sp. pl. p. 1583.*

Br. nanum, lariginis foliis albidis *Dill. Hist. M. p. 364, t. 46, f. 21.*

Br. octoblepharis *Gmel. Syst. nat. II, p. 1331.*

l. *Cortic. et ad rup. umbros.* — As. : Japon., tropic. Afr. : Tropic.,

C. B. *Sp. Am. sept. et merid.* : Intertropic. *Pac.* : Ins. Sandwic.

Exs. : Dusen M. *Camer. n. 116.*

Rehm. M. Afr. austr. n. 453.

ampullaceum *Mitt. M. austr. am. p. 109.*

— *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Guian., Amazon.,

And. Peruv.

angustifolium *Mitt. op. cit. p. 110.*

— *Am. merid.* : And. Quitens.

(1) « Sterile » (C. M.) ; « calyptra mitraeformis » (Mitt.).

- asperum* Mitt. — Leucophanes.
cocuiense Mitt. *op. cit.* p. 109.
 Ad *Palm.* — *Am. merid.* : Amazon.
curvirostre Dz. et Mk. in *sched.* ; Jaeg. *Ad. I*, p. 170.
 — *As.* : Java?
cuspidatum C. M. in *Forschungsreise... Bot.* p. 57 (nom.).
 — *As.* : Ins. Philippin.
cylindricum W. P. Sch. in *hb. Hpe.* ; C. M. *Syn. I*, p. 87.
 1. — *Am. merid.* : Columb., Guian., Amazon.
densifolium Mitt. — Leucophanes.
dentatum Mitt. — Arthrocnemum.
fragillimum Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 6.
 Ster. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
hispidulum Mitt. — Leucophanes.
incrassatum Mitt. — Arthrocnemum.
linearifolium C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 84 et in *Forschungsreise... Bot.* 43.
 Ster. Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Hannov.
longifolium Lindb. in *Oefv....* 1864, p. 608.
 1. — *Pac.* : Taïti.
longifolium Mitt. — O. Mittenii.
microcarpon W. P. Sch. in *sched.* ; Jaeg. *Ad. I*, p. 170.
 1 — *Am. merid.* : Surinam?
minus Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 11.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
Mittenii Jacq. *Ad. I*, p. 169.
 O. *longifolium* Mitt. *op. cit.* p. 110.
 Ster. Ad rup. umbr. et terr. — *Am. sept.* : Guadalup. *Am. merid.* :
 Amazon., Brasil. austr. or.
octoblepharioides Mitt. — Leucophanes.
popillosum Mitt. — Leucophanes.
perforatum C. M. in *Hedwig.* 1895, p. 119.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz).
pulvinatum Mitt. — Arthrocnemum.
Radula Thuc. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 298.
 Leucophanes *Radula* Jaeg. *Ad. II*, p. 656.
 Ster. — *As.* : Ceylan.
Rhaphidostegium C. M. in *Hedwig.* 1895, p. 119.
 2. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz).
recurvum Mitt. — Leucophanes.
sanctum Mitt. — Leucobryum.
scabrum Mitt. — Leucophanes.
Schimperii Mitt. — Arthrocnemum.
Scolopendrium Mitt. *Fl. Vit.* p. 387.
 Syrrhopodon *Scolopendrium* Mitt. in *Bonplandia*, 1861, p. 366.
 Ster. — *Pac.* : Ins. Fidji.

serratum Hook. — *Dissodon indicus*.

smaragdinum Mitt. — *Leucophanes*.

stramineum Mitt. *M. austr. am.* p. 110.

— *Am. merid.* : Amazon.

OCTODICERAS *Brid. Bryol. univ.* II, 675.

Species omn. *CONOMITRIA* ejusd. nom.

ÆDICLADIUM Mitt. *Sam. M.* p. 195 (5 spec.).

involutaceum Mitt. *l. c.*

Leucodon involutaceus *Jaeg. Ad.* II, p. 121.

— *Pac.* : Ins. Samoa.

japonicum (*Besch.*) *Par.*

Endotrichum japonicum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 361.

— *As.* : Japon.

purpuratum Mitt. *Fl. Vit.* p. 393.

Ster.

— *Pac.* : Nov. Hebrid. (*Aneitum*).

rufescens (*Hsch. et Reinw.*) Mitt. *Sam. M.* p. 195.

Leucodon rufescens *H. et R. in Nov. Act. Acad. Cæs. Leop.* XIV, II, *Suppl.* p. 712 ; *C. M. Syn.* II, p. 120 ; *Bryol. jav.* II, p. 103, t. 214.

Neckera praemollis *C. M. l. c.* p. 671.

Stereodon praemollis Mitt. *M. Ind. or.* p. 106.

2.

— *As.* : Khasia, Ceylan, Sumatra, Java, Amboine.

sinicum Mitt. *in Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 171.

2 ?

— *As.* : Japon.

ÆDIPODIUM *Schwaegr. Suppl.* II, I, p. 15, t. 105 (1 spec.).

Griffithianum (*Dicks.*) *Schwaegr. l. c.* ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 83 ; *Bryol. eur.* III, t. 280 ; *C. M. Syn.* I, p. 128 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 354.

Bryum Griffithianum *Dicks. Fasc. IV Pl. crypt.* p. 8, t. 10, f. 10.

Gymnostomum Griffithianum *Sm. Fl. brit.* III, p. 1162.

Physcomitrium Griffithii *Ångstr. Disp. M. Scand.* p. 10.

Splachnum Froehlichianum *With. Bot. arr. brit. pl.* III ed., III, p. 794 (*excl. syn.*).

Spl. Griffithianum *With. et Hull (ex Hook. et Tayl. Muscol. brit.)* p. 11, t. 7).

Spl. ? succulentum *Brid. M. Rec.* II, III, p. 64 (*in obs.*).

Syn. Ad terr. humos. et in rup. fiss. — *Eur.* : Lappon., Alp. Scandiv.,

M. Scot., Angl., Cambrovall. Am. sept. : Groenland.

Exs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 1159.

OLIGOTRICHUM *DC. Fl. fr.* II, p. 492 (10 spec.).

aligerum Mitt. *in Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 48, t. 8 ; *Sull. Ic.*

M. Suppl. p. 55, t. 3 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 258.

2. Ad terr. humid. — *Am sept.* : *Columb. brit., M. Rupestr., Washing-*
ton, Oregon.

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 218.

canaliculatum (*Hook.*) Mitt. *M. austr. am.* p. 606.

Catharinea canaliculata *C. M. Syn.* II, p. 199.

Polytrichum canaliculatum *Hook. in Capt. Beechey's Voy.* p. 54.

2.

— *Am. merid.* : Chile.

- « *var. major* Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 186.
Ad arbor. — *Am. merid.* : Valdivia.
- erosum* (Hpe.) Lindb. in *Notiz.* 1867, p. 103; *Mitt. M. austr. am.* p. 646, n. 46.
Catharinea erosa Hpe. in *Linn.* 1863, p. 46.
2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- glabratum* Lindb. — *Psilopilum arcticum*.
- hercynicum* DC. *Fl. fr.* II, p. 492; *Bryol. eur.* IV, t. 413; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 531.
Atrichum hercynicum P. B. *Prodr.* p. 42.
Bryum incurvum Huds. *Fl. Angl.* II ed.
Catharinea hercynica Ehrh. *Beitr.* p. 190; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 99;
C. M. Syn. I, p. 196 et II, p. 559.
Catharinea hercynica var. sancta Brid. *Br. univ.* II, p. 101?
C. sancta ej. *Mant. M.* p. 203, n. 3?
C. sudetica Brid. *Bryol. univ.* II, p. 106?
O. incurvum Lindb. in *Hartm. Skand. Fl.* IX ed., II, p. 4 (*inter syn.*).
Orthotrichum hercynicum Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 25.
Polytrichum hercynicum Hedw. *M. frond.* I, p. 48, t. 15.
2. Ad terr. denudat. granit., aren., rar. turf. — *Eur.* : Reg. montan. super. usq. in Alp. et Pyr. *Am. sept.* : Groenland, fret. Behring. *Exs.* : Rab. *Bryoth. eur.* n. 114.
- « *var. latifolium* C. M. et Kindb. in *Mac. Cat.* p. 149.
Ad mol. glacial. — *Am. sept.* : M. Selkirk.
- incurvum* Lindb. — *O. hercynicum*.
- javanicum* (Hpe.) *Bryol. jav.* I, p. 37, t. 28.
Catharinea javanica Hpe, *Ic. M.* t. 22; *C. M. Syn.* I, p. 196.
2. — *As.* : Summ. M. Java.
- javanicum* Dz. et Mk. — *O. semi-lamellatum*.
- laevigatum* *Bryol. eur.* — *Psilopilum arcticum*.
- Molinae* (Mont.) Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 186.
Catharinea Molinae C. M. *Syn.* I, p. 198.
Polytrichum Molinae Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 102 et in *Hist. Chil. Bot. Crypt.* t. 4, f. 3.
- 2? Terr. — *Am. merid.* : Valdiv., *Chil. austr.*
- ? *Nietneri* (C. M.) Jaeg. *Ad.* I, p. 700.
Catharinea Nietneri C. M. in *Linn.* 1853, p. 36.
Ster. — *As.* : Ceylan.
- Riedelianum* (Mont.) Mitt. *M. austr. am.* p. 665.
Catharinea Riedleana Hpe. in *Linn.* 1847, p. 77; *C. M. Syn.* I, p. 197.
Polytrichum nigricans H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 151.
P. Riedelianum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1841, p. 269.
2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- semi-lamellatum* (Hook.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 150.
Catharinea semi-lamellata Hpe. in *Linn.* 1847, p. 79; *C. M. Syn.* I, p. 198.
O. javanicum *Bryol. jav.* (*fid. Mitt. l. c.*).
Polytrichum falcifolium Griff. *Not.* p. 387 et *Ic. Pl. asiat.* II, t. 93, f. 1.
P. semi-lamellatum Hook. *Ic. pl. rar.* t. 194 A. f. I.
2. — *As.* : Himalaya or., Khasia.
- * *f. yunnanensis* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 68.
Terr. — *As.* : Yunnan.

tenuirostre (*Hook.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 699.

Catharinea tenuirostris *Brid. Bryol. univ. II*, p. 101; *C. M. Syn. I*, p. 198.
Polytrichum tenuirostre *Hook. M. ex. t.* 75; *Handb. of N. Zeal. Fl.*
 p. 453.

2. — *Pac.*; *Nov. Zeland.*

tschutschicum *Lindb. et Arn.* — *Psilopilum*.

undulatum *Lam. et DC.* — *Atrichum undulatum*.

β minus eor. — *Atrichum undulatum var. abbreviatum* (1).

OMALIA vid. HOMALIA.

Omaliadelphus *C. M. Syn. II*, p. 208 (subsect. *HOOKERIAE*).

ONCOPHORUS *Brid. Bryol. univ. I*, p. 389.

alpestris *Lindb.* — *Cynodontium gracilescens var. alpestris*.

Billardieri *Brid.* — *Dicranum*.

brevipes *Brid.* — *Cynodontium*.

Bruntoni *Lindb.* — *Dicranoweisia*.

cerviculatus *Brid.* — *Dicranella*.

var. *uncinatus* *Brid.* — *Dicranella cerviculata var. pusilla*.

cirratus *Lindb.* — *Cynodontium gracilescens var. inflexum*.

conglomeratus *Brid.* — *Dicranum spurium*.

crispatus *Lindb.* — *Rhabdoweisia*.

crispifolius *Lindb.* — *Cynodontium*.

cyathicarpus *Mitt.* — *Amphoridium*.

dichotomus *Brid.* — *Dicranum*.

falcatus *Brid.* — *Dicranum*.

β *brevisetus* *Brid.* — *Dicranum*?

flavidus *Brid.* — *Dicranella cerviculata*.

fragilis *Brid.* — *Dicranum spurium*.

fugax *Lindb.* — *Rhabdoweisia*.

glaucescens *Lindb. et Arn.* — *Cynodontium*.

glaucus *W. P. Sch.* — *Leucobryum*.

gracilescens *Lindb.* — *Cynodontium*.

longirostris *Brid.* — *Dicranum spurium*.

Martianus *Lindb.* — *Oreas*.

obtusatus *Lindb.* — *Cynodontium gracilescens var. alpestre*.

polycarpus *Brid.* — *Cynodontium*.

β *atratus* *Brid.* — *Cynodontium polycarpum*?

γ *laevigatus* *Brid.* — *Cynodontium polycarpum*?

? *pusillus* *Brid.* — *Dicranella cerviculata var. pusilla*.

Schisti *Lindb.* — *Cynodontium*.

serrulatus *Lindb. et Arn.* — *Oreoweisia*.

sinensis *C. M.* — *Cynodontium*.

squarrosus *Brid.* — *Dicranella*.

β *abbreviatus* *Brid.* — *Dicranella squarrosa*?

Starkii *Brid.* — *Dicranum*.

striatus *Mitt.* — *Rhabdoweisia fugax*.

? *strigosus* *Brid.* — ? *Syrrophodon*.

(1) In *Enum. Kindberg.* nomina nuda (incl., sub *Oligotrich.*, gen. *Psilopilum* et *Polytrichadelphus*).

O. argutum *Mitt.*
atrichopsis *C. M.*
glaucum *Hpe.*

O. Lescurii *Sull.*
microdendrum *C. M.*
nepalense *Angstr.*

- strumifer* Brid. — *Cynodontium polycarpum* var. *strumifer*.
 var. *fuscescens* Weinm. — *Cynodontium virens* var. *Wahlenbergii*?
 var. *substrumosus* Brid. — *Cynodontium polycarpum*.
suecicus L. et J. — *Cynodontium*.
torquescens Lindb. et Arn. — *Cynodontium*.
virens Brid. — *Cynodontium*.
Wahlenbergii Brid. — *Cynodontium virens* var. *Wahlenbergii*.

Oreadella C. M. Syn. I, p. 508 (sect. BARTRAMIAE).

OREAS Brid. Bryol. univ, I, p. 380 (1 spec.).

- capensis* Br. — *Mielichhoferia Eckloni*.
elongata Brid. — *Mielichhoferia nitida* var. *elongata*.
Mielichhoferi Brid. — *Mielichhoferia nitida*.

Martiana Brid. op. cit. p. 383; Bryol. eur. IV, t. 314; C. M. Syn. I, p. 509; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 507.

Catoscopium Martianum Hüb. Muscol. germ. p. 153.

Grimmia Schubartiana Ltz. Moosst. p. 131, t. 5.

Onchophorus Martii Lindb. in Uth... p. 34.

Weisia Martiana Hsch. in Bot. Zeit. 1859, II, p. 86.

I. Terr. et rupic. — Eur.: Summ. Alp. Carinth., Salzburg., Stir.,
 Rhœt., Tirol., Helvet. As.: Sikkim.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 47, 1066.

OREOWEISIA W. P. Sch. Syn. I ed., p. 57 (subgen. WEISIAE) et II ed. p. 57 (gen. propr.) (12 spec.).

ampliata Mitt. M. austr. am. p. 53.

— *Am. merid.*: And. Quitens.

anomala Broth. in Ule Bryoth. brasil. n. 108.

Inter saxa. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

auridens (C. M.) Par.

Weisia auridens C. M. in Linn. 1880-83, p. 436.

l. — *Am. merid.*: M. Argent. Tucum.

* var. *robusta* (C. M.) Par.

Weisia auridens var. *robusta* C. M. op. cit. p. 437.

Ubi typ.

bogotensis (Hpe.) Mitt. l. c.

Weisia bogotensis Hpe. in Linn. 1869, p. 131.

Syn. Rupic. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat. et Boliv.

Exs.: Mandon Pl. Boliv. n. 1605.

brasiliensis Hpe. Symb. 1874, p. 485.

Weisia brasiliensis Hpe. Enum. M. Brasil. p. 14.

Syn.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Bruntoni Milde. — *Dicranoweisia*.

chilensis (Hpe.) Par.

Weisia chilensis Hpe. mss.; C. M. in Bot. Zeit. 1862. p. 350.

Syn.

— *Am. merid.*: And. Chilens.

erosa (Hpe.) Par.

Weisia erosa Hpe. mss.; C. M. in op cit. 1858, p. 163.

l.

— Afr.: C. B. Sp.

laxifolia (Hook.) Par.

Didymodon laxifolius Mitt. *M. Ind. or.* p. 23.

Grimmia flaccida Royle in sched.

Gr. laxifolia Hook. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 5 et *l.c. pl. rar.* t. 194 B; *C. M. Syn. I*, p. 783.

Weisia laxifolia Hpe. in *Jaeg. Ad. II*, p. 634.

W. serrulata Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 291.

— *As.* : Himalaya, Yunnan.

Lechleri (C. M.) Par.

Weisia Lechleri C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 350.

« *var. minor* (C. M.) Par.

Weisia Lechleri var. minor C. M. l. c.

— *Am. merid.* : Summ. Cordillier.

ligularis Mitt. *M. austr. am.* p. 53.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

obtusata Kindb. — *O. serrulata var. tenuior.*

Schmidii (C. M.) Par.

Anoetangium Schmidii Mitt. *M. Ind. or.* p. 32.

Zygodon Schmidii C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 60.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

serrulata (Funk) W. P. Sch. op. cit. p. 57.

Cynodontium serrulatum Jur. in *Verh. d. zool. bot. Gesells. in Wien*, 1871.

Onchophorus serrulatus Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 93.

Trichostomum paradoxum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 817.

Weisia procera Laur. in *Bryol. germ. II, II*, p. 90, t. 33.

W. serrulata Funk in *Brid. l. c.* p. 804; *C. M. Syn. I*, p. 655.

W. torquescens *Bryol. germ. l. c.* p. 86, t. 32; *Brid. l. c.* p. 349.

1. In rup. fissur. humos. — *Eur.* : Spitzberg, Alp. Salisburg., Stir., Carinth., Helvet., Tirol., Bergam. *As.* : Amour. *Am. sept.* : Lac, Super., Alaska, New Jersey, Pensilv.

Ews. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 1057.

« *var. tenuior* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 15.

A. obtusata ej. in *Rev. bryol.* 1896, p. 18.

Ad rup. torrent. — *Am. sept.* : M. Rupestr. (1).

ORONTOBRYUM Hpe. in sched.

recurvulum Hpe. — *Hypnum.*

Orthocarpus C. M. *Syn. I*, p. 319 (sect. BRYI).

Orthodicranum ej. l. c. p. 37 (sect. DICRANI).

ORTHODON (sect. p. 870)

ORTHODONTIUM Schwaegr. *Suppl. II, II, II*, p. 123 (21 spec.)

aethiopicum C. M. in *Bot. Zeit.* 1855.

O. gracile ej. *Syn. I*, p. 238 p.p.

— *Afr.* : Abyss.

australe Hook. f. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 545; *Fl. An-*

(1) In Enum. Kindb. nom. nudum :

O. laevifolia Lindb.

- tarct. II*, p. 412, t. 153, f. 5 et *Fl. Tasm. II*, p. 188; *C. M. Syn. I*, p. 239 et *II*, p. 567.
- Apalodium australe* Mitt. *M. austr. am.* p. 239.
1. Lignic. — *Afr.*: Ins. Marion. *Am. merid.*: Fuegia, ins. Eremit., Maclov. *Pac.*: Tasman.
- confine* Hpe. in *Ann. sc. nat.* 1865, V ser., IV, p. 338.
1. Filic. et lignic. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
- denticulatum* Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881, p. .
1. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.
- Emodi* C. M. in *Jaeg. Ad. I*, p. 576 (nom.).
- *As.*: Sikkim.
- Fendleri* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 473.
1. — *Am. merid.*: Venezuela.
- gracile* Schwaegr. in litt. ad Wilson; *Bryol. eur. IV*, t. 330; *C. M. Syn. I*, p. 238 (excl. loc. Abyss.); *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 389.
- Bryum* (Pohlia) *gracile* Wils. in *Gardn. M. brit. t.* 31 App.
- Stableria gracilis* Lindb. in *Utk. till en nat. grupp. Eur. bladn.* p. 29.
- 1 vel 2. Ad rup. arenar. vel terr. humos. — *Eur.*: Anglia, Gall. occ. (Armoric.).
- Exs.*: Rab. *Bryoth. eur. n.* 677.
- gracile* C. M. p.p. — *O. aethiopicum*.
- humile* (Mont.) Mitt. *M. austr. am.* p. 275.
- Bryum* (Pohlia) *humile* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 104.
- O. tenue* C. M. *Syn. I*, p. 240.
2. — *Am. merid.*: Chil. austr.
- inflatum* (Mitt.) Par.
- Apalodium inflatum* Mitt. in *Voy. of H. M. S. Challenger, Bot. IV*, p. 198 (in adn.).
- *Pac.*: Austral. or. (Nov. Valesia).
- infractum* Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 313 et *M. frond. ined. Archip. Ind.* p. 34, t. 14; *Bryol. jav. I*, p. 135.
- O. sulcatum* C. M. *Syn. I*, p. 239.
1. — *As.*: Ceylan, Java, Borneo.
- julaceum* Schwaegr. — *Bryum Gilliesii*.
- lanceolatum* Mitt. in *Kew journ. bot.* 1856, p. 261.
- Apalodium lanceolatum* Mitt. in *op. cit.* p. 761.
- *Pac.*: Austral. or., Tasman.
- lineare* Schwaegr. l. c. p. 124, t. 188; *C. M. Syn. I*, p. 238.
- Apalodium lineare* Mitt.
1. — *Afr.*: C. B. Sp.
- longisetum* Hpe. in *Linn.* 1863, p. 129.
- O. pellucens* (fid. Mitt.).
1. Terr. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
- loreifolium* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 89.
1. Cortic. — *Afr.*: Ins. Borbon.
- Oorschoti* Lac. — *Splachnobryum*.
- Osculationum* de Not. in *Acad. Torin. II ser., XVIII*, p. 443, t. 4.
- *Am. merid.*: Columb.

ovale C. M. in *Oefv. af Finska Vet. Soc. Foerh.* 1893, p. 36.

1. Lignic. — *Pac.* : Austral. (Nov. Vales.).

pellucens (Hook.) *Bryol. eur.* IV (mon. p. 3) ; C. M. *Syn.* I, p. 240.

Apalodium pellucens Mitt. *M. austr. am.* p. 238.

Bryum (Pohlia) *pellucens* Hook. *Ic. pl. rar.* I, t. 34.

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat et Quitens.

pycnoblastum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 132.

Filicic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

setaceum W. P. Sch. in *Mandon Fl. Boliv.* n. 1658.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

sulcatum Hook. f. et Wils. in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 739 B ; *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 81 et *Handb.* p. 436 ; C. M. *Syn.* II, p. 566.

1 vel syn. Lignic. et rupic. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

sulcatum C. M. (*Syn.* I). — *O. infractum*.

tenellum Mitt. *M. austr. am.* p. 205.

Syn. — *Am. merid.* : And. Quitens., Brasil.

tenue C. M. -- *O. humile*.

ORTHODON Bory Saint-Vincent in *Schwaegr. Suppl.* II, p. 23, t. 106.

Spec. omn. non indicatae sunt DISSODONTES ejusd. nom.

serratus Bory p.p. } *Dissodon borbonicus*.
 } *Dissodon Isleanus*.

ORTHOMNIUM Wils. in *Kew Journ.* IX, p. 368 (2 spec.).

crispum Wils. l. c.

Mnium crispum Mitt. *M. Ind. or.* p. 142.

2. — *As.* : Sikkim.

trichomitrium Wils. l. c.

Mnium trichomitrium Mitt. l. c.

Orthotrichum? *bryoides* Griff. *Not.* p. 404 et *Ic. Pl. assiat.* II, t. 77, f. 3.

2. — *As.* : Khasia.

Orthophyllaria C. M. *Syn.* I, p. 688 (sect. ORTHOTRICH).

Orthophyllina ej. l. c. p. 723 (sect. MACROMITRII).

Orthophyllum ej. l. c. p. 523 (sect. SYRRHOPODONTIS).

ORTHOPUS Lindb. *M. Scand.* p. 25 (nom., = *Campylopus brevifolius*).

ORTHOPYXIS P. B. *Prodr.* p. 78.

androgyna P. B. -- *Aulacomnium*.

aristata P. B. — *Barbulata unguiculata*.

attenuata P. B. } (fid. Brid.). — *Bryum pallens* var. *attenuata*.
 } (fid. Lindb.). — *Entosthodon Templetoni?*

heterosticha P. B. — *Aulacomnium*.

longicolla P. B. — *Webera*.

macrocarpa P. B. — *Leptostomum*.

megapolitana P. B. — *Timmia*.

palustris P. B. — *Aulacomnium*.

ramosa P. B. — *Aulacomnium palustre* var. *polycephalum*.

squarrosa P. B. — *Paludella*.

ORTHORHYNCHIUM Reichdt. in Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien, 1868, p. 115 (4 spec.).

elegans (Hook. f. et Wils.) Reichdt. l. c.

Phyllogonium elegans H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 548; Fl. of the N. Zeal. II, p. 102, t. 88, f. 6 et Handb. p. 462; C. M. Syn II, p. 21.

Ad arbor. — Pac. : Austral felix, Nov. Zeland.

Hampeanum C. M. in Linn. 1869-70, p. 29.

Acrocladium politum (fid. Mitt.).

Phyllogonium elegans Hpe. in Müll. M. Austral. et in Linn. 1855-56, p. 212.

Ster. — Pac. : Austral. felix.

Nietneri C. M. op. cit. p. 28.

Phyllogonium elegans Mitt. M. Ind. or. p. 115.

— As. : Ceylan.

philippinense (Hpe.) C. M. op. cit. p. 80.

Phyllogonium philippinense Hpe. in sched.

Ster. — As. : Ins. Basilan Philippin.

ORTHOSTICHELLA C. M. Syn. II, p. 123 (*primum subsect. NECKERAE, postea gen. propr.*).

Species omn. PILOTRICHELLAE ejusd. nom.

ORTHOTHECA Brid. Bryol. univ. I, p. 778.

Species omn. non indicatae sunt SYRRHOPODONTES ejusd. nom.

<i>Berteriana</i> Brid. p p.	{	— Syrrhopoda.
		— Syrrhopodon malouinensis.
		— Syrrhopodon Urvilleanus.

Orthotheciella C. M. in Engler's Bot. Jarhb. 1883, p. 83 (sect. HYPNI sensu Müller.).

ORTHOTHECIUM Bryol. eur. V (10 spec.).

? *binervulum* Mdo. in litt. 1861; Ltz. Moosst. p. 120; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 805.

Holmgrenia binervula Mdo. in Ltz. Moosst. p. 122.

Leskea binervula Mdo. Bayern Laubm. p. 218.

O. intricatum var. *binervulum* Husn. Muscol. gall. p. 317.

Fl. et fr. ign. Ad niv. inter moles chaotic. calcar. — Eur. : Stiria, Alp. Bavar., Tirol. merid.

? *Bollei* Jaeg. — ? *Pylaisia*.

Celebesiae C. M. in Jaeg. Ad. II, p. 369.

Hypnum neelgheriense Bryol. jav. II, p. 228.

Oucodium Celebesiae C. M. in Kindb. Enum. Bryin. ex. 1888, p. 27.

— As. : Celebes.

chryseum (Schwaegr.) Bryol. eur. V (mon. p. 3), t. 465; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 631.

Holmgrenia chrysea Lindb. in Oefv. Vet.-Ak. Foerh. 1862, n. 10.

Hypnum chryseum Schwaegr. in Schult. Reise auf d. Glockner, II, p. 364; C. M. Syn. II, p. 385.

H. rufescens H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 221.

H. rufescens var. *chryseum* Rab. Deutsch. Krypt. II, III, p. 298.

Isothecium chryseum Spr. in Ann. aud Mag. of nat. hist. 1849.

1. *rufescens* β *chryseum* Hüb. *Muscol. germ.* p. 601.
Leskea chrysea Hartm. *Skand. Fl.* VI ed.
L. rufescens β *chryseum* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 286.
Pylaisia chrysea Vent. et Bott. *Enum.* p. 19.
Stereodon chryseus Mitt. *M. Ind. or.* p. 93.
2. *Rupic.* — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursorum, Alp. Lapon., Scandin., Fenniae; Tatra, Salisb., Stir., Austr. infer., Alp. Bavar. et Algov., Tirol., Helvet. As. : Tibet occ. Am. sept. : Groenland, M. Rupestr. *Ecs.* : Mac. Canad. M. n. 226.
 Rab. Bryoth. eur. n. 994.
- « *var. cochlearifolia* Lindb. *Spitsb. Mossor.* p. 543.
O. chryseum *var. patula* Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norw.* p. 45?
 — *Eur.* : Spitzberg; Scandin.?
- « *f. lapponica* (W. P. Sch.) Lindb. in *Meddel.* 1886, p. 254.
Brachythecium lapponicum W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 697.
Leskea lapponica Lindb. *Spitsb. Mossor.* p. 543.
Leucodon Lagurus *var. borealis* (Wils.) Lindb. *mss.*
O. lapponicum Hartm. *Skand. Fl. ed. X. II.* p. 29.
Stereodon lapponicus Lindb. *M. Scand.* p. 38.
Ad niv. deliquesc. — *Eur.* : Lapon. Pitens.
var. patula Kindb. — *O. chryseum* *var. cochlearifolia*?
chryseum Helb. *Un. itin.* — *Camptothecium lutescens* *var. involuta.*
complanatum Kindb. — *O. rufescens.*
- Duriei* (Mont.) *Besch. Cat. M. Alger.* p. 34.
Brachythecium Duriei de Not. *Epil.* p. 122.
Hypnum Duriei Mont. *Syll.* p. 9; *C. M. Syn. II,* p. 417 (1).
 2. *Fr. ign. Terr.* — *Eur.* : Galloprov., Sardin., ins. Ponza. *Afr.* : Alger. (ins. Galita).
- intricatum* (Hartm.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 4), t. 457; W. P. Sch. *op. cit.* p. 630.
Holmgrenia intricata Lindb. in *Oefv. Vet.-Ak. Foerh.* 1862, n. 10.
Hypnum chrysophylloides C. M. *Syn. II,* p. 436 p.p.
H. irroratum C. M. *Syn. II,* p. 395.
Isothecium homomallum Spr. *mss.*
I. intricatum Boul. *M. Fr. I,* p. 148.
Leskea intricata Hartm. *Skand. Fl. V ed.* p. 336.
L. irrorata Sendtn. *Beobacht. über die Klimat. Verbreit. d. Laubm.* p. 26.
L. polyantha β *sericeola* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 313.
L. subrufa Wils. *Bryol. brit.*
Pylaisia intricata Vent. et Bott. *Enum.* p. 19.
P. sericea de Not. *Epil.* p. 207.
Stereodon subrufus Lindb. *M. Scand.* p. 38.
2. *Rariss. fruct. Ad rup. calcar. humid.* — *Eur.* : Scandin., Beskid., Sudet., Riesengeb., Boehmerwald, Tatra, Salisb., Carinth., Thüring., Westphal., Rhoengeb., Luxemb., Wurtemb., Francon., Alp. Bavar. et Algov., Tirol., Helvet. As. : Caucas. Am. sept. : Groenland, M. Rupestr. *Ecs.* : Rab. Bryoth. eur. n. 345.
 Un. itin. 1867, n. 14.
var. binervulum Husn. — *O. binervulum.*
var. rubellum Husn. — *O. strictum.*
- « *var. sericeum* *Bryol. eur. l. c.*
 — *Eur.* : Norveg.

(1) Cf. Philibert in *Rev. bryol.* 1889, p. 51.

lapponicum Hartm. — *O. chryseum* f. *lapponica*.

neelgheriense (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 369.

Hypnum Bonplandi Mitt. *M. Ind. or. p.p.* (fid. *C. M. in Linn.* 1869-70, p. 71).

H. neelgheriense *C. M. Syn. II*, p. 462.

Isothecium neelgheriense Mont. in *Ann. sc. nat.* 1842, p. 246.

Pleuropus fenestratus Griff. *Not. p.* 468 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 90, f. I (p.p. ?).

2 ?

— *As.* : Assam, M. Neilgherr., China.

* *var. ceylanicum* (*C. M.*) Jaeg. *l. c.*

Hypnum Bonplandi Mitt. *l. c. p.p.* (fid. *C. M. l. c.*).

H. neelgheriense var. ceylanicum *C. M. in Linn. l. c.*

— *As.* : Ceylan.

rubellum (Mitt.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 315.

O. strictum Ltz. (fid. *Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, *II*, p. 154).

Stereodon rubellus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 40.

2. *Ster. ?*

— *Eur.* : Lappon., Norveg. *As.* : Ienissei

super. Am. sept. : Fret. Davis, M. *Rupestr.*

rubellum Kindb. — *O. strictum*.

rufescens (Dicks.) *Bryol. eur. V* (mön. p. 3), t. 460; *W. P. Sch. op. cit.* p. 631.

Holmgrenia rufescens *Lindb. in Oefv. Vet.-Ak. Foerh.* 1862, n. 10.

Hypnum caulibus vix ramosis, foliis subulatis aristatis, capsulis gracilibus Hall. *Hist. stirp. Helvet. n.* 1784.

H. rufescens Dicks. *Fasc. III, Pl. crypt. p.* 9, t. 8, f. I; *C. M. Syn. II*, p. 384.

Isothecium chryseum Spr. *M. Pyren. n.* 90 et in *Ann. and Mag. nat. hist.* 1849.

I. rufescens Hüb. *Muscol. germ.* p. 600.

Leskea rufescens *Schwaeagr. Suppl. I, II*, p. 284.

O. complanatum Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norw.* p. 45.

Pylaisia rufescens de Not. *Epil.* p. 206.

Stereodon rufescens Mitt. *op. et l. cc.*

2. In fissur. rup. irror. — *Eur.* : Alp. omn., praesert. calcar. *As.* : Ienissei inter. *Am. sept.* : Fret. Davis.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 134, 290 a-c.

Un. itin. 1867, n. 13.

? *Schlagintweitii* (Sendtn.) Par.

Hypnum Schlagintweitii Sendtn. *mss.*; *C. M. Syn. II*, p. 395.

2.

— *Eur.* : Carinth.

strictum Ltz. *Moosst. p.* 122, t. 5; *W. P. Sch. op. cit. p.* 805.

Holmgrenia stricta Ltz. *l. c.*

Isothecium strictum Boul. *M. Fr. I*, p. 149.

Leskea intricata var. suberecta C. Hartm. *Skand. Fl. X ed. p.* 29.

L. stricta *Lindb. Spitsb. Mossor. p.* 543.

O. intricatum var. rubellum *Husn. Muscol. gall. p.* 317.

O. rubellum Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norw. p.* 46.

Stereodon rubellus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 40 (fid. *Limpr.*).

♂ et fr. ign. In fissur. rup. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursorum, Scandin., Fennia, Carinth., Helvet. *Am. sept.* : Groenland?

Orthothuidium *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p.* 91 (subgen. THUIDI).

ORTHOTRICHUM Hedw. M. frond. p. 96 (214 spec.).

abbreviatum Groenw. — O. Sardagnae.

aciculare Hook. et Grev. — Macromitrium.

acuminatum Philib. in *Rev. bryol.* 1881 et in *Husn. Muscol. gall.* p. 167.
l. Cortic. — Eur. : Gall. centr., Galloprov., Corsica, Etrur., Tirol.

acuminatum R. Br. — O. Brownii.

acutifolium R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 436, t. XXIX, fig. 25.
l. Cortic. — Pac. : Nov. Zeland.

acutifolium Hook. et Grev. — Macromitrium longirostre..

aequatoreum Mitt. M. austr. am. p. 184.

l. Cortic. — Am. merid. : And. Quitens.

aetnense de Not. — O. rupestre var. aetnense.

affine Schrad. *Spic. fl. Germ.* p. 67 ; *Brid. Bryol. univ.* I, pp. 281 et 785 ;
Bryol. eur. III (mon. p. 7), t. 216 ; C. M. Syn. I, p. 705 ; W. P. Sch.
Syn. II ed. p. 321.

Bryum affine Gmel. *Syst. nat.* II, p. 1335 ?

Br. semi-vacuum Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 868 ?

Dorcadium affine Lindb. M. Scand. p. 28.

O. octoblephare *Brid. M. Rec.* II, II, p. 24.

O. striatum Hedw. M. frond. II, p. 99, t. 36, f. 9 (fid. Limpr.).

O. umbonatum *Brid. Bryol. univ.* I, p. 787.

Polytrichum Bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, majus *Dill. Hist. M.*
p. 430, t. 55, f. 8 (fid. Limpr.).

P. capsulis sessilibus, foliis brevibus rectis carinatis *Dill. op. cit.* p. 432,
t. 55, f. 10 ? (fid. C. M.).

Sphagnum semi-vacuum P. B. *Prodr.* p. 89.

Weisia affinis Roth. *Fl. Germ.* III, I, p. 217.

W. octoblepharis ej. op. cit. p. 218.

l. Cortic. — Eur. : Vulgatiss. As. : Kamschatka, Caucas. Afr. : Septentr. Am. sept. : Fret. Smith, New Brunswick, Ontario, lac. Super., Idaho, Oregon, Washington, Vancouver.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 279 et b, 890 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 182.

var. *fastigiatum* Hüb. — O. fastigiatum.

var. *neglectum* Vent. — O. neglectum.

var. *patens* Groenw. — O. patens.

var. *pulvinatum* Vent. — O. appendiculatum.

var. *pumilum* } Hook. — O. strangulatum.
 } H. et T. — O. fallax.

var. *rupestre* Brid. — O. rupestre.

var. Hook. — O. canadense.

affine Schwaegr. — O. fastigiatum.

alpestre Hsch. in sched. ; *Bryol. eur.* III (mon. Suppl. I), t. 213 (1849) ;
C. M. Syn. I, p. 698 ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 325.

Dorcadium alpestre Lindb. l. c.

O. stramineum *Bryol. eur.* III (mon. p. 23) p.p. (1837).

O. stramineum var. *alpestre* Vent. in *Vent. et Bott. Enum.* p. 29.

l. Rupic., rar. cortic. — Eur. : Ins. Ursor., Alp. Norveg., Carinth.,
Salisb., Stir., Austr., Tatra, Rhœet., Vall. Tell., Tirol. ; Pyren.
As. : Jenissei sup. Am. sept. : Ontario, M. Rupestr., Idaho, Utah.

Exs. : Un. itin. 1863, n. 45.

- « *var. majus* Lesq. et Jam. Man. p. 169.
O. alpestre var. Sull. Ic. M. Suppl. p. 69, t. 51.
O. occidentale Jam. in Bot. King Exped. p. 402.
 — Am. sept. : Ubi typus.
- var. Sull.* — *O. alpestre* var. *majus*.
alpestre Wils. — *O. fastigiatum*.
- Amanni Culman in Rev. bryol. 1892, p. 57 (1).
 l. Cortic. — Eur. : Gall. sept. or. (Compiègne).
- americanum* P. B. — *Ulota Hutchinsiae* (2).
Anderssonii C. M. — *Ulota leiothecia*.
angulosum P. B. — *Schlotheimia quadrifida*.
- angustifolium* Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 547 ;
Fl. Antarct. I, p. 125, t. 57 et *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 433 ; C. M.
Syn. I, p. 691 et *II*, p. 638.
 l. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen. Pac. : Ins. Campbell.
- anomalum* Hedw. Sp. M. p. 162 ; *Bryol. eur. III* (mon. p. 10), t. 210 ;
 C. M. *Syn. I*, p. 694 ; W. P. Sch. op. cit. p. 308.
Brachytrichum anomalum Roehl. Ann. d. Wett. Ges. III, p. 194.
Dorcadium anomalum Lindb. l. c.
Grimmia ovata Schrank Baiers Fl. II, p. 443.
O. aureum Mart. Fl. Erlang. crypt. p. 11, t. XI.
O. humile Schleich. Cent. IV pl. Helv. n. 15.
O. leptocarpum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 326.
Weisia anomala Roth. Fl. Germ. III, I, p. 215.
W. ithyphylla β minor Ehrh. Beitr. I, p. 191.
- l. Ad mur., rup., tecta, rar. arbor. — Eur. : In reg. camp. vulg. As. :
 Jenissei sup., Kashmir, Himalaya et Tibet. occ., Pers., Caucas.
 Afr. : Alger. Am. sept. : Groenland, New Brunswick, Ontario,
 Saskatchewan, reg. sept. occ., M. Rupestr., Massachussets, New
 York.
 Exs. : Mac. Canad M. n. 118 p.p.
 Rab. Bryoth. eur. n. 181.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 177.
- « *var. americanum* Vent. in Mac. Cat. p. 86.
O. anomalum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 148 ; Mac. Canad. M. n. 118 p p.
 Rupic. — Am. sept. : Alberta, Manitoba.
- var. americanum* Brid. — *Ulota Hutchinsiae*.
var. ciliatum Jur. — *O. anomatum* var. *cylindricum*.
- « *var. cylindricum* W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. I-II (Orthotr.) t. 10
 et op. cit. p. 308 (3).
O. anomalum Wils. Bryol. brit. p. 177.
O. anomalum β *ciliatum* Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 213.
O. saxatile Wood. Not. and Obs. on the *O. anomalum*, in *Physiol.* 1860.
 Ad sax. calcar. — Eur. : Westphal., Bernina.
- « *var. defluens* Vent. in Husn. l. c.
O. pellucidum Lindb. ?
 — Eur. : Reg. montan. silic.

(1) « An potius var. *O. appendiculati* ? » (ej. l. c.).

(2) Conf. Venturi in Rev. bryol. 1892, p. 4.

(3) Sec. Venturi in Husnot Muscol. gall. p. 159, forma normalis.

« var. saxatile Vent. l. c.

Dorcadium saxatile Lindb. l. c.

O. saxatile Brid. *Bryol. univ.* I, p. 275.

— *Eur.* : Anglia. *As.* : Caucas.

« var. *Kindb.* in *Mac. Cat.* p. 87.

O. Venturi Mac. *Canad. M. n.* 455.

Ad *Thuy. occid.* — *Am. sept.* : Ontario.

anomalum { *Drumm.* — *O. anomalum* var. *americanum*.
Engl. Bot. — *O. cupulatum*.
Rob. Br. — *O. Novae Zelandiae*.
Wils. — *O. cupulatum* var. *cylindricum*.

anomalum ♀ × *stramineum* ♂ *Ruthe* in *Hedwig.* 1873, n. 1

Ad *Salic.* — *Eur.* : Boruss. sept.

apiculatum Mitt. *M. austr. am. p.* 188.

2. — *Am. merid.* : M. Pichincha.

apiculatum Hook. — *Macromitrium*.

appendiculatum W. P. Sch. *ll. cc. t.* 9 et p. 330.

O. affine β *pulvinatum* Vent. in *Jaeg. Ad. I,* p. 458.

O. fastigiatum β *appendiculatum* Jur. *Laubm. Oesterr. Ung. p.* 203.

1. Ad arbor. ambulacr. — *Eur.* : Ins. Norderney, vall. Rhen., Siles.,
 Austr. inf., Bavar., Ital. super.

Araucarieti C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 20.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

arcticum W. P. Sch. *ll. cc. t.* 5 et p. 310 (1).

Dorcadium arcticum Lindb. *M. Scand. p.* 29.

1. Rupic. — *Eur.* : Spitzberg, Lappon. ross., Norveg. *Am. sept.* :
 Groenland.

arctum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 440, t. XLI, fig. 34.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

aristatum Hpe. in *Linn.* 1863, p. 145.

2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

aristatum Turn. — *O. diaphanum*.

Arnellii Groenv. — *O. pallens*.

assamicum Griff. — *Macromitrium*.

assimile C. M. *Syn. I,* p. 704 ; Mitt. *M. austr. am. p.* 185.

1. — *Am. merid.* : Chile.

atratum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 66.

1. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

aurantiacum Groenv. — *O. pallens* var. *parvum*.

Aurantiorum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 443.

1. Ad *Aurant.* — *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

aureum Mart. — *O. anomalum*.

auridens W. P. Sch. — *O. Rogeri*.

(1) « Species omnes sect. *Orthotrichorum arcticorum* in Husn. *Muscol. gall.* p. 172, scilicet : *O. arcticum*, *Barthii*, *Blyttii*, *Breutelii*, *brevinerve*, *microblephare*, *Sommerfeldti*, formas unius speciei sistunt. » (Vent. l. c.).

australe *Jur. in Hedwig. 1867, n. 10.*

— *Eur. : Hispan. (Arragonia).*

avonense *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 438, t. XI., fig. 29.*

1. Cortic. — *Pac. : Nov. Zeland.*

Baldaccii *Bott. et Vent. in Hedwig. 1892, p. 135 ; Vent. in Rev. bryol. 1893, n. 97.*

1. Ad rup. calcar. — *Eur. : Montenegro ; Hispania (Cuença).*

Barthii *Sendtn. in Fl. 1849, p. 274 ; C. M. Syn. I, p. 693.*

O. Blyttii ? (fid. Vent. in Husn. l. c.).

1. Rupic. — *Am. sept. : Groenland.*

bellum *C. M. in Linn. 1878-79, p. 360.*

1. Cortic. — *Am. merid. : Argentin. subtropic.*

benmoreense *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, n. 430, t. XXXVII, fig. 12.*

1. Ad ramul. — *Pac. : Nov. Zeland.*

Blyttii *W. P. Sch. ll. cc. t. 4 et p. 311.*

O. Barthii ?
O. Breutelii ? } (*fid. Vent. l. c.*).

Dorcadium Blyttii Lindb. l. c.

1. Rupic. — *Eur. : Lappon., Norveg. Am. sept. : Groenland.*

Bolanderi *Sull. Ic. M. Suppl. p. 64, t. 46 ; Lesq. et Jam. Man. p. 167.*

O. rupestre var. vulgare f. densior Vent. l. c. p. 156.

1. Rupic. — *Am. sept. : Calif.*

boreale *Groenv. — O. pallens var. parvum ?*

brachytrichum *W. P. Sch. mss. ; Lesq. et Jam. in Proced. Am. Acad. XIV, p. 140 et Man. p. 172.*

O. inflexum C. M. Syn. I, p. 690.

O. obtusifolium Drumm. M. bor. am. I ed. n. 157.

O. Rogeri Br. et Sch. Corr. M. Drumm. in Lond. Journ of bot. 1843, p. 667.

2. Cortic. — *Am. sept. : Ab Ontario ad M. Rupestr., Columb. brit.*

Braunii *Bryol. eur. III (mon. p. 16). t. 215 ; C. M. Syn. I, p. 702 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 326.*

O. strangulatum Aust. M. Appal. (fid. Vent. p. 182).

1. Ad arbor. praepr. junior. — *Eur. : Vall. Rhen., Palatin., ins. Rügen, Salisb., Stir., Bavar., Tirol., Helvet. Am. sept. : New Brunswick.*

Breutelii *Hpe. — O. Pylaiscei.*

var. ? *Berggr. — O. pellucidum.*

breve *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 426, t. XXXV, fig. 3.*

1. Cortic. — *Pac. : Nov. Zeland.*

breve *P. B. — Macromitrium aciculare.*

brevicolle *Mitt. — Ulota.*

brevirostrum *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 436, t. XL, fig. 28.*

1. Cortic. — *Pac. : Nov. Zeland.*

brevinerve *Lindb. in Rev. bryol. 1887, p. 63.*

Dorcadium brevinerve ej. M. Scand. p. 28.

1. Ad rup. madid. — *Eur. : Lappon. Tornens.*

brevisetum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894.

1. Cortic. et rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Brownianum Sm. — *Tetrodontium*.

Brownii Par.

O. acuminatum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 434, t. XXXIX, fig. 21.

1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Bruchii { Hüb. — *O. speciosum*.
Wils. — *Ulota*.

? *bryoides* Griff. — *Orthomnium trichomitrium*.

bullatum C. M. in *Fl.* 1887, p. 223.

1. — *Am. sept.* : Calif.

calcareum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1834, p. 427, t. XXXVI, fig. 6.

1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

californicum Vent. in *Hedwig*. 1873, p. 5 (nom.).
— *Am. sept.* : Calif.

callistomum Fisch. Ost. in *Bryol. eur.* III (mon. p.), t. 224 ; C. M. *Syn.* II, p. 639 ; W. P. Sch. op. cit. p. 339.

1. Ad cort. *Fagi*. — *Eur.* : Helvet.

calvescens Carringt. — *Ulota*.

calvum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* p. 8, t. 85, f. 7 et *Handb.* p. 432.

Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

canadense Br. et Sch. in *Lond. Journ. of bot.* 1843, p. 667 ; C. M. *Syn.* I, p. 703.

O. affine var. Hook. in *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 149 et 151.

1. — *Am. sept.* : M. Rupestr.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 181.

canadense Sull. et Lesq. — *O. ohioense*.

canum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 26.

— *Am. sept.* : Columb. brit. ; Texas ?

carinatum Mitt. — *Ulota*.

caucasicum Vent. in *Husn. Muscol. gall.* p. 176.

1. — *As.* : Caucas. centr.

chilense Mitt. — *Ulota*.

cirratum Bernh. — *Ulota crispula*.

cirrosum H. et Grev. — *Macromitrium*.

citrinum Aust. — *O. ohioense* var. *citrinum*.

clausum Hsch. — *Ulota Ludwigii*.

clavellatum H. et Grev. — *Drummondia*.

Clintonii Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 429, t. XXXVI, fig. 10.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

coarctatum { *Bryol. eur.* — *Ulota Bruchii*.
H. et Grev. — *Ulota fuegiana*.
P. B. — *Ulota Ludwigii*.

- columbicum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 24 ; Lesq. et Jam. Man. p. 175.
 O. pulchellum (fid. Sull. et Kindb.).
 1. — Am. sept. : Ins. Vancouver.
- commutatum Br. — O. cupulatum var. Rudolphianum.
 compositum Brid. — Pilotrichum.
 concavifolium Griff. — Acrocryphaea.
 confertum Br. — O. cupulatum.
- conicorostrum Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 425, t. XXXV, fig. 1.
 1. Cortic. — Pac. : Nov. Zeland.
- connectens Kindb. — Ulota crispa.
- consimile Mitt. in op. et l. cc. ; Sull. Ic. M. Suppl. p. 59, t. 43 ; Lesq. et Jam. Man. p. 173.
 — Am. sept. : Ins. Vancouver.
- consimile Mac. — O. columbicum ? vel pulchellum ?
- coralloides Duby in Mémoires.... Genève, 1876, p. 4, t. 11, f. 5 et in Fl. 1877, n. 6.
 1. Cortic. — As. : Ins. Philippin.
- Coulteri Mitt. in op. cit. p. 25 ; Lesq. et Jam. Man. p. 173.
 1. — Am. sept. : Calif.
- crassifolium Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 546 ; C. M. Syn. I, p. 691 et II, p. 638.
 Ulota crassifolia H. f. et W. Fl. Antarct. p. 125, t. 57, f. 8 et Handb. of N. Zeal. Fl., p. 438.
 1. — Afr. : Ins. Kerguelen. Am. merid. : Ins. Eremit., Maclov. Pac. : Ins. Auckland, Campbell.
- « var. acutum C. M. l. c.
 — Afr. : Ins. Kerguelen.
- crenulatum Mitt. M. Ind. or. p. 48.
 1. — As. : Tibet occ.
- cribrosum C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.
 Dorcadium cribrosum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 98.
 1. — As. : Penins. Tschutschica.
- crispatum H. et Grev. — Ptychomitrium.
 crispulum Bryol. eur. — Ulota.
- crispum } Hedw. — Ulota.
 } H. et W. — Ulota phyllantha.
 var. minus Schwaegr. — Ulota crispula.
 var. β Wahlenb. — Ulota Drummondii.
 var. Brid. — Ulota fulva.
 var. Hook. f. et W. — Ulota lutea.
- croceum Hpe. — Ulota lutea.
- cupulatum Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 26 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 272 ; Bryol. eur. III (mon. p. 8), t. 209 ; C. M. Syn. I, p. 700 ; W. P. Sch. op. cit. p. 313.
 Brachytrichum cupulatum Roehl. Ann. d. Wett. Ges. III, p. 195.
 Dorcadium cupulatum Lindb. l. c.
 O. anomalum Engl. Bot. t. 1423.
 O. confertum Br. in Brid. l. c. p. 783.

O. urceolatum Schleich. *Cat. pl. Helv.* p. 42.

Weisia cupulata Roth. *Fl. Germ.* III, I, p. 217.

1. Ad mur. et sax. praecip. calcar. — *Eur.* : Passim. *As.* : Kashmir, Himalaya occ., Mesopot., Assyri., Pers., Kurdistan., Caucas., *As. min.* *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Sinus Baffin, Columb. brit., reg. or. et central., Calif.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 583.

Rab. Bryoth. eur. n. 177, 891.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II, n. 176.

var. *calcareum* Vent. — *O. urnigerum* var. *calcareum*.

var. *Floerkei* Bryol. eur. — *O. cupulatum* var. *Rudolphianum*.

« var. *longifolium* (Groenv.) Limpr. *Laubm. Deutschl.* II, p. 44.

O. longifolium Groenv. in *Oefv...* 1889, p. 175.

— *Eur.* : Helvet. occid.

« var. *minus* Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 61, t. 44; *Lesq. et Jam. Man.* p. 165.

O. Lescurii Aust. M. *Appal.* n. 163 et in *Bull. Torr. bot. Club.* VI, p. 341.

Cortic. — *Am. sept.* : Columb. brit., Ontario, Ohio.

« var. *octo-striatum* Limpr. l. c.

Ad rup. dolomit. — *Eur.* : Eifel, Stiria.

« var. *parvulum* Sull. l. c.; *Lesq. et Jam. Man.* p. 166.

O. parvulum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 25.

O. Sturnici Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 117 p.p.

— *Am. sept.* : Nov. Mexic.

var. *Peckei* Sull. — *O. cupulatum* var. *Porteri*.

« var. *Porteri* Vent. in *Husn. Muscol. gall.* p. 160; *Lesq. et Jam. Man.* p. 165 (emend.).

O. cupulatum (?) Drumm. M. bor. am. II ed. n. 81.

O. cupulatum var. *Peckei* Sull., *Lesq. et Jam. ll. cc.*

O. Peckei Aust. M. *Appal.* n. 162.

O. Porteri ej. ll. cc. n. 161 et VI, p. 341.

Rupic. — *Am. sept.* : New York, Pensilv.

« var. *riparium* Hüb. *Muscol. germ.* p. 381; *Bryol. eur.* et W. P. Sch. ll. cc.

O. nudum Sm. *Fl. Brit.* III, p. 1268.

Ad sax. arenac. ripar. — *Eur.* : Sept. et centr. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Ottawa.

« var. *Rudolphianum* (Lehm.) W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 261 et II ed. l. c.

O. commutatum Br. in *Brid. op. cit.* p. 784.

O. cupulatum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 152.

O. cupulatum var. *Floerkei* Bryol. eur. l. c.

O. Floerkei Hsch. in *Brid.* l. c. p. 783.

O. nudum Sm. p.p. (fid. Vent.).

O. nudum var. *Rudolphianum* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 87.

O. reflexum Hsch. mss.

O. Rudolphianum Lehm. in *Fl.* 1827, p. 656.

Ubi praeced. — *Eur.* : Sept. et centr. *Am. sept.* : Niagara, Columb. brit.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1073.

cupulatum (?) Drumm. } — *O. cupulatum* var. *Porteri*.
 } — *O. cupulatum* var. *Rudolphianum*.

var. *sardagnanum* Vent. — *O. sardagnanum*.

curvatum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 442, t. XLII, fig. 40.

l. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

curvatum Brid. — *Rhacomitrium patens*.

curvifolium Wahlenb. — *Ulota*.

cyathiforme Rob. Br. in *op. cit.* p. 436, t. XXXIX, fig. 24.

l. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

cylindricum Warnst. — *O. speciosum*.

cylindrocarpum Lesq. in *Trans. of the Am. Phil. Soc.* XIII, p. 6; Lesq et Jam. Man. p. 173.

Cortic. et rupic. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 178.

cylindrothecium (*male* : *cylindrothecum*) Rob. Br. in *op. cit.* p. 432, t. XXXVIII, fig. 16.

l. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Darwini Mitt. — *Ulota*.

diaphanum Schrad. *Spic. Fl. Germ.* p. 69; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 293; *Bryol. eur.* III (mon. p. 26), t. 219 : C. M. Syn. I, p. 694; W. P. Sch. *op. cit.* p. 333.

Bryum diaphanum Gmel. *Syst. nat.* II, p. 1335.

Dorcadium diaphanum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 1335.

O. aristatum Turn. *Muscol. Hib.* p. 100, t. 9, f. 2.

O. heterophyllum P. B. *Prodr.* p. 80.

O. pilosum ej. l. c. p. 81.

Weisia diaphana Roth *Fl. germ.* III, I, p. 223.

l. Arbor., rar. saxic. — *Eur.* : Reg. merid. et intermed., raro subsept.

As. : Sibiria. *Afr.* : Alger., ins Canar. *Am. sept.* : Texas.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 180, 1009, 1176.

“ *var. aquatica* Davies mss. ; Vent. in *Hedwig.* 1873, p. 39.

— *Eur.* : Anglia.

“ *var. ulmicola* (Lag.) Hüb. l. c.

O. ulmicola Lag. in *Ann. d. scienc. nat.* n. 14, p. 186.

Ad *Ulmos*. — *Eur.* : Hambourg.

dilatatum Bryol. eur. — *Ulota Bruchii*.

Douglasii Duby *Choix de crypt. ex.* 1867, p. 3, c. ic. et in *Mém... Genève*, 1868, p. 293, t. I, f. 2.

— *Am. sept.* : Columb. brit.

Drummondii Grev. — *Ulota*.

Duthiei Vent. in *Rev. bryol.* 1896, p. 27.

l. Rupic. — *As.* : Kashmir.

Eckloni Hsch. — *Ulota*.

elegans Schwaegr. ap. Rich. in *Franklin's App.* p. 756.

Dorcadium elegans Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II.

O. speciosum Lesq. et Jam. Man. p. 169 p.p. ; Kindb. in *Mac. Cat.* p. 89 p.p.

l. Cortic. — *As.* : Jenissei, Obi. *Am. sept.* : M. Rupestr., Idaho.

elegans Hsch. — *Macromitrium brevipes*.

elegantulum W. P. Sch. in *Lechl. Pl. Magell.* n. 1290 ; Mitt. M. austr. am. p. 187.

Cortic. — *Am. merid.* : Patagon austr.

elongatum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 45; *C. M. Syn.* I, p. 706; *Mitt. op. et l. cc.*

2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

epibryum de Not. M. Napoan. in *Acad... d. Torino... II ser.*, XVIII, p. 448.

— *Am. merid.* : Columb.

erectum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 441, t. XLII, fig. 38.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

eremitense Mitt. — *Ulota Hermitei*.

eroso-crenatum C. M. — *Ulota*.

erpodiaceum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 364.

2. Fr. ign. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

erythrostomum Groenv. in *Nya Bidr.* p. 12.

1. Rupic. — *Eur.* : Suecia.

euryphyllum Vent. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

1. Ad saxa rivul. — *Am. sept.* : Washington.

exiguum Sull. M. of U. St. p. 33 et *lc. M.* p. 55, t. 35.

2. Ad rad. arb. — *Am. sept.* : Carol. merid.

fallax W. P. Sch. *Syn.* I ed., p. 264 et II ed., p. 327.

Dorcadium Schimperii Lindb. M. Scand. p. 28.

O. affine β *pumilum* H. et T. *Musc. Brit.* p. 74.

O. *pumilum* *Bryol. eur.* III (mon. p. 14), t. 211; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 285?; *C. M. Syn.* I, p. 696; *W. P. Sch. Syn.* II ed., p. 327.

O. *Schimperii* Ol. *Hammar Mon. Orthotr. et Ulot.* 1852, p. 9.

1. Ad arbor. campestr. — *Eur.* : Præpr. in reg. merid.; Britannia? As. : Caucas. occ. et centr. Afr. : Alger. *Am. sept.* : Ontario? Idaho.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 82?

Rab. *Bryoth. eur.* n. 125 b, 372?

« *var. truncatulum* Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*; VI, p. 344; *Lesq. et Jam. Man.* p. 171.

— *Am. sept.* : Rar. : Illinois.

fallax { *Bryol. eur.* — O. *pumilum*.
Rab. — O. *patens*.

fasciculare Brid. — *Ulota phyllantha* (1).

fastigiatum Br. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 785; *Bryol. eur.* III (mon. p.), t. 216; *C. M. Syn.* I, p. 698; *W. P. Sch. op. cit.* p. 322.

Dorcadium affine β *fastigiatum* Lindb. l. c.

O. affine *Schwaegr. Suppl.* I, II, p. 19, t. 49.

O. affine *var. fastigiatum* Hüb. *Muscol. germ.* p. 365.

O. *alpestre* Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 326.

1. Ad arbor. campestr., rar. ad saxa. — *Eur.* : Vulg.; desiderat. in Britann. As. : Kashmir, Himalaya occ. Afr. : Alger. *Am. sept.* : Lac. super.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 434, 892.

var. appendiculatum Jur. — O. *appendiculatum*.

var. neglectum Limpr. — O. *neglectum*.

(1) *fasciculatum* Brid. *Bryol. univ.* I, p. 297; *C. M. Syn.* I, p. 718. { delendum.
Grimmia fasciculata Brid. *Mant. M.* p. 37.

« *var. robustum* Limpr. *Deutschl. Laubm.* II, p. 83.
 Ut typ. — *Eur.* : Neumark., Siles., Algov., Tirol.

ferrugineum H. et Gr. — *Schlotheimia*.

filiforme eor. — *Macromitrium*.

fimbriatum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 430,
 t. XXXVII, fig. 13.

1. *Rupic.* — *Pac.* : Nov. Zeland.

firmum Vent. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 15.

1. — *Afr.* : Abyssin.

flaccum de Not. — *O. rupestre*.

flexifolium Rob. Br. in *op. cit.* p. 428, t. XXXVI, fig. 8.

1. *Cortic.* — *Pac.* : Nov. Zeland.

Floërkei Hsch. — *O. cupulatum var. Rudolphianum*.

Franzonianum de Not. — *O. rupestre var. Franzonianum*.

fuegianum Mitt. — *Ulota*.

fulvellum Mitt. — *Ulota*.

Germanum Mont. — *Ulota*.

gevaliense Groenv. — *O. microcarpon*.

glabellum Mitt. — *Ulota*.

glaucum Spreng. *Syst. veg.* IV, II, p. 323; *C. M. Syn.* I, p. 695.

1. *Cortic.* — *Afr.* : C. B. Sp.

gracile Hook. — *Macromitrium*.

gracillimum Rob. Br. in *op. cit.* p. 427, t. XXXV, fig. 5.

1. *Rupic.* — *Pac.* : Nov. Zeland.

graphiomitrium C. M. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1888, p. 291.

1. *Arbor.* — *Pac.* : Nov. Zeland.

groenlandicum Berggr. in *Rev. bryol.* 1877, p. 70 (*nom.*).

— *Am. sept.* : Groenland merid.

gymnostomum Br. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 782; *Bryol. eur.* III (*mon.*
 p. 8), t. 208; *C. M. Syn.* I, p. 689; *W. P. Sch. op. cit.* p. 319.

Dorcadium gymnostomum Lindb. l. c. p. 29.

2. *Ad Popul. tremul.* — *Eur.* : Scandin. merid., Boruss. or., Siles.,
 Rhoengeb., Salisb., vall. Rhen., Bavar., Helvet., Voges., Gall. med.
 occ. As. : Japon. *Am. sept.* : Terra nova.

Exs : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1074.

Hainesiae Aust. — *O. speciosum var. Hainesiae*.

Hallii Sull. et Lesq. in *Lesq. et Jam. Man.* p. 170; *Sull. Ic. M. Suppl.*
 p. 63, t. 45.

1. *Rupic.* ? et *cortic.* — *Am. sept.* : M. Rupestr., Montana.

Hendersoni Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 42, t. 7 A.

1. *Cortic.* — *Am. sept.* : Oregon.

hercynicum Hoffm. — *Oligotrichum* (1).

heterophyllum P. B. — *O. diaphanum*.

Holmgreni Lindb.

O. Bolanderi (fid. Vent. in *Husn. Muscol. gall.* p. 126).

O. rupestre var. vulgare f. densior Vent. in *op. et l. cc.*

— *Eur.* : Scandin. ? *Am. sept.* : (*Cf. O. Bolanderi*).

(1) *heteromallum* Schwaegr. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 297; *C. M. Syn.* I,
 p. 718 ? *Delendum*.

Hookeri Mitt. *M. Ind. or.* p. 48.

1. Cortic. — As. : Nepal., Sikkim, Alp. Yunnan.

Hornschuchii H. et Grev. — *Macromitrium pulchellum*.

hortense Bosw. in *Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 97, t. 320.

1? — *Pac.* : Nov. Zeland.

humile Schleich. — *O. anomalum*.

Hurunui Rob. Br. in *Trans. of [the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 436, t. XL, fig. 26.

1. Ad rup. sicc. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Hutchinsiae Sm. — *Ulota*.

imperfectum C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

Dorcadium imperfectum Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 99.

1. Rupic. — As. : Penins. Tschutschica.

immersum Brid. — *O. pallens*.

inaequale Rob. Br. in *op. cit.* p. 429, t. XXXVII, fig. II.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

incanum C. M. — *Ulota*.

inclinatum C. M. — *Ulota*.

incurvifolium H. et Gr. — *Macromitrium*.

inflexum C. M. — *O. brachytrichum*.

involutifolium H. et Gr. — *Macromitrium*.

Jamesianum Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 71, t. 53; *James in Bot. King Exped.* p. 401; *Lesq. et Jam. Man.* p. 177.

1. Ad rup. aren. — *Am. sept.* : M. Rupestr.? Columb. brit., Nevada.

Jamesoni Arn. — *Schlotheimia*.

japonicum Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad...* 1859, p. 277.

1. Cortic. — As. : Japon.

jutlandicum Brid. — *Ulota phyllantha*.

Killiasii C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 166; *W. P. Sch. op. cit.* p. 323.

Dorcadium Killiasii Lindb. *M. Scand.* p. 28.

O. speciosum var. *Jur. Laubm. Oesterr. Ung.* p. 202.

1. Ad rup. silic. — *Eur.* : Norveg. (Dovre), Alp. Helvet., Tirol.,

Carinth., Stir., Salisb. As. : Caucas. or. *Am. sept.* : Groenland.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 998.

« var. *macroblepharum* *W. P. Sch. op. et l. cc. et Bryol. eur. Suppl.* I-II, t. 7.

O. macroblepharum ej. *Bryol. Suppl.* I-II.

— *Eur.* : Spitzberg et ubi typ.

Kingianum Lesq. in *Mem. Calif. Acad.* I, p. 18; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 74, t. 55; *Lesq. et Jam. Man.* p. 170 (1).

Rupic. — *Am. sept.* : Calif.

laevigatum Zetterst. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1862, p. 287; *W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl.* I-II, (*Orthotr.* p. 2), t. 2 et *Syn.* II ed. p. 309.

Dorcadium laevigatum Lindb. *M. Scand.* p. 28.

1. Rupic. — *Eur.* : Norveg., Island. *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Idaho, Oregon, Nevada occ.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 454.

(1) Cf. Dna E. G. Britton in *Bull. Torr. bot. Club*, 1893, p. 401.

lanceolatum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 429, t. XXXVI, fig. 9.

1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

laticiliatum Vent. in *Broth. Some New Spec. of Austral. M.* . II, p. 33.

1. Rupic. — *Pac.* : Tasman.

laterale Hpe. in *Linn.* 1876, p. 309.

? *Ulota lateralis* Jaeg. *Ad.* II, p. 691.

1. Cortic. — *Pac.* : Austral. or.

latifolium Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 441, t. XLI, fig. 36.

1. Cortic. et rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

latorum R. Br. in *op. cit.* p. 431, t. XXXVII, fig. 15.

1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

latifolium Groenv. — *O. pallens* var. *parvum*.

Laureri Hsch. — *Ulota curvifolia*.

Lawrencii Mitt. in *Fl. Tasman.* II, p. 184, t. 172, f. 5.

— *Pac.* : Tasman.

laxifolium Wils. mss. ; Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 57 et *M. austr. am.* p. 184 ; *C. M. Syn.* II, p. 640.

1. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Lebruni Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXII.

1. — *Am. merid.* : Patagon. austr.

Leikipiae C. M. *Fl.* 1890, p. 483.

1. — *Afr.* : M. Aberdare.

leiocarpon *Bryol. eur.* III (mon. p. 28), t. 230 ; *W. P. Sch. op. cit.* p. 337.

Bryum striatum L. *Sp. pl.* p. 1579.

Dorcadium striatum *Lindb. l. c.*

Grimmia oblonga *Schrank Baiers Fl.* II, p. 443.

Gr. striata *Hedw. Fund. M.* II, p. 89.

O. striatum ej. *M. frond.* p. 90, t. 36 p.p. ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 290 ; *C. M. Syn.* I, p. 708 ; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 154.

O. Rogeri *Sull. M. of U. St.* p. 33.

Polytrichum, *Bryi ruralis* facie, capsulis sessilibus, majus *Dill. Hist. M.* p. 430, t. 55, f. 8.

P. bryoides α *striatum* *Weiss Crypt. Goett.* p. 175.

P. striatum *Huds. Fl. Angl.* p. 401.

Weisia ithyphylla var. *major* *Ehrh. Beitr.* I, p. 191.

W. polytrichoides *Wigg. Prim. Fl. Hols.* n. 821.

W. striata *Roth Fl. Germ.* III, I, p. 120.

1. Cortic., lignic., rar. saxic. — *Eur.* : Vulg. *As.* : *Caucas.*, *Talysch.* *Afr.* : *Alger.* ; *C. B. Sp.* ? *Am. sept.* : *Perrar.* : *lac. Super.*, *Washington, Idaho.* *Am. merid.* : *And. Quitens.*

Exs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 516, 888.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 183.

" var. *Rotae* de *Not. Erb. critt. ital.* n. 1211.

Ad arb. campestr. et silv. — *Eur.* : *Riesengeb., Ticin.*

leiocarpum *Mac.* } — *O. elegans.*
 } — *O. speciosum* ?

leiolecythis C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 107.

1. — *As.* : *China or. (prov. Schen-Si).*

leiothecium C. M. — *Ulota.*

leptocarpon Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 488; C. M. Syn. I, p. 706.

1. ? Ad *Eric. acrophyam*. — Afr. : M. Abyssin.

leptocarpon Wils. — O. anomalum.

Lescurii Aust. — O. cupulatum var. minus.

Letourneuxii Besch. Cat. M. Alger. p. 19.

— Afr. : Alger.

leucomitrium Br. in Brid. Bryol. univ. I, p. 789; Bryol. eur. III (mon. p. 26), t. 220; C. M. Syn. I, p. 695; W. P. Sch. op. cit. p. 333.

O. scanicum Groenv. Mon. p. 13.

1. Ad *Acer.*, *Popul.* et *Salic.* ambul. — Eur. : Vall. Rhen., Bavar., Siles., Stir., Salisb., Tirol., Helvet.; deest in Britann. et reg. sept.; rar. in mont. Gall., et in Apenn.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 434 p.p., 989.

Lobbianum Mitt. — Ulota.

lonchothecium C. M. et Kindb. — O. Roellii.

longifolium Hook. — Macromitrium.

longipes Hook. — Macromitrium.

longirostre Hook. — Macromitrium.

longithecium (male: longithecum) R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Int. 1894, p. 433, t. XXXVIII, fig. 18.

1. Rupic. — Pac. : Nov. Zeland.

Lorentzi C. M. in Linn. 1878-79, p. 358.

1. Cortic. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

Ludwigii Schwaegr. — Ulota.

luteolum { H. f. et W. — Ulota fuegiana.
eor. } — Ulota fulvella p.p.
— Germana p.p.

var. eor. — Ulota glabella.

luteum eor. — Ulota lutea.

lycopodioides Burch. — Macromitrium.

Lyellii Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 96, t. 22; Brid. Bryol. univ. I, p. 295, pp. 724 (incl. var. β) et 790; Bryol. eur. III (mon. p.), t. 221; C. M. Syn. I, p. 709; W. P. Sch. op. cit. p. 336.

Dorcadium *Lyellii* Lindb. l. c.

2. Ad arbor. silv. — Eur. : Zon. intermed. et sept. As. : Caucas. occ. Afr. : Alger. Am. sept. : Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon, Calif., reg. occ.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 130.

Rab. Bryoth. eur. n. 518 et b, 1006.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 184.

* var. papillosum (Hpe.) Sull. M. bor. am. II ed. p. 33; Lesq. et Jam. Man. p. 178.

O. pacificum Hpe. in hb. Mus. brit.

O. papillosum Hpe. in Linn. 1859, p. 458.

O. Sullivantii Aust. in Bull. Torr. bot. Club, 1879, p. 343?

— Am. sept. : Ins. Vancouver, Washington, Oregon,

S. Nevada Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 185.

* var. Pringlei C. M. in Mac. Cat. p. 92.

Rupic. — Am. sept. : Columb. brit.

- lyelloides *Kindb. in Rev. bryol.* 1896, p. 11 (1).
 2. Cortic. et rupic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.
- Mac Leai *Rehm. M. Afr. austr. n.* 514.
 — *Afr.* : C. B. Sp. or.
- macroblepharum *W. P. Sch.* — *O. Killiasii* var. macroblepharum.
 macrocalycinum *Mitt.* — *Ulot.*
 magellanicum *Mont.* — *Ulot.*
- magnothecium (*male* : magnothecum) *R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 435, t. XXXIX, fig. 23.
 1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- malacothecium *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 444.
 2? Cortic. — *Am. merid.* : M. Argentin. Tucuman. subtropic.
- Mandoni *W. P. Sch. mss.* ; *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 332.
Ulot. Mandoni *Jaeg. Ad. I*, p. 441.
 2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Boliv.
- marginatum *C. M.* — *Ulot.* fuegiana.
- Meyenianum *Hpe. in C. M. Syn. II*, p. 639.
 1. — *As.* : Ins. Philippin. (Manilla).
- microblepharis *W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. I-II (Orthotrich. p. 2)*,
 t. 2 et op. cit. p. 309.
Dorcadium microblephare Lindb. l. c.
 1. Ad saxa calcar. — *Eur.* : Lappon. or., ins. Aland, Norveg.
- microcarpon *de Not. Epil.* p. 306 ; *W. P. Sch. op. cit.* p. 328.
O. gevaliense Groenv. in Bot. Not. 1886, n. 1 (*fid. Vent.*).
O. pallens var. parvum *Vent. in Hedwig. p.p. (fid. Limpr.)*.
O. pumilum forma *Vent. l. c.* p. 181.
 1. Ad *Morum alb.* — *Eur.* : Rhoengeb., (2) lac. Major. *As.* : Caucas. occ.
- microphyllum *H. et Gr.* — *Macromitrium*.
- microstomum *eor.* — *Macromitrium*.
- minimifolium *R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 439, t. XL, fig. 31.
 1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- minutum *ej. in op. cit.* p. 437, t. XL, f. 27.
 1. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- mollissimum *C. M. in Linn.* 1875, p. 407.
 — *As.* : Litt. or. mar. Erythraei.
- Moorcroftii *H. et Grev.* — *Macromitrium*.
- mucronifolium *eor.* — *Macromitrium*.
- neglectum *W. P. Sch. Syn. II ed.*, p. 330.
O. affine var. neglectum *Vent. in Husn. Muscol. gall.* p. 171.
O. fastigiatum var. neglectum *Limpr. Deutschl. Laubm.* p. 83.
 1. Ad frutic. — *Eur.* : Baden (*W. P. Sch.*) ; vulg. (*Vent.*).
- nepalense *H. et Gr.* — *Macromitrium*.

(1) Sec. *Dem* E. G. Britton in *Rev. bryol.* 1896, p. 73, vix forma *O. Lyellii*.

(2) Species ad *O. pallentem* referenda (*fid. Limpr. Laubm. Deutschl. II*, p. 66).

nigritum Bryol. eur. — *Ulota Hutchinsiae*.

nivale Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1881.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

nudum R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 438, t. XL, fig. 30.

1. Ad ramul. — *Pac.* : Nov. Zeland.

nudum Sm. p.p. { — *O. cupulatum* var. *riparium*.
— *O. cupulatum* var. *Rudolphianum*.

nutans C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 363.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

obscurum Groenv. } — *O. pallens* (fid. *Limpr.*).
— *O. pumilum* var. *obscurum* (fid. *Vent.*).

obesum Rob. Br. in *op. cit.* p. 425, t. XXXIX, fig. 22.

1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

obliquum ej. in *op. cit.* p. 428, t. XXXVI, fig. 7.

1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

obtusatum ej. in *op. cit.* p. 439, t. XL, fig. 32.

1. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

obtusifolium Schrad. *Crypt. Gew.* p. 14; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 287;
Bryol. eur. III (mon. p. 13), t. 208; *C. M. Syn.* I, p. 688; *W. P. Sch. op. cit.* 388.

Dorcadium obtusifolium *Lindb. l. c.*

Weisia obtusifolia *Roth Tent. fl. Germ.* III, I, p. 218.

2. Ad arbor. praecip. campestr. — *Eur.* : Præcip. media : desider. in
Britann. As. : Jenissei, Himalaya occ., Caucas. occ. et centr.
Am. sept. : Nov. Scotia, New Brunswick, Gaspes., Ontario, M.
Rupestr., Columb. brit., Washington, M. Adirondack, Pensilv.,
Idaho.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 128.

Rab. Bryoth. eur. n. 517, 885, 1075.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 173.

obtusifolium *Drumm.* — *O. brachytrichum*.

occidentale *Jam.* — *O. alpestre* var. *majus*.

octoblepharis *Brid.* — *O. affine*.

ohioense *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 66; *Lesq. et Jam. Man.* p. 170.

O. canadense *Sull. M. of U. St.* p. 34; *Sull. et Lesq. M. bor. am.* I ed.
n. 121.

O. psilocarpon *Mac. Canad. M. n.* 123 p.p.

1. Cortic. — *Am. sept.* : New Brunswick, Ontario, New Jersey, Ohio,
Montana, etc.

Exs. : *Sulliv. et Lesq. M. bor. am.* II ed. n. 181.

« var. *citrinum* *Lesq. et Jam. l. c.*

O. citrinum *Aust. M. Appal. n.* 170.

Ut et ubi typ.

ornatum *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 426, t. XXXV,
fig. 4.

1. Ad rup. aren. — *Pac.* : Nov. Zeland.

orneum *Wils.* — *O. Shawii*.

pacificum *Hpe.* — *O. Lyellii* var. *papillosum*.

Paivanum *W. P. Sch. in Mandon Pl. Mad. n.* 15.

O. tenellum (fid. *Mitt. in Godman's Nat. hist. of Azores*, p. 299).

— *Afr.* : Madeira.

- pallens* Br. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 788; *Bryol. eur.* III (mon. p. 24), t. 218; *C. M. Syn.* I, p. 781 (incl. v. β); *W. P. Sch. op. cit.* p. 331.
Dorcadium pallens Lindb. l. c.
Dorcadium pallens var. *scopulorum* ej. l. c.
O. Arnellii Groenv. Mon. p. 115 (fid. Vent. in op. cit. p. 189; spec. propr. sec. Limpr.).
O. immersum Brid. l. c. p. 786.
O. rufescens ej. *Nya Bidr.* p. 8.
O. scopulorum Lindb. in *Notis...* 1868, p. 257.
 1. Ad arbor. junior. et frutic., rar. ad *Popul.*, *Salic.*, *Abiet.*, rarius ad saxa. — *Eur.*: Reg. montana; Fennia. *As.*: Caucas. centr. et occ. *Am. sept.*: Columb. brit.
 « var. *crispula* Vent. in *Hedwig.* 1873, p. 21.
 Ad *Abiet.* — *Eur.*: Helvet., Tirol., Monte Baldo.
 var. *immersum* C. M. — *O. pallens*.
 « var. *parvum* Vent. l. c. (p.p. fid. Limpr.) et in *Husn. Muscol. gall.* p. 189.
Dorcadium pallidum Lindb. et Arn. M. *As. bor.* 1890, II, p. 95.
O. aurantiacum Groenv. Monog. p. 16.
O. boreale ej. l. c. p. 8?
O. latifolium ej. l. c. p. 15 emend.
O. pallidum ej. l. c. p. 15.
 — *Eur.*: Alp. editior., Norveg. septentr. *As.*: Jenissei med. *Am. sept.*: Wyoming.
pallens Brid. p.p. — *O. Rogeri*.
pallidum { Groenv. — *O. pallens* var. *parvum*.
 (x et β) P. B. — *Macromitrium aciculare*.
papillosum Hpe. — *O. Lyellii* var. *papillosum*.
paradoxum Groenv. in *Oefv...* 1889, p. 179.
 1. Ad rup. gneiss. — *Eur.*: Helvet.
 « var. *leucomitrioides* Limpr. *Deutschl. Laubm.* II, p. 62.
 Muric. — *Eur.*: Tirol.
paraguense Besch. in *Journ. de bot.* 1891.
 1. — *Am. merid.*: Paraguay.
Ecs.: Bal. Pl. Parag. n. 3628 p.p.
pariatum Mitt. M. *austr. am.* p. 186.
 2. — *Am. merid.*: Summ. And. Quitens.
parvithecium (male: *parvithecum*) Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 440, t. XLI, fig. 35.
 1. Cortic. — *Pac.*: Nov. Zeland.
parvulum ej. in op. cit. p. 439, t. XLI, fig. 33.
 1. Cortic. — *Pac.*: Nov. Zeland.
parvulum Mitt. — *O. cupulatum* var. *parvulum*.
patens Br. in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 787; *Bryol. eur.* III (mon. p. 17), t. 215; *C. M. Syn.* I, p. 703; *W. P. Sch. op. cit.* p. 324.
O. affine var. *patens* Garov. *Enum. M. austr.* p. 21.
O. fallax Rab. *Bryoth. eur.* n. 125.
O. stramineum var. *patens* Vent. in *Hedw.* 1873, p. 20.
 i. Ad arbor. et frutic. campestr. et silvat. — *Eur.*: Neerland., Belg., Gall. sept., vall. Rhen., German.; Transilv., Stir., Bavar., Helvet.
patens Boul. — *O. stramineum* (fid. Limpr.)

patulum *Mitt. op. cit. p. 184.*

— *Am. merid.* : And. Quitens.

Peckii Aust. — *O. cupulatum var. Porteri.*

pellucidum *Lindb. in Oefv... XXIII, p. 550.*

O. anomalum var. defluens Vent. in Husn. Muscol. gall. p. 159?

O. Breutelii var.? Berggr. in K. Sv. Akad. Handl. XIII, n. 7, p. 53.

1. — *Eur.* : Spitzberg.

penicillatum *Mitt. op. cit. p. 185.*

1. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

perforatum *C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.*

Dorcadium perforatum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 98.

1. Ad ossa human., etc. — *As.* : Penins. Tschutschica.

perforatum Limpr. — *O. urnigerum var. perforatum.*

perichaetiale H. et Gr. — *Macromitrium.*

Philiberti Vent. — *O. pumilum var. Philiberti.*

phyllanthoides C. M. — *Ulota.*

phyllanthum Bryol. eur. — *Ulota.*

piliferum W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 516.

piliferum Arn. — *Macromitrium.*

pilosum P. B. — *O. diaphanum.*

platyblepharis C. M. in *Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.*

Dorcadium platyblepharis Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 98.

1. — *As.* : Penins. Tschutschica.

plicatum P. B. *Prodr. 81 ; C. M. Syn. I, p. 690.*

Leiomitrium plicatum Mitt. in Philos. Trans. of the roy. Soc. 1879 (extra vol.), p. 390.

Ulota plicata Brid. Bryol. univ. I, p. 303.

1. Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae, Rodriguez.

plicatum Ludw. — *Ulota Ludwigii.*

Podocarpi C. M. in *Linn. 1878-79, p. 361.*

1. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

polare *Lindb. in Oefv... p. 537.*

O. alpestre var. ? Berggr. in K. Sv. Akad. Handl. XIII, n. 7, p. 53.

1. — *Eur.* : Spitzberg.

polytrichoides Brid. — *Lepidopilum.*

Porteri Aust. — *O. cupulatum var. Porteri.*

praemorsum Vent. in *Bot. Centralbl. 1890, n. 51.*

1. Rupic. — *Am. sept.* : Yellowstone Park.

Pringlei C. M. in *Bull. Torr. bot. Club. 1885, p. 121 et in Fl. 1886, p. 539 (1).*

2. Cortic. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Oregon, Idaho, Nevada, Calif.

prorepens Hook. — *Macromitrium.*

(1) An *O. Lyellii* var. *Pringlei* ? Cf. Dna E. G. Britton in *Bull. Torr. bot. Club, 1893, p. 399.*

pseudo-tenellum Hpe. mss.; C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 230.

1. — Afr.: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. M. Afr. austr. n. 515?

psilocarpum James in Trans. of the Am. Phil. Soc. XIII, p. 110; Sull. Ic. M. Suppl. p. 68, t. 50; Lesq. et Jam. Man. p. 73.

O. pusillum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 25.

1. Ad Popul. — Am. sept.: Lac. Erie, Massachusetts, Pensilv., Missouri, Carol. merid., Florid.

Exs.: Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 180.

psilocarpum Mac. p.p. — O. ohioense.

psilothecium C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 91.

1. Lignic. — Am. sept.: Ottawa.

psychrophilum Mont. in d'Orbigny Voy. Am. merid. VII, Crypt. p. 89;

C. M. Syn. I, p. 704; Mitt. M. austr. am. p. 186.

1 (C. M.); 2 (Mitt.). Rupic. — Am. merid.: And. Potos.

Puiggarii Duby (fid. Hpe. in Fl. 1889, n. 21). } — *Schlotheimia appressifolia*?
 } — *Schlotheimia Puiggarii*?

pulchellum Engl. Bot. t. 1787; Brid. Bryol. univ. I, pp. 294 et 724; Bryol. eur. III (mon. p. 29), t. 223; C. M. Syn. I, p. 711; W. P. Sch. op. cit. p. 334.

Dorcadium pulchellum Lindb. l. c.

O. columbicum Mitt. (fid. Kindb.).

O. consimile Mac. Canad. M. n. 125.

O. stenocarpum Brid. l. c. p. 271.

1. Ad arbor. et frut. campestr., ram. Pom., Prun. — Eur.: Zon. septentr.; deest in Alp. et in Pyren. Am. sept.: Alaska, Columb. brit., ins. Vancouver, Oregon.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 127.

Rab. Bryoth. eur. n. 887, 1079.

* var. *leucodon* Vent. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.

— Am. sept.: Washington, Vancouver.

* var. *longipes* Sull. in Lesq. et Jam. Man. p. 175.

— Am. sept.: Oregon.

* var. *productipes* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 43.

Cortic. — Am. sept.: Oregon.

pulchellum Rab. — O. Winteri.

var. *Winteri* Braithw. — O. Winteri.

pulvinatum Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 426, t. XXXV, fig. 2.

1. Ad rup. aren. — Pac.: Nov. Zeland.

pumilum Sw. M. Suec. pp. 42 et 92, t. 4; W. P. Sch. Syn. I ed. p. 263 et II ed. p. 328.

Dorcadium pumilum Lindb. l. c.

O. fallax Br. in Brid. Bryol. univ. I, p. 787; Bryol. eur. III (mon. p. 15), t. 211; C. M. Syn. I, p. 697.

O. tenellum var. *pumilum* Boulay M. Fr. I, p. 335.

1. Ad arbor. campestr. impr. Acer., Popul., Salic. — Eur.: Fere tota. As.: Caucas. occ. Afr.: Ins. Canar. Pac.: Nov. Zeland. (?)

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 224, 372.

* var. *americanum* Vent. in Husn. Muscol. gall. p. 180.

— Am. sept.: M. Appalach.

« *var. molle* Vent. l. c.

O. Rogeri Boulay. M. Fr.; Husn. M. Gall. n. 264.

— Eur. : Normannia.

« *var. obscurum* (Groenv.) Vent. l. c.

O. obscurum Groenv. Bidr. p. 12 (fid. Vent. : non ! fid. Limpr.).

— Eur. : Austria infer.

« *var. Philiberti* Vent. l. c.

O. Philiberti ej. in Rev. bryol. 1878.

— Eur. : Galloprov., Sardin.

pumilum Brid. — O. fallax.

punctatum H. et Grev. — Macromitrium.

pungens Mitt. M. austr. am. p. 184.

l. Cortic. — Am. merid. : And. Quitens.

pusillum Mitt. — O. psilocarpum?

pycnophyllum W. P. Sch. mss. ; C. M. Syn. I, p. 709 ; Mitt. op. cit. p. 188.

2. — Am. sept. : Mexic.

pygmaeothecium C. M. — Ulota.

Pylaisaei Brid. Bryol. univ. I, pp. 722 et 790 ; C. M. Syn. I, p. 693.

O. Blyttii ? (quoad O. Breutelii) Vent. in Husn. Muscol. gall. p. 175.

O. Breutelii Hpe. mss. ; Sendtn. in Fl. 1849, p. 273.

l. Rupic. — Eur. : Spitzberg, ins. Ursor. Am. sept. : Groenland.

quadrifidum H. et Gr. — Schlotheimia.

Quenoxæ C. M. in Linn. 1880-83, p. 445.

l. Cortic. — Am. merid. : M. Argentin. subtropic. Tucuman. (1)

Raui Aust. — O. speciosum var. *Raui*.

recurvans W. P. Sch. mss. ; C. M. Syn. I, p. 709.

l. — Am. sept. : Mexic. (M. Orizaba).

recurvifolium (Hsch.) C. M. Syn. II, p. 640.

Syrhopodon recurvifolius Hsch. in Linn. 1841, p. 118 ; C. M. Syn. I, p. 546.

Ster.

— Afr. : C. B. Sp.

recurvifolium H. et Gr. — Macromitrium.

reflexum Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 431, t. XXXVII, fig. 14.

l. Rupic. — Pac. : Nov. Zeland.

reflexum Hsch. — O. cupulatum var. *Rudolphianum*.

rhabdophorum Vent. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.

l. — Am. sept. : Washington.

rivulare Turn. Musc. Hib. p. 96, t. 8 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 292 ; Bryol. eur. III (mon. p. 25), t. 219 ; C. M. Syn. I, p. 699 ; W. P. Sch. op. cit. p. 338.

l. Ad saxa et rad. arbor. saep. inund. — Eur. : Britann., Normann., Belg., Voges. inf., vall. Rhen. med., Harz. Am. sept. : Oregon, Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 883, 1077.

(1) *radiculosum* Brid. Bryol. univ. I, p. 791 ; C. M. Syn. I, p. 718. — *Barbula* sect. *Senophyllum* ? Delend.

robustum Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 442, t. XLII, fig. 39.

l. Rupic. — Pac. : Nov. Zeland.

robustum Wils. — Ulota.

Roellii Vent. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51 (descript. mala) et in Rev. bryol. 1892, p. 17.

O. lonchothecium C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 90; Mac. Canad. M. n. 491.

l. Rupic. — Am. sept. : Athabasca, Columb. brit., M. Rupestr., Washington, Oregon.

Rogeri Brid. Mant. M. p. 110 et Bryol. univ. I, p. 286; Bryol. eur. III (mon. p. 16), t. 212; C. M. Syn. I, p. 700; W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. I-II (Orthotrich., p. 8), t. 8 et Syn. II ed. p. 332 (1).

O. auridens W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. I-II, p. 9 (jid. Limpr.).

O. pallens Br. p.p.

O. subalpinum Limpr. in LX Jahresb. Schles. Gesells. p. 234.

O. ticinense de Not. Epil. p. 310.

l. Ad Abiet. et Fag. — Eur. : Norveg., Siles., Bohem., Bavar., Tirol., Helvet., Jurass., Voges., Gall. centr. (Cantal). Am. sept. : Idaho.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1259.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 174 ?

« var. defluens Vent. in Husn. Muscol. gall. p. 187.

O. stramineum var. defluens ej. in Hedwig. 1873, p. 19.

— Eur. : Siles., Alp. Carinth., Pyren., Hispan. As. :

Caucas. occ.

Rogeri { Br. et Sch. — O. brachytrichum.
M. Gall. — O. pumilum var. molle.
Sull. — O. leiocarpon.

rubescens Mitt. M. austr. am. p. 188.

2. — Am. merid. : And. Quitens.

Rudolphianum Lehm. — O. cupulatum var. Rudolphianum.

rufescens { Hpe. — Ulota

{ Groenv. — O. pallens.

rufulum Mitt. — Ulota.

rugifolium Hook. — Schlotheimia.

rupestre Schleich. Cent. III crypt. Helv. n. 24; Brid. Bryol. univ. I, pp. 279 et 784; Bryol. eur. III (mon. p. 19), t. 217; C. M. Syn. I, p. 707; W. P. Sch. op. cit. p. 316.

Dorcadium rupestre Lindb. l. c.

O. affine β rupestre Brid. Sp. M. II, p. 7.

O. flaccum de Not. Epil. p. 301 et Erb. critt. ital. n. 818; W. P. Sch. op. cit. p. 315 p.p.

O. rupestre var. flaccum Vent.

O. rupestre var. vulgare ej. in Husn. Muscol. gall. p. 156.

O. rupicola Drumm. M. bor. am. I ed. n. 156.

O. Sturnici de Not. Syll. p. 189 p.p.

O. Watsoni Mac. Canad. M. n. 121.

l. Ad rup. et mol. arenac., basalt., granit. et mur. absque cemento calc. — Eur. : Reg. montana usq. in Alp. As. : Kashmir, Himalaya occ., Caucas. Afr. : Alger, ins. Kerguelen. Am. sept. : M. Ru-

(1) Cf. Venturi in Rev. bryol. 1887, p. 58.

pestr.; Columb. brit., Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Colorado, Calif.

Exs. : Un. itin. 1864, n. 15.

« *var. ætnense* (*de Not.*) *Vent. l. c.* p. 157.

O. ætnense *de Not. Epil. p.* 302; *W. P. Sch. op. cit. p.* 315.

O. Sturnici *de Not. Syll. n.* 189 p.p.

Ut typ. — *Eur.* : Stiria, Ætna, Sierra de Guadarrama. *As.* : Caucas.

var. elongata *Vent.* — *O. rupestre* *var. Sehlmeiyeri.*

var. flaccum *Vent.* — *O. rupestre.*

« *var. Franzonianum* (*de Not.*) *Vent. l. c.* (1).

O. Franzonianum *de Not. mss.*; *Vent. in Rev. bryol.* 1879, p. 55.

O. Shawii *de Not. Epil. p.* 303.

Cortic. — *Eur.* : Tirol., Longobard., Corsica.

« *var. ovatum* *Vent. in Rev. bryol.* 1880, p. 68 et in *op. cit. p.* 155.

— *Eur.* : Carinth. *As.* : Caucas. *Afr.* : Abyss.

« ? *f. præperistomata* *Vent. in Rev. bryol.* 1896, p. 67.

Rupic. — *Pac.* : Tasman.

« ? *f. rupestriformis* *Vent. in op. et l. cc.*

Rupic. — *Pac.* : Tasman.

« *var. rupicola* (*Funk*) *Hüb. Muscol. germ. p.* 369; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 316.

O. rupicola *Funk Moostaschb. p.* 25, t. 23; *Brid. op. cit. p.* 284.

Ut et ubi typ. in *Eur.*

« *var. Sehlmeiyeri* (*Br.*) *Hüb. et W. P. Sch. ll. cc.*

O. rupestre *var. elongata* *Vent. in Hedwig.* 1872.

O. rupestre *var. vulgare f. laxior ej. in Husn. Muscol. gall. p.* 157.

O. Sehlmeiyeri *Br. in Brid. op. cit. p.* 784.

Ad basalt. et trachyt. — *Eur.* : Ubi typ. *As.* : Caucas.

var. Sturmii *Jur.* — *O. Sturmii.*

var. vulgare { *Vent.* — *O. rupestre.*

{ *f. densior* *Vent.* } — *O. Bolanderi.*

{ *f. laxior* *Vent.* } — *O. Holmgreni.*

{ *f. laxior* *Vent.* — *O. rupestre* *var. Sehlmeiyeri.*

rupestre *Mitt. (1876).* — *O. rupicolum.*

rupicolum *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p.* 80 et in *Forschungsreise... p.* 24.

O. rupestre *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1876, n. 84.

1. *Rupic.* — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

rupicola { *Drumm.* — *O. rupestre.*

{ *Funk.* — *O. rupestre* *var. rupicola.*

Sardagnæ *Vent. in op. cit. p.* 161.

O. abbreviatum *Groenv. Monog. (fid. Vent.).*

O. cupulatum *var. sardagnanum* *Vent. in Rev. bryol.* 1882, p. 60.

O. sardagnanum *Vent. in Rev. bryol.* 1879.

1. Ad rup. calcar. — *Eur.* : German., Tirol., Dalmat.

sardagnanum *Vent.* — *O. Sardagnæ.*

(1) Cf. Philibert in *Rev. bryol.* 1882, p. 9.

- saxatile* { Brid. — *O. anomalum* var. *saxatile*.
 Wood. — *O. anomalum* var. *cylindrica*.
Schimperii Ol. Hamm. — *O. fallax*.
scanicum Groenv. — *O. leucomitrium*.
Schlotthaueri Vent. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51 (*descript. mala*) et in *Rev. bryol.* 1892, p. 18.
 1. Cortic. et rupic. — Am. sept. : M. Rupestr. ; Idaho ? Montana.
Schmidii C. M. — *Ulota*.
Schnyderi C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 441.
 2. Cortic. — Am. merid. : Argentin. Buenos-Ayr.
Sehlmeyeri Br. — *O. rupestre* var. *Sehlmeyeri*.
Schubartianum Ltz. in *Verhandl. d. Zool. bot. Ges. in Wien*, 1867, p. 657, c. ic. ; W. P. Sch. op. cit. p. 318.
O. Schubartzianum de Not. *Epil.* p. 303.
O. urnigerum Jur. *Laubm. (Esterr. Ung.)* p. 210 (p.p.).
O. urnigerum var. *Schubartianum* Vent. in *Husn. Muscol. gall.* p. 163.
 1. Ad rup. micac. — Eur. : Norveg., Tirol., Helvet., Carinth., M. Bergam. As. : Caucas.
 " var. *laete-virens* Limpr. *Deutschl. Laubm.* II, p. 49.
 Rupic. — Eur. : Tirol.
Schubartzianum de Not. — *O. Schubartianum*.
scopulorum Lindb. — *O. pallens*.
serpens H. et Gr. — *Macromitrium*.
serrifolium C. M. in *Fl.* 1890, p. 482.
 Ster. — Afr. : M. Kilima N'Djaro.
Shawii Wils. mss. ; W. P. Sch. *Bryol. eur. Suppl. I-II (Orthotr., p. 1), t. I et op. cit.* p. 314.
O. orneum Wils. mss. ; Braithw. *Brit. Mossfl.* II, p. 70.
 1. Cortic., praepr. ad *Fraxin.* et *Castan.* — Eur. : Scot., Brandeb., Ticin., lac. Major., Corsica.
Shawii de Not. — *O. rupestre* var. *Franzonianum*.
sibiricum Groenv. *Monog.*
Dorcadium sibiricum Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 96.
 1. Ad *Aln.* et *Salic.* — As. *Jenissei* inf.
simense W. P. Sch. in *W. Sch. M. Abyss.*
 — Afr. : Abyssin.
Smithii Brid. — *Leptodon*.
Sommerfeldti W. P. Sch. *Bryol. eur. Suppl. I-II (Orthotr., p.), t. 6 et op. cit.* p. 312.
Dorcadium Sommerfeldti Lindb. *M. Scand.* p. 29.
O. anomalum var. β *Wahlenb.*
 1. Rupic. — Eur. : Norvegia.
sordidum Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 67, t. 49 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 170.
 1. Cortic. — Am. sept. : New Brunswick, Ontario, lac. Super., Massachusetts, New York.
 Exs. : Mac. Canad. M. n. 122 ?
speciosum Nees ab Es. in *Sturm Deutsch. Fl. crypt. fasc. XVI* ; Brid.

Bryol. univ. I, p. 280; *Bryol. eur. III* (mon. p. 19), t. 217; *C. M. Syn. I*, p. 705; *W. P. Sch. op. cit.* p. 322.

Dorcadium speciosum *Lindb. M. Scand.* p. 28.

O. Bruchii *Hüb.*

O. cylindricum *Warnst. in Hedw.* 1885, n. 3.

O. leiocarpum *Mac. Canad. M. n.* 126 p.p. ?

O. striatum *Hedw. M. frond. II*, t. 35, f. 1-3 (fid. *Limpr.*).

1. *Cortic.* — *Eur.* : Fere tota; rar. in *Britann. As.*: *Amour, Sikkim, Tibet occ., Caucas. Afr.* : *Alger. Am. sept.* : *Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, Manitoba, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Montana, reg. occ. et or.* (1).

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 155 et 158 (an *O. elegans* ?).

Mac. Canad. M. n. 120 (*id.*).

Rab. Bryoth. eur. n. 433, 889.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 183 (an *O. elegans* ?).

Un itin. 1867, n. 87.

« *var. fuscum* *Lindb. in Notis...* 1873 et in *Rev. bryol.* 1887, p. 63.
Ad Betul. periodice inund. — *Eur.* : *Scandin.* ?

« *var. Hainesiae* *Lesq. et Jam. Man. p.* 169.

O. Hainensiae *Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI*, p. 342.

Rupic. — *Am. sept.* : *Colorado.*

« *var. polycarpum* *Lesq. et Jam. l. c.*

— *Am. sept.* : *Colorado.*

« *var. Raii* *Lesq. et Jam. l. c.*

O. Raii *Aust. in op. cit. p.* 343.

— *Am. sept.* : *Colorado.*

« *var. Roellii* *Vent. in Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.

— *Am. sept.* : *Washington, Illinois.*

speciosum *Lesq. et Jam.* — *O. elegans* (p.p. ?).

var. Jur. — *O. Killiasii.*

Sprucei *Mont. in Lond. Journ. of bot.* 1845, p. 186; *Bryol. eur. III* (mon. p.), t. 214; *C. M. Syn. I*, p. 699 et *II. p.* 639; *W. P. Sch. op. cit. p.* 338.

1. *Ad arbor.. præpr. Salic. scæp. submers.* — *Eur.* : *Rar.* : *Britann., Belg., Gall.*

Sprucei × *diaphanum* *Philib. in Rev. bryol.* 1883, p. 8.

Ad Salic. period. submersas. — *Eur.* : *Gallia (Burgondia).*

squarrosus { *Griff.* — *Schlotheimia Grevilleana.*
 { *H. et Gr.* — *Schlotheimia.*

stellatum *Brid. Bryol. univ. I*, p. 274.

— *Am. sept.* : *Massachussets.* (2).

stellulatum *H. et Gr.* — *Macromitrium.*

stenocarpum *Vent. in Bot. Centralbl.* 1890, n. 51 (*descript. mala*) et in *Rev. bryol. p.* 17.

1. *Rupic.* — *Am. sept.* : *Oregon, Idaho, Washington.*

(1) Localitates, præprimis Canadenses, dubiae, ob confusionem inter *O. elegantem* et *O. speciosum*.

(2) Cf. *Venturi in Husn. Muscol. gall. pp.* 171-172.

stenocarpum Brid. — *O. pulchellum*.

Stevenii C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 164.

1. — *As.*: *Caucas.* (Tiflis).

stramineum *Hsch. in Brid. Bryol. univ.* I, p. 789; *Bryol. eur.* III (mon. p. 24), t. 218 p.p.; *C. M. Syn.* I, p. 697; *W. P. Sch. op. cit.* p. 325.

Dorcadium stramineum *Lindb. M. Scand. p. 28.*

O. patens Boulay *M. Fr.* I, p. 336 (*fid. Limpr.*).

O. umbonatum *Brid. op. cit.* p. 787?

Polytrichum Bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, minus *Dill. Hist. M.*
p. 431, t. 55, f. 9.

1. Ad arbor., præcip. *Fag.* et *Acer.*, rar. *Pin.* et *Popul.* — *Eur.* :
E reg. campestr. usq. in alp. *As.* : *Caucas.*

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 373, 1076.

var. *alpestre* Vent. — O. *alpestre*.

var. *defluens* Vent. — *O. Rogeri* var. *defluens*.

" var. intermedium Vent. in Husn. Muscol. gall. p. 183.
— Eur. : Helvet. (Genève).

var. *patens* Vent. — *O. patens*.

" var. vexabile *Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 68*

O. stramineum de Not. *Epil.* p. 315.

Ad *Sorbus*. — *Eur.* : Isergeb., Riesengeb.

stramineum Bryol. eur. p.p. 1837. — O. alpestre.

strangulatum *P. B. Prodr.* p. 81; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 273; *C. M. Syn.* I, p. 702; *Lesq. et Jam. Man.* p. 172.

O. cupulatum (fid. *Limpr. et Braithw.*).

1. Cortic., interd. rupic. — *Am. sept.* : Nov. Scot., New Brunswick,
Ontario, reg. sept., centr. et or.

Eggs. : Mac. Canad. M. n. 124.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 179.

* *var. mucronatum* Vent. in Jaeg. Ad. I, p. 455.

Cortic. — *Eur.* : Ital. med.

striatum { Hedw. { — *O. affine* p.p. (*fid. Limpr.*).
— *O. leiocarpum* (*fid. C. M.*).
— *O. speciosum* p.p. (*fid. Limpr.*).
Ludw. — *Ulota Ludwigii*.

strictissimum *Mdo. in Ltz. Moosst. p. 169.*

O. Sturmii (*fid. Limpr.*).

1. — *Eur.* : Alp. Austriae.

strictum Vent. in Centralbl. 1890, p. 419 (subsp. *O. Lyellii*).

2. — *Am. sept.*: Washington.

strictum Brid. — *Ulot* Hutchinsiae.

Sturmii Hoppe et Hsch. in Bot. Zeit. 1819, p. 89; Brid. Bryol. univ. I, p. 277; Bryol. eur. III (mon. p. 9), t. 209; C. M. Syn. I, p. 708; W. P. Sch. op. cit. p. 314.

Dorcadium rupestre var. *Sturmii* Lindb. *M. Scand.* p. 29.

O. rupestre var. *Sturmi* Jur. Laubm. Oester. Ung. p. 201.

Polytrichum capsulis sessilibus, foliis brevibus rectis carinatis Dill. Hist. M. p. 432, t. 55, f. 10 (*fid. Limpr.*).

1. Rupic. — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in alp.; in Scot. freq. ad

- arbor. As. : Caucas. Afr. : Alger., ins. Canar. Am. sept. : M. Rupestr., Columb. brit., Oregon, Nevada, Colorado, Calif.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 884, 987, 1008.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 175.
- Sturmii* { de Not. — *O. rupestre* var. aetnense.
 de Not. et plur. auct. — *O. rupestre*.
 Sull. et Lesq. p.p. — *O. cupulatum* var. parvulum.
subalpinum Limpr. — *O. Rogeri*.
- subexsertum* W. P. Sch. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 154.
 l. ? — Afr. : C. B. Sp.
Exs. : Rehm M. Afr. austr. n. 170.
- ? *submarginatum* Brid. Bryol. univ., I, p. 792 ; C. M. Syn. I, p. 691.
 Ster. — Am. sept. : Terr. nov.
- subperforatum* C. M. in Bot. Centralbl. 1883, n. 2-4.
Dorcadium subperforatum Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 98.
 l. — As. : Penins. Tschutschica.
- subrepens* Sommerf. — *Ulota Drummondii*.
subtortum H. et Gr. — *Macromitrium*.
- subulatum* Mitt. M. austr. am. p. 184.
 Cortic. — Am. merid. : And. Quitens.
- subulatum* Rob. Br. — *O. teremakauense*.
sulcatum H. et Gr. — *Macromitrium*.
Sullivantii Aust. — *O. Lyellii* var. papillosum.
- Swainsoni* { Hook. — *Macromitrium*.
 Steud. — *Macromitrium stellulatum*.
- tasmanicum* Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 27 et Fl. Tasm. II, p. 184 ; C. M. Syn. I, p. 707.
 l. Cortic. — Pac. : Austral. or., Tasman.
- tenellum* Br. in Brid. Bryol. univ. I, p. 786 ; Bryol. eur. III (mon. p. 15), t. 212 ; C. M. Syn. I, p. 704 ; W. P. Sch. op. cit. p. 329.
Dorcadium tenellum Lindb. M. Scand. p. 28.
 l. Ad arbor. campestr. — Eur. : Fere tota, praecip. merid. Afr. : Alger. ; Madeir. ? Am. sept. : Ontario, M. Rupestr.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1078 a et b.
- « *var. decipiens* Vent. in Husn. Muscol. gall. n. 186.
 Ut typ. — Eur. : German., Tirol.
 var. *pumilum* Boul. — *O. tenellum*.
- tenu* H. et Grev. — *Macromitrium*.
- teremakauense* Par.
O. subulatum Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1894, p. 441, t. XLII, fig. 37.
 l. Cortic. — Pac. : Nov. Zeland.
- texanum* Sull. Ic. M. p. 53, t. 34 ; Lesq. et Jam. Man. p. 166.
 l. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit., ins. Vancouver, Idaho, Colorado, Calif., Nov. Mexic.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 119 p.p.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 187.
- « *var. globosum* Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 17 ; Lesq. et Jam. l. c.
 Ut et ubi typ.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 119 p.p.

- ticinense* de Not. — O. Rogeri.
- tortulosum* Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1894, p. 432, t. XXXVIII, fig. 17.
1. Ad ramul. — Pac. : Nov. Zeland.
- tortum* H. et Grev. — *Schlotheimia torquata*.
- trachymitrium* Mitt. *op. cit.* p. 1883.
Saxic. — Am. merid. : And. Quitens.
- transvaaliense* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 517.
— Afr. : Transvaal.
- truncato-dentatum* C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 442.
1. Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- ulmicola* Lag. — O. *diaphanum* var. *ulmicola*.
- ulotaeforme* Ren. et Card. in *Bot. Gazette* 1890, p. 43, t. 7 B.
1. Cortic. — Am. sept. : Oregon.
- umbonatum* Brid. (fid. C. M.). } — O. affine.
 } — O. stramineum.
- undulatum* Mitt. *op. et l. cc.*
2. — Am. merid. : Summ. And. Quitens.
- undulatum* H. et Gr. p.p. } — *Calymperes repens*.
 } — *Macromitrium*.
- undulatifolium* C. M. in *Fl.* 1888, p. 413.
— Afr. : Kilima N'Djaro.
- urceolatum* } Hook. — *Macromitrium*.
 } Schleich. — O. *cupulatum*.
- urnaceum* C. M. in *Act. hort. Petrop. X*, 1887, f. 1.
1. — As. : Caucas.
- urnigerum* Myr. in *Coroll. fl. Ups.* p. 71 ; *Bryol. eur. III* (mon. p. 29), t. 222 ; C. M. *Syn. I*, p. 710 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 318.
Dorcadium urnigerum Lindb. l. c.
1. Ad rup. humid. — Eur. : Voges., Rhoengeb., Harz, Tatra, Tirol, Helvet. Am. sept. : Wyoming.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 886 p.p.
- * var. *calcareum* Vent. in *Husn. Muscol. gall.* p. 164.
O. *cupulatum* var. *calcareum* ej. in *Hedwig.* 1872.
Ad rup. calcar. — Eur. : Helvet.
- * var. *confertum* W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 277 et *II ed.* p. 319.
Ut typ. — Eur. : Rhaet. (M. Albula).
- * var. *perforatum* (Limpr.) Vent. in *op. cit.* p. 163.
O. *perforatum* Limpr. in *Ann. Soc. sc. Siles.* 1884, p. 214 et *Laubm. Deutschl. II*, p. 51.
Ad rup. calc. — Eur. : Alp. Tirol., Stir. As. : Caucas.
- var. *Schubartianum* Vent. — O. *Schubartianum*.
var. *Venturii* Vent. et Bott. — O. *Venturii*.
urnigerum Jur. p.p. — O. *Schubartianum*.
- Venturii* de Not. *Epil.* p. 305 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 317.
O. *urnigerum* var. *Venturii* Vent. et Bott. *Enum.* p. 28.
1. Rupic. — Eur. : Sabaud., Ital. super., Tirol., Helvet.

« *var. fuscum* Vent. in *Rev. bryol.* 1881, p. 47 et in *op. cit.* p. 164.
— *Eur.* : Alp. Helvet. (Vales.).

« *var. himalayanum* Vent. in *Rev. bryol.* 1895, p. 52.
Rupic. — *As.* : Himalaya.

Venturii Mac. — *O. anomalum* var.

verrucosum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 358.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

vladikaukasum Vent. in *op. cit.* p. 167.

1. Cortic. — *As.* : Caucas. centr.

Wagneri Ltz. *Moost.* p. 162.

1. Rupic. — *Am. merid.* : M. Pichincha.

Wallisii C. M. in *Linn.* 1874, p. 604.

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Watsoni Jam. in *Bot. King Exped.* p. 401 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 73, t. 54 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 168.

1. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Nevada (M. Humboldt).

Watsoni Mac. — *O. rupestre*.

Winteri W. P. Sch. *Bryol. eur. Suppl. I-II* (*Orthotr.*, p.), t. 11 et *op. cit.* p. 335.

O. pulchellum Rab. *Bryoth. eur. n.* 1079.

O. pulchellum var. *Winteri* Braithw. *Brid. Moosfl. II*, p. 88.

1. Ad trunc. et ramul. *Acer.*, *Carpin.*, *Coryl.*, *Fraxin.*, *Lonic.* — *Eur.* : Hibern., Voges. inf. (M. Schaumberg.) (1).

OSCULATIA de Not. in *Acad. R. d. sc. di Torino...* II ser., XVIII (1 spec.).

columbica de Not. in *op. cit.* p. 445.

— *Am. merid.* : Columb.

OSMUNDULA Rab. *Crypt. Fl. Sachs. I*, p. 609.

fissidentoides ej. — *Fissidens osmundioides*.

OTICODIUM C. M. in *Linn.* 1875, p. 469.

Celebesiae C. M. — *Orthothecium*.

Oxystegus Lindb. de *Tortul.* p. 213 (sect. *TRICHOSTOMI*).

Pachyfissidens C. M. *Syn. I*, p. 45 (sect. *FISSIDENTIS*).

Pachynoma Mitt. *M. austr. am.* p. 151 (sect. *BARBULAE*).

Palinocrapsis Lindb. *M. Scand.* p. 25 (sect. *CAMPYLOPODIS*).

PALUDELLA Ehrh. *Phytophylae n.* 96 (1 spec.).

squarrosa (L.) *Brid. Mant. M.* p. 115, t. 2, f. 3 et *Bryol. univ. II*, p. 1 ; *Bryol. eur. IV*, t. 312 ; *C. M. Syn. I*, p. 468 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 502.

Bryum squarrosus L. *Sp. pl.* p. 1585 ; *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 248.

Hypnum Paludella W. et M. *Bot. Taschb.* p. 274.

Mnium squarrosus L. f. *Meth. M.* p. 364.

Orthopyxis squarrosa P. B. *Prodr.* p. 79.

(1) In *Enumer. Kindb.* nomen nudum :

O. ovatum Vent.

2. In palud. spong. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor., reg. subalp. et alp. zon. interm. et sept. *As.* : Penins. Tschutschica, Jenissei med. et inf., Ochotsk. *Afr.* : C. B. Sp. (*fid. C. M.*) *Am. sept.* : Groënland, Labrador, Anticosti, Gaspes., M. Rupestr., Columb. brit., New-York.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 158.

Rab. Bryoth. eur. n. 42, 114, 1401.

Un. itin. 1867, n. 74.

Panckowia *Lindb. M. Scand. p. 34* (sect. HYPNI=EURHYNCHIUM).

PAPILLARIA C. M. Syn. II, p. 134 (*primum subsect. NECKERAE, postea gen. propr.*) (104 spec.).

acinacifolia *Besch. in litt. ; Ren. in Rev. Bryol. 1888, p. 89.*

2. — *Afr.* : Ins. Franciae.

aeruginosa (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 167.*

Meteorium aeruginosum *Mitt. Sam. M. p. 171, t. V B.*

M. floribundum *Sull. in Wilkes Exped. p. 22 ?*

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa, Taïti.

africana (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 176.*

Dendropogon capensis *W. P. Sch. in Breutel M. Capens.*

Neckera africana *C. M. Syn. II, p. 137.*

2. — *Afr.* : M. Usagara, Kilima N'Djaro, C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 324.

« *var. natalensis* *Rehm. l. c. n. 614.*

— *Afr.* : Transvaal.

« *var. rupestris* *C. M. in Rehm. l. c. n. 324 b.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

amblyacis (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 171.*

Meteorium amblyacis *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 82.*

Neckera amblyacis *C. M. in Linn. 1869-70, p. 521.*

2. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

Ångstroemiana *C. M. in Ångstr. Prim. lin. p. 53 ; Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 36 (descript. fruct.).*

Cryphaea helictophylla *Ångstr. in Oef.... 1873, n. 5, p. 124.*

Ad arbor. — *Pac.* : Taïti, Eimeo.

ankeriensis *Kiaër in Borgen M. Madag.*

— *Afr.* : Madagascar.

apophysata *C. M. mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 678.*

— *As.* : Sikkim.

appendiculata *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1893, I, p. 120.*

Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Madagascar.

appressa (*Hsch.*) *Jaeg. l. c. p. 170.*

Hypnum appressum *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 90.*

Meteorium appressum *Mitt. M. austr. am. p. 443.*

Neckera appressa *C. M. Syn. II, pp. 136 et 670.*

1. Terr. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.,

Peruv., Brasil. austr. or.

auriculata *Jaeg.* — *Trachypus.*

Baileyi Broth. in *Bot. Centralbl.* 1888, p. 86.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

bicolor Jaeg. — *Trachypus*.

blanda (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 175.

Neckera blanda Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 14 et in Hook. *Ic. pl. rar. t.* 22 ; *C. M. Syn. II*, p. 185.

Trachypus blandus Mitt. *M. Ind. or.* p. 127 ; *Bryol. jav. II*, p. 101.

2. — *As.* : Nepal., Himalaya, Khasia, M. Neilgherr., Ceylan, Java.

« *var. thuyodes* *Bryol. jav. l. c.*

— *As.* : Java, Borneo, Ceram, Halmaheira.

Boiviniana Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 123 ; *Ren. in Rev. bryol.* 1888, p. 88.

2. *Ster.* *Ad arbor.* — *Afr.* : Ins. Bourbon., Franciae.

breviculifolia C. M. in *Fl.* 1890, p. 494.

Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

Buchanani (Brid.) Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 74.

Isothecium Buchanani Brid. *Bryol. univ. II*, p. 363.

Leskea Buchanani Hook. in *Trans. of the Linn. Soc. IX*, p. 320, t. 28, f. 3.

Neckera Buchanani C. M. *Syn. II*, p. 670.

Trachypus Buchanani Mitt. *M. Ind. or.* p. 129.

Ad arbor. — *As.* : Nepal., Himalaya occ., Bhotan, M. Neilgherr., Ceylan, Alp. Yunnan.

caldensis Ångstr. *Prim. lin.* p. 35.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

callochlorosa C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

Cameruniae (C. M.) Par.

Floribundaria Cameruniae C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 81.

— *Afr.* : M. Cameroon.

capillaris (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 168.

Meteorium capillare Mitt. *M. austr. am.* p. 442.

Neckera capillaris C. M. *Syn. II*, p. 134.

Pilotrichella capillaris Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 80.

Pterogonii spec. Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.* n. 1082.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

capilliramea (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Neckera capilliramea C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 237.

Ster. — *As.* : Java.

Cardoti Broth. in *Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handb.* 1895, n. 3.

2. fr. ign. — *Am. merid.* : Brasil.

catharinensis Par.

P. filipendula C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 166.

— *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

cavifolia C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 173.

Rupic. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

cerina (Mitt.) Par.

Meteorium cerinum H. f. et W. *Fl. Tasman. II*, p. 203, t. 175, f. 4.

Trachypus cerinus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 91.

Ad arbor. — *Fac.* : Austral., Nov. Zeland., Tasman.

- chloronema C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 69.
Ster. — As. : Bhotan, Sikkim.
- chrysoclada (C. M.) *Jaeg. op. cit.* p. 174.
Neckera chrysoclada C. M. *Syn. II*, p. 139.
Trachypus atratus Mitt. ?
Ster. — As. : Ceylan.
- chrysonema C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 69.
Ster. — As. : Bhotan.
- cirrifolia (Schwaegr.) *Jaeg. op. cit.* p. 176.
Hypnum cirrifolium Schwaegr. *Suppl. III*, I, I, t. 218.
Neckera cirrifolia C. M. *Syn. II*, p. 138.
Ster. — Afr. : Ins. Franciae.
- consanguinea (Hpe.) *Jaeg. op. cit.* p. 169.
Meteorium consanguineum Hpe. *herb.*
Pilotrichella consanguinea Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 80.
— Am. sept. : Mexic.
- crispatula *Jaeg.* — Trachypus.
- crocea (Hpe.) *Jaeg. op. cit.* p. 171.
Pilotrichum croceum Hpe. in *Linn.* 1852, p. 715.
P. flexicaule Tayl. ?
— Pac. : Tasman.
- cryphaeopsis C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 175.
Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- cuspidifera (Tayl.) *Jaeg. op. cit.* p. 176,
Meteorium cuspidiferum Tayl. in *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*,
p. 101.
Neckera cuspidifera ej. *mss.*
N. funiformis C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 246.
Trachyloma Taylorii Mitt. *M. Ind. or.* p. 92.
Trachypus cuspidiferus ej. *op. cit.* p. 128.
Ad arbor. — As. : M. Neilgherr., Ceylan. Pac. : Nov. Zeland.
sept. et med., ins. Kermadec et Norfolk, Tasman.
- declinata *Jaeg.* — Trachypus.
- deltoidea (Besch.) *Jaeg. op. cit.* p. 172.
Pilotrichella deltoidea Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 227.
Ad frutic. — Pac. : Nov. Caledon.
- denticulata (C. M.) *Jaeg. op. cit.* p. 170.
Meteorium denticulatum Mitt. *M. austr. am.* p. 443.
Neckera denticulata C. M. *Syn. II*, p. 137.
2. — Am. merid. : Venezuela.
- Deppei (Hsch.) *Jaeg. op. cit.* p. 168.
Meteorium Deppei Mitt. *op. cit.* p. 441.
Neckera Deppei Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic. ; C. M. Syn. II*,
p. 136.
Pilotrichella Deppei Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 80.
Pilotrichum seriatum C. M. in *Linn.* 1847, p. 217.
Pterigynandrum seriatum Hsch. l. c.
1. — Am. sept. : Mexic. Am. merid. : Ins. Trinitat.,
And. Nov. Granat.
- diversicoma (Hpe.) *Par.*
Neckera diversicoma Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 42.
2. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Dubyana (*Hpe.*) *Jaeg. l. c.*

Monoschima viride *Duby Choix de crypt. ex.* 1867, p. 4.

Neckera Dubyana *Hpe. Sp. nov. Mexic. in Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien, 7 April.* 1869.

Pilotrichella Dubyana *Besch. Prodr. Bryol. mexic. p.* 80.

Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic.

Eavesiana (*Hpe.*) *Jaeg. l. c. p.* 170.

Meteorium Eavesianum *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p.* 82.

Neckera Eavesiana *Hpe. in Linn.* 1876, p. 319.

— *Pac.* : Austral. or. subtropic.

Feae C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1891, p. 601 (*nom.*).

Ster. — *As.* : Birman. super.

filifunalis C. M. in Fl. 1890, p. 493.

Ster. — *Afr.* : M. Aberdare, Usambara.

Filipendula (Hook. f. et Wils.) Jaeg. l. c. p. 175.

Meteorium Filipendula H. f. et W. Fl. Tasm. II, p. 203, t. 175, f. 5.

Ad arbor. — *Pac.* : Tasman.

Filipendula C. M. — *P. catharinensis.*

flaccida (Mitt.) Jaeg. l. c. p. 171.

Meteorium flaccidum *Mitt. M. austr. am. p.* 443.

Ster. — *Am. merid.* : And. Peruv.

flavo-limbata (C. M. et Hpe.) Par.

Meteorium limbatum (errat. !) *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p.* 82.

Neckera flavo-limbata C. M. et Hpe. in Linn. 1853, p. 502.

Pilotrichella flavo-limbata Jaeg. Ad. II, p. 171.

Ster. — *Pac.* : Austral. felix.

flexicaulis (Tayl.) Jaeg. l. c. p. 175.

Meteorium flexicaule H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. p. 101 et *Handb. p.* 460.

P. crocea Hpe?

Pilotrichum flexicaule Tayl. mss.

Trachypus flexicaulis *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 91.

— *Am. merid.* : Sine loc. spec. (1). *Pac.* : Nov.

Zeland., Austral. or., Tasman.

flexilis *Jaeg.* — *P. illecebra.*

floribunda C. M. in Linn. 1876, p. 267.

Hypnum floribundum C. M. Syn. II, p. 265.

Leskea floribunda Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 310 et *M. frond. ined. Archip. ind. p.* 162, t. 53.

Meteorium floribundum Bryol. jav. II, p. 91.

Neckera floribunda C. M. in Linn. 1868-69, p. 9.

2. — *As.* : Sumatra, Java, Ceram, Ternate, Halmaheira, Celebes, Tonkin, Japon. *Pac.* : Polynes. (absq. loc. spec.); Nov. Guin. sept. ?

« *var. minor (C. M.) Par.*

Neckera floribunda var. minor C. M. in op. et l. cc.

— *As.* : Ceylan.

(1) Fid. Mitt. l. c., qui non memorat eam in *M. austr. am.*

floribundula (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 125.

Neckera floribundula C. M. in *Linn.* 1876, p. 266.

Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan.

« *var. Mac Leana* Rehm. *M. Afr. austr.* n. 611.

— Afr. : Transvaal.

fulva (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 171.

Meteorium fulvum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 85.

Ster. — Pac. : Austral. (Victoria).

fulvastra Besch. *op. cit.* p. 124.

2. Ster. — Afr. : Usambara, ins. Borbon.

fuscens (Hook.) Jaeg. *l. c.* p. 174.

Daltonia fuscens W. Arn. *Disp.* p. 55.

Meteorium fuscens Bryol. *jav. II*, p. 93, t. 207.

Neckera fuscens Hook. *M. ex. t.* 157.

Pilotrichum fuscens Brid. *Bryol. univ. II*, p. 264; *C. M. Syn. II*, p. 175.

Trachypus fuscens Mitt. *M. Ind. or.* p. 128.

2. Ad arbor. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia, M. Neilgherr., Ceylan, Sumatra, Java, Ceram.

fusco-viridis (Hpe.) Jaeg. *l. c.* p. 173.

Meteorium fusco-viride Mitt. *M. austr. am.* p. 438.

Neckera fusco-viridis Hpe. in *Linn.* 1862, p. 526.

Ster. — Am. sept. : Mexic. ; Guadalup. ? Am. merid. :

And. Nov. Granat.

guarapiensis Besch. in *Journ. de bot.* 1891, p.

P. subnigrescens ej. in *Rev. bryol.* 1885 (nom.).

1. In silvis. — Am. merid. : Paraguay.

helminthoclada C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 113.

Ster. — As. : China or. (prov. Schen-Si).

« *var. progrediens* ej. in *op. cit.* p. 114.

Ster. — As. : Ut typus.

Henscheni C. M. mss. ; Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 35.

2 ? Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

hispida Jaeg. — *Trachypus*.

Hookeri Jaeg. — *P. sparsa*.

illecebra (C. M.) Par.

Anomodon flexilis Hpe. in *Linn.* 1838, p. 356.

Antitrichia cuspidata Nees ab Es. in *Linn.* 1847, p. 681.

Leskea flexilis Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.* n. 1093.

L. heterophylla Hsch. *ibid.*

Meteorium illecebrum Mitt. *M. austr. am.* p. 437.

Neckera illecebra C. M. *Syn. II*, p. 137.

Papillaria flexilis Jaeg. *Ad. II*, p. 172.

Pilotrichella illecebra Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 81.

Pilotrichum illecebrum Hpe. in *sched.*

2. Ad arbor. — Am. sept. : Mexic., Guatemala, Jamaic., ins. Tabago.

Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens., Brasil.

« *var. laevis* Par.

P. illecebraria C. M. in *Linn.* 1874-79, p. 493.

— Am. merid. : Venezuela.

illecebraria C. M. — *P. illecebra var. laevis*.

jumboana (C. M.) Par.

Floribundaria jumboana C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 672.

— Afr. : M. Cameroon.

kermadecensis (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 169.

Meteorium cuspidiferum Tayl. in *Fl. of the N. Zeal.* p. 101 p.p.

M. kermadecense Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 82.

Neckera kermadecensis C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 779.

Pilotrichum nigrescens Hsch. in *Sieb. M. Nov. Holl.* n. 14; C. M. *Syn. II*, p. 135.

Trachypus Hornschuchii Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 90.

1. Ad arbor. — Pac. : Austral., Nov. Zeland., Tasman., ins. Kermadec, Raoul, Sunday, etc.

laeta Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, *II*, p. 192 et M. *Masc. Mad.* n. 38.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Madagasc. sept.

laeviuscula Broth. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 174.

Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

latifolia (Lindb.) Jaeg. *Ad. II*, p. 166 (1).

Neckera latifolia Lindb. mss. ; Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 42.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

laxifolia C. M. in M. *Döering ; Ångstr. in Oefv....* 1876, n. 4, p. 34.

Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

leptonema C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, *I*, p. 70.

Ster. — As. : Bhotan.

leuconeura (C. M.) Jaeg. *l. c.* p. 171.

Meteorium leuconeurum *Bryol. jav. II*, p. 95, t. 209.

M. nigrescens Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 160.

Neckera leuconeura C. M. *Syn. II*, p. 171.

Pilotrichella leuconeura Besch. *Fl. bryol. N. Caled.* p. 227.

2. — As. : Sumatra, M. Java, Ceram, Halmaheira.

Pac. : Nov. Caledon. ?

lindigioides C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 75.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

longifolia (W. P. Sch.) Jaeg. *l. c.* p. 169.

Pilotrichella longifolia W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 81.

Ster. — Am. sept. : Mexic (Orizaba).

longipila (W. P. Sch.) Jaeg. *l. c.*

Pilotrichella longipila W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 40.

Pilotrichum longipilum ej. in *hb. Mus. Paris.*

P. piliferum ej. *l. c.*

Ster. — Am. sept. : And. Costa Ric., Guadalup.

macrotis C. M. in *Hildebr. M. Mad.* n. 2103.

— Afr. : Madagascar.

media Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 36.

Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Moenkemeyeri (C. M.) Par.

Neckera Moenkemeyeri C. M. in *Fl.* 1886, p. 516.

Ster. — Afr. : Old Calabar.

Molleri C. M. in Fl. 1886, p. 283.

Ster. ? Ad arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.

Moseni Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895, n. 3.

2. fr. ign. Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. or.

Nietneri Jaeg. — Trachypus.

nigrescens (Sw.) Jaeg. Ad. II, p. 169.

Hypnum nigrescens Sw. Prodr. p. 141.

Isothecium radicans Brid. Bryol. univ. II, p. 374.

Meteorium nigrescens Mitt. M. austr. am. p. 441; Lesq. et Jam. Man. p. 287.

Neckera nigrescens Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 244 (excl. syn.); C. M. Syn. II, pp. 134 et 670.

Pilotrichum paraphysale C. M. in Linn. 1847, p. 216.

Pterigynandrum nigrescens Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1778.

1. Ad arbor. — Am. sept. : Lac. Huron, Canad. or., Ludovic., Mexic., Costa Rica, Antill. fere omn. Am. merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, Nov. Granat., ins. Gallapag., Brasil. austr. or.

« var. brevifolia (Hpe) Par.

Neckera nigrescens var. brevifolia Hpe. Enum. M. Brasil. p. 43.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

« var. illecebra (C. M.) Par.

Neckera nigrescens var. illecebra C. M. l. c. p. 135.

Pterigynandrum illecebrum Brid. Mant. M. p. 131.

— Am. sept. et merid. : Cum typ.

nitidula Rehm. M. Afr. austr. n. 612.

Ster. — Afr. : Transvaal.

nodicaulis Jaeg. — Trachypus.

octodiceras (C. M.) Par.

Floribundaria octodiceras C. M. in Dusen M. Camer. p. 104.

Neckera octodiceras ej. in Fl. 1886, p. 516.

Ster. ? Ad arbor. — Afr. : M. Cameroon.

Erstedtiana (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 170.

Meteorium Erstedtianum Mitt. M. austr. am. p. 441.

Neckera Erstedtiana C. M. Syn. II, p. 671.

2 ? — Am. sept. : Costa-Rica.

patentissima C. M. in Fl. 1886, p. 282.

Ster. ? Ad arbor. — Afr. : Usambara, ins. S. Thom.

paulensis Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895, n. 3.

2. fr. ign. — Am. merid. : Brasil. or.

perauriculata Broth. in op. et l. cc.

2. fr. ign. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

perichaetialis (Hpe.) Jaeg. l. c.

Neckera perichaetialis Hpe in Linn. 1874, p. 217.

Trachypus? perichaetialis Besch. Fl. bryol. Réunion. etc. p. 129.

— Afr. : Madagascar.

Pintoriana C. M. in Dusen M. Camer. n. 23.

— Afr. : M. Cameroon.

polytricha (Dz. et Mk.) Jaeg. Ad. II, p. 173.

Meteorium polytrichum Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 131, t. 51-52; Bryol. jav. II, p. 96.

- Neckera Miqueliana *C. M. Syn. II*, p. 138.
 2. — *As.* : Sumatra, Java, Ternate, Halmaheira, Celebes.
- pseudo-fulvastra *C. M. mss.*
 — *Afr.* : Madagascar.
- pseudo-funalis *C. M. in Linn. 1878-79*, p. 493.
 — *Am. merid.* : Venezuela.
- pseudillecebra (*C. M.*) *Par.*
Neckera pseudillecebra C. M. in Journ. of Bot. 1877, p. 229 (*nom.*).
 Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- pseudo-sinuata *C. M. in Linn. 1878-79*, p. 493.
 — *Am. merid.* : Venezuela.
- ptychophylla *Angstr. in Oefv...* 1876, n. 4, p. 35.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.
- Reginae (*Hpe.*) *Jaeg. l. c.* p. 176.
Meteorium Reginae Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 82.
Neckera Reginae Hpe. in Linn. 1876, p. 319.
 — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).
- Regnellii *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895*, n. 3.
 2. — *Am. merid.* : Brasil. or.
- Renauldi *Besch. in litt.; Ren. in Rev. bryol. 1888*, p. 88.
 2. Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- retrorsa (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 174.
Meteorium retrorsum Mitt. M. Ind. or. p. 90.
Neckera retrorsa C. M. in Linn. 1869-70, p. 23.
 2? — *As.* : Ceylan.
- Robillardii *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 125.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- Rutenbergii *C. M. in Abhandl. Brem. VII*, p. 209.
 2. — *Afr.* : Madagascar.
- sarmentosa (*Mitt.*) *Besch. in hb. Mus. Paris.*
Meteorium sarmentosum Mitt. in sched.
 — *As.* : Bhotan.
- Scottiae (*C. M.*) *Par.*
Neckera Scottiae C. M. in Linn. 1867-68, p. 621.
Papillaria Filipendula (fid. Mitt.).
 2? — *Pac.* : Austral. or.
- semi-torta (*C. M.*) *Jaeg. l. c.* p. 175.
Meteorium Harveyi Bryol. jav. II, p. II, p. 94, t. 208 (*fid. C. M.*).
M. semi-tortum ibid. p. 227.
Neckera semi-torta C. M. Syn. II, p. 671.
Trachypus Harveyi Mitt. M. Ind. or. p. 127.
 1 (*C. M.*) 2 (*Bryol. jav.*). — *As.* : Ceylan ? Java, Ternate, Halmaheira, Celebes.
- serpentina *C. M. in Fl. 1890*, p. 493.
 Ster. In silvis. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- serrulata *Jaeg.* — *Trachypus.*

sinuata (C. M.) Par.

Meteorium sinuatum Mitt. *M. austr. am.* p. 446.

Neckera sinuata C. M. *Syn. II*, p. 139.

Pilotrichella sinuata Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 82.

Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

socia Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 35.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

sparsa (Mitt.) Par.

Meteorium sparsum Mitt. *M. Ind. or.* p. 89 (*sub* *M. Hookeri*; cf. *l. c.* p. 158).

Papillaria Hookeri Jaeg. *Ad. II*, p. 174.

2. — *As.* : Himalaya occ., Khasia.

squamata Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 34 (*nom.*).

— *Pac.* : Austral.

squamatula C. M. *mss.*; Ångstr. in *op. cit.* p. 35.

Ster. *Ad arbor.* — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subbicolor Jaeg. — *Trachypus*.

subintegra (Lindb.) Jaeg. *Ad. II*, p. 160.

Neckera subintegra Lindb. in *Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 43.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subnigrescens Besch. — *P. guarapiensis*.

subpolytricha Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 73.

Ster. *In silvis.* — *As.* : Yunnan.

subsquamatula C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 493.

— *Am. merid.* : Venezuela.

subulifolia (W. P. Sch.) Jaeg. *l. c.* p. 168.

Meteorium subulifolium W. P. Sch. *Hb.*

Pilotrichella subulifolia Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 81.

— *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

tahitensis Ångstr. — *Meteorium helictophyllum*.

teres (Mitt.) Jaeg. *l. c.* p. 173.

Meteorium teres Mitt. *M. austr. am.* p. 438.

Pilotrichella teres Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 81.

2. *In Quercetis.* — *Am. sept.* : Mexic. (Chiapas, Oajaca, Orizaba).

Am. merid. : And. Quitens.

trachyblasta C. M. in *Rev. bryol.* 1892, p. 41 (*nom.*).

— *As.* : Ins. Nicobar?

usneoides Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

Ster. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

viridula (Mitt.) Jaeg. *l. c.* p. 171.

Meteorium viridulum Mitt. *op. cit.* p. 444.

Neckera viridula ej. in *Kew Journ. bot.* III, p. 351.

Ster. *In silv.* — *Am. sept.* : Costa-Rica. *Am. merid.* : And. Quitens.

Wagneri Ltz. *Moosst.* p. 165.

Ster. — *Am. merid.* : Panama.

Walkerii Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1895, I, p. 70.
Ster. Ad arbor. — As. : Sikkim (1).

Papillidium C. M. in Linn. 1875, p. 466 (sect. HYPNI).

Paradricranum Limpr. Deutsch. Laubm. I, p. 326 (sect. DICRANELLÆ).

Paraleucobryum Lindb. M. Scand. p. 23 (sect. DICRANI).

Parapanckowia ej. l. c. = Eurhynchium myosuroides.

Paraphysanthus Spruce Cat.; Mitt. M. austr. am. p. 451 (subsect. NECKERAE).

Parasymblypharis Lindb. M. Scand. p. 27 (sect. CYNODONTII).

Pegophyllum Mitt. M. austr. am. p. 111 (sect. LEUCOBRYI).

PELEKIUM Mitt. Sam. M. p. 176.

Spec. omn. THUIDIA ejusd. nom.

Peromilla Spr. in Mitt. M. austr. am. p. 372 (sect. LEPIDOPILI).

PEROMNIUM Schwaegr. Suppl. I, III, t. 250.

Spec. omn. non indicatae sunt BRACHYMENIA ejusd. nom.

Wrightii Jaeg. — Leptotheca.

PHAROMITRIUM W. P. Sch. Syn. I ed. p. 119 (1 spec.).

exiguum Aust. — 1 h. subsessile.

marginatum Jaeg. — Streptopogon.

subsessile (Brid.) W. P. Sch. op. cit. et II ed. p. 150.

Anoetangium acaule Roehl. Ann. Wett. Ges. II, p. 200.

A. subsessile Spreng. Syst. Veg. IV ed. I, p. 146.

Fiedleria subsessilis Rab. Deutsch. Crypt. II, p. 98.

Gymnostomum acaule W. et M. Bot. Taschb. p. 79, t. 6 f. 4-8.

G. subsessile Schwaegr. Suppl. I, I, p. 27; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 19.

Ph. exiguum Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 42.

Pottia acaulis Hpe. in Fl. 1837, I, p. 287.

P. subsessilis Bryol. eur. II (mon. p. 6), t. 117.

Pterigoneuron subsessile Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 96.

Schistidium subsessile Brid. Bryol. univ. I, p. 113; C. M. Syn. I, p. 566.

Tortula subsessilis Mitt. M. austr. am. p. 164.

1. In terr. argill. et ad mur. terra obtect. — Eur. : Palatin., German. tota, Helvet., Tirol., deest in Scandin., Britann., Gall. As. : Caucas. Am. sept. : Saskatchewan, Columb. brit., reg. or. et centr. Am. merid. : And. Chilens.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 156.

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 118.

PHASCONIA C. M. in Linn. 1880-83, p. 438 (2 spec.).

Balansae C. M. l. c. (nom.).

— Pac : Nov. Caledon.

Lorentzi C. M. in op. cit. p. 439.

2. — Am. merid. : Uruguay.

(1) In Enum. Kindberg. nom. nud. :

P. Filum C. M.

humilis Lindb.

Philippinarum C. M.

P. sciuroides C. M.
subpiligera Hpe.

PHASCUM Lin. Sp. pl. p.p. (25 spec.).

acaulon L. — *Ph. cuspidatum*.

var. *majus* Ehrh. — *Ph. cuspidatum*.

var. *minus* Ehrh. — *Sphaerangium muticum*.

var. β L. — *Sphaerangium muticum*.

acuminatum Lindb. — *Pleuridium subulatum*.

affine Bryol. germ. — *Ph. cuspidatum* var. *Schreberianum*.

alternifolium } Dicks. — *Archidium*.
 } Kaulf. — *Pleuridium*.

apiculatum H. f. et W. — *Sphaerangium*.

var. *turgidum* Mitt. — *Sphaerangium apiculatum* var. *turgidum*.

Arnoldii Rob. Br. — *Pleuridium*.

austro-crispum C. M. — *Systegium*.

axillare Dicks. — *Pleuridium nitidum*.

badium Bryol. germ. — *Microbryum Floerkeanum* var. *badium*.

Beyrichianum Schwaegr. — *Sporledera*.

brachypelma C. M. — *Systegium*.

brevipes Schwaegr. — *Sporledera Hampeana*.

Bruchu Spreng. — *Archidium alternifolium*.

bryoides Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* 2, t. 10; *Brid. Bryol. univ.* 1, p. 754;
Bryol. eur. 1 (mon. p. 11), t. 6; C. M. *Syn.* I, p. 28 et II, p. 521;
W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 18.

Mildeella bryoides Limpr. *Deutschl. Laubm.* 1, p. 192.

Ph. elongatum Schultz *Fl. Starg.* p. 273.

Ph. graniferum Wahlenb. in *Oefv...* 1806, p. 13, t. 4, f. 3.

Ph. gymnostomoides Brid. *op. cit.* p. 48.

Ph. pusillum Schleich.

Pottia bryoides Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 410.

Tortula bryoides ej. M. *Scand.* p. 21.

l. In ruderat., camp., ad agger. etc. — *Eur.* : A Suec. usq. in Ital.
As. : Caucas. Am. sept. : Perrar. : Calif.

* var. *atro-viride* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 19.
In umbros. humid. — *Eur.* : Ubi typ.

* var. *brachycarpum* ej. ll. cc.
Ut et ubi typ. in *Eur.*

* var. *cernuum* ej. ll. cc.
Ph. bryoides var. *curvisetum* *Bryol. eur.* l. c.

Ut et ubi typ. in *Eur.*

Eos. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 303.

var. *curvisetum* *Bryol. eur.* — *Ph. bryoides* var. *cernuum*.

* var. *piliferum* *Bryol. eur.* et W. P. Sch. ll. cc.
Ad mur. et agg. sic. — *Eur.* : Ubi typ.

* var. *Thornhillii* Wils. *Bryol. brit.* p. ; W. P. Sch. *Syn.* II ed. l. c.
Ut typ. — *Eur.* : Anglia.

bulbosum Voit. — *Sphaerangium muticum*.

var. *minimum* de Not. — *Sphaerangium triquetrum*.

caldense Lindb. — *Ephemerella*.

calodietyum C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

— *Am. merid.* : Monte Video.

carinatum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 4.

— *Am. merid.* : Brasil. anstr. or.

carniolicum Web. et Mohr *Bot. Taschb.* pp. 69 et 450; *Brid. Bryol.*

univ. I, p. 26; Bryol. eur. I (mon. p. 12), t. 5; W. P. Sch. op. cit. p. 19.

Acaulon carniolicum C. M. Syn. I, p. 23 et II, p. 519.

Aschisma carniolicum Lindb. in Utk. till... p. 28.

Systegium carniolicum de Not. Epil. p. 741.

l rariss. syn. Ad terr. limos. — *Eur.*: Gall. merid. (Monspel.), Carniol.; Neuwied? Helvet.? *Afr.*: Tingit. *Am. sept.*: Texas occ.

« *var. speciosum (Mor.) Par.*

Aschisma carniolicum β speciosum Limpr. Laubm. Deutsch. I, p. 196.

Phascum speciosum Moris in sched.

— *Eur.*: Sardin.

cernuum { *Gmel.* — *Ph. curvicollum.*
 { *Lag.* — *Ph. cuspidatum var. curvisetum.*

cohaerens Hedw. — *Ephemerum.*

confervoides Brid. — *Ephemerum serratum.*

crassinervium { *Grev.* — *Ephemerella recurvifolia.*
 { *Schwaegr.* — *Ephemerum crassinervium.*

var. Sull. — *Ephemerum spinulosum.*

crispum { *C. M. p.p.* — *Systegium multicapsulare.*
 { *Hedw.* — *Systegium.*
 { *Sull. p.p.* { *Systegium nitidulum.*
 { *Systegium Sullivanti.*

var. multicapsulare H. et T. — *Systegium.*

var. rostellatum H. f. et W. — *Systegium ludovicianum.*

cristatum H. f. et W. — *Ephemerum.*

cryptocarpum C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 4.

Terr. — *Am. merid.*: Brasil. subtropic. or.

curvicollum Hedw. *M. frond. I, p. 32, t. II; Brid. Bryol. univ. I, pp. 24 et 754; Bryol. eur. I (mon. p. 11), t. 6; C. M. Syn. I, p. 27 et II, p. 521; W. P. Sch. op. cit. p. 19.*

Cycnea curvicolla Berk. Handb. brit. M. p. 301.

Ph. cernuum Gmel. Syst. nat. II, p. 1323.

Pottia curvicollis Mitt. in Ann. and Mag. of nat. hist. 1851, p. 311.

Pyxidium pendulum Ehrh. Beitr. IV, p. 44; Brid. Mant. M. p. 6 (fid. C. M.; non! fid. Lindb. Trichost. eur. p. 6).

l. In campestr. glareos., ad viar. marg., etc. — *Eur.*: Fere tota usq. ad Suec. merid.; Graecia.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n. 154.*

curvicollum Sm. — *Ph. rectum.*

curvisetum Dicks. — *Ph. cuspidatum var. curvisetum.*

curvulum Tayl. — *Pleuridium nervosum.*

cuspidatum Schreb. *de Phasco, p. 8, t. I; Brid. Bryol. univ. I, p. 41; Bryol. eur. I (mon. p. 10), t. 5; C. M. Syn. I, p. 25 et II, p. 521; W. P. Sch. op. cit. p. 16.*

Bryum bulbiferum Neck. Meth. M. p. 235.

Ph. acaulon L. Sp. pl. p. 1570.

Ph. acaulon β majus Ehrh. Hann. Mag. 1780, p. 235.

Pottia cuspidata Mitt. in Ann. and Mag. of nat. hist. 1851, p. 311.

Sphagnum acaulon bulbiforme majus Dill. Hist. M. p. 252, t. 32, f. II.

Sph. acaulon bulbiforme minus ej. op. cit. f. 12 (fid. Lindb. Trichost. eur. p. 5).

l. In camp. et agr. tam aren. quam argill. — *Eur.*: Tota, frigidiss. excepta. *As.*: Caucas. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Reg. or. et centr. *Am. merid.*: And. Quitens.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n. 304, 852.*

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 34.

- « *var. curvisetum* (Dicks.) *Bryol. eur.* (incl. *v. elatum*), *C. M.* (*v. ε* et *ζ*) et *W. P. Sch. ll. cc.*

Ph. cernuum Lag. in *Ann. d. Cienc. nat.* p. 14.

Ph. curvisetum Dicks. *op. cit.* p. 3, t. 4, f. 4; *Brid. op. cit.* p. 42.

Ph. elatum Brid. *op. cit.* p. 45 (incl. *v. β* *prolifera*).

Ph. grandiusculum ej. *Sp. M. I.* p. 9.

Ut et ubi typ. in *Eur.*

var. elatum *Bryol. eur.* — *Ph. cuspidatum var. curvisetum.*

- « *var. macrophyllum* (Wib.) *Bryol. eur.*, *C. M.* (*β p.p.*) et *W. P. Sch. ll. cc.*

Ph. macrophyllum Wib. *Fl. Werth.* p. 282.

Ut et ubi typ. in *Eur. et As.*

var. maximum W. et M. — *Ph. cuspidatum var. Schreberianum.*

- « *var. piliferum* (Schreb.) *Hook. et Tayl. Muscol. brit.* p. 8; *Bryol. eur.*, *C. M.* (*δ*) et *W. P. Sch. ll. cc.*

Ph. cuspidatum Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 5 et 7.

Ph. piliferum Schreb. *op. cit.* p. 8, t. I, f. 7; *Brid. op. cit.* p. 38; *Bryol. germ.* p. 65, t. 6, f. 17 (incl. *var. gemmæforme*, p. 68, t. 6, f. 17***, *latifolium*, p. 67, t. 6, f. 17**, *macrocarpon*, p. 68, t. 6, f. 17*** et *rufescens*, p. 67, t. 6, f. 17*).

Loc. steril. et praecip. in aren. marit. — Eur. : Ut typ. ; Rossia or. Afr. : Alger. Am. sept. : M. Rupestr., Saskatchewan, Idaho, reg. or. et centr.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 853.

- « *var. Schreberianum* (Dicks.) *Bryol. eur.*, *C. M.* (*β p.p. et γ*) et *W. P. Sch. ll. cc.*

Ph. affine *Bryol. germ. I.* p. 74, t. 7, f. 19; *Brid. op. cit.* p. 43.

Ph. cuspidatum β maximum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 68.

Ph. Schreberianum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt. IV*, t. 10; *Brid. op. cit.* p. 42.

Ut et ubi typ.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 853.

- « *var. trichophyllum* (Wallr.) *C. M. l. c.* (*var. η*).

Ph. trichophyllum Wallr. in *Linn.* 1840, p. 679.

Ut et ubi typ.

cuspidatum Drumm. — *Ph. cuspidatum var. piliferum.*

cylindricum Tayl. — *Tetrapterum capense var. cylindricum.*

Dicksoni Brid. — *Ephemerella recurvifolia.*

disrumpens *C. M. in Fl.* 1888, n. 1.

— *Pac. : Austral.*

Drummondii Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 26, t. 1 A; *C. M. Syn. II*, p. 521.

1.

— *Pac. : Austral. merid.*

dubium la Pyl. in *Desv. Journ. bot.* 1813, p. 284, t. 19; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 43; *C. M. Syn. I*, p. 30.

— *Eur. : Gall. (Lutetia).*

elatum Brid. — *Ph. cuspidatum var. piliferum.*

var. proliferum Brid. — *Ph. cuspidatum var. piliferum.*

elegans Hsch. — *Bruchia.*

elongatum Schultz. — *Ph. bryoides.*

exiguum H. f. et W. — *Pleuridium.*

- fleuosum* Schwaegr. — Bruchia.
- Floërkeanum* { Voit. — Microbryum Floërkeanum var. badium.
W. et M. — Microbryum.
- var. *badium* Brid. — Microbryum Floërkeanum var. badium.
- Flotownianum* Funk. — Ephemerella.
- Frucharti* C. M. — Systegium.
- globiferum* Br. — Archidium alternifolium.
- globosum* Schleich. — Sphaerangium muticum.
- grandiusculum* Brid. — Ph. cuspidatum var. curvisetum.
- graniferum* Wahlenb. — Ph. bryoides.
- gymnostomoides* Brid. — Ph. bryoides.
- Halleri* O. F. Müller. — Diphyscium foliosum.
- Hallerianum* Poll. — Diphyscium foliosum.
- heterophyllum* de Not. — Ephemerum cohaerens var. heterophyllum.
- Jamesoni* Tayl. — Glyphocarpus humilis.
- lamprocarpum* C. M. in *Fl.* 1878-79, p. 232.
2. — Am. merid. : Uruguay.
- lamprothecium* C. M. in *op. cit.* p. 233.
1. — Am. merid. : Uruguay.
- lanceolatum* Rob. Br. — Pleuridium.
- leptophyllum* C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.
— Afr. : C. B. Sp.
- lilliputanum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 133.
Terr. — Am. merid. : Brasil. subtropic or.
- lonchophyllum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 7
Terr. — Am. merid. : Brasil. subtropic. or.
- longifolium* Rob. Br. — Pleuridium.
- Lucasianum* Bryol. germ. — Physcomitrella patens var. β.
- ludovicianum* Sull. — Systegium.
- macrophyllum* Wib. — Ph. cuspidatum var. macrophyllum.
- maximum* Lightf. — Diphyscium foliosum.
- megapolitanum* Schultz. — Physcomitrella patens var. megapolitana.
- minutum* Roehl. — Microbryum Floërkeanum.
- Mittenii* C. M. — Systegium.
- mnioides* L. f. — Tetraplodon.
- montanum* Huds. — Diphyscium foliosum.
- multicapsulare* Sm. — Systegium.
var. *Mittenii* Wils. — Systegium Mittenii.
- muticum* { Br., Drumm. — Sphaerangium triquetrum.
Schreb. — Sphaerangium muticum.
var. *majus* H. et T. — Sphaerangium.
var. *minus* eor. — Sphaerangium muticum var. minus.
var. *piligerum* de Not. — Sphaerangium muticum var. cuspidatum.
var. *rubrum* Brid. — Sphaerangium.
- nepalense* Brid. *Bryol. univ.* I, p. 755; C. M. *Syn.* I, p. 30.
— As. : Nepal.
- nervosum* { Drumm. — Pleuridium Sullivantii.
Hook. — Pleuridium.
- nitidulum* C. M. — Systegium.
- nitidum* Hedw. — Pleuridium.
- occultum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 5.
Terr. — Am. merid. : Brasil. subtropic. or.

papillosum Lindb. *Trichost. eur.* p. 5 et *M. Scand.* p. 21 (subsp. *Ph. cuspidati*?).

— *Eur.* : Suecia (Stockholm).

pachycarpum Schwaegr. — *Ephemerella recurvifolia*.

palustre Bryol. eur. — *Sporledera*.

patens Hedw. — *Physcomitrella*.

var. *recurvifolium* Sm. — *Ephemerella recurvifolia*.

pedunculatum } Sm. — *Splachnum sphaericum*.

 } L. — *Tetraplodon mnioides*.

peraristatum C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

— *Afr.* : C. B. Sp.

perpusillum C. M. — *Hymenostomum* ?

piptocarpum DR. et Mont. *Syll.* p. 51.

— *Afr.* : Alger. (Blida).

piliferum Schreb. — *Ph. cuspidatum* var. *piliferum*.

var. *gemmaeforme*

var. *latifolium*

var. *macrocarpon*

var. *rufescens*

} Bryol. germ. — *Ph. cuspidatum* var. *piliferum*.

piriforme L. f. — *Physcomitrium*.

polycarpum Bryol. eur. — *Systegium crispum*.

pusillum Schleich. — *Ph. bryoides*.

rectum Sm. *Fl. brit.* III, p. 1153; *Brid. Bryol. univ.* I, pp. 25 et 754;

Bryol. eur. I (mon. p. II), t. 6; C. M. *Syn.* I, p. 27 et II, p. 521;

W. P. Sch. op. cit. p. 20.

Bryella recta Berk. *Handb. of Brit. M.* 1863, p. 300.

Ph. curvicollum Engl. *Bot.* V, t. 330.

Pottia recta Mitt. in *Ann. and Mag. of nat. hist.* p. 311.

1. In terr. argill., in camp. praepr. marit. — *Eur.* : Angl.; Westphal. ?

Gall. occid. et merid., Nassau, Ital., Sardin.; Graecia; semel in

Alsat. *Afr.* : Alger.

recurvifolium Dicks. — *Ephemerella*.

recurvirostrum C. M. — *Hymenostomum Balansaeum*.

repens With. — *Cryphaea heteromalla*.

Robinsoni Mont. — *Pleuridium*.

rostellatum Brid. — *Hymenostomum*.

Schimperianum Sull. — *Sphaerangium*.

serratum } Drumm. — *Ephemerum serratum* var. *angustifolium*.

 } Schreb. — *Ephemerum*.

var. *angustifolium* } H. f. et W. p.p. — *Ephemerum hystrix*.

 } eor. p.p. — *Ephemerum spinulosum*.

var. *stoloniferum* H. et T. — *Ephemerum serratum*.

Schreberianum Dicks. — *Ph. cuspidatum* var. *Schreberianum*.

sphaericarpon Abbot. — *Systegium multicapsulare*.

splachnoides Hsch. in *Hor. phys. Berol.* p. 57, t. 12; C. M. *Syn.* I, p. 27 et II, p. 521.

Physidium splachnoides Brid. *Bryol. univ.* I, p. 51.

2.

— *Afr.* : C. B. Sp.

stogninum Wall. — *Pleuridium nitidum*.

stellatum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 24; C. M. *Syn.* I, p. 29.

— *Eur.* : Anglia.

stenophyllum Voit } (fid. Lindb.). — *Ephemerella recurvifolia*.

 } (fid. W. P. Sch.). — *Ephemerum*.

stoloniferum Dicks. — *Ephemerum serratum*.

strictum Dicks. — *Pleuridium nitidum*.

subexsertum Hook. in *Drummi. M. bor. am. I ed. n. 9; C. M. Syn. I, p. 26 et II, p. 521*.

2. — *Am. sept.* : Saskatchewan.

subulatum { Hedw. — *Pleuridium alternifolium*.
L. — *Pleuridium*.
Æd. — *Diphyscium foliosum*.

var. β Huds. — *Diphyscium foliosum*.

Sullivanii C. M. — *Systegium*.

Sullivantii C. M. — *Systegium*.

tenerum Br. — *Ephemerum*.

tenue Wils. — *Pleuridium*.

tetragonum Harv. — *Tetrapterum capense*.

var. *cylindricum* C. M. — *Tetrapterum capense* var. *cylindricum*.

trichophyllum Wallr. — *Ph. cuspidatum* var. *trichophyllum*.

triquetrum R. Spr. — *Sphaerangium*.

truncatulum L. jun. — *Pottia truncata*.

uliginosum Gunth. — *Sporledera palustris*.

velutinum Hoffm. — *Ephemerum serratum*.

vernicosum C. M. mss.

— *Am. merid.* :

a var. *minus* ej. in *Ule Bryoth. brasil. n. 8*.

Terr. — *Am. merid.* : Brasil. subtropic. or. (1).

Pheugodon Lindb. *M. Scand. p. 27* (sect. ONCHOPHORI = *Dicranoweisia Bruntoni*).

PHILONOTIS Brid. *Bryol. univ. II, p. 5, t. 6* (167 spec.).

acicularis (C. M.) Par.

Bartramia acicularis C. M. *Bryol. austr. Georg. p. 31*.

Ster. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

acutissima (C. M.) Par.

Bartramia acutissima C. M. in *Linn. 1880-83, p. 406*.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

adpressa Fergus. — *Ph. fontana* var. *adpressa*.

affinis (Hook.) Jaeg. *Ad. II, p. 768*.

Bartramia affinis Hook. *M. ex. t. 176; C. M. Syn. I, p. 505; Fl. Tasm. II, p. 194*.

B. Brownei Brid. *Bryol. univ. II, p. 49*.

Breutelia affinis Mitt. in *Kew Journ. bot. 1856, p. 261*.

Glyphocarpus affinis Jaeg. *Ad. I, p. 525*.

2. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

africana Rehm. *M. Afr. austr. n. 193*.

— *Afr.* : C. B. Sp., Natal.

afro-acuminata (C. M.) Par.

Bartramia afro-acuminata C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n. 532*.

— *Afr.* : C. B. Sp. or.

(1) In Enum. Kindb. nomina nuda :

Ph. assimile C. M.

Ph. loreum W.

alpicola Jur. — *Ph. fontana* var. *alpicola*.

alto-gracilis (C. M.) Par.

Bartramia alto-gracilis C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 464.

♀ et fr. ign. — *Am. merid.* : Venezuela.

amblyoblasta (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 543.

Bartramia amblyoblasta C. M. in *Linn.* 1874, p. 631.

Ph. brachyclada var. *inundata* Besch. in *Hahn-Winter M. Mexic.*

Ster. Saxic. — *Am. sept.* : Mexic.

andina (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 546.

Bartramia andina Mitt. *M. austr. am.* p. 261.

2. Ster. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : M. Pichincha.

androgyna (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 551.

Bartramia androgyna Hpe. in *Bot. Zeit.* 1870, p. 34.

Syn. — *Afr.* : Usambara, Natal.

angularis C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 105.

2. Ster. — *As.* : Alp. Chin. or. (prov. Sèhen-Si).

angusta Mitt. *M. Ind. or.* p. 61.

Bartramia angustata Wils. in *sched.*

B. praetenuis ej. l. c.

2. — *As.* : Sikkim, Ceylan.

« var. *tonkinensis* Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1887, p. 96.

Arenic. — *As.* : Tonkin.

angustissima (C. M.) Par.

Bartramia angustissima C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (nom.)

— *Pac.* : Nov. Caled.

angustiuscula (C. M.) Par.

Philonotula angustiuscula C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 86.

— *Afr.* : M. Cameroon.

anisotheციoides (C. M.) Par.

Bartramia anisotheციoides C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1882, p. 79 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 20.

B. australis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876 ?

2. Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

appressa (Hook. f. et Wils.) Mitt. in *op. cit.* 1859, p. 81.

Bartramia appressa H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 89, t. 86, f. 3.

B. remotifolia eor. *Fl. Tasm. II*, p. 193, t. 174, f. 3 et *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 447.

Hypnum scabrifolium eor. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 552 ; C. M. *Syn. II*, p. 487.

Ph. remotifolia Jaeg. *Ad. I*, p. 545.

2. Rupic. — *Afr.* : Ins. Marion, Kerguelen. *Am. merid.* : And. Quittens. *Pac.* : Nov. Zeland., Alp. Austral. or., Tasman., ins. Auckland.

appressa Mitt. (1876). — *Bartramidula subexigua*.

Arbuscula (C. M.) Par.

Bartramia Arbuscula C. M. in *Linn.* 1875, p. 394.

2. Ster. Terr. — *Afr.* : Dar Fertit.

- Arnellii* Husn. *Muscol. gall.* p. 268; *Philib. in Rev. bryol.* 1894, p. 1894, p. 14 (*descriptio locupletior*).
Ph. capillaris Milde *Bryol. sil.* p. 242.
Ph. fontana var. *capillaris* Arn. in sched.
Ph. marchica var. *capillaris* Limpr. *Krypt. von Schles. I.* p. 117.
Ph. marchica var. *tenuis* Boulay M. Fr. I, p. 216.
 2. In sabulos. — *Eur.* : Suecia, Brandebourg, Silesia, Boruss. occ., Westphal.
- Arnoldi* Mdo. — *Ph. fontana* var. *alpicola*.
- asperifolia* Mitt. *M. Sam.* p. 185.
Bartramia asperifolia ej. in *Journ. of the Linn. Soc.* X, p. 185.
 2. *Rupic.* — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.
- atro-lutea* C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (*nom.*).
 — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).
- australis* (Mitt.) Par.
Bartramia australis Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 448.
 2. — *Pac.* : Nov. Zeland. med.
- australis* Mitt. (1859). — *Conostomum*.
- bagintensis* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 700.
Bartramia bagintensis C. M. in *Linn.* 1875, p. 395.
Ster. Terr. — *Afr.* : Niam-Niam.
- Balansaeana* Besch. *Not. M. Parag.* p. 264.
 1. *Terr.* — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1195.
- basaltica* (C. M.) Par.
Philonotula basaltica C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 436.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- Berteroana* (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 485.
Bartramia Berteroana C. M. in *Linn.* 1843, p. 590 et *Syn. I.* p. 485.
 2. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.
- « *var. flaccida* (C. M.) Besch. *l. c.*
Bartramia Berteroana var. *flaccida* C. M. *l. c.*
Ph. fontana Θ *lanata* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 21.
 — *Am. sept.* : Guadalup.
- boliviana* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1676.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- borealis* (Hag.) Limpr. *Laubm. Deutschl.* p. 565.
Ph. fontana var. *borealis* Hagen in *Norske Vid. Sels.* 1888.
Ster. Ad rup. aqua nivali irror. — *Eur.* : Norvegia.
- brachyclada* Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 59.
 2. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).
 var. *inundata* Besch. — *Ph. amblyoblasta*.
- brevicuspis* (C. M.) Par.
Philonotula brevicuspis C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 492.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- breviseta* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1675.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.

byssiformis *C. M.* in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 105.

Ster. — *Afr.* : Ins. Nossi Be.

caespitosa Wils. — *Ph. fontana* var. *caespitosa*.

var. *syriaca* Ltz. — *Ph. fontana* var. *syriaca*.

caespitosula *C. M.* mss. ; Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 16.

♂ et fr. ign. Ad terr. humid. et saxa madida. — *Am. merid.* : Brasil. or.

calcareia W. P. Sch. *Coroll.* p. 86 et *Syn.* II ed. p. 520.

Bartramia calcarea *Bryol. eur.* IV (mon. p. 19), t. 325 ; *C. M.* *Syn.* I, p. 475.

B. crassinervis Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 370 p.p.

2. Ad scaturig. calcar. — *Eur.* : E reg. campestr. mont. usq. in alp.

As. : Himalaya, Tibet. occ., Luristan, Caucas. occ. et centr. ; *Syr.*

Afr. : Alger. *Am. sept.* : Nevada, Utah, M. Alb., reg. or. (1).

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 130, 176, 817, 965, 1117, 1407.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 250 ?

var. *mollis* Limpr. — *Ph. fontana* var. *caespitosa*.

caldensis Ångstr. in *Oefv....* 1874, n. 4, p. 17.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

calliantha W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1678.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

capillaris *Lindb.* in *Hedw.* 1867, p. 40 et in *R. Hartm. Skand. Fl.* X ed., p. 46.

Ph. fontana var. *capillaris* *Lindb.* *M. Scand.* p. 15.

2. Ster. Loc. humid. et in fiss. rup. madid. — *Eur.* : Suecia, Dania ?

German. ? Rhoengeb., Stiria, Belg., Gall. occid. et centr. (2).

capillaris Milde. — *Ph. Arnellii*.

capillata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 62.

2. — *Afr.* : Ins. Tristan d'Acunha.

carinata Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 164 ; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, XVIII, p. 350 (descript. locuplet.).

2. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 406, 440.

catenulata (*Hpe.*) Par.

Bartramia catenulata *Hpe.* in *Linn.* 1859, p. 631.

2. — *Pac.* : Alp. Austral. felicis.

comorensis (*C. M.*) *Besch. in Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 104.

Bartramia comorensis *C. M.* in *Linn.* 1876, p. 245.

Terr. — *Afr.* : Ins. Borbon., Anjouan, Nossi-Be, Mayotte, S. Maria, Madagasc.

costa-ricensis *C. M.* in *London Journ. of bot.* 1877, p. 228 (nom.).

Terr. — *Am. sept.* : Costa-Rica.

crenatula (*C. M.*) Par.

Bartramia crenatula *C. M.* in *Linn.* 1880-83, p. 420.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

(1) Cf. Lesq. et Jam Man. p. 210.

(2) Cf. Husn. Rev. bryol 1890, p. 42 ; *Lindb.* l. c. n. 68 et W. P. Sch. op. cit. p. 521 ; Limpr., Rab. Krypt. Fl., p. 562 ; Philib. in Rev. bryol. 1894, p. 2.

curvata (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 545.

Bartramia curvata Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 523.

1 (Mitt.) Syn. (Hpe.). Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

curvifolia Besch. *op. cit.* p. 104.

Ster. Ad sax. irror. — *Afr.* : Ins. Borbon.

curvula (C. M.) Par.

Bartramia curvula C. M. in *Fl.* 1879, n. 24.

Ster. — *Afr.* : M. Kenia.

defecta (C. M.) Par.

Bartramia defecta C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 419.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. Tucuman.

dimorpha W. P. Sch. — Ph. vagans.

Dregeana (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 551.

Bartramia Dregeana C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 419.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

elegantula (Tayl.) Jaeg. *Ad. I*, p. 543.

Bartramia elegantula Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* VI, p. 335 ; Mitt. M. austr. am. p. 259.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

erythrocaulis (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 60.

Bartramia affinis Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*

B. erythrocaulis C. M. *Syn. I*, p. 473.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

falcata Mitt. — Ph. fontana var. falcata.

fertilis (Mitt.) Par.

Bartramia fertilis Mitt. in *Kew Journ. bot.* 1856, p. 260.

1. — *Pac.* : Alp. Austral. or.

filamentosa (C. M.) Par.

Philonotula filamentosa C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 511.

— *Afr.* : M. Cameroon.

flaccidifolia (Mitt.) Par.

Bartramia flaccidifolia Mitt. in *Philos. Trans. of the roy. Soc.* 1879 (extra vol.), p. 390.

Ster. Ad rup. madid. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

flavinervis (C. M.) Par.

Bartramia flavinervis C. M. in *Fl.* 1886, p. 511.

2. Ster. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po, M. Cameroon.

Exs. : Dusen M. Camer. n. 101.

floribundaria (C. M.) Par.

Philonotula floribundaria C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 94.

— *Afr.* : M. Cameroon.

fontana (L.) Brid. *Bryol. univ.* II, p. 18 ; W. P. Sch. *Coroll.* p. 86 et *Syn. II ed.* p. 519.

Bartramia crassinervis Wils. p.p. in sched.

B. fontana Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 61 : *Bryol. eur.* IV (mon. p. 18), t. 324 ; C. M. *Syn. I*, p. 474 ; Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 241.

Bryum fontanum Sw. *M. Suec.* p. 48.

Br. interruptum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 13, t. 11, f. 6 ? Brid. *op. cit. I*, p. 685.

Br. palustre scopis teretibus stellatis, vertice multifidis *Dill. Hist. M.* p. 340, t. 44, f. 2.

Didymodon denticulatus *W. P. Sch. in Husn. M. Gall. n.* 508.

Hypnum fontanum *Schrank Baiers Fl. II*, p. 472.

Mnium fontanum *L. Sp. pl.* p. 1574.

2. Ad font., rivul., etc. — *Eur.* : E reg. campestr. montosa usq. in alp. ; Spitzberg, ins. Ursorum. *As.* : Penins. Tschutschica, Obi, Jenissei inf., Japon., Alp. Yunnan., Tibet. occ., Sikkim, Pers. austr., Caucas. *Afr.* : Alger., Abyss., ins. Canar., Madeir. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Terr. nov., ins. Miquelon ; a Nov. Scot. et New Brunswick usq. ad Columb. brit., fret. Behring et ins. Vancouver, a New York et Washington usq. ad Florid. et Calif.

Exs. : Kotschy Pl. Pers. austr. n. 634.

Mac. Canad. M. n. 153.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 251.

W. Schimper M. Abyss. n. 453.

Un. itin. 1864, n. 82-83.

« *var. adpressa* (*Fergus.*) *Limpr. Kryptfl. v. Schles. I*, p. 116.

Ph. adpressa *Ferg. in sched.*

Ster. In rivul. subalp. — *Eur.* : Anglia (Perthshire), Riesengeb., Tatra.

« *var. alpicola* (*Jur.*) *Par.*

Ph. alpicola *Jur. in sched.* ; *Ltz. Moost.* p. 170.

Ph. Arnoldi *Mdo. in sched.*

Ph. Kayseri *Mdo. in sched.*

Ph. (? fontana *var.*) tomentella *Mdo. in Ltz. l. c.*

Alp. calcar. — *Eur.* : Tatra, Salisburg., Stiria, Alp. bavar., Tirol.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1116.

« *var. alpina* *Brid. op. cit. p.* 20 ; *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bartramia fontana var. alpina Bryol. eur. et C. M. ll. cc.

Ut typ. — *Eur.* : Summ. Alp. *As.* : Nepal. *Am. sept.* : Labrador, reg. mont.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 252.

var. borealis Hagen. — Ph. borealis.

« *var. brachyphylla* *Kindb. in Mac. Cat. p.* 107.

Paludic. — *Am. sept.* : New Brunswick.

« *var. caespitosa* (*Wils.*) *W. P. Sch. Syn. II. p.* 520.

Ph. caespitosa *Wils. M. brit. n.* 287.

Ph. mollis *Vent. in Rev. bryol.* 1882, p. 42.

In uligin. vel turfac. — *Eur.* : Scand. , Angl., Belg., Boruss., Siles., Bad., Würtemb., Helvet., Tirol., Carinth., Stir. *Am. sept.* : Groenland, Indiana, Illinois.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1210.

var. capillaris { Arn. — Ph. Arnellii.
Lindb. — Ph. capillaris.

« *var. Columbiae* *Kindb. l. c.*

Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Columb. brit.

« *var. compacta* *W. P. Sch. l. c.*

Ster. — *Eur.* : Norveg. (Dovre).

var. dealbata *Brid.* — Ph. uncinata.

« *var. falcata* *Brid. op. cit. p.* 21 ; *W. P. Sch. l. c.*

Bartramia angustata Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 369.

B. falcata Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 317, t. 27, f. 4.

B. fontana var. *falcata* *Bryol. eur. et C. M. ll. cc.*

B. goniocladia *Wils. in op. et l. cc.*

Ph. falcata *Mitt. M. Ind. or. p. 62.*

Ut typ. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in Alp. As. : Nepal., Sikkim, Tibet. occ., M. Neilgherr. *Am. sept.* : Groenland; ubi typ., sed rarior. *Am. merid.* : Fret. Magellan.

var. *lanata* *Brid.* — *Ph. Berteroana* var. *flaccida*.

« var. *laxa* *Vent. in Rev. bryol. 1882, p. 45.*

Ad rup. madid. — *Eur.* : Gall. centr. (Arvern.), Tirol.

« var. *microblasta* *Kindb. l. c.*

Ad terr. humid. — *Am. sept.* : M. Selkirk.

« var. *parvula* *Lindb. M. Scand. p. 15.*

— *Eur.* : Scandin., Fennia.

« var. *seriata* (*Mitt.*) *Breidl. Laubm. Steierm. p. 152.*

Bryum lycopodiiforme *Schleich. Cat. pl. Helv. II ed. p. 28; Lindb. M. Scand. p. 15, t. 69.*

Ph. seriata *Mitt. M. Ind. or. pp. 63 et 158 (1).*

Ad rivul. in alp. — *Eur.* : Helvet., Engadin., Stiria, Gall. centr. (Arvern.).

« var. *serrata* *Kindb. l. c.*

Paludic. — *Am. sept.* : Columb. brit., fret. Behring.

« var. *syriaca* (*Ltz.*) *Par.*

Bartramia caespitosa var. *syriaca* *Ltz. M. Ehrenb. p. 48, t. 15, f. 3-13.*

— *As.* : Syria.

fontanella (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 569.*

Bartramia fontanella *Hpe. in Linn. 1863, p. 140; Mitt. M. austr. am. p. 261.*

2. Ad rivul. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

fontanoides (*Gill. et Grev.*) *Jaeg. Ad. I, p. 550.*

Bartramia fontanoides *G. et Gr. in Check's Journ. III, t. I; Mitt. op. cit. p. 256.*

1. — *Am. merid.* : And. Chilens.

garckiioides *C. M. in Lond. Journ. of. bot. 1877, p. 228 (nom.).*

Terr. — *Am. sept.* : Costa-Rica.

Gardneri (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 553.*

Bartramia Gardneri *C. M. Syn. I, p. 477; Mitt. op. cit. p. 261.*

B. uncinata *Hsch. Fl. Bras. I, p. 41; C. M. et Wils. in Gardner M. Bras. sil. n. 44.*

2. Ad rup. irror. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

gemmascens (*C. M.*) *Par.*

Bartramia gemmascens *C. M. in Fl. 1890, p. 479.*

Ster. In graminos. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

Giraldii *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 104.*

2. Paludic. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

glabriuscula *Kindb. in Bidrag p. 453 (nom.) et in Mac. Cat. p. 107.*

Webera fontana *ej. in Ott. Nat. IV, p. 62.*

(1) Cf. Cardot in *Rev. bryol.* 1886, p. 39.

Ster. Ad cataract. — *Am. sept.* : New Brunswick.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 578.

glaucescens (*Hsch.*) *Par.*

Bartramia glaucescens *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 40.*

B. tenella γ *erecta* *C. M. Syn. I, p. 482 ?*

2. Ad rup. et terr. humid. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

glomerata (*Wils.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 60.*

Bartramia glomerata *Wils. in sched.*

2. — *As.* : Sikkim.

gracilentia (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 552.*

Bartramia gracilentia *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser. III, p. 371 ; Mitt. M. austr. am. p. 260.*

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

gracilescens *W. P. Sch. mss. ; Wright in Lond. Journ. of bot. 1892, p. 263,*

— *Afr.* : Ins. Franciae.

gracillima *Ångstr. Prim. lin. p. 17.*

♀ et fr. ign. Ad terr. humid. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

graminicola (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 546.*

Bartramia graminicola *C. M. in Linn. 1874, p. 632.*

— *Am. sept.* : Mexic.

Griffithiana (*Wils.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 59.*

Bartramia Griffithiana *Wils. in sched.*

Weisia bartramiioides *Griff. Not. p. 407 et Ic. pl. Asiat. II, t. 78, f. 3.*

2? — *As.* : Himalaya sept. occ., Sikkim, Khasia.

helenica (*Besch.*) *Par.*

Philonotula helenica *Besch. in Journ. de bot. 1891, p.*

1. Rupic. — *Afr.* : Ins. S. Helena.

heterophylla *Mitt. M. Ind. or. p. 61.*

2. — *As.* : Ceylan.

humilis *Brid. — Ph. tenella var. humilis.*

hymenodon (*C. M.*) *Jaeg. Ad. p. 540.*

Bartramia hymenodon *C. M. in Bot. Zeit. 1895, p. 220.*

Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.

imbricatula *Mitt. op. et l. cc.*

Bartramia Griffithiana *Wils. in sched. p.p.*

B. tenella *ej. l. c.*

2. — *As.* : Ceylan.

incrassata (*C. M.*) *Par.*

Bartramia incrassata *C. M. in Fl. 1886, p. 510.*

2. Ster. — *Afr.* : Angola.

japonica (*W. P. Sch.*) *Par.*

Philonotula japonica *W. P. Sch. in Savat. M. Jap. n. 509 p.p. ; Besch. in Ann. sc. nat. 1893, XVIII, p. 348 et in Faurie Pl. Jap. n. 51.*

2? — *As.* : Japon.

Jardini (*Besch.*) *Par.*

Philonotula Jardini *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 29.*

2. Fr. ign. — *Pac.* : Taïti, Nuka-Hiva.

Kayseri Mdo. — *Ph. fontana* var. *alpicola*.

kerguelensis Par.

Bartramia graminicola C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forchungsreise... Bot.* p. 20.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

lancifolia Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 151.

2. Rupic. — As. : Japon.

latiuscula (C. M.) Par.

Philonotula latiuscula C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 96.

— Afr. : M. Cameroon.

laxa Limpr. *Laubm. Deutschl.* p. 563.

Ster. Ad mur. humid. et in foss. inund. — Eur. : Hannovr., Helvet. (Zurich) (1).

laxissima (C. M.) *Bryol. jav.* I, p. 154, t. 124.

Bartramia laxissima C. M. *Syn.* I, p. 480; *Dz. et Mk. Pl. Jungh.* I, p. 333.

Hypnum hastatum Duby in *Moritzi Verz. d. Zoll. Pfl. v. Jav.* p. 132, n. 1813.

2. Rupic. et terr. — As. : Assam, Java, ins. Banca.

leiophylla Kindb. — *Anacolia Menziesii*.

leptocarpa Mitt. *op. cit.* p. 60.

Bartramia mollis var. *Wils. in sched.*

2. — As. : Sikkim.

longicollis (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 64; *Bryol. jav.* I, p. 159, t. 129.

Bartramia dicranoides Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 369.

B. Hookeri ej. l. c.

B. longicollis Hpe. mss.; C. M. *Syn.* I, p. 478.

2. — As. : Sikkim, Java.

lutea Mitt. *op. cit.* p. 53.

Bartramia crassinervis Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 370 p.p.

B. uncinata ej. l. c.

2. — As. : Sikkim.

luteo-viridis Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 104.

2. Ad. scaturig. — Afr. : Ins. Borbon., Francia.

Macounii Lesq. et Jam. *Man.* p. 208.

Ph. marchica Brid. (fid. Kindb.).

2. — Am. sept. : Ins. Vancouver, Washington.

« var. *torquata* Ren. et Geh. in *Rev. bryol.* 1896, p. 61.

— Am. sept. : Oregon.

macrocarpa (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 62.

Bartramia fontana β *falcata* Mont. *Crypt. Neilgh.* n. 41 ?

B. macrocarpa C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 57.

2. — As. : M. Neilgherr.

macrodictya (C. M.) Par.

Bartramia macrodictya C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 463.

Ster. — Am. merid. : Venezuela.

(1) « Probab. forma aquatica *Ph. marchicae* » Limpr. l. c.

marchica (Willd.) Brid. *Bryol. univ.* II, p. 23 et 735; W. P. Sch. *op. cit.* pp. 86 et 518.

Bartramia fontana β *marchica* Hook. et Tayl. *Muscol. brit.* p. 87.

B. fontana β *pumila* Turn. *Musc. hib.* p. 107, t. 19, f. I.

B. marchica Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 59; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 17), t. 323; C. M. *Syn.* I, p. 475.

Bryum marchicum Roth *Fl. Germ.* III, p. 236.

Leskea marchica Willd. *Prodr. fl. Berol.* n. 944, t. 6, f. 12.

Mnium marchicum Hedw. *M. frond.* II, p. 108, t. 39.

Ph. Macounii Lesq. et Jam. (*pd.* Kindb.).

2. In. prat. uligin. præcip. lutoso. aren. — *Eur.*: Reg. septentr. zonae interm.; desider. in Scandin. et Britann. As.; Japon., Caucas. occ. Afr.: Alger. Am. sept. Ontario, Columb. brit.; ins. Vancouver? Washington, Calif.; Kansas?

Eas.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 574, 1017.

var. *capillaris* (Krypt. fl.). — Ph. Arnellii.

var. *tenuis* Boul. — Ph. Arnellii.

mauritiana Ångstr. in *Oefv....* 1873, p. 140.

2. Saxic. — Afr.: Usambara, ins. Borbon., Franciae.

“ var. *stricta* Ren. et Card. in. *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 12. Ster. — Afr.: Madagascar.

microthamnia (C. M.) Par.

Philonotula microthamnia C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 109.

— Afr.: M. Cameroon.

minuta (Tayl.) Jaeg. *Ad.* I, p. 543.

Bartramia minuta Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 335; C. M. *Syn.* I, p. 484; Mitt. *M. austr.* p. 259.

2. — Am. merid.: And. Nov. Granat. et Quitens.

Mohriana (C. M.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 219.

Bartramia Mohriana C. M. in *Fl.* 1873, p. 482.

2. Lignic. — Am. sept.: Ludovic.?, Florida.

mollis Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 300; *Bryol. jav.* I, p. 155, t. 125.

Bartramia mollis C. M. *Syn.* I, p. 484.

2. — As.: Java, Sumatra.

mollis Vent. — Ph. *fontana* var. *caespitosa*.

molmonica Rehm. *M. Afr. austr.* n. 196.

— Afr.: Orange.

Moritziana (Hpe.) Jaeg. *Ad.* I, p. 552.

Bartramia Moritziana Hpe. mss.; C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 338.

2. — Am. merid.: Venezuela.

Mühlenbergii (Schwaegr.) Brid. *Bryol. univ.* II, p. 22; Lesq. et Jam. *Man.* p. 208.

Bartramia marchica Sull. *M. of U. St.* p. 49.

B. Mühlenbergii Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 58, t. 61; C. M. *Syn.* I, p. 472.

2. Ad coll. arenos. et rup. humid. — Am. sept.: Connecticut, Massachusetts, Pensilv., Ohio, Wyoming, Montana, Washington, Kansas.

Eas.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 253.

var. *tenella* Brid. — Ph. *tenella*.

- nano-dendra *C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, II, p. 160.
2. Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Costa-Rica.
- nanothecia (*C. M.*) *Par.*
Bartramia nanothecia C. M. in Fl. 1886, p. 277.
2. Terr. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.
- Niam-Niamiae (*C. M.*) *Jaeg. Ad.* II, p. 700.
Bartramia Niam-Niamiae C. M. in Linn. 1875, p. 394.
2. Fr. ign. Ad terr. gneiss. — *Afr.* : Niam-Niam.
- nitida (*Wils.*) *Mitt. M. Ind. or.* p. 62.
Bartramia nitida Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 370.
2. — *As.* : Himalaya occ.
- obtusata *C. M. in Borgen M. Madag. n.* 19 et in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 61.
— *Afr.* : Madagascar.
- obtusifolia (*Mitt.*) *Par.*
Bartramia obtusifolia Mitt. Fl. Vit. p. 381.
Ster. — *Pac.* : Ins. Ysabel.
- Oraniae *Rehm. M. Afr. austr. n.* 192, 535 et 536.
Ster. — *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.
- orizabana *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 58.
1. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).
- Osculatiana (*de Not.*) *Jaeg. Ad.* I, p. 549.
Bartramia Osculatiana de Not. in Mitt. M. austr. amer. p. 259.
2. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- Pabstiana (*C. M.*) *Jaeg. Ad.* I, p. 545.
Bartramia Pabstiana C. M. Syn. I, p. 486 ; *Mitt. op. cit.* p. 258.
2. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- « *var. plumosa (C. M.) Jaeg. l. c.*
Bartramia Pabstiana var. plumosa C. M. l. c.
Ut et ubi typ.
- pallida (*Hpe.*) *Jaeg. Ad.* II, p. 701.
Bartramia pallida Hpe. in Linn. 1876, p. 307.
B. radicalis var. H. f. et W. in Colenso M. N. Zel.
Ster. — *Pac.* : Austral. subtrop. or., Nov. Zeland.
- palustris *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 150.
— *As.* : China or.
- papillarioides (*C. M.*) *Par.*
Bartramia papillarioides C. M. in Verhandl. d. bot. Ver. Prov. Brandenb.
1890, p. 68.
— *Afr.* : Tropic. occid.
- Pechueli (*C. M.*) *Par.*
Bartramia Pechueli C. M. in Fl. 1886, p. 510.
2. Ster. — *Afr.* : Congo occid.
- pendula *Brid.* — *Breutelia.*
- penicillata *Wright in Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 263.
Paludic. — *Afr.* : Ins. Ascension.

perigonialis Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 105.

2. Loc. muscos. umbros. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

pilicalyx C. M. *mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occ.

polyclada C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 138.

Ad rup. aren. irror. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

polymorpha (C. M.) Par.

Bartramia polymorpha C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 21.

— *Afr.* : Ins. Kerguelen.

pomangium (C. M.) Par.

Bartramia pomangium C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 417.

2. — *Am. merid.* : Argentin trop.

pseudo-fontana (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 548.

Bartramia pseudo-fontana C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 418 ; *Mitt. M. Ind.* or. p. 62.

2. Ster. — *As.* : M. Neilgherr.

pseudo-mollis (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 544

Bartramia pseudo-mollis C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 150.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

pulchella W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

pungens (Mitt.) Par.

Bartramia pungens Mitt. in *Philos. Trans. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.*) p. 390.

2. Ad rup. madid. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

pusilla Mitt. — *Conostomum*.

pygmaeola (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 701.

Bartramia pygmaeola C. M. in *Linn.* 1875, p. 396.

2. Fr. ign. — *Afr.* : Niam-Niam.

radicalis (P. B.) Brid. *Bryol. univ. II*, p. 16.

Bartramia longiseta Rich. in *Mich. Fl. bor. Am. II*, p. 301.

Bartramia radicalis P. B. *Prodr.* p. 44 ; C. M. *Syn. I*, p. 485 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 206.

2. Ad terr. humid. et secus palud. — *Am. sept.* : Carolin., Virgin., Kansas.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II* ed. n. 254.

« var. *plumulosa* (Ren. et Card.) Par.

Bartramia radicalis var. *plumulosa* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, *I*, p. 177.

— *Am. sept.* : Martinic.

remotifolia Jaeg. — *Ph. appressa*.

revoluta *Bryol. jav. I*, p. 158, t. 128.

2. — *As.* : Java.

rigida Brid. *Bryol. univ. II*, p. 17 ; W. P. Sch. *Coroll.* p. 86 et *Syn. II* ed. p. 517.

Bartramia fontana Schwaegr. *Sp. M.* p. 92.

B. rigida Bals. et de Not. *Pug. n. 1* ; *Bryol. eur. IV* (*mon.* p. 20), t. 326 ; C. M. *Syn. I*, p. 471.

1. In arenos. et ad rup. humid. — *Eur.* : Hibern., Cambrovall., Belg., Tirol. merid., Ital. sup., Sicil., Algarv. *As.* : Caucas. occ. *Afr.* : Alger., ins. Azor., Canar., Madeir.
Exs. : Mandon Pl. Madeir. n. 25 b.
 Rab. Bryoth. eur. n. 1018.
- « *var. gracilis* W. P. Sch. *Syn. II ed. l. c.*
Bartramia calabrica Lindb. mss.
 Ad scatur. in silv. — *Eur.* : Pisa, Calabr.
- Roylei* Mitt. — *Bartramidula*.
- ruficuspis* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 162.
 2. Ad rivul. — *As.* : Yunnan.
- rufiflora* (Hsch.) Jaeg. *Ad. I*, p. 543; Mitt. *M. austr. am.* p. 257.
Bartramia angulata Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 55 (fid. Wils. in *C. M.*); Mitt. *l. c.* p. 256.
B. rufiflora Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 40; *C. M. Syn. I*, p. 482.
 2. Ad saxa irror. — *Am. merid.* : And. Quitens., Brasil. austr. or.
- runcinata* C. M. in *Ångstr. Prin. lin.* p. 52.
Ph. tahitensis Ångstr. in *Oefv....* 1872, n. 5, p. 120.
Philonotula runcinata Besch. *Fl. bryol. Taïti, etc.* p. 28.
 — *Pac.* : Taïti.
- rupicola* C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 35.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Ryani* Philib. in *Rev. bryol.* 1894, p. 8.
 2. Ad rup. humid. — *Eur.* : Norvegia.
- scariosula* (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 549.
Bartramia scariosula C. M. in *Linn.* 1874, p. 595.
 2. — *Am. merid.* : Quito.
- Schlumbergeri* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 59.
 — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).
- secunda* Dz. et Mk. in *Pl. Jungh. I*, p. 332; *Bryol. jav. I*, p. 156, t. 126.
 2. — *As.* : Java.
- « *var. perwaktiana* *Bryol. jav. l. c.*
Bartramia prabaktiana Dz. et Mk. in *Zoll. Syst. Verz.* p. 31.
 Rupic. — *As.* : Java.
- seriata* Mitt. — *Ph. fontana var. seriata*.
- simplex* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 700.
Bartramia simplex C. M. in *Linn.* 1875, p. 393.
 2. Ad terr. humid. — *Afr.* : N'Gama.
- simplicissima* (C. M.) Par.
Bartramia simplicissima C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 414.
 Fl. et fr. ign. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos-Ayr.
- Slateri* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 701.
Bartramia Slateri Hpe. in *Linn.* p. 1876, p. 306.
 — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).
- socia* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 151.
 2. — *As.* : Japon.

- sparsifolia* (Hpe.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 104.
Bartramia sparsifolia Hpe. in Linn. 1874, p. 211.
 Ster. — Afr. : Madagasc. or.
Eas. : Rab. Bryoth. eur. n. 1287.
- speciosa* (Griff.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 64.
Bartramia speciosa Griff. *Not.* p. 439 et *Ic. pl. Asiat. II. t. 101, f. I.*
 2. — As. : Nepal, Khasia..
- sphaericarpa* (Sw.) Brid. *Bryol. univ. II,* p. 25 p.p.
Bartramia sphaericarpa Schwaegr. *Suppl. I, II,* p. 59; *C. M. Syn. I,*
p. 481 et II, p. 617; Mitt. *M. austr. am.* p. 261.
Bryum sphaericarpum Sw. *Fl. Ind. occ. III,* p. 1835.
Mnium sphaericarpum Hedw. *M. frond. III,* p. 93, t. 38 A.
Mn. sphaericum Sw. *Prodr* p. 189.
 2. — Am. sept. : Costa Rica? Guadalup., Martinic.,
 Jamaic., ins. S. Vincent. Am. merid. : Venezuela.
- spiralis* (Hpe.) Jaeg. *Ad. I,* p. 549.
Bartramia spiralis Hpe. *Symb.* 1872, p. 49.
 ♀ et fr. ign. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- striata* (C. M.) Par.
Bartramia striata C. M. in Linn. 1880-83, p. 414.
 Ster. — Am. merid. : Argentin. subtropic.
- stenodictyon* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 118 et
M. Masc. Mad. n. 177.
 2. — Afr. : Ins. Borbon.
 « var. patentissima Ren. et Card. in op. cit. p. 119 et *M. Masc. Mad.*
n. 221.
 — Afr. : Madagascar.
- striatula* (Mitt.) Jaeg. *Ad. I,* p. 549.
Bartramia striatula Mitt. op. cit. p. 259.
 2. Ad rup. humid. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- stricta* W. P. Sch. in Savat. *M. Japon. n.* 509 p.p.
Philonotula Savatieriana Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, XVIII, p. 349.
 1. — As. : Japon.
- subcapillaris* Par.
Philonotula capillaris C. M. in Dusen *M. Camer. n.* 402.
 — Afr. : M. Cameroon.
- subcurvula* Par.
Philonotula curvula C. M. l. c. n. 435.
 — Afr. : M. Cameroon.
- subcordata* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 194.
 — Afr. : Natal.
- subelegantula* Par.
Bartramia elegantula C. M. in Linn. 1880-83, p. 415.
 2. Ad rup. humid. — Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.
- submarchica* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 106.
 Ster. Ad saxa rivul. — Afr. : Ins. Borbon.
 « var. plumosa Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 119.
 — Afr. : Ins. Borbon.

subolescens (C. M.) Par.

Bartramia subolescens C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 84 et in Forschungsreise... Bot. p. 41.

Ster. — Afr. : Ins. Ascension.

subulosa (Griff.) Mitt. M. Ind. or. p. 61.

Bartramia subulosa Griff. Not. p. 438 et Ic. pl. Asiat. II, t. 101, f. 2.

2. Terr. — As. : Khasia.

tahitensis (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 541.

Bartramia tahitensis C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 220.

Philonotula tahitensis Besch. Fl. bryol. Taiti, etc., p. 28.

2. — Pac. : Ins. Taïti.

tahitensis Ångstr. — Ph. runcinata.

tenella (C. M.) Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 33.

Bartramia tenella C. M. Syn. I, p. 481; Mitt. M. austr. am. p. 259.

Ph. Mühlenbergii β tenella Brid. Bryol. univ. II, p. 23.

2. Lignic. et terr. — Am. sept. : Florida, Costa Rica, Cuba, Jamaïc., Haïti, S. Christoph., Porto-Rico, Martinic. Am. merid. : Ins. Trinit., Amazon., And. Nov. Granat. et Quitens. ; Peruv., Brasil.

« var. coloradensis Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1896, p. 51.

— Am. sept. : Colorado.

« var. gracillima (C. M.) Par.

Bartramia filiformis Hsch. Fl. Brasil. p. 40.

B. tenella var. gracillima C. M. l. c.

Terr. — Am. merid. : Brasil.

« var. humilis (Brid.) Par.

Anoetangium porto-ricense Spreng. in Brid. op. cit. p. 17.

Bartramia fontana Schwaegr. Sp. M. p. 92.

B. tenella var. humilis C. M. l. c.

Ph. humilis Brid. op. et l. cc.

Ad saxa humid. — Am. sept. : Hispaniola, Porto-Rico.

tenuicula (Hpe.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 204.

Bartramia tenuicula Hpe. in Linn. 1874, p. 210.

Ph. tenuicaulis Jaeg. Ad. I, p. 541.

— Afr. : Madagascar.

tenuis (Tayl.) Jaeg. Ad. I, p. 553.

Bartramia tenuis Tayl. in Phytol. 1844, p. 1095; C. M. Syn. I, p. 477;

H. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 193, t. 174, f. 4.

2. — Afr. : Ins. Tristan d'Acunha, Marion. Pac. :

Nov. Zeland., ins. Auckland, Kermadec, Norfolk ; Tasman. (1).

Thwaitesii Mitt. M. Ind. or. p. 60.

2. — As. : Ceylan.

timmioides C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).

— Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).

tomentella Mdo. — Ph. fontana var. alpicola.

? tomentosa Brid. — Breutelia.

trichodonta (C. M.) Par.

Bartramia trichodonta C. M. in Fl. 1886, p. 276.

2 Terr. — Afr. : Ins. S. Thomas.

(1) Cf Handb. of N. Zeal. Fl. p. 448.

- trichophylla* *Besch. Not. M. I. St-Paul et Amsterd. p. 5.*
Ster. — *Afr. : Ins. Amsterdam.*
- tricolor* (*C. M.*) *Par.*
Bartramia tricolor C. M. in Fl. 1890, p. 478.
Ster. *Paludic. — Afr. : Kilima N'Djaro.*
- Turneriana* (*Schwaegr.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 62; Bryol. jav. I, p. 157, t. 127.*
Bartramia fontana β marchica Griff. Not. p. 437.
B. nitida Wils. in sched. n. 561.
B. Turneriana Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 238; C. M. Syn. I, p. 472.
2. *Arenic., arbor. et ad rup. irror. — As. : Nepal., Sikkim, Khasia, Java. Pac. : Ins. Hawai.*
- uncinata* (*Schwaegr.*) *Brid. Bryol. univ. II, p. 221.*
Bartramia scabrida Schwaegr. Suppl. I, II, p. 57.
B. uncinata ej. op. cit. p. 60; C. M. Syn. I, p. 476; Mitt. M. austr. am. p. 261.
Ph. fontana η dealbata Brid. op. cit. p. 21.
2. *Ad terr. humid. — Am. sept. : Costa-Rica, Guadalup., Martinic., ins. S. Vincent.*
- uncinacula C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).*
— *Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).*
- vagans* (*Hook. f. et Wils.*) *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 80.*
Bartramia vagans Mitt. M. austr. am. p. 262.
Bryum vagans H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 546 et Fl. Antarct. II, p. 414, t. 154, f. I.
Meesea vagans C. M. Syn. I, p. 467 et II, p. 615.
Ph. dimorpha W. P. Sch. in Lechl. Pl. Chil. n. 3063.
Ster. — *Am. merid. : Chile, fret. Magellan., ins. Eremit.*
- versifolia* (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 542.*
Bartramia versifolia Hpe. in Ann. sc. nat. ser. V, III, p. 371.
2. — *Am. merid. : And. Nov. Granat.*
- Vescoana* (*Besch.*) *Par.*
Philonotula Vescoana Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 29.
2. ♀ et fr. ign. — *Pac. : Taïti.*
- Wallisii* (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 701.*
Bartramia Wallisii C. M. in Linn. 1874, p. 554.
Ster. — *As. : Ins. Philippin.*
- Zürniana C. M. et Schlieph. mss.*
— *Pac. : Ins. Auckland. (1).*
- PHILONOTULA** *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 424 (subgen. PHILONOTIDIS);*
Hpe. Symb. gen. propr.
Spec. omn. non indic. sunt **PHILONOTIDES** ejusd. nom.
- capillaris C. M. — Philonotis subcapillaris.*
curvula C. M. — Philonotis subcurvula.

(1) In Enumer. Kindb. nomina nuda :

Ph. afro-fontana Rehm.
boschbergiana C. M.
crystallina C. M.
fabroniacea C. M.
Oreades C. M.

Ph. stenodictyifolia C. M.
subluteola C. M.
Utriae C. M.
Woodii Rehm.

Philudora Mitt. *M. austr. am.* p. 416 (sect. CRYPHAEAE) *postea gen. propr.*

PHŒNICOBRYUM Lindb. in *Oefv...* 1861.

Reinwardti Lindb. — *Hypnodendron*.

PHOTINOPHYLLUM Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1868, p. 175.

pellucidum Mitt. — *Rhizogonium*.

subbasilare Mitt. — *Rhizogonium*.

PHYLLOGONIUM Brid. *Bryol. univ.* II, p. 671 (10 spec.).

angustifolium W. P. Sch. — *Ph. cylindricum*.

aurescens C. M. M. *Polyn.* p. 70.

Ph. fulgens Hpe. et Ltz. in *Krause M. Ecuad.*

Ph. viscosum Mitt. *M. austr. am.* p. 423?

Lignic. — *Am. merid.* : *Æquator*.

aureum Mitt. *op. cit.* p. 424.

Ad arbor. — *Am. sept.* : *Jamaic.*, ins. S. Christoph. *Am. merid.* :

And. Peruv.

caldense C. M. M. *Polyn.* p. 69.

— *Am. merid.* : *Brasil. austr. or.*

callichroum { Brid. — *Ph. viscosum*.
Mont. — *Acrocladium politum*.

cryptocarpon W. P. Sch. — *Ph. cylindricum*.

cylindricum Lindb. in *Oefv....* 1864, p. 603.

Cryptogonium cylindricum ej. in *op. cit.* 1873.

Ph. angustifolium W. P. Sch. in *Fl. Vit.* p. 396 (*fid. Mitt. Sam.* p. 187.)

Ph. cryptocarpon ej. in *Jard. Enum.* p. 19 (*fid. C. M. M. Polyn.* p. 69.)

2. Ad arbor. — *Pac.* : *Taiti*, ins. *Fidji*, *Samoa*, *Marquis.*, *Hawai.*

elegans { Hpe. } — *Orthorhynchum Hampeanum*.
 { } — *Orthorhynchum philippinense*.
 { H. f. et W. — *Orthorhynchum*.
 { Mitt. M. Ind. or. — *Orthorhynchum Nietneri*.

fulgens (Sw.) Brid. *Bryol. univ.* II, p. 671 ; C. M. *Syn.* II, p. 2 p.p. ;

Mitt. *M. austr. am.* p. 423.

Hypnum fulgens Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 140.

Pterigynandrum fulgens Hedw. *M. frond.* IV, p. 10, t. 39.

Pterogonium fulgens Sw. *Fl. Ind. occ.* III, p. 1776.

2. Ad arbor. — *Am. sept. et merid.* : *Tropic.*

fulgens { C. M. p.p. } — *Ph. viride*.
 { } — *Ph. viscosum*.
 { Hpe. — *Ph. serra*.
 { Hpe. et Ltz. — *Ph. aurescens*.
var. *viscosum* Brid. — *Ph. viscoum*.

immersum Mitt. *op. cit.* p. 423.

Ad arbor. — *Am. merid.* : *Brasil.*

norvegicum Sull. — *Bryoxiphium*.

philippinense Hpe. — *Orthorhynchum*.

serra C. M. M. *Polyn.* p. 70.

Ph. fulgens Hpe. in *Lindig M. Nov. Granat.*

Ad arbor. — *Am. merid.* : *And. Nov. Granat.*

speciosum C. M. M. *Polyn.* p. 70.

— *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : Venezuela,
Nov. Granat., *Æquator*.

viride Brid. *Bryol. univ.* II, p. 673; *Mitt. op. cit.* p. 424.

Ph. fulgens C. M. *Syn.* II, p. 2 p.p.

2. *Ad arbor.* — *Am. sept.* : Mexic., ins. S. Kitts. *Am. merid.* : Brasil.

viscosum (P. B.) *Mitt. op. cit.* p. 424.

Hypnum naviculare Brid. *Bryol. univ.* II, p. 540.

Ph. aurescens C. M. M. *Polyn.* p. 70?

Ph. callichroum Brid. *hb.*

Ph. fulgens C. M. *Syn.* II, p. 2 p.p.

Ph. fulgens var. *viscosum* Brid. *op. cit.* p. 673.

Pterigynandrum viscosum P. B. *Prodr.* p. 87.

2. — *Afr.* : Ins. Borbon., Tristan d'Acunha. *Am.*
sept. : Costa Rica (1). *Am. merid.* : And. Quitens.

PHYLLOGONIUM EUSTICHIA Brid. *Bryol. univ.* II, p. 674.

longirostris Brid. — *Eustichia*.

norvegica Brid. — *Bryoxiphium*.

PHYSCOMITRELLA *Bryol. eur.* I (2 spec.).

Hampei Limpr. *Laubm. Deutschl.* I, p. 175.

Aphanorhegma patens var. *anomalum* Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 580.

Ph. patens var. *anomala* Hpe. *mss.* ; *Milde Bryol. siles.* p. 191.

Ph. patens var. *pedicellata* *Bryol. eur.* I, t. 3 γ.

Physcomitrium sphaericum × *Physcomitrella patens* Limpr. *l. c.*

1. *In stagnin. exsicc.* — *Eur.* : Harz, Brandebourg, Siles.

patens (Hedw.) *Bryol. eur.* I, t. 3 et VI, t. 637, f. 1-4; W. P. Sch.
Coroll. p. 3 et *Syn.* II ed. p. 8; *Jaeg. M. cleistoc.* p. 44.

Aphanorhegma patens Lindb. in *Oefv...* 1864, p. 580.

Ephemerum patens Hpe. in *Fl.* 1837, p. 285; C. M. *Syn.* I, p. 33 et II,
p. 522.

E. recurvifolium Hpe. in *Veg. cell. German. sept. etc.* n. 42.

Gentia patens Bayrhofer in *Jahresber. d. Ver. f. Naturk. in Herzogt.*
Nassau, 1849, V Heft, p. 2.

Phascum patens Hedw. *Stirp.* I, t. 10; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 33.

1 et *syn.* *Ad terr. argill. humid.* — *Eur.* : Fere tota. *As.* : *lenissei* sup.
Am. sept. : Ohio.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 5 (*Phascum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 161, 1055.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 30.

var. *angustifolia* de Not. — *Ph. patens* var. *megapolitana*.

* var. *Lucasiana* (*Bryol. germ.*) W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 9 et II ed. *l. c.*

Phascum Lucasianum *Bryol. germ.* I, p. 44, t. 5; Brid. *op. cit.* p. 32.

Ut et cum typ.

* var. *megapolitana* (Schultz) *Bryol. eur.* et W. P. Sch. *ll. cc.*

Phascum megapolitanum Schultz *Suppl. Fl. Starg.* p. 2, t. 1; Brid. *op.*
cit. p. 44.

Physcomitrella patens var. *angustifolia* de Not. in *Erb. critt. ital. Ser. II*,
n. 161.

Ut et cum typ.

var. *pedicellata* *Bryol. eur.* — *Ph. Hampei*.

(1) An *Ph. speciosum*?

PHYSCOMITRIUM Brid. Bryol. univ. I, p. 97 c. tab. suppl. emerid. (66 spec.).

acuminatum (Schleich.) Bryol. eur. III (mon. p. 11), t. 300; C. M. Syn. I, p. 114 et II, p. 544 p.p.; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 376.

Gymnostomum acuminatum Schleich. Cat. pl. helv. IV ed., p. 40.

G. sphaericum var. Bryol. germ. I, p. 127 in not. 3?

l. In limos. — Eur.: Westphal., Helvet. (Vales. inf.), Salisb., Stir., Tirol. (?), Ticin., Pyren. As.: Caucas. Afr.: Alger. (fid. Besch.). Am. sept.: Illinois, Nebraska, Kansas, Texas.

acuminatum { Lesq. et Jam. p.p. — Ph. Drummondii.
C. M. p.p. } — Ph. eury stomum.
— Ph. Hookeri.

var. β *denticulatum* Rab. — Ph. eury stomum.

« var. *patulum* Lindb. in Broth. Enum. M. Caucas. p. 33 (nom.).
— As.: Caucas. occ.

Ahnfeldti Hartm. — *Entosthodon ericetorum* var. *Ahnfeldti*.

apophysatum Wils. — *Entosthodon ericetorum*.

argentanicum Par.

Ph. pusillum C. M. in Linn. 1880-83, p. 359.

— Am. merid.: Argentin. Buenos Ayr.

Auberti Besch Fl. bryol. Réunion, etc. p. 86.

— Afr.: Ins. Borbon. ? vel Tristan d'Acunha ?

australe D^{na} E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1894, p. 201, t. 199.

Gymnostomum tortipes Hook. in Drumm. M. bor. am. n. 25.

l. — Am. sept.: Florida.

Bonplandi { C. M. — *Entosthodon*.

de Not. — *Entosthodon ericetorum*.

brevisetum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1877, p. 65.

— Afr.: Ins. Inaccessible.

brisbanicum C. M. in Linn. 1871-73, p. 146.

— Pac.: Austral. or. (Queensland).

Breutelii C. M. — *Gigaspermum*.

chlorodictyon C. M. in Linn. 1878-79, p. 258.

l ? — Am. merid.: Uruguay.

californicum D^{na} E. G. Britton in op. cit. p. 206, t. 203.

l. Terr. — Am. sept.: Calif.

capillipes C. M. in Hedwig. 1895, p. 127.

Ad terr. humid. — Am. merid.: Brasil. or. (Goyaz).

coloradense D^{na} E. G. Britton in op. et l. cc. t. 202.

l. In limos. — Am. sept.: Montana, Colorado.

conicum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 79 et in Fl. Tasman. II, p. 197.

Ph. piriforme Handb. of N. Zeal. Fl. p. 451 ?

Ph. subserratum Hpe. ?

— Pac.: Tasman.

cubense Mitt. M. austr. am. p. 240.

Ph. immersum Sull. in Proceed. of the Amer. Acad., 1861.

— Am. sept.: Cuba.

cupulare C. M. in Linn. 1878-79, p. 259.

l. — Am. merid. : Uruguay.

cupuliferum Mitt. op. cit. p. 242.

Ph. spathulatum Sull. in op. et l. cc.

— Am. sept. : Cuba.

curvisetum Bryol. eur. — Funaria.

cyathicarpum Mitt. M. Ind. or. p. 54.

Ph. immersum Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 54.

— As. : Pendjab, Nepal.

dilatatum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1890, I, p. 75.

Terr. — Afr. : Madagascar.

Drummondii D^{na} E. G. Britton in op. cit. p. 205, t. 201.

Ph. acuminatum Lesq. et Jam. Man. p. 198 p.p. ?

Ph. Hookeri var. serratum R. et C. in Rev. bryol. 1892, p. 93 (fid. D^{na} E. G. Britt.).

Ph. piriforme var. 3 Drumm. M. bor. am. I ed. n. 24.

Ph. turbinatum var. crassipes R. et C. in Bot. Gaz. 1894, p. 240.

l. Terr. — Am. sept. : Canada, Oregon, Missouri, Ludovic.

enerve (Hook. f. et Wils.) C. M. Syn. II, p. 545.

Goniomitrium enerve H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 142, t. 3 A.

l. Terr. — Pac. : Austral. or.

ericetorum Bryol. eur. — Entosthodon.

eurystomum (Nees ab Es.) Sendtn. in Denkschr. d. K. Bäter. bot. Gesells. zu Regensb. 1841, III, p. 142; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 375.

Gymnostomum eurystomum Nees ab Es. mss.

G. sphaericum Bryol. germ. I, p. 127 in not. 3 ? Hüb. Moost. t. V, n. 5 b.

Ph. acuminatum C. M. p.p.

Ph. acuminatum β denticulatum Rab. Deutsch. Kryptfl. II, III, p. 87.

Ph. sphaericum Moug. et Nestl. Stirp. vog. rh. n. 708.

Ph. sphaericum var. cuspidatum Dz. et Mh. Prodr. fl. batav. II, I, p. 70 c. ic.

Ph. sphaericum var. eurystomum Husn. Muscol. gall. p. 213.

Ph. sphaericum var. Hüberiana Rab. Kryptfl. v. Sachsen, I, p. 368 et Bryoth. eur. n. 452.

Ph. sphaericum var. major Boulay M. Fr. p. 303.

l. In argill. humid. — Eur. : Neerland., vall. Rhen., Thuring., Boruss., Saxon., Siles., Stir., Carinth., Austr. inf., Helvet.

Eas. : Rab. Bryoth. eur. n. 25 c, 54, 1221.

* var. subpatula (Lindb. et Arn.) Par.

Gymnostomum eurystomum var. subpatula L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 58.

— As. : lenissei super.

fasciculare Hpe. — Funaria.

falcifolium C. M. in Hedwig. 1895, p. 127.

— Am. merid. : Brasil. or. (Goyaz).

firmum Mitt. in Kew Journ. bot. VIII, p. 259.

— Pac. : Austral. or.

flaccidum Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 67.

— Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).

flexifolium Mitt. in *Melliss S. Helena*, 1875, p. 361.

— *Afr.* : Ins. S. Helena.

Germanillae C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 259.

1. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

Goniomitrium C. M. *Syn.* II, p. 545 (1).

Goniomitrium acuminatum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 143, t. 3 B.

1. Terr. — *Pac.* : Austral. or.

Griffithii Angstr. — *Cedipodium*.

hians Lindb. — *Ph. Hookeri*.

Hookeri Hpe. *Ic. M.* t. 30 (in obs. ad *Ph. Thielei*) ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 198 ; *D^{na} E. G. Britton in op. cit.* p. 201.

Gymnostomum latifolium Hook. in *Drumm. M. bor. amer.* I ed. n. 16 ; *Schicaegr. Suppl.* IV, t. 304.

Ph. acuminatum C. M. p.p.

Ph. hians Lindb. *Manip. M.* I, p. 51 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 26, t. 16.

Ph. latifolium Lindb. in *Oefv....* 1854, p. 595.

Ph. piriforme Sull. et *Lesq. M. bor. am.* II ed. n. 234 p.p.

1. In terr. argill. — *Am. sept.* : Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Montana, Dakota mer., Minnesota, Ohio, Kansas.

Exs. : *Drumm. M. bor. am.* II ed. n. 25.

var. *serratum* R. et C. — *Ph. Drummondii*.

immersum Sull. *M. of U. St.* p. 51, t. 4, *Ic. M.* p. 93, t. 56 et in *Asa Gray Man. bot. of U. St.* I ed. p. 648 ; *Lesq. et Jam. Man. l. c.* ; *D^{na} E. G. Britton in op. cit.* p. 190.

Gymnostomum immersum Sull. in *Proced. of Amer. Acad...* 1861, p. 273.

Ph. sphaericum var. ? *Sull. M. Allegh.* n. 196.

1. Ad terr. alluv. — *Am. sept.* : Gaspes., New Jersey, New York, Pensilv. occ., Delaware, Carol. merid., Ohio, Missouri, Minnesota, Colorado.

Exs. : *Sull. et Lesq. M. bor. am.* II ed. n. 233.

immersum { *Sull. (Proced.)*. — *Ph. cubense*.
 Wils. — *Ph. cyathicarpum*.

integrifolium Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 490.

— *Pac.* : Austral. or.

? *Jamesoni* Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, t. 239 ; *C. M. Syn.* I, p. 119.

Amphoritheca Jamesoni Hpe. in *Ann. sc. nat.* V ser., III, p. 340.

Tortula limbata Mitt. *M. austr. am.* p. 168.

— *Am. merid.* : M. Pichincha.

japonicum (Hedw.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 164.

Entosthodon japonicus Lindb. in *Oefv....* 1864, p. 596.

Gymnostomum japonicum Hedw. *Sp. M.* p. 34, t. I ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 67 ; *C. M. Syn.* I, p. 557.

Pottia japonica Jaeg. *Ad. I*, p. 199.

— *As.* : Japon.

Kellermanni *D^{na} E. G. Britton in op. cit.* p. 204, t. 200.

1. — *Am. sept.* : Nebraska, Kansas.

latifolium Lindb. — *Ph. Hookeri*.

(1) Cf. Geheeb in *Rev. bryol.* 1879, p. 15.

- laxum* Hook. f. et Wils. *Fl. Antarct. II*, p. 399, t. 151, f. 5; C. M. *Syn. II*, p. 546.
Entosthodon laxus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 80.
 Ad rup. humid. — Afr.: Ins. Kerguelen, Marion. Am. merid.: Archip. antarct. Pac.: Alp. Austral. or., Tasman.
- Lorentzi* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 260.
 1. — Am. merid.: Argentin. Cordob.
- luteolum* Besch. *Note M. Parag.* p. 263.
 Terr. — Am. merid.: Paraguay.
Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 1230.
- Mac-Leai* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 519, 520.
 — Afr.: C. B. Sp.
- macrocyatheum* C. M. in *Journ. of bot.* 1877, p. 327 (nom.).
 In prat. udis. — Am. sept.: Costa Rica.
- megalocarpum* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1889, p. 94 et in *Mac. Cat.* p. 102.
 Ph. piriforme Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 22, 23, 24? (1).
 1. Ad terr. humid. — Am. sept.: Ins. Vancouver, Washington, Oregon, Nevada, Calif.
Exs.: Mac. Canad. M. n. 147.
- minutulum* C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 147.
 1? — Pac.: Austral. or.
- niloticum* (Del.) Lindb. mss.; C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 154.
Gymnostomum niloticum Del. *Fl. Æg.* p. 43; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 756; C. M. *Syn. I*, p. 165.
Micropoma nilotica Lindb. in *Not....* 1870, p. 56.
Microstegium niloticum ej. in *Oefc....* 1864, p. 593.
 Ph. *Sesostris* Ltz. (fid. Jaeg. *Ad. I*, p. 492).
 1. Ad mur. et terr. — Afr.: Ægypt. inf.
- nodulifolium* Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 66.
 — Pac.: Austral. or. (Queensland).
- nutans* Wils. — *Entosthodon*.
- obtusio-apiculatum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 24.
 — Am. merid.: Brasil. austr. or.
- ? *Orbignyanum* Mont. in *Voy. Am. S. de d'Orbigny, VII. Crypt.* p. 87, t. 3, f. 2 et *Syll.* p. 30; C. M. *Syn. I*, p. 117.
Gymnostomum Orbignyanum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1837, p. 51.
 Ad terr. arenos. — Am. merid.: Corrientes.
- paraguense* Besch. *Note M. Parag.* p. 262.
 In limos. exsicc. et in graminos. — Am. merid.: Paraguay.
Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 1229, 1231, 1232.
- ? *Perrottetii* Mont. — *Entosthodon*.
- piriforme* (L.) Brid. *Bryol. univ. in ind.*; *Bryol. eur. III* (mon. p. 11), t. 299; C. M. *Syn. I*, p. 116; W. P. Sch. *op. cit.* p. 376 (1).
Bryum piriforme L. *Sp. pl.* p. 1580.
Br. serpillifolium, *pellucidum*, *capsulis piriformibus* Dill. *Hist. M.* p. 345, t. 44, f. 61.

1) Cf. Dna E. G. Britton in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1894, pp. 189, 190 et 192.

Gymnostomum longifolium Schleich. *Cat. pl. Helv. IV ed.*, p. 40.

G. piriforme Hedw. *Fund. M. II*, p. 87.

G. Physcomitrium piriforme Brid. *Bryol. univ. I*, p. 98.

Phascum piriforme L. *jun. Meth. M.* p. 361.

Pottia piriformis Ehrh. *Beitr. I*, p. 188.

l. In limos., agr. et camp. — *Eur.* : Tota, alpin. et frigidior. excl. As. : Caucas. *Afr.* : Alger., ins. Azor., Canar. *Pac.* : Austral. fel. (fid. Mitt.).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 55 b-d.

floridanum R. et C. — *Ph. turbinatum*.

piriforme { *Auct. amer.* — *Ph. turbinatum*.
Drumm. — *Ph. megalocarpum*?
var. 3 ej. — *Ph. Drummondii*.

var. *Langloisii* R. et C. — *Ph. turbinatum* var. *Langloisii*.

platyphyllum Kindb. in *Mac. Cat.* p. 269 (1),

l. Terr. — *Am. sept.* : Ottawa.

Puiggarii Geh. et Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 4.

— *Am. merid.* : Brasil.

pulchellum (Griff.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 54.

Gymnostomum pulchellum Griff. *Not.* p. 394.

— *As.* : Assam super.

pusillum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 92, t. 87, f. I et *Handb.* p. 451.

— *Pac.* : N. Zeland. sept.

pusillum C. M. — *Ph. argentinicum*.

pygmaeum Jam. in *Bot. King Exped.* p. 404; *Lesq. et Jam. Man.* p. 197.

— *Am. sept.* : Utah (M. Wasatch).

repandum (Griff.) Mitt. *op. et l. cc.*

Gymnostomum repandum Griff. *Not.* p. 392.

— *As.* : Nepal., Assam. sup., Tonkin, Yunnan.

repens C. M. — *Gigaspermum*.

Rottleri Hpe. — *Entosthodon*.

saharampurens C. M. *mss.*

Terr. — *As.* : Himalaya sept. occid.

Savatieri Besch. — *Ph. subturbinatum*.

serratum (Hook. f. et Wils.) C. M. *Syn. II*, p. 545.

Aphanorhegma serrata Sull. *M. of. U. St.* p. 52, t. 4 et *lc. M.* p. 95, t. 57;
Jaeg. M. cleist. p. 46.

Schistidium serratum Sull. *M. Allegh. n.* 198 et in *Mem. of the Am. Acad.*... 1846, p. 60, t. 2 c.

l. Terr. — *Am. sept.* : Oregon, reg. sept. et centr.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 231.

serratum ♀ × *Ph. turbinatum* ♂ (?) D^{na} D. G. Britton in *Bull. Torr. bot. Club*, 1895, p. 65, t. 231.

Schistidium serratum H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. II ed.* n. 20.

— *Am. sept.* : Missouri (Saint-Louis).

(1) Specim. immatura, spec. dubia; cf. D^{na} E. G. Britton in *op. cit.* p. 190.

- serricolum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 136.
Terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- serrifolium* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 257.
1. — Am. merid. : Argent. Cordob.
- serrulatum* Mitt. *M. austr. am.* p. 241.
Terr. — Am. merid. : Brasil.
- Sesostris* Ltz. *M. Ehrenb.* p. 35, t. 7, f. 1-5 et t. 8, f. 6-22.
Ph. niloticum *Lindb.* (fid. *Jaeg. Ad. I.* p. 492).
2. — Afr. : Ægypt. inf.
- Soleirolii* Mont. — *Entosthodon Templetoni*.
- ? *spathulatum* C. M. in *Linn.* 1844, p. 695 et *Syn. I.* p. 118.
Terr. — Afr. : C. B. Sp.
- * *var. brevicollum* C. M. *ll. cc.*
Gymnostomum spathulatum *Hsch.* in *Linn.* 1841, p. 115.
— Afr. : C. B. Sp.
- spathulatum* Sull. — Ph. cupuliferum.
- sphaericum* (*Schwaegr.*) *Brid. Bryol. univ. in indice; Bryol. eur. III*
(*mon. p.*), t. 298; C. M. *Syn. I.* p. 115; W. P. Sch. *op. cit.* p. 375.
Anoetangium sphaericum *Spreng. in Linn. Syst. veg. XVI ed., IV, I.*
p. 146.
Gymnostomum sphaericum *Schwaegr. in Schrad. Journ. IV, p. 15 c. ic*
et Suppl. I, I, p. 21, t. 8.
G. Ph. *sphaericum* *Brid. Bryol. univ. I, p. 97.*
Ph. *sphaericum* β *caulescens* C. M. *l. c.*
1. In terr. argill. — Eur. : Zon. intermed.; rariss. in Britann., deest in
Scandin. As. : Amour.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 25 a, 452, 855, 1389.
var. caulescens C. M. — Ph. *sphaericum*.
var. cuspidatum Dz. et Mk. }
var. eurystoma Husn. } Ph. *eurystomum*.
var. Hüberiana Rab. }
var. major Boul. }
var. ? Sull. — Ph. *immersum*.
- strangulatum* *Kindb.* — Ph. *turbinatum*.
- subrotundum* W. P. Sch. — Ph. *subsphaericum*.
- subserratum* *Hpe. in Linn.* 1859-60, p. 623.
Ph. *conicum* *Mitt. in Fl. Tasman.* p. 197?
1. — Pac. : Austral. or.
- subsphaericum* W. P. Sch. *mss.; C. M. Syn. II, p. 544.*
Ph. *subrotundum* W. P. Sch. in *hb. Mus. Paris.*
— Am. sept. : Mexic. (Orizaba).
- subturbinatum* W. P. Sch. in *Savat. M. Japon. n.* 825.
Ph. *Savatieri* *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 340.
— As. : Japon.
- systylioides* C. M. *mss.; Jaeg. Ad. II, p. 696.*
— As. : Japon.
- tetragonum* *Bryol. eur.* — *Pyramidula*.
- Thielecanum* *Hpe. Ic. M. t.* 30; C. M. *Syn. I. p.* 116 et *II, p.* 544.
Terr. — Am. merid. : Brasil. austr. or., Monte Video.

turbinatum (*Rich.*) *C. M. in Lesq. et Jam. Man. p. 198; Dna E. G. Britton in op. cit. pp. 192-199, t. 198.*

Gymnostomum dilatatum P. B. Prodr. p. 59.

G. splachnoideum ej. l. c.

G. turbinatum Rich. in Mich. Fl. bor. am. II, p. 286.

G. Ph. splachnoides Brid. Bryol. univ. I, p. 99.

G. Ph. turbinatum ej. op. cit. p. 100.

Ph. Hookeri Mac. Canad. M. n. 146 p.p.

Ph. piriforme Aust. amer. (fid. Dna E. G. Britton l. c.); Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 234 p.p.

Ph. piriforme var. floridanum R. et C. in Rev. bryol. 1892, p. 93.

Ph. strangulatum Kindb. in Ott. Nat. IV, p. 60.

l. Terr. — *Am. sept.* : de Ontario ad Florid., Texas; Kansas? Calif.

var. crassipes R. et C. — Ph. Drummondii.

« *var. Langloisii (Ren. et Card.) Dna E. G. Britton in op. cit. pp. 197 et 200, t. 198.*

Ph. piriforme var. Langloisii R. et C. in Bot. Gaz. 1889, p. 94 et M. Amer. sept. n. 45.

In paludos. — *Am. sept.* : Texas, Florid., Ludovic.

« *var. tortipes (Brid.) Par.*

G. Ph. tortipes Brid. Bryol. univ. I, p. 100.

— *Am. sept.* : Pensilv.?

turgidum Mitt. M. austr. am. p. 241.

— *Am. merid.* : M. Chimborazo.

umbonatum Mitt. op. et l. cc.

Terr. — *Am. merid.* : Brasil. or. (1).

PHYSCOMITRIUM ENTOSTHODON *C. M. in Linn. 1844, p. 696.*

Bergianus } *C. M. — Entosthodon.*
curvipes

Mathewsii } *C. M. — Entosthodon.*
 } *C. M. — Entosthodon Mathewsii var. latifolium.*

obtusifolius C. M. — Entosthodon.

PHYSEDIUM *Brid. Bryol. univ. I, p. 51.*

pachycarpum C. M. — Ephemerella recurvifolia.

splachnoides Br. — Phascum.

PILOPOGON *Brid. Bryol. univ. I, p. 519 (10 spec.).*

calycinus W. P. Sch. mss.; C. M. Syn. II, p. 586; Mitt. M. austr. am. p. 70.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

gracilis Brid. Bryol. univ. I, p. 519; C. M. Syn. I, p. 348; Mitt. op. et l. cc.

Didymodon gracilis Hook. in Kunth Syn. pl. acquin. p. 51 et M. exot. t. 5.
Thysanomitrium splendens ej. in hb. Mont. (Mus. Paris).

(I) In Enum. Kindberg. nom. nuda :

Ph. brachypodium C. M. | Ph. subpusillum (C. M.) an Ph. argentinicum?

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens., Jamaic., Guadalup.
Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens. et Boliv.

« *var. Pittieri Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. Belg.* 1892, II, p. 151.
 Ad rup. madid. — *Am. sept.* : Summ. And. Costa Ricens.

liliputans C. M. nss.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

longe-fimbriatus W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1713 bis.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

longirostratus Mitt. op. et l. cc.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

microcarpus Geh. et Hpe. in Fl. 1881.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Mohrii C. M. in Linn. 1874, p. 626.

— *Am. sept.* : Mexic.

nanus Hpe. in Linn. 1863, p. 137; *Mitt. op. et l. cc.*

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

piliferus Hpe. — *Campylopus laevis.*

subulaceus Hpe. Symb. 1874, p. 486.

2. — *Am. merid.* : Brasil austr. or. (1).

Pilorhiza *C. M. in Linn.* 1871-73, p. 158 (sect. *HOOKERIAE*).

PILOTRICHELLA *C. M. Syn.* 11, p. 129 (subsect. *NECKERA*, postea gen. gen. propr.) (129 spec.).

aeruginosa (C. M.) Par.

Orthostichella aeruginosa C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 195.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

ampullacea (C. M.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 127.

Neckera ampullacea C. M. in Linn. 1876, p. 264.

— *Afr.* : Usambara, ins. Anjouan.

Anderssonii (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 166.

Neckera Anderssonii C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 170.

Ster.

— *Am. merid.* : Ins. Gallapagos.

ankaratrensis Kiaer in Borgen M. Mad. n. 29.

— *Afr.* : Madagasc. centr.

Araucarieti C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 169.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

araucariophila C. M. ibid. n. 168.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

atro-lutea (C. M.) Par.

Meteorium atro-luteum Jaeg. Ad. II, p. 152.

Neckera atro-lutea C. M. in Linn. 1874, p. 614.

Ster.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

(1) In Enumer. Kindberg, nom. nud. :
P. grandis Ångstr.

aureo-pallens (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Orthostichella aureo-pallens *G. et Hpe. in Fl.* 1881.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Avellanadae (*C. M.*) *Par.*

Neckera Avellanadae *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 413.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

biformis (*Hpe.*) *C. M. in Abhandl. Brem.* VII, p. 209.

Meteorium biforme *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 128.

Pilotrichum biforme *Hpe. in Linn.* 1874, p. 218.

Ster. Arbor. — *Afr.* : Usambara, Madagascar.

Billardieri (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 163.

Isothecium flexile *Brid. Bryol. univ. II*, p. 362 (*fid. Hpe.*).

Meteorium Billardieri *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 82.

Neckera Billardieri *Hpe. in Linn.* 1859-60, p. 637.

Ad arbor. — *Pac.* : Austral. or., Tasman.

bipinnata *Husn.* — *Pilotrichum*.

breviramea (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 173.

Neckera breviramea *C. M. in Bot. Zeit.* 1854, p. 570.

Trachypus brevirameus *Mitt. M. Ind. or.* p. 129.

2. — *As* : M. Neilgherr.

caldensis *Ångstr. in Oefv....* 1876, n. 4, p. 34.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

calomicra *Broth. in Bol. d. Soc. Brot.* 1890.

Ster. — *Afr.* : Ins. S. Thom.

capillaris *Besch.* — *Papillaria*.

capillicaulis (*C. M.*) *Par.*

Orthostichella capillicaulis *C. M. in Fl.* 1890, p. 491.

Ster. — *Afr.* : M. Aberdare.

Caroli *C. M. in Ångstr. Prim. lin.* p. 52.

P. nigricans *Ångstr. in Oefv....* 1872, n. 5, p. 118.

— *Am. merid.* : Ins. Gallapagos.

characea (*C. M.*) *Par.*

Neckera characea *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 418.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

« *var. nigrescens* (*C. M.*) *Par.*

Neckera characea var. nigrescens *C. M. in op. cit.* p. 419.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

« *var. tenuis* (*C. M.*) *Par.*

Neckera characea var. tenuis *C. M. l. c.*

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

chlorothrix *C. M. in Fl.* 1890, p. 490.

Ster. In silvis. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

chrysoneura (*Hpe.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 126.

Neckera chrysoneura *Hpe. in Linn.* 1876, p. 263.

Filic. — *Afr.* : Ins. Anjouan, Transvaal.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 609 b.

- cochlearifolia* (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 79.
Meteorium orbifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 440.
Neckera cochlearifolia C. M. *Syn. II*, p. 130.
Pilotrichum cochlearifolium C. M. in *Linn.* 1843, p. 599.
 2. — *Am. sept.* : Mexic., ins. Tabago.
 « *var. flagellifera* Besch. *l. c.*
 — *Am. sept.* : Mexic.
- communis* (C. M.) Par.
Orthostichella communis C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 651.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- consanguinea* Besch. — *Papillaria*.
- consimilis* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 167.
Meteorium consimile Mitt. *M. austr. am.* p. 447.
Neckera consimilis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 360.
 2. *Ad arbor.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- crinita* (Sull.) C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 167.
Meteorium crinitum Mitt. *M. austr. am.* p. 431.
M. erinaceum Spr. *Cat. n.* 18.
Neckera crinita Sull. *Expl. Exped.* 1855, t. 10.
Ad arbor. — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : Venezuela, Amazon.,
 And. Quitens. et Peruv., Brasil. austr. or.
- cubensis* (Mitt.) Par.
Meteorium cubense Mitt. *M. austr. am.* p. 431.
M. trichophorum Sull.
 Ster. — *Am. sept.* : Cuba.
- Cumingii* (C. M.) Ltz. in *Krause M. Chile.*
Meteorium molle Mitt. *op. cit.* p. 439.
Neckera Cumingii C. M. *Syn. II*, p. 132 et *Bot. Zeit.* 1855, p. 758.
 2. — *Am. merid.* : Chile, Valdiv., ins. Chiloë, Juan
 Fernandez, Chonos, terr. Magellan.
- curvifrons* (C. M.) Par.
Orthostichella curvifrons C. M. in *Fl.* 1890, p. 491.
 Ster. — *Afr.* : M. Aberdare.
- cuspidans* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 180.
 Ster. *Ad arbor.* — *Am. sept.* : Haïti.
- cyathipoma* (C. M.) Par.
Neckera cyathipoma C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 414.
 2. — *Am. merid.* : And. Boliv., Argentin. subtropic.
- cymbifolia* (Sull.) Jaeg. *Ad. II*, p. 158.
Neckera cymbifolia C. M. in *Fl.* 1875, p. 92; *Lesq. et Jam. Man.* p. 284.
Pilotrichum cymbifolium Sull. *M. of U. St.* p. 81 et *l. c.* p. 122, t. 76 B.
 2. ♂ et fr. ign. *Ad arbor.* — *Am. sept.* : Florida, Ludovic., Cuba.
- debilinervis* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 70.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- delicatula* W. P. Sch. mss.
Callicosta delicatula Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 83.
Pilotrichum delicatulum Jaeg. *Ad. II*, p. 140.
 Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
- deltoidea* }
Deppei } Besch. — *Papillaria*.

densiramea Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 197.

Ster. Arbor. — Afr. : Usambara.

dimorpha (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 772.

Meteorium dimorphum Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 82.

Neckera dimorpha C. M. in Linn. 1871-73, p. 517.

Ster. — Pac. : Austral. or.

dubia C. M. mss.

Ster. — Pac. : Nov. Guinea. (M. Yule).

Dubyana Besch. — Papillaria.

Duseni (C. M.) Par.

Orthostichella Duseni C. M. in Dusen M. Camer. n. 262.

— Afr. : M. Cameroon.

elongata (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 158.

Meteorium elongatum Mitt. M. austr. am. p. 430.

Ster. — Am. merid. : And. Peruv.

excavata (Mitt.) Jaeg. l. c.

Meteorium excavatum Mitt. op. et l. cc.

Ster. — Am. merid. : And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.

filifera (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 165.

Meteorium filiferum Mitt. op. cit. p. 434.

Neckera filifera C. M. Syn. II, p. 133.

Pilotrichum filiferum ej. in Bot. Zeit. 1848, p. 767.

-- Am. merid. : Venezuela, And. Nov. Granat. et

Quitens.

flavo-limbata Jaeg. — Papillaria.

flexilis (Sw.) Jaeg. Ad. II, p. 162.

Hookeria flexilis Sm. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 281.

Hypnum flexile Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 141.

H. nigricans Hpe. in Linn. 1847, p. 87.

Isothecium flexile Brid. Bryol. univ. II, p. 361.

Leskea flexilis Hedw. Sp. M. p. 234, t. 58.

Meteorium flexile Mitt. op. cit. p. 438.

Neckera flexilis C. M. Syn. II, p. 129.

Pilotrichum turgidum ej. in Bot. Zeit. 1848, p. 767.

2. Ad arbor. — Am. sept. : And. Costa Ric., Jamaic. Am. merid. : Venezuela, And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.

floridana (Aust.) Ren. et Card. in Rev. bryol. 1893, p. 11.

? *Neckera floridana* Aust. in Coult. Bot. Gaz. IV, p. 152; Lesq. et Jam. Man. p. 284.

Ster. Ad arbor. — Am. sept. : Florida.

funalis (Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 170.

Meteorium funale Mitt. op. cit. p. 442.

Neckera funalis C. M. Syn. II, p. 136.

Pilotrichum funale Wils. in Ann. and Mag. of nat. Hist. 1847, p. 378.

Ster. — Am. sept. : Jamaic. Am. merid. : Guian. batav.

gracilicaulis (C. M.) Par.

Orthostichella gracilicaulis C. M. in Dusen M. Camer. n. 164.

— Afr. : M. Cameroon.

- Grimaldii Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot Belg. 1891, p. 192 et M. Masc. Mad. n. 39.
2. Arbor. — Afr. : Usambara, Madagascar or.
- guianensis (Mont.) Par.
- Neckera guianensis Mont. Syll. p. 24.
- N. imbricata var. brachypoda ej. Cent. II, n. 74.
- Ad ramul. in silv. — Am. merid. : Guian. gall.
- Hampeana Kiaër in Borgen M. Mad. n. 30.
- Afr. : Madagascar centr.
- hexasticha (Schwaegr.) Jaeg. Ad. II, p. 161.
- Hypnum hexastichum Schwaegr. Suppl. I, II, p. 210.
- Isothecium hexastichum Brid. Bryol. univ. II, p. 380.
- Meteorium hexastichum Mitt. op. cit. p. 432.
- Neckera hexasticha C. M. Syn. II, p. 126.
- Am. sept. : Costa Rica, Cuba, Hispaniola.
- Holstii Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 197.
- Ster. — Afr. : Usambara.
- Husnoti Husn. — Pilotrichum.
- illecebra Besch. — Papillaria.
- illecebraria C. M. — Papillaria illecebra var. laevis.
- illecebrina (C. M.) Par.
- Neckera illecebrina C. M. in Linn. 1878-79, p. 416.
2. Ad arbor. — Am. merid. : Argentin. subtrop.
- imbricata (Schwaegr.) Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 78.
- Hypnum pentastichum W. Arn. Disp. p. 61.
- Isothecium pentastichum Brid. Bryol. univ. II, p. 378.
- Leskea flexilis β pentasticha ej. Sp. M. II, p. 59.
- Meteorium imbricatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 156.
- Neckera imbricata Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 42 (excl. t. 165); C. M. Syn. II, p. 128.
- Pilotrichum imbricatum P. B. Prodr. p. 55, sub Hypno ?
- Ster. — Afr. : Ins. Fernando Po, M. Cameroon, Sierra Leone, M. Usagara, Kilima N'Djaro, ins. Borbon. Am. sept. : Mexic.
- imbricatula C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 209.
- Neckera imbricatula ej. in Fl. 1888, p. 416.
2. In silv. — Afr. : Kilima N'Djaro, Usambara, Madagascar (ster.!).
- * var. nervosa Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 126 et M. Masc. Mad. n. 228.
- Afr. : Madagascar.
- imponderosa Besch. — Meteorium.
- inflatifolia C. M. in Fl. 1886, p. 282.
2. Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.
- inordinata (Mitt.) Broth. in Ule Bryoth. brasil. n. 179.
- Meteorium inordinatum Mitt. M. austr. am. p. 435.
- M. nitidum Sull. in Amer. Expl. Exped. 1855, t. 20 B.
- Am. merid. : Brasil. austr. or.
- involutifolia (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 159.
- Meteorium involutifolium Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 156.
- Ster. — Afr. : Sierra Leone, ins. Rodriguez.

- Isleana* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 126.
Ster. — Afr. : Ins. Borbon.
- « *var. virescens* Besch. *l. c.*
Ster. — Afr. : Ins. Borbon.
- isoclada* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 180.
Ster. Ad ramul. — Am. sept. : Costa Rica.
- Kegeliana* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 167.
Neckera Kegeliana C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 165.
Ster. — As. : Bombay.
- Krausei* Ltz. *Moosst.* p. 164.
Ad arbor. — Am. merid. : Valdiv.
- laevifolia* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 164.
Meteorium laevifolium Mitt. *op. cit.* p. 441.
— Am. sept. : Jamaic. Am. merid. : Venezuela, And.
Quitens.
- leptoclada* C. M. in *Fl.* 1886, p. 282.
Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. S. Thom.
- lepto-eriolada* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 800.
— Afr. : M. Cameroon.
- leuconeura* Besch. — *Papillaria*.
- leucotricha* (Tayl.) Jaeg. *Ad. II*, p. 166.
Hypnum leucotrichum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 196; C. M. *Syn. II*, p. 319.
Meteorium leucotrichum Mitt. *op. cit.* p. 434.
Neckera rufescens C. M. *Syn. II*, p. 134.
Ad arbor. — Am. sept. : Jamaic. Am. merid. : Venezuela, And Nov.
Granat., Quitens. et Peruv.
- ? *livens* (Schwaegr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 161 (1).
Hypnum livens Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 211 et *III, II, II*, t. 284.
Isothecium livens Brid. *Bryol. univ. II*, p. 380.
Meteorium livens Mitt. *op. cit.* p. 433.
Neckera livens C. M. *Syn. II*, p. 128.
Ster. — Am. merid. : Peruv.
- longe-barbata* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 166.
Meteorium longe-barbatum Mitt. *op. cit.* p. 436.
Neckera longe-barbata Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 525.
Ster. Ad arbor. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- longifolia* W. P. Sch. — *Papillaria*.
- longinervis* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 23 et
M. Masc. Mad. n. 185.
2? Ster. Ad trunc. arb. — Afr. : Madagascar.
- longipes* (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 158.
Hypnum quadrangulare Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 212.
Isothecium tetrastichum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 378?
Neckera longipes C. M. *Syn. II*, p. 123.
Pilotrichum longipes Mont. in *litt.*
Pterobryum Pohlii Mitt. *op. cit.* p. 438.

(1) « Forsan a *P. nigricante* non diversa ». Mitt. *l. c.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Guian. gall., Amazon., And. Peruv., Brasil. or.
- longipila* W. P. Sch. — Papillaria.
- Ludoviciae (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 158.
 Neckera Ludoviciae C. M. in *Fl.* 1875, p. 92.
 Ster. lignic. — *Am. sept.* : Ludovicia.
- mascarenica (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 126.
 Isothecium flexile Brid. *Bryol. univ. II*, p. 361 p.p.
 Neckera mascarenica C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 237.
 Ad ram. arbor. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- mauiensis (Sull.) Jaeg. *II*, p. 159.
 Meteorium mauiense Sull. in *Am. Expl. Exped.* p. 21, t. 19.
 Rupic. — *Pac.* : Ins. Samoa, Sandwic.
- mauritiana C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 59 (nom.).
 — *Afr.* : Ins. Franciae.
- membranacea (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 165.
 Meteorium membranaceum Mitt. *M. Ind. or.* p. 88.
 Ster. — *As.* : Assam.
- mexicana W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 79.
 Ster. — *Am. sept.* : Mexic.
- mollis (Hedw.) Jaeg. *Ad. II*, p. 164.
 Hypnum pendulum P. B. *Prodr.* p. 67.
 Leskea mollis Hedw. *M. frond. IV*, p. 40 ; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 292.
 Neckera mollis C. M. *Syn. II*, p. 131.
 Stereodon mollis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 88.
 2. — *Pac.* : Austral. (Victoria), Nov. Hebrid., Nov. Zeland., Tasman.
 & var. β *Fl. Tasman., II*, p. 203.
 — *Pac.* : liisd. loc.
- nigricans (Hook.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 79.
 Hypnum nigricans Hook. in *Kunth Syn. pl. Equin. I*, p. 64.
 Isothecium nigricans Brid. *Bryol. univ. II*, p. 363.
 Meteorium macranthum Dz. et Mk. *Prodr. fl. Surin.* p. 47, t. 12.
 M. nigricans Mitt. *M. austr. am.* p. 433.
 Neckera nigricans Nees in *Linn.* 1846, p. 682 ; C. M. *Syn. II*, p. 132.
 2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Cuba, Guadalup. *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat. et Quitens.
- nigricans Ängstr. — P. Caroli.
- nitens (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 772.
 Meteorium nitens H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 161, t. 87, f. 7 et *Handb.* p. 460.
 Ster. — *Pac.* : Nov. Zeland. bor.
- obovata Kiaër in *Borgen M. Mad. n.* 28.
 — *Afr.* : Madagascar.
- pachygaster (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 160.
 Meteorium pachygaster Mitt. *M. austr. am.* p. 432.
 Neckera pachygaster C. M. *Syn. II*, p. 126.
 2 ?
 — *Am. merid.* : And. Venezuel.

- « *var. gracilis* C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 582.
— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- pachygastrella* C. M. mss.; *Ångstr. in Oefv....* 1876, n. 4, p. 33.
2? Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- panduraefolia* (C. M.) *Jaeg. Ad. II*, p. 159.
Neckera panduraefolia C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 767.
2? — *Afr.* : C. B. Sp.
- pentagona* (Hpe. et Ltz.) *Jaeg. Ad. II*, p. 161.
Pilotrichum pentagonum Hpe. et Ltz. in *Bot. Zeit.* 1869, n. 28.
2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Æquator.
- percapillaris* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 654.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- peruviana* (Mitt.) *Jaeg. Ad. II*, p. 162.
Meteorium peruvianum Mitt. *M. austr. am.* p. 433.
— *Am. merid.* : Peruv.
- phleoides* (Desv.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 127.
Hypnum phleoides Desv. in *Brid. Bryol. univ. II*, p. 431.
Neckera phleoides C. M. *Syn. II*, p. 132.
Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- phyllogonioides* (C. M.) *Jaeg. Ad. II*, p. 166.
Neckera phyllogonioides C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 22.
Ster. — *Afr.* : Ins. Ceylan.
- Pinnatella* Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 198.
Ster. — *Afr.* : Usambara.
- platyclada* (C. M.) *Par.*
Orthostichella platyclada C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 846.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- plicaefolia* (C. M.) *Jaeg. Ad. II*, p. 175.
Neckera plicaefolia C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 569.
Trachypus plicaefolius Mitt. *M. Ind. or.* p. 129.
Ster. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.
- profusicaulis* (C. M.) *Par.*
Orthostichella profusicaulis C. M. in *Fl.* 1890, p. 492.
Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- pseudo-imbricata* (C. M.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 126.
Neckera decolorans Hpe. in *sehed.*
N. pseudo-imbricata C. M. in *Linn.* 1876, p. 265.
2. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. Anjouan, Mayotte.
- « *var. pallescens* (C. M.) *Par.*
Neckera pseudo-imbricata var. pallescens C. M. l. c.
Ut typ. — *Afr.* : Ins. Comores.
- « *var. rufescens* (C. M.) *Par.*
Neckera pseudo-imbricata var. rufescens C. M. l. c.
Ut typ. — *Afr.* : Ins. Comor.
- pseudo-rutilans* C. M. mss.
Ster. — *As.* : Sikkim.

- pulchella* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 78.
— *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba), Costa Rica.
- quinquefaria* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 159.
Hypnum terrestre Aubl. *Fl. Guian.* IV, p. 962 ?
Isothecium pentastichum C. M. in *Linn.* 1848, p. 196.
Leskea ? pentasticha Hsch. in *M. Sieb.* n. 29.
Meteorium quinquefarium Mitt. *M. austr. am.* p. 431.
Muscus terrestris, repens minor, cujus ramuli foliis multis et minimis serialim quadrato ordine dispositis cinguntur Dill. *Hist. M.* p. 335, t. 43, f. 73 ?
Neckera quinquefaria C. M. *Syn. II*, p. 124.
Ster. — *Am. sept.* : Guatemala, Costa Rica. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Guian. batav.
- quitensis* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 161.
Hypnum quitense Mitt. in *Spr. Cat.* p. 15, n. 1012 ; Jaeg. *l. c.* p. 601.
Meteorium quitense Mitt. *M. austr. am.* p. 439.
Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- Ragazzii* Brizzi in *Annuar. d. R. Institut. bot. di Roma*, 1893, V, fasc. 2.
2 ? Ad arbor. — *Afr.* :
- Rehmanni* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 323.
— *Afr.* : Austral.
- remotifolia* (Hsch.) *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 82.
Leskea remotifolia C. M. in *Linn.* 1846, p. 216.
Meteoridium remotifolium ej. in *Linn.* 1878-79, p. 492.
Meteorium remotifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 447.
Neckera remotifolia Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.* n. 1088 ; C. M. *Syn. II*, p. 672.
2. Ad arb. et rupes. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens., Brasil. or.
- rigida* (C. M.) *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 78.
Meteorium rigidum Mitt. *op. cit.* p. 439.
Neckera imbricata Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*
N. rigida C. M. *Syn. II*, pp. 126 et 669.
2. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica.
- rigidiuscula* Husn. — *Pilotrichum debile* var. *rigidiuscula*.
- sericea* (C. M.) Far.
Orthostichella sericea C. M. in *Fl.* 1890, p. 90.
Ster. — *Afr.* : M. Aberdare.
- serricola* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 67.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- sinuata* Besch. — *Papillaria*.
- sordido-viridis* C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 369.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- spiculata* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 165.
Meteorium spiculatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 90.
Ster. — *As.* : Sikkim, Khasia, Ceylan.
- strictula* (C. M.) Par.
Orthostichella strictula C. M. in *Rev. bryol.* 1892, p. 41 (nom.).
— *As.* : Ins. Nicobar ? Tanagra ?
- subheterocladia* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 493.
Ster. — *Am. merid.* : Venezuela.

- subheterophylla (*Geh. et Hpe.*) *Broth. in Ule Bryoth. brasil. n.* 178.
Pilotrichum subheterophyllum *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881.
 Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subimbricata (*Hpe.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p.* 126.
Neckera subimbricata *Hpe. in Linn.* 1874, p. 216.
 Ster. In silvis. — *Afr.* : Madagascar.
- subintegra *Lindb. in Ångstr. Prim. lin. p.* 34 (*nom.*).
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- sublivens (*Besch.*) *Par.*
Meteorium sublivens *Besch. op. cit. p.* 127.
 — *Afr.* : Ins. Borbon.
- subpachygaster (*C. M.*) *Par.*
Orthostichella subpachygaster *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 492.
 — *Am. merid.* : Venezuela.
- subpachygastrella *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handl.* 1895, n. 3.
 2. fr. ign. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).
- subpendula (*Geh. et Hpe.*) *Par.*
Orthostichella subpendula *G. et Hpe. in Fl.* 1881.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- subtenax *C. M. in hb. Calcutta.*
 — *As.* : Sikkim.
- tenax (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 166.
Neckera tenax *C. M. in Linn.* 1869-70, p. 23.
 Ster. — *As.* : Ceylan.
- tenella (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 165.
Neckera tenella *C. M. in Bot. Zeit.* 1859, p. 238.
 Ster. — *Am. sept.* : Ins. S. Doming.
- tenellula (*C. M.*) *Par.*
Orthostichella tenellula *C. M. in Fl.* 1890, p. 492.
 Ster. In silvis. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- tenuinervis *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 181.
 Ster. Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- tenuis (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 159.
Neckera tenuis *C. M. Syn. II, p.* 124.
 2 ? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- teres *Besch.* — *Papillaria.*
- Ternstroemiae (*Brid.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 165.
Hypnum Ternstroemiae *Brid. Bryol. univ. II, p.* 431.
Meteorium Ternstroemiae *Mitt. M. austr. am. p.* 434.
Neckera Ternstroemiae *C. M. Syn. II, p.* 139.
 Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Nov. Granat.
- tetragona (*Sw.*) *Besch. Prodr. bryol. mexic. p.* 78.
Hypnum tetragonum *Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p.* 142.
Isothecium tetragonum *Brid. Bryol. univ. II, p.* 377.
Meteorium tetragonum *Mitt. op. cit. p.* 431.
Neckera tetragona *C. M. Syn. II, p.* 125.

Pterigynandrum aureum Brid. *Mant. M.* p. 101 ?

? *Pt. quadrifarium* ej. *Bryol. univ. II*, p. 194 ?

Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica, Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens., Peruv., Brasil. or. (Minas Geraës).

Thunbergii (Brid.) Jaeg. *Ad. II*, p. 162.

Hypnum Thunbergii Brid. *Mant. M.* p. 167.

Isothecium Thunbergii ej. *Bryol. univ. II*, p. 381; *C. M. Syn. II*, p. 128.

Meteorium Thunbergii Mitt. *op. cit.* p. 432.

Ad arbor. ? — *Am. sept.* : Jamaic.

Tonduzii Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, *I*, p. 181.

Ster. — *Am. sept.* : Costa Rica.

tortipilis (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 166.

Meteorium tortipile Mitt. *op. cit.* p. 435.

Neckera tortipilis C. M. in *Bot. Zeit.* p. 768.

Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

trichophora (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 163.

Isothecium trichophorum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1843, p. 238 et *Syll.* p. 18.

Neckera trichophora C. M. *Syn. II*, p. 130.

Ster. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

trichophoroides (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 163.

Meteorium trichophoroides Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 82.

Neckera trichophoroides C. M. in *Linn.* 1874, p. 668.

Ster. — *Pac.* : Ins. Lord Howe.

turgescens (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 79.

Meteorium turgescens Mitt. *M. austr. am.* p. 440.

Neckera turgescens C. M. *Syn. II*, pp. 131 et 670.

2. In silv. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica, Jamaic., Guadalup. *Am. merid.* : Nov. Granat., And. Quitens.

turgidellacea C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 131.

— *Afr.* : M. Cameroon.

turgidula (C. M.) Par.

Neckera turgidula C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 417.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

* *var. tristis* (C. M.) Par.

Neckera turgidula var. tristis C. M. in *op. cit.* p. 418.

Ibid.

Uleana (C. M.) Par.

Orthostichella Uleana C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 76.

— *Am. merid.* : Brasil. sustr. or.

versicolor (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 162.

Daltonia imbricata Spreng. *Syst. veg. IV*, *I*, p. 187.

Isothecium imbricatum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 379.

Meteorium versicolor Mitt. *op. cit.* p. 432.

Neckera imbricata Schwaegr. *Suppl. II*, *II*, *I*, p. 42, t. 165 (excl. syn. *P. B. Brid. et Hedw.*).

N. versicolor C. M. *Syn. II*, p. 127.

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens., Brasil. austr. or., Montevideo.

viridis (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Meteorium viride Mitt. *op. cit.* p. 433.

Neckera viridis C. M. *Syn. II*, p. 125.

Orthostichella viridis ej. in *Linn.* 1878-79, p. 493.

2. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat.,
Brasil. austr. or (1).

PILOTRICHIDIUM Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 69 (3 spec.).

Antillarum (Mitt.) Besch. l. c.

Hookeria Antillarum Mitt. *M. austr. am.* p. 343.

H. varians var. Sull. in *Proced. of the Amer. Acad.*, August. 1861.

2. Loc. humid. et ad arb. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaic., Guadalup.

brunnescens (W. P. Sch.) Besch. *op. cit.* p. 70.

Hookeria brunnescens W. P. Sch. *hb.*

2. — *Am. sept.* : Guadalup.

callicostatum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 216.

Hookeria callicostata C. M. *Syn. II*, p. 216.

- Ster. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

PILOTRICHUM P. B. Prodr. p. 37 (32 spec.).

abietinum Brid. — Alsia.

affine (Hook.) Brid. *Bryol. univ. II*, p. 261 ; C. M. *Syn. II*, p. 179 ;

Mitt. *M. austr. am.* p. 390.

Callicosta affinis C. M. in *Linn.* 1848, p. 188.

Daltonia affinis W. Arn. *Disp.* p. 54.

Neckera affinis Hook. *M. ex. t.* 122.

N. composita var. β *Schwaegr. Sp. M. I, II*, p. 155.

2. — *Am. sept.* : Jamaic., ins. St-Vincent.

Amazonum Mitt. *op. cit.* p. 387.

- Ster. — *Am. merid.* : Amazon.

ambiguum Hsch. — Meteorium.

angustifolium C. M. — Pterobryum.

antipyreticum C. M. — Fontinalis.

asperifolium Mitt. *op. et l. cc.*

- 2? Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Aurantium C. M. — Garovaglia.

auro-nitens Hsch. — Meteorium Hornschuchii.

biductulosum P. B. — *Lepidopilum flexifolium*.

biforme Hpe. — Pilotrichella.

bipinnatum (Schwaegr.) Brid. *Bryol. univ. II*, p. 283 ; C. M. *Syn. II*,
p. 178 ; Mitt. *op. cit.* p. 388.

Callicosta bipinnata C. M. in *Linn.* 1848, p. 189.

Daltonia bipinnata W. Arn. *Disp.* p. 55.

Neckera bipinnata Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 156, t. 83.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Jamaic., Guadalup. *Am. merid.* : Ins. Tri-
nitat., Guian., Amazon., And. Quitens. et Peruv., Brasil.

(1) In Enumer. Kindberg. nom. nud. :

P. Ankasinae C. M.

P. decolorans C. M.

| *P. Eustichia* W. P. Sch.
| *P. Maenkemeyeri* C. M.

« *var. evanescens* C. M. *Syn. II*, p. 179.

Callicosta evanescens ej. in *Linn. l. c.*

Ad arbor. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Guian. batav.

« *var. filinerve* C. M. *l. c.*

Ut et ubi praeced.

brasiliense (Hsch.) Hpe, *Symb.* 1874, p. 501.

Antitrichia brasiliensis Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 52.

Neckera brasiliensis C. M. *Syn. II*, p. 96.

Pterobryum brasiliense Mitt. *op. cit.* p. 427.

2. — *Am. merid.* : Amazon., Brasil. austr. or.

capillaceum Hsch. — *Lindigia*.

ciliatum C. M. — *Hedwigia*.

var. secundum C. M. — *Hedwigia ciliata var. secunda*.

var. striatum C. M. — *Hedwigia ciliata var. striata*.

cirrifolium Hsch. — *Meteorium longissimum*.

cochlearifolium C. M. } — *Pilotrichella*.

— *Pterobryum*.

compositum (Sw.) P. B. *Prodr.* p. 82 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 262 ;
C. M. *Syn. II*, p. 178.

Callicosta composita C. M. in *Linn.* 1848, p. 188.

Daltonia composita W. Arn. *Disp.* p. 54.

Hypnum compositum Sw. *Prodr. fl. Ind. occ.* p. 141.

Neckera composita Hedw. *Sp. M.* p. 203, t. 46.

Orthotrichum compositum Brid. *M. Rec. II, II*, p. 32, t. I, f. I.

2. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica, Jamaic. ; Guadalup. ? *Am. merid.* :
Venezuela.

consimile C. M. — *Cryphaea*.

convolutum C. M. — *Pterobryum*.

coronatum C. M. — *Erpodium*.

cristatum Mitt. *op. cit.* p. 387.

2 ? — *Am. sept.* : Jamaic.

croceum Hpe. — *Papillaria*.

cryphaeoides W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 45.

2. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

cylindraceum C. M. — *Pterobryum*.

cymbifolium Sull. — *Pilotrichella*.

dalecarlicum C. M. — *Fontinalis*.

decurrens C. M. — *Cryphaea attenuata* ?

debile Besch. *op. cit.* p. 48.

2. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

« *var. rigidiusculum* W. P. Sch. in *op. et l. cc.*

Pilotrichella rigidiuscula Husn. *M. Antill. n.* 160.

— *Am. sept.* : Martinic.

delicatulum Jaeg. — *Pilotrichella*.

densum (1) C. M. — *Prionodon*.

Deppei C. M. — *Cryphaea patens*.

(1) *denticulatum* P. B. *Prodr.* p. 81 ; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 266 ; C. M. *Syn. II*, p. 186.

— *Afr.* : Ins. Borbon. (An *Mniadelphus* ? *Deleatur*).

? disciflorum *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881.

Ster.

— *Am. sept.* : Brasil austr. or.

distichum { C. M. p.p. { — Fontinalis.
 { P. B. — Neckera.

divaricatum *Mitt. M. austr. am* p. 389.

2 ? Ad arbor. — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent.

diversifolium *Angstr.* — *Erpodium*.

domingense C. M. — *Erpodium*.

dubium *Mitt. op. cit.* p. 390.

— *Am. sept.* : Guadalup.

elegans C. M. — Garovaglia.

elongatum C. M. — *Prionodon*.

exiguum C. M. — *Cryphaea*.

fasciculatum C. M. *mss.*

— *Am. sept.* : Guatemala.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 492.

— *Am. merid.* : Venezuela.

filamentosum *Brid.* — *Meteorium*.

flescens *Duby.* — *Meteorium*.

filicinum P. P. — *Pterobryum*.

filiferum C. M. — *Pilotrichella*.

filiforme C. M. — *Cryphaea*.

var. *squarrosulum* C. M. — *Acrocryphaea squarrosula*.

filigranum C. M. *mss.*

— *Am. sept.* : Guatemala.

flagelliferum *Brid.* — *Leucodon domingensis*.

flexile *Hpe.* — *Papillaria illecebra*.

fontinaloides C. M. — *Hydropogon*.

foveolatum *Hpe.* — *Neckera*.

funale *Wils.* — *Pilotrichella*.

fuscens C. M. — *Papillaria*.

genuflexum C. M. — *Meteorium ancistrodes*.

Gorveanum C. M. — *Dendrocryphaea*.

gymnostomum C. M. — *Hydropogonella*.

Hahneanum *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 46.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

hamatum C. M. — Garovaglia.

helictophyllum C. M. — *Meteorium*.

Herminieri *W. P. Sch. in Besch. op. cit.* p. 47.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup.

heteromallum P. B. — *Cryphaea*.

var. *aquatile* C. M. — *Cryphaea heteromalla* var. *aquatis*.

var. *filiforme* C. M. — *Cryphaea glomerata*.

heterophylla P. B. — *Neckera*.

Hookeri *Dz. et Mk.* — *Neckera Plumula*.

Hornschuchii C. M. — *Pterobryum densum*.

Husnoti *W. P. Sch. in Besch. op. et l. cc.*

Pilotrichella Husnoti *Husn. M. Antill. fr. n.* 159 a.

Ster. Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup.

hypnoides (*Hedw.*) *P. Beauv. Prodr.* p. 83 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 260 ;
C. M. Syn. II, p. 179 ; *Mitt. op. cit.* p. 390.

Callicosta hypnoides *C. M. in Linn.* 1848, p. 188.

Daltonia hypnoides *W. Arn. Disp.* p. 51.

Fontinalis hypnoides *Sw. Prodr. fl. Ind. occ.* p. 138.

Neckera hypnoides *Hedw. M. frond.* III, p. 43, t. 17.

2. — *Am. sept.* : Jamaic.

imbricatum *Brid.* — *Pilotrichella*.

imponderosum *C. M.* — *Lindigia*.

inordinatum *Hpe.* — *Pilotrichella*.

intermedium *Hpe.* — *Cryphaea*.

Jamesoni *Hpe.* — *Cryphaea*.

julaceum { *Hpe.* — *Acrocryphaea*.

{ *Hpe. p.p. ?* — *Acrocryphaea mexicana*.

lumbatum *Hpe.* — *Rutenbergia*.

Lindigii *Hpe.* — *Porotrichum*.

longissimum *Hpe.* — *Meteorium*.

longipes *Mont.* — *Pilotrichella*.

longipilum *W. P. Sch.* — *Papillaria*.

lophophyllum *Sull. in Proc. of the Amer. Acad...* 1861.

2? — *Am. sept.* : Cuba.

luteo-virens *C. M.* — *Prionodon*.

Lycopodium *C. M.* — *Prionodon*.

macranthoides *Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 45.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

microcyatheum *C. M.* — *Hedwigia*.

microthamnium *Hpe.* — *Porotrichum*.

mucronatum *Mitt. op. cit.* p. 389.

Ster. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica, Jamaic.

^a *var. elongatum* *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I,
 p. 183.

Ut typ. — *Am. sept.* : Costa Rica.

nematosum *C. M.* — *Climacium sulcatum*.

nervosum *C. M.* — *Cryphaea*.

nigrescens *Hsch.* — *Papillaria kermadecensis*.

nitidum { *Hpe.* — *Porotrichum*.

{ *Wils.* — *Meteorium*.

nivale *C. M.* — *Hedwigia*.

obtusifolium *Brid.* — *Hookeria microcarpa*.

ovalifolium *C. M.* — *Cryphaea*.

paraphysale *C. M.* — *Papillaria nigrescens*.

patagonicum *P. B.* — *Homalia glabella ?*

patens *C. M.* — *Cryphaea*.

patulum { *Brid.* — *Meteorium recurvifolium*.

{ *C. M.* — *Meteorium*.

pennatum *P. B.* — *Neckera*.

pentagonum *Hpe. et Ltz.* — *Pilotrichella*.

Perrottetii *C. M.* — *Erpodium*.

phaeum *Wils.* — *Meteorium*.

piliferum *W. P. Sch.* — *Papillaria longipila*.

piniforme { *Brid.* — *Porotrichum*.

{ *Hsch.* — *Porotrichum Thieleanum*.

pirithea *Ångstr. in Oefv...* 1876, n. 4, p. 28.

2? — *Am. merid.* : Brasil, austr.

- plicatum* C. M. — Garovaglia.
Plumula Nees ab Es. — Neckera.
Pluvini Brid. — Leptodon.
polytrichoides Brid. — Lepidopilum.
Powellii C. M. — Garovaglia.
procerum Mitt. *op. cit.* p. 390.
 2? — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent.
protensum C. M. — Cryphaea.
Puiggarii Geh. et Hpe. — Meteorium.
pumilum P. B. — Neckera.
punctulatum C. M. — Meteorium.
Ragazzii Brizzi in *Annuar. d. R. Istit. bot. di Roma*, 1893, V, fasc. 2.
 1. — *Afr.* : Choa.
ramosissimum Mitt. *op. cit.* p. 388.
 2? Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
reclinatum C. M. — Meteorium.
recurvifolium { Hpe. — Meteorium tovariense.
 { Hsch. — Meteorium.
rufescens C. M. — Dendropogon.
rugicalyx C. M. — Pterobryum.
rugifolium C. M. *Syn. II*, p. 177.
 Neckera hypnoides Hook. in sched.
 2. — *Pac.* : Ins. Hawai.
scabrisetum Brid. — Lepidopilum subenerve.
scariosum Ltz. — Garovaglia.
Schiedeanum C. M. — Cryphaea.
seriatum C. M. — Papillaria Deppii.
serrulatum P. B. — Trachypus.
setigerum Sull. — Garovaglia.
setosum C. M. — Cyrtopus.
Smithii P. B. — Leptodon.
solitarium C. M. — Jaegerina.
sphaerocarpum C. M. — Cryphaea.
sphagnifolium C. M. — Fontinalis biformis.
splendens C. M. — Pterobryum.
squamosum C. M. — Fontinalis.
squarrosus C. M. — Meteorium.
sticticolum C. M. — Meteorium.
stoloniferum C. M. — Jaegerina.
stramineum C. M. — Meteorium.
Stroembachii C. M. — Fontinalis hypnoides.
subambiguum Hpe. — Meteorium.
subrevolutum C. M. — Hedwigia.
sulfureum W. P. Sch. *mss.* ; *Jaeg. Ad. II*, p. 142 (1).
 — *Pac.* : Nov. Zeland.
subheterophyllum Geh. et Hpe. — Pilotrichella.
Symphysodon C. M. — Pterobryum neckeroides.
tamariscinum Hpe. — Porotrichum.
tenellum C. M. — Cryphaea.
tenuicostatum Hpe. — Porotrichum.

(1) « An Meteorium ? » *Jaeg. l. c.* et p. 153.

tenuissimum Hpe. — Meteorium.

Thielemanum Hpe. — Porotrichum.

Tonduzii Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 184.

Ster. In silv. — Am. sept. : Costa Rica.

tovariense C. M. — Meteorium.

Trachypus C. M. — Trachypus bicolor.

trinitense Mitt. op. cit. p. 390.

2? — Am. merid. : Ins. Trinitat.

truncatum P. B. — Neckera disticha?

tumidum Brid. — Meteorium.

turgidum C. M. — Pilotrichella flexilis.

undulatum } P. B. — Neckera.

 } P. B. (fid. Mitt.). — Neckera foveolata.

vitianum Sull. — Pterobryum.

Wallisii C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

Widgrenianum Ångstr. — Meteorium (1).

Pinnatella C. M. in Linn. 1875, p. 456 (sect. HYPNI=POROTRICHUM).

PIREA Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 175 (1 spec.).

Mariae Card. in op. cit. p. 176.

2? Ad arbor. — Am. sept. : Costa Rica.

PLAGIOBRYUM Lindb. in Oefv. Vet. Akad. Foerh. 1862, n. 10 (7 spec.).

demissum (H. et H.) Lindb. M. Scand. p. 17.

Bryum demissum Hook. M. ex. t. 99; Bryol. eur. IV (mon. p. 31), t. 341;
C. M. Syn. I, p. 289; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 250.

Meesea demissa H. et H. in Flora, 1819, p. 106; Brid. Bryol. unic. II,
p. 64.

Pohlia demissa Hüb. Muscol. germ. p. 466.

Zieria (2) *demissa* W. P. Sch. Coroll. p. 69 et Syn. II ed. p. 473; Rab.
Bryoth. eur. n. 1214.

2. Terr. — Eur. : In summ. Alp. cacum. Am. sept. : Perrar. : Colo-
rado, summ. M. Rupestr., ins. Sabine.

Giraldii (C. M.) Par.

Bryum Giraldii C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 94.

2. Terr. — As. : China or. (prov. Schen-Si.).

lamprocarpum (C. M.) Par.

Bryum lamprocarpum C. M. Bryol. Austr. Georg. p. 18.

Polyg. — Am. merid. : Austr. Georg.

leptoclodon (Sull.) Par.

Bryum leptoclodon Sull. in Proced. An. Acad. 1861.

Zieria leptoclada Jaeg. Ad. I, p. 605.

2. Terr. — Am. sept. : Cuba.

(1) In Enum. Kindberg nom. nud. :

P. microthamnium Hpe.

|

P. tenuicostatum Hpe.

(2) Nom. jam. abusum : *Zieria* Sm. in Trans. of the Linn. Soc. 1798, p. 216
(Rutaceae).

macro-demissum (C. M.) Par.

Bryum macro-demissum C. M. mss.

— As. : Nepal. occid.

Wildii Broth. in Oefv. of Finska Vet. Soc. Foerh. 1890, p.

2. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

Zierii (Dicks.) Lindb. in op. et l. cc.

Bryum Zierii Dicks. Fasc. I Pl. crypt. t. 4, f. 10 ; Brid. Bryol. univ. I, p. 641 ; Bryol. eur. IV (mon. p. 29), t. 341 ; C. M. Syn. I, p. 288 et II, p. 572 ; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 252.

Cladodium Zierii Hpe. Fl. Hercyn.

Hypnum Zierii W. et M. Bot. Taschb. p. 275.

Mnium Zierii P. B. Prodr. p. 77.

Pohlia Zierii Schwaegr. Sp. M. p. 76.

Zieria julacea W. P. Sch. in op. et l. cc.

2. In rup. fiss. madid. — Eur. : Reg. subalp. et alp. omn. Alp. et Apenn. ; Spitzberg, ins. Urior., Britann., Pyren. As. : Caucas. centr. et or. Am. sept. : Groenland, M. Rupestr., Gaspesia.

Plagiocarpus Mitt. M. austr. am. p. 74 (sect. CAMPYLOPODIS).

Plagiodus ej. op. cit. p. 248 (sect. FUNARIAE).

Plagiomela ej. op. cit. p. 270 (sect. BARTRAMIAE).

PLAGIOPUS Brid. Bryol. univ. I, p. 596.

Æderi Limpr. — Bartramia.

β condensata Brid. — Bartramia Æderi var. condensata.

PLAGIOTHECIUM Bryol. eur. V (77 spec.).

aciculari-pungens C. M. et Kindb. in Bidr. 454 (nom.) et in Mac. Cat. p. 216.

2. Ster. Terr. — Am. sept. : New Brunswick.

americanum Kindb. — Pl. bifariellum.

andicola W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1695.

H. andinum Hpe. in Ann. sc. nat 1865, V ser., V, p. 389.

— Am. merid. : And. Nov. Granat. et Boliv.

Anderssonii Ångstr. — Isopterygium.

antarcticum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1877, p. 71 (1) et in Philos. Trans. of the roy. Soc. 1879 (extr. vol.), p. 36, t. III, f. 5.

Hypnum antarcticum C. M. in Forschungsreise... Bot. p. 34.

1 — Afr. : Ins. Kerguelen, Marion.

aomoriense Besch. mss.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie n. 40, 55, 220.

aptychopsis (C. M.) Par.

Hypnum aptychopsis C. M. in Fl. 1886, p. 517.

1. Ad arbor. — Afr. : Old Calabar.

arboreum W. P. Sch. in Breutel M. Capens.

— Afr. : C. B. Sp.

{1} « An Isopterygium ? » Jaeg. Ad. II, p. 519.

- Arnoldi *Milde in Hedwig*, 1859, p. 50.
 1. — *Eur.* : Francon., Siles.
- attenuati-rameum *Kindb. in Mac. Cat.* p. 277.
 Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Quebec.
- austro-pulchellum (*C. M.*) *Par.*
Hypnum austro-pulchellum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 82 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 35.
 1. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- bifariellum *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII*, p. 279 et in *Mac. Cat.* p. 211.
 Pl. americanum *ej. Enum. Bryin. ex.*
 2. Ad terr. humid. in silv. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.
- Borrerianum* Spr. — Pl. elegans.
 var. *longinerve* Spr. — Pl. elegans var. *longinerve*.
- Bottinii* (*Breidl.*) *Vent. in Rev. bryol.* 1882, p. 4.
Hypnum Bottinii Breidl. in Nuov. Giorn. bot. ital. XIII.
 1. In paludos. — *Eur.* : Etruria.
- brasiliense* Jaeg. — Pl. subaequans.
- brevipungens* *Kindb. in Bidr.* p. 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 215.
 1. Rupic. — *Am. sept.* : Ontario.
- capense* W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*
 — *Afr.* : C. B. Sp., litt. occ. mar. Erythr.
- Chapmanni* *Duby in Mém... Genève*, 1875, p. 8, t. 2, f. 2.
 1. — *Am. sept.* : Florida.
- Chrismari* Besch. — *Isopterygium*.
- chrysobasis* *C. M. in Journ. of bot.* 1877, p. 229 (nom.).
 Lignic. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- corticolum* *Ångstr. in Oefv...* 1873, n. 5, p. 143.
 1. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- decursivifolium* *Kindb. in Mac. Cat.* p. 277.
Hypnum latebricola Mac. Canad. M. n. 304 p.p.
 2. Ad conifer. semiputr. — *Am. sept.* : Ontario.
- denticulatum* (*L.*) *Bryol. eur. (mon. p. 12), t. 501* ; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 696.
Fissidens denticulatus Willd. Prodr. fl. Berol. n. 922.
Hypnum denticulatum L. Sp. pl. p. 1588 ; *C. M. Syn. II, p.* 251 (una cum *H. silvatico*).
H. denticulatum, pinnatum, pinnulis duplicibus recurvis Dill. Hist. M. p. 266, t. 34, f. 5.
H. Stereodon denticulatus Brid. Bryol. univ. II, p. 551.
Leskea denticulata Timm. Fl. Megap. n. 803.
L. flaccida Brid. op. cit. p. 308.
L. hamosa Ångstr. in Th. Fries Bot. Not. 1866, p. 102.
Pylaisaea radicans Desv. in Brid. op. cit. p. 282.
 1. Lignic. rarius rupic. v. terr. — *Eur.* : Zon. sept. et intermed. : Spitzberg, ins. Parry. As. : Japon., Amour, Saghalien, Jeniss. med. et sup., Obi, Sikkim, Talysch, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontar., lac. Super., M. Rupestr. et Selkirk, Alaska, Sitka, ins. Vancouver, reg. sept. et or. *Am. merid.* : Peruv. Pac. : Austral. or (var. ?), Tasman.

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 164, 166 (*Hypnum*).
 Mac. Canad. M. n. 310 (*Hypnum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 691.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 531 (*Hypnum*).
 Un. itin. 1866, n. 57, 71; 1867, n. 27.

- « *subsp. aptychus* Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1880, p. 35.
 Absque loco.
- « *var. crispatum* Lindb. in *Act. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 1872, p. 278.
 Lignic. et ad terr. humid. — *Eur.* : Scandin., Fennia. As. : Amour.
- « *var. densum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 In fissur. rup. reg. subalp. et alp. in *Eur.* et *Am. sept.*
Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 532.
var. Donnii Lindb. — Pl. denticulatum *var. obtusifolium*.
- « *var. Graveti* (Piré) Par.
 Pl. Graveti Piré *Nouv. rech. bryol...* VII, p. 20.
 Ad rup. madid. — *Eur.* : Belg., Silv. Nigra.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 1193.
var. laetum Aust. — Pl. passaicense.
- « *var. laxum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 Ad truncos deject. reg. subalp. in *Eur.* et *Am. sept.*
- « *var. microcarpum* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1889, p. 98.
 — *Am. sept.* : Washington, Idaho.
- « *var. myurum* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
 In fiss. rup. reg. subalp. et alp. in *Eur.*
- « *var. obtusifolium* (Brid.) Par.
Hypnum denticulatum var. obtusifolium Turn. M. *Hibern.* p. 146, t. 14, f. 2.
H. Donianum Sm. *Fl. brit.* III, p. 1286 et *Engl. Bot.* t. 1446.
H. obtusatum Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 371.
H. obtusifolium Brid. *Mant. M.* p. 153.
 Pl. obtusifolium *var. Donii* Lindb. *Animadv.* p. 30.
 Pl. Donianum Jaeg. *Ad. II*, p. 515.
Stereodon Donianus Mitt. M. *Ind. or.* p. 104.
 Lignic. — As. : Sikkim. *Am. sept.* : Ubi typ. *Am. merid.* : Ins. Eremitae ? Cap Horn ? (fid. *Handb. of N. Zeal. Fl.*) *Pac.* : Nov. Zeland. med., Tasman.
- « *var. phyllorhizans* Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1881.
 — *Eur.* : Pyren. centr.
- « *var. secundum* Lindb. in *Act. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* l. c.
 Lignic. — *Eur.* : Scandin., Fennia.
- « *var. squarrosum* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 179 et in *Mac. Cat.* p. 214.
 Terr. — *Am. sept.* : Columb. brit., fret. Behring.
- « *var. succulentum* Wils. *Bryol. brit.* p. 407.
 Pl. succulentum Lindb. in *Th. Fries Bot. Not.* 1865, p. 143 et *Animadv.* 1867, p. 29.
 — *Eur.* : Britann., Scandin.
- « *subsp. sulcatum* Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1880, p. 355.
 Absque loco.

« *var. tenellum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ad truncos deject. reg. subalp. in *Eur. et Am. sept.*

Donianum Jaeg. — Pl. denticulatum *var. obtusifolium*.

elaiadelphus C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 685.

— *Afr.* : M. Cameroon.

elegans (Hook.) W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 697.

Hypnum Borrerianum Spr. *mss.* ; C. M. *Syn. II*, p. 279.

H. *elegans* Hook. *M. ex. t.* 9 ; Spr. in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* 1849
et *M. Pyr. n.* 24 ; C. M. *l. c.* p. 260.

H. *elegans* β *collinum* Wils. *Bryol. brit.* p. 408.

H. *planifolium* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 411 (*fid. Lindb.*).

Isopterygium Borreri Lindb. in *Act. Soc. pr. Faun.* 3^a X^{br} 1881 (1).

l. *elegans* *ej. Man. M. II*, 1874, p. 416.

Isothecium elegans Brid. *op. cit.* p. 356.

Leskea prostrata Tayl. *mss.* (*fid. Wils. l. c.*).

Pl. *Borrerianum* Spr. in *Lond. Journ. of bot.* 1880, p. 90.

Pl. *Schimperi* Jur. et Milde in *zool. bot. Verhandl. Wien*, 1862, p. 968.

Rhynchostegium elegans Lindb. in *Hedwig.* 1863, p. 79.

2. Ad rup. et terr. — *Eur.* : Zon. intermed. et septentr. ; in *Britann.*
modo fructif. repert. *As.* : *Caucas. occ. Am. sept.* : *Labrador,*
Anticosti, Terr. Nov., ins. Miquel., Nov. Scot., M. Alb., New Jer-
sey, Ontar., Columb. brit., ins. Vancouver, Washington, Oregon.

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 309 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 1093, 1189, 1234.

« *var. longinerve* (Spr.) Par.

Pl. *Borrerianum var. longinerve* Spr. *l. c.*

In silv. arenos. — *Eur.* : *Anglia (Yorkshire).*

« *var. nanum* (Jur.) Par.

Pl. *nanum* Jur. *mss.* ; Milde in *Bot. Zeit.* 1864, *Beil.* 16.

-- *Eur.* : *Westphal., Thuring., Siles.*

« *var. terrestre* (Lindb.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 366.

Rhynchostegium elegans var. terrestre Lindb. in *Th. Fries Bot. Not.* 1865,
p. 139 et *Animadv.* 1867, p. 38.

Terr. — *Am. sept.* : *New Jersey (ster.).*

Fitz-Geraldi Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 23.

Hypnum Fitz-Geraldi *cor. in Lesq. et Jam. Man.* p. 370.

Ster. — *Am. sept.* : *Florida.*

fulvum Jaeg. — Pl. *micans var. fulvum.*

geminum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 519.

Hypnum geminum Lesq. et Jam. *Man.* p. 365.

Stereodon geminus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 39, t. 7.

l. -- *Am. sept.* : *M. Rupestr.*

georgico-antarcticum (C. M.) Par.

Hypnum georgico-antarcticum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 45.

Ster. Rupic. — *Am. merid.* : *Austr. Georg.*

Giraldii C. M. — *Isopterygium*

Graveti Piré. — Pl. denticulatum *var. Graveti.*

(1) Secundum Lindb. l. c., spec. Americana a sp. Europaea differt. — Cf. Spruce
in *Lond. Journ. of bot.* 1880, p. 290 et in *Rev. bryol.* 1881, p. 52.

homaliaceum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, XVIII, p. 385.

1. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 178.

homalophyllum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 511.

Stereodon homalophyllum Mitt. in op. cit. 1863, p. 158.

1. Aquat. — *Afr.* : Niger.

Howeanum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 512.

Hypnum Howeanum C. M. in sched.

— *Pac.* : Ins. Lord Howe.

incurvum de Not. — *Hypnum incurvatum*.

laetum *Bryol. eur. V (mon. p. 7). t. 495* ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 691.

Hypnum denticulatum var. laetum Lindb. Animadv. p. 31 ; *Mac. Canad. M. n.* 311.

Leskea laeta Wils. Bryol. brit. p. 408 in obs.

1. Ad stirp. putresc. et in rup. fissur. — *Eur.* : Suecia, Rhaet. *As.* : Jenissei med. et inf. *Am. sept.* : Groenland, Ontar., lac. Super., Columb. brit.

laevigatum *W. P. Sch. in Savat. M. Japon. n.* 691 ; *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, XVIII, p. 384.

2. ♂ et fr. ign. — *As.* : Japon.

lamprostachys (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 515.

Hypnum lamprostachys Hpe. in Linn. 1859-60, p. 639.

— *Pac.* : Austral. or.

lancifolium *O. Debeaux in Act. Soc. Linn. Bordeaux*, 1876, p. 173.

2? Ad rup. micaschist. littor. — *As.* : China or.

latebricola (*Wils.*) *Bryol. eur. V (mon. p. 6), t. 494* ; *W. P. Sch. op. cit.* p. 690.

Hypnum latebricolum Lindb. mss. ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 363.

H. scitulum Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 44?

Leskea latebricola Wils. Bryol. brit. p. 329.

2. Ad arb. trunc. viv. et deject. putresc. et ad stirp. Filic. — *Eur.* : Suec., Boruss. or., Westphal., Thuring., vall. Rhen. inf., Angl. *Am. sept.* : Ontar., New York, New Jersey.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 543, 1233.

longisetulum *C. M. mss.*

— *Am. sept.* : Guatemala.

longisetum *Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 232.

2. — *As.* : Japon., ins. Kiusiu.

lucidulum (*Hook. f. et Wils.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 521.

Hypnum lucidulum H. f. et W. Fl. Antart. II, p. 418, t. 155, f. I ; *C. M. Syn. II*, p. 349.

2? Rupic. — *Am. merid.* : And. Quitens., Fuegia, ins. Eremitae, Maclov.

lucidum (*Hook. f. et Wils.*) *Par.*

Amblystegium lucidum Jaeg. Ad. II, p. 547.

Hypnum lucidum H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 554 ; *C. M. Syn. II*, p. 259.

— *Am. merid.* : Ins. Eremitae.

luteo-nitens (*Ren. et Card.*) *Par.*

Hypnum luteo-nitens R. et C. in Bull. soc. roy. bot. Belg. XXXI, II, 1892, p. 111 et *M. Masc. Mad. n.* 98.

1. In graminos. — *Afr.* : Madagasc.

magellanicum C. M. in *Fl.* 1885, p. 425.

Hypnum Donianum Mitt. *M. austr. am.* p. 520 (quoad loc. ins. *Eremitae*)?

Isopterygium fuegianum Besch. in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot.* p. 301.

— *Am. merid.* : Fuegia.

magellanicum W. P. Sch. — *Lembophyllum auriculatum*.

membranosulum C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 389.

— *Afr.* : C. B. Sp.

membranosum Kindb. in *Bidr.* 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 21.

Rhynchostegium? *aneuron* Kindb. in *Ott. nat. IV*, p. 65.

2? *Lignic.* — *Am. sept.* : Ontario.

micans (Sw.) Par.

Hypnum albulum C. M. *Syn. II*, p. 280; *Sull. M. of U. St.* p. 71 et *Ic.* *M.* p. 179, t. 112; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.* 448.

H. micans Sw. in *Muhlenb. Cat.* p. 104 et *Adn. bot.* p. 175; *Lesq. et Jam. Man.* p. 365.

H. subsimplex Sull. *M. Allegh. n.* 52 (fid. C. M.).

H. tenerum H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. II ed. n.* 108 et 109.

Isopterygium albulum Jaeg. *Ad. II*, p. 502.

Rhaphidostegium micans Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 21.

2. *Lignic. et terr.* — *Am. sept.* : Reg. merid.

« *var. fulvum* (Hook.) Par.

H. fulvum H. f. et W. l. c. n. 110; *Sull. M. of U. St.* p. 80 et *Ic. M.* p. 205, t. 125.

H. micans var. fulvum Lesq. et Jam. l. c.

Pl. fulvum Jaeg. *Ad. II*, p. 516.

? *Rhaphidostegium fulvum* Ren. et Card. l. c.

In paludos. — *As.* : Japon. *Am. sept.* : Ludovic.

Exs. : Faurie *Pl. Japon.* n. 18.

« *var. submersum* (Ren. et Card.) Par.

Rhaphidostegium micans var. submersum Ren. et Card. l. c.

— *Am. sept.* : Ludovic.

« *var. Ursorum* (Sull.) Par.

H. albulum var. Ursorum Sull. *M. bor. am. II ed.* p. 75.

Terr. — *Am. sept.* : Carol. super.

Monbuttoviae (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 514.

Hypnum Monbuttoviae C. M. in *Linn.* 1875, p. 459.

1. *Loc. humid.* — *Afr.* : Monbottou.

Morokae C. M. *mss.*

— *Pac.* : Nov. Guinea brit.

Mühlenbeckii *Bryol. eur. V* (mon. p. 11), t. 499; W. P. Sch. *op. cit.* p. 702.

Hypnum Mühlenbeckii Hartm. *Skand. Fl. II ed.*, p. 346.

H. pulchellum Br. et Sch. in *Drumm. M. bor. am. Lond. Journ. of bot.* 1843, *II*, p. 668.

H. Seligeri Sw. *p.p.*

H. silesianum Hook. in *Drumm. M. bor. I ed. n.* 168 (fid. C. M.).

H. striatellum C. M. *Syn. II*, p. 282.

Leskea striatella Brid. *Bryol. univ. II*, p. 762.

Pl. striatellum Lindb. in *Th. Fries Bot. Not.* 1865, p. 144 et *Animadv.* p. 33.

1. In rup. fissur. et ad abrupt. graminos. — *Eur.* : Reg. alp. et subalp., rar. mont. : Scandin., Dania, Sudet., Alp. Salisb., Helvet.,

Pyren. ; Scotia. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. Nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Ontar., reg. sept. et or.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 901, 1092.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 533 (*Hypnum*).

« *var. chrysophylloides* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 581 et II ed. l. c.

Hypnum chrysophylloides C. M. *Syn.* II, p. 436.

Ut typ. — *Eur.* : Nordland., Norveg. merid., Sudet.

Müllerianum W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 584 et II ed. p. 698 ; Sull. *lc. M. Suppl.* p. 89. t. 66 (1).

Isopterygium Müllerianum Jaeg. *Ad.* II, p. 507.

2. In loc. excavat. soli imperv. — *Eur.* : Helvet., Tirol. merid., Alp. Bavar., Rhaet. ; Pyren. As. : Caucas. occ. *Am. sept.* : M. Alb., New Jersey, Ohio. *Pac.* : Nov. Zeland. ?

Exs. : Un. itin. 1863, n. 79.

nanum Jur. — Pl. elegans *var. nanum*.

neckeroides Bryol. eur. V (mon. p. 16), t. 505 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 701.

Pl. splendens W. P. Sch. in Savatier *M. Japon.* n. 700.

Stereodon neckeroideus Mitt. *M. Ind. or.* p. 103.

2. In praerupt. umbros. — *Eur.* : Rhaet., Salisburg. As. : Japon., Sikkim.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 20.

Un. itin. 1863, n. 82.

« *var. myurum* Mdo. in Ltz. Bryol. *Notizb.* 1865, p. 73.

Pl. noricum ej. in sched.

Ut et ubi typus.

nemorale Jaeg. — Pl. silvaticum *var. nemorale*.

nitidifolium (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 515.

Stereodon nitidifolius Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 158.

1. Cortic. — Afr. : Ins. Fernando-Po.

nitidulum (Wahlenb.) Bryol. eur. V (mon. p. 10), t. 498 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 694.

Hypnum contextum Schleich. *Crypt. helvet. Centr.* III, n. 49 (an Pl. pulchellum ?)

H. nitidulum Wahlenb. Fl. Lapp. p. 370.

H. nitidum W. et M. Bot. Taschb.

H. pulchellum Brid. Bryol. univ. II, p. 484 p.p. ; C. M. *Syn.* II, p. 277 p.p.

H. pulchellum *var. nitidulum* Lesq. et Jam. Man. p. 364 ; Mac. Canad. M. n. 301.

Isopterygium nitidum Lindb. Man. M. II, p. 416.

Leskea nitidula Wahlenb. in W. et M. *op. cit.* p. 344.

Pl. nitidum Lindb. in Th. Fries Bot. *Notiz.* 1865, p. 145 et *Animadv.* p. 31.

Stereodon nitidulus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1864, p. 39 (in obs.).

1. Lignic., ad fol. putresc. in loc. humid. — *Eur.* : Reg. montana et subalp. ; Spitzberg, ins. Ursor. As. : Jenissei, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, fret. Davis, Anticosti, New York, Gaspes., Ontar., lac. Super., Washington.

var. pulchellum Hartm. — Pl. pulchellum.

(1) An idem ac H. Mülleri H. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 476 (nom.) ?

nitidum Lindb. — Pl. nitidulum.

noricum Mdo. — Pl. neckeroideum var. myurum.

novo-granatense (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 515.

Hypnum novo-granatense Hpe. in Linn. 1861-62, p. 531.

2. Lignic. et terr. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens.

orthocarpum (Hsch.) Mitt. M. austr. am. p. 521.

Hypnum orthocarpum Hsch. in Fl. III, p. 520 (sine diagn.); C. M. Syn. II, p. 253.

Isothecium orthocarpum Brid. Bryol. univ. II, p. 387 (nom. sol. memor.).

2. — Am. merid. : Chile.

orthocladum Bryol. eur. — Pl. silvaticum var. orthocladum.

paleacum (Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 518.

Leskea paleacea Wils. in sched.

Stereodon paleaceus Mitt. M. Ind. or. p. 103.

2. — As. : Sikkim.

passaicense Aust. in Bull. Torr. bot. Club, V, p. 24.

Hypnum latebricola Mac. Canad. M. n. 304.

H. passaicense Lesq. et Jam. Man. p. 363.

Pl. denticulatum var. laetum Aust. M. Appal. n. 362.

2. Ad arbor. et rup. — Am. sept. : New Jersey, Ontar., Columb. brit.

piliferum (Sw.) Bryol. eur. V (mon. p. 8), t. 496; W. P. Sch. op. cit. p. 692.

Hypnum denticulatum var. *Donianum* Hook. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 165.

Hypnum denticulatum var. *piliferum* Wahlenb. Fl. Succ. I ed., II, p. 710.

H. orthocarpon Ångstr. Disp. M. Scand. 1842, p. 2.

H. pulchellum Mac. Canad. M. n. 305 p.p.

H. trichophorum Spr. M. Pyr. n. 25 et in Ann. and Mag. of nat. hist. 1849, II ser., III, p. 276; C. M. Syn. II, p. 253; Mac. Canad. M. n. 305.

Leskea pilifera Sw. Summ. veg. p. 41.

Neckera pilifera Spr. M. Pyr. n. 66.

Pl. trichophorum Kindb. in Mac. Cat. p. 212.

1. Ad rup. umbros. præcip. vertic. vel excav. — Eur. : Scandin., Fennia, Pyren., Corsica, Apenn. Emil. As. : Jenissei sup. Am. sept. : Terr. nov., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Athabasca, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., fret. Behring, Washington, Oregon.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 632.

* var. *brevipilum* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 578 et II ed. l. c.

Ut typ. — Eur. : Norveg.

plumigerum C. M. in Dusen M. Camer. n. 121.

— Afr. : M. Cameroon.

pseudo-latebricola Kindb. in Mac. Cat. p. 211.

2. Lignic. — Am. sept. : Columb. brit.

pseudo-silesiacum W. P. Sch. in Proced. of the Am. Acad.... XIV, p. 140.

Hypnum pseudo-silesiacum Lesq. et Jam. Man. p. 370.

H. silesiacum H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed., n. 111.

1. — Am. sept. : Ohio, Montana.

Puiggarii Geh. et Hpe. mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 776.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

pulchellum (Dicks.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 9), t. 497; W. P. Sch. op. cit. p. 693.

Hypnum pulchellum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt. t.* 5, f. 6; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 454 (una cum *H. nitidulo*); *C. M. Syn. II*, p. 277 (ut *Brid.*)

H. rutilans Wils. *Bryol. brit.* p. 404 in obs.

H. Sendtnerianum C. M. op. cit. p. 394.

Isopterygium nitidum β *pulchellum* Lindb. *M. Scand.* p. 39.

I. pulchellum Jaeg. *Ad. II*, p. 507.

Leskea pulchella Hedw. *Sp. M.* p. 220, t. 55, f. 7-12.

Pl. nitidulum β *pulchellum* Hartm. *Skand. Fl. X ed.*

Pl. nitidum var. *suberectum* Lindb. in *Th. Fries Bot. Notiz.* 1865, p. 145 et *Animadv.* p. 34.

Stereodon pulchellus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 39.

1. Ad terr. humos. et in rup. fissur. — *Eur.*: Reg. alp., rar. subalp.: Scand., Sudet., Salisburg., Hercyn., Tirol., Helvet., Scot., Angl., Cambroval. As.: Jenissei. *Am. sept.*: Terr. nov., New Brunswick, Gaspes., Ontar., Athabasca, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., fret. Behring. *Pac.*: Nov. Zeland. med.?

Exs.: Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 167 (*Hypnum*).

Mac. *Canad. M.* n. 306 p.p. (*Hypnum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1021.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 530 (*Hypnum*).

Un. itin. 1863, n. 80.

pycnopteron (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 518.

Hypnum pycnopteron C. M. in sched.

— As.: Pegou.

radicisetum C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 515.

1. — *Am. merid.*: Guian. brit.

Regnellii Ångstr. in *Oefv....* 1876, p. 44.

2? — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

repens Lindb. — *Pl. silesiacum*.

robustum Jaeg. — *Hypnum*.

Roëseanum (Hpe.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 15), t. 504; W. P. Sch. op. cit. p. 699.

Hypnum Roëseanum Hpe. in sched.

H. Stereodon cavifolius Brid. *Bryol. univ. II*, p. 510.

Pl. silvaticum var. *cavifolium* Jur. in Rab. *Bryoth. eur.* n. 765.

Pl. silvaticum γ *Roesei* Lindb. in *Th. Fries Bot. Not.* 1865, p. 143.

Pl. Sullivantiae *Bryol. eur.*? (fid. Lindb., Spr.).

2. Ad terr. arenos. et arenac.-argill. in silvat. — *Eur.*: Thuring., Baden, etc.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 564 b, 843 et b, 1298 et b.

sandwicense Jaeg. — *Ectropothecium*.

Schimperi Jur. — *Pl. elegans*.

Schraderi (C. M.) Par.

Hypnum Schraderi C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 496.

2. — *Am. merid.*: Venezuela.

selaginelloides C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 390.

— *Afr.*: Austral.

Seligeri Lindb. — *Pl. silesiacum*.

silesiacum (Selig.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 12), t. 500; W. P. Sch. op. cit. p. 703.

Hypnum planifolium Brid. *Bryol. univ. II*, p. 411 (fid. C. M.).

- H. repens* Poll. Pal. III, p. 157.
H. Seligeri C. M. Syn. II, p. 259.
H. silesiacum Selig. mss.; W. et M. Bot. Taschb. p. 343.
H. silesianum P. B. Prodr. p. 70.
H. Stereodon silesiacus Brid. op. cit. p. 554.
Isopterygium repens Lindb. Man. M. II, p. 476.
Leskea Seligeri Brid. M. Rec. II, II, p. 47.
Pl. repens Lindb. Animadv. p. 36.
Pl. Seligeri ej. in Th. Fries Bot. Not. 1865, p. 44.
 1. Lignic, rar. ad rup. arenae. — Eur.: Fere tota in silv. montos.,
 præcip. aceros. As.: Japon., Caucas. occ. et centr. Am. sept.:
 Terr. nov., New Brunswick, Ohio, Washington.
Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 447, 690, 1297.
 Un. itin. 1866, n. 20.
silvaticum (Huds.) Bryol. eur. V (mon. p. 14), t. 503; W. P. Sch. op. cit.
 p. 700.
H. denticulatum C. M. Syn. II, p. 251 p.p.
H. denticulatum β *silvaticum* Turn. Muscol. Hibern. spicil. p. 146.
H. denticulatum pinnulatum, pinnulis rarioribus, simplicibus Dill. Hist.
 M. p. 267, t. 34, f. 6.
H. silvaticum Huds. Fl. Angl. I ed. p. 419; L. Mant. pl. II, p. 310.
H. Stereodon silvaticus Brid. Bryol. univ. II, p. 550.
 2. Ad rup. humid. et terr. argill., rar. lignic. — Eur.: Passim.
 As.: Japon., Saghalien, Jenissei sup., Caucas. occ. et centr.
 Afr.: Madeir. Am. sept.: New Brunswick, Gaspes., Ottawa,
 M. Selkirk, Columb. brit., reg. sept., or. et centr., Florida.
Exs.: Faurie Pl. Japon., n. 65.
 Mac. Canad. M. n. 313 (*Hypnum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 448, 1235.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 534 (*Hypnum*).
 Un. itin. 1866, n. 4.
var. cavifolium. Jur. — Pl. Roëseanum.
 « *var. nemorale* (Mitt.) Par.
Pl. nemorale Jaeg. Ad. II, p. 517.
Stereodon nemoralis Mitt. M. Ind. or. p. 104.
 Filicie. — As.: Japon., Sikkim.
 « *var. orthocladum* W. P. Sch. Coroll. p. 115 et op. cit.
Pl. orthocladum Bryol. eur. l. c. t. 504.
 Terr. — Eur.: Ubi typ. As.: Japon., Caucas. occ. Am. sept.: Ubi typ.
Exs.: Faurie Pl. Japon., n. 20.
var. Roesei Lindb. — Pl. Roëseanum.
 « *var. squarrosum* Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 279 et in
 Mac. Cat. p. 214.
 Terr. — Am. sept.: Columb. brit.
simostegium C. M. mss.
 — As.: Himalaya sept. occ. (Dehra Doun).
sphagnadelphus C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 388.
 Ster. — Afr.: C. B. Sp.
splendens W. P. Sch. — Pl. neckeroideum.
striatellum Lindb. — Pl. Muhlenbeckii.
subaequans (Hpe.) Par.
Hypnum brasiliense Hpe Symb. 1877, p. 731.

H. subaequans *ej. Enum. M. Brasil.* p. 71.

Pl. brasiliense *Jaeg. Ad. II*, p. 776.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subfalcatum *Aust. M. Appal. n.* 366 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 90, t. 67

Hypnum subfalcatum *Lesq. et Jam. Man.* p. 371.

Isopterygium subfalcatum *Jaeg. Ad. II*, p. 504.

Ster. In rup. fissur. — *Am. sept.* : M. New Jersey et New York.

subglaucum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 321

Ster. — *As.* : Ceylan.

subsimplex *Besch.* — *Rhaphidostegium*.

subsquarrosulum *C. M. mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occ. (Dehra Doun).

succulentum *Lindb.* — *Pl. denticulatum* *var. succulentum*.

Sullivantiae *Bryol. eur. V (mon. p. 16, nom.) (1).*

Hypnum silesianum *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 168 (*fid. Kindb.*).

H. Sullivantiae *Sull. M. of U. St. p. 80 et Ic. M. p. 207, t. 126 ; Lesq. et Jam. Man. p. 368.*

2. Ad terr. et rup. arenac. humid. — *Am. sept.* : Terr. nov., ins. Miquelon, Nov. Scotia, New Brunswick, Nov. Anglia, Ontar.,

M. Selkirk, ins. Vancouver, Washington, Wyoming, Ohio.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 312 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 535 (*Hypnum*).

taxirameoides *C. M. mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occ. (Dehra Doun).

tenerrimum *Ångstr.* — *Trichosteleum*.

trichophorum *Vent. et Bott.* — *Pl. piliferum*.

trichopodium *Kindb.* — *Pl. piliferum*.

turfaceum (*Lindb.*) *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 692 et II ed. p. 695.*

Hypnum turfaceum *Lindb. in Oef.* 1857, p. 124.

Isopterygium turfaceum *ej. Man. M. II*, 1874, p. 416.

Stereodon turfaceus *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 39.

1. In terr. turfes. — *Eur.* : Scandin., Fennia. *As.* Amour, Saghalien,

Jenissei sup. *Am. sept.* : Anticosti, ins. Miquel., Nov. Scot., New

Brunswick, M. Alb. et Allegh., New Jersey, Gaspes., Ottawa,

Ontar., Manitoba, Athabasca, Columb. brit. Washington.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 308 (*Hypnum*).

undulatum (*L.*) *Bryol. eur. V (mon. p. 17), t. 506 ; W. P. Sch. op. cit. p. 701.*

Hypnum pennatum, undulatum, Lycopodii instar sparsum *Dill. Hist. M. p. 271, t. 36, f. 11.*

H. undatum *Schrank Baiers Fl. II*, p. 480.

H. undulatum *L. Sp. pl. II ed., p. 1589 ; Bryol. univ. II*, p. 397 ; *C. M. Syn. II*, p. 257.

Leskea crispa *Schrank Prim. fl. Salisb. n.* 835.

Stereodon undulatus *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 39.

2. Ad terr. muscos. in ericet. silvarum. — *Eur.* : E reg. montosa usq. in subalp. *As.* : Sibir. *Am. sept.* : Columb. brit., Alaska, Sitka, ins. Vancouver, Washington, Oregon, Calif.

(1) « Forsan a *Pl. Roëseano* haud distincta spec. » (*Spr. in Lond. Journ. of bot.* 1885 et in *Rev. bryol.* 1881, p. 53 ; *Lindb. Animadv.* p. 29).

Exs. : Mac. Canad. M. n. 314 (*Hypnum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 296.

Un. itin. 1866, n. 67.

unilaterale C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 516.

Ster. — *Am. merid.* : Guian. brit.

Villae-Ricae Besch. Not. M. Parag. n. 271.

1. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1210 (1).

PLATYGYRIUM Bryol. eur. V (9 spec.).

amblyocarpum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 343.

Hypnum extenuatum ? (*fid. Mitt.*).

Leskea amblyocarpa *Hpe. in Linn.* 1859-60, p. 638.

— *Pac.* : Austral. fel.

aureum Sb. — *Cylindrothecium*.

brevifolium (*Wils.*) *W. P. Sch. mss.*

Pylaisaea brevifolia *Wils. in sched.*

P. decolor *Jaeg. Ad. II*, p. 372.

Stereodon brevitoli *Mitt. M. Ind. or.* p. 92.

2? — *As.* : Sikkim.

? denticulifolium C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Shen-Si).

ferricolum (*C. M.*) *Jaeg. l. c.* (false *Pl. brevicollum*).

Pterigynandrum ferricolum C. M. in *Linn.* 1875, p. 454.

2? Ster. Terr. — *Afr.* : Dar Fertit.

gautemaliense *W. P. Sch. mss.* ; *Jaeg. op. cit.* p. 342.

— *Am. sept.* : Guatemala.

inflexum (*Harv.*) *Jaeg. l. c.*

Hypnum inflexum *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 20 et in

Hook. Ic. pl. rar. t. 24 ; *C. M. Syn. II*, p. 430.

Stereodon inflexus *Mitt. M. Ind. or.* p. 92.

2. — *As.* : Nepal., Ava.

julaceum Bryol. jav. — *Erythrodontium squarrulosum*.

pertenue Sande Lac. *Spec. nov. M. Archip. ind.* p. 12.

2. Ster. Ad arbor. — *As.* : Java.

repens (*Brid.*) *Bryol. eur. V*, t. 458 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 622.

Anomodon repens *Hüb. Muscol. germ.* p. 558.

Anomodon repens β majus de *Not. Syll. n.* 10.

Bruchia repens *Hsch. in Bot. Zeit.* 1825, II, Beil. p. 10.

Cylindrothecium repens de *Not. Epil.* p. 214.

Entodon palatinus *Lindb. M. Scand.* p. 39.

Hypnum palatinum *Neck. in Act. Acad. Theod. palat. II*, p. 454 excl. syn.,

t. 4, f. I (*fid. Lindb.*).

Isothecium repens *Spr. in Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849, M. Pyr.

n. 92.

Leptohyemium repens *Hpe. in Linn.* 1835-36, p. 83.

Leskea repens *Hartm. Skand. Fl. V ed.*, p. 340.

(1) In Enumer Kindberg. nom :
Pl. helvolum C. M.

- Maschalocarpus repens* Spreng. *Syst. veg.* IV, I, p. 159.
Neckera repens Schwaegr. *Suppl.* III, I, p. 2, t. 246; *C. M. Syn.* II pp. 87 et 666.
N. sericea Froehl. in *Brid. Sp. M.* II, p. 40; *Drumm. M. bor. am.* I ed n. 159.
Pl. repens var. *orthocladon* Mac. *Canad. M.* n. 259 p.p.
Pterigynandrum repens Brid. *Bryol. univ.* II, p. 183.
Pterogonium intricatum Drumm. *M. bor. am.* I ed. p. 75
Pt. repens Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 100, t. 27.
 2. *Ad arbor. silvat., praepr. Pin. et Betul., tecta stramin., rar. sax. — Eur. : Planit. et reg. campestr. As. : Jenissei sup., Persia, Caucas. occ. et centr. Afr. : Alger. Am. sept. : New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontar., M. Rupestr., reg. septr., occid., or., centr. et merid.*
Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 98.
Rab. Bryoth. eur. n. 4 b et c, 990.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 385.
 « *var. gemmiclada* Limpr. *Laubm. Deutschl.* III, p. 8.
Ut et ubi typ. in Eur. :
 « *var. orthocladon* Kindb. in *Mac. Cat.* n. 172.
Lignic. — Am. sept. : Ottawa.
 « *var. rupestris* Milde in *sched. ; Limpr. Kryptfl. Schles.* I, p. 93.
Ad rup. arenac. et granit. — Eur. : Harz, Tirol.
 « *var. sciuroides* (Saut.) Limpr. *Laubm. Deutschl.* III, p. 7.
Isothecium repens var. sciuroides Saut. in *Breutel M. frond. exs.* n. 296.
Ad tecta straminea. — Eur. : Salisburg., etc.
rupestre Kindb. — *Tripterocladium.*
russulum (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 342.
Stereodon russulus Mitt. *M. Ind. or.* p. 94.
 2? — *As. : Nepal. or., Sikkim.*
squarrulosum Jaeg. — *Erythrodontium.*
stramineum Sb. — *Leptohymenium.*
subjulaceum Jaeg. — *Erythrodontium.*

PLATY-HYPNUM Hpe. *Moosbild.* p. 18.

nitidulum Hpe. — *Isopterygium norfolkianum.*

PLATYLOMA Kindb. *Check-list of Eur. and N. Am. M.* p. 22.

Lescurii Kindb. — *Amblystegium.*

Platyphyllum *C. M. Syn.* I, p. 247 (sect. *BRYI*).

Platysphagnum *C. M. in Linn.* 1874, p. 546 (nom.) et in *Fl.* 1887, p. 404
 (*SPHAGNA CYMBIFOLIA*).

Platystoma *C. M. Syn.* I, p. 776 (sect. *GRIMMIAE*).

Platystomium *C. M. Syn.* II, p. 649 (sect. *GUMBELIAE*).

PLAUBELIA Brid. *Bryol. univ.* I, p. 522.

canariensis Brid. — *Leucodon.*

tortuosa { Brid. — *Trichostomum Berteroanum.*
 { Br. — *Trichostomum mutabile.*

PLEURIDIOPSIS Par. (2 spec.).

amblyocalyx (C. M.) Par.

Astomiopsis amblyocalyx C. M. in Linn. 1880-83, p. 391.

1. — Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.

subulata (C. M.) Par.

Astomiopsis subulata C. M. in op. et l. cc.

1? — Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.

PLEURIDIUM Brid. Bryol. univ. II, p. 160 emend (23 spec.).

acuminatum Lindb. — Pl. subulatum.

alternifolium Brid. Bryol. univ. II, pp. 161 et 769 ; Bryol. eur. V (mon. p. 15), t. 10 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 26.

Astomum alternifolium Hpe. in Linn. 1832, p. ; C. M. Syn. I, p. 14 et II, p. 518.

Phascum alternifolium Dicks. Fasc. I Pl. crypt. p. 2, t. I, f. 2.

Ph. subulatum Hedw. Stirp. t. 25.

Pl. subulatum Lindb. in Oefv. Vet. Akad. Foerh. 1863, p. 408.

Pl. Toepferi Ortel in Deutsch. bot. Monatsschr. 1884, p. 3.

1. In terr. argill. arenac. et argill. — Eur. : Zon. intermed. tota, in sept. passim. As. : Caucas. occ. Am. sept. : Reg. or. et centr.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 153.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 36.

« var. Howei Ren. et Card. in. Rev. bryol. 1893, p. 30.

Terr. — Am. sept. : Calif.

« var. lancastriense Sull. M. bor. am. II ed. p. 9 ; Lesq. et Jam. Man. p. 44.

Ut typ. — Am. sept. : Ohio.

Exs. : Sull. et Lesq. l. c. n. 37.

« var. robustum Sull., Lesq. et Jam. ll. cc.

Archidium Lescurii Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 144.

Ut typ. — Am. sept. : Alabama.

Exs. : Sull. et Lesq. l. c. n. 38.

Arnoldii (R. Br.) Par.

Phascum Arnoldii R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1893, p. 303.

Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

axillare Lindb. — Pl. nitidum.

Bolanderi C. M. mss. ; Jaeg. M. cleist. p. 32 ; Lesq. et Jam. Man. l. c.

1. — Am. sept. : Calif. ; Kansas ?

brachycaulon (C. M.) Par.

Astomum brachycaulon C. M. in Fl. 1888, n. 1.

1. Terr. — Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.)

Breutelium (Hpe.) Jaeg. M. cleist. l. c. et Ad. I, p. 222.

Astomum Breutelium Hpe. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 97.

1. — Afr. : C. B. Sp.

caldense Lindb. mss. ; Ångstr. Prim. lin. p. 3 (nom.).

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

denticulatum (C. M.) Mitt. M. Ind. or. p. 7.

Astomum denticulatum C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 18.

1. — As. : M. Neilgherr.

- exiguum (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. M. cleist.* p. 31 et *Ad. I*, p. 221.
Astomum Krauseanum *Hpe. mss.*; *C. M. Syn. I*, p. 16.
Bruchia exigua *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 99.
Phascum exiguum *H. f. et W. in Hook. Ic. pl. rar. t.* 737 B.
 l. — *Fac.*: Austral. or.
- globiferum *Brid. Bryol. univ. II*, p. 162.
Astomum globiferum *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 98 et *Syn. I*, p. 16.
 Terr. — *Afr.*: Ins. Franciae (*fid. Brid.*).
- gracilentum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 65 et in *Fl. Tasm. II*, p. 164, t. 171, f. 3.
 l. — *Pac.*: Fret. reg. Georg., Austral., Tasman.
- lanceolatum (*R. Br.*) *Par.*
Phascum lanceolatum *R. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 302.
 Terr. — *Pac.*: Nov. Zeland.
- longifolium (*R. Br.*) *Par.*
Phascum longifolium *R. Br. in op. cit.* p. 308.
 Terr. — *Pac.*: Nov. Zeland.
- nervosum (*Hook.*) *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 58.
Astomum nervosum *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 98 et *Syn. M. I*, p. 15 p.p.
Phascum nervosum *Hook. M. ex. t.* 105.
Ph. curvulum *Tayl. in M. Drummond (fid. Wils.)*.
 l. Ad terr. argill. — *Afr.*: C. B. Sp. *Pac.*: Austral. or., Nov. Zeland.
Exs.: *Rehm. M. Afr. austr. n.* 462 et b.
- nervosum* *Sull.* — *Pl. Sullivantii*.
- nitidum (*Hedw.*) *Brycl. eur. I* (mon. p. 12), t. 9; *W. P. Sch. op. cit.* p. 24.
Astomum axillare *Hpe. in Linn.* 1838, p. 533.
A. nitidum *Hpe. in Linn.* 1832, p. ; *C. M. Syn. I*, p. 17 et *II*, p. 518.
Ephemerum nitidum *Hpe. in Fl.* 1837, p. 285.
Phascum axillare *Dicks. Fasc. I Pl. crypt. p. 2, t. I; Brid. Bryol. univ. I*, p. 35.
Ph. nitidum *Hedw. Stirp. I, t. 34 et M. frond. I, p. 92, t. 34; Brid. op. cit. pp. 35 et 755.*
Ph. stagninum *Wallr. in Linn.* 1840, p. 680.
Ph. strictum *Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. t. 10, f. I; Brid. op. cit. p. 34.*
Pl. axillare *Lindb. M. Scand. p. 27.*
 Syn. In terr. argill. et stagn. exsicc. — *Eur.*: Fere tota. *Afr.* Alger.
Exs.: *Rab. Bryoth. eur. n.* 403.
- « *var. bulbilliferum* *Besch. in Husn. Muscol. gall. p. 66.*
 Ut typ. — *Eur.*: Gall. centr. et occ.
- Pappeanum (*C. M.*) *Jaeg. M. Cleist. p. 31 et Ad. I*, p. 221.
Astomum Pappeanum *C. M. Syn. I*, p. 15.
 l. Terr. — *Afr.*: C. B. Sp.
- Ravenelii *Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VI*, p. 142; *Lesq. et Jam. Man. p. 48.*
 Syn. Ad terr. arenos. — *Am. sept.*: Nov. Angl., New Jersey, Carol. merid.
- Robinsoni (*Mont.*) *Mitt. M. austr. am. p. 26.*
Astomum nervosum *C. M. Syn. I*, p. 15 p.p.
A. Robinsoni ej. in Bot. Zeit. 1856, p. 415.
Phascum Robinsoni *Mont. in Ann. sc. nat. IV, II ser., p. 96.*
 l. — *Am. merid.*: Brasil., Monte-Video, Chile, ins. Juan Fernandez.

stramineum Aust. -- Pl. *subulatum* var. *stramineum*.

subnervosum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 660.

Astomum subnervosum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 351.

2. — *Am. merid.* : Uruguay.

subulatum (L.) *Bryol. eur. I* (mon. p. 15), t. 9; W. P. Sch. *op. cit.* p. 25.

Astomum subulatum Hpe. in *Linn.* 1832, p. ; C. M. *Syn. I*, p. 14 et *II*, p. 518.

Bryum ericetorum Neck. *Meth. M.* p. 231.

Phascum acuminatum Lindb. in *Hartm. Skand. Flor. IX ed. II*, p. 78.

Phascum acuminatum L. *Sp. pl.* p. 1570; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 37.

Pl. *acuminatum* Lindb. in *Oefv. Vet. Akad. Foebr.* 1863, p. 406.

Sphagnum acaulon trichodes Dill. *Hist. M.* p. 251, t. 32, f. 10.

Syn. In terr. argill. et ad silv. marg. — *Eur.* : Temperat. tota., rar. in sept. *As.* : China or. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : *Rar.* : Pensilv., Calif.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. II ed. n. 7* (*Phascum*).

Rab. *Bryoth. eur. n. 152*.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n. 39*.

« var. *stramineum* (Aus.) Lesq. in *Lesq. et Jam. Man.* p. 43.

Pl. *stramineum* Aust in *Bull. Torr. bot. Club, VI*, p. 142.

Pl. *subulatum* Lesq. in *Trans. of the Am. Phil. Soc. XIII*, p. 2.

Pl. *subulatum* var. *Watson Bot. calif. II*, p. 359.

Ut et ubi typ. in *Am. sept.* :

subulatum { Lesq. — Pl. *subulatum* var. *stramineum*.
Lindb. — Pl. *alternifolium*.

var. Wats. — Pl. *subulatum* var. *stramineum*.

Sullivantii Aust. in *op. et l. cc.*

Ph. *nervosum* Drumm. *M. bor. am. II ed. n. 6*; Sull. *M. of U. St.* p. 16.

Pl. *nervosum* Sull. *Id. M.* p. 19, t. 10, f. 1-17.

1. Ad terr. arenac. — *Am. sept.* : Pensilv., Carol. merid.

tenellum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1895, p. 65.

1. — *Pac.* : Tasman.

tenue (Wils.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 7.

Phascum tenue Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 290.

— *As.* : Sikkim.

Toepferi Ortel. — Pl. *alternifolium*.

viride (C. M.) Par.

Astomum viride C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

1. Terr. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

PLEUROCHÆTE Lindb. in *Oefv...* XXI.

Spec. omnia sunt BARBULÆ ejusd. nom.

PLEUROPHASCUM Lindb. in *Lond. Journ. of bot.* 1875 et in *Rev. bryol.* 1876, p. 29 (1 spec.)

grandiglobum Lindb. *ll. cc.*

— *Pac.* : Tasman.

PLEUROPUS Griff. *Not. ad pl. Asiat. II*, p. 467 (1849).

densus Griff. — *Cylindrothecium aureum*.

dentatus Griff. — *Leptohymenium*.

fenestratus Griff. — *Orthothecium neilgherriense*.
pterogonioides Griff. — *Rozea*.

PLEUROWEISIA *Limpr. in Jahresb. d. Schles. Gesells. 1884, p. 224.*
Schliephackei Limpr. — *Anoectangium*.

PLEUROZIOPSIS *Kindb. Check-List of Eur. and N. Amer. M. p. 19.*
alaskana Kindb. — *Hypnum*.
prolifera Kindb. — *Hylocomium splendens*.
ruthenica Kindb. — *Climacium*.
triquetra Kindb. — *Hylocomium*.

PLEUROZIUM *Sull. M. of U. St. p. 68; Kindb. op. et l. cc.*
 Spec. omn. non indicatae sunt *HYLOCOMIA* ejusd. nom.
calvescens Kindb. — *Hylocomium squarrosum* var. *subpinnatum*.
flagellare Kindb. — *Hyocomium*.
megaptilon Kindb. — *Camptothecium*.
meridionale Kindb. — *Eurhynchium striatum* var. *meridionale*.
purum Kindb. — *Hypnum*.
pyrenaicum Kindb. — *Hylocomium Oakesii*.
Schreberi Sull. *Hypnum*.
striatum Kindb. — *Eurhynchium*.

PLEUROZYGODON *Lindb. M. Scand. p. 29.*
aestivus Lindb. — *Anoëctangium compactum*.

Plicaria *C. M. Syn. II, p. 454 (subsect. HYPNI).*

Plicatella *C. M. Syn. I, p. 487 (sect. BARTRAMIÆ).*

Plumatella *C. M. in Fl. 1896, p. 463 (sect. PAPILLARIÆ).*

Plumosaria *Kindb. Check-List. of Eur. and N. Amer. M. p. 73*
 (sect. *BRACHYTHERII* sensu *Kindb.*).

PŒCILOPHYLLUM *Mitt. M. austr. am. p. 92.*
 Spec. omn. sunt *LEUCOLOMATA* ejusd. nom.

POGONATUM *P. Beauv. Prodr. p. 84 (156 spec.).*

abbreviatum *Mitt. M. austr. am. p. 615.*
 — *Am. merid. : And. Nov. Granat.*

afro-aloides (*C. M.*) *Par.*

Polytrichum afro-aloides *C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 204.*
 — *Afr. : Madagascar.*

akitense *Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 354.*

2. — *As. : Japon.*

Exs. : Faurie Pl. Japon. 1 et 1425.

albo-marginatum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 728.*

Polytrichum albo-marginatum *C. M. in Linn. 1874, p. 172.*

2. — *As. : M. ins. Philippin.*

albo-vaginatum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 718.*

Polytrichum albo-vaginatum *Hpe. in Bot. Zeit. 1870, p. 51.*

2. — *Am. sept. : Mexic.*

aloides (*Hedw.*) *P. B. Prodr. p. 84; Brid. Bryol. univ. II, p. 119;*
Bryol. eur. IV (mon. p. 6), t. 416; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 535.

Catharinea alsides *Roehl. Moosges. Deutsch. p. 192.*

- Mnium polytrichoides* β L. *Sp. pl.* p. 1576.
Mnium polytrichoides var. *longifructu* Ehrh. in *Hann. Mag.* 1780, p. 236.
P. aloides β *dicarpon* Brid. *op. cit.* p. 121.
P. aloides δ *rubellum* ej. l. c.
Polytrichum aloëfolium var. 1 et 2 Scop. *Fl. Carn.* p. 134, n. 1.
P. aloides Hedw. *M. frond.* I, p. 37; *C. M. Syn.* I, p. 202.
P. mnioides Neck. *Meth. M.* p. 128.
P. nanum Weiss. *Crypt. Goett.* p. 173.
P. parvum Aloes folio serrato capsulis oblongis Dill. *Hist. M.* p. 429, t. 55, f. 7.
P. rubellum Menz. in *Trans. of the Linn. Soc.* IV, p. 79, t. 7, f. 3; Brid. *Mant. M.* p. 201.
P. subrotundum β Huds. *Fl. Angl.* p. 400.
 2. In ericet. arid., ad vias silvat., etc. Eur.: Vulgatiss. As.: Japon., China, Kamschatka, Khasia, Tibet occ., Himalaya, Nepal., Bengal., M. Neilgherr., Ceylan, Caucas. Afr.: Alger., Madeir., Canaries.
Exs.: Mandon Pl. Madeir. n. 27.
 Rab. Bryoth. eur. n. 116, 1136.
 « var. *defluens* Brid. *op. cit.* 121; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 439 et II ed. l. c.
 P. aloides ϵ *Dicksoni* Brid. *op. et l. cc.*
 P. aloides β *minus* Wils. *Bryol. brit.* p. 207; *Bryol. eur.* l. c.
 Polytrichum aloides β *defluens* C. M. *Syn.* II, p. 203.
 P. aloides β *Dicksoni* Hook. et Tayl. *Muscol. brit.*
 P. aloides β et δ Mart. *Fl. crypt. Erlang.* p. 81.
 P. defluens Brid. *Mant. M.* p. 200.
 P. Dicksoni Turn. *Muscol. Hibern.* p. 90, n. 13.
 P. laterale Crome in Hoppe *Taschb.* III.
 P. minimum ej. in *op. cit.* p. 108 et Landm. *Samml.* p. 48, n. 30.
 P. nanum Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 24 (in obs.).
 P. nanum var. *Dicksoni* Lindb. in *Notiz.* 1867, p. 140.
 P. nanum var. *minimum* ej. l. c.
 Ad foss. et viar. cav. latera. — Eur.: Ut typ.
 Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 811.
 var. *dicarpon* Brid. — *P. aloides*.
 var. *Dicksoni* Brid. — *P. aloides* var. *defluens*.
 « var. *longicolla* Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 192.
 — As.: Japon.
 « var. *magna* (C. M.) Par.
 Polytrichum aloides var. *magna* C. M. l. c.
 In limos. silvestr. — Eur.: Enipont.
 var. *minus* Bryol. eur. — *P. aloides* var. *defluens*.
 var. *rubellum* Brid. — *P. aloides*.
 var. γ Schwaegr. — *P. oligodus*.
aloides { Duby. — *P. Subtortile*.
 { Sande Lac. — *P. inflexum*.
alpinum (L.) Roehl. in *Ann. Wett. Ges.* III, p. 226 et *Deutsch. Fl.* III, p. 59; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 129; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 9), t. 418; W. P. Sch. *op. cit.* p. 538.
 Catharinea alpina Roehl. *Moosg. Deutsch.* p. 184.
 P. ambiguum P. B. *Prodr.* p. 84 (fid. W. P. Sch.).
 P. norvegicum ej. l. c. (excl. syn. *P. Ederi* Brid.).
 Polytrichum alpinum L. *Sp. pl.* p. 1573; C. M. *Syn.* I, p. 210; Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 282.
 P. austro-alpinum F. v. Müller (fid. Mitt.).
 P. alpinum α *ciliatam* Retz *Fl. Scand. Prodr.* II, p. 209, n. 1196.

P. alpinum ramosum, capsulis summitate ellipticis *Dill. Hist. M. p. 427, t. 55, f. 4.*

P. ferrugineum *Brid. Sp. M. I, p. 61.*

P. norvegicum *Hedw. Sp. M. 99, t. 22, f. 1-5.*

P. urnigerum β *Huds. Fl. Angl. p. 400.*

2. In petros. abrupt. gramin. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. *As.* : Septentr. tota, *Caucas. Afr.* : Ins. Kerguelen. *Am. sept.* : Groënland, Labrador, sin. Baffin, Terr. nov., New Brunswick, Gaspes., Ontar., lac. Super., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., mar. Behring, fret. Kotzebue, Sitka, Vancouver, Idaho, reg. septr., occ., or. et centr. *Pac.* : Austral. felix, Nov. Zeland., Tasman.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 220.

Rab. Bryoth. eur. n. 284.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 320.

Un. itin. 1867, n. 79.

« *var. arcticum* (Sw.) *Brid. Bryol. univ. II, p. 131* ; *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

P. ambiguum *P. B. Prodr. p. 84 (fid. Lindb.).*

P. arcticum *Roehl. in Ann. Wett. Ges. III, p. 226.*

P. Pylaisaei *Brid. op. cit. p. 744.*

Polytrichum alpinum β *angustifolium* *Lindb. in Not. 1867, p. 130.*

Polytrichum alpinum β *arcticum* *Wahlenb. Fl. Suec. I ed., II, p. 738.*

Polytrichum alpinum γ *cylindricum* *Lindb. l. c.*

Polytrichum alpinum β *silvaticum* *ej. M. Scand. p. 12.*

P. ambiguum *Mich. Fl. Am. bor. II, p. 29* ; *Brid. Sp. M. I, p. 62.*

P. arcticum *Sw. M. Suec. p. 76 et 109, t. 8, f. 17.*

P. silvaticum *Menz. in Trans. of the Linn. Soc. IV, p. 83, t. 7, f. 6.*

Ut typ. — *Eur.* : Alp. editiss. et zon. arctic. : Spitzberg, ins. Parry, Ursorum. *Am. sept.* : Groenland, Terr. nov., Unalaska.

« *var. brevifolium* (R. Br.) *Brid. op. et l. cc.* ; *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 441 et II ed. l. c.*

P. alpinum δ *campanulatum* *Bryol. eur. l. c.*

P. campanulatum *Brid. op. cit. p. 133.*

Polytrichum alpinum β *brevifolium* *C. M. l. c.*

P. alpinum δ *campanulatum* *ej. l. c.*

P. brevifolium *R. Br. Suppl. App. ad it. Parry. p. 494.*

P. campanulatum *Hsch. Hor. phys. Berol., p. 67, t. 13 (?)*

Ut et ubi praeced. in *Eur. et Am. sept.*

var. campanulatum *Bryol. eur.* — *P. alpinum var. brevifolium.*

« *var. furcatum* (*Brid.*) *Par.*

P. furcatum *Brid. Bryol. univ. II, p. 133.*

Polytrichum alpinum var. furcatum *C. M. l. c.*

P. furcatum *Hsch. in op. et l. cc.*

Ut praeced. — *Am. sept.* : Arctic. occ.

« *var. microdontium* *Kindb. in Ott. Nat. V et in Mac. Cat. p. 152.*
— *Am. sept.* : Mar. Behring.

« *var. septentrionale* (Sw.) *Brid. Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

P. septentrionale *Roehl. in Ann. Wett. Ges. III, p. 226 et Fl. Deutsch. III, p. 58.*

P. norvegicum *P. B. Prodr. p. 84 (fid. Lindb.).*

Polytrichum alpinum β *laeve* *Retz Fl. Scand. Prodr. II, p. 299.*

P. hyperboreum *Wahlenb. Fl. Lapp. p. 347 (fid. Lindb.).*

P. Oederi *Brid. M. Rec. II, 1, p. 99, n. 76 (fid. Lindb.).*

P. ramosum *Æd. Fl. Dan. II, fasc. V, p. 9, n. 297* ; *Gunn. Fl. Norveg. II, p. 814.*

- P. septentrionale* Sw. *M. Suec.* pp. 77 et 107, t. 9, f. 18 p.p.; *C. M. Syn.* I, p. 223; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 283.
- P. sexangulare* Angstr. in *Fr. Summ. veg. Scand.* I, p. 90, n. 7 (p p. ?).
- Ubi praeced. — *Eur.*: Alp. editiss. et reg. arctic. *As.*: Caucas. *Am. sept.*: Groenland, M. Rupestr., mar. Behring.
- “ *var. simplex* W. P. Sch. *Coroll.* p. 91 et *Syn.* II ed. p. 539.
- Ut praecedent. — *Eur.*: Alp. Norveg. (Dovre), Island. *Am. sept.*: Groenland.
- ambiguum* P. B. } (fid. Lindb.). — *P. alpinum var. arcticum.*
 } (fid. W. P. Sch.). — *P. alpinum.*
- andinum* (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 615.
- Polytrichum andinum* Hpe. in *Linn.* 1863, p. 147.
- *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
- angolense* (Welw. et Duby) Par.
- Polytrichum angolense* W. et D. in *Mém... Genève*, 1870, p. 3, t. I, f. 2.
- In pascuis humid. — *Afr.*: Angola.
- arcticum* Roehl. — *P. alpinum var. arcticum.*
- arcuatum* Mitt. *op. cit.* p. 617.
- *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
- asperrimum* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 355.
2. — *As.*: Japon.
- Exs.*: Faurie Pl. Japon. n. 1884 p.p.
- atro-virens* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 49.
- *Am. sept.*: Columb. brit., Sitka.
- australasicum* (Hpe. et C. M.) Jaeg. *Ad.* I, p. 718.
- Polytrichum australasicum* Hpe. et C. M. in *Linn.* 1853, p. 500.
2. Ad terr. umbros. — *Pac.*: Austral. or. subtropic., Nov. Zeland., Tasman.
- austro-alpinum* (C. M.) Par.
- Polytrichum austro-alpinum* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 12.
- Ster. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.
- austro-georgicum* (C. M.) Par.
- Polytrichum austro-georgicum* C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 13.
- *Am. merid.*: Austr. Georgia.
- Baldwini* (C. M.) Par.
- Polytrichum Baldwini* C. M. in *Fl.* 1896, p. 439.
- P. Junghunii* Sull. in *Exped. Wilkes*, p. 92 (fid. C. M.).
2. — *Pac.*: Ins. Sandwic.
- barbanum* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, II, p. 170.
2. — *Am. sept.*: Costa Rica.
- Belangeri* (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 109.
- Catharinea intermedia* Belanger Voy. Ind. or. Bot. II, *Crypt.* p. 101, t. 11, f. 3.
- Polytrichum Belangeri* C. M. *Syn.* I, p. 222 et II, p. 564.
2. Ad terr. lapidos. — *Afr.*: Ins. Francise.
- Bernoullii* (C. M.) Par.
- Polytrichum Bernoullii* C. M. in *Bull. hb. Boissier*, p. 178.
- *Am. sept.*: Guatemala.

Bescherellei Hpe. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 63.
In silvis. -- *Am. sept.* : Mexic.

Bisseti (C. M.) Par.

Polytrichum Bisseti C. M. mss.

— *As.* : Japon.

Borgeni (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 717.

Polytrichum Borgeni Hpe. in *Bot. Zeit.* 1870, p. 35.

2. — *Afr.* : Natal.

brachyphyllum P. B. *Prodr.* p. 84; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 113; *Lesq. et Jam. Man.* p. 261.

P. vaginans Brid. *Sp. M. I*, p. 68.

Polytrichum brachyphyllum Rich. in *Mich. Fl. Am. bor. II*, p. 295;
C. M. Syn. I, p. 204; *Sull. Ic. M.* p. 77, t. 48.

2. Terr. — *Am. sept.* : New Jersey, Pensilv., Carol., Georg., Alabama,
Ludovic.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 69.

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 211 et II ed. n. 317.

brachythecium Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 109.

— *Afr.* : Ins. Bourbon.

brasiliense Jaeg. — *Polytrichum*.

brevicaule P. B. — *P. pensilvanicum*.

breviurnaceum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 129.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Briosianum R. Farnetti *M. d. prov. Pavia, III cent.*, p. 27, t. 26, f. 2-13.
2. In calcar. irror. — *Eur.* : Ital. super. (Pavia).

Camerae (C. M.) Par.

Polytrichum Camerae C. M. mss.

— *Pac.* : Austral. or. (Queensland, Nov. Vales.).

campanulatum Brid. — *P. alpinum* var. *brevifolium*.

camptocaulon (C. M.) Par.

Polytrichum camptocaulon C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. Ad terr. arenac. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

campylocarpum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 618.

Polytrichum campylocarpum C. M. *Syn. I*, p. 209 et *II*, p. 503.

2. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : Columb.

see p. 979 { *catharinelloides* (C. M.) Par.

Polytrichum catharinelloides C. M. mss.

— *As.* : Barman. (Tenasserim).

capense (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 711.

Polytrichum capense Hpe. *Ic. M. t.* 21; *C. M. Syn. I*, p. 203.

— *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 573.

capillare (Rich.) Brid. *Bryol. univ. II*, p. 127; *Sull. M. Allegh.* n. 115
et *Ic. M.* p. 79, t. 49; *W. P. Sch. op. cit.* p. 536.

P. intertextum la Pyl. in *Brid. op. cit.* p. 742.

P. longidens Angstr. in *Theden. Nya. bot. Not.* 1852; *W. P. Sch. Syn. I*
ed., p. 441.

P. yuccaeifolium P. B. *Prodr.* p. 85.

Polytrichum capillare Rich. in Mich. Fl. bor. am. II, p. 294; Wahlenb. Fl. Lapp. p. 347; C. M. Syn. II, p. 127.

P. urnigerum C. M. op. cit. p.p.; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 284 p.p.

P. urnigerum β *capillare* Wahlenb. Fl. Suec. I ed., II, p. 739.

2. Ad terr. denudat. sec. fluvios in silvat. — Eur.: Lapon. tota, Suecia, Fennia. As.: Jenissei inf., Amour. Am. sept.: Groenland, Terr. nov., ins. Miquel., M. Alb., Adirondack et Rupestr.

Ews.: Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 318.

“ *var. minus* (Wahlenb.) Par.

P. longidens Ångstr. in op. et l. cc. (fid. Lindb.).

Polytrichum capillare β *minus* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 348.

P. urnigerum β *capillare* Hartm. Skand. Fl. III ed., p. 286.

Ut typ. — Eur.: Lapon., Suecia.

Carionis (C. M.) Par.

Polytrichum Carionis C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 177.

— Am. sept.: Guatemala.

circinatum Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 220.

Ad. terr. argill. — Pac.: Nov. Caledon.

cirratum Brid. — *P. convolutum* *var. cirratum*.

clavatum (Dz. et Mk.) Bryol. jav. I, p. 40, t. 30.

Polytrichum clavatum Dz. et Mk. in Pl. Jungh. p. 326.

2. — As.: M. Java.

comosum W. P. Sch. hb.

Polytrichum comosum C. M. Syn. II, p. 561.

— Am. sept.: Mexic. (M. Orizaba).

consobrinum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, II, p. 171.

2. — Am. sept.: Costa Rica.

contortum (Menz.) Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 27; Sull. Ic. M. Suppl. p. 58, t. 42, Lesq. et Jam. Man. p. 262.

P. dentatum Lesq. in Mem. l. c. p.p.

P. laterale Brid. Bryol. univ. II, p. 112.

Polytrichum contortum Menz. in Trans. of the Linn. Soc. IV, p. 78, t. 7, f. 2; C. M. Syn. I, p. 215 et II, p. 563.

2. Ad terr. argill. in silvat. — As.: Saghalien. Am. sept.: M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, Calif.

“ *var. pallidum* (Lindb.) Par.

Polytrichum contortum *var. pallidum* Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 239.

— As.: Saghalien.

contortum Mac. — *P. erythrodontium*.

convolutum (L.) Brid. Bryol. univ. II, p. 110.

Polytrichum convolutum L. f. Mant. M. p. 374, t. 4, f. 2; C. M. Syn. I, p. 213 et II, p. 563.

P. pachyneuron Hpe. in Linn. 1847, p. 80.

2. — As.: Java. Afr.: Ins. Borbon.

“ *var. cirratum* (Sw.) Par.

P. cirratum Brid. op. et l. cc.; Bryol. jav. I, p. 44, t. 34.

Polytrichum cirratum Sw. in Schrad. Bot. Journ. IV, p. 176, t. 4? (cf. C. M. l. c.).

P. convolutum β *cirratum* C. M. l. c.

P. leucomitrium Hsch. in *Nov. Act. Caes. Leop. XIV Acad., II, Suppl.* p. 732.

— *As.* : Java, Borneo. *Afr.* : C. B. Sp.? *Pac.* : Ins.

Sandwic.

convolutum P. B. p.p. — *P. tortile*.

crispulum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 37.

Terr. — *Am. sept.* : Guadalup.

cubense Sull. — *P. tortile*.

cucullatum (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 613.

Polytrichum cucullatum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 348.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

cuspidatum Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 62.

2. In silvis. — *Am. sept.* : Mexic.

cylindricum W. P. Sch. in Besch. *op. cit.* p. 67.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

dendroides Brid. — *Polytrichadelphus*.

dentatum (Menz.) Brid. *Bryol. univ.* II, pp. 122 et 744; Sull. *lc. M. Suppl.* p. 57, t. 41; Lesq. et Jam. *Man.* p. 261.

P. urnigerum Mac. *Canad. M. n.* 219 p.p.

Polytrichum capillare var. *dentatum* Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 266.

P. capillare var. *oxycalyx* ej. in *Bot. Not.* 1867, p. 137.

P. dentatum Menz. in *Trans. of the Linn. Soc. IV*, p. 80, t. 7, f. 4; C. M. *Syn. I*, p. 208.

P. urnigerum W. Arn. *Disp.* p. 71; Drumm. *M. bor. am. I ed.*, n. 284.

2. Terr. — *As.* : Saghalien, Amour. *Am. sept.* : M. Rupestr. et Selkirk. Alaska, litt. mar. Behring.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 544.

ericifolium Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 66.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

erythrodontium Kindb. in *Mac. Cat.* p. 150.

P. contortum Mac. *Canad. M. n.* 430.

Polytrichum erythrodontium Kindb. in *Bidrag*, p. 453 (nom.).

2. In silv. humid. — *Am. sept.* : Alaska, Vancouver.

fasciculatum P. B. — *P. urnigerum*.

fastigiatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 154.

— *As.* : Himalaya.

Feae C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601 (nom.).

— *As.* : Barman. super.

flexicaule Mitt. *M. Ind. or.* p. 152.

Ster. — *As.* : Assam, Alp. Yunnan.

flexibilifolium C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 18.

— *Afr.* : M. Cameroon.

furcatum Brid. — *P. alpinum* var. *furcatum*.

fuscum Mitt. *op. cit.* p. 154.

— *As.* : Himalaya, Nepal., Khasia.

Gardneri (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 714.

Polytrichum brevicaule Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 47.

- P. Gardneri* C. M. *Syn.* II, p. 560.
P. pensilvanicum H. f. et W. in *Gardn. M. Brasil.* n. 15; C. M. *Syn.* I, p. 205 p.p.
 2. Terr. — *Am. merid.* : Parana, Brasil. or.
- Germaini (C. M.) *Par.*
Polytrichum Germaini C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 14.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- giganteum* Brid. — *Polytrichadelphus*.
- glaciale* Mitt. *M. austr. am.* p. 614.
 — *Am. sept.* : Mexic. (summ. m. San Felipe).
- Glaziovii (Hpe.) *Jaeg. Ad.* I, p. 716.
Polytrichum Glaziovii Hpe. *Symb.* 1874, p. 54.
 2? — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- gracilifolium* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 108.
 2. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- Graeffeanum (C. M.) *Jaeg. l. c.*
Polytrichum Graeffeanum C. M. *M. Polyn.* p. 61.
 2. Terr. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.
- grandifolium* (Lindb.) *Jaeg. Ad.* I, p. 715.
Polytrichum *grandifolium* Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 264.
 2. — *As.* : Amour, Japon.
Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 550.
 Savat. Pl. Japon. n. 536.
- Gullweri (Hpe.) *Jaeg. Ad.* II, p. 717.
Polytrichum Gullweri Hpe. in *Linn.* 1876, p. 315.
 Ster. — *Pac.* : Tasman.
- gymnophyllum* (Wils.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 152.
Polytrichum *gymnophyllum* Wils. in *sched.* p.p.
 — *As.* : Sikkim, Khasia.
- hamatifolium* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, II, p. 172.
 2. In paludos. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- hexagonum* Mitt. *op. cit.* p. 151.
 — *As.* : Nepal., Khasia, M. Neilgherr., Ceylan.
- Hildebrandti C. M. in *Hildebr. M. Mad.* n. 2133.
 — *Afr.* : Madagascar.
- himalayanum* Mitt. *op. cit.* p. 151.
 — *As.* : Himalaya sept. occid. (Dehra Doun); Yun-
 nan ? Japon.
- Holstii (Broth.) *Par.*
Polytrichum Holstii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 191.
 2 ♂ ign. — *Afr.* : Usambara.
- Humboldtianum (Hpe.) *Jaeg. Ad.* II, p. 718.
Polytrichum Humboldtianum Hpe. *Moosb.* p. 10 (nom.).
 — *Am. merid.* : ?
- inflexum* Lindb. in *Not. Saellsk...* 1867, p. 100.
P. aloides Sande Lac. in *Miq. Ann. mus. bot. Lugd. Bot.* II, p. 292 (fid. Mitt.)
 2. — *As.* : Japon.

integerrinum Hpe. hb. (nunc in hb. British Museum).

— As. : Himalaya sept. occ.

intermedium Roehl. — P. nanum.

interxtum Brid. — P. capillare.

japonicum Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.*... 1868, p. 278.

— As. : Japon.

Junghunianum (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. I*, p. 41, t. 36.

Polytrichum Junghunianum Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 323.

2. Ad mur. et terr. limos. — As. : Java, Sumatra.

« *var. incurvum* (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. l. c.*

Polytrichum Junghunianum var. incurvum Dz. et Mk. in *op. et l. cc.*

— As. : M. Java.

« *var. sikkimense* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 65.

— As. : Sikkim.

laterale { Brid. — P. contortum.
W. P. Sch. — P. nuka-hivense.

laxifolium Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 37.

Ster. Terr. — Am. sept. : Guadalup.

leptocarpum Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 65.

2. — Am. sept. : Mexic. (M. Orizaba).

leucopogon Ren. et Card. in *op. cit.* p. 64.

2. — As. : Sikkim.

leptopelma (C. M.) Par.

Polytrichum leptopelma C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 178.

— Am. sept. : Guatemala.

Liebmannianum W. P. Sch. mss.

Polytrichum Liebmannianum C. M. *Syn. II*, p. 563.

— Am. sept. : Mexic. (M. Orizaba).

longidens Ångstr. { (fid. Lindb.). — P. capillare *var. minus*.
(fid. W. P. Sch.). — P. capillare.

longisetum Brid. — *Polytrichadelphus*.

loricalyx (C. M. Par.).

Polytrichum loricalyx C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

2. — As. : Penins. Tschutschica.

« *var. brachypodon* (C. M.) Par.

Polytrichum loricalyx var. brachypodon C. M. *l. c.*

— As. : Ibidem.

Macounii Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVI, p. 96 et in *Mac. Cat.* p. 152.

Polytrichum Macounii ej. in *Bidrag.* p. 453 (nom.).

2. Rupic. et terr. — Am. sept. : Columb. brit., Alaska, Vancouver.
Eas. : Mac. Canad. M. n. 546.

macrophyllum *Bryol. jav. I*, p. 45, t. 35.

Polytrichum convolutum Dz. et Mk. *Pl. Jungh.* p. 323.

2. Ad terr. arenac. — As. : Sumatra, Java, ins. Batjam.

- macropogon W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 67.
— *Am. sept.*: Mexic. (Vera-Cruz).
- ? madagassum (Hpe.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 109.
Ster. — *Afr.*: Madagascar.
- magellanicum P. B. — *Polytrichadelphus*.
- marginatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 153.
— *As.*: Ceylan.
- micro-capillare (C. M.) Par.
Polytrichum micro-capillare C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.
2. — *As.*: Penins. Tschutchica.
- microdendron (C. M.) Par.
Polytrichum microdendron C. M. in *Nuov. giorn. bot. ital.* 1896, p. 93.
— *As.*: China or. (prov. Schen-Si).
- microphyllum (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. I*, p. 39, t. 29.
Polytrichum microphyllum Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 326.
2. Rupic. — *As.*: Borneo, Java.
- microstomum (R. Br.) *Brid. Bryol. univ. II*, p. 745; Mitt. *M. Ind. or.* p. 151.
P. minutum *Brid. op. cit.* p. 127?
Polytrichum microstomum R. Br. in *Trans. of the Linn. Soc. XII*, p. 569;
C. M. *Syn. I*, p. 210.
P. urnigerum? *Griff. Not.* p. 389.
2. — *As.*: Himalaya, sept. occid. (Dehra-Doun),
Nepal., Khasia, M. Neilgherr., Ceylan.
- minutum *Brid.* — *P. microstomum*?
- Molleri (C. M.) Par.
Polytrichum Molleri C. M. in *Fl.* 1886, p. 277.
2. Terr. — *Afr.*: Ins. S. Thomas.
- nanum (Neck.) P. B. *Prodr.* p. 84; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 117; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 5), t. 415; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 534.
Catharinea nana Roehl. *Moossg. Deutsch.* p. 188.
Mnium polytrichoides α L. *Sp. pl.* p. 1576.
Mnium polytrichoides var. *rotundifructu* Ehrh. in *Hann. Mag.* 1780, p. 236.
P. intermedium Roehl. *Deutschl. Fl. II ed. III*, p. 60; *Brid. op. cit.* p. 117.
P. nanum var. *semi-diaphanum* *Brid. op. et l. cc.*
P. pumilum P. B. *Prodr.* p. 84; *Brid. op. cit.* p. 116?
P. pusillum P. B. l. c.; *Brid. op. cit.* p. 119?
P. subrotundum *Lindb. in Hartm. Skand. Fl. IX ed.*, p. 44, n. 11 (inter syn.).
Polytrichum aloëfolium β foliis integerrimis *Scop. Fl. Carn. II ed.*, II, p. 310, n. 1290.
P. ericoides Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 24, n. 7.
P. intermedium *Brid. Mant. M.* p. 117.
P. nanum Neck. *Meth. M.* p. 119 (1771); C. M. *Syn. I*, p. 204.
P. nanum, capsulis rotundis galeritis, Aloë folio non serrato *Dill. Hist. M.* p. 428, t. 55, f. 6.
P. nanum var. β *Weiss Fl. Goett.* p. 175.
P. polytrichoides Broekm. *Laubm. Meckl.* p. 111.
P. pumilum Sw. *M. Suec.* p. 77, t. 9, f. 19.
P. semi-diaphanum *Brid. Mant. M.* p. 200.
P. subrotundum *Huds. Fl. Angl. I ed.*, n. 400.

2. In ericet., pinet., ad silvar. marg., etc. — *Eur.* : Tota. *As.* : Septentr.
Afr. : Alger., Madeir., Canaries.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 288.
- « *var. longisetum* (Hpe.) *Bryol. eur. l. c. t. 7* β 1 ; *W. P. Schl. l. c.*
Polytrichum nanum var. longisetum Hpe. in *C. M. l. c.*
P. subrotundum var. longisetum Lindb. in *Not.* 1867, p. 143.
 Ut typ. — *Eur.* : Saxon., Alp. Delphinat.
var. semi-diaphanum Brid. — *P. nanum.*
- nanum* $\times$ *aloides* J. *Brunnthaler* in *Oesterr. bot. Zeitsch.* 1897, n. 2.
 In schistos. — *Eur.* : Austr. sept. or. (Gansbach.).
- Neesii* (C. M.) *Mitt. M. Ind. or.* p. 151.
Polytrichum aloides Reinw. et Hsch. in *Nov. Act. Acad. Car. XIV, II.*
P. Neesii C. M. *Syn. II*, p. 151.
 2. — *As.* : M. Neilgherr., Java.
- neglectum* (Hpe.) *Jaeg. Ad. I*, p. 727.
Polytrichum neglectum Hpe. in *Bot. Zeit.* 1869, n. 52.
 — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- neo-caledonicum* Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 219.
 Ad terr. argill. — *Pac.* : Nov. Caledon.
- norvegicum* P. B. $\left\{ \begin{array}{l} \text{(fid. C. M.). — } P. \text{ alpinum.} \\ \text{(fid. Lindb.). — } P. \text{ alpinum var. septentrionale.} \end{array} \right.$
- nudicaule* (Wright) *Par.*
Polytrichum nudicaule Wright in *Lond. Journ. of bot.* 1891, p. 106.
 2. — *As.* : China centr.
- nudiusculum* *Mitt. M. Ind. or.* p. 153 (1).
 — *As.* : Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun), Khasia,
 Ceylan.
- nuka hivense* (C. M.) *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc.* p. 32.
P. laterale W. P. Sch. in *Jardin Enum.* p. 21.
Polytrichum nuka-hivense C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 205.
 2. In fissur. rup. — *Pac.* : Nuka-Hiva.
- obscuratum* *Mitt. M. austr. am.* p. 618.
 — *Am. merid.* : M. Pichincha.
- obtusatulum* (C. M.) *Par.*
Polytrichum obtusatulum C. M. in *Abhandl. Brem. VIII*, p. 204.
 — *Afr.* : Madagascar.
- obtusum* (C. M.) *Jaeg. Ad. I*, p. 727.
Polytrichum obtusum C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 171.
 Ster. — *As.* : Ins. Philippin.
- ochromitrium* (C. M.) *Par.*
Polytrichum ochromitrium C. M. mss.
 — *As.* : Himalaya, septr. occid. (Dehra-Doun).
- octangulare* (C. M.) *Mitt. op. cit.* p. 617.
Polytrichum octangulare C. M. *Syn. II*, p. 564.
 2. — *Am. sept.* : Costa Rica.

(1) False « *P. mediusculum* Mitt. l. c. p. 155 » in *Jaeg. Ad. I*, p. 711.

oligodus (Kze.) Mitt. *op. cit.* p. 613.

Cephalotrichum oligodus Bryol. eur. IV (mon. Pogonati).

Polytrichum aloides var. γ Schwaegr. Sp. M. I, p. 13.

P. Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1848, p. 188; C. M. Syn. II, p. 561.

P. oligodus Kze. in Poepp. Pl. Chil. Coll. I, n. 271; C. M. Syn. I, p. 206.

P. polysetum H. et Arn. (fid. Mitt. in Lond. Journ. of bot. 1851, p. 50).

2. In humid. secus rivul. — Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens. et Boliv., Chile.

otaruense Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 352.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Japon n. 79.

patulum (Harv.) Mitt. M. Ind. or p. 152.

Polytrichum patulum Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 18, f. I; C. M. Syn. I, p. 210.

— As. : Nepal.

paucidens Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 70.

2. In silvis. — As. : Yunnan.

pellucens Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 351.

2. — As. : Japon.

Exs. : Savat. Pl. Japon. n. 538.

pensilvanicum (Hedw.) Par.

Mnium polytrichoides γ L. Sp. pl. p. 1576.

P. brevicaulis P. B. Prodr. p. 84 (1805); Brid. Bryol. univ. II, pp. 114 et 743; Sull. M. of U. St. p. 41 et Ic. M. p. 75, t. 47; Lesq. et Jam. Man. p. 260.

P. capillare Mac. Canad. M. n. 377.

Polytrichum acaulon capillaceum, capsulis cylindricis Dill. Hist. M. p. 434, t. 55, f. 12.

P. brevicaulis Brid. M. Rec. II, I, p. 81, n. 66.

P. pensilvanicum Hedw. Sp. M. p. 96, t. 21, f. 1-6 (1801-4); C. M. Syn. I, p. 205.

P. tenue Menz. in Trans. of the Linn. Soc. IV, p. 68.

2. Ad terr. argill. humid. — Am. sept. : Nov. Scot., New Brunswick, Ontar., reg. or. et merid.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 70.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 316.

“ var. *Torreyanum* (Brid.) Par.

P. Torreyanum Brid. Bryol. univ. II, p. 115.

Polytrichum pensilvanicum var. *Torreyanum* C. M. l. c.

Ut et ubi typ.

perichaetiale (Mont.) Jaeg. Ad. I, p. 719.

Polytrichum perichaetiale Mont. in Ann. sc. nat. 1841, p. 252 et Syll. p. 28; C. M. Syn. I, p. 207; Mitt. M. Ind. or. p. 155.

2. Terr. et rupic. — As. : Nepal., Himalaya. sept. occid. (Dehra-Doun), M. Neilgherr.

Petersianum (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 722.

Polytrichum Petersianum C. M. in Linn. 1874, p. 575.

2. Terr. — Am. merid. : Brasil.

perpusillum (C. M.) Par.

Polytrichum perpusillum C. M. in Hedwig. 1897, p. 90.

2. Ad rip. rivul. — Am. merid. : Paraguay.

Exs. : Balansa Pl. Parag. n. 3618.

Pittieri Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, I, p. 169.

2. ♂ ign. In silv. humid. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

Plaeantum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 38.

2. — *Am. sept.* : Martinic.

polare (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 724.

Polytrichum polare C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 205.

2. — *Am. sept.* : Groenland.

polycarpum (W. P. Sch.) Par.

Polytrichum plurisetum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 265.

P. polycarpum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 14.

Trichopilum polycarpum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1684.

2. — *Am. merid.* : And. Boliv., Alp. Argentin Tucuman.

« *var. angustatum* W. P. Sch. l. c. n. 1685.

— *Am. merid.* : And Bolio.

« *var. brevipes* (C. M.) Par.

P. plurisetum var. brevipes C. M. in *Linn.* l. c.

— *Am. merid.* : Alp. Argentin subtropic.

polysetulum (C. M.) Par.

Polytrichum polysetulum C. M. mss.

— *As.* : Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun).

polythamnium (C. M.) Par.

Polytrichum polythamnium C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 93.

2. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

procerum W. P. Sch. mss.; Jaeg. *Ad. I*, p. 727.

Polytrichum procerum Lindb. in *Notis....* 1867, p. 98.

— *Am. sept.* : Mexic.

proliferum (Griff.) Mitt. *Ind. or.* p. 152.

Polytrichum proliferum Griff. *Not.* p. 488 et *Io. pl. Asiat.* II, t. 93, f. 2.

— *As.* : Khasia.

pseudo-alpinum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 724.

P. alpinum (p. d. Mitt.).

Polytrichum pseudo-alpinum C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 750.

2. — *Pac.* : Austral. fel. subalp.

psilopoloides (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 721.

Polytrichum psilopoloides C. M. in *Linn.* 1874, p. 576.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

pulverulentum P. B. — *P. urnigerum*.

pumilum Brid. — *P. nanum*.

purpurascens (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 616.

Polytrichum purpurascens Hpe. in *Linn.* 1863, p. 148.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

pusillum P. B. — *P. nanum*.

Pylaisaei Brid. — *P. alpinum var. arcticum*.

rhopalophorum Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 354.

2. — *As.* : Japon.

Exs. : Savatier *Pl. Japon.* n. 534.

- robustiusculum *Jaeg. Ad. I, p. 726.*
P. robustum *W. P. Sch. in Besch. Prodr. Bryol. mex. p. 66.*
 — *Am. sept. : Mexic.*
- robustum *Mitt. M. austr. p. 616.*
P. Wilsoni *Jaeg. Ad. I, p. 725.*
 — *Am. sept. : Jamaic.*
- robustum { *Jaeg. -- Polytrichadelphus magellanicus.*
 { *W. P. Sch. — P. robustiusculum.*
- rubenti-viride (*C. M.*) *Par.*
Polytrichum rubenti-viride *C. M. in Fl. 1886, p. 277.*
 2. *Terr. — Afr. : Ins. S. Thomas.*
- rubiginosum (*C. M.*) *Par.*
Polytrichum rubiginosum *C. M. hb.*
 — *Pac. : Nov. Zeland.*
- rufisetum (*Wils.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 153.*
Polytrichum rufisetum *Wils. in sched.*
 — *As. : Sikkim.*
- Rutenbergii (*C. M.*) *Par.*
Polytrichum Rutenbergii *C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 205.*
 2. — *Afr. : Madagascar.*
- Sartorii (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 720.*
Polytrichum Sartorii *C. M. in Linn. 1874, p. 621.*
 — *Am. sept. : Mexic.*
- Schlumbergeri *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 66.*
 — *Am. sept. : Mexic.*
- Schmitzii (*Ltz.*) *Besch. op. cit. p. 63.*
Polytrichum Schmitzii *Ltz. Moosst. p. 156.*
 — *Am. sept. : Mexic.*
- semi-angulatum *Brid. — Polytrichadelphus.*
- semi-nudum (*Wils.*) *Mitt. M. Ind. or. p. 152.*
Polytrichum semi-nudum *Wils. in sched. p.p.*
 — *As. : Sikkim, Ceylan.*
- semi-pellucidum (*Hpe.*) *Mitt. M. austr. am. p. 617.*
Polytrichum convolutum *Hook. in Kunth. Syn. Fl. Aequin. I, p. 48.*
P. semi-pellucidum *Hpe. in Linn. 1847, p. 80 ; C. M. Syn. I, p. 214 et II, p. 563.*
P. tortile *C. M. in Linn. 1847, p. 208.*
 2. *Ad terr. humid. — Am. merid. : And. Venezuel., Nov. Granat. et Quitens.*
- septentrionale *Roehl. — P. alpestre var. septentrionale.*
- serpentinum (*C. M.*) *Par.*
Polytrichum serpentinum *C. M. mss.*
 — *Pac. : Nov. Guin. brit.*
- simense (*Br. et Sch.*) *Jaeg. Ad. I, p. 719.*
Cephalotrichum simense *Br. et Sch. in W. Sch. M. Abyss. n. 427 et Bryol. eur. IV (mon. Pogonati).*
Polytrichum simense *C. M. Syn. I, p. 206.*
Syn. — *Afr. : Alp. Abyssin., M. Cameroon.*

sphaerothercium *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, XVIII, p. 353.

2. — *As.* : Japon.

spinulosum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 156.

— *As.* : Japon.

Stevensii *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. belg.* 1895, I, p. 65.

2. — *As.* : Sikkim.

subaloides (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 711.

Polytrichum subaloides C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 12.

2. — *Afr.* : Pico d. Teneriff.

« *var. minor (C. M.) Par.*

Polytrichum subaloides var. minor C. M. l. c.

Ut et ubi typ.

subbifarium *Mitt. M. austr. am.* p. 618.

— *Am. merid.* : Venezuela, Nov. Granat.

subcontortum (*Hpe.*) *Mitt. op. cit.* p. 616.

Polytrichum subcontortum Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 349.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subgracile (*Hpe.*) *Par.*

Polytrichum subgracile Hpe. in Bot. Zeit. 1870, p. 51.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

subrotundum *Lindb.* — *P. nanum.*

subtortile (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 718.

P. aloides Duby in Pl. Zolling. n. 853.

P. Teysmannianum β *tortile Bryol. jav. I*, p. 44.

Polytrichum aloides Hsch. et Reinw. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV, II, Suppl. p. 732 ?

P. subtortile C. M. Syn. I, p. 216 *et II*, p. 563.

2. — *As.* : Java.

subulatum (*Menz.*) *Brid. Bryol. univ. II*, p. 122.

Polytrichum subulatum Menz. in Trans. of the Linn. Soc. IV, p. 303;
C. M. Syn. I, p. 207.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland.

taïtense *W. P. Sch. in Vesco Pl. Ocean.; Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p.* 31.

— *Pac.* : Taïti.

tenellum (*C. M.*) *Par.*

Polytrichum tenellum C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 18.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Teysmannianum (Dz. et Mk.) Bryol. jav. I, p. 43, t. 32.

Polytrichum Teysmannianum Dz. et Mk. in Pl. Jungh. p. 323.

2. *Ad terr. argill.* — *As.* : Java.

var. tortile Bryol. jav. — *P. subtortile.*

thelicarum (*C. M.*) *Par.*

Polytrichum thelicarpum C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 94.

2. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

Thomsoni (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 719.

Polytrichum pungens Wils. in sched. p.p.

P. Thomsoni Mitt. *M. Ind. or.* p. 155.

2. — *As.* : Himalaya occ.

tolucense (Hpe.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 63.

Polytrichum tolucense Hpe. *Sp. M. nov. Mexic. in Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien*, 7^a April, 1869.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

Torreyanum Brid. — *P. pensilvanicum* var. *Torreyanum*.

tortile (Sw.) *P. B. Prodr.* p. 85 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 108 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 618 (1).

P. convolutum *P. B. l. c.* p. 84 p.p.

P. tortile var. *domingense* Brid. *op. et l. cc.*

Polytrichum convolutum Hedw. *Sp. M.* p. 94, t. 10, f. 35.

P. cubense Sull. in *Proced. Am. Acad.*... 1861.

P. domingense Brid. *Mant. M.* p. 201.

P. tortile Sw. *Fl. Ind. occ. III*, p. 1839 ; *C. M. Syn. I*, p. 215 et *II*, p. 563.

2. Ad terr. argillos. — *Afr.* : Ins. *Franciae*. *Am. sept.* : M. *Jamaic.*, *Cuba*, *Guadalup.*, *Martinic.* *Am. merid.* : *Peruv*, *Boliv.* *Pac.* : *Nov. Zeland.*

var. *domingense* Brid. — *P. tortile*.

tortipes (Wils.) Jaeg. *l. c.*

Polytrichum tortipes Wils. in *sched.* ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 155.

2. — *As.* : *Sikkim*.

urnigerum (L.) *P. B. Prodr.* p. 84 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 124 ; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 8), t. 417 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed., p. 536.

Bryum urnigerum Neck. *Del. gall. belg.* II, p. 462, n. 20.

Catharinea pulverulenta Roehl. *Deutsch. Moosg.* p. 216, n. 55 b.

C. urnigera ej. *l. c.* n. 55.

P. fasciculatum *P. B. l. c.*

P. pulverulentum ej. *l. c.*

P. urnigerum var. *fasciculatum* Brid. *l. c.*

P. urnigerum var. *pulverulentum* ej. *l. c.*

Polytrichum alpinum var. β *Huds. Fl. Angl.* I ed., p. 400.

P. axillare Lam. *Fl. fr.* I, p. 43.

P. dubium Scop. *Fl. Carn.* p. 136 et II ed. n. 1291.

P. fasciculatum Mich. *Fl. Am. bor.* II, p. 294.

P. pulverulentum Reyn. in *Act. Lausanne*, II, p. 11, t. 2.

P. ramosum setis ex alis *urnigeris* Dill. *Hist. M.* p. 427, t. 55, f. 5.

P. urnigerum L. *Sp. pl.* p. 1573 ; *C. M. Syn. I*, p. 208.

2. In silv. loc. accliv. petros., ad viar. agger. graminos., etc. — *Eur.* : *E reg. campestr.* usq. in alp. *As.* : *Japon.*, *Kamschatka*, *Jenissei*, *Obi*, *Persia*, *Caucas.* *Afr.* : Ins. *Canar.* *Am. sept.* : *Terr. nov.*, *Nov. Scot.*, *New Brunswick*, *Gaspes.*, *Ontar.*, *M. Selkirk*, *Alaska*, *Unalashka*, *reg. septr.*, *or. et centr.*, *M. Jamaic.*

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 219 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 115.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 319.

" var. *crassum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ut typ. — *Eur.* : In subalp. humid.

var. *fasciculatum* Brid. — *P. urnigerum*.

(1) Cf. Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 35.

« *var. humile* Brid. *op. et l. cc.* : W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 440 et II ed. l. c.*

Polytrichum urnigerum var. humile Wahlenb. *Fl. Lapp. p. 347.*

In siccior. — *Eur.* : Reg. alp.

var. nigrescens Brid. — *Polytrichum gracile.*

var. pulverulentum Brid. — *P. urnigerum.*

« *var. tetragonum* (Lindb.) Par.

Polytrichum urnigerum var. tetragonum Lindb. in *Notis...* 1867, p. 136.

Ut typ. — *Eur.* : Fennia.

« *var. tsangense* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 70.

— *As.* : Yunnan.

var. C. M. — *P. capillare.*

urnigerum } Drumm. p p. — *P. capillare.*
 } Griff. — *P. microstomum?*

usambaricum (Broth.) Par.

Polytrichum usambaricum Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 194.

2. ♂ ign. Terr. — *Afr.* : Usambara.

vaginans Brid. — *P. brachyphyllum.*

varians (Hpe.) Mitt. *M. austr. am. p. 619.*

Polytrichum varians Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser. IV, p. 350.*

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

viride Mitt. *l. c.*

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

vitiense Mitt. *Fl. Vit. p. 403.*

— *Pac.* : Ins. Fidji.

volvatum (C. M.) Par.

Polytrichum volvatum C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 177.

— *Am. sept.* : Guatemala.

Wallisii (C. M.) Jaeg. *Ad. I, p. 722.*

Polytrichum Wallisii C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 171.

2. — *As.* : M. ins. Philippin.

Wilsoni Jaeg. — *P. robustum.*

yunnanense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 69.

2. In silvis. — *As.* : Yunnan (1).

POHLIA Brid. *Mant. M. p. 115 et Bryol. univ. I, p. 607.*

Spec. omn. non indicatae sunt WEBERÆ ejusd. nom.

affinis H. et H. — *Webera polymorpha var. affinis.*

arctica R. Br. — *Bryum.*

var. purpurascens Schwaegr. — *Bryum purpurascens.*

arcuata H. et H. — *Webera acuminata var. arcuata.*

brachycarpa eor. — *Webera polymorpha var. brachycarpa.*

var. polyseta Schwaegr. — *Webera acuminata var. polyseta.*

(1) In Enum. Kindberg. nom. nud. (*Pogonatum*, *Polytrichadelphus* et *Polytrichum*) :

P. breviceps Mitt.
occianum C. M.

B. pallens Besch. (delend., Besch.
in litt. !)

- bryoides* R. Br. — *Bryum Brownii*.
calophylla Schwaegr. — *Bryum*.
cirrifera de Not. — *Bryum Warneum*.
clavata W. P. Sch. — *Bryum*.
curviseta H. et W. — *Webera polymorpha* var. *brachycarpa*.
cylindrica eor. — *Webera elongata*.
demissa Hüb. — *Plagiobryum*.
dimorpha de Not. — *Webera polymorpha*.
elongata Hedw. — *Webera*.
 var. *acuminata* Hüb. — *Webera acuminata*.
 var. *cylindrica* Brid. — *Webera elongata*.
flexuosa Hook. — *Bryum*.
Gilliesii Mont. — *Bryum*.
gracilis { H. et H. — *Webera polymorpha* var. *gracilis*.
 Lindb. — *Webera commutata* var. *gracilis*.
 Wils. — *Orthodontium*.
 var. *pulchella* Hüb. { — *Webera acuminata* var. *polyseta*.
 var. *xanthocarpa* Hüb. {
Greenii Brid. — *Webera polymorpha* var. *affinis*?
humilis Mont. — *Orthodontium*.
imbricata Schwaegr. — *Bryum*.
inclinata Hüb., Sw. — *Bryum*.
intermedia Brid. — *Bryum*.
lacustris Hüb. — *Bryum*.
laete-virens de Not. — *Webera cucullata*.
latifolia Br. — *Bryum calophyllum*.
longiseta Hüb. — *Bryum*.
microcarpa Hsch. — *Bryum*.
 { Brid. p.p.? — *Webera polymorpha* var. *affinis*.
minor { Hsch. { — *Mielichhoferia campylothea*.
 { — *Mielichhoferia Schiedeana*.
 Schleich. — *Webera acuminata* var. *minor*.
 var. *affinis* Brid. p.p.? — *Webera polymorpha* var. *affinis*.
 var. *Greenii* Brid. — *Webera polymorpha* var. *affinis*?
nutans Lindb. — *Webera*.
pallens Br. — *Bryum*.
paradoxa Hüb. — *Bryum cuspidatum*.
patens H. et H. — *Webera acuminata* var. *arcuata*.
pallescent Hook. — *Orthodontium*.
platyphylla Schwaegr. — *Bryum*.
polymorpha H. et H. — *Webera*.
 var. *brachycarpa* Hüb. — *Webera polymorpha* var. *brachycarpa*.
 var. *polyseta* Hüb. — *Webera acuminata* var. *polyseta*.
 var. *tenella* Hüb. — *Webera acuminata* var. *tenella*.
polyseta H. et H. — *Webera acuminata* var. *polyseta*.
proligera Lindb. — *Webera*.
pulchella H. et H. — *Webera acuminata* var. *pulchella*.
purpurascens R. Br. — *Bryum*.
rutilans Lindb. — *Webera Schimperii*.
tenella H. et H. — *Webera acuminata* var. *tenella*.
turbinata Schwaegr. — *Bryum compressidens*.
uliginosa Br. — *Bryum*.
Varenensis de Not. — *Bryum Warneum*.
vegeta H. et H. — *Webera acuminata* var. *arcuata*.
xanthocarpa H. et H. — *Webera acuminata* var. *polyseta*.
Zierii Schwaegr. — *Plagiobryum*.
Weigelia Lindb. — *Webera Ludwigii*.

Polyodon W. P. Sch. Syn. I ed. p. 454 (subgen. BUXBAUMIAE).

POLYPODIOPSIS C. M. in Linn. 1875, p. 358 (sect. FISSIDENTIS); Jaeg. Ad. II, p. 48 (gen. propr.).

Metzgeria Jaeg. — Fissidens.

Polyptychium C. M. in Linn. 1874, p. 600 (sect. BARTRAMIAE).

POLYTRICHADELPHUS C. M. Syn. I, p. 201 (sect. CATHARINAE); Mitt. M. austr. am. p. 607 (gen. propr.) (25 spec.).

Abriaquia (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 717.

Catharinea Abriaquia C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.

2. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

aristatus (Hpe.) Mitt. M. austr. am. p. 609.

Catharinea aristata Hpe. in Linn. 1863, p. 147.

2. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

Arnoldi (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 708.

Catharinea Arnoldi Hpe. in Linn. 1874, p. 664.

— *Pac.*: Alp. Austr. or.

australasicus (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 717.

Catharinea australasica Hpe. in Linn. 1876, p. 315.

Ster. — *Pac.*: Austral. or. subtropic.

ciliatus (Hook. f. et Wils.) Mitt. op. cit. p. 608.

Catharinea ciliata C. M. Syn. I, p. 201 et II, p. 560.

Polytrichum ciliatum H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 290, t. 10.

2. Ad terr. turfos. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

croceus Mitt. — *P. semi-angulatus*.

dendroides (Hedw.) Mitt. op. cit. p. 611.

Catharinea dendroides Hpe. in Linn. 1847, p. 78; C. M. Syn. I, p. 199 et II, p. 559.

Gymnopilum dendroides W. P. Sch. herb.

Pogonatum dendroides Brid. Bryol. univ. II, p. 112.

Polytrichum dendroides Hedw. Sp. M. p. 102; Mont. in Cl. Gay Fl. Chil. VII, p. 70, t. 1.

2. — *Am. merid.*: Peruv., Chile, ins. Chiloë, Patagon. occ., terr. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae. *Pac.*: Nov. Zeland.

ericoides (Hpe.) Mitt. op. et l. cc.

Polytrichum ericoides Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 350.

Ster. — *Am. merid.*: Nov. Granat.

flexuosus (C. M.) Mitt. op. cit. p. 609.

Polytrichum flexuosum C. M. Syn. I, p. 212.

2. Rupic. — *Am. merid.*: Venezuela.

giganteus (Hook.) Mitt. op. et l. cc.

Pogonatum giganteum Brid. Bryol. univ. II, p. 123.

Polytrichum giganteum Hook. M. ex. t. 65; C. M. Syn. I, p. 212.

2. Ad arbor. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

grossidens (C. M.) Par.

Catharinea grossidens C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 713.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

horridus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 98.

P. magellanicum Hedw. *Sp. M.* t. 20, f. 3.

2? — *Am. merid.* : Fret. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae, Maclov., Cap. Horn.

innovans (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 707.

Catharinea innovans C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 548.

P. magellanicum (fid. Mitt.)

2. Terr. — *Pac.* : Tasman.

integrifolius (C. M.) Par.

Catharinea integrifolia C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 84.

Ster. — *Am. merid.* : And. Boliv.

longisetus (Hook.) Mitt. *op. cit.* p. 611.

Pogonatum longisetum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 128.

Polytrichum longisetum Hook. *M. ex. t.* 66 ; *C. M. Syn.* I, p. 217 et II, p. 564.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Lyallii Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 49, t. 8 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 259.

Oligotrichum Lyallii Lindb. *Obs. de Polytr. in Act. Soc. pr. Faun et Fl. Fenn.* IX, p. 102.

2. In silv. conifer. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit., Oregon, Colorado, Idaho, M. Calif.

magellanicus (L.) Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 97.

Catharinea innovans C. M. (fid. Mitt.).

C. magellanica Brid. *Bryol. univ.* II, p. 106 ; *C. M. Syn.* I, p. 201.

C. pseudo-Polytrichum Raddi in *Mem. math. e di fis. d. Soc. ital. Moden.* XVIII, p. 443, t. 18, f. 1.

Gymnopilum magellanicum W. P. Sch. *herb.*

Pogonatum magellanicum P. B. *Prodr.* p. 84.

P. robustum Jaeg. *Ad. I*, p. 717.

Polytrichum magellanicum L. *Suppl.* p. 449

P. robustum Lindb. in *Notis...* 1867, p. 99 (fid. Besch.).

2. — *Am. merid.* : Terr. Magellan., Fuegia, ins.

Maclov. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland, Campbell.

polycarpus (Col.) Broth. in litt.

Polytrichum polycarpum Col. in *Trans. and Proceed. of the N. Zeal. Inst.* 1887, p. 276.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

purpurens Mitt. *M. austr. am.* p. 610.

2. — *Am. merid.* : And. Quitens.

rubiginosus Mitt. *op. et l. cc.*

Saxic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

semi-angulatus (Brid.) Mitt. *op. cit.* p. 609.

Catharinea magellanica Hsch. *Fl. Bras.* I, p. 47 ; *C. M. Syn.* II, p. 560.

C. semi-angulata Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 36.

Pogonatum semi-angulatum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 744.

Polytrichadelphus croceus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 98.

Polytrichum semi-angulatum Sull. in *U. St. Expl. Exped.* t. 6.

2. Terr. et saxic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

squamosus (*Hook. f. et Wils.*) *Mitt. op. cit.* p. 612.

Catharinea squamosa C. M. *Syn. I*, p. 200 et *II*, p. 560.

Polytrichum squamosum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 539 et *Fl. Antarct. II*, p. 411, t. 153, f. 8.

2. — *Am. merid.*: Fret. et terr. Magellan., ins. Eremitae, Maclov. *Pac.*: Nov. Zeland. sept.?

subflexuosus (*Ltz.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 709.

Polytrichum subflexuosum *Ltz. Moosst.* p. 157.

2. — *Am. sept.*: Mexic.

Trianae (C. M.) *Mitt. op. cit.* p. 611.

Catharinea Trianae Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 346.

Polytrichum Trianae C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 577.

2. — *Am. merid.*: Nov. Granat.

umbrosus *Mitt. M. austr. am.* p. 610.

Terr. — *Am. merid.*: And. Boliv., Chile.

Valenciae (C. M.) *Par.*

Catharinea Valenciae C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 468.

2. — *Am. merid.*: Venezuela (1).

POLYTRICHUM Dill. emend. *Hist. M.* p. 4395 (99 spec.).

acaulon, capillaceum, capsulis cylindricis Dill. — *Pogonatum pensilvanicum*.

afro-aloides C. M. — *Pogonatum*.

albo-marginatum C. M. — *Pogonatum*.

albo-vaginatum Hpe. — *Pogonatum*.

aloëfolium Scop. (1 et 2). — *Pogonatum aloides*.

β *foliis integris* Scop (3). — *Pogonatum nanum*.

aloïdes { Hedw. — *Pogonatum*.

{ Hsch. et Reinw. } — *Pogonatum Neesii*.

{ } — *Pogonatum subtortile*?

var. *defluens* C. M. — *Pogonatum aloïdes* var. *defluens*.

var. *Dicksoni* H. et T. — *Pogonatum aloïdes* var. *defluens*.

var. α et β Mart. — *Pogonatum aloïdes* var. *defluens*.

alpestre { Hoppe. — *Polytrichum strictum*.

{ Sw., Hartm. — *Polytrichum Swartzii*.

var. *affine* Brid. — *Polytrichum juniperinum* var. *affine*.

alpinum L. — *Pogonatum*.

var. *angustifolium* Lindb. — *Pogonatum alpinum* var. *arcticum*.

var. *arcticum* Wahlenb. — *Pogonatum alpinum* var. *arcticum*.

var. *brevifolium* C. M. — *Pogonatum alpinum* var. *brevifolium*.

var. *campanulatum* C. M. — *Pogonatum alpinum* var. *brevifolium*.

var. *ciliatum* Retz. — *Pogonatum alpinum*.

var. *cylindricum* Lindb. — *Pogonatum alpinum* var. *arcticum*.

var. *furcatum* C. M. — *Pogonatum alpinum* var. *farcatum*.

var. *laeve* Retz. — *Pogonatum alpinum* var. *septentrionale*.

var. *silvaticum* Lindb. — *Pogonatum alpinum* var. *arcticum*.

var. β { Huds. — *Pogonatum urnigerum*.

{ Wahlenb. — *Pogonatum alpinum* var. *arcticum*.

alpinum ramosum, capsulis e summitate ellipticis Dill. — *Pogonatum alpinum*.

(1) De nom. nud. in Enum. Kindberg. cf. *Pogonatum*.

- altisetum C. M. in *Fl.* 1897, p. 328.
 — *Am. merid.* : And. Venezuel.
- « var. humilisetum C. M. in *op. cit.* p. 329.
 — *Am. merid.* : And. Venezuel., M. Pichincha.
- ambiguum Mich. — Pogonatum alpinum var. arcticum.
- andinum Hpe. — Pogonatum.
- angolense W. et Dy. — Pogonatum.
- angustatum { Brid. — Atrichum.
 Griff. p.p. ? — Atrichum undulatum var. subserratum.
- angustifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 622.
 — *Am. merid.* : Brasil. tropic.
- angustifolium W. P. Sch. — P. verrucosum.
- Antillarum Rich. in *Brid. Bryol. univ.* II, pp. 138 et 747 ; C. M. *Syn.* I, p. 219 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 620.
 P. appressum Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 311 et II, II, p. 5, t. 152.
 P. scabriusculum Brid. *Mant. M.* p. 195.
 P. setifolium Sw. *Adnot. bot.* p. 146, n. 9.
 2. Ad rup. madid. et terr. in silv. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens., S. Doming. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens., Brasil. austr. or.
- appressum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 141 et 747 ; C. M. *Syn.* I, p. 219.
 — *Afr.* : Ins. Borbon.
- appressum Schwaegr. — P. Antillarum.
- Apulejæ Commers. — P. remotifolium.
- arboreum CEd. *Fl. dan.* t. 648. { — Ulota Bruchii?
 — Ulota crispa?
 — Ulota crispula?
- arcticum Sw. — Pogonatum alpinum var. arcticum.
- aristatum W. P. Sch. *mss.* (*fid. Hpe.*) ; Lindb. in *Notis...* 1867, p. 99, n. 12.
 — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- aristatum Hpe. — Polytrichadelphus.
- aristiflorum Mitt. *M. austr. am.* p. 520.
 P. Sprucei Lindb. in *Notis...* 1867, p. 99.
 Rupic. et terr. — *Am. sept.* : Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, Nov. Granat., And. Quitens. et Boliv., Brasil.
- assimile Hpe. in *Fl.* 1881.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- atrighoides C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 273.
 Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.
- attenuatum Menz. — P. formosum.
 var. aurantiacum Turn. — P. gracile.
- aurantiacum Hoppe. — P. gracile.
 var. β Wahlenb. — P. formosum.
- australasicum Hpe. et C. M. — Pogonatum.
- australe H. f. et W. — Psilopilum.
- austro-alpinum { C. M. — Pogonatum.
 F. v. Müller. — Pogonatum alpinum.
- austro-Georgicum C. M. — Pogonatum.
- Autrani Ren. et Card. in *Bull. hb. Boissier*, 1894, p. 33.
 2. Ad rivul. — *As.* : M. Liban.

- axillare* Lam. — *Pogonatum urnigerum*,
Baldwini C. M. — *Pogonatum*.
Bernoullii C. M. — *Pogonatum*.
Bisseti C. M. — *Pogonatum*.
boreale Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norveg., et in Mac. Cat. p. 155.*
— *Am. sept.* : Unalaschka.
Borgenii Hpe. — *Pogonatum*.
brachymitrium C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 468.
2. — *Am. merid.* : Venezuela.
brachyphyllum Rich. — *Pogonatum*.
brachypyxis C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n. 40.*
Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
brasiliense Hpe. *Symb.* 1872, p. 53.
Pogonatum brasiliense Jaeg. *Ad. I, p. 728.*
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
breve C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 90.
— *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic. Tucuman.
brevicaule { *Brid.* — *Pogonatum pensilvanicum*.
{ *Hsch.* — *Pogonatum Gardneri*.
brevifolium R. Br. — *Pogonatum alpinum var. brevifolium*.
Bryi ruralis facie, capsula sessili majus Dill. { — *Orthotrichum affine* (*fid. Limpr.*).
{ — *Orthotrichum leiocarpum* (*fid. C. M.*).
Bryi ruralis facie, capsula sessili minus Dill. — *O. stramineum*.
bryoides var. capillaceum Weiss. { — *Ulota Bruchii*?
{ — *Ulota crispa*?
{ — *Ulota crispula*?
var. striatum Weiss. — *Orthotrichum leiocarpum*.
Buchanani Rehm. *M. Afr. austr. n. 580.*
Ster. — *Afr.* : Natal.
calopogon Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc. p. 115.*
— *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.
« f. majus Besch. *l. c.*
— *Afr.* : Ins. Borbon.
Camerae C. M. — *Pogonatum*.
campanulatum Hsch. — *Pogonatum alpinum var. brevifolium*.
campophilum C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n. 147*
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
camptocaulon C. M. — *Pogonatum*.
campylocarpum C. M. — *Pogonatum*.
canaliculatum Hook. — *Oligotrichum*.
capense Hpe. — *Pogonatum*.
capillare { *Mac.* — *Pogonatum pensilvanicum*.
{ *Rich.* — *Pogonatum*.
var. dentatum Lindb. — *Pogonatum dentatum*.
var. minus Wahlenb. — *Pogonatum capillare var. minus*.
var. oxycalyx Lindb. — *Pogonatum dentatum*.
capillaceum, crispum, calyptris acutis pilosissimis Dill. { — *Ulota Bruchii*.
{ — *Ulota crispa*.
{ — *Ulota crispula*.
capsulis sessilibus foliis brevibus { — *Orthotrichum affine*? (*fid. C. M.*).
rectis carinatis Dill. { — *O. Sturmii* (*fid. Limpr.*).

capsulis subrotundis Huds. — *Pogonatum nanum*.

Carionis C. M. — *Pogonatum*.

Chimborassi *Ltz. Moosst. p.* 156.

2. *Rupic.* — *Am. merid.* : M. Chimborazo.

ciliatum H. f. et W. — *Polytrichadelphus*.

cirratum Sw. — *Pogonatum*.

clavatum Dz. et Mk. — *Pogonatum*.

Commersonianum Brid. — *P. subpilosum*.

commune *L. Sp. pl.* 1573 p.p. ; *Brid. Bryol. univ. II, p.* 148 ; *Bryol. eur. IV (mon. p. 13), t.* 425 ; *C. M. Syn. I, p.* 220 ; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 545.

P. commune α *majus* *Weiss Pl. crypt. Fl. Goett. p.* 168.

P. commune α *serrulatum* *Retz Fl. Scand. Prodr. II, p.* 209, n. 1194.

P. commune α *yuccaefolium* *Ehrh. in Hann. Mag. 1780, p.* 235.

P. pallidisetum *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 279.

P. propinquum *R. Br. Suppl. ad it. Parry. p.* 194 ; *Brid. op. cit. p.* 150.

P. quadrangulare *Gilib. in Steud. Nom. crypt. p.* 353.

P. quadrangulare vulgare, *Yuccae foliis serratis* *Dill. Hist. M. p.* 420, t. 54, f. 1.

P. serratum *Schrank Baiers Fl. II, p.* 446.

P. yuccaefolium *Ehrh. Pl. crypt. exs. n.* 214.

2. In turf. uligin. et palud. silvat. — *Eur.* : Tota ; Spitzberg. *As.* : Japon., Kamschatka, Amour, Saghalien, Obi, Jenissei, Ochotsk, Caucas. *Afr.* : Ins. Azores, Canar., Madeir. ; ins. Borbon. ? Madagascar ? M. Cameroon. *Am. sept.* : Groenland merid., Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Ontario, Sitka, Washington, Oregon, Idaho, reg. sept., or. et centr. *Am. merid.* : And. Peruv., Brasil. *Pac.* : Austral. merid., Nov. Zeland., Tasman., ins. Chatham.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. II ed. n.* 72.

Rab. Bryoth. eur. n. 119.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 329.

α *var. africanum* *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 276.

— *Afr.* : C. B. Sp.

var. attenuatum H. et T. (1). — *P. formosum* p.p.

var. aurantiacum *Wahlb.* — *P. gracile* p.p.

α *var. brevifolium* *Geh. in Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, I.*

— *As.* : Alatau.

var. campestre *Hüb. (β), Wallr. (α).* — *P. commune* *var. perigoniale*.

α *var. canadense* *Kindb. in Mac. Cat. p.* 156.

P. commune *Mac. Canad. M. n.* 225.

Ad terr. humid. in silv. — *Am. sept.* : New Brunswick, Gaspes., Ontar., M. Selkirk.

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 563.

var. ciliatum *Retz.* — *P. juniperinum*.

α *var. Ehrenbergii* *Ltz. M. Ehrenb. p.* 49, t. 14, f. 11-16 et t. 15, f. 1-2.

— *As.* : Syria.

(1) α *P. formosum* a *P. gracili* non distinguunt et utrumque ad *P. commune* revocant. α *Brid. Bryol. univ. II, p.* 154.

« *var. fastigiatum* Wils. *Bryol. brit.* p. 212.

P. cubicum var. fastigiatum Lindb. in *Notis...* 1867, p. 119.

— *Eur.* : Suecia, Scot.

var. formosum Drumm. — *P. juniperinum*.

var. humile Sw., W. P. Sch. — *P. commune var. minus*.

« *var. Mac-Leanum* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 577.

— *Afr.* : Transvaal.

var. majus Weiss. — *P. commune*.

« *var. Maximowiczii* Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 224.

— *As.* : Japon. (ins. Nippon).

var. medium Weigg. — *P. juniperinum*.

« *var. minus* Weiss *Pl. crypt. fl. Goett.* p. 171 p.p.; *Bryol. eur. et C. M. ll. cc.*

P. commune var. humile Sw. *Adn. bot.* p. 141; W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 449 et II ed. p. 546.

P. commune β L. *Sp. pl.* I ed., II, p. 1009 p.p.

P. cubicum Lindb. in *Notis...* 1867, p. 117.

P. quadrangulare Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus Dill. *Hist. M.* p. 424, n. 2 excl. syn. (fid. Lindb.).

P. yuccaefolium Hoppe in *Sturm Deutsch. Fl.* II, p. 4 p.p.

In loc. siccior. — *Eur.* : Hic illic. *Afr.* : C. B. Sp. *Am. sept.* : New Jersey, Unalaschka.

var. minus { *Brid.* — *P. commune var. pygmaeum*.
Weigg. — *P. piliferum*.

« *var. perigoniale* (Rich.) *Bryol. eur.*, *C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*

P. commune var. campestre Wallr. *Fl. crypt. germ.* I, p. 201; Hüb. *Muscol. germ.* p. 525.

P. perigoniale Rich. in *Mich. Fl. bor. am.* II, p. 295; *Brid. op. cit.* p. 150.

P. yuccaefolium β *perigoniale* Mart. *Fl. crypt. Erlang.* p. 83.

Ut praeced. — *Eur.* : Hic illic. *Am. sept.* : Ontario, Columb. brit., reg. sept., or., centr. et merid. *Pac.* : Austral. felix.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 73?

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 330.

var. piliferum Weiss. — *P. piliferum*.

var. pilosum Ehrh. — *P. piliferum*.

« *var. pygmaeum* (Lindb.) Par.

P. commune β *minus* *Brid. Bryol. univ.* II, p. 150? (fid. Lindb.).

P. cubicum var. pygmaeum Lindb. in *Notis...* 1867, p. 118.

In spongiosis. — *Eur.* : Fennia.

var. serrulatum Retz. — *P. commune*.

« *var. uliginosum* Hüb. *Muscol. germ.* p. 535.

P. commune γ *yuccaefolium* de Not. *Epil.* p. 330.

In turfis. silvat. — *Eur.* : Central.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 120.

var. yuccaefolium { Ehrh. — *P. commune*.

{ de Not. — *P. commune var. uliginosum*.

var. β L. — *P. commune var. minus*.

var. γ L. — *P. piliferum*.

commune { *C. M. p.p.* — *P. subpilosum*.

{ Mac. — *P. commune var. canadense*.

{ Schrank. — *P. juniperinum*.

- comorense C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 115.
2. — Afr. : Comor. magna.
- compressum H. f. et W. — Psilopilum.
- conforme Mitt. *M. austr. am.* p. 621.
— Am. merid. : And. Quitens.
- conorhynchum Kindb. in *Mac. Cat.* p. 154.
2. In paludos. — Am. sept. : M. Selkirk.
- contortum Menz. — Pogonatum.
var. *pallidum* Lindb. — Pogonatum contortum var. *pallidum*.
- controversum { Brid. — Atrichum undulatum var. abbreviatum.
Hedw. — Atrichum angustatum.
- convolutum { Dz. et Mk. — Pogonatum macrophyllum.
Hedw. — Pogonatum tortile.
Hook. — Pogonatum semi-pellucidum.
L. — Pogonatum.
- var. *cirratum* C. M. — Pogonatum convolutum var. *cirratum*.
- coronatum Brid. — P. formosum.
- crassisetum Lam. et DC. — P. sexangulare.
- croceum Hpe. in *Linn.* 1852, p. 715.
— Pac. : Tasman.
- cubicum Lindb. — P. commune var. minus.
var. *fastigiatum* Lindb. — P. commune var. *fastigiatum*.
var. *pygmaeum* Lindb. — P. commune var. *pygmaeum*.
- cucullatum Hpe. — Pogonatum.
- cuspidigerum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 16.
— Am. merid. : And. Boliv.
- cuspidirostrum W. P. Sch. in *Mand. Pl. Boliv. n.* 1687 ; C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 16.
— Am. merid. : And. Boliv.
- cylindricum Sw. — Atrichum angustatum.
- decipiens Limpr. in *LXVIII Jahresb. d. Schles. Ges. f. Vaterl. Cultur.* 1890, II, p. 93 et *Laubm. Deutschl. II*, p. 618.
P. ohioense (fid. Kindb.).
2. In petros. — Eur. : Thuring., Riesengeb.
- defluens Brid. — Pogonatum aloides var. *defluens*.
- dendroides Hedw. — Polytrichadelphus.
- densifolium Wils. in *sched.* ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 155.
2. — As. : Sikkim.
- densifolium Hpe. — P. Novae Hollandiae.
- dentatum { Lesq. p.p. — Pogonatum contortum.
Menz. — Pogonatum.
- Dicksoni Turn. — Pogonatum aloides var. *defluens*.
- domingense Brid. — Pogonatum tortile.
- dubium Scop. — Pogonatum urnigerum.
- Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 346.
— Afr. : M. Cameroon.
- elatum P. B. *Prodr.* p. 85 ; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 152 ; C. M. *Syn. I*, p. 221.
P. purpurascens Brid. *Mant. M.* p. 197.
2. In sphagnet. — Afr. : Ins. Borbon., Franciae.

elegans *Hedw. et Duby in Mém... Genève*, 1870, p. 8, t. 11, f. 1.

2. In dumet. rupestr. humidiusc. — *Afr.* : Angola.

elongatum *P. B. Prodr.* p. 85 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 156 ; *C. M. Syn.* I, p. 222 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 622.

— *Am. merid.* : Fret. Magell.

equisetiforme *C. M. in Linn.* 1874, p. 579.

Ster. ♂ et fr. ign. In paludos. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

ericoides { *Hpe.* — *Polytrichadelphus*.
 { *Hoffm.* — *Pogonatum nanum*.

erythrodontium *Kindb.* — *Pogonatum*.

falcifolium *Griff.* — *Oligotrichum semi-lamellatum*.

fasciculatum *Mich.* — *Pogonatum urnigerum*.

ferrugineum *Brid.* — *Pogonatum alpinum*.

flaccido-gracile *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 274.

— *Afr.* : Austral.

flexicaule *C. M. l. c. n.* 275 et b.

— *Afr.* : Austral.

flexuosum *C. M.* — *Polytrichadelphus*.

formosum *Hedw. Sp. M.* p. 92, t. 19 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 151 ; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 9), t. 420 ; *C. M. Syn.* I, p. 224 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 541 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 264 p p.

Atrichum anomalum *Milde (fid. Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 619).

P. attenuatum *Menz. in Trans. of the Linn. Soc.* IV, p. 72, t. 6, f. 2.

P. aurantiacum β *Wahlenb. Fl. Upsal.* p. 387.

P. commune β *attenuatum* *H. et T. Muscol. brit.* p. 26 p.p.

P. commune β *aurantiacum* *Wahlenb. Fl. Suec. I ed., II,* p. 737 p.p.

P. coronatum *Brid. op. cit.* p. 748 ?

P. formosum var. α *quadrangulare* *Hartm. Skand. Fl. I ed.,* p. 404.

P. formosum β *superbum* *Fiedl. Syn. Laubm. Mecklenb.* p. 97.

P. marginatum *Hedw. Sp. M.* p. 8 excl. syn. (fid. *Schwaegr.*)

P. stans *Thuill. herb.*

P. superbum *Schultz Syll. in Ephem. bot. Ratisb.* p. 152.

2. In silvat. — *Eur.* : Reg. montos. usq. in subalp., rar. in planit. *As.* : Japon., Caucas., Syria. *Afr.* : Alger., Madeir. ; ins. Amsterdam ? *Am. sept.* : Groenland, Terr. nov., Miquel., New York, lac. Erie, Columb. brit., Alaska, Sitka, Washington.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 429.

Rab. Bryoth. eur. n. 118.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 323.

var. *aurantiacum* *Hartm.* — *P. gracile*.

var. *gracile* *Vent. et Bott.* — *P. gracile*.

« var. *pallidisetum* (*Funk*) *Brid. Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

P. pallidisetum *Funk Moostschb.* p. 69, t. 55.

Ut typ. — *Eur. et Am. sept.* : In subalp. *As.* : Japon.

var. *superbum* *Fiedl.* — *P. formosum*.

formosum *Lesq. et Jam. p.p.* — *P. ohioense*.

furcatum *Hsch.* — *Pogonatum alpinum* var. *furcatum*.

Gardneri *C. M.* — *Pogonatum*.

Germaini *C. M.* — *Pogonatum*.

Giesbreghtii *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 67.

2.

— *Am. sept.* : Mexic.

giganteum Hook. — Polytrichadelphus.

glabratum Wahlenb. — Psilopilum arcticum.

glabrum Brid. — P. remotifolium.

Glaziovii Hpe. — Pogonatum.

gracile (Dicks.) Menz. in *Trans. of the Linn. Soc.* IV, p. 73, t. 6, f. 3; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 154; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 10), t. 421; *C. M. Syn.* I, p. 225; *W. P. Sch. op. cit.* p. 540.

Catharinea Dixoni Braithw. in *Journ. of the bot. brit. etc.* XXIII, Aug. 1885.

Pogonatum urnigerum ε *nigrescens* Brid. *op. cit.* p. 124.

P. attenuatum β *aurantiacum* Turn. *Muscol. Hibern.* p. 83.

P. aurantiacum Hoppe *Bot. Taschb.* 1800, p. 131.

P. commune β *attenuatum* H. et T. *Muscol. brit.* p. 26 p.p.

P. commune β *aurantiacum* Wahlenb. *Fl. Suec.* I ed., II, p. 737 p.p.

P. formosum β *aurantiacum* Hartm. *Skand. Fl.* I ed. p. 404 et II ed. p. 324.

P. formosum var. *gracile* Vent. et Bott. *Enum. crit.* p. 30.

P. formosum β *rupestre* Brid. l. c.

P. longisetum Sw. *M. Suec.* p. 76, t. 8, f. 16.

P. longisetum β *aurantiacum* Brid. *Sp. M.* I, p. 60.

P. marginatum W. et M. *Ind. mus. pl. crypt.* (1803).

P. nigrescens DC. *Fl. fr.* II, p. 490.

2. In turfis., rar. in rup. fiss. — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in subalp. per zon. intermed. et septentr. *As.*: Japon., Jenissei, Obi, Talysch, Caucas. *Am. sept.*: Terr. nov., ins. Miquel., New Brunswick, Ontar., lac. Super., M. Rupest. et Selkirk, Columb. brit., litt. mar. Behring, fret. Kotzebue, Minnesota, Ohio. *Pac.*: Nov. Zeland.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 478.

Rab. *Bryoth. enr.* n. 122, 286.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 324.

var. *rupestre* Brid. — P. *gracile*.

Graeffeanum C. M. — Pogonatum.

grandifolium Lindb. — Pogonatum.

Gulliveri Hpe. — Pogonatum.

gymnophyllum Wils. — Pogonatum.

helveticum Schleich. — P. *sexangulare*.

hercynicum Hedw. — Oligotrichum.

Hoehneli C. M. in *Fl.* 1890. p. 471.

2. In herbos. — *Afr.*: Kilima N'Djaro, reg. lacustr.

Holstii Broth. — Pogonatum.

Hoppii Hsch. — P. *piliferum* var. *Hoppii*.

Humboldtianum Hpe. — Pogonatum.

R. Br. — P. *piliferum* var. *hyperboreum*.

hyperboreum } Wahlenb. (fid. C. M.). — P. *sexangulare*.

Wahlenb. (fid. Lindb.). — P. *alpinum* var. *septentrionale*.

implicatum Voit. — P. *juniperinum*.

innovans C. M. — Polytrichadelphus.

intermedium Brid. — Pogonatum nanum.

involutum Hpe. *Symb.* 1877, p. 727.

Ster.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Jamesoni Tayl. — Pogonatum oligodus.

Junghunianum Dz. et Mk. — Pogonatum.

var. *incurvum* eor. — Pogonatum *Junghunianum* var. *incurvum*.

juniperellum C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 205.

2.

— *Afr.*: Madagascar.

juniperifolium Hoffm. — *P. juniperinum*.

juniperiforme W. P. Sch. in *Lechler Pl. Peruv. n.* 2281; *Mitt. M. austr. am.* p. 621.

Rupic. — *Am. merid.* : Chile.

juniperinum ^{Weidm.} Hedw. *Sp. M.* p. 89, t. 18, f. 6-10; ⁽¹⁸⁰¹⁾ *Brid. Bryol. univ. II*, pp. 136 et 746; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 12), t. 423; *C. M. Syn. I*, p. 218; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 543.

P. commune Schrank *Baiers Fl. II*, p. 446.

P. commune β *ciliatum* Retz. *Fl. Scand. Prodr. n.* 1194.

P. commune var. *formosum* Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 276.

P. commune β *medium* Weigg. *Fl. Pom. Rug.* p. 679.

P. implicatum Voit *M. Herbig.* p. 59.

P. juniperifolium Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 24, n. 2.

P. pallidisetum var. *Drumm. l. c.* n. 280.

P. quadrangulare Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus Dill. *Hist. M.* p. 424, t. 54, f. 2 (fid. *C. M.*).

2. In ericet. humid., pasc. silvat., etc. — *Eur.* : Tota. *As.* : Japon., Kamschatka, penins. Samoied., Jenissei, Obi, Taimyr, Ochotsk, Irkoutsk, Kashmir, Caucas., *As. min.* *Afr.* : Alger., Madeir., ins. Canar., S. Helena, Tristan d'Acunha, M. Cameroon, C. B. Sp. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, fret. Smith., sin. Baffin et Hudson; de Terr. nov. ad ins. Vancouver et fret. Kotzebue; tota temper., Costa Rica. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens., et Boliv., Valdiv., fret. Magellan. *Pac.* : Alp. Austral. merid. or., Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 277 et *II ed.* n. 71.

Mac. *Canad. M.* n. 223.

Mandon *Pl. Madeir.* n. 29.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 810, b c.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed.* n. 327.

« var. *affine* Roehl. *Deutsch. Fl. III*, p. 58; Lindb. in *Notis...* 1867, p. 123.

P. alpestre β *affine* Funk in *Moostschb.* p. 88, t. 84; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 140.

Ut typ. — *Eur.* : German.

var. *alpestre* *Bryol. eur.* — *P. strictum*.

« var. *alpinum* W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 447 et *II ed.* p. 544.

Ut typ. — *Eur.* : In subalp. usq. ad niv. aetern. *As.* : Kashmir. *Am. sept.* : Wisconsin.

var. *gracile* Wahlenb. — *P. strictum*.

« var. *integrum* *C. M. l. c.*

— *Am. merid.* : Chile.

var. *strictum* Liljeb., *Bryol. eur.* — *P. strictum*.

« var. *Waghornei* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 155.

— *Am. sept.* : Labrador.

var. *W.* et *M.* — *P. strictum*.

laevigatum Wahlenb. — *Psilopilum arcticum*.

laevipilum Hpe. — *P. piliferum* var. *laevipilum*.

laterale Crome. — *Pogonatum aloides* var. *defluens*.

latidens *C. M. in Dusen M. Camer.* n. 512.

— *Afr.* : M. Cameroon.

leioneuron Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II, p. 91 et in Marie M. Mad. n. 9.*

— *Afr.* : Ins. Mayotte.

leptopelma C. M. — *Pogonatum*.

leucomitrium Hsch. — *Pogonatum convolutum var. cirratum*.

Libani Ren. et Card. mss.

2. — *As.* : M. Liban.

Liebmannianum C. M. — *Pogonatum*.

ligulatum Mitt. — *Atrichum Müllerii*.

longifolium Bryol. eur. — *Dawsonia superba* ?

longisetum { Hook. — *Polytrichadelphus*.
Sw. — *P. gracile*.

var. *aurantiacum* Brid. — *P. gracile*.

longissimum C. M. in *Hildebr. M. Mad. n. 2125*.

— *Afr.* : Madagascar.

loricalyx C. M. — *Pogonatum*.

var. *brachypodon* C. M. — *Pogonatum loricalyx var. brachypodon*.

Macounii Kindb. — *Pogonatum*.

macrorhaphis C. M. *Bryol. austr. Georg. p. 14*.

Ster. In lapidos. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

madagassum Hpe. — *Pogonatum* ?

magellanicus { Hedw. p.p. — *Polytrichadelphus horridus*.
L. — *Polytrichadelphus*.

mahense Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc. p. 116*.

2. — *Afr.* : M. ins. Seychelles.

mammillatum Lindb. *M. Scand. p. 12 (subsp. P. juniperini)*.

2. — *Eur.* : Fennia. *As.* : Caucas. centr.

marginatum { Hedw. — *P. formosum*.
Schwaegr. — *Psilopilum arcticum*.
W. et M. — *P. gracile*.

mauritianum C. M. in *Besch. op. cit. p. 117*.

Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.

micro-capillare C. M. — *Pogonatum*.

microcephalum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 77 et in Forschungsreise... Bot. p. 11*.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

microdendron C. M. — *Pogonatum*.

microphyllum Dz. et Mk. — *Pogonatum*.

microstomum R. Br. — *Pogonatum*.

minimum Crome. — *Pogonatum aloides var. defluens*.

minioides Neck. — *Pogonatum aloides*.

Molinae Mont. — *Oligotrichum*.

Molleri C. M. — *Pogonatum*.

nanocephalum C. M. *Bryol. austr. Georg. p. 16*.

Ster. Rupic. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

nano-globulus C. M. in *Fl. 1888, p. 408*.

Rupic. in herbos. — *Afr.* : Kilima N'Djaro, reg. lacustr.

nanum { Hedw. — *Pogonatum nanum*.
Hoffm. — *Pogonatum aloides var. defluens*.
Weiss. — *Pogonatum aloides*.

- var. β Weiss. — *Pogonatum nanum*.
 var. *Dicksoni* Lindb. — *Pogonatum nanum* var. *defluens*.
nanum capsulis rotundatis galeritis, Aloës folio non serrato Dill. —
Pogonatum nanum.
Neesii C. M. — *Pogonatum*.
neglectum Hpe — *Pogonatum*.
nigrescens DC. — *P. gracile*?
nigricans H. f. et W. — *Oligotrichum Riedelianum*.
norvegicum { Hedw. (fid. Brid.). — *P. sexangulare*.
 { Hedw. (fid. Lindb.). — *Pogonatum alpinum* var. *septentrionale*.
 { Hedw. (fid. W. P. Sch.). — *Pogonatum alpinum*.
Novae Hollandiae Jaeg. *Ad. I, p. 732*.
P. densifolium Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 635.
 — *Pac.* : Alp. Austral. or.
nudicaule Wright. — *Pogonatum*.
nuka-hivense C. M. — *Pogonatum*.
obtusatulum C. M. — *Pogonatum*.
obtusum C. M. — *Pogonatum*.
octangulare C. M. — *Pogonatum*.
Æderi Brid. { (fid. C. M.). — *P. sexangulare*.
 { (fid. Lindb.). — *Pogonatum alpinum* var. *septentrionale*.
ohioense Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1885, p. 11, in *Bot. Gaz.* 1888,
 p. 199, t. 17 et *M. Amer. sept. n. 70 et b.*
P. formosum Lesq. et Jam. *Man.* p. 264 p.p.
 2. Ad terr. in silv. — *Am. sept.* : Anticosti, New Brunswick, Gaspes.,
 Ontar., lac. Erie et Super., Columb. brit., reg. sept., or. et centr.
Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 221.
oligodus Kze. — *Pogonatum*.
pachyneuron Hpe. — *Pogonatum convolutum*.
pallidicaule C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n. 41*.
 Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
pallidisetum { Drumm. — *P. commune*.
 { Funk. — *P. formosum* var. *pallidisetum*.
 var. Drumm. — *P. juniperinum*.
parvum Aloës folio serrato, capsulis oblongis Dill. — *Pogonatum aloides*.
patagonicum C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 90.
 — *Am. merid.* : Argentin. Patagon.
patens C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 17.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
putulum Harv. — *Pogonatum*.
paulense Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
pensilvanicum { Hedw. — *Pogonatum*.
 { H. f. et W. — *Pogonatum Gardneri*.
 var. *Torreyanum* C. M. — *Pogonatum pensilvanicum* var. *Torreyanum*.
perichaetiale Mont. — *Pogonatum*.
perigoniale Rich. — *P. commune* var. *perigoniale*.
perpusillum C. M. — *Pogonatum*.
Pervillei Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 114.
 2. — *Afr.* : Madagasc. sept.

« var. leptocaula Besch. l. c.

— Afr. : Ins. Borbon.

Petersianum C. M. — Pogonatum.

piliferum Schreb. *Spic. fl. Lips.* p. 74; *Brid. Bryol. univ.* II, pp. 142 et 747; *Bryol. eur.* IV (mon p. 11), t. 422; C. M. *Syn.* I, p. 217; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 542.

P. commune var. γ L. *Sp. pl.* p. 1573.

P. commune var. β minus Weig. *Fl. Pomer. Rug.* n. 679.

P. commune var. β piliferum Weiss *Crypt. Goett.* p. 172.

P. commune var. β pilosum Ehrh. in *Hann. Mag.* 1780, p. 235.

P. pilifolium Gray *Nat. arr. brit. pl.* I, p. 720.

P. pilosum Neck. *Meth. M.* p. 128.

P. quadrangulare minus, Juniperi foliis pilosis Dill. *Hist. M.* p. 426, t. 54, f. 3.

2. In ericet. sicc. et arenos. steriliss. — Eur. : Tota; Spitzberg., ins. Parry. As. : Japon., Saghalien, Amour, Taimyr, Jenissei, Obi, Ochotsk, Caucas. Afr. : Madeir., ins. Canar. Am. sept. : Groenland, Labrador, de ins. Miquel. ad Alaska et ins. Vancouver; tota temper. Am. merid. : Ins. Juan Fernandez, fret. Magellan., Cap. Horn.; ins. Maclov. ? (1) Pac : Austral.

Ews. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 278.

Mac. *Canad. M.* n. 222.

Mandon *Pl. Madeir.* n. 28.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 121.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 325.

« var. aequinoctiale Ltz. *Moosst.* p. 157.

— Am. merid. : M. Pichincha.

« var. alpestre Wulfsb. in *Christiania.... Forhandl.* 1875 et in *Rev. bryol.* 1887, p. 45.

— Eur. : Norvegia.

« var. australe Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 125.

— Afr. : Ins. Comor. magn.

« var. fastigiatum (Lindb.) Far.

P. pilosum var. fastigiatum Lindb. *M. Scand* p. 12.

— Eur. : Fennia.

« var. gracile Lindb. in *Oefv....* 1866, p. 548, n. 76 β .

Ster.

— Eur. : Spitzberg.

« var. Hoppei (Hsch.) *Bryol. eur. et W. P. Sch.* II, cc.

P. Hoppei Hsch. in *Fl.* II, p. 106 et VI, p. 16; *Brid. Bryol. univ.* II, pp. 143 et 747.

In siccior. — Eur. : Summ. Alp. As. : Caucas. or. Am. sept. : M. Rupestr., Idaho.

« var. hyperboreum (R. Br.) C. M. l. c. p. 218; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 543 (in adn.).

P. hyperboreum R. Br. in *Neue bot. Zeit.* VII, Beil. p. 114 et in *App. ad iter Parray.* p. 194; *Schwaeagr. Suppl.* II, p. 8, t. 153; *Brid. Bryol. univ.* II, pp. 144 et 747.

— Eur. : Spitzberg, Fennia. As. : Penins. Tschutschica, Jenissei. Am. sept. : Groenland, ins. Melville.

[1] An potius *P. trachynoton*?

« *var. laevipilum* (Hpe.) Sull. *M. bor. am. II ed.* p. 55.

P. laevipilum Hpe. in *Linn.* 1859, p. 459.

— *Am. sept.* : Sierra Nevada Calif., M. Rupestr.

piliferum Mitt. — *P. trachynoton* ?

pilifolium C. M. in *Hedwig* 1897, p. 92.

♂ et fr. ign. — *Am. merid.* : La Plata.

pilifolium Gray. — *P. piliferum*.

pilosum Neck. — *P. piliferum*.

var. fastigiatum Lindb. — *P. piliferum var. fastigiatum*.

plurirameum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 15.

Ster. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

plurisetum C. M. — *Pogonatum polycarpum*.

var. brevipes C. M. — *Pogonatum polycarpum var. brevipes*.

Polakowskyi C. M. in *Journ. of bot.* 1877, p. 227 (nom.).

Terr. — *Am. sept.* : Costa Rica.

polycarpum } C. M. — *Pogonatum*.

Col. — *Polytrichadelphus*.

polysetum H. et Arn. — *Pogonatum oligodus*.

polythamnium C. M. — *Pogonatum*.

polytrichoides Brockm. — *Pogonatum nanum*.

Preussii Broth. in *Engler's Bot. Jarb.* 1894, p. 193.

2. — *Afr.* : M. Cameroon.

prionotrichum C. M. in *Hedw.* 1897, p. 92.

— *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

prionctum C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 91.

— *Am. merid.* : And. Argentin. subtropic. Tucuman.

procerum Lindb. — *Pogonatum*.

proliferum Griff. — *Pogonatum*.

propinquum R. Br. — *P. commune*.

pseudo-alpinum C. M. — *Pogonatum*.

psilopiloides C. M. — *Pogonatum*.

pulverulentum Reyn. — *Pogonatum urnigerum*.

pumilum Sw. — *Pogonatum nanum*.

pungens C. M. in *Fl.* 1888, p. 408.

Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

pungens Wils. — *Pogonatum Thomsoni*.

purpurans Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 114.

Ad terr. humid. — *Afr.* : Ins. Borbon.

purpurascens } Brid. — *P. elatum*.

Hpe. — *Pogonatum*.

Gilib. — *P. commune*.

quadrangulare { *Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus* Dill. (fid. Auct. omn.). — *P. juniperinum*.

Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus Dill. (fid. Lindb.) — *P. commune var. minus*.

minus, Juniperi foliis pilosis Dill. — *P. piliferum*.

vulgare, Yuccae foliis serratis Dill. — *P. commune*.

ramosum W. P. Sch. in *Mand. Pl. Boliv.* n. 1686.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

ramosum { Gunn., Œd. — *Pogonatum alpinum* var. septentrionale.
 } *setis ex alis setigeris* Dill. — *Pogonatum urnigerum*.

Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 270.

— *Afr.* : C. B. Sp.

* *var. julaceum* *Rehm. l. c. n.* 576 et b.

— *Afr.* : Transvaal.

remotifolium P. B. *Prodr.* p. 86 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 147 ; C. M. *Syn.* I, p. 222.

P. *Apulejæ* *Commers. in hb. Mus. Paris* (1).

P. *glabrum* *Brid. op. cit.* p. 141 ; C. M. *l. c.* p. 220.

In lacun. exsicc. — *Afr.* : Ins. Bourbon., Franciae.

remotifolium *Brid. p.p.* — P. *Swartzii* ?

Rhacomitrium C. M. in *Journ. of bot.* 1877, p. 227 (nom.).

Terr. — *Am. sept.* : Costa Rica.

rhynchomitrium C. M. in *Linn.* 1874, p. 577.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Riedelianum *Mont.* — *Oligotrichum*.

robustum C. M. in *Hildebr. M. Mad. n.* 2126.

— *Afr.* : Madagascar.

robustum *Lindb.* — *Polytrichadelphus magellanicus*.

rubellum *Menz.* — *Pogonatum aloides*.

rubenti-viride C. M. — *Pogonatum*.

rubescens *Mitt. M. austr. am. p.* 622.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

rubiginosum C. M. — *Pogonatum*.

rufisetum *Wils.* — *Pogonatum*.

Rutenbergii C. M. — *Pogonatum*.

Sartorii C. M. — *Pogonatum*.

scabriusculum *Brid.* — P. *Antillarum*.

Schmitzii *Ltz.* — *Pogonatum*.

secundulum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 15.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

* *var. angusticaule* *ej. l. c.*

Ut typ.

semi-angulatum *Sull.* — *Polytrichadelphus*.

semi-diaphanum *Brid.* — *Pogonatum nanum*.

semi-lamellatum *Hook.* — *Oligotrichum*.

semi-nudum *Wils.* — *Pogonatum*.

semi-pellucidum *Hpe.* — *Pogonatum*.

septentrionale *Sw. p.p.* } — *Pogonatum alpinum* var. septentrionale.

 } — P. *sexangulare*.

serratum *Schrank.* — P. *commune*.

serrulatum *Hpe. hb.*

— *Pac.* : Nov. Zeland.

setifolium *Sw.* — P. *Antillarum*.

(1) Cf. *Bescherelle Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 111.

sexangulare Floerke in Hoppe Bot. Taschb. 1800, p. 150; Brid. Bryol. univ. II, p. 145; Bryol. eur. IV (mon. p. 7), t. 419; W. P. Sch. op. cit. p. 540.

P. crassisetum Lam. et DC. Fl. fr. II, p. 436.

P. helveticum Schleich. Crypt. helv. Cent. III, n. 16.

P. hyperboreum Wahlenb. Fl. Lapp. p. 347 (fid. C. M.).

P. norvegicum Hedw. Sp. M. p. 99, t. 22, f. 1-5.

P. Oederi Brid. M. Rec. II, I, p. 99.

P. septentrionale Sw. M. Suec. p. 77, t. 9, f. 18 p.p. (1); C. M. Syn. I, p. 223.

2. In depressis nivos. — Eur.: Summ. Alp.; Spitzberg?, ins. Ursor., Lappon., Norveg. As.: Kamschatka. Am. sept.: Groenland, ins. Melville, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Alaska, Oregon.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 428.

Rab. Bryoth. eur. n. 285, 732, 1327.

Un. itin. 1867, n. 80.

« var. nivale Kindb. in Hedw. 1896, p. 67.

— Am. sept.: Oregon.

sexangulare Angstr. p.p. — Pogonatum alpinum var. septentrionale.

silvaticum Menz. — Pogonatum alpinum var. arcticum.

sinense C. M. — Pogonatum.

Smithii Hall. — Leptodon.

Spegazzinii C. M. in Fl. 1885, p. 399.

Ster.? Terr. — Am. merid.: Fuegia austral.

Sprucei Lindb. — *P. aristiflorum*.

squamosum H. f. et W. — *Polytrichadelphus*.

stans Thuill. — *P. formosum*.

striatum Huds — *Orthotrichum leiocarpum*.

var. γ Neck. { — *Ulota Bruchii*?
— *Ulota crispa*?
— *Ulota crispula*?

strictum Banks mss.; Menz. in Trans. of the Linn. Soc. IV, p. 77, t. 7, f. I; Brid. Bryol. univ. II, p. 139; W. P. Sch. Coroll. p. 92 et Syn. II ed. p. 544.

P. alpestre Hoppe Bot. Taschb. 1801, p. 198, n. 2; Brid. op. cit. p. 140; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 281.

P. juniperinum var. *W. et M. Bot. Taschb.* p. 220; Engl. Bot. XXXIV, t. 2435.

P. juniperinum var. *alpestre* Bryol. eur. IV (mon. p. 12 et 13), t. 424; C. M. Syn. I, p. 218.

P. juniperinum var. *gracile* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 344.

P. juniperinum var. *strictum* Wallm. in Liljebl. Sv. Fl. III ed., p. 527; Bryol. eur. et C. M. ll. cc.

2. In turfis. et uligin. — Eur.: E reg. campestr. usq. in alp.; Spitzberg. As.: Saghalien, Amour, Penins. Tschutschica, Obi, Jenissei, Alatau. Am. sept.: Groenland, Labrador, Anticosti, Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Sitka, fret. Kotzebue, Wyoming, reg. sept. et or. Am. merid.: Patagon. austr., Fuegia.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 224.

Rab. Bryoth. eur. n. 117, 1010

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 328.

(1) Cf. C. M. l. c., Lindb. in Notis.... 1867, p. 128 et W. P. Sch. l. c.

- subaloides* C. M. — Pogonatum.
 var. *minor* C. M. — Pogonatum *subaloides* var. *minor*.
subappressum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 111.
 — Afr. : Ins. Borbon.
subcarinatum Hpe. *Symb.* 1874, p. 500.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or.
subcontortum Hpe. — Pogonatum.
subflexuosum Ltz. — Polytrichadelphus.
subformosum Besch. *op. cit.* p. 117.
 — Afr. : Ins. Borbon.
subgracile Hpe. { — Pogonatum.
 { — P. *subcarinatum*.
subpilosum P. B. *Prodr.* p. 86.
 P. *Commersonianum* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 153.
 P. *commune* C. M. *Syn.* I, p. 220 p.p.
 — Afr. : Usambara, ins. Borbon.
subremotifolium Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.
 In rupestr. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
subrotundum Huds. — Pogonatum *nanum*.
 var. *longisetum* Lindb. — Pogonatum *nanum* var. *longisetum*.
 var. β Huds. — Pogonatum *aloides*.
substrictum Hpe. in Krause M. *Ecuador*.
 — Am. merid. : And. Æquator., Chile austr.
subtortile C. M. — Pogonatum.
subulatum Menz. — Pogonatum.
Sullivanii Hpe. in Linn. 1876, p. 316.
 2. — Pac. : Austral. or.
superbum Schultz. — P. *formosum*.
Swartzii Hartm. *Skand. Fl.* V ed. p. 361 ; C. M. *Syn.* II, p. 565.
 P. *alpestre* Sw. *Summ. veg. Scand.* p. 40 ; Hartm. *Skand. Fl.* IV ed. p. 2.
 P. *commune* * *Swartzii* C. Hartm. *Skand. Fl.* IX ed. II, p. 43.
 P. *remotifolium* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 147 (*quoad spec. a Kamschatka*) ?
 2. *Paludic.* — Eur. : Penins. Scandin., Fennia. As. : Kamschatka ?
tenellum C. M. — Pogonatum.
tenuë Menz. — Pogonatum *pensilvanicum*.
tenuirostre Hook. — Oligotrichum.
Teysmannianum Dz. et Mk. — Pogonatum.
thelicarpum C. M. — Pogonatum.
Thomsoni Mitt. — Pogonatum.
Thysanomitrium C. M. in Linn. 1874, p. 578.
 2. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
timmioides C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 15.
 Ster. In lapidos. — Am. merid. : Austr. Georg.
tolucense Hpe. — Pogonatum.
tortile { C. M. p.p. — Pogonatum *semi-pellucidum*.
 { Sw. — Pogonatum.
tortipes Wils. — Pogonatum.
trachynotum C. M. in *Fl.* 1885, p. 399.
 P. *piliferum* Mitt. M. *austr. am.* p. 620 ?
 Ster. Terr. — Am. merid. : Fuegia.

Trianae C. M. — *Polytrichadelphus*.

trichodes C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 277 et 578.

— *Afr.* : Transvaal, C. B. Sp.

trichodon H. f. et W. — *Psilopilum*.

Tristani Duby in *Mém.... Genève*, 1875, p. 6, t. 1, f. 2.

2. — *Afr.* : l. Tristan d'Acunha.

tuberculosum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 11.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

tumescens C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 91.

— *Am. merid.* : And. Argentin.

« *var. pygmaeocaulon* C. M. in *op. et l. cc.*

Ubi typ.

undulatum { Hedw. — *Atrichum*.
Schränk. — *Mnium*.

var. minus { Funk; W. et M. — *Atrichum tenellum*.
Hedw. — *Atrichum undulatum var. abbreviatum*.
Mich. — *Atrichum angustatum*.

var. subserratum H. f. et W. — *Atrichum undulatum var. subserratum*.

var. tenellum Wahlenb. — *Atrichum tenellum*.

var. l H. f. et W. — *Atrichum undulatum var. attenuatum*.

var. Sw. — *Atrichum tenellum*.

urnigerum { L. — *Pogonatum*.
W. Arn. — *Pogonatum dentatum*.

var. capillare Hartm. — *Pogonatum*.

var. humile Wahlenb. — *Pogonatum urnigerum var. humile*.

var. tetragonum Lindb. — *Pogonatum urnigerum var. tetragonum*.

var. C. M. — *Pogonatum capillare*.

var. β Huds. — *Pogonatum alpinum*.

usambaricum Broth. — *Pogonatum*.

varians Hpe. — *Pogonatum*.

verrucosum Par.

P. angustifolium W. P. Sch. mss.; C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 178.

— *Am. sept.* : Guatemala.

velvatum C. M. — *Pogonatum*.

Wallisii C. M. — *Pogonatum*.

xanthophilum Wils. in *sched.*; Mitt. *M. Ind. or.* p. 156.

2. — *As.* : Sikkim.

yuccaefolium { Ehrh. — *P. commune*.
Hoppe. — *P. commune var. minus*.
P. B. — *Pogonatum capillare*.

var. perigoniale Mart. — *P. commune var. perigoniale*.

yuccoides Rehm. *M. Afr. austr. n.* 575.

Ster. — *Afr.* : Transvaal (1).

POROPHYLLUM W. P. Sch. *herb.*

Spec. omne **POROTRICHUM** ejusd. nom.

(1) De nom. nud. in Enum. Kindberg. cf. *Pogonatum*.

Porotheca *Limpr. Laubm. Deutsch. 11, p. 632* (sect. POLYTRICH).

POROTRICHUM *Brid. Bryol. univ. 11, p. 275* (sect. CLIMACH); *Bryol. jav. 11, gen. propr. (131 spec.)*.

alopecuroides (*Hook.*) *Bryol. jav. t. 193*.

Hypnum alopecuroides Hook. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 20 et Ic. pl. var. t. 24, f. 5; C. M. Syn. 11, pp. 501 et 692.

Neckera alopecuroides Mitt. M. Ind. or. p. 123.

N. efructifera Griff. Ic. pl. asiat. 11, t. 87, f. 3?

Thamnium alopecuroides Bryol. jav. 11, p. 73.

Ster. — *As. : Nepal., ins. Sumbawa.*

« *var. donghamense (Besch.) Par.*

Thamnium alopecuroides var. donghamense Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1897, p. 97.

Ad rup. madid. — As. : Tonkin.

alopecurum *Lindb. — Thamnium.*

ambiguum Bryol. jav. t. 192.

Thamnium ambiguum ibid. 11, p. 172.

2. *Ad arbor. — As. : Sumatra.*

« *var. javanicum (Bryol. jav.) Jaeg. Ad. 11, p. 215.*

Thamnium ambiguum var. javanicum Bryol. jav. l. c.

— *As. : Java.*

aneitense Mitt. Fl. Vit. p. 397.

Thamnium aneitense ej. in Proced. of the Linn. Soc. 1879 (extra-vol.), p. 101.

2. — *Pac. : Nov. Hebrid. (Aneitum).*

angustulum C. M. mss. ; Jaeg. Ad. 11, p. 206.

— *Am. merid. : Nov. Granat.*

anisopleuron Kiaë, in Borgen M. Mad. n. 42.

— *Afr. : Madagasc. centr.*

arbusculum (Lindb.) Ångstr. Prim. lin. p. 41.

Neckera arbuscula Lindb. mss.

— *Am. merid. : Brasil.*

arbusculum *Mitt. — Comptochaete.*

Bertrandi Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. belg. 1890, 1, p. 181.

Ad arbor. — Am. sept. : Haïti.

biforme C. M. mss.

Ster. — *As. : Sumatra sept. occ.*

bolivianum C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 149.

Ster. — *Am. merid. : And. Boliv.*

Bonianum Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1887, p. 97.

Ster. *Rupic. — As. : Tonkin.*

Braunii Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894. p. 200.

2. Ster. *Ad arbor. — Afr. : M. Cameroon.*

brunneolum C. M. hb.

— *As. : Java, Birman.*

caesium Mitt. M. austr. am. p. 467.

Ster. — *Am. merid. : And. Quitens.*

- callochroum* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 321.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- campylochaete* C. M. mss.
Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- Carantae* C. M. mss. ; *Jaeg. Ad. II*, p. 206.
— *Am. merid.* : Nov. Granat.
- caudatum* Broth. in *Bol. d. Soc. Brot.* 1890.
2. Ster. — *Afr.* : Ins. S. Thomas, Togo, Usambara.
- Chenagoni* C. M. mss.
— *Afr.* : Madagascar.
- clandestinum* Mitt. — *Lembophyllum*.
- cobanense* C. M. in *Bull. hb. Boissier*, p. 202.
Ster. Ad arbor. in silv. primaev. — *Am. sept.* : Guatemala.
- cochlearifolium* Mitt. — *Lembophyllum*.
- comorense* Hpe. in *Linn.* 1876, p. 270.
Ad arbor. — *Afr.* : Usambara, ins. Anjouan, Mayotte.
- confertum* Mitt. — *Thamnium*.
- crassipes* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 185.
1. ? Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica.
- crenulatum* C. M. hb.
— *Am. sept.* : Haïti.
- cymbifolium* (Lindb.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 175.
Isothecium cymbifolium Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 231.
2. — *As.* : I. Kiusiu Japon.
- decompositum* (Brid.) Mitt. *M. austr. am.* p. 463.
Leskea Omalia decomposita Brid. herb.
Neckera decomposita C. M. *Syn. II*, p. 42.
Pterygophyllum decompositum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 761.
Ster. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica, Hispaniola.
- deflexum* Mitt. — *Camptochaete*.
- decurvatum* Hpe. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84 (nom.).
— *Pac.* : Absque loco.
- dendroides* (Hook.) Mitt. *Fl. Vit.* p. 397.
Climacium neckeroides Brid. *Bryol. univ. II*, p. 276.
Neckera australasica C. M. *Syn. II*, p. 42.
N. dendroides Hook. *M. ex. t.* 69.
2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Fidji, Owyhee, Nov. Caledon. (ins. Pinorum).
- denticulatum* Mitt. *M. austr. am.* p. 462.
Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil.
- divulsum* Mitt. — *Lembophyllum*.
- Duseni* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 243.
— *Afr.* : M. Cameroon.
- elatulum* (C. M.) *Jaeg. Ad. II*, p. 206.
Hypnum elatulum C. M. in *Linn.* 1874, p. 617.
2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

- elegantissimum* Mitt. *Sam. M.* p. 187.
Hypnum elegantissimum C. M. *M. Polyn.* p. 90.
 2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- ellipticum* Bryol. jav. II, p. 70, t. 190.
 2. — *As.* : Sumatra, M. Java.
- Engleri* Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 200.
 2. Ster. — *Afr.* : Reg. lacustr.
- expansum* (Tayl.) Mitt. *M. austr. am.* p. 467.
Hypnum expansum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 64 (fid. Mitt.).
 2? — *Am. merid.* : And. Quitens.
- explanatum* Mitt. *op. cit.* p. 468.
 2. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.
- fasciculatum* (Sw.) Mitt. *op. et l. cc.*
Hypnum fasciculatum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 140; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 396; C. M. *Syn.* II, p. 226.
 2. Ad arbor. et rup. humid. — *Am. sept.* : M. Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens. et Peruv. Brasil. austr. or.
- filiferum* Mitt. *op. et l. cc.*
 Ster. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens. et Peruv.
- filiferum* Hpe. — P. Glaziovii.
flabellatum Mitt. — Homalia.
- flagellare* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 210.
Hypnum flagellare C. M. in *Bot. Zeit.* 1854 (fid. Jaeg.).
 Ad terr. in silv. — *Am. merid.* : Venezuela.
- flagellaceum* (Mitt.) Par.
Neckera flagellacea Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* XXIII, p. 52, t. 5, f. 6.
 Ster. — *Afr.* : Niger.
- flagelliferum* (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 469.
Hypnum flagelliferum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 309.
 — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- flaviusculum* (C. M.) Par.
Pinnatella flaviuscula C. M. mss.
 Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. brit.
- fruticosum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 210.
Neckera fruticosa Mitt. *M. Ind. or.* p. 122.
 2. — *As.* : Sikkim.
- fruticosum* Mitt. — *Camptochaete*.
- Geheebii* C. M. in *Linn.* 1876, p. 272.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Anjouan, Mayotte.
- Glaziovii* Par.
Hypnum filiferum Hpe. *Symb.* 1874, p. 506.
 2? Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- gracile* Mitt. — *Camptochaete*.
- grandidens* C. M. hb.
 — *Am. sept.* : Haïti.

- gymnopodium (*Tayl.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 465.
Hypnum gymnopodium C. M. *Syn. II*, p. 226.
Leskea gymnopoda *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 62.
 Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- humile *Mitt. op. cit.* p. 466.
 Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- imbricatum *Mitt. in Spr. Cat. M. Amaz. et And. n.* 1348.
 — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.
- insularum *Mitt. M. austr. am.* p. 464.
Hypnum neckeroideum *Mont. in hb. Mus. Paris.*
Leskea angustata *Tayl. (? fid. Mitt.)*.
Meteorium Husnoti W. P. Sch. *in Husnot M. Antill. n.* 163.
 2 ? Ad arbor. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic., ins. Dominic.
- Khorthalsianum (*Dz. et Mk.*) *Mitt. op. cit.* p. 463.
Neckera Khorthalsiana *Dz. et Mk. Prodr. bryol. Surin. p.* 42, t. 9.
 — *Am. merid.* : Venezuela, Guian. batav.
- Krauseanum *Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit.* 1869.
Dendro-Leskea Krauseana *Hpe. in op. cit. n.* 28.
P. longirostre β minus *eor. in Krause M. Ecuador.*
 1. In silvis. — *Am. merid.* : Æquator.
- Kühlilianum *Bryol. jav. t.* 189.
Thamnium Kühlilianum *ibid. II*, p. 71.
 2. — *As.* : Java.
- Kurzianum *Hpe. mss.; Jaeg. Ad. II*, p. 212.
 — *As.* : Sikkim.
- lancifrons (*Hpe.*) *Mitt. op. cit.* p. 462.
Hypnum lancifrons *Hpe. in Linn.* 1863, p. 158.
 2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- latifolium *Bryol. jav. II*, p. 69, t. 188.
 2. ♂ et fr. ign. — *As.* : Sumatra.
- latinerve *Mitt. in Voy. H. M. S. Challenger, III*, p. 81.
 Ster. Rupic. — *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez.
- laxum *Bryol. jav. t.* 191.
Thamnium laxum *ibid. II*, p. 72.
 2. In silvis. — *As.* : Sumatra, ins. Ceram.
- Lehmannii *Besch. in Bull. hb. Boissier*, 1894, p. 395.
 2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- lepto-Meteorium C. M. *in Dusen M. Camer. n.* 127.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- leptodendron C. M. *l. c. n.* 2.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- leucocaulon (C. M.) *Mitt. op. cit.* p. 463.
Neckera dendroides *Mont. in Voy. de d'Orbigny, VII, II*, p. 110 ?
N. leucocaulon C. M. *Syn. II*, p. 42.
 2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile.
- liguliferum *Bryol. jav. t.*
Thamnium liguliferum *ibid. II*, p. 72.
 2. Ad arbor. — *As.* : Sumatra.

Lindigii (Hpe.) Mitt. op. cit. p. 461.

Pilotrichum Lindigii Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 341.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

linearifolium Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

longirostrum (Hook.) Mitt. op. et l. cc. p.p. (fid. Ren. et Card.).

Climacium Porotrichum longirostrum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 275.

Hypnum expansum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 64 (fid. Wils.).

H. floridum ej. in op. cit. 1847, p. 339 (fid. Mitt.) ; *C. M. Syn. II*, p. 226.

H. Porotrichum C. M. op. cit. p. 223.

Neckera longirostris Hook. *M. ex. t. I*.

Porophyllum longirostrum W. P. Sch. hb.

2. Ad arbor., lignic. et terr. — *Afr.* : M. Cameroon. *Am. merid.* : And.

Nov. Granat, Quitens. et Boliv., Brasil. austr. or.

var. *minus* Hpe. et Ltz. — *P. Krauseanum*.

longirostrum Mitt p.p. — *P. plagiorhynchum*.

lopidioides C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 469.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Lorentzi C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 40.

1. Saxic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

Loriae C. M. mss.

Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. brit.

macrocarpum (Brid.) Par.

Hypnum macrocarpum C. M. *Syn. II*, p. 224.

Lindigia macrocarpa Jaeg. *Ad. II*, p. 379.

Neckera macrocarpa Brid. *Bryol. univ. II*, p. 233 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 122.

2. — *As.* : Nepal.

madagassum Kiaër in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 191.

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

mahahaicum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 207.

Hypnum mahahaicum C. M. in *Linn.* 1874, p. 569.

2. — *As.* : M. ins. Philippin.

mayumbense Besch. in *Journ. de bot.* 1894, p. 44.

2. — *Afr.* : Congo gall. (Brazzaville).

mexicanum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 102.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

microthamniella C. M. mss.

— *Pac.* : Nov. Guin. brit.

microthamnium (Hpe.) Par.

Pilotrichum microthamnium Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 47.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

microthecium C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 55.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

minus Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 376 ; Mitt. *M. austr. am* p. 467.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

minutum Mitt. op. cit. p. 465.

Ster. — *Am. sept.* : Cuba.

mixtum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 205.

Hypnum mixtum C. M. in *Linn.* 1875, p. 458.

Ster. — Afr. : Monbottou.

Morokae C. M. *mss.*

Ster. — Pac. : Nov. Guin. brit.

neckeraeforme (Hpe.) Mitt. *M. austr. am.* p. 464.

Hypnum neckeraeforme Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 309.

1. In silv. ad arbor. — Am. sept. : And. Costa Ric. Am. merid. : And. Nov. Granat.

nitidum (Hpe.) Mitt. *op. cit.* p. 460.

Pilotrichum nitidum Hpe. in *op. cit.* p. 304.

Ster. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

Novae Cambriae Hpe. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84 (*nom.*).

— Pac. : Absque loco.

oblongi-frondeum Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 200.

2. Ster. Cortic. — Afr. : Usambara.

obtusatum Lindb. et Arn. — *Thamnium*.

orbiculare Hpe. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84 (*nom.*).

— Pac. : Absque loco.

panduraefolium (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 468.

Hypnum panduraefolium C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 788.

— Am. merid. : Chile.

patulum Geh. et Hpe. in *Fl.* 1881.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Pechuelii (C. M.) Par.

Neckera Pechuelii C. M. in *Fl.* 1886, p. 515.

Ster. — Afr. : Congo infer.

pennaeforme C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 333.

P. madagassum Kiaer? (fid. Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 311).

Thamnium complanatum W. P. Sch. ? (fid. Mitt. l. c.).

— Afr. : Kilima N'Djaro, C. B. Sp.

« *var. Chauveti* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, 11, p. 126 et M. Mæsc. *Mad.* n. 229.

Ster. — Af. : Ins. Bourbon.

« *var. trachyphyllum* C. M. l. c. n. 334.

— Afr. : Natal.

pennaefrondeum C. M. in *Linn.* 1876, p. 271.

Ster. — Afr. : Ins. Anjouan.

pergracile C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 405.

— Afr. : M. Cameroon.

perrotundatum C. M. l. c. n. 681.

— Afr. : M. Cameroon.

piliferum Mitt. — *Thamnium*.

pinnatelloides C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 409.

Ster. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

piniforme (*Brid.*) *M. M. austr. am.* p. 465.

Homalia pendulina *W. P. Sch. in hb. Mus. Paris.*

Hypnum piniforme *C. M. Syn. II*, p. 228.

Pilotrichum piniforme *Brid. Bryol. univ. II*, p. 260.

2? — *Am. sept.* : Guadalup.

Pittieri *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. I*, p. 188.

2. ♂ ign. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica.

plagiorhynchum *Ren. et Card. in op. cit.* p. 186.

P. longirostrum *Mitt. op. cit.* p. 461 p.p.

2. ♂ ign. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* :

And. Quitens.

plicatulum *Mitt. op. cit.* p. 461.

Ster. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

plicatulum *Mitt.* (1891). — *Thamnium.*

plumosum *Ren. et Card. in op. cit.* p. 191.

2. In silv. ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica.

porrectulum *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 408.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

psendo-pilaceum *Hpe. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria,*
1883, p. 84 (*nom.*).

— *Pac.* : Absque loco.

pterops *Rehm. M. Afr. austr. n.* 621.

Neckera pterops *ej. l. c. n.* 329.

— *Afr.* : Kilima-N'Djaro, Natal.

punctulatum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 78.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Quintasii *Broth. in Bol. d. Soc. Brot.* 1890.

2. Ster. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

ramosissimum *Hpe Symb.* 1874, p. 505.

2. ♂ et fr. ign. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

ramulosum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 282.

— *Afr.* : M. Cameroon.

ramulosum *Mitt.* — *Camptochaete.*

rigidum *Mitt.* — *Thamnium.*

riograndense *C. M. mss.*

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. (Rio grande do Sul).

Robillardi *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.,* p. 133.

2. — *Afr.* : Ins. Borbon., Francia.

rostrifolium (*C. M.*) *Par.*

Thamniopsis rostrifolia *C. M. in Rev. bryol.* 1878, p. 72 (*nom.*).

— *Afr.* : Austral.

rotundi-frondeum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 205.

Hypnum rotundi-frondeum *C. M. in Linn.* 1875, p. 456.

Ster. — *Afr.* : Monbottou.

ruficaule *C. M. in Fl.* 1890, p. 488.

Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

scaberulum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 25 et
M. Masc. Mad. n. 230.

2. Ad ramul. — *Afr.* : Madagascar.

scalpellifolium Mitt. — Homalia.

scoposum *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p.* 374; *Mitt. op. cit. p.* 460.
 — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

setoso-flagellosum *C. M. mss.* ; *Jaeg. Ad. II, p.* 206.
 — *Am. merid.* : Nov. Granat.

sparsiflorum (*Hpe.*) *Mitt. op. cit. p.* 465.

Hypnum sparsiflorum *Hpe. in Linn.* 1863, p. 157.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

stolonaceum *Hpe. in Linn. p.* 154; *Mitt. op. cit. p.* 466.

P. superbum *Tayl. (fid. Mitt.)*.

Porophyllum stolonaceum *W. P. Sch. hb.*

Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica? *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

stoloni-rameum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 920.
 — *Afr.* : M. Cameroon.

striatum *Mitt. op. cit. p.* 462.

Ster. *Rupic.* — *Am. merid.* : Brasil.

Stuhlmanni *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 199.

2. Ster. — *Afr.* : Reg. lacustr.

subambiguum (*C. M.*) *Par.*

Pinnatella subambigua *C. M. mss.*

Ster. — *As.* : Sumatra (ins. Engano).

subcucullatum *Hpe. Enum. M. Brasil. p.* 56.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subpennaeforme *C. M. in Fl.* 1890, p. 488.

Ster. In silv. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

subpunctulatum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 218.

— *Afr.* : M. Cameroon.

subsecundum *Kiaër in Borgen. M. Mad. n.* 41.

— *Afr.* : Madagasc. centr.

subseriatum Mitt. — *Thamnium Sandei*.

substolonaceum *Besch. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 189.

2. In silv. — *Am. sept.* : And. Costa Ric.

substriatum (*Hpe.*) *Mitt. M. austr. am. p.* 463.

Neckera substriata *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p.* 340.

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

superbum (*Tayl.*) *Mitt. op. cit. p.* 459.

Hypnum superbum *C. M. Syn. II, p.* 225.

Leskea superba *Tayl. in Journ. of bot.* 1846, pp. 61 et 452, t. 16.

P. stolonaceum *Hpe. (fid. Mitt.)*.

Porophyllum superbum *W. P. Sch. hb.*

— *Am. merid.* : Columb., And. Nov. Granat. et Qu-
 tens.

tamariscinum (*Hpe.*) *C. M. in Linn.* 1876, p. 272.

Pilotrichum tamariscinum *Hpe. in op. cit.* 1874, p. 219.

Ster. — *Afr.* : Madagasc., ins. Anjouan.

tenuicostatum (Hpe.) Par.

Pilotrichum tenuicostatum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 47.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Thieleanum (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 465.

Hypnum Thieleanum C. M. *Syn. II*, p. 227.

Isothecium intermedium Thiele in *hb. reg. Berol.*

Pilotrichum piniforme Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 58.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil.

undulatum C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 203.

— *Am. sept.* : Guatemala.

usagarum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 315.

Ster. — *Afr.* : M. Usagara.

vagum Mitt. — *Lembophyllum*.

Valdiviae (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 467.

Hypnum Neckera W. P. Sch. in *Lechler pl. Chil. n.* 631.

H. Valdiviae C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 783.

— *Am. merid.* : Chile.

« *var. pallidum* (Ltz.) Jaeg. *Ad. II*, p. 209.

Hypnum Valdiviae var. pallidum Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 188.

variabile Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 375; Mitt. *op. cit.* p. 464.

Neckera flabellata Hpe. in *Linn.* 1861-62, p. 525.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

POTAMIUM Mitt. *M. austr. am.* p. 472.

Species omn. *PTEROGONIELLAE* ejusd. nom.

POTTIA Ehrh. *Beitr. II*, p. 175 (83 spec.).

acaulis R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 290.

Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

acaulis Hpe. — *Pharomitrium subsessile*.

affinis Fürnr. — *P. Heimii*.

Alfredii R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 290.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

amblyophylla (Hook.) C. M. *Syn. I*, p. 557.

Barbula amblyophylla Jaeg. *Ad. I*, p. 273.

Gymnostomum amblyophyllum Hook. *Bot. Misc. I*, 1830, p. 352, t. 75.

Tortula amblyophylla Mitt. *M. austr. am.* p. 155.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or., Monte-Video,

And. Chilens.

Anderssonii Sb. — *P. magellanica*.

angustifolia (Lindb.) Par.

Tortula angustifolia Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 44.

1. Ad aren. argill. humid. — *As.* : Caucas. occ.

antarctica W. P. Sch. — *P. magellanica*.

asperula Mitt. in *Seeman Journ. of bot.* Januar. 1871.

P. Mittenii var. asperula Corbière *M. de la Manche*, p. 236; Husnot *Musc. gall.* p. 77, t. 21.

P. truncata Wils. *M. Brit. n.* 90 p.p.

— *Eur.* : Hibern. et Angl. merid., ins. Jersey.

asperula C. M. — P. Uleana.

assimilis R. Br. in op. cit. p. 294.
Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

bahiensis C. M. — Hyophila.
Barbula C. M. — Hyophila.

Bickertonii R. Br. in op. cit. p. 292.
Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

bicolor C. M. — Barbula.
blanda C. M. — Hyophila.

brachyodus (Hpe.) Jaeg. Ad. I, p. 192.

Anacalypta brachyodus Hpe. in Linn. 1859-60, p. 624.

Tortula adusta Mitt. in Trans and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883.

— Pac. : Austral. or.

brachyphylla Hpe. in hb. Melbourne.

— Pac. : Austral. (Victoria).

brevicaulis (Tayl.) C. M. Syn. I, p. 556.

Gymnostomum brevicaule Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 42.

1 ? — Pac. : Austral. or. (Victoria).

brevicaulis de Not. — P. lanceolata var. angustata.

Brownii Par.

P. macrocarpa R. Br. in op. et l. cc.

Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

brunnea (C. M.) Par.

Trichostomum brunneum C. M. in Linn. 1878-79, p. 315.

2. — Am. merid. : Alp. Argentin. subtropic.

bryoides Lindb. — Phascum.

caespitosa (Br.) C. M. Syn. I, p. 547 et II, p. 621; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 157.

Anacalypta caespitosa Färnrr. in Fl. 1829, II, Ergänz. p. 25; Br. in Bryol. germ. II, II, p. 146, t. 37; Bryol. eur. II (mon. p. 3), t. 26.

Dermatodon caespitosus Hüb. Muscol. germ. p. 111.

Desmatodon caespitosus de Not. Syll. p. 203.

Gymnostomum carbunculoides de Not. in sched.

Trichostomum caespitosum Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 106.

Weisia caespitosa Br. in Brid. Bryol. univ. I, p. 808.

W. tenella Brid. op. cit. p. 809 ?

1. Ad terr. argill. — Eur. : Angl., Normann., Alsat., Palatin., Westphal., Sardin.

caespitulosa (Hpe. et C. M.) Par.

Anacalypta caespitulosa Hpe. et C. M. in Linn. 1853, p. 491.

— Pac. : Austral.

caucasica (Lindb.) Par.

Tortula caucasica Lindb. in Broth. Enum. M. Caucas. p. 43.

1. Ad rupes schistos. — As. : Caucas. centr.

cavifolia Ehrh. Beitr. II, p. 187; Bryol. eur. II (mon. p. 7), t. 118;
C. M. Syn. I, p. 550; W. P. Sch. op. et l. cc.

Aloina pusilla Kindb. Laubm. Schwed. u. Norveg. p. 137.

Bryum ovatum Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 4.

Br. pusillum Hedw. *Fund. M. II*, p. 32.

Gymnostomum ovatum Hedw. *M. frond. I*, p. 16, t. 6; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 59; *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 17 et 18.

G. ovatum β *gracile* H. et T. *Muscol. brit.* p. 12.

G. ovatum β *oblongum* Brid. *op. et l. cc.*

G. pulvinatum Lag. in *Ann. cienc. nat. n.* 14, p. 71.

G. pusillum Hedw. *Fund. M. II*, pp. 32 et 87.

Pottia ovata Fürnr. in *op. cit.* p. 10.

P. pusilla Lindb. in *Oefv. Vet Akad. Foerh.* 1863, p. 410.

Pterigoneuron cavifolium Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 96.

Tortula pusilla Mitt. *M. austr. am.* p. 165.

1. In camp. incult., gramin., etc. — *Eur.* : Vulgatiss. *As.* : Persia, Mesopot., *Caucas. Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Saskatchewan, *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, Washington, Nevada, Idaho. *Am. merid.* : And. Quitens.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 2).

var. *barbuloides* DR. — *Barbula cavifolia*.

« var. *epilosa* W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 122 et *II ed. l. c.*

Gymnostomum ovatum δ *epilosum* Brid. *op. cit.* p. 61.

P. cavifolia β *imbricata* *Bryol. eur. l. c.*

In glareos. calcar. — *Eur.* : Hic illic.

var. *gracilis* Wils. — *Barbula cavifolia*.

var. *imbricata* *Bryol. eur.* — *P. cavifolia* var. *epilosa*.

« var. *incana* *Bryol. eur. l. c.*

Gymnostomum ovatum γ *incanum* *Bryol. germ.* p. 130, t. 9, f. 5 b; *Brid. op. et l. cc.*

Ut typ. — *Eur.* : In reg. mont. et subalp. ut in zon. frigidior.

« var. *Perraldieri* Besch. *Cat. M. Alg.* p. 9.

— *Afr.* : Alger.

ceratodonte C. M. — *Gymnostomum*.

chottica Trabut *Atl. fl. Alg. t. VII et in Rev. bryol.* 1887, p. 13.

Paludic. — *Afr.* : Alger. austr. occ. (el Kh'eider).

circinata C. M. — *Hyophila*.

commutata Limpr. *Deutschl. Laubm. I*, p. 537.

P. minutula {
P. Starkeana { *Jur. in op. et l. cc. p.p.*

1. Ad terr. argill. calc. — *Eur.* : Istria.

compacta W. et Dy. — *Hyophila*.

conica Fürnr. — *P. Starkeana* var. *brachyodus*.

contermina C. M. — *Hyophila*.

crinita Wils. in *Bryol. eur. II (mon. Suppl.)*, t. 123; *C. M. Syn. II*, p. 622; *W. P. Sch. op. cit.* p. 153.

Gymnostomum Wilsoni Hook. *Bot. Misc.* p. p.

P. Mittenii var. *crinita* Corbière *Muscinees de la Manche*, p. 236; *Husn.*

Muscol. gall. p. 77, t. 22.

1. Ad litt. marit. — *Eur.* : Britann., Armoric., Normana.; Rhoengeb. ? (ster.).

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 805.

crinita de Not. — *P. Notarisii*.

cucullata (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 193.

Anacalypta cucullata Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 335.

Weisia cucullata Mitt. *M. austr. am.* p. 140.

— *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

cuneifolia Solms-Laub. *M. Algarv.*; *W. P. Sch. op. cit.* p. 154.

1 ? Ad terr. argill. arenac. — *Eur.*: Algarv.

curvicollis Mitt. — *Phascum*.

curvirostra Ehrh. — *Gymnostomum*.

cuspidata Mitt. — *Phascum*.

cylindrica C. M. — *Hyophila*.

denticulata C. M. — *Hyophila*.

Douglasii R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 293.

Terr. — *Pac.*: Nov. Zeland.

eustoma { C. M. — *P. truncata*.
Hpe. — *P. lanceolata* var. *gymnostoma*.

var. *auripes* J. Lange. — *P. pallida*.

var. *major* Ehrh. — *P. lanceolata* var. *gymnostoma*.

var. *minor* Ehrh. — *P. truncata*.

var. *truncata* Hpe. — *P. truncata*.

flaccida C. M. — *Splachnobryum*.

flavipes Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 122 et in Cl. Gay. *Hist. Chil. Bot. crypt.* t. 3, f. 2; *Syll.* p. 51; *C. M. Syn.* I, p. 552.

Tortula flaccidiseta Mitt. *M. austr. am.* p. 165.

1. Terr. — *Am. merid.*: Chile.

fusco-mucronata C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forschungsreise...* Bot. p. 22.

2? — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

Gardneriana C. M. — *Hyophila*.

gedeana Sande Lac. *Spec. nov. M. Archip. ind.* p. 4, t. 2 B.

1. — *As.*: Java.

glauco-viridis (C. M.) Par.

Trichostomum glauco-viride C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 471.

Ster. — *Am. merid.*: Uruguay.

grata R. Br. in *op. et l. cc.*

Terr. — *Pac.*: Nov. Zeland.

Güßfeldti Schlieph. in *Bericht der deutsch. Bot. Gesells.* 1884, p. 461.

1 ? — *Am. merid.*: And. Argentin.

gymna (C. M.) Par.

Trichostomum gymnum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 312.

2. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.

gymnostomoides W. et Dy. — *Hyophila*.

Heimii (Hedw.) *Bryol. eur.* II (mon. p. 12), t. 124; *C. M. Syn.* I, p. 551 (excl. loc. antarct.); *W. P. Sch. op. cit.* p. 155.

Bryum Heimii Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 4; *Gmel. Syst. nat.* II, p. 1333.

Br. truncatum β *L. Fl. Suéc.* n. 1001?

Gymnostomum affine *Bryol. germ.* I, pp. 138 et 140; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 72.

G. Heimii Hedw. *M. frond.* I, p. 80, t. 30; *Bryol. germ.* l. c. t. 8; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 71; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 13 (var. 1), 14 (var. 2) et 15 (var. 3).

G. obtusum Turn. *Muscol. Hibern.* p. 9, t. 1.

- G. systylium* Funk in sched.
P. affinis Fürnr. in op. cit. p. 10.
P. Heimii var. *affinis* Lindb. *Trichost. Eur.* p. 10.
P. Heimii var. *chlorophyllosa* { *C. M. op. cit.* p. 552.
P. Heimii var. *intermedia* {
P. Krausei Warnst. in *Hedwig.* 1885, n. 3.
Tortula Heimii Mitt. *M. austr. am.* p. 165 p.p.
l. rar. syn. In terr. humid. praecip. salsos. — *Eur.* : Zon. merid. usq. in sept. ; Britann., Neerland., Hungar., German. tota, Alp. Carinth. ; Tirol. merid., Helvet. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, sin. Hudson, M. Rupestr., litt. m. Behring. Colorado, Utah, Nevada, Montana, Idaho. *Am. merid.* : And. Chilens.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 58, 401, 807, 1303.
Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 115.
var. *affinis* Lindb. — *P. Heimii*.
« var. *arctica* Lindb. in *Oefv...* XXIII, p. 551.
Gymnostomum obtusifolium R. Br. *Suppl. App. ad iter Parry.* p. 299.
P. obtusifolia C. M. *Syn. I.* p. 556.
— *Eur.* : Spitzberg, ins. Uror. *As.* : Penins. Tschutschica. *Am. sept.* : Ins. Melville.
var. *chlorophyllosa* C. M. — *P. Heimii*.
« var. *cylindrica* Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
Ut et ubi typ.
var. *intermedia* C. M. — *P. Heimii*.
« var. *longiseta* (Lindb. et Arn.) Par.
Tortula Heimeii var. *longiseta* L. et A. M. *As. bor.* 1890, p. 68
— *As.* : Jenissei inf.
heimioides Kindb. in Mac. Cat. p. 43.
! ? — *Am. sept.* : M. Rupestr.
Hollii C. M. — *Hyophila contorta*.
humillima (Ångstr.) Par.
Anacalypta humillima Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 10.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
imperfecta (C. M.) Par.
Trichostomum imperfectum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 314.
2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.
inflexa (Tayl.) C. M. in *Linn.* 1853, p. 491 (nom.).
Gymnostomum inflexum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846.
Weisia inflexa Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 58.
— *Pac.* : Austral. or.
intermedia Fürnr. — *P. lanceolata* var. *gymnostoma*.
involuta C. M. — *Hyophila*.
involutifolia C. M. — *Hyophila*.
japonica Jaeg. — *Entosthodon*.
javanica C. M. — *Hyophila*.
julacea Dz. et Mk. in *Pl. Jungh.* p. 335 ; *Bryol. jav.* I, p. 62, t. 50.
1. Terr. — *As.* : Java.
Krausei Warnst. — *P. Heimii*.
Kunzeana C. M. — *Gymnostomum*.

- lanceolata* (Dicks.) C. M. Syn. I, p. 548; W. P. Sch. op. cit. p. 157.
Afzelia lanceolata Ehrh. Beitr. VII, p. 4.
Anacalypta lanceolata Roehl. Moosg. Deutsch. I, p. 108; Bryol. eur. II (mon. p. 4), t. 127.
Bryum cuspidatum Gmel. Syst. nat. II, p. 1332.
Br. lanceolatum Dicks. Fasc. III Pl. crypt. p. 4.
Br. pulvinatum β Poll. Pl. Palat. n. 1016.
Coscinodon connatus Brid. Bryol. univ. I, p. 374.
C. lanceolatus ej. op. cit. p. 372.
Dermatodon lanceolatus Hüb. Muscol. germ. p. 112.
Desmatodon lanceolatus de Not. Syll. p. 115.
Dicranum latifolium Turn. Muscol. Hibern. Spic. p. 79 (excl. syn.).
Encalypta lanceolata Hedw. Sp. M. p. 63.
Grimmia connata Kaulf.
Gr. lanceolata W. et M. Bot. Taschb. p. 137.
Leersia cuspidata Schrank Baiers Fl. II, p. 442.
L. lanceolata Hedw. M. frond. III, p. 66, t. 23.
Tortula lanceolata Lindb. M. Scand. p. 21.
Weisia connata Wallr. in Comp. III, p. 142.
Weisia lanceolata Roehl. Deutsch. Fl. II ed. p. III, p. 51.
 1. In arv., camp., ad agger., etc. — Eur.: Vulgatiss., frigidiss. except.
 As.: Japon., Caucas., As. min. Afr.: Alger.
 Exs.: Rab. bryoth. eur. n. 252.
- « *var. aciphylla* (Web. et Mohr.) Par.
Coscinodon aciphyllus Brid. Bryol. univ. I, p. 373.
Grimmia aciphylla W. et M. Bot. Taschb. I, pp. 137 et 457.
Tortula lanceolata var. *aciphylla* Lindb.
Weisia aciphylla Wahlenb. in Nov. Act. Holm. 1806, p. 133, t. 4, f. I.
 Ut typ. — Eur.: Septentr. As.: Caucas.
- « *var. angustata* C. M. Syn. I, p. 549; W. P. Sch. op. cit. p. 158.
Anacalypta lanceolata var. *angustata* Bryol. eur. l. c. t. 125.
Entosthymenium mucronifolium Br. in Fr. Müller M. Scand. et in Fl. 1829, p. 387.
P. brevicaulis de Not.
P. lanceolata var. *brachyodus* Lindb. de Trichost. Eur. p. 11
 Ut typ. — Eur.: Merid. As.: Smyrn. Afr.: Alger.
var. brachyodus Lindb. — *P. lanceolata* var. *angustata*.
- « *var. gymnostoma* W. P. Sch. Syn. II ed. p. 158 (1).
Bryum truncatulum Ehrh. Crypt. n. 14.
Gymnostomum Heimii Timm. Fl. Megap. n. 725.
G. intermedium Turn. Muscol. Hibern., p. 7, t. I, f. a-i; Brid. Bryol. univ. I, p. 69.
G. truncatulum β Hoffm. Fl. germ. II, p. 27; H. et T. Muscol. brit. II ed., p. 22.
G. truncatum Roehl. Fl. Deutsch. III, p. 38 et Ann. Wett. Ges. p. 122.
G. truncatum var. *majus* (α) W. et M. Bot. Taschb. p. 81; (β) Wahlenb. Fl. Carpat. p. 333
P. eustoma Hpe. in Fl. 1829, II, Ergänz. p. 10.
P. eustoma α major Ehrh. Beitr. II, p. 187; C. M. Syn. I, p. 553.
P. intermedia Fürnr. in Fl. 1829, II, Ergänz. Bl. p. 10.
P. lanceolata var. *subgymnostoma* Lindb. de Trichost. Eur. p. 11.
P. major γ *subcylindrica* Bryol. eur. l. c.
P. truncata Mac. Canad. M. n. 62 p p.
P. truncata β major Bryol. eur. l. c. p. 9.
P. truncata γ *subcylindrica* Bryol. eur. l. c.

(1) Spec. propria, fid. Lindb. Man. M. I, p. 67.

- Tortula intermedia* Lindb. *M. Scand.* p. 21.
 Ut typ. — *Eur.* — Cum typ. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Saskatchewan.
- * *var. leucodonta* W. P. Sch. l. c.
P. leucodonta Jaeg. *Ad. I*, p. 193.
 Ut typ. — *Eur.* : Merid.
- latifolia* (Schwaegr.) C. M. *Syn. I*, p. 549; W. P. Sch. *op. et l. cc.*
Anacalypta lanceolata β *sibirica* E. G. et G. G. Borszczow? (fid. Lindb. et Arn.).
A. latifolia Bryol. germ. II, p. 135, t. 36; Bryol. eur. II (mon. p. 5), t. 128.
Dermatodon latifolius Hüb. *Muscol. germ.* p. 115.
Desmatodon bulbosus de Not. *Syll.* p. 103.
Didymodon bulbosus Hartm. *Skand. Fl. IV ed.* p. 382.
Grimmia latifolia W. et M. *Bot. Taschb.* p. 147.
P. pilifera var. *mutica* Lindb. de *Trichost. Eur.* p. 223.
Stegonia latifolia Vent. in *Rev. bryol.* 1883, p. 96.
Tortula bullata var. *mutica* Lindb. *M. Scand.* p. 21.
Weisia latifolia Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 64, t. 18; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 356.
 l. Ad terr. humos. denudat. — *Eur.* : Spitzberg, summ. Alp. Norveg., Scot. centr.; Salisb., Stir., Tirol.; Jurass. As. : Jenissei inf. *Am. sept.* : Groenland, M. Rupestr., Columb. brit., Colorado. *Exs.* : Rab. Bryoth. eur. n. 56, 611.
- * *var. pilifera* (Dicks.) C. M. et W. P. Sch. ll. cc.
Anacalypta latifolia β *pilifera* Bryol. germ. l. c. p. 237; Bryol. eur. l. c.
Bryum piliferum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.*
Coscinodon pilifer Brid. *Bryol. univ. I*, p. 818.
Dermatodon Funkii Hüb. *Muscol. germ.* p. 115.
Dicranum bullatum Sommerf. *Suppl. Fl. Lapp.* p. 55 (excl. syn.).
Didymodon bullatus Hartm. *Skand. Fl. III ed., II*, p. 277 et *IV ed.* p. 382.
P. latifolia Lindb. de *Trichost. Eur.* p. 223.
Tortula bullata Lindb. *M. Scand.* p. 21.
Trichostomum piliferum Sm. *Fl. brit. III*, p. 1245.
Weisia latifolia Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 70.
W. pilifera Funk in sched. et in Wallr. *Comp. III*, p. 149.
 Loc. siccior. — *Eur.* : Ubi typ. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit.
- Leonardi R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 293.
 Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- Leprieurii* Mont. — *Hyophila*.
leucodonta Jaeg. — *P. lanceolata* var. *leucodonta*.
- ligularifolia* C. M. in *Hedwig.* 1895, p. 123.
 l ? Terr. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).
- Lindbergii* (Kindb.) Par.
Tortula Lindbergii Kindb. *Enum. Bryin. exot.* p. 44.
T. pungens Lindb.
 l. Ad rup. calcar. — *As.* : Caucas. centr.
- littoralis* Mitt. in *Seeman Journ. of bot.* Januar. 1871; Braithw. *Brit. Moos. Fl.* p. 198.
 l. In calcar. — *Eur.* : Anglia, Ducat. Badens. *Am. sept.* : Columb. brit.
- longifolia* R. Br. in *op. cit.* p. 292.
 Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

- P. rufescens* Fürnr. in op. et l. cc.
 Ut et ubi typ. in *Eur.*
- var. *cylindrica* H. Müll. — *P. Starkeana* var. *brachyodus*.
- Mittenii* Corbière { var. *asperula*. — *P. asperula*.
 var. *crinita*. — *P. crinita*.
 var. *viridifolia*. — *P. viridula*.
 var. *Wilsoni*. — *P. Wilsoni*.
- Mülleri* Duby — *Hyophila*.
mulica Vent. — *P. Starkeana* var. *brachyodus*.
- Naumannii* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forschungsreise...*
Bot. p. 22.
 Syn. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- Notarisii* W. P. Sch. op. cit. p. 851.
P. crinita de Not. *Epil.* p. 586.
 1. In pascuis. — *Eur.* : Sardin.
- nuda* (C. M.) Par.
Trichostomum nudum C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 422.
 2. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.
- obliqua* R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 294.
 Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.
- obtusifolia* C. M. — *P. Heimii* var. *arctica*.
- Octoblepharum* Spr. mss.
Spadophyllum octoblepharum Hpe. mss. ; *Jaeg. Ad. II*, p. 666.
Weisia Octoblepharum Mitt. *M. austr. am.* p. 140.
 — *Am. merid.* : Amazon.
- œdipodioides* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 79 et in *Forschungsreise...* *Bot.* p. 22.
 2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
- Erstedtiana* C. M. — *Hyophila*.
- Orbignyana* C. M. in *Linn.* 1878, p. 311.
 2. — *Am. merid.* : Chile.
- ovalifolia* Hpe. — *Hyophila*.
ovata Fürnr. — *P. cavifolia*.
- pallida* Lindb. de *Tortul. et Trichost. Europ.* 1863; p. ; W. P. Sch. op. cit. p. 154.
P. eustoma var. *auripes* C. M. mss. ; J. Lange in *Naturh. For. Vid. Meddel.* 1860, p. 15.
 In arenos. marit. — *Eur.* : Isthm. Gaditan.
- pallida* Braithw. — *P. viridula*.
papillinervis Ltz. — *Hyophila*.
- paraguensis* (Besch.) Par.
Anacalypta paraguensis Besch. *Not. M. Parag.* p. 261.
 Ad arbor. — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Balansa n. 1220.
- Patouillardii* Besch. in *Journ. de Bot.* 1894, p. 43, t. I, fig. 1-4.
 1. In arena. — *Afr.* : Gabes.
- perpusilla* (C. M.) Par.
Trichostomum perpusillum C. M. in *Journ. of Bot.* 1877, p. 227 (nom.).
 Terr. — *Am. sept.* : Costa Rica.

physcomitrioides C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 101.

— *Am. merid.* : La Plata.

pilifera Lindb. — *P. latifolia* var. *pilifera*.

var. *mutica* Lindb. — *P. latifolia*.

piriformis Ehrh. — *Physcomitrium*.

Poeppigiana C. M. — *Hyophila*.

pusilla Lindb. — *P. cavifolia*.

recta Lindb. — *Phascum*.

reflexifolia C. M. — *Hyophila*.

riparia Aust. M. *Appal.* n. 112; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 34, t. 21; *Lesq. et Jam. Man.* p. 102.

♂ ign. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : New Jersey et New York merid.

Roscheri Ltz. — *Hyophila*.

rubiginosa Wats. — *Barbula*.

rufescens } C. M. — *Hyophila*.

 } Fürnr. — *P. minutula* var. *rufescens*.

Ryani Philib. in *Rev. bryol.* 1896, p. 28.

1 — *Eur.* : Norveg. sept.

samoana C. M. — *Hyophila*.

serrata R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 291.

Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland.

spathulata C. M. — *Hyophila*.

spathulato-linearis (C. M.) Par.

Trichostomum *spathulato-lineare* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 316.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

Spegazzinii C. M. in *Fl.* 1885, p. 414.

In palud. montos. — *Am. merid.* : Fuegia.

Starkeana (*Hedw.*) C. M. *Syn* I, p. 547; W. P. Sch. *op. cit.* p. 156.

Anacalypta *Starkeana* *Bryol. germ.* II, p. 138, t. 36, f. 2; *Bryol. eur.* II (mon. p. 2), t. 125.

Bryum *minutum* *Dicks. Fasc. IV Pl. crypt.* p. 7, t. 10, f. 17.

Br. *Starkeanum* *Hoffm. Deutsch. Fl.* II, p. 32.

Dermatodon *Starkii* *Hüb. Muscol. germ.* p. 109.

Desmatodon *Starkii* *de Not. Syll.* p. 205.

Grimmia *Starkeana* W. et M. *Bot. Taschb.* p. 137.

Tortula *Starkeana* *Lindb. M. Scand.* p. 21.

Weisia *Starkeana* *Hedw. M. frond.* III, p. 83, t. 34; *Brid. Bryol. univ.* I,

p. 353.

1. In terr. calc. argill. agr. et camp. steril. — *Eur.* : Zon. intermed. et merid. As. : Syria. Afr. : Alger., ins. Canar. *Am. sept.* : Utah, Calif.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 251, 831.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 119.

var. *affinis* Braithw. — *P. Starkeana* var. *brachyodus*.

« var. *brachyodus* C. M. et W. P. Sch. *ll. cc.*

Anacalypta *affinis* Fürnr. in *Fl.* 1829, II, *Erganz.* p. 10.

A. *Starkeana* var. *brachyodus* *Bryol. eur.* l. c.

? *Dermatodon* *affinis* *Hüb. Muscol. germ.* p. 110.

Gymnostomum *conicum* *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 26, t. 9; *Brid. op. cit.*

p. 63.

G. *reflexum* *Brid. l. c.*

P. *conica* Fürnr. l. c.

P. *minutula* γ *conica* *Bryol. eur.* II (mon. p. 8), t. 119; C. M. *Syn.* I, p. 555 (incl. γ γ *oblonga*).

- P. minutula* var. *cylindrica* H. Müll. *Westfal. Laubm.* n. 434.
P. mutica Vent. *Erb. critt. ital. II ser.*, n. 160; *de Not. Epil.* p. 592.
P. Starkii var. *affinis* Braithw. *Brit. Moos. Fl.*
Weisia affinis H. et T. *Muscol. brit.* p. 44, t. 14; *Brid. op. cit.* p. 354.
 Ad mur. et rup. — *Eur.*: Occid.; *Britann. marit.*, *Westphal.*, *Gall.*
mer, *Sardin.*, *Istria*, *Tirol.*
Exs.: *Rab. Bryoth. eur.* n. 1052.
 var. *gymnostoma* Lindb. — *P. minutula.*
stellatifolia (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 193.
Anacalypta stellatifolia Hpe. *Symb.* 1872, p. 37.
 — *Am. merid.*: *Brasil. austr.* or.
Stevenii R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 291.
Terr. — *Pac.*: *Nov. Zeland.*
subcaespitosa (Hpe.) Par.
Anacalypta subcaespitosa Hpe. in *Linn.* 1863, p. 127.
Weisia subcaespitosa Mitt. *M. austr. am.* p. 140.
 l. *Terr.* — *Am. merid.*: *And. Nov. Granat.*
subcrenulata C. M. — *Hyophila.*
subsessilis Bryol. eur. — *Pharomitrium.*
systyliopsis C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 101.
 l? — *Am. merid.*: *La Plata.*
tasmanica Broth. in *Oefv. af Finska Vet. Soc. Foerh.* 1895, p. 57.
 l. *Terr.* — *Pac.*: *Tasman.*
thraustophylla (Ångstr.) Par.
Anacalypta thraustophylla Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 10.
 — *Am. merid.*: *Brasil. austr.* or.
Tortula { C. M. — *Hyophila.*
 { Sull. — *Hyophila Wrightii.*
truncata (Hedw.) Fühnr. l. c. p. 10; *Bryol. eur. II* (mon. p. 9), t. 120.
Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis Dill. *Hist. M.* p. 34, t. 45,
 f. 7 F-K.
Br. truncatulum L. *Sp. pl.* p. 1584.
Br. truncatum Gmel. *Syst. nat. II*, p. 1334.
Gymnostomum circumscissum Roehl. in *Ann. Wett. Ges. II, I*, p. 122.
G. cuspidatum ej. in *op. cit.* p. 130.
G. truncatulum Hedw. *Fund. M. II*, p. 87; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 67.
G. truncatum Hedw. *M. frond. I*, p. 13, t. 5; *Bryol. germ.* p. 132, t. 9,
 f. 6 p.p.
Phascum truncatulum L. *jun. Meth. M.* p. 361.
P. eustoma C. M. *Syn. I*, p. 553.
P. eustoma β minor Ehrh. *Beitr. II*, p. 188.
P. eustoma β *truncata* Hpe. in *Fl.* 1837, I, p. 287.
P. truncatula Lindb. *de Trichost. Europ.* p. 8.
Tortula truncatula Lindb. *M. Scand.* p. 21.
 l. In arv., ad agger., etc. — *Eur.*: *Vulgatiss.* in reg. med. *As.*:
Japon., *Obi*, *Cochinch.*, *As. min.* *Afr.*: *Septentr.*, ins. *Canar.* *Am.*
sept.: *Ontario*; de *Nov. Angl.* ad *Pensilv.*
Exs.: *Faurie Pl. Jap.* n. 5.
Mac. Canad. M. n. 62 p.p.
Rab. Bryoth. eur. n. 797.
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 116.
 " var. *archidioides* Besch. *Cat. M. Alger.* p. 9.
 — *Afr.*: *Alger.*

var. *major* Bryol. eur. — *P. lanceolata* var. *gymnostoma*.

var. *subcylindrica* } Bryol. eur. — *P. lanceolata* var. *gymnostoma*.
James. — *P. Wilsoni*.

truncata { Mac. p.p. { — *P. lanceolata* var. *gymnostoma*.
 { — *P. littoralis*.
 { Wils. p.p. — *P. asperula*.

truncatula Lindb. — *P. truncata*.

Uleana Par.

P. asperula C. M. in *Hedwig*. 1895 p. 123.

Rupic. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Göyaz).

venusta Jur. in *Ung. et Ky. « die Ins. Cypern »* p. 167; *W. P. Sch. op. cit.* p. 154.

l? Ad terr. nud. — *As.* : *Ins. Cypr.* *Afr.* : *Ægypt.* infer.

vernica (Hook.) Hpe. in *C. M. Syn.* I, p. 557; *Bryol. jav.* I, p. 63, t. 51.

Gymnostomum vernicosum Hook. in *Wall. Cat. n.* 7549, *Ic. pl. rar.* t. 17, f. 4 et in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 2.

Hymenostylium vernicosum Mitt. *M. Ind. or.* p. 33.

2. Ad mur. — *As.* : *Nepal.*, *Java*.

viridula Mitt. in *Seeman Journ. of bot.* Januar. 1871.

P. Mittenii var. *viridifolia* Corbière *M. de la Manche* p. 235.

P. pallida Braithw. in *Lond. Journ. of bot.* VIII, p. 255.

l. Ad mur. — *Eur.* : *Hibern.* et *Angl. merid.*, *Normann. marit.*

vitiana C. M. — *Hyophila*.

Wagneri C. M. — *Hyophila*.

Wilsoni (Hook.) *Bryol. eur.* II (mon. p. 14), t. 122; *C. M. Syn.* I, p. 554 et II, p. 622; *W. P. Sch. op. cit.* p. 152.

Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis *Dill. Hist. M.* p. 347, t. 45, f. 7 A-E.

Gymnostomum Combæ de Not. *Syll. et Epil.* ?

G. solivagum Green in *Brid. Bryol. univ.* I, p. 69 ?

G. Wilsoni Hook. *Bot. Misc.* I, p. 143, t. 41 p.p.; *Wils. Suppl. Engl. Bot.* t. 2710.

P. Mittenii var. *Wilsoni* Corbière in *op. et l. cc.*

P. truncata var. *subcylindrica* James in *Bot. King. Exped.* p. 399.

l. In terr. arenos. lapid. — *Eur.* : *Britann.*, *Gall. merid. occ.*; *Sardin.* ?

Etrur. *Am. sept.* : *Nevada*.

Æs. : *Rab. Bryoth. eur.* n. 955.

Wrightii R. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 291.

Terr. — *Pac.* : *Nov. Zeland.*

Wrightii C. M. — *Hyophila*.

xanthocarpa C. M. — *Gymnostomum*.

Zeyheri Hpe. — *Hyophila*.

Zollingeri C. M. — *Barbula spathulata*.

Pottiella *Limpr. Laubm. Deutschl.* I, p. 188 (sect. PHASCI).

POWELLIA Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1867, p. 187 (1 spec.).

involutifolia Mitt. in *op. et l. cc.*, t. 6 D.

Cortic. — *Pac.* : *Ins. Samoa*, *N. Caledon. austral.*

Prælongularia C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 124 (nom., sect. HYPNI = EURHYNCHIUM p p.).

PRIONODON C. M. in Bot. Zeit. 1844, p. 129 (28 spec.).

africanus Rehm. *M. Afr. austr. n.* 606 b.

Ster. — *Afr.* : Transvaal.

auriculatus Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, pp. 31-32.

Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

bolivianus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 146.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

caldensis Broth. in *Bihang till Sv. Vet.-Akad. Handl.* 1895, n. 3.

2. fr. ign. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. or.

ciliatus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 120.

Ster. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

densus (Sw.) C. M. in Bot. Zeit. 1844, p. 129, t. I (sub nom. *false inscripto* Pr. Ehrenbergii); Mitt. *M. austr. am.* p. 418.

Hypnum densum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 141 et in Hedw. *Sp. M.* p. 282, t. 74.

Neckera crassa Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 56 et in Deppe et Schiede *M. Mexic.*

N. densa Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 292, t. II.

Pilotrichum densum C. M. *Syn. II*, p. 160.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica, Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens. ? Brasil. or.

dichotomus Hpe. in *Linn.* 1863, p. 150; Mitt. *op. cit.* p. 420.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : Costa Rica. *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

divaricatus Mitt. *op. et l. cc.*

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat et Quitens.

elongatus (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 127.

? *Bartramia elongata* Mitt. in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 449.

Breutelia elongata ej. in F. v. Müller's *Fragm. Phyt. austral.* XI, p. 114.

Hypnum elongatum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 551 et *Fl. Antarct. I*, p. 137, t. 60, f. 3.

Pilotrichum elongatum C. M. *Syn. II*, pp. 161 et 674.

Ster. — *Pac.* : Ins. Auckland, Campbell, Tasman.

flagellaris Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 356; Mitt. *M. austr. am.* p. 419.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

fusco-lutescens Hpe. in *op. cit.* p. 357; Mitt. *op. et l. cc.*

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

haitiensis Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 125.

2. — *Am. sept.* : Haïti.

Jamesoni C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 146 (nom.).

— *Am. merid.* : And. Quitens.

Kunerti C. M. mss.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. (Rio grande do Sul).

geniculatus C. M. in *Fl.* 1897, p. 338.

Ster. — *Am. merid.* : Nov. Granata.

laeviusculus Mitt. *op. et l. cc.*

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

longissimus Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 178.

2. Ad arbor. — *Am. sept.* : And. Costa Rica.

luteo-virens (Tayl.) Mitt. *op. cit.* p. 417.

Neckera luteo-virens Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 59 c. ic. et p. 452, t. 16 N.

Pilotrichum luteo-virens C. M. *Syn. II*, p. 161.

— *Am. merid.* : And. Quitens. et Boliv.

lycopodioides Hpe. in *Linn.* 1863, p. 150 ; Mitt. *op. cit.* p. 418.

Hylomnium frondiforme Spr. *Cat.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

Lycopodium (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 127.

Pilotrichum Lycopodium C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 581.

P. Mülleri Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 356 ; Mitt. *op. cit.* p. 421.

Ster. Saxic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Mülleri Hpe. — Pr. *Lycopodium*.

pinnatus Hpe. in *op. cit.* p. 355 ; Mitt. *op. cit.* p. 417.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

patentissimus Besch. in *Bull. hb. Boissier* 1894, p. 394.

2? Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens.

ramosus Hpe. *mss.* ; Jaeg. *Ad. II*, p. 128.

— *Am. sept.* : Mexic. ?

Rehmanni Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 311.

Ster.

— *Afr.* : Kilima N'Djaro, Transvaal ; ins. *Franciae* ?

robustus Hpe. — *Breutelia grandis*.

rubiginosus Hpe. *Symb.* 1870, p. 278.

Ster.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

simplex C. M. in *Fl.* 1897, p. 339.

Ster.

— *Am. merid.* : Venezuela.

subgeniculatus C. M. in *op. cit.* p. 338.

Ster.

— *Am. merid.* : Venezuela.

undulatus Mitt. *op. cit.* p. 420.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat et Quitens.

Prionothrix C. M. in *Fl.* 1888, p. 417 (subsect. HYPNI).

Protobium C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 344 (sect. ARCHIDI).

Pseudephemerum Lindb. *M. Scand.* p. 27 (sect. PLEURIDI).

Pseudo-Anomodon Limpr. *Laubm. Deutschl. II*, p. 774 (sect. ANOMODONTIS).

Pseudo-Braunia Lesq. et Jam. *Man.* p. 153 (subgen. BRAUNIAE).

Pseudo-Campylopus Limpr. *Deutschl. Laubm. I*, p. 381 (sect. CAMPYLOPODIS).

Pseudo-Chaetomitrium Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 287 (sect. HYPNI).

PSEUDO-LESKEA Bryol. eur. V (61 spec.).

amblystegiella C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 160.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

andina W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1694.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

angustifolia (Hpe. et C. M.) Par.

Hypnum angustifolium Hpe. et C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 788.

Thuidium angustifolium Jaeg. *Ad. II*, p. 318.

— Afr. : C. B. Sp.

atro-virens (Dicks.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 2), t. 477; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 603.

Hypnum atro-virens Dicks. mss.; Sm. *Engl. Bot. n.* 2422 et *Fl. brit. III*, p. 1307.

H. filamentosum Bert. *Amoen.* p. 438; C. M. *Syn. II*, p. 478.

H. filamentosum β tenue C. M. l. c. p. 479.

H. filiforme Vill. *Pl. Dauph. III*, p. 906.

H. implexum Brid. *M. Rec. II, II*, p. 150, t. 4, f. 3.

H. incurvatum P. B. *Prodr.* p. 65.

Leskea atro-virens Hartm. *Skand. Fl. V* ed. p. 337.

Leskea incurvata Hedw. *Sp. M.* p. 216, t. 53; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 320.

Leskea incurvata var. simplex

Leskea incurvata var. subserrulata } Brid. l. c. ?

Leskea incurvata var. Thomasii

2. Ad sax. in loc. decliv. vel excav. humid. — Eur. : Reg. subalp. et alp., rar. montana; ins. Ursor. As. : Caucas. Am. sept. : Groenland, fret. Hudson, Terr. nov., Niagara, lac. Huron et Super., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Vancouver, Washington, Oregon, Montana, Idaho, Wyoming.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 437.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 781, 991, 1184.

Un. itin. 1867, n. 7, 32.

« var. *atricha* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 180 (*propria spec. serius*).
Rupic. — Am. sept. : Columb. brit.

« var. *brachyclados* (Schwaegr.) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.* (1).

H. filamentosum var. *brachyclados* C. M. l. c.

Leskea brachyclada Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 173; Brid. *op. cit.* p. 322.

L. incurvata var. *brachyclada* Brid. *Sp. M. II*, p. 81.

L. Saviana de Not. *Syll. n.* 87 (*fid. Limpr.*).

Ad saxa umbrosa et arb. rad. in silvat. — Eur. : Reg. subalp. As. : Caucas. Am. sept. : Wyoming.

« var. *filamentosa* Boulay *M. de la Fr.* p. 162.

Lescuraea filamentosa Lindb. *M. Scand.* p. 36.

Leskea filamentosa Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norveg.* p. 12.

— Am. sept. : Washington, Oregon, Montana.

« var. *papillosa* (C. M.) Par.

Hypnum filamentosum δ *papillosum* C. M. l. c.

Leskea Saviana de Not. *Syll.* p. 63 (*fid. C. M.*).

— Eur. : Apenn. Etrur. et Picen.

« var. *subcatenulata* (Scel.) Par.

— Eur. : Karelia.

« var. *subnitidula* (Lindb.) Par.

Lesquereuxia filamentosa var. *subnitidula* Lindb. in *Act. Soc. Fenn. VI*, n. 4 (*nom.*).

— Eur. : Lappon. Kolaëns.

« var. *tenella* Limpr. *Laubm. Deutschl. II*, p. 812.

(1) Cf. Hagen in *Rev. bryol.* 1891, p. 7 et Boulay *M. de la Fr.* p. 162.

Ad rup. calcar. — *Eur.* : Riesengeb., Salzburg., Alp. Bavar.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 6.

austro-catenulata (C. M.) Par.

Hypnum austro-catenulatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 83 et
 in *Forschungsreise... Bot.* p. 36.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

capensis W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

capillata (Mitt.) Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 77.

Leskea capillata Mitt. *M. Ind. or.* p. 130.

Ps. L. ? intermedia Sande-Lac. in *Miq. Ann. Mus. bot. Lugd. Batav.* II,
 p. 297.

Thuidium capillatum Jaeg. *Ad.* II, p. 318.

Th. nipponense W. P. Sch. in *Savatier M. Jap.* n. 616.

Th. papillatum (erratum !) Jaeg. *l. c.* p. 320.

1. — *As.* : Sikkim, Yunnan, Japon.

catenularia C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 97.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

catenulata (Brid.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 3), t. 478 ; W. P. Sch. *op. cit.*
 p. 604.

Grimmia catenulata W. et M. *Bot. Taschb.* p. 151.

Hypnum catenatum Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 909 ?

H. catenulatum Brid. *Sp. M.* II, p. 154 et *Bryol. univ.* II, p. 450 ; C. M.
Syn. II, p. 477.

Isothecium catenulatum Hüb. *Muscol. germ.* p. 599.

Leskea catenulata Lindb. *M. Scand.* p. 31.

L. Froehlichii Brid. *Sp. M.* II, p. 70 et *Bryol. univ.* II, p. 305.

Pterigynandrum catenulatum ej. *M. Rec.* II, I, p. 64, t. 5, f. 4.

Pterogonium catenulatum Schleich. *Crypt. helvet. exs. et Cat. pl. Helv.*
 p. 30.

Pt. filiforme Engl. *Bot.* ? (Brid. ex Hook.).

Thuidium catenulatum de Not. *Epil.* p. 235.

2. Ad sax. umbros. præcip. calcar., rar. ad arb. rad. — *Eur.* : Reg.
 mont. et subalp. Britann., Scand., Siles., Westphal., Belg., Wur-
 temb., Jurass., Helvet., Astur., etc. *As.* : Jenissei sup., Caucas.
 occ. et centr. *Am. sept.* : New York (fid. W. P. Sch.).

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 642 et b, 780 et b, 1183.

Un. itin. 1867, n. 4.

catenulata Mac. — Ps. L. malacoclada.

catenulatula C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 139.

— *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

chalaroclada (C. M.) Par.

Hypnum chalarocladum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 82 et in
Forschungsreise... Bot. p. 36.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

claviramea C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 355.

Anomodon clavirameus Jaeg. *Ad.* II, p. 305.

Hypnum clavirameum C. M. *Bot. Zeit.* 1855, p. 787.

— *Afr.* : C. B. Sp.

« var. acuminata C. M. *l. c.* n. 356.

— *Afr.* : C. B. Sp.

« var. aquatica Rehm. *l. c.* n. 642.

— *Afr.* : Transvaal.

« *var. denudata* (C. M.) Par.

Hypnum clavirameum var. denudata C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 213.

— Afr. : Madagascar.

compressa (Mitt.) Par.

Amblystegium compressum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 186.

1. — As. : China.

congesta (Wils.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 2).

Hypnum congestum Wils. mss.

H. radicosum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 31 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 320.

H. reflexum C. M. *Syn.* II, p. 448 (*quoad pl. Drumm.*).

H. tenax Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 225 p.p.

Ps. L. radica Kindb. in *Mac. Cat.* p. 181.

2. Ad terr. et rad. arb. — Am. sept. : M. Rupestr.

« *var. gracilis* Lesq. et Jam. l. c.

Hypnum tenax Drumm. l. c. p.p.

Ps. L. rigescens Lindb. in *Act. Soc. Fenn.* X, p. 247.

Ps. L. sciuroides Kindb. (*fid. Card.*).

Ut typ. — Am. sept. : Washington, Oregon, Wyoming.

crispula *Bryol. jav.* II, p. 125, t. 228.

2. — As. : Java.

cryptocolea Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1887, p. 97.

1. Rupic. — As. : Tonkin.

« *var. thelidia* Besch. l. c.

Muric. — Ubi typ.

decipiens Kindb. — *Ptychodium*.

desmioclada (C. M.) Par.

Hypnum desmiocladum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 83 et in *Forschungsreise .. Bot.* p. 35.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

falciscuspis C. M. et Kindb. in *Bidrag*, p. 454 (*nom.*) et in *Mac. Cat.* p. 182.

2. Rupic. — Am. sept. : Columb. brit. ; Yellowstone Park.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 510.

? *filum* (C. M.) Par.

Hypnum filum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 83 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 36.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen.

fuscifolia C. M. mss.

— As. : Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun).

gracilis (Jur.) W. P. Sch. *Syn.* II ed., p. 853.

Amblystegium gracile Jur. in *Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien*, 1864.

Thuidium pulchellum (*fid. Limpr.*).

1. Saxic. — Eur. : Tirol. merid., Istria.

heterocladoides Kindb. — *Ps. Leskea patens*.

intermedia Lac. — *Ps. L. capillata*.

laevifolia (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 309.

Leskea laevifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 130.

Ster. ? — As. : Himalaya occ.

Laplatae C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 138.

— *Am. merid.* : La Plata.

latifolia Sande-Lac. in *Miq. Ann. mus. bot. Lugdun. Batav.*, pp. 185 et 297, t. 2.

Amblystegium latifolium Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 186.

— *As.* : Japon.

laxifolia Rehm. *M. Afr. austr.* n. 640.

Ster. — *Afr.* : Transvaal.

Leikipiae (C. M.) Par.

Anomodon Leikipiae C. M. in *Fl.* 1890, p. 495.

Ster. — *Afr.* : M. Aberdare.

Liebmanni *Bryol. eur.* V (mon. p. 2, nom.).

Ps. L. subcatenulata W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 90.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

Mac-Owaniana Rehm. *M. Afr. austr.* n. 643.

— *Afr.* : C. B. Sp. or.

malacoclada C. M. et *Kindb.* in *Bidrag*, p. 454 (nom.) et in *Mac. Cal.* p. 182.

Ps. L. catenulata *Mac. Canad. M.* n. 460.

2. Ad rup. siccior. — *Am. sept.* : Columb. brit

microphylla (Sw.) Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 739.

Hypnum microphyllum Sw. *Prodr. Fl. Ind. occ.* p. 142 ; C. M. *Syn. II*, p. 491.

H. *Stereodon microphyllus* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 649 (excl. sp. *Pennsylvan.*).

Leskea microphylla Mitt. *M. austr. am.* p. 568 p.p.

Thuidium microphyllum Jaeg. *Ad. II*, p. 317.

1. Ad terr. et rad. arb. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaic.

minuta C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 96.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

muricola (C. M.) Sb. in *op. et l. cc.*

Hypnum microphyllum Hsch. *Fl. Brasil.*

H. muricolum C. M. *Syn. II*, p. 492.

Thuidium muricolum Jaeg. *Ad. II*, p. 317.

1. Ad mur. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or., Paraguay.

obscuriuscula (Mitt.) Sb. in *op. et l. cc.*

Leskea obscuriuscula Mitt. *M. Ind. or.* p. 130.

Thuidium obscuriusculum Jaeg. *op. cit.* p. 319.

1. — *As.* : Assam super.

oligoclada *Kindb.* in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 277 et in *Mac. Cal.* p. 180.

Ps. L. atro-virens Br. *eur.* (fid. Card.).

2. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

orbiculata (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 309.

Hypnum orbiculatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 84.

1. — *As.* : Khasia.

papillarioides C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 118

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

patens (Lindb.) Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 806.

? *Leskea patens* Lindb. in Soc. pr. Faun. et Fl. fenn. 9^a Octobr. 1880.

Lesquereuxia patens ej. in Meddel. of Soc. pr. Faun. et Fl. fenn. 1887, Hefte XIV, pp. 75-77.

Ps. *Leskea heterocladioides* Kindb. in Rev. bryol. 1895, p. 83.

Ps. *Leskea ticinensis* Bott. in Proc. verb. Soc. Tosc. sc. nat. 18 Gennajo 1891.

2. Rupic. — Eur.: Scandin., Alp. Scot., Stiriae, Carinth., Helvet., Galliae, Ticin.

paraguensis Besch. Not. M. Parag. p. 267.

1. — Am. merid.: Paraguay.

Exs.: Balansa Pl. Parag. n. 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1211.

paraguensis Besch. (1885). — *Thuidium subnudum* var. *paraguensis*.

Perraldieri Besch. Cat. M. Alger, p. 33.

— Afr.: Alger. (Kabyl. or.).

plagiostoma C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 20.

1. — Afr.: Abyssin.

« var. *attenuata* C. M. l. c.

Ut et ubi typ.

praelonga W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 89.

Heterocladium mexicanum ej. in sched.

1. — Am. sept.: Mexic.

prionophylla (C. M.) Bryol. jav. II, p. 124, t. 227.

Hypnum nervosum Hook. Ic. pl. rar. t. 24, f. 3; Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 21.

H. *prionophyllum* C. M. Syn. II, p. 481.

Leskea prionophylla Mitt. M. Ind. or. p. 132.

2. — As.: Nepal., Sikkim, Khasia, M. Neilgherr., Ceylan, Java, Celebes.

pseudo-gracilis (C. M.). Par.

Haplocladium pseudo-gracile C. M. in Hedwig. 1897, p. 139.

1. — Am. merid.: Argentin. subtropic. (Chaco).

pseudo-vagans C. M. mss.

Ster. — As.: Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun).

radicosa Kindb. — Ps. *L. congesta*.

ramuligera (Mitt.) Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 739.

Leskea ramuligera Mitt. op. et l. cc.

Thuidium ramuligerum Jaeg. Ad. II, p. 319.

1. — As.: Nepal., Himalaya occ.

remotifolia (Lindb.) Par. (subsp. *Ps. L. catenulatae*?)

Leskea remotifolia Lindb. in Broth. Enum. M. Caucas. p. 96.

— As.: Caucas. occ.

rigescens Lindb. — Ps. *L. congesta* var. *gracilis*.

rupestris Kindb. — *Leskea*.

Rusbyana C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 95.

1. — Am. merid.: And. Boliv.

sciuroides Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, p. 296 et in Mac. Cat. p. 180.

Macounia sciuroides Kindb. Enum. Bryin. exot.

Ps. *L. congesta* var. *gracilis* L. et J. (fid. Card.),

2. Rupic. — Am. sept.: M. Rupestr., Columb. brit.

« *var. denudata* *Kindb. in Mac. Cat. p. 181.*

2. *Rupic. — Am. sept. : M. Selkirk.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 564.

scopula (Mitt.) Sb. in op. cit. p. 740.

Leskea scopula Mitt. M. Ind. or. p. 131.

Thuidium scopulum Jaeg. Ad. II, p. 323.

1. — *As. : Himalaya occ.*

semensis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 21.

Hypnum semense Vent. l. c.

— *Afr. : Abyssin.*

siambonica C. M. in Hedwig. 1897, p. 138.

— *Am. merid. : And. Argentin. subtropic. Tucuman.*

stellatifolia *Sb. — Thuidium.*

stenophylla Ren. et Card. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.

1 ? 2 ? *Ad Alnos et sax. in decliv. humid. — Am. sept. : M. Selkirk, Washington.*

Exs. : Mac. Canad. M. n. 580.

stratosa (Mitt.) Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 739.

Anomodon stratosus Jaeg. op. cit. p. 305.

Leskea stratosa Mitt. M. Ind. or. p. 131.

1. — *As. : Assam super.*

subatrovirens *Sb. — Ps. L. subfilamentosa.*

subcatenulata *W. P. Sch. — Ps. L. Liebmanni.*

subfilamentosa Kiaër in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 147.

Ps. L. subatro-virens Sb. in op. et l. cc.

— *Afr. : Usambara, Madagascar.*

subulacea (Mitt.) Sb. in op. cit. p. 140.

Leskea subulacea Mitt. op. et l. cc.

Thuidium subulaceum Jaeg. Ad. II, p. 323.

1. — *As. : Khasia.*

tectorum (A. Br.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 605.

Hypnum dimorphum C. M. Syn. II, p. 490.

Hypnum dimorphum β tectorum Rab. Krytpfl. II, 3, p. 263.

H. Stereodon tectorum Brid. Bryol. univ. II, p. 582.

Leskea ? Mildeana de Not. Epil. p. 247.

Leskea tectorum Lindb. Adn. bot. in Bot. Notis. 1864.

Pterogonium tectorum A. Br. in Brid. l. c.

2. *In tigill. et lign. tectorum, rar. ad arb. trunc. — Eur. : Reg. med., rar. sept. et merid., fere semper ster. ; Spitzberg., ins. Ussor. ; vulgariss. in valle Rhen. ; Arvern., Jurass. : Norvegia merid. (fruct !) ; desider. in Britann. As. : Sibir. occid. Am. sept. : Groenland.*

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 600.

tenuissima Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 147.

2 ? — *Afr. : Ins. Franciae.*

ticinensis *Bott. — Ps. Leskea patens.*

tonkinensis Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1887, p. 98.

Rupic. — As. : Tonkin.

trichodes Besch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, p. 98.

1. *Rupic. — As. : Tonkin.*

uruguensis *C. M. in Hedwig*. 1897.

— *Am. merid.* : Argentin. Urug.

Wallichii (*Hook.*) *Sb. in op. cit.* p. 739.

Hypnum Wallichii Hook. in Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 219; C. M. Syn. II, p. 464.

Leskea Wallichii Mitt. M. Ind. or. p. 132.

2. — *As.* : Nepal., Himalaya.

Zippelii (*Dz. et Mk.*) *Bryol. jav. II, p. 126, t. 229.*

Hypnum Zippelii Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 310; C. M. Syn. II, p. 480.

2. — *As.* : Amboine, Java.

Pseudo-polytrichum *C. M. Syn. I, p. 123* (sect. *POLYTRICHUM*).

Pseudo-rhynchostegium *Lindb. Animadv, p. 27.*

PSILOPILUM *Brid. Bryol. univ. II, p. 95* (13 spec.).

aequinoctiale *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1683.*

Catharinea aequinoctialis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 10.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

antarcticum (*C. M.*) *Par.*

Catharinea antarctica C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1888, p. 77, in Forschungsreise... Bot. p. 10 et Bryol. austr. Georg. p. 13.

Ps. trichodon antarcticum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Am. merid.* : Austr. Georg.

arcticum *Brid. Bryol. univ. II, p. 96; W. P. Sch. Coroll. p. 89 et Syn. II ed. p. 533.*

Catharinea glabrata Hook. Tour in Iceland, I, p. 195.

C. laevigata Brid. Mant. M. p. 102.

Oligotrichum glabratum Lindb. in Notis.... 1867, p. 143.

O. laevigatum Bryol. eur. IV (mon. p. 5, t. 414.

Polytrichum glabratum Wahlenb. in W. et M. Ind. M. Mackenzies Icel. p. 434.

P. laevigatum ej. Fl. Lapp. p. 349, t. 22.

P. laevigatum Lindb. in Oefv... XVIII, p. 190, n. 40.

P. marginatum Schwaegr. Suppl. I, II, p. 329.

2. In arenos. ripar. et terr. turfac. — *Eur.* : Zon. arctic. : Spitzberg, Septem. Ins., etc. *As.* : Penins. Samoied., Taimyr, Jenissei. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, litt. mar. Behring.

australe (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. I, p. 697.*

Polytrichum australe H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 95, t. 87, f. 3 et Handb. p. 454.

2? Ad rup. et terr. — *Afr.* : Ins. Marion. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

compressum (*Hook. f. et Wils.*) *Mitt. M. austr. am. p. 607.*

Catharinea compressa C. M. Syn. I, p. 195 et II, p. 559.

Polytrichum compressum H. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 539 et Fl. antarct. II, p. 410, t. 153, f. 7.

2. — *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremit.

crispulum *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 85, t. 87, f. 3 et Handb. p. 453.*

2. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

gymnostomulum (C. M.) Par.

Catharinea gymnostomula C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 264.

2. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. subtropic.

laevigatum Lindb. — *Ps. arcticum*.

piriforme (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 716.

Atrichum piriforme ej. *Ad. I*, p. 706.

Catharinea piriformis Hpe. in *Linn.* 1871-73, p. 517.

2. — *Pac.* : Austral. or.

pygmaeum (C. M.) Par.

Catharinea pygmaea C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 11.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

tapes (C. M.) Par.

Catharinea tapes C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 12.

Ster. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

trichodon (Hook. f. et Wils.) Mitt. *op. et ll. cc.*

Catharinea trichodon C. M. *Syn. I*, p. 195.

Polytrichum trichodon H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 289, t. 10.

2. Terr. — *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Am. merid.* : Summ. And. Nov. Granat., M. Pichincha.

trichodon Mitt. (1876). — *Ps. antarcticum*.

tschutschicum (C. M.) Par.

Catharinea tschutschica C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2 4.

Oligotrichum tschutschicum Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 10.

2. — *As.* : Penins. Tschutschica.

Ulei Broth. in *Ule Bryoth. Brasil.* n. 151.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Psilotheca C. M. *Syn. I*, p. 513 (sect. ENCALYPTAE).

PTERIGONEURUM Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 95.

cavifolium Jur. — *Pottia*.

lamellatum Jur. — *Barbula cavifolia*.

sessile Jur. — *Pharomitrium*.

PTERIGYNANDRUM Hedw. *Sp. M.* p. 80 (emend.) (2 spec.).

algerianum P. B. — *Rhynchostegium tenellum*.

apiculatum Brid. — *Eurhynchium hians*.

appressum Brid. — *Pylaisia intricata*.

aureum Brid. } (Mant. M.) — *Pilotrichella tetragona*.
 } (Bryol. univ.) — *Cylindrothecium*.

bicolor (1) Lindb. — *Leptohymenium*.

brachycladon Brid. — *Leptohymenium*.

brasiliense Hpe. — *Erythrodontium*.

carolinianum Brid. — *Cylindrothecium seductrix*.

catenulatum Brid. — *Ps. Leskea*.

(1) *Boscii* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 750; C. M. *Syn.* II, p. 75. — Quid? Delendum.

ciliatum Hedw. — Hypopterygium.
cirrosum Brid. — Brachythecium albicans.
crinitum Brid. — Anomodon rostratus.
decipiens Lindb. — Pt. filiforme var. heteropterum.
fabronioides C. M. — Leptohymenium.
ferriculum C. M. — Platygyrium.

filiforme (Timm.) Hedw. *M. frond.* IV, p. 18, t. 7; *Brid. Bryol. univ.* II, pp. 77 et 750; *Bryol. eur.* V, t. 460; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 618.

Encalypta filiformis Roth *Fl. germ.* III, p. 155.

Grimmia filiformis W. et M. *Bot. Taschb.* p. 150.

Hypnum cylindricum Dicks. *Crypt. Fasc.* II, p. 12.

H. filiforme Timm. *Prodr. fl. Megap. n.* 817.

Leptohymenium filiforme Hüb. *Muscol. germ.* p. 552.

Leskea cylindrica Brid. *Sp. M.* p. 60.

Maschalanthus filiformis Schultze *Fl. Starg.* p. 356.

Maschalocarpus filiformis Spreng. *Einleit.* p. 297.

Neckera filiformis C. M. *Syn.* II, p. 89.

Pterogonium caespitosum Engl. *Bot. t.* 2526.

Pt. filiforme Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 100; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 77.

2. Ad trunc. imos arbor. silvat. et sax. umbros. — *Eur.*: E reg. campestr. usq. in subalp.; Spitzberg, Lappon. *As.*: Caucas. occ. et centr. *Afr.*: Alger., ins. Canar. *Am. sept.*: Groenland, Terr. nov., New Brunswick, Gaspes., Ontar., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., Montana, Wyoming, Idaho.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 244.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 637.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 348.

var. *crassius* Hartm. — *Pt. filiforme* var. heteropterum.

« var. *cristatum* (Hpe.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 289.

Leptohymenium cristatum Hpe. in *Linn.* 1859, p. 459.

Ut typ. — *Am. sept.*: Calif.

« var. heteropterum (Brid.) *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Leptohymenium elajochloron Lobarz. in *Haiding. Naturw. Abh.* I, p. 61.

L. filiforme β alpestre Rab. *Deutsch. Kryptfl.* II, III, p. 250.

L. heteropterum Hüb. *Muscol. germ.* p. 553.

Neckera decipiens W. et M. *Bot. Taschb.* I, pp. 241 et 473.

Pterigynandrum decipiens Lindb. *M. Scand.* p. 36.

Pt. filiforme β *crassius* Hartm. *Skand. Fl. ed.* IX.

Pt. heteropterum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 176.

Pterogonium decipiens Kindb. *Laubm. Schwed. u. Norv.* p. 13.

Pt. heteropterum Br. in *Schwaegr. Suppl.* III, I, t. 210 b.

Ad saxa. — *Eur.*: In subalp. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Washington.

« var. *minus* Lesq. et Jam. *l. c.*

Ut praeced. — *Am. sept.*: M. Adirondack.

« var. *Saelanii* (Lindb.) Par.

Pt. Saelanii Lindb. *M. Scand.* p. 37 (subsp. *Pt. filiformis*).

— *Eur.*: Lappon. or.

flavescens Brid. — *Fabronia*.

fragile Schleich. — *Myurella julacea*.

fulgens Hedw. — *Phyllogonium*.

gracile Hedw. — *Pterogonium*.

heteropterum Brid. — *Pt. filiforme* var. heteropterum.

hirtellum Hedw. — *Thelia*.

illecebrum Brid. — *Papillaria nigrescens* var. *illecebra*.

- julaceum* Hedw. — Leucodon.
latifolium Angstr. — Erythrodontium.
lineolatum Duby. — Sauloma.
longifolium Schleich. — Anomodon.
longirostre Brid. — Eustichia.
loriferum Lindb. — Leptohymenium.
madagassum C. M. — Pterogonium.
marginatum Rich. — Anomodon rostratus.
mutabile Brid. — Lescuræa striata.
myurum Brid. — Cylindrothecium.
nervosum Brid. — Leskea.
 β *cylindræum* Roehl. — Anomodon longifolius.
 var. *longifolium* Brid. — Anomodon longifolius.
nigrescens Sw. — Papillaria.
nudicaule Brid. — Leucodon domingensis.
obtusifolium Brid. — Cylindrothecium seductrix.
papillosulum C. M. et Kindb. in *Bidrag*, p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.*
 p. 165.
 2, Rupic. — *Am. sept.* : Columb. brit.
 Exs. : *Mac. Canad.* M. n. 553.
plumulosum Brid. — Anomodon longifolius.
pulchellum Brid. — Pterogoniella.
quadrifarium Brid. — Pilotrichella tetragona ?
repens Brid. — Platyggyrium.
Saelanii Lindb. — Pt. filiforme var. *Saelanii*.
Schweinfurthii C. M. — Erythrodontium.
sciuroides Brid. — Leucodon.
seriatum Hsch. — Papillaria Deppii.
Smithii Brid. — Leptodon.
squarrosus Hpe. — Leptohymenium bicolor.
striatum Duby. — Lescuræa.
subcapillatum Hedw. — Homalothecium.
subjulaceum C. M. — Erythrodontium.
tenerrimum Brid. — Myurella julacea.
tenue Brid. — Leptohymenium.
trichomitrium Hedw. — Forstroemia.
urceolatum Brid. — Pterogoniella.
viscosum P. B. — Phyllogonium.

PTEROBRYELLA C. M. in Linn. 1872, p. 182 (subgen. HYPNI) et Bull.
Soc. bot. Fr. 1878, p. 66 (gen. propr.) (6 spec.).

brevi-acuminata Besch. in *Bull. soc. bot. Fr.* 1878, p. 67.
 2. Ster. — *Pac.* : Nov. Caledon.

longifrons C. M. in *op. cit.* p. 65.

Hypnodendron speciosissimum Mitt. *Fl. Vit.* p. 401 p.p.

Hypnum longifrons C. M. in Linn. 1871-73, p. 180.

Pterobryum elatum Lindb. in *Oefv.* 1864, p. 601 et in *Cuming M. Philipp.* n. 2198.

Pt. longifrons C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 247.

2. — *As.* : M. ins. Philippin.

praenitens (Hpe.) C. M. in *op. et l. cc.*

Dendro-Hypnum praenitens Hpe. in Linn. 1874, p. 671.

Hypnodendron praenitens Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 90.

2. — *Pac.* : Ins. lord Howe.

speciosissima (Sull.) C. M. in op. et l. cc.

Hypnodendron speciosissimum Mitt. Fl. Vit. p. 401 p.p.

Hypnum speciosissimum Sull. in *Proced. of the Am. Acad...* III, p. 75.

2. — Pac. : Ins. Fidji.

Vieillardii C. M. in op. cit. p. 67.

2. Ster. — Pac. : Nov. Caledon.

wagapensis C. M. in op. cit. p. 66.

2. Ster. — Pac. : Nov. Caledon.

PTEROBRYUM Hsch. Fl. Brasil. I, p. 50 (39 spec.).

acutum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 81.

Ster. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

angustifolium (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 426; *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 49.

Pilotrichum angustifolium C. M. Syn. II, p. 181.

2. — Am. sept. : Antill. gall. Am. merid. : Ins. Trinitat.

f. *flagellifera* Besch. l. c. — Pt. *integrifolium*.

arbuscula Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 171.

— As. : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 3537.

australinum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria* 1883, p. 81.

Ster. — Pac. : Austral. (ins. sin. Moreton, Queensland).

biplicatum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 728.

Meteorium biplicatum C. M. in Fl. 1878, n. 6.

Ster. — As. : Sikkim.

brasiliense Mitt. — *Pilotrichum*.

ceylanicum Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 315.

Endotrichum ceylanicum Jaeg. Ad. II, p. 138.

Meteorium crassicaule Mitt. M. Ind. or. p. 84.

— As. : Ceylan.

clandestinum Mitt. — *Lembophyllum*.

cochlearifolium (Hsch.) Jaeg. Ad. II, p. 142.

Cryptotheca cochlearifolia Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*

Meteorium mexicanum Mitt. M. austr. am. p. 433.

Pilotrichum cochlearifolium C. M. Syn. II, p. 182.

1. — Am. sept. : Mexic.

cochlearifolium Mitt. — *Lembophyllum*.

convolutum (Dz. et Mk.) *Bryol. jav.* II, p. 77.

Neckera convoluta Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 312.

Pilotrichum convolutum C. M. Syn. II, p. 182.

Symphyodon convolutus Dz. et Mk. M. frond. ined. *Archip. ind.* p. 88, t. 50.

2. — As. : M. Java.

crassicaule (C. M.) Par.

Endotrichum crassicaule Jaeg. *Ad. II*, p. 138 (*excl. syn. Mitten.*).

Meteorium crassicaule Bryol. jav. *II*, p. 97, t. 210.

Neckera crassicaulis C. M. *Syn. II*, p. 132.

2. — As. : Sumatra, Java.

crassiusculum (C. M.) Par.

Symphysodon crassiusculus C. M. *hb.*

— Pac. : Nov. Guin. brit.

crenulatum (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 145.

Neckera crenulata Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 13 et in *Hook.*

Ic. pl. rar. t. 21, f. 6; C. M. Syn. II, p. 183; Mitt. M. Ind. or. p. 123.

N. spectabilis Griff. *Not. p. 463 et Ic. pl. asiat. II, t. 88, f. 3.*

1 ? — As. : Nepal., Himalaya, Khasia.

cylindraceum (Mont.) Bryol. jav. *II*, p. 78.

? *Neckera cylindracea* Mont. in *Ann. sc. nat.* 1848, p. 109 et *Syll. p. 23.*

Pilotrichum cylindraceum C. M. *Syn. II*, p. 182.

Pt. dextrum W. P. Sch. in *Jardin Enum. p. 19 (nom.)*.

2. — As. : Sumatra, Java. Pac. : Taïti; ins. Samoa?

cylindraceum Mitt. — *Pt. rugicalyx*.

cymbifolium Sull. *Ic. M. t. 76; Mitt. M. austr. am. p. 426.*

Ster. Lignic. — Am. sept. : Cuba.

densum (Schwaegr.) Hsch. *Fl. Brasil. I, p. 50; Mitt. M. austr. am. p. 425.*

Cryptotheca densa Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*

Pilotrichum Hornschuchii C. M. *Syn. II*, p. 179.

Pterogonium densum Schwaegr. *Suppl. III, I, II, t. 243 (excl. syn. Sw.)*
quoad pl. Brasil.

2. Ad arbor. — Am. sept. : Mexic., Guatemala. Am. merid. : Venezuela, And. Quitens., Brasil.

dextrum W. P. Sch. — *Pt. cylindraceum*.

diversinerve Mitt. — *Trachyloma*.

dumosum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled. p. 225.*

1 ? Ad arbor. — Pac. : Nov. Caledon.

duplicatum Mitt. — *Neckera*.

elatum Lindb. — *Pterobryella longifrons*.

excelsum C. M. *mss. ; Jaeg. Ad. II, p. 145.*

— Am. merid. : Nov. Granat.

fasciculatum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 172.

Ster. — As. : Japon.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 491.

2. — Am. merid. : Venezuela.

filicinum (Sw.) Mitt. *M. austr. am. p. 425.*

Fontinalis filicina Sw. *Prodr. fl. Ind. occ. p. 138.*

Neckera filicina Hedw. *M. frond. III, t. 18, f. 45.*

Pilotrichum filicinum P. B. *Prodr. p. 83; Brid. Bryol. univ. II, p. 257;*
C. M. Syn. II, p. 180.

2. — Am. sept. : Cuba, Jamaic., Hispaniola.

flagelliferum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 352.

— Afr. : M. Usagara.

gracile Mitt. — *Camptochaete*.

- Hanningtoni Mitt. in op. et l. cc.
— Afr. : M. Usagara, Usambara.
- humile Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 81.
Ster. — Pac. : Austral. or. (Queensland).
- Husnotianum Besch. Fl. bryol. Antill. fr. n. 49.
Ster. — Am. sept. : Guadalup., Martinic.
- imbricatum Duby. — Climacium japonicum.
- integrifolium Hpe. mss. ; Besch. in Journ. de bot. 1894, p. 62.
Pt. angustifolium f. flagellifera Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 49.
2. Ad rad. arb. — Am. sept. : Guadalup.
- involutum Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 315.
— As. : M. Ceylan.
- julaceum Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 116.
Ster. — Afr. : Usambara.
- Lindbergii C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 77.
— Am. merid. : Brasil. austr. or.
- longifrons C. M. — Pterobryella.
- Lorentzi C. M. in Linn. 1878-79, p. 422.
2. — Am. merid. : Argentin. subtropic.
- Micholitzii Broth. in Oefv. af Finska Vet. Soc. Foehr. 1895, p. 64.
2. Ster. — Pac. : Nov. Hibern.
- Mülleri Mitt. — Hypopterygium.
- nanum (C. M.) Par.
Symphysodon nanus C. M. hb.
Ster. — Pac. : Nov. Guin. brit.
- neckeroides (Dz. et Mk.) Bryol. jav. II, p. 76.
Pilotrichum Symphysodon C. M. Syn. II, p. 181.
Symphysodon neckeroides Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 314.
2. Ad arbor. — As. : Sumatra, M. Java, Borneo.
- obliquifolium Hsch. Fl. Brasil. I, p. 51 ; C. M. Syn. II, p. 183.
Ster. Ad arbor. — Am. merid. : Brasil. austral.
- planifolium Mitt. — Trachyloma.
- Pohlî Mitt. — Pilotrichella longipes.
- pusillum Ångstr. in Oefv.... 1876, n. 4, p. 32.
Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- rugicalyx (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 142.
Pilotrichum rugicalyx C. M. M. Polyn. p. 75.
Pt. cylindraceum Mitt. Sam. M. p. 191 ?
2. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa.
- splendens (Hsch. et Reinw.) Bryol. jav. II, p. 78.
Neckera splendens H. et R. in Nov. Act. Caes. Leop. Carol. XIV, 1829,
II, p. 714.
Pilotrichum splendens C. M. Syn. II, p. 675.
2. Ster. — As. : Java.
- stolonaceum C. M. in Linn. 1878-79, p. 423.
Ster. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

sulcatum Mitt. — Climacium.

trichomanoides Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 425.

Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

vitianum (Sull.) Mitt. *Fl. Vit.* p. 394.

Cryptotheca vitiana Mitt. *Sam. M.* p. 172.

Pilotrichum vitianum Sull. in *Proceed. of the Am. Acad.*.... 1855 et in *Wilkes Exped.* 1859, p. 20, t. 18.

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.

Whiteleggei Broth. in *Oefv. af Finska Vet.-Soc. Foehr.* 1895, p. 63.

2. Ster. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland, Nova Vales.).

PTEROGONIDIUM C. M. mss.

Spec. omn. PTEROGONIELLÆ ejusd. nom.

PTEROGONIELLA W. P. Sch. in herb. Mus. Paris (40 spec.).

andina (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 111.

Meiothecium andinum Mitt. *M. austr. am.* p. 470.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

aptychodes (Schlieph.) Jaeg. *Ad. II*, p. 113.

Meiothecium aptychodes Mitt. *op. cit.* p. 471.

Neckera aptychodes Schlieph. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 382.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

argentata Jaeg. — *Strückia argyreola*.

Boryana (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 111.

Meiothecium Boryanum Mitt. *op. cit.* p. 469.

Neckera Boryana C. M. *Syn. II*, p. 75.

Pterogonium Boryanum Mont. mss.

Pt. urceolatum Schwaegr. in *Weigelt M. Surinam*.

1. Ad arbor. — *Am. sept.* : Haïti, ins. S. Vincent. *Am. merid.* : Ins. Trinitat., Guian., Amazon.

capillaris (C. M.) Par.

Sauloma capillaris C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1896, p. 326.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

cassiquiariensis (Spr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 115.

Potamium cassiquiariense Spr. in Mitt. *op. cit.* p. 472.

1. Ad arbor. inundat. — *Am. merid.* : Amazon.

commutata (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Neckera commutata C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 385.

N. pulchella C. M. *Syn. II*, p. 78 p.p.

Potamium commutatum Mitt. *op. et l. cc.*

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

deceptiva (Mitt.) Jaeg. *l. c.*

Potamium deceptivum Mitt. *op. cit.* p. 475.

1. Ad arbor. et rup. inundat. — *Am. merid.* : Amazon.

diversifolia Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 179 et

M. Masc. Mad. n. 33.

1. Ad arbor. — *Afr.* : Madagascar.

Fabronia (Besch.) Par.*Meiothecium Fabronia* Besch. in *Journ. de Bot.* 1891.*Pterogoniopsis Fabronia* ej. in *Rev. bryol.* 1885, p. 18 et in *Bal. Pl. Parag.* n. 3693 p.p.1. — *Am. merid.* : Paraguay.*fuscescens* (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 114.*Neckera fuscescens* C. M. *Syn. II*, p. 77.*Pterogonium fuscescens* Hsch. in sched.1. — *Afr.* : C. B. Sp.*hamata* Jaeg. — Sauloma.*homalophylla* (Besch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 116.*Potamium homalophyllum* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 52.1. — *Am. sept.* : Guadalup.*intexta* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 112.*Meiothecium intextum* Mitt. *Sam. M.* p. 185.2. — *Pac.* : Ins. Samoa.*Jagori* Jaeg. — Sauloma.*lagenifera* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 111.*Meiothecium lageniferum* Mitt. *M. austr. am.* p. 470.— *Am. merid.* : Brasil. tropic.*leucodontacea* (C. M.) Par.*Aptychus leucodontaceus* C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 517.— *Am. merid.* : Guian. brit.*lineolata* Jaeg. — Sauloma.*lonchophylla* (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 115.*Hypnum lonchophyllum* Mont. *Syll.* p. 10.*Potamium lonchophyllum* Mitt. *op. cit.* p. 473.Aquat. — *Am. merid.* : Guian. gall.*longidens* (C. M.) Jaeg. *l. c.**Potamium longidens* Angstr. *Prim. lin.* p. 41.*Pterogonium longidens* C. M. *mss.*1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.*madagascariensis* (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 119.*Leucodon madagascariensis* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 213.*Neckera madagascariensis* C. M. *Syn. II*, p. 75.1. — *Afr.* : Madagascar.*microcarpa* Jaeg. — Sauloma.*microtheca* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 113.*Hypnum microtheca* C. M. in *Linn.* p. 1848, p. 199 et *Syn. II*, p. 3931. Ad arbor. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat, Surinam.*nana* (Besch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 114.*Meiothecium nanum* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 51.1. Inter musc. al. — *Am. sept.* : Guadalup.*negrensis* (Spr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 113.*Meiothecium negrense* Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 471.— *Am. merid.* : Amazon., And. Quitens. et Peruv.

pacimoniensis (Spr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 115.

Potamium pacimoniense Spr. in Mitt. *op. cit.* p. 474.

1. Ad arbor. demersos in fluv. — *Am. merid.*: Amazon., Brasil. or.

patens W. P. Sch. *herb.*

Meiothecium scabriusculum var. *patens* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 52.

1. Ad arbor. — *Am. sept.*: Martinic.

pulchella (Hook.) W. P. Sch. *herb.*

Neckera pulchella C. M. *Syn. II*, p. 78 p.p.

Potamium pulchellum Mitt. *op. cit.* p. 472.

Pterigynandrum pulchellum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 179 p.p.

Pterogonidium pulchellum C. M. *mss.*

Pterogonium pulchellum Hook. *M. ex. t.* 4.

1. — *Am. merid.*: Ins. Trinitat., And. Nov. Granat.,
Amazon.

revolubilis (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 112.

Meiothecium revolubile Mitt. *op. cit.* p. 471.

— *Am. merid.*: Orinoc.

samoana (C. M.) Par.

Sauloma samoana C. M. in Engler's *Bot. Jahrb.* 1896, p. 326 (nom.).

— *Pac.*: Ins. Samoa.

Sanctae Mariae Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 119.

Ad radic. *Rhizophor.* — *Afr.*: S. Maria d. Madagasc.

sarcophylla (C. M.) Par.

Aptychus sarcophyllus C. M. in Dusen M. *Camer. n. d.* p.p.

Potamium sarcophyllum ej. in *Malpighia*, 1896, p. 517.

— *Afr.*: M. Cameroon.

scabriuscula (Besch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 114.

Meiothecium scabriusculum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 51.

1. — *Am. sept.*: Guadalup.

Schimperi Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 118.

1. — *Afr.*: Ins. Franciae.

stratosa (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 112.

Meiothecium stratosum Mitt. *Sam. M.* p. 185.

2. — *Pac.*: Ins. Samoa.

Stuhlmanni Broth. in Engler's *Bot. Jahrb.* 1894, p. 208.

1. — *Afr.*: Usambara.

submicrotheca (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Hypnum submicrotheca C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 781.

Isopterygium submicrotheca Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc.* 1879
(*extra vol.*), p. 102.

1. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Caledon. (ins. Pinorum).

subtilissima (C. M.) Par.

Pterogonidium subtilissimum C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 209.

— *Am. sept.*: Guatemala.

sulcata (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 111.

Meiothecium sulcatum Mitt. *M. austr. am.* p. 470.

— *Am. merid.*: Brasil. tropic.

tenera (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 112.

Meiothecium tenerum Mitt. op. et l. cc.

— Am. merid. : Brasil. or.

tenuis (C. M.) Par.

Sauloma tenuis C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1896, p. 326 (nom.).

— Pac. : Nov. Guinea.

urceolata (Brid.) Jaeg. Ad. II, p. 115.

Meiothecium urceolatum Mitt. in Melliss's S. Helena, p. 363.

Neckera urceolata C. M. Syn. II, p. 77.

Pterigynandrum urceolatum Brid. Bryol. univ. II, p. 187.

Pterogonium urceolatum Schwaegr. Suppl. II, I, p. 33, t. 110.

1 ?

— Afr. : Ins. Tristan d'Acunha.

usambarica Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 208.

1.

— Afr. : Reg. lacustr.

vulpina (Mont.) Jaeg. l. c.

Neckera vulpina Mont. in Ann. sc. nat. II ser., II, p. 204, t. 4 et Syll.

p. 23; C. M. Syn. II, p. 79.

Potamium vulpinum Mitt. op. cit. p. 473.

1. Rupic. — Am. merid. : Orinoc.

Warmingii Jaeg. — Erythrodontium.

Weigeltiana (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 114.

Pterogonium Weigeltianum Hpe. in sched.

— Am. merid. : Surinam.

PTEROGONIOPSIS C. M. in Linn. 1878-79, p. 436 (1 spec.).

cylindrica ej. l. c.

1.

— Am. merid. : Argentin. Urug.

Fabronia Besch. — Pterogoniella.

PTEROGONIUM Sw. M. Suec. p. 26 (10 spec.).

abruptum Wright in Lond. Journ. of bot. 1892, p. 264.

— Afr. : Zambes. or.

ambiguum Hook. — Cleistostoma.

ascendens Schwaegr. — Leptohymenium brachycladon.

aureum Hook. — Cylindrothecium.

Beyrichianum Hpe. Enum. M. Brasil. n. 55.

1.

— Am. merid. : Brasil. austr.

Boryanum Mont. — Pterogoniella.

brachypterum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 37; Lesq. et Jam. Man. p. 290.

1. Lignic. — Am. sept. : Ontario, Columb. brit.

caespitosum Engl. Bot. — Pterigynandrum filiforme.

carolinianum Schwaegr. — Cylindrothecium seductrix.

catenulatum Schleich. — Pseudo-Leskea.

ciliatum Schwaegr. — Hypopterygium.

commutatum C. M. — Pterogoniella.

consanguineum Mont. — Anomodon.

curvifolium Mitt. in *Phil. Trans. of the Roy. Soc.* 1879 (extra vol.) p. 392, t. 37 c.

1. Cortic. — Afr. : Ins. Rodriguez.

decipiens Wright in *Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 264.

— Afr. : Zambes. or.

decipiens Kindb. — *Pterigynandrum filiforme* var. *heteropterum*.

declinatum Hook. — *Rhegmatodon*.

decumbens Schwaegr. — *Pterobryum*.

densum Schwaegr. — *Pterobryum*.

filiforme { Engl. Bot. — *Pseudo-Leskea catenulata* ?
Schwaegr. — *Pterigynandrum*.

flavescens Hook. — *Fabronia*.

fulgens Sw. — *Phyllogonium*.

fuscescens Hsch. — *Pterogoniella*.

gracile (Dill.) Sw. *M. Suec.* p. 26 ; *Bryol. eur.* V, t. 461 ; W. P. Sch. *Syn.* II, p. 575.

Encalypta gracilis Roth *Fl. Germ.* III, p. 154.

Grimmia ornithopodioides W. et M. *Bot. Taschb.* p. 148.

Hypnum circinatum Brot.

H. gracile L. *Syst. veg.* p. 952.

H. gracile ornithopodioides Dill. *Hist. M.* p. 322, t. 41, f. 55.

H. ornithopodioides Huds. *Fl. Angl.* p. 430.

H. palatinum Neck. *Enum. pl. Palat.* p. 454, t. I, f. I.

Isothecium ornithopodioides Boul. *M. Fr.* I, p. 145.

Leptohymenium gracile Hüb. *Muscol. germ.* p. 554.

Maschalanthus gracilis Spreng. in *Schrad. Journ. bot.* II, p. 467.

Neckera gracilis C. M. *Syn.* II, p. 97.

Pterigynandrum gracile Hedw. *M. frond.* IV, p. 10, t. 6 ; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 174.

Pterogonium ornithopodioides Lindb. in *Oefv...* 1863, p. 411, n. 53.

2. Ad arb. annosior. rad., ad rup. et in lapidos. — Eur. : Praecip. zon. merid. ; Norveg. occ. Afr. sept. : Madeir., ins. Canar., Usambara, C. B. Sp. Am. sept. : Calif. Am. merid. : Patagon. ?

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 475, 686.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 349.

Un. itin. 1863, n. 62.

« var. *capense* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 318.

— Afr. : C. B. Sp.

« var. *cavernarum* Pfeiff. *Bryogr. Stud.* p. 73.

Ad. pariet. spelunc. granit. — Eur. : Tirol.

« var. *duplicato-serratum* Lesq. et Jam. *Man.* p. 290.

Leptohymenium duplicato-serratum Hpe. in *Linn.* 1859, p. 460.

Rupic. — Am. sept. : Calif.

gracile Mitt. — *Erythrodontium rotundifolium* ?

hamatum Hpe. — *Sauloma*.

heteropterum Br. { (fid. C. M.). — *Heterocladium*.

{ (fid. Lindb., W. P. Sch.). — *Pterigynandrum filiforme*
var. *heteropterum*.

hirtellum Schwaegr. — *Thelia*.

indicum Mont. — *Forstroemia*.

intricatum { Drumm. — *Platygyrium repens*.

{ Schwaegr. — *Pylaisia*.

Jagori Jaeg. — *Sauloma*.

Jamesoni Tayl. — *Cylindrothecium*.

julaceum { Hook. } (fid. C. M.). — *Erythrodontium*.
 { (fid. Mitt.). — *Erythrodontium juliforme*.
 Schwaegr. — *Leucodon*.

kilimandscharicum C. M. in *Fl.* 1890, p. 494.

Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

laxum Wils. — *Schwetschkea*.

lineolatum C. M. — *Sauloma*.

longidens C. M. — *Pterogoniella*.

madagassum (C. M.) Par.

Pterigynandrum madagassum C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 211.

2. — *Afr.* : Madagascar.

marginatum { Schwaegr. — *Anomodon rostratus*.
 { Schwein. ? Bryol. eur. — *Clasmatodon parvulus*.

microcarpon Harv. — *Sauloma*.

myurum Hook. — *Cylindrothecium*.

neckeroides Griff. — ? *Homalothecium*.

nervosum Schwaegr. — *Leskea*.

octoblepharis Schleich. — *Fabronia*.

ornithopodioides Lindb. — *Pt. gracile*.

peregrinum W. P. Sch. in *Jardin Enum.* p. 20 (nom.).

— *Am. sept.* : Calif. (S. Francisco).

perpusillum de Not. — *Habrodon Notarisii*.

procurrens Mitt. — *Heterocladium*.

productum Hsch. — *Leptodon*.

pulchellum Hook. — *Pterogoniella*.

repens Schwaegr. — *Platygyrium*.

rotundifolium Engl. Bot. — *Myurella julacea*.

sciuroides Turn. — *Leucodon*.

Smithii Sw. — *Leptodon*.

spec. ? Hsch. — *Papillaria capillaris*.

squarrosus Griff. — *Erythrodontium juliforme*.

squarrulosum Mont. — *Erythrodontium*.

striatum Schwaegr. — *Lescurea*.

subcapillatum Schwaegr. — *Homalothecium*.

? *subenerve* Spr. — *Habrodon Notarisii*.

tectorum A. Br. — *Pseudo-Leskea*.

tenue Schwaegr. — *Leptohyemium*.

trichocladon Tayl. — *Hypnum*.

trichomitrium Schwaegr. — *Forstroemia*.

urceolatum Schwaegr. { (M. Weig.). — *Pterogoniella Boryana*.

 { (Suppl.). — *Pterogoniella*.

viridissimum C. M. mss.

Ster. — *As.* : Singapore.

Weigeltianum (Hpe). — *Pterogoniella* (1).

Pterygodon Lindb. *M. Scand.* p. 12 (sect. POLYTRICH).

PTERYGOPHYLLUM Brid. *Mant. M.* p. 149 et *Bryol. univ.* II, p. 341
 (27 spec.).

acuminatum (C. M.) Par.

Hookeria lucens β *acuminata* C. M. *Syn. II*, p. 202.

(1) In *Enum. Kindb.* nom. nudum :
Pt. cylindricum C. M.

Pt. acutifolium W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 583 in *adn.*

Pt. lucens Sull. *M. Allegh. n.* 58.

2. — *Am. sept.* : *M. Allegh.* (Carol. super.).

acutifolium (Hook.) Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 53.

Hookeria acutifolia Hook. in *Schwaegr. Suppl. II, II, I*, p. 36, t. 163;
C. M. Syn. II, p. 202; *Bryol. jav. II*, p. 33, t. 157; *Mitt. M. Ind. or.*
p. 116 et *M. austr. am.* p. 338.

H. Grevilleana Griff. *Notul.* p. 473 et *Ic. pl. asiat. t. 2, f. 4.*

1. Ad terr. et rup. madid. — *As.* : *Nepal.*, *Java.* *Am. sept.* : *Guadalup.*
Am. merid. : *And. Quitens.*

acutifolium W. P. Sch. — *Pt. acuminatum.*

albicans Brid. p.p. { — *Hookeria.*
— *Hookeria Auberti.*
— *Hookeria vesiculosa.*

anomalum (Schwaegr.) Mitt. *M. austr. am.* p. 397.

Hookeria anomala C. M. *Syn. II*, p. 204; *Lesq. et Jam. Man.* p. 293.

Rhacopilum anomalum Schwaegr. *Suppl. III, II, II*, p. 278.

Ster. ? — *Am. sept.* : *Bor. occid. ??* *Am. merid.* :

Fuegia ? ins. Eremitae.

apiculatum Jaeg. — *Eriopus.*

arcuatum Brid. — *Rhacopilum.*

asplenoides Brid. — *Eriopus.*

atro-virens (Col.) Par.

Hookeria atro-virens Colenso in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1888, p. 46.

— *Pac.* : *Nov. Zeland.*

Blumeanum Bryol. jav. — *Hookeria.*

chonoticum Mitt. in *Voy. H. M. S. Challenger, III*, p. 81 (in *adn.*).

Ster. — *Am. merid.* : *Archip. Chonos.*

complanatum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 246.

Distichophyllum complanatum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy.*
Soc. of Victoria, 1883, p. 77.

Hookeria complanata Hpe. in *Linn.* 1876, p. 320.

2 ? — *Pac.* : *Austral.*

convallium Brid. — *Lepidopilum.*

debile Jaeg. — *Leucomium.*

decompositum Brid. — *Porotrichum.*

denticulatum (Hook. f. et Wils.) Mitt. *op. et l. cc.*

Hookeria denticulata H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 550 et
in *Fl. Antarct. I*, p. 45, t. 62; *C. M. Syn. II*, p. 203.

2. Ad terr. humid. — *Am. merid.* : *Ins. Juan Fernandez*, *Eremit.*,
Maclov. Pac. : *Tasman.*, *ins. Auckland*, *Campbell.*

« *var. latifolia* C. M. *l. c.*

Ut typ. — *Pac.* : *Ins. Auckland.*

depressum Brid. — *Hookeria.*

diaphanum Brid. — *Lepidopilum.*

falcatum Brid. — *Hookeria.*

filiculaeforme Brid. — *Hypopterygium.*

flavum (Col.) Par.

Hookeria flava Colenso in *Trans. and Proceed. of the N. Zeal. Inst.* 1888,
p. 46.

— *Pac.* : *Nov. Zeland.*

- fragile Mitt. in Voy. H. M. S. Challenger, III, p. 81 (in adn.).
— Am. merid. : Chile merid.
- hepaticaefolium (Hpe. et C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 247.
Hookeria hepaticaefolia Hpe. et C. M. in Linn. 1853, p. 503.
Pt. nigellum (fid. Mitt.).
2. — Pac. : Austral. or. (Victoria).
- Hookeri Jaeg. l. c.
Hookeria robusta H. f. et W. Fl. Tasm. II, p. 220, t. 177, f. 4.
Pt. obscurum (fid. Mitt.).
— Pac. : Tasman.
- indicum Bel. — Stereophyllum.
- jungermannioides Brid. — Hypopterygium Tamarisci.
- laete-virens Brid. — Hookeria.
- Levieri Geh. in Rev. bryol. 1881, p. 27.
2. Ad rup. madid. — Pac. : Tasman.
- lucens (L.) Brid. Bryol. univ. II, p. 343; Bryol. eur. V, t. 448; W. P. Sch. op. cit. p. 582.
Hookeria lucens Sm. in Act. Linn. Soc. IX, p. 275; C. M. Syn. II, p. 201.
Hypnum lucens L. Sp. pl. p. 1589.
H. pennatum, aquaticum, lucens, longis latisque foliis Dill. Hist. M. p. 270, t. 34, f. 10.
Leskea lucens Lam. et DC. Fl. fr. II, p. 513.
2. Ad rivul. et scaturig., ad font. frigid. in crypt. — Eur. : Tota in silvat. montos. Afr. : Ins. Madeir. Am. sept. : Columb. brit., Vancouver, Oregon, Idaho, Tennessee, Calif.
Ers. : Mand. Pl. Madeir. n. 35.
Rab. Bryoth. eur. n. 2, 587, 1289.
var. acuminatum W. P. Sch. — Pt. nipponense.
- lucens Sull. — Pt. acuminatum.
- macroneuron (Col.) Par.
Hookeria macroneura Colenso in Trans. and Proceed. of the N. Zeal. Inst. 1885, p. 283.
— Pac. : Nov. Zeland.
- maculatum (Col.) Par.
Hookeria maculata Colenso in op. cit. p. 284.
— Pac. : Nov. Zeland.
- magellanicum Besch. in Miss. sc. Cap Horn, V, Bot. p. 297.
Ster. Ad terr. humid. — Am. merid. : Terr. Magellan.
- megablastum (C. M.) Par.
Hookeria megablasta C. M. in Fl. 1896, p. 460.
Ster. — Pac. : Ins. Sandwic.
- microcarpum Brid. — Mniadelphus.
- mniaceum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 246.
Hookeria mniacea C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 247.
Ster. — Afr. : C. B. Sp.
- Montagnei Bel. — Ectropothecium.
- natalense Rehm. — Hookeria.
- nigellum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 247.
Hookeria nigella H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 124, t. 93, f. 6 et Handb. p. 496.

2. Ad rup. aquatic. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman., ins. Auckland, Kermadec.

nipponense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 362.

Pt. lucens var. *acuminatum* W. P. Sch. in *Savat. M. Jap. n.* 562.

2. — *As.* : Japon.

obscurum (Mont.) Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 96 et op. cit. p. 398.

Hookeria obscura Mont. in *Ann. sc. nat.* 1844, IV, p. 93; *C. M. Syn. II*, p. 204.

1? (C. M.) 2? (Fl. Tasm.). Ad rup. humid. — *Am. merid.* : Chile austr., Valdiv. *Pac.* : Tasman.

pallescent Brid. — *Hookeria*.

pennatum Brid. — *Cyatophorum bulbosum*.

quadrifarium Brid. — *Mniadelphus*.

radiculosum Brid. — *Stereophyllum*.

Rehmanni C. M. in *Rev. bryol.* 1878, p. 72 (nom.).

— *Afr.* : Austr.

rigidum Brid. — *Hookeria*.

robustum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 247.

Hookeria robusta H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 124, t. 93, f. 5 et *Handb.* p. 495.

2. In silv. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland sept.

rotulatum Brid. — *Hypopterygium*.

sexfarium (Col.) Par.

Hookeria sexfaria Colenso in *Trans. and Proceed. of the N. Zeal. Inst.* 1888, p. 45.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

Struthiopteris Brid. — *Hypopterygium*.

sublimbatum Mitt. in *Voy. H. M. S. Challenger, III*, p. 81 (in adn.).
Ster. — *Am. merid.* : Chile merid. (vulc. Osorno).

sublucens C. M. in op. et l. cc.

— *Afr.* : Austral.

subrotundum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 246.

Distichophyllum subrotundum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 77.

Hookeria subrotunda Hpe. in *Linn.* 1876, p. 321.

Ster.

— *Pac.* : Austral. or.

tamariscinum Brid. — *Hypopterygium Tamarisci*.

undatum Brid. — *Hookeria* (1).

PTILIUM de Not. *Bryol. ital.*

Crista-castrensis de Not. — *Hypnum*.

PTILOCLADUS Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 278.

Spec. omn. CAMPTOCHAETE ejusd. nom.

(1) « *Pterygophylla nervosa* forsan genus proprium » *Chylophyllum* « constituenda » Jaeg. *Ad. II*, p. 38.

Pt. eaervia : *acutifolium*, *acuminatum*, *lucens* et forsan *sublucens*.

Ptychobryum C. M. in *Fl.* 1878, n. 6 (sect. **PTEROBRYI**).

PTYCHODIUM W. P. Sch. Syn. I ed. p. 527 (8 spec.).

affine *Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 802.

2. Ad rup. gneiss. — *Eur.* : Stiria.

decipiens *Limpr. op. cit.* II, p. 749.

Pseudo-Leskea decipiens *Kindb. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 17.

2. Ad rup. aren. decomp. — *Eur.* : Tatra, Stiria, Carinth., Tirol., Ticin.

erectum *Culm.* — *Pt. plicatum* var. erectum.

hakoniense (*Mitt.*) *Par.*

Hypnum hakoniense *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1891, p. 185.

2. — *As.* : Japon.

leucodonticaule C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

oligocladon *Limpr. op. cit.* p. 801.

2. Rupic. — *Eur.* : Stiria? Salisb., Pinzgov.

Pfundtneri *Limpr. op. cit.* p. 793.

2. Ad rup. arenac. decompos. — *Eur.* : Stiria, Salzburg., Carinth., Tirol., Vorarlberg, Helvet.

plicatum (*Schleich.*) W. P. Sch. Syn. I ed. p. 527 et II ed. p. 638.

Brachythecium plicatum *Bryol. eur.* VI (mon. p. 21), t. 550.

Hypnum Morettii *Garovagl.*

H. plicatum *Schleich. cent. IV Pl. helv. n. 27; C. M. Syn. II*, p. 363.

H. Stereodon plicatus *Brid. Bryol. univ. II*, p. 636.

Lescuraea plicata *Lindb. M. Scand.* p. 35.

2. Ad sax. calcar., var. granit., umbros. — *Eur.* : Reg. mont. sup. et subalp.; ins. Ursor. *As.* : Caucas. centr.

Exs. : Un. itin. 1863, n. 32.

“ var. erectum (*Culm.*) *Par.*

Pt. plicatum var. erectum *Culm. in Rev. bryol.* 1884, p. 89.

Ster. — *Eur.* : Alp. Helvet.

tanguticum *Broth. in litt. ad C. M.*

— *As.* : China occ. (prov. Tangut).

PTYCHOMITRIUM *Bryol. eur.* III (54 spec.).

acutifolium *Hook. f. et Wils. Fl. Tasm. II*, p. 180, t. 173, f. 2.

Glyphomitrium acutifolium *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 73.

1. Rupic. — *Pac.* : Austral. merid., Tasman.

Adamsoni (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 381.

Glyphomitrium Adamsoni *Mitt. in op. et l. cc.*

Rupic. — *Pac.* : Austral. merid. (Melbourne).

affine *Hpe. mss.*; *Jaeg. Ad. I*, p. 384.

— *Am. merid.* : Brasil.

angustifolium W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n. 1630 bis.*

— *Am. merid.* : And. Boliv.

australe (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 383.

Brachysteleum australe *Hpe. in Linn.* 1856, p. 209.

Glyphomitrium australe Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 57.

— *Pac.* : Alp. Austral. fel.

Balansae Besch. N. M. *Parag.* p. 261 et in *Bal. Pl. Parag.* n. 1235.

Ad tecta. — *Am. merid.* : Paraguay.

brevifolium (C. M.) Par.

Brachysteleum brevifolium C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 357.

Syn. Rupic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

chimborazense (Spr.) Jaeg. *Ad. I*, p. 381.

Glyphomitrium chimborazense Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 107.

Saxic. — *Am. sept.* : Ins. S. Vincent. *Am. merid.* : And. Quitens.

crassinervium W. P. Sch. mss.; Jaeg. *Ad. I*, p. 384.

— *Afr.* : C. B. Sp.

crispatum (Hook. et Grev.) W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 291 (nom.).

Brachypodium crispatum Brid. *Bryol. univ. I*, pp. 147 et 717.

Brachysteleum crispatum Hsch. in *Linn.* 1841, p. 126; C. M. *Syn. I*, p. 768 p.p.

Encalypta crispata Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 60, t. 17.

Glyphomitrium crispatum Brid. *Mant. M.* p. 30.

Grimmia crispata Hook. *Bot. Misc.* 1830, p. 133, t. 36.

Notarisia capensis Hpe. in *Linn.* 1837, p. 379.

Orthotrichum crispatum H. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. I*, 1824, p. 115.

l. Ad arbor. et saxa. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 141 et 495.

cucullatifolium (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 382.

Brachysteleum crispatum β *brachycarpum* Hsch. in *op. et l. cc.*

Br. *cucullatifolium* C. M. *Syn. I*, p. 769.

l. Rupic. — *Afr.* : Orange, C. B. Sp.

Exs. : Rehm. l. c. n. 142 et 496.

Cumingii Duby *Choix de M. ex...* 1880, I, t. I, f. 2.

Pt. *Fernandezianum* ? (fid. Hpe. in *Fl.* 1880, n. 21).

— *Am. merid.* : Valdivia.

cylindraceum (C. M.) Par.

Brachysteleum cylindraceum C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57.

Pt. *Mandoni* Besch. *ibid.* 1885, p. 18.

— *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Balansa M. *Parag. n.* 3686.

Cylindrothecium (C. M.) Par.

Brachysteleum Cylindrothecium C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 199.

— *Am. sept.* : Guatemala.

dentatum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 380.

Glyphomitrium dentatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 149.

Rupic. — *As.* : China, Japon.

Drummondii Sull. — *Glyphomitrium*.

emersum (C. M.) Par.

Brachysteleum emersum C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 448.

l. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

Fernandezianum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 382.

Glyphomitrium Fernandezianum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 74 et *M. austr. am.* p. 107.

— *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez.

fluviatile (C. M.) Par.

Brachysteleum fluviatile C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 13.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Gardneri Lesq. in *Mem. Acad. Calif. I*, p. 16 : *Lesq. et Jam. Man.* p. 156.

1. *Rupic.* — *Am. sept.* : Columb. brit., Washington, Oregon, Idaho, Calif.

geniculatum Hpe. — *Campylosteleum saxicola.*

helenicum (Mitt.) Par.

Glyphomitrium helenicum Mitt. in *Melliss's Helena*, 1875, p. 389.

— *Afr.* : Ins. S. Helena.

Hieronymi Besch. in *Journ. de bot.* 1891.

1. — *Am. merid.* : Argentin.

Howeanum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 683.

Brachysteleum Howeanum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 662.

Glyphomitrium Mülleri (fid. Mitt.).

1. *Rupic.* — *Pac.* : Ins. Lord Howe.

incurvum (Schwaegr.) Sull. *Ic. M.* p. 63, t. 39 et *M. of U. St.* p. 35 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 157, t. 476.

Brachysteleum Hampeanum C. M. in *Linn.* 1843, p. 597.

Br. incurvum ej. *Syn. I*, p. 770.

Grimmia Hookeri Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 61.

Gr. incurva Mühlenb. *Cat. pl. Am. sept.* p. 78.

Gr. Mühlenbergii Brid. *Bryol. univ. I*, p. 181.

Notarisia virginica Hpe. in *Linn.* 1837, p. 379.

Pt. pusillum Sull. *M. Allegh. n.* 135 ; *Br. et Sch. in Lond. Journ. of bot.* 1843, p. 665 (1).

Weisia incurva Schwaegr. *Suppl. II, I*, p. 51, t. 116.

1. *Ad rup. arenac.* — *Am. sept.* : Niagara, New-York occ., Ohio et Georg. merid.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 28, 29.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 195.

indicum (Willd.) Jaeg. *Ad. I*, p. 382.

Brachysteleum indicum C. M. *Syn. I*, p. 768.

Glyphomitrium indicum Mitt. *M. Ind. or.* p. 46.

Trichostomum indicum Willd. in *Roemer und Usteri Mag. für die Bot.* 1787, IV, p. 7, t. 1.

1. — *As.* : Ind. or.

isoskelos (Duby) Par.

Brachysteleum isoskelos Duby *Choix de M. ex.* 1880, p. 3, t. 2, f. 3.

Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

lepidomitrium W. P. Sch. *hb. et in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 41.

Brachysteleum lepidomitrium C. M. *Syn. I*, p. 767.

Glyphomitrium lepidomitrium Mitt. *M. austr. am.* p. 106.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

(1) Cf. Renauld in *Rev. bryol.* 1885, p. 32.

ligulatum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 382.

Brachysteleum ligulatum C. M. in *Fl.* 1885, p. 423.

Glyphomitrium ligulatum Mitt. *op. cit.* p. 107.

— *Am. merid.*: Fuegia, ins. Eremitae.

Lindigii (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 380.

Brachysteleum Lindigii Hpe. in *Linn.* 1863, p. 144.

Glyphomitrium Lindigii Mitt. *op. cit.* p. 105.

l. Rupic. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

lineare (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 684.

Brachysteleum lineare C. M. in *sched.*

— *As.*: Japon.

lobuliferum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 380.

Glyphomitrium lobuliferum Mitt. *op. cit.* p. 106.

Rupic. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

Mandoni W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1630.

— *Am. merid.*: And. Boliv.

Mandoni Besch. — Pt. cylindraceum.

microcarpum (C. M.) Par.

Brachysteleum microcarpum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 107.

Rupic. — *As.*: China or. (prov. Schen-Si).

Mittenii Jaeg. *Ad. I*, p. 380.

Glyphomitrium serratum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 73
et in Fl. Tasm. II, p. 181, t. 173, f. 3.

l. Rupic. — *Pac.*: Tasman.

Mülleri (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 382.

Glyphomitrium Mülleri Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* l. c.

— *Pac.*: Victoria, ins. Lord Howe.

nigricans (Kze.) W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 290.

Brachysteleum crispatum C. M. *Syn. I*, p. 768 p.p.

Br. polyphyllum ej. l. c. p. 767 p.p. (quoad pl. *Madeir.*).

Glyphomitrium pulvinare Mitt. *Contrib. to the crypt. fl. of Atlant. Isl.* p. 2.

Macromitrium nigrescens Kze. in *Fl.* 1830, p. 373.

M. tenerum ej. l. c.

Pt. *pulvinare* Jaeg. *Ad. I*, p. 381.

l. Ad saxa granit. humid. — *Eur.*: Algarb. *Afr.*: *Madeir.*, *Teneriffa*,
ins. Azor.

Exs.: Bourgeau *Pl. Canar.* n. 1141.

Husnot *Pl. Canar.* n. 132.

Mandon *Pl. Madeir.* n. 10.

pachyphyllum (C. M.) Par.

Brachysteleum pachyphyllum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 12.

— *Am. merid.*: Brasil, austr. or.

polyphyloides (C. M.) Par.

Brachysteleum polyphyloides C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 107.

l. — *As.*: China or. (prov. Schen-Si).

polyphyllum (Dicks.) *Bryol. eur. III* (mon. p. 4), t. 229; W. P. Sch. *op. cit.* p. 289.

Bryum cirratum, setis et capsulis brevioribus et pluribus Dill. *Hist. M.*
p. 378, t. 48, f. 41.

- Br. polypillum Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 7.
 Brachysteleum polypillum C. M. *Syn. I*, p. 767 (excl. loc. Madeir.).
 Cecalophum tortile P. B. *Prodr.* p. 52.
 Dicranum aggregatum Brid. *Sp. M. I*, p. 203.
 D. polypillum Sm. *Fl. Brit. III*, p. 1225.
 Glyphomitrium polypillum Mitt.; Lindb. *M. Scand.* p. 29.
 Mnium tortile Brid. *op. cit. III*, p. 64.
 Rhacomitrium falcifolium Brid. *Mant. M.* p. 82.
 Rh. lingulatum ej. *Bryol. univ. I*, p. 777.

Rh. polypillum
 Rh. polypillum var. cirratum
 Rh. polypillum var. falcifolium
 Rh. polypillum var. tortile

Brid. *op. cit.* p. 225

- Trichostomum cirratum Sm. *Fl. Brit. III*, p. 1239.
 Tr. polypillum Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 153, t. 39.
 Tr. serratum Schleich. *Cent. II Pl. helvet. n.* 19.

l. Ad mur. et saxa silic. sicc. — Eur.: Reg. mont., praecip. occid.;
 Suec., Norveg., Fichtelgeb., Thuring., Hanovr., vall. Rhen.,
 Britann., Hispan. sept., Gall. occ., Tirol., Helvet. Afr.: Madeir.,
 ins. Canar., Azor.

Exs.: Mandon *Pl. Madeir. n.* 12.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 515, 571 et b.

procerum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Madeir. n.* 11.

— Afr.: Madeir.

pulvinare Jaeg. — Pt. nigricans.

pusillum (Bals. et de Not.) *Bryol. eur. III* (mon. p. 5), t. 229; W. P.
 Sch. *Syn. II ed.* p. 291.

Brachysteleum glyphomitrioides C. M. *Syn. I*, p. 769.

Grimmia glyphomitrioides B. et de Not. *Prodr. bryol. Mediol.* p. 153.

Notarisia italica Hpe. in *Linn.* 1837, p. 379.

Ptychomitrium glyphomitrioides Vent. et Bott. *Enum. crit.* p. 68.

l. Rupic. — Eur.: Longobard, Pyren. centr. As.: Caucas. occ.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur. n.* 305.

pusillum Sull. — Pt. incurvum.

pygmaeum Lesq. et Jam. in *Proced. of the Am. Acad...* XIV, p. 136 et
Man. p. 157.

l. Rupic.? — Am. merid.: Missouri, Kansas.

Reichenbachianum (Ltz.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 42.

Brachysteleum Reichenbachianum Ltz. *Moost.* p. 162.

l. — Am. sept.: Mexic.

rugosum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 380.

Glyphomitrium rugosum Mitt. *M. austr. am.* p. 105.

— Am. sept.: Mexic.

Sellowianum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 382.

Brachysteleum crispatum Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 20.

Br. Sellowianum C. M. *Syn. I*, p. 769 et *II*, p. 649.

Glyphomitrium Sellowianum Mitt. *op. cit.* p. 106.

Cortic. et rupic. — Am. merid.: Brasil. austr. or., Monte-Video.

serratum *Bryol. eur. III* (mon. p. 4).

Brachysteleum serratum C. M. *Syn. I*, p. 768.

Glyphomitrium serratum Mitt. *M. austr. am.* p. 106.

— Am. sept.: Mexic.

sinense (Mitt.) Jaeg. l. c.

Glyphomitrium sinense Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 149.

— *As.* : China or., Japon.

Soulae C. M. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 118 et in *Ren. et Card. M. Masc. Mad.* n. 169.

1. — *Afr.* : Madagascar.

speciosum Wils. — *Pt.* *Tortula*.

subbaffine (C. M.) Par.

Brachysteleum subbaffine C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 11.

— *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

subdentatum Besch. *Not. M. Paraguay*, p. 262 et in *Bal. Pl. Parag.* n. 1238.

1. In silv. — *Am. merid.* : Paraguay.

Tortula (Harv.) Jaeg. *Ad. I*, p. 383.

Didymodon Tortula Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, II, p. 4 et in *Hook. Ic. pl. rar. t.* 18; *C. M. Syn. I*, p. 461.

Glyphomitrium Tortula Mitt. *M. Ind. or.* p. 46.

Pt. speciosum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 325.

Rupic. — *As.* : Nepal., Sikkim, Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun), *M. Neilgherr.*, Alp. Yunnan.

uruguense (C. M.) Par.

Brachysteleum uruguense C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 446.

1. — *Am. merid.* : Uruguay.

vaginatum Besch. *Not. M. Parag.* p. 262 et in *Bal. Pl. Parag.* n. 1234.

1. *Rupic.* in silv. — *Am. merid.* : Paraguay.

vernicosum (C. M.) Par.

Brachysteleum vernicosum C. M. in *Linn.* 1880-82, p. 450.

1. — *Am. merid.* : Argentin. Tucuman.

Wilsoni Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.* 1859, p. 277.

Glyphomitrium Wilsoni Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 159.

1. Ad rup. et terr. — *As.* : Japon (1).

PTYCHOMNION Mitt. *M. austr. am.* p. 536 (*ACHYROPHYLLUM*, sect. *STEREODONTIS* ej. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 88) (9 spec.)

aciculare (Brid.) Mitt. l. c.

Hypnum aciculare Brid. *M. Rec. II, II*, p. 158, t. 5, f. 2 et *Bryol. univ.* II, p. 505; *C. M. Syn. II*, p. 441.

H. cucullifolium P. B. *Prodr.* p. 62.

Stereodon Ptychomnion Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 89.

2. Ad arbor. et terr. — *Am. merid.* : Chile, Valdiv., ins. Chiloe et Juan Fernandez, terr. Magellan. *Pac.* : Ins. Sandwic., Taïti, Austral. extra trop., Nov. Zeland sept. et med., Nov. Caledon., Tasman., ins. Auckland et Campbell.

cygnisetum (C. M.) Par.

Ectropothecium cygnisetum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 87.

(1) In *Enum. Kindberg.* nom. nud. :
Pt. Spegazzini C. M.

Eurhynchium cygnisetum Jaeg. *Ad. II*, p. 428.

Hypnum aciculare H. et W. *Fl. antarct. p.p.*

H. cygnisetum C. M. in *Fl.* 1885, p. 425.

2. — *Am. merid.* : Chile, Archip. Magellan., Fuegia austr. or. *Pac.* : Ins. Auckland.

densifolium (Brid.) Jaeg. *Ad. II*, p. 617.

Hypnum densifolium Brid. *Sp. M.* p. 204 et *Bryol. univ. II*, p. 514; C. M. *Syn. II*, p. 442.

2. — *Afr.* : Ins. Tristan d'Acunha. *Pac.* : Nov. Zealand. sept.

fruticetorum C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 86.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

itatiaiense Broth. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 190.

In frutic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

latifolium Ångstr. *Prim. lin.* p. 46.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Leichardti (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 618.

Dendro-Hypnum Leichardti Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 523.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

ptychocarpon (Schwaegr.) Mitt. *op. cit.* p. 536.

Hypnum ptychocarpon Schwaegr. in *Linn.* 1844, p. 561, t. 10; C. M. *Syn. II*, p. 459.

Leskea? Gayana Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 95 et in *Cl. Gay Hist. Chil. Bot. crypt. t.* 3, f. 4; *Syll.* p. 20.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Chile austr., Valdiv., Patagon. austr.

subaciculare Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXVII et in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot.* p. 305, t. 5, f. 20.

2. — *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez, Chile, Patag. austr.

PTYCHOSTOMUM Hsch. in *Neue Bot. Zeit. V. Sylloge*, p. 62.

*caespiticiu*m Brid. — *Bryum pendulum* var. *compactum*.

cernuum } Hsch. — *Bryum*.

Sw. — *Bryum pallens* var. *arcuatum*.

compactum Hsch. — *Bryum pendulum* var. *compactum*.

β *spadiceum* Hsch. — *Bryum pendulum* var. *spadiceum*.

pendulum Hsch. — *Bryum*.

pulchellum R. Br. — *Bryum melvilleanum*.

radiculosum Hedw. — *Bryum pendulum*.

Ptychothecium Mitt. *M. austr. am.* p. 68 (sect. DICRANI).

PUIGGARIA Duby *Choix de M. ex.* 1880, p. 7.

elegans Duby — *Lepidopilum subsulcatum*.

ovalifolia Duby. — *Lepidopilum*.

splendens Duby. — *Lepidopilum flavescens*.

PUNGENTELLA C. M.

Spec. omn. non indicatae sunt SEMATOPHYLLA ejusd. nom.

gracilicaulis C. M. — *S. bolivianum*.

lamprophylla C. M. — *Rhaphidostegium*.

upoloviensis C. M. — *Sematophyllum macrorhynchum*

PYCNAPOPHYSCIUM *Rchb. Ic. crypt.*
angustatum Rchb. — Tetraplodon.

Pycneura *C. M. in Fl.* 1888, n. 1 (sect. BRUCHIAE).

Pycnocaulon *C. M. in Linn.* 1871-74, p. 144 (sect. ACAULON = SPHAERANGIUM).

Pycnophyllum *C. M. Syn. I*, p. 567 (sect. TRICHOSTOMI).

Pycnosphagnum *C. M. in Linn.* 1874, p. 545 (nom.) *et in Fl.* 1887, p. 404 (SPHAGNA ACUTIFOLIA).

PYCNOTHECIUM *W. P. Sch. in Mandon Pl. Madeir.*

Mandoni W. P. Sch. — Sciaromium proluxum.

Pyloecium *C. M. in Forschungsreise... Bot.* p. 56 (sect. HYPNI = SEMATOPHYLLUM).

PILAIEA *Lindb. Man. M.* 1, p. 70.

PILAIÆA *Desv. Journ. bot.* V, p. 24.

PILAISEA *ej. in Lem. Dict. XLIV*, p. 128.

PYLAISÆA *Brid. Bryol. univ.* II, p. 281; *Br. et Sch. in Hook. Lond. Journ. of bot.* 1843, II, p. 669 *et Bryol. eur* V.

PYLAISEA *Fürnr. in Fl.* II, *Erg. Bl.* p. 60.

} = PYLAISIA.

PYLAISIA *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 523 (39 spec.).

africana *C. M. in Rehm, M. Afr. austr.* n. 345.

— *Afr.* : Austr.

? *alpicola* (*Lindb.*) *Par.*

Stereodon alpicola *Lindb. in Mitt. Soc. pr. Faun. et Fl. Fenn.* 4a 9br. 1882 (nom.); *Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 153 (descript.).

Ster. In fiss. rup. — *Eur.* : Fennia. *As.* : Jenissei sup.

aomoriensis *Besch. mss. et in Faurie Pl. Jap.* n. 180 bis et 553.

l. *Ad arbor.* — *As.* : Japon.

boliviana *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv.* n. 1692.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

? *Bollei* *de Not. Epil.* p. 207.

? *Orthothecium Bollei* *Jaeg. Ad. II*, p. 368.

Ster. In silv. — *Eur.* : Ins. Ischia.

brachythecioides *C. M. mss.*

Cortic. — *As.* : Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun).

brevifolia *Wils.* — *Platygyrium.*

? *brevirostris* (*Griff.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 745.

Neckera brevirostris *Griff. Not.* p. 456 *et Ic. Pl. asiat. II*, t. 85, f. 1, P. II^u.

Stereodon brevirostris *Mitt. M. Ind. or.* p. 94.

Cortic. — *As.* : Himalaya sept. occid. ? Khasia.

Brotheri *Besch. in Ann. sc. nat.* 1893, p. 369.

l. — *As.* : Japon.

? *camurifolia* (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 379.

Stereodon camurifolius *Mitt. op. cit.* p. 96.

l. — *As.* : Nepal.

? capillacea (Griff.) Jaeg. *Ad. II*, p. 745.

Neckera capillacea Griff. *Not. p.* 457 et *Ic. Pl. asiat. II*, t. 89, f. 3.

Stereodon capillaceus Mitt. *op. cit.* p. 94.

— As. : Khasia.

chrysea Vent. et Bott. — Orthothecium.

complanatula C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897.

1. — As. : China or. (prov. Schen-Si).

condensata (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 272.

Stereodon condensatus Mitt. *op. cit.* p. 93.

1. — As. : Himalaya oce.

denticulata Jaeg. — P. subdenticulata.

dicranelloides C. M. *hb.*

Ad ramul. — As. : Sikkim.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 810.

— Afr. : M. Cameroon.

entodonteia C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 111.

1. — As. : China or. (prov. Schen-Si).

erectiuscula (Sull. et Lesq.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 180.

Hypnum erectiusculum S. et L. in *Proced. of the Am. Acad...* IV, p. 281.

2. — As. : Japon.

extenta (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 372.

P. speciosa Wils. in *sched. p.p.*

Stereodon extentus Mitt. *M. Ind. or.* p. 95.

1. — As. : Nepal., Sikkim.

falcata Bryol. eur. V (mon. p. 3, nom.); W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 103.

1. — Am. sept. : Mexic. (M. Orizaba).

filari-acuminata C. M. et Kindb. in *Bidr.* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 174.

1. In terr. subinund. — Am. sept. : Columb. brit.

heteromalla Br. et Sch. in *Lond. Journ. of bot.* 1843, II, p. 669 in correct. ad Drumm. *M. bor. am. n.* 222; Lesq. et Jam. *Man.* p. 308.

Hypnum multiflorum Tayl. in *Fl. Hibern. Mackay*, II, p. 46 (fid. C. M.).

H. polyanthum Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 222 p.p.

H. polyanthum var. pallidifolium C. M. *Syn. II*, p. 337.

H. resupinatum Tayl. in *Spr. M. Pyr. Ann. and. Mag. of nat. hist.* 1849, n. 46.

P. polyantha var. heteromalla Limpr. *Laubm. Deutschl. III*, p. 12.

Stereodon polyanthos var. heteromalla Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1893, II, p. 153.

1. Cortic. et rupic. — As. : Jenissei sup. Am. sept. : Niagara, Saskatchewan, M. Rupestr., Columb. brit., Minnesota.

homomalla Jaeg. — Rhaphidostegium.

intricata (Hedw.) Bryol. eur. V (mon. p. 3, nom.); Sull. *M. of U. St.* p. 62 et *Ic. M.* p. 139, t. 88; Lesq. et Jam. *Man.* p. 309.

Anomodon intricatus Hpe. in *Linn.* 1839, p. 46.

Hypnum appressum Brid. *Sp. M. II*, p. 161.

H. intricatum C. M. *Syn. II*, p. 338.

Maschalocarpus intricatus Spreng. *Syst. veg. IV*, I, p. 159.

Pterigynandrum appressum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 186.

Pt. intricatum Hedw. *Sp. M.* p. 85, t. 18; Brid. *op. cit.* p. 179.

Pterogonium intricatum Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 100.
Stereodon intricatus Lindb. et Arn. *op. cit.* p. 151.

1. Cortic. et lignic. in silv. — *Eur.*: Rossia occid. (fid. Lindb.).
As.: Jenissei sup., Obi. *Am. sept.*: Nov. Scot., New Brunswick,
 Gaspes, Ottawa, Ontar., lac. Erie, Assiniboine, reg. sept., or.,
 centr. et merid.

Exs.: Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 87.

Mac. *Canad. M.* n. 262 p.p.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 380.

« *var. crassipes* Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 258.

Stereodon intricatus var. crassipes Lindb. et Arn. *l. c.*

— *As.*: Saghalien.

intricata } Mac. p.p. — *P. ontariensis*.
 } Vent. et Bott. — *Orthothecium*.

Jamesii S. et L. — *P. subdenticulata var. obscura*.

nana Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 180.

1. Cortic. — *As.*: Japon.

obtusa Lindb. in *op. cit.* p. 257.

Stereodon obtusus Lindb. et Arn. *op. cit.* p. 153.

1. — *As.*: Saghalien.

ontariensis C. M. et Kindb. in *Bidrag* p. 454 (nom.) et in *Mac. Cat.*
 p. 174.

P. intricata Mac. *Canad. M.* n. 262 p.p.

1. Ad terr. et arb. rad. — *Am. sept.*: Gaspes., Ontario.

plagiangia C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

— *As.*: China or. (prov. Schen-Si).

polyantha (Schreb.) Bryol. eur. V, t. 455; W. P. Sch. *Syn.* II ed. n. 624.

Hypnum filiciforme Huds. *Fl. Angl.* I ed., p. 497.

H. filifolium L. *Mant. pl.* II, p. 310.

H. filiforme Huds. *op. cit.* p. 421.

H. myosuroides var. filiforme Web. *Spic. fl. Goett.* p. 93.

H. polyanthum Schreb. *Spic. fl. Lips.* p. 97; C. M. *Syn.* II, p. 337;
Drumm. M. bor. am. I ed. n. 222 (fid. Kindb.).

H. sericeum ramosius et tenuius, capsulis acuminatis Dill. *Hist. M.* p. 327,
 t. 42, f. 62.

H. strigosum Neck. *Meth. M.* p. 179.

H. velutinum var. Poll. *Pl. Palat.*

Isothecium polyanthum Spr. in *Ann. and Mag. of nat. hist.* 1849.

Leskea filiformis Sibth. *Fl. Osson.* p. 303?

L. polyantha Hedw. *M. frond.* IV, p. 4, t. 2; Brid. *Bryol. univ.* II, p. 311.

L. splendens Wib. *Fl. Werth.* p. 340?

Stereodon polyanthus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* VIII, p. 40.

1. Ad arb. camp., lign. fabref., rar. ad mur. et sax. — *Eur.*: Vulga-
 tiss. in reg. camp. *As.*: Japon., Ochotsk, Obi, Jenissei, Caucas.
Afr.: Alger. *Am. sept.*: Infrequens; Terr. nov., New Brunswick,
 Gaspes., Ontar., Saskatchewan, M. Alb. et Rupestr., Nov. Mexic.

Exs.: Mac. *Canad. M.* n. 260.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 382.

« *var. alpicola* Kindb. *Laubm. Schwed. und Norw.* p. 38.

Ut typ. — *Eur.*: Scandin.

« *var. brevifolia* (Lindb. et Arn.) Par.

Stereodon brevifolius L. et A. *op. cit.* p. 152.

— *As.*: Sibir. occ., Jenissei sup.

- « *var. coloradensis* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1894, p. 238.
— Am. sept. : Colorado.
- « *var. homomalla* Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 279.
Stereodon polyanthus var. homomalla L. et A. op. et l. cc.
— As. : Jenissei sup., Obi.
- « *var. longicuspis* (Lindb. et Arn.) Par.
Stereodon polyanthus var. longicuspis L. et A. op. et l. cc.
— As. : Jenissei sup., Obi.
- var. paludosa* Bryhn. — *Thedenia suecica*.
- « *var. subjulacea* (Lindb. et Arn.) Par.
Stereodon polyanthus var. subjulacea L. et A. op. et l. c.
— As. : Jenissei sup., Obi.
- ? *pseudo-homomalla* (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 745.
Hypnum pseudo-homomallum C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 4.
— Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).
- pseudo-Platygyrium* Kindb. in Mac. Cat. p. 173.
l. Lignic. — Am. sept. : Ontario, Wisconsin.
- radicans* Brid. — *Plagiothecium denticulatum*.
- revolutifolia* Kindb. mss.
— Am. sept. : Canada.
- rufescens* de Not. — *Orthothecium*.
- secunda* (Hook.) Jaeg. Ad. II, p. 372.
Hypnum orthothecium Schwaegr. Suppl. III, I, I, t. 220 ; C. M. Syn. II p. 338.
Leskea secunda Hook. Ic. pl. rar. t. 23, f. 1 et in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 16.
Stereodon orthothecius Mitt. M. Ind. or. p. 101.
1 (C. M.) 2 (Mitt.). — As. : Nepal., Khasia. Pac. : Ins. Samoa.
- Selwyni* Kindb. in Ott. Nat. II, p. 156, in Mac. Cat. p. 174 et Canad. M. n. 434.
P. intricatae forma (fid. Card.).
l. Lignic. — Am. sept. : Ontario.
- sericea* de Not. — *Orthothecium intricatum*.
- ? *simlaënsis* (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 373.
Stereodon simlaënsis Mitt. op. cit. p. 95.
l. — As. : Himalaya occ.
- speciosa* Wils. in sched. p.p.
Stereodon speciosus Mitt. op. cit. p. 95.
l. — As. : Sikkim.
- speciosa* Wils. p.p. — *P. extenta*.
- subdenticulata* Bryol. eur. V (mon. p. 2, nom.) ; Sull. Ic. M. p. 137, t. 87 ; Lesq. et Jam. Man. p. 308.
Hypnum fabroniaefolium C. M. Syn. II, p. 271.
Leskea denticulata Sull. M. of U. St. p. 62 et Ic. M. p. 125, t. 78.
P. denticulata Jaeg. Ad. II, p. 371.
Pylaisiella subdenticulata Kindb. Check-list of Eur. and N. Am. M. p. 21.

1. Cortic. — *Am. sept.* : New Jersey, Ohio, Indiana.
Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 367, 382.

« *var. obscura* Lesq. et Jam. *Man.* p. 310.

P. Jamesii Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 383.

Ad terr. et rad. arb. — *Am. sept.* : Massachussets.

subfalcata Bryol. eur. V (mon. p. 3, nom.); W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 103.

1. — *Am. sept.* : Mexico.

subhomomalla (C. M.) Jaeg. *Ad.* II, p. 373.

Hypnum subhomomallum C. M. in *bot. Zeit.* 1857, p. 781.

Rhaphidostegium crassiusculum (fid. Mitt. in *Proced. of the roy. Soc.* 1879 (extr. vol.), p. 101.

1. — *Pac.* : Ins. Pinor., Nov. Zelandia.

suecica Lindb. — *Thedenia*.

var. compacta Lindb. — *Thedenia suecica var. compacta*.

tenella Wils. in sched.

Stereodon tenuirameus Mitt. *M. Ind. or.* p. 94.

2? Cortic. — *As.* : Sikkim, Java.

tenera C. M. mss.

Ster. — *As.* : Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun).

tenuirostris Jaeg. — *Rhaphidostegium cylindricarpum*.

velutina Bryol. eur. V (mon. p. 3, nom.); Sull. *M. of U. St.* p. 63 et Ic. *M.* p. 140, t. 89; Lesq. et Jam. *Man.* p. 310.

Pylaisiella velutina Kindb. *Check-List. of Eur. a. N. Amer. M.* p. 21.

1. Cortic. — *Am. sept.* : Terr. nov., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontar., lac. Erie et Super., reg. sept., or. et merid.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 470.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 381.

PYLAISIELLA Kindb. *Check-list of Eur. and N. Amer. M.* p. 21.

subdenticulata Kindb. — *Pylaisia*.

velutina Kindb. — *Pylaisia*.

PYLAISIOPSIS W. P. Sch. *herb.*

subcapillata W. P. Sch. — *Homalothecium*.

PYRAMIDIUM Brid. *Bryol. univ.* I, p. 107.

tetragonum Brid. — *Pyramidula*.

PYRAMIDULA Brid. *Mant. M.* p. 20 (1 spec.).

tetragona Brid. l. c.; W. P. Sch. *Coroll.* p. 60 et *Syn.* II ed. p. 374.

Gymnostomum piriforme juvenile Voit. *M. Herbip.* p. 17.

G. tetragonum Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 22, t. 8.

Physcomitrium tetragonum Bryol. eur. III, t. 298.

Pyramidium tetragonum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 108; C. M. *Syn.* I, p. 113

1. In agr. subhumid. — *Eur.* : Suecia, ins. Aland, German., Tirol. merid., Helvet., Pedemont., Gall. centr. (Arvern.); desid. in Britanu. *Am. sept.* : Colorado, Indiana, Kansas, Texas.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 155, 352 et b, 1162, 1352.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 232.

PYRAMITRIUM Wallr. *fid. Hpe. in Linn.* 1872, p. 513 (sect. *ENCALYPTAE*).
Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 61
(*gen. propr.*).

Spec. omn. *ENCALYPTAE* ejusd. nom.

Pyridium C. M. in *Linn.* 1874, p. 597 (sect. *BARTRAMIÆ*).

PYRRHOBRYUM Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1868, p. 174.

Spec. omn. *RHIZOGONIA* ejusd. nom.

PYXIDIUM Ehrh. *Beitr.* IV, p. 44.

pendulum Ehrh. — *Phascum curvicollum*.

RAINERIA de Not. *Syll. M.* p. 275.

splachnoides de Not. — *Tayloria splachnoides* var. *obtusa*.

RAUIA Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, V, p. 23.

scita Aust. — *Thuidium*.

REHMANIELLA C. M. in *Bot. Centralbl.* 1881, n. 37 (1 spec.).

africana C. M. l. c.

Sphaerangium africanum Rehm. *M. Afr. austr.* n. 171 et 518.

1. — *Afr.* : Orange.

RENAULDIA C. M. in *Ball. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, II, p. 190 (2 spec.).

dichotoma C. M. l. c.

— *Afr.* : Madagascar.

hildebrandtielloides C. M. l. c. ; *Ren. et Card. M. Masc. Mad.* n. 226.

2. — *Afr.* : Madagascar.

REMYELLA (see p. 1108)

Reticularia C. M. *Syn.* II, p. 535 (sect. *CONOMITRIUM*, sensu Muller.).

Rhabdogrimmia Limpr. *Laubm. Deutsch.* I, p. 759 (sect. *GRIMMIAE*).

Rhabdotheca C. M. *Syn.* I, p. 519 (sect. *ENCALYPTAE*).

RHABDOWEISIA Bryol. eur. I (8 spec.).

crenulata (Mitt.) Par.

Didymodon crenulatus Mitt. *M. Ind. or.* p. 23.

Rh. denticulata Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 293.

1.

— *As.* : Sikkim.

cyathicarpa (Mont. ?) Mitt. *M. austr. am.* p. 54 (1).

1. *Rupic.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

denticulata (Brid.) Bryol. eur. I (mon. p. 5), t. 42; W. P. Sch. *Syn.* II
ed. p. 59.

Bryum crispatum Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 3, t. 7, f. 4.

Oncophorus crispatus Lindb. *M. Scand.* p. 27.

Weisia crispata Brid. *M. Rec.* II, I, p. 73.

W. denticulata Brid. *Mant. M.* p. 40 et *Bryol. univ.* I, p. 342; C. M.
Syn. I, p. 650.

W. fugax β Roehl. *Deutsch. Fl.* III, p. 49.

W. striata Drumm. *M. bor. am. I ed. n.* 68.

W. striata β major *H. et T. Muscol. brit. II ed., p.* 81, t. 15.

1. In rup. fissur. et pariet. excav., etc. — *Eur.* : Reg. mont. et subalp.
Am. sept. : Terr. nov., lac. Super., Pensilv., M. Alb. et Rupestr.
Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II, n.* 56.

denticulata { Mitt. — Rh. sikkimensis.
 { Wils. — Rh. crenulata.

fugax (*Hedw.*) *Bryol. eur. I, (mon. p. 4), t.* 41 ; *W. P. Sch. op. cit. p.* 58.

Grimmia crispata Roth *Fl. Germ. III, I, p.* 145.

Gr. striata *W. et M. Bot. Taschb. p.* 325.

Oncophorus striatus Lindb. *M. Scand. p.* 27.

Weisia fugax *Hedw. Sp. M. p.* 64, t. 13, f. 5-10 ; *Brid. Bryol. univ. I, p.* 340 ; *C. M. Syn. I, p.* 649.

W. leptodon *Plaub. in Brid. op. cit. p.* 341.

W. pumila *Brid. op. cit. p.* 338.

W. striata *Kaulf. in Sturm Fl. Germ. II, fasc. XVI, t.* 24.

W. striata α minor *H. et T. op. et l. cc.*

1. In fiss. rup. praepr. aren., granit. et micac. schist. — *Eur.* : Med.
 et sept. in reg. montan. et subalp. *As.* : Japon. *Am. sept.* : M. Alb.,
 Ontar., lac Super. *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez (fid. Mitt.).

Exs. : Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 34.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 33 a et b, 1225.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 56.

Lindigiana (*Hpe.*) Mitt. *M. austr. am. p.* 54.

Weisia Lindigiana *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p.* 352.

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Schisti *Bryol. eur. — Cynodontium.*

sikkimensis *C. M. in Linn. 1880-82, p.* 435.

Rh. *denticulata* Mitt. (fid. *C. M.* ; ubi? an ead. ac Rh. *crenulata* ?).

— *As.* : Sikkim.

sphaerothecia (*C. M.*) *Par.*

Weisia sphaerothecia *C. M. in Linn. 1880-82, p.* 434.

1. — *Am. merid.* : Alp. Argentin. Tucuman.

vulcanica (*C. M.*) Mitt. *op. cit. p.* 55.

Weisia vulcanica *C. M. Syn. I, p.* 649.

1. In speluncis. — *Am. sept.* : Mexic.

RHACELOPUS *Bryol. jav. I, p.* 37 (1 spec.).

inermis Mitt. — Rh. pilifer.

pilifer *Bryol. jav. l. c. t.* 27.

Rh. *inermis* Mitt. mss. (fid. *C. M.*).

2. Lignic. et rupic. — *As.* : Tonkin, Borneo, Java. *Pac.* : Nov. Guinea.

RHACOCARPUS Lindb. in Oefv.... 1862 (12 spec.).

apiculatus (*Ren. et Card.*) *Par.*

Harrisonia apiculata *R. et C. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p.* 171.

Ster. In silv. — *Am. sept.* : Costa Rica.

australis (*Hpe.*) *Par.*

Harrisonia australis *Hpe. in Linn. 1859-60, p.* 636.

H. Humboldti (*fid. Mitt.*).

Hedwigia Humboldti ♂ *australis* *H. f. et W. Fl. Tasm.* p. 179.

— *Pac.* : Austral. or., Tasman., Nov. Zeland. sept.

cucullatus (*Rehm.*) *Par.*

Harrisonia cucullata *Rehm. M. Afr. austr. n.* 313.

Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.

cuspidatus (*Rehm.*) *Par.*

Harrisonia cuspidata *Rehm. l. c. n.* 312.

Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.

excisus (*C. M.*) *Par.*

Harrisonia excisa *C. M. in Bot. Zeit.* 1868, p. 48.

Rupic. — *Am. merid.* : Summ. Cordill.

Humboldti (*Spreng.*) *Lindb. in op. et l. cc.*

Anoetangium Humboldti *Brid. Bryol. univ. II,* p. 165.

Braunia Humboldti *H. f. Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 423.

Harrisonia Humboldti *Spreng. Syst. veg. IV, I,* p. 145.

Hedwigia Humboldti *Hook. M. ex. t.* 137.

Neckera Humboldti *C. M. Syn. II,* p. 102.

1. *Rupic.* — *Afr.* : Ins. Borbon.? *Am. sept.* : Mexic., Guadalup., ins.

S. Christof. Am. merid. : And. Nov. Granat., Boliv. et Chilens.;

Brasil. austr. or., Peruv., archip. Magell., ins. Eremitae, Maclov.,

Fuegia. Pac. : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman., ins.

Auckland.

Exs. : *Lechler Pl. Peruv. n.* 2252.

Mandon Pl. Boliv. n. 1639.

« *var. argentinicus* (*C. M.*) *Par.*

Harrisonia Humboldti var. argentinica *C. M. in Linn.* 1878-79, p. 375.

Ster. *Rupic.* — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

« *var. rufipilus* (*Ren. et Card.*) *Par.*

Harrisonia Humboldti var. rufipila *R. et C. in Bull. Soc. roy. bot.*

Belg. 1893, II, p. 21.

In sphagnet. — *Afr.* : Madagascar.

inermis (*C. M.*) *Lindb. in op. et l. cc.*

Harrisonia inermis *Ångstr. Prim. lin.* p. 29.

Hedwigia decalvata *Mitt. M. austr. am.* p. 408.

Neckera inermis *C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 382.

Rupic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

obliquo-inermis (*C. M.*) *Par.*

Harrisonia obliquo-inermis *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n.* 163.

Ad rup. humid. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

orbiculatus (*Mitt.*) *Par.*

Harrisonia orbiculata *Jaeg. Ad. II,* p. 85.

Hedwigia orbiculata *Mitt. M. austr. am.* p. 407.

2. — *Am. merid.* : And. Chilens.

piliferus (*Rehm.*) *Par.*

Harrisonia pilifera *Rehm. M. Afr. austr. n.* 314.

— *Afr.* : C. B. Sp.

piliformis *Broth. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

Rehmanni (C. M.) Par.

Harrisonia Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 270.

Ster.

— Afr. : C. B. Sp.

RHACOMITRIUM Brid. *Bryol. univ.* I, p. 207 (81 spec.).

aciculare (L.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 219 ; *Bryol. eur.* III (mon. p. 6), t. 262 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 274.

Bryum aciculare L. *Sp. pl.* p. 1583.

Br. montanum, hemiheterophyllum, operculis acutis Dill. *Hist. M.* p. 366, t. 46, f. 25.

Br. nigrescens Vill. *Pl. Dauph.* III, II, p. 881, t. 54 (fid. *Limpr.*).

Campylopus acicularis Wahlenb. *Fl. Suec.* II, p. 749.

Dicranum aciculare Hedw. *M. frond.* III, p. 79, t. 33.

Grimmia acicularis C. M. *Syn.* I, p. 801.

Hypnum aciculare Scop. *Fl. Carn.* II ed. p. 1225.

Mnium aciculare Gmel. *Syst. nat.* II, p. 1328.

Rh. obtusifolium Brid. *Mant. M.* p. 80.

Trichostomum aciculare P. B. *Prodr.* p. 90 ; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 133.

Tr. aciculare α obtusifolium W. Arn. in *Mém. Soc. hist. nat. Paris*, II, p. 271.

Tr. obtusifolium P. B. *Prodr.* p. 91.

2. Ad sax. (calc. except.) scœp. irror. rivul. — *Eur.* : Fere tota, in reg. campestr. montos. et montan. *Afr.* : Madeir. *Am. sept.* : Labrador, Terr. nov., Nov. Scot., lac. Super., M. Rupestr., Columb. brit., Alaska, Sitka, reg. occ., sept., or. et centr.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 97.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 220, 1178.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 217.

α var. brachypodium Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 338.

Ad lapid. in rivul. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie n. 202.

affine Lindb. — Rh. heterostichum var. alopecurum.

alopecurum Brid. — Rh. heterostichum var. alopecurum.

attenuatum C. M. et Kindb. in *Bidr.* 455 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 73.

♂ ign. Saxic. — *Am. sept.* : M. Selkirk.

aquaticum Brid. — Rh. protensum.

aterrimum (C. M.) Par.

Grimmia aterrima C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 28.

Ster. Rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

austro-Georgicum Par.

Grimmia austro-patens C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 40 (1889).

Ster. Aquat. ? — *Am. merid.* : Austr. Georg.

austro-patens C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 139 (1878).

— *Afr.* : C. B. Sp.

borbonicum Brid. — Rh. lanuginosum.

brachypus (C. M.) Par.

Grimmia brachypus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 65.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

brevipes C. M. mss. ; *Jaeg. Ad. II*, p. 683.

— *As.* : Japon.

brevipes Kindb. — Rh. micropus.

brevisetum Lindb. *Contrib. ad Fl. As. bor.* 1872, p. 244.

Grimmia breviseta Lindb. et Arn. *M. As. bor.* 1890, II, p. 102.

2. — As. : Saghalien.

canadense Brid. — $\left\{ \begin{array}{l} \text{Rh. canescens ?} \\ \text{Rh. lanuginosum ?} \end{array} \right.$

canescens (Hedw.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 208; *Bryol. eur.* III (mon. p. 12), t. 270; W. P. Sch. *op. cit.* p. 280.

Bryum canescens Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 41.

Br. hypnoides Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 77.

Br. hypnoides α Neck. *Meth. M.* p. 227.

Br. hypnoides β L. *Sp. pl.* p. 1585.

Br. hypnoides β pilosum Retz. *Prodr. Fl. Scand. n.* 1234.

Br. hypnoides hirsutiae canescens, vulgare Dill. *Hist. M.* p. 368, t. 47, f. 27.

Grimmia canescens C. M. *Syn.* I, p. 807.

Gr. ericoides var. canescens Lindb. *M. Scand.* p. 29.

Gymnostomum canescens Schrank *Baiers. Fl.* II, p. 436.

Hypnum canescens pilosum Weiss *Krypt. Goett.* p. 213.

Rh. canadense Brid. *op. cit.* p. 217?

Rh. canescens β brevisetum ej. *op. cit.* p. 310.

Rh. ericoides var. canescens Lindb. in *Oefv. Vet. Akad. Foerh.* 1866, p. 553.

Trichostomum canadense Rich. in *Mich. Fl. Am. bor.* II, p. 296 (1).

Tr. canescens Timm. *Fl. Megap. Prodr.* p. 215.

Tr. hypnoides Hedw. *Fund. M.* II, p. 91, t. 8, f. 43-44

2. Ad terr. arenac. sicc. — Eur. : Tota in reg. montos.; Spitzberg, ins. Parry, Urior. As : Japon., penins. Tschutschica, Jenissei, Sikkim, Ceylan. Afr. : Septentr., Madeir. Am. sept. : Groenland, Labrador, fret. Hudson, Terr. nov., Miquel., Gaspes., lac. Super., M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., litt. mar. Behring, Vancouver, Idaho, reg. sept., occ. or. et centr.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 201, 1386, 3542.

Mac. Canad. M. n. 103.

Rab. Bryoth. eur. n. 219 a-d, 1013.

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 221.

« var. Delamarei Ren. et Card. *Fl. ins. Miquel.* p. 46 (subspec.).

Ster. In turfis. — Am. sept. : Ins. Miquel.

« var. epilosum H. Müll. *Westf. Laubm.* n. 333; *Milde Bryol. sil.* p. 160.

Ut typ. — Eur. : Westphal., Boruss., Tatra, Stiria, Rhoënggeb. As. : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 52, 163, 179, 200, 3543.

« var. ericoides (Dicks.) *Bryol. eur. l. c.* t. 271; W. P. Sch. *op. et l. cc.*

Bryum elongatum Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 41.

Br. ericoides Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 14.

Br. hypnoides var. barbatum Retz. l. c.

Br. hypnoides γ L. l. c.

Br. hypnoides Ericae facie, capsulis barbatis, alpinum Dill. *Hist. M.* p. 371, t. 47, f. 31.

Grimmia canescens β ericoides C. M. l. c.

Gr. ericoides Lindb. l. c.

Hypnum canescens Wib. *Spic. Fl. Goett.* p. 82.

Rh. canescens var. intermedium Vent. et Bott. *Enum.* p. 62.

Rh. ericoides Brid. *Bryol. univ.* I, p. 210.

(1) Cf. C. M. I, p. 806 in syn. ad *Grimmiam lanuginosam*.

Trichostomum elongatum Ehrh. *Crypt. n.* 233.

Tr. ericoides Schrad. *Spic. Fl. germ.* p. 62.

In ericet. et rupestr. aren. — *Eur.* : E reg. montan. sup. usq. in Alp. As. : Caucas. *Am. sept.* : M. Selkirk, Columb. brit., Sitka, Vancouver.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 417.

var. *intermedium* Vent. et Bott. — *Rh. canescens* var. *ericoides*.

« var. *lutescens* Lesq. et Jam. *Man.* p. 151.

Ad rup. umbr. — *Am. sept.* : Columb. brit., Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II, p. 222.

« var. *muticum* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, p. 272 et in *Mac. Cat.* p. 77.

Rupic. — *Am. sept.* : Alp. Columb. brit.

« var. *prolixum* Bryol. *eur. l. c. t.* 271 ; W. P. Sch. *op. et l. cc.*

In ericet. umbros. — *Eur.* : Passim.

« var. *robustum* (Lindb. et Arn.) Par.

Grimmia ericoides var. *robusta* L. et A. M. *As. bor.* 1890, II, p. 101.

— *As.* : Jenissei inf.

var. *strictum* Schlieph. — *R. mollissimum*.

capense Ltz. *Moosst.* p. 163.

2. Ad arbor. — *Afr.* : C. B. Sp.

cataractarum A. Br. — *Rh. protensum*.

var. 3 H. f. et W. — *Rh. lamprocarpum*.

Cheesemani C. M. *hb.*

— *Pac.* : Nov. Zeland. sept.

chlorocarpum (Mitt.) Par.

Dryptodon chlorocarpus Mitt. in F. v. Müller's *Fragm. Phyt. austral.* XI, p. 114.

Grimmia chlorocarpa Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 56.

Rh. crispulum var. β H. f. *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 426.

2 ? Rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen. *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

chrysoblastum (C. M.) Par.

Grimmia chrysoblasta C. M. in Engler's *Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 31.

Gr. lanuginosa Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1876, p. 84.

Ster. Rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

conterminum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, n. 376.

Grimmia contermina C. M. *Syn. II*, p. 655 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 103.

2. — *Am. sept.* : And. Costa-Ricens.

convolutum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 122 et *Syll.* p. 37.

Grimmia convoluta C. M. *Syn. I*, p. 802 ; Mitt. *op. et l. cc.*

2 ? Ad arbor. — *Am. merid.* : Chile.

crispipilum (Tayl.) Jaeg. *Ad. I*, p. 374.

Grimmia crispipila C. M. *Syn. I*, p. 806 ; Mitt. *op. cit.* p. 104.

Trichostomum crispipilum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 47.

2 ? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Quitens.,

Peruv. et Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1636.

- crispulum* *Hook. f. et Wils. Fl. Tasm. p. 181, t. 173, f. 4.*
Dryptodon crispulus eor. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 544 et Fl. Antarct. I, p. 57.
Grimmia crispula C. M. Syn. I, p. 804.
 2? *Rupic. in rivul. — Afr.: Ins. Kerguelen. Pac.: Tasman., ins. Campbell.*
 var. β *H. f. et W. — Rh. chlorocarpum.*
cucullatifolium Hpe. in Linn. 1863, p. 143.
Grimmia cucullatifolia Mitt. op. cit. p. 102.
 2. *Ad arbor. et sax. irror. — Am. merid.: And. Nov. Granat.*
cylindricum W. P. Sch. hb. et in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 40.
Grimmia cylindrica C. M. Syn. I, p. 805; Mitt. op. cit. p. 103.
 2. — *Am. sept.: Mexic. (M. Orizaba, etc.).*
depressum Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 14; Lesq. et Jam. Man. p. 148.
 2. *Ad rup. madid. — Am. sept.: Calif.*
didymum (Mont.) Jaeg. Ad. I, p. 368.
Grimmia didyma Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 122 et Syll. p. 37; C. M. Syn. I, p. 802; Mitt. op. cit. p. 102.
 2? — *Am. merid.: Chile austr.*
dimorphum (C. M.) Par.
Grimmia dimorpha C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 65.
 — *Am. merid.: And. Boliv.*
durum (C. M.) Par.
Grimmia dura C. M. in Dusen M. Camer. n. 296.
 — *Afr.: M. Cameroon.*
ellipticum (Turn.) Bryol. eur. III (mon. p. 5), t. 261; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 273.
Campylopus ellipticus Brid. Mant. M. p. 76. (1919)
Dicranum ellipticum Turn. Muscol. Hibern. p. 76, t. 6, f. 2. (1804)
Dryptodon ellipticus Brid. Bryol. univ. I, p. 204. (1826)
Grimmia elliptica C. M. Syn. I, p. 799. (1849)
Trichostomum ellipticum H. et T. Muscol. brit. p. 62, t. 19. (1818)
 2. *Ad rup. granit., schist. et micac. irror. — Eur.: E reg. montan. usq. in Alp. zon. septentr.: Scand., Scot., Hibern., Cambrovall. Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 1005, 1117.*
emersum (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 375.
Grimmia emersa C. M. in Bot. Zeit. 1851, p. 562.
Rh. symphyodontum H. f. et W.?
 2. *Ad arbor. — Pac.: Tasman.*
ericoides Brid. — Rh. canescens var. ericoides.
 var. *canescens Lindb. — Rh. canescens.*
falcifolium Brid. — Ptychomitrium polyphyllum.
fasciculare (Schrader.) Brid. Bryol. univ. I, p. 218; Bryol. eur. III (mon. p. 8), t. 267; W. P. Sch. op. cit. p. 278.
Bryum fasciculare Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 41.
Br. hypnoides var. virescens Retz. Prodr. Fl. Scand. n. 1234.
Br. hypnoides et hirsutiae virescens Dill. Hist. M. p. 370, t. 47, f. 28.
Br. lutescens Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 14.
Grimmia fascicularis C. M. Syn. I, p. 809.

Rh. virescens *Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1871, p. 68.
 Trichostomum fasciculare *Schrad. Spic. fl. Germ.* p. 61; *Drumm. M. bor. am.* I ed. n. 132.

Tr. maritimum *Blytt mss.*; *Hartm. Skand. Fl.* III ed. p. 283.

Tr. saxatile *Tayl. in Trans. of the Edinb. bot. Soc.* II, I, 1845, p. 1.

2. Ad rup. madid. — *Eur.*: E reg. montan. usq. in alp.; Spitzberg, ins. Parry, Urior. As.: Japon. Am. sept.: Groenland, Labrador, Terr. nov., ins. Miquel., New Brunswick, Nov. Scot., New York, M. Alb., Allegh., Rupestr. et Selkirk, lac. Super., Columb. brit., Alaska, Unalaska, ins. reg. Charlotte.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 416.

Rab. Bryoth. eur. n. 314.

« var. nigricans *Warnst. ined.*

— *Am. sept.*: Groenland.

var. 2 et 3 H. f. et W. — Rh. symphyodontum.

fastigiatum Wallr. — Rh. heterostichum var. alopecurum.

flavipes Brid. — Barbula Brebissoni.

fontinaloides Brid. — Cinclidotus.

funale Hüb. — Grimmia.

fuscescens Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 324.

Grimmia fuscescens *Mitt. M. Ind. or.* p. 44.

2. — *As.*: Sikkim.

geronticum C. M. in *Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien*, 1869, p. 224.

Rh. lanuginosum *Ltz. in Bot. Zeit.* 1866, p. 187.

2. Arenic. — *Am. merid.*: Chile.

glaciale (C. M.) Par.

Grimmia glacialis C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 41.

Ster. Rupic. — *Am. merid.*: Austr. Georg.

heterostichum (Hedw.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 214; *Bryol. eur.* III (mon. p. 9), t. 265; W. P. Sch. op. cit. p. 277.

Bryum heterostichum Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 40.

Br. hypnoides, hirsutie canescens vulgare *Dill. Hist. M.* p. 368, t. 47, f. 27

A. F. G.

Br. secundum *Gmel. Syst. nat.* II, p. 1333.

Dryptodon carnosus Brid. op. cit. p. 206.

Grimmia heterosticha C. M. *Syn.* I, p. 807.

Trichostomum carnosum *Dicks. mss.*; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 206.

Tr. heterostichum *Hedw. M. frond.* II, p. 70, t. 25.

Tr. stenocarpum *Hpe. mss.*; Hüb. *Muscol. germ.* p. 208.

2. Ad rup. et sax. quarzos. — *Eur.*: Tota, in reg. campestr. et mont.

As.: Japon. Am. sept.: Groenland, Labrador, M. Selkirk, Alaska.

Vancouver, Washington, Oregon, Idaho. *Am. merid.*: Ins. Maclov.

Pac.: Nov. Zeland., Tasman.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 99.

Rab. Bryoth. eur. n. 218.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 220.

Un. itin. 1863, n. 13; n. 1867, p. 99.

« var. alopecurum *Hüb. Muscol. germ.* p. 208; *Bryol. eur.* l. c. t. 266; W. P. Sch. op. et l. cc.

Grimmia affinis *Lindb. M. Scand.* p. 29.

Gr. heterosticha var. alopecura C. M. l. c.

Gr. subpurida *Stirton in Scott. nat.* 1887, p. 36.

Rh. affine *Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1875, p. 552; Mac. Canad. M. n. 499.

Rh. alopecurum *Brid. op. cit.* p. 215.

Rh. fastigiatum Wallr. *Fl. Krypt. I*, p. 175.

Trichostomum affine Schleich. *Cat. pl. helv.* 1807, p. 31 et *Cent. IV*, n. 18.

Tr. alopecurum Schk. *Deutsch. M.* p. 77, t. 35.

Tr. fasciculare var. *Tayl. in Mac Kay Fl. Hib. II*, p. 20 in obs.

Tr. saxatile *Tayl. in Trans. of the bot. Soc. of Edinb. II, I*, p. 1.

Loc. humid. — *Eur.* : Reg. montan. usq. in subalp., praecip. zon. sept.

Am. sept. : Terr. nov., Nov. Scot., M. Selkirk, Columb. brit.

Exs. : Un. itin. 1864, n. 27.

« *var. gracilescens* *Bryol. eur. et W. P. Sch. II. cc.*

Grimmia heterosticha var. *gracilescens* *C. M. l. c.*

Ut et ubi praeced. in *Eur. Pac.* : Tasman.

var. *microcarpum* Husn. — *Rh. microcarpum.*

var. *obtusum* Kindb. — *Rh. varium.*

« *var. micropoides* Kindb. in *Hedw.* 1896, p. 65.

— *Am. sept.* : Washington.

« *var. occidentale* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 41.

Rupic. — *Am. sept.* : Washington, Oregon.

« *var. tasmanicum* Hpe. in *Linn.* 1852, p. 714.

— *Pac.* : Tasman.

himalayanum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 375.

Grimmia himalayana Mitt. *M. Ind. or.* p. 45.

Rh. pusillum Wils. in *Kew Journ. bot. IX*, p. 324 p.p.

Rh. subsecundum Wils. in op. cit. p. 325 p.p.

2. — *As.* : Nepal., Sikkim.

hyalino-cuspidatum (C. M.) Par.

Grimmia hyalino-cuspidata C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 39.

1. Rupic. — *Am. merid.* : Austr. Georg.

hypnoides Lindb. — *Rh. lanuginosum.*

incanum C. M. in *Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien*, 1869, p. 224.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 140.

incurvum Hüb. — *Grimmia elatior.*

japonicum (Dz. et Mk.) Par.

Grimmia japonica Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 130, t. 41.

— *As.* : Japon.

javanicum *Bryol. jav. I*, p. 105, t. 84.

2. — *As.* : Java.

Jenseni Kindb. in *Rev. bryol.* 1896, p. 20.

Rh. sudeticum var. *papillosum* Jensen ; *Lge. Fl. Groenl.*

Ster. — *Am. sept.* : Groenland.

laevigatum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 373.

Grimmia laevigata Mitt. *M. austr. am.* p. 104.

Ster. — *Am. merid.* : Fret. Magellan., ins. Eremitae.

lamprocarpum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 368.

Grimmia lamprocarpa C. M. *Syn. I*, p. 802.

Rh. cataractarum var. 2 et 3 H. f. et W. in sched.

2. — *Am. merid.* : Ins. Maclov.

lanuginosum (*Hedw.*) *Brid. Bryol. univ. I, p. 215; Bryol. eur. III (mon. p. 11), t. 269; W. P. Sch. op. cit. p. 279.*

Bryum hypnoides L. Sp. pl. p. 1584 (excol. varr.).

Bryum hypnoides, polycephalum, lanuginosum, montanum Dill. Hist. M. p. 372, t. 47, f. 32.

Br. lanuginosum Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 42.

Hypnum canescens Web. Spic. fl. Goett. p. 211.

H. canescens β hirsutum Weiss Crypt. Goett. p. 211.

Grimmia hypnoides Lindb. M. Scand. p. 29.

Gr. lanuginosa C. M. Syn. I, p. 806.

Rh. borbonicum Brid. op. cit. p. 218.

Rh. canadense ej. op. cit. p. 217?

Rh. hypnoides Lindb. in Oef. Vet. Akad. Foerh. 1866, p. 552.

Trichostomum canadense Rich. in Mich. Fl. Am. bor. II, p. 296?

Tr. hypnoides Willd. Prodr. fl. Berol. n. 916.

Tr. lanuginosum Hedw. M. frond. III, p. 3, t. 2; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 134.

Tr. ramigerum Timm. Prodr. fl. Megap. n. 774.

Tr. serratum Ehrh. Crypt. exs. n. 94.

2. In lapidos. arenac. v. granit. — *Eur.* : Vulgatiss. usq. in zon. arctic. *As.* : Japon., Kamschatka, Taimyr, penins. Samojed. et Tschutschica, Jenissei inf., Sikkim. *Afr.* : Madeir, ins. S. Helena, Kerguelen. *Am. sept.* : Fret. Smith et Huds., Groenland, sin. Baffin, Labrador, ins. Miquel., Nov. Scot., Gaspes., M. Rupestr., Columb. brit., litt. mar. Behring, Vancouver, fret. Korzebuë, Idaho, reg. sept. et or. *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens., Chile, ins. Chiloë, archip. Chonot., fret. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae, Maclov. (1) *Pac.* : Austral. fel., ins. Campbell.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 25, 817.

Mac. Canad. M. n. 102.

Rab. Bryoth. eur. n. 374.

Savatier M. Japon. n. 279.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 223.

var. *pruinsum* H. f. et W. — *Rh. pruinsum.*

« var. *robustum* Lindb. *Hepat. in Hibern. lect. p. 549.*

Ad rup. sicc. et ventos. — *Eur.* : Passim.

« var. *sandwicense* Reichdt. *Beitr. p. 568.*

Ad terr. vulcan. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

« var. *squalidum* Brid. *Bryol. univ. I, p. 216.*

Campylopus squalidus ej. Mant. M. p. 77.

— *Afr.* : Ins. Borbon.

« var. *subimberbe* Hartm. *Shand. Fl. III ed. p. 283.*

In umbros. — *Eur.* : Scandin. *Am. sept.* : Ins. Miquelon.

lanuginosum { *Bryol. jav. — Rh. sundaicum.*
Ltz. — *Rh. geronticum.*
Mitt. (1876). — *Rh. chrysoblastum.*
Sull. — *Rh. rigidissimum.*

Lepervanchei Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc. p. 63.*

2. Lignic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

lingulatum Brid. — *Ptychomitrium polyphyllum.*

lorifolium Hpe. mss. ; Jaeg. *Ad. I, p. 376.*

— *As.* : Sikkim.

(1) Localit. Amer. australioris forsan ad *Rh. geronticum* pertinent.

Macounii Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, p. 93, in *Mac. Cat.* p. 73 et *Canad. M. n.* 418.

2? Ad rup. et sax. — *Am. sept.*: *M. Rupestr.* et *Selkirk*, *Columb. brit.*

membranaceum (Mitt.) Par.

Grimmia membranacea Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 61.

Rupic. — *Am. sept.*: *Ins. Bermud.*

microcarpon Brid. — *Rh. sudeticum*.

microcarpum (Hedw. p. p.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 211 p. p.; *Bryol. eur.* III (mon. p. 10), t. 268; *W. P. Sch. op. cit.* p. 279.

Bryum hypnoides var. *microcarpum* Retz. *Prodr. fl. Scand. n.* 1234.

Bryum hypnoides var. γ Huds. *Fl. Angl.* p. 410.

Bryum hypnoides alpinum setis et capsulis exiguis Dill. *Hist. M.* p. 370, t. 47, f. 29 A. B. C.

Br. microcarpum Gmel. *Syst. nat.* p. 1332.

Dicranum aciculare γ Turn. *Muscol. Hibern.* p. 67.

D. microcarpum Schrad. *Samml. I.* n. 44.

Grimmia ericoides Brid. *op. cit.* p. 768.

Gr. microcarpa C. M. *Syn. I.* p. 804.

Gr. ramulosa Lindb. *M. Scand.* p. 29.

Rh. heterostichum var. *microcarpum* Boulay *M. Fr. I.* p. 360 p. p.

Rh. ramulosum Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1875, p. 550.

Trichostomum microcarpum Hedw. *Sp. M.* p. 112, t. 23 p. p.; *Funk in Bot. Tasehb. n.* 26; *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 128.

2. Ad rup. et sax. sicc. — *Eur.*: *Reg. subalp. silvat. zon. intermed., campestr. zon. sept.*; *rar. in Alp. merid. Am. sept.*: *Groenland, Labrador, Terr. nov., Nov. Scot., Gaspes., M. Alb., Allegh. et Selkirk, lac. Super., Columb. brit., Oregon, Idaho.*

Exs.: *Mac. Canad. M. n.* 101.

Rab. Bryoth. eur. n. 217, 1014.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 219.

Un. itin. 1867, n. 102.

« *var. grimmiaceum* de Not. *Epil. p.* 675.

— *Eur.*: *Helvet.*

« *var. Palmeri* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 267.

Rh. Palmeri ej. in *Rev. bryol.* 1896, p. 10.

— *Am. sept.*: *Ins. mar. Behring.*

microcarpum Mont. — *Rh. symphyodontum*?

var. *sudeticum* Hüb. — *Rh. sudeticum.*

micropus Kindb. in *Mac. Cat.* p. 77.

Rh. brevipes ej. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 252.

2? *Rupic.* — *Am. sept.*: *M. Rupestr., Columb. brit.*

mollissimum Philib. in *Rev. bryol.* 1885, p. 22.

Rh. canescens var. *strictum* Schlieph. in *Limpr. Laubm. Deutschl. I.* p. 811.

2. In aren. glacial. — *Eur.*: *Alp. Valesiae, Rhaet.*

Nevii (C. M.) Wats. *Bot. Calif. II*, p. 381; *Lesq. et Jam. Man.* p. 148.

Grimmia Nevii C. M. in *Fl.* 1873, p. 483 et in *Bull. Torr. bot. Club*, V, p. 6.

2. *Rupic.* — *Am. sept.*: *Nov. Scot., Columb. brit., ins. mar. Behring, Oregon, Idaho.*

Exs.: *Mac. Canad. M. n.* 485.

nigritum (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 368.

Grimmia nigrita C. M. Syn. I, p. 801.

Gr. symphyodonta ej. l. c. p. 809 (fid. Mitt. M. austr. am. p. 103).

Rh. protensum var. H. f. et W. in sched.

2. — Am. merid. : Ins. Eremitae.

nigro-viride C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 139.

— Afr. : Austral.

obscurum Kindb. — Rh. robustifolium.

obtusifolium Brid. — Rh. aciculare.

obtusum Brid. — Rh. sudeticum.

oreganum Ren. et Card. — Rh. varium.

orthotrichaceum (C. M.) Par.

Grimmia orthotrichacea C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 81 et in Forschungsreise... Bot. p. 29.

Ster. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.

Palmeri Kindb. — Rh. microcarpum var. Palmeri.

papeetense Besch. Fl. bryol. Taïti, etc. p. 25.

2. — Pac. : Taïti.

patens (Dicks.) Hüb. Muscol. germ. p. 198 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 272.

Bryum patens Dicks. Fasc. II Pl. crypt. p. 6, t. 4, f. 8.

Campylopus patens Brid. Mant. M. p. 73.

Dicranum arcuatum Schleich.

D. patens Sm. Fl. Brit. III, p. 1213.

Dryptodon patens Brid. Bryol. univ. I, p. 192.

Fissidens patens Wahlenb. Fl. Lapp. p. 334.

Grimmia arcuata de Not. Mant. M. n. 77 et Syll. p. 252.

Gr. patens Bryol. eur. III (mon. p. 18), t. 246 ; C. M. Syn. I, p. 797.

Orthotrichum curvatum Brid. op. cit. p. 791.

Trichostomum patens Schwaegr. Suppl. I, I, p. 1515, t. 37 ; Drumm. M. bor. am. I ed. p. 131.

2. Ad rup. quarzos. madid. — Eur. : Reg. subalp. et alp., montan. in zon. sept. Am. sept. : Groenland, M. Alb. et Rupestr., Columb. brit., fret. Behring, Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, reg. or.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 96.

Rab. Bryoth. eur. n. 315.

polyphyllum Brid.

var. cirratum Brid.

var. falcifolium Brid.

var. tortile Brid.

} — Ptychomitrium polyphyllum.

protensum Al. Br. in Hüb. Muscol. germ. p. 211 ; Bryol. eur. III (mon. p. 6), t. 263 ; W. P. Sch. op. cit. p. 274.

Bryum hypnoides aquaticum, calyptris nigris acutis Dill. Hist. M. p. 367, t. 46, f. 26 (1).

Bryum hypnoides var. γ Huds. Fl. Angl. p. 411.

Br. nigrescens Vill. Pl. Dauph. III, p. 889 (fid. C. M.).

Br. rivulare Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 37.

Dicranum aciculare β fluitans Turn. Muscol. Hibern. p. 67.

D. aquaticum Brid. Sp. M. I, p. 190.

D. subulatum Roehl. Moosg. Deutsch. p. 347.

Grimmia aquatica C. M. Syn. I, p. 800.

Hypnum aciculare β aquaticum Web. Spic. fl. Goett. p. 84.

- Rh. aquaticum *Brid. Bryol. univ. I, p. 222? Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1875, p. 554.*
- Rh. cataractarum *Al. Br. in Brid. op. cit. p. 776.*
- Trichostomum aciculare β acutifolium *W. Arn. in Mém. Soc. hist. nat. Paris, II, p. 271.*
- Trichostomum aciculare β aquaticum *W. et M. Bot. Taschb. p. 192.*
- Tr. aquaticum *Brid. M. Rec. II, I, p. 102.*
- Tr. cataractarum *Hartm. Skand. Fl. III ed. p. 283.*
- Tr. fasciculare β protensum *Hartm. in op. et l. cc.*
2. In rup. later. sæpe rorat., nunquam submers. — *Eur. : Temperata tota, e reg. campestr. usq. in subalp. As. : Caucas. occ. Afr. : Ins. Kerguelen. Am. sept. : Groenland, Vancouver. Am. merid. : Fuegia (teste Handb. of N. Zeal. Fl.). Pac. : Nov. Zeland.*
- Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 221.*
- Un. itin. 1863, n. 40; 1867, n. 98.*
- var. *nigritum* *H. f. et W. — Rh. nigritum.*
- pruinoseum *C. M. in Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien, 1869, p. 224.*
- Rh. lanuginosum var. pruinoseum *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. et Handb. p. 427.*
2. Rupic. — *Afr. : Ins. Amsterdam. Pac. : Nov. Zeland., Tasman., ins. Campbell.*
- pseudo-patens *C. M. in Rev. bryol. 1878, p. 3.*
- *Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).*
- ptychophyllum *Mitt. in Hook. Handb. of N. Zeal. Fl. p. 426.*
- *Pac. : Nov. Zeland. merid.*
- Puccinianum *de Not. in Acad. r. di sc. Torino... III ser., XVIII, p. 452.*
- *Am. merid. : Chile austr.*
- pusillum *Wils. p.p. — Rh. himalayanum.*
- ramulosum *Lindb. — Rh. microcarpum.*
- rigidissimum (*C. M.*) *Par.*
- Grimmia rigidissima C. M. in Fl. 1896, p. 455.*
- Rh. lanuginosum *Sull. in Exped. Wilkes, p. 8.*
- Ster. — *Pac. : Ins. Sandwic.*
- riparium *Brid. — Cinclidotus.*
- robustifolium *Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII, p. 272 et in Mac. Cat. p. 73.*
- Rh. obscurum *ej. in Mac. Canad. M. n. 419.*
2. Rupic. — *Am. sept. : Alp. Columb. brit. et ins. Vancouver.*
- rupestre *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 65; Mitt. M. austr. am. p. 102.*
- Dryptodon rupestris eor. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 544 et Fl. Antart. II, p. 402, t. 152, f. I.*
- Grimmia rupestris C. M. Syn. I, p. 803 et II, p. 655.*
2. — *Afr. : Ins. Kerguelen. Am. merid. : Fret. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae. Pac. : Nov. Zeland., Tasman.*
- sessile *W. P. Sch. in Lechler Pl. Magell. exs.*
- *Am. merid. : Fret. Magellan.*
- Seychellarum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 64.*
- *Afr. : Ins. Seychelles.*
- speciosum (*C. M.*) *Par.*
- Grimmia speciosa C. M. in Bot. Centralbl. 1890, n. 5.*
2. Rupic. in *Quercet. — Am. sept. : Ins. Vancouver.*

- strictifolium (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 367.
 Grimmia strictifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 44.
 2? — As. : Sikkim.
- subcanescens C. M. mss. ; Jaeg. *Ad. II*, p. 683.
 Terr. — As. : Japon.
- subcrispipilum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 374.
 Grimmia subcrispipila C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 374.
 2. — Am. merid. : And. Chilens.
- subheterostichum C. M. mss. ; Jaeg. *Ad. I*, p. 373.
 — As. : Sikkim, vall. super. fl. Gange.
- sublamprocarpum (C. M.) Par.
 Grimmia sublamprocarpa C. M. in *Fl.* 1885, p. 422.
 Ad sax. marit. — Am. merid. : Fuegia austr.
- sublanuginosum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1637.
 — Am. merid. : And. Boliv.
- subnigritum (C. M.) Par.
 Grimmia subnigrita C. M. in *Fl.* 1885, p. 421.
 Rupic. — Am. sept. : Fuegia.
- suborthotrichaceum (C. M.) Par.
 Grimmia suborthotrichacea C. M. in *Ergler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 81 et
in Forschungsreise... Bot. p. 30.
 2. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- subsecundum (Hook. et Grev.) Jaeg. *Ad. I*, p. 370.
 Grimmia subsecunda Mitt. *M. Ind. or.* p. 45.
 Trichostomum subsecundum H. et Grev. mss.
 — As. : Nepal., Sikkim, Himalaya sept. occid., alp.
 Yunnan.
- subsecundum Wils. p.p. — Rh. himalayanum.
- sudeticum (Funk) Bryol. eur. III (mon. p. 7), t. 264 ; W. P. Sch.
Syn. II ed. p. 276.
 Bryum aciculariforme Hoffm. *Fl. Germ. II in Add.?*
 Br. hypnoides δ Huds. *Fl. Angl.* p. 480.
 Br. hypnoides var. obtusum Retz. *Prodr. Fl. Scand.* n. 1234.
 Br. hypnoides alpinum operculis obtusis Dill. *Hist. M.* p. 371, t. 47, f. 30
 (fid. Lindb.).
 Dryptodon sudeticus Brid. *Bryol. univ.* I, p. 195.
 Grimmia microcarpa C. M. *Syn. I*, p. 804 p.p.
 Gr. obtusa Lindb. *M. Scand.* p. 29.
 Gr. procera Bals. et de Not. *Pug. M.* n. 17.
 Rh. microcarpum Brid. *op. cit.* p. 211 p.p.
 Rh. microcarpum β sudeticum Hüb. *Muscol. germ.* p. 202.
 Rh. obtusum Brid. *Mant. M.* p. 79 et *Bryol. univ.* I, p. 213.
 Trichostomum gracile Hsch. mss. ; Hüb. l. c.
 Tr. microcarpum Hedw. *Sp. M.* p. 112, t. 23 p.p.
 Tr. obtusum Sm. *Fl. Brit. III*, p. 1244.
 Tr. nudum Schleich. *Cent III Crypt. Helv.* n. 19?
 Tr. patens β Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 152, t. 37?
 Tr. sudeticum Funk *Stirp. crypt. Fasc.* 27, n. 670 ; Drumm. *M. bor. am.*
I ed. n. 129.
 2. Ad rup. madid., praepr. granit. vel gneiss. — Eur. : Reg. subalp. et
 alp. ; ins. Ursor. As. : Caucas. occ. Am. sept. : Groenland, Labra-
 dor, M. Alb., Allegh., Catskill, Selkirk et Rupestr., Terr. nov.,
 Nov. Scot., Pensilv., lac. Super., Columb. brit., Oregon, Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 98.
 Rab. Bryoth. eur. n. 313.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 218.
 Un. itin. 1867, n. 96 et 101.

var. *papillosum* Jensen. — Rh. Jenseni.

« var. *validior* Jur. Laubm. Oester. Ung. p. 179.
 Ut typ. — Eur. : Alp. Stir., Carinth., Tirol. Helvet.

sulcipilum (C. M.) Par.

Grimmia sulcipila C. M. Syn. I, p. 805.

2. — As. : Coromandel.

sundaicum C. M. in Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien, 1869, p. 224.

Grimmia sundaica Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 56.

Rh. lanuginosum *Bryol. jav. I*, p. 104; *Zoll. hb. n.* 448 et *Coll. n.* 430.

2. Ad lapid. et terr. — As. : Java.

symphyodontum (C. M.) Par.

Grimmia nigrita C. M. (fid. Mitt. M. austr. am. p. 103).

Gr. *symphyodonta* Syn. I, p. 809.

Rh. *emersum* (C. M.) ?

Rh. *microcarpum* Mont. in Voy. au pôle S., Bot. crypt. p. 284 ?

Rh. *symphyodon* Jaeg. Ad. I, p. 375; Mitt. in Fl. Tasm. II, p. 181, t. 173, f. 4.

2. Rupic. — Am. merid. : Fuegia, ins. Eremit., Maclov. Pac. : Nov. Zeland., Tasman.

symphyodon Jaeg., Mitt. — Rh. *symphyodontum*.

tenuinerve Kindb. in Rev. bryol. 1896, p. 19.

— Am. sept. : Alaska, Columb. brit.

varium (Mitt.) Lesq. et Jam. Man. p. 150.

Grimmia varia Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 21.

Rh. *heterostrichum* var. *obtusum* Kindb. in Mac. Canad. M. n. 100.

Rh. *oreganum* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1888, p. 198, t. 15.

1. (Mitt.) 2 (Lesq. et Jam.). Rupic. — Am. sept. : Columb. brit., Vancouver, Washington, Oregon.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 104.

virescens Lindb. — Rh. *fasciculare*.

vulcanicum Ltz. Moosst. p. 163.

2. Rupic. — Am. merid. : M. Ilinitza.

Willii (C. M.) Par.

Grimmia Willii C. M. Bryol. austr. georg. p. 40.

Ster. Rupic. — Am. merid. : Austro-Georg.

zygodonticaule (C. M.) Par.

Grimmia zygodonticaulis C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 81 et in Forschungsreise... Bot. p. 28.

2. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen (1).

RHACOPILUM P. B. Prodr. p. 36 (42 spec.).

aeruginosum C. M. in Rev. bryol. 1877, p. 43 (nom.).

— Pac. : Austral. or. (Queensland).

(1) In Enum. Kindberg. nom. nud. :
 Rh. *canaliculatum* Mitt.

- africanum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 162.
 2. Ad rup. madid. — *Afr.*: M. Cameroon, Togo, Kilima N'Djaro?
 Madagascar, ins. Francia, Rodriguez.
Exs.: Dusen M. Camer. n. 24.
- angustatum *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 112.
 1. — *Am. sept.*: Mexic. (Orizaba).
- angusti-stipulaceum *C. M. in Linn.* 1876, p. 255.
 Ster. — *Afr.*: Ins. Anjouan.
- anomalum *Schwaegr.* — *Pterygophyllum*.
- arcuatum (*Hedw.*) *Jaeg. II*, p. 58.
Hypnum arcuatum Hedw. Sp. M. p. 245, t. 62.
Hypopterygium arcuatum C. M. Syn. II, p. 13.
Pterygophyllum arcuatum Brid. Bryol. univ. II, p. 348.
 Rupic. et terr. — *Pac.*: Austral. or. (Victoria), Tasman.
- aristatum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 155.
 Ster. — *As.*: Japon.
- Auberti* P. B. — *Hookeria*.
- australe* H. f. et W. — *Rh. strumiferum*.
- Ayresii* *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 308.
 — *Afr.*: Ins. Francia.
- brevipes *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 51; *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.*
 1894, p. 217 (*descript.*).
 2. Cortic. — *Afr.*: M. Cameroon.
- Büttneri *Broth. in op. cit.* p. 215.
 2. — *Afr.*: Togo.
- capense *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 297.
 Lignic. et saxic. — *Afr.*: Reg. lacustr., Usambara, Kilima N'Djaro,
 Natal.
- caudatum *C. M. in Fl.* 1896, p. 455.
 — *Pac.*: Nov. Guinea (M. Arfak, Port Moresby, etc.).
- convolutaceum *Hpe. in Lehm. Pl. Preiss. II*, p. 19.
Hypopterygium convolutaceum C. M. Syn. II, p. 13.
Rh. cristatum (fid. Mitt.).
 2. — *Pac.*: Taïti, Austral. or. (Queensland), ins. King,
 Norfolk, Nov. Caledon., Tasman.
- crinitum *Hpe. in Linn.* 1869-70, p. 525.
 2? — *Pac.*: Austral. or.
- cristatum *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 121, t. 92, f. 7 et
Handb. p. 491.
Rh. tomentosum C. M. in Bot. Zeit. 1851, p. 563? (*fid. Mitt. in Handb. l. c.*).
 Ad terr. humid. in silv. — *Pac.*: Austral. or. (Victoria), Nov. Ze-
 land., Tasman., ins. Kermadec, Norfolk.
- cuspidigerum (*Schwaegr.*) *Mitt. Fl. Vit.* p. 391.
Hookeria tomentosa var. subintegrifolia W. Arn. Disp. p. 58.
Hypnum cuspidigerum Schwaegr. in Freycinet Voy. 1826, *Bot.* p. 227;
C. M. Syn. II, p. 14.
Rh. tomentosum Sull. in Exped. Wilkes, p. 27.
 2? In silvis. — *Pac.*: Ins. Sandwic., Samoa, Norfolk, Nov. Caledon.

- demissum *Bryol. jav. II*, p. 18, t. 146.
 Rh. tomentosum *Dz. et Mk. in Zolling Verz.* p. 25.
 2. Ad rad. arb. — *As.* : Celebes, M. Java. *Pac.* : Taïti.
- gracile *Mitt. in Voy. of H. M. S. Challenger, Bot. III*, p. 43.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Ascensionis.
- gracillimum *C. M. in Fl.* 1896, p. 455.
 Ster. — *Pac.* : Ins. Nov. Hebrid.
- indicum *Mitt. M. Ind. or.* p. 136.
 Rh. Schmidii *C. M.* ? (*ex ips.*).
 2 ? — *As.* : Celebes, ins. Ceram, Java, Ceylan.
- insigne *Hsch.* — Rh. tomentosum.
- intermedium *Hpe. in Linn.* 1861, p. 164 ; *Mitt. M. austr. am.* p. 333.
 2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Nov. Granat.
- laetum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 93 et in *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 491.
 2 ? — *Pac.* : Nov. Zeland., ins. Kermadec.
- leptotapes *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 16.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- longe-aristatum *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 19.
 Rh. africanum *Mitt.* ? (*fid. Mitt.*).
 ♂ et fr. ign. — *Afr.* : Abyssin.
- Loriae *C. M. in Fl.* 1896, p. 456.
 — *Pac.* : Nov. Guin. brit.
- * *var. brevicaudata C. M. in op. et l. cc.*
 Ubi typ.
- * *var. paraphysalis C. M. in op. et l. cc.*
 Ut typ.
- mauritianum *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 184.
 Lignic. — *Afr.* : Choa, ins. Franciaë.
- microdictyon *Besch in Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 98.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Mayotte.
- microphyllum *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc.* p. 57.
 2. Ster. — *Pac.* : Nuka-Hiva.
- mnioides *P. B.* — Rh. tomentosum.
- Mougeotianum *Jaeg.* — Hypnum ?
- mucronatum *Mitt.* — Rh. tomentosum.
- Naumannii *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 84 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 42.
 — *Afr.* : Ins. Ascension.
- orthocarpioides *Broth. in Bol. d. Soc. Brot. VIII*, 1890.
 2. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.
- orthocarpon *Wils. in sched.* ; *Mitt. M. Ind. or.* p. 136.
 2 ? — *As.* : Nepal., Sikkim, Khasia.
- pectinatum *C. M. in Linn.* 1875, p. 424.
 Ster. Terr. — *Afr.* : Dar Fertit.
- plicatum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 128.
 Ster. — *Afr.* : Madagascar.

- polythrincium *Spr. in Mitt. M. austr. am. p. 332.*
 2. — *Am. merid. : And. Quitens. ; Peruv.*
- praelongum *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 183.*
 — *Afr. : Madagascar, ins. Borbon.*
- « *var. nossi-beanum Besch. l. c.*
 — *Afr. : Ins. Mayotte, Nossi-Be.*
- « *var. subintegrum Besch. l. c.*
 — *Afr. : Ins. Franciae.*
- purpurascens *C. M. in Linn. 1876, p. 326.*
 Ster. — *Pac. : Austral. merid. (Victoria).*
- robustum *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 21, t. 92, f. 5 et Handb. p. 491.*
 1 ? In silvis. — *Pac. : Nov. Zeland. sept., ins. Chatham.*
- Schmidii (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 56.*
Hypopterygium Schmidii C. M. in Bot. Zeit. 1854, p. 558.
Rh. tomentosum var. africanum Mont. in Perrottet M. Neilgh.
Rh. indicum Mitt. (fid. C. M.).
 — *As. : M. Neilgherr. ; Ceylan ? Java ? ins. Ceram ?*
Celebes ?
- « *var. tonkinense Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1887, p. 96.*
Rupic. — As. : Tonkin.
- spectabile *Reinw. et Hsch. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV, p. 721, t. 40 ; Bryol. jav. II, p. 16, tt. 144 et 145.*
Hypnum Moritzi Duby in Mor. Pl. Zolling. p. 131.
Hypopterygium spectabile C. M. Syn. II, p. 12.
 2. Ad arb. et terr. — *As. : M. Java, Sumatra. Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Nov. Guinea, Nov. Caled.*
- speluncae *C. M. in Linn. 1875, p. 425.*
 Ster. *Rupic. et arbor. — Afr. : Bongo, Usambara, Kilima N'Djaro.*
- strumiferum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 58.*
Hypopterygium strumiferum C. M. in Bot. Zeit. 1851, p. 563.
Rh. australe H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. p. 121, t. 92, f. 7.
 2. *Rupic. et lignic. — Pac. : Nov. Zeland., Tasman.*
- thomeanum *Broth. in Bol. d. Soc. Brot. VIII, 1890.*
 2. Ad arbor. — *Afr. : Ins. Thome.*
- tomentosum (*Hedw.*) *Brid. Bryol. univ. II, p. 719.*
Hookeria tomentosa Grev.
Hypnum mucronatum P. B. Prodr. p. 66.
H. ornithopodioides L. Sp. pl. p. 1589.
H. pennatum ornithopodioides, pinnulis pellucidis Dill. Hist. M. p. 270, t. 34, f. 9 A. B.
H. tomentosum Hedw. M. frond. IV, p. 48, t. 19.
Hypopterygium tomentosum C. M. Syn. II, p. 12.
Leskea ornithopodioides Brid. Mant. M. p. 143.
L. Omalia ornithopodioides Brid. Bryol. univ. II, p. 330.
Rh. insigne Hsch. in Sieber Pl. ins. Trinitat. n. 19.
Rh. mnioides P. B. Prodr. p. 87.
Rh. mucronatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 162.
Rh. tomentosum β africanum Brid. Bryol. univ. II, p. 719.
 1. Ad arbor., rup. et terr. — *As. : Java. Afr. : Inter-tropic. ; C. B. Sp. Am. sept. : Inter-tropic. ; ins. Bermud. Am. merid. : Inter-tropic. ; Paraguay, Chile, ins. Juan. Fernandez.*
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3677.

- var. *africanum* { Brid. — Rh. tomentosum.
 Mont. — Rh. Schmidii.
 var. Ångstr. — Rh. mauritianum.

« var. *gracile* Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 112.
 — *Am. sept.* : Mexic.

« var. *longe-aristatum* C. M. mss.
 — *Am. sept.* : Guatemala.

- tomentosum* { Dz. et Mk. — Rh. demissum.
 Sulliv. — Rh. cuspidigerum.

RHAMPHIDIUM Mitt. *M. austr. am.* p. 45.

macrostegium Mitt. — *Trichostomum dicranelloides*.

RHAPHIDORHYNCHUM W. P. Sch. *Syn. ed. I*, p. 564 (sect. **RHYNCHOSTEGII**) ; Besch., Mitt. *gen. propr.*

Spec. omn. non indicatae sunt **RHAPHIDOSTEGIA** ejusd. nom.

borbonicum Mitt. — *Trichostomum subrhinophyllum*.

confertulum Besch. — *Trichosteleum*.

RHAPHIDOSTEGIUM Bryol. eur. V (subgen. **RHYNCHOSTEGII**) ; W. P. Sch. *gen. propr.* (24 spec.).

acistrostegium (Sull.) Jaeg. *Ad. II*, p. 468.

Hypnum acistrostegium Sull. in *Proced. of the Am. Acad.* 1861, p. 278.

Sematophyllum acistrostegium Mitt. *M. austr. am.* p. 488.

— *Am. sept.* : Cuba.

adhaerens Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 164.

l. Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

affine (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 461.

Hypnum conterminum C. M. *Syn. II*, p. 341.

Leskea affinis Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 71.

Sematophyllum affine Mitt. *op. cit.* p. 483.

Syn. Cortic. in silv. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

afro-demissum (C. M.) Par.

Hypnum afro-demissum C. M. in *Abhandl. Brem. VII*, p. 212.

l.

— *Afr.* : Madagascar.

agnatum (Hpe) Jaeg. *Ad. II*, p. 458.

Hypnum agnatum Hpe. mss.

Sematophyllum agnatum Mitt. *op. cit.* p. 481.

— *Am. merid.* : And. Bogotens.

albi-alare (C. M.) Par.

Heterophyllum albi-alare C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 691.

— *Afr.* : M. Cameroon.

ambiguum (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 471.

Hypnum ambiguum Harv. in Hook. *Ice. pl. rar. t.* 24, f. A et in *Lond.*

Journ. of bot. 1840, II, p. 20 ; C. M. *Syn. II*, p. 340.

l.

— *As.* : Nepal.

amblystegiocarpum (C. M.) Par.

Hypnum amblystegiocarpum C. M. in *Fl.* 1886, p. 285.

l. Ad arbor. — *Afr.* : Ins. S. Thoma.

amaenum (*Hedw.*) *Par.*

Hypnum amaenum Hedw. Sp. M. p. 292, t. 77; C. M. Syn. II, p. 316.

Isothecium amaenum Brid. Bryol. univ. II, p. 382 p.p.

Sematophyllum amaenum Mitt. op. cit. p. 487.

1. — *Am. merid.* : And. (*fid. Handb.*), Fuegia, ins.
Eremitae. *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland.

amnigenum *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895, n. 3.*

1. Ad ligna demersa in fluv. — *Am. merid.* : Brasil. or.

ampullatum (*C. M.*) *Par.*

Aptychus ampullatus C. M. in Hedw. 1897, p. 124.

1. — *Am. merid.* : La Plata.

andinum (*Mitt.*) *Jaeg. II, p. 460.*

Sematophyllum andinum Mitt. op. cit. p. 483.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

andungense (*Welw. et Duby*) *Jaeg. Ad. II, p. 456.*

Hypnum andungense W. et Dy. in Mém.... Genève, 1871, p. 14, t. I, f. I.

Ad arbor. et terr. humid. — *Afr.* : Angola.

« *var. major* (*Welw. et Duby*) *Par.*

Hypnum andungense var. major W. et Dy. l. c.

Rupic. — *Afr.* : Ubi typ.

angusticymbeum (*C. M.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 162.*

Hypnum angusticymbeum C. M. in Linn. 1876, p. 283.

— *Afr.* : Ins. Anjouan.

apaloblastum (*C. M.*) *Broth. mss.*

Aptychus apaloblastus C. M. in Bull. hb. Boissier. 1897, p. 213.

— *Am. sept.* : Guatemala.

argyrophyllum *Besch. in Journ. de bot. 1884, p. 59.*

2? Ster. — *Afr.* : Congo gall.

argyro-viride (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 476.*

Rhyncho-Hypnum argyro-viride Hpe. Symb. 1870, p. 292.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

asperifolium (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 474.*

Sematophyllum asperifolium T. et M. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 319.

2. — *As.* : Ceylan.

asperulifolium (*C. M.*) *Par.*

Aptychus asperulifolius C. M. in Dusen M. Camer. n. 14.

— *Afr.* : M. Cameroon.

aureolum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 775.*

Hypnum aureolum Hpe. Symb. 1877, p. 736.

1. Ad rup. humid. et terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

« *var. minus* (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum aureolum var. minus Hpe. l.c.

Cortic. — *Am. merid.* : Ubi typ.

? *aureolum* *Besch.* — *Rh. nanum.*

aureo-sulfureum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 456.*

Hypnum aureo-sulfureum C. M. in Linn. 1874, p. 615.

1. Ad arbor. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

aureo-viride (C. M.) Par.

Aptychus aureo-viridis C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 122

1. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. Tucuman.

aureus (Besch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 750.

Rhaphidorhynchum aureus Besch. *Not. M. I. S. Paul. et Amsterdam*, p. 5.

1. Ster. — *Afr.* : Ins. Amsterdam.

auricomum Jaeg. — Rh. Welwitschii.

Ayresii W. P. Sch. *hb.* ; Jaeg. *Ad. II*.

— *Afr.* : Ins. Francia.

Barnesi Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 182.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

Bernoullianum (C. M.) Par.

Stigmatella Bernoulliana C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p.

— *Am. sept.* : Guatemala.

Beyrichii (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 460.

Hypnum Beyrichii Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 81, t. 4, f. 1 ; C. M. *Syn. II*, p. 403.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Boivini W. P. Sch. *hb.* ; Jaeg. *Ad. II*.

— *Afr.* : Madagascar.

borbonicum Besch. — Trichosteleum.

Boswellii (Geheeb) Par.

Hypnum Boswellii Geh. in *Abhandl. Brem. VII*, p. 212 (nom.).

— *Afr.* : Madagascar.

brachyacrus (C. M.) Par.

Aptychus brachyacrus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 59.

1. — *Am. merid.* : And. Boliv.

brachycarpum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 462.

Hypnum brachycarpum Hpe. *Ic. M. t. 11* ; C. M. *Syn. II*, p. 328.

1. In silv. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n. 420*.

brachycormum (C. M.) Par.

Heterophyllum brachycormum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 260*.

— *Afr.* : M. Cameroon.

brachydictyon Jaeg. — Trichosteleum.

brachyoxum (C. M.) Par.

Heterophyllum brachyoxum C. M. in *Dusen M. Camer. n. 341*.

— *Afr.* : M. Cameroon.

brachypelma (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 463.

Hypnum brachypelma C. M. *Syn. II*, p. 404.

H. microcarpum Hook. in *Wall. Cat. n. 7657*, in *Lond Journ. of bot.* 1840, p. 18 et *Ic. pl. rar. t. 23, f. 4*.

Stereodon brachypelma Mitt. *M. Ind. or. p. 102*.

1. — *As.* : Nepal.

brachypus (Hpe.) Par.

Hypnum brachypus Hpe. *Enum. M. Brasil. p. 78*.

1. — *Am. merid.* : Brasil austr. or.

brachytheciiforme (C. M.) Par.

Aptychus brachytheciiformis C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 708.

— Afr. : M. Cameroon.

brevi-horridum (C. M.) Par.

Heterophyllum brevi-horridum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 462.

— Afr. : M. Cameroon.

brevi-mucronatum (C. M.) Par.

Hypnum brevi-mucronatum C. M. in *Ule Bryol. brasil.* n. 88.

— Am. merid. : Brasil. subtropic. or.

caespitosum (Sw.) Jaeg. Ad. II, p. 454.

Hypnum caespitosum Sw. *Fl. Ind. occ.* III, p. 1807; C. M. *Syn.* II, p. 330 p.p.

H. densifolium Spreng. in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 591.

H. leptochaeton? Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844.

H. subsecundum W. Arn. *Disp.* p. 62.

H. Stereodon pallidisetus Brid. *op. et l. cc.*

Leskea caespitosa Hedw. *Sp. M.* p. 233, t. 49; *Brid. op. cit.* p. 228 p.p.

L. caespitosa β subsquarrosa *Brid. op. cit.* p. 289 (*vera spec.*, fid. C. M.).

Sematophyllum caespitosum Mitt. *M. austr. am.* p. 479.

l. Ad arbor. — Am. sept. : Mexic.? Cuba, Hispaniola, Porto-Rico, Guadalup., Martinic. Am. merid. : Ins. Trinitat., Columb., Venezuela, Brasil.

« *subsp. abbreviatum* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 75.

Ad terr. et lapid. — Am. sept. : Martinic.

« *subsp. coelophyllum* Besch. *op. cit.* p. 73.

— Am. sept. : Guadalup.

subsp. galipense Besch. — Rh. galipense.

« *subsp. Husnoti* Besch. *op. cit.* p. 74.

— Am. sept. : Guadalup.

« *subsp. megalodictyon* Besch. *op. cit.* p. 73.

— Am. sept. : Guadalup.

« *subsp. stramineum* Besch. *op. cit.* p. 74.

Cortic. — Am. sept. : Guadalup.

calabarenses Par.

Hypnum trachaelocarpum C. M. in *Fl.* 1886, p. 524.

l. Cortic. — Afr. : Nov. Calabar.

callidioides (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 470.

Hypnum callidioides C. M. in *Linn.* 1856, p. 213.

Rhaphidorhynchum callidioides Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 85; *F. v. Müller Austral. M. t.* XIV.

l. — Pac. : Austral. fel., Tasman.

callidum (Mont.) Jaeg. l. c.

Hypnum callidum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 90 et *Syll.* p. 7; C. M. *Syn.* II, p. 313.

Sematophyllum callidum Mitt. *op. cit.* p. 489.

l. Cortic. — Am. merid. : Chile, Valdiv.

calliferum Geh. et Hpe. in *Rev. bryol.* 1881, p. 27.

l. — Pac. : Austral. or. (Victoria), Tasman.

Cambouei Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 183.

l. Cortic. — Afr. : Madagascar.

- campicolum *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* 1895, n. 3.
 1. Lignic. secus rivul. — *Am. merid.* : Brasil. or.
- capilliferum (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 474.
Sematophyllum capilliferum *T. et M. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 318.
 2? — *As.* : Ceylan.
- carolinianum *Jaeg.* — *Rh. demissum* var. *carolinianum*.
- cataractitis (*C. M.*) *Par.*
Hypnum cataractitis *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n.* 92.
 — *Am. merid.* : Brasil. subtropic. or.
- catilliforme (*C. M.*) *Par.*
Aptychus catilliformis *C. M. in Hedwig.* 1897, p. 124.
 1. Cortic. — *Am. merid.* : Monte-Video.
- Catillum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 459.
Hypnum Catillum *C. M. in Linn.* 1875, p. 467.
 Ster. Ad arbor. — *Afr.* : Niam-Niam.
- cavifolium (*Wils.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 458.
Hypnum cavifolium *C. M. Syn. II*, p. 342.
Leskea cavifolia *Wils. in Lond. Journ. of bot.* 1844, III, p. 161.
 Rupic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- cerviculatum (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 469.
Hypnum cerviculatum *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 113, t. 95, f. 2 et *Handb.* p. 473.
H. leptorhynchum var. β *Fl. Antarct. I*, p. 141.
Rhaphidorhynchum cerviculatum *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 85.
Stereodon cerviculatus *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. IV*, p. 87.
 2. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept., ins. Auckland, Austral. or. (Victoria). Tasman.
- ceylonense (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 464.
Hypnum ceylonense *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 276.
 1. — *As.* : Ceylan.
- chlorocormum (*C. M.*) *Par.*
Aptychus chlorocormus *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 58.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- chlorothecium *Besch. Not. M. Paraguay*, p. 270.
 Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1272.
- chrysostegum (*C. M.*) *Jaeg. l. c.*
Hypnum chrysostegum *C. M. Syn. II*, p. 686.
Sematophyllum chrysostegum *Mitt. M. austr. am. p.* 485.
 1. Lignic. — *Am. merid.* : Venezuela.
- chrysotis (*C. M.*) *Par.*
Aptychus chrysotis *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 19.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- circinale (*Hpe.*) *Besch. op. et l. cc.*
H. concavifolium *H. f. et W.*
H. Hampeanum *C. M. Syn. II*, p. 326.
Leskea circinalis *Hpe. Ic. M. t.* 5.

Neckera straminea Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 54 (*fid. C. M.*).

Sematophyllum circinale Mitt. *op. cit.* p. 486.

1. Cortic. et ad rad. arb. — *Am. sept.*: Mexic. *Am. merid.*: Brasil. austr. or., Paraguay.

Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 1218, 3691.

circinale Besch. (1885). — Rh. *circinicaule*.

circinicaule (C. M.) Par.

Aptychus circinicaulis C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 125.

Hypnum circinicaule C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (*nom.*).

Rh. *circinale* Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 19 et in Bal. Pl. Parag. n. 3692.

1. — *Am. merid.*: Paraguay.

cirrifolium (Schwaegr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 474.

Hookeria cirrifolia W. Arn. *Dispos.*

Hypnum cirrifolium Schwaegr. in *Freycinet Voy...* Bot. I, p. 12; C. M. *Syn. II*, p. 281; *Bryol. jav. II*, p. 144.

Leskea cirrifolia Schwaegr. *Suppl. III, II, II*, t. 290.

Sematophyllum cirrifolium Mitt. in *Voy. H. M. C. Challenger*, Bot. III, p. 261.

1. Lignic. — As.: Ins. Rauwack Molucc. Pac.: Ins. Admiral.

cochleatum (C. M.) Par.

Aptychus cochleatulus C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 124.

Ster. Cortic. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic. Tucuman.

cochleatum Broth. in *Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* 1895, n. 3.

1. Ad arbor. in fluv. — *Am. merid.*: Brasil. or.

concinnum (C. M.) Par.

Aptychus concinnus C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 516.

1. — *Am. merid.*: Guian. brit.

condensatum (C. M.) Par.

Aptychus condensatulus C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 122.

1. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic. Tucuman

confertissimum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 458.

Stereodon confertissimus Mitt. *M. Ind. or.* p. 102.

1. — As.: Assam super.

congruens (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 461.

Hypnum congruens Hpe. in *Linn.* 1859, p. 643; F. v. Müller *Austral. M. t. XIII.*

Rhynchostegium congruens Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 89.

1. — Pac.: Austral. or.

constrictum (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 166.

Hypnum constrictum C. M. *Syn. II*, p. 316.

Leskea constricta Brid. *Sp. M. II*, p. 79 et *Bryol. univ. II*, p. 290.

1? — Afr.: Ins. Borbon.

contiguum (Hook. f. et Wils.) Par.

Hypnum contiguum H. f. et W. *Fl. Tasman. II*, p. 213, t. 177, f. 2.

Rhaphidorhynchum contiguum Besch. *Note M. I. St-Paul et Amsterd.* p. 3.

Rhyncho-Hypnum subpungens Hpe. et C. M. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 89.

Sematophyllum contiguum Mitt. *Fl. Vit.* p. 398.

Stereodon contiguus ej. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 87.

1. Lignic. — Afr. : Ins. Saint-Paul. Am. sept. : Sine loco (*fid. Handb.*).
Pac. : Ins. Fidji, lord Howe, Austral. or. (Queensland, Nov. Valesia), Nov. Zeland. sept. et med., Nov. Caledon., Tasman.
- crassiusculum* (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 156.
Hypnum *crassiusculum* Brid. *Sp. M. II*, p. 242; *C. M. Syn. II*, p. 405.
Isothecium *crassiusculum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 384 p.p.
1. Lignic. et terr. — Afr. : Ins. Canar., Tristan d'Acunha, Borbon.,
Franciae. Am. merid. : Nov. Granat. ? (*fid. Brid.*).
- crinitifolium* Jaeg. — Rh. tequedamense.
- crispans* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 158.
1. — Afr. : Ins. Borbon.
- crispulifolium* (C. M.) Par.
Hypnum *crispulifolium* C. M. in *Journ. of Bot.* 1877 p. 229 (*nom.*).
Lignic. — Am. sept. : Costa Rica.
- cucullatifolium* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 459.
Hypnum *cucullatifolium* Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, p. 328.
Sematophyllum *cucullatifolium* Mitt. *M. austr. am.* p. 482.
In udis. — Am. merid. : And. Bogotens.
- curvirostre* (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 460.
Hypnum *curvirostre* C. M. *Syn. II*, p. 408.
Leskea *curvirostris* Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 16 et in Hook.
 Ic. pl. rar. t. 28, f. 1.
Stereodon *Harveyanus* Mitt. *M. Ind. or.* p. 102.
— As. : Nepal.
- curvulum* Jaeg. — Rh. propinquum.
- cuspidatulum* (C. M.) Par.
Hypnum *cuspidatulum* C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (*nom.*).
— Pac. : Nov. Caledon.
- cuspidatum* W. P. Sch. *hb.* ; Jaeg. *Ad. II*, p. 457.
1. — Afr. : Madagascar.
- cuspidiferum* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 457.
Sematophyllum *cuspidiferum* Mitt. *M. austr. am.* p. 480.
1. — Am. merid. : And. Quitens.
- cylindricarpum* (C. M.) Kindb. in *Mac. Cat.* p. 208.
Hypnum *cylindricarpum* C. M. *Syn. II*, p. 308 ; Sull. *Ic. M.* p. 173, t. 109,
 Lesq. et Jam. Man. p. 356.
Leskea *polyantha* var. Sull. *M. Allegh. n.* 60.
L. *tenuirostris* Br. et Sch. in *litt. ad Sull.*
Pylaisia *tenuirostris* Jaeg. *Ad. II*, p. 370.
2. Lignic. — Am. sept. : Labrador, Terr. nov., New Brunswick ; a
New Jersey ad Ohionem et reg. merid. et or.
 Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. n.* 445.
- cylindricum* Jaeg. — Rh. leptocarpon.
- cyparioides* (Brid.) Jaeg. *Ad. II*, p. 470.
Hypnum *cyparioides* Brid. *M. Rec. II, II*, p. 138, t. 3, f. 4 ; *C. M.*
 Syn. II, p. 312.
H. *leptorhynchum* Brid. *Mant. M.* p. 179 p.p.
H. *Stereodon leptorhynchus* ej. *Bryol. univ. II*, p. 621 p.p.
— Pac. : Austral. ? Tasman.

cyparissoides Broth. — *Ectropothecium*.

Danckelmanni (C. M.) Par.

Hypnum Danckelmanni C. M. in *Fl.* 1886, p. 524.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Debeltei Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 162.

Cortic. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

decolor Besch. *op. cit.* p. 165.

2 ? Cortic. — *Afr.* : Ins. Seychell.

decumbens (Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 468.

Hypnum decumbens Wils. *mss.*

Sematophyllum decumbens Mitt. *M. austr. am.* p. 488.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Bogot. et Quitens., Brasil. austr. or.

decurvifolium (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 475.

Sematophyllum decurvifolium Mitt. *op. cit.* p. 495.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Amazon.

delicatulum (Jam.) Par.

Hypnum laxepatulum Lesq. et Jam. *Man.* p. 358.

Isopterygium delicatulum Jaeg. *Ad. II*, p. 504.

Rhynchostegium delicatulum Jam. in Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 93, t. 69.

2 ? ♂ ign.

— *Am. sept.* : New Hampshire.

demissum (Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 453.

Eurhynchium demissum Milde *Bryol. Biles.* p. 308.

Hypnum demissum Wils. *Engl. Bot. Suppl.* t. 2740; C. M. *Syn. II*, p. 327.

H. flavescens Wils. *mss.*

H. Schimperii Br. *mss.* : Rab. *Deutsch. Kryptfl. II, III*, p. 286.

Rhaphidorhynchium demissum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 175.

Rhynchostegium demissum *Bryol. eur. V* (mon. p. 4), t. 507; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 678.

1. Ad sax. quartz. adrep. in silv. montos. — *Eur.* : Scot., Hibern., Cambravall., Voges., Alsat., Helvet., Ital. super. As. : Japon. *Am. sept.* : Terr. nov., New Brunswick, Virgin. occ.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 341, 541.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II*, p. 440 (*Hypnum*).

« *var. carolinianum* (C. M.) Par.

Hypnum carolinianum C. M. *l. c.*

H. demissum Sull. *M. Allegh. n.* 48.

H. demissum var. carolinianum L. et J. *Man.* p. 355.

H. demissum var. Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 298 b.

Rh. carolinianum Jaeg. *Ad. II*, p. 454.

Ad sax. irror. — *Am. sept.* : Carol. super.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 441. (*Hypnum*).

« *var. marylandicum* (C. M.) Par.

Hypnum marylandicum C. M. *op. cit.* p. 328.

H. demissum var. marylandicum L. et J. *Man.* p. 356.

H. demissum var. marylandicum Sull. *M. Allegh. n.* 49; B. et L. *M. bor. am. I ed. n.* 298c.

Rh. marylandicum Jaeg. *l. c.*

Rupic. — *Am. sept.* : Maryland.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 462. (*Hypnum*).

demissum Lange. — *Rh. Welwitschii*.

diaphanodictyon (C. M.) Par.

Aptychus diaphanodictyus C. M. in Hedwig. 1897, p. 120.

1. — Am. merid. : Argentin. subtropic. Tucuman.

Dicnemonella (C. M.) Par.

Aptychus Dicnemonella C. M. in Dusen M. Camer. n. 112.

— Afr. : M. Cameroon.

divaricatum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 475.

Hypnum divaricatum C. M. in sched. ; Hpe. Symb. 1884, p. 517 (errat.
H. divaricatum in Enum. p. 70).

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

Dregei (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 473.

Hypnum Dregei C. M. Syn. II, p. 311.

H. n. 8048 Drege exs.

Rhynchostegium Breutelium W. P. Sch. in Breut. M. Capens.

1. — Afr. : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. M. Afr. austr. n. 411.

Duisabonum (Mont.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 159.

Hypnum Duisabonae C. M. Syn. II, p. 305.

Leskea Duisabonae Mont. in Ann. sc. nat. III ser., 1845, p. 97 et Syll.
p. 19.

Rh. Duisabonae Jaeg. Ad. II, p. 457.

Rupic. — Afr. : Madagascar, ins. Franciae.

« var. granulosum Besch. op. cit. p. 160.

Cortic. in silv. — Afr. : Ins. Borbon.

« var. Le Duceanum (Mont.) Besch. op. et l. cc.

Hookeria Le Duceana Mont. Syll. p. 13.

— Afr. : Ins. Galega.

« var. lutescens Besch. op. et l. cc.

— Afr. : Ins. Franciae.

« var. nossianum Besch. op. et l. cc.

— Afr. : Ins. Nossi-Comba.

« var. rigidiusculum Besch. op. et l. cc.

Hypnum Lecoultriae Duby Choix de M. ex. 1876, p. 8, t. I, f. 3

Sematophyllum Lecoultriae Jaeg. Ad. II, p. 453.

— Afr. : Ins. Franciae.

« var. rufulum Besch. op. cit. p. 161.

— Afr. : Ins. Franciae.

Duisabonæ Jaeg. — Rh. Duisaboanum.

enerve Besch. in litt.

Stereophyllum enerve ej. in Rev. bryol. 1885, p. 19 et in Bal. Pl. Parag.
exs. n. 3634.

— Am. merid. : Paraguay.

erythropodium (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 469.

Sematophyllum erythropodium Mitt. M. austr. am. p. 489.

Lignic. — Am. merid. : Venezuela, And. Bogotens.

falcatum Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 76.

— Am. sept : Guadalup.

fallax Besch. Not. M. Parag. n. 270.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 1213, 1219.

flaccidifolium (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 458.

Hypnum flaccidifolium C. M. Syn. II, p. 333.

Sematophyllum flaccidifolium Mitt. op. cit. p. 481.

— *Am. merid.* : Ins. Trinit.

flagellicaule (C. M.) Par.

Heterophyllum flagellicaule C. M. in Dusen M. Camer. n. 667.

— *Afr.* : M. Cameroon.

flavidum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 458.

Sematophyllum flavidum Mitt. op. cit. p. 482.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Bogotens.

fluminale (C. M.) Par.

Aptychus fluminalis C. M. in Dusen M. Camer. n. 665.

— *Afr.* : M. Cameroon.

fragilirostrum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 464.

Hypnum fragilirostrum Hpe. in Linn. 1863, p. 163.

Sematophyllum fragilirostrum Mitt. op. cit. p. 485.

Rupic. — *Am. merid.* : And. Bogotens.

frullaniadelphus (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 463.

Hypnum frullaniadelphus C. M. in Linn. 1869-70, p. 16.

1. — *As.* : Ceylan.

fulvifolium (Mitt.) Par.

Sematophyllum fulvifolium Mitt. in Philos. Trans. of the roy. Soc. 1879
(extr. vol.), p. 393, t. 37 D.

1. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

fulvum (Hsch.) Jaeg. Ad. II, p. 460.

Hypnum pyrrophyllum C. M. Syn. II, p. 344.

Leskea fulva Hsch. Fl. Brasil. I, p. 73.

Sematophyllum fulvum Mitt. op. cit. p. 482.

1. — *Am. merid.* : Brasil.

fulvum Ren. et Card. — *Plagiothecium micans* var. *fulvum*.

fusco-viride Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 19 et in Journ. de bot. 1891, p.

— *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3682.

galipense (C. M.) Par.

Hypnum caespitosum C. M. Syn. II, p. 331 p.p

H. dissolutum Sull. in Proced. of the Am. Acad.... 1861.

H. galipense C. M. in Bot. Zeit. 1848, p. 780.

H. obliquifolium ej. in op. cit. 1845, p. 110.

H. tovariense ej. in op. cit. 1848, p. 780.

Rh. caespitosum subsp. *galipense* Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 74.

Sematophyllum galipense Mitt. op. cit. p. 480.

1. Ad arb., rup. et terr. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaic., Guadalup.,

Tabago. *Am. merid.* : Venezuela, And. Quitens. et Peruv., Brasil.

aequinoc. et austr. or.

gibbosulum (C. M.) Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 162.

Hypnum gibbosulum C. M. in Linn. 1876, p. 282.

Isopterygium gibbosulum Jaeg. Ad. II, p. 501.

— *Afr.* : Ins. Anjouan.

glaucinum Besch. — *Trichosteleum*.

glauco-viride (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 470.

Leptorhyncho-Hypnum glauco-viride Hpe. in *Linn.* 1876, p. 325.

Rhynchostegium glauco-viride Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 89.

l. Cortic. — *Pac.* : Austral. or.

Glaziovii (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 472.

Hypnum Glaziovii Hpe. *Symb.* 1876, p. 524.

l. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

globosum Besch. in *Rev. bryol.* 1885, p. 19 et in *Journ. de bot.* 1891, p.

l. Ad rup. irror. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Bal. Pl. Parag. n. 3633.

glutinosum (C. M.) Par.

Aptychus glutinosus C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 407.

— *Afr.* : M. Cameroon.

grammicarpum (C. M.) Par.

Aptychus grammicarpus C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 517.

l. — *Am. merid.* : Guian. brit.

grandicellulosum (C. M.) Par.

Aptychus grandicellulosus C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 120.

l. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. Tucuman.

Gueinzii (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 473.

Hypnum cupressiforme var. *Hsch.* in *Drege M. Capens.*

H. Gueinzii Hpe. *Ic. M. t.* 12 ; *C. M. Syn. II*, p. 311.

l. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n.* 409 et b, 659.

“ *var. prostrata* (C. M.) Jaeg. *l. c.*

Hypnum Gueinzii var. prostrata C. M. *l. c.*

Cortic. — *Afr.* : C. B. Sp.

Hampei (Besch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 457.

Rhynchostegium Hampei Besch. *Prodr. bryol. mexic. p.* 105

— *Am. sept.* : Mexic.

hamulosum W. P. Sch. *hb.* ; Jaeg. *Ad. II*.

— *Afr.* : Ins. Borbon.

Hedwigii (Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 461.

Leskea Hedwigii Wils. in *Kew Journ. bot. III*, p. 353.

Sematophyllum Hedwigii Mitt. *M. austr. am. p.* 484.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

helenicum (Mitt.) Par.

Sematophyllum helenicum Mitt. in *Melliss's S. Helena*, 1875, p. 363.

l. Cortic. — *Afr.* : Ins. S. Helena.

? *Henoni* Jaeg. — *Hypnum*.

homomallum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 749.

H. Drummondii Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 63.

H. homomallum C. M. *Syn. II*, p. 336 ; *H. f. Hanlb. of N. Zeal. Fl.*

p. 474.

Leskea homomalla Hpe. *Ic. M. t.* 6 et in *Pl. Preiss. n.* 2465.

Pylaisia homomalla Jaeg. *Ad. II*, p. 373.

- Rhaphidorhynchum homomallum* Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84.
Rhynchostegium homomallum Besch.
2. Cortic. (ad *Banksiam Menziesii*). — *Pac.* : Austral. occ. et or., fret. King's Georges, Nov. Zeland. sept., Nov. Caledon., Tasman.
- humile* (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 463.
Hypnum humile Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, *II*, p. 19 et in Hook. *Ic. pl. rar. t.* 23, *f.* 9 : *C. M. Syn. II*, p. 329.
Stereodon humilis Mitt. *M. Ind. or.* p. 102.
 1. — *As.* : Nepal., Ceylan.
- inconspicuum* (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 459.
Hypnum inconspicuum Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 86; *C. M. Syn. II*, p. 332.
Sematophyllum inconspicuum Mitt. *M. austr. am.* p. 481.
 1. — *Am. merid.* : Brasil.
- incurvum* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 476.
Hypnum incurvum Hpe. *Symb.* 1876, p. 522.
 1. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- insulosum* (Sull.) Jaeg. *Ad. II*, p. 471.
Hypnum insulosum Sull.
Sematophyllum insulosum Mitt. *op. cit.* p. 489.
 Lignic. — *Am. sept.* : Cuba. Guadalup.
- irrepens* (Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 457.
Hypnum irrepens Dy. in *Mém... Genève*, 1876, p. 13, *t.* 11, *f.* 4 et in *Fl.* 1877, *n.* 5-6.
 1. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- Jamesii* (Sull.) Kindb. in *Mac. Cat.* pp. 209 et 276.
Hypnum Jamesii L. et J. *Man.* p. 358.
Isopterygium Jamesii Jaeg. *Ad. II*, p. 504.
Isothecium? Dawsoni Kindb. in *Ott. Natur. IV*, p. 65.
Rhynchostegium Jamesii Sull. *Ic. M. Suppl.* p. 92, *t.* 68.
 1. — *Am. sept.* : Anticosti, Terr. nov., New Brunswick, New Hampshire, Gaspes., Columb. brit.
- Jolliffii* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 457.
Hypnum Jolliffii H. f. *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 474.
Rhaphidorhynchum Jolliffii Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 84.
Stereodon Jolliffii Mitt. in *Fl. Tasman. II*, p. 213.
 1. Ad rup. et terr. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.
- Kegelianum* (C. M.) Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 61.
Hypnum Kegelianum C. M. *Syn. II*, p. 325.
Leskea Kegeliana ej. in *Linn.* 1848, p. 198.
Sematophyllum Kegelianum Mitt. *op. cit.* p. 486.
 1. Cortic. et lignic. — *Am. sept.* : Mississipi, Jamaic., Hispaniola. *Am. merid.* : Ins. Trinit., Guian. batav., And. Quitens. et Peruv., Brasil. aequinoct., Paraguay.
- « *var. floridanum* Ren. et Card. in *op. et l. cc.*
 Ut typ.? — *Am. sept.* : Florida.
- « *var. tenue* (Hpe.) Par.
Hypnum Kegelianum var. tenue C. M. *l. c.*
Leskea caespitosa Brid. *Bryol. univ. II*, p. 289 p.p.
L. Kegeliana var. tenuis Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 58.

L. subpinnata *Brid. op. cit.* p. 287.

Saxic. — *Am. sept.* : Hispaniola, Porto-Rico. *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Krakakammae (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 476.

Hypnum *Krakakammae* *C. M. Syn. II*, p. 285.

l. In silv. — *Afr.* : C. B. Sp.

lamellosum *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1657.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

lamprocladum (*C. M.*) *Par.*

Aptychus lamprocladus *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 21.

— *Afr.* : M. Cameroon.

lamprophyllum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 477.

Hypnum caespitosum *Sull. in Proceed. of the Am. Acad...* 1861, p. 289 et in *Wright M. Cubens. n.* 127.

Pungentella lamprophylla *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1896, p. 330.

Sematophyllum lamprophyllum *Mitt. op. cit.* p. 496.

— *Am. sept.* : Cuba.

latitextum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1895, I, p. 76.

l ? — *As.* : Sikkim.

laxe-patulum (*Lesq. et Jam.*) *Par.*

Hypnum laxepatulum *L. et J. Man. p.* 358.

Rhynchostegium delicatulum *Jam. mss.; Sull. Ic. M. Suppl. p.* 93, t. 69.

♂ ign. — *Am. sept.* : New Hampshire.

laxo-alare (*C. M.*) *Par.*

Aptychus laxo-alaris *C. M. in Hedwig.* 1897, p. 123.

Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. Tucuman.

laxum *W. P. Sch. hb.; Jaeg. Ad. II.*

— *Afr.* : Ins. Franciae.

leptobolax (*C. M.*) *Par.*

Aptychus leptobolax *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 700.

— *Afr.* : M. Cameroon.

leptocarpon (*Schwaegr.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 467.

Hypnum cylindricum *Hsch. et Reinw. in Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. XIV, II, Suppl. p.* 728 (*pd. C. M.*); *Bryol. jav. II*, p. 178, t. 271.

H. leptocarpon *Schwaegr. Suppl. II, II, II*, p. 171, t. 200; *C. M. Syn. II*, p. 316; *Bryol. jav. II*, p. 177, t. 276.

Rh. cylindricum *Jaeg. l. c.*

Sematophyllum leptocarpon *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 5.

Stereodon leptocarpus *ej. M. Ind. or.* p. 102.

l. — *As.* : Ceylan, Sumatra, M. Java, Borneo.

leptochaeton (*Schwaegr.*) *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p.* 81.

Hypnum leptochaeton *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 296; *C. M. Syn. II*, p. 286.

Isothecium leptochaeton *Brid. Bryol. univ. II*, p. 381.

Sematophyllum leptochaeton *Mitt. M. austr. am. p.* 496.

l. Cortic. — *Am. sept.* : Martinic. *Am. merid.* : Guian., Brasil. austr. or.

leptophyllum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 468.

Sematophyllum leptophyllum *Mitt. M. austr. am. p.* 488.

2 ? — *Am. merid.* : Chile.

leptorhynchoides (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 470.

Hypnum leptorhynchoides Mont. in litt. (*deest in Syll.*).

Stereodon leptorhynchoides Mitt. *M. Ind. or.* p. 103.

1. — As. : M. Neilgherr.

leptorhynchum (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 164.

Hypnum leptorhynchum Brid. *Mant. M.* p. 179 p.p. ; *C. M. Syn. II*, p. 313.

H. Stereodon leptorhynchus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 621 p.p.

1. Cortic. in silv. — Afr. : Madagascar sept., ins. Borbon., Franciae.
Pac. : Austral. or. (Victoria).

leptothecium (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 459.

Sematophyllum leptothecium Mitt. *M. austr. am.* p. 482.

— Am. merid. : And. Bogotens.

leucocytus (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 469.

Hypnum leptorhynchum H. f. et W. *Fl. Antarct. I*, p. 141 (*excol. v. β*).

H. leucocytus C. M. *Syn. II*, p. 314.

Stereodon cyparioides Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 87.

1. — Pac. : Austral., Nov. Zeland. sept. et med., ins.
Auckland, Tasman.

leucostomum (Hpe.) Par.

Hypnum leucostomum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 81.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

lignicolum (Ångstr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 466.

Sematophyllum lignicolum Ångstr. in *Oef....* 1876, p. 42.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

lilliputianum (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 468.

Hypnum lilliputianum Mont. in *Cl. Gay Hist. Chil. Crypt. t. 20, f. 3.*

Sematophyllum lilliputianum Mitt. *op. cit.* p. 488.

— Am. merid. : Chile.

Lindigii (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 465.

Hypnum Lindigii Hpe. in *Linn.* 1862, p. 530.

Sematophyllum Lindigii Mitt. *op. cit.* p. 487.

1. Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

littorale (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 459.

Hypnum littorale Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 287.

1. Cortic. — As. : Borneo.

longicollum (Hpe.) Par.

Aptychus longicollis Hpe. in *sched.* ; *C. M. in Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 213.

1. — Am. sept. : Guatemala.

longirostratum (Brid.) Jaeg. *Ad. II*, p. 472.

Hypnum longirostratum C. M. *Syn. II*, p. 393.

Leskea longirostris Brid. *Bryol. univ. II*, p. 311.

Sematophyllum longirostratum Mitt. *op. cit.* p. 490.

1. Cortic. — Am. sept. : Ins. Porto-Rico.

loucoubense Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 165.

In silv. — Afr. : Ins. Nossi Be, S. Maria de Madagasc.

loxense (Hook.) Jaeg. *Ad. II*, p. 456.

Hypnum loxense Hook. in *Kunth Syn. pl. aequinoct. I*, p. 62 ; *C. M. Syn. II*, p. 331.

H. Stereodon loxensis Brid. *Bryol. univ. II*, p. 590.

Sematophyllum loxense Mitt. *op. cit.* p. 479.

1. Ad arbor. et rup. irror. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv. ; Brasil. austr. or.

« *var. lithophilum* (Hsch.) Par.

H. lithophilum Hsch. *Fl. Bras. I*, p. 84.

H. loxense β *rivulare* C. M. *op. cit.* p. 332.

Rh. loxense β *rivulare* Jaeg. *Ad. II*, p. 456.

Secus rivul. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

var. rivulare Jaeg. — *Rh. loxense var. lithophilum.*

lucidum W. P. Sch. *hb.* ; Jaeg. *Ad. II*.

— *Afr.* : Ins. Franciae.

? *ludovicianum* Ren. et Card. *ined.*

— *Am. sept.* : Ludoviciana.

macrocytus (C. M.) Par.

Aptychus macrocytus C. M. in Hedwig. 1897, p. 120.

1. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

macrorhynchum (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 466.

Hypnum macrorhynchum Hsch. *op. cit.* p. 81 ; C. M. *Syn. II*, p. 329.

Sematophyllum macrorhynchum Mitt. *op. cit.* p. 487.

1 ? *Cortic.* — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

mahense Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 167.

— *Afr.* : Ins. Seychelles.

Mailusiae (C. M.) Par.

Hypnum Mailusiae C. M. in Ule *Bryoth. brasil. n.* 181.

— *Am. merid.* : Brasil. subtropic. or.

maritimum (Hook.) Jaeg. *Ad. II*, p. 454.

Hypnum maritimum C. M. *Syn. II*, p. 328.

Leskea maritima Hook. *M. ex. t.* 166 ; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 294.

1. *Terr. ?* — *Afr.* : C. B. Sp.

marylandicum Jaeg. — *Rh. demissum var. marylandicum.*

megasporum (Duby) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 166.

Hypnum megasporum Dy. in *Mém.... Genève*, 1876, p. 12, t. 1, f. 1.

2 (Duby), *syn.* (Besch.). *Lignic.* — *Afr.* : Madagascar sept., ins. Bourbon., Franciae.

meiotocladium Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 80.

— *Am. sept.* : Guadalup.

micans W. P. Sch. in Besch. *op. cit.* p. 75.

Ster. — *Am. sept.* : Guadalup.

micans Ren. et Card. — *Plagiothecium.*

var. submersum eor. — *Plagiothecium micans var. submersum.*

micrangium (C. M.) Par.

Aptychus micrangius C. M. in Hedwig. 1897, p. 122.

1. — *Am. merid.* : And. Argentin. subtropic.

microcarpoides (C. M.) Par.

Hypnum microcarpoides C. M. in Linn. 1878-79, p. 441.

1. *In silv.* — *Am. merid.* : Uruguay.

microcarpum (*Brid.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 462.

H. crassiusculum *H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed. n.* 107.

H. microcarpum *C. M. Syn. II*, p. 326; *Sull. M. of U. St. p. 71 et Ic. M.* p. 175, t. 110; *L. et J. Man.* p. 357.

H. minimum *P. B. Prodr.* p. 66.

Leskea adnata *Rich. in Mich. Fl. Am. bor. II*, p. 314.

L. caespitosa var. *adunca* *Hpe. in Linn.* 1839, p. 47.

L. microcarpa *Brid. Bryol. univ. II*, p. 289.

1. Cortic. — *Am. sept.*: Terr. nov. et Columb. brit. (? Cardot); ab Ohione usq. ad Floridam; Virgin. occ.

Exs.: *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.* 443 (*Hypnum*).

« var. *anisocarpum* *Sull.*; *Jaeg. op. et l. cc.*

H. admistum *Sull. M. Cub. Wright in Proced. of the Am. Acad...* 1861, p. 289.

H. microcarpon var. *ej.* *M. bor. am. II ed.*, p. 74.

Sematophyllum admistum *Mitt. M. austr. am.* p. 485.

Rupic. — *Am. sept.*: New Jersey, Cuba.

Exs.: *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.* 444 (*Hypnum*).

microcladum (*Tayl.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 476.

H. esmeraldicum *C. M. Syn. II*, p. 392.

H. microcladum *Tayl. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 64.

Sematophyllum microcladum *Mitt. op. cit.* p. 495.

Trichosteleum microcladum *Jaeg. Ad. II*, p. 487.

1. — *Am. merid.*: And. Quitens.

microdontum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 163.

Cortic. — *Afr.*: Ins. Nossi-Be.

micropyxidium (*C. M.*) *Par.*

Aptychus micropyxidius *C. M. in Malpighia*, 1896, p. 518.

— *Am. merid.*: Guian. brit.

micropyxis (*C. M.*) *Par.*

Hypnum micropyxis *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 440.

1. — *Am. merid.*: Argentin. Cordob.

microstegium *W. P. Sch.* — *Trichosteleum*.

Molkenboerianum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 467.

Hypnum Molkenboerianum *C. M. Syn. II*, pp. 317 et 685: *Bryol. jav. II*, p. 179.

Leskea falcata *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat.* 1844, IV, p. 310.

1 (*C. M.*) 2 (*Bryol. jav.*). In silv. — *As.*: Java, Borneo, ins. Ceram.

molle *W. P. Sch. hb.*

— *Am. sept.*: Guadalup.

monostictum (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 474.

Sematophyllum monostictum *T. et M. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 318.

1. — *As.*: Ceylan.

mundemonense (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum mundemonense *Hpe. Enum. M. Brasil.* p. 83.

1. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

nanocephalum (*C. M.*) *Par.*

Aptychus nanocephalus *C. M. in Hedwig.* 1897, p. 121.

1. Saxic. et terr. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.

" var. subglauculum (C. M.) Par.

Aptychus nanocephalus var. subglauculus C. M. l. c.

Ubi typ.

nanopyxis (C. M.) Par.

Hypnum nanopyxis C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 212.

1. — Afr. : Madagascar.

? nanothecium (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 750.

Hypnum nanothecium C. M. in *Rev. Bryol.* 1878, p. 59 (nom.).

— Afr. : Ins. Franciae.

nanum (C. M.) Par.

Hypnum nanum C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57.

Rh. aureolum ? Besch. in op. cit. 1885, p. 19 et in *Bal. Pl. Parag.* n. 3695 A.

— Am. merid. : Paraguay.

neckeraceum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 468.

Hypnum neckeraceum C. M. *Syn. II*, p. 318.

Neckera curvirostris Schwaegr. *Suppl. III, I, II*, t. 230.

Stereodon curvirostris Mitt. *M. Ind. or.* p. 97.

2. — As. : Nepal., Khasia.

nematocaulon (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 162.

Hypnum nematocaulon C. M. in *Linn.* 1876, p. 281.

Isopterygium nematocaulon Jaeg. *Ad. II*, p. 501.

— Afr. : Ins. Anjouan.

nigricaule (Brid.) Jaeg. *Ad. II*, p. 476.

Hypnum nigricaule Brid. *Sp. M.* p. 95 et *Bryol. univ. II*, p. 393 ; C. M. *Syn. II*, p. 286.

Ster. — Afr. : Sierra Leone.

noduliferum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 472.

Sematophyllum noduliferum Mitt. *M. austr. am.* p. 491.

— Am. merid. : Fuegia, ins. Eremitae.

Novae Cesareae Ren. et Card. — Hypnum micans.

oblique-rostratum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 472.

Sematophyllum oblique-rostratum Mitt. op. cit. p. 490.

— Am. merid. : And. Quitens.

Olfersii (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 469.

Hypnum Olfersii Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 83 ; C. M. *Syn. II*, p. 287.

Sematophyllum Olfersii Mitt. op. cit. p. 489.

1. — Am. merid. : Brasil.

orbatum Besch. mss.

Ad saxa rivul. — Am. merid. : Brasil. or.

ovale Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV Suppl.* p. 99 (nom.)
et in *Oefv....* 1890, p.

1. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

ovalifolium Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 159.

In silv. — Afr. : Ins. Nossi Be.

pallens W. P. Sch. hb. ; Jaeg. *Ad. II*.

— Afr. : Ins. Franciae.

papillosissimum (Hpe.) Par.

Hypnum papillosissimum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 79.

— Am. merid. : Brasil. austr. or.

? *Pechuelii* (C. M.) Par.

Hypnum Pechuelii C. M. in *Fl.* 1886, p. 523.

Ster. Ad arbor. — Afr. : Tropic. occid.

peralare Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 206.

1. — Afr. : Usambara.

percircinale (C. M.) Par.

Hypnum percircinale C. M. in *Rev. bryol.* 1887, p. 57 (nom.) et in *Bal. Pl. Parag.* n. 3693 p.p.

-- Am. merid. : Paraguay.

perlaxum (C. M.) Par.

Aptychus perlaxus C. M. in *Dusen M. Camer.* n. d p.p.

— Afr. : M. Cameroon.

perrevolutum Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 206.

1. Cortic. — Afr. : Reg. lacustr.

Pervilleanum (W. P. Sch.) Besch. mss.

Hypnum Pervilleanum W. P. Sch. in *hb. Mus. Paris*; C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 212.

Rhynchostegium Pervilleanum Jaeg. *Ad. II*, p. 442.

1. — Afr. : Madagascar.

phaeniceum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 749.

Hypnum phaeniceum C. M. in *Fl.* 1878, n. 6.

Syn. — As. : Ins. Andaman.

piliferum W. P. Sch. *hb.*; Jaeg. *Ad. II*.

— Afr. : Ins. Borbon.

plectophyllum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 75.

— Am. sept. : Guadalup.

plumularium (Mitt.) Par.

Sematophyllum plumularium Mitt. in *Melliss's S. Helena*, 1875, p. 364.

1. Cortic. — Afr. : Ins. S. Helena.

polycarpum W. P. Sch. *hb.*; Jaeg. *Ad. II*.

— Afr. : Ins. Franciaë.

prominulum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 472.

Sematophyllum prominulum Mitt. *M. austr. am.* p. 491.

— Am. merid. : And. Peruv.

propinquum (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, 473.

Hypnum curvulum Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 18 et in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 23, f. 7; C. M. *Syn. II*, p. 310 (fid. Mitt. l. c.).

H. propinquum Harv. *ll. cc.* p. 19 et t. 24; C. M. l. c. p. 309.

Rh. curvulum Jaeg. l. c.

Stereodon propinquus Mitt. *M. Ind. or.* p. 96.

1. — As. : Nepal., Assam super.

protensum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1899, I, p. 183 et *M. Masc. Mad.* n. 92.

2. Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

pseudo-amœnum Besch. — *Trichosteleum*.

pseudo-brachythecium (C. M.) Par.

Heterophyllum pseudo-brachythecium C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 28.

— Afr. : M. Cameroon.

pseudo-callidioides *Broth. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

pseudo-callidum *Jaeg.* — *Rh. xylophilum*.

pseudo-cyparissoides *Broth. mss.*

— *Am. sept.* : Guatemala.

pterocladium *Besch.* — *Trichosteleum*.

pulvinale (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 775.

Hypnum pulvinale Hpe. Symb. 1877, p. 735 (*in Enum.* p. 82 : *H. pulvinatum*).

1. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

punctulatum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum punctulatum C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 213.

— *Afr.* : Madagascar.

pylasiadelphum *Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 90.

1. Cortic. — *As.* : Yunnan.

ramulinum (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 473.

Sematophyllum ramulinum T. et M. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 319.

2. — *As.* : Ceylan.

recurvans (*Schwaegr.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 466.

Hypnum amœnum Hook. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 196.

H. cupressetorum Brid. Bryol. univ. II, p. 409.

H. demissum Mac. Canad. M. n. 443.

H. recurvans Schwaegr. Suppl. II, II, p. 289, t. 146 ; *C. M. Syn. II*, p. 307.

H. recurvans var. Sull. M. Allegh. n. 18.

H. Stereodon recurvans Brid. Bryol. univ. II, p. 614.

Leskea arcuata ej. Sp. M. II, p. 54.

L. recurvans Mich. Fl. Am. bor. II, p. 311.

L. squarrosa ej. op. cit. p. 312.

Rhynchostegium recurvans Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 107.

2. Cortic. et lignic. — *Am. sept.* : Terr. nov., Miquel., New Brunswick, Gaspes., Ottawa, Ontario, reg. sept., austr. et or.

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 299 (*Hypnum*).

replicatum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 158.

— *Afr.* : Ins. Bourbon.

resupinatum *W. P. Sch. hb.* ; *Jaeg. Ad. II*.

— *Afr.* : Ins. Franciae.

rhapidorhynchum *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 370.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Richardi Jaeg. — *Rh. subsimplex*.

rigidicaule (*C. M.*) *Par.*

Heterophyllum rigidicaule C. M. in Dusen M. Camer. n. 794.

— *Afr.* : M. Cameroon.

rivuletorum (*C. M.*) *Par.*

Aptychus rivuletorum C. M. in Dusen M. Camer. n. 210.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Rodriguezi Par.

Sematophyllum incurvum Mitt. in Philos. Trans. of the roy. Soc. 1879 (*extr. vol.*), p. 393, t. 38 A.

1. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

- Roëllii *Ren. et Card. in Bot. Centralbl.* 1890, n. 51.
 1. Lignic. in silv. — *Am. sept.* : Columb. brit., Washington.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 444.
- roridum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 466.
Sematophyllum roridum *Mitt. M. austr. am.* p. 487.
 Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- rubricaula *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 161.
 Cortic. — *Afr.* : Ins. Nossi Be.
- ruficaule (*Thw. et Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 474.
Sematophyllum ruficaule *T. et M. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 319.
 2. — *As.* : Ceylan.
- rufo-viride *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 157.
 — *Afr.* : Ins. Seychell., Nossi Comba.
- rufulum *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 80.
 — *Am. sept.* : Guadalup.
- salaense (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 473.
Hypnum salaense *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 287.
 2. — *As.* : Borneo.
- sanguisetum (*C. M.*) *Par.*
Cupressina sanguiseta *C. M. in Fl.* 1897, p. 340.
 — *Am. merid.* : Venezuela.
- saproxylophilum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 463.
Hypnum microcarpum? *Duby in Moritzi Syst. Verz. d. Zoll. Pfl.* p. 131.
H. saproxylophilum *C. M. Syn. II*, p. 334; *Bryol. jav. II*, p. 216, t. 317.
 1 (*Bryol. jav.*) 2 (*C. M.*). — *As.* : Java.
- Sauloma (*C. M.*) *Par.*
Aptychus Sauloma *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 27.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- Schlimii (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 472.
Hypnum Schlimii *C. M. in Bot. Zeit.* 1848, p. 781 et *Syn. II*, p. 310.
Sematophyllum Schlimii *Mitt. M. austr. am.* p. 491.
 Lignic. — *Am. merid.* : Venezuela.
- Schwaneckeanum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 471.
Hypnum Schwaneckeanum *C. M. in Bot. Zeit.* 1858, p. 172.
Sematophyllum Schwaneckeanum *Mitt. op. cit.* p. 490.
 — *Am. sept.* : Cuba.
- Scorpiurus (*Mont.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 468.
Hypnum Scorpiurus *Mont. in Ann. sc. nat.* 1845, IV, p. 90 et *Syll.* p. 8;
C. M. Syn. II, p. 314.
Sematophyllum Scorpiurus *Mitt. M. austr. am.* p. 488.
 Lignic. — *Am. merid.* : Chile, Valdiv.
- secundifolium (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 458.
Hypnum lithophilum *H. f. et W. Fl. Antarct. II*, p. 420, t. 155, f. 4.
H. secundifolium *C. M. Syn. II*, p. 343.
Sematophyllum secundifolium *Mitt. op. cit.* p. 481.
 Ster. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremit.
- semi-tortulum (*C. M.*) *Par.*
Aptychus semi-tortulus *C. M. in Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 213.
 1. — *Am. sept.* : Guatemala.

- sentosum* Besch. — *Trichosteleum*.
- sericifolium* (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 460.
Hypnum Beyrichii Wright M. *Cubens. n.* 111.
Sematophyllum *sericifolium* Mitt. *op. cit.* p. 483.
 Lignic. — *Am. sept.* : Cuba.
- serifolium* (C. M.) Par.
Aptychus *serifolius* C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 123.
 l. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. Urug.
- sinuosulum* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 161.
 Saxic. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- sphaerotheca* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 458.
Acirhynchum *cupressinum* Hpe. in *sched.*
Hypnum *lithophilum* Hsch. in *Mundt et Maire M. Capens.*
H. sphaerotheca C. M. *Syn. II*, p. 333.
Rhynchostegium *inclinatum* W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*
 l. — *Afr.* : C. B. Sp.
Exs. : Rehm. M. *Afr. austr. n.* 421.
 « *var. procerum* C. M. in *Rehm. l. c. n.* 422.
 — *Afr.* : Natal.
- splendidulum* (Hpe.) Par.
Leskea *splendidula* Hpe. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 85 (*nom.*).
 — *Pac.* : Absque loco.
- stenopyxidium* (C. M.) Par.
Hypnum *stenopyxidium* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 439.
 l. In silv. — *Am. merid.* : Uruguay.
- sticticum* (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 465.
Hypnum *sticticum* C. M. in *Linn.* 1874, p. 616.
 l. Ad *Lichenes*. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- strangulatum* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 474.
Hypnum *strangulatum* Hpe. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 169.
 l. — *Afr.* : C. B. Sp.
 « *var. prostrata* (Hpe.) Jaeg. *l. c.*
Hypnum *strangulatum var. prostratum* Hpe. *l. c.*
 Ut et ubi typ.
- strictum* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 163.
 — *Afr.* : Ins. Seychell.
- subadnatum* C. M. et Kindb. in *Bidrag* p. 454 (*nom.*) et in *Mac. Cat.* p. 209.
 l ? Cortic. — *Am. sept.* : Gaspes., Ontar.
- subbrachycarpum* (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 462.
Hypnum *subbrachycarpum* Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, p. 327.
Sematophyllum *subbrachycarpum* Mitt. *op. cit.* p. 484.
 l. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- subcircinale* (Ltz.) Jaeg. *Ad. II*, p. 465.
Hypnum *subcircinale* Ltz. *Moosst.* p. 167.
 l. — *Am. sept.* : Jamaic.

subcurvulum (C. M.) Par.

Aptychus subcurvulus C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 762.

— *Afr.* : M. Cameroon.

subdemissum *Kindb. in Mac. Cat.* p. 208.

1. *Rupic.* — *Am. sept.* : Alaska.

subdemissum W. P. Sch. — *Trichosteleum*.

subdepressum (*Hpe.*) Par.

Isopterygium subdepressum Jaeg. *Ad. II*, p. 776.

Rhyncho-Hypnum subdepressum Hpe. *Symb.* 1877, p. 734.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subfulvum *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* 1895, n. 3.

1. *Terr. secus fluv.* — *Am. merid.* : Brasil. or.

subhumile (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 433.

Hypnum subhumile C. M. *Syn. II*, p. 330.

Stereodon subhumilis Mitt. *M. Ind. or.* p. 102.

1. — *As.* : M. Neilgherr.

subnervatum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 461.

Sematophyllum subnervatum Mitt. *M. austr. am.* p. 483.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

subscabrisetulum Besch. — *Trichosteleum*.

subscabrum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 465.

Cupressima subscabra C. M. in *Fl.* 1897, p. 341.

Hypnum subscabrum C. M. *Syn. II*, p. 314.

Sematophyllum subscabrum Mitt. *op. cit.* p. 486.

1. *Arbor.* — *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat.

subsecundum (*Hpe.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 463.

Rhyncho-Hypnum subsecundum Hpe. *Symb.* 1870, p. 285.

1. *Lignic.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subsimplex (*Hedw.*) Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 30.

Hypnum brachypoma Schwaegr. in Weig. *M. Surinam.*

H. Richardi ej. *Suppl. I, II*, p. 205, t. 93 (*forma minor* sec. Mitt.); C. M. *Syn. II*, p. 285.

H. subsimplex Hedw. *Sp. M.* p. 270, t. 69; C. M. *Syn. II*, p. 283.

Isothecium Richardi Brid. *Bryol. univ. II*, p. 358.

1. *subsimplex* ej. *l. c.* p. 357.

Plagiothecium subsimplex Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 107.

Rh. Richardi Jaeg. *Ad. II*, p. 475.

Sematophyllum subsimplex Mitt. *op. cit.* p. 494.

1. *Lignic.* — *Am. sept.* : Mexic., Guadalup., Martinic., Barbado., etc.
Am. merid. : Ins. Trinitat., Nov. Granat., Guian., Amazon., And.
 Quitens. et Peruv., Brasil. austr. or.; terr. Magellan?

subspaerocarpum (*Hpe.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 460.

Hypnum subspaerocarpum Hpe. *Symb.* 1876, p. 523.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

substrumiferum (*Hpe.*) Jaeg. *Ad. II*, p. 457.

Rhyncho-Hypnum substrumiferum Hpe. *Symb.* 1870, p. 286.

1. *Cortic.* — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

- subulatulum *Besch. in Marie M. Mayotte n. 157.*
— *Afr. : Ins. Mayotte.*
- succedaneum (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II, p. 461.*
Hypnum succedaneum H. f. et W. Fl. Antarct. II, p. 420 ; C. M. Syn. II, p. 341.
Sematophyllum succedaneum Mitt. op. cit. p. 484.
Ster. — Am. merid. : Brasil.
- tegeticula *Bosw. in Journ. of bot. 1892, p. 98.*
l. — Pac. : Nov. Caledon.
- temperatum (*C. M.*) *Par.*
Aptychus temperatus C. M. in Hedwig. 1897, p. 123.
l. — Am. merid. : La Plata.
- tenerifolium (*C. M.*) *Par.*
Aptychus tenerifolius C. M. in Hedwig. 1897, p. 121.
l. — Am. merid. : Argentin subtropic. Tucuman.
- tenuirostre (*Hook.*) *Jaeg. Ad. II, p. 469.*
Hypnum tenuirostre Hook. M. ex. t. 111 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 616 ; C. M. Syn. II, p. 343 ; H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 113 et Fl. Tasm. II, p. 213.
Rhaphidorrhynchum tenuirostre Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 85.
l. — Pac. : Nov. Zeland. med., Tasman.
- tequendamense (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 472.*
Hypnum crithmifolium Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p. 326.
H. tequendamense ej. in Linn. 1861-62, p. 529.
Rh. crinitifolium Jaeg. Ad. II, p. 461.
Sematophyllum crinitifolium Mitt. op. cit. p. 484.
S. tequendamense ej. op. cit. p. 491.
l. Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.
- thelidictyon (*Sull. et Lesq.*) *Par.*
Hypnum thelidictyon S. et L. in Proceed. of the Am. Acad... 1859, p. 280.
Rhaphidorrhynchum thelidictyon Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 175.
Trichosteleum thelidictyon Jaeg. Ad. II, p. 483.
l. Rupic. — As. : Japon., Hong-Kong.
- trachœlocarpa (*Ångstr.*) *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc. p. 50.*
Hypnum trachœlocarpa Ångstr. in Oefv... 1873, n. 5.
Trichosteleum trachœlocarpa Jaeg. Ad. II, p. 479.
l. — Pac. : Taïti.
- trachypyxis (*C. M.*) *Par.*
Hypnum trachypyxis C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 213.
l. — Afr. : Madagascar.
- trichostegum (*C. M.*) *Par.*
Hypnum trichostegum C. M. in Linn. 1878-79, p. 499.
l. — Am. merid. : Venezuela.
- tristiculum (*Mitt.*) *Jaeg. II, p. 458.*
Stereodon tristiculus Mitt. M. Ind. or. p. 102.
l. — As. : Khasia, Assam super., Ceylan.
- tuliferum *Jaeg. — Rhynchostegium.*

Warmingii (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 466.

Rhyncho-Hypnum Warmingii *Hpe. Symb.* 1870, p. 292.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Welwitschii *W. P. Sch. herb.*

Isothecium crassiusculum *Mont. in Bourg. Pl. Canar.* n. 617.

Hypnum arrectum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* IX?

H. subtrumulosum *Hpe. mss.* ; *C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 12.

Rh. auricomum *Jaeg. Ad. II*, p. 467.

Rh. demissum *Lange in Bot. Tidskrift*, 1868, p. 251.

Rhynchostegium Welwitschii *W. P. Sch. in litt.* 1846 et *Syn. II ed.* p. 679.

Sematophyllum auricomum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 5 c.
ic. in t. II.

1. Cortic. — *Eur.* : Ins. Elba, Lusitan. merid. *Afr.* : Alger. (Kabyl. min.), Madeir., Teneriff.

xylophilum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 470.

Hypnum callidum *Sull. in Proced. of the Am. Acad....* 1861, p. 288 et in
Wright M. Cubens. n. 115.

H. pseudo-callidum *C. M. in sched.*

Rh. pseudo-callidum *Jaeg. l. c.*

Sematophyllum xylophyllum *Mitt. M. austr. am.* p. 499.

— *Am. sept.* : Cuba (1).

Insert on p. 1067 { **REMYELLA** *C. M. in Fl.* 1896, p. 477 (1 spec.).

hawaica *C. M. in op. et l. c. c.*

Ad ramul. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

RHEGMATODON *Brid. Bryol. univ.* II, p. 204 (21 spec.).

acidodon (*Mont.*) *Par.*

Leskea acidodon *Mont. in Ann. sc. nat.* 1845, p. 96, t. 5, f. 4 et *Syll.* p. 19.

Macrohymenium acidodon *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 150.

M. rufum *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 825, p. p.

Rh. rufus *ej. Syn. II*, p. 30, p. p.

— *Afr.* : Madagasc., ins. Seychell., Borbon.

“ *var. acutissima* (*Besch.*) *Par.*

Macrohymenium acidodon var. acutissima *Besch. op. cit.* p. 151.

Rh. madagassus *Geh. Reliq. Rutenb. in Abhandl. v. Naturw. Ver. zu*
Brem. 1882, p. 211.

— *Afr.* : Madagascar, ins. Seychell.

brasiliensis *Lindb. mss.* ; *C. M. in Bot. Zeit.* 1862, p. 374.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

cuspidatus (*Mitt.*) *Par.*

Macrohymenium cuspidatum *Mitt. in litt. ad Kiaër in Christ. Vid. Forh.*
1882, p. 45.

— *As.* : Khasia.

declinatus (*Hook.*) *Brid. Bryol. univ.* II, p. 204 ; *C. M. Syn. II*, p. 30 ;
Mitt. M. Ind. or. p. 127.

Pterogonium declinatum *Hook. in Trans. of the Linn. Soc.* IX, t. 26, f. 3.

1. Ad arbor. — *As.* : Nepal., Khasia.

(1) In *Enum. Kindb. nom. nud.* :

Rh. Acicula *C. M.*
angustum *C. M.*

Rh. gastrophylum *C. M.*
virescentifolium *C. M.*

densus W. P. Sch. *hb.*; *Kiaër in op. cit.* p. 37.

Rh. orizabanus Jaeg. *Ad. II*, p. 741.

Ad arbor. — *Am. sept.* : Mexic.

Feanus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601 (*nom.*).

— *As.* : Birman, super.

filiformis W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 87.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

? *fusco-luteus* W. P. Sch. in *op. cit.* p. 88.

— *Am. sept.* : Mexic.

gracillimus (C. M.) Par.

Macrohymenium gracillimum C. M. in *litt. ad Kiaër, in op. cit.* p. 19.

— *Pac.* : Taïti.

hypnoides W. P. Sch. in *op. cit.* p. 88.

Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

laevis (Thw. et Mitt.) Par.

Macrohymenium laeve T. et M. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 317.

1. — *As.* : Ceylan.

madagassus Geh. — *Rh. acidodon* var. *acutissima*.

minutus (Mitt.) Par.

Hypnum minutum Mitt. *M. austr. am.* p. 549.

1? — *Am. merid.* : And. occid.

Mülleri (Dz. et Mk.) C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 21.

Macrohymenium Mülleri Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 168-169 et *Bryol. jav. II*, p. 114.

1. — *As.* : Sumatra, Java, Borneo.

Nietneri C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 20.

Macrohymenium Nietneri Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1873, p. 318.

1. — *As.* : Ceylan.

orizabanus Jaeg. — *Rh. densus*.

orthostegius Mont. in *Ann. sc. nat.* 1842, p. 248 ; et *Syll.* p. 13 ; C. M. *Syn. II*, p. 29 ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 127.

? *Anhymenium polysetum* Griff. *Not.* p. 472 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 97, f. 2.

1. Cortic. — *As.* : Assam, M. Neilgherr., Ceylan.

palustris Broth. — *Rh. schlotheimioides*.

polycarpus (Griff.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 127.

Anhymenium polycarpum Griff. *Not.* p. 471 et *Ic. pl. asiat. II*, t. 97, f. 1.

— *As.* : Sikkim, Khasia, Assam.

rufus (Reinw. et Hsch.) C. M. *Syn. II*, p. 30 p.p.

Leskea mitrata Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat. III ser., II*, 1844, p. 311.

? *L. rufa* R. et H. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV*, p. 2, *Suppl.* 1826, pp. 716-717.

Macrohymenium rufus C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 825 p.p. ; *Bryol. jav. II*, p. 112.

1. — *As.* : Sumatra, Java.

rufus C. M. p.p. — *Rh. acidodon*.

schlotheimioides Spr. in Mitt. *M. austr. am.* p. 566.

Rh. palustris Broth. in sched.

1. Cortic. et ad rad. arb. — *Am. merid.* : And. Quitens., Brasil. or.

« *var. minor* Broth. in *Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* 1895, n. 3.
— *Am. merid.* : Brasil.

secundus Kiaër in *Christ. Vid. Forh.* 1882, n. 24, p. 28, t. 11, f. 5, 7 et
t. III, f. 1-5.

1. — *Afr.* : Madagascar.

serrulatus (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. II*, pp. 111-112.

Macrohymenium serrulatum Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.*
pp. 170-171, t. 56.

1. — *As.* : Ceylan, Java.

strictus C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 21.

Macrohymenium strictum *Bryol. jav. II*, p. 114.

1. — *As.* : Borneo.

RHIZOGONIUM Brid. *Bryol. univ. II*, p. 664 (41 spec.).

acanthoneuron C. M. — Rh. *Menziesii*.

aeruginosum H. f. et W. — *Hymenodon*.

aristatum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 314.

— *Pac.* : Tasman.

bifarium (Hook.) W. P. Sch. in *Bot. Zeit.* 1844, p. 125; *Handb. of N.*
Zeal. Fl. p. 485.

Hypnum bifarium Hook. *M. ex. t.* 57.

Isothecium bifarium Brid. *Bryol. univ. II*, p. 356.

Mnium bifarium C. M. *Syn. I*, p. 172 et *II*, p. 554.

2. Ad rup. et terr. — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland. sept. et med., ins.
Auckland et Chatham, Tasman.

brevifolium Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV Suppl.* p. 97
(*nom.*) et in *Oefv...* 1890.

2. Lignic. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

distichum (Sw.) Brid. *Bryol. univ. II*, p. 665.

Hypnum distichum Sw. in *Schrad. Journ. IV*, p. 179, t. 3, f. A (*excl.*
syn. Brid.).

Mnium distichum C. M. *Syn. I*, p. 173.

2. Ad rup. aquat. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland. sept. et med.,
Tasman.

distichum C. M. — Rh. *Mülleri*.

Dozyanum Sande Lac. in *Miq. Ann. Mus. bot. Lugd. Batav. II*, p. 295.

2. — *As.* : Japon.

Exs. : Savatier Pl. Japon. n. 479.

flagellare (Sull. et Lesq.) Par.

Mnium flagellare S. et L. in *Proced. of the Am. Acad...* 1859, p. 277.

Trachycistis flagellaris Lindb. in *Act. Soc. Fenn.* 1872, p. 241.

2. Rupic. — *As.* : Amour, Saghalien, Japon.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 829.

Geheebi C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (*nom.*).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).

gracillimum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 314.

Ster. — *Pac.* : Austral. or.

Graeffeanum (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 682.

Mnium Graeffeanum C. M. *M. Polyn.* p. 61.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

Helmsii (C. M.) Par.

Mnium Helmsii C. M. mss.

— Pac. : Nov. Zeland.

Hookeri (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 685.

Hypnum spiniforme H. f. et W. in sched. antarct.

Mnium Hookeri C. M. Syn. II, p. 555.

Rh. spiniforme β H. f. et W. Fl. antarct. I, p. 137.

Rupic. — Pac. : Nov. Zeland. med., ins. Auckland, Campbell, Austral. or. (Victoria), Tasman.

latifolium Bryol. jav. II, p. 2, t. 133.

2. Ad arbor. et terr. — As. : Ins. Banca, Borneo.

latifolium Ångstr. — Rh. spiniforme (fid. C. M.).

Lindigii (Hpe.) Mitt. M. austr. am. p. 328.

Mnium Lindigii Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 345.

Lignic. — Am. sept. : And. Costa Ric. Am. merid. : And. Nov. Granat.

longicollum (C. M.) Par.

Mnium longicollum C. M. mss.

— Am. merid. : Valdivia.

longiflorum (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 685.

Pyrrhobryum longiflorum Mitt. Sam. M. p. 174.

2 ? Lignic. — As. : Ins. Labuan.

mauritianum Hpe. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 101.

— Afr. : Ins. Bourbon., Franciae.

medium Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 217.

— Pac. : Nov. Caledon.

Menziesii (Hook.) Jaeg. Ad. I, p. 686.

Bryum Menziesii Hook. Bot. Misc. I, 1880, p. 36, t. 19.

Hypnum acanthoneuron Schwaegr. Suppl. III, II, I, t. 258 b.

Leucolepis acanthoneura Lindb.

Mnium Menziesii C. M. Syn. I, p. 177; Lesq. et Jam. Man. p. 249.

Rh. acanthoneuron C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 803.

2. — Am. sept. : Alaska, Columb. brit., Sitka, Vancouver, Idaho.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 202 (Mnium).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 306 (Mnium).

microphyllum (Dz. et Mh.) Jaeg. Ad. I, p. 686.

Mnium crispatum W. P. Sch. in Savatier M. Jap. n. 476.

Mnium microphyllum Dz. et Mh. M. frond. ined. Arch. ind. p. 26, t. 12 ;

C. M. Syn. I, p. 176.

Mn. radiatum Wils. in Lond. Journ. of bot. VII, p. 274, t. 10 A ; C. M.

l. c. II, p. 556.

Rh. radiatum Jaeg. l. c.

Trachycystis microphylla Lindb. Obs. de Mn. europ. p. 80.

2. Rupic. — As. : China, Japon.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 1827.

mnioides (Hook.) W. P. Sch. in Bot. Zeit. 1844, p. 125.

Aulacomnium chilense C. M. in Bot. Zeit. 1843, p. 649, t. 3.

Hypnum mnioides Hook. M. ex. t. 77.

H. subbasilare Schwaegr. Suppl. t. 256.

H. Stereodon mnioides Brid. Bryol. univ. II, p. 559.

Mnium polycarpum C. M. *Syn. I*, p. 176.

Rh. *polycarpum* ej. in *Forschungsreise... Bot.* p. 37.

2. Lignic. et rupic. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat. et Chilens., Patagon. austr., terr. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae. — *Pac.*: Austral. ? Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.

« *var. contortum* Hook. f. et Wils. *Fl. Tasm.* p. 215.

Rh. Hookeri

Rh. *Mossmannianum* { C. M. (fid. Mitt. ibidem).

Ut et ubi typ. in *Pac.*

« *var. lutescens* H. f. et W. op. et l. cc.

Ut et ubi typ. in *Pac.*

Mossmannianum C. M. in *Bot. Zeit.* 1851, p. 547.

Rh. Hookeri C. M. (fid. Mitt.).

Rh. *mnoides var. contortum* (fid. Hook. f. *Handb.* p. 485).

2. Lignic. — *Pac.*: Austral., Tasman.

Mülleri Hpe. in *Linn.* 1846, p. 211.

Rh. *distichum* C. M. (fid. *Handb.* p. 484).

— *Pac.*: Austral. fel.

nanum C. M. in *Fl.* 1896, p. 438.

Ster. — *Am. merid.*: Guian. brit.

Novae Caledoniae Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 217.

Terr. — *Pac.*: Nov. Guin. merid. (*var.*), Nov. Caledon.

« *var. minus* Besch. l. c.

Lignic. — *Pac.*: Nov. Caledon.

Novae Hollandiae Brid. *Bryol. univ. II*, p. 664, t. suppl. II, f. 1, 2 et 3 ad sinistr.

Fissidens Novae Hollandiae ej. M. *Rec. II*, I, p. 143, t. 6, f. 11.

Hypnum fissidentoides ej. *Sp. M. II*, p. 89.

Leskea Novae Hollandiae Schwaegr. *Suppl. I*, II, t. 83.

Mnium Novae Hollandiae C. M. *Syn. I*, p. 173 et II, p. 554.

Rhizopelma Novae Hollandiae ej. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 803.

Skitophyllum Novae Hollandiae la Pyl. in Desv. *Journ. bot.* 1813, V, p. 59, t. 36, f. 17.

2. Lignic. — *Pac.*: Austral. or., Nov. Zeland. sept. et med., ins. Auckland, Tasman.

paramattense (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 684.

Mnium paramattense C. M. *Syn. II*, p. 555.

2. Ster. — *Pac.*: Austral. or.

pellucidum (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 683.

Photinophyllum pellucidum Mitt. *Sam. M.* p. 175.

Rh. *reticulatum* Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 636.

1. — *Pac.*: Austral., Nov. Zeland., Tasman.

pennatum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 116, t. 92, f. 2 et *Handb.* p. 484.

2. Ad arbor. — *Pac.*: Nov. Zeland. med.

Pervilleanum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 101.

— *Afr.*: Madagasc. sept.

piliferum H. f. et W. — *Hymenodon*.

polycarpum C. M. — Rh. *mnoides*.

pungens Sull. in *Proced. of the Am. Acad...* III, p. 28, t. 26.
2. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

pusillum C. M. mss.

— *Pac.* : Nov. Guin. brit. (M. Yule).

radiatum Jaeg. — Rh. *microphyllum*.

remotifolium C. M. mss.

Ster.

— *Pac.* : Nov. Guin. brit. (M. Yule).

reticulatum (Hook. f. et Wils.) Mitt. *M. austr. am.* p. 327.

Goniobryum reticulatum Lindb. *Obs. de Mn. europ.* p. 83.

Hypnum reticulatum H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 553 ;

H. et T. Fl. Antarct. II, t. 154, f. 5 ; C. M. *Syn.* I, p. 174 et II, p. 554.

— *Am. merid.* : Patagon. austr., terr. Magellan.,

Fuegia, ins. Eremitae.

reticulatum Hpe. — Rh. *pellucidum*.

setosum Mitt. *Fl. Vit.* p. 384.

Mnium setosum C. M. *M. Polyn.* p. 61.

Pyrrhobryum setosum Mitt. *Sam. M.* p. 174.

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa, Taïti, Nov. Hebrid. (Aneitum).

spiniforme (L.) Br. in *Fl.* 1846, p. 134.

Hypnum erectum, non ramosum, spinarum halecum aemulum Dill. *Hist.*
M. p. 332, t. 43, f. 8. 68

H. spiniforme L. *Sp. pl.* p. 1587.

H. Stereodon spiniformis Brid. *Bryol. univ.* II, p. 557.

Mnium spiniforme C. M. *Syn.* I, p. 175.

Pyrrhobryum spiniforme Mitt. *Sam. M.* p. 174.

Rh. latifolium Ångstr. in *Vet. Akad. Föerh.* 1872, n. 4, p. 18.

Syn. Cortic., lignic. et saxic. — *As.* : Nepal., Sikkim, Assam, penins. Malay., Japon., ins. Philippin., Celebes, Borneo, Java, Sumatra, Ceylan. *Afr.* : M. Cameroon, Kilima N'Djaro, Usambara, ins. Fernando Po, C. B. Sp., Madagasc., ins. Franciae. *Am. sept.* : Ludovic., Alabama, Florid., Mexic., Antill. *Am. merid.* : Tropic. et subtropic. *Pac.* : Ins. Sandwic., Taïti, Nov. Guinea, Nov. Caled., Nov. Zeland sept., Austral. fel., ins. Kermadec, Tasman.

Exs. : Dusen M. Camer. n. 483.

Rehm. *M. Afr. austr.* n. 262.

« *var. acunhense* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 100.

— *Afr.* : Ins. Tristan d'Acunha ? vel Franciae ?

« *var. brevifolium* Besch. *op. et l. cc.*

— *Afr.* : Ins. Borbon.

« *var. comorense* C. M. in *Linn.* 1876, p. 245.

Cortic. — *Afr.* : Ins. Anjouan.

« *var. elatum* *Bryol. jav.*

— *As.* : Java, Sumbawa.

« *var. pumilum* C. M. in *Fl.* 1896, p. 438.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

var. β H. f. et W. — Rh. *Hookeri*.

strictum C. M. in Ångstr. *Prim. lin.* p. 51.

Cryptopodium bartramoides Ångstr. in *Oefv...* 1872, n. 4, p. 51.

♂ et fr. ign.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

subbasilare (*Hook.*) *W. P. Sch. in Bot. Zeit.* 1844, p. 125.

Goniobryum subbasilare Lindb. in Oefv... 1864, p. 607.

Hypnum mnioides Schwaegr. Suppl. III, II, I, n. 257 a.

H. subbasilare Hook. M. ex. t. 10.

H. Stereodon subbasilaris Brid. Bryol. univ. II, p. 559.

Mnium subbasilare C. M. Syn. I, p. 174 et II, p. 555.

Trachyloma subbasilare Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 86.

1. Lignic. et terr. — *Am. merid* : Archip. Magellan., Fuegia, ins. Eremitae. *Pac.* : Ins. Samoa (1), Nov. Zeland. med., Tasman.

taxiforme *Hpe. in Linn.* 1876, p. 312.

Ster. — *Pac.* : Austral. or.

undulatum (*Lindb.*) *Par.*

Mesochaete undulata Lindb. in Oefv..., 1869, p. 70.

2. — *Pac.* : Austral. or.

venustum *Mitt. in Lond. Journ. of bot. VIII, p. 231, t. 12, f. B.*

?

Vallis-Gratiae (*Hpe.*) *Par.*

Mnium Vallis-Gratiae Hpe. in Bot. Zeit. 1859, p. 205.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr. n. 263 b.*

RHIZO-HYPNUM *Hpe. Symb. p. 733 et Enum. M. Brasil, p. 71.*

tamarisciforme Hpe. — *Microthamnium.*

versipoma Hpe. — *Microthamnium.*

RHIZOPELMA *C. M. in Bot. Zeit.* 1847, p. 803.

Novae Hollandiae C. M. — *Rhizogonium.*

RHODOBRYUM *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 381 (subgen. BRYI, gen. propr. in herb.) (95 spec.).*

alto-limbato *Hpe. in Linn.* 1869-70, p. 517.

Bryum alto-limbato Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 73.

2. — *Pac.* : Austral. occid.

alto-pedunculatum (*C. M.*) *Par.*

Bryum alto-pedunculatum C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 26.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

alto-roseum (*C. M.*) *Par.*

Bryum alto-roseum C. M. in Dusen M. Camer. n. 784.

— *Afr.* : M. Cameroon.

andicola (*Kunth.*) *Par.*

Bryum andicola Kth. Syn. pl. Aequinoct. I, p. 58; Brid. Bryol. univ. I, p. 667; C. M. Syn. I, p. 256.

Br. Lechleri C. M. (fid. Mitt.).

2. — *Am. sept.* : Mexic. *Am. merid.* : And. Quitens. et Chilens.

andino-roseum (C. M.) Par.

Bryum andino-roseum C. M. in Fl. 1897, p. 330.

2. — Am. merid. : And. Venezuel.

Antillarum W. P. Sch. hb.

Bryum Antillarum W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 32.

Br. Polla rosea var. domingensis Brid. Bryol. univ. I, p. 698.

Br. domingense Steud. Nom. crypt. p. 87.

Mnium domingense Brid. Mant. M. p. 119.

Mn. grandifolium Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 336 p.p.

2. — Am. sept. : Guadalup.

argutidens (Rehm.) Par.

Bryum argutidens Rehm. M. Afr. austr. n. 556 et b.

Ster. — Afr. : Transvaal.

Beyrichianum (Hsch.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 464 (nom.).

Bryum Beyrichianum C. M. Syn. I, p. 249 p.p.

Br. roseum W. Arn. in Act. Soc. Wern. V, p. 201.

Mnium Beyrichianum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 45.

2. Ad rup. umbros. — Am. merid. : Columb., And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv. ; Chile, Brasil. or.

breviramulosum Hpe. in Linn. 1876, p. 311.

Bryum breviramulosum Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 73.

— Pac. : Austral. or. (Victoria), Tasman.

campylothecium (Tayl.) Par.

Bryum campylothecium Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 52 ; C. M. Syn. I, p. 254.

Ad arbor. et rup. — Pac. : Austral. or., Nov. Zeland., ins. Campbell, Tasman.

caulifolium (C. M.) Par.

Bryum caulifolium C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 20.

— Am. merid. : And. Boliv.

chalarorhodon (C. M.) Par.

Bryum chalarorhodon C. M. in Dusen M. Camer. n. 207.

— Afr. : M. Cameroon.

coloratum (C. M.) Par.

Bryum coloratum . M. in Linn. 1878-79, p. 296.

— Am. merid. : And Boliv.

Commersoni (Schwaegr.) Par.

Bryum Commersoni Brid. Mant. M. p. 119 ; C. M. Syn. I, p. 249.

Br. Polla Commersoni Brid. Bryol. univ. I, p. 710.

Mnium Commersoni Schwaegr. Suppl. I, II, p. 134, t. 80.

2. — Afr. : Kilima N'Djaro, ins. Borbon., Franciae.

Pac. : Austral. or., ins. Lord Howe.

comatum (Besch.) Par.

Bryum comatum Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 55.

2. — Am. sept. : Mexic.

confluens (C. M.) Par.

Bryum confluens C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 179.

Ster. — Am. sept. : Guatemala.

crispatum *Hpe. in Linn.* 1876, p. 310.

Bryum crispatum *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria,* 1883, p. 73.

Syn. — *Pac.* : Austral or.

cygnopelma *C. M. in Bull. hb. Boissier,* 1897, p. 550.

2. — *Am. sept.* : M. Jamaic.

Decaisnei (*Dz. et Mk.*) *Par.*

Br. conicum *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat.* 1844, p. 300.

Br. Decaisnei eor. M. frond. ined. Arch. ind. p. 19, t. 9; *C. M. Syn. I,* p. 251; *Bryol. jav. I,* p. 149.

2. Lignic. — *As.* : M. Java.

Ehrenbergianum (*C. M.*) *Par.*

Bryum Ehrenbergianum C. M. Syn. I, p. 255.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

ellipticifolium *Brizzi in Ann. d. R. Istit. bot. di Roma,* 1893, V, fasc. 2.

In silv. — Afr. : Choa.

erythrocaulon (*Schwaegr.*) *Par.*

Bryum erythrocaulon Brid. Mant. M. p. 119; *C. M. Syn. I,* p. 262.

Br. Polla erythrocaulis Brid. Bryol. univ. I, p. 711.

Mnium erythrocaulon Schwaegr. Suppl. I, II, p. 127, t. 80.

Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae, Rodriguez; Usambara.

fluminale (*C. M.*) *Par.*

Bryum fluminale C. M. in Dusen M. Camer. n. 666.

— *Afr.* : M. Cameroon.

giganteum (*Hook.*) *W. P. Sch. Syn. II ed.,* p. 464 (nom.).

Bryum giganteum Hook. in Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 20, t. 158; *C. M. Syn. I,* p. 248.

Br. Polla rosea γ gigantea Brid. Bryol. univ. I, p. 854.

Br. Sollyanum Griff. Not. p. 446 et *Ic. pl. Asiat. t.* 91, f. I.

2. Ad terr. humid. — *As.* : Nepal., Sikkim, Khasia, Ceylan, Java, Borneo. *Afr.* : Ins. Borbon. *Pac.* : Ins. Hawai.

Glaziovianum *Hpe. Symb.* 1874, p. 496.

2. Ad terr. umbros. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

globicoma (*C. M.*) *Par.*

Bryum globicoma C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

globirhodon (*C. M.*) *Par.*

Bryum globirhodon C. M. in Dusen M. Camer. n. 235.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Goudotii (*Hpe.*) *Par.*

Bryum Goudotii Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 340.

2. — *Am. merid.* : Summ. And. Nov. Granat.

Graeffeanum (*C. M.*) *Par.*

Bryum Graeffeanum C. M. M. Polyn. p. 63.

2. Ad arbor. — *Pac.* : Ins. Fidji.

grandifolium (*Tayl.*) *W. P. Sch. Syn. II.* p. 464 (nom.).

Bryum grandifolium C. M. Syn. I, p. 250.

Mnium grandifolium Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 336.

2. — *Am. merid.* : Venezuela, And. Nov. Granat.,
Quitens. et Boliv.

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n 1666 bis.

Hieronymi (*C. M.*) *Par.*

Bryum Hieronymi C. M. in Linn. 1878-79, p. 285.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

horizontale *Hpe. Symb. 1874, p. 498.*

2. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

lato-cuspidatum (*C. M.*) *Par.*

Bryum lato-cuspidatum C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 180.

Ster. In silv. primaev. — *Am. sept.* : Guatemala.

« *var diaphanulum (C. M.) Par.*

Bryum lato-cuspidatum var. diaphanulum C. M. in op. et l. co.

— *Am. sept.* : Guatemala.

laxiroseum (*C. M.*) *Par.*

Bryum laxiroseum C. M. in Linn. 1876, p. 243.

Ster. Terr. in silv. — *Afr.* : Ins. Anjouan.

Lechleri (*C. M.*) *Par.*

Bryum Lechleri C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 416.

Br. truncorum *W. P. Sch. in Lechler Pl. Chil. n. 626 b.*

2. Ad arbor. — *Am. merid.* : Valdiv.

leptorhodon (*C. M.*) *Far.*

Bryum leptorhodon C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. p. 1896, p. 95.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

lepto-roseum (*C. M.*) *Par.*

Bryum lepto-roseum C. M. in Dusen M. Camer. n. 660.

— *Afr.* : M. Cameroon.

leptothecium (*Tayl.*) *Par.*

Bryum leptothecium Tayl. in Phytol. 1844, n. 41, p. 1094 ; C. M. Syn. I,

p. 254.

Br. truncorum *H. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 192 ; Fl. of the N. Zeal. II, p. 87 et Handb. p. 439.*

— *Pac.* : Ins. Societat., Austral. fel., Nov. Zeland.,
ins. Campbell et Norfolk, Tasman.

leptothrix (*C. M.*) *Par (1).*

Bryum integrifolium Rehm. M. Afr. austr. n. 226.

Br. leptothrix *C. M. l. c. n. 554 et in M. Mac-Orcanianis n. 20.*

— *Afr.* : Sierra Leone, Natal, Madagascar.

leucocanthum *Hpe. in Linn. 1874, p. 663.*

Bryum leucocanthum Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 73.

2. — *Pac.* : Ins. Lord Howe.

Liebmanni *W. P. Sch. hb.*

Bryum Liebmanni ej. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 56.

- 2? — *Am. sept.* : Mexic.

(1) Cl. Mitten in Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 307 conjungit. *Rh. leptothrix, giganteum et grandifolium* ut var. *Rh. rosei*.

- limbato-marginatum (C. M.) Par.
 Bryum limbato-marginatum C. M. in *Fl.* 1896, p. 440.
 Ster. — Pac.: Ins. Sandwic.
- Lindigianum (Hpe.) Par.
 Bryum Lindigianum Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 340.
 2. — Am. merid.: And. Nov. Granat.
- Lorentzianum (C. M.) Par.
 Bryum Lorentzianum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 286.
 2. — Am. merid.: Argentin. subtropic.
- macrorhodon (C. M.) Par.
 Bryum macrorhodon C. M. in *op. cit.* p. 288 (nom.).
 — As.: Japon.
- medianum (Mitt.) Par.
 Bryum medianum Mitt. *M. Ind. or.* p. 74.
 2. — As.: Khasia, M. Neilgherr.
- megalostegium (Sull.) Par.
 Bryum megalostegium Sull. in *Am. Expl. Exped.* 1859, p. 9, t. 7.
 2. — Pac.: Ins. Samoa, Sandwic., Kermadec, Raoul.
- micro-comosum (C. M.) Par.
 Bryum micro-comosum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 19.
 — Am. merid.: And. Boliv.
- microrhodon (C. M.) Par.
 Bryum microrhodon C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 288 (nom.).
 — As.: Japon.
- micro-roseum (C. M.) Par.
 Bryum micro-roseum C. M. in *hb. Saharampur.*
 — As.: Simla.
- minuti-rosatum (C. M.) Par.
 Bryum minuti-rosatum C. M. in *Fl.* 1888, p. 408.
 Br. roseum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 307?
 Ster. In graminos. — Afr.: Kilima N'Djaro.
- mniopsis (C. M.) Par.
 Bryum mniopsis C. M. in *Linn.* 1874, p. 580.
 Ster. — Am. merid.: And. Nov. Granat.
- nanorhodon (C. M.) Par.
 Bryum nanorhodon C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 96.
 Ster. — Afr.: Ins. Franciae.
- nano-rosula (C. M.) Par.
 Bryum nano-rosula C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.
 Ster. — As.: China or. (prov. Schen-Si).
- neilgheriense (Mont.) Par.
 Bryum neilgheriense Mont. in *C. M. Syn. I*, p. 255 et *Syll.* p. 32.
 2. — As.: M. Neilgherr.
- olivaceum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 311.
 Bryum olivaceum Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 73.
 Ster. — Pac.: Austral. or. subtropic.

ontariense (*Kindb.*) *Par.*

Bryum ontariense Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, 1889, p. 96 et in Mac. Cat. p. 135.

Br. roseum Lesq. et Jam. p.p.

2. Lignic. et rupic. in silv. — *Am. sept.*: New Brunswick, Ontario, Ohio, Kansas.

Exs.: *Mac. Canad. M. n. 184 (Bryum.)*.

platense (*C. M.*) *Par.*

Bryum platense C. M. in Hedwig. 1897, p. 95.

Ster. — *Am. merid.*: La Plata.

Preussii (Broth.) Par.

Bryum Preussii Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 187.

2. — *Afr.*: M. Cameroon.

procerum *W. P. Sch. hb.*

Bryum procerum ej. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 55.

— *Am. sept.*: Mexic.

pseudo-giganteum (*C. M.*) *Par.*

Bryum giganteum Sull. in Exped. Wilkes. p. 9.

Br. pseudo-giganteum C. M. in Linn. 1878-1879, p. 288 (nom.) et in Fl. 1896, p. 439.

Ster. — *Pac.*: Ins. Sandwic.

pseudo-marginatum (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Bryum pseudo-marginatum G. et H. in Fl. 1881.

2. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

ptychothecium (*Besch.*) *Par.*

Bryum ptychothecium Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 66.

2. — *As.*: Yunnan.

pusillum (*Broth.*) *Par.*

Bryum pusillum Broth. in Oefv... 1890.

2. Ad arbor. — *Pac.*: Austral. or. (Queensland).

pynopyxis (*C. M.*) *Par.*

Bryum pynopyxis C. M. in Linn. 1878-79, p. 474.

2. — *Am. merid.*: Venezuela.

pynothecioides (*C. M.*) *Par.*

Bryum pynothecioides C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p.

Ster. — *As.*: China or. (prov. Schen-Si).

pyrothecium (*Hpe. et C. M.*) *Par.*

Bryum pyrothecium Hpe. et C. M. in Linn. 1853, p. 495.

Syn. — *Pac.*: Austral. or., Tasman.

Quintasii (*Broth.*) *Par.*

Bryum Quintasii Broth. in Bol. da Soc. Brot. VIII, 1890.

2. *Ster.* Ad arbor. — *Afr.*: Ins. S. Thomas.

rhodocephalum *C. M. in Bot. Zeit. 1838, n. 47.*

— *Am. merid.*: Æquator. ?

rigidum (*Hsch.*) *Par.*

Bryum rigidum C. M. Syn. I, p. 263.

Bryum patens Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 155; *C. M. l. c.* p. 250 (*fid. Mitt.*).

Mnium rigidum Hsch. *Fl. Brasil. I*, p. 46.

2. *Rupic.* — *Am. merid.*: Brasil., Monte Video.

robustulum (*C. M.*) *Par.*

Bryum robustulum *C. M.* in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 77 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 14.

Syn. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

robustum (*Hpe.*) *Par.*

Bryum robustum *Hpe.* in *Linn.* 1856, p. 205.

— *Pac.*: Austral. fel.

roseodens (*C. M.*) *Par.*

Bryum roseodens *C. M.* in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (*nom.*).

— *Am. merid.*: Nov. Granat. *Pac.*: Austral. or. (Nov. Valesia).

roseolum (*C. M.*) *Par.*

Bryum roseolum *C. M.* in *Linn.* 1878-79, p. 287.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.*: Argentin. subtropic.

roseum (*Schreb.*) *W. P. Sch. hb.*

Bryum Commersoni Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 367.

Br. *Bryo Commersoni* affine *ej. op. cit.*

Br. *Bryo neilgherriensi* affine *ej. op. cit.*

Br. *roseum* *Schreb. Spic. Fl. Lips.* p. 84; *Bryol. eur. IV* (*mon.* p. 56), t. 365; *C. M. Syn. I*, p. 247; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 463.

Br. *stellare roseum majus*, capsulis ovatis pendulis *Dill. Hist. M.* p. 411, t. 52, f. 77.

Br. *Zollingeri* Wils. *op. cit.*

Br. *Polla rosea* *Brid. Bryol. univ. I*, p. 696.

Hypnum roseum *W. et M. Bot. Taschb.* p. 207.

Mnium proliferum *Gmel. Syst. Nat. II*, p. 1330.

2. *Ad terr. et rad. arb. in silvat.* — *Eur.*: Reg. campestr. et mont. *As.*: Japon., Jénissei med., Nepal., Himalaya, Tibet. occ., Caucas. *Afr.*: Kilima N'Djaro (?), Madagascar (*Baron, n. 5053*). *Am. sept.*: Calif.?

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 104, 1119.

« *var. brachycarpum* (*Wright*) *Par.*

Bryum roseum var. brachycarpum *Wright in Lond. Journ. of bot.* 1892, p. 263.

— *As.*: Himalaya.

rosulatulum (*C. M.*) *Par.*

Bryum rosulatulum *C. M. in Fl.* 1890, p. 474.

Ster. In graminos. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

rosulatum (*C. M.*) *Par.*

Brachymenium rosulatum *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 51.

Bryum rosulatum *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 416.

2. — *Am. sept.*: Mexic.

rosulicoma (*Ren. et Card.*) *Par.*

Bryum rosulicoma *R. et C. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, I, p. 166.

2. *Ster. Lignic.* — *Am. sept.*: Costa Rica.

saprophilum (*C. M.*) *Par.*

Bryum saprophilum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 752.

— *Afr.*: M. Cameroon.

- Sartorii W. P. Sch. hb.
 Bryum Sartorii ej. in *Besch. op. cit.* p. 56.
 2. — *Am. sept.*: Mexic.
- simplex (Kindb.) Par.
 Bryum simplex Kindb. in *Bidrag* p. 453 et *Mac. Cat.* p. 135.
 Ster. Rupic. — *Am. sept.*: Columb. brit.
- spathulosifolium (C. M.) Par.
 Bryum spathulosifolium C. M. in *Fl.* 1890, p. 474.
 Ster. In graminos. — *Afr.*: Kilima N'Djaro, Usambara.
- stenothecium Hpe. *Symb.* 1874, p. 497.
 Terr. in silv. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.
- streptorhodon (C. M.) Par.
 Bryum streptorhodon C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 179
 — *Am. sept.*: Guatemala.
- suberythrocaulon Par.
 Bryum erythrocaulon C. M. in *Krause M. Ecuador.*
 — *Am. merid.*: And. Æquator.
- subfasciculatum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 312.
 Bryum subfasciculatum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 73.
 Ster. — *Pac.*: Austral. or. subtropic.
- subleptothecium (C. M.) Par.
 Bryum subleptothecium C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (nov.).
 — *Pac.*: Austral. or. (Nov. Valesia).
- subroseum (Besch.) Par.
 Bryum subroseum *Besch. op. cit.* p. 56.
 2. — *Am. sept.*: Mexic.
- subtomentosum Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 516.
 Bryum subtomentosum Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 73.
 Br. truncorum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal.*
 2. — *Pac.*: Austral. or. et merid. (Nov. Vales., Victoria).
- Swarzianum (C. M.) Par.
 Bryum Beyrichianum C. M. *Syn. I*, p. 249 p.p.
 Br. Swartzianum ej. M. *Polyn.* p. 63.
 2. — *Am. sept.*: Jamaic. *Am. merid.*: Venezuela.
- syntrichioides (C. M.) Par.
 Bryum syntrichioides C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 228 et 557.
 — *Afr.*: Orange, Transvaal, Natal.
- truncorum (Brid.) W. P. Sch. hb.
 Bryum truncorum Brid. *Mant. M.* p. 119; C. M. *Syn. I*, p. 254.
 Br. Polla truncorum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 699.
 Mnium giganteum Schwaegr. *Sp. M.* p. 28 p.p.
 Mn. truncorum Brid. *Sp. M. III*, p. 50.
 2. Ad terr. humid. — *Afr.*: Ins. Borbon., Franciae, Tristan d'Acunha,
 Inaccessible. *Am. sept.*: Mexic (?)

umbraculum (*Burch.*). *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 464.

Bryum umbraculum Burch. in Hook. M. ex. t. 133; *C. M. Syn. I*, p. 248.

Br. Polla umbraculum Brid. Bryol. univ. I, p. 698.

Mnium spathulatum Hsch. in Linn. 1841, p. 135.

Mn. umbraculum Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 22, t. 157.

2. Terr. in silv. — *Afr.*: Kilima N'Djaro, Usambara, reg. lacustr.,
C. B. Sp., Natal.

utriculosum (*C. M.*) *Par.*

Bryum utriculosum C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 180.

Ster. — *Am. sept.*: Guatemala.

verticillatum *Hpe. Symb.* 1874, p. 496.

Bryum verticillatum ej. l. c. 1872, p. 51.

Terr. in silv. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Zollingeri (*Duby*) *Par.*

Bryum Zollingeri Dy. in Moritzi Syst. Verz. p. 133; *C. M. Syn. I*, p. 340
et II, p. 569; *Bryol. jav. I*, p. 150.

2. Ad terr. humid. — *As.*: Nepal., M. Neilgherr., Ceylan, Java.

Rhodoweisia *C. M. in Linn.* 1876, p. 298 (*Weisia tophicola ej.*).

RHYNCHO-HYPNUM *Hpe. Fl. Hercynica*, 1873 *et Moosb.* p. 20.

Spec. omn. non indicatae sunt RHAPHIDOSTEGIA ejusd. nom.

Antipodium Hpe. — Rhynchostegium.

apophysatum Hpe. — Rhynchostegium.

subpungens Hpe. et C. M. — Rhynchostegium.

RHYNCHOSTEGIELLA *Bryol. eur. V* (sect. RHYNCHOSTEGII); *Limpr.*
Laubm. Deutschl. IV, p. 207 (*gen. propr.*).

Spec. omn. non indicatae sunt RHYNCHOSTEGIA ejusd. nom.

Teesdalii Limpr. — Eurhynchium.

RHYNCHOSTEGIOPSIS *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 163.

Spec. omn. non indicatae sunt ECTROPOTHECIA ejusd. nom.

flexuosa C. M. — Leucomium.

RHYNCHOSTEGIUM *Bryol. eur. V* (187 spec.).

acanthophyllum (Mont.) Jaeg. Ad. II, p. 430.

Hypnum acanthophyllum Mont. in Ann. sc. nat. 1845, *IV*, p. 90 *et Syll.*
p. 9; *C. M. Syn. II*, p. 398.

1. Cortic. — *Am. merid.*: Chile.

acutifolium (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 442.

Hypnum acutifolium H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 553 *et*
Fl. Antaret. p. 138, t. 60, f. 5.

Ster. — *Pac.*: Ins. Campbell.

afro-rusciforme C. M. in Dusen M. Camer. n. 664.

— *Afr.*: M. Cameroon.

altisetum C. M. in Hedwig. 1897, p. 132.

2? — *Am. merid.*: And. Argentin. subtropic. Tucuman.

ambiguum *W. P. Sh. in Mandon Pl. Boliv. n. 1698.*

— *Am. merid. : And. Boliv.*

amblyacron (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 443.*

Hypnum amblyacron C. M. in sched.

— *As. : Sikkim.*

anceps (*Bryol. jav.*) *Jaeg. Ad. II, p. 438.*

Hypnum anceps Bryol. jav. II, p. 161, t. 260.

1. — *As. : Java.*

androgynum Bryol. eur. — Eurhynchium speciosum.

? *aneuron Kindb. — Plagiothecium membranaceum.*

Antipodium (Hpe.) Par.

Rhyncho-Hypnum Antipodium Hpe. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 88.

1. *Paludic. — Pac. : Austral. or.*

apophysatum (Hsch.) Jaeg. Ad. II, p. 439.

Leskea apophysata Hsch. Fl. Brasil. I, p. 74 ; C. M. Syn. II, p. 27.

Rhyncho-Hypnum apophysatum Hpe. Symb. 1870, p. 283.

1. *Cortic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.*

aquaticum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 444.

Hypnum aquaticum Hpe. in Linn. 1863, p. 161.

In rivul. ad saxa. — Am. merid. : Aequat., Brasil. austr. or.

aristatum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 436.

Brachythecium aristatum Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 89.

Hypnum aristatum H. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 210, t. 176, f. 6 et Handb. of N. Zeal. Fl. p. 478.

1. *Lignic. et ad terr. humid. — Pac. : Austral. or., Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.*

asperisetum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 438.

Hypnum asperisetum C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 171.

Syn. — As. : Java.

Assumptionis Besch. Not. M. Paraguay. p. 271.

— *Am. merid. : Paraguay.*

Exs. : Balansa Pl. Parag. n. 1273.

atlanticum Bryol. eur. — Rh. rusciforme var. atlanticum.

austro-montanum (Hpe.) Par.

Hypnum austro-montanum Hpe. in F. v. Müller's Fragm. XI, Suppl. p. 51.

— *Pac. : Austral. or.*

Berteroanum (Mont.) Jaeg. Ad. II, p. 432.

Hypnum Berteroanum Mont. in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 89 et Syll. p. 6 ; C. M. Syn. II, p. 243.

2. *Terr. — Am. merid. : Chile, ins. Juan Fernandez.*

Beskeanum (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 441.

Hypnum Beskeanum C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 384.

H. megapolitanum Hsch. Fl. Brasil. ?

1. *Lignic. — Am. merid. : Brasil. or.*

blandum Hpe. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 107.

— *Am. sept. : Mexic.*

bolivianum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1696.
— *Am. merid.* : And. Boliv.

Bourgœanum (Mitt.) Par.

Hypnum Bourgœanum Mitt. in *Godman's Nat. hist. of the ins. Azor.* 1870, p. 309.

H. Teneriffae Bourg. *Pl. Canar. exs.* n. 1235.

l. — *Afr.* : Teneriffa.

brachypterum (Hsch.) Jaeg. *Ad. II*, p. 438.

Hypnum brachypterum Hsch. in *Linn.* 1841, p. 142 ; *C. M. Syn. II*, p. 248.

l ? — *Afr.* : C. B. Sp.

Brandegei (Aust.) Par.

Hypnum Brandegei Aust. in *Coult. Bot. Gaz. III*, p. 31.

Ster. — *Am. sept.* : Colorado.

Breutelianum W. P. Sch. — *Rhaphidostegium Dregei*.

brevicuspis C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 134.

Terr. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

Brotheri Par.

Hypnum julaceum Broth. in *Bihang till K. Svet.-Akad.* 1895, n. 3.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

bulnense Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 213.

l. — *Afr.* : Usambara.

cacticolum (C. M.) Par.

Hypnum cacticolum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 479.

Syn. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos-Ayr.

callistomum Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 106.

Cortic. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).

? calocsience (Aust.) Par.

Hypnum calocsience Aust. in *Coult. Bot. Gaz. IV*, p. 161.

l. — *Am. sept.* : Florida.

campylocarpum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 440.

Hypnum campylocarpum C. M. *Syn. II*, p. 249.

H. Sellowii ej. in *Linn.* 1847, p. 219 ; *Hpe. in op. cit.* p. 85.

l. — *Am. merid.* : Venezuela.

campylocladulum C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 134.

l. Ad marg. rivul. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic, Tucuman.

catractile (C. M.) Par.

Hypnum catractile C. M. mss.

— *As.* : Himalaya sept. occid.

celebicum (Bryol. jav.) Jaeg. l. c.

Hypnum celebicum *Bryol. jav. II*, p. 159, t. 258.

l. — *As.* : Tonkin, Celebes.

chrysophylloides (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 434.

Hypnum chrysophylloides Hpe. in *Bot. Zeit.* 1869, p. 52.

-- *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

circinatum de Not. — *Eurhynchium*.

cirrosum de Not. — *Eurhynchium*.

Comorae (C. M.) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 157 et in Ann. sc. nat. VII, p. 96 (descript. amplior).*

Hypnum Comorae C. M. in *Linn.* 1876, p. 281.

Cortic. in silv. — Afr. : Usambara, ins. Anjouan, Mayotte.

complanum (Mitt.) *Jaeg. Ad. II, p. 440.*

Hypnum complanum Mitt. *M. austr. am. p. 553.*

— *Am. merid. : Chile.*

compressifolium (Mitt.) *Par.*

Hypnum compressifolium Mitt. *Fl. Vit. p. 400.*

Syn. — *Pac. : Ins. Kermadec, Raoul, Sunday.*

compridense (C. M.) *Par.*

Hypnum compridense C. M. in *sched. ; Broth. in Bihang till. Sv. Vet.-Akad. 1895, n. 3 (descript.).*

1. Terr. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

conchophyllum (Tayl.) *Jaeg. Ad. II, p. 433.*

Hypnum conchophyllum Tayl. in *Lond. Journ. of bot. 1848, p. 195 ; C. M. Syn. II, p. 250.*

1. — *Am. merid. : M. Pichincha.*

confertum (Dicks.) *Bryol. eur. V (mon. p. 7), t. 510 ; W. P. Sch. Syn. II, ed. p. 683.*

Eurhynchium confertum Milde *Bryol. siles. p. 309.*

Hypnum clavellatum Hedw. *M. frond. IV, p. 80.*

H. confertum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt. p. 17, t. 11, f. 14 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 405 ; C. M. Syn. II, p. 345.*

H. laete-virens Sm. *Fl. brit. III, p. 1290 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 408.*

H. Ludwigianum Spreng. *Anleit. zu Kenntn. d. Gew. III, p. 297, t. 7, f. 16.*

H. rotundifolium Dicks. *Fasc. II Pl. crypt. (excl. syn. Scop. et With.).*

H. serrulatum Turn. *M. Hibern. p. 148 et Sm. l. c. (excl. syn. Hedw.).*

H. thuringicum W. et M. *Bot. Taschb. p. 322 (excl. syn. Brid. et Hedw.).*

Leskea Ludwigiana Brid. *Sp. M. II, p. 161.*

2. Ad saxa, lapid. in dumet., mur. umbr., etc. — *Eur. : Zona intermed., rar. merid., rar. supra reg. campestr. ascend. As. : Caucas. occid. Afr. : Alger., ins. Azor., Canar., Madeira.*

Exs. : Mandon Pl. Madeir. n. 42.

Rab. Bryoth. eur. n. 842, 906.

« *var. brevifolium (Milde) Limpr. Laubm. Deutschl. IV, p. 225.*

Eurhynchium confertum var. brevifolium Milde. op. et l. cc.

Ad rup. arenac. — Eur. : Lotharingia.

« *var. Daldinianum de Not. Epil. p. 73.*

— *Eur. : Ital. super. (Locarno).*

« *var. Delognei (Piré) Boulay M. France, I, p. 97.*

Rh. Delognei Piré in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1871, p. 100.

Ad mur. fontium. — Eur. : Belgia.

var. elatior Mdo. — Rh. murale.

« *var. hercynicum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 365.*

Eurhynchium hercynicum Milde Bryol. siles. p. 309.

Hypnum hercynicum Hpe. in sched. et Fl. hercynica.

Rh. hercynicum Limpr. Laubm. Deutschl. IV, p. 227.

Ad rupes arenac. — Eur. : Harz.

« *f. minutula W. P. Sch. Syn. I ed. p. 569 ; Mdo. Bayer. Laubm. p. 228.*

— *Eur. : Francon., Bavar.*

congruens Mitt. — *Rhaphidostegium*.

convolutifolium (Hpe.) Broth. in *Oefv. af Finska Vet.-Soc. Akad.* 1895, p. 67.

Amblystegium convolutifolium Jaeg. *Ad. II*, p. 549.

Hypnum convolutifolium Hpe. in *Linn.* 1869-70, p. 641.

Rh. strictiusculum Broth. in *Bailey Contr. to the Queensl. Fl. IV*, p. 21 (nom.).

1. Cortic. et lignic. — *Pac.*: Austral. or. (Queensland), Tasman.

cormophilum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 257.

— *Afr.*: M. Cameroon.

crassinervium de Not. — *Eurhynchium*.

crossomitrioides C. M. mss.

— *Am. merid.*: Paraguay.

cucullatum (Mitt.) Par.

Hypnum cucullatum Mitt. in *Kew Journ. bot. VIII*, p. 265.

— *Pac.*: Austral. or.

cupressinum Besch. *Prodr. bryol. mexic. p.* 106.

Ster.

— *Am. sept.*: Mexic.

curvisetum (Brid.) W. P. Sch. *op. cit.*

Eurhynchium Teesdalii Milde *Bryol. siles. p.* 313 p.p.

Hypnum curvisetum Brid. *Sp. M. I*, p. 111.

H. laxo-pinnatum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 405.

H. rigidulum Br. mss.; *Rab. Deutsch. Kryptfl. II, III*, p. 286.

H. rutabuloides Brid. *Bryol. univ. II*, p. 488 (ut syn.).

H. rutabulum γ *tenerrimum* ej. *op. et l. cc.*

H. Schleicheri Spreng. *Syst. veg. XVI, IV ed. I*, p. 208 p.p.; de Not. *Syll. n.* 44.

H. Schleicheri β *curvisetum* Schwaegr. *Suppl. I, II*, pp. 239 et 241; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 404.

H. Teesdalii Hüb. *Muscol. germ. p.* 618 p.p.; C. M. *Syn. II*, p. 400 p.p.

H. Teesdalii var. *Wils. Bryol. brit. p.* 351 (in obs.).

H. tenellum Schwaegr. *Suppl. II, I, II*, p. 161, t. 144 (excl. syn.).

H. Teneriffae Mont. *Hist. nat. Ins. Canar., Crypt. p.* 3, t. III, f. 1 et *Syll. p.* 9.

Rhynchostegiella curviseta Limpr. *Laubm. Deutschl. IV*, p. 211.

1. Ad saxa humid. praecip. secus rivul. et catar. — *Eur.*: Reg. campestr. zonae intermed. et merid.; vall. Rhen., Helvet. occid., Westphal., Austr. infer., Siles., Bavar., reg. mediterr. tota. *Afr.*: Alger., ins. Canar., Madeir. *Am. sept.*: Philadelphia.

« var. *Jacquini* (Garov.) Par.

Hypnum curvisetum var. *longinerve* Lindb. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1868, p. 69; *Rab. Bryoth. eur. n.* 1299.

H. Jacquini Garov. *Bryol. austr. pp.* 82 et 87; C. M. *Syn. II*, p. 481.

H. obscurum Brid. *Sp. M. II*, p. 115?

H. riparium var. *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 195?

H. Schleicheri var. *obscurum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 405?

Rhynchostegiella Jacquini Limpr. *Laubm. Deutschl. IV*, p. 215.

Ad rup. irror. — *Eur.*: Palat., Helvet., Bavar., Austr. infer., Stir., Siles.

delicatulum Jam. — *Rhaphidostegium*.

Delognei Piré. — *Rh. confertum* var. *Delognei*.

demissum Bryol. eur. — *Rhaphidostegium*.

densifolium (Lindb.) Par.

Isopterygium densifolium Lindb. in *Broth. Enum. M. Cauc. p.* 130.

2. Ad rup. calcar. — *As.*: Caucas. occid.

« *var. concavum* (Broth.) Par.

Isopterygium densifolium var. concavum Broth. *op. cit.* p. 531.

— As. : Cum typ.

dentiferum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 437.

Hypnum dentiferum Hpe. in Linn. 1859, p. 642.

1. — Pac. : Austral. felix.

deplanatum W. P. Sch. *mss.*

Hypnum deplanatum Sull. *M. of U. St.* p. 70, *Id. M.* p. 171, t. 108 et *M. Allegh. n.* 50 ; *C. M. Syn. II*, p. 260 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 359.

Isopterygium deplanatum Mitt. *M. austr. am.* p. 498 (in obs. ad I. planissimum).

2. ♂ ign. Ad terr. et sax. in silv. — Am. sept. : Ottawa, Ontar., Manitoba, reg. or. et centr.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 300 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 438 (*Hypnum*).

depressum (Br.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 8), t. 512 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 682.

Hypnum confertum ζ *depressum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 767.

H. depressum Br. in *Bot. Zeit.* 1824, p. 763 ; *C. M. Syn. II*, p. 258.

Eurhynchium depressum Milde *Bryol. siles.* p. 299.

Isopterygium depressum Mitt. *M. austr. am.* p. 498 (in obs. ad I. planissimum).

Plagiothecium depressum Limpr. *Laubm. Deutschl. IV*, p.

2. Ad rup. et sax. quartz., rar. calcar. — Eur. : Zon. intermed. : Cambroval., Normann., Suec., Westphal., Francon., vall. Rhen. med. et inf., Austr. super. As. : Caucas. Am. sept. : Pensilv.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 796, 1090, 1236.

distans Besch. *Fl. bryol. Réunion. etc.* p. 156.

— Afr. : Usambara, reg. lacustr., ins. Borbon.

« *var. breve* Kiaër in *Borgen M. Mad.* (absque n°).

— Afr. : Madagascar.

« *var. cordifolium* Kiaër *l. c.* n. 49.

— Afr. : Madagascar centr.

distratum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 435.

Hypnum distratum Hpe. in Linn. 1859, p. 642.

1. Cortic. vel lignic. — Pac. : Austral. felix.

divergentifolium Broth. *mss.*

Rh. *plagiothecioides* ej. *prius*.

Ster. — As. : Japon.

drepanocladioides (C. M.) Par.

Hypnum drepanocladioides C. M. in Linn. 1880-83, p. 478.

Fl. et fr. ign. — Am. merid. : Argentin Buen. Ayr.

Duthiei C. M. *mss.*

— As. : Himalaya sept. occid.

Duthiei Broth. — Rh. kashmirensse.

elachistos (Duby) Besch. *Fl. bryol. Nouv. Caled.* p. 242.

Hypnum elachistos Duby *mss.*

Cortic. — Pac. : Nov. Caledon.

elegans Lindb. — *Plagiothecium*.

var. terrestre Lindb. — *Plagiothecium elegans var. terrestre*.

elusum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 436.

Hypnum elusum Mitt. in *Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 478.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland. med.

Eriocladella C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 205.

— *Afr.* : M. Cameroon.

erythropodium Mitt. — *Sematophyllum*.

exilissimum Jaeg. — *Helicodontium*.

expallescens (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 439.

Hypnum expallescens C. M. in *Linn.* 1876, p. 659.

Terr. in silv. — *Am. sept.* : Mexic.

Fabroniadelphus (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 430.

Hypnum Fabroniadelphus C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 15.

— *As.* : Ceylan.

ferriviae C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 63.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

finitimum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 439.

Hypnum finitimum Hpe. *Symb.* 1876, p. 520.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Fissidens (C. M.) Par.

Hypnum Fissidens C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 479.

1. In uligin. — *Am. merid.* : Argentin. Buenos Ayr.

fissidentellum Besch. *Not. M. Parag. p.* 270.

Ad terr. ferrug. — *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Balansa Pl. Parag. n. 1217.

fissidentoides (Broth.) Par.

Hypnum fissidentoides Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 479.

2? Cortic. — *Pac.* : Nov. Guinea.

frondicola (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 437.

Hypnum frondicola C. M. in *sched.*

H. serrulatum Sull. in *Proced. of the Am. Acad...* 1861, p. 287 et in

Wright M. Cub. n. 103.

— *Am. sept.* : Cuba.

Funckii de Not. — *Eurhynchium cirrosum* var. *Funcki*.

Gaudichaudii (Mont.) Jaeg. *Ad. II*, p. 440.

Hypnum Gaudichaudii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1843, p. 238, ic. in *Voy.*

Bonite, Crypt. t. 150, *f. I et Syll. p.* 7; C. M. *Syn. II*, p. 249.

H. praelongum Sull. in *Exped. Wilkes, p.* 16?

1. Cortic. — *Pac.* : Ins. Hawaï.

geophilum Aust. *M. Appal. n.* 345; Sull. *Ic. M. Suppl. p.* 94, *t.* 70.

Hypnum depressum Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 437.

H. geophilum Lesq. et Jam. *Man. p.* 358.

Isopterygium geophilum Jaeg. *Ad. II*, p. 503.

1. Ad terr. argillos. — *Am. sept.* : New Jersey, New York, Pensilv., Maryland, Wisconsin.

glaucescens Mitt. — *Hypnum extenuatum*.

glauco-virescens (C. M.) Par.

Hypnum glauco-virescens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 445.

1. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

- glauco-viride* Mitt. — Rhaphidostegium.
- globipyxis* (C. M.) Par.
Hypnum globipyxis C. M. in op. cit. p. 449.
 l. — Am. merid. : Argentin. Jujuiens.
- Hahnianum* Sb. in Jaeg. Ad. II. p. 443.
Rh. obtusifolium Besch. in sched.
 Ad lapid. in rivul. — Am. sept. : Mexic.
- Hampei* Besch. — Rhaphidostegium.
- Hausknechtii* Jur. Beitr. p. 601.
 Ster. — As. : Kurdistan.
- herbaceum* (Mitt.) Jaeg. Ad. II. p. 434.
Hypnum herbaceum Mitt. M. Ind. or. p. 81.
 l. — As. : Sikkim, Khasia.
- hercynicum* Limpr. — *Rh. confertum* var. *hercynicum*.
- homaliocaulon* (C. M.) Par.
Hypnum homaliocaulon C. M. in Linn. 1878-79, p. 446.
 l. — Am. merid. : Argentin Cordob.
- homalobolax* C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 156.
 — Afr. : Ins. Franciaë.
- homomallum* Besch. — Rhaphidostegium.
- Holstii* Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 213.
 l. Cortic. — Afr. : Usambara.
- Hookeri* Sb. in Jaeg. Ad. II. p. 435.
H. semi-tortum Mitt. M. Ind. or. p. 81.
 — As. : Sikkim.
- huitomalconum* (C. M.) Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 107.
H. huitomalconum C. M. Syn. II, p. 248.
H. serrulatum Hsch. in Deppe et Sch. M. Mexic. n. 1095.
 — Am. sept. : Mexic.
- humillimum* (Mitt.) Jaeg. Ad. II. p. 429.
Hypnum humillimum Mitt. op. cit. p. 80.
 l. Cortic. — As. : M. Neilgherr.
- inclinatum* (Mitt.) Jaeg. Ad. II. p. 432.
Hypnum inclinatum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1864, p. 152.
 l. — As. : Japon.
- inclinatum* W. P. Sch. — Rhaphidostegium sphaerotheca.
- incurvum* (Hpe.) Par.
Hypnum incurvum Hpe. in F. v. Müller's Fragm. XI, Suppl. 51.
 — Pac. : Austral. or.?
- inermis* (Mitt.) Jaeg. Ad. II. p. 441.
Hypnum inermis Mitt. M. austr. am. p. 554.
 Ad ramul. arbor. — Am. merid. : And. Quitens.
- Jamesii* Sull. — Rhaphidostegium.
- javanicum* (Bel.) Besch. Fl. bryol. Nouv. Caledon. p. 243.
Hypnum javanicum Belanger Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p. 8, t. X, f. I;
 C. M. Syn. II, p. 247; Bryol. jav. II, p. 158, t. 257.

- H. pellucidum* Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 308.
 l. — As.: Java, Sumatra.
 « *var. majus* Besch. op. et l. cc.
 — Pac.: Nov. Caledon.
- julaceum* Rehm. *M. Afr. austr.* n. 375.
 — Afr.: Orange.
- kashmirens* Par.
Rh. Duthiei Broth. mss.
 — As.: Kashmir.
- laevisetum* Geh. in *Rev. bryol.* 1876, p. 4 (nom.).
 — Pac.: Austral. or. (Nov. Valesia).
- lamasicum* (Spr.) Jaeg. *Ad. II*, p. 441.
Hypnum lamasicum Spr. in *Mitt. op. et l. cc.*
 Saxic. et terr. — Am. merid.: And. Quitens. et Peruv., Brasil.
- latifolium* Geh. in *Rev. bryol.* 1896, p. 4 (nom.).
 — Pac.: Austral. or. (Nova Valesia).
- lepidopilum* C. M. mss.; Jaeg. *Ad. II*, p. 442.
 — As.: Japon.
- leptomerocarpon* (C. M.) Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 107.
Hypnum leptomerocarpon C. M. *Syn. II*, p. 354.
H. megapolitanum Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.* n. 1096.
 — Am. sept.: Mexic.
- leptomitophyllum* C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.
 Ster. — As.: China or. (prov. Schen-Si).
- leptopteridium* C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 133.
 l. — Am. merid.: Argentin. subtropic. Tucuman.
- Letourneuxii* Besch. *Cat. M. Alger* p. 38.
 — Afr.: Alger.
- leucodictyon* C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 133.
 l. — Am. merid.: Argentin. subtropic. Tucuman.
- limbelloides* C. M. in *Fl.* 1896, p. 475.
 Ster. — Pac.: Ins. Sandwic.
- Limnobiella* C. M. in *Fl.* 1897, p. 340.
 Ster. Aquat. — Am. merid.: And. Venezuel.
- limosum* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1699.
 — Am. merid.: And. Boliv.
- littoreum* (de Not.) Bott. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1890, p. 260.
Hypnum littoreum de Not. *Syll. n.* 43; C. M. *Syn. II*, p. 399.
Rhynchostegellia littorea Limpr. *Laubm. Deutschl. IV*, p. 214.
Rhynchostegium curvisetum var. *littoreum* Vent. et Bott. *Enum. crit.* p. 7.
Rh. mediterraneum Jur. in *Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien*, 1874, p. 378.
 l. Terr. — Eur.: Galloprov., Ligur., ins. Elba, Corsica, Sardinia,
 Sicilia, Hispan. merid.
- locarmense* de Not. — *Eurhynchium velutinoides*.
- luteo-nitens* (Welw. et Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 436.
Hypnum luteo-nitens W. et Dy. in *Mém... Genève*, 1871, p. 11, t. 4, f. I.
 Rupic. — Afr.: Angola.

luxatum (Mitt.) Par.

Hypnum luxatum Mitt. in *Kew Journ. bot.* 1856, p. 64.

— Pac. : Austral. or. (Victoria).

Mandoni W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1710.

— Am. merid. : And. Boliv.

mediterraneum Jur. — Rh. littoreum.

megapelma C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 231 ; Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 212 (descript.).

1. Lignic. — Afr. : M. Cameroon.

megapolitanum (Bland.) *Bryol. eur. V* (mon. p. 8), t. 511 ; W. P. Sch. op. cit. p. 684.

Eurhynchium megapolitanum Milde *Bryol. siles. p.* 311.

Hypnum confertum var. megapolitanum Br. in sched.

H. megapolitanum Bland. *M. exs. n.* 147 et in *Sturm Deutsch. Fl. II, fasc. 9* ; *Brid. Bryol. univ. II, p.* 491 ; C. M. *Syn. II, p.* 353.

2. Ad terr. arenos. vel denud. — Eur. : Reg. campestr. zon. intermed. sept. : German. fere tota, Palat., Hercyn., Austr. infer., Stir., Gall. merid. As. : Persia, Caucas. or., Syria. Afr. : Alger., ins. Canar.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 340, 486, 1140, 1342.

« var. meridionale W. P. Sch. *Syn. I ed. p.* 569 et l. c.

In pinet. aren. marit. — Eur. : Gall. merid., Sardin. Afr. : Alger.

menadense (*Bryol. jav.*) Jaeg. *Ad. II, p.* 437.

Hypnum menadense *Bryol. jav. II, p.* 156, t. 255.

1. — As. : Tonkin, Celebes.

meridionale de Not. — Eurhynchium striatum var. meridionale.

micro-asperum C. M. mss.

— As. : Himalaya sept. occid.

micro-pinna C. M. mss.

— As. : Himalaya sept. occid.

microtheca Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 130.

1. Cortic. — Afr. : Madagascar (Diego-Suarez).

minutum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 61.

— Am. merid. : And. Boliv.

Moorei (Broth. et Geh.) Par.

Hypnum Moorei Broth. et Geh. in *Oefv. af Finska Vet.-Soc. Föerh.* 1895, p. 66.

2. Ad rup. irror. — Pac. : Tasman.

Mülleri (*Bryol. jav.*) Jaeg. *Ad. II, p.* 444.

Hypnum Mülleri *Bryol. jav. II, p.* 162, t. 261.

1. — As. : Sumatra, M. Java.

murale (Hedw.) *Bryol. eur. V* (mon. p. 10), t. 514 ; W. P. Sch. op. cit. p. 685.

Eurhynchium murale Milde *Bryol. siles. p.* 228.

Hypnum abbreviatum Hedw. *Sp. M. p.* 249, t. 65, f. 1-4.

H. clavellatum L. *Sp. pl. p.* 1596.

H. confertum Hedw. *M. frond. IV, p.* 79, t. 30 ; C. M. *Syn. II, p.* 346.

H. myosuroides brevius et crassius, capsulis cernuis Dill. *Hist. M. p.* 318, t. 41, f. 52.

H. myosuroides γ Huds. *Fl. Angl. p.* 430.

H. velutinum β murale Neck. *Meth. p.* 172.

H. *Stereodon muralis* *Brid. Bryol. univ. II, p. 586* (incl. *varr. abbreviatus, elongatus, hispanicus, spadiceus, subcirrosus*).

1. Ad sax. et rup. umbr., ad mur. basin humid. — *Eur.* : Fere tota in reg. campestr. *As.* : Caucas., Syria. *Afr.* : Alger.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n. 293, 384, 1428.*

« *var. complanatum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ad rup. madid., praecip. calcar. — *Eur.* : Cum typo.

« *var. julaceum* *Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.*

In siccior. apric. et in subalp. — *Eur.* : Cum typo.

« *var. subalpinum* *Ren. in Rev. bryol. 1885, p. 57.*

— *Eur.* : Pyren.

muriculatum Mitt. — *Eurhynchium.*

myosuroides de Not. — *Eurhynchium.*

nano-pennatum (*Broth.*) *Par.*

Hypnum nano-pennatum *Broth. in Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV, Suppl. p. 99 (nom.) et in Oefv... 1890.*

1. Cortic. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

nanothecium C. M. mss.

— *As.* : Himalaya sept. occid.

Novae Cesareae Aust. — *Hypnum micans.*

obscurum *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 48.*

Ster. Secus torrent. — *Pac.* : Taïti.

obtusifolium (*Hook.*) *Jaeg. Ad. II, p. 443.*

Hypnum arcticum forma C. M. *Syn. II, p. 432.*

H. *obtusifolium* *Hook. in Drumm. M. bor. am. I ed. n. 193; Lesq. et Jam. Man. p. 400.*

Scleropodium obtusifolium *Kindb. in Mac. Cat. p. 202.*

Stereodon obtusifolius Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 42.*

1. Aquat. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit., Washington, Oregon, Montana, Idaho, Calif.

obtusifolium *Besch.* — *Rh. Hahnianum.*

obtusissimum *Geh. in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).*

— *Pac.* : Austral. or. (Nova Vales.).

obtusum *Geh. in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).*

— *Pac.* : Austral. or. (Nova Vales.).

oedipyxis C. M. mss.

— *As.* : Himalaya sept. occid.

pallenticaule C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p.*

— *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

pallidifolium (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II, p. 435.*

Hypnum pallidifolium Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1864, p. 153.*

1. — *As.* : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 54.

pallidius (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p. 441.*

Hypnum pallidius *Hpe. Symb. 1874, p. 521.*

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Pampae (C. M.) *Par.*

Hypnum Pampae C. M. in *Linn. 1878-79, p. 448.*

1. Lignic. et rupic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

paramattense (*Hpe. et C. M.*) *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 88 (*nom.*).

— *Pac.* : Austral. or. (Nova Vales.).

patentifolium *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

— *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

patulum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 436.

Hypnum patulum Hpe. in Linn. 1871-73, p. 162.

— *Pac.* : Austral. or.

pectinatum (*Mitt.*) *Par.*

Hypnum pectinatum Mitt. in Phil. Trans. of the roy. Soc. 1879 (*extra vol.*), p. 395.

In humid. — *Afr.* : Ins. Rodriguez.

pennireptile *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 270.

— *Afr.* : M. Cameroon.

percomplanatum *C. M. mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

perfilare *C. M. mss.*

— *Afr.* : Choa (Ankober).

perintricatum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 677.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Pervilleanum *Jaeg.* — *Rhaphidostegium*.

philippinense (*Duby*) *Jaeg. Ad. II*, p. 438.

Hypnum philippinense Duby in Mém... Genève, 1876, p. 11, t. II, f. 3 et in *Fl.* 1877, n. 5-6.

2. Cortic. (ad *Arecam Cathecu*). — *As.* : Ins. Philipp.

piliferum de Not. — *Eurhynchium*.

pinnicaule (*C. M.*) *Par.*

Hypnum pinnicaule C. M. in Linn. 1878-79, p. 447.

l. fr. ign. Rupic. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

Pirottæ Brizi. — *Eurhynchium*.

Plagiotheciella C. M. in Hedwig. 1897, p. 132.

l. — *Am. merid.* : And. Argentin. subtropic. Tucuman.

plagiothecioides Broth. — *Rh. divergentifolium*.

planifolium *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 156.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

« var. tenue *ej. in op. et l. cc.*

Ubi typ.

planiusculum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 430.

Hypnum planiusculum Mitt. M. Ind. or. p. 81.

l. Ad rup. humid. — *As.* : Himalaya sept. occ., Sikkim.

praecox de Not. — *Eurhynchium strigosum var. praecox*.

praelongum de Not. — *Eurhynchium*.

var. *Swarzii* Vent. et Bott. — *Eurhynchium praelongum var. atrovirens*.

Progelii Saut. — *Eurhynchium strigosum*.

pseudo-confertum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 431.

Hypnum pseudo-confertum C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 170.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

pseudo murale (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 442.

Hypnum pseudo-murale Hpe. in *Linn.* 1859-60, p. 643.

— *Pac.* : Austral. or.

pseudo-serrulatum (Kindb.) Mac. *Canad. M. n.* 456.

Eurhynchium pseudo-serrulatum Kindb. *mss.*

1. Terr. in silv. — *Am. sept.* : Terra nov., New-Brunswick, Ottawa.

pseudo-stramineum Mitt. — *Hypnum stramineoides*.

pumilum de Not. — *Eurhynchium*.

recurvans Besch. — *Rhaphidostegium*.

recurvirameum C. M. in *Fl.* 1896, p. 475.

Ster. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

revelstokense (Kindb.) Par.

Eurhynchium revelstokense Kindb. *mss.*

♂ ign. — *Am. sept.* : Columb. brit.

Rhaphidorhynchum (C. M.) Par.

Hypnum Rhaphidorhynchum C. M. *Syn. II*, p. 354.

1. Lignic. — *Afr.* : Ins. Tristan d'Acunha, Cap. B. Sp. *Pac.* : Austral. or. (Victoria).

rigescens C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 566.

Syn. Lignic. — *Am. sept.* : M. Jamaic.

rivale (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 433.

Hypnum rivale Hpe. *Symb.* 1874, p. 522.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

romanum Brizi. — *Eurhynchium*.

rotundifolium (Scop.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 9), t. 513; W. P. Sch. *op. cit.* p. 685.

Eurhynchium rotundifolium Milde *Bryol. siles.* p. 310.

Hypnum confertum β *rotundifolium* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 407.

H. intertextum Voit.

H. rotundifolium Scop. *Fl. Carn.* II ed., n. 1333; Brid. *op. cit.* p. 768; C. M. *Syn. II*, p. 245.

2. Ad lapid. et rad. arbor. in dumet. — *Eur.* : Zon. intermed. et merid. : Hungar., Austr. infer., Stir., Carinth., Carniol., Tirol., Helvet., vall. Rhen. med., Gall. centr. (Lutetia), Roma, etc. *As.* : Japon., Caucas. occid.

Ews. : Faurie Pl. Japon. n. 100.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 634, 1430.

? *Royae* (Aust.) Par.

Hypnum Royae Aust. in *Coult. Bot. Gaz.* III, p. 31.

2. — *Am. sept.* : Calif.

rusciforme (Weiss) *Bryol. eur.* V (mon. p. 11), t. 515; W. P. Sch. *op. cit.* p. 686.

Eurhynchium rusciforme Milde *Bryol. siles.* p. 312.

Hypnum alopecuroides var. *hibernicum* Hook. in *hb. DC.*

H. rusciforme foliis rusciformibus, capsulis subrotundis Dill. *Hist. M.* p. 298, t. 38, f. 31.

- H. hydropteryx* K. Sch. mss.; *Geh. in Bot. Zeit.* 1871, p. 40.
H. riparioides Hedw. *M. frond.* IV, p. 10, t. 4.
H. rivulare Ehrh. *Crypt. exs.* n. 252.
H. ruscifolium Neck. *Meth. M.* p. 181.
H. ruscifolium γ *rotundifolium* Sm. *Fl. brit.* III, p. 1293.
H. rusciforme Weiss *Crypt. Goett.* p. 225; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 497
 (incl. var. *alopecuroides*, *flaccidum*, *fontanum*, *longisetum*, *rotundifolium*); *C. M. Syn.* II, p. 425.
H. rutabulum var. *ruscifolium* Web. *Spic. Fl. Goett.* p. 91.
H. rutabulum var. *rusciforme* Lightf. *Fl. Scot.* II, p. 748.
H. rutabulum var. *virens* Turn. *Muscol. Hibern.* p. 179.
H. rutabulum var. δ Huds. *Fl. Angl.* p. 497.
H. virens Sw.
2. Ad saxa immersa, lignaq. irror., mur. molendin., rup. madid., etc.
 — *Eur.*: Tota campestr. et montana, *As.*: Japon., Yunnan., Tibet.
 occ., Himalaya, Nepal., Luristan, Caucas. occ. et centr. *Afr.*:
 M. Sinai, Alger., ins. Canar. *Am. sept.*: Terr. nov., New Brun-
 swick, Nov. Scot., Gaspes., Ontar., Columb. brit., Vancouver,
 Oregon, reg. sept., or. et centr.
- Exs.*: Faurie Pl. Jap. n. 56 b.
 Mac. Canad. M. n. 301 (*Hypnum*).
 Rab. Bryoth. eur. n. 385.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. 11 ed. n. 439 (*Hypnum*).
- var. *atlanticum* Bryol. eur. — Rh. *rusciforme* var. *lutescens*.
- « var. *complanatum* H. Schulze in *Kryptfl. v. Schles.* I, p. 86.
 In aq. stagn. vel lentè fluent. — *Eur.*: Ubi typ.
- « var. *inundatum* (Brid.) Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
Hypnum aquaticum Poll. *Pal.* III, p. 1020.
Hypnum inundatum Brid. *M. Rec.* II, II, t. 5, f. 3.
H. obtusifolium Dicks. mss.
H. rusciforme var. *inundatum* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 500.
 In inund. vel irror. praecip. calcar. — *Eur.*: Ubi typ. *As.*: Syria.
Am. sept.: Ubi typ.
- Exs.*: Rab. Bryoth. eur. n. 596.
- « var. *lutescens* W. P. Sch. ll. cc.
H. atlanticum Desf. in Brid. *M. Rec.* II, II, p. 121, t. 4?
H. flagellare, saxatile, capsulis gracilibus Dill. *Hist. M.* p. 306, t. 39, f. 42.
H. rusciforme δ *atlanticum* Brid. *Bryol. univ.* II, p. 499? Lesq. et Jam.
Man. p. 360.
 Rh. *rusciforme* β *atlanticum* Bryol. eur. l. c. t. 516, fig. β 1-2, 4-8.
 Ut et ubi praeced. in *Eur.* et *Am. sept.*
- Exs.*: Rab. Bryoth. eur. n. 1091.
- « var. *prolixum* (Dicks.) Bryol. eur. et W. P. Sch. ll. cc.
Hypnum aquaticum, *prolixum*, foliis ovatis Dill. *Hist. M.* p. 298, t. 37,
 f. 32 et t. 85, f. 2 a.
H. prolixum Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 13.
H. rusciforme β *prolixum* Turn. *Muscol. Hibern.* p. 153; *Brid. Bryol.*
univ. II, p. 499.
- Ut et ubi praeced. in *Eur.* — *As.*: Japon.
- Exs.*: Rab. Bryoth. eur. n. 386.
 Savat. Pl. Jap. n. 186.
- « var. *rigens* de Not. hb.; Brizi in *Annuaire R. Istit. bot. di Roma*,
 1892, p. 7.
- Ad rup. irror. — *Eur.*: Sardinia.

ruscoides Par.

H. subrusciforme C. M. in Linn. 1874, p. 658.

Rh. subrusciforme Jaeg. Ad. II, p. 443.

— *Am. sept.* : Mexic.

ruvenzorense (Broth.) Par.

Hypnum ruvenzorense Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1897, p. 279.

Ster. In silv. humid. — *Afr.* : Regio lacustr.

Savatieri Par.

Rhynchostegium subconfertum W. P. Sch. in Savatier M. Japon. n. 683 ;
Besch. in Ann. sc. nat. 1893, p. 380.

— *As.* : Japon.

saxitapes C. M. in Dusen M. Camer. n. 302.

— *Afr.* : M. Cameroon.

scariosum (Tayl.) Jaeg. Ad. II, p. 440.

Hypnum scariosum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 65 ; C. M.
Syn. II, p. 467 ; Mitt. M. austr. am. p. 553.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

schoanum C. M. mss.

— *Afr.* : Choa (Ankoher.).

selaginellifolium C. M. in Fl. 1896, p. 475.

Ster. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

Sellowii (Hsch.) Jaeg. Ad. II, p. 439.

Hypnum Sellowii Hsch. Fl. Brasil. I, p. 79 ; C. M. Syn. II, p. 248 ; Mitt.
op. cit. p. 552.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or., Uruguay.

semi-tortulum (C. M.) Par.

Hypnum semi-tortulum C. M. in Linn. 1880-83, p. 477.

1. — *Am. merid.* : Argentin. Buen. Ayr.

semi-tortum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 740.

Hypnum semi-tortum Mitt. M. austr. am. p. 556.

2 ? — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

senodictyon (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 438.

Hypnum senodictyon C. M. Syn. II, p. 247.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

serrulatum (Hedw.) Jaeg. Ad. II, p. 436.

Hypnum serrulatum Hedw. Sp. M. p. 238, t. 60 ; Brid. Bryol. univ. II,
p. 390 ; C. M. Syn. II, p. 246 ; Sull. M. of U. St. p. 70 et Ic. M. p. 167,
t. 106 ; Lesq. et Jam. Man. p. 359.

1. Terr. in silv. — *Am. sept.* : Ontar., Columb. brit., Oregon, reg.
sept., centr. or. et merid.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 118 (*Hypnum*).

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 436 (*Hypnum*).

« *subsp. eriense* (Kindb.) Par.

Eurhynchium serrulatum subsp. eriense Kindb. mss.

Terr. in silv. — *Am. sept.* : Ontario.

« *subsp. hispidulum* (Kindb.) Par.

Eurhynchium serrulatum subsp. hispidulum Kindb. mss.

Fl. et fr. ign. — *Am. sept.* : Columb. brit.

sparsirameum (*Geh. et Hpe.*) *Par.*

Hypnum sparsirameum *Geh. et Hpe. in Fl.* 1881.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

speciosum *Vent. et Bott.* — *Eurhynchium.*

sphaeropyxis *Rehm. M. Afr. austr. n.* 372.

— *Afr.* : Orange.

Stokesii *de Not.* — *Eurhynchium.*

striatellum *W. P. Sch.* — *Rigodium Lechleri.*

striatulum *Wils.* — *Eurhynchium.*

striatum *de Not.* — *Eurhynchium.*

strictifolium *Broth.* — *Rh. convolutifolium.*

strigosum *de Not.* — *Eurhynchium.*

var. *diversifolium* *de Not.* — *Eurhynchium strigosum var. diversifolium.*

strumiferum (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum strumiferum *Hpe. in F. v. Müller's Fragm. XI, Suppl. p.* 51.

— *Pac.* : Austral. or. ?

subacutifolium (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 443.

Hypnum subacutifolium *C. M. in Rev. bryol.* 1877, p. 53 (*nom.*).

— *Pac.* : Ins. Auckland.

subclavatum *Jaeg.* — *Rh. tenuifolium.*

subconfertum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 431.

Hypnum subconfertum *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 438.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

subconfertum *W. P. Sch.* — *Rh. Savatieri.*

subenerve (*Hpe. et C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 430.

Hypnum subenerve *Hpe. et C. M. in Bot. Zeit.* 1855, p. 785.

— *Afr.* : C. B. Sp.

subinclinatum (*W. P. Sch.*) *Kindb.* — *Rhaphidostegium sphaerotheca* ?

subintegrifolium (*Kindb.*) *Par.*

Eurhynchium subintegrifolium *Kindb. mss.*

2? *Lignic.* — *Am. sept.* : Columb. brit.

subpungens (*Hpe. et C. M.*) *Par.*

Rhycho-Hypnum subpungens *Hpe. et C. M. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 89.

— *Pac.* : Austral. or.

subrotundum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 433.

Hypnum subrotundum *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p.* 322.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subrusciforme *W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n.* 1697 (1862).

— *Am. merid.* : And. Boliv.

subrusciforme *C. M.* — *Rh. ruscoides.*

subserrulatum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 437.

Hypnum subserrulatum *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 439.

1? — *Afr.* : C. B. Sp.

subspeciosum *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

Eurhynchium subspeciosum *ej. in op. cit.* 1896, p. 124.

— *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

subvagans *Hpe. mss.*: *Jaeg. Ad. II*, p. 435.

— *As.*: Ind. or. (Yomah).

surrectum (*Mitt.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 430.

Hypnum surrectum *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 6, t. 11.

H. substrumulosum *W. P. Sch. in Mandon M. Madeir.* n. 44.

l. Saxic. — *Afr.*: Madeira.

taphrophilum *C. M. in Hedwig.* 1897, p. 135.

— *Am. merid.*: Argentin temperat.

Teesdalii *Bryol. eur.* — *Rh. curvisetum.*

teesdalioides *W. P. Sch. in Breutel M. Capens.*

Eurhynchium teesdalioides *Jaeg. Ad. II*, p. 425.

Rh. pseudo-confertum (*fid. Hpe.*).

— *Afr.*: C. B. Sp.

tenelliforme *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 130.

l. Lignic. — *Afr.*: Ins. Borbon.

tenellum (*Dicks.*) *Bryol. eur.* V (mon. p. 5), t. 508; *W. P. Sch. op. cit.* p. 580.

Hypnum exiguum *Bland. Fasc. II Crypt. exs. n.* 98.

H. tenellum *Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. t.* 11, f. 12; *C. M. Syn. II*, p. 396.

H. Stereodon algerianus *Desf. in Brid. Bryol. univ. II*, p. 592.

Pterigynandrum algerianum *P. B. Prodr.* p. 86.

l. Ad saxa et mur. antiq. — *Eur.*: Rariss. in Suec., rar. in zon. inter-med.: Voges., Silv. nigr., Francon., Jurass., etc.; vulg. in zon. merid. *As.*: Caucas. occ. et centr. *Afr.*: Septentr. tota, Madeir., M. Sinai.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 383, 542 et b, 904.

var. *brevifolium* *Lindb.* — *Amblystegium densum.*

« var. meridionale *Boulay.*

Ut typ. — *Eur.*: Gall. merid. *Afr.*: Alger.

tenerrimum *Jaeg.* — *Homalothecium.*

tenuifolium (*Hedw.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 435.

Hypnum collatum *H. f. et W. Fl. Tasman. II*, p. 209, t. 176, f. 5 (incl. var. β laxifolium, γ minus et δ).

H. confertum *eor. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 108 (incl. var. majus).

H. megapolitanum *eor. Fl. Antarct.*: *Hpe. in Linn.* 1855, p. 213.

H. radicale *Hsch. in Sieber M. Nov. Holl.* n. 2.

H. subclavatum *Hpe. in C. M. Syn. II*, p. 247.

H. tenuifolium *Hedw. Sp. M.* p. 283, t. 75; *C. M. Syn. II*, p. 348.

Isothecium tenuifolium *Brid. Bryol. univ. II*, p. 283.

Rh. subclavatum *Jaeg. l. c.* p. 436.

l. Lignic., ad arb., terr. et sax. — *Am. merid.*: And. Chilens., Brasil. austr., ins. Juan Fernandez. *Pac.*: Austral. or., Nov. Zeland. sept. et med., Tasman.

tenuivagum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 49; *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 279 (descript.).

Ster. Rupic. — *Afr.*: M. Cameroon.

Textori Sande Lac. — *Isopterygium.*

thamnicaulon *C. M. mss.*

— *As.*: Himalaya sept. occid.

thamnophilum *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n.* 90.

Lignic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Tocaremae (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 441.

Hypnum Tocaremae Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., p. 322.

Cortic. — Am. merid. : And. Nov. Granat.

trachychaeton F. v. Müller Austral. M. t. XV.

— Pac. : Austral. or. merid. (Victoria).

trachynoton (C. M.) Par.

Hypnum trachynoton C. M. in Linn. 1878-79, p. 499.

Fl. et fr. ign. — Am. merid. : Venezuela.

trachypelma (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 438.

Hypnum trachypelma C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 780.

Syn. — Pac. : Ins. Kermadec.

Trieblingii C. M. in Hedwig. 1897, p. 135.

— Am. merid. : La Plata.

tuloferum (Hpe.) Par.

Hypnum tuloferum Hpe. in Linn. 1859, p. 644.

Rhaphidostegium tuloferum Jaeg. Ad. II, p. 469.

— Pac. : Austral. or.

ulicon (Tayl.) Jaeg. Ad. II, p. 436.

Hypnum ulicon Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 337 ; C. M. Syn. II, p. 444 ; Mitt. M. austr. am. p. 555.

Rupic ? — Am. merid. : And. Nov. Granat., Quitens. et Peruv.

vagans (Harv.) Jaeg. Ad. II, p. 435.

Hypnum vagans Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 24, f. 2 ; C. M. Syn. II, p. 249 ; Bryol. jav. II, p. 160 ; Mitt. M. Ind. or. p. 81.

2. — As. : Nepal., Sikkim, Java, ins. Ceram, Ternate.

Vaucheri Vent. et Bott. — Eurhynchium.

Volkensii (Broth.) Par.

Hypnum Volkensii Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 211.

1. Cortic. in silv. humid. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Vriesei (Dz. et Mk.) Jaeg. Ad. II, p. 437.

Hypnum Vriesei Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 310 ; Bryol. jav. II, p. 157, t. 256.

1. — As. : Borneo ; Tonkin ?

Welwitschii W. P. Sch. — Rhaphidostegium.

Zeyheri (Spreng.) Jaeg. Ad. II, p. 430.

Hypnum Zeyheri Spreng. mss. ; C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 785.

1. Cortic. — Afr. : C. B. Sp. (1).

Rhystogonium C. M. M. Polyn. p. 69 (sect. PHYLLOGONI).

Rhystophyllina C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 42 (nom., sect. HOOKERLÆ).

Rhystophyllum Ehrh. Crypt. exs. n. 97 ; C. M. Syn. II, p. 46 (subsect. NECKERLÆ).

Rhystotis C. M. in Fl. 1896, p. 463 (sect. METEORII).

(1) In Enum. Kindberg. nom. nuda :

Rh. perexiguum C. M.

| Rh. pseudo-melanangium C. M.

Rhytiadelphus *Lindb. M. Scand. p. 37* (sect. *HYLOCOMI*).

Rhytidium *Sull. mss.*; *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 615* (subgen. *HYPNI*).

RIGODIUM *Kze herb.*; *C. M. Syn. II, p. 418* (15 spec.).

Alaguelae (*C. M.*) *Par.*

Hypnum Alaguelae C. M. in Journ. of Bot. 1877, p. 230 (nom.).

Lignic. — *Am. sept.*: Costa Rica.

argentinum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum argentinum C. M. in Linn. 1880-83, p. 480.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.*: Argentin. Tucum. sub-tropic.

brachypodium (*C. M.*) *Par.*

Hypnum brachypodium C. M. Syn. II, p. 445.

H. toxarion Mitt. p.p.

2. — *Am. merid.*: Chile.

breviramulosum Broth. mss.

— *Am. merid.*: Brasil.

gracile Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I, p. 197.

2. — *Am. sept.*: And. Costa Ricens.

implexum Kze. mss.; *Schw. in Linn. 1844, p. 559, t. 9.*

Heterocladium implexum Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 189.

Hypnum implexum C. M. Syn. II, p. 445.

2. *Terr.* — *Am. merid.*: Chile, Valdivia.

kilimandscharicum (Broth.) Par.

Hypnum kilimandscharicum Broth. Jahrb. 1897, p. 280.

2. *Ad arbor.* — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

Kunerti C. M. mss.

Ster. — *Am. merid.*: Brasil. (Rio-Grande do Sul.).

Lechleri W. P. Sch. in Lechler Pl. Chil. n. 620 a.

Eurhynchium striatellum ej. l. c. (fid. Mitt. M. austr. am. p. 557).

Heterocladium Lechleri { *ej. l. c. (fid. Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit. l. c.).*

Heterocladium prolixum {

Hypnum arborescens C. M. in Bot. Zeit. 1858, p. 172.

H. toxarion Mitt. l. c. p.p.

2. *Cortic.* — *Am. merid.*: Chile.

leptodendron C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 62.

2. — *Am. merid.*: And. Boliv.

nano-fasciculare C. M. hb.

— *Am. merid.*: Valdivia.

Schlosseri (C. M.) Par.

Brachythecium Schlosseri Jaeg. Ad. II, p. 403.

Hypnum Schlosseri Sendtn. mss.; *C. M. Syn. II, p. 451.*

Thamniella Schlosseri Geh. in Rev. bryol. 1897, p. 79.

2. — *Pac.*: Austral. or. (Nov. Vales.).

solutum (Tayl.) Par.

Hypnum solutum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 65; C. M. Syn. II, p. 446.

H. toxarion Wils. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 453.

2? — *Am. merid.*: And. Quitens.

Tamarix C. M. in Hedwig. 1897, p. 139.
Ster. — *Am. merid.* : Fuegia.

toxarion (Schwaegr.) W. P. Sch. herb. (1).

Hypnum toxarion Schwaegr. Suppl. I, II, p. 283; Brid. Bryol. univ. II, p. 443; C. M. Syn. II, p. 446; Mitt. l. c.

— *Am. merid.* : Tota occid. et austral.

vagum Reichdt. — Lembophyllum (2).

ROTTLERIA *Brid. Bryol. univ. I, p. 105.*

gymnostomoides *Brid. — Entosthodon Rottleri.*

javanica *Brid. — Hyophila.*

ROZEA *Besch Prodr. bryol. mexic. p. 97 (8 spec.).*

Andrieuxii (Mont.) Besch. op. cit. p. 101.

Hypnum Andrieuxii C. M. Syn. II, p. 348.

Isothecium Andrieuxii Mont. Syll. p. 18.

— *Am. sept.* : Mexic.

Bourgeaeana Besch. op. cit. p. 98.

— *Am. sept.* : Mexic.

chrysea Besch. op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Mexic.

pterogonioides (Harv.) Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 84.

Hypnum pinetorum Jaeg. Ad. II, p. 610.

H. pterogonioides C. M. Syn. II, p. 349.

Leskea pterogonioides Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 17 et in

Hook. Ic. pl. rar. t. 24, f. 8.

Pleuropus pterogonioides Griff. Not. p. 470.

Stereodon pinetorum Mitt. M. Ind. or. p. 93.

2. — *As.* : Nepal., Himalaya, Yunnan.

Schimperi Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 100.

— *Am. sept.* : Mexic.

stricta Besch. op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Mexic.

subjalacea Besch. op. cit. p. 99.

— *Am. sept.* : Mexic.

viridis Besch. op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Mexic.

RUDIA *W. P. Sch. mss. (1 spec.).*

? *Charazii* *Jaeg. — Helicodontium.*

fluminensis (Hpe.) W. P. Sch. mss.; Jaeg. Ad. II.

Hypnum fluminense Hpe. mss.

— *Am. merid.* : Brasil. austr or.

(1) *R. brachypodium, implexum, Lechleri, solutum et toxarion* unam et eadem spec. sistunt, sec. Mitt. M. austr. am. p. 557.

(2) In Enumer. Kindberg. nom. nudum :
R. concatenatum Lindb.

Rutabularia *Kindb. Check-list of Eur. and N. Amer. M. p. 73* (sect. BRACHYTHECII *sensu* Kindb.).

RUTENBERGIA *Geh. et Hpe. in Abhandl. Brem. VII, p. 110* (4 spec.).

borbonica *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 190.*

Ster. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

cirrata *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 125.*

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

limbata (*Hpe.*) *Besch. op. et l. cc.*

? *Pilotrichum limbatum* *Hpe. in Linn. 1874, p. 220.*

— *Afr.* : Madagascar.

madagassa *Geh. et Hpe. op. et l. cc.*

2. — *Afr.* : Madagascar.

SACCOPHORUM *P. B. Prodr. p. 30.*

aphyllus *P. B.* — *Buxbaumia*.

Salebrosaria *Kindb. Check-list of Eur. and N. Amer. M. p. 33* (sect. BRACHYTHECII *sensu* Kindb.).

SAPROMA *Brid. Bryol. univ. I, p. 52.*

cyrtophyllum *Brid.* — *Bruchia vogesiaca* ?

vogesiaceum *Brid.* — *Bruchia vogesiaca*.

SAULOMA *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 122* (9 spec.).

baliensis *Bryol. jav.* — *Ectropothecium*.

capillaris *C. M.* — *Pterogoniella*.

chloroclada *C. M.* — *Pterogoniella*.

hamata (*Hpe.*) *Bryol. jav. II, p. 110. t. 219.*

Leskea ericoides *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 178.*

Neckera hamata *C. M. Syn. II, pp. 78 et 666.*

Pterogoniella hamata *Jaeg. Ad. II, p. 113.*

Pterogonium *Hpe. mss.*

Syn. — *As.* : Sumatra, Java.

intexta *C. M.* — *Pterogoniella*.

Jagori *Bryol. jav. II, p. 109.*

Neckera Jagori *C. M. in Bot. Zeit. 1864, p. 373.*

Pterogoniella Jagori *Jaeg. Ad. II, p. 111.*

Pterogonium Jagori *C. M. in Forschungsreise... Bot. p. 58.*

l. Cortic. — *As.* : Ceylan, Java, Malacca, Amboine, Celebes.

julacea *C. M. in Dusen M. Camer. n. M.*

— *Afr.* : M. Cameroon.

lineolata (*Duby*) *Par.*

Neckera lineolata *C. M. Syn. II, p. 176.*

Pterigynandrum lineolatum *Duby in Moritz Verz. d. Zoll. Pfl. p. 130.*

Pterogoniella lineolata *Jaeg. Ad. II, p. 113.*

Pterogonium lineolatum *C. M. in Linn. 1869-70, p. 22.*

S. microcarpa *var. lineolata* *Bryol. jav. II, p. 168.*

l. Saxic. — *As.* : Ceylan, Java.

lonchocarpa C. M. mss.

— As. : Ins. Andaman.

microcarpa (Harv.) Bryol. jav. II, p. 108, t. 218.

Neckera leucocytus C. M. Syn. II, p. 76.

Neckera macrocarpa (err. typogr.) ej. l. c. p. 78.

Pterogoniella microcarpa Jaeg. Ad. II, p. 112.

Pterogonium microcarpum Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 12 et in Hook. Ic. pl. rar. t. 24, f. 12.

1. Cortic. — As. : Nepal., Ceylan, Sumatra, Java, Borneo, Banca, Amboine. Pac. : Nov. Guin.

var. lineolata Bryol. jav. — S. lineolata.

“ var. minor Ren. et Card. in Rev. bryol. 1896, p. 101.

Cortic. — As. : Java, Amboine.

plagiothecioides C. M. mss.

Ster. — As. : Ins. Andaman.

samoana C. M. — Pterogoniella.

stratosa C. M. — Pterogoniella.

tenella (Hook. f. et Wils.) Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 89 et in Handb. of N. Zeal. Fl. p. 493.

Hookeria tenella H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 122, t. 92, f. 8.

2. Lignic. et rupic. — Pac. : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman.

tenuis C. M. — Pterogoniella.

Zetterstedti (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 732.

Distichophyllum Zetterstedti Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 77.

Homalia Zetterstedti Jaeg. op. cit. p. 199.

Hookeria Zetterstedti C. M. in Linn. 1871-73, p. 158.

2. — Pac. : Austral.

Scabridaria Kindb. Check-list of Eur. and N. Amer. M. p. 22 (sect. EURHYNCHII sensu Kindb.).

SCHISTIDIUM Brid. Mant. M. p. 20 et Bryol univ. I, p. 113.

Spec. omn. non indicatae sunt GRIMMIAE ejusd. nom.

alpicola Limpr. — Grimmia apocarpa var. alpicola.

apocarpum Wils. — Geheebia cataractarum.

arcuatum H. f. et W. — Eccremidium.

australe Wils. — Hedwigidium Drummondii?

caespiticiu Brid. — Stylostegium.

ciliatum } Brid. — Hedwigia.

 } Hpe. — Hedwigia nivalis.

dominghense Spreng. — Erpodium.

Drummondii Tayl. — Hedwigidium.

gracile Limpr. — Grimmia apocarpa var. gracilis.

imberbe

var. atro-virens } Bryol. germ. — Hedwigidium imberbe.

var. gracile

marginatum H. f. et W. — Streptopogon.

nervosum P. B. — ?

nudum Schleich. — Braunia sciuroides.

Perrotletii Mont. — Erpodium.

pulchellum H. f. et W. — Eccremidium.

- pulvinatum* { Brid. p. p. } — *Grimmia anodon*.
 { Br. et Sch. } — *Grimmia sphaerica*.
 — *Grimmia aethiopica*.
? recurvifolium Spr. — *Barbula*.
repens Brid. — *Gigaspermum*.
serratum H. f. et W. — *Physcomitrium*.
striatum Brid. — *Amphoridium lapponicum*.
subsessile Brid. — *Pharomitrium*.
torquatum Brid. — *Helicophyllum*.

SCHISTOMITRIUM Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 67 (6 spec.).

- acutifolium* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 302.
 Ster. — Afr.: M. Usagara, Natal, Madagascar.
africanum Rehm. M. Afr. austr. n. 456.
 Ster. — Afr.: Transvaal.
apiculatum Dz. et Mk. op. cit. p. 68, t. 24 et 25; C. M. Syn. I, p. 81;
Bryol. jav. I, p. 19, t. 13.
Syrrophodon apiculatus Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 315.
 2. Cortic. — As.: Sumatra, Java, Borneo.
Gardnerianum Mitt. — *Ochrobryum*.
Lowii Mitt. in op. et l. cc.
 — Afr.: Kina-Bahu.
robustum *Bryol. jav. I*, p. 21, t. 18.
 2. — As.: Java.
speciosum (Dz. et Mk.) Hpe. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 922; C. M. Syn. II,
 p. 536.
Leucophanes speciosum C. M. Syn. I, p. 81.
Spirula speciosa Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 72, t. 26;
Bryol. jav. I, p. 22, t. 13 D.
Syrrophodon speciosus eor. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 315.
 2. Cortic. — As.: Java.

SCHISTOPHYLLUM (vid. SKITOPHYLLUM).

SCHISTOSTEGA Web. et Mohr Bot. Taschb. p. 92 (1 spec.).

- osmundacea* (Dicks.) Web. et Mohr. l. c., t. 6; Brid. *Bryol. univ. I*,
 p. 109; *Bryol. eur. III*, t. 279; C. M. Syn. I, p. 38; W. P. Sch. Syn.
 II ed. p. 352.
Bryum pennatum With. 821.
Dicksonia pusilla Ehrh. *Crypt. Dec. n.* 65.
Gymnostomum osmundaceum Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 28.
G. pennatum Hedw. M. frond. I, p. 77, t. 29.
Mnium osmundaceum Dicks. *Fasc. I Pl. crypt.* p. 3, t. I.
Sch. pennata H. et T. *Muscol. brit.* p. 14, t. 8.
 2. In crypt. et cavit. declivit.; calcar. fugit. — Eur.: Sept. et med.:
 Scand., Karelia, Britann.; German., Salisb., Arden., Palatin.,
 Normann., Armor., Arvern., Pyren. Am. sept.: Ontar., M. Ru-
 pestr. et Selkirk, Columb. brit., New York, M. Alb.
 Exs.: Mac. Can. M. n. 137.
 Rab. *Bryoth. eur.* n. 503.
pennata H. et T. — Sch. *osmundacea*.

Schistostegiopsis C. M. in Linn. 1876, p. 362 (sect. FISSIDENTIS).

SCHIZOMITRIUM Bryol. eur. V (mon. *Hookeria*) pro mem. (4 spec.).

daltonioides W. P. Sch. herb.

Callicostella daltonioides Jaeg. Ad. II, p. 261.

— *Am. merid.* : Guian. gall.

Leprieurii W. P. Sch. herb.

Callicostella Leprieurii Jaeg. Ad. II, p. 261 (1).

— *Am. merid.* : Guian. gall.

obliquum (Hpe.) W. P. Sch. herb.

Callicostella obliqua Jaeg. l. c. (2).

Hookeria obliqua Hpe. in sched.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

obscurum W. P. Sch. herb.

Callicostella obscura Jaeg. l. c.

— *Am. sept.* : Ins. S. Cristoph.

papillatum Sull. — *Hookeria oblongifolia* (3).

SCHIZHYMENIUM Harv. in Hook. Ic. pl. rar. III.

bryoides Harv. — *Mielichhoferia Eckloni*.

nanum Tayl. — *Mielichhoferia*.

Schizophascum C. M. in Fl. 1888, n. 1 (sect. PHASCI).

SCHLIEPHACKEA C. M. in Fl. 1875, n. 34-35 (1 spec.).

prostrata C. M. in op. et l. cc.

1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

SCHLOTHEIMIA Brid. Mant. M. p. 114, t. II, f. 10 (115 spec.).

acicularis Brid. — *Macromitrium*.

acuminata Reinw. et Hsch. in Nov. Act. Leop. XIV, II, Suppl. 1829, p. 711; C. M. Syn. I, p. 764; Bryol. jav. I, p. 135.

Macromitrium acuminatum C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 544.

Fl. et fr. ign. — *As.* : Java.

affinis C. M. Syn. I, p. 761.

Schl. squarrosa H. f. et W. in Gardn. M. Brasil. n. 66?

Schl. torquata C. M. ibid.

2. — *Am. merid.* : Brasil.

(1) « Forsan var. *H. scabrisetae*. » Jaeg. l. c.

(2) « Forsan var. *H. microcarpae*. » Jaeg. l. c.

(3) Sec. Jaeg. Ad. II, p. 734, huic gen. pertinent :

H. Martiana.

Merkelii.

Olfersiana.

Forsan quoque :

H. longipedunculata.

H. microcarpa.

pallida.

papillata.

scabriseta.

etc.

angustata Mitt. *M. austr. am.* p. 223.

Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Peruv.

apiculata Lindb. in *Ångstr. Prim. lin.* p. 13 (nom.).

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

appressifolia Mitt. *op. cit.* p. 221.

— *Am. merid.* : Brasil.

Appunii C. M. in *Fl.* 1897, p. 333 (nom.).

— *Am. merid.* : Guian. brit.

Araucarieti C. M. in *Ule Bryoth. brasil. austr. or.*

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

argentinica Ltz. et C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 373.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

argentinica Besch. — Schl. paraguensis.

badiella Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 80.

2. Cortic. — *Afr.* : Madagascar, ins. Borbon.

« *var. brevifolia* Ren. in *Rev. bryol.* 1889, p. 82.

— *Afr.* : Ins. Franciaë.

« *var. helicophylla* Besch. *op. et l. cc.*

— *Afr.* : Madag. sept., ins. Borbon.

« *var. longicaulis* Besch. *op. et l. cc.*

Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

Baileyi Broth. in *Bail. Syn. of the Queensl. Fl. IV Suppl. (nom.) et in Oefv....* 1890.

2. Lignic. — *Pac.* : Austral. or. (Queensland, Nov. Vales.).

Balfourei Mitt. in *Trans. of the roy. Soc. of Edinb.* 1887, p. 333.

— *Afr.* : Ins. Socotora.

Boiviniana Besch. *op. cit.* p. 78.

— *Afr.* : Ins. Comor. magn.

brachyphylla Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 118 et *M. Masc. Mad.* n. 214.

1? — *Afr.* : Ins. Borbon.

brachyrhyncha Schwaegr. — *Macromitrium*.

breviseta Ångstr. *Prim. lin.* p. 14.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Brownei Brid. *Bryol. univ.* I, p. 799 ; *Schwaegr. Suppl.* II, II, I, p. 52, t. 167 ; C. M. *Syn.* I, p. 755 ; *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal.* II, p. 77 et *Handb.* p. 427.

2. Cortic. ? — *Pac.* : Austral., Nov. Zeland. sept.

bursata Ren. et Card. *mss.*

— *Afr.* : Ins. Franciaë.

Campbelliana C. M. *Syn.* I, p. 753 et II, p. 647.

Schl. *quadrifida* H. f. et W. *Fl. Antarct.* I, p. 126, t. 58, f. I.

Ad arbor. et rup. — *Pac.* : Ins. Campbell.

Campylopus C. M. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

capillaris Hpe. *Symb.* 1874, p. 495.

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

- Chamissonis* Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 31; *C. M. Syn.* I, p. 757; *Mitt. M. austr. am.* p. 227.
Macromitrium Chamissonis C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
 — *Am. merid.* : Brasil.
- chlorophyllosa* C. M. — Schl. Mülleri.
- ciliolata* C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 560.
 Cortic. — *Am. sept.* : Jamaic.
- cirrosa* Schwaegr. — *Macromitrium*.
- clavata* Geh. et Hpe. *Enum. M. Brasil*, p. 27.
 — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Commersoniana* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 78.
 2. Ster. — *Afr.* : Ins. Franciae.
- compacta* C. M. *Syn.* I, p. 763.
 Schl. squarrosa? H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, fasc. Mart.
 Schl. trichomitria C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 107 (*jure, fid. Mitt. op. cit.* p. 228).
 2. — *Am. merid.* : Brasil.
- conica* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 115 et *M. Masc. Mad.* n. 67.
 Ad saxa granit. — *Afr.* : Madagascar.
- cuspidata* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 155 et 504.
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- “ *var. brevipedunculata* Rehm. *l. c. n.* 156.
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- cuspidifera* Mitt. *M. austr. am.* p. 222.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil.
- elata* Mitt. *op. cit.* p. 225.
 Rupic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- emergens* Mitt. *op. cit.* p. 222.
 — *Am. merid.* : Brasil.
- excorrugata* C. M. in *Hildebr. M. Mad.* n. 2094.
 — *Afr.* : Madagascar.
- fasciculata* Mitt. *op. cit.* p. 221.
 — *Am. merid.* : Brasil.
- ferruginea* (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 743; *C. M. Syn.* I, p. 555.
Macromitrium ferrugineum C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 544.
Orthotrichum ferrugineum H. et Gr. in *Brewster Edinb. Journ.* I, p. 118, t. 5.
 2. Cortic. — *Afr.* : C. B. Sp.
- fornicata* Duby in *Mém.... Genève*, 1876, p. 5, t. 3, f. 3; *Besch. op. cit.* p. 79.
 2. Cortic. in sily. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.
- foveolata* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 119 et *M. Masc. Mad.* n. 170.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Sancta Maria Madagasc.
- fulva* Angstr. — Ulota.
- furcata* Mitt. in *op. cit.* p. 222.
 Ster. — *Am. merid.* : Brasil. ?

fusco-viridis *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 32*; *C. M. Syn. I, p. 754*; *Mitt. op. cit. p. 226*.

2. Cortic. — *Am. merid.*: Brasil.

glauca *C. M. Syn. II, p. 648*.

Schl. trichomitria *Schwaegr. (fid. Mitt. op. cit. p. 228)*.

2. — *Am. merid.*: Venezuela.

Glaziovii *Hpe. Enum. M. Brasil. p. 26*.

Cortic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

goniorhyncha *Dz. et Mk. -- Macromitrium*.

gracilis *Hsch. op. cit. p. 35*; *C. M. Syn. I, p. 764*; *Mitt. op. cit. p. 228*.

Macromitrium gracile *C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 544*.

Fl. et fr. ign. — *Am. merid.*: Brasil.

gracillima *Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1885, p. LXI et in Miss. sc. Cap Horn, V, Bot. p. 280, t. 3, f. 11*.

Ster. — *Am. merid.*: Patag. austr.

grandiareolata *C. M. in Linn. 1878-79, p. 485*.

— *Am. merid.*: Venezuela.

Grevilleana *Mitt. M. Ind. or. p. 52*.

Orthotrichum squarrosum *Griff. Not. p. 403*.

2? Terr. — *As.*: Khasia, M. Neilgherr., Ceylan. *Afr.*: Transvaal.

Ews.: Rehm. *M. Afr. austr. n. 502*.

Henscheriana *C. M. in Linn. 1874, p. 644*.

2. — *Am. merid.*: Brasil.

illecebra *W. P. Sch. in Besch. op. et l. cc.*

— *Afr.*: Ins. Borbon.

immersa *Mitt. M. austr. am. p. 221*.

— *Am. merid.*: Brasil.

immersa *C. M. — Schl. tecta*.

Jamesoni (*W. Arn.*) *Brid. Bryol. univ. I, p. 742*; *C. M. Syn. I, p. 757*; *Mitt. op. cit. p. 224*.

Macromitrium Jamesoni *C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 543*.

Orthotrichum Jamesoni *W. Arn. in Trans. of Wern. Soc. V, p. 201*.

2. Cortic. et rupic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

« var. elata *Hpe. Enum. M. Brasil. p. 28*.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

julacea *Hsch. op. cit. p. 30*; *C. M. Syn. I, p. 761*; *Mitt. op. cit. p. 224*.

Macromitrium julaceum *C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 543*.

2. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

juliformis *Geh. et Hpe. in Fl. 1881*.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Kegeliana *C. M. Syn. I, p. 754*; *Mitt. op. cit. p. 227*.

Macromitrium Kegelianum *ej. in Linn. 1848, p. 187*.

2. Cortic. — *Am. merid.*: Guian. batav.

Krauseana *Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit. 1869*.

Cortic. — *Am. merid.*: Æquator.

laete-virens *Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 185*.

2. Cortic. — *Afr.*: Usambara.

- lasiomitria C. M. in *Fl.* 1897, p. 333.
— *Am. merid.* : And. Venezuel.
- laxa Hsch. *op. cit.* p. 33 ; C. M. *Syn. I*, p. 762 ; Mitt. *op. cit.* p. 227.
Macromitrium laxum C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
2. — *Am. merid.* : Brasil.
- linealis C. M. in *Abhandl. Brem. VII*, p. 208.
— *Afr.* : Madagascar.
- longifolia Hsch. *op. cit.* p. 34 ; C. M. *Syn. I*, p. 759 ; Mitt. *op. cit.* p. 226.
Macromitrium linearifolium C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
2. — *Am. merid.* : Monte-Video.
- longifolia Schwaegr. — Macromitrium.
- Mac Leai Rehm. *M. Afr. austr. n.* 503.
— *Afr.* : Transvaal.
- macromitrioides C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 514.
Ster. — *Am. merid.* : Guian. brit.
- malacophylla Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 80.
— *Afr.* : Ins. Borbon.
- Martiana Hsch. *op. cit.* p. 32 ; C. M. *Syn. I*, p. 760 ; Mitt. *op. cit.* p. 224.
Macromitrium Martianum C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Merkelii Hsch. — Schl. rugifolia.
- microcarpa W. P. Sch. in *M. Pervillé hb. Mus. Paris.*
— *Afr.* : Madagascar.
- microphylla Besch. *op. cit.* p. 76.
2. — *Afr.* : M. Madagascar.
- Mohriana C. M. in *Linn.* 1876, p. 642.
1. — *Am. sept.* : Mexic.
- mollis Rehm. *M. Afr. austr. n.* 506 et 507.
— *Afr.* : Transvaal.
- Mülleri Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 28.
Schl. chlorophyllosa C. M. in *sched.*
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- nitida Schwaegr. *Suppl. II, II, I.* p. 51, t. 167 ; *Brid. Bryol. univ. I*,
p. 798 ; C. M. *Syn. I*, p. 754 ; Mitt. *op. cit.* p. 223.
2. Cortic. *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- « var. fuscata Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 26.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- nitida Wils. et C. M. — Schl. Sprengelii.
- nossi-beana C. M. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 83.
— *Afr.* : Ins. Nossi-Be.
- oblonga Tayl. — Macromitrium longifolium.
- ochracea Dz. et Mk. — Macromitrium.
- Erstedtiana C. M. *Syn. II*, p. 648 ; Mitt. *op. cit.* p. 224.
2. — *Am. sept.* : And. Costa Ricens.

Ottonis *Schwaegr. Suppl. II, II, I, p. 54, t. 168; Brid. Bryol. univ. I, p. 801; C. M. Syn. I, p. 754; Mitt. op. cit. p. 223.*

Macromitrium Ottonis *C. M. in Bot. Zeit. 1845, p. 544.*

2. — *Am. merid.*: Monte Video.

Pabstiana *C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 762.*

Schl. nitida *Schwaegr. (fid. Mitt. op. cit. p. 224).*

2. Cortic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

paraguensis *Besch. Not. M. Parag. p. 262.*

Schl. argentinica *ej. in Rev. bryol. 1885, p. 18 et in Bal. M. Parag. n. 3675.*

Cortic. — *Am. merid.*: Paraguay.

Exs.: Bal. Pl. Parag. n. 1236, 1239.

patula *Mitt. M. austr. am. p. 225.*

— *Am. merid.*: Brasil.

pellucida *C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 561.*

2. Cortic. — *Am. sept.*: M. Jamaic.

percorrugata *C. M. in Sikora Pl. Mad. n. 14338.*

— *Afr.*: Madagascar.

perichaetialis *Schwaegr. — Macromitrium.*

Perroti *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1896, I, p. 312.*

Cortic. — *Afr.*: Madagascar.

phaeochlora *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc. p. 82.*

Cortic. — *Afr.*: Ins. Borbon., Franciae.

pilicalyx *Broth. et Geh. in Oefv. af Finska Vet.-Soc. Foerh. 1895, p. 61.*

2. — *Pac.*: M. Nov. Guineae.

pilomitria *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 39.*

— *Am. merid.*: And. Boliv.

Puiggarii *Geh. et Hpe. in Fl. 1881.*

Orthotrichum Puiggarii Duby.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

pulchella *Hsch. — Macromitrium.*

pungentissima *C. M. in Linn. 1878-79, p. 485.*

— *Am. merid.*: Venezuela.

quadrifida *Brid. Mant. M. p. 114; C. M. Syn. I, p. 753.*

Orthotrichum angulosum P. B. Prodr. p. 90.

O. quadrifida H. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I, p. 128.

— *Afr.*: Ins. Borbon.; ins. Franciae? Tristan d'Acunha?

quadrifida *H. f. et W. — Schl. Campbelliana.*

recurvifolia *Hsch. op. cit. p. 35; C. M. Syn. I, p. 762; Mitt. op. cit. p. 225.*

2. Rupic. — *Am. merid.*: Brasil.

Regneli *Ångstr. in Oefv.... 1876, n. 4, p. 13.*

2. Cortic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

rhystophylla *C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57.*

— *Pac.*: Nov. Caledon.

- Richardi Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 81 (1).
2? — Afr.: Ins. Borbon.
- rigescens Broth. in Engler's *Bot. Jahrb.* 1894, p. 186.
2. — Afr.: Usambara.
- Robillardii Duby in *Mém.... Genève*, 1876, p. 6, t. 2, f. 6.
2? — Afr.: Ins. Franciae.
- rufo-aeruginosa C. M. in Linn. 1875, p. 410.
2. Filicic. — Afr.: Natal.
- rufo-pallens C. M. in Rehm. *M. Afr. austr. n.* 154.
— Afr.: C. B. Sp.
- rugifolia (Hook.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 322 (excl. syn. Schwaegr.)
et 741; C. M. Syn. I, p. 760; Mitt. op. cit. p. 226.
Macromitrium rugifolium C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
Orthotrichum rugifolium Hook. M. ex. t. 128.
Schl. Merkelii Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 29, t. I.
2. Cortic. — Am. merid.: Brasil. austr. or.
- rugifolia* { Schwaegr. — Schl. sinuata.
Sull. — Schl. Sullivantii.
- sarcotricha C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 196.
Cortic. — Am. sept.: Guatemala.
- Sartorii W. P. Sch. in Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 47.
— Am. sept.: Mexic.
- Schweinfurthii C. M. in Linn. 1875, p. 408.
2. Cortic. — Afr.: Monbottou.
- serricalyx C. M. in Ule *Bryoth. brasil. n.* 19.
— Am. merid.: Brasil. austr. or.
- sinuata Hsch. op. cit. p. 31; C. M. Syn. I, p. 761; Mitt. op. cit. p. 225.
Macromitrium sinuatum C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
Schl. rugifolia Schwaegr. *Suppl. II, II*, t. 139; Wils. et C. M. in *Gardn.*
M. Brasil. n. 68.
2. Cortic. — Am. merid.: Brasil. austr. or.
- sphaeropoma Duby *Choix de Crypt...* 1867, p. 9.
2. Cortic. — Am. sept.: Mexic.
- Sprengelii Hsch. op. cit. p. 34; C. M. Syn. I, p. 758; Mitt. op. cit. p. 222.
Macromitrium Sprengelii C. M. in *Bot. Zeit.* 1845, p. 543.
Schl. nitida Wils. et C. M. in *Gardner M. Brasil. n.* 65.
2. — Am. merid.: Brasil. austr. or.
- squarrosa (Hook. et Grev.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 324; Schwaegr.
Suppl. I, II, p. 39, t. 562; C. M. Syn. I, p. 751.
Orthotrichum squarrosum H. et Gr. in Brewster *Edinb. Journ.* I, p. 128.
Cortic. — Afr.: Madagasc. sept., ins. Borbon.
- squarrosa* { H. f. et W. — Schl. compacta?
eor. — Schl. affinis?
- stellutata Hsch. — Macromitrium.
- sublaevifolia C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 39.
— Am. merid.: And. Boliv.

(1) Quid: Schl. Richardi W. P. Sch. (C. M. in Reliq. Rutenberg. p. 208)?

ventrosa C. M. *Syn. I*, p. 756.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

viticulosa Raddi. — *Macromitrium brachyrhynchum*.

Wainioi Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Minas Geraës.

Wallisii C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 173.

— *As.* : M. ins. Philippin. (1).

SCHAENOBRYUM Dz. et Mk. *M. Archip. ind. t.* 60.

julaceum eor. — *Acrocryphaea concavifolia*.

SCHLUMBERGERIA W. P. Sch. *mss.*

vulcanica ej. — *Ängstroemia brevipes*.

SCHRADERELLA C. M. in *Linn.* 1878-89, p. 501 (1 spec.).

pungens C. M. *l. c.*

— *Am. merid.* : Venezuela.

SCHWETSCHKEA C. M. in *Linn.* 1875, p. 429 (14 spec.).

boliviana C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 53.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 491.

— *Afr.* : M. Cameroon.

gracillima (Tayl.) Jaeg. *Ad. II*, p. 288.

Anomodon gracillimus Jaeg. *op. cit.* p. 301.

Hypnum columbicum C. M. in *Bot. Zeit.* 1856, p. 459.

Leskea gracillima Mitt. *M. austr. am.* p. 567.

Neckera gracillima Tayl. in *Hook. Lond. Journ. VII*, p. 192 ; C. M. *Syn. II*, p. 567.

1. Cortic. et saxic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens.

Grateloupii (Mont) C. M. in *Linn.* 1875, p. 433.

Anomodon Grateloupii Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 100, t. 5, f. 3.

Neckera Grateloupii C. M. *Syn. II*, p. 82.

1. Cortic. — *Afr.* : Ins. Borbon.

guatemaliensis (Hpe.) C. M. in *Linn.* 1875, p. 434 et in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 202.

Clasmatodon guatemaliensis Hpe. in *sched.*

1. — *Am. sept.* : Guatemala.

japonica Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, VII ser., XVIII, p. 362.

1. Cortic. — *As.* : Japon.

laxa (Wils.) Jaeg. *op. et l. cc.*

Neckera laxa C. M. *Syn. II*, p. 83.

Pterogonium laxum Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1843, p. 276, t. 10 E.

1. Cortic. — *As.* : China orient.

minuta C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 53.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Monbottoviae C. M. in *Linn.* 1875, p. 433.

1. fr. ign. — *Afr.* : Monbottou.

(1) In *Enum. Kindberg.* nom. nudum :
Schl. *Balfourii* Mitt.

pygmaea (Dz. et Mh.) C. M. in op. cit. p. 434.

Anacamptodon pygmaeus Bryol. jav. II, p. 180. (1854-1871)

Leskea pygmaea Dz. et Mh. M. frond. ined. Archip. ind. p. 47, t. 49. (1915-18)

Neckera pygmaea eor. in Ann. sc. nat. 1844, p. 313; C. M. Syn. II, p. 82.

— As.: Borneo.

Rehmanni C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 346.

— Afr.: C. B. Sp.

Schweinfurthii C. M. in Linn. 1875, p. 432.

1. Terr. — Afr.: Niam-Niam.

sinensis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 111.

1. — As.: China or. (prov. Shen-Si).

usambarica Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 109.

1. Cortic. — Afr.: Usambara (1).

SCIADOCLADUS Lindb. in Oefv... 1861.

Spec. omn. sunt HYPNODENDRA ejusd nom.

Sciarodium C. M. Syn. II, p. 526 (sect. CONOMITRII sensu Müller.).

SCIAROMIUM Mitt. M. austr. am. p. 571 (26 spec.).

arboreum (Broth.) Par.

Echinodium arboreum Broth. in Oefv... 1893, p.

2. Cortic. — Pac.: Austral. or. (Nov. Vales.).

Cheesemani C. M. mss.

— Pac.: Nov. Zeland. sept.

confluens (C. M.) Par.

Hypnum confluens C. M. in Fl. 1885, p. 429.

H. conspissatum Sull. in Wilkes. Expl. Exped. p. 12?

Limbella confluens C. M. in Erforschungsreise... Bot. p. 37.

Ster. Aquat. — Am. merid.: Fuegia.

conspissatulum (C. M.) Par.

Limbella conspissatula C. M. in Hedwig. 1897, p.

Ster. Ad rip. rivul. — Am. merid.: Argentin. Patagon.

conspissatum (Hook. f. et Wils.) Mitt. op. cit. p. 572.

Hypnum conspissatum H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 553 et

Fl. Antarct. II, p. 419, t. 155; C. M. Syn. II, p. 422 (2).

Limbella conspissata C. M. in Erforschungsreise... Bot. p. 37.

Ster. Aquat. — Afr.: Ins. Kerguelen. Am. merid.: Ins. Maclov.

crassinervatum Mitt. op. et l. cc.

Ster. Ad saxa irror. — Am. merid.: And. Nov. Granat.

drepanophyllopsi (C. M.) Par.

Limbella drepanophyllopsi C. M. in Hedwig. 1897, p. 118.

Ster. — Am. merid.: And. Argentin. subtropic.

(1) In Enum. Kindb. nom. nudum:

Schw. aristaria Rehm.

(2) Cf. Ltz. in Bot. Zeit. 1866, p. 188.

glauco-viride *Mitt. Fl. Vit. p. 400.*

Echinodium glauco-viride Jaeg. Ad. II, p. 380.

Hypnum glauco-viride Mitt. in Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 473.

— *Pac.* : Ins. Kermadec, Norfolk.

hispidum (*Hook. f. et Wils.*) *Par.*

Echinodium hispidum Jaeg. op. et l. cc.

Hypnum aristatum Sull. in Proced. of the Amer. Acad.... 1854.

H. hispidum H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1884, p. 552 et Fl. Antart. I, p. 140, t. 61; C. M. Syn. II, p. 421.

Leskea hispida Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 91.

2. Ad rup. inund. — *Pac.* : Austral. or., Nov. Zeland., Tasman., ins. Norfolk, Auckland.

? aequirameum (*C. M.*) *Par.*

Echinodium aequirameum Jaeg. op. et l. cc.

Hypnum aequirameum C. M. in sched. (1).

— *As.* : Birman.

Krauseanum (*C. M.*) *Par.*

Limbella Krauseana C. M. in Erforschungsreise.... Bot. p. 37 et in Hedwig. 1897, p. 118.

Ster. Ad ramul. secus rivul. — *Am. merid.* : Chile austr.

leptolomaceum (*C. M.*) *Par.*

Limbella leptolomacea C. M. in Fl. 1896, p. 467.

Ster. — *Pac.* : Ins. Hawaï.

limbatulum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum limbatulum C. M. in Erforschungsreise.... Bot. p. 37 (nom.).

Limbella limbatula ej. in Fl. 1896, p. 466.

Ster. — *Pac.* : Ins. Hawaï.

limbatum (*Sull.*) *Jaeg. Ad. II, p. 556.*

Hypnum limbatum Sull. in Proced. of the Amer. Acad.... 1854 et in Wilkes Expl. Exped. p. 18, t. 16; Hook. f. Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 473 (2).

Limbella limbata C. M. in Fl. 1896, p. 466.

Ster. Rupic. — *Pac.* : Nov. Zeland., ins. Hawaï.

lonchocormum (*C. M.*) *Par.*

Limbella lonchocorma C. M. in Hedwig. 1897, p. 118.

Ster. Ad rivul. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

marginatum (*Hpe.*) *Par.*

Limbella marginata C. M. in Hedwig. 1897, p. 119.

Urocladium marginatum Hpe. hb.

— *As.* : Birman. (Moulmein).

obscurifolium *Mitt. M. austr. am. p. 571.*

Ster. — *Am. merid.* : And. Chilens.

pachyloma (*Mont.*) *Par.*

Grimmia pachyloma Mitt. op. cit. p. 97.

Gymnostomum pachyloma Mont. in Ann. sc. nat. 1838, IX, p. 51 et Syll. p. 50; C. M. Syn. II, p. 653.

Limbella pachyloma C. M. in Hedwig. 1897, p. 119.

Ster. Ad scaturig. thermal. — *Am. merid.* : Chile.

(1) An idem ac *Sc. marginatum*? Cf. *C. M. in Hedwig. 1897, p. 119.*

(2) * An *Isothecii marginati* forma? » *Mitt. in Handb. l. c.*

pachylomatum (C. M.) Par.*Limbella pachylomata* C. M. in op. cit. p. 118.Ster. Aquat. in torrent. — *Am. merid.* : Argentin. Patagon.*platylomatum* (C. M.) Par.*Limbella platylomata* C. M. in op. cit. p. 117.Ster. — *Am. merid.* : Argentin. Patagon.*prolixum* (Mitt.) Par.*Echinodium prolixum* Jaeg. Ad. II, p. 381.*Leskea prolixa* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 7, t. 1.*Pycnothecium Mandoni* W. P. Sch. in Mandon M. Madeir. n. 33.*Scleromnium Knyi* Jur. in Bot. Zeit. 1866, pp. 21 et 178.2. — *Afr.* : Ins. Azor., Madeir.*setigerum* (Mitt.) Par.*Echinodium setigerum* Jaeg. Ad. II, p. 379.*Leskea setigera* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 8, t. 1.Ster. — *Afr.* : Madeir.*spinosum* (Mitt.) Par.*Echinodium madeirense* Jur. in op. et l. cc.*E. spinosum* Jaeg. op. et l. cc.*Leskea spinosa* Mitt. in op. et l. cc.2. — *Afr.* : Ins. Azor., Madeir.*subtricostatum* (C. M.) Par.*Hypnum subtricostatum* C. M. in Erforschungsreise.... Bot. p. 37 (nom.).— *Pac.* : Ins. Hawaï.*tricostatum* (Sull.) Mitt. Fl. Vit. p. 400.*Neckera tricostata* Sull. in op. et l. cc. c. ic.In silv. — *Pac.* : Ins. Hawaï.*umbrosum* (Mitt.) Par.*Echinodium umbrosum* Jaeg. op. cit. p. 380.*Hypnum umbrosum* H. f. Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 473.*Leskea umbrosa* Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 92.2. — *Pac.* : Nov. Zeland.**SCIURO-HYPNUM** Hpe. Moosb. p. 19.*Borgenii* Hpe. — ? *Brachythecium*.**SCIURO-LESKEA** Hpe.*xantophylla* Hpe. et Ltz. — *Lescuraea*.**Sclerarchidium** C. M. in Fl. 1888, n. 1 (sect. ARCHIDI).**SCLEROBRYUM** C. M. in sched.*Banquetiae* C. M. — *Bryum*.**Sclerodictyon** C. M. Syn. I, p. 315 (sect. BRYI).**SCLERODONTIUM** Schwaegr. Suppl. II, I, p. 124, t. 144.*Fraseri* Mitt. — *Leucoloma*.*pallidum* Schwaegr. — *Leucoloma Sieberianum*.*pellucidum* Schwaegr. — *Dimerodontium*.

secundum Harv. — *Leucodon*.

strictum Harv. — *Leucodon*.

SCLEROMNIUM *Jur. in Bot. Zeit.* 1866, p. 21.

Knyi Jur. — *Sciaromium prolixum*.

tenax C. M. — *Leucodon Cameruniae*.

SCLERPODIUM *Bryol. eur.* VI (6 spec.).

? *ambiguum* Jaeg. — *Scleropodium illecebrum* var. *piliferum*,

caespitosum (Wils.) *Bryol. eur.* VI (mon. p. 2), t. 556.

Eurhynchium caespitosum Milde *Bryol. siles.* p. 305.

Hypnum caespitans C. M. *Syn.* II, p. 354.

H. caespitosum Wils. in *Suppl. Engl. Bot.* t. 2878 et *Bryol. brit.* p. 344.

2. Ad mur. arenac., terr. ad rad. arbor. loc. saepius inundat. — *Eur.* : Anglia, Neerland., Belgia, Gall. occid. merid., Pyren. *Am. sept.* : Alaska, Vancouver, Washington, Oregon, Idaho, Calif.

Ews. : Mac. Canad. M. n. 200 p.p.

Sulliv. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 510. (*Hypnum*.)

« var. *laeve* Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 61.

— *Am. sept.* : Oregon.

californicum (Lesq.) Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1893, p. 20.

Brachythecium californicum Jaeg. *Ad.* II, p. 392.

Hypnum californicum Lesq. in *Trans. of the Amer. Phil. Soc.* XIII, p. 13 ; Lesq. et Jam. *Man.* p. 346.

2. Arenic. et rupic. — *Am. sept.* : Calif.

illecebrum (Vaill., Schwaegr.) *Bryol. eur.* VI (mon. p. 3), t. 557.

Brachythecium illecebrum de Not. *Epil.* p. 112.

Eurhynchium illecebrum Milde *Bryol. siles.*, p. 305.

Hypnum blandum Lyell in *H. et T. Muscol. brit.* II ed., p. 176, t. 5.

H. crassum la Tourrette in *Brid. Bryol. univ.* II, p. 429.

H. cupressiforme, rotundius, vel *Illecebrae aemulum* Dill. *Hist. M.* p. 311, t. 40, f. 46 A. B.

H. illecebrum Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 225 (1).

H. illecebrum β *Tourretti* Brid. l. c.

H. Tourrettii Brid. *Mant. M.* p. 173.

H. Vaillantii Thuill.

Muscus terrestris, surculis Kali aut *Illecebrae aemulis*, foliis subrotundis squamatis incumbens Vaill. *Bot. Par.* p. 137, t. XXV, fig. 7.

2. Loc. gramin., ad viar. latera, mur. et rup. terra oblect. — *Eur.* : Britann., Dania, Gallia centr. (Lutetia), vall. Rhen. med., Austr. infer., Bavar. ; copiose in zona merid. *Afr.* : Alger., ins. Azor., Canar., Madeir. *Am. sept.* : Alaska, Washington, Calif.

Ews. : Bourgeau Pl. Canar. n. 615 (*Hypnum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 1099.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 508, 509 (*Hypnum*).

« var. *piliferum* (de Not.) Par.

Brachythecium ambiguum de Not. *Epil.* p. 112.

Hypnum illecebrum piliferum ej. *Syll.* n. 29.

Scl. ambiguum Jaeg. *Ad.* II, p. 410.

Ut typ. — *Eur.* : Sardin.

(1) « *H. illecebrum* herbarii Linnaeani ad *Aulacomnium turgidum* pertinet. » W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 660.

Krausei Ren. et Card. — *Brachythecium*,

Macounii (Kindb.) Par.

Eurhynchium Macounii Kindb. in *Rev. bryol.* 1895, p. 85.

Hypnum caespitosum Mac. *Canad. M.* n. 290 pp.

1. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

Novae Angliae Besch. — *Brachythecium*.

ornellianum Mdo. in *Ltz. Bryol. Notizb.* p. 69.

Brachythecium ornellianum Vent. et Bott. *Enum. crit.* p. 9.

Hypnum cyclophyllum Mdo. in *Un. itin.* 1863, n. 95.

H. ornellianum Mdo. *Moosst. Alg. Alp.* p. 109 ; *Par. Index*, p. 663.

2 (semel fructif. lect. !). Ad rup. schistos. — *Eur.* : *Summ. Alp. Algov.* et Longobard.

purum Limpr. — *Hypnum*.

subcaespitosum (Kindb.) Par.

Eurhynchium subcaespitosum Kindb. in *Rev. bryol.* 1895, p. 84.

Ster. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

Sclerostomum Hook. f. et Wils. *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p.

(sect. *HEDWIGIÆ* sensu H. f. et W., *HEDWIGIDIUM* *Bryol. eur.*).

SCOLODIUM C. M. (?) in sched.

filamentosum C. M. — *Meteorium*.

Scopella C. M. in *Fl.* 1890, p. 474 (nom., sect. *DICRANI*).

SCOPELOPHILA Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1869, p. 135, n. 14 in obs. (sect. *WEISIAE*) ; Lindb. *Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or.* p. 269 (gen. propr.) (5 spec.).

acutiuscula Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 37.

2. Ad rup. schistos. — *As.* : *Caucas.* (Imeretia).

agoyanensis (Mitt.) Spr. in *Journ. of bot.* 1881, p. 12.

Hyophila agoyanensis Jaeg. *Ad. I.* p. 206.

Weisia agoyanensis Mitt. *M. austr. am.* p. 135.

Rupic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Duthiei C. M. mss.

— *As.* : Himalaya sept. occid.

latifolia (Kindb.) Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1892, p. 92.

Merceya latifolia Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1889, n. 4 et in *Mac. Cat.* p. 97.

Ster. Terr. in reg. mont. — *Am. sept.* : Ins. Vancouver, Calif.

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 459.

ligulata Spr. in op. et l. cc.

? *Encalypta ligulata* ej. *M. Pyren.* n. 331 et in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* 1849, *M. Pyr.* n. 337.

Merceya ligulata W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 852.

Weisia ligulata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* ll. cc.

Zygodon ligulatus C. M. *Syn. II*, p. 635.

2. ♀ et fr. ign. Ad rup. humid. — *Eur.* : Alp. Salisb., Pyren.

Scorpidium W. P. Sch. Syn. I ed. p. 650 (subgen. HYPN1).

SCORPIURIUM W. P. Sch. Syn. I ed. p. 650.

rivale ej. — *Eurhynchium circinatum* var. *deflexifolium*.

SCOULERIA Hook. in Drumm. M. bor. am. n. 63 et Miscell. bot. I, p. 33. t. 18 (4 spec.).

aquatica Hook. ll. cc.

Grimmia Scouleri C. M. Syn. II, p. 654; Lesq. et Jam. Man. p. 137.

Sc. aquatica var. *catilliformis* C. M. in Bot. Centralbl. 1890, n. 51.

Sc. aquatica var. *virescens* Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, 1889, p. 93.

Sc. Mülleri Kindb. in Mac. Cat. p. 62.

2. Ad rup. irror. — Am. sept.: Ins. Observatory, Vancouver, Columb. brit., Washington, Idaho, Oregon, Calif.

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 63.

var. *catilliformis* C. M. — *Sc. aquatica*.

« var. *nigrescens* Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, 1889, p. 94.

Sc. Neevii C. M. in eod. op. 1890, p. 273.

Ut typ. — Am. sept.: M. Selkirk, Columb. brit., ins. Vancouver.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 388.

var. *virescens* Kindb. op. cit., 1889, p. 93 (1). — *Sc. aquatica*.

marginata Dna E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1895, p. 42, t. 227.

Ad rup. irror. — Am. sept.: Washington, Calif.

Mülleri Kindb. — *Sc. aquatica*.

Neevii C. M. — *Sc. aquatica* var. *nigrescens*.

patagonica (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 74.

Grimmia patagonica Mitt. M. austr. am. p. 96.

Ad rup. irror. — Am. merid.: Patagon.

Rschewini Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 100.

2. Ad rup. in rivul. — As.: Jenissei infer.

SEKRA Adans. II, p. 14.

minor Lindb. — *Cinclidotus fontinaloides*.

SELIGERIA Bryol. eur. II (14 spec.).

acuta de Not. — *Blindia*.

acutifolia Lindb. — *S. pusilla* var. *acutifolia*.

var. *longiseta* Lindb. — *S. pusilla* var. *longiseta*.

apiculata Dz. et Mk. — *Microdus*.

brevifolia Lindb. — *S. pusilla*.

calcareum (Dicks.) Bryol. eur. II (mon. p. 4), t. 110; C. M. Syn. I, p. 419.

Bryum calcareum Dicks. Fasc. Pl. crypt. II, p. 3, t. 4.

Grimmia calcareum Sm. Fl. brit. III, p. 1187.

Weisia calcareum Hedw. Sp. M. p. 66, t. 11; Brid. Bryol. univ. I, p. 351;

Drumm. M. bor. am. I ed. n. 65.

1. Ad rup. cretac. — Eur.: Britann., Gall., Dania, ins. Rügen, West-

(1) Cf. Dna E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1895, pp. 36-43.

- phal., Rhoengeb., Thuring. *Am. sept.* : Vermont, Ontario, lac. Winnipeg.
- Exs.* : Rab. Bryoth., eur. n. 228.
- calcicola* Mitt. — *S. subcernua*.
- calycina* Mitt. — *S. subcernua*.
- campylopoda* Kindb. in *Mac. Cat.* p. 41.
- S. recurvata* Mac. *Canad. M. n.* 60 p.p.
1. Ad rup. madid. — *Am. sept.* : Ontario.
- compacta* Philib. in *Rev. bryol.* 1897, p. 49.
1. — *Eur.* : Galloprov.
- crassinervis* Lindb. *Not. ur Saellsh. pro Faun. et Fl. fenn.* 1868, p. 259 ;
W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 129.
1. Ad rup. calcar. — *Eur.* : Suecia.
- diversifolia* Lindb. in *Oefv....* 1864 ; W. P. Sch. *op. cit.* p. 128.
- 1 ? — *Eur.* : Suecia, Fennia.
- Doniana* C. M. — *Anodus*.
- erecta* Philib. — *S. recurvata* var. *pumila*.
- flavidula* C. M. — *Microdus*.
- globicarpa* C. M. — *Microdus*.
- globifera* Hpe. — *Globulina*.
- Kunzeana* C. M. — *Microdus*.
- Lindigiana* Hpe. — *Microdus*.
- linearifolia* C. M. — *Microdus*.
- longifolia* Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 65 (1.).
- *As.* : Caucas.
- longirostris* C. M. — *Microdus*.
- Migueliana* C. M. — *Microdus*.
- Moenkemeyeri* C. M. in *Fl.* 1886, p. 508.
2. Terr. — *Afr.* : Old Calabar.
- pallens* C. M. — *Microdus*.
- pallidiseta* C. M. — *Microdus*.
- paucifolia* Carruth. — *S. subcernua*.
- polaris* Berggr. *M. Spetsb. n.* 24 et in *K. Sv. Vet. Ak. Handl.* XIII, n. 7, p. 41.
1. Rupic. — *Eur.* : Spitzberg.
- pusilla* (Hedw.) *Bryol. eur.* II (mon. p. 4), t. 110 ; C. M. *Syn.* I, p. 418.
- Afzelia pusilla* Ehrh. *Pl. crypt. exs. n.* 183 et *Beitr.* VII, p. 100.
- Bryum minutum* Gmel. *Syst. Nat.* II, p. 1335.
- Br. paludosum* L. *Sp. Pl.* p. 1584.
- Br. pusillum* Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 33.
- Br. trichodes acaulon palustre minimum*, setis et capsulis brevissimis
Dill. *Hist. M.* p. 387, t. 49, f. 53.
- Grimmia pusilla* Schrad. *Samml.* I, p. 10, n. 39.
- Gr. Seligeri* W. et M. *Bot. Taschb.* pp. 140 et 459.
- Mnium paludosum* L. *jun. Meth. M.* p. 365.
- S. brevifolia* Lindb.
- S. pusilla* var. *brevifolia* Lindb. in *K. Sv. Vet. Ak. Foerh.* 1864, p. 187.
- Swartzia pusilla* Ehrh. *Hann. Magaz.* 1780-82.
- Weisia calcarea* Sull. *M. Allegh. n.* 142.
- Weisia calcarea* β *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 68.

(1) Ut videtur subsp. *S. tristichæ*.

W. paludosa Brid. *Musc. Rec. II, I, p. 74.*

W. pusilla Hedw. *M. frond. II, p. 68, t. 29; Brid. Bryol. univ. I, p. 349; Drumm. M. bor. am. I ed. n. 35.*

W. Seligeri Bryol. germ. II, p. 105, t. 34, f. 26; *Brid. op. cit. p. 350.*

l. Loc. umbros. ad sax. et rup. calcar., schist. et quartz. — *Eur.* : Sporadice per tot. reg. campestr. *As.* : Jenissei super., *Caucas. Am. sept.* : Gaspes., lac. Erie, New York, New Jersey, Missouri.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 59.

Rab. Bryoth. eur. n. 572, 608.

« *var. acutifolia* W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 125.*

S. acutifolia Lindb. in *Hartm. Skand. Fl. IX ed., II, p. 75.*

S. acutifolia var. longiseta ej. in *Not. ur Saellsk. pro Faun. et Fl fenn. 1868, IX, p. 261.*

S. pusilla β *Lacroixiana* de Not. *Epil. p. 656.*

Ut et ubi typ. in *Eur.*

var. brevifolia Lindb. — *S. pusilla.*

var. Lacroixiana de Not. — *S. pusilla var. acutifolia.*

recurvata (Hedw.) Bryol. eur. II (mon. p. 6), t. 112; *C. M. Syn. I, p. 419:*

Bryum recurvatum Hoffm. *Deutschl. Fl. II, p. 31.*

Br. setaceum Jaeg. *Misc. II, t. 5.*

Grimmia parasitica Voit in *Sturm Deutschl. Fl. crypt. fasc. II.*

Gr. recurvata Hedw. *M. frond. I, p. 102, t. 38.*

Weisia parasitica Roehl. *Deutsch. Fl. III, p. 51.*

W. recurvata Brid. *Bryol. univ. I, p. 352.*

S. setacea Lindb. in *Oefv.... Vet. Akad. Foerh. 1863, p. 413.*

l. Ad mur., rup. et sax. quartz., rar. calcar. umbros. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in subalp. per zon. med. et sept. *As.* : *Caucas. Am. sept.* : Pensilv., Ontario, M. Rupestr.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 60 p.p

Rab. Bryoth. eur. n. 59, 171, 1158.

« *var. arcuata* Lesq. et Jam. *Man. p. 97.*

Weisia Seligeri H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. n. 66.*

Ad rup. molass. — *Am. sept.* : Lac. Winnipeg, M. Rupestr.

« *var. brevifolia* Zett. in *Vid. Selsk. Foerh. 1871 (nom.); Lindb. et Arn. M. As. bor. 1890, II, p. 83 (descript.).*

— *As.* : Jenissei infer.

« *var. pumila* W. P. Sch. *Syn. II ed. p. 127.*

S. erecta Philib. in *Rev. bryol. 1879, p. 67 (fid. Lindb. et Arn. op. cit. p. 841).*

S. setacea var. pumila Lindb. *Selig. Scandin.*

— *Eur.* : Cum typ. *As.* : *Rossia orient.*

recurvata Mac. p.p. — *S. campylopoda.*

rostrata C. M. — *Microdus.*

setacea Lindb. — *S. recurvata.*

var. brevifolia Zett. — *S. recurvata var. brevifolia.*

var. pumila Lindb. — *S. recurvata var. pumila.*

subcernua W. P. Sch. *Suppl. Bryol. eur. fasc. I-II (SELIGERIA) t. I et Syn. II ed. p. 128.*

Pryum paucifolium Dicks. *Fasc. Pl. crypt. IV (fid. Lindb.), t. II, f. 3.*

Gymnostomum paucifolium Engl. *Bot. n. 2506 (fid. Lindb.).*

S. calcicola Mitt. in *Seem. Journ. bot. 1864, II, p. 194, t. 19, f. 1-6.*

S. calycina ej. mss.; Lindb. in *Oefv.... 1864, XXI, p. 188.*

S. paucifolia Carruth. (fid. Braithw. t. 17); Lindb. in *Not. ur Saellsk... 1868.*

Calcic. — *Eur.* : Anglia (Yorkshire).

subimmersa Lindb. *M. Scand.* p. 25.

1. Rupic. — *Eur.* : Fennia.

trifaria Lindb. — *S. tristicha*.

var. *patula* Lindb. — *S. tristicha* var. *patula*.

tristicha Bryol. eur. II (mon. p. 5), t. 111; *C. M. Syn.* I, p. 420.

Grimmia trifaria W. et M. *Bot. Taschb.* pp. 141 et 160.

Gr. *tristicha* Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 84, t. 26.

S. trifaria Lindb. *M. Scand.* p. 26.

Weisia tristicha Brid. *Bryol. univ.* I, p. 355.

1. Ad rup. irror. — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Jenissei med., Caucas.

Am. sept. : Perrar. : Ohio.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 726 a et b.

« var. *patula* (Lindb.) Par.

S. trifaria ♂ *patula* Lindb. op. et l. cc.

— *Eur.* : Suecia.

tristichoides Kindb. in *Rev. bryol.* 1896, p. 20.

— *Eur.* : Norvegia.

SEMATOPHYLLUM Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1868 (92 spec.).

acistrostegium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

acutirameum (Mitt.) Jaeg. *Ad.* II, p. 449.

Stereodon acutirameus Mitt. *M. Ind. or.* p. 106.

1. — *As.* : Khasia, Ceylan.

admistum Mitt. — *Rhaphidostegium microcarpon* var. *anisocarpon*.

adpersum (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 451.

Hypnum adpersum Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 284.

2? — *As.* : Borneo.

affine Mitt. — *Rhaphidostegium*.

afro-nemorosum (C. M.) Par.

Trismegistia afro-nemorosa C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 686.

— *Afr.* : M. Cameroon.

agnatum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

alto-pungens (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 450.

Hypnum alto-pungens C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 179.

— *As.* : M. ins. Philippin.

ambiguum Mitt. — *Trichosteleum*.

amœnum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

andinum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

aneuron (Duby) Jaeg. op. cit. p. 453.

Hypnum aneuron Dy. in *Mém... Genève*, 1876, p. 12, t. 3, f. 5 et in *Fl.* 1877, n. 5-6.

1. — *Afr.* : Ins. Franciae.

angulibasis (C. M.) Par.

Pungentella angulibasis C. M. mss.

— *As.* : Amboine.

apiocarpum Mitt. — *Trichosteleum*.

- aquicolum (C. M.) Far.
 Hypnum aquicolum C. M. in Linn. 1878-79, p. 455.
 Fl. et fr. ign. — Am. merid. : Argentin. Cordob.
- arrectum Mitt. — Trichosteleum.
- arthrocormoides (C. M.) Par.
 Pungentella arthrocormoides C. M. in sched.
 Ster. — Pac. : Nov. Guin. brit.
- asperifolium Thw. et Mitt. — Rhaphidostegium.
 auricomum Mitt. — Rhaphidostegium Welwitschii.
- Balansæanum Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 237,
 — Pac. : Nov. Caledon.
- Baldwini (C. M.) Par.
 Hypnum sigmatodontium Ångstr. in Vet. Akad. Foerh. 1872, n. 4, p. 15?
 (C. M.).
 Pungentella Baldwini C. M. in Fl. 1896, p. 471.
 1. — Pac. : Ins. Sandwic.
- baviense Besch. in Journ. de bot. 1890, p.
 1. Saxic. — As. : Tonkin.
- bogasicum (Bryol. jav.) Jaeg. op. cit. p. 451.
 Hypnum bogasicum Bryol. jav. II, p. 217, t. 318.
 2. Ad arbor. — As. : Borneo, M. Java.
- bolivianum Par.
 Pungentella gracilicaulis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 58.
 — Am. merid. : And. Boliv.
- borbonicum { Besch. (Fl. N. Cal.). — Trichosteleum subrhinophyllum.
 Mitt. (Fl. Vit.). — Sematophyllum Pickeringii.
- Braunii (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 448.
 Hypnum Braunii C. M. Syn. II, p. 687; Bryol. jav. II, p. 212, t. 312.
 Stereodon Braunii Mitt. M. Ind. or. p. 106.
 2. — As. : Sumatra, Java, Borneo, Celebes.
- « var. oxyporon (Bryol. jav.) Jaeg. l. c.
 Hypnum Braunii var. oxyporon Bryol. jav. l. c.
 1. — As. : Ceylan, M. Java, Borneo.
- brevi-cuspidatum (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 447.
 Acroporium brevicuspidatum Mitt. Sam. M. p. 183.
 Hypnum brevicuspidatum C. M. M. Polyn. p. 87.
 Pungentella brevicuspidata C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1896, p. 330.
 1. Cortic. — Pac. : Ins. Hawai, Samoa, etc.
- brevisetulum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 449.
 Hypnum brevisetulum C. M. M. Polyn. p. 87.
 Pungentella brevisetula C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1896, p. 330.
 — Pac. : Ins. Samoa.
- Bruchii (Dz. et Mk.) Jaeg. op. cit. p. 443.
 Hypnum Bruchii Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 306; Bryol.
 jav. II, p. 142, t. 240; C. M. Syn. II, p. 388.
 2. — As. : Sumatra.
- caespitosum Mitt. — Rhaphidostegium.

calderense (Sull.) Jaeg. op. cit. p. 445.

Hypnum calderense Sull. in *Proced. of the Am. Acad.*, 1854 et in *U. St. Expl. Exped. Wilkes*, p. 17, t. 15.

— As. : Ins. Philippin.

callidum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

capillarisetum (C. M.) Par.

Pungentella capillariseta C. M. in *Fl.* 1896, p. 470.

— Pac. : Ins. Sandwic.

capilliferum Thw. et Mitt. — *Rhaphidostegium*.

caudatum (Bryol. jav.) Jaeg. op. cit. p. 451.

Hypnum caudatum Bryol. jav. II, p. 219, t. 320 a. b.

Ster. — As. : M. Java.

chrysostegum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

circinale Mitt. — *Rhaphidostegium*.

cirrifolium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

? *citrinum* (Hpe.) Par.

Hypnum citrinum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 70.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

complanatulum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 445.

Acanthodium rigidum Mitt. *Sam. M.* p. 182 ? (fid. C. M.).

Hypnum complanatulum C. M. *M. Polyn.* p. 89.

Ster. Cortic. et rupic. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Nov. Guinea.

condensatum (C. M.) Par.

Pungentella condensata C. M. in *Micholitz M. Philipp.* n. 180.

— As. : Ins. Philippin.

consanguineum (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 449.

Hypnum consanguineum Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 277.

1. — As. : Ceylan.

consanguineum Mitt. — *Trichosteleum*.

contiguum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

convolutum (Bryol. jav.) Jaeg. op. cit. p. 452.

Hypnum convolutum Bryol. jav. II, p. 215, t. 315.

2. — As. : Java, Borneo.

crinitifolium Mitt. — *Rhaphidostegium tequedamense*.

cucullatifolium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

cuculligerum (Lac.) Jaeg. op. cit. p. 451.

Hypnum cuculligerum Bryol. jav. II, p. 218, t. 319.

2. — As. : Java.

cuspidiferum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

decumbens Mitt. — *Rhaphidostegium*.

decurvifolium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

deflexifolium (Mitt.) Par.

Acanthodium deflexifolium Mitt. in *hb. Griff.*

— As. : Bhotan.

dicranifolium (C. M.) Par.

Pungentella dicranifolia C. M. in *sched.*

Ster. — As. : Sumatra (ins. Engano).

erythrocaulon (*Angstr.*) *Jaeg. op. cit.* p. 450.

Hypnum erythrocaulon Angstr. in Oefv.... 1873, n. 5, p. 149.

1. — *Afr.* : Ins. S. Helena.

erythropodium (*Hpe.*) *Jaeg. op. et l. cc.*

Hypnum erythropodium Hpe. in Linn. 1871-73, p. 161.

Rhynchostegium erythropodium Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 89.

1. Ad rup. madid. — *Pac.* : Austral. or.

erythropodium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

flaccidifolium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

flavidum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

fluviale Mitt. — *Trichosteleum*.

fragilirostrum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

fulvifolium C. M. — *Rhaphidostegium*.

fulvum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

fusco-flavum (C. M.) *Par.*

Pungentella fusco-flava C. M. in Fl. 1896, p. 470.

1? — *Pac.* : Ins. Sandwic.

« *var. cuspidatissima* (C. M.) *Par.*

Pungentella fusco-flava var. cuspidatissima C. M. in op. et l. cc.

Ubi typ.

« *var. robusta* (C. M.) *Par.*

Pungentella fusco-flava var. robusta C. M. in op. et l. cc.

Ubi typ.

galipense Mitt. — *Rhaphidostegium*.

gedeanum (C. M.) *Jaeg. op. cit.* p. 448.

Hypnum gedeanum C. M. Syn. II, p. 390; *Bryol. jav. II*, p. 208, t. 307.

Leskea straminea Hsch. et Reinw. in Nov. Act. Acad. Cæsar. Leop. XIV, II, Suppl. p. 717, t. 40, p.p.

Stereodon gedeanus Mitt. M. Ind. or. p. 106.

2. — *As.* : Ceylan, Java.

glaucirameum (C. M.) *Par.*

Pungentella glauciramea C. M. in sched.

— *As.* : Ins. Celebes.

gracilicaule (*Bryol. jav.*) *Jaeg. op. cit.* p. 452.

Hypnum gracilicaule Bryol. jav. II, p. 214, t. 314.

1. — *As.* : M. Java.

guianense Mitt. *M. austr. am.* p. 478.

1 vel syn. — *Am. merid.* : Guian., Amazon.

Hedwigii Mitt. — *Rhaphidostegium*.

helenicum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

hermaphroditum (C. M.) *Besch. Fl. bryol. Nov. Caledon.* p. 237.

Hypnum hermaphroditum C. M. Syn. II, pp. 388 et 689; *Bryol. jav. II*, p. 206, t. 305.

Leskea straminea Hsch. et Reinw. in op et l. cc. p.p.

Syn. Cortic. — *As.* : Sumatra, Java, Celebes. *Pac.* : Nov. Caledon.

hyalinum (*Reinw.*) *Jaeg. op. cit.* p. 449.

Hypnum hyalinum Reinw. in Schwaegr. Suppl. III, I, II, p. 227; *C. M. Syn. II*, p. 390; *Bryol. jav. II*, p. 205, t. 304.

2. — *As.* : Sumatra, Java, ins. Banca, Borneo, Celebes.

implanum Mitt. *M. austr. am.* p. 478.

1 vel syn. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

inconspicuum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

incurvum Mitt. — *Rhaphidostegium* *Rodriguezi*.

insulosum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

inundatum Mitt. — *Trichosteleum*.

Jungneri (*Broth.*) *Par.*

Acanthocladium Jungneri *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 278.

1. Cortic. — *Afr.* : M. Cameroon.

Kegelianum Mitt. — *Rhaphidostegium*,

lamprophyllum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

lancifolium (*Harv.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 445 (*excl. syn.* *H. korthalsii et trismegistum* (1)).

Hypnum lancifolium *C. M. Syn. II*, p. 497; *Bryol. jav. II*, p. 141, t. 239.

Neckera lancifolia *Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 21, f. 5 et in Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 14.

Stereodon lancifolius Mitt. *M. Ind. or.* p. 110.

2. — *As.* : Nepal.

Lecoultriae *Jaeg.* — *Rhaphidostegium Duisabonae var. rigidiusculum*.

Lepinei *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc.* p. 48.

Syn. — *Pac.* : Taïti.

leptocarpon Mitt. — *Rhaphidostegium*.

lepto-cylindricum (*C. M.*) *Par.*

Pungentella lepto-cylindrica *C. M. in Fl.* 1896, p. 470.

1. — *Pac.* : Ins. Sandwic.

leptophyllum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

leptothecium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

? *leucolomoides* (*C. M.*) *Par.*

Horridium leucolomoides *C. M. in sched.*

— *As.* : Ins. Andaman.

Levieri (*C. M.*) *Par.*

Pungentella Levieri *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 152.

1. — *Am. merid.* : And. Boliv.

lignicolum *Ångstr.* — *Rhaphidostegium*.

lilliputianum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

Lindigii Mitt. — *Rhaphidostegium*.

longicaule (*Bryol. jav.*) *Jaeg. op. cit.* p. 447.

Hypnum longicaule *Bryol. jav. II*, p. 209, t. 309.

2. — *As.* : M. Java

longinerve (*Duby*) *Jaeg. op. cit.* p. 453.

Hypnum longinerve *Dy. in Mém.... Genève*, 1876, p. 9, t. 1, f. 2 et in *Fl.* 1877, n. 5.

1. — *Afr.* : Ins. Franciae.

longirostratum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

loxense Mitt. — *Rhaphidostegium*.

(1) An potius *Symphyodon*? Cf. Mitt. l. c.

luridissimum (C. M.) Broth. in litt.

Cupressina luridissima C. M. in Fl. 1896, p. 473.

— Pac.: Ins. Sandwic.

luxurians (Dz. et Mk.) Jaeg. op. cit. p. 446.

Hypnum luxurians Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 307; *Bryol. jav. II*, p. 143, t. 241; C. M. Syn. II, p. 388.

1 et syn. (*Bryol. jav.*); 2 (C. M.).
Java.

— As.: Sumatra

Mac-Gregorii Broth. et Geh. in Oefv. of Finska Vet.-Soc. Foerh. 1895, p. 68.

Ster.

— Pac.: Nov. Guinea.

macrorhynchum (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 447.

Acroporium macrorhynchum Mitt. Sam. M. p. 183.

Hypnum upoloviense C. M. M. Polyn. p. 87.

Pungentella upoloviensis C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1896, p. 329.

2. Cortic. — Pac.: Ins. Samoa.

macrorhynchum Mitt. (M. austr. am.). — *Rhaphidostegium*.

macrodis (C. M.) Par.

Pungentella macrodis C. M. in Micholitz M. Philipp. n. 162.

— As.: Ins. Philippin.

megasporum Ren. et Card. — *Rhaphidostegium*.

var. *densum* eor. — Rh. *megasporum* var. *densum*.

microcarpum (Mitt.) — ? (1).

microcladum (C. M.) Par.

Pungentella microclada C. M. in sched.

Ster.

— Pac.: Nov. Guin. brit.

microcladum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

micro-cormum (C. M.) Par.

Pungentella micro-corma C. M. in Dusen M. Camer. n. 669.

— Afr.: M. Cameroon.

microthelium (C. M.) Par.

Pungentella microthelia C. M. in sched.

Ster.

— Pac.: Nov. Guin. brit.

Mitteni Par.

Acroporium lamprophyllum Mitt. Sam. M. p. 183.

Hypnum lamprophyllum C. M. M. Polyn. p. 88.

2? Cortic. — Pac.: Ins. Samoa.

monoicum (*Bryol. jav.*) Jaeg. op. et l. cc.

Hypnum monoicum *Bryol. jav. II*, p. 207, t. 306.

1. In silvis. — As.: Sumatra, M. Java, Borneo.

monostictum Thw. et Mitt. — *Rhaphidostegium*.

(1) « *S. microcarpum* (Sw. Fl. Ind. occ., sub *Leskea*). Hab.: Ins. Ind. occident. (Swartz), Fl. Negro, San Gabriel (Spruce). » (Mitt. M. austr. am. p. 493). Quid? Nec in Brid. *Bryol. univ.*, nec in C. M. Syn. *Leskea microcarpa* Swartziana reperitur! *L. microcarpa* Brid. = *Rhaphidostegium microcarpon*, in America meridionali nondum, ni fallor, indicatum.

Nietnerianum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 449.

Hypnum Nietnerianum C. M. in Linn. 1869-70, p. 14.

2. — As. : Ceylan.

noduliferum Mitt. — Rhaphidostegium.

oblique-rostratum Mitt. — Rhaphidostegium.

ochreifolium (C. M.) Par.

Pungentella ochreifolia C. M. in Dusen M. Camer. n. 27.

— Afr. : M. Cameroon.

Olfersii Mitt. — Rhaphidostegium.

papillosum Mitt. — Trichosteleum.

Pickeringii (Sull.) Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 49.

H. borbonicum Mitt. Sam. M. p. 184.

Hypnum daltonioides W. P. Sch. in Jardin Enum. p. 20.

H. Pickeringii Sull. in Exped. Wilkes M. p. 18, t. 15.

Sematophyllum borbonicum Mitt. Fl. Vit. p. 398.

Sigmatella Pickeringii C. M. in Fl. 1896, p. 469.

Trichosteleum Pickeringii Jaeg. Ad. II, p. 486.

1. Terr. et cortic. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Hawaï, Taïti, Salomon, Nov. Caled.

platyacron (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 446.

Hypnum platyacron C. M. M. Polyn. p. 89 (nom.).

?

plumularium Mitt. — Rhaphidostegium.

procerum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 446.

Hypnum procerum C. M. Syn. II, p. 389 ; Bryol. jav. II, p. 209, t. 308.

H. tanytrichum Duby in Moritzi Syst. Verz. d. Zoll. Pflanz. p. 130 (1).

2. — As. : M. Java.

prominulum Mitt. — Rhaphidostegium.

pseudo-rufescens (Hpe.) Jaeg. op. et l. cc.

Hypnum pseudo-rufescens Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 285.

1. Ad arbor. — As. : Singapore, Borneo. Pac. : Nov. Guinea.

punctuliferum Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 318.

2. — As. : Ceylan.

pungens (Sw.) Mitt. M. austr. am. p. 477.

Hypnum pungens Hedw. Sp. M. p. 237, t. 60 ; C. M. Syn. II, p. 387.

H. thelipodium C. M. op. cit. p. 275.

Leskea patens Hsch. Fl. Brasil. I, p. 72.

L. pungens Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1806 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 291.

Cortic. — Am. sept. et merid. : Intertropic.

« var. robustum Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 71.

— Am. sept. : Guadalup.

pungifolium (Hpe.) Par.

Hypnum pungifolium Hpe. Enum. M. Brasil. p. 80.

1. — Am. merid. : Brasil. austr.

pusillum Mitt. — Trichosteleum.

(1) Omnibus specim. collect. H. tanytrichum verum admixtum est.

pycnophyllum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 452.

Hypnum luxurians Duby in Moritzi Syst. Verz. Zoll. Pfl. p. 131.

H. pycnophyllum C. M. Syn. II, p. 406; *Bryol. jav. II*, p. 816, t. 316.

2. Ad arbor. — As.: Java.

ramicola (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 448.

Hypnum ramicola Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 285.

2? — As.: Borneo.

ramulinum Thw. et Mitt. — *Rhaphidostegium*.

restitutum (Hpe.) Par.

Hypnum restitutum Hpe. Enum. M. Brasil. p. 69.

1. — Am. merid.: Brasil austr. or.

rhynchophyllum (C. M.) Par.

Pungentella rhynchophylla C. M. in Dusen M. Camer. n. a 5.

— Afr.: M. Cameroon.

rigidum (Hsch. et Reinw.) Mitt. Fl. Vit. p. 398.

Hypnum rigidum H. et R. in Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. XIV, II, Suppl. p. 731; *Bryol. jav. II*, p. 140, t. 237 et 238; C. M. Syn. II, p. 498.

2. Ad arbor. — As.: Sumatra, M. Java, Borneo. Pac.: Nov. Caledon.

« *var. Braunianum* (*Bryol. jav.*) Jaeg. Ad. II, p.

Hypnum rigidum var. Braunianum *Bryol. jav. l. c.*

— As.: Java.

« *var. convolutum* (*Bryol. jav.*) Jaeg. Ad. II, p.

Hypnum rigidum var. convolutum *Bryol. jav. l. c.*

— As.: Java.

roridum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

rubrisetum Mitt. — *Trichosteleum*.

ruficaule Thw. et Mitt. — *Rhaphidostegium*.

Savesianum (C. M.) Par.

Hypnum Savesianum C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57 (nom.).

— Pac.: Nov. Caledon.

scabrellum (*Bryol. jav.*) Par.

Hypnum scabrellum *Bryol. jav. II*, p. 214, t. 315 A.

Ster. — As.: Sumatra, Celebes.

scalare (A. Br.) Jaeg. op. cit. p. 451.

Hypnum scalare A. Br. in C. M. Syn. II, p. 688; *Bryol. jav. II*, p. 219, t. 320.

Ster. — As.: Java.

Schlimii Mitt. — *Rhaphidostegium*.

Schwaneckeanum Mitt. — *Rhaphidostegium*.

scorpiurus Mitt. — *Rhaphidostegium*.

secundifolium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

sentosum Mitt. — *Trichosteleum*.

sericifolium Mitt. — *Rhaphidostegium*.

sigmatodontium (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 448.

Hypnum sigmatodontium C. M. Syn. II, p. 687; *Bryol. jav. II*, p. 211, t. 311.

Syn. — As.: Sumatra, Java. Pac.: Ins. Hawaï, Nov. Guinea.

« *var. elongatum* (*Bryol. jav.*) *Jaeg. l. c.*

Hypnum sigmatodontium var. elongatum Bryol. jav. l. c.

— *As.* : Borneo, Celebes.

sigmocarpon (*C. M.*) *Par.*

Pungentella sigmocarpa C. M. in sched.

— *As.* : Amboine.

spiculosum (*Hpe.*) *Jaeg. op. cit. p. 449.*

Hypnum spiculosum Hpe. in sched.

— *As.* : Sikkim.

stellatum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1896, I, p. 320.

Ster.

— *Afr.* : Madagascar.

stenocarpon (*Hpe. et C. M.*) *Mitt. M. austr. am. p. 478.*

Hypnum stenocarpon H. et C. M. in Bot. Zeit. 1857, p. 384.

1. *Ad arbor.* — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

strepsiphyllum (*Mont.*) *Jaeg. l. c.*

Hypnum strepsiphyllum Mont. in Lond. Journ. of bot. 1844, III, p. 632
in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 91, et Syll. p. 8; C. M. Syn. II, p. 389;
Bryol. jav. II, p. 210, t. 310.

2. *Cortic.* — *As.* : Sumatra, Java, Borneo, ins. Ceram et Halmaheira.

« *var. densum* (*Bryol. jav.*) *Jaeg. l. c.*

Hypnum strepsiphyllum var. densum Bryol. jav. l. c.

— *As.* : Sumatra, Java.

« *var. minus Ren. et Card. in Rev. bryol. 1896, p. 105.*

— *As.* : Java.

subauriculatum (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum subauriculatum Hpe. hb.

Trismegistia subauriculata C. M. in Fl. 1896, p. 474.

Ster.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

subbrachycarpum *Mitt.* — *Rhaphidostegium.*

submitratum *Jaeg.* — *Trichosteleum.*

subnervatum *Mitt.* — *Rhaphidostegium.*

subpilotrichella (*C. M.*) *Par.*

Trismegistia subpilotrichella C. M. in Dusen M. Camer. n. 812.

— *Afr.* : M. Cameroon.

subpungens (*C. M.*) *Jaeg. op. cit. p. 453.*

Hypnum subpungens C. M. in Linn. 1874, p. 655.

Cortic. in silv. — *Am. sept.* : Mexic.

subpungifolium Broth. in Act. Soc. sc. Fenn. XIX, 1891, n. 5.

1.

— *Am. merid.* : Minas Geraës.

subpynophyllum (*C. M.*) *Jaeg. op. cit. p. 452.*

Hypnum subpynophyllum C. M. in Linn. 1874, p. 565.

1. *fr. ign.* — *As.* : M. ins. Philippin.

subscabrellum Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1896, I, p. 321.

Ster.

— *Afr.* : Madagascar.

subscabrum *Mitt.* — *Rhaphidostegium.*

subsimplæ *Mitt.* — *Rhaphidostegium.*

subtrichocolea (C. M.) Par.

Trismegistia subtrichocolea C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 30.

— Afr. : M. Cameroon.

subulatum (Hpe.) Jaeg. op. et l. cc.

Dicranum diminutivum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 814?

Hypnum subulatum Hpe. *lc. M. t.* 9; C. M. *Syn.* II, p. 402; *Bryol. jav.* II, p. 213, t. 313.

2. — As. : Sumatra, Java, Manilla.

succedaneum Mitt. — Rhaphidostegium.

tequedamense Mitt. — Rhaphidostegium.

theliporum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 450.

Hypnum theliporum C. M. *M. Polyn.* p. 88.

Pungentella thelipora C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1896, p. 330.

— Pac. : Ins. Fidji, Samoa.

Trichocolea (C. M.) Par.

Hypnum Trichocolea C. M. in *Fl.* 1888, p. 417.

Lignic. — Afr. : Kilima N'Djaro, Usambara.

trichocoleoides (C. M.) Par.

Hypnum trichocoleoides C. M. in *Fl.* 1886, p. 283.

Ster. — Afr. : Ins. S. Thoma, M. Cameroon.

turgidum (Dz. et Mk.) Jaeg. op. cit. p. 447.

Hypnum turgidum Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, II, p. 309; *Bryol. jav.* II, p. 204, t. 303; C. M. *Syn.* II, p. 390.

Pungentella turgida C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1896, p. 330.

Stereodon turgidus Mitt. *M. Ind. or.* p. 106.

2. — As. : Ceylan, Sumatra, Java, Borneo, Celebes.

Pac. : Ins. Samoa.

ulicinum Mitt. *M. austr. am.* p. 478.

1 vel. syn. Ad arbor. — Am. merid. : And. Quitens., Brasil.

vincentinum Mitt. — Trichosteleum.

xylophilum Mitt. — Rhaphidostegium (1).

Senodictyon C. M. *Syn.* I, p. 325 (sect. BRYI).

Senophyllaria C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 311 (sect. POTTIAE).

Senophyllum C. M. *Syn.* I, p. 606 (sect. BARBULAE).

SERPO-HYPNUM Hpe. *Moosb.* p. 19 (nom.).

Serridium C. M. in *Fl.* 1896, p. 435 (sect. FISSIDENTIS).

SIGMATELLA C. M. *Syn.* II, p. 292 (subsect. HYPNI, postea gen. propr.).

Spec. omn. non indicatae sunt TAXITHELIA ejusd. nom.

Bernoulliana C. M. — Rhaphidostegium.

glabriseta C. M. — Trichosteleum.

Guianae C. M. — Trichosteleum.

impellucida C. M. — Trichosteleum.

(1) In Enum. Kindb. nom. nuda :

S. leucobolax C. M.

micro-lecythis C. M.

S. pseudo-subulatum C. M.

perhamosa C. M. — *Trichosteleum*.
Pickeringii C. M. — *Sematophyllum*.
tenerrima C. M. — *Trichosteleum*.
Zürniana C. M. et Schlieph. — *Trichosteleum*.

SIMOPHYLLUM *Lindb. Rev. crit. Ic. fl. dan. p. 74.*

microstomum Lindb. — *Hymenostomum*.
viridulum Lindb. — *Weisia*.

SKITOPHYLLUM *La Pyl. in Journ. bot. Desvauz, 1813, n. V, p. 31.*

Spec. omn. non indicatae sunt **FISSIDENTES** ejusd. nom.

adiantoides β *marginatum* La Pyl. — *Fissidens decipiens*.
congestum La Pyl. — *Fissidens grandifrons*.
Dillenii La Pyl. — *Conomitrium*.
fontanum La Pyl. — *Conomitrium Julianum*.
gracile La Pyl. — *Fissidens incurvus*.
Julianum Lindb. — *Conomitrium*.
Novae Hollandiae La Pyl. — *Rhizogonium*.
semi-completum La Pyl. — *Conomitrium Hedwigii*.
tamarindifolium La Pyl. — *Fissidens incurvus* var. *tamarindifolius*.
viridulum Lindb. — *Fissidens bryoides*.
Weberi La Pyl. — *Amblystegium riparium*.

SCELANIA *Lindb.*

caesia Lindb. — *Leptotrichum glaucescens*.

SOLMSIA *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 273.*

Spec. omn. **BRAUNFELSIAE** ejusd. nom.

SOLMSIELLA C. M. in *Bot. Centralbl. 1884, n. 31 (2 spec.)*.

ceylonica (*Thw. et Mitt.*) C. M. l. c.

Erpodium ceylanicum *Thw. et M. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 306, t. 5 A.*

1. Cortic. -- As. : Ceylan.

javanica C. M. l. c.

1. Cortic. — As. : Java.

SORAPILLA *Mitt. M. austr. am. p. 603 (1 spec.)*.

Sprucei *Mitt. l. c.*

— *Am. merid.* : And. Quitens.

SPADOPHYLLUM *Hpe. in Jaeg. Ad. II. p. 666.*

Octoblepharum *Hpe.* — *Pottia*.

Spathularia C. M. *Syn. II, p. 229* (subgen. *HYPNI* sens. Muller.).

Spathulidium C. M. in *Linn. 1876, p. 298* (sect. **WEISIAE** = **GYROWEISIA**).

SPHÆRANGIUM W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 12 (14 spec.)*.

africanum *Rehm.* — *Rehmanniella*.

apiculatum (*Hook. f. et Wils.*) W. P. Sch. *Syn. I ed. p. 12.*

Acaulon apiculatum *Jaeg. M. Cleist. p. 20.*

Phascum apiculatum H. f. et W. Fl. N. Zeal. p. 59, t. 83, f. 1 (1).

1. Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

« *var. turgidum* (Mitt.) Par.

Acaulon turgidum Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 58.

Phascum apiculatum var. turgidum Mitt. in H. f. et W. l. c.

Ut typ. — *Pac.* : Tasman.

brisbanicum (C. M.) Jaeg. Ad. 1, p. 184.

Acaulon brisbanicum C. M. in Linn. 1871-73, p. 144.

1 vel 2. — *Pac.* : Austral. or.

capense (C. M.) Jaeg. l. c.

Acaulon capense C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 415.

A. muticum C. M. Syn. I, p. 22 p.p.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

integrifolium (C. M.) Jaeg. l. c.

Acaulon integrifolium C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 745.

2. Terr. — *Pac.* : Austral. or.

Lorentzi (C. M.) Par.

Acaulon Lorentzi C. M. in Linn. 1880-82, p. 353.

2. — *Am. merid.* : Argentin. Urug.

Lorentzi Besch. — *Sph. nanum*.

mediterraneum (Limpr.) Par.

Acaulon mediterraneum Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 180.

A. pellucidum Fleisch. et Warnst. Bryoth. eur. merid. n. 2 ?

2. — *Eur.* : Sardinia.

muticum (Schreb.) W. P. Sch. l. c.

Acaulon muticum C. M. in Bot. Zeit. 1847, p. 99 et Syn. I, p. 22 et II, p. 519 ; Bryol. eur. I (mon. p. 8), t. 4.

Phascum acaulon β L. Sp. Pl. p. 1570.

Phascum acaulon β minus Ehrh. Hannov. Magaz. 1780, p. 235.

Ph. bulbosum Voit M. Herbip. p. 8.

Ph. globosum Schleich.

Ph. muticum Schreb. de Phasco, p. 8, t. I ; Brid. Bryol. univ. I, p. 22 (incl. *var. rubrum*).

Ph. muticum α majus H. et T. Musc. brit. p. 7, t. 5.

Sphagnum acaule bulbiforme minus Dill. Hist. M. p. 252, t. 32, f. 12 A. B. C.

Ps. 2. In campestr. aren., argill., in ericet. humos., etc. — *Eur.* : Fere tota, hand copiose. *Afr.* : Alger. ; C. B. Sp. ? *Am. sept.* : Calif.

Eas. : Rab. Bryoth. eur. n. 151 a-c.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 32.

« *var. cuspidatum* W. P. Sch. l. c.

Acaulon piligerum Limpr. l. c.

Phascum muticum var. piligerum de Not. Syll. p. 306.

Ut typ. — *Eur.* : Sardin., Graecia.

« *var. minus* (H. et T.) W. P. Sch. l. c.

Acaulon minus Jaeg. M. Cleist. p. 19.

(1) « Ubi calyptra sub f. 5 delineata delenda est et capsulae apiculus in fig. 3 et 4 calyptram veram repraesentat ». Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 71.

Phascum muticum β minus *H. et T. l. c.*; *Brid. l. c. p. 23.*

In maritim. — *Eur.*; *Anglia*, *Gall.* *Afr.*; *Alger.*

nanum (*C. M.*) *Par.*

Acaulon nanum *C. M. in Fl. 1888, n. 1.*

Sph. Lorentzi *Besch. in Rev. bryol. 1885, p. 17 et in Bal. Pl. Parag. n. 3624.*

1? *Terr.* — *Am. merid.*; *Paraguay.*

pellucidum *Fl. et Warnst.* — *A. mediterraneum*?

rufescens (*Jaeg.*) *Lesq. et Jam. Man. p. 40.*

Acaulon rufescens *Jaeg. op. et l. cc.*

A. triquetrum var. *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 31.*

1. — *Am. sept.*; *Reg. orient. et centr.*

Schimperianum (*Sulliv.*) *W. P. Sch. l. c.*; *Lesq. et Jam. Man. p. 41.*

Acaulon Schimperianum *Sull. Ic. M. p. 18, t. 9.*

Phascum Schimperianum *ej. M. of U. St. p. 15.*

— *Am. sept.*; *Illinois, Texas.*

Exs.; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 33.*

Sullivanii (*C. M.*) *Par.*

Acaulon Sullivanii *C. M. in Fl. 1888, n. 1.*

2. — *Pac.*; *Austral. or.*

triquetrum (*Spr.*) *W. P. Sch. l. c.*

Acaulon triquetrum *C. M. Syn. I, p. 22 et II, p. 519; Bryol. eur. I (mon. p. 3), t. 1.*

Phascum bulbosum var. *minimum* *de Not. Syll. p. 306.*

Ph. muticum *Br. in M. Sardin. Müller. itin.; Drumm. M. bor. am. n. 8; Moug. et Nestl. Stirp. Voges. rhen. n. 802.*

Ph. triquetrum *Spr. in Lond. Journ. of bot. IV, 1845, p. 189 et in Engl. Bot. Suppl. t. 2901.*

Ps. 2. In agger. et campestr. argill. arenac. — *Eur.*; *Anglia*, *vall. Rhen. med., Saxon., Galloprov., Sardin. Afr.*; *Alger. Am. sept.*; *Nov. Angl., New Jersey, Carol. merid., Saskatchewan.*

Exs.; *Rab. Bryoth. eur. n. 164, 1054, 1156.*

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 31.

« var. *desertorum* *Besch. in Journ. de bot. 1894, p. 43.*

In arenac. — *Afr.*; *Gabes.*

Uleanum (*C. M.*) *Par.*

Acaulon Uleanum *C. M. in Fl. 1888. n. 1.*

— *Am. merid.*; *Brasil. austr. or.*

vesiculosum (*C. M.*) *Par.*

Acaulon vesiculosum *C. M. in op. et l. cc.*

— *Am. merid.*; *Plata.*

SPHÆROCEPHALUS *Neck., Lindb.*

Spec. omn. AULACOMNIA ejusd. nom.

Sphærostegium *C. M. in Fl. 1885, p. 426 (subgen. HYPNI sensu Muller.).*

SPHÆROTHECIUM *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., III, p. 361.*

Spec. omn. CAMPYLOPODES ejusd. nom.

SPHAGNUM Dill. Hist. M. p. 240 emend. (230 spec.).

- bulbiforme majus* Dill. — *Phascum cuspidatum*.
bulbiforme minus Dill. } — *Sphaerangium muticum* (fid. C. M.).
acaulon } — *Phascum cuspidatum* (fid. Lindb.).
, maximum, foliis in centro ciliaribus Dill. — *Diphyscium foliosum*.
trichodes Dill. — *Pleuridium subulatum*.

aciphyllum C. M. in Fl. 1887, p. 419; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 202, t. IV, fig. 10^a, 10^b et t. VII, f. 11.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

aconiense de Not. — *Sph. squarrosum*.

aculeatum Warnst. — *Sph. tumidulum*.

acutifolioides Warnst. in Hedwig. 1890, p. 192, t. IV, fig. 4^a 4^b et t. VII, fig. 16.

Ster. ? — As. : Assam.

acutifolium Ehrh. Crypt. exs. n. 72 p.p. ; C. M. Syn. I, p. 96 p.p. ; W. P. Sch. Mém. Sph. p. 61, tt. XIII et XIV et Syn. II ed., p. 825; Rüss. et Warnst. in Verh. d. bot. Ver. für Brandenburg, 1888, p. 112; Lindb. Torfm. p. 138; Rüss. Beitr. p. 37.

Hypnum cubile β Neck. Meth. M. p. 189.

Sph. Ascherbachianum Breut. in Bot. Zeit. 1824, p. 459.

Sph. alpinum Ruehl.

Sph. capillaceum Wahlenb. Fl. Lapp.

Sph. capillifolioides Breut. in op. cit. p. 438; Brid. Bryol. univ. I, p. 751.

Sph. capillifolium Ehrh. Hann. Mag. 1780, p. 35; Brid. op. cit. p. 11.

Sph. gracile Rich. in Michx. Fl. bor. am. II, p. 285.

Sph. intermedium Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 22 (fid. C. M.).

Sph. nemoreum Scop. Fl. Carn. p. 161.

Sph. palustre L. Sp. pl. p. 1569 p.p. (fid. W. P. Sch.).

Sph. palustre β *capillaceum* Weiss Crypt. Goett. p. 265.

Sph. palustre, molle, deflexum, squamis capillaceis Dill. Hist. M. p. 243, t. XXXII, fig. 2 A. p.p. (fid. W. P. Sch.).

Sph. subulatum Brid. op. cit. p. 18.

1. In silvis et ericet. humid., ad scaturig. — Eur. : Totā : Spitzberg.

As. : Septentr., Nepal., Syria. Afr. : Septentr., ins. Azor. Am. sept. :

Vulg. ; Groenland. Am. merid. : And. Nov. Granat. et Boliv.,

Valdiv. Pac. : Nov. Zeland.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 202, 203, 204.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.

« *var. alpinum* Milde Bryol. siles. p. 382.

Ut typ. — Eur. : Reg. subalp. et alp.

var. aquaticum Schlieph. — *Sph. subnitens*.

var. borbonicum Ren. et Card. — *Sph. obtusiusculum var. purpurascens f. dasybrachyclada*.

« *f. campicolum* (C. M.) Warnst. in Hedwig. 1890, p. 208.

Sph. campicolum C. M. in sched.

— Am. merid. : Brasil. austr. or. (ins. S. Catharina).

var. β capillifolium Ehrh., Bryol. germ. — *Sph. recurvum*.

« *var. coloratum* Roell (1) in Hedwig. 1893, p. 296.

f. molle ej. in op. cit. p. 297.

Ut typ. — Am. sept. : Washington.

(1) Cl. Roell et Warnstorf easdem subformas vel formas, imo forsan varietates diverso nomine nimis probabiliter salutaverunt.

- « *var. Corbieri* Card. in *Corb. Musc. de la Manche*, pp. 208 et 364.
— *Eur.* : Gall. occid. (Normannia).
- « *var. deflexum* W. P. Sch. op. cit. p. 826.
Sph. acutifolium *var. speciosum* Warnst. (fid. Roell in Hedwig. 1893, p. 303).
ff. capitatum, compactum * deflexum, compactum * Schimperii, gracile, gracile * Schliephackeanum, pallescens, pallescens * deflexum, * flaccidum et * versicolor Roell in op. et l. cc.
Ut typ. — *Eur.* : In alp. et zon. frigidioris usq. in arctica. *Am. sept.* : New Jersey, Indiana, Washington.
- « *var. densum* Warnst. in Hedwig. 1884, p. 117.
Ut typ. — *Eur.* : Stiria septentr.
- « *f. diblastum* (C. M.) Warnst. in Hedwig. 1890, p. 208.
Sph. diblastum C. M. in Fl. 1897, p. 416.
— *Am. merid.* : Argentin.
- « *var. elegans* Braithw.
f. dimorphum Roell in Hedwig. 1893, p. 297.
— *Am. sept.* : Wisconsin.
- var. elegans f. plumosa* Roell. — Sph. tenellum.
- var. fallax* Warnst. { — Sph. Girgensohnii.
— Sph. Rüssowii.
- var. flavicaule* Warnst. — Sph. quinquefarium.
- var. flavicomans* Card. — Sph. subnitens *var. flavicomans*.
- « *var. flavo-rubellum* Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 193.
— *Am. sept.* : New Hampshire.
- « *var. fuscum* Roell in Bot. Centralbl. 1891, pp. 21-22.
— *Am. sept.* : Wisconsin.
- var. Gerstenbergeri* Warnst. — Sph. quinquefarium.
- « *var. gracile* Roell System. (1) pp. 16-17.
f. flagelliforme ej. in Hedwig. 1893, p. 304.
— *Am. sept.* : Washington.
- var. gracile* Rüss. — Sph. Warnstorffii.
- « *var. immersum* Schlieph. mss. ; Warnst. Sph. eur. n. 104 et in Hedwig. 1884, p. 117.
Aquat. — *Eur.* : Westphal.
- var. laete-virens* Braithw. — Sph. subnitens.
- var. laxum* Warnst. — Sph. subnitens.
- var. luridum* Hüb., ff. *deflexa, elongata, laete-virens, limosa, plumosa, squarrosula, stricta et violacea.* } Warnst — Sph. subnitens.
- var. meridense* Hpe. — Sph. meridense.

(1) « Spezielle Systematik der Torfmoose. Versuch einer Gruppierung der (Nord-Amerikanischen) Torfmoose nach natürlichen Formenreihen,

36 Formenreihen,
373 Varietäten,
325 Formen

und ZAHLREICHEN unter und nebenformen enthaltend. » Roell in Fl. 1886.
Sit brevius dictum : « Tot specimina, quot nomina. » O Lindbergii Schimperique manes !

- « *var. nanum* (C. M.) Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 208.
Sph. nanum C. M. in sched.
 — *Am. merid.* : Brasil, austr. or. (ins. S. Catharina).
- var. pallens* Warnst. — *Sph. quinquefarium*.
- « *var. pallescens* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 193.
 — *Am. sept.* : Massachussets, New Hampshire.
- « *f. dasy-drepanoclada* Warnst. in *op. cit.* p. 194.
 — *Am. sept.* : New Hampshire.
- « *var. patulum* W. P. Sch. in *op. et l. cc.*
 In pratis uligin. — *Vulg.* in *Eur., As. et Afr. septentr.*
- var. plumosum* Milde. — *Sph. subnitens*.
- var. polyphyllum* Warnst. — *Sph. Rüssowii*.
- « *var. pulchellum* Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 116.
 — *Eur.* : Lapon.
- « *var. purpurascens* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 193.
Sph. acutifolium var. purpureum H. Müll. M. *Westphal.* n. 236.
 — *Eur.* : German. occid. *Am. sept.* : Massachussets, New Hampshire.
- « *var. purpureum* W. P. Sch. in *op. et l. cc.*
 In turfos. profund. mont. editor. — *Eur.* : *Vulg.* *Am. sept.* : Tota ;
 ins. Miquelon.
Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 205.
- var. purpureum* H. Müll. — *Sph. acutifolium var. purpurascens*.
- var. quinquefarium* Braithw. — *Sph. quinquefarium*.
- var. robustum* C. M. ?, Rüss. — *Sph. Rüssowii*.
- var. roseum* Limpr. — *Sph. Rüssowii*.
- var. rubellum* Rüss. — *Sph. tenellum var. rubellum*.
- var. Schillerianum* Warnst. — *Sph. subnitens*.
- « *var. Schlotthaueri* Roell in *Hedwig*. 1893, p. 296.
 — *Am. sept.* : Indiana.
- var. silesiacum* Warnst. — *Sph. quinquefarium*.
- var. speciosum* Warnst. (fid. Roell). — *Sph. acutifolium var. deflexum*.
- var. squarrosulum* Warnst. — *Sph. subnitens*.
- var. strictiforme* Warnst. — *Sph. Rüssowii*.
- var. tenellum* W. P. Sch. — *Sph. tenellum*.
- var. tenerum* Aust. — *Sph. tenerum*.
- var. tenue* { Braithw. — *Sph. tenellum*.
 { *Bryol. germ.* — *Sph. Girgensohni*.
- « *var. versicolor* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 193.
 — *Am. sept.* : Massachussets, New Hampshire.
- « *f. robusta et subf. catoclada* Warnst. in *op. et l. cc.*
 — *Am. sept.* : Vermont.
- « *var. Villardi* Roell in *Hedwig*. 1893, p. 297.
 — *Am. sept.* : Washington.
- « *var. viride* Warnst. in *op. et l. cc.*
 — *Am. sept.* : Massachussets.
- acutifolium* { Funk, n. 8. — *Sph. quinquefarium*.
 { H. f. et W. — *Sph. fimbriatum*.
 { Mitt. — *Sph. Reichardtii*.
 { Rab. n. 204. — *Sph. quinquefarium*.

var. *auriculatum* Warnst. — Sph. *Rüssowii*.

acutiforme Schlieph. et Warnst. {
 var. *pseudo-Schimperi* Warnst. — Sph. *tenellum*.
 var. *rubellum* Schlieph. et Warnst. — Sph. *tenellum* var. *rubellum*.
 var. *tenellum* Schlieph. et Warnst. } — Sph. *tenellum*.
 f. *flavum* Jens. — Sph. *tenellum* f. *flavum*.

acutum Warnst. in *Allgem. Bot. Zeitschr...* in *Karlsruhe*, 1895, n. 7-8.

— As. : Borneo.

æquifolium Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 23, t. I, fig. 9^a, 9^b et t. IV, fig. i.

— Afr. : Madagascar.

affine Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1885, p. 44; Card. *Sph. d'Europe*, pp. 35-36, t. II, fig. 9 et 10 et t. III, fig. 5.

Sph. imbricatum var. *affine* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 250 et in *Hedwig*. 1891, pp. 140, t. XIV, fig. 4 a, 4 b et t. XX, fig. I.

— Am. sept. : Canada, New Jersey, Massachusetts, New-York, Florida.

africanum Welw. et Duby in *Mém...* Genève, 1870, p. 2, t. I, fig. 1.

— Afr. : Angola.

albicans Warnst. in *Hedwig*. 1893, p. I, t. I, fig. 2 a-2 f.
 Ster.

— Afr. : Regio lacustr.

alpinum { L. — *Dicranum elongatum* var. *orthocarpum*.
 Ruehl. — *Sph. acutifolium*.
 Schrank. — *Sph. cuspidatum*.

ambiguum Hüb. — *Sph. rigidum* var. *compactum*.

andinum Hpe. — *Sph. medium*.

Ångstroemi Hartm. *Skand. Fl.* VII-X ed.; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 842; *Lindb. Torfm.* p. 140; *Rüss. Beitr.* p. 79.

Sph. insulosum Ångstr. mss.; W. P. Sch. *Syn.* I ed., p. 683; *Rab. Bryoth. eur.* n. 703.

Sph. molluscum W. P. Sch. *Vers...* p. 72 (quoad pl. *lapponicam*).

— Eur. : Lappon., Spitzberg.

« f. *dasy-anoclada* Rüss. (fid. Warnst. in *Hedw.* 1893, p. 1).

— As. : Sibiria (Kolyma).

angustifolium Jens. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium*.

angusti-limbata Warnst. in *Allgem. Bot. Zeitschr...* in *Karlsruhe* 1895, n. 7-8.

— Afr. : Anstral.

antarcticum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 100; Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 252, t. XIII, fig. 23-27 et t. XIV, fig. c, d.

Sph. compactum var. *Hook. f. et Wils. Crypt. antarct.* p. 122.

Sph. cristatum Hpe. (fid. Warnst. l. c.).

Sph. procerum W. P. Sch. *hb.* (nunc in *hb. Kew.*).

Ad terr. humid. — Pac. : Ins. Campbell., Tasman.

« var. *fluctuans* Warnst. in op. et l. cc.

Ubi typus.

Antillarum W. P. Sch. in *hb. Kew.*; Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 147, t. XV, fig. 11 a, 11 b et t. XXI, fig. O.

— Am. merid.: Ins. Trinitat.

Antillarum Besch. — Sph. Lesueurii.

Arbogasti Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 8; Warnst. in *Hedwig.* 1896, I, t. III, fig. 7 a-7 e.

— Afr.: Madagascar, ins. S. Maria.

arborescens W. P. Sch. in *Lechler Pl. Peruv. n.* 2529 p.p.; Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 32, t. II, fig. 23 a, 23 b, et t. V, fig. r.

Sph. medium (fid. Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 252).

Cortic. — Am. merid.: And. Peruv.

arborescens L. — *Cryphaea heteromalla*.

Ascherbachianum Breut. — Sph. acutifolium.

assamicum C. M. in *Fl.* 1887, p. 411.

Ster. — As.: Assam.

auriculatum W. P. Sch. *Mém. Sph.* p. 79, t. 24 et *Syn. II ed.* p. 844.

Sph. subsecundum var. auriculatum Lindb. *Torfm.* p. 28.

Sph. subsecundum var. isophyllum Rüss. *Beitr.* p. 73 (fid. Jaeg.).

— Eur.: Anglia. Am. sept.: Septentr. et centr.

auriculatum { Lesq. (ex ipso!) — Sph. mendocinum.
Rab. n. 713 et 714. — Sph. neglectum.

Austini Sull. in *Aust. M. Appal. I, n. 2 et Ic. M. Suppl.* p. 9, t. 1; W. P. Sch. op. cit. p. 849; Lindb. *Man. M. II*, p. 391, t. 1, fig. 10 (1).

1 (Warnst.); 2 (Lindb.). — Eur.: Anglia, Suec.,

Brandeb., Westphal., Siles. Am. sept.: Canada, Terr. nova, ins.

Miquelon, Massachussets, New Jersey, Ludovic. or., Mississipi.

Exs.: Braithw. *Sph. brit.* n. 1 et 2.

Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 29, 30, 77; *Eur. Torfm.* ser. I, n. 13 et 14; ser. II, n. 101 et 102.

« var. congestum (Warnst.) Card. in *Rev. bryol.* 1883, p. 76.

— Eur.: Gall. sept. or. (Ardenn.).

« var. cristatum (Warnst.) Par.

Sph. imbricatum var. cristatum Warnst. in *Hedw.* 1891, t. XIV, fig. 5 a, 5 b et t. XX, fig. f.

Ubi typ.

var. glaucum	{ f. imbricatum f. squarrosulum f. subsquarrosulum }	Roell.	{ — Sph. Austini var. imbricatum. — Sph. Austini var. sublaeve. — Sph. Austini var. imbricatum.
--------------	--	--------	---

« var. imbricatum (Hsch.) Lindb. *Contr. ad fl. crypt. As. bor. or.* p. 280 et in *Bot. Not.* 1873, p. 45.

Sph. Austini var. glaucum Roell f. imbricatum et subsquarrosulum ej. in *Hedwig.* 1897, p. 54.

Sph. cymbifolium var. condensatum C. M. *Syn. I*, p. 92 p.p. (fid. Lindb.).

Sph. imbricatum Hsch. in *hb. reg. Berol.* (fid. Rüss. *Beitr.* 1865, p. 21); Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 249 et in *Hedwig.* 1891, p. 139.

(1) Cf. Warnst. in *Hedwig.* 1889, p. 302, t. VIII, fig. 1-6 et 1890, n. 11-12.

— *Eur.* : Ins. Hebrid. *As.* : Kamschatka. *Am. sept.* : Labrador, Canada, Terr. nova, sept. et occid., Arkansas, Florid., Ludovic., Alabama, Mississippi.

« *var. laxum* Roell *System.* p. 107 et *f. fusco-flavescens* ej. in Hedwig. 1897, p. 54.

— *Am. sept.* : Arkansas.

« *var. sublaeve* (Warnst.) Par.

Sph. Austini *var. glaucum* Roell *f. squarrosulum* ej. in Hedwig. 1897, p. 54-55.

Sph. imbricatum *var. sublaeve* Warnst. in op. et l. cc.

Ubi typ.

australe Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 100; *Fl. Tasman.* II, p. 162; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 259, t. XXII, fig. 18, 19 et t. XIV, fig. e.

Sph. compactum *var. ovatum* H. f. et W. *Fl. Antarct.* p. 122.

Sph. confertum Arch. et Mitt. in op. et l. cc.

— *Pac.* : Nov. Zeland, Tasman, ins. Campbell.

australe W. P. Sch. } (fid. Warnst. 1890). — *Sph. cymbifolium*.
 } (fid. Warnst. 1891). — *Sph. maximum*.

austro-molle C. M. — *Sph. capense*.

Balfourianum Warnst. in Hedwig. 1891, t. XVII, fig. 21 a, 21 b et t. XXII, fig. 2.

— *Afr.* : Ins. Franciae.

balticum Jens. — *Sph. recurvum* *var. molle*.

batumense Warnst. in *Schrift. d. Naturforsch. Gesells. in Danzig*, N. F., IX, Heft. II, 1896.

— *As.* : Caucas. (Batoum).

Beccarii Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 278; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 148, t. XV, fig. 12 a, 12 b et t. XXI, fig. p.

— *As.* : Borneo.

Bernieri Besch. — *Sph. cuspidatum*.

Bescherellei Warnst. in Hedw. 1890, p. 240, t. XI, fig. 1-2 et t. XIV, fig. g.

Sph. patens Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 329.

Ster. ?

— *Afr.* : Ins. Borbon.

Bessoni Warnst. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, n. 8 et in Hedwig. 1893, p. 1, t. I, fig. 3 a-3 f.

— *Afr.* : Madagascar.

Beyrichianum Warnst. in Hedwig. 1897, p. 157.

— *Afr.* : Pondo-Land.

bicolor Besch. — *Sph. medium*.

Bolanderi Warnst. in Hedwig. 1891, p. 173, t. XIX, fig. 34 a et 34 b.

— *Am. sept.* : California.

Bordasii Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 189; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 25, t. II, f. 17 a, 17 b et t. IV, fig. 9.

Sph. coronatum Rehm. *M. Afr. austr.* n. 432 p.p.

— *Afr.* : Austral. ; ins. Franciae.

borneoense Warnst. in *Allgem. Bot. Zeitschr...* in Karlsruhe, 1895.

— *As.* : Borneo.

brachybolax C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 78.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or. (ins. S. Catharina).

brachycladum C. M. in *Wainio M. brasil. n.* 8; *Warnst. in Hedwig.* 1891, p. 43, t. III, fig. 35 a, 35 b et t. V, fig. cc.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës, ins. Catharina, Serra do Mar).

brasiliense *Warnst. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5 et in *Hedwig.* 1891, p. 150, t. XV, fig. 14 a, 14 c et t. XXII, fig. s α , s β , s γ .

Sph. brevirameum Hpe. forma? *Warnst. l. c.*

Sph. papillosum var. *plumosum* Rüss. mss.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

« var. *carneum* *Warnst. in op. et l. cc., f. dasy-brachyclada* *Warnst. in op. et l. cc. et in Hedw.* 1891, p. 151. sub nom. *f. brachy-dasyclada*.

Ster. — *Am. merid.* : Ubi typ.

var. *chlorinum* *Warnst.* — *Sph. brasiliense* var. *glaucescens*.

« var. *glaucescens* *Warnst. in op. et l. cc.*

Sph. brasiliense var. *chlorinum* ej. in *Hedwig.* 1891, p. 151.

Sph. squarrosulum *Warnst. in op. et l. cc.*

— *Am. merid.* : Ubi typ.

brevifolium Roell p.p. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium*.

brevirameum Hpe. — *Sph. erythrocalyx* var. *papillosum* f. *brevirameum*.

caldense C. M. in *Bot. Zeit* 1862, p. 327; *Warnst. in Hedwig.* 1891, p. 24, t. II, fig. 18 a, 18 b.

— *Am. merid.* : Brasil. or.

var. *scorpioides* Hpe. — *Sph. cyclophyllum*.

campicolum C. M. — *Sph. acutifolium* f. *campicolum*.

capense Hsch. in *Linn.* 1841, p. 113; C. M. *Syn. I*, p. 103; *Warnst. in Hedwig.* 1891, t. I, fig. 13 a; t. II, fig. 13 b, 14 b, 15 a, 15 b, 16 a, 16 b, 16 c et t. IV, fig. n.

Sph. austro-molle C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 16 b, 433 b, c, et in *Fl.* 1887, p. 419.

Sph. mollissimum ej. in *ll. cc. n.* 17 et 434 b et p. 418.

— *Afr.* : Cap. B. Sp.

capillaceum Wahlenb. — *Sph. acutifolium*.

capillifolioides Breut. — *Sph. acutifolium*.

capillifolium } Ehrh. — *Sph. acutifolium*.

 } Moug. et Nestl. n. 1. — *Sph. quinquefarium*.

Cardoti *Warnst. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 8 et in *Hedwig.* 1893, p. 1, t. I, fig. 4 a, 4 b et t. II, fig. 4 c, 4 g.

— *Afr.* : Madagascar.

carneum C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 1289 et 1290; *Warnst. in Hedwig.* 1897, p. 145.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Ouro Preto).

cavifolium } var. *lapponicum* *Warnst.* — *Sph. Dusenii*.

 } var. *laricinum* *Warnst.* — *Sph. laricinum*.

 } var. *subsecundum* *Warnst.* — *Sph. subsecundum*.

centrale C. Jensen in *Sv. Vet. Akad. Handl.* XXI, III, n. 10, p. 34.

Sph. intermedium Rüss. 1894 (incl. var. *glaucescens*, *fusco-flavescens*, *flavo-fuscescens*, *fuscescens*, Rüss. et *pallescens* (*Warnst.*).

— *Eur.* : Septentr.

ceyonicum *Mitt. mss.*; Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 195, t. IV, fig. 7 a, 7 b et t. VII, fig. 14.

Ster. ? — As. : Ceylan.

chilense *Ltz. in Bot. Zeit.* 1866, p. 185.

l. — Am. merid. : Valdivia.

chinense *Brid. Bryol. univ.* I, p. 750; *C. M. Syn.* I, p. 104.

— As. : China.

comosum *C. M. in Fl.* 1887, p. 413; Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 35, t. II, fig. 26 a, 26 b, t. III, fig. 26 c et t. V, fig. u.

— Pac. : Austral. or. (Nova Vales.).

compactum { *Brid.* } — Sph. medium.
 { } — Sph. rigidum var. compactum.
 { *C. M. pp.* } — Sph. molle.

var. *ambiguum* H. f. et W. — Sph. subsecundum.

var. *ovatum* H. f. et W. — Sph. australe.

var. *ramulosum* C. M. — Sph. molle.

var. *rigidum* *Bryol. germ.* — Sph. rigidum.

var. *turgidum* Roell. — Sph. rigidum var. compactum ?

var. H. f. et W. — Sph. antarcticum.

condensatum *Brid.* — Sph. ericetorum ?

confertum Arch. et Mitt. — Sph. australe.

contortum *Schultz Fl. Starg.* p. 64! (*fid. Limpr. in litt.* 18^a April 1888 ad Warnst. in *Hedw.* 1888, pp. 266-267; Warnst. l. c. e spec. origin.); *Brid. op. cit.* I, p. 7.

Sph. laricinum Spr. (*fid. Warnst. l. c. et in Bot. Gaz.* 1890, p. 24).

— Eur. : Mecklembourg. Am. sept. : Canada, Mas-
sachusetts.

Exs. : Funk, *Deutschl. M.* n. 6.

« var. *albescens* Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 123 et in *Hedwig*. 1884, n. 7-8.

— Eur. : Hannoveria.

« var. *Beckmanni* Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 126 et in *Hedwig*. l. c.

— Eur. : Hannoveria.

« var. *brachycladum* Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 128 et 129 et in *Hedwig*. l. c.

— Eur. : Brandebourg, Hannoveria.

« var. *compactum* Warnst. (*ubi?*), ff. *heterophyllum* Roell *Syst.* p. 81 et *Schimperi* ej. in *Hedwig*. 1893, p. 313.

— Am. sept. : Washington.

« var. *corniculatum* Roell *System.* p. 86.

— Am. sept. : Indiana, Arkansas.

« var. *deflexum* Gravet *mss.*; Warnst. in *Hedwig*. l. c.

— Eur. : Belgia.

var. *laricinum* Wils. — Sph. laricinum.

« var. *Lindbergii* Roell in *Bot. Centralbl.* 1891, pp. 21-22.

— Am. sept. : Indiana.

« var. *squarrosulum* Gravet *mss.*; Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 125 et in *Hedwig*. l. c.

— Eur. : Belgia.

« *f. robustum* Roell *System.* p. 83.

— *Am. sept.*: Washington.

var. *subsecundum* Wils. — *Sph. subsecundum*.

var. Wils. — *Sph. khasianum*.

convolutum Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 220, t. VIII, fig. 10-12 et t. X, fig. 6.

? *Sph. hypnoides* W. P. Sch. in *hb. Kew.*

Ster. ? — *Afr.*: C. B. Sp.

Cordemoyi Warnst. in *Hedwig.* 1897, p. 150.

— *Afr.*: Ins. Borbon.

coronatum C. M. in *Fl.* 1887, n. 12; Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 27, t. II, fig. 19 a, 19 b et t. IV, fig. h.

Ster. — *Afr.*: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. M. *Afr. austr.* n. 9 p.p.

coronatum Rehm. p.p. — *Sph. Bordasii*.

var. *cuspidatum* Rehm. n. 10. — *Sph. oxycladum*.

coryphaeum Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 189, t. IV, fig. 2 a, 2 b, 2 c. et t. fig. 18.

— *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

costa-ricense Warnst. in *Bull. hb. Boissier.* 1894, p. 401.

— *Am. sept.*: Costa-Rica.

crassycladum Warnst. in *Bot. Centralbl.* 1889, n. 45 c.ic.

— *Eur.*: Anglia (Cheshire).

crassisetum Brid. — *Sph. cymbifolium*.

crassum C. M. — *Sph. medium*.

cribrosum Lindb. — *Sph. macrophyllum* var. *floridanum*.

cristatum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 661.

Sph. antarcticum (fid. Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 252).

— *Pac.*: Alp. Austral. or.

curvifolium Wils. } (fid. Warnst.). — *Sph. recurvum*.

 } (fid. W. P. Sch. — *Sph. laricinum*.

cuspidatiforme Breut. — *Sph. cuspidatum*.

cuspidatulum C. M. in *Linn.* 1874, p. 549; Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 225, t. VIII, fig. 20-23.

Sph. Fœæ C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601, nom. (fid. Warnst.).

Ster.

— *As.*: Khasia, Birman. super.

cuspidatum Ehrh. *Dec. crypt.* n. 251; Brid. *Brychl. univ.* I, p. 14; C. M.

Syn. I, p. 96; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 831; Lindb. *Torf.* p. 135;

Rüss. Beitr. p. 55; Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » p. 205, t. I, fig. 13-14.

Sph. alpinum Schrank *Baiers Fl.* II, p. 435.

Sph. Bernieri Besch. in *hb. Mus. Paris*, 1879, (fid. Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 236, t. IX, fig. 30-33).

Sph. capillifolium β *cuspidatum* Wahlenb. *Fl. Lapp.* p. 301.

Sph. cuspidatiforme Breut. in *Fl.* 1824, p. 407.

Sph. cuspidatum β *immersum* W. P. Sch. *Mém. Sph.* t. XVI, fig. β 1 et β 2.

Sph. gabonense Besch. in *hb. Mus. Paris*, 1883 (fid. Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 236, t. IX, fig. 26-29).

Sph. laricinum Aust. M. *Appal.* n. 31; C. M. *Syn.* I, p. 97; Ångstr. in *Rab. Bryoth. eur.* n. 712.

Sph. Naumannii C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et in *Fors-*

chungsreise... p. 59 (fid. Warnst. in Hedwig. 1890, p. 236, t. I, fig. 28, 29 a, 29 b et 31).

Sph. palustre, molle, deflexum, squamis capillaceis Dill. H. M. p. 243, t. XXXII, fig. 2 A. (fid. C. M.).

Sph. variabile var. 2 p.p. Warnst. Eur. Torfm. p. 69.

1 (W. P. Sch. Mém.) 2 (ej. Syn.). In turf. aquos. e reg. campestr. usq. in subalp. — Eur.: Fere tota. As.: Septentr. Afr.: Gabon, Madagascar. Am. sept.: Canada, Terr. nova; reg. or. et merid., de Labrador ad Florid. et Ludovic. Am. merid.: Ins. Trinitat.; Brasil. ? Pac.: Nov. Zeland., Austral. or. (Queensland).

Exs.: Braithw. Sph. brit. n. 50-52.

Ehrh. Fl. crypt. n. 251.

Erb. crit. ital. n. 1214 (fid. Limpr.).

Gravet, Sph. Belg. n. 37, 38, 40-46.

Jack, Lind. et St. Krypt. bad. n. 222-224, 571.

Limpr. Bryoth. siles. n. 197 a et b.

Moug. et Nestl. Stirp. vog. rhen. n. 40 (cum Sph. recurvo mixt.).

H. Müller, Westfal. Laubm. n. 232.

Rab. Bryoth. eur. n. 210, 211 (excl. 211 c.), 609, 716 b (excl. 716).

Warnst. Sphagnoth. eur. n. 49, 50, 96-99, 116-119, 182-183, 196.

Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. I, n. 96; ser. II, n. 196.

var. *biforme* (Braithw.) Mac. — Sph. Dusenii.

var. *crispulum* Warnst. — Sph. Dusenii.

var. *deflexum* Warnst. — Sph. Dusenii.

« var. *falcatum* (Besch.) Par.

Sph. cuspidatum Sull. in Wilkes Expl. Exped. p. I (fid. Besch.).

Sph. cuspidatum var. *falcatum* Warnst. in Hedwig. 1890, p. 236, t. IX, fig. 14-17 et t. X, fig. 20.

Sph. *falcatum* Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1885, p. LXVII et in Mss. sc. Cap Horn, V, Bot., p. 306, t. 6, fig. 21.

— Am. merid.: Patag., ins. Stat., cap. Horn.

« var. *falcatum* Rüss. Beitr. zur Kentn. d. Torfm. p. 59; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 832.

f. *pumila* Gravet; Warnst. in Hedwig. 1884, p. 125,

f. *rigida* Warnst. in Abh... l. c. p. 207.

Ut typ. — Eur.: Ubi typ. Am. sept.: Ubi typ.; ins. Miquelon.

var. *falcatum* Warnst. — Sph. cuspidatum var. *falcatum*.

« var. *hypnoides* (A. Br.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 832 et Mém. Sph. t. XVI, fig. ε.

Sph. *hypnoides* A. Br. in Fl. 1825, p. 62 et in Brid. Bryol. univ. I, p. 752.

Sph. *laxifolium* var. *hypnoides* C. M. Syn. I, p. 98.

Ut et ubi typ. in Eur. et Am. sept.

var. *immersum* W. P. Sch. — Sph. cuspidatum.

var. *laxifolium* Rab. (n. 716). — Sph. Dusenii.

« var. *majus* Rüss. Beitr.... p. 58 p.p.

Sph. *riparium* Ångstr. in Rab. Bryoth. eur. n. 707 (fid. Jaeg.).

Ut et ubi typ. in Eur. et in Am. sept.

var. *majus* Jens. — Sph. Dusenii.

var. *mendocinum* Card. — Sph. mendocinum.

var. *microporum* (Warnst.) Par.

Sph. *falcatum* var. *microporum* Warnst. in Allgem. Bot. Zeitschr., in Karlsruhe, 1895.

— Am. merid.: Ins. Maclov.

- « *var. miquelonense* Ren. et Card. in Bull. soc. roy. bot. Belg. XXVI, I p.p.; Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » p. 209, t. I, fig. 24 a, 24 b et t. II, fig. h α et h β .
- Sph. cuspidatum var. Torreyanum* Ren. et Card. p.p. (fid. Warnst. l. c.).
— Eur.: Anglia (Lancashire). Am. sept.: Massachusetts, ins. Miquelon.
- miquelonense* R. et C. p.p. — *Sph. cuspidatum var. Torreyanum* (fid. Warnst.).
- f. *mollis* Warnst. — *Sph. cuspidatum var. plumulosum*.
- « *var. monocladium v. Klinggraeff* in Hedwig. 1882, p. 2; Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » p. 208, t. I, fig. 27 a, 27 b, 28, 31 et t. II, fig. c α , c β , c γ .
— Eur.: Boruss. occid.
- var. patens* Ångstr. — *Sph. Wulfianum*.
- « *var. plumosum* Bryol. germ. I, p. 24, t. IV, fig. 9*; W. P. Sch. in op. et l. cc., fig. 5; Rüss. Beitr.... p. 60; Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » p. 207, t. I, fig. 22 a, 22 b, 23 et t. II, fig. g.
- Sph. cuspidatum Crome Samml. deutsch. Laubm. n. 5; Funk, Crypt. Gew. Fichtelgeb. n. 347.*
- Sph. laxifolium* C. M. Syn. I, p. 97,
f. *serrata* Schlieph. Beitr.... 1865; Warnst. in op. cit. p. 208, t. I, fig. 15-16.
f. *truncata* Schlieph. l. c.; Warnst. l. c. fig. 17.
— Eur.: Ubi typ. As.: Java? Am. sept.: Reg. alp., Mississippi.
- Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 210 b, 211 b, 716 a et b.
- var. plumosum* Rab. (211 c, 717, 952). — *Sph. Dusenii*.
- « *var. plumulosum* W. P. Sch. in op. et l. cc. fig. γ 1 et γ 2.
- Sph. cuspidatum f. mollis* Warnst. Samml. eur. Torfm. n. 95-96 et « *die Cuspidat...* Gr. », p. 207.
- Sph. cuspidatum var. polyphyllum* Schlieph. in Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » l. c., t. II, fig. k.
- Sph. hypnoides* Al. Braun (fid. Warnst. l. c.).
subf. *crispula* Warnst. l. c.
— Eur.: Ut et ubi typ. Am. sept.: Reg. alp.
- var. plumulosum* Rab. (n. 210 a, 211). — *Sph. cuspidatum var. submersum*.
- var. polyphyllum* Schlieph. — *Sph. cuspidatum var. plumulosum*.
- var. Rauei* Aust. — *Sph. recurvum*.
- subsp. *riparium* Lindb. — *Sph. spectabile*.
- var. serratum* (Aust.) { Lesq. et Jam. — *Sph. trinitense*.
Warnst. — *Sph. cuspidatum var. submersum*
f. *serrulata*.
- var. speciosum* Rüss. — *Sph. spectabile*.
- « *var. submersum* W. P. Sch. Mém. Sph. p. 67, t. XVI, fig. 1 β , 2 β et Syn. II ed. l. c.; Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » p. 207, t. I, fig. 1821 a, b et t. II, fig. f.
- Sph. cuspidatum var. plumulosum* Rab. Bryoth. eur. n. 210 a, 211.
f. *serrulata* Warnst. in Hedwig. 1890, p. 235.
- Sph. serratum* Aust. in Bull. Torr. bot. Club, 1877, p. 145 (fid. Warnst. l. c.).
In turfos. — Eur.: Brandebourg, etc. Am. sept.: Sept. et orient.; Ludovic. (f. *serrulata*).
- « *var. tenellum* Warnst. in Hedwig. 1884, p. 125.
— Eur.: Brandebourg.

« var. *Torreyanum* Sull. *M. bor. am.* II ed., p. 4; Warnst. « *die Cuspidat.... Gr.* » p. 209, t. I. fig. 26 et 30.

Sph. cuspidatum var. *miquelonense* Ren. et Card. p.p. (fid. Warnst. l. c.).

Sph. cuspidatum var. *Torreyi* Braithw. *Sph. brit.* p. 82 p.p. (fid. Warnst. l. c.).

Sph. Torreyanum Sull. in *Mem. Acad....* IV, p. 175; C. M. Syn. II, p. 539.

— *Eur.* : Anglia (Shropshire, fid. Boswell.).

sept. : Ins. Miquelon, New Jersey, Massachussets; reg. merid.

var. *Torreyi* Braithw. — *Sph. cuspidatum* var. *Torreyanum*.

« var. *uplandense* Ångstr. in *Rab. Bryoth. eur.* n. 715.

— *Eur.* : Lappon. (Uplandia).

var. α Rüss. f. $\left\{ \begin{array}{l} \text{mollissima Rüss.} \\ \text{recurvum Rüss.} \\ \text{typicum Rüss.} \end{array} \right\}$ — *Sph. recurvum*.

cuspidatum $\left\{ \begin{array}{l} \text{Crome, Funk. — } \textit{Sph. cuspidatum} \text{ var. } \textit{plumosum.} \\ \text{Lindb. — } \textit{Sph. Lindbergii.} \\ \text{Mitt. } \left\{ \begin{array}{l} \text{— } \textit{Sph. cuspidatum.} \\ \text{— } \textit{Sph. rufulum.} \\ \text{— } \textit{Sph. Seemanni.} \end{array} \right. \\ \text{Sulliv. — } \textit{Sph. cuspidatum} \text{ var. } \textit{falcatum.} \\ \text{W. P. Sch. Syn. I ed. — } \textit{Sph. recurvum.} \end{array} \right.$

cyclophyllum Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 5 et II ed. n. 8; Sull. *M. of U. St.* p. 11 et *lc. M.* p. 13, t. VI, et *Suppl.* p. 16, t. VII.

Hemitheca cyclophylla Lindb. *Hvitmossor.* 1882.

Sph. caldense β *scorpioides* Hpe. *Symb.* 1874, p. 480 et in *Glaziou M. Brasil.* n. 7042.

Sph. Drummondii Wils. mss.; Braithw. *Sph. Eur. et N. Amer.*

Sph. laricinum var. *cyclophyllum* Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 280 et *Man. M.* II, p. 403.

Sph. obtusifolium var. *turgidum* H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am.* II ed., n. 17.

2. — *Eur.* : Fennia. *Am. sept.* : New Jersey merid., Carol., Ludovic.

Eas. : Aust. M. Appal. I ed., n. 25.

« var. *macrophyllum* Warnst. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, n. 5, f. *dasy-anocladum* Warnst. l. c.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

cymbifolioides $\left\{ \begin{array}{l} \text{Breut. — } \textit{Sph. cymbifolium.} \\ \text{C. M. — } \textit{Sph. cymbophyllum.} \end{array} \right.$

cymbifolium Ehr. *Hann. Mag.* 1780, p. 235; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 2; C. M. Syn. I, p. 92; W. P. Sch. *Mém. Sph.* p. 69, t. XX et Syn. II ed. p. 847; Lindb. *Torfm.* p. 143; Rüss. *Beitr....* p. 77.

Sph. australe W. P. Sch. in *hb. Besch.* (fid. Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 250).

Sph. crassisetum Brid. *Sp. M.* I, p. 15.

Sph. cymbifolioides Breut. in *Fl.* p. 435.

Sph. cymbifolium var. *magellanicum* Brid. *Bryol. univ.* I, p. 4.

Sph. latifolium Hedw. *Sp. M.* p. 27; Moug. et Nestl. *Stirp. rog. rhen.* n. 113; A. de Breb. *M. Norm.* n. 99.

Sph. magellanicum Brid. *M. Rec.* II, I, p. 14, t. II, fig. 1.

Sph. molle, deflexum, squamis cymbiformibus Dill. *Hist. M.* p. 240, t. XXX, fig. 1.

Sph. oblongum P. B. *Prodr.* p. 6; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 6.

Sph. obtusifolium (Ehrh.) Hook. et Tayl. *Musc. brit.* p. 3, t. IV; Funk, *Crypt. Gew. Fichtelgeb.* n. 230.

Sph. palustre L. (fid. Lindb.).

Sph. subbicolor Hpe. in *Fl.* 1880, p. 440 (fid. Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 250).

Sph. vulgare Rich. in *Mich. Fl. bor. am.* II, p. 285.

2. Secus rivul. mont. praepr. arenac. et granit., in ericet. humid., etc.
— *Eur.* Tota. *As.* : Japon., Saghalien, Caucas. occid., Java, ins. Banca. *Afr.* : Teneriffa, ins. Azor. *Am. sept.* : De Labrador et Columb. brit. usq. ad Florid. : Jamaic., Guadalup., Cuba. *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil., Chile. *Pac.* : Austral. or., Tasman.

Exs. : H. Müll. M. Westfal. n. 223.

Rab. Bryoth. eur. n. 207, 803.

« *var. atro-viride* Schlieph. mss. ; Warnst. in *Hedwig.* 1884, n. 7-8.

— *Eur.* : Thuring. *Am. sept.* : Ubi typ.

var. borbonense P. B. — *Sph. cymbifolium var. patens.*

« *var. brachycladum* Roell in *Hedwig.* 1893, p. 316, f. *bicolor ej. l. c.*

— *Am. sept.* : Washington.

« *var. compactum* Schlieph. et Warnst. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Wisconsin, Washington.

ff. *brachycladon et strictum* Roell in *Hedwig.* 1893, p. 317.

— *Am. sept.* : Washington.

var. compactum Rüss. — *Sph. medium.*

« *var. condensatum* Hook. *Fl. antarct.* II, p. 398.

— *Am. merid.* : Fret. Magellan.

var. condensatum C. M. (fid. Lindb.). — *Sph. Austini var. imbricatum.*

« *var. congestum* Roell in *Hedwig.* 1893, p. 315.

— *Am. sept.* : New Jersey.

f. *bicolor et* * *strictum ej. in op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : Washington.

var. congestum { Rab. (n. 722). — *Sph. medium var. laeve f. purpu-*
rascens.
W. P. Sch. — *Sph. medium.*

« *var. contortum* Roell in op. cit. p. 316.

— *Am. sept.* : Wisconsin.

« *var. deflexum* Schlieph. mss. ; Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 195 et in *Hedwig.* 1884, n. 7-8.

— *Eur.* : Belgia, Hannov., Thuring.

« *var. fuscum* Warnst. in *Hedwig.* l. c.

— *Am. sept.* : Indiana.

« *var. globiceps* Schlieph. mss. f. *fuscescens* Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Indiana.

var. Hampeanum f. gracilis Warnst. — *Sph. guadalupense.*

« *var. imbricatum* Roell *Syst.* p. 96, f. *bicolor ej. in Hedwig.* 1893, p. 316.

— *Am. sept.* : Wisconsin.

subsp. *intermedium* Rüss. — *Sph. papillosum var. intermedium.*

« *var. laeve* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 251, f. *glaucescens, subf. squarrosula.*

Sph. glaucum v. Klingg. 1872.

— *Am. sept.* : Massachusetts.

« *var. laxum* Roell *System. p.* 97.

— *Am. sept.* : Indiana.

f. bicolor Roell in *Hedwig. 1893, p.* 316.

— *Am. sept.* : Washington.

f. fuscescens Roell in *op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : Wisconsin.

var. longifolium Hsch. — *Sph. erythrocalyx var. laeve.*

« *var. ludovicianum* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, I,*
p. 4.

Sph. ludovicianum Warnst. in *Hedwig. 1891, p.* 161, *t. XVIII, fig.* 26 a,
26 b et *t. XXIII, fig.* gg.

— *Am. sept.* : New Jersey, Florid., Ludovic., Mis-
sissippi.

var. magellanicum Brid. — *Sph. cymbifolium.*

var. papillosum W. P. Sch. — *Sph. papillosum.*

var. Paradisii Besch. — *Sph. medium.*

« *var. patens* Brid. *Bryol. univ. I, p.* 4 p.p.

Sph. cymbifolium C. M. *Syn. I, p.* 91 p.p.

Sph. cymbifolium var. borbonense P. B. *Prodr. p.* 88 ?

Sph. patens Brid. *Sp. M. I, pp.* 13-14 p.p.

— *Afr.* : Ins. Borbon.

var. patens Brid. (quoad pl. Hispaniolae). — *Sph. meridense.*

« *var. plathyphyllum* Roell in *Hedwig. 1893, p.* 316.

— *Am. sept.* : Wisconsin.

f. complanata Roell in *op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : New Jersey.

« *var. purpurascens* Schlieph. mss.; Warnst. *Sphagnoth. eur. n.* 150 et
in *Hedwig. 1884, n.* 7-8.

— *Eur.* : Belgia.

« *var. rigidum* Roell in *op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : Indiana.

« *var. Roellii* Schlieph. mss.

— *Am. sept.* : Wisconsin.

« *var. Schliephackeanum* Roell in *op. et l. cc. et f. squarrosula ej. l. c.*

— *Am. sept.* : New Jersey.

var. squarrosum Breut. — *Sph. squarrosum.*

« *var. squarrosulum* *Bryol. germ. I, p.* 8.

ff. deflexum, globiceps, immersum et pycnocladum Gravet mss.; Warnst.
in *Hedwig. 1884, n.* 7-8.

— *Eur.* : Hassia (*f. globiceps*), Belgia.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 721.

« *var. sublaeve* Limpr. mss.; Warnst. in *op. et l. cc.*

— *Eur.* : Germania.

« *var. tenue* Roell in *Bot. Centralbl. 1891, pp.* 21-22.

— *Am. sept.* : New Jersey.

<i>cymbifolium</i>	$\left\{ \begin{array}{l} \text{C. M. pp.} \\ \text{Sull.} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{— } \text{Sph. cymbifolium } \textit{var. patens.} \\ \text{— } \text{Sph. Pylaisaei.} \\ \text{— } \text{Sph. sedoides.} \end{array} \right.$	
			— <i>Sph. Wrightii.</i>

- cymbophyllum *F. v. Müller in Mossmann's Laubm. Samml. n. 767 (1854).*
Sph. cymbifolioides C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 546; Warnst. in Hedwig.
1891, p. 36, t. III, fig. 27 a, 27 b et t. V, fig. v.
Sph. contortum Wils. ? (fid. Mitt.).
 2. — *Pac. : Austral. or., Tasman.*
- dasyphyllum *Warnst. in Hedwig. 1892, p. 196, t. XVI, fig. 7-9.*
Ster. ? — Am. sept. : Connecticut.
- decipiens *Sull. et Lesq. — Sph. subsecundum var. obesum.*
- degenerans *Warnst. in Bot. Centralbl. 1889, n. 17 et in Hedwig. p. 42,*
t. XIV, fig. 7 a, 7 b et t. XXI, fig. i, k α , k β .
Ster. — Eur. : Anglia (Cheshire).
- « *var. immersum Warnst. in Bot. Centralbl. 1889, n. 17, c. ic.*
Ubi typ.
- densum *C. M. et Warnst. in Hedwig. 1897, p. 147 et in Ule Bryoth. bras-*
sil. n. 1743.
 — *Am. merid. : Brasil. or. (Serra do Itatiaia).*
- diblastum *C. M. — Sph. acutifolium f. diblastum.*
- domingense *C. M. — Sph. mexicanum.*
- Drummondii *Wils. — Sph. cyclophyllum.*
- dubiosum *Warnst. in Hedwig. 1891, p. 20, t. I, fig. 7 a, 7 b et t. V,*
fig. dd.
 — *Am. sept. : Terra nov. Pac. : Austral. merid.*
- Duseni *C. Jens. in litt. ; Rüss. et Warnst. in Sitzungsber. d. Dorpater*
Naturforsch. Gesells. 1889, p. 99.
- Sph. cavifolium δ lapponicum Warnst. Eur. Torfm. n. 90.*
- Sph. cuspidatum var. biforme (Braithw.) Mac. Canad. M. n. 8.*
- Sph. cuspidatum var. crispulum Warnst. in Hedwig. 1884, p. 124.*
- Sph. cuspidatum var. d-flexum ej. in op. et l. cc.*
- Sph. cuspidatum var. laxifolium Rab. Bryoth. eur. n. 716.*
- Sph. cuspidatum var. majus Rüss. Beitr... p. 58 p.p.*
- Sph. cuspidatum var. plumosum Rab. Bryoth. eur. n. 211 (Sph. recurvo*
immixt.), 717 et 952.
- Sph. laricinum Ångstr. in Oefv. Vet. Akad. Foerh. 1864, p. 197 ; Rab.*
Bryoth. eur. n. 712.
- Sph. majus (Rüss.) C. Jens. in De danske Sph. Arten, p. 106.*
- Sph. mendocinum Warnst. in Hedwig. 1888, p. 275 et in « die Cuspidat ..*
Gr. » 1889, p. 210, t. I, f. 34 et t. II, fig. 1 α , 1 β et m.
- Sph. obtusum var. Duseni Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. I, n. 97.*
- Sph. porosum Schlieph. mss. ; Warnst. Rückblick in Fl. 1884.*
 — *Eur. : Lapon., Fennia, Rossia, Dania, German.,*
Belg., Salisb., Stir. As. : Siber. occid. Am. sept. : Anticosti, Maine,
New Hampshire, New York, Wisconsin.
- « *var. parvifolium, f. tenuis, subf. subfalcata Warnst. Eur. Torfm.*
ser. III, n. 281 et in Hedwig. 1893, I.
 — *Am. sept. : New Hampshire.*
- elegans *C. M. in Fl. 1887, p. 413 ; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 224,*
t. VIII, fig. 17-19 et t. X, fig. 9.
Ster. — Pac. : Nov. Zeland. austr.
Exs. : Helms, N Seeland. M. n. 45.
- ellipticum *C. M. et Warnst. in Hedwig. 1897, p. 165 et in Ule Bryoth.*
brasil. n. 1752.
 — *Am. merid. : Brasil. or. (Serra do Itatiaia).*

ericetorum *Brid. Bryol. univ. I, p. 17; C. M. Syn. I, p. 103; Warnst. in Bot. Centralbl. 1882, n. 3 et in Hedwig. 1890, p. 227, t. VIII, fig. 28-29 et t. X, fig. 1-12 (non Besch., fid. Warnst. in op. cit. 228).*

Sph. condensatum *Brid. Bryol. univ. p. 16?*

— *Afr. : Ins. Borbon.*

erosum *Warnst. in Hedwig. 1890, f. 242, t. XI, fig. 5-6 et t. XIV, fig. i. Ster.?*

— *Pac. : Nov. Zeland.*

erythrocalyx *Hpe. in C. M. Syn. I, p. 92; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 156, t. XVI, fig. 17 a, 17 b.*

Sph. medium *Limpr. (fid. Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 252).*

— *Am. merid. : Boliv., Peruv., Brasil. austr. or.*

« *var. laeve* *Warnst. in Hedwig. l. c. p. 157.*

Sph. cymbifolium β *longifolium* *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 3 (fid. Hpe. ad Sph. perich.).*

Sph. perichaetiale *Hpe. in C. M. l. c. (fid. Warnst. l. c. t. XV, fig. 15 a, 15 b et t. XX, fig. t).*

Sph. peruvianum *Mitt. M. austr. am. p. 62 (fid. Warnst. l. c. fig. 16 a, 16 b et t. XXII, fig. u α et u β .)*

Sph. suberythrocalyx *C. M. in sched. (fid. Warnst. l. c. t. XVI, fig. 18 a, 18 b et XXII, fig. w).*

— *Am. sept. : Guadalup. Am. merid. : And. Peruv., et Boliv., Brasil. austr. or.*

« *var. papillosum* *f. brevirameum* *Warnst. in Hedwig. 1891, p. 156.*

Sph. brevirameum *Hpe. Symb. 1874, p. 479.*

— *Am. merid. : Brasil. austr. or.*

falcatulum *Besch. — Sph. cuspidatum* *var. falcatulum.*

fallax *v. Klingg. — Sph. recurvum* *var. mucronatum.*

Feae *C. M. — Sph. cuspidatum.*

fimbriatum *Hook. f. et Wils. M. antarct. p. 92, Fl. Antarct. p. 398 et Bryol. brit. p. 21; W. P. Sch. Mém. Sph. p. 64, t. XV et Syn. II ed. p. 829; Lindb. Torfmoss. p. 137; Riiss. Beitr... p. 51.*

Sph. acutifolium *H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. I ed., n. 4; C. M. Syn. II, p. 538.*

Sph. subulatum *Br. in hb. Kew.*

Sph. teres *var. concinnum* *Berggr. M. Spetsb. n. 94 et Moosfl. Groenl. p. 40.*

I. In prat. torfac. — *Eur. : Spitzberg, Dovre; fere tota. As. : Japon. Am. sept. : Groenland, Canada, Terra nova, ins. Miquelon, Maine, New Hampshire, New Jersey, Massachussets, Minnesota, Wyoming, Alaska, Sierra Nevada Calif. Am. merid. : Fret. Magell., ins. Eremit., Maclov.*

« *var. arcticum* *C. Jens. mss.; Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 128.*

— *Am. sept. : Groenland.*

« *var. densum* *Roell in Bot. Centralbl. 1891, n. 21-22.*

— *Am. sept. : Wyoming.*

« *var. flagelliforme* *Warnst. f. viridis* *Roell in Hedwig. 1893, p. 307.*

— *Am. sept. : Wyoming.*

« *var. gracilescens* *Roell in op. cit. p. 306, f. viridis ej. l. c.*

— *Am. sept. : Wyoming.*

« *var. robustum* *Braithw. Sph. brit. n. 44.*

— *Eur. : Brandebourg. Am. sept. : Ubi typ.*

var. *strictum* Lindb. — Sph. Girgensohni.

« var. *submersum* Roell *System.* p. 38, **Schliephackeanum* ej. in *Hedwig.* p. 306 et *f. tenellum* ej. l. c.

— *Am. sept.* : New Jersey.

« var. *tenue* Gravet mss. ; Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 128.

— *Am. sept.* : Ins. Miquelon, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, M. Alb., Wyoming, Sierra Nevada Calif.

fimbriatum { Mitt. — Sph. Girgensohni.
Rab. (n. 20 b et 718). — Sph. Girgensohni.
Wils. — Sph. Thomsoni.

var. *strictum* Lindb. — Sph. Girgensohni.

Fitz-Geraldi Ren. in *Lesq. et Jam. Man.* p. 23 et in *Rev. bryol.* 1885, p. 46 ; Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 232, t. IX, fig. 7-13, t. X, fig. 18 et « *die Cuspidat...* Gr. » t. I, fig. 54, 55 a et b, 56 a, b, c, 57 a, b et t. II, fig. w.

2. Lignic. — *Am. sept.* : Florida.

flaccidum Besch. *Note M. Parag.* p. 272 ; Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 42, t. 3, fig. 34 a, 34 b et t. V, fig. hb.

— *Am. merid.* : Paraguay.

flavicans Warnst. in *Allgem. bot. Zeitschr....* in Karlsruhe, 1895, n. 11.

— *Am. sept.* : Mexic. (Oajaca).

flavicaule Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 190, fig. 3 a, 3 b, et t. VII, fig. 17 (erratum sub Sph. flavo).

Ster. ? — *Am. merid.* : Venezuela, Peruv.

flexuosum Dz. et Mk. — Sph. recurvum.

floridanum Aust. — Sph. macrophyllum var. floridanum.

fluctuans C. M. in *Fl.* 1887, p. 414.

Ster. — *Afr.* : C. B. Sp.

fontanum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 174 ; Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 38, t. III, fig. 30 a, 30 b et t. V, fig. x.

Sph. late-truncatum Warnst. in sched.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

fuscum (W. P. Sch.) v. Klinggr. in *Schrift. d. Phys.-oecon. Gesells. in Koenigsberg*, XIII, I, p. 4, n. 4.

Sph. acutifolium var. fuscum W. P. Sch. *Mém. Sph.* p. 63, t. XIII, fig. z et *Syn.* II ed. p. 826.

1. In turf. profund. mont. editor. — *Eur.* : Lappon., Voges., Alp., etc. *Am. sept.* : Labrador, Canada, Alaska, Terra nov., ins. Miquelon, sept. occid., Indiana, Minnesota, M. Rupestr., Washington, Vancouver.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 710.

« var. *compactum* Roell in *Fl.* 1886, p. 25, *f. strictum* ej. in *Hedwig.* 1893, p. 294.

— *Am. sept.* : Washington.

« var. *densum* ej. in *Bot. Centralbl.* 1891, pp. 21-22.

— *Am. sept.* : Washington.

ff. deflexum, strictum et virescens ej. in *op. et l. cc.*

— *Am. sept.* : Washington.

« var. *filiforme* Roell in *Hedwig.* 1893, p. 295.

— *Am. sept.* : Indiana.

« *var. flaccidum* Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Washington.

« *var. fuscescens* Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 135.

— *Am. sept.* : New Hampshire.

f. dasy-anoclada ej. in op. et l. c.

— *Am. sept.* : New Hampshire.

f. robusta ej. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Vermont.

« *var. fusco-viride* Rüss. mss. ; Warnst. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : New Hampshire, Massachussets.

f. robusta Warnst. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Massachussets.

subf. drepanoclada Warnst. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : New Hampshire, Massachussets

« *var. gracile* Roell in Hedwig. 1893, p. 294.

— *Am. sept.* : Washington, Michigan.

ff. strictum et virescens ej. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Washington.

« *var. robustum* Roell in Centralbl. 1891, n. 21-22.

— *Am. sept.* : Washington.

f. virescens ej. in Hedwig. 1893, p. 294.

— *Am. sept.* : Washington.

« *var. stellaris* Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Washington.

ff. deflexum, strictum et virescens ej. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Washington.

gabonense Besch. — *Sph. cuspidatum*.

Garberi Lesq. et Jam. in *Proced. Am. Acad.* XIV, p. 133, et *Man.* p. 18 ;

Warnst. in Hedwig. 1890, p. 245, t. XI, fig. 7-9 et t. XIV, fig. n.

Sph. humile Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VII, p. 2.

2. — *Am. sept.* : Labrador, Terra nov., Maine, New Jersey, Florida.

« *var. sphaerocephalum* Warnst. in Hedwig. 1893, n. 1.

— *Am. sept.* : Maine.

« *var. squarrosulum* Warnst. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : New Jersey, Florida.

« *var. subsquarrosum* ej. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Labrador, Maine, Terra nova.

gedeanum Dz. et Mk. in *Verh. d. k. Acad.* v. Wet. Amsterdam, 1854

et *Bryol. jav.* p. 28, t. 19 ; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 99, t. V, 12 a, 12 b et t. VII, fig. 9.

— *As.* : Khasia, Java.

georgianum Schwein. — *Sph. macrophyllum*.

Girgensohni Rüss. *Beitr.*... p. 46 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 14, t. 17 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 827.

Sph. acutifolium var. *fallax* p.p Warnst. *Eur. Torfm.* p. 42.

Sph. acutifolium ε *tenue* *Bryol. germ.* I, p. 22.

Sph. fimbriatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 156 (n. 1285); *Wils. in hb. Ind. or.* n. 1288; *Rab. Bryoth. eur.* n. 201 b et 718.

Sph. fimbriatum var. *strictum* Lindb. in *Oefv....* 1862 et *Torfm. bygg.* p. 138.

Sph. Hookeri C. M. in *Linn.* 1874, p. 547.

Sph. leptocladum Besch. in *hb. Mus. Paris.*

Sph. strictum Lindb. *Torfm.* p. 138 (in obs. et syn.) in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 263 et *Hvitm.* p. 51.

Sph. Warnstorffi Roell in *Fl.* 1886, p. p.

2. In scaturig. silvat. — *Eur.*: Tota usque in arctica. *As.*: Amour, Saghalien, Japon., Yunnan, Sikkim. *Am. sept.*: Groenland, Canada, Alaska, Terra nov., ins. Miquelon, New Hampshire, Washington.

Exs.: Austin, *M. Appal.* n. 20.

Braithw. *Sph. brit.* n. 42 a.

Broth. *M. Fenn.* n. 99.

Fell. *M. Suec.* n. 184.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 801.

« var. *albescens* Roell *System.* p. 34; *f. irregularis ej.* in *Hedwig.* 1893, p. 306.

— *Am. sept.*: Washington.

« var. *coryphaeum* Rüss. in *Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. I, n. 26*; *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, p. 29.

— *Am. sept.*: Massachussets, New Hampshire, M. Alb.

« var. *deflexum* Schlieph. mss.; *f. densum* Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.*: Washington.

« var. *densum* Gravet (incl. var. *pulchrum* et *molle ejusd.*) mss.; *Warnst. in Hedwig.* 1884, p. 119.

— *Eur.*: Belgia.

« var. *flagellare* Schlieph. (fid. Roell in *Hedwig.* 1897, p. 51).

f. ochraceum Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.*: Wisconsin.

« var. *gracilescens* Gravet mss.; *Warnst. in op. et l. cc.*

— *Eur.*: Belgia. *Am. sept.*: Ubi typ.

f. ochraceum Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.*: Wisconsin.

« var. *molle* Rüss. in *Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. II, n. 115*; *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, p. 130.

— *Am. sept.*: Labrador, Canada, Terra nov., ins.

Miquelon, sept. occid., Washington.

f. flagellare Roell in *Hedwig.* 1893, p. 306.

— *Am. sept.*: Washington.

var. *molle* Gravet.

var. *pulchrum* Gravet.

var. *roseum* Limpr. — *Sph. Rüssowii.*

— *Sph. Girgensohni* var. *densum.*

« var. *sphaerocephalum* Warnst. in *Hedwig.* 1893, n. 1.

— *Am. sept.*: Maine.

« var. *squarrosulum* Rüss. et W. P. Sch. in op. et l. cc.

In graminos. humid. — *Eur.*: Ubi typ., rarius. *Am. sept.*: New Jersey.

« var. *stachyodes* Rüss. in *Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. I, n. 50*;

Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 129.

— *Am. sept.*: New Hampshire.

" *var. strictum* Rüss. et W. P. Sch. in op. et l. cc.

In turfos. parum humid. — *Eur.* : Ubi typ. *Am. sept.* : Labrador, New Jersey.

glaucum v. Klinggr. — *Sph. cymbifolium var. laeve f. glaucescens subf. squarrosula.*

Godmanni Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 189, t. IV, fig. 1 a, 1 b et t. VII, fig. 19.

Ster. — *Afr.* : Ins. Azor.

gracile Rich. — *Sph. acutifolium var. gracile.*

gracilescens Hpe. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 327; Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 37, t. III, fig. 28 a, 29 et t. V, fig. w et in *Ule Bryoth. brasil.* n. 1077, 1108, 1305-6, 1753.

Sph. submolluscum Hpe. *Symb.* 1877, p. 715.

2. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës) et austr. or.

" *var. minutulum f. brachy-dasyclada* C. M. et Warnst. in *Hedwig*. 1897 et in *Ule Bryoth. brasil.* n. 1751.

— *Am. merid.* : Brasil. or.

gracilum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 7.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Griffithianum Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 151, t. XVI, fig. 19 a, 19 b et t. XXII, fig. x.

— *As.* : Ind. or. (sine loco spec.).

guadalupense W. P. Sch. in *hb. Mus. Paris* et in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 90; Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 148, t. XV, fig. 13 a, 13 b et t. XXI, fig. g α , g β , 2 α , 2 β .

Sph. cymbifolium var. Hampeanum f. gracilis Warnst. in *Bot. Centralbl.* 1882, p. 133.

Sph. Guyoni Warnst. in *Deutsch. bot. Monatschr.* 1884, n. 2.

Sph. Husnoti W. P. Sch. (fid. Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 148).

— *Am. sept.* : Guadalup, Martinic. *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

guatemalense Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 243, t. XII, fig. 20 et t. XIV, fig. 1.

Ster. — *Am. sept.* : Guatemala.

Guyoni Warnst. — *Sph. guadalupense.*

Hahnianum C. M. — *Sph. medium.*

helenicum Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 19, t. I, fig. 5 a, 5 b et t. IV, fig. e.

— *Afr.* : Ins. S. Helena.

Helmsii Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 224, t. XIII, fig. f.

Sph. novo-zelandicum C. M. in *Helms N. Seeland, M.* n. 43.

Ster. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Herminieri W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 91.

Sph. porto-ricense var. Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894 (1).

— *Am. sept.* : Guadalup.

heteromallum polycephalum Dill. — *Cryphaea heteromalla.*

(1) Cf. Warnst. in *Hedwig*. 1889, p. 304, t. IX, fig. 12 et 1890, n. 11-12.

- Hildebrandti* C. M. — *Sphagnum tumidulum* var. *microphyllum* f. *euryclada*.
- Holleanum* Dz. et Mk. in *Verh. d. k. Akad. d. Wissensch. et Bryol. jav. I*, p. 29, t. 20.
 Sph. sericeum {
 Sph. seriolum { C. M. (fid. Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 197).
 Ad arbor. — As. : Java.
 Exs. : Zolling. n. 2217.
- Hookeri* C. M. — *Sph. Girgensohni*.
 { Aust. — *Sph. Garberi*.
humile { W. P. Sch. { (fid. Card., Lindb.). — *Sph. rigidum*.
 { (fid. Warnst.). — *Sph. molle forma*.
- Husnoti* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 90.
Sph. guadalupense (fid. Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 148).
 — Am. sept. : Guadalup.
 Exs. : Husnot, M. Ant. fr. n. 189.
- hymenophyllophilum* C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 97.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or. (ins. S. Catharina).
- hypnoides* { A. Br. { (fid. Warnst.). — *Sph. cuspidatum* var. *plumulosum*.
 { (fid. W. P. Sch.). — *Sph. cuspidatum* var. *hypnoides*.
 { ? W. P. Sch. — *Sph. convolutum*.
- imbricatum* { H sch. { (fid. Lindb.). — *Sph. Austini* var. *imbricatum*.
 { (fid. Rüss. et Warnst.). — *Sph. Austini*.
 { W. P. Sch. — *Sph. tumidulum* var. *microphyllum* f. *dasyclada*.
 var. *affine* Warnst. — *Sph. affine*.
 var. *cristatum* Warnst. — *Sph. Austini* var. *cristatum*.
 var. *sublaeve* Warnst. — *Sph. Austini* var. *sublaeve*.
- immersum* { Bryol germ. — *Sph. rigidum* var. *compactum*.
 { Casseb. — *Sph. papillosum*.
- insulosum* Ångstr., Rab. n. 703. — *Sph. Ångstroemi*.
 { Funk, n. 10. — *Sph. quinquefarium*.
intermedium { Hoffm. { (fid. C. M.). — *Sph. acutifolium*.
 { (fid. Lesq. et Jam.) — *Sph. recurvum*.
 { (fid. Mac.). — *Sph. mendocinum*.
 { (fid. Rüss.). — *Sph. centrale*.
- var. *pseudo-Lindbergii* C. Jens. — *Sph. obtusum* var. *pseudo-Lindbergii*.
- iridans* Brid. — *Leucobryum longifolium*.
- irritans* Warnst. in *Allgem. Bot. Zeitschr.... in Karlsruhe*, 1895, n. 7-8.
 — Pac. : Ins. Chatham.
- Islei* Warnst. in *hb. Mus. Paris* (G. de l'Isle, n. 42) et in *Hedwig.* 1891, p. 19, t. 1, fig. 6 a, 6 b et t. IV, fig. f.
 — Afr. : Ins. Amsterdam.
- Itacolumitis* C. M. et Warnst. in *Hedwig.* 1897, p. 172 et in *Ule Bryoth. brasil.* n. 1302.
 — Am. merid. : Brasil. or.
- Itatiaiae* C. M. et Warnst. in *op. et l. cit.* p. 145 et n. 1741-2.
 — Am. merid. : Brasil. or.
- japonicum* Warnst. in *Allgem. Bot. Zeitschr.... in Karlsruhe*, n. 12.
 — As. : Japon.

javanense P. B. — *Leucobryum Boryanum* ?

? *javense* Schwaegr. } (fid. Besch.). — *Leucobryum Boryanum*.
 } (fid. C. M.). — *Leucobryum falcatum*.

Junghunianum *Bryol. jav. I, p. 27, t. 18; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 198, t. V, fig. 11 a, 11 b et t. VII, fig. 10.*

Sph. Thomsoni C. M. (fid. *Warnst. l. c.*).

— *As.* : *Ins. Philippin., M. Java, Khasia; Sikkim*
(quoad Sph. Thomsoni).

Khasianum *Mitt. M. Ind. or. p. 156; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 40, t. III, fig. 32 a, 32 b et t. V, fig. z.*

Sph. contortum var. *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 290.*

Sph. obtusifolium *Griff. Not. p. 386 ?*

— *As.* : *Khasia.*

Klinggraëffii *Roell.*

— *Am. sept.* : *Washington.*

« *var. laxum* *Roell System. p. 98.*

— *Am. sept.* : *Washington.*

labradorenses *Warnst. in Hedwig. 1892, p. 174, t. XVI, fig. 1-3, et 1893, t. III, fig. 3 a, 8 z, 9 a - 9 h.*

Ster. ?

— *Am. sept.* : *Terra nov., New Jersey.*

laceratum C. M. et *Warnst. in Hedwig. 1897, p. 149 et in Ule Bryoth. brasil. n. 1294.*

— *Am. merid.* : *Brasil. or. (Minas Geraës).*

lacteolum *Besch. Note M. ins. S. Paul et Amsterdam, p. 5; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 254, t. XIII, fig. 31-32 et t. XIV, fig. fa.*

— *Afr.* : *Ins. Amsterdam.*

lanceolatum *Warnst. in Hedwig. 1890, p. 219, t. VIII, fig. 7-9 et t. X, fig. 4-5.*

Ster. ?

— *Pac.* : *Nov. Zeland.*

Exs. : *Colenso n. 41 a.*

lancifolium C. M. et *Warnst. in Hedwig. 1897, p. 154.*

— *Pac.* : *Austral. or. (Nov. Vales.).*

Langloisii *Warnst. in Hedwig. 1897, p. 166.*

— *Am. sept.* : *Ludoviciana.*

laricinum *Spr. mss. 1847; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 845; Lindb Man. M. II, p. 401 et Hvitm. p. 25.*

Sph. cavifolium var. *laricinum* *Warnst. Eur. Torfm. n. 86.*

Sph. contortum *Schultz (fid. Warnst. in Hedwig. 1888, p. 201 et in Bot. Gaz. 1890, p. 245).*

Sph. contortum var. *laricinum* *Wils. Bryol. brit. p. 23.*

Sph. curvifolium *ej. mss.; Hunt in Mem. lit.-phil. Soc. of Manchester, III sér. III, p. 233.*

Sph. neglectum *Angstr. (fid. Lindb. l. c.).*

Sph. subsecundum C. M. (*quoad pl. americanam, fid. Lindb. l. c.*).

2. In paludos. — *Eur.* : *Scandin., Fennia, Livon., Boruss., Rhaet., Anglia.* *Am. sept.* : *Massachussets, New Jersey, New York, Ohio, Indiana.*

Exs. : *Austin M. Appal. I ser., n. 26.*

« *var. congestum* C. Jens. mss.; *Warnst. in Hedwig. 1884, n. 7-8.*

— *Eur.* : *Dania.*

« *var. crispulum* *Schlieph. mss.; Warnst. in op. et l. cc.*

— *Eur.* : *Hassia.*

var. *cyclophyllum* Lindb. — *Sph. cyclophyllum*.

« var. *falcatum* Schlieph. mss.; Warnst. in op. et l. cc., et *Sphagnoth. eur.* n. 185.

— *Eur.*: Dania, Hassia.

f. *viride* Roell in Hedwig. 1893, p. 310.

— *Am. sept.*: Indiana.

« var. *floridanum* Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1885, p. 46.

Sph. plicatum Warnst. in Hedwig. 1891, p. 169, t. XIX, fig. 32 a, 32 b et t. XXIV, fig. pp.

— *Am. sept.*: Massachussets, Florida, Ludovic.

var. *platyphyllum* Lindb. — *Sph. neglectum*.

var. *teretiuseulum* Lindb. — *Sph. neglectum*.

laricinum { Ångstr. — *Sph. Dusenii*.
Aust. — *Sph. cuspidatum*.
Rab. n. 712. — *Sph. mendocinum*.
W. P. Sch. (fid. Warnst.). — *Sph. recurvum* var. *pulchrum*.

late-truncatum Warnst. — *Sph. fontanum*.

latifolium Hedw. — *Sph. cymbitolum*.

var. *squarrosum* Wahlenb. — *Sph. squarrosum*.

laxifolium C. M. — *Sph. cuspidatum* var. *plumosum*.

var. *hypnoides* C. M. — *Sph. cuspidatum* var. *hypnoides*.

var. *laxum* Lesq. et Jam. — *Sph. subsecundum* var. *Lescurii*.

leionotum C. M. — *Sph. Whiteleggei*.

leptocladum Besch. — *Sph. Girgensohni*.

Lescurii Sull. — *Sph. subsecundum* var. *Lescurii*.

Lesueurii Warnst. in Hedwig. 1890, p. 204, t. V, fig. 16 a, 16 b et t. VI, fig. 5.

Sph. Antillarum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 89; Husnot, *M. Ant. fr.* n. 191.

— *Am. sept.*: Guadalup.

limbatum Mitt. *M. austr. am.* p. 625; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 201, t. V, fig. 14 a, 14 b et t. VI, fig. 7.

Ster. ? — *Am. merid.*: Venezuela.

Limprichtii Roell p.p. — *Sph. obtusum*.

var. *parvifolium* (Sendtn.) Roell. — *Sph. recurvum*.

Lindbergii W. P. Sch. *Versuch. ein Entwickl. d. Torfm.* p. 67, tt. XXV et XXVII et *Syn. II ed.* p. 832; Warnst. « *die Cuspidat...* Gr. » p. 201, t. I, fig. 1-6 et t. II, fig. a; Lindb. *Torfm.* p. 136.

Sph. cuspidatum Lindb. in *Bot. Notiz.* p. 122.

l. In paludos. et ad rip. lac. — *Eur.*: Ins. Ursorum, Lappon., Sudet., Alp. Stir. *Am. sept.*: Groënland, Labrador, Canada, Alaska, Terra nov., ins. Miquelon, New Hampshire, New York, M. Alb.

Eas.: Berggr. M. Spitzb. n. 163.

Braithw. *Sph. brit.* n. 45.

Brentel M. frond. n. 24.

Kerner F. exs. Austr. Hung. n. 330.

Limpr. *Bryoth. siles.* n. 100.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 301, 701.

Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 136, 176.

« var. *brachycladum* Roell f. *fuscum* ej. in Hedwig. 1897, p. 65.

— *Am. sept.*: Labrador, Groenland.

var. *compactum* Limpr. — *Sph. Lindbergii* var. *congestum*.

- « *var. congestum* Gravel mss.; Warnst. in Hedwig. 1884, p. 120.
Sph. Lindbergii var. compactum Limpr. Syst. d. Torfm. 1881, p. 319.
 — Eur. : Lappon., ad mare arcticum; Riesengeb.
- « *var. microphyllum f. brachy-dasyclada* Warnst. in Hedwig. 1893, I, t. III, fig. 10 a, 10 b et t. IV, fig. 10 c-10 f.
 — Am. sept. : Ins. S. Georges.
- lonchocladum* C. M. in Fl. 1896, p. 436.
 Ster. — Pac. : Ins. Sandwic.
- lonchophyllum* C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 1105 et in Hedwig. 1897, p. 152.
 In turfos. — Am. merid. : Brasil. or. (ins. S. Catharina).
- longifolium* W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1602; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 234.
 Ster. ? — Am. merid. : And. Boliv.
- longistolo* C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 1227 et in Hedwig. 1897, p. 169.
 In turfos. — Am. merid. : Brasil. austr. or. (Rio de Janeiro).
- loricatum* C. M. — *Sph. medium*.
- ludovicianum* Warnst. — *Sph. cymbifolium var. ludovicianum*.
- luridum* Hüb. — *Sph. subnitens*.
- macrocephalum* Warnst. in Hedwig. 1893, I, t. XI, fig. 6 a-6 g.
 Ster. ? Ad terr. humid. — Pac. : Tasman.
- macrophyllum* Bernh. in Brid. Bryol. univ. I, p. 10 (haud p. 753, quod est *Leucobryum longifolium*); C. M. Syn. I, p. 91 et II, p. 538; Sull. Ic. M. p. 1, t. 1 et M. of U. St. p. 12; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 229, t. IX, fig. 1-6 et t. IX, fig. 13-15.
Isocladus macrophyllus Lindb. Torfm. p. 134.
Sph. georgianum Schwein. (fid. Sull.).
 2. — Am. sept. : New Jersey, Carol., Florid., Ludovic., Alabama, Mississippi.
 Eas. : Aust. M. Appal. ser. I, n. 41.
 Drumm. M. am. bor. II ed. n. 18.
 Sull. M. Allegh. II, n. 207.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 1 et II ed. n. 1.
 Rab. Bryoth. eur. n. 1447.
- « *var. floridanum* Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 26, I, p. ; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 231, t. X, fig. 16-19 et 1893, I, t. IV, fig. 12 b et 12 c.
Sph. cribrosum Lindb. Hvitm. 1882, p. 74.
Sp. floridanum Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VII, p. 15.
 Ster. — Am. merid. : Florid., Ludovic. or.
- macrophyllum* Brid. (p. 753). — *Leucobryum longifolium*.
- macro rigidum* C. M. in Fl. 1887, p. 417; Warnst. in Hedw. 1890, p. 251, t. XIII, fig. 29-30 et t. XIV, fig. b.
 Ster. — Pac. : Nov. Zeland. austr.
- madegassum* C. M. — *Sph. tumidulum var. microphyllum f. euryclada*.
- magellanicum* Brid. — *Sph. cymbifolium*.
- majus* (Rüss.) C. Jens. — *Sph. Dusenii*.
- malaccense* Warnst. in Hedwig. 1892, p. 175, t. XVI, fig. 4-6.
 Ster. ? — As. : Penins. Malacc.

marginatum W. P. Sch. in *Brutel M. Capens.*; Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 28, t. II, fig. 20 a, 20 b et t. IV, fig. o.
— Afr. : C. B. Sp.

mauritianum Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 17, t. I, fig. 3 a, 3 b et t. IV, fig. c.
— Afr. : Ins. Franciae.

maximum Warnst. in *op. cit.* p. 160, t. XVIII, fig. 25 a, 25 b et t. XXIII, fig. ff.
Sph. australe W. P. Sch. in *hb. Besch.*
— Pac. : Nov. Zeland., Tasman.

medium Limpr. in *Bot. Centralbl.* 1881, p. 113.

Sph. andinum Hpe. in *Ann. sc. nat. ser. V*, p. 334.

Sph. arboreum W. P. Sch. p.p. (fid Warnst.).

Sph. bicolor Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXVIII.

Sph. compactum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 16 p.p.

Sph. crassum C. M. in *hb. Rom.*

Sph. cymbifolium var. *compactum* Rüss. *Beitr.*... p. 80.

Sph. cymbifolium var. *congestum* W. P. Sch. *Mém. Sph.* 74, t. XII, fig. 3 et *Syn. II* ed. p. 848.

Sph. cymbifolium var. *Paradisii* Besch. *hb.*

Sph. cymbifolium var. *purpurascens* Rüss. in *op. et l. cc.*

Sph. Hahnianum C. M. *mss.* 1880.

Sph. loricatum C. M. in *Fl.* 1887, p. 409.

Sph. tursum ej. in *op. cit.* p. 410.

2. — Eur. : Fere tota. Am. sept. : Labrador, Terr. nova, ins. Miquelon; reg. or., de Canada ad Florid. Am. merid. : De Brasil., Peruv. et Chile ad Patagon.

« var. *brachycladum* f. *bicolor* Roell in *Hedwig*. 1893, p. 315.
— Am. sept. : Indiana.

f. *fuscescens* ej. in *op. et l. cc.*
— Am. sept. : Wisconsin.

« var. *congestum* Schlieph. et Warnst. (ubi?).
— Am. sept. : Wisconsin.

f. *purpureum* Roell in *Hedwig*. 1897, p. 51.
— Am. sept. : Michigan.

« var. *glauco-fuscescens* Warnst. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 198.
— Am. merid. : Brasil. austr. or.

« var. *gracile* Roell in *Bot. Centralbl.* 1891, pp. 21-22.
— Am. sept. : Wisconsin.

f. *fuscum* ej. in *Hedwig*. 1891, p. 315.
— Am. sept. : Wisconsin.

« var. *imbricatum* Roell in *op. et l. cc.*
— Am. sept. : Washington, Michigan.

« var. *immersum* Warnst. in *Hedwig*. 1884, n. 7-8.
— Eur. : Thuring. Am. sept. : New Jersey.

f. *viride* Roell in *Hedwig*. 1897, p. 52.
— Am. sept. : Indiana.

« var. *laeve* (Rüss.) Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 253, f. *albescens* ej. in *op. cit.* p. 254.
— Am. merid. : Chile.

f. fuscescens Warnst. in op. cit. p. 253.

— Am. sept. : Massachussets.

f. purpurascens (Rüss.) Warnst. in op. et l. cc.

Sph. cymbifolium var. *congestum* Rab. Bryoth. eur. n. 722.

— Eur. :

Am. sept. : Massachussets,

New Hampshire.

ff. virescens et versicolor Warnst. in op. et l. cc.

— Am. sept. : Massachussets, New Hampshire,

Vermont.

« var. *laxum* Roell System. p. 95, *ff. bicolor, fuscescens et viride ej. in Hedwig. 1893, p. 315.*

— Am. sept. : Wisconsin.

mendocinum Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 23; Sull. Ic. M. Suppl. p. 12, t. III; Warnst. « die Cuspidat... Gr. » p. 210, t. I, fig. 34 et t. II, fig. 1 α, 1 β, m et in Hedwig. 1893, I, t. IV, fig. 11 a-11 g.

Sph. auriculatum Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 4 (ex ips.!).

Sph. cuspidatum var. *laxifolium* Rab. Bryoth. eur. n. 716.

Sph. cuspidatum var. *mendocinum* Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. XXVI, I.

Sph. cuspidatum var. *plumosum* Rab. l. c. n. 211 c. (*Sph. recurvo* mixt.), 717, 952.

Sph. intermedium Mac. Canad. M. n. 9.

Sph. laricinum Rab. Bryoth. eur. n. 712.

Sph. subsecundum var. *oblongifolium* Lesq. in op. et l. cc.

2. — Eur. : Lappon., Fennia, Rossia, Dania, Salisb., Stir., Belg. Am. sept. : Ontario, Massachussets, New Hampshire, ins. Vancouver, Sierra Nevada Calif.

Exs. : Warnst. Eur. Torfm. ser. I, n. 97; ser. II, n. 192.

* var. *gracilescens* Warnst. in Hedwig. 1893, I.

— Am. sept. : Canada, Calif.

« var. *recurvum* Roell in Hedwig. 1897, p. 62.

— Am. sept. : Washington.

« var. *robustum ej. in op. et l. cc.*

— Am. sept. : Calif.

mendocinum Warnst. — *Sph. Dusenii*.

meridense C. M. Syn. I, p. 95 et II, p. 538; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 200, t. V, fig. 13 a, 13 b et t. VII, fig. 8.

Sph. acutifolium var. *meridense* Hpe. in Linn. 1847, p. 66.

Sph. cymbifolium var. *patens* Brid. Bryol. univ. I, p. 4 (excl. syn. *Sph. cymbifolio borbonense* P. R.).

Sph. subsecundum C. M. in Linn. 1847, p. 209.

— Am. sept. : Hispaniola. Am. merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, Columb., And. Nov. Granat., Boliv.

mexicanum Mitt. M. austr. am. p. 624; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 247, t. XII, fig. 11-13 et t. XIV, fig. m.

Sph. domingense C. M. in Coll. Eggers. 1887.

— Am. sept. : Mexic., Haïti.

microcarpum Warnst. in Hedwig. 1891, p. 170, t. XIX, fig. 31 a, 31 b et t. XXIV, fig. 00.

— Am. sept. : New Jersey, Florid., Ludovic. or., Alabama, Mississippi.

- microphyllum* Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 172, t. XIX, fig. 33 a, 33 b.
— *Am. sept.* : Calif.
- minutulum* C. M. et Warnst. in *Hedwig*. 1897, p. 166 et in *Ule Bryoth. brasil.* n. 1749.
— *Am. merid.* : Brasil. or. (Serra do Itatiaia.).
- mirabile* C. M. et Warnst. in *op. et l. cit.* p. 161 et n. 1287.
— *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).
- mobile* Warnst. in *Hedwig*. 1892, t. XVII, fig. 16-19.
— *Am. sept.* : Alabama.
- Mohrianum* Warnst. in *Hedwig*. 1892, p. 179, t. XVI, fig. 13-15.
— *Am. sept.* : Alabama.
- molle* Sull. *M. Allegh.* n. 205, *M. of U. St.* p. 13 et *Ic. M.* p. 7, t. IV;
C. M. Syn. I, p. 104; *Lindb. Hicitm.* p. 33.
Sph. compactum C. M. *Syn.* I, p. 98 et II, p. 539 (excl. syn. *Sph. strictum*).
Sph. compactum δ *ramulosum* C. M. in *op. cit.* pp. 99 et 539.
Sph. humile W. P. Sch. (ubi? fid. Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 226 et in *Hedwig*. 1890, p. 209).
Sph. molluscoides Rab. *Bryoth. eur.* n. 1149.
Sph. tabulare Sull. *M. Allegh.* n. 204 et *M. of U. St.* p. 12.
2. — *Eur.* : Suec. *Am. sept.* : New Jersey, Carol. merid., Georg., Florid., Ludovic., Alabama; Kansas?
Exs. : Braithw. *Sph. brit.* n. 21 (excl. specim. infer. ad sinistr.) et 21 *c.
Broth. *M. Fenniae*, I, n. 44
H. Müll. *M. Westfal.* n. 222.
Rab. *Bryoth. eur.* n. 556, 1248.
- « *var. compactum* Gravet mss.; Warnst. in *Hedwig*. 1885, p. 115 (1).
— *Eur.* : Belgia.
- var. fluitans* W. P. Sch. — *Sph. molluscum* *var. immersum*.
var. Mülleri Braithw. — *Sph. Mülleri*.
- « *var. squarrosulum* Gravet mss.; Warnst. in *op. cit.* p. 114.
— *Eur.* : Belgia.
- « *var. tenerum* (Sull.) Braithw. *Sph. brit.* p. 55.
Sph. tenerum Sull. *M. of U. St.* p. II.
— *Am. sept.* : New Jersey.
Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. II.
- molle* (Sull.) Lindb., Rab. n. 550. — *Sph. Mülleri*.
- molliculum* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 99; Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 34, t. II, fig. 25 a, 25 b et t. V, fig. t.
Sph. Mossmanianum C. M. in *hb. Kew*.
— *Pac.* : Tasman.
- mollissimum* C. M. } — *Sph. capense*.
 } — *Sph. pycnocladulum*.
- molluscoides* { C. M. — *Sph. Mülleri*.
 } Rab. n. 1149. — *Sph. molle*.
- molluscum* Br. in *Fl.* 1825, p. 633; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 753; *C. M. Syn.* I, p. 93; W. P. Sch. *Mém. Sph.* p. 76, t. XXI et *Syn.* II ed. p. 846; Warnst. « *die Cuspidat.... Gr.* » p. 225, t. I, fig. 51 a, b, c, 52 a, b, c, 53 a, b, c, d et t. II, fig. v α , β et γ .

(1) An potius hinc varietati syn. C. Mülleri typo ducta, referenda?

Sph. tenellum *Bryol. germ.* I, p. 8, t. I, fig. 2; *Lindb. in Bot. Notiz.* p. 142; *Rüss. Beitr...* p. 75; *H. Müll. M. Westfal.* n. 226.

2. In locis spongios. et ad mont. latera, rar. in turf. — *Eur.*: Zon. intermed. et septentr. *As.*: Japon. *Am. sept.*: Labrador, Terra nov., ins. Miquelon, Anticosti, Maine, New Jersey, Oregon, Vancouver.

Exs.: Blandow, M. frond. n. 205.

Braithw. *Sph. brit.* n. 11, 12.

Breutel, M. frond. n. 25.

Broth. M. Fenn. n. 100.

Faurie Pl. Japon. n. 14191, 14192.

Gravet, *Sph. Belg.* n. 69, 70.

Limpricht *Bryoth. siles.* n. 150.

Moug. et Nestl. *Stirp. vog. rhen.* n. 808.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 213, 720 (*p.p. Sph. subsecundo intermixt*), 1150, b, c, d.

Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 35, 84, 132, 133, 191-194.

Warnst. *Samml. eur. Torfm. ser. II*, n. 108.

« *var. compactum* (Warnst.) Par.

Sph. tenellum var. compactum Warnst. in *Hedwig.* 1884, p. 114 et *Sphagnoth. eur.* n. 193.

— *Eur.*: Hassia.

« *var. immersum* W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 846.

Sph. molle β *fluitans ej. Vers.... t. XII, fig. 6 et Syn. I ed.* p. 682.

In turf. — *Eur.*: Jurass. helvet.

« *var. suberectum* (Grav.) Par.

Sph. tenellum var. suberectum Gravet mss.; Warnst. in *Hedwig.* 1884, p. 114.

— *Eur.*: Gall. sept. or. (Ardenn.).

molluscum W. P. Sch. *p.p.* — *Sph. Ångstroemi.*

Moorei Warnst. in *Pap. and Proceed. of the roy. Soc. of Tasman.* 1894-1895, p. 16 (*nom.*) et in *Allgem. bot. Zeitschr.... in Karlsruhe*, 1895.

Ad terr. humid. — *Pac.*: Nov. Zeland.

Mossmannianum C. M. — *Sph. molliculum.*

Mougeoti W. P. Sch. — *Sph. recurvum.*

mucronatum C. M. in *Fl.* 1887, p. 421.

Sph. tumidulum Besch. ? (*fid. Warnst. in Hedwig.* 1891, p. 130).

Ster.

— *Afr.*: Madagascar.

Mülleri W. P. Sch. *Vers.... p. 73, t. 26, Syn. II ed.* p. 686 et *II ed.* p. 841.

Sph. molle *Lindb. in Rab. Bryoth. eur.* n. 556, *Torf.... p. 140 et Bidr. till Moss... p. 414; Rüss. Beitr... p. 78; Sull. Ic. M. p. 9, t. V.*

Sph. molle var. Mülleri Braithw. *Sphag.* p. 54, t. XII.

Sph. molluscoides C. M. *Syn. I*, p. 99.

2. In palud. et turf. — *Eur.*: Suec., German. sept., Ardenn., Neerland., Westphal., etc. *Am. sept.*: New Jersey, Tennessee, Georg., Florid., Alabama, Ludovic.

nanum C. M. { — *Sph. acutifolium f. nanum* (*fid. Warnst.* 1890).
— *Sph. oxyphyllum var. nanum* (*fid. Warnst.* 1897).

Naumannii C. M. — *Sph. cuspidatum.*

neglectum Ångstr. in *Oefv. Vet. Akad. Foerh.* 1864, p. 201.

Sph. auriculatum Rab. *Bryoth. eur.* n. 713, 714.

Sph. laricinum var. platyphyllum (Sull.) { Lindb. Man. M. II, pp. 402-403.
 Sph. laricinum var. teretiusculum

Sph. neglectum var. Aust. M. Appal. p. 7, n. 27.

Sph. neglectum var. ?

Sph. platyphyllum spec. nov. ? { Sull. mss. 1868.

Sph. platyphyllum Warnst. in Fl. 1884.

Sph. subsecundum var. isophyllum Rüss. Beitr.... p. 73 (fid. Warnst.).

2. — Eur. : Scandin., Fennia, Livon., Esthon. Am.
 sept. : Massachussets, New Jersey, Virgin.

« var. turgescens (Warnst.) Par.

Sph. platyphyllum var. turgescens Warnst. in Hedwig. 1884, n. 7-8.

— Eur. : Westphal.

neglectum Ångstr. — Sph. laricinum.

var. Aust. — Sph. neglectum.

var. ? Sull. — Sph. neglectum.

negrense Mitt. M. austr. am. p. 624; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 146,
 t. XV, fig. 10 a, 10 b et t. XXI, fig. n.

Ad rup. irror. — Am. merid. : Amazon.

nemoreum Scop. — Sph. acutifolium.

nitidum Warnst. in Allgem. bot. Zeitschr.... in Karlsruhe, 1895.

— Am. sept. : Terra nova.

nodosum hirsutie incanum Dill. — Hedwigia ciliata.

novo-zelandicum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 99; Warnst.

in Hedwig. 1891, p. 33, t. II, fig. 24 a, 24 b, et t. V, fig. s.

— Pac. : Nov. Zeland., Austral. or., Tasman.

novo-zelandicum C. M. — Sph. Helmsii.

obesum Wils. — Sph. subsecundum var. obesum.

oblongum P. B. — Sph. cymbifolium.

obovatum Warnst. in Hedwig. 1891, p. 18, t. I, fig. 4 a, 4 b et IV, fig. d.

— Afr. : Madagascar.

obtusifolium { Ehrh. — Sph. cymbifolium.

{ Griff. — Sph. khasianum ?

var. turgidum H. f. et W. — Sph. cyclophyllum.

obtusiusculum Lindb. in hb. Kew.; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 196,

t. IV, fig. 8 a, 8 b et t. VII, fig. 13.

Ster. ?

— Afr. : Ins. Borbon., Francia, Madagascar.

« var. purpurascens f. dasy-brachyclada Warnst. in op. cit. p. 197.

Sph. acutifolium var. borbonicum Ren. et Card. mss.

— Afr. : Ins. Borbon.

obtusum Warnst. « die Cuspidat.... Gr. » t. I, fig. 47 a, b, c, d, et t. II,
 fig. t et u; Rüss. in Sitzungsber. d. Natur. Gesells. in Dorpat, 1889.

Sph. cuspidatum var. majus Rüss. Beitr.... p. 58 p.p.

Sph. Limprichtii Roell in Fl. 1886 p.p. (1).

(1) « In System. d. Torfm. in Fl. 1886, conjungit Roell Sph. Limprichtii suo formas sequentes : ambiguum Schlieph., gracile Roell, laricinum Roell, molle Roell, obtusum Warnst., parvifolium (Sendtn.) Warnst., porosum Schlieph. et Warnst., pseudo-Lindbergii C. Jens., robustum Limpr., squarrosulum Roell, tenellum Warnst., teres Roell. »

Warnst. « die Cuspidat.... Gr. », p. 225.

Sph. recurvum var. *Limprichtii* Schlieph. mss. ; Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 121.

Sph. recurvum var. *obtusum* Warnst. p.p. ; *Limpr. Kryptog. Fl. Deutschl.* p. 132.

2. — *Eur.* : Rossia occid., Fennia, ins. Aland, Dania, Germania or, Bohem., Stir., Austria infer., Bavar., Belg. (1).

Exs. : Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 45.

Warnst. *Samml. eur. Torfm. ser. II*, n. 193.

« var. *aquaticum* Warnst. in *op. et l. cc.*

— *Eur.* : Brandeburg.

var. *Dusenii* Warnst. — *Sph. Dusenii*.

e var. *pseudo-Lindbergii* (C. Jens) Warnst. in *op. et l. cc. t. I*, fig. 49 a, b, c, 50 a et b.

Sph. intermedium var. *pseudo-Lindbergii* C. Jens. in *Cat... Soc. Copenhagen....* 1883, p. 23.

— *Eur.* : Dania, Livon., Esthon.

« var. *tenellum* Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 121.

— *Eur.* : Brandebourg.

f. *sphaerocephala* Warnst. « *die Cuspidat... Gr.* » p. 224.

— *Eur.* : Brandebourg.

f. *teres* Warnst. in *op. et l. cc.*

— *Eur.* : Brandebourg.

oligodon Rehm. *M. Afr. austr. n.* 14 ; *C. M. in Fl.* 1887, p. 412 ; Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 39, t. III, fig. 31 a, 31 b et t. V, fig. y.

Ster. — *Afr.* : Natal.

oligodon Rehm. n. 141. — *Sph. Rehmanni*.

orlandense Warnst. in *Hedwig*. 1892, p. 177, t. XVI, fig. 10-12.

Ster. ? — *Am. sept.* : New Jersey, Florid.

ouro-pratense C. M. et Warnst. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 1283 et in *Hedwig*. 1897, p. 172.

In turfosis. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Serra de Ouro-Preto).

ovalifolium Warnst. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1891, p. 23, t. I, fig. 11 a, 11 b et t. IV, fig. 1.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

« var. *angustatum* Warnst. in *Hedwig*. 1895, p. 130.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz).

« var. *robustius* C. M. et Warnst. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 1295 et in *Hedwig*. 1897.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

« var. *tenuissimum* C. M. et Warnst. *ll. cc. n.* 1303.

Ubi praeced.

ovatum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 546 et in *Kurz M. Himal. n.* 546.

— *As.* : Sikkim.

ovatum W. P. Sch. — *Sph. medium*.

oxycladum Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 15, t. I, fig. 1 a, 1 b et t. IV, fig. a.

Sph. coronatum var. *cuspidatum* Rehm. *M. Afr. austr. n.* 10.

— *Afr.* : Austral.

(1) « In America boreali false indicatum » Warnst. in *Hedwig*. 1894, p. 337.

oxyphyllum Warnst. in Hedwig. 1890, p. 192, t. IV, fig. 5 a, 5 b et t. VII, fig. 15.

— Am. merid.: Brasil. austr. or.

« var. nanum (C. M.) Warnst. in Hedwig. 1897, p. 150.

Sph. nanum C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 416.

— Am. merid.: Brasil. or. (ins. S. Catharina).

pallidum Warnst. in Hedwig. 1891, p. 171, t. XIX, fig. 30 a, 30 b et t. XXIV, fig. nn.

— Afr.: Ins. Borbon.

palustre { Broth. n. 43. — Sph. papillosum.
L. { (fid. Lindb.). — Sph. cymbifolium.
(fid. W. P. Sch.). — Sph. acutifolium.

β capillaceum Weiss. — Sph. acutifolium.

palustre, molle, deflexum, { (fid. C. M.). — Sph. cuspidatum.
squamis capillaceis Dill. { (fid. W. P. Sch.). { — Sph. acutifolium p.p.
— Sph. recurvum p.p.

palustre, molle, deflexum, squamis cymbiformibus Dill. — Sph. cymbifolium.

panduraefolium C. M. in Fl. 1887, p. 418; Warnst. in Hedw. 1891, p. 26, t. 1, fig. 12 a, 12 b et t. IV, fig. m.

Ster. — Afr.: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. M. Afr. austr. n. 15.

papillosum Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 280 (in add.), Hvit. Moss. p. 14 et Man. M. II, p. 392, t. 1, fig. II; Braithw. in Monthl. Micr. Journ. 1873, p. 214, n. 6 et Sph. pp. 29 et 35, n. 3, t. IV; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 158 et Eur. Torfm. p. 137.

Sph. cymbifolium var. papillosum W. P. Sch. Syn. II ed. p. 848.

Sph. immersum Casseb. in Wett. Laubm. Sphagnum, 1832, n. 8 (fid. Lindb.).

Sph. palustre Broth. M. Fenn. n. 43.

2. In loc. humid. mont. — Eur.: Scandin., Dania, Fennia, Hercyn., Westphal., Britann., Gallia. As.: Caucas. occ. Am. sept.: Labrador, Canada, Alaska, Terr. nov., reg. or. et merid., Indiana, Wisconsin, Washington.

Exs.: Braithw. Sph. brit. n. 3-6, 8 a.

« var. abbreviatum Gravel mss.; Warnst. in Hedwig. 1884, n. 7-8 et Sphagnoth. eur. n. 200.

— Eur.: Belgia.

« var. brachycladum Schlieph. mss.

— Am. sept.: Indiana.

« var. confertum Lindb. in op. et l. cc.; Braithw. in Monthl. Micr. Journ. 1873, p. 215.

— Eur.: Fennia, Dania, Anglia, Hibernia. As.:

Java. Am. sept.: Ubi typ.

« var. intermedium (Rüss.) Warnst. in Hedwig. 1891, t. VII, fig. 23 a, 23 b et t. XXIII, fig. dd.

Sph. cymbifolium subsp. intermedium Rüss. in «Zur Anat. d. Torfm.», Dorpat, 1887; Limpr. in Bot. Centralbl. 1881, p. 313.

Ubi typ. in Eur. et Am. sept.

« var. normale Warnst. in Hedwig. 191, p. 160, t. XVII, fig. 24 a, t. XVII, fig. 24 b et t. XXIII, fig. ee et ee'.

Ubi typ.

« *var. patens f. nigrescens Schlieph. mss.*
— *Am. sept.* : Wisconsin.

var. plumosum Rüss. — *Sph. brasiliense*.

« *var. stenophyllum Lindb. in op. et l. cc.*
— *Eur.* : Fennia, Anglia.

« *var. sublaeve Warnst. in Hedwig. ll. cc.*
Ut typ. in *Eur.* et *Am. sept.*

Pappeanum C. M. *Syn. I, p. 101*; *Warnst. in Hedwig. 1890, p. 248,*
t. XII, fig. 14-17 et t. XIV, fig. k.

— *Afr.* : C. B. Sp., reg. lacustr.

Exs. : Rehm. M. *Afr. austr. n. 12.*

patens { *Besch.* — *Sph. Bescherelei.*
 { *Brid.* { — *Sph. cymbifolium var. patens.*
 { — *Sph. meridense.*
patulum Mitt. — *Sph. squarrosum.*

paucifibrosus Warnst. in Hedwig. 1891, p. 152, t. XII, fig. 20 a, 20 b
et t. XXII, fig. y.

— *Am. merid.* : Brasil.

pennatum { *planum* Dill. — *Homalia glabella?*
 { *undulatum, vagina pilosa* Dill. — *Neckera undulata.*
 { *undulatum, vagina squamosa* Dill. — *Neckera pennata.*
pentastichum Brid. — *Sph. recurvum.*

perforatum Warnst. in Ule Bryoth. brasil. n. 1757, 1892 et in Hedwig.
1891, p. 23, t. I, fig. 10 a, 10 b et t. IV, fig. k.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

« *var. rotundifolium ej. in op. cit. 1895, p. 130.*

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz).

perichaetiale Hpe. — *Sph. erythrocalyx var. laeve.*

peruvianum Mitt. — *Sph. erythrocalyx var. laeve.*

planifolium C. M. in Fl. 1887, p. 415; *Warnst. in Hedwig. 1890, p. 226,*
t. VIII, fig. 24-27 et t. X, fig. 10-11.

Ster. — *Afr.* : Gabon.

platycladum C. M. in Fl. 1887, p. 417.

Ster. — *Am. sept.* : Mexic.

platyphylloideum Warnst. in Act. Soc. sc. Fenn. 1891, n. 5, in Ule
Bryoth. brasil. n. 1755 et in Hedwig. 1891, p. 21, t. I, fig. 8 a, 8 b et
t. V, fig. ee.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Minas Geraës).

platyphyllum Sull., *Warnst.* — *Sph. neglectum.*

var. turgescens Warnst. — *Sph. neglectum var. turgescens.*

plicatum Warnst. — *Sph. laricinum var. floridanum.*

plumosum { *varr. elongata, laete virens, limo-*
 { *sum, luridum, plumosum, Schil-*
 { *lerianum, squarrosulum, sub-*
 { *mersum?, violaceum,*
 { *varr. Gerstenbergeri, quinquefarium et silesiacum (Warnst.)*
 { *Roell.* — *Sph. subnitens.*

plumulosum var. luridum (Hüb.) f. dimorphum Roell. — *Sph. subnitens.*

porosum { *Lindb.* — *Sph. squarrosum.*
 { *Schlieph. et Warnst.* — *Sph. Dusenii.*

porto-ricense Hpe. in Linn. 1852, p. 369; Sull. Ic. M. pp. 3 et 14, t. 2; Lindb. Hvitm. p. 9; Braithw. in Monthl. Micr. Journ. 1875, p. 47, n. 21 et Sph. pp. 29 et 32, n. 1; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 138, t. XIV, fig. 3 a, 3 b et t. XX, fig. d.

Sph. Herminieri W. P. Sch. (fid. Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 249 (1); Card. in Bull. Soc. roy. Belg.).

Sph. Sullivantianum Aust. in Am. Journ. sc. 1863, p. 252.

2? — Am. sept.: New Jersey, reg. merid., M. Porto-Ric.; Guadalup. (Sph. Herminieri).

Exs.: Aust. M. Appal. ser. I, n. 1.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed., n. 2.

praemorsum Z. D. — Sph. rigidum var. compactum.

procerum W. P. Sch. — Sph. antarcticum.

pseudo-acutifolium C. M. et Warnst. in Hedwig. 1897, p. 118 et in Ule Bryoth. brasil. n. 1745.

— Am. merid.: Brasil. or. (Serra do Itatiaia).

pseudo-cuspidatum Warnst. in Hedwig. 1890, p. 218, t. VIII, fig. 4-6 et t. X, fig. 3.

Ster.? — Afr.: Madagascar.

pseudo-cymbifolium C. M. in Linn. 1874, p. 547; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 141, t. XIV, fig. 6 a, 6 b et t. XX, fig. g, h α , h β .

Sph. cymbifolium Mitt. M. Ind. or. p. 156; Wils. in hb. Ind. or. n. 1289; Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 250.

Ster. — As.: Sikkin.

pseudo-medium Warnst. in Hedwig. 1891, t. XVIII, fig. 27 a, 27 b et t. XXIV, fig. hb.

— Am. sept.: Guatemala?

pseudo-recurvum Roell p.p. — Sph. recurvum.

pseudo-rigidum Besch. — Sph. Weddellianum.

pseudo-rufescens Warnst. in Hedwig. 1893, I, t. II, fig. 5 a, 5 l.

Ster.? In palud. — Pac.: Tasman.

pugionatum C. M. — Sph. tumidulum.

Puiggarii C. M. in Fl. 1887, p. 409.

Sph. submolluscum Hpe. Enum. p. 2; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 145, t. XIV, fig. 9 a, 9 b et t. XXI, fig. m.

Ster. — Am. merid.: Brasil. austr. or.

Exs.: Ule Bryoth. brasil. n. 411, 413, 414.

pulchricoma C. M. — Sph. recurvum.

pumilum C. M. et Warnst. in Hedwig. 1897, p. 163 et in Ule Bryoth. brasil. n. 1750.

— Am. merid.: Brasil. or. (Serra do Itatiaia).

purpuratum C. M. hb.; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 267, t. V, fig. 18 a, b, c, et t. VI, fig. 4.

Ster.? — Am. merid.: Brasil. austr. or. (ins. Catharina, S. Jose, S. Pablo).

purpureum W. P. Sch. hb. (nunc in hb. Kew); Warnst. in Hedwig. 1890, p. 197, t. IV, fig. 9 a, 9 b et t. VII, fig. 12.

Ster.? — Afr.: Ins. Franciae.

(1) Cf. Warnst. in Hedwig. 1889, p. 304, t. VIII, fig. 7 et t. IX, fig. 8-11; 1890, n. 11-12.

pycnocladulum C. M. in *Fl.* 1887, p. 420; Warnst. in *Hedwig.* 1891, p. 130. t. XIV, fig. 2 a, 2 b, 2 c et t. XX, fig. c.

Sph. mollissimum C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 17.

Ster. — *Afr.* : Austral.

Exs. : *Rehm. M. Afr. austr.* n. 13.

pycnocladulum Ren. — *Sph. tumidulum*.

pycnocladum Langstr. — *Sph. Wulfianum*.

Pylaesii Brid. *Bryol. univ.* 1, p. 749; Sull. *Ic. M.* p. 12, t. VI.

Hemitheca Pylaesii Lindb. *Hvitm.* p. 76.

Sph. cymbifolium C. M. *Syn. I.* p. 91 p.p.

Sph. sedoides var. Sull. *M. Allegh.* n. 208 (fid. Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, pp. 242, 243); Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 3, 4 et II ed. n. 57.

2. — *Am. sept.* : Labrador, Terr. nov., ins. Miquelon, reg. or. usq. ad Floridam.

Exs. : Aust. *M. Appal.* n. 23-24.

« *var. ramosum* Warnst. *Samml. eur. Torfm. ser. I.* n. 98 et in *Bot. Gaz.* 1890, p. 233; *f. ferruginea* ej. l. c.

— *Am. sept.* : New Hampshire.

f. nigricans ej. l. c.

— *Am. sept.* : New Hampshire, ins. Miquelon.

f. versicolor ej. l. c.

— *Am. sept.* : New Hampshire.

quinquefarium (Braithw.) Warnst. in *Hedwig.* 1885, pp. 222-224 et 1886, n. 6.

Sph. acutifolium Funk *Deutsch. Laubm.* n. 8; Rab. *Bryoth. eur.* n. 204.

Sph. acutifolium var. *flavicaule* Warnst. *Eur. Torfm.* n. 50.

Sph. acutifolium var. *Gerstenbergeri* ej. in *Fl.* 1882, p. 206.

Sph. acutifolium var. *pallens* ej. in *Hedwig.* 1881, p. 116.

Sph. acutifolium var. *quinquefarium* Braithw. *Sph. Eur. and N. Amer.*

Sph. acutifolium var. *silesiacum* Warnst. in op. cit. p. 18.

Sph. intermedium Funk *Kryptog. Gew.* n. 16.

Sph. plumosum var. *Gerstenbergeri* (Warnst.)

Sph. plumosum var. *quinquefarium* (Braithw.)

Sph. plumosum var. *silesiacum* (Warnst.)

Sph. Warnstorffii var. *pallens* (Warnst.)

Sph. Warnstorffii var. *pseudo-patulum*

Roell in *Fl.* 1886.

l. rar. 2.

— *Eur.* : Septentr. *Am. sept.* : Canada,

Terra nov., reg. or.

Exs. : Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 52, 56.

« *var. roseum* Jur. mss. ; Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 191.

— *Eur.* : Austria.

f. dasy-homalo-anoclada et *f. dasy-homalo-drepanoclada* Warnst. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : New Hampshire.

« *var. viride* *f. homaloclada* Warnst. in op. et l. c.c.

— *Am. sept.* : Vermont.

recurviforme Warnst. in *Allgem. Bot. Zeitschr...* in Karlsruhe, 1895, n. 5.

— *Pac.* : Ins. Fidji.

recurvum P. B. *Prodr.* p. 88; Brid. *Bryol. univ.* 1, p. 13; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 830 et *Mém. Sph. t. XVI*, fig. 1-10; Warnst. « *die Cuspidat. ... Gr.* » p. 213, t. 2, fig. p.

- Sph. acutifolium β capillifolium *Bryol. germ. I, p. 20, t. III, fig. 8.*
 Sph. cuspidatum *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 675.*
 Sph. cuspidatum α f. typica, β recurvum et γ mollissimum *Rüss. Beitr.*
 Sph. cuspidatum *Ehrh. p.p. ; W. P. Sch. Syn. ed. I, p. 675 (excl. varr.);*
C. M. Syn. I, p. 96 p.p. ; Lindb. Torfm. p. 136 ; Rüss. et Warnst. in
Sitzungsber. d. Dorpater Naturf. Gesells. 1889, p. 69 ; Rab. Bryoth.
eur. n. 202, 708.
 Sph. cuspidatum var. plumosum *Rab. Bryoth. eur. n. 209.*
 Sph. cuspidatum var. Rauei *Aust. in Rau et Harv. Cat. p. 49.*
 Sph. cuspidatum var. *Rab. Bryoth. eur. n. 715.*
 Sph. flexuosum *Dz. et Mk. Prodr. fl. Batav. II, I, p. 76.*
 Sph. intermedium *Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 22 (fid. Braithw., Lesq. et*
Jam., Lindb.).
 Sph. Limprichtii v. parvifolium (*Sendtn.*) *Roell Syst. d. Torfm. in Fl. 1886.*
 Sph. Mougeoti *W. P. Sch. in Moug. et Nestl. Stirp. vog. rhen. n. 1306.*
 Sph. palastre, molle, deflexum, squamis capillaceis *Dill. Hist. M. p. 243,*
t. XXXII, fig. 2 A p.p. (fid. W. P. Sch.).
 Sph. pentastichum *Brid. Sp. M. I, p. 16.*
 Sph. pseudo-recurvum *Roell in Bot. Centralbl. 1889, n. 88 p.p.*
 Sph. recurvifolium *Wils. mss. ; Hunt in Mem. litt. phil. Soc. of Manches-*
ter, p. 233.
 Sph. riparium *Ångstr. in Oefv. Vet. Akad. Föerh. 1864, p. 21.*
 Sph. variabile var. intermedium *Warnst. Eur. Torfm. p. 60.*
 2. In scatur., secus rivul. et in turfis. — *Eur. : E reg. campestr. mon-*
tos. usque in montana super. ; Spitzberg. Am. sept. : Groenland,
fret. Kotzebue, Canada, ins. S. Georges, reg. or., ins. Miquelon.
Am. merid. : A Brasil. usque ad And. Columb. per Boliviam.
Exs. : Braithw. Sph. brit. n. 47.
Crome Samml. deutsch. Laubm. n. 4 p.p.
Funk, Deutsch. Laubm. n. 9.
Gravet, Sphagnoth. belg. n. 15-35 ; 36 p.p.
Jack, Lind. et St. Krypt. badens. n. 221.
Limpr. Bryoth. siles. n. 196.
H. Müller, Westfal. Laubm. n. 231.
Rab. Bryoth. eur. n. 211 (Sph. mendoeino intermixt.), 1148 a et b.
Warnst. Sphagnoth. eur. n. 46, 48, 87-95, 109-114, 177-179, 181.
Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. I, n. 89-94 ; ser. II, n. 194, 195.
 " var. amblyophyllum *Rüss. (ut subsp.) ; Warnst. in Bot. Gaz. 1890,*
p. 219 et " die Cuspidat... Gr. », p. 216, t. 1, fig. 7 b.
 Sph. caldensi-recurvum *C. M. in sched.*
 Sph. pulchricoma *C. M. (fid. Warnst. in op. cit., t. XXXIX, fig. a et b,*
et t. XLI, fig. a et b) in Ule Bryoth. brasil. n. 1736, 1737 et 1740 (1).
 Sph. recurvum var. squarrosulum *Roell System. p. 46.*
f. viride ej. in Hedwig. 1893, p. 307.
 Sph. recurvum forma *Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. XXVI, I ;*
Warnst. in Hedwig. 1890, p. 235.
 Sph. rufulum *C. M. (fid. Warnst. in op. cit. p. 217).*
 Sph. Serrae *C. M. (fid. Warnst. in Hedwig. 1890, p. 235).*
f. immersa Schlieph. et Warnst. " die Cuspidat... Gr. » p. 217.
 Sph. squarrosulum *Brid. hb. ; Hsch. Fl. Brasil. I, p. 4.*
 — *Eur. : Ubi typ. Am. sept. : Washington, Michi-*
gan, Ludovic. Am. merid. : Brasil., fret. Magellan., ins. Eremitae.
Pac. : Nov. Zeland.
Exs. : Gravet, Sphagnoth. belg. n. 19-21, 31, 32, 34, 35.
Ule, Bryoth. brasil. n. 1109, 1292, 1293, 1738, 1739.
Warnst. Sphagnoth. eur. n. 87, 91, 92, 94, 95, 109, 110, 112,
113, 178, 181.

(1) In Hedwig. 1897 (sect. *Cuspidata*), cl. Warnstorff distinguit var. *amblyophyllum* et var. *pulchricomam*.

- subsp. *angustifolium* (C. Jens.) Rüss. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium*.
- var. *balticum* Rüss. — *Sph. recurvum* var. *mollissimum*.
- var. *brevifolium* Lindb. — *Sph. recurvum* var. *mollissimum*.
- f. *Broëckii* Card. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium* f. *tenuis*.
- « var. *deflexum* Gravet mss.; Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 121.
— Eur.: Belgium.
- « var. *fallax* Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 122 (1).
— Eur.: Brandebourg.
- « var. *fibrosum* Schlieph. mss.; Warnst. in op. cit. p. 123.
— Eur.: Tirol.
- var. *gracile* Gravet. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium* f. *tenuis*.
- var. *humile* Schlieph. et Roell. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium* f. *tenuis*.
- « var. *immersum* Schlieph. et Warnst. in op. cit. p. 122, f. *tenellum* eor. l. c.
— Eur.: Thuring.
- « var. *indianensis* Roell in *Bot. Centralbl.* 1891, pp. 21-22.
— Am. sept.: Indiana.
- f. *crispum* ej. in *Hedwig*. 1893, p. 107.
— Am. sept.: Indiana.
- var. *Limprichtii* Schlieph., Warnst. — *Sph. obtusum*.
- « var. *majus* Ångstr. mss.
— Am. sept.: Washington.
- * *capitatum* Roell in *Hedwig*. 1893, p. 308.
— Am. sept.: Indiana.
- « var. *mollissimum* Rüss. *Beitr....* 1865, p. 61; Warnst. « *die Cuspidat... Gr.* » p. 221, t. I, fig. 38 a, b, c, 44 a, b, c, 45 a, b et t. II, fig. s.
- Sph. balticum* Rüss. mss.; C. Jens. in *De danske Sph. Art.* 1890, p. 100.
- Sph. recurvum* var. *balticum* Rüss. in *Sitzungsber. d. Naturf. Gesells. in Dorpat*, 1889.
- Sph. recurvum* var. *brevifolium* Lindb. in *Braithw. the Sph...* » 1880.
- f. *dasyclada* subf. *anoclada* Warnst. in op. cit. p. 222.
- Sph. recurvum* var. *strictum* ej. }
in *Fl.* 1882, subff. *delicatula* } Warnst. « *die Cuspidat... Gr.* » p. 222.
et *homoclada* }
f. *euryclada* }
- Eur.: Lapon., Norveg., Fennia, ins. Aland, Livon., Esthon., Anglia, Scotia. Am. sept.: Groenland.
- « var. *mucronatum* Rüss. (ut subsp.) in op. et l. cc.; Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 218 et « *die Cuspidat... Gr.* » p. 217, t. I, fig. 35, 36 a et b, 37 c, 42 a et b, et t. II, fig. 9.
- Sph. fallax* var. *Klinggr. Topog. Fl. West. Preuss.* p. 128.
- f. *fluitans* subf. *strictifolia* Warnst. in op. et l. cc.
- Eur.: Anglia. As.: Japon.
- Exs.: Faurie, Pl. Japon, n. 12800, 14494.
- Warnst. *Sphagnoth. eur.* n. 114.

f. riparioides Warnst. in op. cit. p. 218.

— *Eur.* : Anglia (Cheshire). *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* ; Ubi typ. *Am. merid.* : Boliv.
Exs. : Gravet, Sphagnoth. belg. n. 16, 18, 22, 28, 33 (omn. ad *f. riparioidem pertin.*).

Warnst. Sphagnoth. eur. n. 46, 49, 90, 91, 93, 109, 110, 111 (114 ad *f. fluitantem subf. strictifoliam*), 177, 178.

Warnst. Samml. eur. Torfm. n. 89-91.

var. *obtusum* Warnst. — *Sph. obtusum*.

« var. *parvifolium* (Sendtn.) Warnst. in Fl. 1883, p. 374 et « die Cuspidat... Gr. » p. 219, t. I, fig. 37 d, e, f, 43 a, b et t. II, fig. r.

Sph. angustifolium (subsp.) C. Jens. in op. cit. p. 104.

Sph. brevifolium Roell p.p. in Bot. Centralbl. 1889, n. 38.

Sph. recurvum subsp. *angustifolium* (C. Jens.) Rüss. in op. et l. cc.
f. tenuis v. Klinggr. ; Warnst. in op. et l. cc.

Sph. recurvum var. *Broeckii* Card. in Rev. bryol. 1884.

Sph. recurvum var. *gracile* Grav. Sphagnoth. belg. n. 29.

Sph. recurvum var. *humile* Schlieph. et Roell mss.

Sph. recurvum var. *squamosum* Ångstr. in Grav. Sph. belg. n. 30.

subf. *brachyclada* (Rüss.) Warnst. in op. et l. cc.

subf. *capitata* Gravet mss. ; Warnst. in op. et l. cc.

subf. *crispula* (Rüss.) Warnst. in op. et l. cc.

f. filiforme subff. rubricaule et viride Roell in Hedwig. 1893, p. 308.

f. Warnstorffii C. Jens. mss. ; Warnst. in op. et l. cc.

— *Eur.* : Belgia, Thuring. *Am. sept.* : Ubi typ.

(*f. filiforme* Wisconsin ; subf. *rubricaule* Washington ; subf. *viride* New Jersey).

Exs. : Gravet, Sphagnoth. belg. n. 15, 17.

Jack, Lind. et St. Krypt. badens. n. 221.

Warnst. Sphagnoth. eur. n. 48, 179.

Warnst. Samml. eur. Torfm. ser. I, n. 92-94.

« var. *pulchrum* Lindb. in Braithw. Sph. of Eur. and N. Amer. ;
 Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 218 et « die Cuspidat... Gr. » p. 215,
 t. I, fig. 37 a, 40 a, b, c, d et t. II, fig. o.

Sph. laricinum (Spr.) W. P. Sch. in Un. itin. 1865 (fid. Warnst.).

* *dimorphum* Roell in Hedwig. 1893, p. 308.

— *Eur.* : Anglia (Cheshire). *Am. sept.* : Passim,

Washington (* *dimorphum*).

Exs. : Braithw. Sph. brit. n. 48.

« var. *rigidulum f. ochraceum* Roell in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Wisconsin.

var. *squamosum* Ångstr. — *Sph. recurvum* var. *parvifolium f. tenuis*.

var. *squarrosulum* Roell. — *Sph. recurvum* var. *amblyophyllum*.

var. *strictum* Warnst. — *Sph. recurvum* var. *mollis f. dasyclada subf. anoclada*.

« var. *Warnstorffii* C. Jens. mss. ; Warnst. in Hedwig. 1884, p. 122 (1).

— *Eur.* : Dania, Livon., Thuring.

« var. *Winteri* Warnst. in Hedwig. 1884, p. 123 et « die Cuspidat...

Gr. » t. I, fig. 46 a, b, c, d, e.

— *Eur.* : Brandebourg.

[1]. An eadem ac var. *parvifolium f. Warnstorffii* ?

Rehmanni Warnst. in *Hedwig*. 1891, p. 16, t. I, fig. 2 a, 2 b et t. IV, fig. b.
Sph. oligodon Rehm. M. Afr. austr. n. 431.

— Afr. : Transvaal.

Reichhardtii Hpe. in *Expl. Novara*, p. 175 : Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 206, t. V, fig. 17 a, 17 b et t. VI, fig. 1, 2 et 3.

Sph. acutifolium Mitt. Fl. Vit. p. 404.

— Afr. : Ins. S. Paul.

rigidulum Warnst. in *Hedwig*. 1890, p. 241, t. XI, fig. 3-4 et t. XIV, fig. h.

Ster. ?

— Pac. : Ins. Hawaï.

rigidum (Bryol. germ.) W. P. Sch. Mém. Sph. p. 71, t. XIX, Syn. ed. I, p. 678 et ed. II, p. 839.

Sph. compactum β rigidum Bryol. germ. I, p. 14, t. II, fig. 5 ; C. M. Syn. I, p. 99 ; Lindb. Torfm. p. 139.

Sph. humile W. P. Sch. in Sull. Ic. M. p. 5, t. 3 et Mém. Amer. Acad. N. S. p. 175 (fid. Card., Lindb.).

Sph. strictum Sulliv. M. Allegh. p. 49 et n. 201.

1. In ericet. humid. et ad rup. rorid. — Eur. : Zon. intermed. et sept. Afr. : Ins. Azor. Am. sept. : Arctic., Canada, Terr. nova, ins. Miquelon : de New Jersey ad Florid. et Alabama, Calif.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 601.

« var. compactum (Brid.) W. P. Sch. in op. et l. cc.

Sph. ambiguum Hüb. Musc. germ. p. 25.

Sph. compactum Brid. Bryol. univ. I, p. 16 et p. 752 p.p. ; C. M. Syn. I, p. 98 ; Lindb. Hvitm. p. 37.

Sph. immersum Bryol. germ. I, p. 11, t. 2, fig. 4.

Sph. praemorsum Z. D. M. Thuring. n. 18.

In turfis. siccior. vel mont. altior. — Eur. : Ut typ. Am. sept. : Labrador, Canada, ins. Vancouver et Miquelon ; de Maine ad Florid. et Alabama ; Calif. Pac. : Tasman.

Exs. : Funk, Samml. Krypt. Gew. n. 548.

De Brebisson, M. Norman. n. 100.

H. Müller, Westfal. Laubm. n. 228.

Rab. Bryoth. eur. n. 602.

f. purpurascens Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 114.

— Eur. : Norveg.

« var. squarrosum Rüss. Beitr... p. 77.

— Am. sept. : Ins. Miquelon, New Jersey, Massachusetts, Pensilv., Florid., Alabama.

riparium Ångstr. { — Sph. recurvum (fid. W. P. Sch.).
— Sph. cuspidatum β majus (fid. Jaeg.).
— Sph. spectabile (fid. Warnst.).

rivulare Warnst. in *Hedwig*. 1897, p. 160.

— Am. merid. : Brasil. or. (Minas Geraës).

robustum (Rüss.) Roell. — Sph. Rüssowii.

rotundatum C. M. et Warnst. in *Hedwig*. 1897, p. 152 et in Ule Bryoth. brasil. n. 1760.

— Am. merid. : Brasil. or. (Serra do Itatiaia).

rotundifolium C. M. et Warnst. in op. et l. cc. p. 159 et n. 1756.

— Am. merid. : Brasil. or. (Serra do Itatiaia).

rubellum { H. Müll. n. 227. — Sph. Rüssowii.
 Rab. n. 951 et 1249. — Sph. tenellum.
 Wils. — Sph. tenellum var. versicolor.

rufescens Bryol. germ. — Sph. subsecundum var. rufescens.

rufulum C. M. in Linn. 1874, p. 548; Warnst. in Hedwig. 1890, p. 234.

Sph. cuspidatum Mitt. M. Ind. or. p. 156, n. 1290, 1291; Wils. in hb. Ind. or. iisd. num. (fid. C. M.).

Sph. recurvum var. amblyophyllum (fid. Warnst. in Hedwig. 1890, p. 226 et die Cuspidat... Gr. p. pp. 213 et 217.

Ster. — As.: Sikkim.

Rüssowii Warnst. in Hedwig. 1886, p. 225.

Sph. acutifolium var. fallax p.p. Warnst. Eur. Torfm. p. 42.

Sph. acutifolium var. polyphyllum ej. in Fl. 1882, p. 206.

Sph. acutifolium var. robustum Rüss. Beitr... p. 39.

Sph. acutifolium var. roseum Limpr. mss.; Milde Bryol. siles. p. 382.

Sph. acutifolium var. strictiforme Warnst. in Fl. 1883, p. 373.

Sph. acutiforme var. auriculatum ej. in Hedwig. 1884, p. 117 et Sphagnoth. eur. n. 152.

Sph. Girgensohni ε roseum Limpr. Kryptog. Fl. Deutschl. IV, p. 109.

Sph. robustum (Rüss.) Roell in Fl. 1886 (p.p.?).

Sph. rubellum H. M. Westfal. Laubm. n. 227.

Sph. Warnstorffii var. auriculatum (Warnst.) f. deflexa, var. fallax (Warnst. p.p.), fimbriatum (Warnst. p.p.), polyphyllum (Warnst.), strictiforme (Warnst.), strictum f. deflexa, squarrosa et teres Roell in Fl. 1886.

Sph. Wilsoni var. roseum (Limpr.) Roell in op. et l. cc.

2. rar. l. — Eur.: German. As.: Siber. occid. Am. sept.: Labrador, Terra nov., ins. Miquelon, New Brunswick, Maine, New Hampshire, M. Rupestr., Washington.

Exs.: Braithw. Sphagnoth. brit. n. 42 b ♂.

Warnst. Sphagnoth. eur. n. 57, 151, 152, 155.

« var. fallax Roell in Bot. Centralbl. 1891, pp. 21-22, f. pallens ej. in Hedwig. 1893, p. 305 (1).

— Am. sept.: Washington.

« var. girgensohnioides Rüss. mss.; Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 132.

— Am. sept.: Vermont, New Hampshire.

« var. laxum f. pallens et purpurascens Roell Syst. p. 30 et in Hedwig. l. c.

— Am. sept.: Washington.

« var. obscurum Rüss. mss.; Warnst. in op. cit. p. 133.

— Am. sept.: New Hampshire.

« var. poëcilum Rüss. mss.; Warnst. in op. cit. p. 132.

— Am. sept.: Vermont, New Hampshire.

« var. rhodochroum Rüss. mss.; Warnst. in op. et l. cc.; f. dasy-anoclada Warnst. l. c.

— Am. sept.: New Hampshire.

Rutenbergii C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 203.

Ster. — Afr.: Madagascar.

(1) « Hierher rechne ich auch die von mir in Systematik S. 27 unter Sph. Warnstorffii mihi, var. fallax Warnst., f. squarrosula mihi und f. teres mihi angeführten Formen ». Roell l. c.

Schimperi { var. *gracile* { Roell. — *Sph. tenellum*.
var. *tenellum* }

Scortecchini C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 153.

— *Pac.* : Austral. or. (Queensland).

sedoides Brid. *Bryol. univ.* 1, p. 750 ; *Sull. Ic. M.* p. 11, t. VI.

Sph. cymbifolium C. M. *Syn. I*, p. 91 p.p.

Sph. Pylaisaei var. (fid. *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, p. 242).

— *Am. sept.* : New York, Carol. infer.

var. *Sull. et Lesq.* — *Sph. Pylaisaei*.

Seemanni C. M. *M. Polyn.* p. 56.

Sph. cuspidatum Mitt. in *Bonplandia*, 1861, p. 366.

Ster. — *Pac.* : Ins. Fidji.

semi-vacuum P. B. — *Orthotrichum affine*.

sericeum C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 481 et *Syn. I*, p. 90 ; *Bryol. jav.* 1, p. 30, t. 21 ; *Warnst. in Hedwig*. 1890, p. 222, t. VIII, fig. 13-16 et t. X, fig. 7-8.

Ster. ? — *As.* : Sumatra sept., Java.

Sph. Hollianum Dz. et Mk. { (fid. *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, p. 197).
Sph. seriolum C. M. }

seriolum C. M. in *Fl.* 1887, p. 421 (de syn. cf. *Sph. sericeum*).

Ster. — *As.* : Sumatra.

Serrae C. M. — *Sph. recurvum* var. *amblyophyllum*.

serratum Aust. { (fid. C. M.). — *Sph. trinitense*.
(fid. *Warnst.*). — *Sph. cuspidatum* var. *submersum*
f. *serrulata*.

serrulatum *Warnst. in Hedwig*. 1893, 1, t. I, fig. 1 a-l g.

Ster. ? Submers. — *Pac.* : Tasman.

simile *Warnst. in Hedwig*. 1894, pp. 326 et 335.

— *Am. sept.* : Wisconsin.

simplicissimum Lour. — *Gymnostomum*.

sparsifolium *Warnst. in Hedwig*. 1894, pp. 320 et 324.

— *Am. sept.* : Guadalup.

sparsum Hpe. *Symb.* 1870, p. 267 ; *Warnst. in Hedwig*. 1890, p. 203, t. IV, fig. 15 a, 15 b et VI, fig. 6.

— *Am. merid.* : Nov. Granat., Brasil. austr. or.

speciosum v. Klinggr. — *Sph. spectabile*.

spectabile W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 834.

Sph. cuspidatum subsp. *riparium* Lindb. *Hvitm.* p. 69.

Sph. cuspidatum var. *speciosum* Rüss. *Beitr.* p. 57, fig. 3, 49, 64 (fid. *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, p. 217) ; *Rab. Bryoth. eur.* n. 1350.

Sph. riparium Ångstr. in *Oefv. Vet. Akad. Förel.* 1864, p. 198 ; *Warnst. « die Cuspidat.... Gr. »* p. 203, t. I, fig. 7-12 et t. II, fig. b α, b β, c, d, e ; *Rab. Bryoth. eur.* n. 707.

Sph. speciosum v. Klinggr. in *Schrift. d. Phys. oecon. Gesells. in Königsb.* 1872.

Sph. variabile α *speciosum* *Warnst. Eur. Torfm.* p. 62.

— *Eur.* : Lappon., Scandin., Fennia, Livon., Esthon., German. sept. et med., Bohem., Salisb., Stir., etc. ; Anglia. *Am. sept.* : Groënland, fret. Kotzebue, Columb. brit. ; septentr. tota.

squarrosulum Lesq. — *Sph. squarrosum* var. *squarrosulum*.
var. *laxum* Schlieph., Roell. — *Sph. teres* var. *laxum*.

squarrosum Pers. *Prodr.* p. 88; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 5; *C. M. Syn.* I, p. 94; *W. P. Sch. Mém. Sph.* p. 69, t. 17 et *Syn.* II ed. p. 835; *Lindb. Bidrag....* p. 414, *Hvitm.* p. 42 et *Torf. m.* p. 139; *Rüss. Beitr.* p. 62.

Sph. aconiense de Not. mss.; *Lindb. Torfm.* p. 138 (ut syn.).

Sph. cymbifolium var. *squarrosum* Br. in *Bryol. germ.* I, p. 11 in obs.

Sph. latifolium β *squarrosum* Wahlenb. *Fl. Upsal.* p. 391.

Sph. patulum Mitt. mss.; *Braithw. in Monthl. Micr. Journ.* 1874, II (ut. syn.).

Sph. porosum *Lindb. in op. et l. cc.*

Sph. teres var. *squarrosum* Warnst. *Eur. Torfm.* p. 121.

l. In montos. silvat. scaturigin., rar. in turf. — *Eur.*: Zon. intermed., rar. sept.; Spitzberg, ins. Ursorum. *As.*: Amour, Japon. *Afr.*: Ins. Azor. *Am. sept.*: Labrador, fret. Davis, Alaska, mar. Behring, ins. S. Paul, S. Georges, Pribyloff, Terr. nov., ins. Michelon, sept., centr., et or.

Exs.: Faurie, Pl. Japon, n. 14494.

Funk, Samml. Krypt. Gew. n. 207.

H. Müll. Westfal. Laubm. n. 230.

Moug. et Nestl. Stirp. vog. rhen. n. 209.

Rab. Bryoth. eur. n. 1250 b.

« var. *compactum* Warnst. in *Hedwig.* 1884, p. 120.
— *Am. sept.*: Groenland.

« var. *cuspidatum* Warnst. in op. et l. cc.
— *Eur.*: Bohemia.

« var. *densum* Roell *System.* p. 64, f. *deflexum* * *versicolor* ej. in *Hedwig.* 1893, p. 310.
— *Am. sept.*: Washington.

« var. *elegans* Roell in *Hedwig.* l. c.
— *Am. sept.*: Washington.

« var. *humile* Schlieph. (ubi?).
— *Am. sept.*: Michigan.

« var. *imbricatum* W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 836.
— *Eur.*: Suecia, Rhoengeb., Thuring. *Am. sept.*: Groenland, Washington.

« var. *immersum* Beckmann mss.; f. *robustum* Roell in op. et l. cc.
— *Am. sept.*: Washington, Michigan.

« var. *molle* Roell in op. et l. cc.
— *Am. sept.*: Washington.

« var. *patulum* Roell in *Hedwig.* 1897, p. 49 (nom.).
— *Am. sept.*: Michigan.

« var. *robustum* Roell in op. et l. cc.
— *Am. sept.*: Washington.

« var. *semi-squarrosum* Rüss. mss.; Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 224.
Sph. squarrosum Rab. *Bryoth. eur.* n. 1250.

— *Eur.*: Westphal., Alp. Helvet. *Am. sept.*: Canada, New Hampshire.

« var. *spectabile* (Rüss.); Warnst. in op. et l. cc.
— *Am. sept.*: Vermont, Massachussets, New Hampshire.

- « *var. squarrosulum* (Lesq.) W. P. Sch. *Syn.* 1 ed. p. 677 et 11 ed. l. c.
Sph. squarrosulum Lesq. in *Mem. Acad. Calif.* I, p. 3
Sph. teres var. squarrosulum Warnst. in *op. cit.* p. 225.

In turfac. — *Eur.* : Suec., Westphal., Jurass. helv. ; Spitzberg ? *Am. sept.* : Arctic., Canada, Terr. nova, ins. Miquelon, Columb. brit., Washington, Minnesota, Calif. *Am. merid.* : Fret. Magellan ?
Exs. : Moug. et Nestl. *Stirp. vog. rhen.* n. 1305.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 212.

- squarrosulum* { Hsch. — *Sph. recurvum var. amblyophyllum*.
 { Rab. n. 1250. — *Sph. squarrosulum var. semi-squarrosulum*.
var. teres W. P. Sch. — *Sph. teres*.
strictum { Lindb. — *Sph. Girgensohnii*.
 { Sull. — *Sph. rigidum*.

Stuhlmanni Warnst. in *Allgem. bot. Zeitschr...* in *Karlsruhe*, 1895, n. 7-8.
 — *Afr.* : Reg. lacustr.

subacutifolium Warnst. in *op. cit.* n. 5.

— *As.* : Japon.

Exs. : Savatier., *Pl. Japon.* n. 534.

subæquifolium Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 3.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subbicolor Hpe. — *Sph. cymbifolium*

subcontortum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 301.

Sph. subsecundum var. subcontortum Jaeg. *Ad. II*, p. 626.

Ster. — *Pac.* : Austral. or.

subcuspidatum C. M. et Warnst. in *Hedwig.* 1897, p. 151.

In turfos. — *Pac.* : Nov. Zeland. (Otago).

subcuspidatum W. P. Sch. { — *Sph. molle*
 { — *Sph. recurvum var. mollissimum* } p.p. (fid. Warnst. in *Hedwig.* 1890, p. 234.

suberythrocalyx C. M. — *Sph. erythrocalyx var. laeve*.

subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis Dill. — *Grimmia apocarpa*.

submolliculum Warnst. in *Hedwig.* 1897, p. 164.

— *Pac.* : Tasman.

submollissimum Hpe. — *Sph. Puiggarii*.

submolluscum Hpe. { — *Sph. gracilescens*.
 { — *Sph. Puiggarii*.

submucronatum C. M. — *Sph. tumidulum*.

subnitens Rüss. et Warnst. in *Verh. d. bot. Ver. für Brandenburg*, 1888, p. 15.

Sph. acutifolium de Bréb. *M. Normann.* n. 125.

Sph. acutifolium var. aquaticum Schlieph. in *Hedwig.* 1884.

Sph. acutifolium var. laete-virens Braithw. *Sph. Eur. and N. Amer.* 1880.

Sph. acutifolium var. laxum Warnst. *Eur. Torfm.* pp. 48-50.

Sph. acutifolium var. luridum (Hüb.) Warnst. in *op. et l. cc.*, ff. *deflexa*, *elongata*, *laete-virens*, *limosa*, *plumosa*, *squarrosula*, *stricta* et *violacea* ej. *Sphagn. Rückblick in Fl.* 1884.

Sph. acutifolium var. plumosum Milde *Bryol. siles.* p. 382.

Sph. acutifolium var. Schillerianum Warnst. in *Fl.* 1882.

Sph. acutifolium var. squarrosulum ej. *Eur. Torfm.* l. c.

Sph. capillifolium (cum *Sph. quinquefario immixt.*) Moug. et Nestl. *Stirp. vog. rhen.* n. 1.

Sph. luridum (Hüb.) Warnst. in *Hedwig.* 1886, p. 230.

Sph. plumosum var. elongatum, *laete-virens*, *limosum*, *luridum*, *plumo-*

sum, Schillerianum, squarrosum, submersum et violaceum *Roell Syst. d. Torfm. in Fl.* 1886.

Sph. plumulosum *Roell Syst. p.* 19, *var. luridum* (*Hub.*) *f. dimorphum* *ej. in Hedwig.* 1893, *p.* 295.

1 et 2. — *Eur.*: Sept. et med. *As.*: Yunnan. *Afr.*: Ins. Azor. *Am. sept.*: Labrador, Alaska, Terr. nov., ins. Miquelon, sept. et sept. or., Indiana, Calif.

Exs.: Delavay, Pl. Yunnan. n. 2049, 4737.

« *var. flavicomans* (*Ren. et Card.*) *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, pp. 194-196.

Sph. acutifolium *var. flavicomans* *R. et C. in Rev. bryol.* 1885, *p.* 55 et *Sph. d'Eur. p.* 68, *not.*

— *Am. sept.*: Ins. Miquelon.

Exs.: *Warnst. Eur. Torfm. ser. I, n.* 77.

« *var. griseum* *Warnst. in Schrift. d. Naturf. Gesells. in Danzig, N. F. IX, Heft 2,* 1896.

— *Eur.*: Westphal.

« *var. obscurum* *Warnst. in Bot. Gaz.* 1850, *p.* 196.

— *Am. sept.*: Massachusetts.

« *var. pallescens* *Warnst. in Ann. sc. nat.* 1892, *I, p.* (1).

— *As.*: Yunnan.

« *var. viride* *Warnst. in Bot. Gaz.* 1890, *p.* 196.

— *Am. sept.*: Massachusetts.

subovalifolium *C. M. et Warnst. in Hedwig.* 1897, *p.* 162 et in *Ule Bryoth. brasil. n.* 1754.

— *Am. merid.*: Brasil. or. (Serra do Itatiaia).

subpulchricoma *C. M. in Fl.* 1887, *p.* 115.

Ster.

— *Am. merid.*: Brasil. subtropic.

subrecurvum *Warnst. in Allgem. bot. Zeitschr... in Karlsruhe,* 1895, *n.* 7-8.

— *As.*: Java.

subrigidum *Hpe. et Ltz. in Bot. Zeit.* 1868, *n.* 47.

— *Am. merid.*: Summ. Cordill. Æquat.

subsecundum *Bryol. germ. I, p.* 17, *t.* III; *Brid. Bryol. univ. I, p.* 8; *C. M. Syn. I, p.* 100 (*excl. varr.*); *W. P. Sch. Mém. Sph. p.* 78, *t.* XXII-XXIII et *Syn. II ed. p.* 843; *Lindb. Torfm. p.* 141 et *Hvitm. p.* 28.

Sph. cavifolium *var. subsecundum* *Warnst. Eur. Torfm. p.* 81.

Sph. compactum β *ambiguum* *H. f. et W. Fl. N. Zealand, II, p.* 57.

Sph. contortum *Rab. Bryoth. eur. n.* 302, 551, 552, 706, 807.

Sph. contortum (*Schultz.*) *var. subsecundum* *Wils. Bryol. brit. p.* 22, *t.* LX.

Sph. subsecundum *var. heterophyllum* *Rüss. Beitr... p.* 72; *Lindb. Torfm. p.* 141.

2. In turf. et foss. prat. uligin. — *Eur.*: Fere tota. *As.*: Caucas. occ. et centr. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Terr. nov., ins. Miquelon, reg. sept. et or. usq. ad Floridam. *Am. merid.*: Brasil. *Pac.*: Nov. Zeland., Tasman.

Exs.: Funk, Samml. Krypt. Gew. n. 626.

H. Müll. Westfal. Laubm. n. 224.

(1) An idem ac *Sph. acutifolium* *var. pallescens*?

Moug. et Nestl. Stirp. vog. rhen. n. 806.
Rab. Bryoth. eur. n. 208, 704, 705, 719.

var. *auriculatum* Lindb. — Sph. *auriculatum*.

var. *contortum* W. P. Sch. — Sph. *subsecundum* var. *rufescens*.

« var. *Dieckei* ff. *aureum*, *laxum*, *versicolor* et *viride* Roell in Hedwig. 1893, pp. 312-313.

— Am. sept.: Wisconsin.

var. *gracile* C. M. — Sph. *tenellum* Pers. (fid. C. M.).

var. *heterophyllum* Rüss. — Sph. *subsecundum*.

« var. *indianensis* Roell in Bot. Centralbl. 1891, pp. 21-22.

— Am. sept.: Indiana.

« var. *intermedium* Warnst. (*ubi?*) f. *viride* Roell in Hedwig. 1893, p. 311.

— Am. sept.: Washington.

var. *isophyllum* Rüss. } — Sph. *auriculatum* (fid. Jaeg.).
— Sph. *neglectum* (fid. Warnst).

« var. *Jensenii* Warnst. in Hedwig. 1884, n. 7-8.

— Eur.: Ins. Bornholm.

« var. *latifolium* Roell in Hedwig. 1893, p. 312.

— Am. sept.: New Jersey.

var. *laxum* Lesq. et Jam. — Sph. *subsecundum* var. *Lescurii*.

« var. *Lescurii* Sull. M. bor. am. II ed. p. 16.

Sph. *Lescurii* ej. M. bor. am. I ed. n. 6.

Sph. *subsecundum* var. *laxum* Lesq. et Jam. Man. p. 19.

— Am. sept.: Passim cum typo.

« var. *majus* Roell System. p. 77, f. *albescens*, * *capitatum*, * *deflexum*, * *dimorphum* et * *patulum*; f. *Schimperi* et f. *virescens*, * *capitatum* et * *patulum* ej. in Hedwig. 1893, p. 311.

— Am. sept.: Indiana (f. *albescens*, * *dimorphum* et f. *Schimperi*); Washington.

« var. *molle* Warnst. (*ubi?*)

— Am. sept.: Wisconsin.

« var. *natans* Schlieph. (*ubi?*)

— Am. sept.: Wisconsin.

« var. *obesum* (Wils.) W. P. Sch. Syn. II ed. p. 844.

Sph. *decipiens* Sull. et Lesq. in hb. Kew.

Sph. *obesum* Wils. Bryol. brit. p. 22; Warnst. in Bot. Gaz. 1870, p. 247.

Sph. *subsecundum* var. *turgidum* C. M. Syn. I, p. 101?

Sph. *turgidum* (C. M.) Roell in Fl. 1886.

In aq. stagn. mont. editor. et in silvat. turf. — Eur.: Sept. et med.

Am. sept.: Sept. occid.

Exs.: H. Müll. Westfal. Laubm. n. 235 b.

var. *oblongifolium* Lesq. — Sph. *mendocinum*.

« var. *pseudo-molle* Ren. et Card. in Rev. bryol. 1885, p. 45.

— Am. sept.: Florid.

« var. *robustum* et f. *compactum* Roell in Hedwig. 1893, pp. 311-312.

— Am. sept.: Washington.

- « *var. Roederi* *Roell System. p. 77 f. dimorphum ej. in Hedwig. l. c.*
— *Am. sept. : New Jersey.*
- « *var. rufescens* (*Bryol. germ.*) *Warnst. in Hedwig. 1888, p. 267.*
Sph. rufescens Bryol. germ. p. 15, t. II, fig. 6.*
Sph. subsecundum var. contortum C. M. et W. P. Sch. ll. cc.
— *Eur. : Lappon., Baden. Am. sept. : A. Labrador,*
Canada et Terr. nov. usq. in Connecticut ; Washington, Calif.
Exs. : H. Müll. Westfal. Laubm. n. 225.
- « *var. simplicissimum* *Milde Bryol. siles. p. 393.*
— *Eur. : Silesia.*
- « *var. strictum* *Roell System. p. 77 f. Schimperii ej. in Hedwig. 1893,*
p. 310.
— *Am. sept. : Indiana.*
- var. subcontortum* *Jaeg. — Sph. subcontortum.*
- « *var. tenellum* *Warnst. in Hedwig. 1884, n. 7-8.*
— *Eur. : Brandenburg., Thuring.*
- « *var. teres et ff. myurum, versicolor et viride* *Roell in Hedwig. l. c.*
— *Am. sept. : Washington.*
- var. turgidum* *C. M. — Sph. subsecundum var. obesum?*
- « *var. virescens* *Angstr. mss.; Warnst. in Hedwig. l. c.*
— *Eur. : Thuring.*
- subsecundum* *C. M. p.p., — Sph. laricinum.*
- subtursum* *C. M. in Hedwig. 1897, p. 171 et in Ule Bryoth. brasil. n. 414.*
In turf. — Am. merid. : Brasil or. (ins. Catharina).
- « *var. squarrosulum* *Warnst. in op. et l. cc. n. 413.*
Ut et ubi typus.
- subulatum* { *Brid. — Sph. acutifolium.*
 { *Br. — Sph. fimbriatum.*
- subundulatum* *C. M. et Warnst. in op. et l. cc. p. 152 et n. 1298.*
— *Am. merid. : Brasil. or. (Minas Geraes, Serra do*
Ouro preto).
- Sullivantianum* *Aust. — Sph. porto-ricense.*
- tabulare* *Sull. — Sph. molle.*
- tenellum* (*W. P. Sch.*) *v. Klinggr. in Schrift. d. Phys.-oecon. Gesells. in*
Koenigsberg, 1872, I, p. 4, n. 5; Warnst. in Bot. Gaz. 1890,
p. 135; Lindb. Torfm. p. 142.
- Sph. acutifolium var. elegans f. plumosa* *Roell in Fl. 1886.*
- Sph. acutifolium var. tenellum* *W. P. Sch. Mon. Sph. t. XIII. fig. γ et*
Syn. II ed. p. 826.
- Sph. acutifolium var. tenue* *Braithw. Sph. brit.*
- Sph. acutiforme var. pseudo-Schimperi* *Warnst. in Hedwig. 1884, p. 118?*
- Sph. acutiforme var. tenellum* *Schlieph. et Warnst. in Fl. 1884, p.p.*
- Sph. Schimperii* { *var. gracile* { *Roell in Fl. 1886.*
 { *var. tenellum* {
- Sph. subsecundum var. gracile* *C. M. Syn. I, p. 101?*
- Sph. Wilsoni* *Roell in op. et l. cc. p.p.*
2. *In turf. profund. mont. editor. — Eur. : Lappon., Helvet., Jurass.,*
Pyren. Am. sept. : Labrador, Canada, Terr. nov., ins. Miquelon,
sept. or.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 711.

var. *compactum* Warnst. — *Sph. molluscum* var. *compactum*.

f. *flavum* (C. Jens.) Par.

Sph. acutiforme var. *tenellum* f. *flavum* C. Jens. mss.; Warnst. in Hedwig. 1884, p. 118.

— Eur.: Ubi typ.

« var. *pallescent* Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 137.

— Am. sept.: Massachussets, New Hampshire.

« var. *pallido-glaucescens* Warnst. in Schrift. d. Naturf. Gesells in Danzig, N. F., Heft 2, 1896.

— Eur.: Westphal.

« var. *rubellum* (Wils.) Warnst. in op. et l. cc.

Sph. acutifolium var. *rubellum* Rüss. Beitr. p. 41.

Sph. acutiforme var. *rubellum* Schlieph. et Warnst. in Fl. 1884.

Sph. rubellum Wils. Bryol. brit. p. 19, t. LX; W. P. Sch. Mém. Sph. p. 75, t. XX et Syn. II ed. p. 826; Lindb. Torfm. p. 142.

In palud. montos. — Eur.: Zona intermed. Am. sept.: Canada, New Brunswick, Massachussets, ins. Miquelon.

Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 555.

var. *suberectum* Gravet. — *Sph. molluscum* var. *suberectum*.

« var. *versicolor* Warnst. in op. et l. cc.

Sph. rubellum Rab. Bryoth. eur. n. 951 et 1249.

— Eur.: Suecia, Westphal., Anglia. Am. sept.: Massachussets.

« var. *viride* Warnst. in op. et l. cc.

— Am. sept.: Massachussets.

tenellum Bryol. germ. — *Sph. molluscum*.

tenerum (Aust.) Warnst. in Hedwig. 1890, p. 194, t. IV, fig. 6 a, 6 b.

Sph. acutifolium var. *tenerum* Aust. mss.

Ster.? — Am. sept.: New Jersey, Connecticut.

tenerum Sull. et Lesq. — *Sph. molle* var. *tenerum*.

tenuifolium Warnst. in Allgem. bot. Zeitschr... in Karlsruhe, 1895, n. 6.

— Am. sept.: Labrador.

teres Ångstr. in Hartm. Skand. Fl. VIII ed., p. 417; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 836; Lindb. Torfm. p. 138.

Sph. squarrosum var. *teres* W. P. Sch. Syn. I ed. p. 677; Rüss. Beitr... p. 64.

Sph. teres var. *gracile* Warnst. Eur. Torfm. p. 125.

2. In paludosis. — Eur.: Spitzberg. Lappon., Scand., Fennia, Sudet., Thuring., Siles., Neerland., Taunus, Anglia. As.: Caucas. occ. Am. sept.: Labrador, Canada, Columb. brit., Washington, ins. Miquelon, sept. or.

Exs.: H. Müll. Westfal.-Laubm. n. 229.

Rab. Bryoth. eur. n. 554.

« var. *compactum* Warnst. ff. *bicolor* et *fuscum* Roell. in Hedwig. 1893, p. 308.

— Am. sept.: Washington.

var. *concinnum* Berggr. — *Sph. fimbriatum*.

« var. *densum* ff. *bicolor*, *fuscum* et *viride* Roell in op. cit. p. 309.

— Am. sept.: Washington.

- var. *gracile* Warnst. — Sph. *teres*.
- « var. *imbricatum* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 224.
— Eur.: Westphal. Am. sept.: Massachussets,
New Hampshire.
- « var. *laxum* Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 120.
Sph. *squarrosulum* var. *laxum* Schlieph. mss.; Roell *Torf. d. Thur.*
Fl... IV Heft, p. 10.
— Eur.: Thuring.
- var. *squarrosum* Warnst. — Sph. *squarrosum*.
var. *squarrosulum* Warnst. — Sph. *squarrosum* var. *squarrosulum*.
- « var. *submersum* Warnst. in *Hedwig*. 1884, p. 120.
— Eur.: Dania. Am. sept.: Passim ut typ.
ff. *complanatum*, *squarrosulum* et *strictum* Roell in *Hedwig*. 1893,
p. 309.
— Am. sept.: New Jersey.
- « var. *subsquarrosum* Warnst. in op. et l. cc.
— Eur.: Lappon. Westphal. Am. sept.: Massachus-
sets.
Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 702, 1153.
- « var. *subteres* Braithw. (ubi?) f. *virescens* Roell in op. et l. cc.
— Am. sept.: Washington.
f. *fibrorum* * *virescens* Roell in *Hedwig*. 1897, p. 52 (nom.).
— Am. sept.: Indiana.
- « var. *tenellum* Roell in *Bot. Centralbl.* 1891, pp. 21-22, ff. *complanatum*,
fusco-virescens et *versicolor* ej. in *Hedwig*. l. c.
— Am. sept.: Washington.
- Thomsoni C. M. in *Linn.* 1874, p. 545.
Sph. *fimbriatum* Wils. in *hb. Ind. or.* n. 1293.
Sph. *Junghunianum* Mitt. M. *Ind. or.* p. 156.
Ster. — As.: Ins. Philippin., Khasia, Sikkim.
- Torreyanum* Sull. — Sph. *cuspidatum* var. *Torreyanum*.
trachynotum C. M. — Sph. *Whiteleggei*.
- transvaaliense* C. M. mss.; Warnst. in *Hedwig*. 1891, t. II, fig. 2 a, 2 b
et t. V, fig. 9.
— Afr.: Transvaal.
- trigonum* C. M. et Warnst. in *Hedwig*. 1897, p. 158 et in *Ule Bryoth.*
brasil. n. 1634-1635.
— Am. merid.: Brasil. or.
f. *brachy-dasyclada* Warnst. in op. et l. cc. n. 1636.
Ut et ubi typ.
- trinitense* C. M. *Syn.* I, p. 102 et in *Fl.* 1887, p. 406; Warnst. in *Hedwig*.
1890, p. 235, t. IX, fig. 18-25 et t. X, fig. 21.
Sph. *cuspidatum* var. *serratum* (Aust.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 15.
Sph. *serratum* Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1877, p. 145 (fid. C. M.).
— Am. sept.: Florida. Am. merid.: Ins. Trinitat.
- truncatum* Hsch. in *Linn.* 1841, p. 114; C. M. *Syn.* I, p. 103; Warnst.
in *Hedwig*. 1891, p. 28, t. II, fig. 21 a, 21 b et t. IV, fig. p.
— Afr.: C. B. Sp.

- tumidulum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 188; *Warnst. in Hedwig*, 1891, p. 128, t. XIV, fig. 1 a, 1 b et t. X, fig. a, b α , b β .
Sph. aculeatum Warnst. in Bot. Centralbl. 1882.
Sph. pugionatum C. M. in sched.
Sph. pycnocladulum Ren. in sched.
Sph. submucronatum C. M. in Sikora M. Mad. n. 14341. } *fid. Warnst. in Hedwig*, 1897.
 — *Afr.*: Ins. Borbon., Rodriguez, Madagascar.
- « *var. microphyllum f. dasyclada Warnst. in Hedwig*, 1891, p. 129.
Sph. imbricatum W. P. Sch. in hb. Kew.
 — *Afr.*: Ins. Borbon.
- f. euryclada Warnst. in op. et l. cc.*
Sph. Hildebrandti C. M. in Fl. 1887, p. 415.
Sph. madegassum ej. in op. cit. p. 420.
 — *Afr.*: Madagascar.
- Exs.*: Hildebr. n. 2106.
- turfaceum *Warnst. in Schrift. d. Naturf. Gesells. in Danzig, N. F.* IX, Heft. II, 1896.
 In turfos. — *Eur.*: Westphal.
- turgescens *Warnst. in Ule Bryoth. brasil. n.* 1530 et in *Hedwig*, 1895, p. 131.
 — *Am. merid.*: Brasil. or. (Goyaz.).
- turgidum (C. M.) Roell. — *Sph. subsecundum var. obesum?*
tursum C. M. — Sph. medium.
- Uleanum *C. M. in Fl.* 1888, p. 416; *Warnst. in Hedwig*, 1891, p. 41, t. III, fig. 33 a, 33 b et t. V, fig. aa.
 Ster. — *Am. merid.*: Brasil. subtropic. or.
- undulatum *Warnst. in Hedwig*, 1894, pp. 317 et 334.
 — *Pac.*: Patagon.
- vancouveriense *Warnst. in op. cit.* pp. 309 et 332.
 — *Am. sept.*: Columb. brit.
- variabile *Warnst.* { *var. α speciosum ej. — Sph. recurvum.*
 var. 1. intermedium ej. — Sph. recurvum.
 var. 2 ej. — Sph. cuspidatum.
- vesiculare *C. M. et Warnst. in Ule Bryoth. brasil. n.* 1301 et in *Hedwig*, 1897, n. 1301.
 — *Am. merid.*: Brasil. or. (Itacolumi).
- violascens *C. M. in Fl.* 1887, p. 422.
 Ster. — *Afr.*: Mozambic.
- vitianum *W. P. Sch. in hb. Kew.*; *Warnst. in Hedwig*, 1891, p. 144, t. XIV, fig. 8 a, 8 b et t. XXI, fig. I.
 — *Pac.*: Ins. Fidji.
- vulgare Mich. — *Sph. cymbifolium.*
- Waghornei *Warnst. in Hedwig*, 1894, pp. 329 et 336.
 — *Am. sept.*: Terra nov.
- Wallisii *C. M. in Linn.* 1874, p. 573
 Ster. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.
- Warnstorffii *Rüss. in Sitzungsber. d. Dorpater Naturf. Gesells.* 1887, p. 315.
Sph. acutifolium var. gracile Rüss. Beitr.... p. 44.

- Sph. acutiforme var. tenellum Schlieph. et Warnst. p.p. in Fl. 1884 p.
 Sph. Wilsoni var. tenellum f. purpurea Roell in Fl. 1886.
2. — Eur.: Septentr. et med. Am. sept.: Labrador, Canada, Alaska, Terr. nov., ins. Miquelon, Minnesota, Montana, M. Rupestr., sept. occ.
- varr. auriculatum (Warnst.), fallax (Warnst. p.p.) fimbriatum (Warnst.), polyphyllum (Warnst.) et f. deflexa Roell. — Sph. Rüssowii.
- varr. pallens (Warnst.) et pseudo-patulum Roell. — Sph. quinquefarium.
- « var. purpurascens Rüss. mss.; Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 140.
 — Am. sept.: Vermont, Massachussets, New Hampshire.
- ff. squarrosa et teres Roell. — Sph. Rüssowii.
- « var. versicolor Rüss. mss.; Warnst. in op. et l. cc.
 — Am. sept.: Ubi praeced.
- « var. viride Rüss. mss.; Warnst. in op. et l. cc.
 — Am. sept.: Massachussets, Vermont.
- Warnstorffii Roell p.p. — Sph. Girgensohnii.
- Weberi Warnst. in Hedwig. 1890, p. 217, t. VIII, fig. 1, 2 et t. X, fig. 1.
 Ster. — Pac.: M. ins. Samoa.
- Weddelianum Besch. in hb. Mus. Paris; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 163, t. XVIII, fig. 28 a, 28 b, t. XIX, fig. 28 a et t. XXIV, fig. ii, kk.
 Sph. pseudo-rigidum Besch. l. c.
 — Am. merid.: Brasil. or. (Minas Geraës), Peruv.
- « var. fuscescens f. dasyclada Warnst. in op. cit. p. 164.
 — Am. merid.: Ut typ.
- « var. pallescens f. dasyclada subf. orthoclada Warnst. in op. et l. cc.
 — Am. merid.: Ubi typ.
- Wheeleri C. M. in Fl. 1887, p. 416.
 Ster. — Pac.: Ins. Hawai.
- Wilcoxii C. M. in op. cit. p. 407.
 Ster. — Pac.: Austral. or. (Nova Vales.).
- Wilsoni Roell p.p. — Sph. tenellum.
 var. roseum Limpr. — Sph. Rüssowii.
 var. tenellum f. purpurea Roell. — Sph. Warnstorffii.
- Whiteleggei C. M. in op. cit. p. 408; Warnst. in Hedwig. 1891, p. 154, t. XVII, fig. 22 a, 22 b, 22 c et t. XXIV, fig. aa, bb, cc.
 Sph. cymbifolium (fid. Warnst. in Bot. Gaz. 1890, p. 250).
 Sph. leionotum C. M. in Fl. l. c.
 Sph. trachynotum ej. in Helms M. Nov. Zeland. n. 44.
 Ster. — Pac.: Austral. or. (Nova Vales.).
- Wrightii C. M. in op. cit. p. 411.
 Sph. cymbifolium Sull. in Wright M. Cubens. n. 1.
 — Am. sept.: Cuba, Guadalup.
- Wulfianum Girgens. in Arch. Nat. Livon.-Esthon. und Kurland, 2^e ser., II, 1860, p. 178; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 838; Rüss. Beitr... p. 66; Lindb. Hvitm. p. 57.

Sph. cuspidatum var. *patens* Ångstr. mss.; Lindb. in *Oefv. Vet.*... 1862, p. 137.

Sph. pycnocladum Ångstr. in *Oefv. Vet.* 1862, p. 202; Rab. *Bryoth. eur.* n. 709.

1. In silvat. et pinetis humid. — *Eur.*: Lappon., Fennia, Livon., Esthon. *Am. sept.*: Canada, Maine, New Hampshire, New York, Wisconsin, Minnesota, Vancouver.

« var. *squarrosulum* Rüss. *Beitr.*... p. 66; W. P. Sch. in op. et l. cc. Ut typ. — *Eur.*: Scandin. merid. *Am. sept.*: Canada, New York.

« var. *versicolor* Warnst. in *Bot. Gaz.* 1890, p. 225. — *Am. sept.*: Vermont, New Hampshire.

« var. *viride* Warnst. in op. et l. cc. — *Am. sept.*: Massachussets, New Hampshire.

xerophilum Warnst. in *Hedwig.* 1897, p. 167.

In arena humid. — *Am. sept.*: Alabama.

SPIRIDENS Nees ab Esenb. in *Nov. Act.* XI, I, p. 143, t. 17.

aristifolius Mitt. *Sam. M.* p. 193.

S. Reinwardti Sull. in *U. St. Expl. Exped. Wilkes, M.* p. 25 (pro planta *Samoana*).

— *Pac.*: Ins. Fidji, Samoa.

Balfourianus Grev. in *Ann. and Magaz. of nat. Hist.* 1848, p. 326, t. 18; W. P. Sch. in *Mem. Akad. Dresde*, 1865, t. III, fig. b.

Neckera Balfouriana C. M. *Syn.* II, p. 121.

2. Ad *Filic.* arbor. — *Pac.*: Ins. Fidji, Societat., Morea, Taïti, Nov. Caledon.

capilliferus Mitt. op. cit. p. 194.

Ster. Ad arbor. — *Pac.*: Ins. Samoa.

flagellosus W. P. Sch. in op. cit. t. IV.

Sph. Reinwardti Sull. in op. cit. p. 26 p.p.

Ad arbor. — *Pac.*: Ins. Fidji, Samoa, Nov. Hebrid., Nov. Caledon.

longifolius Lindb. in *Cumming Pl. Philipp.* n. 2210 et in *Oefv.*... 1864, p. 600; W. P. Sch. in op. cit., t. III, fig. 1.

Sph. Reinwardti Mont. in *Hook. Lond. Journ. of bot.* IV, p. 10.

Fl. et fr. ign. — *As.*: Ins. Philippin.

Mülleri Hpe. in *Linn.* 1874, p. 665.

— *Pac.*: Ins. Lord Howe.

Reinwardti Nees in op. et l. cc.; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 280; *Bryol. jav.* II, p. 174, t. 194; W. P. Sch. in op. et l. cc., t. III, fig. r.

Neckera Reinwardti C. M. *Syn.* II, p. 120.

2. Lignic. — *As.*: Ins. Tidor, Java. *Pac.*: Nov. Guinea.

Reinwardti { Mont. — *Sp. longifolius*
 { Sull. } — *Sp. aristifolius*.
 { } — *Sp. flagellosus*.

setosus Mitt. — *Cyrtopus*.

Vieillardii W. P. Sch. in op. et l. cc., t. II.

2. — *Pac.*: Nov. Caledon.

Spiridentella C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 133 (sect. RHIZOGONI = Rh. Helmsii).

SPIRULA Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind. p. 62, t. 26.*
speciosa eor. — Schizomitrium.

SPLACHNOBRYUM C. M. in Verhandl. d. K.K. zool. bot. Gesellsch. in
 Wien, 1869, p. 501 (22 spec.).

aquaticum C. M. in Linn. 1876, p. 241.

Ster. Aquat. — Afr. : Somali.

atro-virens Besch. in Rev. bryol. 1891, p. 76.

Ster. — Am. sept. : Guadalup.

Baileyi Broth. in Bot. Centralbl. 1888, p. 85.

2. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

Bernouillii C. M. in Verhandl... p. 505.

2. — Am. sept. : Guatemala.

Boivini C. M. in Besch. Fl. bryol. de la Réunion, etc. p. 15.

Aquat. — Afr. : Ins. Nossi Be.

byssoides C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1891, p. 601 (nom.).

— As. : Birman. super.

erosulum C. M. in Dusen M. Camer. n. 437.

— Afr. : M. Cameroon.

flaccidum (Harv) C. M. in Linn. 1871-73, p. 175.

Didymodon flaccidus Mitt. in Hook. Journ. of bot. 1856, p. 353.

Pottia flaccida C. M. Syn. I, p. 548.

Weisia flaccida Harv. in Hook. Ic. pl. rar. t. 18, f. 3 et in Lond. Journ.
 of bot. 1840, II, p. 6.

Ad terr. humid. — As. : Nepal., penins. Malay.

gracile Besch. in Ann. sc. nat. VII ser., II, p. 89.

2. Terr. — Afr. : Ins. Mayotte.

indicum Hpe. et C. M. in Linn. 1871-73, p. 174.

— As. : Calcutta.

inundatum C. M. in Besch. op. et l. cc.

Fr. ign. Aquat. — Afr. : Ins. Nossi Be.

julaceum Besch. in Rev. bryol. l. c.

2. Terr. — Am. sept. : Guadalup.

laevidorsum Besch. in op. et l. cc.

Ster. Ad arbor. — Am. sept. : Guadalup.

Lorentzi C. M. in Linn. 1880-82, p. 355.

— Am. merid. : Argentin. temper.

Mariei Besch. in Rev. bryol. l. c.

2. Terr. — Am. sept. : Guadalup.

obtusum (Hook.) C. M. in Verhandl... p. 504.

Didymodon splachnifolius Hook. M. ex. p. 10, t. 126.

Dissodon rotundifolius C. M. Syn. I, p. 140.

Syrhophodon obtusus Schwaegr. Suppl. II, II, t. 182.

Weisia obtusa Brid. Bryol. univ. I, p. 358.

W. obtusifolia Rich. in Schwaegr. l. c. p. 106.

W. splachnifolia Mitt. M. austr. am. p. 141 (excl. planta Peruviana).

2. Terr. — Am. sept. : Dominic., Jamaic.

Oorschoti (Lac.) C. M. in Linn. 1876, p. 293.

Orthodontium Oorschoti Lac. Sp. nov. Archip. ind. p. 11.

2. Muric. — As. : Java.

Spruceanum C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 175.

Weisia splachnifolia Mitt. *M. austr. am.* p. 141 (*quoad pl. Peruvianam*).

Ad saxa irror. — *Am. merid.* : And. Peruv.

tenerum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 88.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Valdiviae C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 175.

Ster. — *Am. merid.* : Valdivia.

Wrightii C. M. in *Vorhandl.*... p. 505.

Entosthodon minimus Hunt in *Proced. litt. and phil. Soc. of Manchester*, XI, p. 9.

? *Dissodon rotundifolius* Sull. in *Wright. M. Cub.* n. 54.

2. Muric. et rupic. — *Eur.* : Hibernia. *Am. sept.* : Cuba.

Wulfschlaegelii C. M. in *op. cit.* p. 504.

2. Terr. — *Am. merid.* : Surinam.

SPLACHNUM Linn. Fl. Suec. (8 spec.).

Adansianum Hsch. — *Tetraplodon mnioides* var. *Adansianum*.

ampullaceum L. *Sp. Pl.* p. 1592 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 259 (*incl. v. β Turnerianum*) ; *Bryol. eur.* III (*mon.* p. 10), t. 294 ; *C. M. Syn.* I, p. 146 ; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 369.

Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo strictiore *Dill. Hist. M.* p. 342, t. 44, f. 3.

Spl. sagittaeifolium *With. Bot. arrang.* p. 791, t. 18, f. 2.

Spl. Turnerianum *Dicks. Fasc. Pl. crypt.* II, p. 3, t. 10, f. 11.

1 et 2. In turf., excrement. animal. herbiv. insidens. — *Eur.* : Tota zon. intermed. et septentr., e reg. campestr. usq. in montana super. *As.* : Septentr., Caucas. *Am. sept.* : Ins. Miquel., Terr. nov., New Brunswick, Nov. Scotia, Anticosti, reg. septr. occ., Nov. Anglia, New Jersey, Pensilv., Ohio, etc.

Ex. : *Mac. Canad. M.* n. 145.

Rab. Bryoth. eur. n. 43, 573.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 230.

Un. itin. crypt. 1864, n. 75, 76.

var. *Turnerianum* *Brid.* — *Spl. ampullaceum*.

angustatum L. f. — *Tetraplodon*.

arcticum R. Br. — *Tetraplodon mnioides*.

attenuatum *Brid.* — *Tayloria tenuis*.

bavaricum *Schrank.* — *Spl. sphaericum*.

Brewerianum *Hedw.* — *Tetraplodon mnioides* var. *Brewerianum*.

bryoides *Zoeg.* — *Tetraplodon mnioides*.

canescens P. B. — *Tetraplodon mnioides* var. *canescens*.

exsertum R. Br. — *Tetraplodon mnioides*.

fastigiatum *Dicks.* — *Tetraplodon mnioides* var. *fastigiatum*.

flagellare *Brid.* — *Tayloria serrata* var. *flagellaris*.

Froehlichianum { *Brid.* — *Oedipodium Griffithianum*.
 Hedw. — *Dissodon*.

gracile *Schwaëgr.* — *Spl. sphaericum*.

Griffithianum *With. et Hall.* — *Oedipodium*.

Gunnii *Wils. in Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 26, t. I b ; *C. M. Syn.* II, p. 552.

2 ? Ad *Filices* emort. — *Pac.* : Tasman.

- helveticum* Schleich. — *Tayloria serrata* var. *flagellaris*.
heterophyllum Drumm. — *Spl. vasculosum*.
intermedium Drumm. — *Spl. sphaericum*.
Juressi Schwaegr. — *Entosthodon Templetoni*.
ligulatum { Dicks. — *Dissodon splachnoides*.
 Hoffm. — *Tayloria tenuis*.
longicollum Schwaegr. *Suppl. II, II, p. 87, t. 178* (excl. syn. Dicks.);
 C. M. Syn. I, p. 148 (1).
 — *Afr.* : C. B. Sp.
longicollum Dicks. — *Tayloria tenuis*.
longisetum Schrank. — *Spl. sphaericum*.
luteum L. *Fl. Suec. p. 954*; *Brid. Bryol. univ. I, p. 260*; *Bryol. eur. III*
 (*mon. p. 12*), *t. 296*; *C. M. Syn. I, p. 147*; *W. P. Sch. Syn. II ed.*
 p. 371.
 Spl. luteum var. *melanocaulon* Wahlenb. in *Magaz. Ges. Naturf. Ber-*
 lin, 1811, p. 294, n. 1; *C. M. l. c.*
 Spl. luteum var. *pygmaeum* Norr. in *Notiss.... 1873, p. 300*.
 Spl. melanocaulon Schwaegr. *Suppl. II, p. 28, t. 109*; *Brid. op. cit.*
 p. 261.
 2. In uligin. silvat. zon. sept. — *Eur.* : Scandin., Fennia, Rossia sept.
 As. : Kamschatka, Obi, Jenissei med. *Am. sept.* : Reg. sept. occ.,
 M. Rupestr., Columb. brit.
 Exs. : Drumm. *M. bor. am. I ed. n. 33*.
 Rab. *Bryoth. eur. n. 728*.
 var. *melanocaulon* { *Brid. (M. M.). — Spl. luteum*.
 C. M. — Spl. luteum.
magellanicum Schwaegr. — *Dissodon*.
melanocaulon Schwaegr. — *Spl. luteum*.
nnioides Hedw. — *Tetraplodon nnioides*.
 var. *majus* H. et T. — *Tetraplodon nnioides* var. *Brewerianus*.
octoblepharum H. f. et W. — *Dissodon*.
 var. β eor. — *Dissodon plagiopus*.
ovatum { Hedw. — *Spl. sphaericum*.
 Schleich. — *Tayloria tenuis*.
paradoxum R. Br. — *Tetraplodon nnioides* var. *Adansonianus*.
pedunculatum Lindb. — *Spl. sphaericum*.
plagiopus Mont. — *Dissodon*.
propinquum R. Br. — *Tetraplodon nnioides*.
punctatum Brid. — *Dissodon Froehlichianus*.
purpurascens H. f. et W. — *Dissodon*.
purpureum With. — *Tayloria tenuis*.
pusillum P. B. — *Spl. sphaericum*.
refractum Brid. — *Spl. sphaericum*.
reticulatum Sw. — *Dissodon Froehlichianus*.
rubrum L. *Fl. Suec. p. 963*; *Brid. Bryol. univ. I, p. 262*; *Bryol. eur. III*
 (*mon. p. 11*), *t. 295*; *C. M. Syn. I, p. 146*; *W. P. Sch. Syn. II ed.*
 p. 370.
 Muscus norvegicus umbraculo ruberrimo insignitus Dill. *Hist. M. p. 547*,
 t. 83, f. 9.
 2. In uligin. silvat. zon. sept. — *Eur.* : Scandin., Fennia, Rossia sept.
 As. : « In omn. Sibiria vulg. » (fid. Weimann); Ochotsk, Jenissei
 med. *Am. sept.* : Maine, New Brunswick, M. Rupestr., reg. sept.
 occid.

(1) « Forsan *Entosthodon* » C. M. l. c.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* 1 ed. n. 32.

Rab. Bryoth. eur. n. 924.

rugosum Sm. — *Spl. vasculosum*.

sagittaeifolium With. — *Spl. ampullaceum*.

scabrisetum Hook. — *Dissodon*.

serratum { Hedw. — *Tayloria*.

{ Schwaegr. } — *Tayloria serrata* var. *flagellaris*.

{ } — *Tayloria tenuis*.

setaceum Mich. — *Tetraplodon angustatus*.

sphaericum L. *f. Meth. M. p.* 33, t. 1, f. 1; *Brid. Bryol. univ. I. p.* 256; *Bryol. eur. III (mon. p. 8), t.* 292; *C. M. Syn. I, p.* 144; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 368.

Bryum ampullaceum foliis serpylli pellucidis, collo crassiore *Dill. Hist. M. p.* 344, t. 44, f. 4.

Phascum pedunculatum *Huds. Fl. Angl. II ed., p.* 397.

Spl. bavaricum *Schrank*.

Spl. gracile *Schwaegr. Suppl. I, I, p.* 52, t. 15; *Brid. op. cit. p.* 254.

Spl. intermedium *Drumm. M. bor. am. I ed., n.* 39.

Spl. longisetum *Schrank Baiers. Fl. II, p.* 441.

Spl. ovatum *Hedw. Sp. M. p.* 43, t. 8; *Brid. op. cit. p.* 253.

Spl. pedunculatum *Lindb. M. scand. p.* 19.

Spl. pusillum *P. B. Prodr. p.* 89; *Brid. op. cit. p.* 257?

Spl. refractum *Brid. Sp. M. I, p.* 145.

Spl. viride *Vill. Pl. Dauph. p.* 861, t. 44.

2. In umbros. humid. stercore bov. hospes. — *Eur.* : Reg. subalp. zon. intermed., montana zon. sept. *As.* : *Jenissei. Am. sept.* : Labrador, Manitoba, *M. Rupestr.*, *Columb. brit.*, *Alaska*.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 35, 36.

Mac. Canad. M. n. 144.

Rab. Bryoth. eur. n. 124, 256, 814, 1387.

Un. itin. crypt. 1867, n. 78.

squarrosus Hook. — *Dissodon Isleanus*.

? *succulentum* *Brid.* — *Oedipodium Griffithianum*.

tenuis *Dicks.* — *Tayloria*.

var. *flagellare* *Roehl.* — *Tayloria serrata* var. *flagellaris*.

turbinatum *Brid.* — *Mielichhoferia Jamesoni*.

Turnerianum *Dicks.* — *Spl. ampullaceum*.

urceolatum *Hedw.* — *Tetraplodon urceolatum* var. *cavifolius*.

var. *minus* *Wahlenb.* — *Tetraplodon mnioides*.

vasculosum L. *Sp. Pl. II ed. p.* 1572; *Brid. Bryol. univ. I, p.* 257;

Bryol. eur. III (mon. p. 11), t. 294; *C. M. Syn. I, p.* 145; *W. P.*

Sch. Syn. II ed. p. 368.

Spl. heterophyllum *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 37.

Spl. vasculosum var. *acutifolium* *Grev. Scott. crypt. fl. t.* 311.

Spl. rugosum Sm. *Fl. brit. III, p.* 1173.

2. In uligin. et depress. zon. sept. usq. in Alp. — *Eur.* : *Spitzberg*, *ins. Ursorum*, *Scandin.*, *Scotia. As.* : *Jenissei inf. Am. sept.* : *Greenland*, *Labrador*, *fret. Smith*, *Sitka*; probab. *arctic. tota*.

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 34.

Rab. Bryoth. eur. n. 729, 1388.

Un. itin. crypt. 1867, n. 77.

var. *acutifolium* *Grev.* — *Spl. vasculosum*.

viride *Vill.* — *Spl. sphaericum*.

Wormskioldii *Hornem. Fl. Dan. t.* 1659; *Bryol. eur. III (mon. p. 7), t.* 291; *C. M. Syn. I, p.* 143; *W. P. Sch. Syn. II ed. p.* 365.

Aplodon Wormskioldii R. Br. *Vermisch. Schrift. I*, p. 442.

Eremodon Wormskioldii Brid. *Bryol. univ. I*, p. 237.

Tetraplodon Wormskioldii Lindb. *M. Scand.* p. 19.

1. In turfis. zon. sept. arct. et subarct. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ussor. Lappon., Norveg. (Dovre). *As.* : Jenissei infer. *Am. sept.* : Arctica, tota.

SPORLEDERA Hpe. in Linn. 1837, p. 279 (9 spec.).

Beyrichiana Hpe. in op. et l. cc.

Bruchia Beyrichiana C. M. *Syn. I*, p. 18; *Lesq. et Jam. Man.* p. 47.

Phascum Beyrichianum Schwaegr. *Suppl. IV*, p. 301.

1. — *Am. sept.* : New Jersey, Maryland, Illinois.

Drummondii Hpe. — *Bruchia flexuosa*.

Eckloniana Hpe mss.

Bruchia Eckloniana C. M. *Syn. I*, p. 19.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

flexuosa Hpe. — *Bruchia*.

Hampeana (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 25 (1).

Bruchia Hampeana C. M. *Syn. I*, p. 18.

Br. *Schwaegrichenii* Jaeg. *M. Cleistoc.* p. 36.

Phascum brevipes Schwaegr. *Suppl. IV*, p. 303 b.

1. — *Am. sept.* : Ludovic. *Am. merid.* : Chile.

Lindigiana Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser. III*, p. 338.

1. — *Am. merid.* : Nov. Granat.

minuta Mitt. in *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 223.

Bruchia minuta ej. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 65 et in *Fl. Tasm. II*, p. 165, t. 171, f. 4.

1. Terr. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

palustris Hpe. in op. l. cc.; W. P. Sch. *Coroll.* p. 6 et *Syn. II ed.* p. 27.

Astomum Hpe. in *Fl.* 1837, p. 285.

Bruchia palustris C. M. *Syn. I*, p. 19.

Phascum palustre Br. et Sch. in *Mem. Soc. Mus. Strasb. II*, p. 2, t. A (1835) et *Bryol. eur. I* (mon. p. 11), t. 7 (1837).

Ph. *uliginosum* Hüb. mss. in *Genth. Fl. Nassau*, p. 146.

Pleuridium alternifolium β *germanicum* Brid. *Bryol. univ. II*, p. 162.

Pl. *palustre* *Bryol. eur. I* (mon. p. 15), t. 10 (1850).

- I. In prat. uligin., turfis. zon. interm. et sept. — *Eur.* : Vall. Rhen. med., Suec. merid., etc. *Am. sept.* : Rar. : New Jersey, Ludovicia.

Ews : Drumm. *M. bor. am. II ed. n.* 8 (*Pleuridium*).

Rab. *Bryoth. eur. n.* 502, 596.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 40 (*Pleuridium*).

Ravenelii Jaeg. — *Bruchia*.

Rehmanni (C. M.) Par.

Bruchia Rehmanni C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

— *Afr.* : C. B. Sp.

setifolia Jaeg. — *Bruchia flexuosa* var. *microcarpa*.

subnervis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 337.

1. — *Am. sept.* : Nov. Granat.

(1) Cf. Dna E. G. Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1894, p. 370.

Whiteleggei (C. M.) Par.

Bruchia Whiteleggei C. M. in op. et l. cc.

1. — *Pac.* : Austral. or.

SPRUCEA Hook. f. et Wils. in sched. *M. Antarct.*
perichæticalis eor. — *Holomitrium*.

Squarridium C. M. in Linn. 1878-79, p. 422 (sect. METEORII).

STABLERIA Lindb. in *Utk. till. en nat....* p. 20.
gracilis Lindb. — *Orthodontium*.

Starkeella Kindb. *Check-list. of Eur. and N. Amer. M.* p. 23 (sect. EURHYNCHII sensu Kindb. = BRACHYTHECIUM).

STEGONIA Vent. in *Rev. bryol.* 1883, p. 96.
latifolia ej. — *Pottia*.

Stegotheca Mitt. *M. austr. am.* p. 220 (sect. SCHLOTHEIMIAE).

STENODESMUS Mitt. *M. austr. am.* p. 347 (sect. HOOKERIAE); *Jaeg. Ad II*,
p. 262 (gen. propr.).
tenuicuspis Jaeg. — *Hookeria*.

STENOCARPIDIUM C. M. in Hedwig. 1897, p. 144 (1 spec.).

Leucodon C. M. in op. et l. cc.

1. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. (Chaco).

STENODICTYON Mitt. op. cit. p. 348 (*id.*); *Jaeg. l. c. (id.)*.
nitidum Jaeg. — *Hookeria*.

STENOTHECIUM C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601 (*nom.*).
Spec. omn. LEPTOHYMENIA ejusd. nom.

Stephanostoma Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 307 (sect. ERPODII).

STEREODON (HYPNUM Brid. *Bryol. univ. II*, pp. 550 et 770) Mitt. *M.*
Ind. or. p. 92.

Spec. omn. non indicatae sunt HYPNA ejusd. nom.

abietinus Brid. — *Thuidium*.

abyssinicus Mitt. — *Cylindrothecium*.

acicularis Mitt. — *Ptychomnium*.

acutirameus Mitt. — *Sematophyllum*.

adnatus Brid. — *Amblystegium*.

β *laevigatus* Mitt. — *Amblystegium* ?

aduncus var. *longipes* Brid. — *H. aduncum*.

var. *revolvens* Brid. — *Hypnum revolvens*.

var. *sterilis* Brid. } — *Hypnum aduncum* ?

var. *tenuis* Brid. }

albescens Mitt. — *Isopterygium*.

alvirianus Brid. — *Rhynchostegium tenellum*.

alpicola Lindb. — *Pylaisia*.

angustatus Mitt. — *Camptochaete*.

angustifolius Mitt. — *Cylindrothecium*.

angustus Mitt. — *Symphyodon*.

asper Mitt. — *Symphyodon*.

assamicus Mitt. — *Isopterygium*.

Auberti Brid. — *Acrocladium*.

aureus Mitt. — *Cylindrothecium*.

auriculatus Mitt. — *Lembophyllum chlamyphyllum*.

- Barteri* Mitt. — *Leptohyemenium*.
Blandowii Brid. — *Thuidium*.
borbonicus Mitt. — *Trichosteleum*.
Braunii Mitt. — *Sematophyllum*.
brevirostris Mitt. — ? *Pylaisia*.
Buitenzorgii Mitt. — *Ectropothecium*.
caliginosus Mitt. — *Cylindrothecium*.
camurifolius Mitt. — *Pylaisia*.
canariensis Mitt. — *Pylaisia*.
caperatus Mitt. — *Pylaisia*.
capillaceus Mitt. — *Pylaisia*?
cavifolius Brid. — *Plagiothecium* Roëseanum.
cerviculatus Mitt. — *Rhaphidostegium*.
Chamissonis Brid. — *Ectropothecium*.
chryseus Mitt. — *Orthothecium*.
chrysophyllus var. *squarrosulus* Brid. — *Hypnum callichroum*.
circularis Mitt. — *Hypnum Bambergeri*.
clarescens Mitt. — *Microthamnium*.
cochlearifolius Mitt. — *Lembophyllum*.
comes Mitt. — *Cylindrothecium*.
compactus Mitt. — *Amblystegium*.
compressifolius Mitt. — *Ectropothecium*.
condensatus Mitt. — *Pylaisia*.
confertissimus Mitt. — *Rhaphidostegium*.
confervoides Brid. — *Amblystegium*.
contiguum Mitt. — *Rhaphidostegium*.
 var. *aduncoides* Brid. — *Hypnum aduncoides*.
 var. *chrysocomus* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *complanatus* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *compressus* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *compressum*.
 var. *conicus* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *corruscans* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *crispatissimus* Brid. } — *Hypnum fastigiatum*.
 } — *Hypnum hamulosum* (f. Br.).
 var. *decipiens* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *fragilis* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *hamulosus* Brid. — *Hypnum fastigiatum*.
 var. *julaceus* Brid. — *Hypnum Vaucheri* var. *julaceum*?
 var. *lacunosus* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *lacunosum*.
 var. *Lauri* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *Lauri*.
 var. *Leucanthemum* Brid. — *Hypnum*?
 var. *longisetus* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *longisetum*.
 var. *mammillatus* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *mammillatum*.
 var. *Mossmannianum* Mitt. — *Hypnum Mossmannianum*.
 var. *nigro-viridis* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *tectorum*.
 var. *plumosus* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *regularis* Brid. — *Ectropothecium*.
 var. *striatus* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *subjulaceus* Mitt. — *Hypnum cupressiforme* var. *subjulaceum*.
 var. *tectorum* Brid. — *Hypnum cupressiforme* var. *tectorum*.
 var. *tenuifolius* Brid. — *Hypnum cupressiforme*.
 var. *Vaucheri* Mitt. — *Hypnum Vaucheri*.

cupressiformis

- curvatus* Mitt. — *Cylindrothecium*.
curviculatus Mitt. — *Rhaphidostegium*.
curvirostris Mitt. — *Rhaphidostegium neckeraceum*.
cygnicollis Mitt. — *Ectropothecium*.
cyparoides Mitt. — *Rhaphidostegium leucocytus*.
cyperoides Mitt. — *Ectropothecium*.
decolor Mitt. — *Platygyrium brevifolium*.
deflexus Mitt. — *Camptochaete*.
denticulatus Brid. — *Plagiothecium*.
 var. *brunneus* Brid. — *Plagiothecium* ?
 var. *obtusifolius* Brid. — *Plagiothecium denticulatum* var. *obtusifolium*.
 var. *silvaticus* Brid. — *Plagiothecium* ?
diffusus Mitt. — *Ectropothecium*.
dimorphus Brid. — *Heterocladium*.
distichaceus Mitt. — *Isopterygium*.
Donianus Mitt. — *Plagiothecium denticulatum* var. *obtusifolium*.
echinatus Mitt. — *Symphyodon*.
enervis Lindb. — *Amblystegium*.
erinaceus Mitt. — *Symphyodon*.
erraticus Mitt. — *Symphyodon*.
extenuus Mitt. — *Pylaisia*.
Fabronia Mitt. — *Microthamnium*.
fastigiatus var. *Sauteri* Lindb. — *Hypnum Sauteri*.
filiformis Lindb. — *Hypnum cupressiforme* var. *filiforme*.
flavescens Mitt. — *Fabronia*.
 var. *aduncoides* Brid. — *Hypnum fluitans* var. *falcatum* ?
fluitans { var. *minor* Brid. — *Hypnum fluitans* var. *submersum* ?
 var. *nigricans* Brid. — *Hypnum fluitans* ?
 var. *scoparius* Brid. — *Hypnum fluitans* ?
 var. *Weiss.* — ?
fragilis Brid. — *Hypnum chrysophyllum*.
frondosus Mitt. — *Microthamnium*.
fruticellus Mitt. — *Microthamnium*.
fulvo-nitens Mitt. — *Cylindrothecium*.
Gardneri Mitt. — *Cylindrothecium myurum*.
gedeanus Mitt. — *Sematophyllum*.
geminus Mitt. — *Plagiothecium*.
glaucocarpus Mitt. — *Plagiothecium*.
glauco-virens Mitt. — *Chionostomum*.
gracilis Mitt. — *Camptochaete*.
gratus Brid. — *Thuidium*.
Griffithii Mitt. — *Cylindrothecium*.
Haldanei Lindb. — *Hypnum Haldanianum*.
Harveyanus Mitt. — *Rhaphidostegium curvirostre*.
himalayanus Mitt. — *Hylocomium*.
homalophyllum Mitt. — *Plagiothecium*.
humilis Mitt. — *Rhaphidostegium*.
ichnotocladus Mitt. — *Ectropothecium*.
incurvatus var. *Blyttii* Lindb. — *Hypnum Blyttii*.
inflexus Mitt. — *Platygyrium*.
intextus Brid. — *Hypnum palustre* var. *julaceum*.
intricatus Lindb. et Arn. — *Pylaisia*.
 var. *crassipes* eor. — *Pylaisia intricata* var. *crassipes*.
Ivoreanus Mitt. — *Isopterygium*.
Jolliffii Mitt. — *Rhaphidostegium*.
juliformis Mitt. — *Erythrodontium*.
Kneiffii Mitt. — *Hypnum aduncum* var. *Kneiffii*.
Lagurus Mitt. — *Lepyrodon*.

- lancifolius* Mitt. — *Sematophyllum*.
lapponicus Lindb. — *Orthothecium chryseum* f. *lapponica*.
latus Mitt. — *Cylindrothecium*.
Laureri Brid. — *Rhynchostegium* ?
laxus Brid. — ?
leiophyllus Mitt. — *Ectropothecium*.
leptocarpus Mitt. — *Rhaphidostegium*.
leptorhynchoides Mitt. — *Rhaphidostegium*.
leptorhynchus { Brid. — *Rhaphidostegium*.
 Mitt. — *Rhaphidostegium cyparioides*.
 var. *viridulus* Mitt. — *Ectropothecium* ? *viridulum*.
lignicola Mitt. — *Isopterygium*.
longithecum Mitt. — *Isopterygium*.
loxensis Brid. — *Rhaphidostegium*.
luridus Mitt. — *Cylindrothecium*.
Lyallii Mitt. — *Leucodon nitidus*.
macrocarpus Mitt. — *Hylocomium*.
mammillatus Lindb. — *Hypnum cupressiforme* var. *mammillatum*.
microphyllus Brid. { — *Pseudo-Leskea*.
 — *Thuidium varium*.
minutulus Brid. { — *Thuidium*.
 — *Thuidium eceremocarpum*.
 var. *acuminatus* Brid. — *Thuidium* ?
 var. *submuticus* Brid. — *Thuidium* ?
mnoides Brid. — *Rhizogonium*.
mollicellus Mitt. — *Ectropothecium*.
mollis Brid. — *Hypnum alpestre*.
 var. *heteromallus* Brid. — *Hypnum alpestre*.
muralis Brid. — *Rhynchostegium*.
 var. *abbreviatus*
 var. *elongatus*
 var. *hispanicus* { Brid. — *Rhynchostegium murale*.
 var. *spadiceus*
 var. *subcirrhosus*
neckeroides Mitt. — *Plagiothecium*.
neglectus Brid. — *Hypnum palustre* var. *julaceum*.
nemoralis Mitt. — *Plagiothecium silvaticum* var. *nemorale*.
nepalensis Mitt. — *Trichosteleum*.
nitens Brid. — *Camptothecium*.
nitidifolius Mitt. — *Plagiothecium*.
nitidulus Mitt. — *Plagiothecium*.
Novae Zelandiae Brid. — *Rhaphidostegium tenuirostre*.
obtusifolius Mitt. — *Rhynchostegium*.
obtusus Lindb. et Arn. — *Pylaisia*.
orientalis Mitt. — *Eurhynchium*.
orthothecius Mitt. — *Pylaisia secunda*.
paleaceus Mitt. — *Plagiothecium*.
pallescens { var. *perichætiale* Mitt. — *Hypnum pallescens* var. *subjula-*
 ceum.
 var. *protuberans* Mitt. — *Hypnum pallescens* var. *protuberans*.
pallidisetus Brid. — *Rhaphidostegium caespitosum*.
pallidulus Mitt. — *Isopterygium*.
palustris { var. *aquatilis* Brid. — *Hypnum palustre*.
 var. *ferrugineus* Brid. — *Hypnum*.
papillatus Mitt. — *Trichosteleum*.
papillosus Mitt. — *Trichosteleum*.
penicillatus Mitt. — *Eurhynchium*.
Perrottetii Mitt. — *Symphyodon*.

- pilosulus* Mitt. — *Leptohymerium*.
pinetorum Mitt. — *Rozea pterogonioides*.
planus Mitt. — *Taxithelium*.
planulus Mitt. — *Symphyodon*.
plicatus { Brid. — *Ptychodium*.
 } Mitt. — *Cylindrothecium*.
plumifer Mitt. — *Hypnum subimponens*.
polyanthos Mitt. — *Pylaisia*.
 var. *brevifolius* Mitt. et A. — *Pylaisia polyantha* var. *brevifolia*.
 var. *heteromallus* eor. — *Pylaisia polyantha* var. *heteromalla*.
 var. *homomallus* eor. — *Pylaisia polyantha* var. *homomalla*.
 var. *longicuspis* eor. — *Pylaisia polyantha* var. *longicuspis*.
 var. *subjulaceus* eor. — *Pylaisia polyantha* var. *subjulacea*.
polymorphus Mitt. — *Hypnum Elodes*.
praecox Brid. — *Eurynchium strigosum* var. *praecox*.
praemollis Mitt. — *Oedocladium rufescens*.
propinquus Mitt. — *Rhaphidostegium*.
prorepens Mitt. — *Cylindrothecium*.
protuberans Brid. — *Hypnum pallescens* var. *protuberans*.
pseudo-striatus Mitt. — *Eurynchium*.
Psilurus Mitt. — *Leptohymerium*.
pulchellus Mitt. — *Cylindrothecium*.
punctulatus Mitt. — *Trichosteleum*.
radicalis Brid. — *Amblystegium*.
recurvans Brid. — *Hypnum pallescens*.
 var. *squarrosus* Brid. — *Hypnum*?
reptile Mitt. — *Hypnum pallescens*.
reticulatus Mitt. — *Ectropothecium*.
revolutus Mitt. — *Hypnum Heufleri*.
riparius Mitt. — *Amblystegium*.
rostellatus Mitt. — *Ectropothecium*.
rostratus Mitt. — *Chionostomum*.
rubellus Mitt. — *Orthothecium strictum*.
rubicundus Mitt. — *Cylindrothecium*.
ruderalis Brid. — *Stereophyllum*.
 var. *tenellus* Brid. — *Stereophyllum*?
rufescens Mitt. — *Orthothecium*.
russulus Mitt. — *Platygyrium*.
scaturigineus Mitt. — *Ectropothecium*.
Schwaegrichenii Mitt. — *Cylindrothecium flavescens*.
scitus Brid. — *Thuidium*.
sciuroides Mitt. — *Cladomnium*.
serpens Brid. — *Amblystegium*.
 var. *aurantiacus* Brid. — *Amblystegium serpens*.
 var. *brachyclados* }
 var. *byssoides* } Brid. — *Amblystegium*?
 var. *clavatus* }
 var. *contextus* Brid. — *Amblystegium serpens*.
 var. *crassinervius* Brid. — *Amblystegium*?
 var. *crispabilis* }
 var. *cylindricus* } Brid. — *Amblystegium serpens*.
 var. *excentricus* }
 var. *falciformis* Brid. — *Amblystegium*?
 var. *macrocarpus* Brid. — *Amblystegium serpens*.
 var. *patentissimus* }
 var. *pensilvanicus* } Brid. — *Amblystegium*?
 var. *repens* }
 var. *spinulosus* } Brid. — *Amblystegium serpens*.

- var. *subtilis* Brid. — *Amblystegium*
 var. *tenuis* Brid. — *Amblystegium serpens* var. *tenuis*.
 var. *viridis* Brid. — *Amblystegium serpens*.
serrula Mitt. — *Microthamnium*?
silesiacus Brid. — *Plagiothecium*.
silvaticus Brid. — *Plagiothecium*.
simlaënsis Mitt. — *Pylaisia*.
speciosus Mitt. — *Pylaisia*.
spiniformis Brid. — *Rhizogonium*.
Starkii Brid. — *Brachythecium*.
 var. *tenellus* Brid. — *Brachythecium velutinum*.
stissophyllum Mitt. — *Trichosteleum*.
stellatus { var. *hispidulus* Brid. — *Hypnum hispidulum*.
 var. *polymorphus* Brid. — *Hypnum Sommerfeldti*.
 var. *protensus* Brid. — *Hypnum stellatum* var. *protensum*.
 var. *Terrae Novae* Brid. — *Hypnum sarmentosum*.
subbasilaris Brid. — *Rhizogonium*.
subhumilis Mitt. — *Rhaphidostegium*.
subrectifolius Brid. — *Hypnum molluscum*.
subrufulus Lindb. — *Orthothecium intricatum*.
subsphaericarpos Brid. — *Hypnum palustre* var. *subsphaericarpos*.
succosus Mitt. — *Ectropothecium*.
suecicus Lindb. — *Thedenia*.
taxirameus Mitt. — *Isopterygium*.
tectorum Brid. — *Pseudo-Leskea*.
tenuirameus Mitt. — *Pylaisia tenella*.
tenuirostris Brid. — *Rhaphidostegium*.
tenuis Mitt. — *Leptohymenium*.
Terrae novae Brid. — *Hypnum imponens*.
Thomsoni Mitt. — *Cylindrothecium*.
tristichus Mitt. — *Rhaphidostegium*.
tuberculatus Mitt. — *Ectropothecium*.
turfaceus Mitt. — *Plagiothecium*.
turgidus Mitt. — *Sematophyllum*.
uncinatus var. *bicolor* Brid. — *Hypnum uncinatum*.
undulatus Mitt. — *Plagiothecium*.
varius Brid. — *Amblystegium radicale*.
venustus Mitt. — *Chaetomitrium leptopoma*.
virginianus Brid. — *Thuidium gracile* var. *lancastriense*.

STEREOPHYLLUM Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859 (48 spec.).

- affixum* C. M. in Bull. hb. Boissier, p. 217.
 1. — Am. sept. : Guatemala.
aptychopsis C. M. in Hedwig. 1897, p. 130.
 1. — Am. merid. : Argentin. subtropic. (Chaco).
Bassaeum C. M. in Dusen M. Camer. n. 7.
 — Afr. : M. Cameroon.
brevipes (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 542.
Euglossophyllum brevipes Hpe. Symb. 1870, p. 277.
Glossophyllum brevipes ej. Enum. M. Brasil. p. 60.
Hypnum brevipes C. M. Syn. II, p. 232.
 1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
Büttneri Broth. — St. rivulare.

chlorophyllum (*Hsch.*) *Mitt. op. cit. p. 544 p.p.*

Hypnum chlorophyllum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 89; C. M. Syn. II, p. 261; p.p. (quoad pl. Brasil.).

Pilosium chlorophyllum C. M. in Fl. 1897, p. 340.

2. — *Am. merid. : Brasil. or.*

chlorophyllum *Mitt.* { (*quoad pl. Crüger.*). — *St. Crügerianum.*
{ (*quoad pl. Sprucean.*). { — *St. pseudo-radiculosum.*
— *St. subchlorophyllum.*

combianse Besch. in Ann. sc. nat. VII ser., II, p. 97.

1. — *Afr. : Ins. Mayotte.*

contorte-operculatum (C. M.) Mitt. op. cit. p. 543.

Hypnum contorte-operculatum C. M. Syn. II, p. 682.

1. — *Am. sept. : Costa Rica.*

Crügerianum (C. M.) Par.

Hypnum chlorophyllum C. M. Syn. II, p. 261 p.p.

Pilosium Crügerianum C. M. in Fl. 1897, p. 340.

St. chlorophyllum Mitt. op. et l. cc.

— *Am. merid. : Ins. Trinitat.*

cubense Mitt. op. cit. p. 544.

1. *Cortic. — Am. sept. : Cuba.*

cultelliforme (Sull.) Mitt. op. et l. cc.

Hypnum cultelliforme Sull. in Proced. of the Am. Acad.... 1861, p. 289.

1. *Ad rup. umbr. — Am. sept. : Cuba. Am. merid. : And. Peruv.*

emodicolum (C. M.) Par.

Euglossophyllum emodicolum C. M. in sched.

— *As. : Himalaya sept. occ.*

enerve Besch. — Rhaphidostegium.

flaccisetum (C. M.) Par.

Pilosium flaccisetum C. M. in Fl. 1897, p. 339.

— *Am. merid. : Guian.*

flavo-brunneum C. M. in Dusen M. Camer. n. 50.

— *Afr. : M. Cameroon.*

fuegianum Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1885, p. 67 (syn. excl.) et in Miss. sc. Cap Horn, V, Bot. p. 302, t. 5, f. 19.

Ster. — Am. merid. : Fuegia.

fulvum (Harv.) Par.

Hypnum fulvum C. M. Syn. II, p. 353.

Leskea fulva Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 16 et in Hook. Ic. pl. rar. t. 23, f. 2.

Ster. ? — As. : Nepal., Himalaya.

gracile (Hpe.) Par.

Glossophyllum gracile Hpe. Enum. M. Brasil p. 60.

1. — *Am. merid. : Brasil. or.*

guarapense Besch. Not. M. Paraguay, p. 269.

Hypnum turgidicaule C. M. in Rev. bryol. 1887, p. 57 et in Bal. M. Parag. n. 3680.

1. — *Am. merid. : Paraguay.*

homalioides *Besch. in Journ. de bot.* 1891, p. 348.

Homalia paraguensis *ej. in Rev. bryol.* 1885, p. 18 et in *Bal. M. Parag.* n. 3680 a.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.

indicum (*Bel.*) *Mitt. M. Ind. or.* p. 117.

Hookeria obtusifolia *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 15 et in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 24, f. 11.

Hypnum indicum *C. M. Syn. II*, p. 232.

Pterygophyllum indicum *Belang. Voy. Ind. or., Crypt.* p. 87, t. 9, f. 2.

2. Terr. ? et cortic. — *As.* : Nepal, Carnate.

jamaïcense *C. M. in Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 565.

1. — *Am. sept.* : Jamaic.

laetevirens *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 110.

1. — *Afr.* : Usambara.

leptopes *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 67.

— *Afr.* : M. Cameroon.

leptostegium (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 776.

Complanato-Hypnum leptostegium *Hpe. Symb.* p. 732.

Glossophyllum leptostegium *ej. in Enum. M. Brasil* p. 61.

1. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

lepturum *Mitt.* — *Brachythecium*.

leucostegum (*Brid.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 543.

Hypnum flavo-nitens *C. M. in Bot. Zeit.* 1844, p. 742.

H. Gardnerianum *ej. in op. et l. cc.*

H. leucostegum *ej. Syn. II*, p. 344.

H. saxatile *H. f. et W. in Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 164; *C. M. op. et l. cc. fid. Mitt.*

H. subflavum *eor. in Lond. Journ. of bot. et in Gardner M. Brasil. n.* 121.

Leskea leucostega *Brid. Bryol. univ. II*, p. 333.

St. saxatile *Jaeg. Ad. II*, p. 543.

1. Cortic., lignic. et rupic. — *Am. sept.* : Cuba, ins. Porto-Rico.

Am. merid. : Amazon., Brasil. or.

ligulatum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 541.

Hypnum ligulatum *C. M. in Bot. Zeit.* 1856, p. 438.

1. — *As.* : Bombay.

limnobioides *Ren. in Rev. fr. de bot.* 1891, p. , in *Bull. Soc. roy. bot.*

Belg. 1893, I, p. 126 et *M. Masc. Mad. n.* 93.

1. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.

longisetulum (*C. M.*) *Par.*

Pilosium longisetulum *C. M. in Fl.* 1897, p. 340 (*nom.*).

— *Am. sept.* : Guatemala.

medium *Besch. in Rev. bryol.* 1878, p. 58 (*nom.*).

— *Am. merid.* : Paraguay.

microstegum *Jaeg.* — *St. tavoyense*.

Mohandiae (*C. M.*) *Par.*

Englossophyllum Mohandiae *C. M. mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

nitens *Mitt. in M. herb. Hook.*, 1860, p. 51, t. 5, f. 3.

1. Lignic. — *Afr.* : Ins. Fernando-Po.

obtusum *Mitt. M. austr. am.* p. 542.

1. — *Am. merid.* : And. Peruv., Brasil. tropic.

odontocalyx (*C. M.*) *Jaeg. op. et l. cc.*

Hookeria radiculosa *Hsch. in Drege M. Capens.*

Hypnum odontocalyx *C. M. Syn. II*, p. 232.

1. — *Afr.* : C. B. Sp.

omalosekos (*Welw. et Duby*) *Jaeg. op. et l. cc.*

Hypnum omalosekos *W. et Dy. in Mém. Soc... Genève*, 1871, p. 9, t. 4, f. 3.

1. Cortic. — *Afr.* : Angola.

papilliferum *Mitt. op. cit.* p. 544.

1. — *Am. merid.* : Guayaquil.

paraguense *Besch. Not. M. Parag.* p. 268.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Paraguay.

parvifolium *Jaeg.* — *Thuidium involvens*

peruvianum (*Mont.*) *Mitt. op. cit.* p. 542.

Hypnum peruvianum *Mont. in Voy. Bonite, Crypt.*, t. 150, f. 2 et *Syll.* p. 6; *C. M. Syn. II*, p. 244.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Guayaquil.

pseudo-radiculosum (*C. M.*) *Par.*

Pilosium pseudo-radiculosum *C. M. in Fl.* 1897, p. 340 (*nom.*).

St. chlorophyllum *Mitt. op. et l. cc. p.p. et in Spruce M. Amaz. n.* 1321.

— *Am. merid.* : Amazon.

pycnoblastum *C. M. in Bull. hb. Boissier.* 1897, p. 217.

— *Am. sept.* : Guatemala.

radiculosulum (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 541.

Hypnum radiculosulum *C. M. in Linn.* 1876, p. 650.

— *Am. sept.* : Mexic.

radiculosum (*Hook.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 542.

Hookeria radiculosa *Hook. M. ex. t.* 51.

Hypnum radiculosum *C. M. Syn. II*, p. 231.

Pterygophyllum radiculosum *Brid. Bryol. univ. II*, p. 346.

1. Cortic. et saxic. — *Am. sept.* : Jamaic. *Am. merid.* : Venezuela, And. Peruv., Brasil. trop.

rhamphostegium (*Hpe.*) *Par.*

Euglossophyllum radiculosum *Hpe. Symb.* p. 277.

Glossophyllum rhamphostegium *ej. Enum. M. Brasil.* p. 59.

Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

rigescens *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 211.

1. Cortic. — *Afr.* : Usambara.

rigulare *Mitt. in M. herb. Hook.*, 1860, p. 52, t. 5, f. 4.

St. Büttneri *Broth. in Mittheil. aus den deutsch. Schutzgeb. VI, III*, p. 5.

Ster. Ad rup. et terr. — *Afr.* : Niger, Togo.

ruderae (*Brid.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 543.

Hypnum ruderae *C. M. Syn. II*, p. 352.

H. Stereodon ruderalis *Brid. Bryol. univ. II*, p. 585.

H. viridulum *ej. Sp. M.* p. 181.

1. — *Am. sept.* : Hispaniola.

rufescens *Broth. in op. cit.* p. 210.

1. — *Afr.* : Reg. lacustr.

subchlorophyllum (C. M.) Par.

Pilosium subchlorophyllum C. M. in *Fl.* 1887, p. 340 (nom.).

St. chlorophyllum Mitt. op. et l. cc. p. p et in *Spruce M. And.* n. 1318.

— *Am. merid.* : And. Peruv.

saxatile Jaeg. — St. leucostegum.

seminerve Mitt. — Helicodontium.

tavoyense (Hook.) Jaeg. *Ad.* II, p. 543.

Hookeria prostrata Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 15 et in *Hook. Ic. pl. rar.* t. 20, f. 5.

Hypnum tavoyense Hook. in *Wall. Cat.* n. 7655; Harv. in op. cc. p. 19 et t. 24, f. I; C. M. *Syn.* II, p. 245.

H. prostratum C. M. *Syn.* II, p. 345.

St. microstegum Jaeg. op. et l. cc.

! ? Cortic. — As. : Penins. Malay.

Wrightii (Mitt.) Jaeg. op. et l. cc.

Hypnum Wrightii Mitt. *M. Ind. or.* p. 82.

! — As. : Khasia, Himalaya, Madras (1).

Stokesiella Kindb. *Check-list. of Eur. and N. Amer. M.* p. 22 (sect. EURHYNCHII).

STREBLOPIUM Ångstr. in *Oefv...* 1876, n. 4, p. 18.

Regnellii ej. — Brachymenium.

STREBLOTRICHUM P. B. *Prodr.* p. 89.

Spec. omn. BARBULAE ejusd. nom.

STREPHEDIUM P. B. *Prodr.* p. 89.

Spec. omn. FUNARIAE ejusd. nom.

STREPTOCALYPTA C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 354 (1 spec.).

Lorentzi C. M. in op. et l. cc.

Syn. — *Am. merid.* : Uruguay.

STREPTOPOGON Wils. mss. ; Mitt. in *Lond. Journ. of bot.* 1851, p. 51 (22 spec.).

australis Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1877, p. 66.

Williae spec. ? C. M. in *Forschungsreise...* Bot. p. 45.

Ster. — Afr. : Ins. Kerguelen, Marion.

bolivianus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 49.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

calymperifolius C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 207.

Ster. — Afr. : Madagascar.

cavifolius Mitt. *M. austr. am.* p. 180.

Ster. Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

clavipes Spr. in Mitt. op. cit. p. 178

! — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

(1) In Enum. Kindb. nom. nuda :

St. lato-acutum C. M.

| St. peracutum C. M.

crispatulus (C. M.) Par.

Barbula crispatula C. M. in *Hedwig*. 1897, p. 104.

Ster. — *Am. merid.* : Patagonia.

crispatus (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 670.

Barbula crispata Hpe. in *Linn.* 1876, p. 304.

Cortic. — *Pac.* : Austral. or., Tasman.

erythrodontus (Tayl.) Mitt. *op. et l. cc.*

Barbula erythrodonta Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 50, t. XV F ;

C. M. Syn. I, p. 606 et *II*, p. 630.

1. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Quitens. *Pac.* : Ins. Sandwic. (*fid. Sull.*).

gemmascens Mitt. — *Didymodon flexifolius* β *gemmigerus*.

Hampeanus Besch. in *litt.*

Calymperes Lindigii Hpe. in *Ann. sc. nat. V*, ser. III, p. 342 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 127.

Ad arbor. — *Am. merid.* : Nov. Granata.

Hildebrandti C. M. in *Hildebr. M. Mad. n.* 2095.

— *Afr.* : Madagascar.

latifolius Mitt. *op. cit.* p. 179.

2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

marginatus (Hook. f. et Wils.) Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 72.

Pharomitrium marginatum Jaeg. *Ad. I*, p. 189.

Schistidium marginatum Hook. et Wils. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 539 et *Fl. antarct. II*, p. 399, t. 151, f. 6 ; *C. M. Syn. I*, p. 566 et *II*, p. 624.

1 ? — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

maveganensis Besch. in *Marie M. Mad. n.* 269.

— *Afr.* : Ins. Mayotte.

? *mayottensis* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1885, *II*, p. 88.

♀ et fr. ign. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

mnioides (Schwaegr.) Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 78.

Barbula mnioides Schwaegr. *Suppl. IV*, p. 310 ; *C. M. Syn. I*, p. 632.

Tortula mnioides Hook. f. *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 420.

2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens., Chile, Valdiv. *Pac.* : Nov. Zeland. sept., Tasman.

« *var. prostrata* (Mont.) Par.

Barbula prostrata Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 157 ; *Fl. Chil. VII*, p. 148 et *Syll.* p. 40.

Tortula prostrata Mitt. *M. austr. am.* p. 172.

Ut et cum typ.

Parkeri Mitt. *mss.* ; C. H. Wright *M. Mad. p.* 4 (*nom.*).

— *Afr.* : Madagasc. centr.

Rutenbergii C. M. in *Abhandl. Brem. VII*, p. 207.

1. — *Afr.* : Madagascar.

Schenckii Broth. in *Hedwig*. 1894, p. 128.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

setiferus Mitt. *M. austr. am.* p. 180.

1. Filicic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Wilhelmii (C. M.) Par.

Barbula Wilhelmii C. M. in Hedwig. 1897, p. 104 (nom).

Cortic. — Pac. : Austral, or. (Victoria), Tasman.

Strigodium C. M. Syn. II, p. 434 (subsect. HYPNI sens. Müller.).

STRUCKIA C. M. in Rev. bryol 1893, p. 94 et in Archiv. var. fr. Naturges. Mecklenbourg, 1893 (4 spec.).

argentata (Mitt.) C. M. ll. cc.

Hypnum argentatum Mitt. M. Ind. or. p. 77 p.p.

— As. : Himalaya sept. occid.

argyreola C. M. ll. cc.

Maschalocarpus argentatus Hpe. in sched.

— As. : Sikkim.

Griffithii C. M. ll. cc.

— As. : Assam.

pallescent C. M. ll. cc.

Hypnum argentatum Mitt. M. Ind. or. p.p.

— As. : Himalaya bor. occid.

STYLOSTEGIUM Bryol. eur. II (1 spec.).

caespitium (Schwaegr.) Bryol. eur. II, t. 113; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 130.

Anoetangium caespitium Schwaegr. in Schrad. Neu Journ. bot. IV, p. 13, t. 2 A.

Blindia caespiticia Lindb. M. Scand. p. 25.

Bl. Stylostegium C. M. Syn. I, p. 345 et II, p. 584.

Gymnostomum caespitium W. et M. Bot. Taschb. pp. 77 et 452.

G. subulatum Bryol. germ. I, p. 147, t. 10 ? Brid. Bryol. univ. I, p. 104.

Schistidium caespitium Brid. Bryol. univ. I, p. 119.

1 et 2. Ad rupes humid. — Eur. : Summ. Alp. Scot., Scandin., Helvet., Rhaet., Salzburg.

Ews. : Rab. Bryoth. eur. n. 426.

SWARTZIA Hedw. M. frond. II, p. 72, t. 27, f. 7.

capillacea Hedw. — Distichium.

cernua Poir. — Bryum pendulum.

inclinata Hedw. — Distichium.

pilifera Brid. — Desmatodon latifolius.

pusilla Ehrh. — Seligeria.

radiculosa Hedw. f. — Bryum pendulum.

trifaria Hedw. — Didymodon luridus.

SYMBLEPHARIS Mont. in Ann. sc. nat. 1837, p. 252 (16 spec.).

asiatica Besch. in Ann. sc. nat. I, p. 50.

1. In silv. — As. : Alp. Yunnan.

boliviana C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 39.

S. Lindigii W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1656.

— Am. merid. : And. Boliv.

brevisetula Wils. — Dichodontium Reinwardti.

Chrismari *C. M. Syn. II*, p. 614.

1. Lignic. — *Am. sept.* : Mexic.

? circinnata *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 20.

Fr. ign. — *Afr.* : Comor. magna, ins. Borbon.

cirrifolia *Lindb. in Ångstr. Prim. lin.* p. 5 (nom.).

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

densifolia *Wils.* — *Holomitrium Griffithianum*.

dilatata *Wils. p.p.* } — *Dichodontium Hookeri*.
— *Dichodontium Reinwardti*.

fragilis *Mitt. M. austr. am.* p. 49.

1. — *Am. merid.* : And. Quitens.

helicophylla *Mont. in Ann. sc. nat. 1837, XVIII, p. 252 et Syll. p. 46*;

C. M. Syn. I, p. 461.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

himalayana *Mitt. mss.*

— *As.* : Himalaya.

Hookeri *Wils.* — *Dichodontium*.

jamaicensis *C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 555.*

2. — *Am. sept.* : Jamaic.

Lindigii *Hpe. in Linn.* 1863, p. 136.

1. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Lindigii *W. P. Sch.* — *S. boliviana*.

microtheca *C. M. in hb. Saharampur, n. 5203.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

Erstedtiana *C. M. Syn. II*, p. 613.

S. helicophylla (fid. *Mitt. M. austr. am.* p. 48).

2. — *Am. sept.* : And. Costa-Ric. *Am. merid.* : And.

Quitens.

perichæticalis *Wils.* — *Holomitrium*.

pumila *Hook.* — *Holomitrium*.

pusilla *Hpe. mss.; Jaeg. Ad. II*, p. 636.

— *As.* : Ind. or. (sine loc. spec.).

Reinwardti *Bryol. jav.* — *Dichodontium*.

socotrana *Mitt. in Trans. of the roy. Soc. of Edinb. 1887, p. 331.*

2. — *Afr.* : Ins. Socotora.

tenuis *W. P. Sch. mss.*

— *As.* : Simla.

usambarica *Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1894, p. 179.*

— *Afr.* : Usambara.

SYMPHYODON *Mont. in Ann. sc. nat. 1841, p. 279, c. ic. (8 spec.).*

angustus (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 362.

Neckera angusta *C. M. Syn. II*, p. 67.

Stereodon angustus *Mitt. M. Ind. or.* p. 110.

2. — *As.* : Bombay.

asper (*Mitt.*) *Jaeg. op. et l. cc.*

Stereodon asper *Mitt. op. et l. cc.*

2? — *As.* : Khasia.

echinatus (Mitt.) Jaeg. op. et l. cc.

Stereodon echinatus Mitt. op. et l. cc.

2. — As. : Sikkim.

erinaceus (Mitt.) Jaeg. op. et l. cc.

Stereodon erinaceus Mitt. op. et l. cc.

2. — As. : Khasia.

erraticus (Mitt.) Jaeg. op. et l. cc.

Stereodon erraticus Mitt. op. cit. p. 111.

Ster. — As. : Nepal., Sikkim, Ceylan.

Perrottetii Mont. in Ann. sc. nat. 1841, p. 279, t. 17 (quoad perist. errone.)
et Syll. p. 21.

Neckera Perrottetii C. M. Syn. II, pp. 72 et 665.

Stereodon Perrottetii Mitt. M. Ind. or. p. 110.

2. Cortic. — As. : M. Neilgherr., Ceylan, Java, ins. Ceram, Halmaheira.

planulus (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 362.

Stereodon planulus Mitt. M. Ind. or. p. 111.

— As. : Himalaya or., Khasia.

scabrisetus Hpe. in sched. ; Jaeg. op. et l. cc.

— As. : Sikkim.

SYMPHYSODON Dz. et Mk. M. frond. Archip. ind. p. 88.

Spec. omn. PTEROBRYA ejusd. nom.

SYNTRICHIA Web. et Mohr Bot. Taschb. p. 214, t. 8, f. 4-5.

Spec. omn. non indicatae sunt BARBULAE ejusd. nom.

alpina Brid. — *Barbula subulata*.

ericetorum Brid. — *Barbula unguiculata* var. *patagonica*.

hyperborea Brid. — *Barbula mucronifolia* var. *arctica*.

laevipila { var. *mutica* Schultz. — *B. latifolia*.

{ var. Ahnf. — *B. papillosa*.

montana Nees { (fid. C. M.) — *B. laevipila*.

{ (fid. Lindb.) — *B. intermedia*.

mucronifolia R. Br. — *B. mucronifolia* var. *arctica*.

norvegica W. et M. — *B. aciphylla*.

var. *alpina* Wahlenb. — *B. aciphylla*.

{ H. f. et W. — *B. cuspidata*.

princeps { Mitt. { (M. Ind. or.) — *B. Mülleri*.

{ (Jourñ. Linn. Soc.) — *B. antarctica*.

{ — *B. rubella*.

ruralis { var. *laevipila* Spreng. — *B. laevipila*.

{ var. *latifolia* Br. — *B. latifolia*.

subulata { var. *inermis* Brid. — *B. inermis*.

{ var. *macrocarpa* Brid. — *B. subulata*?

tenera P. B. — ? Deleatur.

SYRIGOTHECIUM Mitt. M. austr. am. p. 497 (1 spec.).

Sprucei Mitt. op. et l. cc.

1. — Am. merid. : And. Quitens.

Syrrhodictyon C. M. in Linn. 1830-83, p. 397 (sect. DICRANI, nom.).

SYRRHOPODON Schwaegr. Suppl. II, II, p. 110 (215 spec.).

acanthoneuros C. M. — *S. prolifer* var. *acanthoneuros*.

aculeo-serratus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 61.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

adpressus Broth. in *Micholitz M. Nov. Guin* n. 135.

— Pac. : Nov. Guinea.

africanus (Mitt.) Besch. *Ann. sc. nat.* 1895-96, I, p.

Calymperes africanum Par. *Index*, p. 227.

Thyridium africanum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 303.

Ster. — Afr. : M. Usagara.

afro-ciliatus C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 66.

— Afr. : M. Cameroon.

afro-tristichus C. M. l. c. n. 155.

— Afr. : M. Cameroon.

alabamensis Lesq. et W. P. Sch. in *Jaeg, Ad.* II, p. 677.

S. texanus Sull. p.p.

— Am. sept. : Alabama.

albidus Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1878, p. 298.

Ster. — As. : Ceylan.

albo-vaginatus Schwaegr. Suppl. II, II, p. 112, t. 131 ; C. M. Syn. I, p. 541 ; *Bryol. jav.* I, p. 60.

Calymperes albo-vaginatum W. Arn. *Disp. M.* p. 14.

Cleistostoma albo-vaginatum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 156.

2. — As. : Ins. Rauwack Molucc. Pac. : Ins. Fidji,

Samoa, Admiral., Nov. Caled. (ins. Pinorum).

albo-vaginatus { Besch. — *S. Sartorii*.

{ H. f. et W. — *S. floridanus*.

Andamaniae C. M. mss.

— As. : Ins. Andaman.

andamensis (C. M.) Par.

Calymperes andamense C. M. in *hb. Hpe.* n. 2545.

Thyridium andamense Besch. in *Ann. sc. nat.* 1895-1896, p. 277.

— As. : Ins. Andaman.

andamensis Hpe. — *Calymperes*.

androgynus Besch. — *S. rigidus*.

anomalus Broth. in *Bihang till K. Svet. Akad.* 1895, n. 3.

2. Cortic. — Am. merid. : Brasil. or.

apertifolius Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 62.

Ster. — Afr. : Ins. Francia.

apiculatus Dz. et Mk. — *Schizomitrium*.

argenteus Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn.* XIX, 1891, n. 5.

2. — Am. merid. : Brasil. or. (Minas Geraës).

argentinius Ltz. in *Linn.* 1878-79, p. 356.

Fl. et fr. ign. — Am. merid. : Argentin. subtropic.

argentinius Besch. — *S. paraguensis*.

? *aristifolius* Mitt. *Sam. M.* p. 176.

Ster. Cortic. — Pac. : Ins. Samoa.

armatus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 151.

2. — Afr. : Littor. tropic. (sine loc. spec.).

- asper* Mitt. in *op. cit.* 1866, p. 303.
Ster. — Afr. : M. Usagara, Kilima N'Djaro.
- asperimus* Broth. in *Oefv. af Finska Vet.-Soc. Foerh.* 1895, p. 55.
2. — Pac. : Ins. Ducis York (Mioko).
- atro-virens* Broth. in *Oefv...* 1893.
2. Cortic. — Pac. : Nov. Guinea.
- badius* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 23.
Fr. ign. — Am. sept. : Guadalup.
- Banksii* C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 162.
1. — Pac. : Taïti, ins. Vanikoro, Tuokuro.
- Bernoullii* C. M. in *Bull. hb. Boissier.* 1897, p. 189.
— Am. sept. : Guatemala.
- Berteroamus* (Brid.) C. M. *Syn. I*, p. 539.
Dicranum Berteroanum Brid. *Bryol. univ. I*, p. 445.
Orthotheca Berteroana *ej. op. cit.* p. 778 p.p.
2. Cortic. — Am. sept. : Porto-Rico, Jamaïc., ins. S. Vincent. Am. merid. : Ins. Trinitat., And. Peruv., Brasil. tropic.
- bornensis* (Hpe.) Jaeg. *Ad. I*, p. 316.
Trachymitrium bornense Hpe. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 280.
2. — As. : Borneo.
« *var. javanicus* Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1896, p. 100 et in *Ann. du jard. bot. de Buitenzorg*, 1897, 1^{er} Suppl. p. 5, t. II, A.
— As. : Java.
- brachystelioides* C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1877, p. 48.
— Am. merid. : And. Boliv.
- brevis* C. M. in *sched.*
— Pac. : Nov. Guin. brit.
- caespitosus* Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 298.
Ster. — As. : Ceylan.
- calymperidianus* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 21.
Fr. ign. — Am. sept. : Guadalup.
- Campylopus* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 53.
2. Ster. — Pac. : Nov. Guinea.
- candidus* Hsch. — Leucophanes.
- capillaceus* Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 9.
Lignic. — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- carassensis* Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn. XIX*, 1891, n. 5.
2. Terr. — Am. merid. : Brasil. or. (Minas Geraës).
- cavifolius* Lac. *Sp. nov. M. Archipel. ind.* p. 5, t. 3 c.
2. fr. ign. Lignic. — As. : Ins. Banca, Borneo.
- ceylonensis* Par.
S. parvulus Thw. et Mitt. in *op. cit.* p. 229.
Thyridium parvulum Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 679.
— As. : Ceylan.
- Chenagoni* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, I, p. 175.
Ster. — Afr. : Madagascar.

ciliatus (*Hook.*) *Schwaegr. Suppl. II, II, p. 114, t. 130; C. M. Syn. I, p. 144; Bryol. jav. I, p. 60, t. 48.*

Trachymitrium ciliatum *Brid. Bryol. univ. I, p. 159.*

Weisia ciliata *Hook. M. ex. t. 171.*

2. Cortic., lignic. et terr. — *As.* : Sumatra, ins. Banca, Borneo, Celebes, Amboine. Ternate. *Pac.* : Ins. Admiral., Nov. Guinea.

ciliolatus *Geh. et Hpe. in Fl. 1881.*

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

cincinatus *Hpe. Symb. 1874, p. 481.*

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

circinatus (*Brid.*) *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 22.*

? *Dicranum circinatum* *Brid. Bryol. univ. I, p. 446.*

Orthotheca circinata *ej. op. cit. p. 779.*

S. sordidus *C. M. in Bot. Zeit. 1848, p. 766 et Syn. I, p. 537.*

— *Am. sept.* : Guadalup. *Am. merid.* : Venezuela,

Nov. Granat.

circinatus *W. P. Sch.* — *S. Schimperianus.*

cirrifolius *W. P. Sch. in Breutel M. Capens.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

clavatus *Schwaegr. Suppl. III, II, II, t. 299; C. M. Syn. I, p. 532.*

Sc. fasciculatus (*fid. Mitt.*).

Ster. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

Codonoblepharum *C. M. Syn. I, p. 529.*

Codonoblepharum undulatum *Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 96, t. 32; Bryol. jav. I, p. 52.*

S. undulatus *Lindb. in Oefv... 1864, p. 605.*

Thyridium Codonoblepharum *Ren. et Card. in Rev. bryol. 1896, p. 100.*

2. Ad arbor. — *As.* : Sumatra, Java, ins. Banca, Borneo, Celebes.

compactulus *C. M. in Fl. 1897, p. 332.*

S. prolifer *C. M. Syn. I, p. 542 (quoad pl. Moritz.).*

Ster. — *Am. merid.* : Venezuela.

confertus *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p. 4, t. 2 c.*

2. Ad arbor. — *As.* : Sumatra, ins. Banca.

congolensis *Besch. in Journ. de bot. 1894, p. 43.*

2? — *Afr.* : Congo gall. (Brazzaville).

constrictus *Sull. in U. St. Expl. Exped. Wilkes, 1859, p. 6.*

Thyridium constrictum *Mitt. Sam. M. p. 188.*

— *Pac.* : Ins. Hawaï, Samoa, etc.

crassinervis (*Mitt.*) *Par.*

Calymperes crassinerve *Jaeg. Ad. I, p. 329.*

Codonoblepharum crassinerve *C. M. M. Polyn. p. 67.*

Thyridium crassinerve *Mitt. in Proceed. of the Linn. Soc. 1868, p. 189.*

— *Pac.* : Ins. Samoa.

crassus *Broth. in Micholitz M. Nov. Guin. n. 133.*

Ster.? — *Pac.* : Nov. Guinea.

crispatus *Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., V, p. 335.*

Ster. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

crispus *Aust. in Bot. Gaz. II, p. 109.*

? *Calymperes crispum* *ej. in op. cit. IV, p. 151.*

Ster. — *Am. sept.* : Florida.

croceus Mitt. *M. Ind. or.* p. 41.

Calymperes aurantium Hpe. mss. in *Bryol. jav. Suppl.* p. 223 (fid. Lacoste).

C. heterophyllum A. Br. mss. in *Bryol. jav.* p. 223 (fid. Lacoste).

Arbor. — As.: Ceylan (fid. Besch.), Sumatra, Java, Singapore, ins. Banca, Labuan.

croceus Mitt. (Sam. M.). — *Syrrhopodon subcroceus*.

cryptocarpus Dz. et Mk. *Prodr. fl. bryol. Surinam.* p. 14, t. 7.

2. Cortic. — Am. merid.: Guian. batav.

cryptodus Mitt. *M. austr. am.* p. 119.

— Am. merid.: And. Peruv.

cylindrothecius C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 484.

— Am. merid.: Venezuela.

cyrtophyllus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 59.

Lignic. — Afr.: Ins. Borbon.

decolorans C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 188.

In silv. primaev. — Am. sept.: Guatemala.

Dregei Hsch. in *Linn.* 1841, p. 116; *C. M. Syn. I*, p. 530.

S. perichaetialis Br. in *Reg. Bot. Zeit.* 1846, p. 132.

2. Cortic. et rupic. — Afr.: C. B. Sp., Pondoland.

dubius Schwaegr. — *Zygodon Schwaegrichenii*.

Duseni C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 513.

— Afr.: M. Cameroon.

elator Hpe. *Symb.* 1874, p. 482.

Terr. — Am. merid.: Brasil. austr. or.

elatus Mont. in *Ann. sc. nat.* III, p. 198 et *Syll.* p. 46; *C. M. Syn. I*, p. 545.

Ster. Cortic. — Am. merid.: Guian. gall.

elongatus Sull. in *Proced. of the Am. Acad.*... 1861, p. 280.

— Am. sept.: Cuba.

epapillosus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 483.

— Am. merid.: Venezuela.

erectifolius C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 128.

— Afr.: C. B. Sp.

? *excelsus* Sull. — *Amphoridium Sullivantii*.

fallax Lac. *Sp. nov. M. Archipel. ind.* p. 5, t. 3 B.

2. Cortic. — As.: Ins. Banca, Borneo.

fasciculatus Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. of sc.* III, p. 225 (1); *Schwaegr. Suppl. IV*, t. 299; *C. M. Syn. I*, p. 529.

Calymperes fasciculatum Mitt. *M. Ind. or.* p. 41.

Codonoblepharum fasciculatum *Bryol. jav. I*, p. 53.

S. undulatus A. Br. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 938 (fid. Hpe.).

Thyridium fasciculatum Mitt. *Sam. M.* p. 189.

2. Lignic. — As.: Nepal., Java, Singapore, penins. Malay., Borneo, ins. Ternate et Arrow Molucc. Afr.: Ins. Franciae. Am. merid.: Chile. Pac.: Austral., ins. Pitcairn, Samoa.

(1) « Cum ic. ubi calyptra ad naturam delineata est, non obstante observatione cl. Müllerī l. c. » Mitt. *M. Ind. or.* p. 41.

fastigiatus Dz. et Mk. — *S. Gardneri* var. *fastigiatus*.

fimbriatulus Sb. in *Jueg. Ad. II*, p. 677.

S. fimbriatus C. M. in *Linn.* 1871-73, p. 151.

Ster. — *Pac.* : Austral. or.

fimbriatus Mitt. *M. austr. am.* p. 122.

Cortic. — *Am. merid.* : Amazon.

fimbriatus C. M. — *S. fimbriatulus*.

flabelliformis C. M. in sched.

— *As.* : Amboine.

flammeonervis C. M. in *Linn.* 1874, p. 557.

Ster. — *As.* : Ins. Philippin.

flavescens C. M. *Syn. I*, p. 541.

2. — *Am. sept.* : Guadalup., ins. S. Vincent. *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

flavescens Hpe. — *S. Schwaneckeanus*.

flavifolius C. M. *M. Polyn.* p. 66.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

flavus C. M. in *Bot. Zeit.* 1855, p. 763; *Bryol. jav. I*, p. 61, t. 49.

2. — *As.* : Java.

flexiareolatus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 484.

— *Am. merid.* : Venezuela.

flexifolius Mitt. *M. austr. am.* p. 118.

— *Am. merid.* : And. Peruv.

floridanus Sull. *M. of U. St.* p. 31 et *Id. M.* p. 49, t. 31; *Lesq. et Jam. Man.* p. 185.

S. albo-vaginatus H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. II ed.*, n. 37; *Sull. M. Allegh.* n. 171.

2. Lignic. — *Am. sept.* : Florid., Ludovic.

fragilis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, III, p. 342.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Gardneri (Hook.) *Schwaegr. Suppl. II*, II, p. 110, t. 131; *C. M. Syn. I*, p. 538; *Bryol. jav. I*, p. 54, t. 43.

Calymperes Gardneri Hook. *M. ex. t.* 146.

Cleistostoma Gardneri Brid. *Bryol. univ. I*, p. 155.

Weisia Mac-Clellanai Griff. *Not.* p. 408.

2. — *As.* : Nepal., Khasia, Ceylan, Java.

“ var. *fastigiatus* *Bryol. jav. l. c.* p. 55.

S. fastigiatus Dz. et Mk. in *Pl. Jungh. I*, p. 334.

— *As.* : Khasia, Ceylan, Java.

Gaudichandi Mont. in *Ann. sc. nat. II ser.*, II, p. 376, t. 16 et *Syll.* p. 46; *C. M. Syn. I*, p. 542.

S. undulatus C. M. in *Bot. Zeit.* 1844, p. 727.

2. Cortic. et lignic. — *Am. sept.* : Cuba, Guadalup. *Am. merid.* : Amazon., Brasil. austr. or.

Geheebii Par.

S. gracilis Geh. *Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.*, p. 2, t. I.

2. — *Pac.* : Nov. Guin. merid.

- glauco-virens* Mitt. *Sam. M.* p. 176.
 Ster. Arbor. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- glaucophyllus* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1890, *I*, p. 174.
 Fr. ign. Lignic. et terr. — *Afr.* : Ins. Borbon., Franciae.
- « *var. rufus eor.* in *op. cit.* 1894, *II*, p. 116.
S. rufus eor. *M. Masc. Mad. n.* 114.
 — *Afr.* : Madagascar.
- glaucus* Schwaegr. — *Leucophanes*.
- Glaziovii* Hpe. *Symb.* 1874, p. 483; *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet. Akad.* 1895, *n.* 3 (*descript. fruct.*).
 Cortic. et terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- goyaziensis* Broth. in *Hedwig.* 1895, p. 122.
 2. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. or.
- gracilescens* Broth. in *Act. Soc. sc. Fenn. XIX*, 1891, *n.* 5.
 Ster. — *Am. merid.* : Minas Geraës.
- gracilis* Mitt. *Fl. Vit.* p. 388.
 — *Pac.* : Sine loc. spec.
- gracilis* Geh. — *S. Geheebii*.
- Graeffeanus* C. M. M. *Polyn.* p. 66.
 2. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.
- graminifolius* Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg. XXXI*, 1892, *II*, p. 104.
 Ster. Lignic. — *Afr.* : Madagascar.
- Griffithii* Mitt. *M. Ind. or.* p. 40
 2. — *As.* : Singapore. *Pac.* : Nov. Guin.
- havaicus* C. M. in *Fl.* 1896, p. 437.
 Ster. — *Pac.* : Ins. Sandwic.
- helicophyllus* Mitt. *M. austr. am.* p. 119.
 — *Am. merid.* : And. Peruv.
- heterophyllus* { Lac. — *Calymperes retusum*.
 Mitt. — *Calymperes*.
- hispido-costatus* Ren. et Card. in *op. cit.* p. 103.
 Ster. Lignic. — *Afr.* : Madagascar.
- Hobsoni* Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. of sc.*, *III*, p. 224;
C. M. Syn. I, p. 535.
Calymperes Hobsoni Grev. in *Ann. of the Lyc. of nat. Hist. of New York*, *V*, 1824, p. 271, c. ic.
 ? *Cleistostoma incompletum* Brid. *Bryol. univ. I*, p. 158.
S. incompletus Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 119.
S. semi-completus ej. l. c. II, II, II, p. 97.
 2. — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : Ins. Trinitat, Guian., Brasil. or.
- Hobsoni* Besch. — *S. Mohri*.
- Hornschuchii* Mart. *Fl. Brasil.* p. 6; *C. M. Syn. I*, p. 528.
 — *Am. merid.* : Amazon., Brasil. austr. or.
- Husnoti* Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.*, p. 21.
 Fr. ign. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.
- incompletus* Schwaegr. — *S. Hobsoni*.

- inflexus* Mitt. *M. austr. am.* p. 117.
— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- involutus* Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 117, t. 132 ; *C. M. Syn.* I, p. 538 ;
Bryol. jav. I, p. 59.
Cleistostoma involutum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 157.
S. Jardini W. P. Sch. in *Jardin Enum.* p. 20.
2. — *As.* : Ins. Banca, Rauwack Molucc. *Pac.* : Ins.
Samoa, Taïti.
- iridans* Mitt. *op. et l. cc.*
— *Am. merid.* : Æquator.
- Isleanus* Besch. *Not. M. I. S. Paul et Amst.*, p. 3.
Fr. ign. — *Afr.* : Ins. S. Paul.
- Jamesoni* Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 331 ; *C. M. Syn.* I, p. 545.
Tortula armata Mitt. *op. cit.* p. 163.
— *Am. merid.* : And. Quitens.
- Jardini* W. P. Sch. — *S. involutus*.
- Junquillian* Mitt. in *Bryol. jav.* I, p. 57, t. 46.
Thyridium Junquillian Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 679.
2. — *As.* : Borneo.
- Kurzii* Hpe. — *Calymperes prionotum*.
- labeanus* *Bryol. jav.* I, p. 56, t. 45.
2. — *As.* : Borneo, ins. Labuan, Celebes.
- laevigatus* Mitt. *Fl. Vit.* p. 389.
— *Pac.* : Ins. Hawaï, Samoa.
- laeviusculus* Broth. in *Hedwig.* 1895. p. 122.
2. Cortic. — *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz).
- lamprocarpus* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 151.
2? — *Afr.* : Ins. Fernando-Po.
- Lepervanchei* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.* p. 62.
Fr. ign. — *Afr.* : Usambara, ins. Borbon.
- Leprieurii* Mont. in *Ann. sc. nat.* III, p. 197 et *Syll.* p. 46 ; *C. M. Syn.* I,
p. 541.
2. Cortic. — *Am. merid.* : Guian. gall., Amazon.
- leptodontioides* Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 59.
Fr. ign. — *Afr.* : Madagascar sept.
- Leucoloma* C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungs-
reise... Bot.* p. 52.
Ster. Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Guinea.
- ligulatus* Mont. *Syll.* p. 49.
Cortic. — *Am. sept.* : Guadalup. *Am. merid.* : Guian.
- littoralis* C. M. in *Hildebr. M. Mad.* n. 2057.
— *Afr.* : Ins. Nossi-Be.
- longifolius* Lindb. mss. ; Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 7.
— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- longisetaceus* C. M. — *S. rigidus*.
- loxorhynchus* Ångstr. — *Hyophila*.

luteus (Mitt.) Jaeg. Ad. I, p. 315.

Codonoblepharum luteum C. M. M. Polyn. p. 67.

Thyridium luteum Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc.* 1868, p. 188.

Cortic. et rupic. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa.

lycopodioides (Sw.) C. M. Syn. I, p. 538.

Bryum lycopodioides Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 139.

? *Dicranum lycopodioides* ej. Fl. Ind. occ. III, p. 1066; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 444.

Orthotheca lycopodioides Brid. op. cit. I, p. 778.

2. Cortic. — Am. sept. : Hispaniola, Jamaic., S. Doming., Porto-Rico, Antill. gall. Am. merid. : Ins. Trinitat., Venezuela, And. Nov. Granat. et Quitens., Brasil.

macro-prolifer C. M. in Fl. 1897, p. 332.

Ster. — Am. merid. : Venezuela.

mahensis Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 61.

— Afr. : Ins. Seychelles.

malouinensis C. M. Syn. I, p. 539.

Orthotheca Berteriana Brid. Bryol. univ. I, p. 778 p.p.

2? — Am. merid. : Ins. Maclov.

malouinensis Ångstr. — S. mauritianus.

mammillatus C. M. M. Polyn. p. 66.

Ster. — Pac. : Ins. Samoa.

mammillosus C. M. M. Polyn. p. 66.

Ster. — Pac. : Nov. Caledon.

Manii C. M. in sched.

— As. : Ins. Andaman.

mauritianus C. M. in Ångstr. Prim. lin. p. 54.

S. malouinensis Ångstr. in Oefv.... 1873, p. 141.

Fr. ign. — Afr. : Ins. Franciae.

maveganensis Besch. in Ann. sc. nat. VII ser. II, p. 88.

Ster. — Afr. : Ins. Mayotte.

Micholtzii C. M. mss.

— As. : Ins. Philippin. (Mindanao).

microbolacus C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 60.

S. microbolax Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 678.

— Afr. : Ins. Nossi Be.

microbolax Sb. — *S. microbolacus*.

Miquelianus C. M. Syn. I, p. 535.

S. surinamensis Dz. et Mk. Prodr. fl. bryol. Surinam. p. 12, t. 6.

2. — Am. merid. : Surinam, Amazon.

Mohri C. M. in Linn. 1874, p. 633.

S. Hobsoni Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 29.

Cortic. — Am. sept. : Mexic.

Mülleri (Dz. et Mk.) Bryol. jav. II, p. 224.

Calymperes Mülleri Mitt. M. Ind. or. p. 42.

Calymperidium Mülleri Bryol. jav. I, p. 51, t. 42 (excl. fig. 17, 20 et 21).

2. Cortic. — As. : Ceylan, Sumatra, Java, ins. Banca, Borneo, Celebes.

Pac. : Ins. Samoa, Nov. Guinea.

- nossi-beanus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 59.*
 Fr. ign. — Ins. Mayotte, Nossi Be.
- « var. borbonicus *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 117.*
 Secus rivul. — Afr. : Ins. Borbon.
- Novae-Valesiae *C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 3 (nom.) (1).*
 — Pac. : Austral. (Nov. Vales.).
- novo-guineensis *Par.*
 S. strictifolius *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin. p. 8.*
 Ster. — Pac. : Nov. Guin. merid.
- obliquirostris *C. M. Syn. I, p. 543.*
 2. — Afr. : C. B. Sp.
- obscurus *Rehm. M. Afr. austr. n. 126.*
 — Afr. : Orange.
- obtusifolius *Lindb. in Oefv... 1864, p. 605.*
 2? — Pac. : Taïti.
- obtusus *Schwaegr. — Splachnobryum.*
- octoblepharis *Nees. — Leucophanes octoblepharoides.*
- pachyneurus *C. M. in sched.*
 — As. : Ternate.
- pallidus *Mitt. M. austr. am. p. 121.*
 — Am. merid. : And. Quitens.
- papillosus *C. M. in Bot. Zeit. 1848, p. 766 et Syn. I, p. 543.*
 2. Cortic. — Am. merid. : And. Columb.
- papuanus *Broth. in Oefv..., af Finska Vet.-Soc. Foerh. 1895, p. 54.*
 2. — Pac. : Nov. Hibern.
- paraguensis *Besch. in Journ. de bot. 1891, p. 349.*
 S. argentinicus *ej. in Rev. bryol. 1885, p. 17.*
 2. Cortic. — Am. merid. : Paraguay.
- parasiticus (*Sw.*) *Besch. in Ann. sc. nat. 1895-96, I, p. 298.*
Anictangium parasiticum Brid. Sp. M. I, p. 270
Brachypodium? parasiticum Brid. Bryol. univ. I, p. 149 ; C. M. Syn. I, p. 750.
Bryum parasiticum Sw. Prodr. fl. Ind. occ. p. 139.
Calymperes parasiticum Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. I, p. 131 ; Mitt. M. austr. am. p. 127,
Encalypta parasitica Sw. Fl. Ind. occ. III, p. 1739.
Glyphomitrium parasiticum Brid. Mant. M. p. 21.
Weisia parasitica Mohr in Koen. and Simps. Ann. bot. II. p. 415.
 Arbor. — Am. sept. : Haïti. Am. merid. : And. Quitens.
- parvicaulis *C. M. in sched.*
 Ster. — Pac. : Nov. Guinea brit.
- parvulus *W. P. Sch. in C. M. Syn. I, p. 544.*
 2. — Am. sept. : Mexic.
- parvulus *Thw. et Mitt. — S. ceylonensis.*
- paucifimbriatus *C. M. in Dusen M. Camer. n. 828.*
 — Afr. : M. Cameroon.

(1) « An *S. Gaudichaudi* forma? » *Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 677.*

- perasper *C. M. in sched.*
 Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. brit.
- perichætiæ Br. — *S. Dregei.*
- perundulatus *Broth. in Micholitz M. N. Guin. n. 134.*
 — *Pac.* : Nov. Guinea.
- phragmidiaceus *C. M. in Fl. 1886, p. 511.*
 Ster. — *Afr.* : Gabon.
- piriformis *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 488.*
 — *Afr.* : Transvaal.
- Platycerii *Mitt. Fl. Vit. p. 388.*
 — *Afr.* : Ins. S. Paul. *Pac.* : Ins. Lord Howe.
- polytrichoides *Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 206.*
 — *Pac.* : Nov. Caledon.
- pomiformis (*Hook.*) *Hpe. in C. M. Syn. I, p. 531.*
 ? *Grimmia pomiformis Brid. Bryol. univ. I, p. 187.*
Weisia pomiformis Hook. M. ex. t. 131.
 2. *Rupic.* — *Afr.* : C. B. Sp.
 « *var. truncicola Rehm. M. Afr. austr. n. 124.*
Cortic. — *Afr.* : C. B. Sp.
- prolifer *Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 99, t. 180; C. M. Syn. I, p. 542 p.p.*
 2. *Lignic. et rupic.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Peruv. ?
Brasil. austr. or.
 « *var. acanthoneuros C. M. l. c.*
S. acanthoneuros ej. in Bot. Zeit. 1845, p. 106.
 — *Am. merid.* : Brasil. or.
- prolifer* { *C. M. (quoad pl. Venezuel.). — S. compactulus.*
 { *Duby. — Leucoloma molle.*
- pusillus *Mitt. M. austr. am. p. 120.*
Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- Quintasi *Broth. in Bol. da Soc. Brot. VIII, 1890.*
 2. *Fr. ign. Cortic.* — *Afr.* : Ins. S. Thoma.
- ? *Rauei Aust. — Dicranum fulvum.*
- recurvifolium* { *Hsch. — Orthotrichum.*
 { *Wils. — Calymperes.*
- recurvulus Mitt. M. austr. am. p. 120.*
 — *Am. sept.* : Cuba.
- Reinwardti Hsch. — Zygodon.*
- repens Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, II, p. 7 et in Hook. Ic. pl. rar. t. 22, f. 4.*
Calymperes repens C. M. Syn. I, p. 526.
Orthotrichum undulatum Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. of sc. p. 17, t. 4 p.p.
Thyridium repens Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 679.
 Ster. *Cortic.* — *As.* : Ceylan, Penang, ins. Banca, Ternate.
- repens Bryol. jav. — S. subrepens.*
- revolutus Dz. et Mk. — S. rufescens.*
- rigescens Schwaegr. Suppl. II, II, II, p. 102, t. 181; C. M. Syn. I, p. 533.*
 2 ? — *Am. merid.* : Ins. Maclov.

rigidus Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. of sc. III, p. 226;
C. M. Syn. I, p. 536.

Calymperes androgynum Mont. in Ann. sc. nat. III, p. 195.

S. androgynus Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 23.

S. longisetaceus C. M. Syn. I, p. 535.

2. Cortic. — Am sept.: Antill. gall., Porto Rico, ins. S. Vincent.
Am. merid.: Ins. Trinitat., Guian., Nov. Granat.

rigidus Duby. — *Leucobryum chlorophyllosum*.

Rodriguezii Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 115
et M. Masc. Mad. n. 19.

Ster. — Afr.: Ins. Borbon.

« var. *sublaevis* eor. in op. cit. p. 116.

Cum typ.

rotundatus Broth. in Oefv.... 1893.

Ster. ? — Pac.: Nov. Guin.

rubiginosus Mitt. M. austr. am. p. 125.

Thyridium rubiginosum Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 679.

Cortic. — Am. merid.: Orinoc.

rufescens Hook. et Grev. in op. cit. p. 227; C. M. Syn. I, p. 534.

S. revolutus Dz. et Mk. M. frond. ined. Archip. ind. p. 59, t. 22; Bryol.
jav. I, p. 58.

Trachymitrium revolutum Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 280.

1. Cortic. — As.: Sumatra, Java, Penang, Singapore, ins. Banca et
Labuan, Borneo, ins. Philippin. Pac.: Ins. Mariann.

rufus Ren. et Card. — *S. glaucophyllus* var. *rufus*.

rupestris Mitt. M. austr. am. p. 124.

Ster. Rupic. — Am. merid.: Amazon.

Sanctae Catharinae C. M. mss.

— Am. merid.: Brasil. austr. or.

Sartorii C. M. in Linn. 1874, p. 633.

S. albo-vaginatus Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 29.

— Am. sept.: Mexic.

scaber Mitt. M. austr. am. p. 119.

Lignic. — Am. sept.: Cuba.

scaberrimus C. M. in Malpighia, 1896, p. 513.

Ster. — Am. merid.: Guian. brit.

Schimperianus Par.

S. circinatus W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mex. p. 28.

— Am. sept.: Mexic.

Schwaneckeanus C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 763.

S. flavescens Hpe. in Linn. 1852, p. 360.

2. — Am. sept.: Porto-Rico, Antill. gall.

Scolopendrium Mitt. — *Octoblepharum*.

Seignaei Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 63.

Fr. ign. — Afr.: Ins. Nossi Be.

semi-circularis C. M. in Verhandl. d. bot. Ver. Prov. Brandenb. 1890,
p. 67.

— Afr.: Tropic. occid.

semi-completus Schwaegr. — *S. Hobsoni*.

semi-liberus (Mitt.) Besch. in litt.

Calymperes semi-liberus Mitt. *M. Ind. or.* p. 41.

2. Arbor. — *As.* : Penins. Malay.

Semperi C. M. in Linn. 1874, p. 557.

Ster. — *As.* : Ins. Philippin.

serpentinus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 48.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Serra C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise.... Bot.*, p. 53.

Ster. Cortic. — *Pac.* : Nov. Guin.

serrulatus Wils. — *Calymperes heterophyllum*.

silvaticus Mitt. *M. austr. am.* p. 121.

Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Smithii Besch. in litt.

Calymperes disciforme Lesq. et Jam. *Man.* p. 184.

Arbor. — *Am. sept.* : Florida.

sordidus C. M. — *S. circinatus*

sparsus Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1891, II, p. 186.

Ster. Lignic. — *Afr.* : Madagascar centr.

speciosus W. P. Sch. in *Jardin Enum....* p. 19 (nom.).

— *Pac.* : Nouka Hiva.

speciosus Dz. et Mk. — *Schizomitrium*.

spiculosus Hook. et Grev. in *Brewster Edinb. Journ. of sc.* III, p. 226 ;

C. M. Syn. I, p. 534.

2. Rupic. — *As.* : Sumatra, Singapore, ins. Banca et Labuan, Borneo.

spininervis Lindb. mss. ; Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 7.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

spiralis Ren. et Card. in *op. cit.* p. 185 et *M. Masc. Mad.* n. 113.

Ster. Terr. aren. — *Afr.* : Madagascar.

Spruceanus Mitt. *op. cit.* p. 114.

2. — *Am. merid.* : Amazon.

strictifolius Mitt. *Fl. Vit.* p. 388.

Ster. — *Pac.* : Ins. Samoa.

strictifolius Geh. — *S. novo-guineensis*.

strictus Thos. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 299.

— *As.* : Ceylan.

strigosus (Brid.) Mitt. *M. austr. am.* p. 125.

Oncophorus strigosus Brid. *Bryol. univ.* I, p. 405 ; *C. M. Syn.* I, p. 367.

Ster. — *Am. sept.* : Hispaniola.

Stuhlmanni Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 240.

2. — *Afr.* : Orient. germ.

subciliatus C. M. in sched.

— *Pac.* : Nov. Guin. brit. (M. Yule).

subcroceus Besch. in litt.

Calymperes croceus C. M. *M. Polyn.* p. 63.

S. croceus Mitt. *Sam. M.* p. 175.

Arbor. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.

- subdisciformis (C. M.) Besch. in *Ann. sc. nat.* 1895-96, p. 305.
 Calymperes subdisciforme C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 500.
 — Afr. : M. Cameroon.
- subfasciculatus (Hpe.) Par.
 Codonoblepharum subfasciculatum Hpe. in *Linn.* 1876, p. 603.
 Thyridium subfasciculatum Sb. in *Jaeg. Ad. II*, p. 679.
 — Pac. : Ins. Tuo-Kuro.
- subflavus Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1896, I, p. 310.
 Ster. Cortic. — Afr. : Madagascar (Diego-Suarez).
- subinteger Lindb. mss. ; Ångstr. in *Oefv....* 1876, n. 4, p. 7.
 — Am. merid. : Brasil. austr. or.
- subluteus (C. M.) Par.
 Codonoblepharum subluteum C. M. M. *Polyn.* p. 67.
 Thyridium subluteum Sb. in op. et l. cc.
 Ster. — Pac. : Ins. Samoa.
- subpolytrichoides C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise... Bot.*, p. 53.
 Ster. Cortic. — Pac. : Nov. Guin.
- subrepens C. M. in *Linn.* 1874, p. 556 (nom.).
 S. repens *Bryol. jav. II*, p. 224.
 Thyridium subrepens Sb. in op. et l. cc.
 — As. : Archip. ind. (sin loc. spec.).
- subspiculosus C. M. M. *Polyn.* p. 67
 Ster. — Pac. : Ins. Samoa.
- subulatus Lac. *Sp. nov. M. Archip. ind.* p. 5, t. 3 A.
 2. Cortic. — As. : Sumatra, Celebes. Pac. : Nov. Guin. merid.
- subviridis Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 22.
 Fr. ign. — Am. sept. : Guadalup.
- Sullivantii *Bryol. jav. I*, p. 58, t. 47.
 2. — As. : Java.
- surinamensis Dz. et Mk. — S. Miquelianus.
- taïtensis Sull. in *U. St. Expl. Exped. Wilkes*, 1859, M. p. 6, t. 4.
 Calymperes Daemellii Hpe. mss.
 C. taïtense Mitt. *Sam. M.* p. 172.
 Ster. Rupic. et terr. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Taïti, Nouka Hiva,
 Arch. Gambier, Nov. Hebrid.
- Taylori Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 115, t. 132 ; C. M. *Syn. I*, p. 545.
 Blindia Taylori Hpe. mss. (fid. Besch. in litt.).
 Cleistostoma Taylori Brid. *Bryol. univ. I*, p. 156.
 Leucoloma Taylori Mitt. *M. Ind. or.* p. 13.
 l. Lignic. — As. : Nepal., penins. Malay.
- tenellifolius (C. M.) Besch. in *Ann. sc. nat.* 1895-96, p. 305.
 Calymperes tenellifolium C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 432.
 — Afr. : M. Cameroon.
- tenellus Mitt. in *Proc. of the Linn. Soc.* 1879 (extra-vol.) p. 99.
 — Pac. : Nov. Caledon. (ins. Pinorum).
- tenuifolius (Sull.) Mitt. *M. austr. am.* p. 117.
 Calymperes tenuifolium Sull. in *Proced. of the Am. Acad....* 1861.
 Lignic. — Am. sept. : Cuba.

- terebellum *C. M. in Bot. Zeit.* 1857, p. 777.
 2. — *Pac.* : Nov. Caledon. (ins. Pinorum).
- texanus *Sull. M. of U. St. p.* 103 *et Ic. M. Suppl. p.* 32, *t.* 20, *p.p.* ;
Lesq. et Jam. Man. p. 185.
 2. ♂ ign. — *Am. sept.* : A Carol. sept. usq. ad Florid.
- texanus *Sull. p.p.* — *S. alabamensis.*
- tortilis *Hpe. Symb.* 1872, p. 38.
 2. — *Am. merid.* : Brasil. austr.
- tortuosus *Hsch.* — *Amphoridium cyathicarpum.*
- trachyphyllus *Mont. Syll. p.* 47.
 2 ? — *As.* : Singapore, ins. Labuan, Borneo.
- tristichus *Nees in Schwaegr. Suppl. IV, t.* 311 ; *C. M. Syn. I, p.* 540 ;
Bryol. jav. I, p. 55, *t.* 44.
 2. Cortic. — *As.* : Ceylan, Sumatra, Java, Amboine.
- tristichus *Mitt.* — *S. laevigatus.*
- tubulosus *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p.* 7, *t.* 4 B.
 2. Ster. — *As.* : Sumatra, Borneo.
- uncinifolius *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n.* 129 *et* 486.
 — *Afr.* : C. B. Sp., Transvaal.
- undulatus { *A. Br.* — *S. fasciculatus.*
C. M. — *S. Gaudichandi.*
Lindb. — *S. Codonoblepharum.*
- Urvilleanus *C. M. Syn. I, p.* 540.
Orthotheca Berteriana Brid. Bryol. univ. I, p. 778 *p.p.*
 2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- vaginans *Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad.* 1895, *n.* 3.
 2. Cortic. et lignic. — *Am. merid.* : Brasil. or.
- venezuelanus *Mitt. M. austr. am. p.* 125.
 — *Am. merid.* : Venezuela.
- vittatus *Wils.* — *Calymperes heterophyllum.*
- Vriesei *Lac. Sp. nov. M. Archip. ind. p.* 6, *t.* 4 A.
 2. Cortic. — *As.* : Java.
- Wainioi *Broth. in Act. Soc. sc. Fenn. XIX,* 1895, *n.* 5.
 Ster. Cortic. — *Am. merid.* : Minas Geraës.
- Wallisii *C. M. in Linn.* 1874, p. 555.
Thyridium Wallisii Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 679.
 Ster. — *As.* : Ins. Philippin.
- Welwitschii (*Duby*) *Besch. in Ann. sc. nat.* 1895-96, *I, p.* 307.
Calymperes Welwitschii Duby in Mém.... Genève, 1871, p. 20. *t.* 8.
 Ster. Ad rad. arb. secus rivul. — *Afr.* : Angola.
- xanthophyllus *Mitt. M. austr. am. p.* 115.
 Terr. — *Am. merid.* : Amazon (1).

(1) In Enum. Kindb. nomen nud. :

S. braunioides C. M.

SYSTEGIUM W. P. Sch. Syn. 1 ed., p. 30 (17 spec.).

abbreviatum *Thw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 299.
Terr. — As. : Ceylan.

austro-crispum (C. M.) *Par.*

Phascum austro-crispum C. M. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1893, p. 274.

1. Terr. — Pac. : Nov. Zeland.

brachypelma (C. M.) *Par.*

Phascum brachypelma C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

— Pac. : Australia.

carniolicum de Not. — *Phascum*.

crispum (*Hedw.*) W. P. Sch. l. c. et Syn. 11 ed. p. 31.

Astomum crispum *Hpe. in Linn.* 1837, p. 385 ; *Bryol. eur.* 1 (mon. p. 13), t. 10.

A. polycarpum *Hpe. mss.* ; C. M. in *Bot. Zeit.* 1847, p. 98.

Mollia crispa *Lindb. M. Scand.* p. 22.

Phascum crispum *Hedw. Fund. M. II*, p. 85 et *M. frond. I*, p. 25, t. 9 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 46 ; C. M. Syn. I, p. 24.

Simophyllum crispum *Lindb. Rev. crit. ic. fl. dan.* p. 38.

Weisia crispa *Mitt. in Ann. and Magaz. of nat. Hist. II ser., VIII*, 1851, p. 316.

W. longifolia *Mitt. l. c.* p. 317.

1. In campestr. argill.-aren. et praecip. calc. — Eur. : Tota, arctic. except. As. : Japon. Afr. : Alger., Ægypt. Am. sept. : Saskatchewan, Missouri, Indiana, Pensilv., Kansas, Texas, Ludovic.

Exs. : *Drumm. M. bor. am.* 11 ed. n. 9 (*Phascum*).

Rab. Bryoth. eur. n. 30, 653.

« var. *Philiberti* *Husn. Muscol. gall.* p. 427.

— Eur. : Galloprov.

crispum *Lac.* — *S. japonicum*.

Drummondii *Kindb. in Mac. Cat.* p. 12.

Gymnostomum phascoides *Hook. in Drumm. M. bor. am.* n. 12 (*fid. Kindb.*).

Ad terr. humid. — Am. sept. : Saskatchewan.

erythrosteqium W. P. Sch. — *S. ludovicianum*.

Forsythii *Geh.* — *S. Levieri*.

Frucharti (C. M.) *Par.*

Phascum Frucharti C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

— Am. merid. : Monte-Video.

japonicum *Besch. mss.*

S. crispum *Lac. Prol. fl. Japon. in Ann. Mus. bot. Lugd. Batav. I*, 1865-68.

— As. : Japon.

Levieri (*Limpr.*) *Par.*

Astomum Levieri *Limpr. in LXXIII Jahresber. d. Schles. Gesells. für vaterl. Cultur*, 1896, p. , et in *Fl. et Warnst. Bryoth. eur. merid.* n. 4.

S. crispum var. *Philiberti* *Husn.* ?

S. Forsythii

S. multicapsulare { *Geh. ad inter. in Fl.* 1886, n. 22.

1. Terr. — Eur. : Hassia, Toscan., Istria

Lindigii Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, III, p. 337.

Weisia Hampei Mitt. *M. austr. am.* p. 131.

l. — *Am. merid.*; And. Nov. Granat.

ludovicianum (Sull.) Jaeg. *Ad. I*, p. 35.

Astomum ludovicianum Sull. *Ic. M.* p. 21, t. 12; *Lesq. et Jam. Man.* p. 52.

Phascum crispum var. *rostellatum* H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. II ed.*, n. 10.

Ph. ludovicianum Sull. *M. of U. St.* p. 16.

S. erythrostegeum W. P. Sch. in *Proced. of the Am. Acad. XIV*, p. 140.

l. Terr. — *Am. sept.*; Florid., Ludovic.

Mittenii (Bryol. eur.) W. P. Sch. *l. c.*

Astomum Mittenii Bryol. eur. *I* (mon. p. 3), t. 13.

Phascum multicapsulare β Mittenii Wils. *Bryol. brit.*

Ph. Mittenii C. M. *Syn. II*, p. 520.

l et polyg. In arv. et ad viar. marg. — *Eur.*; Anglia merid.

mollifolium C. M. in *Hedwig.* 1895, p. 117.

Terr. — *Am. merid.*; Brasil. or. (Goyaz.).

multicapsulare (Sm.) W. P. Sch. *l. c.*

Astomum multicapsulare Bryol. eur. (mon. p. 3), t. 14.

Phascum crispum C. M. *Syn. I*, p. 24 p.p.

Phascum crispum β multicapsulare H. et T. *Muscol. brit.* p. 6.

Ph. multicapsulare Sm. *Fl. Brit. III*, p. 1152; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 48.

Ph. sphaericarpon Abbot *Fl. Bedf.* p. 230.

l et polyg. In terr. argill. campor. et tumul. denud. — *Eur.*; Anglia.

multicapsulare Geh. — S. Levieri.

nitidulum (Bryol. eur.) Jaeg. *Ad. I*, p. 35.

Astomum nitidulum Bryol. eur. *I* (mon. p. 3); *Lesq. et Jam. Man.* p. 52.

Phascum crispum Sull. *M. Allegh. n.* 211 p.p.

Ph. nitidulum C. M. *Syn. II*, p. 519.

l. Terr. — *Am. sept.*; Ohio.

Exs.; Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 47 (*Astomum*).

« var. pygmaeum (Lesq. et Jam.) Par.

Astomum nitidulum var. *pygmaeum* Lesq. in *L. et J. l. c.*

Ut et typ.

rostellatum Boulay. — *Hymenostomum*.

squarrosus Boulay. — *Hymenostomum*.

subacaule Mitt. — *Hymenostomum*.

Sullivanii (C. M.) Par.

Phascum Sullivanii C. M. in *Fl.* 1888, n. 1.

l. — *Pac.*; Austral. or.

Sullivantii (Bryol. eur.) Jaeg. *Ad. I*, p. 35.

Astomum Sullivantii Bryol. eur. *I* (mon. p. 2); Sull. *Ic. M.* p. 20, t. II; *Lesq. et Jam. l. c.*

Phascum crispum Sull. *M. Allegh. n.* 211 p.p.

Ph. Sullivantii C. M. *Syn. II*, p. 519.

l. Terr. — *Am. sept.*; Reg. or., Kansas, Ludovic.

Exs.; Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 46 (*Astomum*).

unguiculatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 304.
— Afr.: Gwa Chiropa (*Quid?*) (1).

SYSTYLIIUM Hsch. *Comment. de Voitia et Systylia*, p. 19, t. 2.
splachnoides Hsch. — Dissodon.

Taeniocladium Mitt. *Sam. M.* p. 18 (sect. NECKERÆ).

TAMARISCELLA C. M. *Syn. II*, p. 482 (subsect. HYPNI), *postea gen. propr.*
Spec. omn. non indicatae sunt THUIDIA ejusd. nom.
nuda C. M. — Amblystegium Haplocladium.

Tanytrix C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 213 (subgen. HYPNI).

Tapeinodon Mitt. (*fid. Lindb. Man. M. I*, p. 47 in obs.) = SPLACHNOBRYUM.

TAXICAULIS C. M. *Syn. II*, p. 277 (subsect. HYPNI), *postea gen. propr.*
Spec. omn. non indicatae sunt ISOPTERYGIA ejusd. nom.
compressicaulis C. M. — Taxithelium.
nivescens C. M. p.p. — Rhaphidostegium.

TAXITHELIUM Spr. *Catal.*; Mitt. *M. austr. am.* p. 496 (40 spec.).

acuminulatum Jaeg. — T. planum var. acuminulatum.

afro-acuminulatum (C. M.) Par.

Hypnum afro-acuminulatum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 88 et
in *Forschungsreise... Bot.* p. 64.

l. Cortic. — Afr.: Tropic. occid.

argyrophyllum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II,
p. 131 et *M. Masc. Mad. n.* 140.

l. Lignic. — Afr.: Madagascar (Diego-Suarez).

callicostelloides (C. M.) Par.

Sigmatella callicostelloides C. M. in *Dusen M. Camer. n.* a 18.

— Afr.: M. Cameroon.

capillipale (C. M.) Par.

Sigmatella capillipalis C. M. mss.

— Pac.: Nov. Guinea (Onin).

compactulum (C. M.) Par.

Sigmatella compactula C. M. mss.

— As.: Borneo.

compressicaule (C. M.) Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 265.

Isopterygium compressicaulum Par. *Index*, p. 706.

Taxicaulis compressicaulis C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 758.

l. Fr. ignot. Cortic. — Afr.: M. Cameroon.

fraternum (Hpe.) Par.

Hypnum fraternum Hpe. hb. (*nunc in hb. British Museum*).

— As.: Ins. Andaman.

(1) In Enum. Kindb. nom. nudum:
S. recurvifolium C. M.

- glabratum* Broth. et Geh. in Bull. hb. Boissier, 1896, p. 401.
— Afr. : Congo.
- glabrisetum* (C. M.) Par.
Sigmatella glabriseta C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1896, p. 329.
— Pac. : Ins. Samoa.
- glabriusculum* (C. M.) Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1897, p. 266.
Isopterygium anomalum ej. in Mitth. aus d. deutsch. Schutzgeb. 1893,
III (nom.),
Sigmatella glabriuscula C. M. in sched.
l. Fr. ign. Rupic. — Afr. : Liberia (Monrovia), Togo.
- glaucophyllum* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 169.
l. — Afr. : Madagascar, ins. Nossi Be.
- Guianae* (C. M.) Par.
Sigmatella Guianae C. M. in Malpighia 1896, p. 518.
— Am. merid. : Guian. britann.
- hemicuspis* (C. M.) Par.
Sigmatella hemicuspis C. M. in Dusen M. Camer. n. 800.
— Afr. : M. Cameroon.
- impellucidum* (C. M.) Par.
Sigmatella impellucida C. M. in Malpighia, 1896, p. 518.
— Am. merid. : Guian. britann.
- leptopunctatum* (C. M.) Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1897, p. 266.
Sigmatella leptopunctata C. M. in sched.
l. Fr. ign. Rupic. — Afr. : Liberia (Monrovia).
- leptosquarrosus* (C. M.) Par.
Sigmatella leptosquarrosa C. M. in Hedwig. 1895, p. 129.
— Am. merid. : Brasil. or. (Goyaz).
- leptostigmatum* (C. M.) Par.
Sigmatella leptostigmata C. M. mss.
— Pac. : Nov. Guinea (Sorou).
- micrangium* (C. M.) Par.
Sigmatella micrangia C. M. in Dusen M. Camer. n. i.
— Afr. : M. Cameroon.
- microthamnioides* (C. M.) Par.
Sigmatella microthamnioides C. M. in Hedwig. 1897, p. 117.
— Am. merid. : Argentin. subtropic. (Chaco).
- nanangium* (C. M.) Par.
Sigmatella nanangia C. M. mss.
— Pac. : Nov. Guinea britann.
- nossianum* Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 169.
l. — Afr. : Ins. Nossi Be.
- Octodiceras* (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 489.
Hypnum Octodiceras C. M. in Linn. 1875, p. 463.
l. Cortic. — Afr. : Niam-Niam.
- opacifolium* (C. M.) Par.
Sigmatella opacifolia C. M. mss.
— Pac. : Nov. Guinea (Andai).

perminutulum (C. M.) Par.

Sigmatella perminutula C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 475.

— Afr. : M. Cameroon.

perminutum (C. M.) Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 267.

Sigmatella perminuta C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 1030.

l. Rupic. — Afr. : M. Cameroon.

perplanicaule (C. M.) Broth. in *op. cit.* p. 261.

Hypnum perplanicaule C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 704; *Par. Index*, p. 667.

Ster. Ad rup. in rivul. — Afr. : M. Cameroon.

planulum Besch. *op. cit.* p. 168.

l. Cortic. — Afr. : Ins. Mayotte, Nossi Be.

planum (Brid.) Mitt. *M. austr. am.* p. 496.

Hypnum concavum Hook. in *Kth. Syn. pl. Æquin.* p. 63; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 501; C. M. *Syn.* II, p. 261.

H. crassicollum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 337; C. M. *op. cit.* p. 343.

H. planum Brid. *Sp. M.* II, p. 97 et *Bryol. univ.* II, p. 394; C. M. *op. cit.* p. 264.

Leskea Omalia cyrtabifolia Brid. *Bryol. univ.* II, p. 333.

L. subpinnata ej. *op. cit.* p. 287 p.p.

Stereodon planus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 157.

l. Lignic. et rupic. — Afr. : Niger (fid. Mitt.). Am. sept. : Florid., Panama, Antill. omn. Am. merid. : Orinoc., Guian., Amazon., And. Quitens. et Peruv., Brasil.

« var. acuminulatum (Hsch.) Par.

Hypnum planum Hsch. *Fl. Brasil.* I, p. 76.

H. planum β acuminulatum C. M. *Syn.* II, p. 265.

Taxithelium acuminulatum Jaeg. *Ad.* II, p. 489.

— Am. merid. : Amazon.

« var. distichum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 81.

— Am. sept. : Guadalup., Martinic.

« var. flavescens (C. M.) Par.

Hypnum planum var. flavescens C. M. *op. et l. cc.*

— Am. merid. : Ins. Trinitat.

polystictum (Hook.) Jaeg. *Ad.* II, p. 489.

Hypnum polystictum Hook. f. *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 482.

Ster. Ad *Lichenes* (*Stictas*). — Pac. : Nov. Zeland. sept.

pseudo-acuminulatum (C. M.) Par.

Sigmatella pseudo-acuminulata C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 214.

Aquat. ? In silv. primaev. — Am. sept. : Guatemala.

Quelchii (C. M.) Par.

Sigmatella Quelchii C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 519.

— Am. merid. : Guian. britann.

ramivagum (C. M.) Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 266.

Isopterygium ramivagum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 797; *Par. Index*, p. 740.

Ad ramul. — Afr. : M. Cameroon.

rotundatum (C. M.) Broth. in op. cit. p. 265.

Sigmatella rotundatula C. M. in Dusen M. Camer. n. 703.

1. Ad rad. arbor. — Afr. : M. Cameroon.

Schweinfurthii (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 489.

Hypnum Schweinfurthii C. M. in Linn. 1875, p. 462.

1. Terr. — Afr. : Niam-Niam.

scutellifolium Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 170.

1. Terr. — Afr. : Madagascar, ins. Nossi Comba.

stigmopyxis (C. M.) Par.

Stigmatella stigmopyxis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 15.

1. — Am. merid. : And. Boliv.

subjulaceum Besch. in sched.

— Am. sept. : Guadalup.

subscabrellum (C. M.) Par.

Stigmatella subscabrella C. M. in sched.

Ster. — As. : Sumatra sept. occ.

tenuisetum (Sull.) Mitt. Fl. Vit. p. 397.

Hypnum tenuisetum Sull. in Proced. Am. Acad., III.

Trichosteleum tenuisetum Jaeg. Ad. II, p. 480.

— Pac. : Ins. Samoa.

trichochaete (C. M.) Par.

Stigmatella trichochaete C. M. in sched.

— As. : Ins. Andaman.

? variegatum (Welw. et Duby) Jaeg. op. cit. p. 489.

Hypnum ? variegatum W. et D. in Mém., Genève, 1871, p. 12, t. 4, f. 4.

2. Palud. — Afr. : Angola.

Zürnianum (C. M. et Schlieph.) Par.

Hypnum Zürnianum C. M. et Schlieph. in sched.

— Pac. : Ins. Auckland.

TAYLORIA Hook. in Journ. of Sc. and Arts, III, p. 144 (emend) (18 spec.).

Spec. omn. non indicatae sunt DISSODONTES ejusd. nom.

acuminata Hsch. -- T. splachnoides.

Boryana Mitt. — Dissodon borbonicus.

Cochambae C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 11.

— Am. merid. : And. Boliv.

cuspidata Hartm. — T. splachnoides var. angustifolia.

Delavayi Besch. in Ann. Sc. nat. 1892, I, p. 59.

1. In silvis. — As. : Yunnan.

Jamesoni (Tayl.) C. M. Syn. I, p. 135 ; Mitt. M. austr. am. p. 249.

Brachymitrium Jamesoni Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 44 ; Wils. in cod. op. p. 448, t. XV A.

T. limbata Spr. in Journ. of the Linn. Soc. V, p. 47.

— Am. merid. : And. Quitens.

Kilimandscharica Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1897, p. 242.

2. Ad Senecion. Johnstoni. — Afr. : Kilima N'Djaro.

laciniata Spr. in *Journ. of the Linn. Soc.* V, p. 48; *Mitt. op. et l. cc.*
Cortic. — *Am. merid.*; And. Quitens.

limbata Spr. — T. Jamesoni.

lingulata Lindb. — *Dissodon splachnoides*.

Mandoni C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 11.

Brachymitrium Jamesoni W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1644.

Ad arbor. — *Am. merid.*; And. Boliv.

Moritziana C. M. *Syn.* I, p. 134; *Mitt. op. cit.* p. 250.

Lignic. — *Am. sept.*; Costa Rica. *Am. merid.*; And. nov. Granat.,
Quitens. et Boliv.

« *var. carbonaria* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 463.

— *Am. merid.*; Venezuela.

obliqua Sendtn. — T. *splachnoides*.

obtusissima Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1895, p. 62.

2. Ster. — *Pac.*; Tasman.

orbispathulata C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 230.

— *Afr.*; M. Cameroon.

papulata C. M. in *Bot. Zeit.* 1868, n. 47, p. 48.

Lignic. — *Am. merid.*; Chile.

parvula Phil. et Amann. in *Rev. bryol.* 1889, p. 56.

2. Humic. in silv. — *Eur.*; Alp. Rhaet.

pichinchensis C. M. *Syn.* II, p. 549.

Weisia Jamesoni Tayl. in *Lond. Journ. of Bot.* 1847, p. 330.

— *Am. merid.*; M. Pichincha.

Raineriana de Not. — T. *splachnoides var. obtusa*.

Rudolphiana (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur.* III (mon. p. 10), t. 287; C. M.
Syn. I, p. 136 et II, p. 550; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 362.

Eremodon Rudolphianus *Bryol. germ.* II, p. 176, t. 40.

Syn. et polyg. Ad *Acer.* et *Fagos muscos.* — *Eur.*; Alp. Salisb., Austr.
super., Bavar., Carinth., Helvet.

serrata (*Hedw.*) *Bryol. eur.* III (mon. p. 6), t. 284; C. M. *Syn.* I, p. 133;
W. P. Sch. *op. cit.* p. 359.

Splachnum serratum *Hedw.* *Sp. M.* p. 53. t. 8; *Brid. Bryol. univ.* I,
p. 245.

Syn. et polyg. Ad terr. stercore vaccino conspurcatam. — *Eur.*; In
silv. *Acer.* reg. subalp. per tot. Alp. zon. intermed; deest in Bri-
tann. et in Scand. *Am. sept.*; Terr. nov., Oregon, Columb. brit.,
Washington, Vancouver, Alaska, M. Calif.

Exs.; Mac. *Canad. M.* n. 140.

Rab. Bryoth. eur. n. 612.

« *var. flagellaris* (*Brid.*) *Bryol. eur.* l. c. t. 285; C. M. *op. et l. cc.*

Splachnum flagellare *Brid. op. cit.* p. 247.

Spl. helveticum *Schleich. Centr.* II, n. 9.

Spl. serratum *Schwaegr. Suppl.* I, I, p. 49 p.p.

Spl. tenue var. flagellare *Roehl. Deutsch. Fl.* III, p. 43.

In humid. valde umbrosis. — *Eur.*; Cum typ. *Am. sept.*; Cum typ.;
Groenland.

var. tenuis *Bryol. eur.* — T. *tenuis*.

spathulata (*Hook. f. et Wils.*) *C. M. Syn. I*, p. 134.

Eremodon spathulatus *H. f. et W. in Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 448, t. XV B.

— *Am. merid.* : Absque loco.

splachnoides (*Schleich.*) *Hook. in Journ. of Sc. and Arts, III*, p. 144 et *M. ex. t.* 173 ; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 266 ; *Bryol. eur. III* (mon. p. 8), t. 236 ; *C. M. Syn. I*, p. 136 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 361.

Hookeria splachnoides *Schleich. in Brid l. c. et Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 340, t. 100.

T. acuminata *Hsch. in Fl.*, 1826, *I*, p. 78 (1).

T. obliqua *Sendtn. in sched.*

Syn. et polyg. Lignic. et ad terr. humidiusc. substant. animal. imbibit.

— *Eur.* : Reg. subalp. zon. intermed. et sept. : deest in Britann.

Am sept. : Gaspesia, Nevada, Columb. brit., *M. Rupestr.*, *M. Humboldt.*

Exs. : *Drumm. M. bor. am. I ed.* n. 47.

« *var. angustifolia* *Bryol. eur. l. c.*

T. cuspidata *Hartm. Fl. Skand.*

T. splachnoides var. apiculata *ej. postea.*

T. splachnoides var. cuspidata *C. M. l. c.*

— *Eur.* : Alp. Norveg.

var. apiculata *Hartm.* { — *T. splachnoides var. angustifolia.*
var. cuspidata *C. M.* {

« *var. obtusa* *Bryol. eur. et C. M. ll. cc.*

Raineria splachnoides *de Not. Syll. M.* p. 275.

T. Raineriana *ej. Epil.* p. 472.

— *Eur.* : Ad limit. super. silvar.

tenuis (*Dicks.*) *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 360.

Grimmia splachnoides *Sm. Fl. brit. III*, p. 1197.

Splachnum attenuatum *Brid. Bryol. univ. I*, p. 248.

Spl. lingulatum *Hoffm. Fl. Germ.* p. 23, n. 4.

Spl. longicollum *Dicks. Fasc. Pl. crypt. IV*, t. 10, f. 9.

Spl. ovatum *Schleich. in sched.*

Spl. purpureum *With. Arrang.* p. 794, t. 18, f. 9.

Spl. serratum *Schwaegr. Suppl. I, I*, p. 49 p.p.

Spl. tenue *Dicks. op. cit. II*, p. 2.

T. serrata β *tenuis* *Bryol. eur. l. c.* ; *C. M. op. cit.* p. 133.

Syn. et polyg. Ad terr. humid. praepr. turfos. — *Eur.* : Scot., Scandin., et per tot. Alp. jugum. *Am. sept.* : Greenland, Nov. Scotia, New Brunswick, Gaspesia, Montana, Vermont.

Exs. : *Mac. Canad. M.* n. 141.

Uleana *C. M. in Hedwig.* 1895, p. 126.

2. *Cortic.* — *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz.).

TEICHODONTIUM *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 119 (1 spec.).

Rusbyanum *C. M. in op. et l. cc.*

Macromitrium Rusbyanum *Dna E. G. Britt. in Bull. Torr. bot. Club,*
Decembr. 1896.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

TETRACMIS *Brid. Bryol. univ. I*, p. 129 int. syn. (= *TETRAPHIS*).

(1) Cf. *Lindb. in Rev. bryol.* 1884, pp. 17-18 et *Aman op. cit.* 1889, p. 56.

TETRACOCINODON (I) Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1896, pp. 551-553 (1 spec.).

Hectori ej. in op. et l. cc.

Ad rup. calcar. — *Pac.* : Nov. Zeland.

TETRAPHIS Hedw. Fund. M. II, p. 87, t. 7, f. 32 (2 spec.).

Browniana Brid. — *Tetrodontium*.

cylindrica Voit. — *T. pellucida*.

geniculata Girgens. mss. ; *Milde in Bot. Zeit.* 1865, p. 155 ; *W. P. Sch. Bryol. eur. Suppl. Tetraphis*, p. I, t. I.

Georgia geniculata Lindb. *Contrib. ad fl. crypt. As. bor. or.* 1872, p. 239.

Lignic. — *As.* : Japon., Saghalien, Amour. *Am. sept.* : Terr. nov. ? Idaho, Oregon, Columb. brit., Washington, Vancouver, Sitka.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 442.

oblonga Turn. — *T. pellucida*.

ovata Funk. — *Tetrodontium Brownianum*.

pellucida (L.) Hedw. *Sp. M.* p. 43, t. 7, f. I a-f ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 134 ; *Bryol. eur.* II, t. 196.

Bryum diaphanum Web. *Spic. Fl. Goett.* p. 190.

Br. pellucidum Abbot *Fl. Bedf.* p. 231.

Georgia Mnemosyna Ehrh. *Hann. Mag.* 1780, p. 931 ; *C. M. Syn.* I, p. 182.

G. pellucida Rab. *Deutsch. Kryptfl.* II, III, p. 231, n. 6470.

Mnium pellucidum L. *Sp. pl.* p. 1574.

Mn. Serpylli foliis tenuibus pellucidis Dill. *Hist. M.* p. 232, t. 31, f. 2 (*fid. C. M.*).

T. cylindrica Voit. *M. Herbip.* p. 17, n. 1.

T. oblonga Turn. *Musc. hibern.* p. 12.

1. Lignic., rupic. et ad terr. turf. in silv. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in alp. *As.* : lenissei, Obi, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Labrador, Athabasca, Saskatchewan, Vancouver, Canad. tot., Terr. nov., ins. Miquel., reg. bor., or., centr. et occ.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 31 et II ed. n. 26.

Mac. Canad. M. n. 136.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 457.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 161.

« var. *obtusifolia* Kindb. in Hedw. 1896, p. 66 (nom.).

— *Am. sept.* : Washington.

repanda Funk. — *Tetrodontium*.

rigida Hedw. f. — *Tetrodontium Brownianum*.

TETRAPLODON *Bryol. eur.* III (8 spec.).

angustatus (L. f.) *Bryol. eur.* III (mon. p. 4), t. 228 ; *C. M. Syn.* I, p. 130.

Pycnapophyscium angustatum Rehb. *Ic. crypt.*

Splachnum angustatum L. f. *Desc. meth. M.* p. 33 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 248.

Spl. setaceum Mich. *Fl. Am. bor.* II, p. 788 ; *Brid. op. cit.* p. 250.

1. In animal. carnivor. excrement. et murium cadav. — *Eur.* : Rar. in reg. subalp. tract. Alp., copiose in reg. silvat. et turf. Lappon., Scandin., Scotiae, Sudet. *Am. sept.* : Vulgatiss. in reg. arctic. et sept. ; Terr. nov., *M. Alb.* et Adirondack, lac. Super.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 42 (*Splachnum*).

Mac. Canad. *M.* n. 142.

Rab. Bryoth. eur. n. 1267.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 228.

« *var. Anzei de Not. Epil.*

Ad *Larices*. — *Eur.* : Ital. super.

« *var. latifolius Lindb. et Arn. M. As. bor.* 1890, II, p. 61.

— *As.* : *Ienissei* infer.

australis Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 151 ; *Sull. M. of U. St.* p. 53, t. 4 et *Id. M.* p. 97, t. 58 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 192.

Spl. setaceum H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed. n. 27.

1. In palud. et ad sterc. mulorum. — *Am. sept.* : Nov. Scotia ; a New Jersey ad Florid.

Exs. : Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 227.

Brewerianus de Not. — *T. mnioides var. Brewerianus.*

bryoides Lindb. — *T. mnioides.*

fuegianus Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1895, p. 64 et in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot.* p. 281, t. 4, f. 14.

1.

— *Am. merid.* : Patagon. austr., terr. Magell.

mnioides (L. f.) Bryol. eur. III (mon. p. 5), t. 289 ; *C. M. Syn.* I, p. 130.

Phascum mnioides L. f. Meth. M. p. 6.

Ph. pedunculatum L. Syst. veg. p. 944.

Splachnum arcticum R. Br. Fl. ins. Melville, p. 301.

Spl. bryoides Zoega Fl. Island p. 239 ?

Spl. exsertum R. Br. l. c.

Spl. mnioides Hedw. M. frond. II, p. 35, t. II ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 240.

Spl. propinquum R. Br. l. c.

T. bryoides Lindb. M. Scand. p. 19.

1. In Alp. reg. silvat. et turfosis, nec non in sterc. animal. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor., Scand., Scot., Angl., Hibern., Alp. Salisb., Helvet. ; Sudet., Belg. *As.* : Kamschatka, penins. Tchutschica, *Ienissei* inf., Japon., Alp. Yunnan, Sikkim. *Am. sept.* : Groenland, fret. Smith, Labrador, Terr. nov., ins. Miquelon ; a New Brunswick usq. ad m. Behring ; Columb. brit., *M. Rupestr.*, Washington, Vancouver, Sitka, *M. Adirondack, Alb.* et Catskill.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 40 et 41 (*Splachnum*).

Mac. Canad. *M.* n. 143.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 229.

« *var. Adamsianus (Hsch.) Bryol. eur. et C. M. ll. cc.*

Splachnum Adamsianum Hsch. in Hor. phys. Berol. p. 58, t. 12 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 250.

Spl. paradoxum Adamsianum R. Br. l. c.

Ut typ. — *As.* : Arctic. *Am. sept.* : Arctic.

« *var. Brewerianus (Hedw.) Bryol. eur. et C. M. ll. cc.*

Bryum ampullaceum, foliis et ampullis angustioribus Dill Hist. M. p. 345, t. 44, f. 5.

Br. canescens Vill. Pl. Dauph. III, p. 883 ?

Splachnum Brewerianum Hedw. M. frond. p. 105, t. 38 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 251.

Spl. canescens P. B. *Prodr.* p. 88 ?

Spl. fastigiatum Dicks. *Fasc. Pl. crypt.* III, p. 2.

Spl. mnioides β majus H. et T. *Muscol. brit.* p. 20.

T. *Brewerianus* de Not. *Epil.* p. 466.

Locis humidior. — *Eur.* : Ubi typ. *Am. sept.* : Copiose in arctic.

« *var. cavifolius* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 304 et II ed. p. 365.

Splachnum urceolatum Hedw. *M. frond.* II, p. 39, t. 13 ; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 242 p.p.

Ut typ. — *Eur.* : Scandin. *As.* : Arctic. *Am. sept.* : Arctic.

Mülleri Arn. et Lindb. — *Krauseella tchutschica*.

pallidus Hagen in *Det Kong. Norske Vid. Selsk. Skrift.* 1893, p. 75.

— *Eur.* : Scandia.

tasmanicus Hpe. in *Linn.* 1876, p. 302 ; *Weymouth in Pap. and Proceed. of the roy. Soc. of Tasman.* 1894-95, p. 206-207 (*descript. locupletior*).

Splachnum Gunnii (fid. Mitt.) (1).

— *Pac.* : Tasman.

tchutschicus C. M. in *Bot. Centralbl.* 1883, n. 2-4.

1. — *As.* : Penins. *Tchuschica*, perrar.

tchutschicus Lindb. — *Krauseella*.

urceolatus *Bryol. eur.* III (mon. p. 7), t. 290 ; *C. M. Syn.* I, p. 131.

1. Locis gramin. apric. ventis verberat. — *Eur.* : Summ. Alp. Helvet., Bavar., Carinth., Stir., Salzburg. ; deest in Scandin. et in Britann. *As.* : Sikkim, Caucas. *Am. sept.* : Labrador, summ. M. Rupestr., fret. Kotzebue, mar. Behring, Colorado.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 38 (*Splachnum*).

Rab. *Bryoth. eur.* n. 65 b.

Wormskioldii Lindb. — *Splachnum*.

TETRAPTERUM Hpe. in litt. ad C. M. *Syn.* I, p. 29 (1 spec.).

australe Hpe. — T. *capense* *var. cylindricum*.

capense Hpe. *mss.* ; *Jaeg. M. Cleist.* p. 26.

Phascum tetragonum Harv. in *Hook. bot. Misc* I, p. 124, t. 31 ; *C. M.* l. c. et II, p. 521.

2. — *Afr.* : C. B. Sp.

Exs. : Rehm. *M. Afr. austr.* n. 76.

« *var. cylindricum* (Tayl.) Par.

Astomum cylindricum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 70.

Phascum cylindricum Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1846, p. 42.

Ph. tetragonum *var. cylindricum* C. M. l. c.

T. *australe* Hpe. in *Linn.* 1853, p. 489.

T. *cylindricum* *Jaeg. M. Cleist.* p. 27.

— *Pac.* : Austral. or., Tasman.

cylindricum *Jaeg.* — T. *capense* *var. cylindricum*.

Tetrastichium Mitt. *M. austr. am.* p. 359 (sect. LEPIDOPILI).

(1) « *Tetraplodon tasmanicus* a *Splachno Gunnii* foliis integerrimis jam recedit ! » Geh. in *Rev. bryol.* 1897, p. 70.

THAMNIUM Bryol. eur. V (39 spec.).

Spec. omn. non indicatae sunt POROTRICHAE ejusd. nom.

africanum (Welw. et Duby) Jaeg. Ad. II, p. 216.

Hypnum africanum W. et D. in Mém.... Genève, 1871, p. 12, t. 3, f. 4.

Ster. Ad arbor. — Afr.: Ins. S. Thom., Angola.

allegghaniense (C. M.) Bryol. eur. V (mon. p. 4); Lesq. et Jam. Man. p. 362.

Hypnum allegghaniense C. M. Syn. II, p. 502; Sull. Ic. M. p. 161, t. 103.

H. neckeroides H. f. et W. in Drumm. M. bor. am. II ed. n. 119.

l. et syn. Ad saxa irror. — Am. sept.: Nov. Scot., Ottawa, Ontario, Pensilv., Ohio, Missouri, Arkansas.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 302.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 422.

alopecurum (L.) Bryol. eur. l. c. t. 518; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 688.

Hypnum alopecurum L. Sp. pl. p. 1594; Brid. Bryol. univ. II, p. 444; C. M. Syn. II, p. 501.

H. Arbuscula Brid. M. Rec. II, II, p. 96.

H. dendroides, obscurius, setis et capsulis brevioribus subnutantibus Dill. H. M. p. 315, t. 41, f. 49.

H. neckeroides Mac. Canad. M. n. 445.

Isothecium alopecurum Spr. M. Pyren. n. 82 et in Ann. and Mag. nat. hist. 1849.

Porotrichum alopecurum Mitt. M. austr. am. p. 467.

2. Ad spelunc. pariet. humid., terr. et rup. umbros. tam quartz. quam calcar. — Eur.: Reg. campestr. et mont. totius, arctic. except. As.: Japon., Himalaya sept. occid., Pers., Caucas. Afr.: Septentr., ins. Azor., Canar., Madeir. Am. sept.: Columb. brit.

Exs.: Faurie, Pl. Jap. n. 304, 504.

Mandon, Pl. Madeir. n. 42 bis.

Rab. Bryoth. eur. n. 292, 902 a, b.

var. *elongatum* Husn. — Th. alopecurum var. protensum.

“ var. *Lemani* Schnetzler in Husn. Muscol. gall. p. 348 et in Bot. Centralbl. n. 1885, n. 37 et 1886, n. 7.

Submers. — Eur.: Lac. Lemman.

var. *pendulum* Mdo. — Th. alopecurum var. protensum.

“ var. *protensum* Turn. Muscol. Hibern. p. 163.

Th. alopecurum var. *elongatum* Husn. Muscol. gall. p. 348.

Th. alopecurum β *pendulum* Mdo. Bayer. Laubm. p. 221.

Ad cataractas. — Eur.: Passim.

andinum W. P. Sch. in Mandon Pl. Boliv. n. 1712.

— Am. merid.: And. Boliv.

angustifolium Holt in Journ. of bot. 1886, p. 65.

Ster. In calcar. — Eur.: Anglia (Derbyshire).

arbusculans (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 216.

Hypnum arbusculans C. M. in Linn., 1874, p. 618.

2. — Am. sept.: Chile.

arcuans (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 215.

Neckera arcuans Mitt. M. Ind. or. p. 123.

l. — As.: Sikkim, M. Neilgherr.

- Bigelowii (Jaeg.) *Ad. II*, p. 731; *Lesq. et Jam. Man.* p. 362.
 Eurhynchium Bigelowi Jaeg. *op. cit.* p. 418.
 Hypnum Bigelowii Sull. in *Pacif. R. B. IV*, p. 189, t. 9.
 2. — *Am. sept.* : Vancouver, Columb. brit., Oregon,
 M. Calif.
Exs. : Mac. Canad. M. n. 303 (*Hypnum*).
- complanatum W. P. Sch. in *Breutel M. Capens.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- confertum (Mitt.) Par.
 Porotrichum confertum Mitt. in *Voy. H. M. S. Challenger, III*, p. 81.
 Ster. Ad arbor. — *Am. merid.* : Ins. Juan Fernandez.
- decolorans (Welw. et Duby.) Jaeg. *Ad. II*, p. 216.
 Hypnum decolorans W. et D. in *Mém.... Genève*, 1871, t. 3.
 Speluncie. — *Afr.* : Angola.
- decumbens Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. 67 et in *Miss. sc. Cap Horn, V, Bot.* p. 294, t. 5, f. 18.
 Ster. — *Am. merid.* : Terr. Magellan.
- Duthiei C. M. in sched.
 Ster. — *As.* : Himalaya sept. occid.
- eflagellare Ångstr. in *Oefv.* 1872, n. 4, p. 13 (*sub. Th. flagellare* : cf. *err. in op. cit.* 1873, n. 5, p. 151).
 2. Lignic. — *Pac.* : Austral. or. (Nov. Vales.).
- fluviaticum C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 787.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- Hildebrandti (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 135.
 Hypnum Hildebrandti C. M. in *Linn.* 1876, p. 287.
 Ad saxa irror. — *Afr.* : Kilima N'Djaro, Usambara, ins. Anjouan, Mayotte, Mascaren.
- latifolium *Bryol. jav. II*, p. 69, t. 188.
 — *As.* : Sumatra.
- Leibergii (D^{na} E. G. Britton) *Ren. et Card. M. Am. sept.* p. 55.
 Hypnum Leibergii D^{na} E. G. Br. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1889, p. 111.
 2. Ad Quarzit. — *Am. sept.* : Idaho, Washington.
- leptopteris C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 239.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- lombrophyllaceum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 150.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- micro alopecurum *Kindb. in Rev. bryol.* 1895, p. 81.
 Ster. — *Am. sept.* : Oregon.
- Moenkemeyeri (C. M.) Par.
 Hypnum Moenkemeyeri C. M. in *Flora*, 1886, p. 517.
 Ster. — *Afr.* : Ins. Fernando Po.
- Molleri (C. M.) Par.
 Hypnum Molleri C. M. in *Fl.* 1886, p. 284.
 Ster. Terr. — *Afr.* : M. Cameroon, ins. S. Th. m.

neckeroides (*Hook.*) *Bryol. eur.* V (mon. p. 4).

Hypnum Neckera Schwaegr. Suppl. III, II, II, t. 288.

H. neckeroides Hook. M. ex. t. 58; C. M. Syn. II, p. 502.

Isothecium neckeroides Brid. Bryol. univ. II, p. 373.

2. — *Am. sept.*: Columb. brit., Washington (1).

Am. merid.: Chile. *Pac.*: Nov. Zeland.

Eas.: Lechler, Pl. Chil. n. 631.

obtusatum (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Porotrichum obtusatum L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 158.

Ster. Ad arbor. — *As.*: *lenissei med.*

pandum (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. II, p. 216.*

Isothecium pandum H. f. et W. Fl. of the N. Zeal., t. 89, f. 1.

Arbor. et rupic. — *Pac.*: Nov. Zeland. *bor. et med., Austral. or.*
(Queensland, Nov. Vales.).

parvulum (*Mitt.*) *Jaeg. op. cit. II, p. 215.*

Neckera parvula Mitt. M. Ind. or. p. 123.

Ster. — *As.*: M. Neilgherr.

perpusillum *C. M. in Rev. bryol.* 1877, p. 43 (nom.).

— *Pac.*: Austral. or. (Nov. Vales.).

planissimum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 20.*

— *Afr.*: M. Cameroon.

plicatum *Sande Lac. in Miq. Aus. bot. Lugdun. Batav. II, p. 299.*

Porotrichum plicatum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 175.

— *As.*: Japon.

profusum *C. M. in Dusen M. Camer. n. 224 a.*

— *Afr.*: M. Cameroon.

pumilum (*Hook. f. et Wils.*) *Par.*

Isothecium pumilum H. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 206, t. 175, f. 7.

Microthamnium pumilum Jaeg. Ad. II, p. 492.

Neckera rivalis Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 89.

2. *Rupic.* — *Pac.*: Austral. or. (Nov. Vales.), Tasman.

Sande Besch. Fl. bryol. Japon, p. 381.

Isothecium subseriatum Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 231.

Neckera subseriata Dz. et Mk. in Herb. Mus. Lugd. Batav.

Porotrichum subseriatum Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1891, p. 175.

Thamnium Yokohamae? C. M. in hb. Sb.

Th. subseriatum ej. in Journ. of the Linn. Soc. 1865, p. 155; *Sande Lac.*
in Prolusio Fl. Jap.

1. — *As.*: China or. (Buffalo Bay), Japon.

Exs.: Faurie Pl. Japon. n. 45, 68, 82, 215.

Savatier Pl. Japon. n. 689.

scariosum *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 256.

2. — *Afr.*: Orient. german.

Schmidii (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 215.*

Hypnum alopecurum Mont. in Perrottet M. Neilgh.

H. Schmidii C. M. in Bot. Zeit. 1854, p. 574.

Neckera Schmidii Mitt. M. Ind. or. p. 123.

2. — *As.*: M. Neilgherr.

(1) *Sec. Ren. et Card. in Obs.* 1894, *Th. Leibergii.*

serpentinaule C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 102.

— Afr. : M. Cameroon.

subfasciculatum C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 182.

Ster. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

subseriatum Mitt. — Th. Sandei.

subserratum (Hook.) Besch. *Fl. bryol. Japon*, p. 382.

Hypnum subserratum C. M. *Syn. II*, p. 228.

Neckera subseriata Hook. *Ic. pl. rar. t. I, f. 7.*

N. subserrata ej. in *Lond. Journ. of Bot.* 1840, *II*, p. 13; Mitt. *M. Ind. or.* p. 122.

Rupic. — As. : Nepal., Simla, Sikkim, Himalaya sept. occid.

tenerascens Burch. in *Pap. and Proced. of the roy. Soc. of Tasman.* 1893, p. 204 (nom.).

— Pac. : Tasman.

thyrsodes C. M. in *Nuov. giorn. bot. ital.* 1897, p. 149.

Th. andinum W. P. Sch. ?

2? — Am. merid. : And. Boliv.

Yokohamae C. M. — Th. Sandaei ?

THEDENIA Bryol. eur. V (1 spec.).

suecica Bryol. eur. l. c. t. 454; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 591 (1).

Hypnum suecicum Hartm. *Skand. Fl. VI ed.* p. 358.

Pylaisia suecica Lindb. *Man. M. I*, p. 70.

Stereodon suecicus ej. *M. Scand.* p. 38.

l. — Eur. : Suec., Norveg.

« var. compacta (Lindb.) Jaeg. *Ad. II*, p. 737.

Pylaisia suecica var. compacta Lindb. *op. et l. cc.*

Rupic. — Eur. : Lappon.

THELIA Sull. *Ic. M. et M. of U. St.* (5 spec.).

asprella (Schwaegr.) Sull. *Ic. M.* p. 129, t. 81 et *M. of U. St.* p. 60; Lesq. et Jam. *Man.* p. 299.

Brachythecium asprellum Jaeg. *Ad. II*, p. 398.

Hypnum asprellum Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 246; Brid. *Bryol. univ. II*, p. 480.

H. hirtellum β furcatum C. M. *Syn. II*, p. 469.

H. pseudo-plumosum ej. *op. cit.* p. 352 p.p.

Leskea asprella Bryol. eur. V (mon. p. 2).

2. Ad rad. arbor. — Am. sept. : Lac. Erie, reg. sept., centr. et occ. ; Kansas.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* II ed. n. 129.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 371.

compacta Kindb. in *Ottawa Nat. IV*, p. 62 et in *Mac. Cat.* p. 166.

Th. hirtellum Mac. *Canad. M. n.* 248.

2. Ad Acer. — Am. sept. : New Brunswick, Ontario.

(1) Cf. Philib. in *Rev. bryol.* 1889, p. 60.

hirtella (Hedw.) Sull. *Ic. M. p. 128, t. 80 et M. of U. St. p. 60; Lesq. et Jam. Man. p. 299.*

Hypnum hirtellum C. M. *Syn. II, p. 468.*

Leptohymenium hirtellum Schwaegr. *Suppl. IV in exco. ad t. 322.*

Pterigynandrum hirtellum Hedw. *Sp. M. p. 89, t. 18, f. 2-6; Brid. Bryol. univ. II, p. 188.*

Pterogonium hirtellum Schwaegr. *Suppl. I, I, p. 108.*

2. Cortic. — *Am. sept. : Ontario, reg. sept., centr., or. et merid.*

Exs. : Drumm. M. bor. am. I ed. n. 79 et II ed. p. 90 (Pterogonium).

Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 247 et II ed. n. 370.

hirtella Mac. — *Th. compacta.*

Lescurii Sull. *Ic. M. p. 130, t. 82 et M. of U. St. p. 60; Lesq. et Jam. op. et l. cc.*

Arenic., rar. ad arbor. — Am. sept. : Reg. centr., or. et merid.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. I ed. n. 249 et II ed. n. 372.

robusta Duby in *Flora*, 1875 et *Choix de M. ex. 1875, p. 10, t. 1, f. 1; Lesq. et Jam. op. et l. cc.*

— *Am. sept. : Florida.*

Thelidium C. M. in *Linn.* 1875, p. 466 (sect. *HYPNI sensu Müller. = TRICHOSTELEUM, postea gen. propr.*).

Theliphyllum C. M. *Syn. II, p. 408 (sect. HYPNI sensu Müller.)*.

THIEMEA C. M. in *Bot. Centralbl.* 1881, n. 37 (1 spec.).

Hampeana C. M. in *op. et l. cc.*

Funaria saxicola Hpe. in *Jaeg. Ad. II, p. 697.*

1 ?

— *As. : Birman., Pegu.*

Thuidiella W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 91 (subgen. THUIDII)*.

THUIDIUM *Bryol. eur. V (244 spec.)*.

abietinum (L.) *Bryol. eur. V (mon. p. 9), t. 485; W. P. Sch. Syn. II, p. 615.*

Hypnum abietinum L. *Sp. pl. 1591; C. M. Syn. II, p. 482.*

H. lutescens, alis subulatis tenacibus Dill. *Hist. M. p. 280, t. 35, f. 17.*

H. Stereodon abietinus Brid. *Bryol. univ. II, p. 573.*

2. In ericet. sicc. et abiegn. arenos. — *Eur. : Vulgatiss., rar. fructif.; Spitzberg. As. : Amour, penins. Tchutschica, Ienissei, Obi, Taimyr, Caucas., Kashmir. Am. sept. : Groenland, Terr. nov., New Brunswick, Nova Scot., Ottawa, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., Athabasca, reg. sept.*

Exs. : Drumm. M. bor. am. ed. n. 216 (Hypnum).

Mac. Canad. M. n. 273.

Rab. Bryoth. eur. n. 770 et b.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 413 (Hypnum).

aculeo-serratum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 121 et *M. Masc. Mad. n. 231.*

2. Ster.

— *Afr. : Madagascar.*

- acuminatum *Mitt. M. austr. am. p. 579.*
Hypnum pseudo-recognitum Hpe. in Enum. M. Brasil. p. 85 et in Fl. 1881.
Thuidium pseudo-recognitum Broth. in Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handl. 1895, n. 3.
 Ad rup. humid. et rad. arb. — *Am. sept. : Jamaic. Am. merid. : Brasil. austr. or.*
- aequatoriale *Mitt. in Spr. M. Amaz. et And. n. 1471.*
Hypnum delicatulum Hsch. Fl. Brasil.
 — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*
- aequinotiale *Mitt. in sched.*
Hypnum tamariscinum Hsch. Fl. Brasil.
 — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*
- aestivum *Aust. — Th. scitum var. aestivale.*
- afro-capillatum *Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1897, p. 284.*
 1. — *Afr. : Regio lacustr.*
- Alleni *Aust. in Bull. Torr. bot. Club, VII, p. 16.*
Hypnum Alleni Lesq. et Jam. Man. p. 327.
 Ster. Paludic. — *Am. sept. : Connecticut.*
- amblyostomum (*C. M.*) *Par.*
Hypnum amblyostomum C. M. in Linn. 1880-83, p. 483.
 1. Cortic. — *Am. merid. : Argentin. Buenos-Ayr.*
- « *var. attenuatifolium (C. M.) Par.*
Hypnum amblyostomum var. attenuatifolium C. M. in op. cit. p. 485.
 Ut et ubi typ.
- « *var. paludicolum (C. M.) Par.*
Hypnum amblyostomum var. paludicolum C. M. in op. cit. p. 484.
 Lignic. in paludos. — *Am. merid. : Ubi typ.*
- amblystegioides *C. M. in Rev. bryol. 1876, p. 4 (nom.).*
Th. furfurosum (fid. Mitt.).
 — *Pac. : Austral. or. (Nov. Vales.).*
- angolense *Welw. et Duby in Mémoires... Genève, 1871, p. 17, t. 5, f. 4.*
 1. Cortic. in silv. — *Afr. : Angola.*
- angustifolium *Jaeg. — Pseudo-Leskea.*
- angustifrons (*C. M.*) *Par.*
Tamariscella angustifrons C. M. in sched.
 Ster. — *As. : Himalaya sept. occid.*
- Antillarum *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 70.*
H. tamariscinum ♂ *delicatulum Brid. Bryol. univ. II, p. 441 ?*
H. tamariscinum ζ *tenerrimum ej. op. cit. p. 443 ?*
 2. — *Am. sept. : Costa Rica, Antill. gall.*
- Araucariae *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 191.*
 Terr. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*
- Arzobispae (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II, p. 319.*
Hypnum Arzobispae C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.
H. intermedium Hpe. Prodr. Fl. Nov. Granat. p. 103.
 1. Rupic. — *Am. merid. : And. Nov. Granat.*

assimile (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 326.

Leskea assimilis Mitt. *M. Ind. or.* p. 133.

2. — *As.* : Yunnan, Himalaya occ., Sikkim.

? *assurgens* (Sull. et Lesq.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 190.

Hypnum assurgens Sull. et Lesq. in *Proced. of the Am. Acad.* 1860, p. 279.

2. Lignic. — *As.* : Japon., ins. Loo Choo.

? *austro-serpens* (C. M.) Par.

Hypnum austro-serpens C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 459.

1. — *Am. merid.* : Uruguay.

bello-confertum C. M. in sched.

Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. occid. (ins. Aron).

bifarium *Bryol. jav. II*, p. 123, t. 226.

2? — *As.* : Java, Sumatra.

« *var. pertenuis* *Bryol. jav. l. c.*

— *As.* : Celebes.

bipinnatum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 190.

1. *As.* : Japon.

Blandowii (Web. et Mohr) *Bryol. eur. V* (mon. p. 10), t. 486; W. P. Sch. *Syn. II* ed. p. 616.

Hypnum abietinum var. paludosum Wahlenb. *Fl. Suec. II*, p. 698.

H. affine Crome *Nachl. II*, n. 20.

H. Blandowii W. et M. *Bot. Taschb. I*, p. 332; C. M. *Syn. II*, p. 454.

H. laricinum Wils. in *Hook. Brit. fl. II* ed., I, p. 87 et in *Engl. Bot. Suppl. t.* 2760.

H. Stereodon Blandowii Brid. *Bryol. univ. II*, p. 577.

1. In turfis. uligin. — *Eur.* : Scandin., German. sept., Dan., Neerland, Britann. *As.* : Kamschatka, Saghalien, Ienissei. *Am. sept.* : Groenland, ins. Miquelon, Anticosti, Nov. Scotia, New Brunswick, Ottawa, Ontario, M. Rupestr., Columb. brit., Vermont, New York, Ohio, Wisconsin, Washington, Colorado.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. I* ed. n. 215 (*Hypnum*).

Mac. *Canad. M.* n. 274.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 141 b.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II* ed. n. 414 (*Hypnum*).

Un. itin. 1865, n. 95, 96.

blepharophyllum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 329.

Hypnum blepharophyllum C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 573.

H. tamariscinum var. delicatulum Mont. in Perrot. *M. Neilgherr. ?*

Leskea amblyophylla Mitt. *M. Ind. or.* p. 133.

2. — *As.* : M. Neilgherr.

Bolanderi (G. N. Best) Par.

Claopodium Bolanderi G. N. Best in *Bull. of the Torr. bot. Club*, 1897, p. 431.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Calif.

Bonianum Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1887, p. 98.

1. — *As.* : Tonkin.

borbonicum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 148.

1. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

brachypyxis (C. M.) Par.

Hypnum brachypyxis C. M. in *Journ. of Bot.* 1877, p. 229 (nom.).

Lignic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

brachypyxis C. M. — Th. Lorentzi.

Brachythecium (Hpe. et Ltz.) Jaeg. *Ad. II*, p. 320.

Cyrto-Hypnum Brachythecium Hpe. et Ltz. in *Bot. Zeit.* 1869, p.

1. In silv. mont. — *Am. merid.* : Æquator

Brandisi (C. M.) Jaeg. *op. cit.* p. 328.

Hypnum Brandisi C. M. in *Fl.* 1878, n. 6.

2. — *As.* : Himalaya bor. occ.

brasiliense Mitt. *M. austr. am.* p. 579.

Ster. — *Am. merid.* : Brasil. æquinoct.

byssoideum Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 95.

1. Terr. — *Afr.* : Ins. Mayotte.

byssoideum C. M. — Th. guatemalense.

byssophorum C. M. in *sched.*

Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. brit.

caldense Broth. in *Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* 1895, n. 3.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

calopteris C. M. in *sched.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

calyptratum (Sull.) Par.

Hypnum calyptratum Sull. in *Pac. R. R. IV*, p. 190, t. 10 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 324.

1. Terr. — *Am. sept.* : Calif.

campanulatum Mitt. *op. cit.* p. 574.

Lignic. — *Am. merid.* : And. Quitens.

Campbellianum (Hpe.) Jaeg. *op. cit.* p. 326.

Cyrto-Hypnum Campbellianum Hpe. in *Linn.* 1874, p. 670.

2. — *Pac.* : Ins. Nov. Hebrid.

capillatum Jaeg. — *Pseudo-Leskea*.

Carantæ (C. M.) Jaeg. *op. cit.* p. 330.

Hypnum Carantæ C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

2. Fr. ign. Rupic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

casuarinum (C. M.) Jaeg. *op. cit.* p. 331.

Hypnum casuarinum C. M. in *Linn.* 1874, p. 569.

♂ et fr. ign. — *As.* : M. ins. Philippin.

? *cataractarum* (C. M.) Par.

Hypnum cataractarum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 458.

Leskea microphylla Mitt. *M. austr. am.* p. 568.

1. Ad rup. irror. — *Am. merid.* : And. Peruv., Brasil. austr. or.

catenulatum de Not. — *Pseudo-Leskea*.

candatulum C. M. in *sched.*

Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. brit.

chacoanum C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 143.

1. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic. (Chaco).

- Chenagoni *C. M. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, II, p. 129.
Th. integricalyx ej. in Ren. M. Masc.-Mad. n. 134.
 1. — *Afr.*: Madagascar (Diego Suarez).
- chilense *Mitt. op. cit. p.* 579.
 Ster. — *Am. merid.*: Chile.
- chloropsis (*C. M.*) *Par.*
Hypnum chloropsis C. M. in Fl. 1886, p. 525.
 Ster. *Rupic.* — *Afr.*: Gabon.
- chrysopteris (*C. M.*) *Par.*
Tamariscella chrysopteris C. M. in sched.
 Ster. — *As.*: Himalaya sept. occid.
- ciliatum *Mitt. op. cit. p.* 576.
 — *Am. merid.*: And. Peruv.
- complanum *Mitt. op. cit. p.* 575.
 1. — *Am. merid.*: Ins. Trinitat.
- concinnum *C. M. in sched.*
 — *As.*: Himalaya sept. occid.
- contortulum (*Wils.*) *Jaeg. op. cit. p.* 322.
Hypnum contortulum Wils. in sched.
Leskea contortula Mitt. M. Ind. or. p. 134.
 — *As.*: Sikkim.
- crenulatum *Mitt. Fl. Vit. p.* 402
 1. — *Pac.*: Ins. Sandwic.
- crispifolium (*Hook.*) *Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 272.
Claopodium crispifolium Card. M. Am. bor. p. 50.
Hypnum crispifolium Hook. M. ex. t. 31; *C. M. Syn. II, p.* 450; *Lesq. et Jam. Man. p.* 329.
Isothecium crispifolium Brid. Bryol. univ. II, p. 360.
 2. Ad terr. et rup. humid. — *As.*: Amour. *Am. sept.*: Alaska, Vancouver, Columb. brit., Washington, Oregon, Idaho, Calif.
Exs.: Mac. Canad. *M. n.* 275, 276,
Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. p. 405.
- curvatum *Mitt. in Melliss's S. Helena, 1875, p.* 365.
 Ster. — *Afr.*: Ins. Tristan d'Acunha.
- cygnisetum (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. II, p.* 318.
Cyrto-Hypnum cygnisetum Hpe. in sched.
Tamariscella cygniseta C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1891, p. 601.
 — *As.*: Birman.
- cylindraceum *Mitt. M. austr. am. p.* 574.
 — *Am. merid.*: And. Quitens.
- cylindraceum *Mitt.* — *Th. fugisanum.*
- cylindrangium *C. M. in sched.*
 — *As.*: Himalaya sept. occid.
- cylindrella *C. M. in Hedwig. 1897, p.* 142.
 1. — *Am. merid.*: And. Argentina. subtropic.
- cymbifolium (*C. M.*) *Par.*
Hypnum cymbifolium Sull. in Exped. Wilkes, p. 17? (*C. M.*).
Tamariscella cymbifoliola C. M. in Fl. 1896, p. 476.
 — *Pac.*: Ins. Sandwic.

cymbifolium (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. II*, p. 165, t. 221.

Hypnum cymbifolium Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 306; C. M. *Syn. II*, p. 485.

Leskea cymbifolia Mitt. *M. Ind. or.* p. 163.

2. *Rupic.* — As.: Japon., Alp. Yunnan, Kashmir, Himalaya, Sikkim, Nepal., Khasia, M. Neilgherr., ins. Nicobar, Sumatra, Java, penins. Malay., ins. Ceram, Halmaheira, Saparaea, Amboine, Celebes.

decipiens de Not. *Epil.* p. 233; W. P. Sch. *Syn. II ed.*, p. 612 (1).

Amblystegium glaucum var. *decipiens* Lindb.

Hypnum Notarisii Boulay *M. Fr.* p. 597.

1. In uligin. et ad rivul. — Eur.: Britann. ? Finmarck. ? Alp. Helvet., Arvernia, Pyren., Ital. super. As.: Caucas.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 1182.

delicatulum (Hedw.) Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. XII*, p. 578; W. P. Sch. *Syn. II ed.*, p. 615.

Hypnum delicatulum L. *Sp. pl. I ed.*, II, p. 1125, n. 16 (quoad sol. pl. Americ.); *Hedw. M. frond. IV*, p. 87, t. 33.

H. filicinum, *Tamarisci foliis minimis non splendentibus, setis, capsulis et alis brevioribus* Dill. *Hist. M.* p. 546, t. 83, f. 6.

H. proliferum Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 136.

H. protensum Rich. in *Mich. Fl. Am. bor. II*, p. 317.

H. tamariscinum Sull. *M. Allegh. n. 3*; Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed.* n. 272.

H. tamariscinum γ *protensum* Brid. *Sp. M. II*, p. 139 et *Bryol. univ. II*, p. 441.

H. tamariscinum δ *delicatulum* ej. *ll. cc.*

Th. protensum Jaeg. *Ad. II*, p. 330.

Th. recognitum var. *delicatulum* Warnst. in *Bot. Centralbl.* 1881, n. 6.

Thuidium delicatulum Lindb. *Man. M. II*, 1874, t. I, f. 8.

2. In silvatic. paludos. — Eur.: Fennia (ins. Hogland, ster.), German. fere tota (*fid. Limpr.*), Gall. austr. (Ardèche), Alp. Rhaet., Astur, As.: Japon., Ienissei med. et super., Caucas. occ. Am. sept.: Labrador, ins. Miquelon, Terr. nov., Nova Scot., New Brunswick, Ottawa, Ontario, Saskatchewan, copiose in reg. sept., centr., or. et merid., ins. Jamaic., Haïti, S. Vincent. Am. merid.: Venezuela, And. Nov. Granat., Amazon., And. Quitens et Peruv., Brasil. austr. or.

Exs.: Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 213 et II ed. n. 136 (*Hypnum*).

Faurie, *Pl. Japon.* n. 57.

Mac. *Canad. M.* n. 272.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 7.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed.* n. 272 et II ed. n. 404 (*Hypnum*).

delicatulum *Bryol. eur.* — *Th. recognitum*.

denticulosum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 324.

Hypnum denticulosum Mitt. in *Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl.*, p. 472.

Ster. — Pac.: Nov. Zeland. sept.

diaphanulum C. M. in. *sched.*

Ster. — Pac.: Nov. Guin. brit.

djuriense (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 313.

Hypnum djuriense C. M. in *Linn.* 1875, p. 472

1. Fr. ign. Ster. — Afr.: Djour.

- dubiosum Warnst. in *Schrift. d. Naturf. Gesells. in Danzig*, 1896, p. 65.
— Eur. : Westphal.
- eccremocarpum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 577.
Hypnum eccremocarpum C. M. *Syn. II*, p. 495.
H. Stereodon minutulus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 578.
1. — Am. sept. : Haïti.
- elodioides Ren. et Card. in *Hedwig*. 1893, p. 251.
Th. paludosum elodioides G. N. Best in *Bull. of the Torr. bot. Club*, 1896, p. 90.
1. — Am. sept. : New York, Indiana.
- erectum Duby in *Fl.* 1875, p. 284 et *Choix de Cr. ex...* 1875, p. 10, t. 11, f. 3.
Hypnum erectum Lesq. et Jam. *Man.* p. 323.
1. — Am. sept. : Florida.
- erosulum Mitt. — Th. faulense.
- exasperatum Mitt. *M. austr. am.* p. 576.
1. Cortic. — Am. merid. : Brasil.
- fallax Kindb. — Amblystegium.
- faulense (Reichdt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 321.
Hypnum faulense Reichdt. in *Verh. d. K. K. zool. et bot. Gesells. in Wien*, 1868, p. 196.
Th. erosulum Mitt. *Sam. M.* p. 186.
1. Cortic. et rupic. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Stewart.
- Fauriei Par.
Th. micropteris Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 367 et in *Faurie, Pl. Japon. n.* 50, 177, 199, 205, 1499.
1. — As. : Japon.
- ferriculum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 222.
Hypnum ferriculum C. M. in *Linn.* 1875, p. 471.
1. Fr. ign. Terr. — Afr. : Dar Fertit.
- filarium Mitt. *M. austr. am.* p. 579.
2. Ster. Ad rad. arb. — Am. merid. : Brasil. or.
- filicinum Kindb. — Hypnum.
- filiforme Welw. et Duby in *Mém.... Genève*, 1871, p. 16, t. 4, f. 7.
Ster. Cortic. et rupic. — Afr. : Angola.
- firmulum C. M. in *Hedwig*. 1887, p. 143.
Ster. — Am. merid. : Argentin. subtropic. Tucuman.
- fissicalyx (C. M.) Par.
Pelekium fissicalyx C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 87 et in *Forschungsreise....* p. 59.
1. Terr. — As. : Amboine.
- Frontinoae (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 319.
Hypnum Frontinoae C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.
1. — Am. merid. : Venezuela, Nov. Granat.
- fuciforme (Brid.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 150.
Hypnum fuciforme Brid. *Sp. M. II*, p. 135 et *Bryol. univ. II*, p. 432 ;
C. M. *Syn. II*, p. 487.
Ster. Terr. in silv. — Afr. : Ins. Borbon., Franciae.

fujisanum Par.

Th. cylindraceum Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 190.

1. — As. : Japon.

fulvastrum (Mitt.) Jaeg. *Ad. II*, p. 322.

Hypnum fulvastrum Hook. *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 471.

H. furfurosum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 107, t. 88, f. 7 (p.p.).

Leskea fulvastra Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 92.

2. — Afr. : Ins. Tristan d'Acunha. Pac. : Nov. Zeland. sept. et med.

furfurosum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 322.

Hypnum furfurosum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 107, t. 88, f. 7 (p.p.) et *Handb.* p. 475; *Fl. Tasm. II*, p. 208, t. 176, f. 2.

H. unguiculatum eor. *Fl. Tasm. II*, cc. f. 3.

Th. hastatum (fid. Mitt.).

2. Ad rup. humid. — Pac. : Nov. Zeland., Austral. or., Tasman.

fuscatum Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 78.

1. In silvis. — As. : Yunnan.

fuscissimum (C. M.) Par.

Haplocladium fuscissimum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

— As. : China or. (prov. Schen-Si).

Giraldii (C. M.) Par.

Abietinella Giraldii C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 115.

Ster. — As. : China or. (prov. Schen-Si).

glaucescens W. P. Sch. in *Besch. Prodr. fl. mexic.*, p. 90.

1. — Am. sept. : Mexic.

glaucinum (Mitt.) *Bryol. jav. II*, p. 117, t. 222.

Leskea glaucinea Mitt. *M. Ind. or.* p. 133.

2. Cortic. et rupic. — As. : Japon., Sikkim, Khasia, Ceylan, Sumatra, Java, Celeb. s. Amboine, ins. Halmaheira, Saparæa.

gracile (Br. et Sch.) *Bryol. eur. V* (mon. p. 5).

Hypnum abietinum β minor Hook. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 217.

H. gracile Br. et Sch. in *Lond. Journ. of bot.* 1843, p. 668 p.p.; C. M. *Syn. II*, p. 488; Sull. *M. Allegh. n.* 5 et *Id. M.* p. 156, t. 100; Lesq. et Jam. *Man.* p. 324.

H. Grayanum Sull. in *sched.* 1850.

H. microphyllum Mühlenbg. *Cat.* p. 99 (fid. Sull.).

H. Stereodon microphyllum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 649 (quoad pl. Pensilv.).

H. varium H. f. et W. in *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 140 et 141 (fid. Sull.).

Leskea gracilis Mitt. in *Proced. of the Linn. Soc.* 1864, p. 44.

Th. microphyllum G. N. Best in *Bull. of the Torr. bot. Club*, 1896, p. 87.

1. Lignic., rupic. et terr. — Eur. : Suecia. As. : Ienissei super., Obi. Am. sept. : New Brunswick, Ottawa, Ontario, Saskatchewan, Terr. nov., reg. sept., orient. et merid.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 270.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. I ed. n.* 277 et *II ed. n.* 410 (*Hypnum*).

« var. *lancastrienne* (Sull. et Lesq.) *Card. M. Am. sept.* p. 49.

Hypnum caespitosum filamentosum minimum subflexum Dill. *Hist. M.* p. 282, t. 36, f. 18?

H. virginianum Brid. *Bryol. univ. II*, p. 576; *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 144.

Th. virginianum Lindb. *M. Scand.* p. 36; G. N. Best in *Torr. bot. Club.* 1896, p. 86, fig. 261.

Ut et ubi typ. in *Am. sept.*; Mexic.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 278 et II ed. n. 411 (*Hypnum*).

« *var. Ravenelii* (Sull. et Lesq.) *Card. op. et l. cc.*

Hypnum gracile var. Ravenelii Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 279.

Muric. et saxic. — *Am. sept.*: Carol. infer., Florida.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 412 (*Hypnum*.)

gracile Lindb. — Th. pallens.

granulatum (Hpe.) Par.

Hypnum granulatum Hpe. *Symb.* 1877, p. 737.

— *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

gratum (P. B.) Jaeg. *Ad. II*, p. 322.

Hypnum gratum P. B. *Prodr.* p. 64; *Brid. Bryol. univ. II*, p. 579; *C. M. Syn. II*, p. 496.

1? Rupic., ad rad. et trunc. arbor. — *Afr.*: Benin, Cameroon, Niger.

guatemalense Par.

Th. byssoideum *C. M. in Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 219.

— *Am. sept.*: Guatemala.

haplohymenioides *C. M. in sched.*

— *As.*: Himalaya sept. occid.

Haplohymenium (Harv.) Jaeg. *Ad. II*, p. 317.

Hypnum Haplohymenium Harv. in *Lond. Journ. of bot.* 1840, *II*, p. 21; *C. M. Syn. II*, p. 489.

Leptohymenium microphyllum Schwaegr. *Suppl. III, II, I, t.* 271.

Leskea Haplohymenium Mitt. *M. Ind. or.* p. 135.

L. microphylla Hook. in *Wallich Cat. n.* 7638.

1. — *As.*: Himalaya, Nepal.

hastatum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 331.

Hypnum hastatum *C. M. Syn. II*, p. 485.

H. recognitum Hpe. in *Preiss Pl. Nov. Holl. II*, p. 119.

Leskea microphylla Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 93.

2. Ad rup. madid. — *Pac.*: Austral. or., Tasman.

hatschullianum Hpe. *hb. (nunc in hb. British Museum)*.

— *As.*: Ins. Andaman.

hawaiense Reichdt. *Beitr.* p. 579.

Hypnum cymbifolium Sull. in *U. St. Expl. Exped. II*, p. 17.

2. Ad rup. madid. umbros. — *Pac.*: Ins. Sandwic.

hispidipes *C. M. in sched.*

— *Pac.*: Nov. Guin. (Onin).

histicosum Mitt. in *Seeman's Journ. of bot.* 1863, *I*, p. 356.

2. — *Eur.*: Anglia (Sussex).

Holzingeri Ren. et Card. in *Bot. Gaz.* 1894, p. 240, t. 22, f. A.

2. — *Am. sept.*: Oregon.

Hookeri (Mitt.) Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, *I*, p. 83.

Leskea Hookeri Mitt. *M. Ind. or.* p. 132.

Ster. — *As.*: Alp. Yunnan, Sikkim, Nepal.

incompleto-pinnatum *C. M. in Pap. and Proced. of the roy. Soc. of Tasman.* 1894-1895, p. 209 (*nom.*).

— *Pac.*: Nov. Zeland., Tasman.

integricalyx C. M. — Th. Chenagoni.

integripilum C. M. in sched.

— Pac. : Nov. Guin. brit.

intermedium Mitt. in *Kew Journ. of bot.* III, p. 353 et *M. austr. am.* p. 573.

1. Rupic. — Am. merid. : And. Nov. Granat. et Quitens.

intermedium Philib. — Th. Philiberti.

intricatum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 317.

Leskea intricata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 161.

1. — Afr. : M. Cameroon.

investe (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 316.

Hypnum investe Mitt. in *Hook. Journ. bot.* 1856, p. 355.

Leskea investis ej. *M. Ind. or.* p. 135.

1. Rupic. — As. : Penins. Malay. (Moulmein).

involvens (Hedw.) Mitt. *M. austr. am.* p. 575.

Hookeria parvifolia Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1843, p. 193 (fid. Mitt.).

Hypnum gratum Brid. *Bryol. univ.* II, p. 579 p.p.

H. involvens P. B. *Prodr.* p. 65 ; C. M. *Syn.* II, p. 496.

H. parvifolium C. M. *Syn.* II, p. 833.

Leskea involvens Hedw. *M. frond.* IV, p. 27, t. 11.

L. Omalia involvens Brid. *Bryol. univ.* II, p. 326.

Stereophyllum parvifolium Jaeg. Ad. II, p. 542.

Th. petradelphus C. M. in *Mitth. aus d. deutsch. Schutzgeb.* 1893, III, p. 5.

1. Cortic. et lignic. — Am. sept. : Cuba, Jamaïc., Martinic. Am. merid. : Venezuela, Guiana, And. Quitens. et Peruv.

« var. thomeanum Broth. in *Bol. da Soc. Brot.* 1890, p.

Rupic. et ad rad. arbor. — Afr. : Ins. S. Thomas, Cameroon, Togo.

iodopteris (C. M.) Par.

Tamariscella iodopteris C. M. in sched.

Ster. — As. : Himalaya sept. occid.

Jacquemonti (Br. et Sch.) Par.

Hypnum Jacquemonti Br. et Sch. in *W. Sch. M. Abyss. n.* 481 ; C. M. *Syn.* II, p. 489.

1. Cortic. — Afr. : Abyss.

japonicum Dz. et Mk. (fid. Sande Lac. in *Miquel Ann. Mus. bot. Lugdun. Batav.* II, p. 297.)

Th. tamarisciforme W. P. Sch. in *Savatier M. Jap. n.* 613 a.

2. — As. : Japon.

Exs. : Faurie, Pl. Japon. n. 31, 409.

Kiaeri C. M. in *Borgen M. Mad. n.* 126 ; Jaeg. Ad. II, p. 740.

— Afr. : Madagascar.

laevipes Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 318.

1. Cortic. — Afr. : Kilima N'Djaro, Usambara.

laeviusculum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 324.

Hypnum laeviusculum Mitt. in *Hook. f. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 471.

Leskea laeviuscula ej. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 92.

2. — Pac. : Nov. Zeland. sept. et med., Austral. or., Tasman.

lasiomitrium Jaeg. — *Th. plumulosum*.

? *laterale* (C. M.) Par.

Hypnum laterale C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 457.

1. — *Am. merid.* : Uruguay.

laxifolium (Hook.) Mac. Cat. p. 187.

Claopodium laxifolium Card. M. *Am. sept.* p. 150.

Eurhynchium laxifolium Jaeg. *Ad. II*, p. 426.

Hypnum laxifolium Schwaegr. *Suppl. II, II*, p. 159, t. 143; C. M. *Syn. II*, p. 449; *Lesq. et Jam. Man.* p. 329.

Isothecium laxifolium Brid. *Bryol. univ. II*, p. 359.

Leskea laxifolia Hook, M. ex. t. 30.

2. — *Am. sept.* : Litt. Alaska et Columb. brit.

leptocladum (Tayl.) Mitt. M. *austr. am.* p. 573.

Hypnum leptocladum C. M. *Syn. II*, p. 495.

Leskea leptoclada Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 339.

1. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Boliv.

? *leptopteris* (C. M.) Par.

Haplocladium leptopteris C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 116.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

leskeaeefolium Ren. et Card. in *Bull. Soc. Roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 199.

1. — *Am. sept.* : Costa Rica.

leskeoides Kindb. — *Th. Whippleanum*.

leuconeuron (Sull.) Lesq. in *Mem. Calif. Acad. I*, p. 31.

Claopodium leuconeuron Card. M. *Am. sept.* p. 59.

Hypnum leuconeuron Sull. ic. M. p. 102, t. 80; *Lesq. et Jam. Man.* p. 328.

Ad Querc. agrifol. — *Am. sept.* : Montana, Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 407 b.

lignicola Kindb. in *Bidrag* p. 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 185.

Th. gracile var. (*vix*!) G. N. Best in *Sull. of the Torr. bot. Club*, 1896, p. 88.

1. Lignic. — *Am. sept.* : Ontario, Manitoba, Columb. brit.

« var. *Roellii* Ren. et Card. in *Hedwig.* 1897, p. 50.

— *Am. sept.* : Ohio.

lonchopodium (C. M.) Par.

Pelekium lonchopodium C. M. in *Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin.*, p. 7.

Th. trachypodon (fid. Geh. l. c.).

Cortic. — *Pac.* : Nov. Guin. merid.

lonchopyxis (C. M.) Par.

Hypnum lonchopyxis C. M. in *Journ. of bot.* 1877, p. 229 (nom.).

Lignic. — *Am. sept.* : Costa Rica.

longicuspes Broth. in *Bihang till K. Sw. Vet.-Akad.* 1895, n. 3.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

longinerve Lindb. in *Ann. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 272.

Syn. Lignic. — *As.* : Amour.

Lorentzi Par.

Th. brachypyxis C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 142.

1. — *Am. merid.* : And. Argentin.

loricalycinum (C. M.) Par.

Hypnum loricalycinum C. M. in *Fl.* 1890, p. 498.

Ster. In silv. — Afr. : Kilima N'Djaro.

? macropilum (C. M.) Par.

Haplocladium macropilum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 116.

1. — As. : China (prov. Schen-Si).

Manianum C. M. in *sched.*

Ster. — As. : Ins. Andaman.

mascarenicum (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 150.

Hypnum mascarenicum C. M. *Syn. II*, p. 485.

H. tamariscinum Brid. *herb.*

2. — Afr. : Ins. Borbon.

matarumense Besch. *op. cit.* p. 149.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

mexicanum Mitt. *M. austr. am.* p. 577.

1. — Am. sep. : Mexic.

Meyenianum (Hpe.) *Bryol. jav. II*, p. 121, t. 224.

Hypnum cymbifolium Duby in *Moritzii Syst. Verz.* p. 131.

H. kuripanum Dz. et Mk. in *Zolling. Verz.* 1854, pp. 27 et 32.

H. Meyenianum Hpe. *lc. M.* 1844, t. 8.

H. plumulosum C. M. *Syn. II*, p. 486.

1. Ad rup. calcar. — As. : Java, ins. Banca, Banda, Saparœa, Philippin.

? microcalycinum (C. M.) Par.

Haplocladium microcalycinum C. M. in *sched.*

— As. : Himalaya sept. occid. (Dehra-Doun).

microcladum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 323.

Hypnum microcladum C. M. in *sched.*

— As. : Pegu.

microphyllum { Best. — Th. gracile.
 { Jaeg. — Pseudo-Leskea.

microphyllum lignicolum G. N. Best. — Th. lignicola.

micropteris C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 65.

Th. gratum (*fid. Broth.*).

— Afr. : M. Cameroon.

micropteris Besch. — Th. Fauriei.

minusculum (Wils.) Jaeg. *Ad. II*, p. 322.

Hypnum minusculum Wils. in *sched.*

Leskea minuscula Mitt. *M. Ind. or.* p. 134.

1. Lignic. — As. : Khasia.

minutulum (Hedw.) *Bryol. eur. V* (mon. p. 5), t. 481 ; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 609.

Hypnum bavaricum Voit in *Sturm Fl. Germ. II, fasc.* 14.

H. Martianum Sendtn. in *Regensb. Denkschr. III*, 1841, p. 150.

H. minutulum Hedw. *M. frond. IV*, p. 90, t. 34 ; C. M. *Syn. II*, p. 492.

H. Stereodon minutulus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 578.

1. Lignic. — Eur. : Vall. Rhen. med., Bavar., Salisb. ; Stir. ? Afr. : Ins. Azor. Am. sept. : New Brunswick, Ottawa, Ontario, tota temper. copiose.

Exs. : Drumm. M. bor. am. II ed. n. 137 (*Hypnum*).

Mac. Canad. M. n. 268 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 540.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 406 (*Hypnum*).

minutulum Mitt. — Th. Wrightii.

miradoricum Jaeg. — Th. tamariscinum var. mexicanum.

Molkenboeri Sande Lac. in Miquel Ann. Mus. bot. Lugdun. Batav. II, p. 298, t. 2.

— As. : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 3522.

muricatum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 319.

Hypnum muricatum Hpe. in Linn. 1847, p. 88 (false *H. muriculosum* in Ann. sc. nat.) ; C. M. Syn. II, p. 493.

1. — Am. merid. : Venezuela.

muricolum Jaeg. — Pseudo-Leskea.

nabambissense (C. M.) Jaeg. Ad. II, p. 322.

Hypnum nabambissense C. M. in Linn. 1875, p. 470.

1. — Afr. : Niam-Niam.

nano-delicatulum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 325.

Hypnum nano-delicatulum Hpe. in Linn. 1876, p. 323.

Th. Pennula C. M. in Bail. Syn. of the Queensland Fl. IV, Suppl. p. 99.

Fr. ign. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

nanophyllum C. M. in Fl. 1896, p. 476.

— Pac. : Ins. Sandwic.

Naumanni (C. M.) Par.

Hypnum Naumanni C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 87 et in Forschungsreise... p. 56.

2. Ad arbor. — Pac. : Nov. Hannov., Nov. Mecklenb., Nov. Guinea.

nigerianum (Mitt.) Par.

Leskea nigeriana Mitt. in M. hb. Hook. 1860, p. 52, t. 5, f. 8.

1 vel syn. — Afr. : Niger.

nipponense W. P. Sch. — Pseudo-Leskea capillata.

niveo-calycinum C. M. in Hedwig... 1897, p. 140.

1. — Am. merid. : Argentin. subtrop. (Chaco).

nutans Besch. Fl. bryol. Nov. Caledon. p. 238.

2. Rupic. — Pac. : Nov. Caledon.

obscuriusculum Jaeg. — Pseudo-Leskea.

occultirete C. M. in Hedwig. 1887, p. 142.

1. — Am. merid. : Argent. subtropic. Saltens.

orthangium (C. M.) Par.

Tamariscella orthangia C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

orthocarpum Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 90.

Leskea tamariscina W. P. Sch. in hb. Mus. Paris.

2. — Am. sept : Mexic.

pallens *Lindb. mss.* 1865; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 611.

Hypnum pallens *Lindb. mss. in M. nov. Scand.* 1868.

Th. gracile *Lindb. in Not. ur. Saellsk. pro Faun. et Fl. fenn. Voerh.* 1868, IX, p. 268.

l. — *Eur.*: *Suec. merid.*

paludosum (*Sulliv.*) *Rau et Herv. Cat.* p. 38.

Elodium paludosum *Aust. M. Appal. n.* 306.

Hylocomium paludosum *Jaeg. Ad. II,* p. 611.

Hypnum paludosum *Sull. M. Allegh. n.* 7, *M. of U. St.* p. 68 et *Id. M.* p. 157, t. 101.

l. *Paludic.* — *As.*: *Japon. Am. sept.*: *Rhode-Island, Massachus., Vermont, Ohio sept., etc.*

Exs.: *Sull. et Lesq. M. bor. am.* II ed. n. 281 et II ed. n. 415.

papillariaceum (*C. M.*) *Par.*

Haplocladium papillariaceum *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

— *As.*: *China or. (prov. Schen-Si).*

paraguense *Besch. in Rev. bryol.* 1885, p. 18 et in *Journ. de bot.* 1891, p. 346.

l. *Lignic.* — *Am. merid.*: *Paraguay.*

Exs.: *Bal. Pl. Parag. n.* 3688.

pauperum (*C. M.*) *Mitt. M. austr. am.* p. 576.

Hypnum muricatum *C. M. in Bot. Zeit.* 1848, p. 779.

H. pauperum *ej. Syn. II,* p. 493.

l. *Lignic.* — *Am. merid.*: *Venezuela.*

pelekioides *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1893, p. 479.

l. — *Pac.*: *Nov. Guinea.*

pellucens *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1894, I, p. 198

l. *In silvat.* — *Am. sept.*: *Costa Rica.*

pennula *C. M.* — *Th. nano-delicatulum.*

perbyssaceum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 267.

Rupic. — *Afr.*: *M. Cameroon.*

perintricatum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum perintricatum *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 293; *Par. Index,* p. 667.

— *Afr.*: *M. Cameroon.*

perrigidum *C. M. in Bull. hb. Boissier,* 1897, p. 567.

— *Am. sept.*: *Jamaic.*

perscisum (*C. M.*) *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.,* p. 148.

Hypnum perscisum *C. M. in Linn.* 1876, p. 286.

l. *Cortic.* — *Afr.*: *Ins. Anjouan, Mayotte.*

persistens (*C. M.*) *Par.*

Hypnum persistens *C. M. in Linn.* 1880-83, p. 485.

Ster. — *Am. merid.*: *M. Argentin. Buenos Ayr.*

peruvianum *Mitt. M. austr. am.* p. 578.

— *Am. merid.*: *And. Nov. Granat. Quitens. et*

Boliv.; Peruv.

petradelphus *C. M.* — *Th. involvens* var. *thomeanum.*

Philiberti Limpr. *Laubm. Deutschl. II*, p. 835.

Th. intermedium *Philib.* in *Rev. bryol.* 1893, p. 33(1); *G. N. Best in Torr. bot. Club*, 1896, p. 84, fig. 260.

Th. *recognitum* var. *radicans* Kindb. in *Rev. bryol.* 1892, p. 103.

2. In calcar. humid. — *Eur.*: Voges., Jurass., Sabaud., Helvet., Bavar., Anglia, Stir. *Am. sept.*: New Jersey, Pensilv.

pinnatum Lindb. in *sched.*; Ångstr. in *Oefv....* 1876, p. 46.

Hypnum pinnatum Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 87.

1. Lignic. — *Am. merid.*: Brasil. or.

pinnatum Rehm. — Th. *Rehmanni*.

plicatum Mitt. *Fl. Vit.* p. 402.

— *Pac.*: Ins. Sandwic.

plumulosiforme (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 333.

Hypnum plumulosiforme Hpe. in *Linn.* 1876, p. 324.

2. — *Pac.*: Austral. or. (Nov. Vales.).

plumulosum (Dz. et Mk.) *Bryol. jav. II*, p. 118, t. 223.

Hypnum lasiomitrium C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 393.

H. plumulosum Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1844, p. 308 et *M. Archip. ind.* p. 13.

Th. *lasiomitrium* Jaeg. *Ad. II*, p. 333.

2. — *As.*: Ceylan, Sumatra, Java, Borneo, Ceram, Amboine, Molucc. *Pac.*: Ins. Admiral., Fidji, Nov. Guinea.

pristocalyx (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 323.

Hypnum pristocalyx C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 573.

Leskea pristocalyx Mitt. *M. Ind. or.* p. 133.

2. — *As.*: M. Neilgherr.

protensum Jaeg. — Th. *delicatulum*.

pseudo-æquatoriale (C. M.) Par.

Tamariscella pseudo-æquatorialis C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 140.

Ster. — *Am. merid.*: And. Argentin. subtropic.

« *var. casuarina* (C. M.) Par.

Tamariscella pseudo-æquatorialis var. casuarina C. M. l. c.

— *Am. merid.*: And. Boliv., Argentin. subtropic.

Tucuman.

pseudo-delicatulum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 326.

Hypnum pseudo-delicatulum C. M. in *Fl.* 1875, n. 34-35.

2. Ster. Filicic. — *Am. merid.*: Nov. Granat.

pseudo-involvens (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 148.

Hypnum pseudo-involvens C. M. in *Linn.* 1876, p. 285.

1. Cortic. — *Afr.*: Tropic. orient., ins. Anjouan, Mayotte.

pseudo-protensum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 578.

Hypnum pseudo-protensum C. M. in *Bot. Zeit.* 1848, p. 779 et *Syn. II*, p. 484.

2. Ster. Cortic. — *Am. merid.*: Venezuela.

pseudo-recognitum Broth. — *Thuidium acuminatum*.

pseudo-Tamarisci Limpr. *Laubm. Deutschl. II*, p. 831 (1).

2. Muric. et terr. in umbros. — *Eur.*: Tirol., Carinth., Carniol.

pulchellum de Not. *Epil.* p. 235; W. P. Sch. *Syn.* II, p. 611.

Pseudo-Leskea gracilis (fid. *Limpr.*).

1. — *Eur.*: Ticin. (Locarno).

pulchellum A. Kerner. — *Th. punctulatum*.

pulvinatum C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 141.

Ster. — *Am. merid.*: Uruguay.

punctulatum de Not. *Erb. critt. ital.* n. 909 et *Epil.* p. 234; W. P. Sch. *op. cit.* p. 610.

Hypnum punctulatum Bals. et de Not. *Prodr. bryol. Mediol.* p. 78 et *Syll. M.* p. 12; C. M. *Syn.* II, p. 488.

Th. gracile var. *lancastricense* (fid. *Limpr.*).

Th. pulchellum A. Kerner *Fl. exs. austr. hung.* n. 1930.

1. Terr. — *Eur.*: Rhaet., Ticin., Lombard., Pedem.; Transilv., Stir. As.: Caucas. occ. (1).

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 769.

purpureum (Geh. et Hpe.) Par.

Hypnum purpureum G. et Hpe in *Fl.* 1881.

2. — *Am. merid.*: Brasil. austr.

pusillum Mitt. *M. austr. am.* p. 577.

1. — *Am. merid.*: Venezuela.

pycnangiellum C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 225; Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 283.

2. Lignic, rupic. et ad rad. arbor. — *Afr.*: M. Cameroon.

pycnothallum (C. M.) Par.

Tamariscella pycnothalla C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 116.

2. — As.: China or. (prov.-Schen Si).

pygmaeum (Sull.) *Bryol. eur.* V (mon. p. 6).

1. Rupic. — *Am. sept.*: Rar.: Canada, New Jersey, Pensilv., Ohio.

Exs.: Sull. et Lesq. *M. bor. am.* I ed. n. 277 et II ed. n. 408.

quadrifarium Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 189.

Hypnum pygmaeum Sull. *M. of U. St.* p. 67 et *Id. M.* p. 153, t. 98; Lesq. et Jam. *Man.* p. 322.

Hypnum proliferum var. *compactum* Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 214.

H. recognitum Funk *exs.* n. 436 p.p.

Th. recognitum Wils. *M. Amer. exs.* p.p.

2. — *Eur.*: Voges, Alp. centr. (St Gothard). *Am. sept.*: Canada.

ramentosum Mitt. *Sam. M.* p. 186.

Leskea ramentosa ej. in *Bonpl.* 1861.

— *Pac.*: Ins. Fidji, Samoa, Norfolk, Austral. or.

ramuligerum Jaeg. — *Pseudo-Leskea*.

ramulosum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 323.

Hypnum ramulosum Hpe. in *C. M. Syn.* II, p. 486.

Th. crispifolium (fid. Barnes in *Bot. Gaz.* 1891, p. 206).

2. — *Am. sept.*: Washington.

(1) Cf. Venturi in *Rev. bryol.* 1880, p. 102.

ramusculosum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 317.

Leskea ramusculosa Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 161.

1. — Afr.: Ins. Fernando Po.

recognitum (Hedw.) Lindb. Man. M. II, p. 416, t. 1, f. 9; W. P. Sch. op. cit. p. 614.

Hypnum delicatulum L. Sp. pl. II ed. p. 1590 (quoad sol. pl. europ.).

H. recognitum Hedw. M. frond. IV, p. 92, t. 35.

H. tamariscifolium β Neck. Meth. M. p. 158 (excl. syn.).

H. tamariscinum C. M. Syn. II, p. 483.

H. tamariscinum β recognitum Brid. Bryol. univ. II, 440.

Th. delicatulum Bryol. eur. V (mon. p. 8), t. 484; Warnst. Maerk. Laubm. n. 163.

2. Lignic., rupic. et terr. — Eur.: Media tota. As.: Japon., Obi, Ienissei, Ross. or., Caucas., Persia. Afr. Alger. Am. sept.: Groenland, Labrador, New Brunswick, Nov. Scot., Ottawa, Ontario, Columb. brit., M. Rupestr., reg. sept., centr., or. et merid. (1).

Exs.: Drumm. M. bor. am. I ed. n. 214 (fid. Best l. c.).

Faurie Pl. Japon. n. 104, 174, 1426.

Mac. Canad. M. n. 271.

Rab. Bryoth. eur. n. 768.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 404 (fid. Best l. c.).

var. radicans Kindb. — Th. Philiberti.

recognitum Wils. p.p. — Th. quadrifarum.

Rehmanni Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 741.

Th. pinnatulum Rehm. M. Afr. austr. n. 360.

— Afr.: Natal.

remotifolium (Grev.) Par.

Eurhynchium remotifolium Jaeg. Ad. II, p. 422 p.p.

Hypnum remotifolium Grev. in Trans. of Werner Soc. Edinb. V, p. 483; C. M. Syn. II, p. 490; Lesq. et Jam. Man. p. 327.

1. — Am. sept.: Occid. (absque loc. spec.).

remotifolium Jaeg. p.p. — Eurhynchium scabrisetum.

rhapidostegum (C. M.) Mitt. M. austr. am. p. 577.

Hypnum rhapidostegum C. M. Syn. II, p. 494.

1. — Am. merid.: Chile.

rostratum W. P. Sch. in sched.; Jaeg. Ad. II, p. 246.

— Am. sept.: Guatemala.

rubens (Hpe. et C. M.) Par.

Hypnum rubens Hpe. et C. M. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 91.

— Pac.: Austral. or.

rubiginosum Besch. in Ann. sc. nat. 1892, I, p. 80.

1. In silvis. — As.: Yunnan.

sachalinense Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1872, p. 244.

2. — As.: Saghalien.

(1) « Vulgatiss. », Lesq. et Jam. Man. p. 325. « Nondum in America septentrionali observatum ». W. P. Sch. l. c. — Spectant ne potius localitates omn. Americ. ad Th. quadrifarum? Cf. G. N. Best in Torr. bot. Club 1896, pp. 83-84.

? sambokiphila (C. M.) Par.

Haplocladium sambokiphilum C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 96.

— Am. merid. : Brasil, austr. or.

samoanum Mitt. *Sam. M.* p. 186.

Hypnum samoanum C. M. *M. Polyn.* p. 88.

Cortic. et rupic. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Salomon.

scabrosulum Mitt. *M. austr. am.* p. 574.

1. Cortic., lignic. et terr. — Am. merid. : Amazon., Brasil. trop.

Schiedeanum (C. M.) Mitt. *M. austr. am.* p. 576.

Hypnum minutulum Hsch. in *Deppe et Schiede M. Mexic.*

H. Schiedeanum C. M. *Syn. II*, p. 494.

1. — Am. sept. : Mexic.

schistocalyx (C. M.) Mitt. *op. cit.* p. 575.

Hypnum schistocalyx C. M. *Syn. II*, p. 691.

1? Cortic. — Am. sept. : Costa Rica, Nicaragua, Cuba. Am. merid. : Amazon.

Schlumbergeri W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 92.

2. — Am. sept. : Mexic.

scitum (P. B.) Aust. *M. Appal.* n. 300.

Hypnum abietinum var. minor Drumm. *M. bor. am. I ed.* n. 217.

H. intertextum Wühleb. in *Sull. M. Allegh.* n. 6.

H. porrigens Wils. *ibid.*

H. scitum P. B. *Prodr.* p. 69 ; *Sull. Ic. M.* p. 155, t. 99 ; C. M. *Syn. II*, p. 488 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 323

H. Stereodon scitus Brid. *Bryol. univ. II*, p. 575.

Rauia scita Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VII, p. 16.

1. Cortic. et saxic. — Am. sept. : New Brunswick, Ottawa, Ontario, reg. sept.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 268 p.p., 269.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 409.

« var. aestivale Aust. *M. Appal.* n. 301.

Hypnum scitum var. aestivale Lesq. et Jam. *l. c.*

Th. aestivum Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, V, p. 23.

Ut typ. — Am. sept. : Canada, New Jersey, Vermont, New York, Pensilv., Wisconsin, Carol. sept.

« var. lonchoneuron Kindb. in *Mac. Cat.* p. 184.

Lignic. — Am. sept. : Ontario.

scoparium Wils. in *sched.* ; *Jaeg. Ad. II*, p. 333.

— As. : Himalaya.

scopulum Jaeg. — Pseudo-Leskea.

semi-lunare C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 141.

— Am. merid. : Argentin. subtropic. Tucuman.

semi-tortulum (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 318.

Hypnum semi-tortulum C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 17.

Ster. — As. : Ceylan.

Sigmatella (C. M.) Jaeg. *Ad. II*, p. 321.

Hypnum Sigmatella C. M. in *Linn.* 1875, p. 473.

1. Terr. — Afr. : Djour.

siphotheca (C. M.) Jaeg. l. c

Hypnum siphotheca C. M. in Bot. Zeit., 1858, p. 171.

1. — Am. sept. : Guatemala. Am. merid. : Venezuela.

sparsifolium (Mitt.) Jaeg. Ad. II. p. 314.

Leskea sparsifolia Mitt. M. Ind. or. p. 135.

1. — As. : Nepal, Himalaya sept. occid.

« var. altisetum C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

sparsum (Hook. f. et Wils.) Jaeg. Ad. II, p. 332.

Hypnum sparsum H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II, p. 109, t. 89, f. 5 et Handb. p. 471.

Th. furfurosum var. ? (fid. Mitt.).

2. — Pac. : Nov. Zeland. sept. et med., Alp. Austral. or. (Queensland), Tasman.

stellatifolium (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 317.

Hypnum stellatifolium Hpe. Symb. 1874, p. 525.

Pseudo-Leskea stellatifolia Sb. in Jaeg. op. cit. p. 739.

1. — Am. sept. : Brasil. austr. or.

striinerve (C. M.) Par.

Tamariscella striinervis C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1891, p. 601 (nom.).

Ster. — As. : Birman. super.

Struthiopteris C. M. in Hildebrandt M. Mad. n. 2075.

— Afr. : Madagascar merid.

Stuartii (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 332.

Hypnum hastatum Hpe. in Linn. 1852, p. 715.

H. Stuartii C. M. in Bot. Zeit. 1856, p. 459.

Th. furfurosum (fid. Mitt.).

2. — Pac. : Tasman.

subbifarium Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1893, p. 478.

2. Fr. ign. — Pac. : Nov. Guinea.

subdelicatulum (Hpe.) Par.

Hypnum subdelicatulum Hpe. Enum. M. Brasil. p. 84.

2. Ad rup. umbrat. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

suberectum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 312.

Hypnum suberectum Hpe. in Linn. 1859-60, p. 638 ; F. v. Müller, M. Austr. t. XXII.

— Pac. : Austral. or.

subfalcatum (Mitt.) Par.

Leskea subfalcata Mitt. in M. hb. Hook. 1860, p. 53, t. 5, f. 7.

1. Ad rup. madid. — Afr. : Niger.

subgracile (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 314.

Cyrto-Hypnum subgracile Hpe. Symb. 1870, p. 284.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

subgranulatum (Geh. et Hpe.) Par.

Hypnum subgranulatum Geh. et Hpe. Enum. M. Brasil. n. 87.

— Am. merid. : Brasil.

subinvolvens *C. M. in sched.*

Hypnum schistocalyx Sull. in *Wright M. Cub. n. 96 et in Proced. Am. Acad.*.... 1861, p. 286.

— *Am. sept.* : Cuba.

? sublaevifolium (*C. M.*) *Par.*

Haplocladium sublaevifolium *C. M. mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occ.

subnudum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum subnudum *C. M. in Rev. bryol.* 1887, p. 57 (*nom.*).

— *Am. merid.* : Paraguay.

Exs. : Balansa *Pl. Parag. n. 3673.*

« *var. Bescherellei* *Par.*

Hypnum subnudum *var. C. M. l. c. (nom.)*.

Pseudo Leskea paraguensis *Besch. in Bal. Pl. Parag. n. 3679 A et in Rev. bryol.* 1885, p. 18.

— *Am. merid.* : Paraguay.

subperseissum *C. M. in Rev. bryol.* 1878, p. 59 (*nom.*).

— *Afr.* : Ins. Franciae.

subpinnatum (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum subpinnatum *Hpe. in Fl.* 1881.

Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. or.

subscissum *C. M. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 149.*

1. Secus rivul. — *Afr.* : Tropic. or., ins. Mayotte, Nossi Be.

subserratum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 122 et *M. Masc. Mad. n. 190.*

2. ♀ et fr. ign. — *Afr.* : Comor. magna.

subtamariscinum (*Hpe.*) *Par.*

Hypnum subtamariscinum *Hpe. Enum. M. Brasil. p. 85.*

Th. brasiliense *Mitt. ?*

2. Terr. in silv. — *Am. merid.* : Brasil. or.

subulaceum *Jaeg.* — *Pseudo-Leskea.*

talongense *Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 81.

1. In silv. — *As.* : Yunnan.

tamariscellum (*C. M.*) *Bryol. jav. II, p. 120.*

Hypnum tamariscellum *C. M. in Bot. Zeit.* 1854, p. 573.

Leskea tamariscella *Mitt. M. Ind. or. p. 134.*

1. — *As.* : Tonkin, M. Neilgherr., Sumatra.

tamariscifolium *Lindb.* — *Th. tamariscinum.*

tamarisciforme *W. P. Sch.* — *Th. japonicum.*

tamariscinum (*Hedw.*) *Bryol. eur. V (mon. p. 7), t. 483 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 613.*

Hypnum delicatulum *C. M. Syn. II, p. 484.*

H. delicatum *Ehrh. Dec. n. 30.*

H. filicinum *Tamarisci foliis minoribus non splendentibus* *Dill. Hist. M. p. 276, t. 35, f. 14.*

H. parietinum *Murr. in L. Syst. veg. p. 590.*

H. proliferum *L. Sp. pl. 1590.*

H. tamariscifolium *Neck. Meth. M. p. 158 (excl. syn.).*

H. tamariscinum *Hedw. Sp. M. p. 262, t. 67 ; Brid. Bryol. univ. II, p. 438.*

Th. tamariscifolium *Lindb. Man. M. II, p. 415, t. I, f. 7.*

2. Rupic. et terr. in silvat. — *Eur.*: Fere tota. *Afr.*: Ins. Azor., Madeir., Transvaal. *Am. sept.*: Temperata tota.
Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 20.
 Rehm. M. Afr. austr. n. 646.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 403.
- « *var. mexicanum* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 92.*
Th. miradorium Jaeg. *Ad. II*, p. 329.
 — *Am. sept.*: Mexic., Costa Rica; Haïti (*fid. Ren. et Card.*).
- tenellum* W. P. Sch. in *sched.*; Jaeg. *Ad. II*, p. 319.
 — *Afr.*: Ins. Borbon.
- tenuissimum* Welw. et Duby in *Mém... Genève*, 1871, p. 18, t. 5, f. 2.
 1. Ad rivul. — *Afr.*: Angola.
- thamnieladum* (C. M.) Par.
Tamariscella thamnielada C. M. in *sched.*
 — *As.*: Himalaya sept. occid.
- tomentosum* W. P. Sch. in *Besch. op. cit. p. 93.*
 Ster. — *Am. sept.*: Mexic.
- torrentium* C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n. 644.*
 — *Afr.*: Transvaal.
- Torskii* Kiaer in *sched.*; C. M. in *Hedwig*, 1897, p. 144.
 Ster. — *Am. merid.*: Argentin temper.
- trachyacron* (C. M.) Par.
Tamariscella trachyakra C. M. in *sched.*
 — *As.*: Birman. sup.
- trachypodum* (Mitt.) *Bryol. jav. II*, p. 122, t. 225.
Hypnum plumulosum C. M. *Syn. II*, p. 486 p. p.?
Leskea trachypoda Mitt. *M. Ind. or. p. 133.*
Pelekium trachypodum Jaeg. *Ad. II*, p. 324.
 1. — *As.*: Nepal., Sumatra, Java.
- tripinnatum* (C. M.) Par.
Tamariscella tripinnata C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 161.
 — *Am. merid.*: And. Boliv.
- Türckheimii* C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 219.
 — *Am. sept.*: Guatemala.
- urceolatum* Ltz. *Moosst. p. 167.*
 2 — *Am. sept.*: Jamaic., Guadalup.
- vancouveriense* Kindb. — *Heterocladium.*
- varians* Welw. et Duby in *Mém... Genève*, 1871, p. 16, t. 5, f. 3.
 1. Ad arbor. rad. — *Afr.*: Angola.
- velatum* (Mitt.) Par.
Lorentzia longirostris (*fid. Mitt.*).
Pelekium velatum Mitt. *Sam. M. p. 176, t. VI, C.*
 1. Saxic. — *As.*: Borneo, Java. *Pac.*: Ins. Admiral., Samoa.
- ventrifolium* (C. M.) Par.
Tamariscella ventrifolia C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 220.
 Ster. Cortic. et terr. — *Am. sept.*: Guatemala.

venustum Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 78.

1. Ad rivul. — As. : Yunnan. Afr. : Usambara.

verrucipes C. M. in *Malpighia*, 1896, p. 159.

— *Am. merid.* : Guian. brit.

versicolor (C. M.) W. P. Sch. in *Breut. M. Capens.*

Hypnum minutulum Hsch. in *Drege M. Capens.*

H. versicolor C. M. *Syn. II*, p. 494.

1. Cortic. — Afr. : C. B. Sp.

vestitissimum Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 79.

2. — As. : Yunnan.

virginianum Lindb. — *Th. gracile* var. *lancastricense*.

viride Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 188.

Ster. — As. : Japon.

Whippleanum (Sull.) Jaeg. *Ad. II*, p. 323.

Claopodium Whippleanum Card. *M. Am. sept.* p. 50.

Hypnum Whippleanum Sull. in *Bot. Pac. R. R. Surv.* (*Whipple*), p. 190, t. 9; *Lesq. et Jam. Man.* p. 328.

Th. leskeoides Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, 1890, p. 277.

2. Rupic. — *Am. sept.* : Vancouver, Calif. infer.

Wrightii Jaeg. *Ad. II*, p. 315.

Th. minutulum Mitt. *M. austr. am.* p. 577.

1. — *Am. sept.* : Cuba, Jamaic. (1).

THUYIDIUM Lindb. *M. Scand.* (= **THUIDIUM**).

THYRIDIUM Mitt. *M. austr. am.* p. 114.

Spec. omn. non indicatae sunt SYRROPONTES ejusd. nom.

crassinerve Mitt. — *Calymperes*.

parvulum Sb. — *Syrhopodon ceylonensis*.

THYSANOMITRIUM Schwaegr. *Suppl. II*, t. 118.

Spec. omn. non indicatae sunt CAMPYLOPODES ejusd. nom.

arctocarpum β *Moritzi* Hpe. — *Campylopus porphyreodictyon*.

ciliatum Brid. — *Syrhopodon*.

havaicum C. M. — *Campylopus sandwicensis*.

introflexum Hpe. — *Campylopus erectus*.

jamaicense C. M. — *Campylopus Cinchonae*.

Mülleri Hpe. — *Campylopus Richardi*.

phascoideum Hpe. — *Campylopus comosus*.

piriforme Rab. — *Campylopus turfaceus*.

scabrisetum Hpe. — *Campylopus Sellowianus*.

splendens Hook. — *Pilopogon gracilis*.

uncinatum Harv. — *Dicranodontium*.

(1) In Enum. Kindberg. nom. nuda :

denniceps C. M.

micro-tamariscinum C. M.

pseudo-erectum (Hpe. et C. M.) Kindb.

thamniopsis Rehm.

TIMMIA Hedw. M. frond. I, p. 83 (6 spec.).

austriaca Hedw. Sp. M. p. 176, t. 42, f. 1-7; Brid. Bryol. univ. II, p. 71; Bryol. eur. IV (mon. p. 7), t. 408; C. M. Syn. I, p. 189; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 525.

Mnium megapolitanum P. B. Prodr. p. 74.

T. polytrichoides β *lutescens* Brid. Sp. M. III, p. 99.

2. In silvat. umbr. et ad rivul. — *Eur.*: Spitzberg. ins. Ursor., tot. jugum alp. As.: Alp. Yunnan., Jenissei med. et infer., Himalaya, Tibet occ.? *Am. sept.*: Groenland, M. Rupestr., Columb. brit., Vancouver, Washington, Idaho, Montana, Colorado.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 213.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 312.

var. *alpina* Hartm. — *T. megapolitana*.

var. *bavarica* Hüb. — *T. megapolitana*.

« var. *brevifolia* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1894, p. 238.

— *Am. sept.*: Colorado.

var. *umbilicata* Hartm. — *T. megapolitana*.

bavarica Heul. — *T. megapolitana*.

comata Arn. et Lindb. M. As. bor. 1890, II, p. 24.

Ster. — *As.*: Jenissei med. et infer.

cucullata Rich. — *T. megapolitana*.

Hookeri W. P. Sch. Syn. II ed. p. 525 (nom.).

— *As.*: Tibet.

megapolitana Hedw. M. fr. I, p. 83, t. 31; Brid. Bryol. univ. II, p. 69; Bryol. eur. IV (mon. p. 6), t. 407; C. M. Syn. I, p. 189; W. P. Sch. Syn. II ed., p. 523.

Bryum foliis lanceolatis falcatis, setis alaribus, capsula ovata inclinata Hall. Hist. St. Helv. n. 1779.

Mnium megapolitanum Gmel. Syst. nat. II, p. 1327.

Mn. *Timmia* Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 58.

Orthopyxis megapolitana P. B. Prodr. p. 79.

T. alpina Laurer in Fl. 1827, p. 292.

T. austriaca { β *alpina* Hartm. Skand. Fl. III ed., II, p. 292.
 γ *bavarica* Hüb. Muscol. germ. p. 514.
 β *umbilicata* Hartm. Skand. Fl. II ed.

T. bavarica Heuler Comm. de Timmia, p. 19, f. 3.

T. cucullata Rich. in Mich. Fl. Am. bor. II, p. 304.

T. megapolitana β *bavarica* Brid. op. cit. p. 271.

T. polytrichoides Brid. Mant. M. p. 122.

T. polytrichoides α *viridis* Brid. Sp. M. III, p. 99.

T. salisburgensis Hoppe mss.; Laurer in Fl. 1827, p. 295.

T. viridis Brid. Bryol. univ. II, p. 70.

1. In turfis. et cryptis vel sub rup. — *Eur.*: Per tot. Alp. tract zon. intermed. et septentr.; desideratur in Britann. (W. P. Sch.); Scotia (C. M.), Pyren. As.: Jenissei, Caucas. occ. et centr., Himalaya sept. occid., Kashmir. Afr.: Alger. *Am. sept.*: Groenland, ins. Melville, Gaspes., Ottawa, Ontario, Athabasca, Saskatchewan, M. Rupestr., Vancouver, Washington, Montana, Idaho, Colorado.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 213.

Rab. Bryoth. eur. n. 66, 67, 525, 625.

Un. itin. 1863, p. 52; 1867, n. 49.

var. *bavarica* Brid. — *T. megapolitana*.

« *var. brevifolia* E. G. et G. G. Borszczow in Arn. et Lindb. *M. As. bor.* 1890, II, p. 25.

Ster. — As. : Taimyr.

var. norvegica Lindb. — *T. norvegica*.

norvegica Zett. in Oefv. Vet Akad. Foerh. 1862, p. 364; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 526.

T. megapolitana β *norvegica* Lindb. in Oefv. Vet. Akad. Foerh. 1864, n. 6, p. 337.

2. *Rupic.* — *Eur.*: Spitzberg, ins. Ursor., Norveg., Scot.; Stiria (*fertil.*, *fid. Juratzka*). *As.*: Jenissei infer., Caucas. centr. *Am. sept.*: Groenland, *M. Rupestr.*, Athabasca.

Exs.: Mac. Canad. *M. n.* 586.

Rab. Bryoth. eur. n. 1023.

polytrichoides Brid. — *T. megapolitana*.

β *lutescens* Brid. — *T. austriaca*.

α *viridis* Brid. — *T. megapolitana*.

salisburgensis Hoppe. — *T. megapolitana*.

sibirica Arn. et Lindb. *M. As. bor.* 1890, II, p. 24.

Ster. — As. : Jenissei med. et infer.

viridis Brid. — *T. megapolitana*.

TIMMIELLA de Not. Cron. briol. ital. I, p. 14 (sect. TRICHOSTOMI); Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 590 (*gen. propr.*).

anomala Limpr. — *Trichostomum*.

Barbula Limpr. — *Trichostomum*.

flexiseta Limpr. — *Trichostomum flexipes*.

TORTELLA C. M. Syn. I, p. 599 (sect. BARBULAE); Limpr. op. cit. p. 599 (*gen. propr.*).

Spec. omn. sunt BARBULAE ejusd. nom.

TORTULA Hedw. Sp. M. p. 122.

Spec. omn. non indicatae sunt BARBULAE ejusd. nom.

acuminata { Brid. (M. Rec.). — *B. cuneifolia*.
Brid. (Spec. M.). — *B. unguiculata* var. *brachypus*.
Sw. ? Mitt. — *B. marginata*.

acuta Brid. — *B. gracilis*.

adusta Mitt. — *Pottia brachypus*.

aestiva P. B. — *B. muralis* var. *aestiva*.

aloides de Not. p.p { — *B. aloides*.
— *B. ambigua*.

ambigua Roehl. — *B. muralis*.

amblyophylla Mitt. — *Pottia*.

amœna Brid. — *B. unguiculata*.

Anderssonii Angstr. — *B. australis*.

andina Mitt. — *Trichostomum*.

angustifolia Lindb. — *Pottia*.

anomala Mitt. — *Trichostomum*.

apiculata { Brid. — *B. unguiculata* var. *apiculata*.
Wils. — *B. gregaria*.

arcuata Mitt. { — *Syrrhopodon Jamesoni*.

— *Trichostomum campylocarpum*.

aristata Sm. — *B. unguiculata*.

atlantica Brid. — *Eucladium verticillatum*.

- barbata* Sm. — *B. unguiculata*.
bermudana Mitt. — *Trichostomum*.
Berteroana Mitt. — *Trichostomum*.
bifrons de Not. — *B. rigida* var. *pilifera*.
bombayensis Mitt. — *Didymodon*.
brachydontia Mitt. — *Trichostomum mutabile*.
brachyphylla Mitt. — *B. Hampeana*.
brevicaulis Hook. et Grev. — *B. fallax* var. *brevicaulis*.
brevifolia Sm. — *B. fallax* var. *brevifolia*.
brevirostris Grev. — *B. rigida*.
bryoides { Hook. — *Desmatodon Laureri*.
 { Lindb. — *Phascum*.
bullata Lindb. — *Pottia latifolia* var. *pilifera*.
 var. *mutica* Lindb. — *Pottia latifolia*.
cacuminata Wils. — *Gymnostomum recurvum*.
caespitosa Hook. et Grev. — *B. marginata*.
 var. *eor.* — *B. Knightii*.
calcicola Mitt. — *Trichostomum*.
campylocarpa Mitt. (*quoad pl. Guatemal.*). — *Barbula Godmaniana*.
canaliculata Mitt. — *Trichostomum*.
caucasica Lindb. — *Pottia*.
cernua Lindb. — *Desmatodon*.
chilensis Mitt. — *Trichostomum*.
chloronotos Brid. — *B. membranifolia*.
cirrata { Lag. — *B. caespitosa*.
 { W. Arn. — *Trichostomum Barbula* (*fid. Limpr.*).
cirrifolia Mitt. — *Trichostomum*.
comosa ? Wils. — *B. hastata*.
contortifolia Mitt. — *Trichostomum*.
crassinervia de Not. — *B. chloronotos*.
crispula Mitt. — *Trichostomum*.
crocea Brid. — *B. paludosa*.
 var. *humilis* Lindb. — *B. paludosa* var. *Funkiana*.
curta Sw. — *Ditrichum tortile* var. *pusillum*.
curvata Schlecht. — *B. inclinata*.
cylindrica Mitt. { — *Didymodon*.
 { — *Hyophila circinata*.
danica Lge. — *B. pulvinata*.
Davallii Lindb. — *Pottia minutula*.
decipiens { Brid. — *B. agraria*.
 { Sibth. — *B. unguiculata*.
dubia P. B. — *B. unguiculata*.
enervis Hook. et Grev. — *B. rigida*.
ericaefolia Lindb. — *B. ambigua*.
ericetorum Sm. — *B. unguiculata* var. *patagonica*.
erubescens Mitt. — *Didymodon*.
eucalyptrata Lindb. — *Desmatodon latifolius* var. *glacialis*.
extenuata de Not. — *B. Vahlia*.
fallax { Hook. et Grev. — *B. unguiculata*.
 { Wils. — *B. nigrescens*.
 var. γ H. et Gr. — *B. fallax* var. *brevicaulis*.
 var. *stricta* de Not. — *B. gracilis* var. *viridis*.
 var. Wils. — *Geheebia cataractarum*.
flavescens Brid. — *B. fallax*.
 var. Wils. — *B. gracilentia*.
flaviseta Mitt. — *Pottia flavipes*.
 var. *minor* Lindb. — *Trichostomum flavo-virens* var. *viridi-flavum*.
flexuosa Brid. — ? Deleatur.

- var. Hook. — *B. calycina*?
fragilis Wils. — *B. Drummondii*.
fuegiana Mitt. (1876). — *B. semi-rubra*.
Funkiana Hook. et Grev. — *B. paludosa* var. *Funkiana*.
fuscescens Hook. et Grev. — *B. Australasiae*.
gigantea Lindb. — *Geheebia cataractarum*.
goettingensis Brid. — *B. muralis*.
Heimii Mitt. — *Pottia*.
 var. *arctica* Lindb. — *Pottia Heimii* var. *arctica*.
 var. *longiseta* Lindb. — *Pottia Heimii* var. *longiseta*.
hercynica Schrad. — *B. subulata*.
humilis { Brid. — *B. caespitosa*.
 { Drumm. — *B. amplexa*.
 { Hook. — *B. obtusifolia*.
 { Turn. — *B. unguiculata*.
imberbis Sm. — *B. fallax*.
inclinata var. β Hook. et Grev. — *B. inclinata* var. *leptotheca*.
indica Hook. — *Trichostomum orientale*.
inflexa Lindb. — *Trichostomum orientale* var. *inflexum*.
insulana de Not. — *B. cylindrica*.
intermedia { Lindb. — *Pottia lanceolata* var. *gymnostoma*.
 { Mitt. — *B. caespitosa*.
jamaicensis Mitt. — *Trichostomum*.
lacustris P. B. — *Didymodon rubellus*.
laevipila { var. *marginata* Lindb. — *B. laevipila* var. *meridionalis*
 { var. *propagulifera* Lindb. — *B. pagorum*.
 { var. Wils. — *B. Mülleri*.
laevipilaeformis de Not. — *B. laevipila* var. *meridionalis*.
lamellata Lindb. — *B. cavifolia*.
lanceolata { P. B. — *B. unguiculata* var. *obtusifolia*.
 { Lindb. — *Pottia*.
 var. *aciphylla* Lindb. — *Pottia lanceolata* var. *aciphylla*.
latifolia Lindb. — *Desmatodon*.
 var. *mutica* Lindb. — *Desmatodon latifolius* var. *glacialis*.
Laureri Lindb. — *Desmatodon*.
limbata Lindb. — *B. sublimbata*.
Lindbergii Kindb. — *Pottia*.
linoides Brid. — *B. unguiculata*.
longifolia Mitt. — *Didymodon*.
lusitanica Brid. — *Trichostomum Barbula*.
macrocarpa Mitt. — *Pottia*.
marginata Kze. — *B. Kunzeana*.
melanocarpa Mitt. — *Hyophila Barbula*.
mexicana Mitt. — *Pottia*.
nnioides Hook. — *Streptopogon*.
montana Lindb. — *B. intermedia*.
mucronata Lindb. — *B. Brebissonii*.
mucronifolia { de Not. — *B. alpina*.
 { Hook. — *B. mucronifolia* var. *arctica*.
 var. *arctica* Hook. et Grev. — *B. mucronifolia* var. *arctica*.
mucronulata { Sm. — *B. unguiculata*.
 { Sw. — *B. unguiculata* var. *cuspidata*.
 var. β Turn. — *B. unguiculata* var. *cuspidata*.
Mülleri H. f. et W. — *B. antarctica*.
muralis var. *goettingensis* Brid. — *B. muralis*.
mutica { Brid. — *B. cuneifolia*.
 { Lindb. — *B. latifolia*.
 { Mitt. — *Trichostomum*.

- nervosa* { Brid. — *B. inclinata*.
 { Engl. Bot. — *B. revoluta*.
Northiana Grev. — *B. caespitosa*.
norvegica Wahlenb. — *B. aciphylla*.
oblongifolia Wils. — *B. Vahlia*.
obscura Mitt. — *B. Wrightii*.
occidentalis Mitt. — *Trichostomum*.
oenea Mitt. — *Didymodon*.
pallens Brid. — *B. agraria*.
parvula Hook. et Grev. — *B. atro-virens*.
pellucida { de Not. — *B. sublimbata*.
 { Hook. et Grev. — *B. agraria*.
pilosa Schrad. — *B. muralis*.
platyphylla Mitt. — *Desmatodon amblyophyllus*.
princeps de Not. — *B. Mülleri*.
prostrata Mitt. — *Streptopogon mnioides* var. *prostrata*.
punctulata Mitt. — *B. robusta*.
pungens Lindb. — *Pottia Kindbergii*.
pusilla Mitt. — *Pottia cavifolia*.
rectifolia Mitt. — *B. gracilis*.
reflexa Brid. — *B. fallax*.
revoluta H. et T. — *B. Hornschuchiana*.
rigida { Brid. — *B. ambigua*.
 { Sm. — *B. aloides*.
rivalis Mitt. — *Trichostomum*.
robusta var. β H. f. et W. — *B. rubra*.
rosulata Wils. — *B. mucronifolia*.
rotundifolia Hartm. — *B. papillosa*.
ruralis { var. *alpina* de Not. — *B. aciphylla*.
 { var. *crinita* de Not. — *B. intermedia*.
 { var. *laevipila* Hook. et Grev. — *B. laevipila*.
 { var. *latifolia* W. Arn. — *B. latifolia*.
 { var. *minor* Wils. — *B. intermedia*.
 { var. *rupestris* Wils. — *B. intermedia*.
 { var. *I. Spr.* — *B. intermedia*.
 { var. *H. et T.* — *B. papillosa*.
 { var. *Wils.* — *B. caninervis*.
Saussuriana P. B. — *Ceratodon purpureus*.
Schlimii Mitt. — *Trichostomum*.
semi-vaginata D^{na} E. G. Britt. — *Trichostomum*.
serrulata Mitt. — *B. rubra*.
setosa P. B. — *B. convoluta*.
sinuosa Rab. — *Didymodon*.
spathulaefolia de Not. — *B. cuneifolia*.
Sprengelii Hook. et Grev. — *Trichostomum Berteroanum* ?
squamigera de Not. — *B. membranifolia*.
 var. *pottioidea* de Not. — *B. grisea*.
Starkeana Lindb. — *Pottia*.
 var. *Davallii* Lindb. — *Pottia minutula*.
stellata { Hook. et Grev. — *B. agraria*.
 { Lindb. — *B. rigida*.
stricta Brid. — *B. unguiculata*.
suberecta Hook. — *Desmatodon obliquus*.
subsessilis Mitt. — *Pharomitrium*.
subulata Drumm.
 var. *laevifolia* Lindb. { — *B. mucronifolia*.
 var. *mucronifolia* Roehl. {
systylia Lindb. — *Desmatodon*.

- tenuirostris* Mitt. — *Didymodon cylindricus*.
tortuosa var. *inclinata* Drumm. — *B. Drummondii*.
truncatula Lindb. — *Pottia truncata*.
Turneri Brid. — *Didymodon rubellus*.
unguiculata Turn. — *Didymodon rubellus*.
VahlII ? *subflaccida* Lindb. — *B. VahlIIana*.
verticillata Mitt. — *Eucladium*.
vinealis { de Not. p.p. — *B. cylindrica*.
 { var. *glacialis* Spr. — *Geheebia cataractarum*.
 { var. Wils. — *B. constricta*.
virescens de Not. { (Epil.). — *B. pulvinata* ?
 { (M. ital.). — *B. ruralis* var. *virescens*.

TRACHYCYSTIS Lindb. *Mniac. eur.* p. 80.

Spec. omn. RHIZOGONIA ejusd. nom.

TRACHYLOMA Brid. *Bryol. univ.* II, p. 277 (10 spec.).

africanum Rehm. *M. Afr. austr.* n. 332; *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 198 (*descriptio*).

Calypothecium africanum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 312.

2. *Cortic.* — *Afr.* : M. Usagara, Kilima N'Djaro, Usambara; *austral.*

Antipodum C. M. et Schlieph. in *sched.*

— *Pac.* : Ins. Auckland.

arborescens Mitt. { (Sam. M.). — *Hypnodendron subspiniervium*.
 { (M. Ind. or.). — *Hypnodendron*.

Archeri Mitt. — *Hypnodendron*.

arcuatum Mitt. — *Hypnodendron spiniervium* var. *arcuatum*.

Buftoni (Broth.) Par.

Calypothecium Buftoni Broth. in *op. cit.* 1895, p. 65.

2. — *Pac.* : Tasman.

comosum Mitt. — *Mniodendron*.

cylindricum Lindb. ? Jaeg. — *Tr. planifolium*.

diversinerve Hpe. in *F. v. Müller's Fragm. Phyt. Austr.* XI, *Suppl.* III, p. 50.

Pterobryum diversinerve Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 81.

Ster ? — *Pac.* : Austral. (Victoria).

Helmii C. M. in *sched.*

Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept.

indicum Mitt. *M. Ind. or.* p. 91; *Bryol. jav.* II, p. 82, t. 197.

Neckera planifolia Reinw. et Hsch. in *Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol.* XIV, p. 714.

Ster. — *As.* : Ceylan, Java. *Pac.* : Nov. Guinea.

Junghunii Mitt. — *Hypopterygium vitiense*.

Menziezii Par.

Neckera planifolia Hook. *M. ex. t.* 23; *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal.* II, p. 103 et *Fl. Tasm.* II, p. 205.

N. Trachyloma C. M. *Syn.* II, p. 44.

Tr. planifolium Jaeg. *Ad.* II, p. 201; *Brid. Bryol. univ.* II, p. 278 p.p.; *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 463.

2? *Lignic.* — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

Mülleri *Hpe. in F. v. Müller's Fragm. Phyt. Austral. XI, Suppl. III, p. 50.*

Ster. — *Pac.* : Austral. (Victoria).

Novae Guineae *C. M. in sched.*

Ster. — *Pac.* : Nov. Guin. brit.

planifolium (*Hedw.*) *Brid. op. et l. cc. p.p.*

Neckera planifolia Hedw. Sp. M. p. 206, t. 48; C. M. Syn. II, p. 45.

Pterobryum planifolium Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p. 81.

Tr. cylindricum Lindb. (?) Jaeg. Ad. II, p. 204.

2. Lignic. — *Pac.* : Nov. Zeland. sept. et med.

planifolium Jaeg. — Tr. Menziesii.

stipitatum Mitt. — Hypnodendron.

subbasilare Mitt. — Rhizogonium.

Taylori Mitt. — Papillaria cuspidigera.

TRACHYMITRIUM *Brid. Bryol. univ. II, p. 159.*

Spec. omn. sunt SYRROPODONTES ejusd. nom.

Trachynotus *C. M. M. Polyn. p. 57 (sect. LEUCOPHANIS).*

TRACHYPODIUM *W. P. Sch. in Savatier M. Japon.*

filamentosum W. P. Sch. — Meteorium aureum forma.

TRACHYPUS *Reinw. et Hsch. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. XIV, II, Suppl. p. 708, t. 39 (20 spec.).*

atratus Mitt. M. Ind. or. p. 129.

Pilotrichella chrysoclada C. M. ?

2. — *As.* : M. Neilgherr., Ceylan.

auriculatus Mitt. op. et l. cc.

Papillaria auriculata Jaeg. Ad. II, p. 178.

2. — *As.* : Sikkim.

baviensis Besch. in Journ. de bot. 1890, p. 203.

Ster. Saxic. — *As.* : Tonkin.

bicolor Reinw. et Hsch. in op. et l. cc.

Neckera Trachypus C. M. Syn. II, p. 672.

Papillaria bicolor Jaeg. Ad. II, p. 177.

Pilotrichum Trachypus C. M. op. cit. p. 162.

2. — *As.* : Sikkim, M. Neilgherries, Ceylan (Tr.

Nietneri? fid. C. M.), Sumatra, Java, ins. Ceram.

bicolor Mitt. p.p. — Tr. Nietneri?

blandus Mitt. — Papillaria.

brevirameus Mitt. — Pilotrichella.

Buchanani Mitt. — Papillaria.

cerinus Mitt. — Papillaria.

crispatulus (Hook.) Mitt. M. Ind. or. p. 129.

Hypnum crispatulum Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 321.

Neckera crispatula ej. M. ex. t. 152; Brid. Bryol. univ. II, p. 237; C. M. Syn. II, p. 140.

Papillaria crispatula Jaeg. Ad. II, p. 178.

2. — *As.* : Yunnan, Himalaya sept. occ., Nepal.,

Sikkim, Khasia, Ceylan, ins. Andaman, Java, ins. Halmaheira.

- cuspidiferus* Mitt. — Papillaria.
declinatus Mitt. *op. et l. cc.*
Papillaria declinata Jaeg. *op. cit.* p. 177.
 2? — As. : Nepal., Himalaya occ., Java.
Feae C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1891, p. 601 (*nom.*).
Ster. — As. : Birman. super. (Tenasserim).
flexicaulis Mitt. — Papillaria.
fuscescens Mitt. — Papillaria.
grossiserratus C. M. in *op. et l. cc.*
Ster. — As. : Birman. super. (Tenasserim).
Harveyi Mitt. — Papillaria semi-torta.
helictophyllus Mitt. — Meteorium intricatum?
 ? *himantophyllus* C. M. in *sched.*
 — As. : Sikkim.
hispidus (C. M.) Par.
Meteorium hispidum Mitt. *M. Ind. or.* p. 89.
Neckera hispida C. M. in *Bot. Zeit.* 1854, p. 579.
Papillaria hispida Jaeg. *op. et l. cc.*
 2? — As. : M. Neilgherr., Ceylan.
Hornschuchii Mitt. — Papillaria kermadecensis.
humilis Lindb. in *Act. Soc. sc. Fenn.* 1872, p. 230.
 2. Rupic. — As. : Japon. (ins. Kiu-Siu).
Massarti Ren. et Card. in *Rev. bryol.* 1896, p. 103.
Ster. — As. : Java.
Nietneri (C. M.) Par.
Neckera Nietneri C. M. in *Linn.* 1869-70, p. 25.
Papillaria Nietneri Jaeg. *Ad. II*, p. 177.
 2. — As. : Ceylan.
nodicaulis (C. M.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 129.
Neckera nodicaulis C. M. in *Linn.* 1876, p. 269.
Papillaria nodicaulis Jaeg. *Ad. II*, p. 179.
Ster. Ad arbor. — Afr. : Ins. Anjouan.
ornans (Reichdt.) C. M. in *Fl.* 1896, p. 465.
Hemiragis ornans Reichdt. *Beitr.* p. 577.
Hookeria ornans Par. *Index*, p. 581.
Ster. Filicie. — Pac. : Ins. Sandwic.
 ? *perichaetialis* Besch. — Papillaria.
plicaeifolius Mitt. — Pilotrichella.
procumbens Mitt. — Leptodon.
rugosus (Mont.) Lindb. in *Oefv....* 1864, p. 602 et in *Cumming Pl. Philipp.* n. 2197.
Dicnemon rugosus ? Mont. in *Hook. Journ. bot.* 1845, p. 10.
 2. — As. : Ins. Philippin., Celebes.
Rutenbergii C. M. in *Abhandl. Brem.* VII, p. 209.
Ster. — Afr. : Madagascar.
serrulatus (P. B.) Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 128.
Hypnum ericetorum Brid. *Sp. M.* II, p. 97.

Meteorium serrulatum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 156.

Neckera serrulata Brid. *Bryol. univ.* II, p. 238; *C. M. Syn.* II, p. 140.

Papillaria serrulata Jaeg. *Ad.* II, p. 178.

Pilotrichum serrulatum P. B. *Prodr.* p. 83.

Ster. — Afr.: Ins. Fernando Po, Kilima N'Djaro,
Madagascar, ins. Borbon.

subbicolor *C. M.* in sched.; *Jaeg. Ad.* II, p. 177.

— As.: Sikkim.

subcrispatulus *C. M.* in sched.

— As.: Himalaya sept. occid.

TREMATODON Rich. in Mich. Fl. Am. bor. II, p. 289 (65 spec.).

acicularis Kindb. in *Rev. bryol.* 1896, p. 18.

Paludic. — Am. sept.: Columb. brit.

acutus *C. M. Syn.* I, p. 458; *Bryol. jav.* I, p. 88, t. 72, fig. 1-25.

Tr. longicollis β crispatisissimus Hsch. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop.
Carol. XIV, II, Suppl. p. 102?

1. — As.: Java.

affinis Bryol. eur. — Tr. reflexus.

ambiguus (Hedw.) Hsch. in Fl. 1819, p. 88; *Bryol. eur.* I (mon. p. 5),
t. 96; *C. M. Syn.* I, p. 457; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 68.

Dicranum ambiguum Hedw. *M. frond.* III, p. 87, t. 36.

Mnium setaceum L. *Sp. pl.* p. 1576?

Tr. vulgaris Brid. *Bryol. univ.* I, p. 386.

1. In turfis. et uligin. — Eur.: E reg. montos. usq. in alp. Am. sept.:
Terr. nov., ins. Miquel., Nov. Scot., New Brunswick, Ontario,
Columb. brit., reg. or.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 24.

Rab. Bryoth. eur. n. 410, 1227.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 96.

ambiguus Hsch. (Fl. Bras.). — Tr. vaginatus.

β *brevicollis* Schwaegr. — Tr. brevicollis.

angolensis Welw. et Duby in *Mém...* Genève, 1870, p. 13, t. IV, f. 5.

2. In pasc. herbos. — Afr.: Angola.

anomalus Hpe. — Tr. gymnostomus.

arcuatus Mitt. in Hook. *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 415.

2. — Pac.: Nov. Zeland. bor.

aureus *C. M.* in Ule *Bryoth. brasil.* n. 15.

— Am. merid.: Brasil. austr. or.

Baileyi Broth. in Bail. *Syn. of the Queensland Fl.* IV Suppl. p. 95
(nom.) et in Oefv. of Finska Vet.-Soc. Foerh. 1890, p.

Terr. — Pac.: Austral. or. (Queensland).

bolivianus *C. M.* in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 38.

— Am. merid.: And. Boliv.

borbonicus Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 19.

1. — Afr.: Ins. Borbon.

brachypus Mont. hb.; Mitt. *M. austr. am.* p. 46.

Tr. gymnostomum Lindb.?

1. — Am. merid.: Brasil.

brevicollis Hsch. in *Fl.* 1819, p. 88; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 385; *Bryol. eur.* I (mon. p. 5), t. 95; *C. M. Syn.* I, p. 457; *W. P. Sch. Syn.* II ed. p. 67.

Tr. ambiguus β *brevicollis* Schwaegr. *Suppl.* II, p. 69.

1. Terr. — *Eur.*: Rariss. in reg. supraalp. zon. interm. et sept.: Norveg., Tirol., Alp. Helvet., Valesia. *Am. sept.*: Groenland.

brevifolius Broth. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 106.

Rupic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

brevirostris Hpe. in *Ann. sc. nat. ser.* V, V, p. 336.

1? — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

capillifolius C. M. in sched.

— *As.*: Himalaya sept. occid.

capillipes C. M. in sched.

— *As.*: Ins. Philippin. (Luzon).

ceylonensis C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 350.

Tr. longicollis Wils. et Mitt. in *hb. Ind. or.* n. 45.

1. — *As.*: Ceylan.

Cheesemani C. M. in sched.

— *Pac.*: Ins. Kermadec.

conformis Mitt. *M. Ind. or.* p. 12.

1. — *As.*: Nepal, Sikkim.

crispatissimus Hsch. *Fl. Bras.* I, p. 10; *Hpe. Enum. M. Bras.* p. 13.

Arenic. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or., Monte Video.

decipiens Mitt. — *Wilsoniella pellucida*.

divaricatus *Bryol. eur.* I (mon. p. 4, nom.); *C. M. Syn.* I, p. 460.

— *Afr.*: C. B. Sp.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 470.

1. — *Am. merid.*: Venezuela.

flexifolius C. M. in *Fl.* 1886, p. 278.

2. Terr. — *Afr.*: Ins. S. Thomas.

flexipes Mitt. in *Fl. Tasman.* II, p. 173, t. 172, f. 6; *Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 415.

2? Terr. — *Pac.*: Nov. Zeland., Tasman.

fontinaloides Roehl. — *Cinclidotus*.

gymnostomus Lindb. in sched.; *C. M. in Bot. Zeit.* 1859.

Tr. anomalus Hpe. *Symb.* 1870, p. 271.

Tr. brachyus (nec: brevipes, ut ait Angstr. *Prim. lin.* p. 5) Mont. in Mitt. *M. austr. am.* p. 46?

2. Terr. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

heterophyllus Broth. in *Hedwig.* 1895, p. 118.

— *Am. merid.*: Brasil. or. (Goyaz).

Hildebrandti C. M. in *Linn.* 1876, p. 241.

1. Humic. — *Afr.*: Ins. Anjouan.

Hookeri C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 350.

Tr. longicollis Wils. et Mitt. in *hb. Ind. or.* n. 48.

1. — *As.*: Sikkim.

humilis Mitt. *M. austr. am.* p. 47.

2? — *Am. sept.* : Cuba. *Am. merid.* : And. Quitens.

intermedius Welw. et Duby in *Mém...* Genève, 1870, p. 12, t. III, f. 6.

2. In limos. — *Afr.* : Angola.

« *var. nanus* Welw. et Duby in *op. et l. cc.*

Ad terr. madid. in rupestr. — *Afr.* : Ibid.

Jardini W. P. Sch. — *Wilsoniella*.

lacunosus Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, II, p. 9 et
M. Masc. Mad. n. 152.

2. Ad terr. argill. humid. — *Afr.* : Madagascar.

lacustris C. M. in *Hedwig.* 1895, p. 118.

— *Am. merid.* : Brasil. or. (Goyaz).

latinervis C. M. in *Fl.* 1896, p. 445.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

ligulatus Rehm. *M. Afr. austr. n.* 22.

— *Afr.* : Natal.

linguaeformis Besch. in *Marie M. Mayotte, n.* 221 p. p.

— *Afr.* : Ins. Mayotte.

longescens C. M. in *Rev. bryol.* 1876, p. 3 (nom.).

— *Pac.* : Austral. or. (Nov. Valesia).

longicollis Rich. in *Mich. Fl. Am. bor. II*, p. 289; *Brid. Bryol. univ.*
I, p. 388; *Bryol. eur. Suppl. fasc. III-IV*; *C. M. Syn. I*, p. 458;
Sull. Ic. M. p. 31, t. 19; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 68.

Cynontodium Trematodon P. B. *Prodr.* p. 52.

Dicranum longicollum *Brid. Sp. M. I*, p. 203.

Tr. Solmsii Boll in *Verh. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb.* 1865.

1. — *Eur.* : Pouzolles, ins. Ischia. *As.* : Japon.,

Assam; Sikkim ? *Am. sept.* : New Jersey, Pensilv., reg. merid.

Exs. : Drumm. *M. bor. am. II ed.* n. 55.

Rab. Bryoth. eur. n. 1065, 1269.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 95.

<i>longicollis</i>	{	Besch. — <i>Tr. uncinatus</i> .
		Duby. — <i>Tr. paucifolius</i> .
		H. f. et W. — <i>Tr. suberectus</i> .
		Hsch. — <i>Tr. reflexus</i> .
		Mont. — <i>Tr. Schmidii</i> .
		Wils. — <i>Tr. megapophysatus</i> .
		Wils. et Mitt. } — <i>Tr. ceylonensis</i> .
		— <i>Tr. Hookeri</i> .

β *crispatisissimus* Hsch. — *Tr. acutus*.

longirostris Schwaegr. — *Microdus*.

Mac-Leai Rehm. *M. Afr. austr. n.* 439.

— *Afr.* : Transvaal.

mayottensis Besch. in *Ann. sc. nat. VII ser., II*, p. 84.

— *Afr.* : Ins. Mayotte.

megapophysatus C. M. in *Bot. Zeit.* 1864, p. 350.

Tr. longicollis Wils. in *hb. Ind. or. n.* 46.

1. — *As.* : Japon., Sikkim.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 618, 763.

- microthecius *Besch. in Bull. Soc. bot. Fr.* 1894, p. 78.
 1. Ad terr. limos. — *As.* : Tonkin.
- minutulus *C. M. in Dusen M. Camer. n. a.*
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- nitidulus *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 17.*
 1. — *Am. sept.* : Mexic. (Orizaba).
- Novae Caledoniae *C. M. in Th. Savin M. N. Caled. n. 17.*
 — *Pac.* : Nov. Caledon.
- Novae Hannoverae *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 83 et in Forschungsreise .. p. 46.*
 1. Terr. — *Pac.* : Nov. Hannov.
- nudus *C. M. in Dusen M. Camer. n. 370.*
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- palettifolius *C. M. in Besch. Note M. Paraguay, p. 260.*
 Terr. — *Am. merid.* : Paraguay.
Exs. : Balansa Pl. Parag. n. 1257.
- pallidens *C. M. in Linn. 1876, p. 242.*
 2. Terr. — *Afr.* : Ins. Anjouan, Nossi-Be.
- paradoxus *Hsch. in Linn. 1841, p. 122; C. M. Syn. I, p. 456.*
 1. — *Afr.* : C. B. Sp., ins. Borbon.
- paucifolius *C. M. Syn. I, p. 459; Bryol. jav. I, p. 89, t. 73, f. 1-35*
Tr. longicollis Duby in Zollinger Coll. n. 1943.
 1 (*C. M.*); 2 (*Bryol. jav.*) — *As.* : M. Neilgherr.,
 Java.
- Pechueli *C. M. in Fl. 1886, p. 508.*
 1. — *Afr.* : Stanley Pool.
- reflexus *C. M. Syn. I, p. 459.*
Tr. affinis Bryol. eur. (mon. p. 4, nom.) ?
Tr. longicollis Hsch. Fl. Brasil. I, p. 9.
 1. Rupic. et ad terr. argill. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- Reineckii *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1896, p. 320.*
 Ad terr. tophac. aprie. — *Pac.* : Ins. Samoa.
- reticulatus *C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 205.*
 — *Afr.* : Madagascar.
- sabulosus *Griff. Not. p. 413 et Ic. pl. asiat. pl. LXXXII, f. 1; Mitt. M. Ind. or. p. 13.*
 — *As.* : Assam, Bhotan.
- Schmidii *C. M. in Bot. Zeit. 1853, p. 40.*
Tr. longicollis Mont. in Perrottet M. Neilgh. n. 54.
 1. Terr. — *As.* : M. Neilgherr.
- Serrae *C. M. in Ule Bryoth. brasil. n. 105.*
 Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- setaceus *Hpe. in Besch. Note M. I. S. Paul et Amsterdam, p. 2.*
 1. — *Afr.* : Ins. S. Paul.
- Solmsii *Boll. — Tr. longicollis.*
- squarrosulus *C. M. in Fl. 1896, p. 478.*
 — *Pac.* : Ins. Sandwic.

squarrosus *C. M. in Bot. Zeit.* 1857, p. 381.

1. Terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subambiguus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 20.

1. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

suberectus *Mitt. in Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 415.

Tr. longicollis *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 69.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland.

tenellus *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 4.

1. Rupic. — *Am. sept.* : Guadalup.

tonkinensis *Besch. in Journ. de bot.* 1890, p. 201.

Terr. — *As* : Tonkin.

uncinatus *C. M. in Linn.* 1874, p. 628.

Tr. longicollis *Besch. in Prodr. bryol. mexic.* p. 17.

1. — *Am. sept.* : Mexic.

vaginatus *C. M. in Bot. Zeit.* 1857, p. 380.

Gymnostomum *Barbula Gardn. M. Brasil. n.* 4.

Tr. ambiguus *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. 10.

1. Rupic. et terr. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Victoriae *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 309.

— *Afr.* : M. Cameroon.

vulgaris *Brid.* — Tr. ambiguus.

TRENTEPOHLIA *Roth. in Usteri Ann. bot. X*, p. 52.

erecta *Roth.* — *Webera annotina.*

Tricherpodium *C. M. in Linn.* 1875, p. 419 (sect. ERPODII).

TRICHODON *W. P. Sch. Coroll.* p. 36 et *Syn. II ed.* p. 138 (2 spec.).

cylindricus (*Hedw.*) *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Ångstroemia cylindrica *C. M. Syn. I*, p. 441 et *II*, p. 610.

Ceratodon cylindricus *Bryol. eur. II (mon. p. 6), t.* 192.

Dicranum cylindricum *W. et M. Bot. Taschb.* p. 202.

Didymodon cylindricus *Wahlenb. Fl. Suec.* p. 754.

Ditrichum cylindricum *Lindb. M. Scand.* p. 27.

D. tenuifolium *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin.* p. 178.

Leptotrichum cylindricum *Husn. Musc. gall.* p. 61.

Trichostomum cylindricum *Hedw. Sp. M.* p. 107, t. 24; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 491.

Tr. tenuifolium *Schrad. Bot. Journ. II*, p. 58.

Tr. tenue *Schrad. (fid. W. P. Sch.).*

2. In terr. arenos. humid. — *Eur.* : E planit., ubi rar., usq. in reg. alp. *As.* : Ieniss. med. et sup., Obi. *Am. sept.* : Columb. brit., Ontario, Nevada, Pensilv. *M. Alb.* et Allegh.

Exs. : Mac. Canad. *M. n.* 411.

Rab. Bryoth. eur. n. 856, 948, 962.

? flexifolius *Ren. et Card. in Bot. Gaz.* 1889, p. 94, t. XIII, f. A et *M. Amer. sept. n.* 20.

1. Arenic. — *Am. sept.* : Florida.

oblongus *Lindb.* — *Ceratodon.*

Trichomitrium *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 127 (nom., sect. SCHLOTHEIMIAE).

TRICHOPILUM W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.*
polycarpum W. P. Sch. — *Pogonatum*.

TRICHOSTELEUM Mitt. M. austr. am. p. 492 (sect. SEMATOPHYLLI) et
 Sam. M. p. 181 (gen. propr.) (103 spec.).

altisetulum C. M. in sched.

— *Pac.* : Nov. Guin. brit.

ambiguum (Schwaegr.) Par.

Hypnum Hornschuchii Hpe. (in contextu *H. subulati*) Ic. M. t. 9; C. M.
Syn. II, p. 406.

H. microcarpum Hsch. Fl. Brasil. I, p. 84, t. 4.

Leskea ambigua Schwaegr. Suppl. II, II, II, t. 198.

Sematophyllum ambiguum Mitt. M. austr. am. p. 492.

Tr. Hornschuchii Jaeg. Ad. II, p. 484.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Amazon., And. Peruv.

aoratum (Duby) Jaeg. Ad. II, p. 482.

Hypnum aoratum Duby in Mém.... Genève, 1876, p. 13, t. I, f. 6.

Isopterygium intortum? (fid. Besch.).

1. Cortic. — *Afr.* : Ins. Franciae.

apiocarpum (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 481.

Sematophyllum apiocarpum Mitt. op. cit. p. 493.

1. — *Am. merid.* : Ins. Trinitat.

arrectum (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 484.

Sematophyllum arrectum Mitt. op. cit. p. 494.

1. Lignic. — *Am. merid.* : Amazon.

bartramiocarpum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 478.

Hypnum bartramiocarpum C. M. Syn. II, p. 633.

2? — *As.* : Java.

Basilaniae (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 487.

Hypnum Basilaniae C. M. in Linn. 1875, p. 466 (nom.).

— *As.* : Archip. ind.

bistrumosum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 486.

Hypnum bistrumosum C. M. in Linn. 1874, p. 566.

1. — *As.* : M. ins. Philippin.

borbonicum (Bel.) Jaeg. op. cit. p. 486.

Hypnum borbonicum C. M. Syn. II, p. 315.

Leskea borbonica Belang. Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p. 97, t. II, f. 2.

Rhaphidostegium borbonicum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 166.

Stereodon borbonicus Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 157.

1. Cortic. et lignic. — *Afr.* : Tropic. occ. litt., Usambara, ins. Seychelles, Mayotte, Mascaren.

Boschii (Dz. et Mk.) Jaeg. op. cit. p. 487.

Hypnum Boschii Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, IV, p. 306; C. M.

Syn. II, p. 404; *Bryol. jav. II*, p. 175, t. 274.

1. Cortic. — *As.* : Sumatra, Java, Banca, Borneo.

brachydictyon (Besch.) Jaeg. Ad. II, p. 482.

Rhaphidostegium brachydictyon Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 78.

1. Cortic. — *Am. sept.* : Guadalup.

bunodicarpum (C. M.) Par.

Hypnum bunodicarpum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 85 et in Forschungsreise... p. 48.

1. Cortic. — Pac. : Nov. Hannov.

chloropterum (C. M.) Kindb. Enum.

Hypnum chloropterum C. M. in Fl. 1886, p. 522.

1. Cortic. — Afr. : Ins. Fernando Po.

confertulum (Besch.) Jaeg. Ad. II, p. 750.

Rhaphidorhynchum confertulum Besch. Note M. I. S. Paul et Amsterd. p. 3.

1. — Afr. : Ins. S. Paul.

consanguineum (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 485.

Sematophyllum consanguineum Mitt. M. austr. am. p. 493.

1. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

cyathothecium (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 480.

Hypnum cyathothecium C. M. M. Polyn. p. 82.

1 et 2. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa.

diaphanum Broth. in Hedwig. 1895, p. 69.

1. Ad ramul. arb. — Pac. : Nov. Hibern.

dicranelloides Broth. in Bol. da Soc. Brot. VIII, 1890.

1. Rupic. — Afr. : Ins. S. Thomas.

dicranoides Broth. in Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 1895, n. 3.

1. Cortic. — Am. merid. : Brasil.

distichophyllum (Hpe.) Jaeg. Ad. II, p. 482.

Hypnum distichophyllum Hpe. in Bryol. jav. II, p. 167, t. 266.

2 ? — As. : Ins. Luzon., Celebes, Java.

epiphyllum Ren. et Card. in Rev. bryol. 1896, p. 106.

Ster. Ad fol. Querc. — As. : Java.

fissum Mitt. Sam. M. p. 182.

2. Cortic. — Pac. : Ins. Samoa.

flagelliferum Broth. in Bihang till K. Sv.-Akad. Handl. 1895, n. 3.

Ster. Cortic. — Am. merid. : Brasil. or.

fluviale (Mitt.) Jaeg. Ad. II, p. 485.

Sematophyllum fluviale Mitt. M. austr. am. p. 493.

1. — Am. merid. : Novo Granat.

fuscocaule (C. M.) Par.

Hypnum fuscocaule C. M. M. Polyn. p. 85.

Ster. — Pac. : Ins. Samoa.

glaucinum (Besch.) Jaeg. Ad. II, p. 482.

Rhaphidostegium glaucinum Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 79.

1. — Am. sept. : Guadalup.

Gottscheanum (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 478.

Hypnum Gottscheanum Hpe. in Linn. 1874, p. 568.

2. — As. : Ins. Philippin.

graminicolor Jaeg. — Eurhynchium Sullivantii.

grosso-mammillosum (C. M.) Par.

Hypnum *grosso-mammillosum* C. M. in sched.

Ster. — Pac. : Nov. Guin. brit.

guineense (Ångstr.) Jaeg. op. cit. p. 479.

Cylindrothecium *guineense* Ångstr. mss.

Hypnum *guineense* C. M. in Linn. 1875, p. 465 (nom.).

— Pac. : Nov. Guinea.

hamatum (Dz. et Mk.) Jaeg. op. cit. p. 486.

Hypnum *hamatum* Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, p. 307 et M. frond. Archip. ind. p. 11; Bryol. jav. II, p. 176, t. 275.

H. scaberulum Mont. in Lond. journ. of bot. 1844, p. 632 et in Ann. sc. nat. 1845, IV, p. 92, t. V, f. 2; C. M. Syn. II, p. 272.

Tr. *scaberulum* Besch. Fl. bryol. Taïti, etc., p. 51.

l. Lignic. — As. : Sumatra, Java, Banca, Borneo, Celebes. Pac. : Taïti (var. ? fid. Besch.), ins. Sandwic.

« var. *semi-mammillosum* (C. M.) Par.

Hypnum *hamatum* var. *semi-mammillosum* C. M. in Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guin., p. 11.

— Pac. : Nov. Guin. sept.

herpeticum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 480.

Hypnum *herpeticum* C. M. M. Polyn. p. 84.

l. — Pac. : Ins. Samoa.

Hornschuchii Jaeg. — Tr. *ambiguum*.

inclinatum Kiaër in Borgen M. Madec.

— Afr. : Madagascar.

instratum (Brid.) Jaeg. op. cit. p. 478.

Hypnum *instratum* Brid. Bryol. univ. II, p. 394; C. M. Syn. II, p. 265; Bryol. jav. II, p. 169, t. 268 p.p.

H. planum var. *instratum* Schwaegr. Suppl. III, II, II, t. 280.

l. Cortic. et rupic. — As. : Java, Banca, Celebes, ins. Rauwack Molucc.

inundatum (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 484.

Sematophyllum *inundatum* Mitt. M. austr. am. p. 494.

l. Lignic., rupic. et terr. — Am. merid. : Amazon.

isocladum (Bryol. jav.) Jaeg. op. cit. p. 478.

Hypnum *isocladum* Bryol. jav. II, p. 173, t. 272.

l. In silv. — As. : Ins. Banca.

Kaernbaehii Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1893, p. 480.

l. Pac. : Nova Guin.

Kerianum Broth. in Bailey Syn. of the Queensland Fl. IV Suppl. p. 99 (nom.) et in Oefv. af Finska Vet.-Soc. Foehr. 1890.

l. Cortic. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

Kuilui (C. M.) Kindb. Enum.

Hypnum *Kuilui* C. M. in Fl. 1886, p. 523.

Ster. Cortic. — Afr. : Tropic. occid.

Kurzii Sb. in Jaeg. Ad. II, p. 480.

H. microcladon Hpe. (fid. C. M. in sched.).

Afr. : Pegu.

laetum *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1892, II, p. 110.

Lignic. — *Afr.* : Madagascar.

Lindbergii (*Bryol. jav.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 478.

Hypnum Lindbergii Bryol. jav. II, p. 172, t. 271.

1. — *As.* : Java, Borneo, ins. Cèram, Saparœa.

madagassum (*C. M.*) *Jaeg. op. cit.* p. 481.

Hypnum madagassum C. M. in Linn. 1875, p. 465 (*nom.*).

— *Afr.* : Madagascar.

mammillipes *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1894, p. 207.

1. Cortic. — *Afr.* : Usambara.

mamosum (*C. M.*) *Jaeg. op. cit.* p. 487.

Hypnum mamosum C. M. Syn. II, p. 684; *Bryol. jav. II*, p. 174, t. 273.

1. — *As.* : Java, Sumatra.

Martianum (*Ltz.*) *Jaeg. op. cit.* p. 485.

Hypnum Martiannm Ltz. Moosst. p. 166.

2. — *Am. merid.* : Guian. batav.

microcalyx *Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1896, I, p. 319.

1. Lignic. — *Afr.* : Congo.

microcladum (*Dz. et Mk.*) *Jaeg. op. cit.* p. 487.

Hypnum microcladum Dz. et Mk. in Ann. sc. nat. 1844, II, p. 308; *C. M. Syn. II*, p. 274; *Bryol. jav. II*, p. 145, t. 242.

1. — *As.* : Borneo, Celebes. *Pac.* : Nov. Guinea.

microstegium (*W. P. Sch.*) *Jaeg. op. cit.* p. 482.

Rhaphidostegium microstegium W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Antill. fr p. 79.

1. — *Am. sept.* : Guadalup.

microthamnioides (*C. M.*) *Par.*

Hypnum microthamnioides C. M. in Abhandl. Brem. VII, p. 212.

Ster. — *Afr.* : Madagascar.

nepalense (*Schwaegr.*) *Jaeg. op. cit.* p. 478.

Hypnum nepalense Schwaegr. Suppl. III, I, II, t. 226; C. M. Syn. II, p. 226; *Bryol. jav. II*, p. 168, t. 267.

H. punctulatum Harv. (fid. C. M.).

Stereodon nepalensis Mitt. M. Ind. or. p. 100.

1. Lignic. — *As.* : Nepal., Bengal., Java, Borneo, Amboine.

Niam-Niamiae (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 488

Hypnum Niam-Niamiae C. M. in Linn. 1875, p. 468.

Ster. Terr. — *Afr.* : Niam-Niam.

novo-guineense (*Geh.*) *Par.*

Hypnum novo-guineense Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu-Guinea, p. 8, t. 6.

2. — *Pac.* : Nov. Guinea merid.

Orthothecium (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 480.

Hypnum Orthothecium C. M. M. Polyn. p.

2. — *Pac.* : Ins. Samoa.

palanense (*Hpe.*) *Jaeg. op. cit.* p. 486.

Hypnum palanense Hpe. in Linn. 1874, p. 567.

2. — *As.* : M. ins. Philippin.

pallido-scabrum *C. M. in sched.*

— *Pac.* : Nov. Guin brit.

papillatum (*Harv.*) *Par.*

Acanthodium papillatum *Mitt. Sam. M. p.* 182.

Hypnum papillatum *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, *II*, p. 18 et in *Hook. Ic. pl. rar. I*, t. 23; *C. M. Syn. II*, p. 273 (1); *Bryol. jav. II*, p. 171, t. 270.

Sematophyllum papillatum *Mitt. Fl. Vit. p.* 398.

Stereodon papillatus *Mitt. M. Ind. or. p.* 113 (1).

1 ? (*C. M.*). *Polyg. (Bryol. jav.)*.

— *As.* : Nepal.,

Sumatra, Java, ins. Banca, penins. Malay., Borneo, Celebes. *Pac.* :

Ins. Ovalau, Samoa, Nov. Guinea.

papillosum (*Hsch.*) *Par.*

Hypnum papillosum *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. 82, t. 4; *C. M. Syn. II*, p. 272, *H. spirale* *C. M. in Linn.* 1848, p. 200.

Sematophyllum papillosum *Mitt. M. austr. am. p.* 492.

Stereodon papillosus *ej. in Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 517.

Tr. spirale *Jaeg. Ad. II*, p. 485.

1. Lignic. — *Afr.* : Tropic. occid. litt. *Am. merid.* : Guian., Amazon., Brasil.

perhamosum (*C. M.*) *Broth. in Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 277.

Sigmatella perhamosa *C. M. in Dusen M. Camer. n.* 924.

1. Lignic. — *Afr.* : Cameroon.

perpygmaeum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum perpygmaeum *C. M. in sched.*

— *As.* : Sumatra (ins. Engano).

Perrotti Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1892, *II*, p. 109.

1. In silv. — *Afr.* : Madagascar.

Pickeringii *Jaeg.* — *Sematophyllum*.

Plumularia (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 482.

Hypnum Plumularia *C. M. Syn. II*, p. 684; *Bryol. jav. II*, p. 166, t. 265.

Syn. — *As.* : Java.

pluripunctatum *Ren. et Card. in op. cit. I*, p. 184.

Ster. — *Am. sept.* : Martinic.

prostratum (*Dz. et Mk.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 483.

Hypnum prostratum *Dz. et Mk. in Ann. sc. nat.* 1844, *II*, p. 309 et *M. frond. Archip. ind. p.* 13; *C. M. Syn. II*, p. 271; *Bryol. jav. II*, p. 170, t. 269.

2? — *As.* : Java.

pseudo-amœnum (*Belang.*) *Jaeg. op. cit. p.* 479.

Hypnum pseudo-amœnum *Bel. Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p.* 87; *C. M. Syn. II*, p. 266.

Rhaphidostegium pseudo-amœnum *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p.* 166.

1. — *Afr.* : Ins. Borbon.

pseudo-planum (*Hpe.*) *Jaeg. op. et l. cc.*

Hypnum pseudo-planum *Hpe. mss.*; *C. M. in Linn.* 1875, p. 465 (nom.).

— *As.* : Ind. or.

(1) « Pedunculus breviusculus » *C. M. l. c.* « Pedicellus longissimus » *Mitt. l. c.*

pterocladium (*Besch.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 482.

Rhaphidostegium pterocladium *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 78.

l. Cortic. — *Am. sept.* : Martinic.

punctipapillosum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum punctipapillosum *C. M. in sched.*

Ster. — *As.* : Ins. Andaman.

punctulatum (*Harv.*) *Jaeg. op. cit.* p. 477.

Hypnum punctulatum *Harv. in Lond. Journ. of bot.* 1840, p. 18 et in *Hook. Ic. pl. rar. I*, t. 23, f. 10.

Stereodon punctulatus *Mitt. M. Ind. or.* p. 101.

l. — *As.* : Madras.

pusillum (*Hsch.*) *Jaeg. op. cit.* p. 484.

Hypnum pusillum *Hsch. Fl. Brasil. I*, p. 85; *C. M. Syn. II*, p. 405.

Sematophyllum pusillum *Mitt. M. austr. am.* p. 494.

l. In turfis. — *Am. merid.* : Brasil.

rhinophyllum (*C. M.*) *Par.*

Hypnum rhinophyllum *C. M. M. Polyn.* p. 85.

l. — *Pac.* : Ins. Fidji.

Rhizophoreti (*C. M.*) *Jaeg. Ad. II*, p. 480.

Hypnum Rhizophoreti *C. M. M. Polyn.* p. 83.

l. — *Pac.* : Ins. Samoa.

rubrisetum (*Mitt.*) *Jaeg. op. cit.* p. 481.

Sematophyllum rubrisetum *Mitt. M. austr. am.* p. 492.

l. — *Am. merid.* : Amazon., And. Quitens.

rugisetum (*Hpe.*) *Jaeg. op. cit.* p. 486.

Hypnum rugisetum *Hpe. mss.*; *C. M. in Linn.* 1875, p. 466 (nom.).

Absque loco.

samoanum (*Mitt.*) *Jaeg. op. cit.* p. 479.

Hypnum Powellianum *C. M. M. Polyn.* p. 84.

H. samoanum *Mitt. Sam. M.* p. 184.

l. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.

scaberulum *Besch.* — *Tr. hastatum*.

scabrellum (*Bryol. jav.*) *Jaeg. op. cit.* p. 484.

Hypnum scabrellum *Bryol. jav. II*, p. 214, t. 315; *Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1872, p. 284 (descript. locupletior).

— *As.* : Sumatra, Borneo, Celebes.

selenithecium (*C. M.*) *Par.*

Hypnum selenithecium *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise... Bot.* p. 55.

l. Ad arbor. — *Pac.* : Nov. Guinea, Nov. Hannov., Archip. Duc d'York.

semi-mammillosum (*C. M.*) *Broth. in sched.* (1).

Hypnum semi-mammillosum *C. M. mss.*

Cortic. — *Pac.* : Archip. d'Entrecasteaux (ins. Ferguson), Nov. Guin. brit.

(1) An idem ac *Tr. hastatum* var. *semi-mammillosum* ?

sentosum (Sull.) Jaeg. op. cit. p. 481.

Hypnum sentosum Sull. in *Proced. of the Amer. Acad.*.... 1861, p. 288.

Rhaphidostegium sentosum Besch. *Fl. bryol. Antill. fr.* p. 77.

Sematophyllum sentosum Mitt. *M. austr. am.* p. 493.

l. Cortic. — *Am. sept.* : Cuba, Guadalup.

« var. majus (Besch.) Par.

Rhaphidostegium sentosum var. majus Besch. op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Guadalup.

sphacelatum (Duby) Jaeg. *Ad. II*, p. 480.

Hypnum sphacelatum Duby mss. ; *C. M. in Linn.* 1875, p. 465 (nom.).

— *Pac.* : Nov. Caledon.

spirale Jaeg. — *Tr. papillosum*.

Staudtii Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 277.

l. Lignic. — *Afr.* : Cameroon.

stigmatosum Mitt. *Sam. M.* p. 181.

Hypnum papillatum Sull. in *Wilkes Exped. M. n.* 17.

H. stigmatosum C. M. M. Polyn. p. 84.

l. — *Pac.* : Ins. Fidji, Samoa.

stissophyllum (Hpe.) Jaeg. *Ad. II*, p. 483.

Hypnum stistophyllum Hpe. in *C. M. Syn. II*, p. 273; *Bryol. jav. II*, p. 176.

Stereodon stissophyllum Mitt. *M. Ind. or.* p. 101.

l. — *As.* : Khasia, Ceylan, Java.

subdemissum (W. P. Sch.) Jaeg. op. cit. p. 484.

Rhaphidostegium subdemissum W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 76.

l. — *Am. sept.* : Guadalup.

subinistratum (Besch.) Jaeg. op. cit. p. 486.

Sematophyllum subinistratum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 238.

l. — *Pac.* : Nov. Caledon.

subplanum Besch. mss. ; Jaeg. op. cit. p. 480.

— *Pac.* : Nov. Caledon.

subpycnocylindricum Broth. in *Boll. da Soc. Brot. VIII*, 1890.

l. Cortic. — *Afr.* : Ins. S. Thomas.

subrhinophyllum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 485.

Hypnum subrhinophyllum C. M. in *Linn.* 1875, p. 466.

Rhaphidorhynchum borbonicum Mitt. in *Proced. of the roy. Soc.* 1879 (extr. vol.), p. 101.

Sematophyllum subrhinophyllum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 238.

l. — *Pac.* : Nov. Caledon.

subscabrisetulum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 486.

Hypnum subscabrisetulum C. M. in *Linn.* 1876, p. 284.

Rhaphidostegium subscabrisetulum Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 166.

l. Cortic. — *Afr.* : Ins. Anjouan.

substigmatosum (C. M.) Par.

Hypnum substigmatosum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 86 et in *Forschungsreise*.... p. 55.

Ster. Cortic. — *Pac.* : Nov. Guinea.

subulatulum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 484.

Hypnum subulatulum C. M. in Linn. 1876, p. 284.

Rhaphidostegium subulatulum Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 166.

l. Cortic. — Afr. : Ins. Anjouan.

tabescens (C. M.) Kinc'b. Enum.

Hypnum tabescens C. M. in Geh. Neue Beitr. zur Moosfl. v. Neu Guinea, p. 7.

l. — Pac. : Nov. Guinea merid

tenero-papillosum (C. M.) Par.

Thelidium tenero-papillosum C. M. mss.

— As. : Ins. Philippin. (Mindanao).

tenerrimum (Ångstr.) Jaeg. op. cit. p. 479.

Plagiothecium tenerrimum Ångstr. in Oefv... 1872, n. 4, p. 16.

Sigmatella tenerrima C. M. in Fl. 1896, p. 469.

Syn. — Pac. : Ins. Sandwic.

tenuisetum Jaeg. — Taxithelium.

thelidictyon Jaeg. — Rhaphidostegium.

tongense (C. M.) Jaeg. op. et l. cc.

Hypnum tongense C. M. M. Polyn. p. 83.

l. — Pac. : Ins. Tonga.

trachaelocarpum Jaeg. — Rhaphidostegium.

trachyamphorum (C. M.) Par.

Hypnum trachyamphorum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 85 et in Forschungsreise... p. 49.

l. Cortic. — Pac. : Ins. Fidji, Samoa, Nov. Hannov.

trochalophyllum (Hpe.) Jaeg. op. cit. p. 480.

Hypnum trochalophyllum (Hpe. fid. C. M. in sched.).

— As. : Birman.

truncatulum Jaeg. — Ectropothecium.

turgidellum (C. M.) Par.

Hypnum nepalense Bryol. jav. p.p.

H. turgidellum C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 87 et in Forschungsreise... p. 58.

l. Cortic. — As. : Amboine, Timorlaut.

unipapillosum (C. M.) Par.

Hypnum unipapillosum C. M. in sched.

Ster. — Pac. : Nov. Guin. brit.

ventrifolium (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 479.

Hypnum ventrifolium C. M. M. Polyn. p. 84.

l. fr. ign. — Pac. : Ins. Fidji.

Vernieri (Duby) Jaeg. op. cit. p. 480.

Hypnum Lepineanum W. P. Sch. in Jardin Enum... p. 20 (nom.).

H. Vernieri Duby in Mém.... Genève, 1875, p. 9, t. 2, f. 6.

l (Besch.) ; 2 (Duby). Lignic. et terr. — Pac. : Taïti, Nuka-Hiva.

vincentinum (Mitt.) Jaeg. op. cit. p. 482.

Sematophyllum vincentinum Mitt. M. austr. am. p. 493.

1. — Am. sept. : Guadalup., ins. S. Vincent (1).

TRICHOSTOMUM Hedw. M. frond. t. 27 (151 spec.).

acaulon C. M. in Linn. 1878-79, p. 320.

2. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

aciculare P. B. — Rhacomitrium.

var. acutifolium W. Arn. — Rhacomitrium protensum.

var. aquaticum W. et M. — Rhacomitrium protensum.

var. obtusifolium W. Arn. — Rhacomitrium aciculare.

affine Schleich. — Rhacomitrium heterostichum var. alopecurum.

afro-phaeum Rehm. M. Afr. austr. n. 120 et 473.

— Afr. : Orange, Transvaal.

aggregatum C. M. — Leptodontium.

aloides Koch. — Barbula.

alopecurum Schrank. — Rhacomitrium heterostichum var. alopecurum.

alpigenum Vent. — Didymodon rubellus var. dentatus.

amblyophyllum C. M. — Desmatodon.

amblystegium C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 118 (nom.).

Tr. inclinatum Hpe. (ubi ? fid. C. M.).

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

andinum Sull. U. St. Expl. Exped. 1859, p. 5 c. ic.

Tortula andina Mitt. M. austr. am. p. 147.

2. — Am. merid. : And. Peruv.

ancæctangioides C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p.

Ster. — As. : China or. (prov. Schen-Si).

anomalum W. P. Sch. Coroll. p. 28 et Syn. II ed. p. 178.

Barbula anomala Bryol. eur. II (mon. p. 45), t. 169 ; C. M. Syn. I, p. 603.

Timmiella anomala Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 592.

Tortula anomala Mitt. M. Ind. or. p. 28.

1. Muric. et terr. — Eur. : Tirol. merid., Ital. super., Gall. merid. (Monspel.). As. : Himalaya. Am. sept. : Calif., Florida.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 461.

Anomodon Bals. et de Not. — Didymodon.

apiculatum Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1896, p. 484, t. XLI, fig. 3.

1. Ad terr. humid. — Pac. : Nov. Zeland.

aquaticum } Brid. — Rhacomitrium protensum.

} Schleich. — Cinclidotus riparius.

arbustorum Brid. — Macromitrium aciculare.

arcuatum (Mitt.) C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 119 (nom.).

Tortula arcuata Mitt. M. austr. am. p. 165 p.p.

— Am. merid. : And. Quitens.

Aronis Ltz. — Gyroweisia.

(1) In Enum. Kindb. nom. nuda :

Tr. pallidifrons C. M.

atro-rubens *Besch. in Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 55.

2. Terr. in silv. — *As.* : Alp. Yunnan.

« *var. circinans Besch. l. c.*

— *As.* : Ibid.

atro-virens *Rehm. M. Afr. austr. n.* 119 et 495.

— *Afr.* : Transvaal, Natal.

Australasiae Jaeg. — Barbula.

australe H. f. et W. — Lophiodon strictus.

austro-alpigenum *C. M. in Engler's Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Erforschungsreise...* p. 24.

Ster. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

avonense *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, p. 481, t. XXXIX, fig. 5.

1. Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Ayresianum *W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.,* p. 54.

Ster. — *Afr.* : Ins. Borbon.

azoricum *Card. in Ann. Rep. of the Missouri Bot. Gard.* p. 58.

1 vel subsyn. — *Afr.* : Ins. Azor.

Bainsii *Rehm. M. Afr. austr. n.* 469.

— *Afr.* : Transvaal.

Bambergeri *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 173.

2. Muric. — *Eur.* : Tirol. merid. ; Stiria (ster.).

Barbula *Schwaegr. Suppl. I, I, p. 144, t. 36; Bryol. eur. II (mon. p. 5), t. 170; C. M. Syn. I, p. 583; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 127.*

Barbula lusitanica Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 252.

Timmiella Barbula Limpr. Laubm. Deutschl. I. p. 594.

Tortula cirrata W. Arn. in Mém. Soc. hist. nat. Paris, II, p. 287.

T. lusitanica Brid. Sp. M. I, p. 249.

Tr. barbuloides Brid. Bryol. univ. I, p. 493.

1. Ad mur., rup. et terr. calcar. — *Eur.* : Reg. mediterr. tota. *As.* : Minor, Pers. austr. *Afr.* : Septentr., Abyss., ins. Canar., Madeir.

Exs. : Mandon Pl. Madeir. n. 8.

barbuloides Brid. — Tr. Barbula.

basiflorum Schrank. — Ceratodon purpureus.

bericum } de Not. — *Leptobarbula.*

 } Husn. p. p. — *Leptobarbula meridionalis.*

bermudanum (Mitt.) Par.

Tortula bermudana Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1877, p. 60.

2. In aren. calcar. — *Am. sept.* : Ins. Bermud.

Berteroanum (Spreng.) C. M. Syn. I, p. 568.

Barbula Sprengelii Schwaegr. Suppl. II, p. 64, t. 119; Brid. Bryol. univ. I, p. 532.

Plaubelia tortuosa Brid. op. cit. I, p. 522.

Tortula Berteroana Mitt. M. austr. am. p. 154.

Weisia Berteroana Spreng. Syst. veg. IV, p. 156.

2. — *Am. sept.* : Haïti.

Bescherellei W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 33.

Didymodon macromitrium W. P. Sch. in sched.

Hyophila Bescherellei C. M. in Fl. 1875, n. 34-35.

2. Ad mur., rup. et terr. — *Am. sept.* : Mexic.

bifidum Brid. — Leucoloma.

Bimsii Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, p. 486, t. XLIII, fig. 10.

1. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Blumii Dz. et Mk. — *Campylopus Dozyanus*.

bombayense } C. M. — *Didymodon*.
 } Wils. — *Barbula cylindrotheca*.

brachydontium Br. — *Tr. mutabile*.

brachyphyllum Wils. — *Barbula gregaria*.

brasiliense (*Broth.*) *Par.*

Atractylocarpus brasiliensis *Broth. in Ule Bryoth. brasil. n.* 109.

Paludic. — *Am. merid.* : Brasil, austr. or.

brevicaule *Hpe. in C. M. Syn. I, p.* 567; *Bryol. jav. I, p.* 95, t. 77.

2. Ad terr. calc. et vulcan. — *As.* : Java. *Pac.* : Nov. Caledon.

brevifolium *Sendtn. in C. M. Syn. I, p.* 572.

Didymodon brevifolius *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p.* 275.

— *Eur.* : Bosnia.

brevifolium *Hpe. et Ltz.* — *Tr. Krauseanum*.

brevirostrum *Rob. Br. in op. cit. p.* 481, t. XXXIX, fig. 4.

Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

brunneum C. M. — *Pottia*.

Buchanani *Rob. Br. in op. cit. p.* 482, t. XXXIX, fig. 6.

Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

caespitosum *W. P. Sch. in sched. ; Jaeg. Ad. I, p.* 240.

— *Eur.* : Hibern.

caespitosum *Jur.* — *Pottia*.

calcareum *Rob. Br. in op. cit. p.* 480, t. XXXIX, fig. 2.

1. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

calcareum *Lindb.* — *Gymnostomum*.

calcicola *Hpe. Ic. M. t.* 29; *C. M. Syn. I, p.* 587.

Tortula calcicola *Mitt. in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria, 1883, p.* 60.

2. Rupic. — *Pac.* : Austral. or. (Victoria).

Cameruniae (*Broth.*) *Par.*

Timmiella Cameruniae *Broth. in Engler's Bot. Jahrb. 1897, p.* 238.

2. Terr. — *Afr.* : Cameroon.

campylocarpum *C. M. Syn. II, p.* 628.

Tortula arcuata *Mitt. M. austr. am. p.* 163 p.p.

2. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica. *Am. merid.* :
Nov. Granat. ? And. Boliv. ?

Exs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1617.

campylopyxis *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p.* 118.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

canadense *Rich.* } — *Rhacomitrium canescens* ?
 } — *Rhacomitrium lanuginosum* ?

canaliculatum (*Mitt.*) *Par.*

Tortula canaliculata *Mitt. M. austr. am. p.* 147.

— *Am. sept.* : Cuba.

canaliculatum Sull. — *Tr. nivale*.

canescens Timm. — *Rhacomitrium*.

capillaceum Sm. — *Distichium*.

carassense Broth. in *Ule Bryoth. brasil. n.* 128.

Terr. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

carnosum Brid. — *Rhacomitrium heterostichum*.

cataractarum Hartm. — *Rhacomitrium protensum*.

cernuum Lindb. — *Desmatodon*.

chilense Mont. in *Ann. sc. nat. IV*, p. 109 et *Syll. p.* 38; *C. M. Syn. I*, p. 576.

Tortula chilensis Mitt. *M. austr. am. p.* 146.

2. Ad terr. arenac. — *Am. merid.*: And. Quitens., Chile austr.

chlorophyllum C. M. in *Linn.* 1874, p. 635.

2. Ad terr. in silv. — *Am. sept.*: Mexic.

chrysopus C. M. in *Sikora Pl. Mad. n.* 14346.

— *Afr.*: Madagascar.

circinans W. P. Sch. — *Barbula nitida* (*fid. Linpr.*).

cirratum Hpe. *Ic. M. t.* 24; *C. M. Syn. I*, p. 584.

2. — *Pac.*: Austral. or., ins. Lord Howe.

cirratum Sm. — *Ptychomitrium polyphyllum*.

cirrifolium (Mitt.) Par.

Tortula cirrifolia Mitt. in *Godman's Nat. hist. of the I. Azor.*, 1870, p. 276.

2. Terr. — *Afr.*: Madeir.

citrinum Hpe. — *Leptodontium*.

Clintoni C. M. in *Linn.* 1874, p. 636.

Tr. crispulum Besch. *Prodr. bryol. mexic. p.* 33.

2. Ad arbor. et terr. — *Am. sept.*: Mexic.

Cockayini Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, p. 486, t. XLII, fig. 8.

In fissur. rup. — *Pac.*: Nov. Zeland.

? *coloradense* Aust. in *Coult. Bot. Gaz. II*, p. 90; *Lesq. et Jam. Man.* p. 413.

Ster. — *Am. sept.*: Colorado; Calif.?

compactulum C. M. in *Linn.* 1878-79.

Ster. Rupic. — *Am. merid.*: Argentin. Cordob.

compactum Wils. in *hb. W. P. Sch.*; *Jaeg. Ad. I*, p. 240.

— *Eur.*: Hibern.

conicum Hpe. in *C. M. Syn. I*, p. 575.

Ceratodon conicus Lindb. *M. Scand. p.* 27.

2. Muric. — *Eur.*: Suec., Fenn., German. sept. As.: Caucas. *Am. sept.*: Columb. brit.

connivens (Lindb.) Par.

Mollia connivens Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas. p.* 48.

2. Fr. ign. Ad rup. granit. et schist. — As.: Caucas. occ. et centr.

contortifolium (Mitt.) *Jaeg. Ad. I*, p. 246.

Tortula contortifolia Mitt. *M. austr. am. p.* 147.

2? — *Am. merid.*: M. Chimborazo; And. Boliv.?

contortifolium Rob. Br. — *Tr. maoricum*.
convolutum Brid. — *Barbula atro-virens*.
cordatum Milde. — *Didymodon*.

corniculatum (*Wahlenb.*) *Schwaegr. Suppl. II*, p. 75, t. 118; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 494; *C. M. Syn. I*, p. 584.

Encalypta corniculata *Wahlenb. in Berl. Mag. V*, p. 295, t. 7, f. 2.
Mollia corniculata *Arn. et Lindb. M. As. bor. 1890, II*, p. 70.

2. Terr. — *As.* : Kamschatka.

crassinerve *Hpe. in Linn. 1859-60*, p. 456.

Tr. flavo-virens var. crassinerve *Lesq. et Jam. Man.* p. 108.

2. Terr. — *Am. sept.* : *M. Calif.*

crispipilum *Tayl.* — *Rhacomitrium*.

crispulum *Br. in Fr. Müll. M. Sard. et in Fl. 1829*, p. 295, t. 4; *Bryol. eur. II (mon. p. 7)*, t. 173; *C. M. Syn. I*, p. 571; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 171*.

Didymodon crispulus *Wils. in Engl. Bot., II Suppl. t. 2734 (fid. Lindb.)*.

Mollia crispula *Lindb. M. Scand. p. 21*.

Tortula crispula *Mitt. in Melliss's S. Helena*, p. 360.

2. Ad mur., terr. et rup. — *Eur.* : *Zon. merid., praecip. mediterr.*
As. : *Ienissei infer. (?)*; *Caucas. Afr.* : *Alger*; *S. Helen. (indig. ?)*.
Am. sept. : *Rar.* : *Kansas, Calif. merid.*

Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 532*.

« *var. algarvicum* *W. P. Sch. op. cit. p. 172*.

— *Eur.* : *Algarb.*

« *var. angustifolium* *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*

Didymodon rigidulus β *trifarius* *Hartm. Skand. Fl. III ed., II*, p. 176.

Mollia crispula β *viridula* *Lindb. M. Scand. p. 21*.

Tr. crispulum var. viridulum *Braithw. Brit. Moosfl. p. 243*.

Tr. planum *Lindb. in Oefv. Vet. Akad. Foerh. 1859*, p. 210, n. 84.

Tr. trifarium *C. Hartm. Skand. Fl. VII ed., p. 381*.

Tr. viridulum *Br. in Fl. 1829*, p. 301, t. 5.

Ad terr. aren. argill. humid. — *Eur.* : *Alsat., Helvet., Rhaet., Tirol., Bavar., Stir., Salisb.*

Exs. : *Rab. Bryoth. eur. n. 533 et b.*

« *var. brevifolium* *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. ll. cc.*

Ut typ. — *Eur.* : *Cum typ. Afr.* : *Alger.*

« *var. elatum* *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Ad rup. humid. interdum irror. — *Eur.* : *Hibern., Angl., Pyren., Astur. Afr.* : *Alger.*

« *var. longifolium* *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Ut typ. — *Eur.* : *Galloprov.*

« *var. pseudo-Weisia* *W. P. Sch. op. et l. cc.*

— *Eur.* : *Algarb. Afr.* : *Alger.*

crispulum *Besch.* — *Tr. Clintoni*?

var. robustum *W. P. Sch.* — *Barbula cirrifolia*.

var. viridulum *Braithw.* — *Tr. crispulum var. angustifolium*.

curvifolium *Br.* — *Tr. inflexum*.

curvithecium *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1896*, p. 487, t. XLIII, fig. 13.

Ad rup. humid. — *Pac.* : *Nov. Zeland.*

cuspidatum W. P. Sch. *op. cit.* p. 181.

Tr. mutabile forma (*fid. Geh. in Fl.* 1886, n. 22 et *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 579).

Ster. Ad rup. calcar. — *Eur.* : Westphal.

cuspidatum Bryol. jav. — *Didymodon*.

cylindricum { C. M. — *Didymodon*.
Hedw. — *Trichodon*.
Lindb. — *Ceratodon oblongus*.

decipiens Schultz. — *Grimmia Schultzii*.

delicatulum Wils. { — *Ditrichum laxissimum*.
— *Ditrichum tortipes*.

densifolium C. M. — *Leptodontium*.

dentatum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 468.

— *Afr.* : Transvaal.

dentatum Wils. { — *Barbula Wallichii*.
— *Leptodontium*.

dicranoides (*false.* : *dicranelloides*) W. P. Sch. *in litt. ad C. M. et in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 31.

Barbula macrostegia Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 262.

Leptotrichum dicranoides C. M. *Syn. II*, p. 612.

Ramphidium macrostegium Mitt. *M. austr. am.* p. 45.

Tr. leptorhynchum W. P. Sch. *in hb. Mus. Paris*.

Tr. macrostegium Sull. *in Wright M. Cubens n.* 24.

2. Ad terr. argill. — *Am. sept.* : Ludovic., Mexic., Cuba, Jamaic.,
Guadalup. *Am. merid.* : And. Quitens., Brasil. tropic.

difficile Duby. — *Ditrichum Boryanum*.

diffractum Mitt. — *Barbula nitida*.

distans Hpe. — *Didymodon leptocarpus*.

Ehrenbergii Ltz. *M. Ehrenb.* p. 25, t. 4, f. 1-6 et t. 5, f. 7-19.

Didymodon Ehrenbergii Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 281.

Hydrogonium Ehrenbergii Jaeg. *Ad. II*, p. 669.

H. mediterraneum Fitz-Ger. et Bott. *in Nuov. giorn. bot. ital.* April. 1881.

Tr. mediterraneum C. M. *in Rev. bryol.* 1879, p. 33; *Husn. Muscol. gall.* p. 85.

♂ et fr. ign. Ad mur. et lapid. calcar. soepius submers. — *Eur.* :
Galloprov., Emilia. As. : M. Sinai.

« *var. Algeriae* (*Besch.*) *Par.*

Tr. mediterraneum *var. Algeriae* *Besch. Bot. M. Alg.* p. 11.

Ad cataract. — *Afr.* : Alger.

ellipticum H. et T. — *Rhacomitrium*.

elongatum Hook. f. et Wils. *Fl. Tasman. II*, p. 176, t. 173, f. I; *Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, t. XL, fig. 10.

Cynodontium elongatum Mitt. *M. austr. am.* p. 43.

Ditrichum elongatum Mitt. *in Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 51.

Leptotrichum elongatum Jaeg. *Ad. I*, p. 230.

1. Ad terr. humid. — *Am. merid.* : Chile? *Pac.* : Nov. Zeland.,
Austral. or., Tasman.

elongatum Ehrh. { — *Rhacomitrium canescens var. ericoides*.
ericoides Schrad. }

erosum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 472.

— *Afr.* : Transvaal.

exasperatum Schwaegr. — *Campylopus*.

falcatum Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, p. 480, t. XXXIX, fig. 1.

2. Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

« var. β ej. op. et l. cc., fig. 1 A.

Ut et ubi typ.

fasciculare Schrad. — *Rhacomitrium*.

β *protensum* Hartm. — *Rhacomitrium protensum*.

Fendleri C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 481.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

ferrugineum Brid. — *Leucoloma sinuosum*.

filescens Hpe. — *Leptodontium*.

filiformifolium Rob. Br. in op. cit. p. 482, t. XXXIX, fig. 7.

2. Ad terr. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

« var. β ej. op. et l. cc., t. XL, fig. 7 a.

Ut et ubi typ.

flavicans C. M. — *Barbula obtusifolia*.

flavipes Steud. — *Barbula Brebissonii*.

flavo-virens Br. in *Fr. Müller M. Sardin. in Fl.* 1829, p. 304, t. 7 ; *Bryol. eur. II* (mon. p. 6), t. 172 ; C. M. *Syn. I*, p. 585 ; W. P. Sch. *Syn. II* ed., p. 174.

Barbula flavo-virens Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 254.

Didymodon tricolor Bals. et de Not. in *Mém. Acad. Turin.* 1838, p. 333.

Mollia flavo-virens Lindb. *M. Scand.* p. 21.

Tortula flavo-virens ej. de *Tortul.* p. 252.

2. In terr. aren. silvat. maritim. — *Eur.* : Anglia et Neerlandia (ster.) ; Galloprov., Sardin., Hispan. Afr. : Alger., ins. Azor. *Am. sept.* : Florida.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 1370.

var. *crassinerve* Lesq. et Jam. — *Tr. crassinerve*.

var. *minor* Lindb. — *Tr. flavo-virens* var. *viridi-flavum*.

« var. *viridi-flavum* (de Not.) Jaeg. *Ad. I*, p. 248.

Barbula viridi-flava Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 254.

Tr. flavo-virens var. *minor* Lindb. *Trichost.* p. 45.

Tr. viridi-flavum de Not. *Epil.* p. 503.

Ad rup. aren. et calcar. — *Eur.* : Istria.

flexicaule Bryol. eur. — *Ditrichum*.

flexifolium Brid. — *Didymodon*.

flexipes Bryol. eur. II (mon. p. 6), t. 171 ; C. M. *Syn. I*, p. 584 ; W. P. Sch. op. cit. p. 179.

Barbula flexiseta Kindb. op. cit. p. 252.

Timmiella flexipes Limpr. *Laubm. Deutschl. I*, p. 595.

Tr. flexisetum Br. in *Fr. Müller M. Sardin.* ; de Not. *Syll. et Epil.*

2. Ad terr. siccam et in dumetis. — *Eur.* : Sardin., Algarb. *Am. sept.* : Calif.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur. n.* 148.

flexisetum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

— *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

flexisetum Br. — *Tr. flexipes*.

fontanum C. M. in Linn. 1878-79, p. 295.

Hydrogonium fontanum Jaeg. Ad. II, p. 669.

Ster. Subaquat. — Afr. : Somali.

fontinaloides Hedw. — Cinclidotus.

fragile C. M. — Barbula Drummondii.

funale } Hsch. — Grimmia elatior.

funale } Schwaegr. — Grimmia.

fusco-mucronatum C. M. — Desmatodon.

glauescens } Sull. — Ditrichum subglauescens.

glauescens } Sw. — Ditrichum.

glauco-viride Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1894, II, p. 113
et M. Masc. Mad. n. 166.

Ster. — Afr. : Ins. Borbon.

glauco-viride C. M. — Pottia.

gracile Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1896, p. 486, t. XLIII,
fig. 9.

2. Ad rup. humid. — Pac. : Nov. Zeland.

gracile } Hsch. — Rhacomitrium sudeticum.

gracile } Mdo. — Zygodon.

gracilescens C. M. — Leptodontium.

gracillimum C. M. in Linn. 1878-79, p. 313.

2. Rupic. — Am. merid. : Argentin. Cordob.

grimmiioides C. M. — Leptodontium.

Guepini C. M. — Barbula.

gymnum C. M. — Pottia.

Hallii (Tortula?) Rob. Br. in op. cit. p. 482, t. XL, fig. 8.

1. Lignic. — Pac. : Nov. Zeland.

heterostichum Hedw. — Rhacomitrium.

homomallum Bryol. eur. — Ditrichum.

var. densum W. P. Sch. — Ditrichum vaginans.

Hoppeanum Schultz. — Desmatodon latifolius var. glacialis.

hyophilaceum C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, n. 191.

2. — Am. sept. : Guatemala.

hypnoides } Hedw. — Rhacomitrium canescens.

hypnoides } Willd. — Rhacomitrium lanuginosum.

imperfectum C. M. — Pottia.

inclinans W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 32.

2. — Am. sept. : Mexic.

inclinatum } C. M. — Desmatodon cernuus.

inclinatum } Hpe. — Tr. amblystegium.

incurvum Hsch. — Grimmia elatior.

indicum } Schwaegr. — Ti. orientale.

indicum } Willd. — Ptychomitrium.

indigenus Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1896, p. 50, t. IV, f. A.

2 ? ♂ ign. — Am. sept. : Terra nova.

inflexum Br. in Fr. Müller M. Sardin. in Fl. 1829, p. 402, t. 6; C. M.

Syn. I, p. 587; W. P. Sch. op. cit. p. 173. *Det. Eur. t. 178*

Barbula inflexa Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 254.

Tortula inflexa Lindb. Trichost. eur. p. 44

Tr. curvifolium Br. mss.; de Not. Syll. et Epil.

2. Ad rup. calcar. — *Eur.* : Galloprov., Sardin., Istria, ins. Melit., Minorc., Algarb. *As.* : Japon. *Afr.* : Alger.

interruptum (Mitt.) Besch. Note M. I. S. Paul et Amsterd., p. 4.

Didymodon interruptus Mitt. in Hook. Handb. of the N. Zeal. Fl. p. 425.

Ad *Lycopod.* — *Afr.* : Ins. Amsterdam. *Pac.* : Nov. Zeland.

involutum Sull. in *Proced. of the Amer. Acad.*... 1861, p. 277 et in Wright M. Cub. n. 25.

— *Am. sept.* : Cuba.

« var. minor Sull. in op. et l. cc.

— *Am. sept.* : Ibid.

jamaicense (Mitt.) Par.

Tortula jamaicensis Mitt. M. austr. am. p. 547.

2 ? — *Am. sept.* : Jamaica.

juniperinum C. M. in Bot. Zeit. 1862, p. 349.

2 ? Ster. Muric. — *Am. merid.* : Peruv.

Krauseanum Par.

Ångstroemia brevifolia Hpe. et Ltz. in sched.

Tr. brevifolium cor. in Bot. Zeit. 1869, p.

2. Terr. — *Am. merid.* : Æquator.

Krintjingianum Dz. et Mk. — Ceratodon purpureus.

laetum Kze. in Poepp. Pl. Chil. ; C. M. Syn. I, p. 574.

Tortula laeta Mitt. M. austr. am. p. 159.

2. Terr. — *Am. merid.* : Paraguay, Chile austr.

lamprothecium C. M. in Linn. 1874, p. 637.

2. Terr. — *Am. sept.* : Mexic.

lamprothecium C. M. (1897). — Tr. sublamprothecium.

Lamyianum W. P. Sch. — Didymodon Lamyi.

lanuginosum Hedw. — Rhacomitrium.

latifolium Schwaegr. — Desmatodon.

β Laureri Hüb. — Desmatodon Laureri.

β muticum C. M. — Desmatodon latifolius var. glacialis.

Laureri Schultz. — Desmatodon.

laxifolium Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 72; Rob. Br. in Trans. of the N. Zeal. Inst. 1896, t. XLIII, fig. 12.

Dicranum flexifolium Hook. M. exot. t. 144.

Ditrichum flexifolium Hpe. in Linn. 1867, pp. 181-182.

D. laxifolium Mitt. in Trans. and *Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 51.

Leptotrichum flexifolium Hpe. in Jaeg. Ad. I, p. 240 et II, p. 763.

Ad terr. humid. — *Afr.* : Austr. *Am. merid.* : Austr. (fid. Jaeg.)

Pac. : Nov. Zeland., Austral. or. (Victoria), Tasman.

Leikipiae C. M. in Fl. 1890, p. 481.

Ster. — *Afr.* : M. Kenia.

leiodontium C. M. hb.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Leptodon Mitt. — Campylopus.

leptorhynchum W. P. Sch. — Tr. dicranoides.

leptotheca C. M. in Linn. 1867-68, p. 625.

2. — *Pac.* : Austral. or.

Leucodon C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 192.

— *Am. sept.* : And. vulcan. Guatemal.

Leucoloma Schwaegr. — *Leucoloma bifidum*.

ligulatum (Tortula?) Rob. Br. in *op. cit.* p. 485, t. XLII, fig. 5.

1. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

linealifolium C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 481.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

lineare Sm. { — *Dichodontium pellucidum*.
— *Tr. tophaceum*.

linearifolium Rob. Br. in *op. cit.* p. 485, t. XLII, fig. 7.

1. Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

lingulatum Hook. f. et Wils. *Fl. of the N. Zeal.* II, p. 71, t. 84, f. 4 et
Handb. p. 416 ; Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896.

— *Pac.* : Nov. Zeland.

« var. β *eor. op. et ll. cc.*

— *Pac.* : Ibid.

linoides { Brid. — *Barbula unguiculata*.
Engl. Bot. { — *Didymodon luridus*.
— *Tr. tophaceum*.

littorale Mitt. in *Seem. Journ. of bot.* 1868, p. 99, t. 77, f. 7-9 ; W. P.
Sch. Syn. II ed. p. 180.

Didymodon littoralis *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin.* p. 275.

Mollia littoralis *Braithw. Brit. Mossfl.* p. 224.

Fr. ign. Ad rup. marit. — *Eur.* : Anglia merid., Normann. marit. ;

Bade ? (*fid. Limpr.*) ; Norveg., Tirol. (*fid. Hagen*).

lonchobasis C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 102.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

longifolium { Brid. — *Leucoloma sinuosum*.
Dz. et Mk. — *Ditrichum Boryanum*.
 β *humile* Brid. — *Leucoloma sinuosum*.

longirostre Hartm. — *Dicranodontium*.

luridum Spr. — *Didymodon*.

luteolum Besch. — *Leptodontium*.

luteum Hpe. — *Leptodontium*.

macrostegium Sull. — *Tr. dicranoides*.

mahaliesmontanum *Rehm. M. Afr. austr. n.* 470.

— *Afr.* : Transvaal.

Mandoni C. M. — *Leptodontium*.

mediterraneum C. M. — *Tr. Ehrenbergii*.

var. *Algeriae* Besch. — *Tr. Ehrenbergii* var. *Algeriae*.

melanocarpum Mitt. — *Hyophila Barbula*.

micrangium C. M. — *Desmatodon*.

microcarpum W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr.* p. 24.

Calymperes involutum ej. in *hb. Boissier*.

2. — *Am. sept.* : Guadalup., Martinic.

microcarpum Hedw. { — *Rhacomitrium*.
— *Rhacomitrium sudeticum*.

microthecium C. M. — *Pottia*.

Mildeanum *Jur. Beitr...* p. 592.

2. Muric. — *As.* : Persia.

minutifolium Rob. Br. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, p. 484, t. XLI, fig. 2.

Ad rup. humid. — *Pac.* : Nov. Zeland.

monspeliense W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 175.

Didymodon monspeliensis Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 273.

Tr. triumphans var. *monspeliense* Husn. *Musc. gall.* p. 89.

1. Ad terr. aren. calcar. — *Eur.* : Gall. merid. (Monspel.).

Moretoni (Tortula)? Rob. Br. in *op. cit.* p. 483, t. XL, fig. 9.

1. Lignic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

Mosis Ltz. — *Gyroweisia*.

mucronatulum Card. in *Ann. Rep. of the Missouri Bot. Gard.* 1897, p. 57.

Ster. — *Afr.* : Ins. Azor.

mucronatum Besch. *Fl. bryol. Nov. Caled.* p. 205.

Ster. — *Pac.* : Nov. Caledon.

mutabile *Bryol. eur.* II (mon. p. 8), t. 174; *C. M. Syn.* I, p. 571; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 170.

Didymodon Benthami W. Arn. (*fid. C. M.*).

D. brachydontius Wils. in *Engl. Fl.* V, p. 30.

D. crispulus ej. (*fid. C. M.*).

Hymenostylium Mülleri Br. in *Fl.* 1829, p. 386, f. 1-13.

Mollia brachydontia Lindb. *M. Scand.* p. 21.

Plaubelia tortuosa Br. in *Fr. Müll. M. Sardin.*

Tortula brachydontia Mitt. *M. austr. am* p. 148.

Tr. brachydontium Br. in *Fl.* 1829, p. 393, t. 3.

2. Ad rup. humid. fissur. et terr. petros. humid. — *Eur.* : Ins. Brit., reg. merid.; rar. et ster. in reg. sept. *As.* : *Caucas.* *Afr.* : *Alger.*, *Maroc*, *Madeir.*, ins. *Canar.* *Am. merid.* : *And.* *Quitens.* *Pac.* : *Nov. Zeland.* sept.

Exs. : *Mandon Pl. Madeir.* n. 7.

Rab. Bryoth. eur. n. 870, 960.

« var. *cylindricum* W. P. Sch. *op. cit.* p. 171.

— *Eur.* : *Algarb.*

« var. *densum* *Bryol. eur. l. c.*

Ut et ubi typ. in *Eur.*

« var. *eophocarpum* W. P. Sch. *op. et l. cc.*

— *Eur.* : *Algarb.*

var. *robustius* Jur. — *Tr. nitidum.*

var. *unguiculatum* Husn. — *Hymenostomum.*

muticum (Mitt.) Par.

Tortula mutica Mitt. in *Phil. Trans. of the roy. Soc.* 1879 (*extr. vol.*) p. 389.

Ster. — *Afr.* : Ins. *Rodriguez.*

Neesi *Bryol. jav.* — *Didymodon.*

nervosum Br. — *Barbula atro-virens.*

nigricans Brid. — *Cinclidotus riparius.*

nitidum W. P. Sch. — *Barbula.*

nodulosum Aust. in *Bull. Torr. bot. Club*, VI, p. 74.

Ditrichum vaginans var. *Lesq. et Jam. Man.* p. 106.

— *Am. sept.* ?

nudum { *C. M.* — *Pottia.*

{ *Schleich.* — *Rhacomitrium sudeticum.*

obliquum C. M. — Desmatodon.

obscurum de Not. — Dicranoweisia Bruntoni.

obtusifolium Hpe. in *Bot. Zeit.* 1870, p. 49.

2. Ad rup. calcar. — *Am. sept.* : Mexic.

obtusifolium { P. B. — Rhacomitrium.
W. P. Sch. — Desmatodon Schimper.

obtusum Sm. — Rhacomitrium sudeticum.

occidentale (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 245.

Tortula occidentalis Mitt. *M. austr. am.* p. 155.

2. Terr. — *Am. merid.* : And. Peruv.

œneum C. M. — Didymodon.

œruginosum Lindb. — Gymnostomum rupestre.

oocarpum Rehm. *M. Afr. austr. n.* 117 et 474.

— *Afr.* : Orange, Transvaal.

« *var. lanceolatum* ej. l. c. n. 474 b.

— *Afr.* : Transvaal.

orientale Willd. *herb.* ; C. M. *Syn. I*, p. 568.

Barbula indica Brid. *Bryol. univ. I*, pp. 544 et 828 ((*excl. syn. Willd.*) ;
Bryol. jav. I, p. 99, t. 81.

Tortula indica Hook. *M. ex. II*, p. 7, t. 135 (*excl. syn. Willd.*) ; Mitt. *M. Ind. or.* p. 30.

Tr. orientale Schwaegr. *Suppl. I, I*, p. 142, t. 36.

2. Muric. — *As.* : Nepal., Bengal., Ceylan, Java, ins. Ceram, Banca, Borneo. *Pac* : Nov. Guin. occid. (ins. Kei).

orthotrichoides C. M. in *Linn.* 1874, p. 601.

Ster. — *Am. merid.* : Nov. Granat.

ovatum W. et M. — *Grimmia commutata*.

pallidisetum H. Müll. *Zeitschr. d. Rhein. Naturf. Ges.* 1864, p. ;

W. P. Sch. *Suppl. Bryol. eur. III-IV*, t. 2 et *Syn. II ed.* p.

Didymodon pallidisetus Kindb. *Eur. and M. Am. Bryin.* p. 274.

Tr. triumphans var. pallidisetum Husn. *Muscol. gall.* p. 89.

1. In fissur. rup. calcar. — *Eur.* : Westphal., Thuring., Rhoengeb., Helvet.

pallidum { Brid. — *Ditrichum Boryanum*.
Hedw. — *Ditrichum*.

β *strictum* Schwaegr. — *Ditrichum pallidum*.

papillosum Sm. — *Ceratodon purpureus*.

paradoxum Brid. — *Oreoweisia serrulata*.

patens Schwaegr. — *Rhacomitrium*.

var. β Schwaegr. — *Rhacomitrium sudeticum*.

β *funale* H. et T. — *Grimmia funalis*.

pellucidum Wils. — *Wilsoniella*.

pensilvanicum Spreng. — *Barbula unguiculata*.

? *perangustum* Besch. *Note M. I. S. Paul et Amsterd.* p. 4.

Ster. — *Afr.* : Ins. Amsterd.

perichaetiale Hook. — *Holomitrium*.

perpusillum C. M. — *Pottia*.

persicum Jur. et Milde *Beitr...* p. 592.

Ster. — *As.* : Pers. austr.

phaeum *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II, p. 72, t. 84, f. 5 et Handb. p. 416.*

— *Pac.*: Nov. Zeland. bor.

Philiberti *W. P. Sch. Syn. II. ed. p. 175.*

Didymodon Philiberti *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 273.*

Tr. triumphans *var. Philiberti Husn. Muscol. gall. p. 89.*

1. Ad mur. argill. aren. — *Eur.*: Gall. merid. (Monspel.).

piliferum Sm. } (fid. C. M.) — *Desmatodon latifolius var. brevicaulis.*
 } (fid. Lindb.) — *Pottia latifolia var. pilifera.*

piriforme *Lesq. et Jam. Man. p. 109.*

2. — *Am. sept.*: Florida.

planum Lindb. — *Tr. crispulum var. angustifolium.*

plicatulum C. M. in *Linn. 1878-79, p. 423.*

1. — *Am. merid.*: Uruguay.

pseudo-sulfureum C. M. — *Leptodontium.*

pulvinatum W. et M. — *Grimmia.*

β *alpestre* eor. — *Grimmia alpestris.*

pumilum C. M. in *Fl. 1890, p. 480.*

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

pungens (Mitt.) Par.

Didymodon pungens Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 150.*

— *Afr.*: M. Cameroon.

purpuratum (Mitt.) Par.

Rhamphidium purpuratum Mitt. in *Godman's Nat. hist. of Ins. Azor., p. 290.*

— *Afr.*: Madeir., ins. Azor.

pusillum Hedw. — *Ditrichum tortile var. pusillum.*

var. 2 et 3 Hedw. — *Ditrichum vaginans.*

radiculosum Rob. Br. in *Trans. and Proced. of the N. Zeal. Inst. 1896, p. 489, t. XXXIX, fig. 3.*

Ad terr. humid. — *Pac.*: Nov. Zeland.

ramigerum Timm. — *Rhacomitrium lanuginosum.*

ramulosum W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 33.*

2. — *Am. sept.*: Mexic.

recurvirostre Lindb. — *Didymodon rubellus.*

reflexidens Hpe. — *Desmatodon.*

reflexum Lindb. — *Gyroweisia.*

β *gymnostomum* Lindb. — *Gyroweisia tenuis.*

repandifolium Rob. Br. in *op. cit. p. 487, t. XLIII, fig. 11.*

1. Ad rup. humid. — *Pac.*: Nov. Zeland.

repens C. M. in *Fl. 1890, p. 481.*

Ster. — *Afr.*: Kilima N'Djaro.

repens Schwaegr. — *Amblystegium serpens.*

rigidiusculum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n. 1617 bis.*

— *Am. merid.*: And. Boliv.

rigidulum Sm., *Bryol. eur.* — *Barbula.*

rigidulum × *nitidum* Boul. — *Barbula spadicea.*

riparium Rehm. *M. Afr. austr. n.* 121.

— *Afr.* : Natal.

riparium W. et M. — *Cinclidotus*.

rivale (Mitt.) Par.

Tortula rivalis Mitt. *M. austr. am.* p. 147.

Tr. canaliculatum Sull. in *Proced. of the Amer. Acad.* 1861.

Ad rivul. — *Am. sept.* : Cuba.

rostratum Rob. Br. in *op. cit.* p. 485, t. XLII, fig. 6.

In fissur. rup. — *Pac.* : Nov. Zeland.

rosulatum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p.

Ster. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

rubellum Rab. — *Didymodon*.

β *spectabile* Rab. — *Geheebia cataractarum*.

rubiginosum C. M. in *Linn.* 1867-68, p. 625.

Tortula rubiginosa Mitt. in *Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Victoria*, p. 1883, p. 60.

2. — *Pac.* : Austral. or. (Victoria).

rubripes Mitt. in *Hook. f. Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 417.

2. — *Pac.* : Nov. Zeland.

rufisetum C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 115.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Sartorii C. M. — *Desmatodon*.

saxatile Tayl. — *Rhacomitrium fasciculare*.

saxicola Hsch. — *Campylosteleum*.

Schimperii Mont. — *Desmatodon*.

Schlimii C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 579.

Tortula Schlimii Mitt. *M. austr. am.* p. 148.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

? *scitulum* Aust. — *Distichium inclinatum*.

sciuroides W. et M. — *Leucodon*.

Searrellii Rob. Br. in *op. cit.* p. 484, t. XLII, fig. 4.

1. Ad terr. humld. — *Pac.* : Nov. Zeland.

semi-vaginatum W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1658.

Tortula semi-vaginata Dna E. G. Britton in *Bull. Torr. bot. Club*, Decembr. 1896.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

serratum Ehrh. — *Rhacomitrium lanuginosum*.

setosum H. f. et W. — *Ditrichum affine*.

sinense C. M. — *Leptodontium*.

sinuosum Mitt. — *Didymodon*.

spathulato-lineare C. M. — *Pottia*.

squarrosus Brid. — *Leptodontium expunctatum*.

stellatum C. M. — *Leptodontium*.

stenocarpum Hpe. — *Rhacomitrium heterostichum*.

strictum { Bryol. eur. — *Ceratodon chloropus*.

{ Sw. — *Ditrichum pallidum*.

subalpinum *de Not. Syll. M. p. 184; C. M. Syn. II, p. 525.*

? *Didymodon subalpinus Jaeg. Ad. I, p. 211 (1).*

Leptodontium subalpinum Lindb. de Tortul. p. 227 (in obs.); de Not. Epil. p. 49.

Ad rivul. — *Eur.* : Pedemont.

subanomalum *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 33.*

1. — *Am. sept.* : Mexic.

subcirratum *Hpe. Symb. 1874, p. 483.*

2. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

subcirrifolium C. M. — Leptodontium.

subdenticulatum C. M. — Leptodontium.

sublamprothecium Par.

Tr. lamprothecium C. M. in Bull. hb. Boissier, 1897, p. 556.

— *Am. sept.* : Jamaic.

subsecundum H. et Grev. — Rhacomitrium.

subulatum Bryol. eur. — Ditrichum.

sudeticum Funk. — Rhacomitrium.

sulphureum { *C. M. — Leptodontium.*
 Rehm. — Leptodontium transvaaliense.

sulphuripes C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 103.

2. — *As.* : China or. (prov. Schen Si).

syntrichioides C. M. — Didymodon?

systylium C. M. — Desmatodon.

? *tenue Hedw. Sp. M. p. 107, t. 24; Brid. Bryol. univ. I, p. 491 (2).*

Coscinodon pullulans Brid. op. cit. p. 371.

Ditrichum tenue Hpe. in Fl. 1867, pp. 181-182.

Grimmia pullulans Spreng. Pl. min. cogn. Pug. III, p. 94.

Leptotrichum tenue C. M. Syn. I, p. 447 (excl. syn. Bryol. eur.) et II, p. 611.

Weisia capillacea Brid. op. cit. p. 359.

— *Am. sept.* : Pensilv.

Exs. : Drumm. *M. bor. Am. II ed. n. 58?*

tenue { *Schrad. — Trichodon cylindricus.*

 { *W. P. Sch. Coroll. — Leptobarbula berica.*

var. *glaciale W. P. Sch. — Ditrichum vaginans var. glaciale.*

tenuifolium { *C. M. — Leptodontium.*

 { *Schrad. — Trichodon cylindricus.*

tenuirostre Lindb. — Didymodon cylindricus.

Thomsoni C. M. — Desmatodon.

tonkinense Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1887, p. 96.

2. — *As.* : Tonkin.

*tophaceum Brid. Mant. M. p. 84 et Bryol. univ. I, p. 495 (incl. β *leucotrichum*); Bryol. eur. II (mon. p. 9), t. 175; C. M. Syn, I, p. 573 et II, p. 624; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 169.*

Anacalypta tophacea Färnrr. (fid. Lindb.); Br. in Bryol. germ. II, p. 148, t. 37.

Barbula brevifolia Lindb.

B. tophacea Mitt. M. Ind. or. p. 35.

(1) « Suspectissima species! » *Jaeg. l. c.* In *W. P. Sch. Syn. deest.*

(2) *Secund. Lesq. et Jam. Man. p. 106, incerta spec., ab Hedwigio a nemine visa.*

- Ceratodon purpureus* { *Wils. in Kew Journ. bot. IX, p. 299?*
C. stenocarpus {
Dicranum pellucidum var. *Sw. in Schrad. Bot. Journ. II, p. 177.*
Didymodon tophaceus *Jur. Laubm. Oester. Ung. p. 100.*
D. trifarius *H. et T. Musc. brit.*
Tr. lineare *Sm. Fl. brit. III, p. 1247?*
Tr. linoides (*Dicks. sub Bryo, sed false fid, Wils.*) *Engl. Bot. t. 2295.*
 2. Ad rup. et mur. calcar. perpet. aq. calcar. irror. — *Eur.* : Media tota, Gall. sept., Italia, Sardin. Astur., etc. *As.* : Tibet., Caucas., Minor. *Afr.* : M. Sinai, Alger., C. B. Sp. *Am. sept.* : Ontario, Niagara, New York, Texas, Calif. *Am. merid.* : And. Boliv.
Ecs. : Mandon Pl. Boliv. n. 1619.
 Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 151.
 « *var. acutifolium* *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 70.*
 Tr. tophaceum var. brevicaule ej. Syn. I ed. p. 150.
 Tr. tophaceum var. humile Bryol. eur. l. c.
 Ad rup. et terr. aren. calcar. — *Eur.* : Suecia, Dania, German. sept., Anglia. *Afr.* : Alger.
 var. brevicaule *W. P. Sch.* — *Tr. tophaceum var. acutifolium.*
 « *var. brevifolium* (*Dicks.*) *Bryol. eur. l. c.*
 Bryum brevifolium Dicks. Fasc. pl. crypt. II, p. 4 (fid. Wils.).
 Locis minus aquos. — *Eur.* : Ubi typ.
 var. humile *Bryol. eur.* — *Tr. tophaceum var. acutifolium.*
 « *var. laxum* *Kindb. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 15.*
 — *Eur.* : Ital. (Ticin.).
torquescens *W. P. Sch. mss. C. M. in Bot. Zeit. 1859, p. 229.*
 1. — *Afr.* : Abyss., C. B. Sp.
Tortella *C. M. in Linn. 1878-79, p. 319.*
 Ster. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.
tortile { *Schrad.* — *Ditrichum tortile.*
 { *Wils.* — *Barbula comosa.*
 β *pusillum* *Bryol. eur.* — *Ditrichum tortile var. pusillum.*
tortuloides *Sull. et Lesq. in Proceed. of the Amer. Acad. 1859, p. 277.*
 1. *Rupic.* — *Afr.* : C. B. Sp.
tortum *Schrank.* — *Ceratodon purpureus.*
tovarense *C. M. in Fl. 1897, p. 331.*
 — *Am. merid.* : And. Venezuel.
trachyneuron (*Kindb.*) *Par.*
 Didymodon trachyneuron Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 275.
 Ster. — *Am. sept.* : Canada (Quebec).
trifarium { *C. Hartm.* — *Tr. crispulum var. angustifolium.*
 { *Sm.* — *Didymodon luridus.*
triumphans *de Not. M. ital. mss.* ; *W. P. Sch. Syn. I ed. p. 690; Suppl. Bryol. eur. fasc. III-IV et Syn. II ed. p. 176.*
 Didymodon triumphans Kindb. in op. cit. p. 273.
 1. In pasc. aren. ster. — *Eur.* : Liguria. *Afr.* : Alger.
 var. monspeliense *Husn.* — *Tr. monspeliense.*
 var. pallidisetum *Husn.* — *Tr. pallidisetum.*
 var. Philiberti *Husn.* — *Tr. Philiberti.*

ulocalyx C. M. — *Leptodontium*.

umbellatum Schwaegr. — *Campylopus*.

umbrosum C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 318.

Syn. Muric., rupic. et terr. — *Am. merid.* : Argentin. Cordob.

undatum W. P. Sch. — *Barbula commutata*.

vaginans Sull. — *Ditrichum*.

vaginatum Dz. et Mh. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 134, t. 42; *Bryol. jav.* I, p. 98.

2. Terr. — *As.* : Sumatra.

vaginatum Hook. — *Holomitrium*.

vancouveriense Broth. hb.

Didymodon vancouveriensis Kindb. in op. cit. p. 252.

— *Am. sept.* : Ins. Vancouver.

vernicosum Ren. et Card. in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1896, I, p. 308.

2. — *Afr.* : Ins. Bourbon.

viridiflavum de Not. — *Tr. flavo-virens* var. *viridiflavum*.

viridulum Br. — *Tr. crispulum* var. *angustifolium*.

Wallisi C. M. in *Linn.* 1874, p. 603.

2. Paludic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Warnstorffii Limpr. *Laubm. Deutschl.* I, p. 587 (1).

Barbula lingulata Warnst. in *Hedwig.* 1885, n. 3.

2. Fr. ign. Ad lapid. calc. et aren. rip. flum. et lacuum. — *Eur.* : Helvet.

Winteri Husn. — *Leptobarbula*.

Woodii Husn. — *Barbula*.

xanthocarpum W. P. Sch. mss.; C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 229.

Ceratodon xanthocarpus Hsch. (*Ad. Jaeg. Ad.* I, p. 310).

1? — *Afr.* : C. B. Sp.

TRIDONTIUM Hook. f. *Ic. pl. rar.* II, t. 148.

Spec. omn. **DICHODONTIA** ejusd. nom.

TRIMATIUM Froehl. in hb. Bridel.

tophaceum Froehl. — *Eucladium verticillatum*.

TRIPLOCOMA La Pyl. in *Journ. bot. Desvaux*, n. 5.

polytrichoides La Pyl. — *Dawsonia*.

TRIPTEROCLADIUM C. M. in *Fl.* 1875, p. 79 et in *Rev. bryol.* 1875, p. 46 (2 spec.).

compressulum (C. M.) Jaeg. *Ad.* II, p. 748.

Eurhynchium compressulum Jaeg. op. cit. p. 428.

Hypnum compressulum C. M. in op. et ll. co.; *Lesq. et Jam. Man.* p. 331.

1. — *Am. sept.* : Oregon.

(1) « An *Tr. Warnstorffii* ♂ et *Tr. Ehrenbergii* ♀ unicae et ejusd. spec. ? ». Limpr. l. c.

leucocladulum (C. M.) Jaeg. op. cit. p. 748.

Eurhynchium leucocladulum Jaeg. op. cit. p. 428.

Hypnum leucocladulum C. M. in op. et l. cc.; Lesq. et Jam. Man. p. 330.

Platygyrium rupestre Kindb. in Bull. of Torr. bot. Club, 1890, p. 276;
Mac. Canad. M. n. 469.

Tr. rupestre Card. M. Am. sept. p. 50, n. 1068.

l. Rupic. — Am. sept.: Columb. brit., Oregon, Idaho.

TRIQUETRELLA C. M. mss. (2 spec.).

filiformis C. M. mss.

— Pac.: Austral. merid. (Adelaide).

triquetra C. M. mss.

— Pac.: Austral.

Trismegistia C. M. M. Polyn. p. 89 (sect. *HYPNI* = *SEMATOPHYLLUM*).

TRISTICHIOPSIS C. M. in Linn. 1880-82, p. 394 (1 spec.).

mirabilis C. M. in op. et l. cc.

l. — Am. merid.: Alp. Argentin. subtropic.

TRISTICHIMUM C. M. in Linn. 1878-1879, p. 235 (1 spec.).

Lorentzi C. M. in op. et l. cc.

l. — Am. merid.: Alp. Argentin.

TROCHOBRYUM Breidl. et G. Beck in Verh. d. K.K. zool.-bot. Ges. in
Wien, 6 Febr. 1884, c. ic. (1 spec.).

carniolicum Breidl. et G. Beck in op. et l. cc.

Ad saxa calcar. madida. — Eur.: Carniol.

Tropinotus C. M. M. Polyn. p. 58 (sect. *LEUCOPHANIS*).

Turgidella C. M. in Fl. 1896, p. 484 (sect. *PILOTRICHELLAE*).

ULEA C. M. in H. dwig. 1897, p. 102 (2 spec.).

palmicola C. M. in op. et l. cc.

l. Ad *Cocoim eriospatham*. — Am. merid.: Brasil. austr. or.

yesensis Besch. in litt.

l. — As.: Japon.

Exs.: Faurie n. 11 b et 554.

Ulobryum C. M. in Fl. 1896, p. 435 (sect. *LEUCOBRYI*).

ULOTA Brid. Bryol. univ. I, p. 298 (57 spec.).

americana Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. VIII, p. 26; Lesq. et Jam
Man. p. 162 (1).

Orthotrichum crispum Drumm. M. bor. am. I ed. n. 153 (fid. Dna E. G.
Britton in Bull. Torr. bot. Club, 1894, p. 65).

Ulotia curvifolia (id.).

U. intermedia (fid. Ren. et Card.).

l. Cortic. et rupic. — As.: Japon. Am. sept.: Nov. Scot., New Bruns-
wick, Gaspes., lac. Huron et Super., Columb. brit.

(1) Cf. Venturi in Rev. bryol. 1892, p. 2.

americana { Limpr. — *U. Hutchinsiae*.
 { Mac. exs. — *U. scabrida*.
β nigrita Limpr. — *U. Hutchinsiae*.

anceps Vent. in *Oefv...* 1893, p. et in *Pap. and Proced. of the roy. Soc. of Tasman.* 1893, p. 201.

l. Cortic. — *Pac.* : *Tasman*.

Anderssonii Jaeg. — *U. leiothecia*.

angustissima C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 104.

Ster. — *Am. merid.* : *Valdivia*.

Barclayi Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 26 ; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 75, t. 56 ; *Lesq. et Jam. Man.* p. 164.

Orthotrichum Barclayi Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 305.

l. — *Am. sept.* : *Sitka*.

bellissima Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 57.

l. Cortic. — *As.* : *Yunnan*.

bicolor Brid. — *U. Drummondii*.

brevicollis (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 442.

Orthotrichum brevicolle Mitt. *M. austr. am.* p. 192.

— *Am. merid.* : *Valdivia*.

Bruchii Hsch. in *Brid. Bryol. univ. I*, p. 894 ; *W. P. Sch. Syn. I ed.* p. 256 et *II ed.* p. 303.

Orthotrichum Bruchii Wils. *Bryol. brit.* p. 188, t. 45.

O. coarctatum *Bryol. eur. III* (mon. p. 21), t. 227 ; *C. M. Syn. I*, p. 713.

O. dilatatum *Bryol. eur. l. c.* (mon. p. 22).

U. coarctata *W. P. Sch. Coroll.* p. 41.

U. dilatata *ej. l. c.*

Ulotrichum coarctatum *ej. Compend. Bryol. eur.*

Weissia Bruchii *Lindb. M. Scand.* p. 28 (1).

l. Ad arb. silvat. praepr. *Fagos* junior. et *Abietes*. — *Eur.* : *Reg. montana*. *Am. sept.* : *Terr. nov.*, lac. *Erie*, *Ontario*, *Columb. brit.*, *reg. or.*

Exs. ; *Mac. Canad. M. n.* 453 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 569, 880.

Un. itin. 1867, n. 17.

Bruchii *Mac. p.p.* — *U. obtusiuscula*.

calvescens Wils. in *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 303 et *Suppl. Bryol. eur. fasc. III-IV*.

Orthotrichum calvescens *Carrington in Trans. of the bot. Soc. of Edinb. VII*, p. 386.

U. vittata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 3.

l. Ad ramul. fructic., rar. ad truncos arb. junior. — *Eur.* : *Anglia*, *Hibernia*. *Afr.* : *Madeir.*

Exs. : *Mandon Pl. Madeir. n.* 17.

Rab. Bryoth. eur. n. 520.

camptopoda Kindb. — *U. crispa*.

carinata Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 75.

Orthotrichum carinatum *ej. M. austr. am.* p. 190.

l. — *Am. merid.* : *Ins. Chiloe*.

(1) De syn. antiquior. cf. *C. M. Syn. I*, p. 713 ad *O. crispum*.

chilensis (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 442.

Orthotrichum chilense Mitt. *op. cit.* p. 193.

— *Am. merid.* : Valdiv.

coarctata W. P. Sch. — *U. Bruchii*.

cochleata Vent. in *Oefv.*.... 1893, p. et in *Pap. and Proced. of the roy. Soc. of Tasman.* 1893, p. 201.

1. Cortic. — *Pac.* : Tasman.

connectens Kindb. — *U. crispa*.

crassifolia H. et T. — *Orthotrichum*.

crenato-erosa (C. M.) Par.

Orthotrichum crenato-erosum C. M. in *Fl.* 1885, p. 420.

2. Lignic. — *Am. merid.* : Fuegia occid.

crispa (Hedw.) Brid. *Bryol. univ. I*, p. 299; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 304.

Bryum crispum Hoffm. *Deutsch. Fl. II*, p. 25.

Grimmia capillata Maench. *Fl. Marp.* p. 731.

Gr. silvatica Willd. *Prodr. Fl. Berol. n.* 906.

Orthotrichum connectens Kindb. in *Ottawa Nat. IV*, p. 64.

O. crispum Hedw. *Sp. M.* p. 162; *Bryol. eur. III* (mon. p. 23), t. 228; C. M. *Syn. I*, p. 712 (1).

O. ulophyllum Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 307.

Neckera ulophylla W. et M. *Bot. Taschb.* p. 236.

Ulota campopoda Kindb. in *Mac. Cat.* p. 85; *Mac. Can. M. n.* 582.

U. connectens ej. in *op. et l. cc.*; *Mac. Canad. M. n.* 557.

Ulotrichum crispum *Compend. Bryol. eur.*

Weissia crispa Roth. *Fl. Germ. III, I*, p. 222.

W. ulophylla Ehrh. *Beitr. I*, p. 191.

1. Ad trunc. et ramul. arb. silvat. praepr. *Fagorum*, *Abietum* et *Betul.* — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Saghalien, Amour, Caucas. occ. *Afr.* : Ins. Canar. *Am. sept.* : Terr. nov., New Brunswick, Nov. Scotia, Gaspesia, reg. sept. et or. *Pac.* : Tasman.

Exs. : *Mac. Canad. M. n.* 113 p.p.

Rab. *Bryoth. eur. n.* 178, 521.

Sull. et Lesq. *M. bor. am. II ed. n.* 90.

var. *crispula* Hamm. — *U. crispula*.

« var. *minor* Lesq. et Jam. *Man. p.* 162.

U. intermedia W. P. Sch. ?

Cortic. — *Am. sept.* : Ins. Miquelon, Terr. nov., Ontario, lac. Huron, Columb. brit.

crispula Br. in Brid. *Bryol. univ. I*, p. 793; W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 305.

Orthotrichum cirratum Bernh. in Brid. *op. cit.* p. 301 (sub *O. crispo*).

O. crispulum *Bryol. eur. III* (mon. p. 23), t. 228; C. M. *Syn. I*, p. 713 (1).

O. crispum β minus *Schwaegr. Suppl. I, II*, p. 25.

U. crispa var. *crispula* Hammar Mon. *Orthotr. Sueciae*, p. 24.

Ulotrichum crispulum *Compend. Bryol. eur.*

Weissia crispula Lindb. *M. Scand. p.* 28.

1. Ad arbor. junior. — *Eur.* : Fere tota. *As.* : Caucas. centr. et occ. *Am. sept.* : Terr. nov., Anticosti, New Brunswick, Nov. Scotia, Gaspesia, Ontario, reg. sept. et or.

(1) De syn. antiquior. cf. C. M. l. c.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 114.

Rab. Bryoth. eur. n. 179.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 179.

β *ambigua* W. P. Sch. — *U. intermedia*.

« *var. dolosa* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1896, p. 51.

— *Am. sept.* : District of Columbia.

curvifolia (Wahlenb.) Brid. Bryol. univ. I, p. 302; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 302.

Orthotrichum curvifolium Wahlenb. Fl. Lapp. p. 365; Bryol. eur. III (mon. p. 21), t. 226; C. M. Syn. I, p. 715.

O. Laureri Hsch. in Fl. 1827, p. 656.

Ulotrichum curvifolium Consp. Bryol. eur.

Weissia curvifolia Lindb. M. Scand. p. 28.

2. Ad sax. granit. latera. — *Eur.* : Rariss. in reg. alp. zon. interm., frequent. in reg. montan. et subalp. zonae sept. : Scandin., Fenn., Alp. Carinth., Salisb.; deest in Britann. *Am. sept.* : Groenland, Ontario.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 182, 222.

Un. itin. 1867, n. 88. 89.

Darwinii Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 77.

Orthotrichum Darwinii ej. M. austr. am. p. 192.

1? — *Am. merid.* : Fuegia.

dilatata W. P. Sch. — *U. Bruchii*.

Drummondii (Grev.) Brid. Bryol. univ. I, p. 299; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 300.

Macromitrium Drummondii Hpe. in Bot. Zeit. 1837, p. 280.

Orthotrichum crispum β Wahlenb. Fl. Lapp.

O. Drummondii Grev. Scot. Crypt. Fl. II, t. 115; Bryol. eur. III (mon. p. 12), t. 210; C. M. Syn. I, p. 712.

O. subrepens Sommerf. Suppl. Fl. Lapp. p. 191, t. 1, f. 2.

Ulotrichum bicolor Brid. op. cit. p. 792.

U. Drummondii Consp. Bryol. eur.

Weissia Drummondii Lindb. M. Scand. p. 28

1. Ad trunc. Alnorum, Betul. et Sorb. aucupar. — *Eur.* : Zon. sept., rar. intermed.; Scandin., Scot., Hibern., Westphal., Voges., Hercyn., Sudet., Riesengeb., Tatra; Transilv. ? *Am. sept.* : Canada, Terr. nov., ins. Miquelon.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 881.

dura C. M. in Dusen M. Camer. n. 351.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Eckloni (Hsch.) Par.

Orthotrichum Eckloni Hsch. in Linn. 1841, p. 129; C. M. Syn. I, p. 715.

1? Rupic. — *Afr.* : C. B. Sp.

eremitensis (false *Hermitei*) Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 75.

Orthotrichum eremitensis ej. M. austr. am. p. 189.

O. luteolum H. f. et W. Crypt. antarct. p.p.

1. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremitae, cap. Horn.

fuegiana Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1859, p. 76.

Orthotrichum coarctatum H. et Grev. ?

O. fuegianum Mitt. M. austr. am. p. 192.

O. luteolum H. f. et W. Crypt. antarct. (quoad ic. calyptrae).

O. marginatum Angstr. in Oefv.... 1872, n. 4, p. 4.

U. marginata Jaeg. Ad. II, p. 691.

1. — *Am. merid.* : Fuegia, ins. Eremit., cap. Horn.

fulva Brid. *Bryol. univ.* I, p. 301; *C. M. Syn.* I, p. 718.

Orthotrichum crispum var. Brid. *Sp. M.* II, p. 5.

Schlotheimia fulva Ångstr. in *Oefv....* 1873, n. 5, p. 141.

l. Cortic. — Afr. : Madagasc. sept., ins. Borbon., Franciae.

fulvella Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 75.

Orthotrichum fulvellum ej. *M. austr. am.* p. 191.

O. luteolum H. f. et W. *Crypt. antarct.* p.p.

l. — Am. merid. : Fuegia, ins. Eremitae.

Germanae (Mont.) Jaeg. *Ad.* I, p. 441.

Orthotrichum Germanae Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 121; *C. M. Syn.* I, p. 715 et II, p. 641.

O. luteolum H. f. et W. *Fl. Antarct.* II, p. 403, t. 152, f. 2 (p.p.).

l. Cortic. — Am. merid. : Chile, ins. Eremit.

Exs. : Lechler. *Pl. Chil.* n. 527.

glabella Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 75.

Orthotrichum glabellum ej. *M. austr. am.* p. 189.

O. luteolum var. H. f. et W. *Crypt. antarct.*

l. — Am. merid. : Fuegia, ins. Eremit., cap. Horn.

gymnomitria C. M. in *Hedwig.* 1897, p. 104.

l. — Am. merid. : Patagonia.

Hermitei Mitt. — *U. eremitensis.*

Hutchinsiae (Sm.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 41 et *Syn.* II ed. p. 306.

Orthotrichum americanum P. B. *Prodr.* p. 80; Brid. *Bryol. univ.* I, pp. 278 et 720.

O. anomalum β *americanum* Brid. *Sp. M.* II, p. 10.

O. Hutchinsiae Sm. *Engl. Bot.* t. 2532; Brid. *op. cit.* pp. 277 et 720; *Bryol. eur.* III (mon. p. 20), t. 226; *C. M. Syn.* I, p. 692.

O. nigrum *Bryol. eur.* III (mon. p. 11), t. 225; *C. M. Syn.* I, p. 692.

O. strictum Brid. *Bryol. univ.* p. 289.

U. americana Limpr. *Laubm. Deutschl.* II, p. 21.

U. americana β *nigrita* ej. *op. et l. cc.*

U. nigricans ej. *op. cit.* p. 792.

U. nigrita W. P. Sch. *Coroll.* p. 41.

Ulotrichum Hutchinsiae Comp. *Bryol. eur.*

Weissia americana Lindb. *M. Scand.* p. 28.

l. Ad rup. et sax. silic. praepr. granit. — Eur. : Reg. montan. zon. interm. et sept. Am. sept. : Canada, Idaho, reg. sept. et or.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 117 et II ed. n. 83 (*Orthotrichum*).
Mac. *Canad. M.* n. 117.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 278, 879, 1007.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 188.

« var. *rufescens* (D^{na} E. G. Britton) Par.

Weissia americana var. *rufescens* D^{na} E. G. Br. in *Bull. Torr. bot. Club.* 1894, p. 69.

Ad *Piceas marianam* et *rubram*. — Am. sept. : M. Adirondack, lac. Super.

incana (C. M.) Par.

Orthotrichum incanum C. M. in *Fl.* 1885, p. 419.

l. Cortic. et lignic. — Am. merid. : Fret. Magellan., Fuegia.

inclinata (C. M.) Par.

Orthotrichum inclinatum C. M. in *op. et l. cc.*

Lignic. — Am. merid. : Fuegia occ.

intermedia W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 305.

Orthotrichum crispum Drumm. *M. bor. am.* n. 153 p.p.

O. intermedium Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 307.

U. americana Mitt. ? (*fid. Ren. et Card.*).

U. crispa Mac. *Canad. M.* n. 113 p.p.

U. crispula β *ambigua* W. P. Sch. *Syn.* I ed. p. 258.

Weissia ulophylla β *intermedia* Braithw. *Brit. Mossfl.* II, p. 93.

1. Ad *Acer.*, *Fagos*, *Frazin.* — *Eur.* : Scot., Hass. super., Oldenbourg, Rhoengeb., Tatra, Siles., Austr. inf., Salisb., Carinth., Tirol. *Am. sept.* : Terr. nov., ins. Miquelon, Ontario.

japonica (Sull. et Lesq.) Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 162.

Orthotrichum japonicum Sulliv. et Lesq. in *Roger's N. Pac. Expl. Exped.*

— *As.* : Japon.

? *lateralis* Jaeg. — *Orthotrichum.*

leiothecia (C. M.) Jaeg. *Ad.* I, p. 439.

Orthotrichum Andersonii Ångstr. in *Oef....* 1872, n. 4, p. 5.

O. leiothecium C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 350.

U. Anderssonii Jaeg. *Ad.* II, p. 691.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Fret. Magell.

Lobbiana Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 75.

Orthotrichum Lobbianum ej. *M. austr. am.* p. 192.

1 ? — *Am. merid.* : Ins. Chiloë, Patag.

Ludwigii (Schwaegr.) Brid. *Bryol. univ.* I, pp. 302 et 794 ; W. P. Sch. *Coroll.* p. 41 et *Syn.* II ed. p. 301.

Orthotrichum clausum Hsch. in *sched.* ; C. M. *Syn.* I, p. 714.

O. coarctatum P. B. *Prodr.* p. 80 ; Brid. *Bryol. univ.* I, p. 713 (1).

O. Ludwigii Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 24, t. 51 ; *Bryol. eur.* III (mon. p. 12), t. 225 ; C. M. *Syn.* I, p. 714.

O. plicatum Ludw. in *sched.*

O. striatum ej. in *Krypt. Gewaechs.* n. 120.

Ulotrichum Ludwigii *Bryol. eur. Consp.* III.

Weissia coarctata Lindb. *M. Scand.* p. 28.

1. Ad arb. silvat. praepr. junior. — *Eur.* : Fere tota ; rariss. in Britann. *Am. sept.* : Terr. Nov., Anticosti, Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, reg. sept. or.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 146 (*Orthotrichum*).

Mac. *Canad. M.* n. 112.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 519.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 189.

lutea Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 77.

Orthotrichum crispum var. *H. f. et W. Fl. Tasm.* I, p. 184 (*fid. Mitt.*).

O. croceum Hpe. in *F. v. Müller's Fragm. Phyt. Austral.* XI, *Suppl.* p. 48.

O. luteum *H. f. et W. op. et l. cc. et Handb. of the N. Zeal. Fl.* p. 433.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland., Tasman.

macrocalycina Mitt. in *op. cit.* p. 75.

Orthotrichum macrocalycinum ej. *M. austr. am.* p. 190.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Fret. Magellan., Fuegia, Port Famine.

Mandoni Jaeg. — *Orthotrichum.*

(1) Cf. W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 301.

magellanica (Mont.) Jaeg. *Ad. I*, p. 442.

Orthotrichum magellanicum Mont. in *Voy. au Pôle S., Crypt. t.* 20, f. 2;
C. M. Syn. I, p. 716.

Cortic. — *Am. merid.* : Fret. Magellan.

marchica Warnst. — *U. Bruchii* var. *marchica*.

marginata Jaeg. — *U. fuegiana*.

maritima C. M. et Kindb. *Bidr.* p. 455 (nom.) et in *Mac. Catal.* p. 84.

Orthotrichum maritimum eor. in Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 308.

U. phyllantha Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VIII*, p. 26; *Mac. Canad. M. n.* 116 p.p.

Ster. Rupic. — *Am. sept.* : Ins. Miquelon, Columb. brit., Vancouver, Alaska, M. Behring.

megalospora Vent. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 5.

Orthotrichum megalosporum C. M. et Kindb. in op. cit. p. 305.

Ulotia subulifolia eor. in *Mac. Cat.*

Syn. — *Am. sept.* : Washington.

nigricans Brid.

nigrita W. P. Sch. } — *Hutchinsiae*.

nipponensis Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 339.

1. — *As* : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Jap. n. 11 b, 554.

obtusiuscula C. M. et Kindb. *Bidr.* p. 455 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 82.

Orthotrichum obtusiusculum eor. in op. cit. p. 307.

U. Bruchii Mac. *Canad. M. n.* 453 p.p.

1. Cortic. — *Am. sept.* : Columb. brit., Vancouver.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 523.

palmicola C. M. mss.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or. (ins. S. Catarina).

phyllantha Brid. *Mant. M.* p. 113; W. P. Sch. *Coroll.* p. 41 et *Syn. II* ed. p. 306.

Orthotrichum crispum H. f. et W. in sched. *M. antarct.*

O. fasciculare La Pyl. in Brid. *Bryol. univ. I*, p. 790.

O. jutlandicum Brid. op. cit. p. 296; C. M. *Syn. I*, p. 717.

O. phyllanthum Steud. *Nom. crypt.* p. 304; *Bryol. eur. III* (mon. p. 30), t. 223.

Ulotrichum phyllanthum *Bryol. eur. Consp.*

Weissia phyllantha Lindb. *M. Scand.* p. 28.

2. *Rariss. fructif.* Ad arb., praepr. *Quercuum* et *Salic.*, rar. rupic. —

Eur. : Littus mar. German., Anglia, Hibern. (c. fr. !), Gall. sept.

Am. sept. : Ins. Miquelon, Nov. Scot., Terr. nov., Vancouver,

Oregon (c. fr. !), *Am. merid.* : Fret. Magellan., ins. Eremitae, etc.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 116 p.p.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 570 et b, 949.

phyllantha Mac. p.p. — *U. maritima*.

phyllanthoides (C. M.) Par.

Orthotrichum phyllanthoides C. M. in Engler's *Bot. Jahrb.* 1883, p. 80 et in *Forschungsreise....* p. 25.

Ster. Rupic. ? — *Afr.* : Ins. Kerguelen.

pilifera Nees. — *Macromitrium*.

plicata Brid. *Bryol. univ.* I, p. 726 (*excl. syn. Hook; C. M. Syn.* I, p. 764) (1).
Ster. — *Am. sept.* : Terr. nov.

plicata Brid. I, p. 303. — *Orthotrichum*.

pygmaeothecia (C. M.) Par.

Orthotrichum pygmaeothecium C. M. in *Fl.* 1885, p. 418.

l. Cortic. — *Am. merid.* : Fuegia.

Rehmanni Jur. in *Verh. d. zool.-bot. Ges. in Wien*, 1864, p. 191.

Orthotrichum Rehmanni Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 307.

l. Cortic. in subalp. — *Eur.* : Tatra, Salisb., Stir. As. : Caucas. occ.

reptans Mitt. in *Trans. of the Linn. Soc.* 1891, p. 161.

l. Cortic. — As. : Japon.

robusta Mitt. *M. Ind. or.* p. 49.

Orthotrichum robustum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 327.

l. — As. : Sikkim.

rufescens (Hpe.) Jaeg. *Ad.* I, p. 441.

Orthotrichum rufescens Hpe. in *Ann. sc. nat.* V ser., IV, p. 334.

Ster. Cortic. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

rufula (Mitt.) Jaeg. *op. cit.* p. 442.

Orthotrichum rufulum Mitt. *M. austr. am.* p. 191.

— *Am. merid.* : Valdivia.

Savatieri Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LXII et in *Miss. sc. Cap Horn*, V, Bot. p. 275, t. 3, f. 10.

l. — *Am. merid.* : Patagon. austr.

scabrida Kindb. in *Bidr.* p. 453 (*nom.*) et in *Mac. Cat.* p. 83.

Orthotrichum scabridum ej. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 306.

U. americana Mac. *Canad. M. n.* 115.

— *Am. sept.* : M. Rupestr.

Schmidii (C. M.) Jaeg. *Ad.* I, p. 437.

Orthotrichum Schmidii C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 60.

l. — As. : M. Neilgherr.

subulata Kindb. in *Bidr.* p. 455 (*nom.*) et in *Mac. Cat.* p. 82.

Orthotrichum subulatum C. M. et Kindb. in *op. et l. cc.*

Cortic. — *Am. sept.* : Columb. brit.

subulifolia C. M. et Kindb. — *U. megalospora*.

viridis Vent. in *Oefv....* 1893, p. et in *Pap. and Proced. of the roy. Soc. of Tasman.* 1893, p. 202.

l. Cortic. — Pac. : Tasman.

vittata Mitt. — *U. calvescens*.

Weymouthi Burch. in *Pap. and. Proced. of the roy. Soc. of Tasman.* 1893, p. 200 (*nom.*).

Cortic. — Pac. : Nov. Zeland.

ULOTRICHUM W. P. Sch. *Conspect. Bryol. eur.*

Spec. omn. sunt ULOTRICHUM ejusd. nom.

(1) Species dubia, ab auct. recentior. non memorata.

Ulozygodon C. M. *op. cit.* p. 680 (sect. ZYGODONTIS).

Umbracularia C. M. *Syn.* I, p. 146 (sect. SPLACHNI).

UROCLADION Hpe. *mss.*; *Jaeg. Ad. II*, p. 729.

marginatum Hpe. — *Sciaromium*.

Urolepidopilum C. M. *in Fl.* 1875, n. 34-35 (sect. LEPIDOPILI).

Vaginella C. M. *Syn.* I, p. 492 (sect. BARTRAMIAE).

Vallidens C. M. *in Linn.* 1880-83, p. 432 (sect. BARBULAE.).

Velutinaria Kindb. *Check-List.* p. 73 (nom., sect. BRACHYTHEGII sensu Kindb.).

VENTURIELLA C. M. *in Linn.* 1875, p. 421 (1 spec.).

sinensis (Vent.) C. M. *in op. et l. cc.*

Erpodium sinense Vent. *in Rab. Bryoth. eur.* n. 1211.

1? *Ad Popul.* — As.: Shang Haï.

Vesicularia C. M. *Syn.* II, p. 233 (subsect. HYPNI = ECTROPOTHECIUM).

sandwichensis C. M. — *Ectropothecium Didrichseni*.

VOITIA Hsch. *Comment de Voitia et Systylio*, p. 5, t. 1 (1 spec.).

Hookeri Mitt. — *V. nivalis* var. *stenocarpa*.

hyperborea Grev. et Arn. — *V. nivalis* var. *hyperborea*.

nivalis Hsch. *l. c.*; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 54; *Bryol. eur.* I, t. 7; C. M. *Syn.* I, p. 35 et II, p. 522; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 21.

1. In stercore vaccino et ad aren. micac. ab aq. nival. irror. — Eur.: Alp. Carinth., Tirol.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 367.

« var. *hyperborea* (Grev. et Arn.) W. P. Sch. *op. cit.* p. 22.

V. hyperborea Grev. et Arn. *in Act. Soc. Wern.* IV, p. 109, t. 7; *Brid. op. cit.* p. 55; C. M. *op. et l. cc.*

— Eur.: Spitzberg. As.: Fret. Sinjawan. Am. sept.: Groenland, ins. Melville.

« var. *stenocarpa* (Wils.) Par.

V. Hookeri Mitt. *M. Ind. or.* p. 56.

V. stenocarpa Wils. *in Kew Journ. bot.* IX, p. 329.

— As.: Sikkim.

stenocarpa Wils. — *V. nivalis* var. *stenocarpa*.

vogesiaca Hsch. — *Bruchia*.

WARDIA Harv. *in Hook. Consp. of the bot. mag.* II, p. 183, t. 15 (1 spec.).

hygrometrica Harv. *in op. et l. cc.*; *Card. Mon.* p. 129.

Neckera hygrometrica C. M. *Syn.* II, p. 667.

2. *Ad rup.* irror. — Afr.: C. B. Sp.

Exs.: Rehm. *M. Afr. austr.* p. 302.

WEBERA Hedw. *Hist. M.* p. 95 (139 spec.).

acuminata (H. et H.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 64 et *Syn.* II ed. p. 391.

Bryum acuminatum *Bryol. eur.* IV (mon. p. 21), t. 343; C. M. *Syn.* I, p. 326.

Pohlia acuminata H. et H. *in Fl.* 1819, II, p. 94 et *in Brid. Bryol. univ.* I, p. 610.

P. elongata γ *acuminata* Hüb. *Muscol. germ.* p. 473.

W. elongata β *acuminata* Schwaegr. *Sp. M.* p. 49.

1. In decliv. et fiss. rup. — *Eur.* : Reg. subalp. ; deest in Britann. et Scandin. *As.* : Caucas. centr. *Am. sept.* : New Brunswick, M. Adirondack et Rupestr., Wisconsin, Colorado, reg. sept. et or.

Exs. : Mac. Canad. M. n. 521.

Sull. et Lesq. M. bor. am. n. 264.

« *var. arcuata* (*H. et H.*) *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bryum acuminatum var. arcuatum Bryol. eur. l. c., t. 344.

Pohlia arcuata H. et H. in op. cit. p. 98 ; Brid. op. cit. p. 614.

P. patens H. et H. et Brid. op. cit. pp. 101 et 620 p.p.

P. vegeta eor. op. et ll. cc. p.p.

Ut typ. — *Eur.* : In pascuis alp. usq. in reg. supraalp.

var. minor (*Schleich.*) *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bryum acuminatum β minus Bryol. eur. l. c. t. 343.

Br. polymorphum C. M. Syn. I, p. 329 p.p.

Pohlia minor Schleich. Cent. pl. helv. IV, n. 19 ; H. et H. op. et l. cc. ; Brid. op. cit. p. 611 p.p.

W. elongata β minor Schwaegr. Sp. M p. 49.

Ut et ubi praeced.

« *var. polyseta* (*H. et H.*) *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bryum acuminatum γ polysetum Bryol. eur. l. c. t. 344.

Br. polymorphum C. M. op. et l. cc. p.p.

Pohlia brachycarpa var. polyseta Schwaegr. Sp. M. p. 72.

P. gracilis γ pulchella { *Hüb. Muscol. germ. p. 472.*

P. gracilis β xanthocarpa }

P. polymorpha γ polyseta ej. op. cit. p. 470.

P. polyseta {

P. pulchella { *H. et H. op. cit. pp. 97 et 99 ; Brid. op. cit. pp. 613 et 617.*

P. xanthocarpa }

Ut et ubi praeced.

« *var. tenella* (*H. et H.*) *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bryum acuminatum δ tenellum Bryol. eur. ll. cc.

Pohlia polymorpha δ tenella Hüb. op. cit. p. 470.

P. tenella H. et H. op. cit. p. 95 ; Brid. op. cit. p. 614.

Ut et ubi praeced.

acuminatula (*C. M.*) *Par.*

Bryum acuminatulum C. M. in sched.

— *As.* : Himalaya sept. occid.

affinis *Br.* — *Bryum cuspidatum.*

afro-cruda (*C. M.*) *Par.*

1380 Ster. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.

aggregata (*C. M.*) *Par.*

Bryum aggregatum C. M. in Bull. hb. Roissier, 1897, p. 181.

— *Am. sept.* : Guatemala.

alba (*Lindb. et Arn.*) *Par.*

Pohlia alba L. et A. M. As. bor. 1890, II, p. 53.

2. Terr. — *As.* : Jenissei med.

Alberti Corbière in Rev. bryol. 1889, p. 33.

2. Muric. — *Eur.* : Galloprovinc.

albicans (*Wahlenb.*) *W. P. Sch. Coroll. p. 64 et Syn. II ed. p. 407.*

Bryum albicans *Brid. Bryol. univ. I. p. 656 ; C. M. Syn. I, p. 295.*

Bryum carneum *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 260.*

Br. Wahlenbergii *Schwaegr. Suppl. I, II, p. 92, t. 70 ; Bryol. eur. IV (mon. p. 44), t. 354.*

Hypnum Wahlenbergii *W. et M. Bot. Taschb. p. 280.*

Lamprophyllum albicans *Lindb. in Oefv... 1867, p. 75.*

Mniobryum albicans *Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 277.*

Mnium albicans *Wahlenb. Fl. Lapp. p. 353.*

Pohlia albicans *Lindb. M. Scand. p. 17.*

2. Ad terr. glareos. ster. aqua imbib. et rup. madid. — *Eur.* : E reg. campestr. usq. in subalp. *As.* : Penins. Samoied., Jenissei, Caucas. occ. et centr. *Afr.* : Alger., ins. Kerguelen. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Terr. nov., Nov. Scot., New Brunswick, Gaspes., Ontario, M. Rupestr. et Selkirk, Columb. brit., reg. sept., centr., or. et merid. *Am. merid.* : And. Nov. Granat. et Boliv., M. Pichincha, Chile, ins. Falkland. *Pac.* : Nov. Zeland., Austral. or., ins. Falkland. Stewart,

Exs. : Mac. Canad. M. n. 165.

Rab. Bryoth. eur. n. 361, 1002.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 274.

« *var. glacialis* (*Schleich.*) *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bryum albicans β glaciale *C. M. op. et l. cc.*

Br. glaciale *Schleich. in Brid. op. cit. p. 852.*

Br. Schleicheri *Schwaegr. Sp. M. p. 55.*

Br. Wahlenbergii β glaciale *Hüb. Muscol. germ. p. 456 ; Bryol. eur. l. c. p. 45.*

Mnium glaciale *Schleich. Cent. pl. helv. III, n. 51.*

Pohlia albicans *var. glacialis* *Lindb. M. Scand. p. 17.*

Ad font. et in uligin. frigid. — *Eur.* : Reg. alp. ; ins. Ursorum. *As.* :

Himalaya, Tibet. occ., Caucas. centr. *Am. sept.* : Groenland.

Exs. : Un. itin. 1863, n. 48.

« *var. nigricans* *Lesq. et Jam. Man. p. 223.*

— *Am. sept.* : Calif.

Exs. : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 275.

« *var. speciosa* *Mitt. M. Ind. or. p. 66.*

— *As.* : Tibet. occ.

« *var. urceolata* *Ren. et Card. M. Am. sept. p. 35.*

— *Am. sept.* : Oregon.

alpina *Hsch., Moug. et Nestl. — W. longicolla.*

alticaulis (*C. M.*) *Par.*

Bryum alticaule *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 83 et in Forschungsreise... p. 37.*

Ster. In turf. — *Am. merid.* : Fuegia.

« *var. robustior* (*C. M.*) *Par.*

Bryum alticaulis *var. robustior* *C. M. in op. et l. cc.*

Ut et ubi typ.

ambigua *Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 237.*

l. — *Eur.* : Alp. Salisb. (Lungau).

ampliretis (*C. M.*) *Par.*

Bryum amplirete *C. M. Bryol. austr. Georg. p.*

Ster. — *Am. merid.* : Austr. Georgia.

annotina (*Hedw.*) *Schwaegr. Sp. M.* p. 52; *W. P. Sch. Syn. II ed.* p. 400.

Bryum annotinum Huds. Fl. Angl. I ed. p. 414? *Hedw. Sp. M.* p. 184, t. 43; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 662; *Bryol. eur. IV (mon. p. 40)*, t. 352; *C. M. Syn. I*, p. 331.

Br. annotinum lanceolatum pellucidum capsulis oblongis pendulis Dill. Hist. M. p. 339, t. 50, f. 68.

Br. decipiens Lam. et DC. Syn. Fl. gall. n. 1301; *Brid. op. cit.* p. 687?

Hypnum annotinum W. et M. Bot. Taschb. p. 280.

Lamprophyllum annotinum Lindb. in Oefv.... 1867, p. 75.

Mnium annotinum L. Sp. pl. p. 1576 (*vix! fid. W. P. Sch.*).

Pohlia annotina Lindb. M. Scand. p. 17.

Trentepohlia erecta Roth. in Uster. Ann. bot. X, p. 52.

2. In arvis arenos. humid. — *Eur.*: Reg. campestr. ab Ital. usq. in Lappon.; Spitzberg, ins. Parry. As.: Penins. Samojed., Obi, Jenissei. *Afr.*: Alger. *Am. sept.*: Groenland, ins. Sabine, Nov. Scotia, Gaspes., Ontario, Manitoba, Athabasca, Assiniboine, M. Selkirk, ins. Vancouver, Washington, Nov. Angl., Kansas.

Exs.: Mac. Canad. M. n. 162.

Rab. Bryoth. eur. n. 86, 968.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 271.

« *var. angustifolia W. P. Sch. op. cit.* p. 401.

In paludosis. — *Eur.*: Anglia.

« *var. decurrens Ren. et Card. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.* 1893, I, p. 116 et *M. Masc. Mad.* n. 30.

Ad terr. silic.-argill. humid. — *Afr.*: Madagascar.

« *var. filiformis W. P. Sch. op. et l. cc.*

— *Eur.*: Lappon.

« *var. lapponica W. P. Sch. op. et l. cc.*

— *Eur.*: Lappon.

« *var. tenuifolia W. P. Sch. op. et l. cc.*

Hic, illic cum typ. in *Eur.*

antarctica (*Hook. f. et Wils.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 599.

Bryum antarcticum H. f. W. Fl. antarct. II, p. 414, t. 153, f. 6; *C. M. Syn. II*, p. 572.

1. — *Am. merid.*: Ins. Cockburn.

aptychoides (*C. M.*) *Par.*

Bryum aptychoides C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 78 et in *Forschungsreise....* p. 17.

Ster. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

austro-albicans (*C. M.*) *Par.*

Bryum albicans Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876 (*fid. C. M.*).

Br. austro-albicans C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 78 et in *Forschungsreise....* p. 15.

Ster. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

austro-cruda (*C. M.*) *Par.*

Bryum austro-crudum C. M. in op. cc. pp. 78 et 16.

Br. crudum Mitt. in op. et l. c. (fid. C. M.).

2. Fr. ign. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

austro-elongata (*C. M.*) *Par.*

Bryum austro-elongatum C. M. in op. et ll. cc.

Br. elongatum Mitt. in op. et l. cc. (fid. C. M.).

Syn. Rupic. — *Afr.*: Ins. Kerguelen.

austro-nutans *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 221 et 551.*

— *Afr. : Transvaal, C. B. Sp.*

austro-polymorpha *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 78 et in Forschungsreise... p. 16.*

Syn. — *Afr. : Ins. Kerguelen.*

bicolor *H. et H. — W. nutans var. bicolor.*

Bigelowi (*Sull.*) *Lesq. et Jam. Man. p. 223.*

Bryum Bigelowii Sull. in Pac. R. Rep. IV, p. 187, t. 5.

W. Ludwigii var. microphylla Kindb. in Mac. Cat. p. 117.

2. *Rupic. ? — Am. sept. : Sonora.*

Bolanderi (*Lesq.*) *Lesq. et Jam. Man. p. 220.*

Bryum Bolanderi Lesq. in Mem. Calif. Acad. I, p. 22.

2. — *Am. sept. : Calif.*

brachydontia (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 592.*

Bryum brachydontium Hpe. in C. M. Syn. I, p. 327.

W. Hampeana Bryol. jav. I, p. 137, t. 175.

1 (*Bryol. jav.*) ; 2 (*C. M.*) *Saxic. — As. : Java.*

brachymeniacea *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 224 et 553.*

— *Afr. : C. B. Sp.*

Breidleri Jur. — W. Ludwigii.

brevicolla Sande Lac. — W. scabridens.

brevinervis (*Arn. et Lindb.*) *Par.*

Pohlia brevinervis A. et L. M. As. bor. 1890, II, p. 51.

2. *Terr. — As. : Jenissei med.*

Brideliana (*C. M.*) *Jaeg. Ad. I, p. 600.*

Bryum Bridelianum C. M. Syn. I, p. 341.

Er. W. flexuosa Brid. Bryol. univ. I, p. 843.

Paludic. — Am. sept. : Terr. nov. (1).

caespitosa *H. et H. — W. nutans var. caespitosa.*

? calopyxis (*C. M.*) *Par.*

Bryum calopyxis C. M. in Linn. 1880-83, p. 377.

Syn. — *Am. merid. : Argentin. subtropic.*

camptotrachela *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1888, p. 199, t. 16.*

Bryum camptotrachelum Kindb. Eur. and N. Am. Bryin., p. 385 (ut subsp. W. nutantis).

2. — *Am. sept. : Calif.*

canaliculata *C. M. et Kindb. in Mac. Cat. p. 113.*

Bryum canaliculatum Kindb. op. et l. cc. (ut subsp. W. nutantis).

W. albicans var. deflexa Kindb. in Bull. Torr. bot. Club, XVII.

W. nutans var. deflexa Kindb. in sched.

1 ? *Rupic. — Am. sept. : Columb. brit., Vancouver.*

Cardoti *Ren. in Bot. Gaz. 1889, p. 95, t. XIII, B.*

Bryum Cardoti Kind. op. cit. p. 388 (ut subsp. W. commutatæ).

2. — *Am. sept. : Oregon.*

carinata *Limpr. — W. cucullata var. carinata.*

(1) Spec. dubia. ab auctor. recentior. non memorata.

carnea W. P. Sch. *Coroll.* p. 67 et *Syn.* II ed. p. 405.

Bryum carneum L. *Sp. pl.* 1587; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 652; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 43), t. 253; *C. M. Syn.* I, p. 294.

Br. coarctatum Schultz *Ephem. bot. Reg. Syll. pl.* II, p. 91.

Br. compactum Dicks. *Fasc. IV pl. crypt.* IV, p. 15, t. II, f. 11; *Brid. op. cit.* p. 686.

Br. delicatulum Hedw. *M. frond.* I, p. 52, t. 20.

Br. lanceolatum pellucidum, capsulis subrotundis, pedunculis carneis *Dill. Hist. M.* p. 400, t. 50, f. 69, A-F et var. foliis, surculis et setis longioribus *op. cit.* p. 401.

Br. melanodon *Brid. op. cit.* p. 845

Br. pallidisetum *ej. Mant. M.* p. 117.

Br. rubellum *ej. Bryol. univ.* I, p. 650.

Hypnum carneum W. et M. *Bot. Taschb.* p. 278.

Lamprophyllum carneum *Lindb. in Oefv....* 1867.

Mniobryum carneum *Limpr. Laubm. Deutschl.* II, p. 275.

Mnium carneum L. *jun. Meth. M. ap. Ludw.* p. 366.

Mn. rubellum P. B. *Prodr.* p. 76.

Pohlia carnea *Lindb. M. Scand.* p. 17.

2. In agr. argill. et pasc. humid. — *Eur.* : Fere tota, supra reg. campestr. non ascend. *As.* : Caucas. occ. et or. *Afr.* : Alger., Ægypt. infer. *Am. sept.* : Nov. Scot., Columb. brit., Illinois.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 163 p.p.

Rab. Bryoth. eur. n. 236, 441.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 441.

carnea *Rab. n.* 1021. — W. *pulchella*.

clandestina Hedw. — *Bartramia Halleriana*.

clavaeformis (*Hpe.*) *Jaeg. Ad. I*, p. 591.

Bryum clavaeforme *Hpe. in Linn.* 1869-70, p. 519.

Br. nutans *H. f. et W. Fl. of. the N. Zeal.?*

Syn. — *Pac* : Austral. fel.

columbica *Kindb. Bidr. p.* 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 115.

Bryum columbicum *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p.* 386.

Bryum carneum var. *pulchellum* *Drumm. M. bor. am. I ed. n.* 261 p.p.

W. *pulchella* *Mac. Canad. M. n.* 164.

2. Ad terr. humid. — *Am. sept.* : Athabasca, M. Selkirk, Columb. brit.

commutata W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 403.

Bryum commutatum *Wats. Bot. Calif. II*, p. 391; *Boulay M. Fr. I*, p. 278 (excl. var. β).

Br. Ludwigii *Brid. Bryol. univ. I*, p. 647? *Bryol. eur. IV* (mon. p. 38), t. 354; *C. M. Syn. I*, p. 332.

Pohlia commutata *Lindb. M. Scand.* p. 17.

W. *Ludwigii* W. P. Sch. *Coroll.* p. 67; *Rab. Bryoth. eur. n.* 1215; *Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n.* 270.

2. Ad terr. humid. et in uligin. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. *As.* : Caucas. *Am. sept.* : Gaspes, M. Selkirk, Washington, Oregon, Calif.

Exs. : Mac. *Canad. M. n.* 423.

var. *elongata* Payot. }
var. β *filum* Husn. } — W. filum.

« var. *gracilis* (*Schleich.*) W. P. Sch. *op. cit.* p. 404.

Bryum commutatum var. *gracile* *Boulay M. Fr. I*, p. 279.

Br. gracile *Schleich. in Neu bot. Zeit. VI*, p. 57; *Brid. op. cit.* p. 688.

Br. Ludwigii β *gracile* *Bryol. eur. l. c. p.* 39; *C. M. Syn. I*, p. 333 et II, p. 583

Pohlia gracilis *Lindb. M. Scand.* p. 17.

W. gracilis de Not. *Epil.* p. 418.

W. Ludwigii β *gracilis* *W. P. Sch. Coroll. et l. c.*

In terr. aren. et turf. humid. — *Eur.* : Summ. Alp., e reg. interm. moy. in septentr.; *Pyren. As.* : Jenissei infer., *Caucas. Am. sept.* : Oregon.

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 237, 1286.

Un. itin. 1864, n. 56, 66.

compactilis (*C. M.*) *Par.*

Bryum compactile *C. M. in hb. Scharampur, n. 6334.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

contracta (*C. M.*) *Par.*

Bryum contractum *C. M. mss.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

crassidens (*Lindb.*) *Kindb. Enum. Bryin. p. 22.*

Bryum crassidens *Kindb. Eur. et N. Am. Bryin. p. 384.*

Pohlia crassidens *Lindb. in Rev. bryol. 1883, p. 5.*

W. trachydontea *Sanio in Bot. Centralbl. 1883, n. 7.*

2. Terr. et rupic. — *Eur.* : Lapon. torn., Norveg. (Dovre).

crassinervis (*Lindb.*) *Par.*

Pohlia crassinervis *Lindb. in Act. Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 2 a April 1881.*

♂ et fr. ign.

— *Eur.* : Lapon. suec.

cruda (*L.*) *Schwaegr. Sp. M. p. 50*; *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 398.*

Bryum crudum *Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 83*; *Bryol. eur. IV* (mon. p. 37), t. 348; *C. M. Syn. I, p. 333.*

Br. elongatum *Drumm. M. bor. am. I ed. n. 270.*

Br. lucidum *James Pl. Kaneanae.*

Br. pendulum *hornum molle foliis et lanceolatis et gramineis* *Dill. Hist. M. p. 401, t. 51, f. 70 (fid. C. M.).*

Br. stellare *hornum, silvarum, capsulis magnis nutantibus* *Dill. op. cit. p. 402, t. 51, f. 71 (fid. Limpr.).*

Br. Polla cruda *Brid. Bryol. univ. I, p. 693.*

Hypnum crudum *W. et M. Bot. Taschb. p. 290.*

Lamprophyllum crudum *Lindb. Revis. critic. ic. p. 87.*

Mnium crudum *L. Sp. pl. p. 1576*; *Hedw. M. frond. I, p. 99, t. 88.*

Pohlia cruda *Lindb. M. Scand. p. 57.*

W. intermedia *Schleich. Cent. pl. helv. IV, n. 18.*

2. et syn., rar. 1. In fissur. rup. — *Eur.* : E reg. campestr. mont. usq. in supraalp.; *Ross. or.*, *Spitzberg*, ins. *Ursorum*. *As.* : Japon., *Amour.*, *Talysch*, *Obi*, *Jenissei*, *Sikkim*, *Khasia*, *Kashmir*, *Caucas. Afr.* : *Alger.*, ins. *Kerguelen*. *Am. sept.* : *Groenland*, *Labrador*, fret. *Smith.*, *Terr. nov.*, *Nov. Scotia*, *New Brunswick*, *Gaspes.*, *Ontar.*, *lac. Super.*, *Athabasca*, *Alaska*, *mar. Rehring*, *Columb. brit.*, *Vancouver*, *M. Rupestr.* et *Selkirk*, *Washington*, *Oregon*, *Idaho*, reg. sept. et or., *Mexic.*, *Guatemala*. *Am. merid.* : *Fret. Magell. Pac.* : *Nov. Zeland.*

Exs. : *Faurie Pl. Japon., n. 3533 p.p*

Mac. Canad. M. n. 161.

Rab. Bryoth. eur. n. 1024.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 269.

Un. itin. 1864, n. 50, 53, 58, 72; 1867, n. 104.

« *var. densa* *Thériot in Rev. bryol. 1898, p. 23.*

— *Eur.* : Alp. Delphinat.

« *var. minor* *W. P. Sch. Coroll. p. 65 et Syn. II ed. p. 398.*

Bryum crudum *var. minus* *Bryol. eur. l. c.*

Br. longicollum « *dioicum* » *Sw. M. Suec. p. 49, t. 6, f. 13?*

Bryum nitescens Kindb. in Bot. Notiz. 1896.

Br. W. nitens Kindb. in Bot. Not. 1882, p. 146.

Ut typ. — Eur. : Summ. Alp. Am. sept. : Groenland, Labrador.

var. *minor* Ren. et Card. — W. cruda var. *oregonensis*.

« var. *oregonensis* Par.

W. cruda var. *minor* Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1890, p. 43.

— Am. sept. : Oregon.

« var. *subglobosa* W. P. Sch. op. et l. cc.

Terr. — Eur. : Norveg.

crudoides (Sull. et Lesq.) Par.

Bryum crudoides Sull. et Lesq. in *Proced. of the Amer. Acad.*, 1859, p. 278.

2. — Am. sept. : Fret. Behring.

cucullata (Schwaegr.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 86 et *Syn.* II ed. p. 397.

Bryum cucullatum Schwaegr. *Suppl.* I, II, p. 94, t. 68; *Brid. Bryol. univ.* I, p. 649; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 21), t. 343; *C. M. Syn.* I, p. 328.

Br. *obtusifolium* Vill. *Pl. Dauph.* III, p. 882.

Lamprophyllum cucullatum Lindb. *Revis. crit. ic.* p. 87.

Pohlia cucullata Schwaegr. *Sp. M.* p. 73; *Brid. op. cit.* p. 840.

P. laete-virens de Not. *Mant.* p. 7 et *Syll.* p. 111.

1. Ad terr. humid., praecip. in depress. nivos. — Eur. : Reg. subalp. et alp. : Spitzberg, ins. Ursorum; deest in Britann. As. : Penins. Tschutschica. Am. sept. : Groenland, Labrador, Columb. brit., Oregon, Calif., reg. or.

Exs. : Mac. *Canad. M.* n. 468 p.p.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 442, 1216.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 265.

« var. *carinata* (Brid.) Boulay in *Rev. bryol.* 1888, p. 44 et in *Husn. Musc. gall.* p. 229.

Bryum carinatum Brid. *Bryol. univ.* I, p. 649 (ut syn.); Boulay *M. Fr.* p. 280 et in *Husn. M. Gall.* n. 772.

Br. *cymbuliforme* Cardot in *Rev. bryol.* 1887, p. 22.

Br. *naviculare* ej. in *op. cit.* 1886, p. 27.

W. *carinata* Limpr. *Laubm. Deutschl.* II, p. 261.

2. Ad terr. humid. sabulos. — Eur. : Alp. Sabaud. (M. Blanc), Pyren.

« var. *Hausmanni* de Not. *Epil.* p. 430.

— Eur. : Tirol. (Botzen).

cucullata Mac. exs. p.p. — W. polymorpha.

cucullatiformis (Kindb.) Par.

Bryum cucullatiforme Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 287.

1. — Am. sept. : Alaska.

cylindrica (Mont.) W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 52.

Bryum cylindricum Mont. *herb. (mus. Paris)*.

1. — Am. sept. : Mexic.

delicatula (Wils.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 66.

Bryum delicatulum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 332.

2? — As. : Sikkim, Khasia.

Demawendi (C. M.) Par.

Bryum Demawendi C. M. in *sched.*

— As. : Persia (M. Demawend).

Diphyscium Ehrh. — *Diphyscium foliosum*.

Drummondii (C. M.) Lesq. et Jam. Man. p. 219.

Bryum carneum var. *pulchellum* Drumm. M. bor. am. I ed. n. 261 p.p.

Br. *Drummondii* C. M. in Bot. Zeit. XX, p. 328.

Br. *nutans* var. *minor* Drumm. l. c. n. 263.

Mniobryum vexans (fid. Kindb.).

2. Ad terr. humid. — Am. sept. : M. Rupestr., Sitka.

Eckloniana (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 600.

Bryum Ecklonianum C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 752.

Syn. Rupic. — Afr. : C. B. Sp.

elongata (Dicks.) Schwaegr. Sp. M. p. 48 ; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 394.

Bryum cylindricum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 12, t. 11, f. 4 (fid. C. M.).

Br. *elongatum* ej. op. cit. p. 8 ; Bryol. eur. IV (mon. p. 32), t. 345 (excl. var. β) ; C. M. Syn. I, p. 336.

Br. foliis gramineis pellucidis, cauliculo rubente Dill. Hist. M. p. 359, t. 46, f. 17.

Lamprophyllum elongatum Lindb. Revis. crit. ic.... p. 27.

Leskea elongata W. et M. Bot. Taschb. p. 243.

Mnium Pohlia Hoffm. Deutsch. Fl. II, p. 48.

Pohlia cylindrica H. et H. in Fl. 1819, I, p. 93.

P. *elongata* Hedw. M. frond. I, p. 96, t. 36 (1) ; Brid. Bryol. univ. I, p. 608.

P. *elongata* β *cylindrica* Brid. op. cit. p. 610.

Syn. vel l. Ad marg. viar. cav. et parietes inque fiss. rup. quartz. —

Eur. : E. reg. camp. mont. usq. in Alp. per zon. interm. et sept.

As. : Japon., Alp. Yunnan., Amour, Himalaya, Kashmir, Nepal.,

Caucas. occ. et centr. Afr. : Alger., Kilima N'Djaro, ins. Kerguelen.

Am. sept. : Groenland, New Brunswick, reg. sept. et or.

Ecs. : Rab. Bryoth. eur. n. 273, 360.

Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 266.

var. *acuminata* Schwaegr. — W. *acuminata*.

« var. *humilis* W. P. Sch. Coroll. p. 65 et Syn. II ed. l.c.

Ut typ. — Eur. : Salzburg. Carinth., Stiria. Am. sept. : Colorado.

« var. *macrocarpa* (Hsch.) W. P. Sch. op. et l. cc.

Bryum elongatum γ *macrocarpum* Bryol. eur. et C. M. op. et l. cc.

Br. W. *macrocarpa* Brid. op. cit. p. 628.

W. *macrocarpa* Hsch. in Bot. Zeit. 1819, I, p. 104.

Ut typ. — Eur. : In subalpin.

var. *minor* Schwaegr. — W. *acuminata* var. *minor*.

? *emergens* (C. M.) Par.

Bryum emergens C. M. in Linn. 1878-79, p. 306.

Syn. Terr. — Am. merid. : M. Argentin. Tucuman.

Emodi-acuminata (C. M.) Par.

Bryum Emodi-acuminatum C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

Emodi-carnea (C. M.) Par.

Bryum Emodi-carneum C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

(1) Cf. Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 241 in adn.

Emodi-cruda (C. M. Par.).

Bryum Emodi-crudum C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

erecta (Lindb.) Limpr. *Laubm. Deutschl.* II, p. 239.

Mielichhoferia defecta Sanio in *Bot. Centralbl.* 1883, p. 7.

M. erecta Kindb. *Enum. Bryin.* p. 22.

Pohlia erecta Lindb. in *Rev. bryol.* 1883, p. 7.

2. Ad terr. arenac. — Eur. : Norveg. (Dovre).

erythrocanlis (Hpe.) Jaeg. *Ad.* II, p. 704.

Bryum erythrocaule Hpe. in *Linn.* 1871-73, p. 516.

Syn. — Pac. : Austral. or.

falcata Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 53.

1. — Am. sept. : Mexic. (Orizaba).

fasciculata Hsch. } — *W. longicolla* var. (fid. Limpr.).
 } — *W. nutans* (fid. C. M.).

filum (W. P. Sch.) Par.

Bryum commutatum var. *elongata* Boul. *M. Fr.* I, p. 279.

Br. filum W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 470; *Par. Index*, p. 182.

W. commutata var. *elongata* Payot, *Fl. M. Blanc*, II, p. 36.

W. commutata var. *filum* Husn. *Muscol. gall.* p. 230.

Ster. Ad rivul. — Eur. : Norveg., Alp. Sabaud. (M. Blanc).

flexuosa (Hook.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 66.

Bryum flexuosum C. M. *Syn.* I, p. 327.

Pohlia flexuosa Hook. in *Wall. Catal. n.* 7591; *Harv. in Lond. Journ. of Bot.* 1840, p. 9 et in *Hook. Ic. pl. rar. t.* 19, f. 5.

Syn. ? — As. : Himalaya, Nepal.

gracilicarpa Hpe. *Symb.* 1874, p. 499.

Syn. — Am. merid. : Brasil. austr. or

gracilis } de Not. — *W. commutata* var. *gracilis*.
 } Mac. — *W. subciliata*.

grande Kindb. — *W. Ludwigii* var. *latifolia*.

gregaria Rehm. *M. Afr. austr. n.* 549.

— Afr. : Transvaal.

gymnophylla C. M. in Besch. *Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 92.

Bryum gymnophyllum ej. in *Rev. bryol.* 1877, p. 15.

1. — Afr. : Comor. magn.

Halleriana Hedw. — *Bartramia*.

Hampeana Bryol. jav. — *W. brachydontia*.

himalayana Mitt. *M. Ind. or.* p. 66.

Bryum acuminatum Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 332.

1. — As. : Sikkim.

inflexa (C. M.) Par.

Bryum inflexum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 200.

Ster. — Am. merid. : Austro-Georg.

integridens (C. M.) W. P. Sch. in Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 52.

Bryum integridens C. M. *Syn.* I, p. 338.

1. — Am. sept. : Mexic.

integriuscula (C. M.) Par.

Bryum integriusculum C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

intermedia { Schleich. — W. cruda.
Schwaegr. — *Bryum*.

iwozanica Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 342.

2? — As. : Japon.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 8539.

julacea de Not. — *Bryum* filiforme.

juniperina (C. M.) Par.

Bryum juniperinum C. M. in sched.

— As. : Himalaya sept. occid.

Korbiana (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 591.

Bryum Korbianum C. M. in *Fl.* 1874, n. 31.

2. In fossis aquat. — Afr. : Oasis Dachel.

leptoblepharon (C. M.) Jaeg. *op. cit.* p. 600.

Bryum leptoblepharon C. M. *Syn. I*, p. 337; *Rehm. M. Afr. austr.* n. 550?

1. — Afr. : Transvaal ? C. B. Sp.

leptocarpa *Bryol. jav. I*, p. 136, t. 112.

Bryum elongatum Dz. et Mk. *M. frond. ined. Archip. ind.* p. 25.

2. — As. : Borneo.

leptodontia (Mitt.) Jaeg. *op. cit.* p. 592.

Bryum leptodontium Mitt. *M. austr. am.* p. 293.

— Am. merid. : And. Nov. Granat.

leptopoda Hpe. *Symb.* 1874, p. 499.

Syn. — Am. merid. : Brasil. austr. or.

Lescuriana (Sull.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 221.

Bryum Lescurianum Sull. in *Mem. of the Amer. Acad.* IV, p. 171, Ic. *M.* p. 81, t. 50 et *M. of U. St.* p. 44; C. M. *Syn. II*, p. 582.

Br. pulchellum Sull. *M. Allegh.* n. 101.

2. Ad terr. humid. — Am. sept. : Nov. Scot., New Brunswick, reg. or., Arkansas.

Exs. : Mac. Canad. *M.* n. 163 p.p.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 273.

limbata (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 598.

Bryum limbatum C. M. *Syn. II*, p. 573.

2. — Am. sept. : Costa Rica.

longibracteata (Broth.) Par.

Bryum longibracteatum Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 384.

Pohlia longibracteata Broth. in *Bot. Centralbl.* 1890, n. 51 et in Roell *M. Am. sept.* n. 276.

2. In terr. argill. — Am. sept. : Washington.

longicolla (Sw.) Hedw. *Sp. M.* p. 169, t. 41, f. 1-5; W. Sch. *Syn. II*, p. 395.

Bryum Boissieri de Not. *Syll.* p. 134.

Br. cylindricum Dicks. *Fasc. IV Pl. crypt.* p. 12, t. 11, f. 4 (fid. *Limpr.*).

Br. elongatum var. *alpinum* *Bryol. eur. IV (mon. p. 32)*, t. 346.

Br. elongatum var. *longicollum* H. et T. *Muscol. brit.* p. 123.

- Br. Hornschuchii *Spreng. Syst. veg. IV ed. p. 212.*
 Br. longicollum *Sw. M. Suec. pp. 49 et 99, t. 6; C. M. Syn. I, p. 836.*
 Br. W. alpina *Brid. Bryol. univ. I, p. 626.*
 Br. W. grimsulana *ej. op. cit. p. 628.*
 Br. W. longicolla *ej. op. cit. p. 625.*
 Hypnum longicollum *W. et M. Bot. Taschb. p. 291.*
 Lamprophyllum longicollum *Lindb. Revis. crit. ic... p. 26.*
 Orthopyxis longicolla *P. B. Prodr. p. 79.*
 Pohlia longicolla *Lindb. M. Scand. p. 18.*
 W. alpina *Hsch. in Fl. 1819, I, p. 104.*
 W. alpina var. brachycarpa *ej. in op. et l. cc.*
 W. fasciculata *ej. in op. et l. cc. (fid. Limpr.).*
 W. longicolla var. Boissieri *de Not. Epil. p. 425.*
 W. pennina *de Not. in sched.*

1. In fissur. rup. humid. — *Eur.* : Reg. subalp., rarius alp. *As.* : Japon., Kashmir, Caucas. occ. et centr. *Am. sept.* : Groenland, Wyoming, Oregon, Washington, M. Cascades.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 359, 873.
 Un. itin. 1865, n. 52.

longifolia (*C. M. et Hpe.*) *Jaeg. Ad. I, p. 599.*

Bryum longifolium C. M. et Hpe. in Linn. 1856, p. 205.
 W. nutans (*fid. Mitt.*).

Syn. In sphagnet. — *Pac.* : Austral. felix.

Ludwigii (*Spreng.*) *W. P. Sch. Syn. II ed. p. 402.*

- Bryum Breidlerii Mac. Canad. M. n. 425.*
 Br. cyclophyllum var. laxifolium { *Sanio in Hedwig. 1887, n. 3.*
 Br. cyclophyllum var. lyccense {
 Br. laxifolium *Warnst. in Hedwig. 1887, p. 53.*
 Br. Ludwigii *Spreng. in Schwaegr. Suppl. I, II, p. 95, t. 68; Brid. Bryol. univ. I, p. 647 p.p. ?*
 Br. sudeticum *Ludw. Krypt. Gew. Riesengeb. Cent. I, n. 3.*
 Br. Weigelii *Brid. op. et l. cc. (1).*
 Mnium turbinatum β Ludwigii *Roehl. Deutsch. Fl. III, I, p. 95.*
 Pohlia Ludwigii *Broth. Enum. M. Caucas. p. 27.*
 P. Weigelii *Lindb. in Meddel... p. 1886, p. 252.*
 W. Breidlerii *Jur. in Verh. d. K.K. zool. bot. Ges. in Wien, 1870, p. 168, c. ic.*

2. Ad. terr. humid. vel uligin. — *Eur.* : Reg. subalp. ; Spitzberg, ins. Parry, Ursorum. *As.* : Caucas. occ. *Am. sept.* : Groenland, Columb. brit., Oregon.

« var. elata *W. P. Sch. op. et l. cc.*
 Ster. In paludos. — *Eur.* : Scotia.

var. gracilis *W. P. Sch.* — *W. commutata* var. gracilis.

« var. latifolia *W. P. Sch. op. et l. cc.*

Bryum grande Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 387 (ut subsp.).

Ster. — *Eur.* : Alp. Sabaud. (M. Blanc), Pyren. centr.

« var. lutescens *Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 270.*

Bryum lutescens Kindb. in op. cit. p. 386.

W. pulchella Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 257 p.p.

Ad terr. argill. humid. — *Eur.* : Siles. ? Stiria, Helvet.

var. microphylla *Kindb.* — *W. Bigelowii.*

- « var. subcarnosa *Berggr. M. Spetsb. n. 65 et in K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIII, n. 7, p. 59.*
 — *Eur.* : Spitzberg, ins. Ursor. *Am. sept.* : Groenland.
- Ludwigii* W. P. Sch. (Coroll.). — W. commutata.
- Mac-Leai* *Rehm. M. Afr. austr. n. 548.*
 — *Afr.* : C. B. Sp.
- macrocarpa* Hsch. — W. elongata var. macrocarpa.
- manca* (C. M.) *Par.*
Bryum mancum C. M. in *Linn. 1878-79, p. 304.*
Syn. — *Am. merid.* : M. Argentin. Tucum.
- Mandoni* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n. 1660.*
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- Mangiferae* (C. M.) *Par.*
Bryum Mangiferae C. M. in sched.
 Cortic. — *As.* : Himalaya sept. occid.
- mexicana* *Besch. in Bull. Soc. bot. Fr. 1873, p. LXIII.*
 2. — *Am. sept.* : Mexic.
- Meyeniana* Hpe. — *Brachymenium.*
- micro-apiculata* C. M. et *Kindb. Bidr. p. 455 (nom.) et in Mac. Cat. p. 45.*
Bryum canadense *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 389.*
 Ster. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : M. Rupestr., Columb. brit.
- microcaulon* C. M. et *Kindb. Bidr. l. c. (nom.) et in Mac. Cat. p. 114.*
 — *Am. sept.* : Fret. Hudson (ins. Digge).
- micro-commutata* (*Kindb.*) *Par.*
Bryum micro-commutatum *Kindb. in Bot. Notis. 1896.*
Br. norvegicum *ej. Eur. and N. Am. Bryin. p. 389.*
 — *Eur.* : Alp. Norveg.
- micro-denticulatum* C. M. et *Kindb. in op. et l. cc.*
Br. microdontium *Kindb. op. cit. p. 388 (ut subsp. W. commutatae).*
 2. Juxta niv. aetern. — *Am. sept.* : M. Columb. brit.
- mnioides* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Antill. fr. p. 30.*
 2. — *Am. sept.* : Guadalup.
- Montis Cavi* *Rehm. M. Afr. austr. n. 552.*
 1. — *Am. sept.* : C. B. Sp. or.
- Mülleriana* W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 52.*
 1. — *Am. sept.* : Mexico.
- multiflora* (C. M.) *Hpe. Enum. M. Brasil. p. 35.*
Bryum multiflorum C. M. *Syn. I, p. 339.*
W. pulchella *Hsch. Fl. Brasil. I, p. 43.*
 1. Muric. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- mutabilis* Hedw. — W. nutans.
- neapolitana* de Not. — *Bryum juliforme.*
- nemicaulon* (C. M.) *Par.*
Bryum nemicaulon C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 96.*
 1. — *As.* : China or. (prov. Schen-Si).

nevadensis (C. M.) Par.

Bryum nevadense C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 304.

Terr. — Am. merid. : Argentin. Salt.

nitens Kindb. — W. *cruda* var. minor.

nudicaulis (Lesq.) Lesq. et Jam. *Man.* p. 220.

Bryum nudicaule Lesq. in *Mem. Calif. Acad.* I, p. 21; *Sull. Ic. M. Suppl.* p. 49, t. 34.

W. *microcaulon* C. M. et Kindb. *Bidrag. (nom.) et in Mac. Cat.* p. 115. 2. — Am. sept. : Calif.

nutans (Schreb.) Hedw. *M. frond.* I, p. 10, t. 4; W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 396.

Bryum laxum Reichdt. *Exp. Novara*, p. 176, t. 31.

Bryum nutans Schreb. *Spic. Fl. Lips.* p. 81; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 34), t. 343; C. M. *Syn.* I, p. 335.

Br. *piriforme* β Weiss *Crypt. Goett.* p. 153.

Br. *trichodes* Hedw. *Fund. M.* I, t. 4, f. 16-20.

Br. *trichodes laete-virens capitulis cernuis oblongis* Dill. *Hist. M.* p. 391, t. 50, f. 61.

Br. *umbonatum* Wallr. *Fl. crypt. germ.* I, III, p. 272?

Br. W. *fasciculata* Brid. *Bryol. univ.* I, p. 627.

Br. W. *nutans* ej. op. cit. p. 634.

Hypnum nutans W. et M. *Bot. Taschb.* p. 289.

Lamprophyllum nutans Lindb. *Revis. crit. ic.* p. 25.

Mnium aureum β majus Web. *Spic. Fl. Goett.* n. 182 β .

Mn. nutans P. B. *Prodr.* p. 75.

Pohlia nutans Lindb. *M. Scand.* p. 18.

W. *fasciculata* Hsch. in *Fl.* 1819, II, p. 103 (fid. C. M.).

W. *mutabilis* Hedw. *Fund. M.* II, p. 104, t. 6, f. 28.

W. *trichodes* ej. op. cit. p. 95.

1. Ad rup. arenac., terr. umbr. et in ericet.; calcar. tugit. — Eur. : Fere tota; Spitzberg, ins. Parry. As. : Japon., Kamschatka, Saghalien, Amour, Talysch, Taimyr, Obi, Jenissei, Alatau, Ochotsk, Caucas. Afr. : C. B. Sp., ins. Kerguelen; de Atlantic. ad mar. Behring, temperata tota. Am. merid. : Ins. Chiloë, Eremit., Fuegia. Pac. : Nov. Zeland., Austral. or., Nov. Caledon., Tasman., ins. Auckland.

Exs. : Drumm. *M. bor. am.* I ed. n. 262 (*Bryum*).

Faurie *Pl. Japon.* n. 3533 p.p.

Mac. *Canad. M.* n. 160.

Rab. *Bryoth. eur.* n. 272, 584.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 267.

Un. itin. 1865, n. 54, 61, 65, 68.

« var. *bicolor* (H. et H.) Hüb. *Musc. germ.* p. 429; W. P. Sch. op. et l. cc.

Bryum nutans γ *bicolor* *Bryol. eur.* l. c.

Br. W. *bicolor* Brid. op. cit. p. 630.

W. *bicolor* H. et H. in op. cit. p. 102.

In depress. humid. — Eur. : Reg. subalp.; Spitzberg, ins. Parry. As. : Kasbmir. Am. sept. : Labrador, Alaska, ins. Miquelon, M. Alb., etc.

« var. *caespitosa* (H. et H.) Hüb. et W. P. Sch. op. et ll. cc.

Bryum nutans var. *caespitosum* *Bryol. eur.* l. c.

Br. W. *caespitosa* Brid. op. cit. p. 629.

W. *caespitosa* H. et H. in op. et l. cc.

In montosis umbr. — Eur. : Reg. subalp. et alp. Am. sept. : Colorado.

- « *var. hokinensis* Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 65.
In silv. — As. : Yunnan.
- « *var. longiseta* (Thomas) Hüb. et W. P. Sch. op. et l. cc.
Bryum nutans α *longisetum* Bryol. eur. l. c.
Br. W. *longiseta* Thomas in *Brid. op. cit.* p. 636.
In turfosis. — Eur. : Hic. illic. Am. sept. : Colorado.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 585.
- « *subsp. Macounii* (Kindb.) Par.
Bryum Macounii Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 385.
Rupic. — Am. sept. : Ins. Vancouver.
- « *var. macrospora* Kindb. in *Bull. Torr. bot. Club*, XVII, p. 273.
— Am. sept. : Summ. M. Columb. brit.
- « *var. minor* (Brid.) Par.
Br. *nutans*, minus Kth. Syn. Pl. *Æquinoct.* I, p. 58.
Br. W. *nutans* β *minor* Brid. op. cit. p. 842.
— Eur. : Corsica. Am. merid. : Andes (1).
- « *var. pseudo-cucullata* Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 250.
— Eur. : Summ. Riesengeb (2).
- « *var. rufescens* Lindb. in *Berggr. M. Spetsb.* n. 60 c.
— Eur. : Spitzberg, ins. Parry. Am. sept. : Groenland.
- « *var. sphagnetorum* W. P. Sch. Coroll. p. 66 et Syn. II ed. p. 397.
In sphagn. soc. *Aulacomnio palustri.* — Eur. : Reg. subalp. et alp.
Am. sept. : Groenland.
- « *var. strangulata* (Nees) W. P. Sch. op. et ll. cc.
Bryum nutans *var. pinetorum* H. Müll. Westfal. Laubm. n. 272.
W. *strangulata* Nees in Hub. Muscol. germ. p. 428.
In ericetis humid. et pinetis. — Eur. : Reg. subalp. Am. sept. : Labrad-
dor.
Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 838.
- « *var. subdenticulata* (Brid.) Hüb. et W. P. Sch. op. et l. cc.
Bryum nutans δ *subdenticulatum* Bryol. eur. l. c.
Br. W. *pendula* Brid. op. cit. p. 636.
Br. W. *subdenticulata* ej. op. cit. p. 634.
Rupic. et terr. — Eur. : Reg. subalp. et alp. Am. sept. : Groenland;
ins. Miquelon.
- « *var. uliginosa* W. P. Sch. op. et ll. cc.
In uligin. — Eur. : Reg. alp. Am. sept. : Groenland.
- ædoneura* (C. M.) Par.
Bryum ædoneurum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 97.
2. — As. : China or. (prov. Schen Si).
- Erstedtiana* (C. M.) Jaeg. Ad. I, p. 590.
Bryum Erstedtianum C. M. Syn. II, p. 583.
1. — Am. sept. : And. Costa-Ricens.

(1) Quid ?

(2) « An spec. propria ? » Limpr. l. c.

paucifolia Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., IV*, p. 344.

Bryum paucifolium Mitt. *M. austr. am.* p. 292.

— *Am. merid.* : Nov. Granat.

pauperum (C. M.) Par.

Bryum pauperum C. M. in *hb. Scharampur*, n. 6360.

Ad mal. glacial. — *As.* : Himalaya sept. occid.

Payoti Limpr. — *Bryum*.

pennina de Not. — *W. longicolla*.

perdecurrens (C. M.) Par.

Bryum perdecurrens C. M. in *sched.*

— *As.* : Himalaya sept. occid.

philonotidea (C. M.) Par.

Bryum philonotideum C. M. in *Fl.* 1885, p. 403.

Ster. In palud. montos. — *Am. merid.* : Fuegia.

picta (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 599.

Anisostichium pictum Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc. VII, Bot.* p. 119.

— *Am. sept.* : Jamaic. *Am. merid.* : Columb. occid.

(Veraguas).

piriformis Hedw. — *Leptobryum*.

plumaefolia (C. M.) Par.

Bryum plumaefolium C. M. in *Fl.* 1896, p. 450.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

polycarpa (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 596.

Bryum polycarpum Mitt. *M. austr. am.* p. 293.

— *Am. sept.* : Guatemala.

polymorpha (H. et H.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 65 et *Syn. II ed.* p. 392.

Bryum polymorphum *Bryol. eur. IV* (mon. p. 25), t. 344; *C. M. Syn. I*, p. 229 p.p. (1).

Pohlia dimorpha de Not. *Spic. n. 4 et Syll.* p. 142 (an potius ad *W. acuminat.* referenda?)

P. polymorpha H. et H. in *Fl.* 1819, p. 95; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 619.

W. cucullata Mac. *Canad. M. n.* 468 p.p.

1. Ad terr. et in fissur. rup. — *Eur.* : Reg. subalp. et alp. ; Spitzberg. *As.* : Penins. Tschutschica, Kamschatka. Alp. Yunnan., Himalaya, Kashmir, Caucas. occ. *Am. sept.* : Groenland, Labrador, Columb. brit., Sitka, Oregon, Calif.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 1285.

“ *var. affinis* (H. et H.) Hüb. *op. cit.* p. 416 ; W. P. Sch. *op. et l. cc.*

Bryum polymorphum § affine *Bryol. eur. l. c.*

Pohlia affinis H. et H. in *op. cit.* p. 97.

P. Greenii *Brid. Mant. M.* p. 115?

P. minor *Brid. Mant. M.* p. 115 et *Bryol. univ. I*, p. 611 p.p.?

P. minor var. affinis ej. *Bryol. univ. l. c.* p. 612 p.p.

P. minor var. Greenii ej. *Mant. M. et Bryol. univ. ll. cc.*?

P. minor var. polyphylla ej. *Bryol. univ. l. c.*

Loc. siccior. vel frigidior. — *Eur.* : Reg. alp. et supraalp.

(1) Cf. W. P. Sch. *Coroll.* l. c. in obs. ad *W. acuminatam*.

- « *var. brachycarpa* (*H. et H.*) *Hüb. et W. P. Sch. op. et ll. cc.*
Bryum polymorphum ε *brachycarpum* } *Bryol. eur. l. c.*
Br. polymorphum $\varepsilon\beta$ *curvisetum*
Meesia curviseta *Schwaegr. Suppl. III, I, p. 234.*
Pohlia brachycarpa *H. et H. in op. cit. p. 96; Brid. Bryol. univ. I, p. 616.*
P. curviseta *H. et H. in op. cit. p. 98; Brid. op. cit. p. 618.*
- « *var. Camonia* (*Rota*) *de Not. Epil. p. 429.*
Bryum Camonium *Rota Cat. M. Bergom. mss.*
 — *Eur. : Ital. super.*
- « *var. gracilis* (*H. et H.*) *W. P. Sch. op. et ll. cc.*
Bryum polymorphum δ *gracile* *Bryol. eur. l. c.*
Pohlia gracilis *H. et H. in op. cit. p. 100; Brid. op. et l. cc.*
Ut et ubi praeced.
- « *subsp. pseudo-acuminata* (*Kindb.*) *Par.*
Bryum pseudo-acuminatum *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 390.*
Rupic. — Eur. : Norveg.
- « *var. stricta* (*Bryol. eur.*) *W. P. Sch. op. et ll. cc.*
Bryum polymorphum γ *strictum* *Bryol. eur. l. c.*
Ut et ubi praeced.
- polymorphoides* *Kindb. in Mac. Cat. p. III.*
Bryum polymorphoides *ej. Eur. and N. Am. Bryin. p. 387.*
Ad nives aetern. — Am. sept. : M. Selkirk.
- polysetula* (*C. M.*) *Par.*
Bryum polysetulum *C. M. in sched.*
 — *As. : Himalaya sept. occid.*
- pomiformis* *Hedw. — Bartramia.*
- proligera* (*Lindb.*) *Kindb. Enum. Bryin. dovr. App. n. 309 (1).*
Bryum proligerum *Kindb. Eur. and N. Am. Bryin. p. 384.*
Pohlia proligera *Lindb. mss.*
 2. *Ad terr. argill.-arenos. — Eur. : Norveg.? Stir., Carinth., Tirol. ;*
Alp. Bavar.? Helvet.?
- pseudo-nutans* *Par.*
Bryum austro-nutans *C. M. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 78 et in*
Forschungsreise... p. 16.
Br. nutans *Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1876 (fid. C. M.).*
Syn. Rupic. — Afr. : Ins. Kerguelen.
- Puiggarii* *Geh. et Hpe. in Fl. 1881.*
 2. — *Am. merid. : Brasil. austr. or.*
- pulchella* (*Hedw.*) *W. P. Sch. Coroll. p. 67 et Syn. II ed. p. 404 p.p.*
Bryum carneum β *pulchellum* *H. et T. Muscol. brit. p. 119; Boulay M.*
Fr. I, p. 282.
Br. pulchellum *Hedw. M. frond. III, p. 95, t. 38; Brid. Bryol. univ. I,*
p. 651 p.p. ; Bryol. eur. IV (mon. p. 42), t. 352 p.p. ; C. M. Syn. I,
p. 332 p.p.
Mnium pulchellum *P. B. Prodr. p. 76.*
Pohlia pulchella *Lindb. M. Scand. p. 17.*
W. carnea *Rab. Bryoth. eur. n. 1021.*

(1) « An *W. annotina* *var. tenuifolia?* ». (*Limpr. Laubm. Deutschl. II. p. 268*).

2. Ad rip. fluvior. — *Eur.* : Scandin. sept. et med., Fennia ; Salisb. ?
 Ardenn., Sabaud. As. : Jenissei. *Am. sept.* : Columb. brit., Idaho.

pulchella { Hsch. — *W. multiflora*.
 Jur. p.p. — *W. lutescens*.
 Mac. — *W. columbica*.
 W. P. Sch. p.p. — *W. vexans*.

pulvinata (C. M.) Par.

Bryum pulvinatum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 21.

Syn. Rupic. — *Am. merid.* : Austr. Georgia.

pycno-decurrens C. M. et Kindb. *Bidr.* p. 455 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 114.

Bryum microsporum Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 388.

2. Terr. et rupic. ad niv. aetern. — *Am. sept.* : Columb. brit.

rigescens (Wils.) Mitt. *M. Ind. or.* p. 65.

Bryum rigescens Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 366.

2? — As. : Himalaya.

rigida (Lindb.) Par.

Epipterygium rigidum Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas.* p. 30.

2. Ad terr. argill.-arenac. humid. — As : Imeretia.

rubella Philib. in *Rev. bryol.* 1896, p. 85.

2. In graminos. — *Eur.* : Helvet. (M. S. Bernard. maj.).

Rusbyana (C. M.) Par.

Bryum Rusbyanum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 21.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

rutilans (Brid.) W. P. Sch. *Syn. II ed.* p. 400.

Bryum rutilans Brid. *Bryol. univ.* I, p. 684 ; C. M. *Syn.* I, p. 274 (*excl. syn.*).

Ster. — *Am. sept.* : Ins. Melville.

rutilans W. P. Sch. (Coroll.). — W. Schimper.

sacra Ltz. *M. Ehrenb.* p. 40, t. 9.

Bryum syriacum Jur. et Milde ?

2. — As. : M. Sinaï.

saprophila Broth. in *litt. ad C. M.*

Bryum saprophilum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1896, p. 97.

2? — As. : China or. (prov. Kansu).

scabridens (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 592.

Bryum scabridens Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1864, p. 151.

W. brevicolla Sande Lac. in *Miq. Ann. mus. bot. Lugd. Batav.* II, p. 294.

2. — As. : Japon.

Schimperi (C. M.). W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 338 et *II ed.* p. 400.

Bryum gelidum Hagen in *K. Norske Vid.-Selsk. Skrift.* 1888-90, p. 11 (*ex ipso* !)

Br. *rutilans* *Bryol. eur. IV (mon. Suppl.* p. 5), t. 350.

Br. *Schimperi* C. M. *Syn. I*, p. 334.

Pohlia rutilans Lindb. *M. Scand.* p. 18.

W. rutilans W. P. Sch. *Coroll.* p. 66.

1 et syn. Rupic. et terr. in paludos. — *Eur.* : Spitzberg, ins. Parry, Ursorum, Alp. Norveg. *Am. sept.* : Ins. Sabine, fret. Smith.

schisticola (C. M.) Par.

Bryum schisticolum C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 21.

Webera spectabilis W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1659.

2. In schistos. — *Am. merid.* : And. Boliv.

Seleri (C. M.) Par.

Bryum Seleri C. M. in *Bull. hb. Boissier*, 1897, p. 181.

2. — *Am. sept.* : Guatemala.

sessilis Lindb. — *Diphyscium*.

sinaïtica Ltz. M. *Ehrenb.* p. 42, t. 10.

Bryum syriacum ♂ (*fid. Jur. et Milde*).

♀ et fr. ign. — *Afr.* : M. Sinaï.

spectabilis (C. M.) Jaeg. *Ad. I*, p. 589.

Eryum spectabile C. M. *Syn. II*, p. 583.

1. Ad rup. humid. — *Am. sept.* : Mexic., Costa Rica, Guatemala.

Am. merid. : And. Nov. Granat.

spectabilis W. P. Sch. — *W. schisticola*.

sphagnadelphus (C. M.) Besch. in *Miss. sc. Cap Horn*, p. 285.

Bryum nutans Mitt. M. *austr. am.* p. 292 ?

Br. *sphagnadelphus* C. M. in *Fl.* 1885, p. 402.

Syn. Paludic. — *Am. merid.* : Patagon. austr., Fuegia.

sphagnicola (*Bryol. eur.*) W. P. Sch. *Coroll.* p. 66 et *Syn. II ed.* p. 399.

Bryum Sphagni C. M. *Syn. I*, p. 330 p.p.

Br. *sphagnicola* *Bryol. eur. IV* (mon. *Suppl.* p. 6), t. 349.

Pohlia sphagnicola Lindb. et Arn. M. *As. bor.* 1890, II, p. 53.

2. In sphagnet. profund. — *Eur.* : Spitzberg, Norveg., Carinth., Rhönggeb., Brandeb.; Pomeran. ? *As.* : Ienissei. inf. *Am. sept.* : Groenland, Nov. Scotia, M. Adirondack.

strangulata Nees. — *W. nutans* var. *strangulata*.

strictipes (C. M.) Par.

Bryum strictipes C. M. in *hb. Scharampur*, n. 8042.

— *As.* : Himalaya sept. occid.

subcarnea W. P. Sch. in *Savat. M. Japon.* n. 405 ; Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 342.

2. — *As.* : Japon.

subcucullata C. M. et Kindb. *Bidr.* p. 455 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 113.

Bryum subcucullatum Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 388.

W. gracilis Mac. *Canad. M.* n. 424.

2 In fissur. rup. — *Am. sept.* : Summ. M. Columb. brit.

subcurvata (Mitt.) Jaeg. *Ad. I*, p. 589.

Bryum subcurvatum Mitt. M. *austr. am.* p. 291.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

subpolymorpha (Kindb.) Par.

Bryum subpolymorphum Kindb. *Eur. and N. Am. Bryin.* p. 390.

2. — *Am. sept.* : M. Columb. britann.

synoico-cruda (C. M. Par.).

Bryum synoico-crudum C. M. in *Engler's Bot. Jahrb.* p. 83 et in *Forschungsreise....* p. 37.

Br. *crudum* Mitt. M. *austr. am.* p. 293 ?

Syn. In gramin. — *Am. merid.* : Fret. Magell.

tapintzensis Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 65.

Syn. Ad rivul. — As. : Yunnan.

tasmanica (Broth.) Par.

Mniobryum tasmanicum Broth. in *Oefv. af Finska Vet.-Soc. Föerh.* 1893, p. 37 et in *Pap. and Proceed. of the roy. Soc. of Tasman.* 1895, p. 203.

2. Ster. Ad terr. humid. — Pac. : Tasman.

tenuifolia (Hook. f. et Wils.) Jaeg. op. et l. cc.

Bryum tenuifolium H. f. et W. in *Lond. Journ. of bot.* 1844, p. 546 ; *C. M. Syn.* I, p. 335.

2. — Pac. : Nov. Zeland.

Tozeri (Grev.) W. P. Sch. *Coroll.* p. 67 et *Syn.* II ed. p. 406.

Anisostichium Tozeri Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 119.

Bryum marginatum Br. in *Fr. Müller M. Sardin.* 1827.

Br. *Tozeri* Grev. *Scot. crypt. Fl.* V, t. 285 ; *Bryol. eur.* IV (mon. p. 41), t. 353 ; *C. M. Syn.* I, p. 298 et II, p. 574.

Epipterygium Tozeri Lindb.

2. In terr. argill. et aren.-argill. humid. — Eur. : Britann., Normann., reg. merid. As. : Java. Afr. : Alger., ins. Azor., Canar., Madeir. Am. sept. : Vancouver, Oregon. Calif. merid.

Exs. : Rab. *Bryoth. eur.* n. 581.

Sull. et Lesq. *M. bor. am.* II ed. n. 272.

trachydontea Sanio. — W. *crassidens*.

trematodontea (C. M.) Par.

Bryum trematodonteum C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 33.

1. — As. : M. Neilgherr.

trichodes Hedw. { — *Meesea uliginosa*.
— *W. nutans*.

vexans (Limpr.) Par.

Bryum pulchellum *Bryol. eur.* (mon. p. 42), t. 352 p.p.

Mniobryum vexans Limpr. *Laubm. Deutschl.* II, p. 273.

W. pulchella W. P. Sch. p.p.

2. Terr. in subalp. — Eur. : Stir., Pinzgov., Engadin.

viridata (C. M.) Par.

Bryum viridatum C. M. *Bryol. austr. Georg.* p. 21.

Ster. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georgia.

viridis (Arn. et Lindb.) Par.

Pohlia viridis A. et L. M. As. bor. 1890, II, p. 55.

2. Terr. — As. : Jenissei super.

Wilsoni Jaeg. — *Brachymenium*.

Woodii Rehm. M. Afr. austr. n. 547 et b.

— Afr. : Natal, Transvaal.

yunnanensis Besch. in *Ann. sc. nat.* 1892, I, p. 64.

Syn. In silv. — As. : Yunnan.

Weberiopsis C. M. in *Fl.* 1897, p. 328 (nom., sect. *CONOMITRII* (sensu Müller).

WEISIA Hedw. Fund. M. II, p. 90 (24 spec.).

aciphylla Wahlenb. — *Pottia lanceolata* var. *aciphylla*.

acuta { Hedw. — *Blindia*.
Hook. et Tayl. — *Dicranum fulvellum*.

β *rupestris* {
γ *rupicola* { Brid. — *Blindia acuta*.

affinis { Hook. et Tayl. — *Pottia Starkeana* var. *brachyodus*.
Roth. — *Orthotrichum affine*.

agoyanensis Mitt. — *Scopelophila*.

amblyodon Brid. — *W. viridula* var. *amblyodon*.

anomala Roth. — *Orthotrichum*.

apiculata Kiaër in *Borgen M. Madag. n. 11*,
— *Afr.* : Madagasc. centr.

apiculata Br.

var. *gymnostomoides* Rab. { — *W. mucronata*.
var. *subglobosa* Rab.

arborea Mitt. — *Hyophila*.

argentinica C. M. — *Hymenostomum*.

atro-virens Bryol. germ. — *Dicranoweisia compacta*.

auridens C. M. — *Oreoweisia*.

var. *robusta* C. M. — *Oreoweisia auridens* var. *robusta*.

? *Ayresii* W. P. Sch. in *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 14.
1. — *Afr.* : Ins. Franciaë.

Barbula Mitt. — *Hyophila*.

barbulacea C. M. in *Linn.* 1874, p. 634.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

bartramiioides Griff. — *Philonotis Griffithiana*.

Belangeriana Mont. — *Microdus longirostris*.

Bergiana Hsch. — *Entosthodon*.

Berteroana Spreng. — *Trichostomum*.

bicolor H. f. — *Gymnostomum*.

blanda Mitt. — *Hyophila*.

bogotensis Hpe. — *Oreoweisia*.

brachycarpa Jur. — *Hymenostomum microstomum* var. *brachycarpa*.

brachypelma C. M. — *Hymenostomum*.

Brandegei Aust. — *W. viridula* var. *amblyodon*.

brasiliensis Hpe. — *Oreoweisia*.

Breutelii C. M. — *Gymnostomum*.

Bruchiana Bryol. germ. — *W. viridula*.

Bruntoni de Not. — *Dicranoweisia*.

caespitosa Br. — *Pottia*.

calcareum { C. M. — *Gymnostomum*.
Drumm. — *Seligeria*.
Sull. — *Seligeria pusilla*.

var. *gracillima* C. M. — *Gymnostomum calcareum*.

var. *tenella* C. M. — *Gymnostomum calcareum* var. *tenella*.

var. *viridula* C. M. — *Gymnostomum calcareum* var. *intermedium*

var. β Schwaegr. — *Seligeria pusilla*.

californica Hpe. — *W. viridula*.

calycina Hedw. — *Holomitrium*.

campylocarpa Hook. — *Mielichhoferia campylothea*.

capillacea Brid. — *Trichostomum tenue*.

capilliseta C. M. in *Ule Bryoth. brasil. n. 31 et 32*.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

- cataractarum* Mitt. — *Hyophila*.
chilensis Hpe. — *Oreoweisia*.
ciliata Hook. — *Syrrophodon*.
cirrata Hedw. — *Dicranoweisia*.
 var. crispula Wahlenb. — *Dicranoweisia*.
 var. cylindrica Wahlenb. — *Didymodon*.
commutata Braithw. — *Gymnostomum curvirostre*.
comosa Hpe. — *Garckea phascoides*.
compacta Brid. — *Dicranoweisia*.
condensata Brid. — *Dicranoweisia compacta*.
connata Wallr. — *Pottia lanceolata*.
contecta H. f. et W. — *Dicranoweisia*.
contermina Mitt. — *Hyophila*.
controversa Hedw. — *W. viridula*.
 var. densifolia Wils. — *W. viridula var. densifolia*.
 var. stenocarpa Wils. — *W. viridula var. stenocarpa*.
convoluta C. M. et Kindb. *Bidr.* p. 453 (nom.) et in *Mac. Cat.* p. 14.
 1. In fissur. rup. — *Am. sept.* : *M. Rupestr.*
crispa { Roth. — *Ulota*.
 Timm. — *W. viridula*.
crispata { Brid. — *Rhabdoweisia denticulata*.
 C. M. — *Hymenostomum*.
 Jur. — *W. viridula var. gymnostomoides*.
cripula { Hedw. — *Dicranoweisia*.
 Wils. — *Dicranoweisia antarctica*.
 var. atrata { Bryol. eur. } — *Dicranoweisia crispula var. atrata*.
 Bryol. germ. }
 var. nigrescens Bryol. germ. }
cryptodon Mont. — *Dicranoweisia*.
cucullata { C. M. — *Hymenostomum*.
 Mitt. — *Pottia*.
cupulata Roth. — *Orthotrichum*.
curvicaulis Brid. — *W. viridula*.
curvirostris C. M. — *Gymnostomum*.
 var. lacustris Brid. — *Didymodon rubellus*.
 var. microcarpa C. M. — *Gymnostomum curvirostre var. microcarpa*.
 var. pallidiseta C. M. — *Gymnostomum curvirostre var. cataractarum*.
 var. revoluta Brid. — *Didymodon rubellus*.
cylindrica Br. — *Didymodon*.
cyrnaea Brid. — *W. viridula*.
densifolia Wils. — *W. viridula var. densifolia*.
denticulata Brid. — *Rhabdoweisia*.
diaphana Roth. — *Orthotrichum*.
Dicksoni { Brid. — *Dicranoweisia cirrata*.
 Gmel. — *W. viridula*.
dubia Roehl. — *W. viridula*.
edentula { Mitt. — *Hymenostomum*.
 Sull. — *W. viridula*.
elongata Hook. — *Mielichhoferia nitida var. elongata*.
erosa Hpe. — *Oreoweisia*.
erythrogonia Brid. *Bryol. univ.* I, p. 337 ; *C. M. Syn.* I, p. 664 (1).
 2. Ster. — *Am. sept.* : ?
exigua Schwaegr. — *Microdus*.

(1) Spec. dubia, ab anctor. recentior. non memorata.

- falcata* { Bryol. germ. — Dicranoweisia crispula.
 Kindb. — Gymnostomum.
fallax Kindb. — W. viridula.
fastigiata Kindb. — Blindia acuta.
flaccida Harv. — Splachnobryum.
flavipes Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. I, p. 59, t. 83, f. 2 et
 Handb. p. 404.
 1. Terr. — Pac. : Nov. Zeland., Austral. or., Tasman.
flexuosa Bryol. germ. — Dicranum fulvellum.
fornicata Brid. — Bryum calophyllum.
Forsteri Brid. — Zygodon.
fugax Hedw. — Rhabdoweisia.
 var. β Roehl. — Rhabdoweisia denticulata.
Ganderi Jur. in Verh. d. K. K. zool. bot. Ges. in Wien, 1875, p. 780 et
 Laubm. Oesterr. Ung. p. 13.
 W. mucronata β Ganderi Boulay M. Fr. I, p. 550.
 1. In pascuis. — Eur. : Pusterthal, Tirol., Gall. or. (Ardèche).
geniculata Brid. — Campylosteleum saxicola.
groënlandica Kindb. — Pottia.
gymnostomoides { Brid. — W. viridula var. gymnostomoides.
 Bryol. germ. — W. viridula var. amblyodon.
gypsacea Schl. ich. — Eucladium verticillatum.
Hampei Mitt. — Systegium Lindigii.
heteromalla Hedw. — Ditrichum homomallum.
Hildebrandti C. M. — Gyroweisia.
humilis Bryol. germ. — W. viridula.
immersa Brid. — Campylopus flexuosus.
incarnata Schwaegr. — Discelium nudum.
incerta Mitt. — Barbula.
incurva Mitt. — Hyophila.
indica Wils. { — Dicranoweisia.
 { — Dicranoweisia alpina.
inflexa Mitt. — Pottia.
involutifolia Mitt. — Hyophila.
irrorata Mitt. — Eucladium.
ithyphylla { α major Ehrh. — Orthotrichum leiocarpum.
 { β minor Ehrh. — Orthotrichum anomalum.
Jamesoni { Mitt. — Gymnostomum.
 { Tayl. — Tayloria pichinchensis.
Kunzeana C. M. — Gymnostomum marginatum.
lanceolata Roehl. — Pottia.
latifolia { Schwaegr. — Pottia.
 { Drumm. — Pottia latifolia var. pilifera.
laxifolia Hpe. — Oreoweisia.
Lechleri C. M. — Oreoweisia.
 β minor C. M. — Oreoweisia Lechleri var. minor.
Leprieurii Mitt. — Hyophila.
leptocarpa W. P. Sch. mss. ; Besch. in « Deux Excurs. bot.... par L. Le-
 resche et E. Levier » p. 171.
 1. — Eur. : Lusit. (Cintra). Afr. : Alger. ?
leptodon Plaub. — Rhabdoweisia fugax.
leptotrichacea C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p.
 — As. : China or. (prov. Schen-Si).

- ligulata* Mitt. — Scopelophila.
Lindigiana Hpe. — Rhabdoweisia.
Lindigii Mitt. — Hyophila.
lineaefolia C. M. — Hymenostomum?
linearifolia Hsch. — Microdus.
longicollis Link. — Entosthodon Templetoni.
longipes Sommerf. — ngstroemia.
longirostris { Mitt. — Gymnostomum Kunzeanum.
 { Schwaegr. — Microdus.
longiseta Lesq. et Jam. Man. p. 56.
 W. viridula var. australis Aust. M. Appal. Suppl. n. 466 et in Bull. Torr.
 bot. Club, VII, p. 4.
 2. Terr. — Am. sept.: Carol. merid., Florid., Ludovic., Mississipi.
lurida Mitt. — Barbula.
Mac-Clellandi Griff. — Syrrhopodon Gardneri.
macrocarpa Hook. — Mielichhoferia.
macrorhyncha Mont. — Microdus Miquelianus.
Martiana Hsch. — Oreas.
mauritiana W. P. Sch. in Besch. Fl. bryol. Réunion, etc., p. 14.
 — Afr.: Ins. Franciae.
melanostoma Mitt. — Hyophila.
micacea C. M. — Hymenostomum.
microcarpa H. f. et W. — Dicranoweisia.
microdes Schwaegr. { — W. viridula.
microdonta Hedw. {
microstoma { Bryol. germ. — W. viridula var. amblyodon.
 { C. M. — Hymenostomum.
 var. *brachycarpa* C. M. — Hymenostomum microstomum var. brachy-
 carpa.
 var. *brevirostris* C. M. — Hymenostomum microstomum var. breviro-
 stris.
 var. *elata* C. M. — Hymenostomum microstomum var. elata.
 var. *obliqua* C. M. — Hymenostomum microstomum var. obliqua.
Mielichhoferiana Funk. — Mielichhoferia nitida.
 β *elongata* Schwaegr. — Mielichhoferia nitida var. elongata.
minutissima Mitt. — Hyophila.
Miqueliana Mont. — Microdus.
monoclados Brid. — Barbula vinealis.
mucronata Bryol. eur. I (mon. p. 7), t. 23; W. P. Sch. Syn. II ed. p. 53.
 Gymnostomum microstomum var. Schultz Fl. Starg. p. 279.
 G. rutilans Hedw. Sp. M. p. 37, t. 3, f. 8-11.
 Hymenostomum rutilans Bryol. germ. I, p. 201, t. 12; Brid. Bryol.
 univ. II, p. 78.
 Mollia rutilans Lindb. in Braithw. Brit. Mossfl. I, p. 238.
 W. apiculata Br. in Bryol. germ. II, II, p. 40, t. 26.
 β *gymnostoma* { Rab. Deutsch. Kryptfl. II, p. 126.
 γ *subglobosa* {
 W. mucronata Br. in Spreng. L. Syst. veg. IV, p. 158. *ulata*
 W. viridula var. stenocarpa Rab. Bryoth. eur. n. 355.
 1. Ad terr. argill. inter dumeta. — Eur.: Rar.; reg. med. Afr.:
 Alger.
 Exs.: Rab. Bryoth. eur. n. 607.
 var. *Ganderi* Boul. — W. Ganderi.
mutabilis Hedw. — W. viridula.
navicularis Mitt. — Barbula.

- nervosa* Hook. — *Barbula atro-virens*.
nigrita Hedw. — *Catoscopium*.
nivalis Brid. — *Campylopus*.
nova spec. n. 496 Zeyh. — *Leucoloma Zeyheri*.
nuda Mitt. in *Trans. and Proceed. of the roy. Soc. of Victoria*, 1883, p. 59.
 — *Pac.* : Austral. or.
nuda H. et T. — *Discelium*.
nudiflora C. M. et Hpe. in *Linn.* 1853, p. 456.
 Syn. — *Pac.* : Austral. felix.
 « *var. major* Hpe. in *Linn.* 1856, p. 205 (*nom.*).
 Ubi typ.
obscura Roehl. — *W. viridula*.
obtusa Brid. — *Splachnobryum*.
obtusifolia { C. M. — *Hyophila*.
 { Rich. — *Splachnobryum*.
 { Roth. — *Orthotrichum*.
occulta Wallrr. in *Linn.* 1840, p. 682; C. M. *Syn.* I, p. 664 (1).
 — *Eur.* : *Hercynia merid.*
octoblepharis { Mitt. — *Pottia*.
 { Roth. — *Orthotrichum affine*.
Erstedtiana Mitt. — *Hyophila*.
Pabstiana C. M. — *Gymnostomum*.
pallens H. f. et W. — *Microdus*.
pallescent W. P. Sch. in *hb. DR.* ; *Besch. Cat. M. Alger.* p. 5.
 1. — *Afr.* : *Alger.*
pallidiseta Schwaegr. — *Microdus*.
paludosa Brid. — *Seligeria pusilla*.
parasitica { Mohr. — *Calymperes*.
 { Roehl. — *Seligeria recurvata*.
pennata Schrank. — *Neckera*.
pentasticha Hedw. — *Conostomum australe*.
phascoides C. M. — *Hymenostomum rostellatum*.
pilifera { Funk. — *Pottia latifolia var. pilifera*.
 { Roehl. — *Grimmia*.
Poeppigiana Mitt. — *Hyophila*.
polytrichoides Wigg. — *Orthotrichum leiocarpum*.
pomiformis Hook. — *Syrrophodon*.
procera Laur. — *Oreoweisia serrulata*.
pulicaris Besch. — *Hymenostomum*.
pumila Brid. — *Rhabdoweisia fugax*.
punctulata Mitt. — *Hyophila*.
pusilla Kindb. in *Rev. bryol.* 1896, p. 20.
 Gymnostomum tenue ej. in Mac. Cat. p. 14 p.p.
 2. Ad rup. calcar. — *Am. sept.* : Ontario (Owen Sound).
pusilla Sw. — *Seligeria diversifolia*.
radians Hedw. { (fid. C. M.). — *Entosthodon*.
 { (fid. Hpe). — *Funaria glabra*.
recurvata Brid. — *Seligeria*.
recurvirostra Hedw. {
recurvirostris Schwaegr. { — *Didymodon rubellus*.

(1) Spec. dubia, ab auctor. recentior. non memorata.

- reflexa* Brid. — Gyroweisia.
reticulata Hook. — Mielichhoferia clavata.
revoluta Schleich. — Didymodon rubellus.
rigescens C. M. — Gymnostomum.
riparia Hpe. — Dicranoweisia.
Rohlfiana C. M. — Gyroweisia.
Roscheri Mitt. — Hyophila.
rosea Wahlenb. — Discelium nudum.
rostellata Lindb. — Hymenostomum.
rubella Roehl. — Didymodon.
Rudolphiana Bryol. germ. — W. viridula var. gymnostomoides.
Rugeliana W. P. Sch. — W. viridula var. Rugeliana.
rupestris { C. M. — Gymnostomum rupestre.
 Hedw. — Blindia acuta.
 var. *compacta* C. M. — Gymnostomum rupestre var. *compacta*.
 var. *ramosissima* C. M. — Gymnostomum rupestre var. *ramosissima*.
 var. *stelligera* C. M. — Gymnostomum rupestre var. *stelligera*.
samoana Mitt. — Hyophila.
Schisti Brid. — Cynodontium.
? *sclerodonta* Hpe. in sched.
 — Afr. : C. B. Sp.
Seligeri { Bryol. germ. — Seligeria pusilla.
 H. f. et W. — Seligeria recurvata var. *arcuata*.
Sellowii Schwaegr. — Holomitrium crispulum var. *gracile*.
semi-involuta C. M. — Hymenostomum.
senocarpa C. M. — Hymenostomum.
serrulata { Funk. — Oreoweisia.
 Wils. — Oreoweisia laxifolia.
simplex Brid. Bryol. univ. 1, p. 803; C. M. Syn. I, p. 664 (1)
 Patria ign. (hb. DC.).
socotrana Mitt. — Gymnostomum.
sphaerothecia C. M. — Rhabdoweisia.
splachnifolia Mitt. { — Splachnobryum obtusum.
 — Splachnobryum Spruceanum.
splachnoides Thunb. — Dissodon.
squarrosa C. M. — Hymenostomum.
Starkeana Hedw. — Pottia.
stillicidiorum Mitt. — Gymnostomum.
striata { Kaulf. — Rhabdoweisia fugax.
 Roth. — Orthotrichum leiocarpum.
 var. *major* H. et T. — Rhabdoweisia denticulata.
 var. *minor* eor. — Rhabdoweisia fugax.
stricta H. f. et W. — Blindia.
subacaulis Mitt. — Hymenostomum.
subcaespitosa Mitt. — Hyophila.
submicacea C. M. — Hymenostomum.
? *tenella* W. P. Sch. hb.
 — Afr. : C. B. Sp.
tenella Brid. — Pottia caespitosa.
tenuirostris H. et T. — Didymodon cylindricus.
tenuis { C. M. — Gyroweisia.
 Kze. — Microdus.
tenuiseta W. P. Sch. — W. viridula var. *tenuiseta*.

- Termiditarum* C. M. — *Hymenostomum*.
tophicola C. M. — *Gyroweisia*.
toquescens Bryol. germ. — *Oreoweisia serrulata*.
tortifolia H. f. et W. — *Dicranoweisia*.
tortilis { C. M. — *Hymenostomum*.
 { Spreng. — *W. viridula*.
Tortula Mitt. { — *Hyophila*.
 { (quoad pl. Cubens.). — *Hyophila Wrightii*.
trichodes H. et T. — *Brachyodus*.
tristicha Brid. — *Seligeria*.
truncicola de Not. — *Dicranum montanum*.
turbinata Drumm. — *Dissodon splachnoides*.
umbrosa Mitt. — *Gymnostomum*.
uncinata Brid. — *Macromitrium fimbriatum*.
vaginans Brid. — *Holomitrium*.
venezuelensis C. M. — *Gymnostomum*.
verticillata Brid. — *Eucladium*.
virens Brid. — *W. viridula*.
viridissima Brid. — *Bartramia subulata* ?
viridula (L.) Brid. *Bryol. univ.* I, p. 334; *Bryol. eur.* I (mon. p. 5), t. 21;
 C. M. *Syn.* I, p. 651; W. P. Sch. *Syn.* II ed., p. 51.
Afzelia crispa Ehrh. *Crypt. exs. n.* 222.
Bryum capillaceum breve pallide et laete virens, capsulis ovatis Dill. *Hist.*
 M. p. 380, t. 48, f. 43.
Br. controversum Hoffm. *Deutsch. Fl.* II, p. 34.
Br. luteolum ej. op. et l. cc.
Br. paludosum β *viridulum* Web. *Spic. Fl. Goett.* p. 11.
Br. virens Dicks. *Fasc. II Pl. crypt.* p. 4.
Br. viridulum L. *Sp. pl.* p. 1584.
Dicranum xanthodon Hedw. *Sp. M.* p. 145, t. 30.
Grimmia controversa W. et M. *Rot. Taschb.* p. 133.
Gr. crispa Roth. *Tent.* III.
Gr. viridula ej. op. et l. cc.
Hymenostomum subglobosum *Bryol. germ.* I, p. 103; Brid. *Bryol.*
 univ. II, p. 79. 103 (103 by typo, error in Br. Bryol.)
H. tortile Rab. *Bryoth. eur. n.* 408.
Mnium viridulum Sw. *Meth. M.* p. 365.
Mollia viridula Lindb. *M. Scand.* p. 21.
Simophyllum viridulum Lindb. *Revis. crit. ic. fl. dan.* p. 51.
W. Bruchiana *Bryol. germ.* II, II, pp. 36 et 38, tt. 26 et 28.
W. californica Hpe. in sched.
W. controversa Hedw. *M. frond.* III, p. 12, t. 5; Drumm. *M. bor. am.*
 I ed. n. 67 et II ed. n. 32, 33.
W. crispa Timm. *Prodr. fl. Megap.* p. 736.
W. curvicaulis Brid. *Bryol. univ.* I, p. 336.
W. cyrnaea ej. op. cit. p. 803.
W. Dicksoni Gmel. *Syst. nat.* II, p. 1334.
W. dubia Roehl. *Moosges.* p. 149.
W. edentula Sull. in *Proced. of the Amer. Acad.* 1861 (fid. Mitt.).
W. fallax { *Bryol. germ.* l. c.
W. humilis. {
W. microdes Schwaegr. *Suppl.* I, I, p. 77.
W. microdonta Hedw. *Sp. M.* p. 67, t. 11, f. 7-12.
W. mutabilis Brid. *Sp. M.* I, p. 103.
W. obscura Roehl. in *Ann. Wett. Ges.* III, p. 99; Brid. *Bryol. univ.* I,
 p. 337 ?
W. tortilis Spreng. *Syst. veg.* IV, II, p. 381.
W. virens Brid. *M. Rec.* II, I, p. 69.
1. In pascuis, agris, ad mur. terr. obtect., etc., rar. ad saxa. — Reg.
 temperat. in Eur., As., Afr., Am. sept. et merid. Pac. : Taïti ? Nov.
 Zeland., Tasman.

Exs. : Faurie Pl. Japon. n. 4. 209, 212.

Mac. Canad. M. n. 515.

Rab. Bryoth. eur. n. 169, 354.

Rehm. M. Afr. austr. n. 438.

Sull. et Lesq. M. bor. am. 11 ed. n. 49.

- « *var. amblyodon* (Brid.) *Bryol. eur. l. c. t. 22* ; *C. M. op. cit. p. 652* ;
W. P. Sch. op. cit. p. 52.

W. amblyodon Brid. *Bryol. univ. I, p. 805.*

W. Brandegei Aust. in *Bull. Torr. bot. Club, VI, p. 46.*

W. gymnostomoides *Bryol. germ. 11, 11, p. 34, t. 25.*

W. microstoma *ibid. p. 52, t. 37.*

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *Am. sept.* : Colorado.

- « *var. arenicola* *Limpr. Laubm. Deutschl. I, p. 257.*

Ad rup. aren. desaggreg. — *Eur.* : Silesia.

var. australis Aust. — *W. longiseta.*

- « *var. brevifolia* (Lindb.) *Par.*

Mollia viridula var. brevifolia Lindb. in *Broth. Enum. M. Caucas. p. 51.*

Ad rup. calcar. — *As.* : Imeretia.

- « *var. canaliculata* *Hpe. Prodr. Fl. Nov. Granat., p. 15.*

— *Am. merid.* : Nov. Grânat. Brasil. austr. or.

- « *var. cylindrica* *W. P. Sch. in Mandon M. Madeir. n. 1.*

— *Afr.* : Madeir.

- « *var. densifolia* (Wils.) *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. op. et ll. cc.*

W. controversa var. densifolia Wils. *Bryol. brit.*

W. densifolia Wils. *mss.*

Ut et cum typ. in *Eur. et Am. sept.*

Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 794, 795.

- « *var. gymnostomoides* (Brid.) *Bryol. eur. l. c. t. 22* ; *C. M. et W. P. Sch. op. et ll. cc.*

Gymnostomum Rauanum Aust. in *Bull. Torr. bot. Club, V, p. 21.*

Hymenostomum microstomum ej. *M. Appal. n. 63.*

W. crispata *Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 11 (fid. C. M.).*

W. gymnostomoides Brid. *op. cit. p. 342.*

W. Rudolphiana *Bryol. germ. II, II, p. 33, t. 25.*

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *As.* : Minor, Caucas. *Am. sept.* : Nov.

Angl., New Jersey, Pensilv.

- « *subsp. longirostris* *Kindb. in Hedw. 1896, p. 59.*

— *Am. sept.* : Illinois.

var. mucronata *C. M.* — *W. mucronata.*

- « *var. nitida* *Ren. et Card. in Bot. Gaz. 1889, p. 91 et M. Amer. sept. n. 3.*

Arenic. — *Am. sept.* : Florid., Ludovic.

- « *var. Rugeliana* (W. P. Sch.) *Ren. et Card. in Rev. bryol. 1892, p. 73.*

W. Rugeliana *W. P. Sch. mss.*

— *Am. merid.* : Georgia.

- « *var. stenocarpa* (*Bryol. germ.*) *Bryol. eur., C. M. et W. P. Sch. op. et ll. cc.*

W. controversa var. stenocarpa *Bryol. germ. I, p. 45, t. 17.*

Ut typ. — *Eur.* : Cum typ. *Am. sept.* : Arkansas, Kansas.

- « *var. stereodon* *C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 20.*

— *Afr.* : C. B. Sp.

« *var. subglobosa* W. P. Sch. mss. ; *Limpr. Laubm. Deutschl. I*, p. 256.
Hymenostomum subglobosum Bryol. germ. ?
 In silvat. — Eur. : Bade.

« *var. tenuiseta* (W. P. Sch.) Besch. in *Ann. sc. nat.* 1893, p. 330.
W. tenuiseta W. P. Sch. in *Savat. M. Japon. n.* 53.
 — As. : Japon.

viridula Roth. — *Fissidens exilis* ?

vulcanica { Brid. — *Angstroemia*.
 C. M. — *Rhabdoweisia*.
 Hook. — *Angstroemia brevipes*.

Wagneri Mitt. — *Hyophila*.

Welwitschii W. P. Sch. — *Campylosteleum strictum*.

Wimmeriana (Sendtn.) Bryol. eur. I (mon. p. 4), t. 20 ; C. M. Syn. I, p. 653 p.p. ; W. P. Sch. op. cit. p. 50.

Gymnostomum Wimmerianum Sendtn. in *Fl.* 1840, I, p. 50 et in *R. Denkschr.* 1841, p. 142.

G. trafoiense W. P. Sch. in sched.

Mollia Wimmeriana Lindb. *M. Scand.* p. 21.

1. In fiss. rup. humo repletis. — Eur. : Alp. Norveg., Sudet., Salisb., Tirol., Rhaet., Helvet., M. Baldo, Gall. centr. (Arvernica), Lusitan.
 Exs. : Rab. Bryoth. eur. n. 453.

Wimmeriana C. M. p. p. — *Hymenostomum murale*.

Wolffi Lesq. et Jam. *Man.* p. 57.

2. Terr. — Am. sept. : Illinois.

zonata Brid. Bryol. univ. I, p. 364 ; C. M. Syn. I, p. 665.

Conostomum variegatum Brid. op. et l. cc.

Ster. — Eur. : German., Pyren. or.

Weisiella C. M. in *Fl.* 1896, p. 446 (sect. DICRANELLAE).

WEISIODON W. P. Sch. *Coroll.* p. 9.

reflexus W. P. Sch. — *Gyroweisia*.

WEISIOPSIS Bryol. eur. I (subgen. WEISIAE, = *Gyroweisia reflexa*).

WEISSIA Ehrh. *Beitr.* 1.

Spec. omn. non indicatae sunt ULOTÆ ejusd. nom.

coarctata Lindb. — U. Ludwigii.

incurva Schwaegr. — *Ptychomitrium*.

Templetoni { Griff. — *Entosthodon Wallichii*.
 Hook. — *Entosthodon*.

ulophylla Ehrh. — U. crispa.

β *intermedia* Braithw. — U. intermedia.

WILDIA C. M. et Broth. in *Oefv. af Finska Vet.-Soc. Foerh.* 1890 (1 spec.).

solmsiellacea C. M. et Broth. in op. et l. cc.

Aulacopilum Wildii Broth. mss.

Syn. Cortic. — Pac. : Austral. or. (Queensland).

WILLIA C. M. Bryol. austr. Georg. p. 35 (1 spec.)

grimmiioides C. M. op. et l. cc.

2. Rupic. — Am. merid. : Austr. Georgia.

WILSONIELLA C. M. in Bot. Centralbl. 1881, n. 37 (5 spec.).

crispidens C. M. in *Dusen M. Camer.* n. 308; *Broth. in Engler's Bot. Jarhb.* 1897, p. 244 (descript.).

1. Terr. ad vias. — Afr. : M. Cameroon.

Jardini (W. P. Sch.) *Besch. Fl. bryol. Taïti, etc.*, p. 54.

Trematodon Jardini W. P. Sch. in *Jardin Enum.* p. 20.

1. Terr. — Pac. : Taïti.

Karsteniana C. M. in *op. et l. cc.*

1. — Pac. : Austral. or.

pellucida C. M. in *op. et l. cc.*

Trichostomum decipiens Mitt. *M. Ind. or.* p. 13.

? *Tr. pellucidum* Wils. in *Kew Journ. bot.* IX, p. 321.

1. — As. : Ceylan, Java.

tonkinensis *Besch. in Journ. de bot.* 1890, p. 201.

Terr. — As. : Tonkin.

ZIERIA W. P. Sch. *Coroll.* p. 68.

Spec. omn. *PLAGIOBRYA* ejusd. nom.

ZYGODON Hook. et Tayl. *Muscol. brit.* p. 70 (107 spec.).

acutifolius C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 58.

Codonoblepharum acutifolium Jaeg. *Ad. I*, p. 397.

2. — As. : M. Neilgherries.

affinis *Bryol. jav. I*, p. 107, t. 85.

2. — As. : Java.

affinis W. P. Sch. — *Z. mexicanus*.

andinus Mitt. *M. austr. am.* p. 236.

— *Am. merid.* : M. Pichincha.

angustatus W. P. Sch. in *C. M. Syn. I*, p. 676.

Syn. — *Am. sept.* : M. Orizaba.

anæctangioides C. M. in *Fl.* 1896, p. 449.

— *Pac.* : Ins. Sandwic.

anomalus Dz. et Mk. in *Ann. sc. nat.* 1884, p. 316 et *M. Archip. ind. IV*, p. 92, t. 31; *Bryol. jav. I*, p. 106; *C. M. Syn. I*, p. 672; *Hook. f. et Wils. Fl. Tasman. II*, p. 185.

Z. Reinwardti Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1859, p. 74; *H. f. et W. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 81 et *Handb.* p. 434.

Syn. — As. : Java. *Pac.* : Tasman.

Araucariae C. M. in *Ule Bryoth. brasil.* n. 22.

— *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

aristatus Lindb. — *Z. Stirtoni*.

asper C. M. in *sched.*

— As. : Himalaya sept. occid.

aureus C. M. in *Fl.* 1875, n. 34 et 35.

2. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

Bolleanus C. M. in *Bot. Zeit.* 1859, p. 230.

2. — Afr. : Ins. Capit. viridis (S. Nicolas).

- borbonicus *Besch. Fl. bryol. Réunion, etc.*, p. 65.
Syn. — *Afr.* : Ins. Borbon.
- brachyodus *C. M. et Hpe. in Linn.* 1856, p. 210.
2. — *Pac.* : Austral. felix.
- Brebissoni* *Bryol. eur.* — *Z. conoideus*.
- breviciliatus *Thun. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 304.
Syn. — *As.* : Ceylan.
- brevicollis *Mitt. M. austr. am.* p. 234.
Codonoblepharum brevicolle *Jaeg. Ad. I*, p. 396.
— *Am. merid.* : And. Quitens.
- brevipes *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 121.
— *Am. merid.* : And. Boliv.
- « *var. longius pedicellatus ej.*
Ut typ.
- brevisetus *Wils. in Kew Journ. bot. IX*, p. 325; *Mitt. M. Ind. or.* p. 47.
2. Cortic. — *As.* : Sikkim.
- Brownii *Schwaegr. Suppl. IV*, p. 317; *C. M. Syn. I*, p. 674; *Hook. f. et Wils. Fl. of the N. Zeal. II*, p. 481 et *Handb.* p. 434.
1 (*C. M.*) ; 2 (*Handb.*). Lignic. et rupic. — *Afr.* : Ins. Kerguelen.
Pac. : Nov. Zeland., Austral. or., Tasman.
- caldensis *Ångstr. in Oefv...* 1876, n. 4, p. 15.
1. Lignic. — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.
- californicus *Hpe.* — *Amphoridium*.
- campylophyllus *C. M. Syn. I*, p. 680.
2. — *Am. sept.* : Mexic.
- ceratodontoides *C. M. in Fl.* 1875, n. 34-35.
1. — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.
- cernuus *C. M. in sched.*
— *Afr.* : C. B. Sp.
- Cesatii* *de Not.* — *Z. Forsteri*.
- circinatus *W. P. Sch. in Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 43.
2. — *Am. sept.* : Mexic. (Cordoba).
- coarctatus *W. P. Sch. in Lechler Pl. Chil. n.* 2697.
— *Am. merid.* : Peruv., Chile.
- compactus *C. M.* — *Anoëctangium*.
- conoideus (*Dicks.*) *Hook. et Tayl. Muscol. brit.* p. 71, t. 21 (*var. α*) ;
W. P. Sch. Syn. I ed. p. 250 et *II ed.* p. 296.
Bryum conoideum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 9, t. 11.
Mnium conoideum Sm. Fl. brit. III, p. 1345.
Z. Brebissoni Bryol. eur. III (mon. p. 8), t. 206.
Z. conoideus α minus Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ.... 1824, p. 132.
2. Cortic. — *Eur.* : Rariss. ; Norveg. occid., Britann., Normann.
- conoideus { *Auct. amer.* — *Z. rufo-tomentosus*.
{ *Brid., C. M.* — *Z. Forsteri*.
α minus H. et Gr. — *Z. conoideus*.
β succulentus eor. — *Z. Forsteri*.

- corralensis* Ltz. in *Bot. Zeit.* 1866, p. 187.
Ceratodon corralense Jaeg. *Ad. I*, p. 309.
 Muric. — *Am. merid.* : Valdivia.
- crenulatus* Mitt. *M. austr. am.* p. 238.
 Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- crispatus* Kindb. — *Amphoridium*.
cyathicarpus Mont. — *Amphoridium*.
- cylindricarpus* C. M. in *Bot. Zeit.* 1853, p. 59.
 1. — *As.* : M. Neilgherr.
- cylindricus* W. P. Sch. in *C. M. Syn. I*, p. 672.
 2. — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).
- dentatus* Breidl. — *Z. viridissimus* var. *dentatus*.
- denticulatus* Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1847, p. 329 ; *C. M. Syn. I*, p. 679 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 232.
 2. — *Am. merid.* : And. Quitens. et Chilens.
- Drummondii* Tayl. in *op. cit.* 1846, p. 46 ; *C. M. Syn. I*, p. 668.
Z. Menziesii (fid. Mitt.).
 2. Cortic. — *Pac.* : Austral. or.
- Duseni* C. M. in *Dusen M. Camer. n.* 277.
 — *Afr.* : M. Cameroon.
- Ehrenbergii* C. M. in *Linn.* 1844, p. 672 et *Syn. I*, p. 676.
 2. — *Am. sept.* : Mexic.
- erosus* Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1886, p. 305.
 Cortic. — *Afr.* : Kilima N'Djaro.
- erythrocarpus* C. M. in *Linn.* 1878-1879, p. 365.
 2. Cortic. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.
- excelsus* C. M. — *Anoëctangium*.
- fasciculatus* Mitt. *M. austr. am.* p. 231.
 2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- Fendleri* C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 484.
 1. — *Am. merid.* : And. Venezuelens.
- ferrugineus* W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1627 ; *C. M. in Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 120.
 — *Am. merid.* : And. Boliv.
- « var. *viridis* C. M. in *op. et l. cc.*
 Ubi typ.
- filiformis* Ltz. *Moost.* p. 162.
 Ster. Rupic. — *Am. merid.* : And. Quitens.
- firmus* C. M. in *Fl.* 1896, p. 450.
 Ster. ? Terr. ? — *Pac.* : Ins. Sandwic.
- Forsteri* (Dicks.) Wils. *Bryol. brit.* p. 194, t. 46 ; W. P. Sch. *Syn. I ed.* p. 250 et *II ed.* p. 298.
Amphidium pulvinatum Nees in *Sturm Deutschl. Fl. crypt. II*, fasc. 17.
Bryum Forsteri Dicks. *Fasc. III Pl. crypt.* p. 4, t. 7, f. 8.
Euzygodon Forsteri Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 192.
Gagea compacta Raddi *Nuov. Race. Dec. II*.
Grimmia Forsteri Sm. *Fl. brit. III*, p. 1196.
Gymnocephalus conoideus Schwaegr. *Suppl. I, II*, p. 87.

Weisia Forsteri Brid. *Bryol. univ.* I, p. 357.

Z. Cesatii de Not. *Cron. d. briol. ital. in comm.* II, p. 204.

Z. conoideus Brid. *op. cit.* p. 590; *Bryol. eur.* III (mon. p. 8), t. 207
C. M. *Syn.* I, p. 667.

Z. conoideus β *succulentus* H. et Grev. in *Brewster Edinb. journ.*.... 1824.

1. Ad arbor. annosior: — *Eur.*: Angl. merid., Gall. occid. et merid.,
vall. Rhen. med., Sardin., Ital.

Exs.: Rab. *Bryoth. eur.* n. 882, 1325.

Glaziovii Hpe. *Symb.* 1874, p. 492.

Syn. — *Am. merid.*: Brasil. austr. or.

Goudotii Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser.*, IV, p. 325.

2. — *Am. merid.*: And. Nov. Granat.

gracilis Wils. *M. brit.* n. 200.

Amphoridium gracile de Not. *Epil.* p. 278.

Didymodon gracilis W. P. Sch. in *Un. crypt. itin.* 1863, n. 16 et 17.

D. subalpinus Card. in *Rev. bryol.* 1887, p. 21 (*fid. Limpr.*).

Leptodontium gracile de Not.

Trichostomum gracile Mdo. *Bayern's Laubm.* p. 79.

Z. Nowellii W. P. Sch. *Syn.* II ed. p. 297; Rab. *Bryoth. eur.* n. 1080,
1254.

Z. viridissimus var. *saxicola* Mdo. *Bav. Schliersee*, p. 96.

2. Ad mur. et rup. calcar. — *Eur.*: Angl. merid., Helvet., Tirol., Alp.
Algov. et Bavar.

« var. *alpina* (W. P. Sch.) Par.

Z. Nowellii var. *alpina* W. P. Sch. *op. et l. cc.*

— *Eur.*: Tirol. merid.

gracilis Jur. p. p. — *Z. viridissimus* var. *dentatus*.

gymnus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 485.

Syn. — *Am. merid.*: Venezuela.

Haleakalae C. M. — *Anoectangium*.

hamatus Mitt. *M. austr. am.* p. 233.

Ster. — *Am. merid.*: And. Quitens.

Hookeri Hpe. in *Linn.* 1859, p. 632.

2. Cortic. — *Pac.*: M. Austral. fel.

Hornschuchianus C. M. — *Anoectangium*.

humilis Thw. et Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1872, p. 304.

2. Cortic. — *As.*: Ceylan.

Hyadesi Besch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* 1885, p. LX et in *Miss. sc. cap*
Horn, V, Bot. p. 273, t. 3, f. 9.

1. — *Am. merid.*: Patag. austr., Fuegia.

hymenodontoides C. M. — *Anoectangium*.

integrifolius C. M. — *Amphoridium*.

intermedius *Bryol. eur.* III (mon. p. 9); C. M. *Syn.* I, p. 671; *Hook. f.*
et *Wils. Fl. of the N. Zeal.* II, p. 80 et *Handb.* p. 434 (1).

2. — *Afr.*: Abyss. *Am. merid.*: Chile (*fid. Handb.*).

Pac.: N. Zeland., Austral. felix, Tasman.

Exs.: W. Sch. *Pl. Abyss.* n. 457.

jamaicense C. M. — *Anoectangium*.

Kilimandscharicus C. M. — Amphoridium.

Krausei Ltz. *Moosst.* p. 163.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Valdivia.

lapponicus Bryol. eur. — Amphoridium.

leptobolax C. M. in *Rehm. M. Afr. austr. n.* 499.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Liebmanni W. P. Sch. in *C. M. Syn. I*, p. 673.

2. Cortic. — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

ligulatus C. M. — Scopelophila.

liliputanus C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 122.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

linearifolius Mitt. *M. austr. am.* p. 236.

Z. papillatus ej. in *Kew Journ. bot.* III, p. 356.

— *Am. merid.* : And. Quitens.

linearis C. M. — Anoetangium Mandoni.

linguiformis C. M. in *Bot. Zeit.* 1858, p. 163.

Codonoblepharum linguiforme Jaeg. *Ad. I*, p. 397.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Columb., And. Nov. Granat., Brasil. austr. or.

Mac-Leanus *Rehm. M. Afr. austr. n.* 501.

— *Afr.* : Transvaal.

Menziezii (Schwaegr.) W. Arn. *Dispos.* p. 15; *C. M. Syn. I*, p. 668.

Codonoblepharum Menziezii Schwaegr. *Suppl. II*, p. 142, t. 137; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 594; *H. f. et W. Fl. Tasm. II*, p. 186 et *Handb. of N. Zeal. Fl.* p. 435.

2. Lignic. et terr. — *Am. merid.* : Chile, ins. Chiloë. *Pac.* : Nov. Zeland., Austral. fel., Tasman.

mexicanus Jaeg. *Ad. I*, p. 390.

Z. affinis W. P. Sch. in *Besch. Prodr. bryol. mexic.* p. 42.

2. — *Am. sept.* : Mexic. (M. Orizaba).

minutus C. M. et Hpe. in *Linn.* 1856, p. 211.

2. — *Pac.* : Austral. felix, Tasman.

Moritzianus C. M. in *Linn.* 1847, p. 199; *Syn. I*, p. 678 et *II*, p. 637.

2. Cortic. — *Am. merid.* : And. Venezuelens.

Mougeotii W. P. Sch. — Amphoridium.

mucronatus Broth. in *Trans. of the N. Zeal. Inst.* 1896, p. 441, t. XXIX, fig. 26.

Syn. Cortic. — *Pac.* : Nov. Zeland.

neglectus C. M. in *sched.*

Codonoblepharum neglectum Jaeg. *Ad. I*, p. 396.

Z. obtusifolius H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. II*, p. 80 et *Handb.* p. 434.

1. — *Pac.* : Nov. Zeland.

nivalis Hpe. in *Ann. sc. nat. V ser., III*, p. 326.

Ster. — *Am. merid.* : Summ. And. Nov. Granat.

Nowellii W. P. Sch. — *Z. gracilis*.

var. *alpina* W. P. Sch. — *Z. gracilis* var. *alpina*.

obtusifolius Hook. *M. ex. t.* 159; *Brid. Bryol. univ. I*, p. 594; *C. M. Syn. I*, p. 670; *Mitt. M. Ind. or.* p. 47.

Codonoblepharum obtusifolium Jaeg. *Ad. I*, p. 397.

1. — *As.* : Nepal., Sikkim.

obtusifolius H. f. et W. — *Z. neglectus*.

ochraceus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 363.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

ovalis Mitt. *M. austr. am.* p. 235.

— *Am. merid.* : M. Chimborazo.

palmarum C. M. in *Linn.* 1880-83, p. 440.

Ster. Cortic. — *Am. merid.* : Uruguay subtropic.

papillatus Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 106 et *Syll.* p. 37; *C. M. Syn. I*, p. 669.

Codonoblepharum papillatum Jaeg. *Ad. I*, p. 396.

2. Cortic. — *Am. merid.* : Chile austr.

papillatus Mitt. — *Z. linearifolius*.

parvulus Geh. et Hpe. *Enum. M. Brasil.* p. 23.

— *Am. merid.* : Brasil.

paucidens C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 220.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

pentastichus (Mont.) C. M. *Syn. I*, p. 675.

Aulacomnium pentastichum Mont. in *Ann. sc. nat.* 1845, p. 103 in Gay *Hist. Chil. Bot. Crypt. t. 5, f. I et Syll.* p. 31.

2. — *Am. merid.* : Chile, ins. Chiloë.

Exs. : Lechler *M. Chil. n.* 528.

perpusillus Thw. et Mitt. — *Hypnodon*.

peruvianus Sull. in *U. St. Expl. Exp.* 1859, p. 6, t. 4; *Mitt. M. austr. am.* p. 233.

Codonoblepharum peruvianum Jaeg. *Ad. I*, p. 396.

— *Am. merid.* : And. Peruv.

pichinchensis (Tayl.) Mitt. in *Kew Journ. bot. III*, p. 356 et *M. austr. am.* p. 237.

? *Didymodon pichinchensis* Tayl. in *Lond. Journ. of bot.* 1848, p. 280; *C. M. Syn. I*, p. 581.

— *Am. merid.* : M. Chimborazo et Pichincha.

pilosulus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 484.

2. — *Am. merid.* : Venezuela.

piriformis W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv. n.* 1628.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Preissianus Hpe. in *Linn* 1859-60, p. 633.

Didymodon papillatus? *Preiss M. Nov. Holl. n.* 2449.

Leptodontium papillatum H. f. et W. *Fl. of the N. Zeal. t.* 85.

Leskea rubricaulis Tayl. *mss.* (fid. Mitt.).

2. — *Pac.* : Australia.

pungens C. M. in *Bot. Zeit.* 1862, p. 361.

Codonoblepharum pungens Jaeg. *Ad. I*, p. 397.

1. Cortic. — *Am. merid.* : Venezuela.

pusillus C. M. — *Anoectangium euchloron*.

pygmaeus C. M. in *Linn.* 1878-79, p. 368.

2. — *Am. merid.* : Argentin. subtropic.

quitensis Mitt. *M. austr. am.* p. 238.

Ster. — *Am. merid.* : And. Quitens.

recurvifolius W. P. Sch. in *Mandon Pl. Boliv.* n. 1629 ; C. M. in *Nuov. Giorn. bot. ital.* 1897, p. 120.

— *Am. merid.* : And. Boliv.

Rehmanni C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 149 et 498.

— *Afr.* : C. B. Sp.

Reinwardti (Hsch.) A. Br. in *Bryol. eur.* IV (mon. p. 9) ; C. M. *Syn.* I, p. 678 ; Dz. et Mk. *M. frond. ined.* *Archip. ind.* p. 94 ; *Bryol. jav.* I, p. 109, t. 87.

Syrrhopodon Reinwardti Hsch. in *Nov. Act. Phys. Medik. Akad. Leop.* XIV, II, p. 700, t. 39 ; *Schwaegr. Suppl.* IV, t. 312.

Syn. vel polyg. Cortic. — *As.* : Ceylan, Java, *Pac.* : Nov. Zeland.

Reinwardti H. f. et W., Mitt. — *Z. anomalus*.

rufo-tomentosus D^{na} E. G. Britton *ined.*

Z. conoideus Auct. *americ.*

2. — *Am. sept.* : Virgin., reg. or.

rugifolius C. M. in *Rehm. M. Afr. austr.* n. 151.

— *Afr.* : C. B. Sp.

runcinatus C. M. *ibid.* n. 150.

— *Afr.* : C. B. Sp.

rupestris Lindb. — *Z. viridissimus* var. *rupestris*.

Schenkei Broth. in *Hedwig.* 1894, p. 129.

2? *Cortic.* — *Am. merid.* : Brasil. austr. or.

Schimperii Hpe. *miss.* ; C. M. in *Linn.* 1844, p. 671 et *Syn.* I, p. 677.

2. — *Afr.* : Abyss.

Schmidii C. M. — *Qreoweisia*.

Schwaegrichenii C. M. in *Linn.* 1844, p. 669 et *Syn.* I, p. 669.

Syrrhopodon dubius *Schwaegr. Suppl.* IV, p. 312.

2. — *Pac.* : Austral.

semi-tortus Mitt. in *Journ. of the Linn. Soc.* 1863, p. 152.

— *Afr.* : M. Cameroon.

Sendtneri (Jur.) Vent. et Bott. *Enum. crit.* p. 26.

Euzygodon Sendtneri Jur. *Laubm. Oesterr. Ung.* p. 191.

1. *Cortic.* — *Eur.* : Istria.

Sendtnerianus C. M. — *Anoectangium*.

setulosus Mitt. *M. austr. am.* p. 237.

— *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

sordidus C. M. in *Bot. Zeit.* 1857, p. 579 ; Mitt. *M. austr. am.* p. 230.

2. *Cortic.* — *Am. merid.* : And. Nov. Granat.

spathulaefolius Besch. *Prodr. bryol. mexic.* p. 43.

2. — *Am. sept.* : Mexic.

squarrosus (Tayl.) C. M. Syn. I, p. 675; Mitt. M. austr. am. p. 237.

Aulacomnium flexifolium H. f. et W. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 448, t. 15.

Leptostomum squarrosum Tayl. in eod. op. p. 43.

— Am. merid. : Summ. M. Pichincha.

stenocarpus Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1847, p. 300; C. M. Syn. I, p. 673; Mitt. op. cit. p. 234.

2. — Am. merid. : And. Quitens.

Stirtoni W. P. Sch. in Trans. of the bot. Soc. of Edinb., IX.

Z. aristatus Lindb. in Act. Soc. sc. Fenn. 1875, p. 542.

2. Ad rup. marit. — Eur. : Scot., Hibern., Angl., Armoric., Norman.

strictissimus C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 144.

— Afr. : C. B. Sp.

strictus Mitt. — Drummondia.

subcyathicarpus C. M. in Rehm. M. Afr. austr. n. 146.

— Afr. : C. B. Sp.

subdenticulatus Hpe. in Ann. sc. nat. V ser., IV, p. 326; Mitt. M. austr. am. p. 232.

Sullivantii C. M. — Amphoridium.

tenellus Mitt. — Anoetangium euchloron.

tenerrimus Kze. — Anoetangium laxifolium.

tetragonostomus A. Br. in Bryol. eur. IV (mon. p. 9); C. M. Syn. I, p. 677 et II, p. 637; Bryol. jav. I, p. 108, t. 86.

1 et syn. — As. : M. Neilgherr., Ceylan, Java.

torquatus { Broth. — Anoetangium.
Liebm. — Grimmia.

transvaaliensis Rehm. M. Afr. austr. n. 500.

— Afr. : Transvaal.

trichomitrius Hook. f. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1846, p. 143, t. 4 B; C. M. Syn. I, p. 677 et II, p. 637.

2? Cortic. — Afr. : C. B. Sp.

tristichus C. M. in Bot. Zeit. 1855, p. 764.

2. Terr. — Afr. : C. B. Sp.

Ews. : Rehm. M. Afr. austr. n. 145.

uncinatus Mitt. M. austr. am. p. 234.

Codonoblepharum uncinatum Jaeg. Ad. I, p. 396.

— Am. merid. : Ins. Chiloë.

ventricosus C. M. in Linn. 1844, p. 668 et Syn. I, p. 674.

Cortic. — Am. merid. : And. Chilens.

viridatus C. M. — Anoetangium.

viridissimus (Dicks.) Brid. Bryol. univ. I, p. 592 (excl. syn. Grimmia Forsteri); Bryol. eur. III (mon. p. 7), t. 206 (excl. syn. Weisia Forsteri); C. M. Syn. I, p. 671.

Amphoridium viridissimum de Not. Epil. p. 274.

Bryum viridissimum Dicks. Fasc. IV Pl. crypt. p. 9, t. 10, f. 8.

Dicranum viridissimum Sm. Musc. brit. III, p. 1224.

Gymnostomum viridissimum H. et T. Musc. brit. p. 10, t. 6 (excl. syn. Grimmia Forsteri); Drumm. M. bor. dm. I ed. n. 27.

2. Cortic., rar. ad rup. calcar. — *Eur.* : Norveg. occid. ; zon. occid. et merid. *As.* : Caucas. *Afr.* : Alger. *Am. sept.* : Sinus Hudson. *Exc.* : Rab. Bryoth. eur. n. 524.

« *var. dentatus* (Breidl.) Limpr. Laubm. Deutschl. II, p. 12.

Z. dentatus Breidl. mss.

Z. gracilis Jur. Laubm. Oesterr. Ung. p. 190 p.p.

Cortic. — *Eur.* : Alp. Salisb., Stir., Algov. et Bavar., Vorarlberg.

« *var. rupestris* (Lindb.) Hartm. Skand. Fl. IX ed. p. 52.

Amphoridium rupestre de Not. Epil. p. 274.

Z. rupestris Lindb. *M. Scand.* p. 29.

Z. viridissimus var. *saxicola* Mdo. in Rab. Bryoth. eur. n. 626.

Ad rup. basalt. et trachyt. — *Eur.* : Suecia, Fennia, Hassia super., Thuring., Rhoengeb., Francon., Tirol., Bavar., Stiria.

var. *saxicola* Mdo } (Bav. Schl.), — *Z. gracilis*.

(Rab. exs.). — *Z. viridissimus* var. *rupestris*.

? *viridissimo affinis* Wils. — *Drummondia stricta*.

Volkensi Broth. in *Engler's Bot. Jahrb.* 1897, p. 241.

Syn. — Afr. : Kilima N'Djaro.

Welwitschii Duby in *Mém.... Genève*, 1871, p. 20, t. I, f. 7 (1).

1. — *Afr.*: Angóla.

ZYGOTRICHIA *Brid. Bryol. univ. I, p. 520.*

cylindrica Tayl. { — *Barbula cylindrica* (fid. W. P. Sch.).
— { *Didymodon flexifolius* (fid. C. M.).

cylindrica Layl. } — { *Didymodon flexifolius* (fid. C. M.).

leucostoma Brid. — *Barbula*.

Zygotrichodon W. P. Sch. *Syn. II ed.*, p. 169 (subgen. TRICHOSTOMI).

(1) In Enum. Kindb. nom. nud. :

Z. tenerrimus C. M. (an *Anoetangium laxifolium*?).

ERRATA

-
- ✓ pp. 743 : *lata* inter : *lapponica* et *latebricola*, p. 744.
- ✓ 745 : loco : *nervosa* Hedw. p.p...., lege : *obscura*.
- ✓ 792 : de : Un. itin. 1864, n. 73 ad : *curviseta* Schwaegr. ad *M. uliginosam* pertinet ; post : Sull. et Lesq. M. bor. am. II ed. n. 248, p. 794 collocandum.
- ✓ 833 : *rhynchomitrium* ante *rhynchophorum*.
- ✓ 870 : **ORTHODON** inter **Orthodicranum** et **ORTHO-DONTIUM**, p. 868.
- ✓ 929 : *stenodictyon* ante : *striata*.
- ✓ 929 : *subcordata* ante : *subcurvula*.
- ✓ 955 : *longissimum* post : *longipilum*.
- ✓ 978 : *catharinelloides* post : *Carionii*, p. 979.
- ✓ 1108 : genus **REMYELLA** ante genus : **RENAULDIA** p. 1067.
- ✓ 1223 : *Whiteleggei* inter : *Wheeleri* et *Wilcoxii*.
- ✓ 1343 : post : afro-cruda (C. M) Par., lege :
Bryum afro-crudum C. M. in Fl. 1890, p. 478.