- I444B
QE
727
.D33
1992

Percy E. Raymond.

Delgado

Ernst Mayr Library
Museum of Comparative Zoology
Harvard University

W. E. Raymond

*Monsieur Percy E. Raymond
hommage de l'auteur*

COMMISSÃO DOS TRABALHOS GEOLOGICOS DE PORTUGAL

J. Delgado

FAUNA SILURICA

DE

PORTUGAL

DESCRIÇÃO DE UMA FÓRMA NOVA DE TRILOBITE

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

POR

J. F. N. DELGADO

DIRECTOR DOS TRABALHOS GEOLOGICOS
SOCIO EFFECTIVO DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

LISBOA

TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS

1892

OUVRAGES PUBLIÉS

PAR LA

COMMISSION DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES DU PORTUGAL

(COMMISSION GÉOLOGIQUE DU PORTUGAL, 1857-1868.—SECTION DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES, 1869-1886)

MÉMOIRES

GÉOLOGIE APPLIQUÉE

Estudos geologicos:—Memoria sobre o abastecimento de Lisboa com aguas de nascente e aguas de rio, por Carlos Ribeiro. 4°, 115 pag. Lisboa, 1867. Epuisé.

Étude géologique du tunnel du Rocio, contribution à la connaissance du sous-sol de Lisbonne, par Paul Choffat. Avec un article paléontologique par M. J. C. Berkeley Cotter et un article zoologique par M. Albert Girard. 4°, 106 pag., 7 pl. Lisbonne, 1889.

FLORE FOSSILE

Flora fossil do terreno carbonifero das visinhanças do Porto, Serra do Bussaco e Moinho d'Ordem proximo a Alcacer do Sal (Flore fossile du terrain carbonifère des environs du Porto, Serra do Bussaco et Moinho d'Ordem près d'Alcacer do Sal), por Bernardino Antonio Gomes. 4°, 44 pag., 6 est. Lisboa, 1865. (Avec traduction française en regard).

Contributions à la Flore fossile du Portugal, par Oswald Heer. 4°, 47 pag., 29 pl. Lisbonne, 1881.

Monographia do genero Dicranophyllum (Systema carbonico), por Wenceslau de Lima. 4°, 14 pag., 3 est. Lisboa, 1888. (Avec traduction en français).

PALÉOZOÏQUE

Terrenos paleozoicos de Portugal:—Sobre a existencia do terreno siluriano no Baixo-Alemtejo (Sur l'existence du terrain silurien dans le Baixo-Alemtejo), por J. F. N. Delgado. 4°, 35 pag., 2 est., 1 carta. Lisboa, 1876. (Avec traduction en français). Epuisé.

Estudo sobre os Bilobites e outros fosseis das quartzites da base do systema silurico de Portugal. (Étude sur les Bilobites et autres fossiles des quartzites de la base du Système silurique du Portugal), por J. F. N. Delgado. 4°, 111 pag., 43 estampas, sendo 3 de formato duplo. Lisboa, 1885. (Avec traduction en français).

—**Supplemento.** (Supplément) por J. F. N. Delgado. 4°, 75 pag., 12 estampas, sendo 2 de maior formato. Lisboa, 1888. (Avec traduction en français).

JURASSIQUE

Étude stratigraphique et paléontologique des terrains jurassiques du Portugal, par Paul Choffat. 1^{ère} liv. Le Lias et le Dogger au nord du Tage. 4°, 72 pag. Lisbonne, 1880.

Description de la Faune jurassique du Portugal. Mollusques Lamellibranches, par Paul Choffat. Deuxième ordre, Asiphonidae. 1^{ère} livraison. 4°, 36 pag., 10 pl. Lisbonne, 1885.—2^e livraison, 40 pag., 10 pl. Lisbonne, 1888.

—**Echinodermes**, par P. de Loriol. 1^{er} fascicule. Echinides réguliers. 4°, 108 pag., 18 pl. Lisbonne, 1890.—2^d fascicule et dernier: Echinides irréguliers, 71, pag., 11 pl. Lisbonne, 1891.

CRÉTACIQUE

Recueil de Monographies stratigraphiques sur le Système crétacique du Portugal, par Paul Choffat. Première étude. Contrées de Cintra, de Bellas et de Lisbonne. 4°, 68 pag., 3 pl. Lisbonne, 1885.

Recueil d'Etudes paléontologiques sur la Faune crétacique du Portugal. Vol. I. Espèces nouvelles ou peu connues, par Paul Choffat. Première série. 4°, 40 pag., 18 pl., dont 2 doubles. Lisbonne, 1886.

FAUNA SILURICA

DE

PORTUGAL

COMMISSÃO DOS TRABALHOS GEOLOGICOS DE PORTUGAL

FAUNA SILURICA

DE

PORTUGAL

DESCRIÇÃO DE UMA FÓRMA NOVA DE TRILOBITE

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

POR

J. F. N. DELGADO

DIRECTOR DOS TRABALHOS GEOLOGICOS
SOCIO EFFECTIVO DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

LISBOA

TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS

1892

TERRENOS PALEOZOICOS DE PORTUGAL

CONTRIBUIÇÕES

PARA O ESTUDO DA FAUNA SILURICA

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI, sp. n.

Generalidades.—A importante ordem dos Trilobites, tão característica dos depositos paleozoicos, sobre tudo da divisão inferior, é representada nas nossas bacias silurianas por numerosissimos individuos, mas pertencentes a um numero de especies relativamente limitado, quando se faz a comparação com as faunas contemporaneas de outros paizes. Algumas d'estas especies são eminentemente características das camadas que as encerram, quer pela sua abundancia, quer porque sómente ahi se encontram. N'este ultimo caso está a especie que vamos descrever, *Lichas Ribeiroi*, que reputamos nova, e sómente foi encontrada em Portugal na bacia siluriana de Vallongo, onde occupa o tecto da assentada de schistos ardosiferos, tendo, como especie local, uma grande importancia, porque caracteriza perfeitamente a zona em que apparece.

A especie mais proxima d'esta, *Lichas Heberti*, com a qual a confundimos ao principio, parece tambem ter tido pouco larga dispersão, porquanto não sabemos que ella tenha sido descoberta n'outras localidades, além das que foram indicadas na França por Marie Rouault, que a descobriu em Vitré (Bretanha oriental)¹, e pelos srs. Tromelin e Lebesconte, que continuaram os estudos d'aquelle zeloso explorador nos terrenos paleozoicos da parte occidental da França, ao todo tres pontos differentes: Monteneuf, Vitré e Angers. A estas localidades temos, porém, agora que accrescentar mais duas portuguezas; Penacova, a NE. de Coimbra, e Vallongo, ao nascente do Porto, onde ella tambem apparece. Encontram-se, com effeito, na bacia siluriana do Bussaco, entre outros exemplares de *Lichas*, um que julgamos dever referir a *L. Heberti*, e que na verdade se distingue de *L. Ribeiroi* pela grandeza relativa e saliencia das differentes partes da glabella, bem como pela granulação que a cobre, que n'aquelle exemplar é

¹ Segundo os srs. Tromelin e Lebesconte os primeiros especimens de *L. Heberti* que se descobriram, foram achados em Monteneuf pelo abbade Danielo; o exemplar que Rouault figurou, proveniente de Vitré, foi achado depois. (*Assoc. franç. avanc. des sciences. Congrès de Nantes, 1875, p. 631*).

formada de tuberculos irregulares, arredondados, mas terminando visivelmente em ponta. Este exemplar, proveniente de Riba de Cima proximo de Penacova, acha-se representado na nossa est. VI, fig. 3. Um outro exemplar muito semelhante a este, mas em que os lobulos lateraes anteriores parecem, comtudo, relativamente um pouco maiores, existe na collecção paleontologica do Museu Nacional junto á Escola Polytechnica, com a indicação pouco precisa de Vallongo, tendo pertencido ás collecções da antiga Commissão Geologica. N'este exemplar são muito evidentes os caracteres da especie descripta por Marie Rouault, a saber: a grandeza relativa e a fórma dos lobulos mediano e anteriores da glabella, e a existencia de uma covinha do lado interior d'estes lobulos, que fórma como uma expansão do sulco lateral a um terço proximamente do seu comprimento contando da extremidade posterior, caracter que, segundo Rouault, a distingue de todas as outras *Lichas* por elle conhecidas.

Na bacia do Bussaco esta especie occupa um horizonte muito proximo d'aquelle em que apparece *L. Ribeiroi* na bacia de Vallongo, e das especies do mesmo genero é a que ali se tem descoberto em nivel mais baixo. As outras especies de *Lichas* occupam todas o tecto do andar da fauna segunda, n'uma camada em que apparecem misturadas as especies d'esta fauna com algumas da fauna terceira, estando d'esta fórma representado no Bussaco, a nosso ver, o phenomeno colonial da Bohemia, posto que sob um aspecto um pouco differente.

Vem a proposito notar que as analogias dos depositos silurianos inferiores do norte de Portugal com os da região occidental da França são estreitissimas, em quanto que os depositos da Bohemia teem em Portugal um representante mais proximo na bacia do Bussaco, onde o maior numero de especies de *Lichas* que se teem descoberto occupam um horizonte mais elevado do que em Vallongo, precisamente o tecto do nosso Silurico inferior, analogamente ao que succede na Bohemia¹, onde ellas tambem occupam de preferencia a divisão d5, a mais superior do andar D.

O typo *Lichas*, bem como *Cheirurus*, *Dionide*, *Acidaspis* e o cirripede *Plumulites*, que o acompanham na mesma camada, tiveram na bacia siluriana de Vallongo uma apparição tardia em relação ao que succede na Bohemia, onde todos estes generos appareceram logo no começo da existencia da fauna segunda, em d1.² Ainda mais: estes generos mostram-se sómente n'aquella camada, com excepção de uma especie de *Lichas*, *L. incola*, que se encontra na camada immediatamente inferior, e que é uma das 4 especies³ que representam este genero na bacia de Vallongo⁴.

Os exemplares do genero *Lichas* são relativamente raros no systema silurico do nosso paiz, como o são aliás geralmente em toda a parte onde estes Trilobites teem sido encontrados. Nas listas dos fosseis silurianos de Portugal, de Sharpe e Salter, publicadas no *Quarterly Journal* da Sociedade geologica de Londres⁵, não vem mencionada nenhuma especie de *Lichas*; todavia possuimos no nosso Silurico inferior pelo menos 7 especies, sendo entre ellas a mais notavel e a melhor representada, *L. Ribeiroi*.

¹ *Système silurien du centre de la Bohême*, vol. I, Suppl., p. 285.

² *Ibid.*, p. 276 e 569.

³ No quadro que vae como appendice no fim d'este trabalho figuram sómente 3 especies de *Lichas*, porque não incluimos n'elle *L. Heberti*, cujo horizonte preciso, como dissemos, nos é desconhecido.

⁴ Veja nota no fim.

⁵ *Quart. Journ. Geol. Soc.*, vol. v, 1849, p. 146; e vol. ix, 1853, p. 141 e 160.

De Hespanha só temos conhecimento da existencia de uma especie, proveniente de Puente de las Ovejas proximo de Ciudad Real, a qual foi descripta sob o nome de *L. Hispanica* por Verneuil e Barrande ¹, que tinham obtido d'ella sómente a cabeça. Esta especie pertence ao Silurico inferior, e tem na verdade bastante semelhança com *L. Heberti*, ao ponto que os srs. Tromelin e Lebesconte admittem a possibilidade de que sejam identicas ², opinião com a qual todavia não podemos concordar.

Conforme se vê pelas nossas estampas, *L. Ribeiroi* era uma especie gigantesca, e certamente é um dos maiores Trilobites conhecidos. Os srs. Tromelin e Lebesconte (*l. c.*) dizem que Bayan, estudando uma cabeça de *L. Heberti* colligida nas ardosieiras de Angers, julgou que o individuo a que ella pertencia devia ter 70 a 80 centimetros de comprimento; porém Marie Rouault attribue a esta especie muito menores dimensões, sómente 40 centimetros de comprimento. Sendo certo que a nossa especie attingia dimensões extraordinarias, não julgamos entretanto que nenhum dos exemplares portuguezes medisse aquelle comprimento.

Os materiaes até agora colligidos para o conhecimento de *L. Heberti* são, ao que nos parece, bastante incompletos, e não conhecemos d'esta especie nenhuma figura senão a que, ha já 43 annos, Marie Rouault deu de uma glabella imperfeita e um tanto deformada, que vem figurada no *Boletim da Sociedade Geologica de França* ³. Rouault, apresentando esta figura, diz que, na mesma localidade em que encontrou a glabella, achou tambem uma porção consideravel do corpo do mesmo Trilobite, no qual reconheceu caracteres particulares, que o distinguiram essencialmente de todos os seus congenes, não só pelo que respeita á cabeça, como tambem ao pygidio, em que observara caracteres não menos importantes; todavia o mais notavel dos caracteres que se observam na especie portugueza—o extenso prolongamento caudal do pygidio—não foi observado pelo geologo de Rennes, e cremos que o não tem sido até agora por nenhum paleontologo em qualquer especie de *Lichas*, pois que não figura na caracteristica d'este genero, nem de nenhum dos subgeneros em que elle se divide, no grande *Tratado de paleontologia* do dr. Zittel. Este caracter é, na verdade, tão extraordinario, que o sabio conservador da secção de geologia e paleontologia do Museu de historia natural de South Kensington, o sr. Henry Woodward, cuja superior auctoridade na materia é bem notoria, examinando uma photographia do exemplar representado na nossa est. III, que eu lhe apresentara juntamente com as photographias da cabeça e de outras partes do Trilobite, ao principio duvidou de que aquelle exemplar pertencesse ao genero *Lichas*, e emittiu a opinião que provavelmente representaria um individuo do genero *Eurypterus*. Só depois que n'uma colheita posterior obtivemos o exemplar representado na est. IV, fig. 1, e que o illustre paleontologo observou esta estampa, é que reconheceu que todos os fragmentos pertenciam effectivamente á mesma especie. N'uma carta que o sr. Woodward teve a bondade de escrever-me, e pela qual folgo de poder reiterar-lhe aqui os meus agradecimentos, expressou esta opinião nos seguintes termos: «...é na verdade déveras notavel, mas não pode duvidar-se do facto, a julgar pelas vossas bellas estampas, que a comprida ponta estava com effeito fixa ao pygidio de *Lichas*».

Quanto á duvida que ainda então se me offerecia, se realmente pertenciam ao genero

¹ Bull. Soc. Géol. de France, 2^e série, t. XII, 1855, p. 977.

² Assoc. franç. avanc. des sciences. Congrès de Nantes, 1875, p. 631.

³ Bull. Soc. Géol. de France, 2^e série, t. VI, 1849, p. 378.

Lichas, ou a um genero novo todos estes restos, o eximio naturalista respondeu-me affirmativamente, citando varias especies figuradas por Angelin, cujo pygidio, quebrado na parte posterior, poderia ter tido um prolongamento do eixo, como a nossa especie ¹.

Além do solido apoio que para a solução d'esta duvida me offerecia tão respeitavel auctoridade, eu não hesito agora em referir ao genero *Lichas* os nossos exemplares, depois que tive a fortuna de descobrir na mesma pedreira d'onde elles proveem, um hypostoma (est. VI, fig. 4), que não pode deixar de pertencer á mesma especie, e que tem as mais decididas analogias com o hypostoma de *L. avus*, Barr.

Barrande, fazendo a classificação das *Lichas* de que se conhecia a pleura thoracica quando publicou o primeiro volume do seu *Systema siluriano* ², distribue-as em dois grupos, no primeiro dos quaes reúne as especies cuja pleura é dividida em duas faixas achatadas, e no segundo aquellas em que a faixa posterior da pleura é saliente; mas não allude a nenhuma especie que tenha appendice caudal. Subdivide ainda as do primeiro grupo em duas secções, segundo o pygidio é ou não chanfrado em frente do eixo. Na Bohemia existem como representantes do primeiro grupo, *L. scabra*, *L. avus* e *L. incola*, que todas pertencem á primeira subdivisão. Da segunda subdivisão Barrande cita sómente duas especies, *L. laciniata*, Wahl. e *L. Trentonensis*, Conr., ás quaes talvez deva juntar-se tambem *L. validus*, Linsn., ³ mas nenhuma d'ellas tem a mais remota semelhança com a nossa.

O pygidio representado por Brongniart sob o nome de *Paradoxides laciniatus* ⁴, e que foi copiado de Wahlenberg, é o que representa esta especie de *Lichas*, e tem o bordo inteiro, sem nenhum indicio de ponta caudal. A cabeça que lhe está associada, e que foi referida por Wahlenberg á mesma especie, porque «constantemente a viu junta com o pygidio no mesmo lugar e na mesma rocha, não porque tivesse visto nenhum exemplar completo», evidentemente não pertence ao genero *Lichas*; será talvez antes de *Cheirurus*.

Dalman, representando um pygidio um tanto semelhante ao precedente, sob o nome de *Asaphus laciniatus* ⁵ tambem lhe dá o bordo inteiro.

Do mesmo modo *L. Trentonensis*, que é figurado e descripto pelo professor James Hall sob o nome de *Platynotus trentonensis* ⁶, não tem prolongamento caudal, sendo para notar-se que os exemplares figurados por J. Hall são os mesmos sobre que fundou Conrad esta especie.

Admittindo, pois, que os nossos exemplares pertençam ao genero *Lichas*, restaria saber se devem formar um subgenero á parte as especies que teem um prolongamento caudal, ou se não haverá motivo para esta distincção, pois que no genero *Dalmanites*, por exemplo, umas especies teem o contorno do pygidio arredondado, e outras teem o eixo prolongado posteriormente n'uma ponta mais ou menos comprida.

Para decidir este ponto importante devemos antes de tudo observar que o prolonga-

¹ Das especies citadas pelo sr. Woodward: *Lichas laticeps*, *L. latifons* e *Platymetopus planifrons*, a ultima é a que me parece offerecer maior probabilidade de ter tido prolongamento caudal.

² *Système silurien du centre de la Bohême*. Vol. I. Trilobites. 1852, p. 595.

³ O pygidio representado por Linnarson (*Om Vestergötlands cambriska och siluriska Aflagringar*. Tafl. I, fig. 20. —Kongl. Svenska Vetenskaps-akademiens Handlingar. Bandet 8. N.º 2. Stockholm, 1869) não está completo; todavia, pela impressão da dobra do limbo, parece que não havia nenhuma interrupção em frente do eixo.

⁴ *Crustacés fossiles*, p. 35, pl. III, fig. 3.

⁵ *Palaeaden*, p. 53, Tab. VI, fig. 4.

⁶ *Paleont. of New-York*, vol. I, p. 235, pl. 64, fig. 4.

imento que mostram os nossos exemplares, conforme se vê na est. III, não representa propriamente um appendice, mas accusa uma modificação profunda na conformação do pygidio, produzida, para assim dizer, pelo enrolamento da crusta n'um tubo comprido. A existencia de um tal prolongamento, importando necessariamente uma modificação correspondente na forma d'esta parte do corpo do animal, parece-me ser de tanta importancia, pelo menos, como as modificações dos sulcos ou da forma e relevo dos lobulos da glabella, sobre as quaes principalmente se funda a distincção dos subgeneros *Platymetopus* Ang., *Hoplolichas* Dames, e *Conolichas* Dames¹. Admittindo-se, em vista d'estas considerações, para os nossos exemplares a criação de mais um subgenero de *Lichas*, proporiamos para elle o nome «*Uralichas*», para indicar a existencia do grande prolongamento caudal, que possui, e que forma o seu caracter mais saliente.

Os exemplares que representamos nas estampas I a V, e na est. VI, figs. 1 e 4, foram todos obtidos na mesma pedreira, a 1400 metros a S. 51° E. da egreja de Covelo, ou 12,5 kilometros a E.S.E. do Porto. A camada d'onde foram extrahidos representa, como já dissemos, o horizonte fossilifero superior da fauna segunda n'esta região.

Na mesma camada, em dois pontos mais para o norte, na vertente occidental da serra de Santa Justa, encontrou-se, juntamente com *L. Ribeiroi*, mais outra especie de *Lichas*, que se approxima de *L. incola* Barr., e que é representada sómente por duas glabellas soltas e imperfeitas. Aguardamos por materiaes mais completos para fazer a descripção d'esta especie e das outras do mesmo genero, que se encontram nos nossos depositos silurianos.

Descripção da especie.—A cabeça de *L. Ribeiroi* é representada nas nossas estampas por dois exemplares; possuimos mais alguns menos perfeitos, que julgámos inutil figurar. Na est. I vê-se a impressão externa de uma cabeça muito achatada pela compressão, cujo molde estava menos bem conservado para reproduzir os caracteres da superficie. Pelo contrario, na est. V, fig. 1, temos a representação do molde interno de uma glabella pouco deformada. O hypostoma está representado por dois exemplares de localidades differentes na est. VI. O pygidio, varias partes do thorax e o prolongamento caudal estão representados nas outras estampas. O estudo comparativo d'estes exemplares e dos outros que possuimos, leva-nos a reunir os caracteres da especie da seguinte forma.

A cabeça era mediocrementemente abobadada. O seu contorno exterior, subparabolico, era formado por um limbo muito estreito, separado da superficie cephalica por uma ranhura tambem estreita e funda. O contorno interior era quasi rectilineo, porem um pouco concavo na parte central correspondente ao eixo do thorax, e nas extremidades encurvava-se para diante na parte correspondente á face movel. Resulta d'esta disposição aquelle aspecto particular que Barrande notou em varias especies de *Lichas*, cuja cabeça apresenta uma curvatura convexa para o thorax, em vez da disposição contraria, que é a mais commum nos Trilobites.

A superficie da cabeça é dividida por meio de ranhuras n'um certo numero de compartimentos, que correspondem á lobação ordinaria dos outros generos de Trilobites. N'esta especie, como em *L. Hispanica*, á qual ella bastante se assemelha, a lobação da glabella comprehende todos os lobulos e sulcos, o que não succede em todas as *Lichas*, como é sabido.

¹ Zittel. *Traité de paléontologie* traduit par Ch. Barrois. Tome II, p. 619.
MAI, 1892

O corpo mediano ou lobulo frontal da glabella estende-se até ao sulco occipital, tendo na parte anterior largura tripla da que tem a dois terços do seu comprimento entre as extremidades posteriores dos lobulos lateraes anteriores, e alarga-se outra vez a traz d'estes lobulos avizinhando do sulco occipital.

O lobulo frontal domina pelo seu relevo todas as outras partes da cabeça, mas não era extremamente elevado; pelo contrario, desce suavemente para os lados e para o sulco occipital, e um pouco mais fortemente para a frente. O seu ponto culminante devia de corresponder ao perfil transversal que corta perpendicularmente a cabeça passando pelas extremidades anteriores dos sulcos lateraes anteriores. Estes sulcos, começando no ponto onde os sulcos dorsaes encontram a ranhura do limbo, são muito largos e fundos, e encurvam-se para o eixo, voltando para elle a convexidade, e vão reunir-se posteriormente com os sulcos medios, os quaes, seguindo um curso inverso, e sendo tambem muito pronunciados, limitam com aquelles os lobulos lateraes anteriores, que teem a forma oval alongada e se dirigem obliquamente para o eixo do corpo. Estes lobulos apresentam do lado interno, proximamente a um terço do comprimento dos sulcos lateraes a contar da sua extremidade anterior, uma depressão analogá á que tem *L. Heberti*, mas n'outra posição.

Os lobulos posteriores, comprehendidos entre os sulcos lateraes posteriores e o sulco occipital, teem tambem a forma oval, mas ponteaguda nas extremidades, e são dispostos quasi perpendicularmente ao eixo, inclinando mesmo um pouco para diante. A sua superficie não chega a um terço da dos lobulos anteriores.

Os lobulos medios, com menor relevo, mas occupando maior superficie do que os lobulos posteriores, são definidos por um espaço subquadrangular entre os lobulos anteriores e os posteriores, e limitados interiormente por uma depressão pouco apparente, que une a extremidade posterior dos lobulos anteriores com a extremidade interior dos lobulos posteriores, correndo parallelamente ao eixo.

Os sulcos dorsaes não são igualmente pronunciados em toda a sua extensão. Muito profundos na parte correspondente aos lobulos anteriores e aos posteriores, que em parte limitam, são menos fundamente impressos na porção intermedia, e desenhám no seu trajecto uma curva, cuja concavidade é voltada para fóra.

A face fixa tem uma superficie muito pequena em relação á grandeza da cabeça, mas é-nos muito imperfeitamente conhecida. Da face movel temos tambem um conhecimento muito incompleto; todavia vê-se na est. I e est. VI, fig. 1, que ella era pequena e armada, como em todas as *Lichas*, de uma ponta genal, que é o prolongamento do limbo frontal. Em virtude da posição muita avançada d'esta ponta, que era fronteira ao olho, reconhece-se que n'este particular *L. Ribeiroi* se assemelha muito a *L. Haueri* Barr.

Dos olhos não temos nenhum conhecimento; sabemos sómente pela est. I e est. VI, fig. 1, qual a posição e grandeza do lobulo palpebral, que era coberto por uma granulação irregular como toda a glabella, da qual era separado por um sulco occupando o diametro do semicirculo que elle forma.

O sulco occipital, muito largo e perpendicular ao eixo na sua parte mediana, estreita-se dos dois lados, e inflecte-se um pouco para traz, formando duas curvaturas nas quaes estão alojados os lobulos posteriores. D'esta disposição resulta que o anel occipital é muito mais largo na parte central, correspondente ao eixo do thorax, do que nas partes lateraes contiguas áquelles

lobulos. Como em *L. Hispanica*, o anel occipital tem sobre o eixo um pequeno tuberculo, que está situado a um terço da sua largura a contar do bordo posterior.

O hypostoma, do qual possuímos dois exemplares colligidos em sitios differentes (est. VI, figs. 2, 2a e 4, 4a), tem a forma subpentagonal. O corpo central fracamente abobadado nos dois sentidos, occupa proxivamente dois terços do comprimento total, e é limitado posteriormente por um sulco transversal perpendicular ao eixo, mais largo no meio e estreitando para os lados, com a superficie irregularmente franzida, como é tambem a dos sulcos da glabella. É dividido em duas partes muito desiguaes por um par de impressões musculares, os sulcos medios, que se dirigem obliquamente para o eixo de figura, extendendo-se desde o sulco lateral até quasi o sulco transversal de que fallámos. A parte anterior do corpo, ou lobulo anterior, que resulta d'este estrangulamento, é oval, com o eixo maior da figura no sentido do comprimento do corpo. O lobulo posterior, muito menos desenvolvido, forma uma faixa transversa, estreita na parte central, e expandindo-se dos dois lados para diante, mas terminando em ponta. Os sulcos medios, que são estreitos e profundos a partir do sulco lateral, tornam-se menos fundos e alargam em forma de pera na sua extremidade interna, ficando ambos distanciados entre si apenas um quarto da largura do corpo. A borda buccal, ou posterior, é muito larga e bifurcada com entalho profundo, como succede em *L. avus* Barr., ou ainda melhor no genero *Asaphus*. O contorno anterior é provido de um limbo muito estreito; pelo contrario as azas são bem desenvolvidas. Estas teem a forma triangular e correspondem ao meio do comprimento do lobulo anterior, formando um subito alargamento da borda frontal, que é, como dissemos, muito estreita. A granulação que cobre esta peça é mais fina e menos irregular do que a da superficie da cabeça.

Desconhecemos o numero dos segmentos do thorax. Nas est. IV, fig. 2, e V, fig. 2, representamos os melhores exemplares, quasi os unicos, que possuímos. Vê-se n'elles que o eixo tinha pouco relevo e occupava proxivamente um terço da largura do Trilobite. Na segunda figura citada as pleuras apresentam maior comprimento do que era realmente a largura do Trilobite, porque estão desdobradas no mesmo plano a sua parte interna e a externa.

As pleuras, recurvadas para traz e terminando em forma de foice, são divididas longitudinalmente em duas faixas desiguaes — a anterior maior do que a posterior, ambas achata-das e de igual relevo — por um sulco estreito e fundo, que se estende desde o sulco dorsal quasi até á sua extremidade. Os anneis, ligeiramente concavos para diante, são separados por meio de ranhuras relativamente estreitas. Os sulcos dorsaes tambem são estreitos, mas muito distinctos.

O pygidio tem a forma triangular muito alongada, e acompanha no seu relevo o thorax. As estampas II e IV, fig. 1, representam respectivamente o molde e a impressão do mesmo exemplar em grandeza natural e na escala de dois terços.

O eixo tinha maior relevo do que os lobulos lateraes, e occupa um terço da largura total na sua parte anterior. N'esta parte distinguem-se claramente tres anneis; mas parece que havia outros anneis incipientes, que não chegaram a desenvolver-se. Aquelles tres anneis occupam muito menos de metade do comprimento do eixo até ao contorno do pygidio. O eixo diminue gradualmente de largura e é limitado distinctamente pelos sulcos dorsaes, que são bem pronunciados até á origem do prolongamento caudal, que é a continuação do eixo. Proximo da sua extremidade posterior os sulcos dorsaes convergem um pouco, um para o outro, diminuindo n'essa parte ainda mais a largura do eixo (est. II).

Cada lobulo lateral compõe-se de tres pleuras, mas sómente nas duas primeiras se distinguem os elementos que as compõem: cada uma d'estas é dividida por um sulco em duas faixas desiguaes, e termina em ponta muito saliente no contorno. A extensão da superficie, e a forma de cada uma das pleuras é muito differente. A anterior tem a forma trapezoidal; as duas outras são triangulares, mas muito differentes entre si. Na est. III, fig. 1, vê-se a impressão da dobra da crusta, que é coberta de estrias subparallelas, parabolicas.

As figs. 1 e 2 da est. III representam o prolongamento caudal proximamente completo, vendo-se na fig. 1 a impressão de parte da sua face inferior, que era plana, e na fig. 2 a impressão de parte da sua face superior, que era pelo contrario fortemente abaulada, d'onde resulta que a secção transversal era plano-convexa. Na parte posterior o exemplar soffreu um esmagamento, que visivelmente o deformou; mas pela impressão que se observa na parte inferior da fig. 2, vê-se que a sua terminação posterior não era em ponta aguda, e alem d'isso, que um sulco longitudinal muito estreito, prolongando-se em toda a sua extensão, o dividia na extremidade posterior em duas pontas muito curtas e rombas. Dir-se-hia que este prolongamento caudal provém da junção, pelo seu bordo exterior, das duas pleuras posteriores do pygidio, extremamente alongadas e dobrando-se cada uma sobre si para o lado de baixo, pois que a ornamentação que este prolongamento apresenta é a mesma nas superficies superior e inferior, e igual á da superficie do pygidio; vindo assim o prolongamento caudal a representar o ultimo segmento post-abdominal, correspondendo ao telson dos Eurypterideos fundido com o penultimo segmento, ao qual pelo modo de terminação elle antes se assemelha. A especie fica, em todo o caso, comprehendida na secção das *Lichas* do primeiro grupo, que teem uma chanfradura no prolongamento do eixo; porem o subgenero *Uralichas* deve, em nosso entender, representar um typo superior de Trilobites, que de certo modo fórma um dos elos de ligação entre esta ordem de crustaceos e o grupo immediatamente superior dos *Merostomas*.

A crusta foi destruida em todos os exemplares e quasi não restam d'ella vestigios; porem os moldes e impressões mostram bem a sua ornamentação, que consistia n'uma granulação muito irregular, e ordinariamente muito junta, formada de tuberculos desiguaes, arredondados, mas tendendo, ao que parece, a elevar-se em ponta. Muitos d'estes tuberculos attingem 1 millimetro de diametro.

A granulação abrange toda a superficie do Trilobite á excepção do fundo dos sulcos, e era muito forte e muito cerrada, sobretudo na glabella, cuja superficie cobria totalmente, tocando-se quasi os tuberculos sem deixarem intervallos lisos entre si. Já dissemos que, na superficie do hypostoma, a granulação era, pelo contrario, mais fina e menos irregular.

Dimensões.—Não é facil determinar as dimensões d'esta especie, com os exemplares incompletos, e todos mais ou menos deformados, que possuímos. Se, tendo em attenção a grandeza dos diversos fragmentos, buscamos uma comparação nas dimensões relativas de *L. avus*, á qual *L. Ribeiroi* se approxima pela configuração do hypostoma e por outros caracteres, diremos que os nossos exemplares não tinham menos de 385 millimetros de comprimento, excluindo o prolongamento caudal, que só por si mede, como mostra a est. III, 175 millimetros, o que elevaria a 560 millimetros o comprimento total do Trilobite. Esta dimensão não deve considerar-se exagerada, porque só o pygidio, aliás incompleto, representado na est. IV, fig. 1, mede 300 millimetros de comprimento. As dimensões que indicámos excedem muito as de to-

das as *Lichas* descriptas, mas estão ainda muito longe das dimensões que o sr. Bayan attribuiu a *L. Heberti*.

Analogias e diferenças.—Pelas suas enormes proporções e especiaes caracteres, *L. Ribeiroi* differença-se facilmente de todas as outras especies congeneres. O exame de glabellas isoladas, deformadas como ellas quasi sempre se apresentam, poderia comtudo n'alguns casos suggerir duvidas; por isso chamaremos a attenção sobre os seus caracteres distinctivos.

De todas as especies de *Lichas* é certamente de *L. Heberti* que a nossa especie mais se approxima. Segundo a descripção dada por Marie Rouault reconhece-se, comtudo, que existem differenças notaveis que separam estas duas especies uma da outra, principalmente a grandeza e a forma do corpo mediano da glabella, que em *L. Heberti* é relativamente maior e muito mais saliente, tendo alem d'isso na parte anterior uma largura quintupla da que tem entre as extremidades posteriores dos lobulos lateraes anteriores; deve notar-se, alem disso, a differença dos ornatos da crusta, que em *L. Heberti*, a julgar pelos dois exemplares portuguezes, é formada de tuberculos menos numerosos, mais agudos e separados por maiores intervallos de superficie lisa. Como caracter menos importante, podemos notar a posição differente da covinha na parte interna dos lobulos anteriores, a qual é situada a um terço proximamente do comprimento d'estes lobulos, mas a contar da sua extremidade posterior. Porventura haverá differenças essenciaes na conformação do pygidio, mas sobre este ponto a descripção de *L. Heberti* dada por Marie Rouault nada deixa entrever.

Quanto a *L. Hispanica* tambem estreitas analogias a ligam com *L. Ribeiroi*: o mesmo systema de lobação completa da glabella; as dimensões relativas e a posição dos differentes lobulos; a forma do annel occipital, e porventura ainda outros caracteres não descriptos, porque de *L. Hispanica* apenas se conhece a cabeça, tornam as duas especies affins; todavia, alem da enorme differença de dimensões, *L. Ribeiroi* distingue-se da sua congenera, porque não apresenta, como esta, a grande saliencia do corpo mediano da glabella, que, segundo a descripção dada por Verneuil e Barrande, forma n'ella quasi como um hemispherio ligando-se atraz a uma parte baixa; porque não existe n'ella a forte depressão que atravessa n'esta parte o lobulo mediano, unindo pelas extremidades posteriores os lobulos anteriores da glabella, e limitando uma faixa transversa que figura um segundo annel occipital; emfim porque a granulação não é formada de tuberculos agudos, como em *L. Hispanica*.

Jazigo e localidades.—Dissemos já que esta especie só tem sido encontrada na bacia siluriana de Vallongo, onde occupa o tecto da assentada de schistos ardosiferos, isto é, a camada mais superior que ali encerra a fauna segunda; e obtivemo-la unicamente em duas localidades: 1400 metros a S. 51° E. da igreja de Covelo, a uns 12,5 kilometros de distancia do Porto na vertente direita do Douro, e 1000 metros ao S. da ermida de Santa Justa, na encosta occidental da serra d'este nome, nas vizinhanças de Vallongo.

NOTA COMPLEMENTAR

A lista das especies, que até ao presente temos apurado nos tres horizontes fossilife-
ros da assentada de schistos ardosiferos de Vallongo, é a seguinte, designando respectivamente
pelas letras **A**, **B**, **C** estes horizontes, começando pelo mais inferior.

	A	B	C		A	B	C
<i>Lichas Ribeiroi</i> , Delgado.....	..	..	+	<i>Bellerophon Duriensis</i> , Sh. (an <i>B. bilobatus</i> , var.)	..	+	+
» <i>incola</i> , Barr.....	..	+		» <i>aff. carinatus</i> , Sow.....	..	+	
» <i>aff. incola</i> , Barr. (an <i>sp. n.</i>)	..	..	+	<i>Ribeiria sp.</i>	..	..	+
<i>Acidaspis Buchi</i> , Barr.....	..	..	+	<i>Orthonota britannica</i> , Rou. (<i>Sanguinolites Pelli-</i> <i>coi</i> , Vern. e Barr.)	+	+	
<i>Placoparia Tourneminei</i> , Rou.....	+	+	+	<i>Dolabra Lusitanica</i> , Sh.....	..	+	
<i>Cheirurus cfr. clariger</i> , Beyr.....	..	..	+	<i>Redonia Deshayesiana</i> , Rou.	..	+	+
» (<i>Actinopeltis</i>) <i>octolobatus</i> , M ^c Coy	..	..	+	» <i>Duvaliana</i> , Rou.....	..	+	+
<i>Dalmanites socialis</i> , Barr.....	+	+		» <i>Bohemica</i> , Barr.	..	?	+
» » var. <i>proaeva</i>	+	+		<i>Nucula aff. amica</i> , Barr.....	..	+	
» <i>Vetillarti</i> , Rou.....	+	+	+	<i>Ctenodonta Ciaae</i> , Sh. (<i>Leda Bohemica</i> , Barr.)..	..	+	+
» » var. <i>caudata</i> (<i>D. macro-</i> <i>phthalma</i> , Brongn.)....	..	..	+	» <i>cfr. Costae</i> , Sh.	..	..	+
» <i>Torrubiae</i> , Vern. e Barr.....	..	..	+	» <i>aff. erratica</i> , Trom.....	..	..	+
» <i>Downingiae</i> , Murch	..	..	+	» <i>aff. compar</i> , Barr.	..	..	+
<i>Iliaenus giganteus</i> , Burm. (<i>I. Lusitanicus</i> , Sh) ..	+	+	+	<i>Tellinomya sp.</i> (<i>aff. T. elliptica</i> , Hall.)	..	+	
» » var. <i>larga</i> (<i>I. Hispanicus</i> , Vern. e Barr.).....	..	..	+	<i>Arca Naranjoana</i> , Vern. e Barr.....	..	..	+
» <i>Wahlenbergianus</i> , Barr.	..	..	+	<i>Modiolopsis aff. elegantulus</i> , Sh.....	..	..	+
» <i>Beaumonti</i> , Rou.	..	..	+	<i>Strophomena cfr. comitans</i> , Barr.....	..	..	+
<i>Asaphus nobilis</i> , Barr.....	+	+	+	» <i>cfr. spiriferoides</i> , M ^c Coy.....	..	+	
» <i>glabratus</i> , Salt.	+	?	+	» <i>cfr. Phillipsi</i> , Barr.....	..	..	+
» <i>Guettardi</i> , Brongn.	?	+	+	<i>Orthis noctilio</i> , Sh.	+	+	+
» <i>contractus</i> , Vern. e Barr.	..	+	+	» <i>Lusitanica</i> , Sh.	+	+	+
» <i>Delessei</i> , Duf.	+	+		» <i>Miniensis</i> , Sh.	+	?	
» <i>cfr. Cianus</i> , Vern. e Barr.	..	+		» <i>Duriensis</i> , Sh.	+	+	
» <i>aff. glabratus</i> , var. <i>gigantea</i> (an <i>sp. n.</i>) ..	..	..	+	» <i>redux</i> , Barr.	..	?	+
<i>Ogygia Desmaresti</i> , Brongn.....	..	+		» <i>testudinaria</i> , Vern. e Barr.....	..	..	+
» <i>aff. desiderata</i> , Barr. (<i>Isotelus Powisii</i> , Portl? in Sh.)	..	..	+	» <i>filiceraei</i> , Rou.	..	..	+
<i>Calymene Tristani</i> , Brongn.....	+	+	+	» <i>cfr. patera</i> , Salt.	..	+	+
» <i>Salteri</i> , Rou.....	+	+	+	» <i>cfr. pulvinata</i> , Salt.	..	+	
» <i>pulchra</i> , Barr.	..	+	+	» <i>cfr. protensa</i> , Sow. (an <i>O. testudinaria</i> , Dalm.)	+		
» <i>Aragoi?</i> Rou.....	..	+		» <i>cfr. testudinaria</i> , Dalm.	..	..	+
<i>Dionide formosa</i> , Barr.....	..	..	+	» <i>vespertilio</i> , juv.? Sow.....	..	+	
<i>Plumulites aff. regius</i> , Barr.....	..	..	+	» <i>aff. calligramma</i> , Dalm.	+	..	+
<i>Orthoceras vagans</i> , Salt.....	..	+	+	» <i>aff. Ribeiroi</i> , Sh. (an <i>O. Noctilio</i> , var.) ..	+	+	
» <i>Hisingeri</i> , Rou.....	..	+	+	<i>Lingula Lesueuri</i> , Rou.....	..	+	
» <i>aff. lineatum</i> , His.	..	+	+	» <i>aff. transiens</i> , Barr.....	..	..	+
<i>Endoceras Dalimieri</i> , Barr. (<i>O. duplex</i> , Wahl.) ..	..	+	+	<i>Calix Murchisoni</i> , (Vern. e Barr.).....	+	+	
» <i>cfr. vaginatus</i> , Schloth.....	..	+		<i>Tetragraptus Halli</i> , Hopk.?	+		
<i>Hyalithes cfr. elegans</i> , Barr.....	..	..	+	<i>Didymograptus Murchisoni</i> , Böeck.	+		
» <i>cfr. undulatus</i> , Barr.....	..	+		» <i>pennatululus</i> , Hall.....	+		
<i>Bellerophon bilobatus</i> , Sow.....	+	+	+	<i>Graptolites ind.</i> , 2 ou 3 sp.....	+		

EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

Todos os exemplares figurados pertencem ás collecções da Comissão dos trabalhos geologicos de Portugal. Com excepção da estampa IV, cuja escala é de $\frac{2}{3}$, as figuras de todas as outras estampas são no tamanho natural dos objectos que representam.

ESTAMPA I

Impressão externa de uma cabeça muito achatada e esmagada pela compressão. Uma das faces moveis separou-se da cabeça e a sua impressão mostra-se do lado direito da figura.

ESTAMPA II

Molde de um pygidio incompleto. Nota-se n'este exemplar o maior estreitamento do eixo na sua parte posterior, e o começo do sulco longitudinal n'essa parte e prolongando-se para traz. (Comp. est. IV, fig. 1).

ESTAMPA III

Molde e impressão do prolongamento caudal. Na parte superior da fig. 1 vê-se a impressão da face inferior d'este prolongamento na sua ligação com o pygidio, junta á impressão da dobra da crusta, e na parte inferior uma porção do molde, que foi esmagado pela compressão.

Na fig. 2 tem-se, pelo contrario, o molde d'este prolongamento na sua ligação com a parte posterior do pygidio, e a impressão da metade posterior do mesmo prolongamento, mostrando mais claramente do que na fig. 1, o sulco longitudinal, e a terminação em duas pontas curtas e rombas.

Em ambos os exemplares se vê que a secção transversal do prolongamento caudal era plano-convexa, correspondendo a face plana á sua superficie inferior, e a convexa á superior, que era muito abaulada.

ESTAMPA IV

Fig. 1. Impressão da face superior de um pygidio com o prolongamento caudal quasi completo. Como os outros exemplares, este está tambem um pouco esmagado, mas deixa perceber a existencia do sulco longitudinal em toda a extensão d'este prolongamento, começando na parte posterior do eixo, onde elle estreita mais.

Fig. 2. Impressão de tres anneis incompletos do eixo do thorax e da parte interna de uma das pleuras.

ESTAMPA V

Fig. 1. Molde de uma glabella incompleta, mas pouco deformada. Observa-se n'este exemplar a granulação irregular e muito junta que lhe cobre a superficie, faltando sómente no fundo dos sulcos, cuja superficie é enrugada transversalmente.

Fig. 2. Impressão e molde em relevo de varios segmentos do thorax muito incompletos. As pleuras eram divididas em duas faixas deseguaes por um sulco obliquo, nascendo no sulco dorsal e extendendo-se quasi até á ponta.

ESTAMPA VI

Fig. 1. Molde da face movel com a ponta genal um pouco deformada e incompleta.

Fig. 2, 2 a. Molde e impressão do hypostoma, quasi completo, de *L. Ribeiroi* um pouco deformado. Exemplar colligido na serra de Santa Justa, a 1000^m ao S. da ermida do mesmo nome (Vallongo).

Fig. 3. Glabella incompleta de um individuo que julgo dever referir-se a *L. Heberti*, Rou. A granulação d'este exemplar é formada de tuberculos visivelmente agudos, e mais salientes do que os que formam a ornamentação de *L. Ribeiroi*; a lobação da glabella é tambem differente. Este exemplar foi colligido a 500^m a S. 74° E. de Riba de Cima (Penacova), na bacia siluriana do Bussaco.

Fig. 4, 4 a. Impressão e molde do hypostoma de *L. Ribeiroi*, incompleto e um pouco deformado. Este exemplar, bem como o da fig. 1 d'esta estampa e todos os das estampas anteriores, foram colligidos n'uma mesma pedreira situada a 1400^m a S. 51° E. da igreja de Covelo, na vertente direita do Douro.

COMMISSION DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES DU PORTUGAL

FAUNE SILURIQUE

DU

PORTUGAL

DESCRIPTION D'UNE FORME NOUVELLE DE TRILOBITE

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

PAR

J. F. N. DELGADO

DIRECTEUR DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES
MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE LISBONNE

LISBONNE

IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

1892

TERRAINS PALÉOZOÏQUES DU PORTUGAL

CONTRIBUTIONS

A L'ÉTUDE DE LA FAUNE SILURIQUE

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI, sp. n.

Généralités.—L'ordre important des Trilobites, si caractéristique des dépôts paléozoïques, surtout de ceux de la division inférieure, est représenté dans nos bassins siluriens par d'innombrables individus, appartenant toutefois à un nombre d'espèces relativement restreint, si on les compare aux faunes contemporaines d'autres pays. Quelques-unes de ces espèces sont éminemment caractéristiques des couches qui les renferment, soit par leur abondance, soit parce qu'elles s'y rencontrent exclusivement. Dans ce dernier cas se trouve l'espèce que nous allons décrire, *Lichas Ribeiroi*, que nous jugeons être nouvelle et qui n'a été rencontrée en Portugal que dans le bassin silurien de Vallongo, où elle occupe le toit de l'assise des schistes ardoisiers, y ayant une grande importance comme espèce locale, car elle caractérise parfaitement la zone où elle paraît.

L'espèce la plus rapprochée de celle-ci, *Lichas Heberti*, avec laquelle nous l'avons confondu d'abord, semble de même avoir été peu répandue, car, à notre connaissance, elle n'a pas été rencontrée en d'autres localités que celles indiquées, en France, par Marie Rouault, qui l'a trouvée à Vitré (Bretagne orientale)¹ et par MM. de Tromelin et Lebesconte, qui ont poursuivi les études de ce zélé explorateur dans les terrains paléozoïques de l'Ouest de la France, en tout en trois points différents: Monteneuf, Vitré et Angers. A ces localités il faut maintenant en ajouter deux portugaises: Penacova, au nord-est de Coimbra dans le bassin silurien de Bussaco, et Vallongo à l'Est de Porto. Dans la première de ces localités, au milieu d'autres échantillons de *Lichas* s'en trouvait un que nous croyons devoir rapporter à *L. Heberti*, et qui en vérité se distingue de *L. Ribeiroi* par la grandeur relative des différentes parties de la

¹ D'après MM. de Tromelin et Lebesconte, les premiers spécimens découverts de *L. Heberti* ont été trouvés à Monteneuf par l'abbé Daniello; l'échantillon figuré par Rouault, provenant de Vitré, n'a été trouvé que plus tard. (*Assoc. franç. avanc. des sciences. Congrès de Nantes, 1875, p. 634*).

glabelle, ainsi que par leur relief et par la granulation qui la recouvre, granulation formée de tubercules irréguliers, arrondis, mais se terminant visiblement en pointe. Cet échantillon, provenant de Riba de cima près de Penacova, se trouve représenté sur notre pl. VI, fig. 3. Un échantillon très semblable à celui-ci, mais dont les lobes latéraux antérieurs semblent, cependant, être un peu plus volumineux, se trouve dans la collection paléontologique du Musée national annexé à l'Ecole Polytechnique, portant l'indication peu précise « Vallongo ». Cet échantillon appartenait aux collections de l'ancienne Commission Géologique. Dans cet échantillon les caractères de l'espèce décrite par Marie Rouault sont très évidents, à savoir : la grandeur relative et la forme du corps médian et des lobes antérieurs de la glabelle, et l'existence d'une fossette dans le côté intérieur de ces lobes, laquelle forme une espèce d'expansion du sillon latéral au tiers environ de sa longueur à compter de l'extrémité postérieure de ce sillon ; cette fossette constitue un caractère qui distingue, d'après Rouault, *L. Heberti* de toutes les autres espèces du même genre qu'il a connues.

Dans le bassin de Bussaco, l'espèce citée occupe un horizon très rapproché de celui où se trouve *L. Ribeiroi* dans le bassin de Vallongo, et, parmi les espèces du même genre, c'est celle qui y a été découverte dans le niveau le plus bas. Les autres espèces de *Lichas* occupent toutes le toit de l'étage de la faune seconde, dans une couche où les espèces de cette faune se trouvent mélangées avec quelques-unes de la faune troisième, de sorte que le phénomène colonial de la Bohême s'y trouve représenté, à ce qu'il nous semble, quoique sous un aspect un peu différent.

Il vient à propos de faire remarquer que les analogies des dépôts siluriens inférieurs du Nord du Portugal avec ceux de la région occidentale de la France sont très étroites, tandis que les dépôts de la Bohême ont en Portugal leur plus proche représentant dans le bassin de Bussaco, où la plupart des espèces de *Lichas* qui y sont connues occupent un horizon plus élevé qu'à Vallongo, précisément le toit de notre Silurique inférieur, niveau qu'elles occupent aussi de préférence en Bohême ¹, c'est-à-dire dans la subdivision d5, la plus supérieure de l'étage D.

Le type *Lichas*, ainsi que *Cheirurus*, *Dionide*, *Acidaspis* et le cirripède *Plumulites*, qui l'accompagnent dans la même couche, ont fait, dans le bassin silurien de Vallongo, une apparition tardive relativement à ce qui a eu lieu en Bohême, où tous ces genres paraissent dès le commencement de l'existence de la faune seconde, en d1. ² Il y a plus, ces genres ne se montrent que dans cette couche, à l'exception d'une espèce de *Lichas*, *L. incola*, rencontrée dans la couche immédiatement inférieure et qui est une des quatre espèces ³ qui représentent ce genre dans le bassin de Vallongo ⁴.

Les échantillons du genre *Lichas* sont relativement rares dans le système silurique de notre pays, comme ils le sont d'ailleurs généralement partout où ces Trilobites ont été découverts. Dans les listes des fossiles siluriens du Portugal données par Sharpe et Salter dans le *Quarterly Journal* de la Société Géologique de Londres ⁵, on ne mentionne aucune espèce de

¹ *Système silurien du centre de la Bohême*, vol. I, Suppl., p. 285.

² *Ibid.*, p. 276 et 569.

³ Dans le tableau qui se trouve à la fin de ce travail, on n'indique que trois espèces de *Lichas* ; l'espèce *L. Heberti* n'y est pas comprise, car son horizon précis ne nous est pas connu, comme nous l'avons dit plus haut.

⁴ Voir note à la fin.

⁵ *Quart. Journ. Geol. Soc.*, vol. v, 1849, p. 146 ; et vol. ix, 1853, p. 141 et 160.

Lichas; nous en possédons cependant dans notre Silurique inférieur 7 espèces au moins, dont la plus remarquable est le *L. Ribeiroi*, qui est aussi l'espèce la mieux représentée.

En Espagne, nous ne connaissons qu'une espèce provenant de Puente de las Ovejas près Ciudad Real, décrite par de Verneuil et Barrande sous le nom de *L. Hispanica*¹, mais dont ils n'avaient obtenu que la tête. Cette espèce appartient au Silurique inférieur, et en vérité elle ressemble assez à *L. Heberti*, à un tel point que MM. de Tromelin et Lebesconte admettent la possibilité qu'elles soient identiques²; je ne puis toutefois me ranger à cette opinion.

D'après ce que l'on voit par nos planches, *L. Ribeiroi* était une espèce gigantesque, et il est sans doute un des plus grands Trilobites connus. MM. de Tromelin et Lebesconte (*l. c.*) rapportent que Bayan, en étudiant une tête de *L. Heberti* recueillie dans les ardoisières d'Angers, estima que l'individu d'où elle provenait aurait dû mesurer 70 à 80 centimètres de longueur; toutefois, Marie Rouault attribue à cette espèce des dimensions bien moindres, 40 centimètres de longueur seulement. Quoiqu'il soit indubitable que notre espèce atteignait de très grandes dimensions, nous ne pensons pas cependant qu'aucun des échantillons portugais ait mesuré cette longueur.

Les matériaux recueillis jusqu'ici pour la connaissance de *L. Heberti* sont, il nous semble, assez incomplets; aussi n'en connaissons-nous pas d'autre figure que celle d'une glabelle incomplète et un peu déformée, représentée il y a déjà 43 ans par Marie Rouault dans le *Bulletin de la Société Géologique de France*³. Rouault, en présentant cette figure, dit que dans la même localité où il a rencontré la glabelle, il a trouvé aussi une partie considérable du corps du même Trilobite, dans lequel il a reconnu des caractères particuliers qui le distinguaient essentiellement de tous ses congénères, non seulement par rapport à la tête mais aussi au pygidium, où il avait remarqué des caractères non moins importants; toutefois le plus remarquable des caractères observés dans l'espèce portugaise — le grand prolongement caudal du pygidium — n'a pas été constaté par le géologue de Rennes, et nous croyons que jusqu'ici nul paléontologue ne l'a observé dans aucune espèce de *Lichas*, car dans le grand *Traité de paléontologie* du Dr. Zittel, cette circonstance ne figure pas dans la caractéristique du genre ni d'aucun des sous-genres dans lesquels les *Lichas* sont partagés. En vérité ce caractère est si extraordinaire que le savant conservateur de la section de géologie et de paléontologie au Musée d'histoire naturelle de South Kensington, M. Henry Woodward, dont la grande autorité en cette matière est bien notoire, en examinant une photographie de l'échantillon figuré sur notre pl. III, que je lui avais présentée avec les photographies de la tête et d'autres parties du Trilobite, douta d'abord que cet échantillon appartienne au genre *Lichas* et il émit l'opinion que l'échantillon représentait probablement un individu du genre *Eurypterus*. Ce ne fut qu'après l'examen de fig. 1, pl. IV, représentant un échantillon trouvé dans une fouille ultérieure, que l'illustre paléontologue reconnut que tous les fragments appartenaient en réalité à la même espèce. Dans une lettre que M. Woodward a eu l'obligeance de m'écrire, et pour laquelle j'ai le plaisir de lui renouveler ici mes remerciements, il exprima cette opinion dans les termes

¹ *Bull. Soc. Géol. de France*, 2^e série, t. XII, 1855, p. 977.

² *Assoc. franç. avanc. des sciences*. Congrès de Nantes, 1875, p. 631.

³ *Bull. Soc. Géol. de France*, 2^e série, t. VI, 1849, p. 378.

suivants:—«It is indeed truly remarkable but there can be no doubt of the fact, judging by your beautiful plates, that the long spine is really attached to the pygidium of *Lichas*.»

Quant au doute dans lequel j'étais alors, si réellement tous ces restes appartenaient au genre *Lichas* ou à un genre nouveau, l'éminent naturaliste m'a répondu affirmativement, en citant différentes espèces figurées par Angelin, où le pygidium, brisé à sa partie postérieure, aurait dû porter un prolongement de l'axe, comme l'espèce portugaise ¹.

En outre du fort appui que, pour la solution de ce doute, nous prête une si respectable autorité, je n'hésite pas maintenant à rapporter nos échantillons au genre *Lichas*, depuis que j'ai eu la chance de découvrir dans la même carrière, avec ces divers restes, un hypostome (pl. VI, fig. 4), qui appartient sans doute à la même espèce et présente des analogies très décisives avec l'hypostome de *L. avus* Barr.

Barrande, en faisant la classification des *Lichas*, dont on connaissait la plèvre thoracique lorsqu'il publia le 1^{er} volume de son *Système silurien*², les distribue en deux groupes, dans le premier desquels il réunit les espèces dont la plèvre est divisée en deux bandes aplaties, et dans le second celles où la bande postérieure de la plèvre est saillante; mais il ne fait pas allusion à aucune espèce ayant un appendice caudal. Il subdivise encore celles du premier groupe en deux sections, selon que le pygidium est ou n'est pas échancré au droit de l'axe. En Bohême il existe, comme représentants du premier groupe, *L. scabra*, *L. avus*, et *L. incola*, qui appartiennent toutes à la première sous-division. De la seconde sous-division Barrande cite seulement deux espèces, *L. laciniata* Wahl. et *L. Trentonensis* Conr., auxquelles on devrait peut-être ajouter aussi *L. validus* Linsn.,³ mais aucune parmi elles n'a la moindre ressemblance avec la nôtre.

Le pygidium représenté par Brongniart sous le nom de *Paradoxides laciniatus*⁴, et qui a été copié de Wahlenberg, est la seule figure à rapporter à cette espèce de *Lichas*; il a le bord entier, sans aucune marque de pointe caudale. La tête, qui lui est associée, et qui a été rapportée par Wahlenberg à la même espèce, «parce qu'il les a constamment vus dans le même lieu et dans la même roche, n'ayant jamais vu aucun exemplaire complet de ce Trilobite», n'appartient évidemment pas au genre *Lichas*; peut-être doit-elle être rapportée à *Cheirurus*.

Dalman, en figurant un pygidium un peu semblable au précédent, sous le nom de *Asaphus laciniatus*⁵, lui assigne aussi le bord entier.

De même, *L. Trentonensis*, figuré et décrit par le professeur James Hall sous le nom de *Platynotus Trentonensis*⁶, n'a pas de prolongement caudal; il est à remarquer que les échantillons figurés par J. Hall sont les mêmes sur lesquels Conrad fonda cette espèce.

En admettant donc que nos échantillons appartiennent au genre *Lichas*, il reste à savoir si les espèces à prolongement caudal doivent former un sous-genre à part, ou bien s'il n'y

¹ Parmi les espèces citées par M. Woodward: *Lichas laticeps*, *L. latifrons* et *Platymetopus planifrons*, c'est la dernière qui paraît offrir plus de probabilités d'avoir eu un prolongement caudal.

² *Système silurien du centre de la Bohême*. Vol. I, Trilobites. 1852, p. 595.

³ Le pygidium représenté par Linnarson (*Om Vestergötlands cambriska och siluriska Aflagringar*. Tafl. I, fig. 20. —Kongl. Svenska Vetenskaps-akademiens Handlingar. Bandet 8. N.º 2. Stockholm, 1869) n'est pas complet; néanmoins, d'après l'empreinte de la doublure du limbe, il paraît qu'il n'y avait pas d'interruption au droit de l'axe.

⁴ *Crustacés fossiles*, p. 35, pl. III, fig. 3.

⁵ *Palaeaden*, p. 53, Tab. VI, fig. 1.

⁶ *Paleont. of New-York*, vol. I, p. 235, pl. 64, fig. 1.

a pas de motif pour cette distinction, puisque dans le genre *Dalmanites*, par exemple, quelques espèces ont le contour du pygidium arrondi, et d'autres ont l'axe prolongé postérieurement en une pointe plus ou moins longue.

Pour décider ce point intéressant nous devons avant tout remarquer que le prolongement observé sur nos échantillons, comme on le voit sur la pl. III, ne représente pas véritablement un appendice, mais accuse une modification profonde dans la conformation du pygidium, produite pour ainsi dire par l'enroulement du test en un long tube. Comme l'existence d'un tel prolongement comporte nécessairement une modification correspondante dans la forme de cette partie du corps de l'animal, il me semble qu'elle est au moins d'une aussi grande importance que les modifications des sillons, ou de la forme et du relief des lobes de la glabelle, modifications sur lesquelles se fonde principalement la distinction des sous-genres *Platymetopus* Ang., *Hoploichas* Dames, et *Conolichas* Dames¹. En admettant, en vue de ces considérations, pour nos exemplaires la création d'un nouveau sous-genre dans le genre *Lichas*, nous proposerions pour lui le nom «*Uralichas*», qui rappellerait le grand prolongement caudal, qu'il possède et qui représente son caractère le plus frappant.

Les exemplaires que nous figurons sur les pl. I à V et pl. VI, fig. 1 et 4, ont tous été extraits de la même carrière, à 1400^m au S. 51° E. de l'église de Covelo, c'est-à-dire 12,5 kilomètres E.-S.-E. de la ville de Porto. La couche d'où ils furent obtenus représente, ainsi que nous l'avons dit, l'horizon fossilifère supérieur de la faune seconde dans cette région.

Dans la même couche, en deux points plus au nord, sur le versant occidental de la serra de Santa-Justa, on a rencontré conjointement avec *L. Ribeiroi*, encore une autre espèce de *Lichas*, que se rapproche de *L. incola* Barr., et qui est représentée seulement par deux glabelles détachées et imparfaites. Nous attendons que de nouvelles récoltes nous procurent des matériaux plus complets pour faire la description de cette espèce et des autres espèces du même genre qui se rencontrent dans nos dépôts siluriens.

Description de l'espèce.—La tête de *L. Ribeiroi* est figurée sur nos planches par deux échantillons; nous en possédons encore quelques-uns moins parfaits, que nous croyons inutile de représenter. Sur la pl. I nous voyons l'empreinte extérieure d'une tête très aplatie par compression, dont le moule se trouvait moins bien conservé pour reproduire les caractères de la surface. Par contre, sur la pl. V, fig. 1, nous avons la représentation du moule interne d'une glabelle peu déformée. L'hypostome est représenté par deux échantillons de localités différentes, sur la pl. VI. Le pygidium, diverses parties du thorax et le prolongement caudal sont figurés sur les autres planches. L'étude comparative de ces exemplaires et des autres que nous possédons, nous conduit à réunir les caractères de l'espèce comme il suit.

La tête était médiocrement bombée. Son contour extérieur, subparabolique, était formé par un limbe très étroit, séparé de la surface céphalique par une rainure, étroite aussi, et profonde. Le contour intérieur était presque rectiligne, mais un peu concave dans la partie centrale correspondante à l'axe du thorax; aux extrémités il se courbait en avant dans la partie correspondante à la face mobile. De cette disposition il résulte cet aspect particulier que Barrande a

¹ Zittel, *Traité de paléontologie*, traduit par Ch. Barrois. Tome II, p. 619.

remarqué dans plusieurs espèces de *Lichas*, dont la tête présente une courbure convexe vers le thorax, au lieu de la disposition contraire, qui est la plus commune dans les Trilobites.

La surface de la tête est divisée, par des rainures, en un certain nombre de compartiments, qui correspondent à la lobation ordinaire des autres genres de Trilobites. Dans cette espèce, comme dans *L. Hispanica*, à laquelle elle ressemble assez, la lobation de la glabelle comprend tous les lobes et sillons, ce qui n'arrive pas, comme on le sait, chez tous les *Lichas*.

Le corps médian ou lobe frontal de la glabelle s'étend jusqu'au sillon occipital; à la partie antérieure il a une largeur triple de celle qu'il a aux deux tiers de sa longueur entre les extrémités postérieures des lobes latéraux antérieurs, puis il s'élargit de nouveau derrière ces lobes en s'approchant du sillon occipital.

Le lobe frontal domine par son relief toutes les autres parties de la tête, mais il ne paraît pas qu'il ait été fortement voûté; il descend au contraire graduellement vers les côtés et vers le sillon occipital, et un peu plus abruptement vers le front. Son point culminant a dû correspondre au profil transversal coupant perpendiculairement la tête et passant par les extrémités antérieures des sillons latéraux antérieurs. Ces sillons, qui prennent naissance au point où les sillons dorsaux rencontrent la rainure du limbe, sont très larges et profonds, ils se recourbent vers l'axe, auquel ils tournent leur convexité, puis ils vont se réunir en arrière aux sillons moyens, lesquels, en suivant un cours inverse et étant de même très prononcés, limitent avec ceux-là les lobes latéraux antérieurs. Ces lobes ont une forme ovale allongée et se dirigent obliquement vers l'axe du corps. Ils présentent du côté interne, au tiers environ de la longueur des sillons latéraux à partir de leur extrémité antérieure, une dépression analogue à celle observée chez *L. Heberti*, mais dans une autre position.

Les lobes postérieurs, compris entre les sillons latéraux postérieurs et le sillon occipital, ont de même une forme ovale, mais pointue aux deux bouts; ils sont placés presque perpendiculairement à l'axe, en s'inclinant un peu en avant. Leur surface n'arrive pas à un tiers de celle des lobes antérieurs.

Les lobes moyens, à plus faible relief, mais occupant une surface plus grande que les lobes postérieurs, sont définis par un espace subquadrangulaire entre les lobes antérieurs et les postérieurs, et sont limités intérieurement par une dépression peu visible qui réunit ensemble l'extrémité postérieure des lobes antérieurs et l'extrémité intérieure des lobes postérieurs, en suivant parallèlement à l'axe.

Les sillons dorsaux ne sont pas également prononcés sur toute leur étendue. Très profonds dans la partie correspondante aux lobes antérieurs et aux lobes postérieurs, qu'ils limitent en partie, ils sont moins profondément marquées dans la partie intermédiaire et dessinent dans leur parcours une courbe dont la concavité est tournée en dehors.

La face fixe présente une surface très réduite relativement à la grosseur de la tête, mais elle nous est très imparfaitement connue. Nous avons aussi une connaissance très incomplète de la face mobile; toutefois on voit, pl. I et pl. VI, fig. 1, qu'elle était assez petite et armée, comme chez tous les *Lichas*, d'une pointe génale, qui n'est que le prolongement du limbe frontal. En vertu de la position très avancée de cette pointe, qui était au droit de l'œil, on reconnaît que, sous ce rapport, *L. Ribeiroi* ressemble beaucoup à *L. Haueri* Barr.

Nous ne connaissons rien en ce qui concerne les yeux; nous savons seulement (voir pl. I, et pl. VI, fig. 1) quelle était la position et l'étendue du lobe palpébral, qui était recouvert

d'une granulation irrégulière, comme toute la glabelle, dont il était séparé par un sillon dessinant le diamètre du demi-cercle formé par ce même lobe.

Le sillon occipital, très large et perpendiculaire à l'axe, dans sa partie médiane, se rétrécit et s'infléchit quelque peu en arrière, des deux côtés, en formant ainsi deux courbures où sont logés les lobes postérieurs. Il s'ensuit de cette disposition, que l'anneau occipital est beaucoup plus large dans la partie centrale correspondante à l'axe du thorax que dans les parties latérales contiguës à ces lobes. Ainsi que dans *L. Hispanica*, l'anneau occipital porte sur l'axe un petit tubercule, situé à un tiers de sa largeur comptée depuis le bord postérieur.

L'hypostome, dont nous possédons deux échantillons recueillis en des endroits différents (pl. VI, fig. 2, 2a et 4, 4a) a une forme subpentagonale. Le corps central, faiblement bombé dans les deux sens, occupe approximativement les deux tiers de la longueur totale, il est limité postérieurement par un sillon transversal perpendiculaire à l'axe, plus large dans sa partie centrale et se rétrécissant vers les deux côtés, ayant sa surface irrégulièrement ridée, comme l'est aussi celle des sillons de la glabelle. Il est divisé en deux parties fort inégales par une paire d'empreintes musculaires, les sillons moyens, qui sont dirigés obliquement vers l'axe du corps et s'étendent depuis le sillon latéral presque jusqu'au sillon transversal dont nous avons parlé. La partie antérieure du corps, ou lobe antérieur, qui provient de cet étranglement, est ovale, le grand axe de la figure étant dans le sens de la longueur du corps. Le lobe postérieur, bien moins développé, forme une bande transverse, étroite dans sa partie centrale, s'élargissant aux deux bouts et remontant vers l'avant en forme de pointe. Les sillons moyens, étroits et profonds près du sillon latéral, deviennent moins profonds et s'élargissent en forme de poire à leur extrémité interne, l'espace qui les sépare étant à peine un quart de la largeur du corps. Le bord buccal, ou postérieur, est très large et fortement échancré en fourche, comme cela arrive chez *L. avus* Barr., ou mieux encore chez les formes du genre *Asaphus*. Le contour antérieur est garni d'un limbe très étroit; par contre, les ailes sont bien développées. Elles ont une forme triangulaire et sont placées vis-à-vis du milieu de la longueur du lobe antérieur, en formant un élargissement subit du bord frontal, qui est lui-même, comme nous l'avons dit, très étroit. La granulation qui recouvre cette pièce est plus fine et moins irrégulière que celle de la surface de la tête.

Le nombre des segments thoraciques nous est inconnu. Nous avons figuré sur les pl. IV, fig. 2, et V, fig. 2, les meilleurs exemplaires, les seuls presque que nous possédons. On y voit que l'axe avait peu de relief et qu'il occupait environ un tiers de la largeur du Trilobite. Dans la seconde figure citée les plèvres montrent une longueur plus grande que la largeur réelle du Trilobite, parce que leur partie interne et leur partie externe se trouvent déployées sur le même plan.

Les plèvres, recourbées en arrière et se terminant en faucille, sont divisées longitudinalement en deux bandes inégales — l'antérieure plus grande que la postérieure, toutes les deux aplaties et d'un égal relief — par un sillon étroit et profond, qui se prolonge depuis le sillon dorsal jusque près de la pointe. Les anneaux, légèrement concaves vers le devant, sont séparés par des rainures relativement étroites. Les sillons dorsaux sont étroits aussi, mais très distincts.

Le pygidium a une forme triangulaire très allongée, et il accompagne le thorax dans son relief. Sur les pl. II et IV, fig. 4, sont représentés le moule et l'empreinte du même échantillon respectivement à l'échelle naturelle et à celle des deux tiers.

L'axe avait un plus fort relief que les lobes latéraux, et il occupe à sa partie antérieure un tiers de la largeur totale. Dans cette partie on distingue nettement trois anneaux; toutefois il paraît qu'il y en avait d'autres à l'état rudimentaire, qui ne sont pas parvenus à se développer. Ces trois anneaux occupent bien moins de la moitié de la longueur de l'axe jusqu'au contour. L'axe diminue graduellement en largeur et il est limité distinctement par les sillons dorsaux, qui sont bien prononcés jusqu'à l'origine du prolongement caudal, lequel continue l'axe. Près de leur extrémité postérieure ils convergent un peu l'un vers l'autre, par ce motif la largeur de l'axe y diminue encore davantage (pl. II).

Chaque lobe latéral se compose de trois plèvres, mais ce n'est que dans les deux premières que l'on distingue les éléments qui les composent: chacune de celles-ci est divisée par un sillon en deux bandes inégales et se termine en pointe très saillante sur le contour. L'étendue de la surface et la forme de chacune des plèvres sont très différentes. La plèvre antérieure a une forme trapézoïdale, les deux autres sont triangulaires, mais très différentes entre elles.

Sur la pl. III, fig. 1, on voit l'empreinte de la doublure du test, recouverte de stries subparallèles, paraboliques.

Les fig. 1 et 2 de la pl. III représentent le prolongement caudal à peu près complet; on voit dans la fig. 1 l'empreinte d'une partie de sa surface inférieure, qui était plane et dans la fig. 2 l'empreinte d'une partie de sa surface supérieure, qui était au contraire fortement voûtée; d'où il résulte que la section transversale était plano-convexe. L'exemplaire a subi à sa partie postérieure un écrasement, qui l'a visiblement déformé; mais d'après l'empreinte que l'on observe à la partie inférieure de la fig. 2, on voit qu'il ne finissait pas en pointe aiguë, et que, en outre, un sillon longitudinal très étroit, qui se prolongeait sur toute sa longueur, le divisait à l'extrémité postérieure en deux pointes très courtes et arrondies. On dirait que ce prolongement caudal provient de la jonction, par leur bord extérieur, des deux plèvres postérieures du pygidium, extrêmement allongées et se repliant chacune sur elle-même vers le bas, car les ornements du test de ce prolongement sont les mêmes dans sa surface supérieure et dans l'inférieure, aussi bien que dans la surface du pygidium; ce prolongement caudal représente donc le dernier segment post-abdominal, correspondant au telson des Euryptérides, fondu avec l'avant-dernier segment, auquel ce prolongement ressemble plutôt par la forme de sa terminaison. En tout cas l'espèce resterait comprise dans la section des *Lichas* du premier groupe, qui ont une échancrure au droit de l'axe; toutefois le sous-genre *Uralichas* doit représenter, à notre avis, un type élevé des Trilobites, qui forme en quelque sorte l'un des chaînons de liaison entre cet ordre de crustacés et le groupe immédiatement supérieur des Mérostomes.

Le test a été détruit dans tous les exemplaires et il n'en reste guère de vestiges; mais les moules et les empreintes montrent bien les ornements du test, qui consistaient en une granulation très irrégulière et en général très serrée, formée de tubercules inégaux, arrondis, mais tendant, à ce qu'il semble, à s'élever en pointe. Beaucoup de ces tubercules atteignent 1 millimètre de diamètre.

La granulation couvrait toute la surface du Trilobite sauf le fond des sillons, elle était très forte et très serrée surtout sur la glabelle, dont la surface en était presque totalement recouverte, de sorte que les tubercules se touchaient presque sans laisser d'intervalles lisses entre eux. Nous avons déjà dit que sur la surface de l'hypostome la granulation était, au contraire, plus fine et moins irrégulière.

Dimensions. — Il n'est pas facile de déterminer les dimensions de cette espèce avec les échantillons incomplets, et tous plus ou moins déformés, que nous possédons. Si, en tenant compte des dimensions des divers fragments, nous cherchons à établir une comparaison avec *L. avus*, auquel *L. Ribeiroi* ressemble par la forme de l'hypostome et par d'autres caractères, nous dirons que nos exemplaires n'avaient pas moins de 385 millimètres de longueur hors le prolongement caudal, qui à lui seul, ainsi que le montre la pl. III, mesure 175 millimètres de longueur, ce qui élèverait à 560 millimètres la longueur totale du Trilobite. Cette dimension ne doit pas être réputée comme exagérée, puisque le pygidium, du reste incomplet, représenté sur la pl. IV, fig. 1, mesure 300 millimètres de longueur.

Ces dimensions surpassent de beaucoup celles de tous les *Lichas* décrits, mais restent encore bien loin de celles que M. Bayan a attribué à *L. Heberti*.

Rapports et différences. — Par ses énormes proportions et caractères spéciaux, *L. Ribeiroi* se distingue facilement de toutes les autres espèces de *Lichas*. L'examen de glabelles isolées et déformées, comme elles se présentent presque toujours, pourrait cependant suggérer des doutes dans quelques cas, et par cette raison nous appellerons l'attention sur leurs caractères distinctifs.

Parmi toutes les espèces de *Lichas*, c'est certainement de *L. Heberti* que notre espèce se rapproche le plus. D'après la description donnée par Marie Rouault on reconnaît cependant que des différences notables séparent ces deux espèces entre elles; c'est surtout la grandeur et la forme du corps médian de la glabelle, relativement plus grande et bien plus saillante dans *L. Heberti*, et présentant en outre à la partie antérieure une largeur quintuple de celle qu'elle a entre les extrémités postérieures des lobes antérieurs. Il faut remarquer, en outre, la différence des ornements du test, qui, d'après les deux exemplaires portugais, consistent, dans *L. Heberti*, en tubercules moins nombreux, plus aigus et séparés par de plus grands intervalles à surface lisse. Comme caractère de moindre importance, nous remarquerons la position différente de la dépression dans la partie intérieure des lobes antérieurs, qui se trouve à environ un tiers de la longueur de ces lobes, mais à partir de leur extrémité postérieure. Il se peut qu'il y ait des différences essentielles dans la conformation du pygidium, mais sur ce point la description de *L. Heberti* par Marie Rouault ne laisse rien soupçonner.

Il y a aussi de fortes analogies entre *L. Hispanica* et *L. Ribeiroi*, espèces que se rapprochent par le même système de lobation complète de la glabelle, par les dimensions relatives et la position des différents lobes, par la forme de l'anneau occipital, et peut-être encore par d'autres caractères non décrits, car l'on ne connaît que la tête de *L. Hispanica*. Toutefois, outre la différence énorme dans les dimensions, *L. Ribeiroi* se distingue de son congénère en ce qu'il ne présente pas le grand relief du corps médian de la glabelle qui, d'après la description de *L. Hispanica* par de Verneuil et Barrande, forme presque comme un hémisphère terminé vers l'arrière par une partie basse; en ce qu'il n'y existe pas la forte dépression qui dans cette partie traverse le lobe médian de la glabelle, réunissant les lobes antérieurs par leurs extrémités postérieures et limitant un bourrelet transverse qui figure comme un second anneau occipital; et en ce que la granulation du test n'est pas formée de tubercules aigus comme celle de *L. Hispanica*.

Gisement et localités.—Nous avons déjà dit que cette espèce n'a été trouvée que dans le bassin silurien de Vallongo, où elle occupe le toit de l'assise des schistes ardoisiers, c'est-à-dire, la couche la plus supérieure qui y renferme la faune seconde. Nous l'avons recueillie seulement en deux localités: à 1400 mètres au S. 51° E. de l'église de Covêlo, environ 12,5 kilomètres de Porto, du côté droit du fleuve Douro, et à 1 kilomètre au S. de la chapelle de Santa-Justa sur le versant de la colline de ce même nom, dans le voisinage de Vallongo.

NOTE COMPLÉMENTAIRE

Ci-joint la liste des espèces, que nous avons jusqu'à présent déterminées dans les trois horizons fossilifères de l'assise des schistes ardoisiers de Vallongo, les lettres **A**, **B**, **C** désignant respectivement ces horizons, en commençant par le plus inférieur.

	A	B	C		A	B	C
<i>Lichas Ribeiroi</i> , Delgado	..	..	+	<i>Bellerophon Duriensis</i> , Sh. (an <i>B. bilobatus</i> , var.) ..	+	+	
» <i>incola</i> , Barr.....	..	+		» <i>aff. carinatus</i> , Sow.....	..	+	
» <i>aff. incola</i> , Barr. (an sp. n.)	..	..	+	<i>Ribeiria</i> sp.	..	..	+
<i>Acidaspis Buchi</i> , Barr.....	..	..	+	<i>Orthonota britannica</i> , Rou. (<i>Sanguinolites Pelli-</i>			
<i>Placoparia Tourneminei</i> , Rou.....	+	+	+	<i>coi</i> , Vern. et Barr.).....	+	+	
<i>Cheirurus</i> cfr. <i>claviger</i> , Beyr.....	..	..	+	<i>Dolabra Lusitanica</i> , Sh.....	..	+	
» (<i>Actinopeltis</i>) <i>octolobatus</i> , M ^e Coy	..	..	+	<i>Redonia Deshayesiana</i> , Rou.	..	+	+
<i>Dalmanites socialis</i> , Barr.....	+	+		» <i>Duvaliana</i> , Rou.....	..	+	+
» » var. <i>proaeva</i>	+	+		» <i>Bohemica</i> , Barr.	..	?	+
» <i>Vetillarti</i> , Rou.	+	+	+	<i>Nucula aff. amica</i> , Barr.....	..	+	
» » var. <i>caudata</i> (<i>D. macro-</i>				<i>Ctenodonta Ciaae</i> , Sh. (<i>Leda Bohemica</i> , Barr.)..	..	+	+
<i>phthalma</i> , Brongn.)....	..	..	+	» <i>cfr. Costae</i> , Sh.	..	..	+
» <i>Torrubiae</i> , Vern. et Barr.....	..	..	+	» <i>aff. erratica</i> , Trom.	..	..	+
» <i>Downingiae</i> , Murch	..	..	+	» <i>aff. compar</i> , Barr.	..	..	+
<i>Iliaenus giganteus</i> , Burm. (<i>I. Lusitanicus</i> , Sh.)..	+	+	+	<i>Tellinomya</i> sp. (<i>aff. T. elliptica</i> , Hall.)	..	+	
» » forme large (<i>I. Hispanicus</i> ,				<i>Arca Naranjoana</i> , Vern. et Barr.	..	..	+
Vern. et Barr.)	..	..	+	<i>Modiolopsis aff. elegantulus</i> , Sh.....	..	..	+
» <i>Wahlenbergianus</i> , Barr.	..	..	+	<i>Strophomena cfr. comitans</i> , Barr.....	..	..	+
» <i>Beaumonti</i> , Rou.	..	..	+	» <i>cfr. spiriferoides</i> , M ^e Coy.....	..	+	
<i>Asaphus nobilis</i> , Barr.....	+	+	+	» <i>cfr. Phillipsi</i> , Barr.....	..	..	+
» <i>glabratus</i> , Salt.	+	?	+	<i>Orthis noctilio</i> , Sh.	+	+	+
» <i>Guettardi</i> , Brongn.	?	+	+	» <i>Lusitanica</i> , Sh.	+	+	+
» <i>contractus</i> , Vern. et Barr.....	..	+	+	» <i>Miniensis</i> , Sh.	+	?	
» <i>Delessei</i> , Duf.	+	+		» <i>Duriensis</i> , Sh.....	+	+	
» <i>cfr. Cianus</i> , Vern. et Barr.....	..	+		» <i>redux</i> , Barr.	..	?	+
» <i>aff. glabratus</i> , var. <i>gigantea</i> (an sp. n.).	..	..	+	» <i>testudinaria</i> , Vern. et Barr.....	..	..	+
<i>Ogygia Desmaresti</i> , Brongn.....	..	+		» <i>fliceraei</i> , Rou.	..	..	+
» <i>aff. desiderata</i> , Barr. (<i>Isotelus Powisii</i> ,				» <i>cfr. patera</i> , Salt.	..	+	+
Portl? in Sh.)	..	..	+	» <i>cfr. pulvinata</i> , Salt.	..	+	
<i>Calymene Tristani</i> , Brongn.....	+	+	+	» <i>cfr. protensa</i> , Sow. (an <i>O. testudinaria</i> ,			
» <i>Salteri</i> , Rou.....	+	+	+	Dalm.)	+		
» <i>pulchra</i> , Barr.	..	+	+	» <i>cfr. testudinaria</i> , Dalm.	..	..	+
» <i>Aragoi?</i> Rou.....	..	+		» <i>vespertilio</i> , juv.? Sow.....	..	+	
<i>Dionide formosa</i> , Barr.....	..	..	+	» <i>aff. calligramma</i> , Dalm.	+	..	+
<i>Plumulites aff. regius</i> , Barr.....	..	..	+	» <i>aff. Ribeiroi</i> , Sh. (an <i>O. Noctilio</i> , var.).	+	+	
<i>Orthoceras vagans</i> , Salt.....	..	+	+	<i>Lingula Lesueuri</i> , Rou.....	..	+	
» <i>Hisingeri</i> , Rou.....	..	+	+	» <i>aff. transiens</i> , Barr.	..	..	+
» <i>aff. lineatum</i> , His.	..	+		<i>Calix Murchisoni</i> , (Vern. et Barr.)	+	+	
<i>Endoceras Dalimieri</i> , Barr. (<i>O. duplex</i> , Wahl.).	..	+	+	<i>Tetragraptus Halli</i> , Hopk.?	+		
» <i>cfr. vaginatus</i> , Schloth.....	..	+		<i>Didymograptus Murchisoni</i> , Böck.	+		
<i>Hyolithes cfr. elegans</i> , Barr.....	..	..	+	» <i>pennatulus</i> , Hall.....	+		
» <i>cfr. undulatus</i> , Barr.	..	+		<i>Graptolites</i> ind., 2 ou 3 sp.....	+		
<i>Bellerophon bilobatus</i> , Sow.....	+	+	+				

EXPLICATION DES PLANCHES

Tous les exemplaires figurés appartiennent aux collections de la Commission des travaux géologiques du Portugal. Toutes les figures sont à l'échelle naturelle à l'exception de la planche IV, qui est réduite aux $\frac{2}{3}$.

PLANCHE I

Empreinte de la surface extérieure d'une tête très aplatie et écrasée par compression. L'une des joues mobiles s'est détachée de la tête; on voit son empreinte du côté droit de la figure.

PLANCHE II

Empreinte en relief d'un pygidium incomplet. On remarque dans cet exemplaire le rétrécissement plus fort de l'axe à sa partie postérieure, où commence le sillon longitudinal qui se prolonge vers l'arrière. (Comp. avec pl. IV, fig. 1).

PLANCHE III

Moule et empreinte du prolongement caudal. On voit dans la partie supérieure de la fig. 1 l'empreinte de la face inférieure de ce prolongement dans sa liaison avec le pygidium, représenté par l'empreinte de la doublure du test, et on voit à la partie inférieure de la figure la moitié postérieure du moule du même prolongement écrasé par compression.

Dans la fig. 2, on a par contre le moule du prolongement caudal dans sa liaison avec la partie postérieure du pygidium, et l'empreinte de la moitié postérieure de ce prolongement; on y distingue mieux que dans la fig. 1, le sillon longitudinal et la terminaison caudale en deux pointes courtes et arrondies.

On observe dans les deux échantillons que la section transversale du prolongement caudal était plano-convexe, la face plane correspondant à sa surface inférieure et la face convexe à sa surface supérieure, qui était fortement voutée.

PLANCHE IV

Fig. 1. Empreinte en creux de la surface supérieure d'un pygidium avec son prolongement caudal presque complet. Ainsi que les autres exemplaires, celui-ci se montre de même un peu écrasé, mais il laisse voir le sillon longitudinal dans toute l'étendue de ce prolongement, commençant à l'extrémité postérieure de l'axe, où il se rétrécit davantage.

Fig. 2. Empreinte en creux de trois anneaux incomplets de l'axe du thorax et de la partie interne d'une des plèvres.

PLANCHE V

Fig. 1. Empreinte en relief d'une glabelle incomplète, mais peu déformée. On voit dans cet exemplaire la granulation irrégulière et très serrée s'étendant sur toute sa surface à l'exception du fond des sillons qui se présente ridé transversalement.

Fig. 2. Empreinte en creux et en relief de plusieurs segments du thorax très incomplets. Les plèvres étaient divisées en deux bandes inégales par un sillon oblique prenant son origine dans le sillon dorsal et s'étendant presque jusqu'à la pointe.

PLANCHE VI

Fig. 1. Empreinte en relief de la joue mobile avec la pointe génale, un peu déformée et incomplète.

Fig. 2, 2 a. Empreinte en relief et en creux de l'hypostome presque complet de *L. Ribeiroi*, un peu déformé. Exemplaire trouvé dans la serra de Santa-Justa, à un kilomètre au sud de la chapelle de ce nom (Vallongo).

Fig. 3. Glabelle incomplète d'un individu, que je crois devoir être rapporté à *L. Heberti*, Rou. La granulation de cet exemplaire est forme de tubercules visiblement aigus et plus saillants que ceux qui forment les ornements de *L. Ribeiroi*; la lobation de la glabelle est différente aussi. Cet exemplaire a été recueilli dans le bassin silurien de Bussaco à un demi kilomètre au S. 74° E. de Riba-de-Cima (Penacova).

Fig. 4, 4 a. Empreinte en creux et en relief de l'hypostome de *L. Ribeiroi*, incomplet et un peu déformé. Cet exemplaire aussi bien que celui représenté dans la fig. 1 de cette planche, et ceux représentés sur les planches I à V, ont été ramassés dans la même carrière à 1400^m au S. 51° E. de l'église de Covêlo, sur le versant droit du Douro.

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J. F. N. DELGADO.

Trilobites. *Pl. I.*

Cliché M. D. Santos.

Phototyp. S. Leipold.

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J. EN. DELGADO.

Trilobites. *Pl. II.*

Cliché M. A. Santos.

Phototyp. D. Leopold.

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J. F. N. DELGADO

Trilobites 14 11

S. grandis

S. grandis

Stictopora S. Scipoli

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J. F. N. DELGADO.

Trilobites. *Pl. V.*

1

2

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J.F.N. DELGADO,

Trilobites. *Pl. VII.*

1

2a

2b

3

4a

4b

State Library
y E. Raymond

MÉMOIRE N° 16

Uralichas Ribeiroi des Schistes d'Angers

MÉMOIRES
DE LA
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE
DE FRANCE

PALÉONTOLOGIE

MÉMOIRE N° 16

URALICHAS RIBEIROI

DES

SCHISTES D'ANGERS

PAR

D. P. ŒHLERT

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

7, Rue des Grands-Augustins

1896

URALICHAS RIBEROI

DES SCHISTES D'ANGERS

PAR

D.-P. OEHLERT

Les schistes des environs d'Angers, exploités comme ardoises, et si connus au point de vue industriel, renferment une riche faune Trilobitique. Malheureusement, les spécimens y sont toujours très déformés par compression et étirement ; toutefois certains caractères génériques et spécifiques, suffisamment conservés, ont permis d'étudier cet ensemble de formes qui depuis le XVIII^e siècle jusqu'à nos jours a attiré à juste titre l'attention des savants. Les travaux de Guettard, Burmeister, Brongniart, de Tromelin et Lebesconte, Dufet, L. Bureau, etc., ont déjà fait connaître un certain nombre de types de cette provenance, auxquels nous en ajoutons un nouveau qui présente à divers titres un véritable intérêt.

Tout récemment, M. Préaubert, président de la société d'Études scientifiques d'Angers, nous a envoyait en communication, un pygidium de Trilobite provenant des schistes ardoisiers exploités à La Pouëze. Ce fragment est remarquable à divers points de vue ; d'abord par sa taille exceptionnellement développée qui indique un individu appartenant à une espèce géante, et ensuite par la ressemblance et même l'identité spécifique qu'il semble offrir avec une forme décrite par M. Delgado sous le nom de *Lichas (Uralichas) Riberoi* (1), montrant ainsi l'extension dans l'ouest de la France d'une espèce qui n'était connue jusqu'ici que dans le bassin de Vallongo en Portugal, où elle est localisée à la partie supérieure des schistes ardoisiers. Ce fait, du reste, vient confirmer la similitude si frappante, qui existe entre certains niveaux ordoviciens du Portugal et du massif armoricain.

Le caractère principal sur lequel M. Delgado s'est basé pour la création d'un nouveau sous-genre, d'ailleurs très justifié, consiste dans le prolongement axial sous la forme d'une longue pointe qui n'existe pas chez les *Lichas* proprement dits. Cette pointe médiane donne

(1) Delgado, 189 . *Descricao de una forma nova de Trilobite. Lichas (Uralichas) Riberoi*. Commissao dos Trabalhos geologicos de Portugal.

aux espèces qui en sont pourvues, un aspect spécial rappelant au premier abord le telson des Mérostomes. Cette ressemblance avait frappé M. Woodward, dont la compétence fait autorité en pareille matière, et l'examen des premiers fragments d'*Uralichas Riberoi* du Portugal que lui avait envoyés M. Delgado lui avait fait émettre l'opinion que l'on se trouvait en présence d'une forme appartenant au genre *Eurypterus* ; ce ne fut que plus tard, en étudiant des échantillons mieux conservés, qu'il reconnut que l'étrange prolongement caudal faisait réellement partie intégrante du pygidium d'un Trilobite, et que ce dernier devait être rattaché au genre *Lichas*, faisant remarquer du reste, combien ce caractère était remarquable.

L'étude du pygidium trouvé à la Pouëze, nous a amenés à rechercher si antérieurement aucun débris de trilobite analogue n'avait été signalé dans l'Ordovicien de la France, Or, nous avons constaté qu'en 1873, Bayan avait appelé l'attention de la Société Géologique (1) sur une tête gigantesque d'un *Lichas* provenant des ardoisières d'Angers. Ce fragment très déformé, qui autrefois avait été, d'après Bayan, présenté à l'Académie des Sciences comme une tête de poisson, fait actuellement partie de la collection de l'École des Mines, où nous avons pu l'étudier, grâce à l'obligeance de M. Douvillé ; quoique fortement comprimé, il laisse toutefois reconnaître un céphalothorax de l'*Uralichas Riberoi* de M. Delgado.

Pour Bayan, les caractères génériques de ce fossile ne laissaient aucun doute, aussi le plaça-t-il avec certitude dans le genre *Lichas* non encore demembré à cette époque ; quant à sa détermination spécifique, il crut devoir l'homologuer avec le *Lichas Heberti* de Rouault en le comparant à un moulage du type, et en étant influencé évidemment dans cette assimilation par la grande taille de l'une et de l'autre forme.

Nous ne pouvons, pour des motifs que nous développerons dans le cours de cette note, nous ranger à l'opinion de Bayan ; en effet, par sa dimension et par plusieurs de ses caractères, le céphalothorax recueilli à Angers, montre qu'il doit être rapporté, de même que le pygidium découvert à La Pouëze, à l'*Uralichas Riberoi* ; ces deux fragments fournissent ainsi une double preuve de la présence de cette forme dans l'ouest de la France.

Uralichas Riberoi, DELGADO.

Lichas (Uralichas) Riberoi, Delgado, 1892. Fauna Silurica de Portugal. Descrip. d'une nouvelle forme de Trilobite, p. 1-31. Pl. I-VI.

L'énorme céphalothorax provenant des ardoisières d'Angers est trop déformé pour qu'il soit possible d'en donner une description détaillée ; sa longueur, quoique visiblement augmentée sous l'influence de la pression n'en est pas moins considérable. En tenant compte de l'étirement des aspérités qui hérissent la surface de ce moule interne, et qui primitivement, devaient avoir une section sensiblement circulaire, on est porté à admettre d'après leur allongement moyen que la longueur totale, qui est actuellement de 20 centimètres peut être réduite d'un quart, ce qui ramène la dimension primitive à une longueur de 15 centimètres.

(1) Bayan, 1873. *Sur un très grand individu de Lichas Heberti*. Bul. Soc. Géol. Fr., 2^e sér. T. XXIX, p. 229.

Ce céphalothorax ne peut être comparé pour la taille, parmi les *Lichas* qu'au seul *Lichas Heberti*, Rouault (1), qu'il dépasse du reste de plus de moitié dans ses proportions ; cette dernière espèce n'est connue que d'après un moule interne, qui a sa forme modifiée par une compression latérale dont l'effet a été de diminuer sa largeur, tandis qu'il augmentait la longueur ; ce spécimen provient des schistes de Vitré dont les fossiles ont toujours subi des déformations souvent très considérables et qui varient suivant l'orientation des fossiles dans la roche.

Si l'on examine à ce point de vue l'*Uralichas Riberoi* d'Angers et le *Lichas Heberti* des schistes de Vitré, on constate qu'aucun d'eux ne peut donner une notion exacte et rigoureuse de ses caractères spécifiques ; tous les deux sont très déformés et proviennent de gisements également schisteux, mais ayant un faciès bien différent. En effet, les schistes de Vitré qui sont très compactes, tendent à se diviser en aiguilles et ne peuvent être utilisés dans l'industrie que sciés ou taillés, tandis que ceux d'Angers fournissent des ardoises très estimées, par suite de la fissilité lamellaire qui y est très développée. Quant aux fossiles de ces deux localités, ils présentent, comme conséquence même de la nature de la roche, des déformations spéciales résultant de la pression qu'ils ont subie ; à Vitré, les trilobites, bien que toujours très déformés, ont conservé en partie leurs reliefs, ceux-ci pouvant même dans certains cas être exagérés ; à Angers, au contraire, ils ont été pour ainsi dire laminés de telle sorte que leurs différentes parties, quelle que soit leur saillie, se dessinent sur une surface presque plane. Ces réflexions peuvent également s'appliquer aux spécimens d'*Uralichas Riberoi* de Portugal. Les deux têtes figurées par M. Delgado (2) nous montrent en effet combien la pression a modifié les rapports des différentes régions de la tête, les deux échantillons ayant eu à supporter une poussée dirigée obliquement par rapport à l'axe, mais venant de gauche dans l'un et de droite dans l'autre.

En tenant compte de ces altérations dans la forme, on peut néanmoins retrouver certains caractères suffisamment conservés pour être décrits.

D'après le céphalothorax trouvé à Angers, on voit que le contour antérieur est subparabolique, et que le lobe frontal ou médian est très développé, très bombé et très élargi en avant, tandis qu'à l'arrière il se trouve très resserré entre les extrémités des sillons latéraux ; au niveau de la partie terminale des lobes antérieurs, dans sa partie la plus rétrécie, il présente une dépression transversale, après quoi il s'élargit de nouveau jusqu'au sillon occipital. Les lobes antérieur, à contour ovalaire, sont obliques par rapport à l'axe ; nous n'y avons pas observé les fossettes signalées par Marie Rouault le long des sillons latéraux antérieurs de *Lichas Heberti* et formant une sorte d'échancrure située au tiers environ du sillon en partant de son extrémité postérieure. Dans les spécimens du Portugal, on les constate, bien qu'atténués et situés plus en avant.

En tous cas, ces fossettes ne doivent pas avoir l'importance que leur attribuait M. Rouault, qui déclarait que leur présence était un caractère permettant de distinguer *L. Heberti* de toutes les espèces du même genre ; on sait en effet que de pareilles cavités ont été signalées chez d'autres formes. Les lobes moyens sont bien développés, mais leur place a été modi-

(1) M. Rouault, 1849. *Note sur de nouvelles espèces de fossiles découvertes en Bretagne*. Bul. Soc. Géol. Fr. 2^e série. T. VI, p. 377.

(2) Delgado. *Loc. cit.* Pl. I, Pl. V.

fiée par la pression qui les a ramenés vers l'axe ; ils étaient nettement délimités du côté interne. Les lobes postérieurs sont comme toujours les plus petits et occupent l'espace compris entre les précédents et le sillon occipital. Les joues fixes et les joues mobiles ne nous sont connues qu'en partie et ne peuvent fournir aucun caractère précis. La surface entière de ce moule interne est couverte de granulations inégales, pustuliformes, donnant à l'ensemble un aspect chagriné, caractère qui s'atténue dans les sillons et le long des dépressions.

Le superbe pygidium de La Pouëze que nous figurons, est un peu étiré et déjeté du côté droit par suite de la compression ; ses reliefs étant normalement moins saillants que ceux de la tête, la déformation s'y est opérée beaucoup plus régulièrement, et il devient ainsi facile de se rendre compte de sa forme primitive, de ses caractères et même de ses dimensions normales. En tenant compte de leur allongement accidentel, on peut estimer que le pygidium et la partie conservée de l'épine caudale devaient mesurer 26 c. environ.

L'axe médian, à sa partie antérieure, occupe presque un tiers de la largeur totale du pygidium, puis décroît graduellement, mais assez lentement en largeur et se continue ensuite au delà des plèvres sous la forme de cette large et longue pointe qui, dans l'échantillon en question devait dépasser la longueur totale du pygidium. A la partie antérieure de l'axe médian, sur le premier quart environ, on constate l'existence de trois anneaux un peu sinueux, dont la convexité médiane est tournée vers l'arrière : les deux premiers sont très distincts et séparés par un sillon, mais le troisième est beaucoup plus obscur et au-delà on ne voit aucune trace de segmentation.

L'axe médian est limité de chaque côté par les sillons dorsaux très faiblement convergents, lesquels deviennent peu visibles et finissent par disparaître sur la partie postérieure ; les lobes latéraux sont constitués chacun par trois plèvres planes, un peu différentes de forme entre elles ; les deux premières seules sont munies d'une large et forte épine latérale, et divisées en deux parties inégales (l'antérieure étant la plus large) par un sillon semblable à ceux qui séparent les plèvres entre elles. Ces plèvres retombent de plus en plus rapidement vers l'arrière. La troisième, celle qui est dépourvue d'épine terminale et de sillon, est très longue et très étroite et s'amincit progressivement de façon à donner à la partie postérieure du pygidium une forme si étroite et si anguleuse que le point où l'épine caudale prend naissance est à peine indiqué sur le contour par une très légère inflexion. L'empreinte externe de la doublure, par suite de la disparition du moule interne sur certains points du pourtour, est très visible sous les épines de la première et de la deuxième plèvre du côté gauche, ainsi que tout le long du côté droit ; elle montre l'existence de stries longitudinales irrégulières et un peu flexueuses. Au contraire, dans une partie fracturée de l'épine caudale, l'empreinte externe de la doublure montre que le côté ventral de cette pointe était entièrement couvert d'une grande quantité de granulations, ornementation analogue à celle du côté dorsal et fort différente de celle de la doublure marginale du pygidium.

Parmi les spécimens du Portugal, M. Delgado figure un échantillon où l'on voit très nettement un sillon longitudinal dirigé suivant l'axe de la pointe caudale et divisant celle-ci en deux parties (1). Ce sillon que M. Delgado regarde comme normal et qui, d'après lui, devait se prolonger sur toute la longueur de l'épine, fait admettre à cet auteur que le prolon-

(1) Delgado. *Loc. cit.*, p. 26. Pl. III, fig. 1 et 2.

gement caudal était « divisé à son extrémité postérieure en deux pointes très courtes et très arrondies. »

Il en conclut que cet appendice provient de la jonction, par leur bord externe, des deux plèvres postérieures du pygidium, lequel représenterait un dernier segment post-abdominal, et correspondrait au telson des Euryptéridées auquel il ressemble par sa forme terminale, mais qui, ici, contrairement à ce qui se passe chez les Mérostomes est soudé à l'avant-dernier segment. De telle sorte que, pour M. Delgado, *Uralichas* est un Lichadæ, appartenant à la section des *Lichas* qui ont une échancrure au droit de l'axe, représentant un type très élevé parmi les Trilobites et « formant en quelque sorte l'un des chaînons de liaison entre cet ordre de Crustacés et le groupe immédiatement supérieur des Mérostomes. »

Nous pouvons d'autant moins nous rallier à l'hypothèse émise par M. Delgado, que nous ne croyons pas à l'existence normale d'un sillon longitudinal le long de l'épine caudale, et que tout nous porte à croire que celle-ci devait être spiniforme et non bifurquée à son extrémité. Notre échantillon montre en effet sur l'empreinte laissée par le côté ventral de l'épine, une crête indiquant l'existence d'une dépression, mais en se reportant à la figure, on verra que cette dépression, qui pour nous, correspond à une cassure, est irrégulière dans sa direction, qu'elle est coupée par des sillons analogues qui ne sont que l'indication de fractures et enfin, que du côté dorsal il n'en existe aucune trace. L'examen des figures auxquelles renvoie M. Delgado ne fait d'ailleurs que confirmer notre manière de voir, car nous y constatons que le sillon peut parfois être double d'un même côté, qu'il est très irrégulier, et que sur son parcours, les granulations ne se modifient aucunement, alors qu'elles s'atténuent et disparaissent dans toutes les dépressions linéaires de la tête et du pygidium. Nous ne voyons donc dans ce caractère que le résultat de l'écrasement de l'épine caudale, laquelle, par suite de la compression qu'elle a subie, s'est fracturée transversalement et longitudinalement, ainsi que cela a toujours lieu lorsqu'un corps tubulaire à section elliptique ou circulaire se trouve comprimé parallèlement à son axe : les orthocères et surtout les tiges d'encrines qui présentent si souvent des accidents de ce genre, en sont un frappant exemple.

Quant au mode de formation de cette pointe, que M. Delgado considère comme étant constituée à l'aide des deux dernières plèvres du pygidium allongées démesurément et reployées l'une sur l'autre, nous pensons, au contraire, qu'elle forme plutôt un tout continu avec l'axe médian dont elle ne serait qu'une prolongation au-delà des plèvres.

Le tégument ayant toujours disparu et toutes les surfaces de nos fossiles correspondant à des moules internes, il y avait lieu de se demander si les nombreuses aspérités qui les recouvrent reproduisaient, grâce à la minceur de la carapace, les véritables granulations de la surface externe de la carapace, ou bien si elles n'étaient autre chose que le moulage de petites cavités situées exclusivement à la surface interne de celle-ci. Le moule interne de l'épine caudale étant brisé et ayant disparu en partie, montre que l'empreinte laissée par la surface externe de la carapace est couverte de nombreuses petites cavités, ce qui ne laisse aucun doute à cet égard montrant nettement la nature des granulations qui recouvraient toute la surface. Ces granulations, qui sont serrées parfois de façon à se toucher presque, sont constituées par de petits tubercules subarrondis et coniques ; parmi ceux-ci, les uns sont très petits et ce sont les plus nombreux, tandis que d'autres, beaucoup plus gros, apparaissent disséminés au milieu de la masse, étant encore assez rapprochés entre eux et assez régu-

lièrement répartis. Les plus gros atteignent au moins un millimètre de diamètre. Sur la pointe caudale ces granulations sont un peu plus petites.

Cette forme ne peut être comparée, aussi bien par sa taille que par l'ensemble de ses caractères, qu'au *L. Heberti*, de Rouault ; toutefois, elle se distingue de cette espèce par ses dimensions plus considérables, ainsi que par son lobe frontal moins bombé, moins développé à la partie antérieure et moins resserré en arrière : la partie rétrécie correspondant environ au tiers de la largeur maximum de ce lobe dans *U. Riberoi*, tandis qu'elle n'équivaut qu'au cinquième dans *Lichas Heberti*. De plus, l'échancrure des lobes antérieurs le long du sillon antérieur n'occupe pas la même place dans les deux espèces, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, et enfin les granulations du céphalothorax sont plus fines et moins serrées dans l'espèce de Vitré. A ces différences, il est certain que l'on pourrait en ajouter bien d'autres si les échantillons que l'on possède de ces deux espèces n'étaient pas toujours déformés. Le pygidium, connu seulement chez l'une d'elles, pourrait aussi certainement fournir d'autres caractères distinctifs ; c'est du reste avec cette présomption que nous laissons provisoirement l'espèce de Rouault sous le nom générique de *Lichas*.

Nous figurons à nouveau le type de *L. Heberti* qui fait partir des collections du Musée de Vitré, et que notre ami, M. le Docteur Rupin a bien voulu nous confier pour cette étude. Cette espèce paraît être très rare. On la connaît dans les schistes de Vitré, et à Monteneuf où, d'après MM. de Tromelin et Lebesconte, l'abbé Daniello l'aurait trouvée antérieurement à Marie Rouault. Sa présence dans les ardoises d'Angers nous semble douteuse, étant donné que le seul spécimen de cette localité qui ait été rapporté à cette espèce, est celui qui a été décrit par Bayan, lequel est en réalité un *Uralichas Riberoi*.

En Portugal, M. Delgado a indiqué le *L. Heberti* à Penacova, au Nord-Est de Coimbre dans le bassin silurien de Bussaco, et à Vallongo à l'Est de Porto ; malheureusement, le spécimen figuré est trop incomplet pour pouvoir fournir une preuve certaine à l'appui de cette détermination. *L. Heberti* occuperait dans le bassin de Bussaco, un horizon très rapproché de celui auquel on trouve *U. Riberoi* dans celui de Vallongo. Ces deux formes, du reste, y seraient localisées dans les schistes ardoisiers inférieurs à *Calymene Tristani*, *Placoparia Tourneminei*, *Asaphus nobilis*, *Redonia Duvaliana*, *R. Deshayesiana*, etc., occupant dans ces couches le niveau le plus supérieur. Cette précision dans la distinction des horizons n'a pu être vérifiée dans l'Ouest de la France, mais il n'en est pas moins vrai que c'est dans des couches équivalentes comme âge qu'on les rencontre.

Les dimensions vraiment extraordinaires atteintes par l'*Uralichas Riberoi* dont nous figurons un céphalothorax et un pygidium, nous ont amenés à chercher à rétablir la taille de ce trilobite géant, en tenant compte de sa déformation et en reconstituant les parties manquantes. Nous l'avons comparé sous ce rapport avec les autres formes de grande taille actuellement connues et nous avons cherché à savoir si l'apparition des géants était en relation, soit avec le maximum de développement, soit avec le déclin ou la disparition d'un groupe.

Bayan en signalant la tête de l'*U. Ribeiroi* à la Société Géologique, en avait déjà évalué la longueur totale à 70 ou 80 cm. Ce chiffre ne nous paraît pas exagéré, étant donné la longueur du céphalothorax et du pygidium qui mesurent chacun 20 cm. de long, abstraction faite de la pointe caudale. Or, comme le thorax compte chez les *Lichas* pour plus d'un tiers dans la longueur du corps, et qu'il faut y ajouter le prolongement axial du pygidium

dont la dimension peut être évaluée en prolongeant les deux lignes marginales de celui-ci, on arrive, d'après ces chiffres, à une longueur totale de plus de 90 cm. que nous ramenons à 70 pour compenser l'exagération due à l'étirement par compression. Cette dimension est, croyons-nous, la plus grande qui soit connue chez les Trilobites.

Les espèces appartenant à cet ordre et atteignant une grande taille se trouvent dans toutes les formations paléozoïques, sauf dans le Carbonifère où la réduction en nombre des genres et des espèces coïncide avec une réduction dans les dimensions des individus. En général, toutefois les individus géants ne sont connus qu'à l'état fragmentaire, fait qui s'explique d'autant plus facilement que les Tribolites complets, même de taille médiocre, se rencontrent toujours beaucoup plus exceptionnellement que les autres dans la majeure partie des sédiments, et qu'à plus forte raison leurs chances de conservation ont diminué avec une augmentation de surface de la carapace.

Dès le Cambrien, certains trilobites atteignent des dimensions gigantesques : c'est du reste l'époque pendant laquelle existent concurremment les formes les plus petites, associées à d'autres excessivement développées. Le genre *Paradoxides* est celui qui fournit les types les plus grands, et cela en même temps que des espèces de taille moyenne et même relativement petite. Des longueurs de 30 et de 40 cm. sont relativement fréquentes ; ex : *Paradoxides spinosus*, Böck (30 cm.), et *P. Tessini*, Brong. du Cambrien de Bohême (30 cm.), ainsi que *P. regina* Matthew, des couches de St-John dans le Canada dont les proportions sont tout à fait remarquables, puisqu'il mesure 31 cm. de large sur 39 de long ; ces dimensions peuvent encore être dépassées, ainsi qu'on le voit dans *P. Harlani* Green, du Potsdamien des environs de Boston, lequel atteint jusqu'à 45 centimètres.

À l'époque ordovicienne, on trouve la famille des *Asaphidæ* qui pendant longtemps a été considérée comme ayant fourni les spécimens les plus exceptionnellement développés en dimensions ; ceux de 20 à 30 cm. n'y sont pas rares. Barrande a figuré un *Asaphus nobilis* de 28 cm. de long ; les *A. Barrandei*, de Vern. provenant de l'Hérault, mesurent jusqu'à 40 centimètres. D'autres espèces appartenant à la même famille, mais classées dans un autre sous-genre, ont également un développement remarquable ; nous citerons en particulier les *Megalaspis gigas* et *M. Heros* provenant de Suède et qui ont 35 à 40 centimètres.

La taille de ces *Asaphidæ* a été encore dépassée à l'époque ordovicienne par les *Uralichas* qui surpassent de beaucoup toutes les dimensions connues, puisque le spécimen des environs d'Angers atteint, d'après nos calculs, plus de 70 cm. de long. Les spécimens du Portugal qui devaient se rapprocher de ce chiffre, montrent également que cette espèce géante était de beaucoup la plus grande parmi tous les Trilobites connus.

La famille des *Lichadæ* est d'ailleurs celle qui renferme jusqu'ici les formes les plus gigantesques ; en effet, c'est encore le type d'un des genres de cette famille, *Terataspis grandis*, qui pendant le Dévonien va dépasser par ses dimensions tous les autres trilobites vivant à la même époque. Bien que moins grand qu'*Uralichas Riberoi*, il mesure cependant 47 cm. de long sur 27 cm. de large. Il provient des couches du Schoharie et du Corniferous group d'Amérique, c'est-à-dire de la partie supérieure du Dévonien inférieur. Cette espèce dont nous devons une très intéressante restauration à M. Clarke (1), faite d'après de nombreux fragments, nous montre combien cet animal est remarquable, non seulement par sa

(1) Clarke. 1890. Observations on the *Terataspis grandis* Hall ; the largest known Trilobite.

taille, mais aussi par la présence de prolongements épineux dont sont pourvus la partie postérieure de la tête, l'axe thoracique, et les bords du pygidium.

La taille de l'animal et la disposition de ses épines, que M. Clarke considère comme des armes offensives et défensives, ont fait dire à cet auteur qu'il devait être un véritable « lord dans le domaine des Invertébrés, mais un morceau peu friand pour les lourds placoides de cette époque ».

Un autre genre, *Homalonotus*, a également fourni des formes géantes qui, bien que moins remarquables que celles que nous venons de citer dans les Lichadæ, doivent cependant être signalées ici. Dès l'Ordovicien moyen (grès de Caradoc), époque à laquelle les *Homalonotus* sont communs, on trouve déjà *H. rudis*, Salter, qui devait atteindre 30 cm. de long.

Les espèces connues dans le Silurien supérieur, sont de taille moyenne, mais celles du Dévonien inférieur, tant en Europe que dans l'Amérique du Nord, atteignent des dimensions souvent très remarquables.

En Allemagne, M. Beushausen (1) signale dans le Coblentzien, *H. scabrosus* Koch, dont la taille moyenne est de 18 à 20 cm. et qui peut s'allonger jusqu'à 35 cm. Quant à *H. armatus* Burmeister, il mesure jusqu'à 38 et 40 cm. En Amérique M. Whitfield (2) a décrit et figuré, provenant de l'Oriskany sandstone, un *Homalonotus* (*H. major*), qui devait avoir lorsqu'il était complet de 39 à 40 cm. de longueur, et MM. Hall et Clarke qui ont étudié à nouveau cette espèce sont arrivés aux mêmes résultats (3). Ces dimensions ne paraissent d'ailleurs pas très rares chez les espèces de ce genre à l'époque dévonienne inférieure. Nous possédons un échantillon trouvé à St-Germain-le-Fouilloux, près Laval, ayant son céphalothorax presque complet, auquel 5 anneaux thoraciques sont restés attachés. Cet exemplaire devait atteindre comme les grands *Homalonotus* d'Allemagne et d'Amérique, environ 40 cm. de long.

Ces recherches ne nous ont fait découvrir aucune relation certaine entre l'apparition des formes géantes et l'histoire du groupe auquel elles appartiennent, celles-ci pouvant correspondre tout aussi bien à l'apogée d'une race qu'au moment voisin de son extinction. Toutefois, d'une façon générale, on peut dire que dans un même groupe, les premières formes apparues atteignent rarement leur maximum de développement, et que celui-ci semble plutôt se rapprocher du moment voisin de l'extinction du type, et même parfois marquer le moment même de cette extinction comme c'est le cas pour les Calymènes.

Il n'en est plus ainsi si nous considérons l'ensemble du groupe trilobitique, qui, n'ayant donné lieu à aucune manifestation spéciale de développements excessifs pendant l'époque du Dévonien supérieur, n'est plus représenté pendant le Carbonifère, que par des genres où ne figurent que des espèces de très petite taille.

(1) Beushausen. 1883. *Monographie der Homalonotus-Arten des Rheinischen Unterdevon*.

(2) Whitfield. 1885. *Notice on a very large species of Homalonotus from the Oriskany Sandstone formation*. Bul. A. M. New York. Vol. I. p. 193, n° XXII.

(3) Hall and Clarke. 1888. *Paleont. of New York*. Vol. VII, p. 4, Pl. V, A.

MÉMOIRE N° 16

Pl. I.

- Fig. 1. — Pygidium d'*Uralichas Riberoi*, provenant des schistes ardoisiers de la Pouëze, près d'Angers. Grandeur naturelle.
- Fig. 2. — Tête d'*U. Riberoi*, provenant des schistes d'Angers. Grandeur naturelle.
- Fig. 3. — Tête de *Lichas? Heberti*, provenant des schistes de Vitré, type de l'espèce. Grandeur naturelle.

MÉMOIRE N° 16

P. L.

3

2

1

FAUNA SILURICA

DE

PORTUGAL

DIRECÇÃO DOS TRABALHOS GEOLOGICOS DE PORTUGAL

FAUNA SILURICA

DE

PORTUGAL

NOVAS OBSERVAÇÕES Á CERCA

DE

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

POR

J. F. N. DELGADO

DIRECTOR DOS TRABALHOS GEOLOGICOS
SOCIO EFFECTIVO DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

LISBOA

TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS

1897

TERRENOS PALEOZOICOS DE PORTUGAL

CONTRIBUIÇÕES

PARA O ESTUDO DA FAUNA SILURICA

NOVAS OBSERVAÇÕES Á CERCA

DE

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

O sr. Daniel OEhlert na sua memoria intitulada «*Uralichas Ribeiroi des schistes d'Angers*» publicada em 1896 no tomo VI, fasc. I das memorias da Sociedade geologica de França, faz varias considerações á cerca d'esta especie da bacia de Vallongo,¹ que quatro annos antes eu havia descripto, contestando algumas asserções que eu tinha apresentado á cerca d'este notavel Trilobite, mórmente no que respeita á fórma do pygidio.

A muita consideração devida a tão respeitavel mestre, incitou-me naturalmente a repetir as explorações na pedreira d'onde os primeiros exemplares de *Uralichas* haviam sido extrahidos, para vêr se obtinha novos materiaes de estudo que me esclarecessem sobre os pontos duvidosos; o que facilmente pude realisar, mercê da benevolencia do proprietario do terreno o Ex.^{mo} Barão de Soutelinho, que não só me permittiu fazer as excavações necessarias, mas generosamente me concedeu a posse de todos os fosseis que obtivesse. É-me muito agradavel fazer esta declaração, expressando publicamente o meu reconhecimento pela valiosa divida feita por esta fórma ao museu da Direcção geologica a meu cargo.

As explorações duraram dez semanas, tendo sido n'ellas empregados activamente tres operarios, que desmontaram approximadamente 200 metros cubicos de schisto. O material extrahido foi miudamente explorado, obtendo-se muitas centenas, mesmo alguns milhares de exemplares de Trilobites de varias especies, mas sendo poucos e pela maior parte máos os restos da especie que particularmente me interessava.

Vista a excepcional importancia d'esta especie, reproduzimos hoje como supplemento alguns dos exemplares obtidos n'esta nova exploração, os quaes fornecem novos elementos para o conhecimento da especie, ou completam os que já tinhamos dado anteriormente.

¹ *Descripção de uma forma nova de Trilobite, Lichas (Uralichas) Ribeiroi*, por J. F. N. Delgado. 1892, in 4.º, 31 p., 6 est.

Infelizmente todos os nossos exemplares estão mais ou menos deformados pela compressão ou distensão que os schistos soffreram, variando muito de fórma segundo a orientação dos fosseis na rocha. Assim, não admira que, tendo sido a mesma a causa de deformação de todos elles, os resultados sejam muito differentes, parecendo que uns fosseis, por exemplo, foram comprimidos no sentido do comprimento, emquanto que outros o foram lateralmente, ou mais ou menos obliquamente.

Em vista dos resultados obtidos, pode affirmar-se que *Uralichas Ribeiroi* é uma especie relativamente rara; comtudo, não é por isso menos interessante, visto como ella caracteriza distinctamente o horizonte onde apparece em Portugal, provavelmente o mesmo que occupa na parte occidental da França. Este facto, diz o sr. OEhlert, serve para confirmar a semelhança frisante que existe entre certos niveis ordovicianos de Portugal e do massiço armoricano.

Acceitando, como perfeitamente justificadas, algumas das considerações apresentadas pelo meu sabio collega, seja-me permittido discordar n'outros pontos das suas apreciações.

Assim, o estudo dos exemplares que novamente obtivemos, prova indubitavelmente que o prolongamento caudal do pygidio é simples e não bifurcado como eu tinha supposto, dependendo aquelle falso aspecto¹ unicamente do esmagamento e da fractura do exemplar, que está de facto incompleto n'esta parte. A inspecção da fig. 4, est. IV, do presente trabalho, onde está representado um pygidio quasi completo e pouco deformado de um individuo novo de *Uralichas Ribeiroi*, tira toda a duvida a semelhante respeito. A comparação d'este exemplar com o pygidio de La Pouëze figurado pelo sr. OEhlert, mostra, além da sua identidade, que este ultimo devia prolongar-se muito mais do que indica a figura, medindo portanto o individuo, quando restaurado, ainda maior comprimento do que aquelle que o sr. OEhlert lhe attribuiu.

Mas, se n'esta parte de bom grado confessamos o nosso erro, estamos por emquanto longe de admittir que o prolongamento do pygidio de *Uralichas* seja, como o sr. OEhlert pretende, um espinho caudal ou appendice spiniforme, simples projecção do eixo²; pelo contrario, julgamos que a sua ligação com os lobulos lateraes é pelo menos tão intima como com o eixo, cuja saliencia aliás desaparece antes d'este ter attingido o contorno do pygidio. Por isso, como consequencia logica d'esta disposição, eu formulei a hypothese que este prolongamento caudal seja o representante das duas pleuras posteriores do pygidio, extremamente alongadas, dobrando-se para a face ventral do Trilobite, e soldando-se uma á outra pela sua borda exterior; idéa tanto mais plausivel, porquanto a ornamentação d'aquelle prolongamento é a mesma na sua face dorsal e na face inferior, e identica á da superficie do pygidio.

Este caso é inteiramente differente do que se dá com outros Trilobites que possuem um appendice caudal, como por exemplo certas especies de *Dalmanites*. Em *D. socialis* o eixo termina por um appendice caudal, que se levanta com a inclinação de 45° sobre o plano do Trilobite³. Em *D. Vetillarti*, que representamos, para comparação, na est. III, figs. 2, 5 e 6, e est. IV, fig. 5, ha tambem uma perfeita ligação da ponta caudal e do eixo do pygidio, com o

¹ Veja est. III da minha memoria anterior.

² Diz o sr. OEhlert: «Quanto ao modo de formação d'esta ponta, que o sr. Delgado considera como sendo constituida á custa das duas ultimas pleuras do pygidio extraordinariamente alongadas e dobradas uma sobre a outra, eu julgo, pelo contrario, que ella fórma um todo continuo com o eixo mediano, representando sómente o prolongamento d'este além das pleuras.» (Mem. cit., p. 5).

³ *Système silurien de la Bohême*, vol. I, p. 553.

qual se continua; esta ponta, mais ou menos extensa, e n'alguns exemplares chegando a egualar a metade do comprimento do corpo do Trilobite, é visivelmente o prolongamento do eixo, ao qual se liga sem nenhuma dependencia dos lobulos lateraes.

Em *Uralichas Ribeiroi*, porém, succede exactamente o contrario; os dois sulcos dorsaes que limitam o eixo desvanecem-se, convergindo um para o outro, antes de alcançarem o contorno do pygidio, e no sitio onde desaparecem, ha uma depressão correspondente no eixo, a qual parece indicar a terminação d'este; assim, o prolongamento caudal vem a ser formado pela junção dos lobulos lateraes em frente do eixo, mas visivelmente sem a interferencia d'este.

Poderíamos accrescentar ainda em apoio da nossa idéa que Barrande, fallando de *Dalmanites rugosa*, Cord. sp., que tambem possui um appendice caudal com disposição analoga ao de *Uralichas*, diz o seguinte:

«O seu contorno (do pygidio) é formado por um limbo quasi horizontal de 3 a 5 mill. de largura, terminando posteriormente por um appendice caudal, de 5 a 10 mill. de comprimento. O eixo, ligeiramente abobadado, desaparece muito perto do talude, mas vê-se por detrás d'elle uma carena que se estende até á ponta caudal.»¹

Observações analogas faz ácerca de *Dalm. auriculata*, Dalm. sp. e *D. spinifera*, Barr., que semelhantemente teem um appendice caudal nascendo do limbo do contorno do pygidio e não formando rigorosamente o prolongamento do eixo.

Por outro lado, descrevendo *Dalmanites solitaria*, Barr., o egregio paleontologista diz o seguinte:

«O pygidio tem 6 a 8 articulações distinctas e uma carena que alcança o appendice caudal, o qual parece resultar da soldadura das duas bordas.»²

Não ha pois impossibilidade de que o prolongamento caudal de *Uralichas*, fosse tambem produzido da mesma fórma.

Devemos ainda notar que em todos os exemplares de *Dalmanites Vetillarti*, em que a ponta caudal foi destruida, mas em que pode observar-se a sua impressão, (est. III, fig. 2 e 4, est. IV, fig. 5) vê-se sempre uma crista longitudinal saliente como a que se observa nas impressões do prolongamento caudal de *Uralichas* (est. IV, fig. 4); reconhecendo-se, portanto, que este aspecto não é accidental e simplesmente devido ao esmagamento, mas indica pelo contrario a existencia de um sulco estreito na face inferior do prolongamento caudal. Este sulco não corresponde, pois, a uma fractura, como o sr. OEhlert affirma, posto seja evidente que o esmagamento do exemplar que primeiro representámos³ produzisse as fracturas irregulares que n'elle se observam, algumas vezes tendo-se mesmo dado no sentido longitudinal.

Para que pudesse acceitar-se a explicação que o sabio paleontologista de Laval dá da existencia d'este sulco longitudinal, seria aliás necessario que se realisasse a condição que elle suppõe, de que o prolongamento caudal fosse um tubo de secção circular ou elliptica. Ora, no exemplar da est. III do nosso primeiro trabalho vê-se claramente que, emquanto a sua superficie era superiormente abaulada, inferiormente era plana, d'onde resulta que a secção era plano-convexa; e n'este caso não se comprehende como a fractura se fizesse longitudinalmente

¹ Op. cit., p. 545.

² Op. cit., p. 556.

³ Veja est. III do meu trabalho anterior.

na face plana, coincidindo exactamente com o eixo, quando era bem mais natural que se produzisse na face opposta ou convexa.

Se se acceitasse esta opinião do sr. OEhlert, isto é, que o prolongamento caudal é um simples ornamento do pygidio, «formando um todo continuo com o eixo mediano, do qual seria apenas o prolongamento além das pleuras» não haveria na verdade motivo para o estabelecimento do subgenero *Uralichas*, que o sr. OEhlert aliás admite; pois que não só no mesmo genero se comprehendem especies em que existe o appendice caudal, e outras que o não teem, mas até na mesma especie uns individuos o possuem e outros não. Por isso, julgo expressar bem a minha idéa dizendo que o prolongamento do pygidio de *Uralichas* não representa simplesmente um appendice sem importancia, mas pelo contrario accusa uma modificação profunda na conformação d'aquella parte do corpo do Trilobite, produzida por assim dizer pelo enrolamento da crusta sobre si mesma n'um tubo comprido. Com effeito, a ornamentação no lado dorsal como no lado ventral, analoga á da superficie do corpo, e muito differente da do forro marginal do pygidio, auctorisa este modo de vêr.

A fórma ponteaguda do prolongamento caudal do pygidio de *Uralichas* é um character que, em todo o caso, tem a nosso vêr singular importancia. Aos dois grupos de *Lichas* estabelecidos por Barrande para as especies cuja pleura é dividida em duas faixas achatadas, um d'elles formado pelas especies que teem o contorno do pygidio inteiro, e outro comprehendendo as fórmas que teem uma chanfradura em frente do eixo, ha que accrescentar um terceiro grupo, inteiramente o opposto d'este ultimo, o qual reunirá as especies que, em vez de chanfradura, teem aquelle prolongamento.

Em conclusão: a descoberta do magnifico pygidio de La Pouëze deu o conhecimento de dois factos interessantes para o conhecimento de *Uralichas Ribeiroi*: 1.º que a ponta caudal não é bifurcada na extremidade, como erradamente eu tinha supposto pelo exame de um exemplar esmagado e incompleto, representado na est. III do meu trabalho anterior; 2.º que as dimensões d'esta especie são superiores ao que eu tinha julgado, porquanto attribui-lhe sómente 560 mill. de comprimento, emquanto que o sr. OEhlert, baseando-se em dados seguros, eleva esta dimensão a 700 mill. Ora, deve advertir-se que eu calculei aquella dimensão, suppondo que o pygidio figurado com o prolongamento caudal estava proximamente completo; porém, se tivermos em consideração a grandeza relativa do pygidio e respectivo appendice caudal representado na est. IV, fig. 4, do presente trabalho, sem grande difficuldade chegaremos a obter para os nossos exemplares aquella maior dimensão.

Passando em revista as differentes especies de Trilobites que podem considerar-se gigantes, chega o sr. OEhlert, como nós, á conclusão que *Uralichas Ribeiroi* é a maior especie conhecida.

Dos differentes generos que povoaram os mares paleozoicos em todas as epochas (com exclusão da epocha siluriana superior, cujas especies são de grandeza mediana, e da carbonifera em que figuram unicamente especies de pequeno porte, e além disso em pequeno numero) o sr. OEhlert cita os generos *Paradoxides*, *Asaphus*, *Lichas* e *Homalonotus*, como os que deram

as maiores especies de Trilobites, e sendo a familia das Lichadae que até agora reúne as formas mais gigantescas, mostrando-se assim ainda na epocha devoniana.

Possuindo nós nas nossas collecções varios Trilobites, de grandes dimensões, devemos citar, além de *Uralichas Ribeiroi*, sem duvida o maior de todos, a impressão de um segmento incompleto do thorax de um *Asaphus* ou de *Ogygia*, pertencente ás collecções da antiga Comissão geologica e agora existente no museu da Escola Polytechnica de Lisboa, o qual mediria, se fosse completo, 385 millimetros de comprimento. O Trilobite teria, pois, 36 a 40 centimetros de comprimento, suppondo que as tres partes principaes do corpo eram proximamente eguaes; mas se o compararmos, por exemplo, com a forma longa de *A. nobilis* o seu comprimento excederia talvez 60 centimetros.

Um outro exemplar incompleto de *Asaphus*, muito esmagado e deformado, proveniente da Pedreira do Gallinheiro, a 3500^m a S.-E. da capella de S.^{to} Adrião (Sobrado de Paiva), provavelmente da especie que foi classificada por Sharpe como *Isotelus Powisi*, Murch., mediria, se estivesse completo, mais de 40 centimetros de comprimento.¹

Muitos exemplares mais ou menos completos de *Asaphus*, obtidos da mesma pedreira de Covelo onde foi achada *Uralichas Ribeiroi*, tambem são de grandes dimensões, provando assim que esta paragem, além de extraordinariamente favoravel á multiplicação dos individuos, foi ao mesmo tempo muito propria para o desenvolvimento das differentes formas de Trilobites.

Elementos para a descripção da especie

Cabeça.—Na est. I representamos o molde e a impressão externa de uma cabeça de dimensões proximamente eguaes á do exemplar figurado tambem na est. I do nosso trabalho anterior, porém melhor conservada e um pouco mais completa. Além da glabella, vê-se tambem n'aquelle exemplar a face movel, mas falta a ponta genal, que se partiu. A granulação da cabeça era muito cerrada e irregular, cobrindo toda a superficie, menos o fundo dos sulcos, onde desaparece totalmente, e as partes deprimidas, onde era mais fina. Os tuberculos eram subarredondados, mas não terminam superiormente em ponta aguda como em *Lichas Ribeiroi*. Nenhum character notavel ha que accrescentar aos que já demos d'esta parte do corpo.

Na fig. 1 da est. II está representada uma cabeça de *Uralichas* de menores dimensões, quasi completa, porém deformada por compressão lateral. N'este exemplar vê-se bem qual era a posição do olho, collocado em frente dos lobulos medios, descobrindo-se n'este particular mais uma analogia entre *Uralichas Ribeiroi* e as *Lichas* da primeira subdivisão creada por Barrande (*L. scabra*, *L. avus*, *L. incola*). A mesma ligação achamos entre os dois grupos na conformação do pygidio, fazendo aliás abstracção do prolongamento caudal, que é, pelo contrario, substituido por uma chanfradura mais ou menos funda no contorno d'aquellas especies.

O olho, que se vê representado com uma parte da face fixa na fig. 6 da est. III, e que por effeito do esmagamento se mostra de frente, tendo quasi desaparecido o lobulo palpebral,

¹ Aproveito a occasião para rectificar um erro que me escapou quando organizei a lista dos fosseis de Vallongo, que acompanha o meu precedente trabalho. A especie citada por Sharpe (Q. J., 1848, p. 146) como *Isotelus Powisi*, Portl., é effectivamente um *Asaphus*, e não *Ogygia* aff. *desiderata*, como eu a citei, á qual todavia pela forma geral muito se assemelha.

tem 18 millímetros de comprimento, mostrando portanto que pertencera a uma cabeça de grandes dimensões. N'este exemplar vêem-se vasias as capsulas das lentes, que eram numerosissimas, de fôrma circular e dispostas em quincunce. Pelo mau estado de conservação do exemplar, não é possível contar precisamente o numero das lentes; porém o numero das filas verticaes decerto excedia 50, contando-se em cada uma 20 a 30 lentes, o que dá para o numero total d'ellas 1200 a 1500.

Nas figs. 2 e 2a da est. II estão emfim representados o molde e a impressão externa da cabeça de um individuo novo de *Uralichas Ribeiroi*, ao qual pertenceria talvez o pygidio representado na est. IV, fig. 4. A compressão que esta cabeça soffreu, diminuiu-lhe o comprimento, ao passo que lhe exaggerou um pouco a largura; todavia, as suas proporções geraes, a fôrma da lobação e outros caracteres, mostram que ella não deve separar-se da especie que descrevemos, sobretudo comparando-a ao exemplar representado na est. I.

Thorax.—São mais elucidativos os fragmentos que obtivemos agora d'esta parte do corpo de *Uralichas Ribeiroi* do que os que possuíamos anteriormente. Na est. IV, figs. 1, 2 e 3, estão representados fragmentos pertencentes a dois ou a tres individuos differentes, que mostram claramente os caracteres das pleuras, confirmando e ampliando a descripção que anteriormente d'ellas tínhamos dado.

Na fig. 1 vê-se a impressão de 9 segmentos contiguos de um exemplar, aliás incompleto e um pouco deformado, que na sua fôrma geral todavia se assemelha bastante a *L. scabra*. Como n'esta especie, o eixo de *Uralichas* era medianamente convexo, emquanto que as pleuras na sua metade interna eram planas.

Nos exemplares das figs. 2 e 3 vê-se melhor a fôrma das pleuras, que eram falciformes e recurvadas para traz. O sulco, curvando-se elegantemente desde o sulco dorsal até á extremidade da pleura, e partindo quasi do meio da largura do annel, era muito estreito e fundo, e dividia a pleura em duas faixas quasi eguaes, planas e ao mesmo nivel, a anterior um pouco mais larga do que a posterior, especialmente á altura do cotovelo. Nos exemplares representados no meu primeiro trabalho, mal podiam apreciar-se estes caracteres. A fig. 2 deixa perceber qual era a largura do forro da crusta, que se extendia até proximo do cotovelo da pleura.

Pygidio.—D'esta parte do corpo, que mais nos importava conhecer, representamos um exemplar quasi completo de um individuo novo (est. IV, fig. 4), um pygidio muito imperfeito (est. III, figs. 1 e 1a), e um fragmento de outro pygidio de grandes dimensões (est. III, fig. 3). Nos dois primeiros exemplares, mas especialmente no primeiro, reconhece-se distinctamente que o appendice caudal não é o prolongamento do eixo, o qual se interrompe antes de attingir o contorno; mas sim é uma dependencia dos lobulos lateraes do pygidio, aos quaes está intimamente ligado e com os quaes se continua, mostrando, como elles, a mesma ornamentação. Tambem se reconhece n'estes exemplares, mas mais claramente no da est. IV, fig. 4, que na face inferior do prolongamento caudal existia um sulco longitudinal, que se reproduz na impressão externa do fossil n'uma crista saliente.

O pequeno fragmento figurado na est. III, fig. 3, apresenta algumas differenças no curso dos sulcos em relação ao pygidio representado pelo molde e impressão externa na est. II

e est. IV, fig. 1, do meu primeiro trabalho, e bem assim ao pygidio de la Pouëze. Com effeito, os sulcos que limitam e os que dividem as pleuras seguem um curso differente, convergindo n'um mesmo ponto do sulco dorsal, e é muito mais estreita e aguda do que n'aquelles exemplares a ponta saliente do contorno. Estas differenças, porém, são de pouca importancia, e não me parece que bastem para fazer suppor a existencia de outra especie de *Uralichas* nos nossos depositos, antes cabem nos limites das variações individuaes, que podem dar-se dentro da mesma especie.

Já Barrande, descrevendo *L. scabra*, notou as mesmas differenças na extensão relativa occupada por cada uma das pleuras do pygidio e na subdivisão de cada uma das pleuras.

«Estas variações, diz Barrande, são puramente individuaes, pois que se mostram mais ou menos nos fragmentos da mesma localidade, muito semelhantes aliás sob todos os aspectos¹.»

Cortes cuidadosamente feitos e com a maior individuação no Bussaco, mostraram que o nivel, que ali occupa *Lichas Heberti*, é proximamente o mesmo que o de *Uralichas Ribeiroi* na bacia de Vallongo, isto é, immediatamente inferior aos grés de Loredó, que são com toda a probabilidade proximamente synchronicos do grés de May. Com effeito, a comparação dos depositos silurianos do Bussaco e da Bretanha mostra a seguinte correspondencia:

BUSSACO	BRETANHA
Schistos impuros diabasicos.....	}.....Schistos de Trinucleus
Schistos de <i>Dalmanites Dujardini</i> ...	
Grés de Loredó.....	Grés de May
Schistos de <i>Homalonotus rarus</i>	}.....Schistos de Calymenes
Schistos de <i>Orthis Ribeiroi</i>	
Quartzites de Bilobites.....	Grés armoricano

Será por isso interessante apresentarmos para comparação com a lista de fosseis silurianos que demos de Vallongo, a lista dos fosseis do Bussaco, aliás ainda incompleta, que vae em seguida.

¹ Op. cit., p. 598.

Lista das especies do Silurico inferior (serie Ordoviciano) do Bussaco

	Schistos impu- ros diabasicos	Schistos de Dalm. Dujardini	Grés de Lored	Schistos de Homa- lonotus rarus	Schistos de Orthia Ribeiroi	Quartzites de Bi- lobites
Crustacea						
<i>Acidaspis Buchi</i> , Barr.....	..	..	..	*	*	
<i>Areia Bussacensis</i> , sp. n.....	*					
<i>Asaphus nobilis</i> , Barr.....	*	..	..	*	?	
» ou <i>Ogygia</i> , sp. n.....	..	..	..	*	*	
<i>Bronteus Choffati</i> , sp. n.....	*					
<i>Calymene Tristani</i> , Brongn.....	..	..	*	*	*	*
» » var. (com os sulcos da glabella desvanecidos)....	..	..	..	*		
» <i>Aragoi</i> , Rou.....	..	..	*	*	*	
» <i>transiens</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	*		
» <i>Costae</i> , sp. n. (aff. <i>C. Blumenbachi</i> , Brongn.).....	*					
<i>Cheirurus gryphus</i> , Barr.....	*					
» <i>claviger</i> , Beyr.....	?	..	..	..	*	
» <i>Bocagei</i> , sp. n.....	*					
» aff. <i>verrucosus</i> , Brögger.....	*					
» aff. <i>tumescens</i> , Barr.....	*					
<i>Dalmanites socialis</i> , Barr.....	*	*	*	*	*	
» » var. <i>grandis</i>	..	..	..	*		
» <i>Dujardini</i> , Rou.....	..	*	*	*		
» <i>Phillipsi</i> , Barr.....	..	*	..	*		
» <i>Vetillarti</i> , Rou.....	..	..	..	*	*	
<i>Homalonotus rarus</i> , Corda.....	..	..	..	*	*	
<i>Iliaenus Hispanicus</i> , Vern. e Barr. (<i>I. giganteus</i> , Burm., forma larga) ..	..	..	..	*	*	
» <i>Lusitanicus</i> , Sh. (<i>I. giganteus</i> , Burm., forma longa).....	..	..	..	*		
» <i>Loredensis</i> , sp. n.....	*					
» aff. <i>Murchisoni</i> , Salter.....	..	*				
<i>Lichas Heberti</i> , Rou.....	..	..	..	*		
» aff. <i>incola</i> , Barr.....	*					
» aff. <i>convexus</i> , Angelin.....	*					
<i>Ogygia glabrata</i> , Sh.....	..	..	..	*	*	
<i>Placoparia Zippei</i> , Bœck. (<i>Pl. Tourneminei</i> , Rou., non <i>Pl. Zippei</i> , Barr.) ..	..	..	*	*	*	
<i>Proetus Loredensis</i> , sp. n.....	*					
<i>Phillipsia parabola</i> , Barr.....	*					
<i>Remopleurides (Caphyra) Lorioli</i> , sp. n.....	..	..	..	*		
<i>Trinuclues Bureau</i> , OEhlert.....	*	*				
» <i>Goldfussi</i> , Barr.....	*	*				
<i>Beyrichia Bussacensis</i> , Jones.....	..	*	..	*	*	
» <i>simplex</i> , Jones.....	*	*	..	*	*	
» <i>major</i> , sp. n.....	*					
<i>Plumulites fraternus</i> , Barr.....	..	*				
» cfr. <i>Bohemicus</i> , Barr.....	*					
Cephalopoda						
<i>Lituites intermedius?</i> Vern. e Barr.....	..	*				
<i>Orthoceras bonum</i> , Barr.....	*					
» cfr. <i>bisignatum</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» cfr. <i>Bohemicum</i> , Barr.....	*					
» aff. <i>probum</i> , Barr.....	*					
» ind., varias especies.....	*	*	..	*	*	

	Schistos impu- ros diabasicos	Schistos de Dalm. Dujardini	Grés de Loredó	Schistos de Homa- lonotus rarus	Schistos de Orthis Ribeiroi	Quartzites de Bl- lobites
<i>Endoceras duplex</i> . Wahlbg. sp.....	..	..	..	..	*	
» <i>vaginatus</i> , Schloth.....	..	..	..	*		
Pteropoda						
<i>Hyolithes elegans</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» <i>Beirensis</i> , Sh.....	..	*	*	*		
» <i>cinctus?</i> Barr.....	..	*				
» <i>cfr. elongatus</i> , Barr.....	..	*				
» <i>cfr. indistinctus</i> , Barr.....	..	*				
» <i>cfr. simplex</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
» <i>cfr. striatulus</i> , Barr.....	*					
<i>Conularia nobilis</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
» <i>fecunda</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
» <i>cfr. Bohemica</i> , Barr.....	..	*	..	*		
» <i>tenuistriata</i> , sp. n.....	..	..	..	..	*	
Heteropoda						
<i>Bellerophon acutus</i> . Sow.....	..	*	*	*	*	
» <i>aff. acutus</i> , Sow. (♂ an sp. n.).....	..	*				
» <i>trilobatus</i> , Sow.....	..	*	*	*		
» <i>bilobatus</i> , Sow.....	..	*	..	*		
» <i>expansus</i> , Sow.....	..	*				
» <i>elongatus</i> , Portl.....	..	*				
» <i>Lebescontei</i> , Trom.....	..	..	..	*	*	
» <i>cfr. carinatus</i> , Sow.....	..	*				
Gastropoda						
<i>Ribeiria pholadiformis</i> , Sh.....	..	..	..	*		
» <i>OEhlerti</i> , sp. n.....	..	..	..	*		
» <i>gigantea</i> , nobis (<i>Myocaris Lutraria</i> , Salter).....	..	..	..	..	..	*
<i>Natica</i> , 2 especies ind.....	*					
<i>Platyostoma cfr. niagarensis</i> , Hall.....	..	*				
<i>Straparollus?</i> sp.....	..	..	..	*		
<i>Euomphalus cfr. carinatus</i> , Sow.....	*					
<i>Trochonema</i> sp.....	*					
<i>Cyclonema aff. sulcata</i> , Hall.....	*					
<i>Murchisonia</i> sp.....	*					
<i>Pleurotomaria Bussacensis</i> , Sh.....	..	*	*	*	*	
Lamellibranchiata						
<i>Orthonota britannica</i> , Rou. (<i>Sanguinolites Pellicoi</i> , Vern. e Barr.).....	..	..	..	*	*	*
<i>Tellinopsis</i> , 2 especies.....	..	..	..	*		
<i>Dceruska primula</i> , Barr.....	..	..	..	*		
<i>Dolabra? Lusitanica</i> , Sh.....	..	..	*	*	*	*
<i>Redonia Duvaliana</i> , Rou. (<i>R. Bohemica</i> , Barr., forma larga).....	..	..	..	*	*	
<i>Leda Escosurae</i> , Sh.....	..	*	*	*	*	
» <i>incola</i> , Barr. (var. de <i>Leda Escosurae</i>).....	..	*				
» <i>cfr. bilunata</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» <i>cfr. librans</i> , Barr.....	..	..	..	*		
<i>Nucula (Ctenodonta) Costae</i> , Sh.....	*	*	?	*	*	
» <i>Ciae</i> , Sh. (<i>Leda Bohemica</i> , Barr.).....	..	*	*	*	*	
» <i>Bussacensis</i> , Sh.....	..	*	..	?	*	

	Schistos impu- ros diabásicos	Schistos de Dalm. Dujardini	Grés de Loredó	Schistos de Homa. lonotus rarus	Schistos de Orthis Ribeiroi	Quartzites de Bi- lobites
<i>Nucula Ribeiroi</i> , Sh.....	..	*	*	*		
» <i>Beirensis</i> , Sh.....	..	*	..	*		
» <i>Ezquerrae</i> , Sh.....	..	*	..	*	*	
» <i>Eschwegii</i> , Sh.....	..	*	..	?	*	
» <i>Maestrei</i> , Sh.....	..	*				
» » var.....	..	*				
» <i>erratica</i> , Trom. (<i>Ctenodonta Bertrandii</i> , Salt., non <i>Nucula Ber- trandii</i> , Rou.).....	..	..	..	*	*	
» <i>cfr. dispar</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
<i>Cypricardia Beirensis</i> , Sh.....	..	*	*	*	*	
<i>Arca? Kosoviensis? Barr.</i>	..	..	*			
» <i>Naranjoana</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	..	*	
<i>Modiolopsis elegantulus? Sh.</i>	..	..	..	*		
» <i>cfr. obliquus</i> , Salter, (¿ an <i>Cyrtodonta</i>).....	..	..	*			
» <i>cfr. Armorici</i> , Salter, (id.).....	..	..	..	*	*	
» (<i>Astarte?</i>) <i>convergens</i> , Barr. (sp.).....	..	..	*	..	*	
Brachiopoda						
<i>Stringocephalus</i> sp. (<i>cfr. Leptaena Vicaryi</i> , Salter).....	*					
<i>Rhynchonella nucula</i> , Sow. (<i>Hypothyris semisulcata</i> , Salter).....	..	*				
» <i>cfr. ambigena</i> , Barr.....	*					
» <i>cfr. deflexa</i> , Sow.....	*					
<i>Atrypa reticularis? Linn.</i>	*					
<i>Uncites</i> sp....	*					
<i>Spirifer antiquissimus</i> , Salter, (<i>cfr. Strophomena spiriferoides</i> , Mc Coy).	*	?				
» <i>cfr. indifferens</i> , Barr.....	*					
<i>Leptaena Beirensis</i> , Sh., forma larga.....	*	*				
» » forma longa (<i>Leptaena ignava</i> , Sh.).....	*					
» <i>sericea</i> , Sow.....	..	*				
» <i>tenuissime-striata? Mc Coy</i>	*					
<i>Strophomena deltoidea</i> , Conrad.....	*					
» » var. <i>undata</i> , Mc Coy.....	*					
» » var. <i>camerata</i> (<i>Leptaena camerata</i> , Conrad)....	*					
» <i>rhomboidalis</i> , Wilkens (sp.).....	*					
» » var. <i>Loredensis</i> , nobis.....	*					
» <i>cfr. Phillipsi</i> , Barr.....	*					
<i>Orthis Actoniae</i> , Sow.....	*					
» <i>honorata</i> , Barr.....	*					
» <i>calligramma</i> , Dalm.....	*	..	..	..	*	
» <i>elegantula</i> , Dalm.....	..	..	..	*		
» <i>cfr. elegantula</i> , Dalm.....	*					
» <i>exornata</i> , Sh.....	*					
» <i>Berthoisi</i> , Rou.....	*	*				
» <i>Mundae</i> , Sh.....	*					
» <i>testudinaria</i> , Dalm. (<i>O. redux</i> , Barr., segundo Salter).....	*	*	..	*	?	
» <i>Michelini</i> , Léveillé.....	..	*				
» <i>Ribeiroi</i> , Sh. e diferentes variedades.....	..	*	..	*	*	
» <i>Bussacensis</i> , Sh. (non <i>O. testudinaria</i> , Vern. e Barr.).....	..	..	..	*		
» <i>sardoa</i> , Menegh.....	*					
» <i>cfr. ellipsoides</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» <i>aff. suburbana</i> , Barr.....	*	..	..	*		
» <i>aff. multistriata</i> , Hall. (¿ an sp. n.).....	*					
» <i>aff. alata</i> , Sow.....	*					
» <i>cfr. flabellulum</i> , Sow.....	*					
» sp. (¿ an <i>O. turgida</i> , Mc Coy).....	..	..	..	*		

	Schistos impu- ros diabasicos	Schistos de Dalm. Dujardini	Grés de Loredo	Schistos de Homa- lonotus rarus	Schistos de Orthis Ribeiroi	Quartzites de Bi- lobites
<i>Porambonites Ribeiroi</i> , Sh.....	*					
<i>Discina</i> sp.....	..	..	..	..	*	
<i>Obolus Bowlesi</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	*		
» <i>filosus</i> , Hall. (sp.).....	..	..	..	*	*	
<i>Lingula Lesueuri</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Lesueuri</i> , Rou.....	*					
» <i>lata</i> , Sow.....	..	..	..	..	*	
» <i>Rouaulti</i> ? Salter.....	..	..	..	..	*	*
» <i>cfr. Rouaulti</i> , Salter.....	..	..	..	..	*	
» <i>Symondsi</i> , Salter.....	..	..	..	*		
» <i>brevis</i> ? Portl.....	*					
» <i>longissima</i> ? Pander.....	..	..	..	..	*	
» <i>aff. cornea</i> , Sow. (¿ an <i>L. ovata</i> , M ^c Coy.).....	..	*				
» <i>cfr. ovata</i> , M ^c Coy.....	..	..	..	*		
» <i>cfr. attenuata</i> , Sow.....	..	*	..	*		
<i>Brachiopodes ind.</i> , varias especies.....	*	*	*	..	*	
Bryozoa						
<i>Cheilostomata</i> , Busk. (<i>Bryozoarios cellulinados</i> , d'Orb.).....	*					
Annelida						
<i>Rastos de Nereites ind.</i>	..	*				
Echinodermata						
<i>Caryocrinus ornatus</i> , Say.....	*					
<i>Echinospaerites (Caryocistites) Balticus</i> , Eichw. (Vej. <i>Echinospaerites Davisi</i> , M ^c Coy).....	*					
» <i>cfr. quaerendus</i> , Barr.....	*					
<i>Aristocystites cfr. sculptus</i> , Barr.....	*					
» <i>cfr. Bohemicus</i> , Barr.....	*					
<i>Calix (Echinospaerites) Murchisoni</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	*	*	
» <i>Sedgwicki</i> , Rou. (Comp. <i>Aristocystites Bohemicus</i> , Barr.).....	..	..	..	..	*	
» sp. (diferente das precedentes).....	..	..	..	*		
Cœlenterata						
<i>Synocladia Lusitanica</i> , Sh.....	*					
» <i>hypnoides</i> , Sh.....	*					
<i>Disteichia reticulata</i> , Sh.....	*					
<i>Phyllopora</i> sp. (<i>Retepora</i> , na lista de Sharpe).....	*					
<i>Diplograptus palmeus</i> , Barr.....	..	*	..	*		
<i>Didymograptus Murchisoni</i> , Bœck.....	..	..	..	*	*	
» sp.....	..	..	..	..	*	
<i>Cladopora fibrosa</i> , Hall.....	*	..	..	..	*	
<i>Calamopora</i> sp. (Vej. <i>C. favosa</i> , Goldf.).....	*					
<i>Discophyllum plicatum</i> , Barrois, non Phillips.....	..	..	..	..	..	*
Incertae sedis						
<i>Cruziana furcifera</i> , d'Orb.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. furcifera</i> , d'Orb.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Beirensis</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Beirensis</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*

	Schistos impu- ros diabasicos	Schistos de Dalm. Dujardini	Grés de Loredó	Schistos de Homa- lonotus rarus	Schistos de Orthis Ribelroi	Quartzites de Bi- lobites
<i>Cruziana Monspelliensis</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Bagnolensis</i> Morière.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Nathorsti</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Goldfussi</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Vilanovae</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Cordieri?</i> Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Cordieri</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>aff. Cordieri</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
<i>Fraena Lyelli</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
<i>Arthropycus cfr. Harlani</i> , Hall.....	..	..	..	..	..	*
<i>Scolithus Dufrenoyi</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>linearis?</i> Hall.....	..	..	..	..	..	*
<i>Vexillum Desglandi</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Morierei</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Morierei</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Halli</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
<i>Rhysophycus Saportai</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Rouaulti</i> , Lebesc.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Barrandei?</i> Trom. e Lebesc.....	..	..	..	..	..	*
<i>Foralites Pomeli</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*

EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

Todos os exemplares figurados pertencem ás collecções da Direcção dos trabalhos geologicos e provêm do mesmo jazigo, proximo de Covelo, na vertente direita do Douro, onde se obtiveram os exemplares de *Uralichas Ribeiroi* representados na minha memoria anterior. As figuras são todas na grandeza natural dos objectos que representam, porém estão invertidas, porque não se empregou o prisma para a sua reproducção photographica.

ESTAMPA I

Figs. 1 e 1 a. Molde e impressão externa de uma cabeça de *Uralichas Ribeiroi* de grandes dimensões, comprimida no sentido longitudinal um pouco obliquamente. Uma das faces moveis acha-se ligada á cabeça, porém está incompleta, faltando-lhe a ponta genal.

ESTAMPA II

A fig. 1 representa uma cabeça de *Uralichas Ribeiroi* de menor grandeza do que a precedente, comprimida lateralmente ou distendida no sentido longitudinal. Do lado direito da figura (esquerdo do exemplar) vê-se distinctamente o lobulo palpebral; porém o olho foi esmagado ou distendido, e não deixa perceber as lentes que compunham a superficie visual.

As figs. 2 e 2 a representam o molde e a impressão externa da cabeça de um individuo novo de *Uralichas Ribeiroi*, ao qual pertenceria talvez o pygidio representado na est. IV, fig. 4. Esta cabeça, ao contrario da anterior, foi comprimida longitudinalmente, mostrando portanto menor comprimento do que realmente tinha. No sulco lateral anterior direito da glabella, fig. 2 a, vê-se que existia uma depressão analoga á que foi indicada por Marie Rouault em *Lichas Heberti*, e proximamente na mesma posição do que n'esta especie, o que parece provar que este caracter não tem a importancia especifica que o geologo de Rennes lhe attribuiu.

ESTAMPA III

As figs. 1 e 1 a representam o molde e a impressão de um pygidio muito imperfeito de um individuo novo de *Uralichas Ribeiroi*.

As figs. 2, 4 e 5 representam os moldes de tres exemplares mais ou menos perfeitos de *Dalmanites Vetillarti*, aqui figurados para comparação dos pygidios com os de *Uralichas*. Vê-se claramente n'estes exemplares, bem como no da est. IV, fig. 5, que o prolongamento caudal é um simples appendice do eixo do pygidio, que nada influe na conformação d'este, pois que não tem nenhuma ligação com os lobulos lateraes. No exemplar da fig. 4, onde a ponta caudal foi destruida e a impressão se mostra com a maior nitidez, vê-se que esta forma uma crista aguda, que evidentemente denota a existencia de um sulco anguloso na face inferior d'aquelle appendice. É pois um caracter normal, e não produzido accidentalmente pela fractura do exemplar.

A fig. 3 representa um fragmento de um grande pygidio de *Uralichas Ribeiroi*, no qual se descobrem algumas diferenças no curso dos sulcos relativamente ao que se observa nos outros pygidios da mesma especie.

Na fig. 6 está representada uma parte da face fixa com o olho de um grande exemplar de *Uralichas Ribeiroi*. A photographia não reproduz distinctamente as lentes, que eram numerosissimas e dispostas em filas, cruzando-se obliquamente em quincunce.

ESTAMPA IV

Figs. 1, 2 e 3. Molde e impressão de varios fragmentos do thorax de *Uralichas Ribeiroi*. A impressão da fig. 1 é a mais perfeita e que dá melhor idéa do eixo, o qual era medianamente convexo, emquanto que as pleuras na sua parte interna eram planas. O exemplar da fig. 2 mostra o molde de tres pleuras contiguas, percebendo-se na sua extremidade uma serie de linhas irregulares obliquas que representam a impressão do forro da crusta.

A fig. 4 reproduz o pygidio quasi completo de um individuo novo de *Uralichas Ribeiroi*. É evidente n'este exemplar que a ponta caudal é um verdadeiro prolongamento do pygidio, abrangendo os seus lobulos lateraes, e não o prolongamento do eixo, que se desvanece antes de alcançar o contorno, fundindo-se com os lobulos lateraes n'um corpo unico. Este prolongamento foi destruido na sua extremidade posterior, mas deixa vêr na impressão uma crista aguda como a do exemplar de *Dalmanites Vetillarti* representado na est. III, fig. 4, mostrando portanto que na face inferior d'aquelle prolongamento existia um sulco como no appendice caudal d'esta ultima especie.

A fig. 5 representa um outro exemplar de *Dalmanites Vetillarti*, cujo appendice caudal, continuando-se com o eixo, tinha um comprimento insolito.

DIRECTION DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES DU PORTUGAL

FAUNE SILURIQUE

DU

PORTUGAL

NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

PAR

J. F. N. DELGADO

DIRECTEUR DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES
MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE LISBONNE

LISBONNE

IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

1897

TERRAINS PALÉOZOÏQUES DU PORTUGAL

CONTRIBUTIONS

A L'ÉTUDE DE LA FAUNE SILURIQUE

NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR

LICHAS (URALICHAS) RIBEIROI

Dans un mémoire intitulé «*Uralichas Ribeiroi des schistes d'Angers*» publié en 1896 dans le tome VI, fasc. I, des Mémoires de la Société géologique de France, M. D.-P. OEhlert fait plusieurs considérations à l'égard de cette espèce du bassin de Vallongo¹, que j'avais décrite quatre années auparavant, en contestant quelques assertions que j'avais présentées sur ce remarquable Trilobite, particulièrement en ce qui concerne la forme du pygidium.

La haute considération due à un maître aussi respectable m'a porté naturellement à répéter les fouilles dans la carrière d'où les premiers exemplaires de l'*Uralichas* ont été extraits, pour tâcher d'obtenir de nouveaux matériaux d'étude qui pussent éclaircir les points douteux. J'ai pu facilement réaliser ces fouilles grâce à la bienveillance du propriétaire du terrain, M. le Baron de Soutelinho, qui non seulement m'a permis de faire les excavations nécessaires, mais encore m'a permis généreusement de garder tous les fossiles obtenus; j'éprouve une vive satisfaction, en lui exprimant publiquement ma reconnaissance pour le don important fait de la sorte au musée de la Direction géologique à ma charge.

Les fouilles ont duré dix semaines; trois ouvriers y ont été employés activement, ils ont enlevé à peu près 200 mètres cubes de schiste. Le matériel extrait a été cassé et minutieusement examiné, et l'on a obtenu plusieurs centaines, voire même quelques milliers d'exemplaires de Trilobites de plusieurs espèces, mais les restes de l'espèce qui m'intéressait le plus ont été peu nombreux et pour la plupart mauvais.

Vu l'importance exceptionnelle de cette espèce, nous reproduisons aujourd'hui comme supplément quelques exemplaires obtenus dans cette dernière fouille, lesquels fournissent de nouveaux éléments pour la connaissance de l'espèce, ou bien complètent ceux que j'avais déjà donnés antérieurement.

¹ Description d'une forme nouvelle de Trilobite, *Lichas (Uralichas) Ribeiroi*, par J. F. N. Delgado. 1892, in 4.°, 31 p., 6 pl.

Malheureusement tous nos exemplaires sont plus ou moins déformés par la compression ou la distension que les schistes ont subi, et leur forme varie beaucoup selon l'orientation des fossiles dans la roche. Ainsi, il n'est pas surprenant que les résultats de leur déformation soient très différents, bien que la cause en fût la même; il semble que quelques fossiles ont été comprimés dans le sens longitudinal, tandis que d'autres l'ont été latéralement, ou plus ou moins obliquement.

En vue des résultats obtenus, on peut assurer qu'*Uralichas Ribeiroi* est une espèce relativement rare; elle n'en est pas pourtant moins intéressante, attendu qu'elle caractérise distinctement l'horizon où elle apparaît en Portugal, probablement le même qu'elle occupe dans l'Ouest de la France. Ce fait, dit M. OEhlert, vient confirmer la similitude si frappante, qui existe entre certains niveaux ordoviciens du Portugal et du massif armoricain.

Tout en acceptant comme parfaitement justifiées quelques-unes des considérations présentées par mon savant collègue, qu'il nous soit cependant permis de différer d'opinion sur d'autres points de ses appréciations.

Ainsi, l'étude des exemplaires nouvellement obtenus, prouve indubitablement que le prolongement caudal du pygidium est simple et non bifurqué comme je l'avais supposé, ce faux aspect¹ dépendait uniquement de l'écrasement et des brisures de l'exemplaire, qui est incomplet dans cette partie. L'examen de la fig. 4, pl. IV, du présent travail, où est représenté un pygidium presque complet et peu déformé d'un jeune individu de l'*Uralichas Ribeiroi*, efface le moindre doute à cet égard. La comparaison de cet exemplaire avec le pygidium de La Pouëze figuré par M. OEhlert, montre, en plus de leur identité, que ce dernier devait se prolonger bien au delà de ce que la figure l'indique; par conséquent individu, une fois restauré, aurait une plus grande longueur que celle que M. OEhlert lui a attribué.

Mais, si nous avouons volontiers sur ce point notre erreur, nous sommes loin d'admettre que le prolongement du pygidium de l'*Uralichas* soit, comme le prétend M. OEhlert, une épine caudale ou appendice spiniforme, simple projection de l'axe²; au contraire, nous croyons que sa liaison avec les lobes latéraux est tout au moins aussi intime qu'avec l'axe, dont le relief disparaît avant qu'il ait atteint le contour du pygidium. Aussi, comme conséquence logique de cette disposition, j'ai formulé l'hypothèse que ce prolongement caudal pourrait être le représentant des deux plèvres postérieures du pygidium, extrêmement allongées, se repleyant vers la face ventrale du Trilobite et se soudant l'une à l'autre par leur bord extérieur. Cette supposition est d'autant plus plausible que l'ornementation de ce prolongement est la même sur sa face dorsale que sur sa face inférieure, et identique à celle de la surface du pygidium.

Ce cas est tout à fait différent de ce qu'il arrive chez d'autres Trilobites qui possèdent un appendice caudal, comme par exemple certaines espèces de *Dalmanites*. Dans *D. socialis* l'axe se termine par un appendice caudal, relevé avec l'inclinaison de 45° sur le plan du Trilobite³. Dans *D. Vetillarti*, que nous représentons sur la pl. III, figs. 2, 5 et 6, et pl. IV, fig. 5,

¹ Voir pl. III de mon travail antérieur.

² M. OEhlert dit: «Quant au mode de formation de cette pointe, que M. Delgado considère comme étant constituée à l'aide des deux dernières plèvres du pygidium allongées démesurément et repleyées l'une sur l'autre, nous pensons, au contraire, qu'elle forme plutôt un tout continu avec l'axe médian dont elle ne serait qu'une prolongation au-delà des plèvres.» (Mém. cit., p. 5).

³ *Système silurien de la Bohême*, vol. 1, p. 553.

pour la comparaison, il existe de même une parfaite liaison de la pointe caudale avec l'axe du pygidium, dont elle forme la continuation; cette pointe, plus ou moins longue, parvenant à égaler quelquefois la moitié de la longueur du corps du Trilobite, est visiblement le prolongement de l'axe, auquel elle se rattache sans aucune dépendance des lobes latéraux.

Dans *Uralichas Ribeiroi*, cependant, il arrive exactement le contraire; les deux sillons dorsaux, qui limitent l'axe, s'effacent, en convergeant l'un vers l'autre, avant d'atteindre le contour du pygidium, et à l'endroit où ils disparaissent, on voit un affaissement subit de l'axe, qui semble indiquer la terminaison de celui-ci; ainsi la pointe caudale devient formée par la jonction des lobes latéraux au droit de l'axe, mais visiblement sans l'intervention de ce dernier.

Nous pourrions encore ajouter en faveur de notre idée ce que Barrande dit¹, en parlant de *Dalmanites rugosa*, qui possède aussi un appendice caudal dans une disposition analogue à celui de *Uralichas*:

«Son contour est formé par un limbe presque horizontal, de 3 à 5 mill. de largeur, terminé à l'arrière par un appendice caudal, de 5 à 10 mill. de longueur. L'axe, doucement bombé, disparaît très près du talus, mais on voit derrière lui une carène, qui s'étend jusques sur la pointe caudale.»

Il fait des observations analogues à l'égard de *Dalm. auriculata*, Dalm. sp. et *D. spinifera*, Barr., qui ont également un appendice caudal provenant du limbe du contour du pygidium, et ne formant pas rigoureusement le prolongement de l'axe.

D'un autre côté, en décrivant *Dalmanites solitaria*, Barr., l'éminent paléontologue dit:

«Il montre (le pygidium) 6 à 8 articulations distinctes et une carène joignant l'appendice caudal, qui semble résulter de la soudure des deux bords².»

Rien ne s'oppose donc à ce que le prolongement caudal de l'*Uralichas* fût produit de la même manière.

De plus nous devons observer que dans tous les exemplaires de *Dalm. Vetillarti* où la pointe caudale est détruite, mais où l'on peut observer son empreinte (pl. III, figs. 2 et 4, et pl. IV, fig. 5) on voit toujours une crête longitudinale saillante comme celle qui existe dans les empreintes du prolongement caudal de l'*Uralichas* (pl. IV, fig. 4); on reconnaît par conséquent que cet aspect n'est pas accidentel et simplement dû à l'écrasement, mais il indique l'existence d'un sillon étroit à la surface inférieure du prolongement caudal. Ce sillon ne correspond donc pas à une cassure, comme M. OEhlert l'affirme, bien qu'il soit évident que l'écrasement de l'exemplaire que nous avons représenté³ a produit les cassures irrégulières qu'on y observe, ces cassures se produisant parfois même dans le sens longitudinal.

Pour qu'on pût accepter l'explication que le savant paléontologue de Laval donne de l'existence de ce sillon longitudinal, il serait d'ailleurs nécessaire que la condition qu'il suppose se réalisât, c'est-à-dire, que le prolongement caudal fût un tube à section circulaire ou elliptique. Dans l'exemplaire de la pl. III de notre premier travail, on voit clairement que, tandis que supérieurement sa surface était bombée, inférieurement elle était plane, d'où il résulte que la section était plano-convexe; ainsi on ne comprend donc pas que la fracture se fit

¹ Op. cit., p. 545.

² Op. cit., p. 556.

³ Voir pl. III du mémoire cité.

longitudinalement dans la surface plane, sur le prolongement de l'axe, alors qu'il serait bien plus naturel qu'elle se produisît dans la face opposée ou convexe.

Si l'on acceptait cette opinion de M. OEhlert, c'est-à-dire, que la pointe caudale n'est qu'un simple ornement du pygidium en formant «un tout continu avec l'axe médian, dont elle ne serait qu'une prolongation au-delà des plèvres», il n'y aurait en vérité aucun motif pour l'établissement du sous-genre *Uralichas*, que M. OEhlert admet d'ailleurs, car non seulement le même genre comprend des espèces où l'appendice caudal existe et d'autres qui ne l'ont pas, mais encore dans une même espèce quelques individus le possèdent, tandis que d'autres en sont dépourvus. Ainsi, je crois bien exprimer mon idée en disant que le prolongement du pygidium de l'*Uralichas* ne représente pas seulement un appendice sans importance, mais qu'il accuse au contraire une modification profonde dans la conformation de cette partie du corps du Trilobite, produite pour ainsi dire par l'enroulement du test sur lui-même en un tube long. En effet, l'ornementation sur le côté dorsal, comme sur le côté ventral, étant analogue à celle de la surface du corps, et très différente de celle de la doublure marginal du pygidium, autorise cette supposition.

La forme pointue du prolongement caudal du pygidium d'*Uralichas* est un caractère qui, en tout cas, a selon nous une importance particulière. Aux deux groupes de *Lichas* établis par Barrande pour les espèces dont la plèvre est divisée en deux bandes aplaties, l'un de ces groupes formé par les espèces qui ont le contour du pygidium entier, et l'autre comprenant les formes qui ont une échancrure au droit de l'axe, il faut ajouter un troisième groupe, tout à fait opposé à ce dernier, et qui renfermera les espèces qui, au lieu d'échancrure, auront ce prolongement caudal.

Comme conclusion: la découverte du magnifique pygidium de La Pouëze a fait connaître deux faits intéressants: 1° que la pointe caudale n'est pas bifurquée à son extrémité, comme je l'avais à tort supposé par l'examen d'un exemplaire écrasé et incomplet, qui est représenté sur la pl. III de mon travail antérieur; 2° que les dimensions de cette espèce sont supérieures à ce que j'avais d'abord cru, puisque je ne lui attribuai que 560 mill. de longueur, tandis que M. OEhlert, en se basant sur des données positives, élève cette dimension à 700 mill. Or, il faut remarquer que j'ai calculé cette dimension en supposant que le pygidium figuré avec son prolongement caudal était à peu près complet; toutefois, si nous tenons compte de la grandeur relative du pygidium et de l'appendice caudal représenté sur la pl. IV, fig. 4, du présent travail, nous parviendrons sans trop de peine à obtenir pour nos exemplaires cette plus grande dimension.

En passant en revue les différentes espèces de Trilobites que l'on peut considérer gigantesques, M. OEhlert, arrive comme nous-même à la conclusion que l'*Uralichas Ribeiroi* est la plus grande espèce connue.

Parmi les différents genres qui ont peuplé les mers dans toutes les époques paléozoïques (à l'exclusion de l'époque silurienne supérieure, dont les espèces sont de grandeur moyenne, et de l'époque carbonifère où paraissent seulement des espèces de petite taille et en petit nom-

bre) M. OEhlert cite les genres *Paradoxides*, *Asaphus*, *Lichas* et *Homalonotus*, comme ceux qui ont fourni les plus grandes espèces de Trilobites, et la famille des Lichadæ étant celle qui réunit jusqu'à présent les formes les plus gigantesques, se montrant ainsi jusque dans l'époque dévonienne.

Dans nos collections, où il se trouve plusieurs Trilobites de grande taille, nous devons citer, outre *Uralichas Ribeiroi*, sans doute le plus gigantesque, l'empreinte d'un segment incomplet du thorax d'un *Asaphus* ou d'un *Ogygia*, appartenant aux collections de l'ancienne Commission géologique, se trouvant maintenant dans le musée de l'Ecole Polytechnique de Lisbonne. Cet exemplaire mesurerait, s'il était complet, 385 millimètres de longueur; le Trilobite aurait, donc, 36 à 40 centimètres de longueur, en supposant que les trois parties principales du corps étaient à peu près égales; toutefois si nous le comparons à la forme longue d'*A. nobilis*, sa longueur dépasserait peut-être 60 centimètres.

Un autre exemplaire incomplet d'*Asaphus*, très écrasé et déformé, provenant de Pedreira do Gallinheiro, à 3500^m au S.-E. de la chapelle de S'-Adrien (Sobrado de Paiva), probablement de la même espèce que le Trilobite qui a été classée par Sharpe comme *Isotelus Powisi*, Murch., présenterait, s'il était complet, plus de 40 centimètres de longueur.¹

Plusieurs exemplaires plus ou moins complets d'*Asaphus*, obtenus de la même carrière de Covelo où *Uralichas Ribeiroi* a été trouvé, ont de même de grandes dimensions; ils prouvent de la sorte que cette localité, outre qu'elle fut extraordinairement favorable à la multiplication des individus, fut à la fois très propice au développement des différentes formes de Trilobites.

Eléments pour la description de l'espèce

Tête.—Nous représentons sur la planche I le moule et l'empreinte extérieure d'une tête à dimensions à peu près égales à celles de l'exemplaire figuré sur la pl. I de notre travail antérieur, elle est cependant en meilleur état et un peu plus complète. Outre la glabelle, on voit aussi dans cet exemplaire la face mobile, mais il y manque la pointe génale, qui s'est cassée. La granulation de la tête était très serrée et irrégulière, elle couvrait toute la surface excepté le fond des sillons, où elle disparaît totalement, et dans les dépressions où elle était plus fine. Les tubercules étaient subarrondis, mais ils ne se terminent pas en pointe aigüe, comme dans *Lichas Heberti*. Nous n'avons point de caractère remarquable à ajouter à ceux que nous avons déjà donnés de cette partie du corps du Trilobite.

Une tête d'*Uralichas* de moindres dimensions que la précédente est représentée dans la fig. 1 de la pl. II. Elle est presque complète, quoique déformée par compression latérale. Dans cet exemplaire on voit bien quelle était la position de l'œil, qui était placé en face des lobes médians; on découvre dans cette particularité une analogie entre *Uralichas Ribeiroi* et les *Lichas* de la première sous-division de ce genre créée par Barrande (*L. scabra*, *L. avus*, *L. in-*

¹ Je profite de l'occasion pour rectifier une erreur qui m'a échappée lorsque j'ai dressé la liste des fossiles de Vallongo, qui accompagne mon travail précédent. L'espèce citée par Sharpe (Q. J., 1848, p. 146) comme *Isotelus Powisi*, Portl. est en effet un *Asaphus* et pas l'*Ogygia* aff. *desiderata*, comme je l'ai cité, espèce à laquelle elle ressemble cependant beaucoup par sa forme générale.

cola). Nous trouvons encore dans la conformation du pygidium la même liaison entre les deux groupes, tout en faisant abstraction du prolongement caudal, qui est, au contraire, remplacé par une échancrure plus ou moins profonde dans le contour des trois espèces citées.

L'œil que l'on voit représenté avec une partie de la face fixe dans la fig. 4 de la pl. III, a 18 millimètres de longueur; il a donc appartenu à une tête de grandes dimensions: on le voit de face, le lobe palpébral ayant disparu en vertu de l'écrasement qu'il a subi.

Dans cet exemplaire les capsules des loupes, qui étaient fort nombreuses, sont vides; elles ont la forme orbiculaire et sont disposées en quinconce. A cause du mauvais état de l'exemplaire, il n'est pas possible de compter précisément le nombre des loupes, mais celui des rangs verticaux surpassait assurément 50, chacun ayant 20 à 30 loupes, ce qui élève leur nombre à 1200 ou 1500.

Enfin, dans les fig. 2 et 2a de la pl. II sont représentés le moule et l'empreinte extérieure de la tête d'un jeune individu d'*Uralichas Ribeiroi*, auquel appartiendrait peut-être le pygidium représenté dans la pl. IV, fig. 4. La compression qu'a subi cette tête en a diminué la longueur, tandis qu'elle en a exagéré un peu la largeur; cependant, ses proportions générales, la forme de la lobation et d'autres caractères, montrent qu'elle ne doit pas se séparer de l'espèce que nous décrivons, surtout si on la compare à l'exemplaire représenté dans la pl. I.

Thorax.— Les fragments que nous venons d'obtenir de cette partie du corps de l'*Uralichas Ribeiroi* sont plus elucidatifs que ceux que nous possédions auparavant. Dans la pl. IV, fig. 1, 2 et 3, sont représentés des fragments appartenant à deux ou à trois individus différents, ils montrent bien clairement les caractères des plèvres, en confirmant et en amplifiant la description que nous en avons donnée précédemment.

Dans la fig. 1 on voit l'empreinte de 9 segments d'un exemplaire, incomplet d'ailleurs et un peu déformé, qui toutefois dans sa forme générale ressemble assez à *L. scabra*. Comme il en est de cette espèce, l'axe de l'*Uralichas* était moyennement convexe, tandis que les plèvres étaient unies dans sa moitié intérieure.

Dans les exemplaires des fig. 2 et 3, on voit mieux la forme des plèvres, qui étaient falciformes et recourbées en arrière. Le sillon se courbant doucement depuis le sillon dorsal, venant presque du milieu de la largeur de l'anneau jusqu'à l'extrémité de la plèvre, était très étroit et profond et divisait la plèvre en deux bandes peu inégales, unies et au même niveau, l'antérieure étant un peu plus grande que la postérieure. Dans les exemplaires représentés dans mon premier travail, c'est à peine si l'on pouvait apprécier ces caractères. La fig. 2 laisse apercevoir quelle était la largeur de la doublure du test, qui s'étendait jusque près du coude de la plèvre.

Pygidium.— De cette partie du corps, celle que nous tenions le plus à connaître, nous représentons un exemplaire presque complet d'un jeune individu (pl. IV, fig. 4), un pygidium très imparfait (pl. III, figs. 1 et 1a), et un fragment d'un autre pygidium de grandes dimensions (pl. III, fig. 3). Dans les deux premiers exemplaires, mais surtout dans le premier, on reconnaît distinctement que l'appendice caudal n'est pas le prolongement de l'axe, qui est interrompu avant d'atteindre le contour, mais bien une dépendance des lobes latéraux du pygidium, auxquels il est intimement lié et avec lesquels il se continue, en montrant la même ornementa-

tion que ceux-ci. On reconnaît aussi dans ces exemplaires, mais plus clairement dans celui de la pl. IV, fig. 4, qu'à la surface inférieure du prolongement caudal existait un sillon longitudinal, qui se reproduit dans l'empreinte extérieure du fossile en une crête saillante.

Le petit fragment représenté dans la pl. III, fig. 3, montre quelques différences dans l'allure des sillons par rapport au pygidium représenté par le moule et l'empreinte extérieure dans la pl. II et pl. IV, fig. 4, de mon premier travail, aussi bien que par rapport au pygidium de la Pouëze. En effet, les sillons qui limitent les plèvres et ceux qui les divisent, suivent une direction différente en convergeant à un même point du sillon dorsal, et la pointe saillante du contour est beaucoup plus étroite et aigüe que dans les autres exemplaires. Ces différences sont, cependant, de peu d'importance: je ne crois pas qu'elles puissent faire supposer l'existence d'une autre espèce d'*Uralichas* dans notre dépôt, mais elles rentrent plutôt dans les limites des variations individuelles, qui peuvent être observées dans une même espèce.

Barrande, en décrivant *L. scabra*, a déjà remarqué les mêmes différences dans l'étendue relative occupée par chacune des plèvres du pygidium et dans la sous-division de chacune des plèvres.

« Ces variations sont purement individuelles, car elles se montrent plus ou moins, sur les fragments d'une même localité, très semblables d'ailleurs sous tous les rapports ».¹

Des coupes faites soigneusement et avec le plus grand détail dans le Bussaco, ont démontré que le niveau que *Lichas Heberti* y occupe est à peu près le même que celui de l'*Uralichas Ribeiroi* dans le bassin de Vallongo, c'est-à-dire, immédiatement inférieur aux grès de Loredo, qui selon toute probabilité sont à peu près synchroniques du grès de May. En effet, la comparaison des dépôts siluriens du Bussaco et de l'Ouest de la France montre la correspondance suivante:

BUSSACO	NORMANDIE
Schistes impurs diabasiques.....	} Schistes à <i>Trinucleus</i>
Schistes à <i>Dalmanites Dujardini</i> ...	
Grès de Loredo.....	Grès de May
Schistes à <i>Homalonotus rarus</i>	} Schistes à Calymènes
Schistes à <i>Orthis Ribeiroi</i>	
Quartzites à <i>Bilobites</i>	Grès armoricain

Il sera donc intéressant de présenter en comparaison avec la liste des fossiles siluriens que nous avons donnée de Vallongo, la liste suivante, encore incomplète d'ailleurs, des fossiles du Bussaco.

¹ Op. cit., p. 598.

Tableau des espèces du Silurique inférieur (série Ordovicienne) du Bussaco

	Schistes impurs diabasiques	Schistes à Dalm. Dujardini	Grès de Loreda	Schistes à Homalo- notus rarus	Schistes à Orthis Ribeiroi	Quartzites à Billo- bites
Crustacea						
<i>Acidaspis Buchi</i> , Barr.....	..	..	..	*	*	
<i>Areia Bussacensis</i> , sp. n.....	*					
<i>Asaphus nobilis</i> , Barr.....	*	..	..	*	?	
» ou <i>Ogygia</i> , sp. n.....	..	..	..	*	*	
<i>Bronteus Choffati</i> , sp. n.....	*					
<i>Calymene Tristani</i> , Brongn.....	..	..	*	*	*	*
» » var. (avec les sillons de la glabellle un peu effacés).	..	..	..	*		
» <i>Aragoi</i> , Rou.....	..	..	*	*	*	
» <i>transiens</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	*		
» <i>Costae</i> , sp. n. (aff. <i>C. Blumenbachi</i> , Brongn.).....	*					
<i>Cheirurus gryphus</i> , Barr.....	*					
» <i>claviger</i> , Beyr.....	?	..	..	..	*	
» <i>Bocagei</i> , sp. n.....	*					
» aff. <i>verrucosus</i> , Brögger.....	*					
» aff. <i>tumescens</i> , Barr.....	*					
<i>Dalmanites socialis</i> , Barr.....	*	*	*	*	*	
» » var. <i>grandis</i>	..	..	..	*		
» <i>Dujardini</i> , Rou.....	..	*	*	*		
» <i>Phillipsi</i> , Barr.....	..	*	..	*		
» <i>Vetillarti</i> , Rou.....	..	..	..	*	*	
<i>Homalonotus rarus</i> , Corda.....	..	..	..	*	*	
<i>Iliaenus Hispanicus</i> , Vern. e Barr. (<i>I. giganteus</i> , Burm., forme large) ..	..	..	..	*	*	
» <i>Lusitanicus</i> , Sh. (<i>I. giganteus</i> , Burm., forme longue).....	..	..	..	*		
» <i>Loredensis</i> , sp. n.....	*					
» aff. <i>Murchisoni</i> , Salter.....	..	*				
<i>Lichas Heberti</i> , Rou.....	..	..	..	*		
» aff. <i>incola</i> , Barr.....	*					
» aff. <i>convexus</i> , Angelin.....	*					
<i>Ogygia glabrata</i> , Sh.....	..	..	..	*	*	
<i>Placoparia Zippei</i> , Böeck. (<i>Pl. Tourneminei</i> , Rou., non <i>Pl. Zippei</i> , Barr.) ..	..	..	*	*	*	
<i>Proetus Loredensis</i> , sp. n.....	*					
<i>Phillipsia parabola</i> , Barr.....	*					
<i>Remopleurides (Caphyra) Lorioli</i> , sp. n.....	..	..	..	*		
<i>Trinucleus Bureau</i> , OEhlert.....	*	*				
» <i>Goldfussi</i> , Barr.....	*	*				
<i>Beyrichia Bussacensis</i> , Jones.....	..	*	..	*	*	
» <i>simplex</i> , Jones.....	*	*	..	*	*	
» <i>major</i> , sp. n.....	*					
<i>Plumulites fraternus</i> , Barr.....	..	*				
» cfr. <i>Bohemicus</i> , Barr.....	*					
Cephalopoda						
<i>Lituities intermedius?</i> Vern. e Barr.....	..	*				
<i>Orthoeras bonum</i> , Barr.....	*					
» cfr. <i>bisignatum</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» cfr. <i>Bohemicum</i> , Barr.....	*					
» aff. <i>probum</i> , Barr.....	*					
» ind., plusieurs espèces.....	*	*	..	*	*	

	Schistes impurs diabasiques	Schistes à Dalm. Dujardini	Grès de Lored	Schistes à Homalo- notus rarus	Schistes à Orthis Ribeiroi	Quarizites à Bilo- bites
<i>Endoceras duplex</i> . Wahlbg. (sp).....	..	..	..	..	*	
» <i>vaginatus</i> , Schloth.....	..	..	..	*		
Pteropoda						
<i>Hyolithes elegans</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» <i>Beirensis</i> , Sh.....	..	*	*	*		
» <i>cinctus?</i> Barr.....	..	*				
» <i>cfr. elongatus</i> , Barr.....	..	*				
» <i>cfr. indistinctus</i> , Barr.....	..	*				
» <i>cfr. simplex</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
» <i>cfr. striatulus</i> , Barr.....	*					
<i>Conularia nobilis</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
» <i>fecunda</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
» <i>cfr. Bohemica</i> , Barr.....	..	*	..	*		
» <i>tenuistriata</i> , sp. n.....	..	..	..	..	*	
Heteropoda						
<i>Bellerophon acutus</i> . Sow.....	..	*	*	*	*	
» <i>aff. acutus</i> , Sow. (1 an sp. n.).....	..	*				
» <i>trilobatus</i> , Sow.....	..	*	*	*		
» <i>bilobatus</i> , Sow.....	..	*	..	*		
» <i>expansus</i> , Sow.....	..	*				
» <i>elongatus</i> , Portl.....	..	*				
» <i>Lebescontei</i> , Trom.....	..	..	..	*	*	
» <i>cfr. carinatus</i> , Sow.....	..					
Gastropoda						
<i>Ribeiria pholadiformis</i> , Sh.....	..	..	..	*		
» <i>OEhlerti</i> , sp. n.....	..	..	..	*		
» <i>gigantea</i> , nobis (<i>Myocaris Lutraria</i> , Salter).....	..	..	..	..	..	*
<i>Natica</i> , 2 espèces ind.....	*					
<i>Platystoma cfr. niagarensis</i> , Hall.....	..	*				
<i>Straparollus?</i> sp.....	..	..	..	*		
<i>Euomphalus cfr. carinatus</i> , Sow.....	*					
<i>Trochonema</i> sp.....	*					
<i>Cyclonema aff. sulcata</i> , Hall.....	*					
<i>Murchisonia</i> sp.....	*					
<i>Pleurotomaria Bussacensis</i> , Sh.....	..	*	*	*	*	
Lamellibranchiata						
<i>Orthonota britannica</i> , Rou. (<i>Sanguinolites Pellicoi</i> , Vern. et Barr.).....	..	..	..	?	*	*
<i>Tellinopsis</i> , 2 espèces.....	..	..	..	*		
<i>Dceruska primula</i> , Barr.....	..	..	..	*		
<i>Dolabra? Lusitanica</i> , Sh.....	..	..	*	*	*	*
<i>Redonia Duvaliana</i> , Rou. (<i>R. Bohemica</i> , Barr., forme large).....	..	..	..	*	*	
<i>Leda Escosurae</i> , Sh.....	..	*	*	*	*	
» <i>incola</i> , Barr. (var. de <i>Leda Escosurae</i>).....	..	*				
» <i>cfr. bilunata</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» <i>cfr. librans</i> , Barr.....	..	..	..	*		
<i>Nucula (Ctenodonta) Costae</i> , Sh.....	*	*	?	*	*	
» <i>Ciae</i> , Sh. (<i>Leda Bohemica</i> , Barr).....	..	*	*	*	*	
» <i>Bussacensis</i> , Sh.....	..	*	..	?	*	

	Schistes impurs diabasiques	Schistes à Dalm. Dufardini	Grès de Lored	Schistes à Homalo- notus rarus	Schistes à Orthia Ribeiroi	Quartzites à Bilo- bites
<i>Nucula Ribeiroi</i> , Sh.....	..	*	*	*		
» <i>Beirensis</i> , Sh.....	..	*	..	*		
» <i>Ezquerrae</i> , Sh.....	..	*	..	*	*	
» <i>Eschwegii</i> , Sh.....	..	*	..	?	*	
» <i>Maestrei</i> , Sh.....	..	*				
» » var.....	..	*				
» <i>erratica</i> , Trom. (<i>Ctenodonta Bertrandi</i> , Salt., non <i>Nucula Bertrandi</i> , Rou.).....	..	..	..	*	*	
» <i>cfr. dispar</i> , Barr.....	..	..	..	..	*	
<i>Cypricardia Beirensis</i> , Sh.....	..	*	*	*	*	
<i>Arca? Kosoviensis? Barr.</i>	..	..	*			
» <i>Naranjoana</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	..	*	
<i>Modiolopsis elegantulus? Sh.</i>	..	..	..	*		
» <i>cfr. obliquus</i> , Salter, (<i>an Cyrtodonta</i>).....	..	..	*			
» <i>cfr. Armorici</i> , Salter, (id.).....	..	..	..	*	*	
» (<i>Astarte?</i>) <i>convergens</i> , Barr. (sp.).....	..	..	*	..	*	
Brachiopoda						
<i>Stringocephalus</i> sp. (<i>cfr. Leptaena Vicaryi</i> , Salter).....	*					
<i>Rhynchonella nucula</i> , Sow. (<i>Hypothyris semisulcata</i> , Salter).....	..	*				
» <i>cfr. ambigena</i> , Barr.....	*					
» <i>cfr. deflexa</i> , Sow.....	*					
<i>Atrypa reticularis? Linn.</i>	*					
<i>Uncites</i> sp.....	*					
<i>Spirifer antiquissimus</i> , Salter, (<i>cfr. Strophomena spiriferoides</i> , M ^e Coy). » <i>cfr. indifferens</i> , Barr.....	* *	? *				
<i>Leptaena Beirensis</i> , Sh., forme large.....	*	*				
» » forme longue (<i>Leptaena ignava</i> , Sh.).....	*					
» <i>sericea</i> , Sow.....	..	*				
» <i>tenuissime-striata? M^e Coy.</i>	*					
<i>Strophomena deltoidea</i> , Conrad.....	*					
» » var. <i>undata</i> , M ^e Coy.....	*					
» » var. <i>camerata</i> (<i>Leptaena camerata</i> , Conrad).....	*					
» <i>rhomboidalis</i> , Wilkens (sp.).....	*					
» » var. <i>Loredensis</i> , nobis.....	*					
» <i>cfr. Phillipsi</i> , Barr.....	*					
<i>Orthis Actoniae</i> , Sow.....	*					
» <i>honorata</i> , Barr.....	*					
» <i>calligramma</i> , Dalm.....	*	..	..	..	*	
» <i>elegantula</i> , Dalm.....	..	..	..	*		
» <i>cfr. elegantula</i> , Dalm.....	*					
» <i>exornata</i> , Sh.....	*					
» <i>Berthoisi</i> , Rou.....	*	*				
» <i>Mundae</i> , Sh.....	*					
» <i>testudinaria</i> , Dalm. (<i>O. redux</i> , Barr., d'après Salter).....	*	*	..	*	?	
» <i>Michelini</i> , Lèveillé.....	..	*				
» <i>Ribeiroi</i> , Sh. et plusieurs variétés.....	..	*	..	*	*	
» <i>Bussacensis</i> , Sh. (non <i>O. testudinaria</i> , Vern. et Barr.).....	..	..	..	*		
» <i>sardoa</i> , Menegh.....	*					
» <i>cfr. ellipsoïdes</i> , Barr.....	..	..	..	*		
» <i>aff. suburbana</i> , Barr.....	*	..	..	*		
» <i>aff. multistriata</i> , Hall. (<i>an sp. n.</i>).....	*					
» <i>aff. alata</i> , Sow.....	*					
» <i>cfr. flabellulum</i> , Sow.....	*					
» <i>sp. (an O. turgida</i> , M ^e Coy).....	..	..	..	*		

	Schistes impura diabasiques	Schistes à Dalm. Dujardini	Grès de Loredó	Schistes à Homalo- notus rarus	Schistes à Orthis Ribelroi	Quartzites à Billo- bites
<i>Porambonites Ribeiroi</i> , Sh.....	*					
<i>Discina</i> sp.....	..	..	..	..	*	
<i>Obolus Bowlesi</i> , Vern. e Barr.....	..	..	..	*		
» <i>filosus</i> , Hall. (sp.).....	..	..	..	*	*	
<i>Lingula Lesueuri</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Lesueuri</i> , Rou.....	*					
» <i>lata</i> , Sow.....	..	..	..	..	*	
» <i>Rouaulti</i> ? Salter.....	..	..	..	..	*	*
» <i>cfr. Rouaulti</i> , Salter.....	..	..	..	..	*	
» <i>Symondsi</i> , Salter.....	..	..	..	*		
» <i>brevis</i> ? Portl.....	*					
» <i>longissima</i> ? Pander.....	..	..	..	..	*	
» <i>aff. cornea</i> , Sow. (g an <i>L. ovata</i> , M ^e Coy.).....	..	*				
» <i>cfr. ovata</i> , M ^e Coy.....	..	..	..	*		
» <i>cfr. attenuata</i> , Sow.....	..	*	..	*		
<i>Brachiopodes</i> ind., plusieurs espèces.....	*	*	*	..	*	
Bryozoa						
<i>Cheilostomata</i> , Busk. (Bryozoaires cellulins, d'Orb.).....	*					
Annelida						
<i>Traces de Nereites</i> ind.....	..	*				
Echinodermata						
<i>Caryocrinus ornatus</i> , Say.....	*					
<i>Echinospaerites</i> (<i>Caryocistites</i>) <i>Balticus</i> , Eichw. (Voyez <i>Echinospaerites Davisi</i> , M ^e Coy).....	*					
» <i>cfr. quaerendus</i> , Barr.....	*					
<i>Aristocystites cfr. sculptus</i> , Barr.....	*					
» <i>cfr. Bohemicus</i> , Barr.....	*					
<i>Calix</i> (<i>Echinospaerites</i>) <i>Murchisoni</i> , Vern. et Barr.....	..	..	..	*	*	
» <i>Sedgwicki</i> , Rou. (Comp. <i>Aristocystites Bohemicus</i> , Barr.).....	..	..	..	..	*	
» sp. (différente des espèces précédentes).....	..	..	..	*		
Cœlenterata						
<i>Synocladia Lusitanica</i> , Sh.....	*					
» <i>hypnoides</i> , Sh.....	*					
<i>Disteichia reticulata</i> , Sh.....	*					
<i>Phyllopora</i> sp. (<i>Retepora</i> , dans la liste de Sharpe).....	*					
<i>Diplograptus palmeus</i> , Barr.....	..	*	..	*		
<i>Didymograptus Murchisoni</i> , Bœck.....	..	..	..	*	*	
» sp.....	..	..	..	..	*	
<i>Cladopora fibrosa</i> , Hall.....	*	..	..	..	*	
<i>Calamopora</i> sp. (Voyez <i>C. favosa</i> , Goldf.).....	*					
<i>Discophyllum plicatum</i> , Barrois, non Phillips.....	..	..	..	..	..	*
Incertae sedis						
<i>Cruziana furcifera</i> , d'Orb.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. furcifera</i> , d'Orb.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Beirensis</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Beirensis</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*

	Schistes impurs diabasiques	Schistes à Dalm. Dujardini	Grès de Loredò	Schistes à Homalo- notus rarus	Schistes à Orthis Ribelroi	Quartzites à Bilo- bites
<i>Cruziana Monspelliensis</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Bagnolensis</i> Morière.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Nathorsti</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Goldfussi</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Vilanovae</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Cordieri?</i> Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Cordieri</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>aff. Cordieri</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
<i>Fraena Lyelli</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
<i>Arthropycus cfr. Harlani</i> , Hall.....	..	..	..	..	..	*
<i>Scolithus Dufrenoyi</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>linearis?</i> Hall.....	..	..	..	..	..	*
<i>Vexillum Desglandi</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Morierei</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Morierei</i> , Sap.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Halli</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*
<i>Rhysophycus Saportai</i> , nobis.....	..	..	..	..	..	*
» <i>cfr. Rouaulti</i> , Lebesc.....	..	..	..	..	..	*
» <i>Barrandei?</i> Trom. e Lebesc.....	..	..	..	..	..	*
<i>Foralites Pomeli</i> , Rou.....	..	..	..	..	..	*

EXPLICATION DES PLANCHES

Tous les exemplaires représentés appartiennent aux collections de la Direction des travaux géologiques du Portugal; ils proviennent du même gisement, près de Covelo, sur le versant droit du Douro, où les exemplaires d'*Uralichas Ribeiroi* figurés dans mon mémoire antérieur ont été recueillis. Toutes les figures sont de grandeur naturelle, mais elles sont interverties, faute de l'emploi du prisme dans la reproduction photographique.

PLANCHE I

Fig. 1 et 1 a. Moule et empreinte extérieure d'une tête d'*Uralichas Ribeiroi* de grandes dimensions, comprimée un peu obliquement dans le sens longitudinal. L'une des joues mobiles est jointe à la tête, elle est cependant incomplète, car il lui manque la pointe génale.

PLANCHE II

La fig. 1 représente une tête d'*Uralichas Ribeiroi* de moindres dimensions que celle de la planche I, elle est comprimée latéralement ou étirée dans le sens longitudinal. On voit distinctement le lobe palpébral à la droite de la figure (côté gauche de l'exemplaire), cependant l'œil a été écrasé ou étiré et l'on n'y découvre pas les lentilles qui couvraient la surface visuelle.

Les fig. 2 et 2 a représentent le moule et l'empreinte extérieure de la tête d'un jeune individu d'*Uralichas Ribeiroi*, auquel appartiendrait peut-être le pygidium reproduit sur la pl. IV, fig. 4. Au contraire de la tête fig. 1, celle-ci a été comprimée longitudinalement, et montre par conséquent une longueur moindre que celle qu'elle avait réellement. Dans le sillon latéral antérieur droit de la glabellle on voit, fig. 2 a, qu'il existait une fossette analogue à celle indiquée par Marie Rouault dans *Lichas Heberti* et à peu près dans la même position que celle-ci. Il semble donc que ce caractère n'a pas la valeur spécifique que le géologue de Rennes lui a attribuée.

PLANCHE III

Les fig. 1 et 1 a représentent le moule et l'empreinte extérieure d'un pygidium très incomplet d'un jeune individu d'*Uralichas Ribeiroi*.

Les fig. 2, 4 et 5 représentent les moules de trois exemplaires plus au moins parfaits de *Dalmanites Vetillarti*, figurés ici pour la comparaison de leurs pygidiums avec ceux de l'*Uralichas*. On voit clairement dans ces exemplaires, ainsi que dans celui de la pl. IV, fig. 5, que le prolongement caudal est un simple appendice de l'axe du pygidium, qui n'a aucune influence sur la conformation de celui-ci, car il n'y a point de liaison avec les lobes latéraux. Dans l'exemplaire fig. 4, où la pointe caudale a été détruite, mais dont l'empreinte est très nette, on voit qu'elle forme une crête aigüe, qui

marque l'existence d'un sillon anguleux à la face inférieure de cet appendice. Ce sillon est, par conséquent, un caractère normal et non pas produit accidentellement par la cassure de l'exemplaire.

La fig. 3 représente un fragment d'un grand pygidium d'*Uralichas Ribeiroi*, où l'on observe quelques différences dans l'allure des sillons relativement aux autres pygidiums de cette même espèce.

Dans la fig. 6 est représentée une partie de la joue fixe d'un exemplaire d'*Uralichas Ribeiroi* de grande taille. La photographie n'a pas reproduit clairement les lentilles, qui étaient très nombreuses et rangées en des files s'entrecroisant obliquement en quinconce.

PLANCHE IV

Fig. 1, 2 et 3. Moule et empreintes de quelques fragments du thorax d'*Uralichas Ribeiroi*. L'empreinte fig. 1 est la plus parfaite et celle qui rend le mieux la forme de l'axe, qui était médiocrement convexe, tandis que la partie interne des plèvres était aplatie.

L'exemplaire de la fig. 2 est le moule de trois plèvres contigües, on observe à leur extrémité une série de lignes obliques irrégulières qui représentent l'empreinte de la doublure du test.

La fig. 4 reproduit le pygidium presque entier d'un jeune individu d'*Uralichas Ribeiroi*. Dans cet exemplaire il est évident que la pointe caudale est un véritable prolongement du pygidium comprenant les lobes latéraux et non pas simplement le prolongement de l'axe, qui s'évanouit avant d'atteindre le contour en se soudant avec les lobes latéraux dans un seul corps. Ce prolongement a été détruit à son extrémité postérieure, cependant il laisse voir sur son empreinte une crête aigüe comme celle de l'exemplaire de *Dalmanites Vetillarti* représenté dans la pl. III, fig. 4, ce qui prouve qu'il y avait à la surface inférieure de ce prolongement un sillon analogue à celui de l'appendice caudal de cette dernière espèce.

La fig. 5 montre un autre exemplaire de *Dalmanites Vetillarti*, dont l'appendice caudal, se continuant avec l'axe, avait une longueur insolite.

ERRATA

PAG.	LIN.	ONDE ESTÁ	LEIA-SE
6	36	figs. 2, 5 e 6	figs. 2, 4 e 5
11	16 e 17	Bretanha	Normandia
22	4	füsse	fût
22	37	figs. 2, 5 et 6	figs. 2, 4 et 5
26	4	fig. 4	fig. 6
33	25	plus au moins	plus ou moins

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J. F. N. DELGADO.

Trilobites *Pl. I*

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J.F.N. DELGADO.

Trilobites *Pl. II*

Cliche J. T. Coelho

Phototyp. A. S. Amancio.

FAUNE SILURIQUE DU PORTUGAL

J.F.N. DELGADO.

Trilobites *Pl. III*

Cliche J. J. Coelho

Phototyp. A. S. Amancio.

1

2

3

4

5

SYSTÈME SILURIQUE DU PORTUGAL

ÉTUDE DE STRATIGRAPHIE PALÉONTOLOGIQUE

COMMISSION DU SERVICE GÉOLOGIQUE DU PORTUGAL

SYSTÈME SILURIQUE

DU

PORTUGAL

ÉTUDE DE STRATIGRAPHIE PALÉONTOLOGIQUE

PAR

J. F. NERY DELGADO

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU SERVICE GÉOLOGIQUE
MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE LISBONNE

LISBONNE

IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

1908

SYSTÈME SILURIQUE DU PORTUGAL

INTRODUCTION

EXAMEN DE LA LITTÉRATURE

Avant de présenter le résultat de mes recherches sur le système silurique du Portugal, étude à laquelle j'ai consacré particulièrement mon attention pendant de longues années, il est de mon devoir de faire connaître quoique brièvement l'importance des travaux antérieurs au mien. Je noterai spécialement ceux qui ont pu m'être de quelque utilité dans cette étude. Comme on le verra par la suite, la plupart de ces ouvrages ne m'ont que fort peu ou même pas du tout aidé.

*

* *

1805.—Les plus anciens travaux publiés sur la géologie du Portugal sont ceux de Link et du baron d'Eschwege, tous du commencement du siècle passé, et par conséquent bien antérieurs à la création du système silurique (1835). On y décrit à grands traits et à vrai dire pas toujours avec beaucoup d'exactitude, la composition lithologique du sol que ces deux explorateurs parcoururent dans leurs voyages, ou bien ils se réfèrent à des questions minières. Il est donc inutile de chercher dans ces travaux quelques renseignements stratigraphiques ou paléontologiques qui parlent spécialement des couches de ce système.

Dans l'ouvrage *Voyage en Portugal par le comte de Hoffmansegg*¹ on rencontre quelques notes très incomplètes sur la nature du sol des provinces du nord du Portugal. Selon l'auteur, la plus grande partie de la province de Trás-os-Montes, les deux versants de la serra d'Estrella et une grande partie de la région comprise entre le Zézere et la frontière d'Espagne, sont formés par des schistes et des ardoises mêlés de grès schisteux, semblables à ceux de la région de Vallongo. Ainsi toutes les roches schisteuses de l'Archaïque et du Précambrique, ainsi que celles qui appartiennent au Silurique et à d'autres systèmes paléozoïques plus modernes, se trouvent englobées dans un même groupe.

¹ *Voyage en Portugal par M. le Comte Hoffmansegg*, rédigé par M. Link. Paris, 1805.

De même, Eschwege qui, en qualité d'inspecteur des mines de la capitainerie de Minas Geraes (Brésil), a été au service du Portugal, a traversé dans ses voyages au nord du pays quelques régions occupées par les roches du système silurique, mais sans y accorder une attention spéciale. Il est même à remarquer que Eschwege, qui séjourna à Vallongo et étudia minutieusement la serra de Santa Justa qu'il reconnut avoir été dans les temps anciens un champ d'exploitation minière de grande importance, puisqu'il y découvrit des traces d'exploitation d'une mine d'or, ne fût pas frappé par les formes et la structure de cette colline et des serras de quartzite qui s'y rattachent, et ne parle que des filons de quartz qui la traversent.

1848.—José Pinto Rebello de Carvalho dans son mémoire sur la constitution du Alto Douro (délimité d'après la carte topographique de José James Forrester)¹, fut le premier qui parla du système silurique du Portugal. Il attribua toute la formation schisteuse du district vinicole (district qui est presque tout entouré par les roches granitiques) aux *terrains siluriens ainsi nommés par le Dr. Murchison*, et il supposa que le même système de roches s'étendait dans tout le nord de la Péninsule. En un point de sa description (pag. 21) il est plus explicite, et déclare que sa classification est basée sur la grande ressemblance qui existe entre les roches de la vallée du Douro et celles de la Bretagne classées par Dufrenoy dans la formation de Caradoc, sur l'existence de vraies ardoises à Marão, à Vallongo et en d'autres endroits, sur l'existence de l'anhracite dans cette dernière localité et des schistes argileux maclifères ou chiasolitiques dans la serra de Marão, et enfin sur d'autres faits.

Tout ceci lui paraît «confirmer la justesse de la classification de nos terrains phylla-difères avec leurs différentes modifications comme étant des dépôts de l'époque silurienne ou de Caradoc».

Dans l'esquisse de la carte géologique qui accompagne la carte à grande échelle de Forrester, les schistes de la région vinicole (*schistous and other stratified rocks*) sont indiqués comme *terrain métamorphique*, les calcaires qui leur sont subordonnés étant séparés comme *terrains de transition (transition limestone)*. Pourtant dans la description que le Dr. Rebello de Carvalho fait d'une partie de la Beira et du Minho, il considère que le terrain silurique occupe les deux rives du Douro, mais il ignore cependant l'extension qu'occupe ce terrain dans la province de Trás-os-Montes. Mais il ne nous donne aucune indication précise quant aux limites de la région renfermée dans ce système, ou quant à sa faune, réunissant dans un même système et sous la même désignation (ce qui est bien excusable pour cette époque-là) toutes les couches schisteuses que s'offrirent à ses recherches et qui sont de systèmes différents. Il est cependant remarquable que dans l'esquisse de la carte géologique à petite échelle qui accompagne la grande carte de Forrester, les bandes de calcaire qui traversent le Douro près de l'embouchure du Pinhão et qui en réalité sont les seuls affleurements de cette nature qui se trouvent dans toute cette région, soient indiqués avec la plus grande exactitude.

¹ *Considerações geraes sobre a constituição geologica do Alto Douro (demarcado conforme a carta topographica de José James Forrester)*. Porto, 1848.—La dédicatoire qui sert de préface à cet ouvrage porte la date du 4 mai 1847. L'impression du mémoire fut cependant faite l'année suivante.

1849.—Cependant le premier ouvrage où se rencontrent des données positives sur l'existence du système silurique en Portugal est la notice de Daniel Sharpe, intitulée *On the Geology of the neighbourhood of Oporto, including the Silurian Coal and Slates of Vallongo*, insérée dans le *Quarterly Journal of the Geological Society of London*, vol. v, 1849, p. 142-153. Elle est accompagnée d'une planche de fossiles et d'une esquisse géologique de la région au nord du Douro entre Porto et Espozende, s'étendant vers l'intérieur jusqu'à la limite du grand affleurement de granite porphyroïde qu'il classifia comme syenite.

Sharpe dit que le 11 avril 1832 il présenta à la Société Géologique de Londres une première note sur la géologie des environs de Porto, qui fut imprimée dans les *Proceedings* de la même Société, vol. i, p. 395: mais plusieurs espèces de fossiles, Trilobites et mollusques, ayant été découvertes postérieurement à cette date dans les schistes de Vallongo, ce fut là l'origine de la note déjà mentionnée qu'il présenta à la même Société dans sa séance du 29 novembre 1848.

Dans ce travail Sharpe fait allusion à l'œuvre du Dr. Rebello de Carvalho, disant que ce dernier décrivit les roches schisteuses qui forment la haute serra de Marão, couvrent la célèbre région vinicole du Douro supérieur et qui ressemblent par leur caractère minéral aux schistes et grès de la coupe de Vallongo qu'il décrit lui-même.

Sharpe fait d'abord une courte description des roches cristallines des voisinages de Porto (granite, micaschiste, gneiss et schistes micacés ou chloritiques), il suppose que les divers membres de ce système (dont il pense que le granite est le plus inférieur) forment différentes bandes parallèles qui se répètent régulièrement d'un côté et d'autre de l'axe formé par cette roche éruptive. Le feuilleté des schistes et du gneiss est parallèle à l'axe principal, cependant il incline en sens contraire des deux côtés de l'axe granitique formant les plans de clivage comme un arc au-dessus de l'axe de soulèvement des roches de la région. Quoique cette disposition des bandes soit tout à fait théorique et que dans ses détails la carte géologique que Sharpe présente s'éloigne beaucoup de la réalité, il est juste de reconnaître que l'idée d'un anticlinal, dont l'axe serait formé par le granite de Porto, fut alors exprimée pour la première fois.

Le système de roches cristallines de Porto est accompagné du côté oriental, par une bande de roches sédimentaires, que Sharpe classifia dans le Silurique inférieur (*Lower Silurian Formation*) et qu'il décrit suivant une coupe géologique tracée de l'embouchure du Douro jusqu'à Baltar, longeant la route de première classe de Porto à Amarante. Cette coupe passe à Vallongo et traverse toute la série des roches de la région jusqu'à ce qu'on arrive au granite porphyroïde du grand affleurement du Minho. C'est dans la partie orientale de cette coupe, qu'il nomme coupe de Vallongo, que Sharpe se base pour faire la description du système silurique.

Sharpe considère qu'il y a quatre groupes de couches dans cette coupe, correspondant en effet à des étages distincts. Ces groupes sont, du haut en bas, c'est-à-dire allant du levant au couchant les suivants:

1. *Micaceous Sandstone*. Grauwackes de Sobrado, qui confinent au granite de Baltar.
2. *Black Carbonaceous Slate*. Schistes ampéliteux du Gothlandien, qu'il dit avoir exactement le même aspect que les schistes du Carbonique supérieur, mais où les recherches comme l'on devait s'attendre, furent toujours infructueuses.

3. *Clay-slate*. Schistes argileux tégulaires proprement du Silurique inférieur et avec la faune caractéristique de cette division du Silurique, mais dans lesquels il fit rentrer les couches inférieures du Gothlandien.

4. *Carboniferous series of San Pedro da Cova*. Série carbonifère de S. Pedro da Cova composée de grès, conglomérés et schistes, contenant quelques lits d'anthracite et des impressions de restes de végétaux.

Décrivant cette partie de la coupe, Sharpe place cette série dans la base du Silurique inférieur, au-dessous de la série schisteuse avec des Trilobites et *Orthis*, parce que, dit-il, une parfaite concordance réunit les deux séries, de plus il existe un passage graduel entre les couches, lequel comme on peut le supposer n'existe pas en réalité.

Il faut pourtant observer que Charles Bunbury, à qui Sharpe soumit l'examen des fossiles végétaux trouvés à S. Pedro da Cova, ne donna point son opinion sur l'âge du dépôt; au contraire il dit qu'il découvrit parmi les fossiles qu'il examina, trois espèces de fougères, en mauvais état de conservation et très indistinctes; cependant une, présentait une grande ressemblance avec le *Pecopteris Cyathea*, espèce commune dans le Coal-measures, et les deux autres rappelaient les *Pecopteris muricata* et *Neuropteris tenuifolia* du même terrain.

Cette observation semble avoir fait hésiter un peu Sharpe sur la classification qu'il faisait des couches carbonifères dans la base du Silurique, et lui fit dire qu'il espérait qu'après peu de temps, de nouvelles recherches feraient voir si les mêmes espèces de plantes existèrent en effet dans deux périodes si éloignées l'une de l'autre (*it is to be expected that before long specimens may be brought to light which will show whether the same species of plant existed at two periods so remote from one another*).

Ainsi Sharpe réunit dans un même système, les considérant comme étant du Silurique inférieur: le Silurique inférieur (*Clay-slate*), le Silurique supérieur (*Micaceous Sandstone* et *Black Carbonaceous Slate*), et le Carbonique (*Carboniferous series of San Pedro da Cova*), confondant de plus avec le Silurique, les schistes du Précambrique de la vallée du Douro et de la serra d'Estrella. On comprend d'ailleurs que cette confusion provenait principalement des idées dominantes de l'époque où l'on attribuait au système silurique tous les dépôts sédimentaires au-dessous du Dévonique ou du Old Red Sandstone jusqu'aux plus anciennes roches stratifiées alors connues. C'est le moment de rappeler que vers la même époque, l'éminent Barrande incorporait dans son *Système Silurien de la Bohême* les schistes cristallins et les gneiss de l'Archaïque qui forment ses deux étages A et B, que, comme nous l'avons vu, Sharpe a laissé séparés.

Sharpe donne la liste suivante des espèces rencontrées à Vallongo:

Calymene Tristani Brongn.

» une autre espèce, spécimens imparfaits.

Ogygia Guettardi Brongn.

Isotelus Powisi Portlock.

Iliaenus Lusitanicus n. s.

Chirurus, fragments d'une espèce non décrite.

Beyrichia ou *Cythere*, une petite espèce, abondante.

Orthis Noctilio n. s.

» *Miniensis* n. s.

» *Duriensis* n. s.

Orthis Lusitanica n. s.

» fragments de plusieurs autres espèces.

Orthoceras vagans Salter.

» fragment avec 2 1/2 pouces (65 mill.) de diamètre.

Bellerophon Duriensis n. s.

Graptolithus Murchisoni? *Sil. syst.*, pl. 26, fig. 4.

La détermination de ces espèces fut faite par Sharpe aidé, comme il déclare lui-même, par Salter, qui classifia les Trilobites, et par Morris qui le seconda dans la description des mollusques. Outre ces espèces, il trouva beaucoup plus d'autres fossiles, les exemplaires étant pourtant trop imparfaits pour être classifiés. Il nota cependant le fait, que les fragments de Trilobites étaient très abondants, beaucoup d'entre eux très déformés, quelques-uns ayant de grandes dimensions.

Les fossiles auxquels il s'en réfère furent trouvés au nord, au sud et à l'ouest de Vallongo, aucun n'a été découvert à l'est de cette ville, ni dans une couche au-dessus des carrières d'ardoise.

Les Trilobites furent revus plus tard et leur classification modifiée par Salter, qui la corrigea de la manière suivante (*Proceedings of the Geological Society of London*, Apr. 6, 1853, p. 160):

Calymene Tristani Brongn.

» *Arago* Rou.

Asaphus Guettardi Brongn. (*O. Edwardsi* Rou.).

» espèce probablement nouvelle avec le pygidium extrêmement large et l'axe court (*Isotelus Powisi* de la première liste).

Iliaenus giganteus Burmeister (*I. Lusitanicus* Sh.).

Placoparia Zippei Böeck? (*Chirurus* de la première liste).

1853.—Le mémoire sur le Bussaco *On the Carboniferous and Silurian Formations of the neighbourhood of Bussaco in Portugal* publié aussi, cinq ans plus tard, dans les *Proceedings* de la Société Géologique de Londres, vol. ix, 1853, p. 135-161, a sans doute plus de valeur que le travail sur le Silurique de Vallongo auquel nous nous en sommes rapportés.

Ce mémoire fut rédigé par Sharpe sur les notes que Carlos Ribeiro lui fournit dans une série de lettres envoyées en 1850 alors que notre géologue s'occupait du creusement d'un puits pour la recherche du charbon à Santa Christina, sur la pente occidentale de la serra de Bussaco. Carlos Ribeiro lui envoya à cette occasion une collection de fossiles pour illustrer ses notes, fossiles qui furent décrits par Sharpe, avec l'aide de Salter pour les Trilobites, de Rupert Jones pour les Entomostracés et de Charles Bunbury pour les plantes fossiles du Carbonique. Dans une esquisse de carte géologique qui accompagne le mémoire, tous les terrains de la région y sont représentés, le Silurique est indiquée par une bande comprenant les montagnes du Bussaco et de Murcella et en plus par un petit affleurement situé plus au sud au milieu des grès sous-crétaciques et qui doit correspondre à celui de S. Miguel de Poiars.

Deux coupes presque parallèles faites à travers la serra de Bussaco et à peu de distance l'une de l'autre, la première allant de Santa Christina vers le haut de l'ancien télégraphe situé sur le point le plus élevé de la serra près de la Tapada, et l'autre se dirigeant de

Pêgo à la Cruz Alta et à Monte Novo, démontrent assez nettement les relations des couches du système silurique avec les autres terrains que les mêmes coupes traversent et qui sont tous sommairement décrits.

Prenant seulement dans cette description ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui se rattache au système silurique, nous voyons que la division de ce système (*Silurian Formation*) s'y établit en trois groupes principaux, dont les deux inférieurs appartiennent à la série silurienne inférieure (*Lower Silurian*) et le groupe supérieur (*Upper Silurian*) correspond au Wenlock ou partie inférieure de la série silurienne supérieure de l'Angleterre. Le Carbonique y repose en discordance de stratification sur les schistes cristallins et sur le Silurique.

Dans sa partie essentielle cette classification est correcte, mais dans ses détails, comme nous le verrons, nous nous éloignons beaucoup des opinions exprimées par l'auteur du mémoire.

Il est à noter, cependant, que Carlos Ribeiro faisant allusion accidentellement au charbon de S. Pedro da Cova, persiste dans la même erreur commise par Sharpe. Celui-ci déclarait que la série carbonifère de cette localité occupe la base du système silurique, faisant ressortir que la position du charbon sous les schistes contenant des Trilobites et *Orthis* ne peut être expliquée par une inversion supposée des strates.

On comprend mal cette erreur, puisque nous voyons qu'à cette époque Carlos Ribeiro dûment attribuait au système carbonique la formation carbonifère du Bussaco qui contient parmi d'autres espèces une très caractéristique de ce système, le *Pecopteris Cyathea*, que Bunbury avait déjà reconnu à S. Pedro da Cova.

Dans la division inférieure (*Lowest Division*) Carlos Ribeiro comprend presque toute la série ordovicienne y faisant rentrer même les calcaires, qui en vérité sont associées aux schistes diabasiques.

Ces derniers toujours accompagnés de la diabase (*greenstone or diorite*) constituent la division supérieure du Silurique inférieur (*Middle division of the Silurian Formation*). Cette division est constituée par une roche argileuse ochracée, de caractère métamorphique (argilolite) qui passe quelquefois insensiblement au greenstone ou diorite. Cette roche est fossilifère, et contient dans quelques localités des empreintes de Brachiopodes (*Orthis*, *Leptaena*, etc.) et de petits coraux ramifiés en grande abondance. La diorite y apparaît à des intervalles dans une grande extension suivant la même direction que les strates siluriennes qu'elle modifie; cependant les couches carbonifères ne montrant aucune altération, on reconnaît qu'elles doivent être d'un âge postérieur à l'éruption de la diorite.

La liste des fossiles de la *Lowest Division* est la suivante:

<i>Iliaenus giganteus</i> Burm.	<i>Ogygia glabrata</i> Salter, n. s.
(<i>I. Lusitanicus</i> Sh.	<i>Beyrichia Bussacensis</i> Jones, n. s.
= <i>I. Desmaresti</i> Rou.).	» <i>simplex</i> Jones, n. s.
<i>Phacops Dujardini</i> Rou.	<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.
» <i>proaevus</i> Emmrich	» <i>Deshayesiana</i> Rou.
(<i>Ph. socialis</i> Barr.).	<i>Nucula Costae</i> n. s.
<i>Placoparia Zippei</i> Böeck.	» <i>Ciae</i> n. s.
<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	» <i>Ribeiro</i> n. s.
» <i>Arago</i> Rou.	» <i>Ezquerrae</i> n. s.
<i>Trinucleus Pongerardi</i> Rou.	» <i>Eschwegii</i> n. s.

<i>Nucula Maestri</i> n. s.	<i>Orthis fissicosta?</i> Hall.
» <i>Beirensis</i> n. s.	» <i>basalis</i> Dalm.
» <i>Bussacensis</i> n. s.	» <i>testudinaria</i> Dalm.
<i>Leda Escosurae</i> n. s.	» <i>parva</i> Pander.
<i>Dolabra? Lusitanica</i> n. s.	<i>Pleurotomaria Bussacensis</i> n. s.
<i>Cypricardia Beirensis</i> n. s.	<i>Ribeiria pholadiformis</i> n. s.
<i>Modiolopsis elegantulus</i> n. s.	<i>Bellerophon trilobatus</i> , Sil. Syst.
<i>Orthis Ribeiro</i> n. s.	» <i>carinatus</i> , Sil. Syst.
» <i>Bussacensis</i> n. s.	<i>Theca Beirensis</i> n. s.

Dans la *Middle Division* le plus grand nombre d'espèces lui sont privatives, quelques-unes d'entre elles cependant sont communes avec celles de la division inférieure, comme on voit par la liste suivante:

<i>Phacops Dujardini</i> Rou.	<i>Leptæna Beirensis</i> n. s.
<i>Dithyrocaris? longicauda</i> n. s.	» <i>ignava</i> n. s.
<i>Orthis exornata</i> n. s.	» <i>deltoidea</i> Conrad sp.
» <i>Bussacensis</i> n. s.	<i>Pleurotomaria Bussacensis</i> n. s.
» <i>Mundae</i> n. s.	<i>Favosites fibrosa</i> Goldf.
» <i>testudinaria</i> Dalm.	<i>Synocladia Lusitanica</i> n. s.
» <i>Berthoisi</i> Rou.	» <i>hypnoides</i> n. s.
» <i>parva</i> Pander.	<i>Disteichia reticulata</i> n. s.
<i>Parambonites Ribeiro</i> n. s.	<i>Retepora</i> , 1 ou 2 espèces.
» <i>lima</i> n. s.	

Le Silurique supérieur ou *Upper Division of the Silurian Formation* est constitué par des schistes, qui passent sous les couches carbonifères, où l'on ne rencontre aucune des espèces découvertes dans les couches sous-jacentes, les premiers étant caractérisés par *Cardiola interrupta*, *Orthoceras*, *Graptolites*, etc.

La faune du Silurique supérieur alors connue se résumait dans les espèces suivantes:

<i>Graptolithus ludensis</i> , Sil. Syst.	<i>Cardiola interrupta</i> , Sil. Syst.
<i>Creseis</i> , 1 espèce.	<i>Cardium striatum?</i> Sil. Syst.
<i>Orthoceras</i> , 4 espèces.	

1850.—Dans la description géographique et géologique de la province de l'Algarve par Charles Bonnet¹, les schistes et grauweekes du Culm sont rapportés au système silurique sans aucune base sérieuse pour une telle classification, car le propre auteur du mémoire déclare que, n'ayant rencontré aucun fossile, il lui était difficile de déterminer le terrain auquel appartenaient les couches qu'il observa, et ce n'est qu'en se guidant par les caractères minéralogiques qu'il donnait cette indication. En outre, supposant arbitrairement que les grauweekes grossières et les grès quartzeux représentaient les couches supérieures du système, il suggère l'idée qu'elles pourraient être considérées comme indépendantes et les réfère au système Dévonique!

¹ Algarve. Portugal. Description géographique et géologique de cette province, par Charles Bonnet. 1850.

1852-1896.— Eugène Schmitz, ingénieur des mines, français, qui passa la plus grande partie de sa vie en Portugal et dirigea successivement jusqu'à sa mort, en 1896, l'exploitation des mines de charbon de S. Pedro da Cova, du Bussaco et du Cap Mondego, fit insérer en 1852 dans la *Revue Lusitanienne* (revue littéraire et scientifique qui était alors publiée à Lisbonne) 4 articles (50 pages) subordonnées au titre *Études géologiques sur le terrain des environs de Porto. Gisements et exploitations des combustibles fossiles*. Ces articles furent écrits au point de vue industriel; ils contiennent cependant une description lithologique très brève des terrains des environs de Porto, mais on n'y trouve aucune indication qui puisse être de quelque utilité pour l'étude du système silurique; au contraire, les plus déplorables confusions s'établissent au point de vue stratigraphique.

Les gneiss et micaschistes des voisinages de Porto sont considérés par l'auteur comme des roches sédimentaires métamorphiques, établissant le passage du granite aux schistes argileux; et toute la série de roches arenacées et schisteuses, qu'il considère former la partie supérieure des schistes argileux métamorphiques, est rapportée par lui au terrain Dévonien ou anthracifère. Il confond donc sous cette désignation le Précambrique, le Silurique inférieur et supérieur et le Carbonique, et n'exclut que le petit bassin de S. Pedro da Cova, qui dans son dernier article il fait rentrer dans le système Carbonique.

Il cite très génériquement l'existence, dans cette région, de rares débris de végétaux et de restes d'animaux fossiles sur le versant occidental de la serra de Vallongo, seul lieu où il les découvrit, mais il ne détermine pas les espèces et ne donne aucune indication sur leur gisement ni sur leur âge.

Connaissant mal le pays, il attribue aux deux provinces au nord du Douro et aussi à une grande partie de la Beira, la même composition géologique qu'il observa dans les environs de Porto, et référant l'anthracite au système dévonique, il exclut de ce terrain le bassin de S. Pedro da Cova, bassin assez petit, comme il le dit, mais clairement séparé du terrain d'anthracite qui l'entoure!

Dans le volume II des *Annaes de Sciencias Naturaes*, Porto, 1905, p. 6-16, on trouve un petit article posthume de Schmitz sur le même sujet intitulé *Notice sur la composition et la classification des terrains dans les provinces du nord du Portugal*, où l'on est forcé d'admettre qu'il n'ajoute rien de nouveau, ne modifie pas la classification faite antérieurement, et ne donne aucun éclaircissement soit sur la stratigraphie, soit sur la paléontologie des différents systèmes paléozoïques.

1870.— Dans le volume I de la *Revista de Obras Publicas e Minas*, organe de l'Association des ingénieurs civils portugais, j'ai publié trois articles sous le titre de *Breves apontamentos sobre os terrenos paleozoicos do nosso paiz*. Comme on voit par cette désignation, ce sont de simples notes, avec lesquelles nous prétendons seulement assurer la priorité des études faites dans les terrains paléozoïques antérieurement à la dissolution de l'ancienne Commission géologique en 1869.

Les terrains paléozoïques sont classifiés dans les systèmes suivants: Silurien inférieur (faune seconde), Silurien supérieur (faune troisième), Dévonien inférieur, Carbonifère inférieur et Carbonifère supérieur. Outre ces systèmes, il faut considérer un grand groupe azoïque, qui forme la base de nos formations sédimentaires, et que à l'exemple de De Vereiul j'ai nommé

terrain métamorphique. Ce groupe de couches est décrit avec plus de détails que les autres systèmes, la distribution des différentes couches qui le composent et les phénomènes orogéniques qui ont eu lieu étant indiqués d'une manière générale. Le système silurique est décrit en un plus petit nombre de pages.

On rencontre dans ce travail la première liste générale des fossiles des terrains paléozoïques du Portugal, où l'on cite 98 espèces dans le Silurien inférieur, 8 dans le Silurien supérieur, 15 dans le Dévonien inférieur et 30 dans le Carbonifère inférieur (Culm). Beaucoup d'espèces sont, cependant, indiquées génériquement ou indéterminées.

Dans une collection de fossiles du Culm que j'ai alors envoyé au professeur Ferdinand Roemer de Breslau, ce célèbre paléontologiste reconnut les espèces suivantes:

Pecten Munsteri H. v. Meyer (*P. densistria* Sandb.).

Goniatites sphaericus (*G. crenistria* Phillips).

» *mixolobus* Phillips.

Calamites transitionis Göppert, la plante la plus caractéristique du Culm.

Ces espèces sont mentionnées dans ma liste, excepté la première, que je n'avais pas reconnu.

1875.— Mon mémoire intitulé *Sur l'existence du terrain silurien dans le Baixo Alemtejo*, 4°, 38 p., avec deux planches et une esquisse géologique, à l'échelle de 1:1000000, de la partie orientale de la province de l'Alemtejo et d'une partie de la Basse Beira jusqu'à Penamacor, fut présenté à l'Académie royale des sciences de Lisbonne au mois de mai de 1875.

J'ai voulu démontrer dans ce mémoire, l'existence du système silurique dans la partie méridionale de notre pays par la découverte de quelques fossiles recueillis près de l'amas de l'important gisement ferro-cuprifère de S. Domingos. Ces fossiles furent décrits sommairement et se trouvent représentés sur deux planches lithographiées qui accompagnent le mémoire.

Ces fossiles jusqu'alors complètement inconnus dans la Péninsule, appartiennent à trois types distincts, que j'ai rapporté aux genres *Nereites* de Murchison, *Crossopodia* McCoy, et à un troisième type absolument nouveau pour moi, représenté par une forme ramifiée. J'ai cru reconnaître là, les caractères distinctifs de la famille des Graptolites à cause des cellules disposées en série se développant toujours du même côté des branches du Polypier, comme dans l'espèce typique du genre *Dendrograptus*, dont je l'ai rapproché.

Cependant, ayant reçu après la publication de mon travail, plusieurs informations qui me furent aimablement données par les professeurs Geinitz de Dresde et Richter de Saalfeld, je reconnus que cette forme était la même ou une forme très rapprochée de celle qui avait été déjà découverte dans les schistes de Wurzbach, et que le premier de ces deux savants avait dénommé *Lophoctenium comosum*.

Dans l'esquisse géologique qui accompagne le mémoire, le système silurique est représenté par une large bande qui s'étend depuis la mine de S. Domingos jusqu'à Aljustrel dans la direction W.N.W., occupant à peu près la même position que la bande plus large indiquée dans la carte géologique du Portugal publiée en 1899 comme appartenant au système dévonien, par conséquent à un niveau bien supérieur à celui que nous lui avons attribué la première fois.

Dans mon mémoire, j'ai fait une description succincte des différents systèmes paléozoïques de l'Alemtejo, surtout du Silurique et du Dévonique de la serra de Portalegre, du Culm et de l'Archaïque du Bas Alemtejo et plus spécialement de la formation schisteuse de S. Domingos, qui contient les fossiles auxquels nous avons fait allusion plus haut.

Comme je l'ai démontré alors, les difficultés qui s'offraient pour la classification des fossiles et pour la détermination de leur âge, étaient presque insurmontables, et cela a été reconnu par d'éminents savants qui ont eu connaissance de mon ouvrage. En effet, la formation schisteuse de S. Domingos étant comprise entre les schistes supérieurs de l'Archaïque et les grauwackes et schistes du Culm, une large latitude se présente pour sa classification, et nous pouvons seulement affirmer qu'elle appartient à l'ère paléozoïque. Me basant spécialement sur l'existence dans les schistes de S. Domingos de différentes formes de Néreites (genre auquel j'attribuais trop d'importance) et de l'autre forme que je supposais être un graptolite; discutant la composition des faunes du système cambrique, comme il était alors considéré, et du système taconique de l'Amérique, j'ai été amené à la conclusion que les schistes avec Néreites et autres fossiles caractéristiques du *Taconic Slate*, auxquels j'ai assimilé ceux du Portugal, devaient se rapporter à l'époque silurienne, et très probablement à la base de la faune seconde. J'ai assigné à cette formation la même position que celle des couches du groupe de Québec (Canada oriental), et j'arrivais ainsi à la même conclusion que Barrande, conclusion à laquelle il était arrivé en se guidant par des considérations de la plus haute valeur scientifique.

Ayant ensuite établi un parallèle entre les roches du *Lake district* (région des schistes de Skiddaw du nord de l'Angleterre) et une coupe donnée par Gümbel, qui traverse la région schisteuse de la célèbre localité de Hof sur la frontière de Bavière, j'obtins pour résultat que les schistes à Néreites de cette région doivent appartenir au Llandeilo, et non au Dévonien, comme prétendait Gümbel avec l'inversion supposée des couches de sa coupe.

En rapprochant toutes ces considérations, je suis arrivé à la conclusion que les schistes fossilifères de S. Domingos avaient dû être formés à une époque presque contemporaine, probablement un peu postérieure aux quartzites à Bilobites, mais dans une mer différente. Les schistes étaient ainsi les représentants synchroniques de ces quartzites dans la région transtagane, mais sans qu'il y eut aucune liaison stratigraphique, paléontologique ou lithologique, entre la formation de S. Domingos et les roches siluriennes du centre et du nord du Portugal, soit de la division supérieure, soit de la division inférieure du système.

1878.—A l'occasion de l'excursion géologique que je fis en 1878 dans la province de Huelva, en compagnie du membre de la Commission de la carte géologique d'Espagne D. Joaquin Gonzalo y Tarin, dans le but d'établir l'accord sur la classification et la délimitation des terrains paléozoïques dans la zone limitrophe des deux royaumes de la Péninsule, et surtout pour reconnaître le prolongement de la formation fossilifère de S. Domingos dans l'intérieur de cette province, nous découvrîmes un important gisement de Graptolites à une lieue au S.W. d'Encinasola, ce qui décida de suite la classification des schistes de Barrancos dans le système silurique.

La lentille charbonneuse où les Graptolites furent trouvés étant subordonnée à un phyllade de caractères très semblables à ceux des schistes à Néreites de S. Domingos, je fus

porté à penser que les couches de S. Domingos et celles de Barrancos appartenaient à un même horizon.

D'un autre côté on avait observé une assise de calcaire accompagnant les schistes, et l'ingénieur Tarin la considérait comme l'équivalent des calcaires du nord de la province de Séville, où D. José Macpherson avait découvert une forme d'*Archaeocyathus*, qui les faisait rentrer dans la faune primordiale. La classification que j'avais faite deux ans auparavant des schistes de S. Domingos en les rapportant à la base du Silurique inférieur, se trouvait ainsi en quelque sorte justifiée. Cette opinion fut acceptée par le professeur Ferdinand Rømer qui d'abord contesta la classification que j'avais faite des couches de S. Domingos, voulant les rapporter à une division inférieure du Culm, cependant il avoua ensuite «que j'avais défendu avec de très bonnes raisons le placement des couches à Néreites de S. Domingos dans le système silurien, et qu'il espérait qu'on y trouverait un jour des fossiles encore plus décisifs».

Ce fut un rayon de lumière pour me guider dans mes investigations subséquentes, mais on verra qu'elles m'amènèrent à des conclusions bien différentes.

1879.—Après la découverte faite à Barrancos, d'une faune et d'une flore spéciales, inconnues jusqu'alors dans la Péninsule et que j'ai attribuées au Silurique, croyant qu'elles représentaient un facies spécial de ce système avec des caractères analogues à ceux des dépôts de la même époque formés dans les mers de la zone paléozoïque du nord de l'Europe, j'entre-tins une correspondance suivie avec les professeurs allemands le Dr. H. B. Geinitz de Dresde, le Dr. Reinhard Richter de Saalfeld, le Dr. K. Th. Liebe de Gera et le Dr. Ferdinand Rømer de Breslau, tous malheureusement déjà décédés. Quelques-unes de mes lettres furent publiées dans le tome VII du *Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes* de l'Académie royale des sciences de Lisbonne sous le titre: *Correspondance relative à la classification des schistes siluriens à Néreites découverts dans le sud du Portugal*. Ainsi je rendais publique cette découverte, afin que les savants pussent juger immédiatement de sa valeur scientifique.

Dans une lettre adressée au Dr. Richter en janvier 1879, je mentionnais les profondes analogies que j'avais reconnues deux ans auparavant entre les schistes taconiques de la Thuringe ainsi nommés (schistes de Wurzbach) et les schistes à Néreites, et j'arrivais à la conclusion que ces derniers avaient dû être formés dans la même mer paléozoïque qui embrasse la Thuringe, et qu'ils appartenaient au Silurique supérieur, ou plutôt au sommet du Silurique inférieur. La découverte du gisement fossilifère de Barrancos alors faite, renforçait encore à mon avis cette hypothèse.

Me rapportant aux étages **F**, **G**, **H** de la Bohême, je les considérais comme correspondant, du moins en partie, au grès à Spirifères du bassin du Rhin, c'est-à-dire à la partie inférieure du Dévonique, le bassin de la Bohême ayant maintenu les conditions d'existence propres à la conservation et au développement de la faune troisième silurienne, tandis que ces conditions avaient changé en dehors de cette région privilégiée et la faune dévonienne commençait à peupler les mers. J'étais alors déjà enclin à considérer les couches à Spirifères comme un facies spécial des schistes à Néreites, représentant cependant un horizon supérieur à celui de ces schistes.

Dans une autre lettre adressée quelques mois plus tard au professeur Ferd. Rømer, je lui annonçais la découverte de Graptolites à Barrancos, ce qui établissait un lien de plus

entre les terrains paléozoïques du Bas Alemtejo et ceux de la Thuringe; je considérais pourtant qu'il existait une correspondance complète entre les schistes à Néreites de S. Domingos et ceux de Barrancos où l'on avait aussi découvert des Néreites, opinion que je considère aujourd'hui insoutenable, les schistes de S. Domingos et de Barrancos appartenant au contraire à deux étages ou peut-être à deux systèmes différents.

Dans une troisième lettre adressée au Dr. Richter au mois d'août de la même année, je disais que le nombre des espèces recueillies à Barrancos s'élevait à 63, comprenant une trentaine d'espèces de Graptolites et 12 de végétaux marins, qui sont distribués en différents niveaux, l'un étant caractérisé par l'abondance de restes de végétaux et d'empreintes d'Annélides, et les autres par certaines espèces de Graptolites, mais tous représentant un même système géologique qui correspondait, très probablement, à l'*Obersilurische Formation* de la Thuringe.

1881.—Pendant le court voyage que je fis en Allemagne en automne 1881, spécialement dans le but d'obtenir des données précises pour la classification des schistes à Néreites du Bas Alemtejo, que je considérais équivalents aux couches de Wurzbach, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les professeurs Gümbel, H. B. Geinitz, K. Th. Liebe et R. Richter qui pouvaient le mieux m'éclairer sur ce sujet; cependant les résultats ne répondirent pas à mon attente, puisque ces savants n'étaient pas d'accord sur l'âge de ces couches. Ce désaccord se manifesta évidemment dans la longue correspondance que j'entretins avec eux durant quelques années.

Selon la déclaration de Gümbel les schistes à Néreites de Portugal correspondent aux *Nereitenschichten* du Fichtelgebirge, qu'il rapportait au Dévonien inférieur, cet étage marquant par conséquent d'après ce savant l'âge de nos couches.

Le principal argument sur lequel Gümbel se basait pour considérer comme appartenant au Dévonien inférieur les couches à Néreites du Fichtelgebirge, était l'apparition de deux espèces du grès à Spirifères du Rhin (*Spirifer macropterus* et *Pleurodictyum problematicum*) dans une couche de quartzite subordonnée aux schistes à Néreites.

Le professeur Geinitz s'écartant de l'opinion généralement adoptée par les géologues allemands, qui rangeaient les couches de Wurzbach dans le Culm, les considérait comme représentant en Europe les schistes taconiques de l'Amérique du Nord, les classifiant cependant dans le Silurien inférieur (faune seconde).

Le professeur Liebe, se basant sur des données stratigraphiques et lithologiques, avait d'abord émis l'opinion que les couches taconiques du Haut Reuss, qui embrassent les schistes de Wurzbach, appartenaient à l'époque silurienne inférieure, opinion qui était en harmonie avec les résultats auxquels le Dr. Geinitz était arrivé en s'appuyant uniquement sur des données paléontologiques; toutefois il soutenait plus tard fermement l'idée que ces schistes appartenaient au Culm.

Contrairement aux opinions émises par Geinitz et Liebe, le Dr. Richter supposait les couches à Néreites formées pendant l'époque silurienne supérieure, en se basant en même temps sur des données stratigraphiques et paléontologiques, ayant reconnu en Thuringe une série de couches fossilifères, contenant une faune très riche, indiscutablement silurienne, dans laquelle sont comprises les couches à Néreites.

Le professeur Ferdinand Roemer semblait partager cette même idée en 1876. Dans une lettre qu'il m'écrivit alors, il me disait que cela l'intéressait de savoir que *Posidonomya Becheri*, qu'il avait trouvé dans la province de Huelva, existait aussi en Portugal; cette espèce venait donc à occuper le même niveau géologique du Culm depuis la Haute Silésie en Prusse jusqu'au coin S.W. le plus éloigné de l'Europe. Il ajoutait:

«Quant aux schistes de S. Domingos je ne suis pas encore tout à fait convaincu qu'ils appartiennent véritablement au Silurien inférieur. En Thuringe, aux environs de Saalfeld, des schistes avec le même aspect contenant aussi des Néréites et des Nemertites, appartiennent d'après les observations les plus récentes à la partie la plus supérieure du système silurien.»

Dans une lettre ultérieure il me disait cependant qu'il doutait qu'une conclusion certaine sur l'âge des schistes de S. Domingos pût être donnée en se basant sur les Néréites, car la distinction des genres et des espèces est très incertaine, et en outre ces formes se rencontrent à des niveaux très différents des terrains paléozoïques. Les Néréites se trouvant aussi dans le Culm, il ne lui semblait pas improbable que les schistes à Néréites de S. Domingos fussent seulement la division inférieure du Culm ou *Posidomyenschiefer*.

D'après l'examen que je fis des fossiles de Wurzbach au musée géologique de Dresde et ensuite à Gera dans la collection du prince Henri de Reuss, j'acquis la conviction que l'horizon géologique de S. Domingos est le même que celui de Wurzbach; mais je n'ai pu me décider à classer ces schistes soit dans le Silurique, soit dans le Carbonique inférieur, parce que quelques-uns des fossiles de Barrancos, qui sont incontestablement siluriens, ayant des formes différentes de celles de S. Domingos, montrent aussi de profondes analogies avec quelques fossiles de Wurzbach. Le rapport entre les schistes de S. Domingos et ceux de Wurzbach fut d'ailleurs reconnu par Geinitz, par Liebe, par Richter et par Gümbel.

Richter me disait ce qui suit dans une lettre datée du 6 juin 1880, que je traduis:

«Le fait d'avoir eu des doutes, et d'en avoir encore, sur la position des couches de Wurzbach, couches qui ont une ressemblance frappante avec celles de Néréites du Portugal, a été cause de mon retard à vous répondre.

«Après avoir considéré les couches de Wurzbach, comme appartenant au Silurique supérieur, à cause des Néréites qu'elles contiennent et parce que les véritables couches à Néréites, ainsi que les autres membres de mon Silurien supérieur (à présent l'Hercynien des auteurs modernes) se trouvent *in situ* dans leur plus proche voisinage, les couches de Wurzbach furent considérées comme taconiques par Geinitz et Liebe, et par Roemer et Gümbel (dans son ouvrage le plus récent) comme Culm ou Carbonifère inférieur. Cependant mes doutes sur l'exactitude de cette position subsistent encore, parce que le Culm et même le Calcaire carbonifère se trouvent aussi dans le voisinage de Wurzbach, n'ayant pourtant aucune conformité avec les couches de Wurzbach, ni par leurs caractères lithologiques, ni par leurs caractères paléontologiques. Cependant, la ressemblance avec vos couches est très grande; on le reconnaît à ce que Wurzbach présente aussi des formes rappelant les Graptolites qui existent en Portugal, et que Geinitz considérait comme *Lophoctenium*. En attendant, ce n'est qu'après que vous aurez découvert de nouveaux fossiles dans les couches en question, qu'on pourra leur assigner une position définie et certaine. J'attends avec anxiété de savoir l'âge qu'auront ces couches, sans doute très intéressantes, puisque la détermination de leur âge a varié si souvent jusqu'à présent. Naturellement votre découverte donnera aussi la clef de l'âge relatif des couches de

Wurzbach, ce que je considère très important, même dans le cas où cette décision définitive placerait dans le Culm les couches de Wurzbach ainsi que celles du Portugal, parce qu'un gisement pareil serait certainement une exception très rare, puisqu'il différerait tant par les caractères lithologiques, que par les caractères paléontologiques du Culm qui l'entoure et qui s'étend à une grande distance.»

Lui ayant envoyé une série de planches où étaient représentés les fossiles recueillis à Barrancos et à S. Domingos, le même professeur me disait dans une autre lettre datée du 18 janvier 1881:

«S'il est permis de présumer un parallélisme entre la Thuringe et le Portugal, je dirais que les schistes de Barrancos appartiennent au système silurien supérieur (étage **E** de Barrande) et seront sans doute plus anciens que les schistes à Néreites de S. Domingos.

«En Thuringe, les couches à Néreites (= aux couches de S. Domingos) se trouvent au-dessus des couches à Graptolites.

«Le système silurien inférieur est surmonté par les ampélites inférieures à Graptolites, celles-ci par le calcaire à *Cardiola interrupta*, celui-ci par l'horizon de Graptolites supérieur, sur lequel viennent les couches à Tentaculites avec des concrétions calcaires, qui forment la base des couches à Néreites; celles-ci sont recouvertes par les schistes à Tentaculites sans concrétions et par les schistes noirs *Grenzchiefer*, après lesquels vient le vrai Dévonien. Les couches à Néreites se trouvent ainsi séparées des ampélites inférieures à Graptolites, par les calcaires, par les ampélites supérieures et par les couches à Tentaculites avec concrétions calcaires.

«L'examen des fossiles de tout ce système de couches m'engageait à le considérer comme appartenant au Silurique supérieur, quoique Murchison eut placé ces couches à Néreites dans le Cambrien ou Silurique inférieur. Plus tard Gümbel prétendait que ces couches, où il avait trouvé deux exemplaires d'un *Spirifer* qui lui semblait être le *Sp. macropterus*, étaient dévoniennes, et Mr. Kayser se soumit à l'autorité de Gümbel, quoique la plupart des fossiles qu'il décrit dans son livre (*Die Fauna des ältesten Devonablagerungen des Harzes*, Berlin, 1878) ne soient pas connus jusqu'à présent dans le système dévonien. Zittel dans son *Handbuch der Paleontologie*, I, 1880, est d'accord avec cette opinion, mais dans ce même livre il dit que les Néreites portugais sont des fossiles siluriens. Comme on le voit les opinions sont encore très divergentes, et j'ai la confiance que la découverte des Néreites dans le Portugal établira enfin la décision sur l'âge des Néreites. Les formes semblables du vrai Dévonien et du Culm dont Gümbel parle aussi, ne sont point des Néreites, et pour cette raison je doute encore que les schistes de Wurzbach que Geinitz a pris pour taconiques, appartiennent réellement au Culm.

«Les figures d'une de vos planches (celles que je lui avais envoyées) sont presque identiques aux fossiles de Wurzbach; les figures d'une autre planche représentent les plantes des couches à Néreites en général.»

Le professeur Liebe, au contraire, dans une lettre datée du 24 janvier 1891, me disait:

«Les *Lophoctenium* de Richter et de Geinitz se trouvent en deux couches ou horizons très éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire d'un côté, dans le Culm inférieur, et de l'autre dans les couches les plus profondes du Dévonien inférieur.

«Les *Lophoctenium Hartungi* Gein. et *Loph. rhabdiforme* appartiennent au premier

horizon. Le *Lophoctenium comosum* Richter (1850), qui est très différent des espèces précédentes, appartient à la formation dévonienne inférieure, il se présente par des empreintes en relief, et par conséquent inverties, dans la base des couches de quartzite connues sous le nom de *Nereitenquartzite*.

«Le *Lophoctenium comosum* figuré par Geinitz (*Ueber ein Aequivalent der taconischen Schiefer Nordamerika's in Deutschland*, 1866, Tab. V, fig. 3) se trouve seulement dans le Culm. L'espèce portugaise correspond à celle-ci.»

Ainsi l'opinion de Liebe était que nos schistes à Néreites appartenaient à la base du Culm.

Toujours complaisant, l'illustre professeur s'empressa de m'envoyer des photographies, qu'il avait faites exprès pour moi, des exemplaires de *Lophoctenium* du Culm inférieur et du Dévonique inférieur, particulièrement de l'espèce de Wurzbach, qui apparaît associée au *Phyllodocites Jacksoni*, et qu'il rapportait à la partie inférieure du Culm inférieur.

De son côté Geinitz m'écrivait le 1 juin 1884 :

«Je suis désireux de savoir si vous avez fait de nouvelles découvertes sur la position géologique de nos couches taconiques ou du Silurien inférieur, qui contiennent les vers, etc. rapportés par d'autres au Culm.»

Vis-à-vis d'opinions si contraires, on peut juger de l'embarras où je me trouvais pour résoudre une question si compliquée, embarras qui me fit retarder jusqu'à présent la publication de ce que j'ai pu vérifier, par mes propres observations, relativement à ce point si compliqué de la géologie du Bas Alemtejo.

1885.— Dans mon article qui sert de préambule au tome 1 des *Comunicações do Serviço Geologico* sous le titre *Considerações acerca dos estudos geologicos de Portugal*, je mentionne le progrès de ces études à cette époque, et je rappelle que le système silurien était déjà alors reconnu dans beaucoup de points du pays, bien que très imparfaitement étudié; quelques données plus importantes avaient été réunies sur le Bussaco et sur Barrancos, et l'étude des fossiles avait montré l'existence des deux étages siluriens inférieur et supérieur, renfermant respectivement les deux faunes seconde et troisième, et d'une manière générale la succession des diverses assises. Les études faites postérieurement éclaircissent beaucoup de points alors douteux, mais il reste encore aujourd'hui un vaste champ où les géologues peuvent exercer leur activité.

1885.— J. F. N. Delgado: *Étude sur les Bilobites et autres fossiles des quartzites de la base du système silurique du Portugal*.

Dans la première partie de cet ouvrage portant le titre de «Considérations préliminaires» on remarque l'importance de l'étude des corps fossilisés qui ont été désignés collectivement sous la dénomination de Bilobites, et l'on fait la description générale des couches où ces fossiles se rencontrent, marquant leur grande diffusion géographique et fixant l'horizon qu'ils occupent dans l'assise inférieure de l'Ordovicien.

Discutant ensuite les opinions présentées pour expliquer l'origine de ces formes singulières, sont comparées les deux hypothèses: 1° que les Bilobites représentent des moules d'organismes de la nature des algues actuelles, comme Saprota et Marion le prétendaient, 2° qu'ils représentent seulement les vestiges ou traces du passage d'animaux au fond de la mer ou sur

la plage, ou enfin qu'ils sont de simples empreintes mécaniques produites par des corps inertes qui y furent entraînés à l'époque où se déposaient les sédiments qui les renferment, comme le prétend le Dr. A. G. Nathorst.

Me référant spécialement au mémoire présenté par l'illustre géologue suédois, je discute mot à mot tous les arguments avancés par Mr. Nathorst en faveur de sa théorie, et j'arrive à la conclusion que cette hypothèse est tout à fait inadmissible et que par contre l'hypothèse contraire doit être acceptée, c'est-à-dire, que les *Bilobites* étaient des organismes, qui probablement ont appartenu à la classe des algues marines.

Dans la deuxième partie du mémoire on fait la description des fossiles, qui comptent 19 formes de *Cruziana*, dont trois sont nouvelles, 3 espèces de *Rhysophycus*, l'une d'elles nouvelle, 1 espèce d'*Arthropycus*, 2 espèces de *Scolithus*, 3 de *Vexillum*, 3 de *Foralites*, dont deux sont considérées nouvelles, et 2 espèces de *Palaeochorda*. Ces espèces se trouvent représentées par la phototypie sur 43 planches, les figures n'ayant point été retouchées afin que l'authenticité des spécimens représentés ne puisse être mise en doute. Ces exemplaires proviennent des régions du Haut Douro, du Bussaco, de la Basse Beira (Penha Garcia) et du bassin du Tage (Niza, Villa Velha, Sardoal, Amendoa).

1887.—J. F. N. Delgado: *Études sur les Bilobites etc.* Supplément.

Dans ce second mémoire je discute minutieusement un autre travail que le Dr. Nathorst présenta à l'Académie royale des sciences de la Suède au mois de septembre 1885, dans lequel il cherche à réfuter les arguments que plusieurs naturalistes, surtout Saporita et Lebesconte, présentèrent pour prouver que les *Bilobites* étaient de vrais organismes. Il analyse dans l'appendice qui termine son ouvrage, le mémoire que j'avais publié quelque temps auparavant, où je réfutais aussi ses conclusions.

Dans ce nouvel ouvrage Mr. Nathorst base ses conclusions sur les résultats obtenus artificiellement par l'emploi d'un rouleau strié de forme spéciale, se mouvant sur la surface d'une couche d'argile ou de plâtre, obtenant ainsi plusieurs modèles qui, au premier abord rappellent quelques *Bilobites*, mais ne ressemblent en aucune façon aux *Cruziana*. J'analyse minutieusement un à un tous les arguments présentés par Mr. Nathorst, et j'arrive à la même conclusion à laquelle je suis arrivé dans mon étude antérieure, c'est-à-dire, que les *Bilobites* représentent de vrais organismes et qu'ils ne peuvent être des traces d'animaux ou de simples empreintes mécaniques. J'ai la satisfaction de déclarer que jusqu'aujourd'hui je n'ai pas vu que mon argumentation ait été démolie.

Dans la seconde partie du mémoire sont décrites 10 espèces de *Cruziana*, dont 5 nouvelles, aussi 2 espèces de *Rhysophycus* et 1 d'*Arthropycus*, la même espèce qui avait été décrite dans l'étude antérieure. Ces exemplaires proviennent des régions siluriennes de Vallongo et d'Amendoa, et sont représentés par la phototypie en 11 planches.

1887.—J. F. N. Delgado: *Reconhecimento scientifico dos jazigos de marmore e de alabastro de Santo Adrião* (Comunicações, t. II).

Dans cette notice on décrit au point de vue industriel les calcaires de la région, qui appartiennent au système silurique, mais on n'y rencontre point de données stratigraphiques ou paléontologiques de quelque utilité pour la description du même système.

1892.—J. F. N. Delgado: *Contributions à l'étude des terrains anciens du Portugal*, avec 3 planches.

Dans le tome II des « Communicações », p. 216-231, on rencontre plusieurs notes subordonnées au titre ci-dessus, dans la première desquelles je mentionne la découverte de fossiles du Silurique inférieur (*Iliaenus Lusitanicus* et *Redonia Duvaliana*) solidement incrustés dans un schiste maclifère de la Serra de Marão, conservant encore des vestiges du test silicifié, des cristaux de chiastolite s'étant développés dans la masse de la roche aussi bien que dans les moules des fossiles. Je mentionne aussi la découverte faite antérieurement dans la région silurienne de Vallongo, d'un lit de schiste ampéliteux chargé de Graptolites, compris dans une couche de même nature, mais contenant au lieu de fossiles, une infinité de petits cristaux de chiastolite.

Dans une autre note je décris un exemplaire de *Discophyllum* très probablement *Discoplicatum*, spécimen unique de cette espèce, qui fut trouvé au sein de l'assise de quartzites de la Serra de Bussaco.

Enfin, dans une troisième note je mentionne pour la première fois la découverte de fossiles cambriens dans le Haut Alemtejo, fossiles qui appartiennent évidemment au même étage que l'exemplaire de l'*Archaeocyathus* trouvé par D. José Macpherson à Casalla de la Sierra au nord de la province de Séville, que le professeur Ferdinand Roemer dénomma *Archaeocyathus marianus* le considérant comme contemporain du grès de Potsdam du Canada.

Les fossiles recueillis en Portugal représentent une algue de grandes dimensions que j'ai représentée le premier et qui fut ensuite décrite par mon estimable collègue de la Commission Géologique, le Dr. Wenceslau de Lima, sous le nom de *Helvientia Delgadoi* (Communicações, t. III, p. 92-96, 4 est.). Les exemplaires étaient renfermés dans une couche de tuf diabasique subordonné aux calcaires cambriens de Villa Boim, ainsi il semble qu'ils ont été couverts par les cendres d'une éruption diabasique ce qui a permis leur fossilisation. Ils représentent donc une algue primordiale, peut-être contemporaine de la faune à *Paradoxides*, comme j'ai pu le reconnaître par les découvertes faites postérieurement près de Villa Boim.

1892.—J. F. N. Delgado: *Description d'une forme nouvelle de Trilobite, Lichas (Uralichas) Ribeiroi*.

Dans ce mémoire je décris une forme remarquable de *Lichas* du bassin silurien de Vallongo, sans doute un des plus grands Trilobites connus, je fais la comparaison avec les autres formes analogues du même genre, et je présente les bases pour la création d'un nouveau sous-genre. Cette espèce caractérise l'assise supérieure des schistes téglaires de Vallongo.

Je présente la liste des espèces alors connues du Silurique inférieur de cette région. Cette liste comprend 79 espèces, dont 31 sont des Crustacés (Trilobites), 1 Cirrhipède, 5 Céphalopodes, 2 Ptéropodes, 3 Hétéropodes, 1 Gastropode, 13 Lamellibranches, 19 Brachiopodes, 1 Cystidée et 3 Rhabdophora.

1895.—J. F. N. Delgado: *Sur l'existence de la faune primordiale dans le Alto Alemtejo* (Communicações, t. III, p. 98-103).

Poursuivant mes recherches dans le système cambrique du Haut Alemtejo je parvins

à découvrir à un niveau immédiatement inférieur aux calcaires de Villa Boim (où est compris le lit de tuf diabasique avec *Helvientia Delgadoi*) plusieurs glabelles et fragments isolés de diverses espèces de Trilobites de petites dimensions, tout à fait distincts de ceux qui avaient été jusqu'alors découverts dans le système silurique de la Péninsule. L'étude de ces fossiles me fit reconnaître qu'ils appartenaient à la faune primordiale, montrant cependant des caractères tout à fait différents de ceux que cette faune présente dans les divers points de l'Espagne où elle a été découverte, et se rapprochant au contraire des caractères de la faune primordiale des régions paléozoïques du nord de l'Europe et de l'Amérique.

On a obtenu alors des restes de 7 ou 8 espèces différentes, que je supposais être nouvelles et appartenir à la famille des *Olenidæ* et des *Conocephalidæ*. J'ai rapproché quelques-unes des glabelles du genre *Liostracus* Angelin, jugeant cependant que quelques autres pourraient être rapportées aux genres *Ptychoparia* ou *Bathyrurus*.

1897.—J. F. N. Delgado: *Nouvelles observations sur Lichas (Uralichas) Ribeiroi*.

En réponse aux observations que l'illustre paléontologiste Mr. Daniel OEhlert présenta sur cette espèce qu'il découvrit aussi dans les schistes d'Angers, j'ai publié ce deuxième mémoire, complément du premier, où sont présentés de nouveaux éléments pour la description de l'espèce que l'on reconnaît, selon l'opinion de Mr. OEhlert d'accord avec les nouvelles données obtenues, être en effet le plus grand Trilobite jusqu'à présent découvert.

Pour faire la comparaison avec la liste des fossiles de Vallongo, on trouve dans ce mémoire la liste des espèces de la série ordovicienne de Bussaco. Cette liste comprend: Trilobites 40 espèces, Céphalopodes 8, Ptéropodes 11, Hétéropodes 8, Gastropodes 12, Lamellibranches 28, Brachiopodes 52, Bryozoaire 1, Annélide 1, Echinodermes 8, Coelenterata 10, *Incertæ sedis* 24; en tout 203 espèces.

Plusieurs exemplaires de *Dalmanites Vetillarti*, trouvés dans le même gisement de l'*Uralichas Ribeiroi*, sont représentés sur deux planches, pour la comparaison des pygidiums de ces deux espèces.

1900.—Paul Choffat: *Aperçu de la géologie du Portugal* (in *Le Portugal au point de vue agricole*).

Dans la description des terrains paléozoïques, notre savant collègue donne une idée très succincte de la composition lithologique du Silurique, mais sans faire aucune référence spéciale, soit à la stratigraphie soit à la faune de ce système, la nature de sa description, qui a un but purement agricole, ne l'exigeant certes pas.

1901.—J. F. N. Delgado: *Considérations générales sur la classification du système silurique* (Communicações, t. iv).

Sous ce titre j'ai publié un article, où j'ai cherché à fixer les limites des deux grandes divisions du Silurique et principalement sa limite supérieure, détermination qui offre de grandes difficultés dans les points où l'on passe des couches siluriennes supérieures à d'autres couches plus modernes. Cette détermination est d'autant plus nécessaire que des tendances se sont manifestées dernièrement à faire passer dans le système dévonique des couches qu'une étude réfléchie montre devoir appartenir au Silurique.

Dans cet article on établit d'abord le rapport entre les calcaires à *Archaeocyathus* du nord de la province de Séville et ceux de Villa Boim, qui sont immédiatement supérieurs aux schistes de cette localité, où des espèces de la première phase de la faune primordiale ont été découvertes.

Plusieurs éclaircissements sont ensuite donnés sur le Silurique inférieur et sur le Silurique supérieur, indiquant d'une manière générale la distribution des grands affleurements ordoviciens et gothlandiens, distribution qui fut déterminée par différents mouvements orogéniques, d'exhaussement et d'affaissement du fond de la mer paléozoïque. On fait remarquer l'influence que la grande éruption diabasique du Bussaco eut sur ces phénomènes, éruption qui commença au début de l'époque ordovicienne et atteignit son maximum d'intensité à la fin de la même époque. Intimement liée à ces mouvements, se trouve la formation à Barrancos et à Vallongo de dépôts qui n'existent pas au Bussaco, et qui marquent la phase de la liaison entre les deux grandes divisions du Silurique, lesquels doivent être considérés comme appartenant au *Llandovery group* du nord de l'Angleterre. On sait cependant, d'après des observations faites dans ce pays par Mr. Etheridge, que les dépôts de cette phase intermédiaire doivent se rapporter au toit de l'Ordovicien plutôt qu'à la base du Gothlandien.

Discutant avec un certain développement les opinions émises par le Dr. E. Kayser, de Berlin, qui rapporte au système dévonien du Harz les étages **F**, **G**, **H** du bassin de la Bohême, et faisant l'étude comparative des faunes des deux régions selon les données fournies par Barrande et par le Dr. Ottomar Novák, je suis arrivé à la conclusion que la zone **f1** de la base de l'étage **F**, où sont trouvés les derniers représentants des Graptolites dans la Bohême, doit être considérée comme formant le toit du système silurique, ou en d'autres termes, que les Graptolites caractérisent exclusivement ce système. La loi sagement formulée depuis longtemps déjà par l'éminent fondateur du système silurique: *Graptolites always Silurian*, restait ainsi confirmée.

1903.—J. F. N. Delgado: *Note sur Scolithus Dufrenoyi* Rou. (Comunicações, t. iv).

On revendique dans cette note l'origine animale pour les *Scolithus*, que l'on reconnaît être les moules de trous pratiqués par des vers dans le sable au fond de la mer ou dans les plages, contrairement à l'opinion exprimée dans l'*Étude sur les Bilobites* où ils étaient classés parmi les algues calcaires.

1905.—J. F. N. Delgado: *Faune cambrienne du Haut Alemtejo* [Portugal] (Comunicações, t. v, p. 307-374; 6 pl.).

Dans la première partie de ce mémoire j'indique les caractères de la formation schisteuse de la Beira, désignée par le monogramme **Cb**¹ dans la carte géologique et qui appartient au Précambrique, et je m'occupe plus particulièrement de la formation schisto-calcaire du Haut Alemtejo, laquelle représente le système Cambrique proprement dit, où l'on a découvert la faune primordiale qui, d'après ses caractères, doit se rapporter à la première phase de cette époque.

L'intéressante algue (*Helvientia Delgadoi*) dont nous avons parlé antérieurement (1892) a été découverte à un niveau supérieur à la couche schisteuse où cette faune se trouve.

Je décris ensuite une coupe géologique où l'on fixe la position de la strate fossilifère sous-jacente aux calcaires de Villa Boim (= aux calcaires à *Archaeocyathus* de la province de

Séville) et au moyen de laquelle on reconnaît la liaison entre le Cambrique et le système de couches sous-jacentes (formation schisteuse de la Beira).

Notre faune cambrienne se compose d'espèces dont la plupart sont nouvelles, les Trilobites étant les plus abondants; les Ptéropodes, Lamellibranches et Brachiopodes sont en quantité bien inférieure. Parmi ces espèces, il y en a qui semblent se rattacher plus intimement à de certaines formes de la zone d'*Olenellus* de l'Amérique du Nord plutôt qu'à aucune de celles de la zone à *Paradoxides*.

L'existence de plusieurs espèces de Lamellibranches donne à cette faune un caractère particulier, parce qu'en général les fossiles de cette classe sont très rares dans tous les bassins cambriens. En outre, comme dans l'Amérique du Nord ils se montrent seulement dans la zone inférieure de la faune primordiale (ne se trouvant ni dans le Cambrique moyen, ni dans le Cambrique supérieur) ils fournissent un argument de plus pour faire considérer notre faune cambrienne comme appartenant à cette zone.

Enfin, je fais la comparaison de cette faune avec celle de la zone d'*Olenellus* de l'Amérique du Nord et je reconnais qu'elle est inférieure à la faune à *Paradoxides* (Cambrique moyen) découverte en plusieurs points de l'Espagne, et qu'elle se rapproche au contraire de la faune cambrienne de la Sardaigne, quoique l'on n'ait pas découvert dans les calcaires de Villa Boim les espèces d'*Archaeocyathus* si abondantes dans ce pays et dans la Sibérie orientale, régions classifiées aussi dans le Cambrique inférieur (zone d'*Olenellus*).

D'autre part, les analogies de notre faune avec la faune cambrienne de la vallée de la Lena [Sibérie] (qui est composée de 10 espèces, dont la plus grande partie ont leur correspondant dans le Cambrique inférieur et le Cambrique moyen de l'Amérique du Nord, mais surtout dans le Cambrique inférieur), sont établies par la prédominance d'espèces du genre *Microdiscus* et par la présence d'*Hyolithes*. Ainsi nous arrivons à la conclusion que la faune primordiale du Haut Alemtejo correspond à la zone d'*Olenellus* de l'Amérique du Nord.

Dans la seconde partie du mémoire, je fais la description des fossiles qui sont représentés par la phototypie en 6 planches. La faune comprend: 18 espèces de Trilobites des genres *Paradoxides*, *Olenopsis*, *Hicksia*, *Metadoxides*, *Olenellus* ? et *Microdiscus*; 3 espèces de Ptéropodes du genre *Hyolithes*, et en outre un Ptéropode indéterminé; 10 espèces de Lamellibranches dont une indéterminée, appartenant aux genres *Posidonomya*?, *Fordilla*, *Modiolopsis*, *Syneke*?, *Davidia* et *Ctenodonta*; et 8 espèces de Brachiopodes des genres *Obolella*, *Acrothele*, *Lingulepis* et *Lingullela*.

Parmi les Trilobites il faut considérer particulièrement les formes les plus abondantes et que je pensais pouvoir rapporter au genre *Liostracus*, quoiqu'ils offrent aussi des analogies avec les genres *Ptychoparia* et *Solenopleura* ou *Bathyurus*. L'étude détaillée que j'ai faite de ces exemplaires, m'amena cependant à reconnaître qu'ils représentent un type à part, pour lequel j'ai proposé le nom de *Hicksia*, en hommage à la mémoire du savant explorateur du Pays de Galles.

SYSTÈME SILURIQUE

ÉTUDE DE STRATIGRAPHIE PALÉONTOLOGIQUE

Généralités.—Le système silurique présente en Portugal une distribution très irrégulière, et les découvertes faites successivement depuis la publication de la première édition de la carte géologique du royaume en 1876, nous portèrent à élargir de beaucoup l'aire qu'il occupe relativement à ce qui est indiqué dans cette carte. Ces découvertes ont révélé l'existence de divers gisements de Graptolithes dans la partie nord-orientale de la province de Trás-os-Montes et aussi dans l'Alemtejo, dans des schistes dont l'âge nous fit longtemps hésiter, mais que nous rapportons aujourd'hui presque totalement à la période d'existence de la faune troisième silurienne, et une petite partie appartenant à la phase de transition de la faune seconde à la faune troisième, représentant très plausiblement un équivalent synchronique du groupe de Llandovery en Angleterre.

Classification des différents affleurements.—Les différents affleurements et lambeaux siluriens plus ou moins étendus qui se trouvent disséminés dans notre pays, peuvent être classés selon les positions qu'ils occupent par rapport aux bassins hydrographiques où ils sont compris; pour en faciliter la description, nous considérerons séparément les différents lambeaux des bassins du Douro, du Mondégo, du Tage et du Guadiana. Cette division n'est d'ailleurs pas tout à fait arbitraire, parce que en effet les différences de leurs caractères paléontologiques et pétrographiques s'accordent en quelque sorte avec leur distribution géographique. Du reste, il n'en pourrait être autrement, attendu que ces caractères sont étroitement liés avec les mouvements orogéniques survenus pendant la formation de ces dépôts.

Donc, en considérant d'une manière générale ces quatre groupes dans lesquels nous divisons les affleurements du système silurique, nous voyons que dans le bassin du Mondégo, où les dépôts de la base et de toute la division inférieure du système (série ordovicienne) sont plus largement représentés, il y eut ensuite une interruption dans la sédimentation; tandis que, dans une partie des bassins du Douro (affleurements de Vallongo, Marão et Bragança) et du

Guadiana (Barrancos) il se forma, pendant cet intervalle, quelques dépôts qui n'ont pas de représentant stratigraphique dans les autres deux bassins.

Étendue et nature des dépôts.—L'examen de la carte géologique montre que les dépôts siluriens occupent une aire beaucoup moindre que ceux des systèmes sédimentaires plus anciens; ils se présentent en masses isolées ou îles, reposant en discordance de stratification sur les terrains plus anciens (Précambrique supérieur¹ et Archaïque). On reconnaît que ces masses considérées dans leur ensemble sont les restes d'une formation très étendue, qui a autrefois couvert la plus grande partie de la surface du pays que nous habitons. La puissante dénudation, qui entraîna les parties qui y manquent, a épargné les quartzites de la base du système, lesquels, par leur dureté naturelle, et surtout parce qu'ils constituent une assise fort épaisse, offrirent plus de résistance à cette action destructive. Aussi, ces quartzites forment-ils ordinairement des crêtes élevées, qui observées de loin, semblent les restes de grandes murailles en ruines. Ces crêtes jouent un rôle très important dans l'orographie du sol. Il est facile de les reconnaître, puisque les quartzites forment des collines allongées, s'élevant aux plus grandes altitudes de la contrée, tandis que les schistes, surtout ceux du Silurique supérieur, quand ils accompagnent les quartzites, occupent, au contraire, les points les plus bas du sol.

Cependant, ayant égard à la variation de composition pétrographique et à la différence des faunes correspondantes dans les différents bassins, nous ne pouvons croire que tous ces dépôts aient été formés dans une même mer ouverte, ni supposer que les diverses assises soient absolument synchroniques.

Mouvements du fond de la mer.—Comme point fondamental nous devons tout d'abord consigner que les études que nous avons faites, surtout dans le Bussaco, montrent que plusieurs oscillations du fond de la mer où ces dépôts s'accumulèrent, ont eu lieu pendant la formation des dépôts siluriens, c'est-à-dire, que différents mouvements d'exhaussement et d'affaissement se sont accomplis, ce qui donne une explication plausible de la nature et de la distribution de ces mêmes dépôts.

Nous possédons les preuves évidentes de ces mouvements, par suite desquels le sol tantôt se submergeait en certaines parties pour recevoir les dépôts en voie de formation, tantôt s'élevait dans d'autres points, et restant à découvert, s'exemptait de recevoir ces dépôts.

D'abord, la grande étendue que, relativement aux autres assises du Silurique, occupent les quartzites à *Bilobites* et à *Scolithus*, qui en Portugal représentent presque partout la base du système, manquant la faune à *Paradoxides*, qui paraît par contre dans le nord, le nord-est et le centre de l'Espagne², indique clairement qu'ils doivent leur formation à un

¹ Cambrique inférieur (Cb¹) dans la carte géologique.

² On a découvert dans le Haut Alemtejo la faune primordiale, mais représentée par sa première phase, la faune d'*Olenellus*, dans laquelle nous jugeons que doit être réuni le calcaire à *Archaeocyathus* du nord de la province de Séville, que l'illustre géologue espagnol D. José Macpherson considérait contemporain du grès de Potsdam du Canada, suivant l'avis du professeur Ferd. Roemer, de Breslau. Il manque en Portugal, ou du moins on n'a pas encore découvert (et nous n'espérons nullement y parvenir) ni le Cambrique moyen (faune à *Paradoxides*), ni le Cambrique supérieur (faune à *Olenus*), sauf si l'on veut rapporter à cet étage les grauwackes rouges de la Serra du Bussaco, qui sont immédiatement sous-jacentes aux quartzites à *Scolithus*, et qui n'existent que dans cet endroit. (Voyez *Comunicações da Comissão do Serviço Geologico de Portugal*, t. v, 1904, p. 307 et seq.)

mouvement de submersion, qui à la fin de la période cambrienne (ou de l'existence de la faune primordiale) a plongé lentement et successivement sous les eaux de grandes surfaces du sol de la Péninsule.

D'autre part, on a la preuve évidente que cette assise de quartzites s'est formée pendant une période d'affaissement lent et graduel du littoral de la mer silurienne, ayant été suivie d'un long intervalle où cette contrée resta à sec, car c'est seulement de cette façon que l'on peut se rendre compte de la profonde discordance de stratification qui sépare les quartzites des schistes précambriens à Moncorvo, Penha Garcia, Villa de Rei, Villa Velha de Ródam, et en plusieurs autres points où l'on voit les quartzites reposant sur les tranches de ces schistes.

Le fait que les couches de grès et de schistes de la série ordovicienne alternent souvent dans les divers affleurements de la Beira, tout en indiquant la variation des courants qui charriaient les sédiments, prouve aussi des irrégularités dans le mouvement d'affaissement qui accompagna la formation de ces dépôts, quelquefois plus rapide et surpassant le rapport de dépôt des sédiments, qui par conséquent s'est fait dans des eaux plus profondes, d'autres fois, au contraire, très lent, les dépôts prenant alors le caractère sous-littoral ou de rivage.

En effet, il faut bien admettre de grands mouvements et des oscillations répétées du fond de la mer pendant le dépôt des couches siluriennes, pour que l'on puisse comprendre le développement inégal, l'étendue variée et les différences de composition que montrent les différentes assises de ce système dans les points où elles paraissent. Les oscillations continuelles du sol faisaient varier à tout moment les limites du bassin, donc aussi celles de l'aire de dispersion des sédiments, qui représentent respectivement le Silurique inférieur, le Silurique moyen et le Silurique supérieur.

Les mouvements du sol ont en outre déterminé des interruptions dans les dépôts, d'autant plus importantes que ces mouvements ont été plus prolongés et énergiques. Ainsi, comme nous l'avons dit, il existe dans le Bussaco une lacune qui marque le terme des dépôts ordovi-ciens dans cette contrée; tandis que plus loin vers le nord, à Vallongo, et dans le sud du pays, à Barrancos, des dépôts très importants furent formés dans cette période d'interruption, qui sont fort intéressants par leur composition lithologique, et surtout par leurs caractères paléontologiques.

Le mouvement d'affaissement du sol, que nous avons cité et auquel la formation de l'assise des quartzites à Bilobites, qui s'étend sur presque toute l'aire occupée par le Silurique, est intimement liée, continua pendant l'époque où s'accumulèrent les dépôts, pour la plupart schisteux, qui renferment les espèces de la faune seconde. Ce mouvement a peut-être perdu de son intensité vers la fin de cette époque, il a même subi localement des oscillations dans le sens contraire, par l'effet de l'action volcanique, qui se manifesta alors au Bussaco dans sa plus grande intensité. Ce mouvement d'exhaussement a mis à découvert l'aire où ces phénomènes se produisirent, tandis que dans les autres endroits où le mouvement d'affaissement n'a pas été interrompu, les dépôts continuèrent à se former.

Ce mouvement, qui a arrêté temporairement dans le Bussaco l'accumulation des sédiments, dura jusqu'au commencement de l'époque silurienne supérieure quand les phénomènes volcaniques ont aussi été suspendus; en ce temps-là le mouvement d'affaissement a recommencé, en embrassant toute l'aire occupée après par les dépôts gothlandiens.

Ainsi, le terme de l'époque silurienne inférieure dans notre pays, est annoncé, à notre avis, par la suspension du mouvement de dépression, laquelle a eu lieu au moment où de profondes perturbations stratigraphiques préparèrent les conditions biologiques favorables à l'extinction de la faune existant alors et à son remplacement par la faune caractéristique du Silurique supérieur.

Un autre mouvement d'exhaussement, qui est venu plus tard, s'étendit sur toute l'aire occupée par les dépôts gothlandiens et il a empêché définitivement l'accumulation des sédiments siluriens dans nos latitudes.

Dans la Serra du Bussaco on observe cependant une transition graduelle des quartzites à *Scolithus*, en parfaite concordance de stratification, avec une formation schisteuse sous-jacente, qui s'interpose entre ces roches et les schistes du Précambrique. Cette localité, qui correspondrait peut-être à l'axe ou à la partie la plus profonde du golfe ou bras de la mer silurienne, est la seule où jusqu'à présent, dans notre pays, ce passage graduel ait été observé, et l'affaissement du sol, en élargissant successivement les limites du bassin, a fait que dans d'autres points les couches de quartzite moyennes et supérieures de l'assise se sont déposées immédiatement sur les tranches du Précambrique, les couches schisteuses de la base, qui ne se montrent qu'au Bussaco¹, y faisant défaut.

Aire occupée par les quartzites de la base du système.—On doit remarquer que dans notre territoire les quartzites à Bilobites dépassent à peine le parallèle de Portalegre, c'est-à-dire, qu'ils descendent vers le sud peu au delà de la divisoire des eaux entre le Tage et le Guadiana près de la frontière; néanmoins, dans l'intérieur de l'Espagne ils avancent beaucoup plus vers le sud.

En effet, par la reconnaissance géologique de la province de Cordoue, faite par l'ancien professeur de l'École des mines de Madrid, membre de la Commission de la carte géologique de l'Espagne, D. Lucas Mallada², on sait que le système silurique de cette province, représenté aussi à la base par les quartzites et grès à Bilobites, ayant traversé les provinces de Cacerès et de Badajoz, descend jusqu'à la rive droite du Guadalquivir à l'est de Cordoue, aux environs d'Adamuz, cette latitude étant la plus basse où jusqu'à présent le système silurique ait été observé dans la Péninsule. Ce point se trouve à une latitude bien inférieure à celle de Portalegre; et comme les couches y sont soudainement interrompues par la faille du Guadalquivir, on doit présumer qu'elles se prolongeaient encore vers le sud, conservant néanmoins partout les mêmes caractères pétrographiques et paléontologiques que nous leur reconnaissons dans notre province de Beira et particulièrement au Bussaco.

Imperfections de l'étude.—L'étude que nous avons faite du système silurique est encore incomplète. Tandis que pour les deux régions principales déjà connues, Bussaco et Vallongo, où les couches de ce système présentent un beau développement, et encore pour la province de l'Alemtejo, nous possédons des données suffisantes pour y établir des subdivi-

¹ Dans le département de la Mayenne (France), les schistes rouges de la base du Silurique manquent aussi en plusieurs endroits. Mr. OEhlert ne les connaissait que dans un seul point. (*Notes géologiques sur la Mayenne*, p. 29).

² *Boletín de la Comision del mapa geológico d'España*, t. VII, 1880.

sions, d'autres affleurements, tels que ceux de la Basse Beira et surtout ceux de Trás-os-Montes, sont encore imparfaitement explorés; aussi les données sur lesquelles se base notre description ont moins de valeur. Nous pouvons cependant dire que, si le développement horizontal de ce système est relativement peu considérable, ou plutôt si l'aire qu'il occupe est restreinte, en revanche il gagne en épaisseur une importance qui le rend comparable à chaque groupe du Silurique des pays classiques pour l'étude de ce système.

a) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU MONDÉGO

AFFLEUREMENT DU BUSSACO

Nous commencerons notre description par l'affleurement du Bussaco, où la série stratigraphique de l'Ordovicien se présente plus complète, et où la grande abondance de fossiles permet d'établir la subdivision du système en plusieurs groupes sédimentaires d'un ordre inférieur. Le fait évident de la superposition régulière et de la succession stratigraphique des couches rend incontestables les conclusions auxquelles nous avons abouti. La stratigraphie et la paléontologie s'entr'aident pour la résolution de ce difficile problème, en permettant d'établir le parallélisme de couches, que l'on prendrait d'abord comme différentes, en divers points du pays.

Grand synclinal du Bussaco.— Si l'on considère tout l'ensemble des couches siluriennes de la contrée du Bussaco, on reconnaît de prime abord qu'elles forment un long synclinal, les mêmes couches se répétant avec une certaine uniformité dans chaque flanc depuis la base de l'Ordovicien, et l'axe du synclinal se trouvant occupé par les roches du Silurique supérieur. Ces roches forment un affleurement triangulaire correspondant à la vallée de Sazes, où elles montrent leur plus grande largeur, se prolongeant vers Penacova en une bande très étroite, partiellement interrompue, n'ayant parfois que quelques dizaines de mètres de largeur.

A l'axe du synclinal correspond une faille où sont cachées près de Penacova, soit entièrement soit en partie, quelques-unes des assises ordoviciennes, par suite du glissement des couches les unes sur les autres lors de leur mouvement ascensionnel.

Le Silurique supérieur continue au sud du Mondégo, il y forme aussi une bande étroite, deux fois interrompue, qui se cache bientôt sous les grès crétaciques, en se montrant de nouveau près de San Miguel de Poiares jusqu'à ce qu'il disparaisse tout à fait dans la vallée de Ceira, à une lieue au N. W. de Goes.

Le synclinal du Bussaco se prolonge pourtant vers le S. E., en embrassant la serra du Penedo de Goes, il reparaît suivant la même direction à Villa Velha de Ródam, où il est coupé par le Tage, puis va former la serra de San Miguel. Toutes ces collines sont cependant constituées seulement par les couches inférieures de l'Ordovicien.

On peut considérer que le même synclinal se rattache encore à l'affleurement silurien de la serra de Portalegre; cependant là il s'éloigne un peu de la direction N. W.—S. E., qu'il avait, pour se rapprocher plutôt de l'W. N. W., qui est aussi la direction des lambeaux siluriens de Monforte à Castello Branco et de Penha Garcia, au nord du Tage.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Une coupe faite de l'est vers l'ouest à travers la montagne du Bussaco, montre la succession ascendante des couches ordoviciennes, le lambeau silurien reposant en discordance sur les schistes précambriens du grand affleurement de la Beira, ainsi qu'il suit :

Coupe à travers le Silurique inférieur du Bussaco en passant au sud de Cassemeas

1. Schiste micacé, plus ou moins grossier, de couleur rouge lie de vin à taches vert clair, ou verdâtre à taches rouges, avec quelques lits de quartzite intercalés et contenant des moules de *Fucoïdes* indéterminables, empâtés totalement dans la roche. Épaisseur 25^m.

2. Quartzite, grès dur et grauwacke schistoïde micacée, violet clair, avec intercalations de lits de schiste sableux, micacé, très grossier, blanchâtre et de couleur lie de vin, dont quelques-uns sont traversés perpendiculairement par des moules cylindriques irréguliers rappelant les *Scolithus* ou plutôt les tiges de *Vexillum*. Épaisseur 140^m.

3. Grès quartzeux fin et quartzite en gros bancs, avec d'autres strates intercalées, plus minces, de couleur blanchâtre et verdâtre à taches rougeâtres, ou vice-versa, plusieurs renfermant *Vexillum Desglandi* Rou. Épaisseur 220^m.

4. Grès quartzeux très grossier, fin et micacé dans quelques strates, blanc à taches rouges, et quartzite en gros bancs jusqu'à 1^m,60 d'épaisseur et en strates moins épaisses, contenant *Vexillum Desglandi* Rou. et *Scolithus Dufrenoyi* Rou.

Le toit de cette assise est formé par quelques bancs, qui longent le sommet de la montagne, de grès grossier, très dur, à ciment siliceux, ou quartzite à aspect vitreux, alternant avec d'autres strates de quartzite fin. Épaisseur 300^m.

5. Quartzite dur en lits minces et quartzite schistoïde très micacé, renfermant plusieurs strates fossilifères, dont quelques-unes avec Bilobites (*Cruziana furcifera* d'Orb., *Cr. Bagnolensis* Mor., *Rhysophycus*), d'autres avec *Vexillum* cf. *Morierei* Sap., d'autres enfin chargés surtout de débris de *Lingula Lesueuri* Rou. Épaisseur 80^m.

6. Quartzite fin, gris clair, à taches rouges et grès fin, très micacé, schistoïde, comprenant plusieurs strates avec fossiles, notamment deux lits avec *Vexillum* cf. *Morierei*, et un autre compris dans un gros banc de quartzite de couleur gris-rougeâtre, qui renferme plusieurs moules de coquilles solidement empâtés dans la roche, mais qui ont pu être déterminés, du moins génériquement (*Myocaris lutraria* Salt., *Sanguinolites Pellicoi* Vern. et Barr., *Dolabra? Lusitanica* Sh., *Ctenodonta*, *Cyrtodonta*, *Lingula Lesueuri* Rou.), des restes de *Calymene Tristani* Brongn. et un exemplaire de *Discophyllum plicatum* Barr.¹ Épaisseur 10^m.

7. Quartzite fin, gris, en partie micacé, et grès fin blanc, micacé, schistoïde, en strates de différentes épaisseurs, comprenant plusieurs lits fossilifères, avec *Lingula Lesueuri* Rou., *Vexillum* cf. *Morierei* Sap., *Scolithus Dufrenoyi* Rou., *Cruziana Beirensis* Delg., *C.* cf. *furcifera* d'Orb. et *Cr. Bagnolensis* Mor.

La couche supérieure de quartzite devient parfois une brèche à fragments irréguliers, contenant quelques cailloux roulés, et comprend plusieurs lits fossilifères, qui renfer-

¹ Voyez *Comunicações*, t. II, p. 219, pl. III, fig. 1.

ment *Lingula Lesueuri* Rou. en menus fragments, *L. Rouaulti* Salt.?, *Cruziana Beirensis* Delg., et particulièrement *Arthropycus* cf. *Harlani* Hall., que l'on ne rencontre qu'à ce niveau. Épaisseur 40^m.

8. Schistes finement micacés, gris foncé, à taches blanchâtres, en d'autres parties blancs, jaunâtres et gris clair, avec beaucoup de fossiles dans toute l'épaisseur de l'assise, renfermant de petits nodules ou concrétions dures, d'autres encore de plus grandes dimensions à forme ellipsoïdale aplatie, allant jusqu'à 0^m,40 de longueur et, comme les premiers, très fossilifères.

La faune de cette assise est très variée et riche en exemplaires, parmi lesquels abondent surtout *Orthis Ribeiroi* Sh. dans la partie supérieure de l'assise, où le nombre d'exemplaires est si élevé qu'il surpasse celui de tous les autres fossiles ensemble, et *Didymograptus Murchisoni* Böeck, qui la traverse dans toute sa hauteur, en formant toutefois un niveau spécial près de la base, où il se montre sans être accompagné d'aucun autre fossile.

Plusieurs espèces de Trilobites, *Calix Murchisoni* Vern. et Barr. sp. et *Conularia nobilis* Barr. s'y montrent aussi, et l'on peut citer comme assez fréquentes *Sanguinolites Pellicoi* Vern. et Barr. et *Redonia Duvaliana* Rou. Épaisseur 150^m.

9. Schistes gris foncé avec taches gris clair et blanchâtre, pour la plupart très micacés et grossiers, quelques strates renfermant de petits nodules durs, ayant parfois des fossiles. Dans la moitié supérieure de l'assise ces schistes sont très fossilifères; cependant les fossiles sont rares dans les strates de grès blanc et de quartzite micacé, schistoïde en partie, qui sont subordonnées aux schistes à différentes hauteurs de l'assise. *Homalonotus (Plaesiacomia) Oehlerti* Kerforne¹ peut être considéré le fossile le plus caractéristique, puisqu'il est fort abondant et traverse toute l'épaisseur de l'assise. Outre cette espèce *Calymene Tristani* Brongn., *Dalmanites socialis* Barr., *D. Phillipsi* Barr., *Beyrichia simplex* Jones, *Dolabra? Lusitanica* Sh., plusieurs espèces de *Ctenodonta*, *Orthis testudinaria*, Dalm. etc., sont aussi très fréquentes. Épaisseur 150^m.

10. Grauwacke à grain plus ou moins grossier, tantôt très micacée et schistoïde, tantôt de structure massive, plus dure et passant même au quartzite, de couleur verdâtre, jaunâtre et blanchâtre, en gros bancs et renfermant des lits intercalés de schiste grossier très micacé, gris à taches rouges et jaunâtres, dans lequel on n'a point découvert de fossiles. Dans la base de l'assise se trouve un lit de schiste de couleur verdâtre foncé, renfermant beaucoup de petits nodules siliceux, noirs, de formes très irrégulières, quelques-uns contenant des moules de fossiles spécifiquement indéterminables et de très nombreux grains globulaires, en grande partie de pyrite. Ce schiste a la texture oolithique, les oolithes étant fortement agglomérés et, tout comme les nodules, liés par un ciment argileux limonitique sur lequel ils prédominent.

Mon collègue Mr. V. Souza-Brandão, chargé de la pétrographie et de la minéralogie du Service géologique, a étudié cette roche au microscope et il la nomme schiste chamoisitique, du nom du minerai constituant les oolithes, qui est la chamoisite.

Ce lit vert a une grande continuité et marque l'aurore de l'apparition des *Trinucleus* (*Tr. Bureaui*) qui, dans un endroit près de Loredó, sont très abondants; ils y forment une véritable colonie, et n'ont pas encore été jusqu'à présent trouvés à niveaux inférieurs.

¹ Cette espèce a été à tort généralement indiquée dans les listes de fossiles de ce niveau comme *Homanolotus rarus* Corda, qui est pourtant une espèce bien différente.

Cette assise, que nous avons nommée *Grès de Loredó*, représente un accident local. C'est un dépôt sableux qui se formait en de certains endroits, tandis qu'en d'autres se poursuivait la sédimentation bourbeuse des schistes précédents. Épaisseur 50^m.

11. Schistes très micacés, plus ou moins grossiers, noirâtres, gris à petites taches noirâtres, ou gris foncé à taches claires, se divisant en menus fragments irréguliers; grès fin très micacé ou grauwacke schistoïde, et quartzite gris, en lits minces alternants. Le quartzite forme aussi quelques rares bancs d'une plus forte épaisseur. Dans quelques parties le schiste renferme des fragments arrondis, très roulés, d'autres roches schisteuses, et de petits nodules irréguliers, là où il est plus fin. Il contient des fossiles en abondance, surtout de petites bivalves à l'état de moules, qui parfois composent presque entièrement la roche, se trouvant tellement enchâssés dans quelques lits, qu'ils sont pour la plupart absolument indéterminables. *Dalmanites Dujardini* Rou. est le fossile le plus abondant et le plus caractéristique. Cette espèce paraît associée à *Trinucleus Bureaui* OEhl., *Pleurotomaria Bussacensis* Sh., *Bellerophon acutus* Sow., *B. trilobatus* Sow., *Leda Escosurae* Sh., plusieurs espèces de *Ctenodonta* et *Orthis Berthoisi* Rou. Épaisseur 165^m.

12. Diabase à structure globulaire et schistes diabasiques profondément altérés, de couleur jaunâtre-ochracé, ayant aussi parfois la structure globulaire. Ces schistes sont traversés par des injections de la diabase parfaitement cristalline ou amygdaloïde, qui forme aussi des coulées intercalées.

Cette roche éruptive montre sa plus grande épaisseur dans la direction où nous fîmes la coupe; cependant, tout en étant contemporaine du dépôt, elle ne forme pas une nappe continue; au contraire, elle est interrompue horizontalement en plusieurs points, et se montre, en outre, dans d'autres niveaux supérieurs et inférieurs.

La diabase est granulaire ou compacte (spilite), étant dans ce cas amygdaloïde et paraissant associée à une variolite amphibolique. Au même niveau on observe encore un tuf diabasique amygdaloïde. Épaisseur 200^m.

13. Schistes impurs diabasiques, plus ou moins grossiers, de couleur verdâtre et par altération, jaunâtre-ochracée et blanche. Ces schistes sont en général peu distinctement stratifiés, la stratification ne pouvant souvent se distinguer que par la disposition des moules de fossiles ou des cavités qu'ils occupaient lorsqu'ils ont été détruits en laissant des espaces vides. Ils montrent la structure globulaire au voisinage de la diabase ou bien ils se divisent en fragments prismatiques, mais, vers la partie inférieure de l'assise, ils forment, au contraire, de minces lits de peu de centimètres d'épaisseur.

Dans la base de l'assise il y a un grès fin passant au quartzite, sur lequel repose un schiste fin, gris foncé à taches blanchâtres, se divisant en fragments très irréguliers et renfermant quelques moules de fossiles très déformés pour la plupart. On reconnaît cependant que ce schiste, d'après ses caractères pétrographiques et paléontologiques, appartient encore au groupe de schistes très micacés sous-jacents à la diabase, celle-ci restant donc rigoureusement comprise, dans le même complexe avec les n^{os} 11 et 13.

Dans la partie supérieure de l'assise un schiste siliceux et caverneux, blanc, traversé par des veines de quartz, est subordonné aux schistes diabasiques verdâtres; il y a en outre une brèche quartzreuse ayant ce schiste pour ciment, et un quartzite caverneux, jaunâtre et blanchâtre, auquel sont intimement liés les calcaires, qui forment des masses considérables,

surtout dans le flanc occidental du synclinal; du côté oriental ils se montrent aussi, principalement à N.W. de Loredó, à l'endroit nommé Porto de Sant'Anna, le point le plus septentrional où ils paraissent.

Le calcaire est ordinairement compact, parfois cristallin, de couleur gris bleuâtre, coupé d'innombrables veinules de spath calcaire blanc laiteux, ayant en partie des taches ou veinules de pyrite, et renfermant aussi des géodes de cristaux de quartz éparses dans la roche. Il forme des masses lenticulaires irrégulières, plus ou moins grandes, au milieu des schistes ou du quartzite, auxquels il fait transition, ne montrant pas toutefois en nul point une stratification bien définie. Dans quelques points il est remplacé par une véritable dolomite; dans d'autres il est accompagné de la limonite, qu'il renferme en petite quantité.

Cette assise se termine en haut par une émission silico-ferrugineuse, qui semble marquer le terme de l'époque ordovicienne dans cette contrée.

Quelquefois le calcaire, chargé de silice et parfaitement compact, a subi par l'action des agents atmosphériques une altération profonde à la surface; on n'y voit que le squelette de la silice spongieuse avec les fossiles, que l'on ne découvre pas à l'intérieur de la masse calcaire non altérée. C'est vraiment une silicite calcarifère.

L'oxyde de fer forme des affleurements importants au milieu de ces couches culminantes de l'Ordovicien. On trouve même en plusieurs points beaucoup de scories de fer, indiquant que cette substance a déjà été traitée comme minerai de fer, et en effet elle est encore aujourd'hui exploitée dans ce but.

Les schistes ont tantôt la division prismatique irrégulière, tantôt la structure globulaire, comme la diabase, sans qu'ils laissent pourtant d'être fossilifères; au contraire, c'est précisément dans le voisinage de la roche éruptive, qu'ils sont, en beaucoup d'endroits, le plus chargés de moules de fossiles. Dans les parties mêmes où le schiste est profondément altéré par la diabase et où il possède la même structure de cette roche, il montre des vestiges de fossiles; ce qui peut s'expliquer en admettant que les éléments provenant de la désagrégation de la diabase, ou les cendres qui accompagnèrent l'éruption de cette roche, ont contribué à la formation du schiste en se mêlant aux dépôts des courants vaseux, auxquels celui-ci doit principalement sa formation.

La faune est extrêmement variable dans les divers points, selon la nature des roches, étant spécialement riche et variée dans le voisinage des calcaires; cependant, dans la partie saine de cette roche, c'est-à-dire où elle se présente à l'état de plus grande pureté, on n'a point découvert de fossiles.

Dans quelques strates les fossiles abondent tellement que la roche semble en être tout à fait constitué. Par suite de leur destruction, l'espace qu'ils occupaient est rempli d'une poussière ochracée, cette altération s'étendant jusqu'à la masse des schistes, qui présentent alors cette même couleur. Les Polypiers et Brachiopodes sont dans plusieurs strates très abondants, et dominant d'une manière extraordinaire sur tous les autres fossiles; les Trilobites ne se trouvent qu'en certains points, toujours peu nombreux, et les fossiles des autres classes sont encore plus rares.

On peut citer comme fossiles les plus caractéristiques de cette assise: *Orthis Berthoisi* Rou., *O. exornata* Sh., *Porambonites Ribeiroi* Sh., *Echinosphaerites balticus* Eichw., *Synocladia Lusitanica* Sh., *S. hypnoides* Sh. et *Disteichia reticulata* Sh. Épaisseur 170^m.

Tableau des assises du Silurique inférieur du Bussaco.— En résumant, nous voyons que le Silurique inférieur, dans le flanc oriental du synclinal du Bussaco, est constitué par les assises suivantes que l'on peut partager en trois étages distincts:

Étages	Assises	Épaisseurs approximatives ¹
Ordovicien supérieur... (585 ^m)	Schistes diabasiques ayant accidentellement des calcaires subordonnés.....	170 mètres
	Diabase.....	200 »
	Schistes à <i>Dalmanites Dujardini</i>	165 »
	Grès de Loredó.....	50 »
Ordovicien moyen..... (300 ^m)	Schistes à <i>Homalonotus Oehlerti</i>	150 »
	Schistes à <i>Orthis Ribeiroi</i>	150 »
Ordovicien inférieur... (815 ^m)	Quartzites à <i>Bilobites</i>	130 »
	Grès à <i>Scolithus</i>	520 »
	Grauwackes rouges inférieures.....	165 »
Puissance totale.....		1700 »

Coupes donnant le détail des assises précédemment décrites

a) Coupe suivant le ravin du Zuvinhal, traversant la montagne du Bussaco depuis la limite du Silurique supérieur, à 500^m au N. 65° W. du hameau de Palheiros, jusqu'aux schistes précambriens dans la base du penchant oriental de cette montagne ².

SILURIQUE SUPÉRIEUR

1. Schiste gris plus ou moins foncé, parfois très micacé, prenant par altération les couleurs rougeâtre, jaunâtre ou blanchâtre, ayant quelques lits de schiste subordonnés. Ce schiste est dur, micacé, criblé d'innombrables cavités laissées par la destruction du test d'Orthocères. Un de ces lits fossilifères marque précisément la limite du Silurique supérieur. On y a recueilli les espèces suivantes:

<i>Orthoceras</i> sp. (Voy. <i>O. styloideum</i> Barr.)	<i>Cardiola</i> sp.
<i>Cardiola striata</i> ? Sow.	<i>Monograptus colonus</i> Barr.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes culminants

2. Schistes diabasiques verdâtres prenant par altération la couleur rougeâtre, et schiste sili-
ceux, caverneux, blanc, traversé par des veinules de quartz laiteux et divisé en lits minces, parmi
lesquels deux contiennent des fossiles (Brachiopodes, Crinoïdes, Polypiers) en petit nombre et indé-
terminables. Sur le prolongement de ces schistes vers le sud paraissent des calcaires, dans le ruis-
seau de Palheiros. Épaisseur approximative 28^m.

¹ Il se peut que quelques-unes de ces épaisseurs soient exagérées, parce que en vertu du plissement et des cassures qui en sont résultées, quelques couches se trouvent répétées dans la coupe; cependant, d'une manière générale nous pouvons affirmer que la puissance de notre système silurique est énorme, et les différences paléontologiques d'une couche à l'autre confirment leur succession régulière et leur indépendance, ainsi que nous l'avons établi dans la description ci-dessus.

² Nous avons indiqué le degré de fréquence ou de rareté des fossiles par les lettres F, f, R, r placés à la suite du nom de l'espèce.

3. Schiste siliceux blanc, brèche quartzeuse avec ciment du même schiste et quartzite carverneux, jaunâtre et d'un blanc sale, passant au silex nectique. On a trouvé des fossiles à la partie inférieure de ce complexe (Polypiers et tiges de Crinoïdes). Épaisseur 8^m.

4. Schistes impurs, diabasiques, à stratification peu distincte, partiellement siliceux, divisés en général en lits de peu d'épaisseur, 2 à 5 centimètres, et montrant en partie la structure globulaire. On a découvert des fossiles en 8 lits différents, ils sont particulièrement abondants, surtout des Brachiopodes et des Polypiers, dans le lit qui forme la base du complexe. Épaisseur 96^m.

Iliaenus Loredensis sp. n. (voisin de
I. Bowmanni Salter).
Lichas aff. *convexus* Ang.
($\frac{1}{2}$ an *L. incola* Barr. var.)
Trinucleus Bureaui OEhlert.¹
Cheirurus Gryphus Barr.
Orthoceras, moules indét. de 2 espèces.
Beyrichia major sp. n., un seul échantillon. R.
Cyclonema aff. *sulcata* Hall.
(Voy. *Cycl. (Turbo) crebristria* McCoy).
Orthis Berthoisi Rou. F.
» *sardoa* Menegh. R.
» *exornata* juv. Sh.
» *testudinaria* Dalm.?

Rhynchonella cf. *ambigena* Barr. f.
Strophomena cf. *Phillipsi* Barr. f.
» *rhomboidalis* Wilkens. R.
Porambonites Ribeiroi Sh. R.
Leptaena tenuissime-striata McCoy? R.
Lingula sp. juv. ($\frac{1}{2}$ an *L. brevis* Portlock).
Brachiopodes ind., 8 espèces au moins.
Crinoïde, empreinte d'un article de la tige.
Cheilostomata Busk (*Bryozoaires cellulins* d'Orb.).
Synocladia Lusitanica Sh.
» *hypnoides* Sh.
Phyllopora? (*Retepora* sur la liste de Sharpe).
Favosites (Stenopora) fibrosa Goldf.
Polypiers ind. (*Anthozoaires*), 3 ou 4 espèces.

5. Schiste très fin, gris foncé taché de gris clair et blanc, se débitant en morceaux très irréguliers et contenant des moules de fossiles en petite quantité, en général déformés. Épaisseur 3^m.

Dalmanites Dujardini juv. Rou.
Bellerophon (Tropidodiscus) aff. *acutus* Sow.
($\frac{1}{2}$ an sp. n.).
Pleurotomaria Bussacensis juv. Sh.?
Ctenodonta Costae Sh.

Ctenodonta Ciae Sh. (cf. *Leda Bohemica* Barr.)
Leptaena Beirensis Sh.
Disteichia reticulata Sh.
Synocladia sp.
Diplograptus palmeus Barr.

6. Grès fin blanc et jaunâtre passant parfois au quartzite en lits de 12 à 50 centimètres d'épaisseur, ayant intercalées trois ou quatre strates de schiste grossier, très micacé, de couleur jaune ochracée par la décomposition du mica. On a recueilli dans un lit de grès un seul moule de *Ctenodonta Costae* Sh. Épaisseur 7^m.

7. Schistes diabasiques profondément altérés par les agents extérieurs, de couleur jaune ochracée, en partie avec la structure sphéroïdale et traversés par des injections de diabase parfaitement cristalline contenant des grains disséminés de pyrite. Épaisseur 28^m.

Diabase

8. Diabase cristalline ou compacte avec la structure sphéroïdale, à textures variées. Épaisseur 200^m.

Schistes à Dalmanites Dujardini

9. Grès fin, schistoïde, gris clair, très micacé et quartzite de même très micacé, blanchâtre, contenant des lits intercalés de schiste grossier gris-noir, micacé, de 2 à 30 centimètres d'épaisseur. On n'y a pas découvert de fossiles. Les schistes prédominent à la partie inférieure du complexe. Épaisseur 16^m.

¹ Nous réunissons provisoirement dans cette espèce deux têtes remarquables que l'on pourrait peut-être rapporter respectivement à *Tr. ornatus* Bureau non Stern. (= *Tr. Bureaui* OEhlert) et à *Tr. Seunesi* Kerforne. Le premier de ces échantillons se distingue particulièrement par la granulation irrégulière que portent les joues, et le second par sa grandeur, qui dépasse les dimensions de toutes les espèces à ma connaissance, ainsi que par la saillie extraordinaire de la glabellle, très supérieure à celle indiquée sur tous les dessins de *Trinucleus* que j'ai vus.

10. Schiste gris foncé, très micacé, taché de blanc et de jaunâtre, contenant quelques lits de grès fin, aussi très micacé, à structure schistoïde. Le schiste se divise en minces plaquettes et renferme de petits nodules irréguliers, quelquefois fossilifères, qui s'accumulent à la partie inférieure de la couche, disparaissant vers le haut, où le schiste est plus grossier et plus chargé de mica. Épaisseur 14^m.

<i>Dalmanites Dujardini</i> Rou. f.	<i>Ctenodonta Costae</i> Sh.
<i>Beyrichia simplex</i> juv. Jones.	<i>Ctenodonta Bussacensis</i> Sh.?
<i>Beyrichia Bussacensis</i> juv. Jones.	<i>Ctenodonta Ribeiroi</i> Sh.
» sp., peut-être une forme différente.	» <i>Ezquerrae</i> Sh.
<i>Hyolithes</i> cf. <i>indistinctus</i> Barr.	» <i>Eschwegii</i> Sh.
<i>Bellerophon acutus</i> Sow.	<i>Leda Escosurae</i> Sh. (Voy. <i>L. incola</i> Barr.).
» <i>trilobatus</i> Sow.	<i>Bivalves</i> ind., plusieurs espèces.
(cf. <i>B. bisulcatus</i> Roemer).	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
» <i>bilobatus</i> juv. Sow.?	<i>Leptaena sericia</i> Sow.
<i>Pleurotomaria Bussacensis</i> Sh.?	<i>Lingula</i> cf. <i>attenuata</i> Sow.

11. Quartzite gris en bancs épais de 10 à 75 centimètres, séparés par des lits de schiste grossier, gris foncé, très micacé et de grès fin ou grauwacke gris-jaunâtre, pareillement micacée. Cette couche est dépourvue de fossiles. Épaisseur 8^m.

12. Schistes gris foncé, plus ou moins grossiers, très micacés, divisés en lits minces, l'un desquels, à la partie inférieure du massif, a fourni quelques restes de fossiles empâtés dans la roche et très difficiles à déterminer. Il y a, intercalés dans ces schistes, quelques lits de grès fin micacé, dur, passant au quartzite, chacun de 5 à 25 centimètres d'épaisseur. Épaisseur 24^m.

<i>Dalmanites Dujardini</i> Rou.?	<i>Ctenodonta Bussacensis</i> Sh.
<i>Beyrichia</i> sp.	

13. Schistes très micacés, gris foncé taché de blanc, ou de jaune et de rouge par les oxydes de fer; grès schistoïde très micacé et quartzite en lits alternants, épais de 2 à 25 centimètres. Le schiste renferme des fragments très roulés et arrondis d'autres roches schisteuses, et en outre des fossiles en grande abondance, surtout des moules de petites bivalves, qui constituent parfois presque entièrement la roche, ils forment 5 lits différents tous réunis dans la moitié supérieure du complexe. Dans sa partie inférieure on n'a point découvert de fossiles. Épaisseur 85^m.

<i>Trinucleus Bureaui</i> Oehlert.	<i>Ctenodonta Ribeiroi</i> Sh.
<i>Dalmanites Dujardini</i> Rou.	» <i>Costae</i> Sh.
» <i>socialis</i> Barr.?	» <i>Maestri</i> Sh.
<i>Beyrichia Bussacensis</i> Sh. R.	» <i>Ezquerrae</i> Sh.
<i>Hyolithes (Theca) Beirensis</i> Sh.	<i>Orthis Berthoisi</i> Rou.
<i>Bellerophon trilobatus</i> Sow.	<i>Rhynchonella</i> sp.
» <i>expansus</i> Sow.	<i>Brachiopodes</i> ind., plusieurs espèces.
» <i>bilobatus</i> juv. Sow.?	<i>Crinoïde</i>
<i>Leda Escosurae</i> Sh.	<i>Polypier</i>
<i>Ctenodonta Ciae</i> Sh.	

14. Schistes très micacés gris-noir et gris moucheté de noir, et quartzite gris en lits alternants de 1 à 6 centimètres, sans fossiles. Épaisseur 22^m.

Grès de Loredó

15. Grauwacke à grains plus ou moins gros, en partie schistoïde, très micacée, en d'autres strates à structure massive, plus dure et passant même au quartzite. Elle a les couleurs verdâtre, jaunâtre et blanchâtre, et forme des bancs épais de 10 jusqu'à 90 centimètres, séparés par de minces lits de schiste grossier, très micacé, gris taché de jaune et de rouge par suite du commencement de l'altération du mica. Ce massif n'a pas fourni de fossiles. Épaisseur 25^m.

16. Schiste très micacé, gris avec taches rouges en lits minces alternant avec une grauwacke

schistoïde, aussi très micacée, de couleur verdâtre et rougeâtre, passant en partie à un quartzite blanchâtre. A la partie inférieure du complexe, on observe 4 lits de grauwacke épais de 10 à 60 centimètres. Un lit de schiste argileux limonitique, de couleur verdâtre foncé, chargé de petits oolithes, forme un bon horizon stratigraphique à la base de ce complexe; il renferme beaucoup de nodules noirs, siliceux, durs, de petites dimensions et à formes très irrégulières, contenant accidentellement de très mauvais moules de fossiles. Cette roche ou plutôt ce minerai de fer, présente la texture oolithique, et les nodules contiennent de même de nombreux grains globulaires, en grande partie de pyrite. Les fossiles à peu près indéterminables, appartiennent aux types suivants. Épaisseur 8^m.

Dalmanites socialis Barr.

Bellerophon sp.

Orthis sp.

Lingula ?

Crinoïde ind.

17. Schiste gris foncé, micacé, en minces lits, renfermant quelques petits nodules à formes irrégulières, dans lesquels on n'a pas trouvé de fossiles. Ceux-ci, à l'état de moules, sont écrasés et empâtés dans le schiste, ils sont peu abondants, les lamellibranches prédominant toutefois, ceux-ci sont distribués dans toute l'épaisseur du massif. Épaisseur 17^m.

Dalmanites socialis Barr.

» *Dujardini* Rou., une seule
glabelle. R.

Placoparia Zippei Bœck.

(= *Pl. Tourneminei* Rou.) R.

Hyolithes (Theca) Beirensis Sh.

Bellerophon, 2 espèces ind.

Dolabra? Lusitanica Sh.

Arca? Kosoviensis Barr.?

Ctenodonta Ribeiroi Sh.?

» *Costae* Sh.?

» *Ciae* Sh.?

Cyrtodonta ?

Orthis, moules très déformés et empâtés dans le
schiste.

Crinoïde.

Schistes à *Homalonotus* Ehlerti

18. Schiste grossier, très micacé, gris foncé avec taches claires, en lits généralement minces, alternant avec d'autres lits de quartzite et de grauwacke de 4 à 40 centimètres d'épaisseur. Quelques lits du schiste renferment des fossiles peu abondants et en très mauvais état de conservation. Épaisseur 24^m.

Homalonotus Ehlerti Kerforne ?

Calymene Tristani Brongn.

Ribeiria sp.

Cypricardia Beirensis Sh.

Dolabra? Lusitanica Sh.?

Ctenodonta Ciae Sh.

» moules d'autres espèces empâtés
dans le schiste et indéterminables.

Orthis, un moule d'une petite espèce.

Lingula, moules d'une petite espèce.

19. Schiste très micacé, gris foncé avec taches blanchâtres, contenant de nombreux et beaux fossiles dans toute l'épaisseur du massif, et renfermant beaucoup de petits nodules dont quelques-uns fossilifères. Il est très difficile de reconnaître dans ce schiste les plans de la stratification, qui ne peuvent être déterminés que par la différence de coloration en bandes très fines, exactement parallèles entre elles. La faune est très riche et variée comme le prouve la liste suivante:

Calymene Tristani Brongn. F.

» *Aragoi* Rou. r.

Placoparia Zippei Bœck.

(= *Pl. Tourneminei* Rou.) r.

Dalmanites socialis Barr.

» » var. *grandis*.

» *Phillipsi* Barr. f.

Iliaenus Hispanicus Vern. et Barr.¹

(= *I. giganteus* Burm., forme large). f.

Asaphus nobilis Barr.

» *glabratus* Sh.

» sp. n., un pygidium très caractéristique. R.

Homalonotus Ehlerti Kerforne. F.

Orthoceras cf. *expectans* Barr.

Hyolithes (Theca) Beirensis Sh.

Beyrichia Bussacensis Jones. R.

» *simplex* Jones.

Bellerophon acutus Sow.

¹ Par sa forme générale *I. Lusitanicus* Sh. est plus rapproché de *I. giganteus* Burm. que de *I. Hispanicus* Vern. et Barr.; néanmoins un spécimen que nous possédons de la colline de Boloi (Vallongo), qui ressemble profondément à *I. gi-*

Bellerophon trilobatus Sow.?
 » *Lebescontei* Trom.
Pleurotomaria Bussacensis Sh.
Ribeiria pholadiformis Sh.
 » sp.
Ctenodonta Beirensis Sh.
 » *Ezquerrae* Sh.
 » *Costae* Sh.
 » *Ciae* Sh.
 » *erratica* Trom.
 » sp. n. aff. *Costae*.
Redonia Duvaliana Rou.
Dolabra ? Lusitanica Sh.

Cypricardia Beirensis Sh.
Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr.
Modiolopsis cf. *Armorici* Salt.
Obolus ?
Lingula cf. *attenuata* Sow.
Orthis testudinaria Dalm.
 » cf. *ellipsoides* Barr.
 » *elegantula* Dalm.
 » sp. (voyez *O. turgida* McCoy.)
Disteichia reticulata Sh.
Calix (Echinospaerites) Murchisoni Vern. et Barr. sp.
Crinoide ind.

20. Quartzite gris, micacé, en lits épais de 10 à 65 centimètres, alternant à la partie supérieure de la couche avec des lits de grès blanc très micacé, schistoïde. Un des lits de quartzite, au milieu de la couche, contient des moules de fossiles dont la coquille est entièrement détruite. Épaisseur 12^m.

Dalmanites sp.
Bellerophon trilobatus Sow.?
Cypricardia Beirensis Sh.

Ctenodonta erratica Trom.
 » sp. ind.
Orthis testudinaria Dalm.

21. Schiste gris clair, jaunâtre et rouge, très micacé et la plupart du temps grossier, avec quelques lits subordonnés, épais de 2 à 40 centimètres, de quartzite micacé aussi gris clair, en partie schistoïde. A la partie supérieure de cette couche, on a recueilli quelques restes de Trilobites (*Dalmanites*?) fort empâtés dans la roche et indéterminables. Épaisseur 14^m.

22. Grès blanc, très micacé, en partie schistoïde, divisé en lits épais de 5 à 50 centimètres avec quelques lits subordonnés de quartzite micacé, gris clair. A la partie inférieure du complexe, il y a quelques lits de schiste gris, grossier, très micacé, et de grauwaacke avec quelques centimètres d'épaisseur à peine. Un lit de grès blanc jaunâtre, au milieu du complexe, a fourni des fossiles, principalement des *Orthis*, et quelques moules de bivalves tout à fait empâtés dans la roche et absolument indéterminables. Épaisseur 20^m.

Ctenodonta ?

Orthis testudinaria Dalm.

Schistes à *Orthis* Ribeiroi

23. Schistes gris noir avec des taches gris clair et blanches, très micacés, surtout dans les lits supérieurs qui sont dépourvus de fossiles; ils contiennent de petits nodules durs, irréguliers, de même sans fossiles, qui sont en petit nombre et distribués dans toute l'épaisseur du massif. Épaisseur 56^m.

Dalmanites socialis Barr.
 » *Vetillarti* Rou.
Calymene Tristani Brongn.
Homalonotus Oehlerti Kerforne.
Illaenus Lusitanicus Sh.
Asaphus nobilis Barr.
 » sp.
Orthoceras sp.
Beyrichia simplex Jones.

Beyrichia Bussacensis Jones.
Ribeiria pholadiformis Sh.
Pleurotomaria ?
Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr. °
Redonia Duvaliana Rou.
Ctenodonta Beirensis Sh.
 » *Ribeiroi* Sh.
 » *Costae* Sh.
 » *Ezquerrae* Sh.

ganteus, présente les séries de points creux que l'on observe dans cette espèce aussi bien que sur *I. Hispanicus*. Cela nous porte naturellement à réunir les trois formes dans une même espèce, considérant les deux formes de la Péninsule comme des variétés longue et large de l'espèce plus ancienne, dont le nom doit prévaloir. L'identité entre *I. Lusitanicus* et *I. giganteus* fut d'ailleurs depuis longtemps établie par Salter (*Quart. journ. of the Geol. Soc. of London*, vol. ix, 1853, p. 160). Toutefois, s'il y a un motif pour séparer les deux formes péninsulaires comme des espèces distinctes, il faut ne pas oublier que la forme typique de *I. giganteus* se trouve réunie avec celles-là en quantité extraordinaire dans un même point du bassin silurien de Vallongo.

Ctenodonta Eschwegi Sh.?
 » *Bussacensis* Sh.?
 » *Ciae* juv. Sh.
Modiolopsis elegantulus Sh.?
Cypricardia Beirensis Sh.?
Tellinopsis? 2 formes distinctes.

Orthis testudinaria Dalm.
 » *Ribeiroi* Sh.
 » » var.
 » *Bussacensis* Sh.
Lingula Symondsi Salt.

24. Schistes micacés, gris foncé, avec taches gris clair et blanchâtres, très fossilifères dans toute l'épaisseur du massif, contenant des nodules en partie fossilifères, pour la plupart de petites dimensions, et quelques-uns très volumineux. Un de ces derniers, à forme ellipsoïdale aplatie et mesurant 40 centimètres de grand axe, a fourni un grand nombre d'espèces qui sont indiquées sur la liste ci-après par un astérisque. Ce rognon se trouvait dans la partie inférieure du massif au-dessous d'un lit ferrugineux épais de 20 centimètres. C'est là que paraissent les Graptolites (*Didymograptus*) conjointement avec d'autres fossiles, et à un niveau plus bas, près de la base du massif, ils se montrent seuls dans un lit. Épaisseur 68^m.

* *Calymene Tristani* Brongn.
 * » *Aragoi* Rou.
Illaenus Hispanicus Vern. et Barr.
Placoparia Zippei Böck.
Dalmanites socialis Barr.
 » *Vetillarti* Rou.
Acidaspis Buchi Barr.
Cheirurus claviger Beyr.
Asaphus ou *Ogygia*.
 * *Lichas* sp.
Beyrichia simplex Jones.
 » *Bussacensis* Jones.
 * *Orthoceras duplex* Wahlbg.?
 » sp.
Conularia nobilis Barr.
 * *Hyolithes* sp.
Bellerophon Lebescontei Trom.?
 » *acutus* Sow.
Pleurotomaria Bussacensis Sh.
Cyrtodonta?

* *Sanguinolites Pellicoi* Vern. et Barr. f
 * *Redonia Duvaliana* Rou. f.
Dolabra? *Lusitanica* Sh.
Cypricardia Beirensis Sh.?
Ctenodonta erratica Trom.
 » *Ciae* Sh.
 » *Costae* Sh.
 » *Ezquerrae* Sh.
 » cf. *dispar* Barr.
Orthis Ribeiroi Sh. F.
 » » var. à larges côtes.
 » » var. dépourvu des ailes latérales.
 * » *calligramma* Dalm.
 * » *testudinaria* Dalm.?
Lingula cf. *Rouaulti* Salter.
Didymograptus Murchisoni Böck.? f.
 » sp.
 * *Calix Murchisoni* Vern. et Barr. sp.
Cladopora fibrosa Hall.
 * *Polypier*

25. Schiste fin, mou, taché de blanc, de gris et de jaunâtre, contenant de petits rognons ou concrétions dures, dont quelques-unes renferment des fossiles généralement en mauvais état de conservation. Ce massif a fourni des fossiles pas très abondants dans presque toute son épaisseur, tous à l'état de moules ayant perdu la coquille, et presque tous écrasés et empâtés solidement dans le schiste. Une partie du massif est caché par les débris des quartzites tombés du versant de la serra. Épaisseur 26^m.

Calymene Tristani Brongn.
Dalmanites socialis juv. Barr.
Asaphus nobilis Barr.?
Ogygia sp.
 » ou *Asaphus*, 2 ou 3 espèces indét.
Beyrichia Bussacensis Jones? R.
Redonia Duvaliana Rou.
Modiolopsis (Astarte?) convergens Barr.

Modiolopsis ind., 5 espèces au moins.
Bivalves ind.
Orthis calligramma Dalm.
 » sp.
Discina sp.
Lingula, 2 ou 3 espèces distinctes.
Didymograptus Murchisoni Böck.?

— Couvert sur une étendue de 27^m par les débris des quartzites siluriens et du grès crétacique du haut de la serra, la limite de l'assise des quartzites à Bilobites restant ainsi cachée.

Quartzites à Bilobites

26. Quartzite et grès très micacé, schistoïdes, et schistes très micacés en lits de 2 à 15 centimètres. Ce complexe est en partie caché par les débris des quartzites du haut de la serra du Bussaco; il comprend 5 lits fossilifères, dont 3 avec *Lingula* et 2 avec *Cruziana* et *Arthropycus*. Ce sont les deux lits supérieurs et le plus inférieur qui ont fourni les lingules, brisées presque totalement en menus morceaux, qui se sont réunis extraordinairement sur quelques points. Le quartzite passe parfois à une brèche à fragments irréguliers, liés ensemble avec quelques cailloux roulés. Épaisseur 6^m.

Lingula Lesueuri Rou. f.
» *Rouaulti* Salter?

Arthropycus cf. *Harlani* Hall.
Cruziana Beirensis Delg.

27. Grès fin passant par places au quartzite, et quartzite schistoïde très micacé, en lits de 8 à 50 centimètres d'épaisseur. A la partie inférieure de la couche, on a recueilli des moules de *Cruziana Beirensis* Delg. Épaisseur 5^m.

28. Quartzite et grès schistoïde micacés, en lits très minces, avec intercalation d'autres lits de schiste blanchâtre. On y a trouvé des Bilobites, mais rares et très mal conservés. Épaisseur 5^m.

Cruziana Beirensis Delg.
» cf. *furcifera* d'Orb.

Cruziana Bagnolensis Mor.

— Couvert sur 5 mètres d'extension.

29. Quartzite micacé en lits épais de 10 à 85 centimètres, quelques-uns se divisant en minces plaquettes jusqu'à 1 centimètre d'épaisseur. On a observé beaucoup de *Vexillum* en 4 lits différents; dans le plus inférieur qui a 40 cent. de puissance et qui est très dur, ces fossiles étaient si solidement enchassés dans la roche qu'il n'a pas été possible de les en détacher. Épaisseur 6^m.

Bivalves, 2 moules indéterminés.

Vexillum cf. *Morierei* Sap. f.

30. Quartzite très micacé, schistoïde, généralement en lits très minces, variant de 1 jusqu'à 20 centimètres d'épaisseur. Cette couche comprend 4 lits fossilifères, 2 à la partie supérieure avec *Lingula* et 2 à la partie inférieure avec *Vexillum*. Elle est cachée sur une grande extension par les débris des quartzites. Épaisseur 11^m.

Lingula Lesueuri Rou.
Cruziana Bagnolensis Mor.

Vexillum cf. *Morierei* Sap.
» sp.¹

31. Quartzite fin, gris clair, avec taches rouges, bien stratifié, en lits de 10 à 70 centimètres, et grès fin, schistoïde, se divisant en plaquettes à surface unie, de quelques centimètres à peine d'épaisseur. Cette couche comprend 2 lits avec *Cruziana*, 1 avec *Vexillum* et 5 avec d'autres fossiles, surtout des moules de bivalves en très grand nombre, fort empâtés dans la roche et ayant perdu leur test, qui est réduit dans quelques échantillons à une pellicule pulvérulente d'ocre rouge, et dans d'autres il a tout à fait disparu. Les espèces sont pour la plupart indéterminables, on reconnaît cependant qu'elles appartiennent à la même faune des assises précédemment décrites. Épaisseur 9^m.

Myocaris lutraria Salter.
Calymene Tristani Brongn.
Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr.
Cyrtodonta?

Ctenodonta?
Bivalves ind., plusieurs espèces.
Lingula Lesueuri Rou.
Discophyllum plicatum Phillips sp.

32. Quartzite schistoïde, très micacé, en minces lits qui se divisent en plaquettes à surface unie

¹ Dans un lit de quartzite, j'ai vu des cavités infundibuliformes se continuant avec des trous cylindriques qui le traversaient perpendiculairement et qui furent plausiblement produits par un ver qui s'est frayé un passage à travers le sable, excavant d'abord à la surface avant d'y pénétrer. Le remplissage des cavités a été fait postérieurement, et c'est pour cela que la partie supérieure, conique, restant vide, la partie inférieure ou cylindrique est remplie par une substance différente de la roche, savoir du silex blanc pulvérulent, les parois des cavités montrant sur toute leur étendue la même altération que la surface du lit, qui a une couleur rougeâtre pénétrant dans la roche jusqu'à une certaine profondeur.

de peu de millimètres d'épaisseur. Cette couche comprend 3 lits fossilifères, l'un à la partie supérieure avec *Vexillum*, et les deux autres à la partie inférieure, l'un avec *Cruziana*, et le plus inférieur avec *Vexillum*. Elle est cachée dans sa plus grande extension par les débris des quartzites. Épaisseur 14^m.

Cruziana Bagnolensis Mor.

Vexillum cf. *Morierei* Sap.

— Couvert sur une étendue de 62 mètres.

33. Quartzite très dur, en lits minces jusqu'à 30 centimètres d'épaisseur, avec *Bilobites* en deux lits différents. Épaisseur 10^m.

Cruziana Beirensis Delg.

Cruziana Bagnolensis Mor.?

Grès à *Scolithus*

34. Grès siliceux à grain très fin, passant au quartzite blanc ou rouge brique par un commencement d'altération, et formant des bancs épais de 50 cent. jusqu'à 2^m,60. Ce n'est qu'à la partie inférieure que ce massif comprend quelques lits de moindre épaisseur; le toit en est formé par un banc puissant de quartzite très dur de couleur rouge avec l'aspect vitreux. Il contient quelques lits avec *Scolithus*. Épaisseur 45^m.

Scolithus (Tigillites) Dufrenoyi Rou.

Vexillum?

35. Quartzite et grès siliceux fin, peu micacé, en bancs de différentes épaisseurs jusqu'à 1^m,60 avec des lits moins puissants qui parfois contiennent *Scolithus* et *Vexillum*. Ce complexe est caché en grande partie par les débris et masses de quartzite écroulés du haut de la serra. Épaisseur 94^m.

Scolithus Dufrenoyi Rou.

Vexillum? d'autres formes problématiques.

Vexillum Desglandi Rou.

— Couvert sur une étendue de 58 mètres.

36. Grès siliceux fin et quartzite en gros bancs jusqu'à 3^m,0 de puissance, séparés par d'autres strates moins épaisses de même nature, avec quelques décimètres à peine d'épaisseur. Au milieu de ce massif, et correspondant au sommet de la serra du Bussaco, il se montre sur la direction de la coupe quelques strates de grès siliceux dur, à gros grains, ou quartzite d'un aspect fort analogue aux grès crétaciques qui recouvrent le Silurique en plusieurs points. A la partie inférieure du massif, il y a deux lits de grès fin, blanc, taché de rouge foncé par l'oxyde de fer, contenant des *Vexillum*. Épaisseur 166^m.

Vexillum Desglandi Rou., tiges et frondes diversement enroulées.

37. Grès fin passant au quartzite de couleur rougeâtre foncé ou verdâtre clair avec taches rouges, en lits de 0^m,15 jusqu'à 1^m,40 d'épaisseur. Ce massif est caché en plusieurs points par les débris des quartzites. A sa partie inférieure il comprend 5 lits différents avec *Vexillum*. Épaisseur 113^m.

Vexillum Desglandi Rou.

38. Grès passant au quartzite, blanchâtre ou verdâtre avec taches rouge foncé et châtain, en lits de 10 à 80 centimètres d'épaisseur. Ce massif comprend 4 lits avec *Vexillum*. Épaisseur 55^m.

Vexillum Desglandi Rou.

Grauwackes rouges inférieures

39. Grès dur passant au quartzite et grauwacke micacée de couleur violette en lits de 10 à 60 centimètres d'épaisseur, alternant avec d'autres lits de schiste gréseux, peu micacé, blanchâtre ou couleur lie de vin avec taches claires. Ce schiste est traversé par des corps cylindroïdes blancs, se dirigeant dans tous les sens, et qui se détachent sur le fond rougeâtre de la roche; ils représentent le remplissage postérieur de cavités occupées préalablement par des tiges de *Vexillum*. A simple vue, on reconnaît pourtant que ces moules sont d'une matière différente de celle de la roche qui les renferme; ils sont formés par du quartzite blanc, contrastant avec le grès fin environnant, aussi bien par sa composition que par sa couleur. Plusieurs de ces cylindres sont divisés transversalement en an-

neaux de hauteur variable, ce qui a trait peut-être à la structure spéciale de la roche, c'est-à-dire aux pressions qu'elle a subies. Épaisseur 44^m.

40. Quartzite de couleur violet clair et blanchâtre, et grès dur, en général fin, violet plus ou moins foncé ou blanchâtre, en lits de 10 centimètres jusqu'à 1^m,20 d'épaisseur, ayant intercalés quelques lits de schiste gréseux couleur lie de vin. Trois de ces lits sont traversés par des corps cylindroïdes à formes peu régulières, semblables à ceux que nous avons indiqués dans le complexe du numéro précédent, auquel doit être vraisemblablement rattaché celui-ci. Épaisseur 93^m.

41. Schiste gréseux micacé, couleur lie de vin, foncé, formant des bancs très puissants à stratification indistincte, avec cassure inégale, se divisant en morceaux anguleux de formes très irrégulières. A la partie inférieure du massif, il a la couleur verdâtre clair ou blanchâtre, et renferme quelques lits intercalés de quartzite épais de 5 à 35 centimètres. Le schiste contient des moules de *Fucoïdes* indéterminables, tout à fait empâtés dans la roche. Épaisseur 28^m.

PRÉCAMBRIQUE

42. Schistes fins, gris, en strates très épaisses avec quelques minces lits de quartzite subordonnés, en stratification manifestement discordante avec les couches siluriennes qui les recouvrent.

b) Coupe suivant le ravin du Val San Jorge, depuis la limite du Silurique supérieur, près de Contonças, jusqu'aux quartzites à *Bilobites* du haut de la montagne du Bussaco.¹

SILURIQUE SUPÉRIEUR

1. Schiste gris, micacé, fissile, et schiste altéré, jaunâtre et rougeâtre, ochracé, avec fossiles, précisément au contact de l'Ordovicien.

Orthoceras, moules écrasés indéterminables.
Cardiola interrupta Sow.

Cardiola? *striata* Sow.
Monograptus colonus Barr.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes culminants

2. Schiste siliceux et caverneux, jaunâtre, traversé par des veines de quartz blanc, et schiste dur, verdâtre ou gris-verdâtre en lits minces, pétri de fossiles dans un lit de 10 centimètres d'épaisseur, à la partie supérieure du complexe. Par la décomposition du test des fossiles, l'espace qu'ils occupaient est rempli d'une poussière jaune, ochracée, d'hydroxide de fer, cette altération ayant envahi la masse même du schiste.

Phillipsia parabola Barr.
Hyalithes cf. *striatulus* Barr.
Cyclonema aff. *crebristria* McCoy.
Pleurotomaria?
Trochonema sp.
Natica sp.
Murchisonia sp.
Gastropodes ind., 2 ou 3 espèces.

Spirifer antiquissimus Salt.
(cf. *Strophomena spiriferoides* McCoy).
Orthis cf. *flabellulum* Sow.
» *honorata* Barr.
» *calligramma* Dalm.
» cf. *elegantula* Dalm.
Athyris? 2 espèces.
Stringocephalus sp. (cf. *Strophomena Vicaryi* Salt.).

¹ Cette coupe forme comme un complément de la coupe précédemment décrite, la faune des différentes couches y étant mieux représentée.

Brachiopodes ind., 8 espèces au moins.

Caryocrinus ornatus Say?

Echinospaerites (Caryocystites) balticus Eichw.

Orocystites Helmhackeri Barr.

Arystocystites cf. *sculptus* Barr.

» cf. *Bohemicus* Barr.

Crinoides ind.

Polypiers ind.

3. Calcaire dolomitique jaunâtre, avec géodes de cristaux de quartz hyalin, disséminés dans sa masse, sans stratification visible et sans fossiles.

— Couvert sur une étendue de 20 mètres.

4. Schistes impurs, diabasiques, généralement fort altérés, de couleur jaunâtre ou rougeâtre foncé, montrant la structure sphéroïdale aux approches de la diabase, qui forme ici une coulée représentant le niveau le plus élevé où cette roche paraît. Les schistes sont divisés en lits de 4 à 30 centimètres d'épaisseur. On n'a trouvé de fossiles que dans un lit peu épais, correspondant au milieu du complexe. En outre de la diabase, il se montre aussi dans ce complexe du quartz carié et caverneux, de couleur ochracée foncée, où les cavités sont séparées les unes des autres par des cloisons qui lui donnent une apparence spongieuse et une grande légèreté.

Orthis calligramma Dalm.

» *exornata* Sh.

» ? *spiriferoides* McCoy.

Synocladia Lusitanica Sh. f.

Synocladia hypnoides Sh.

Cladopora fibrosa Goldf. sp.

Polypier ind.

5. Schiste argileux très fin, gris foncé avec taches blanchâtres, devenant jaunâtre par altération et se débitant en très menus morceaux de formes irrégulières, et schiste gréseux à grain très fin ou grès fin argileux, tendre, de couleur jaunâtre. Les fossiles sont tous à l'état de moules, généralement comprimés et très déformés.

Dalmanites socialis Barr.

Beyrichia simplex Jones.

Orthoceras sp.

Bellerophon sp.

Ctenodonta Costae Sh.?

Orthis Berthoisi Rou.

Orthis Munda juv. Sh.

» *exornata* juv. Sh.

Leptaena Beirensis juv. Sh.?

Synocladia Lusitanica Sh.?

Polypier ind.

6. Quartzite et grès fin passant au quartzite, blanc avec taches jaunâtres, en bancs de 2 à 80 centimètres d'épaisseur, ayant intercalés quelques lits de schiste gréseux, dur, très micacé, sans fossiles, se divisant en plaquettes très minces, de couleur gris plombé foncé.

Diabase

7. Diabase crystalline et schistes diabasiques altérés, de couleur rouge et jaunâtre ochracée, divisés en minces lits de 4 à 20 centimètres d'épaisseur, montrant parfois la structure sphéroïdale comme la roche éruptive.

Schistes à *Dalmanites Dujardini*

8. Schistes grossiers très micacés, gris foncé avec taches claires, à texture ténace, se débitant en menus morceaux irréguliers, ayant intercalés des lits épais de 4 à 35 centimètres, de quartzite gris clair, de grès fin très micacé ou grauwacke grise devenant blanchâtre par commencement d'altération, et de schiste dur, très micacé, fissile, gris foncé. A la partie inférieure du complexe quelques lits de schiste contiennent des fossiles, tous à l'état de moules et solidement enchâssés dans la roche.

Dalmanites Dujardini Rou.

Bellerophon sp.

Pleurotomaria Bussacensis Sh.

Leda incola Barr.

» *Escosurae* Sh.

Ctenodonta Costae Sh.

» *Ciae* Sh.

» *Beirensis* Sh.

» sp.

Orthis Berthoisi Rou.

9. Diabase granulaire avec la structure sphéroïdale. Cette bande crystalline passe auprès de l'église de Palheiros et se dirige vers Cássemes.

10. Schistes grossiers très micacés, de couleur gris noirâtre avec taches claires par commencement d'altération. Ils se divisent en menus morceaux très irréguliers, à cassure conchoïdale et renferment quelques minces lits de grès fin schistoïde ou grauwacke très micacée parcourus par de nombreux joints, qui les partagent en petites masses prismatiques, parallélipipèdes ou rhomboïdales. Quelques lits de schiste contiennent des fossiles fort engagés dans la roche et beaucoup d'eux déformés.

Dalmanites Dujardini Rou.

Bellerophon sp.

Pleurotomaria Bussacensis Sh.

Leda incola Barr.

» sp.

Ctenodonta Costae Sh.

» *Beirensis* Sh.?

Cypricardia Beirensis Sh.

Orthis Berthoisi juv. Sh.

11. Quartzite gris en bancs épais de 10 à 60 centimètres ayant subordonnés quelques lits de schiste grossier, très micacé, gris plombé foncé, sans fossiles.

12. Schistes très micacés, feuilletés, gris foncé, divisés en lits minces, ayant subordonnés quelques lits de quartzite et de grès fin, très micacé, épais de quelques centimètres jusqu'à 2 décimètres. Ce complexe n'a point fourni de fossiles.

13. Diabase cristalline.

14. Schistes très micacés et grès schistoïde ou grauwacke également très micacée, en minces lits alternants, de couleur gris foncé avec taches blanchâtres et jaunâtres, ochracées, par altération. Quelques lits sont très fossilifères et contiennent d'innombrables petits moules de fossiles, particulièrement de *Ctenodonta* et de *Bellerophon*. D'autres lits sont pétris de moules de *Pleurotomaria* et de Trilobites (surtout *Dalmanites Dujardini*). Les schistes renferment des concrétions dures, noduleuses, irrégulières, souvent fossilifères.

Dalmanites Dujardini Rou. f.

» *socialis* Barr., une seule tête. R.

Trinucleus Bureaui Oehlert.

Lituites intermedius Vern. et Barr., un moule incomplet. R.

Orthoceras sp.

Hyolithes cf. *elongatus* Barr.

» sp. n.?

Bellerophon trilobatus Sow. (*Tropidodiscus trilobatus* Sow. var. *bisulcatus* F. A. Rømer).

» cf. *carinatus* Sow.

» cf. *expansus* Sow.

» aff. *acutus* Sow.

Pleurotomaria Bussacensis Sh. f.

Ctenodonta Ciaie Sh. F.

Ctenodonta Maestri Sh..

» » var.

» *Costae* Sh.

» *Ribeiroi* Sh.

» ind., 2 ou 3 petites espèces.

Leda Escosurae Sh.

» » var. (= *Leda incola* Barr.).

Bivalves ind., plusieurs espèces.

Orthis Berthoisi Rou. r.

» *testudinaria* Dalm.

» cf. *spiriferoides* McCoy.

» sp.

Leptaena?

Lingula cornea Sow.

Crinoïde.

Polypier, traces.

15. Schistes très micacés, gris foncé avec taches claires, quartzite fin, gris clair, traversé par des veines de quartz blanc et grauwacke fine, micacée, en minces lits alternants, quelques-uns fossilifères, surtout ceux de la grauwacke.

Dalmanites Phillipsi Barr.

» *socialis* Barr.

Trinucleus Bureaui Oehlert.

Iliaenus aff. *Murchisoni* Salter.

Conularia aff. *Bohemica* Barr.

(cf. *C. quadriculata* Portl.)

Bellerophon sp.

Platystoma cf. *niagarensis* Hall.

Ctenodonta Ribeiroi Sh.

» *Costae* Sh.

Ctenodonta Ciaie Sh.?

» *Eschwegii* Sh.?

Bivalves ind., 2 espèces.

Orthis Berthoisi Rou., exemplaires peu développés. f.

» *Michelini* Lèveillé, Jan O. *Berthoisi* var.

» *Ribeiroi* Sh. R.

» *testudinaria* Dalm.

Rhynchonella nucula Sow. (*Hypothyris semisulcata* Salt.)

Crinoïde.

Grès de Loredó

16. Grès blanc et jaunâtre, très micacé, plus ou moins schistoïde, formant des bancs épais de 10 centimètres à 1 mètre. C'est à la base du massif que se trouvent les deux bancs de plus forte épaisseur. Il y a quelques lits subordonnés de quartzite gris, peu micacé, et de schistes gris foncé et blancs, très micacés. Point de fossiles.

17. Schiste fin, gris avec taches claires, et schiste très micacé, blanchâtre, devenant rougeâtre par commencement d'altération. Ce dernier fait transition à la grauwaacke et comprend de minces lits de quartzite gris clair, intercalés. A la partie inférieure du complexe, il y a un lit de schiste grossier, couleur verdâtre foncé, avec la texture oolithique et renfermant des fossiles. Ce complexe correspond au n.º 16 de la coupe du ravin du Zuvihal.

Calymene Aragoi Rou.

Dalmanites socialis Barr.

Bellerophon ?

Pleurotomaria ?, 1 ou 2 espèces.

Orthis sp.

Brachiopode ind., un mauvais petit moule. R.

Crinoïde.

18. Schiste gris foncé avec taches blanchâtres, généralement fin et en quelques points très micacé, chargé de nodules argilo-siliceux, quelques-uns très volumineux et en partie fossilifères. Ce massif comprend deux bancs épais de quartzite très micacé, gris verdâtre, puissants de 60 centimètres, dont l'un en forme la base. Les fossiles sont distribués dans le schiste et dans les nodules; cependant, le quartzite a aussi fourni un moule d'une petite bivalve, probablement *Ctenodonta*.

On observe dans ce point de la coupe un plissement des strates, mais bientôt après la stratification devient régulière, les strates ayant la même allure et le même plongement que les couches des numéros précédents.

Calymene Tristani Brongn.

» *Aragoi* Rou.

Dalmanites Dujardini Rou.

» *socialis* Barr.

Illaenus Lusitanicus Sh.?

Orthoceras sp.

Bellerophon acutus Sow.

» *trilobatus* Sow.

» ind., 2 autres espèces.

Pleurotomaria Bussacensis Sh.

Ctenodonta Ribeiroi Sh.

Leda Escosurae Sh.

Dolabra ? *Lusitanica* Sh.

Modiolopsis ? cf. *obliquus* Salter.

Cypricardia Beirensis Sh.?

Bivalves ind.

Orthis sp.

Crinoïde.

Schistes à *Homanolotus Ehlerti*

19. Schistes micacés comprenant peu de lits de grauwaacke, couleur gris foncé, gris clair, blanchâtre et jaunâtre avec taches rouges dues à l'altération du mica. Les fossiles sont très abondants dans toute l'épaisseur du massif, qui renferme beaucoup de nodules en partie fossilifères.

Calymene Tristani Brongn. f.

» *Aragoi* Rou.

Asaphus nobilis Barr.

Acidaspis sp.

Illaenus Hispanicus Vern. et Barr.

Homanolotus (Plaesiacomia) Ehlerti Kerf. f.

Dalmanites socialis Barr. f.

» *Phillipsi* Barr.

Beyrichia simplex Jones.

» *Bussacensis* Jones.

Orthoceras sp.

Hyolithes Beirensis Sh.

» cf. *elegans* Barr.

Conularia aff. *Bohemica* Barr.

Bellerophon Lebescontei Tromelin.

» *acutus* Sow.

» *trilobatus* Sow.

Ribeiria pholadiformis Sh.

» sp.

Pleurotomaria Bussacensis juv. Sh.

Straparollus ?

Dolabra ? *Lusitanica* Sh. f.

Cypricardia Beirensis Sh.

Arca (subgen. *Carbonarca*) sp.

Redonia Duvaliana Rou.

Ctenodonta Ciae Sh.

» *Costae* Sh. r.

» *Beirensis* Sh.

<i>Ctenodonta Ezquerrae</i> Sh.	<i>Orthis Ribeiroi</i> Sh., un seul moule. R.
» <i>Ribeiroi</i> juv. Sh. r.	» aff. <i>suburbana</i> Barr.
<i>Leda</i> cf. <i>bilunata</i> Barr. r.	» <i>redux</i> Barr.
» cf. <i>librans</i> Barr, un seul spécimen. R.	» ind., 2 espèces.
» sp.	<i>Lingula</i> , 3 moules différents.
<i>Orthis testudinaria</i> Dalm. f.	<i>Diplograptus</i> sp.

20. Schistes très fins, très doux, très micacés, de couleur gris foncé à l'intérieur, mais à la surface généralement blanchâtres avec taches jaunâtres ochracées par un commencement d'altération. Ce massif contient beaucoup de petits nodules, quelques-uns ferrugineux, et il est traversé par quelques veines d'hydroxyde de fer. Les fossiles sont très nombreux, le test des Trilobites a été remplacé, à ce qu'il paraît, par de l'hématite, parce que l'on voit quelques moules encore revêtus d'une couche ferrugineuse très mince.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn. F.	<i>Bellerophon acutus</i> Sow.
» <i>Aragoi</i> Rou.	» sp.
<i>Remopleurides (Caphyra) Lorioli</i> sp. n.	<i>Dolabra? Lusitanica</i> Sh.
<i>Homalonotus OEhlerti</i> Kerf.	<i>Cypricardia Beirensis</i> Sh.
<i>Acidaspis</i> sp.	<i>Modiolopsis? cf. Armorici</i> Salter.
<i>Illaenus Lusitanicus</i> Sh.	<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.
» <i>Hispanicus</i> Vern. et Barr.	<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.
<i>Asaphus nobilis</i> Barr.	<i>Ctenodonta Ciae</i> Sh.
<i>Ogygia glabrata</i> Sh.?	» <i>Costae</i> Sh.
<i>Dalmanites socialis</i> Barr.	» <i>Ezquerrae</i> Sh.
» <i>Phillipsi</i> Barr.	» <i>Beirensis</i> Sh.
<i>Beyrichia simplex</i> Jones. F.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm. F.
» <i>Bussacensis</i> Jones. r.	<i>Lingula</i> cf. <i>ovata</i> McCoy.
<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Calix</i> sp. n.?
<i>Hyalithes elegans</i> Barr.	<i>Phyllograptus</i> sp. n.
<i>Conularia</i> aff. <i>Bohemica</i> Barr.	<i>Polypier</i> .

21. Quartzite fin, gris et grauwaacke blanche très micacée, en lits épais de 1 à 50 centimètres y compris un lit de schiste fin, doux, micacé. La base du complexe est formé par un lit de quartzite de 14 centimètres d'épaisseur, dans lequel on a découvert des fossiles.

<i>Dalmanites Dujardini</i> Rou.	<i>Bivalves</i> ind., 2 espèces.
<i>Hemalonotus OEhlerti</i> Kerf.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm. f.
<i>Gastropode</i> .	

22. Schistes gris, blanchâtres et jaunes, très micacés, en lits minces, dont quelques-uns de quartzite schistoïde et de grauwaacke épais de 4 à 25 centimètres. Les fossiles étaient compris dans 5 lits différents, l'un à la partie supérieure du complexe et les autres à la partie inférieure.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
<i>Homalonotus (Plaesiacomia) brevicaudata</i> Desl. sp.	Crinoïde.
<i>Orthoceras</i> sp.	

23. Grauwaacke blanche, micacée, en partie schistoïde et alors très micacée, en bancs épais de 10 à 60 centimètres, comprenant quelques strates de schiste blanc, peu cohérent, très micacé, de 80 centimètres d'épaisseur. Dans toute l'épaisseur du complexe il y a 4 lits fossilifères, tous de grauwaacke.

<i>Trilobite</i> ind., coupe transversale.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
<i>Bivalves</i> ind., petits moules, peut-être <i>Ctenodonta</i> .	

24. Schistes blanchâtres, rougeâtres et jaunâtres, très micacés, en lits de 2 à 25 centimètres, avec quelques lits subordonnés de grauwaacke schistoïde, très micacée. Il y a 4 lits fossilifères dans toute l'épaisseur du complexe. Les fossiles sont rares et très mauvais.

<i>Trilobite</i> ind., fragments de plèvres.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
<i>Nucula Eschwegii</i> Sh.?	

Schistes à *Orthis Ribeiroi*

25. Schistes gris plus ou moins foncé tachés de blanchâtre, finement micacés et comprenant quelques petits nodules. Ce massif est très fossilifère dans presque toute son épaisseur. Sur le ravin on ne découvre pas les plans de la stratification, cependant où le schiste se montre à découvert on voit qu'il se divise en minces lits.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Leda Escosurae</i> Sh.?
» » var. avec les sillons de la glabelle effacés.	<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.
» <i>Aragoi</i> Rou.	» <i>Ribeiroi</i> Sh.
<i>Illaenus Hispanicus</i> Vern. et Barr.?	» ind., 2 ou 3 espèces
<i>Dalmanites socialis</i> Barr.	<i>Cypricardia Beirensis</i> Sh.?
» <i>Vetillarti</i> Rou.	<i>Modiolopsis</i> ?
<i>Homanolotus (Plaesiacomia) brevicaudata</i> Desl. sp.	<i>Tellinopsis</i> ?
<i>Asaphus</i> sp.	<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.
<i>Beyrichia simplex</i> Jones.	<i>Dolabra Lusitanica</i> juv. Sh.
» <i>Bussacensis</i> Jones.	<i>Bivalves</i> ind., 2 ou 3 espèces.
<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Orthis Ribeiroi</i> Sh.
<i>Bellerophon</i> ?	» <i>testudinaria</i> Dalm.
<i>Ribeiria pholadiformis</i> Sh.	» <i>Bussacensis</i> Sh. r.
» sp.	<i>Lingula</i> cf. <i>attenuata</i> Sow.
<i>Pleurotomaria Bussacensis</i> Sh.	<i>Crinoïde</i> .
<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Böeck.
	<i>Diplograptus</i> sp.

26. Schiste très micacé, en partie fin et doux, gris plus ou moins foncé avec taches blanchâtres, renfermant quelques petits nodules. Ce massif est très fossilifère dans toute son épaisseur, la quantité d'exemplaires d'*Orthis Ribeiroi* est surtout vraiment extraordinaire; cette espèce atteint dans ce niveau son plus grand développement, soit par le nombre des individus, soit par leurs dimensions.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Ctenodonta Eschwegi</i> Sh.
» <i>Aragoi</i> Rou.	» <i>Ciae</i> Sh.
<i>Placoparia Zippei</i> Böeck.	» <i>Bussacensis</i> Sh.
<i>Homanolotus Oehlerti</i> Kerf.	» <i>Costae</i> Sh.
<i>Illaenus Hispanicus</i> Vern. et Barr.	<i>Leda Escosurae</i> juv. Sh.
<i>Dalmanites socialis</i> Barr.	» <i>Bohemica</i> Barr.
» <i>Vetillarti</i> Rou.	<i>Cyrtodonta</i> ? (an <i>Modiolopsis</i> cf. <i>obliquus</i> Sh.)
<i>Asaphus</i> ?	<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.
<i>Beyrichia simplex</i> Jones. r.	<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.
» <i>Bussacensis</i> Jones. r.	<i>Orthis Ribeiroi</i> Sh., espèce extrêmement abondante. F.
<i>Hyolithes</i> sp.	<i>Lingula lata</i> Sow.
<i>Conularia fecunda</i> Barr.	» <i>longissima</i> Pander.?
<i>Bellerophon Lebescontei</i> Tromelin?	<i>Calix Sedgwicki</i> Rou. (cf. <i>Arystocystites Bohemicus</i> Barr.)
<i>Dolabra Lusitanica</i> juv. Sh.?	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Böeck.
<i>Ctenodonta erratica</i> Trom.	» sp.

— Couvert sur 21^m,0 d'étendue.

27. Schiste fin, gris foncé et blanchâtre, en partie micacé, renfermant quelques lits et concrétions ferrugineuses. Ce massif est partiellement couvert. Il a fourni des fossiles à sa partie supérieure, au milieu de sa hauteur et dans la partie découverte de sa base.

— Couvert sur 52 mètres d'étendue. La limite des schistes à *Orthis Ribeiroi* avec l'assise des quartzites à *Bilobites* est cachée dans cet intervalle.

Incorporation dans l'Ordovicien des grauweekes rouges inférieures.— Comme nous l'avons vu, la série décrite du Silurique du Bussaco commence en bas par une puissante assise de grauweekes et de grès plus ou moins grossiers, quelquefois micacés et de division schistoïde, où

domine la couleur rouge lie de vin, et de schistes grossiers de cette même couleur, en strates épaisses, alternantes.

Cette assise n'a été observée que sur le versant oriental de la montagne du Bussaco; elle traverse le Mondégo vers le sud et se poursuit sur 3 kilomètres au sud du pont de Mucella où elle disparaît sous les grès crétaciques. Ces grès couronnent aussi la montagne sur plusieurs points, mais les grauweekes rouges n'ont été découvertes en aucun autre point.

A une demi-lieue au N.N.W. de Penacova, près du hameau de Chan, on observe une couche de conglomérat épaisse de 8 à 10 mètres, qui contient de nombreux cailloux roulés de différentes grosseurs, de quartzite, de grauweeke précambrienne, de gneiss silicifié et de porphyre quartzifère, les plus gros mesurant 25 centimètres de diamètre, engagés dans une pâte de schiste argileux vert clair. Ce conglomérat n'a été découvert que dans ce point, il se poursuit avec quelques interruptions sur l'étendue de 1.800 mètres le long de la limite du Silurique et forme la base de ce système. Il passe graduellement en haut à une grauweeke argileuse, verdâtre, qui devient ensuite plus fine, à laquelle se succèdent les schistes grossiers couleur lie de vin foncé, tachés de blanchâtre et verdâtre clair. Ces schistes forment la limite orientale de l'affleurement du Silurique depuis le hameau de Chan jusqu'à son extrémité nord près du signal du Bussaco; au sud du Mondégo ils se suivent sur une étendue de 2 kilomètres jusqu'à Valle Maior, où ils disparaissent.

L'assise de grauweekes rouges va en s'amincissant graduellement au sud du Mondégo, les couches les plus inférieures manquant successivement, de sorte que, à l'extrémité sud de l'affleurement silurique, on ne voit que les couches les plus supérieures de cette assise, qui renferment des moules de *Cruziana* en deux lits.

En effet, près du toit de l'assise de grauweekes rouges on découvrit à 1.200 mètres au nord de Penacova un spécimen de *Cruziana furcifera* dans un lit de quartzite fin, gris, taché de rouge, qui est subordonné aux schistes grossiers lie de vin; de même à l'ouest du hameau de Barreiro, sur la descente vers Ponte de Mucella, on a trouvé dans le même niveau quelques exemplaires de *Cruziana*, montrant nettement la liaison de l'assise de grauweekes rouges avec les quartzites à Bilobites qui la surmontent et qui appartiennent sans aucun doute à l'Ordovicien. D'autre part le complexe de quartzites et de grès qui constituent l'étage ordovicien inférieur, est coupé perpendiculairement par la vallée du Mondégo, et l'on peut y observer sur les deux flancs la succession complète et régulière des strates, qui montrent des inclinaisons très fortes et sont parfois même verticales, se succédant en stratification parfaitement concordante et formant une série simple avec une puissance totale qui dépasse 800 mètres.

Le toit de l'assise de grauweekes rouges est formé par une succession de lits de schiste grossier, de grauweeke et de grès fin passant quelquefois au quartzite, de couleur verdâtre clair, mêlée de taches rouges. Ces lits sont généralement très minces, ils ont peu de décimètres, parfois même quelques centimètres à peine, d'épaisseur. Près de la base, au contraire, les grauweekes et les schistes grossiers, rouge foncé, ont une stratification mal définie; ceux-ci comprennent un lit constitué presque intégralement par des moules ressemblant aux *Vexillum*; cependant, ils ont la surface couverte par des côtes transversales, ce qui porte à croire qu'ils représentent un autre type d'algue marine. Immédiatement au-dessus de ce lit, on a recueilli un échantillon de *Cruziana* cf. *Cordieri*, dans un lit de grès blanchâtre ou grauweeke subordonné aux grauweekes rouges.

Par ses caractères lithologiques et sa position stratigraphique cette assise correspond donc vraisemblablement aux poudingues et schistes rouges de Normandie, que les géologues français, presque sans exception, placent dans le toit du système cambrique; toutefois, dans le Portugal, nous ne voyons pas de motif pour séparer cette assise du système silurique¹. Il y aurait tout au plus motif pour considérer ces couches comme formant une zone distincte dans la base de ce système, mais non pour les séparer comme appartenant à un système différent.

En effet, les rapports stratigraphiques, pétrographiques et même paléontologiques, qui les lient aux quartzites en gros bancs qui leur sont immédiatement superposés, et qui sont regardés par tous les géologues comme appartenant au système silurique, sont tellement intimes, la transition, disons-nous, d'une assise à l'autre est si graduelle, qu'il serait fort difficile de les séparer, d'autant plus que la même forme de *Vexillum* (*V. Desglanndei*), qui paraît dans ces couches inférieures, monte jusqu'à celles de *Scolithus Dufrenoyi* avec lequel on la voit associée au sein de l'assise des quartzites à Bilobites; et réciproquement, comme nous l'avons déjà remarqué, de véritables *Cruziana* paraissent aussi dans le toit des couches rouges inférieures.

Par ce motif, et par la discordance absolue de stratification entre ces couches et les schistes du Précambrique supérieur, ainsi qu'entre les quartzites à Bilobites et ces derniers, sur les tranches desquels elles reposent aussi en discordance — quel que soit d'ailleurs le développement vertical des couches inférieures du Silurique dans les différents points où elles paraissent — pour tout cela, nous le répétons, nous n'avons pas séparé les grauweekes rouges pour les réunir au Cambrique supérieur; nous jugeons plutôt que toute la série représentée dans le Bussaco appartient à la même succession régulière de dépôts du système silurique, dont la formation s'est initiée dans cette région près de Penacova; c'est pourquoi il y a acquis plus d'épaisseur.

En effet, l'assise inférieure de schistes rouges montre à Penacova son plus grand développement, qui ne saurait être évalué à moins de 200 mètres de puissance; les couches y sont presque verticales et étant coupées par le Mondégo perpendiculairement à leur direction, elles s'amincissent rapidement vers le sud, et il n'en paraît plus le moindre vestige dans la serra de San Miguel de Poiars, ni dans la serra de Goes. On reconnaît donc que ces couches et les quartzites à *Scolithus* et à Bilobites, qui leur sont superposées, se formèrent pendant une période d'affaissement lent et graduel du fond de la mer. Cet affaissement marqua en Portugal le commencement de l'époque silurienne proprement dite, en permettant que les couches supérieures se soient développées dans une aire successivement plus étendue, tandis que les grauweekes rouges inférieures ont occupé un espace très restreint.

Mouvements du sol.— Pendant cet affaissement du sol, qui embrassa une vaste superficie, un mouvement en sens contraire ou d'élévation eut lieu dans le centre ou à l'est de la Beira, lequel s'est réfléchi dans les parties sud et occidentale de cette province, de sorte que les dépôts ordoviciens se montrent dans quelques points assez réduits.

Ce mouvement d'élévation, qui sans doute accompagna l'éruption diabasique, s'il n'en est même pas la conséquence, a exercé ses effets plus énergiquement dans le Bussaco, où

¹ Sir A. Geikie place dans le *Lower Silurian* (Arenig) les schistes rouges et les conglomérats sans fossiles qui forment la base du système silurique dans l'Ille-et-Vilaine. (*Text-book of geology*, 4^e édition, p. 972.)

l'action volcanique fut plus intense, et a mis à sec cette contrée, laquelle par conséquent n'a pu recevoir les dépôts de la fin de l'époque ordovicienne.

Dans le flanc occidental du synclinal du Bussaco, en prolongeant vers le S.W. la coupe que nous avons décrite, le Silurique inférieur montre beaucoup moins d'épaisseur; celle-ci diminue encore plus au sud de cette ligne, parce que les couches, ayant obéi en partie à un plissement dans la direction E.-W., postérieur au plissement général vers le N.W., lequel a produit le grand synclinal dont nous avons parlé, ont glissé les unes sur les autres parallèlement à la stratification, plusieurs d'entre elles restant cachées; de cette façon les différentes assises sont à peine représentées, sauf la plus inférieure, qui manque parce qu'elle ne s'y est pas déposée.

Diminution de l'épaisseur des couches.— Au nord de Ponte da Matta, où le Silurique inférieur, par suite de la dislocation des couches, a subi un étranglement, les couches obéissant librement au susdit plissement E.-W., montrent à peu près le même développement qu'elles ont dans la montagne du Bussaco; cependant, les assises supérieures, prises séparément, acquièrent des épaisseurs et des caractères fort différents. C'est ainsi que la diabase et les schistes diabasiques y sont représentés par une bande très étroite, et que des empreintes de *Ne-reites* paraissent dans l'assise des schistes culminants, empreintes qu'on ne découvre point dans le versant occidental du Bussaco. Ceci prouve à la fois que l'éruption diabasique s'est faite dans des eaux plus profondes et que le rivage était relativement à peu de distance vers l'ouest.

Discordance entre les deux sections du Silurique.— Tandis que dans le flanc oriental du synclinal on peut observer la superposition immédiate, avec discordance de stratification, des schistes de l'étage Gothlandien sur l'assise des schistes impurs diabasiques de l'Ordovicien, du côté occidental, au nord de Ponte da Matta, un contact anormal existe entre les deux étages siluriens, la limite étant formée en partie par une cassure irrégulière, dont la production aura été accompagnée de mouvements très compliqués. C'est pour ainsi dire une faille béante, remplie sur le coup par une brèche gigantesque, formée par d'énormes masses, ou plutôt de faisceaux des couches ordoviciennes les plus supérieures, tombées dans la large bouche ouverte par le déplacement horizontal du sol. On reconnaît, cependant, que la nappe de diabase eut de ce côté du synclinal une épaisseur incomparablement moindre, si bien qu'elle disparaît presque.

Il paraît que, dans cette localité, les couches ayant été traversées par une faille dans la direction à peu près N.-S., avec production de cassures perpendiculaires (faille dont on peut reconnaître les effets sur la carte géologique depuis la vallée du Tage jusqu'à la Galice) ont subi plus tard une forte impulsion venant du sud, qui a déplacé un des prismes qui s'étaient séparés, en faisant plonger les couches vers le nord, en même temps en entraînant dans son mouvement et étirant le long de la paroi de la faille une partie des couches supérieures du prisme suivant. Ces dernières, à Pê do Viso, en obéissant partiellement à l'impulsion reçue, sont tombées vers l'énorme bouche béante, en s'ouvrant en éventail, de sorte que les assises supérieures sont inverties, semblant reposer en concordance sur les schistes à nodules du Silurique supérieur.

Encore plus au sud, à l'ouest de Sazes, la faille établit le contact de l'Ordovicien avec le Précambrique supérieur, et à Portella d'Alagoa, au S.W. de Sazes, elle est indiquée par une

véritable brèche de friction formée par l'écrasement et la trituration des schistes ordoviciens. Le rejet vertical de la faille dans ce point peut être évalué à plusieurs centaines de mètres.

Une coupe faite à travers le flanc occidental du synclinal du Bussaco, passant à Pêdo Viso, traverse la série suivante de couches en ordre descendant.

Coupe traversant le flanc occidental du synclinal du Bussaco

Schistes culminants.—Schistes grossiers micacés, gris foncés et jaunâtres; grauwacke très micacée, blanche et jaunâtre, avec peu de lits de schiste quartzeux intercalés et quartzite gris, micacé, dur, dans quelques parties schistoïde, dans d'autres strates caverneux, divisé en lits de différente épaisseur et formant deux couches entre lesquelles les schistes restent compris. On n'a pas découvert de fossiles dans ces strates; à peine dans un petit nodule à mi-hauteur de l'assise, a-t-on pu trouver une tige de Crinoïde et des vestiges d'un Polypier.

Au-dessus de la strate de quartzite qui forme le toit de cette assise, il y a, cependant, un schiste phylladifère, dur, gris foncé et verdâtre, finement micacé, se débitant en minces plaquettes, avec peu de lits très minces de grauwacke ou de quartzite intercalés, dans lesquels on découvrit des empreintes de *Nereites* étroits, très semblables à ceux qui furent trouvés dans les schistes de Povia (Amarelleja) et de la vallée de Murtigão, sur la route de Santo Aleixo à Barrancos et appartenant peut-être au même niveau. Épaisseur 40^m.

Diabase et calcaire.—Calcaire sublamellaire, gris foncé, à taches et veines spathiques de sidérite, associé à de la diabase compacte (spilite) amygdaloïde, le calcaire montrant à sa partie inférieure des vestiges de fossiles (une glabelle incomplète et un pygidium de *Dalmanites socialis*). Épaisseur 10^m.

Schistes à *Dalmanites Dujardini*.—Schistes très micacés, gris foncé à taches blanchâtres, renfermant quelques lits très minces de quartzite et de grauwacke micacée.

Les schistes contiennent dans quelques lits des fossiles en mauvais état et peu abondants: *Dalmanites Dujardini* Rou., *D. socialis* juv. Barr.?, *Bellerophon trilobatus* Sow. var. *typus* Sandb. (= *B. bisulcatus* F. A. Roemer), *Ctenodonta*, *Orthis*. Épaisseur 32^m.

Grès de Loredó.—Quartzite gris et blanc en strates de différentes épaisseurs, parfois très micacé et schistoïde, sans fossiles. Épaisseur 47^m.

Schistes à *Homalotus (Ehlerti)*.—Schistes gris foncé à taches claires, très micacés, avec intercalations de minces lits de quartzite et de grauwacke passant au quartzite, et renfermant quelques nodules siliceux ou argilo-siliceux pour la plupart ne contenant pas de fossiles. Quelques lits de schiste sont, au contraire, très fossilifères.

Dans cette assise est comprise une couche de quartzite gris clair et de grauwacke micacée blanche avec peu de lits de schiste grossier, très micacé, intercalés. Voici la liste des principales espèces qu'on y a recueillies: *Homalotus OEhlerti* Kerforne, qui traverse l'assise dans toute son épaisseur; *Calymene Tristani* Brongn., fort abondant; *Dalmanites socialis* Barr., *D. Phillipsi* Barr., *Asaphus nobilis* Barr., *Beyrichia Bussacensis* Jones, *B. simplex* Jones, *Bellerophon trilobatus*, Sow., *Ribeiria pholadiformis* Sh., *Dolabra? Lusitanica* Sh., *Ctenodonta*, plusieurs espèces très abondantes, *Orthis fliceraei* Rou. et d'autres espèces. Épaisseur 95^m.

Schistes à *Orthis Ribeiroi*.—Schistes gris foncés et blanchâtres, très micacés et en partie grossiers, comprenant quelques lits avec fossiles assez déformés et enchâssés dans la roche. En outre de *Orthis Ribeiroi* et *Didymograptus Murchisoni*, qui sont les fossiles les plus caractéristiques de cette assise (ce dernier marquant, comme en Angleterre, un horizon spécial dans la partie inférieure de l'assise), elle renferme aussi *Calymene Tristani* Brongn., *C. Aragoi* Rou., *Placoparia Zippei* Böeck., *Dalmanites socialis* Barr., *Calix Murchisoni* Vern. et Barr. sp. et d'autres espèces. Épaisseur 46^m.

Quartzites à *Bilobites*.—Quartzite micacé, généralement blanchâtre, en partie schistoïde, divisé en strates minces, comprenant dans la partie supérieure de l'assise deux lits de quartzite bréchiforme ou grès grossier avec des restes très atténués du test de *Lingules*, et dans toute la hauteur de l'assise, des lits de quartzite schistoïde avec *Bilobites* (*Cruziana Bagnolensis* et d'autres espèces) et un lit avec *Scolithus*?

Quartzite blanc, avec taches rougeâtres dans les parties exposées aux agents atmosphériques, en gros bancs, peu micacé.

Quartzite blanc, très micacé, en partie schistoïde, formant de minces plaquettes, dans lesquelles on a découvert des *Bilobites* (*Cr. furcifera*, *Cr. Beirensis*, *Scolithus*?). Épaisseur 154^m.

Quartzites à *Scolithus*.—Quartzite en gros bancs, jusqu'à 3 mètres d'épaisseur, avec quelques lits de *Scolithus* et de *Vexillum*. Dans la partie inférieure de l'assise les couches sont si épaisses qu'il devient très difficile de reconnaître la stratification. On y a découvert *Vexillum Desglандei* et *Scolithus*. Épaisseur 256^m.

En résumé, la coupe du flanc occidental du synclinal du Bussaco montre la succession suivante:

Étages	Assises	Épaisseurs ¹
Ordovicien supérieur... (130 ^m)	Schistes culminants	40 mètres
	Diabase et calcaire.....	10 »
	Schistes à <i>Dalmanites Dujardini</i>	32 »
	Grès de Loredó.....	48 »
Ordovicien moyen (140 ^m)	Schistes à <i>Homalonotus OEhlerti</i>	95 »
	Schistes à <i>Orthis Ribeiroi</i>	45 »
Ordovicien inférieur ... (410 ^m)	Quartzites à <i>Bilobites</i>	154 »
	Quartzites à <i>Scolithus</i>	256 »
Puissance totale		680 »

Cette puissance dépasse peu un tiers de l'épaisseur des mêmes dépôts dans la serra du Bussaco, en gardant toutefois dans les étages moyen et inférieur, d'un côté et de l'autre du synclinal, les mêmes rapports proportionnels, la moitié à peu près.

¹ Ces épaisseurs ont été mesurées en suivant la direction de la coupe. Plus vers le nord ou plus vers le sud, la largeur des bandes varie beaucoup et par conséquent aussi la puissance des différentes assises. Dans une coupe faite depuis Chan da Matta de Peniz vers le nord en traversant la colline de Carvoeiro, les différentes assises montrent beaucoup plus d'épaisseur à l'égale presque de ce que l'on observe dans le flanc oriental du synclinal, en suivant la coupe du ravin du Zuvinhal traversant le Bussaco. En effet, la puissance totale de la série ordovicienne, d'après cette coupe, peut être évaluée à plus de 1.000 mètres, exception faite des grès rouges inférieurs, qui ne paraissent, comme nous l'avons dit, que dans la serra du Bussaco.

Description détaillée de la coupe précédente

Coupe de Casqueira à Pê do Viso¹

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR (Cb¹)

1. Schiste fin, gris, micacé, avec du mica en paillettes très fines que l'on aperçoit difficilement à l'œil nu, et schiste verdâtre clair et violet, traversé par de nombreuses veinules très minces (moins d'un millimètre) d'oxyde de fer qui s'entre-croisent de mille manières. Ces schistes forment des couches généralement très épaisses, qui plongent vers N. 52° E.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Quartzites à Scolithus

2. Quartzite fin, compact, blanc, avec les lamelles de mica fort minces, clairsemées, et grès fin, très dur, passant au quartzite, de couleur violet clair taché de blanc. Ce complexe forme des bancs épais de 2 centimètres à 1 mètre, la partie inférieure contenant quelques bancs de 2 à 3 mètres d'épaisseur et d'autres encore plus puissants, dans lesquels il est extrêmement difficile de distinguer les plans de la stratification. Plongement des strates 40 à 50° vers le N. N. E.

Vexillum Desglandei Rou.

Scolithus Dufrenoyi Rou.

3. Quartzite compact et grès fin, dur, avec des moules de *Scolithus Dufrenoyi* et de *Vexillum Desglandei*, ceux de *Scolithus* étant très grêles, de 1 à 2 millimètres de diamètre, fort abondants. Les strates ont de 20 centimètres à 1^m,40 d'épaisseur; ils ont des directions variées et plongent de 40 à 50° vers le N. N. E.

Quartzites à Bilobites

4. Quartzite fin, compact, gris clair, en lits minces peu réguliers, de 1 à 22 cent. d'épaisseur. Quelques lits renferment des moules de Bilobites. Un autre lit, de quartzite polygénique, contient plusieurs petits cailloux roulés de différentes roches quartzieuses. On a recueilli les espèces suivantes:

Cruziana furcifera d'Orb.

Cruziana Lebescontei Delg.

» *Beirensis* Delg.

Foralites gracilis Delg.

— Couvert sur 23^m,50 d'extension.

5. Quartzite blanc, très micacé, en partie schistoïde, avec muscovite, formant des lits minces de 1 à 20 centimètres d'épaisseur, se divisant en plaquettes de peu de millimètres, à surface irrégulière. Ces plaquettes sont couvertes de paillettes de mica dans une telle abondance que par leur réunion elles forment comme une pellicule. Ce massif renferme quelques moules de Bilobites parfaitement empâtés dans la roche et indéterminables. Plongement des strates vers le N. N. E.

6. Quartzite blanc taché de rougeâtre, peu et très irrégulièrement micacé, en lits épais de 10 à 82 centimètres. On n'a pas découvert de fossiles dans cette couche. Plongement 40 à 50° vers le N.

7. Quartzite en lits peu réguliers, épais de 2 à 40 centimètres, en partie schistoïde, très micacé à la surface des lits et des plaquettes irrégulières qui les forment. A la partie supérieure du massif il y a quelques lits très minces de quartzite schistoïde avec des moules de Bilobites, parmi lesquels j'ai reconnu *Cruziana Bagnolensis* Morière. Plongement des strates vers le N. N. E.

¹ Cette coupe commence à 300 mètres au S. E. du hameau de Casqueira et passant au S. de Zuvinhoiro va se terminer à Azenha do Lagar, près Ponte da Matta.

8. Quartzite fin, de couleur claire ou blanchâtre, traversé par des veinules de quartz blanc, en partie schistoïde et très micacé, se débitant en minces plaquettes, peu régulières, dont la surface est couverte de paillettes de mica. A la partie supérieure de cette couche il y a deux lits d'un quartzite bréchiforme ou grès grossier, de couleur brunâtre, avec débris très menus de test de Brachio-podes (Lingules). Plongement de 40 à 50° vers le N. E.

Schistes à *Orthis Ribeiroi*

9. Schistes fins, gris foncé et blanchâtre, partiellement très micacés par l'inégale distribution du mica. Quelques lits contiennent des fossiles, tous à l'état de moules, ordinairement très déformés et empâtés dans le schiste. Les lits les plus inférieurs sont les plus fins et doux, ils ont une teinte blanchâtre ou gris clair avec taches jaunâtres ocracées et ils sont les plus fossilifères. Plongement des strates vers N. 10° E.

Calymene Tristani Brongn.

» *Aragoi* Rou.

Homalonotus Bohemicus Barr., deux glabelles
uniques. R.

Placoparia Zippei Böck.

Dalmanites socialis Barr.

Asaphus glabratus Sh.?

Ogygia sp.

Illaenus sp.

Orthoceras ind.

Beyrichia Bussacensis Jones.

» *simplex* Jones?

Hyolithes cf. *elegans* Barr.

Conularia nobilis Barr., un fragment.

Redonia Duvaliana Rou.

» *Deshayesiana* Rou.

Ctenodonta Beirensis Sh.

» *Ciae* juv. Sh.

Bivalves ind.

Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr.

Orthis Ribeiroi Sh. F.

» cf. *calligramma* Dalm.

» *testudinaria* Dalm. (non *O. testudinaria* Vern. et Barr.)

Lingula ind.

Didymograptus Murchisoni Böck. F.

Calix (*Echinospaerites*) *Murchisoni* Vern. et Barr.

Crinoïde, moule interne d'un fragment de tige très grêle.

Schistes à *Homalonotus Ehlerti*

10. Schistes très micacés, gris foncé et gris clair, contenant des lits de grès fin, très micacé, dur, passant au quartzite, et de quartzite épais de 2 à 28 centimètres. Ils comprennent quatre lits fossilifères, dans le plus inférieur paraissent les *Homalonotus*. Les fossiles sont très rares et presque tous indéterminables. Plongement 50 à 60° vers N. 10° E.

Homalonotus (*Plaesiacomia*) *Oehlerti* Kerf.

Trilobite ind.

Ctenodonta sp.

Orthis sp.

11. Quartzite gris clair et grès fin, dur, passant au quartzite, très micacé, blanc, en lits épais de 5 à 60 centimètres, ayant intercalés quelques lits de schiste grossier, très micacé, bien stratifié, en lames alternantes, gris foncé et gris clair, sans fossiles. Plongement 50 à 60° vers N. 12° E.

12. Schiste argileux, très micacé, gris foncé avec taches claires, renfermant beaucoup de fossiles dans toute l'épaisseur du massif, principalement des moules de petites bivalves qui jonchent littéralement la surface de quelques lits. Ce schiste contient aussi quelques petits nodules argileux, durs, à formes irrégulières, quelques-uns avec fossiles. On n'a pu préciser la direction des strates, on voit pourtant qu'elles plongent dans le même sens que les couches précédentes.

Calymene Tristani Brongn. f.

Illaenus Hispanicus Vern. et Barr.

Asaphus nobilis Barr.

» sp. n., avec une petite pointe au
pygidium.

Homalonotus Oehlerti Kerf. f.

Dalmanites socialis Barr. F.

» *Phillipsi* Barr. f.

» sp., hypostome d'une autre espèce.

Beyrichia simplex Jones.

» *Bussacensis* Jones.

Orthoceras sp.

Bellerophon bilobatus Sow.

» *acutus* Sow.

Conularia Bohemica Barr.

Hyolithes elegans Barr.

Pleurotomaria Bussacensis Sh.

Ribeiria pholadiformis Sh.

Dolabra Lusitanica Sh.

Leda aff. *decurtata* Barr.

Ctenodonta Costae Sh.

» *Beirensis* Sh.

» *Ciae* Sh.

» *Ribeiroi* Sh.

» cf. *dispar* Barr.

Redonia Bohemica Barr.

» *Duvaliana* Rou.

Synek antiquus Barr.

Cypricardia Beirensis Sh.

Orthis testudinaria Dalm.

» *elegantula* Dalm.

» *Berthoisi* Rou.?

» *fliceraei* Rou.

Lingula longissima Pander.?

» sp.

Crinoïde, empreintes circulaires d'articles de la tige, d'un millimètre de diamètre.

13. Schiste gris foncé, par places très micacé, avec des taches gris clair et jaunâtres par suite d'un commencement d'altération superficielle. Il contient de nombreux lits de grès fin, très dur, passant au quartzite, épais de 2 à 35 centimètres, où les fossiles sont principalement accumulés. Dans un lit les fossiles (surtout des glabelles, des pygidiums et des débris de segments du thorax de *Calymene Tristani*) sont très abondants, formant comme une *lumachelle*, où les fossiles se trouvent confusément entassés. Le schiste contient en outre quelques petits nodules, qui n'ont point fourni de fossiles déterminables. Plongement de 40 à 50° vers N. 16° E.

Calymene Tristani Brongn. F.

Dalmanites socialis Barr. f.

Beyrichia simplex Jones.

» *Bussacensis* Jones.

Cyrtoceras sp.

Orthoceras sp.

Bellerophon trilobatus Sow. var. *typus* Sandb.

Dolabra Lusitanica Sh.

Ctenodonta Beirensis Sh.

» *Ciae* Sh.

Ctenodonta Ribeiroi Sh.

» *Costae* Sh.?

Synek antiquus Barr.?

Ribeiria pholadiformis Sh.

Orthis fliceraei Rou.

» *testudinaria* Dalm.

Lingula sp.

Crinoïde, empreintes circulaires de petit diamètre, d'articulations et fragments de tiges.

Grès de Loredó

14. Quartzite gris et blanc, par places schistoïde et très micacé, formant des lits de 10 à 60 centimètres d'épaisseur, qui se divisent en plaquettes très minces, à surface plane par l'interposition de feuillets argileux. Plongement 70° vers le N.N.E.

15. Schiste micacé, couleur gris foncé avec taches blanchâtres et jaunâtres ocracées, ayant intercalés à la partie supérieure du massif quelques lits minces, de 2 à 10 centimètres d'épaisseur, de schiste gréseux très dur, ou grès fin très micacé, gris foncé. Le schiste contient des fossiles peu abondants et en mauvais état, irrégulièrement distribués, écrasés et parfaitement empâtés dans la roche.

On n'a pas pu fixer la direction des strates, on voit pourtant qu'elles plongent faiblement vers le quadrant de S.W. On a recueilli dans cette assise:

Dalmanites Dujardini Rou.

» *socialis* juv. Barr.

Beyrichia simplex Jones.

» *Bussacensis* Jones.

Bellerophon trilobatus Sow. var. *typus* Sandb.

» *expansus* juv. Sow.?

Ctenodonta Bussacensis Sh.

» *Ciae* Sh.?

Orthis redux Barr.

Lingula ind.

Crinoïde.

Calcaire et diabase

16. Diabase et calcaire compact et sublamellaire, gris foncé, sans la moindre trace de stratification, montrant dans la cassure beaucoup de facettes brillantes, spathiques, avec des taches et veines blanchâtres de fer spathique, auquel il fait transition. A la base du massif, c'est-à-dire près du schiste précédent, le calcaire contient des restes de fossiles; on y a découvert une glabelle et un pygidium de *Dalmanites socialis* et trois moules de *Beyrichia*?

Couches culminantes

17. Schiste dur, fissile, gris foncé, plus ou moins micacé, se divisant en plaquettes de peu de millimètres d'épaisseur, avec quelques lits subordonnés, de quartzite schistoïde, très micacé, épais de 2 à 10 centimètres, de même couleur gris foncé. Quelques lits du schiste présentent des traces de *Nereites* ou *Phyllodoites* semblables à celles des schistes de Pova, à l'ouest d'Amarelleja, et de la rivière de Murtigão, sur la route de Santo Aleixo à Barrancos. A la surface d'un de ces lits on remarque l'ondulation ou crépi analogue à celui produit par les vibrations de l'eau sur les plages sableuses humides lorsqu'elles sont couvertes par une couche d'eau très mince. Le même phénomène a été aussi observé, comme nous verrons plus loin, sur une dalle de schiste dans une carrière près de Barrancos. Plongement des strates faible vers le S. S. W.

18. Quartzite fin, blanc, peu micacé, quartzite schistoïde, gris, très micacé, et grauwaacke ou grès fin, très micacé, blanc et jaunâtre par commencement d'altération, formant des lits alternants de 2 à 35 centimètres d'épaisseur, avec intercalations de lits et feuillets de schiste quartzeux, très micacé. Sans fossiles. Plongement faible vers le S.

19. Schiste grossier, micacé, gris foncé ou jaunâtre, avec des concrétions dures, siliceuses, ou petits nodules irréguliers, où l'on a découvert l'empreinte d'un Crinoïde et des traces d'un Polypier?. Plongement faible vers le S.

20. Quartzite compact, gris, dur, très micacé, en lits épais de 2 à 45 centimètres, ayant quelques lits intercalés de schiste très micacé, gris foncé et blanchâtre. Le quartzite est parfois caverneux et paraît contenir des traces de fossiles. Plongement faible vers le S.

Remarques sur les coupes décrites. — En considérant spécialement les couches les plus supérieures de l'Ordovicien du Bussaco, on remarque une profonde dissemblance entre les deux coupes que nous avons décrites; du côté occidental du synclinal paraît un faisceau de couches, qui n'est pas représenté dans le versant du Bussaco, ou bien s'il y existe, les roches sont totalement métamorphosées, étant comprises dans la bande des schistes diabasiques. Au contraire, ces derniers, qui ont un développement énorme dans le flanc oriental du synclinal, ne sont pas représentés dans la coupe de Pê do Viso; il semble qu'ils y sont remplacés par le groupe des schistes culminants, dont nous avons parlé.

Quoiqu'il en soit, l'extrême variabilité de caractère des roches de l'assise supérieure, que nous avons désignées sous le nom de «schistes diabasiques» nous porte à la conviction qu'elles ne furent pas formées en conditions normales, c'est-à-dire, qu'elles ne doivent pas leur existence simplement à des phénomènes de déposition chimique, ou de sédimentation mécanique; on ne saurait non plus juger que leurs caractères lithologiques, contrastant avec ceux de toutes les autres couches siluriennes en dessus ou en dessous de ce niveau, dépende de phénomènes de métamorphisme dûs au voisinage de la diabase, quoiqu'elles semblent être en dépendance intime de cette roche éruptive, puisque c'est seulement là où elle paraît, que l'on observe ce groupe de couches¹.

¹ Dans le mémoire de Carlos Ribeiro et Daniel Sharpe: *On the Carboniferous and Silurian Formations of the neighbourhood of Bussaco in Portugal*, ces couches sont désignées sous le titre de «couches de Porto de Sant'Anna» du nom de la localité où elles furent d'abord reconnues, et constituent la *Middle Division of the Silurian Formation*, ou division supérieure des couches siluriennes inférieures; la diabase (*greenstone or diorite*) est regardée comme ayant exercé une action métamorphique et perturbatrice sur les schistes siluriens qu'elle traverse, et par conséquent réputée d'âge post-silurien; or, cette supposition est, selon nous, manifestement erronée.

Formation des schistes diabasiques.—La composition des schistes diabasiques et l'examen attentif du sol qu'ils forment, renfermant dans leur sein plusieurs lentilles, plus ou moins grandes et même des strates continues des schistes à *Dalmanites Dujardini* avec leurs caractères typiques, le passage des premiers à ceux-ci par une transition graduelle, et encore les coulées de diabase formant des masses concordantes avec la stratification des schistes, tout cela démontre que, pendant la période de formation des schistes à *Dalmanites*, alors que les courants transportaient les sédiments vaseux pour leur formation, des éjections volcaniques venant par intermittence en plusieurs points du fond de la mer, ont étendu des nappes plus ou moins considérables de la roche éruptive, qui a fourni par sa désagrégation, conjointement avec les cendres et sables volcaniques qui sortaient des mêmes bouches d'éruption, une partie importante des matériaux des couches qui se formèrent à cette époque-là.

Formation des calcaires.—En ce qui concerne le calcaire, il ne paraît ni dans le Silurique supérieur, ni sur le flanc oriental du synclinal près de la ligne limite des deux étages siluriens, comme c'est le cas du côté occidental, où, au contraire, il se trouve évidemment compris dans le groupe des couches les plus supérieures de l'Ordovicien. Il est donc très plausible de supposer que sa formation appartienne exclusivement à cet étage plus ancien, comme l'indiquent d'ailleurs les fossiles trouvés dans le même calcaire, ainsi que dans les couches argileuses et quartzo-argileuses, contemporaines de cette roche.

C'est dans le voisinage de Penacova que les masses de calcaire sont le plus développées. Par leurs grandes dimensions elles représentent de grandes accumulations de cette substance dans des espaces limités du fond de la mer, où se déposaient en même temps les schistes qui les accompagnent et qui appartiennent à la même assise. On ne peut pourtant pas comprendre que le calcaire, qui forme des masses aussi volumineuses, dont l'une dépasse 600 mètres de longueur sur 100 mètres de largeur, et séparées les unes des autres, ait été entraîné en dissolution dans les eaux conjointement avec les sédiments vaseux; ainsi l'idée de récifs coralliens s'impose immédiatement à l'esprit. En effet, on ne saurait attribuer à ces masses la même origine qu'ont les nodules calcaires des ampélites du Silurique supérieur.

Près de Cássemes et aussi près du hameau de Estrada (Penacova) on trouva des masses de calcaire subordonnées aux schistes diabasiques. Ce calcaire est dolomitique, compact, par places caverneux, ayant des parties spathiques, comme dans la vigne de Leira Mã, près de Porto de Sant'Anna, où il contient des restes de Polypiers, de Bryozoaires, d'Echinodermes (Cystidées), de Brachiopodes, et très peu de Gastropodes et d'Acéphales. On ne voit ces fossiles que dans la croûte extérieure, altérée, des masses de calcaire; dans la partie intérieure de celles-ci, où la roche est compacte et saine, on ne peut pas découvrir les fossiles.

Dans quelques points près de Penacova, les masses de calcaire se changent inférieurement en un lit de marne verdâtre bien stratifié, renfermant aussi des fossiles: Cystidées (Echinospaerites), Polypiers, Brachiopodes, Echinodermes (Blastoidea), qui sont tous remplacés par de la dolomite.

Nous concluons, donc, que les différentes masses de calcaire, qui paraissent alignées dans le sens de la stratification au milieu des schistes diabasiques, sont d'origine organique et représentent des récifs isolés, comme les îles de coraux des mers actuelles, qui se formèrent dans le fond de la mer ordovicienne durant la phase de déposition des schistes micacés à

Dalmanites Dujardini. Toutefois, quelques petites masses de calcaire ferrugineux, voire de sidérite, qui paraissent aussi intercalées dans les schistes diabasiques, précisément là où ils se montrent le plus fossilifères, furent peut-être formées par la précipitation, au sein des eaux, de la matière qui les compose et qui s'y trouvait dissoute, par la présence de matière organique abondante en décomposition, provenant naturellement de ces mêmes organismes.

Sources minérales en liaison avec l'éruption diabasique.—Des sources jaillissantes therminérales, chargées de silice et de sels magnésiens, ont contribué aussi en grande partie à la formation des dépôts culminants du Silurique inférieur du Bussaco, marquant la dernière période d'activité volcanique représentée par l'épanchement des diabases.

Ces sources éruptives, d'eaux chaude et de vapeur, ont produit d'une part la dolomitisation des calcaires, qui sont tous plus ou moins dolomitiques, et en partie transformés même en une véritable dolomie saccharoïde, caverneuse, parfaitement caractéristique, où l'on ne découvre aucun vestige de fossiles; d'autre part elles ont causé la précipitation de la silice, à laquelle est due la formation d'une silicite calcarifère, de la silicite cornéenne (Hornstein), d'un quartzite jaspoïde et d'une argilo-silicite; ces roches sont toutes contemporaines du calcaire; elles furent formées soit par un procès analogue à celui des dépôts des geysers d'Islande et de Yellowstone¹, ou des sources geysériennes du Valle das Furnas dans notre île de San Miguel (Açores), soit par métamorphisme d'une roche argileuse (calcaire marneux ou schiste argileux) par des eaux thermales contenant de la silice en dissolution².

Doit-on attribuer la même origine hydrothermale à certains minéraux accidentels, comme la pyrite et l'oxyde de fer, qui imprègnent fortement quelques-unes de ces roches et dont la formation ne peut s'expliquer que par l'intervention de sources minérales chargées de carbonate de fer, qui auraient aussi accompagné le phénomène éruptif?

C'est dans le voisinage de la diabase, ou plutôt dans le schiste impur diabasique, que les fossiles se montrent en plus grande abondance. Il semble donc que les conditions biologiques locales n'étaient favorables au développement de la vie que dans les intervalles où l'action des sources minérales était plus affaiblie et en des points situés à une certaine distance des foyers éruptifs, où la roche formée est le résultat du mélange des sédiments constitutifs des schistes normaux avec les débris des roches volcaniques et aussi en partie avec les produits des sources minérales.

En confirmation des idées que nous venons d'exposer, il existe à Cássemes, comprise dans cette assise supérieure de l'Ordovicien et en contact avec la roche éruptive, une couche de tuf, constitué surtout de débris de la diabase, de schiste vert et de fragments de Polypiers roulés; c'est vraiment une roche d'agglomération, formée sans doute au milieu d'eaux tumultueuses, comme devraient l'être celles où se fit l'émission trappique et geysérienne.

Extinction de la faune ordovicienne.—Les forts courants, qui vraisemblablement accompagnèrent les mouvements du sol concomitants de ces phénomènes volcaniques précurseurs de

¹ «Yellowstone National Park» dans la partie N.W. du territoire de Wyoming, U. S. A.

² Ces roches ont toutes été étudiées au microscope par mon collègue Mr. Souza-Brandão; les conclusions auxquelles il est parvenu, s'accordent avec l'hypothèse que j'avais déjà formulée longtemps auparavant, c'est-à-dire, que plusieurs de ces roches furent formées par précipitation chimique, ayant l'origine hydrothermale.

l'extinction de la faune ordovicienne, ont dû suspendre temporairement la formation des dépôts sédimentaires dans cette localité, tout en opérant, au contraire, la dénudation des dépôts formés antérieurement. Ainsi, nous jugeons que par cette manière, la faune seconde s'est éteinte dans cette contrée; et la vie animale, façonnée sous un nouveau plan, vint plus tard s'y manifester, ayant pourtant laissé au sein des dépôts culminants du Silurique inférieur les premiers représentants de cette faune, qui seulement plus tard parvint à se fixer définitivement dans nos mers.

Dans le Bussaco le terme de l'époque silurienne inférieure est annoncé par l'apparition soudaine d'un grand nombre d'espèces nouvelles et d'autres qui vraisemblablement vivaient alors dans les mers siluriennes du nord, car plusieurs d'entre elles ont là leurs représentants. Ces espèces se sont mêlées dans la même strate avec les espèces de la faune seconde, qui était encore florissante dans cette contrée.

C'est dans le groupe du Niagara, rapporté par J. Hall à son *Middle Silurian*, que nous trouvons le plus grand nombre d'espèces représentatives ou analogues de celles qui firent irruption dans la mer silurienne du Bussaco à la fin de l'époque ordovicienne.

En vue des faits que nous venons d'exposer on restera, cependant, dans le doute quant à une véritable émigration d'espèces d'une contrée quelconque dans celle du Bussaco, où elles paraissent inopinément. On se demandera si ce n'est pas plutôt les conditions spéciales de la sédimentation, ou les conditions biologiques spéciales créées par les émanations geysériennes, qui ont originé les conditions propres au développement de ces espèces. Quoiqu'il en soit, on ne saurait nier l'influence prédominante du milieu ambiant pour expliquer cette subite variation dans la composition de la faune, qui se manifesta à la fois par l'adjonction d'un grand nombre d'espèces nouvelles, et par la disparition presque totale de celles qui les ont immédiatement précédé dans cette contrée.

Terme de la période ordovicienne dans le Bussaco.—En conclusion: le terme de l'époque silurienne inférieure dans le Bussaco fut marqué par une grave et longue perturbation stratigraphique, pendant laquelle il y eut une importante émission diabasique, accompagnée de l'apparition de sources minérales jaillissantes et suivie d'une forte dénudation.

Cette émission s'est faite principalement pendant la phase de formation de l'assise de schistes très micacés à *Dalmanites Dujardini*, s'étant initiée toutefois bien auparavant, à la fin de la phase de déposition des quartzites à Bilobites. On observe ce fait près du hameau de Villa Nova, à l'est de Penacova, sur le flanc gauche du Mondégo, où l'on a découvert, au milieu des quartzites en lits minces, à une vingtaine de mètres au-dessous du mur des couches à *Orthis Ribeiroi*, un petit affleurement de roche éruptive très altérée (gabbro ou diabase).

Cet affleurement représente donc le commencement de l'action volcanique, qui se manifesta avec plus d'intensité dans les phases postérieures de l'Ordovicien, ayant son plus grand développement à la phase du dépôt des couches à *Dalmanites Dujardini*.

La durée de l'éruption volcanique n'a pas dépassé toutefois dans cette contrée la fin de l'époque ordovicienne; elle se trouve par conséquent comprise dans des limites bien définies.

La contemporanéité des roches éruptives et des roches sédimentaires est prouvée par plusieurs faits que nous avons cités, et en outre par leur constante apparition au même horizon stratigraphique dans toute l'étendue de l'affleurement du Silurique. Là, il nous semble voir,

sous un aspect un peu différent, le phénomène observé par Barrande en Bohême, où la masse sédimentaire qui renferme les colonies, est aussi associée à des coulées de trapp.

Horizon des *Didymograptus*.—A 570 mètres à l'est de la chapelle de Loredò, justement au contact des quartzites à *Bilobites* en lits minces de la serra du Bussaco, une faune variée fut rencontrée dans un schiste très fin et mou, finement micacé, gris noir taché de blanchâtre, qui forme le mur de l'assise schisteuse de l'Ordovicien moyen. Cette faune est caractérisée principalement par la présence de *Didymograptus Murchisoni*; en outre des Graptolites, elle se compose de diverses espèces de Trilobites, de Lamellibranches et de quelques Brachiopodes. Les Trilobites sont peu nombreux et presque tous de petite taille, montrant que les conditions biologiques n'étaient pas alors bien favorables à leur développement. La même observation peut se faire par rapport à quelques bivalves. Cette faune doit être l'équivalent de celle du niveau supérieur de l'assise à *Didymograptus* de Vallongo, les deux niveaux moyen et inférieur qui sont représentés dans cette localité manquant au Bussaco.

Voici la liste des espèces:

<i>Iliaenus</i> sp., un petit exemplaire, très probablement <i>I. Lusitanicus</i> juv. Sh.	<i>Hyolithes</i> sp.
<i>Asaphus glabratus</i> Sh. f.	<i>Redonia Duvaliana</i> Rou. F.
» sp., de dimensions considérables.	<i>Dolabra Lusitanica</i> Sh.
<i>Calymene Tristani</i> juv. Brongn.	<i>Cypricardia Beirensis</i> Sh.
» <i>Aragoi</i> juv. Rou. f.	<i>Ctenodonta</i> sp.
<i>Dalmanites socialis</i> juv. Barr.	<i>Sanguinolites Pellicoi</i> juv. Vern. et Barr.
<i>Beyrichia Bussacensis</i> Jones.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
» <i>simplex</i> Jones.	» <i>calligramma</i> Dalm.
<i>Orthoceras duplex</i> Wahl.?	<i>Obolus</i> aff. <i>Davidsoni</i> Sow.? R.
	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Böeck.
	» <i>nanus</i> Lapw.
	<i>Bryozoa</i> .

TABLEAU DES ESPÈCES DU SILURIQUE INFÉRIEUR (SÉRIE ORDOVICIENNE) DU BUSSACO

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen		Ordovicien inférieur	
	Schistes culminants et schistes diabasiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à Dalmanites Dujardini	Grès de Lored	Schistes à Homalonotus (Ehleri)	Schistes à Orthis Riberol	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
CRUSTACEA							
Ichthyodorulites ou Ceratiocaris?	..	..	+				
Ceratiocaris? (voyez C. Sharyi Barr.)	+						
Myocaris lutraria Salter	..	..	..	..	..	+	
Acidaspis Buchi Barr.	..	..	..	+	+		
Areia Bussacensis sp. n.	+						
Asaphus nobilis Barr.	+	..	..	+	?		
» ou Ogygia sp. n.	..	..	..	+	+		
Calymene Tristani Broun.	..	..	+	+	+	+	
» » var. (avec les sillons de la glabellule effacés)	..	..	..	+	+		
» Aragoi Rou.	+	..	+	+	+		
» pulchra Barr.	+	..	+	..	+		
» transiens Vern. et Barr.	..	..	..	+			
» Costai sp. n. (aff. C. incerta Barr.)	+						
Cheirurus gryphus Barr.	+						
» claviger Beyr.	+	..	..	..	+		
» globosus Barr.	+						
» Bocagei sp. n.	+						
» Venceslasi sp. n.	+						
» cf. tumescens Barr.	+						
» aff. verrucosus Brögger.	+						
Choffatia Loredensis gen. et sp. n.	+						
Dalmanites socialis Barr.	+	+	+	+	+		
» » var. proaeva Emmer.	+						
» » var. grandis	..	..	..	+			
» Dujardini Rou.	..	+	+	+			
» Phillipsi Barr.	..	+	..	+			
» Vetillarti Rou.	..	..	..	+	+		
» cf. Angelini Barr.	+						
Homalonotus Bohemicus Barr.	..	..	..	..	+		
» (Plaesiacomia) Oehlerti Kerforne	..	+	..	+	+		
» » brevicaudata Desl. sp.	..	..	..	+	+		
Illaenus Hispanicus Vern. et Barr. (I. giganteus Burm., forme large)	..	..	..	+	+		
» Lusitanicus Sh. (I. giganteus Burm., forme longue)	..	..	..	+	?		
» Loredensis sp. n.	+						
» cf. Panderi Barr.	+						
» aff. Murchisoni Salt.	..	+					
» aff. Bouchardi Barr.	..	..	+				
» Lorioli sp. n.	+						
Lichas Heberti Rou.	..	..	..	+			
» cf. incola Barr. (L. incola var.)	+						
» aff. convexus Angelin.	+						
Ogygia glabrata Sh.	?	..	..	+	+		
» sp.	..	..	..	..	+		
Placoparia Zippei Bæck. (Pl. Tourneminei Rou., non Pl. Zippei Barr.)	..	..	+	+	+		
Proetus Loredensis sp. n.	+						
Phillipsia parabola Barr.	+						

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen	Ordovicien inférieur		
	Schistes culminants et schistes diabasiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à Dalmanites Dujardini	Grès de Loredó	Schistes à Homalotus OEhlerti	Schistes à Orthis Ricci	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
Remopleurides (Caphyra) Lorioli sp. n.	..	..	..	+			
Trinucleus Bureaui OEhlert	+	+	+				
» Goldfussi Barr.	+	+					
Beyrichia Bussacensis Jones	..	+	+	+	+		
» simplex Jones	+	+	+	+	+		
» major sp. n.	+						
Plumulites fraternus Barr.	..	+					
» cfr. Bohemicus Barr.	+						
CEPHALOPODA							
Lituites intermedius Vern. et Barr.	..	+					
Orthoceras bonum Barr.	+						
» cf. expectans Barr.	..	..	..	+			
» aff. Bohemicum Barr.	+						
» aff. probum Barr.	+						
» cf. sodale Barr.	+						
» ind., plusieurs espèces	+	+	..	+	+		
Endoceras duplex Wahlbg. sp.	..	..	..	..	+		
» vaginatus Schloth.	..	..	..	+			
Cyrtoceras sp.	..	..	..	+			
PTEROPODA							
Hyalolithes elegans Barr.	..	..	..	+	+		
» Beirensis Sh.	..	+	+	+			
» cinctus Barr.?	..	+					
» cf. elongatus Barr.	..	+					
» cf. indistinctus Barr.	..	+					
» cf. simplex Barr.	..	..	..	..	+		
» cf. striatulus Barr.	+	..	..	..			
Conularia nobilis Barr.	+	..	?	..	+		
» fecunda Barr.	..	..	..	..	+		
» Bohemica Barr.	..	+	..	+			
» tenuistriata sp. n.	..	..	..	..	+		
» aff. simplex Barr.	+						
HETEROPODA							
Bellerophon acutus Sow.	..	+	+	+	+		
» aff. acutus Sow. (cf. an sp. n.)	..	+					
» trilobatus Sow.	..	+	+	+			
» bilobatus Sow.	..	+	..	+			
» expansus Sow.	..	+	?				
» elongatus Portl.	..	+					
» Lebescontei Trom.	..	..	..	+	+		
» cf. carinatus Sow.	..	+					
» sp. (voyez Buccania angustata Hall)	+						
GASTROPODA							
Ribeiria pholadiformis Sh.	..	..	..	+			
» OEhlerti sp. n.	..	..	..	+			
Natica aff. ampullacea Eichw.	+						

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen		Ordovicien inférieur	
	Schistes culminants et schistes diabasiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à Dalmanites Dujardini	Grès de Loredó	Schistes à Homalotus (Ehleri)	Schistes à Orthis Ribeiroi	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
<i>Natica</i> ind., 2 espèces	+						
<i>Platyostoma</i> cf. <i>Niagarensis</i> Hall.	..	+					
» ? sp.	+						
<i>Euomphalus</i> cf. <i>carinatus</i> Sow.	+						
<i>Trochonema</i> sp.	+						
<i>Holopea</i> cf. <i>paludiniiformis</i> Hall.	+						
» cf. <i>symmetrica</i> Hall.	+						
» cf. <i>obliqua</i> Hall.	+						
» <i>ventricosa</i> Hall.	+						
» sp. (voyez <i>Natica denudata</i> Eichw.)	+						
» ou <i>Cyclonema</i> ? sp.	+						
<i>Straparollus</i> ? sp.	+						
<i>Murchisonia</i> sp.	..	..	..	+			
<i>Pleurotomaria</i> <i>Bussacensis</i> Sh.	+						
» aff. <i>lenticularis</i> Hall.	?	+	+	+	+		
<i>Subulites</i> ? (voyez <i>S. Psyche</i> Billings)	+						
<i>Cyclonema</i> aff. <i>crebristria</i> McCoy	+						
» cf. <i>ventricosa</i> Hall.	+						
» sp. (voyez <i>Natica prisca</i> Eichw.)	+						
» sp. (voyez <i>Turbo trimarginatus</i> Eichw.)	+						
» aff. <i>sulcata</i> Hall.	+						
LAMELLIBRANCHIATA							
<i>Orthonota britannica</i> Rou. (<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.)	..	..	..	+	+	+	
<i>Tellinopsis</i> , 2 espèces	..	..	..	+			
<i>Dceruska primula</i> Barr.	..	..	..	+			
<i>Synech antiquus</i> Barr.	..	..	..	+			
<i>Dolabra</i> ? <i>Lusitanica</i> Sh.	..	..	+	+	+	+	
<i>Redonia Duvaliana</i> Rou. (<i>R. Bohemica</i> Barr., forme large)	..	..	..	+	+		
» <i>Deshayesiana</i> Rou.	..	..	..	..	+		
» <i>Bohemica</i> Barr.	..	..	..	+			
<i>Leda Escosurae</i> Sh.	..	+	+	+	+		
» <i>incola</i> Barr. (<i>L. Escosurae</i> Sh. var.)	..	+					
» <i>Bohemica</i> Barr.	..	..	..		+		
» cf. <i>bilunata</i> Barr.	..	..	..	+			
» aff. <i>decurtata</i> Barr.	..	..	..	+			
<i>Ctenodonta</i> cf. <i>librans</i> Barr.	..	..	..	+			
» <i>Costae</i> Sh.	+	+	?	+	+		
» <i>Ciae</i> Sh.	+	+	+	+	+		
» <i>Bussacensis</i> Sh.	..	+	+	?	+		
» <i>Ribeiroi</i> Sh.	+	+	+	+			
» <i>Beirensis</i> Sh.	..	+	..	+	+		
» <i>Ezquerra</i> Sh.	..	+	..	+	+		
» <i>Eschwegii</i> Sh.	..	+	..	?	+		
» <i>Maestrei</i> Sh.	..	+					
» » var.	..	+					
» <i>erratica</i> Trom. (<i>C. Bertrandi</i> Salt., non <i>Nucula Bertrandi</i> Rou.)	..	..	..	+	+		
» cf. <i>dispar</i> Barr.	..	..	..	+	+		
» sp. n. aff. <i>Costae</i> Sh.	..	..	..	+			
<i>Cypricardia Beirensis</i> Sh.	..	+	+	+	+		
<i>Arca Kosoviensis</i> Barr.?	..	..	+				
» <i>Naranjoana</i> Vern. et Barr.	..	..	..	..	+		

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen		Ordovicien inférieur	
	Schistes culminants et schistes diabasiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à Dalmanites Dujardini	Grès de Lored	Schistes à Homalotus Ehlerti	Schistes à Orthos Riberi	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
<i>Modiolopsis elegantulus</i> Sh.?	..	..	..	+	?		
» cf. <i>obliquus</i> Salt. (½ an <i>Cyrtodonta</i> sp.)	..	..	+				
» cf. <i>Armorici</i> Salt. (id.)	..	..	..	+	+		
» (<i>Astarte</i> ?) <i>convergens</i> Barr. sp.	..	..	+	..	+		
» aff. <i>Veterana</i> Barr.	+						
<i>Mytilus</i> cf. <i>Budnianus</i> Barr.	+						
Bivalves ind., plusieurs espèces	..	..	..	..	+		
BRACHIOPODA							
<i>Stringocephalus</i> sp. [cf. <i>Orthos</i> (<i>Strophomena</i>) <i>Vicaryi</i> Dav.]	+						
<i>Rhynchonella</i> <i>nucula</i> Sow. (<i>Hypothyris semisulcata</i> Salt.)	..	+					
» aff. <i>Llandoveryana</i> Dav. (<i>Atrypa serrata</i> Mc Coy).	+						
» cf. <i>ambigena</i> Barr.	+						
» cf. <i>deflexa</i> Sow.	+						
» aff. <i>princeps</i> Barr.	+						
» ind., plusieurs espèces	+						
<i>Atrypa</i> <i>reticularis</i> Linn.	+						
» aff. <i>imbricata</i> Sow.	+						
» aff. <i>marginalis</i> Dalm.	+						
» sp. (voyez <i>A. insolita</i> Barr.)	+						
» <i>incerta</i> Dav.	+						
<i>Spirifer antiquissimus</i> Salt. (cf. <i>Strophomena spiriferoides</i> Mc Coy)	+	?					
» cf. <i>indifferens</i> Barr.	+						
<i>Leptaena</i> <i>Beirensis</i> Sh., forme large	+	+					
» Sh., forme longue (<i>L. ignava</i> Sh.)	+						
» <i>sericea</i> Sow.	..	+					
» <i>tenuissime-striata</i> Mc Coy	+						
<i>Strophomena deltoidea</i> Conrad	+						
» var. <i>undata</i> Mc Coy	+						
» var. <i>camerata</i> (<i>L. camerata</i> Conrad)	+						
» <i>rhomboidalis</i> Wilkens sp. (<i>L. depressa</i> Dalm.)	+						
» var. <i>Loredensis nobis</i>	+						
» <i>euglypha</i> Sow.	+						
» cf. <i>Phillipsi</i> Barr.	+						
» <i>tenuistriata</i> Sow.	+						
» sp. n. (voyez <i>S. suavissima</i> Barr.)	+						
» <i>pecten</i> Linn.	+						
» <i>expansa</i> Sow. sp.	+						
» sp. n. (½ an <i>Leptaena Beirensis</i> var.)	+						
<i>Trimerella</i> sp. (voyez <i>T. acuminata</i> Billings)	+						
<i>Spirifera plicatella</i> Linn. sp. var. <i>radiatus</i>	+						
» var. <i>globosa</i> Salt.	+						
<i>Porambonites</i> <i>Ribeiroi</i> Sh.	+						
» <i>lima</i> Sh.	+						
» sp. n.?	+						
<i>Pentamerus</i> <i>vestitus</i> Barr.	+						
» cf. <i>pelagicus</i> Barr.	+						
» cf. <i>optatus</i> Barr.	+						
» sp.	+						
<i>Discina</i> sp.	..	..	..	..	+		
<i>Stricklandinia</i> sp. (voyez <i>S. lens</i> Sow.)	+						

NOMS DES ESPÈCES

	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen		Ordovicien inférieur	
	Schistes culminants et schistes diabasiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à Dalmanites Dujardini	Grès de Loredó	Schistes à Homalotus (Ehlerti)	Schistes à Orthis Ribeiroi	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
<i>Stricklandinia</i> sp. (voyez <i>S. lirata</i> Sow. sp.)	+						
» sp. ind., 2 espèces	+						
<i>Orthis</i> ellipsoides Barr.	+						
» cf. ellipsoides Barr.	+	..	..	+			
» unguis Sow. sp.	+						
» aff. basalis Dalm.	+						
» aff. distorta Barr. ..	+						
» reversa Salt. var. Mullochiensis.	+						
» parva Pander, dans la liste de Sharpe (1 an <i>O. lunata</i> Sow.)	+						
» Edgelliana Salt.	+						
» cf. Valpyana Dar.	+						
» Actoniae Sow.	+						
» canaliculata Lindström.	+						
» honorata Barr.	+						
» calligramma Dalm.	+	..	..	..	+		
» » var. gigantea (1 an sp. n.)	+						
» elegantula Dalm.	+	..	+	+			
» cf. elegantula Dalm.	+						
» exornata Sh.	+						
» Berthoisi Rou., différentes variétés	+	+	?	?			
» flabellulum Sow.	+						
» Mundae Sh.	+						
» testudinaria Dalm. (<i>O. redux</i> Barr., d'après Salter)	+	+	+	+	+		
» Michelini Léveillé (1 an <i>O. Berthoisi</i> var.)	..	+					
» cf. Michelini Léveillé.	+						
» Ribeiroi Sh., différentes variétés	..	+	..	+	+		
» Bussacensis Sh. (non <i>O. testudinaria</i> Vern. et Barr.)	..	..	..	+			
» Budleighensis Dav. (<i>O. redux</i> Barr.)	+						
» filiceraei Rou.	..	..	..	+			
» sardoa Menegh.	+						
» cf. lunata Sow.	+						
» cf. multistriata Hall.	+						
» aff. multistriata Hall. (1 an sp. n.)	+						
» aff. suburbana Barr.	+	..	..	+			
» aff. alata Sow.	+						
» cf. flabellulum Sow.	+						
» sp. (voyez <i>O. turgida</i> McCoy)	..	..	..	+			
<i>Obolus</i> Bowlesi Vern. et Barr.	..	..	..	+			
» filusus Hall. sp.	..	..	..	+	+		
» aff. Davidsoni Salter	..	..	..	..	+		
<i>Lingula</i> Lesueuri Rou.	..	..	..	..	..	+	
» aff. Lesueuri Rou.	+						
» Bechei Salt.	+						
» lata Sow.	..	..	..	..	+		
» Rouaulti Salt.?	..	..	..	..	+	+	
» cf. Rouaulti Salt.	..	..	..	..	+		
» Symondsi Salt.	..	..	..	+			
» brevis Portl.?	+						
» longissima Pander.	..	..	..	?	+		
» aff. cornea Sow. (1 an <i>L. ovata</i> McCoy)	..	+					
» cf. ovata McCoy	..	..	..	+			
» cf. attenuata Sow.	..	+	..	+	+		
<i>Brachiopodes</i> ind., plusieurs espèces	+	+	+	..	+		

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen		Ordovicien inférieur	
	Schistes culminants et schistes diabastiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à Dalmanites Dujardini	Grès de Loredó	Schistes à Homanolotus (Ehlerti)	Schistes à Orthis Ri-beiroi	Quartzites à Billobites	Quartzites à Scolithus
BRYOZOA							
Cheilostomata <i>Busk.</i> (Bryozoaires cellulins d' <i>Orb.</i>)	+						
Orbipora distincta <i>Eichw.</i>	+						
» ?	+						
Synocladia Lusitanica <i>Sh.</i>	+						
» hypnoides <i>Sh.</i>	+						
Disteichia reticulata <i>Sh.</i>	+						
Phyllopora sp. (Retepora, dans la liste de Sharpe)	+						
Clathropora cf. frondosa <i>Hall.</i>	+						
Bryozoaire ind.	..	..	..	..	+		
ANNELIDA							
Traces de Nereites ind.	+						
ECHINODERMATA							
Caryocrinus ornatus <i>Say.</i>	+						
Mimocystites Bohemicus <i>Barr.?</i>	+						
Echinospaerites aurantium <i>Gyll.</i>	+						
» (Caryocystites) Balticus <i>Eichw.</i> (voyez Ech. Davisi <i>McCoy</i>)	+						
» quaerendus <i>Barr.</i>	+						
Aristocystites cf. sculptus <i>Barr.</i>	+						
» cf. Bohemicus <i>Barr.</i>	+						
Calix (Echinospaerites) Murchisoni <i>Vern. et Barr.</i>	..	..	..	+	+		
» Sedgwicki <i>Rou.</i> (cf. Aristocystites Bohemicus <i>Barr.</i>)	..	..	..	..	+		
» sp. n.? (différente des 2 espèces précédentes)	..	..	..	+			
Orocystites Helmhackeri <i>Barr.</i>	+						
Mespilocystites Bussacensis sp. n.	+						
Troostocrinus?	+						
COELENTERATA							
Phyllograptus sp. n.	..	..	..	+			
Diplograptus palmeus <i>Barr.</i>	+	+	..	+			
Didymograptus Murchisoni <i>Bæck.</i>	..	..	..	+	+		
» nanus <i>Lapw.</i>	..	..	..	..	+		
» sp.	..	..	..	..	+		
Discophyllum plicatum <i>Barrois</i> non <i>Phillips.</i>	..	..	..	..	..	+	
Labecheia conferta <i>Milne-Edw. et J. Haime.</i>	+						
Favosites (Cladopora) fibrosa <i>Goldf.</i>	+						
Cystiphyllum Grayi <i>Milne-Edw. et J. Haime.</i>	+						
Monticulipora? (voyez M. Bowerbanki <i>Milne-Edw. et J. Haime</i>)	+						
INCERTAE SEDIS							
Cruziana furcifera d' <i>Orb.</i>	..	..	..	..	..	+	
» Beirensis <i>Delg.</i>	..	..	..	..	..	+	
» cf. Beirensis <i>Delg.</i>	..	..	..	..	..	+	
» Monspelliensis <i>Sap.</i>	..	..	..	..	..	+	
» Bagnolensis <i>Morière.</i>	..	..	..	..	..	+	
» Nathorsti <i>Delg.</i>	..	..	..	..	..	+	

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien supérieur			Ordovicien moyen		Ordovicien inférieur	
	Schistes culminants et schistes diabasiques avec des calcaires subordonnés	Schistes à <i>Dalmanites Dujardini</i>	Grès de Loredo	Schistes à <i>Homalotus Ehlerti</i>	Schistes à <i>Orthis Riberi</i>	Quartzites à <i>Bilobites</i>	Quartzites à <i>Scolithus</i>
<i>Cruziana Goldfussi Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
» <i>Lebescontei Delg.</i>	..	..	..	..	..	+	
» <i>Vilanovae Sap.</i>	..	..	..	..	..	+	
» <i>Cordieri Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
» cf. <i>Cordieri Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
» aff. <i>Cordieri Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
<i>Fraena Lyelli Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
<i>Arthropycus</i> cf. <i>Harlani Hall.</i>	..	..	..	..	..	+	
<i>Scolithus Dufrenoyi Rou.</i>	..	..	..	..	..	..	++
» sp. ind.	..	..	..	..	..	..	++
<i>Vexillum Desglanndei Rou.</i>	..	..	..	..	..	..	++
» cf. <i>Morierei Sap.</i>	..	..	..	..	..	+	
» <i>Halli Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
<i>Rhysophycus Saportai Delg.</i>	..	..	..	..	..	+	
» cf. <i>Rouaulti Lebes.</i>	..	..	..	..	..	+	
» <i>Barrandei Trom. et Lebesc.?</i>	..	..	..	..	..	+	
<i>Foralites Pomeli Rou.</i>	..	..	..	..	..	+	
» <i>gracilis Delg.</i>	..	..	..	..	..	+	
<i>Palaeochorda tenuis Emm.</i>	..	..	..	..	..	—	

Note.—La classification des espèces indiquées sur cette liste et dans les autres qui accompagnent ce travail, a été la plupart du temps faite d'après une première étude du matériel abondant du Musée géologique, rassemblé par des fouilles répétées pendant des dizaines d'années, lequel remplit beaucoup de centaines de planchettes. Il y a certainement beaucoup à corriger dans mes déterminations; mais quels que soient les changements qui en proviennent, ils ne pourront infirmer, j'en suis sûr, sous le point de vue stratigraphique, les conclusions auxquelles je suis arrivé.

Considérations sur le tableau précédent.—L'examen de ce tableau suggère tout d'abord quelques considérations intéressantes. Ainsi, nous voyons que le nombre total des espèces distinctes qu'il comprend étant de 293 (au minimum), plus de la moitié de ce nombre, soit 159, appartient à l'assise supérieure, dont 139 marque le nombre des espèces propres à cette assise, et seulement 20 proviennent des niveaux inférieurs. En outre, il est à remarquer l'abondance extraordinaire de Gastropodes, de Brachiopodes, de Bryozoaires et d'Echinodermes, classes qui sont presque exclusives de l'assise supérieure.

Cette profonde différence dans la faune, et son rapide et remarquable enrichissement, pourraient nous porter à considérer ce groupe de couches comme étant d'un étage distinct de celui des couches sous-jacentes; cependant ses rapports ordoviciens sont clairement assurés par un certain nombre d'espèces très caractéristiques de l'étage inférieur du Silurique, surtout les Trilobites. De plus, le caractère lithologique des roches lie étroitement cette assise culminante avec les schistes à *Dalmanites Dujardini*, qui lui succèdent immédiatement en dessous, et ce n'est que dans les couches les plus supérieures, où l'on trouva des empreintes de Néréites, que l'on remarque un changement de facies.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Distribution et composition du Gothlandien.—Le Silurique supérieur a dans l'affleurement du Bussaco, comme nous l'avons dit, beaucoup moins de développement que la série ordovicienne; vers le sud du Mondégo il forme une bande très étroite, de 100 à 300 mètres à peine de largeur, qui disparaît en traversant la rivière Ceira près de Serpins, au N.W. de Goes. Dans les autres lambeaux de la Beira le Silurique inférieur est seul représenté et il l'est principalement par l'assise de quartzites à Bilobites de la base du système.

Les roches de la division supérieure du Silurique du Bussaco présentent une grande uniformité de composition: ce sont en général des schistes fins, à stratification souvent peu visible, où l'élément quartzeux est moins abondant et où les calcaires manquent absolument. Ce terrain ne renferme pas, en effet, les puissantes assises de quartzites et de grauwackes qui abondent dans l'Ordovicien; il contient, cependant, à une certaine hauteur, beaucoup de minces lits de quartzite et une énorme quantité de nodules siliceux et argilo-siliceux, plus ou moins durs, distribués très irrégulièrement dans un schiste fin et tendre, ou même une argile schisteuse à couleur gris plus ou moins foncé, ayant çà et là des taches noires ampéliteuses, dans lesquelles les fossiles se montrent de préférence, ainsi que dans les nodules.

Les nodules sont pour la plupart petits; ils surpassent rarement la grosseur du poing et ont généralement la forme sphéroïdale ou ellipsoïdale aplatie, plus ou moins régulière. Beaucoup d'entre eux renferment des restes d'êtres organisés fossilisés par la pyrite; en vertu de la décomposition de cette substance, les espaces que les fossiles occupaient paraissent presque toujours vides. Quelques nodules sont même pyriteux; d'autres, très rares, contiennent intérieurement du calcaire spathique ou de la sidérose, qui semble être venu remplir la cavité laissée par la destruction partielle du nodule, en tout cas, ne représentant pas une concrétion.

C'est un fait bien remarquable que l'absence totale du calcaire à l'état de concrétions ou sphéroïdes au milieu des schistes de notre Silurique supérieur, lesquels sont par contre si abondants dans d'autres régions. Ordinairement ce sont les nodules les plus grands qui contiennent les fossiles; les petits, très durs, de la grosseur d'une noix ou encore plus petits, ne les renferment presque jamais.

Comme on devait s'y attendre, c'est dans le schiste plus fin et doux que les nodules paraissent de préférence. Dans les parties où le schiste est plus grossier, il se charge de mica et alterne avec les lits de schiste quartzeux ou de quartzite, minces et peu réguliers, qui n'atteignent que très rarement l'épaisseur de quelques décimètres. Ces lits disparaissent fréquemment et forment comme des masses ganglionnaires, qui disparaissent aussi subitement ou diminuent rapidement en épaisseur. Exceptionnellement, dans quelques points, le schiste est fissile et formé de lames alternantes de peu de millimètres d'un phyllade gris foncé et de quartzite, qui lui donnent l'aspect rayé sur les tranches des strates.

Pauvreté relative de la faune gothlandienne.—Quoique les fossiles, que renferment les nodules et quelques lits de schiste soient très abondants, dans leur ensemble ils constituent une faune assez pauvre. Cette faune est absolument distincte de celle de l'Ordovicien; aucune espèce commune aux deux étages n'a été jusqu'à présent découverte.

Tandis que le Silurique inférieur du Bussaco est remarquable par la grande abondance de fossiles, qui composent une faune variée et relativement riche dans les différentes assises schisteuses, surtout dans celle des schistes diabasiques, le Silurique supérieur de cette contrée renferme un nombre restreint d'espèces, parmi lesquelles les plus remarquables sont: *Bolbozoe bohémica*, plusieurs espèces d'*Orthoceras* indéterminables pour la plupart, *Cardiola interrupta*, *C. migrans*, *Cardiola? striata*, quelques Hydrozoaires, *Monograptus priodon*, etc., mais jusqu'à présent on n'y a pas encore découvert le moindre vestige de Trilobites.

On trouve les fossiles autant dans les nodules que dans le schiste fin argileux, et aussi dans le schiste quartzeux ou quartzite subordonné aux schistes fins. Souvent le test des fossiles contenus dans les nodules a été détruit aussi bien que les moules et il n'en reste que l'empreinte extérieure dans les cavités qu'ils occupaient. Quelques lits de grès renferment de nombreux moules de petites bivalves, dont quelques-unes côtelées (*Rhynchonella?*) et plusieurs Lamellibranches. Les schistes contiennent une petite bivalve côtelée, la même espèce de Brachio-pode qui occupe le même niveau à Revelladas (serra de Portalegre) et dans d'autres localités. Les Graptolites sont rares et généralement en mauvais état.

Étant exposé à l'air, le schiste fin se débite en morceaux irréguliers très menus, qui produisent une terre argileuse ou glaise très épaisse; quelquefois pourtant, il montre la structure ondulée, et se divise en fragments à surface conchoïdale, faisant alors rappeler par son aspect certaines couches schisteuses du toit du groupe archaïque.

Faune du Silurique supérieur du Bussaco.—La liste des espèces du Silurique supérieur que nous pûmes recueillir dans la contrée du Bussaco est celle qui suit:

<i>Ceratiocaris (Onchus)</i> , empreinte d'un aiguillon secondaire du telson.	<i>Cardiola gibbosa</i> Barr.
<i>Pterigotus</i> sp. (cf. Barrande, <i>Syst. Sil.</i> <i>Boh.</i> , vol. 1, Suppl., pl. XVII, fig. 1-19).	» aff. <i>gibbosa</i> Barr.
» empreinte d'un segment de la carapace d'une autre espèce, renfermée dans un nodule.	» <i>migrans</i> Barr.
<i>Aptychopsis primus</i> Barr.	» cf. <i>contrastans</i> Barr.
<i>Entomis pelagica</i> Barr.	» sp. n. aff. <i>C. contrastans</i> Barr.
<i>Phragmoceras?</i>	» ? <i>striata</i> Sow. sp.
<i>Orthoceras subannulare</i> Münst.	» sp. aff. <i>striata</i> Sow., an var.
» <i>redundans</i> Barr.	<i>Cardium integrum</i> juv. Barr.?
» <i>Bohemicum</i> Barr.	<i>Paracardium delicatum</i> Barr.?
» <i>styloideum</i> Barr.?	<i>Mytilus Budnianus</i> Barr.
» cf. <i>Arion</i> Barr.	» <i>esuriens</i> Barr.
» ind., 3 espèces au moins.	» sp. (voyez <i>M. longior</i> Barr.)
<i>Bolbozoe anomala</i> Barr.	<i>Anodontopsis</i> cf. <i>bullæ</i> McCoy.
» <i>Bohémica</i> Barr.	» sp.
» sp. aff. <i>Bohémica</i> Barr.	<i>Palæarca?</i>
<i>Beyrichia?</i>	<i>Isocardia</i> cf. <i>simplex</i> Barr.
<i>Cardiola interrupta</i> Sow.	<i>Cardiomorpha</i> ou <i>Isocardia</i> sp.
	<i>Posidonomya?</i> (voyez <i>P. eugyra</i> Barr.)
	<i>Pterinea</i> sp. aff. <i>tenuistriata</i> McCoy.
	» <i>laevis</i> juv. Goldf.
	» aff. <i>retroflexa</i> Wahl. sp.
	» aff. <i>retroflexa</i> Wahl. var.
	» ind., 2 ou 3 petites espèces.

<i>Aricula</i> ou <i>Pterinea</i> , 4 ou 5 espèces.	<i>Monograptus planus</i> Barr. var. (<i>M. Proteus</i>) =
» sp.	<i>M. resurgens</i> Linnars.)
<i>Vlasta sinistra</i> Barr.	» <i>nudus</i> Lapw. (<i>M. Hisingeri</i> var.
<i>Bivalves</i> ind., plusieurs espèces.	<i>nudus</i> Lapw.)
<i>Atrypa</i> cf. <i>insolita</i> Barr.	» <i>leptotheca</i> Lapw.
» sp.	» <i>jaculum</i> Lapw.
<i>Rhynchonella</i> ? petite espèce.	» <i>crenulatus</i> Törnq.
<i>Orthis</i> cf. <i>translata</i> Barr.	» <i>dubius</i> Suess?
» cf. <i>canaliculata</i> Lindström.	» <i>spiralis</i> Gein.?
<i>Fenestella</i> ou <i>Polypora</i> ?	» ind., plusieurs espèces.
<i>Scyphocrinites elegans</i> Zenk.?, Barr. Ms.	<i>Phyllograptus angustifolius</i> Hall. sp.
<i>Crinoïdes</i> ind.	<i>Retiograptus</i> sp.
<i>Cystidées</i> ind.	<i>Cyrtograptus</i> cf. <i>Lundgreni</i> Tullberg.
<i>Monograptus priodon</i> Bronn.	<i>Syringopora</i> cf. <i>cancellata</i> Milne-Edw. et J.
» <i>ultimus</i> Perner.	Haime.

Nous donnons à la suite la description d'une coupe du Gothlandien du Bussaco traversant l'affleurement silurien dans sa plus grande largeur.

Cette coupe est réunie avec celles du ravin du Zuvinhal et de Casqueira à Pê de Viso, déjà décrites, pour former un même profil (pl. I, n° 3).

Coupe du Silurique supérieur suivant le ruisseau de Palheiros depuis Azenha do Lagar, près Ponte da Matta, jusqu'à Azenha do Netto, près Palheiros.

1. Schistes fins, gris et noirs, avec beaucoup de nodules ellipsoïdaux ou globulaires, de petites dimensions, alternant avec des schistes grossiers, très micacés, ainsi qu'avec quelques lits épais de 2 à 25 centimètres, de quartzite compact, gris foncé, et de grès fin, très dur, micacé, gris et jaunâtre ocracé par suite d'un commencement d'altération. Le schiste aussi bien que les grès sont fossilifères et quelques nodules renferment aussi des fossiles. Le test des fossiles aussi bien que les moules contenus dans les nodules furent souvent détruits, ne laissant que les empreintes externes dans les cavités qu'ils occupaient. Quelques lits du grès sont pétris de fossiles, surtout des moules de petites bivalves, parmi lesquels on a reconnu des Brachiopodes (*Orthis* cf. *canaliculata* et un *Rhynchonella*), les Lamellibranches étant peu abondants. Les Graptolites sont très rares.

Les strates sont répétées par le plissement, elles sont fortement comprimées et tordues, ayant des allures très variées; en quelques points on voit pourtant qu'elles suivent dans la direction N. 30° W. avec plongement vers N. 60° E.

Fossiles des schistes:

<i>Aptychopsis primus</i> Barr.	<i>Bivalves</i> , 2 moules écrasés, indéterminables.
<i>Orthoceras</i> ind., plusieurs espèces, échantillons écrasés.	<i>Orthis</i> sp.

Fossiles des nodules:

<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Rhynchonella</i> ? petite espèce.
<i>Isocardia</i> cf. <i>simplex</i> Barr.	<i>Crinoïde</i> ?
<i>Mytilus</i> sp. (voyez <i>M. longior</i> Barr.)	<i>Monograptus</i> sp.
<i>Orthis</i> cf. <i>canaliculata</i> Lindström.	

Fossiles du grès:

<i>Bolbozoe anomala</i> Barr.	<i>Palaearca</i> sp.
<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Bivalve</i> ind.
<i>Paracardium delicatum</i> Barr.?	<i>Orthis</i> cf. <i>canaliculata</i> Lindström. F.
<i>Pterinea</i> sp.	<i>Rhynchonella</i> sp.

2. Schistes fins, fissiles, gris, et schistes grossiers, durs, très micacés, avec intercalation de quelques minces lits de quartzite et de grès fin ou grauwasche, épais de 1 à 8 centimètres. Quelques lits de schiste renferment des nodules durs, subellipsoïdaux ou de forme aplatie, dont quelques-uns contiennent des fossiles. L'allure des strates est très variée, parce qu'elles sont très plissées et tordues; la direction moyenne ou la plus régulière est N.W.-S.E. et l'inclinaison de 50 à 60° vers le N.E.

Fossiles du schiste fin:

<i>Bolbozoe anomala</i> Barr.?	<i>Monograptus ultimus</i> Perner.
<i>Cardiola?</i> <i>striata</i> Sow.?	» <i>spiralis</i> Gein.?
» sp.	» sp.
<i>Bivalves</i> ind.	

Tous ces fossiles, d'ailleurs très rares (car chaque espèce n'est représentée que par un seul spécimen) sont très comprimés et aplatis, d'où leur détermination devient très incertaine.

Fossiles de nodules:

<i>Bolbozoe anomala</i> Barr.	<i>Anodontopsis</i> sp.
<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Pterinea laevis</i> juv. Goldf.
<i>Cardiola interrupta</i> Sow.	» ind., 2 ou 3 petites espèces de petite taille.
» ? <i>striata</i> Sow.?	<i>Mytilus</i> sp.
<i>Anodontopsis</i> cf. <i>bulli</i> McCoy.	

3. Schistes fins, fissiles, avec quelques lits de quartzite intercalés, épais de 12 à 15 centimètres. Quelques strates se divisent en petits morceaux allongés par suite de la structure spéciale que la roche a acquise par la compression qu'elle a subie. Ce massif schisteux contient beaucoup de nodules dans toute sa hauteur, les fossiles n'ayant été trouvés que dans ceux-ci, bien que la plupart des nodules ne les contiennent pas. Plongement des strates 60° vers le N.E.

<i>Bolbozoe anomala</i> Barr.	<i>Cardiola striata</i> var.
<i>Orthoceras</i> ind., plusieurs espèces très mal représentées.	» sp. aff. <i>striata</i> juv. Sow.
<i>Mytilus esuriens</i> Barr.	<i>Rhynchonella</i> , petite espèce.
<i>Pterinea</i> sp.	<i>Monograptus</i> ind.
<i>Cardiola?</i> <i>striata</i> Sow. ¹	<i>Polypier?</i>

4. Schistes en général fissiles, en partie grossiers et très micacés, avec quelques lits, épais de 3 à 28 centimètres, de quartzite fin, micacé, gris foncé et de grès fin argileux, pareillement micacé. Ce complexe contient quelques nodules, qui renferment rarement des fossiles, mal conservés et très engagés dans la roche, comme il arrive aussi dans le grès et dans le schiste. Plongement le plus ordinaire, 50 à 60° vers le N.E.

<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Bivalve</i> ind.
<i>Cardiola?</i> <i>striata</i> Sow.?	<i>Rhynchonella?</i>
<i>Mytilus</i> sp.	<i>Monograptus</i> ind., plusieurs espèces.

5. Schistes fins gris-noirs avec taches blanchâtres, en partie micacés, ayant subordonnées des strates de schiste grossier très micacé et des lits de quartzite compact, épais de 2 à 20 centimètres, zonés en bandes très fines alternativement gris foncé et gris clair. Quelques lits de schiste sont fossilifères ainsi que quelques-uns des nodules qu'il renferme. Plongement 60 à 70° vers le S.W. et en quelques points aussi vers le N.E.

Fossiles des nodules:

<i>Bolbozoe anomala</i> Barr.	<i>Orthoceras</i> , différentes espèces. ²
-------------------------------	---

¹ Dans un moule de cette espèce on observe sous les crochets une série rectiligne de petites dents marquant la ligne cardinale, ce qui est un des caractères distinctifs du genre *Cardiola*. Cette observation est intéressante, car on n'est pas encore arrivé à fixer le genre auquel on doit rapporter ce fossile si caractéristique du Gothlandien.

² Quelques spécimens furent fossilisés par la sidérose à l'état spathique, qui a rempli entièrement la cavité occupée par le fossile. Parfois la fossilisation a eu lieu par la pyrite de fer, qui constitue en partie le nodule.

Anodontopsis cf. *bullæ* McCoy.
Cardiola? *striata* Sow.

Bivalve ind., moule d'une petite espèce.
Crinoïde.

Fossiles du schiste fin:

Orthoceras, moules très écrasés, indéterminables.
Cardiola interrupta Sow.
 » *migrans* Barr.

Cardiola? *striata* Sow.
Bivalves ind.
Monograptus sp.

6. Schistes fins avec quelques lits subordonnés de schiste grossier très micacé et d'autres de quartzite micacé, de 1 à 10 centimètres d'épaisseur. Ce complexe renferme des nodules globulaires ou ellipsoïdaux, généralement de petites dimensions, quelques-uns avec fossiles, ainsi que le schiste. Plongement vers W. 37° S.

7. Schistes fins, gris et blanchâtres, avec intercalation de strates de schiste grossier très micacé et quelques minces lits de quartzite et de grès fin très micacé, de 1 à 15 centimètres d'épaisseur. Ces schistes contiennent quelques nodules ellipsoïdaux, durs, parfois fossilifères. Les schistes aussi bien que le grès renferment de même des fossiles. Un des lits de grès fin, dur, de couleur jaunâtre ocracé, épais de 6 centimètres, est entièrement criblé de cavités cylindriques, qui représentent les espaces vides laissés par la destruction des moules d'*Orthocères* qui les occupaient. Ce lit est compris dans le n° 1 de la coupe de la vallée de San Jorge, que nous avons décrit (p. 38). Il n'est pas douteux que les couches de ce n° 7, conjointement avec celles des deux numéros précédents, 5 et 6, forment un même complexe, dans lequel les mêmes strates se trouvent plusieurs fois répétées par suite du plissement. Plongement 50 à 60° vers le S.W.

Fossiles des nodules:

Bolbozoe sp.
Cardiola? *striata* Sow.

Mytilus sp., un spécimen de petite taille.
Bivalve, id.

Fossiles des schistes:

Orthoceras sp..
Cardiola interrupta Barr.
 » *migrans* Barr.
 » ? *striata* Sow.

Mytilus sp.
Bivalve ind.
Monograptus sp.

LAMBEAU SILURIEN DE LA SERRA DE GOES

La serra du Penedo de Goes à l'ouest du bourg de ce nom, est constituée dans sa partie la plus haute, par des quartzites en gros bancs, qui sont le prolongement de ceux qui occupent le dos de la montagne du Bussaco, inclinant cependant dans le sens contraire, c'est-à-dire, vers l'est. Il lui succède l'assise de quartzites en partie schistoïdes, en lits minces, séparés par des lames de schiste grossier, où l'on trouva abondamment plusieurs espèces de *Cruziana* et d'*Arthropycus*, celui-ci étant un des gisements les plus riches de ces fossiles que nous ayons découvert. Elle semble être inférieure aux quartzites, en gros bancs, précités, mais lui est en réalité supérieure, parce que les couches se trouvent inverties.

A l'extrémité nord de la serra les quartzites sont gracieusement ondulés, formant un double plis synclinal, qui comprend aussi une partie des couches de schiste noir avec *Didymograptus Murchisoni*. Ce schiste se répète trois fois en vertu du plissement des couches, et du côté occidental de l'affleurement il va se heurter contre les schistes du Précambrique, un contact anormal s'y établissant par suite d'une faille avec un rejet considérable qui correspond directement à l'axe du synclinal du Bussaco; on peut observer cette discordance précisément sur la ligne limite des deux systèmes. Cependant, tandis que dans cette partie de la serra la

série est plus complète, les couches de schistes supérieurs aux quartzites ayant été préservées avec ceux-ci, ce n'est qu'à l'extrémité méridionale de la serra qu'apparaissent les quartzites les plus inférieurs, en gros bancs, les couches à *Bilobites* faisant défaut, ainsi que les schistes à *Didymograptus*. Du côté oriental de la serra, on voit aussi clairement la discordance des quartzites siluriens sur les schistes précambriens du coteau, due d'ailleurs au dépôt original des couches.

Comme nous le voyons, le synclinal du Bussaco est représenté dans la serra du Penedo de Goes uniquement par des couches de l'Ordovicien inférieur et celles de la base de l'Ordovicien moyen: savoir, l'assise de quartzites en gros bancs, celles des quartzites à *Bilobites* en lits minces et les schistes à *Didymograptus Murchisoni*, qui leur sont immédiatement superposés.

Coupe au nord de la serra du Penedo de Goes passant par le signal de Sótam

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR (Cb¹)

1. Schiste et grauwacke fine, schistoïde, de teintes gris et verdâtre avec de très petites paillettes de mica, très rares.

2. Schiste gris foncé, très peu ou nullement fissile, se divisant en fragments prismatiques irréguliers par les joints qui le traversent en des directions diverses.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Dalmanites Dujardini*

3. Schiste gris foncé, ordinairement très micacé, avec taches blanchâtres et chatain ocracé par un commencement d'altération, très chargé de fossiles, surtout des tiges de Crinoïdes et Bryozoaires. Il se montre subordonné à ce schiste un quartzite compact, verdâtre foncé et une roche argileuse blanche.

Dalmanites socialis Barr. var. *grandis*.

Avicula?, un moule très déformé.

Orthis circularis Sow.

» *Berthoisi* Rou.

Bryzoaire (*Trematopora*?) f.

Rhombifera Bohemica Barr.

Crinoïde (*Scyphocrinites*?)

Schistes à *Homalonotus Ehlerti*

4. Schiste micacé avec du mica blanc très irrégulièrement distribué, couleur gris foncé et blanchâtre avec taches chatain ocracé par l'altération du mica, contenant de nombreux fossiles, surtout des moules de petites bivalves très déformés. Ce schiste comprend quelques minces lits de quartzite micacé, gris clair.

Calymene Tristani Brongn.

Homalonotus Ehlerti Kerforne.

Dalmanites Phillipsi Barr.

« *socialis* Barr.?, un pygidium très déformé.

Ribeiria, 2 espèces.

Ctenodonta Beirensis Sh.

» *Costae* Sh.

Cypricardia Beirensis Sh.

Orthis flabellulum juv. Sow.

Schistes à *Orthis Ribeiroi*

5. Schiste gris foncé avec taches blanches et chatain ocracé, renfermant des moules de fossiles très déformés par la pression qu'ils ont subie.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn. f.	<i>Bivalve</i> ind.
» <i>Aragoi</i> Rou.?, une petite glabellle. R.	<i>Orthis Ribeiroi</i> Sh., extraordinairement abondante. F.
<i>Dalmanites socialis</i> Barr.?	» sp.
<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.?, moules très déformés.	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Bœck.
<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.?	<i>Calix Murchisoni</i> Vern. et Barr. sp.

Quartzites à Bilobites

6. Quartzite gris en lits minces.

<i>Arthropycus</i> cf. <i>Harlani</i> Hall.	<i>Cruziana Bagnolensis</i> Mor.
<i>Cruziana furcifera</i> d'Orb.	» sp.
» <i>rugosa</i> d'Orb.	

Quartzites à Scolithus

7. Quartzite blanc en gros bancs.

Scolithus Dufrenoyi Rou.

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

8. Schiste gris verdâtre foncé, non fissile, ressemblant beaucoup au n° 2.

9. Grauwacke fine, micacée, verdâtre, contenant des petits fragments de schiste gris foncé.

6) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TAGE

LAMBEAU SILURIEN DE VILLA VELHA DE RÓDAM

Plus vers le S.E. à Villa Velha de Ródam, sur le prolongement de la même ligne de plissement des couches siluriennes de la serra de Goes, les quartzites à Bilobites, pliés à plusieurs reprises, montrent un grand développement au lieu dit «Portas de Ródam», là où le Tage est resserré dans un défilé étroit, de quelques dizaines de mètres à peine de largeur.¹

Ces quartzites se répètent du côté est du lambeau, en formant une bande indépendante de celle de Portas de Ródam. Le pont du Tage, sur la route de Portalegre à Villa Velha de Ródam, s'appuie sur ces quartzites de la bande orientale.

On voit donc que les mêmes couches forment plusieurs plis subordonnés au synclinal principal qui vient du Bussaco; cependant l'assise des quartzites semble être incomplètement représentée dans cette localité. Comme dans le Bussaco on y a aussi découvert les *Arthropycus* occupant le toit de l'assise.

Les couches inférieures, en gros bancs compacts, quelques-uns de plus de 1^m d'épaisseur, renferment le *Scolithus Dufrenoyi*, dont les cylindres quelquefois de 0^m,5 de longueur visible, traversent perpendiculairement dans toute son épaisseur la strate de quartzite qui les contient.

¹ Les Portes de Ródam formèrent autrefois une cascade ou chute d'eau, que le Tage a détruite; nous en avons le témoignage dans la grande profondeur qu'a le lit du fleuve en aval de ce point, et qui n'a pu encore être remplie malgré l'énorme masse de débris que le Tage charrie, surtout à l'occasion des crues. Le courant y est alors si fort qu'un objet quelconque flottant est submergé dans cet abîme profond, allant reparaître bien loin en aval. Le tourbillon formé de cette façon, est sans doute la cause immédiate de la grande profondeur qu'y présente le lit du Tage.

Une formation schisteuse, dont les roches ont en général des nuances claires et sont assez micacées, repose en concordance de stratification sur les deux bandes de quartzites que nous avons indiquées. Seule l'assise inférieure du Bussaco semble y être représentée, l'éruption diabasique n'ayant pas atteint ce point.

Dans les schistes de cette localité les fossiles sont rares, naturellement parce que ces schistes représentent des dépôts de mer d'une plus grande profondeur. La faune qu'on y découvrit montre cependant de plus grandes analogies avec l'Ordovicien de Vallongo qu'avec celui du Bussaco, ce qui s'explique facilement par la différence de conditions bathymétriques où les dépôts furent formés. En outre que les fossiles sont rares, ils se présentent à l'état de moules très enchâssés dans la roche, le test des mollusques et des Trilobites ayant été totalement détruit; aussi il est très difficile de découvrir les fossiles.

Dans les quartzites les Bilobites sont de même moins abondants, ce fait s'explique aussi en admettant que les sables se sont déposés plus loin du rivage, ou dans des eaux un peu plus profondes. En effet, on y voit des Brachiopodes associés à des *Cruziana* dans la même strate¹.

Les masses de quartzite qui couronnent les différentes collines qui constituent ce lambeau de Villa Velha, forment des parois abruptes, quelquefois verticales, de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, selon l'inclinaison des couches.

Au sud du Tage, les deux branches du synclinal, c'est-à-dire les deux collines ou lignes de quartzite parallèles, se fondent en une seule, comme à Goes, moins élevée et de formes moins âpres, nommée serra de San Miguel.

LAMBEAUX DE CASTELLO BRANCO ET DE MONFORTE

Tous les autres lambeaux siluriens de la Basse Beira ont une composition analogue à celle du lambeau de Villa Velha, les quartzites de la base du système y prédominent, d'où les formes imposantes des serras qu'ils constituent, qu'on aperçoit de très loin, et qui impriment au sol une physionomie particulière.

A Castello Branco on voit affleurer sur la colline du château l'assise de quartzites à Bilobites, composée de bancs épais à grain grossier et de lits minces, schistoïdes, redressés verticalement et orientés vers le N.W. Comme à Marvão, les quartzites paraissent en contact avec le granite porphyroïde, se montrant assez altérés, ainsi que les strates schisteuses qui les accompagnent.

Sur le sommet de S. Martinho, à 3 kilomètres au S.E. de Castello Branco, il y a aussi un petit affleurement des quartzites à *Vexillum Desglanndei*.

Le petit lambeau de Monforte, aligné avec des deux affleurements précédents, repose en discordance sur le Précambrique; comme à Villa Velha de Ródam, l'assise schisteuse inférieure à *Orthis Ribeiroi* est la seule qui y soit représentée en plus de celle des quartzites. On a recueilli dans un schiste violet à 1.200 mètres au N.W. de l'église de Monforte, un pygidium d'*Asaphus*, des *Orthoceras*, *Lingula* et une bivalve indéterminée.

¹ Nous appelons très particulièrement l'attention sur ce fait, qui exclut à lui seul l'idée que les *Cruziana* puissent représenter des traces d'animaux, qui disparaîtraient ou bien ne se formeraient pas au fond des eaux où les Brachiopodes vivaient.

LAMBEAU DE PENHA GARCIA

Le lambeau silurien de Penha Garcia pénètre dans l'Espagne suivant la direction N.W., parallèlement aux affleurements cités en dernier lieu et à l'étroite bande de Pédorido à Gafanhão, au sud du Douro. Il présente certaines différences par rapport aux autres lambeaux que nous avons décrits, semblant plutôt se rattacher aux affleurements du Haut Douro qu'à ceux du Bussaco et de la partie occidentale de la Beira. On constate là aussi un étage inférieur de quartzites surmonté par un autre étage schisteux; cependant on ne peut pas y établir la division des assises que nous reconnaissons dans le Bussaco.

Dans l'assise de quartzites de la base de l'Ordovicien, où les Bilobites sont très abondants, il ne semble pas exister la localisation et la succession régulière dans l'apparition des différentes formes, comme nous l'avons constaté dans cette contrée; on trouve ensemble dans la même strate des formes de *Cruziana*, d'*Arthropycus* et de *Scolithus*. Ce qui est certain en tout cas, c'est que cette assise se forma dans des eaux très basses, quelquefois agitées par des courants de vent plus ou moins fort, d'autres fois par une douce brise, comme le montre la surface ondulée ou à peine ridée de quelques lits de quartzite.

Dans l'épaisse assise schisteuse qui succède stratigraphiquement aux quartzites, on découvrit des vestiges indéterminables d'Acéphales, quelques Graptolites du genre *Diplograptus*, et vers la partie inférieure de l'assise, quelques restes de Trilobites et d'autres fossiles, qui, quoique sont rares et mal conservés, suffisent à classer les strates qui les contiennent dans la série Ordovicienne.

Les Graptolites se trouvent dans un schiste gris noirâtre, finement micacé, se débitant en plaques très minces à surface plane, comme les schistes graptolitiques à l'est de Barrancos. Comme là, on n'a découvert dans ce schiste des vestiges d'aucune autre classe de fossiles, ce qui semble prouver que les conditions bathymétriques où se formèrent les dépôts furent peut-être les mêmes dans chacune de ces localités, et qu'elles furent très différentes de celles que présentait le Bussaco.

A Penha Garcia il y a aussi un plissement synclinal des couches, avec production de faille, la rivière Ponsul coulant près de son origine dans une vallée schisteuse comprise entre deux monts de quartzite.

AFFLEUREMENT D'AMENDOA

SILURIQUE INFÉRIEUR

L'étude de l'affleurement silurien d'Amendoa, le plus important de la Beira par ses dimensions, n'est pas encore aujourd'hui complètement faite; aussi n'a-t-on pas pu marquer sur la carte géologique les deux étages siluriens, ni séparer dans l'étage inférieur les différentes assises qui le composent, comme c'est le cas dans le Bussaco.

Cependant, par des études faites postérieurement à la publication de cette carte, on reconnaît qu'il a une composition analogue à celle du Silurique de cette contrée; toutes les assises y sont représentées, quoique l'épaisseur totale des dépôts soit beaucoup moindre. On peut même dire que l'affleurement du Bussaco se prolonge vers le sud pour se rattacher à celui

du bassin du Tage; telle est la profonde ressemblance de caractères lithologiques et paléontologiques qui unit les deux contrées.

Description de la série.— Une coupe faite à une lieue à l'est d'Amendoa, menée dans la direction N.—S., d'Aldeia d'Eiras au hameau de Roballo, réunie à une autre qui, commençant au signal du Bando (cote 605) et descendant par le coteau nord-oriental de cette colline, va se rattacher à la coupe précédente à Aldeia d'Eiras, traverse la série entière des couches siluriennes de cette région. La partie supérieure de cette série a beaucoup plus de développement que dans le Bussaco, car il s'y trouve une assise puissante ne paraissant pas dans cette localité.

La base de l'étage inférieur est constituée par un grès grossier, blanc, feldspathique, qui, vers le haut, devient chaque fois plus fin, faisant transition au quartzite fin avec *Scolithus*.

Les couches les plus inférieures du grès ont en partie la texture bréchiforme, par la grande quantité de grains et de cristaux d'orthose, et de fragments de quartz gris qu'elles renferment. Ce grès mérite bien le nom de arkose sans mica, puisqu'il ne contient que de rares paillettes de ce minéral.

Comme au Bussaco, les quartzites à *Scolithus* sont très durs et compacts, ils font fréquemment transition à des grès fins ainsi qu'à des schistes quartzifères, chacune de ces roches alternant avec ceux-là. Ils sont ordinairement de couleur blanchâtre, gris-jaunâtre ou gris clair, mais ils sont aussi rougeâtres, en plusieurs nuances; ces couleurs leur sont données par le fer en différents états d'oxydation. Ils renferment assez fréquemment des paillettes de mica blanc ou doré, menues ordinairement et en petite quantité, excepté dans les lits interstrafés de schiste quartzifère, où abonde ce minéral, ainsi qu'à la surface des Bilobites, autour desquels il forme très souvent comme une ténue pellicule.

A l'est d'Amendoa, la discordance de cette assise de la base du Silurique sur les couches schisteuses du Précambrique est évidente, les strates des deux systèmes suivent des directions différentes, ayant aussi des inclinaisons diverses. A Roballo, hameau qui est assis sur la formation de schistes et de grauweekes du Précambrique, l'allure des couches est peu différente de celle des couches du système silurique, cependant elles plongent en sens diamétralement opposé.

Sur les quartzites à *Scolithus* se développe un grès grossier, qui devient plus fin vers sa partie supérieure. Ce grès ne présente pas une stratification bien distincte. Au-dessus vient une couche de schiste sableux, grossier, gris, très micacé, avec de minces lits de quartzite intercalés, dont quelques-uns renferment de nombreux exemplaires de *Cruziana* et d'*Arthropycus*, qui font toujours saillie sur la face inférieure des lits. *Cruziana Goldfussi* et *Cr. Bagnolensis*, qui paraissent ensemble dans la même strate, appartiennent aux lits les plus hauts. Vers la partie supérieure de l'assise les schistes deviennent graduellement plus fins et mous, ayant cependant quelques intercalations de lits de quartzite à Bilobites.

A ces couches schisteuses succèdent des couches de quartzite schistoïde, en strates généralement très minces, avec peu de schistes intercalés, où l'on trouva aussi des Bilobites¹

¹ Il faut observer que, tandis que la surface de quelques strates est littéralement couverte de moules de cette nature, d'autres strates contiguës ne montrent pas même la moindre trace de Bilobites, ce qui est peu en harmonie avec l'idée que ces fossiles soient les moules d'empreintes mécaniques ou de traces d'animaux, qui ne manqueraient pas d'exis-

(*Cruziana furcifera* et *Arthropycus*). Cependant, dans une strate supérieure de cette assise, on ne rencontre que les *Arthropycus*.

Le complexe que nous venons de décrire se termine à la partie supérieure par un groupe de couches de grès schistoïde et de schiste sableux, très micacé, blanc, avec des plaquettes de quartzite intercalées; ce groupe passe à un schiste très fin et mou, comme celui de *Didymograptus Murchisoni* ou de la base de l'assise à *Orthis Ribeiroi* dans le Bussaco. On trouva, en effet, dans un schiste gris-noirâtre de cette assise, en outre de *Didymograptus Murchisoni*, *Calymene Tristani*, *C. Aragoi*, *Dalmanites socialis*, *Homalonotus Oehlerti*, *Beyrichia simplex*, *Sanguinolites Pellicoi*, quelques moules de *Ctenodonta* et d'*Orthis*, tous d'individus très peu développés, montrant que les conditions biologiques de la mer silurienne n'étaient pas alors, dans cette localité, assez favorables au développement des espèces.

Sur cette assise de schistes fins se déroule une autre de grès fins argileux, ou de schistes sableux très micacés, formant des couches peu épaisses, dures, avec des strates de schiste grossier très micacé subordonnées.

Cette assise forme la base de la série schisteuse suivante qui est constituée de schistes fins, très finement micacés, de caractère minéralogique très semblable ou presque identique à celui des schistes à *Didymograptus* sous-jacents, et contenant des fossiles en abondance: *Homalonotus Oehlerti*, *Calymene Tristani*, *C. Aragoi*, *Dalmanites socialis*, *Beyrichia simplex*, *B. Bussacensis*, beaucoup d'espèces de *Ctenodonta*, *Orthis*, etc.

Ce schiste fin, qui correspond au schiste à *Homalonotus* du Bussaco, devient graduellement vers le haut très micacé et grossier, et contient des concrétions dures, se changeant parfois en grauwacke, à stratification peu distincte, et renfermant une faune particulière. Ce schiste est gris, cependant il devient blanchâtre par commencement d'altération superficielle. Son caractère distinctif est que le mica y est très irrégulièrement distribué, s'accumulant sur certaines parties de la roche sous forme de taches ou pellicules, tandis qu'il manque absolument dans d'autres points.

Là où le schiste est fossilifère, il montre des taches ocracées, correspondant aux points occupés par les fossiles. Il renferme principalement *Orthis Berthoisi*, plusieurs formes d'Echinodermes, et aussi quelques espèces de Trilobites, parmi lesquelles *Calymene Aragoi* qui est particulièrement abondante; par contre *Dalmanites Dujardini*, si caractéristique des couches correspondantes dans le Bussaco, est ici excessivement rare, puisqu'on n'a découvert jusqu'à présent qu'une seule glabelle de cette espèce.

Cette assise schisteuse doit correspondre stratigraphiquement aux schistes diabasiques du versant occidental de la serra du Bussaco, et conjointement aux couches sous-jacentes jus-

ter durant toute la formation du dépôt, et par conséquent laisseraient plus ou moins clairement leurs vestiges dans toutes les strates. Au contraire, en les considérant comme des végétaux marins qui soient entraînés de temps en temps par des courants plus forts et rejetés sur le rivage par intervalles, comme le sont les algues à l'époque actuelle, il est évident qu'ils devront paraître seulement dans de certaines strates.

D'un autre côté, à 700^m au S. E. du hameau de Carregueira sur la route de Mação, sont exposés les plans de quelques lits minces de quartzite, qui montrent à la surface supérieure plusieurs moules d'*Arthropycus*, plus ou moins solidement liés à la roche, et en même temps des sillons sinueux laissés par l'ablation de ces fossiles. Je pus même détacher d'un de ces sillons un fragment d'un moule d'*Arthropycus*, dont la fossilisation s'était donc faite avec relief complet. Ceci donne la preuve concluante que les *Arthropycus* sont de véritables organismes, comme le sont de même les *Cruziana*, parce que les traces ou empreintes d'animaux quelconques ne sauraient produire un pareil résultat.

qu'au grès de Loredó; cependant, nous devons remarquer que l'on n'y voit ni la diabase, ni les roches associées à celle-ci.

Les grès de Loredó n'y sont pas nettement représentés, ou bien s'ils existent, ils ont très peu de développement.

Appartenant encore au Silurique inférieur, et surmontant immédiatement le schiste précédent, se développe une série de couches de quartzite en gros bancs bien stratifiés, auxquelles succède un schiste noir, grossier, très micacé, très dur et tenace dans la partie saine, sans stratification visible, montrant la structure globulaire comme la diabase, et se débitant en menus fragments irréguliers, ou de forme allongée. Finalement, et représentant le dernier terme de l'étage, on trouve un quartzite fin, compact, bien stratifié en lits minces, mais comprenant des bancs de quelques décimètres jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, avec des schistes fins intercalés, où l'on a découvert des empreintes de Néréites.

Rareté des fossiles à Alcaravella.—Il est bien à remarquer que, du côté sud de l'affleurement, près d'Alcaravella, il y a une grande rareté de fossiles dans les couches ordoviciennes. Ce fait semble indiquer que les eaux de la mer silurienne étaient plus profondes en ce point, ce qui est d'accord avec le fait de l'absence absolue de couches de quartzite ou de grès dans toute l'épaisseur de l'étage, jusqu'à ce qu'on arrive aux quartzites à Bilobites de la base.

Puissance de l'Ordovicien.—L'épaisseur totale des couches ordoviciennes donnée par la coupe ci-avant décrite est la suivante:

Étages	Assises	Épaisseurs
Ordovicien supérieur (317 ^m)	Quartzites et schistes culminants	115 mètres
	Schistes à <i>Orthis Berthoisi</i>	202 »
Ordovicien moyen (319 ^m)	Schistes à <i>Homalonotus</i>	107 »
	Schistes à <i>Didymograptus</i>	212 »
Ordovicien inférieur (153 ^m)	Quartzites à Bilobites	82 »
	Quartzites à <i>Scolithus</i>	71 »
Puissance totale		789 »

Étendue de l'Ordovicien inférieur.—Les quartzites à Bilobites et à *Scolithus* forment sans interruption tout le bord septentrional, oriental et méridional de l'affleurement silurien depuis Villa de Rei vers l'est, jusqu'aux environs d'Aboboreira, en passant par les serras d'Amendoa et de Gargantada, qui se rattachent à celles de Ladeira, d'Envendos et d'Alfeijoeira; en les suivant vers le couchant, on voit qu'ils reparaissent dans les serras de Lercas, Chã, d'Alcaravella et des Mogos.

Outliers du Tertiaire lacustre.—Depuis ce point jusqu'à ce qu'on atteigne la rivière Zézere, la plus grande partie de la surface occupée par le Silurique est cachée par les grès et conglomérats du Tertiaire lacustre, qui forment de nombreux lambeaux plus ou moins étendus, de vrais outliers du grand affleurement du bassin du Tage, qui ne sont pas tous représentés sur la carte géologique. Il est à remarquer l'absence presque absolue de ces dépôts à l'ouest de la rivière Zézere, vu qu'on n'a découvert ici que deux petits lambeaux de 200 à 300 mètres

de longueur, vis-à-vis du confluent du ruisseau de Codes, et deux autres lambeaux encore plus petits au bord de la rivière Zézere, dans le voisinage de Dornes.

Affleurements de granite.— Les pointements de roche éruptive de Mação et de Penascoso ont aussi déplacé les quartzites à Bilobites, qu'ils ont poussé vers la surface conjointement avec les assises schisteuses qui leur sont superposées. De cette façon, les quartzites forment la serra de Valle de Mação, qui est le prolongement occidental de la serra d'Alfeijoeira, et ils entourent du côté nord et du côté ouest l'affleurement granitique de Mação, allant se rattacher aux quartzites du moulin de Carregueira. Ces derniers se prolongent vers le nord jusqu'à près de la chapelle de Carregueira, et s'étendent vers le sud presque jusqu'à la route de Penascoso à Mação. Il en est de même du massif de roche éruptive de Penascoso, là où il confine avec le Silurique est aussi partiellement entourée par l'assise de quartzites.

Autant du côté nord que du côté sud de l'affleurement du Silurique, la série schisteuse que nous avons décrite se développe sur les quartzites, les couches ordoviciennes formant par conséquent un pli synclinal, ou plutôt un bassin, étant cachées en grande partie par les couches du Silurique supérieur. Cet étage montre ici, comme nous l'avons dit, beaucoup plus de développement que dans le Bussaco, en comprenant des strates qui n'y sont pas représentées, peut-être parce qu'elles furent entraînées par la dénudation.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Description de la série.— Le Silurique supérieur de cette contrée montre la succession suivante de bas en haut :

1) Schistes fins, tendres, gris, se débitant en menus morceaux par l'exposition à l'air. A une vingtaine de mètres de la base, cette assise montre la première lentille, de quelques décimètres d'épaisseur, de schiste ampéliteux, mou, renfermant des Graptolites (*Monograptus*) et des moules écrasés et très aplatis d'*Orthoceras*. Ces schistes semblent concorder stratigraphiquement avec les quartzites du toit du Silurique inférieur (quoique cette concordance ne soit qu'apparente) et sont intimement liés à un schiste dur, fissile, en partie micacé.

2) Il leur succède un schiste gris, fin, mou, renfermant beaucoup de nodules ellipsoïdaux, durs, dont plusieurs contiennent des fossiles (*Orthoceras*, *Cardiola*, *Monograptus*) et des moules de petites bivalves.

3) Sur le schiste à nodules se développe une zone de schistes fissiles, très bien stratifiés en lits minces, généralement divisés par des lames très minces de quartz blanc qui leur donnent sur les tranches l'aspect d'être rayés, comme le sont les schistes de Gáfete dans la serra de Portalegre. On n'a point découvert de fossiles dans ces schistes. Cette assise est très puissante, elle est épaisse de 150 mètres au moins.

4) Surmontant la série précédente, vient une succession de couches de grès, de quartzites et de schistes gréseux, fissiles, très bien stratifiés, en lits alternants, constituant une assise de plus de 135 mètres de puissance. Les quartzites forment spécialement 5 ou 6 couches distinctes, séparées les unes des autres par des schistes quartzeux qui sont divisés par de minces lames de quartz, comme les schistes sous-jacents. Le passage des quartzites aux schistes se fait graduellement, les lits de quartzite devenant de plus en plus minces jusqu'à ce qu'enfin

ils disparaissent. Chacune des couches est formée par une succession de lits superposés, de quelques décimètres d'épaisseur. La couche la plus inférieure est épaisse d'environ 10 mètres; les autres ont moins de puissance.

Le quartzite est fin, blanc, tout en présentant plusieurs taches ferrugineuses, il est même parfois d'un rouge vif, surtout dans les strates supérieures.

Ces quartzites ressemblent à première vue à ceux qui couronnent la serra de San Mamede, où se trouve le signal géodésique de 1^{er} ordre, cependant la faune en est essentiellement différente. Ils représentent le terme culminant de notre Silurique supérieur (*Upper Ludlow*, ou peut-être *Downtonian*) qui n'est pas représenté au Bussaco.

La distribution des espèces dans cette assise quartzreuse est indiquée de bas en haut dans le tableau suivant:

TABLEAU DES ESPÈCES DU SILURIQUE SUPÉRIEUR D'AMENDOA

NOMS DES ESPÈCES	Grès supérieurs				Schistes à nodules
	4	3	2	1	
<i>Homalonotus</i> sp. n. aff. <i>Knightii</i> Koenig	+	+	+		
<i>Lituities</i> ? (voyez <i>L. ibex</i> Sow. sp.)	..	..	+		
» (voyez <i>L. perelegans</i> Salter) ..	..	..	..	+	
<i>Orthoceras</i> visitatum Barr.	..	..	+		
» cf. <i>Tiphys</i> Barr.	..	..	+		
» ind., plusieurs espèces.	+	+	+	+	+
<i>Phragmotheca</i> ? (voyez Ph. <i>Bohemica</i> Barr.)	..	+			
<i>Hyolithes</i> sp.	..	+			
<i>Bellerophon</i> trilobatus Sow. var. <i>tumidus</i> Sandb. (½ an var. <i>gigantea mihi</i>)	+	+	+		
» <i>carinatus</i> Sow. ..	..	+			
» <i>acutus</i> Sow.	..	..	+		
» <i>striatus</i> Sow. (<i>B. Murchisoni</i> d'Orb.)	..	+			
<i>Holopea</i> cf. <i>elongata</i> Hall.	..	..	+		
<i>Loxonema</i> ou <i>Murchisonia</i> sp. (voyez <i>Holopella</i> <i>obsoleta</i> Sow.)	..	+	+		
<i>Murchisonia</i> sp.	+	+	+		
<i>Platyostoma</i> sp. (voyez <i>Strophostylus</i> <i>obtus</i> Hall.)	..	..	+		
» sp.	+	+	+		
<i>Capulus</i> sp.	..	+			
<i>Pleurotomaria</i> ou <i>Cyclonema</i> (voyez Pl. <i>laevis</i> A. Rømer).	..	..	+		
<i>Panenka</i> <i>humilis</i> Barr.	..	..	+		
» cf. <i>girans</i> Barr.	..	..	..	+	
<i>Cardiola</i> <i>interrupta</i> Sow.	..	+	..	..	+
» <i>migrans</i> Barr.	..	..	..	..	+
» ? <i>striata</i> Sow. sp.	..	..	..	+	+
<i>Ctenodonta</i> <i>Eastnori</i> Sow. sp.	..	+			
» sp. (cf. <i>Nucula</i> <i>coarctata</i> Phillips)	..	+	+		
» sp.	..	+			
<i>Leda</i> aff. <i>similaris</i> Barr.	..	..	+		
» sp., probablement nouvelle	..	+			
<i>Dualina</i> <i>trimera</i> Barr.	..	+			
<i>Slava</i> sp., du type de <i>Slava</i> <i>Bohemica</i> Barr.	..	..	..	..	+
<i>Astarte</i> cf. <i>Bohemica</i> Barr. ...	..	..	..	..	+
» sp.	..	+			
<i>Anodontopsis</i> <i>angustifrons</i> McCoy?	..	..	+		
<i>Mytilus</i> <i>esuriens</i> Barr.	..	..	+		
» cf. <i>Buridani</i> Barr.	..	..	+		
» cf. <i>longior</i> Barr.	..	..	+		
» sp.	+				

NOMS DES ESPÈCES	Grès supérieurs				Schistes à nodules
	4	3	2	1	
<i>Modiolopsis</i> aff. <i>modiolaris</i> <i>Conrad</i> sp.....	..	..	+		
» sp.	..	+			
<i>Macrodon</i> sp. α	..	+			
» sp. β	..	+			
» sp. γ , comprenant une variété à forme très aplatie.....	..	+			
<i>Pterinea</i> cf. <i>demissa</i> <i>Conrad</i> sp. (Pt. <i>retroflexa</i> <i>Wahl.</i> var.)	..	..	+		
» sp., forme très semblable à <i>Megambonia lamellosa</i> <i>Hall.</i>	..	..	..	+	
» ou <i>Avicula</i> , 5 espèces différentes	..	+	+		
<i>Orthonota</i> (<i>Grammysia</i>) <i>cingulata</i> <i>His.</i> sp. var. β (<i>O. triangulata</i> <i>Salter</i>)	..	+	+		
» ou <i>Cyrtodonta</i> (<i>Cypricardites</i>) sp.	..	..	+		
<i>Goniophora</i> ? sp. (voyez <i>G. bipartita</i> <i>F. Rømer</i>)	..	+			
Bivalves ind., plusieurs espèces.....	+	+	+		
<i>Atrypa</i> cf. <i>comata</i> <i>Barr.</i>	..	..	..	..	+
<i>Rhynchonella nucula</i> <i>Sow.</i> sp. (<i>Hypothyris semisulcata</i> <i>Salt.</i>)	..	+	+		
» sp.	+	+	+	+	
Bryozoaire	..	+			
<i>Cyrtograptus</i> sp. (voyez <i>Monograptus vesiculosus</i> <i>Perner</i>)	..	..	..	..	+
<i>Monograptus colonus</i> <i>Barr.</i>	..	..	..	..	+
» sp. n	..	..	..	..	+
» sp. ind.....	..	..	..	..	+

Serra du Bando dos Santos.—La serra du Bando dos Santos, indiquée sur la carte géologique par la cote 641 au nord de Mação, est constituée par cette assise quartzeuse, le signal géodésique de ce nom reposant sur la strate la plus supérieure, qui est formée d'un grès blanc, fin, en quelques points pulvérulent, parfois aussi très dur, passant au véritable quartzite, blanc ou violet par suite de l'infiltration de l'oxyde de fer, et tout pétri de moules de fossiles. Les tranches de ces couches dures, qui sont légèrement pliées en fond de bateau formant un petit synclinal, se montrent sur chaque flanc de la colline.

En outre de cet affleurement, deux autres encore, celui de la serra du Bando de Codes (cote 605, à l'ouest du Bando dos Santos), et celui du sommet de San Gens (cote 393, situé auprès et au sud du Bando dos Santos) où n'est pas représentée l'assise (3), sont formés par ces mêmes strates qui se montrent à différentes altitudes parce que leur inclinaison générale est vers le S.W.

Les quartzites fossilifères du sommet de San Gens reposent immédiatement sur les schistes à nodules, tandis que les serras du Bando dos Santos et du Bando de Codes contiennent une assise de schistes et de grès en couches minces, épaisse de plus de 150 mètres, qui s'interpose entre les schistes à nodules et les quartzites du même niveau que ceux de San Gens.

Ce fait démontre une discordance entre l'assise des quartzites et les schistes sous-jacents, qui ont été dénudés avant la déposition des quartzites, ce qui est d'ailleurs confirmé par la différence absolue des faunes des deux groupes de couches. De là provient que les couches supérieures [assise (4)] reposent à San Gens en transgression sur les schistes à nodules avec *Cardiola interrupta*. Dans la serra du Bando de Codes se trouvent en outre quelques couches de quartzites en gros bancs, qui surmontent les strates les plus supérieures représentées dans le Bando dos Santos.

Les grauwackes et schistes grossiers de Sobrido, qui forment la base du Silurique supérieur à Vallongo, ou qui représentent plutôt un groupe de transition entre le Silurique inférieur et le Silurique supérieur, ne se montrent pas dans cette contrée. Il paraît que ces couches ne se formèrent pas ici, comme il arrive aussi au Bussaco. Les couches les plus inférieures du Gothlandien à Amendoa sont les schistes à Graptolites [assise (1) de la série décrite].

Outliers des grès supérieurs.— Les trois lambeaux cités se présentent isolés, formant de vrais *outliers* au milieu de l'affleurement du Silurique supérieur; ce sont des témoins de la masse principale, que la dénudation a presque totalement enlevée; il est donc facile d'apprécier leurs rapports avec les schistes à nodules qui leur sont sous-jacents.

Il résulte de cette composition du Silurique supérieur que, d'une manière générale, les vallées ou les points les plus bas du sol dans la région qu'il embrasse, sont occupés par les couches plus anciennes, tandis que les points plus élevés sont occupés par les couches plus modernes.

Schiste ampéliteux à Valle das Fontes.— A Valle das Fontes, près du hameau de Carvoeiro, on observe beaucoup de lentilles noires de schiste ampéliteux à Graptolites; on y a fait des recherches infructueuses de charbon, ce qui est arrivé d'ailleurs sur plusieurs autres points de notre pays et à l'étranger.

Le schiste ampéliteux a la même structure que les schistes gris dans lesquels il se montre intercalé. Par l'exposition aux agents extérieurs, il se couvre de plusieurs efflorescences jaunes, de sulfate de fer, provenant de l'oxydation de la pyrite, qui accompagne toujours ces roches.

Les couches qui composent cet affleurement ont subi de fortes pressions qui les ont ondulées, en les faisant répéter plusieurs fois sur des points éloignés; cependant, en définitive, ces ondulations ne sont que des plis synclinaux parallèles, dirigés vers le N.W. et vers le N. Les couches sont en outre traversées par des failles, qui se produisirent parfois avec de grands dénivellements.

Les espèces fossiles recueillies dans les deux séries gothlandienne et ordovicienne de cette contrée, et leur distribution dans les différentes assises se trouvent mentionnées dans le tableau suivant:

TABLEAU GÉNÉRAL DES ESPÈCES
DU SYSTÈME SILURIQUE DANS LE GRAND AFFLEUREMENT DU BASSIN DU TAGE

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien		Ordovicien					
	Grès supérieurs	Schistes à nodules	supérieur		moyen		inférieur	
			Couches culminantes	Schistes à Orthis Berthoisi	Schistes à Homalonus Ehlerti	Schistes à Didymograptus	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
CRUSTACEA								
Acidaspis Buchi Barr.	..	..	..	+				
» cf. Keyserlingi Barr.	..	..	..	+				
» sp.	..	..	..	+				
Areia Bussacensis sp. n.	..	..	..	+				
Calymene Tristani Brongn.	..	..	..	..	+	+		
» Aragoi Rou.	..	..	..	+	+	+		
» pulchra Barr.	..	..	..	+				
Cheirurus claviger Beyr.	..	..	..	+				
» (Eccoptochile) Sedgwicki McCoy	..	..	..	+				
» sp. n. aff. gryphus Barr.	..	..	..	+				
» cf. insocialis Barr.	..	..	..	+				
» sp. (voyez Ch. globosus Barr.)	..	..	..	+				
Dalmanites socialis Barr.	..	..	..	+	+	+		
» » var. proaeva Emmr.	..	..	..	+				
» Angelini Barr.	..	..	..	+				
» aff. Deshayesi Barr.	..	..	..	+				
» Phillipsi Barr.	..	..	..	+	+			
» » var. Beirensis mihi (1 an sp. n.)	..	..	..	+				
» Dujardini Rou.	..	..	..	+				
Harpes cf. Flanaganii Portl.	..	..	..	+				
» cf. Doranni Portl.	..	..	..	+				
Homalonus Deslongchampsii Trom. var. gigantea mihi (1 an sp. n.)	..	..	..	+				
» (Plaesiacomia) breviceaudata Deslongch. sp.	..	..	..	+	+			
» » Oehlerti Kerforne	..	..	..	..	+	+		
» Brongniarti Deslongch.	..	..	..	..	+	+		
» aff. Bohemicus Barr.	..	..	..	..	+			
» cf. bisulcatus Salt.	..	..	..	..	+	+		
» sp. n. aff. Knightii Koenig	+	..	..	..	+			
» rarus Corda.	..	..	..	..	+			
» sp.	..	..	..	+	+			
Maenus Salteri Barr.	..	..	..	+				
» Loredensis sp. n.	..	..	..	+				
» cf. Panderi Barr.	..	..	..	+				
» cf. Bowmanni Salt.	..	..	..	+				
» sp. (avec l'axe très large, 10 segments dans le thorax)	..	..	..	+				
» sp.	..	..	..	+				
» Lusitanicus Sh. (I. giganteus Burm., forme longue)	..	..	..	..	..	+		
» Hispanicus Vern. et Barr. (I. giganteus Burm., forme large)	..	..	..	..	+	+		
Trinucleus Bureaui Oehlert.	..	..	..	+				
» Seunesi Kerforne	..	..	..	+				
Beyrichia simplex Jones	..	..	..	..	+	+		
» Bussacensis Jones	..	..	..	..	+	+		

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien		Ordovicien					
			supérieur		moyen		inférieur	
	Grès supérieurs	Schistes à nodules	Conches culminantes	Schistes à <i>Orthis Berthoisi</i>	Schistes à <i>Homalotus Ehlerti</i>	Schistes à <i>Didymograptus</i>	Quartzites à <i>Bilobites</i>	Quartzites à <i>Scolithus</i>
CEPHALOPODA								
<i>Lituites?</i> (voyez <i>L. perelegans</i> <i>Salter</i>)	+							
» (voyez <i>L. ibex</i> <i>Sow. sp.</i>)	+							
<i>Orthoceras</i> sodale <i>Barr.</i>	..	..	..	+				
» <i>visitatum</i> <i>Barr.</i>	+							
» cf. <i>Tiphys</i> <i>Barr.</i>	+							
» ind., plusieurs espèces	+	+	..	+	+			
<i>Endoceras</i> vaginatus <i>Schloth.</i>	..	..	..	..	..	+		
<i>Phragmotheca?</i> (voyez <i>Phr. Bohemica</i> <i>Barr.</i>)	+							
<i>Cyrtoceras?</i>	..	..	..	+				
PTEROPODA								
<i>Hyalithes</i> undulatus <i>Barr.</i>	..	..	..	..	..	+		
» sp. ind.	+	..	..	..	..	+		
HETEROPODA								
<i>Bellerophon</i> expansus <i>Sow.</i>	..	..	..	+				
» <i>trilobatus</i> <i>Sow.</i> var. <i>tumidus</i> <i>Sandb.</i>	+							
» " juv. <i>Sow.</i>	..	..	..	..	+			
» <i>acutus</i> <i>Sow.</i>	+							
» " juv. <i>Sow.</i>	..	..	..	..	+			
» <i>carinatus</i> <i>Sow.</i>	+							
» <i>striatus</i> <i>Sow.</i> (<i>B. Murchisoni</i> d'Orb.)	+							
GASTROPODA								
<i>Ribeiria</i> pholadiformis <i>Sh.</i>	..	..	..	..	+	+		
» sp.	..	..	..	+	+			
<i>Natica</i> sp. (voyez <i>N. plicistria</i> <i>Phill.</i> var. <i>α</i> <i>Portlock</i>)	..	..	..	+				
<i>Murchisonia</i> ou <i>Loxonema</i> (voyez <i>Holopella obsoleta</i> <i>Sow.</i>)	+							
» sp.	+	..	..	+				
<i>Cyclonema</i> aff. <i>crebristria</i> <i>McCoy</i>	..	..	..	+				
» aff. <i>Montrealensis</i> <i>Bill.</i>	..	..	..	+				
» sp.	..	..	..	+				
<i>Pleurotomaria</i> cf. <i>rotuloides</i> <i>Hall.</i>	..	..	..	+				
» ou <i>Cyclonema</i> (voyez <i>Pl. laevis</i> <i>A. Roemer</i>)	+							
<i>Holopea</i> paludiformis <i>Hall.</i>	..	..	..	+				
» cf. <i>elongata</i> <i>Hall.</i>	+							
» cf. <i>obliqua</i> <i>Hall.</i>	..	..	..	+				
» aff. <i>Guelphensis</i> <i>Bill.</i>	..	..	..	+				
» sp.	..	..	..	+				
» ou <i>Platyostoma</i>	..	..	..	+				
<i>Platyostoma</i> sp. (voyez <i>Strophostylus obtusus</i> <i>Hall.</i>)	+	..	..	+				
» sp.	+	α	..	+				
<i>Capulus</i> sp.	+							
Univalves ind., plusieurs espèces	..	..	..	+				
LAMELLIBRANCHIATA								
<i>Dolabra?</i> <i>Lusitanica</i> <i>Sh.</i>	..	..	..	+	+	+		
<i>Cypriocardia?</i> <i>Beirensis</i> <i>Sh.</i>	..	..	..	..	+	+		
<i>Redonia</i> <i>Duvaliana</i> <i>Rou.</i>	..	..	..	..	..	+		

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien		Ordovicien					
	Grès supérieurs	Schistes à nodules	supérieur		moyen		inférieur	
			Couches culminantes	Schistes à Orthis Berthoisi	Schistes à Homalotus Ehlerti	Schistes à Didymograptus	Quartzites à Bilobites	Quartzites à Scolithus
<i>Redonia Bohemica</i> Barr.	..	..	..	..	..	+		
» sp.	..	..	..	..	+			
<i>Modiolopsis</i> aff. <i>Draboviensis</i> Barr.	..	..	..	..	+			
» cf. <i>Armorici</i> Salt.	..	..	..	..	+			
» aff. <i>modiolaris</i> Conrad sp.	+							
» sp.	+							
<i>Anodontopsis angustifrons</i> McCoy?	+							
<i>Deeruska</i> (<i>Filiola</i>) <i>primula</i> var. <i>curtior</i> Barr.	..	..	..	..	+	+		
<i>Panenka humilis</i> Barr.	+							
» cf. <i>gyrans</i> Barr.	+							
<i>Cardiola interrupta</i> Sow.	+	+						
» <i>migrans</i> Barr.	..	+						
» ? <i>striata</i> Sow.	+	+						
<i>Slava</i> sp., du type de <i>S. Bohemica</i> Barr.	..	+						
<i>Astarte</i> cf. <i>Bohemica</i> Barr. ..	..	+						
» sp.	+							
<i>Leda incola</i> Barr.	..	..	..	+				
» <i>Escosurae</i> Sh.?	..	..	..	+				
» aff. <i>similaris</i> Barr.	+							
» sp. n.	+							
<i>Ctenodonta Eastnori</i> Sow.	+							
» <i>Ciae</i> Sh.	..	..	..	+	+			
» <i>Costae</i> Sh.	..	..	..	+	+			
» <i>Beirensis</i> Sh.	..	..	..	+	+	?		
» <i>Ribeiroi</i> Sh.	..	..	..	+	+			
» <i>Bussacensis</i> Sh.	..	..	..	..	+			
» <i>Ezquerrae</i> Sh.	..	..	..	..	+			
» sp. n. <i>gigantea</i> , du type de <i>C. Beirensis</i>	..	..	..	..	+			
» sp. α (cf. <i>Nucula coarctata</i> Phillips)	+							
» sp. β	+							
» sp. ind.	..	..	..	..	+	?		
<i>Dualina trimera</i> Barr.	+							
<i>Orthonota britannica</i> Rou.? (<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.)	..	..	..	..	..	+		
» (<i>Grammysia</i>) <i>cingulata</i> His. var. β <i>triangulata</i> Salt.	+							
<i>Macrodon</i> sp. α	+							
» sp. β	+							
» sp. γ	+							
<i>Goniophora</i> ? (voyez <i>G. bipartita</i> F. Roemer)	+							
<i>Mytilus esuriens</i> Barr.	+							
» cf. <i>longior</i> Barr.	+							
» cf. <i>Buridani</i> Barr.	+							
» sp.	+							
<i>Pterinea</i> cf. <i>demissa</i> Conrad sp. (<i>P. retroflexa</i> Wahl. var.)	+							
» sp., forme ressemblant beaucoup à <i>Megambonia lamellosa</i> Hall. ...	+							
» ou <i>Avicula</i> , 5 espèces différentes	+							
<i>Bivalves</i> ind., plusieurs espèces	+	..	..	+	+	+		
BRACHIOPODA								
<i>Orthis ellipsoides</i> Barr.	..	..	..	..	+	+		
» <i>testudinaria</i> Dalm.	..	..	..	+	+	+		
» <i>Ribeiroi</i> Sh.	..	..	..	..	..	+		

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien		Ordovicien					
	Grès supérieurs	Schistes à nodules	supérieur		moyen		inférieur	
			Couches culminantes	Schistes à <i>Orthis Berthoisi</i>	Schistes à <i>Homonolotus Ehlerti</i>	Schistes à <i>Didymograptus</i>	Quartzites à Bilobites	Quartzites à <i>Scolithus</i>
<i>Orthis</i> aff. <i>Trubinensis</i> Barr.	..	..	..	..	+	+		
» <i>elegantula</i> Dalm.	..	..	..	+				
» <i>verpertilio</i> Sow.	..	..	..	+				
» <i>Berthoisi</i> Rou.	..	..	..	+				
» sp.	..	..	..	..	..	+		
<i>Strophomena pecten</i> Linn.	..	..	..	+				
» sp.	..	..	..	+				
<i>Porambonites Ribeiroi</i> Sh.?	..	..	..	+				
<i>Rhynchonella nucula</i> Sow. (<i>Hypothyris semisulcata</i> Salt.) ..	+							
» sp.	+							
<i>Atrypa</i> cf. <i>insolita</i> Barr.	..	+						
» cf. <i>comata</i> Barr.	..	+						
Brachiopodes ind., plusieurs espèces ..	..	..	..	+				
BRYOZOA								
<i>Synocladia hypnoides</i> Sh.	..	..	..	+				
<i>Clathropora</i> sp.	..	..	..	+				
<i>Fenestella</i> ? ..	..	..	..	..	+			
Bryozoaire ind.	+							
ANNELIDA								
<i>Myrianites</i> sp.	..	..	+					
ECHINODERMATA								
<i>Caryocrinus ornatus</i> Say.	..	..	..	+				
» ? sp.	..	..	..	+				
<i>Mimocystites</i> ? ..	..	..	..	+				
<i>Rhombifera Bohemica</i> Barr.	..	..	..	+				
» ? sp. n.	..	..	..	+				
<i>Homocystites</i> cf. <i>alter</i> Barr.	..	..	..	+				
<i>Echinosphaerites quaerendus</i> Barr.	..	..	..	+				
» ? (voyez <i>E. confortatus</i> Barr.) ..	..	..	..	+				
<i>Calix</i> (<i>Echinosphaerites</i>) <i>Murchisoni</i> Vern. et Barr.	..	..	..	..	..	+		
<i>Oroecystites</i> cf. <i>Helmhackeri</i> Barr.	..	..	..	+				
<i>Aristocystites Bohemicus</i> Barr.? ..	..	..	..	+				
Crinoïdes ind., fragments de la tige ..	..	..	..	+	+			
COELENTERATA								
<i>Cyrtograptus</i> ? ..	..	+						
<i>Monograptus priodon</i> Bronn. var. <i>validus</i> Perner ..	..	+						
» <i>colonus</i> Barr.	..	+						
» <i>latus</i> McCoy ..	..	+						
» <i>dubius</i> Suess ..	..	+						
» <i>Roemeri</i> Barr.? ..	..	+						
» sp. n.	..	+						
» autres espèces indéterminées ..	..	+						
<i>Didymograptus Murchisoni</i> Bæck.	..	..	..	..	..	+		
» » var. <i>geminus</i> His.	..	..	..	..	..	+		

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien		Ordovicien				
	Grès supérieurs	Schistes à nodules	supérieur		moyen		inférieur
			Couches culminantes	Schistes à Orthis Berthouisi	Schistes à Homalotus Ehlerti	Schistes à Didymograptus	Quartzites à Bilobites Quartzites à Scolithus
Didymograptus bifidus Hall.	..	..	..	..	..	+	
» cf. clavulus Perner.....	..	..	..	..	..	+	
Favosites fibrosa Goldf.	..	..	..	+			
Calamopora spongites Goldf.	..	..	..	+			
Cyathaxonia ou Zaphrentis	..	..	..	+			
Chaetetes (Monotrypella) cf. arbusculus Hall.	..	..	..	+			
Heliolites Murchisoni Milne Edwards et J. Haime.....	..	..	..	+			
Zaphrentis ou Cyathophyllum	..	..	..	+			
INCERTAE SEDIS							
Cruziana Goldfussi Rou.	..	..	..	..	..	..	+
» cf. Goldfussi Rou.	..	..	..	..	..	..	+
» furcifera d'Orb.	..	..	..	..	..	..	+
» Beirensis Delg.	..	..	..	..	..	..	+
» Bagnolensis Morière	..	..	..	..	..	..	+
» Cordieri Rou.	..	..	..	..	..	..	+
» cf. Cordieri Rou.	..	..	..	..	..	..	+
Arthropycus Harlani Hall.	..	..	..	..	..	..	+
Foralites gracilis Delg.	..	..	..	..	..	..	+
» Pomeli Rou.	..	..	..	..	..	..	+
Scolithus Dufrenoyi Rou.	..	..	..	..	..	..	+
Vexillum Morierei Sap.	..	..	..	..	..	..	+

Pour la meilleure intelligence du tableau qui précède, nous jugeons utile d'ajouter la description de deux coupes où est représentée la série entière du Silurique de cette région.

Coupe depuis le signal géodésique du Bando dos Santos au signal du Pico do Ar passant par le hameau de Sanguinheira. (Pl. V, profil n° 6.)

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Grès supérieurs

1. Distance horizontale 120^m.—Grès fin, en partie friable, en partie dur, passant à un vrai quartzite blanc, avec taches violacé foncé et rougeâtres. Ce grès est très fossilifère et les fossiles sont tous à l'état de moules solidement enchâssés dans la roche, le plus souvent revêtus d'une pellicule noire, qui donne un trait rouge cerise ou jaunâtre quand elle est entamée par une pointe d'acier. La même substance noire (oxyde de fer), avec du quartz, occupe les cloisons des chambres d'air des Orthocères et remplit aussi la cavité du siphon.

Ce grès forme en général de minces lits de quelques centimètres jusqu'à 2 décimètres d'épaisseur, quelques-uns atteignant exceptionnellement 5 à 6 décimètres de diamètre.

Cette même couche a été fouillée à 100^m au S. 10° W. du signal géodésique du Bando et à 350^m au S. 30° W. du même signal. Ce n'est que très rarement qu'il y a dans ce massif des interpositions de lits de schiste.

Les strates comprises dans ce n° 1 sont les plus supérieures d'une série simple, qui descend régulièrement jusqu'au n° 8.

Homalonotus sp. n. aff. *Knightii* Koenig.
Orthoceras ind., 3 ou 4 espèces.
Phragmotheca ? (voyez *Ph. Bohemica* Barr.)
Hyolithes ?
Bellerophon carinatus Sow.
 " *striatus* Sow. (*B. Murchisoni* d'Orb.)
Loxonema ou *Murchisonia* (voyez *Holopella obsoleta* Sow.).
Platyostoma sp.
Ctenodonta sp. (voyez *Nucula coarctata* Phillips)
 " sp.

Leda sp.
Macrodon sp. F.
Orthonota (*Grammysia*) *cingulata* His. sp. var. β (*O. triangulata* Salter).
Astarte sp.
Modiolopsis sp.
Pterinea ?
Bivalves ind.
Rhynchonella nucula Sow. sp.
 " sp.

Direction des strates N. 37 à 47° W. Plongement 20 à 40° vers le S.W.

2. Dist. hor. 30^m.—Quartzite blanc, en lits d'épaisseurs diverses, généralement très minces, de quelques centimètres jusqu'à 1 décimètre, quelques-uns contenant beaucoup de moules de petites bivalves et de Rhynchonelles enchâssés dans la roche et absolument indéterminables.

Même direction et plongement des strates.

3. Dist. hor. 90^m.—Grès fin, micacé, blanchâtre et quartzite blanc taché de rouge et de violet, formant généralement des lits minces avec intercalations d'autres lits de schiste grossier, micacé, rougeâtre foncé, à surface très irrégulière, et de grès blanc et violet avec un aspect semblable. A la partie inférieure du complexe, quelques lits renferment des moules de bivalves et d'Orthocères enchâssés dans le grès et indéterminables.

Lituites ? (voyez *L. ibex* Sow. sp.)
Orthoceras sp.

Pterinea sp.
Bivalves ind.

Même direction et plongement des strates.

4. Dist. hor. 90^m.—Quartzite blanc et violet clair avec des taches rougeâtre foncé produites par l'oxyde de fer, qui revêt les cavités laissées par la destruction de quelques fossiles (Orthocères) formant une pellicule noire, quelquefois luisante, donnant un trait rouge. Ce quartzite forme généralement des lits minces variant entre quelques centimètres et 1 décimètre d'épaisseur, toutefois ils atteignent jusqu'à 5 décimètres.

Il alterne avec quelques lits de schiste grossier, micacé, et de quartzite micacé, et à la partie inférieure du complexe, il contient quelques moules de petites bivalves et d'Orthocères très solidement enchâssés dans la roche.

On pourrait vraisemblablement réunir ce complexe avec le numéro précédent pour former un seul massif.

Orthoceras ind., 2 espèces au moins.
Lituites ? (voyez *L. perelegans* Salt.)
Panenka cf. *gyrans* Barr., un moule.
Cardiola ? *striata* Sow. sp.

Pterinea sp., forme très semblable à *Megambonia lamellosa* Hall.
Rhynchonella sp.

Même direction et plongement des strates.

5. Dist. hor. 60^m.—Grès schistoïde, très micacé, d'un gris clair taché de violet et de rougeâtre, se divisant en minces plaquettes à surface irrégulière. Ce grès devient compact en quelques points et passe parfois au quartzite. Quelques lits ont une couleur rouge-violet foncé. Il n'a pas fourni de fossiles.

Même direction et plongement des strates.

6. Dist. hor. 240^m.—Schiste fin, gris foncé avec taches jaunâtre clair, ayant plusieurs intercalations de lits, épais de 1 à 3 centimètres, de grès argileux, schistoïde, très micacé, divisé en plaquettes à surface unie, et d'autres lits de quartzite grossier, gris foncé et rougeâtre, aussi très micacé, mouchelé de points rouges d'oxyde de fer provenant de l'altération du mica. Sans fossiles.

Même direction des strates. Plongement 30 à 50° vers le S.W.

Schistes à nodules

7. Dist. hor. 370^m.—Schiste fin, dur, fissile, gris foncé, avec beaucoup de minces lits intercalés, de grès schistoïde et de quartzite grossier schistoïde, très micacés, de couleur gris-noirâtre. Dans la partie inférieure du complexe, quelques lits renferment de mauvaises empreintes de Graptolites. A la partie supérieure, il y a aussi des strates de schistes à Graptolites avec des Orthocères, des petites bivalves et quelques nodules argilo-siliceux fossilifères, distribués dans un schiste gris, fin et doux. Les strates se présentent ondulées en plusieurs points. Ce complexe correspond évidemment aux schistes à nodules de Sazes (Bussaco).

Orthoceras sp., dans les nodules et aussi en mou-
les très écrasés dans le schiste. f.

Astarte cf. *Bohemica* Barr. f.

Cardiola interrupta Sow.

» *migrans* Barr.

» ? *striata* Sow.

Slava sp., du type de *Slava Bohemica* Barr.

Cyrtograptus? sp. (voyez *Monograptus vesiculosus* Perner)

Monograptus colonus Barr.

» sp. n.

» ind., plusieurs espèces.

Même direction et plongement des strates.

8. Dist. hor. 90^m.—Schiste fissile, micacé, noir, avec intercalation de quelques minces lits de schiste grossier, très micacé, couleur verdâtre foncé, et de grauwaque schistoïde, aussi très micacée, de même couleur verdâtre. Le schiste noir renferme des empreintes très frustes de Graptolites et d'une bivalve.

Monograptus ind.

Atrypa cf. *comata* Barr.

Même direction et plongement des strates.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Couches culminantes

9. Dist. hor. 275^m. Grès fin, micacé, blanc sale et quartzite en minces lits de 2 à 35 centimètres d'épaisseur, avec du mica blanc, très inégalement distribué. Sans fossiles. Les strates sont fort plissées, il a donc été impossible de préciser leur puissance. Ils appartiennent au toit de l'Ordovicien.

Direction des strates N. 57 à 77° W. Plongement très varié depuis 10° jusqu'à 70° vers le S.W. et le N.E. en vertu du plissement.

Outlier du Gothlandien

10. Dist. hor. 300^m.—Schiste noir, fissile, et schiste gris-verdâtre avec la structure confuse, comprenant quelques lits de grauwaque très micacée, rougeâtre et jaunâtre, à division un peu schistoïde. Quelques lits du schiste noir contiennent des Graptolites et des empreintes d'une petite bivalve, probablement un Brachiopode. Le schiste verdâtre, traversé par des veinules d'oxyde de fer terreux (ocre), montre des empreintes indéterminables d'une petite bivalve. Ce complexe correspond très vraisemblablement au n° 8 et représente un lambeau du Gothlandien (*outlier*) reposant sur les quartzites du toit de l'Ordovicien, qui est représenté par les numéros 9 et 11.

Orthoceras ind.

Atrypa cf. *insolita* Barr.

Monograptus priodon Bronn var. *validus* Perner.

» *colonus* Barr.

Monograptus latus McCoy.

» *Ræmeri* Barr.?

» *dubius* Suess.

Direction des strates N. 37 à 67° W. Plongement 40 à 60° vers le N.E.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Couches culminantes

11. Dist. hor. 15^m.—Grès fin blanc, peu micacé, passant parfois au quartzite, en minces lits de 1 à 35 centimètres d'épaisseur. Il n'a pas fourni de fossiles. Cette couche est identique au n° 9 et forme, comme nous l'avons dit, le toit de l'Ordovicien.

Direction des strates N. 47 à 77° W. Plongement près de la verticale.

12. Dist. hor. 35^m.—Schiste plus ou moins micacé, gris taché de blanc et de jaunâtre par un commencement d'altération. Il comprend 3 ou 4 lits de grès fin, blanc avec taches jaunâtres, dur, passant au quartzite. Sans fossiles.

Direction des strates N. 77 à 87° W. Plongement 40 à 60° vers l'occident.

13. Dist. hor. 30^m.—Grès blanc, peu micacé, plus ou moins dur, parfois trop tendre et friable, renfermant des parties argileuses, de couleur marron foncé, formant des lits épais de 10 à 60 centimètres. Sans fossiles.

Même direction et plongement des strates.

Schistes à *Orthis Berthoisi*

14. Dist. hor. 175^m.—Schistes grossiers, très micacés, couleur gris foncé avec taches jaunâtres ocracées par commencement d'altération, comprenant quelques lits de grauwacke fine, schistoïde, gris jaunâtre et rougeâtre foncé. A la partie inférieure du complexe il y a 2 lits de grès fossilifère.

Orthoceras ind.

Orthis Berthoisi Rou., individus peu développés.

Gastropode ou *Hétéropode*.

Bryozoaire ou *Polypier*.

Direction des strates N. 67 à 82° W. Plongement 50° vers le S. S. W.

Couches culminantes

15. Dist. hor. 55^m.—Quartzite fin, en partie schistoïde, couleur gris clair, peu micacé, avec le mica (muscovite) distribué très irrégulièrement, sauf à la surface des lits où il est très abondant et forme une mince pellicule qui devient rougeâtre par altération. Ce quartzite est bien stratifié en lits minces de 2 à 35 centimètres d'épaisseur. Cette couche correspond au n° 11 décrit ci-dessus. Elle ne contient pas de fossiles.

Même direction des strates. Plongement 50 à 70° vers le S. W.

16. Dir. hor. 65^m.—Schiste verdâtre foncé avec taches jaunâtres, renfermant quelques lits de quartzite et de grès fin, dur, passant au quartzite. Il correspond au n° 12, dont il est une répétition.

Direction des strates N. 70° W. Plongement 50 à 60° vers le S. S. W.

17. Dist. hor. 20^m.—Quartzite fin et grès passant au quartzite avec du mica blanc, formant des lits de 5 à 60 centimètres d'épaisseur. Ce complexe correspond au n° 13, de même il ne contient pas de fossiles.

Direction des strates N. 67 à 77° W. Plongement 40 à 50° vers le S. S. W.

Schistes à *Orthis Berthoisi*

48. Dist. hor. 145^m.—Schiste très micacé, gris foncé à l'intérieur, blanc avec taches jaunâtres à la surface des couches. Il contient quelques lits intercalés de grès fin schistoïde, très micacé, blanc, jaunâtre ou rougeâtre. Quelques lits du schiste sont fossilifères.

Dalmanites Dujardini Rou., quelques mauvaises glabelles.

Orthis Berthoisi Rou., individus de petite taille. F.

Ctenodonta Ciae Sh.?

Crinoïde.

Zaphrentis ou *Cyathophyllum*.

Même direction des strates. Plongement 40 à 70° vers le S. S. W. et le N. N. E.

19. Dist. hor. 120^m.—Schiste micacé, gris foncé avec taches claires, jaunâtres. Il est en partie très micacé, en d'autres points il contient beaucoup de sable très fin et passe à un schiste gréseux, micacé, à texture massive ou compacte, gris foncé ou rougeâtre par altération.

Direction des strates N. 77 à 90° W. Plongement 70 à 80° vers le N.

20. Dist. hor. 235^m.—Schistes très micacés, plus ou moins grossiers, non fissiles, tachés de gris clair et de gris foncé, et schiste plus dur, verdâtre foncé avec taches ocracées, jaunâtres et couleur marron. Ce massif comprend quelques minces lits de quartzite très micacé, gris foncé, et de grès fin ou grauwaque micacée, un peu schistoïde, de couleur jaunâtre claire par un commencement d'altération. Les fossiles paraissent aussi bien dans le schiste, où ils sont d'ailleurs en plus grande abondance, que dans la grauwaque. Ce complexe correspond aux numéros 18 et 23.

Calymene Aragoi Rou., individus très développés. f.

Dalmanites Dujardini Rou., une seule tête.

Trinucleus Bureaui OEhlert, dans le schiste verdâtre.

Platystoma sp.

Orthis Berthoisi Rou., dans le schiste gris et dans la grauwaque. F.

» *testudinaria* Dalm.

Synocladia hypnoides Sh.?

Caryocrinus ornatus Say.

Mimocystites?

Hemocystites cf. *alter* Barr.

Orocystites cf. *Helmhackeri* Barr.

Echinosphaerites quaerendus Barr.

Crinoïde ind., fragment de la tige.

Calamopora spongites Goldf.

Favosites fibrosa Goldf.

Direction de la stratification N. 72° W. à N. 82° W. Plongement 60 à 72° vers le S. S. W.

21. Dist. hor. 240^m.—Schistes plus ou moins micacés, sans fossiles, gris foncé ou gris avec taches claires, en partie grossiers et durs passant à un grès fin. Ce massif schisteux comprend une couche de quartzite fin, qui lui est immédiatement sous-jacent et qui comprend quelques lits de schiste intercalés. Ce quartzite forme une masse compacte à laquelle est subordonné un grès schistoïde très micacé; il correspond vraisemblablement au n° 15.

Les schistes ont sur plusieurs points la structure globulaire, ils forment de grandes boules d'un mètre et plus de diamètre; par l'action atmosphérique ils se divisent en très petits morceaux, parfois à formes anguleuses, d'autres fois allongés.

Direction des strates N. 77° W. Plongement de 20 à 60° vers le S. S. W. et le N. N. E., par suite du plissement.

22. Dist. hor. 50^m.—Quartzite et grès fin partiellement très micacé et schistoïde, formant respectivement des lits minces et des bancs puissants jusqu'à 1^m,5 d'épaisseur. Au milieu du massif se trouvent quelques strates de schiste dur, très grossier et micacé, gris noirâtre, passant à un grès fin, argileux, micacé. Point de fossiles.

Direction des strates N. 67 à 77° W. Plongement 30 à 50° vers le S. S. W.

23. Dist. hor. 180^m.—Schistes grossiers très micacés, comprenant de minces lits de quartzite parfois schistoïde et très micacé, gris foncé et noirâtre, en partie fossilifère. Ce complexe comprend aussi un lit irrégulier, épais de 0^m,4 à peu près, d'un conglomérat formé de galets de schiste argileux, compact, du Précambrique, très roulés et arrondis liés entre eux par un ciment du même schiste. Ce complexe correspond aux numéros 18 et 20 précédemment décrits.

Trinucleus Seunesi Kerforne.

Homalonotus sp., une glabellle.

Calymene Aragoi Rou., échantillons de grande taille. f.

Dalmanites socialis Barr., individus très développés.

Ctenodonta Costae Sh.

Bivalve ind.

Orthis Berthoisi Rou., échantillons peu développés. F.

» ind.

Crinoïde, empreinte d'une tige enroulée.

Calamopora spongites Goldf.

Schistes à *Homalonotus* Ehlerti

24. Dist. hor. 75^m.—Schistes irrégulièrement micacés, avec de petites concrétions dures ou nodules argilo-sableux, de couleur gris noirâtre, devenant gris clair et jaunâtre ocracé par un commencement d'altération. Ce massif renferme à la partie supérieure quelques lits de quartzite et de

grès dur schistoïde ou grauwacke fine très micacée, avec beaucoup de fossiles dans quelques strates, les moules de petites bivalves (*Ctenodonta* et autres Lamellibranches) prédominant surtout. Les restes de Trilobites sont moins nombreux, toujours très déformés et l'on n'en trouve pas un seul moule entier. Les fossiles se trouvent aussi bien dans les schistes que dans le grès schistoïde et dans les nodules; ils sont pourtant bien plus fréquents et mieux conservés dans les schistes.

<i>Dalmanites socialis</i> Barr.	<i>Ctenodonta Ciae</i> Sh.
<i>Calymene Tristani</i> Brongn. f.	» <i>Ribeiroi</i> Sh.
<i>Homalonotus OEhlerti</i> Kerforne.	» <i>Costae</i> Sh.
» <i>rarus</i> Corda, un seul exemplaire. R.	» <i>Bussacensis</i> Sh.
» aff. <i>Bohemicus</i> Barr.	» <i>Ezquerrae</i> Sh.
<i>Beyrichia Bussacensis</i> Jones.	» sp.
» <i>simplex</i> Jones.	<i>Redonia</i> ?
<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Modiolopsis</i> cf. <i>Armorici</i> Salt. (an <i>Cyrtodonta</i> ?).
<i>Bellerophon trilobatus</i> juv. Sow.	<i>Cypricardia</i> ? <i>Beirensis</i> Sh.
<i>Ribeiria pholadiformis</i> Sh.	<i>Dolabra</i> ? <i>Lusitanica</i> Sh.
» sp.	<i>Crinoïdes</i> .
<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.	<i>Bryozoaire (Fenestella?)</i> .

Même direction des strates. Plongement de 60° vers le S. S. W.

25. Dist. hor. 140^m.—Quartzite et grès fin, dur, très micacé et schistoïde, couleur gris et blanc, avec quelques lits subordonnés de schiste grossier très micacé. Les lits de quartzite et de grès sont épais de 10 à 40 centimètres. Ils renferment peu de fossiles qui sont tous en très mauvais état. Le grès a fourni:

Débris de <i>Trilobites</i> .	Moules de petites bivalves (<i>Ctenodonta</i> ?) empâtés dans
<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.	la roche.

Direction des strates N. 57 à 77° W. Plongement 50 à 68° vers le S. S. W.

Schistes à *Didymograptus*

26. Dist. hor. 155^m.—Schistes gris, irrégulièrement micacés, parfois très chargés de mica, contenant des moules de fossiles, en général mauvais et très empâtés, surtout des *Orthis*, qui sont très abondants dans une strate.

<i>Iliaenus hispanicus</i> Vern. et Barr.	<i>Redonia</i> sp.
<i>Dalmanites socialis</i> Barr.	<i>Cypricardia</i> ? <i>Beirensis</i> Sh.
<i>Calymene Aragoi</i> Rou.	<i>Orthis Ribeiroi</i> Sh. r.
» <i>Tristani</i> Brongn. f.	» <i>ellipsoïdes</i> Barr.
<i>Homalonotus</i> sp.	» <i>testudinaria</i> Dalm.
<i>Ribeiria</i> sp.	» aff. <i>Trubinensis</i> Barr.

Direction des strates N. 67 à 77° W. Plongement 50° vers le S. S. W.

PLÉISTOCÈNE

27. Dist. hor. 60^m.—Sable très fin, jaunâtre, aggloméré par un ciment argileux avec des cailloux roulés, mais conservant encore des vestiges de leurs formes anguleuses primitives. C'est un dépôt pléistocénique, qui interrompt la coupe en cachant une partie du Silurique.

Schistes à *Didymograptus*

28. Dist. hor. 150^m.—Schistes gris, fins, peu fissiles, très peu micacés, comprenant à la partie inférieure du massif un lit bréchiforme ou de conglomérat vert-noirâtre, épais de 0^m,1, qui surmonte la strate de schiste argileux où les *Didymograptus* sont fort abondants. Ce conglomérat a un ciment ferrugineux à texture oolithique (chamoisite ou schiste chamoisitique).

Le massif se termine à la base par un faisceau de lits alternants de schiste argileux et de grès fin schistoïde, très micacé, qui établit le passage à l'assise de quartzites à Bilobites sous-jacente. Le grès est traversé perpendiculairement par des corps cylindroïdes, évidemment les moules de traces pratiqués par des vers perforants.

Les fossiles sont en général très mauvais et de petite taille.

Ogygia sp., hypostome.

Illaenus Hispanicus juv. Vern. et Barr.

Calymene Tristani Brongn., individus peu développés.

Dalmanites socialis Barr., id.

Beyrichia simplex Jones.

Endoceras vaginatus Schloth.

Hyalithes sp.

Ribeiria pholadiformis Sh.

Redonia Duvaliana Rou.

Dolabra? Lusitanica Sh.

Bivalves ind., 2 petites espèces.

Orthis testudinaria Dalm., des moules très petits.

Calix (Echinospaerites) Murchisoni Vern. et Barr.

Didymograptus Murchisoni Böck. F.

Direction et plongement des strates, les mêmes du n° 26.

Quartzites à Bilobites

29. Dist. hor. 480^m.—Quartzite et grès dur passant au quartzite, finement micacés, avec Bilobites, généralement en lits minces, mais comprenant aussi 3 ou 4 bancs épais de 1 mètre, avec intercalations de lits de schiste grossier et gréseux, très micacé. On y a recueilli les espèces suivantes:

Cruziana furcifera d'Orb. f.

» *Goldfussi* Rou.

» *Bagnolensis* Morière.

Cruziana cf. *Cordieri* Rou.

Foralites? sp.¹

Les strates continuent dans la même direction, mais plongent avec une inclinaison faible, de 40 à 45°, vers les quadrans du S.W. et du N.E.

Quartzites à Scolithus

30. Dist. hor. 165^m.—Grès fins et quartzite blancs en strates très épaisses avec *Scolithus*. A la base du massif il y a une alternance de strates de grès grossier contenant beaucoup de débris de cristaux d'orthose et de grès fin où manquent les *Scolithus*. Ces fossiles ne se trouvent pas dans toutes les strates de quartzite, mais ils les traversent toujours perpendiculairement.

Direction des strates environ E.-W. Plongement de 20 à 40° vers le S.

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

31. Schiste argileux, gris, fin, et grauwacke fine, micacée, de même couleur, en bancs alternants, très épais et parcourus par de nombreux joints qui les divisent en masses prismatiques. Ce complexe appartient au Précambrique supérieur. Les strates suivent les directions N. 53 à 73° E. Leur plongement est de 60 à 70° vers le S.E. Il y a donc une discordance bien manifeste avec les couches du système Silurique.

¹ Les moules de cette dernière espèce traversent perpendiculairement les échantillons de *Cr. furcifera* et quelques plaquettes de quartzite. J'hésite à les rapporter au genre *Foralites* parce qu'ils sont parfois conjugués ou disposés par couples comme les *Arenicolites*. En tout cas ils diffèrent de *F. gracilis* Delg. et de *F. Pomeli* Rou. [Cf. *Q. J.*, n° 135, p. 763 et *Siluria*, 3^e éd., p. 41, fossils (3), qui représentent des formes semblables à celle-ci].

Coupe depuis Aldeia d'Eiras jusqu'au hameau de Roballo montrant l'épaisseur du Silurique inférieur dans cette contrée. (Pl. I, profil n° 7.)

SILURIQUE SUPÉRIEUR

1. Schiste fin, fissile, micacé, noir, très chargé de petits cristaux cubiques de pyrite, qui à cause de la facilité avec laquelle leurs éléments s'altèrent à l'air, produisent des efflorescences de sulfate de fer qui amènent la décomposition entière du schiste. Celui-ci renferme des empreintes de Graptolites et d'une petite bivalve, parfois si abondantes qu'elles couvrent entièrement la surface de quelques plaquettes du schiste.

Monograptus colonus Barr.

Atrypa cf. *comata* Barr.

Cette couche correspond au n° 8 de la coupe du signal du Bando dos Santos au signal du Pico do Ar précédemment décrite.

La direction des strates est N. 77 à 87° W. Plongement de 50° vers le S. S. W.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Couches culminantes

2. Quartzite gris foncé, gris clair et blanchâtre, en lits généralement peu épais (5 à 30 centimètres), exceptionnellement 2 ou 3 bancs ont 60 à 80 centimètres d'épaisseur. Il y a intercalés dans ce quartzite quelques lits de schiste grossier, micacé et de quartzite aussi micacé, un peu schistoïde. Point de fossiles.

Direction de la stratification N. 57 à 77° W. Plongement 40 à 60° vers le S. S. W. Épaisseur 45^m.

3. Schiste tégulaire, fin, dur, gris-noirâtre, irrégulièrement et très finement micacé, avec quelques traces de Néréides. A la partie inférieure il comprend trois lits de quartzite blanchâtre, ayant chacun de 30 à 40 centimètres d'épaisseur. Dans le schiste on a découvert quelques moules et empreintes de *Myrianites*.

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 18^m.

4. Schistes gris, en général très grossiers et très micacés, à stratification peu distincte, avec des petites concrétions dures à formes très irrégulières. Quelques strates à grain plus fin ont la structure globulaire, ils se divisent en fragments allongés, irrégulièrement prismatiques. D'autres strates sont fort chargées de sable et passent à un grès fin ou quartzite schistoïde très micacé. Sans fossiles.

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 34^m.

5. Quartzite plus ou moins fin, micacé, et grès fin, dur, très micacé, passant au quartzite, gris verdâtre, ordinairement en bancs épais de 40 à 80 centimètres, comprenant des lits plus minces, de 15 à 20 centimètres.

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 18^m.

Schistes à *Orthis* Berthoisi

6. Schiste grossier, très micacé et gréseux, faisant transition au grès, ayant intercalés des lits de schiste fin, très micacé, et d'autres lits plus minces de grauwacke schistoïde aussi très micacée. Quelques strates de ce complexe sont fossilifères.

Dalmanites socialis Barr.

Bellerophon expansus Sow.

Ribeiria sp.

Leda Escosurae Sh.?

» *incola* Barr.

Ctenodonta Ciae Sh.

» ?, deux petits moules.

Orthis Berthoisi Rou. F.

Cystidée ind.

Cyathaxonia ou *Zaphrentis*.

Direction des strates N. 72 à 82° W. Plongement 50 à 60° vers le S. S. W. Épaisseur 110^m.

7. Schistes plus ou moins grossiers et irrégulièrement micacés, gris foncé avec taches jaunâtres, le plus souvent peu fissiles, contenant de petites concrétions dures, à formes irrégulières. Accidentellement ils possèdent la texture oolithique et montrent une teinte verdâtre ocracée par un commencement d'altération. Ils renferment quelques lits de quartzite gris foncé, finement micacé, épais de 2 à 30 centimètres, de grès fin, dur, schistoïde, très micacé, et de grauwaque fine, schistoïde, blanchâtre. Au milieu de cet ensemble quelques lits de schiste sont fossilifères. On y a recueilli les espèces suivantes:

<i>Cheirurus claviger</i> Beyr.	<i>Dolabra? Lusitanica</i> Sh.
<i>Iliaenus</i> aff. <i>Panderi</i> Barr., forme large.	<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.
<i>Homalonotus</i> sp.	» <i>Ribeiroi</i> Sh.?
<i>Calymene Aragoi</i> Rou., individus de grande taille.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.?
<i>Dalmanites socialis</i> juv. Barr.	<i>Strophomena pecten</i> Linn.
<i>Cyclonema</i> sp.	<i>Mimocystites?</i>
<i>Platyostoma</i> sp.	<i>Echinosphaerites?</i>
	<i>Bryozoa</i> (<i>Clathropora</i>).

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 92^m.

Schistes à *Homalonotus* Ehlerti

8. Schiste fin, irrégulièrement micacé, gris foncé avec taches blanchâtres, pétri de fossiles dans toute l'épaisseur du massif. Ce schiste renferme des concrétions dures ou nodules argilo-ferrugineux, quelques-uns fossilifères, qui par leur altération acquièrent une teinte jaunâtre ocracée, aussi bien que les lits gréseux et siliceux qui lui sont subordonnés et où les moules de fossiles (particulièrement *Ctenodonta*) sont très nombreux. Quelquefois les moules sont tellement abondants que l'on reconnaît que les individus qu'ils représentent tapissaient entièrement, en quelques points, le fond de la mer. Un lit de schiste de quelques centimètres d'épaisseur montre la structure spéciale que les géologues anglais nomment *cone-in-cone*.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn., individus peu développés. f.	<i>Bellerophon acutus</i> juv. Sow.
» <i>Aragoi</i> Rou., une petite glabell.	<i>Ribeiria pholadiformis</i> Sh.
<i>Homalonotus (Plaesiacomia) Ehlerti</i> Kerforne. f.	<i>Dolabra? Lusitanica</i> Sh.
» » <i>brevicaudata</i> Desl.	<i>Cypricardia? Beirensis</i> Sh.
(<i>Homalonotus rarus</i> Vern. et Barr., Bull., 1855).	<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.
<i>Dalmanites socialis</i> Barr. f.	» <i>Ezquerrae</i> Sh.
» <i>Phillipsi</i> Barr.	» <i>Costae</i> Sh.
<i>Beyrichia simplex</i> Jones.	» <i>Ribeiroi</i> Sh.
» <i>Bussacensis</i> Jones.	» <i>Ciae</i> Sh.
<i>Bellerophon trilobatus</i> juv. Sow.	» sp. n., gigantesque, du type de <i>C. Beirensis</i> .
	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
	» aff. <i>Trubinensis</i> Barr.

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 54^m.

9. Grès fin, gris, dur, passant au quartzite et grauwaque fine blanche et grise, très micacée, en lits épais de 5 à 30 centimètres et seulement par exception atteignant jusqu'à 70 cent. Dans ce massif sont intercalés quelques lits de schiste; la grauwaque est très fossilifère dans quelques lits.

<i>Homalonotus</i> cf. <i>Brongniarti</i> Deslonch. ¹	<i>Hypostome</i> ind.
» (<i>Plaesiacomia</i>) <i>brevicaudata</i> Deslongchamps sp.	<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.
» ? sp.	» sp.
<i>Dalmanites Phillipsi</i> Barr.	<i>Modiolopsis</i> aff. <i>Draboviensis</i> Barr., un moule. R.
» <i>socialis</i> Barr.?	<i>Bivalves</i> ind., deux petites espèces.
	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm. F.

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 53^m.

¹ Il paraît être la même espèce de Budleigh Salterton, figurée par Salter (*Quart. Journ. Geol. Soc.*, vol. xx, 1864, pl. 15, fig. 1 et 2, p. 290).

Schistes à *Didymograptus*

10. Schistes fins, gris, très fossilifères. Dans le haut de ce massif un lit de 30 à 40 centimètres d'épaisseur contient en abondance des petites glabellles d'*Homalonotus* conjointement avec *Didymograptus*. Dans le bas un lit de schiste gris-noirâtre ne renferme que des empreintes de *Didymograptus*, d'ailleurs en très grand nombre. Il est à remarquer l'absence dans cette localité d'*Orthis Ribeiroi* et de quelques autres espèces que caractérisent ce niveau au Bussaco. Au-dessus du schiste noir à *Didymograptus* on observe un lit de schiste chamoisitique épais de quelques centimètres à peine, avec la texture oolithique.

<i>Homalonotus</i> cf. <i>bisulcatus</i> Salt.	<i>Dolabra?</i> <i>Lusitanica</i> Sh.
» <i>Brongniarti</i> Deslong.	<i>Ctenodonta Beirensis</i> Sh.?, un moule écrasé.
» (<i>Plaesiacomia</i>) <i>OEhlerti</i> Kerf. F.	<i>Deeraska primula</i> var. <i>curtior</i> Barr.
<i>Calymene Tristani</i> Brongn. f.	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
» <i>Aragoi</i> Rou. r.	» sp., moules d'une petite espèce.
<i>Dalmanites socialis</i> Barr.	<i>Bivalves</i> ind., 8 espèces différentes.
<i>Illaenus Lusitanicus</i> Sh. (<i>I. giganteus</i> Burm., forme longue).	<i>Calix (Echinosphaerites) Murchisoni</i> Vern. et Barr.
<i>Beyrichia simplex</i> Jones. r.	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Böeck. F.
» <i>Bussacensis</i> Jones. R.	» » var. <i>geminus</i> His.
<i>Hyolithes undulatus</i> Barr. sp.	» <i>bifidus</i> Hall. F.
<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.	» cf. <i>clavulus</i> Perner.

Même direction et plongement des strates. Épaisseur 142^m.

11. Schistes fins et doux, très peu micacés, gris à l'intérieur et d'une teinte jaunâtre claire ou blanchâtre à la surface par un commencement d'altération. Ils comprennent des minces lits de grau-
wacke micacée, schistoïde, très fine, rougeâtre claire, qui a aussi subi un commencement d'altération. La grau-
wacke, de même que le schiste, est fossilifère; elle ne contient que des Graptolites, tandis que le schiste renferme quelques empreintes de Graptolites et des moules de bivalves très empâtés et le plus souvent indéterminables.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Ctenodonta?</i>
<i>Beyrichia?</i>	<i>Orthis</i> sp.
<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.?	<i>Bivalves</i> ind.
<i>Dolabra?</i> <i>Lusitanica</i> Sh.?	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Böeck., de mauvais spécimens
<i>Cypricardia?</i> <i>Beirensis</i> Sh.	aussi bien dans le schiste que dans la grau- wacke.

Direction des strates N. 73° W. Plongement 60 à 70° vers le S. S. W. Épaisseur 70^m.

Quartzites à Bilobites

12. Quartzite et schistes en minces lits alternants. Cet ensemble correspond au n° 29 de la coupe du Bando dos Santos. Les fossiles se montrent de préférence dans les couches supérieures.

<i>Cruziana</i> cf. <i>Goldfussi</i> Rou.	<i>Cruziana Cordieri</i> Rou.
» <i>furcifera</i> d'Orb.	<i>Arthropycus</i> cf. <i>Harlani</i> Hall.
» <i>Beirensis</i> Delg.	

Direction des strates N. 57 à 77° W. Plongement 50 à 60° vers le S. S. W. Épaisseur 82^m.

Quartzites à *Scolithus*

13. Quartzite et grès passant au quartzite, blanc, en bancs puissants. Dans le haut de ce massif on n'a pas découvert de vestiges de fossiles, mais au-dessous de ces strates azoïques vient un groupe de minces couches de schiste, de grès fin schistoïde et de schiste grossier alternant avec des lits de grès fin ou quartzite contenant des *Vexillum*.

La moitié inférieure du massif est formée par un grès très fin, dur, ordinairement en bancs puissants, atteignant 2^m,40 d'épaisseur; cependant, il y a là quelques lits très minces, de quelques centimètres à peine, les bancs les plus épais ainsi que ces lits minces étant en partie pétris de moules de *Scolithus*.

Subordonné au grès fin il se montre dans la base du massif, un banc de grès dur, très grossier, épais de 2 mètres, contenant quelques cristaux d'orthose, au-dessus duquel se présente une autre strate de même nature, mais très irrégulière, avec quelques décimètres d'épaisseur. On voit, par conséquent, que le grès grossier feldspathique est lié au grès à *Scolithus*, ne représentant qu'un accident de celui-ci.

Vexillum Morierei Sap.

Scolithus Dufrenoyi Rou. F.

Direction des strates N. 67° W. Plongement 40 à 50° vers le S. S. W. Épaisseur 71^m.

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

14. Schiste gris et grauwacke fine, grise et violacée, en strates épaisses.

LAMBEAU D'ALBERGARIA A VELHA

Le petit lambeau du Silurique à l'Est d'Albergaria a Velha, forme le prolongement septentrional de l'affleurement du Bussaco, semblant marquer sa liaison avec l'affleurement de Vallongo. Il est constitué de quartzites et de schistes, ces derniers formant une couche plus épaisse intercalée entre deux autres de quartzite.

Dans un lit de schiste fin, gris, à taches blanches, on découvrit quelques moules de Brachiopodes très déformés, qui ressemblent beaucoup à *Orthis noctilio* Sh., du bassin silurien du Douro, ce qui m'a fait rapporter ce lambeau au Silurique inférieur, quoiqu'on ne découvrit pas les Bilobites caractéristiques dans les strates de quartzite, qui sont très probablement sous-jacentes à ce schiste fossilifère, se trouvant pliées avec celui-ci en un petit synclinal ayant la direction N.—S.

c) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU DOURO

AFFLEUREMENT DE VALLONGO

Anticlinal de la serra de Santa Justa. — L'affleurement silurien de Vallongo offre de grandes différences relativement à celui du Bussaco, autant par ses caractères pétrographiques et paléontologiques que par ses caractères structuraux ou géotectoniques.

Cet affleurement est formé par un pli anticlinal des couches ordoviciennes, qui se firent jour à travers le Silurique supérieur, déjà antérieurement disloqué par un plissement contemporain du synclinal du Bussaco. Une déchirure s'étant produite à Vallongo suivant l'axe du synclinal, les couches ordoviciennes y parurent, en formant un pli isoclinal déjetée vers l'ouest; les couches gothlandiennes de la lèvre orientale de la faille vinrent alors s'adosser contre celles-là en s'affaissant vers l'extérieur, tandis que celles du côté occidental plongent sous les schistes ordoviciens, se trouvant par conséquent inverties. Ce fait a donné lieu à l'erreur com-

mise par Sharpe, qui a placé dans la base du Silurique inférieur les couches carbonifères, car elles se trouvent intercalées dans le Silurique supérieur, auxquelles elles semblent être sous-jacentes, aussi bien qu'aux couches ordoviciennes situées plus à l'est.

L'axe de l'anticlinal correspond au dos de la serra de Santa Justa où se montrent les quartzites à Bilobites; il embrasse l'ensemble des couches de l'Ordovicien et du Précambrique supérieur, sur lequel le premier reposait en discordance.

Une coupe faite à travers la serra de Santa Justa dans sa partie culminante, montre que les couches se succèdent régulièrement de chaque côté de cette colline. Surmontant immédiatement les quartzites à Bilobites, on observe sur l'un et sur l'autre versant une assise schisteuse à *Didymograptus*, qui n'existe que partiellement représentée au Bussaco. Nous avons pu distinguer dans cette assise trois niveaux différents, chacun caractérisé par un certain nombre d'espèces distinctes. Ces niveaux sont successivement celui d'*Azygograptus Hicksi*, celui de *Didymograptus sparsus* et celui de *Didymograptus Murchisoni*, qui est le plus supérieur.

Les couches les plus supérieures de l'Ordovicien au nord de Vallongo, c'est-à-dire les couches à *Uralichas Ribeiroi*, suivent pincées entre les grauweekes de Sobrido, se prolongeant en une pointe étroite, qui se dirige d'Alfena vers la chapelle de San Miguel, qu'elles dépassent un peu, cette chapelle reposant sur des grauweekes d'un niveau supérieur.

Le pli anticlinal se prolonge donc dans une faille qui traverse les couches de la base du Silurique supérieur, en passant à peu de distance à l'est de la limite de l'affleurement granitique de S. Romão de Coronado; sur son chemin on rencontre en deux points différents une brèche formée exclusivement de fragments des mêmes schistes et de quartz blanc, qui les traverse en veines cimentées par l'oxyde de fer. C'est une véritable brèche de friction, qui indique donc plausiblement l'axe de soulèvement auquel les couches ordoviciennes au nord de Vallongo ont obéi.

LAMBEAU DE SAN FELIX

Cette même faille de Vallongo ou une autre qui lui est proche et parallèle dans la direction N. N. W., lie la colline de San Felix (au N. N. E. de Pova de Varzim) qui est aussi couronnée par les quartzites à Bilobites, avec l'affleurement ordovicien de Vallongo. Cette faille se prolonge jusqu'à la mer, en permettant l'apparition dans ce trajet, de plusieurs masses des mêmes quartzites, qui affleurent au milieu des sables pliocènes, alignées vers le N. N. W., qui est la direction générale de l'affleurement au nord du Douro.

Dans la colline de San Felix cette faille a permis le pointement du Silurique inférieur à travers le Gothlandien; cependant presque toute la série ordovicienne et une grande partie du Gothlandien restent cachés dans cette faille, vu qu'il n'est pas admissible de supposer que toute la formation schisteuse représentée à Vallongo, qui compte plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, ne se soit pas formée à une si courte distance vers le nord.

Pointement des quartzites à travers le Gothlandien. — A San Felix, le plissement des couches, dû à la poussée latérale ou tangentielle qu'elles ont subies, fit rompre les quartzites à Bilobites à travers les couches gothlandiennes, en entraînant à leur passage, mais d'un seul côté de l'anticlinal (celui de l'ouest) une partie des couches schisteuses ordoviciennes; cependant on y voit les schistes du Dévonique inférieur, qui ne paraissent pas à Vallongo, et c'est précisément dans le voisinage de la colline de San Felix, qu'ils occupent une plus grande largeur.

Au sommet de la colline de San Felix les quartzites fins en gros bancs forment une bande large de 300 mètres environ, qui se prolonge vers le N. W. jusqu'à la mer, où elle pénètre, en s'élargissant beaucoup et en formant les récifs de Pena au S. W. de Fão; elle est cependant cachée sur une grande étendue par les sables pliocènes et modernes de la plaine d'Apulia. Ces quartzites renferment principalement *Vexillum* et quelques grands *Cruziana* (*Cr. Monspelliensis* Sap.); ils semblent inférieurs aux couches que l'on découvre dans la serra de Santa Justa, où ils ne parviennent pas à se montrer. A 3 kilomètres au N. W. du signal de San Felix ils renferment des *Cruziana* percés par des *Foralites*. Dans la falaise maritime à Apulia, on voit que les *Cruziana* sont aussi perforés par des *Foralites*.

Il y a une brèche subordonnée à cette assise de quartzites, formée de fragments anguleux de quartzite fin, cimentés par le même quartzite, semblable à celle qui paraît au sommet de la serra du Bussaco et dans d'autres localités.

Les quartzites ordoviciens du sommet de San Felix forment une série simple et plongent vers l'est, ayant pointé à travers les schistes du Silurique supérieur en vertu du plissement général des couches dans la direction N. W.—S. E., les schistes de l'Archaïque qui formaient une muraille se dirigeant de Fanzeres à Nabaes ayant servi de barrière fixe (Horst) contre laquelle ils se plièrent. Les quartzites, rompus longitudinalement à une grande profondeur, ont pu, parce qu'ils étaient plus rigides, percer à travers la fente ouverte suivant la limite des schistes gothlandiens, lesquels, au contraire, étant plus mous, offraient une faible résistance.

Comme nous l'avons dit, les quartzites de la colline de San Felix ont entraîné dans leur mouvement ascensionnel quelques couches schisteuses ordoviciennes, qui les accompagnent au dos de cette colline. En effet, à peu de centaines de mètres au S. E. du signal géodésique de 1^{er} ordre placé au sommet de San Felix, des fossiles de la faune seconde (*Calymene Tristani*, *Beyrichia*, *Orthis*, etc.) ont été recueillis dans un schiste fin, gris foncé, indubitablement supérieur aux quartzites, lequel forme une bande étroite, de 2,5 kilomètres de longueur. A ce point les quartzites sont interrompus et remplacés par les schistes, mais ils reparaissent plus loin vers le sud. On n'a découvert les schistes ordoviciens que dans ce point.

On observe le même phénomène plus vers le sud, mais avec plus d'ampleur, en approchant du Douro, où l'Archaïque se trouve aussi à l'ouest de l'affleurement silurien. Comme il y avait plus d'espace, les couches du Précambrique, sur lesquelles les mêmes quartzites reposaient, ont accompagné l'Ordovicien dans son mouvement ascensionnel. D'ailleurs on reconnaît clairement que le contour de l'affleurement ordovicien obéit dans ses plus petits détails à l'action de ce plissement.

Au contraire de ce qu'il arrive au Bussaco et en général dans les différents lambeaux siluriens de la Beira, le plissement des couches dans la direction N. W.—S. E. a produit un anticlinal à Vallongo, l'affleurement ordovicien montrant dans son contour des directions concordantes avec celles de ces lambeaux.

Pour faire connaître la structure du sol nous avons dressé un profil traversant la colline de San Felix (pl. II, n° 1) dont nous donnons la description à la suite.

Coupe traversant la colline de Laundos passant à Rapejães. (Pl. II, profil n° 1)

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

1. Schiste argileux, fin, gris, verdâtre, violacé ou jaune, très peu micacé, bien stratifié, dans lequel on n'a pas trouvé de fossiles. Le hameau de Rapejães repose en partie sur ces schistes.

Les strates se dirigent N. 42° W. avec pendage très fort, de 80° vers le N.E.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Quartzite à Scolithus?

2. Distance horizontale 6^m.—Quartzite fin et brèche quartzreuse en bancs ayant 2 mètres et plus de puissance, traversé par des veinules de quartz blanc, sans fossiles.

PLIOCÉNIQUE

3. Dist. hor. 190^m.—Sables liés faiblement par un ciment argileux ou grès pulvérulent, de teintes jaunâtres et rougeâtres avec beaucoup de points blancs, feldspathiques. Dans quelques points, ces sables montrent distinctement les preuves d'avoir été déposés horizontalement; dans un petit échantillon de quelques centimètres ils se montrent zonés en bandes parallèles, alternativement blanches et rouges, ce qui leur donne un aspect stratifié bien visible. Ils renferment par places des cailloux très roulés, ellipsoïdaux, de quartzite de toutes les dimensions, depuis la grosseur d'une olive jusqu'à celle de petits melons, un grand nombre étant de la grosseur du poing. Ces galets sont distribués irrégulièrement et forment une couche irrégulière au milieu des sables, chacun gardant les positions d'équilibre les plus instables.

Un dépôt de très gros cailloux roulés de quartzite silurien, qui dépassent quelquefois 1 mètre de longueur, couvre en quelques points le grès, dans lequel ils sont enfouis. Ces cailloux ont tous des formes plus ou moins arrondies et la surface lisse, ils proviennent vraisemblablement de l'arase-ment des crêtes de quartzites siluriens, produit par la dénudation exercée à la fin de la période pliocène par de forts courants d'eau provenant du dégel soudain des glaciers qui couvraient alors nos chaînes les plus élevées. Les cailloux sont donc venus de grandes distances, d'où leurs formes spéciales, et semblent représenter un dépôt alluvial ancien comme ceux que l'on observe à Goes et sur les versants de la serra du Bussaco.¹

A la partie supérieure, les sables sont solidement cimentés par l'oxyde de fer, parfois concrétionné, formant un grès très dur, rouge châtain, même noir, qui couvre d'une couche plus ou moins épaisse la surface des gros cailloux lorsqu'il a pu les atteindre.

Ce ciment ferrugineux qui agglutine les grains de sable est de formation secondaire, par places il est si concentré qu'il a donné origine à un vrai minerai de fer. Il représente plausiblement une recimentation postérieure des sables par l'oxyde de fer précipité de solutions aqueuses, qui s'étaient répandues à la surface du grès. Cette recimentation s'est donc accomplie très probablement à l'ère quaternaire.

Au-dessus du grès ferrugineux se trouve en quelques points un dépôt, certainement d'origine glaciaire, formé par une accumulation très irrégulière de fragments de quartzite silurien enveloppés dans le grès, généralement de petite taille et de formes anguleuses, avec les arêtes émoussées, quelques-uns même à formes arrondies.

Le grès repose en stratification absolument discordante sur les tranches des couches de quartzites siluriens et des schistes du Précambrique.

¹ Cf. *Note sur l'existence d'anciens glaciers dans la vallée du Mondégo*. (Comunicações, t. III, p. 55 et seq.)

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Didymograptus*

4. Dist. hor. 50^m.—Schiste gris, fin et doux, avec de très rares et très minces paillettes de mica blanc, contenant quelques fossiles à l'état de moules. Direction des strates suivant N. 37 à 47° W; plongement vers le N. E. sous un angle de 60 à 70°.

Calymene Tristani Brongn.

Orthis sp.

Orthonota (Cypricardia) amygdalina Sow.?

Calix Murchisoni Vern. et Barr. sp.

CARBONIQUE

5. Dist. hor. 70^m.—Grès et conglomérats alternant avec peu de schistes gris renfermant des fossiles végétaux. Les strates paraissent concordantes avec les schistes du Silurique inférieur, et inclinent de 50 à 70° vers le N. E.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

6. Dist. hor. 350^m.—Grès fin, dur, micacé, blanc, devenant jaunâtre et pulvérulent par un commencement d'altération, avec quelques lits de schiste subordonnés et renfermant de nombreux moules de fossiles.

Ce complexe réunit 5 lits fossilifères distincts.

Dans une première strate de grès on a trouvé quelques moules très empâtés dans la roche:

Homalonotus, une glabelle.

Rhynchonella, petite espèce.

Bivalve ind.

Dans un niveau supérieur au précédent et correspondant au dos de la colline de Laundos, on a recueilli dans un schiste grossier, blanc, avec beaucoup de muscovite en paillettes bien visibles, les espèces suivantes:

Phacops (voyez *Ph. laciniatus* F. Roemer sp.).

Crinoïde, fragment de la tige.

Dans un grès fin, blanc et jaunâtre, lié au schiste précédent:

Solen? aff. *S. costatus* Sandb.

Rhynchonella ind., petite espèce.

Bivalve (*Orthonota*?).

Dans un grès fin, dur, faisant passage au quartzite, peu micacé et très fossilifère, qui correspond certainement aux couches culminantes du Silurique supérieur du Bando dos Santos, les fossiles à l'état de moules intimement empâtés dans la roche se sont accumulés dans quelques points d'une telle façon qu'ils semblent la constituer presque intégralement. Ils sont difficilement déterminables, cependant nous avons pu reconnaître:

Homalonotus, 2 glabelles incomplètes.

Bivalves ind., plusieurs espèces.

Orthoceras cf. *intermedium* Marklin.

Rhynchonella decemplicata Sow.

» ind., 2 espèces.

» sp.

Orthonota triangulata Salt. [*Grammysia cingulata* His. sp. var. β (*triangulata*) Salt. sp.]

Crinoïde, empreinte d'un petit article rond, d'un millimètre de diamètre.

Avicula (voyez *A. ampliata* Phill.)

Dans d'autres lits de schiste et de grès, on a découvert quelques moules de fossiles, surtout de Brachiopodes (*Rhynchonella*).

A 450^m au S. 78° E de la chapelle de San Felix on a trouvé dans un schiste micacé, gris clair, très fin et doux, une mâchoire de poisson, appartenant très probablement à la même espèce de l'Upper Ludlow, *Plectrodus mirabilis* Ag.

Dans un lit de grès fin, ferrugineux, de teinte châtain ocracé, on a enfin trouvé des empreintes d'articles de la tige d'un Crinoïde de grand diamètre.

Toutes ces strates se dirigent N. 17 à 37° W., avec plongement de 60 à 80° vers l'E. N. E. et vers l'W. S. W., quelques-unes étant verticales.

DÉVONIQUE

7. Dist. hor. 150^m.—Schistes fins, blanc sale et jaunâtre très clair avec concrétions ferrugineuses, rouges, renfermant la faune du Dévonique inférieur (Coblentzien).

Cryphaeus laciniatus Rømer non Vern.

Spirifer sp.

Orthis sp.

Crinoïde, empreinte de deux articles de la tige.

Gorgonia Bouchardi Mich.

Près de la base de l'assise se trouve une grauwacke blanche, peu micacée, avec des moules de fossiles très empâtés, contenant des fragments de schiste talqueux, vert foncé. Les strates plongent de 70° W. S. W.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

8. Schistes pour la plupart fins, gris, rougeâtres ou violets avec peu de grauwackes fines, dans lesquels on n'a pas découvert de fossiles. Ce sont les mêmes schistes de Rates. Direction des strates N. 37 à 57° W. Plongement 70 à 85° vers le N. E. aussi bien que vers le S. W.

Schistes de Laundos.—A l'ouest du sommet de San Felix, à Laundos, on rencontre les schistes précambriques (Cb¹), qui forment un petit affleurement à forme triangulaire, étant cachés au nord par les sables pliocéniques.

Les schistes de Rates y furent interrompus par l'intrusion forcée des couches ordoviciennes contre la barrière formée par le Précambrique.

Ces couches ont subi une compression telle, que plusieurs d'entre elles disparurent par le laminage ou ne parvinrent pas à se faire jour, parce que les couches ayant glissé les unes sur les autres, sont restées pour la plupart ainsi cachées en profondeur. On ne peut donc observer ici la superposition normale des strates.

Quartzites du col de Rapejães.—Les quartzites fossilifères du col de Rapejães, qui sont les mêmes du Bando dos Santos, surmontaient les schistes fins lorsque l'Ordovicien perça au travers d'eux. Ils représentent par conséquent un petit lambeau, épargné par la dénudation, comme le lambeau du Carbonique qui les accompagne à l'ouest.

Ces quartzites ont une puissance très variable, les lits montrant une plus grande épaisseur aux points les plus élevés de la colline. Là, quelques-unes des strates ont jusqu'à 2^m de puissance, tandis que plus au nord (Cova d'Andorinha et Lagoa Negra) elles sont épaisses de 1 à 3 décimètres à peine, l'intervalle qui les sépare étant occupé par des schistes.

Les strates de schistes grossiers avec quelques lits de quartzite, que nous croyons représenter les schistes du versant est de la serra da Murta, ne se découvrent dans cette contrée qu'au nord de Cova d'Andorinha. Il paraît que ces strates furent disloquées par l'Ordovicien quand il a traversé les schistes fins de Rates, restant cachées dans la direction du profil de Rapejães sous le Dévonique et les couches gothlandiennes les plus modernes.

Le Dévonique forme une bande étroite le long de la serra de Rates, se dirigeant vers

Cova d'Andorinha; il représente un lambeau du Coblentzien qui reposait sur le Silurique supérieur, comme les schistes de Porto da Espada (serra de Portalegre) qui surmontent les quartzites de la serra de Salada.

Liaison de l'affleurement ordovicien de Vallongo avec celui de San Felix.—La liaison de l'affleurement ordovicien de Vallongo avec celui de San Felix est donnée par une bande fort étroite de schistes mesurant à peine quelques dizaines de mètres en largeur et 4 kilomètres ou plus en longueur; cette bande traverse la rivière Ave en aval de Bougado. Dans un point au sud de cette rivière, situé à 2000^m au N. 37° W. du signal de Bougado, sur le chemin de Bougado à Guidões, on découvrit dans un schiste très fin, gris, des fossiles à l'état de moules très déformés et aplatis, parmi lesquels on a reconnu les espèces suivantes appartenant sans doute à l'Ordovicien. Il y a surtout deux formes de Trilobites très remarquables du genre *Harpes* (l'une de ces formes ressemblant beaucoup à une espèce de la Bohême et l'autre étant probablement nouvelle), les seuls spécimens de ce genre qui aient été découverts jusqu'à présent en Portugal.

Harpes cf. *primus* Barr. R.

» sp. n. R.

Illaenus Lusitanicus Sh. f.

Placoparia Tourneminei Rou. F.

Asaphus nobilis Barr.

» cf. *contractus* Vern. et Barr.,
une glabelle très imparfaite.

Calymene Salteri Rou.

Ogygia Salteri sp. n. (*Isotelus Powisi* Portl.
dans la liste de Sharpe).

» *Desmaresti* Brongn. (*O. Brongniarti*
Rou.)

Dalmanites sp., un pygidium.

Leptaena sericea Sow.

Orthis sp.

Crinoïde, fragment de la tige.

A une petite distance de ce gisement et presque sur le prolongement de la strate fossilifère vers le nord, on voit un schiste très fin et doux, mesurant à peine quelques dizaines de mètres en largeur et renfermant plusieurs lits de quelques millimètres jusqu'à peu de centimètres d'épaisseur, d'un grès friable par places, dans lequel on a découvert des fossiles presque indéterminables, parmi lesquels on a pourtant reconnu des restes de Trilobites (*Homalotus*), *Orthoceras*, un petit Brachiopode (*Rhynchonella*) et de nombreuses empreintes d'articles d'un petit Crinoïde à forme circulaire. Cette couche correspond sans doute au n° 9 de la coupe d'Ervedosa à Balsa, elle est traversée par la route de Porto à Vallongo à l'ouest de cette ville. Elle appartient évidemment au toit du Gothlandien.

On observe la même succession des strates à l'est de Rapejães, nos 4 à 6 de la coupe de la colline de San Felix, décrite ci-dessus.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Composition du Silurique inférieur de Vallongo.—L'uniformité des caractères lithologiques des schistes ordoviciens de Vallongo rend très difficile d'y établir des divisions. Cependant, en rassemblant les observations faites en plusieurs points isolés, nous parvîmes à recomposer la série suivante qui représente, à notre avis, la succession naturelle des dépôts du Silurique inférieur dans cette contrée.

En allant de bas en haut, on observe à Vallongo la superposition suivante:

1. Schistes quartzeux grossiers, avec quelques quartzites, tous deux traversés par de très nombreuses veines de quartz blanc, et renfermant plusieurs espèces de *Cruziana*. Ces fossiles sont pour la plupart de grandes dimensions, ils se montrent ordinairement sur la face inférieure des lits de quartzite, épais de 1 à 2 décimètres. Ces lits sont séparés par d'autres plus minces et irréguliers de schiste, de quelques centimètres à peine, et se trouvent au milieu d'autres strates plus épaisses, où manquent les *Cruziana*.

Le caractère et la structure de ces couches diffèrent beaucoup de ceux de l'assise de quartzites à Bilobites du Bussaco et de l'affleurement d'Amendoa. Tandis que dans la Beira les quartzites dominant en gros bancs, les plus supérieurs où les Bilobites paraissent étant schistoïdes et en minces plaquettes, dans l'affleurement silurien de Vallongo c'est l'élément argileux qui prédomine, et les couches fossilifères, moins distinctement stratifiées, sont beaucoup plus épaisses. On peut même dire que le vrai quartzite y est une exception; la plupart des strates sont de schiste très grossier, micacé, ou de grauwache schistoïde micacé.

Les espèces de Bilobites diffèrent aussi dans les deux régions, les *Cruziana* étant de plus grandes dimensions et de formes moins variées à Vallongo; il y manque en outre les genres *Arthropycus* et *Scolithus*, et l'on y découvre à peine quelques vestiges indistincts de *Vexillum* sur la cime de la serra de Santa Justa.

Ce groupe de couches, ayant une épaisseur non inférieure à 120 mètres, est coupé par la rivière Souza sur le prolongement des serras de Pias et de Vallongueda, des ramifications de la serra de Santa Justa qui se bifurque en embrassant l'extrémité septentrionale de l'affleurement précambrien de Melres.

La nature même de l'assise quartzeuse inférieure à Bilobites, où le quartzite pur est relativement rare, ainsi que le manque de tant de formes de Bilobites qui paraissent dans le Bussaco et dans les autres affleurements de la Beira, montrent que cette assise se forma ici en des conditions diverses, probablement à plus de distance du rivage que les quartzites à Bilobites des autres localités.

2. Le groupe quartzeux dont nous venons de parler est surmonté par une puissante assise de schistes argileux qui renferme des fossiles à des niveaux différents, séparés par de larges intervalles où ils ne paraissent pas, ou bien sont extrêmement rares. Cette assise commence à la base par un schiste dur, gris-bleuâtre, très micacé, taché à la surface en violet et jaunâtre, dans lequel on a observé, à deux niveaux superposés, deux faunules distinctes, caractérisées surtout par des formes différentes de Graptolites. Cette couche est surmontée par un schiste gris, plus fin, contenant en abondance *Didymograptus Murchisoni*, *Orthis noctilio* et plusieurs espèces de Trilobites et Orthocères.

Comme au Bussaco et dans la Basse Beira, cette strate schisteuse, avec *Didymograptus Murchisoni* très abondants, appartient à la base de l'Ordovicien moyen; toutefois, à Vallongo, cette strate est séparée des schistes quartzeux à Bilobites par une centaine de mètres de schistes dans lesquels se trouvent les deux autres niveaux fossilifères ci-dessus indiqués, que l'on ne découvre pas au Bussaco.

3. Surmontant les schistes précédents, vient un schiste imparfaitement téglulaire, très puissant, contenant quelques nodules lequel, à 120 ou 150 mètres au-dessus de l'assise quartzeuse à Bilobites, renferme une faune variée, composée principalement de Trilobites: *Calymene Tristani*, *C. Salteri* juv., *Iliaenus Lusitanicus* juv., *Asaphus nobilis* juv., *Placoparia*

Tourneminei, *Orthoceras vagans*, *Bellerophon bilobatus*, *Redonia Deshayesiana*, etc. Le petit développement des exemplaires de Trilobites qui, aux niveaux supérieurs, acquièrent leurs dimensions ordinaires, fait voir que les conditions biologiques pour le développement de ces êtres n'étaient pas alors très favorables à ce point-là.

4. Sur le schiste précédent viennent d'autres strates de schistes renfermant en abondance des nodules de forme ellipsoïdale, quelques uns très volumineux, depuis 4 décimètres jusqu'à 1 mètre de longueur.

Cette circonstance rend très probable la correspondance de ces couches, que l'on observe du côté occidental de la bande ordovicienne, avec celles qui passent à l'est de Vallongo, et qui se suivent de la station du chemin de fer vers les ardoisières du Gallinheiro sur le versant occidental de la serra da Murta, dans lesquelles on découvrit aussi beaucoup de nodules de diverses grandeurs, dont quelques-uns de grandes dimensions.

Cette assise de schistes avec de grands nodules comprend une strate très riche en fossiles, parmi lesquels sont particulièrement remarquables *Uralichas Ribeiroi*, *Calymene pulchra*, *Acidaspis Buchi*, *Dalmanites Vetillarti* var. *caudata* (an *D. macrophthalma* Brongn.), *Dionide formosa* et plusieurs espèces de *Ctenodonta* et d'*Orthis*.

Dans cet horizon, non seulement les fossiles sont très abondants, mais plusieurs des espèces de Trilobites atteignent des dimensions vraiment extraordinaires, comme nous ne leur connaissons en nul autre point de notre pays.

L'assise de schistes ardoisiers monte jusqu'à plus de la moitié de la côte occidentale de la serra da Murta, qui forme la limite de la bande ordovicienne à l'est de Vallongo. Dans sa partie supérieure, c'est-à-dire au-dessus des ardoisières du Gallinheiro, elle renferme de nombreux nodules ellipsoïdaux aplatis, durs, disposés selon la stratification, pour la plupart de 1 décimètre à peu près de longueur, cependant exceptionnellement de plus grandes dimensions, surpassant même 1 mètre. Quelques-uns de ces nodules, quoique très rarement, renferment des fossiles (Trilobites).

5. Supérieurement à l'assise de schistes ardoisiers se succèdent, dans l'épaisseur de 200 mètres ou plus, d'autres schistes plus ou moins durs, généralement fissiles, où les fossiles sont en petite quantité, comme c'est le cas dans les couches immédiatement sous-jacentes, et où les nodules manquent graduellement jusqu'à ce qu'ils disparaissent tout à fait. Ces schistes représentent les couches les plus supérieures de l'Ordovicien dans cette localité; on reconnaît que les grauweekes du sommet de la serra da Murta qui viennent ensuite, d'après leurs rapports stratigraphiques appartiennent déjà à un étage différent.

Composition de la bande occidentale de l'Ordovicien à Vallongo.— En montant de Vallongo vers le col de Senhora da Chã, sur la route du Porto, on voit que sur les schistes plus ou moins fissiles de Vallongo vient un schiste argileux micacé, gris foncé, ayant le mica très irrégulièrement distribué; plus haut c'est un schiste semblable au précédent, mais se divisant en morceaux irréguliers, allongés, comme de petites bûches. Ce schiste passe graduellement à un autre, à stratification indistincte, après lequel viennent à la fin les grauweekes de la base du Silurique supérieur. On n'a découvert que très rarement des fossiles dans les nodules ellipsoïdaux, durs, que ces schistes renferment.

Du côté occidental de l'affleurement, les schistes à nodules ont, dans quelques points,

un faible développement; il y manque une grande partie de la série ordovicienne, que l'on découvre près de Vallongo, soit par son amincissement, soit, ce qui est plus probable, parce que ces couches restèrent cachées sous le Silurique supérieur, qui couvrait cette région, alors que le Silurique inférieur a pointé par le plissement, à travers ces couches plus modernes.

Différences dans la structure des schistes.—La structure que montrent les schistes du côté occidental de l'affleurement, point du tout fissiles et se divisant en fragments irréguliers de forme allongée, contraste avec le caractère qu'ils ont du côté opposé, où ils sont parfaitement téglulaires. De cette façon se révèlent les différences de pression que les couches ont subies, étant d'un côté fortement comprimées dans le sens perpendiculaire, tandis que de l'autre côté elles ont subi une distension longitudinale, qui se manifeste clairement dans les déformations que présentent tous les fossiles.

Cette différence de structure des schistes de chaque côté de l'affleurement ordovicien trouve d'ailleurs son explication dans la direction oblique de la serra de Santa Justa (qui marque l'axe du soulèvement) par rapport à la serra da Murta, tandis qu'elle est parallèle à la serra de Vallongueda, la poussée agissant donc inégalement sur les deux branches de l'anticlinal.

Ploiment des quartzites de Santa Justa.—Les quartzites de la serra de Santa Justa forment une large voûte, se liant à ceux de la serra de Pias, du côté de l'est, et à ceux de Vallongueda, du côté de l'ouest; ils participent des mouvements qui ont affecté les schistes précambriens, qu'ils entourent à l'est, au nord et à l'ouest. Sur le sommet de la serra de Santa Justa les quartzites sont redressés verticalement, et forment un pli en éventail, la voûte s'étant cassée au sommet et les deux branches de l'arc qu'ils ont formé s'étant juxtaposées.

Les quartzites à Bilobites poussés dans leur ploiment par les schistes précambriens sous-jacents, ont soulevé en concordance sur eux, de chaque côté de l'axe anticlinal, la série schisteuse ordovicienne, perçant à travers les couches du Silurique supérieur qui couvrait la région.

Au sommet de la serra de Pias, on voit également le bombement des quartzites et des schistes quartzeux grossiers à Bilobites, qui se reproduit sur le flanc sud-oriental de la serra de Santa Justa, en formant cependant une voûte plus large et plus aplatie, qui se bifurqua dans les deux branches qui constituent la serra de Pias et celle de Vallongueda.

Cette assise de schistes quartzeux grossiers et de quartzites à Bilobites de la serra de Pias, se prolonge sans interruption vers le S. S. E., allant former la serra du Facho, à l'est de Senande, et celles de Santa Iria et de Preza, continuation de la précédente, et longeant le co-teau méridional de la serra de Boneca sur la rive droite du Douro, elle s'infléchit vers l'orient et, traversant ensuite ce fleuve, elle va enfin buter contre le granite de Sobrado de Paiva à une courte distance.

Au sommet de la serra du Facho, ces couches quartzieuses se montrent redressées verticalement, formant une crête saillante, aussi occupent-elles bien moins de largeur que dans les bords de la rivière Souza près du pont de Senande où, au contraire, elles se montrent ondulées et parfois presque horizontales. (Voyez pl. II, profil n° 7.)

Dans la serra de Vallongueda, cette assise inférieure du Silurique est représentée par un groupe de couches de schiste grossier, dur, gris foncé, peu micacé, sillonné de veinules de

quartz blanc, et avec beaucoup de points blancs de petits grains de quartz, passant quelquefois au quartzite, et renfermant accidentellement de petits galets de cette roche. Cette assise a précisément les caractères de celle qui forme le dos de la serra de Santa Justa, et renferme aussi des *Cruziana* dans quelques strates.

Puissance des quartzites.—A l'endroit où cette assise traverse la rivière Ferreira, elle forme une série simple qui a environ 120 mètres de puissance. Là, les quartzites redressés verticalement au contact des schistes précambriens (dont le pendage est très fort et qui, à peu de distance de la limite, plongent moyennement vers le S.W.) s'épanouissent en éventail, l'inclinaison des couches variant jusqu'à ce que, dans le passage aux schistes qui leur sont immédiatement superposés, ils plongent vers l'orient, par conséquent contrairement aux schistes précambriens, et se montrent invertis.

Discordance du Silurique avec le Précambrique.—Le diagramme suivant montre la disposition des couches à 1.350 mètres à l'O. 10° N. du signal de Pias, soit 300 mètres en amont du Moinho Caiado, sur le flanc gauche de la rivière Ferreira.

La discordance entre les deux systèmes paléozoïques est donc, ici, bien manifeste.

De même, près du pont de la rivière Souza, sur la route d'Aguiar de Souza à Senande, les quartzites siluriens, avec inclinaison moyenne vers le quadrant de l'est, reposent en discordance sur les tranches des couches schisteuses du Précambrique, qui se présentent à ce point-là presque verticales et suivent tout naturellement la même direction N.—S. que les quartzites, cette direction ayant été donnée par le plissement des couches, qui affecta simultanément les deux systèmes. (Voyez pl. VI, profil n° 7.)

Vestiges d'une ancienne exploitation minière.—En connexité avec la direction des plus grosses veines de quartz, qui traversent les quartzites de la serra de Santa Justa dans la direction E.—O. à peu près, c'est-à-dire perpendiculairement à la direction de la serra, il y a un ravin qui la coupe profondément dans cette même direction, et qui représente l'excavation faite par d'anciens travaux d'exploitation, probablement en rapport avec des gisements aurifères. Pareillement, on observe dans la serra du Facho des vestiges d'une exploitation ancienne ayant un certain développement.

Prolongement de l'affleurement vers le S.E.—L'étroite bande de roches quartzieuses de la serra de Vallongueda, accompagnées à peine de quelques schistes, traverse le fleuve Douro,

se prolongeant vers le S.E. jusqu'à Gafanhão, où elle est interrompue par les granites de Castro Daire.

Plus loin cette bande reparait, ayant été déplacée de sa position primitive par un décrochement horizontal, et formant un petit lambeau près de Queiriga, au N.E. de Vizeu, où elle est représentée seulement par les schistes.

Cette bande reste séparée des affleurements du Bussaco et de la Basse Beira par le massif archaïque d'Oliveira de Azemeis à Vizeu et par le massif granitique de la serra de Camullo et de la serra d'Estrella, ce qui explique leur indépendance mutuelle.

Développement des schistes ordoviciens dans la bande orientale de l'affleurement.—Le développement incomparablement plus grand qu'ont les schistes ordoviciens à l'est de la serra de Pias, par rapport à celui qu'ils montrent dans la bande occidentale, se comprend facilement aux plis répétés des couches, bien évidents dans les quartzites aux bords de la rivière Souza. Les schistes étant plus flexibles que les quartzites, les branches des différents plis qui se formèrent devraient se juxtaposer, semblant composer une série continue, quand en réalité les couches doivent être bien des fois répétées, en occupant par ce motif un espace beaucoup plus large, malgré leurs fortes inclinaisons.

Uniformité des caractères des schistes et rareté de fossiles.—Il est également à remarquer l'uniformité de caractère de ces schistes dans la large bande qu'ils forment, sans qu'on ait jamais découvert à l'est de Melres, entre la serra de Pias et Capella, une seule strate de quartzite ou de grauwacke, ce qui montre que, pendant une longue période, les conditions de la sédimentation ont été très régulières.

D'un autre côté, la rareté extraordinaire de fossiles, du moins dans les couches les plus supérieures, semble indiquer que ces schistes représentent un dépôt de mer profonde.¹

¹ Seulement près de Capella on a découvert quelques empreintes et moules très déformés d'un Trilobite (*Calymene Tristani*) et une empreinte d'*Orthis* dans un schiste maclifère, gris foncé, très chargé de petits cristaux de chiastolite, lequel montre une ressemblance frappante avec celui de Fragas da Ermida, dans l'extrémité sud-est de l'affleurement silurique de la serra de Marão (Trás-os-Montes).

TABLEAU DES ESPÈCES DU SILURIQUE INFÉRIEUR (SÉRIE ORDOVICIENNE) DE VALLONGO

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien moyen (sous-étage des schistes ardoisiers)			Ordovicien inférieur (sous-étage des quartzites)
	Schistes à Uralichas Ribeiroi	Schistes à O. nosti- lio	Schistes à Didymo- graptus	Schistes quartzeux et quartzites à Bi- lobites
CRUSTACEA				
Acidaspis Buchi Barr.	+			
» ind.	..	..	+	
Asaphus nobilis Barr. (Ogygia Edwardsi Rou., forme longue et forme large)	+	+	+	
» glabratus Sh. (forme longue et forme large)	+	+	+	
» aff. glabratus Sh. var. gigantea mihi (l an. sp. n.)	+	..	+	
» Desmaresti Brongn. sp. (Ogygia Brongniarti Rou.)	+	+	+	
» » var. caudata mihi	+			
» Guettardi Brongn. sp.	+	+	+	
» Delessei Duf. sp. (l an A. Guettardi var. caudata)	+	+	+	
» contractus Vern. et Barr.	+	+	?	
» caudatus Brongn.?	..	..	+	
» cf. Cianus Vern. et Barr.	..	+		
» sp. ind.	+	+	+	
Calymene Tristani Brongn. (type de l'espèce)	+	+	+	
» » var., avec les sillons antérieurs et moyens de la glabellle effacés	..	..	+	
» Aragoi Rou.	+	+		
» Salteri Rou.	+	+	+	
» pulchra Barr.	+	+	+	
Cheirurus claviger Beyr. (forme longue et forme large)	+			
» Guillieri Trom. (aff. Ch. claviger Beyr.)	+			
» sp. n. (aff. Ch. Sedgwicki McCoy)	+			
Dalmanites socialis Barr.	..	+		
» » var. proaeva Emmr. (forme longue et forme large)	+	+	+	
» Downingiae Murch.	+			
» Vetillarti Rou.	+	+	+	
» » var. caudata mihi (l an sp. n.)	+			
» Torrubiae Vern. et Barr.	+			
» Hawlei Barr.	+			
» sp. n. (aff. Phacops Downingiae Murch.)	+	..	+	
» sp.	..	..	+	
Dionide formosa Barr.	+	..	+	
Illaenus giganteus Burm. (type de l'espèce)	+			
» » var. Lusitanicus Sh. (forme longue)	+	+	+	
» » var. Hispanicus Vern. et Barr. (forme large)	+	+		
» cf. Beaumonti Rou. (l an sp. n.)	+			
» (Dysplanus) Wahlebergianus Barr.	+			
» sp. n. (aff. I. Beaumonti Rou. sp.)	+			
Lichas (Uralichas) Ribeiroi Delg.	+	+		
» » juv. (cf. Lichas Hispanica Vern. et Barr.)	..	+		
» sp. n. (aff. L. incola Barr.)	+			
» sp. n. (aff. L. scabra Barr.)	+			
Ogygia Salteri sp. n. (Isotelus Powisii Portl., d'après Sharpe)	+	+	+	
» Desmaresti Brongn. (O. Brongniarti Rou.)	..	..	+	
» aff. desiderata Barr.	+			
» ind., 2 espèces	..	..	+	
Placoparia Tourneminei Rou.	+	+	+	

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien moyen (sous-étage des schistes ardoisiers)			Ordovicien inférieur (sous-étage des quartzites)
	Schistes à Uralichas Ribeiroi	Schistes à O. nocti- lio	Schistes à Didymo- graptus	Schistes quartzeux et quartzites à Bi- lobites
Homalonotus cf. Bohemicus Barr.....	..	..	+	
Harpes cf. primus Barr.....	..	..	+	
» sp. n.	..	..	+	
Cybele? (voyez C. loveni var. girvanensis)	..	..	+	
Trilobites ind., 2 formes différentes que nous croyons appartenir à un genre nouveau	..	..	+	
Ostracode (Cytheropsis?)	..	..	+	
Beyrichia sp.	..	..	+	
Plumulites aff. regius Barr.	+			
CEPHALOPODA				
Orthoceras vagans Salter	+	+	+	
» Hisingeri Rou.	+	?		
» aff. lineatum His.	..	+		
» sp. ind.	+	+	+	
Endoceras Dalimieri Barr. (Orthoceras duplex Wahl.)	+	+	+	
» cf. vaginatus Schloth.	..	+	+	
Céphalopode ind.	..	..	+	
Lituites cornu-arietis Sow.	+			
PTEROPODA				
Hyolithes cf. elegans Barr.....	+			
» cf. undulatus Barr.	..	+		
» sp. ind.	..	+	+	
Conularia nobilis Barr.?	+			
» sp. n., à surface unie.	..	..	+	
» sp., probablement nouvelle	+			
HETEROPODA				
Bellerophon bilobatus Sow. (B. Duriensis Sh.)	+	+	+	
» cf. elongatus Portl. (i an B. bilobatus Sow. var.)	..	+		
» cf. carinatus Sow. (i an sp. n.)	..	+		
» aff. acutus Sow.	..	..	+	
GASTROPODA				
Ribeiria sp., différent de R. pholadiformis Sh.	+			
Pleurotomaria sp.	+			
» ? sp.	..	..	+	
Natica ind., 2 espèces.	+			
Acroculia ou Turbo?	+			
Holopea (Littorina)?	+			
Univalve ind. (voyez Euomphalus Corndensis Sow.)	..	+		
» ind.	..	..	+	
LAMELLIBRANCHIATA				
Orthonota britannica Rou. (Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr.)	?	+	+	
» sp.	..	+		
Dolabra? Lusitanica Sh. (voyez Modiolopsis veterana Barr.)	?	+		
Arca Naranjoana Vern. et Barr.	+			
Modiolopsis aff. elegantulus Sh.	+			

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien moyen (sous-étage des schistes ardoisiers)			Ordovicien inférieur (sous-étage des quartzites)
	Schistes à Uralichas Ribeiroi	Schistes à O. noctilio	Schistes à Didymograptus	
Modiolopsis ou Tellinomya.....	..	+		
Tellinomya aff. elliptica Hall.....	..	+		
Nucula aff. amica Barr.	..	+		
Leda Bohemica Barr. (voyez Ctenodonta Ciae Sh.)	+	+		
Ctenodonta Morreni Rou. sp.	+			
» cf. Costae Sh.	+			
» aff. subaequalis McCoy.....	+	..	+	
» aff. erratica Trom.	+			
» compar Barr. sp.	..	+		
» aff. compar Barr.	+			
» sp.	..	..	+	
Redonia Duvaliana Rou.	+	+	+	
» Deshayesiana Rou.	+	+		
» Bohemica Barr.	+	+		
Ambonychia?	..	..	+	
Bivalves ind., plusieurs espèces.....	+	+	+	
BRACHIOPODA				
Strophomena cf. comitans Barr.	+			
» cf. Phillipsi Barr.	+			
» cf. spiriferoides McCoy.....	..	+		
» ?	..	..	+	
Leptaena sericea Sow.	+	..	+	
Orthis Duriensis Sh.	..	?	+	
» noctilio Sh.	+	+	+	
» » var. (aff. O. Ribeiroi Sh.)	..	+	+	
» Lusitanica Sh.	+	..	+	
» Miniensis Sh.	..	?	+	
» testudinaria Dalm.	..	..	+	
» cf. testudinaria Dalm.	+			
» filiceraei Rou. (O. testudinaria Vern. et Barr.)	+			
» Valpyana Dav.	+			
» redux Barr. (O. Budleighensis Dav.)	+	+		
» calligramma Dalm.	+	..	+	
» aff. calligramma Dalm.	..	..	+	
» cf. pulvinata Salt.	+	+		
» cf. patera Salt.	+	+		
» cf. protensa Sow.	..	..	+	
» cf. spiriferoides McCoy	..	+		
» ind., plusieurs espèces	..	+	+	
Lingula Lesueuri Rou.	+	+		
» aff. transiens Barr.	+			
» ind., plusieurs formes différentes.....	+	..	+	
Obolus sp. n. (aff. O. Davidsoni Salter)	..	..	+	
ECHINODERMATA				
Calix (Echinosphaerites) Murchisoni Vern. et Barr.	..	+	+	
» Barrandei Rou.	..	+		
» Sedgwicki Rou.?	..	..	+	
Crinoïdes, fragments de la tige	+	+	+	

NOMS DES ESPÈCES	Ordovicien moyen (sous-étage des schistes ardoisiers)			Ordovicien inférieur (sous-étage des quartzites)
	Schistes à Uralichas Ribeiroi	Schistes à O. nocti- lio	Schistes à Didymo- graptus	Schistes quartzeux et quartzites à Bi- lobites
COELENTERATA				
Polypier ind.	+			
Didymograptus Murchisoni Bøeck	..	..	+	
" " var. geminus His.	..	..	+	
" pennatulus Hall. sp.	..	..	+	
" " Hall. sp. var. hamatus Perner.	..	..	+	
" hirundo Salter	..	..	+	
" sparsus Hopk.	..	..	+	
" superstes Lapw.	..	..	+	
" bifidus Hall.	..	..	+	
" nanus Lapw.	..	..	+	
" euodus Lapw.	..	..	+	
" uniformis Elles et Wood	..	..	+	
" cf. uniformis Elles et Wood	..	..	+	
" extensus Hall.	..	..	+	
" nitidus Hall.	..	..	+	
" cf. indentus Hall.	..	..	+	
" sp., probablement nouvelle	..	..	+	
Azygograptus Hicksii Hopk.	..	..	+	
" Lapworthi Nich.	..	..	+	
" sp., probablement nouvelle.	..	..	+	
Dichograptus? (voyez D. Richardsoni Hall.)	..	..	+	
Tiges de végétaux terrestres	..	..	+	
INCERTAE SEDIS				
Cruziana furcifera d'Orb.	..	..	..	+
" rugosa d'Orb.	..	..	..	+
" Ximenezi Prado	..	..	..	+
" Saportai Delg.	..	..	..	+
" Hughesi Delg.	..	..	..	+
" Goldfussi Rou.?	..	..	..	+
Vexillum, traces	..	..	..	+

Analogies stratigraphiques avec le Bussaco.—Par la comparaison des faunes ordoviciennes du Bussaco et de Vallongo, il semble y avoir de la correspondance stratigraphique entre les numéros 2 et 3 de la série que nous avons décrite (*antè*, p. 90) et le groupe de schistes à *Orthis Ribeiroi* du Bussaco, et semblablement du n° 4 avec les schistes à *Homalonotus Oehlerti*. Il est pourtant à remarquer que ni l'une ni l'autre de ces deux espèces si caractéristiques de cette contrée ne paraît à Vallongo.

Les assises supérieures du Bussaco (Ordovicien supérieur) représentées essentiellement par les schistes à *Dalm. Dujardini*, n'ont pas de représentant bien défini dans cet affleurement septentrional du Silurique, sauf si l'on cherche cette correspondance dans les couches supérieures aux schistes ardoisiers, qui se montrent sur le haut du versant occidental de la serra da Murta. En effet, une espèce de Trilobite (*Calymene pulchra*) qui paraît dans le grès

de Loredó ensemble avec les *Trinucleus* et d'autres fossiles, se trouve, comme nous l'avons dit, un peu au sud de Vallongo, dans l'horizon fossilifère supérieur qui est caractérisé principalement par *Uralichas Ribeiroi*.

On voit donc qu'à Vallongo l'étage ordovicien supérieur fait défaut, ou du moins il n'est pas nettement représenté, en même temps que l'émission diabasique n'y est pas reconnue, tandis qu'au Bussaco, au contraire, cet étage a un puissant développement, à l'égal de l'éruption diabasique. Par contre, le Gothlandien a dans la contrée de Vallongo un bien plus grand développement qu'au Bussaco, il comprend une série de couches qui ne sont pas représentées dans cette dernière contrée, de sorte qu'il reste prouvé qu'à la dernière phase de l'époque ordovicienne et dans son passage au Gothlandien, d'importants mouvements du fond de la mer ont eu lieu, ce qui explique la différence des dépôts dans les deux contrées.

En outre, on reconnaît que le mouvement d'exhaussement qui a mis à découvert la contrée du Bussaco vers la fin de l'époque ordovicienne, était déjà initié auparavant dans le nord du Portugal, car on n'y découvre pas les assises supérieures formées au Bussaco, et on voit simultanément que le mouvement d'affaissement de l'époque Gothlandienne a pareillement commencé dans le nord du pays et (comme nous verrons plus loin) contemporanément aussi dans le sud, avant qu'il eut atteint le Bussaco, qui seulement plus tard a reçu les dépôts de cette époque.

Lentille de l'Ordovicien au milieu des schistes gothlandiens.— A l'est de la serra da Murta il se montre intercalée dans les schistes graptolitiques du Silurique supérieur une bande interrompue et très irrégulière de quelques 9,5 kilomètres de longueur sur 300 mètres de largeur maximum, de schistes fins, fossilifères, comprenant une strate de 4 mètres d'épaisseur où les fossiles sont plus abondants. Ces schistes sont fissiles, gris foncé avec taches blanchâtres ou jaunâtres, parfois violacé clair ou rougeâtre, et contiennent quelques nodules durs, argilo-siliceux, dépourvus de fossiles. La faune de cette strate est très variée et composée d'espèces clairement ordoviciennes, mais qui en grande partie ne furent trouvées que dans cette localité.

Il est à remarquer principalement la diversité des espèces et la profusion des exemplaires de *Didymograptus*¹ découverts dans une carrière contigue à la route du hameau du Paço vers Sobrado, car ce genre d'Hydrozoaires, sauf une espèce (*D. Murchisoni*) qui accompagne toujours en les surmontant les quartzites à Bilobites, est représenté par peu de formes différentes dans les autres gisements.

La carrière dont nous parlons est située à 1200 mètres à S. 40° W. de l'église de Sobrado. La faune y trouvée comprend :

Placoparia Tourneminei Rou.

Calymene Salteri Rou.?, une seule tête.

Homalonotus cf. *Bohemicus* Barr., une glabelle.

Asaphus caudatus Brongn.?, un pygidium imparfait.

Asaphus sp.

Ogygia, 2 espèces ind.

Iliaenus sp., moules très aplatis, indéterminables.

Dalmanites sp., une tête incomplète.

Acidaspis sp., un fragment du thorax.

¹ Il mérite une mention spéciale *D. sparsus* Hopk., qui se trouve aussi, comme nous verrons plus loin, dans les schistes de la carrière du Mestre André (Barrancos), ce qui porte à croire que l'horizon géognostique des deux localités soit le même.

Trilobites ind., 2 formes différentes que nous croyons appartenir à un genre nouveau.

Beyrichia simplex Jones?

Orthoceras ind., 2 moules différents absolument indéterminables.

Bellerophon bilobatus Sow?

Conularia sp. n., avec la surface unie.

Pleurotomaria?

Redonia Duvaliana Rou.

Ctenodonta sp.

Bivalve ind.

Orthis testudinaria Dalm.

» *calligramma* Dalm.

Orthis sp.

Strophomena?

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Didymograptus hirundo Salter.

» *sparsus* Hopk.

» *superstes* Lapw.

» *pennatulus* Hall?

» *uniformis* Elles et Wood.

» *extensus* Hall.

» *nitidus* Hall.

» sp.

Azygograptus sp.

Crinoïde, fragment de la tige.

Tiges de végétaux.

La même strate fossilifère a été fouillée à 1700 mètres à S. 68° E. du signal géodésique de Quintarei, ainsi qu'à 2600 mètres à S. 17° E. de l'église de Gandra. Dans un point intermédiaire, à 300 mètres à E. de Pinguella et 1 kilomètre à peu près au S. E. du Paço, fut trouvé le moule d'un jeune individu d'*Ogygia*.

Tout près du pont de Villarinho de Cima sur la grande route du Porto à Amarante, on observe sur la rive gauche du ruisseau un schiste très fin, fissile, gris foncé, sans doute la même couche dont nous venons de parler. Il est pourtant à remarquer dans cet endroit un banc de grès fin, blanc, ou quartzite compact, puissant de 6 à 8 mètres et divisé en lits minces bien stratifiés. On y a découvert un hypostome d'*Ogygia* et un moule de bivalve (*Arca*?). Dans quelques autres points les schistes sont aussi accompagnés par de petites masses de quartzite qui peut-être appartiennent à l'assise à Bilobites sous-jacente.

Discordance entre les grauweekes de Sobrido et les schistes ordoviciens.— A 400 mètres au N. W. de l'église de S. Martinho do Campo passe la limite des grauweekes blanches à taches violacées du sommet de la serra da Murta avec les schistes du Silurique inférieur du versant occidental de cette colline. Sur les tranchées du chemin on voit que les grauweekes reposent sur ces schistes, les unes et les autres étant presque verticaux, montrant cependant un petit écartement dans leur direction. Les grauweekes se dirigent verticalement vers N. 10 à 12° W., tandis que les schistes suivent vers le N. N. W. avec inclinaison très forte ou presque verticale sur l'E. Il est donc évidente la discordance entre les deux étages siluriens. En d'autres points de cette ligne-limite la discordance est encore plus manifeste.

Plus au sud de ce point, à 1200^m au S. 65° E. du signal de Terronha sur le chemin de fer du Douro, on voit aussi le contact des deux sections du Silurique qui montrent une forte discordance.

Cet exemple montre que les couches de l'Ordovicien forment le *substratum* des grau-
wackes et schistes grossiers de la serra da Murta, les schistes à *Didymograptus* pouvant donc
appartenir à la base de la série schisteuse de cette section du Silurique, ayant été mis à dé-
couvert dans ce point par la dénudation des couches supérieures. C'est ce que d'ailleurs prouve
clairement le profil d'Ervedosa à Balsa (pl. VII, n° 2).

En d'autres points où les deux étages Gothlandien et Ordovicien sont en contact im-
médiat, les directions des couches varient beaucoup et la discordance est toujours visible.

A 2300^m au S. de l'église d'Alfena sur la route de Vallongo à Cabeda, c'est un autre
point de la limite des schistes ordoviciens avec les grau-
wackes blanches du Silurique supé-
rieur. Ces dernières suivent la direction N. 42° E. avec plongement de 55° vers le N. W.,
tandis que les schistes ordoviciens ont une allure bien différente, qui semble être N. 47° W.
avec une inclinaison très forte vers le N. E. Le contact des deux sections du Silurique n'est
pas visible dans cet endroit à cause des éboulis qui le cachent.

Au-dessous de ce point sur le chemin de fer du Douro on observe pourtant le contact
du Gothlandien et de l'Ordovicien avec discordance comme le montre le diagramme suivant.

Au contraire, dans le col de passage de l'ancienne route du Porto à Vallongo à l'ouest
de ce village, on observe nettement la discordance des grau-
wackes du plateau de Senhora da
Chan sur les schistes ordoviciens de Vallongo.

Ces schistes se dirigent vers N. 27° W. avec une inclinaison forte sur l'E. N. E. Les
grau-
wackes montrent une stratification confuse, cependant elles semblent suivre verticalement
vers le quadrant du N. (N. à N. 15° W.)

Au col de la nouvelle route le même contact peut être observé, là les grau-
wackes se
dirigent vers N. 42° W. avec plongement de 60° sur le S. W., tandis que les schistes du Silu-
rique inférieur suivent à peu près vers le N. avec une inclinaison plus faible sur l'E.

Ces grau-
wackes passent parfois à un quartzite gris; elles sont traversées par d'innom-
brables veinules irrégulières de quartz blanc et se relient évidemment aux grau-
wackes du dos
de la serra da Murta, dont elles se trouvent séparées par l'intrusion de la voûte ordovicienne
de Vallongo.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Généralités. — En embrassant l'affleurement ordovicien de Vallongo qui termine au nord,
comme nous l'avons dit, en une pointe effilée très étroite, il se développe de chaque côté une
assise de grau-
wackes avec quelques schistes qui, selon nous, forme la base du Silurique
supérieur.

Nous réunissons donc dans cet étage toute l'épaisse série de couches à partir des grau-
wackes de la serra da Murta, en considérant toutefois qu'elle se fût formée pendant l'inter-
valle où les phénomènes sédimentaires, à la fin de l'époque ordovicienne, ont été interrompus
dans le Bussaco.

On doit considérer cette série comme appartenant à l'assise de Llandovery, que Etheridge et Barrande, en s'appuyant sur des preuves paléontologiques, d'ailleurs d'une grande valeur, ont placé au toit du Silurique inférieur. Cependant, suivant l'avis de l'éminent géologue Sir Archibald Geikie, avis plus conforme à celui de la Commission de la carte géologique internationale de l'Europe, nous l'avons placée à la base du Gothlandien.

Cette opinion est d'ailleurs justifiée, car les rapports stratigraphiques de ces couches en Portugal, nous portent naturellement à tracer, comme nous l'avons fait, la ligne de séparation entre les deux étages siluriens, au point où commence l'assise des grauwackes.

Les deux bandes de grauwackes, l'orientale et l'occidentale, qui couronnent respectivement les deux serras da Murta ou de Sobrido et de Mattosinhos, à l'est et à l'ouest de l'affleurement ordovicien au nord de Vallongo, convergent au sommet de San Miguel, faisant leur jonction à quelques centaines de mètres au nord de cette chapelle. Il est à remarquer l'abondance extraordinaire de quartz blanc, qui traverse les grauwackes à ce point-là, en formant des filons et même de grandes masses au milieu de ces roches.

Grauwackes de la serra da Murta.— Les grauwackes ne forment pas des couches régulières bien distinctes, et n'ont pas non plus une composition uniforme sur une longue étendue; au contraire, elles montrent des caractères très variables, en passant latéralement, de même que verticalement, à des schistes plus ou moins grossiers et dans quelques parties aussi à un quartzite compact.

C'est dans la serra da Murta que les grauwackes présentent une plus grande puissance; elles y forment une masse avec des caractères uniformes sur plus de 200 mètres d'épaisseur; cependant elles s'amincissent vers les deux côtés en forme de lentille et du côté du sud elles se relient à un ensemble de schistes micacés, gris noirâtres, qui va passer à Recarei. L'assise de grauwackes est faiblement représentée à la partie septentrionale de la même serra; on y passe tout-à-coup du schiste grossier, dont les grauwachas ne sont d'ailleurs qu'un accident, aux schistes ardoisiers du Silurique inférieur, les deux étant séparés par une forte discordance.

Les grauwackes sont ordinairement blanches et micacées, plus ou moins schistoïdes, elles sont traversées par de nombreux filons et veinules de quartz blanc et d'oxyde de fer, qui leur donnent un aspect tout particulier et caractéristique; dans les parties saines de la roche on voit cependant qu'elles ont la couleur gris foncé, passant fréquemment dans le sens horizontal à un schiste grossier, très micacé. Elles sont en partie criblées de petites cavités cubiques, provenant de la destruction de cristaux de pyrite, fort abondants dans quelques points.

Ces grauwackes passent aussi en haut très graduellement à un schiste grossier sableux, gris ou rougeâtre, et renferment quelques lentilles de petites dimensions d'un schiste très fin et mou.

Grandes masses de quartzite.— En subordination aux grauwackes on voit aussi des lits d'un schiste fin, sans stratification ni schistosité visibles, traversé par des veinules de quartz et d'oxyde de fer, et passant accidentellement au quartzite.

Celui-ci se montre souvent en masses détachées, que l'on pourrait par inadvertance regarder comme des blocs erratiques, vu qu'elles ne correspondent pas par leur nature aux

roches du sol où elles reposent; on reconnaît cependant qu'elles sont rigoureusement en place ayant été séparées des grauwackes par les agents atmosphériques dans l'époque actuelle.

Ces masses de quartzite représentent donc un accident de la grauwacke; peut-être aussi en partie sont-elles en rapport avec les nombreux gisements métallifères de cette région, principalement d'antimonite, qui dans quelques mines paraît alliée à un métal noble, l'or, qui l'accompagne en quantité suffisante pour pouvoir être utilisé industriellement.

Grauwackes de la serra d'Ervedosa.—Dans le point culminant de la serra d'Ervedosa, ces masses sont très puissantes, formant des rochers élevés sans stratification distincte; le quartzite passe supérieurement à un schiste grossier, gris, renfermant quelques nodules plus durs, au moyen d'un schiste blanc finement sableux, ou grauwacke. Inférieurement il passe de même au schiste grossier, de sorte que toutes les trois roches, quartzite, grauwacke et schiste grossier, représentent en effet une seule couche.

L'assise de grauwacke schistoïde blanche et de nuances claires de la serra da Murta, est sans contredit la même de la serra de Senhora da Chan et du dos de la serra d'Ervedosa, sur le flanc occidental de l'anticlinal de Vallongo, quoique les caractères des roches, par des circonstances purement locales de la sédimentation, ne soient pas identiques. Celles-ci ont fait varier horizontalement, comme nous l'avons dit, la composition des strates, même à de courtes distances.

A San Martinho do Campo les grauwackes de la serra da Murta ont subi une forte inflexion vers l'est, leur ligne-limite passant à quelques dizaines de mètres au nord de cette paroisse. Cette inflexion est parallèle au coude que fait la bande de schistes à *Didymograptus* à l'est du Paço, où elle subit une interruption. Malgré cette inflexion, les couches sont dirigées vers N. 35 à 40° W., direction concordante avec celle de l'affleurement silurien.

Bande graptolitique orientale.—En traversant la serra da Murta vers l'est, dans le flanc oriental de l'anticlinal de Vallongo, il vient à la suite des grauwackes schistoïdes, blanches, du sommet de cette colline, un schiste grossier, micacé, très puissant, qui leur succède en concordance parfaite et en transition graduelle. Ce schiste est parfois un peu plus fin, il a la couleur gris verdâtre foncé, et par un commencement d'altération il devient rouge, jaunâtre ou gris en grandes taches, ou rouge irrégulièrement rayé de violet.

Poursuivant cette coupe sur la route de Paço à Sobrado, le schiste grossier est recouvert immédiatement par un schiste fin, gris, à taches blanchâtres, qui contient quelques lits minces de schiste siliceux noir, parfaitement compact, qui a fourni plusieurs formes de Graptolites des genres *Monograptus* et *Diplograptus* absolument indéterminables. Ce schiste renferme en outre quelques grands nodules où l'on a aussi découverts quelques mauvaises empreintes de Graptolites.

Cette couche fossilifère a été fouillée à 1.200 mètres au N. 65° E. de l'église de San Martinho do Campo, elle se poursuit encore vers le S. E., allant se terminer à 500 mètres à l'est de l'église de Recarei. A 1.200 mètres à S. 64° E. de l'église de Sobreira, peu au sud du chemin de fer du Douro, un schiste ampéliteux noir, en partie maclifère, a aussi fourni des empreintes de 2 ou 3 espèces de *Monograptus*.

Dans la localité ci-dessus citée, à E. N. E. de San Martinho do Campo, le schiste est

de même ampéliteux, fissile, noir, chargé d'empreintes de Graptolites et il renferme beaucoup de cristaux de pyrite. On y a recueilli:

Monograptus Proteus Barr.

» *Becki* Barr.

» *turriculatus* Barr.

» *convolutus* His. var. *spiralis* Gein. (*Grapt. spiralis* Gein.)

» *priodon* Bronn.

» *sagittarius* His.

» cf. *Sedgwicki* Portl.

» cf. *colonus* Barr.

Monograptus cf. *tenuis* Portl.

» indet., 3 espèces probablement nouvelles, dont une a 4 millimètres de largeur et les cellules très serrées, pouvant se compter plus de 20 en 1 centimètre de longueur.

Diplograptus palmeus Barr.

Rastrites Linnaei Barr.

Phyllograptus cf. *angustifolius* Hall.

Surmontant cette strate fossilifère et suivant la même route vers Sobrado, vient l'affleurement lenticulaire de schistes ordoviciens, auquel nous avons fait allusion (p. 110) et plus vers l'est, à 200 mètres de distance du schiste gothlandien qui le précède, c'est-à-dire, à 950^m S. 53° W. de l'église de Sobrado, il vient un autre lit de schiste fin, très dur, passant à la lydite, blanc ou gris clair à taches noires, qui contient aussi quelques formes de Graptolites, très mal conservées, mais qui semblent devoir être rapportées au genre *Diplograptus*.

Sur le prolongement nord de ce lit on a pourtant rencontré à 1.650^m au N. 84° W. de l'église de Sobrado

Cyrtograptus Murchisoni Carr. var.
crassiusculus Tullb.

» sp.

Retiolites Geinitzianus Barr.?

Diplograptus bellulus Törnq.

espèces qui le classent sans hésitation dans le Silurique supérieur.

Après un large espace occupé par des schistes fins et quelques grauweekes jusqu'au près de l'église de Sobrado, on passe graduellement à une assise très puissante de grauweekes, généralement très fines, et de schistes d'une teinte rouge prédominante, sur laquelle repose la paroisse de Sobrado. Cette assise embrasse une largeur de quelques kilomètres jusqu'à la limite du massif granitique, qui occupe la surface presque entière de la province de Minho. Au milieu de cet ensemble schisteux on découvre par-ci par-là quelques lentilles de schiste ampéliteux noir, avec empreintes de Graptolites presque toujours indéchiffrables, mais appartenant sans aucun doute au Silurique supérieur. Près du contact du granite plusieurs couches sont plus ou moins distinctement maclifères.

Gisements graptolitiques de la bande orientale.— Il y a plusieurs autres gisements graptolitiques alignés avec ceux du Paço qui forment ensemble une bande adossée au schiste grossier, et qui se poursuit vers le nord et vers le sud sur plusieurs kilomètres. Cette bande est indiquée sur la carte géologique par une série de signes disposés en une ligne parallèle à la limite du Silurique inférieur. Ces signes désignent les points principaux où l'on a découvert les fossiles, points que leur position relative permet de reconnaître comme appartenant tous très plausiblement au même niveau.

Cette bande graptolitique représentée par différents affleurements ampéliteux, tous orientés suivant la même direction, passe tout près de la station du chemin de fer à Recarei;

elle commence à 500 mètres à l'est de l'église de ce village et se dirige vers le N.W., en passant aux hameaux de Villarinho de Cima, Pinguella, Paço, Ferraria et à l'est de Fonte Leite et de San Romão de Coronado.

Nous n'avons pas pu la suivre vers le nord de ce dernier point, cependant nous croyons qu'elle se poursuit dans ce sens en passant un peu à l'est de l'église de Balazar, à Paradella, Senhora das Necessidades et Fonte Boa (3 kilomètres au S.E. de Fão) sur une étendue totale de 45 kilomètres au moins.

La bande graptolitique a visiblement subi la même déviation dans sa direction que les schistes grossiers et les grauwackes, auxquels elle est rattachée. Elle est représentée par un schiste fin, noir ou gris noirâtre qui renferme les fossiles, et aussi en plusieurs points par une lydite, à laquelle le schiste fait transition. Accompagnant cette bande parallèlement, on voit toujours le schiste micacé très grossier, gris foncé, qui est la roche principale de l'assise des grauwackes.

Bande graptolitique occidentale.— En descendant du col de Senhora da Chan vers l'ouest, suivant l'ancienne route de Vallongo au Porto, il vient immédiatement après les grauwackes de Senhora da Chan (voir pl. VI, profil n° 4) une bande de schistes fins à Graptolites, blancs et noirs, surmontée par des schistes aussi fins, les schistes de Telheiras, qui renferment des nodules contenant des Trilobites et d'autres fossiles (*Phacops*, *Tentaculites*, Crinoïdes).

La transition des grauwackes aux schistes fins est parfaitement graduelle. Les grauwackes contiennent en plusieurs points des petites masses lenticulaires de 1 mètre d'épaisseur et moindres, d'un schiste mou, fin, gris.

Le schiste ampéliteux à Graptolites tient de l'aspect de l'anthracite et une matière charbonneuse forme en effet de minces plaquettes intercalées dans le schiste. Par ce motif ces couches ont été souvent mal interprétées; on les a considérées comme la continuation de celles du bassin carbonifère de San Pedro da Cova et on y a même entrepris une fausse recherche de charbon.

A l'ouest de la bande de schistes fins du Gothlandien vient la bande du Carbonique, au milieu de laquelle on aperçoit quelques lits, épais de quelques centimètres à peine, d'un grès fin, friable, blanchâtre, qui est évidemment subordonné aux schistes fins, car il a fourni *Orthoceras*, *Cardiola interrupta*, *C. striata*, *Monograptus* et des moules de petites bivalves indéterminées. Les schistes sont fort contournés, ils sont rayés en bandes très fines, alternativement blanc et gris plus ou moins foncé. On voit donc que le Carbonique reposait immédiatement sur le Silurique supérieur; les couches des deux systèmes ont été plissées ensemble, le Carbonique restant pincé dans un pli des schistes gothlandiens, qui s'appuyent du côté de l'ouest sur les micaschistes du hameau de Seixo.

Sur la route de Vallongo à Cabeda, on observe que les schistes fins, gris et violacés, rayés de gris plus ou moins foncé, de blanc et de rougeâtre, qui renferment les lits graptolitiques, sont fort contournés et ondulés. Ces schistes renferment une couche épaisse de 8 à 10 mètres de schiste grossier très micacé, tout à fait semblable aux schistes grossiers de la serra da Murta, marquant par conséquent nettement la liaison des grauwackes avec les schistes fins graptolitiques dans une même assise.

Cette bande graptolitique est interrompue en plusieurs points, cependant elle accom-

pagne toujours du côté de l'est la bande du Carbonique. Elle passe à Boloï (Vella), à l'est de San Pedro da Cova, Senhora da Chan, Cabeda, Alfena et Barracão (3,5 kilomètres au S. W. du pont de Trofa sur la rivière Ave, dans la route de Porto à Villa Nova de Famalicão).

Différentes assises du Gothlandien.—En résumé, la succession des strates du Silurique supérieur dans cette contrée est en ordre descendant la suivante:

Schistes fins à nodules de Telheiras, avec une faune spéciale.

Schistes et grauweekes rouges de Sobrado.

Schistes fins de Cabeda à Graptolites abondants et quelques autres fossiles. Ces schistes forment la bande graptolitique orientale, en considérant réunis dans une même couche les deux lits fossilifères du Silurique supérieur du Paço, auxquels nous avons fait allusion.

Schistes grossiers du coteau oriental de la serra da Murta.

Grauweekes blanches tachées de violet et quartzites du dos de la serra da Murta ou de Sobrido.

Dans le flanc oriental de l'anticlinal de Vallongo le schiste à nodules (schiste de Telheiras) fait défaut, sans doute parce qu'il a été entraîné par la dénudation.

Ce sont les grauweekes blanches, qui forment la base de cette série, qui ont été percées directement par les schistes ordoviciens, la série se montrant incomplète de chaque côté, en partie par suite du glissement des couches les unes sur les autres pendant l'acte du soulèvement.

Vu la discordance des grauweekes avec les schistes tégulaires de l'Ordovicien, il est logique de supposer que les unes et les autres appartiennent à des époques distinctes.

D'autre part, il n'est pas inadmissible que les grauweekes et schistes grossiers, qui indiquent un changement profond dans les conditions physiques de la sédimentation, lequel a précédé la formation des schistes à Graptolites, se soient déposés pendant la période où les phénomènes sédimentaires ont été interrompus au Bussaco. Ils doivent donc être rapportés à la phase de transition entre les deux sections du Silurique, et par conséquent ils doivent correspondre, comme nous l'avons dit, au Llandovery group du nord de l'Angleterre, qui a été généralement considéré comme appartenant au Silurique supérieur, mais qui selon Mr. Etheridge forme le toit de l'Ordovicien.¹

Grauweekes de la bande occidentale.—La bande occidentale des grauweekes subit une déviation vers l'est en traversant la ligne du chemin de fer au nord de Vallongo; elle accompagne l'affleurement du Silurique inférieur jusqu'à son extrémité nord, la largeur de cet affleurement diminuant de beaucoup par ce motif. A ce point, la discordance entre les deux étages siluriens est bien visible par la différence d'inclinaison et de direction des couches, puisque les grauweekes suivent vers N. 42° E. avec plongement de 35° vers le N. W., tandis que les schistes ordoviciens à nodules abondants et quelquefois très volumineux, suivent vers N. 53° W. avec une forte inclinaison sur le N. E.

¹ *Quart. Journ.*, 1881, Anniversary address of the President.

Les grauwackes sans stratification visible ou très peu distincte sont traversées obliquement sur la voie ferrée dans l'étendue d'environ 500 mètres et continuent vers le nord passant entre le signal et l'église d'Alfena.

A l'ouest des grauwackes se trouvent des schistes gris plus ou moins foncés, quelquefois rayés de violet, contenant plusieurs lentilles charbonneuses, dont quelques-unes ont fourni des Graptolites.

Schistes à nodules de Telheiras.— Un peu au nord de la voie ferrée près de la limite de l'Archaïque au N.E. d'Ermezinde, on trouva plusieurs nodules durs, plus ou moins grands, à forme ellipsoïdale, parsemés dans un schiste fin, gris, avec plusieurs taches noires et renfermant des restes abondants de Crinoïdes et d'Orthocères. Plusieurs nodules sont percés par des cavités cylindriques laissées par la destruction des moules d'Orthocères et renferment aussi des empreintes de *Monograptus*; d'autres nodules contiennent des moules de *Cardiola interrupta*. En outre des nodules, le schiste fin renferme aussi de petites concrétions de fer hydroxydé à formes irrégulières.

A Telheiras, près d'une petite tache ampéliteuse dans laquelle on trouva quelques mauvais échantillons de Graptolites, on a recueilli des têtes et des pygidiums de Trilobites et des moules de Brachiopodes dans une strate de schiste mou avec l'aspect oolithique, à 1.800 mètres au S. 87° W. du signal d'Alfena. Or, comme le schiste à nodules de Telheiras surmonte immédiatement en stratification concordante les grauwackes de Sobrado, qui reposent sur les schistes fins à Graptolites, il faut conclure que les schistes de Telheiras sont aussi liés étroitement aux schistes à Graptolites.

Les schistes de Telheiras ressemblent par l'aspect aux schistes de Sazes; cependant ils ne renferment pas les minces lits de quartzite, qui par contre sont fort abondants dans le Silurique supérieur d'Amendoa et du Bussaco. Sans le moindre doute ce sont les mêmes couches qui montrent la *Cardiola interrupta* à l'ouest de Vallongo et traversent la grande route avant d'arriver aux grauwackes du plateau de Senhora da Chan; ils sont enfin les mêmes qui passent un peu à l'est d'Ervedosa, où cependant l'on ne découvrit aucun nodule.

L'argile provenant du schiste fin à nodules de Telheiras est utilisée pour la fabrication de la tuile, en lui ajoutant du schiste sableux pour dégraisser la pâte et éviter qu'elle se fende.

Ce schiste à nodules est au contact des micaschistes d'Ermezinde; la ligne du contact y est pourtant cachée par une étroite bande du Carbonique.

Faune de la bande graptolitique occidentale.— A Cabeda, à 1.500 mètres au sud de l'église d'Alfena, on observe une masse considérable de schiste ampéliteux, noir, immédiatement superjacent aux schistes grossiers de la zone des grauwackes. On découvrit dans ce schiste plusieurs espèces de Graptolites et quelques petites bivalves, celui-ci étant un des gisements fossilifères les plus riches que nous ayons découvert dans notre Silurique supérieur, comme l'on peut juger d'après la liste ci-dessous:

Cardiola retrostriata v. Buch. var. *tenuicosta* Sandb.
Pterinea sp.
Ariculopecten sp.

Atrypa?

Monograptus Becki Barr.

» *lobiferus* McCoy.

» » var. *Nicoli* Harkn.

<i>Monograptus lobiferus</i> McCoy var. <i>mil-</i>	<i>Monograptus triangulatus</i> Harkn.
<i>lipeda</i> Lapw.	» <i>leptotheca</i> Lapw.
» <i>Proteus</i> Barr.	» <i>Hisingeri</i> Carr.
» <i>Sedgwicki</i> Portl.	» cf. <i>nuntius</i> Barr.
» <i>convolutus</i> His. sp. (<i>M.</i>	» <i>latus</i> McCoy.
<i>spiralis</i> Barr. non	» ind., 2 espèces probablement
Gein.)	nouvelles.
» aff. <i>convolutus</i> His. (à an	<i>Diplograptus palmeus</i> Barr.
sp. n.)	» <i>foliaceus</i> Murch.
» <i>spiralis</i> Gein.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.
» <i>tenuis</i> Portl.	» <i>gemmatus</i> Barr.
» <i>priodon</i> Bronn.	<i>Cyrtograptus radians</i> Törnq.
» <i>distans</i> Portl.	» cf. <i>Carruthersi</i> Lapw.
» <i>communis</i> Lapw.	<i>Phyllograptus?</i> (cf. <i>Ph. typus</i> Hall).

Faune de la bande graptolitique orientale. — Cet horizon fossilifère est sans aucun doute le même que l'on découvre du côté occidental de l'affleurement ordovicien dont nous avons déjà fait mention.

Le plus important des gisements fossilifères est celui de Villarinho de Cima, à l'est de Vallongo, sur la grande route de Porto à Penafiel, où l'on n'a trouvé que des Graptolites, en grande partie d'espèces nouvelles et communes avec celles de Cabeda.

Les espèces rencontrées à 900 mètres au S.E. du hameau de Villarinho de Cima sont les suivantes :

<i>Monograptus Becki</i> Barr.	<i>Monograptus Hisingeri</i> var. <i>jaculum</i> Lapw.
» <i>lobiferus</i> McCoy var. <i>mil-</i>	» <i>latus</i> McCoy.
<i>lipeda</i> Lapw.	» cf. <i>mutuliferus</i> Menegh.
» <i>turriculatus</i> Barr.	» cf. <i>Gonii</i> Menegh.
» <i>convolutus</i> His. sp.	» <i>triangulatus</i> Harkn.
» <i>Halli</i> Barr.?	» ind., 11 espèces que nous con-
» <i>incisus</i> Harkn. (<i>M. sagit-</i>	sidérons toutes nouvelles. ¹
<i>tarius</i> His.)	<i>Diplograptus folium</i> His.?
» <i>tenuis</i> Portl.	» aff. <i>pristis</i> His.
» <i>Sedgwicki</i> Portl.	<i>Rastrites Linnaei</i> Barr.
» <i>galaensis</i> Lapw.	» <i>peregrinus</i> Barr.
» cf. <i>Lamarmorae</i> Menegh.	<i>Phyllograptus</i> cf. <i>angustifolius</i> Hall.

Cette zone graptolitique renferme une faune très riche et variée, non moins de 35 espèces déterminées spécifiquement, outre plusieurs espèces nouvelles, en tout montant à 52 espèces seulement dans la bande orientale, appartenant aux genres *Monograptus* (38 espèces), *Diplograptus* (5), *Rastrites* (2), *Phyllograptus* (1), Crinoïde (1 moule), une espèce de Brachio-pode, un *Ctenodonta?*, un *Orthoceras* ind., une espèce d'*Iliaenus* et un *Asaphus* ou *Ogygia*. A ces espèces il faut en ajouter 95 (communes en grande partie avec les précédentes) qui paraissent du côté occidental au même niveau ou à un niveau peu différent de celles de la

¹ Plusieurs de ces espèces sont remarquables par leurs énormes dimensions, les empreintes parvenant à atteindre 1 centimètre de largeur ; elles le sont aussi par le nombre des cellules qui s'élève quelquefois à plus de 20, et d'autres fois descend jusqu'à 3 ou 4 en 1 centimètre de longueur de l'hydrosome.

bande orientale, en composant toutes ensemble la série de formes connues jusqu'à présent de la faune du Silurique supérieur dans le bassin silurien de Vallongo, ainsi qu'on le voit dans la liste suivante :

LISTE DES ESPÈCES DU SILURIQUE SUPÉRIEUR DE VALLONGO¹

- + *Plectrodus mirabilis* Ag., fragment de mâchoire probablement de cette espèce. R.
- + *Crustacé* ind.
- + *Phacops* cf. *Potieri* Bayle.
- + » sp. n. (aff. *Ph. miser* Barr.)
- + » sp. (voyez *Ph. intermedius* Barr.)
- + » sp. (voyez *Ph. laciniatus* F. Roemer.)
- + » ind., 2 espèces.
- + *Homalonotus* sp. n. (aff. *H. delphinocephalus* Green.)
- * *Iliaenus* sp.
- * *Asaphus* ou *Ogygia*.
- + *Bolbozoe Bohemica* Barr.
- + » *anomala* Barr.
- + *Orthoceras* aff. *currens* Barr.
- + » cf. *Gruenewaldti* Barr.
- + » cf. *Bohemicum* Barr.
- + » cf. *intermedium* Marklin.
- * + » ind., plusieurs espèces.
- + *Tentaculites tenuis* Sow.
- + » *tenuicinctus* F. A. Roemer
- + » *subcochleatus* Sandb.
- + *Bellerophon carinatus* Sow.
- + » *trilobatus* Sow.
- + *Murchisonia* sp. (voyez *M. gracilis* Hall.)
- + *Pleurotomaria* cf. *rotuloides* Hall.
- + » sp.
- + *Cardiola gibbosa* Barr.
- + » *retrostriata* v. Buch var. *tenuicosta* Sandb.
- + » ? *striata* Sow. sp.
- + *Spanila* aff. *cardiopsis* Barr.
- + *Solen* aff. *costatus* Sandb.
- + *Mytilus esuriens* Barr.
- + » ind., 3 espèces différentes.
- + *Orthonota triangulata* Salt. [*Grammysia cingulata* His. sp. var. β (*triangulata*) Salter sp.]
- + » sp.
- + *Avicula pseudo-laevis* OEhlert (*A. laevis* Vern. et Barr., non *A. laevis* Goldf.).
- + » sp. (voyez *A. ampliata* Phill.).
- + » sp.
- + *Aviculopecten* sp.
- + *Pterinea* aff. *pleuroptera* Conrad.
- + *Meristella furcata* Sow. sp.

¹ Les espèces marquées par un astérisque (*) se trouvent dans la bande orientale. Celles indiquées par une croix (+) appartiennent à la bande occidentale.

- + *Leda* aff. *similaris* Barr.
- * *Ctenodonta*?
- + *Bivalves* ind., plusieurs espèces.
- + *Rhynchonella decemplicata* Sow.
- + » ind., petite espèce.
- * + *Strophomena* cf. *pecten* Sow.
- + » sp.
- + *Orthis sacculus* Sandb.
- + » sp.
- + *Spirifer* cf. *crispus* Linn.
- + » sp. (voyez *S. nudifera* var. *undulata* F. Roemer).
- + *Atrypa*?
- + *Orthothetes hipponyx* Schnur sp.
- + *Brachiopodes* ind., 2 ou 3 espèces.
- * + *Monograptus triangulatus* Harkn.
- * + » *priodon* Bronn.
- + » cf. *priodon* Bronn.
- * + » *latus* McCoy.
- + » cf. *latus* McCoy.
- * + » *colonus* Barr.
- * » cf. *colonus* Barr.
- + » *Hisingeri* Carr.
- * » cf. *Hisingeri* Carr. var. *jaculum* Lapw.
- * + » cf. *mutuliferus* Menegh.
- * + » *incisus* Harkn. (*Prionotus sagittarius* His.).
- + » cf. *incisus* Harkn.
- * + » *convolutus* His. sp. (*M. spiralis* Barr. non Gein.)
- * + » » var. *communis* Lapw. (*M. communis* Lapw.)
- * + » » var. *spiralis* Gein. (*M. spiralis* Gein.)
- * + » » var. *Proteus* Barr. (*M. Proteus* Barr.)
- + » aff. *convolutus* His. (an sp. n.)
- * + » *tenuis* Portl.
- + » aff. *tenuis* Portl.
- + » *Nilssoni* Barr.?
- * + » *Becki* Barr.
- * + » *turriculatus* Barr.
- + » cf. *cygnus* Törnq.
- * » *dubius* Suess.
- * » *argutus* Lapw.
- * » *nudus* Lapw.
- * » *gregarius* Lapw.
- * + » *Sedgwicki* Portl.
- * + » cf. *Sedgwicki* Portl.
- * + » *millipeda* McCoy.
- * + » *Halli* Barr.?
- * + » cf. *Lamarmorae* Menegh.
- * + » *Galaensis* Lapw.
- * + » cf. *Goni* Menegh.
- + » *lobiferus* McCoy.

- + *Monograptus distans* Portl.
- + » *leptotheca* Lapw.
- + » cf. *nuntius* Barr.
- + » *Nicoli* Harkn. (*M. Becki* var., d'après Geinitz).
- + » cf. *alternatus* Hopk.
- * » plus 12 espèces, déjà reconnues, toutes probablement nouvelles, et quelques-unes remarquables par leurs dimensions extraordinaires ou par le nombre des cellules.
- * + *Diplograptus palmeus* Barr.
- * + » » var. *tenuis*.
- * + » *foliaceus* Murch.
- + » *ovatus* Barr.
- * » *folium* His.
- * » aff. *pristis* His.
- * *Rastrites Linnaei* Barr.
- * + » *peregrinus* Barr.
- + » *gemmatus* Barr.
- * *Phyllograptus* cf. *angustifolius* Hall.
- + » cf. *typus* Hall.
- + *Cyrtograptus radians* Törnq.
- + » cf. *Carruthersi* Lapw.
- * + *Crinoïdes*, fragments de la tige.
- + *Pleurodictyum problematicum* Goldf.
- + *Polypiers* ind.

Grauwackes de Sobrado.—Aux schistes fins de la bande graptolitique orientale succède subitement vers l'est une fort puissante assise de grauwackes, peu dures en général, où domine la couleur rouge brique, mais aussi parfois violacées, jaunes ou gris verdâtres. Quelques-unes de ces grauwackes sont divisibles en fragments prismatiques irréguliers par les innombrables diaclases qui les traversent. Elles renferment quelques couches de schiste, alternant avec elles, ainsi que des masses de quartzite, qui représentent un accident au milieu de ces dernières. Elles sont en outre traversées fréquemment par des veines de quartz blanc, les points culminants du sol étant couronnés par de grandes masses de cette substance, correspondant aux points où les veines se gonflent, et qui par conséquent ont offert plus de résistance à l'action des agents atmosphériques et à la dénudation.

On traverse cette formation de grauwackes, sur laquelle reposent Sobrado et d'autres villages, dans une largeur supérieure à 5 kilomètres perpendiculairement à la stratification; vers le nord elle occupe encore plus de largeur.

Cette assise de grauwackes rouges renferme plusieurs lentilles ampéliteuses, plus ou moins grandes, ordinairement de peu de mètres de largeur, dans lesquelles on a découvert des empreintes de Graptolites (*Monograptus*) pour la plupart indéterminables.

Schistes de Trofa Velha.—A 500 mètres au S.W. du pont de Trofa Velha, soit à 3 kilomètres au sud de la rivière Ave, la route de Porto à Villa Nova de Famalicão est traversée par un schiste fin, gris verdâtre clair, surmontant immédiatement la bande graptolitique. Il est téguilaire ou divisible en dalles minces, à la surface desquelles on observe en quelques

points une grande accumulation de paillettes de mica, comme dans les schistes de la carrière de Mestre André (Barrancos) auxquels il ressemble en effet.

A Trofa Velha paraît un schiste semblable et de la même couleur, fissile et très micacé, qui suit verticalement vers le N.W.

Plus vers le nord, près de la station de Trofa sur les rives de l'Ave, on voit le passage à des schistes très fins, rouges, violacés et gris verdâtres clairs, sans mica, ou du moins invisible à simple vue. Ces schistes appartiennent, sans doute, à l'étage de roches rouges de Sobrado, qui changent horizontalement de caractère, étant les mêmes couches qui s'étendent vers le N.W. jusqu'à Rates et vont même au delà d'Espozende.

Schistes de Rates.—A Rates il se développe une assise très puissante de schistes fins, plus ou moins durs, parfaitement stratifiés, quelquefois se débitant en plaquettes à surface plane et unie. Ils sont tantôt gris foncé, tantôt blanchâtres, et par suite d'un commencement d'altération ils acquièrent la couleur rougeâtre ou violacée. Ces différentes couleurs se décèlent par des raies dans la coupe transversale ou sur les tranches des strates. Ces schistes renferment quelques strates de grauwacke intercalées et sont à peine traversés par de rares veines minces de quartz blanc.

Par leur aspect, ils font rappeler les schistes dévoniens à Spirifères de la serra de Portalegre; toutefois ils sont évidemment les mêmes qui vont jusqu'à Trofa, et nous les considérons du Silurique supérieur, parce qu'en plusieurs points de la bande qu'ils forment, ils renferment des taches ampéliteuses avec des Graptolites, ceux-ci étant d'ailleurs les seuls fossiles que nous y ayons découverts.

Schistes de Terra Negra.—Les schistes de «Terra Negra», qui traversent la route de Porto à Villa Nova de Famalicão, à 2 kilomètres au nord de la rivière Ave, représentent le plus grand affleurement d'ampélites dont nous ayons connaissance, subordonné à ces schistes fins. On y a aussi découvert des empreintes frustes de *Monograptus*.

Distribution des taches ampéliteuses.—Les lentilles de schiste ampéliteux à Graptolites présentent une grande inégalité dans leur distribution, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'elles sont nécessairement en rapport avec la nature des sédiments, laquelle devait varier selon la profondeur de la mer, la direction des courants et d'autres causes encore. Ainsi, sur les points où les taches charbonneuses manquent totalement, les schistes montrent un caractère uniforme en accusant un dépôt d'eaux plus profondes. Au contraire, dans les endroits où les dépôts sont littoraux ou peu profonds, comme nous le révèle la prédominance des couches sableuses, les lentilles se répètent fréquemment.

Aux grauwackes rouges de Sobrado succèdent vers l'est, en superposition concordante, des schistes gris et des grauwackes bien stratifiées en lits minces très réguliers; au milieu de ces couches se montrent quelques taches noirâtres, mais dans lesquelles on n'a généralement pas découvert des Graptolites.

Enfin, on pénètre à Agrella dans une bande de schistes maclifères, déchirés en quelques points par des injections de granite tourmalinifère à muscovite très décomposé, qui forme une auréole du grand massif de granite grossier porphyroïde.

Habitat des Graptolites.—L'opinion exprimée par quelques géologues que les Graptolites vivaient à de grandes profondeurs semble manquer de fondement, d'autant plus qu'à Barrancos, dans la carrière de Mestre André, comme nous le verrons plus loin, on trouva dans le même lit de schiste quelques débris de ces Hydrozoaires mélangés à de nombreux moules d'algues et des traces d'annélides qui ne pourraient se former qu'au bord du rivage; même si l'on admet que les algues aient été arrachées du fond de la mer, à une certaine distance et jetées sur le rivage, la rareté relative des restes de Graptolites prouve qu'ils furent entraînés à peu près du point où existaient les algues, qui ont, comme l'on sait, un habitat littoral ou sublittoral.

Métamorphisme des schistes.—La zone de métamorphisme périphérique des schistes au voisinage du granite, embrasse en quelques points une largeur très considérable, qui s'étend depuis quelques centaines de mètres jusqu'à 3 ou 4 kilomètres, ce qui dépend certainement en partie de la profondeur ou de la distance à laquelle se trouve la roche éruptive.

Voici un fait intéressant à remarquer: c'est que les schistes ne se montrent maclifères que du côté oriental de l'affleurement silurien. Ceci est une preuve évidente de la postériorité du granite grossier porphyroïde par rapport à ces schistes; de plus comme cette bande de métamorphisme embrasse simultanément les schistes ordoviciens et ceux du Silurique supérieur, on reconnaît donc que l'éruption de ce granite est d'une date postérieure à la formation de l'anticlinal de Melres à Vallongo.

Près de la station de Recarei, à 1 kilomètre à l'ouest de la limite de l'affleurement granitique, les fossiles de la bande graptolitique, en très mauvais état de conservation, sont contenus dans un schiste doux, ampéliteux, noir. Il est, cependant, quelque chose de remarquable à observer en ce point, c'est que le lit schisteux qui renferme les Graptolites se trouve intercalé entre deux autres, en apparence de même nature et du même aspect, à la seule différence qu'ils renferment au lieu de fossiles, des cristaux très abondants de chiastolite de forme prismatique allongée.

On voit donc que les causes modifiantes, qui firent changer si profondément le caractère lithologique du schiste, ne furent pas assez énergiques pour détruire les empreintes des fossiles.

Cependant, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette double modification se montre dans une vingtaine de mètres d'épaisseur du schiste fin, gris noirâtre, les cristaux étant toutefois plus abondants dans la strate la plus orientale, c'est-à-dire la plus rapprochée du pourtour de l'affleurement de granite grossier porphyroïde, qui passe toutefois à une distance considérable (plus d'un kilomètre); une partie de l'assise de grauweekes et de schistes rougeâtres et violacés de Sobrado s'y interpose, et ceux-ci ne montrent pas la même altération métamorphique.

Lentilles de schiste ampéliteux.—En suivant de Recarei vers le N.E. au delà de la station du chemin de fer, on voit au milieu de ces grauweekes, différentes masses lenticulaires, ou de petites taches de schiste ampéliteux, ce qui nous porte à reconnaître la liaison intime entre le schiste noir et les grauweekes. Cette liaison est rendue incontestable par les observations faites sur la même route si l'on se dirige vers Baltar.

Avant de pénétrer dans la contrée granitique, on découvre au milieu de la grauwacke violacée ou rougeâtre, trois ou quatre grandes taches de schiste ampéliteux à Graptolites, en outre d'autres de moindres dimensions. La dernière de ces taches est précisément sur la limite du Silurique avec le granite grossier porphyroïde.

Cette roche a percé la grauwacke et le schiste, en y envoyant des apophyses, le schiste étant chargé en quelques points de petits cristaux de chialtolite; cependant la roche au contact immédiat du granite n'est pas maclifère, sans doute parce que sa composition primitive ne permettait pas ce genre de métamorphisme.

Schistes d'Ervedosa. — Du côté occidental de l'affleurement, les schistes gothlandiens sur lesquels sont bâties la plupart des maisons d'Ervedosa près de la limite du Carbonique, ont précisément l'aspect des schistes fins à nodules de Sazes, avec la seule différence que les noyaux n'y existent pas. Ils se débitent en menus fragments prismatiques à formes allongées et ils contiennent les mêmes petits Ostracodes qu'au Bussaco (*Bolbozoe Bohemica*, etc.).

Du côté oriental de l'affleurement silurique, à Courel, le schiste au voisinage du granite grossier à deux micas, devient maclifère; il est chargé de petits cristaux prismatiques de chialtolite, autour desquels les feuilletés du schiste se sont adaptés, celui-ci montrant par ce motif une structure un peu ondulée. Les cristaux font saillie dans les surfaces exposées aux agents atmosphériques, parce qu'ils ont offert une plus grande résistance à cette action destructive. Cependant, au contact direct du granite, le schiste n'est pas maclifère, il devient très micacé, montrant presque l'aspect d'un micaschiste.

LAMBEAU AU NORD DE BARCELLOS

Au nord de l'affleurement de Vallongo, on voit une bande étroite du Silurique supérieur qui s'étend depuis la rivière Cávado jusqu'à la vallée de la Lima, cette bande suit parallèlement à l'affleurement, en faisant partie du même pli synclinal. Elle est en rapport avec deux petits lambeaux qui lui sont contigus, où les schistes ont subi un profond métamorphisme, mais qui appartiennent sans doute à cette même section du Silurique. En effet, on a découvert dans quelques points, notamment à 2 kilomètres W. de l'église de Durrães, des empreintes de *Monograptus* qui, bien qu'imparfaites, fixent définitivement l'âge de ces schistes. Ces empreintes étaient renfermées dans un schiste peu fissile, assez durci, noir-bleuâtre, avec du mica jaune formant de grandes accumulations. A 4 kilomètres au S. W. de la même église de Durrães, on a recueilli au milieu de la bande schisteuse des échantillons plus distincts de *Monograptus*.

L'état métamorphique des schistes, dû au voisinage des roches granitiques et aux pressions énormes qu'ils ont subi, a tellement changé leurs caractères primitifs, qu'il est extrêmement difficile de séparer les schistes paléozoïques métamorphiques, transformés en des schistes maclifères, des schistes de l'Archaïque qui ont ce même caractère.

Le schiste profondément métamorphisé au contact du granite à deux micas du côté ouest du lambeau du Silurique, prend l'aspect d'un gneiss imparfait; un peu plus loin il se charge de beaucoup de mica, ce minéral formant par l'accumulation des lamelles, de petites taches alignées dans le sens longitudinal du lambeau. Du côté oriental de celui-ci le granite porphyroïde est au contact du schiste.

Ce lambeau du Silurique reposait en stratification discordante sur les tranches des phyllades de l'Archaique dans la vallée de la Lima, comme l'on peut observer à son extrémité nord; ce qui est aussi le cas à l'endroit où la bande du Carbonique est interrompue à l'ouest de Vallongo sur la route du Porto, où l'on voit aussi le Silurique au contact des schistes archéens.

Nous terminerons la description du système silurique de la région inférieure de la vallée du Douro en donnant la description de quelques coupes qui font mieux connaître la composition des deux sections de ce système dans cette région.

Coupes donnant le détail des assises du Silurique du Bas Douro

Coupe de Villar de Mattos à Alfena. (Pl. III, profil n° 4.)

ARCHAÏQUE

1. Micaschiste montrant les plans de schistosité dirigés vers N. 27° W., avec plongement de 70° vers l'E. N. E.

CARBONIQUE

2. Distance horizontale 475^m.—Grès feldspathique (arkose) gris, avec du mica blanc, argiles grises et noires, avec des fossiles végétaux, et quelques conglomérats.

Direction des strates N.—S. à peu-près. Inclinaison 50 à 60° vers l'E.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

3. Dist. hor. 925^m.—Schistes très fins et doux, de couleur gris clair, noire et rougeâtre, avec des lits intercalés d'un schiste micacé, doux, à aspect finement granulé, de couleur grise ou légèrement rougeâtre, dans lequel on a découvert des moules de Trilobites et d'autres fossiles. Le schiste noir contient de rares empreintes de Graptolites indéterminables, qui ont été remplacés par une matière talqueuse blanche. Les schistes sont très ondulés et contournés et renferment à la partie supérieure du complexe qu'ils forment des nodules durs, ferrugineux et argilo-siliceux, quelques-uns assez volumineux. Les strates suivent en des directions très variées, depuis N. 37° W. jusqu'à N. 33° E., et plongent tant vers l'est que vers l'ouest par suite du plissement, quelquefois étant verticales. Suivant la direction de la coupe, ces schistes sont interrompus dans l'extension de 375 mètres par les schistes et grauweekes du complexe n° 4, qui leur sont subjacents.

On a découvert dans le schiste fin à aspect granulé de la partie supérieure du complexe, à 4.850 mètres au S. 70° W. du signal géodésique d'Alfena, les espèces suivantes:

Phacops sp. n. aff. *miser* Barr.

» 2 espèces indéterminées, représentées
par deux pygidiums aplatis et très
déformés.

Tentaculites tenuicinctus F. A. Römer.

» *subcochleatus* Sandb.?

Meristella furcata Sow. sp.?

Orthis sp.

Crinoïde, articles de la tige à section circulaire.

Pleurodictyum problematicum Goldf.?

Polypier ind.

Dans la même localité furent trouvés les espèces indiquées ci-dessous dans des nodules argilo-siliceux et d'autres argilo-ferrugineux de formes très irrégulières, renfermés dans un schiste gris noir avec empreintes indéterminables de *Monograptus*. Ce schiste prend par altération une teinte rougeâtre.

Orthoceras-aff. *currens* Barr.
 » cf. *Bohemicum* Barr.
 » cf. *Gruenewaldti* Barr.
 » ind., plusieurs empreintes.
Tentaculites?
Mytilus esuriens Barr.

Spanila aff. *cardiopsis* Barr
Cardiola gibbosa Barr.
 » ? *striata* Sow.
Monograptus priodon Bronn.
 » sp.
Crinoïde, empreintes de quelques articles.

A l'ouest, c'est-à-dire au-dessus de la couche précédente, la coupe traverse à 1.900 mètres au S. 86° W. du signal d'Alfena, un schiste gris noir avec empreintes indéterminables de *Monograptus*, parmi lesquelles se trouve *M. priodon*?. Ce schiste renferme quelques lits subordonnés du schiste doux à aspect finement granulé, parfaitement analogue à celui qui, dans un niveau inférieur, contient les Trilobites.

Des nodules durs, argilo-ferrugineux, disséminés dans le même schiste, ont fourni les fossiles suivants:

Mytilus, 3 petits moules différents. *Polypier* (*Michelinea*?).
Crinoïde, empreintes de 2 espèces au moins.

A l'endroit de Telheiras, où sont les fours à tuile, on observe un schiste fin, doux, rouge, qui est la roche principal de ce massif, avec intercalation d'un schiste très fin et très doux, peu micacé, ou argile schisteuse de couleur gris clair, qui est trempée dans l'eau et pétrie avec les pieds pour la fabrication des tuiles. Dans ce schiste fin on n'a trouvé qu'un petit Polypier.

4. Dist. hor. 950^m.—Schiste fin, gris, jaunâtre et rougeâtre en gros bancs alternants avec des grauwackes fines des mêmes couleurs.

5. Dist. hor. 40^m.—Schiste ampéliteux noir formant une lentille au milieu d'un schiste fissile, gris clair, avec des empreintes de Graptolites très effacés. Ce schiste passe à l'est de l'église d'Alfena. C'est le même niveau de Cabeda, où les fossiles sont très abondants et de formes très variées.

Cardiola? *striata* Sow.? *Cyrtograptus* sp.
Monograptus sp.

6. Dist. hor. 70^m.—Schiste grossier, micacé, gris foncé à taches blanchâtres, sans fossiles. Il représente la couche la plus élevée de l'assise des schistes et grauwackes qui forme le plateau de Senhora da Chan et qui est au contact du Silurique inférieur (n° 7, *postea*).

Direction des strates N. 17° W. Inclinaison 60 à 70° vers l'orient.

SILURIQUE INFÉRIEUR

7. Dist. hor. 60^m.—Schiste téguilaire, gris foncé, dans lequel on n'a pas pu découvrir de fossiles.

Direction de la stratification N. 27° W. Inclinaison 50 à 70° vers le levant et vers l'occident par suite du plissement anticlinal des couches.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

8. Dist. hor. 110^m.—Grauwacke schistoïde blanche, sans fossiles, sur laquelle repose le signal d'Alfena. C'est la même couche qui se continue sur le dos de la serra da Murta, faisant transition au schiste grossier du numéro suivant.

Direction des strates N. 27 à 38° W. Inclinaison 60 à 70° vers l'occident.

9. Dist. hor. 690^m.—Schiste grossier, gris foncé, à taches brunâtres, rougeâtres et jaunâtres, sans fossiles.

Direction des strates N. 27 à 50° W. Inclinaison 60 à 75° vers l'est et vers l'ouest, quelques lits étant verticaux.

10. Dist. hor. 60^m.—Schiste graptolitique, gris foncé, peu micacé, avec des grains de pyrite,

contenant une lentille ampéliteuse, noire, non fossilifère. Ce schiste correspond à la bande graptolitique occidentale du Paço, qui se prolonge vers le nord avec quelques interruptions.

Les strates suivent dans la direction N. 27° W. avec pendage de 60° vers l'orient.

11. Schistes et grauweekes fines, rouges et grises, en couches épaisses alternantes, avec intercalation de quelques bancs de grès quartzeux, finement micacé, très dur, passant au quartzite. Près d'Alto-do-Chão-dos-Olhos où se termine la coupe, on découvre une masse de quartzite noir ou lydite, traversée par des veines blanches, dans laquelle nous avons trouvé des moules de Graptolites mal conservés et difficiles à déterminer. Il m'a semblé voir parmi eux un moule de *Diplograptus* ou *Retiolites*, et un autre de *Monograptus convolutus* His.

Les strates se dirigent vers N. 27 à 47° W. avec plongement de 40 à 70° vers le levant, quelques-unes étant verticales.

Coupe de Cabeda traversant l'affleurement du Silurique. (Pl. II, profil n° 3.)

ARCHAÏQUE

1. Micaschiste avec staurotides dans une grande épaisseur.

Direction des plans de schistosité N. 27° W. Pendage 50 à 60° vers l'E. N. E.

CARBONIQUE

2. Distance horizontale 230^m.—Grès grossier très micacé, à mica blanc, gris noirâtre, comprenant quelques strates subordonnées de schiste micacé, gris et de grès fin argileux, schistoïde, aussi avec de la muscovite et contenant des débris de végétaux fossiles.

Direction des strates N. 37° W. avec plongement de 40 à 60° vers l'E. N. E. et l'W. S. W.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

3. Dist. hor. 400^m.—Schiste gris foncé à taches blanchâtres et jaunâtres, en général fin et peu micacé, mais avec le mica très irrégulièrement distribué, de sorte qu'il est par places très micacé. Il contient quelques masses irrégulières de quartzite fin, compact, de couleur claire.

Ce schiste correspond au n° 9 de la coupe d'Ervedosa à Balsa.

Il comprend deux niveaux fossilifères dans la partie orientale du massif. Le premier, ou le plus supérieur, est dans un lit mince de grès fin, pulvérulent, blanc à taches jaunâtres, subordonné à un schiste fin, violet, contenant des moules de petites bivalves (*Mytilus*, *Aracula* ou *Pterinea*?, *Orthis sacculus* Sandb.), en outre d'un *Orthoceras* et d'un Polypier. Le second, à un niveau inférieur et à 100 mètres de distance du lit fossilifère précédent, est dans un schiste très doux, à aspect finement granulé, de teinte violette très claire, dans lequel on a découvert le moule d'une partie du thorax d'un Trilobite, très probablement du genre *Phacops*. Cette couche est la même qui passe à Telheiras.

Direction des strates variant entre N. 37° W. et N. 3° E. Pendage de 40 à 70° vers l'est et vers l'ouest.

4. Dist. hor. 720^m.—Schiste fin gris et rougeâtre, peu fissile, en lits généralement minces, comprenant quelques strates de schiste grossier, micacé, gris noirâtre et gris foncé avec taches jaunâtres claires, et schiste blanc et noir, plus ou moins fissile avec des empreintes de Graptolites en trois lits différents. Dans le schiste noir, ampéliteux, des deux lits les plus orientaux, on a fait quelques fausses recherches de charbon.

Les empreintes de Graptolites dans le schiste blanc, happant, sont indéterminables. Par contre le schiste noir est peuplé par un grand nombre d'espèces de ces Hydrozoaires ayant pu être déter-

minées. Ce schiste est traversé par des veinules de quartz blanc, qui se ramifient dans tous les sens, et contient des petites masses et des grains de pyrite, qui a parfois remplacé quelques-uns des fossiles. On a recueilli dans ce schiste tout près des maisons du hameau de Cabeda, à 1050 mètres au N. W. de la chapelle de San Bartholomeu, les espèces suivantes:

<i>Pterinea</i> aff. <i>pleuroptera</i> Conrad.	<i>Monograptus tenuis</i> Portl.
<i>Atrypa</i> ? ind.	» <i>priodon</i> Bronn.
<i>Cyrtograptus radians</i> Törnquist.	» <i>distans</i> Portl.
» sp. (cf. <i>C. Carruthersi</i> Lapw.)	» <i>communis</i> Lapw.
<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.	» <i>triangulatus</i> Harkn.
» <i>gemmatus</i> Barr.	» aff. <i>convolutus</i> His. (Jan sp. n.)
<i>Diplograptus palmeus</i> Barr.	» <i>leptotheca</i> Lapw.
» <i>foliaceus</i> Murch.	» <i>Hisingeri</i> Carr.
<i>Monograptus Becki</i> Barr.	» <i>latus</i> McCoy.
» <i>lobifrons</i> McCoy.	» <i>millipeda</i> McCoy.
» <i>Sedgwicki</i> Portl.	» cf. <i>nuntius</i> Barr.
» <i>Proteus</i> Barr.	» ind., 2 espèces.
» <i>spiralis</i> Barr.	<i>Phyllograptus</i> ? (voyez <i>Ph. typus</i> Hall.)

Ce lit fossilifère est évidemment le même qui suit plus à l'est le long de la serra da Murta, où il a fourni de nombreux fossiles, surtout des Graptolites. A 950 mètres au S. 60° E. du hameau de Villarinho de Cima, par exemple, on en a récolté pas moins d'une trentaine d'espèces, qui correspondent en grande partie à celles trouvées à Cabeda. Ce même lit se répète dans le n° 8 de cette coupe par suite du plissement des strates.

Sur la direction de la coupe le ruisseau de Cabeda traverse un petit affleurement des grau-wackes et schistes grossiers du n° 5, d'une vingtaine de mètres de largeur et 400 mètres de longueur, qui interrompt la masse des schistes fins à Graptolites.

Direction et plongement des strates les mêmes que pour le numéro précédent. Dans le lit du ruisseau de Cabeda les strates sont verticales.

5. Dist. hor. 600^m.—Schistes grossiers peu micacés, gris, et jaunâtres par commencement d'altération, et grau-wacke fine, schistoïde, gris clair et blanche, par places jaunâtre, traversée par des veines de quartz blanc, qui forme un banc épais de 6 à 7 mètres au contact du Silurique inférieur sur la direction de la coupe. Ce complexe est le même qui forme le plateau de Senhora da Chan à l'ouest de Vallongo.

Les strates suivent les directions N. 17 à 37° W. avec pendage de 50 à 60° à l'E. N. E.

SILURIQUE INFÉRIEUR

6. Dist. hor. 250^m.—Schiste téguilaire, micacé, gris foncé, renfermant de nombreux nodules pour la plupart petits et quelques-uns de grandes dimensions. Ce schiste est sur le prolongement des couches qui surmontent l'ardoisière de Gallinheiro. Les fossiles y sont très rares; on n'a pu obtenir que les formes suivantes:

<i>Iliaenus</i> sp. ind.	<i>Orthis noctilio</i> Sh.?
<i>Orthoceras</i> sp.	<i>Crinoïde</i> .

La direction des strates et leur inclinaison sont conformes avec ceux des schistes du Silurique supérieur du numéro précédent.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

7. Dist. hor. 1.100^m.—Grauwacke schistoïde peu micacée, blanche tachée de violet clair, sans fossiles, qui occupe une largeur de 130 mètres sans l'intercalation d'aucune autre roche. Après cette grau-wacke vient un schiste grossier beaucoup plus épais, gris plus ou moins foncé, ordinairement

rement peu micacé, aussi dépourvu de fossiles. Ce puissant massif forme le prolongement de la serra da Murta ou de Sobrido. Il correspond évidemment au n° 5 précédent, les couches se montrant répétées par suite du plissement anticlinal, qui a fait affleurer à la surface les schistes du Silurique inférieur en les ouvrant en éventail.

Direction des strates concordante avec celle des strates du Silurique inférieur, qui les a percées. Inclinaison à l'ouest sous des angles de 60 à 80° et même vertical.

8. Dist. hor. 60^m.—Schiste fin, gris clair rayé de jaunâtre clair, et schiste dur, ampéliteux, noir, tachant les doigts, avec empreintes de Graptolites. On y a fait une fausse recherche de charbon. C'est la bande fossilifère la plus occidentale du Paço, la même qui a fourni de nombreux fossiles à 1.200 mètres au N. 64° E. de l'église de San Martinho do Campo et en d'autres points. Elle a été explorée à 1.000 mètres environ au N. du signal géodésique de Quintarei, où les empreintes des fossiles sont en général très effacées; cependant, nous avons pu déterminer les espèces suivantes:

Monograptus priodon Bronn. ?
 » *convolutus* His.
 » *communis* Lapw.

Monograptus triangulatus Harkn.
Rastrites peregrinus Barr.
Diplograptus sp.

Direction des strates N. 37 à 52° W. Plongement 60 à 80° au N. E.

9. Grauwackes fines, schistoïdes, et schistes micacés formant des couches épaisses alternantes, de teintes grise, violette, jaune et rouge, généralement sans fossiles, mais contenant quelques lentilles de schiste ampéliteux noir, où se montrent quelquefois des Graptolites. Ce complexe se développe vers l'est jusqu'à la limite du massif granitique.

Direction des strates N. 37 à 57° W. Pendage, 65 à 80° au N. E., quelques lits étant verticaux.

Coupe d'Ervedosa à Balsa. (Pl. III, profil n° 2.)¹

ARCHAÏQUE

1. Micaschiste et schistes luisants, satinés, métamorphiques, avec tendance à devenir maclifères, ayant subordonnée une épaisse couche de pseudo-conglomérat quartzeux, qui semble provenir de l'écrasement d'une masse de quartz, dont les fragments furent cylindrés, la matière argileuse du schiste s'injectant dans les espaces intermédiaires. Une faille importante sépare ce système des schistes du numéro suivant. Les plans de la schistosité plongent de 60 à 80° vers l'E. N. E.

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

2. Distance horizontale 50^m.—Schiste fin, gris, et grauwacke fine, schistoïde, de même couleur, en strates alternantes, le schiste montrant une tendance à se charger de cristaux de chiastolite. Ce complexe occupe une petite largeur sur la direction de la coupe, car le Précambrique interrompu par la faille qui le sépare du système archaïque, vient se terminer en pointe tout près de l'endroit où il est traversé par la coupe. Strates plongeant dans le même sens que les schistes cristallins précédents.

CARBONIQUE

3. Dist. hor. 50.—Brèche argileuse formée de fragments anguleux, en général de petites dimensions, des schistes précambriques, empâtés dans un ciment argileux provenant de la trituration des mêmes schistes. Cette brèche marque le passage à la bande du Carbonique supérieur. Elle occupe des largeurs très variées, autant au nord qu'au sud de la coupe; quelquefois elle dépasse

¹ Cette coupe commence au hameau d'Ervedosa, il se dirige vers la chapelle de Santa Justa et passant par l'église de Sobrado il va se terminer au hameau de Parteira au N. E. de l'usine de Balsa.

100 mètres dans les points où le sol s'élève, en d'autres points elle s'amincit jusqu'à 10 mètres. Elle représente vraisemblablement une brèche de friction correspondant à une ligne de faille, et est formée aux dépens des roches des parois de la fente qu'elle a rempli.

4. Dist. hor. 200^m.—Schistes gris, parfois micacés, avec le mica en petites écailles et renfermant en abondance des débris de végétaux fossiles. Quelques lits de grès micacés, plus ou moins grossiers, avec le mica blanc (arkose), et passant quelquefois à des conglomérats, sont intercalés dans les schistes. Le hameau d'Ervedosa est assis sur ces couches, qui se dirigent vers N. 27 à 37° W. avec plongement de 40 à 50° sur le levant.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

5. Dist. hor. 140^m.—Schistes gris, fins, fortement comprimés, avec cette structure spéciale qui détermine leur division en petits fragments allongés à forme prismatique. Intercalés dans ces schistes il y a des lits minces de grès micacé, très fin, pulvérulent, de couleur jaunâtre clair par un commencement d'altération du mica. Les strates suivent en des directions très variées depuis N. 28° W. jusqu'à N. 60° W., avec plongement de 30 à 60° vers le levant. Cette assise a une forte ressemblance à celle des schistes fins de Sazes (Bussaco). On y a découvert

Monograptus ind., empreintes très frustes.

Bolbozoe anomala Barr., moules très écrasés.

Bolbozoe Bohemica Barr., moules très écrasés.

CARBONIQUE

6. Dist. hor. 5^m.—Grès micacé avec du mica blanc (arkose) sans fossiles.

Direction des strates N. 25 à 37° W. Plongement 30 à 50° vers le N. E.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Orthis noctilio*

7. Dist. hor. 80^m.—Schiste gris foncé, micacé, avec de mauvais fossiles, très déformés et peu abondants. Plongement des strates, 40° vers E. 37° N.

Iliaenus giganteus Burm.?, grand spécimen très déformé.

Calymene Tristani Brongn.

Orthis Miniensis Sh.?

Orthis noctilio Sh.

Orthis noctilio var. aff. *O. Ribeiroi* Sh. (forme représentative de cette dernière espèce dans le bassin de Vallongo).

Didymograptus?

Obs.—L'apparition inopinée de ce lambeau du Silurique inférieur (qui ne mesure guère en largeur qu'une centaine de mètres) au milieu du Silurique supérieur, fait voir que par suite du plissement des couches, un pli de l'Ordovicien a percé ici à travers le Gothlandien, ce qui certes a eu lieu en vertu de la résistance que la paroi de la faille qui passe à l'ouest d'Ervedosa, a opposé au développement naturel des plis. Ce petit affleurement du Silurique inférieur n'a été observé que dans ce point sur le flanc occidental de l'anticlinal de Vallongo, sauf un autre affleurement encore plus petit des schistes d'*Uralichas Ribeiroi* que l'on observe un peu au sud du premier. On n'en aperçoit pas la moindre trace à quelques centaines de mètres de distance, soit au nord soit au sud, de la direction de la coupe.

En examinant celle-ci d'une façon générale on voit que sur le versant occidental de la serra de Santa Justa les différentes bandes du Silurique ont une largeur beaucoup moindre que celle qu'elles occupent du côté oriental de la même colline, ce qui s'explique facilement car les couches lors du plissement se sont rompues et ont glissé les unes sur les autres, quelques-unes d'entre elles pouvant

de cette façon rester cachées, ce mouvement s'opérant d'ailleurs différemment sur les deux branches de l'anticlinal.

C'est par ce motif, nous le croyons, que les schistes à nodules de Telheiras ne se montrent que du côté occidental du plissement, là où les couches du Silurique supérieur se montrent avec un plus grand développement, tandis que du côté oriental elles ont entièrement disparu, entraînées par la dénudation.

On voit donc que ce plissement du Silurique est post-carbonifère; peut-être correspond-t-il à l'éruption en masse du granite porphyroïde du Minho et de la Beira, qui a déchiré et refoulé sur les deux côtés les strates siluriennes, qui ont après disparu presque entièrement par l'action destructive des courants de dénudation.

CARBONIQUE

8. Dist. hor. 15^m.—Schiste gris, finement micacé, avec des empreintes de fossiles végétaux; schiste grossier, micacé, rouge foncé, passant à une *grauwacke* schistoïde, dans lequel on a découvert le moule de la tige d'une espèce de *Calamites*, et grès gris, peu micacé, avec du mica blanc, formant quelques lits au milieu du schiste. Les strates suivent vers N. 25 à 37° W. avec plongement de 40 à 50° vers l'E. N. E.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

9. Dist. hor. 140^m.—Schiste gris-verdâtre foncé avec taches claires, contenant du mica blanc disséminé irrégulièrement en paillettes bien visibles. Il y a intercalés dans ce schiste quelques lits irréguliers souvent interrompus, d'un grès fin, blanc, par places pulvérulent, en d'autres points très dur et faisant passage au quartzite.

Ce grès est fossilifère dans quelques lits, il contient en général les mêmes espèces qui se montrent dans la colline de San Felix (Laundos), à Junqueira, à la serra du Bando dos Santos (Amendoa) et à la serra de San Mamede (Portalegre), lesquelles indiquent la zone la plus haute du Silurique supérieur.

On a découvert dans ce complexe trois horizons fossilifères différents, séparés par des couches de schistes et de grès qui n'ont point fourni de fossiles.

L'horizon supérieur consiste en un lit de schiste gris foncé avec taches claires et blanchâtres, il a été fouillé à 180 mètres au N. 40° E. d'Ervedosa et il a fourni de beaux spécimens d'un Crinoïde dont les bras sont garnis de très nombreuses pinnules. C'est le seul fossile que l'on y a trouvé. Le mica blanc en grandes écailles isolées est très abondant sur les plans de schistosité, à côté des fossiles.

Le second horizon est celui du grès fin, où le test des fossiles a été entièrement détruit, les moules se montrant couverts par une poussière ocracée, jaune, qui colore la roche avec cette même teinte. Le grès sain est très dur, faisant passage au quartzite.

L'horizon inférieur, enfin, est représenté par un schiste très fin et doux, gris clair avec taches blanches et jaunâtres, qui a fourni, à 1.050 mètres à l'ouest du signal géodésique de Santa Justa, des moules de fossiles très écrasés et empâtés dans la roche, tous réduits à des débris absolument indéterminables. Ce schiste fin, qui a d'ailleurs un aspect analogue à celui des schistes dévoniens de San Julião (serra de Portalegre), paraît former le toit de la zone inférieure du Silurique supérieur représenté dans cette localité.

Fossiles du 2^{ème} horizon où le grès fin est quelquefois tendre, quelquefois dur, passant au quartzite.—Loc. 210 mètres à N. 28° E. d'Ervedosa.

Crustacé ind.

Homalonotus sp. n. (aff. *H. delphinocephalus*
Green.) F.

Orthoceras ind.

Bellerophon carinatus Sow.

» *trilobatus* Sow.

Murchisonia sp. (voyez *M. gracilis* Hall.)

Pleurotomaria cf. *rotuloides* Hall.

» sp., un moule très déformé.

Avicula pseudo-laevis OEhlert (*A. laevis* Vern. et Barr.,
non *A. laevis* Goldf.).

Leda aff. *similaris* Barr.

Bivalves ind.
Spirifer cf. *crispus* Linn.
Orthothetes hipponyx Schnur sp.
Brachiopode ind.

Crinoïdes, empreintes de plaquettes isolées du calice. F.
 » empreintes de facettes articulaires, circulaires,
 de petit diamètre.

Fossiles de l'horizon inférieur du schiste fin.—Loc. 1.050 mètres à l'W. du signal géodésique de Santa Justa.

Restes de Trilobites (*Phacops*?).
Tentaculites (Jan *T. tenuis* Sow.).
Brachiopodes ind.

Crinoïdes ind.
Polypiers ind.

Sur ce même horizon, un peu plus vers le sud, à 900 mètres à N. 80° E. de l'église de San Pedro da Cova, on a recueilli les espèces suivantes, les restes de Trilobites, très aplatis et déformés, étant de beaucoup les plus abondants. Tout en reconnaissant qu'ils appartiennent au genre *Phacops*, quelques-uns se rapprochent de *Ph. miser* Barr., tandis que d'autres moules représentent une ou deux espèces différentes de celle-ci.

Phacops, 2 ou 3 espèces.
Tentaculites tenuis Sow. F.
Spirifer sp. (voyez *Spirifera undifera*? var. *undulata* F. Roemer.)

Bivalves ind., 2 espèces.
Crinoïdes, empreintes d'articles circulaires.
Pleurodictyum problematicum Goldf.
Polypiers, 2 espèces indéterminables.

On doit rapporter encore à ce même niveau les fossiles récoltés à 1.850 mètres au S. 70° W. du signal d'Alfena, dans un schiste fin, ampéliteux, gris foncé, contenant des nodules ferrugineux avec *Orthoceras* et des empreintes de *Monograptus* indéterminables.

Ce schiste est exploité pour la fabrication des tuiles. Il a subordonné un schiste blanchâtre et violet clair, très micacé, avec de la muscovite, en de minces strates alternantes et renfermant des moules de Trilobites, de Brachiopodes et des restes de Crinoïdes et de Polypiers.

Les nodules ont fourni les espèces suivantes:

Orthoceras sp., moules indéterminables.
Tentaculites sp.
Cardiola? *striata* Sow.

Crinoïdes, empreintes d'articles de la tige d'une espèce trouvée aussi à Barrancos.

Les fossiles rencontrés dans le schiste sont:

Phacops sp. (voyez *Ph. intermedius* Barr.)
Trilobite ind., une autre espèce.
Tentaculites cf. *tenuicinctus* F. A. Roemer.
Brachiopodes, 2 ou 3 espèces indéterminées.

Crinoïdes, empreintes d'articles de forme ronde.
Pleurodictyum problematicum Goldf.
Polypier ind.

10. Dist. hor. 260^m.—Schistes grossiers, micacés, gris et accidentellement rougeâtres, et grauwacke schistoïde, dure, blanche, formant le plateau de Senhora da Chan. Ces strates n'ont pas fourni des fossiles. Elles paraissent concordantes dans leur allure avec les couches précédentes et plongent de 40 à 60° vers le quadrant du N. E., les grauwackes étant verticales au sommet de la serra.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à Uralichas Ribeiroi

11. Dist. hor. 280^m.—Schistes argileux, gris foncé avec taches blanchâtres et jaunâtres appartenant à l'assise de schistes à Uralichas Ribeiroi. Ils suivent la direction N. 17 à 37° W. et plongent de 60 à 80° vers l'est, quelques lits atteignant la verticalité. Ces schistes renferment quelques gros nodules comme les ardoises de Gallinheiro, auxquelles sans doute ils correspondent. On y a recueilli les espèces suivantes:

Calymene Tristani Brongn.

» *pulchra* Barr.

» *Aragoi* Rou.?

Dalmanites socialis Barr. var. *proaeva* Emm.,
forme large.

Asaphus nobilis Barr., forme longue.

Placoparia Tourneminei Rou.

Iliaenus Lusitanicus Sh.

Ribeiria sp.

Orthis Budleighensis Dav. (*O. redux* Barr.)

» *fliceraei* (*O. testudinaria* Vern. et Barr.), peut-être
identique avec l'espèce précédente.

» cf. *pulvinata* Salter.

Schistes à *Orthis noctilio*

12. Dist. hor. 70^m.—Schistes gris et rougeâtres en stratification concordante avec les strates précédentes, suivant la direction N. 25 à 37° W. avec plongement de 50 à 60° vers l'E. N. E.

Calymene Salteri Rou.

» *Aragoi* Rou.?

Asaphus glabratus Sh.

Asaphus nobilis Barr.?

Orthis noctilio Sh.

» *miniensis* Sh.?

Schistes à *Didymograptus*

13. Dist. hor. 100^m.—Schistes fins, couleur gris foncé et violet avec taches blanchâtres, finement micacés, avec le mica irrégulièrement distribué, en général peu fissiles, et renfermant dans quelques lits d'innombrables empreintes de Graptolites et des moules d'autres fossiles très empâtés dans la roche. Les strates suivent dans les directions N. 18 à 27° W. avec plongement de 70 à 80° vers le levant.

Dans une coupe faite en travers de ce massif, à 200 mètres au N. W. de la chapelle de Santa Justa, on a recueilli les espèces suivantes distribuées dans trois niveaux différents:

Niveau supérieur

Placoparia Tourneminei Rou.

Dionide formosa Barr.

Asaphus glabratus Sh.?

Calymene Tristani Brongn.?

» *Salteri* Rou.?

Iliaenus Lusitanicus Sh.

Orthis noctilio Sh.

» sp.

Didymograptus Murchisoni Böeck, type de l'espèce.

» sp.

Niveau moyen

Calymene Tristani Brongn.

Asaphus glabratus Sh.

Redonia sp.

Bivalves ind., plusieurs espèces.

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Orthis?

Lingula?

Didymograptus sparsus Hopk.

» *hirundo* Salt.

» *Murchisoni* var. *geminus* His.

» ind., d'autres espèces en mauvais état de conservation.

Niveau inférieur

Asaphus glabratus Sh.

» sp.

Bivalves ind., plusieurs espèces.

Lingula sp.

Azygograptus Hicksi Hopk.

» *Lapworthi* Nich.

» sp., probablement nouvelle.

Quartzites à Bilobites

14. Dist. hor. 50^m.—Schistes grossiers, micacés, gris foncé, blanchâtres et violet-rougeâtre et grauwacke schistoïde, micacée, se débitant en plaquettes très minces à surface unie, en stratification parfaitement concordante avec les couches précédentes et plongeant dans le même sens. Pas de fossiles. Le schiste violet se trouve près de la petite chapelle de Santa Justa. Ce massif établit le passage des schistes à Trilobites vers les quartzites à Bilobites.

15. Dist. hor. 170^m.—Quartzite fin, gris clair, contenant des Bilobites, en lits de différentes épaisseurs, quelquefois schistoïde, se divisant en plaquettes très minces séparées par des lames de

schiste très micacé. Même direction des strates qui précèdent, et plongement de 40 à 60° vers l'est et vers l'ouest, vertical au sommet de la serra.

Cruziana furcifera d'Orb.

Cruziana Goldfussi Rou.?

16. Dist. hor. 500^m.—Schistes plus ou moins grossiers, micacés, gris foncé, gris clair et rougeâtre, ordinairement peu fissiles, quelquefois très micacés, sans fossiles. Ce sont les mêmes couches du n° 14. Leur direction est encore la même, le plongement faible vers le quadrant de l'E. n'atteignant que très rarement 40°.

Schistes à *Didymograptus*

17. Dist. hor. 680^m.—Les mêmes strates du n° 13 occupant une plus grande largeur vu sa faible inclinaison, qui descend jusqu'à 20°.

La liste complète des espèces récoltées en différents points de cette zone sur les deux flancs de la serra de Santa Justa se trouve dans le tableau suivant où elles sont toutes réunies.

FAUNE DE LA ZONE À DIDYMOGRAPTUS

NOMS DES ESPÈCES	Niveaux		
	supérieur	moyen	inférieur
* <i>Calymene Tristani</i> Brongn., type de l'espèce	+	+	+
» » var.	..	+	
» <i>Salteri</i> Rou.	+		
<i>Asaphus glabratus</i> Sh.	+	+	+
» aff. <i>glabratus</i> Sh. var. <i>gigantea</i> (Jan sp. n.) ..	+		
» <i>Desmaresti</i> Brongn. sp. (<i>Ogygia Brongniarti</i> Rou.) ..	+	+	
» <i>nobilis</i> Barr.	+		
<i>Dalmanites</i> sp. (aff. <i>Phacops Downingiae</i> Murch.) ..	+		
* » sp.	+	+	
<i>Placoparia Tourneminei</i> Rou.	+		
<i>Dionide formosa</i> Barr.	+		
<i>Iliaenus Lusitanicus</i> Sh.	+		
<i>Cybele</i> ? (voyez <i>C. loveni</i> var. <i>girvanensis</i>) ..	..	+	
Ostracode — <i>Cytheropsis</i> ? ..	+		
<i>Beyrichia</i> sp.	+		
* <i>Orthoceras</i> sp.	..	+	
<i>Endoceras vaginatus</i> Schloth.	+		
Céphalopode, forme nouvelle très caractéristique, qui rappelle la coquille interne de <i>Sepiophora</i> ..		+	
<i>Hyalolithes</i> sp.	+		
<i>Bellerophon bilobatus</i> Sow., ou <i>B. Duriensis</i> Sh.	+	..	+
» aff. <i>acutus</i> Sow.	+		
Univalve ind.	+		
<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.	+	?	+
<i>Sanguinolites Pellicoi</i> Vern. et Barr.	+	..	+
<i>Ambonychia</i> ? ..	..	..	+
Bivalves ind., plusieurs espèces de petite taille.	+	+	+
<i>Orthis noctilio</i> Sh.	+		
» <i>Miniensis</i> juv. Sh.	+		
» sp.	+	+	
<i>Obolus</i> ? sp. n. (aff. <i>O. Davidsoni</i> Salt.) ..	..	+	
<i>Lingula</i> sp., moules de 2 espèces au moins ..	+	+	+
<i>Calix</i> (<i>Echinosphaerites</i>) <i>Murchisoni</i> Vern. et Barr. sp.	+		
» <i>Sedgwicki</i> Rou.? ..	+		
Crinoïde ...	+		
<i>Dichograptus</i> ? (voyez <i>D. Richardsoni</i> Hall.) ..	..	+	

NOMS DES ESPÈCES	Niveaux		
	supérieur	moyen	inférieur
<i>Didymograptus Murchisoni</i> Bæck.	+		
» » var. <i>geminus</i> His.	+	+	
» <i>bifidus</i> Hall.	+		
» <i>nanus</i> Lapw.	+		
» cf. <i>uniformis</i> Elles et Wood.	+		
» cf. <i>indentus</i> Hall.	+		
* » <i>sparsus</i> Hopk.	..	+	
* » <i>hirundo</i> Salt.	..	+	
» <i>euodus</i> Lapw.	..	+	
* » <i>superstes</i> Lapw.	..	+	
* » <i>pennatulus</i> Hall.	..	+	
* » sp., très probablement nouvelle	..	+	+
<i>Azygograptus Hicksi</i> Hopk.	..	..	+
» <i>Lapworthi</i> Nich.	..	..	+
» sp., probablement nouvelle	..	..	+
Tiges de végétaux	..	+	

Note.—Les espèces marquées par un astérisque se trouvent principalement à la partie supérieure du niveau moyen.

Schistes à *Orthis noctilio*

18. Dist. hor. 200^m.—Schistes durs, gris-noirâtre, peu micacés, ordinairement peu fossilifères, ne contenant de fossiles qu'en certains niveaux, particulièrement dans les couches supérieures du massif où ils sont plus abondants, dans un niveau immédiatement inférieur à l'assise à *Uralichas Ribeiroi*. Ces schistes supérieurs renferment quelques gros nodules. Les strates suivent en concordance avec celles des numéros précédents, et plongent de 40 à 80° vers l'est et vers l'ouest, se montrant parfois verticales.

Les fossiles sont toujours très écrasés et empâtés dans la roche.

En dehors de la direction de la coupe on a obtenu les espèces suivantes à 850 mètres à l'E. 5° N. de l'église de Vallongo, à l'ouest du chemin de fer.

Calymene Tristani Brongn.

Iliaenus Hispanicus Vern. et Barr.

Dalmanites Vetillarti Rou.?

Orthoceras (Endoceras) duplex Wahlbg.?

Ctenodonta (Nucula) compar Barr., spécimen unique. R.

Orthis noctilio Sh. f.

Crinoïde.

Calix Barrandei Rou., spécimen unique. R.

Schistes à *Uralichas Ribeiroi*

19. Dist. hor. 670^m.—Schistes téglulaires, gris foncé, avec nodules à forme ellipsoïdale allongée, quelques-uns très volumineux, ayant 1 mètre et plus de longueur, mais peu fréquents, dans les couches inférieures du massif, d'autres plus nombreux, mais de moindres dimensions, dans les couches moyennes, et faisant absolument défaut dans les couches supérieures, en même temps que les fossiles deviennent plus rares à mesure que l'on monte vers les couches les plus modernes. Dans ce massif sont compris les schistes à *Uralichas Ribeiroi* bien que l'on n'y ait jamais découvert le moindre vestige de cette espèce de ce côté de la serra de Vallongo. Il comprend aussi l'assise exploitée dans les ardoisières du Gallinheiro, où les fossiles manquent presque absolument, ce qui rehausse la valeur des ardoises; ce n'est que dans les couches schisteuses qui les surmontent que l'on a découvert quelques moules d'Orthocères. Même direction des strates; plongement très fort jusqu'à la verticale, vers l'ouest et de 50 à 70° vers l'est. On y a recueilli les espèces suivantes:

Calymene Tristani Brongn., individus très développés.

Iliaenus sp.

Orthoceras vagans Salt. f.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

20. Dist. hor. 1.400^m.—Grauwacke schistoïde, blanche, peu micacée et schistes grossiers très puissants, gris, micacés, passant par places à la grauwacke. On n'a point découvert de fossiles dans ce massif. Ces couches forment le dos et le versant est de la serra da Murta ou de Sobrido; en apparence elles semblent reposer en stratification concordante sur le Silurique inférieur, suivant dans la direction N. 47° W. avec plongement de 60 à 80° vers l'est et vers l'ouest, quelques lits étant verticaux.

21. Dist. hor. 30^m.—Schistes fins, gris, gris-noirâtres et rougeâtres par un commencement d'altération, contenant des empreintes de *Monograptus* et de *Diplograptus*? toutes indéterminables. Le test des fossiles a été remplacé par une matière blanche, talqueuse?, qui tranche par sa couleur sur le fond gris noirâtre du schiste.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Didymograptus*

22. Dist. hor. 180^m.—Schiste gris foncé avec taches blanchâtres et jaunâtres, en quelques points violet clair ou rougeâtre. Quelques lits sont couverts d'innombrables petites taches circulaires, ocracées, de différents diamètres, quelques-unes d'un millimètre à peine.

Dans une carrière située à 1.200 mètres au S. 40° W. de l'église de Sobrado, tout près de la route vers Paço, on a recueilli les espèces suivantes, dans divers lits de ce schiste, sur une épaisseur de 4 à 5 mètres.

<i>Placoparia Tourneminei</i> Rou.	<i>Bivalve</i> ind.
<i>Calymene Salteri</i> Rou.?	<i>Obolus</i> sp. n. (aff. <i>O. Davidsoni</i> Salter). F.
<i>Homalonotus</i> cf. <i>Bohemicus</i> Barr.?	<i>Orthis testudinaria</i> Dalm.
<i>Asaphus caudatus</i> Brongn.?	» <i>calligramma</i> Dalm.
» sp.	» sp. ind.
<i>Ogygia</i> , 2 espèces.	<i>Strophonema</i> ?
<i>Iliaenus</i> sp.	<i>Didymograptus hirundo</i> Salter. f.
<i>Dalmanites</i> sp.	» <i>sparsus</i> Hopk. F.
<i>Acidaspis</i> sp.	» <i>superstes</i> Lapw.
<i>Trilobites</i> ind., 2 formes différentes, peut-être	» <i>pennatulus</i> Hall?
d'un genre nouveau.	» <i>uniformis</i> Elles et Wood.
<i>Beyrichia</i> sp.	» <i>extensus</i> Hall.
<i>Orthoceras</i> ind., 2 moules différents.	» <i>nitidus</i> Hall.
<i>Bellerophon bilobatus</i> Sow.?	» sp.
<i>Conularia</i> sp. n., à surface unie.	<i>Azygograptus Hicksii</i> Hopk.
<i>Pleurotomaria</i> ?	Crinoïde.
<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.	Tiges de végétaux terrestres.
<i>Ctenodonta</i> sp.	

Comme l'on voit, par cette liste c'est la faune du niveau moyen de la zone à *Didymograptus* (n° 17, *ante*) qui est principalement représentée; les espèces les plus caractéristiques du niveau supérieur faisant défaut et celles du niveau inférieur y figurant à peine.

Obs.—Une coupe partielle faite postérieurement, traversant cette même couche à peu de distance au nord de la carrière, mais embrassant 15 mètres d'épaisseur de strates, nous a montré la succession suivante des espèces dans les différents lits superposés, qui appartiennent évidemment aux niveaux moyen et inférieur cités ci-dessus.

Description de la petite coupe traversant le Silurique inférieur près du Paço

- 1) Schiste fin, gris, à taches noirâtres, fissile, contenant de rares empreintes de Graptolites.

Didymograptus hirundo Salter?

Didymograptus euodus Lapw. ou *sparsus* Hopk.

- 2) Schiste fin, gris foncé, avec taches jaunâtres, contenant de rares et mauvaises empreintes de Graptolites indéterminables.

- 3) Schiste fin, fissile, gris foncé, avec taches ferrugineuses, jaunâtres, renfermant des moules de fossiles très aplatis.

Iliaenus Lusitanicus Sh.

» sp.

Asaphus caudatus Brongn.

» *nobilis* juv. Barr.?

» *glabratus* Sh. var. *gigantea* (Lan sp. n.).

Calymene pulchra Barr.

» *Salteri* Rou.?

Redonia sp.

Bivalve ind.

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Didymograptus pennatulus Hall.

» *uniformis* Elles et Wood.

» *euodus* Lapw.?

Azygograptus?

Crinoïde ramifié.

Bryozoaire.

- 4) Schiste fin, gris, taché de violet.

Orthoceras, un moule écrasé, indéterminable.

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Didymograptus hirundo Salter.

Didymograptus sparsus Hopk.

Azygograptus Hicksi Hopk.

- 5) Schiste fin, gris et violet, avec taches jaunâtres.

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Orthis sp.

Azygograptus sp.

Didymograptus, 2 espèces indéterminées.

- 6) Schiste fin, gris, avec taches jaunâtres et violettes.

Conularia sp., à surface unie.

Didymograptus sparsus Hopk.

Didymograptus hirundo Salt.

Azygograptus Hicksii Hopk.

- 7) Schiste fin, gris foncé, avec taches jaunâtre ocracé.

Orthis sp.

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Didymograptus superstes Hopk.

Tige de végétal.

- 8) Schiste fin, taché de gris et violet.

Obolus sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salter)

Didymograptus hirundo Salter.

» *euodus* Lapw.

Didymograptus cf. *uniformis* Elles et Wood.

» *sparsus* Hopk.

Tige de végétal.

- 9) Schiste fin, gris foncé, avec taches violettes et jaunâtre clair.

Trilobite.

Orthoceras ind.

Redonia sp.

Didymograptus hirundo Salt.

» *sparsus* Hopk.

» cf. *uniformis* Elles et Wood.

En dehors de la direction de cette coupe, mais à une petite distance, à 1.100 mètres au S. 48° W. de l'église de Sobrado, on a obtenu les espèces mentionnées à la suite, dans un lit de schiste surmontant immédiatement le n° 9. Ces espèces marquent l'existence dans cette localité du niveau supérieur reconnu à Santa Justa.

Placoparia Tourneminei Rou.

Iliaenus Lusitanicus Sh.

Asaphus glabratus Sh. var. *gigantea* (Lan sp. n.).

Didymograptus Murchisoni Bœck?

Nous voyons donc que les trois niveaux que nous avons reconnus sur les deux versants de la serra de Santa Justa sont aussi représentés aux environs du Paço, où ils sont bien différenciés par un certain nombre d'espèces caractéristiques de chacun d'eux.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

23. Dist. hor. 10^m.—Schiste très dur et sonore, gris-noirâtre, avec taches blanchâtres ou gris très clair, passant à la lydite, avec empreintes et moules de Graptolites, probablement de plus d'une espèce du genre *Diplograptus*?

24. Dist. hor. 2.950^m.—Grauwackes argileuses très fines, ordinairement peu micacées, grises, verdâtre clair, jaunâtres et rougeâtres, en strates épaisses alternant avec intercalations d'autres moins épaisses de grauwacke schistoïde ou de schiste gris, toutes ces couches sans la moindre trace de fossiles. L'église de Sobrado repose sur cette assise. Même direction des couches en concordance avec les schistes sous-jacents. Plongement 30 à 80° vers l'est et vers l'ouest avec quelques lits verticaux.

25. Dist. hor. 1.600^m.—Grauwackes fines, dures, quelquefois faisant transition au quartzite, altérées au voisinage du granite, avec quelques lits de schiste intercalés et comprenant près du hameau de Balsa une lentille de schiste ampéliteux, noir, dur, avec beaucoup de débris de Graptolites. Cette lentille est traversée par la coupe à 350 mètres au S. 27° E. de l'usine de Balsa; on y a découvert, parmi les restes de Graptolites, un spécimen que l'on doit rapporter à *M. convolutus* His. Au delà de l'usine de Balsa, c'est-à-dire en se rapprochant du granite, plusieurs couches de grauwacke et de schiste, mais pas toutes successivement, sont maclifères, ou plutôt elles sont chargées de cristaux de chiastolite qui n'aboutissent pas à se développer entièrement. Au contact du granite, près du hameau de Parteira, les roches schisteuses deviennent extrêmement micacées. Les strates suivent toujours dans la même direction N. 25 à 58° W. avec plongement de 50 à 80° vers le N. E. et le S. W.

26. Granite grossier porphyroïde à deux micas, la muscovite étant très rare, tandis que les grands cristaux d'orthose sont fort abondants. Le hameau de Parteira repose sur cette roche.

Coupe depuis la mine de Mont'alto (Midões) par Aguiar de Souza, à Recarei et Serra Queimada. (Pl. III, profil n° 3.)

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

1. Schiste fin, gris, et poudingue quartzeux orientés vers le N. W. et le N. avec plongement presque vertical. Près du Carbonique (n° 2) quelques strates plongent vers le W. S. W. sous un angle de 50 à 60°.

CARBONIQUE SUPÉRIEUR

2. Distance horizontale 400^m.—Schistes noirs, micacés, avec fossiles végétaux; grès noirs et gris de même avec des restes de végétaux et conglomérat de cailloux roulés de quartzite reliés par un grès grossier, micacé, à mica blanc. Direction des strates N. 30 à 55° W.; plongement 40 à 70° vers le N. E. et le S. W.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

3. Dist. hor. 40^m.—Schiste fin, mou, gris, avec intercalation d'un schiste dur, blanc, en minces plaquettes avec Graptolites tout à fait semblable à celui du versant est de la serra Colorada (Barrancos). Le hameau de Midões repose sur ce massif schisteux, où l'on a découvert les espèces suivantes:

Monograptus spiralis Gein.

» sp.

Rastrites peregrinus Barr.

» » var. *hybridus* Lapw.

Les strates plongent de 40 à 50° vers N. 52° E.

4. Dist. hor. 60^m.—Schiste grossier, micacé et grauwacke schistoïde, micacée, gris foncé avec des taches blanchâtres. Du côté oriental du massif, au contact avec le Silurique inférieur, il y a une

couche de grauwacke blanche, peu micacée, par places passant au quartzite, laquelle correspond évidemment aux grauwackes du sommet de la serra da Murta ou de Sobrido, ainsi qu'aux grau-wackes de Senhora da Chan.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Uralichas Ribeiroi*

5. Dist. hor. 150^m.—Schiste téglulaire, micacé, gris foncé, avec des nodules ellipsoïdaux argilo-sableux, quelques-uns très volumineux et renfermant des fossiles. Bien que l'espèce *Uralichas Ribeiroi* n'ait pas été trouvée sur la ligne de la coupe, il n'en est pas moins certain que ce schiste est compris dans le faisceau de couches qui a fourni une faune très riche, comprenant cette espèce, à 1.400 mètres au S. 50° E. de l'église de Covelo, à peu de distance au S. de la coupe.

<i>Illaenus Lusitanicus</i> Sh.	<i>Univalve</i> ind. (<i>Cyclonema</i> ?)
<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Redonia Duvaliana</i> Rou.?
<i>Dalmanites Vetillarti</i> Rou.	<i>Ctenodonta Costae</i> Sh.
<i>Placoparia Tourneminei</i> Rou.	<i>Orthis redux</i> Barr. (<i>O. Budleighensis</i> Dav.)
<i>Asaphus nobilis</i> Barr.	» sp.
» sp. n. (aff. <i>A. glabratus</i> Sh.)	<i>Leptaena sericea</i> Sow.
<i>Endoceras Dalimieri</i> Barr. (<i>Orthoceras duplex</i> Wahlbg.)	<i>Cladopora fibrosa</i> Hall, dans un nodule.
<i>Orthoceras</i> sp.	Crinoïde, empreintes circulaires d'articulations d'un petit diamètre.
<i>Bellerophon bilobatus</i> Sow. (<i>B. Duriensis</i> Sh.)	

Ces spécimens furent recueillis à 150 mètres à l'est du hameau de Midões sur la ligne de la coupe. Plongement des strates, 50 à 80° vers le quadrant de N.E. (E. 27° N. à N. 47° E.).

Schistes à *Orthis noctilio*

6. Dist. hor. 100^m.—Schiste téglulaire, gris foncé, micacé, avec quelques nodules ellipsoïdaux contenant des fossiles. Plongement, 45 à 70° vers le N.E.

<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Orthonota britannica</i> Rou.?
<i>Illaenus Lusitanicus</i> Sh.	<i>Orthis noctilio</i> Sh. F.
<i>Ogygia</i> sp.	» <i>miniensis</i> Sh. f.
<i>Endoceras duplex</i> Wahlbg. sp.	<i>Calix Murchisoni</i> Vern. et Barr. sp.
<i>Orthoceras vagans</i> Salt.	<i>Graptolite</i> ind.
<i>Bellerophon bilobatus</i> Sow.	<i>Heterocrinus</i> ou <i>Glyptocrinus</i> .
<i>Cyclonema</i> sp.	Crinoïde, empreintes d'un fragment de la tige.
<i>Tellinomya</i> sp. (voyez <i>T. elliptica</i> Hall)	

Ces fossiles furent ramassés à 450 mètres à l'est de Midões, sur le chemin vers Aguiar de Souza.

Schistes à *Didymograptus*

7. Dist. hor. 60^m.—Schiste gris, noir, très micacé.

Dans ce massif schisteux on découvre les trois niveaux graptolitiques que l'on observe au N.W. de la chapelle de Santa Justa dans les mêmes couches (voir coupe d'Ervedosa à Balsa, n° 13).

Niveau supérieur

<i>Calymene Tristani</i> Brongn.	<i>Bellerophon bilobatus</i> Sow. (<i>B. Duriensis</i> Sh.)
<i>Illaenus Lusitanicus</i> Sh.	<i>Bivalves</i> ind., 2 espèces.
<i>Ogygia</i> sp.	<i>Orthis miniensis</i> Sh.
<i>Beyrichia</i> sp.	» sp.
<i>Endoceras duplex</i> Wahlbg. sp.	<i>Didymograptus Murchisoni</i> Böck.
<i>Orthoceras vagans</i> Salter.	

Niveau moyen

Bellerophon sp.*Didymograptus sparsus* Hopk.*Lingula* sp.» *Murchisoni* var. *geminus* His.*Didymograptus pennatulus* Hall.

Niveau inférieur

Azygograptus Hicksii Hopk.*Azygograptus* sp.

Quartzites à Bilobites

8. Dist. hor. 300^m.—Schiste dur, très micacé, gris foncé, avec des lamelles interstratifiées de quartzite blanc et quartzite en partie schistoïde, formant des lits de différentes épaisseurs, ayant beaucoup de strates subordonnées de schiste dur, gris foncé, très micacé. Par suite de l'altération le schiste prend une couleur violet très clair. Le quartzite a fourni *Cruziana furcifera* d'Orb.

Plongement des strates, 50 à 75° vers le N.N.E., parfois vertical.

PRÉCAMBRIQUE SUPÉRIEUR

9. Dist. hor. 2.050^m.—Schiste argileux, fin, parfois doux, gris clair, verdâtre, rougeâtre, jaunâtre et violacé clair, en bancs très épais, ainsi qu'en minces lits alternants, et grauwacke fine ou grès argileux, quelquefois dur, sans la moindre trace de fossiles. Direction des strates N.-S. à N. 65° W.; inclinaisons très variées depuis 40° jusqu'à la verticale, le plus souvent vers l'est, mais quelquefois aussi vers l'ouest.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Quartzites à Bilobites

10. Dist. hor. 220^m.—Quartzites et schistes durs alternants, analogues au n° 8. Les strates sont très ondulées; elles plongent ordinairement de 30 à 50° vers le N.E., cependant elles atteignent par places la verticalité.

Cruziana furcifera d'Orb.*Cruziana Prevosti* Rou.» *rugosa* d'Orb.» *Bagnolensis* Mor.

Schistes à Didymograptus

11. Dist. hor. 470^m.—Schiste argileux, très micacé, gris foncé, se divisant en morceaux allongés comme des bûches, avec des restes de fossiles indéterminables; et schiste dur, gris noirâtre, très micacé, évidemment analogue au n° 7.

On a découvert dans ce massif quelques empreintes de

Bivalve ind.*Azygograptus* sp.

Plongement des couches variant de 40 à 60° vers E.N.E., parfois vertical.

Quartzites à Bilobites

12. Dist. hor. 180^m.—Quartzite en minces lits, par places très micacé et schistoïde, avec beaucoup de lits de schistes intercalés. Le quartzite est blanc, en quelques lits très micacé, contenant de la muscovite. Cette assise correspond au fond d'un ravin, où les strates sont courbées formant une voûte. Elles plongent de 20 à 30° vers le N.N.E. et le S.S.W.

Cruziana furcifera d'Orb.*Cruziana rugosa* d'Orb.

Schistes à *Didymograptus*

13. Dist. hor. 250^m.—Schiste tégulaire, micacé, gris-noirâtre avec des traces de fossiles (restes de Trilobites et de petits *Orthis*). Il correspond sans doute aux n^{os} 11 et 7. Plongement, 60 à 80° vers N. 52° E. et vers S. 52° W.

Schistes à *Orthis noctilio*

14. Dist. hor. 150^m.—Schiste micacé, gris foncé, avec taches ocreuses par suite de la destruction du test des fossiles, qui sont tous fort écrasés. Ce massif schisteux, de plusieurs centaines de mètres de puissance, a fourni successivement en des points différents les faunules indiquées ci-après. Les strates sont invariablement orientées N. 35 à 48° W. et plongent ordinairement de 60 à 80°, tantôt vers le N. E. tantôt vers le S. W., quelques-unes étant même verticales.

Dans un schiste tégulaire, gris foncé, avec les fossiles très déformés, on a obtenu à 1.950 mètres à N. 6° W. du signal du Facho.

Calymene Tristani Brongn.
Asaphus nobilis Barr.
Placoparia Tourneminei Rou.
Endoceras duplex Wahlbg. sp.
Bellerophon bilobatus Sow.

Redonia Duvaliana Rou.?
Orthis noctilio Sh.
 » *Miniensis* Sh.?
Calix Murchisoni Vern. et Barr. sp.

A 1.650 mètres au N. 3° W. du signal du Facho on a recueilli, dans le même schiste tégulaire renfermant quelques gros nodules, les fossiles suivants, tous à l'état de moules très déformés:

Calymene Tristani Brongn.
 » *Salteri* Rou.?
Iliaenus Lusitanicus Sh.
Placoparia Tourneminei Rou.
Asaphus nobilis Barr.
Endoceras duplex Wahlbg. sp.
Orthoceras vagans Salt.

Bellerophon bilobatus Sow. f.
Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr.?. spécimens très déformés.
Redonia Duvaliana Rou.?, spécimens très déformés.
Orthis noctilio Sh. F.
Calix Murchisoni Vern. et Barr. sp.

A 1.750 mètres à E. 12° N. de la chapelle d'Aguiar de Souza, en dehors de la direction de la coupe, on a recueilli des moules très déformés et écrasés des espèces suivantes:

Placoparia Tourneminei Rou.
Endoceras duplex Wahlbg. sp.

Sanguinolites Pellicoi Vern. et Barr.
Orthis noctilio Sh.

en plus de quelques empreintes de Graptolites, peut-être de *Didymograptus* absolument indéterminables, qui furent trouvées dans un point à côté de celui-là.

Schistes à *Uralichas Ribeiroi*

15. Dist. hor. 1.980^m.—Schiste tégulaire, gris foncé, micacé, avec le mica en paillettes très fines, et renfermant très peu de fossiles dans toute l'épaisseur du massif. A la partie inférieure celui-ci contient des noyaux plus durs, à forme ellipsoïdale allongée, qui dépassent parfois 1 mètre de longueur. Dans les couches moyennes les noyaux sont plus nombreux et de moindres dimensions; quelques-uns sont siliceux et contiennent des Orthocères, qui ont été fossilisés par du quartz hyalin. Enfin, les couches les plus supérieures sont presque dépourvues de fossiles et les nodules y font absolument défaut.

Ce groupe de couches est le même qui va former un peu plus au nord le penchant occidental de la serra da Murta, embrassant les ardoisières de Gallinheiro et comprenant le paquet de schistes qui au S. E. de Covelo a fourni une faune très riche de ce même niveau, bien que du côté oriental de l'anticlinal ordovicien le Trilobite caractéristique *Uralichas Ribeiroi*, comme nous avons dit, n'ait été jamais trouvé.

Nous avons recueilli des fossiles dans les localités ci-dessous mentionnées.

A 700 mètres au N. 70° W. du hameau de Albre:

Calymene Tristani Brongn. f.

» *Aragoi* juv. Rou.?

Asaphus nobilis Barr.

Bellerophon bilobatus Sow.

Redonia Bohemica Barr.?

Cypricardia Beirensis Sh.

Nucula domina Barr., un moule très beau, spécimen unique.

Lingula Lesueuri juv. Rou.

A 650 mètres au N. 62° W. du même hameau:

Calymene Tristani Brongn. f.

Iliaenus Lusitanicus Sh.

Orthoceras sp.

Redonia Bohemica Barr.?

Orthis noctilio Sh.?

» sp.

Lingula aff. *transiens* Barr.

A 200 mètres au N. 47° W. du même hameau:

Calymene Tristani Brongn.

Placoparia Tourneminei Rou.

Bellerophon bilobatus Sow.

Redonia Bohemica Barr.

Bivalve ind.

A 650 mètres au N. 80° W. du même hameau:

Calymene Tristani Brongn.

Iliaenus Lusitanicus Sh.?

Orthoceras vagans Salt.

Bellerophon bilobatus Sow.

Ctenodonta?

A 200 mètres au N. 5° W. du même hameau:

Calymene Tristani Brongn. F.

Asaphus nobilis Barr.

Bellerophon sp.

Cyrtodonta sp.

Orthis sp.

Lingula, 2 espèces.

Finalement, à un niveau supérieur à celui des localités précitées, on a recueilli, dans un schiste gris foncé, très micacé, avec le mica en paillettes très fines, où les fossiles sont extrêmement rares, un tout petit pygidium de *Calymene Tristani* très déformé et engagé dans la roche.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

16. Dist. hor. 850^m.—Schiste gris, micacé, très grossier, passant à une grauwaacke fine, schistoïde, de couleur grise et verdâtre, devenant jaunâtre par l'altération du mica. Cette grauwaacke correspond évidemment à celle du dos de la serra da Murta (Sobrido). Les strates plongent de 60 à 80° vers le N.E. et le S.W.

17. Dist. hor. 280^m.—Schiste gris foncé, par places très micacé, contenant des lits très durs de schiste siliceux gris et noir, et différentes taches de schiste ampéliteux noir souillant fortement les doigts, dans lequel on a découvert des Graptolites (*Monograptus*) de plusieurs espèces différentes, dont une mesure 8 millimètres de largeur, avec 6 à 7 cellules sur 1 centimètre de longueur. Quelques lits de schiste fin, doux, sans mica, contiennent beaucoup de cristaux aciculaires épars de chiasolite. Plongement des strates de 50 à 70° vers le N.E.

Note.—Cette bande de schistes ampéliteux est celle qui passe à Villarinho de Cima, près de Paço, etc.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Didymograptus*

18. Dist. hor. 30^m.—Schiste fin, gris foncé, dont quelques lits sont couverts d'innombrables petites taches circulaires, ocracées, de 1 à 3 millimètres de diamètre, dont nous ignorons l'origine, mais qui semblent être un caractère distinctif des schistes de cet horizon puisque nous les avons rencontrées dans d'autres localités.

En dehors de la direction de la coupe nous avons recueilli dans cette même couche:

Calymene Salteri Rou.

Orthis sp., un jeune individu.

Obolus? sp. n. (aff. *O. Davidsoni* Salt.)

SILURIQUE SUPÉRIEUR

19. Dist. hor. 50^m.—Schiste gris foncé et noir avec taches blanchâtres, en général très dur et passant à la lydite, avec des empreintes de Graptolites pour la plupart réduits à de menus débris. On a découvert:

Diplograptus sp.

Monograptus triangulatus Harkn.

Rastrites Linnaei Barr.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à *Didymograptus*

20. Dist. hor. 50^m.—Les mêmes couches du n° 18.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

21. Dist. hor. 200^m.—Schiste fin, doux, gris foncé et schiste grossier, très micacé, gris, avec quelques strates subordonnées de quartzite.

22. Dist. hor. 1.240^m.—Grauwackes fines et schistes de couleur grise, jaunâtre et rougeâtre, en strates alternantes, épaisses de plus de 1 mètre. Ce massif comprend plusieurs taches ampéli-teuses, où l'on a découvert des Graptolites presque toujours indéterminables. Dans toute l'épaisseur de ce complexe les couches sont plus ou moins métamorphiques.

Au voisinage du massif granitique, quelques strates du schiste sont formées de lames alternantes, avec coloration différente, les unes de schiste tacheté par des noyaux obscurs de macles qui ne parvinrent pas à se développer, et les autres ne montrant pas ce caractère. Vers le haut du complexe ce sont les grauwackes qui prédominent; elles se chargent de mica, en paillettes fines, mais elles ne sont jamais maclifères. Au contact du granite la grauwacke se durcit et passe au quartzite. Plongement 20 à 40° vers le N.E. et le S.W.

23. Granite porphyroïde à grain très grossier, avec deux micas, la biotite étant de beaucoup la plus abondante.

SILURIQUE DE LA PROVINCE DE TRÁS-OS-MONTES

Le Silurique de la province de Trás-os-Montes est moins bien connu que celui du Minho, que nous venons de décrire; cependant, quelques données font voir qu'il a été formé dans des conditions un peu différentes.

Sur la carte géologique sont représentés trois affleurements principaux de ce système. Le premier, à l'extrémité occidentale de la province, correspond à la serra de Marão. Le deuxième, dans la partie sud-orientale, correspond à la grande courbure du Douro en amont du confluent de la rivière Sabor; il se montre découpé par l'érosion en trois lambeaux distincts, dont l'un est de bien plus grandes dimensions que les deux autres. Le troisième affleurement embrassant une surface plus vaste que les deux affleurements précités, forme dans les parties orientale et septentrionale de la province, une bande assez longue, à contour irrégulier, qui, par son extrémité sud, se lie presque avec le second affleurement, et au nord et à l'est pénètre dans l'Espagne. Dans le premier et le troisième affleurements les roches de la division supérieure du Silurique ont leur plus grand développement; par contre, dans le second affleurement, les couches du Silurique inférieur prédominent, ou elles sont peut-être même exclusives. Suivant la méthode adoptée, nous commencerons notre description par cet affleurement.

AFFLEUREMENT DE MONCORVO

De même que dans l'affleurement de Vallongo, la base du système silurique dans la province de Trás-os-Montes est formée par une assise de quartzites et schistes quartzeux grossiers, contenant des moules de *Cruziana*, *Vexillum* et des restes de *Fucoïdes* indéterminés.

Au-dessus de cette assise quartzeuse, qui est très puissante, vient un groupe schisteux d'une épaisseur énorme où les fossiles sont extrêmement rares.

L'uniformité des caractères de cette formation schisteuse montre que les conditions de la sédimentation ont été très régulières. Ce fait, réuni à la rareté extraordinaire de fossiles, indique que les dépôts se sont effectués à des profondeurs considérables et dans tous les cas à une grande distance du rivage.

Sur toute l'étendue de cet affleurement, outre les *Bilobites* et les *Fucoïdes* dans l'assise inférieure de quartzites, on n'a pas trouvé d'autres fossiles que l'empreinte d'un *Brachiopode* (*Obolus* ou *Lingula*)¹ et d'un *Acéphale* indéterminé, qui furent rencontrés à 4 kilomètres à l'est de Moz; un moule d'*Orthoceras* (*O. cf. sodale* Barr.) à 2.500 mètres au N. E. de Ligares, et une empreinte très fruste du bout de la plèvre d'un *Trilobite*, tous ces fossiles ayant été recueillis dans des schistes.

Gisement remarquable d'hématite. — La serra de Roboredo, qui domine Moncorvo, renferme un gisement puissant d'hématite, qui est subordonné aux quartzites à *Bilobites*, et qui se poursuit sur plus de deux lieues en longueur avec une largeur moyenne d'un kilomètre.

¹ Cette espèce paraît être la même qui fut trouvée à Paço (à l'E. N. E. de Vallongo), laquelle a été citée dans la liste de fossiles du n° 17 de la coupe d'Ervedosa à Balsa (p. 135).

Cette hématite, plus ou moins pure, ou mélangée avec de l'argile et du quartzite, forme des strates diverses intercalées à la partie supérieure de l'assise de quartzites, alternant avec des schistes ou du quartzite et concordant avec ces derniers. On voit bien qu'elle est contemporaine des dépôts sédimentaires et qu'elle a été formée par précipitation chimique, ayant plausiblement l'origine hydrothermale.

Ce minéral s'est déposé dans quelques points du fond de la mer silurienne en quantité plus ou moins grande, lorsque les courants charriaient les sédiments argileux, qui ont donné lieu à la formation des lits de schiste avec lesquels alternent les masses de minerai de fer. L'hématite a donc, à notre avis, une origine semblable à celle des amas d'oxyde de fer qui se montrent dans le Bussaco au toit du Silurique inférieur, associés au calcaire et à la silice. Il y a toutefois à noter une différence, c'est que près des points où jaillirent dans le Bussaco les sources minérales, la vie s'est développée exubérante et sous des formes variées, tandis que dans cette contrée du bassin du Douro, où l'on voit prédominer l'oxyde de fer, les eaux devinrent absolument impropres au développement de la vie et par cette raison on n'y rencontre aucun fossile, sauf les Bilobites dans les couches de quartzite sous-jacentes à l'horizon métallifère. L'hématite se charge en quelques points de grains sableux, en d'autres points elle est mélangée d'argile en proportions variables, et passe au fer oxydé rouge, terreux, et même à l'ocre rouge. Dans les parties où elle est plus pure, elle a la texture cristalline ou fibreuse et une couleur gris d'acier.

Le mont de Mua, qui est près du sommet indiqué sur la carte géologique par la cote 827, est constitué principalement par l'hématite qui s'y montre distinctement stratifiée, les fragments détachés ayant même la structure schistoïde. C'est là qu'on a fait les concessions des gîtes les plus importants de ce champ métallifère.

Plissement des couches.—Dans cet affleurement les couches siluriennes forment plusieurs plis parallèles. Un synclinal correspond à la serra de Poiares; un autre est compris entre la serra de Cruz dos Valles (au nord de la précédente) et la serra de Roboredo; et plus au nord se dessine un autre synclinal au mont de Mua, où les strates plongent vers le N.N.E., contrairement à l'inclinaison qu'elles montrent à la serra de Roboredo, bien que l'allure générale soit toujours la même, vers le W.N.W.

Au-dessus des quartzites se développe en stratification concordante la puissante assise de schistes, qui forment l'axe des divers plis synclinaux et montrent dans la partie septentrionale de l'affleurement son plus grand développement.

La serra de Poiares est constituée par de puissantes masses de grès et de quartzites, qui la rendent presque inaccessible du côté nord.

La croupe de la serra de Cruz dos Valles est aussi constituée par des quartzites d'un gris clair dans la partie saine de la roche, et extérieurement teints en rouge par les oxydes de fer; ils alternent avec des schistes grossiers, très ferrugineux, micacés, de couleur grise, verdâtre, violacée ou rouge. Les quartzites aussi bien que les schistes sont traversés par de fines veines de quartz blanc.

Métamorphisme des schistes.—Au voisinage du granite à deux micas de Carviçaes, les schistes siluriens ont subi du métamorphisme, ils se chargent de petits noyaux noirâtres mon-

trant le passage aux schistes maclifères, mais les cristaux de chiastolite n'arrivent pas à se développer. Il en est autrement au nord de Mazouco, au contact du granite porphyroïde, les schistes intercalés dans les quartzites à Bilobites deviennent maclifères sur une zone étroite, les quartzites conservant toutefois les moules de Bilobites avec leur forme nettement définie, tandis que les schistes acquièrent le caractère luisant et se chargent de petits cristaux de chiastolite.¹

La serra de Lagoaça, comprise dans cet affleurement de Silurique, est essentiellement composée de schistes alternant avec quelques lits de quartzite, les uns et les autres traversés par des veines plus ou moins épaisses de quartz blanc. Au sommet de la serra, le schiste est faiblement luisant, très micacé, d'une teinte verdâtre foncée. Les strates forment de larges ondulations et plongent généralement avec de faibles inclinaisons vers différents points de l'horizon. Près du signal géodésique les Bilobites se trouvent en abondance.

Au nord de Bruçó, à l'extrémité orientale de l'affleurement, il se trouve un schiste fin, gris clair, par places très chargé de mica blanc en petites paillettes et contenant des lits subordonnés de lydite noire. Peut-être appartient-il au Silurique supérieur, mais nous n'y avons pas découvert des fossiles.

Sur la limite septentrionale du lambeau, à un kilomètre au sud de Villar de Rei, les quartzites réapparaissent reposant en stratification discordante sur les schistes luisants du Précambrique supérieur.

Le bord méridional du lambeau silurien du côté de Maçores est également formé par un faisceau de quartzites, qui reposent en discordance sur les couches du Précambrique.

Les schistes grossiers subordonnés aux quartzites sont moins fissiles et moins régulièrement stratifiés que les schistes précambriens avec lesquels ils sont en contact en plusieurs points, ils montrent une structure en quelque sorte nodulaire, semblable à celle des schistes quartzeux de la serra de Santa Justa (Vallongo).

Par suite du plissement général, qui a affecté simultanément les couches précambriennes et les schistes et quartzites siluriens, toutes ces strates paraissent en quelques points en stratification concordante, bien qu'en réalité la discordance entre les couches des deux systèmes soit un fait reconnu presque partout où elles se trouvent en contact.

AFFLEUREMENT DE LA SERRA DE MARÃO

L'étude de l'affleurement silurien de la serra de Marão est assez embarrassant et les données sont encore très incomplètes. Nous savons pourtant que dans cet affleurement la série ordovicienne est représentée par les quartzites à Bilobites de la base et par une puissante assise schisteuse qui la surmonte, tandis que la série Gothlandienne est formée par un complexe de schistes gris et verdâtres, contenant des Graptolites, associés à des lydites et à des calcaires, au-dessus de laquelle vient une formation de schistes et grauweekes rougeâtres,

¹ Ce fait, parfaitement en harmonie avec celui que nous avons cité à propos des schistes gothlandiens de Recarei, est, ce nous semble, un argument très valable contre l'hypothèse que les schistes précambriens contenaient des fossiles qui se sont effacés par le métamorphisme. Le principe, généralement admis, que le métamorphisme a dû faire disparaître les traces des organismes de plusieurs strates anciennes qui les renfermaient, ne peut être accepté qu'avec beaucoup de réserve, si même il doit l'être.

semblables à ceux de Sobrado. On reconnaît donc clairement la correspondance de cet affleurement avec celui de Vallongo, les deux lambeaux représentant les restes d'un grand synclinal, démantelé et presque entièrement arasé par la dénudation.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Quartzites à Bilobites.—L'assise de quartzites à Bilobites occupe le sommet de la serra de Marão. Elle se prolonge vers le S.E. jusqu'à Fragas da Ermida, où les couches sont brusquement interrompues et coupées à pic. Ce point, avec la cote 1.301 mètres, est situé à 1.700 mètres du signal géodésique de Marão (altitude 1.415 mètres).

Le quartzite est fin, à texture compacte, traversé par de fines veinules de quartz blanc laiteux et il forme des lits d'une faible épaisseur qui alternent avec un schiste gris noir, très micacé. Réciproquement, ce dernier est divisé en lits peu épais par l'intercalation de minces plaquettes de quartzite; cependant quelquefois au lieu de se diviser en dalles plates, il contient des noyaux quartzeux en affectant des surfaces ondulées et bosselées, qui lui donnent un aspect caractéristique. Dans quelques lits, le schiste, en se chargeant de grains sableux et de petits fragments de quartz, fait passage à une brèche ou grès très grossier, extrêmement dur.

On a découvert dans quelques lits de quartzite des moules de *Cruziana rugosa*, *Cr. furcifera*, *Cr. cf. Goldfussi* et d'autres espèces de Bilobites des formes les plus communes, mais pour la plupart difficilement déterminables. Un lit de même nature renfermait un petit moule de bivalve aussi indéterminable. Cette assise comprend quelques strates qui semblent entièrement constituées par des moules de *Vexillum* comprimés les uns contre les autres.

Au sommet de la serra de Marão les strates de quartzite sont gracieusement pliées et contournées formant deux ou trois voûtes contigues.

La composition de l'assise est en général la même de celle de la serra de Santa Justa (Vallongo) et de la serra de Poiaras (Freixo d'Espada á Cinta), où l'élément argileux joue aussi un rôle important.

Immédiatement au-dessous de l'assise de quartzites à Bilobites, semblant appartenir à la même assise, il se montre un schiste vert très puissant, traversé par des veinules de quartz blanc, et renfermant des lits irréguliers chargés de petits fragments anguleux de quartz, qui lui donnent l'aspect bréchiforme. Un schiste dur, gris foncé, rayé de traits blancs par des lames de quartzite et en d'autres points pétri de nodules de quartz, se montre intimement lié au schiste vert et établit un passage graduel aux quartzites.

A l'ouest des quartzites, c'est-à-dire à un niveau supérieur, se développe un schiste téglulaire très puissant, gris foncé, qui montre d'abord ses caractères normaux, et plus loin renferme des cristaux isolés de chiastolite, en quantité plus ou moins grande selon leur grandeur, plus rares quand ils sont plus volumineux. Le maximum est de 3 centimètres de longueur et 4 millimètres de largeur. Ce schiste se prolonge vers l'ardoisière de Fragas da Ermida à l'extrémité sud-est de l'affleurement.

Fossiles dans des schistes maclifères.—Au-dessus de cette ardoise vient un schiste grossier, à stratification indistincte, renfermant des cristaux abondants, très luisants, de chiastolite.

Ce schiste contient, solidement empâtés, quelques moules de fossiles de la faune seconde (*Iliaenus Lusitanicus* et *Redonia Duvaliana*), les prismes de chialolite s'étant développés aussi bien dans le schiste que dans les moules de fossiles, sans que ceux-ci aient perdu leurs formes habituelles.¹

Les cristaux sont très nombreux et sont distribués très irrégulièrement. Ils sont bien reconnaissables par le prisme noir qui en occupe le centre; quelquefois ce prisme est entouré d'une matière vitreuse claire, d'autres fois il est relié aux angles du cristal, qui sont aussi occupés par des prismes noirs, par des lames de cette même nature, le tout se dessinant dans la section transversale comme une croix rappelant la lettre χ .

Cette découverte a été faite à 1.700 mètres au S.W. du signal géodésique de premier ordre du Marão, et à une altitude de 1.180 mètres.

Les fossiles ont été recueillis à plus de 2 kilomètres de distance horizontale de la limite du granite porphyroïde, auquel l'action métamorphique est visiblement due.

De plus, on doit remarquer que, la zone de métamorphisme des schistes embrassant plus de 3 kilomètres de largeur, l'altération de ces roches n'est pas la même dans toutes les strates, et qu'elle ne diminue pas graduellement, comme l'on pouvait s'y attendre, selon la distance de la roche éruptive; au contraire, dans les lits les plus rapprochés du granite porphyroïde, les cristaux de chialolite sont moins nombreux et souvent même ils disparaissent. En outre, les schistes précambriens, qui sont à une plus grande distance du côté opposé de l'affleurement du Silurique, ne se présentent pas maclifères au contact du granite ordinaire à deux micas. C'est une preuve concluante que le développement des cristaux, bien qu'on doive l'attribuer aux pressions et au voisinage du granite porphyroïde, dépend surtout essentiellement de la composition chimique originelle de la roche qui les contient.

Schistes supérieurs aux quartzites.—Les schistes qui se superposent immédiatement aux quartzites sont très micacés, et seulement ceux qui succèdent aux premiers sont maclifères; néanmoins, les cristaux de chialolite sont de grandes dimensions et peu nombreux dans les strates les plus inférieures ou qui sont les plus éloignées du massif granitique; ils sont moins gros et déjà abondants dans les strates immédiates, tandis qu'ils deviennent petits et très nombreux en se rapprochant du granite.

Il paraît que la limite entre les deux séries ordovicienne et gothlandienne à l'ouest du Marão est donnée par une faille dirigée vers le N.W., les schistes ordoviciens et les quartzites à Bilobites ayant été soulevés ensemble avec les schistes précambriens, sur lesquels ils reposaient, et un contact anormal entre les deux séries du Silurique s'étant établi de la sorte.

Petits lambeaux de quartzites.—Sur la lisière du Précambrique au nord de Campeã, on observe deux petits lambeaux de dimensions minimales, des quartzites et du schiste grossier, qui reproduisent à une échelle plus petite le même phénomène observé dans la serra de Marão.

Un peu plus au nord, à l'origine d'un ravin qui descend vers Pardelhas, se montre un ploiement de ces mêmes quartzites, que l'on voit paraître à la surface du sol, en formant une voûte qui se relie souterrainement aux petits lambeaux dont nous avons parlé.

¹ Voyez *Comunicações*, t. II, p. 216, pl. III, fig. 2 et 3.

Au nord de l'affleurement des quartzites, à Covellas, on voit un schiste téguilaire, très puissant, semblable à celui de Fragas da Ermida, par conséquent appartenant au Silurique inférieur. Sur la carte géologique, ce schiste est confondu avec ceux du Silurique supérieur sous la même teinte, vu l'impossibilité où nous étions de le séparer de ces derniers.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Lorsqu'on se dirige de Campeã vers Campanhó, on observe le passage soudain des schistes précambriens à ceux du Silurique supérieur, un schiste gris-verdâtre, rayé de traits plus clairs, qui appartient au Précambrique supérieur, se trouvant en contact avec un schiste très micacé, offrant des colorations grises, verdâtres et violacées, dont l'allure est très tourmentée, qui appartient au Silurique supérieur.

Ce schiste se montre tordu, trituré et même réduit à une pâte argileuse noire, qui met hors de doute l'existence d'une faille passant par ce point, se dirigeant vers le N.N.E. parallèlement à la direction de la vallée de Tamega et à d'autres lignes géographiques facilement reconnaissables à la simple inspection de la carte.

Dans la lèvre occidentale de la faille, les schistes siluriens offrent de faibles inclinaisons, tandis que les couches précambriennes, dans la paroi opposée, sont fortement disloquées. Cela tient aussi probablement en partie à la discordance des deux systèmes.

Calcaires de Campanhó.— A Campanhó passe une bande de calcaires se dirigeant à peu près W.S.W.; le plongement des couches est très irrégulier, mais toujours faible vers le quadrant du N.

Ce calcaire est compact, gris foncé ou noir, traversé par des veinules blanches de spath calcaire, et renferme aussi des amas de cette substance. Il forme des lentilles plus ou moins grosses, quelques-unes très épaisses, intercalées en parfaite concordance dans un schiste fin, en général fissile, très puissant et renfermant des Graptolites dans quelques strates.

En outre de la bande de Campanhó, il y a d'autres bandes de calcaire, moins importantes, au milieu du schiste à Graptolites.

Dans les carrières de Sobrido, près de Campanhó, on observe deux amas ou couches lenticulaires de calcaire, séparées par une couche de schiste gris-noirâtre, le complexe ayant plus de 100 mètres d'épaisseur. C'est là que les calcaires montrent leur plus forte puissance.¹

Au-dessous des calcaires se développe une assise de schistes ampéliteux, noirs, plus ou moins durs, avec des lits subordonnés de lydite noire, traversée en tous sens par de fines veinules blanches.

L'ampélite renferme différentes espèces de *Monograptus*, quelques-unes de dimensions insolites, comme celles qui atteignent quelques espèces de la bande graptolitique, à l'est de Vallongo. Le niveau géologique doit en effet être le même dans les deux localités.

Ce schiste fossilifère est un peu grossier et très micacé, il se divise en minces plaquettes à surface unie.

¹ Ces calcaires sont exploités pour la fabrication de la chaux, qui est transportée à de grandes distances dans les provinces de Minho et de Trás-os-Montes et même au sud du Douro car, on ne trouve cette roche nulle part dans un rayon de plusieurs lieues autour de Campanhó.

Schiste supérieur aux calcaires.— Surmontant les calcaires, c'est-à-dire au nord de Campanhó et se retrouvant aussi à Oiteiro dos Santos (cote 862), se montre un schiste gris et vert clair, zoné par des raies plus claires et couvert de petites taches, qui semblent lui donner le caractère maclifère imparfait. Ce schiste est très puissant, et en se chargeant de mica en fines pailletes, il scintille au soleil et fait transition aux schistes maclifères bien caractérisés. Au sommet de l'assise, le schiste contient quelques lits subordonnés de grauwacke à grain très fin.

A Portella d'Espinho (le col du Marão sur la route royale de Porto à Villa Real) se montre un schiste gris, maclifère, à grands cristaux de chialstolite, qui appartient probablement aussi au Silurique supérieur. A un kilomètre à l'ouest de ce point, on entre dans le groupe des grauwackes, qui se développe vers l'ouest jusqu'à la limite du massif granitique. Ces grauwackes sont en général de couleur rouge brique plus ou moins foncée, elles ressemblent beaucoup aux grauwackes de Sobrado et de la serra de Balsa, auxquelles elles doivent correspondre.

Métamorphisme des schistes.— Sur la zone de métamorphisme, toutes les couches ne sont pas maclifères: au contraire, le métamorphisme de ces roches se manifeste principalement par la présence de concentrations noduleuses mal définies d'un silicate alumineux, à la place des cristaux de chialstolite qui n'aboutirent pas à se former.

Au contact du granite grossier, porphyroïde, avec les schistes siluriens, on voit que la roche éruptive a envoyé des apophyses dans ces schistes et, en outre, qu'elle englobe de petites masses de ces roches. On reconnaît donc que, pendant l'acte de l'éruption, le granite avait une certaine fluidité; cependant, il n'a subi aucun changement dans ses caractères typiques; au contraire, il est partout parfaitement cristallin et renferme en grande abondance des cristaux très volumineux d'orthose, comme nous en avons rarement observé ailleurs.

Malgré l'aire très restreinte qu'embrasse cet affleurement du Marão, le Silurique supérieur a une très grande puissance.

AFFLEUREMENT NORD-ORIENTAL

L'affleurement silurien du nord-est de la province de Trás-os-Montes est le plus étendu du nord du pays, malheureusement il est encore le moins connu. Ainsi qu'il arrive dans les autres affleurements décrits, les couches se montrent ondulées et répétées en plissements divers, occupant par ce motif une largeur qui n'est pas en rapport avec l'épaisseur des dépôts, bien qu'elle soit réellement très considérable.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Le silurique inférieur n'y est représenté qu'en deux points par les quartzites à *Vexillum* de la base du système: à serra de Sicouro ou de Senhora da Luz, au nord de Miranda do Douro, et à Pradogatão près de l'extrémité sud de l'affleurement.

La chapelle de Senhora da Luz, au nord-ouest de Constantim, sur la ligne de la frontière, est assise sur le sommet d'une colline à formes douces, qui s'élève à une petite altitude au-dessus du terrain environnant. Cette colline est constituée par une assise de quartzites,

couleur gris clair à taches rougeâtres, composée de strates minces en général, quelques-unes parfaitement schistoïdes et fissiles. Ces quartzites ont la structure pseudo-fibreuse, qui se déce le par la facilité avec laquelle les fragments détachés de la roche se divisent dans le sens longitudinal, tandis qu'au contraire la fracture est très irrégulière et difficile, perpendiculairement à cette direction.

Quelques strates renferment de nombreux exemplaires de *Vexillum* (*V. Halli* Rou.), parfois elles semblent même en être totalement formées; elles se dirigent vers le N.W. avec plongement N.E. et reposent immédiatement sur l'Archaïque.

Ces quartzites forment un dos aplati, qui se prolonge vers le *marrão de Sicouro*, sommet où est assis le signal géodésique de premier ordre; il continue encore vers l'ouest, en se courbant graduellement dans cette direction, de sorte que dans la partie qui avoisine la source de la rivière Angueira, il suit dans la direction W.N.W.

La crête de cette serra marque la frontière. Sur le versant nord, par conséquent déjà dans le territoire espagnol, se montrent des schistes téglaires qui reposent immédiatement sur les quartzites. Par leurs rapports stratigraphiques en d'autres points de l'affleurement, nous pensons que ces schistes doivent appartenir au Silurique supérieur.

L'autre point où l'on a découvert les quartzites à *Vexillum* est à 500 mètres à l'ouest de Pradogató. Ces quartzites sont également stratifiés en lits minces séparés par d'autres de schiste micacé. D'après leurs caractères lithologiques et leurs rapports stratigraphiques, ils correspondent, sans le moindre doute, à ceux de la serra de Senhora da Luz.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

L'affleurement silurique dont nous nous occupons à présent, est constitué principalement par des schistes argileux, fins, gris foncé, que nous rapportons au Gothlandien, parce qu'ils ont fourni en plusieurs points les Graptolites caractéristiques de cette section du système silurique.

Nous avons rencontré ces fossiles en grand nombre, particulièrement en des schistes près de la frontière, aux environs de l'église de França (au nord de Bragança) et plus à l'est, à Quadremil. Ils sont contenus dans une lydite noire à Rio de Onor et à l'est de Carregosa, près de la limite de l'affleurement au nord de Bragança. Les espèces rencontrées dans ces différentes localités se trouvent réunies dans la liste qui suit:

<i>Monograptus priodon</i> Bronn.?	<i>Monograptus</i> ind., 4 ou 5 espèces probablement nouvelles. ¹
» <i>vomerinus</i> Nichols.	
» <i>Nilssoni</i> Barr.	<i>Retiolites Geinitzianus</i> Barr.
» <i>convolutus</i> His.	» sp. (aff. <i>R. venosus</i> Hall.)
» <i>Proteus</i> Barr.	<i>Phyllograptus</i> cf. <i>typus</i> Hall.

A Gimonde, on observe un schiste téglair, gris, tout à fait semblable par sa couleur et son aspect à celui que l'on voit plus au sud à Pedreiras de Santo Adrião, dans les points où il n'est pas métamorphisé au voisinage du granite. Dans ces carrières, le schiste se trouve associé à des calcaires.²

¹ Une de ces espèces mesure 5 millimètres de largeur et l'on compte 20 cellules sur 1 centimètre de longueur.

² Voyez *Comunicações*, t. II, fasc. I, p. 45 et seq.

A l'est de Gimonde, cette assise de schistes fins comprend quelques strates de grau-
wacke et de schiste vert, ainsi que de puissantes couches de lydite noire traversée par des
veinules de quartz blanc.

A Milhão, les schistes ont une couleur verdâtre; ils ressemblent beaucoup par leur
aspect aux schistes précambriens, mais il n'y a pas moyen de les séparer de l'affleurement
silurique, dans lequel ils doivent être compris.

En effet, les mêmes schistes gris et verdâtres, avec de la lydite subordonnée, se trou-
vent aussi à França, où ils ont fourni des Graptolites.

Depuis ce village jusqu'à Montesinho, on traverse des schistes plus ou moins luisants,
quelques-uns téglulaires, qui se débitent en dalles minces servant dans la contrée pour la
couverture des toits et pour le pavage, et celles de plus grandes dimensions sont destinées à
servir comme supports et pour d'autres usages.

La direction ordinaire des couches est le plus souvent vers le quadrant du N.W.
(N. 58° W.) avec inclinaison vers le S.W. Il va sans dire que cette direction est la même que
les couches siluriennes affectent en général dans l'affleurement du Marão.

A Vimioso, les schistes sont très fins et doux, ils se divisent en morceaux allongés,
montrant une structure xyloïde plutôt que schisteuse, ressemblant beaucoup par ce carac-
tère aux schistes de Mourão (Alemtejo). Dans les points où ces schistes se montrent fortement
froncés, ils sont luisants et parfois même scintillants, aspect qui est dû probablement à un com-
mencement de métamorphisme qu'ils ont subi par suite de la compression produite par l'intru-
sion de la masse de granite qui affleure à l'est. Cependant, ils se distinguent facilement des
schistes satinés du Précambrique parce qu'ils ne montrent le caractère luisant de ceux-ci que
sur de faibles étendues.

Au N.E. de Vimioso, dans le contact du granite, les schistes s'endurcissent et devien-
nent maclifères en se chargeant de cristaux de chialtolite, d'ailleurs imparfaits et de dimen-
sions exigües.

A Granja, 3 kilomètres au sud des carrières de Santo Adrião, se trouve un schiste
grossier, verdâtre, très puissant, qui passe à une grau-
wacke un peu schistoïde. Associé à ces
roches se montre un schiste fin, téglulaire, gris foncé ou noir, de même très puissant, auquel
sont subordonnés quelques bancs irréguliers de calcaire, ainsi que des strates de lydite noire,
dans laquelle nous avons découvert une empreinte de *Diplograptus*. Ce fossile unique montre
pourtant que les schistes et calcaires de la contrée sont assurément siluriens et très vraisem-
blablement du Silurique supérieur.

A 2 kilomètres à l'est de Teixeira on passe des schistes téglulaires gris-noirâtres, les mê-
mes qui vont à Granja, à un groupe de grau-
wackes et de schistes fins, verdâtres, plus ou moins
durs, qui alternent avec d'autres schistes un peu fissiles, de cette même couleur ou gris noir,
que l'on pourrait considérer par leur aspect comme appartenant au Précambrique supérieur,
mais que l'on reconnaît que, comme ceux de Granja, sont compris dans l'affleurement silurique.

Calcaires de Santo Adrião.—C'est dans les carrières de Santo Adrião que les calcaires
montrent leur plus grand développement en épaisseur, ils y sont associés à des schistes fissiles,
plus ou moins luisants, à surface ondulée, qui sont traversés par de rares veinules de quartz
blanc. Sur plusieurs centaines de mètres de largeur, ces schistes avec le même aspect que

ceux de Gimonde, deviennent maclifères au voisinage du granite, étant chargés de petits cristaux de chiastolite.

Les calcaires, plus ou moins purs, forment des masses lenticulaires au milieu des schistes, auxquels ils sont intimement raliés, car ils renferment quelques lits et des petites lentilles de ces derniers.

Dans les carrières de Santo Adrião les calcaires forment deux bandes principales, séparées l'une de l'autre par d'autres bandes de schiste, le même fait s'observant entre la bande inférieure et le granite.

Les calcaires sont cristallins, saccharoïdes, à grain fin, cependant ils ne montrent pas une texture uniforme; ils sont blancs ou gris-bleu, reçoivent un beau poli, et les variétés moins foncées montrent une certaine translucidité.

Dans la bande orientale, celle qui est plus près du granite, les marbres sont plus purs et de couleur blanche. Ceux de la bande supérieure, qui forment la masse la plus importante, ont des teintes plus sombres, grises ou bleuâtres, et renferment plusieurs grottes, dont le sol est revêtu par de puissantes masses d'albâtre calcaire, qui parfois remplissent presque entièrement quelques-unes de ces grottes. Cette bande se prolonge vers le S.E. sur plus de 3 kilomètres jusqu'aux environs de S. Pedro da Silva.

Les marbres se trouvent aussi près du pont de la rivière Angueira, sur la route de Vimioso à Miranda do Douro, où ils forment différentes lentilles qui occupent trois niveaux distincts au milieu des schistes gris, à stratification peu distincte, se divisant en fragments allongés comme les schistes de Vimioso.

Les calcaires se prolongent encore vers le N.W., ils se rencontrent à 1 kilomètre à l'est de Vimioso, ce point étant le plus septentrional où jusqu'à présent ils ont été observés.

Près des grottes, les calcaires sont caverneux, ayant la surface criblée de petites cavités. Il est probable que cette altération ne soit que superficielle, et qu'elle soit due à la corrosion que les calcaires ont subie par la pénétration des eaux plus ou moins chargées d'acide carbonique, qui ont dissous le calcaire et l'ont déposé ensuite sous la forme de concrétions stalactiteuses.

L'albâtre est d'ordinaire blanc, blanc nébuleux ou légèrement jaunâtre, et il est demi-transparent ou translucide. Dans quelques grottes on a pourtant découvert un albâtre tacheté, ou mieux moiré d'une teinte jaunâtre plus ou moins foncée, ou zoné en raies concentriques des mêmes nuances, qui est la plus belle de toutes les variétés observées.

A San Joannico, 10 kilomètres à l'E.N.E. de Vimioso, on voit des schistes subluisants, avec l'aspect scintillant, qui ont fourni des empreintes bien reconnaissables de *Monograptus*, ce qui les fait réunir de prime abord dans la série gothlandienne, ainsi que les strates de quartzite que les accompagnent.

On a aussi découvert à 1 kilomètre à l'est de Vimioso, un schiste quartzeux avec empreintes de *Monograptus*.

Comme l'on trouve quelques lentilles de calcaire pareil à celui des carrières de Santo Adrião subordonnées à ces schistes, il ne peut y avoir de doute que toutes ces roches appartiennent au Silurique supérieur.

A l'ouest d'Angueira se montrent des schistes maclifères tout à fait semblables à ceux de Portella d'Espinho (Marão). Le métamorphisme a été produit par la même cause, le voisi-

nage du granite grossier porphyroïde. Ces schistes sont remarquables par l'absence de quartz, ainsi que par leur texture fibreuse ou xyloïde, qui les fait ressembler à ceux de San Joannico qui renferment les Graptolites.

Analogies du système silurique du Portugal avec celui de l'Espagne.— En comparant le Silurique de la province de Trás-os-Montes aux affleurements de la Beira et de l'Estremadure, et principalement à celui du Bussaco, on est surpris des analogies qui lient notre système silurique respectivement avec celui des chaînes Hespérique et Ibérique, selon Mr. A. Dereims nous fait connaître dans un travail très intéressant publié en 1898.¹

Dans le nord du Portugal, au Haut Douro, on observe comme dans la première de ces chaînes, l'absence de fossiles dans l'Ordovicien et un grand développement du Gothlandien, tandis qu'au Bussaco l'Ordovicien est représenté par des dépôts puissants avec plusieurs niveaux fossilifères bien distincts, et le Silurique supérieur est bien moins développé et contient une faune peu variée, à l'égal de ce qu'il arrive dans la chaîne Ibérique. Ces analogies sont très singulières et semblent indiquer qu'à l'époque ordovicienne les mêmes conditions bathymétriques réunissaient l'ancienne mer ou golfe hespérique par la vallée du Douro avec le Haut Douro portugais, tandis que le golfe ibérique traversant le cœur de l'Espagne, baignait alors la vallée du Tage et la Basse Beira, pénétrant aussi dans la vallée du Mondégo.

L'absence de dépôts ordoviciens, du moins avec leurs caractères ordinaires, dans la contrée inférieure du Guadiana et dans la province de l'Alemtejo (sauf dans la serra de Portalegre où le Silurique inférieur est d'ailleurs très mal représenté) peut s'expliquer par l'interposition du massif archaïque de Campo Maior à Abrantes et Ferreira do Zezere, qui isolait autrefois cette province. Au contraire, dans l'époque gothlandienne cet obstacle ayant disparu par l'affaissement du sol et la mer étant unique, la liaison des dépôts du Bas Alemtejo avec ceux du Bas Douro a eu lieu par l'occident de la Péninsule, et il en fut de même de la liaison de ces dépôts avec ceux de Trás-os-Montes, la mer embrassant à la fin toute l'aire occupée par nos différents bassins siluriens.

d) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU GUADIANA

SILURIQUE DE L'ALEMTEJO

Généralités.— Le Silurique de l'Alemtejo forme deux affleurements distincts, à grandeur très inégale et avec des caractères tout à fait différents, prouvant que leurs dépôts furent formés dans des conditions essentiellement distinctes.

Le plus septentrional de ces affleurements, de petites dimensions et à contour très irrégulier, est formé par des bandes étroites réunies en ziz-zag, il occupe le coin nord-est de la province dans la contrée montagneuse de la serra de Portalegre. Il a des rapports intimes, tant stratigraphiques que paléontologiques, avec les lambeaux de la Basse Beira et de la ré-

¹ *Recherches géologiques dans le sud de l'Aragon.* Thèse présentée à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de Docteur ès-sciences naturelles.

gion centrale de l'Espagne. Par ses caractères cet affleurement doit être considéré comme appartenant au bassin hydrographique du Tage.

L'autre affleurement, de dimensions incomparablement supérieures, dépasse de beaucoup en grandeur tous les autres affleurements du centre et du nord du pays, il a des caractères particuliers, qui le distinguent profondément de l'affleurement précédent et par contre le rapprochent de l'affleurement de Vallongo, et par conséquent aussi des affleurements de Trás-os-Montes.

Au contraire de l'affleurement précédent, celui-ci appartient au bassin hydrographique du Guadiana, dans lequel il est compris dans sa plus grande extension.

Dans le nord et dans le sud du pays, à Vallongo et à Barrancos, le mouvement d'affaissement qui s'opérait dans la dernière phase de l'Ordovicien, avec une intensité diverse en différents points du pays, a continué sans interruption jusqu'à la fin de cette époque, contrairement à ce qu'il est arrivé au Bussaco, en se formant ainsi une série de dépôts que l'on ne reconnaît pas dans cette contrée et qui doit correspondre stratigraphiquement, comme nous l'avons dit, au *Llandovery group* de l'Angleterre.

Il est cependant à remarquer très particulièrement que, tandis qu'à Vallongo s'est déposée durant l'époque ordovicienne une puissante formation schisteuse fossilifère, au Bas Alemtejo on constate une longue interruption dans la formation des dépôts, jusqu'à ce qu'une nouvelle invasion de la mer silurienne ait eu lieu vers la fin de cette époque. L'Ordovicien se trouve donc mal représenté à Barrancos, comme c'est aussi le cas dans le nord de la province d'Alemtejo.

Cette invasion de la mer silurienne dans le sud du Portugal paraît donc être contemporaine du mouvement d'exhaussement au Bussaco, produit par un mouvement de bascule, lequel a mis à découvert cette contrée pendant la phase de transition de l'Ordovicien au Gothlandien; elle est en même temps en liaison étroite avec l'éruption de la diabase durant la période la plus importante de son épanchement, dont l'action ne s'est pourtant pas fait sentir à de grandes distances.

Comme nous l'avons dit, il n'y a que le Silurique supérieur qui soit nettement représenté dans le grand affleurement silurien de l'Alemtejo. On doit en outre remarquer que cet affleurement comprend un faisceau de couches qui n'existe pas au Bussaco, et qui n'est représenté avec les mêmes caractères sur aucun autre point de notre territoire; par ses rapports stratigraphiques l'on reconnaît qu'il appartient à la section inférieure du Silurique.

Le mouvement d'exhaussement a commencé dans le sud (Barrancos) à la fin de l'époque ordovicienne inférieure, il a mis à découvert les dépôts antérieurement formés, tandis qu'au Bussaco et à Vallongo le sol descendait lentement et que les couches de l'Ordovicien moyen se sont déposées. Lorsqu'au Bussaco s'est initié le mouvement ascensionnel, les contrées de Vallongo et de Barrancos se submergèrent successivement en recevant alors les dépôts du Llandovery, qui dans la dernière contrée ne sont représentés que par les couches les plus supérieures.

Pendant le mouvement d'affaissement qui continua pendant l'époque gothlandienne, les eaux envahirent des espaces successivement plus larges, comprenant même des endroits où s'étaient formées les dépôts siluriens plus anciens, principalement les quartzites à Bilobites. Par cette raison les couches du Silurique supérieur ont acquis un grand développement, quel-

quefois reposant en stratification discordante immédiatement sur ces quartzites avec des épaisseurs variables en divers points.

Dans la serra de Portalegre, aussi bien qu'à Monforte (Basse Beira) et Villa Velha de Ródam, la série schisteuse du Silurique inférieur est faiblement représentée, en vertu de la diminution successive d'épaisseur des couches lorsqu'on se dirige vers le sud, ou peut-être parce que cette série schisteuse inférieure, avec un développement plus ou moins grand, est cachée en partie sous les couches du Silurique supérieur et du Dévonique.

AFFLEUREMENT DE LA SERRA DE PORTALEGRE

Dans le petit affleurement septentrional de l'Alemtejo, le Silurique inférieur est représenté par la zone de quartzites de la base de cette série et par quelques couches de schistes et de grauweekes qui se montrent seulement du côté occidental de l'affleurement. Les fossiles y sont extrêmement rares, d'où l'impossibilité de distinguer les différentes zones que l'on a séparées à Bussaco et en d'autres points. Par contre, le Silurique supérieur est constitué par une puissante assise schisteuse surmontée par un groupe de grès et quartzites contenant une faune spéciale, lequel représente le toit de la série et manque au Bussaco.

Quartzites à Bilobites.— Dans cet affleurement, les quartzites à Bilobites se répètent des deux côtés de la vallée d'Escusa; du côté oriental ils constituent la serra de Marvão et celle d'Esparoeiras, qui est sur le prolongement de la précédente vers le S.E., déjà dans le territoire espagnol, et du côté occidental ils forment les serras du Facho et de Malhadaes, au sud de Castello de Vide. Les quartzites se continuent vers le sud-est et forment une bifurcation au sud d'Alegrete; ils constituent la serra d'Alegrete et celle de Senhora da Penha à l'ouest de Portalegre, et en se prolongeant dans une seule branche vers Senhora da Esperança, ils s'y bifurquent une seconde fois et pénètrent peu après en Espagne, ce point étant le plus méridional où ces couches aient été observées dans notre pays.

La puissante muraille ou croupe allongée de quartzites, qui couronne le flanc occidental de la vallée d'Escusa, se prolonge sans interruption vers le S.W. depuis Senhora da Penha, près de Castello de Vide, formant les serras du Facho et du Lobo, jusqu'au sommet de Malhadaes, en s'amincissant graduellement et terminant en pointe aiguë près du hameau de Pena, à 1.700 mètres au S.S.W. de l'église de San Salvador d'Aramenha. Toutes ces serras confinent du côté ouest avec l'affleurement de granite et de gneiss de Portalegre, les quartzites ayant perdu, au contact, tous les vestiges de stratification. Du côté de l'est ils sont accompagnés par une grauweeke rouge alliée à un schiste gris, qui se débite en menus fragments, et qui appartient probablement au Silurique supérieur.

Serra du Facho.— Dans la serra du Facho, la succession des couches de grès et de quartzites qui forment ici la base du Silurique, est de haut en bas la suivante:

- a) Quartzite à *Cruziana* en lits minces;
- b) Quartzite à *Arthropycus* (la même couche que l'on observe à Esparoeiras);
- c) Grès-quartzite fin à *Scolithus* (*Tigillites Dufrenoyi* Rou.), en bancs épais, traversé par des veines de quartz blanc;

d) Grès dur plus ou moins grossier, composé de fragments de quartz vitreux arrondis, liés fortement par un ciment kaolinique, montrant les mêmes caractères que le grès qui forme la base de l'assise dans l'affleurement silurien d'Amendoa. Il est très singulier de constater l'aspect de cette roche, qui ressemble profondément aux grès du Crétacique supérieur (ou Oligocène?) qui couvrent en différents points la serra du Bussaco.

Dans la serra de Senhora da Esperança la série ordovicienne est représentée par des quartzites, des schistes et de puissantes couches de grauwacke schistoïde passant au quartzite. Le même faisceau de couches forme la branche occidentale de la bifurcation de la bande du Silurique qui se poursuit de Senhora da Esperança vers Portalegre.

La serra du Almo, à 8 kilomètres au nord-ouest de Senhora da Esperança, où se fait la jonction des deux bandes de quartzites du Silurique inférieur, est de même couronnée par de grandes masses de ces roches.

Les quartzites siluriens qui forment les serras du Facho à Malhadaes, sont les mêmes qui se présentent sur le versant opposé de la vallée d'Escusa, dans la montagne de Marvão et à Esparoeiras, cette vallée étant occupée par des strates du Silurique supérieur et du Dévonique. Il y existe donc un synclinal aussi clairement défini que celui du Bussaco.

Ce synclinal, dû au ploiement des couches dans la direction N. W.—S. E., est le même qui se reproduit dans l'affleurement silurique d'Amendoa, où il affecte seulement les couches siluriennes. Les lambeaux de Monforte et de Castello Branco, ceux de Penha Garcia, de Pêdorido à Gafanhão (au sud du Douro) et celui de Villa Flor (Trás-os-Montes) ont obéi à la même compression latérale, puisqu'ils sont tous orientés suivant la même direction.

La puissance de cette assise de quartzites n'est pas inférieure à 50 mètres. On y a découvert partout des spécimens de *Cruziana* et d'*Arthropycus*.

Serra de Marvão.— La haute montagne de Marvão, l'accident orographique le plus important de cette contrée, et qui appartient avec la croupe d'Esparoeiras à la même ligne de dislocation, est couronnée aussi par les quartzites à Bilobites. On y observe nettement que ces couches, fortement comprimées du côté de N. E., furent ployées conjointement avec les schistes et les grauwackes du Silurique supérieur, qu'elles ont percés et déchirés, en même temps que l'éruption du granite grossier porphyroïde a métamorphosé ces schistes en les rendant maclifères sur quelques points. Comme il arrive d'ailleurs fréquemment, ce caractère est plus prononcé dans quelques strates que dans d'autres strates contiguës. Dans quelques points ces schistes maclifères montrent pourtant des empreintes de *Monograptus*.

Ces schistes et grauwackes doivent être immédiatement supérieurs aux schistes de Revelladas, ils correspondent vraisemblablement aux couches de Sobrado et de Rates.

Sur le versant occidental de la montagne de Marvão on observe un petit lambeau (*outlier*) de schistes gothlandiens, qui forme une bande longitudinale très étroite, entourée tout autour par les quartzites, qui les ont pincés en se pliant. Le dos de la montagne est formé par les quartzites à *Arthropycus* et à *Cruziana*, qui affectent des surfaces ondulées, les strates étant séparées par des lits de schiste noir maclifère.

Les strates du Silurique supérieur de Marvão furent disloquées par l'éruption du granite porphyroïde en même temps que celles de Vallongo, et avant que les quartzites à Bilobites de la montagne de Marvão se fissent jour en les traversant.

Cette seconde dislocation, à peu près dans la direction N.W., correspond à la direction des bandes de quartzites de Monforte et de Penha Garcia, aussi bien qu'à celle de la bande du Silurique de Pédorido à Gafanhão, au sud du Douro, et de Villa Flor et de Eucisia (Alfandega da Fé) dans la province de Trás-os-Montes.

La dislocation des quartzites ordoviciens de la colline de San Felix suit aussi la même direction, elle est donc probablement aussi contemporaine de celles des quartzites de Marvão et d'Esparoeiras.

Ploiement des quartzites à la serra d'Alegrete.— Dans la colline d'Alegrete, où est assis le château, les quartzites en gros bancs sont gracieusement ondulées et forment une voûte entière au sommet de laquelle s'élève une pyramide géodésique de deuxième ordre. Au-dessous des quartzites vient un schiste téglulaire très puissant, gris noir avec tâches blanchâtres et rougeâtres, qui renferme beaucoup de cristaux cubiques de pyrite, en partie détruits mais laissant bien nettes les cavités qu'ils occupaient. Ce schiste passe inférieurement à une couche épaisse de grauwacke schistoïde, d'une teinte jaunâtre ou rougeâtre, séparée par un lit de schiste mou, très fissile, d'une strate de quartzite, qui a la structure prismatique due aux diaclases qui la divisent.

Dans la croupe des serras de quartzite du Pico et de Broa, qui se dirige d'Alegrete vers le N.W., les couches sont courbées comme dans la colline du château; cependant, en quelques points la voûte s'est rompue à la clef, les couches s'épanouissant en éventail et inverties, plongent vers l'ouest avec une forte inclinaison.

Silurique inférieur de la serra de Caleira.— Le versant est de ces serras est constitué par des schistes avec quelques lits de grauwacke intercalés, contenant de très rares fossiles de la faune seconde.

Ces couches forment une bande étroite, qui descend jusqu'au pied du versant occidental de la serra de Caleira, aussi orientée N.W.—S.E. comme les serras de Pico et de Broa, et suivant dans cette direction, se termine en pointe près du hameau de Cantarinha à l'ouest du signal géodésique de premier ordre de San Mamede. Cette assise est couronnée par une strate de schiste avec des Polypiers, des mêmes espèces qui se trouvent au Bussaco et dans l'affleurement d'Amendoa, laquelle est comprise dans la zone de schistes à *Dalmanites Dujardini*.

La serra de Caleira est renfermée dans la bande schisteuse du Silurique supérieur, qui se prolonge vers la montagne de San Mamede, et plus loin, dans la vallée d'Escusa, elle est cachée dans sa plus grande étendue par les strates dévoniennes de San Julião et de San Salvador d'Aramenha.

Ilôt de l'Ordovicien au milieu des quartzites du toit du Silurique.— A 2.700 mètres au S. 65° E. du signal géodésique de premier ordre, sur le versant oriental de la montagne de San Mamede, nous avons découvert, occupant une petite aire de quelques dizaines de mètres, des glabelles et des pygidiums de *Calymene Tristani* et de *Homalonotus Oehlerti*, des fragments d'un autre Trilobite indéterminable et un petit Brachiopode (*Orthis?*). Tous ces fossiles étaient à l'état de moules enchâssés dans un schiste mou, gris clair avec du mica blanc en petites paillettes distribuées très irrégulièrement, se débitant en menus morceaux à formes irrégulières.

Les fossiles montrent l'existence indubitable de l'Ordovicien, que la dénudation a mis à découvert en ce point, au milieu des quartzites du toit du Gothlandien.

On ne peut pas découvrir les rapports entre ces deux terrains; on voit, cependant, que le Gothlandien repose en discordance sur l'Ordovicien, comme d'ailleurs c'est le cas du côté oriental de l'affleurement, à Esparoeiras, où les schistes à Graptolites sont aussi en contact immédiat avec les quartzites à *Arthropycus* et à *Cruziana* de la base du Silurique.

Nous avons observé un fait semblable à celui-ci sur le versant est de la serra du Bando de Codes, dans le grand affleurement silurique d'Amendoa, à une lieue de distance au sud-est de ce village. Là aussi un petit îlot de l'Ordovicien, mesurant 1.700 mètres de longueur sur 250 mètres de largeur affleure au milieu des schistes du Silurique supérieur; il a fourni *Homalonotus OEhlerti*, *Dalmanites* sp., *Orthis* sp. et Polypiers, et il est entouré par les schistes gothlandiens à nodules avec Graptolites et *Cardiola interrupta*.

Silurique supérieur de la serra de Caleira.—Immédiatement au-dessus de la strate avec Polypiers, qui forme le toit de l'Ordovicien sur le versant occidental de la serra de Caleira, se trouve une couche de grauwacke et de quartzite blancs, micacés, épaisse de quelques dizaines de mètres, qui par ses caractères lithologiques et sa position stratigraphique doit correspondre à la couche de grauwacke du dos de la serra da Murta (Vallongo). Cette couche renferme des lentilles d'un schiste fin gris foncé, elle est surmontée par une strate de schiste de même nature renfermant quelques nodules, dans lequel on a recueilli les espèces mentionnées dans la liste qui suit:

FOSSILES DE LA BANDE DU SILURIQUE SUPÉRIEUR

Mytilus sp. (voyez *Mytilus? insolitus* Barr.)

Pterinea sp. [cf. *Avicula (Pterinea?) latiuscula* Barr.]

» ind., 3 espèces nouvelles.

Panenka? (voyez *Panenka oriens* Barr.)

Bivalve ind.

Monograptus priodon Br.

» » var. *validus* Perner.

» » var. *ludensis* (*Grapt. ludensis* Murch.).

» sp. aff. *Jaekeli* Perner.

» *clavulus* Perner.

» *tumescens* Miss Wood (*Mon. colonus* Barr., pars).

» *Hisingeri* Carr. var. *jaculum* Lapw. (*Pristiograptus jaculum* Lapw.)

» cf. *Hisingeri* Carr.

» sp. aff. *tenuis* Portl.

» cf. *latus* McCoy.

» sp. n. avec 4 mill. de largeur et 4 à 5 cellules sur 1 cent. de longueur.

» ind., 2 ou 3 espèces peut-être nouvelles.

Cyrtograptus Murchisoni Carr.

» *Lundgreni* Tullb.

Graptolite ind.

Le Silurique supérieur présente des caractères différents de part et d'autre de l'affleurement de la serra de Portalegre. On reconnaît que les couches de chaque côté du synclinal

qu'elles forment ne sont pas les mêmes. C'est du côté occidental, dans la montagne de San Mamede, que le Gothlandien a son plus grand développement.¹ Le Dévonique y repose en discordance sur ces couches, les cachant dans leur plus grande étendue.

Schistes de Gáfete.— Du côté occidental de la montagne il se montre une puissante assise de schistes gris foncés, en partie fins et mous, avec quelques lits de quartzite subordonnés; en partie téglulaires, micacés et durs, avec beaucoup de plaquettes interstratifiées de quartz; en d'autres points, enfin, grossiers et gréseux, peu ou point du tout fissiles, avec taches ampéliteuses, qui ont fourni des Graptolites sur plusieurs points.²

Ces schistes, qui forment une assise fort puissante, ne se voient pas à Porto da Espada (4 kilomètres au S. E. de San Salvador d'Aramenha, côté oriental de l'affleurement), où les schistes coblentziens à Spirifers surmontent immédiatement les quartzites de la serra de Salada, qui sont synchroniques des quartzites de la montagne de San Mamede.

D'autres schistes et grauwackes, avec taches noires graptolitiques, succèdent inférieurement aux quartzites; ils appartiennent sans doute au Gothlandien et semblent correspondre aux grauwackes de Sobrado.

Coteau de Penha Cahida.— Le coteau de Penha Cahida, à 2.400 mètres au nord du signal de San Mamede, est formé par les quartzites dans lesquels on n'a découvert que des moules de petites bivalves indéterminables. Nous considérons ces quartzites comme identiques avec ceux de la serra de Salada et de la serra Fria,³ et par conséquent identiques aussi avec ceux de la montagne de San Mamede.

Coteau de Canchos dos Altos.— Dans le coteau de Canchos dos Altos, à 2.400 mètres au N. W. du signal de San Mamede, on a découvert des empreintes de *Monograptus* et des moules écrasés et très aplatis d'*Orthoceras* et d'une bivalve à forme allongée, dans un schiste mou, gris foncé, immédiatement sous-jacent à l'assise de quartzites. Le test des Graptolites a été remplacé par une matière talqueuse, blanchâtre. Une des espèces de Graptolites a une largeur insolite et les cellules sont en très grand nombre et très serrées; elle correspond probablement à une des espèces non dénommées de la bande graptolitique à l'est de Vallongo.

Du côté ouest de l'affleurement, à 1.850 mètres au S. W. du signal de San Mamede, on a de même trouvé des Graptolites et des Orthocères, dans une lentille ampéliteuse, dans les schistes immédiatement au-dessous d'un faisceau de quartzites. C'est probablement la même strate fossilifère qui passe à l'est d'Alegrete et se prolonge vers le nord à Canchos dos Altos.

¹ Dans ce point, l'affleurement silurien indiqué sur la carte géologique doit être agrandi, en embrassant une partie de la montagne de San Mamede, et s'étendant vers le S. E. jusqu'à Alegrete. L'étude des fossiles recueillis dans cette région, après la publication de la carte géologique, impose cette rectification importante.

De même, du côté oriental, la bande du Silurique supérieur doit être beaucoup élargie, en reculant la ligne-limite avec le Dévonique jusque près de la base du versant ouest de la serra Fria, et en la courbant vers l'est pour pénétrer en Espagne à 1 kilomètre au N. E. de San Julião.

² Nous nommerons cette assise — schistes de Gáfete — du nom d'un hameau qui est bâti sur ces couches, à 2 kilomètres au N. W. du signal géodésique de San Mamede, sur le chemin de Portalegre à Porto da Espada.

³ La cote qui indique cette colline à 5 kilomètres au N. E. du signal de San Mamede, a été par méprise indiquée sur la carte géologique par le chiffre 874, au lieu de 974 qui lui appartient.

En descendant la pente orientale du coteau de Canchos dos Altos, on coupe une formation schisteuse où prédomine un schiste dur, en partie gréseux, compact, très peu fissile, ayant quelques lits de quartzite subordonnés, et un schiste micacé plus fissile, très puissant, ressemblant beaucoup par ses caractères lithologiques aux schistes de Gáfete auxquels il fait évidemment transition. Cette assise doit correspondre à celle qui est immédiatement sous-jacente aux quartzites fossilifères du sommet du Bando dos Santos (n° 6 de la coupe, pag. 85 *ante*). La direction et l'inclinaison de ce schiste changent fréquemment ainsi que son aspect; il comprend plusieurs lentilles ampéliteuses, plus ou moins foncées, d'un schiste fin et mou avec Graptolites. Il se distingue, cependant, du schiste à nodules, et il ne renferme aucune strate de quartzite.

Les schistes sont ondulés et très tourmentés, surtout aux environs du hameau de Revelladas (2.400 mètres au N.W. du signal de San Mamede), et ils semblent pour cela avoir une épaisseur énorme.

L'allure générale des couches est vers le quadrant du N.W., et le plongement, très fort vers le S.W.; il paraît donc que les couches sont successivement plus anciennes lorsqu'on se dirige vers l'est. Cependant, cette supposition serait erronée, car les couches ont formé par leur flexion plusieurs plis parallèles, isoclinaux, de sorte que les couches plongeant dans le même sens sont répétées et en grande partie interverties.

Quartzites du haut de la montagne de San Mamede.—Les quartzites qui couronnent la serra de San Mamede, sur lesquels est assis le signal géodésique, forment quelques bandes parallèles orientées N.W.—S.E. suivant l'allure générale des couches. Ce quartzite est fin, il montre la structure pseudo-prismatique dans les fragments détachés à la surface du sol, quelques-uns affectant même la forme de prismes rhomboïdaux.

Les sommets indiqués sur la feuille 21 de la carte chorographique successivement par les cotes 900, 935 et 899, forment un dos-d'âne suivi, et ils sont couronnés par cette assise de quartzites en gros bancs orientés vers le N.W. En vertu du plissement, ces couches se montrent aussi sur le versant est de la montagne de San Mamede, en couronnant le coteau de Penha Cahida, et, en se prolongeant vers le N.W., passent à Fonte dos Telheiros et traversent la route de Portalegre à Marvão un peu au sud de San Salvador d'Aramenha, près du hameau de Covões.

Les quartzites de Canchos dos Altos, qui sont pliés dans un petit synclinal, occupent une grande largeur; ils suivent une autre direction plus rapprochée du méridien (N. 25° W.) car ces couches ont été influencées par l'éruption du massif granitique de Portalegre, après avoir été disloquées dans la direction du N.W. Ces quartzites marquent très plausiblement le prolongement de la bande formée par les trois sommets précités. On a découvert dans ces quartzites quelques moules d'Orthocères, mais ils sont tellement enchassés dans la roche que leurs caractères extérieurs se sont entièrement effacés.

La liste ci-après réunit les espèces qui furent trouvées dans les grauwackes et grès supérieurs de la serra de San Mamede.

A la suite, nous donnons la liste des fossiles de la contrée siluro-dévonique de la serra de Portalegre, pour montrer la succession des différents horizons fossilifères et les rapports qui lient les faunes des deux systèmes paléozoïques.

LISTE DES ESPÈCES DES GRÈS SUPÉRIEURS DE LA MONTAGNE DE SAN MAMEDE

*Ichthyodorulites.**Proetus OEhlerti* Bayle.

» sp.

Cryphaeus sp. n. (aff. *C. Michelini* Rou sp.)

» sp.

Phacops sp. n. (aff. *Ph. Potieri* Bayle).*Homalonotus* sp. n. (aff. *H. Knightii* König.)» cf. *delphinocephalus* Green.» aff. *delphinocephalus* Green. (6 an sp. n.).» aff. *cylindricus* Salter (6 an sp. n.).» sp. n. (aff. *H. Pradoanus* Vern.).

» sp.

Trilobites ind., différentes espèces.*Orthoceras* ind., plusieurs espèces.*Conularia* sp. (voyez *C. simplex* Barr.)*Bellerophon trilobatus* Sow. var. *typus* Sandb. (*B. bisulcatus* F. A. Roemer).*Cornulites major* Barr.» *serpularius* Schloth.*Capulus* cf. *compressus* Goldf. sp..» *naticoides* Roemer sp.» cf. *crispus* Goldf.» cf. *hercynicus* Kayser var. *acuta* Roemer.» ? (voyez *Oxydiscus minimus* Tchern.).*Loxonema sinuosa* Sow.*Platyostoma*?*Actinopteria manca* Barr. sp.? in Barrois.*Pterinea* cf. *Kerforni* OEhlert.» sp. (voyez *Avicula insolita* Barr.)» sp. (voyez *Megambonia aviculoidea* Hall.)

» sp. n.

» ?

Avicula sp. (aff. *Liopteria leucosia* OEhlert).» *pseudo-laevis* OEhlert.» *laevis* Vern. et Barr. (non *A. laevis* Goldf.)» sp. [voyez *Pterinea (Actinoptera) Trigeri* OEhlert].

» ind., 3 espèces au moins.

» ou *Megambonia* sp. n.?*Orthonota* sp. n. (voyez *O. perlata* Barr.)*Modiolopsis* aff. *imperita* Barr.» cf. *antiqua* Barr.» cf. *submissa* Barr.*Cypricardinia* aff. *alveolaria* OEhlert.

» sp.

Ambonychia sp.*Macrodon*?*Cardiola*?

Polypiers ind.

NOMS DES ESPÈCES	Dévonique					Silurique supérieur				
	Schistes coblentziens					Grès supérieurs				Schistes à nodules
PISCES										
<i>Gyroptychius</i> ?	..	..	+							
<i>Ichthyodorulites</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
CRUSTACEA										
<i>Proetus OEhlerti Bayle</i>	..	+	+	..	..	..	..	+		
» <i>aff. Bohemicus Corda</i>	..	+								
» <i>sp.</i>	..	..	..	..	..	..	..	+		
<i>Cryphaeus laciniatus Roemer non Vern.</i>	..	+	+							
» <i>Barrandei Caill. (C. calitelles Vern. non Green)</i>	..	+	+	+						
» <i>sp. n. du type de C. Barrandei Caill.</i>	..	..	+							
» <i>sp. n. (aff. C. Michelini Rou. sp.)</i>	..	..	..	..	..	..	..	+		
» <i>punctatus Roemer (Phacops arachnoides Burm.)</i>	..	+	+	+						
» <i>stellifer Burm.</i>	..	+	+	+						
» <i>sp.</i>	..	+	+	..	..	..	..	+		
<i>Dalmanites cf. Fletcheri Barr.</i>	..	+	+							
<i>Phacops latifrons Brown.</i>	..	+								
» <i>Potieri Bayle</i>	..	+	+							
» <i>sp. (aff. Ph. Potieri Bayle)</i>	..	..	..	..	..	..	..	+		
» ? <i>sp. ind.</i>	..	..	+							
<i>Cyphaspis sp. n. (aff. C. Halli Barr.)</i>	..	+	+							
<i>Homalonotus sp. n. (aff. H. Knightii Koenig)</i>	..	..	..	..	..	..	..	+		
» <i>sp. n. (aff. H. Pradoanus Vern.)</i>	..	+	..	..	..	..	..	+		
» <i>cf. delphinocephalus Green</i>	..	..	..	..	..	..	+			

[illegible]

NOMS DES ESPÈCES	Dévonique						Silurique supérieur			
	Schistes coblentziens						Grès supérieurs			
										Schistes à nodules
<i>Avicula laevis</i> Vern. et Barr., non <i>A. laevis</i> Goldf.....	..	..	..	..	..	+	..	..	+	
» sp. [voyez <i>Pterinea</i> (<i>Actinoptera</i>) <i>Trigeri</i> OEhlert]	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» ind., 3 espèces au moins	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» ou <i>Megambonia</i> sp. n.?	..	..	..	..	..	..	+			
<i>Myalinodonta</i> ?	..	..	+							
<i>Orthonota</i> sp. n. (voyez <i>O. perlata</i> Barr.)	..	..	..	..	..	..	..	+		
<i>Modiolopsis</i> aff. <i>imperita</i> Barr.	..	..	..	..	..	..	..	+		
» cf. <i>antiqua</i> Barr.	..	..	..	..	..	..	+			
» cf. <i>submissa</i> Barr.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
<i>Mytilus</i> sp. (voyez <i>Mytilus</i> ? <i>insolitus</i> Barr.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
<i>Cypricardina</i> aff. <i>alveolaria</i> OEhlert.....	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» aff. <i>gratiosa</i> Barr.	+									
» sp.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
<i>Macrodon</i> ?	..	..	..	..	..	..	..	+		
<i>Ambonychia</i> sp.	..	..	..	..	..	..	..	+		
<i>Cardiola interrupta</i> Sow.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» ? sp.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
<i>Pecten</i> sp.	..	+	?							
<i>Pseudomonotis</i> ? ou <i>Vlasta</i> ?	..	..	..	..	..	..	..	+		
<i>Sanguinolites</i> sp. (aff. <i>S. variabilis</i> McCoy)	..	..	..	..	..	..	..	+		
<i>Leda</i> sp. (voyez <i>L. tumida</i> Sandb.)	..	..	..	..	..	..	..	+		
Bivalve (voyez <i>Goniophora excavata</i> Kayser)	..	..	+							
Bivalves ind., plusieurs espèces.....	..	..	+	..	..	+	+	+	+	..
BRACHIOPODA										
<i>Discina</i> aff. <i>nitida</i> Phillips	..	..	+							
<i>Athyris globosa</i> A. Rømer	..	..	..	..	+					
<i>Terebratula mucronata</i> Vern.?	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» <i>concentrica</i> v. Buch	+	..	..	..	+					
» (<i>Athyris</i>) cf. <i>Ferronesensis</i> Vern. et Arch.	..	..	+							
» (<i>Rhynchonella</i>) <i>subcordiformis</i> Schnur	..	..	+							
» " <i>pila</i> Schnur	..	..	+							
» ? (aff. <i>Centronella</i> <i>Guerangueri</i> Vern.)	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
<i>Centronella</i> <i>Guerangueri</i> Vern. sp.	..	..	..	..	..	+				
<i>Rhynchonella parallelepiped</i> Bronn sp. non Sandb.	..	..	+							
» <i>Orbignyana</i> Vern. sp.?	..	..	+							
» <i>Marianna</i> Vern. et Barr.	..	..	+							
» aff. <i>letiensis</i> Goss.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» cf. <i>nux</i> Goss.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» cf. <i>Omaliusi</i> Goss.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» sp.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» ind., plusieurs petites espèces, peut-être nouvelles	..	..	..	..	..	..	+	..	+	
<i>Trigleria</i> (<i>Retzia</i>) <i>Adrieni</i> Vern. sp.	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
<i>Spirifer auriculatus</i> Sandb. (<i>Sp. cultrijugatus</i> Rømer)	..	+	+	+						
» <i>mediotextus</i> Arch. et Vern.	..	..	+							
» <i>laevicosta</i> Valenc. var. <i>multicostata</i> mihi.	..	..	+							
» <i>Rousseaui</i> Rou.	..	+								
» <i>speciosus</i> Phill.	..	+	+							
» aff. <i>speciosus</i> Schloth.	..	+	+							
» <i>disjuncta</i> Sow.	..	+	+							
» <i>Verneuili</i> Murch. (<i>Sp. disjuncta</i> Sow. var.)	..	..	..	..	..	+				
» <i>macropterus</i> Goldf. type (<i>Sp. paradoxus</i> Quenst.)	..	+	+	+						
» <i>subspeciosus</i> Vern.	..	..	+	..	+					
» <i>micropterus</i> Goldf. (<i>Sp. elegans</i> Steininger)	..	+	+	+						
» cf. <i>Arduennensis</i> Schnur	..	..	+							
» <i>costata</i> Sow. (<i>Sp. speciosa</i> de l'Eifel, d'après Sedg. et Murch)... ..	..	+	+							

NOMS DES ESPÈCES	Dévonique						Silurique supérieur		
	Schistes coblentziens						Grès supérieurs		
									Schistes à nodules
<i>Spirifer carinatus</i> Schnur (Sp. hystericus Schloth.)	..	..	+						
» cf. <i>carinatus</i> Schnur	..	+							
» <i>Rojasi</i> Vern.	..	+							
» <i>Pellicoi</i> Vern. (Sp. paradoxus Schloth.)	..	+	+	+	..	+			
» » var. avec de grandes ailes	..	..	..	+					
» <i>paradoxus</i> Schnur	..	+	+						
» <i>Cabedanus</i> juv. Vern.	+								
» <i>gigantea</i> Sow. (Sp. disjuncta Sow. d'après Dav.)	..	+							
» <i>primaevus</i> Steiningen	..	+							
<i>Spirifera extensa</i> Sow. (½ an Sp. paradoxus Schloth.)	..	..	..	..	..	+			
<i>Atrypa desquamata</i> Sow.	..	..	+						
» ? sp.	..	..	+						
<i>Strophodonta Leblanci</i> Rou. sp.?	..	..	+						
» ?	..	..	+						
<i>Strophomena depressa</i> Dalm. (Str. rhomboidalis var. nodulosa Phillips) ..	..	+	+						
» <i>subarachnoidea</i> Arch. et Vern.	..	+	+	+					
» <i>Phillipsi</i> Barr.	..	+	+						
» <i>taeniolata</i> Sandb.? (Str. Sedgwicki Arch. et Vern.)	..	..	+	..	?				
» (Strophodonta) <i>piligera</i> Sandb.	..	+	+	..	+				
» <i>rhomboidalis</i> Wahl. var. <i>analoga</i> Phillips	..	..	..	+					
» <i>Murchisoni</i> Vern. et Arch. type	..	+	..	?					
» » var. <i>A. Vern. et Arch.</i>	..	+	+						
<i>Leptaena explanata</i> Sow.	..	..	+						
» <i>Naranjoana</i> Vern.?	..	..	+	+					
» cf. <i>laticosta</i> Conr.	..	..	+						
» <i>Sedgwicki</i> Vern. et Arch.	..	..	+	+					
<i>Orthis personata</i> Zeiler	..	..	+						
» <i>striatula</i> d'Orb. (Hysterolites vulvarius Schloth)	..	+	+						
» sp. n. aff. <i>striatula</i> d'Orb.	..	..	..	..	+				
» <i>subeordiformis</i> Kayser	..	..	+						
» <i>Beaumonti</i> Vern.	..	+	+						
» <i>circularis</i> Sow.	..	+	+	..	..	?			
» <i>hysterita</i> Gmel.	..	..	+	..	+				
» <i>orbicularis</i> Sow.	..	..	+						
» <i>pecten</i> Dalm. (O. arachnoidea Phillips)	..	..	+	..	+				
» <i>obovata</i> Sow.	+	+	+						
» <i>hipparionix</i> Schnur non Hall	..	..	+	+					
» sp. n. aff. <i>hipparionix</i> Vanuxem et J. Hall	+								
» cf. <i>plicatella</i> Schnur	..	..	+						
» cf. <i>dilatata</i> Quenst.	..	+							
» cf. <i>umbraculum</i> Quenst.	..	..	..	..	+				
» cf. <i>longisulcata</i> Phillips	+								
» cf. <i>spathulata</i> F. A. Rømer	..	+							
» cf. <i>nudifera</i> Schnur	..	+							
» sp.	..	..	+						
<i>Orthotetes hipponix</i> Schnur sp.	+	+	+	..	..	..	..	..	+
<i>Pentamerus globus</i> Bronn? (P. brevirostris Phill.)	..	..	+						
» cf. <i>Heberti</i> OEhlert	..	..	+						
» sp.	..	..	+						
<i>Chonetes dilatata</i> F. Rømer sp.	..	?	+						
» cf. <i>sarcinulata</i> Schloth. sp.	..	+	..	..	+				
<i>Stringocephalus Burtini</i> Defr. juv.?	+								
<i>Spirigera Campomanesii</i> Vern. et Arch. sp.	..	..	..	..	+				
» <i>Toreno</i> Vern. et Arch. sp.	..	..	..	..	+				
<i>Streptorhynchus gigas</i> McCoy	..	+	+						
» <i>umbraculum</i> Schloth.	..	..	+						
<i>Lingula</i> sp. n. aff. <i>elliptica</i> Phillips	..	..	+						

NOMS DES ESPÈCES	Dévonique					Silurique supérieur				Schistes à nodules
	Schistes coblentziens					Grès supérieurs				
Lingula sp. n. aff. mytiloides Sow.	..	..	+							
Brachiopode ind. (1 an Terebratula insquamosa Schnur)	..	..	+							
» ind., un grande nombre d'espèces	..	+	+	+	+	+	..	..	+	
ECHINODERMATA										
Crinoïdes ind., empreintes de plaquettes calicinales détachées	..	..	..	..	..	..	..	..	+	
» empreintes de facettes articulaires et fragments de tiges.....	..	+	+	..	..	..	..	..	+	
COELENTERATA										
Monograptus priodon Bronn.....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» » var. validus Perner	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» » var. ludensis Murch.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» sp. aff. Jaekeli Perner	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» clavulus Perner.....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» tumescens Miss Wood (M. colonus Barr. pars).....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» Hisingeri Carr.....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» » var. jaculum Lapw. (Pristiniograptus jaculum Lapw. sp).....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» cf. latus McCoy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» sp. aff. tenuis Portl.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» aff. colonus Barr.....	..	+	..	..	..	..	..	..	..	+
» sp. n.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» ind., 3 ou 4 espèces, peut-être nouvelles.....	..	..	..	..	..	..	..	..	+	+
Cyrtograptus Murchisoni Carr.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
» Lundgreni Tullb.....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	+
Graptolite ramifié?	..	+	..	..	..	..	..	..	..	+
Pleurodictyum problematicum Goldf.	..	+	+	?	..	..	..	..	+	
» giganteum Kayser	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
Combophyllum Marianum J. Haim.....	..	+	+	+	..	..	..	..	+	
Cyathophyllum binum M. Edw. et J. Haime	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
» ou Petraia	..	+	+	..	..	..	..	..	..	
Baryphyllum Verneuilanum M. Edw. et J. Haime.....	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
Retepora retiformis Mich.	..	+	+	..	..	..	..	..	..	
» cf. infundibulum Lonsdale (Fenestella antiqua Goldf. sp.)...	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
Gorgonia Bouchardi Mich. sp.	..	+	+	+	..	..	..	..	..	
Fenestella sp.	..	+	+	+	..	..	..	..	..	
Calamopora polymorpha Goldf. var. γ (Favosites cervicornis Blainv. sp.)...	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
» squamosa Mich. ?	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Turbinolopsis elongata Lonsdale.....	..	..	+	+	..	..	..	..	..	
» pauciradialis Schnur?.....	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
» sp. (voyez T. punctato-crenulata Rømer)	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Lichenalia sp.	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Plasmopora? (voyez Pl. petaliformis Lonsdale sp.)	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Favosites ou Chaetetes	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Alveolites sp.	..	+	+	..	..	..	..	..	..	
Petraia ou Zaphrentis (voyez Z. celtica Lamour.).....	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
» » une autre espèce	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
» sp. (voyez P. undulata A. Rømer)	..	..	+	..	..	..	..	..	..	
» (Turbinolopsis) ind., 2 espèces.....	..	+	+	..	..	..	..	..	..	
Stromatopora sp.	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Syringopora?	..	+	..	..	..	..	..	..	..	
Polypiers ind.....	..	+	+	+	..	..	..	..	+	+
PLANTAE										
Algues (Chondrites ou Palaeophycus?).....	..	+	?	..	..	..	..	..	..	

Considérations sur la faune des grès supérieurs.— L'examen de cette liste suggère quelques considérations intéressantes.

L'ensemble des espèces y mentionnées imprime un facies silurien en même temps que dévonien à la faune qu'elles représentent. Quelques espèces, bien qu'en petit nombre : *Proetus OEhlerti* Bayle, *Avicula laevis* Vern. et Barr., *Orthotetes hipponyx* Schnur, *Pleurodictyum problematicum* Goldf. et *Combophyllum Marianum* Haime (chacune des deux dernières n'étant d'ailleurs représentée que par un seul spécimen) sont caractéristiquement dévoniennes et elles semblent établir la liaison des grès et quartzites avec les couches schisteuses coblentiennes qui les surmontent, où se retrouvent les mêmes espèces. Ainsi, ces grès pourraient représenter l'étage Gédinnien ou le quartzite du Taunus, d'autant plus qu'aucune espèce caractéristique du notre Silurique supérieur incontestable n'y a été découverte. Pendant longtemps nous avons partagé cette opinion, ce qui nous a porté à incorporer, autrefois, dans le système Dévonique, toutes les couches de la montagne de San Mamede. Néanmoins, les affinités qui lient les quartzites avec le système Silurique sont nettement établies par plusieurs espèces d'*Orthoceras*, *Bellerophon*, *Conularia*, *Cornulites*, ainsi que par différentes formes de Gastropodes, d'Acéphales et de Brachiopodes, qui manquent dans les schistes dévoniens, elles le sont également par l'absence absolue, dans les grès, des genres *Spirifer*, *Strophomena*, *Leptaena*, *Orthis*, *Pentamerus*, *Spirigera*, *Lingula*, etc., si abondantes dans les schistes dévoniens et finalement par l'absence presque totale de Polypiers, avec la seule exception des deux échantillons cités. Tous ces arguments nous porteraient donc plutôt à séparer les grès et quartzites avec les schistes subordonnés de la montagne de San Mamede comme Silurique supérieur, dont ils formeraient le toit, en ne laissant dans le Dévonique que la formation schisteuse à Spirifers de San Julião à Alegrete et Senhora da Esperança, avec les masses de calcaire et les quartzites qui les accompagnent.

Toutefois, en face des considérations exposées, on pourrait en juger autrement, et l'opinion la plus plausible est peut-être que ces couches forment un groupe de passage entre le Silurique et le Dévonique, appartenant pourtant au premier système. Cette hypothèse est d'autant plus admissible que, d'après les observations que nous avons faites, tant dans la serra de Portalegre que dans les environs d'Amendoa, il existe évidemment une discordance entre le Dévonique et les couches du Silurique supérieur incontestable, de sorte que ces deux systèmes sont indépendants l'un de l'autre et séparés naturellement par un intervalle de dénudation.

En tout cas, la différence manifeste entre la faune des quartzites de la montagne de San Mamede, comparée à celle des quartzites du Bando dos Santos, qui a d'ailleurs un facies silurien nettement accentué, fait voir que les premiers ont été formés antérieurement à ces derniers, par conséquent il est aussi raisonnable de supposer qu'ils appartiennent à des zones différentes.

D'un autre côté, l'analogie des caractères lithologiques de ce groupe gréseux de la montagne de San Mamede avec les couches culminantes du Silurique supérieur d'Amendoa, montre qu'il y a eu une succession parfaite dans la formation des dépôts dans l'une et l'autre localités, ce qui rend très plausible la liaison des deux systèmes Silurique et Dévonique dans notre pays. Il paraît que ces dépôts se formèrent pendant une phase d'affaissement du fond de la mer, qui fit déplacer graduellement le rivage vers l'ouest.

Mais, que l'on considère l'assise de quartzites de la serra de San Mamede comme appartenant au toit du Silurique, ou qu'on la considère comme représentant un terme intermédiaire du système Silurique au Dévonique, ou enfin que cette assise forme la base du Dévonique, on ne peut nullement méconnaître son indépendance comme un membre distinct dans la série stratigraphique, soit par rapport aux schistes coblentziens qui la surmontent, soit relativement aux schistes gothlandiens à Graptolites, qui lui sont sous-jacents.

De la sorte, avant que furent établies les conditions biologiques qui amenèrent la fixation de la faune coblentzienne dans nos latitudes, le terme de la période silurique dans le bassin du Tage fut signalé par des mouvements du sol auxquels est due la transgressivité des quartzites sur les dépôts gothlandiens formés auparavant et disloqués, et le changement de la faune s'est opéré avant l'implantation définitive de la faune coblentzienne qui, très antérieurement (comme nous le montrerons plus loin), avait déjà fait son apparition dans le Bas Alemtejo qu'elle avait temporairement envahi, sans toutefois pouvoir se fixer alors dans ces parages.

Plissement des quartzites de la montagne de San Mamede.— Le plissement des quartzites de la montagne de San Mamede correspond à la flexion en fond de bateau des mêmes couches aux environs de Carvoeiro, dans le grand affleurement du Silurique de la Basse Beira, où ils couronnent aussi quelques collines plus élevées dans le milieu du Gothlandien (Bando dos Santos, cote 641, Bando de Codes, cote 605, et chapelle de San Gens, cote 393).

Couches de la pente orientale de la montagne de San Mamede.— En montant la pente orientale de la montagne de San Mamede, on passe subitement des schistes fins coblentziens à une assise de quartzites en lits minces, alternant avec des schistes et quelques strates de grauwacke fine, de teintes variées, gris, blanc, jaune et violet. Au-dessus de ce faisceau de couches, en apparence concordantes avec les schistes précédents, viennent d'autres schistes et quartzites, ces derniers formant à intervalles de gros bancs.

La chapelle de San Mamede, sur la pente occidentale de la montagne, est assise sur des rochers de quartzite, ou plutôt d'un schiste micacé, durci, contenant beaucoup de quartz, les paillettes de mica s'accumulant dans de certains plans et formant par leur réunion de minces pellicules. Ce schiste quartzeux passe en haut à des masses de quartzite bien stratifié, que l'on trouve à une centaine de mètres au S.W. de la chapelle.

Cette couche appartient sans doute à l'assise de schistes de Gáfete, ayant subi un métamorphisme mécanique, qui lui donna un clivage perpendiculaire à la stratification. On voit, en effet, les plaquettes de quartz, interstratifiées dans le schiste, froncées par la compression et coupées transversalement par les plans de schistosité.

En descendant de la chapelle de San Mamede vers le S.E., on observe une bonne section des couches, qui forment le versant nord de la montagne. Ce sont des schistes à teintes variées, jaune, rouge et violet, qui donnent la couleur dominante du sol; d'autres schistes gris foncés et blancs, mous, se débitant en menus morceaux; d'autres enfin qui forment le plus ordinairement des masses compactes comprenant quelques strates de quartzite dur et de grès fin. Vers le bas de la série, c'est-à-dire en approchant de la ferme de San Mamede, on aperçoit de puissantes couches de grauwackes schistoïdes à grain fin, de couleur rouge ou violette, subordonnées aux schistes.

Composition différente du Silurique dans les deux flancs du synclinal.— La composition du Silurique dans les deux flancs du synclinal de la serra de Portalegre n'est pas la même. Du côté occidental on voit au nord d'Alegrete la succession des assises de ce système, bien que très incomplète et avec une faible puissance, depuis les grès à *Bilobites* de la base jusqu'aux quartzites culminants de ce système, tandis que du côté oriental l'Ordovicien n'est représenté que par les quartzites à *Bilobites* de Marvão et d'Esparoeiras qui se frayèrent un passage à travers les schistes tendres du Gothlandien, toutes les assises de l'Ordovicien moyen et de l'Ordovicien supérieur ayant disparu par laminage. Par suite du plissement, les strates rigides des quartzites se sont brisées longitudinalement et présentent une crête rectiligne, formée par un pli dans l'axe duquel se trouve un petit lambeau de ces schistes que la dénudation a respecté et qui est complètement entouré par les quartzites.

On doit attribuer à une cause semblable l'apparition sporadique du pointement du Silurique inférieur (schistes à *Homalonotus Oehlerti*) sur le versant est de la montagne de San Mamede, il se montre au milieu des quartzites culminants du Gothlandien, que la dénudation a aussi mis à découvert. Ces schistes ne sont pas visibles sur la bande ordovicienne de la serra do Pico (Alegrete), où ils sont cachés par suite du laminage que les couches ont subi lors de leur mouvement ascensionnel en traversant les couches plus modernes.

Dans le flanc oriental du synclinal les couches du Silurique supérieur montrent aussi des caractères différents de ceux du Gothlandien du flanc occidental.

Dans la colline d'Urre, au N.W. d'Escusa, le Silurique supérieur est représenté par des schistes et grauwackes maclifères dans quelques strates et dans d'autres ne montrant pas ce caractère, les cristaux de chialtolite n'arrivant pas à s'y développer.

Dans la serra de Salada, au nord de Porto da Espada, la succession des strates est du haut en bas la suivante. Immédiatement au-dessous de la formation schisteuse dévonienne, de Porto da Espada, on observe une couche de quartzite fin chargé de petits cristaux cubiques de pyrite de fer, se divisant en fragments prismatiques. Ce quartzite est blanc à l'intérieur et prend extérieurement une coloration brun rouge foncé, due à la suroxydation du fer qu'il contient, dans une profondeur plus ou moins grande à partir de la surface et qui embrasse quelquefois toute l'épaisseur des fragments. Après ce quartzite vient un schiste peu fissile à teinte violette, alternant avec un quartzite de couleur verdâtre dans quelques strates.

En poursuivant cette coupe vers l'est, on trouve dans le col de la serra un grès à ciment ferrugineux très abondant, par places d'une couleur noire, le sol prenant une teinte rougeâtre sombre, par suite d'un commencement d'altération des débris du grès qui le couvrent.

En descendant vers Gallegos on traverse au-dessous de ces couches une assise de schistes et quartzites alternants, de caractères semblables aux roches précédentes; il vient ensuite une autre assise très puissante de schistes gris et de grauwackes, qui prédominent et passent quelquefois aux quartzites. Cette assise comprend plusieurs lentilles de schiste noir ampéliteux, souillant fortement les doigts et contenant quelques nodules ellipsoïdaux de 1 à 2 décimètres de plus grand axe, qui renferment des moules de fossiles montrant surtout les cavités laissées par la destruction des moules d'*Orthocères*.

Grès de la serra Fria.— Un peu plus au S.W., le faite de la serra Fria est formé par une couche épaisse de 8 à 10 mètres, d'un grès très dur et tenace, de couleur verdâtre, en quel-

ques points blanc avec des mouchetures ocracées, jaunes et rouges, par commencement d'altération du ciment ferrugineux. Ce grès est fossilifère et, en quelques points, très chargé de fossiles lesquels sont très difficiles à obtenir en bon état, particulièrement à cause de la nature de la roche, dans laquelle les moules sont solidement enchassés. Il est en partie très fin et passe au quartzite. Les fossiles qu'il contient sont surtout des moules de Trilobites, des genres *Homalonotus*, *Cryphaeus*, *Proetus* et *Calymene*, en outre d'autres espèces: *Cornulites serpularius*, *Avicula laevis*, *Capulus* cf. *compressus* et de plusieurs Brachiopodes. Sans la moindre hésitation, il correspond donc aux grès blancs très fossilifères de la montagne de San Mamede.

Cette couche se superpose immédiatement en stratification concordante à une strate de schiste très fin et mou, peu fissile, irrégulièrement micacé, se débitant en morceaux allongés et contenant quelques nodules argilo-siliceux et des fossiles disséminés, savoir: des moules et empreintes d'*Ichthyodorulites*, d'*Orthoceras*, de *Monograptus*, un Polypier et des petites bivalves appartenant au Silurique supérieur.

Ce schiste est gris foncé et, par altération, il prend une coloration rougeâtre. Les fossiles furent rencontrés dans une lentille noire, ampéliteuse, où le schiste est plus fin et plus fissile. Cette strate de schiste fossilifère paraît intercalée dans l'assise des quartzites.

A 800 mètres au N.W. du signal géodésique de serra Fria, reposant en apparence sur les couches précédentes, passe un schiste téglulaire, très micacé, rayé de blanc sur la tranche des strates par de minces lames de quartzite interstratifiées. Ce schiste ressemble beaucoup aux schistes de Gáfete, mais nous ne croyons pas qu'il appartienne au même niveau.

Sur la pente occidentale de la serra de Marvão, on observe une couche de quartzite ou plutôt de grès dur que l'on ne découvre pas au sud de la rivière d'Aramenha, bien qu'elle soit sur le prolongement des schistes gothlandiens d'Esparoeiras. Cette couche de grès est comprise dans l'assise de schistes et grauwackes avec quelques lits de quartzite subordonnés que l'on traverse en descendant de Marvão vers le N.W. après avoir traversé la bande de quartzites ordoviciens.

Cette assise est la même qui forme le versant oriental de la serra Fria et qui traverse, au delà du pont de Portagem, la route internationale de Portalegre à Valencia d'Alcantara. Elle est sous-jacente aux schistes de la colline d'Urre (3,5 kilomètres à l'W.N.W. de Marvão) qui deviennent maclifères au voisinage du granite porphyroïde, aussi bien là que dans les environs de Castello de Vide. Ces schistes, ondulés en quelques points en des courbes gracieuses, doivent correspondre synchroniquement aux schistes de Gáfete dans le flanc occidental du synclinal, montrant pourtant ici un facies différent.

Lentilles graptolitiques. — A 2.500 mètres au N.W. du signal d'Esparoeiras, sur la route internationale dont nous avons parlé tout à l'heure, on a découvert des empreintes de Graptolites. Près de là, une autre tache ampéliteuse renferme des concrétions dures, à formes irrégulières qui, au lieu des fossiles, contiennent des cristaux d'andalousite, le schiste carbonneux se montrant, en outre, criblé à la surface par des cavités provenant de la destruction de cristaux de même nature. D'autres rognons ellipsoïdaux contiennent des moules d'Orthocères.

Quartzites de Portagem. — Sur le flanc droit de la rivière d'Aramenha, au lieu dit Portagem, passe une couche de quartzite d'une puissance de 15 mètres, qui est comprise dans

l'assise de schistes d'Urre. Ce quartzite est fin, micacé, d'une couleur foncée, gris ou noir, et traversé par des veinules de quartz blanc.

Quartzites d'Alegrete.—Du côté opposé du synclinal, à 750 mètres au N.E. du fort d'Alegrete, on voit des quartzites bien stratifiés, formant une couche épaisse de 20 mètres, à l'est de laquelle se trouve une suite de couches de schiste gris sans fossiles, ayant des lits de quartzite intercalés et quelques lentilles de schiste ampéliteux noir, dans lequel on a découvert des Graptolites. Cette assise, d'une puissance de 200 mètres environ, correspond à celle qui constitue le versant oriental de la colline de Canchos dos Altos, et très probablement aussi aux schistes de Gáfete. Au-dessus de ces couches vient une succession de strates de quartzite et de grès durs très fossilifères, qui appartient assurément au même niveau que les quartzites de la montagne de San Mamede.

Parallélisme du Silurique supérieur dans les deux flancs du synclinal.—La correspondance que nous croyons pouvoir établir entre les schistes à Graptolites du Silurique supérieur et les quartzites qui les surmontent dans chaque flanc du synclinal de la serra de Portalegre, est indiquée sur le tableau suivant, où les couches sont disposées de haut en bas :

SYNCLINAL DE LA SERRA DE PORTALEGRE

Flanc occidental	Flanc oriental
Grès et quartzites avec quelques schistes intercalés, peu fossilifères, du sommet de la montagne de San Mamede et de la crête de la serra de Caleira.	Manque
Grès et quartzites très fossilifères, alternant avec des schistes en minces lits de la pente septentrionale de la montagne de San Mamede.	Grès et quartzites des sommets des serras de Salada, de San Braz et de la serra Fria.
Schistes de Gáfete et de Revelladas, avec des lentilles graptolitiques.	Schistes d'Urre et schistes et grauweekes du versant occidental de la colline de Marvão et du versant est de la serra de Salada et serra Fria, renfermant des lentilles graptolitiques.
Schistes grauweekes et quartzites blancs renfermant des lentilles de schiste noir avec Graptolites, se dirigeant d'Alegrete vers le pied occidental de la montagne de San Mamede, près de Cantarinhas.—Cette assise doit correspondre aux grauweekes et quartzites de la serra da Murta (Sobrido).	Manque

GRAND AFFLEUREMENT DE LA PROVINCE DE L'ALEMTEJO

Etendue de l'affleurement.— Le grand affleurement silurien de l'Alemtejo repose d'un côté sur le Précambrique, de l'autre sur l'Archaïque et embrasse une surface étendue dans les districts de Beja, d'Evora et de Portalegre. Son existence ne fut pourtant reconnue qu'après la découverte que nous avons faite à Barrancos de divers gisements fossilifères, ceci après le voyage de quelques jours fait en 1878 dans la province de Huelva en compagnie de notre illustre collègue de la Commission de la carte géologique d'Espagne, Mr. Joaquin Gonzalo y Tarin, alors officiellement chargé de l'étude de cette province.

Comme à cette occasion nous avons découvert dans le site nommé Prado de Pero Gil, à 6 kilomètres au S. E. de Barrancos, aux confins de l'ancienne Contenda de Moura, divers exemplaires de Graptolites, cette trouvaille m'a conduit à suivre les mêmes couches dans le prolongement du N. W. jusqu'au grand affleurement tertiaire lacustre du bassin hydrographique du Tage, au-dessous duquel disparaissent, à l'occident d'Aviz, leurs derniers affleurements.

Les exemplaires de Graptolites furent trouvés dans un schiste ampéliteux provenant des déblais d'un puits antérieurement creusé lors d'une recherche erronée pour charbon.

En poursuivant ces études que je fus obligé d'interrompre à plusieurs reprises, je découvris aux environs de Barrancos différentes bandes fossilifères dont quelques-unes peuvent se reconnaître sur toute l'étendue de l'affleurement.

Caractères spéciaux.— Mais à Barrancos on voit un ensemble de couches qui, à l'intérieur du territoire portugais, ne se découvre en aucun autre point, du moins pas avec les mêmes caractères; aussi sans le moindre doute est-ce à Barrancos qu'on peut le mieux étudier le Silurique du Bas Alemtejo.

L'examen d'une coupe, qui traverse perpendiculairement ces couches et celles qui se succèdent verticalement, pourra servir de base à la description de cet affleurement si important de notre système silurique.

Coupe du S. W. au N. E. à travers le grand affleurement silurien de l'Alemtejo commençant à une demi-lieue à l'occident de Barrancos à la ferme d'Eiras Altas, passant au nord de ce bourg, et traversant la serra Colorada va se terminer à la frontière à Volta dos Nogaes. (Pl. VIII, profil n° 2.)

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Grauwackes et schistes supérieurs

1. Distance horizontale 880^m.— Assise très épaisse de grauwackes et de schistes peu micacés, de couleur grise ou verdâtre, en strates alternantes, en partie minces; les grauwackes forment de gros bancs compacts à grande uniformité de composition et d'aspect.¹ Exceptionnellement les schistes sont fissiles, se divisant en lames très minces.

¹ Par la ressemblance des caractères lithologiques de ces couches (prises en bloc) et de celles du Cambrique inférieur (Précambrique) de la Beira, elles ont été confondues et désignées par la même teinte conventionnelle dans la

La ferme d'Eiras Altas repose sur des schistes que l'on coupe vers le levant sans interruption sur 150 mètres de distance. Ensuite on passe à un groupe de schistes et de grau-wackes en couches alternantes de peu de centimètres d'épaisseur.

Dans le passage au numéro suivant, c'est-à-dire à la base de l'assise, quelques strates de schiste, tout comme des grau-wackes renferment des moules de tiges de végétaux en menus débris, roulés et quelquefois fortement atténués et se trouvent en partie couvertes par une substance talqueuse, légèrement verdâtre, comme celle qui remplit ordinairement les cavités laissées par la destruction des Graptolites.

Les strates suivent dans les directions N. W. à N. 60° W. et s'inclinent de 50 à 70° sur le quadrant de S. W.

Dans le tracé que suit la coupe, les schistes forment la roche dominante; mais en traversant à quelques kilomètres, au sud, l'ancienne Contenda de Moura on voit, au contraire, que ce sont les grau-wackes qui prédominent. Malgré la difficulté, ou mieux l'impossibilité, de déterminer l'épaisseur de cette assise, parce que les couches diffèrent beaucoup de caractère dans le sens horizontal et sont visiblement répétées par plusieurs plis isocliniques, les voûtes ayant disparu par l'érosion, on reconnaît, sans hésitation, qu'elle est de plusieurs centaines de mètres, la même assise étant supérieure à la série des couches qui se développe vers le levant sur laquelle elle repose en stratification concordante.

A première vue le développement différent que montre la série de couches représentées aux numéros suivants de la coupe, qui embrasse successivement une plus grande largeur allant vers le N. W. de Barrancos à Noudar, fait penser que les deux groupes de couches sont indépendants, et qu'il existe une transgression ou discordance qui sépare l'assise des schistes et des grau-wackes, que nous avons décrite, des couches qui lui sont inférieures; en tout cas, l'apparition dans ces dernières de quelques lits de grau-wackes, tout comme celle de débris de tiges de végétaux, fait voir qu'elles appartiennent au même système géologique.

L'assise des schistes et des grau-wackes se développe à l'occident de la ferme d'Eiras Altas sur la route de Barrancos à Santo Aleixo, jusqu'au sommet da Gata (cote 297) à 8,5 kilomètres de distance horizontale à l'ouest de Barrancos.

On voit qu'elle est ici principalement composée de schistes gris, comprenant quelques couches finement sableuses et micacées, verdâtres, passant aux grau-wackes qui leur sont subordonnées, et de quelques conglomérats, mais les schistes dominant beaucoup sur les grau-wackes. Ces schistes se distinguent bien de ceux de Barrancos par l'absence presque complète du mica et de ceux de Russiana qui renferment des Graptolites, parce qu'ils ne contiennent pas les minces lames quartzeuses et qu'ils ne sont pas téglulaires.

Horizon supérieur des Graptolites

2. Dist. hor. 300^m.— Schiste fin, gris rougeâtre, finement micacé, avec des intercalations de beaucoup de lits minces et peu réguliers de quartzite et de grau-wacke. Au milieu de cette assise apparaît une couche irrégulière ou masse lenticulaire de 10 mètres d'épaisseur

première carte géologique du pays publiée en 1876. De même il y a une analogie très notable entre les caractères physiques de ces couches et de quelques-unes du Culm, et il serait quelquefois presque impossible de les distinguer quand elles sont en contact, s'il n'y avait la faune spéciale qui caractérise celles du Culm.

et ne montrant, que par places, des vestiges de stratification, d'une grauwacke dure, blanchâtre, à structure prismatique par suite des nombreuses diaclases qui la divisent et qui renferme des restes très atténués, de tiges de végétaux conjointement avec des petits morceaux de schiste gris foncé. On avait fait dans cette couche la recherche d'une mine de cuivre. Les strates suivent les directions N. 35 à 60° W. avec inclinaisons de 50 à 70° vers le S. W. et sont aussi verticales en quelques points.

En établissant la liaison avec le numéro suivant, il y a une couche dure de quartzite blanchâtre dans laquelle la stratification est plus distincte et qui est composée en partie de lits de peu de centimètres, séparés par des bandes de schiste quartzeux également blanc. Cette couche s'amincit en coin et disparaît subitement à peu de distance. Elle est suivie d'un schiste fin, gris clair, en partie violet ou rougeâtre, alternant avec des lits très minces de quartzite et de lydite noire, ayant généralement moins de 1 centimètre d'épaisseur et atteignant, exceptionnellement seulement, 2 à 3 décimètres.

Dans la direction de la coupe ce faisceau de strates se termine dans le haut par une couche ou mieux par une lentille de schiste ampéliteux noir, dans lequel nous avons découvert d'abondants exemplaires de Graptolites accumulés dans un lit de 1 à 2 centimètres d'épaisseur, lequel passe au fond du ravin da Coitada, à 600 mètres à l'ouest du signal géodésique du Calvario.

En ce point on a découvert les espèces suivantes:

Monograptus lobiferus McCoy.

» *Jaekeli* Perner.

» *latus* McCoy.

» *Nilssoni* Barr.

» *Becki* Barr.

» *colonus* Barr.

» *triangulatus* Harkn.

Monograptus cf. *priodon* Bronn.

» cf. *Lamarmorae* Menegh. sp.

» cf. *mutuliferus* Menegh. sp.

» cf. *vomerinus* Nicholson.

Diplograptus palmeus Barr.

Cyrtograptus cf. *Murchisoni* Carr.

Retiolites Geinitzianus Barr.

La superficie de ce lit fossilifère se présente plissée par suite des pressions qu'il a subies. Ces pressions s'exerçaient obliquement aux plans de la stratification, aussi elles déformèrent les empreintes des Graptolites qui ordinairement se montrent raccourcies dans le sens longitudinal et allongées latéralement, ce qui rend leur détermination très difficile et incertaine. On reconnaît cependant que le nombre des espèces est relativement faible, tandis que celui des individus est réellement extraordinaire.

Le schiste qui alterne avec la lydite, est micacé et en partie quartzeux et très fissile, il se divise en lames très minces de moins de 1 millimètre d'épaisseur.

La lydite est coupée de petites veines, quelquefois très minces et très irrégulières, de quartz blanc qui s'entrecroisent de mille façons et, tout comme le schiste, elle renferme des empreintes et des moules de Graptolites, dont quelques-uns ont conservé leur forme.

La lydite s'est probablement formée par un procédé chimique, la silice se précipitant à l'état gélatineux ou au moins à un état de grande division. Elle peut avoir une origine minérale provenant de l'intérieur du globe, et dans ce cas elle a pu venir en dissolution dans les eaux de sources thermo-minérales, ou elle peut avoir eu une origine organique, végétale et peut-être même aussi animale, en admettant dans ce cas que ce sont les propres Graptolites qui, par leur destruction, ont fourni les éléments nécessaires à la formation de cette roche. En

effet, certaines strates du schiste siliceux montrent, en outre des empreintes déterminables de Graptolites, des débris de ces organismes qui se dessinent sous forme de traits blancs sur le fond noir de la roche.

La coloration noire de la lydite, tout comme celle des schistes, peut s'attribuer à la grande accumulation de végétaux marins qui se sont développés et amassés au fond de la mer, lorsque ces dépôts se sont formés.

Ce lit à Graptolites représente une bande qui, avec de petites interruptions, se dirige vers Noudar, passant à l'est du confluent des deux rivières de Múrtega et d'Ardilla. De là, passant sur un court espace en territoire espagnol, il continue vers le nord, passe à l'est du signal géodésique de Mentiras qui se trouve à la frontière, puis il traverse le territoire portugais à l'est de Granja, pénètre une deuxième fois en Espagne, réapparaît à la frontière portugaise et franchit le Guadiana au S.E. de Capellins, d'où il se dirige sur Senhora do Rozario et sur Alandroal où il est interrompu par l'affleurement de l'Archaïque d'Estremoz.

En tout cas, il est probable que la bande continue vers le N.W., et qu'elle est représentée par le gisement fossilifère de Villa Viçosa, qui est situé tout près de la limite de cet affleurement, et qu'elle traverse la route d'Estremoz à Portalegre peu au delà de la limite de l'Archaïque se prolongeant encore vers le N.W., mais nous n'avons pas pu la suivre plus loin dans cette direction.

3. Dist. hor. 120^m.—Ce numéro comprend deux groupes de strates. Le premier succède immédiatement à la lydite de Graptolites et se compose de schistes argileux grossiers et irrégulièrement micacés, de couleur gris-verdâtre, à aspect très semblable aux schistes du versant occidental de la Serra Colorada (n° 12 de la coupe), quelques-unes des strates ayant dans la surface plusieurs marques suborbiculaires de divers diamètres (1 à 5 millimètres) d'un gris foncé, qui représentent peut-être des trous verticaux d'Annélides remplis par de la matière bourbeuse. Cette assise occupe de 50 à 60 mètres de largeur dans la direction de la coupe; elle est suivie d'un deuxième groupe de strates, ayant approximativement le même développement, de schistes fins, tégalaires, avec beaucoup de lits minces de grau-wacke micacée, verdâtre et grisâtre, dont l'un renferme de très petits débris de tiges de végétaux et quelques lits de quartzite grossier, de couleur grise, formant une couche de 4 mètres d'épaisseur. A l'est de ce quartzite, il y a des lits minces et durs de quartzite ou de grau-wacke, intercalées dans un schiste fin, dans lequel on a découvert un exemplaire de *Nereites* cf. *pugnus* Emm. à 500 mètres à l'ouest du signal du Calvario. La direction des strates est N. 35° à 60° W. et l'inclinaison est de 40 à 70° sur le S.W. et sur le N.E.; il y a également quelques lits verticaux.

4. Dist. hor. 190^m.—Schistes grossiers, très micacés, de couleur gris foncé et verdâtre, à stratification en général peu distincte, et dans lesquels on n'a pas découvert de fossiles. Ces schistes sont les mêmes qui vont passer à l'ouest de Noudar, et par leur aspect ils ressemblent à quelques-uns de l'assise supérieure du numéro précédent. Ils ont les mêmes directions N. 35° W. à N. 60° W., et ils ont des inclinaisons très fortes, de 70 à 80°, vers l'est et vers l'ouest et parfois sont même verticaux.

5. Dist. hor. 100^m.—Schistes gris et vert clair, micacés, en partie fins, avec quelques lits intercalés de quartzite gris et de lydite noire, subordonnés à des schistes blancs, micacés, avec empreintes de *Monograptus* difficilement déterminables.

Les espèces suivantes ont été recueillies dans la partie supérieure de l'ensemble des strates fossilifères:

Monograptus triangulatus Harkn.
Rastrites peregrinus Barr.

Diplograptus bellulus Törnq.

Les couches ont les directions N. 30° W à N. W. et s'inclinent de 60 à 80° sur l'occident, et quelques-unes arrivent même à être verticales.

Calcaires et diabase

6. Dist. hor. 220^m.—Calcaire siliceux compact, à parties spathiques, de couleur gris foncé, avec quelques lits intercalés de schiste, de sidérite (chalybite) de couleur blanc-jaunâtre, de brèche verdâtre renfermant plusieurs fragments du calcaire et de sidérite, et diabase. Cet ensemble forme une masse ellipsoïdale, de 400 mètres de longueur, qui correspond au sommet du Barrocal, à 750 mètres à l'W.N.W. de l'église de Barrancos, en interrompant à cet endroit la bande des schistes à Graptolites, précédemment décrite.

Cette masse de calcaires est liée longitudinalement à plusieurs autres qui occupent approximativement le même niveau et qui forment avec elle, au milieu des schistes, comme une espèce de colossal rosaire.¹

Les strates de calcaire du massif de Barrocal sont pliées dans un petit synclinal qui correspond au ravin du même nom, montrant une inclinaison bien plus faible dans la branche occidentale.

En quelques points, on ne découvre pas la stratification des calcaires, mais ils sont nettement stratifiés en d'autres points, et forment même des lits très minces qui leur donnent un aspect schistoïde.

La direction qui s'observe dans les strates de la masse traversée par la coupe est, comme dans les couches précédentes, N. 35 à 60° W., avec des inclinaisons de 30 à 55° vers le N.E. et vers le S.W.

A 650 mètres au N. 50° W. du signal du Calvario, un calcaire compact blanc, en lits très minces, de quelques centimètres à peine, alterne avec la brèche calcaire qui forme des strates plus épaisses, mais les uns et les autres étant pliés forment une voûte parfaite et sont traversés par un filon de roche éruptive en direction voisine de E.-W.²

Intercalées dans les lits de calcaire, apparaissent des lames de quelques millimètres d'épaisseur d'une roche verdâtre paraissant être la même que celle qui forme le ciment de la brèche. Au contact avec les parois de la fente par laquelle la roche éruptive s'est injectée, le calcaire est profondément altéré, passant même par gradations à la roche éruptive franchement cristalline.

¹ Ces différentes masses de calcaire auxquelles est associée en divers points une roche éruptive, principalement de la diabase, ont été grossièrement indiquées dans la carte géologique du royaume, par la teinte conventionnelle de cette dernière roche.

² Cette roche, en bien des points de texture franchement cristalline, est probablement une diorite, d'après le professeur Kenngott qui l'a examinée, parce qu'elle se compose essentiellement de feldspath oligoclase, en quantité très prépondérante, et d'amphibole verte. Mon collègue pétrographe de la Commission géologique, Mr. V. Souza Brandão, ayant examiné plusieurs échantillons de la même provenance, les a pourtant classifiés comme diabase.

On voit donc que la diabase est de date postérieure au calcaire et à la brèche. Comme d'autre part nous savons que la plus grande partie des mines de la région (ou du moins les plus importantes) sont près des calcaires ou dans les calcaires, les différents gisements suivant de préférence la ligne de contact de cette roche avec les schistes à Graptolites qui les accompagnent, et, comme en outre, on n'a jamais découvert la roche éruptive séparée des calcaires, il est plausible de supposer que l'émission métallifère du cuivre, qui a eu lieu sur une large échelle dans cette contrée, est liée à une éruption de diabase.

C'est précisément au prolongement nord-ouest de la grande masse de calcaire de Barrocal, traversée par la coupe et liée à elle, que se rencontre un schiste fin, tendre, gris-verdâtre, auquel est subordonné un autre schiste, divisible en fragments irréguliers, plus ou moins allongés, qui, tout comme quelques-uns des lits de lydite qui l'accompagnent, a fourni diverses espèces de Graptolites.

Du côté sud-est de la même masse de calcaire et dans son prolongement, l'espace qu'elle devrait occuper est aussi rempli par un groupe de strates minces, alternantes, fortement ondulées, de schiste argileux et lydite, dans lesquelles on a découvert un exemplaire de *Monograptus lobiferus*. Même près de la masse de calcaire, à 400 mètres au N. 20° W. du signal du Calvario, on a rencontré un nodule renfermant un bel exemplaire (l'unique que nous possédions) de *Cardiola partita* Barr. (*C. fortis* Barr. var.). On reconnaît par conséquent que la formation de calcaire est locale et contemporaine du dépôt des schistes à Graptolites.

Ainsi que nous l'avons dit, le calcaire est, par endroits, siliceux et très dur; en d'autres points il est plus pur, compact ou subcristallin.

Le calcaire siliceux établit une transition entre le calcaire non modifié et les silicites qui résultent de la substitution plus ou moins complète du carbonate de chaux par la silice des sources thermales, comme les geysers.

Intérieurement, il a une couleur bleu foncé et est traversé par plusieurs veines irrégulières de spath calcaire blanc, mais par suite de l'altération superficielle, il prend une couleur ocreuse, faisant même transition à la sidérite, et, par décomposition de cette dernière, fait transition à l'oxyde de fer avec lequel il est intimement lié. Enfin, dans d'autres parties, ce calcaire forme une transition à une brèche, à laquelle on ne peut pas manquer d'attribuer une origine sédimentaire, mais qui a été certainement formée en conditions anormales. Cette brèche est principalement composée de fragments de calcaire siliceux compact, de calcaire sableux et de calcaire ocracé (sidéro-calcite), enveloppés dans une pâte verte ou ocreuse.

Le calcaire, la sidérite, la brèche, l'oxyde de fer et en quelques points aussi la diabase forment une bande de largeur très irrégulière et plusieurs fois interrompue qui se dirige de Barrancos vers le N.W. jusqu'au delà de la ferme de Coitadinha, à 4 kilomètres à l'est du confluent de la rivière de Múrtega avec celle d'Ardilla.

La formation des brèches qui accompagnent les calcaires signifie l'existence de forts courants qui empêchaient en ces points le dépôt de sédiments fins. Mais à certaine distance des points où les eaux étaient fortement agitées, ou dans les intervalles dans lesquels ces courants étaient moins forts et entraînaient les sédiments fins, les débris de la flore marine d'alors ont également pu se déposer.

L'apparition sporadique des calcaires en masses lenticulaires passant subitement aux schistes à Graptolites, au milieu desquels ils apparaissent intercalés, suggère immédiatement

l'idée qu'ils ont été formés d'une façon analogue à celle des récifs des mers actuelles. Mais l'argument qui donne le plus de force à cette hypothèse est que dans la ferme de Russiana, à un niveau correspondant à celui de ces masses de calcaire, apparaissent, au milieu du schiste rayé, auquel est subordonné le schiste à Graptolites, divers lits minces ou mieux petites masses lenticulaires de calcaire schistoïde, dont quelques-unes sont chargées de Polypiers et de Crinoïdes. Ces lits occupent précisément le même niveau géologique que ceux dans le prolongement du S.E., au levant de la serra Colorada (en particulier à 650 mètres au N. 65° E. du signal du haut de cette colline, près de la ferme de Concha Polida, n° 14 de la coupe) où l'on a trouvé des fossiles du Dévonique inférieur appartenant aux espèces qui caractérisent cet étage dans la serra de Portalegre.

Cette strate fossilifère est intercalée, avec les lits de calcaire, dans le schiste rayé à Graptolites, de telle manière qu'il n'est pas possible de les séparer stratigraphiquement.

A ce propos, il est bon de remarquer que les schistes à Spirifères du Coblentzien de la serra de Portalegre sont accompagnés de grandes masses de calcaire, qui se présentent isolément sur le même horizon, et dont quelques-unes atteignent d'énormes dimensions.

Dans les masses de calcaire cristallin, on n'a pas découvert de vestiges de fossiles, ce qui ne doit pas nous étonner, parce que l'on sait que dans les récifs coralliens actuels l'infiltration de l'eau à travers la masse du récif fait déposer le calcaire dans les pores et dans les fentes, par un procédé semblable à celui de la formation des stalactites, les mêmes cavités étant remplies par le sable calcaire produit par l'action érosive des vagues sur la surface des mêmes récifs. Ainsi se consolide le calcaire, la masse corallienne perdant la structure organique et prenant intérieurement le caractère cristallin, pareillement aux calcaires anciens.

Au contraire, quand le calcaire forme des lits minces au milieu des schistes et se trouve altéré, on reconnaît qu'il est constitué intégralement de restes de fossiles empâtés dans la roche, principalement de Crinoïdes et de Polypiers qui, toutefois, ne se reconnaissent pas dans la partie inaltérée de la roche.

D'autre part, le passage subit des masses de calcaire, en général bien délimitées, aux schistes gris et noirs à Graptolites est également facile à comprendre, parce que l'eau bourbeuse à laquelle ceux-ci doivent leur formation, empêche précisément l'accroissement des coraux. Avec tout cela, ces masses ne pourraient se former qu'à de certaines profondeurs et dans les endroits où les courants marins charriaient avec abondance l'aliment nécessaire à l'accroissement des coraux, ce qui arrivait dans ces localités, et manquait dans tous les autres points de la région silurienne.

L'association intime et sans doute la contemporanéité d'origine de roches avec des caractères si distincts ne peut s'expliquer, d'après nous, que par l'intervention de puissantes sources minérales, magnésiennes et ferrugineuses, surgissant du fond de la mer silurienne quand les récifs coralliens étaient en voie de formation, leurs effets se combinant avec ceux des courants qui transportaient les sédiments pour les schistes à Graptolites et pour les grès.

Ainsi que nous l'avons dit, les calcaires ne forment pas une couche continue à extension considérable; au contraire, ils sont interrompus ou morcelés dans le sens longitudinal et forment des masses isolées qui ne correspondent pas toutes rigoureusement au même niveau. Ainsi, la formation des récifs coralliens a duré pendant longtemps, s'interrompant en plusieurs points, alors qu'elle continuait sans interruption en des points voisins.

La masse des calcaires de Barrocal que la coupe traverse est, considérée isolément, la plus importante de toutes; toutefois, c'est près de la ferme de Coitadinha, entre les rivières d'Ardilla et de Múrtega, que les calcaires montrent le plus de développement.

Au contraire, au levant de Barrancos cette roche est à peine représentée par de minces lits irréguliers qui s'observent en plusieurs points, notamment à 2 kilomètres au N.E. de cette ville et également près de la ferme de Volta dos Nogaes, où un calcaire à couleur verdâtre, devenant extérieurement brun-marron et ocracé, est coupé de veinules de fer spathique. Toutefois ces affleurements n'offrent pas de continuité et accompagnent toujours des taches ampériteuses à Graptolites.

Vers le N.W. du coteau de Barrocal les calcaires se divisent en deux branches principales séparées par un intervalle de schistes; mais près de la ferme de Coitadinha où ils forment la plus grande masse, qui mesure 1.250 mètres de longueur, les deux branches se réunissent à nouveau.

Au S.E. de ce coteau elles disparaissent subitement, manquent sur un intervalle de 700 mètres et sont seulement représentées par quatre petites masses isolées, associées à de la diabase, qui vont jusqu'à 1.100 mètres au S.S.E. de Barrancos sur la frontière.

Au col de Zambujeiro, à 800 mètres au S. 53° E. du signal de Perdigão, on voit du côté oriental du chemin de Barrancos à Noudar une petite masse de calcaire compact, gris-blanchâtre, coupé de veines de spath calcaire blanc, en partie bréchiforme et passant fréquemment à l'hydroxyde de fer ou à l'ocre jaune par décomposition plus avancée due aux agents extérieurs.

En traversant vers le nord, à une lieue au N.W. de Barrancos, la rivière de Múrtega qui va se jeter dans la rivière d'Ardilla à 2 kilomètres en aval de Noudar, les mêmes roches paraissent dans la grande masse de Coitadinha: c'est un calcaire compact, bleu foncé et extérieurement ocracé, puis de la sidérite et de l'oxyde de fer, accompagnés de diabase; enfin à côté de ces roches il y a un schiste avec empreintes de Graptolites.

Ce fait semble prouver la liaison intime qui existe entre l'apparition des Graptolites et les phénomènes hydrothermiques auxquels la dolomie, la silice et l'oxyde de fer doivent leur origine. On reconnaît en outre que les colonies de Graptolites habitaient de préférence près des points où il y avait des émissions de sources minérales et surtout là où les eaux étaient chargées de silice et probablement avaient une température supérieure à la normale. En effet, c'est un fait reconnu que la proportion de silice diminue et tend même à s'annuler à mesure que diminue la température des eaux thermales qui la renferment en dissolution. Cette hypothèse faciliterait même l'explication, parce que les restes de ces organismes se présentent toujours en affleurements lenticulaires au milieu du schiste ou en espaces très restreints, et qu'ils se montrent plusieurs fois fortement accumulés en un point tandis qu'ils disparaissent à une courte distance, la composition du schiste étant apparemment la même.

Dans le prolongement de la grande masse de calcaire du Barrocal on a découvert, comme nous l'avons dit, des Graptolites en divers points dans un schiste argileux gris et violet.

Ce schiste, rayé sur les tranches de diverses couleurs plus ou moins foncées et en partie durci par métamorphisme, passe à un phyllade sonore, de couleur blanchâtre, comme si le même schiste était porcelanisé. Il a une structure irrégulière et se divise en fragments plus ou moins allongés, quelquefois subprismatiques, et renferme plusieurs cavités irrégulières

remplies d'une poudre ocreuse, jaune, qui peut provenir de la décomposition des cristaux de pyrite. Ordinairement les fossiles, qui se rencontrent dans ce schiste et dans une lydite noire qui l'accompagne, sont peu distincts et difficilement déterminables. Quoiqu'il en soit nous avons pu vérifier l'existence des espèces suivantes :

<i>Monograptus lobiferus</i> McCoy.	<i>Monograptus</i> cf. <i>Nilssoni</i> Barr.
» <i>Becki</i> Barr.	» cf. <i>vesiculosus</i> Perner.
» <i>sagittarius</i> His.	<i>Diplograptus foliaceus</i> Murch?
» <i>priodon</i> Bronn?	<i>Retiolites</i> cf. <i>Geinitzianus</i> Barr.
» <i>Proteus</i> Barr.	<i>Tetragraptus</i> sp.

A 1.000 mètres au N. 13° W. du signal de Perdigão, hors de la ligne de la coupe, passe un schiste fin, fissile, violet clair, avec plusieurs empreintes de Graptolites, formant une couche de 2 à 3 mètres de puissance avec intercalation de quelques lits de peu de centimètres de lydite noire. Ce schiste est compris dans l'horizon des calcaires, sur le prolongement desquels il se rencontre. On y a découvert les espèces suivantes :

<i>Monograptus convolutus</i> His. sp.	<i>Monograptus lobiferus</i> McCoy.
» <i>priodon</i> Bronn.	» <i>Becki</i> Barr.
» <i>priodon</i> var. <i>validus</i> Pern.	» cf. <i>dextrorsus</i> Linrs. (6 an sp. n.)
» <i>spiralis</i> Gein. F.	» <i>communis</i> Lapw.?
» <i>spiralis</i> mut. <i>subconica</i>	» aff. <i>crispus</i> Lapw. (6 an sp. n.)
» Törnq. F.	<i>Retiolites Geinitzianus</i> Barr.
» <i>latus</i> McCoy.	» sp. n.?

7. Dist. hor. 200^m.—Schistes micacés d'un gris foncé avec parties verdâtres ou légèrement rougeâtres, ordinairement à division fissile et ressemblant en partie à ceux du versant oriental de la serra Colorada (n° 14 de la coupe). Au toit, c'est-à-dire près des calcaires, les schistes sont généralement mal stratifiés et montrent même une stratification confuse, se divisant en des fragments de forme très irrégulière et ne contenant pas de fossiles.

La roche principale de ce groupe de couches est un schiste gris-noirâtre, rayé parallèlement à la stratification par de minces plaquettes blanches ou jaunâtres de quartzite ou de schiste quartzeux. Le clivage de cette roche coupe obliquement les plans de stratification qui sont clairement indiqués par ces plaquettes.

Au milieu de ce groupe de strates, à 600 mètres au N. 25° W. du signal du Calvario, quelques lits très minces de quartzite schistoïde renferment des empreintes de *Nereites* et de *Nemertites*. Une empreinte de *Nereites* de grandes dimensions semble se rapporter à *N. pugnus* Emm.

Les autres empreintes de Néréites, toutes de moindres dimensions et à aspect ressemblant à celui des empreintes des schistes à Néréites de San Domingos, ne peuvent pas être classifiées. La direction des strates est de N. 25 à 45° W. et l'inclinaison est de 50 à 80° vers l'occident.

Le prolongement de ces couches passe près de la mine de Minancos, à 1.000 mètres au N. 36° W. de l'église de Barrancos, le bâtiment de la mine reposant sur ces mêmes couches.

Horizon inférieur des Graptolites

8. Dist. hor. 90^m.— Schistes fins, bien stratifiés, avec une faune à Graptolites variée, renfermant dans la partie inférieure du massif plusieurs lits de lydite noire et occasionnellement des nodules durs, de forme très irrégulière ou plus ou moins ellipsoïdale, dont quelques-uns renferment des fossiles, spécialement des moules d'Orthocères et Crinoïdes. Les nodules sont en général très durs, argilo-siliceux ou siliceux; quelques-uns sont d'une roche silico-ferrugineuse très compacte, d'autres d'une substance verte, d'autres enfin sont pyriteux. Ils ne sont pas très abondants et pour la plupart il ne renferment pas de fossiles; ils deviennent de plus en plus rares vers la partie supérieure jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement à mi-hauteur du massif.

Ces concrétions sont renfermées dans un schiste de couleur claire, blanche ou grise, qui forme la base du massif, et, dans quelques points, comme auprès de Barrancos, il est divisé en deux bandes séparées par un intervalle où le schiste est noir.

En outre, le schiste blanc comprend une succession de minces lits de schiste siliceux noir ou gris, très dur, qui lui donnent dans ces parties l'aspect zoné.

Comme le schiste argileux, qui est la roche dominante, était doué d'une grande plasticité, ces lits quartzeux se présentent diversement ondulés, montrant les pressions éprouvées par ces strates; mais la direction générale de la stratification est toujours vers le quadrant du N.W. (N. 25 à 45° W.) et l'inclinaison est ordinairement vers le S.W., de 40 à 50°.

Cet horizon est bien évident en divers points à l'occident de Barrancos, mais ne présente pas de grande continuité. La largeur du faisceau de schistes blancs à nodules et de lydite noire est, en terme moyen, d'environ 50 mètres.

C'est à côté de Barrancos et tout près de la mine de Minancos qu'elle embrasse la plus grande largeur, la couche à nodules reposant en discordance sur un quartzite ou sur une grauwacke micacée, de coloration grise ou violacé, qui va passer à Barrancos même et qui appartient au numéro suivant de la coupe.

Cette discordance est bien manifeste à la tranchée de la nouvelle route de Moura, à 500 mètres au N. 7° E. du signal du Calvario où l'on observe la coupe suivante:

Cette assise comprend également un schiste argileux blanc, happant à la langue et un schiste un peu siliceux, gris clair, dans lequel les empreintes scalariformes de Graptolites sont assez abondantes, alors que dans les strates argileuses contiguës les empreintes sont latérales et couvertes d'une substance talqueuse d'un vert clair, ainsi que cela arrive ordinairement.

Même à la base du massif en établissant la transition à la grauwacke, on rencontre

un schiste argileux, micacé, blanc ou gris, en strates très minces, séparées par d'autres lits peu régulières de schiste siliceux noir qui dépassent rarement 3 centimètres d'épaisseur.

L'expérience a montré que c'est seulement dans le schiste bien stratifié, de couleur blanche dominante et de division fissile, accompagné de lydite noire, que l'on rencontre des Graptolites, et c'est d'après ce critérium que les différentes bandes graptolitiques ont été indiqués sur la carte géologique.

Dans la direction de la coupe on a rassemblé dans cette couche les espèces suivantes:

<i>Cyrtograptus Lundgreni</i> Tullberg.	<i>Monograptus Becki</i> Barr.
<i>Monograptus</i> cf. <i>largus</i> Perner.	» <i>tenuis</i> Portl., dans un nodule de lydite noire.
» <i>dubius</i> Suess.	» ind., plusieurs espèces, dont 2 nouvelles.
» <i>testis</i> Barr.	
» <i>ludensis</i> Murch. sp. (<i>M. colonus</i> Barr. var. <i>ludensis</i>).	<i>Crinoïdes</i> ind., empreintes et articles de la tige.

En suivant la couche des nodules dans un sens ou dans l'autre, on constate que ces nodules ainsi que la lydite manquent en divers points et que les schistes changent plusieurs fois de couleur. La couche à nodules passe à l'occident de Barrancos et sert d'assise à une partie du bourg. Auprès des dernières maisons du côté sud, on a rencontré des moules d'*Orthoceras* et des articles de *Crinoïdes* dans des nodules argilo-siliceux de formes très irrégulières. En plus, on a découvert les espèces suivantes de Graptolites qui se trouvent dans un schiste blanc, fissile, renfermant les nodules:

<i>Orthoceras</i> , 4 espèces différentes, indéterminées.	<i>Monograptus triangulatus</i> Harkn.
<i>Crinoïdes</i> .	» <i>communis</i> Lapw.
<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.	» <i>lobiferus</i> McCoy.
» <i>Linnaei</i> Barr.	» <i>dubius</i> Suess.
<i>Monograptus turriculatus</i> Barr. F.	» <i>Jaekeli</i> Perner.
» <i>spiralis</i> Gein. var. β <i>subconicus</i> Törnq. F.	» <i>ultimus</i> Perner.
» <i>Nilssoni</i> Barr.	» <i>Proteus</i> Barr.
» <i>convolutus</i> His.	» <i>crispus</i> Lapw.
» <i>Sedgwicki</i> Portl.	» <i>latus</i> McCoy?
» cf. <i>dextrorsus</i> Linrs. (Jan sp. n.)	<i>Diplograptus bellulus</i> Törnq.
	» <i>palmeus</i> Barr.
	» (<i>Petalograptus</i>) <i>folium</i> (His.) Tullberg.

En divers autres points de cette couche fossilifère on a rencontré les espèces suivantes avec lesquelles on peut compléter la faune de cette zone:

<i>Phacops</i> (<i>Trimercephalus</i>) aff. <i>laevis</i> Münster.	<i>Bellerophon Murchisoni</i> d'Orb. (<i>B. compressus</i> Sandb.)
<i>Orthoceras</i> cf. <i>corneum</i> Richter.	<i>Cardiola Bohemica</i> Barr.
» cf. <i>currens</i> Barr.	» <i>interrupta</i> Sow..
» cf. <i>Bohemicum</i> Barr.	» cf. <i>fortis</i> Barr.
» ind., 4 espèces.	» cf. <i>fluctuans</i> Barr.
<i>Clymenia</i> ? aff. <i>C. flexuosa</i> juv. Münster.	» ? <i>striata</i> Sow. sp.
<i>Hyalithes</i> aff. <i>columnaris</i> Barr.	<i>Atrypa sphaerula</i> Barr.

<i>Bivalve</i> ind.	<i>Monograptus chimaera</i> Barr.
<i>Crinoïdes</i> ind., 4 espèces au moins.	» <i>Jaekeli</i> Perner.
<i>Monograptus triangulatus</i> Harkn.	» <i>ultimus</i> Perner.
» <i>convolutus</i> His.	» <i>latus</i> McCoy.
» cf. <i>revolutus</i> Kurck.	» <i>Roemeri</i> Barr.
» <i>turriculatus</i> Barr.	» <i>Halli</i> Barr.
» <i>priodon</i> Bronn.	<i>Diplograptus foliaceus</i> Murch.
» <i>Ludensis</i> Murch.	» <i>bellulus</i> Törnq.
» <i>sagittarius</i> His.	» <i>tamariscus</i> Nich.
» <i>leptotheca</i> Lapw.	» <i>palmeus</i> Barr.
» <i>Nilssoni</i> Barr.	» (<i>Petalograptus</i>) <i>folium</i> (His.) Tull-
» <i>lobiferus</i> McCoy.	berg s. str.
» <i>communis</i> Lapw.	» (<i>Petalograptus</i>) <i>folium</i> (His.) Tull-
» <i>Sedgwicki</i> Portl.	berg mut. <i>ovato-elongata</i> Kurck.
» <i>dubius</i> Sss.	<i>Retiolites Geinitzianus</i> Barr.
» cf. <i>dextrorsus</i> Linrs. (¿ an	» <i>Richteri</i> sp. n.
sp. n.)	<i>Stomatograptus</i> cf. <i>grandis</i> Sss.
» cf. <i>largus</i> Perner.	<i>Phyllograptus angustifolius</i> Hall.
» <i>crenulatus</i> Törnq.	» (¿ an sp. n.).
» <i>crispus</i> Lapw.	<i>Cyrtograptus</i> sp.
» <i>colonus</i> Barr.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.
» <i>spiralis</i> Gein. mut. <i>subco-</i>	» <i>Linnaci</i> Barr.
<i>nica</i> Törnq.	<i>Polypier</i> ind.
» <i>Proteus</i> Barr.	

La structure du schiste à nodules est un peu confuse; il ne paraît pas que le dépôt des sédiments limoneux qui le constituent se soit formé avec la régularité qui se manifeste dans les schistes rayés qui le surmontent et dans lesquels il est compris.

Les nodules sont très abondants en quelques points, mais même là ils paraissent devenir de plus en plus rares vers la partie supérieure de la couche, embrassant une épaisseur de dépôts qui, près de Barrancos, n'est pas supérieure à 20 mètres. Dans d'autres points de la couche ces nodules sont excessivement rares et disparaissent même tout à fait.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Grauwackes de Barrancos et de la serra Colorada

9. Dist. hor. 20^m.—Grauwacke fine, micacée, blanche ou violette, à structure prismatique irrégulière et quartzite fin, gris, avec moules de *Arenicolites* ou *Scolithus*.

L'église de Barrancos repose sur cette grauwacke qui est un peu schistoïde, elle est associée à un schiste grossier de couleur gris-noirâtre à l'intérieur, verdâtre et même blanc à la surface, formant de gros bancs à stratification indistincte, mais qui sont concordants avec les couches du numéro suivant; en effet ils suivent comme elles sur le quadrant du N.W. avec inclinaison de 40 à 50° sur le S.W.

A Barrancos la grauwacke et les roches qui lui sont associées occupent une largeur qui n'est pas inférieure à 200 mètres.

Cette grauwacke a la forme lenticulaire comme en général toutes les couches de ce

terrain. Sa formation est certainement due à des courants spéciaux qui, distribuant très irrégulièrement les matériaux sédimentaires, ont fait varier beaucoup la composition des couches.

A un peu plus de 2 kilomètres au N.W. de l'église de Barrancos les grauwackes s'interrompent subitement et les schistes violets qui leur sont sous-jacents se trouvent en contact avec les schistes rayés (n° 7) sur un espace d'environ 1.500 mètres; au-delà les schistes violets sont en contact avec les schistes à Graptolites et avec de petites masses de calcaires (n° 8), la limite entre les deux passant à l'est de la ferme de Coitadinha à quelques 300 mètres de distance.

Cette assise est sans le moindre doute la même que celle du dos de la serra Colorada dont nous parlerons plus loin. Là, tout comme dans la première couche de quartzite ou dans la couche la plus inférieure qui est suivie directement des schistes de Barrancos, apparaissent les *Arenicolites* qui couvrent profusément la surface d'un mince lit de quartzite. Plus haut on a découvert plusieurs moules cylindriques parallèles, mais de moindre diamètre, qui traversent perpendiculairement un autre lit de quartzite.

Au S.E. de Barrancos les grauwackes se répètent en deux bandes distinctes entre lesquelles apparaissent les schistes à nodules avec Graptolites et autres fossiles. La bande de grauwacke le plus à l'est est celle qui va vers l'intérieur du bourg et sur laquelle est située l'église. La bande de grauwacke le plus à l'ouest s'interrompt et reste cachée au-dessous des schistes à Graptolites. Cette répétition indique donc une ondulation ou un plissement local des couches.

Schistes de Barrancos

10. Dist. hor. 450^m.—Schiste finement micacé, blanc ou gris-verdâtre clair et schiste très micacé, téguilaire, verdâtre et plus fréquemment violet avec des moules de *Palaeochorda*, des pistes de Crustacées (J. Hall) et des empreintes d'Annélides. Dans sa partie supérieure ces schistes correspondent évidemment aux couches du versant occidental de la serra Colorada.

Un lit de schiste fin, violet et gris clair de cette assise présente des empreintes de *Nereites*, *Myrianites* et des pistes de Crustacées (J. Hall); dans la surface d'une strate on observe des empreintes circulaires de 12 à 15 millimètres de diamètre avec une cicatrice au milieu, dont l'origine nous est inconnue.

Les couches suivent les directions N. 45 à 65° W. et s'inclinent de 45 à 75° sur le S.W.

Le bourg de Barrancos repose par sa plus grande partie sur ces schistes. Le cimetière est dans les couches supérieures qui correspondent aux couches les plus élevées du versant occidental de la serra Colorada.

11.—Dist. hor. 540^m.—Schistes de composition très uniforme, en général très fins et fissiles, et très micacés sur quelques surfaces, à coloration dominante d'un violet foncé, mais également gris clair et jaunâtre ou verdâtre.

Ces schistes fournissent des dalles à surfaces planes et même des plaques très minces de grandes dimensions; dans quelques lits ils sont plus grossiers se chargeant extraordinairement de mica, réparti d'ailleurs très irrégulièrement et formant par endroits des taches ou des pellicules de certaine étendue. Ils renferment des empreintes de *Myrianites*, des pistes de Crustacés (J. Hall) et des moules de *Palaeochorda* et de *Chondrites*?

Les couches suivent les directions N. 40 à 60° W. et s'inclinent de 60 à 80° sur le S.W.

Schistes à Phyllocytes

12. Dist. hor. 130^m.—Schistes tégulaires, très micacés, de couleur grise, verdâtre et rougeâtre, contenant beaucoup de fossiles dans quelques strates.

Ces schistes qui forment le versant occidental de la serra Colorada et qui clairement correspondent aux schistes de Barrancos (n° 10 *ante*) ont été depuis longue date largement exploités et on y a ouvert une carrière nommée jadis «Pedreira do Mestre André», d'après le nom du carrier qui l'a ouverte; actuellement cette carrière est connue sous le nom plus simple de «louseira» (ardoisière). On y obtient de grandes dalles qui sont employées pour le pavage des maisons, ainsi que pour d'autres services en remplacement du bois qui devient très rare dans la localité. Cette carrière est située à 1.100 mètres au N.E. de l'église de Barrancos, au haut du coteau. C'est là que l'on a fait une grande récolte de fossiles, consistant principalement en restes de végétaux marins (algues) et en traces et en empreintes d'Annélides, accusant donc un dépôt littoral, formé tranquillement sous une mince couche d'eau durant une période d'affaissement graduel et très lent du sol.

En effet, quelques lits de schistes présentent leur surface légèrement froncée ou ridée comme si une douce brise avait exercé son action sur la surface de la vase couverte d'une mince couche d'eau; à la surface d'autres lits on découvre des empreintes de gouttes d'une pluie passagère et enfin dans d'autres on observe le «ripple-mark» caractéristique de la surface des plages après le retrait de la marée.

Mais la découverte la plus intéressante qui s'est faite dans ce groupe de couches a été la trouvaille, dans la partie la plus élevée de la carrière, de quelques empreintes de Graptolites du genre *Didymograptus* (*D. sparsus* Hopk.), espèce qui occupe à Vallongo un horizon peu supérieur à l'assise de quartzites à Bilobites.

Les strates suivent les directions N. 47 à 57° W. et s'inclinent de 60 à 80° sur le S.W.; parfois encore elles sont verticales.

Dans les strates les plus élevées de la carrière le schiste se charge de quartz, qui forme des lames minces ayant une épaisseur d'un demi millimètre et moins qui y sont interstratifiées, donnant à la roche une structure tabulaire.

Dans la carrière de Mestre André le passage des schistes aux grauweekes du dos de la serra Colorada se fait avec l'intermédiaire d'un schiste micacé, très grossier, de couleur violette, montrant une structure spéciale qui lui permet de se diviser en fragments allongés subprismatiques comme de petites bûches de bois. A la suite de ce schiste vient un quartzite fin, en lits minces de 1 centimètre et à surface très irrégulière ou grumeleuse; ces lits sont traversés par de nombreux trous d'*Arenicolites*. Ensuite, on passe à un schiste grossier, ou grauwacke très micacée, peu fissile, de couleur claire, formant des strates très épaisses avec des lits intercalés de schiste très micacé, plus fissile. Immédiatement après reparait le quartzite avec des *Arenicolites*, formant des couches de diverses épaisseurs; puis il est suivi d'une grauwacke fine, schisteuse, micacée, et finalement d'un schiste très grossier, micacé, grisâtre, qui appartient déjà au numéro suivant.

Grauwackes de la serra Colorada

13. Dist. hor. 320^m.—Grauwacke schisteuse et schiste très micacé, grossier, formant des bancs compacts de grande épaisseur et passant fréquemment à un quartzite avec quelques lits intercalés de quartzite et de schiste plus fin.

Ces couches se présentent très ondulées et descendent sur le coteau oriental de la serra Colorada, étant coupées en plusieurs directions par des diaclases qui leur donnent une structure prismatique. Le quartzite est comme grumeleux ou bréchiforme et constitue des lits de structure irrégulière avec une surface assez inégale, tout comme les lits de schiste qui l'accompagnent.

A la base de l'assise, c'est-à-dire dans les couches du sommet de la serra (parce que par suite du plissement anticlinal les strates se trouvent inverties) il y a un quartzite en lits minces peu réguliers, coupés par des veines d'oxyde de fer.

Vers la partie supérieure, au contraire, la grauwacke est bien stratifiée et parfois schistoïde, étant divisée en bancs de différentes épaisseurs par des lits de schiste micacé.

Le schiste grossier a la plus grande ressemblance avec celui qui passe à l'intérieur de Barrancos, et nous ne doutons pas qu'il appartienne à la même assise.

Sa formation est certainement due aux mêmes causes, savoir à des courants plus forts, charriant en conséquence les sédiments plus grossiers ou venant d'une distance moindre. Ce schiste grossier tout comme les couches de grauwacke et de quartzite qui s'y rattachent, forment ensemble une même assise, qui en tout cas ne montre pas une épaisseur uniforme sur un grand espace.

On remarque très bien que ces roches forment une masse lenticulaire alignée dans la direction N.W.—S.E., qui est celle que l'on observe le plus généralement dans ces couches; elles s'amincissent de l'un et de l'autre des côtés et correspondent, dans leur plus forte épaisseur, au lit de la rivière de Múrtega, qu'elles traversent perpendiculairement près du pont de Russiana. Là cette masse occupe environ 700 mètres de large, les couches se montrant ondulées en aval du pont; ordinairement elles présentent une très forte inclinaison et arrivent à être presque verticales en bien des points. Cette masse s'amincit comme nous l'avons dit, vers le S.E. et encore plus vers le N.W.; son épaisseur peut être estimée à 250 mètres au dos de la serra Colorada, à 700 mètres au N.N.W. de Barrancos et se réduit à quelques dizaines de mètres à peine à la serra de Boticas, au nord de la rivière de Múrtega, étant même interrompue dans un point. Plus en avant la bande des grauwackes s'élargit car les couches sont très ondulées et elle s'amincit une seconde fois sur le flanc gauche de la rivière d'Ardilla qu'elle traverse pour pénétrer en Espagne.

En vertu de la plus grande dureté des roches qui composent cette assise, elle forme un relief très prononcé sur le sol contigu. Elle embrasse successivement la serra Colorada, celle du Tambor, celle de Boticas et plusieurs autres collines alignées dans la même direction, formant une imposante crête, escarpée et en quelques points presque inaccessible.

Cette assise ressemble assez par ses caractères lithologiques à celle qui forme la serra de Senhora da Chan et la serra da Murta, respectivement à l'ouest et au nord-est de Vallongo, bien qu'elles soient d'âges très différents.

Dans les quartzites sont intercalés plusieurs lits de schistes fins; dans l'un de ces lits on a découvert de petites taches circulaires, blanches, de quelques millimètres de diamètre, semblables à celles que l'on observe entre Povia et Amarella dans des schistes d'un âge un peu plus ancien.

La surface de quelques-uns des lits de quartzite, les plus inférieurs et les plus minces, est littéralement couverte par de petites cavités circulaires, disposés par couples, qui représentent les extrémités des cavités tubulaires d'Annélides (*Arenicolites*), produites dans le sable de la plage pendant l'accumulation des sédiments.¹

Ainsi que nous l'avons vu les schistes à nodules sont séparés des grauweekes par une discordance; aussi pourra-t-on dire sans hésitation que celles-ci appartiennent au Silurique inférieur. D'autre part, on a pu remarquer que dans la coupe de Pè do Viso (p. 52) on a découvert dans les couches culminantes de cette série des empreintes de *Nereites* qui ressemblent beaucoup à celles qui ont été observées à Barrancos, dans les couches supérieures du côté occidental de l'affleurement (n° 3 de la coupe).

Les courants auxquels les grauweekes doivent leur formation correspondent donc très probablement à des mouvements du sol, qui ont eu lieu sur des points plus ou moins distants, au milieu de l'époque ordovicienne.

Dans cette région méridionale ces mouvements sont peut-être le reflet de l'éruption diabasique du Bussaco, qui a été suivie d'un exhaussement du sol, mettant à découvert cette partie de notre territoire. La direction des strates est N. 45 à 60° W. et l'inclinaison est ordinairement de 60 à 80° sur l'occident.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Horizon inférieur des Graptolites

Enclaves de fossiles dévoniens.—14. Dist. hor. 320^m.—La roche principale et pour ainsi dire normale et typique de ce massif est un schiste fin, dur, gris noir, sans mica, qui renferme plusieurs lames de quartzite subordonnées ainsi que quelques lits de schiste très grossier passant à la grauwacke, puis de la grauwacke schistoïde très micacée.

Ce schiste fin possède une structure tabulaire et se compose de plaquettes alternantes, ordinairement de peu de millimètres d'épaisseur, séparées par d'autres, encore plus minces, de quartzite blanc, qui lui donnent l'aspect rayé quand on observe la roche sur les tranches des strates. En divers points le schiste présente une schistosité oblique aux plans de véritable stratification, schistosité nettement définie par les lames quartzeuses qui sont quelquefois aussi minces qu'une feuille de papier. Cette schistosité, parfaitement analogue à une fausse stratification des grès mésozoïques, est certainement due aux courants qui variaient à tout moment de direction et d'intensité et qui transportaient alternativement des sédiments vaseux et sableux.

Ce schiste rayé occupe la plus grande partie de la ferme de Russiana, au nord de la rivière de Múrtega et de Barrancos. C'est pendant sa formation que se sont réalisés les phé-

¹ Cette espèce d'annélide est désignée par erreur sous le nom de *Scolithus linearis* Hall dans la fig. 1 de la pl. XXXIX de mon *Étude sur les Bilobites*, classification que j'ai alors adoptée, parce que notre exemplaire ressemble beaucoup au fossile ainsi nommé, représenté dans la *Siluria*, 3^e ed. [Fossiles (3), p. 44].

nomènes sédimentaires qui ont apporté à cette région, par périodes, différentes colonies de Graptolites qui d'ailleurs ont toujours eu une durée éphémère, occupant successivement de petites surfaces en divers points isolés. Dans ce schiste, qui forme la base du versant oriental de la serra Colorada, sont compris deux bandes de Graptolites, séparées par un intervalle de 200 mètres, occupé par des schistes qui ne contiennent que des moules de végétaux marins des genres *Palaeochorda* et *Chondrites*, ainsi que quelques impressions et moules de *Nemertites* et de *Nereites*.

Les grauweekes de la serra Colorada sont dans le voisinage de la première de ces deux bandes graptolitiques. Cette bande est principalement représentée par un schiste fin, gris clair et blanc, ordinairement très dur et fissile, qui se divise en lames très minces, sans mica, visible à l'œil nu, et qui renferme quelques lits de peu de centimètres d'épaisseur d'une grau-wacke fine, schistoïde, extraordinairement micacée. Ce schiste renferme en outre quelques nodules irréguliers, argilo-siliceux et ferrugineux, en partie fossilifères, et de minces lits de schiste siliceux gris et noir (lydite) traversé par de très nombreuses veinules de quartz blanc.

Cette couche correspond évidemment à la couche à nodules qui passe à l'ouest de Barrancos (n° 8 de la coupe), mais les concrétions dures y sont moins abondantes que dans cette dernière.

En haut, c'est-à-dire vers l'est, elle passe à un schiste gris, tégulaire, dur, rayé en blanc par des intercalations de minces lames de quartzite. Ce schiste renferme quelques moules de Néréides et de plantes marines: *Nemertites*, *Palaeochorda*, *Chondrites* et *Phymatoderma*?

En plus d'espèces qu'il n'a pas été possible de reconnaître, nous avons pu déterminer dans la couche à nodules les espèces suivantes:

<i>Monograptus ultimus</i> Pern.	<i>Monograptus turriculatus</i> Barr.
» <i>Roemeri</i> Barr.?	<i>Rastrites maximus</i> Carruth.
» <i>Becki</i> Barr.	» <i>Linnaei</i> Barr.
» <i>priodon</i> Bronn.	<i>Diplograptus</i> sp.
» <i>testis</i> Barr.?	<i>Petalograptus folium</i> (His.) Tullberg.
» <i>spiralis</i> Gein. var. β sub-	<i>Cyrtograptus dubius</i> Tullb.?
» <i>conicus</i> Törnq.	» sp.
» <i>convolutus</i> His.	<i>Graptolites</i> ind., diverses espèces, entre autres
» <i>exiguus</i> Nichols.	une très grande espèce ayant plus de 5 mil-
» cf. <i>lobiferus</i> McCoy, spéci-	limètres de large, dans laquelle nous com-
» men gigantesque.	ptons 9 cellules par centimètre de longueur.

L'autre bande graptolitique qui passe près de la ferme de Concha Polida, contient une plus grande quantité de nodules qui atteignent exceptionnellement de grandes dimensions (l'un d'eux a 0^m,80 de longueur!). En dehors de la direction de la coupe, on voit que cette bande qui est évidemment la répétition de celle qui la précède, se montre intercalée entre deux lits de schiste passant à une faible distance et qui lui sont immédiatement supérieurs. Ils renferment de nombreux fossiles (Brachiopodes, Bryozoaires et Polypiers, conjointement avec des restes de Crinoïdes et quelques Trilobites) appartenant tous à la faune du Coblentzien de la serra de Portalegre. Les schistes rayés s'interposent entre les deux lits à fossiles dévoniens et la bande des Graptolites; on reconnaît donc que ces lits, qui d'ailleurs représentent tous les deux le même horizon fossilifère, sont subordonnés à ces schistes, comme l'est d'ailleurs

la bande graptolitique. Ces lits schisteux à facies dévonien, mais qui sans le moindre doute sont compris dans la série silurienne, sont irrégulièrement micacés et souvent très micacées, montrant une coloration grise dans la partie inaltérée, et jaunâtre ou brun clair par suite d'un commencement d'altération dans la couche extérieure.

Le schiste représente évidemment la roche principale de l'enclave; mais subordonné à ce schiste et intercalé en petites lentilles ou lits irréguliers il y a un calcaire grossier, compact, très micacé, gris foncé, et une roche cristalline de couleur jaunâtre ocracée, qui montre plusieurs facettes brillantes à fracture spathique et qui fait une forte effervescence avec les acides. A la surface de fracture de cette roche on reconnaît qu'elle est essentiellement constituée de fragments d'articles de Crinoïdes, par conséquent elle représente suivant toute probabilité un ancien récif corallien.

Les moules et les empreintes de fossiles dans le schiste sont très déformés et la matière testacée de tous les fossiles a été complètement détruite, en ne laissant à la place qu'une poudre ferrugineuse ou ocre jaunâtre qui colore le schiste de la même teinte.

Les points où ont été découverts les fossiles dévoniens suivant la direction de la coupe sont respectivement situées à 580 mètres au N. 73° E. et à 650 mètres au N. 65° E. du signal de la serra Colorada. En ce dernier point les fossiles sont plus variés et en plus grande abondance, parce que la récolte des fossiles y a été plus prolongée et qu'en conséquence elle a pu donner un meilleur résultat. Mais comme la strate graptolitique correspond évidemment à la couche à nodules de Barrancos et de la base du coteau oriental de la serra Colorada et comme les couches forment un double pli, on est obligé de reconnaître qu'il n'y a qu'un lit à fossiles dévoniens.

Dans les deux points précités on a respectivement rencontré les espèces suivantes:
Dans le gisement à l'occident de la bande graptolitique:

<i>Orthis circularis</i> Sow.	<i>Favosites reticulata</i> Blainv.
» <i>obovata</i> Sow.? (à an <i>O. personata</i> Zeiler).	<i>Fenestella</i> (<i>Retepora</i>) <i>retiformis</i> Mich.
<i>Spirifer paradoxus</i> Schloth.?	<i>Polypiers</i> ind., 2 ou 3 espèces.
<i>Brachiopodes</i> ind., 5 espèces au moins.	<i>Crinoïdes</i> , empreintes d'articles de la tige et d'une plaquette isolée du calice.
<i>Pleurodictyum Zorgense</i> Kays.	

Dans le gisement à l'orient de la bande graptolitique:

<i>Phacops Potieri</i> Bayle.	<i>Bivalves</i> ind., 3 espèces.
<i>Cryphaeus pectinatus</i> Roem.	<i>Leptaena Murchisoni</i> Arch. et Vern., type.
» <i>callitelles</i> Vern.	» <i>lepis</i> Goldf.
» cf. <i>Barrandei</i> Cailliaud.	» cf. <i>transversalis</i> Wahlenb.
» cf. <i>sublaciniata</i> V. et Barr.	<i>Strophomena rhomboidalis</i> Wilkens sp.
» sp. ind.	» <i>Bouei</i> Barr.
<i>Orthoceras</i> ind.	<i>Retzia ferita</i> v. Buch.?
<i>Capulus</i> (<i>Platyceras</i>) cf. <i>Selcanum</i> Giebel (<i>C. hercynicus</i> Kays. var. <i>Selcana</i> Giebel).	<i>Spirifer paradoxus</i> var. <i>Hercyniae</i> Giebel.
<i>Buccinum</i> cf. <i>arculatum</i> Arch. et Vern.	<i>Orthis Dumontiana</i> Vern.
<i>Pterinea</i> (<i>Avicula</i>) <i>Pailleti</i> Vern. et Barr.	» <i>Beaumonti</i> Vern.
<i>Cypricardinia</i> sp.?	» <i>striatula</i> d'Orb.
	» <i>circularis</i> Sow.
	» <i>obovata</i> Sow.

<i>Orthis</i> sp. n. (aff. <i>O. vulvarius</i> Schloth.)	<i>Cyathophyllum caespitosum</i> Goldf.?
<i>Athyris undata</i> Defr. sp.	<i>Favosites reticulata</i> Blainv.
<i>Rhynchonella Orbignyana</i> Vern.	<i>Fenestella (Retepora) retiformis</i> Mich.
» sp. n. (aff. <i>Rh. Orbignyana</i> Vern.)	» <i>Bischofi</i> Roemer.
<i>Spirigera Ferronesensis</i> Vern. et Arch.	<i>Gorgonia Bouchardi</i> Mich. sp.
<i>Brachiopodes</i> ind., plusieurs espèces.	<i>Retepora</i> cf. <i>infundibulum</i> Lonsdale.
<i>Pleurodictyum Selcanum</i> Giebel.	<i>Monticulipora Bowerbanki</i> Milne-Edw. et J. Haime?
» <i>problematicum</i> Goldf.?	<i>Polypiers</i> ind.
(cf. <i>Pleur. giganteum</i> Kays.).	<i>Crinoïdes</i> , empreintes d'articles de la tige et de plaquettes isolées du calice de diverses espèces.
» sp.	
<i>Syringopora caespitosa</i> Goldf.	

Ces fossiles sont contenus dans un schiste micacé dont le mica est irrégulièrement distribué, mais par places très abondant, de couleur grise dans la partie inaltérée, et de couleur jaune ou brun clair dans la partie où il a subi un commencement d'altération. Accompagnant le schiste apparaissent quelques plaquettes de calcaire qui semblent indiquer que c'est la formation de cette roche qui a déterminé temporairement et localement le changement de faune. En outre en suivant les enclaves de fossiles dévoniens, dans le sens longitudinal, on voit qu'ils sont toujours accompagnés par les bandes graptolitiques, les uns et les autres se trouvant également intercalés dans les schistes rayés. Il n'y a donc pas le moindre doute en ce qui concerne l'association intime des Graptolites avec les fossiles du Dévonique inférieur dans la même assise, on pour mieux dire dans des lits contigus de la même couche. Aucun changement dans le caractère lithologique, aucune altération dans le relief ou dans la structure du sol ne permet d'autoriser une séparation quelconque.

Le lit fossilifère à Graptolites a été traversé par la coupe et il va passer entre les deux gisements de fossiles dévoniens mentionnés, à 600 mètres au N. 73° E. du signal de la serra Colorada, près de la ferme de Concha Polida. En cet endroit on a obtenu les espèces suivantes, en outre de plusieurs autres que nous n'avons pas pu déterminer.

<i>Orthoceras</i> cf. <i>rigescens</i> Barr.	<i>Bivalves</i> ind., 2 petits moules.
» cf. <i>innotatum</i> Barr.	<i>Crinoïdes</i> , moules et empreintes d'articles de la tige de 2 ou 3 espèces.
» ind., 3 ou 4 espèces.	
<i>Holopella</i> sp. (voyez <i>H. subulata</i> F. A. Roemer sp.)	<i>Monograptus</i> ind.
<i>Cardiola Bohemica</i> Barr.?	<i>Calamopora cervicornis</i> Blainv. sp.
» ? <i>striata</i> Sow.?	<i>Polypier</i> ind.

Cette couche fossilifère se prolonge vers le N.W., allant passer à l'est d'un coude formé par la rivière de Múrtega, dit « Volta Ferreira », à 900 mètres au nord du signal de la serra Colorada, où elle a fourni également un grand nombre de fossiles. Cet affleurement graptolitique est, comme les autres, très étroit et les fossiles sont concentrés dans un lit de schiste blanc un peu siliceux, durci et comme porcelanisé par suite du métamorphisme causé par le voisinage d'un gisement cuprifère. Ce schiste, par endroits ondulé et très fissile, est sonore et happe fortement à la langue, et les empreintes des fossiles qu'il renferme sont couvertes par une substance talqueuse d'un vert clair.

Du côté de l'occident cet affleurement est accompagné par une étroite bande de grauwackes et de schistes grossiers d'une centaine de mètres de largeur, qui visiblement appartient à la grande masse de la serra Colorada avec laquelle il va se réunir sur la rive gauche de la rivière de Múrtega. La strate graptolitique continue sans interruption depuis la ferme de Concha Polida jusqu'à cette rivière qu'elle traverse à Volta Ferreira, disparaissant un peu plus loin.

Les grauwackes affleurent même à la courbe de Volta Ferreira, ainsi que nous l'avons dit; ces grauwackes ont, de l'un et de l'autre des côtés, des schistes blancs à Graptolites avec quelques nodules et suivent de ce point vers le N. W. dans la direction du cerro do Tambor et de la serra de Boticas, s'incorporant dans la bande qui va de la serra Colorada vers le même cerro, les schistes graptolitiques étant ainsi contenus dans un petit synclinal.

On voit donc que c'est un plissement local des grauwackes qui les fait affleurer à la Volta Ferreira, elles sont cachées en dessous de la ferme de Concha Polida, suivant la direction de la coupe. De même, une autre bande étroite de schistes rayés et de schiste blanc à Graptolites apparaît intercalée dans l'affleurement des grauwackes de la serra Colorada et se termine en pointe à la rive droite de la rivière de Múrtega, 400 mètres en aval du pont de Russiana.

On doit remarquer que les Graptolites apparaissent toujours en lentilles de petite largeur subordonnées au schiste rayé gris, allant longitudinalement dans le sens de la stratification, se montrant pour ainsi dire toujours inopinément et disparaissant également subitement. En tout cas on reconnaît qu'il y a en général une certaine correspondance entre les divers affleurements graptolitiques qui forment comme de longues lignes moniliformes qui se suivent sur plusieurs kilomètres de longueur.

Les fossiles dévoniens ont été découverts en plusieurs points du coteau oriental de la serra Colorada et les bandes qu'ils forment se prolongent vers le N. W. dans la ferme de Russiana, ces fossiles ayant été reconnus sur 8 kilomètres de longueur, jusqu'au flanc gauche de la rivière d'Ardilla. Néanmoins, ces fossiles ne se rencontrent pas en strate continue, mais en divers points isolés, presque toujours accompagnés par les calcaires et formant de petites taches au milieu des schistes rayés, tout comme cela se passe pour les Graptolites.

A 1.250 mètres au S. 30° E. du signal de Boticas, dans ce même groupe de couches et au prolongement de celles qui ont été explorées près de la ferme de Concha Polida, passe un schiste fissile, gris, taché de brun ocracé, chargé de moules et d'empreintes de fossiles, en grande partie réduits en petits fragments et tous très déformés et aplatis. Subordonné à ce schiste il y a un calcaire schistoïde micacé, compact, gris, coupé de veinules de spath calcaire blanc, formant des lits minces, irréguliers, de peu de centimètres d'épaisseur et un calcaire subcristallin à plusieurs facettes brillantes de cristaux de calcite, montrant dans l'enveloppe extérieure, altérée, ferrugineuse et ne faisant déjà plus effervescence avec les acides, beaucoup d'empreintes de Crinoïdes et de Polypiers. Cette roche semble donc indiquer l'existence d'un récif formé au fond de la mer silurienne d'une façon analogue aux récifs coralliens des mers actuelles.

La faune du schiste est très riche, mais les fossiles sont en majeure partie en très mauvais état de conservation, donc difficilement déterminables. Nous avons cependant pu classer les espèces suivantes:

<i>Cryphaeus</i> cf. <i>Barrandei</i> Caill. (<i>Cryphaeus calliteles</i> Green. in de Vern.)	<i>Athyris?</i> sp. (voyez <i>Terebratula prunulum</i> Schnur)
» <i>stellifer</i> Burm.	<i>Ptychospira ferita</i> v. Buch sp.
» <i>Michelini</i> Rou.	<i>Strophodonta clausa</i> Vern. sp.?
» sp.	<i>Orthis Hamoni</i> Rou.?
<i>Phacops Potieri</i> Bayle.	» aff. <i>oblata</i> J. Hall.
» sp.	<i>Spirifer undiferus</i> F. Roemer.
<i>Proetus</i> sp. (voyez <i>P. fallax</i> Barr.)	<i>Chonetes crenulata</i> de Kon?
<i>Conularia</i> sp.	» cf. <i>sarcinulata</i> de Kon.
<i>Pleurotomaria?</i> (voyez <i>Pleur. occidentis</i> Hall).	<i>Crinoïdes</i> , empreintes d'articles de la tige d'au moins 5 espèces différentes.
<i>Pterinea</i> (<i>Avicula</i>) <i>Pailleti</i> Vern. et Barr.?	<i>Pleurodictyum problematicum</i> Goldf.
<i>Rhynchonella Orbignyana</i> Vern. sp.	<i>Chaetetes petropolitanum</i> Pander sp.
<i>Streptorhyncus umbraculum</i> Schloth.	<i>Alveolites cervicornis</i> Blainv.
(<i>Orthotheses hipponyx</i> Schnur sp.)	<i>Retepora retiformis</i> Mich.
<i>Athyris undata</i> Defr. sp.	<i>Turbinolopsis</i> (<i>Cyathophyllum</i>) <i>helianthoides</i> Goldf.

Du côté opposé à la serra Colorada, à l'occident de Barrancos, les fossiles dévoniens n'ont pas été découverts dans la direction de la coupe; mais à 2 kilomètres au N.W. de Barrancos, ces fossiles apparaissent en divers points au N.E. du sommet de Perdigão et se montrent en minces lits intercalés dans les schistes rayés à empreintes de *Nereites*; ils se trouvent aussi liés à des lits minces de calcaire schistoïde.

Au N.E. du signal de Perdigão, respectivement à 600 et 700 mètres de distance, on a découvert deux lits de schiste avec les fossiles dévoniens, intercalés en concordance dans les schistes à Graptolites immédiatement supérieurs à la couche à nodules qui passe à Barrancos.

La bande la plus orientale va se terminer obliquement contre les phyllades de Barrancos qui sont immédiatement sous-jacents aux quartzites et aux grauweekes à *Arenicolites* (qui manquent ici), ce qui est une nouvelle et évidente preuve de la discordance qui sépare les deux étages de roches.

Ces enclaves de fossiles dévoniens au milieu des schistes rayés à lydite renfermant des Graptolites et avec des traces de *Nereites* à la surface de quelques lits plus durs, occupent précisément le même niveau que les lits à fossiles dévoniens de Concha Polida qui ont été précédemment décrits.

Il paraît donc évident que, quand a commencé la formation des récifs coralliens durant la formation du schiste à nodules, l'apparition de colonies de fossiles dévoniens a eu lieu en des points isolés. Ce sont les premiers représentants de la faune du Dévonique qui, plus tard seulement, a définitivement pu s'implanter dans nos latitudes, atteignant alors un développement extraordinaire.

Toutefois, lorsque la formation des récifs coralliens était en pleine activité, la faune dévonienne avait déjà disparu de cette région et la faune graptolitique se trouvait de nouveau en plein développement.

A la cote 338, formant un sommet à 1 kilomètre à l'est du signal de Perdigão, les grauweekes ont un grand développement formant une large protubérance au N.W. de laquelle elles disparaissent.

Dans leur prolongement il y a les schistes rayés à Graptolites qui se développent du côté de l'est dans la ferme de Russiana. Là aussi les Graptolites apparaissent à l'ouest, c'est-à-dire au-dessus des Brachiopodes et des Polypiers dévoniens, qui sont pareillement intercalés dans les schistes rayés (800 mètres au N. 13° E. du signal de Perdigão).

De même à 1 kilomètre au nord du signal de Perdigão, dans le prolongement de ces mêmes couches, on voit des lits de calcaire micacé, grossier, ocracé, qui sont liés à un schiste de couleur gris clair renfermant des Graptolites (*Monograptus triangulatus* Harkn.), ce qui prouve encore que la couche de fossiles dévoniens, le calcaire et le schiste à Graptolites sont tous les trois contemporains.

La direction de la stratification dans ce groupe de couches est vers N. 35 à 60° W., les strates s'inclinant sur l'occident de 50 à 70° et quelques-unes étant même verticales.

Ce complexe n° 14 de la coupe, correspond évidemment aux n°s 7 et 8 qui ont été décrits plus haut, le premier lit de Graptolites du complexe étant incontestablement le même qui forme la base de la couche 8. On reconnaît d'ailleurs que c'est un plissement anticlinal des couches qui les fait se répéter, les schistes violets du n° 11 étant par conséquent les couches les plus anciennes de la coupe qui aient été décrites jusqu'à ce point.

15. Dist. hor. 560^m.—Schistes rayés, durs, bien stratifiés, comme ceux du numéro précédent, avec des moules et des empreintes de *Nemertites* et comprenant au milieu du massif un lit de schiste gris clair ou blanc, à Graptolites. Ces fossiles ont été détruits et l'espace qu'ils occupaient est rempli par une poudre ocracée, jaune ou rouge. Ce schiste est compact, divisible en plaquettes minces à surfaces planes, et happe fortement à la langue; à côté apparaissent, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, quelques lits minces de calcaire grossier, compact, schistoïde, très micacé, de couleur gris-verdâtre, formant de petites masses isolées au milieu du schiste. La plus grande partie des empreintes de fossiles contenus dans ce schiste sont indéterminables; nous avons cependant pu classer les espèces suivantes rencontrées à 950 mètres au S. 13° W. de la ferme de Volta dos Nogaes, en dehors de la direction de la coupe:

Monograptus spiralis Gein. var. β sub-
conicus Törnq.

Monograptus convolutus His.
» *galaensis* Lapw.

Les lits de calcaire sont accompagnés d'un schiste grossier micacé, dans lequel on a découvert les fossiles dévoniens en divers points, formant deux bandes parallèles et contiguës au schiste graptolitique, pareillement à ce qui s'observe à la ferme de Concha Polida.

Dans le prolongement de la strate graptolitique vers le N. W. on a aussi découvert à 500 mètres au S. 73° E. de la ferme de Russiana, sur la rive gauche de la rivière de Múrtega, dans un schiste très fin, fissile, gris, peu micacé, des moules et des empreintes de fossiles, principalement de Brachiopodes et de débris de Polypiers, appartenant à la faune dévonienne, ainsi que cela se voit d'après la liste suivante:

Cryphaeus pectinatus Roemer.
Dalmanites sp., espèce très probable-
ment nouvelle.
Strophomena Murchisoni Arch. et Vern.,
type de l'espèce.
Terebratula Eifliensis Schnur.
Atrypa curvata Schloth.?

Meristella sp.
Brachiopodes ind., 4 ou 5 espèces.
Crinoïde, empreinte.
Retepora retiformis Mich.
Pleurodictyum problematicum Goldf.
Turbinolopsis sp.

Les strates suivent les directions N. 45 à 60° W. et s'inclinent de 60 à 70° vers le S. W., ayant même quelques lits verticaux.

16. Dist. hor. 700^m.—Schistes fins bien stratifiés, rayés par des lames de quartzite et contenant quelques lits de schiste gris clair et blanc avec des empreintes très déformées et très frustes de Graptolites. Ces lits forment deux bandes distantes de 180 mètres l'une de l'autre, la première passant à 500 mètres au S. 43° W. de la ferme de Volta dos Nogaes et la deuxième à 300 mètres au S. W. de la même ferme.

En ce dernier point on a découvert dans le schiste blanchâtre ou de couleur violette très claire, des empreintes de *Monograptus spiralis* et d'un *Diplograptus*.

Les deux bandes sont accompagnées de lits minces, irréguliers, de calcaire grossier, micacé, schistoïde, de couleur d'un violet brunâtre qui sont intercalés dans le schiste.

Près de la ferme de Volta dos Nogaes, à l'extrémité de la coupe, les schistes rayés à *Nemertites* renferment quelques lits de calcaire, mais le schiste à Graptolites qui devrait les accompagner y manque, bien qu'il ait été reconnu sur le prolongement des mêmes couches vers le N. W., sur la rive gauche de la rivière de Múrtega.

La direction des couches est encore vers le N. 45 à 60° W. et l'inclinaison est de 60 à 80° vers l'ouest et vers l'est; en quelques points les couches sont même verticales.

On voit donc que les dernières couches de la coupe que nous avons décrite sont très répétées par suite du plissement qu'elles ont subi, mais nous voyons aussi que toutes appartiennent à la même assise supérieure aux grauwackes de la serra Colorada, la même qui se développe au couchant de Barrancos (n^{os} 7 et 8 de la coupe).

Pour pouvoir traverser l'affleurement silurien dans toute sa largeur jusqu'à la frontière d'Espagne, nous avons fait une autre coupe qui commence au couchant de la ferme de Valle de Corcho, et qui passant par le signal de Culebras et Fonte de Fatuquedo va se terminer à la rive gauche de la rivière d'Ardilla, à la frontière. On peut considérer cette coupe comme la continuation à l'est de celle que nous venons de décrire, les premiers numéros correspondent effectivement aux dernières couches de la coupe précédente.

Coupe de la ferme de Valle de Corcho à Fatuquedo, traversant la colline de Culebras et se terminant à la rive gauche de la rivière d'Ardilla. (Pl. VIII, profil n^o 3.)

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Horizon inférieur des Graptolites

1. Distance horizontale 200^m.—Schiste gris foncé, rayé de blanc par de minces plaquettes de quartzite, peu fissile, avec le clivage discordant de la stratification.

Au commencement de la coupe ce schiste comprend une couche de schiste de couleur gris clair avec des empreintes très frustes et indéterminables de Graptolites et quelques nodules, partiellement durs, contenant des fossiles. En suivant cette strate fossilifère vers le S. E. on voit qu'elle se prolonge vers la ferme de Volta dos Nogaes, passant près et à l'est de cette maison, établissant ainsi visiblement le lien qui relie cette coupe à celle qui a été précédemment décrite. Direction de la stratification N. 35 à 57° W.; inclinaison de 60 à 70°, augmentant vers le N. E., beaucoup de strates étant même verticales.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Grauwackes de la serra Colorada

2. Dist. hor. 125^m.—Grauwacke micacée et quartzite dans quelques lits avec des *Arenicolites*, qui se rencontrent dans les premières strates, c'est-à-dire les plus occidentales, ainsi que dans les strates les plus anciennes de l'assise.

Ces couches sont évidemment les mêmes que celles de la serra Colorada, et la direction de la stratification est la même que celle des schistes du numéro précédent, s'inclinant également de 60 à 70° sur le N.E. avec quelques lits verticaux.

3. Dist. hor. 385^m.—Schistes téglulaires très micacés, de couleur grise, verdâtre et rougeâtre, avec moules de *Palaeochorda*, correspondant évidemment aux schistes de la carrière de Mestre André. Ils suivent encore la même direction N. 35 à 57° W., mais s'inclinent vers le N.E. et vers le S.W.; les inclinaisons sont variables et plusieurs couches sont verticales.

4. Dist. hor. 260^m.—Grauwackes et quartzites comme ceux du numéro 2, avec des *Arenicolites* dans les premières strates qui forment une crête à la partie occidentale du complexe. Les strates suivent dans les directions N. 35 à 47° W. et s'inclinent de 60 à 70° sur le S.W., les strates les plus à l'est étant presque verticales.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Horizon inférieur des Graptolites

5. Dist. hor. 260^m.—Schistes fins, gris, rayés de blanc par des lames de quartzite, comprenant une strate de schiste blanc et gris et de lydite grise avec des empreintes de Graptolites. Ces schistes sont en partie très durs et très micacés et, par suite d'un commencement d'altération, ils ont pris une coloration violette ou rouge clair.

La couche fossilifère est traversée par la coupe à 500 mètres au couchant du signal géodésique de Culebras; c'est sans doute sur cette couche, la même qui passe à l'ouest de Barrancos, qu'est assise cette pyramide (n° 8 *postea*). On a recueilli dans cette localité les espèces suivantes dans un schiste durci par métamorphisme, en général très fissile, et contenant quelques nodules:

Monograptus turriculatus Barr.

» *Proteus* Barr.

» *Halli* Barr.

» *lobiferus* McCoy?

» *priodon* Bronn?

» *Becki* Barr.

Monograptus cf. *dextrorsus* Linrs.

» *spiralis* Gein. var. β *subconicus*
Törnq.

Retiolites Geinitzianus Barr.

Retiograptus sp.

Les couches suivent dans les directions N. 25 à 47° W. et s'inclinent de 60 à 70° et encore plus fortement sur l'ouest.

En dehors de la direction de la coupe on a trouvé des fossiles dans cette même couche, entre autres points à 1.250 mètres au S. 11° E. du signal de Culebras sur la rive droite du ravin de Cadaval, où un schiste gris, avec beaucoup d'empreintes frustes de Graptolites,

contient beaucoup de nodules durs, argilo-siliceux et silico-ferrugineux de formes très irrégulières. Beaucoup de ces nodules renferment également des fossiles, spécialement des moules d'*Orthoceras* et des Crinoïdes. On y a obtenu les espèces suivantes:

Hyolithes cf. *simplex* Barr.

Cardiola interrupta Sow.

Praecardium cf. *Bohemicum* Barr.

Orthoceras cf. *migrans* Barr.

» sp.

Monograptus, 2 ou 3 espèces indéterminées.

Retiolites sp.

Crinoïdes, articles de la tige de plusieurs espèces.

Polypier ind.

A la Cova das Palomas, à 500 mètres au S. 7° W. du signal de Culebras, on a recueilli les espèces suivantes:

Monograptus communis Lapw.

» *lobiferus* McCoy.

Rastrites peregrinus Barr.

Diplograptus sp.

Dans la ferme de Valle de Silva, à 1.100 mètres au N. 52° W. du signal de Culebras, on a trouvé dans cette même couche les mêmes fossiles:

Monograptus communis Lapw.

» *lobiferus* McCoy.

Rastrites peregrinus Barr.

Diplograptus palmeus Barr.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à Phyllocytes

6. Dist. hor. 100^m.—Schistes très micacés, téglaires, ressemblant beaucoup à ceux de la carrière de Mestre André et appartenant très probablement à la même assise. Ils ont la direction N. 25 à 47° W. avec une inclinaison de 70° sur l'occident et arrivent parfois à être verticaux.

Le passage subit des schistes rayés aux schistes téglaires fait présumer l'existence d'une faille qui sépare les numéros 5 et 6, puisqu'il manque entre les uns et les autres les grauwackes de la serra Colorada. Cette faille serait produite par le plissement et par la fracture consécutive de ces couches dures. Cette faille doit être parallèle à une autre qui sépare les numéros 8 et 9; le massif de la serra de Culebras en s'affaissant aurait glissé sur les deux plans de fracture. C'est ainsi que sont restées cachées les grauwackes et les quartzites, qui d'ailleurs se découvrent en beaucoup de sommets et avec grand développement à l'ouest de la serra de Culebras.

Grauwackes de la serra Colorada

7. Dist. hor. 60^m.—Grauwackes et quartzites avec *Arenicolites* comme ceux de la serra Colorada. Direction des plans de stratification N. 17° W. à N. 27° W. L'inclinaison sur l'ouest est de 75° et arrive jusqu'à la verticale.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Horizon inférieur des Graptolites

8. Dist. hor. 240^m.—Schistes altérés par une émission métallifère, chargés d'oxyde de fer et devenant siliceux. Ils contiennent beaucoup de Graptolites, spécialement en deux strates dont l'une correspond au faite de la serra de Culebras (où il y a un signal géodésique de deuxième ordre) et dont l'autre va à 100 mètres à l'ouest de cette pyramide. Ce schiste est très dur, fissile et de couleur violette, et les fossiles qu'il renferme se détachent par une couleur foncée sur le fond uniforme de la roche, mais il sont en grande partie indéchiffrables. On a pu toutefois reconnaître les espèces suivantes :

<i>Monograptus latus</i> McCoy.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.
» <i>priodon</i> Bronn.	<i>Cyrtograptus Lundgreni</i> Tullb.
» <i>convolutus</i> His.	<i>Diplograptus palmeus</i> Barr.?
» <i>spiralis</i> Gein. var. β sub-	» <i>(Petalograptus) folium</i> (His.) Tull-
» <i>conicus</i> Törnq.	» berg?
» <i>triangulatus</i> Harkn.	

En dehors de la coupe on a obtenu, dans le même niveau, à 800 mètres au N. 37° W. du signal de Culebras, les espèces suivantes dans un schiste siliceux, dur, peu fissile, gris avec taches rougeâtres ou violettes qui est la même couche sur laquelle repose le signal géodésique de Culebras :

<i>Monograptus triangulatus</i> Harkn.	<i>Diplograptus bellulus</i> Törnq.
» <i>Becki</i> Barr.	» <i>(Petalograptus) folium</i> (His.) Tull-
» <i>communis</i> Lapw.	» berg.
» <i>fimbriatus</i> Nich.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.

Suivant toute probabilité ce schiste fossilifère correspond à celui du n° 5 (*anté*) et au schiste à nodules de la coupe d'Eiras Altas à Volta dos Nogaes. Les strates suivent les directions N. 25 à 47° W. et sont inclinées de 60 à 70° sur l'est et sur le couchant, étant en quelques points verticales comme près du signal de Culebras au sommet de la colline.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes à Phyllocytes

9. Dist. hor. 60^m.—Schistes très micacés, téglaires, à aspect ressemblant à ceux de la carrière de Mestre André, en partie froncés par les pressions latérales qu'ils ont subies près de la faille qui, comme nous le pensons, sépare ce numéro du numéro précédent. On n'a pas découvert de fossiles dans ces schistes qui plongent sur le quadrant du S. W.

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Horizon inférieur des Graptolites

10. Dist. hor. 25^m.—Schiste durci, violet clair, et lydite grise avec empreintes très frustes et même indéterminables de Graptolites. Il correspond sans doute au n° 8 qui a été précédemment décrit, et représente le bout d'un petit lambeau de cette couche fossilifère reposant en discordance sur les schistes de la carrière de Mestre André. La direction des strates est N. 45° à 57° W. et l'inclinaison est très forte, presque verticale sur le S.W.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes de Barrancos

11. Dist. hor. 160^m.—Schistes tégmentaires, très micacés avec du mica très irrégulièrement distribué, comme cela arrive à ceux du versant occidental de la serra Colorada et ayant un aspect semblable, mais on n'y a pas découvert de fossiles. Insensiblement ils font transition aux schistes du numéro suivant qui commence la série que nous avons nommée «schistes de Fatuquedo». Ce passage est si graduel qu'il n'est pas possible de tracer une ligne de division qui les sépare. Direction de la stratification N. 25 à 37° W et inclinaison de 70° sur le S.W. et quelquefois verticale.

Schistes de Fatuquedo

12. Dist. hor. 500^m.—Schistes micacés de couleur gris et verdâtre-clair, en général moins distinctement stratifiés que ceux du n° 11. Entre eux il y a un schiste tégmentaire ayant l'aspect de ceux de la carrière de Mestre André, intercalé entre autres strates de schistes peu fissiles, avec quelques lits de grauwaque un peu schistoïde. Cette grauwaque se répète dans le n° 14 de la coupe. On a mesuré dans ces schistes des directions variables entre N. 17° W. et N. 57° W., avec des inclinaisons de 50 à 70° sur l'est et sur l'ouest, quelques couches étant même verticales.

13. Dist. hor. 1.060^m.—Strates alternantes de schiste peu micacé et de grauwaque grise et fine. La grauwaque renferme quelques petits cristaux de pyrite. Le schiste est en partie rayé de gris plus ou moins foncé et a le clivage oblique aux plans de stratification.

Les strates suivent en diverses directions, la plus régulière étant entre N. 35 et 47° W., avec des inclinaisons très fortes sur le S.W. Beaucoup de strates se présentent courbées et suivent en directions très variables depuis N. 33° E. jusqu'à N. 47° W. avec des inclinaisons de 50 à 70°, aussi bien vers le N.E. que vers le S.W. C'est dans ce groupe de couches que jaillit la source de Fatuquedo.

14. Dist. hor. 500^m.—Schiste gris et vert et grauwaque fine, grise, en partie très micacée et renfermant de petits morceaux de schiste, en strates alternantes avec le schiste; plusieurs lits minces de grauwaque dure, dans laquelle on semble voir des moules d'*Arenicolites*, sont aussi compris dans ce complexe.

Une strate de grauwaque plus grossière, analogue à celle du n° 12, montre plusieurs points blancs qui semblent des débris de cristaux d'orthose. Direction des strates N. 17° W. à N. 37° W. et inclinaison de 60 à 80° sur l'ouest.

15. Dist. hor. 700^m.—Schiste gris foncé, en partie rayé, avec le clivage oblique aux plans de stratification; en quelques points il est dur, passe à une grauwacke fine, se divise en dalles minces suivant les plans de clivage, et présente quelques moulages d'algues (*Chondrites?*) ainsi que des traces d'*Arenicolites*.

On observe ces fossiles sur la rive gauche de la rivière d'Ardilla, à la frontière, où se termine la coupe, à 300 ou 400 mètres au N.W. du confluent du ravin de Figueira avec cette rivière. La direction des strates est N. 27 à 57° W. et l'inclinaison est de 50 à 70° sur le S.W.

Les schistes de Fatuquedo sont compris dans les numéros 12 à 15 de la coupe. En considérant l'énorme développement en extension superficielle de ces schistes, on doit conclure que les mêmes couches sont répétées plusieurs fois, les sommets des plis ayant été arasés par la dénudation. On doit aussi reconnaître qu'ils contiennent des intercalations des schistes de Barrancos que l'on ne peut pas séparer.

Ces schistes présentent une grande variabilité de caractères, tant en ce qui concerne la grosseur du grain, qu'en ce qui se rapporte à la structure et à la couleur de la roche. Ordinairement ils présentent une structure spéciale, xylloïde ou pseudofibreuse, qui leur permet de se diviser en fragments allongés de forme irrégulière, ressemblant à de petites bûches de bois. Cette structure est tellement accentuée que même les grands fragments ont des formes un peu prismatiques; elle est certainement due aux pressions que les schistes ont subies lors du plissement. Le mica s'y distingue bien et est même très abondant dans plusieurs strates; la structure de la roche est par contre très confuse en bien des endroits, au point qu'il est parfois difficile de connaître le véritable sens de la stratification.

Cette assise est très épaisse; dans le territoire portugais on la traverse sur plusieurs centaines de mètres; elle embrasse plus de 3 kilomètres de largeur sur la route d'Oliva qui passe près de la source de Fatuquedo, en haut de la rivière d'Ardilla, près de la frontière.

Ces schistes se distinguent de tous les autres que nous avons décrits et peuvent à peine se comparer avec les schistes de Barrancos auxquels ils sont certainement liés; ils représentent une assise ou un étage inférieur à ces derniers, ayant acquis une structure différente par suite des pressions auxquelles ils ont été soumis. Vu leur énorme puissance et vu leur position stratigraphique, on doit juger qu'ils appartiennent à un niveau très bas de l'Ordovicien. En tout cas, nous pouvons considérer comme un fait bien établi que les schistes de Fatuquedo sont sous-jacents à toute la série qui a été précédemment décrite.

Traversant la rivière de Múrtega à la courbe de Volta dos Nogaes, et allant directement vers le N.E. en pénétrant dans le territoire espagnol, on coupe d'abord une épaisse assise de grauwackes qui occupe plus de 800 mètres de large, qui est la même que l'assise de la serra Colorada et qui y reparait occupant un aussi grand espace, par un effet du plissement des couches qui l'a fait affleurer à la surface, tandis que les couches plus modernes ont disparu par l'érosion.

Les grauwackes sont suivies d'un groupe de schistes blancs à Graptolites, de 200 mètres de large, qui va à la serra de Culebras et qui passe à l'est du pont d'Encinasola, sur le chemin de Barrancos à ce bourg espagnol; le pont repose sur ces grauwackes. On a découvert des Graptolites dans ces schistes, à 3 kilomètres au N. 42° E. du signal de la serra Colo-

rada. A l'est de la couche fossilifère, suivent, sur une petite largeur, des schistes à aspect rappelant les schistes de la carrière de Mestre André et qui passent graduellement aux schistes de Fatuquedo.

Pour compléter cette description et pour que l'on puisse en tout temps vérifier la justesse de mes observations, je donne, ci-dessous, la liste des localités où l'on a recueilli des fossiles dans cette contrée, aussi bien dans les couches à Graptolites que dans les enclaves de fossiles dévonien.

LISTE DES LOCALITÉS OÙ L'ON A TROUVÉ DES GRAPTOLITES

270 ^m au N 10° E		1550 ^m au S 87° E	
1400 N 83 W		1570 S 19 W	
1250 N 55 W		1750 S 53 E	du signal de Lobo.
1200 N 17 W		1950 S 49 E	
1200 N 79 W	du signal de Culebras.	1970 S 53 E	
1100 N 52 W		2350 S 70 W	
850 N 27 W			
800 N 37 W		2170 N 53 W	
400 N 37 W		1900 N 45 W	
		1600 N 41 W	
Près du signal de Culebras		1300 N 43 E	
70 ^m au S 63° W		1100 N 43 E	
500 S 73 W		650 N 41 W	
700 S 8 W	du signal de Culebras.	450 N 40 E	du signal de Cuco.
850 S 5 E		450 N 81 E	
1250 S 11 E		850 S 53 E	
		900 S 50 E	
800 N 4 E		950 S 69 E	
500 N 17 W		950 S 37 E	
200 S 83 W		1570 S 51 W	
300 S 15 E			
250 N 86 W	de la ferme de Valle de Corcho.	450 N 57 W	
550 S 53 W		250 N 67 W	
1020 S 73 W		400 S 73 W	de la ferme de Volta dos Nogaes.
650 S 74 W		450 S 83 W	
		500 S 33 W	
1750 N 89 E		1650 S 47 W	
270 S			
300 S 29 E		2500 N 75 E	
2000 S 45 E		900 S 35 W	
400 S 71 E		1150 S 55 W	
500 S 49 W		1200 S 54 E	
700 S 87 E		1200 S 56 E	
770 S 65 W		1250 S 17 W	du signal de Boticas.
1100 S 83 E	du signal de Lobo.	1550 S 55 W	
1100 S 57 E		1700 S 28 W	
1200 S 77 E		2050 S 50 W	
1200 S 59 E		2150 S 69 W	
1300 S 65 E		2200 S 35 W	
1370 S 69 E		2830 S 73 W	
1380 S 79 E			
1450 S 55 E		1500 N 73 E.	du pont de Russiana.
1450 S 43 W		1100 N 67 W	
1550 S 59 W		900 N 82 W	de la ferme de Russiana.
		400 N 89 W	

350 ^m au S 27° E			800 ^m au N 68° E		
200 S 47 E	de la ferme de Russiana.		800 N 81 E	du signal de Perdigão.	
650 S 71 W			800 N 3 E		
950 N 23 W			570 N 29 E		
950 N 17 W	du signal de la serra Colorada.		150 S 79 E		
900 N			40 S 73 W		
850 N 37 E			750 S 50 E		
850 N 33 E			800 S 77 W		
600 N 73 E			800 S 72 W		
550 N 56 E			850 S 53 W		
500 N 63 E			1400 N 49 W	de l'église de Barrancos.	
350 N 73 E			1300 N 62 W		
250 N 53 E			1470 N 45 W		
480 S 81 E			1150 N 47 W		
600 S 77 E			550 N 47 W		
700 S 57 E			400 N 52 W		
950 S 62 E			150 S 13 W		
1000 N			250 S		
650 N 51 W			400 S 25 W		
600 N 42 W			600 S 17 E		
650 S 25 E	de la ferme de Coitadinha.		1100 S 85 O	de Barrancos.	
750 S 14 W			1100 S 45 E		
650 S 30 W			1200 S 27 E		
			1070 S 44 E		
1600 N 79 E	du signal de Noudar.		200 N 17 W	de Barrancos.	
1100 N 57 E			100 S 63 W		
360 N 50 E			500 S 12 E		
1200 S 60 W			600 S 37 E		
1500 S 82 E			1000 N 55 W	du signal de Calvario.	
700 N 73 E	de la chapelle de San Ginez.		1000 N 22 W		
650 N 53 E			900 N 13 W		
350 N 53 E			800 N 51 W		
350 N 48 E			800 N 17 W		
550 N 50 E			750 N 41 W		
400 S 12 E			550 N 17 W		
750 S 23 W			450 N 18 E		
850 S			400 N 37 W		
1200 S 7 E			300 N 43 E		
1350 S 27 E			450 N 71 W		
1500 S 12 E			100 S 73 W		
1500 S 25 E			750 S 33 E		
1600 S 17 E	de la ferme de Defeza.		1350 N 7 W	du signal d'Eiras Altas.	
1850 S 63 E			1650 N 7 E		
2400 S 37 E			1500 N 45 E		
850 N 30 W			1300 N 11 W		
400 N 62 W	du signal de Perdigão.		1200 N 7 E	de la ferme de Jeronymo.	
170 S 81 W			1150 N 49 E		
700 S 28 E			900 N 63 E		
3200 N 62 W	de la ferme de Saramago.		850 N 59 E		
1250 N 23 W			2050 N 78 W	de la ferme de Saramago.	
1000 N 13 W			1800 N 83 W		
825 N 67 E					

850^m au S 30° W }
 1450 S 85 W } de la ferme de Saramago.
 950 N 65 W du signal de Gata.

400^m au S 27° W }
 450 S 2 W }
 500 S 3 W } du signal de Gata.
 1050 S 21 E }

LISTE DES LOCALITÉS OÙ L'ON A DÉCOUVERT LES ESPÈCES DE LA FAUNE COBLENTZIENNE
 EN DES LITS INTERCALÉS DANS LA SÉRIE GOTHLANDIENNE

650^m au S 19° W }
 700 S 33 W }
 700 S 23 W }
 750 S 5 E }
 900 S 59 W }
 950 S 5 E }
 1000 S 53 W }
 1000 S 5 W } du signal de Lobo.
 1100 S 31 E }
 1100 S 38 E }
 1200 S 20 E }
 1350 S 31 W }
 1370 S 55 W }
 1500 S 13 W }
 2150 S 23 E }
 2150 S 12 E }
 1800 N 71 W }
 1300 N 87 W }
 950 N 63 W }
 900 W }
 580 S 55 W }
 600 S 23 W }
 900 S 79 W }
 1000 S 75 W }
 1030 S 17 E } du signal de Cuco.
 1100 S }
 1100 S 13 E }
 1250 S 9 E }
 1300 S 70 W }
 1400 W }
 1400 S 30 E }
 1500 S 79 W }
 1500 S 77 W }
 1050 N 69 E }
 1050 N 73 E }
 1000 N 23 E } du signal de Boticas.
 900 N 71 E }
 700 N 21 E }

700^m au N 77° E }
 600 N 53 E }
 550 N 21 W }
 350 N 10 W }
 400 E }
 850 E } du signal de Boticas.
 1200 S 75 E }
 1200 S 65 E }
 1250 S 84 E }
 1500 S 85 E }
 200 N 87 E }
 200 N 73 E }
 150 N 33 W }
 150 N 5 W }
 150 N 75 E } de la ferme de Russiana.
 150 N 71 E }
 120 N 73 E }
 200 S 87 E }
 500 S 73 E }
 1150 N }
 1000 N 59 E }
 950 N 61 E }
 920 N 37 E }
 920 N 41 E }
 900 S 80 E }
 870 N 49 E } du signal de la serra Colorada.
 750 S 81 E }
 750 E }
 670 N 81 E }
 650 N 65 E }
 550 N 73 E }
 700 S 87 E }
 720 N 63 E }
 720 N 71 E }
 700 N 47 E }
 650 N 63 E } du signal de Perdiggão.
 620 N 29 E }
 600 N 49 E }

Une troisième coupe, faite de Santo Aleixo à la ferme d'Eiras Altas, complète la section à travers le grand affleurement du Silurique de l'Alemtejo, révélant l'existence d'un grand synclinal dans lequel sont représentés, d'un côté et de l'autre, avec divers développements, les couches traversées par les deux coupes ci-devant décrites.

Coupe de Santo Aleixo à la ferme d'Eiras Altas (Pl. VIII, profil n° 1)

ARCHAÏQUE

1. Schiste chloritique, gris, avec quelques lits de quartz, imprégné de calcaire qui forme également des plaquettes concordantes avec la stratification; et schiste vert en partie zoné, à lames irrégulières de spath calcaire, de couleur rosée claire, qui imprègne également le schiste. Les couches sont très contournées et renferment de nombreuses veines ainsi que des lits irréguliers de quartz blanc, interstratifiés dans le schiste. Le village de Santo Aleixo repose sur ces couches, les mêmes que celles qui vont passer à Safára et Santo Amador et qui appartiennent au toit de l'Archaïque. Les strates suivent vers N. 45 à 60° W. et sont inclinées de 40 à 70° sur le N.E.

SILURIQUE INFÉRIEUR

Schistes de Barrancos

2. Distance horizontale 1.260^m.—Schistes argileux, gris, et en quelques points violets, fins et fissiles, mais sans fossiles. Les couches ont la direction N. 45 à 60° W. avec inclinaisons très fortes de 65 à 80° sur l'est et sur l'ouest; quelques-uns des lits arrivent à être verticaux. Ces schistes appartiennent certainement au système silurique, mais semblent concorder avec ceux de l'Archaïque; aussi, pour ce motif, est-il fort difficile de tracer la ligne de démarcation entre les deux systèmes. De même que pour les schistes des numéros suivants, les strates ont été fort soumises à des contorsions et ont été très ridées par suite des pressions latérales; elles présentent d'innombrables plis et replis, les voûtes ayant été enlevées par érosion.

3. Dist. hor. 1.660^m.—Schistes fins, fissiles en grande partie, à coloration grise, rougeâtre ou violette, avec la même direction et le même plongement que ceux du numéro précédent auxquels ils sont reliés, étant traversés par d'innombrables veines irrégulières de quartz blanc qui les croisent dans toutes les directions.

4. Dist. hor. 700^m.—Schistes semblables à ceux du numéro précédent, très fins et fissiles, à coloration identique, comprenant quelques strates zonées de gris foncé et blanchâtre; ils présentent divers plis et sont partiellement traversés par plusieurs veines de quartz. Leur allure et leur plongement sont les mêmes que pour les couches précédentes.

5. Dist. hor. 1.270^m.—Schistes très fins et fissiles, de coloration verte et violette; on peut en extraire des dalles planes. Ils correspondent évidemment aux schistes à l'est de Barrancos. Quelques lits montrent des empreintes de *Myrianites* et d'autres Annélides, des pistes de Crustacés (J. Hall), des moules de *Palaeochorda*, de *Palaeophycus* et de *Chondrites?*, ainsi que des empreintes de gouttes de pluie et de filets d'eau ruisselant sur la surface de la vase de la plage; ils présentent également le *ripple-mark* produit par l'action d'une douce brise sur la même surface. La direction des strates et l'inclinaison et le sens du plongement sont encore les mêmes que celles des couches précédentes. En quelques points ces schistes sont plissés en zig-zag, les tournants sont si étroits qu'ils peuvent s'observer sur des échantillons manuels.

6. Dist. hor. 2.060^m.—Schistes très fins et fissiles, gris et violets, se divisant en lames très minces, à surface plane, avec des moules et des empreintes de *Nemertites* et de *Myrianites*, près de l'extrémité occidentale de ce groupe de couches, immédiatement à l'est de la rivière de Murtigão, et également près de la ferme de Maria Carrasca dans le passage au numéro suivant. A la surface de quelques lits, on observe de petites fossettes circulaires, de diamètre variable, dans lesquelles on voit une accumulation de mica; toutefois ces fossettes ne correspondent pas à des trous qui traversent perpendiculairement le schiste. La direction de la stratification est encore concordante avec celle des couches précédentes, mais l'inclinaison est très forte vers l'est et vers l'ouest, étant même verticale dans la plupart des cas.

7. Dist. hor. 350^m.—Schistes très fins et fissiles, de couleur vert-jaunâtre et également violette; au milieu de ce groupe de couches il y a, près de la ferme de Maria Carrasca, des empreintes de *Nemertites*, de *Palaeochorda minor* et des pistes de Crustacés (J. Hall), plus probablement d'Annélides qui marchaient sur la vase couverte d'une mince couche d'eau. Les couches sont concordantes avec celles des numéros précédents, et les inclinaisons sont semblables.

Schistes à Phyllocytes

8. Dist. hor. 450^m.—Schistes téglaires à coloration d'un vert-clair, très micacés, avec le mica distribué irrégulièrement et accumulé en abondance extraordinaire sur différents points; ils comprennent quelques lits de grauwacke et de quartzite. Ces schistes ont exactement l'aspect de ceux de la carrière de Mestre André, auxquels ils correspondent sans le moindre doute. Dans les couches les plus à l'est de l'assise on a découvert des moules de *Palaeochorda major* et de *P. minor*. Les couches suivent en concordance avec celles des numéros antérieurs.

Dans le passage au numéro suivant, on voit en quelques points des lits de grauwacke dure, passant au quartzite, épais de quelques décimètres, qui représentent, quoique avec moins de développement, l'assise des grauwackes et des quartzites de la serra Colorada. Mais cette strate quartzreuse manque en bien des points, le schiste à Graptolites du n° 9 reposant immédiatement sur les schistes téglaires. Sur la direction de la coupe, ce passage est marqué par une forte discordance comme l'on voit par le diagramme suivant:

Tranchée de la route de Barrancos à 600^m au S. 5° E. du signal de Gata

SILURIQUE SUPÉRIEUR

Horizon inférieur des Graptolites

9. Dist. hor. 100^m.—Schistes fins, gris, d'une teinte plus ou moins foncée, ou à coloration rouge clair ou violette, avec beaucoup d'empreintes de Graptolites pour la plupart très frustes, mais qui marquent bien un horizon fossilifère se poursuivant sur plusieurs dizaines de

kilomètres, sur toute la longueur de l'affleurement silurien. Dans la direction de la coupe, c'est à peine si nous avons pu déterminer les espèces suivantes:

Monograptus dubius Suess.

» *Sedgwicki* Portl.?

Stomatograptus cf. *grandis* Suess. (6 an sp. n.)

A l'ancienne Contenda de Moura, à 700 mètres au S. 53° E. du signal de Mofeda Escura, on a rencontré dans le même horizon et dans un schiste fin, fissile, violet clair, les espèces suivantes de Graptolites, représentées par d'innombrables empreintes:

Monograptus Proteus Barr.

» *lobiferus* McCoy.

» *colonus* Barr.

» *spiralis* Gein. var. β sub-
conicus Törnq.

» *ansulosus* Törnq.

» *priodon* Bronn.

» *latus* McCoy.

» *communis* Lapw.

» *Bohemicus* Barr.

Monograptus indét., 2 espèces probablement nouvelles.

Linograptus Nilssoni Barr. sp.

Cyrtograptus Lapworthi Tullb.

» *Lundgreni* Tullb.

» *spiralis* (Gein.) Tullb. (*M. convolutus* Gein. non His.)

» *Murchisoni* Carr. var. *crassiusculus* Tullb. f.

Stomatograptus cf. *Törnquisti* Tullb. f.

Dans le prolongement de la même couche vers le sud-est, très près de la frontière mais déjà en territoire espagnol, à 500 mètres au S. 55° E. du signal du Alto do Charco Portuguez, on a recueilli les espèces suivantes dans un schiste gris noirâtre, maculé de taches blanchâtres, avec beaucoup d'empreintes de Graptolites. Il renferme quelques lits de schiste siliceux et quelques rognons durs, siliceux ou grésiformes.

Monograptus priodon Br.

» *Barrandei* Suess.

» *lobiferus* McCoy.

» *convolutus* Gein. non His.

» *Proteus* Barr.

» *sartorius* Törnq.

» *spiralis* Gein. var. β sub-
conicus Törnq.

» *latus* McCoy.

» aff. *distans* Portl.

» *ansulosus* Törnq.

Monograptus priodon Br. var. *Flemingi* Lapw.
(*M. Flemingi* Salter in Lapw.)

Cyrtograptus Murchisoni Carr., type de l'espèce.

» *Murchisoni* Carr. var. *crassiusculus* Tullb. f.

Retiolites Geinitzianus Barr.

Stomatograptus cf. *grandis* Suess. f.

» *Törnquisti* Tullb.

» » sp.

Cet horizon semble être le même que celui de la bande graptolitique de Vallongo, ainsi que cela se voit d'après le grand nombre d'espèces de Graptolites qui sont communes aux deux localités. Il correspond également à la couche à nodules ou horizon inférieur des Graptolites de Barrancos (n° 8 de la coupe d'Eiras Altas à la ferme de Volta dos Nogaes); toutefois, la lydite noire manque dans la direction de la coupe ainsi que les nodules qui se rencontrent, comme nous l'avons vu, dans le prolongement sud de la strate fossilifère, en dedans de l'ancienne Contenda de Moura. Les couches sont concordantes avec celles des numéros antérieurs et s'inclinent de 60 à 70° sur l'est; quelques-unes arrivent à être verticales.

10. Dist. hor. 1000^m.—Schistes de couleur grise et vert-jaunâtre, avec des intercalations de beaucoup de strates de grauwackes plus ou moins grossières, passant même quel-

quefois à un véritable conglomérat, et contenant plusieurs moulages de débris de tiges de végétaux répartis en diverses couches. L'une de ces couches passe près du signal de Gata.

Le coteau de Gata est constitué par des grauwackes verdâtres et est couronné par une couche de conglomérat très grossier, composé de gros grains de quartz gris et de petits fragments de schiste gris cimentés par une pâte de grès argileux.

Les grauwackes ont une structure prismatique et les fragments détachés à la surface du sol présentent des formes anguleuses irrégulières.

La direction des couches est concordante avec celle des assises décrites et l'inclinaison est verticale ou de 70 à 80° sur l'est et sur l'ouest. Au-delà de la coupe, à 1.150 mètres au N. 25° W. du signal de Gata, on rencontre un quartzite grisâtre, en lits très minces, d'un centimètre et moins d'épaisseur, avec des moulages d'algues et des empreintes de *Nereites*?

11. Dist. hor. 1.070^m.—Schistes argileux, gris, avec quelques grauwackes fines et en partie schistoïdes. En dehors de la coupe, mais compris dans ce numéro, à 1.300 mètres au N. 5° E. du signal de Gata, on rencontre un quartzite gris en lits très minces, dont la surface montre des empreintes de *Néréites*, on y voit aussi quelques couches de conglomérat avec de gros cailloux de quartzite, très roulés, dans la pâte du même schiste gris, imprégné de calcaire faisant effervescence avec les acides. La direction des couches est N. 25 à 50° W. et l'inclinaison est ou verticale ou de 60 à 80°, tant sur l'est que sur l'ouest.

12. Dist. hor. 1.900^m.—Ce grand intervalle est occupé par des schistes avec intercalation de rares lits de grauwackes, dans l'un desquels on a découvert des moulages de débris de tiges de végétaux à 550 mètres au S. 53° W de la ferme de Claudio, sur la route de Santo Aleixo à Barrancos. Dans les tranchées de la route on observe de nombreux plis dont les sommets ont été détruits partout ailleurs, sous l'influence de l'érosion.

La direction et l'inclinaison des couches sont très variables, les directions sont ordinairement N. 55 à 85° W. et l'inclinaison est tantôt sur le quadrant du N. E., tantôt sur celui du S. W., depuis 30 jusqu'à 90°.

Au-delà de la direction de la coupe, mais appartenant à ce groupe de couches, il y a au sommet, avec la cote 323, au-dessus du ruisseau de Gamos, quelques puissantes couches de grauwackes, les unes très grossières, les autres fines.

Un peu en avant sur le même ruisseau, à 2.100 mètres au S. 40° W. de la ferme d'Eiras Altas, on voit quelques lits fort minces de quartzite, au milieu des schistes; ces lits renferment des empreintes de *Nereites* et des moulages d'algues. Egalemeut au-delà de la coupe, à 1.900 mètres au S. 50° W. de la ferme d'Eiras Altas, on observe des empreintes de *Nemertites*, près d'un faisceau de strates, épais de 50 mètres, formés par un conglomérat composé de cailloux très roulés à forme arrondie ou ellipsoïdale, dont quelques-uns arrivent à être fort volumineux comme de petits melons, de quartzite, de quartz et de calcaire cimentés par une pâte de schiste d'un gris foncé.

Adossée à ce conglomérat du côté de l'est, on a découvert une petite masse de calcaire parfaitement compact, schistoïde, ressemblant beaucoup par son aspect au calcaire à Crinoïdes et Polypiers qui accompagne les fossiles dévoniens à l'est de la serra Colorada; toutefois, on n'a pas rencontré ici de vestiges de ces fossiles.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que cette petite masse de calcaire occupe un niveau très supérieur aux calcaires de Barrocal. Le conglomérat correspond peut-être à la

bande de la même roche qui est traversée par la route en amont du pont d'Encinasola, où apparaissent également des calcaires.

13. Dist. hor. 2.520^m.— Schistes d'un gris foncé, en partie fissiles, avec quelques lits de grauwaque fine dans lesquels on n'a pas découvert de fossiles. Ces schistes appartiennent au même étage que ceux des numéros 1 et 2 de la coupe de la ferme d'Eiras Altas à Volta dos Nogaes, avec lesquels ils doivent être réunis. Ils suivent les mêmes directions N. 65° W. à N. 85° W. en concordance avec les couches précédentes et s'inclinent de 50 à 70° vers le S. W.; quelques lits arrivent même à être verticaux.

A 1.400 mètres au S. 10° W. de la ferme d'Eiras Altas, en dehors de la direction de la coupe, passe un schiste fissile avec *Nemertites* et un lit de conglomérat à cailloux très roulés et ellipsoïdaux de grauwaque fine.

Restent compris dans ce numéro les schistes de Monte do Castello, à 8 kilomètres à l'est d'Amarelleja, où l'on a trouvé, au fond d'un ravin descendant du coteau de Mentiras, de nombreuses empreintes de *Nereites* ainsi que des moulages d'algues, en particulier de *Nereites* cf. *pugnus* Emm., *N.* aff. *Jacksoni* Emm., en outre de *Nereites*, *Myrianites* et *Nemertites* indéterminées, ainsi qu'un *Palaeophycus* dans un schiste tégulaire, dur, gris foncé. Je crois que ce sont les mêmes couches qui vont passer près de la ferme de Claudio à une lieue à l'ouest de Barrancos. Dans les schistes de la ferme do Forte près de Bencatel, qui occupent à peu près le même niveau, on a trouvé des empreintes semblables.

Classification des dépôts.— En réunissant les couches des trois coupes décrites d'après leur contenu organique, puis en combinant ce critérium avec celui qui dérive des caractères lithologiques, en tenant en outre compte des plissements que les couches ont subi et qui les ont fait répéter à plusieurs reprises, nous croyons pouvoir distinguer dans le Silurique de cette région sept assises distinctes qui se succèdent de haut en bas dans la forme suivante:

7. Schistes et grauwaques avec présence dans certaines couches de débris de tiges de végétaux.
6. Schistes et lydite à Graptolites de Noudar avec des débris de tiges de végétaux et des empreintes de Néréides dans quelques couches.
5. Schistes rayés avec empreintes de *Nereites* auxquels sont subordonnés les calcaires et les brèches en masses lenticulaires, plus ou moins grandes, ainsi que les minces lits irréguliers qui en de nombreux points accompagnent des enclaves de fossiles dévoniens.
4. Schistes à nodules avec *Cardiola interrupta*, contenant une faune graptolitique variée et riche en espèces.
- Lacune.
3. Grauwaque et quartzite de la serra Colorada.
2. Schistes de Barrancos (à l'est) comprenant dans leur partie supérieure les phyllades de la carrière de Mestre André avec plusieurs moules d'algues et des empreintes de Néréides et contenant une forme remarquable de Graptolite (*Didymograptus sparsus* Hopk.).
1. Schistes de Fatuquedo.

Épaisseur de la série.— En admettant que l'épaisseur totale de ces dépôts est très considérable, certainement de plusieurs centaines ou même de quelques milliers de mètres, elle n'est néanmoins pas en rapport avec la largeur de l'affleurement qu'ils forment.

Sur le parallèle de Mourão, par exemple, on ne voit que les schistes de Barrancos qui y ont leur plus grand développement, occupant une largeur de 26 kilomètres perpendiculairement à la direction des couches, ce qui sans plus ample examen nous montre immédiatement que les couches sont répétées à plusieurs reprises en plusieurs ondulations ou plis parallèles formant une série d'anticlinaux et de synclinaux subordonnés au plissement principal.

Au contraire, dans la partie septentrionale de l'affleurement, les schistes à Graptolites présentent un très grand développement, ils sont interrompus et refoulés sur les deux côtés par l'intrusion de l'affleurement des calcaires archaïques d'Estremoz.

Considérations générales sur les coupes décrites.— L'assise des schistes et des grauwackes supérieurs (n° 7 du tableau ci-dessus) se dirige vers le nord, serrée entre les deux bandes graptolitiques parallèles qui sont indiquées sur la carte géologique par une série de repères qui indiquent les principaux gisements fossilifères; elle va se terminer au massif des calcaires archaïques, car au nord d'Alandroal on ne voit que les schistes à Graptolites.

Comme il est clair que les deux bandes graptolitiques, l'orientale et l'occidentale, appartiennent au même niveau géologique, on reconnaît que les couches du grand affleurement silurien de l'Alemtejo forment un long synclinal, les couches étant répétées dans l'un et dans l'autre flanc.

D'autre part il est évident que les couches, étant obligées d'occuper beaucoup moins de largeur que celle qu'elles avaient primitivement, ont formé par suite du plissement plusieurs plis parallèles, ce qui fait paraître leur développement vertical plus grand qu'il ne l'est réellement. De plus, il semble qu'il y a une succession de plusieurs horizons fossilifères différents qui cependant n'existent pas en réalité.

Inférieurement, c'est-à-dire à l'ouest de la bande graptolitique occidentale, on a découvert en plusieurs points, et particulièrement à l'ouest d'Amarelleja et à l'est de Santo Aleixo sur la route de Barrancos, des marques et des pistes de *Nereites* et des moulages d'algues ressemblant à celles que l'on a découvert dans les schistes de Barrancos et de la carrière de Mestre André. Cela montre la correspondance générale qu'il y a entre le faisceau schisteux à l'occident et celui à l'orient, bien que du côté de l'occident la série des couches qui s'observe aux environs de Barrancos n'est représentée en aucun point, du moins avec les mêmes caractères.

Un schiste tégulaire gris-verdâtre, irrégulièrement micacé, qui s'observe près d'Amarelleja, renferme des moules de *Palaeochorda* et présente des caractères identiques à ceux des schistes du versant occidental de la serra Colorada; c'est ce qui confirme d'ailleurs la correspondance indiquée.

Une couche de quartzite accompagne dans le coteau de Gata (cote 297 à l'ouest de Barrancos) le schiste fin de coloration grise ou rougeâtre qui renferme les Graptolites; on en a également découvert à Granja, aux sommets d'Atalaia da Coxa (cote 227) et de Cuncos (cote 216, à une lieue à l'est de Mourão), au sommet d'Azinhal Redondo (cote 210), à Valle de Clara (cote 311, à l'ouest de Terena) et le long du versant oriental de la serra d'Ossa. Toutefois vers la cime sur laquelle repose le signal de Cuncos, on voit que les quartzites sont plissés et qu'ils

ont obéi à la même pression latérale que les schistes de Mourão. Ils forment là un petit pli anticlinal dans la direction N.-S. qui correspond au sommet du coteau, les strates se montrant verticales du côté de l'occident et moyennement inclinées du côté du levant où elles vont se relier à un pli synclinal qui pénètre en territoire espagnol.

Par suite de la différence de caractères de la bande du Silurique, traversée par la coupe d'Eiras Altas à Volta dos Nogaes, comparée avec le groupe de couches qui se développe vers l'ouest du sommet de Gata, on est forcé d'admettre que, pendant que se déposait à l'est, dans la région de Barrancos, l'épaisse formation de schistes à Graptolites qui accuse un mouvement d'affaissement lent du fond de la mer, la région occidentale restait presque immobile.

En effet là est représentée, par une très petite épaisseur de strates, toute la série des schistes graptolitiques et des calcaires superjacentes aux grauwackes de Barrancos et de la serra Colorada. En tout cas, près des ponts de Godelim, à 3 kilomètres au N.N.W. de Granja, immédiatement au-dessus de la couche de quartzite qui accompagne les Graptolites, donc à peu près sur le même horizon que ces fossiles, on a découvert des débris de Polypiers et de Crinoïdes qui rappellent les colonies de fossiles dévoniens qui occupent ce même niveau dans la coupe d'Eiras Altas à Volta dos Nogaes.

D'autre part, la répétition de la même couche fossilifère à formes variées de Graptolites, formant deux lignes brisées à peu près parallèles, suivant une étendue aussi considérable que celle de la longueur de l'affleurement silurien et occupant la partie moyenne de cet affleurement, rend assez probable, sinon presque certain, que cette coupe traverse la branche orientale d'un synclinal principal. Les conglomérats et les brèches du sommet de Gata et de Granja sont contemporains des calcaires et brèches de Barrancos; quant aux grauwackes de cette localité et aux schistes sous-jacents, ils ont leur correspondant stratigraphique dans le puissant groupe schisteux qui se développe à l'occident du signal de Gata vers Santo Aleixo et Safára.

Ainsi que nous l'avons dit, on rencontre en effet à Amarelleja des schistes parfaitement analogues à ceux de la carrière de Mestre André et qui renferment quelques-unes des espèces fossiles qui s'y rencontrent.

Dans la branche occidentale du grand synclinal dont l'axe peut être considéré comme passant à mi-distance entre le sommet de Gata et Barrancos et comme se prolongeant sur le nord parallèlement à la ligne tracée par la série de gisements fossilifères qui se dirige vers la base de la serra d'Ossa, les calcaires sont à peine indiqués dans la mine d'Apariz, près de la ferme de Saramago, les deux horizons, supérieur et inférieur de Graptolites, étant réunis dans une même couche.

Faune de la bande graptolitique occidentale.— Des deux bandes fossilifères c'est l'occidentale que l'on a pu le mieux suivre et c'est celle qui renferme une faune plus riche, attendu que l'on y a découvert 49 formes différentes de Graptolites qui appartiennent pour la plupart au genre *Monograptus*; plusieurs de ces formes sont communes à celles du Silurique supérieur de Val-longo, par conséquent elles doivent se rapporter plausiblement au même horizon géologique. Cette faune est indiquée sur la liste suivante:

<i>Rastrites</i> aff. <i>gemmatus</i> Barr.	<i>Monograptus</i> aff. <i>colonus</i> Barr.
<i>Retiolites</i> <i>Geinitzianus</i> Barr.	» <i>Sedgwicki</i> Portl.
» sp. aff. <i>Geinitzianus</i> Barr.	» aff. <i>Sedgwicki</i> Portl.
» sp. (6 an <i>R. fibratus</i> Lapw.)	» cf. <i>vomerinus</i> Nich.
<i>Monograptus</i> <i>Halli</i> Barr.	» <i>latus</i> McCoy.
» <i>discretus</i> Nich.	» aff. <i>latus</i> McCoy.
» cf. <i>discretus</i> Nich.	» <i>sagittarius</i> His.
» <i>tenuis</i> Portl.	» aff. <i>Nilssoni</i> Barr.
» aff. <i>tenuis</i> Portl.	» cf. <i>Flemingii</i> Salt. sp.
» <i>Becki</i> Barr.	» <i>distans</i> Portl.
» <i>lobiferus</i> McCoy.	» cf. <i>fimbriatus</i> Nich.
» cf. <i>testis</i> Barr.	» aff. <i>Riccartonensis</i> Lapw.
» <i>triangulatus</i> Harkn.	» aff. <i>antennulatus</i> Menegh.
» cf. <i>crispus</i> Lapw.	» <i>ultimus</i> Perner.
» cf. <i>Clingani</i> Carr. sp.	» <i>argutus</i> Lapw.
» cf. <i>Barrandei</i> Suess.	» <i>dubius</i> Suess.
» aff. <i>Barrandei</i> Suess.	» <i>communis</i> Lapw.
» <i>convolutus</i> His.	» <i>priodon</i> Br. var. <i>validus</i> Perner.
» <i>Proteus</i> Barr.	» <i>flagellaris</i> Törnq.
» <i>spiralis</i> Gein.	» <i>lobiferus</i> McCoy. var. <i>Nicoli</i> Harkn.
» <i>priodon</i> Br.	» <i>cultellus</i> Törnq.
» aff. <i>priodon</i> Br.	<i>Linograptus</i> <i>Nilssoni</i> Barr. sp.
» cf. <i>mutuliferus</i> Menegh.	<i>Stomatograptus</i> <i>Törnquisti</i> Tullberg.
» aff. <i>distans</i> Portl.	<i>Tetragraptus</i> ?
» <i>colonus</i> Barr.	

Cette bande graptolitique peut être suivie depuis la frontière (au milieu de l'ancienne Contenda de Moura, à 7 kilomètres au sud de Barrancos) dans la direction du N.W. Elle passe au sommet de Gata (cote 297), au sommet de Travessa (cote 298), dans la serra d'Amarella (cote 253 à l'est d'Amarelleja); elle se continue dans la même direction sur Granja où elle tourne vers le nord, passant à 6 kilomètres à l'est de Mourão. Là elle s'infléchit encore une fois sur le N.W., passe à l'ouest de Terena et se continue suivant la base orientale de la serra d'Ossa, se prolongeant encore sur le nord-ouest sur plus de 50 kilomètres, vu qu'elle passe à 3 kilomètres au S.W. d'Estremoz et qu'elle rejoint Aviz, où l'on a découvert plusieurs affleurements graptolitiques.

Dans ce long trajet qui n'est pas inférieur à 140 kilomètres, on a découvert des fossiles en plusieurs points, mais parmi tous les gisements fossilifères le plus important par la variété d'espèces est celui de Fonte Ferrenha, à la base de la serra d'Ossa, à 5 kilomètres au S. 42° W. de l'église de Bencatel et près de la route de ce village au bourg de Redondo. Dans cette localité on a obtenu les espèces suivantes:

<i>Monograptus</i> <i>colonus</i> Barr.	<i>Monograptus</i> <i>sagittarius</i> His. (<i>M. leptotheca</i>
» <i>latus</i> McCoy.	Lapw., d'après Tullberg).
» <i>ultimus</i> Perner.	» <i>Proteus</i> Barr.
» <i>argutus</i> Lapw.?	» <i>vomerinus</i> Nich.
» <i>dubius</i> Suess.	» <i>convolutus</i> His.?
» <i>communis</i> Lapw.	» <i>Halli</i> Barr.
» <i>testis</i> Barr.?	» <i>discretus</i> Nich.

<i>Monograptus priodon</i> Br.	<i>Monograptus</i> cf. <i>Sedgwicki</i> Portl.
» » Br. var. <i>validus</i>	» ind., diverses espèces.
» Perner.	<i>Linograptus Nilssoni</i> Barr. sp.
» <i>Becki</i> Barr.	<i>Retiolites Geinitzianus</i> Barr.
» aff. <i>distans</i> Portl.	» sp. aff. <i>Geinitzianus</i> Barr.
» <i>flagellaris</i> Törnq.	» cf. <i>fibratus</i> Lapw.
» <i>lobiferus</i> McCoy. var. <i>Ni-</i>	<i>Stomatograptus Törnquisti</i> Tullb. (<i>Stom. gran-</i>
» <i>coli</i> Harkn.	» <i>dis</i> Suess, d'après Törnq. et F. Roemer).
» <i>cultellus</i> Törnq.	<i>Tetragraptus</i> ?

Au total 27 espèces, dont 15 sont communes à celles de Vallongo.

Faune de la bande graptolitique orientale. — La bande graptolitique orientale a fourni à peine 6 espèces au sommet de l'Algarve Secco, là où elle est le mieux représentée:

<i>Monograptus spiralis</i> Gein.	<i>Monograptus</i> aff. <i>colonus</i> Barr.
» <i>Proteus</i> Barr.	<i>Retiolites Geinitzianus</i> Barr.
» aff. <i>priodon</i> Br.	<i>Rastrites</i> aff. <i>gemmatus</i> Barr.

Toutes ces espèces, sauf la dernière, ont été aussi découvertes dans la bande occidentale.

A l'est et parallèlement aux deux bandes graptolitiques décrites, il y a une autre bande qui se prolonge de San Romão vers Veiros, passant à l'est de ce village et à une demi-lieue au N.N.E. de Fronteira, où l'on n'a trouvé de fossiles qu'en deux points à peine. Sans le moindre doute cette troisième bande est, par suite d'un pli des couches, la répétition de l'horizon fossilifère des deux autres. Les deux points dont il est question sont: la ferme de Torneiros, à 4.350 mètres au N.W. de l'église de Terrugem, et le point à 1.150 mètres au S. 42° W. de l'église de Santo Aleixo, près de la limite orientale de l'affleurement silurien.

On a découvert dans ces points les espèces suivantes:

Près de la ferme de Torneiros:

<i>Monograptus spiralis</i> Gein. var. β sub-	<i>Monograptus convolutus</i> His. var. <i>communis</i>
» <i>conicus</i> Törnq.	Lapw.
» <i>latus</i> McCoy.	» ind., plusieurs espèces.
» <i>Sedgwicki</i> Portl. sp.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.

Au S.W. de Santo Aleixo:

<i>Monograptus convolutus</i> His.	<i>Monograptus</i> aff. <i>tenuis</i> Portl.
» <i>Proteus</i> Barr.	» <i>harpago</i> Törnq. (cf. <i>M. lobife-</i>
» <i>communis</i> Lapw.	» <i>rus</i> var.)
» <i>testis</i> Barr.?	» ind., diverses espèces.

On a également trouvé des fossiles à 2.300 mètres au S.W. de l'église de San Romão en un point qui est au delà de l'alignement précédent. Les espèces recueillies sont:

<i>Monograptus spiralis</i> Gein. var. β sub-	<i>Monograptus convolutus</i> His. (<i>M. spiralis</i> Barr.
» <i>conicus</i> Törnq.	non Gein.)
» <i>priodon</i> Br.	<i>Phyllograptus typus</i> Hall.

Différences dans la nature des dépôts.—En observant attentivement le tableau que nous avons présenté (pag. 209) on voit qu'au-dessous du groupe schisteux, caractérisé par une faune graptolitique abondante, il y a une assise de quartzites et de grauwackes qui en est séparée par une forte discordance. Ces grauwackes annoncent une série de conditions physiques absolument différentes de celles dans lesquelles se sont formés les schistes qui leur ont succédé. Donc les deux groupes de couches représentent deux horizons stratigraphiques et paléontologiques distincts. Les schistes à Graptolites appartiennent évidemment au Silurique supérieur (Wenlock); les grauwackes et les schistes de Barrancos comprenant ceux de la carrière de Mestre André doivent donc appartenir à l'Ordovicien.¹

Les schistes de la carrière de Mestre André indiquent un horizon fossilifère particulier, caractérisé par plusieurs espèces de Néréides et de plantes marines et spécialement par une forme notable de Graptolite (*Didymograptus sparsus* Hopk.) qui d'après les meilleures autorités a été jusqu'à présent considérée comme appartenant à l'étage d'Arenig²; cependant à Vallongo nous avons vu que cette espèce occupe un niveau supérieur à celui des quartzites à Bilobites, par conséquent elle appartient à la base de l'Ordovicien moyen.

Faisant corps avec les schistes de la carrière de Mestre André et intimement reliée à eux, se développe inférieurement une puissante assise schisteuse, les schistes de Barrancos, dans lesquels on a découvert quelques rares moules et empreintes de Néréides. On doit conclure que ces schistes appartiennent à la partie inférieure de l'Ordovicien, c'est-à-dire qu'ils sont un représentant taxonomique ou dépôt contemporain des quartzites à Bilobites et à Scolithus qui s'est formé en des eaux plus profondes ou à une plus grande distance de la plage que ces quartzites.

Au-dessous des schistes de Barrancos vient l'étage des schistes de Fatuquedo dans lequel on n'a pas découvert des fossiles; c'est à peine si l'on a trouvé en un point (comme nous l'avons dit) quelques moules d'algues (*Chondrites?*) et des trous d'*Arenicolites*, mais il est bien probable que ces fossiles appartiennent plutôt aux schistes de Barrancos.

¹ On doit supposer que les grauwackes de la serra Colorada, ainsi que les schistes et grauwackes de Barrancos se sont déposés à l'époque ordovicienne. En effet, Keeping [*The geology of Central Wales* (Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London, vol. xxxvii, 1881, p. 170)] dit que tous les faits observés concordent pour indiquer la continuité des dépôts siluriens et cambriens (Sedgwick) (c'est-à-dire du Silurique supérieur ou Silurique proprement dit et du Silurique inférieur) dans l'ouest et dans le centre du pays de Galles, tandis qu'une importante interruption (*break*) se manifeste à l'est et au nord-est.

De là il conclut que dans les derniers temps cambriens et au commencement de l'ère silurienne les forces élévatoires, travaillant dans la direction N.-S., ont relevé le fond de la mer pour former des terres à la partie occidentale de l'Angleterre et à la frontière du pays de Galles. Sur la plus grande partie de la surface de ce pays ces forces n'ont eu d'influence qu'à un degré inférieur ayant produit, à ce qui semble, les eaux moins profondes dans lesquelles se sont déposés les grès de Aberystwyth, mais n'interrompant pas le dépôt continu de sédiments et la succession ininterrompue des phénomènes géologiques dans le passage de l'ère cambrienne (Ordovicien) à l'ère silurienne (Gothlandien).

Il paraît que les mêmes phénomènes se sont réalisés en Portugal et pour ce motif nous trouvons représentée à Vallongo la série des dépôts qui relie l'Ordovicien au Gothlandien, tandis qu'elle manque à Bussaco.

Comme il arrive dans cette contrée les forces élévatoires sont plausiblement en relation avec l'apparition de la diabase; l'affaissement du fond de la mer a été très lent à cette époque pour toute la région à l'est de Barrancos et s'est fait encore moins sentir du côté occidental où les dépôts montrent une épaisseur incomparablement plus faible.

² Robert Etheridge, *The anniversary address* (Proceedings of the Geol. Soc. of London, vol. xxxvii, Part II, May 1881, p. 109).

— *Fossils of the British Islands*, 1888, p. 8.

Misses Elles and Wood, *A monograph of British Graptolites*, 1901, p. 17.

Au-dessus du schiste à nodules avec *Cardiola interrupta* et plusieurs autres espèces caractéristiques du Silurique supérieur, particulièrement des Graptolites, il vient un groupe épais de schistes rayés auquel sont subordonnées les masses de calcaire ainsi que les colonies de fossiles dévoniens qui se rencontrent isolément en beaucoup de points.

Au-dessus des schistes rayés se développent les schistes et la lydite à Graptolites de Noudar, représentant l'horizon supérieur de Graptolites, appartenant également sans contestation au Silurique supérieur, donc à la partie supérieure de cet étage.

Cet horizon supérieur de Graptolites forme la bande qui suit avec la plus grande régularité dans toute la longueur de l'affleurement du Silurique.

Dans le flanc occidental du grand synclinal les deux horizons, supérieur et inférieur, de Graptolites se réunissent en une seule couche, que l'on peut suivre sans aucune interruption depuis la frontière au sud-est du sommet de Gata, dans l'ancienne Contenda de Moura, jusqu'au delà de la serra d'Ossa, se reproduisant au nord d'Estremoz dans l'autre branche du synclinal.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les numéros 2 et 3 du tableau appartiennent au Silurique inférieur et les trois numéros suivants au Wenlock et Ludlow réunis, c'est-à-dire au Silurique supérieur proprement dit. Le numéro 7 devra donc appartenir à la partie culminante du système silurique ou peut-être mieux au Dévonique inférieur, les schistes de Fatuquedo, par contre, devant être placés à la base de l'Ordovicien.

Comparaison avec la série du Lake District.— Si maintenant nous faisons la comparaison de notre tableau avec la série du Lake District qui sera décrite plus loin, nous pourrions établir (tant qu'il est permis de le faire) en quelque sorte un parallélisme de nos divisions avec celles qui ont été établies dans cette région classique du nord de l'Angleterre. La seule différence est que la période d'éruption volcanique aura été accomplie dans nos latitudes par une formation d'importants dépôts sédimentaires entre lesquels il faudra placer les schistes de Barrancos. Mais pour bien comprendre ce point, il convient d'abord connaître la distribution verticale des fossiles dans les divers groupes sédimentaires que nous avons décrit. C'est ce que montre le tableau qui suit, dans lequel sont indiquées par un astérisque les espèces qui se trouvent dans les enclaves de fossiles dévoniens.

**TABEAU DE LA DISTRIBUTION VERTICALE
DES ESPÈCES DE LA FAUNE SILURIQUE AUX ENVIRONS DE BARRANCOS**

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien				Ordovicien		
	Grauwackes et schistes supérieurs (7)	Schistes et lydite de Noudar (Horizon supérieur des Graptolites) (6)	Horizon des calcaires (5)	Schistes à nodules (Horizon inférieur des Graptolites) (4)	Grauwackes et quartzites de la serra Colorada (3)	Schistes de Barrancos (2)	Schistes de Fatunado (1)
CRUSTACEA							
Traces de Crustacés (J. Hall).....	..	..	..	..	..	+	
* Dalmanites sp. n.....	..	..	+				
* Proetus sp. (voyez P. fallax Barr.).....	..	..	+				
* Phacops Potieri Bayle.....	..	..	+				
» (Trimercephalus) aff. laevis Münster.....	..	..	..	+			
* » sp.	..	..	+				
* Cryphaeus stellifer Burm.	..	..	+				
* » Michelini Rou.....	..	..	+				
* » pectinatus Rœm.....	..	..	+				
* » callitelles Vern.	..	..	+				
* » cf. Barrandei Cailliaud	..	..	+				
* » cf. sublaciniata Vern. et Barr.	..	..	+				
* » sp. ind.	..	..	+				
CEPHALOPODA							
Orthoceras aff. currens Barr.....	..	..	..	+			
» cf. Bohemicum Barr.....	..	..	..	+			
* » cf. rigescens Barr.....	..	..	+	+			
* » cf. innotatum Barr.....	..	..	+	+			
» cf. corneum Richter (à an O. styloideum Barr.).....	..	..	..	+			
» cf. migrans Barr.....	..	..	..	+			
* » ind., plusieurs espèces.....	..	..	+	+			
Clymenia? aff. C. flexuosa juv. Münster.....	..	..	..	+			
PTEROPODA							
Hyolithes cf. simplex Barr.....	..	..	..	+			
» aff. columnaris Barr.....	..	..	..	+			
* Conularia sp.	..	..	+				
HETEROPODA							
Bellerophon Murchisoni d'Orb. (B. compressus Sandb.).....	..	..	..	+			
GASTROPODA							
* Capulus (Platiceras) cf. Selcanum Giebel (C. hercynicus Kays. var. Selcana Giebel)	..	..	+				
* Holopella sp. (voyez H. subulata F. A. Rœmer sp.)	..	..	+	+			
* Buccinum cf. arculatum Arch. et Vern.....	..	..	+				
* Pleurotomaria? (voyez Pl. occident Hall)	..	..	+				

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien				Ordovicien		
	Grauwackes et schistes supérieurs (7)	Schistes et lydite de Noudar (Horizon supérieur des Graptolites) (6)	Horizon des calcaires (5)	Schistes à nodules (Horizon inférieur des Graptolites) (4)	Grauwackes et quartzites de la serra Corada (3)	Schistes de Barrancos (2)	Schistes de Fatuquedo (1)
LAMELLIBRANCHIATA							
Cardiola interrupta Sow.....	..	..	..	+			
* » Bohemica Barr.....	..	..	?	+			
» cf. fortis Barr.....	..	..	..	+			
» cf. fluctuans Barr.....	..	..	..	+			
» partita Barr. (C. fortis Barr. var.) ..	..	..	+				
» ? striata Sow. sp.	..	..	?	+			
Praecardium cf. Bohemicum Barr.....	..	..	..	+			
* Pterinea (Avicula) Pailleti Vern. et Barr.	..	..	+				
* Cypricardinia? sp.....	..	..	+				
* Bivalves ind., plusieurs espèces.....	..	..	+	+			
BRACHIOPODA							
* Atrypa curvata Schloth.?.....	..	..	+				
» sphaerula Barr.	..	..	..	+			
* Meristella sp.	..	..	+				
* Terebratula Eifliensis Schnur.....	..	..	+				
* Ptychospira ferita v. Buch sp.....	..	..	+				
* Strophodonta clausa Vern. sp.? ..	..	..	+				
* Orthis Dumontiana Vern.	..	..	+				
* » Beaumonti Vern.....	..	..	+				
* » striatula d'Orb.....	..	..	+				
* » circularis Sow.....	..	..	+				
* » obovata Sow.....	..	..	+				
* » Hamoni Rou.? ..	..	..	+				
* » aff. oblata Hall ..	..	..	+				
* » sp. n. aff. vulvarius Schloth.....	..	..	+				
* Spirifer undiferus F. Rømer ..	..	..	+				
* » paradoxus Schloth.?.....	..	..	+				
* » » var. Hercyniae Giebel.....	..	..	+				
* Chonetes crenulata Kon.? ..	..	..	+				
* » cf. sarcinulata Kon.....	..	..	+				
* Streptorhynchus umbraculum Schloth. (Orthothetes hipponix Schnur sp.) ..	..	..	+				
* Spirigera Ferronesensis Vern. et Barr.	..	..	+				
* Rhynchonella Orbignyana Vern. sp.	..	..	+				
* » sp. n. aff. Orbignyana Vern.....	..	..	+				
* Athyris undata Defr. sp.....	..	..	+				
* » sp.? (voyez Terebratula prunulum Schnur) ..	..	..	+				
* Leptaena Murchisoni Arch. et Vern., type de l'espèce.....	..	..	+				
* » lepis Goldf.	..	..	+				
* » cf. transversalis Wahlenb.....	..	..	+				
* Strophomena Murchisoni Arch. et Vern., type de l'espèce.....	..	..	+				
* » rhomboidalis Wilkens sp.....	..	..	+				
* » Bouei Barr.....	..	..	+				
* Brachiopodes ind., plusieurs espèces ..	..	..	+				
ANNELIDA							
Nereites Loomisi Emm.	..	..	+				
» cf. robustus Emm.	..	..	+				

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien				Ordovicien		
	Gravauvackes et schistes supérieurs (7)	Schistes et lydite de Noudar (Horizon supérieur des Graptolites) (6)	Horizon des calcaires (5)	Schistes à nodules (Horizon inférieur des Graptolites) (4)	Gravauvackes et quartzites de la serra Corada (3)	Schistes de Barrancos (2)	Schistes de Fatuquedo (1)
Nereites cf. pugnus <i>Emm.</i>	..	..	+				
Phyllodocites Saportai sp. n.	..	..	..	..	..	+	
Myrianites Lorioli sp. n.	..	..	..	..	..	+	
» Mac Leayi <i>Murch.</i> ?	..	..	..	..	..	+	
» tenuis <i>McCoy</i>	..	..	..	..	..	+	
» Andréi sp. n.	..	..	..	..	..	+	
» ind., plusieurs formes différentes	..	..	..	..	..	+	
Lophoctenium Geinitzi sp. n.	..	..	..	..	..	+	
Fraena? sp. (an gen. et sp. n.) [voyez <i>Fraena tenella Linrs.</i>]	..	..	..	..	..	+	
Arenicolites	..	..	..	..	+		
Traces de vers ou empreintes mécaniques	..	..	+	..	..	+	
ECHINODERMATA							
* Crinoïdes ind., empreintes d'articles de la tige et de plaquettes isolées du calice de plusieurs espèces	..	..	+	+			
COELENTERATA							
Monograptus colonus <i>Barr.</i>	..	+	..	+			
» ludensis <i>Murch.</i>	..	..	..	+			
» Flemingi <i>Lapw.</i>	..	..	..	+			
» dubius <i>Suess.</i>	..	..	..	+			
» triangulatus <i>Harkn.</i>	..	+	+	+			
» lobiferus <i>McCoy</i>	..	+	+	+			
» » var. undulatus <i>Perner</i>	..	+	+	+			
» » var. Nicoli <i>Harkn.</i>	..	+	+				
» » millipeda <i>Lapw.</i>	..	..	..	+			
» cf. lobiferus <i>McCoy</i> var. gigantea (an sp. n.)	..	..	..	+			
» spiralis <i>Gein.</i>	..	..	+	+			
» » var. β. subconicus <i>Törnq.</i>	..	..	+	+			
» convolutus <i>His.</i> sp. (<i>M. spiralis Barr.</i> non <i>Gein.</i>)	..	..	+	+			
» » <i>Gein.</i> non <i>His.</i>	..	..	..	+			
» communis <i>Lapw.</i>	..	..	?	+			
» Proteus <i>Barr.</i>	..	..	+	+			
» turriculatus <i>Barr.</i>	..	..	..	+			
» sagittarius <i>His.</i> (<i>M. Hisingeri Carr.</i>)	..	..	+	+			
» Sedgwicki <i>Portl.</i>	..	..	..	+			
» aff. Sedgwicki <i>Portl.</i> (voyez <i>M. clavulus Perner</i>)	..	..	..	+			
» fimbriatus <i>Nich.</i>	..	..	..	+			
» cf. vomerinus <i>Nich.</i>	..	+					
» priodon <i>Br.</i>	..	..	+	+			
» » var. validus <i>Perner</i>	..	..	+	+			
» cf. priodon <i>Br.</i>	..	+					
» exiguus <i>Nich.</i> sp.	..	..	..	+			
» latus <i>McCoy</i>	..	+	+	+			
» cf. largus <i>Perner</i>	..	..	..	+			
» Nilssoni <i>Barr.</i>	..	+	..	+			
» cf. Nilssoni <i>Barr.</i>	..	..	+				
» leptotheca <i>Lapw.</i>	..	..	..	+			
» Becki <i>Barr.</i>	..	+	+	+			
» sp. n. aff. Becki <i>Barr.</i>	..	..	..	+			

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien				Ordovicien		
	Grauwackes et schistes supérieurs (7)	Schistes et lydite de Nondar (Horizon supérieur des Graptolites) (6)	Horizon des calcaires (5)	Schistes à nodules (Horizon inférieur des Graptolites) (4)	Grauwackes et quartzites de la serra Colorado (3)	Schistes de Barrancos (2)	Schistes de Fatukedo (1)
<i>Monograptus</i> cf. <i>mutuliferus</i> Menegh. sp.	..	+					
» cf. <i>Lamarmorae</i> Menegh. sp.	..	+					
» cf. <i>vesiculosus</i> Perner	..	..	+				
» <i>chimera</i> Barr.	..	..	..	+			
» <i>ultimus</i> Perner	..	..	..	+			
» <i>Bohemicus</i> Barr.	..	..	..	+			
» <i>Ræmeri</i> Barr.	..	..	..	+			
» <i>Halli</i> Barr.	..	..	..	+			
» cf. <i>revolutus</i> Kurck.	..	..	..	+			
» <i>Jaekeli</i> Perner	..	+	..	+			
» <i>crenulatus</i> Törnq.	..	..	..	+			
» <i>Galaensis</i> Lapw.	..	..	+	+			
» <i>testis</i> Barr.	..	..	..	+			
» <i>Suessi</i> Perner	..	..	..	+			
» <i>crispus</i> Lapw.	..	..	..	+			
» aff. <i>crispus</i> Lapw. (1 an sp. n.)	..	..	+	+			
» <i>Barrandei</i> Suess.	..	..	..	+			
» <i>sartorius</i> Törnq.	..	..	..	+			
» <i>ansulosus</i> Törnq.	..	..	..	+			
» <i>tenuis</i> Portl.	..	..	..	+			
» cf. <i>dextrorsus</i> Linrs. (1 an sp. n.)	..	..	+	+			
» aff. <i>distans</i> Portl.	..	..	..	+			
» ind., plusieurs espèces, quelques-unes sans doute nouvelles	..	..	+	+			
<i>Diplograptus</i> <i>foliaceus</i> Murch.	..	..	?	+			
» » var. <i>calcarata</i> Murch.	..	..	?	+			
» <i>bellulus</i> Törnq.	..	+	+	+			
» <i>palmeus</i> Barr.	..	+	..	+			
» <i>tamariscus</i> Nich.	..	..	..	+			
<i>Petalograptus</i> <i>folium</i> (His.) Tullb. s. str.	..	..	..	+			
» » mut. <i>ovato-elongata</i> Kurck	..	..	..	+			
<i>Retiolites</i> <i>Geinitzianus</i> Barr.	..	+	+	+			
» <i>Richterii</i> sp. n. (voyez R. <i>venosus</i> Hall)	..	..	..	+			
» sp. n.?	..	..	+	+			
<i>Stomatograptus</i> cf. <i>grandis</i> Suess (1 an sp. n.)	..	..	..	+			
» <i>Törnquisti</i> Tullb.	..	..	..	+			
» sp. n.?	..	..	..	+			
<i>Cyrtograptus</i> <i>spiralis</i> (Gein.) Tullb. (<i>Monograptus convolutus</i> Gein. non His.)	..	..	..	+			
» <i>Murchisoni</i> Carr.	..	+	..	+			
» » var. <i>crassiusculus</i> Tullb.	..	..	..	+			
» <i>Lapworthi</i> Tullb.	..	..	..	+			
» <i>Lundgreni</i> Tullb.	..	..	..	+			
» <i>dubius</i> Tullb.	..	..	..	+			
» sp.	..	..	+	+			
<i>Tetragraptus</i> sp.	..	..	..	+			
<i>Phyllograptus</i> <i>angustifolius</i> Hall	..	..	..	+			
» sp. n.?	..	..	..	+			
<i>Rastrites</i> <i>peregrinus</i> Barr.	..	+	+	+			
» <i>Linnaei</i> Barr.	..	..	..	+			
» <i>maximus</i> Carr.	..	..	..	+			
<i>Didymograptus</i> <i>sparsus</i> Hopk.	..	..	..	..	..	+	

NOMS DES ESPÈCES	Gothlandien				Ordovicien		
	Grauwackes et schistes supérieurs	Schistes et lydite de Noudar (Horizon supérieur des Graptolites)	Horizon des calcaires	Schistes à nodules (Horizon inférieur des Graptolites)	Grauwackes et quartzites de la serra Corada	Schistes de Barrancos	Schistes de Fatuquedo
	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
Oldhamia sp. n. (voyez Forchhamera silurica Göpp.).....	..	..	..	..	..	+	
Lophoctenium Geinitzi sp. n. (aff. L. comosum Richter)	..	..	..	..	..	+	
* Calamopora cervicornis Blainv. sp.	..	..	+				
* Pleurodictyum problematicum Goldf.	..	..	+				
* " " ? (cf. Pl. giganteum Kayser)	..	..	+				
* " Selcanum Giebel.....	..	..	+				
* " Zorgense Kays.	..	..	+				
* " sp.	..	..	+				
* Chaetetes petropolitanum Pander sp.	..	..	+				
* Alveolites cervicornis Blainv.	..	..	+				
* Turbinolopsis (Cyathophyllum) helianthoides Gold.	..	..	+				
* " sp.....	..	..	+				
* Cyathophyllum caespitosum Goldf.?	..	..	+				
* Syringopora caespitosa Goldf.	..	..	+				
* Favosites reticulata Blainv.	..	..	+				
* Fenestella (Retepora) retiformis Mich.	..	..	+				
* " Bischofi Ræmer	..	..	+				
* Retepora cf. infundibulum Lonsdale	..	..	+				
* Gorgonia Bouchardi Mich. sp.	..	..	+				
* Monticulipora Bowerbanki Milne-Edw. et J. Haime?	..	..	+				
* Polypiers ind.....	..	..	+	+			
PLANTAE							
Palaeochorda major M ^c Coy.....	..	..	..	..	..	+	
" minor M ^c Coy.....	..	..	..	..	..	+	
" cf. marina Emm.	..	..	..	..	..	+	
" cf. tenuis Fitch sp.	..	..	..	..	..	+	
Palaeophycus sp. (voyez P. striatus Hall)	..	..	..	..	..	+	
" (voyez P. irregularis Hall).....	..	..	..	..	..	+	
" (voyez P. tubularis Hall)	..	..	..	..	..	+	
" ? (voyez P. falcatus Ludw.)	..	..	..	..	..	?	
Chondrites fruticulosus Göpp.?	..	..	..	..	..	+	
" aff. Göpperti Gein. (voy. Sphaerococcites Sharyanus Göpp.) ..	..	..	..	..	..	+	
Bythotrephis gracilis Hall?	..	..	..	..	..	+	
" " var. crassa Hall	..	..	..	..	..	+	
Alectorurus cincinnaticus Sch.....	..	..	..	..	..	+	
Fraena? sp. (an gen. et sp. n.)	..	..	..	..	..	+	
Débris de tiges de végétaux	+	+					
Ripplemarks et empreintes de gouttes de pluie	..	..	..	..	..	+	

Examen du tableau précédent.—L'examen de ce tableau nous montre qu'il y a un contraste visible, nous dirons même une parfaite opposition entre les faunes des assises (2) et (4), car il n'y a pas une seule espèce qui soit commune aux deux; au contraire, les couches (4) et (6), qui sont principalement caractérisées par des Graptolites, renferment un grand nombre d'espèces communes; mais ces connexions ne sont pas de tel ordre que nous puissions considérer les deux assises comme absolument contemporaines, cependant nous devons

les considérer comme des termes successifs du même étage. En effet, le schiste à nodules renferme 60 espèces qui lui sont spéciales, en outre de 31 espèces plus 5 douteuses, qui sont communes à celles des assises supérieures. Mais si nous comparons le schiste à nodules avec l'assise (5) qui lui est directement superposée et qui a avec elle les rapports lithologiques et stratigraphiques les plus intimes, nous reconnaitrons qu'il n'y a que 27 espèces et en plus 5 douteuses qui les relient. Le plus grand nombre d'espèces qui composent la faune de l'assise (5) qui compte plus de 100 formes différentes, sont exclusives de cet horizon et se retrouvent en même temps dans la faune coblentzienne de Portalegre. Toutefois les connexions de cette assise avec le Silurique supérieur sont établies par les espèces ci-dessus énumérées, pour la plupart des Graptolites.

D'autre part, les schistes de Barrancos ont 27 espèces qui leur appartiennent exclusivement, entre elles un *Didymograptus*, et aucune de ces espèces ne se rencontre dans les niveaux supérieurs.

On voit donc que, avant que la faune graptolitique n'ait atteint dans cette région son plein développement, des circonstances quelconques, mais sans contredit bien extraordinaires, avaient imprimé un caractère particulier à la faune de la phase précédente, qui est principalement caractérisée par des empreintes et des traces d'Annélides, auxquelles sont venues se joindre de très rares Graptolites.

C'est également dans cette phase qu'une flore marine exubérante s'est développée; on rencontre de nombreux vestiges de cette flore, spécialement dans les strates supérieures de l'assise (carrière de Mestre André).

Développement de la faune graptolitique.—Les causes qui ont déterminé cette singulière composition de la faune ayant varié, il y a eu de nouvelles conditions géologiques d'après lesquelles il s'est produit un changement radical dans les êtres qui habitaient notre mer silurienne de l'Alemtejo.

C'est alors que la faune graptolitique s'est développée, ces conditions s'étant maintenues pendant une longue période, vu que effectivement un certain nombre d'espèces de Graptolites ont survécu jusqu'à la formation du dépôt des couches les plus supérieures de cet étage.

Nous avons donc une phase distincte de l'existence des Graptolites dans l'Alemtejo, phase qui a été précédée par une longue période de temps, représentée par le large intervalle qui sépare les assises (3) et (4) et par l'énorme épaisseur de dépôts (2) et (3), où les très rares représentants de cette famille qui y apparaissent appartiennent à un type distinct, qui se présente seulement au toit de l'assise (2). On doit rappeler la particularité qu'une autre espèce du même type (*Didymograptus Murchisoni*) caractérise dans les bassins siluriens du Bussaco et de Vallongo, tout comme dans les bassins siluriens du nord et de l'ouest de l'Europe, précisément les couches les plus inférieures de la série trilobitique, c'est-à-dire celles qui se superposent immédiatement à l'assise des quartzites à Bilobites de la base du système silurique.

Classification des différentes assises.—Les phénomènes révélés par l'étude des coupes que nous avons décrites ont une explication plausible par la simple considération du changement des courants qui ont transporté les sédiments. Vu la différence de nature de ces sédiments, nous sommes amenés à penser que les courants venaient de divers points et formaient des dé-

pôts essentiellement distincts. Sous ce point de vue on peut particulièrement noter les quartzites, les grauwackes et les schistes grossiers qui ont précédé la formation des schistes à nodules, et le schiste rayé gris-noirâtre qui représente la roche normale et pour ainsi dire fondamentale du Silurique supérieur de cette région.

Une importante lacune, représentée par la discordance entre les grauwackes et le schiste à nodules, marque un intervalle entre les deux séries de couches, intervalle durant lequel il n'y a pas eu formation de dépôts dans cette région; donc ces séries appartiennent à deux époques différentes du système silurique.

Des phénomènes physiques et occasionnellement des mouvements du sol, ont dévié les courants vers d'autres régions, ou bien les ont au moins arrêtés et c'est à cela que doivent leur formation les schistes fins de Barrancos qui se terminent en haut par les phyllades de la carrière de Mestre André; immédiatement après viennent les grauwackes et les quartzites de la serra Colorada qui représentent le dernier terme de cet étage. Plus tard, d'autres courants ont envahi notre région du Bas Alemtejo et ont apporté les colonies graptolitiques, en déposant les sédiments dans des conditions de la plus grande régularité. Les conditions hydrographiques changèrent encore une autre fois et elles furent remplacées temporairement par d'autres, auxquelles est due la formation des calcaires accompagnant simultanément en plusieurs points des enclaves de fossiles dévoniens. Cette succession de phénomènes s'est terminée par le rétablissement des conditions antérieures et c'est ainsi qu'a été formé l'horizon supérieur des schistes graptolitiques.

Le schiste à Néréites de la carrière de Mestre André représente une véritable intercalation dans la série stratigraphique, aussi ne doit-on pas s'étonner que sa faune soit essentiellement distincte de celle des autres couches fossilifères.

On peut dire que la roche typique dominante ou représentant le mieux les phénomènes sédimentaires de l'époque silurienne supérieure, dans le voisinage de Barrancos, est un schiste gris foncé avec de petites lames interstratifiées de quartzite qui lui donnent un aspect rayé, quand on l'observe sur les tranches des couches.

Le dépôt de ce schiste s'est effectué tranquillement au sein des eaux basses, pendant une longue période d'affaissement graduel et très lent du fond de la mer, sa formation ayant été précédée par des courants plus forts, lorsque les couches de grauwacke se déposèrent.

Dépôts littoraux.— Que le fond de la mer où se sont déposés les schistes de la carrière de Mestre André ait été également très bas et que ce dépôt se soit effectué durant une période d'affaissement lent, cela nous est clairement démontré par la grande quantité de restes d'algues dans cette formation schisteuse accompagnant les Néréites, animaux qui devaient vivre près des plages, si beaucoup ou même la majeure partie des empreintes que nous avons découvertes ne représentent pas plutôt les vestiges du passage de ces vers, vestiges qui certainement n'auraient pas pu se conserver à une profondeur considérable au-dessous de l'eau.

En tout cas, l'absence ou du moins l'extrême rareté de restes fossiles quelconques dans la grande masse de schistes de Barrancos (exception faite des schistes de la carrière de Mestre André) et le caractère uniforme de ces schistes, en général très fins, semble prouver que le mouvement de dépression a été plus rapide durant la phase de formation de ces couches, en d'autres termes que ces schistes se sont formés en des eaux plus profondes.

Enclaves de fossiles dévoniens.—L'apparition d'espèces dévoniennes qui ont habité temporairement cette région en des strates intercalées dans le schiste à Graptolites, vient révéler un fait très intéressant, à savoir que la faune coblentzienne de la serra de Portalegre coexistait avec la faune graptolitique de Barrancos qui est, sans le moindre doute, silurienne. Par conséquent, une partie au moins de ces couches à faune du Dévonique inférieur, s'est déposée lorsque la faune gothlandienne existait encore à Barrancos.

Age des schistes à Néréites de San Domingos.—C'est probablement contemporanément aux calcaires qui accompagnent les enclaves de fossiles dévoniens que se sont formés les schistes à Néréites de San Domingos qui représentent un dépôt entièrement littoral ou du moins formé en eaux très basses.

L'étage de schistes et de grauwaackes d'Eiras Altas avec des débris de végétaux et quelques empreintes de Néréites est donc probablement synchronique de la masse principale des schistes à Spirifères de la serra de Portalegre, représentant un facies contemporain de ces schistes.

Quoiqu'il en soit, ce qui précède justifie jusqu'à un certain point l'opinion de Gumbel qui a classifié les schistes à Néréites dans la période dévonienne, en supposant qu'ils représentaient un facies spécial du grès à Spirifères, dans une région du littoral, ou près de la plage.

En tout cas, l'étude de notre coupe nous amène inébranlablement à la conclusion que les schistes graptolitiques appartiennent au système silurique; donc les schistes à faune dévonienne intercalés dans ceux-ci sont également siluriens et, à plus forte raison encore, les schistes contenant des Néréites de la carrière de Mestre André, qui leur sont bien inférieurs.

S'il y a eu une liaison temporaire de la mer dévonienne de la serra de Portalegre avec la mer du Gothlandien de Barrancos qui ait permis l'invasion des espèces de la première région dans cette dernière, ou si l'apparition des fossiles dévoniens au milieu des schistes graptolitiques est due au changement de milieu principalement motivé par la formation des récifs calcaires, c'est une question que nous ne pouvons trancher; cependant on doit reconnaître que le phénomène a la plus grande analogie avec l'apparition des colonies de la faune tertiaire silurienne dans la partie supérieure des dépôts de la faune seconde en Bohême, comme cela a été démontré par Barrande. Ce phénomène est également analogue à celui que nous avons observé à Bussaco où la fin de la série ordovicienne est indiquée par l'apparition subite d'un grand nombre d'espèces nouvelles qui en partie appartiennent au Silurique supérieur ou ayant dans leur ensemble, le facies de la faune de cet étage.

La loi des colonies, établie par Barrande, semble donc avoir une application plus générale que celle qui jusqu'à présent lui a été attribuée, même par les géologues qui vénèrent encore sa mémoire et acceptent les principes qu'il a établis si consciencieusement et avec un si parfait amour de la vérité.

Mais quelle que soit l'explication que l'on puisse donner du fait de l'intercalation des fossiles dévoniens au milieu des schistes graptolitiques, ce qui est hors de doute c'est la liaison étroite des dépôts siluriens du Bas Alemtejo avec des dépôts coblentziens de la serra de Portalegre, et comme conséquence logique, que le système dévonique doit être représenté à Barrancos par la série des couches supérieures à la lydite à Graptolites.

En d'autres mots, les grauwackes et les schistes supérieurs d'Eiras Altas au sommet de Gata peuvent, suivant toute probabilité, être considérés comme appartenant au Dévonique inférieur, étant probablement contemporains des couches à Spirifères de la serra de Portalegre.

Opinion du professeur Contejean.— Dans tous les cas, il semble que l'on trouve ici la confirmation des idées exprimées par le professeur Contejean au sujet de la puissante influence du milieu sur la composition des faunes et sur la richesse fossilifère des couches.

Le savant professeur, sans contester que l'espèce comme l'individu a un terme fatal, n'a cependant pas hésité à dire que quelques faits observés faisaient supposer que la réapparition d'un milieu et de conditions extérieures ayant déjà existé, a suffi pour provoquer un nouveau développement d'une faune qui semblait éteinte. Comme arguments en faveur de cette opinion il cite divers exemples, particulièrement la réapparition de certaines espèces coralliennes dans l'étage Kimméridgien de Montbéliard qu'il a étudié d'une façon si approfondie, de sorte que, d'après l'illustre professeur, la même faune corallienne s'est reproduite à trois niveaux différents de l'étage supérieur.¹

Conditions physiques à Barrancos.— De même, il paraît qu'à Barrancos, étant données certaines conditions de milieu qui, dans nos latitudes, n'ont pu se réaliser de façon permanente qu'à l'époque coblentzienne, un certain nombre d'espèces dévoniennes ont pu se développer et que des espèces siluriennes qui, précédemment, occupaient cet endroit ont pu y retourner pour l'habiter, aussitôt que les conditions temporaires avaient cessé.

Le changement des conditions physiques qui ont favorisé la formation de calcaires coralliens a provoqué en même temps dans ces parages l'éclosion des Brachiopodes et d'autres organismes, en somme d'espèces qui, plus tard seulement, se sont montrées dans leur plein développement à la serra de Portalegre; leur apparition là coïncide de même avec la formation de très puissantes masses de calcaires de cette même origine.

Je conclus donc que, étant données certaines conditions de milieu, c'est durant l'époque du Silurique supérieur qu'ont commencé à se former les schistes à Spirifères qui ont plus ou moins de développement en tel ou tel autre point, suivant le temps pendant lequel ces conditions se sont maintenues.

L'apparition de cette faune qui, jusqu'à présent, était considérée comme exclusivement dévoniennne, coïncidant avec l'existence dans les mêmes couches de masses de calcaires, qui représentent des récifs formés à la même époque, il est permis de supposer que cela a été la cause ayant déterminé le changement subit de la faune; et, quand par suite de l'influence de courants boueuses la formation du récif s'arrêta et les conditions antérieures furent rétablies, les schistes à Graptolites se formèrent de nouveau dans les mêmes parages.

Comparaison avec le Dévonique du Harz.— C'est ainsi qu'on peut, peut-être, expliquer la correspondance de la faune du Harz avec celle des étages siluriens supérieurs de la Bohême, sans qu'il soit nécessaire d'admettre pour cette région des conditions de sédimentation exceptionnelles qui ne se seraient réalisées en aucune autre région, et sans que soit détruite la

¹ Ch. Contejean, *Éléments de géologie et de paléontologie*, Paris, 1874, p. 454.

liaison paléontologique entre les étages E, F, G et H de la Bohême, qui a été si savamment établie par Barrande.

Suivant la classification faite par le Dr. Em. Kayser des dépôts dévoniens les plus inférieurs du Harz¹, il manquerait dans l'Europe centrale les représentants de toute la série silurienne bien connue et supérieure au Wenlock, ou à l'étage E de Barrande. On doit cependant noter que Mr. Kayser comprend dans sa faune dévonienne plusieurs espèces qui, jusqu'à présent, ont été considérées comme éminemment caractéristiques du système silurique, telles que : *Cardiola interrupta*, *Monograptus priodon*, *Nilssoni*, *convolutus*, *Halli*, *colonus*, *dubius*, *sagittarius*, *jaculum*.

En tant que je sache, en aucune autre région, sauf celle du Harz, il n'a été établi qu'il existe une semblable association; ce qui, naturellement, fait penser qu'une partie au moins du Hercynien est réellement du Silurique.

Pour moi, la contemporanéité des couches à Spirifères et de celles du Silurique supérieur dans notre Alemtejo est un fait bien établi. Cela se reconnaît par la position que ces couches occupent toujours au même niveau compris entre les deux horizons supérieur et inférieur des Graptolites. On ne peut pas considérer les innombrables petites enclaves de fossiles dévoniens comme des lambeaux isolés d'un terrain plus moderne, parce que le phénomène se répète avec une régularité notable, tout en étant d'un développement différent de chaque côté de l'anticlinal de Barrancos, ce qui vient encore à l'appui de notre affirmative.

Il est également évident que l'apparition de la faune dévonienne dans cette contrée est en relation intime avec la formation des calcaires qui l'accompagnent toujours; il paraît donc que c'est le changement du milieu ambiant qui a fait varier la nature de la faune, et c'est pour cela que les schistes rayés renferment les fossiles dévoniens en des lentilles isolées, plus ou moins grandes, suivant la grandeur des masses de calcaire; cependant, du côté occidental de l'affleurement, les fossiles manquent précisément aux points où ces masses sont plus puissantes.

On voit donc que ce n'est que lorsque les calcaires sont réduits en lits minces discontinus, c'est-à-dire quand les eaux dans lesquelles se sont formés les récifs n'étaient pas surchargées des éléments nécessaires pour leur développement, au point de se rendre impropres à recevoir les nouveaux habitants, que les fossiles dévoniens apparaissent.

Au flanc occidental de l'anticlinal de Barrancos, les fossiles dévoniens ne se montrent qu'en quelques points près du signal de Perdigão où la bande des calcaires est interrompue; au contraire, au flanc oriental, où les masses de calcaire sont partout de très petites dimensions, les fossiles dévoniens se montrent en une infinité de points.

Remarques du professeur Geikie.— Déjà l'éminent géologue Sir A. Geikie semblait avoir prévu, par intuition, l'observation que nous avons faite plus haut, quand il écrivait²:

« Il est un fait curieux que dans quelques pays où les couches dévoniennes inférieures sont développées, les couches siluriennes supérieures sont à peine reconnaissables ou bien, si elles apparaissent, elles peuvent difficilement se séparer des roches nommées dévoniennes.

¹ Em. Kayser, *Die Faune der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes*, p. 263.

² *Text-book of Geology*, vol. II, 4^e éd., 1903, p. 981-982.

C'est pour cela qu'il est tout à fait possible que les portions inférieures de la série qui a été appelée dévonienne, puissent en certaines régions, jusqu'à un certain point, représenter ce qui en d'autres se reconnaîtrait indubitablement comme des roches de Ludlow ou peut-être même de Wenlock. Nous ne pouvons pas supposer que la riche faune silurienne ait subitement disparu au terme de l'époque de Ludlow. Nous serions plutôt disposés à découvrir des roches siluriennes plus récentes que les dernières du Silurique d'Angleterre, telles que Barrande a montré qu'elles existent en son étage H, ou à découvrir un facies dévonien de fossiles dans des roches qui malgré cela sont considérées comme siluriennes. Les roches nommées *Lower Devonian* peuvent en partie représenter l'une des dernières phases de la vie silurienne.»

Comparaison avec le Silurique de la Thuringe.— En nous référant spécialement à l'accumulation de restes de végétaux marins au toit de l'assise de schistes fins de Barrancos, nous voyons qu'en Portugal cette flore est liée à l'apparition des Néréites, comme à Reuss; mais au lieu d'occuper, comme en Thuringe, un niveau supérieur à celui des calcaires, elle lui est au contraire très inférieure. Eu égard à ce fait, nous sommes amenés à considérer les schistes de la carrière de Mestre André comme plus anciens que les couches à Néréites (*Nereitenschichten*) de la Thuringe qui ont leur correspondant exact dans les schistes à Néréites de San Domingos et en conséquence nous sommes portés à considérer qu'en général la série fossilifère de Barrancos est plus antique que celle de cette région, d'autant plus que la distribution verticale des fossiles est un peu différente dans les deux pays. De plus on peut invoquer cette différence d'âge pour expliquer la différence des faunes des schistes à Néréites de San Domingos et des schistes de la carrière de Mestre André en des points d'ailleurs très rapprochés, mais qui ne sont certainement pas contemporaines.

Roches siluriennes du Lake District.— Dans un travail fort instructif du Révérend J. Clifton Ward publié dans le *Geological Magazine*¹, ce savant décrit les conditions physiques dans lesquelles se sont formées les roches siluriennes de la région septentrionale de l'Angleterre connue sous le nom de «Lake District». En réalité nous avons rencontré dans sa description tant de points d'analogie avec notre système silurique du Bas Alemtejo, que nous sommes amenés à penser que les conditions dans lesquelles se sont formés les uns et les autres des dépôts sont identiques, pour le moins jusqu'à un certain point.

En classifiant les terrains représentés dans cette région classique, Clifton Ward les divise en quatre groupes distincts dont quelques-uns sont séparés entre eux par de longues périodes de dénudation dont il ne reste (suivant la phrase imaginative de l'auteur) aucuns registres écrits, mais qui sont clairement mis en évidence par la destruction des registres des périodes antérieures.

Voici ces groupes dans l'ordre descendant:

- d) Carboniferous and Basement Conglomerate.
- c) Upper Silurian and Coniston Limestone Series.
- b) Volcanic Series of Borrowdale.
- a) Skiddaw Slates.

¹ *On the Physical History of the English Lake District. With notes on the possible subdivisions of the Skiddaw Slates* (The Geological Magazine, Dec. II, vol. VI, n° 2, 1879, p. 49 et seq.).

Les périodes (*b*) et (*c*) sont séparées par un intervalle d'une durée inconnue, dans lequel il ne s'est pas formé de dépôts dans cette région; il en est de même des périodes (*c*) et (*d*) entre lesquelles s'intercale toute la période de durée de l'*Old Red* qui n'y est pas représentée.

Je ne puis pas accompagner l'auteur dans tous les développements qu'il présente, je crois néanmoins utile de transcrire les points essentiels de ce travail afin de montrer la corrélation qui pourra exister entre cette série silurienne du nord de l'Angleterre et celle qui est représentée dans nos coupes.

Schistes de Skiddaw.—Les schistes de Skiddaw qui représentent d'anciennes vases marines, sont la roche principale de la série et celle qui renferme le plus fréquemment des fossiles, tels que les Graptolites, quelques Trilobites, etc.

Interstratifiés avec les schistes noirs et formant même quelquefois des masses épaisses, se montrent des bandes et des couches de boue sableuse et de grès, passant occasionnellement à un véritable conglomérat par l'adjonction de galets de quartz et de fragments de schistes noirs, qui sont quelquefois accompagnés de portions feldspathiques.

En considérant en bloc la série des Skiddaw Slates, on reconnaît qu'elle contient diverses alternances de dépôts qui diffèrent beaucoup entre eux par leurs caractères: premièrement une série supérieure de schistes tégulaires noirs, puis une série bien distincte de grès, puis immédiatement au-dessous une série de schistes noirs et ferrugineux et enfin inférieurement une grande épaisseur de couches sableuses et de grès. La plus grande partie des Graptolites ont été découverts dans les couches schisteuses du toit, c'est-à-dire au-dessus du grès supérieur; cependant les Graptolites apparaissent aussi dans les couches schisteuses sous-jacentes à cette couche où les sédiments paraissent avoir été favorables à leur existence. Les fossiles sont très rares dans les couches de la série inférieure du grès et c'est à peine dans les points où elles montrent la structure tabulaire (*flaggy*) que l'on a découvert quelques traces de vers et quelques Graptolites douteux.

En traitant des conditions physiques dans lesquelles se sont formés les schistes de Skiddaw, l'auteur dit que dans les 10.000 ou 12.000 pieds de dépôts sédimentaires appartenant à cette période, on ne découvre aucun indice de mer profonde; au contraire les conditions des eaux basses et des plages sont partout évidentes; si les dépôts ne sont pas entièrement formés en deltas, du moins ils ne s'en écartent pas beaucoup par leurs caractères.

Pour comprendre comment une telle épaisseur de dépôts a pu se former en eaux basses, il faut admettre un affaissement continu de la surface des dépôts; et comme les couches de grès sont plus épaisses à la partie inférieure de la série, ce fait s'allie bien à l'idée qu'une telle dépression lente s'est effectivement réalisée et qu'elle ait produit une submersion graduelle des terres voisines d'où ont pu dériver les sédiments plus grossiers.

La présence d'un lit de grès à la partie supérieure de la série schisteuse peut avoir été le résultat de courants spéciaux ayant duré peu de temps et ayant distribué les matériaux très irrégulièrement, comme le démontrent réellement les grandes variations de l'épaisseur de la couche.

D'autre part, il est bien possible que cette couche de grès indique la cessation du mouvement d'affaissement et une légère dénudation des dépôts antérieurement formés, ou même une élévation partielle, accompagnée de dénudation.

Dépôts volcaniques.— En quelques points, des dépôts volcaniques succèdent immédiatement à cette couche de grès, les schistes noirs culminants de Skiddaw faisant défaut. Cela semble montrer que les forces volcaniques se sont développées premièrement dans ces points; mais comme l'action volcanique est d'ordinaire liée à des mouvements d'élévation, il a pu arriver que quelques-uns de ces mouvements aient précédé et même préparé les conditions pour le dépôt du grès.

Les roches déposées au Lake District durant la période intermédiaire à celle de la formation des *Skiddaw Slates* et de l'*Upper Silurian* (représenté à la base, suivant l'auteur, par le *Coniston Limestone*) sont presque exclusivement d'origine volcanique. A la base de cette série, dont l'épaisseur totale s'élève peut-être à 12.000 pieds, apparaissent des alternances de schistes de Skiddaw et de dépôts volcaniques sous-marins.

L'action volcanique donc a commencé au terme de la période des *Skiddaw Slates* sous les eaux de la mer de cette époque; ensuite il y a eu un passage graduel des conditions volcaniques sous-marines à celles des volcans terrestres et entièrement subaériens, parce que dans la grande épaisseur de la série volcanique on ne voit pas ces alternances, ni l'apparition des galets quartzeux roulés, pas plus que de fossiles mélangés aux lits de cendres stratifiées, comme cela arrive à la base de la série.

A cette période d'intense et longue activité volcanique durant laquelle a été suspendu de façon visible le mouvement de submersion, auquel cette région avait été auparavant soumise, succéda un intervalle de durée inconnue, non représenté par des dépôts, mais évident par la dénudation exercée sur les roches formées antérieurement.

L'Etna cambrien, dit le savant géologue anglais, avait cessé son activité et comme il arrive très souvent, il en était résulté un affaissement de la région volcanique, accompagné sans doute d'une vaste destruction des matières volcaniques par l'action de la dénudation atmosphérique.

Cependant l'affaissement s'est continué jusqu'à ce que l'antique volcan ait été sujet à l'action niveleuse des courants marins, si bien qu'il n'en resta probablement qu'une faible partie au-dessus du niveau de la mer.

Interruption physique.— Clifton Ward dit que pour cette région, la Cumbria, ce fait marque sans doute le point où l'on doit tracer la ligne de division entre le *Lower* et le *Upper Silurian*. Donc il y a ici une grande interruption physique et les dépôts accumulés au-dessus de la série volcanique sont notablement transgressifs par rapport à ceux de cette série, bien que par places la direction des uns et des autres est plus ou moins conforme.

Cette période de dénudation à laquelle nous faisons allusion s'est terminée par la formation au fond de la mer silurienne moyenne d'un dépôt de calcaire (le calcaire de Coniston) riche en vestiges de la vie marine.

Mais en association avec ce calcaire apparaissent quelques lits de laves, à composition différente de celle de la formation volcanique précitée, mais qui en tout cas représente un renouvellement temporaire de conditions volcaniques. Avec cette dernière et faible manifestation de l'énergie volcanique dans la région que nous considérons, commence une autre grande série de dépôts marins totalement dépourvus de phénomènes volcaniques et qui appartient sans aucun doute à l'étage Silurique supérieur.

Silurique supérieur.— Sous le titre de *Upper Silurian Period* l'auteur comprend également, ainsi que cela se voit, le temps durant lequel le calcaire de Coniston et les couches associées se sont formées. Dans ce district, dit le distingué géologue, ces dépôts appartiennent physiquement au Silurique supérieur, tandis que paléontologiquement ils peuvent être équivalents de la division silurienne inférieure de la principauté de Galles.

Suivant les observations de Mr. W. Talbot Aveline dans le district de Kendall, l'épaisseur totale des couches de l'*Upper Silurian* n'est pas inférieure à 14.000 pieds. A la base de cette grande série est l'unique couche de calcaire qu'elle renferme (le calcaire de Coniston); dans toute son épaisseur il y a des alternances de dépôts argileux et sableux, les premiers très schisteux et plissés et les derniers formant des grès plus ou moins grossiers divisibles en dalles (*flags*).

Qu'il existe ou non, comme il a été longuement discuté, une légère discordance entre la série des calcaires de Coniston et le puissant groupe des *Coniston Flags* qui les surmonte, pratiquement tout ce complexe de couches forme une succession continue de dépôts sédimentaires.

Les conditions physiques de cette période correspondent en grande partie à celles qui ont dominé dans la période des *Skiddaw Slates*; une si grande épaisseur de couches, comme celle qui y est représentée, implique nécessairement un affaissement lent et continu du fond de la mer pendant toute la période du dépôt et indique de plus d'une manière décisive le caractère de bien des strates qui ont été formées en eaux basses. En tout cas, quand les strates siluriennes les plus élevées se sont déposées, les schistes de Skiddaw devaient être ensevelis à 20.000 ou 25.000 pieds de profondeur au-dessous de la grande série volcanique et de la grande accumulation des strates de l'*Upper Silurian*.

Comparaison du Silurique de Barrancos à la série de Skiddaw.— Il est sans doute risqué d'établir des correspondances stratigraphiques entre des régions géographiquement aussi distantes que celles de l'Angleterre et du sud du Portugal; cependant sans prétendre que ces parallélismes soient rigoureusement exacts, il est très singulier (et sur ce point nous nous permettons d'attirer l'attention des géologues) que la succession des phénomènes sédimentaires soit avec peu de différence la même dans les deux régions, ce qui autorise d'une certaine manière la comparaison que nous faisons.

Donc en tenant compte des explications qui précèdent, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître la correspondance ou pour le moins une certaine analogie de la formation schisteuse de la région de Barrancos avec une partie de la série de Skiddaw, quoique la position de ces dernières couches ait été établie à un niveau bien inférieur à celui auquel les premières appartiennent en grande partie, attendu que les schistes de Skiddaw sont placés à la base de l'Ordovicien (groupe d'Arenig) et peut-être aussi en partie dans le système cambrique (Tremadoc et Lingula Flags).¹

Il est en effet notable que l'on rencontre à Barrancos plusieurs espèces de la faune graptolitique découverte dans cette localité du nord de l'Angleterre, comme il est indiqué dans le catalogue des fossiles cambriens et siluriens du musée du *Geological Survey* de la Grande

¹ A. Geikie, *Text book of geology*, 4^e édit., p. 949.

Bretagne et Irlande (*Museum of practical Geology*) publié en 1878 et comme je l'ai vérifié moi-même en examinant les collections de ce musée à l'occasion de la 4^e session du Congrès géologique en 1888.

Espèces communes aux deux régions comparées.— En effet les espèces suivantes sont communes à Barrancos et à Skiddaw :

<i>Diplograptus folium</i> His.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.
<i>Monograptus Nilssoni</i> Barr.	<i>Phyllograptus angustifolius</i> Hall.
» <i>sagittarius</i> His.	

En outre de ces espèces, les suivantes provenant des environs de Barrancos se rencontrent dans diverses localités de l'*Upper Llandeilo* mentionnées dans le même catalogue :

<i>Diplograptus folium</i> His.	<i>Monograptus Nilssoni</i> Barr.
<i>Monograptus Becki</i> Barr.	» <i>sagittarius</i> Linn.
» <i>convolutus</i> His.	» <i>tenuis</i> Portl.
» <i>Hisingeri</i> Carr.	» <i>Sedgwicki</i> Portl.
» <i>lobiferus</i> M ^c Coy.	<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que ces espèces qui sont mentionnées au catalogue du Musée de Londres dans les étages de l'*Arenig* et de *Llandeilo* n'y reparaissent pas cités en aucun niveau supérieur; tandis que dans le tableau des fossiles siluriens des Iles Britanniques publiée par Mr. John Marr¹, il n'y a que l'une de ces espèces, *Phyllograptus angustifolius*, qui soit rapporté à l'*Arenig*; la plus grande partie des autres sont uniquement attribuées au May Hill ou Llandovery supérieur, comme

<i>Rastrites peregrinus</i> Barr.	<i>Monograptus Hisingeri</i> Carr.
<i>Diplograptus folium</i> His.	» <i>Sedgwicki</i> Portl.
<i>Monograptus Becki</i> Barr.	» <i>tenuis</i> Portl.
» <i>lobiferus</i> M ^c Coy.	

En outre de ces espèces il faut encore considérer les suivantes de Barrancos qui sont mentionnées dans le tableau de J. Marr et qui y sont également rapportées au Silurique supérieur (groupes de May Hill et de Salopian = Llandovery supérieur et Wenlock):

<i>Cardiola interrupta</i> Sow.—Salopian.
» ? <i>striata</i> Sow.—Salopian.
<i>Cyrtograptus Carruthersi</i> Lapw.—Salopian.
» <i>Murchisoni</i> Carr.—Salopian.
<i>Retiolites Geinitzianus</i> Barr.—May Hill et Salopian.
<i>Monograptus Bohemicus</i> Barr.—Salopian.
» <i>colonus</i> Barr.—Salopian.
» <i>fimbriatus</i> Nich.—May Hill.
» <i>Galaensis</i> Lapw.—May Hill.
» <i>exiguus</i> Nich.—May Hill.
» <i>Halli</i> Barr.—May Hill et Salopian.

¹ *The classification of the Cambrian and Silurian rocks.* Cambridge, 1883, p. 122.

- Monograptus leptotheca* Lapw.—May Hill.
 » *priodon* Bronn.—May Hill et Salopian.
 » *Proteus* Barr.—May Hill.
 » *Roemeri* Barr.—Salopian.
 » *spiralis* Gein.—May Hill.
 » *turriculatus* Barr.—May Hill.
 » *vomerinus* Nich.—Salopian.
Diplograptus palmeus Barr.—May Hill.
 » *tamariscus* Nich.—May Hill.
Myrianites tenuis M^cCoy.—May Hill.

On doit particulièrement noter que bien des espèces de la région de Barrancos se trouvent aussi dans le bassin silurien de Vallongo, où elles sont supérieures à l'assise des grau-wackes de la serra da Murta, qui forment la base du Silurique supérieur de ce bassin.

Les espèces communes à Barrancos et à Vallongo sont indiquées dans la liste suivante :

<i>Orthoceras</i> aff. <i>currens</i> Barr.	<i>Monograptus dubius</i> Suess.
» cf. <i>Bohemicum</i> Barr.	» <i>Sedgwicki</i> Portl.
<i>Cardiola?</i> <i>striata</i> Sow. sp.	» cf. <i>Lamarmorae</i> Menegh.
<i>Monograptus triangulatus</i> Harkn.	» <i>Halli</i> Barr.
» <i>priodon</i> Bronn.	» <i>Galaensis</i> Lapw.
» cf. <i>priodon</i> Bronn.	» <i>lobiferus</i> M ^c Coy.
» <i>colonus</i> Barr.	» » var. <i>Nicoli</i> Harkn.
» <i>latus</i> M ^c Coy.	» » var. <i>millipeda</i> Lapw.
» cf. <i>mutuliferus</i> Menegh.	» <i>distans</i> Portl.
» <i>communis</i> Lapw.	» <i>leptotheca</i> Lapw.
» <i>Proteus</i> Barr.	<i>Didymograptus sparsus</i> Hopk.
» <i>spiralis</i> Gein.	<i>Diplograptus palmeus</i> Barr.
» <i>tenuis</i> Portl.	» <i>foliaceus</i> Murch.
» <i>Nilssoni</i> Barr.	» <i>folium</i> His.
» <i>Becki</i> Barr.	<i>Rastrites Linnaei</i> Barr.
» <i>turriculatus</i> Barr.	» <i>peregrinus</i> Barr.
» <i>gregarius</i> Lapw.	<i>Phyllograptus</i> cf. <i>angustifolius</i> Hall.

Il vient à propos de rappeler que Robert Etheridge dans son discours présidentiel (*Anniversary Address*)¹ prononcé en 1881 à la Société Géologique de Londres, fait remarquer avec étrangeté la différence qui existe entre les faunes des groupes d'Arenig et de Skiddaw dans les deux régions du pays de Galles septentrional et du pays de Galles méridional. Dans toute la faune d'Arenig du pays de Galles méridional (97 espèces) il n'y a, d'après l'illustre paléontologue, que 5 formes du N.W. qui soient communes aux deux régions (3 Trilobites et 2 Brachiopodes); 26 Trilobites, 8 Brachiopodes, 38 Rhabdophora et 3 Ptéropodes (en tout 75 espèces) sont particulières et appartiennent exclusivement à la région du pays de Galles méridional. Ainsi Etheridge note que sur une si petite surface géographique, comme le pays de Galles, la corrélation des espèces est une question difficile à trancher pour un même groupe de roches.

¹ Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London, vol. xxxvii, part II, May 1881, p. 104.

A notre avis ce désaccord représente une exception si extraordinaire aux lois générales de la paléontologie, que nous sommes involontairement amenés à penser qu'il serait peut-être possible que les dépôts des deux régions ne soient pas tout à fait synchroniques, une partie de la série de Skiddaw appartenant peut-être à l'étage de Llandovery, ainsi que cela semble du reste indiqué par le catalogue du Musée de géologie pratique. Si cette hypothèse était admissible, il arriverait donc que l'anomalie que nous avons indiquée à propos de nos couches à Graptolites de Barrancos serait détruite, car les couches à Graptolites en question appartiennent certainement à une division relativement supérieure du Silurique.

Conclusions.— Si d'après les explications si claires que nous avons transcriptes, nous venons essayer, avec les restrictions exigées dans tels cas, de faire la comparaison de la série de la région des Lacs (Lake District) avec notre coupe de Barrancos, et ceci en y introduisant les divisions correspondantes et en harmonie avec la distribution des fossiles indiquée par notre tableau, il ne nous semblera pas que ce soit une hypothèse trop hasardée de prétendre que la lydite à Graptolites conjointement avec les calcaires et le schiste à nodules (numéros 4 à 6 du tableau de la page 209) correspondent à la division supérieure silurienne du Lake District (*Upper Silurian and Coniston Limestone Series*).

Comme il y a absence en Portugal de la série volcanique de Borrowdale qui malgré son énorme épaisseur a pu être déposée en un laps de temps relativement court, il se peut qu'au point de vue chronologique les grauwackes de la serra Colorada (que nous avons vu être séparées des schistes à nodules par une lacune) lui correspondent, conjointement avec les schistes à Néréites de la carrière de Mestre André.

Les schistes fins de Barrancos qui leur sont sous-jacents et la puissante série azoïque de Fatuquedo qui est manifestement indépendante des schistes et des quartzites du Cambrique inférieur d'Encinasola, appartiennent par conséquent encore au système silurique et certainement au Silurique inférieur et pourraient être le représentant taxonomique de la masse principale des schistes de Skiddaw.

Cette hypothèse étant admise, l'harmonie dans la classification des dépôts siluriens de l'Alemtejo et de ceux de la région au nord du Tage serait ainsi établie, en considérant qu'en Portugal s'est accomplie la même série des phénomènes sédimentaires qui s'était produite en Angleterre. C'est ainsi également que serait définitivement fixé l'âge des schistes de la carrière de Mestre André, ces schistes appartenant très plausiblement au Llandeilo.

La classification des roches siluriennes du Lake District établie par le professeur Alleyne Nicholson fait encore mieux ressortir la correspondance de la succession stratigraphique que nous observons à Barrancos et de celle de la série de Skiddaw.

L'illustre professeur indique la succession suivante, en ordre descendant, des couches qui reposent sur les schistes de Skiddaw, en notant particulièrement que ces schistes sont couverts par une grande masse de roches dans lesquelles n'apparaissent pas les Graptolites.¹

The Kendal Rocks.

The Coniston Grits.

The Coniston Flags.

¹ *Geological Magazine*, vol. ix, 1872, p. 384 et *Quart. Journ.*, vol. xxviii, 1872, p. 226.

The Graptolitic Mudstones.

The Coniston Limestone and Associated Shales.

The Borrowdale Series or Green Slates and Porphyries.

The Skiddaw Slates.

Le terme de la période des *Graptolitic Mudstones* ou *Coniston Mudstones* fut, d'après Nicholson, marqué au nord de l'Angleterre par un établissement de conditions défavorables à l'existence des Graptolites. En effet, de 29 espèces de Graptolites qui ont été découvertes dans les *Mudstones*, il n'y en a que 3 passant dans les *Coniston Flags* qui se trouvent au-dessus. Cette assise conjointement avec les *Graptolitic Mudstones* et le *Coniston Limestone and Associated Shales*, pourrait donc correspondre à notre lydite à Graptolites, conjointement avec les calcaires et les schistes à nodules, les deux groupes supérieurs *The Kendal Rocks* et *The Coniston Grits* ayant leur représentant dans l'épaisse assise de schistes et de grauweekes d'Eiras Altas. D'un autre côté les *Green Slates* pourraient correspondre aux grauweekes de la serra Colorada et aux schistes à Néréites de la carrière de Mestre André, tandis que les schistes de Skiddaw auraient leur représentant dans les schistes fins, violets, à l'est de Barrancos et dans les schistes de Fatuquedo.

TABLEAU SYNCHRONISTIQUE DU SYSTÈME SILURIQUE DU PORTUGAL

Système silurique du Portugal, par J. F. N. Delgado.

	VALLONGO	BUSSACO	AMENDOA	PORTALEGRE	BARRANCOS
Silurique supérieur	Grès fin, blanc, friable par places, en d'autres points très dur et passant au quartzite. Il contient la même faune qu'à Bando dos Santos. Schistes fins de Telheiras associés au grès précédent.		Grès et quartzites en lits minces du sommet du Bando dos Santos, avec beaucoup de fossiles.	Quartzites et grès du sommet de la montagne de San Mamede, correspondant à ceux des coteaux de Canchos dos Altos, de Penha Cahida, de la serra da Caleira et des serras Fria, de San Braz et da Salada.	Grauwackes et schistes avec débris de végétaux et de rares empreintes de Néréites.
	Grauwackes et schistes rougeâtres de Sobrado à Agrella et d'Alfena, et schistes de Rates, les uns et les autres avec des taches ampéliteuses, graptolitiques.		Schistes fissiles et grauwackes bien stratifiées en lits minces, sans fossiles.	Grès et schistes en lits minces du versant est du coteau de Canchos dos Altos, correspondant aux schistes de Gáfete et du coteau de Urra.	Schiste ampéliteux et lydite à Graptolites de Noudar, avec débris de tiges de végétaux et empreintes de Néréites, en quelques strates.
	Bande de schistes graptolitiques de Recarei et de Cabeda.	Schistes fins avec des lits minces de quartzite intercalés, contenant de nombreux nodules argilo-siliceux, en partie fossilifères (<i>Orthoceras</i> , <i>Cardiola interrupta</i> , <i>Bolbozoe Bohemica</i> , <i>Monograptus priodon</i> , etc.).	Schistes fins à nodules avec <i>Cardiola interrupta</i> et d'autres fossiles.	Schistes de Revelladas avec des taches graptolitiques, correspondant à ceux du versant oriental de la serra de Salada.	Calcaires et brèches en grandes masses lenticulaires.
	Schistes grossiers du versant oriental de la serra da Murta ou de Sobrido, et grauwackes blanches du sommet de cette serra et du plateau de Senhora da Chan. sans fossiles.			Grauwackes blanches de la base du versant occidental de la serra de Caleira.	Schistes à nodules avec Graptolites et <i>Cardiola interrupta</i> .
		Quartzites et schistes culminants.	Quartzites et schistes culminants.	Schiste à Polypiers.	
Silurique inférieur	Schistes à <i>Uralichas Ribeiroi</i> avec des fossiles abondants à la partie inférieure de l'assise, ils deviennent plus rares vers le haut jusqu'à ce qu'ils disparaissent tout à fait. Ces schistes contiennent de même de nombreux nodules, plus ou moins gros, qui diminuent graduellement de grandeur et sont moins nombreux vers le toit de l'assise, en disparaissant enfin ainsi que les fossiles.	Schistes à <i>Dalmanites Dujardini</i> avec association de calcaires, de la diabase et de schistes diabasiques. Grès de Loredó formant la base de cette assise.	Schistes à <i>Orthis Berthoisi</i> .	Schistes avec des lits de quartzite et de grès intercalés, contenant de rares fossiles.	
	Schistes à <i>Orthis noctilio</i> avec une faune variée. Schistes à <i>Didymograptus</i> avec trois niveaux fossilifères distincts, caractérisés par différentes espèces de Graptolites.	Schistes et grauwackes à <i>Homalonotus OEhlerti</i> .	Schistes et grauwackes à <i>Homalonotus OEhlerti</i> .	Schistes à <i>Didymograptus Murchisoni</i> .	Grauwackes et quartzites avec <i>Arenicolites</i> de Barrancos et de la serra Colorada. Schiste à <i>Phyllodocites</i> de la Pedreira de Mestre André avec <i>Didymograptus sparsus</i> et des restes de végétaux marins très abondants.
	Schistes quartzeux et quartzites à Bilobites.	Quartzites à Bilobites en lits minces.	Quartzites à Bilobites en lits minces.	Quartzites à Bilobites.	Schistes fins, gris, verdâtres et violets de Barrancos avec de rares empreintes de Néréites.
		Quartzites à <i>Scolithus</i> en bancs épais.	Quartzites à <i>Scolithus</i> en bancs épais, ayant à la base une couche de grès grossier, blanc, feldspathique (arkose).		Schistes et grauwackes de Fatuquedo.
		Grauwackes rouges inférieures.			

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Carte géologique de la région de Bussaco. Échelle 1:50.000.

Cette carte a été exécutée, en partie à l'échelle de 1:10.000 par l'ingénieur Frédéric A. de Vasconcellos pour l'étude des dépôts carbonifères de Bussaco, en partie à l'échelle de 1:20.000 par le personnel du Service géologique, finalement la partie méridionale est l'amplification au double de la feuille n° 13 de la carte chorographique du Portugal à l'échelle de 1:100.000.

Cette carte représente la partie septentrionale de l'affleurement du système silurique du bassin du Mondêgo où ce système présente son plus grand développement. L'affleurement s'étend jusqu'à la serra du Penedo de Goes sur une longueur de 38 kilomètres, se dirigeant perpendiculairement à la serra de Louzã et étant exactement sur le prolongement du lambeau de Villa Velha de Ródam.

Par suite de la compression latérale, les couches ont été plissées en un synclinal qui s'est produit à la fin de l'ère paléozoïque (plissement hercynien); mais depuis ce mouvement les couches du flanc occidental ont été fortement disloquées par l'action d'une force agissant du côté du sud et dont les effets ont été subordonnés à l'existence d'une faille en direction approximative du N. au S. qui limite le massif disloqué du côté de l'est et qui représente l'un des principaux accidents tectoniques de notre pays au nord du Tage.

Cette faille indique la limite septentrionale de l'affleurement silurien, attendu que les couches du flanc oriental du synclinal y sont subitement interrompues, ne dépassant pas la limite du Carbonique qui repose en discordance sur elles.

La production de cette faille a été accompagnée de fractures transversales, secondaires, qui ont divisé le massif paléozoïque en divers prismes dont le principal est celui de la serra do Carvoeiro où la série ordovicienne se présente complète, les couches étant d'ailleurs profondément disloquées de leur position primitive.

Les lignes continues tracées dans cette carte et désignées par les n°s 1, 2 et 3 correspondent aux profils à même numérotage de la planche V, où ces profils sont représentés. Dans la légende sont indiquées quelques divisions qui ne figurent pas sur la carte, mais qui apparaissent dans d'autres lambeaux siluriens situés plus au sud.

PLANCHE II

Carte géologique des environs de Laundos (San Felix). Échelle 1:50.000.

Cette carte a été copiée sur les minutes de la carte chorographique du royaume dressée à la même échelle par l'ancienne Direction générale des travaux géodésiques et topographiques. L'équidistance des courbes de niveau est de 25 mètres.

Ce petit affleurement de Silurique, qui forme la colline de San Felix et qui se prolonge vers le nord-ouest jusqu'à la mer, indique le prolongement de l'affleurement de Vallongo qui est représenté dans la planche III. Il en est séparé par un intervalle de 19 kilomètres où les couches de l'Ordovicien ne sont représentées que par une bande étroite de schistes à Bougado (*ante*, p. 100). Les quartzites à Bilobites de San Felix, recouverts par les sables pliocènes, apparaissent de nouveau à Apulia et dans les récifs de Pena au sud-ouest de Fão sur la côte maritime.

L'apparition de l'Ordovicien en ce point s'est effectuée en perçant les quartzites, suivant la surface de jonction du Précambrique avec les schistes du Gothlandien, et en n'en traînant dans ce mouvement que quelques couches schisteuses de l'Ordovicien moyen.

Le tracé des limites des différents terrains dans cette région est un peu conventionnel, attendu que les sables pliocènes cachent sur une grande étendue les roches du sous-sol.

La forme lenticulaire du lambeau qui est désigné sous le nom de Dévonique inférieur (D¹), sa parfaite concordance avec les schistes gothlandiens de Rates et son intercalation entre ces schistes et les grès supérieurs gothlandiens peuvent faire juger qu'il représente une enclave dans le système silurique comme beaucoup d'autres observées par nous dans les environs de Barrancos, occupant peut-être un niveau supérieur à ceux-ci.

L'absence de calcaires qui accompagnent toujours ces enclaves, me fait pourtant considérer le lambeau comme appartenant à un système différent, ce dont toutefois je ne suis pas bien certain.

PLANCHE III

Carte géologique des environs de Vallongo. Échelle 1:50.000. La table des conventions est la même que celle de la planche II.

Cette carte est l'amplification au double d'une partie de la feuille 7 de la carte chorographique du Portugal. Sur elle sont tracés: le méridien réel par rapport à l'observatoire du château de Lisbonne, le parallèle 41° 40' N. et la division en rectangles (de 8 × 5 kilomètres) qui a servi au lever topographique.

L'anticlinal de la serra de Santa Justa ou de Vallongo qui suit la même direction que le synclinal du Bussaco, semble être dû au même phénomène de compression latérale qui a précédé l'éruption du granite porphyroïde. Au sud du Douro l'affleurement silurien prend une autre direction, se rapprochant davantage de W. N. W., parallèlement à la direction des lambeaux de Penha Garcia et de Monforte, et a obéi peut-être à un autre mouvement orogénique.

La ligne des affleurements des schistes à *Didymograptus* qui se reconnaît depuis Recarei jusqu'à Quintarei représente une ligne de dislocation en direction N. W. qui se prolonge sur San Romão de Coronado, en marquant la limite extrême de l'affleurement ordovicien de Vallongo.

Sur le flanc occidental de l'anticlinal, à 2 kilomètres au sud de Vallongo, on observe également un petit affleurement lenticulaire de Silurique inférieur (schistes à *Orthis noctilio*) qui a percé à travers les schistes à Graptolites du Gothlandien, paraissant y être intercalé. Plus au sud, sur la limite des grauwackes de Sobrido, se trouve un autre affleurement, encore plus petit, des schistes à *Uralichas Ribeiroi* qui fait pendant au grand affleurement des mêmes couches sur le flanc oriental.

PLANCHE IV

Esquisse d'une carte géologique des environs de Barrancos. Échelle 1:50.000.

Cette carte est l'amplification au double d'une partie de la feuille 33 de la carte chorographique du royaume. L'équidistance des courbes de niveau est de 25 mètres. Les grauwackes et les schistes supérieurs, que nous rapportons au toit du Gothlandien, peuvent peut-être être contemporains des schistes à Spirifères de la serra de Portalegre; ils ont été formés dans des conditions différentes et c'est pour cela qu'on ne rencontre pas ici les fossiles si abondants dans cette région.

Nous indiquons dans cette carte les principaux points où l'on a découvert des fossiles, soit des Graptolites dans les schistes à Graptolites, qui définissent clairement le Silurique supérieur, soit les espèces du Dévonique inférieur qui apparaissent intercalées dans ces schistes, formant diverses bandes qui peuvent se suivre sur plusieurs kilomètres de longueur, principalement sur le flanc oriental de l'anticlinal de Barrancos.

Les grauwackes que nous désignons par le nom de grauwackes de la serra Colorada, parce que c'est là qu'elles montrent leur meilleur développement, ont été accompagnées dans leur mouvement par les schistes de Barrancos qui leur sont immédiatement sous-jacents, ayant percé par suite de divers mouvements à travers les schistes gothlandiens qui, pour ce motif, présentent un contour très irrégulier. On voit qu'à leur limite ces grauwackes sont accompagnées d'une couche de nodules à *Cardiola interrupta* et à autres fossiles caractéristiques du Gothlandien.

PLANCHE V

Les profils n^{os} 1, 2 et 3 sont ceux qui sont indiqués avec le même numérotage dans la planche I. Les profils n^{os} 4 et 5 appartiennent à l'affleurement de Bussaco, mais à la partie méridionale qui n'est pas comprise dans cette planche. Les deux derniers n^{os} 6 et 7 appartiennent au grand affleurement silurien d'Amendoa, dans le bassin hydrographique du Tage.

Dans le profil n^o 1 on voit que le Permo-carbonique repose en discordance sur l'Archaïque et sur le Précambrique, ayant été disloqué et extrêmement dénudé avant que les grès triasiques ne soient venus se déposer sur les deux premiers terrains.

Le profil n^o 2 traverse d'abord la serra de Carvoeiro où la série ordovicienne est presque complète, les diverses couches se succédant en ordre ascendant avec la plus grande régularité; puis après avoir traversé les schistes à nodules de Sazes (avec *Cardiola interrupta*, *Monograptus* et autres fossiles gothlandiens) et, sur une grande étendue, les grès et les conglomérats du Permo-carbonique, il s'infléchit à Porto de Sant'Anna sur la montagne de Bussaco, traversant une autre fois, mais en ordre descendant, la série ordovicienne sur le flanc oriental du synclinal qui est ainsi clairement marqué.

Le profil n^o 3 qui réunit les trois coupes décrites: coupe de Casqueira à Pê do Viso (p. 49), coupe du Silurique supérieur suivant le ruisseau de Palheiros (p. 66) et coupe d'Azenha do Netto à Santo Antonio do Cantaro (p. 30) traverse, comme le profil n^o 2, les deux branches du synclinal; les couches montrent en général une inclinaison vers l'axe et se succèdent avec toute la régularité.

Dans les profils n^{os} 4 et 5 la série des couches est considérablement réduite.

Dans le premier de ces profils les deux branches du synclinal sont encore représentées, mais le Gothlandien est à peine formé par deux très petits affleurements des schistes à nodules reposant en discordance sur les couches supérieures de l'Ordovicien; mais dans le second profil c'est à peine si la branche orientale du synclinal est représentée; la branche occidentale a disparu, cachée dans la faille correspondante à l'axe du synclinal.

Dans le profil n° 6 on reconnaît clairement le plissement des couches, dû à une pression tangentielle. En ce point la série ordovicienne se montre presque complète, c'est à peine s'il manque les grauwackes rouges de la base, les grès de Loredó qui sont confondus avec les schistes à *Dalmanites* et les calcaires et les diabases qui n'apparaissent qu'à Bussaco.

Sur cette série se développe le Gothlandien qui dans cette partie du pays semble être uniquement représenté par les schistes à nodules et par les grès supérieurs qui ont une faune très variée.

Le profil n° 7 présente la même succession régulière des couches ordoviciennes jusqu'aux couches culminantes, où l'on a découvert quelques empreintes de Néréites.

PLANCHE VI

Même légende que pour planche VII. Dans ces deux planches se trouvent réunis les profils qui traversent l'affleurement du Silurique du Bas Douro dans le petit lambeau de Laundos, ainsi que dans la partie principale de l'affleurement au voisinage de Vallongo. Les profils n°s 1 et 2 de la planche VI traversent la colline de Laundos. Tous les autres profils de cette planche et ceux de la planche VII traversent l'affleurement de Vallongo.

Dans le profil n° 1 de planche VI on voit l'intercalation d'une bande que nous avons considérée comme étant du Dévonique inférieur, entre les schistes de Rates qui correspondent aux grauwackes de Sobrado (S_m^2) et les grès supérieurs (S_1^2). Cette bande occupe donc une position stratigraphique un peu différente de celle des enclaves de fossiles dévoniens dans la région de Barrancos où nous avons vu qu'ils sont compris dans les schistes à Graptolites, immédiatement au-dessus de la couche à nodules avec *Cardiola interrupta*, tandis qu'à Sah Felix ils occupent un niveau supérieur.

Comme dans ce profil la série des couches se présente en apparence concordante, il semble que les couches que j'ai rapporté au Dévonique inférieur (D^1) par leurs caractères paléontologiques, mais qui ont une forme lenticulaire, se présentant comme une intercalation dans les schistes de Rates, pourraient bien correspondre aux schistes à nodules de Telheiras, en considérant ces schistes comme supérieurs aux grauwackes de Sobrado. La découverte faite dans les mêmes couches d'une faune spéciale dans laquelle on a rencontré une mâchoire de poisson qui concorde avec *Plectrodus mirabilis* Ag. de l'*Upper Ludlow* d'Angleterre, est un argument de plus pour considérer ces couches comme appartenant au toit du Gothlandien.

Dans le profil n° 2, qui traverse la colline de Laundos près de Rates, la succession des couches est précisément la même et leur concordance est également manifeste.

Au milieu de la longueur du profil n° 3 on voit l'intrusion du Silurique inférieur (S_1^1) traversant l'assise inférieure du Gothlandien (S_1^2 , grauwackes de Sobrado); mais du côté gauche on voit, près de l'extrémité occidentale du profil, les schistes à nodules de Telheiras qui se prolongent vers le sud en une bande très étroite, accompagnant à l'occident les schistes à Graptolites (S_m^2), tandis que du côté oriental du profil se développent les grauwackes de Sobrado, les schistes de Telheiras y faisant défaut.

De même que dans le profil n° 4, qui correspond à la partie occidentale du profil précédent, les grauwackes de Sobrado manquent et les schistes à nodules de Telheiras apparaissent immédiatement après les schistes à Graptolites. Une faille sépare l'Ordovicien du Gothlandien dans le plateau de Senhora da Chan, mais les couches du Silurique inférieur qui établissent ce contact sont plus inférieures que celles qu'on observe à l'est de Cabeda.

(C'est par erreur qu'il a été marquée dans ce profil une faille à l'ouest de la chapelle de Senhora da Chan, faille qui en réalité n'existe pas.)

Le profil n° 5 dans la direction N.E.-S.W. traverse la bande du Silurique inférieur sur toute sa largeur. Les couches les plus inférieures de l'anticlinal qui est représenté ici sont celles de *Didymograptus*. Les quartzites à Bilobites de la serra de Santa Justa ne se découvrent que plus au sud et arrivent seulement aux maisons les plus élevées de Vallongo.

Le profil n° 6 passant par l'église de San Pedro da Cova présente les rapports du Carbonifère avec les schistes à Graptolites du Silurien supérieur sur lesquels il repose en discordance et dans lesquels il apparaît intercalé. Ici manquent également les grauwackes de Sobrado, tandis qu'au contraire les schistes de Telheiras se montrent au contact des schistes à Graptolites.

(C'est aussi par méprise que dans ce profil une faille a été indiquée près de Casa da Murta.)

Enfin le profil n° 7 qui suit la rive gauche du rio Souza, au nord de Senande, montre la ligne de l'anticlinal formé par les couches du Précambrique (Cb⁴) qui ont soulevé les quartzites à Bilibites, très plissés par cette impulsion, ainsi que les schistes à *Didymograptus* qui reposent en concordance sur ces quartzites et qui se présentent intervertis.

PLANCHE VII

La légende de cette planche est la même que celle de la planche VI.

Le profil n° 1, de Villar de Mattos à Penas d'Abelha, traverse sur presque toute sa longueur les couches du Gothlandien. C'est à peine si, près du signal d'Alfena, affleurent les schistes ordovi-ciens de l'assise d'*Uralichas Ribeiroi*, qui sur un petit espace passent à travers les grau-wackes de Sobrido qui sont certainement ondulées, parce que les schistes à Graptolites apparaissent plus à l'est avant d'arriver aux grau-wackes de Sobrado.

C'est l'étude de la région traversée par cette coupe qui m'a amené à considérer les schistes de Telheiras comme formant une assise distincte et à la placer au-dessus des grauweekes de Sobrado. Il est en tout cas possible que les schistes de Telheiras soient liés aux schistes à Graptolites et même qu'ils représentent un niveau inférieur de cette assise, comme semble le montrer le profil d'Ervedosa (pl. VII, n° 2) où les schistes de Telheiras apparaissent intercalés entre les schistes à Graptolites et les grauweekes de Sobrado, dans ce cas les schistes de Telheiras doivent être considérés comme sous-jacents aux grauweekes de Sobrado. En tout cas l'étude des autres coupes et les caractères paléontologiques de ces schistes, qui les rapprochent des grès supérieurs du Bando dos Santos, nous amènent à maintenir la première opinion. On comprend d'ailleurs la difficulté qu'il y a de tracer les limites des différentes divisions du Gothlandien, surtout en terrain souvent accidenté et couvert de végétation.

Nous donnons ci-dessous le tracé probable des plis dans ce profil et dans le profil n° 2.

N.º 1 - Perfil de Villar de Mattos à Penas - d'Abelha passant à Alfena

N°2 - Profil d'Ervedosa au hameau de Parteira traversant la bande du Silurique.

Dans le profil n° 2 qui traverse l'affleurement silurien sur toute sa largeur, on voit la succession régulière des couches ordoviciennes des deux côtés de l'anticlinal formé par les quartzites de la serra de Santa Justa. Sur le flanc oriental les couches des différents groupes sont répétées en plusieurs plis couchés, déjetés vers l'ouest. Ce plissement des couches embrasse aussi le Gothlandien sur la moitié orientale de la coupe.

Sur le flanc occidental de l'anticlinal les couches forment une série simple, régulière, qui est interrompue à l'est d'Ervedosa par un pointement des couches ordoviciennes à *Orthis noctilio*, qui tra-

verse les schistes à Graptolites, mais ici se montrent les schistes de Telheiras qui manquent du côté oriental.

Près du hameau du Paço il y a un pointement des couches ordoviciennes à *Didymograptus*, qui ont percé à travers le Gothlandien formant une lentille au milieu des schistes à Graptolites (*ante*, p. 110). Dans cet affleurement de l'Ordovicien apparaissent, réunies dans la même strate, diverses espèces de *Didymograptus* qui occupent trois niveaux différents à l'occident de la chapelle de Santa Justa (voir p. 134).

Dans le profil n° 3 qui traverse en ligne droite et presque perpendiculairement toute la bande silurienne, l'anticlinal est nettement indiqué par l'interposition du Précambrique qui a refoulé sur les deux côtés les quartzites à Bilobites qui se présentent ondulés, tout comme les couches qu'ils recouvrent, et qui sont en général interverties.

A l'est de Recarei les schistes à *Didymograptus* de la bande qui va au Paço ont percé suivant la limite entre les schistes à Graptolites et les grauwackes de Sobrado, se divisant en deux branches qui s'y terminent subitement contre un filon de quartz avec la direction N.E.-S.W., les grauwackes de Sobrado se trouvant dans leur prolongement.

PLANCHE VIII

Les trois profils dessinés sur cette planche, celui de Santo Aleixo au signal d'Eiras Altas (dont une partie seulement est embrassée par la planche IV), celui d'Eiras Altas à Volta dos Nogaes et celui de Valle de Corcho à Fatuquedo, forment ensemble une seule coupe qui traverse l'affleurement silurien de l'Alemtejo sur toute sa largeur. On reconnaît immédiatement que les couches forment dans leur ensemble un synclinal principal auquel est subordonné l'anticlinal de Barrancos et ce n'est que dans le flanc occidental de cet anticlinal que l'on peut connaître la composition du système silurique de cette région.

Le profil n° 1 est presque entièrement occupé par les schistes de Barrancos et par les grauwackes et les schistes supérieurs, chacun de ces groupes embrassant plusieurs kilomètres d'étendue, ce qui signifie que les couches sont plissées à plusieurs reprises, mais on n'aperçoit les plis qu'en l'un ou l'autre point. La bande étroite, d'une centaine de mètres de large, des schistes graptolitiques à l'occident du signal de Gata, correspond à la bande bien plus large du profil n° 2 qui comprend les ravins da Coitada et du Barrocal, jusqu'à ce qu'on arrive aux quartzites à *Arenicolites* de Barrancos. Au contraire les schistes de Barrancos occupent dans le profil n° 1 une largeur bien plus grande que celle qu'ils occupent au flanc oriental du grand synclinal car ils embrassent du côté occidental une largeur sept fois plus grande que celle qu'ils ont près de cette ville.

Dans le profil n° 2 on voit à l'ouest de Barrancos la succession régulière des différentes assises du Silurique supérieur, tandis qu'à l'est de la serra Colorada les couches sont interverties et ondulées, n'étant ici représentées que les couches à Graptolites avec les enclaves de fossiles dévoniens qu'elles renferment.

Dans le profil n° 3 se répètent les mêmes couches en divers points, par suite des failles qui correspondent au coteau dit «cerro de Culebras».

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Examen de la littérature.....	1
-------------------------------	---

SYSTÈME SILURIQUE

ÉTUDE DE STRATIGRAPHIE PALÉONTOLOGIQUE

Généralités.....	21
Classification des différents affleurements.....	21
Étendue et nature des dépôts.....	22
Mouvements du fond de la mer.....	22
Aire occupée par les quartzites de la base du système.....	24
Imperfections de l'étude.....	24

a) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU MONDÉGO

AFFLEUREMENT DU BUSSACO

Grand synclinal du Bussaco.....	25
Silurique inférieur.....	26
<i>Coupe à travers le Silurique inférieur du Bussaco en passant au sud de Cássemes</i>	26
Tableau des assises du Silurique inférieur du Bussaco.....	30
COUPES DONNANT LE DÉTAIL DES ASSISES PRÉCÉDEMMENT DÉCRITES.....	30
a) <i>Coupe suivant le ravin du Zuvinhã</i>	30
b) <i>Coupe suivant le ravin du Val San Jorge</i>	38
Incorporation dans l'Ordovicien des grauweekes rouges inférieures.....	43
Mouvements du sol.....	45
Diminution de l'épaisseur des couches.....	46
Discordance entre les deux sections du Silurique.....	46
<i>Coupe traversant le flanc occidental du synclinal du Bussaco</i>	47
Tableau des assises du Silurique inférieur dans le flanc occidental du synclinal du Bussaco.....	48
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA COUPE PRÉCÉDENTE.— <i>Coupe de Casqueira à Pé do Viso</i>	49

Remarques sur les coupes décrites	52
Formation des schistes diabasiques.....	53
Formation des calcaires	53
Sources minérales en liaison avec l'éruption diabasique	54
Extinction de la faune ordovicienne.....	54
Terme de la période ordovicienne dans le Bussaco.....	55
Horizon des <i>Didymograptus</i>	56
Tableau des espèces du Silurique inférieur (série ordovicienne) du Bussaco.....	57
Considérations sur le tableau précédent.....	63
Silurique supérieur. —Distribution et composition du Gothlandien	64
Pauvreté relative de la faune gothlandienne	64
Faune du Silurique supérieur du Bussaco.....	65
<i>Coupe du Silurique supérieur suivant le ruisseau de Palheiros depuis Azenha do Lagar jusqu'à Azenha do Netto</i>	66
LAMBEAU SILURIEN DE LA SERRA DE GOES	68
<i>Coupe au nord de la serra du Penedo de Goes passant par le signal de Sótam</i>	69

b) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TAGE

LAMBEAU SILURIEN DE VILLA VELHA DE RÓDAM.—LAMBEAUX DE CASTELLO BRANCO ET DE MONFORTE.—LAMBEAU DE PENHA GARCIA

AFFLEUREMENT D'AMENDOA

Silurique inférieur	72
Description de la série	73
Rareté des fossiles à Alcaravella	75
Puissance de l'Ordovicien.....	75
Étendue de l'Ordovicien inférieur.....	75
Outliers du Tertiaire lacustre.....	75
Affleurements de granite.....	76
Silurique supérieur. —Description de la série.....	76
Tableau des espèces du Silurique supérieur d'Amendoa	77
Serra du Bando dos Santos	78
Outliers des grès supérieurs.....	79
Schiste ampéliteux à Valle das Fontes	79
Tableau général des espèces du système silurique dans le grand affleurement du bassin du Tage.....	80
<i>Coupe depuis le signal du Bando dos Santos au signal du Pico do Ar</i>	84
<i>Coupe depuis Aldeia d'Eiras jusqu'au hameau de Robalo</i>	91

LAMBEAU D'ALBERGARIA A VELHA

c) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU DOURO

AFFLEUREMENT DE VALLONGO

LAMBEAU DE SAN FELIX	95
Pointement des quartzites à travers le Gothlandien	95
<i>Coupe traversant la colline de Laundos passant à Rapejães</i>	97
Schistes de Laundos	99
Quartzites du col de Rapejães	99
Liaison de l'affleurement ordovicien de Vallongo avec celui de San Felix	100
Silurique inférieur. —Composition du Silurique inférieur de Vallongo	100
Composition de la bande occidentale de l'Ordovicien à Vallongo	102
Différences dans la structure des schistes.....	103
Ploiement des quartzites de Santa Justa.....	103
Puissance des quartzites	104

Discordance du Silurique avec le Précambrique	104
Vestiges d'une ancienne exploitation minière	104
Prolongement de l'affleurement vers le S. E.	104
Développement des schistes ordoviciens dans la bande orientale de l'affleurement	105
Uniformité des caractères des schistes et rareté de fossiles	105
Tableau des espèces du Silurique inférieur (série ordovicienne) de Vallongo	106
Analogies stratigraphiques avec le Bussaco	109
Lentille de l'Ordovicien au milieu des schistes gothlandiens	110
Discordance entre les grauweekes de Sobrido et les schistes ordoviciens	111
Silurique supérieur.— Généralités	112
Grauweekes de la serra da Murta	113
Grandes masses de quartzite	113
Grauweekes de la serra d'Ervedosa	114
Bande graptolitique orientale	114
Gisements graptolitiques de la bande orientale	115
Bande graptolitique occidentale	116
Différentes assises du Gothlandien	117
Grauweekes de la bande occidentale	117
Schistes à nodules de Telheiras	118
Faune de la bande graptolitique occidentale	118
Faune de la bande graptolitique orientale	119
Liste des espèces du Silurique supérieur de Vallongo	120
Grauweekes de Sobrado	122
Schistes de Trofa Velha	122
Schistes de Rates	123
Schistes de Terra Negra	123
Distribution des taches ampéliteuses	123
Habitat des Graptolites	124
Métamorphisme des schistes	124
Lentilles de schiste ampéliteux	124
Schistes d'Ervedosa	125

LAMBEAU AU NORD DE BARCELLOS

COUPES DONNANT LE DÉTAIL DES ASSISES DU SILURIQUE DU BAS DOURO	126
<i>Coupe de Villar de Mattos à Alfena</i>	126
<i>Coupe de Cabeda traversant l'affleurement du Silurique</i>	128
<i>Coupe d'Ervedosa à Balsa</i>	130
Faune de la zone à <i>Didymograptus</i>	135
<i>Coupe depuis la mine de Mont'alto à serra Queimada</i>	139

SILURIQUE DE LA PROVINCE DE TRAS-OS-MONTES

AFFLEUREMENT DE MONCORVO

Gisement remarquable d'hématite	145
Plissement des couches	146
Métamorphisme des schistes	: 146

AFFLEUREMENT DE LA SERRA DE MARÃO

Silurique inférieur.— Quartzites à Bilobites	148
Fossiles dans des schistes maclifères	148
Schistes supérieurs aux quartzites	149
Petits lambeaux de quartzites	149
Silurique supérieur	150

Calcaires de Campanhó.....	150
Schiste supérieur aux calcaires.....	151
Métamorphisme des schistes.....	151

AFFLEUREMENT NORD-ORIENTAL

Silurique inférieur.....	151
Silurique supérieur.....	152
Calcaires de Santo Adrião.....	153
Analogies du système silurique du Portugal avec celui de l'Espagne.....	155

d) BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU GUADIANA

SILURIQUE DE L'ALEMTEJO

AFFLEUREMENT DE LA SERRA DE PORTALEGRE

Quartzites à Bilobites.....	157
Serra du Facho.....	157
Serra de Marvão.....	158
Ploiement des quartzites à la serra d'Alegrete.....	159
Silurique inférieur de la serra de Caleira.....	159
Ilôt de l'Ordovicien au milieu des quartzites du toit du Silurique.....	159
Silurique supérieur de la serra de Caleira.....	160
Fossiles de la bande du Silurique supérieur.....	160
Schistes de Gáfete.....	161
Coteau de Penha Cahida.....	161
Coteau de Canchos dos Altos.....	161
Quartzites du haut de la montagne de San Mamede.....	162
Liste des espèces des grès supérieurs de la montagne de San Mamede.....	163
Tableau des fossiles de la contrée siluro-dévonique de la serra de Portalegre, montrant la succession des différents horizons fossilifères.....	164
Considérations sur la faune des grès supérieurs.....	169
Plissement des quartzites de la montagne de San Mamede.....	170
Couches de la pente orientale de la montagne de San Mamede.....	170
Composition différente du Silurique dans les deux flancs du synclinal ..	171
Grès de la serra Fria.....	171
Lentilles graptolitiques.....	172
Quartzites de Portagem.....	172
Quartzites d'Alegrete.....	173
Parallélisme du Silurique supérieur dans les deux flancs du synclinal.....	173

GRAND AFFLEUREMENT DE LA PROVINCE DE L'ALEMTEJO

Étendue de l'affleurement.....	174
Caractères spéciaux.....	174
<i>Coupe de la ferme d'Eiras Altas à Volta dos Nogaes.....</i>	174
Enclaves de fossiles dévoniens.....	189
<i>Coupe de la ferme de Valle de Corcho à Fatuquedo, traversant la colline de Culebras.....</i>	196
Liste des localités où l'on a trouvé des Graptolites.....	202
Liste des localités où l'on a découvert les espèces de la faune coblentzienne en des lits intercalés dans la série gothlandienne.....	204
<i>Coupe de Santo Aleixo à la ferme d'Eiras Altas.....</i>	205
Classification des dépôts.....	209
Épaisseur de la série.....	210
Considérations générales sur les coupes décrites.....	210
Faune de la bande graptolitique occidentale.....	211

Faune de la bande graptolitique orientale	213
Différences dans la nature des dépôts	214
Comparaison avec la série du Lake District	215
Tableau de la distribution verticale des espèces de la faune silurique aux environs de Barrancos	216
Examen du tableau précédent	220
Développement de la faune graptolitique	221
Classification des différentes assises	221
Dépôts littoraux	222
Enclaves de fossiles dévoniens	223
Age des schistes à Néréites de San Domingos	223
Opinion du professeur Contejean	224
Conditions physiques à Barrancos	224
Comparaison avec le Dévonique du Harz	224
Remarques du professeur Geikie	225
Comparaison avec le Silurique de la Thuringe ..	226
Roches siluriennes du Lake District	226
Schistes de Skiddaw	227
Dépôts volcaniques	228
Interruption physique	228
Silurique supérieur	229
Comparaison du Silurique de Barrancos à la série de Skiddaw	229
Espèces communes aux deux régions comparées	230
Conclusions	232
EXPLICATION DES PLANCHES	234
ADDITIONS ET CORRECTIONS	247

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Note à la page 187

Nous avons nommé l'assise sous-jacente aux grauweekes de la serra Colorada «schistes à Phyllodocites» d'après le nombre considérable d'empreintes de vers qu'elle contient et que nous croyons appartenir à ce genre de Néréides. Nous remarquerons principalement *Phyllodocites Geinitzi* sp. n. qui se rapproche extrêmement de *Phyll. Jacksoni* Emmons sp. au point que nous avons trouvé difficile de séparer les deux espèces.

Page	8, ligne	7 du bas,	au lieu de prétendons, lire prétendions
»	8, »	1 »	» Vereiul, lire Verneuil
»	30, »	19 du haut,	ajouter au bout de la ligne (Pl. I, n° 3; pl. V, profil n° 3).
»	49, »	2 »	» (Pl. I, n° 3; pl. V, profil n° 3).
»	56, »	5 »	au lieu de taché, lire tacheté
»	69, »	11 »	ajouter au bout de la ligne (Pl. V, profil n° 5).
»	73, »	4 »	ajouter après hameau de Robalo (Pl. V, profil n° 7),
»	91, »	2 »	au lieu de Pl. I, lire Pl. V
»	94, »	4 du bas,	» déjetée, lire déjeté
»	96, »	5 »	supprimer dans la direction N. W.—S. E.
»	97, »	1 du haut,	au lieu de Pl. II, lire Pl. VI
»	110, »	21 »	» 9,5, lire 10,5
»	125, »	18 du bas,	» synclical, lire synclinal
»	126, »	11 du haut,	» Pl. III, lire Pl. VII
»	128, »	12 »	» (Pl. II, profil n° 3), lire (Pl. VI, profil n° 3*)
»	130, »	22 »	» Pl. III, lire Pl. VII
»	139, »	23 »	» Pl. III, lire Pl. VII
»	150, »	2 du bas,	» Douro car, lire Douro, car
»	170, »	12 du haut,	» plus loin, lire page 189
»	184, »	2 »	» régulières, lire réguliers
»	184, »	4 »	» recontre, lire rencontre
»	190, »	4 du bas,	» Coblentzien de la, lire Coblentzien et dont un bon nombre se trouvent dans la
»	193, »	12 »	» taché, lire tacheté
»	193, »	5 »	modifier comme suit cette ligne, au fond de la mer silurienne, d'une formation corallienne analogue aux récifs coralliens des
»	221, »	7 du haut,	» et se retrouvent, lire et quelques-unes se retrouvent

LÉGENDE

Gothlandien		Grauwackes et schistes supérieurs.
		Schistes et lydite de Noudar.
		Calcaires et diabase.
		Enclaves de fossiles dévoniens.
		Schistes à nodules.
		Gisements de Graptolites.
Ordovicien		Grauwackes de la Serra Colorada.
		Schistes de Barrancos.
		Schistes de Fatuguedo.

Echelle 1:50.000

N°2 - Profil de Matta de Peniz passant à Porto-de-Sant'Anna, traversant la montagne du Bussaco et se terminant près de Cerquedo.

N°7 - Profil du Silurien inférieur suivant le chemin d'Aldeia-d'Eiras au hameau de Robalo.

N°1 - Profil de Lameiras de Santa Eufemia au signal de Cabeço Redondo passant par la chapelle de San-João.

LÉGENDE

Q	Quaternaire
P	Placène
C ⁵	Senonien (Craie du Bussaco)
T	Triasique
H ¹	Permien carbonifère
D	Dévonien
Ord. supérieur	
S ³	Graès supérieurs.
S ²	Schistes à nodules.
S ¹	Couches culminantes.
S ⁰	Calcaires.
S ⁻¹	Diabase.
S ⁻²	Schistes diabasiques.
S ⁻³	Schistes à Dalmanites Dujardini.
S ⁻⁴	Graès de Loreda.
S ⁻⁵	Couches à Homalotus (Ehleri).
S ⁻⁶	Schistes à Orthio Ribeiroi.
S ⁻⁷	Quartzites à Bilobites.
S ⁻⁸	Quartzites à Scolithus.
S ⁻⁹	Grauwackes rouges inférieures.
CB	Précambrique.
Z	Archéen.

N°5 - Profil traversant la montagne de Góes passant par le signal de Sótam.

N°4 - Profil de San-Miguel de Poiares au signal de Bidueiro.

N°3 - Profil de Casqueira à Santo-Antonio-do-Cantaro traversant la montagne du Bussaco.

N°6 - Profil entre les signaux géodésiques de Bando-dos-Santos et du Pico-do-Ar.

Echelle — 1 : 10.000

A geological cross-section of the Colline region. The diagram shows a series of rock units and structural features. At the top, three labels are written diagonally: 'pyrites, schistules', 'Monocrepas', and 'Acipules'. Below these, a series of rock units are labeled: 'C^{b1}', 'S^{m1}', 'S^{m1}', 'D', and 'S^{m2}'. A dashed line labeled 'Colline' runs horizontally across the bottom. The units are separated by lines representing faults or boundaries. The 'S^{m1}' units are shaded with diagonal lines, while the 'D' unit is unshaded. The 'S^{m2}' unit is also shaded with diagonal lines. The 'C^{b1}' unit is at the far left, and the 'S^{m1}' unit is at the far right.

Nº 2 — Profil traversant la colline de Laundos près de Rates.

Nº 7... Profil sur la rive gauche de la rivière Souza au N. de Senande.

Nº 4 - Profil au col de Senhora-da-Chan sur l'ancienne route de Vallongo à Porto.

Nº 5 — Perfil de Senhora-da-Chan au hameau de Suzão.

Grave chez I. Wührer, rue de l'Abbe de l'Épee 4 - Paris

N°3 — Profil commençant à la mine de Mont'Alto (*Midões*) et passant par Aguiar-de-Souza, Recarei et Serra Queimada.

N°2 — Profil d'Ervedosa au hameau de Parteira traversant la bande du Silurique.

N°1 — Profil de Villar-de-Matto's à Penas-d'Abelha passant à Alfena

4 [redacted] technique

MCZ ERNST MAYR LIBRARY

3 2044 118 618 4