New York
State College of Agriculture
At Cornell University
Ithaca, N. Y.

Library

Cornell University Library
QK 930.C54

La biologie des plantes ...

3 1924 000 673 024

mann

Cornell University Library

The original of this book is in
the Cornell University Library.

There are no known copyright restrictions in
the United States on the use of the text.

LA BIOLOGIE DES PLANTES

R. CHODAT

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

CORRESPONDANT DE L'INSTITUT DE FRANCE

LA BIOLOGIE DES PLANTES

LES PLANTES AQUATIQUES

GENÈVE
ÉDITION ATAR
CORRATERIE, 12

PARIS
ÉDITION ATAR
RUE SAINT-DOMINIQUE, 26

IMPRIMÉ EN SUISSE

md

INTRODUCTION

SOUS le nom de plantes aquatiques, je groupe ces catégories de végétaux qui, de près ou de loin, vivent de la vie des plantes des eaux douces.

En introduisant ici la vie des lichens, dont beaucoup, si ce n'est la plupart, fuient les lieux humides, j'ai voulu montrer comment les algues, par une association avantageuse, peuvent quitter les milieux aquatiques proprement dits et s'habituer au milieu aérien. C'est ce qu'on verra aussi à propos des Broméliacées qui, pour d'autres raisons, subissent une évolution analogue.

Un répertoire systématique à la fin du volume et un index permettront aux personnes qui s'intéressent plus particulièrement à la botanique de retrouver les indications relatives aux plantes étudiées dans ce volume.

PRÉFACE DE L'AUTEUR

LES essais biologiques que je présente au public cultivé sont destinés à développer dans les cercles, même les plus éloignés de la recherche scientifique proprement dite, l'intérêt pour les choses de la Nature. Il ne peut s'agir, ici, de solutions données aux « Enigmes de l'Univers ». La Science moderne est plus prudente. Si elle connaît la force et la valeur de ses méthodes, si elle est fière de l'œuvre énorme accomplie, elle connaît encore mieux ses déficits. Elle sait que Science n'est pas synonyme de solution définitive, mais bien plutôt d'ambition de connaître, de savoir toujours mieux. Le lecteur doit donc s'attendre à plus d'une déception, en plus de celles que vous laissez, après lecture, le titre alléchant d'un ouvrage. Parmi les plus sensibles, pour lui, il y aura sans doute celle qui résulte de cette constatation que, malgré la science de leurs Instituts et de leurs laboratoires, les savants sont encore si peu d'accord sur les questions fondamentales d'origine et de finalité. Mais, si le lecteur veut bien consentir à suivre l'auteur de cet ouvrage dans le détail des faits, il ne pourra s'empêcher d'être saisi d'admiration devant cette Nature si riche et si accueillante. Si riche, parce que jamais l'investigation scientifique n'épuise le trésor qui est en elle et qui paraît grandir à mesure qu'on l'exploite. Si accueillante, parce que, malgré tout, elle donne à celui qui la consulte plus qu'il n'aurait osé espérer.

Et si, chemin faisant, le lecteur s'aperçoit que telle théorie qui, hier encore, recueillait tous les suffrages, semble aujourd'hui devoir être définitivement abandonnée, il n'y verra point, comme on l'a prétendu, une faillite de la science, mais le triomphe du bon sens sur la superstition.

La biologie proprement dite est une science relativement neuve. Trop longtemps la botanique et la zoologie se sont bornées à établir de compendieux catalogues, des systèmes habillés dans un appareil bibliographique parfois plus pédant qu'instructif. Et cependant, les savants des XVII^e et XVIII^e siècles, ALDROVANDI, SPALLANZANI, BONNET,

BUFFON lui même, étaient déjà attentifs aux faits biologiques, décrivant avec soin, avec intelligence, les mœurs des animaux. Un Rousseau lui aussi, dans ses lettres sur la botanique saisit bien tout l'intérêt qu'il y a à suivre la plante dans ses vicissitudes au milieu de la nature. Le genevois P. VAUCHER, après de belles études sur les Conferves, inaugure la biologie végétale par son *Histoire physiologique des plantes d'Europe*. Mais déjà SPRENGEL et KÖELREUTER l'avaient précédé en étudiant la biologie des fleurs.

Mais c'est à l'école anglaise du XIX^e siècle que nous devons le renouveau de la biologie. DARWIN dans son « *Voyage autour du Monde* », WALLACE en publiant son « *Tropical life* », Th. BELT avec son « *Naturaliste au Nicaragua* » et « *last not least* », BATES en faisant connaître dans deux beaux volumes la vie des plantes et des animaux de l'Amazonie, ont donné une impulsion puissante à ce genre d'études.

Malheureusement, depuis lors la biologie, dominée par la théorie trop exclusive du transformisme, a glissé sur la pente fatale de la scolastique évolutionniste. Ceci a provoqué une réaction qui se dessine puissante actuellement et qui demande qu'on substitue aux explications finalistes des néo-darwiniens des descriptions rigoureuses reposant sur la connaissance mécanique des relations de cause à effet. Toute une branche intéressante de la botanique s'est ainsi développée, celle de la morphologie expérimentale.

Dans cette dernière, on établit la dépendance de la forme avec le milieu, on montre que la lumière, la chaleur et les autres causes physiques impriment, chacune pour elle-même ou en combinaison les unes avec les autres, un certain facies aux organes, à la plante entière. Cela est bien et on ne saurait assez expérimenter. Mais il n'en reste pas moins que, pour le moment, la description exacte des dépendances de l'organisme vis-à-vis du milieu et l'action formatrice, morphogène de ce dernier ne permettent pas de comprendre les faits extrêmement nombreux et variés d'adaptation ou de structure qui nous paraissent comme calculés pour atteindre un certain effet. Le naturaliste est donc contraint ou de refuser de voir ces merveilleuses coïncidences ou, les constatant, de renoncer provisoirement à les expliquer, c'est-à-dire à en donner la causalité.

L'auteur du présent ouvrage est bien de cet avis qu'une science saine ne peut accepter comme démontré que ce qui peut être répété à

volonté. Selon lui, le problème biologique se ramène en dernière analyse à des équations physico-chimiques et doit pouvoir être décrit dans le langage simple et général de la mathématique. Mais la plupart des faits les plus intéressants de la biologie sont encore trop peu analysés pour pouvoir être décrits de cette façon. Alors intervient, à la place d'une explication en termes de causalité, un exposé qui consiste en des comparaisons de phénomènes complexes, par lesquelles s'établissent les traits communs et les dissemblances. Cette classification devient naturelle si les faits sont décrits en raison de certaines coordonnées que nous fournissent les classifications systématiques et l'évaluation des homologues. Montrer, par exemple, que le même organe dans une série d'espèces du même genre est autrement conformé et que les déviations d'un type idéal sont en rapport avec la situation de la plante dans le milieu naturel auquel cette structure semble correspondre, c'est aussi faire de la science et de la bonne science.

Etudier successivement, dans leur développement individuel, soit chaque espèce, soit dans une espèce chaque organe; et reconnaître entre ces formes, à un moment donné, et les circonstances extérieures une relation définie, c'est aussi de la science.

Il serait inutile, dans une introduction comme celle-ci, d'aborder une discussion trop abstraite et d'essayer de donner même les rudiments d'une théorie générale de la biologie, c'est-à-dire de la conformité de l'organe à la fonction. Mais, dès maintenant, l'auteur se sent pressé de dire que, pour lui, cette conformité n'est pas toujours visible; elle n'est pas toujours manifestée par des appareils qui fonctionnent sous nos yeux. Celles des plantes qui paraissent les plus étonnantes sont évidemment celles que nous comprenons le mieux, parce que leur manière d'être paraît plus étroitement, plus visiblement, correspondre à un genre de vie.

Pour me servir d'une analogie, nous saisissons facilement les opérations successives d'un travail mécanique, l'adresse d'un artisan, la force d'un manœuvre, tandis que nous sommes incapables de saisir le mécanisme psychologique qui préside à l'élaboration d'une œuvre scientifique ou artistique.

Ainsi, beaucoup de végétaux ne paraissent pas, par leur structure extérieure, être particulièrement adaptés aux circonstances; à l'environnement. La concordance est à chercher alors entre des capacités de

nature invisible, comme la vigueur, la résistance aux conditions défavorables, c'est-à-dire entre la sensibilité et le milieu. C'est ce que nous verrons souvent au cours de cet exposé.

Comme notre but était d'intéresser les esprits cultivés aux choses de la biologie végétale, nous avons, de propos délibéré, laissé de côté tout ce qui suppose des connaissances trop spécialisées et, en particulier, ce qui a rapport à la structure microscopique des appareils compliqués. Mais le sujet est si vaste que le lecteur ne s'apercevra guère de cette lacune et nous saura gré d'avoir allégé notre esquisse.

Je me suis aussi efforcé d'employer un langage dépourvu d'expressions trop techniques, de manière à rendre la lecture de cet ouvrage plus facile à ceux qui n'ont pas à leur disposition cette nomenclature scientifique souvent utile, mais tout aussi souvent inutilement pédante et encombrante.

Grâce à cet artifice, j'évite, me semble-t-il, l'écueil de la spécialisation et je porte mon effort sur les questions les plus générales.

J'ai aussi cherché à ne parler que de phénomènes que j'aie étudiés moi-même ou tout au moins de ceux seulement sur lesquels j'aie des renseignements de première main, contrôlables par moi-même ou par l'analogie qu'ils présentent avec d'autres que je connais par mes propres travaux.

Ce faisant, j'ai essayé de donner à cet ouvrage une saveur originale, ce qui ne veut pas dire que je mésestime les travaux de mes confrères; je les ai mis largement à contribution. Mais on ne parle avec autorité que des choses qu'on a expérimentées.

Je dois des remerciements à des confrères ou à des collègues qui ont bien voulu me prêter des clichés ou des photographies.

Ce sont MM. D^r Brun, Prof. Emile Chaix, D^r Vischer.

Enfin mes remerciements vont aussi à l'Editeur, la Maison Atar, qui n'a rien négligé pour assurer une exécution typographique soignée.

Genève, octobre 1917.

R. C. del.

Algues des Neiges; de la chaîne du mont Blanc.

Les neiges colorées.

(PLANCHE I.)

SI singulier que cela puisse paraître, il y a une flore des neiges comme il y a une flore des prairies, des dunes ou des étangs. Ce sont non pas des plantes que le vent aurait accidentellement transportées sur ce milieu glacé, mais il s'agit réellement de végétaux qui appartiennent en propre à la neige et qu'on chercherait vainement dans d'autres stations. N'allez cependant pas les chercher sur la neige fraîche qui vient de tomber en hiver ; il faut au développement et à l'accumulation de cette flore la durée, les neiges persistantes. Jusqu'à ces dernières années on ne connaissait dans nos Alpes que des neiges colorées estivales. Mais voici que presque en même temps sur la neige qui entoure en hiver les lacs de Davos et de Montana (Grisons et Valais), deux stations d'hiver, on a reconnu la présence, sur de grandes étendues, d'un nouvel organisme des neiges, une algue d'hiver, une gracieuse Périidiniacée le *Glenodinium Pascheri*. Comment cet organisme qui apparaît d'une manière épidémique sur la blanche neige et y produit des taches étendues d'un rouge brique intense a-t-il pu échapper à l'observation des biologistes ! On ne va guère en hiver dans les montagnes ; les quelques alpinistes, skieurs, sportsmen, qui s'aventurent dans ces parages en cette saison, ne sont guère préoccupés de scruter les problèmes de la nature. Les difficultés d'une course pénible, la nécessité de songer en première ligne à se tirer d'affaire, absorbent toute l'attention. Et puis il semble qu'il faut à l'accumulation de ces micro-organismes, ce qui les rend visible à l'œil nu, une intensité et une durée de luminosité qui n'est pas réalisée partout. Les bourrasques de neige fraîche, qui viennent recouvrir l'ancienne neige tassée ensevelissent les premières tentatives d'une multiplication intensive. Plus haut, vers les sommets où souffle un vent glacé, les conditions de vie pour les plantes des neiges sont rarement réalisées. Si peu exigeantes qu'elles soient,

il leur faut l'élément liquide pour se développer. Sans eau, pas de végétation, pas de croissance.] *Corpora non agunt nisi soluta*, disait un vieil adage de la chimie et de l'alchimie. Si cela n'est plus vrai aujourd'hui pour beaucoup de réactions chimiques, les corps qui réagissent les uns sur les autres dans les phénomènes chimiques de la vie, ne le peuvent en dehors d'un milieu liquide ou imprégné d'eau proprement dite.

C'est dire qu'il faut à ces organismes au moins la température de 0°, celle à laquelle fond la neige pure des solitudes glacées de nos montagnes ou des calottes polaires. Or, en hiver, même dans les stations les plus ensoleillées de nos Alpes (Montana, Davos), la neige ne fond que pendant une partie de la journée ; même vers le milieu du jour, l'ombre de la montagne ou des arbres interrompt cette fusion ; la nuit, tout redevient glacé ; les plantes microscopiques sont prises dans les cristaux de glace qui se forment à la surface de la neige en fusion. Pendant longtemps, rien ne viendra trahir le fourmillement des organismes, des infiniment petits qui, disséminés dans la neige, assimilent, respirent et se multiplient. De même si, par une belle journée d'été, penché sur la balustrade d'un bateau à vapeur, le touriste se laisse fasciner par le bleu cristallin et profond d'un de nos lacs, le Léman par exemple, ce qui l'impressionne, l'émeut, c'est la pureté de ces eaux, leur admirable transparence. Mais si ses yeux avaient le pouvoir pénétrant et grossissant d'un microscope, il verrait ces eaux constellées d'organismes de toute sorte, comme la voûte du ciel d'une belle nuit est parsemée d'étoiles.

De même ici, dans la neige, des germes de vie sont disséminés et n'attendent que l'occasion de se multiplier. Il leur faut, comme à toute plante, lumière, chaleur, nourriture. Dans nos montagnes, l'intensité lumineuse augmente rapidement avec l'altitude ; tous ceux qui ont voyagé sur les glaciers des Alpes ont éprouvé l'action intense du soleil qui fendille la peau, aveugle l'imprudent qui ne s'est pas protégé par des enduits isolants ou des lunettes de glacier. Les organismes des neiges ne vont donc pas manquer de lumière, bien au contraire ; nous verrons même qu'ils seront forcés de porter, eux aussi, leurs lunettes de glacier. Il leur faut de la chaleur pour effectuer leur travail de synthèse, de nutrition végétale.

tales. Et voici que la neige paraît un milieu peu propice à satisfaire à ce besoin. Tout d'abord elle ne peut guère se réchauffer ; aussi longtemps qu'elle n'est pas toute fondue, la température va se maintenir constante, soit à peu près à 0° centigrade. A l'ombre et le soir, elle va se refroidir et se prendre en glace : les cellules végétales seront dès lors emprisonnées dans ce milieu solide, et leur développement complètement arrêté. Elles ne sont pas les seules à supporter ces alternances de gel et de dégel ; beaucoup d'algues, de filaments verts, se maintiennent vivants pendant de longues semaines d'hiver dans la glace de nos étangs. Je me suis souvent amusé à récolter des algues en cassant la glace des étangs ; à peine cette dernière était-elle fondue que l'on voyait ces organismes, qui avaient comme passé par un frigorifique, manifester leur vie par l'émission d'un grand nombre de cellules propagatrices qui nageaient avec rapidité dans l'eau glacée. A un point de vue cependant, les organismes des neiges, qui appartiennent tous à la classe des Algues, sont vraiment dans des circonstances particulières. Tout leur cycle vital se fait à une seule et même température, celle de la neige fondante, soit 0°. Lorsque baisse la température, leur vie est ralentie, suspendue comme celle d'une graine au repos. Ils ont capacité de vie, mais ne vivent plus ; ce sont comme des horloges arrêtées, la température de 0° remet le balancier en mouvement.

La plupart des autres plantes ont un domaine thermique beaucoup plus étendu. Le blé germe déjà en automne à une température de 5° ; il se feuille, talle et croît avantageusement de 6° à 16° ; il ne mûrit cependant que si ses jeunes épis sont exposés à une température de 20°.

Les dattiers cultivés en Provence, à Hyères par exemple, sont aussi beaux, aussi robustes que leurs congénères de l'oasis de Biskra, mais ils ne mûrissent pas leurs dattes. Pour cela, il leur faudrait, comme à ceux du désert, le pied dans l'eau et la tête dans le feu. Tout autour de ce glacier et de ces névés, vous voyez ces robustes et pittoresques aroles, ces vigoureux mélèzes. Encore robustes végétativement à la limite de la végétation forestière, ils n'arrivent pas à mûrir leurs cônes ; les petits pâtres, qui sont très friands de leurs amandes, vont les récolter plus bas.

Eh bien, les algues microscopiques des neiges ont un violon bien simplifié pour y jouer leur symphonie vitale; leur unique corde est accordée à une seule température, à une seule hauteur de son, celui de la neige fondante.

Fig 1. — La Soldanelle (*Soldanella alpina*), plante qui peut croître et fleurir dans la neige; à droite, tiges fructifères à capsules dressées, ouvertes. Dessin de R. C.

Sans doute, d'autres plantes, et parmi les plus gracieuses de nos Alpes, commencent à germer, à respirer, à pousser à une température de 0°; même plus d'une de ces plantes supérieures, comme les Crocus et les Soldanelles (*fig. 1*), se frayent un chemin dans la neige et parfois balancent leurs corolles au-dessus du névé qu'elles ont percé; mais toutes nécessitent pour leur fructification une température beaucoup plus élevée.

Nos petites algues des neiges se maintiennent donc toute leur vie à une même température comme ces favorisés de la fortune

qui, l'hiver durant, grâce au chauffage central, se sont maintenus dans des appartements à 18° et qui, vers l'été, ne pouvant régler la température de leurs demeures à cette douce chaleur, vont passer les canicules à 2000 m., puis reviennent en ville en passant successivement par les stations intermédiaires aménagées pour la société à température constante. Cela n'est guère varié, mais cela est ainsi pour les algues des neiges. La seule interruption à cette monotonie de température, c'est le frisson nocturne quand elles passent ainsi périodiquement de vie à trépas : espèce de mort qu'il faut bien se garder de confondre avec le sommeil.

[Comment se nourrissent ces minuscules plantes dans ce milieu qui paraît si peu nutritif ? Il est aisé de constater que toutes les espèces, même celles qui paraissent rouges, brunes ou jaune d'or, possèdent dans leur cellule de la chlorophylle, le vert des feuilles qui, dans la lumière, sert à toutes les plantes à extraire, de l'acide carbonique, le carbone nécessaire à leur nutrition. C'est là un mode de nutrition général chez toutes les plantes non parasites, et dont nous aurons à parler plus d'une fois.]

Et, à ce point de vue, les algues des neiges sont vraiment favorisées ; l'eau glacée qui circule sur le névé et dans le grain du névé inondé de lumière est beaucoup plus nutritive que l'eau chaude de nos étangs. L'acide carbonique de l'air est contenu dans ce milieu dans une proportion à peu près constante, mais l'eau froide en contient plus que l'eau chaude. Ainsi, à 5°, il y a deux fois plus de CO_2 dissous qu'à 20°¹. L'oxygène, qui est nécessaire à l'entretien de la vie, à la respiration, sans laquelle ne peut se faire aucun travail, se dissout aussi en plus grande proportion dans l'eau froide que dans l'eau chaude. On est moins rapidement asphyxié dans de l'eau glacée que dans de l'eau tempérée.

Voici donc deux conditions essentielles de la vie des plantes : nutrition carbonée et respiration, qui sont favorisées dans ce milieu en apparence hostile à la vie. La neige, en tombant, a aussi absorbé les poussières de l'air et entraîné les combinaisons azotées qui résultent des décharges électriques dans l'atmosphère. Elle n'a donc de la pureté que l'apparence ; en réalité, elle est

¹ A 5°, un litre d'eau du lac de Genève contient 7,3 ccm. d'oxygène et 0,6 ccm. de gaz carbonique, tandis qu'à 20°, ces chiffres sont respectivement 5,7 et 0,3 ccm.

souillée d'une quantité considérable d'impuretés. Toute la question est donc d'expliquer comment, à cette température basse, une croissance active, une multiplication rapide est possible.

Y a-t-il, dans cette vie à 0°, qui nous donne le frisson, un mystère plus grand et plus insondable que dans notre propre vie à 36°? Nous brûlons le carbone de notre sang et de nos tissus, sans flamme, par une combustion lente, continue, mais qui, en principe, est du même ordre que celle du bois dans notre cheminée ou de l'huile de notre lampe. Seulement, dans ce dernier cas, il nous faut y mettre le feu et le maintenir à une température de plus de 250°, tandis que nous brûlons comme une lampe qui s'allumerait d'elle-même, qui prendrait feu spontanément à une température très basse. Si nous pouvions expliquer notre propre respiration, nous pourrions sans doute dire aussi pourquoi il arrive que d'autres organismes brûlent leurs réserves à une température encore plus basse. Il ne s'agit pas ici du combustible de respiration, qui est essentiellement le même chez les plantes inférieures, les plantes-feuilles et les animaux. La physiologie nous fait connaître ces matières qui sont essentiellement les sucres, les féculs, les graisses. Le chimiste, dans son calorimètre, ne peut amorcer ces réactions entre l'oxygène de l'air et les sucres et les graisses qu'en chauffant à plus de 300°, l'animal à sang chaud y arrive à 36°, la plante verte de 0-40°, l'algue des neiges à 0°. Mais ce qu'il y a de plus curieux dans ce phénomène, c'est que, à l'inverse des combustions chimiques, qui sont progressivement accélérées par l'élévation de température sans qu'on saisisse une limite supérieure, ici, avec l'élévation de température, le phénomène de la respiration, qui avait tout d'abord progressé, s'arrête brusquement, et cet arrêt correspond non pas comme l'arrêt par les températures basses à une simple inhibition, à un arrêt momentané, mais à une altération définitive, irréversible comme l'on dit: l'organisme meurt. Nos expériences nous ont appris que pour la plupart des algues des neiges, pendant leur vie active, une température plus élevée que 4° agit comme l'eau bouillante sur les organismes supérieurs.

On a souvent pensé que la respiration, qui est essentiellement une combustion, serait sous le contrôle de ferments oxydants, c'est-à-dire de substances spécifiques capables de sensibiliser les

réactions, d'accélérer la vitesse de ces réactions. Sans nul doute la respiration des animaux comme celle des plantes dépend de ces substances qu'une science moderne a su extraire de beaucoup d'organismes, mais il y a dans le phénomène si mystérieux de la respiration plus que cela. C'est comme si la nature vivante était

Fig. 2. — Solitude neigeuse sur le glacier du Tour (mont Blanc) ; remarquer la teinte à gauche. Comparez fig. 7, qui représente les organismes de la neige rouge récoltée en cet endroit. Phot. de R. C.

comme un échafaudage instable que la moindre chiquenaude fait effondrer. Nous verrons ce qu'il faut penser de cette hypothèse quand nous parlerons des Thermes.

Quoi qu'il en soit, la plupart des algues des neiges meurent à une température qui est trop basse pour permettre à la plupart des végétaux de notre pays d'effectuer leur germination.

Il me semble, en écrivant ce prologue, que je fais comme ces jeunes éphèbes qui, devant une salle qui attend impatiemment

l'exécution d'une comédie de Molière ou d'une tragédie de Shakespeare, lit un savant mémoire sur le théâtre français ou sur l'identité réelle ou fictive de Bacon et de l'immortel dramaturge. Le public s'impatiente, il veut voir jouer la pièce et jugera par lui-même.

Eh bien, sans tarder, laissons parler les artistes eux-mêmes, montons ensemble de Champex au col des Ecandies. Le chemin qui avait quitté le vallon d'Arpette s'engage maintenant sur les flancs de l'immense moraine du glacier d'Arpette ; évitant les gros blocs vacillants, nous voici arrivés au bas du col, dans une dépression en vaste cuvette ; la neige d'août a laissé, en s'évaporant, quelques tables de glacier. Notre petite caravane, un peu fatiguée, avance lentement. Quelqu'un me fait remarquer, sur la neige ancienne, des taches tout d'abord éparses, comme celles qu'aurait faites un liquide coloré tombant goutte à goutte, puis des espaces continus d'un beau rouge framboise. C'était en 1895 ; quoique habitué des solitudes glacées de nos Alpes, je n'avais jamais observé de la neige colorée. La première impression était que notre caravane avait été précédée par un chasseur ou un braconnier du pays, dont le petit tonneau de vin rouge qu'il a l'habitude de porter à la façon d'une gourde se serait vidé peu à peu. Il y a une énorme différence à connaître une chose par les livres ou de la savoir par l'observation personnelle. Il ne me fallut cependant pas longtemps pour me convaincre que la coloration n'était pas accidentelle. Très irrégulièrement, cette teinte envahit la neige jusqu'à plusieurs centimètres de profondeur, un peu de la même manière que les colonies bactériennes disséminées sur un milieu nutritif pénètrent dans la masse ou tendent à se confondre en se rencontrant dans leur expansion. Si le botaniste algologue remplit un des flacons, qu'il porte toujours sur lui, de la masse neigeuse, celle-ci est de l'apparence et de la consistance d'une glace aux fraises ou parfois, lorsque la concentration est plus forte, de la couleur d'une glace aux framboises. Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque les organismes ont pu pendant longtemps se multiplier autour d'un germe initial, que la couleur devient plus intense, rouge brique.

La beauté et l'intensité du phénomène nous décidèrent sur-le-

champ d'en faire une étude méthodique, en nous aidant d'un microscope que nous étions allé prendre à Champex (1465 m.), alors notre station d'été, et que non sans peine nous avions hissé jusqu'à ces solitudes glacées.

Ce n'était certes pas un laboratoire banal, le microscope sur une table de glacier, les hautes parois de la pointe d'Orny et

Fig. 3. — Magdalena bay (Spitzberg). Glacier qui s'effondre dans la mer ; la surface était couverte de neige rouge. Phot. de A. Brun.

celles du Zénépi ; en arrière, le flanc de la moraine, devant nous le névé qui grimpait vers la fenêtre du col par lequel les derniers rayons du soir venaient éclairer le miroir de mon instrument. Plus ému encore par l'inattendue trouvaille que par la solitude sauvage du site, je le fus davantage encore en reconnaissant dans cette neige rouge, en plus de l'organisme habituel des neiges rouges, plusieurs autres algues qui m'étaient inconnues et dont deux se trouvaient être nouvelles pour la Science.

Malgré la lumière qui baissait, je continuais à me laisser absorber par ces curieuses observations, bien décidé de ne m'en aller qu'à l'extrême limite du jour, lorsque brusquement je fus surpris par un orage avec coups de tonnerre. C'est un phénomène grandiose dans tous pays et à toute altitude, mais combien plus ici dans cette solitude, dans cet espèce de gouffre noir.

J'allais me sauver précipitamment et je me préparais à interrompre mes observations lorsque je fus interpellé par un gentleman suivi de deux dames qui fuyaient devant la tempête et qui, dans le brouillard qui nous enveloppait, avaient perdu la direction. Rassuré, il s'approche, s'étonne de ce microscope à cette altitude, à une heure si tardive. Il s'intéresse malgré la pluie qui vient, et depuis lors n'a cessé de correspondre avec l'auteur de ces lignes sur cet intéressant sujet. Tout en descendant, je lui explique ce que je sais et lui-même, fervent alpiniste, me promet de surveiller les hautes routes des névés et des glaciers, et il a tenu parole, m'envoyant de diverses grandes excursions de la neige rouge ou d'utiles renseignements. Je dois aussi à mon savant confrère le volcanologue bien connu, M. ALBERT BRUN, la connaissance de la neige rouge du Spitzberg, qu'il a bien voulu récolter pour moi (1909).

Cette première étude, poursuivie pendant plusieurs jours sur place, a été le point de départ d'observations que nous avons continuées pendant plus de vingt ans, dans diverses régions des Alpes suisses et du Jura français. Enfin, depuis la création d'un laboratoire de biologie alpine au jardin alpin de la Linnaea à Bourg-Saint-Pierre (1700 m.), nous sommes installés pour pouvoir suivre l'évolution de ces micro-organismes de la neige ; nous pouvons facilement nous procurer de la neige rouge dès le mois de juillet, soit des névés de la Chenalette (2.889 m.), soit des amas de neige qui se maintiennent dans le Vallon des Morts, au Grand-Saint-Bernard (2.470 m.). Observée pour la première fois par le Genevois H.-B. DE SAUSSURE, qui, sans en connaître la nature, l'avait nommée, dans son voyage dans les Alpes (1778), terre rouge de la neige, (au Grand-Saint-Bernard), puis par l'expédition arctique, JOHN ROSS (1819), la neige rouge est produite par un ensemble d'organismes, dont le principal fut successivement considéré comme un champignon par F. BAUER (1819), comme une rouille de

la neige (*Uredo nivalis*), analogue à la rouille qui attaque les céréales, puis par le Suédois AGARDH, comme une algue (*Protococcus nivalis*) formant une fleur de la neige, nommée par le Norvégien SOMMERFELT (1824) *Sphaerella nivalis*, et *Haematococcus nivalis* par FLOTOW, qui la considérait comme une espèce parallèle de l'*Haematococcus pluvialis* des flaques ou des creux humides des rochers de la plaine et de la montagne.

Cette dernière espèce (fig. 41) qui appartient à un autre genre n'est pas rare même dans les régions élevées, mais elle ne s'est jamais rencontrée dans la neige. Dans le massif du mont Blanc, je l'ai vue colorant en rouge l'eau du bénitier du cimetière d'Orsières et de la chapelle de Ferret, puis plus haut, au-dessus du glacier de Saleinaz, dans les creux humides des rochers du Plan Magnin. C'est un organisme qui supporte des températures élevées et que nous sommes arrivés à cultiver en culture pure dans le laboratoire, ce que nous n'avons jamais pu faire pour l'organisme rouge des neiges.

Le nom de cette plante microscopique unicellulaire a donc subi bien des vicissitudes. Cela provient du fait que jusqu'à ma publication en 1896, elle était très mal connue. En 1903, mon savant collègue et ami, le professeur WILLE de Christiana, reprenant une suggestion que j'avais faite en 1896, puis en 1902, la place définitivement dans le genre *Chlamydomonas* (*Chlamydomonas nivalis* Wille). C'est que cet organisme unicellulaire, comme ses congénères est excessivement variable; ellipsoïdes ou ovoïdes, ses cellules, nagent dans la neige fondante au moyen de deux longs cils qui battent sous l'impulsion de deux vacuoles dont les pulsations alternantes rappellent celles d'un cœur en activité (fig. 4). Ces cellules mobiles sont d'ailleurs très peu actives; il est difficile de les conserver longtemps dans cet état, sous le

Fig. 4. — Cellule mobile (zoospore) d'une algue unicellulaire, *Chlamydomonas*. *f*, flagelle (cils); *s*, stigma ou tache oculaire; *n*, noyau; *p*, réserve de nourriture.

Gross. 1650 fois.

Dess. de R. C.

microscope, à cause de l'élévation de la température. On appelle chez les algues des cellules semblables *zoospores* (fig. 4), à cause de leur mobilité, qui rappelle celle des animaux inférieurs. Chaque cellule est ou nue, ou plus souvent enveloppée par une membrane, sorte de sac hyalin, fait d'une gelée plus ou moins épaisse. On trouve de ces cellules de toute grandeur : de $15\ \mu$ à $65\ \mu$ de longueur. Par le gel ou par l'élévation de la température, ces cellules s'enkystent, ou, sans modifier leurs formes ou en s'arrondissant, prennent alors l'apparence de cellules *Protococcus* arrondies, enveloppées par une simple membrane ou protégées par une auréole gélifiée, faite d'emboîtements répétés. C'est sous cette forme que les algues de la neige rouge passent par un temps de repos. Leur multiplication se fait à l'intérieur de cette vésicule (fig. 5) par une division simple ou répétée, ce qui fournit 2 ou 4 spores. Ces dernières sont émises par rupture de la vésicule.

J'ai observé parfois la sexualité qui, chez ces plus simples des plantes, ne se marque par aucun signe extérieur : deux petites zoospores, c'est-à-dire cellules mobiles ordinaires, mais qui ont perdu la faculté de se développer et de se multiplier par elles-

Fig 5. — Organisme (algue) principal de la neige rouge (*Chlamydomonas nivalis*) : 1, 2, 3, 6, 9, 14, divers états de cellules immobiles ; 2, 6, 8, cellules en voie de multiplication ; 5, 11, 12, cellules mobiles (zoospores).

Gross. 600 fois.

Dess. de R. C.

mêmes, s'attirent, s'approchent, se mettent à cheminer de compagnie ; on les voit se souder latéralement et constituer ainsi une double cellule, qui, pendant un certain temps, chemine avec ses deux paires de cils. Peu à peu, se fait la fusion des deux gamètes, ainsi qu'on nomme les cellules sexuelles. Le développement ultérieur n'a pas été suivi.

Par ces caractères, le *Chlamydomonas* des neiges ne diffère que par des

caractères secondaires des *Chlamydomonas* de nos étangs et de nos flaques d'eau. Nous en reparlerons autre part.

Mais la neige rouge n'a pas été constatée que dans nos Alpes où nous l'avons étudiée dans plusieurs stations du massif du Mont-Blanc, au Grand-Saint-Bernard, au col Fenêtre, à Mattmark, etc. Au Spitzberg, elle colore d'immenses étendues de neige et y

Fig. 6. — Baie de Smøøereburg (au Spitzberg).
On voit sur la neige de très larges taches de neige rouge. Phot. D' A. Brun.

est beaucoup plus apparente; on l'a signalée du Groenland septentrional, des montagnes de la Scandinavie, des Carpathes, du Jura, des Hautes Andes de l'Equateur et de la Bolivie, et enfin, de l'Antarctique.

Sa couleur rouge est due à une accumulation, plus ou moins forte, d'huile qui tient en dissolution la même matière colorante que celle qui donne à la carotte et à la tomate leur vive colora-

tion. C'est cette accumulation d'huile rouge qui masque la couleur verte de la cellule. J'ai cultivé dans un «thermos» contenant de la neige les organismes de la neige rouge : la diminution de lumière amène la disparition de la carotène, et le vert réapparaît.

C'est à une cause analogue qu'est due chez des plantes supérieures la coloration rouge brique des feuilles en hiver. Lorsque, dans les lieux découverts, par exemple sur les collines pierreuses ou les dunes du bassin moyen du Rhône, les buis sont exposés pendant plusieurs semaines à la vive insolation, leurs feuilles se colorent en rouge vif comme les tomates ; il ne faut pas confondre cette coloration avec la teinte automnale des feuilles qui est due à un autre pigment.

La biologie est la science de la vie, elle cherche à expliquer les manières d'être des organismes et, selon le point de vue, donne le nom d'explication à des raisonnements de valeur très différente. Etablir une relation de cause à effet, par exemple décrire la formation de la carotène et de l'huile sous l'influence de conditions extérieures connues, c'est introduire une explication mécanique, c'est expliquer le résultat par l'antécédent. Cela n'est possible que par l'observation et l'expérience. C'est de la science proprement dite.

L'autre méthode consiste à se poser des questions sur le rôle et la fonction des organes, des structures. A quoi servent ces particularités morphologiques ? On établit la relation qui unit organe et fonction ; on remarque que ces organes semblent très souvent comme calculés pour fonctionner dans un milieu donné qui est justement celui où vit la plante ou l'animal considéré. Il semble dès lors que l'organisme est conforme au milieu, ce qu'on exprime en disant qu'il est adapté.

Comment se sont constituées ces merveilleuses coïncidences entre structure et fonction, entre organismes et milieux adéquats, qui parfois semblent calculées, prévues l'une pour l'autre comme la clef pour la serrure ? C'est ce qu'il est impossible de dire aujourd'hui, malgré l'effort magnifique de l'école évolutionniste.

Toute structure, toute particularité n'est pas nécessairement adaptée.

En particulier, on ne voit pas très bien ce qui, dans la forme du *Chlamydomonas nivalis*, correspond d'une manière plus étroite au

milieu spécial, la neige. Et cependant, le peu de motilité qu'exhibe cette espèce, comparée à celle de ses congénères des étangs et des mares, est évidente ; ici le transport à grande distance est quasi impossible, la multiplication se fait de proche en proche comme le développement d'une cellule microbienne dans un milieu solide gélatinisé. Dès lors, manquent les cellules migratrices ou, si elles se développent, leur pouvoir de translation est extrêmement affaibli. Le mode d'enkystement avec les enveloppes épaisses et gélifiées protège la cellule contre une rapide dessiccation ; l'accumulation des réserves nutritives, comme dans une semence, assure la possibilité d'une vie ralentie sans qu'intervienne une brusque contraction comme cela arrive dans les organismes délicats ou très éphémères des eaux pures. On raconte, mais je n'ai pu m'assurer de ce fait, que les cellules enkystées bourrées de nourriture de cet organisme des neiges, qui passent par une vie de repos, peuvent, comme les cellules analogues de l'*Haematococcus* rouge des pluies, se dessécher complètement et reprendre vie au contact de l'eau et à la température convenable. Quoi qu'il en soit, ces *Chlamydomonas* ont fait le tour du monde emportées avec les poussières cosmiques plus facilement que les spores des Fougères ou que les minuscules semences de certaines plantes supérieures ubiquistes. La migration des organismes de la neige colorée se fait certainement de massif montagneux à massif montagneux, de champ de neige à champ de neige, par des pays tout entiers, à des distances incommensurables.

Si maintenant je passe à l'origine et au rôle de l'hématochrome, comme on appelle l'huile saturée de carotène rouge de ces algues, je constate qu'on peut expérimentalement provoquer l'accumulation de ce pigment par l'action des facteurs qui justement sont actifs sur les névés. Tout d'abord par l'intensité lumineuse, puis par l'augmentation de la nutrition hydrocarbonée avec diminution de la respiration. En hiver souvent, dans les feuilles des plantes persistantes, se continue une active nutrition dans la lumière ; cette nutrition n'étant pas contrebalancée par une respiration proportionnelle, il en résulte une accumulation considérable de réserves — huileuses ou sucrées — qui favorisent la production de la carotène.

Mais, d'autre part, la matière verte est facilement décolorée par une trop forte intensité lumineuse ; si elle ne peut se régénérer, et elle le fait difficilement à basse température, la plante

Fig. 7. — Algues des neiges du Mont-Blanc 1, divers états du *Chlamydomonas nivalis* (neige rouge) ; 2, *Scotiella nivalis* (neige jaune) ; 3, *Anclonema Nordenskiöldii* (neige pourpre) ; 4, *Ankistrodesmus* (*Raphidium*) *nivalis* (neige verte) ; 5, gonidie de lichen ; 6, 7, squelettes de deux Diatomacées. Comparez avec la planche I.
Gross. env. 500-800 fois.

Dess. de R. C.

meurt d'inanition. L'huile fonctionne ici comme écran protecteur, ce qui paraît avantageux à cet organisme, exposé directement à la lumière intense des hauteurs.

Mais revenons à la neige rouge du col des Ecandies, qui comprenait, quoique à titre subordonné, trois autres algues qui depuis lors ont été retrouvées un peu partout dans les mêmes

conditions. Tout d'abord une Mésoténiacée, à cellules très simples, cylindriques, disposées en courts boudins bi- ou tricellulaires, de couleur assez singulière résultant de la combinaison d'un suc coloré par une anthocyane pourpre et du plastide vert (*fig. 7, 3*). Les cellules vertes des plantes contiennent dans leur plasma ou matière vivante, des disques, des bandes ou des corps étoilés, eux-mêmes vivants et auxquels s'est attaché, comme une teinture se fixe sur un tissu, le pigment vert nommé chlorophylle. Cette dernière substance est insoluble dans l'eau. Les anthocyanes sont au contraire des matières colorantes qui jamais ne s'attachent directement à la matière vivante, mais restent en solution dans le suc des plantes. Ainsi le bleu des bleuets, le rouge des pétales de roses, des passeroses, le violet noir des fruits des myrtilles sont des anthocyanes.

Dans l'*Ancylonema* (*Nordenskiöldii*), la coloration pourpre livide est justement la combinaison de ces deux sortes de pigments.

Cette plante, observée pour la première fois par le botaniste de l'expédition suédoise au nord du Groenland, dirigée par NORDENSKIÖLD, a été surtout étudiée dans la neige du fjord d'Auleitsivi. Elle a été retrouvée plus tard par NORDSTEDT (1878) en Scandinavie, et, depuis lors, par moi dans les nombreuses neiges rouges, que j'ai eu l'occasion d'étudier, du Mont-Blanc au Mont-Rose. Sur les falaises neigeuses du Groenland, BERGGREN l'a constatée en telle abondance qu'elle donnait à la surface habituellement immaculée du névé une teinte bien caractéristique d'un pourpre livide (neige brune). Sans y être commune, l'*Ancylonema* ne fait pas défaut aux neiges antarctiques.

La troisième espèce, reconnue par moi dans la neige rouge du col des Ecandies, était nouvelle pour la science ; ses cellules isolées sont brièvement fusiformes, munies d'ailes sinueuses longitudinales, dépendances de la membrane, par quoi elle rappellent les états dormants d'une algue habituellement mobile de nos mares, le *Pteromonas alata*. Mais, comme dans la neige, on n'a jamais observé comme dans le *Chlamydomonas* rouge, des états mobiles, M. FRITSCH, botaniste à Londres, qui a examiné les Algues rapportées de l'expédition du « Scotia », a proposé pour ces formes le nom générique de *Scotiella*, ce qui a pour conséquence de désigner notre plante

sous le nom de *Scotiella nivalis* (fig. 7, 2). Cet organisme cache ordinairement son corps vert sous une forte accumulation d'huile colorée en jaune d'or par une substance analogue sinon identique à celle qui produit en automne la coloration jaune dorée des feuilles avant leur chute. Je l'ai observé sans exception dans toutes les neiges rouges et surtout dans les neiges noires de nos Alpes et du Jura. Je l'ai trouvé encore plus abondant dans la neige rouge du Spitzberg. FRITSCH, et presque en même temps GAIN, en ont rencontré dans les neiges colorées de l'Antarctide, étudiées à l'occasion des expéditions polaires du « Scotia » (1902-1904) ou du « Pourquoi pas ? » (1908-1910). Mais, tandis que dans nos Alpes suisses je n'ai su reconnaître qu'une seule espèce de *Scotiella*, ces auteurs décriront pour les neiges des îles Orcades du sud et des îles Argentines, Shetlands du sud, Terre de Graham, etc., en plus du *Pteromonas nivalis*, deux *Scotiella* voisins : *Scotiella antarctica*, *S. polyptera*, espèces analogues, qui diffèrent les unes des autres par des caractères tirés de la forme et de la dimension des cellules. Jamais dans nos montagnes les *Scotiella* ne s'accumulent assez et ne sont assez exclusifs pour arriver à produire à la superficie de la neige une teinte jaune caractéristique ; au contraire, aux Orcades du Sud, le naturaliste R. BROWN, du « Scotia », a observé un nouveau type de neige coloré, la neige jaune. Cette dernière, quand elle est éclairée, est d'un jaune brillant pâle ; selon ce même observateur, neige rouge et neige jaune sont souvent bien distinctes dans ces parages.

Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets : la concentration de l'acide carbonique, la diminution de la respiration à 0° et la forte intensité lumineuse qui amènent chez le *Chlamydomonas* de la neige à la production d'un écran rouge ont ici pour résultat une superbe coloration dorée qui semble, comme le violet pourpre de l'*Ancylonema*, avoir comme effet de protéger cet organisme contre la lumière vive qui arrive directement sur la neige.

C'est que chaque plante riposte à sa façon, et rien dans sa forme ou dans ses particularités visibles ne nous avertit de sa capacité de réaction. J'ai en culture pure dans mon laboratoire depuis bien des années des organismes unicellulaires arrondis que

rien sous le microscope ne distingue les uns des autres ; mais vis-à-vis de la concentration de la nourriture et de l'intensité lumineuse, chacun réagissant à sa façon, par leur accumulation sur les milieux artificiels, les uns forment des disques verts, les autres

Fig. 8. — Touristes sur le glacier du Tour, qui ont protégé leurs yeux par des lunettes noires et leur visage par un voile. Phot. R. C.

des disques rouge brique et, enfin, d'autres prennent une vive coloration jaune.

Vous avez sans doute fait, en compagnie de charmants amis et de guides éprouvés, de grandes courses de neige et de glacier. Les uns supportent l'extrême sécheresse de l'air et l'intensité lumineuse sans avoir recours à la protection des lunettes enfumées, les autres, au contraire, même protégés par un enduit noirâtre, rentrent de la montagne avec un teint de homard ébouillanté.

De même, il existe dans la neige plusieurs organismes qu'on ne trouve que là et qui cependant semblent ne pas avoir à lutter

contre une trop vive lumière, ce qui amène habituellement à la destruction de la chlorophylle ; il y a des plantes de soleil et des plantes d'ombre également vertes, des fougères qui, non protégées par des buissons ou la forêt, blanchissent, s'étiolent, et d'autres, plus rares il est vrai, qui bravent la lumière directe.

Les organismes de la neige verte sont formés de cellules en bâtonnet. Le *Raphidium* des neiges (*Ankistrodesmus nivalis*) ne manque jamais au rendez-vous dans la neige rouge des Alpes, mais il n'y est pas abondant (*fig. 9*). Seul M. SCHERFFEL l'a récolté en dehors de nos limites, dans la neige des Carpathes, en compagnie du *Scoliella nivalis*.

Fig. 9. — *Ankistrodesmus nivalis* (*Raphidium*). Cellules en voie de multiplication ;
Gross. 600–800 fois. neige du Valais. Dess. de R. C.

Cette espèce est très différente du *Raphidium Vireti* qui, en 1910, formait au glacier d'Argentière une neige verte caractéristique, qui m'a été communiquée par mon ancien élève, M. L. VIRET, et dans laquelle j'ai reconnu une espèce nouvelle (*fig. 10 et 15*). Elle était si abondante dans cette station que les *Chlamydomonas* rouges et les *Scoliella* jaunes présents n'arrivaient pas à éteindre la couleur verte du *Raphidium*.

Ce type n'a, depuis lors, jamais été retrouvé, et cependant il est si caractéristique qu'il ne peut être confondu avec aucune espèce voisine. Ceci doit nous avertir du danger qu'il y aurait de croire que tout a été dit sur ce sujet, et qu'il serait improbable de trouver d'autres types de neige colorée que ceux décrits jusqu'à

présent. Aussi est-ce sans trop de surprise que j'ai appris par un beau travail de M. GAIN sur les Algues antarctiques que la neige

Fig. 10. — *Ankistrodesmus Vireti* (*Raphidium Vireti*). Cellules en voie de multiplication ; d'après une récolte faite au glacier d'Argentières.
Gross. 600 fois.

Dess. de R. C.

verte de la côte ouest de la Terre de Graham était en majeure partie colorée par un *Stichococcus*, que cet auteur rapporte au *Stichococcus bacillaris* de Naegeli (fig. 11), mais que, pour ne rien préjuger, j'appelle *Stichococcus nivalis*. Il est en effet peu probable que l'espèce de la neige antarctique soit la même que celle qui, sur les écorces humides de nos arbres ou sur les chapeaux subéreux des champignons Polypores, produit la pruine verte bien connue.

Enfin, M. de LAGERHEIM, étudiant la flore des neiges du Pichincha (4787 m.) dans l'Equateur, y a trouvé une

Fig. 11 — Cellules de l'Algue verte *Stichococcus*, genre qui est représenté dans la neige verte par le *St. nivalis*.
Gross. 800 fois.

Dess. de R. C.

algue filamenteuse qui rappelle les *Raphidium*, le *Raphidonema nivale*, et SCHERFFEL une espèce voisine dans les mêmes stations du Haut-Tatra.

Ainsi, dans les Alpes et autre part, la neige colorée constitue une formation biologique bien distincte, à laquelle j'ai donné, en 1902, le nom de *cryoplanton*. Les organismes qui la composent sont tout à fait spécifiques. On ne les rencontre pas dans les eaux voisines, si ce n'est au pourtour immédiat des champs de neige. En outre, il faut remarquer que les organismes végétaux microscopiques, variés et nombreux des lacs, mares, marécages et mousses humides des régions haut-alpines, font totalement défaut aux neiges colorées. Et pourtant le groupe des Desmidiées et plus encore celui des Diatomacées sont d'une extrême richesse de formes dans ces hauteurs ; les Diatomacées, si curieuses avec leur enveloppe siliceuse, y sont représentées par des formes géantes aussi variées qu'abondantes.

De même, dans les eaux glacées qui sourdent du glacier, sur les pierres des ruisselets et des ruisseaux, de nombreuses algues bleues et des Flagellées jaune d'or pullulent. Tout un cortège d'algues vertes unicellulaires se rencontre dans les marécages des hautes Alpes jusqu'à la limite des neiges éternelles. Et cependant, aucune de ces espèces si communes ne s'établit à demeure sur la neige voisine, n'y devient prépondérante ou même ne s'y laisse reconnaître le plus souvent.

S'il fallait énumérer dans la liste des organismes du cryoplanton tous ceux qui accidentellement ont été une fois rencontrés dans la neige, on pourrait, ainsi que l'a fait WITTROCK et d'autres, allonger ce compte. Mais je considère la plupart, sinon la totalité, des espèces (autres que celles énumérées tout à l'heure) citées par les auteurs, ou comme incorrectement déterminées, ou ne jouant dans la constitution de cette formation végétale qu'un rôle à peine plus important que les écailles des ailes de papillons que le vent a chassées jusque sur les champs de neige, ou que les grains de pollen des conifères, des aulnes verts ou des *rhododendrons* qui se mêlent aux poussières de toute sorte qui souillent la neige. Il y a lieu de distinguer ici, comme autre part, ce qui est caractéristique, permanent, de ce qui est accidentel.

Parmi les causes qui paraissent devoir éloigner de la neige tant d'algues communes dans les eaux et les stations humides du

Fig. 12. — Gonidies du Lichen *Cladonia furcata*. Cellules isolées, agrégées et d'autres produisant des spores.
Gross. 800 fois.

Dess. de R. C.

voisinage immédiat des névés, il faut, abstraction faite de l'amplitude nulle de la température utile, attirer l'attention sur l'action

comburante de la neige au soleil. Cette oxydation se marque partout, dans les dépressions où s'accumulent les poussières, par la carbonisation des débris végétaux tombés sur la neige ou apportés par le vent : lichens, débris de feuilles, poussières organiques qui, brûlés par l'eau oxygénée produite par la vive insolation dans

Fig. 13. — *Ankistrodesmus Vireti*. Cellules arrangées en étoile ;
du glacier d'Argentières (neige verte).
Gross. 600 fois.

Dess. de R. C.

l'air sec du névé ou du glacier et sous l'influence des catalyseurs présents (matières minérales et organiques), contribuent, avec les débris des roches, à donner la couleur caractéristique de la neige noire.

On trouve presque toujours dans la neige colorée, et aussi dans la neige noire, des cellules vertes arrondies, des gonidies de lichens (*fig. 12*), ces petites algues nourricières qu'emprisonne le

lakis d'un champignon ; elles proviennent de la désagrégation des lichens des rochers, par l'action successive du gel et du dégel et que le ruissellement a amenés sur le névé. Quelques-unes de ces cellules, qu'on appelle gonidies, reconnaissables à leur plastide étoilé, finissent par prendre, comme les *Scotiella*, une teinte jaune d'or. Mais malgré l'abondance des lichens saxicoles qui, jusqu'aux sommets les plus élevés, recouvrent les rochers d'une lèpre de couleur variée, verte, grise, rouge ou noirâtre (4000-4800 m.), la présence de gonidies vivantes dans la neige est tout à fait exceptionnelle (*fig. 12*). Ainsi chaque milieu retient, à la façon d'un filtre, les organismes qui lui sont adaptés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On voit dans cet exemple, que j'ai choisi le premier à cause de son extrême simplicité, qu'un même milieu ne se traduit pas nécessairement chez les divers organismes qui peuvent l'habiter, par de mêmes réactions.

Les formes des cellules des micro-organismes de la neige sont celles de leurs congénères des eaux voisines ; rien dans leur apparence ne trahit donc leur capacité de pouvoir vivre dans ce milieu uniforme et si spécialisé. Cela dépend de leur résistance et de leur pouvoir d'effectuer dans des limites si étroites de température toutes leurs fonctions vitales. Dès lors, les uns ne se protègent pas contre la lumière, les autres, plus sensibles, développent, chacun, selon son type, un écran particulier.

Et, chose surprenante, de la cohorte immense des algues unicellulaires, qui comprend d'après les énumérations les plus modernes des milliers d'espèces, une dizaine seulement, vrais Esquimaux du règne végétal, ont fait de ce linceul blanc une demeure confortable. Bien plus rapidement que l'ours polaire qui, loin de sa patrie de glace, dans la ménagerie anxieusement se balance cherchant la fraîcheur, les algues des neiges meurent au contact de climats plus doux.

BIBLIOGRAPHIE

- WITTROCK, V. B. — Om snöns och isens flora (1883).
- CHODAT, R. — La flore des neiges des Ecandies. *Bull. Herb. Boissier*, Genève IV (1896) 886.
- Id. Monographies d'Algues en culture pure, Berne (1913).
- Id. Neige verte du glacier d'Argentières. *Bull. Soc. bot. Genève*, II^e Série, t. I (1909) 295.
- GAIN, L. — La flore algologique des régions antarctiques, II^e *Exp. française Charcot* (1908-1910), avec contributions de N. Wille.
- Etudes critiques et expérimentales sur le polymorphisme des Algues, Genève (1909).
- Algues vertes de la Suisse, Berne (1902).
- Les neiges colorées, *Revue générale des Sciences* (1917) janvier.
- FRITSCH, F. E. — Freshwater Algae collected in the South Orkney, *Linn. Soc. Journ. Botany* XL (1912) 294.
-

R. C. del.

1. Dépôts minéraux formés par les « Algues » des thermes au Parc national américain (Yellowstone) 2. Vasque d'eau chaude tapissée et bordée d'« Algues » de couleurs variées.

Les plantes des Thermes.

(PLANCHE II.)

ON s'est souvent demandé quelles pouvaient bien avoir été les premières plantes. L'imagination des naturalistes est souvent désordonnée; spontanée, elle est capable des hypothèses les plus audacieuses. Tour à tour, les protophytes ou premières plantes ont été cherchées parmi les algues, parmi ces unicellulaires ciliés verts et mobiles, qui semblent contenir en eux, sous une forme raccourcie, à un état condensé, tout ce qui est essentiel chez les plantes supérieures: la capacité de se nourrir d'une manière indépendante, en assimilant par leur chlorophylle l'acide carbonique de l'eau dans laquelle ils effectuent leur cycle évolutif; le mouvement qui est l'une des manifestations les plus inéquivoques de la vie; la capacité de se diriger par un ensemble de sensibilités qu'on appelle tactismes; la présence même d'un œil rudimentaire dans la tache rouge de leur stigma (*fig. 4*); des complications sexuelles qui, dans l'essentiel, ne le cèdent en rien aux arrangements qui, chez les végétaux supérieurs, assurent la fécondation directe ou croisée; la multiplication par spores, qui est en principe celle de tous les végétaux à partir des mousses jusqu'aux plantes à fleurs et dont les spores mâles bien connues sont les grains de pollen. Dans la cellule même de ces unicellulaires, il y a souvent plus de complications visibles que dans celles des Phanérogames.

Le botaniste saisit bien le lien qui unit ces simples organismes aux êtres supérieurs, ce merveilleux enchaînement qui se laisse deviner dans la série des végétaux, des algues unicellulaires aux tulipes.

Mais cette cellule des *Chlamydomonas* que nous avons figurée est déjà un microcosme (*fig. 4*); cela est déjà si compliqué que l'esprit critique se refuse à croire que ces êtres ont quelque chose de primitif, quelque chose qui ferait penser aux époques lointaines, où

la vapeur d'eau se condensant à la surface de la terre permettait l'apparition de la vie, assurait la possibilité d'une existence. Car tout vit dans l'eau; cela est évident pour les plantes et les animaux aquatiques; cela le serait aussi dès qu'on analyserait le fonctionnement des êtres terrestres. Leurs cellules vivantes sont des sacs pleins d'eau ou des gouttelettes de plasma imbibées d'eau. Pour être assimilé, l'acide carbonique de l'air se dissout tout

Fig. 14. — Bassins d'eau chaude, aux thermes de Mammoth Hot Springs au Parc national américain « Yellowstone ». Température de 74° C. (d'après W. H. Weed). Les dépôts de travertins qui forment les parois des bassins sont d'un blanc pur; là où l'eau est un peu refroidie, les algues prédominent et donnent lieu à des franges brillamment colorées.

Phot. Prof. E. Chaix.

d'abord dans l'eau de la cellule. Tout le chimisme de la nutrition se fait dans le milieu liquide qui imprègne chaque organe vivant. L'action si importante des ferments solubles, des diastases des pepsines, etc., ne peut s'exercer sans l'intermède de l'eau. La circulation de la sève, du sang et, dans la cellule, le mouvement du plasma, sont parmi les illustrations les plus évidentes de cette vie aquatique.

Mais l'eau qui, aux premiers âges du globe se condensait, selon la théorie de Laplace, à la surface de la terre en refroidisse-

ment, devait être cependant de l'eau chaude (*fig. 15*). Et puisque, quittant le terrain solide de l'étude de la nature actuelle, nous nous laissons entraîner par delà les milliers de siècles aux âges héroïques de la création, il nous sera bien permis de nous demander si, logiquement, nous pouvons supposer que la vie a commencé

Fig. 15. — Solfatare du Papandajan (Java central). Il s'écoule de la solfatare de larges ruisseaux acides (acide chlorhydrique).
Phot. D' A. Brun.

dans les eaux chaudes. La plupart des végétaux actuels vivent normalement et se développent le mieux entre des températures qui oscillent de 14° à 30° .

Sous l'équateur, la température moyenne de la surface de la mer est de $26,6$ (*de Martone*) ; elle diminue rapidement avec la profondeur : à 700 m. (1000 m.), la température de 4° est atteinte puis diminue insensiblement vers les grands fonds pour atteindre $0-2^{\circ}$ vers 2000 m. On voit clairement que la chaleur des

mers, en surface, est un effet direct du soleil et que si les fonds ne sont pas complètement refroidis, c'est que depuis des milliers de siècles s'est accumulée cette réserve thermique qui est un des éléments de stabilité du régime de chaleur de la surface terrestre.

Le climat tropical humide, de terre ferme, qui correspond au meilleur rendement végétal, par exemple à Batavia, ($6^{\circ},11$ S) est de $25^{\circ},9$ avec une oscillation de $1^{\circ},1$ entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. En Amazonie, à Manaos, en pleine selve tropicale, la température s'élève à 26° avec une oscillation mensuelle de $1^{\circ},6$.

On connaît dans l'Inde des climats moyens de $27^{\circ},70$ et parfois la végétation doit subir temporairement des températures plus élevées que 50° C.

Mais l'altération des fonctions de respiration et d'assimilation, qui est déjà évidente pour la plupart des plantes vers 49° , s'aggrave brusquement au-dessus de 50° . A 51° C., le plasma commence à se coaguler et à perdre ses propriétés électives.

Ainsi, dans les eaux comme sur la terre, l'immense majorité des plantes actuelles sont adaptées à des températures moyennes. Il en est de même des animaux.

Dès lors, il devient extrêmement improbable que cette végétation contemporaine soit une partie conservée du monde primitif des plantes, alors que la terre non encore refroidie permettait aux eaux de sa surface d'atteindre la température à laquelle actuellement toutes, sans exception, meurent. Si, cependant, une plante actuelle peut, pendant quelques minutes, parfois quelques heures subir, sans dommage irréparable, une température élevée, la prolongation de cette température au-dessus de l'optimum amène fatalement à la désorganisation et à la mort. Or le temps de cuisson diminue rapidement avec l'élévation de température. Cette température extrême est pour la plupart des plantes feuillées de 51° à 55° .

Mais voici que nous avons dans les thermes, dans les sources chaudes un milieu naturel que nous pouvons consulter pour savoir quelles espèces d'organismes peuvent au besoin supporter de pareilles températures et ceci d'une manière constante.

Les thermes les mieux étudiées à ce point de vue sont celles

Fig. 16. — Une vue générale des sources chaudes de Mammoth Springs (Yellowstone) « Pulpit basins » ; les dépôts pénètrent dans la forêt qui est détruite. Phot. Prof. E. Chaix.

du Yellowstone, dans le parc national des Etats-Unis. Dans ce paysage volcanique de laves, d'obsidiennes, desquelles jaillissent les fameux geysers, de nombreuses sources thermales, celles des Mammoth Springs par exemple, s'épanchent en formant sur le versant de la montagne des vasques distinctes souvent disposées en hémicycle, desquelles en cascates que répètent plus bas les piscines en gradins, l'eau pure et transparente se concrétionne en dentelles calcaires ou siliceuses d'un blanc éclatant, tandis que, tapissant le fond de chaque cuvette, des algues multicolores contrastent avec le bleu d'acier de l'eau chaude (*fig. 21, 22*).

Ces sources sont ordinairement entourées de bordures de substance minérale déposées par les eaux. Aux sources Mammoth, cette minéralisation consiste en carbonate de calcium qui forme les terrasses, uniques dans leur genre, et les gradins de marbre si célèbres.

Dans les vasques des geysers du même parc, les eaux déposent de la silice qui s'organise en bassins givrés ou s'accumule en colon-

Fig. 17. — Algues bleues des thermes (Cyanophycées) de divers genres : 1, *Gloeocapsa quaternata* ; 2, *G. thermalis* ; 3, *G. violacea* ; 4, *Lyngbya* sp ; 5, 6, 7, 8, *Oscillatoria* des eaux chaudes ; 11, *Spirulina major* et *S. caldaria*.
Gross. 800—1000 fois.

Dess. de R. C., d'après Tilden.

nettes coralloïdes ou moniliformes. Tout autour des sources, le sol est couvert d'une espèce de tuf d'un blanc éclatant.

Ce qu'on sait moins, c'est que ces travertins sont essentiellement dus au travail patient d'une végétation particulière, de ces algues qu'on a souvent appelées *algues bleues*, mais qui plus exactement doivent s'appeler *Schizophycées* ou *Cyanophycées*.

Ces plantes sont bien réellement les plus inférieures que l'on connaisse : leurs cellules n'ont pas de noyau défini ; jamais ces plantes ne se reproduisent par spores ; on n'y découvre aucune sexualité, et le mode de multiplication est limité à un fractionne-

ment successif des cellules ou des filaments. Toutes possèdent de la chlorophylle, mais elle y est toujours masquée par un pigment bleu (phycocyanine) qui peut, selon les circonstances, passer au violet, au pourpre et même au jaune. De la combinaison du vert de la chlorophylle avec le bleu de la phycocyanine résulte la couleur vert-de-gris qui leur est si habituelle, ou la teinte bleu verdâtre, ou vert foncé brunâtre, ou, si le rouge a remplacé le bleu, les divers tons qui vont du livide au pourpre rouge.

Lorsque meurent ces algues, la chlorophylle est retenue assez longtemps par le cadavre de la cellule, tandis que les pigments accessoires bleus, violets, rouges, pourpres, tous singulièrement fluorescents, se répandent tout autour et contribuent à donner aux stations où ces plantes abondent des teintes singulières qui pourraient être comparées pour la beauté du coloris avec les couleurs d'aniline, les fuchsines, les fluorescéines, la cyanine. Selon les

Fig. 18. — Autres algues bleues des thermes : 12, *Schizothrix* sp. ; 13, *Lyngbya thermalis* ; 14, *Scytonema caldarium* ; 16, *Hapalosiphon major* ; 17, *Fischerella thermalis* ; 18, *Nostoc caldarium* ; 19, *Rivuloria* sp. ; 20, *Oscillatoria sancta* ; 20, *Gloeocapsa thermalis*.
Gross. 800—1000 fois.

Dess. de R. C.

variations du milieu, lumière, nourriture, température, la même plante peut présenter, en vrai caméléon, toutes les couleurs qui vont du rouge au violet. Parfois même il semble qu'il y ait une espèce d'adaptation complémentaire par laquelle la Cyanophycée se colore de la teinte complémentaire de la lumière colorée qui l'atteint.

Dans les sources chaudes, comme aussi autre part, ces plantes microscopiques sont enveloppées dans des gaines mucilagineuses qui les retiennent en forme de peaux, de fines membranes, de cylindres ou de vésicules aux contours irréguliers. Plusieurs des formes allongées en filaments manifestent des mouvements pendulaires, ce qui leur a valu le nom d'*Oscillatoria*; d'autres sont gracieusement spirales, celles-ci disposées en bouquets, chacune terminée en un long poil incolore; enfin, les plus petites ne sont que des globules verts ou bleus, ou violacés pourpres, enveloppés dans des capsules mucilagineuses souvent très dilatées. Il faut de suite remarquer qu'aucune de ces formes ne présente vis-à-vis des sources chaudes, vis-à-vis des conditions dans lesquelles elles sont forcées de vivre, un dispositif qui expliquerait pourquoi elles sont là plutôt qu'ailleurs. C'est ce que j'ai déjà montré à propos des algues de la neige. Des formes analogues de Cyanophycées se rencontrent aussi sur les rochers humides de nos montagnes ou sur les vases d'eau douce ou salée des régions tempérées.

La capacité de résister à cette haute température, qui suffit souvent pour cuire un œuf en quatre ou cinq minutes, comme dans les eaux chaudes du Laugarnes, en Islande, ou dans plus d'une source au parc Yellowstone, réside donc dans une propriété de la matière vivante. Or, il s'agit ici d'une particularité essentielle du plasma qui, dans chaque cellule, forme un sac absolument clos et au travers duquel doivent se faire les échanges nutritifs et les sécrétions. C'est une espèce de filtre, mais un filtre qui retient certaines substances nécessaires à la croissance et qui laisse passer les matières indifférentes ou les solutions nutritives qui sont utiles au développement d'autres cellules, où elles sont appelées par une espèce d'automatisme social de l'offre et de la demande et qui est réglé par des ruptures d'équilibre. Lorsque, dans une cellule ou une partie de cellule, une matière première, carbone, azote, soufre,

sels, est incorporée à la matière vivante et qu'elle fait maintenant partie de cette mystérieuse molécule complexe, le granule vivant, l'équilibre est rompu et la matière première (acide carbonique, sels azotés, matières minérales : potasse, soude, fer, etc.), en solution dans l'eau, coule pour ainsi dire comme l'eau d'un canal, retenue par une écluse, s'écoule vers le seuil le plus bas lorsqu'une dif-

Fig. 19. — Vue des sources chaudes de Mammoth Springs (Yellowstone).

Phot. Prof. E. Chaix.

férence de niveau a été établie par cette bascule. Ceci se passe également entre le monde extérieur, entre les solutions de substances minérales, les gaz de nutrition ou de respiration dans lesquels vivent ces plantes ou que les plantes supérieures absorbent par leurs racines et chacune des cellules.

Mais tous ces échanges passent par un courtier bienveillant ; ils sont soumis au contrôle d'un sévère gardien qui est la couche la plus extérieure de ces sacs de plasma. Aussi longtemps que la structure de cette couche, qui peut être comparée à un grillage infiniment délicat, dont les mailles peuvent se dilater ou se con-

tracter automatiquement comme se distend et se contracte le muscle de nos organes, reste intacte, ce jeu de portier attentif peut s'exercer ; mais un rien ruine cet agencement, cet échafaudage, ce délicat réseau qui enveloppe la partie vivante de chaque cellule. Si la continuité de ce film délicat est rompue, par la brèche se précipitent sans ordre les substances extérieures dans le plasma vivant et y causent des désordres irréparables. Or, tout aussi souvent, la surveillance du portier étant mise en défaut, l'écluse, qui retenait dans la cellule les matières nécessaires à la vie, brusquement s'étant relâchée, maintenant largement ouverte, laisse écouler à l'extérieur ce qui précédemment n'était échangé qu'à bon escient. Nous sommes assez bien informés sur le va-et-vient de ces écluses, sur la dilatation et la contraction de ces mailles hyper-microscopiques, donc directement invisibles (même au plus fort grossissement du microscope) par une belle série de recherches physiologiques, mais nous le sommes beaucoup moins sur l'humeur variable du portier, qui est parfois déconcertante, comme tout ce qui se rapporte à la vie proprement dite.

Ce que nous savons, c'est que l'une des propriétés les plus importantes de ce film de triage, sa nature en réseau, est altérée par les températures auxquelles il n'est pas accordé. Le gel, la production de glace le rompent en plusieurs endroits ; la chaleur le coagule comme elle coagule le blanc d'œuf ; les acides, les poisons font de même quand ils caillent le lait ; parfois un rien, l'air ou l'eau pure arrivant directement le transforment en caillot comme le sang généreux et brillant est coagulé à l'air libre.

Or, ce qu'il y a de curieux, c'est que la température de 52°-85° qui infailliblement détruit cette structure chez la plupart des plantes supérieures en activité et coagule leur plasma sans possibilité de retour, laisse inaltérée l'albumine des plantes thermophiles, cette espèce de blanc d'œuf dont est formé le film de triage qui enveloppe le plasma de ces algues des sources chaudes.

On les a dénombrées, on les a groupées dans une quinzaine de genres de plus de quarante espèces différentes, en *espèces thermophiles*, comme on a groupé les espèces de la neige en *plantes cryophiles*. Rares sont les représentants d'autres familles qui savent résister à ces hautes températures. Les bactéries thermophiles,

globules ou filaments incolores, encore plus menus que les Cyanophycées, sont parmi ces organismes en majorité. Dans l'intestin, dans le fumier échauffé, dans le foin qui fermente et qui finit par s'allumer spontanément, on les a rencontrés, étudiés et recensés. Ils sont plus maniables que les délicates algues des thermes et ont été mieux étudiés au point de vue de leur physiologie.

Certains d'entre ces micro-organismes (*Hapalosiphon major* 51°) ne commencent à vivre d'une vie active qu'à partir d'une température qui tue les autres organismes. On a donc par là trouvé une méthode qui permet, dans les mélanges, de leur donner le pas, de les sélectionner; il suffit, en effet, de cultiver ces matières intestinales, ces débris de fumier, cette infusion de foin à une température supérieure (52°). Bientôt tous les autres organismes meurent, survivent les thermophiles, qu'on peut dès lors isoler.

De nos algues des thermes, il en est qui, d'une manière analogue, ne se développent qu'au-dessus de 40-45°, ce sont les thermophiles exclusives. Mais beaucoup supportent aussi des températures plus modérées et même s'y développent tout aussi bien. Il est d'ailleurs difficile d'affirmer que deux Cyanophycées de même forme et de même dimension, dont l'une appartient à la flore des sources chaudes et l'autre a été rencontrée dans des eaux froides ou tempérées, appartiennent à une seule et même espèce. Le grand nombre d'espèces de bactéries qui, tout en ayant la même forme et le même diamètre, sont physiologiquement différentes, absolument distinctes, nous avertit d'être prudents.

Le microscope, aidé du jugement le plus affiné, ne suffit pas, même au plus exercé des spécialistes, pour décider si deux formes identiques dans leur *structure visible* sont réellement identiques.

J'ai montré de nombreux exemples de cas semblables dans le monde des algues vertes par mes cultures pures. Cela est aussi vrai pour les Cyanophycées, ce groupe de plantes inférieures, qui comprend la majorité des Algues des thermes.

Nous savons qu'il est des plantes thermophiles qui peuvent résister aux basses températures et même s'y développer et supporter cependant les eaux presque bouillantes. On pourrait établir un spectre de température pour la végétation :

1. Algues des neiges — 2. *Hydrurus*. — 3. Soldanelles. — 4. Blé. — 5. Courges. — 6. Algues thermophiles. — 7. Algues thermophiles. — 8. Certaines bactéries de l'intestin. — 9. Bactéries thermophiles.

Quelques botanistes ont vu dans les plantes thermophiles végétaux exceptionnels qui se sont progressivement adaptés aux hautes températures. Les autres les considèrent comme descendant en ligne directe de ces plantes primitives, témoins des premiers âges du globe terrestre, alors que les eaux chaudes étaient abondantes des terrains éruptifs que la géologie nous fait connaître dans tous les continents.

Comme de nos jours, dans la région du Yellowstone, Islande, plus de trois kilomètres carrés avec plus de 3600 sources chaudes et 100 geysers, mais d'une manière autrement gigantesque pendant l'époque primaire de la terre, dans les innombrables sources chaudes alimentées par de gigantesques geysers, les algues nophycées devaient abonder et colorer les abords de ces sources de leurs singulières couleurs aux reflets chatoyants.

Ce qui vient appuyer aussi cette vue de l'esprit, c'est que toutes ces plantes vivent dans des eaux fortement minéralisées, chargées de gaz variés. Il y a en effet dans l'eau de Carlsbad (73°) plus d'un demi-gramme de matières salines ; à Louèche, il n'y en a que 0,1948. Dans l'eau chaude des geysers du parc national américain, cette quantité s'élève de 1,472 gr. à 1,63 gr. par litre d'eau ; dans le grand geyser d'Islande, cette proportion n'est pas moindre. Ajoutez à ceci que l'acide carbonique y est habituellement contenu à une dose de 0,1-0,2 pour mille, c'est-à-dire dix fois plus qu'il n'y en a dans l'eau du lac de Genève à 15°. Il y manque ni la potasse, ni la magnésie, ni le calcaire si nécessaires au développement des plantes. Seul le phosphore n'y est contenu que dans des proportions minimales.

D'une manière générale, les eaux chaudes sont moins nutritives que les eaux froides, ce qui explique l'énorme développement des prairies polaires sous-marines.

Mais ici la saturation excessive de l'eau thermique par l'acide carbonique rappelle ce que de tout temps on a considéré comme

Fig. 20. — Au Parc national américain ; dépôts calcaires de travertins.

Comparez avec la planche II.

Phot. Prof. E. Chaix.

Probable pour l'atmosphère des temps carbonifères, c'est-à-dire une plus grande richesse en acide carbonique.

Ainsi, la minéralisation de l'eau et sa température élevée, qui ent des thermes les algues vertes et les végétaux aquatiques inférieurs, sont des conditions qui paraissent convenir d'une manière parfaite à ce groupe de plantes très inférieures.

Mais il y a plus ! Les Cyanophycées, plus particulièrement des thermes et aussi dans d'autres sources, sont aptes à favoriser le

Fig. 21, 22. — Bassins étagés (Marble basins) à Mammoth Springs, formés par l'action des Cyanophycées des thermes (dépôts calcaires).
Phot. Prof. E. Chaix.

dépôt de travertins, dont la structure et la stratification sont directement l'œuvre de ces modestes ouvriers.

Sans doute, en dehors de toute action des algues, l'eau chaude

Fig. 23. — Rochers crayeux, sculptés par l'action des algues et des lichens, jointe à l'action érosive du vent. Les Baux, Provence. Phot. R. C.

perdant peu à peu son acide carbonique, dépose du carbonate de calcium en masses blanches comme celles qui incrustent nos chaudières; mais, dans ces travertins, il s'agit d'une structure qui est immédiatement dépendante de la présence et de la croissance de chaque espèce de Cyanophycées (*fig. 21, 22*). Quand se dissolvent ces

fibres, ces perles, ces apparences coralloïdes, on trouve au centre le filament de l'algue ou les cellules arrondies de la *Gloeocapsa*.

D'ailleurs, l'observation microscopique décèle le carbonate de calcium dans le mucus même qui enveloppe comme d'une gaine les filaments des algues.

Si l'eau cesse d'arriver à ces travertins en voie de croissance,

Fig. 24. — Desagrégation (carie) des rochers des Baux (Provence), due, au moins en partie, à l'action des algues et des lichens.

Phot R. G.

les plantes meurent, le vert se change en brun puis en rose chair, et finalement la teinte devient saumon. Mais au bout d'un certain temps toute couleur a disparu, et de la croissance gélatineuse de ces Cyanophycées il ne reste plus qu'un dépôt crayeux, poreux et tendre. Ainsi parfois aux sources « Mammoth ».

Les travertins déposés en majeure partie par l'action des végétaux aux sources chaudes Mammoth sont souvent en forme d'éven-

tail, formés de fibres et d'excroissances en chou frisé, rappelant certains ouvrages d'argenterie filigranés (Pl. II).

Avec le temps, la couleur des travertins morts, qui est blanche, passe à la surface à un gris de pierre vieillie. Par la pluie, la neige et les infiltrations, les travertins prennent de la compacité et de l'homogénéité. Tout ceci n'est donc plus attribuable à l'ac-

Fig. 25, 26. — Diatomées fossiles. On voit l'enveloppe siliceuse de la cellule, ornementée de dessins en relief. Gross. 450 fois.

tion des végétaux. Ce sont des phénomènes purement cosmiques.

Le plus souvent, dans les innombrables thermes au Parc national américain les dépôts sont de silice. L'eau des cuvettes y est toujours d'une extrême transparence et d'un bleu-vert admirable. L'analyse décèle de la silice et des sels alcalins et alcalino-terreux.

On y voit les algues vivre encore à la température de 85°C (185°F), mais leur maximum de développement se fait vers 60°C

(140°F). Leur nature végétale se reconnaît à la couleur rouge ou brun cuir qui entoure les sources et rappelant la teinte des varechs qu'on trouve autour des côtes maritimes. Mais, dans les eaux plus chaudes, leur substance gélatineuse dense ressemble plus au cartilage d'un animal qu'à un produit végétal. Leur couleur est alors brillante, jaune d'or, orangé, rouge, dans les eaux les plus chaudes couleur rose chair ou même blanche. Lorsque l'eau est moins chaude, le fond vert émeraude, de la consistance du cuir humide, s'évase en une marge fongoyde jaune, vieil or, orangé, puis qui passe par degrés insensibles aux teintes rouge saumon, écarlate, brun cuir ou brun-rouge.

Dans ces eaux chaudes se concrétionnent sous l'influence de ces Cyanophycées des « champignons » de silice, isolés puis réunis comme se réunissent dans un marécage les touffes serrées des laiches (*Carex stricta*).

Les dépôts de calcaire atteignent aux sources « Mammoth » 76 m., ceux de silice atteignent par place 10 m. d'épaisseur.

Il n'est donc pas douteux que dans les temps reculés où les sources siliceuses et calcaires étaient infiniment plus communes,

Fig. 26 bis. — Dessins de deux Diatomacées fossiles.

Gross. 500 fois.

D'après J. Brun.

Fig. 27. — Bassins en réseaux, formés par les travertins calcaires déposés par l'action des algues des thermes.
Phot. Prof. E. Chaix.

à cause de l'action volcanique plus générale, des masses énormes de silice et de carbonate de calcium ont été déposées par des végétaux, de même que dans d'autres conditions les coraux, les madrépores et même les algues ont constitué des bancs énormes de calcaire.

Les Diatomées, petites plantes unicellulaires, ne font pas défaut aux sources chaudes, mais elles préfèrent les cuvettes dont l'eau a été tempérée. Ces Diatomées ont la curieuse propriété d'arrêter au passage les plus faibles traces de silice, de s'en former une carapace finement sculptée, aux dessins microscopiques d'une étonnante variété (*fig. 25, 26*).

On sait que des dépôts de silice (Kieselguhr) sont entièrement dus à l'activité de ces unicellulaires, mais ils ne jouent dans les sources chaudes qu'un rôle subordonné ou nul.

Peut-on, dès lors, supposer que les Cyanophycées ont conservé de ces anciens âges l'habitude de vivre à cette haute température et de végéter dans les eaux minéralisées. Dans les eaux de nos

lacs, beaucoup déposent également des tufs comme au banc du Roc-de-Chère, qu'on voit à 2-3 m. de fond en passant avec le bateau à vapeur devant Talloires, au lac d'Annecy. De même, dans les lacs verts de Géronte, à Sierre, en Valais, et bien autre part. Sur les grèves de nos lacs, quelques-unes concrétionnent le calcaire en petits disques, qui ressemblent à des coquillages minuscules. C'est ce que nous a appris l'étude de M. BAUMANN sur le lac de Constance.

D'autres vivent dans les pierres qu'elles carient irrégulièrement ou pénètrent dans les rochers en facilitant la colonisation des lichens (*fig. 23, 24*).

Plantes des âges fabuleux, vous êtes déjà si anciennes que nous avons plus que de la difficulté à vous faire dire votre secret, celui de vos plus lointaines origines. Isolées dans la Nature actuelle, sans parents rapprochés, vous paraissez étrangères à la vie générale et cependant elle ne pourrait guère se passer de vous.

Premiers pionniers de la végétation avec vos cousines les bactéries, vous attaquez les rochers, même les laves, peu après la dénudation d'un pays par une éruption volcanique. Vous préparez le terrain pour une végétation plus complexe. Quelques-unes de vos espèces jouent un rôle capital dans la désagrégation des rochers tant calcaires que granitiques. D'autres édifient des bancs minéraux. D'autres produisent des fleurs d'eau étendues et, enfin, beaucoup se sont associées avec des champignons pour constituer des lichens.

D'où venez-vous ? Quels sont les rapports génétiques que vous avez avec les autres plantes ? Vous êtes d'un monde à part, peut-être d'un monde précurseur de celui-ci, qui lui, à son tour, a possédé aussi ses familles de plantes, ses espèces, aujourd'hui éteintes dans notre monde trop refroidi. Vous êtes peut-être les fossiles vivants de la grande période volcanique alors que sur toute la terre, fumerolles, mofettes, immenses geysers et cascades bouillonnantes préparaient par leurs incrustations la venue d'un monde nouveau.

Peut-être ! Mais au juste qu'en savons-nous ?

BIBLIOGRAPHIE

- AGARDHT. — Flora (1827).
- COHN, F. — *Abhđl. Schles. Gesell. Naturw.* (1886).
- CHODAT, R. — Etudes de biologie lacustre. *Bulletin de l'Herbier Boissier*, VI (1898).
— Principes de botanique, Genève et Paris, I^{re}, II^{me} et III^{me} éd. (1907-1920).
- TILDEN, J. — *Minnesota Algae*, I (1910).
- GOMONT, M. — Monographie des Oscillatoriées, *Ann. Sc. natur.*, 7^e série (1892).
- BAUMANN, E. — Die Vegetation des Untersees, Zürich-Stuttgart (1911) 31, fig. 2.
- MACFERLANE, M. — The relation of plant protoplasm to its environment, in *Journ. of the Academy of Natural Science of Philadelphia* (1912).
- WEED, W. A. — Formation of travertine and siliceous sinter by the vegetation of hot springs, U. S. Geolog. Survey, IX^e Report (1887-88).

R. C. del

Au Grand St. Bernard, Coloration des rochers par le lichen *RHIZOCARPON GEOGRAPHICUM*. 2. Toit d'un village de montagne dont les schistes (ardoises) sont couverts du lichen *PLACODIUM MURORUM* et *P. ELEGANS*.

Une audacieuse entreprise.

(PLANCHES III et IV.)

UN conte du vieux Japon contient l'histoire suivante :
Un jour, le roi des Dragons, qui jusqu'alors était resté garçon, se mit dans la tête de se marier. Sa fiancée était une petite dragonne âgée de seize ans juste, assez gentille, tranquille, et bien faite pour être la femme d'un roi. Les réjouissances furent grandes en cette occasion.

Mais, hélas ! même les dragons ont leurs épreuves ; avant qu'un mois se fût écoulé, la jeune reine tomba malade. Les docteurs..... Enfin ils hochèrent la tête et déclarèrent qu'il n'y avait rien à faire. La maladie devait suivre son cours, et la reine en mourrait. Mais celle-ci dit à son mari :

— Je sais ce qui peut me sauver ; donnez-moi le foie d'un singe vivant ; quand je l'aurai mangé, je serai de nouveau et de suite en bonne santé.

— Le foie d'un singe vivant ! s'écria le roi ; mais à quoi pensez-vous, ma chère ? *Comment ! Vous oubliez que nous, dragons, nous vivons dans la mer, tandis que les singes vivent bien loin d'ici, dans les arbres des forêts, dans les rochers, sur terre.* Un foie de singe ! Mais, ma chère, vous êtes folle !

L'histoire raconte ensuite l'expédition de la méduse, simple et naïve, envoyée par le roi pour se procurer le foie d'un singe ; les difficultés de l'entreprise et, finalement, la faillite de ce voyage impossible.

L'histoire que je vais raconter est plus ancienne que ce conte du vieux Japon. Il n'y a pas longtemps qu'elle est connue cependant.

Dans l'eau, les Algues dont nous avons parlé sont poursuivies par un monde d'ennemis. Je laisse de côté leurs ennemis naturels, les petits herbivores crustacés ou autres petits animaux. On ne plaint guère une antilope qui finit par être capturée par un lion, mais elle inspire la pitié quand on la voit languir dans la brousse,

attaquée par un microbe, l'astucieux trypanosome qui pullule dans son sang.

Chacune de ces Algues a son ennemi particulier, sa maladie microbienne; de délicats mais peu sympathiques *Diplozygopsis* s'implantent sur les gracieuses Astérionelles; des *Olpidiopsis* (Chytridiacée), s'introduisent dans la superbe cellule du *Spirogyra*. Tout un cortège de champignons parasites menacent continuellement ces plantes vertes. C'est une mort sans beauté. Je doute fort que ce soit pour ces raisons que plusieurs Algues se sont mis dans... la

Fig. 28. — Lichens ou arbuscules appartenant au genre *Cladonia*; ils vivent sur l'humus, le bois pourri ou dans la mousse de la forêt.
Grandeur naturelle.

Dess. de R. C.

tête, c'est un peu osé de parler de tête à propos d'algues unicellulaires ou microscopiques, disons dans la cellule, le désir de sortir de l'eau et d'aller habiter sur les arbres, dans les rochers, sur la terre. Ce qui est encore plus fou, c'est que dans cette audacieuse expédition elles ont choisi comme compagnons, comme protecteurs, ces champignons redoutables. Mais, qu'on y prenne garde, la nature est complexe, les drames qui s'y passent sont loin de ressembler dans leur simplicité aux contes du vieux Japon, et nous risquons, en nous aventurant dans cette histoire, avec l'âme d'une méduse simple et naïve, d'en revenir battu à plate couture, ce qui nous fera ressembler à toutes les méduses, qui sont sans os et ne présentent qu'une masse gélatineuse.

Le fait est que, depuis DE BARY, SCHWENDENER et BORNET,

nous savons que les lichens sont des êtres doubles formés de filaments de champignons, d'espèces de moisissures, qui emprisonnent des Algues. Ni l'un ni l'autre de ces botanistes n'était lichénologue ; ils étaient, comme le disait mon maître MULLER, d'Argovie, absolument dépourvus de toute compétence en cette branche de la botanique. La théorie de la double nature des lichens fut donc âprement combattue par tous les spécialistes, par les meilleurs connaisseurs des lichens. Le Suédois NYLANDER, le Suisse J. MULLER, l'Allemand MINKS, et tant d'autres qui se sont distingués dans ce domaine difficile de la systématique, tous menèrent une campagne virulente contre les idées subversives de SCHWENDENER et BORNET. Et, pour être écrites en latin, parfois même en très bon latin, ce qui n'est guère l'usage parmi les botanistes qui continuent à se servir pour leurs descriptions de la langue sobre et claire de Cicéron, ces savantes dissertations d'hommes rompus au métier, d'autorités classées, reconnues, furent impuissantes pour arrêter l'hérésie. Aujourd'hui, à part M. ELFVING, personne parmi les botanistes ne renoncerait à la *théorie de la symbiose*, de la vie en commun d'une algue et d'un champignon, pour expliquer la biologie des lichens.

Et cependant il y avait, dans l'opposition que faisaient à cette nouvelle théorie les maîtres de la lichénologie, non pas, comme on l'a dit trop souvent, une obstination de vieux savants, mais le sentiment très net que cette histoire était celle de la méduse simple et naïve ; qu'elle était, comme toutes les idées neuves, en partie inexacte, certainement superficielle et mal étayée.

SCHWENDENER disait : Il n'y a plus de Lichens ; il serait absurde de conserver ce groupe hétérogène ; qu'on place le champignon parmi ses congénères, chaque espèce selon ses spores dans le groupe correspondant des Champignons ; quant aux Algues, elles y sont si peu variées qu'il ne sera pas difficile de les identifier avec des espèces libres déjà connues. Et, en effet, lui-même et plus tard BORNET n'hésitèrent pas à considérer les cellules vertes des lichens comme appartenant à des algues très communes dans nos marécages ou nos lieux humides.

Mon vénéré maître MÜLLER *Argoviensis*, comme il aimait à se désigner pour ne pas être confondu avec d'autres Müller, bota-

nistes aussi, était un savant fort hospitalier. Un jeune botaniste, étranger à Genève, de mes amis, un mycologue, c'est-à-dire un spécialiste dans la science des champignons, étant de passage à Genève, nous fûmes tous deux invités à dîner chez l'illustre lichénologue. Imprudemment, au dessert, l'autre se mit à parler de la nouvelle théorie, à en exalter les mérites, etc. Cela fit l'effet d'une glace, mais pas d'une glace aux fruits. J'étais consterné, car je savais qu'il fallait parler de ces choses avec ménagements. Dans la soirée, la gaiété étant revenue, car MÜLLER était la bonté même, l'imprudent mycologue parla de ses ascensions, des lichens qu'il avait, au marteau, détachés du sommet du mont Rose ; il serait intéressant d'en connaître les noms, la station étant peu accessible. On voyait sur la figure classique du lichénologue s'esquisser un sourire narquois.

— Mon cher collègue, lui dit-il, vous n'avez guère besoin de moi ; vous êtes mycologue, vous déterminerez le champignon ; votre ami qui est algologue ne refusera pas de vous donner le nom de l'algue.

Tous deux nous fûmes interdits, car il nous eût été difficile, comme d'ailleurs à tout botaniste, de le faire. Aujourd'hui encore, que tous nous admettons l'idée féconde d'une symbiose, d'une vie en commun d'une Algue et d'un Champignon, nous sommes forcés de reconnaître que la question n'était pas si simple que se l'imaginaient les géniaux fondateurs de la théorie de la double nature des Lichens.

Parcourez en effet nos montagnes, pénétrez dans les bois, examinez les rochers brûlés par le soleil de Provence ou fendillés par le gel des Hautes-Alpes, partout vous rencontrez ces êtres singuliers.

Intéressants à cause de leur double nature, ils ne le sont pas moins par le rôle qu'ils jouent dans la constitution du paysage. On me permettra de répéter ce que j'en disais il y a déjà longtemps.

Ce sont des peintres sans le savoir, et je dois ajouter : ce sont de très grands peintres que les Lichens.

Chacun connaît l'importance de la couverture végétale dans la constitution du paysage. La grise garigue de Provence, aride et sèche, presque froide même sous le soleil ardent du Midi,

cachant mal le sol pierreux et dur, alors même qu'elle étincelle de mille fleurs, cistes blancs comme des églantiers, ou cistes roses au calice d'argent, genêts et ajoncs comme une pluie d'or répandue sur les épines, romarins et lavandes reflétant le vif azur du ciel dans leurs corolles délicates, la garrigue, à l'apogée de sa splen-

Fig. 29. — Au sommet du Portalet, dans la chaîne du mont Blanc. Désagrégation par le gel et roches incrustées de lichens noirs ou verts. Phot. R. C.

deur n'apparaît de loin que comme un vêtement de tristesse et de mélancolie.

Les landes des collines d'Ecosse et du pays de Galles, dessinant, vers le soir, leur profil estompé sur le ciel rosé qui semble continuer la teinte lilacine de leur tapis de bruyère qu'anime la fumée bleuâtre du cottage lointain, ont inspiré, au pays classique de l'aquarelle, plus d'un grand artiste.

Et, plus près de nous, lorsque a disparu le dernier des essaims cosmopolites qui, périodiquement, envahissent, de juillet à mi-septembre,

nos plus beaux sites, lorsque cette désharmonie a cessé et que, dans les hauteurs, on ne rencontre plus que l'alpiniste attardé ou le chasseur de chamois, c'est alors qu'il faut visiter nos belles montagnes, malgré les jours si courts.

Au-dessus de la région des arbres, c'est à ce moment un spectacle merveilleux. Du fond des vallées jusqu'au pied des glaciers, quel riche tapis végétal ! La prairie alpine, dans sa robe de juin, est moins brillante que la lande alpine en septembre avec ses myrtilles et ses airelles aux tons si variés. La fraîcheur des nuits a fait apparaître par places des teintes rouges dont la coloration automnale de nos bois de hêtres ne donne qu'une image bien imparfaite. De loin, on dirait un incendie qui gagne le flanc abrupt des monts lorsque, filtrant au travers de la « fenêtre » d'un col, la lumière du couchant vient illuminer ces feuillages rutilants, aviver le vert tendre des jeunes branches, fait vibrer le jaune éteint des saules nains, et dessine une auréole lumineuse tout autour des aigrettes des anémones et des dryades.

Mais que serait le paysage sans la présence des lichens, artistes invisibles qui donnent aux sites les plus désolés un charme de couleur indéfinissable, qui, de la plaine aux plus hauts sommets, enveloppent de leur réseau toutes les pentes rocheuses et les plus vives arêtes ?

Prenez cette pierre d'un éboulis, examinez-la attentivement. Toute la surface est comme chagrinée, comme saupoudrée d'une efflorescence farineuse. En regardant de près on aperçoit de multiples petits points noirs, puis, tout autour, des cercles ou des rayons à peine indiqués, ici des taches jaunes ou orangées, là des enduits bleuâtres. Le botaniste, armé d'un verre grossissant, y découvre tout un jardin enraciné dans la pierre et qui la recouvre comme d'une lèpre. Un lichénologue y reconnaîtrait plusieurs espèces qui empiètent les unes sur les autres comme se pénètrent mutuellement les herbes d'un gazon. Nulle part la pierre n'est à nu, partout d'invisibles micro-organismes ont sécrété des acides végétaux au moyen desquels ils se sont fait un chemin dans la pierre, calcaire ou granit. Ici, ce sont des lécidies blanches comme la craie, ou noires comme du charbon, là ce sont des verrucaires, roses comme les pétales d'une églantine, plus loin les thalloïdimes

aux croûtes argentées ou carnées, toutes plus ou moins enfouies dans le minéral ou effleurant à peine.

Le long des stries sinueuses, où suinte lentement l'eau du rocher surplombant, ces lichens pulvérulents ou minéralisés font place à d'autres lichens, croûtes visqueuses olivâtres ou d'un bleu-noir. Dans les gorges humides des montagnes, la pierre a pris

Fig. 30. — Cellules (gonidies) d'une algue unicellulaire (isolée à gauche en bas) enserrées par les suçoirs du filament du champignon-lichen.
Gross. 1000 fois.

Dess. de R. C.

une curieuse teinte hépatique. Le passant n'y voit que du fer, le botaniste y reconnaît encore une végétation, celle d'un des associés du lichen, une petite algue microscopique, qui s'est échappée de la prison où maître lichen la tenait en servitude.

Autre part, dans les fissures plus profondes, lorsque les parois se rapprochent et que l'humidité devient plus grande, alimentée par la buée blanche du torrent, toute la roche est comme hérissée d'une laine courte et rouge orangé ; c'est encore un lichen, mais un lichen en dissociation.

Nous savons, en effet, que chaque lichen se compose de deux commensaux. Un lichen est toujours une association, une plante

Fig. 31. — Gonidies appartenant au genre d'algue verte, *Coccolobrya* et associées à des lichens de rochers, les *Verrucaria*.
Gross. 800 fois.

Dess. de R. C.

double, la réunion d'un champignon incolore, par conséquent parasite, et d'une petite algue verte ou colorée de diverses manières (fig. 30). Tout champignon, quel qu'il soit, étant, en dernière analyse, constitué par un lacis de filaments très fins, qu'on n'aperçoit qu'au microscope, c'est dans ce réseau, dans cette espèce de toile d'araignée déliée, que le mycélium du lichen retient captives les petites algues vertes, bleues ou rouges.

Mais qu'on se rassure, ce n'est pas pour les dévorer que le lacis les enveloppe. Bien au contraire, la conservation de ces précieux auxiliaires est pour le lichen la question importante «to be or not to be». Appliquant contre les cellules de l'algue ses tentacules multiples, il saura ne pas abuser de sa puissance, il leur laissera de quoi vivre et se multiplier. Sans doute, presque toute la nourriture est fournie par l'industrielle plante verte qui sait absorber de l'atmosphère et se les assimiler les matières nutritives, mais le lichen n'a-t-il pas construit pour ses ouvrières de spacieux locaux, bien aérés, où elles sont à l'abri de la sécheresse et des intempéries? En effet, ces algues microscopiques ne pouvant subsister, laissées à leurs propres forces, que dans des lieux humides, entraînées par le réseau du lichen qui sait pomper et retenir la rosée, protégées contre la sécheresse, elles peuvent ainsi participer à la conquête du monde par le lichen.

Faut-il, dans cette association, ne voir que la domestication de toute une classe par une autre, ou doit-on, au contraire, admirer la sagesse de cette société où chacun est à sa place, l'algue au

travail d'assimilation, le champignon-lichen à celui d'expansion, de conquête et d'organisation?

Problème embarrassant et qui comporte plusieurs solutions, selon le lieu et les circonstances.

Le fait est que, lorsque l'humidité augmente, le lichen pourrit et l'algue est rendue à la liberté. C'est alors à elle et à elle seule que sont dues les teintes vertes, glauques, brunâtres ou rouges des rochers humides et des fissures. Elle devient alors un élément important dans la constitution du coloris du paysage. Ainsi parfois, le long des torrents alpins, certaines de ces algues, libérées des lichens, colorent tous les blocs de rocher et les galets arrondis en rouge vif. On dirait qu'ils ont été passés au cinnabre. Elles exhalent un doux parfum de violette qui a valu aux pierres qui en sont couvertes le nom de «Veilchenstein». Mais qu'à la suite d'une crue subite, comme il en arrive souvent au moment de la fonte des neiges, le torrent obstrue son ancien lit et s'en fraye un nouveau, les algues insuffisamment humides se laissent de nouveau envahir par le réseau du champignon-lichen et le lichen se reconstitue sur ces blocs desséchés.

Plus haut encore, sur les rocs des plus fières cimes, lorsqu'elles sont en partie dégarnies de neige, s'établissent aussi de ces associations passagères ou permanentes. Vraie toile de Pénélope, la végétation lichénique enveloppe d'un réseau presque continu les arêtes nues des rocs les plus hardis; elle se fait et se défait sans cesse. En construction pendant la belle saison, quelque

Fig. 32. — Gonidies appartenant au genre d'algue verte *Cystococcus* et vivant en symbiose dans le lichen *Cladonia pyxidata*. Gross. 800 fois. Dess. de R. C.

courte qu'elle soit, le lichen, vers l'automne et au printemps, sous l'influence des pluies et des rafales, du gel et du dégel, est détaché du roc. Ce dernier se fendille et se délite. Il forme alors, avec d'autres végétaux, sur la neige, cette suie qu'on appelle la neige noire. Car sous l'action comburante du soleil, ces végétaux sont en partie carbonisés. Les petites algues auxquelles conviennent ces conditions s'échappent avec l'eau qui ruisselle. Parfois elles s'accumulent jusqu'à colorer la neige en vert.

C'est donc aux lichens qu'est due cette admirable patine du temps, formée de tons atténués, adoucis, et harmonieux, qu'ont prise avec les siècles nos montagnes calcaires ou siliceuses (*fig. 29*). Lorsque, par hasard, l'exploitation d'une carrière ou le tracé d'un chemin de fer ont éventré les rochers que les lichens ont revêtus d'une parure chatoyante et qu'ils ont façonnés par leur lente érosion, toute beauté a disparu.

Voyez par exemple au Saint-Bernard, combien serait plus poignante encore la solitude et la désolation de ce site sans arbres si la roche siliceuse n'était pas tout imprégnée de cette lèpre jaune et verte, le lichen géographique. Lorsque le soleil qui descend les éclaire, le mont Mort et la Chenalette paraissent comme saupoudrés d'or (*planche III¹*).

Au Bourg-Saint-Pierre, en descendant du Saint-Bernard, ce n'est certes pas un spectacle banal que celui des toits de schistes qui rutilent au soleil en leur gaie couverture de lichens orangés (*planche III²*). Cela rappelle les couleurs analogues que prennent dans les mêmes circonstances le sommet des rochers escarpés du col de la Gemmi.

Partout ces minuscules végétaux impriment sur la pierre ce caractère de mélancolique beauté qui contribue si fortement à la note dominante du paysage alpestre.

Mais, pour le naturaliste, il y a des problèmes à résoudre qui sont d'une esthétique supérieure et que l'homme du monde ne fait qu'entrevoir. Suivre pas à pas toutes les péripéties de la formation du lichen sur rocher (saxicole). Reconnaître les organes de reproduction du champignon-lichen, lesquels sont de petits sacs remplis de 8 spores. Voir comment ces spores sont projetés hors des petits tubes qui les contiennent avec la force d'une explosion.

Reconnaître qu'il y a un nombre si considérable de lichens que, seuls les spécialistes qui consacrent leur existence à l'étude particulière de ces plantes peuvent à peu près les connaître. Constaté que ces associations ne sont pas quelconques, mais qu'il se fait un choix; les associés se conviennent ou ont une aversion mutuelle. Découvrir que la morphologie, c'est-à-dire la manière d'être des champignons-lichens est toute différente de celle des champignons parasites. La présence de cellules vertes dans leur lacis leur confère des propriétés que ne possèdent pas les vrais champignons, êtres blafards, toujours à la recherche d'un hôte ou d'une pourriture à dévorer, hyène du règne végétal. Eux, les lichens ont réalisé l'association de l'aveugle et du paralytique. Ils usent de l'algue, mais n'en abusent pas. Ils sont aussi, vis-à-vis de ces gracieux végé-

taux nourriciers dans la situation du pâtre vis-à-vis du troupeau, vaches laitières de notre alpin ou rennes du Samoyède. Il y a en quelque sorte domestication. Le champignon-lichen fournit l'eau et la nourriture minérale contenue dans l'eau. L'algue en retour fabrique, à partir de l'acide carbonique de l'atmosphère, le sucre nécessaire à sa propre croissance et un surplus qui est abandonné au champignon-lichen. Faut-il penser que ce surplus est le superflu ou devons-nous supposer que les algues sont en quelque sorte rationnées par l'insatiable lichen? Ce sont des points encore actuellement en discussion. Il va de soi que toute association, toute société comporte une perte de l'individualité. La coo-

Fig. 33. — Filaments en chaînettes d'un *Nostoc*, algue bleue qui entre en symbiose dans les lichens gélatineux. Gross. 300 fois.

pération diffère du travail individuel. Ici, comme dans le monde des sociétés, il y a subordination. La question est de savoir si le travail fait à deux ou en société n'aurait pu être fait par chacun individuellement. Quand il s'agit de lichen, la réponse est aisée. La société, j'allais presque dire la raison sociale champignon-algue, n'est ni algue ni champignon. Ce n'est pas non plus la simple addition des deux, mais c'est un organisme nouveau, à caractère propre, à la fois différent des algues et des champignons, par sa physiologie comme par sa morphologie.

Fig. 34. — Sorédies de lichens, c'est-à-dire désagrégation du lichen en petites boules qui comprennent l'algue-gonidie verte et la petite pelotte formée par les filaments du champignon.
Gross. 400 fois. D'après R. Chodat.

Il n'y a point de champignons qui vivent sur les rochers, et les algues sont exclues des surfaces desséchées. Les formes prises par les lichens ne se retrouvent ni chez les champignons, ni chez les algues. Ainsi l'association consentie ou imposée imprime à la nouvelle plante, à cet être double, une allure spéciale, qui fait que, sans analyse, le botaniste reconnaît immédiatement un lichen d'un champignon.

Mais, dans cette vie en commun, l'un des associés a perdu le pouvoir de vivre seul. Le champignon-lichen, qui a conservé les mêmes appareils reproducteurs que ses congénères les champignons vrais (morilles, pezizes, etc.), ne voit germer ses spores que si elles viennent à rencontrer, et le hasard est aveugle, l'algue de

prédilection, l'algue habituelle sur laquelle puisse s'appliquer le crampon suçoir par lequel débute cette domestication. A défaut d'algue, la spore germe, mais s'arrête dans son développement, même sur les milieux les plus nutritifs. Et, comme il faut à chaque espèce de lichen une catégorie d'algues, les chances de réussir paraissent bien minimes. Cependant, ces algues libérées se mul-

Fig. 35. — Lichens de divers genres. A, *Peltigera*, lichen foliacé, dont on voit les fruits en B ; C, *Solorina* ; D, *Parmelia* sur une écorce ; E, *Endocarpon* sur rocher (gris souris) ; F, *Ramalina*. Grandeur naturelle.

Dess. de R. C.

tiplient avec rapidité. Leur extrême petitesse facilite leur dissémination. La plupart supportent la dessiccation si elle s'est faite lentement ; elles pourront donc être emportées comme poussière et rencontrer sur le roc humide la spore du lichen qui attend cette occasion avec la résignation fataliste d'un Oriental.

Aussi chez beaucoup de lichens voit-on se former des appareils de dissémination, qu'on appelle sorédies, et qui se présentent à la surface du lichen qu'ils ont crevée comme une farine grossière que le vent emporte. Chaque grain est une petite boule formée de

quelques filaments du champignon tressés en corbeille et enfermant quelques cellules, parfois une cellule verte appropriée (*fig. 34*).

Visitez les gorges du Trient, sur les parois des falaises abruptes, vous ne manquerez pas de rencontrer d'immenses amas de sorédies vert-de-gris ou jaune doré qui attendent le vent ou le courant qui les emportera.

Chaque rocher de nos régions tempérées est un désert en miniature. Même lorsque la pluie est abondante, elle n'est pas retenue ; elle humecte à peine la surface lisse du rocher. Près des glaciers, où la neige et la glace condensent l'humidité et où l'air est souvent d'une sécheresse extrême, exposés au soleil d'août sur les déserts pierreux, les lichens se dessèchent, deviennent friables ; on les réduirait en poussière entre les doigts. Alors, ils supportent des températures de 50-60°. Sur les rochers des déserts subtropicaux ils sont de longs mois à subir ces températures élevées ; leur croissance est alors suspendue, elle ne reprend qu'à la première ondée pour s'arrêter bientôt. Ceci fait que leur croissance est ordinairement lente. Un paysage gâté par l'explosion des rochers met des années à regagner sa teinte primitive, des siècles à adoucir ses arêtes, à les sculpter artistiquement. Il faut aux lichens des siècles de vie pour effectuer toute leur œuvre de beauté.

Il nous faudrait encore parler de tout ce monde de lichens qui garnissent si gracieusement les branches de nos arbres, qui, sur les troncs lisses des aulnes, tracent comme de petits hiéroglyphes, pendent en longues chevelures blanches ou noires des rameaux des sapins ou se détachent en jaune d'or de l'écorce rouge des mélèzes.

Nous ne devrions pas non plus oublier ceux, plus modestes, qui revêtent comme d'une gracieuse dentelle les branches menues des vieux noyers. A la fin de l'hiver, alors que les saules commencent à rougir leurs baguettes et que l'herbe desséchée timidement reverdit, la teinte jaune du lichen du noyer jette dans le paysage délicat une note de lumière et de gaîté qui nous annonce le printemps.

On a tenté de séparer les deux associés et de leur imposer une vie indépendante. Le plus souvent les spores ne germent pas ou, si elles germent, les difficultés de les isoler ne permettent pas de les

protéger contre les bactéries ou les moisissures habituelles. Dans quelques expériences on est arrivé à les amener jusqu'à la formation de tout petits thalles, de petites croûtes, mais c'est tout. On n'est, dès lors, pas fondé de dire que ce sont des champignons habituels ; ils sont de la nature morphologique des champignons ; comme eux ils sont formés par des filaments, les hyphes comme on les appelle, mais ils ne peuvent se développer normalement qu'en présence de leur associée, l'algue, la plante qui contient la chlorophylle.

Et celle-ci ! Il est déjà plus facile de l'isoler, quoique cette culture aussi nécessite plus de trois mois d'opérations préliminaires. Pour aborder et résoudre de pareils sujets, il ne faut pas être pressé. J'ai réussi depuis, seul ou avec l'aide de mes collaborateurs, à extraire et à cultiver plus de douze gonidies de lichens différents. Jusqu'alors, par l'examen au microscope on n'avait reconnu qu'un petit nombre de formes de gonidies. Parmi les plus habituelles, on cite dans tous les ouvrages les espèces suivantes : *Cystococcus humicola*, *Dactylacoccus*, *Pleurococcus vulgaris*, *Stichococcus bacillaris*, *Nostoc*.

Tous les auteurs modernes, forts de leur jugement exercé au microscope, ne reconnaissaient qu'un petit nombre de ces catégories de cellules vertes. La même algue aurait la possibilité d'entrer en association avec un grand nombre de formes différentes de champignons-lichens, lesquels s'en serviraient pour leur nutrition à la façon du paysan qui traite sa vache.

En effet, dans la théorie classique, on suppose que l'algue, assimilant au soleil le carbone de l'air, fabrique du sucre lequel, en excès, est abandonné au champignon, qui s'en nourrit, tandis qu'il fournit à l'algue non seulement l'eau qu'il sait puiser dans le sol ou dans l'air humide, mais avec l'eau les sels nécessaires au développement de toutes les plantes vertes.

Or, voici que nous avons trouvé que les gonidies des lichens, tout en ayant extérieurement, parfois une à une, la même apparence que certaines algues de nos étangs, en diffèrent étonnamment lorsqu'on les cultive comparativement. Les différences qui échappaient, quand on les observe cellule à cellule, se marquent d'une manière frappante lorsque ces cellules s'étant multipliées en for-

mant des tas, c'est-à-dire des espèces de forêts de cellules, on peut évaluer l'apparence de l'ensemble. Chacune de ces gonidies a une manière à elle de croître : celle-ci forme des tas vert foncé finement granuleux ; cette autre constitue des croûtes ridées et visqueuses, une troisième prend dans son accumulation l'apparence d'une mûre à gros grains arrondis et vert clair, etc.

Un enfant les distinguerait au premier coup d'œil ; les individus, c'est-à-dire les cellules isolées, se ressemblent ; la société qu'ils

Fig. 36. — Gonidies de deux lichens foliacés, *Solorina saccata* (voyez fig. 35, C) de la plaine, et *Solorina crocea* (rouge minimum en dessous) des Hautes-Alpes.
Gross. 800 fois.

Dess. de R. C.

forment est totalement différente selon l'origine des individus, mais est toujours réalisée de la même manière si on est parti des germes de même provenance.

Or, comme ces tas de cellules ne sont pas des tissus, mais simplement un agrégat de granules, de cellules isolées, il en résulte qu'il peut exister une morphologie sociale comme il existe d'espèce à espèce une morphologie individuelle. On le voit, le microscope est impuissant à nous dévoiler tous ces caractères. Un tas de gravier ressemble à un autre tas de gravier ; ici, l'accumulation de particules en apparence identiques aboutit à des apparences totalement différentes. Ce n'est pas la moindre des étonnantes particularités des lichens que cette grande diversité des gonidies. Autant

que nous avons pu le reconnaître, en particulier dans les genres *Cladonia* et *Solorina*, chaque espèce de lichen a sa gonidie propre. Quant à la forme du lichen, elle varie d'espèce à espèce (*fig. 28*), de genre à genre, il n'y a que ce trait général que ces champignons-lichens ne ressemblent pas aux champignons proprement dits; tous sont dans leur croissance comme préoccupés de disposer les grains verts, leurs gonidies-algues en une couche qui puisse absorber la lumière à la façon du tissu vert dans le limbe d'une feuille. Cette couche occupe une zone située un peu au-dessous de la périphérie du lichen qui, par le feutrage de ses filaments, plus dense dans cette région, est comme un épiderme protecteur, une zone limite continue. Beaucoup de lichens sont ainsi foliacés (*fig. 35*); on peut, dès lors, bien affirmer que la morphologie du lichen est dominée par l'influence des cellules vertes. Le tout est un compromis, une résultante. J'ai montré plus haut que dans leur accumulation en culture, dans le laboratoire, sur des milieux artificiels, chaque gonidie a une morphologie sociale particulière. On ne s'étonnera donc pas de trouver dans l'association de deux êtres, de nature dissemblable, les éléments d'une morphologie qui est dans son extrême diversité, cependant spéciale à ce groupe.

Ces lichens produisent comme les champignons Ascomycètes, auxquels ils sont apparentés par leur mode de reproduction, des spores de diverses catégories. Mais beaucoup d'espèces restent indéfiniment stériles. Je les suspecte même de produire des spores sans utilité. En effet, la plupart de ces spores ne germent pas. Un très grand nombre d'entre eux se disséminent par un procédé qui leur permet d'éviter l'aléa de la germination; et, comme pour pouvoir germer et se développer, il leur faut sans doute l'excitation spécifique d'une algue, à laquelle ils sont étroitement adaptés et qu'ils n'ont guère de chance de rencontrer, ils ont tourné la difficulté en fabriquant des propagules (corpuscules propagateurs d'origine non sexuée) de nature double auxquels on a donné le nom de sorédies (*fig. 34*).

La portion du lichen qui se sorédifie se résout par une des articulations de ses filaments en petits tronçons qui, se ramifiant, emprisonnent en une espèce de pilule microscopique les gonidies spécifiques sans lesquelles le lichen ne peut vivre. Ce faisant, ils

se comportent comme ces fourmis tropicales dont l'existence est liée à l'établissement de champignonnières; la reine qui émigre emporte avec elle dans sa bouche un peu du précieux mycète sans lequel aucun établissement, aucune fourmilière de cette espèce n'est possible.

Voilà un instinct bien remarquable chez le champignon-lichen et qui explique que ces végétaux puissent être si répandus. Quelques-uns qui vivent sur les rochers et même dans les roches granitiques les plus dures, granits, gneiss, quartz, ne forment jamais de sorédies, mais en revanche sont fendillés par les alternances de sécheresse et d'humidité, dans les hautes régions par la succession brusque du gel et du dégel. Le vent emporte ces poussières qui, de nature double, germent immédiatement si elles tombent sur un milieu propice.

D'après STAHL, chez un lichen de rocher, l'*Endocarpon pusillum*, les gonidies entourent les appareils producteurs de spores; lorsque ces dernières sont éjectées, elles emportent avec elles les cellules vertes nourricières.

Le résultat théorique de cette symbiose, c'est, semble-t-il, de permettre à l'algue de quitter le milieu aquatique pour habiter le domaine aérien. On est en droit de supposer que, lorsque les premiers lichens s'essayèrent à cette symbiose, ce dut être au bord des cours d'eau ou sur les pierres humides; là, nous pouvons nous imaginer les algues unicellulaires ou des nostocs (*fig. 55*) s'essayant peu à peu à la vie terrestre, rencontrant des champignons qui, indifférents d'abord, finissent par saisir l'intérêt qu'ils ont à se servir de ces gonidies vertes, vraies nourrices, qui ne demandent qu'à faire une « ballade » dans le monde. Mais, comme toujours, notre imagination est trop pauvre; elle revient inconsciemment aux mêmes clichés. Voulons-nous l'enrichir, allons puiser à la source même de l'inépuisable richesse : à la nature elle-même. Les organismes unicellulaires ont, au contraire des plus compliqués, une distribution géographique immense. Nous avons vu les neiges de l'ancien et du nouveau Monde, de la calotte arctique et de l'Inlandsis antarctique, habitées par les mêmes plantes inférieures proto-phytes, les étangs du Bengale, du Cordofan avoir, en commun avec

les mares du Salève, en Savoie, un grand nombre de Protococcées vertes. A l'état de spores, à l'état de cellules dormantes, ces minuscules algues desséchées supportent des déplacements énormes. Emportées avec la poussière cosmique, elles font le tour du monde. On voit aux Canaries la côte orientale de Lanzarote et Fuerteventura couverte jusqu'au sommet des montagnes par le sable blanc que le vent de l'est apporte du désert africain, à travers une mer large de 75 milles, ce qui équivaut à 135 kilomètres. Les spores des algues unicellulaires sont cent fois plus légères que

Fig. 37. — Gonidie du lichen épiphyllé qui vit sur les feuilles du buis; cette gonidie (algue verte) vit aussi à l'état isolé, en liberté. On l'appelle *Phycopeltis epiphytica*.
Gross. 420 fois. D'après Millardet.

ces grains de sable. A plus forte raison, ces germes sont retenus par toutes les surfaces poreuses, rugueuses. On les voit, par exemple, pulluler sur les champignons subéreux, les Dédalles, les Polypores, dont la consistance d'amadou se prête à la fois à pomper l'humidité et à retenir les poussières. Examinez un peu plus loin ces écorces des arbres, à demi pourries, tout au moins fendillées : elles sont envahies, comme l'humus de la forêt, par un monde de champignons qui continuent la désagrégation, divisent la matière végétale et la rendent poreuse. Ce sont là aussi des stations de prédilection pour les poussières vertes qui, du côté de l'ombre, dans le parc humide, ont saupoudré de leur pruine verte le tronc des grands arbres. Regardez sous le microscope cet enduit vert : on y voit au hasard des circonstances se faire des rencontres ;

des lichens rudimentaires, des algues libres, des filaments de champignons qui enlacent d'une manière engageante quelques cellules vertes (*fig. 30*) ; mais tout cela n'amène pas à des mariages réguliers, cela se fait et se défait sans ordre.

On peut au moins chez un lichen saisir les débuts de la lichénisation ; ici elle est, si je peux m'exprimer ainsi, facultative. Il s'agit de ces curieux lichens qui ont élu domicile sur les feuilles persistantes (*planche IV*) des arbustes du sous-bois des Tropiques.

Ces feuilles, comme toutes celles des végétaux toujours verts, sont recouvertes d'une pellicule transparente, qu'il n'est souvent pas difficile d'enlever ; la cuticule — comme l'appellent les botanistes — n'est pas un tissu formé de cellules, c'est simplement une espèce de vernis qui, sécrété par la feuille, recouvre toute sa surface supérieure. Parfois, elle se fendille, elle se boursoufle, elle se détache en lambeaux ; c'est là que s'est établie une algue, (*fig. 37*) d'une forme inusitée. Sa spore, en poussant son tube germinatif, le divise rapidement en deux branches qui s'appliquent contre la surface, puis chacune à son tour faisant de même, il se constitue des éventails qui, en s'étalant à droite et à gauche, arrivent à la forme d'un disque rayonné. C'est comme si la plante sentait le substratum auquel elle désire s'attacher et si elle agissait en conséquence. On connaît d'autres organismes ou organes qui font de même, ainsi ces algues qui, à la face inférieure des grosses feuilles de nénuphar, se collent au mucus de l'épiderme. Dans la mer même, j'ai signalé ce phénomène chez des algues brunes qui s'étalent sur d'autres algues pour s'y cramponner. Des champignons qui vivent sur les feuilles du maté ramifient leurs filaments en disques du même style (*fig. 38*). Et pour compléter la démonstration, voici que cette mousse (Hépatique) qui, dans la forêt humide, s'est étalée sur les feuilles persistantes, se cramponne par des appareils de même construction. Voici des cas dans lesquels aux mêmes sollicitations correspondent les mêmes réponses : algues vertes, algues brunes, champignons, mousses épiphylls, c'est-à-dire vivant sur la surface des feuilles. Les gens prudents disent qu'il y a convergence, c'est-à-dire que des plantes appartenant à des groupes systématiques bien différents, dans les mêmes conditions se comportent de même. Les emballés disent qu'il y a adaptation,

c'est-à-dire que la plante répond d'une manière adéquate à son milieu. Les scientifiques expérimentent, ils démontrent que si on cultive ces organismes dans d'autres conditions, ces structures ne se font pas, mais qu'on peut, en leur offrant au lieu de feuilles des plaques de verre, provoquer la formation des disques. Les premiers font de la morphologie comparée, les seconds font de la téléologie, ils y voient de la finalité; les troisièmes, les expérimenta-

Fig. 38. — Disque formé par les filaments du champignon tropical qui vit sur les feuilles du Maté (comparez avec la fig. 37). D'après D' Lendner.

teurs, ramènent les formes à des causes efficientes connues, donnent la loi mécanique du phénomène. Mais ni les uns ni les autres ne nous apprennent pourquoi tous les végétaux analogues ne se comportent pas de même. La seule chose certaine, c'est qu'il y a des plantes, petites ou grandes, qui sous l'excitation de causes connues, ici le contact, produisent des disques d'adhésion de la forme décrite. Et ceci explique le mode de vie, justifie la présence de ces plantules sur les feuilles. Souvent ces algues du genre *Phycopellis* ou *Cephaleuros* se bornent à produire des disques verts sous la cuticule des feuilles persistantes du sous-bois tropical.

On voit donc que la formation de ces disques n'a rien à voir

avec la formation des lichens et que c'est un phénomène habituel dans ces mêmes conditions. C'est sur ces petits disques, tantôt de très bonne heure, tout au début, tantôt plus tard, qu'un champignon-lichen fait germer sa spore et étale ses minces filaments. Alors la couleur verte est cachée ; les disques blanchâtres ou glauques portent finalement les appareils reproducteurs des lichens, de petites assiettes microscopiques, ici, de couleur jaune, et dans lesquelles sont les sacs sporifères (asque).

Mais la présence de l'associé du champignon, n'a pas changé l'apparence générale, c'est la plante verte qui a imposé sa loi ; le lichen, l'association n'a pas, ici, de morphologie à elle, elle l'emprunte à la plante verte !

Ces lichens *Strigula* n'étaient, jusqu'en 1912, connus que des forêts tropicales ; au cours d'une excursion botanique que je faisais avec mes élèves dans une forêt d'un type unique en Europe, la forêt de buis de Coudrée, au bord du lac de Genève, je montrais à ces jeunes gens, dans la forêt sombre et humide, pendant des branches, en longs festons, les guirlandes d'une mousse, le *Neckera crispa*.

L'obscurité relative, l'humidité, les reflets verts et les guirlandes de mousse, les feuilles persistantes de ces arbres dans notre végétation européenne, tout, faisais-je remarquer, rappelle la forêt tropicale ; il n'y manque, disais-je, que les lichens épiphylls (lichen sur les feuilles, de ἐπί et φύλλον). Au fait, si nous regardions ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Je ne m'attendais guère à cette surprise : là, sur presque toutes les feuilles, on voyait, soulevant le cuticule en petits disques vert-de-gris, les *Strigula* comme on l'aurait vu dans un sous-bois de Cuba, du Congo ou de l'Amazonie ! Une année plus tard, M. ELENKIN ne trouvait-il pas à son tour ce même lichen sur les feuilles des buis du Caucase (*planche II*) !

A quand la découverte chez nous d'un vrai *Coenogonium* comme ceux que j'eus l'occasion de voir dans les forêts sombres et humides du Paraguay ?

Celui-ci est tout aussi intéressant : figurez-vous, se détachant des troncs lisses et blancs des Mytacées, des chapeaux minces de la forme de certains Polypores de chez nous, zonés comme le

R. C. del.

Lichen épiphyllé, vivant sur les feuilles du Buis à la forêt de Coudrée (Savoie).

Polyporus zonatus ou *versicolor*, mais toute la texture en était comme celle d'une grossière toile d'araignée, de couleur verte, portant par-ci par-là les petites écuelles jaunes, appareils reproducteurs du lichen (apothécies). A l'examen, on voit que presque toute la toile est formée par les filaments ramifiés de l'algue, laquelle se comporte dans sa morphologie non en algue, car il n'y en a pas de cette structure, mais comme un champignon à chapeau, comme un Polypore. C'est comme si la plante verte s'était substituée à un champignon. Sans doute, ici, c'est l'algue qui l'emporte comme masse, mais elle a épousé la forme d'un autre organisme. Les minéralogistes appelleraient ceci une pseudo-morphose : à la place du cristal qui disparaît, la substance d'un autre minéral remplit la place, épousant dans sa forme extérieure celle d'un corps étranger à sa nature cristalline, à sa symétrie propre.

Mais ce sont là deux cas extrêmes, il faudrait tout autant expliquer la cause de la structure de ces croûtes blanches ou roses des *Verrucaria* pointillés de noir, de nos rochers calcaires, les mosaïques fendillées, aréolées vertes et noires du lichen géographique qui colore des montagnes entières dans nos Alpes granitiques (planche III). Les croûtes festonnées des *Parmelia* (fig. 55, D), les arbuscules des *Cladonia* (fig. 28) et tant d'autres structures qu'on ne voit que chez les lichens.

Dans leur folle entreprise de conquérir le monde, les algues, quittant leur milieu aquatique, ont dû se prêter à bien des compromis. Elles se sont répandues, multipliées, mais non en véritables conquérants. Trop étrangères au milieu aérien, elles ont dû accepter les services du champignon, du parasite, dont elles sont devenues le serviteur. Il y a sans doute association, vie en commun, mais la question serait de savoir lequel des deux associés est le plus favorisé. Or, nous l'avons dit plus haut, il nous est possible, — et nous l'avons fait pour plus de douze espèces, — de cultiver en liberté dans le laboratoire les algues vertes des lichens. Peuvent-elles d'elles-mêmes échapper à ce servage et, se retirant dans de sûrs asiles, dans les eaux, vivre d'une vie modeste mais indépendante ?

Elles le peuvent sans doute accidentellement. Mais elles portent, comme le chien de la fable, la marque indélébile de la domestication.

En lutte pour la place avec leurs congénères indépendants, elles succombent. Pour autant que nous pouvons en juger aujourd'hui dans la nature avec tous ses aléas, ses risques, la concurrence vitale, ellés ne se multiplient qu'en servage, comme beaucoup de nos races cultivées de plantes ou d'animaux domestiques.

Trop longtemps les botanistes pressés se sont imaginé que tout avait été dit sur la biologie des lichens, mais plus j'avance dans cette minutieuse étude, plus je m'aperçois que dans la symbiose il y a, comme dans tout fait biologique, un grand nombre de variantes. Ainsi, il est certain que beaucoup de lichens peuvent, comme les champignons, par leurs poils absorbants, extraire, de l'humus ou des troncs pourris, une partie de leur nourriture. Alors l'algue tire plus de profits de l'association que le champignon ; dans d'autres cas assez nombreux, le champignon finit par digérer les algues qui lui avaient servi de nourriture. Une ingratitude aussi notoire n'est pas isolée dans le règne végétal. On en peut trouver des exemples dans la symbiose des Orchidées avec les champignons ; mais dans ce dernier cas, c'est la plante verte qui digère le parasite.

On pourra dès lors juger du nombre considérable de combinaisons qui ont pu, au cours des siècles, s'établir entre les deux associés, entre la plante aquatique et le végétal parasite. Le premier a quitté ses habitudes de méduse aquatique, le second n'est habituellement plus parasite, il s'est associé avec un végétal vert, et les deux constituent une unité physiologique, en quelque sorte l'association de l'aveugle et du paralytique. Nous ne savons pas quand les lichens apparurent pour la première fois, nous ne savons pas même si de nouveaux lichens peuvent aujourd'hui se former. Nous savons cependant une chose, c'est qu'il y a des lichens de hautes régions, certains même qui ne vivent que tout près des neiges éternelles, d'autres qui vivent sur les rochers, en collection d'espèces qui se pénètrent mutuellement, y dessinent des taches de couleurs variées, et qu'on retrouve identiques dans les pays les plus éloignés. Il y a les lichens des forêts qui garnissent les troncs et les branches de leurs franges argentées ou de leurs lanières verdâtres, qui pendent des branches en longues chevelures grises ou noir olivâtre ; d'autres qui, sur le tronc pourri, mêlent leurs petits buissons en forme de coraux, aux mousses et aux myrtilles. D'autres,

Fig. 38 bis. — Forêt de Pins d'Alep dans la région nuageuse de la cordillère de Mallorca, dont les arbres sont couverts de lichens en barbes grises du genre *Ramalina* (cf. fig. 35 F).

Phot. R. C.

comme le lichen des rennes ou la « mousse d'Islande » (*Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina*), qui, au dessus de la zone des forêts, posés sur le col de l'alpe, se laissent pénétrer par les Azalées et les Lycopodes, en un gazon dur. C'est la Toundra qui, dans les régions arctiques, couvre, au delà du cercle, de grandes étendues, broutées par les rennes. Les sables, les rochers maritimes, ceux des côtes de l'Erythrée ou du Sahara, comme les écorces des arbres de chez nous et de tous les pays, tous hébergent des lichens. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette multiplicité des formes, c'est qu'on peut, comme pour les végétaux de nature simple : les algues, les mousses, les champignons, les grouper en classes, en ordres, en familles en genres, en espèces et en variétés. En un mot, dans la classification des lichens, l'association se comporte comme une unité ; les espèces voisines par l'apparence sont aussi voisines

par leurs gonidies, par leurs spores. S'il y a donc eu évolution, les lichens ont dû, eux aussi, se développer à partir de quelques types fondamentaux, en une étonnante multiplicité d'espèces. Plus encore, comme chez les autres plantes, il en est d'aquatiques, ce sont les plus rares, d'hygrophytes, habitant les marécages et les tourbières, de xérophytes, exposées à la lumière et à la sécheresse, et qui résistent à la dessiccation. En un mot, aux circonstances si variées de la nature se sont adaptées des formes de lichens chez lesquels il n'est généralement pas difficile de reconnaître des structures accordées au milieu.

Ainsi, le conte japonais est devenu une réalité, la plante aquatique s'est aventurée à la conquête des espaces aériens et, dans cette audacieuse entreprise, avec son associé le champignon-lichen, ils ont tissé autour du monde inerte et du monde des plantes un réseau délicat, atténuant par leurs teintes fines et variées la couleur crue des rochers nus, garnissant branches et troncs de dentelles ou d'un semis délicat. Et dans ces vicissitudes complexes au cours desquelles la plante double se défait et se refait sans cesse, les deux associés qui la composent ont su progresser de compagnie sans jamais se confondre.

D'ailleurs, toute la vie n'est-elle pas liée à une incessante symbiose. Chaque cellule est comme une association d'un noyau et du protoplasma; dans la multiplication de la cellule, de chaque cellule, chacun des deux occupants conserve son individualité, a ses lois, sa biologie propre; dans le plasma de chaque cellule il y a encore des individualités distinctes qui jamais ne se confondent avec lui, se multiplient indépendamment. Et maintenant, si nous poursuivions notre analyse plus loin, nous trouverions, et on en connaît, des unités plus petites encore, les microsomes, les chondriosomes et peut-être encore d'autres. Le noyau lui-même qui, nous apparaît au repos comme une unité, lorsqu'il se divise se révèle comme une association de corpuscules, les chromosomes, dont le nombre est fixe pour chaque espèce.

Enfin, la matière vivante est formée de granules, ceux-ci de molécules chimiques, celles-ci d'atomes et eux aussi sont composés. Il n'y a nulle part l'homogénéité, l'unité. Partout, c'est le complexe. Lorsque nous isolons les deux associés du lichen, la vie du

lichen a disparu, mais nous pouvons la reconstituer; nous ne savons pas séparer de la cellule le noyau du plasma, sans détruire et la vie de la cellule et celle des composants.

Les chromosomes eux-mêmes seraient composés de particules, les gènes, vrais porteurs des caractères, dont l'association, la symbiose déterminerait la mosaïque des caractères manifestés!

Toute la théorie moderne de l'hérédité repose sur cette notion de la symbiose, c'est-à-dire de l'association, dans le noyau de la cellule, d'unités biologiques indépendantes, dissociables et capables de se grouper à nouveau pour reconstituer l'individu apparent.

Mais de cette théorie nous parlerons une autre fois.

C'est une idée à laquelle l'un de ceux qui ont fait le plus avancer la connaissance de la vie des lichens, le vénérable savant russe Faminçin, s'est particulièrement attaché, la symbiose, comme principe général de vie. Société, solidarité, œuvres collectives, humanité, sont-ce là de vains mots ?

BIBLIOGRAPHIE

- FAMINTZIN et BARANETSKI. — Entwicklungsgeschichte der Gonidien .. von *Physcia parietina*. *Botanische Zeitung* (1867) 186-190.
- SCHWENDENER, S. — Die Algentypen der Flechtengonidien. Bâle (1869) 38.
- Ueber die Natur der Flechten, in Verhandlung. der naturforsch. Gesellschaft der Schweiz. Session de Rheinfelden (1867) 88-90.
- DE BARY. — Morphologie und Physiologie der Pilze (1866) 291.
- BORNET, Ed. — Recherches sur les gonidies des lichens. *Ann. des Sc. naturelles*, Paris, V^e série, XVII (1873).
- BONNIER, G. — Recherche sur la synthèse des lichens. *Ann. des Sc. naturelles*, VII^e série, IX (1886).
- CHODAT, R. — Monographies d'algues en culture pure, Gonidies des lichens. Berne (1913) 185, 207 et 217-234.
- LETELLIER, A. — Etude de quelques gonidies de lichens, in *Institut de Botanique*. Genève (Chodat), IX^e série, VII^e fasc.
- FAMINÇIN. — Die Symbiose als Mittel der Synthese von Organismen. *Ber. der deutsch. bot. Gesell.* XXX. (1912) 435.
- MÜLLER, J. — Flora (1872) 90-93.
- NYLANDER, F. — Animadversio de theoria gonidiorum algologica. *Flora* (1870) 52.
- ELFVING. — Untersuchungen über die Flechtengonidien. Helsingfors (1913), in *Acta Societatis scientiarum fennicae* XLIV (1913).
- MINKS. — Das Mikrogonidium, ein Beitrag zur Kenntnis des wahren Wesens der Flechten, Bâle-Genève (1879).

R. C. del

Torrent de montagne (Praç de Fort, Valais) dont les pierres se colorent par l'HYDRURIS (en jaune) et par les TRENTÉPOHLIA (en rouge).

Histoire biologique d'un torrent.

(PLANCHES V, VI, VII, VIII.)

NOUS voici à Praz-de-Fort, au pied du Portalet, dans le massif du mont Blanc; le torrent de Saleinaz, qui, descendu des névés, se dégage de la base du glacier, rejoint la Dranse de Ferret en précipitant ses eaux laiteuses de rocher en rocher, limant sans cesse, par le sable fin qu'il met en mouvement, les arêtes des gros blocs. Ceux-ci sont à ce moment et pour cette cause, au commencement de juillet, d'un granit très joli, au grain comme celui d'une pierre polie par un artisan. Tout autour, les gros blocs de la berge, moussus en haut, sont garnis, sur les côtés, d'un feutre odorant, parfumé comme un bouquet de violettes (*planche V*). On les dirait passés au minium, tant leur teinte est vive; mais, à l'examen, ce vernis se révèle comme formé par les filaments d'une algue aérienne, le *Trentepohlia Jolithus*: la pierre au parfum de violette. Parfois l'algue est humectée par la pluie, puis elle se dessèche; par les eaux du torrent, elle est tout à coup inondée, puis elle est de nouveau mise à sec; la buée de la cascade vient aussi à son tour se mêler comme une fumée au parfum qui la trahit.

Mais, autre part, vers la forêt humide de Champex, sous les pins de montagne, envahis par la barbe grise des lichens, elle est tout aussi abondante, et si, le matin, par la fraîcheur, elle est souvent humectée par la rosée, vers le milieu du jour elle ne craint pas l'ardeur même du soleil qui la dessèche complètement. Protégée contre une lumière trop vive par son « hématochrome » ou huile rouge, comment fait-elle pour résister à ces alternances de sécheresse et d'humidité qui tueraient infailliblement d'autres végétaux? C'est encore là une de ces propriétés mystérieuses, qui n'appartiennent qu'à un petit nombre de végétaux, de pouvoir ainsi, après dessiccation, reprendre vie par l'humidité, d'être en un mot reviviscents.

Dans l'eau du torrent, la mousse, nommée *Fontinalis*, qui se laisse entraîner par le courant à cause de la flexibilité de ses tiges et qui paraît si délicate avec ses feuilles transparentes, va, elle aussi, subir, sans qu'elle y soit préparée, la crise de la complète dessiccation ; ses tiges vont retomber sur la pierre exondée lorsque le niveau baisse et, au soleil, vont se comporter comme celles d'une plante morte de soif. Mais, qu'on attende une pluie nouvelle qui fera grossir le torrent, et voilà que ce cadavre reprend vie comme par enchantement ; cette mousse gonfle ses tissus, étale ses petites feuilles et se met à respirer de nouveau.

Fig. 39. — Mousse aquatique, *Fontinalis*.

Dess. de R. C.

La Nature est un merveilleux laboratoire ; là nous pouvons en toute saison trouver de nouveaux problèmes. Cependant elle ne se donne qu'à ceux qui savent lui faire une cour assidue. Rarement elle répond aux avances des gens pressés, si ce n'est par son sourire un peu moqueur. Elle est d'ailleurs toujours réservée et ne livre jamais tout son secret. La nature a vraiment l'âme féminine.

Nous avons choisi, en ce mois de juillet, cette retraite ombragée vers le bord du torrent. Rien ne sert de courir si l'on ne sait voir et trouver du nouveau partout. Hier, sous ces sapins, nous avons observé comment ce curieux champignon, qui sort de terre comme un gros ver noir, le *Cordiceps*, attaque et se nourrit d'un autre champignon tout aussi singulier. Celui-ci a l'air d'une truffe noire et vit, lui, de l'humus de la forêt. On est toujours plus ou moins le parasite de quelqu'un. Aujourd'hui, j'observe cette curieuse société qui s'est établie sur ce vieux tronc pourri : des lichens, des mousses, de gluants *Myxomycètes* ; une Orchidée a

plongé ses racines dans le bois vermoulu par l'action des moisissures ; puis c'est un bouquet d'airelles dont une partie des branches et des feuilles ont pris une teinte rouge cerise sous l'influence d'un champignon parasite qui excite cette espèce de bruyère à de singuliers déportements. L'histoire d'un tronc pourri ! ce sera pour une autre fois. En ce moment, mon attention est attirée par un phénomène aquatique, et puisqu'on ne progresse qu'en suivant une méthode, hélas ! laissons de côté le tronc pourri et soyons bien sages. Il s'agit en effet de l'histoire du torrent. Voici le cinquième jour de notre villégiature et, jusqu'à présent, je n'avais vu que des pierres polies d'une couleur charmante et uniforme, d'un gris argenté brillant ; les paillettes de mica scintillaient au soleil. Aujourd'hui, changement de décor, toutes les pierres sont jaunes, d'un jaune livide assez peu engageant (*planche V*). Au toucher elles sont comme enveloppées par une mucosité. Nous reviendrons les jours suivants et, remontant le ravin jusqu'au glacier, nous verrons que le torrent est comme pris par une épidémie de jaunisse, tandis que, dès le confluent avec la Dranse, l'ictère des pierres cesse comme par enchantement. Peu à peu, de ce mucus, inondé par l'écume du torrent, se détachent des filaments visqueux brunâtres plus ou moins ramifiés qui flottent au hasard, suivant dans leur direction le fil de l'eau, et qui peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. de longueur. La plante est connue depuis longtemps sous le nom de *Hydrurus penicillatus*, l'Hydrure en pinceau (*fig. 40*). Autant l'algue à parfum de violette est résistante à la sécheresse, aux variations de la température, autant celle-ci est délicate. Si elle n'est constamment dans une eau aérée, si elle vient à être momentanément mise à sec, elle prend une teinte verdâtre et meurt. Pendant tout l'été, elle persiste dans ce torrent, se renouvelant constamment et sur plusieurs kilomètres, en remontant le vallon alpin. C'est en vain qu'on la chercherait dans les ruisseaux qui se jettent en été dans le Léman. Mais en hiver elle apparaît avec encore plus d'intensité dans nos cours d'eau de plaine. Mon savant ami M. Camille SAUVAGEAU l'a même signalée en hiver 1895, dans le Rhône, à Lyon. Dans notre torrent de Saleinaz, la température ne s'élève guère pendant les mois d'été au-dessus de 6°,5. Du 9 juillet au 19 août, d'après les mesures faites très soigneusement

et très régulièrement par une de mes élèves, M^{lle} Christin, la température n'oscille qu'entre 4°,9 et 6°,7 C. Pendant la même période, celle de la Dranse de Ferret, dont la source et les glaciers d'alimentation sont plus éloignés, varie de 7° à 8° C. Tout l'hiver, alors que l'eau est encore plus froide, l'algue se maintient pour disparaître au moment de la grande fonte des neiges, moment de la grande débâcle qui nettoie les pierres de

Fig. 40. — A, apparence des filaments muqueux de l'*Hydrurus*; B, un bout de filament vu au microscope; C, cellule mobile de dissémination (zoospore).
Dess. de R. C.

toutes leurs impuretés. En poursuivant cette étude, on voit que l'*Hydrure* est un végétal qui est tué par une température de 14° C. et au-dessus, ce qui explique son absence dans les ruisseaux de la basse région en été. Cette curieuse plante donne naissance, au moment de sa reproduction, à des cellules mobiles, ou éléments de propagation errants, ciliés, d'une forme singulière (fig. 40, C). Ce sont ces zoospores qui s'attachent à la pierre par leur mucus et qui, dans cette eau froide, si extraordinairement pure, savent trouver assez de nourriture pour se développer en une véritable épidémie. C'est comme si ces végétaux savaient attirer à eux, hors de l'eau presque pure, les molécules nutritives avec une foudroyante rapidité.

R. C. del.

Desmidiées (Algues vertes) d'un marais tourbeux des Alpes (Saas-Fee).

Remontons par une radieuse journée du commencement d'août le ruisseau qui alimente notre torrent. Nous voici, à 2000 m., devant un petit lac où viennent s'abreuver les troupeaux ; la surface de l'eau en est par places toute verte ou toute rouge. Selon la direction de la lumière, ces teintes se déplacent. Ici, sur le bord, on voit, au soleil, hors des ouates vertes qui accompagnent ces efflorescences, se dégager des bulles d'oxygène. La journée

Fig. 41. — Quatre espèces de *Chlamydomonas* : E, *Chl. Reinhardi*, F, zygote, c'est-à-dire œuf fécondé du dit ; G, H, id. du *Chl. Steinii* ; I, *Chl. de Baryana*, b, union de deux cellules pour former l'œuf ; J, *Chl. globulosa*, c, gamètes qui s'unissent, d, zygote, soit œuf fécondé
Dess. de R. C.

est chaude, nous mesurons la température de l'eau, elle dépasse 20°. C'est que ces petites mares alpines peu profondes, alimentées par le suintement des ruisselets, peuvent, dans la journée, s'échauffer beaucoup. Il ne faut donc pas s'étonner si les organismes que nous allons y découvrir sont les mêmes que ceux que nous pourrions observer dans une mare du Paraguay ou du Cordofan.

Il y a d'abord tout un monde fourmillant de *Chlamydomonas* (fig. 41) et d'autres algues unicellulaires de diverses espèces, à tous les degrés de développement ; les uns comme des obus qui décrivent une trajectoire tout en tournant sur leur axe, les cils

en avant, d'autres, aplatis comme une raie, fendent l'eau en décrivant de curieuses spirales, d'autres cheminent de compagnie quatre

Fig. 42. — Colonie de seize cellules de *Gonium pectorale* mise en mouvement par ses cils

par quatre ou seize par seize et, comme associés au même radeau qu'ils mettent en mouvement, battent chacun de leurs deux cils comme des galériens faisant manœuvrer leurs rames (fig. 42).

Mais ce qui va captiver notre attention, c'est le fait de trouver, à ce niveau si inférieur du règne végétal, tous les degrés, toutes les formes de la sexualité. Sans doute, il ne nous sera pas possible d'élucider tous les problèmes qui se rat-

tachent à ces constatations, au cours d'une excursion de montagne. Il y faut bien des années de patientes investigations, de travail délicat et difficile, des cultures à propos desquelles chaque germe est trié soigneusement selon des méthodes à découvrir. Plus d'insuccès que de réussites, ce qui donne du prix aux quelques résultats positifs. Ce serait trop long d'exposer ici comment on arrive à séparer chacun de ces organismes et à le cultiver en dehors de toute contamination. C'est affaire de spécialiste et le grand public ne s'intéresse qu'aux résultats. J'ai actuellement en culture pure plus de cent quatre-vingts espèces de ces petits organismes verts, un jardin botanique en miniature dans lequel il faut que, dans un même enclos, il n'y ait qu'une seule espèce, issue d'ailleurs d'un seul germe. Il y a grandes difficultés d'empêcher que les mauvaises herbes, dans ce cas particulier d'autres micro-organismes (donc eux aussi microscopiques) ne viennent souiller ces cultures pures. Au lieu de la mare aux grenouilles, où pullulaient côte à côte bactéries, champignons, algues d'espèces variées, ainsi que,

dans une prairie, voisinent des végétaux nombreux et différents, on n'a maintenant, comme dans un champ de blé, plus qu'une seule espèce en culture. Mieux encore, car on n'y voit pas, comme dans le plus soigné de ces champs, coquelicots, bleuets, nielles, ou ivraies.

Examinons maintenant ensemble deux des organismes microscopiques qu'après de patientes recherches nous avons réussi à isoler de cette mare de montagne.

Voici l'*Hematococcus pluvialis* qui dans certains de ses états ressemble si fort à l'organisme de la neige rouge. Cultivé dans une eau très pure, à la lumière diffuse, il perd complètement sa couleur rouge et se multiplie avec une excessive rapidité. A la lumière et en milieu nutritif, il prend une couleur rouge brique intense. Mais quelque condition que nous fassions varier, il ne produit jamais autre chose que des cellules arrondies ou des cellules mobiles, des zoospores (fig. 43).

Voici cette autre espèce qui lui est tout à fait semblable, elle produit avec facilité, à côté des zoospores, de plus petites cellules de même forme, mais qui, même dans de bonnes conditions, n'arrivent pas à se développer par elles-mêmes. Au cours

Fig. 43. — *Haematococcus pluvialis* (Sphaerella). A, B, F, zoospores, c'est-à-dire cellules mobiles; C, E, D, états enkystés au repos, cellules pleines de matière rouge (hématochrome).

Dess. de R. C.

Fig. 44. — *Chlamydomonas intermedia*. A, cellules sexuelles variées; B, multiplication dans l'enveloppe de la cellule mère; C, union de deux gamètes; D, commencement de la soudure par un petit processus; E, F, G, H, fusion, états successifs; J, deux gamètes très inégaux; K, L, moins inégaux.
Dess. de R. C.

de leurs pérégrinations dans le champ du microscope qui sert à les observer, car elles ne sont bien visibles qu'à un grossissement de 500 diamètres, on les voit s'approcher, se rechercher et, finalement, s'unir par deux et se confondre en une seule cellule arrondie qui est la zygote, l'œuf fécondé (fig. 44). Comment faut-il nommer ces deux cellules ? où est ici le mâle, où est la femelle ? Les deux cellules sont en apparence égales, mais la grandeur et la forme ne nous renseignent pas suffisamment. En effet, nous en

Fig. 44 bis. — Coujugaison chez un *Spirogyra*. 1, deux filaments se sont anastomosés, conjugaison habituelle, en haut, passage de la cellule mâle, en bas, la zygote est formée; 2, ici ce sont deux cellules du même filament qui vont se confondre, on voit la cellule mâle qui a percé la paroi, en train de passer dans la cellule femelle pour s'y fusionner; 3, phénomène analogue; 4, id.; 5, la fusion s'opère entre des filaments distincts, mais en outre des processus sont attirés par la cellule femelle qui excite plusieurs cellules mâles.

voyons qui passent indifférentes l'une à côté de l'autre : elles sont du même sexe, elles ne s'attirent pas ; en voici deux autres qui ne paraissent pas plus différenciées que les précédentes et qui, dès la première rencontre, se sont fait des avances, se sont rapprochées, ont fini par cheminer de compagnie et par se fusionner. La sexualité, ici, ne se traduit pas par quelque chose d'extérieur, pas plus que dans les algues dont nous avons fait l'histoire, la résistance au froid ou la capacité de produire du pigment ne se trahissait extérieurement par aucun signe visible. Il est beaucoup de ces unicellulaires chez lesquels la sexualité est ainsi rudimentaire.

En voici une autre qui produit dans un même milieu, selon les lois du hasard, des gamètes ou cellules sexuelles de toute dimension ; alors on peut voir simultanément des fusions, des copulations

entre des cellules égales, phénomène qu'on appelle isogamie; puis entre des cellules faiblement inégales, c'est l'hétérogamie; enfin, entre des cellules très inégales (sexualité marquée); alors la cellule femelle peu mobile attire à elle un élément de même forme, mais beaucoup plus petit, très agile et le plus souvent très peu coloré, que les botanistes appellent par analogie avec les mêmes organes des animaux, spermatozoïde ou anthérozoïde (*fig. 44*).

Chez toutes les plantes supérieures, ainsi les Fougères et les Phanérogames, ou plantes à fleurs, la sexualité est, comme chez les animaux supérieurs, traduite en dernière analyse par la réunion de deux cellules : l'une, immobile, plus grosse, la cellule femelle ou œuf; l'autre, mobile, plus petite, la cellule mâle ou spermatozoïde.

Mais, tandis que chez toutes ces plantes supérieures la détermination du sexe est absolue, au moins chez les espèces dont les sexes sont sur des pieds séparés, chez beaucoup de ces unicellulaires il y a une indétermination déconcertante.

Examinons sous le microscope les filaments un peu décolorés de cette ouate verte qui flotte sur le bord de notre mare et qui est suspendue par les bulles d'oxygène qu'elle émet au soleil. C'est un *Spirogyra*, bien reconnaissable à sa bande verte spiralée. J'ai beaucoup étudié ce genre et j'espère avoir encore de nombreuses occasions de compléter cette étude. Dans les cas habituels, les filaments qui sont simples sont de deux sortes, sans que souvent il soit possible de distinguer le mâle de la femelle; d'autres fois, les cellules du filament mâle sont plus courtes que celles de l'autre sexe. Tous les auteurs ont décrit la copulation d'une manière inexacte. Il faut tout d'abord que deux filaments de sexe contraire se soient accidentellement touchés; alors, au point de contact, les deux cellules poussent un prolongement par lequel elles se soudent, elles s'anastomosent. Ce premier contact établi, l'irritation sexuelle se transmet aux cellules voisines, et de nombreux ponts s'établissent (*fig. 44*). Un peu plus tard, on voit le contenu des deux cellules copulatrices se détacher de la membrane, puis, par un orifice que perce le gamète mâle, celui-ci se déverse insensiblement dans la cellule femelle adjacente. Finalement, la cellule mâle vidée est opposée à une cellule œuf, résultat de l'union de deux cellules vivantes. La zygote, comme on appelle

R. C. del.

Algues du Plankton d'un marécage alpin.

l'œuf fécondé, se contracte, s'entoure d'une coque solide et passe par un temps de repos.

Ce n'est pas là le seul mode de fécondation ; il arrive, chez certaines espèces, que les cellules successives d'un même filament s'excitent sexuellement ; alors, tantôt le contenu de la cellule mâle perce la paroi de séparation, tantôt l'anastomose se fait par des becs qui s'unissent en boucle des deux côtés de la cloison. Parfois aussi une même cellule femelle provoque la production de filaments mâles de plusieurs cellules qui convergent vers cet œuf sans cependant que la copulation se fasse entre plus de deux cellules.

Comment une cellule mâle mobile ou non peut-elle percevoir l'excitation sexuelle et se comporter en conséquence ? Cela est bien connu des cellules mobiles, des spermatozoïdes des fougères ; on sait que ces éléments fécondants sont attirés dans l'œuf par l'excitation provoquée par la sécrétion d'un acide végétal, le même qui donne aux pommes leur saveur. C'est l'acide malique. On peut, le sachant, attirer ces spermatozoïdes qui, dans l'eau, sous le microscope, se mouvaient dans tous les sens, sans orientation spéciale, en leur offrant, dans un petit tube capillaire de verre, l'acide malique qui les attire. On les voit alors immédiatement cesser leur mouvement désordonné, s'orienter et, comme une troupe au commandement, se diriger en bon ordre dans la direction du tube acidulé. Finalement tous entrent dans cette trappe comme si c'était un canal conduisant à la cellule femelle.

Voilà donc une découverte bien éloquente puisque, en substituant à la nature un appareil, on arrive à tromper les cellules mâles !

On a dès lors, et encore pour d'autres raisons, tout lieu de supposer que la cellule femelle, chez toutes les plantes, sécrète une substance qui, diffusant dans l'eau autour d'elle, avertit le gamète mâle, le guide et le détermine à s'approcher, puis à se fusionner. Chaque espèce, sans doute, sécrète autour de ses œufs des substances particulières, car il est bien rare que dans la nature les spermatozoïdes, ces cellules mobiles mâles d'espèces différentes, se trompent. La copulation même, en mélange complexe, se fait d'espèce à espèce avec une précision mathématique.

Voyez ce qui se passe dans l'eau d'un lac tourbeux, comme le

lac Champex extraordinairement riche en Desmidiées (*fig. 45*), merveilleuses petites algues unicellulaires. ARCHER, qui en a suivi attentivement la copulation, nous dit que la meilleure preuve de l'existence d'un grand nombre d'espèces dans ce groupe d'algues, c'est la régularité avec laquelle chaque forme s'unit avec une forme

Fig. 45. — Eau du lac tourbeux de Champex avec cellules de Desmidiées, vues de face et de profil, *Cosmarium* (1), *Sphaerocoma* (4) et divers *Stauroastrum*.

identique, non seulement semblable par le profil du contour, mais par tous les détails de la structure de l'enveloppe. N'est-ce pas l'un des sujets les plus merveilleux de la biologie que cet instinct qui permet (ordinairement, car il y a des exceptions) à chaque être de trouver son semblable, de le distinguer des espèces voisines et de maintenir ainsi la pureté de la race?

Retournons à nos petites mares alpines dont l'eau verte,

trouble, est d'une grande richesse en formes curieuses. La plupart de ces dernières, appartiennent aux Protococcacées, algues uni-

Fig. 46. — *Pediatrism duplex*, colonie en réseau de cellules.
Dess. de R. C.

cellulaires qui restent isolées ou se groupent en de bizarres associations (fig. 46, 47). Chez toutes, l'enveloppe résistante, un peu épaisse, est construite de manière à les protéger contre les microbes voraces ou les champignons destructeurs. Dans les eaux des étangs, où ce danger est réel, on les voit, comme pour éviter cette infection, préparer, au moment de leur naissance, leurs cellules filles, en les dotant déjà de toutes leurs particularités, de celles surtout qui sont nécessaires à leur maintien dans le monde liquide, plein d'ennemis, avant de les mettre en liberté. Au moment où elles quittent le ventre de leur mère, elles sont déjà armées pour la vie comme l'oisillon que la mère chasse du nid quand il peut voler de ses propres ailes (fig. 53). Dans ce monde spécial des Protococcacées suspendues, il n'y a plus de zoospores mi-

Fig. 47. — Colonie (cénobe) d'un *Pediatrism*. (16 cellulaire)
(*P. duplex*).
Dess. de R. C.

gratrices, plus de sexualité. La multiplication s'y fait exclusivement par division. Mais, en revanche, que de variété dans la forme, les appendices des cellules, leurs groupements, tous ces dispositifs paraissant calculés en vue de leur vie de poussière vivante, suspendue passivement dans les eaux !

Voici tout d'abord les formes arrondies qui se sont allégées par une auréole de mucus au travers de laquelle des piquants

Fig. 48. — *Chodatella longiseta*. Algue du plancton, dont les cellules produisent sur leur enveloppe des soies allongées qui augmentent la surface de frottement (diminution de la capacité de chute).
Dess. de R. C.

rayonnent en tous sens. En voici d'autres qui, en se multipliant, ont formé des arbuscules dont le centre est occupé par une gelée à peine plus lourde que l'eau et qui offre à la chute une grande résistance. D'autres fois la cellule s'allonge et, sur l'ellipse, se dessinent de longues arêtes (fig. 48) ; celles-ci se groupent en bandes planes ou spiralées, en disques qui fonctionnent comme radeaux ; parfois même ces radeaux sont comme perforés (fig. 47) ou bien les cellules, disposées en corbeilles ajourées, amènent à des dispositions savantes où la surface est augmentée d'une manière excessive par rapport à la masse (fig. 52). On le voit, ce sont d'ingé-

nieux architectes très au courant des questions d'équilibre et de suspension. Un exemple bien simple, que j'utilise dans mon cours devant les étudiants de première année, va illustrer cette théorie mieux que d'interminables raisonnements. Voici, je prends ce morceau de craie, je le jette en l'air, il retombe comme une pierre sur la table avec bruit. Je prends le même morceau, et dans un petit mortier de porcelaine je le réduis en poudre fine. Maintenant, je renverse le mortier, la poudre se répand dans l'air, mais ne retombe qu'avec lenteur. La surface a été multipliée par un facteur considérable, le frottement a infiniment augmenté; de là le ralentissement considérable dans la chute (*fig. 48, 30, etc.*).

Le ruisseau est devenu rivière, il court vers la plaine, remplit les cuvettes creusées par les anciens glaciers, y forme des lacs aux eaux tranquilles, traverse le barrage qui retient les eaux du lac de montagne suspendu au-dessus de la vallée et, en belles cascades, descend vers les dépressions qui s'alignent en lacs d'émeraude, ceux de Suisse et de

Savoie, espèces de mers en miniature dans le miroir tranquille desquelles se mirent en bleu profond les silhouettes des hautes cimes.

Tous les touristes ont pris à Montreux le bateau à vapeur qui, en une croisière charmante, les a conduits de Chillon au Bouveret et du Bouveret à Genève, la perle du Léman. Ils ont vu les eaux

Fig. 49. — *Dinobryon divergens*. Flagellée du lac de Genève; on voit les cellules à deux cils inégaux entourées chacune d'une coque cellulosique ou urne allongée; D, cellule qui s'est enkystée (stade de repos).
Dess. de R. C.

boueuses du Rhône, le fleuve-torrent du Valais descendu en cascade sous-lacustre dans l'eau bleue du lac. Les eaux froides, plus

Fig. 50. — *Asterionella gracillima*, étoiles formées par les cellules de la diatomacée. *Synedra longissima*, autre diatomacée en aiguille. Plankton du lac de Genève. Dess. de R. C.

lourdes, tombent, sans se mêler tout d'abord avec celles du grand réservoir limpide, dans lequel se clarifient les flots laiteux venus des glaciers. A Genève, ils ont admiré, au pont de la Machine, le Rhône aux eaux toujours transparentes, sa cascade bleue, de ce bleu qu'on ne s'attend à rencontrer qu'à l'intérieur du glacier dans une grotte de cristal. Au travers de l'eau pure du port, ils ont vu tout au fond briller les herbes aquatiques et jouer les poissons. Nulle eau n'est

plus pure, nul lac plus bleu, plus limpide, que celui de Genève.

On se demande de quoi peuvent donc vivre les poissons. Se mangent-ils mutuellement? Mais cela ne peut durer indéfiniment. Cette eau est si limpide que MM. FOL et SARASIN ont pu constater qu'à 200 mètres de profondeur la plaque photographique est encore impressionnée. Devant Yvoire, SCHNETZLER a reconnu une mousse qui, fixée sur un banc lacustre (60 m.), végète parfaitement. Et cependant cette eau pure est, pour qui sait l'étudier, un jardin plein de belles fleurs. Tout un peuple de petits organismes habite sa surface et ses profondeurs. Mais ils y sont si disséminés qu'au plus fort de leur développement l'eau n'en est pas visiblement troublée.

Ainsi, suivons dans leur biologie nos ruisseaux, nos torrents qui viennent se jeter dans le lac de Genève. On pourrait croire que la biologie végétale du Léman serait comme la résultante des vies partielles des affluents, y compris les lacs alpins, les

R. C. del.

Algues du Plancton du lac de Genève.

tourbières ou les mares. Mais un lac comme celui-ci diffère essentiellement des lacs alpins de faible profondeur, chez lesquels, au cours de l'été, la chaleur de la surface pénètre jusqu'au fond. La végétation des bords, le caractère marécageux d'une grande partie du bassin lacustre, la tourbe qui colore l'eau, tout contribue à faire de l'eau des petits lacs un bouillon nutritif avantageux pour certaines catégories de micro-organismes. Aussi la flore des petits lacs, des lacs-étangs est-elle beaucoup plus variée en espèces et plus abondante comme quantité que celle de l'eau pure des grands lacs. Chez ceux-ci, l'eau de la profondeur se maintenant à une température constante (au lac de Genève à 4° environ), la variation thermique des couches superficielles y est beaucoup moins considérable. On retrouve ici, comme sur la neige, que des conditions défavorables à une vie intense des organismes végétaux microscopiques ont régularisé en quelque sorte la biologie lacustre. Il n'y a plus qu'un nombre restreint d'espèces qui fréquentent ces eaux pures, et ce sont en grande partie des espèces spéciales qui sont ou rares autre part, ou représentées par d'autres formes. La majorité de ces organismes appartient au groupe des Diatomées, algues de couleur jaune ou brune, dont chaque cellule est comme enveloppée par une carapace siliceuse faite au moins de deux moitiés ou souvent de pièces siliceuses savamment ajustées et transparentes comme le cristal de roche. On retrouve chez ces Diatomacées (*planche VIII*^{3, 4, 10, 14}) les mêmes arrangements qui, chez les algues vertes des marécages, assurent la suspension : les Cyclotelles (*planche VIII*³), aux cellules en boîtes arrondies réunies les unes aux autres par des bandes gélifiées ; (parfois, ces bandes gélifiées se tordent en spirales, ce qui leur donne plus de rigidité et augmente leur pouvoir de suspension) ; chez les *Cymatopleura*, la cellule s'est largement aplatie en disque ; dans le *Synedra longissima* (*planche VIII*¹⁰ et *fig. 50*), la cellule est deve-

Fig. 51. — *Fragilaria crotonensis*, diatomacée dont les cellules (individus) sont disposées en peigne. Dess. de R. C.

nue une longue aiguille ; celles du *Fragilaria crotonensis* (planche VIII^{4,14} et fig. 51) se sont disposées en peignes, en bandes allongées, parfois tordues en spirales ; dans l'*Asterionella* (fig. 50), les cellules se disposent en gracieuses étoiles.

Fig. 52 — *Coelastrum Chodati*.
Colonie de cellules en boule, munie de processus allongés.
D'après le D^r Ducellier.

Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes ces élégantes architectures, qui semblent comme inventées à plaisir pour satisfaire notre besoin « d'explication finaliste », n'acquièrent toute leur valeur que dans les eaux qui semblent nécessiter par leurs propriétés une mise au point perfectionnée de ces mécanismes. Ainsi, dans les eaux plus froides, c'est-à-dire qui ont un poids spécifique plus élevé qui résistent, par conséquent, mieux à la pression des corps qui chutent et dont la viscosité est proportionnellement encore plus grande que l'augmentation de leur densité. C'est, en effet, un fait bien connu que la cohésion de l'eau, c'est-à-dire sa viscosité, diminue plus rapidement avec l'élévation de température que la densité. Ceci rend les particules de l'eau plus mobiles, plus aisément déplaçables, ce qui aurait pour effet une chute accélérée des organismes suspendus, si ceux-ci ne savaient régler leur surface de sustentation en conséquence (fig. 52).

J'ai fait faire par une de mes élèves, M^{lle} Rayss, à partir d'une des algues les plus plastiques des eaux pures, le

Coelastrum proboscideum, une recherche étendue et méthodique pour donner à ce problème une base expérimentale. Les résultats étaient conformes à la prévision. Toute cause qui amène à une plus grande

viscosité de l'eau ou à augmenter son poids spécifique a pour effet de diminuer la surface active de suspension et vice versa.

L'organisme répond d'une manière adéquate aux changements du milieu. Nous ne sommes plus, à propos d'une étude de ce genre, dans la rêverie biologique qui cherche des intentions à la nature, mais on y fait usage d'une science saine, celle qui établit la relation de cause à effet. Mais reconnaissons que l'effet obtenu semble être celui qui pouvait être le plus utile à l'espèce, en cette occurrence.

Tous ces organismes sont dispersés dans l'eau claire de telle manière que si on examinait au microscope l'eau même du lac,

Fig. 53. — *Chodatella echidna*. Reproduction de la cellule (armée de piquants) par 4 cellules spores qui déjà dans la cellule mère acquièrent la forme et les processus de l'adulte. Espèce de viviparie. Dess. de R. C.

comme nous avons examiné la neige rouge ou l'eau de la mare aux *Chlamydomonas*, nous n'aurions aucune chance de rencontrer un seul organisme dans la goutte d'eau mise sous la lentille du microscope. Pour étudier ces organismes, on traîne lentement un filet de soie à mailles très fines pendant plus d'un quart d'heure. On filtre ainsi à travers la soie des centaines de litres d'eau : les organismes retenus sur le filtre se concentrent et peuvent être dès lors étudiés sans peine. On remarque alors que beaucoup sont accompagnés d'auréoles gélifiées, espèces de parachutes très légers. Tout ce petit monde végétal vit près de la surface du lac ; à mesure qu'on descend, la flore s'appauvrit ; il faut aux végétaux de la lumière et celle-ci est rapidement absorbée par l'élément liquide. A vingt mètres, il n'y a presque plus de vie végétale, et

dans les grands fonds toute plante verte à chlorophylle a disparu.

Le temps est particulièrement calme aujourd'hui, je vais louer une barque légère et, pendant que le batelier rame doucement, je laisse traîner mon filet très près de la surface de l'eau. On sent à la tension modérée de la corde que tout va bien et que l'eau ne rejaille pas hors du filet. Un jour que je faisais de même au lac de Paladru, le batelier qui m'accompagnait et qui m'avait observé pendant un instant, timidement, mais d'un ton qui, pour être déférent laissait cependant percer l'ironie me dit : « L'an dernier, il y en a qui sont venus de Lyon avec des appareils pour prendre du poisson, mais ils n'en ont guère pris et c'étaient pourtant des appareils de pêche ; je crains bien qu'avec votre petit filet vous n'en attrapiez pas du tout. » Je lui montrais alors qu'il ne s'agissait pas de poissons mais de nourriture du poisson, de cette poussière vivante qui, dans les eaux des lacs et de la mer, travaille sans relâche à fixer du carbone organique, à assimiler ce qui est mort, ce qui est inerte, pour lui conférer cette puissance de vie que seuls les végétaux savent multiplier aux dépens du monde inanimé. J'essayai de lui faire comprendre que ces Diatomées prenant leur énergie au soleil, constituent les prairies sous-lacustres auxquelles viennent brouter de minuscules animaux, Crustacés Rotifères, etc., qui, à leur tour, servent de nourriture aux poissons. Et pour pouvoir remplir leur rôle, il faut qu'elles restent près de la surface, là où la lumière est encore active ; et pour se maintenir à un niveau convenable elles ont comme inventé ces dispositifs, les ceintures de sauvetage sans lesquelles elles seraient fatalement entraînées vers le royaume des ombres, où il n'y a, pour les fils de la lumière, pour des plantes à chlorophylle, qu'un tombeau sans réveil.

L'homme me regardait tout ahuri. « Sauf votre respect, me dit-il, je crains bien cependant qu'avec cet engin vous ne preniez pas du poisson. »

— Grand merci pour votre judicieux conseil, mais nous n'allons, en effet, pas prendre du poisson, ce que nous récoltons, c'est la nourriture du poisson, du tout petit poisson. La pâture même du plus petit que le plus petit poisson.

Voyez maintenant, après l'avoir traîné dans l'eau qui est filtrée à travers les mailles, je retire mon filet; j'ai fait par ce temps calme une pêche miraculeuse. Si je lave mon filet, à l'intérieur, avec la dernière cuillerée d'eau qui reste au fond, celle que je fais découler dans un flacon préparé à l'avance est toute troublée, jaune, dorée par les millions de minuscules organismes que le filtre

Fig. 54. — *Botryococcus Braunii*, algue qui se maintient à la surface de l'eau des lacs, grâce à son pouvoir de produire de l'huile qui fonctionne comme flotteur. A, vue de l'ensemble de la colonie, grossi 100 fois; B, portion de celle-ci montrant les gros globules d'huile excrétés (flotteurs); C, D, E, F, divers aspects du détail des colonies et des cellules. Dess. de R. C.

a retenus dans ses mailles si serrées. Nous avons, au moyen de ce filet, filtré des centaines, des milliers de litres d'eau, et maintenant que nous avons rassemblé ces plantes éparpillées dans l'eau claire, ce fond de filet est comme un bouillon en fermentation, habité par une infinité de petites algues et d'infusoires.

Il serait temps maintenant de nous rapprocher du bord et d'étudier au microscope, pendant qu'ils sont encore vivants, ces organismes du plancton¹. Il s'agit de ne pas tarder, car la plupart

¹ On appelle plancton le monde microscopique des eaux.

sont excessivement fragiles, excessivement sensibles. Hors de leur milieu naturel, ils meurent rapidement, sans qu'on ait pu savoir jusqu'à présent pourquoi.

Cette fois-ci nous avons pêché tout près de la surface et, dans le flacon qui contient l'eau troublée par les organismes, on voit déjà à l'œil nu nager des corpuscules verts qui ne sont pas comme les autres, entraînés au fond en une masse plus ou moins gélatineuse. C'est le *Botryococcus Braunii* dont j'ai élucidé en 1896 la singulière biologie (*planche VIII¹⁵ et fig. 54*). Les cellules en cône

Fig. 55. — Deux algues pélagiques du lac de Genève. A gauche, l'*Anabaena circinalis*, espèce de Nostocacée, à droite, l'*Oscillatoria rubescens*; les deux contiennent dans leurs cellules des vacuoles remplies d'un gaz qui les allège.

Dess. de R. C.

assez obtus sont groupées en gâteaux irrégulièrement bosselés, comme fichées dans une pâte gélatineuse; tout autour des gâteaux, eux-mêmes irrégulièrement disposés autour d'un centre organique, il y a une vésicule gélatineuse peu consistante. C'est à l'intérieur de cette vésicule et tout autour des cellules que le *Botryococcus* sécrète une huile abondante, qui lui sert de flotteur; ceci fait que, invariablement, l'algue qui serait assez lourde par elle-même et dont les gâteaux at-

teignent parfois jusqu'à 1-2 mm. de diamètre, submergée par le mouvement de l'eau, revient subitement à la surface comme une bouée insubmersible. Je ne connais d'ailleurs que cette seule espèce qui fasse ainsi. C'est une algue très répandue et très variable. En hiver, par les belles journées ensoleillées, elle colore son huile en rouge, comme le fait sur la neige le *Chlamydomonas nivalis*. Mais ici, l'huile excessivement abondante n'est pas une réserve, elle est une sécrétion extracellulaire qui allège la plante et que la moindre pression, sous le microscope, fait déborder en grosses gouttes confluentes.

Quel est maintenant cet organisme dont les cellules en boudin sont attachées les unes aux autres comme les articles d'un saucis-

son. Il est beaucoup plus petit que le *Bolryococcus* et d'une couleur vert-de-gris bien singulière. A un fort grossissement, je vois ses cellules farcies de globules rouges (fig. 55). Avec la même persistance, avec la même insistance il revient à la surface comme allégé par un flotteur. Mais j'ai beau chercher, je n'y peux

trouver, comme dans l'autre espèce, de vésicule huileuse. Il faut songer à autre chose. Alors je me rappelle que l'*Anabaena* appartient à ce groupe des algues bleues dont plusieurs forment, dans les étangs, les lacs et les mers, des fleurs d'eau étendues. Au lac de Morat, l'une de ses congénères couvre parfois en hiver toute la surface; il arrive souvent, après des périodes de calme pendant lesquelles l'algue a pu librement se multiplier, s'accumuler à la surface, que le vent du nord ramène vers le rivage ces algues flottantes. Alors, comme

Fig. 56 — Section à travers la coquille d'une Anodonte, perforée par les filaments du *Foretiella perforans*; C, vue de l'apparence de l'algue à la surface.
Dess. de R. C.

leur couleur verte est masquée par un pigment rouge, l'écume du flot qui déferle sur la plage sablonneuse semble souillée d'un sang en décomposition. C'est ici qu'en 1476 les Suisses défirent les Bourguignons et Charles le Téméraire. La superstition populaire y voit le retour périodique du sang des Bourguignons. On retrouve cette Oscillaire dans plusieurs lacs suisses. A Zurich, elle se tient régulièrement à 13 mètres de profondeur;

dans le lac de Genève, elle est excessivement rare. Je l'ai aussi rencontrée en grande abondance au lac de Varèse, dans la Haute-Italie. La couleur qui a valu son nom à la mer Rouge est due à l'abondance d'un organisme analogue. Chez tous, le flotteur est interne. Il s'agit d'un gaz dans lequel j'ai cru reconnaître de la méthylamine, gaz qui serait sécrété directement dans le plasma vivant et qui, ne pouvant se dissoudre dans la cellule, donnerait naissance à ces curieux globules rouges qui se font remarquer chez toutes les espèces flottantes de ce groupe si riche en espèces curieuses.

On rencontre dans ce groupe des cellules arrondies, des cellules disposées en chaînettes, des cellules comme chez les *Oscillatoria*, arrangées en longs bâtons oscillants, des filaments terminés par un long poil, etc.

Dans un grand lac à eau pure, elles ne jouent qu'un rôle subordonné comme élément de la flore pélagique (plancton), mais sur les bords elles reprennent leur importance. Les unes, ainsi au Roc de Cher au lac d'Annecy, et en plusieurs endroits de la rive vaudoise du Léman, contribuent à déposer des tufs sous-lacustres comme elles le font dans beaucoup de thermes. Sur le rivage de nos lacs jurassiques, certaines d'entre elles, qui sont très minces, pénètrent dans les pierres calcaires, dans la pierre des galets de la beine. Peu à peu elles carient le caillou, comme les bactéries carient nos dents si nous n'y mettons bon ordre. Comme la pierre est d'une structure hétérogène, leur action s'exerce irrégulièrement ; de là ces dessins méandriques qu'on observe sur les galets sculptés des lacs de Genève, mais surtout de Bienne et de Neuchâtel. Tous les goûts sont dans la nature, les *Anabaena* préfèrent se laisser balancer au gré du flot, les *Schizothrix*, leurs voisins, ont le pouvoir de s'enfoncer dans les pierres. Il y aurait à décrire la manière curieuse dont elles usent pour déliter le caillou, comment en sécrétant, autour de leurs filaments ténus, des gaines qui gonflent plus tard, elles ébranlent la structure compacte de la pierre, comment finalement elles dissolvent le calcaire. Mais ceci nécessiterait des développements qui ne sont pas de mise ici.

Il convient cependant de raconter ici l'histoire étonnante d'une algue que j'eus l'occasion de découvrir au lac de Genève, en 1897.

Fig. 57. — Section à travers la coquille d'une Anodonte, passant par le côté interne. On voit l'algue qui a traversé la couche nacrée, venir pousser ses filaments suçoirs du côté du manteau et y provoquer la formation de petites perles
Dess. de R. C.

C'était par une froide journée d'hiver, le hasard de la promenade m'avait amené sur le rivage de la Pointe à la Bise, à la Belotte, près de Genève. Pendant que j'examinais les cailloux du rivage couverts d'algues, ma petite fille pour passer le temps ramassait des coquillages et en particulier des valves d'anodontes, dont la face intérieure nacrée charmait, par ses couleurs irisées, son imagination enfantine. Encore pour passer le temps, son père s'absorbant dans ses observations, ne sachant plus que voir, elle imagina de regarder le soleil au travers de ces lunettes translucides, lorsque tout à coup elle m'appelle : « Papa, il y a une tache noire dans cette coquille ». On voyait nettement quelque chose qui empêchait le passage de la lumière au travers de la masse autre part opalescente. Il ne pouvait s'agir que d'un organisme étranger à la coquille, et ceci fut confirmé par la couleur verte de la tranche de la valve brisée. Il ne faut jamais laisser passer la chance. Je me mis immédiatement à la chasse, cherchant dans l'eau les anodontes vivantes, qui se placent perpendiculairement dans la vase, en laissant sortir une partie de leur valve. Dans ces occasions, le biologiste n'hésite jamais ; il entre résolument

dans l'eau pour y recueillir les précieux objets, observer « in situ » la manière dont se comportent l'hôte et le parasite. Trempé jusqu'aux os, — une fois n'est pas coutume, — je renonce au tram pour me réchauffer, et je rentre au plus vite pour étudier ma précieuse trouvaille.

L'aventure en valait la peine ; il s'agissait d'une plante tout à fait exceptionnelle : une plante verte qui eût pu si elle l'eût voulu (!) vivre honnêtement dans l'eau ou se borner à ronger des pierres. Mais l'occasion, l'herbe tendre... j'allais oublier que la coquille d'une anodonte n'est pas justement un mets délicat. Il fallait, pour qu'il en valût la peine, arriver au contact du manteau de l'animal, là où il y avait quelque avantage nutritif et, pour ce faire, notre algue verte se met à percer la valve du Lamellibranche comme au moyen d'une tarière (*fig. 56*), ne s'inquiétant ni de la direction des

couches, ni de leur dureté relative, traversant cette matière solide de la couche cornée et de la couche prismatique comme si c'était du beurre, puis s'étalant contre la surface du manteau en un réseau qui ressemble à un système d'absorption. Il est difficile de dire ce que cette plante retire de cette vie en commun avec le Lamellibranche vivant, mais il est bien évident que ce n'est pas pour satisfaire à une pure gloriole d'algue verte en veine d'excentricité qu'elle se met à percer les valves des anodontes et à pousser des suçoirs vers le manteau (*fig. 57*), vers les muscles qui commandent au mécanisme de cette coquille.

Depuis lors, les anodontes sont devenues rares ; j'ai sou-

Fig. 58. — Bord méridional des cent chutes de l'Yguazu. Stations de prédilection des Podostémoneacées. D'après Chodat et Vischer.

vent songé à reprendre cette étude, à suivre pas à pas et à loisir l'infection de l'animal par la plante, la réaction progressive de l'anodonte qui produit, en réponse à cette excitation, des espèces de perles. Comment le *Foreliella*¹ — c'est le nom que j'ai imposé à cette algue perforante — se dissémine-t-il. Peut-il vivre sans son hôte? dans quelle mesure l'Anodonte en est-elle affectée? Ce sont là des problèmes qui attendent leur solution. Comme le dit un proverbe populaire de

Fig. 59. — *Apinagia yguaçuensis* Apparence des pousses algoides. Réduction d'un sixième.
Phot. d'après Chodat et Vischer.

chez nous, qu'un artiste de mes amis grava un jour sur le fond d'une boîte, en souvenir d'une soirée charmante: « Il n'y a rien de si patient que le travail qui attend qu'on le fasse ».

Combien de problèmes qui attendent depuis longtemps leur solution. Il faudrait avoir des loisirs, et les professeurs ne les connaissent que d'ouï-dire. Ils comptent sur leurs élèves, mais la plupart des élèves d'aujourd'hui sont des forts en thème qui fréquentent assidûment les cours et les laboratoires et ne voient la nature que par les lunettes de leurs livres où l'interprétation de leur magister. Ils disent que nous avons de la mémoire, mais la vraie mémoire, c'est le souvenir des choses vues, des expériences faites, des longues heures passées à épier un phénomène, en un mot c'est le travail personnel, face à face avec un problème difficile. Mais, disent-ils, si les professeurs étaient persuadés de cela, s'ils étaient conséquents, ils n'écriraient pas des livres!

¹ En l'honneur de F. A. FOREL, le fondateur de la Biologie lacustre.

BIBLIOGRAPHIE

- CHODAT, R. — Algues vertes de la Suisse. Berne (1902).
- Etudes de Biologie lacustre. *Bull. de l'Herbier Boissier* (1897, 1898).
- Sur la structure et la biologie de deux algues pélagiques. *Journal de Botanique*, Paris (1896).
- SAUVAGEAU, C. — Sur la présence de l'*Hydrurus foetidus* à Lyon. *Journ. de Bot.* (1895).
- FOREL, F. A. — Le Léman, Monographie limnologique, III (1901), Lausanne.
- BACHMANN. — Das Phytoplankton des Süßwassers. Luzern (1911).
- LE ROUX. — Recherches biologiques sur le lac d'Annecy. *Ann. Biol. lacustre*. Bruxelles (1907).
- WESENBURG-LUND, C. — Studier over de danske søers plankton. Kjöbenhavn (1904).

R. C. del.

Podostémonacées des chutes de l'Yguaçu et de l'Alto-Parana.

Cascades et Podostémonacées.

(PLANCHE IX.)

IL est pour le moins singulier que seuls les rapides, les cascades des tropiques aient réussi à développer une flore particulière. Les belles chutes du Niagara, celles du Rhin ne montrent sur leurs rochers battus par le courant que des algues, incrustées dans la pierre, ou des mousses.

Cependant, en cherchant un peu, il ne serait pas difficile de trouver aussi chez nous, dans les torrents, même jusqu'à leur origine, des espèces spéciales. N'avons-nous pas parlé plus haut de cette Flagellée dorée qui se développe et se maintient dans l'eau agitée des torrents de montagne (*planche V*).

Sur un revêtement visqueux, fortement adhérent à la pierre, elle pousse des espèces de filaments qui par leur consistance muqueuse n'offrent à l'action déchirante du remous de l'eau qu'un minimum de résistance. Chose singulière, elle est la seule de son groupe qui soit arrivée à former de semblables chevelures. Car tous ses congénères sont des végétaux unicellulaires, rarement associés en petites boules ou en espèces de fascicules. Celle-ci, par un mode singulier de croissance, après sa division, qui se fait, comme chez toutes les Flagellées, par un plan longitudinal de segmentation, fait glisser l'une des deux cellules en arrière, tandis que la première, qui conserve le pouvoir de se diviser activement, se segmente de nouveau et ainsi de suite (*fig. 40, B*). On pourrait presque dire que les cellules s'ajustent successivement comme si elles grimpaient les unes sur les autres. Chez d'autres, chaque cellule irait errer au loin, dans l'eau ; ici, dans l'eau courante, il se forme autour de chacune un fourreau de mucus qui, se confondant avec les précédents, retient ces unicellulaires en un filament, lequel peut atteindre plus de 10 cm. de longueur (*fig. 40*).

Plus bas, dans le ruisseau aux eaux rapides, les mousses *Fontinalis* semblent courir avec l'eau qui entraîne leurs longues

Fig 60. — *Podostemon Warmingii*, 1, 2, 5, fleur, on voit en 2 et 5 la fleur nue qui a rompu la spathe, espèce de coiffe dans laquelle elle était enfermée alors que la plante était submergée; il y a deux étamines portées sur un filet commun bifurqué, et un pistil à deux stigmates; 3, base d'une feuille avec sa stipule, on voit la feuille avec son limbe divisé en deux à la base de la fleur, et à l'opposé une jeune feuille. — *Apinagia yguaquensis*, 4, base de la plante avec son disque d'adhésion, le stipe de son thalle; en 6, 7, les lames qui ressemblent à des algues.
D'après Chodat et Vischer.

tiges flexibles (*fig. 59*). Ce sont aussi les plus robustes de nos mousses.

Cependant, aucune plante à fleur, phanérogame, ne se rencontre dans nos eaux fortement agitées. C'est à peine si, dans les rivières à courant marqué, les *Potamogeton* et les *Zanichellia*, comme la mousse citée plus haut, en longues chevelures, indiquent la direction du courant. Mais dans la nature tropicale qui est si

riche, il y a une famille de plantes à genres nombreux et à espèces excessivement variées qui s'est fait une spécialité de ces localités. Découvertes pour la première fois dans les rapides de la Guyane française, les Podostémonacées ont dès lors (1775) été retrouvées dans les principales rivières et fleuves de l'Amérique tropicale et subtropicale. La station la plus méridionale est celle du Salto-Grande de l'Uruguay; la plus septentrionale est aux Etats-Unis (Mass.).

En Afrique, on les connaît surtout du Cameroun; aux Indes, M. WILLIS les a étudiées à Ceylan, dans les Nilghiries et jusque dans le Khasia (fig. 63).

Si je décrivais tout de suite leur apparence, le lecteur pourrait douter de leur réelle situation systématique. Il les prendrait pour des Lichens d'eau, des Hépatiques ou des Mousses aquatiques, ou même pour des Algues marines qui auraient remonté les fleuves, changeant le régime salé pour celui de l'eau douce, comme le font certains poissons migrateurs. Et cependant ces plantes qui, dans leurs appareils végétatifs, ne rappellent en rien les Phanérogames, ont des fleurs, des étamines et des pistils comme tant d'autres (fig. 60²), comme ces plantes aquatiques submergées qui se haussent au-dessus du niveau de l'eau pour les ouvrir au soleil, pour exposer leur pollen au vent, ou attirer les insectes fécondateurs (fig. 61). Mais, comme on va le voir tout à l'heure, elles ne sauraient atteindre ce niveau; ce dernier est d'ailleurs indécis dans le bouillonnement de l'eau qui se précipite sur la pente rocheuse et qui rejaillit en blanche écume. Pour fleurir, il leur faut attendre la baisse des eaux; elles poussent seulement alors une tige florifère qui porte les organes sexuels. Mais, à ce moment, la Podostémonacée est en danger de mort; rien ne la protège maintenant contre la dessiccation. Mise à sec, elle racornit ses tissus et meurt. Elle ne sait pas, comme les Algues des rochers maritimes, supporter périodiquement le flux et le reflux, ou, comme certaines

Fig. 61. — *Podostemon aguiensis*, jeune fruit (capsule), munie à sa base de la coiffe qui enveloppait la fleur quand elle était submergée.

Mousses aquatiques, résister à la dessiccation et reprendre vie comme les Fougères dont nous avons parlé. La baisse des eaux, une, deux journées au soleil, à l'air, et, de toute cette végétation aquatique des cascades, il ne reste plus que des croûtes desséchées et mortes.

Mais ici nous voyons de nouveau l'admirable prévision de la nature ou, si vous aimez mieux, la remarquable adaptation aux circonstances si spéciales dans lesquelles vivent ces plantes. Au moment où se fait la baisse des eaux, c'est-à-dire aux périodes habituelles de cette baisse, par exemple à Ceylan vers la fin de l'année ou au commencement de janvier, les fleurs sont déjà toutes prêtes; cachées dans une poche de la plante, dans une espèce d'alvéole, elles sont enveloppées par une coiffe (*fig. 60^{2 et 5}*) à l'intérieur de laquelle elles préparent leurs organes et qui les empêche d'être mouillées. Lorsque l'eau baisse, elles sont soulevées par un pédicelle qui les pousse hors de la spathe, cette poche protectrice; leurs étamines déjà prêtes abandonnent au vent leur pollen léger; le pistil a déjà étalé ses stigmates et la fécondation se fait avec rapidité (*planche IX, fig. 1a*).

Peu de jours après, le fruit est mûr, il est désarticulé et tombe sur le rocher desséché. Ceci a lieu en février et lorsque, en mars, avec la mousson du S.-W., l'eau s'élève de nouveau, la germination se fait rapidement et le cycle recommence.

En Amérique où j'ai pu observer la floraison et la fructification des Podostémonacées, elles sont tout aussi rapides; mais, à l'Yguazu, au Salto-Grande de Victoria, la fructification se fait déjà que l'eau rejaillit encore assez pour humecter les petites plantes, qui n'atteignent ici que quelques centimètres de hauteur. Chez beaucoup d'espèces, la germination se fait si rapidement que l'on trouve souvent les plantules fixées sur le pédicelle. Mais ce qui étonne le botaniste curieux, c'est que le fruit est à peine plus gros que le pistil, et cependant l'embryon remplit toute la semence. Comment cela est-il possible? Or voici qu'on a découvert que ces Podostémonacées préparent d'avance, pour y recevoir l'embryon, une cavité (*fig. 62*) qui est déjà suffisante lors de la fécondation et dans laquelle l'œuf fécondé n'a qu'à se développer sans effort. Cet arrangement unique dans le règne végétal et le

Fig. 62. — *Podostemon Warmingii*, 1, ovule (jeune semence non fécondée); on y voit à l'extérieur le futur tégument de la semence, puis l'amande (nucelle) qui porte à son sommet le sac embryonnaire où se trouve l'œuf qui doit être fécondé et au-dessous, une cavité (en formation) destinée à recevoir le futur embryon. On voit dans cette cavité les débris des cellules dont la disparition amène à la formation de cette cavité.

fait que l'enveloppe de la semence est déjà toute prête avant la fécondation, simplifient, accélèrent la constitution du fruit. Nous avons vu d'autres plantes aquatiques fleurir à l'air, mais pour mûrir leurs fruits elles les retirent dans l'eau, sous l'eau. Ces semences-ci gardent dans leur cavité l'eau nécessaire au développement de l'embryon, puis, après quelques jours, que dis-je? quelques heures de maturation, elles sont susceptibles de germer.

Sans doute si, dans la période intermédiaire qui va de la germination, avec la crue des eaux, jusqu'à la décrue, pour une raison de sécheresse exceptionnelle, une partie de la rivière est

mise à sec, les Podostémonacées de cette région meurent. Elles n'ont donc pas tout prévu, même les accidents. Mais il en reste toujours quelques-unes dans les anfractuosités, qui peuvent échapper au désastre et continuer le cycle dès que l'eau remonte à son niveau. La biologie de ces plantes pendant la période végétative n'est pas toujours aisée à débrouiller. Peu de personnes les ont observées en place. Pour cela il faut entrer dans la cascade, et

Fig. 63. — Divers aspects des Podostémonacées du Sud de l'Asie. — 1, *Willisia selaginoides*; 2, *Farmeria metzgerioides*; 3, *Hydrobryum lichenoides*; 4, 5, *Griffithella Hookeriana*.
D'après Willis.

parfois la force de l'eau est si violente que le danger d'être emporté est grand.

Aux chutes de l'Yguazu, les plus grandes du monde, qui, sur plus de 4 km. de développement, tombent de 70 m. de hauteur (fig. 58, 64, 72, 74) (Niagara 1 km. et 47 m.), nous n'avons pu les étudier que dans l'une des cent chutes latérales et en y mettant des précautions. J'aimerais, et il en vaudrait la peine, explorer à nouveau cet immense cirque d'eaux mugissantes. Lorsqu'on est au pied de ce monde de cascades et que, levant les yeux, on voit, à 80 m. au-dessus, la ligne des eaux qui fait le tour de l'horizon, on est presque terrifié devant ce spectacle grandiose d'un océan qui se déverse dans le gouffre. Les eaux du déluge s'écoulant subitement dans les entrailles de la terre, par une faveur divine, dans

un paysage d'une impressionnante beauté, au milieu de la végétation exubérante des tropiques ; les frondes des grandes fougères, les fûts des bambous, les stipes élancés des palmiers, et mille espèces d'arbres, aux couronnes penchées sur l'abîme garni de mousses, de begonias roses, d'orchidées aux fleurs d'or, de brillantes broméliacées et de lianes fleuries, aux trompettes lilacines, tout cela ajouté au fracas étourdissant, assourdissant, qu'on entend même de très loin, fait une impression énorme, émotionne au delà de toute expression.

Mais la science n'abandonne jamais ses droits ; les merveilles de la biologie, pour ne pas être saisies en un même moment, n'en sont pas moins aussi, que dis-je, beaucoup plus étonnantes, plus harmonieuses, infiniment plus grandioses que tout ce fracas qui fait impression sur nos sens, sur ce qu'il y a de plus primitif en nous, et qui ne saurait être comparé avec la jouissance artistique que procure la compréhension d'un ensemble de phénomènes biologiques, mystérieusement enchaînés.

On ne trouve les Podostémonacées que sur des rochers auxquels elles se cramponnent ; la violence du courant écarte tout autre compétiteur. Maîtres de la place, elles semblent le plus souvent s'isoler par espèces, chacune préférant sa station, l'une au milieu de l'écume, l'autre sous une corniche, la troisième dans le courant encore limpide au bord supérieur de la chute. Selon ces stations, elles sont plus ou moins adhérentes à la pierre. En Asie, dans les

Fig. 64 — Vue d'une partie des cent chutes de l'Yguazu, côté de l'Argentine.
D'après Chodat et Vischer.

Fig. 65. — *Apinagia yguaçuensis*. La plante fixée par un crampon, se développe en lames algaïdes qui portent sur leur bord extrême des filaments (branchies).
Gross. $1\frac{1}{2}$ fois.

D'après Chodat et Vischer.

eaux très agitées, les Podostémonacées du genre *Lawia* s'étalent sur la pierre, s'y cramponnent au moyen d'un ciment (fig. 63²) et constituant des croûtes semblables à des lichens de rochers, font presque corps avec la pierre. Sur les rebords de ces disques

a

b

Fig. 66. — *Podostemon atrichus*. Pousses disposées sur des lanières appliquées au rocher a, dans la cascade; b, dans l'eau courante mais plus tranquille.

festonnés il y a des bouquets de petites feuilles, des sortes de branchies. Dans les *Hydrobryum*, ce sont encore des disques frangés au bord, ou de curieuses ventouses desquelles s'élèvent des stipes terminés par un panache de filaments minces. Ces croûtes sont remplacées chez d'autres par des lanières qui rampent contre le rocher comme des vers plats et qui, se ramifiant souvent à angle droit, traçent sur la pierre de curieux dessins géométriques (fig. 66). On compare ces lanières aux racines de certaines Orchidées épiphytes, c'est-à-dire arboricoles, qui, elles aussi, s'appliquent contre la surface des écorces, se moulant aux aspérités; les ramifications se font à la partie inférieure, très près de la marge, comme pour assurer à ces appendices une protection contre la déchirure (planche IX¹ et fig. 70); d'autres ramifications, qui portent des espèces de feuilles, divisées comme celles des renoncules d'eau, naissent de la même manière, mais avant de quitter les lanières, adhérentes à la pierre par le milieu de leur face ventrale, elles poussent des crampons spéciaux qui, à la façon de griffes ou de ventouses, viennent s'accrocher à leur tour au rocher. Parfois leurs organes basilaires fonctionnent à la façon de vrilles et enroulent de leurs spires les cailloux de la cascade ou les éléments dissociés des conglomérats (planche IX³ et fig. 69, 71).

Fig. 67. — Rameau d'une Mimosa du Paraguay hors duquel sortent les fleurs d'un parasite de la famille des Rafflesiacées (*Pilostyles* sp.), dont la tige informe se répand dans les tissus de l'hôte, à la façon d'un champignon. Dess. de R.C.

D'autres, enfin, se fixent par un crampon-disque et s'évasent en forme d'entonnoir, comme le font certains champignons en trompette (*Griffithella*) (fig. 63⁴). Chez les *Apinagia yguazuensis* nous avons décrit une forme analogue, mais qui s'étale en éventail (fig. 59, 65). C'est sur ces appareils foliacés que se détachent des bouquets de filaments qu'on appelle branchies (planche IX²).

Ces dernières formes sont flexibles et habitent les eaux moins

Fig. 68. — Renoncule aquatique (*Ranunculus aquatilis*) à deux sortes de feuilles, dont la morphologie est provoquée par le changement de milieu, feuilles nageantes 3-5 lobées, feuilles submerses finement ramifiées, comme des feuilles de certaines Podostémonacées.
Dess. de R. C.

rapides. Ainsi, chez des plantes de cette famille, les notions de racine, tige, feuilles, sont ou confondues ou remplacées par de nouvelles notions qui font abstraction des catégories habituelles. C'est ce qui est aussi évident dans les plantes parasites, celles qui s'enfoncent dans le tissu de leurs hôtes comme ces curieux végétaux dont on ne voit que les fleurs poindre hors de la plante hospitalière (fig. 67). Là aussi, dans les tissus de l'hôte, le parasite est une masse informe, il y est constitué par des filaments, des cordons, dans lesquels on ne peut distinguer ce qui appartiendrait à une racine, une tige, des feuilles. Mais qu'il se fortifie en empruntant sa nourriture à l'hôte, et alors on verra, perçant l'écorce, un bourgeon floral, qui tout à coup se souvient de sa dignité de plante supérieure et qui porte de vraies feuilles, une corolle, des étamines et des carpelles comme les autres plantes supérieures. Chez ces parasites, il y a véritablement dégradation, et cette dernière impose au thalle la forme des champignons qui poussent dans le bois et y développent les cordons nommés rhizomorphes.

Ici, je ne sais s'il faut parler de dégradation, car la plante reste une plante verte qui assimile l'acide carbonique dissous dans l'eau et qui, par conséquent, n'a rien d'un parasite. Si, dans sa forme, elle simule, l'une un lichen crustacé ou foliacé, l'autre

une hépatique aquatique, l'autre l'apparence des algues marines ou même des mousses aquatiques, toutes ces structures sont cependant au service du travail indépendant d'assimilation dans la lumière. Comme chez d'autres plantes submergées, l'eau a eu un effet modificateur. Chez les renoncules d'eau, la feuille normale à limbe étalé est remplacée par un limbe ramifié en pinceau. Or, nous pourrions insister sur ce fait que ces modifications ne sont qu'une exagération de l'état embryonnaire, que la feuille en pinceau existe au début dans le bourgeon et que le seul effet de l'eau a été de pousser au développement excessif de ce qui, dans l'état normal, est représenté au pourtour de la feuille sous forme de dents (*fig, 68*).

On pourrait citer des exemples contraires, des feuilles comme celle de la capucine qui, dans le bourgeon, alors qu'elles n'ont encore qu'un demi-millimètre de longueur, sont nettement ramifiées, et qui, plus tard, au cours de leur évolution individuelle, ont tellement développé leur masse en une lame que les lobes primitifs ne peuvent plus être reconnus sur le pourtour du grand disque qui vient s'étaler à la lumière. On voit quelque chose d'analogue dans les monstruosité des plantes supérieures, nommées fasciations, chez lesquelles les ramifications de la tige ne se sont pas accentuées, tandis que l'axe principal, s'étalant en éventail, montre en se dévelop-

Fig. 69. — *Podostemon atrichus*. Racines rubannées qui à la façon de vrilles se sont enroulées autour d'un caillou ; on voit des tiges et des feuilles très divisées.

Gross. 3 fois.

D'après Chodat et Vischer.

Fig 70 — *Podostemon Warmingii*. Un bouton floral, la spathe enfermant les organes floraux (voir le dit développement fig. 60^{1, 5}), les autres dessins montrent les lanières dont les ramifications sont munies d'espèces de ventouses par lesquelles elles se cramponnent au rocher.
D'après Chodat et Vischer.

pant les insertions prolongées des rameaux et des feuilles comme autant de veines saillantes. C'est aussi ce qui s'observe dans la plante horticole nommée crête de coq.

Il y a ainsi, chez les Podostémonacées, deux tendances bien

Fig. 71. — *Podostemon atrichus*. Insertion de la plante, *a*, sur la tige d'une autre (hôte en noir), au moyen de crampons en forme de ventouses (on n'a pas dessiné les feuilles); *b*, sur un caillou.

D'après Chodat et Vischer.

distinctes qui se font jour : dans l'une la tige ou la racine tendent à s'étaler, leurs ramifications ne sont plus visibles que comme de faibles saillies ; on arrive ainsi aux lanières, aux lanières frangées, aux éventails, aux entonnoirs, aux croûtes circulaires.

La seconde tendance est de ramifier à l'excès les rudiments de feuilles qui, sur ces lames, se détachent parfois comme des houppes, comme des filaments associés du type des feuilles de

renoncule aquatique ou, enfin, d'allonger simplement leurs organes en longs filaments (*fig. 63*¹).

En d'autres termes, les Podostémonacées, en restant à un développement primitif, embryonnaire, se prolongeant pendant toute la croissance, prennent l'apparence d'une plante inférieure algoïde.

Mais, d'autre part, ces plantes seraient incapables de vivre dans les cascades si elles n'avaient la faculté de produire des crampons ou si elles ne pouvaient se coller au rocher par un ciment.

On conçoit, dès lors, que leur morphologie soit toute différente de celle des espèces aquatiques des eaux tranquilles. La seule analogie qu'elles présentent, au point de vue de leur fixation, doit être cherchée chez ces algues brunes des côtes de l'Océan, dont les lanières ou les panaches secoués par la vague tendent à chaque coup de la marée à résister à l'action déchirante de l'eau par une fixation solide, au moyen d'un crampon solidement fixé au rocher.

Comme ces algues, les Podostémonacées n'ont pas les espaces aérifères qui caractérisent l'anatomie des tissus de toutes les autres plantes aquatiques. Leur aération est assurée par l'agitation de l'eau et par la minceur de leurs organes, la petitesse générale de leurs appareils.

Ce sont, en effet, de très petites plantes. Seul le *Mourera fluvialilis* peut atteindre 30 cm. Les autres ne dépassent guère dix centimètres, le plus souvent elles atteignent, au moment de la floraison, 2-3 cm. de hauteur.

Dans les cascades, où elles se développent souvent à 1-2 pieds au-dessous de la surface, elles sont dans des conditions, semble-t-il, assez défavorables pour leur éclairage et leur nutrition. Vivant dans des eaux qui jamais ne descendent au-dessous de 14°, le plus souvent qui maintiennent leur température à 20-25° toute l'année, elles n'ont pas, comme les algues des eaux froides de la neige et des mers arctiques, l'avantage d'un milieu qui tient en dissolution le maximum d'acide carbonique. Mais ce désavantage est compensé par le renouvellement rapide de l'eau. La plupart incrustent leurs parois externes de concrétions siliceuses, et

ceci est plus marqué chez les espèces de la cascade proprement dite que chez celles de l'eau courante, plus flexibles, moins résistantes.

Fig. 72. — L'une des cascades secondaires de l'Yguazu, à l'extrême limite méridionale; c'est sur l'arrête rocheuse que nous avons récolté les Podostémonacées décrites. On voit en haut à droite le profil d'un homme, ce qui donne l'échelle.
D'après Chodat et Vischer.

Cette espèce de carapace siliceuse a été parfois considérée comme une protection contre les ennemis, en particulier contre les poissons. Mais WENT fait remarquer qu'à la Guyane hol-

landaise, le nom de ces plantes indique au contraire que certaines espèces sont mangées par ces animaux.

La couleur de ces plantes est souvent plus rose que verte; chez plusieurs, la couleur rouge est aussi nette, aussi belle que celle des Floridées (algues rouges de l'Océan). Mais ici, le rouge est dû à un pigment qui est dissout dans le suc de la plante, l'anthocyane des pétales de nos fleurs, le rouge des roses, des mauves, des *geranium* ou du raisin. C'est aussi cette même coloration qu'on voit dans beaucoup de jeunes pousses, au premier printemps.

A l'Yagué, au centre du Paraguay, où nous avons, dans la cascade, étudié pas à pas la situation et l'apparence d'un *Podostemon* qui y était abondant, nous avons remarqué que les plantes situées le plus près de la surface, sur les dalles des grès, étaient les plus vivement colorées en rouge, tandis que celles qui s'étaient implantées dans la cascade elle-même, sous les corniches et par conséquent plus à l'ombre, étaient de coloration olivâtre. Déjà WEDDEL, à propos des Podostémonacées du Rio Tocantins, dit : « ...le fleuve semblait, — qu'on me pardonne l'expression, — rouler sur un tapis de roses ».

Le botaniste qui étudie les Podostémonacées ne peut manquer d'être frappé par ce fait singulier du peu d'extension qu'ont prise les espèces, chacune en particulier.

La plus abondante et la plus robuste, le *Mourera fluviatilis*, est dans plusieurs fleuves des Guyanès, mais la plupart des autres ne sont connues que d'une seule localité; on va même jusqu'à prétendre que chaque cascade aurait ses espèces. Aucune des formes de l'ancien monde ne s'est retrouvée en Amérique. Cela contraste avec l'énorme distribution qu'ont fini par conquérir beaucoup de plantes aquatiques de marécages, dont quelques-unes vont de l'Argentine à la Virginie.

Le *Ceratopteris*, cette curieuse fougère des îles flottantes, est connu de la Chine comme de l'Amazonie ou du bassin paranéen. Je le répète, aucune Podostémonacée n'est de grande extension.

Comment se peut-il faire que chaque rapide, même chaque cas-

cade ait ses propres espèces? Si, en se plaçant au point de vue lamarckien, on voulait rapporter la multiplicité des formes à l'action des milieux changeants, on serait ici, comme dans beaucoup d'autres cas, dans un grand embarras. Sans doute, toutes les espèces pour vivre dans ce milieu agité ne pourraient se passer de leurs singu-

Fig. 73. — *Podostemon Warmingii*. Racines rampantes, rouges, avec pousses latérales (voir aussi le détail dans fig. 70).
Grand. nat. Phot. d'après Chodat et Vischer.

liers moyens de fixation. On pourrait voir dans la production de ces crampons, de ces croûtes collées contre le rocher comme des réponses à ce milieu particulier. On pourrait montrer que les algues, dans les mêmes circonstances, répondent de même. Mais s'il est possible de trouver à ces excitations du milieu quelques réactions générales, on ne pourra manquer cependant d'être tout aussi frappé par l'extrême multiplicité des formes, même de formes qui devraient, semble-t-il, répondre de la même manière à un milieu relativement uniforme, puisqu'elles appartiennent à une seule et même famille. Mais, dans la structure de ces appareils végétatifs, c'est comme si la Nature se jouait à nous étonner par une faculté d'invention presque infinie. D'ailleurs, n'en est-il pas de même dans le monde si varié des algues unicellulaires, Desmidiées, qui, dans les mêmes conditions, présentent les formes les plus aberrantes, les plus variées? Il est vrai, chacune des espèces répond à sa façon au milieu ou, si l'on préfère dire, ce qui est plus exact, chaque espèce est un appareil adéquat à son milieu, à défaut de quoi elle n'y pourrait subsister. L'une s'y maintient par sa capacité de résistance, l'autre par sa rapidité de multiplication, une troisième par son organisation comme calculée pour ce milieu. Si nous devons classer les espèces de Podostémonacées d'après leur degré d'adaptation au milieu si singulier des cascades, nous serions bien embarrassés. Toutes s'y cramponnent au rocher, mais dans ce milieu assez uniforme chaque espèce a l'air

de vouloir se singulariser. Il n'y a rien de plus difficile que de donner une idée générale de la forme de ces plantes. La raison de cette diversité n'est donc pas dans le milieu changeant, la raison d'être des espèces dans ce groupe doit être cherchée autre

Fig. 74. — Région argentine du cirque des chutes de l'Yguazu; on ne voit de ce cirque qu'une petite partie. D'après Chodat et Vischer.

part. La question se complique si, au lieu de suivre Lamarck, nous voulons nous rattacher à DARWIN. La lutte entre les formes, la lutte pour l'existence? Mais les Podostémonacées n'ont pas de compétiteurs; elles sont les seules à pouvoir vivre dans les cascades; très rarement deux espèces vivent en mélange, leurs gazons sont d'une seule espèce.

Je ne voudrais pas aller jusqu'à prétendre que, dans les tropiques, toutes les cascades soient comparables: la nature du substratum plus ou moins friable, la rapidité du courant, l'époque des crues sont des facteurs variés, mais qui ne sont pas d'une manière évidente en relation avec la morphologie externe de ces plantes. Comme nous le ver-

rons à propos de *Tillandsia* épiphytes, la fixation de ces plantes par leurs racines se fait sur des végétaux variés. Indifférentes, les plantules germent même sur les tiges florales de la même espèce. L'agitation de l'eau? Mais cela est un facteur très variable, et leur adaptation comme on le voit dans les cascades n'est pas si étroite qu'elles ne puissent vivre que dans une région définie de celles-ci. Et d'ailleurs, pour les espèces qui ont pu être étudiées sur place, on a reconnu que chacune présente un nombre considérable de possibilités, chaque plante étant

extraordinairement plastique tout en conservant sa spécificité.

La biologie écologique, celle qui s'occupe des relations qui existent entre la forme et le milieu est donc plus une science descriptive qu'une science explicative. Elle pose les problèmes d'origine, elle trie les hypothèses et rejette celles qui sont inadéquates ; elle classe les théories, mais la parole est à l'expérience. Il ne suffit pas d'imaginer, d'après la comparaison des formes existantes, ce qui a pu être, comment ont pu se former les espèces. La similitude du corps de l'homme et de celui des singes anthropoïdes prouve bien leur parenté systématique, mais ne prouve pas leur filiation. Après avoir dit que l'homme descend du singe, voici que certains anthropologues, et non des moindres, ne voient dans le gorille et le chimpanzé que des hommes dégénérés.

Dire que les Podostémonacées ne sont pas des plantes admirablement adaptées à leur milieu, c'est nier l'évidence

même, puisque seules dans la nature actuelle elles peuvent habiter les cascades, s'y cramponner par des moyens qui n'appartiennent qu'à elles, que seules parmi les plantes supérieures elles ont préparé à l'avance une cavité pour y recevoir l'embryon et qu'elles ont ainsi raccourci le temps de maturation, que seules aussi elles ont modifié leur appareil végétatif jusqu'à lui donner l'apparence des algues qui, dans la mer, vivent dans des situations analogues (*fig. 59, 63, 65*) pour ce qui est de l'agitation de l'eau. Mais, quand les Podostémonacées renoncèrent-elles à la vie terrestre

Fig. 75. — Autre vue de l'Yguazu ; au premier plan le cocotier de Romanzoff (*Cocos Romanzoffiana*).
D'après Chodat et Vischer

pour descendre dans les cascades? Quels ont été leurs ancêtres? Leurs fleurs, qui ont besoin de l'air pour finir leur floraison et faire leurs fruits, montrent bien que ces plantes n'ont pas une origine aquatique. On en connaît cependant une espèce qui peut fleurir sous l'eau et s'y féconder, la fleur encore enfermée dans sa spathe, par l'action de son propre pollen (*Podostemon Barberi*, d'après WILLIS). HOOKER dit que des espèces du Khasia fructifient aussi sous l'eau. Mais ces exceptions confirment la règle.

Les botanistes leur ont cherché des parents, mais ne leur en ont trouvé que de très éloignés. Dans tous les cas, les plantes auxquelles il faut penser d'après la structure de la fleur sont les Saxifragées ou peut-être les *Parnassia*.

Partout, autre part, la végétation d'une station est une association de représentants de familles diverses. Les Podostémonacées seules sont des plantes exclusives, et c'est là leur trait le plus saillant.

BIBLIOGRAPHIE

- TULASNE. — Monograph. Podostemmarum (1852). *Archives du Museum d'histoire naturelle*, VI (1852).
- AUBLET, F. — Histoire des plantes de la Guyane (1775) I et IV.
- WARMING, F. — Familien Podostemonaceae, Vidensk. Selks. Skrifter, VI^e série, I et II, in vol. II (1881) etc. (1888, 1891, 1899, 1901).
- WILLIS, J. C. — Studies in the morphology and Ecology of the Podostemonaceae. *Annals of the Royal bot. Garden Peradenya* (1902), 38 pl.
- BAILLON. — Histoire des plantes, IX (1886), 263.
- WENT. — Recherches sur les Podostémonacées, in *Compte rend. de l'Acad. Amsterdam*, XVI (1910).
- GOEBEL. — Pflanzbiolog. Schilderungen, II (1889).
- WILLIS. — Sur le défaut d'adaptation chez les Podostémonacées. *Proceed. Royal Society, London*, LXXXVIII (1914), 532.
- CHODAT, R. et VISCHER, W. — Podostémonacées, in Chodat, La végétation du Paraguay, *Bull. Soc. bot.*, Genève (1917).

R. C. del.

1. Broméliacées (*Aechmea*) dans le Chaco.
2. Broméliacée (*Billbergia*) sur le tronc d'un arbre.

Citernes végétales et marécages suspendus.

(PLANCHE X.)

LORSQUE vous voyagez dans le sud de l'Amérique, ce qui, dans la végétation, frappe le plus, c'est sans contredit les grands *Bromelia* qui, au pourtour des bois ou des îlots de selves, forment un fourré presque infranchissable. Quelque temps avant la floraison, celle-ci s'annonce par la couleur rouge vif du cœur des grands bouquets de feuilles étroites qui, à partir d'un centre rayonnent en jet d'eau vers l'extérieur, formant ainsi une espèce d'entonnoir. De loin, ce sont comme des fusées fulgurantes qui sortent d'un cœur vert (*fig. 77*).

Le limbe de chaque feuille est garni, sur son bord, de piquants robustes ; légèrement carénées, elles se continuent vers leur base en un chéneau qui, venant se réunir à beaucoup d'autres, amène l'eau de pluie vers le bourgeon central, le bourgeon floral encore caché au fond de l'entonnoir végétal. Bientôt, du milieu de ces feuilles rutilantes s'élève un gros stipe couvert de squames blanches imbriquées, précédées de feuilles bractées, brusquement repliées, et qui, par leurs épines terminales et les dents acérées de leur marge, gardent jalousement cette espèce de chou-fleur de l'approche des herbivores. Maintenant on voit les fleurs violet pourpre, écartant les écailles, dressées comme si elles craignaient de trop oser, montrer l'orifice trilobé de leur corolle. Les bractées rouge feu, les squames blanches, appliquées contre le cône, les corolles vivement pourprées, tout cela au milieu d'un bouquet de feuilles vertes et rouges, brille au soleil tropical comme un feu ardent dans le noir de la cheminée sombre. Des buissons voisins, où ils se sont perchés pour un instant, on entend les oiseaux-mouches fendre l'air d'un vol rapide, avec le bruit strident d'un projectile ; il en est de bleu métallique, de vert doré, de vert et bleu, de violet d'aniline, que sais-je, de couleurs plus merveilleuses encore que celles du *Bromelia* au moment de sa floraison. On voit ces

Fig 76. — *Ananas* dans la forêt de Paraguay ; on voit autour de la tête fleurie les feuilles en chéneau qui amènent l'eau au centre.
D'après Chodat et Vischer.

oiseaux-mouches s'approcher de l'inflorescence, battant des ailes d'une manière imperceptible avec un frémissement d'aile qui rappelle celui des sphinx de chez nous quand ils visitent les chèvrefeuilles, baissant la tête, tandis qu'ils glissent dans l'étroit orifice de la corolle leur long bec effilé et leur langue filiforme. Avec une précision, un coup d'œil surprenants, l'oiseau visite successivement toutes les fleurs d'une inflorescence, puis repart avec un bruit de flèche qui cingle l'air. On a longtemps cru que l'oiseau-mouche vivait exclusivement du nectar, du miel des fleurs, mais nous savons aujourd'hui qu'il se nourrit tout autant des petits insectes qui abondent dans les corolles riches en nectar (espèces de Thrips).

Presque toutes les espèces de Broméliacées sont comme celles-ci, des plantes dont les fleurs, vivement colorées de teintes inattendues, insoupçonnées de ceux qui n'ont vu que la végétation des pays tempérés, viennent opposer le vert cru de leur calice, le rouge rubis ou le bleu métallique de de leurs pétales aux couleurs amaranthe ou pourpre des bractées qui, tantôt les entourent comme d'un involucre, tantôt les surplombent comme d'un dais magnifique. Il en est de rouges, de pourpres, de bleues, de jaunes, d'orangées, combinant ces teintes en contrastes heurtés de mascarade à faire jaloux des perroquets, des aras en personne. Or, les oiseaux-mouches ne sont pas comme nos abeilles d'Europe qui préfèrent à toutes les couleurs le bleu délicat des véroniques ou le violet

bleuté des centaurées ; ils aiment décidément les couleurs bruyantes, les rouges vermeils, les oranges rutilants.

Toutes ces plantes Broméliacées — il en est de petites et de grandes — ont leurs feuilles étroites disposées en bouquets serrés ; toutes, grâce à cet arrangement, par la pluie se remplissent donc inévitablement d'eau qui, dirigée par les feuilles canaliculées vient séjourner au centre de la rosette. Beaucoup de Monocotylédonées, dont les feuilles sont disposées de même, se sont arrangées pour faire dévier l'eau qui tendrait à s'accumuler au centre du végétal, en laissant retomber le limbe de leurs feuilles, en établissant à la base du limbe, comme chez les Graminées, deux gouttières qui conduisent l'eau vers l'extérieur, ou en s'appliquant, par la gaine de leur base, étroitement contre la tige, en un système étanche, imperméable à l'eau.

Ici, rien de semblable, les feuilles en chéneau sont comme préoccupées d'assurer un ravitaillement suffisant d'eau, de l'amener au centre de la plante, de convertir cette dernière en une espèce de citerne dans laquelle le liquide parfois séjourne plusieurs mois (fig. 76, 77, 78).

Chez ces curieux végétaux le marécage n'est donc pas tout autour, il est dans la plante elle-même.

En Europe, nous n'avons guère que les *Dipsacus* qui, par la soudure de la base de leurs feuilles, récoltent l'eau de pluie et la

Fig 77. — *Bromelia Serra* Fourré d'une Broméliacée dont les feuilles en chéneau dirigent l'eau vers le centre. D'après Chodat et Vischer.

conservent pendant la toute première période de leur végétation, c'est-à-dire avant l'allongement de leur tige florifère.

Si nous avons la curiosité de nous approcher, d'examiner le contenu de ces sacs remplis d'eau nous y trouverions tout un

Fig. 78. — *Aechmea polystachya* (comparez avec la planche X) dans les sables du Chaco; on voit bien les feuilles en chéneau qui conduisent l'eau d'une manière centripète aux citernes formées par les gaines.

D'après Chodat et Vischer.

monde d'organismes en voie de putréfaction, une véritable sentine, et cependant ce liquide nauséabond ne cause aucun préjudice au végétal supérieur qui paraît vouloir, au contraire, maintenir à la fois la fraîcheur de ses vigoureux bourgeons et leur assurer un supplément de nourriture azotée.

Chez nos grandes Bromélie, le liquide est ordinairement plus clair, moins nauséabond. Cependant, avec le temps, il prend une teinte colorée jaunâtre ou brunâtre comme l'eau d'un marécage ou d'une tourbière. Pour de si grandes plantes l'enracinement est médiocre; sans nul doute, l'eau conservée autour de la jeune inflorescence favorise son développement rapide. On la voit en peu de jours, comme une asperge vigoureuse, et géante,

s'élever du cœur mouillé et épanouir ses fleurs. Puis, quand, par les colibris, la fécondation est opérée, les fruits agrégés à la base de chaque fleur, à l'aisselle d'une écaille, se développent en de grosses baies juteuses. L'ananas, qui est une plante du même pays, mais qui préfère les bois humides, remplace lui aussi le gros pompon de bractées roses et de fleurs pourprées, par une accumulation de baies qui, avec la tige charnue, forme la grosse pomme de pin comestible bien connue.

Allons maintenant plus à l'ouest vers les plaines arides, parfois inondées, parfois desséchées, du Gran-Chaco. Mêlé aux grands Palmiers à cire ou aux Espinillares presque impénétrables, sur les argiles comme sur les sables et autre part aussi sur les rochers les plus secs, un autre représentant de cette famille, l'*Aechmea polystachya*, haut de quarante à soixante centimètres, presse les unes contre les autres ses touffes rigides (planche X et fig. 78); ses feuilles dressées ou à peine étalées vers l'extérieur, de couleur glauque, vert bleuâtre, semblent faites de tôle vernie. Elle aussi, au moment de la floraison, pousse une tige, couronnée d'admirables calices roses et de bractées écarlates. Approchons-nous, malgré les épines qui nous déchirent les mains, en ayant soin d'éviter les serpents qui souvent aiment à se réfugier dans ces brousses. Chaque feuille nous apparaît comme un chéneau qui se dilate à la base en une citerne pouvant contenir jusqu'à un demi-litre d'eau. Le voyageur, par la sécheresse terrible qui, dans cette région, dure de longues semaines, peut trouver ici le salut; c'est un puits dans le désert. Je dis qu'il peut, il aurait fallu dire il trouve de quoi étancher la soif qui le brûle. Nous avons circulé dans ces parages par 37° de chaleur, alors que l'eau dans nos gourdes s'était, au soleil, échauffée jusqu'à 41°. Mais nous savions trouver le soir au campement l'eau nécessaire à calmer notre soif. Dans ces conditions, le voyageur s'habitue rapidement à boire des eaux brunes du marécage, à plus forte raison de l'eau moins réellement croupissante des citernes de nos *Aechmea* (*Bromelia*).

M. BARBROCKE-GRUBB, dans son beau livre d'*Un peuple inconnu dans un pays inconnu* (Les légendes dans le Chaco) nous raconte une halte dans le désert en ces termes : « Comme la sécheresse durait depuis quelque temps, il n'y avait plus à notre disposition que l'eau qu'on pouvait trouver dans la plante Caraguata (on nomme ainsi toutes les Broméliacées-citernes), qui est le salut des voyageurs dans le Chaco pendant la saison sèche. Les longues feuilles en chéneau rassemblent la rosée et la pluie, et c'est ainsi qu'une provision d'eau est conservée pendant quelques mois. J'accompagnai les femmes dans la forêt (clairière), là où cette plante utile

se rencontre ; nous avons apporté avec nous tout ce que nous avons de pots et de jarres en terre.

« Le Caraguata, qui ressemble extérieurement à un grand aloès, est muni d'épines nombreuses, ce qui empêche les animaux d'en boire l'eau et ce qui, d'autre part, le rend difficile à manier. Au moyen d'un couteau (machete), nous coupons en travers les sommets épineux des feuilles sans détacher la plante de ses racines ; nous les tenions par-dessus des pots d'argile et, les poignardant par en bas, nous laissions l'eau s'échapper des « citernes ». Chaque plante nous donnait une grosse tasse d'eau. Chaque fois qu'un des vases était rempli, nous filtrions l'eau d'un pot dans l'autre en la faisant passer au travers d'un tampon d'herbes, pour la débarrasser du grand nombre d'araignées et d'autres insectes, comme aussi des débris végétaux, qui s'accumulent dans ces plantes. »

Et, dans un autre voyage : « Nous voyageâmes ainsi jusqu'au milieu du jour à travers un pays ouvert et des forêts de palmiers, et comme nous avions une soif intense, nous nous mîmes à la recherche de bosquets dans lesquels nous aurions quelque chance de trouver des Caraguata, mais nous ne trouvâmes que des individus presque à sec... »

Voici donc des végétaux qui, pendant de longues semaines, se maintiennent frais par cet ingénieux système des citernes foliaires. GRUBB dit que ces feuilles récoltent la rosée ; cela peut paraître surprenant dans un pays dont on parle avec terreur à cause de sa sécheresse. Mais justement ces plaines et ces rochers brûlés par le soleil ardent du jour, sont froids par les nuits claires ; elles sont nombreuses et rafraîchies par le rayonnement intense. Nous avons assisté en plein hiver à des variations de température vraiment surprenantes. A une heure de l'après-midi le thermomètre marquait 37°. Ce n'est qu'avec peine que sous ce soleil implacable nous pouvions encore nous intéresser aux particularités biologiques si curieuses de ces déserts, notant, photographiant, examinant sous la loupe ce qui attirait notre attention, nous efforçant de ne pas nous laisser gagner par l'indifférence, la paresse. Et puis, la nuit, sous la tente, la température baissait, vers les 4 à 5 heures du matin, à 4°. Dehors, le thermomètre

marquait 1° ou 2°; une abondante rosée couvrait les plantes et les *Caraguata*, avec leurs feuilles dressées, étaient particulièrement aptes à diriger cette abondante rosée vers leurs citernes, d'autant

Fig. 79. — *Aechmea pulchra*. Broméliacée arboricole (comparez avec fig. 78), dont l'ensemble des feuilles constitue un entonnoir plein d'eau. D'après Chodat et Vischer.

mieux que leur surface, couverte de poils, ne se laisse pas mouiller dans leur moitié supérieure.

Nous ne nous étonnerons dès lors plus autant de trouver, sur les arbres du sud de l'Amérique une vraie cohorte de Bromélia-

cées de tous genres. Tout d'abord, un *Aechmea* (*A. pulchra*) très semblable au précédent et dont les racines ne servent guère qu'à fixer la plante à l'arbre, mais qui, soit par leur structure — ce sont plutôt des câbles — soit par leur masse, sont incapables d'alimenter en eau cette grosse plante épiphyte. D'ailleurs, soit l'écorce rugueuse de l'arbre, soit le peu d'humus qui s'est accumulé autour des racines fixatrices ne pourraient être utilisés par la plante comme réservoir d'eau. La plante Broméliacée se tire donc d'affaire en utilisant l'eau qui, inévitablement s'accumule à la base de ses feuilles, dans les citernes déjà décrites (fig. 79). Le botaniste qui des troncs détache ces gros bouquets de feuilles renverse involontairement leur contenu sur sa tête. Parfois, sur un même tronc, se sont groupées plusieurs espèces : des *Billbergia*, aux magnifiques inflorescences pendantes, rouges, bleues et vertes (planche X), des *Tillandsia* aux feuilles renflées à leur base en une outre, dont l'orifice étroit est en communication avec l'étroit limbe canaliculé, des *Nidularium*, vrais entonnoirs (fig. 96), dont le cœur est égayé de bractées roses ou écarlates. Chacune de ces plantes retient, d'une manière ou d'une autre, une quantité considérable d'eau, qui y persiste pendant toute la saison sèche ; là pullulent les organismes habituels des marécages. On y peut récolter des algues vertes microscopiques, des Diatomacées, des mousses et des hépatiques aquatiques. Même des plantes supérieures y élisent domicile et quelques-unes semblent avoir choisi ces stations de préférence, comme ces Utriculaires qui, vivant dans le minuscule marécage, dans le puits rempli d'eau, grimpent d'une citerne à l'autre au moyen de tiges allongées, émettant de longs flagelles dont le sommet, attiré par l'eau, vient plonger successivement dans ces lacs groupés autour d'un centre organique ou étagés sur les branches.

Dans la forêt tropicale ou subtropicale, quand à la faveur d'un cours d'eau on peut en voir l'intérieur, c'est une vraie merveille que ces Broméliacées épiphytes, plus vivement colorées que les plus belles Orchidées, garnissant les grosses branches et suspendant leurs brillantes inflorescences au-dessus de l'eau noire ou éclatant de couleurs, qu'elles savent rendre brillantes par la production d'espèces de cellules, de lentilles qui, collectant la lumière, brillent dans l'ombre comme autant de pierres précieuses. Certains

botanistes attribuent aux plantes des yeux et localisent dans l'épiderme des feuilles un système de lentilles qui, comme le cristallin de notre œil, sait faire converger la lumière sur un fond coloré. Je n'irai pas jusqu'à parler d'yeux à propos de plantes, car un œil, ce n'est pas seulement une lentille, un appareil qui reproduit une image, c'est cet organe sans pareil qui sait voir, qui s'adapte, qui s'efforce, qui scrute, qui est relié à un cerveau. De tout cela, nous ne trouvons guère que des rudiments dans le végétal, et cependant avec quel soin ne semble-t-il pas attirer parfois l'attention sur lui, souvent, comme ici, se parant bruyamment, avec une exubérance de couleurs qui, autre part que sous les tropiques, paraîtrait de mauvais goût (planche X).

La vivacité du coloris dépend sans doute le plus souvent de l'intensité de la lumière ; mais ici nous voyons la Nature si déconcertante parer, dans la forêt même, les Broméliacées des plus étonnantes teintes et des contrastes les plus accentués. Dans cette forêt sombre ne voyons-nous pas aussi les Rubiacées, aux corolles translucides, briller comme des améthystes, des fruits donner des feux comme des rubis, et les feuilles de certains Poivres luire comme de superbes émeraudes. Si nous en avons le loisir, nous pourrions montrer que ce ne sont pas, pour la plupart, des bizarreries, mais que ces yeux de couleurs variées, qui dans l'ombre brillent comme ceux d'un félin, assurent au végétal qui les possède

Fig. 80 — *Bromelia* du Paraguay, en fleur, aux bractées rutilantes et aux feuilles fonctionnant comme chéneaux.

D'après Chodat et Vischer.

un avantage indiscutable. Dans tous les cas, nous n'avons pas de peine à en imaginer un. La question est toujours la même : vivant dans telle station, cette plante est comme construite pour y vivre. Partant de ce point de vue, nous pourrions poursuivre l'histoire de nos plantes de marécage, lesquelles ayant abandonné la mare de leurs ancêtres ont continué, sur l'arbre, à vivre dans l'eau et à se comporter comme des plantes aquatiques. En effet, leurs racines ne servent guère qu'à les fixer ; elles n'acquièrent jamais le grand développement de celles des plantes terrestres. Emigrées sur les arbres, les Broméliacées continuent, accentuent même cette réduction des racines qui, chez beaucoup d'espèces, ne sont plus, au moment de la croissance et du développement des fleurs, que des cordons desséchés, de nature cornée, noircis et qui, en crampons, se sont attachés à l'arbre-support ou qui, se moulant sur l'écorce fissurée, s'y sont collés comme par une masse adhésive. Les feuilles de toutes ces Broméliacées ont une structure qui, au point de vue physiologique, paraît contradictoire. Une section pratiquée au travers du limbe montre qu'il y a, du côté supérieur, au-dessous d'une épaisse cutine, espèce de vernis protecteur, un tissu de cellules incolores, véritable réservoir d'eau comme celui qui se forme dans la majeure partie des plantes grasses, chez les plantes des rochers secs et des déserts. A la face inférieure, ce tissu aquifère alterne avec un tissu vert en relation avec les stomates, petits orifices qui permettent la respiration, l'assimilation de l'acide carbonique et la transpiration. Mais ce tissu est construit comme chez une plante aquatique. Les cellules étoilées laissent entre elles de grosses lacunes. Cette structure de plante aquatique s'exagère encore dans la citerne, dans la région qui est inondée.

La plante citerne hésite donc, comme beaucoup de plantes de marécage, entre le danger d'être étouffée par l'eau peu aérée et celui non moins réel (pour la portion qui hors de l'eau est exposée à la lumière et à l'air) d'être desséchée par le vent, la chaleur et la lumière. La Broméliacée-citerne pare donc adroitement à ces deux dangers contraires.

Protégée contre une rapide dessiccation, soit par ses réservoirs internes, cellulaires, soit par sa carapace de cutine, la Broméliacée peut puiser l'eau nécessaire à couvrir son déficit de

transpiration par les poils absorbants en écusson qui tapissent la région inondée des citernes et dont le pied s'enfonce dans la feuille en tissu conducteur.

On trouve aussi sur la portion exondée du limbe des poils

Fig. 81. — Myrtacée du Paraguay, sur les branches de laquelle sont venus se fixer des *Tillandsia*; on voit en haut des touffes grises, portant des tiges dont les unes laissent pendre les capsules (fruits) ouverts (au milieu de l'espace entre les deux branches); de jeunes plantules se sont implantées en dessous (étoiles blanches) (*Tillandsia loliacea*). D'après Chodat et Vischer.

semblables qui se laissent mouiller avec rapidité. Ces deux caractères, citernes et poils absorbants des feuilles, permettent de comprendre la biologie d'autres Broméliacées. Les unes ont encore des citernes et sont intermédiaires entre les précédentes et les autres qui, dépourvues d'appareils pour conserver l'eau et, comme nous allons le voir, de racines pour l'extraire du sol, de l'écorce ou des rochers, vivent exclusivement de l'air, ce qui leur a valu le nom caractéristique de « Flor del aire ». Celles-ci appartiennent toutes au genre *Tillandsia*. Il en est de très

petites, à peine d'un pouce de longueur ; d'autres, plus rares, atteignent jusqu'à un mètre et plus de hauteur. Chez ces plantes qui

Fig. 82. — Dissémination par viviparie du *Tillandsia liliacea*. En haut on voit la capsule-fruit ouverte, laissant échapper non pas des graines, mais des plantules munies à leur base des poils de la graine, hors de laquelle elles ont germé déjà dans la capsule. En bas, à droite, deux plantules réunies en chaînette et emportées par la brise, à gauche, cette chaînette s'est accrochée à la branche d'un haut buisson et l'une des plantules va pousser une racine crampon (comparez fig. 84). D'après Chodat et Vischer.

vivent exclusivement ou sur la couronne extérieure des arbres de la forêt tropicale, exposées à la vive lumière (fig. 81), ou sur les branches des grandes épines des Espinillares des plaines paraguayennes ou chacoennes, les feuilles sont couvertes d'un indument presque continu de poils en écusson qui vont, en entonnoir, s'implanter dans la feuille. Par le temps sec, ces poils appliqués contre la feuille lui donnent une apparence finement chaînée, comme poussiéreuse, comme parsemée de petites écailles nacrées ou argentées (fig. 88, 89). Par le temps humide, cette apparence de lichen, d'*Usnea* ou de *Cetra-*

ria, disparaît et fait place à une teinte vert grisâtre. Du milieu des petites rosettes aux feuilles étroites, en bouquet, part une tige florifère munie d'écailles et terminée par quelques fleurs dont on ne voit poindre, hors des bractées imbriquées, que la corolle trilobée. La couleur en est généralement pâle, jaune ou violacée. Fécondées, ces fleurs produisent une espèce de longue silique dans laquelle mûrissent des semences minuscules, fusiformes, accompagnées par une aigrette de poils, soyeuse ou cotonneuse. A la maturité, on voit ces étroites siliques s'ouvrir sous la pression des poils qui foisonnent, et les semences, allégées par leur fine chevelure, se laisser balancer par la brise et transporter par les remous du vent, un peu comme chez nous, au printemps, sont disséminées les semences des peupliers (fig. 82, 83).

Les Broméliacées à fruits charnus sont recherchées par les oiseaux, les chauves-souris, les singes. Dans la forêt tropicale et subtropicale américaine, la vie animale se passe principalement dans l'étage supérieur; il faudrait, pour comprendre la vraie biologie de la forêt amazonienne ou paranéenne, pouvoir suivre d'arbre en arbre les singes qu'on entend hurler en bandes dans le lointain de la forêt, observer les mœurs des nombreux oiseaux frugivores qui se nourrissent des baies des Broméliacées, des cerises aromatiques des Myrtacées et des fruits charnus des Aroïdées; surveiller, le soir, les habitudes des chauves-souris dix fois plus nombreuses que chez nous, de jour, les perroquets qui se régalent de baies; et jusqu'aux fantastiques Toucans aux gros et longs becs qui remplacent les longs bras et la queue prenante des singes par l'informe appendice nasal qui les défigure. Tous ces frugivores ont contribué et contribuent à disséminer les plantes épiphytes à fruits charnus, sur la couronne des arbres et en particulier sur la fourche des troncs ou des grosses branches sur lesquelles ils viennent se percher.

Les *Tillandsia* sont à ce point de vue d'une tout autre biologie. Il serait difficile de trouver à l'intérieur d'une autre famille, aussi naturelle que celle des Broméliacées, un contraste plus frappant, au point de vue des fruits, que celui que nous présentent les

Fig. 83. — Chaînette de trois plantules attachée par des poils à deux branches voisines; on voit déjà les petites racines dans les deux plantules de droite

Tillandsia avec leurs semences légères qu'emporte la moindre brise et les lourds fruits charnus, isolés ou agrégés, des *Aechmea* et des *Ananas* (fig. 68).

La capsule des *Tillandsia* s'ouvre prudemment de haut en bas, mettant à nu les semences poilues qui y étaient comprimées et qui maintenant dé-

Fig. 84. — *Tillandsia liliacea* (voir fig. 82). Fixation des plantules à des branches ; on voit les poils qui servent à l'allégement et au transport par le vent, les racines qui s'enroulent autour des branches et se dilatent en lanières d'adhésion en se collant.

gagent leurs aigrettes. Le vent qui les emporte finit par les déposer sur des branches (fig. 81), sur le tronc des arbres, sur les feuilles même, parfois sur la surface lisse d'un grand Cierge. Alors l'humidité du matin ou la surface un peu glutineuse ou cé-

racée des végétaux les retient ; grâce à l'humidité de la rosée, elles germent en fournissant rapidement quelques menues radicelles qui manifestent des mouvements de va-et-vient comme les vrilles des lianes ; les unes, au contact de la branche, sont irritées et répondent à ce choc, à cette pression par une réaction tactile qui s'exprime par la production d'un disque d'adhésion, espèce de ventouse (fig. 84, 85) qui vient s'étaler, se mouler exactement sur la surface lisse ou rugueuse de l'écorce. Dès lors la plantule est définitivement fixée et sa germination continue : un petit bouquet de feuilles qui s'allongent, puis finalement une tige florifère portant quelques fleurs jaunes ou violacées.

La faculté de se fixer sur des corps quelconques est générale chez certaines espèces. Ainsi nous avons vu l'une des plus petites, le *Tillandsia liliacea*, s'attacher à des branches, à des troncs, des pierres, des feuilles lisses ; au Brésil, on provoque le développement de ces fleurs de l'air par des fils tendus entre les balcons, ce qui donne, au moment de la floraison, des décors originaux et, selon les espèces, des guirlandes multicolores. On les voit parfois, dans l'Amérique latine, garnir les fils télégraphiques abandonnés, ce service n'étant pas toujours d'une régularité

absolue. Nous avons aussi vu la surface verticale et lisse des grandes falaises au Cerro San Tomas, près de Paraguari, garnie d'un gazon de *Tillandsia*. Même de grandes espèces comme le *T. rupestris*, qui forment habituellement une espèce de prairie (fig. 97), arrivent, si les circonstances ont été favorables, à se suspendre aux granites par un disque d'adhésion qui ne dépasse

Fig. 85. — Germination de la plantule vivipare du *Tillandsia Lorentziana* (voir fig. 92). On n'a représenté que la base de la plantule: remarquer l'enveloppe de la graine qui donne les trois touffes de poils par sa dissolution; un petit bouquet de feuilles (5) dont on ne voit pas le sommet (comparez avec fig. 82); de la base de cette plantule sortent trois racines qui, au contact du substratum, s'étalent à leur sommet en disques d'adhésion, espèce de ventouses fixatrices qui vont se mouler et se coller contre le rocher. D'après Chodat et Vischer.

pas 0,6 cm. et par lequel une plante de plus de 25 cm. se balance par-dessus l'abîme (fig. 86). A cet effet, le crampon sécrète une substance adhésive et durcit ses radicelles qui deviennent résistantes comme un fil de fer. Dans cet exemple on voit bien que la plante, même si elle produit encore au début de minuscules radicelles, ne peut s'en servir pour se nourrir, pour absorber l'eau. Chez les espèces qui reposent sur le sol, par exemple chez celles qui, entre les gros blocs des éboulis gigantesques des Sierra du Paraguay central et du Cerro d'Acahay, forment de grossiers

gazons de 20 à 30 cm. de hauteur et dans lesquels il ne faut avancer qu'avec prudence car ils recouvrent souvent des trous profonds où se plaît le « Kiririviju », le plus dangereux des serpents dont la couleur grise, zébrée de noir, se confond avec la teinte des plantes et le grain du granit, même chez ces espèces en apparence terricoles, la base de la tige, qui s'allonge en un chaume un peu ascendant, ne pousse au dehors aucune racine. Les plantes sont comme coupées à leur base ; on peut en emporter des brassées sans aucun effort ; accumulées entre les blocs, elles sont comme de la paille de bois qu'on dispose entre des objets fragiles pour les expédier. Elles vivent donc exclusivement de l'air.

Chez d'autres espèces arboricoles, les radicelles s'enroulent autour des branches menues à la façon des vrilles (*fig. 90*) d'une clématite qui fixe solidement ses longs sarments aux branches de nos arbres. Mais la clématite, mais toutes les lianes, tous les épiphytes autres que les *Tillandsia* restent en communication avec le sol par des racines, ou si, comme chez certaines Orchidées de la forêt humide tropicale, elles y ont renoncé, elles puisent l'humidité dans l'atmosphère par de longues racines aériennes, enveloppées d'un voile spongieux sur lequel la rosée et les poussières viennent se déposer. Ici, chez les *Tillandsia*, chez les « Fleurs de l'air », la racine n'est plus un organe d'absorption ; elle n'est plus, dans les cas cités, qu'un simple crampon, une griffe dont les tissus, maintenant morts, assurent la fixation du végétal. Chez le *Tillandsia arbiza* et le *T. rupestris*, on n'en voit aucun vestige à l'extérieur du végétal, lequel est simplement posé sur les pierres ou serré entre les blocs. J'ai dit : on n'en voit pas ; si on les cherchait on les trouverait cependant. Une section pratiquée dans une tige de ces broméliacées aériennes, en particulier dans les grandes espèces suspendues, révèle une structure unique dans la nature actuelle. Autour du cylindre de la tige, il y a dans l'écorce, immergées dans les tissus de ce fourreau de la tige, des racines dont les tissus sont sclérifiés et qui courent parallèlement à la surface jusque tout près de la base de la tige. Dans l'espèce qui est simplement posée sur le rocher, ces racines ne se font pas un chemin vers l'extérieur, mais, chez une autre espèce qui lui ressemble beaucoup et dont les bouquets de feuilles en longues alènes

sont comme suspendus par une ficelle (*fig. 86*) au rocher, celle-ci s'agrafe à la pierre par quelques racines qui ont percé la base de la tige et qui sont venues former un disque d'adhésion en se ramifiant en processus digitiformes, et comme une main qui cherche à se cramponner, soutiennent le poids considérable du végétal (*fig. 87*).

Fig. 86 — Belle touffe du *Tillandsia rupestris*, sur les granites (éboulis) du Cerro San Tomas, cramponnée contre une paroi verticale par quelques petites racines (voir *fig. 97*), le feuillage, par le sec, blanc de neige; on voit les tiges florifères horizontales.

Le lecteur qui aura bien voulu me suivre jusqu'ici comprendra l'émotion qui nous saisit, M. le D^r VISCHER, mon compagnon de voyage, et moi-même, à la vue de ces merveilleux végétaux. Alors, la chaleur torride, la fatigue, la difficulté de hisser nos appareils photographiques, dont le plus lourd, mais aussi le plus précieux, pèse deux kilos, le danger des vipères, longues de deux mètres, sur lesquelles nous avons tout à l'heure failli mettre le pied, tout cela n'est pas oublié, mais cela ne nous arrête pas. Même la brousse épineuse qui s'ingénie à nous piquer de ses

dards variés, la soif intense même qui nous brûle la gorge, tout cela ne fait qu'augmenter l'étrangeté de ces plantes toutes grises, sans racines, sans citernes, auxquelles nous serions cette fois heureux de nous rafraîchir, ne fût-ce que d'une goutte d'eau. L'opposition de ces végétaux qui, presque desséchés comme les chaumes après la moisson (*fig. 97*), avec tout ce que nous connaissions des autres végétaux qui puisent l'eau dans le sol au moyen de leurs racines, ou même le contraste apparent qu'ils offrent avec les Broméliacées citernes, dont on voit du haut de cette Sierra les

Fig. 87. — Base de plantes du même type que la fig. 97. (*Tillandsia rupestris*). Chez cette plante, les racines qui sont cachées dans l'écorce de la tige, ne font saillie qu'à la base et comme des fils de fer développés en crochets vont s'attacher au rocher (voir fig. 86).

épis fulgurants pointer la plaine comme autant de flammes, cela est plus qu'étonnant. Et cependant la sécheresse n'est pas si extrême qu'il paraît, puisque même ceux-ci savent, dans cet enfer, porter vers le ciel, sur une hampe gracieuse, quelques fleurettes lilacines. Le tableau que j'ai essayé, d'après nature, d'esquisser en quelques traits est celui du milieu du jour. Il faudrait revenir ici le matin, vers les quatre heures, par une de ces nuits froides dont j'ai parlé. On verrait alors ces hérissons aux alènes argentées se couvrir de rosée, la pomper presque instantanément par l'indument des poils grisâtres qui les enveloppent, microscopiques paillettes, dont chacune est, par le sec, une pompe aspirante, et dont le mécanisme d'absorption a été élucidé par les recherches de MM. SCHIMPER et MEZ.

Mais nous pouvons sans tarder expérimenter dès maintenant; le peu d'eau qui reste au fond de notre gourde va nous servir. On voit qu'en passant un pinceau imbibé d'eau sur la feuille, celle-ci absorbe l'eau comme une éponge et peu à peu perd sa couleur argentée pour se vêtir d'un ton verdâtre qui laisse deviner sous l'indument la chlorophylle de la feuille.

Chacun de ces poils, vu d'en haut, est comme un disque (*fig. 88*) à plusieurs grandes cellules, les unes centrales, les autres marginales. En section longitudinale, cet appareil se montre constitué par deux régions bien distinctes comme fonctions (*fig. 89*). L'étage supérieur comprend des cellules mortes, mortes comme celles de la moelle du sureau. Du côté extérieur, leur paroi, par le sec, est formée de zones superposées d'une substance cornée à ce moment, mais qui par la rosée gonfle comme de la gélatine qu'on met dans l'eau. Cependant, ce gonflement par lequel l'épaisseur de cette paroi est plusieurs fois multipliée est si rapide que quelques secondes suffisent, sous le microscope, pour observer tout le phénomène. Nous appellerons couvercle cette zone membraneuse externe capable de gonflement; comme elle est beaucoup plus épaisse en son centre que sur ses bords, le disque se bombe vers l'extérieur et s'applique par ses bords contre l'épiderme de la feuille, ce qui augmente la capillarité en diminuant l'espace. L'eau en excès retenue par capillarité, est maintenant pompée dans les cellules du disque, ainsi que nous appellerons les cellules extérieures. En effet, par la sécheresse, l'eau qu'elles contenaient s'étant évaporée, elles se sont successivement effondrées, car leurs minces parois verticales ne sont pas assez rigides pour les maintenir en dilatation; ces parois minces se sont plissées en soufflet

Fig. 88. — Vue de sommet d'une partie du poil disque dont on a figuré, en 89, la coupe verticale.

d'orgue ou d'harmonica : en se vidant d'eau, elles ne se remplissent donc pas d'air. C'est pourquoi, lorsque vient l'humidité, la rosée, la pluie, elles peuvent si facilement se remplir à nouveau d'eau en redressant leur soufflet effondré. Comme il n'y a pas d'air, il y a appel, et le couvercle, déjà bombé, est encore soulevé dans le même sens et avec la même courbure, car les cellules du centre sont beaucoup plus élevées. Or, l'eau pompée dans ce disque passe maintenant dans la pile verticale de cellules, dont la

Fig. 89. — Poil absorbant dont les cellules supérieures mortes pompent l'eau de la rosée et ensuite l'abandonnent aux tissus de la feuille qu'on voit au-dessous de la ligne noire qui indique la surface de la feuille.

supérieure, comme un suçoir, communique avec toutes les cellules du disque, qui ne sont à ce moment que de petits tonneaux pleins d'eau ; cette cellule *vivante* suce maintenant par sa force osmotique l'eau qui n'est retenue par aucune force importante dans le couvercle et l'abandonne aux cellules sous-jacentes, selon la dynamique de l'absorption végétale. Tout cela est facilité par un ingénieux dispositif accessoire. L'épiderme de la feuille est protégé par un vernis cuticulaire imperméable à l'eau ; ce vernis se continue dans la fosse qui sert d'insertion au pied du poil. Tout le pourtour de ce pied est enveloppé par un cylindre de ce même vernis, tandis que les parois transversales sont perméables à l'eau. Ainsi, de poche en poche, l'eau chemine dans ce conduit, attirée par les cellules assoiffées du tissu foliaire. C'est peu de chose pour chaque poil, mais comme toute la surface est garnie de ces pompes microscopiques, l'effet est suffisant. D'ailleurs, le

Tillandsia ne s'est pas écarté définitivement de ses congénères Broméliacées citernes, Broméliacées marécages suspendus. Par la pluie, les feuilles imbriquées constituent, elles aussi, de petits entonnoirs, surtout chez les espèces érigées.

Quelques-unes même ont encore des citernes qui se remplissent par capillarité et dont l'eau a quelque peine à s'écouler, même si la plante est renversée ou si elle est en situation pen-

Fig 90. — *Tillandsia polytrichoides*; on voit les racines-vrilles entourant une branche; à droite, une capsule ouverte. Réduction de moitié. D'après Chodat et Vischer.

chée, car l'orifice de la citerne est petit, une bulle d'air forme alors bouchon, par le sec. Mais toutes ont encore dans leurs tissus des réservoirs d'eau à côté des cellules vertes; elles savent ainsi répartir avec sagesse la fonction, travail d'assimilation, et la fonction réservoir, l'épargne.

Les cellules réservoirs peuvent aussi s'effondrer en prenant l'apparence d'un soufflet d'orgue à mesure que les tissus actifs puisent dans cette réserve aqueuse. Mais ces cellules-ci restent vivantes.

Chose qui paraît au premier abord surprenante, ces plantes, qui pourraient être classées parmi les plantes xérophytes, c'est-à-dire des lieux secs, ont dans leurs tissus la structure de plantes semi-aquatiques: des cellules étoilées, des lacunes, l'insignifiance, la réduction du système conducteur pour l'eau. Plus encore, ce

dernier système s'oblitére rapidement ; les vaisseaux spirales et ponctués se remplissent de gomme et ne peuvent plus conduire. Encore un peu actifs dans le premier âge, ils sont rapidement mis

Fig. 91 — *Tillandsia usneoides*. Plantule fixée par quelques racines (ce qui est exceptionnel, car la plante s'accroche habituellement par ses feuilles). D'après Chodat et Vischer.

hors de fonction dans la plante adulte qui, à l'instar des plantes aquatiques, absorbe l'eau par sa surface et non par ses racines.

De loin, les arbres qui sont envahis par les *Tillandsiées* (il y en a plus de 250 espèces en Amérique) ont l'apparence de nos bois

garnis de lichens, d'*Evernia*, de *Parmelia*, d'*Usnea*. Cette impression est encore augmentée parce que, comme les gros lichens d nos bois de conifères, dans la région des nuages, les *Tillandsia* d

Fig. 92. — Vue générale de l'endroit où a été prise la photographie 93 ; en arrière du rocher, brousse épineuse ; sur le rebord, des cactées du genre *Echinocactus* ; sur les parois *verticale* des Broméliacées en gazon collées contre la pierre (voir le début de cette végétation fig. 8 *Tillandsia Lorentziana*).
D'après Chodat et Vischer.

plusieurs espèces, et parmi les plus petites, savent entourer tout la branche. On en voit de dressés, de latéraux et de suspendus leurs tiges florifères même ne s'orientent pas, par rapport à l

verticale, mais s'éloignent simplement en ligne droite du point d'attache de la plante. C'est comme dans le gui, ce parasite de nos arbres qui, se ramifiant en fourche dans toutes les directions, arrive à former les boules bien connues qui entourent les branches.

La plupart des autres végétaux terrestres sont rigoureusement soumis dans leur direction de croissance à l'influence de la pesanteur ; vis-à-vis de cette force, ils dressent leur tige principale, enterrent leur racine, disposent leurs branches et leurs feuilles.

Ces *Tillandsia*, comme le gui, ne perçoivent donc pas, en tant que force d'orientation, la pesanteur. Sans doute, quand ils se détachent du tronc sur lequel ils sont fixés, ils tombent comme tous les corps lourds. Il s'agit ici d'une tout autre chose : sentir la direction, ordonner sa croissance d'après la direction de la pesanteur, redresser les organes quand par une cause ou une autre ils ont été écartés de la position d'équilibre qui leur est imposée par leur nature qui est de s'orienter par rapport à cette force. Voir comment, à chaque époque de la vie, le végétal sait se diriger, comment même après avoir penché ses fleurs pour les présenter aux insectes, il les redresse sur de longs et élastiques pédicelles pour les faire secouer par le vent, c'est un des objets les plus captivants de la Biologie végétale, c'est saisir comment la plante sait maintenir un équilibre nécessaire ou changer cet équilibre par un autre équilibre meilleur désormais.

Il semblerait que la perte de cette sensibilité serait pour les plantes ce que serait pour l'homme la perte du sens tactile, de la vue, de l'ouïe.

Eh bien ! les *Tillandsia*, qui n'« entendent » plus la pesanteur comme force d'orientation, sont cependant avantagés puisque, autour de la branche, ils vont pouvoir croître dans les situations les plus diverses ; l'espace à occuper sera plus grand, la lumière, l'air pourront avoir meilleur accès. D'ailleurs, tous ne se comportent pas de même. C'est un charmant spectacle que celui, au pourtour de la lagune Ypoa, des « Quebrachales » (forêts claires d'arbres épineux ou à petites feuilles sur terrains salés) sur les branches desquelles les *Tillandsiées* de tout genre ont établi domicile, les unes cheminant comme avec précaution sur l'arête supérieure de la branche, se tenant bien prudemment comme un dan-

seur de corde dans la verticale, les autres garnissant tout le pourtour de la branche de leurs rosettes de feuilles grises, toute fleuries, de couleurs variées, gracieux jardins suspendus.

Fig. 93. — Au sommet du Cerro San Tomas, Paraguay central ; on voit sur le rebord rocheux deux boules d'une cactée (*Echinocactus Schumannianus*), entre lesquelles s'est placé un *T. landsia* (*T. Durati*) ; comparez avec fig. 92.

Il semblerait que dans ce groupe étonnant les espèces eussent voulu, dans une espèce de surenchère, nous surprendre au concours. Pour vivre sur l'arbre et y suspendre leurs citernes, il sen

blerait qu'elles dussent toutes produire, au moins dans leur jeunesse, quelques racines crampons. Mais voici des espèces qui se sont habituées à grimper dans les arbres sans racines. Ce sont en général de grosses plantes.

Nous les avons étudiées dans les ravins des plateaux rocheux des « Causses » de Tobaty et des falaises de San Tomas et, plus au nord, dans les Espinillares de Concepcion. L'une de ces espèces, quand elle est encore sur le sol, par exemple dans un ravin rocheux, sans prendre racine, dresse une tige garnie de feuilles disposées sur deux rangs, et dont l'extrémité se recourbe spontanément en crochet, lequel finit par s'enrouler en queue de scorpion ; elle s'appuie contre la pente sans s'y cramponner (*fig. 94*). Ceux des exemplaires qui, à 1-2 mètres, ont atteint aux premières branches d'un petit arbre, changent alors de manière de faire : les feuilles, en voie de développement, se renversent dans tous les sens en corbeille inversée, et par leurs extrémités qui se courbent en crochets, elles s'attachent à cette branche, l'enroulent ensuite de leurs spires et, soutenu par ces échasses, le végétal continue à allonger sa tige, à pousser en avant ses longues feuilles en flagelles, en espèces de fouets, pour s'accrocher plus haut.

On en trouve qui ont grimpé jusqu'au sommet des grands arbres. La portion située au-dessous de la corbeille renversée (*fig. 95*), des échasses, disparaît avec le temps, elle se détruit.

Cette espèce évidemment connaît la direction de la pesanteur et c'est ce sentiment qui lui fait pousser en avant ses feuilles jeunes et recourber ses feuilles âgées, pour s'établir sur une espèce de trépied, sur une espèce de cône, en équilibre parfait.

Beaucoup de ces *Tillandsia* ont simplifié leur cycle évolutif en accélérant leur germination ; ce phénomène, pour certaines espèces, est si général, qu'il l'emporte sur la multiplication par semences, qu'emporterait le vent. Chez celles-ci la germination se fait immédiatement dans la capsule et, lorsque le vent emporte le coton qui enveloppait ces semences, les plantules déjà munies de radicules sont prêtes à s'implanter au contact avec les branches des arbres. Il faut supposer que la capacité de germination dure peu et que, plus rapide est le développement, plus les chances de fixation sont augmentées. Dans tous les cas, cela facilite la colo-

nisation des arbres voisins, en quelque sorte la prise de possession de la branche de proche en proche. Nous avons trouvé cette viviparie chez des espèces de *Tillandsia* de toutes les régions de l'Amérique du Sud.

Notre biologie des Broméliacées serait incomplète si nous oublions l'une des plus remarquables, dans tous les cas la plus répandue des espèces de cette famille, le *Tillandsia usneoides*, qui, de loin, donne aux Légumineuses du Tebicuari et du Parana, comme aux chênes de la Floride, l'apparence de nos forêts de montagnes, quand elles sont garnies des longues barbes ou des filaments, des étoupes, des lichens, l'*Usnea barbata* ou l'*Alectoria jubata*.

Il est excessivement rare de voir cette minuscule Broméliacée se fixer par des racines (fig. 91); le plus souvent, elle se suspend par ses plantules aux feuilles recourbées en crochet qui, produisant de longs stolons filiformes munis de quelques feuilles et d'autres stolons qui simulent, en effet, l'*Usnea* de nos sapinières.

La grande extension des *Tillandsia usneoides* est due aussi au fait que des oiseaux (*Ostinops decumanus*) s'en servent pour la confection de leurs nids.

Elle se reproduit rarement par semences; le vent en emporte

Fig. 94. — Le *Tillandsia Duratii* en voie de grimper; à gauche, un exemplaire qui correspond au stade photographié (voir fig. 93); à droite, la plante allongée et dont le sommet s'est cramponné par ses feuilles-crochets, tandis qu'elle continue à progresser.

D'après Chodat et Vischer.

les tronçons et les suspend comme de la laine qui s'accroche aux buissons, aux branches des bois humides.

Nous avons parlé des citernes et des marécages suspendus. Les *Tillandsia* avec leur surface spongieuse, d'autres Broméliacées avec leurs feuilles grisâtres et rugueuses, par l'abondance de poils qui pompent de l'eau, sont aussi des espèces de tourbières suspendues ; vous avez sans doute vu les *Sphagnum* de nos sagnes,

Fig. 95. — Spécimen dont les feuilles en corbeille renversée reposent sur le haut d'un arbre.

de nos tourbières élevées. On s'en sert pour maintenir humides les paniers suspendus dans lesquels nos jardiniers cultivent les Orchidées arboricoles. On y trouve aussi, à côté de cellules vertes des cellules mortes qui pompent de l'eau par capillarité. Eh bien ! ces amas de mousse hygroscopiques sont envahis par de petites algues vertes, les mêmes qui dans l'indument des *Tillandsia* trouvent l'humidité journalière qui leur est nécessaire.

N'est-ce pas un paradoxe que l'histoire de ces habitants des demi-déserts qui font de leur surface une tourbière en miniature ?

Je me suis souvent promené avec des gens du monde ; le plus souvent je me suis tu. Il me plaisait de me détacher de mes préoccupations pour entendre leur aimable et spirituelle conversation.

Fig. 96. — Grand figuier du Brésil sur la base du tronc duquel s'est fixé un épiphyte du type d plantes citernes. Photographie commerciale

Le naturaliste ne perd pas ses droits, même dans la société bruyante et mondaine. Il y a des puits de science, des citernes profondes, des marécages aussi et des tourbières de l'esprit. La science de l'observation ne s'arrête pas au domaine de la botan

que. Mais je n'ai jamais pu goûter le jugement superficiel qu'ils portent souvent sur la Science de la nature et sur les savants qui, préoccupés de menus détails, ne peuvent, disent-ils, s'élever aux grandes vues, aux vues générales.

Ah ! la pauvreté des idées générales, des jugements d'ensemble, cette admiration conventionnelle des gens du monde pour ce pay-

Fig. 97. — Gazon fleuri d'un *Tillandsia* (*T. rupestris*) sans racines, simplement posé dans les interstices de l'éboulis, vivant donc exclusivement de l'air (voir la forme fixée dans la fig. 86).
D'après Chodat et Vischer.

sage qu'aucun des spectateurs peut-être n'a compris, ni dans son agencement, ni dans sa tonalité. Courbez la tête, artistes et savants, il vous faut, pauvres d'imagination que vous êtes, l'observation lente, le travail persévérant, avant de saisir les grandes lignes et encore après avoir passé votre vie à saisir des rapports, c'est à peine si vous pouvez formuler une règle. L'homme du monde, le politique, le journaliste ont des solutions concrètes à tous les problèmes. Devant la nature même, devant un paysage reconnu sublime, ils savent s'émotionner selon les formules consa-

créées ; ce sont les formules de tout le monde, on les écoute.

Et parfois, pourtant, j'ai parlé de ces choses qui nous passionnent, et j'ai vu les plus indifférents attentifs. C'est lorsque, résumant une question longtemps, patiemment, étudiée, on saisissait le lien invisible qui unit tous ces phénomènes. Ici même je ne sache pas qui pourrait rester indifférent devant l'histoire contée en toute simplicité, des Broméliacées, nombreuses et variées et pourtant si différentes de toutes les autres plantes, de leur voyage terrestre et aérien. L'histoire biologique d'une famille est plus passionnante qu'un choix d'anecdotes ramassées un peu partout. En approfondissant un sujet, en limitant ses recherches à un petit espace, à un clan, on pénètre bien plus avant dans la biologie générale, car l'histoire d'une famille, c'est aussi l'histoire d'un peuple. On pourrait, à propos d'un groupe quelconque de plantes, faire un cours de biologie générale. C'est ce qui m'a autorisé à m'étendre un peu plus que de coutume sur le sujet, presque inépuisable de la vie des Broméliacées. Et je n'ai pas dit comment se comportent celles qui ont les feuilles, charnues comme des aloès et les fleurs, brillantes comme des jacinthes ni comment se disséminent leurs graines ailées.

Comment fonctionnent leurs appareils floraux parmi les plus brillants du règne végétal ? Il ne s'agit pas de tout dire, il importe seulement d'attirer l'attention. Je voudrais qu'à la lecture de ces essais biologiques quelques-uns, désirant en savoir plus long, m'accusent d'être incomplet.

BIBLIOGRAPHIE

- BAILLON. — Histoire des plantes.
- PICADO. — Les Broméliacées épiphytes considérées comme milieu biologique. *Thèse*, Paris (1913).
- SCHIMPER, A. W. — Die epiphyte Vegetation Amerikas, *Biolog. Mitt. aus den Tropen*, Jena (1888).
- Die Epiphyten Westindiens. *Bot. Centralblatt*, XVIII (1884).
- MEZ, C. — Die Wasserökonomie der extremen Tillandsieen. *Jahrb. f. wiss. Botanik*, XL (1904).
- CHODAT, R. et VISCHER, W. — Broméliacées in Chodat, *Végétation du Paraguay*.
- KEILINE, E. — *Revue générale de Botanique*, Paris. XXVII (1815).
-

R. C. del.

*Etang-tourbière de la « Gruyère » (Jura bernois) avec Pin de montagne,
Sphagnum, Myrtilles et Drosera.*

Arbres amphibies.

(PLANCHE XI.)

A un certain degré, toutes les plantes sont aquatiques, puisque, sans eau, pas de végétation ; leurs racines doivent plonger dans un sol suffisamment humide.

On transforme des déserts en plaines fertiles par l'irrigation. Au milieu du Sahara, l'Arabe brise la couche d'aliôs en forant des puits jusqu'à 70 m. de profondeur pour amener l'eau à la surface et constituer une oasis, une palmeraie, où les dattiers ont, comme on dit, le pied dans l'eau et la tête dans le feu.

Cependant, la plupart des arbres meurent si l'eau qui séjourne dans le sol est trop abondante. Un verger trop inondé voit pourrir les racines des pommiers ; l'élévation du niveau d'une rivière fait périr les arbres plantés le long des rivages. Leurs racines ne supportent pas cette asphyxie prolongée, et on assiste à ce phénomène singulier de platanes (*fig. 98*) qui ont le pied dans l'eau et dont les feuilles se dessèchent faute d'eau. La fermentation des racines a amené à la destruction des radicelles et à l'oblitération des conduits. Et cependant, il est, même chez nous, des arbres qui supportent l'inondation, même permanente : les saules des rives, les aulnes de nos marécages, parfois les bouleaux des tourbières. Chose étonnante, le pin sylvestre, dans sa variété *montana*, occupe souvent, autour de nos tourbières ou sur nos tourbières, un espace considérable, comme par exemple à l'étang de la Gruyère, dans le Jura bernois. On le voit, à la faveur des touffes des laiches (*Carex stricta*) s'avancer dans l'eau et plonger finalement ses grosses racines dans la vase humide. Il constitue alors des forêts marécages, régulièrement inondées aux hautes eaux. Et cependant rien dans sa structure n'indique un arbre aquatique ; ni son écorce épaisse, ni ses feuilles dures ne rappellent le feuillage large et mince des plantes amphibies (*fig. 99 et planche XI*).

Beaucoup d'arbres tropicaux supportent l'inondation pendant plusieurs semaines, et même certains de ces arbres n'habitent que des régions périodiquement inondées, ainsi le palmier à cire du sud de l'Amérique. Et cependant on ne saurait le mettre dans la

catégorie des arbres amphibies, car il lui faut tout autant une sécheresse prolongée lorsque les eaux ont baissé, faute de quoi il finit par pourrir (*Copernicia australis*, *C. cerifera*) (fig. 121).

C'est qu'un sol humide est un sol mal aéré. Les pins échappent à cet inconvénient en remplaçant le pivot qu'ils envoient habituellement dans la profondeur s'ils se trouvent dans un sol nor-

Fig. 98. — Deux platanes dont la base est inondée et qui meurent lentement par asphyxie de leurs racines; on voit encore, en bas, des pousses feuillées; les branches supérieures sont desséchées à cause de l'inondation.
Phot. D^r Masson.

mal, par des racines qui cheminent à ras du sol, là où la vase est plus aérée. D'ailleurs, chez le pin de montagne, il n'y pas de racine pivotante, le système racinaire est étalé au-dessous de la surface (fig. 99).

Plus encore que le pin des tourbières, le cyprès chauve (*Taxodium distichum*) des Etats-Unis (Virginie, Caroline, Louisiane) pénètre à demeure dans les grands marécages (fig. 100) où abondent les nénuphars variés (des *Nelumbium*, des *Brasenia*) un peu à la façon de nos pins de marécages en formant une lisière forestière qui se reconnaît de loin aux troncs en gros cônes renversés à la base et

à la haute couronne en parasol. C'est l'un des rares conifères qui perde son feuillage en hiver. Au lieu de détacher ses feuilles une à une, il désarticule des petits rameaux qui chaque année portent les aigrettes délicates.

Chose curieuse, le mélèze (*Larix decidua*), qui appartient aussi

Fig. 99. — Etang de la Gruyère, près de Saignelégier (Jura bernois); on voit la sagne entourée par une forêt de Pins de montagne; au premier plan les arbres pénètrent dans la tourbière, s'étant implantés dans les touffes solides des laiches (*Carex stricta*). Phot. de R. C.

à la catégorie des arbres conifères à feuilles caduques, est une plante continentale des régions les plus sèches de nos Alpes et de la Sibérie à climat continental.

Rien de plus triste qu'une forêt de mélèzes en hiver; ce ne sont que fûts et bâtons desséchés comme si le feu avait passé par là. Tout aussi désolées, les forêts de cyprès chauves pendant la période de défeuillaison. A l'apparence chauve vient ici se joindre la désolation qu'ajoute l'eau, les cadavres flottants ou accumulés

des troncs que le vent a renversés. Paysage d'inondation en hiver. Quelques barbes grises de *Tillandsia usneoides* (fig. 91) (Spanish moss) pendent lugubrement des branches qui se tordent ou se tendent comme un personnage tourmenté.

Fig. 100 — Dismal Swamp, Lac Drummond, Cyprés chauves en hiver, portant une végétation d'épiphytes (*Tillandsia usneoides*). D'après Kearney. Dess. de R. C.

Mais lorsque revient le printemps, quelle délicate frondaison ! On voit tout le long des branches sortir les ramuscules qui porteront les feuilles d'un vert gai. C'est comme au mois de mai les bois de mélèzes, dans la montagne.

Il faut aller voir cet arbre dans le *Dismal Swamp*, à la limite de la Virginie du N. où il forme, avec le gommier américain

(*Nyssa biflora*, *N. aquatica*), des forêts mystérieuses dans lesquelles l'habitant ne s'avanceit autrefois qu'avec crainte (fig. 102). Nous n'avons rien en Europe qui pourrait rappeler ces marécages forestiers avec leurs eaux foncées (1-3 pieds) rendues livides par la lumière chlorotique qui filtre à travers le feuillage et qui semblent cacher de profonds abîmes, vasières dans lesquelles on s'enlise

Fig. 101. — Le *Sterculia Wigmanni* à Java. «Sapopema», c'est-à-dire arbre tropical dont les racines, à leur insertion sur le tronc, se sont élevées en forme de planches et constituent un socle.

Dess. de R. C., d'après une photographie de A. Ernst.

sans espoir (*Dark Swamp*). Ici s'accumulent d'immenses quantités de substance organique, des forêts englouties de cyprès plus que millénaires; c'est donc l'un des endroits du monde où l'on peut le mieux se représenter la manière dont se sont formés les charbons dans la période carbonifère. Il y a par places jusqu'à trois mètres et plus de matière charbonneuse noire.

C'est là, dans ces eaux sombres, que croît une forêt dont les principaux représentants ont la base élargie en un immense

socle qui, dans le cyprès chauve, atteint parfois huit à dix fois l'épaisseur des troncs au-dessus du renflement (*fig. 100*). Le plus singulier de ces arbres a reçu, à cause de cette particularité, au lac Drummond (*fig. 100*), le nom de *Samson Maul*. Cet élargissement de la base s'observe aussi dans les autres arbres de ces stations, en particulier à la base du tronc des *Nyssa* et du frêne de la Caroline (*Fraxinus caroliniana*). Ces arbres atteignent parfois 35 m., et leur tronc au-dessus du tubercule dépasse un m. et demi en diamètre.

Dans tous les cas étudiés, il s'agit là d'insertions de racines qui, au lieu de se détacher sur une racine primaire pivotante, se dégagent de la base du tronc pour courir ensuite parallèlement au sol.

Dans nos forêts, les arbres qui ont cette sorte de racines superficielles ont aussi souvent, mais à un degré moindre, de ces épaississements basilaires : ainsi chez le sapin rouge, mieux encore chez l'érable. Dans la forêt équatoriale, où ces socles prennent parfois des dimensions gigantesques, ils se forment comme chez les arbres qui maintiennent leurs racines à peu de distance de la surface du sol. Alors on voit le tronc comme soutenu par un socle renforcé de lames ligneuses qui, ainsi que d'énormes planches (*Sapopema*) (*fig. 101*), viennent en triangle en assurer la stabilité. Ces excroissances extérieures sont parfois si développées, en Amazonie, qu'entre deux saillants le voyageur n'a, pour compléter d'un toit la hutte naturelle offerte par l'arbre, qu'à étendre quelques grandes feuilles de palmier sur les hypoténuses de deux *Sapopema*¹ adjacents (SPRUCE). Ceci s'observe, mais à un degré moindre, chez nos palafitteurs végétaux N. américains, les *Taxodium* et les *Nyssa*. On pourrait aussi comparer ces socles fixateurs aux énormes griffes des grandes algues marines, comme on en rencontre dans les *Saccorbiza* et les *Laminaria* de l'Océan. Nous ne connaissons rien des intentions de la nature, mais nous savons que de semblables structures sont réalisées un peu partout dans le règne végétal là où une fixation solide semble s'imposer. Nous verrons chez les palafitteurs marins ce même principe d'élargissement de la base s'affirmer d'une manière encore plus évidente quoique au moyen d'un système tout autre. Nous l'avons également vu se marquer dans la manière curieuse dont certains *Tillandsia* sans racines se dressent sur un socle basilaire fait de tentacules disposées en un large cône (*fig. 95*).

¹ *Sápo* racine, *péma* plat, dans la langue des Indiens de l'Amazonie, d'après SPRUCE.

Fig. 102. — Cyprès chauve entouré de ses racines dressées et qui font saillie hors de l'eau ; en arrière, une végétation de *Nyssa* (*Nyssa biflora*). Dess. de R. C , d'après Kearney.

Ajoutez encore à cette apparence inusitée de troncs qui sortent comme d'un gros champignon aquatique la couronne des racines aériennes dressées qui émergent du lac ou de la vase du marécage, comme autant de gigantesques asperges, cela complétera l'image fantastique qu'offre en beaucoup d'endroits la forêt de cyprès chauve. Ce sont en effet des racines, ces énormes doigts qu'on voit régulièrement disposés tout à l'entour. Il vaudrait mieux dire narines car ils représentent en quelque sorte les grosses narines d'un hippopotame qui élève au-dessus de l'eau, tout en restant immergé lui-même, ses orifices respiratoires. Ces racines érigées ne se développent bien que lorsque l'arbre croît dans un sol couvert d'eau. Dans les grands marécages du Mississippi et de ses bayous, ces productions coniques s'élèvent souvent jusqu'à 2 m. au-dessus des racines horizontales qui leur ont donné naissance. Aux hautes eaux, alors que le socle est inondé,

Fig. 103. — Forêt de Cyprès chauves (*Taxodium distichum*), pénétrant dans un lac de Floride.
Dess. de R. C., d'après une photographie.

on voit encore (par exemple en Floride) émerger de l'eau, de la nappe uniforme, les narines du cyprès chauve (fig. 102).

Dans les gommiers (*Nyssa*), les racines sortent aussi de l'eau; mais pour respirer hors de la vase ou hors du liquide asphyxiant, elles se relèvent sur leur parcours horizontal en forme d'arceaux tournant leur convexité vers le ciel.

Plus belles encore, les forêts inondées des régions lacustres de la Floride avec leurs cypraies aux couronnes étalées qui s'avancent en colonnes serrées (fig. 103) à la conquête de l'eau noire, dans des lacs où se sont rencontrés les plus beaux nénuphars (*Nymphaea*, *Nelumbo lutea*, *Brasenia*). Ces arbres sont envahis à un tel point par les *Tillandsia* qu'ils ressemblent, par leurs barbes grises, à des saules pleureurs d'un nouveau genre. On pourrait aussi les comparer à nos forêts de conifères lorsqu'elles sont envahies par les épiphytes lichens, les *Usnea* (*U. barbata*) ou les *Alectoria* (*A. jubata*).

Fig. 104. — Palétuvier (*Rhizophora mangle*) au Cameroun, dont on voit les racines échasses partant des branches inférieures. Dess. de Em. et R. C., d'après une photographie.

Il n'y a rien de plus beau, à mon sentiment, que les paysages de marécages, surtout lorsque la végétation forestière les encadre (fig. 103) ou comme, en Camargue, les étangs dans lesquels se reflètent tamaris, genévriers de Phénicie ou pins pignons.

Plus merveilleux encore les rivières au cours incertain, les grands fleuves américains pleins de graminées aquatiques, dépassées par les grandes forêts mystérieuses qui, avec leurs lianes fleuries, semblent s'écrouler dans les eaux.

La formation marine des *palétuviers* (mangrove) est beaucoup plus uniforme :

Lorsque, après une longue traversée, le vapeur pénètre dans l'estuaire d'un grand fleuve ou aborde vers une côte basse des Tropiques, l'œil, enchanté de contempler de nouveau la côte, aime à se reposer sur le vert uniforme des cordons littoraux de forêts aquatiques qui prolongent le littoral dans la mer.

Il y a, en effet, sur toutes ces côtes basses, que ce soit à l'embouchure de l'Amazone, sur la côte de Zanzibar ou dans l'Insulinde une végétation spéciale d'arbres, aux couronnes arrondies, qui se confondent en une ligne presque uniforme d'un vert sombre et qui, sur des échasses, à marée basse, semblent vouloir marcher à la conquête de l'Océan (*fig. 104*). A marée haute, on ne voit plus que la monotone silhouette de la couronne des palétuviers inondés.

Or, ces palafitteurs marins, que le vulgaire croit reconnaître à chaque escale dans son voyage autour du monde, sont loin d'être aussi uniformes que leur silhouette générale le laisserait supposer.

Il y a d'abord les plus répandus, les *mangliers* (*Rhizophora* et *Bruguiera*) qui appartiennent à une famille voisine des myrtes (Rhizophoracées) souvent réunie aux Lécythidacées et dont le représentant le plus réputé est le *Bertholletia excelsa*, la noix de Para bien connue.

Le *Rhizophora mangle* est l'un des palétuviers américains ; le *R. mucronata* de l'Afrique orientale et de l'Asie tropicale ; le *R. conjugata* est exclusivement asiatique.

Les *Bruguiera* sont répandus de Zanzibar à l'Insulinde (*B. gymnorhiza*). Les *Ceriops* de l'ancien Monde sont de la même famille.

Les *Sonneratia* sont d'une famille voisine des Lécythidacées (Sonneratiacées), de même que les *Lumnitzera* et les *Laguncularia*, qu'on met dans les Combrétacées. Puis viennent les Verbénacées, du genre *Avicennia*, de la côte brésilienne et congolaise. (*A. nitida*, *A. africana*).

On voit donc que les principaux représentants des palétuviers appartiennent à des familles systématiquement voisines, car Rhizo-

phoracées, Lécythidacées, Sonneratiacées sont apparentées aux Myrtiflores, parmi lesquelles on rencontre des plantes étroitement adaptées à la vie aquatique (Oenothéracées (*Jussiaea*, *Trapa natans*).

Mais les *Xylocarpus* de l'ancien Monde sont des Méliacées comme les Carapa.

Pour bien comprendre cette biologie des palafitteurs végétaux, nous allons, cette fois-ci, nous transporter dans l'Afrique orientale

Fig. 105. — « Mangrove » avec racines respiratoires dressées du *Xylocarpus granatum*.
Dess. de R. C., d'après phot. J. Schmidt.

équatoriale. Nous aurons pour guide l'un des meilleurs connaisseurs de la flore africaine, M. Ad. ENGLER.

Comme à l'embouchure de l'Amazone, on voit, de Laru jusqu'à Beira, même jusqu'à Durban, les palétuviers occuper le pourtour des estuaires et ne remonter les fleuves que pour autant que l'eau reste encore saumâtre. Si on pénètre en bateau dans ces formations sylvaques littorales, à marée haute, on ne voit guère, au-dessus de la surface de la mer, que les couronnes arrondies de ces petits arbres, d'un vert foncé uniforme. C'est tout d'abord, en venant de la mer, le *Rhizophora mucronata*, au feuillage toujours

vert, qui forme une paroi compacte de limbes coriaces lancéolés. A marée basse, on peut voir que du tronc principal partent, de tous côtés, presque à angle droit, des grosses racines brunes qui, en grand arc, atteignent la vase où elles développent des racines secondaires (fig. 104). Ainsi se constitue, à la base des arbres, un panier renversé élastique, une espèce de nasse, qui peut résister à la fois au courant du fleuve et au choc des vagues de la mer dé-

Fig. 106. — A, Pneumatophores, c'est-à-dire racines dressées de la Verbenacée *Avicennia officinalis*. — B, *id.*, mais racines genouillées du *Bruguiera caryophyllata*. D'après Schimper.

montée. On voit parfois aussi des racines adventives, chez les grands arbres, partir des rameaux qui, cette fois-ci, descendent verticalement comme un câble jusqu'à ce qu'elles arrivent au contact de la vase où, à leur tour, elles se fixent par des racines latérales. De ces racines verticales naissent, à une certaine distance de leur sortie des branches, des racines secondaires qui en arc, comme celles qui sont sorties du tronc, assurent la stabilité.

Un peu plus en arrière de ce premier cordon de palétuviers s'en constitue un second, formé par le *Ceriops Candolleana*, qui est du même type que le *Rhizophora*, mais de taille plus réduite.

Ce sont là les vrais arbres sur échasses, en quelque sorte les éclaireurs, l'avant-garde des palafitteurs végétaux. La haute cou-

ronne des *Bruguiera gymnorrhiza* dépasse de beaucoup le cordon uniforme des mangliers; c'est le plus grand arbre de la formation; à sa base se développe aussi, mais comme il convient à un végétal qui occupe une zone plus continentale, un système de racines en corbeille. En plus, on voit partir du pourtour inférieur du tronc

Fig. 107. — La « mangrove » formée par le *Bruguiera gymnorrhiza* avec ses racines genouillées, à marée basse, au sud de Liukiu. Dess. de R. C., d'après Warbourg.

d'autres racines qui, sur leur premier parcours, se glissent horizontalement sous la vase puis se relèvent brusquement en genou replié (fig. 106 B, 107) pour disparaître ensuite de nouveau dans le sol. Parfois, ces racines genouillées s'élèvent à 50 cm. au-dessus du parcours horizontal. On donne à ces organes, comme à ceux dont nous allons parler, le nom de *pneumatophores*, à cause de leur structure spongieuse qui se prête, par ses lacunes, à favoriser la respiration à la façon d'un poumon; mais ce sont ici des racines

secondaires qui, nées de la racine horizontale, s'élèvent hors du sol pour se replier en angle aigu et s'enfoncer de nouveau.

C'est aussi ce qu'on observe chez le *Lumnitzera racemosa*. Dans les deux espèces suivantes, qui habitent plus à l'intérieur, souvent même sur le sable exposé aux variations de la marée, du flux et du reflux, nous voyons se répéter ce que nous avons déjà observé chez le cyprès chauve, c'est-à-dire la production de racines aériennes dressées qui, hors de la vase ou du sable, élèvent leurs asperges, leurs pneumatophores. Tout autour d'un *Sonneratia*, d'un *Avicennia*, il y a, à marée basse, comme une plantation de ces cônes ou de ces cylindres hauts de 0,5 cm. à 1 m. 50 (fig. 105, 106 A).

Dans les *Xylocarpus*, ce sont, sur les racines horizontales, des excroissances disposées en série.

Chez toutes ces plantes, il s'agit d'organes qui portent un tissu aérifère spongieux en communication avec l'atmosphère. On peut comparer ces organes aux lenticelles qu'on voit sur le liège qui enveloppe les tiges, les branches de nos arbres et qui, formées de cellules lâchement réunies, servent à assurer, à travers l'écorce, une aération suffisante des tissus profonds.

Seulement, ici, cette disposition s'exagère, les cellules se spécialisent en un tissu, l'aérénchyme, dont l'alvéolation rappelle celle d'un poumon.

Comme toujours, il ne serait pas difficile de trouver, même chez nous, dans les marécages, des arrangements analogues, ainsi à la base des tiges des saules, des ombellifères aquatiques, des salicaires, des *Jussieua*, etc.

Ce qui n'était qu'esquissé chez les cyprès chauves est maintenant, chez les palétuviers, amplifié, spécialisé. La plante aquatique marine s'est ainsi fabriqué un appareil respiratoire de secours, qui certainement facilite la mise en liberté d'énergie au profit de la croissance, dans un milieu pauvre en oxygène.

On a décrit des racines aérifères de même valeur chez une plante herbacée très répandue, le *Jussieua repens*, d'une famille de plantes alliée aux précédentes, la famille des Onagracées, qui comprend beaucoup d'espèces aquatiques ou hygrophiles d'eau douce.

Ainsi, tout ce cortège de végétaux aquatiques réagit de la même manière au contact de l'eau, c'est-à-dire sous l'influence

d'une aération insuffisante; on ne sera donc pas trop étonné de reconnaître dans d'autres particularités, en rapport avec la vie aquatique, de semblables convergences, c'est-à-dire des répétitions

Fig. 108. — A₁, A₂, fleurs fécondées vivipares du *Bruguiera gymnorhiza*; A₃, embryon qui vient de se détacher de la fleur A₂; on voit en haut la ligne de rupture circulaire. — B, Autre *Bruguiera vivipare*; C, *B. eriopetala*, plantule qui s'est détachée et qui germe, suite de A₃.

Dess. de R. C.

analogues de forme et de structure, qui paraissent au premier abord constituer comme une réponse au milieu. Mais dans la réaction des racines aérifères, qui semble adéquate, c'est-à-dire conforme, ou plus simplement dit, comme calculée pour le milieu vaseux, la riposte s'exerce directement sous l'influence du milieu ambiant:

l'action de la vase humide peu aérée s'exerce sur la racine qui y est immergée; dans le cas des échasses des palétuviers, par des raisons plus difficiles à définir, les raisons d'équilibre dépendent de la disposition générale des racines dans l'ensemble des plantes enracinées.

Fig. 109. — *Rhizophora mucronata* (Java). Trois fruits qui germent sur l'arbre et dont on voit l'embryon, qui a produit déjà une longue racine, prêt à se détacher et à tomber dans la vase; voir sur les côtés de la racine les protubérances qui deviendront les radicelles fixatrices. Comparez avec fig. 110.
Dess. de R. C.

Seulement, chez ces plantes à échasses, qui sont d'ailleurs toutes des plantes aquatiques ou des lieux humides, la réaction se fait indirectement et non pas sur l'axe principal de la racine, laquelle généralement ou ne se forme pas, ou se détruit de bonne heure. Dès lors, l'arbre ne peut se fixer par un pivot solide qui fait défaut.

On sait, d'ailleurs, avec quelle facilité certaines plantes produisent des racines adventives sur les tiges quand ces dernières sont exposées à l'humidité et surtout quand elles sont détachées de leur racine. Or, chez nos mangliers, il s'agit d'un cas semblable ; la racine terminale faisant défaut, l'axe aérien est sous l'influence de l'humidité. Les palétuviers à échasses ne font donc qu'utiliser, d'une manière adéquate, une propriété très répandue dans le règne végétal, celle de produire, à l'humidité, des racines adventives.

Mais pour bien saisir tout ce que cette réaction a de valeur au point de vue de la réussite du palétuvier, il faut le reprendre peu après sa fécondation. La fleur, qui ressemble un peu à celle d'une salicaire de nos marécages, mais dont l'ovaire est infère, laisse tomber dès ce moment sa corolle et ses étamines. Le fruit qui en résulte a la forme d'une poire renversée (*fig. 109*) ; au lieu de tomber, il reste attaché à l'arbre. Bientôt on voit du milieu de ce fruit, suspendu comme une petite poire et couronné par les dents du calice, sortir progressivement un corps allongé qui ressemble à une longue silique, charnuë, à un haricot géant et qui peut atteindre parfois 40 cm. à 1 m. de longueur. C'est l'embryon dont l'axe, au-dessus des cotylédons, s'est accru en un corps longuement fusiforme qui s'épaissit, vers son extrémité libre, en une massue allongée. Au lieu de laisser tomber son fruit ou de le laisser emporter par les oiseaux frugivores ou de s'ouvrir pour mettre en liberté ses semences, il modifie totalement le mode de faire habituel. Il conserve sa semence unique, qu'il enveloppe de sa pulpe. Dans cette semence, il y a un gros embryon qui germe en plantule pendant que le fruit est encore attaché à la branche. Par conséquent, on peut dire du manglier qu'il est vivipare. Le corps qui tombe est comme un bâton fusiforme, lourd et pointu, qui porte à son sommet le bourgeon terminal (*fig. 110*). La semence unique, enfermée dans un

fruit charnu, a germé sur l'arbre. L'embryon se nourrit des réserves au moyen de ses deux gros cotylédons qui, soudés en un corps unique, absorbent les matières déposées dans le tissu nourricier, l'albume de la semence.

Finalement, la plantule, qui comprend un bourgeon terminal (plumule) et l'axe allongé qui s'est développé au-dessous des cotylédons, se détache de ces derniers qui avaient servi d'intermédiaires, c'est-à-dire de suçoir, entre le tissu nourricier et l'embryon en voie de croissance. Si la chute de ce corps a lieu à marée basse, la plantule, entraînée en direction verticale par le poids de la partie renflée et lourde, s'enfonce directement dans la vase. Déjà avant de tomber, la plantule avait préparé des racines secondaires, cachées sous les tissus du corps en masse; en peu d'heures,

Fig. 110. — *Kandelia Rheedii*, Insulinde. A, fleur fructifère encore attachée à la branche; hors du fruit sort l'embryon avec sa radicule fusiforme (comparez avec fig. 108 et 109); B, embryon qui vient de se détacher et qui a laissé les cotylédons dans le fruit en place; on voit la ligne de rupture circulaire à la base du bourgeon primaire (plumule) qui se développera en pousse feuillée (fig. C), tandis que des racines fixatrices se formeront au bout de la radicule.

Dess. de R. C.

elles se développent, percent les tissus et ancrent solidement la plantule dans la vase. Mais, à marée haute, beaucoup de plantules sont emportées par le courant, plusieurs se perdent; d'autres, cependant, s'étant imbibées d'eau, plongent grâce au renflement en massue qui fait plomb et s'implantent dans les bas-fonds, comme il a déjà été dit.

La même viviparie a été observée chez d'autres Palétuviers *Aegiceras* (Myrsinacée), les *Ceriops Candolleana*, le *Kandelia Rheedii* (fig. 110), le *Bruguiera eriopetala*, *B. gymnorrhiza* (fig. 108, 111) et

Fig. 111. — *Bruguiera caryophyllata* (Asig). Trois fleurs fécondées; de droite à gauche, l'embryon en voie de développement; en gris le tissu nourricier, l'embryon en blanc; dans la troisième figure, la radicule grossie s'allonge verticalement pour saillir au dehors (comparez avec fig. 108, 109, 110, qui représentent les états plus avancés). D'après Schimper.

d'autres. Chez d'autres espèces la viviparie fait défaut, mais on retrouve dans la biologie de leurs semences des particularités intéressantes. Ainsi, dans les espèces du genre *Sonneratia*, les semences nombreuses, munies d'une enveloppe ligneuse, flottent et germent sur l'eau en moins de vingt-quatre heures. Chez les *Avicennia*, le fruit ovoïde tombe sur l'eau, s'ouvre peu après par une fente qui émet la plantule déjà très avancée dans son développement et qui, tombant au fond de l'eau, s'ancre au sol au moyen de poils crochus.

Chez d'autres la semence est munie d'un flotteur qui maintient la plantule dans une situation normale pour sa germination. Ainsi celle des *Xylocarpus* qui, de forme tétragonale, tourne invariablement l'une de ses faces du côté de la surface de l'eau. On comprend qu'il en soit ainsi, car de ce côté le tégument séminal est constitué par une couche épaisse de liège, tandis que du côté de la pointe, tournée en bas, le tégument est mince. L'embryon lourd, et qui fait plomb, se loge vers le sommet de ce tétraèdre et sa

radicule peut germer vers l'eau (*fig. 113 B*). Finalement elle tombe au fond, où elle s'implante en se libérant des racines latérales.

Fig. 112. — Espèce de *Cerriops* de l'Insulinde; à droite le fruit attaché à l'arbre, vivipare; à gauche l'embryon qui s'est détaché et dont l'extrémité de la radicule commence à produire les radicelles fixatrices.

Dess. de R. C.

A

B

C

Fig. 113. — *Xylocarpus obovatus*; A, graine vue de côté; B, section longitudinale de la graine; C, graine en germination dans la situation qu'elle a lorsqu'elle nage sur l'eau.

D'après Karsten.

Chez toutes les espèces de la formation des Palétuviers, on a constaté une remarquable conformité entre le mode de dissémination et les nécessités de la station. Il y a là de troublantes conformités au milieu, que la plus ingénieuse physiologie n'explique pas.

Fig. 114. — A, B, C, légumes indéhiscent d'une Mimosacée sud-américaine, l'*Inga uruguensis*, dont les graines, qu'on voit dans la section D, sont enveloppées dans une espèce de liège flotteur.

Dess. de R. C.

Ainsi les semences de beaucoup d'arbres et de plantes de rivages germent en peu de jours, même souvent perdent rapidement leur faculté de germination.

Sans doute, l'absence de période de repos est commune chez les semences des espèces aquatiques; l'humidité favorise la germination. Mais il faudrait expliquer aussi la structure adéquate du fuseau alourdi des embryons des mangliers qui est dirigé exactement comme le veut la théorie de l'adaptation; expliquer aussi que chez ces espèces les cotylédons se désarticulent au bon moment; dire pourquoi dans la semence du *Xylocarpus* le lest est

accumulé du côté qui devra laisser passer la racine en germination et tant d'autres particularités curieuses de ces plantes étonnantes.

Il faudrait avoir le temps de décrire, à côté des semences de cette Méliacée, comme calculées dans leur structure pour ce voyage en mer, les semences ailées des grandes espèces sylvatiques du genre *Cedrela*, de la même famille, emportées par le vent lorsque l'arbre est défeuillé, ou chez d'autres genres de Méliacées, les *Trichilia* et les *Guarea*, les semences suspendues sous le feuillage, ou exposées sur le feuillage, avec des arilles charnus, de couleur vive, qui attirent les oiseaux de la forêt tropicale, friands de cette pulpe douceâtre, pour bien montrer le lien qui unit le mode de dissémination et l'habitat. Les espèces hydrophiles n'ont pas leurs semences construites pour la dissémination par le vent, celles des forêts n'auraient que faire de flotteurs.

Cela est tout aussi évident dans d'autres familles. Prenons, en remontant le grand fleuve, sur les bords de l'Amazonie, là où cesse déjà le cordon des Palétuviers, par défaut d'eau saumâtre, comme exemple, les grandes lianes du grand *Entada polystachya* qui, sur les bords de la forêt riveraine, s'élèvent jusqu'à 10 et 20 mètres de hauteur.

C'est une Mimosacée dont le fruit a la forme d'un grand haricot aplati. A la maturité, la peau du fruit se détache successivement par lambeaux et met à nu l'intérieur du gros haricot dont les nervures marginales, formant cadre, retiennent encore pour un temps les semences. Celles-ci sont enfermées chacune dans un flotteur aplati, de la nature et de la consistance de ce liège dont on fabrique les bouchons. Dans le grand genre *Mimosa*, qui comprend plus de trois cents espèces américaines, il est des espèces qui vivent dans l'eau et qui ont développé — et cela ne se trouve que chez les espèces aquatiques ou riveraines — le même mode de dissémination que les *Entada* de l'Amazonie. C'est en particulier le cas d'une plante que nous avons rencontrée autour des lacs et des étangs du Paraguay et qui, dans l'eau, forme une brousse épineuse presque inaccessible (*Mimosa asperata*).

On attribue la grande dissémination de l'*Entada scandens*, dont les fruits peuvent atteindre un mètre de long, à son mode de

désarticulation qui permet à ses semences d'être transportées par les courants marins.

Il faut aussi citer, dans la même famille des légumineuses, les grands *Inga*, arbres sur échasses, qui bordent les fleuves de presque toute l'Amérique du Sud et dont chaque espèce a un mode particulier de dissémination par l'eau. Voici, par exemple, le fruit

Fig. 115. — Marais, espèce d'« Ygapo », bordée d'une forêt d'*Inga*, au Paraguay.

d'une espèce de ce genre qui abonde sur les rives du Paraguay. Les semences sont portées dans un légume cylindrique qui ne s'ouvre pas à la façon des haricots, mais dont toute la paroi transformée en un tissu spongieux sert de flotteur (*fig. 114*).

Mais, dira-t-on, toutes les plantes, tous les arbres de marécage, tous ceux qui bordent les cours d'eau montrent-ils, chacun dans leur genre, des dispositifs aussi évidemment en rapport avec leur mode de vie? Certainement pas. Dans chaque formation végétale, à côté de plantes dont on peut lire sur leurs organes visibles, sans trop de difficulté, la manière de se conformer au

milieu, vous en trouvez d'autres, souvent beaucoup d'autres, dont la réaction n'est pas aussi évidente, beaucoup qui dans leur structure visible ne trahissent rien de particulier. Des arbres qui, pendant de longues périodes, des semaines, des mois, vivent inondés jusqu'à hauteur d'homme et qui semblent n'avoir pas réagi vis-à-vis de ce milieu si peu aéré.

Ainsi, sur les bords des grands fleuves sud-américains, on rencontre quantité de végétaux qui, malgré leur présence exclusive dans ces stations, n'ont développé, au cours de leur histoire supposée, aucun appareil particulier. Et cependant, ils sont soumis à des inondations périodiques et souvent persistantes, parfois pendant plusieurs mois chaque année, pendant lesquels les arbres jeunes et les buissons pendant toute leur existence doivent être doués de la curieuse propriété de survivre à cette submersion complète et prolongée, ce qui constitue pour eux une espèce d'hibernation (SPRUCE). Beaucoup d'ailleurs se disséminent alors que les eaux se sont retirées. Il y a d'abord toute la frange de graminées habituelles sans autre adaptation que celle d'avoir des lacunes plus abondantes et une végétation plus vigoureuse. Souvent ce premier cordon est dépassé par une magnifique graminée, le *Gynerium saccharoides*, qui, en masses com-

Fig. 116. — Grand haricot (légume) d'une Mimosacée de l'Amazonie, *Entada polystachya*; on remarque que l'enveloppe du fruit se détache par lambeaux (ep.); l'intérieur se divise en articles formés d'un liège qui contient au centre une semence et à laquelle il sert de flotteur.

Dess. de R. C.

pactes, croît le long des rives inondées de l'Amazone et que j'ai eu aussi l'occasion d'observer dans les mêmes stations du Rio Parana et du Rio Paraguay. D'ailleurs, presque chaque espèce

Fig. 117. — Palmeraie-marécage (« Buritisales »), formée par le *Mauritia vinifera*, Matto-Grosso, Brésil.
Phot. D' Endlich.

qui habite l'Ygapo, ou les forêts riveraines, est représentée par un congénère sur terre ferme, ce qui fait supposer que l'une des formes dérive de l'autre ou que les deux ont une origine commune.

On l'appelle en «tupi» Uirva ou arbre flèche. Ses chaumes, de quatre à cinq mètres de hauteur, dépassent les hautes graminées ; épaisse comme le poignet, la tige montre des nœuds qui lui donnent de la solidité. On ne lui voit point de feuilles jusqu'à l'endroit où, sur deux rangs serrés, il porte un merveilleux éventail de feuilles en grandes lanières dont les extrémités, gracieusement recourbées, ajoutent à la grâce de l'écran.

Au moment de la floraison de cette herbe, un pédoncule d'un à deux mètres de long porte une belle inflorescence qui rappelle, mais en plus robuste, celle de nos roseaux d'Europe (*Phragmites communis*).

Souvent, en arrière des *Gynerium*, on voit des graminées plus vigoureuses encore, des *Chusquea*, des *Guadua*, espèces de grands bambous grimpants, faire reposer, comme de gigantesques plumes d'autruches, leurs chaumes de dix à vingt mètres, sur la paroi de la forêt riveraine. Ici et là un saule (*Salix Humboldtiana*), une espèce de saule pleureur, penche ses branches flexibles au-dessus des eaux. Ce sont aussi, par places, les troncs, droits et blancs, articulés, des arbres à trompettes, les *Cecropia*, qui élèvent contre le ciel bleu leurs rameaux verticillés et leurs grandes feuilles argentées en dessous, palmées comme celles de nos marronniers. Ce sont aussi les *Erythrina* aux troncs tortueux qui font penser, par la disposition de leurs branches, à des saules têtards, mais qui, au moment de la floraison, offrent aux colibris des fleurs papilionacées d'un rouge éclatant.

Ou bien, plus au nord, ce sont les palmeraies chacoennes infinies, périodiquement inondées, ou, en Amazonie, dans les îles basses, un monde d'autres palmiers amphibies sur un sol vaseux dépourvu de tout sous-bois. On y trouve, entre autres, l'*Ubussu*, un palmier sans tronc, dont les feuilles arrangées en bouquet élevé, dressé autour de la souche, ne sont pas complètement déchirées ou découpées comme celles des autres espèces de cette famille, mais restent à peu près entières, s'élevant toutes droites comme de gigantesques plumes d'oiseau, de 5 à 7 mètres de longueur sur 1 m. 80 à 2 mètres de largeur. Chacun de ces végétaux est assez caractéristique pour retenir l'attention, mais on n'est pas encore complètement informé sur les particularités de leur biologie de plantes amphibies.

Pour bien comprendre la biologie de ces îles, de ces plaines ou de ces rives inondées, il faudrait pouvoir séjourner longtemps dans ces régions insalubres, errer au milieu des arbres pendant l'inondation, les surprendre plus tard quand l'eau s'est retirée et qu'à l'humidité succède parfois une extrême sécheresse. BATES, SPRUCE et, plus récemment, mon ancien assistant et ami le D^r JACQUES HUBER y ont fait d'intéressantes constatations; mais l'Amazonie, le Brésil, avec plus de 40.000 espèces de Phanérogames, seront longtemps encore des terrains à exploiter pour ceux qui auront le courage et la force de tenter de semblables aventures.

Déjà maintenant nous connaissons de ces végétaux, caractéristiques pour ces terrains d'inondation, quelques particularités biologiques intéressantes. Parmi les, plus curieuses, les plus générales sont celles qui caractérisent les plantes américaines nommées myrmécophiles, c'est-à-dire amies des fourmis. Beaucoup de végétaux arborescents en Amérique donnent, en effet, asile à des fourmis, ce qui a donné lieu à plusieurs interprétations entre lesquelles il faut choisir.

Les plus connus de ces végétaux, les plus souvent cités, sont les arbres du genre *Cecropia*, dont les troncs, comme ceux d'un bambou, d'une graminée, sont fistuleux et divisés en chambres superposées. On ne rencontre guère de *Cecropia*, du Paraguay à l'Amazonie, qui ne soit habité par des fourmis. Il suffit de frapper contre le tronc pour les voir sortir de leurs cachettes, de leurs chambres, cherchant à se défendre de l'agresseur. Ce sont des fourmis *Azteca* (*A. Muelleri*). L'arbre (il en est de plusieurs espèces, *Cecropia adenopus*, *C. palmata*) atteint 15 m.; sa ramification est en candélabre et rien de spécial, quoi qu'on ait dit, ne trahit de l'extérieur la présence des insectes. Si on suit attentivement la colonisation des *Cecropia* par leurs commensaux, on constate que la reine fécondée d'*Azteca Muelleri* choisit une jeune plante de 1-2 mètres de haut et pénètre dans l'une des chambres. A cet effet, elle perce dans la paroi du tronc un orifice circulaire. Ce travail lui est facilité par cette curieuse coïncidence qu'il y a déjà prédisposition à cette perforation; le bourgeon axillaire semble avoir dans le bouton, dans le bourgeon, empêché la paroi du tronc de s'épaissir à cet endroit précis, si bien que l'animal n'a qu'à

forer une épaisseur minime et peu résistante. Arrivée dans la grande « cellule », la femelle oblitère l'ouverture avec un peu de la substance médullaire visqueuse qu'elle y trouve. Le résidu de la moelle sert à sa nourriture. Alors elle se met à pondre et élève quelques ouvrières qui émigrent en ouvrant la paroi qui s'est reconstituée par cicatrisation du premier orifice, et celles-ci vont à leur tour coloniser une chambre située plus haut. Peu à peu, s'établissent dans beaucoup de ces chambres des colonies partielles, lesquelles finissent par se concentrer dans une région supérieure du tronc qui affecte parfois une apparence renflée et comprend quatre à cinq en-

Fig. 118 — *Cecropia adenopus*. A, sommet d'un rameau avec bourgeon enveloppé d'une stipule gaine; on voit au 2^e entre-nœud une fossette allongée par laquelle l'insecte pénètre en perforant; dans le premier entre-nœud on voit la fourmilière avec les larves; puis successivement des chambres dont la moelle a été évidée; dans l'entre-nœud inférieur, on remarque la chambre vide et le trou par lequel elle communique avec l'extérieur. — B, section dans une tige jeune du même arbre; dans l'entre-nœud supérieur, la moelle non encore complètement rongée (en gris), dans la 4^e chambre, des fourmis.

Dess. de R. C.

trenœuds reliés par des perforations. Ces fourmis se nourrissent de la moelle de la jeune plante ou de celle des entre-nœuds supérieurs encore en voie de croissance. On voit aussi ces bestioles rechercher des glandes brillantes qui sont à la base des pétioles épaissis, du côté inférieur. Ces glandes sont mêlées à des poils brunâtres; finissant par se détacher de leur pédicelle, elles ne sont plus retenues que par le lacs des poils dans lequel elles sont suspendues comme des œufs minuscules dans un gazon microscopique. Ces corps sont riches en huile et en substances azotées et,

bien que les fourmis ne soient pas liées à n'utiliser que cette nourriture et qu'elles ne s'en servent pas pour nourrir les larves, elles paraissent en être très friandes.

Le naturaliste BELT, qui a publié sur le Nicaragua un remarquable volume de biologie (*The naturalist in Nicaragua*) est le premier qui ait fait la supposition que ces fourmis Azteca vivaient en symbiose avec les plantes sur lesquelles elles ont élu domicile, la plante fournissant logis et couvert. Mais quel serait le profit pour le végétal? Il le voyait dans la protection qui en résulterait pour les plantes myrmécophiles contre les ravages de ces terribles ennemis de la végétation américaine tropicale, les fourmis découpeuses, les fourmis jardinières, qui, avec les débris de feuilles, établissent des terreaux sur lesquels elles cultivent des champignons.

Pendant longtemps cette hypothèse a été acceptée; développée en théorie par F. MÜLLER et par SCHIMPER, elle n'a pu tenir devant la critique. En réalité, la protection conférée par ces commensaux est minime si même elle est réelle. Tout d'abord elle serait nulle dans les jeunes *Cecropia*, qui sont libres de fourmis avant d'avoir atteint la dimension indiquée plus haut. Les fourmis Azteca sont peu guerrières, et leurs combats sont menés contre toute espèce de fourmis qui les dérangent. Les *Cecropia* ont d'ailleurs d'autres ennemis plus dangereux, comme par exemple les paresseux, qui aiment à manger leurs feuilles et leurs fruits.

Quoi qu'il en soit, la présence de ces fourmis n'est pas un inconvénient pour le végétal, qui semble s'être parfaitement accommodé de cet hôte. Ce n'est pas non plus un simple accident, car il y a trop de particularités qui sont comme accordées entre la plante et son hôte. Parmi ces structures, il faut citer la préparation des portes à percer, la production de glandes nutritives, etc.

En 1869, le botaniste SPRUCE, qui avait passé en Amazonie quinze années comme botaniste voyageur, de 1849 à 1864, envoyait à DARWIN, pour être lu à la Société Linnéenne de Londres et éventuellement pour être publié dans ses *Transactions* un Mémoire sur les *Changements ou modifications dans la structure des plantes, produits par le moyen des fourmis*, et dans lequel il exposait, d'une manière excessivement suggestive une théorie qui a été,

d'une manière indépendante, reprise beaucoup plus tard, en 1900, par Jacques HUBER et BUSCALIONI lesquels, évidemment, ne connaissaient pas les recherches de SPRUCE sur le même sujet. Ce travail fut lu en séance le 15 avril 1869 et, comme de coutume, soumis au Conseil pour décider de sa publication. Après mûre considération, la décision fut communiquée à SPRUCE.

Le Comité, qui semble avoir été préoccupé de maintenir pure une doctrine darwinienne, opposée à l'hérédité des caractères acquis, fait savoir au naturaliste, qui connaissait alors le mieux la biologie amazonienne, que son Mémoire demande quelques modifications avant que ce Comité puisse en recommander la publication.

En réalité, il n'y avait dans la communication de SPRUCE autre chose que ce que depuis longtemps LAMARCK et ses disciples avaient affirmé et que beaucoup de demi-savants, aujourd'hui, confondant l'évolution avec les théories de l'évolution, appellent darwinisme.

Le titre expose bien le point de vue de l'auteur : *Ant agency in Plant structure*, ou « les modifications dans la structure des plantes qui ont été produites par des fourmis [par la longue durée de l'action desquelles ces modifications sont devenues héréditaires et ont acquis une permanence suffisante pour pouvoir être employées comme caractères botaniques] ».

J'ai mis entre parenthèses la partie du titre incriminée par le comité de la Société Linnéenne.

« Dans les forêts de l'Amazonie et de l'Orinoco et autre part dans l'Amérique tropicale, il y a de nombreuses plantes appartenant à des familles très différentes, qui possèdent de singulières dilatations de tissus et des membranes, sous la forme de sacs sur les feuilles ou de nœuds fusiformes creux sur leurs pétioles ou leurs branches (transformés en tubercules sur les rhizomes), ou même des branches minces allongées d'une manière désordonnée et fistuleuses. J'ai des raisons de suspecter que toutes ces structures, en apparence anormales, doivent leur origine aux fourmis et sont encore maintenues par elles, de telle façon que si leur action était supprimée les sacs immédiatement tendraient à disparaître des feuilles, les branches dilatées à devenir cylindriques et les rameaux allongés à se raccourcir, et, quoique l'hérédité de structures qui n'auraient plus raison d'être puisse dans bien

des cas se maintenir pendant des milliers d'années sans atténuation sensible, je suppose que dans quelques cas cette hérédité cesserait et que la feuille ou la branche retournerait à sa forme primitive. »

DARWIN, au mois d'avril 1869, dans une lettre intéressante, lui dit :

« Vous me demandez mon opinion ; si vous m'aviez posé cette question il y a un ou deux ans, je vous aurais dit que je ne pourrais croire que la visite des fourmis puisse produire un effet héréditaire ; mais récemment je suis arrivé à croire un peu plus à l'hérédité des mutilations, J'ai avancé contre cette croyance que les galles ne sont jamais héréditaires...

« Avez-vous observé le commencement de ces sacs dans de jeunes feuilles non encore déployées qui n'auraient pu à ce moment déjà être visitées par des fourmis?... »

« J'ajouterai que vous n'êtes pas tout à fait dans la vérité (à la fin de votre Mémoire) en supposant que je crois que les insectes modifient la forme des fleurs. Je crois seulement que des variations spontanées adaptées à la structure de certains insectes réussissent et sont conservées. »

Or voici que SPRUCE nous apprend, et ceci a été pleinement confirmé par les observations de HUBER, que toutes ces plantes myrmécophiles de l'Amazonie sont trouvées dans ces parties de la forêt qui sont adjacentes aux rivières et qui peuvent être inondées par ces dernières ou par les lacs ; parfois elles se rencontrent dans la profondeur de la forêt vierge, mais là seulement où le sol est assez bas pour que l'eau des pluies puisse s'accumuler jusqu'à former un petit lac d'une certaine profondeur.

Ce sont donc des plantes de forêts riveraines dont plusieurs sont submergées lors de la crue et qui offrent aux fourmis un *refuge contre l'inondation*.

Presque toutes les fourmis arboricoles, alors même que dans la saison sèche elles pourraient descendre sur le sol et y prendre domicile estival, gardent les sacs et les tubes mentionnés comme habitations permanentes, et plusieurs espèces paraissent n'avoir jamais d'autre domicile toute l'année. Il y a, il est vrai, quelques fourmis qui continuent à habiter des *Tococca* dans des régions où

il n'y a aucun danger d'inondation, comme cela est le cas pour le *T. pterocalyx* qui croît sur des pentes boisées des Andes. On pourrait citer aussi les *Cecropia* qui d'habitude bordent les cours d'eau, mais s'élèvent parfois sur les pentes des forêts. SPRUCE a comparé ce cas à celui des palafitteurs habitants des lacs de l'estuaire de l'Orénoque et des savanes inondées de Guayaquil, dont les descendants, qui habitent la terre ferme, bien loin du domaine des inondations et des marées de l'océan, continuent à bâtir leurs demeures sur des pilotis, à 6 ou 8 pieds au-dessus du sol.

Or, ce qui nous intéresse ici, c'est que tout un groupe biologique de plantes appartenant à des familles différentes et qui n'ont pas répondu par une structure adéquate, visible, à l'action de l'eau périodiquement agissante, pendant l'inondation des « Ygapo » ont acquis au cours de leur histoire, en compagnie avec les fourmis, des structures particulières qui en font des refuges de fourmis.

Toute la question serait de savoir si ces sacs et autres appareils, qui sont comme calculés pour les recevoir, sont, ainsi que le croyait SPRUCE, des ripostes à l'action de ces insectes, dont quelques-unes seraient devenues héréditaires, ou s'il faut avec DARWIN penser que les êtres varient spontanément et que, dans ces variations, la nature choisit celles qui correspondent à certaines conditions ou qui sont utiles. C'est là l'opposition du lamarckisme (hérédité des caractères acquis par l'usage, par les mutilations, etc.) et du darwinisme (variation spontanée lente et sélection dans la lutte pour l'existence des formes adaptées qui ainsi l'emportent et survivent).

Mais aujourd'hui encore, après tant d'années de patientes recherches, l'incertitude est tout aussi grande. Le comité de la Société Linnéenne, dont j'ai le grand honneur d'être membre étranger, ne me paraît pas avoir, à ce moment-là, été bien inspiré en refusant l'impression telle quelle de la superbe contribution du sagace naturaliste anglais. Cette question serait aujourd'hui plus avancée, car, à propos de ces plantes myrmécophiles, sous l'influence de BELT, de MÜLLER et de SCHIMPER, on a bâti des romans biologiques inacceptables au lieu de poursuivre logiquement la question d'origine.

La biologie contemporaine connaît sa faiblesse ; c'est une science descriptive comme les autres : elle expose les mœurs des plantes et des animaux sans pouvoir dépasser dans ses explications la limite incertaine des présomptions. C'est à la science de l'hérédité proprement dite, à la génétique expérimentale, qu'est dévolue la tâche de nous dévoiler l'origine des formes, la transmission des caractères et l'ordre de cette transmission. Mais cette jeune science est prudente ; elle a devant elle une tâche immense, qu'elle veut aborder méthodiquement.

Dans ce livre, nous ne faisons pas encore d'expériences, nous groupons des faits analogues et nous essayons d'entrevoir des solutions.

Ceux qui n'ont pas visité les Tropiques se font difficilement une idée de l'importance des insectes et, en particulier, des fourmis et des termites dans l'économie biologique de ces contrées.

Tous les voyageurs s'accordent sur ce point. Écoutons plutôt Spruce, qui se plaint du monde des insectes. Après avoir gémi sur les moustiques et les tiques, il ajoute : «et les fourmis faisaient leur nid au milieu de mes collections de plantes sèches et les saturaient d'acide formique ou même les découpaient pour les transporter au loin. Quel souvenir que celui d'une rentrée à la maison, où je trouvais celle-ci envahie par une armée de fourmis Arriero ou de Saùba, qui étaient en train de découper scientifiquement mes piles de spécimens séchés, en disques circulaires, dont le diamètre était exactement égal au plus long diamètre de l'artiste. Le peu de notes sur les insectes éparses dans mon journal de voyage se rapportent en effet à des fourmis, qui méritent d'être considérées comme les véritables propriétaires actuels de l'Amazonie bien plus que le Peau-rouge ou l'Homme blanc. »

On comprendra dès lors l'importance de ce facteur dans la biologie végétale des Tropiques. On commence seulement aujourd'hui à mieux saisir les dépendances mutuelles qui existent entre les deux règnes, plantes et animaux. Nous savons que, même chez nous, les fourmis jouent un grand rôle dans la dissémination des semences. Et ce qu'on connaît moins, ce sont les migrations noc-

turnes, ces hordes d'insectes que le voyageur imprudent s'expose à rencontrer inopinément sur son chemin et qui le mordent cruellement. Au premier cri que poussent ses compagnons, le voyageur

Fig. 119. — A, feuille de Mélastomacée (*Tococca guianensis*) avec sac à fourmis à la base. — B, base d'une feuille de *Tococca lancifolia*, montrant les deux sacs formicaires.
Fig. A, dess. de R. C. ; fig. B, d'après Schumann.

est amusé de les entendre en gémissant, sauter sur une jambe ou sur l'autre jusqu'à ce qu'à son tour il soit forcé de faire la même danse, les mêmes grimaces.

Mais il s'agit ici de ces curieuses fourmis qui se sont réfugiées sur les végétaux inondés des Ygapo. Nous avons déjà parlé de

celles des *Cecropia*. Encore un mot sur ces arbres à trompettes. On les trouve en Amazonie, formant souvent au-dessus du cordon de *Gynerium* une frange régulière, à un niveau qu'atteint certainement la crue périodique. Sur le cours de certains affluents de l'Amazone, les *Cecropia* constituent, dans les bas-fonds, des forêts presque pures de tout mélange.

Nous les avons vus le long du Rio Parana former une lisière au-dessus de la ligne régulière des bambous géants, vers la limite de l'inondation.

Quant aux *Tococca* de la famille des Mélastomacées, ce sont des buissons de 2 à 4 m. ; leurs feuilles opposées, lancéolées ou ovales, possèdent à leur base, tantôt sur chaque paire, tantôt seulement sur l'une des feuilles de chaque paire, un sac ou deux sacs accouplés (*fig. 119*).

La majorité des espèces de ce genre ont des feuilles à trois nervures, réunies par des anastomoses disposées en échelle ; il y a cependant un petit nombre d'espèces à cinq ou même à sept nervures. Chez toutes, l'origine des nervures les plus internes se prend à 2-3 cm. au-dessus de la base du limbe, sur la nervure moyenne. C'est cette portion du limbe située au-dessous de cette insertion qui se développe en sac. Celui-ci tantôt occupe une partie de la largeur du limbe, tantôt toute la largeur ; le sac s'ouvre en haut par un orifice étroit. Parfois, il y a des sacs des deux côtés de la nervure moyenne. On y trouve toujours des fourmis brunes, très guerrières, qui attaquent le botaniste qui herborise ; ces fourmis mordent mais ne piquent pas.

Chez l'une des espèces basses qui, lors de l'inondation, est complètement noyée, les feuilles ne portent pas de sac à fourmis. Ces bestioles ne pourraient pas y trouver de refuge. D'ailleurs, toutes les feuilles ne portent pas nécessairement des sacs à fourmis. Chez les Mélastomacées, pour une cause inconnue, des deux feuilles opposées, la plus grosse seulement en porte.

On pourrait supposer que ces excroissances, qui paraissent anormales, sont comme les replis ou les poches qui se forment sur plusieurs espèces de feuilles sous l'influence de certains aphides. Ce sont alors de véritables galles qui résultent d'une irritation locale provoquée par la présence de ces petits animaux et de leurs

sécrétions. Tout autour du point d'irritation, les tissus de la feuille se multiplient, elle devient bullulée (vigne : *Phyllocoptes vilis*, acariose) ou en sacs singuliers qui rappellent ceux des *Tococca*; par

Fig. 120. — Borraginacée de terrains d'inondation, le *Cordia nodosa* de l'Amazonie dont le nœud est renflé en formicaire; à gauche, section longitudinale; à droite, vue de l'extérieur; on a coupé les feuilles.
Dess. de R. G., d'après des matériaux conservés dans l'alcool.

exemple dans les *Len-tisques*. Mais, comme le dit justement DARWIN, aucune de ces galles n'est héréditaire.

Ici, au contraire, avant même que la plante ait pu être en contact avec les fourmis, elle leur prépare une demeure. Dans les serres à Kew, près Londres, les *Tococca* cultivées produisent spontanément de ces poches. Mais déjà SPRUCE avait remarqué que la présence des fourmis provoque une exagération de ces renflements.

Dans cette même famille, les genres *Myrmidone*, *Majeta*, *Calophysa* ont des espèces myrmécophiles, habitant les mêmes Ygapo. Chez le *Majeta guianensis* Aubl., les branches, épaissies au nœud, sont fistuleuses, ce qui met en communication les sacs des deux feuilles opposées.

On trouve également des sacs à fourmis à la base des feuilles d'une Rubiacée américaine, le *Duroia saccifera* (Amaiona). Ils sont moins marqués chez les *Remijia physophora* (Rubiaceae) et chez la Schizobalanacée *Hirtella physophora*, tous de la région amazonienne des inondations.

Sur les îles inondées des Uaupés, croît un bel arbre de 10 m., le *Tachygalia cavipes* et le *T. ptychophysa*; leurs feuilles pennées de Césalpiniées (Légumineuses) ont leur pétiole renflé en sac à

fourmis, qui donne réellement asile à des fourmis noires très petites, lesquelles y pénètrent par un orifice au-dessous du sac.

Les *Sclerolobium* ne sont pas en général des arbres de la forêt riveraine ; la seule espèce myrmécophile croît sur la berge du Rio Negro, qu'il parfume de ses belles inflorescences jaunes.

On trouve aussi des nids de fourmis sur les branches de certaines Borraginées arborescentes appartenant au genre *Cordia*, qui se renflent au-dessus des feuilles groupées en faux verticilles, *Cordia nodosa* (Pao de formiga), *C. formicarum*, *C. callococca*, etc.

Enfin, parmi les plus répandues des plantes à fourmis de la grande dépression amazonienne-paraguayenne, les Polygonacées de divers genres comme les *Triplaris*, les *Coccoloba*, les *Ruprechtia* des stations inondées des forêts riveraines ont, comme les *Cecropia*, leurs branches fistuleuses, quelquefois le tronc tout entier, de la racine presque jusqu'au sommet des jeunes branches, évidées par l'action des fourmis Tachi, qui toutes piquent violemment. Elles entrent dans leurs demeures par une ouverture qui aboutit à l'intérieur d'une stipule caractéristique pour cette famille, et qui, en un fourreau brun, enveloppe chaque base d'entrenœud.

Il reste des recherches de SPRUCE ce fait bien établi, comme aussi des confirmations d'HUBER et de BUSCALIONI, qu'en Amazonie, et probablement partout dans l'Amérique du Sud, la myrmécophilie a pris naissance dans le pays d'inondation et que, de même que les hommes, des végétaux, pour échapper à l'inondation, élèvent leurs demeures sur des échasses, sur des pilotis, les fourmis des Ygapo ont su ou profiter des accidents qui se sont formés à la base des feuilles, ou de la nature des tiges des arbres à bois tendre et à croissance rapide, comme le sont les arbres des marécages tropicaux, en y creusant ou en agrandissant les cavités naturelles, ou bien peut-être aussi ont-elles été la cause de la formation et de la fixation de ces curieuses structures qui semblent parfois calculées pour elles. Comme le dit SPRUCE, chaque « structure du végétal » doit être ramenée à l'action de forces non seulement internes, mais aussi extérieures à la plante elle-même.

« Dans cette merveilleuse « Vie », qui n'existe que par un chan-

Fig. 121. — Paysage de Chaco paraguayen, pays d'inondation, avec les grandes palmeries (*Copernicia australis*); les Capparidacées, arbres à couronne arrondie (*Crataeva Tapia*), et les brousses à *Acacia Cavenia*, plante myrmécophile.
Dess. de R. C.

gement perpétuel, chaque équilibre est instable, et ce que nous appelons « permanence » n'est peut-être qu'un état transitoire. »

Aujourd'hui, la majorité des naturalistes s'est ralliée à la théorie de HUBER et BUSCALIONI qui dit que les fourmis arboricoles ne rendent aucun service à leur plante hospitalière. Cela est peut-être exagéré. Il faudrait connaître mieux encore toute la biologie des myrmécophiles des Ygapo pour pouvoir être si affirmatif. On ne peut cependant ne pas être confondu devant certains dispositifs, ceux qui ont provoqué et l'étonnement de BELT et sa théorie de la symbiose. J'ai en vue les *Acacia* myrmécophiles comme l'*Acacia sphaerocephala*, l'*Acacia cornigera* qui non seulement donnent asile aux fourmis dans leurs grosses stipules métamor-

phosées en chambres hospitalières après la chute des feuilles, mais leur offrent, comme le font aussi les *Cecropia*, un corpuscule nourricier qui, ici, se développe au sommet de chaque foliole.

Au Paraguay, l'*Acacia Cavenia*, qui possède les mêmes stipules, est aussi une plante de pays d'inondation.

En décrivant cette vie curieuse des arbres amphibies, nous avons voulu montrer combien complexe est la nature dans ses manifestations. Nous ne saisissons de ses intentions à peu près que celles par lesquelles elle semble aller au-devant de nous en copiant les nôtres. Sommes-nous bien sûrs des nôtres? Connaissons-nous bien nos semblables? De même que cette plante qui, inondée pendant des mois, ne réagit apparemment d'aucune manière, il est beaucoup de taciturnes qui sentent profondément, mais dont rien sur le visage ne trahit l'émotion. Il me serait facile de montrer que toute action extérieure ne se manifeste pas nécessairement par une réaction visible, mais qu'elle est suivie de modifications internes qui interviennent dans les procès physiologiques de la respiration, de la nutrition, de la périodicité et de bien d'autres caractéristiques de la vie.

Encore à propos de cette catégorie, nous constatons que le matériel vivant est une mosaïque de caractères, de possibilités qui, différente dans chaque espèce, ne laisse apparaître son dessin que selon l'action des conditions extérieures.

BIBLIOGRAPHIE

- BÖRGESSEN, F. og. OVE PAULSEN. — Om vegetationen paa de danskvestindiske øer, Copenhagen (1898).
- HUBERT, J. — La végétation du Rio Purus (Amazonie), *Bull. de l'Herbier Boissier*, Genève, II^e série (1906).
- KEARNEY, T. H. — Report on a botanical Survey of the Dismal Swamp region, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.*, V (1901).
- SPRUCE, R. — Notes of a botanist on the Amazons and Andes, Edit. by A. R. Wallace, London (1908).
- SCHIMPER, A. F. W. — Die indomalayische Strandflora, *Bot. Mitteil. aus den Tropen*, III (1891). — *Id.* Pflanzengeographie (1898) 416. — *Id.* Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Ameisen, l. c. (1883).
- SCHENK, H. — Die Luftwurzeln von *Avicennia tomentosa* u. *Laguncularia racemosa*, *Flora* LXXII (1889).
- BUSCALIONI, L. et HUBERT, J. — Eine neue Theorie des Ameisenpflanzen, *Biolog. C. B.*, IX (1900).
- CHODAT et VISCHER, in Chodat, la végétation du Paraguay, IX (1919).
- CHODAT, R. et CARISSE, L. — Une nouvelle théorie de la Myrmécophilie, *Archives*, Genève, (1920).

R. C. del.

1. *SAXIFRAGA HIRCULUS* sur la tourbière.
2. *BETULA NANA*, buisson arctique des sagnes.

Les Sagnes.

(PLANCHES XII et XIII.)

J'AI déjà décrit plus d'une formation végétale qui doit son existence à l'exclusion de concurrents, éliminés par des facteurs extrêmes, qui ne peuvent leur convenir,

Le plancton des neiges est protégé, dans sa station, par la froidure constante, l'extrême insolation, l'action comburante de la neige au soleil, tandis que les Cyanophycées des thermes, étant les seules à supporter une température habituellement supérieure à 50°, restent maîtresses du terrain. L'eau agitée des cascades tropicales protège les Podostémonacées contre tout concurrent. Il y a ainsi dans la Nature des conditions extrêmes qui assurent à certaines catégories de plantes un domaine réservé.

En est-il de même des Sagnes? Mais disons tout d'abord ce que c'est qu'une Sagne. Sous cette dénomination on comprend, dans le Jura suisse romand, une formation bien définie, la tourbière élevée: cette tourbière qui, à son apogée, est un bassin d'eau dans une dépression imperméable, alimentée principalement par l'eau de pluie, complètement ou presque complètement rempli de mousses du genre *Sphagnum* (les Sphaignes). Ces mousses forment un immense coussin, bombé en son centre, et souvent de couleur vert pâle, ou à reflets rougeâtres, ou même parfois franchement rouges. Lorsque la Sagne est constituée définitivement, le voyageur peut s'avancer sans crainte sur ces canapés élastiques; il sent son pied comprimer la mousse ce qui fait jaillir l'eau par compression. C'est comme une masse spongieuse imbibée, vraiment comme une éponge pleine de liquide. La surface de ce canapé végétal est parsemée de buttes ou de coussins secondaires qui s'élèvent jusqu'à vingt-cinq centimètres au-dessus de la superficie générale.

Mais malheur à l'imprudent qui s'est aventuré dans une sagne en formation; il peut voir l'éponge céder sous ses pas, s'ouvrir, l'engloutir pour toujours.

Revenons prudemment sur la « tourbière élevée » déjà susceptible d'exploitation. Les fossés, les creux à tourbe nous montrent l'eau brune bien au-dessous du niveau de la surface végétale ; cette tranche nous permet de reconnaître que, de la profondeur à la surface, la tourbe a subi des altérations profondes ; presque noire au niveau de l'eau, elle est brune au-dessus, puis, vers la surface elle pâlit ; maintenant

nous pouvons, en écartant un peu les tiges dont elle est formée, reconnaître que cette surface est vivante, à une profondeur qui varie de six à vingt centimètres. Elle est tout entière constituée par les extrémités, serrées les unes contre les autres et dressées, des tiges des Sphaignes qu'on peut suivre bien profondément dans la masse tourbeuse, mais qui ne sont plus, au delà de cette zone vivante, que des fibres jaunies et mortifiées.

Si nous suivons l'une de ces tiges dans la profondeur nous verrons qu'elle n'est que la ramification de tiges plus profondes encore qui, toutes, portent des rameaux dressés. Tige et rameaux sont couverts de feuilles imbriquées, qu'on n'aperçoit guère parce qu'elles sont dressées et appliquées les unes contre les autres. C'est un revêtement de petites écailles qui recouvrent l'axe central, la tige, les rameaux.

C'est d'ailleurs une mousse assez singulière ; sans racines, sans poils d'absorption, sans sys-

Fig. 122. — Sommet d'une mousse de sagne, du genre *Sphagnum*, rameaux garnis de feuilles.

Gross. 2 fois.

Dess. de R. C.

tème conducteur dans la tige, sans nervures dans les feuilles. Elle est cependant capable d'élever de l'eau de la profondeur de l'étang vers la surface. Au fait, nous pourrions faire une expérience ! Dans un verre à moitié rempli d'eau, je vais placer cette tige feuillée de vingt centimètres de longueur ; bientôt je m'apercevrai que le sommet se remplit d'eau et que peu à peu cette eau s'écoule en gouttes qui tombent lourdement de l'extrémité qui s'est penchée. J'ai ainsi fabriqué une petite fontaine qui va, si je n'y mets bon ordre, vider le verre et répandre le liquide sur les feuilles éparses de mon manuscrit.

L'eau a été pompée par capillarité parce que tout, dans la structure de cette plante, est disposé pour en faire un élévateur d'eau ; il y a d'abord la manière dont les feuilles, qui se laissent mouiller, sont étroitement appliquées contre la tige ; elles ménagent ainsi des espaces capillaires comme ceux qui se forment entre les pages d'un livre et qui deviennent actifs quand par malheur, ayant renversé l'encrier, elles sucent le fâcheux liquide. Avec l'aide d'un microscope je pourrais vous montrer que la succion capillaire est encore facilitée par une structure tout à fait adéquate. La tige

Fig. 123. — Un fragment de la surface d'une sagne, mélange de Sphaignes (*Sphagnum*) et de *Polytrichum*, dont on voit la capsule portée sur un long pédicelle.
Gross. $1\frac{1}{8}$ fois. Dess. de R. C.

vivante est enveloppée par un manteau de cellules mortes; les feuilles, à ce fort grossissement, nous montrent une régulière alternance de cellules mortes incolores, encadrées par de plus étroites cellules vivantes dont on voit bien les grains de chlorophylle. Il s'est donc fait ici une division du travail. Les cellules vertes qui assimilent doivent nécessairement rester en contact les unes avec les autres et, par la base de la feuille, avec la tige qu'elles nourrissent. Les cellules mortes sont maintenant renflées comme autant de petits tonneaux; leur paroi est encadrée par une spirale interne de soutien qui les maintient tendues. Par des orifices circulaires, une espèce de bonde, ces petits tonneaux peuvent se remplir à condition que les espaces qui séparent deux cellules soient assez étroits pour que la capillarité s'exerce d'une manière efficace. Et ceci, elles l'obtiennent facilement en se développant en vésicules d'un seul côté de la feuille, ce qui rapproche les autres du côté extérieur. Les orifices sont ménagés de telle façon qu'ils se regardent d'une vésicule à l'autre. Or, ceci se répétant autour de la tige, l'eau monte par capillarité d'une vésicule à la suivante, puis, retenue par la même force entre les feuilles imbriquées, elle finit par vaincre cette adhésion et par tomber goutte à goutte du sommet de la tige.

Il y a, d'une espèce de *Sphagnum* à l'autre, des variations, mais le principe reste le même. L'intérêt augmente quand on constate que dans le *Sphagnum cuspidatum*, lorsqu'il est submergé, les nouveaux rameaux formés ne développent pas cet appareil capillaire. On voit dès lors que la plante réagit d'une manière adéquate.

Toutes les autres mousses sont dépourvues de ce système d'ampoules; cependant, le *Leucobryum*, une Bryacée des tourbières, sait aussi élever l'eau par capillarité et s'imbiber d'eau. Mais chez celle-ci la feuille a deux coussinets de cellules vésicules recouvrant une lame verte, mince. Ces ampoules communiquent aussi par des trous.

Voici encore un exemple de deux plantes qui appartiennent à deux genres de familles très éloignées des mousses, et qui, dans les mêmes stations, savent utiliser le même principe d'hydrostatique. Il ne nous faut pas chercher bien longtemps pour découvrir dans le *Sphagnum* des colonies du *Leucobryum glaucum*.

La quantité d'eau que peut absorber le *Sphagnum* sec est vraiment étonnante. Cela va de 17 à 20 fois son poids et même plus. Dans la grande guerre, on s'en est beaucoup servi comme succédané du coton-charpie hygrophile. Mais il ne suffit pas de décrire ce qui est ; il faudrait savoir ce qui a été, comment ce tapis épais de tourbe, surmonté de la zone vivante, a pu se développer.

Il est des sagnes qui ont pris naissance à partir d'un marécage. Il faut évidemment que ce marécage ne soit pas trop profond. La première condition, pour la formation d'une tourbière élevée, c'est que la réserve minérale s'épuise. C'est ce qui arrive si, au bout d'un certain temps, le fond étant occupé par des dépôts imperméables, une végétation active de Potamots, de *Myriophyllum*, de Nénuphars, etc., a épuisé la réserve en matières minérales nutritives. Mais il y faut aussi le caractère acide de l'humus qui se forme, à l'abri de l'air, par une fermentation lente.

Ces matières colloïdales brunes retiennent les matières salines de l'eau, précipitent une grande partie du calcaire et, d'autre part, jouent le rôle d'auximones¹, positives pour les *Sphagnum* et négatives pour d'autres plantes de marécages. Si les *Sphagnum* manquent, le marécage peut être complètement ou presque complètement stérilisé, les plantes supérieures disparaissent.

L'analyse chimique montre que, toutes choses étant égales, l'eau d'un pré marécageux ou d'une roselière (*Phragmitée*) contient jusqu'à 6 $\frac{1}{2}$ fois plus de matières minérales que celle d'une tourbière à *Sphagnum*. On remarque aussi qu'il s'est fait, dans cette dernière, une intense décalcification. L'eau d'une sagne est donc une eau pauvre en substances nutritives et presque décalcifiée.

C'est dans ce milieu appauvri qu'accidentellement sont transportés les *Sphagnum*. Ces mousses commencent par se multiplier comme plantes flottantes jusqu'à ce que, accumulées, elles soient forcées de vivre côte à côte. Elles forment un tapis suspendu, sur lequel il est imprudent, dangereux même de s'aventurer. Ce n'est qu'au bout de siècles d'activité végétale que, les anciens matériaux, plus profonds, s'étant tassés successivement et ayant constitué la base solide de la tourbe, la sagne prend l'apparence et la

¹ On appelle *auximone*, une substance qui accélère le développement ; on dit quelques fois aussi *vitamines*.

consistance d'un immense coussin bombé et élastique. C'est là le type de nos grandes tourbières.

La sagne peut aussi se former dans une forêt humide, dont le sol peu profond a été appauvri par la végétation et dans lequel l'excès d'humidité a provoqué la destruction lente, à l'abri de l'air, de matières végétales. Dans ce sol acide, tourbeux, s'établissent enfin des touffes de *Sphagnum* qui bientôt, en buttes, s'élèvent de l'humus, entourent le pied des arbres et, progressant, finissent par se confondre. Grâce au mode de ramification, qui est centrifuge, cette disposition, qu'on retrouve dans les plantes à coussi-

Fig. 124. — Butte de *Sphagnum*, dont on a représenté la section transversale (hauteur 55 cm.); à la surface une zone vivante, au-dessous un cœur progressivement mortifié; ces buttes qui peu à peu se dessèchent sont plus tard colonisées par une végétation de végétaux supérieurs ou de *Polytrichum*. Marais des Ponts.

D'après Früh et Schroeter.

Fig. 125. — Butte de *Sphagnum*, colonisée au sommet par un gazon sec de *Polytrichum* (v. fig. 123); au pourtour du sommet par des *Andromeda*, plus bas par de la bruyère (*Calluna vulgaris*). Marais des Ponts.

D'après Früh et Schroeter.

nets, les mousses des murs ou le *Silene acaulis* des Hautes-Alpes, est rapidement atteinte. Mais, tandis que chez ces plantes supérieures chaque coussin a une racine pivotante centrale unique, ici, il n'y a pas de racines. Alors que chez ces mousses de rocher la disposition est telle que les poussières de l'atmosphère, la terre, sont retenues entre les rayons du coussinet, et qu'il se fait par cela même un terreau individuel, ici, chez les *Sphagnum*, il n'y a rien de semblable; sur le sol humide ou inondé même, la sagne est simplement posée; elle fonctionne exclusivement comme éponge. On voit parfois de ces tourbières qui sont suspendues sur le flanc des montagnes comme en certaines régions élevées des Alpes, là

où l'eau qui est amenée par les ruisselets, ne circule plus qu'avec lenteur. Cela commence souvent par un marécage à *Eriophorum* (Linaigrettes) ou à mousses ordinaires, puis vient le *Sphagnum* qui tend à régner désormais en maître. Dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, on admire sur les pentes des montagnes

Fig. 126. — Au lac de Mattmark (Alpes pennines). En arrière, un gazon continu de jonc arctique (*Juncus arcticus*), en avant, une colonie de Linaigrette (*Eriophorum Scheuchzeri*).
Phot. R. Chod.

de belles tourbières qui, en moelleux tapis, s'étendent sur le sol et en atténuent tous les contours.

Il faut d'ailleurs à la constitution de ces sagnes un climat humide, des brouillards, car l'action desséchante des mousses aquatiques est très forte. On a constaté que, toutes choses étant égales, une même surface de terrain ou de marécage occupé par la sagne évapore jusqu'à cinq fois plus qu'une même surface d'eau librement exposée à l'air. Au soleil, la surface de la sagne perd

souvent assez d'eau pour paraître, en été, complètement desséchée. Le *Sphagnum* n'en est pas sensiblement altéré, car il supporte assez bien une dessiccation prolongée; il a la capacité de reviviscence.

Lorsque la pluie tombe ou que le brouillard permet une absorption d'eau équilibrée avec celle qui s'évapore, le *Sphagnum* reprend sa teinte verte et rouge qu'il avait échangée, pendant la sécheresse, contre l'apparence blanchâtre d'un tissu plein d'air.

C'est dire que l'eau d'une tourbière élevée provient, en grande partie, de l'atmosphère et que la circulation de cet élément liquide se fait tout aussi bien de la surface de la masse de *Sphagnum* vers la profondeur qu'inversement. Si donc, en été, il arrive que la surface de la sagne se

Fig. 127. — Deux plantes (Ericacées) des buttes de *Sphagnum*. A, *Andromeda polyfolia*, aux fleurs rosées; B, *Oxy-coccus palustris*, aux fleurs franchement roses et au feuillage brillant.

Dess. de R. C.

dessèche, c'est que, dans ces régions de la tourbière, les sphaignes ne pouvaient élever l'eau du niveau inférieur parce que les tissus profonds ne sont plus capables de conduction.

C'est maintenant sur cette tourbière élevée, sur ce grand coussin de mousses, que viennent s'implanter, en un jardin bien caractéristique, un certain nombre de plantes supérieures.

Il y a d'abord les linaigrettes (*Eriophorum vaginatum*) (fig. 126 et planche XIII) qui, en touffes serrées, viennent dresser leurs

R. C. del.

*Tourbière dans le Jura suisse; au fond les pins, plus près SWERTIA,
COMARUM et Linaigrettes.*

pompons soyeux et blancs. Quelques *Carex* (laiches), les *C. stricta*, *C. ampullacea*, grosses espèces qu'on voit au pourtour de la sagne. Dans les coussins de mousses, ce sont de plus fins *Carex* (*C. pauciflora*, *C. heleonastes*, *C. chordorrhiza*, *C. canescens*).

Ne font jamais défaut les gracieux Rosolis aux feuilles rouges étalées sur la mousse et dont les tentacules portent à leur sommet une goutte de « rosée » (planche XI), les Lycopodes, qui préfèrent les flaques ou mares d'eau noire non encore envahies par le *Sphagnum* (*L. inundatum*). De minuscules bruyères en fines dentelles sèment ici et là leurs fleurs roses (*Oxycoeos palustris*). Un peu plus robuste, l'*Andromeda polyfolia* fait la transition aux bruyères proprement dites (fig. 127 et planche XI) : les myrtilles (*Vaccinium Myrtillus*), les airelles (*V. Vitis Idæae*), l'airelle des marécages (*V. uliginosum*) et, finalement, les *Calluna* qui, vers la fin de l'été, garnissent les buttes de leurs épis roses. Ce sont déjà des sous-arbrisseaux, dont les branches et les racines se ramifient dans la profondeur des mousses.

Ici et là un buisson un peu plus élevé, c'est le bouleau nain (planche XII et fig. 132) avec ses petites feuilles orbiculaires et ses chatons dressés, dont on ne voit que l'extrémité des branches poindre hors de la sagne. Dans les stations jurassiques et en Allemagne, ce paysage mélancolique s'égaie en été par les étoiles dorées du *Saxifraga Hirculus* aux pétales ponctués de rouge (planche XII). On le voit souvent s'associer aux *Parnassia*, qui le copient mais en blanc. Par place, une potentille aux fleurs d'un pourpre rouge foncé (*Comarum palustre*) surprend le jeune botaniste habitué aux potentilles jaunes (planche XIII).

Avec le temps, la surface de la sagne est plus longtemps sèche ; alors s'installent, au sommet des buttes, des touffes d'une grande mousse aux feuilles dressées et qui porte une livrée de petit conifère. Celle-ci est aussi souvent fructifiée que le *Sphagnum* l'est rarement (fig. 123). Ce n'est qu'exceptionnellement que de zélés botanistes réussissent à découvrir dans cette immense étendue une plante de sphaigne portant une capsule. La présence des *Polytrichum* annonce déjà la sécheresse : des tertres de bruyères et de lichens viennent ensuite et alors il n'y a plus guère

de différence floristique entre cette surface tourbeuse et la lande proprement dite.

En effet, les plantes les plus caractéristiques des landes alpines (*Empetrum nigrum*), les *Gnaphalium* aux pompons blancs et roses (*Anleinnaria dioica*), les rhododendrons eux-mêmes et les arnica viennent fleurir ces sagnes-landes.

C'est qu'entre les deux formations il y a, dans l'Europe moyenne et l'Europe septentrionale, toutes les transitions. Au delà du cercle arctique et dans nos Alpes, au-dessus de la limite du dernier sapin, la lande appauvrie, qu'on appelle toundra, passe de même, dans ces stations plus humides, aux sagnes minuscules des hautes régions.

En effet, ce qui caractérise toutes ces formations homologues, c'est la pauvreté du sol ou de l'eau en sels nutritifs et aussi l'absence de calcaire ; le degré d'humidité et de chaleur déterminera si la lande est une sagne, une sagne-lande, une bruyère ou une toundra.

Mais il reste cependant un certain nombre de plantes qui, dans l'Europe centrale, n'existent que sur le *Sphagnum*. J'appellerai ces espèces « espèces caractéristiques ». Celles qui, d'une autre formation où elles sont abondantes passent aussi sur le *Sphagnum*, seront appelées « transfuges ».

Ainsi les *Drosera* ne se trouvent pas dans les landes, ni l'*Oxycoccus*, ni les deux gracieuses Orchidées qui accompagnent souvent les Rosolis sur le *Sphagnum*. Ce sont des plantes qui ont bien réellement des caractères qui les rendent propres à vivre dans ce milieu. Soit les *Drosera*, soit les Orchidées citées s'élèvent en étages dans le *Sphagnum* à mesure que sa surface se hausse. Ils croissent donc à la façon de la mousse sphaigne elle-même (fig. 129, 130, etc.). Mais les aireselles et les bruyères sont ici seulement des transfuges, car, dans leurs landes de plaine ou de la montagne, elles ne sont pas accompagnées du *Sphagnum* et des Rosolis.

Deux arbres seulement s'aventurent dans les sagnes proprement dites, un conifère (*Pinus montana*) et un bouleau (*Betula pubescens*).

Il nous faut aller voir, à l'étang de la Gruyère, dans le Jura bernois, la superbe sagne-forêt qui se reflète dans l'eau noire (*planche XI et fig. 99*). Pénétrée par les *Sphagnum* rouges, les airelles et les bruyères, la forêt est exclusivement formée par le pin de montagne au tronc droit, à la couronne étroitement pyra-

Fig. 128. — Le Pin de montagne (*Pinus montana*) sur les rochers calcaires du Jura (Court-Moutier). Comparez la forme rabougrie avec les fûts de la variété de tourbière (fig. 99).

Phot. Alb. Sauter.

midale; on la voit s'avancer vers l'étang à la faveur des touffes des laiches (*Carex ampullacea*, *C. stricta*). Et de cet arbre, si voisin du pin sylvestre, dont il diffère surtout par l'obliquité des cônes et leur asymétrie, les botanistes nous disent qu'il n'est pas lié à ces stations humides.

Descendons de Tramelan à Court, à l'entrée des superbes cluses de Court-Moutier; dans les rochers, le pin de montagne découpe sa silhouette tourmentée sur le gris lilacin de la pierre (*fig. 128*).

Mais ici il est réduit, rabougri. Dans les Alpes, le pin de montagne est assez rare. En Dauphiné, en Valais (Champex), c'est un arbre longuement pyramidal, au feuillage condensé et foncé comme celui de l'arole. Au Parc national suisse, cette forme

Fig. 129. — Orchidée à fleurs vertes, des sagnes. On voit, à gauche, les pseudo-bulbes et les feuilles grossies ; à droite, la manière dont la tige s'allonge en étages pour suivre la croissance du *Sphagnum* et maintenir son niveau (*Liparis Loeselii*).

Dess. de R. C.

alterne avec le pin couché des éboulis qui, plus à l'est, est l'arbre caractéristique des Alpes orientales. Mais partout le pin de montagne choisit des stations stériles : rochers, éboulis, sables, landes et sagnes. On ne le voit pas dans les marécages proprement dits. Ce transfuge a certains principes, mais il n'épouse guère ceux de ses associés, il supporte sécheresse et humidité, ce qui lui permet de s'associer successivement à des groupes de plantes diverses, appartenant à des formations distinctes : l'éboulis, le rocher, la tourbière, la lande. Selon les stations, il modifie sa vie, se restreint ou se dépense largement, se dresse hautain ou se fait petit, rampe même, et, partout où il réussit il domine, il dépasse ses associés. Il est de ceux qui ne peuvent réussir que dans les milieux rabougris par la misère physiologique ; dans les bons terrains, il ne peut lutter. Il envahit les stations que les autres dédaignent. Est-ce bien vrai ? Nous lui faisons tort : il réussit là où d'autres, trop exigeants, ne savent pas tirer parti des faibles ressources du sol et, dans ce sol appauvri, il arrive cependant parfois à dresser des fûts de 15 à 20 m. de hauteur et de 45 cm. d'épaisseur.

Ces eaux épuisées que les autres mousses dédaignent, les *Sphagnum* les ont converties en de gracieuses, mais mélancoliques prairies, la lande s'y est installée et les racines ligneuses, les troncs et les branches des *Calluna* et des bouleaux nains se sont mêlés aux tissus spongieux des mousses et, à leur tour, ont contribué, dans le fond de la sagne, à former la tourbe. Des pins de montagne ont été enfouis dans la tourbière et le bouleau blanc est venu en automne agiter son menu feuillage jaunissant au-dessus des bruyères roses (*planches XII et XIII*), tandis qu'au printemps suivant le vent secouait ses petites samares triangulaires. A son tour, il a été englouti par l'éponge végétale. Ainsi, depuis des siècles, s'accumulent, sans se détruire, des masses végétales qui lentement se charbonnent sous l'eau. Des bactéries spéciales, des champignons, moisissures particulières, étudiés par mon élève Dazewska, altèrent, mais lentement, ces cadavres de plantes, leur extraient l'oxygène nécessaire à leur respiration et leur font subir une fermentation qui les transforme peu à peu en tourbe, en charbon, en lignite. A l'air, dans le sol meuble des landes, ce procès

de fermentation, quoique lent aussi, finit par détruire, oxyder les débris charbonneux. Ici la majeure partie est conservée, la structure végétale dans la tourbière est très longtemps respectée. On peut dès lors reconnaître là, dans le fond de la sagne, dans cette tourbe compacte, la nature des plantes qui ont été enfouies il y a des siècles et des siècles et reconstituer ainsi l'histoire de la végétation de ces tourbières depuis des périodes fabuleuses. Les sagnes sont donc nos houillères récentes, et nous allons les interroger. Ce travail de reconstitution historique a été fait par beaucoup de botanistes du nord de l'Europe et de la Suisse.

Voyons par quelques exemples quelques-uns des résultats de cette enquête.

A tout seigneur tout honneur ! Le pin de montagne, le pin à crochets, comme on dit parfois, est actuellement un conifère qui va des Pyrénées au Caucase ; plus abondant dans le premier massif, il s'avance vers les Alpes occidentales par les Cévennes, devient rare à partir du Valais pour réapparaître abondant dans l'Engadine, puis dans les Alpes orientales ; rare dans les Carpathes et en Macédoine, il l'est encore plus au Caucase.

Vers le nord, on le voit s'avancer dans les Vosges et le Schwarzwald, dans l'Erzgebirge et le Riesengebirge ; au sud, il pénètre jusqu'aux Abruzzes ; on le trouve aussi au mont Ventoux, de 1400-1800 m.

Si on ne consultait que sa distribution actuelle, le pin de montagne serait classé parmi les végétaux montagnards des massifs de l'Europe moyenne. Par sa plus ou moins grande abondance, il se marquerait comme plante plus occidentale qu'orientale. Mais déjà sa distribution morcelée dans les Alpes et le Jura fait songer à une plante relique, à aires disjointes, lesquelles sont comme autant de refuges pour cette espèce. Elle ne persiste que lorsque la lutte pour l'existence se dessine plus particulièrement favorable pour elle, par l'incapacité pour ses concurrentes de vivre dans les stations stériles qu'elle préfère.

Nous sommes assez bien informés sur son histoire paléontologique.

Absente actuellement des régions polaires ou nordiques, elle y était abondamment représentée pendant les temps tertiaires

(Miocène), par exemple au Spitzberg, d'après Oswald HEER. Avec l'époque glaciaire, qui désole les pays nordiques, l'arbre est refoulé vers le sud. SAPORTA la signale des tufs quaternaires du Midi de la France ; FLICHE, du glaciaire des environs de Nancy ; MOORE, des tourbières fossiles d'Irlande ; d'autres, du nord de l'Allemagne. C'est donc bien une espèce d'origine nordique qui, depuis le glaciaire, s'est avancée jusque dans les massifs de l'Europe méridionale, l'Ibérie, l'Italie, la Macédoine. Beaucoup plus commune en Suisse et en France pendant les époques glaciaires successives qu'aujourd'hui, elle a cédé le pas à d'autres arbres plus entreprenants, plus robustes, dès que les conditions de vie sont devenues meilleures. Depuis les époques de sa grandeur, elle s'est réfugiée dans les tourbières, sur les rochers des gorges fraîches du Jura bernois ou dans les dolomies stériles de l'Engadine.

Les stations isolées du plateau central (France), qui ont été décrites par M. ROUX, sont particulièrement intéressantes, car ici le pin est complètement isolé ; perdu dans quelques tourbières, au milieu d'une végétation d'une tout autre origine. Voici donc un arbre qui a vu le déclin du Tertiaire en Europe, qui a assisté à l'envahissement progressif des plaines de l'Europe par les glaciers. Il a survécu au mammouth, à l'ours des cavernes, à l'homme paléolithique. Le pin de montagne est donc un fossile vivant ; autour de l'étang de la Guyère, il dessine un paysage glaciaire typique (*planche XI*), et ses associés, le bouleau nain en particulier, complètent cette impression de la végétation d'un autre âge.

Les sagnes sont par conséquent des musées paléontologiques. Comme certaines îles ont gardé une flore ancienne parce qu'elles n'ont pas été envahies par les nouvelles flores continentales, les tourbières élevées, impropres à l'établissement d'une flore plus exigeante, conservent ou attirent à elles les éléments quaternaires, glaciaires ou autres, qui fuient la lutte, comme les habitants de la Nouvelle-Guinée qui se retirent devant la civilisation envahissante de l'immigré européen, l'envahisseur, l'homme des temps nouveaux et lui abandonnant les meilleurs terrains se contentent de refuges dédaignés.

L'apparence mélancolique du paysage de la tourbière élevée n'est donc pas seulement due à l'étrangeté de cette station, mais ce sentiment qui saisit le plus insensible vient certainement de ce que l'on devine, sans le comprendre complètement, le drame qui se joue ici. L'inutile prairie moussue, les bouleaux tortueux ou rabougris, les pins de montagne lugubres dans leur étroit manteau de verdure : c'est ici le refuge d'une armée décimée, d'un vieux peuple fatigué de vivre.

Mais toutes les sagnes ne sont pas si anciennes. D'abord nous savons à n'en pas douter que la plupart des grandes sagnes datent de l'époque glaciaire. Au fond de ces cuvettes on a découvert comme contemporaines du mammoth des plantes qui actuellement ne se trouvent même plus dans les hautes Alpes.

Plusieurs de ces plantes qui, autrefois, étaient abondantes dans les tourbières ont en partie disparu. Ainsi le *Scheuchzeria palustris* qui, trouvé fossile par SCHROETER dans la plupart des tourbières, n'existe plus actuellement que dans peu de stations.

Plus intéressante encore est la présence dans les tourbes anciennes d'une Nymphéacée (fig. 131) qui, actuellement, est localisée aux États-Unis et qui, certainement, appartenait à cette flore tertiaire américaine-européenne que l'époque glaciaire a détruite chez nous. Le *Brasenia purpurea* des États-Unis de l'Est était très répandu dans nos sagnes comme il l'est actuellement dans les tourbières dont nous

Fig. 130. — Manière dont le *Scheuchzeria palustris* (Joncaginée) élève ses tiges hors du *Sphagnum* pour atteindre le niveau biologique et amener ses feuilles étroites à la surface.
Dess. de R. C.

avons parlé encore à propos des forêts amphibies du Dismal Swamp (*fig. 100, 102*).

D'autre part, les sagnes paraissent avoir constitué une oasis dans le monde actuel où se seraient maintenues des plantes arctiques datant de l'immigration de ces plantes à partir des régions

Fig. 131. — Petite Nymphéacée des Etats-Unis (*Brasenia purpurea*), qu'on trouve fossile dans les sagnes du centre de l'Europe. On a marqué par un pointillé la gaine gélatineuse qui enveloppe les tiges et la base des pétioles. Dess. de R. C.

polaires lors des grandes extensions glaciaires. C'est ainsi qu'à Einsiedeln le *Trientalis europea* (*fig. 133*) et le *Juncus stygius* ont été souvent considérés comme des reliques glaciaires-arctiques. Dans le Jura, le bouleau nain et le saxifrage jaune (*S. Hirculus*) ont aussi été pris pour des résidus de cette ancienne flore (*planche XII*).

Mais comme ces plantes ont toutes des moyens de dissémination qui favorisent leur transport à de grandes distances, il n'est pas certain que les stations suisses soient vraiment des refuges pour ces plantes ; on pourrait aussi supposer une réimmigration actuelle de plantes arctiques par le moyen des sagnes de

l'Allemagne du Nord et de l'Europe centrale. Il n'est, en effet, pas difficile de montrer la continuité relative de l'aire de ces plantes à partir de leurs stations suisses à celles du Nord par les tourbières de l'Allemagne.

Fig. 132. — Rameau, quatre fois grossi, du *Betula nana* avec deux chatons femelles. Comparez avec planche XII.

Dess. de R. C.

On sait en effet que dans beaucoup de stations du nord de l'Allemagne, les tourbières sont d'origine relativement récente et que les plantes arctiques, qu'on y rencontre, y sont arrivées par migration actuelle.

Lorsqu'il s'agit de résoudre des questions aussi complexes que celles relatives à l'histoire de la végétation et de la distribution actuelle des plantes, il faut, avant d'avoir recours à des explications exceptionnelles, essayer de les aborder par le moyen de la géographie botanique actuelle.

Voyons ce qu'il en est des sagnes. Nous avons vu que les sphaignes ne réussissent que dans ces circonstances exceptionnelles qui résultent de l'épuisement du milieu liquide en sels nutritifs. Il serait absurde de dire que les sagnes sont des reliques d'un autre âge, l'âge des tourbières : il n'y a jamais eu, en effet, une période semblable. Les conditions pour la formation d'un milieu semblable étant réalisées en cet endroit ou en celui-ci, la colonisation peut se faire et se fait assez souvent par le vent, les migrations des oiseaux de marécages et l'homme lui-même. De tourbière en tourbière, les plantes de marécages ont à franchir des distances souvent considérables, et cependant rien n'est plus uniforme dans l'Europe centrale que la composition de la flore des sagnes. La colonisation de ces dernières s'est faite à travers les airs ; elle n'a pu se faire de proche en proche par une migration terrestre puisqu'il aurait fallu à cela une continuité du régime de tourbière qui n'a jamais existé. Le problème le plus proche est donc d'étudier les conditions de transport des plantes des sagnes d'une tourbière à l'autre. Or les *Drosera*, les *Andromeda*, les *Calluna*, les Orchidées, le *Parnassia*, le *Saxifraga Hirculus*, toutes ont des semences d'une excessive légèreté. Les Airelles et les *Oxycoccus* ont des baies que les oiseaux transportent. Les sphaignes elles-mêmes s'attachent aux pieds des oiseaux palmipèdes et supportent une dessiccation prolongée.

Fig. 133. — Primulacée de tourbière : *Trientalis europaea*, aux fleurs blanches ; on voit aussi chez cette plante la manière dont la tige s'élève dans la mousse et y produit des feuilles rudimentaires. Dess. de R. C.

Il devient dès lors difficile d'attribuer à chaque facteur son importance réelle. Néanmoins le paysage des sagnes est un paysage arctique dont le caractère nordique est encore accentué par la présence, autour de plus d'une tourbière, de la forêt du *Pinus montana*, le Pin des tourbières, conifère qui, venu du Nord, comme on l'a vu plus haut, en a disparu depuis lors.

Ainsi, dans l'Europe centrale, aucune station végétale n'est plus intéressante à étudier puisque tous ses habitants sont en quelque sorte, directement ou indirectement, des reliques glaciaires à propos desquelles d'intéressants problèmes d'histoire végétale se posent et avec quelque certitude de pouvoir être résolus.

On a fait sur ce sujet, surtout dans les pays scandinaves, des études méthodiques qui ont décelé dans ces tourbières une succession de flores par laquelle on peut reconstituer l'histoire climatique du pays depuis l'époque glaciaire. Mais la tourbière aussi a une fin, car, par sa propre activité, la sagne finit par arrêter sa croissance. Dans la zone supérieure elle s'épaissit annuellement de 2-3 cm., ce qui ne représente, dans les couches inférieures, après compression de la tourbe par son propre poids, que 1-2 mm. La sagne a donc une croissance excessivement lente. Cependant il arrive un moment où la hauteur du coussin dépasse la capacité d'élever utilement, par capillarité, l'eau du réservoir du fond; alors, cette surface se desséchant, elle devient propre à l'extension de la lande à bruyères et à lichens dont nous avons parlé et, peu à peu, la forêt de pins et de bouleaux s'installe. A ce moment la tourbière est de toute beauté, surtout en automne. Mais peu à peu le niveau de la tourbière a diminué par compression, la forêt réduisant par son ombre l'évaporation de la surface, le sphagnum, au-dessous, se met à croître; il enveloppe les troncs qui pourrissent, et ces derniers sont, en tombant, ensevelis dans le sphagnum jeune, et le stade sagne, pur sphagnum, recommence. C'est ce phénomène qui permet de comprendre qu'il y ait plusieurs horizons dans la succession des couches de la tourbe et qui sont dus à une régulation autonome, à une alternance spontanée de la mousse et de la forêt. C'est ce qui s'observe un peu partout. Dans le nord de l'Allemagne, au Danemark et dans la Scandinavie, c'est-à-dire autour de la Baltique, tous ceux qui

ont étudié la succession des couches de la tourbe ont pu constater au fond de la tourbière une végétation glaciaire, puis la toundra, puis la sagne avec pénétration de forêts, selon le schéma indiqué ci-dessus. Apparaissent successivement le bouleau, le peuplier tremble, puis le pin sylvestre et cette végétation forestière suivie d'une croissance nouvelle de la mousse; dans une période ultérieure, on voit apparaître le chêne et le coudrier, puis la tourbe recommence à se former jusqu'à la période actuelle.

Les uns voient dans ces successions la preuve d'une modification importante et périodique du climat depuis les temps glaciaires; pour d'autres, il ne s'agit que d'oscillations périodiques pluriséculaires et autonomes que subit la tourbière, dans sa croissance, lorsqu'elle passe par les périodes d'humidité ou de sécheresse causées, comme il a été dit plus haut, par sa propre activité; sphagnum, sphagnum-lande, lande-forêt, forêt, sphagnum.

On dit souvent, dans les traités de géo-botanique, que les tourbières font défaut aux régions tropicales; cela n'est vrai qu'en partie; il n'y a pas, dans ces pays, de tourbières profondes comme chez nous, où d'immenses tapis de sphagnum s'étendent par-dessus l'eau noire. Mais le long des ruisselets, sur les pentes douces, nous avons vu de vraies sagnes à sphagnum mêlées aux Lycopodes, et dans lesquelles prennent pied les Eriocaulonacées, comme chez nous s'implantent dans les sphaignes les touffes de l'*Eriophorum vaginatum*. On y trouve aussi les jolies *Mayaca*, Monocotylédonées à végétation de mousse et aux gracieuses fleurs roses. A la longue, sur le parcours d'un ruisseau ou même d'une rivière à cours lent, la végétation, sur la pente, en arrête ou en dévie le cours; il se constitue alors une formation qui ressemble à nos tourbières et qu'on a nommée Ypayeré. Elles occupent souvent toute la largeur d'un vallon; dans la profondeur, se forme une tourbe noire. En d'autres points, pénètrent dans ces Ypayerés des fougères aux troncs courts comme autant de petits Cycas, les *Blechnum capense*, des Cypéracées du genre *Scleria*, puis, sous les arbres (*Villaresia Congonha* et les *Symplocos*), de grandes fougères arborescentes. On y trouve aussi parfois, comme chez nous dans les marécages ou les lieux humides le *Prunus padus*, le *P. brasiliensis*. Mais tout cela n'arrive pas à

former une tourbe persistante ; l'activité des organismes destructeurs, bactéries, insectes termites, etc., est trop grande, sous les Tropiques, pour permettre la fossilisation lente de ces débris végétaux.

Le domaine exclusif des sagnes proprement dites est l'hémisphère nord et, dans cette région, la zone tempérée et même

Fig. 134. — A, fleur de l'*Oxycoccochloa palustris* (voyez aussi planche XI) et de l'*Andromeda polifolia*, grossie, 7 fois.

Dess. de R. C.

froide. Rares dans les Alpes, elles jalonnent le Jura, des Rousses au Jura septentrional.

Partout elles sont remarquables par la pauvreté relative de leur flore. Partout elles frappent le biologiste par le contraste qu'offrent les plantes supérieures insérées sur le sphagnum avec la mousse elle-même. En effet, ces bruyères, ce genévrier, le pin de montagne lui-même, ont tous la structure de végétaux de lieux secs, le bouleau nain y compris. En effet, le *Calluna* a réduit ses feuilles et cache ses stomates dans des sillons, l'*Empetrum* les a enveloppés dans un cylindre, fait du reploiement de la

feuille. Le myrtille se débarrasse de ses feuilles et les remplace par des tiges vertes et ailées comme le font les genêts des landes sèches ; la face inférieure des feuilles y est couverte de cire, qui diminue la transpiration ; l'*Andromeda*, l'*Oxycoccus* ont aussi des feuilles de plantes xérophytes. Aucune modification ne s'observe qui indiquerait que ces végétaux des landes, qui sont parmi les stations les plus sèches, les plus arides, les plus pauvres, auraient subi sur le milieu humide de la tourbière une adaptation hygrophile. C'est que les racines de plusieurs de ces espèces circulent dans la mousse humide sans atteindre le niveau de l'eau ; ainsi qu'on l'a dit plus haut, la couche supérieure du *sphagnum* se dessèche avec facilité au soleil. Plus encore, vers l'automne, lorsque la tourbière est refroidie, plus tard encore avec les premiers gels, alors que l'absorption de l'eau glacée est rendue difficile, le soleil et le vent agissent fortement pour dessécher ces plantes qui ont conservé leurs feuilles pendant la mauvaise saison.

La contradiction qui semblait évidente entre la structure de ces plantes et leur situation sur l'eau est donc moins choquante. Mais on a déjà dit que la lande ne s'établit que sur cette portion du *Sphagnum* qui est la plus sèche, il vaudrait mieux dire la moins humide. En réalité, ce que ces plantes trouvent ici, c'est le milieu pauvre en sels nutritifs qui leur convient, comme elles le trouvent aussi dans le bois pourri de nos forêts qui, avec ses mousses, fait souvent l'effet d'une tourbière en miniature.

BIBLIOGRAPHIE

- FRÜH et SCHROETER, C. — Die Moore der Schweiz, in Soc. helvétique des Sciences naturelles, Nouveaux Mémoires (1904).
- GRAEBNER, P. — Die Heide Norddeutschlands, Leipzig (1991).
- ANDERSSON, GUNNAR. — Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmasser, Bih. k. Svensk. Akad. Handl., XVIII (1895).
- CHODAT, R. — La végétation du Paraguay, Les Ypayérés, p. 20 (Genève).
- WEBER, C. A. — Die wichtigsten Humus und Torfarten und ihre Beteiligung an dem Aufbau deutscher Moore. Berlin (1908).

Le Nuphar luteum fleurissant à la surface d'un marécage.

Zones de végétation et associations.

(PLANCHES XIV, XV et XVI.)

UN des chapitres les plus intéressants de la biologie des plantes, c'est celui qui traite des associations et des formations, autrement dit de la *sociologie végétale*.

Cette science, comme toutes les sciences vraies, a des origines lointaines. L'homme primitif, en lutte constante avec la nature, a fait, dès le début de son entrée dans le monde, de multiples expériences. On peut assurer que plus un peuple est primitif, plus il est au courant des choses de la nature, cette école de toute vraie science. Aussi le devoir du botaniste en voyage est-il de recueillir pieusement les traditions populaires, les dénominations par lesquelles plantes, parties de plantes ou groupements végétaux sont désignés dans chaque pays. Même sous une apparente erreur se cache une observation juste. Ainsi j'ai entendu des femmes du Val d'Hérens appeler les colchiques et les crocus « trèfle ». Ce n'est sans doute pas le trèfle du botaniste, mais le nom est bien choisi, il fait remarquer la symétrie de la fleur qui est sur le type trois. Avant que de sourire, le jeune botaniste fera bien de s'informer, il trouvera généralement les habitants des champs remarquablement bien informés sur les plantes et leurs groupements habituels. En Espagne, le paysan distingue très clairement la forêt (monte) du maquis (monte-bajo) de la garigue à labiées (tomillares) ; il a désigné par un nom spécial les landes à cistes (charales) et les génistées (tojal).

Mais il n'en a sans doute pas toujours été ainsi. Le terme de lande exprime l'idée du pays non cultivé (Land) par opposition aux cultures, de même que le terme équivalent, lui aussi d'origine germanique, « Heide » s'applique primitivement à tout terrain non cultivé, sauvage. En France, on fit ensuite la distinction entre « lande » et « friche », pays incultivable et pays sauvage non

cultivé mais cultivable. Or, comme les landes à bruyères sont les plus répandues des terres stériles, l'association des définitions amène peu à peu à caractériser les landes comme des terrains incultes couverts de bruyères, de genêts, de fougères et autres plantes spontanées de peu de valeur (Littre).

Ici, le caractère de stérilité, l'absence de valeur au point de vue agricole est le point de départ du terme; il ne s'agit pas d'un vague instinct de géo-botanique, mais c'est le résultat d'une observation et d'une expérience populaires.

Dans le Jura suisse, le mot Sagne désigne, nous l'avons vu, une tourbière élevée, envahie par les mousses du genre *Sphagnum* et puis ensuite par les éléments des landes, bruyères et lichens. Frappé comme le vulgaire par des définitions instinctives, le botaniste qui fait l'énumération des plantes d'un pays, localise ses plantes selon ces grandes divisions de la géo-botanique populaire.

Cependant, chez les botanistes eux-mêmes, l'idée de grouper les plantes selon des associations définies ou selon des définitions géographiques, ne se fait jour que peu à peu. Les anciens, en situant leurs plantes, font comme les peuples primitifs, ils sont moins guidés dans leurs énumérations par des considérations scientifiques que par le souci d'utiliser les termes consacrés dans le langage usuel; ils parlent de lieux incultes, lieux arides, solitaires, lieux aréneux, rochers, marécages, sol inutile et aride, sol âpre et aride, les prés, les champs, les haies, les forêts, lieux ensoleillés, rivages, rivages maritimes, lieux humides, prés humides, vignes, lieux secs et brûlés par le soleil, après les moissons, etc.

C'est ce qu'on rencontre à chaque page de ce vieux livre de l'Ecluse sur les plantes d'Espagne, la première énumération des richesses végétales de l'Ibérie.

Même chez les modernes, ainsi dans la *Géographie botanique raisonnée* de DE CANDOLLE, la notion d'association et de relation entre le milieu et la flore est à peine esquissée. Il en est tout autrement de la distribution par zones. Les anciens n'avaient de la géographie botanique que de vagues lueurs; ceux du moyen âge croyaient retrouver en France et en Allemagne ou en Espagne les plantes d'Orient énumérées par les anciens, DIOS-

Fig. 135. — Phragmitaie en floraison. Pinchat, Genève. Phot. R. C.

CORIDE, PLINE, THÉOPHRASTE. De là une confusion qui se perpétue jusque dans les temps modernes. Mais peu à peu on s'aperçoit que chaque région a ses plantes spéciales à côté de plantes plus répandues. Les flores énumèrent ces productions et bientôt, mais surtout au XIX^{me} siècle, des travaux étendus montrent que la distribution des plantes suit des règles qui dépendent du climat, du sol, de l'altitude, etc. On distingue ainsi des régions, arctique, tempérée, méditerranéenne, subtropicale, etc. Dans chaque territoire se laissent de même définir des subdivisions d'autant plus nombreuses que le pays est plus accidenté; elle sont constituées par des aires régulièrement étagées selon la longitude ou la latitude si le pays est géographiquement plus uniforme. Ainsi dans l'*Historia Stirpium Helvetiae* de HALLER, en 1768, où se trouve définie une géographie botanique selon l'altitude et la latitude. (Voir H. CHRIST, *La flore de la Suisse et ses origines*.)

Mais, en plus, les botanistes depuis HUMBOLDT ont attiré l'attention sur ces apparences de végétation qui font que l'ensemble présente une certaine *physiognomie*. De loin on reconnaît une pinède,

une sapinière, une palmeraie, une brousse, une savane ou une steppe herbeuse. Cela provient, ou bien de ce que la majorité des plantes qui font partie de cette catégorie végétale sont d'une seule espèce (espèces sociales), soit de ce que, comme dans la brousse épineuse, la plupart des arbrisseaux ou des arbustes sont du même type épineux, ou comme dans la prairie toutes les herbes ont pris plus ou moins la même apparence graminéoïde.

Mais, dans la forêt, il y a plusieurs étages de végétation, le couvert des arbres, le sous-bois, les épiphytes, c'est-à-dire les plantes qui vivent sur les arbres; dans la prairie également, entre les hautes herbes, se dressent, comme sous leur protection, de minuscules végétaux qui y végètent en espèce de sous-bois en miniature. Nous avons montré qu'en pleine dune, sous les buis qui fournissent une ombre épaisse, peut se cacher une végétation de sous-bois en raccourci. La saison fait aussi varier la flore et son apparence. Au printemps, avant la feuillaison, le sous-bois de la *chênaie* fleurit; en été, l'apparence du couvert est tout autre.

D'ailleurs, le terme prairie est exclusivement physiognomique, car la composition d'une prairie alpine ou d'une *prairie* américaine des États-Unis, quand même les deux sont des étendues de végétaux herbacés, leur composition est tout autre; une liste de plantes montrerait tout de suite cette différence. On a dès lors établi une règle qui malheureusement n'est pas toujours suivie. Tout d'abord établir une liste des plantes en donnant, dans cette énumération, à chaque espèce sa valeur propre comme fréquence, comme abondance d'individus, ou comme importance au point de vue de la masse végétale. Ainsi, dans une *association*, comme on appelle ces groupements habituels, il y a rarement un groupement pur d'une seule espèce; il y a presque toujours un assemblage d'espèces variées qui sont les unes vis-à-vis des autres dans une sorte de dépendance harmonique. Certaines prédominent, ce sont les plus nombreuses en individus ou les plus importantes comme masse (espèces prédominantes); il y a ensuite une graduation à établir qui va des espèces abondantes en individus jusqu'aux espèces rares. Enfin il y a dans chaque station des étages dominants, comme celui de la couronne des

arbres dans une forêt, et les étages dominés, tel que le sous-bois buissonnant, et sous ce dernier les herbes et les mousses. Et cependant cette association, parfois complexe, a une certaine physiognomie générale qu'elle doit habituellement à l'espèce abondante ou aux espèces prédominantes.

Si l'on fait abstraction de la physiognomie, on classera les associations d'après une ou deux des espèces abondantes.

Ainsi l'association du *Pinus sylvestris* dans les Alpes, celle du Pin d'Alep, sur les côtes de la Méditerranée, ou celle du Pin parasol, sur les dunes maritimes. Mais toutes ces pinèdes ont un air de famille, un même facies qui est dû à la silhouette familière des espèces du genre *Pinus*. Ce sont les *Pinières* ou *Pinèdes*, comme il y a des *Chênaies*, des *Hêtraies*, des *Châtaigneraies*, des *Aulnaies*, des *Sapinières*, etc. Et toutes sont des *forêts*, les unes à feuilles persistantes, les autres à feuilles caduques. Si maintenant nous poursuivons cette enquête, nous verrons que les *Pinèdes* sont habituellement sur un sol aréneux léger, les *Châtaigneraies* fuient le calcaire, les *Aulnaies* s'établissent sur un sol compact et humide. Il est donc assez facile, pour certaines associations, de trouver un rapport entre la nature du sol et leur présence en cet endroit. Ce sont les lieux édaphiques, les conditions de terrain. Les forêts de Mélèzes (*Laricaies*) et les *Hêtraies* seront rarement en compétition, car le Mélèze préférant un climat continental, et le Hêtre ne poussant pas dans ces mêmes conditions, les deux arbres rarement s'associeront. Au contraire, souvent la forêt sera, au moins dans l'Europe moyenne, une association complexe d'arbres variés, Sapins, Érables, Chênes et Hêtres. La définition de forêt perd alors de sa netteté comme association, car en ces stations la prédominance d'une espèce n'est pas clairement marquée. Il en sera des sociétés végétales comme des sociétés humaines, il en est de simples et de complexes. Dans tous les cas, botaniquement parlant, l'association, c'est-à-dire l'énumération des espèces qui vivent habituellement ensemble, est de toutes ces notions la plus essentielle, c'est la base de toutes autres sortes de considérations géo-botaniques. On pourra, par exemple, choisir une espèce, disons le roseau ordinaire, et noter, dans toutes les stations où on les rencontrera, ses associés. Or, comme cette

Graminée a une immense extension — on la connaît du centre de l'Afrique, de l'Amérique comme de l'Asie, — on s'attendra à la trouver associée à des végétaux bien différents. Et cependant partout ses exigences vis-à-vis de l'humidité sont les mêmes ; c'est toujours une haute Graminée dont le pied est dans l'eau une partie de l'année ou toute l'année. Il y a donc des plantes de grande extension et d'autres si rares qu'elles ne sont connues que d'une seule localité. Cette extrême localisation est rare chez les plantes aquatiques ou amphibies, car l'eau est un milieu assez uniforme.

Dès lors, si nous choisissons comme plante type pour caractériser une association : la *Phragmitaie*¹, le terme signifiera autre chose dans l'Ouganda, au Mississipi, sur les bords du Danube ou au pourtour de nos étangs.

Le terme qui devait désigner une « association » ne garde sa valeur que pour un territoire restreint dans lequel les commensaux restent les mêmes, tandis que pour un territoire plus étendu il sert à caractériser une « formation », c'est-à-dire un facies particulier des pièces d'eau et des marécages. Dès lors, la rigueur qu'on aimerait voir régner dans la nomenclature disparaît, la notion est élastique, le terme s'applique à deux catégories différentes de la géographie des plantes. On passe de la notion de *société* à celle de *station*. Dans le premier cas, le *Phragmites* était la plante la plus caractéristique de sa compagnie ; dans le second cas, il est comme le réactif qui fait connaître la nature du sol.

Mais voici une nouvelle complication ; le géographe qui, de loin, voit un marécage, ou qui, peu informé, de près, reconnaît des roseaux, décrit cette apparence comme une *Roselière*, et cependant le *Phragmites* est absent de cette *roselière*. A la place du *Phragmité* il y a, ou le grand roseau du Midi, l'*Arundo Donax*, ou, chez nous, une plus petite Graminée, le *Phalaris arundinacea*, ou enfin, sous les tropiques, des fourrés de *Bambous* ou de *Gyncrium*. Toutes ces grandes Graminées, dans des stations analogues, ont la même apparence sociale, celle de grands roseaux, c'est la *Roselière*, notion physiognomique tout d'abord, puis, après examen de la station, notion édaphique, c'est-à-dire réactif du milieu géographique. A des conditions de vie analogues correspondent des

¹ *Phragmites communis*. Roseau.

formes analogues. Il y a coïncidence. Sur les rochers, on trouve des plantes grasses, des plantes épineuses, des plantes en coussinets, toutes ces formes font défaut aux plantes aquatiques. Soit dans leur mode d'implantation dans la vase ou sur le rocher submergé, soit dans la structure de leurs organes immergés ou émergés, on remarque de nouvelles coïncidences qui sont comme des ripostes au milieu ; c'est comme si ces formes étaient adaptées à ce milieu, comme construites pour vivre dans ces stations. Décrire pour chaque catégorie de station la conformité de structure au milieu, c'est étendre à un nouveau domaine l'enquête sur

Fig. 136. — Bambusaie. Phot. R. C.

les associations. Les plantes sont donc non seulement habituellement associées en groupements définis, mais dans les groupements qui, par leur ensemble, se marquent avec une certaine physionomie la structure interne, la disposition des parties et leur développement se répètent analogues de station en station, quand même les plantes sont différentes, quand même elles appartiennent à des familles, à des genres, à des espèces distinctes. Il y a des plantes grasses parmi les Cactacées, Crassulacées, Géraniacées, Asclépiadacées, Euphorbiacées, des apparences de Bruyères chez des Conifères, des Euphorbiacées, des Polygalacées, des Myrtacées, des Mélastomacées, etc., des Jongs dans les plus différentes familles.

Aussi les anciens botanistes, se laissant guider par l'apparence, donnaient-ils les mêmes noms aux plantes les plus diverses. Ainsi CLUSIUS, qui réunit les *Empetrum* aux vrais *Erica* et leur associe même une Algue brune éricoïde de la Méditerranée.

Fig. 137. — Lac avec rivage; schéma, montrant les zones de végétation sur la grève humide, les roseaux entremêlés de laïches (*Carex stricta*); puis un premier cordon (*b*) de roseaux (*Phragmites*) dans l'eau; un second de joncs (*Scirpus*) avec, au fond, le gazon des Chara; c, des potamogets; d, des nénuphars; e, de nouveau des joncs; f, les potamogets et les myriophyllum.

La biologie végétale réunit ces différents points de vue, elle s'en sert pour essayer d'effectuer une espèce de synthèse, représenter la plante vivante dans son milieu, trouvant son équilibre vis-à-vis du milieu changeant et en relation avec ses associés. On conçoit dès lors que le problème puisse être compliqué et que, pour cette cause, plus d'une question attende encore sa solution.

Choisissons comme exemple, pour illustrer ce qui vient d'être dit, les formations qui, chez nous, s'établissent au pourtour des étangs et des lacs-étangs, en laissant de côté ce qui a trait à la flore microscopique.

Il vaut mieux choisir pour cette démonstration des bassins profonds de 20 à 25 m.; on saisira mieux chez eux la zonation qui résulte de l'augmentation de profondeur.

On peut tout de suite reconnaître au bord de ces lacs-étangs les zones géographiques suivantes :

- A) La grève exondée, plus ou moins humide.
- B) La grève inondée, talus plus ou moins abrupt qui indique l'action érosive de l'eau.
- C) Une surface à peu près horizontale, la beine ou blanc-fond, qui résulte de l'effondrement du bord primitif et dont les

matériaux se sont alluvionnés. Cette beine est de 1 m. 50 à 3 m. au-dessous de la surface.

D) Le mont, la pente nouvelle formée par la beine d'alluvion.

E) Le reste du talus primitif.

F) Le plafond du lac.

A chacune de ces zones correspond une végétation particulière (fig. 137),

Une ceinture littorale de roseaux et de joncs, qui émergent d'ordinaire et qui s'avancent sur la beine. On y distingue habituellement un premier cordon de roseaux (*Phragmites communis*) qui peut plonger jusqu'à 1 ou 2 m. de profondeur; une seconde zone plus interne de *Scirpus lacustris*, formée par des joncs qui s'enfoncent jusqu'à 3 m. de profondeur mais qui, habituellement, vont moins profondément. Mais, dans d'autres cas et parfois dans les baies du lac de Genève, la Scirpaie est externe. Plus à l'intérieur et occupant des fonds de 2 à 4 m. dans les lacs-étangs du Jura et généralement en une zone de peu d'étendue qui souvent se mêle aux précédentes, une nupharaie à nénuphars jaunes ou blancs, dont les feuilles, portées sur de longs pétioles, atteignent la surface et nagent.

Fig. 138. — Etang avec pente accentuée; a, cordon de laiches (*Carex stricta*); b, alisma; c, *Typha* (Massettes); d, myriophyllum; e, nénuphars; f, potamogets.

La zone suivante ne comprend que des plantes submergées pendant la majeure partie de leur existence et qui ne sortent de l'eau que leur extrémité florifère. Ce sont les *Potamogeton* et le *Myriophyllum spicatum* ou le *Ceratophyllum demersum*.

Le fond du lac, jusqu'à des profondeurs de 20 à 30 m., est occupé par des gazons étendus

d'algues calcaires incrustées, les *Chara*, ou sans calcaire, les *Nitella*. Cette zone est habituellement par 10 à 15 m. de fond. Les *Characées* n'atteignent sur le fond que de 10 à 20 cm. de hauteur, mais elles y constituent souvent de vrais gazons (*Chara hispida*, *Ch. rudis*, *Ch. ceratophylla*, *Ch. contraria*, *Ch. aspera*) (*Nitella syncarpa*).

Disons tout de suite que les deux zones externes, *Phragmitaie* et *Scirpaie*, même la *Nupharaie*, ne se maintiennent, au lac de Genève, que dans les petites baies abritées, là où le caractère lacustre fait place au caractère étang marécageux. La *Characae*

Fig. 139. — Le *Nuphar juranum* de Magnin; forme des eaux profondes des petits lacs jurassiques.

D'après Ant. Magnin.

R. C. del.

1. Passage de la roselière à la joncaie et à la nupharaie. 2. Grèves inondées du lac de Genève avec Renoncules, Myosotis et Littorella.

et la Potamogétonaie s'établissent normalement. On voit du pont des bateaux à vapeur qui circulent sur le lac de grandes traînées ou des taches étendues de ces gazons sous-lacustres. Aux mois de juillet et d'août, les Potamots, enracinés par 15 m. de fond, viennent épanouir leurs épis à la surface jusqu'à 200 m. du rivage, et les rames des bateliers viennent s'enchevêtrer dans le lacis compliqué de leurs longs câbles.

Jamais au lac de Genève la Nupharaie ne s'établit dans le lac proprement dit. Quant aux Roselières et aux Joncaies, elles s'abritent volontiers dans les anses, où la vague est moins forte.

M. MAGNIN, qui a minutieusement étudié les lacs du Jura, fait une distinction nette entre le mode de vie du Nénuphar aux roses blanches, qui prend pied par un gros rhizome, lequel se ramifie dans la vase, à 20 cm. ou 1 m. de fond, tandis que le Nénuphar jaune a le rhizome sur le sol et atteint des fonds de 2 à 4 m. sur les bords de la beine. Dans sa variété *juranum*, ce dernier développe, dans les eaux profondes, des pétioles et des pédoncules de 4 m. de longueur.

Mais cette espèce n'est pas rare dans les étangs sur le Plateau suisse, entre les grands lacs, dont il semble craindre les vagues et l'eau trop pure.

A chacun de ces types correspond, dans les eaux moins profondes, des formes biologiquement parallèles. Les petites flaques sur la grève caillouteuse ont, dans les Renoncules aux feuilles nageantes, un modèle réduit des Nénuphars ; aux Phragmites correspondent de plus petites graminées, comme le *Phalaris arundinacea*, plus petite encore comme le *Deschampsia littoralis*, aux Scirpes correspondent les menus *Eleocharis palustris* plus petits encore *E. acicularis* et le minuscule *E. Lereschii*, tandis que, en prairie sous-lacustre, alors stérile ou en cordon plus rapproché du bord, un plantain aquatique vient dresser hors de l'eau ses fleurs aux étamines oscillantes (*fig. 140*). Pour compléter cette florule de végétaux nains, une renoncule rampe dans l'eau et fleurit à l'air, tandis que le myosotis, tout autour, rachète l'exiguïté de sa taille par de superbes fleurs bleues et roses (*planche XV, B*).

Là où l'eau est un peu plus profonde, l'*Hippuris* répète les

gazons des littorelles ou se mêle à ces dernières, tandis que, plus près du bord, il porte ses fleurs rudimentaires à l'aisselle de chacune de ses feuilles en verticille.

Fig. 140. — Le *Littorella lacustris* plantaginacée des rivages et des eaux peu profondes. Selon la profondeur de l'eau, le pédicelle floral s'allonge plus ou moins pour amener à l'air la fleur, dont les étamines à longs filets vont secouer au vent leur pollen ; C, forme aquatique stérile à feuilles rubannées.

Dess. de R. C., en partie d'après Glück.

Si maintenant, plus en arrière, nous étudions, comme par exemple, dans les eaux mortes de Coudrée, entre la forêt et le nouveau rivage, la zonation des plantes aquatiques dans les étangs qui sont entourés par des dunes lacustres, nous trouvons au centre une Nupharaie qui se mêle aux *Phragmites* et aux *Scirpus*, puis aux *Cladium*. Vers le bord, des touffes de *Carex* en mottes tendent à se souder et à former un terrain solide ; elles sont encore à moitié immergées dans l'eau du marais et avancent pro-

gressivement jusqu'à la Phragmitaie, même dans la Phragmitaie. Enfin, un nouveau cordon fait du *Schoenus nigricans* puis, à la limite de la zone inondée, une haie continue de *Scirpus Holoschoenus*. Cette succession se répète autre part et elle est tout à fait typique pour ces eaux mortes enclavées dans les sables.

Ainsi, dans ces diverses stations se marquent des zones bien définies, chacune d'elle correspondant à des degrés d'humidité variable. Cependant, chacune de ces plantes peut vivre, quand elle n'est pas en concurrence, dans d'autres zones. C'est ainsi que les Scirpes (joncs) peuvent se développer sous l'eau sans fleurir, alors elles allongent leurs feuilles ; les Littorella en gazons ou les Hippuris se multiplier végétativement pendant longtemps, sans fleurir.

D'ailleurs, dans nos marécages et nos étangs, beaucoup d'autres végétaux s'associent à ces plantes-types dont il a été question et souvent simulent leur facies.

Aux Phragmites correspondent les graminées *Calamagrostis*, *Epigeios*, *Phalaris arundinacea*. Aux Scirpes, aux joncs simples, l'*Equisetum limosum*, les hautes Massettes, les joncs (*Juncus acutiflorus*, *J. obtusiflorus*), le *Ranunculus Lingua*, les Ombellifères aquatiques aux feuilles à segments linéaires, etc. (*Oenanthe phellandrium*). Puis, dans la région extrême des Phragmites, les iris d'eau, les Butomes, les Sparganium, les *Cyperus*, l'*Acorus Calamus*.

Au *Carex stricta* se mêlent les *Carex ampullacea* et beaucoup d'autres espèces, selon les stations. Un ail même, vient se mêler aux joncs qui bordent la littorellaie et répète l'apparence des Eriophorum et des Scirpus gazonnants. Puis ce sont les *Triglochin*, les *Alisma*, etc.

Et ces facies végétaux se répètent dans le monde entier.

Autour des grandes Nupharaies du *Victoria regia* (*V. orbigniana*) des eaux mortes du Rio Paraguay, on voit, répétant le type des joncs, de singuliers *Solanum* aux tiges simples, qui se dressent, comme autant de Scirpus, en un cordon de bâtons inondés. Dans les marécages, mêlés aux Cypéracées, les Polygala joncoïdes et équisétoïdes, des Asclépiadacées et une foule d'autres plantes tropicales auxquelles a été donné le nom de joncoïdes,

équisétoïdes, subtiles, ténus, *tenuicaulis*, semblent porter l'empreinte du marécage et la livrée de ses joncs.

C'est une journée chaude de juillet; dans les saulées et les eupatoires qui bordent l'étang, quelques lianes ont grimpé dans

Fig. 141. — Bord d'un marais, avec dunes lacustres, de Sciez (lac de Genève); on voit bien le cordon externe du jonc, le *Scirpus Holoschoenus*.
Phot. R. C.

les buissons : les grands liserons ouvrent au soleil leurs coupes blanches; de gros bourdons se glissent jusqu'au fond des calices; la douce-amère secoue ses gracieuses fleurs violettes et porte déjà des baies vertes ou rouges par-dessus les lysimaques jaunes. Le bord argileux est garni de grands *Alisma*, dont les inflorescences dressées ressemblent à de gracieux candélabres; leurs corolles aux trois pétales bleu-lilas alternent avec les fleurs non écloses et les fruits déjà mûrs (fig. 145).

Dans l'eau, de grandes massettes (*Typha*) ont déjà perdu leurs fleurs mâles et mûrissent leurs fruits disposés en robustes pompons cylindriques. Puis, c'est l'eau plus profonde, masquée par places par l'accumulation des lentilles d'eau (*Lemna*). Les potamots sont venus étaler sur l'eau leurs feuilles nageantes ; on voit déjà leurs rameaux fructifères qui ont renversé dans l'eau leurs épis presque mûrs. Une seule plante à ce moment fleurit dans l'eau, — je veux dire pousse sa tige florifère hors de l'eau, — c'est le *Myriophyllum* (planche XVI), le millefeuille d'eau. Il a ses tiges flottantes entre deux eaux ; d'autres sont encore enracinés. La plupart nagent librement sans racines, portant à chaque nœud une croix de feuilles ramifiées en peigne. Les jeunes inflorescences sont encore submergées, mais voici que ces dernières se mettent à dresser leur épi hors de l'eau par une courbure de l'entrenœud situé entre les deux derniers verticilles de feuilles. Plus tard, quand les fruits mûriront, cette courbure se fera en sens contraire et l'épi fructifère sera entraîné dans l'eau. La plante paraît donc savoir à quel moment elle doit élever son extrémité au-dessus de la surface de l'étang et change de sentiment avec l'âge (tonus). Les botanistes qui aiment à classer et qui trouvent avantage à se servir d'expressions choisies, disent que son tonus change avec l'âge. « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. » Il n'y a pas que les plantes qui changent d'humeur en vieillissant.

D'abord, le *Myriophyllum* sait maintenir ses branches terminales tout près de la surface de l'eau ; il sait aussi effectuer une courbure comme calculée pour amener non pas les feuilles hors de l'eau — elles s'y dessécheraient rapidement — mais toute la portion florifère. La courbure continue jusqu'à ce que l'axe soit parfaitement vertical ; alors les tiges inondées s'arrangent à faire balancier et à maintenir à l'inflorescence sa direction normale. Si pour une cause ou pour une autre le rameau était déplacé par une courbure de compensation, la région qui a déjà effectué la première courbure rétablirait l'équilibre rompu et l'épi sortirait de nouveau, droit vers le ciel.

Les physiologistes disent aussi que cette plante est géotropique, c'est-à-dire qu'elle s'oriente par rapport à la pesanteur ; elle n'est en équilibre que lorsque son épi occupe, au-dessus de

l'eau, une situation verticale. Mais le reste de sa tige, ses feuilles dans l'eau, n'occupent aucune situation particulière, sinon d'être près de la surface ; pour percevoir l'orientation, il faut à la

Fig. 142. — *Myriophyllum spicatum*, fortement grossi. A, Sommet de la tige florifère (comparez avec planche XVI) ; 1, boutons des fleurs mâles encore clos ; 2, les étamines ont soulevé les pétales, dont deux sont déjà tombés dans la fleur de droite ; fleur mâle épanouie avec bractée, préfeuilles et calice : de ce dernier s'élèvent les filets des étamines. B, fleur femelle nue, située plus bas (cfr. planche XVI), on voit la bractée, les préfeuilles et le pistil avec ses stigmates papilleux.
Dess. de R. C.

plante son épi en voie de développement, et, chose intéressante, ce mouvement qui se fait au profit de l'inflorescence ne s'exécute pas par une partie de l'inflorescence, mais par le dernier ou l'un des derniers entrenœuds foliifères. Remarquez aussi que les

feuilles, disposées en croix, se disposent de manière quelconque par rapport au fil à plomb ; la seule chose qui paraît leur être nécessaire, c'est de s'écarter de la tige, de s'étaler complètement.

Mais, choisissons parmi ces innombrables épis qui s'élèvent de 5 à 10 cm. au-dessus de l'eau celui-ci, qui est déjà bien développé. Je vois que l'épi comprend des étages assez nombreux. A chaque étage, il y a quatre feuilles rudimentaires, les plus inférieures ressemblent encore aux feuilles submergées, elles sont encore pectinées en peigne ou, si elles sont plus simplifiées, simplement dentées. Les croix alternent à chaque étage ; dans les moyens et les supérieurs, les bractées, — comme on appelle la feuille qui précède un bouton floral, — sont simples et portent, à l'angle qu'elles forment avec la tige, une fleur. Commençons par les dernières fleurs qui sont encore en boutons ; chacun de ces petits boutons ovoïdes est accompagné de deux feuilles minuscules : les bractéoles des botanistes, aussi nommées préfeuilles. On voit clairement que le développement se fait de bas en haut de l'inflorescence, car les plus petites, les moins avancées, sont au sommet. A ce moment-ci, il y a encore trois étages de boutons disposés par quatre ; ils sont encore contigus, les uns au-dessus des autres. Je détache une des fleurs les plus avancées mais non encore ouverte et j'aperçois un calice court à quatre dents, puis une corolle dont les quatre pétales rouges en dehors, se recouvrant les uns les autres, enveloppent les étamines comme d'un capuchon. Au dedans, il y a huit étamines et, au dedans de ces étamines, quatre ovaires rudimentaires, qui devraient donner le fruit après la fécondation. Mais voici que je m'aperçois qu'il y a, à la base de l'inflorescence, des étages de fleurs d'un autre type ; ce sont les femelles ; elles sont aussi, chacune, précédées par deux minuscules bractéoles, mais je n'y aperçois ni calice ni corolle ; elles ne sont donc pas protégées, leurs quatre carpelles tiennent ensemble en un ovaire turbiné en toupie, couronné par quatre stigmates disposés en croix et couverts de longues papilles, de poils roses. Ces fleurs femelles non protégées exhibent et étalent leurs stigmates, offrant cette surface au pollen qui doit y être amené par un véhicule ou un autre. Ces fleurs-ci ne peuvent donc se passer d'une fécondation croisée puisqu'elles ne possèdent pas les organes mâles, les éta-

mines, le pollen qui est la poussière fécondante. On trouve ainsi quatre ou cinq étages de fleurs femelles qui se séparent successivement par l'allongement des entrenœuds. Comme à ce moment-ci les fleurs mâles situées plus haut ne sont pas encore ouvertes, la fécondation doit se faire, et se fait réellement, par le pollen apporté d'épis voisins, par le vent.

C'est à la fois un des objets les plus simples et parmi les plus intéressants que l'épi florifère du *Myriophyllum*. Examinons à loisir et, pour cela, transportons nos plantes aquatiques à la maison, nous nous organiserons un laboratoire dans la chambre de bain ou sur la terrasse. Cela ne sera d'ailleurs pas compliqué : dans une cuvette nous placerons soigneusement les tiges sous l'eau, par une pierre plate nous maintiendrons l'orientation primitive. Les épis étant bien verticaux, situés comme dans le marécage hors de l'eau, nous pourrons à chaque moment, et les vacances d'été nous en laissant le loisir, revenir voir ce qui se passe. Eh bien ! ce qui va suivre est assez singulier.

Voici les fleurs mâles près de s'ouvrir (*planche XVI^e et fig. 142*) ; leurs pétales encore recourbés sont d'une vive couleur rouge ; bientôt je m'aperçois que la fleur ne s'épanouit pas comme celle que je connais, comme par exemple une fleur de pommier, en étalant ses pétales en une gracieuse étoile. Ici, je vois les pétales se détacher par leur base, et réunis encore par leur sommet en une espèce de capuchon, être poussés en avant par le développement des étamines, plus justement dit par l'allongement des filets des étamines qui soulèvent les anthères (sacs à pollen), encore enveloppées par le capuchon formé par les quatre pétales. Ce petit manège prend bien une demi-journée. Les étamines maintenant commencent à diverger et, ce faisant, décollent les pétales qui, un à un, sont éliminés avant même que le pollen soit complètement mûr. Voici donc une fleur qui possédait quatre beaux pétales rosés, ornement habituel d'une fleur, et qui les rejette comme on se débarrasse d'un vêtement inutile.

D'ailleurs, les fleurs femelles, situées plus bas, sont nues, elles aussi mais elles le sont dès le début ; elles ont jugé inutile ce développement de pétales, car, plus rapidement mûres, les premières sorties de l'eau, elles n'ont pas besoin de cette enveloppe

R. C. del.

1. MYRIOPHYLLUM qui vient fleurir au-dessus de l'eau
2. POTAMOGETON dans le lac de Genève.

protectrice. Les fleurs mâles, au contraire, vont se développer étage après étage ; ce développement sera précédé par l'allongement de l'entrenœud sous-jacent. C'est dans leur capuchon que les anthères vont préparer leur pollen jusqu'à l'y amener à la maturation presque complète. Il faut à chaque étage le temps d'une journée. Le pollen, pour garder son activité, doit ne pas se dessécher, et les anthères, pour arriver à leur maturation et préparer leur mécanisme d'ouverture qui permettra l'émission du pollen, doivent se développer dans une atmosphère humide sous la protection de la corolle. Mais maintenant, pour cette sorte de fleur, la corolle est inutile. Le *Myriophyllum* pouvait choisir entre deux modes de fécondation : par les insectes, par le vent ; il a préféré ce dernier véhicule. En effet, les filets des étamines maintenant érigés, minces mais élastiques, portent chacun une anthère ou double sac à pollen, que le vent, que la moindre brise fait osciller, et hors desquels le pollen, comme une poussière sèche et légère, s'échappe d'un coup en une fumée légère et soufrée. La corolle serait plutôt gênante ; la plante sait fort bien s'en débarrasser au bon moment, après s'en être servie pendant la maturation du pollen comme enveloppe protectrice.

Remarquez aussi avec quelle apparente sagesse cette plante développe successivement les étages de fleurs mâles. A chaque jour suffit sa peine ; elle multiplie les chances de réussite en ne mettant pas tous ses œufs dans un même panier. Comme un joueur prudent, elle espace ses mises ; c'est là un caractère qui est souvent réalisé chez les plantes qui se servent du vent comme intermède de leur pollinisation. Mais chez peu de végétaux il y a cette régulière périodicité qui assure une dissémination accordée au développement rythmique correspondant des fleurs femelles, dans les inflorescences plus jeunes.

En choisissant le vent comme intermède, le *Myriophyllum* ne s'est pas conformé à une règle qui serait générale dans les plantes aquatiques. Voyez le Nénuphar aux grandes fleurs ouvertes, l'*Alisma* aux corolles lilacines (*fig. 143*), les Utriculaires aux fleurs éperonnées, elles sont, celles-là, visitées par les insectes et ne s'en portent pas plus mal. D'ailleurs, chez le *Myriophyllum*, cette anémophilie ou fécondation par l'intermède du vent n'est pas non

plus un caractère de famille, car non loin d'ici, tout près même, sur le bord de l'étang, des *Epilobes* de deux espèces (de la même famille) attirent tout un monde d'insectes. Mais, chez eux, la corolle aux quatre pétales roses s'étale et contribue, après l'épanouissement, à rendre la fleur visible aux insectes. Il y a d'ailleurs des anémophiles terrestres (beaucoup de nos arbres : coudriers,

Fig. 143 — Fleur (fortement grossie) de l'*Alisma Plantago* ; on voit la collerette, qui réunit les bases des étamines, produire dans l'intervalle une gouttelette de nectar. Dess. de R. C.

bouleaux, aulnes, chênes, frênes, etc.), mais chez tous il manque le nectar, cette sécrétion sucrée qui attire les insectes et la vive coloration des corolles ou des inflorescences.

Puisque nous y sommes, ne quittons pas cet étang. Il y a plus de choses curieuses à étudier ici que nous n'avions tout d'abord pensé. Malgré la chaleur humide, toujours désagréable aux rhumatisants, nous allons surveiller l'*Alisma* et ses fleurs aux trois pétales violet pâle. Au besoin, nous nous servirons de jumelles pour l'étudier à notre aise, et bien installé sur cette touffe de laiche, nous attendons les insectes butinants. Ils sont variés.

Remarquez maintenant, comment, en se promenant dans cette fleur largement ouverte, l'insecte se couvre de pollen en frôlant les

anthères portées sur les filets divergents, tandis qu'il touche avec son abdomen aux stigmates, étalés en rayons, des nombreux carpelles du centre de la fleur. Il va butiner le nectar qui brille en gouttelettes limpides sur le bord de la collerette qui réunit les étamines par leur base (*fig. 145*).

Cet *Alisma* est le type d'une famille vaste que plusieurs ont subdivisée en sous-familles, mais qu'on peut sans danger pour la systématique laisser sous le nom d'Hydrocharitées ou de Naïadées. Sans aller bien loin, nous pouvons, à son sujet, faire une incursion dans l'un des domaines les plus passionnants de la Biologie végétale. Chez les Potamots, leurs alliés qui sont représentés dans nos marécages et dans nos lacs par plus de 20 espèces, le plus souvent, les épis florifères qui ressemblent extérieurement à ceux des *Myriophyllum*, sont aussi anémophiles.

Mais ici les fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'on trouve les deux sexes dans un même bouton ; cependant, ces fleurs à étamines et à pistils ne peuvent se féconder d'elles-mêmes, car les organes des deux sexes dans une même fleur ne mûrissent pas en même temps. Ici, chez les *Potamogeton* (*planche XVI²*), les stigmates sont déjà prêts à recevoir le pollen alors que les anthères de cette même fleur sont encore appliquées contre la base de l'ovaire et, pour longtemps encore, incapables de s'ouvrir pour laisser échapper le pollen. Il y a donc, dans cette fleur, un premier stade femelle. La fécondation étant faite par l'intermède du vent qui apporte le pollen étranger, les étamines qui étaient restées inactives s'étalent, ouvrent leurs sacs et émettent un pollen abondant. Nous voici maintenant dans la phase mâle : le pollen, par le temps calme, s'accumule en sortant des anthères dans des appareils en forme de cuiller qui sont des appendices des filets de l'étamine et, lorsque le vent vient à souffler gentiment par-dessus l'étang, on voit partir des inflorescences, comme un nuage de soufre.

N'avez-vous jamais assisté, dans la montagne, au départ du pollen qui s'était accumulé pendant le calme entre les écailles des chatons mâles des sapins et qui tout à coup est enlevé par la brise : on voit alors partir de l'arbre comme une fumée soufrée, que le vent emporte où il veut.

Ce qui nous intéresse ici, c'est la formation, sur l'étamine elle-

même, de cette cuiller sur laquelle le pollen expulsé de l'anthere est déposé provisoirement.

A part ces écailles dorsales des étamines, les *Potamogeton* ne possèdent aucune espèce d'enveloppe florale ; les fleurs y sont vertes et nues. Rien n'y attire ou ne retient les insectes. Rarement, quelques collecteurs de pollen s'y arrêtent un instant.

Quelques espèces de *Potamogeton* semblent pouvoir fleurir sous l'eau ; mais leur biologie est encore mal connue. Mais à défaut d'espèces de ce genre nous avons les *Zanichellia* (*Zanichellia palustris*) qui ressemblent extérieurement aux minces *Potamogeton* des cours d'eau ou des lacs de montagne. Ici, les fleurs sont toujours submergées ; elles sont réduites à la plus simple expression. Il en est de mâles et de femelles ; les premières développent une seule étamine, les secondes ont au dedans d'une enveloppe en forme de sac ouvert 4 carpelles dont les stigmates, en forme d'entonnoir, sont aptes à accumuler les poussières, le pollen par conséquent. Celui-ci, qui est du poids spécifique de l'eau, reste suspendu dans le liquide ; les mouvements occasionnés par les variations de température et l'agitation le déplacent et l'amènent accidentellement vers le stigmate des fleurs femelles. Ici donc l'intermédiaire c'est l'eau, et le pollen

Fig. 144. — *Potamogeton lucens*, réduit au $\frac{1}{4}$. Dess. de R. C.

s'arrange en conséquence ; il n'est plus ni visqueux comme celui des plantes visitées par les insectes, ni sec et léger comme le pollen des fleurs anémophiles ; il a la densité de l'eau, ce qui l'empêche à la fois d'être amené à la surface ou de tomber lentement vers la profondeur. Chose intéressante déjà chez ce *Zanichellia* et mieux encore chez une autre Naïadée de l'océan, le pollen s'allonge en une sorte de bâton, ce qui augmente sa résistance à la chute, comme nous l'avons déjà vu à propos des *Raphidium* et des *Synedra* du plancton.

Mais la Nature partout infiniment ingénieuse s'est, semble-t-il, chez les plantes aquatiques, surpassée encore ; elle déroute le biologiste qui veut mettre de l'ordre et de la méthode dans ses classifications.

Nous aimons à nous imaginer une nature enfantine maladroite qui, lentement, accumule ses expériences, faites autant d'échecs que de réussites ; nous nous la sommes imaginée évoluant, corrigeant ses erreurs, progressant toujours. Mais à coup sûr, une nature réalisant du premier coup, sans tâtonnements, un appareil compliqué, cette Nature-là nous est incompréhensible. Dans tous les cas elle n'expose guère, comme les bons artistes, que les réussites, gardant pour elle, le plus souvent les détruisant, les ébauches. C'est une idée un peu puérile que celle qui nous est libéralement exposée par les charlatans du transformisme, à savoir que les différentes espèces d'un même genre sont comme une série d'ébauches, tentatives plus ou moins réussies d'une suite d'essais pour arriver à la forme parfaite. Je connais d'honnêtes, mais naïfs naturalistes qui, dans cette exposition universelle, plus réellement universelle que nos foires et exhibitions internationales, accordent aux espèces, en leur qualité de jurés, des diplômes d'encouragement, des prix de 1^{re} et de 2^{me} classe et même des « hors-concours ». Il y a, pour ces jurés, des espèces peu évoluées, des espèces à un degré de perfection plus avancé que d'autres. Le barème de ces jugements ? C'est en général le degré de complication visible ; pour eux, l'espèce évoluée c'est celle qui paraît le mieux adaptée à son milieu par une certaine coïncidence entre sa structure, sa biologie et les conditions de vie. Pour moi, plus j'avance dans cette étude plus je vois que ce que nous retenons, ce sont les cas les plus simples, ceux

dans lesquels la relation entre le milieu et la structure est la plus évidente. Voici une plante qui, de tous temps, a fait l'admiration des élèves de première année, c'est le *Vallisneria spiralis*, mais je ne vois rien dans sa biologie que je ne trouverais au même degré, quoique sous une autre forme, dans le modeste *Hyriophyllum*. Comme

le *Vallisneria*, la plante étudiée en tête de ce chapitre sait élever ses fleurs hors de l'eau; elle sait détacher des organes comme les pétales devenus inutiles, sérier sa pollinisation de façon à la rendre efficace, etc., etc. Chez le *Vallisneria* tout cela se lit plus aisément, prend une tournure plus dramatique, frappe donc plus l'imagination.

En réalité, chaque forme vivante se révèle à qui sait l'interroger comme un appareil merveilleusement construit, tantôt étroitement ajusté à des circonstances très spéciales, tantôt capable par une moins exclusive spécialisation d'occuper d'immenses espaces en vertu de toute la gamme de ses possibilités. Mais nous aurons à reprendre ces questions de philosophie botanique.

Revenons donc au *Vallisneria*. C'est encore une plante de la même famille des *Najadées*, comme les *Potamogeton* et les *Zanichellia*. Fixée au fond d'eaux stagnantes peu profondes, elle développe en-

Fig. 145 — *Vallisneria spiralis*. A, Schéma représentant la plante femelle au moment où les fleurs ont été élevées à la surface de l'eau. B, Plante mâle dont on voit à gauche le bouton d'inflorescence qui contient dans son intérieur les fleurs mâles globuleuses qui devront se détacher et arriver à la surface.

tre ses feuilles longuement rubanées, sur un pédicelle de longueur variable, une spathe comme celle qui, dans les *Alisma*, enveloppe les jeunes inflorescences ; ici, elle est formée de trois pièces soudées en un capuchon, dans lequel il y a une fleur quand il s'agit de plantes femelles, ou tout un petit épi de fleurs aux boutons globuleux, quand il s'agit de la plante mâle. Lors de la maturation, le pédicelle, au-dessous de la spathe femelle, s'al-

Fig. 146. — Fécondation du *Vallisneria* américain (*v. Wylti* nob.) ; au centre le sommet de la fleur femelle, dont on voit les trois pièces d'enveloppe en gris et les trois stigmates divisés et spirales en plus clair, le tout au fond d'une cuvette produite par l'action même de la fleur sur l'eau ; autour, sur l'eau, quatre fleurs mâles nageant au moyen de leurs sépales renversés, ce petit esquif couronné par les deux étamines qui ont émis leur pollen : voir au pourtour de l'entonnoir la culbute des fleurs mâles.

Dess. de R. C., d'après Wylie.

longe beaucoup, sans que tout d'abord la fleur soit élevée jusqu'au niveau de l'eau ; alors il s'enroule en spirale et finit, au dernier moment, par se dérouler presque complètement en s'allongeant et en se redressant. A ce moment la fleur femelle sortie de sa spathe, est portée sur un pédicelle spécial. Pour atteindre la surface de l'eau, les pédicelles s'allongent parfois jusqu'à plus d'un mètre de longueur ; les feuilles rubanées peuvent atteindre jusqu'à 80 cm. de longueur. Alors l'allongement du pédicelle cesse, la fleur femelle écarte ses trois sépales (il n'y a plus dans cette fleur

que de minuscules pétales au fond du calice) ; puis les trois stigmates échancrés s'étalent entre les sépales qu'ils arrivent à dépasser extérieurement. Alors dans les plantes mâles, dont la spathe est portée par un pédicelle qui n'atteint que quelques centimètres de longueur, se fait une curieuse transformation. Par la fente irrégulière de la spathe qui s'ouvre on voit les boutons mâles — il en est parfois plus de mille — petits globules de 0,3 à 0,4 millimètres de diamètre — se détacher de l'axe du centre de la spathe et monter dans l'eau comme des bulles d'air. En effet, chacune de ces fleurs mâles, non encore épanouïes, renferme de l'air, ce qui l'allège. Souvent, dans les pays où ces plantes abondent, il y a des traînées de fleurs mâles qui, en parfait équilibre sur l'eau, sont poussées par le vent. Arrivées à la surface, les trois sépales verts s'étalent, se recourbent en arrière et constituent ainsi un appareil à trois nacelles qui repose sur la surface de l'eau sans se mouiller. Des trois étamines, habituellement deux seulement se développent, leurs filets divergent ; poussées par le vent ou le courant, les fleurs mâles épanouïes arrivent au contact des fleurs femelles ; la position des anthères est telle que la pollinisation se fait par contact entre ces dernières et les stigmates qui sont venus comme à leur rencontre. La fleur fécondée est ensuite ramenée sous l'eau par l'enroulement du pédicelle. Le fruit plus lourd que l'eau mûrit et germe sur le fond (*fig. 145*).

Mais chez une espèce voisine américaine, la fécondation se fait un peu autrement. La fleur femelle qui arrive, par son long pédicelle, à la surface de l'eau, est garnie extérieurement d'un revêtement de cire, ce qui empêche l'adhésion de l'eau ; il se forme autour de chaque fleur femelle une espèce de petite cuvette parce que l'eau ne peut la mouiller. Alors les fleurs mâles, dont les étamines sont contiguës et qui portent leur pollen en une espèce de massue, chassées par le vent, arrivent dans le voisinage de la fleur femelle. Si la vague est plus accentuée, la fleur femelle oscille et plonge plus ou moins, ce qui approfondit la cuvette en un entonnoir. Dans celui-ci culbutent les fleurs mâles qui, cette fois peuvent chavirer, sans danger pour elles, car elles sont capturées par la fleur femelle au moment où elle s'enfonce légèrement. On voit les petites fleurs mâles culbuter les unes sur les autres.

lorsque la fleur femelle remonte, le film d'eau retire une partie de ces fleurs mâles, tandis que d'autres, plus avancées, restent dans la fleur femelle au contact des stigmates. Ce manège excessivement curieux, surveillé par M. WYLIE, rappelle celui de l'*Elodea canadensis*, la peste d'eau, chez laquelle les fleurs mâles se détachent aussi, montent à la surface, mais, cette fois-ci, explosent subitement en jetant leur pollen sur l'eau. Le vent se charge de conduire le

Fig. 147. — La lentille d'eau (*Lemna minor*). Toute la plante formée de feuilles-tiges bourgeonnantes et munie d'une à deux racines qui plongent dans l'eau.
Dess. de R. C.

pollen vers la fleur femelle qui à la surface de l'eau, par les mouvements de plongée, capture les grains de pollen (fig. 246).

Mais quelque curieuses que soient les structures adéquates pour assurer la fécondation chez toutes ces plantes aquatiques, la multiplication s'y fait principalement par boutures ou par stolons. Des branches accidentellement détachées, des stolons qui rampent sur la vase et vont prendre racine au-dessous du bourgeon terminal assurent à ces végétaux, en dehors de toute fructification, une persistance certaine. Nombreuses sont les plantes aquatiques qui pendant de longues périodes se reproduisent ainsi et exclusivement ainsi.

Voyez les lentilles d'eau (*Lemna minor*, *L. trisulca*) sur nos marécages et nos étangs qui, en quelques semaines, en recouvrent toute la surface comme d'un manteau vert. Elles bourgeonnent

constamment, chaque nouvel article en reproduit deux ou trois nouveaux qui, détachés à leur tour, prolifèrent (*fig. 147*).

La vitesse de croissance de ces plantes est extraordinaire.

Beaucoup de plantes franchement aquatiques peuvent aussi mener une vie terrestre. Elles sont dès lors bien faites pour nous renseigner sur les équilibres morphologiques qui correspondent à ces deux modes de vie.

Suivons, sans trop nous écarter de ce que nous savons déjà, l'une de nos plantes, l'*Alisma Plantago*. Comme plante terrestre, elle produit, au-dessus de son faisceau de racines, des feuilles dont le contour est figuré dans notre dessin ; le limbe y est dressé (*fig. 150*).

Si cette plante vient à être inondée, les feuilles déjà formées ne se modifient pas, mais les nouvelles sont autres ; à une grande profondeur, les limbes nouveaux sont linéaires (70-80 cm.) sans distinction de pétiole et de limbe, tandis que, cultivée dans de l'eau de profondeur moyenne, il se forme des feuilles nageantes chez lesquelles on voit un long pétiole flexueux se terminer par un limbe ovale qui nage à la surface de l'eau à la façon d'une feuille de Nénuphar. En outre, dans l'eau peu profonde, naissent des feuilles intermédiaires, comme forme, entre les feuilles nageantes et les feuilles aériennes (*fig. 150*).

Cette transformation est encore plus évidente chez le *Sagittaria*, une plante systématiquement très voisine des *Alisma* (*fig. 149*).

Les feuilles submergées sont très semblables à celles des *Callisneria*, elles sont longuement rubanées, tandis que les feuilles aériennes sont franchement sagittées comme l'indique le nom du genre (*fig. 149*).

On obtiendrait des effets analogues si l'expérience avait porté sur la Renoncule aquatique aux fleurs blanches. Cette plante peut exister sous trois formes : une forme terrestre des lieux humides à limbe en forme de feuille de lierre ; une forme aquatique dont les limbes nageants vont étaler leur surface lobée sur la surface de l'eau et dont les feuilles submergées sont divisées en pinceau. Certaines espèces ont ainsi dans l'eau les deux formes de feuilles, tandis que d'autres ne développent jamais que des feuilles en pinceau (*fig. 68*).

Cette dernière forme de feuille ne s'observe jamais chez les Monocotylédonées aquatiques qui, sous l'eau, se bornent à sim-

plifier ou à allonger leur limbe, tandis que beaucoup de Dicotylédonnées appartenant à des familles très variées divisent le limbe de leurs feuilles submergées (*Renonculacées*, *R. aquatilis*; *Nymphéacées*, *Cabomba aquatica*; *Primulacées*, *Hottonia palustris*;

Fig. 148. — Primulacée aquatique (*Hottonia palustris*) aux fleurs violacées et aux feuilles finement ramifiées.
Dess. de R. C.

Composées, *Bidens Beckii*; Onagrariées, *Myriophyllum spicatum*.

Il semblerait au premier abord que ces deux groupes de plantes se comporteraient vis-à-vis de la submersion d'une manière opposée. Mais nous allons examiner dans le bouton foliaire, tout au centre, là où se forment les nouveaux organes, les jeunes feuilles

Fig. 149 — *Sagittaria sagittifolia*. A, feuilles submergées qui passent à la forme linéaire; B, forme habituelle, dressée, aérienne; C, forme élargie; D, feuilles nageantes; E, id.
D'après Glück.

de l'une et de l'autre des catégories. Les jeunes feuilles des Monocotylédones, donc des *Alisma*, des *Sagittaria*, sont entières, sans trace même d'indication d'une ramification quelconque. Chez les Dicotylédones énumérées, au contraire, à ce stade, la jeune feuille embryonnaire est déjà fortement ramifiée; plus tard, si elle devient une feuille terrestre, ces ramifications ne se reconnaissent plus

sur la feuille adulte que comme des dents ou des lobes de valeur secondaire. Pour arriver à ce stade, la jeune feuille dilate sa portion moyenne en une peau, en une membrane qui porte sur

Fig. 150. — *Alisma Plantago*. A, exemplaire à feuilles inférieures submergées, linéaires, deux feuilles intermédiaires, deux feuilles dont les limbes nagent à la surface de l'eau. B, forme *graminifolium*, submergée. D'après Glück.

son bord les ramifications primaires maintenant arrêtées dans leur croissance.

La forme terrestre s'est donc manifestée comme chez les

Monocotylédonées par un développement transversal, par la dilatation du limbe primitif.

Le milieu aquatique, au contraire, a favorisé l'allongement en une lanière de la feuille primitive, comme il favorise chez les Dicotylédonées l'allongement des segments primitifs, des organes préexistants. Il s'agit donc, dans tous ces cas, de l'allongement, chez les Monocotylédonées, de la seule lanière primitive ; chez les Dicotylédonées, de toutes les lanières de la feuille embryonnaire. La lumière favorise chez la plupart des plantes le développement des limbes, tandis que l'obscurité allonge les organes.

On parle souvent de l'action morphogène de l'eau, c'est-à-dire de l'action formatrice de l'eau qui semble modeler les organes. Que faut-il entendre par là ? Est-ce l'eau comme substance chimique, l'eau parce que l'eau diminue la transpiration, l'eau parce qu'elle exerce une pression ou parce qu'elle absorbe rapidement la lumière, ou enfin parce que ce milieu est beaucoup moins aéré que l'atmosphère ?

On voit, par ces questions, que lorsque les biologistes lui attribuent une action modelante sur les organismes aquatiques ou amphibies, ils traitent de ce facteur comme d'une unité alors que, comme nous venons de le voir, son action se laisse représenter par au moins cinq facteurs différents.

La vie végétale dans les eaux diminue assez rapidement avec la profondeur. Dans la mer, il n'y a plus que des Algues rouges à la profondeur de 50-100 m. ; les autres ont déjà disparu à des profondeurs moindres.

La lumière est en effet rapidement absorbée par l'eau. Ce sont tout d'abord les radiations rouges, puis les plus réfrangibles selon l'ordre du spectre solaire. L'intensité lumineuse dans l'eau de mer bien claire, au soleil, est diminuée jusqu'à n'avoir plus que l'éclat de la lumière de la lune à 34 m. pour le rouge, à 177 m. pour le jaune et à 32 m. pour le vert.

Dans le lac Léman, à 60 m., il n'y a plus qu'une mousse qui ait été rencontrée ; même les Algues microscopiques diminuent rapidement en espèces et en nombre d'individus avec l'éloignement de la surface.

Or il est évident que ce qui arrête si brusquement la vie à

une certaine profondeur, c'est la diminution considérable de la lumière. Il est peu de végétaux verts qui peuvent supporter une atténuation considérable de lumière s'ils n'ont, comme la mousse des cavernes ou certaines plantes des sous-bois sombres de la forêt tropicale, des appareils spéciaux pour concentrer cette lumière. La pression de l'eau joue sans doute aussi un rôle ; il n'a d'ailleurs jamais été bien défini. On peut, dans un milieu suffisamment humide, reproduire le plus souvent les formes aquatiques par la diminution de la lumière ou par l'obscurité.

D'autre part, chez les Algues, nous avons montré, dans nos travaux et ceux de nos élèves, que les organismes augmentent leur surface à mesure que l'aération devient plus mauvaise, et ceci en dehors de toute diminution de lumière. La division du limbe des Renoncles ou l'allongement excessif de celui des feuilles des *Alisma* et des *Sagittaria*, accompagné d'un amincissement, produit en partie par la diminution de la lumière, en partie par l'asphyxie relative, a pour effet écologique de mettre la plante dans des conditions favorables au point de vue de sa respiration. Cette action de l'eau, milieu peu aéré, se traduit, dans la structure de toutes ces plantes supérieures, par la production d'espaces aérifères nommés lacunes, espèces de sacs qui abondent dans toutes les parties du végétal aquatique. Ces espaces remplis d'air allègent nécessairement la plante et lui confèrent ainsi la propriété de nager, de s'élever jusqu'à la surface, comme portée par un flotteur, de tendre ainsi mécaniquement, vers l'air et la lumière.

Il est alors d'autant plus intéressant de découvrir que, chez beaucoup de ces plantes aquatiques, les fruits (*Vallisneria*), les bourgeons d'hiver (*Hydrocharis*) sont dépourvus de ces lacunes et qu'ils s'alourdissent en se gorgeant de nourriture, d'amidon en particulier. Ils descendent, ainsi lestés, vers la vase du fond où ils passent la mauvaise saison.

Dans le groupe des Naïades, il est une plante qui ne peut manquer d'être signalée ici, c'est l'*Aponogeton fenestralis* des eaux stagnantes de Madagascar ; elle arrive à augmenter sa surface de respiration par un procédé qui, avec cette régularité, est unique dans le règne végétal. Nous avons eu en culture cette plante dans

Fig. 15L. — *Aponogeton fenestralis*,
feuille perforée adulte.
Phot. Inst. bot., Genève.

le laboratoire et nous avons pu en suivre l'évolution. Il s'agit chez elle, non pas de se créer une atmosphère interne, par la formation de canaux aérières, mais de transformer une feuille elliptique en un réseau dont les fils sont les nervures et les mailles ouvertes, le parenchyme déchiré. Ce phénomène de perforation du limbe commence de bonne heure par des fentes allongées entre les nervures et les nervilles; puis, ces dernières s'allongeant, les mailles du réseau s'agrandissent; finalement, la feuille est comme une dentelle, perforée de fenêtres, un limbe ajouré.

Nous avons suivi pas à pas ce phénomène; on voit, à mesure que la déchirure progresse, un tissu cicatriciel border les mailles, reconstituant un épiderme nouveau qui tapisse les perforations. Il n'y a à ceci aucune cause externe directe, car on ne voit pas pourquoi, comme chez les autres Aponogéton, les portions du limbe situées entre les nervures ne pourraient suivre, dans leur développement, le système des nervures (*fig. 151, 152*).

Certains auteurs ont attribué cette perforation à l'influence du mouvement de l'eau; mais M. GUILLOT, qui nous a rapporté ces plantes de Madagascar

nous a affirmé les avoir récoltées dans des eaux tranquilles. On ne saurait donc y voir une adaptation à la vie dans les cascades; il faut mettre ces structures en parallèle avec les feuilles en pinceau des Renoncules aquatiques ou en peigne des *Myriophyllum*. On pourrait presque dire que la seule chance que peut avoir une Monocotylédonée de diviser sa feuille, c'est de la déchirer.

Fig. 15 — *Aponogeton Bernerianus*, cultivé dans le laboratoire et à l'obscurité.
D'après Serguéef, Inst. bot., Genève.

C'est ce que font aussi les Bananiers qui laissent au vent le soin de diviser leurs feuilles en menues lanières, ou les Palmiers qui, dès le début, les dilacèrent, tantôt selon le mode des Dattiers, tantôt selon le mode des *Chamaerops* ou des Lataniers. Mais ici le résultat biologique est tout autre, les grandes feuilles de ces arbres offrent une moins grande résistance au vent, tandis que dans l'*Aponogeton fenestralis* la perforation du limbe a pour effet d'augmenter, dans des eaux chaudes, stagnantes, pauvres en air, la surface de respiration.

Ce groupe des Naiades a des représentants dans toutes les parties du monde ; dans les petits lacs de nos Alpes, on trouve en abondance des *Potamogeton* comme dans les mares arctiques ; le *Vallisneria* n'apparaît que plus au sud, par exemple dans les lacs insubriens, puis tout autour de la Méditerranée. Cette plante supporte d'ailleurs, ce qui est rare chez les végétaux supérieurs, une température habituelle de 42°, comme certaines Algues des thermes.

Ces plantes, on l'a vu, mécaniquement détachées ou broutées par les mollusques aquatiques, produisent des rameaux nageants qui s'accumulent parfois en véritables radeaux aquatiques. L'*Hydrocharis Morsus Ranae*, qui est de la même famille, est un végétal nageant, à feuilles d'un petit Nénuphar ; d'ailleurs par sa fleur blanche, elle aussi, rappelle les *Nymphaea* ; elle couvre parfois des étendues considérables grâce à ses tiges horizontales minces qui se terminent par un bourgeon d'où sortiront de nouvelles rosettes de feuilles nageantes et des fleurs. En automne, elle émet des bourgeons ovoïdes nommés hibernacles qui se détachent et qui, plus lourds que l'eau, descendent et hivernent au fond sur la vase, pour revenir, au printemps suivant, allégés, flotter à la surface et s'y développer en nouvelles plantes nageantes.

Cette catégorie de végétaux nageants méritait d'être désignée par un nom qui en traduisît la biologie : on l'appelle macroplankton, par opposition au microplankton formé par les algues suspendues des eaux douces et des eaux salées ou saumâtres. Les lentilles d'eau dont j'ai déjà parlé en sont chez nous l'expression la plus parlante. Appartenant à une famille dans laquelle nous trouvons le gouet ou Pied de veau, celle des Aroïdées, qui comprend

aussi les *Calla* (*Richardia africana*) aux grands cornets blancs, et les *Anthurium* aux spathes écarlates de nos serres, les *Lemna* ont simplifié leur végétation en renonçant presque totalement aux notions de la morphologie habituelle. On me demandera en effet ce que sont ces lentilles qui bourgeonnent en produisant de nouvelles lentilles. Si ce sont des feuilles, où sont les tiges ? Si ce sont des tiges, où sont les feuilles ?

En réalité, la plante se moque de nos catégories ; nous avons classé pour nos convenances les organes des plantes en racines, tiges (ou axes) et feuilles. Cependant, toute plante commence par un œuf qui est une cellule ; à ce moment au moins il n'y a aucun de ces membres. L'embryon des plantes supérieures qui se développe à partir de cet œuf par multiplication de cellules, rapidement se décide à fabriquer une petite racine ou radicule, puis une ou deux premières feuilles ou cotylédons et, enfin, une tige rudimentaire représentée par un minuscule bourgeon.

Notre lentille d'eau est donc une plante supérieure, car à certains moments elle produit de minuscules fleurs qui ont carpelles et étamines. La fécondation faite, l'œuf se développe en embryon logé dans une petite graine. Cet embryon a ceci de particulier qu'il ne développe pas sa tige rudimentaire, mais que, élevé vers la surface de l'eau par un flotteur, il produit toute la plante par prolifération, par bourgeonnement d'une première feuille, nommée cotylédon. C'est un cas assez rare dans le règne végétal que cette multiplication à partir de la feuille qui fonctionne comme point végétatif à la façon d'une tige. Ceci a également lieu chez les Utriculaires flottantes (*fig. 274*).

Mais ce n'est pas toujours que les plantes nageantes du macroplancton arrivent à leurs fins par une simplification à l'extrême ; la plupart suivent un autre chemin. D'ailleurs, nous verrons que chacune a sa manière de se comporter.

Je vous transporte maintenant dans un marécage du Chaco, ce pays aux grands horizons, encore incomplètement connu, car il est dangereux de s'y aventurer. A certains moments, inondé par les crues du fleuve, c'est un immense et incertain marécage, domaine des alligators qui semblent flotter dans l'eau peu profonde comme

autant de vieux troncs d'arbres ; à d'autres moments, l'eau se retire et laisse des espaces déserts, brûlés par le soleil tropical. Dans les bas-fonds, l'eau séjourne, s'échauffe et devient propice au développement rapide du macroplancton. Je ne pense pas que nulle autre part on ait cité une telle abondance de végétaux flottants. Au Pilcomayo, rivière aux bords incertains qui traverse ce pays sauvage, l'abondance des végétaux flottants — en particu-

Fig. 153. — Amaranthacée nageante (*Alternanthera Hassleriana*), dont la tige, sous l'influence de l'eau, se transforme en flotteurs renflés, portant aux nœuds les feuilles dressées et qui, avec les deux groupes de racines, fonctionnent comme balancier. Dess. de R. C.

lier des graminées — est telle à certains moments de l'année que des expéditions bien outillées, munies de canots automobiles, ont été forcées de renoncer à aller plus avant.

Approchons-nous d'un de ces marécages comme nous en avons vu au Chaco ; nous allons y rencontrer tout d'abord deux plantes inattendues dans cette compagnie des végétaux aquatiques flottants. La première est une amaranthacée dont presque tous les congénères sont des habitants des campos les plus secs (espèces de steppes américaines) (fig. 153).

Leurs fleurs, groupées en capitules, sont enveloppées dans des pétales glumacés, de la nature de la paille, ce qui les fait ressembler tantôt à des immortelles, tantôt à des graminées. Ces

capitules blancs, roses ou jaunes d'or, sont d'un effet ornemental assez puissant pour en avoir justifié l'introduction dans les jardins (*Amaranthus*, *Celosia*, etc.). Celle qui nous intéresse n'a qu'un capitule blanc argenté brillant, mais elle nous surprend par son mode de vie ; elle occupe sur l'eau, des espaces considérables y ramifiant ses tiges, renflées en forme de gros cigares ou de tonneaux allongés, couverts de grossiers poils rouges. Ces flotteurs sont à moitié plongés dans l'eau, à la façon d'un navire, d'un torpilleur à demi immergé. Le tout est lesté par les deux feuilles assez grosses qui se dressent dans un plan vertical. Elles servent en même temps de balancier à cet esquif en équilibre mobile. Des racines, qui divergent, complètent le système du balancier.

Les poils cités ont pour effet, à la surface de l'eau, d'augmenter l'adhésion par leur force capillaire ; en outre, ils amènent à la surface des tiges, mal protégées par ailleurs contre la dessiccation, l'eau nécessaire à leur complète imbibition : c'est le principe de l'éponge. On le voit, c'est comme si chaque particularité avait été calculée pour la flottaison de cette plante vraiment merveilleuse.

Cette même plante peut vivre au pourtour du marécage en végétal terrestre. Alors elle *dresse* ses entrenœuds qui ne développent plus de poils ; elle change donc d'humeur par rapport à la pesanteur, ses nouvelles branches s'amincissent, les feuilles y sont plus étroites et le végétal tout entier rappelle à s'y méprendre une espèce déjà connue du bord des marécages sud-américains, l'*Alternanthera phylloxeroides*.

Le systématicien qui, en Europe, examinerait les formes terrestre de ces deux plantes les classerait certainement dans la même espèce et en ferait une même variété. Mais voici que les deux entrent dans l'eau, l'une et l'autre gonflent leurs entrenœuds, mais celle-ci n'arrive pas à former les gros cigares-flotteurs, ni les poils-éponges, ni les grosses feuilles-balanciers. Identiques en apparence sur la terre ferme, les deux espèces se révèlent distinctes au contact de l'élément aqueux.

« C'est au travail qu'on connaît l'ouvrier. » La Nature vivante est riche en exemples de cette sorte, mais les botanistes de cabinet, d'herbier et aussi parfois de laboratoire n'y ont pas pris

garde. Le plus souvent ils tuent la plante avant de l'examiner, de l'étiqueter. Il est temps qu'on traite la Botanique comme une

science de la Nature et que la pseudo-science du collectionneur fasse place à l'investigation, à la résolution de problèmes que suggèrent les phénomènes du vivant. Il faudra sans doute toujours des collectionneurs et des collections, mais, de grâce, qu'on ne donne pas à cela le nom de science; les matériaux sont nécessaires, mais le problème essentiel, c'est de saisir la vie sur le fait, c'est d'observer et d'expérimenter pour contrôler les observations.

Fig. 154. — Euphorbiacée nageante (*Phyllanthus fluitans*); on voit les feuilles munies de deux bosses et entourées d'un rebord plat adhérent à la surface de l'eau.
Dess. de R. C.

espèces, une seule est nageante. Découverte pour la première fois par Richard Spruce en Amazonie, ce savant naturaliste écrivait :

« Quoique aussi éloigné de *Salvinia* (fougère aquatique nageante) que les pôles le sont l'un de l'autre, le *Phyllanthus fluitans* lui ressemblait tellement, dans son apparence générale, que je pouvais à peine croire mes yeux en reconnaissant qu'il appartenait aux plantes à fleurs. C'est un des nombreux cas que j'ai rencontrés de plantes qui, totalement différentes par la structure de leurs fleurs et de leurs fruits, arrivent à se ressembler dans leurs appareils

Voici, dans le même marécage, une autre plante plus étonnante encore. Elle appartient au genre *Phyllanthus*, genre d'Euphorbiacée qui comprend plus de 400 espèces. De toutes ces

végétatifs lorsqu'elles sont soumises aux mêmes conditions d'existence. C'est l'une des causes, je ne saurais en douter ; mais il y en a probablement d'autres, cachées quelque part, plus profondes, que nous n'avons été jusqu'à présent capables de pénétrer, qui ont, comme dans le cas analogue nommé « mimicry » chez les insectes, aidé à provoquer ces étonnantes et inattendues simulations. »

En effet, la ressemblance est frappante au premier coup d'œil : comme dans la fougère aquatique, dont il faudra dire quelques mots pour la comparer à une autre fougère de notre marécage, la tige filiforme porte deux rangées de feuilles qui sont comme posées sur l'eau, tandis que des racines plongent dans l'élément liquide. Mais, à l'examen, cette ressemblance du *Phyllanthus fluitans* et de la *Salvinia* ne paraît plus que superficielle. Chacune de ces plantes a réalisé le problème de la flottaison à sa façon.

Ici, la feuille orbiculaire, de couleur verdâtre fortement teintée de rouge, de la couleur rouge d'une belle prune, repose sur l'eau par sa nervure moyenne et par son bord membraneux, tandis que des deux côtés de la nervure elle s'élève en une vésicule dont le rebord, formé par la marge de la feuille, vient adhérer à la superficie de l'eau. Grâce à ce dispositif, chaque feuille forme avec la surface de l'eau un double sac qui emprisonne une grosse bulle d'air. Voyez, en outre, l'ingéniosité de ce flotteur : l'eau peut humecter la marge inférieure, mais la cire qui, comme un mince vernis, recouvre d'une pruine légère la surface extérieure, rosée, de la feuille, empêche celle-ci d'être mouillée du côté supérieur (fig. 154).

Ainsi, la plante se maintient en un constant équilibre qui lui permet, comme à la lentille d'eau, d'occuper d'immenses étendues.

Tout à l'heure, nous avons mentionné une fougère nageante, la *Salvinia natans*. N'étaient les organes reproducteurs, espèces de sacs sporifères qui sont exactement du type général des fougères, on aurait quelque peine à reconnaître dans ce végétal un parent des Polypodes et des Adiantum. Cette plante, absolument dépourvue de racines, possède à côté des deux séries de feuilles nageantes, une troisième série de feuilles qui simulent des racines, mais qui sont en réalité des feuilles vertes ramifiées comme celles

d'une renoncule submergée. Ce sont à la fois des flotteurs-balanciers et des appareils d'absorption. Grâce aux aspérités qui cou-

Fig. 155. — Le *Salvinia natans*, fougère aquatique nageante.

vrent la surface des feuilles et à la cire qui les empêche d'être mouillées, ces dernières résistent à l'agitation de l'eau et reviennent automatiquement à la surface (fig. 155).

Telle autre¹, beaucoup plus grande, est encore une fougère dont la tige, très courte, ne s'enracine pas; les feuilles sont munies à leur base d'un gros flotteur plein d'air, tandis que leur limbe étalé sur l'eau est, de même que les précédents, recouvert de cire. On voit ces grosses feuilles en éventail proliférer sur leur bord et, par un bourgeonnement particulier qui rappelle celui des lentilles d'eau (*Lemna*), donner naissance à de nouvelles plantes qui se détacheront et iront propager l'espèce.

Enfin tout près, dans ce même marécage, voici les Pontédériacées nageantes, elles aussi constituées par une rosette de feuilles munies à leur base d'un simple flotteur. Dans ces eaux chaudes, elles se multiplient rapidement. Au bord du lac Ypacaray et dans les eaux du Chaco, elles s'accumulent sur de grandes étendues, refoulant toute autre végétation. Comme elles portent sur une tige assez courte une belle inflorescence violette, de l'apparence et de la couleur de celle d'un petit Iris, au moment de la floraison, elles couvrent ces eaux comme d'un jardin suspendu. Avec les Graminées flottantes qui ont renflé leurs chaumes et qui s'agrégent en gazons denses, elles arrivent à former des îles flottantes

¹ *Ceratopteris thalictroides*.

qui entravent la navigation. Dans ces îles circule une vie végétale et animale intense ; elles sont animées par le cri, le jacasement de milliers d'oiseaux qui ont élu domicile sur les troncs d'arbres à moitié pourris qui, entraînés de la rive, sont arrêtés par cette barrière ; des buissons y ont germé et s'élèvent déjà à une certaine hauteur, comme les *Neptunia*, les *Caperonia* et bien d'autres qui ont cette même capacité de produire des flotteurs.

Miss PALLIS a observé de semblables îles flottantes, mais constituées en majeure partie de roseaux (*Phragmites communis*), dans le Delta du Danube ¹.

On assiste parfois à la migration de ces îles flottantes (nommées en Amazonie « Cannarana ») sur l'Orinoco, le Mississipi, l'Amazonie et le Rio Paraguay. Elles occupent parfois une étendue de 1 à 2 hectares. Elles se forment naturellement dans les marais qui communiquent avec les fleuves ou dans les baies tranquilles, où ces graminées sont faiblement enracinées ; souvent même la base des chaumes est déjà pourrie lorsque la crue arrive ; les gazons compacts sont facilement détachés de la vase et entraînés vers la rivière. De même que dans nos lacs les Potamots arrivent à atteindre la longueur de 4 à 5 mètres, dans les eaux mortes de l'Amazonie supérieure, Spruce a mesuré des *Paspalum* (*P. pyramidale*) (*Paspalum repens*, selon HUBER), graminées de ces îles, qui possédaient 78 nœuds avec une longueur de 15 mètres. Il y a des îles flottantes qui atteignent 6 à 10 mètres en épaisseur. Des nœuds, partent des racines allongées. La surface de ces radeaux porte à certains moments d'innombrables panicules, ce qui les fait ressembler à une prairie artificielle de chez nous, au mois de juin. C'est aussi dans ces îles qu'abondent les *Salvinia*, les *Ceratopteris*, les *Limnobium*, des *Polygonum* aquatiques, grandes renouées qui ressemblent aux *Alternanthera* dont on a parlé.

Le danger que courent les vaisseaux qui naviguent sur les grands fleuves de l'Amérique, pendant la crue, n'est pas petit. On a vu des vapeurs ancrés dans le fleuve, emportés par la masse végétale et faire naufrage. Parfois des alligators, des gros serpents d'eau, énormes Eunectes, même des Jaguars, sont emportés sur ces îles par le courant.

¹ Cf. s. Linn. Soc. 43.

On conçoit dès lors que ces masses flottantes puissent servir à propager beaucoup d'espèces qui, sans elles, tomberaient rapidement, en s'imbibant, au fond de l'eau ou altéreraient leurs semences par un séjour prolongé dans l'eau.

Nulle part dans la nature nous ne voyons d'une manière plus évidente que chez les plantes aquatiques, amphibies ou nageantes, la morphologie s'écarter plus singulièrement du type général. On est bien forcé dès lors de considérer la vie aquatique, chez les plantes supérieures, comme le mode exceptionnel. En nous plaçant au point de vue de la filiation, il n'y a pas lieu de douter que les plantes terrestres ne doivent être, chez les Spermaphytes (à fleurs et à semences), considérées comme les plus primitives, les moins déviées du plan général.

La vie aquatique qui a rendu superflue, chez beaucoup d'espèces, l'existence de nervures compliquées pour la circulation de l'eau, qui a fait disparaître les pores qui mettent l'intérieur de la plante en communication avec l'extérieur, avec l'air, ou qui les a localisés sur les faces exposées à l'air, a cependant ordinairement respecté la structure générale de la fleur qui, le plus souvent, reste aérienne ou doit arriver à la surface pour y être fécondée.

Mais elle a profondément modifié la morphologie des feuilles ; certaines espèces répondent à ce milieu spécial d'une manière si adéquate qu'on en reste confondu d'admiration.

Étudions, pour terminer, l'une des plus curieuses des formes nageantes, celle des Utriculaires. Ici, comme chez les lentilles d'eau, la plante a renoncé aux définitions étroites de la morphologie habituelle : elle est constituée tout entière par des feuilles qui s'allongent en stolons, flanqués d'appendices foliacés, lobés, et d'autres appendices en forme d'utricules, ce qui leur a valu leur nom. Lorsque le moment de la floraison est venu, on voit se dresser un fil qui, cette fois-ci, porte des feuilles écailleuses et, à son sommet, dans l'air, des fleurs jaune d'or, que viennent visiter les insectes. Chez l'une des espèces qui habitent les marécages du Chaco déjà citées, chaque inflorescence porte, dans l'eau, à sa base, de singuliers appendices disposés en croix et dont la région moyenne est renflée en sacs allongés, en flotteurs. La

Fig. 155 bis. — Apparence générale de l'*Utricularia vulgaris*. D'après Kerner.

stabilité de l'inflorescence est donc facilitée, assurée, par le jeu de ce balancier, véritable ceinture de sauvetage qui règle le niveau auquel doit se maintenir le végétal pour être fécondé par les insectes.

On a cru pendant longtemps, et c'était l'opinion de Pyrame de Candolle, que les utricules étaient les véritables organes de suspension, qu'ils avaient la faculté de s'alléger et de s'alourdir selon les nécessités. Ce sont, en réalité, des trappes au moyen desquelles l'Utriculaire complète sa nutrition par un supplément de

viande fraîche. Rien de plus surprenant que ces utricules carnivores. La cavité est tapissée du côté intérieur par des glandes digestives qui sécrètent un suc gastrique très actif. De petits animaux

Copépodes, Ostracodes (Cypris) sont attirés vers les urnes par la sécrétion d'un mucilage. Involontairement, ils poussent devant eux l'obturateur de l'urne, espèce de porte, qui cède facilement à un animal venant du dehors, mais par le jeu d'un cran d'arrêt, ne permet pas la sortie aux animaux qui sont entrés dans la trappe. Ces petits animaux sont rapidement étouffés par la gelée qui est abondante dans l'urne ; bientôt la

Fig. 156. — Portion d'une «tige» submergée de l'*Utricularia minor*, montrant les lobes foliacés et les urnes (ascidies).
Dess. de R. C.

Fig. 157. — *Utricularia vulgaris*, portion d'une «tige» avec lobes foliacés et lobes «urnés». Dess. de R. C.

digestion s'y effectue, comme dans un estomac le bol alimentaire se ramollit pour être finalement digéré et absorbé dans l'intestin.

Tout ceci se passe sous l'eau. Il en est de même chez l'*Aldrovandia* (fig. 159, 160) des eaux tempérées du centre et du sud de l'Europe. Comme l'*Utricularia*, cette plante est sans racines ; ses feuilles sont à chaque nœud en verticille de 8 à 9, chacune portée sur un pétiole, lui-même terminé à son sommet par un groupe de soies assez raides. Le limbe foliaire est si clairement construit pour la capture des petits animaux qu'il vaut la peine de l'étudier en détail. Étale, il comprend des deux côtés de la nervure médiane :

1° au centre, une zone couverte de glandes digestives ; 2° autour de cette zone active, une zone dépourvue de glandes et entourée à son tour par une marge glutineuse qui attire les animaux ; le tout est bordé par un liseré muni de soies. Pour comprendre ce mécanisme, il faut examiner, tout d'abord, la structure générale et puis aborder ensuite l'analyse des particularités. Lorsque la feuille qui, au repos, dispose ses deux moitiés selon un angle de 60° , est fermée, on remarque que la zone interne, bombée vers l'extérieur forme une vésicule hermétiquement close : les marges, largement aplaties, sont venues s'appliquer l'une contre l'autre comme les deux valves d'une huître. La proie est ainsi enfermée dans une cavité digestive, dans laquelle elle peut encore se débattre, pendant un certain temps. Il y a donc une trappe qui se ferme brusquement sur l'imprudent qui pénètre dans l'aire de la zone interne. C'est qu'en progressant vers l'intérieur, l'animal a rencontré des organes sensibles, qui sont des soies, que le moindre attouchement déforme et irrite ; cette irritation se transmet au limbe et en particulier à la nervure qui, par un mouvement de charnière, ferme la boîte sur l'imprudent visiteur. Alors entrent en action d'autres poils, beaucoup plus courts, qui sécrètent un suc digestif. En même temps la feuille émet une bulle d'air qui refoule le suc de

Fig. 158. — Structure des poils sensibles d'*Aldrovandia vesiculosa*. A, poil sensible ; f, socle ; h_1 , h_2 et h_3 , les étages à cellules allongées et à parois externes épaisses ; g, articulation perceptive à parois minces ; B, articulation avec les cellules voisines ; C, la même après courbure, on voit la déformation que subira le plasma sensible. D'après Haberlandt.

digestion, en quelque sorte le bol alimentaire, vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la marge, où sont situées les papilles digestives et absorbantes. Cette région fonctionne donc comme un intestin, tandis que la plus interne a le rôle d'une cavité stomacale. L'animal étouffé est rapidement digéré.

Fig. 159. — *Aldrovandia*. L'une des feuilles verticillées (comp. avec fig. 160) à limbe étalé : *a*, pétiole muni au sommet d'appendices en forme de soies ; *b*, rebord plat de la feuille qui, lorsque la feuille repliera ses deux valves, s'appliquera exactement sur le rebord correspondant de l'autre moitié ; *d*, région bombée vers l'extérieur, sur laquelle sont les soies sensibles et qui peut contenir l'insecte.

Dess. de R. C.

Quant à la perception de l'irritation, causée par le contact de l'animal avec les soies sensibles, elle est facilitée par un ingénieux dispositif étudié par M. HABERLANDT. Chacune de ces soies est rigide dans sa partie inférieure et sa pointe, mais les deux régions sont reliées entre elles par une zone moyenne moins résistante.

Toute pression exercée sur l'extrémité a, pour effet, de la déplacer latéralement, tandis que le pied de la soie reste rigide. De cette manière, la zone moyenne est tendue d'un côté, de l'autre elle est pincée, comprimée, ce qui lui fait faire un pli. Ceci agit comme une égratignure, une piqure sur un épithélium sensible; de là l'intensité de la réaction effectuée par la nervure foliaire qui, en un mouvement réflexe, fonctionne comme une charnière (*fig. 158*).

Fig. 160. — Feuille de l'*Aldrovandia*, dont le limbe s'est replié et s'est fermé; les deux valves sont appliquées l'une contre l'autre par leurs bords b. Dess. de R. C.

Si l'irritation a été produite par un corps dur quelconque, inerte, l'occlusion des valves se fait immédiatement, mais ces dernières ne tardent pas à s'étaler de nouveau; ceci n'a pas lieu si l'irritation a été produite par un corps vivant, par une proie!

C'est une idée répandue que les plantes manquent de vraie sensibilité, ou que si elles en ont une, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle se manifeste, par une réaction visible, comme dans le cas de l'*Aldrovandia* qui, au moindre contact, ainsi qu'une paupière, se ferme brusquement.

Comme chez les animaux, l'*Aldrovandia* réagit par un mouvement effectué par une zone motrice. La nervure foliaire joue le rôle du muscle qui se contracte; mais, pour obtenir cet effet, il ne suffit pas d'irriter cette nervure, il faut toucher une place

sensible, ici localisée dans l'articulation, au milieu de la longueur des soies, spécialement construites à cet effet. Cette irritation doit être conduite jusqu'à l'organe moteur; il y a donc bien ici, comme chez l'animal, la chaîne bien connue du réflexe nerveux. Mais, pour être plus frappante ici que dans les autres mouvements des végétaux, cette localisation de zones sensibles et motrices ne fait pas défaut autre part.

De quoi s'est-il agi dans l'exposé que j'ai fait des équilibres variés que prennent, selon les circonstances, les organes des végétaux aquatiques, sinon de sensibilité vis-à-vis de ces excitations?

Lorsque le *Myriophyllum* ou le *Potamogeton* effectue la courbure de sa tige, qui amènera l'épi florifère au-dessus de l'eau pour y fleurir et s'y féconder, la perception se fait par l'épi jeune qui est en quelque sorte la cervelle du système, tandis que la courbure s'effectue bien plus bas, dans l'eau, par la zone de la tige qui a conservé le pouvoir de croissance, c'est-à-dire par l'un des derniers entre nœuds. Tous ces mouvements par lesquels la plante maintient son niveau, dispose ses feuilles par rapport à l'horizon ou la surface de l'eau, entraîne ses fruits pour les mûrir sous l'eau, toutes ces flexions, ces plongées savantes et, par conséquent, comme minutieusement calculées, sont possibles parce que, quelque part dans le végétal, il y a comme un cerveau, comme des ganglions, des fibres sensibles qui perçoivent les variations du monde ambiant et qui, vis-à-vis de ces variations, amènent à un nouvel équilibre. Plus encore, et bien moins compréhensible à notre pauvre petite jugeotte, il y a ces changements de sensibilité amenés par l'âge, par la dépendance mutuelle des parties, coordonnées en un mot, dépendant de l'état de l'individu à un moment donné. Mais, toutes les plantes, dans les mêmes circonstances, ne se comportent pas de même. En naissant, elles avaient déjà leur nature propre, leur personnalité. On peut, il est vrai, forcer presque toutes les Monocotylédonées amphibies à développer, dans l'eau profonde, des feuilles d'un seul et même type, des lanières étroites, mais qu'on baisse le niveau et le naturel, c'est-à-dire le spécifique, «revient au galop», celle-ci produisant des feuilles ovales, alors que celle-là les forme en fer de lance, une autre en cœur.

Tandis que ce Potamot nageant, pour entraîner ses fruits dans l'eau, courbe ses pédoncules, son voisin ne fait que les défléchir latéralement !

Ainsi notre science nous permet, il est vrai, de savoir que ces mouvements, comme toutes nos actions, ne peuvent s'effectuer sans puiser dans l'énergie accumulée en nous par la nutrition et libérée de nos tissus et de notre sang par la respiration ; mais elle ne sait pas encore nous expliquer en quoi consiste ce clavier sensible sur lequel dame Nature joue quelques airs, mais qui diffère de plante à plante.

Celui qui devant tant d'énigmes à résoudre désespérerait ne serait pas de la race des chercheurs ; à la quête de l'absolu l'homme de science, sans y atteindre, enrichit l'humanité de quelques expériences. Ce faisant, il gagne, lui aussi, en méthode et renonce à quelques erreurs.

BIBLIOGRAPHIE

- Glück, H. — Biologie und morphologische Untersuchungen über Wassergewächse, Jena (1905-1911).
- Warming, E. — Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie.
- Kirchner, Loew u. Schroeter. — Lebensgeschichte der Blütenpflanzen, Stuttgart (1904, se continue).
- Kerner, v. Marilaun. — Das Pflanzenleben der Donauländer, Innsbruck (1863).
- Flahault, Ch. — Projet de nomenclature phytogéographique, Comptes rendus du Congrès, Paris (1900).
- Magnin, A. — Les lacs du Jura, Paris (1904).
- Moss, C.-E. — The fundamental Units of vegetation, *New Phytologist*, IX (1910).
The Journal of Ecology, Cambridge University Press (1913 et seq.)
- Massart, J. — Esquisse de la géographie botanique de la Belgique (1910) et plusieurs autres travaux fondamentaux.
- Sauvageau, M. — Potamogetonacées, *Journ. de Botanique* (1890-1894).
- Chodat, R. — Les dunes de Sciez et les garides, *Bull. Soc. bot. Suisse*, XII (1905).
- Wylie, R. — The pollination of *Vallineria spiralis*, *Bot. Gazette*, 63 (1917).
- Chodat, R. — Observation sur le Macroplankton des étangs du Paraguay, *Bull. de l'Herbier Boissier* (1906).
- Principes de Botanique (1907, 1921).
- Brockmann et Rübel, E. (Zurich). — Einteilung der Pflanzengesellschaften, Leipzig (1912).

Les Nénuphars. — Les Nupharaies.

LES Nénuphars proprement dits sont tous des espèces aquatiques qui possèdent un vigoureux rhizome charnu (ou tige souterraine), ancré dans la vase par des racines minces et nombreuses. Cette tige n'atteint jamais une grande longueur ; le bourgeon terminal se met au niveau de la vase dans laquelle est enfoui la tige. De ce tronc partent les feuilles et les fleurs qui sont élevées par de longs pétioles ou pédoncules jusqu'à la surface de l'eau ; les feuilles se placent sur l'eau quand le pétiole n'est pas assez robuste, mais chez certaines espèces la vigueur est suffisante pour élever le limbe au-dessus de la surface ; il en est de même des fleurs qui, presque toujours, s'épanouissent à l'air et à la lumière. Cependant, dans deux espèces, l'une et l'autre de l'Amérique équatoriale, les fleurs peu brillantes semblent pouvoir se féconder sans s'ouvrir.

Rien de plus intéressant que le procès de régulation par lequel les Nénuphars s'adaptent à des niveaux d'eau variables. La longueur des pétioles et des pédoncules dépend de la hauteur de la colonne d'eau.

On peut s'assurer de cet ajustement en plaçant des plantes en culture dans un milieu où l'eau est plus profonde. On verra le lendemain que leurs pétioles se sont allongés de quelques centimètres et que les limbes nagent de nouveau à la surface de l'eau. Si l'on a mis la plante dans de l'eau moins profonde, les feuilles dont les pétioles sont trop longs n'ont qu'à augmenter l'angle qu'ils font avec le point de départ, et les limbes sont de nouveau à la surface de l'eau. Par contre les nouvelles feuilles ne développent que des pétioles de la longueur nécessaire pour atteindre la surface. D'ailleurs, ces plantes ont un remarquable instinct pour utiliser la place, un peu comme les feuilles des arbres de nos forêts qui savent

se placer en de curieuses mosaïques comme pour utiliser la lumière de la manière la plus avantageuse. Ici, chez les Nénuphars,

Fig. 161. — Serre dans laquelle on a cultivé le *Victoria regia* ; au premier plan, la fleur épanouie ; grandes feuilles qui adhèrent si fortement à l'eau qu'un jeune homme peut s'y tenir debout.

Phot. commerciale.

comme pour céder la place aux feuilles plus jeunes, les anciennes allongent leurs pétioles, ce qui les écarte de plus en plus de la verticale qui passe par le point de départ, le point végétatif. Les causes physiques qui interviennent pour renseigner la plante sur

ce qu'elle doit faire sont encore mal connues ; il semble pourtant que la tension de l'oxygène joue un rôle dans ce phénomène.

Quant au limbe qui nage, son insertion sur le pétiole est telle que la submersion n'est guère possible. En effet, le limbe étant plus ou moins attaché en son milieu, la tension du pétiole tend à appliquer la lame sur l'eau. Si ce pétiole était inséré à la base du limbe par tension du premier, il y aurait submersion. On constate un semblable ajustement pour ce qui est des fleurs. Il a déjà été

Fig. 162. — Serre dans laquelle on a cultivé le *Victoria regia*. Grandes feuilles qui adhèrent si fortement sur l'eau qu'une jeune fille peut s'y tenir debout.

Phot. du Jardin botanique de Moscou.

dit que si le niveau s'élève, le pédoncule s'allonge pendant le développement de la fleur jusqu'à ce que la surface ait été atteinte. Mais si on fait croître un nénuphar dans un bassin peu profond, le pédoncule floral, qui continue à croître malgré le peu de profondeur, trouve moyen, par une courbure appropriée, de garder le bouton floral sous l'eau jusqu'à la maturation de la fleur. Alors ce pédoncule se raidit, se redresse et élève la fleur épanouie hors de l'eau (*Nymphaea flavo-virens*).

Ces « roses des eaux » ont l'habitude de n'ouvrir leurs fleurs que pendant quelques heures et à certaines heures du jour.

M. CONRAD a établi pour les espèces cultivées par lui (Phila-

delphie) un horaire de Flore. Il faut se lever matin pour assister au réveil du nénuphar des Amazones, lequel s'épanouit vers trois à quatre heures du matin et se ferme déjà vers cinq à six heures. C'est seulement alors, par contre, que notre commun nénuphar (var. *candidissima*) s'épanouit, pour fermer sa corolle vers le milieu de l'après-midi.

Le *N. rudgeana*, espèce originaire de l'Amérique tropicale, commence sa floraison à neuf heures du soir et l'a déjà terminée à minuit.

Notre nénuphar blanc ouvre ses fleurs à des heures variées selon la latitude ; on a indiqué 7 heures du matin pour Upsal et 8-9 heures pour Innsbruck.

La fleur du *N. amazonum* s'ouvre deux nuits de suite. La première nuit, son bouton est encore plongé d'un centimètre dans l'eau ; vers 3 heures du matin, elle commence à étaler ses sépales jusqu'à 4 h. 15. A 4 h. 45, cette fleur se prépare déjà à se refermer et l'occlusion est complète à 6 h. du matin. La seconde nuit, l'épanouissement est plus avancé ; déjà vers le soir les sépales commencent à diverger, mais ce n'est que vers 3 heures du matin que le centre de la fleur s'étale un peu et que les étamines s'ouvrent. A 5 heures, au plus tard à 6 heures du matin, l'occlusion est parfaite et le bourgeon floral est progressivement retiré sous l'eau, ce qui prend à peu près 8 heures. Ce second jour, le mouvement des sépales qui s'ouvrent est assez rapide pour être vu ; parfois l'espace parcouru par un sépale à son sommet était de 5 cm. en 6 minutes.

La lumière est le principal facteur qui influe sur cet épanouissement périodique, mais la chaleur intervient. Certaines espèces ne font ces mouvements que si la température est suffisamment élevée. Mais notre *N. alba* est beaucoup moins sensible à ces variations de température que les espèces exotiques.

La fécondation se fait par des coléoptères qui viennent visiter ces grandes fleurs pour en récolter le pollen ; tantôt il y a fécondation croisée, tantôt directe. Après la pollinisation, le pédoncule retire la fleur sous l'eau, ou comme chez le lotus d'Égypte par une courbure en crosse, ou chez la plupart des autres par

un enroulement en spirale, un peu comme cela a lieu chez le *Valisneria spiralis*. Si la fleur n'a pas été fécondée, ces mouvements n'ont pas lieu. Dans l'eau, où il a été ainsi retiré, le fruit mûrit et de la capsule ouverte s'échappent finalement les semences qui montent à la surface au moyen d'un appendice qui fonctionne comme flotteur; au lieu de germer sur place, elles sont ainsi disséminées par le courant de l'eau.

Finalement, les semences, débarrassées de leur flotteur, se noient et vont germer dans la vase du fond. Chaque plantule développe tout d'abord une feuille étroite joncoïde, puis des feuilles aquatiques submergées et seulement ensuite les feuilles nageantes à longs pétioles.

Comment ne pas être saisi d'étonnement devant cette série d'actes qui semblent comme calculés pour un effet proche ou lointain et qui s'enchaînent logiquement. Je voudrais qu'au lieu de dépenser tant de talent et d'énergie à identifier des milliers d'espèces et de variétés déjà cent fois, mille fois cataloguées, nos jeunes naturalistes, après l'apprentissage systématique nécessaire et utile, s'essayent à suivre dans leur histoire les espèces d'un groupe naturel de plantes d'Europe. L'un ferait germer des ombellifères de prairie ou de marécage, l'autre étudierait la dissémination des fruits charnus par les oiseaux, un troisième l'enracinement et la conquête du terrain par les composées bisannuelles ou persistantes. Mais pour cela il faudrait transformer l'enseignement des sciences dans les Universités puis dans les écoles spéciales qui forment les maîtres, en détournant les élèves des sciences exclusivement verbales, ou même de l'anatomie, science la plus souvent morte, pour les diriger du côté de la vie et de ses manifestations.

Ces magnifiques plantes, si décoratives, caractérisent la zone dite des Nupharaies dans le monde entier, de la Nouvelle-Zélande au nord de l'Amérique. Le *Nymphæa alba* s'élève jusqu'à 1200 m. dans nos Alpes. Il est des espèces qui sont extrêmement répandues comme celle-ci, qui va de l'Europe au nord de l'Afrique. Les deux espèces de lotus des anciens qui figurent sur les monuments égyptiens sont le *N. lotus*, espèce à floraison nocturne, et le *N. cærulea* ou lotus bleu, à floraison diurne. Le D^r Schweinfurth

qui a étudié les plantes des tombeaux égyptiens, a reconnu le lotus bleu non seulement à ses pétales aigus, mais à ses feuilles

Fig. 163. Le *Victoria cruziana*, couvrant de grandes étendues, au Rio Paraguay.

entières, sur plus d'une décoration de sarcophage ; enfin, on a parfois rencontré des décorations, de la période ptoléméenne, où le lotus est peint en bleu. Le même voyageur-naturaliste a pu constater que, soit l'une soit l'autre de ces espèces, souvent conservées

comme guirlandes des morts, documents aussi certains que des échantillons récents d'herbier, n'avaient varié en rien depuis les 1500-2000 ans avant J.-C. qui nous séparent de la XX^e et XXI^e dynasties. Remarquable constance de l'espèce !

Blanches comme dans le *Nymphaea alba*, les fleurs sont presque identiques, mais bleu pâle, dans le *Nymphaea caerulea*, jaune d'or

Fig. 164. — *Nuphar luteum*. A, fleur (comparez avec planche XIV) ; B, fruit.
Dess. de R. C., d'après Magnin.

dans le *N. sulfurea*, rouges dans *N. rubra* ; quelques espèces comme *N. rubra*, *N. Zanzibarensis* et *N. gigantea* ont des fleurs de plus de 30 cm. de diamètre. Ces Nénuphars de l'Inde, du Mexique et des Etats-Unis, avec leurs hybrides de toutes nuances, sont les ornements favoris de nos étangs et de nos serres.

Du même type biologique, le *Victoria regia* de l'Amazonie et son cousin, espèce parallèle, le *V. cruziana* du haut Paraguay, l'emportent sur toutes les autres comme grandeur et beauté des fleurs ; leurs immenses feuilles à bords repliés, retroussés comme ceux d'une feuille à gâteau, ont parfois deux mètres de diamètre. Ces immenses limbes résistent à l'action déchirante des tempêtes par le réseau solide de leurs nervures à la face inférieure. Cet arrangement explique aussi que de grands enfants puissent, sans danger,

se placer sur ces limbes sans que ceux-ci se replient. Ils sont comme portés sur un cadre et un treillis solides (*fig. 161 et 162*).

Beaucoup d'autres végétaux aquatiques sont du même type. Ainsi au point de vue des feuilles, plusieurs Potamogetons, des Hydrocharitacées et des Alismatacées aux feuilles nageantes, plus ou moins orbiculaires, avec le pétiole au milieu du disque et des fleurs qui ressemblent à de petits nénuphars, sans appartenir à la même famille. Ce sont là des phénomènes de convergence et qui frappent l'une ou l'autre des espèces dans les familles les plus diverses. Ainsi, dans les Hydrocharitacées, l'*Hydrocharis morsus-ranæ* des tourbières du plateau suisse, le *Limnanthemum Humboldtianum*, Gentianacée des Tropiques, les Renoncules d'eau comme les *Ranunculus aquatilis*, *R. trichophyllus*; mais chez dernières, il y a aussi des feuilles submergées, en pinceau (branchies).

Les Nuphars jaunes des lacs du Jura et des tourbières du nord de l'Europe représentent un second type de Nénuphars, mais dont l'ovaire est complètement libre. Leur biologie est à peine différente de celle des précédents. Il y a dans ce groupe plusieurs espèces mal définies et qui sont reliées les unes aux autres par des intermédiaires embarrassants même pour le botaniste systématique (*planche XIV et fig. 159, 164*).

Il faut encore citer, de cette famille, les *Nelumbo* asiatiques, aux feuilles dressées et terminées en entonnoir, de l'Asie tropicale et de l'Extrême-Orient.

Les Joncs. — Les Roseaux.

LE type le plus caractéristique des joncs de chez nous est le *Scirpus lacustris*, dont les tiges, au moment de la floraison, atteignent parfois plus de deux mètres de hauteur. Il est le modèle de beaucoup de plantes de la même station et qui, toutes, ont pris cette apparence joncoïde à tige simple, lisse et flexible, et le long de laquelle l'eau n'adhère que passagèrement (*Planche XV et fig. 164 bis*).

Il y a tout d'abord le groupe important et nombreux en espèces des joncs proprement dits (*Juncus lamprocarpus*, *J. alpinus*, *J. obtusiflorus*), puis les *Eleocharis* petits et grands (*E. palustris*, *E. uniglumis*, *E. setacea*), les *Schoenus* (*S. nigricans*), les *Cyperus*.

N'oublions pas de citer ici ces plantes joncoïdes qui, par leurs feuilles, font penser aux *Allium*, comme la Ciboule (*Allium Schœnoprasum*) et qui se retrouvent dans les familles les plus diverses et les plus éloignées les unes des autres, au point de vue systématique. Toutes ces ciboules vivent dans les mêmes stations : zones humides ou submergées ou temporairement inondées.

Ainsi, dans les Isoètes, espèces de Lycopodinéés de marécage qui simulent un *Eleocharis*, ou aussi, chez cette singulière Plantaginée, des eaux mortes de nos lacs, le *Littorella lacustris* qui souvent forme des prairies de petites Ciboules, parfois immergées. Alors elles vont porter leur unique fleur hors de l'eau, sur un pédoncule, ce qui permet aux étamines, disposées comme chez le plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*), d'osciller à l'air et de laisser emporter leur pollen par le vent (*fig. 140 A. B.*).

On remplirait un livre de la description des espèces joncoïdes dans les diverses familles. Je veux citer encore, dans les flaques autour des lacs, ce singulier *Ranunculus reptans* que l'on voit dessinant sur la vase de nos grèves lacustres des réseaux de tiges filiformes munies de feuilles étroites, ou un peu spatulées ;

dans l'eau les feuilles de cette espèce deviennent semblables à celles d'un *Littorella* ; elles perdent leur limbe et sont parfaitement joncoïdes (*Planche XV*).

Toutes ces plantes cheminent sur des tiges souterraines peu profondes qui se ramifient en jeu d'orgue ou en série régulière. (*fig. 166*).

Si les rhizomes, on nomme ainsi ces tiges souterraines qui cheminent horizontalement, sont profonds, les racines qui en sortent semblent fuir la vase et s'approcher de la surface comme pour y respirer.

Les joncaies acquièrent dans les marécages tropicaux une importance énorme. On y retrouve les mêmes formes biologiques que chez nous, mais en plus grand. Ainsi, le *Papyrus* des anciens, qu'on trouve déjà en Europe dans les marécages de la Sicile, à Syracuse, mais qu'il faut aller voir là où il est réellement chez lui, au cœur de l'Afrique. Dans les immenses marais du pourtour des grands lacs il forme des fourrés puissants dans lesquels se cachent les hippopotames.

Il est de la famille des Cypéracées dont la majorité des espèces préfère les milieux humides. Et parmi les espèces si nombreuses de cette famille, il en est de toutes les régions aquatiques, les *Eléocharis* inondés, les *Scirpus* des grands lacs, les *Cyperus Papyrus* des marais subtropicaux, les *Carex* (600 espèces) de toute sorte. Quelques formes de *Carex* s'échappent des eaux et deviennent des plantes de prairies, de rochers ou de forêts.

Il est alors instructif de comparer les diverses catégories : *Carex* des tourbières

Fig. 164 bis. — *Scirpus lacustris*. Sommet de la tige simple avec l'inflorescence. (Comparez avec pl. XV).
Dess. de R. C.

dont les feuilles et les épis étroits rappellent les joncs, ceux des marais inondés, aux feuilles raides, dressées et qui vivent en touffes; les *Carex* des rochers et des sables, aux feuilles étalées et brillantes et à structure hautement xérophyte, et enfin les espèces sylvatiques aux feuilles minces et flexueuses.

Le jeune biologiste fera bien de surveiller les Cypéracées dans leurs stations; il verra combien chaque forme semble comme construite pour un terrain donné.

Fig. 165. — Section au travers d'un marais à la forêt de Coudrée (Savoie). Dans l'eau, au centre, le roseau (*Phragmites communis*), roselière R.; tout autour les buttes-touffes des laiches (*Carex stricta*), encore dans l'eau; à la limite de l'eau (s), *Schoenus nigricans*; plus à l'extérieur, le cordon du *Scirpus Holoschoenus* exondé; sur la pente de sable l'*Hippophae rhamnoides* et au sommet le Pin.
Dess. de R. C.

Plus d'une espèce constitue des touffes, en se multipliant par de nouvelles pousses serrées les unes contre les autres, comme dans le *Carex stricta*, ce qui assèche la station; peu à peu les touffes se rejoignent et la prairie remplace le marécage.

Les laiches et leurs congénères, en général des plantes peu élevées, sont dépassées par les Roselières, grandes graminées, qui, elles aussi, se constituent en société, grâce à leurs rhizomes, ramifiés dans tous les sens, et grâce aussi à leurs stolons qui rampent sur le sol à plusieurs mètres de distance (fig. 155).

Par le vent, on voit les feuilles de ces roseaux tourner comme des girouettes et leur limbe indiquer la direction du vent. Cela est possible, grâce au fait que la gaine des feuilles, peu adhérente et lisse à l'intérieur, se déplace autour du chaume; il y a aussi une espèce d'articulation à leur base.

Dans le Midi de l'Europe, les Roselières sont faites souvent de l'*Arundo Donax*, de la Canne ; au centre de l'Afrique, les roseaux de *Phragmites communis* (c'est une forme géante de

Fig. 166. — *Eleocharis acicularis*. A. forme aquatique stérile. B, forme terrestre sur sol tout à fait sec, prolongé de hampes fertiles et de hampes stériles.

Dess. de R. C., d'après Glück.

Fig. 167. — Récolte du *Cyperus giganteus*, dans une lagune du Paraguay central.
Phot. commerciale.

notre plante d'Europe) atteignent la hauteur d'une jeune forêt. A errer dans ces fourrés, on se croirait au milieu d'un bosquet de bambous.

Citons aussi les joncaies immenses des lacs sud-américains avec leur *Cyperus giganteus* qu'on récolte en grand pour la confection des nattes (fig. 167).

Dans chacune de ces régions du lac, de la tourbière ou du marécage, bien d'autres plantes se mêlent aux espèces types signalées ; plus on s'écarte de la terre ferme plus aussi les espèces de familles différentes doivent, pour supporter l'immersion temporaire ou permanente, être munies de dispositifs qui les associent aux espèces dominantes. Alors dans la Nupharaie, dans la Joncaie, dans la Phragmitaie se constituent des sociétés qui tantôt comprennent des plantes qui ont toutes le même facies aquatique, toutes taillées

à la même mesure ou qui, au contraire, utilisent le milieu et l'association selon leur nature. Ainsi même dans la Phragmitaie on peut trouver des lianes, comme le grand *Convolvulus sepium* ou le *Solanum dulcamara*, des Iris jaunes (*I. pseudo-acorus*), des *Butomus* à l'apparence caricoïde, etc., etc., et une foule d'espèces chez lesquelles la vie subaquatique n'a pas essentiellement modifié la structure et la morphologie externe. Dans le marécage ordinaire, à la joncaie du lac succède la Phragmitaie du bord, puis la Caricaie de la lisière ; à cette dernière vient se mêler la cohorte des espèces des prairies marécageuses les *Eupatorium*, *Lysimachia*, *Lythrum Salicaria*, *Acorus Calamus*, *Rumex*, *Gentianes*, *Renoncles*, *R. lingua*, *R. sceleratus*, *Thalictrum flavum*, *Spiraea Ulmaria*, *Sanguisorba officinalis*, *Lotus uliginosus*, *Euphorbia palustris*, *Oenothera* ; *Epilobium roseum*, *Cicuta virosa*, *Oenanthe*, *Erythraea Centaureum*, *Menyanthes trifoliata*, *Symphytum officinale*, *Scutellaria galericulata*, *Mentha*, *Gratiola officinalis*, *Pedicularis palustris*, *Valeriana officinalis* ; puis dans ces pâturages acides s'aventurent des buissons comme le *Salix repens*, le *S. purpurea*, *S. incana*, le *Rhamnus frangula*, le *Viburnum Opulus*. Enfin les Aulnes, les Peupliers finissent par dessécher la tourbière et préparent l'avènement d'une flore plus xérophyte, plus amie de la sécheresse.

Chaque station se modifie donc spontanément, par sa propre activité ; il y a des successions comme disent les Américains, une histoire des formations aquatiques. Celles-ci se laissent particulièrement bien déchiffrer dans les marécages autour des étangs qu'elles finissent par envahir. A leur tour elles sont supplantées par la flore voisine des prairies.

La succession d'étages de végétation, que nous venons d'esquisser, n'est pas particulière aux formations des pays tempérés. Dans les régions subtropicales et tropicales, des zones semblables se forment autour des étangs, des marécages. Mais aux Cypéracées, aux Graminées s'associent des plantes appartenant à d'autres familles des Monocotylédonées : de grandes Aroïdées, de puissantes Cannacées et Marantacées, des touffes d'Eriocaulonacées et de Centrolépidacées. L'apparence de ces Roselières ou de ces joncaies est, de loin, la même que chez nous, mais la vigueur a doublé ou triplé ! En remontant en bateau les fleuves du

Brésil ou des pays platéens, on peut, comme dans un cinématographe, voir se dérouler un film, celui de la succession des formations littorales. Ainsi, le long des fleuves à étiage, comme à l'Alto Parana, les zones se marquent, sur un parcours de plusieurs centaines de kilomètres, avec une netteté extraordinaire et une désespérante monotonie. Au niveau le plus bas, une zone d'algues, puis une assise glauque de graminées amphibies à laquelle succède un cordon gris de l'Euphorbiacée des marécages, le *Croton urucurana*; enfin, encore dans la zone inondable, une forêt de grands bambous qui s'étend sur tout le cours du fleuve, de Posadas aux chutes de la Guayra. Ces grandes Graminées sont en quelque sorte la Phragmitaie des régions tropicales et subtropicales. Grâce au système des rhizomes souterrains les Bambusaies deviennent exclusives sur le bord des cours d'eau et y constituent des fourrés presque infranchissables et ceci à un niveau bien défini. Pendant de longues années, leurs troncs ramifiés en gigantesques plumes d'autruche ont formé, le long de ces fleuves, une admirable frange de gracieux panaches. Mais voici que le voyageur qui s'était habitué à voir, chaque année, s'allonger les arceaux et les rameaux, assiste, un jour, à un phénomène unique dans le monde végétal. Sur plus de 400 kilomètres, le même mois de la même année, les bambous, qui jusqu'alors n'avaient jamais fleuri, se mettent, comme d'un commun accord, à se couvrir de thyrses et à secouer leurs étamines au vent qui se joue dans leur fier plumage. Je dis d'un commun accord, oui, car tous les individus fleurissent sur un espace immense comme si, après avoir tant tardé, ils s'étaient donné le mot. On voit, chez nous, au printemps, les arbres fruitiers fleurir en même temps; il y a un temps de floraison et un temps de feuillaison. Cela est si régulier chaque année que nous le trouvons tout naturel. Mais chez ces bambous, la floraison ne se fait qu'une fois dans la vie; les gigantesques chaumes porteront des semences, puis, l'an suivant, de nouveau, comme d'un commun accord, toute cette végétation s'arrête. On voit, au-dessus du cordon argenté des *Croton urucurana* (Euphorbiacée à feuilles de guimauve), sur des centaines de kilomètres, la forêt lisière des bambous desséchée.

Certains bambous fleurissent tous les cinq ans; d'autres

attendent trente années et même plus. Leur vitesse de croissance est tout d'abord lente, puis s'accélère ; dans le *Bambusa arundinacea*, on a vu la tige s'allonger de plus de 91 cm. en un jour ; chez le *Phyllostachys mitis* de 84 cm. en 24 heures. Certaines espèces poussent, de leurs rhizomes, des asperges qui, en une matinée, s'élèvent à la hauteur du tabouret de bambou sur lequel le botaniste est assis pendant qu'il fait ses observations.

Cette coïncidence de la floraison de certains bambous va même si loin que la même année le *Phyllostachys puberula* qui ne fleurit qu'à des périodes très éloignées ; c'est-à-dire tous les soixante ans, a porté des fleurs dans tout l'Extrême-Orient et, chose plus curieuse, la même année aussi, en Europe, dans les parcs où cette espèce a été introduite. Cela ne paraît pas aller de soi ; il faudrait à cette mystérieuse concordance une cause extérieure, la saison, un phénomène climatique extrême. Mais comment, même dans une région aussi uniforme que l'Alto-Parana, de Posadas au Guayra, imaginer que tous les bambous, tous les individus de ces forêts riveraines seraient sous la même influence édaphique (du sol) et climatique, que tous, au même moment, auraient la même disposition individuelle ? A plus forte raison nous paraîtra étonnante la simultanéité de floraison des bambous, d'une certaine espèce, au Japon, en Suisse et en France, alors que dans tous les pays où cette espèce a été introduite elle a tardé plus d'un demi-siècle à fleurir.

C'est que précisément la rareté du phénomène établit la nécessité d'un point de départ unique : ou bien tous les bambous d'une région sont reproduits asexuellement par voie végétative, par l'extension des rhizomes tout le long d'une même région, d'une même zone, d'un étage qui est celui qui leur convient ; ou bien il s'agit de semences emportées par les eaux et déposées la même année le long de tout le rivage d'amont en aval, et la germination au niveau déterminé de la berge se fait simultanément. Dès lors, il y aurait uniformité du point de départ. Chez les végétaux annuels ou qui fleurissent bisannuellement la floraison, à une époque déterminée de l'année, est sensiblement fixée ; les flores indiquent avec une certaine approximation la période de floraison. L'espèce est printanière, perce-neige (*Galanthus nivalis*) ; tardive (*Colchicum autum-*

nale); automnale, le lierre (*Hedera Helix*). Malgré certaines différences il y a une régularité assez frappante pour que le botaniste annonce avec une forte chance de réelle prévision la floraison ou le début de la floraison au moins pour le mois. La périodicité de ces plantes est relativement fixée; à moins de circonstances exceptionnelles, elles fleurissent, se feuillent, fructifient et se défeuilleent à des périodes déterminées. On peut sans doute altérer plus ou moins cette périodicité par des facteurs extérieurs exceptionnels, mais il n'y a, dans le retard ou l'avancement du phénomène, qu'un déplacement anormal hors règle et qui montre, qu'en dehors de la périodicité inhérente à chaque organisme, il y

a la dépendance relative de cette périodicité, de ce naturel, si je puis ainsi m'exprimer, vis-à-vis des conditions extérieures. Or, il est certain que la floraison des bambous pour être espacée de 5-15-30-60 années souffre de quelques irrégularités qui dépendent de causes exceptionnelles. Si l'on pouvait prévoir l'année de floraison, on arriverait par l'intervention de la fumure ou par une autre action extérieure, à retarder ou à avancer ce moment. On sait que l'action de l'éther avance le moment de la floraison de certaines plantes horticoles; d'autres conditions, comme l'élévation de la température en hiver, permettent de « forcer » les plantes.

Mais ici, il s'agit d'une périodicité annuelle, tandis que chez les bambous la périodicité est beaucoup plus espacée, parfois à phases soixante fois plus longues. Dans ces conditions, les facteurs

Fig. 168. — Bords du cañon du Rio Alto-Parana, limite de l'Argentine et du Paraguay. On voit la zonation des formations selon l'étiage qui vaut ici de 20 à 30 m. Bambusaie desséchée au-dessous de la forêt.
Photo R. C.

individuels sont évidemment moins importants, l'exactitude de la prévision, ou si l'on aime mieux la régularité du cycle, devient plus grande ; disons, dans le cas du *Phyllostachys*, soixante fois plus grande au moins. C'est comme le joueur qui répète le même geste à un jeu de hasard, la probabilité augmente rapidement avec la fréquence ; ici, la fréquence, c'est le grand nombre de jours, de mois, d'années. Je pense que la simultanéité de floraison doit être d'autant plus parfaite que les intervalles spécifiques du rythme sont plus longs.

Si on examine la croissance d'une plante, par exemple d'une graminée (comme l'est aussi le bambou), on voit que, considérée dans son ensemble, l'augmentation en poids qui est la seule mesure vraiment inéquivoque et qui tient compte de la plante entière, suit une courbe régulière ; cette augmentation, lente tout d'abord, va s'accéléralant. Mais cette accéléralation comme la chute des corps suit une règle bien définie. C'est ce qu'on appelle une courbe logarithmique, celle qui exprime le mode d'accéléralation d'une réaction chimique qui marche d'elle-même et où la cause d'accéléralation est donnée par la quantité de matière déjà formée.

Que l'on compare la croissance d'un enfant ou de l'avoine, on verra que les deux phénomènes se laissent décrire de la même manière ; mathématiquement parlant, c'est un seul et même phénomène. Si l'on examine non pas une plante d'avoine mais cent plantes, non pas un enfant mais cent enfants pris au hasard, la croissance est un phénomène continu, régulièrement accéléré, jusqu'à un moment qui est celui du ralentissement et qui, pour l'avoine comme pour l'homme, correspond à la maturation sexuelle. Vers ce moment, il intervient un nouveau facteur qui travaille en sens contraire et tend vers un autre équilibre.

Or, toute périodicité, toute maturation et, par extension, toute réaction chimique après avoir été accélérée, tend vers un équilibre. Cela est dû, par le jeu des réactions secondaires, à la production de déchets, poisons, produits accessoires qui, en petite quantité au début, n'avaient aucune action marquée, mais qui, par leur accumulation, travaillent en sens contraire de la réaction principale et tendent à l'arrêter.

Il y a alors équilibre, il y a arrêt. Or, cet arrêt, ce peut être une période de repos, l'hivernage ; pendant cette période, les fonc-

tions de respiration arrivent à détruire ces matières qui entravaient le développement. Et si, comme dans le repos hivernal, l'abaissement de la température favorise l'action d'un ferment qui attaque le produit accessoire, cause de la fatigue, du ralentissement, de la défeuillaison, etc., alors, cette cause d'arrêt étant supprimée, avec les beaux jours recommence une nouvelle poussée.

Ou bien, avec la maturation et la production des semences, la plante est arrivée à l'équilibre; elle désassimile et meurt.

Ce qui dans nos bambous surprend, c'est la simultanéité du phénomène. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ces bambous, sur d'immenses étendues, ne sont peut-être que les pousses d'une même plante, multipliée végétativement, par les organes souterrains; par conséquent chaque partie est comme une bouture, et on sait combien uniforme est la multiplication par boutures. Il se pourrait aussi que, chez les bambous qui montrent cette remarquable périodicité, les semences se forment, comme chez beaucoup de plantes supérieures, sans vraie fécondation, par une espèce de parthénogénèse, par une bouture intra-ovarienne. Nous connaissons beaucoup d'exemples de cette perte de la sexualité chez des plantes qui continuent à fleurir, à développer des étamines et des pétales, mais sans s'en servir dans la fécondation. Ainsi, l'embryon d'un pissenlit se forme sans fécondation; en est-il de même des bambous périodiques? je le suspecte et je pense qu'à cela est due cette extrême régularité. Mais dans le cas des *Phyllostachys* le problème est plus simple. Une enquête soignée a montré que tous ces *Phyllostachys* introduits de l'Extrême-Orient en Europe l'ont été par multiplication végétative de plantes provenant d'une même région. Il y a donc uniformité — il s'agit en quelque sorte d'un seul individu — et la périodicité s'y manifeste avec une régularité vraiment mathématique.

Partout nous trouvons dans le monde végétal une espèce de périodicité, souvent très précise, très étroitement liée à un rythme régulier et alternant. Tout à l'heure, on a cité la régularité de la floraison des nénuphars, les uns la nuit, les autres le jour; certaines de ces fleurs ne s'ouvrent que deux fois successivement, d'autres plusieurs fois de suite. On sait que diverses conditions amènent à une certaine inversion de ce rythme, mais cela n'est que passager. Car la périodicité — le rythme — est une qualité

inhérente à la nature de chaque espèce ; chacune a son oscillation, en quelque sorte sa longueur d'onde. Ce caractère comme tout autre, peut-être dévié, déplacé ; mais avec une persistance remarquable l'oscillation revient à sa valeur première dès que la cause incidente a cessé d'agir.

Il n'y a rien de si triste que la forêt de bambous l'année qui suit la floraison ; pendant quatre jours de navigation nous avons suivi le long du chenal du Haut Parana, à l'infini, le cortège des *Chusquea* desséchés, lugubres bâtons gris ou jaune violacé, qui font penser à un lendemain de catastrophe, à une épidémie, une peste végétale à laquelle rien n'aurait résisté.

Et ce que nous avons observé en Amérique se voit périodiquement au Bengale, au Japon, partout où les bambous occupent de grandes surfaces. Mais nulle part il n'est possible, comme le long du grand fleuve américain, d'assister à ces gigantesques funérailles sur la totalité de l'aire d'une espèce. C'est un phénomène grandiose et lugubre à la fois, mystérieux dans sa grandeur comme d'autres le sont dans leur infinie petitesse.

BIBLIOGRAPHIE

- BRANDIS, D.-J. — Périodicité des Bambous, in Engl. u. Prantl. Natürl. Pflanzenfamilien (Graminées, p. 20).
- CONRAD, H.-S. — The waterlilies. Carnegie Institution; Publication n° 4.
- MAGNIN. — Les lacs du Jura, Paris.
- GLÜCK, H. — Biologische und morphologische Untersuchungen über Wassergewächse, Jena (1908-1911).
- COSTANTIN, J. — Etudes sur les feuilles des plantes aquatiques, *Ann. Sc. naturelles*, VII^e série, III (1886).
- HARSHBERGER. — The vegetation of the New Jersey, Pine-Barrens, Philadelphia (1916).
- BAUMANN, E. — Die Vegetation des Untersees, Stuttgart (1911).
- GOEBEL, K. — Pflanzenbiologische Schilderungen, Marburg (1889 et 1893).
- KÜSTER, E. — Ueber den Rythmus im Leben der Pflanzen, *Zeitschr. f. allg. Physiologie*, 17 (1916).
- HORI, S. — Ueber die Ursache der Blütenkrankheiten des Bambus, in *Bull. Imp. Centr. Agric. Exper. Stat., Japan*. n° 38 (1911), 1-44, pl. I et II.

TABLE DES PLANCHES

Planche I p. 11

Chlamydomonas nivalis. 1, zoospore mobile à deux cils; 2, id. mais immobile; 3, multiplication par spores; 4, petite zoospore qui a perdu ses cils; 5, cellule arrondie à l'état de repos, entourée d'une auréole de gelée; 6, grosse cellule à l'état de repos; 7, division en deux cellules; 8, zoospore mobile à deux cils; 9, 10, fusion latérale de deux cellules; 11, zoospore arrêtée; 12, état de repos, arrondi; 13, multiplication par quatre; 14, cellule arrêtée; 15, zoospore géante dont on voit en avant les deux trous par lesquels passent les cils.

Gonidie de lichen, 16, 17. — *Scotiella nivalis*, 18, 19, 21, 22, 23, divers états de la même algue. — *Raphidium nivale* (*Ankistrodesmus nivalis*), 20, 24, 25. — *Ankistrodesmus Vireti*, 26. — *Ancylonema Nordenskiöldii*, 27, 28. — *Glenodinium Pascheri*, 29 (lac de Montana).

Planche II p. 37

A. Vue générale des cascades incrustantes à Mammoth Spring, Yellowstone. Voir les teintes jaunâtres, livides, dues aux algues.

B. Autour de la vasque d'eau chaude, la bordure des Cyanophycées aux couleurs changeantes. (D'après une photographie commerciale.)

Planche III. p. 59

A. Vue prise au Grand St-Bernard; au premier plan, pierre incrustée du lichen *Rhizocarpon geographicum*. Remarquer les teintes vertes sur les montagnes et les rochers autour du lac.

B. *Placodium*, lichen couleur de minium qui est, à gauche, représenté comme incrustant la pierre; il donne, au coucher du soleil, la couleur vive des toits couverts d'ardoisès.

Planche IV p. 81

A. Portion de feuille de Buis, grossi 6 fois, sur laquelle on voit le lichen épiphyllé *Strigula Buxi* s'étaler sous la cuticule de la feuille; le centre est déjà désorganisé.

B. Id., moins fortement grossie; on voit au bord antérieur un autre lichen épiphyllé, le *Catillaria Bouteillei*, au bord supérieur, un petit thalle de *Parmelia*.

Planche V p. 87

Torrent de montagne (Praz de Fort, Valais) dont les pierres se colorent par l'*Hydrurus* (en jaune) et par les *Trentepohlia* (en rouge).

Planche VI p. 91

Desmidiées, algues vertes du groupe des Conjuguées, rencontrées dans une même mare tourbeuse à Saas-Fée (1800 m.). Espèces diverses des genres: 1, *Penium*; 2, *Penium*; 3, 4, 5, *Cosmarium*; 6, 7, *Euastrum* vue de face et profil; 8, 9, 10, *Xanthidium*; 11, 12, 13, 14, divers aspects, de face et de profil, de plusieurs espèces de *Stauroastrum*; 15, 16, 17, 18, *Euastrum*; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, *Cosmarium* divers; 27, 28, œufs fécondés (zygotes) de Desmidiées; 29, *Spirotaenia*.

Planche VII p. 97

Algues vertes vivant ensemble dans une mare de montagne: 1, cellules arrondies (4) à paroi étoilée du genre *Trochiscia*; 2, Polyèdre; 3, *Scenedesmus acutiformis*; 4, *Pediastrum* à 8 cellules; 5, *Kirchneriella* en forme de lune; 6, *Oocystis* fusiforme; 7, *Scenedesmus* (espèce voisine du *S. quadricauda*); 8, Polyèdre muni de longs piquants; 9, *Oocystis bernardinensis*; 10, *Ankistrodesmus falcatus*; 11, 12, *Scenedesmus wisconsinensis*; 13, *Tetraedron minimum*; 14, *Tetraedron caudatum*; 15, *Scenedesmus falcatus*; 16, *Golenkinia radiata*; 17, *Selenastrum Bibrayanum*; 18, *Pediastrum* octocellulaire; 19, *Chlorella* en multiplication formant ses spores; 20, *Scenedesmus quadricauda*, avec 4 piquants; 21, *Kirchneriella contorta*; 22, *Raphidium* (*Ankistrodesmus falcatus*) en faisceau; 23, quatre cellules d'un *Kirchneriella* en croissant; 24, Zoospore biciliée d'un *Chlamydomonas*; 25, quatre cellules associées du *Scenedesmus bijuga*; 26, deux cellules retenues par les deux valves de la membrane de la cellule mère brisée; 27, Colonie flottante du

même *Dictyosphaerium Ehrenbergianum*, en arbuscule rayonnant; 28, quatre cellules du *Scenedesmus obliquus*; 29, Cellule à quatre soies du *Lagerheimia genevensis*.

Planche VIII p. 103

1, 2, *Sphaerocystis Schroeteri*; 3, *Cyclotella Comta*, diatomacée; 4, 14, *Fragilaria crotonensis*, diatomacée dont les cellules sont disposées en peigne; 5, Petite *Cyclotella*; 6, *Melosira catenata*, petite diatomacée, vue de profil; 7, *Ankistrodesmus lacustris*; 8, *Dinobryon stipitatum*, flagellée jaune dorée, ciliée; 9, *Peridinium tabulatum*, flagellée munie d'un long cil; 10, *Synedra longissima*, diatomacée en longue aiguille; 11, *Coccomyxa lacustris*; 12, 16, *Cosmarium*, espèce de Desmidiée; 15, *Botryococcus Braunii*, colonie de l'algue émettant de gros globules d'huile; 17, *Ceratium hirundinella*.

Planche IX p. 115

Podostemon Warmingii, des lanières-racines, rose violacé, partent des feuilles et, en a, une fleur qui vient de sortir de son enveloppe (spathelle); on voit les deux étamines et le pistil (en brun). — *Apinagia Yguaçuensis*, espèce de racine-cordon sur lequel sont fixées des lames, plus ou moins ramifiées et arquées, terminées par des touffes branchies. — *Podostemon atrichus* (comparez avec fig. 69 du texte).

Planche X p. 135

A. Paysage du Chaco paraguayen; au premier plan, les touffes de la Broméliacée *Aechmaea polystachya*, la plante-citerne avec ses inflorescences rouges; plus en arrière, le palmier *Copernicia australis*, puis une lagune et dans le lointain, la Palmeraie.

B. Tronc moussu, portant par-dessus la rivière une Broméliacée du genre *Billbergia* aux bractées rosées; forêt paraguayenne.

Planche XI p. 167

A. Etang-tourbière de la Gruyère (Jura bernois), avec *Sphagnum* et touffes de *Carex* dans lesquelles se sont implantés les arbres *Pinus montana*; au premier plan le *Sphagnum*, à gauche, de couleur rouge.

B. Surface de *Sphagnum* avec Myrtille en fleur, à gauche, *Oxycoccus* au feuillage ovale, *Drosera*, à droite, avec ses feuilles en train de digérer de petits insectes.

Planche XII p. 207

A. *Saxifraga Hirculus* sur la Sagne, en arrière le bois de *Betula pubescens*.

B. Branches du Bouleau nain (*Betula nana*) dans la Sagne.

Planche XIII p. 215

Tourbière dans le Jura suisse; au fond les pins, plus près *Swertia, Comarum* et Linaigrettes.

Planche XIV p. 231

Le *Nuphar luteum* fleurissant à la surface d'un marécage. Etang de Bienne.

Planche XV p. 241

A. Roselière (*Phragmites communis*), plus avant dans le lac, la joncaie (*Scirpus lacustris*), puis la Nupharaie (*Nymphaea alba*).

B. Grève mouillée du lac de Genève à la Belotte. *Ranunculus reptans* avec ses stolons rampants et qui prennent racine. A gauche, le *Myosotis*, plus en arrière, la graminée *Deschampsia littoralis*; à droite, des tiges de *Littorella lacustris*.

Planche XVI p. 249

A gauche, deux pousses florifères du *Myriophyllum spicatum*; en arrière sur la rive, des saules au feuillage argenté et des joncs; un premier épi qui vient fleurir au-dessus de l'eau, on ne voit encore que les fleurs mâles rosées; plus près, l'épi est plus émergé, les fleurs supérieures sont encore fermées; il y a deux étages de fleurs qui ont dressé leurs étamines, puis plus bas les fleurs femelles déjà prêtes à être pollinisées.

A droite, le *Potamogeton lucens*.

INDEX SYSTÉMATIQUE ¹

	Pages		Pages
Acacia Cavenia (Mimosacée) . . .	205	Arnica montana (Composée) . . .	216
Acorus Calamus (Aroïdée) . . .	243, 296	Arole (<i>Pinus cembra</i>) (Conifère)	13
Aechmea (Broméliacée) 138, 139, 141		Arundo Donax (Canne, Graminée).	236
	142	Asterionella gracillima (Alg. Dia-	
Aegiceras (Myrsinacée) . . .	185	tomacée).	102, 104
Airelle (<i>Vaccinium Vitis Ideae</i> , Ericacée)	225	Avicennia (Verbénacée) . 176, 178, 185	
Aldrovandia vesiculosa (Droséra- cée)	277	Bactéries thermophiles (Bactéria- cées)	17
Alectoria jubata (Lichen) . . .	174	Bambou (<i>Bambusa</i> , <i>Chusquea</i> , <i>Phyllostachys</i> , Graminées) 236, 297	
Algues	59	<i>Betula nana</i> (Bétulacée)	224
Algues bleues (Cyanophycées) 32, 42		» <i>pubescens</i>	216
Allium schoenoprasum (Ciboule, Liliacée)	291	Bidens (Graminée)	260
Alternanthera (Amaranthacée) 268, 273		Billbergia (Broméliacée)	142
Alisma Plantago (Alismatacée) 239, 244		Blé (<i>Triticum vulgare</i> , Graminée) 13	
	243, 250, 258, 260, 261	Blechnum capense (Fougère) . . .	227
Amaranthus (Amaranthacée) . . .	209	Botryococcus Braunii (Algue) 107, 108	
Anabaena (Cyanophycée)	108	Bouleau (Bétulacée)	216
Ananas (Broméliacée)	136	» <i>nain</i>	215
Ancylonema (Alg. Desmidiée) 26, 27		Brasenia (Nymphéacée) 168, 174, 221	
Androméda (Ericacée) 212, 214, 225, 228			223
Ankistrodesmus nivalis (Raphi- dium, Algue verte)	26	Bromelia serra (Broméliacée) 135, 137	
Ankistrodesmus Vireti (Alg. verte)	13		143
	31	Bruguiera (Rhizophoracée) 176, 178, 181	
Antennaria dioica (Composée) . .	216		185
Anthurium (Aroïdée)	269	Bruyères (Ericacées)	215
Apinagia (Podostémonacée) 116, 122		Butomus (Butomacée)	243, 296
	123	Cabomba (Nymphéacée)	259
Aponogeton fenestralis (= <i>Ouvi- randra</i>) (Aponogétonacée) . . .	263	Calamagrostis (Graminée)	243

¹ Voir pour les noms d'espèce le renvoi aux pages indiquées.

	Pages
Calluna (Ericacée)	212, 225, 228
Calophysa (Mélastomacée)	202
Caperonia (Euphorbiacée)	273
Caraguata (<i>Bromelia</i>)	140, 141
Carex (Cypéracée)	217, 238, 242, 243
» stricta	167
Cecropia (Moracée)	192, 193, 194, 203
Cedrela (Méliacée)	188
Celosia (Amaranthacée)	269
Ceratophyllum (Cératophyllacée)	240
Cerriops (Rhizophoracée)	176, 178, 186
Cetraria (Lichen)	83, 146
Chara (Alg. Characée)	238, 240
Chusquea (Graminée)	302
» (Bambusée)	303
Chlamydomonas (Algue)	37, 91
» intermedia	94
» nivalis	21, 28
Chodatella (Algue)	100, 105
Chytridiacées (Champignon)	60
Cicuta (Ombellifère)	269
Cladium (Cypéracée)	242
Cladonia (Lichen)	60, 81
» rangiferina	84
Coccoloba (Polygonacée)	203
Coccolobrys (gonidie, algue)	66
Cocos Romanzoffiana (Palmier)	133
Coelastrum (Alg. verte)	104
Coenogonium (Lichen)	80
Colchicum (Liliacée)	296
Comarum palustre (Rosacée)	215
Convolvulus sepium (Convolvulacée)	296
Copernicia cerifera (Palmier)	168
» australis	168, 204
Cordia nodosa (Boraginacée)	202
Cosmarium (Alg. Desmidiée)	98
Crataeva tapia (Capparidacée)	204
Crocus (Iridacée)	14
Croton (Euphorbiacée)	297
Cryptomonas	32

	Pages
Cyanophycées	42, 49
Cymatopleura (Diatomacée)	103
Cyperus (Cypéracée)	243, 291, 295
Cyprés chauve (<i>Taxodium</i> , Conifère)	168, 170, 173
Cystococcus (Alg. verte, Gonidie)	73
Dactylococcus (Alg.)	73
Dattier (<i>Phoenix</i> , (Palmier)	13
Deschampsia (Graminée)	241
Desmidiées (Algues)	32, 98
Diatomacées (Algues siliceuses)	103
» fossiles	53, 54, 55
Diplozygopsis (Champignon)	60
Dipsacus (Dipsacée)	137
Drosera (Droséracée)	225
Duroia (Rubiaceae)	202
Dinobryon (Algue)	101
Eleocharis (Cypéracée)	241, 291, 294
Elodea (Hydrocharitacée)	257
Empetrum (Empétracée)	216, 228, 237
Endocarpon (Lichen)	76
Entada (Mimosacée)	188, 190
Epilobium (Oenothéracée)	296
Equisetum (Equisétacée)	243
Erica (Ericacée)	237
Eriocaulonacée	227
Eriophorum (Cypéracée)	214, 227
Erythraea (Gentianacée)	296
Erythrina (Papilionacée)	192
Euphorbia (Euphorbiacée)	296
Evernia (Lichen)	157
Farmeria (Podostémonacée)	120
Fischerella (Cyanophycée)	43
Flagellées (Algues)	32
Fontinalis (Mousse)	88, 115
Foreliella (Algue)	109
Fragilaria (Alg. Diatomacée)	103

	Pages		Pages
Galanthus (Liliacée)	298	Limnanthemum (Gentianacée)	290
Glenodinium (Algue, Péridiniacée)	11	Limnobium (Hydrocharitacée)	273
Gloeocapsa (Cyanophycée)	42, 52	Linaigrette (<i>Eriophorum</i>)	214
Gonidies (Alg.) 33, 65, 66, 67, 73,	74	Littorella (Plantaginée)	242, 291
Gonium (Alg. verte)	92	Lotus bleu (Nymphéacée)	287
Gratiola (Scrophulariacée)	296	Lumnitzera (Combrétacée)	175, 180
Griffithella (Podostémonacée) 120, 123		Lycopode (Lycopodiacee)	215, 227
Guarea (Méliacée)	188	Lyngbya (Cyanophycée)	42, 43
Gynerium (Graminacée)	190, 236	Lysimachia (Primulacée)	296
Haematococcus (Alg.)	25, 93	Lythrum Salicaria (Lythracée)	296
Hapalosiphon (Cyanophc.)	43, 47	Majeta (Mélastomacée)	202
Hippophae (Eléagnacée)	293	Manglier (Rhizophora)	176
Hirtella (Schizobalanacée)	202	Mauritia (Palmier)	191
Hottonia (Primulacée)	259	Mayaca (Mayacacée)	227
Hydrobryum (Podostémonacée)	120, 123	Mélèze (<i>Larix</i> , Conifère)	169
Hydrocharis (Hydrocharitacée)	263, 266, 290, 299	Menyanthes (Gentianacée)	296
Hydrurus (Algue, Flagellée), 89, 90,	115	Mimosa asperata (Mimosacée)	188
Hippuris (Oenothéracée)	241	Mourera (Podostémonacée)	128, 130
Inga (Mimosacée)	187, 189	Myriophyllum (Oenothéracée, Haloragidée)	238, 239, 240, 245, 280
Iris (Iridacée)	296	Myrmidone (Mélastomacée)	202
Juncus (Juncacée)	238, 243, 291	Myrtille (<i>Vaccinium Myrtillus</i>)	215
» <i>stygus</i>	223	Neige rouge (<i>Chlamydomonas nivalis</i>)	20
Jussieua (Oenothéracée)	177, 180	Nelumbium (Nymphéacée)	168, 174, 290
Kandelia (Rhizophoracée)	184, 185	Neptunia (Mimosacée)	273
Laguncularia (Combrétacée)	176	Nymphaea (Nymphéacée) 174, 238, 239	283, 285, 286, 289
Laiche (Carex) 167, 215, 238, 239, 296		Nitella (Alg. Characée)	240
Larix decidua (Conifère)	169	Nostoc (Cyanophycée)	43, 69, 73
Lawia (Podostémonacée)	122	Nuphar (Nymphéacée)	240, 242, 290
Lemna (Aroïdée)	245, 257, 267, 272	Nyssa (Nyssacée)	171, 173, 174
Leucobryum (Mousse)	210	Oenanthe (Ombellifère)	243
Lichens	64, 71	Olpidiopsis (Champignon)	60
		Oscillatoria (Cyanophycée) 42, 43, 108	
		Oxycoccus (Ericacée)	228

	Pages		Pages
Palétuvier (<i>Rhizophora</i>)	175	<i>Rhizophora</i> (<i>Rhizophoracée</i>)	175, 177
<i>Parmelia</i> (<i>Lichen</i>)	71, 81, 157		182
<i>Paspalum</i> (<i>Graminée</i>)	273	<i>Rhododendron</i> (<i>Ericacée</i>)	216
<i>Papyrus</i> (<i>Cypéracée</i>)	292	Roseaux	293, 294
<i>Pediastrum</i> (<i>Alg.</i>)	99	<i>Rosolis</i> (<i>Drosera</i>)	215
<i>Pedicularis</i> (<i>Scrophulariacée</i>)	296	<i>Ruprechtia</i> (<i>Polygonée</i>)	203
<i>Peltigera</i> (<i>Lichen</i>)	71		
Péridiniacées (<i>Algues</i>)	11	<i>Sagittaria</i> (<i>Alismatacée</i>)	258, 260, 261
Peste d'eau (<i>Elodea</i>)	257	<i>Salix</i> (<i>Salicinée</i>)	192, 296
Peuplier (<i>Populus</i>)	296	<i>Salvinia</i> (<i>Fougère</i>)	271, 272
<i>Phalaris</i> (<i>Graminée</i>)	236, 241, 243	<i>Sapopema</i>	172
<i>Phragmites</i> (<i>Roseau, Graminée</i>)	233	<i>Saxifraga hirculus</i> (<i>Saxifragacée</i>)	215
	242, 293		225
<i>Phycopeltis</i> (<i>Alg.</i>)	77	<i>Scheuchzeria</i> (<i>Scheuchzériacée</i>)	222
<i>Phyllanthus</i> (<i>Euphorbiacée</i>)	270	<i>Schizophycée</i> (<i>Cyanophycée</i>)	42
<i>Phyllostachys</i> (<i>Bambusée</i>)	298	<i>Schizothrix</i> (<i>Cyanophycée</i>)	43, 110
Pin de montagne (<i>Pinus montana</i>)		<i>Schoenus</i> (<i>Cypéracée</i>)	243, 291, 293
	167, 217, 216, 220	<i>Scirpus</i> (<i>Cypéracée</i>)	238, 242, 291, 292
Pin sylvestre (<i>P. sylvestris</i>)	235		293
Platane (<i>P. acerifolia</i>)	168	» <i>Holoschoenus</i>	243
<i>Pleurococcus vulgaris</i> (<i>Alg.</i>)	73	<i>Scleria</i> (<i>Cypéracée</i>)	227
<i>Polygala joncoïde</i> (<i>Polygalacée</i>)	243	<i>Sclerolobium</i> (<i>Césalpiniacée, Lé-</i>	
<i>Podostemon</i> (<i>Podostémonacée</i>)	116	gumineuse)	203
	117, 119, 125, 126, 127	<i>Scotiella</i> (<i>Algue</i>)	28
<i>Polygonum</i> (<i>Polygonacée</i>)	273	<i>Scutellaria</i> (<i>Labiée</i>)	296
<i>Polytrichum</i> (<i>Mousse</i>)	215	<i>Scotiella nivalis</i> (<i>Alg.</i>)	26
<i>Potamogeton</i> (<i>Potamogétonacée</i>)	251	<i>Scytonema</i> (<i>Cyanophycée</i>)	43
	252, 280	<i>Solanum dulcamara</i> (<i>Solanacée</i>)	296
Potamots (<i>Potamogétonacée</i>)	238, 239	<i>Soldanella</i> (<i>Primulacée</i>)	14
<i>Protococcus</i>	22	<i>Solorina</i> (<i>Lichen</i>)	71, 74, 75
<i>Prunus Padus</i> (<i>Rosacée</i>)	227	<i>Sonneratia</i> (<i>Sonnératiacée</i>)	176, 180, 185
<i>Pteromonas</i> (<i>Alg.</i>)	27	<i>Sorédies</i> (<i>Lichen</i>)	70, 72
		<i>Sparganium</i> (<i>Sparganiacée</i>)	243
<i>Ramalina</i> (<i>Lichen</i>)	71, 83	<i>Sphaerozoma</i> (<i>Alg. Desmidiée</i>)	98
<i>Ranunculus</i> (<i>Renonculacée</i>)	124, 243	<i>Sphagnum</i> (<i>Mousse</i>)	208, 209
	259, 290, 291, 296	<i>Spirogyra</i> (<i>Algue verte</i>)	60, 95, 96
<i>Raphidium</i> (<i>Alg. verte</i>)	30	<i>Staurostrum</i> (<i>Desmidiée</i>)	98
<i>Remigia</i> (<i>Rubiacee</i>)	202	<i>Sterculia Wigmanni</i> (<i>Sterculiacée</i>)	171
<i>Richardia</i> (<i>Aroïdée</i>)	267	<i>Stichococcus nivalis</i> (<i>Alg. verte</i>)	31, 73
<i>Rivularia</i> (<i>Cyanophycée</i>)	43	<i>Strigula</i> (<i>Lichen</i>)	78, 80
<i>Rhamnus</i> (<i>Rhamnacée</i>)	296	<i>Symbiose</i> (<i>Lichen</i>)	85

	Pages		Pages
<i>Symplocos</i> (Symplocacée)	227	<i>Usnea</i> (Lichen)	146, 157, 174
<i>Synedra longissima</i> (Alg. Diatomacée)	102, 103	<i>Vaccinium</i> (Ericacée)	215
<i>Tachygalia</i> (Légumineuse)	202	<i>Valeriana</i> (Valérianacée)	296
<i>Taxodium distichum</i> (Conifère)	168 174	<i>Vallisneria</i> (Hydrocharitacée)	254, 263 287
<i>Thalictrum</i> (Renonculacée).	296	<i>Verrucaria</i> (Lichen)	66, 81
<i>Tillandsia</i> (Broméliacée)	132, 142, 145 146, 147, 148, 152, 155, 156, 161 164, 170	<i>Viburnum</i> (Caprifoliacée)	296
<i>Tococca</i> (Mélastomacées)	197, 200	<i>Victoria</i> (Nymphéacée)	243, 284, 285 288, 289
<i>Trapa</i> (Oenothéracées)	177, 239, 245	<i>Villaresia</i> (Icacinacée)	227
<i>Trentepohlia</i> (Alg. verte).	87	<i>Willisia</i> (Podostémonacée)	120
<i>Trichilia</i> (Méliacée)	188	<i>Xylocarpus</i> (Méliacée)	177, 185, 186
<i>Trientalis</i> (Primulacée)	223, 225	<i>Zanichellia</i> (Potamogetonacée)	116, 252
<i>Triglochin</i> (Scheuchzériacée).	243		
<i>Triplaris</i> (Polygonacée)	203

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	6
Préface de l'auteur	7
Les neiges colorées	11
Les plantes des thermes	37
Une audacieuse entreprise	59
Histoire biologique d'un torrent	87
Cascades et Podostémonacées	115
Citernes végétales et marécages suspendus	135
Arbres amphibies	167
Les Sagnes	207
Zones de végétation et associations	231
Les nénuphars — les Nupharaies	283
Les joncs — Les roseaux	291
Table des planches	303
Index systématique	307