E. Wagner

Die Grundlagen der räumlichen
Ordnung im Walde.

ALBERT R. MANN
LIBRARY

AT

CORNELL UNIVERSITY

Cornell University Library
SD 373.W13 1911

Die Grundlagen der räumlichen Ordnung i

3 1924 000 733 513

Cornell University Library

The original of this book is in
the Cornell University Library.

There are no known copyright restrictions in
the United States on the use of the text.

<http://www.archive.org/details/cu31924000733513>

Wagner, Grundlagen. 2. Aufl.

H. Laupp'sche Buchhandlung, Tübingen.

Die Grundlagen
der
räumlichen Ordnung
im Walde.

Von

Professor **C. Wagner.**

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 60 Figuren im Text und einer farbigen Tafel.

Tübingen
Verlag der **H. L a u p p'schen** Buchhandlung
1911.
S

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

Vorwort.

Noch ehe die versprochene Fortsetzung dieser Schrift unter die Presse gebracht werden konnte, ist es dank dem freundlichen Interesse so vieler Fachgenossen nötig geworden, sie selbst in neuer Auflage hinausgehen zu lassen.

Die zahlreichen Bestätigungen meiner Beobachtungen, die mir inzwischen aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands und Oesterreichs zugegangen sind, und für die ich auch an diesem Orte verbindlichst danke, wie die eigenen fortgesetzten Wahrnehmungen zeigen mir, daß ich von meinen Ausführungen und aufgestellten Sätzen nichts zurückzunehmen brauche. So konnte ich mich in der neuen Auflage auf eine Reihe von Erläuterungen und Ergänzungen des früher Gebotenen beschränken. Mit Einwänden und Mißverständnissen habe ich mich meist in Fußnoten auseinandergesetzt.

Meine Absicht war allerdings gewesen, die Untersuchungen und Vorschläge dieser Schrift, die in wichtigen Teilen zunächst nur auf örtlich gewonnene Erfahrung gegründet waren, in der Zwischenzeit durch Einleitung exakter Versuche vergleichender Art, die unter, nach Standort und Bestockung abweichenden Verhältnissen vorgenommen werden sollten, auf eine breitere und festere Basis zu stellen, und dabei wohl manche weitere, für die Sache wichtige Aufschlüsse zu erhalten, — wie ich glaube, die selbstverständliche Pflicht eines Hochschullehrers und Mitglieds einer staatlichen Versuchsanstalt, von dem man ohne weiteres annimmt, daß ihm vor Andern Mittel und Wege offenstehen, solche Arbeiten durchzuführen. Es bedarf daher der Rechtfertigung, wenn nach dieser Richtung nichts geschehen ist.

Schon vor 9 Jahren, als ich meinen, an Beobachtungsgelegenheit reichen Wirkungskreis verlassen sollte, um in den akademischen Beruf überzutreten, hatte ich von jener Absicht geleitet, meinen Uebertritt von einer Anstellungsbedingung abhängig gemacht, die mir auch weiterhin die Möglichkeit exakter Versuche sichern sollte. Obgleich nun diese Bedingung durch Königliche Entschliebung bewilligt worden war, hat man trotz, meiner mehrfachen Bemühungen, in der Unterrichts- und Finanzverwaltung Württembergs durch 9 Jahre leider weder innerhalb noch außerhalb der forstlichen Versuchsanstalt einen Weg finden können, der mir die Durchführung der beabsichtigten Versuche gestattet hätte. Ich habe darum auf die fernere Mitgliedschaft der Versuchsanstalt verzichtet. Bei dieser Sachlage war mir während jener langen Zeit

jede Möglichkeit abgeschnitten, meine Studien auf dem Weg des Versuchs weiter zu fördern. Es bestanden nämlich Bedenken, die in Aussicht genommenen Versuche im Staatswald zuzulassen, weil die Sache noch nicht genügend erprobt sei. Erst in allerneuester Zeit, für diese Schrift leider zu spät, wurde mir — außerhalb der Versuchsanstalt — die Möglichkeit eröffnet, im Staatswald Versuche anzustellen.

So ist denn alle Förderung der hier vertretenen Sache nach wie vor ausschließlich nur persönlichem Interesse und privatem Entgegenkommen Einzelner zu danken, ein billiges Urteil über diese Schrift wird diesem Umstand Rechnung tragen müssen.

Mögen nun aber auch — zum Schaden der Sache — jene exakten Versuche vereitelt worden sein, so bleibt doch dem Autor die Möglichkeit, auf die reine Quelle aller forstlichen Erkenntnis hinzuweisen; ich kann das Buch hinausgehen lassen mit der Aufforderung an die Leser: Fraget selbst den Wald, er wird Euch die Antwort nicht schuldig bleiben!

T ü b i n g e n , März 1911.

Der Verfasser.

Vorwort zur ersten Auflage.

In der vorliegenden Schrift sind Anschauungen und Vorschläge zum Ausdruck gebracht, die zum großen Teil einer selbständigen praktischen Tätigkeit im Walde entstammen, die also nicht — wie mein dermaliger Beruf anzudeuten scheint — das Ergebnis vorwiegend theoretischer Erwägungen sind. Jene Tätigkeit hat mich, wie die nachfolgenden Untersuchungen zeigen, zu der Erkenntnis geführt, daß an Stelle des üblichen flächenweisen Vorgehens im Forstbetrieb allgemein und grundsätzlich das lineare Fortschreiten über die Wirtschaftsfläche gesetzt werden sollte. Die Durchführung dieses Grundsatzes aber würde eine durchgreifende Aenderung im gesamten heutigen Aufbau der räumlichen Ordnung im Walde bedingen.

Die erste Anregung nach dieser Richtung¹⁾ verdanke ich dem leider viel zu früh verstorbenen Forstdirektor Hugo Speidel. Schon seine bekannten Vorschläge zur Weiterentwicklung der Forsteinrichtung in Württemberg²⁾ hatten mir in bezug auf Ordnung des Forstbetriebs eine Richtung gezeigt, die m. E. verdient, weiterverfolgt zu werden; ich hatte weiterhin auch noch das Glück, unter Speidels Leitung den Betriebsplan gerade desjenigen Wirtschaftsbezirks bearbeiten zu dürfen, dessen Verhältnisse ihn — wie er mir selbst mitteilte — mit andern in erster Linie zu seiner Veröffentlichung veranlaßten, und dessen Karte vor ihm lag, als er den Aufsatz schrieb.

Beobachtung und praktische Erfahrung haben mich nun zwar im Laufe der Zeit teilweise andere Wege geführt; sollte es mir trotzdem gelungen sein, im Nachfolgenden den Faden im Sinne des Verstorbenen weiterzuspinnen, — des unstreitig bedeutendsten forstlichen Praktikers, den Württemberg hervorgebracht —, so würde mich das in ehrendem Gedenken an diesen trefflichen Mann ganz besonders befriedigen.

Die Ziele, die das vorliegende Buch verfolgt, und die Vorschläge, zu denen es gelangt, sind also vorwiegend aus praktischer Tätigkeit erwachsen und beschäftigten mich durch eine Reihe von Jahren, während deren ich das Glück hatte, selbständig und frei wirtschaften zu können. Der Uebergang

1) Man hat diese Mitteilung auf die in dieser Schrift empfohlene Saumschlagform bezogen, eine Annahme, die nicht zutrifft. Die Anregungen beziehen sich vielmehr auf die Pflege der räumlichen Ordnung im allgemeinen, im besondern aber auf die, erst in einer folgenden Schrift zu behandelnde Hiebszugsbildung.

2) Speidel: Aus Theorie und Praxis der Forstbetriebseinrichtung, Allg. F. u. JZtg. 1893 S. 145.

zum akademischen Lehrberuf hat die längst beabsichtigte Veröffentlichung um Jahre verzögert; er hat aber insofern genützt, als er eine eingehendere Berücksichtigung der Literatur gestattete, die überdies inzwischen um weitere, für das behandelte Gebiet sehr wertvolle Arbeiten, so insbesondere diejenigen von Engler¹⁾, Eifert²⁾ und Bargmann³⁾ bereichert worden ist. Zudem war es in der Zwischenzeit möglich, die hier empfohlenen Grundsätze im praktischen Betrieb — wenn auch in bescheidenem Umfang — nicht allein durchzuführen, sondern auch auf ihre Wirkung zu prüfen, soweit eine so kurze Zeit dies gestattet. Viele der nachfolgenden Vorschläge haben somit wenigstens den Vorzug, im praktischen Betrieb bereits durchgeführt zu sein; sie haben sich nach Ansicht derer, die ihre Wirkung kennen, bis heute bewährt, und werden dies, wie ich zuversichtlich hoffe, auch fernerhin tun.

Diese Schrift muß sich nun leider darauf beschränken, die Grundlagen nachzuweisen, auf denen die Forstwirtschaft ihre räumliche Betriebsordnung aufbauen sollte; diesem Nachweis sofort eine Prüfung der heutigen Raumordnung und ihrer Organe an der Hand der entwickelten Grundsätze folgen zu lassen, sowie den aus ihnen sich ergebenden besten Aufbau der räumlichen Ordnung selbst zu schildern, um insbesondere einen einfachen Weg zu zeigen, der aus der heutigen — mir unbefriedigend erscheinenden — Raumordnung in diese hinüberführt, muß ich mir zunächst versagen und einer späteren Darstellung vorbehalten.

Zu besonderem Dank für freundliche Unterstützung bin ich Herrn Professor Ramsperger in Nürtingen verpflichtet, der sich aufs liebenswürdigste mit meinen Ideen vertraut machte, um mit geschickter Hand einen großen Teil der Skizzen zu entwerfen, von denen ich hoffen darf, daß sie die Verständigung zwischen Verfasser und Leser wesentlich fördern werden.

So gebe ich denn das Buch aus der Hand, mit dem Wunsche, daß der Inhalt desselben förderlich sein möge für Theorie und Praxis der Forstwirtschaft.

T ü b i n g e n , Dezember 1906.

Der Verfasser.

1) Engler: Einfluß der Provenienz des Samens auf die Eigenschaften der forstlichen Holzgewächse. Mitteil. der Schweiz. Centralanstalt f. d. forstl. Versuchswesen VIII, 2. 1905.

2) Eifert: Forstliche Sturmbeobachtungen im Mittelgebirge. Allg. F. u. JZtg. 1903 S. 323.

3) Bargmann: Die Verteidigung und Sicherung der Wälder gegen die Angriffe und die Gewalt der Stürme. . . . Allg. F. u. JZtg. 1904 S. 81.

Inhalt.

	Seite
Einleitung	1
1. Abschnitt. Waldbau und räumliche Betriebsordnung	12
1. Kapitel. Die Wahl der Verjüngungsart	13
Die Erhaltung örtlicher Sondereigenschaften der Bestockung: S. 21.	
Die wirtschaftliche Züchtung: S. 44. Die naturgemäße Jugendentwicklung der Bestände: S. 63. Die Naturwidrigkeit der Fichtenspflanzung: S. 68. Ballenpflanzung: S. 77.	
2. Kapitel. Die Bedingungen der Naturverjüngung	81
Der Blenderwald: S. 87. Der räumlich geordnete Blenderwald: S. 98.	
3. Kapitel. Die Betriebsformen in ihrem Verhältnis zur Naturverjüngung	102
Einteilung der Betriebsformen 105. Die Großflächenwirtschaft: S. 111. Die Kleinflächenwirtschaft: S. 120.	
4. Kapitel. Der Saumschlag	127
Die Hiebsart: S. 127. Der Hiebsfortschritt: S. 129. Die Hiebsrichtung: S. 130. Das Blendersaumschlagverfahren: S. 152. Kritische Betrachtung des Blendersaumschlags: S. 166. Vergleich mit verwandten Formen: S. 168.	
2. Abschnitt. Die Sicherheit des Betriebs	175
1. Kapitel. Der Sturm	179
I. Die wirtschaftlich entscheidenden Eigenschaften der Stürme	181
1. Die Richtung der Stürme: S. 182. 2. Sonstige Eigenschaften der Stürme: S. 189. Sturmstatistik: S. 191.	
II. Die Wirkung der stark bewegten Luft auf den Wald	196
1. Holzart und Sturm: S. 197. 2. Wuchsraum und Sturmwirkung: S. 198. 3. Alter und Gesundheit: S. 205.	
III. Der Sturmschutz	205
1. Der Schutz nach innen: S. 207. 2. Der Schutz nach außen: S. 210.	
IV. Die Betriebsformen und der Sturm	214
A. Die Betriebsformen mit ungleichwüchsiger Bestockung	214
B. Die Betriebsformen mit gleichwüchsiger Bestockung	215
1. Kahlschlagbetrieb: S. 217. 2. Schirmschlagbetrieb: S. 217. 3. Blenderschlagbetrieb: S. 218. 4. Saumschlag: S. 220. — Blendersaumschlag: S. 223.	
2. Kapitel. Weitere Gefahren	231
I. Schneedruck	232
II. Frost	232
III. Feuer	234
IV. Pilzschaden	235
V. Unkrautwuchs	239
VI. Insektenschaden	239
VII. Wildverbiß	243

	Seite
Schlußbetrachtung	244
3. Abschnitt. Technische Eigenschaften und Nutzung der Produkte	246
1. Kapitel. Die Anforderungen an Beschaffenheit und Dimensionen des Holzes	247
Anforderungen an das Schafftholz: S. 248. Die Betrachtung der einzelnen Betriebsarten: S. 251.	
2. Kapitel. Die Ernte des Holzes	252
Allgem. Anforderungen: S. 253. Wirkung auf das junge Holz: S. 254. Maßregeln zur Verhütung von Schaden: S. 256. Die verschiedenen Betriebsformen: S. 262. Der Blendersaumschlag: S. 265.	
4. Abschnitt. Die Durchführung der Betriebsmaßregeln	271
1. Kapitel. Die Ableitung allgemeiner Forderungen	272
Die einzelnen Betriebsaufgaben und ihre Erfordernisse in räumlicher Beziehung: S. 275. (1. Die Verjüngung 275. 2. Die Bestandserziehung 277. 3. Die Endnutzung 280). Ableitung allgemeiner Forderungen an die räumliche Ordnung: S. 281.	
2. Kapitel. Die Betrachtung der einzelnen Betriebsformen	286
Die Großschlagformen und die Blenderform: S. 286. Die Saumschlagform und die Forderungen der Betriebsführung: S. 289. 1. Die Verjüngung: S. 290. 2. Die Bestandserziehung: S. 291. 3. Die Endnutzung: S. 292. — Der Wirtschaftler und die Naturverjüngung, Erhaltung des subjektiven Moments: S. 294.	
5. Abschnitt. Forderungen der Forststatik	297
I. Die Möglichkeit, alles Holz dann schadlos zu nutzen, wenn es hiebsreif ist	297
II. Die schärfste Anspannung aller erzeugenden Naturkräfte zur Produktion bei geringstem Aufwand an Kapital und Arbeit	298
Allgemeine ökonomische Betrachtungen: S. 300. Sonderstellung der Forstwirtschaft: S. 301. Naturintensität: S. 303. 1. Volle Ausnutzung der Standortsfaktoren: S. 307. 2. Möglichste Ermäßigung der bezüglichen Produktionskosten: S. 309.	
6. Abschnitt. Die Ertragsregelung und die räumliche Ordnung	315
1. Kapitel. Die Methoden der Ertragsregelung und ihr Verhältnis zur räumlichen Ordnung	316
I. Kennzeichnung der Methoden der Ertragsregelung	317
Geschichtliche Entwicklung: S. 317. Aufstellung eines Systems: S. 323.	
II. Das Verhältnis der Methoden der Ertragsregelung zur räumlichen Ordnung	329
1. Methoden, die sich auf Ermittlung des nachhaltigen Hiebssatzes beschränken	330
2. Methoden, die mit der Ertragsregelung eine Einwirkung auf die räumliche Ordnung im Wald verbinden	333
a. Flächenteilungsmethoden: S. 333. b. Fachwerksmethoden: S. 333. (Massenfachwerk 334. Flächenfachwerk und komb. Fachwerk 336.) c. Altersklassenmethoden: S. 350. Verhältnis der Altersklassenmethoden zum Fachwerk: S. 352. Vorschlag vollkommener Trennung der Pflege zeitlicher und räumlicher Ordnung: S. 356.	
2. Kapitel. Die berechtigten Forderungen der Ertragsregelung an die räumliche Ordnung	359
Schlußbetrachtung	365

Einleitung.

Wenn es hier — wohl zum erstenmal — unternommen wird, die Forstwirtschaft ganz selbständig, wenn man will, einseitig von ihrer einen — räumlichen Seite zu betrachten, um die Grundbedingungen ihrer Tätigkeit so, wie sie sich in der räumlichen Ordnung im Wald äußern, zu prüfen und wenn möglich zu verbessern ¹⁾, so geschieht dies aus einer Anschauung heraus, die schon einen Grundgedanken Heinrich Cottas in bezug auf Ordnung des Forstbetriebs bildete (Vorwort der „Anweisung zur Forsteinrichtung und -abschätzung I. Teil, 1820, These 4), daß nämlich die gute Einrichtung (d. h. Raumordnung) eines Waldes gewöhnlich viel wichtiger sei, als die Ertragsbestimmung.

Verfasser teilt nicht allein diese Anschauung über die entscheidende Bedeutung der räumlichen Ordnung, sondern er ist auch der Ansicht, daß diese auf forstlichem Gebiet noch nicht die ihr gebührende Wertung erfahren hat, daß die räumliche Ordnung als die entscheidende Grundlage der gesamten Wirtschaft noch nicht die notwendige Selbständigkeit in ihrem Aufbau besitzt. Er hofft in dieser Schrift den überzeugenden Nachweis erbringen zu können, daß die räumliche Ordnung der Schlüssel ist für vollen wirtschaftlichen Erfolg im Wald, da nur sie — und zwar bei selbständigem Aufbau — das richtige Mittel an die Hand gibt, die Gegensätze zwischen dem natürlichen und dem ökonomischen Prinzip in der Forstwirtschaft, deren Widerstreit vollem Wirtschaftserfolg hindernd im Wege steht, zu versöhnen. Erst die Versöhnung dieser Gegensätze führt uns zu voller wirtschaftlicher Freiheit, die dem Forstbetrieb deshalb so sehr nottut, weil sie ihm den Weg bahnt zu seinen höchsten Wirtschaftszielen ²⁾.

1) Stötzer beanstandet (Allg. F. u. J.Ztg. 1907 Dez.) den Titel dieser Schrift und meint, derselbe hätte lauten müssen: „Der Blendersaumschlag in seinen Beziehungen zum Waldbau, zum Forstschutz, zur Forstbenutzung, sowie zur Statik und Ertragsregelung“. Das kann nicht zugegeben werden, denn der Blendersaumschlag ist uns nicht Ausgangspunkt und Leitmotiv, sondern schließliches Ergebnis einer streng sachlichen Untersuchung der genannten Gebiete auf ihre Anforderungen an die räumliche Ordnung. Der vorgeschlagene Titel würde geradezu darauf hindeuten, daß die Untersuchungen nicht voraussetzungslos geführt seien.

2) Um im nachfolgenden nicht immer wieder zu Einschränkungen genötigt zu sein durch Einwendungen auf Grund von allerlei örtlichen Besonderheiten — Einwendungen, an denen die forstliche Literatur allen neuen Vorschlägen gegenüber so reich ist — sei in bezug auf die hier vorausgesetzten Wirtschaftsziele ein für allemal ausdrücklich gesagt, daß die nachfolgenden Untersuchungen vom normal behandelten Ertragswald ausgehen, d. h. von einem Wald, der frei von irgend erheblichen Beschränkungen durch Berechtigungen, Schutzwaldeigenschaft, klimatische Extreme, große Steilheit der Fläche, mangelnden Aufschluß durch Wege, beschränkten Absatz,

Darum erscheinen uns die räumlichen Beziehungen im Wald, die fast alle Gebiete der Forstwissenschaft durchdringen oder doch berühren, als ein Gegenstand, der wert ist, für sich allein einer eingehenden Untersuchung unterworfen zu werden. Wir dürfen als deren Ergebnis Mittel und Wege zu einem selbständigen Aufbau der räumlichen Ordnung des Waldes erhoffen, der den natürlichen und ökonomischen Grundbedingungen unserer Wirtschaft in gleicher Weise Rechnung trägt.

Es fragt sich nun: Lassen sich die räumlichen und zeitlichen Beziehungen im Wald einer getrennten Betrachtung unterwerfen?

Raum und Zeit sind die zwei Anschauungsformen, in denen uns alle forstliche Tätigkeit begegnet, sie zeigen uns die zwei Richtungen, nach denen die Forstwirtschaft ihre Arbeit regeln und ihr Vorgehen vervollkommen muß, um ihre Zwecke immer besser zu verwirklichen. Die Regeln, deren sie dazu bedarf und die sie sich schafft und ausbildet, finden wir ausgeprägt in der räumlichen und zeitlichen Ordnung des Betriebs.

Die Anschauungsform des Raums, das Nebeneinander der Dinge, tritt uns in der Forstwirtschaft entgegen in der Waldfläche und ihren Teilen, in der Anordnung der Wirtschaftsobjekte, der Bestockungseinheiten (Baumindividuen und Bestände) auf derselben. Wir verstehen demgemäß unter räumlicher Ordnung die, bestimmten Regeln folgende (planmäßige) Lagerung der Baumindividuen und Bestände zu einander nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Eigenschaften und die dieser Lagerung als ihr Rahmen entsprechende Waldeinteilung.

Die andere Form, die Zeit, das Nacheinander der Dinge, findet im forstlichen Betrieb ihren Ausdruck — entsprechend dem allmählichen, durch die Wirtschaft zu fördernden Entstehen (Reifen) der Produkte und ihrer Ernte — in der Abgrenzung von Wirtschaftszeiträumen (Wirtschaftsjahr und -periode, Umtriebszeit u.s.w.), der Gütererzeugung innerhalb derselben und der Verteilung aller wirtschaftlichen Maßregeln auf dieselben. Auf die Zeit in erster Linie beziehen wir demnach auch den jährlich erfolgenden Holzzuwachs und damit sein Produkt, den Ertragsfaktor der Masse, wie den Gesamtertrag des Walds, mag er nun in der Masse oder im Flächenmaß ausgedrückt werden. Wir fassen also unter zeitlicher Ordnung das planmäßige Aneinanderreihen der wirtschaftlichen Maßregeln zusammen. Diese beziehen sich insbesondere auf Erzeugung und Ernte der Waldprodukte.

Die Betriebsordnung im Wald ist nun beides — eine räumliche und eine zeit-

Liebhabeereien des Besitzers, abnorme Bestockung, erkrankten Boden u. a. m., in erster Linie auf höchsten Ertrag bewirtschaftet werden kann. Wir setzen ferner einen Wald voraus, der die mittleren Verhältnisse zeigt, unter denen in Deutschland Waldwirtschaft getrieben wird. Ungünstige Rechtsverhältnisse, extremes Klima (hohe Gebirgslage, Meeresküste . . .) und dauernd beschränkter Absatz bedingen naturgemäß Modifikationen, für sie sollen die hier aufgestellten Sätze nicht ohne weiteres Geltung haben. In bezug auf ungünstige Absatzlage, welche die Verwertung schwächerer Sortimente ausschließt, die z. B. gegen dichte Jugendbestockung und normale d. h. lockere Bestandserziehung geltend gemacht werden könnte, ist übrigens zu erwägen, daß hier stets nur der Absatz der Zukunft, nicht derjenige der Gegenwart in Frage kommt und daß bei der zu erwartenden wirtschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands wohl nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der gesamten Waldfläche infolge mangelnden Absatzes für schwächeres Holz außerhalb unserer Betrachtungen fällt.

liche; wenn aber auch räumliche und zeitliche Beziehungen in der Forstwirtschaft vielfach innig verbunden erscheinen und sich gegenseitig bedingen, so läßt sich doch die forstwirtschaftliche Einwirkung auf den Wald nach den beiden Richtungen — jedenfalls begrifflich — auseinanderhalten und einer selbständigen Betrachtung unterziehen.

Fassen wir z. B. den einzelnen Bestand ins Auge, so ist derselbe nach seiner Lage im Raum und seiner Flächenausdehnung und -form ein Gegenstand der räumlichen Ordnung, nach seinem Zuwachs, dem Alter der Bestockung, das die Zeit seiner Hiebsreife bestimmt und der Masse, die Grundlage der Nutzungsregelung ist, ein Gegenstand der zeitlichen Ordnung.

Wenn wir nun mehrere solche Bestände nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Eigenschaften zur Schlagreihe zusammenordnen, so vollziehen wir damit einen Akt der räumlichen Ordnung, auch wenn unter anderen ein zeitliches Moment, das Alter, hiebei mitbestimmend ist, und erst die zeitliche Verfügung über ihre Nutzungsmassen, das Verteilen derselben auf bestimmte Nutzungszeiträume gehört in das Gebiet der zeitlichen Ordnung.

In der hier angenommenen weiten Fassung des Begriffs der räumlichen Ordnung im Wald umspannt derselbe nicht allein das, was man in der Forsteinrichtung darunter zu verstehen pflegt — Waldeinteilung und Bestandeslagerung — sondern er greift darüber hinaus ins waldbauliche Gebiet, er umfaßt auch die Bestandesform, die Art, wie sich die Individuen nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Eigenschaften, besonders Alter und Holzart, räumlich gruppieren. Die räumliche Ordnung befaßt sich daher auch mit der Betriebsart u.s.w., kurz — unmittelbar und mittelbar — mit den gesamten räumlichen Beziehungen des Waldes und aller seiner Glieder. Es ist notwendig, den Begriff so weit zu fassen und selbst Art und Form des Bestandes — wenn auch mit Einschränkung — in den Kreis dieser Betrachtungen zu ziehen, da jene für den Aufbau der räumlichen Ordnung grundlegende Bedeutung haben; denn nicht im Waldbau, sondern nur in der Forsteinrichtung kann der Ort sein, diesen Aufbau nach allen bestimmenden Momenten richtig zu würdigen. Wollen wir hier die wesentlichen Bedingungen der räumlichen Ordnung und die Wirkungen, auf die sie berechnet sein soll, ergründen, wollen wir eine solche räumliche Ordnung suchen, die allen Forderungen eines zweckmäßigen Betriebs möglichst vollkommen entspricht, dann darf selbst die Bestandesform nicht als gegeben vorausgesetzt werden, sondern auch sie muß sich erst aus den Grundlagen ergeben.

Soll nun die Stellung der räumlichen Ordnung innerhalb des Forstbetriebs kurz gezeichnet und ihr Verhältnis zur zeitlichen Ordnung klargestellt werden, so bedarf es einiger einleitender Bemerkungen:

Die Forstwirtschaft macht aus dem Naturwald, in dem nur der Zweck der Erhaltung und Fortpflanzung herrscht, einen Wirtschaftswald, indem sie jenem natürlichen noch einen weiteren wirtschaftlichen Zweck, denjenigen zweckmäßiger Gütererzeugung an die Seite stellt. Dieser neue Zweck steht nun aber mit dem ersteren nicht ohne weiteres in vollem Einklang, es entwickeln sich

vielmehr Gegensätze, sodaß sich im Wirtschaftswald zwei streitende Prinzipien gegenüberstehen:

ein natürliches Prinzip, das den Wald zu erhalten und den Individuen nach den in der Waldesnatur begründeten Gesetzen bestes Gedeihen zu sichern strebt und ein ökonomisches Prinzip, das den Wald dem Menschen in vollkommenstem Maß nutzbar machen will, das höchsten Reinertrag der Wirtschaft sucht und dabei möglichst wertvolle wirtschaftliche Güter erzeugen möchte.

Das natürliche Prinzip findet seinen Ausdruck in den Forderungen des Produktionsfaktors Natur, d. h. der Summe aller im Forstbetrieb tätigen erzeugenden Naturkräfte. Es strebt reichster und ungestörter Entfaltung derselben zu und bedarf dazu unbeschränkter wirtschaftlicher Freiheit, die dem Betrieb gestattet, ungehindert den Gesetzen der Natur zu folgen und die jede Beschränkung durch einseitig ökonomische Momente ausschließt.

Nun bedarf freilich der Wald an sich eines planmäßigen räumlichen Aufbaus für sein Bestehen nicht. Aber sobald die menschliche Wirtschaft von ihm Besitz ergreift und die Forderungen des ökonomischen Prinzips mit der natürlichen Ordnung in Wettbewerb treten, dann müssen die natürlichen Bedingungen — wenn der Wald erhalten und fortgepflanzt werden soll — beachtet und gewahrt sein vor allem durch die Art der räumlichen Anordnung.

Darum entscheidet auch die räumliche Ordnung im Wald geradezu über Durchführbarkeit und Erfolg dessen, was die forstliche Produktionslehre, was insbesondere Waldbau und Forstschutz fordern und erstreben; ohne ihre ausschlaggebende Mitwirkung bei der gesamten räumlichen Betriebsordnung bleiben unsere produktiven Wirtschaftsziele, wie Naturverjüngung, Holzartenmischung, Betriebssicherheit u. s. w. mehr oder weniger fromme Wünsche.

Das natürliche Prinzip findet seine Bedingungen in vollkommenster Weise erfüllt nicht im gleichaltrigen, sondern im ungleichaltrigen Wald und zwar in der dem Naturwald nächststehenden ¹⁾ Blenderform ²⁾.

1) Cermak schließt in seinem interessanten Aufsatz: „Einiges über den Urwald von waldbaulichen Gesichtspunkten“ (Zentralbl. f. d. ges. Forstw. 1910 S. 340 ff.) aus dieser Äußerung auf eine falsche Vorstellung vom Aufbau des Urwalds. Diese Annahme trifft nicht zu. Es ist klar, daß ein Wald, in dem 400—500 Altersstufen neben einander gedeihen sollen, und in dem die lichternde Hand des Menschen fehlt, ein anderes Bild bieten muß, als ein solcher mit nur etwa 100 einjährigen Altersstufen, in den der Mensch eingreift, und daß jener vielfach Bilder erzeugen wird, die auf großen Flächen an heutige Wirtschaftsbestände erinnern, z. B. an unsere sehr alten aus ehemaligem Blenderwald zusammengewachsenen Schlagwaldbestände. Ebenso klar ist aber auch, daß der Aufbau des Urwalds vollständig vom Standort im weitesten Sinn und seinen Gefahren, den Holzarten und ihren Gefahren u. s. f. abhängt und mit ihnen wechselt; der Naturwald wird also, wenn er schon im einzelnen Waldgebiet einen mannigfaltigen Wechsel der Formen zeigt, dies noch viel mehr unter verschiedenen Himmelsstrichen tun. Darum wurde auch nur gesagt, daß der Urwald der Blenderform unter allen Formen des Wirtschaftswalds am nächsten stehe und zwar nicht zuletzt eben wegen seiner Vieltätigkeit, die wir auch für den Blenderwald in Anspruch nehmen möchten. Auch er kann Bilder erzeugen, die dem Schlagwald ähnlich sind; vgl. z. B. Wesselys „Fichtenplänterwald des Gebirges“.

Verf. kennt den Urwald nicht aus eigener Anschauung, aber er kann sich auf eine Autorität berufen, die den Urwald unter den verschiedensten Himmelsstrichen kennen gelernt hat und die auch C. anerkennen wird, da er sie aus anderem Anlaß anruft. Es ist Mayr, der in seinem Waldbau (S. 252) fast noch weiter geht als Verf., wenn er sagt: „Sinkt endlich die Einheit der Flächengröße und -behandlung bis zum Trupp und Einzelindividuum, dann hat der Wald äußerlich den Charakter des Urwalds angenommen; er wird Plenter- oder Femelwald genannt.“

2) Wenn hier die sonst nicht übliche Schreibweise „Blender“-wald gewählt

Im Gegensatz dazu äußert sich das ökonomische Prinzip in den Forderungen höchster wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit des Betriebs, also in rationaler Betriebsführung, entsprechender zeitlicher Verteilung der Erträge aus dem Wald (Nachhaltigkeit), höchster Verzinsung des Produktionskapitals (Wirtschaftlichkeit), größtem Gebrauchswert der Produkte u. a. Es bedient sich zu deren Erfüllung der räumlichen und der zeitlichen Ordnung, legt aber den Schwerpunkt auf die letztere, denn die zeitliche Ordnung in erster Linie hat die Ziele der Wirtschaftlichkeit und mehr noch der Nachhaltigkeit im Auge, als die vornehmsten Äußerungen des ökonomischen Prinzips. In seinen Anforderungen an die räumliche Ordnung gerät es mehrfach in Widerstreit mit dem natürlichen Prinzip. Daß den Forderungen der Natur als wichtigsten Produktionsfaktors aufs beste entsprochen werde, muß es zwar voraussetzen, aber es fördert sie nicht von sich aus, ist eher versucht, sie unterzuordnen, denn seine Tendenzen gehen nach anderer Richtung. Die Ziele des ökonomischen Prinzips bedingen — in dieser einseitigen Durchführung — Gebundenheit des Betriebs und führen zu Gleichaltrigkeit der Bestockung. Sein Ideal ist der gleichaltrige Hochwald.

Die Gegensätze nun, welche die Folgen dieser abweichenden Tendenzen des natürlichen und des ökonomischen Prinzips sind, werden im Forstbetrieb auf demjenigen Gebiet hervortreten, auf dem beide Prinzipien nebeneinander sich geltend machen, d. h. auf dem Gebiet der räumlichen Ordnung, hier wird auch der Ort sein für Anbahnung eines Ausgleichs.

Ein solcher Ausgleich hat jedoch nicht in vollem Maße stattgefunden.

Betrachten wir den eigentlichen Ertragswald, in dem das ökonomische Prinzip seine Forderungen mit größtem Nachdruck betont, so liegt gerade hier die Gefahr besonders nahe, daß der Schematismus der Ertragsregelung in der räumlichen Ordnung das Uebergewicht erlangt und in ihr die Berücksichtigung der natürlichen Bedingungen zurückdrängt bzw. sie unterordnet.

Dieser Fall ist in der Tat eingetreten. — Von jeher hat in der Forsteinrichtung die Ertragsregelung und die von ihr abhängige zeitliche Ordnung eine bevorzugte Stellung eingenommen und einen bestimmenden Einfluß auch auf die räumliche Ordnung geübt, — einmal, weil die Ertragsregelung und damit die zeitliche Ordnung ein Gebiet ist, in dem die Forsteinrichtung — auf vorwiegend ökonomischen Grundlagen fußend — selbständig, d. h. von der Produktionslehre unabhängig, vorgehen kann und dann, weil es ja zuerst die Ertragsregelung war, die

wird, so folgen wir damit J a c. G r i m m s deutschem Wörterbuch, welches das Wort vom Substantiv „Blender“ = blendender, lichtraubender, beschattender Baum ableitet.

Der Blenderbetrieb würde also seinen Namen von dem ihm charakteristischen Herausnehmen starkbekronter, daher lichtraubender, verdämmender Stämme herleiten. Diese Schreibweise scheint zudem die ältere zu sein. Die spätere Herleitung von plantare, welche die Schreibweise „Plänterwald“ begründen soll, erinnert zu sehr an die bekannte Ableitung: *lucus a non lucendo*, während die übliche: „Plenterwald“ (die von den forstlichen Versuchsanstalten angenommene offizielle Schreibung) einer ausreichenden Erklärung überhaupt zu entbehren scheint. Keine der beiden Schreibungen hat sich bis heute in unserer Literatur der andern gegenüber vollkommen durchzusetzen vermocht, noch immer werden beide neben einander gebraucht. Vielleicht gelingt dies mit der Zeit der hier angewendeten Schreibung.

Was die Bezeichnung dieser Betriebsform als solche betrifft, so möchten wir die zweifellos deutsche Benennung „Blenderwald“ der meist synonym gebrauchten: „Femelwald“ vorziehen.

ein Bedürfnis nach bestimmter Raumordnung im Wald erzeugte. So wurde es ihr nicht schwer, in der Forsteinrichtungslehre den Ton anzugeben und selbst für die räumliche Ordnung Gesetze vorzuschreiben, sodaß diese ihr in ausgedehnter Weise dienstbar wurde. Es standen sich also seit lange und bis daher die konkurrierenden Aufgaben der räumlichen und zeitlichen Ordnung nicht unabhängig und gleichwertig gegenüber, sondern das ökonomische Prinzip, wie es in der zeitlichen Ordnung verkörpert ist, hat auch auf den räumlichen Aufbau des Waldes einen überwiegenden Einfluß gewonnen, so daß die Forderungen des natürlichen Prinzips zurückgestellt wurden und nicht zu ihrem Recht kamen¹⁾.

Das tatsächliche Verhältnis von räumlicher und zeitlicher Ordnung in unserer Forsteinrichtungslehre wird vielleicht durch nichts so gut beleuchtet, wie durch den „Normalzustand des Waldes“, den sie lehrt.

Betrachten wir den genau, so erweist er sich als ein Normalzustand nur der zeitlichen Ordnung, er wird durch nichts weiter gekennzeichnet als durch normalen Vorrat, normalen Zuwachs und normales Altersklassenverhältnis, und wenn auch der räumlichen Ordnung in der normalen Lagerung der Altersklassen ein bescheidenes Plätzchen eingeräumt ist, so erscheint sie doch hier lediglich als zum Dienst der zeitlichen Ordnung beigezogen. Wir haben somit ein ausschließlich aus dem ökonomischen Prinzip herausgewachsenes Betriebsideal lediglich der zeitlichen Ordnung vor uns, geeignet, beim Lernenden — für den es geschaffen — das Bewußtsein von der entscheidenden Bedeutung des natürlichen Prinzips und damit der räumlichen Ordnung im Wald zu verdrängen. Man sollte so etwas nicht den „Normalzustand des Waldes“ oder schlechthin „Normalwald“ nennen. Denn was ist hier normal? Doch nur die Grundlagen der zeitlichen Ordnung. Der wahre Normalzustand des Waldes sieht ganz anders aus:

Er ist in erster Linie bedingt durch eine normale räumliche Ordnung, die sich gleicherweise auf produktions- wie auf betriebstechnischen Forderungen aufbaut, die demgemäß die beste Wahl der Verjüngungsart des Waldes, die möglichste Sicherung vor Gefahren und die rationellste Ernte und Beförderung der Produkte in sich schließt, nicht weniger als den höchsten ökonomischen Wert dieser letzteren, die Möglichkeit rentabelster Wirtschaft und eine leichte sichere Ertragsregelung und Betriebsführung.

Erst in zweiter Linie sind für den wahren Normalzustand des Waldes bezeichnend die Momente der zeitlichen Ordnung, die heute übermäßig betont wer-

1) Wie sehr dies auch heute noch den herrschenden Anschauungen entspricht, zeigt vielleicht nichts klarer, als der mehrfach gegen den Titel dieses Buchs gerichtete Einwand, „man habe nach demselben die Behandlung von Forsteinrichtungsfragen in dem Buch erwartet und finde dort zu seinem Erstaunen insbesondere waldbauliche und andere Gegenstände erörtert“. Das zeigt doch klar, daß man die Grundlagen der räumlichen Ordnung keineswegs im Waldbau und auf sonstigen Gebieten der Produktionslehre suchte, sondern ausschließlich auf dem Gebiet der Ertragsregelung und das — nota bene! — selbst, nachdem man das Buch gelesen hatte! — Oder vielleicht, weil man es nicht gelesen hatte, als man die Kritik abgab?

den: der normale Vorrat, der normale Zuwachs, das normale Altersklassenverhältnis, denn sie können einem Wald nur dann das Gepräge des Normalzustands geben, wenn die erstgenannten Voraussetzungen in vollem Maße erfüllt sind (vgl. auch Nossek, Weißkirchener forstl. Blätter 1. Heft 1902, S. 117).

Einseitiger Einfluß der zeitlichen Ordnung auf den räumlichen Aufbau des Waldes ist nun aber von größtem wirtschaftlichen Nachteil und muß verhütet werden. Nur wenn die räumliche Ordnung selbständig geregelt wird, ist es möglich, auf diesem Gebiete die Forderungen des natürlichen und des ökonomischen Prinzips ihrer wahren Bedeutung entsprechend zu berücksichtigen und Gegensätze auszugleichen.

Dann erst erlangt die räumliche Ordnung diejenige durchgreifende Bedeutung, die ihr schon der oben wiedergegebene Ausspruch Cottas zuweist, die sie aber bis heute im Forstbetrieb nicht allgemein hat erlangen können.

Wem fällt nun aber die Aufgabe zu, die Gegensätze auszugleichen, die sich in der räumlichen Ordnung geltend machen? Es ist dies ohne Zweifel die Forsteinrichtung, denn ihre Gesamtaufgabe lautet: Die räumliche und zeitliche Ordnung des Betriebs herzustellen (Judeich, Forsteinrichtung 6. A. S. 5). Sie hat also auch für jedes der sich gegenüberstehenden Prinzipien den Einfluß auf die räumliche Ordnung abzugrenzen und sicherzustellen.

Während die Forsteinrichtung auf forststatistischer Grundlage ohne weiteres über die zeitliche Ordnung selbständig entscheidet, da diese unter dem fast ausschließlichen Einfluß des ökonomischen Prinzips steht, kommt ihr ein gleich ausschließliches Verfügungsrecht über die räumliche Ordnung nicht zu, denn auf deren Gebiet begegnen sich, wie gezeigt wurde, die Ansprüche des natürlichen und ökonomischen Prinzips und damit entscheidende Forderungen fast aller forstlichen Wissensgebiete. Hier treten Waldbau, Forstschutz und Forstbenutzung in Wettbewerb, sowohl unter sich, als mit wichtigen Zielen aus den Gebieten der Betriebslehre. Hier also hat die Forsteinrichtung nicht wie dort lediglich nach eigenen ökonomischen Gesichtspunkten Bestimmungen zu treffen, sondern hier ist ihre Aufgabe, die ihr entgegengebrachten vielseitigen Forderungen und Bedürfnisse festzustellen, gegen einander abzuwägen und sich Widerstreitendes zu versöhnen. Das Ergebnis dieser schwierigen Arbeit ist dann eine räumliche Ordnung im Walde, in der sich das natürliche und ökonomische Prinzip nicht gegenseitig beeinträchtigen, sondern sich einträchtig die Hände reichen zu höchstem Gesamterfolg der Wirtschaft.

Gerade die Forderungen des natürlichen Prinzips, nicht diejenigen des ökonomischen sollten in erster Linie die räumliche Ordnung im Wald bestimmen, die letzteren dürfen immer erst in zweiter Reihe, d. h. nur soweit Berücksichtigung finden und auf die ersteren abändernd einwirken, als dies ohne deren wesentliche Benachteiligung möglich ist. Wir möchten daher hier schon den Satz aufstellen:

Die rein ökonomischen Gesichtspunkte dürfen beim Aufbau der räumlichen Ordnung im Walde immer nur im

Rahmen und unter Wahrung der natürlichen, produktiven Forderungen berücksichtigt werden.

Eine unparteiische Würdigung aller Ansprüche an die räumliche Ordnung für deren Aufbau ist unseres Erachtens die wichtigste Aufgabe der Forsteinrichtung. Hier ist recht eigentlich der Ort, wo die zahlreichen, aus verschiedenen forstlichen Wissensgebieten stammenden Forderungen überblickt, sachlich gewürdigt und zusammengefaßt werden können. Denn die Entscheidung über den gesamten Aufbau der räumlichen Ordnung, und zwar von der Stellung der einzelnen Individuen zueinander aufwärts bis zur normalen Betriebsklasse, ist nicht Sache eines einzelnen Wissensgebiets, sondern eines planmäßigen Zusammenwirkens aller. Dieser ersten für sich zu lösenden Aufgabe steht dann eine zweite gegenüber, deren Lösung der Forsteinrichtung allein und selbständig zusteht: die Ertragsregelung. Sie hat nicht die ihr zugewiesene, ausschlaggebende Bedeutung, wir möchten vielmehr im Gegensatz zur herrschenden Uebung fordern: Die zeitliche Regelung des Betriebs ist der räumlichen nachzuordnen; diese hat ihr als selbständige Aufgabe voranzugehen und sich vorwiegend auf das natürliche Prinzip aufzubauen, sie hat vor allem sämtlichen berechtigten Forderungen von Waldbau, Forstschutz und Forstbenutzung Rechnung zu tragen, dabei freilich auch einen Weg zu suchen, auf dem gleichzeitig eine entsprechende Ordnung des Betriebs im Sinne des ökonomischen Prinzips möglich ist.

Nun findet heute allerdings das natürliche Prinzip in der Einrichtungspraxis, wenn auch nicht die ihm gebührende, so doch eine wesentlich weitergehende Berücksichtigung, als dies früher allgemein der Fall war; doch zeigen Praxis wie Literatur, daß dieser Einfluß auch heute noch ungenügend ist (vgl. z. B. Englers Referat auf der Vers. des Schweiz. Forstvereins zu Stans 1900 über: „Wirtschaftsprinzipien für die natürliche Verjüngung der Waldungen“). Er muß ungenügend sein, weil das natürliche Prinzip sich nur innerhalb desjenigen Rahmens frei bewegen kann, den das ökonomische für die räumliche Ordnung geschaffen hat; denn noch baut die Forsteinrichtung ihr Ideal der räumlichen Ordnung nicht vorwiegend auf den Forderungen des natürlichen Prinzips auf.

Wenn z. B. v. Guttenberg neuestens (Forstbetriebseinrichtung 1903, S. 9) feststellt, daß die heutige Betriebseinrichtung ihr Hauptaugenmerk auf die Nutzungsordnung im Walde lege und die Nutzungsgröße aus den gegebenen Verhältnissen der einzelnen Bestände ableite, daß die Sicherung der Nachhaltigkeit mehr auf der Herstellung einer guten Bestandesordnung ruhe, so zeigt uns das einen bedeutenden Fortschritt in der Würdigung der räumlichen Ordnung, dabei aber auch, daß der Schwerpunkt noch immer auf seiten der zeitlichen Ordnung liegt. „Gute“ Bestandesordnung wird hergestellt in erster Linie im Sinne der Ertragsregelung!

Solange sich nicht beide Prinzipien mindestens ebenbürtig gegenüberstehen, können sie sich beim Aufbau der räumlichen Ordnung auch nicht so einigen und ineinander greifen, daß stets den wichtigsten Forderungen zuerst Rechnung getragen wird.

Was ist der geharnischte Protest Tichys („Forsteinrichtung in Eigen-

regie“ . . . 1884, wo Tichy die herrschenden Methoden verwirft und eine räumliche Ordnung auf natürlicher Grundlage vorschlägt, von der abhängig erst die Ertragsregelung erfolgen soll) und vieler Anderen gegen die Tätigkeit der „Forsteinrichtungsgilde“ anderes, als die in der wirtschaftenden Praxis, wenn auch z. T. unbekannt, sich regende Gegenwirkung des natürlichen Prinzips gegen die Verquickung von räumlicher und zeitlicher Ordnung mit Unterordnung der ersteren, — dagegen, daß mit der Festsetzung des nachhaltigen Nutzungssatzes gleichzeitig und von ihr abhängig die räumliche Ordnung im Wald festgenagelt wird (vgl. auch Engler l. c.). Gegen die Höhe des Nutzungssatzes, wenn er sich in wirtschaftlich vernünftigen Grenzen bewegt, wird wohl nie die Praxis sich aufgelehnt haben, ihre Festsetzung überläßt sie gerne der höheren Weisheit der „Gilde“; was sie dagegen empfindlich trifft und zu scharfen Äußerungen treibt, ist die Unterbindung der waldbaulich zweckmäßigen Tätigkeit durch Knebelung der Wirtschaft in räumlicher Beziehung im Interesse lediglich der Ertragsregelung.

Diese Gegenwirkung des natürlichen Prinzips wirft nun in rein waldbaulichem Eifer vielfach alle räumliche Ordnung über Bord und fordert „freie Wirtschaft“, gewiß nicht zum Besten des Ganzen, denn so würde das ökonomische Prinzip auch in seinen unerläßlichen Forderungen hintangesetzt; wir zweifeln auch nicht, daß sich die Urheber derartiger Forderungen gerne einer solchen räumlichen Ordnung fügen würden, die neben dem ökonomischen auch dem natürlichen Faktor seine volle Geltung sichert, weil sie die in zweckmäßiger Ordnung liegenden Vorteile nach der wirtschaftlichen Seite bald erkennen würden.

Im folgenden soll deshalb versucht werden, alle berechtigten Ansprüche an die räumliche Ordnung, wie sie sowohl dem natürlichen als auch dem ökonomischen Prinzip entspringen, festzustellen, um damit Grundlagen zu schaffen für einen Aufbau der Betriebsordnung, der alle Forderungen zweckmäßiger Wirtschaft, in erster Linie diejenigen der erzeugenden Kräfte im Wald, in zweiter diejenigen des Betriebs, in befriedigender Weise erfüllt.

Unsere Aufgabe beschränkt sich aber in dieser Schrift darauf, die verschiedenen forstlichen Wissenszweige: Waldbau, Forstschutz, Forstbenutzung, dann Betriebsführung, Forststatik und Ertragsregelung um diejenigen Forderungen zu befragen, die sie an die räumliche Ordnung zu stellen haben; die Art des Aufbaus selbst bleibt besonderen Ausführungen vorbehalten.

Voran stehen mit dem Anspruch auf Berücksichtigung ohne Zweifel die Gebiete der forstlichen Produktionslehre: Waldbau, Forstschutz und Forstbenutzung. Ihre Forderungen sind in erster Reihe zu berücksichtigen, soll anders unser Betrieb seinem letzten Ziel, höchster Wertserzeugung zugeführt werden. Erst in zweiter Linie folgen dann, gewissermaßen unter der Voraussetzung, daß die ersteren Forderungen in ihrer Erfüllung gesichert sind, die verschiedenen Zweige der Betriebslehre: Betriebsführung, Forststatik und Ertragsregelung mit ihren Ansprüchen an die räumliche Ordnung. In dieser Reihenfolge möchten wir zugleich den Grad der Einflußnahme zum Ausdruck bringen, der den einzelnen Gebieten der Forstwirtschaft am Aufbau der räumlichen Ordnung unseres Erachtens zukommt.

Aufgabe der Forsteinrichtung ist es dann, die Forderungen, die sich aus diesen Betrachtungen ergeben, zu sammeln, gegen einander abzuwägen und, wo sie in Gegensatz zu einander treten, soweit irgend möglich in Einklang zu bringen, um auf dieser Grundlage das Gebäude der räumlichen Ordnung im Wald in zweckmäßiger Weise zu errichten.

Betrachten wir diese Grundlagen, so ist klar, daß die Forderungen für die verschiedenen Holzarten bei deren so abweichendem Verhalten den äußeren Einflüssen gegenüber auseinandergehen bzw. verschiedenes Gewicht haben werden. Unterschiede werden sich ergeben für Laub- und Nadelhölzer, Licht- und Schattenhölzer, gefährdete und ungefährdete, Nutzholz und Brennholz liefernde Holzarten u.s.w. Dasselbe gilt, wenn auch in geringerem Grad, für verschiedene Standorte. Trotz dieser Verschiedenheiten betrachten wir es als eine wichtige Aufgabe, gemeinsame Betriebsformen, eine einheitliche räumliche Ordnung als Rahmen für den Betrieb zu finden, die für alle gleicherweise ein Optimum bildet. Wir tun dies auf die Gefahr hin, uns dem Vorwurf der Schablone auszusetzen, denn wir betrachten Einheitlichkeit nach dieser Richtung, also gleichartige räumliche Formen, als ein entscheidendes Wirtschaftsmoment für die auf großen unübersichtlichen Flächen arbeitende Forstwirtschaft¹⁾.

Einheitlichkeit in der räumlichen Anordnung, in großen Zügen wenigstens, für alle Standorte des reinen Ertragswalds, wie für alle Holzarten und Mischungen macht den ganzen Betrieb einfacher und klarer, was für die Schulung aller im Betrieb arbeitenden Personen von großer Bedeutung ist. Sie schließt — wenn ohne Schroffheit durchgeführt — überdies ein wichtiges Moment wirtschaftlicher Freiheit in sich, denn es kann bei Einheitlichkeit der räumlichen Ordnung ohne weiteres von einer Holzart oder Mischung zur andern übergegangen werden.

Diese Untersuchungen gehen zunächst von der Fichte aus, denn die bei dieser Holzart am schärfsten zutage tretenden Bedürfnisse und heute vorliegenden Mißstände haben in erster Linie den Anstoß zu den nachfolgenden Betrachtungen gegeben. In ihr haben wir die wirtschaftlich wichtigste und zugleich wertvollste, in Süddeutschland meistverbreitete Holzart vor uns. Die Fichte ist eine der waldbaulich empfindlichsten Holzarten, dabei meistgefährdet, sie ist diejenige Holzart, an der am größten gesündigt werden kann und tatsächlich gesündigt worden

1) Das Streben nach Einheitlichkeit im räumlichen Aufbau der Wirtschaft, nach einem einheitlichen räumlichen Rahmen, der zu allen Verhältnissen paßt, dabei jedem Raum läßt, seiner Eigenart Rechnung zu tragen, und das Suchen in Natur und Wirtschaft nach gemeinsamen Grundlagen für die wirtschaftliche Behandlung der Holzarten, Standorte u.s.f., hat uns, wie ja zu erwarten stand, von vielen Seiten den Vorwurf des „Generalisierens“ eingetragen. Verf. hat sich mit diesem Vorwurf in einem Aufsatz „Das Großflächenprinzip in der Forstwirtschaft“ (Forstw. Zentralbl. 1907 S. 636) und später bei Besprechung der Schrift von Wappes: „Studien über die Grundbegriffe und die Systematik der Forstwissenschaft“ (Naturwissensch. Zeitschr. für Land- und Forstwirtschaft 1909) kurz auseinandergesetzt und wird noch an anderem Ort Gelegenheit nehmen, näher auf diese grundsätzlich wichtige Frage einzugehen, denn es liegt nicht selten in der ausgedehnten, wahllosen Anwendung jenes Schlagworts in unserer Literatur eine vollkommene Verkennung der Aufgaben der Wissenschaft und damit eine Gefahr für die Weiterentwicklung unseres Fachs.

ist (vgl. z. B. J a n k o w s k y , die Begründung naturgemäßer Hochwaldbestände 3. A. S. 4 u. 28). Sie ist es, die in ihren natürlichen Existenzbedingungen, die in der natürlichen Fortpflanzung am schärfsten hervortreten, augenscheinlich den herrschenden Betriebssystemen am meisten widerstrebt. Und eben, wenn hier a l l g e m e i n g ü l t i g e Grundsätze abgeleitet werden sollen, tun wir am besten, die Fichte in Vordergrund zu stellen, denn auch die Allgemeingültigkeit ist dann am meisten gesichert, wenn wir von der empfindlichsten, d. h. von derjenigen Holzart ausgehen, deren Anforderungen am weitesten reichen. Gerade die Fichte scheint uns diejenige Holzart zu sein, welche die wirtschaftlichen Erfordernisse auch aller andern in sich vereinigt und am klarsten erkennen läßt; unter den von ihr geforderten räumlichen Bedingungen werden sich auch die andern Holzarten wohlbefinden. Mögen auch bei ihnen manche Momente weniger scharf hervortreten (z. B. Empfindlichkeit des Anflugs, Schädlichkeit der Pflanzung, Sturmgefahr, Aufbereitung langer Sortimenten u. a. m.) und weniger zwingend Berücksichtigung fordern, als bei der Fichte, so können die Unterschiede doch immer nur graduelle sein. Die entscheidenden Momente für Wachstum und Gedeihen, für Nutzung und Betriebsordnung sind überall dieselben (vgl. auch B o r g g r e v e auf der deutschen Forstversammlung zu Kassel 1890 Ber. S. 51) und ihr Uebersehen beim Aufbau der räumlichen Ordnung rächt sich überall, auch wenn der Nachteil nicht so unmittelbar und handgreiflich zutage tritt, wie gerade bei dieser Holzart.

1. Abschnitt.

Waldbau und räumliche Betriebsordnung.

Die Forderungen des Waldbaus an die räumliche Ordnung des Betriebs ergeben sich vorwiegend aus den Bedürfnissen der Verjüngung des Waldes, der anzuwendenden Verjüngungsart. Sie hat den ersten und wichtigsten Einfluß zu üben auf die Wahl der Betriebsart und Bestandesform und damit auf die räumliche Stellung der Baumindividuen, Gruppen und Bestände zu einander nach Maßgabe ihres Alters.

Zwei Arten von Verjüngung stehen sich hier gegenüber: Naturverjüngung und künstlicher Anbau, die beide heute im praktischen Betrieb in erheblichem Umfang Anwendung finden und zwar ziemlich getrennt nach Holzarten, die eigentlichen Schattenhölzer, Tanne und Buche, werden fast ausschließlich natürlich, die Fichte und die Lichthölzer fast ebenso ausschließlich künstlich verjüngt.

Wir wollen vorerst noch nicht untersuchen, ob diese verschiedene Behandlung der Holzarten — die in der gegenwärtig geltenden Wirtschaftsordnung viel für sich haben mag — die richtige ist, oder ob man sich bezüglich aller Holzarten für die eine oder andere Verjüngungsart zu entscheiden hat. Vielmehr möchten wir zuerst, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Fichte, für welche die Wahl der Verjüngungsart besonders wichtig und doch strittig ist, prüfen, ob entscheidende Gründe für die eine oder andere sprechen. Ist dies der Fall, so wäre ernstlich zu erwägen, ob nicht die den Vorzug verdienende Methode auch für alle anderen, nicht so empfindlichen Holzarten angenommen werden sollte. Denn das verhehlen wir jetzt schon nicht, geht auch aus früher Gesagtem hervor, es ist uns darum zu tun, eine gemeinsame Betriebsform, eine gemeinsame räumliche Ordnung für die Naturverjüngung aller Holzarten zu finden, auch wenn an sich für einzelne derselben mit gleichem speziell waldbaulichem Erfolg andere Wege beschritten werden könnten. Von der so gewählten Verjüngungsart hätten wir dann unsere Forderungen an die räumliche Ordnung des Betriebs abzuleiten.

Erste Aufgabe dieses Abschnitts wird also sein, unter den Verjüngungsarten Wahl zu treffen, zweite dann, diejenigen räumlichen Bedingungen zu suchen, die für die gewählte Verjüngungsart erforderlich bzw. die günstigsten sind. Auf Grund dieser Bedingungen können wir weiter die in der Forstwissenschaft gegebenen Be-

triebsformen prüfen, um endlich aus deren Reihe diejenige zu wählen und nach Bedarf umzuformen, die uns die geeignetste scheint zum Erreichen des gewählten Wirtschaftsziels. Dann werden wir in der Lage sein, aus der gewählten Betriebsform diejenigen Forderungen abzuleiten, die der Waldbau an die räumliche Ordnung des Betriebs zu stellen hat.

1. Kapitel.

Die Wahl der Verjüngungsart.

In alter Zeit, etwa bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, hatte im meist ungleichaltrigen Wald Naturverjüngung geherrscht, sie wurde noch von den Altmeistern der Forstwissenschaft gefordert und empfohlen. An ihre Stelle trat jedoch bald, schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts, je mehr in der Forstwirtschaft das natürliche Prinzip durch das ökonomische verdrängt wurde, je mehr die Wirtschaft zum gleichaltrigen Hochwald überging und je höhere Anforderungen an die Bestockung des Bodens gestellt wurden, der künstliche Anbau. Die bekannten Vorzüge der Kunstverjüngung traten um so schärfer hervor, diese wurde um so mehr wirtschaftliche Notwendigkeit, je allgemeiner sich der Forstbetrieb der Großflächenwirtschaft, d. h. einer gleichzeitigen Verjüngung großer Flächen und damit der Gleichaltrigkeit auf großer Fläche zuwandte, denn hier führte sie am raschesten und sichersten zum gesteckten Ziel. So sagt Heyer (Waldbau 4. A. S. 6), erst mit allgemeinem Eingang des schlagweisen Betriebs sei die künstliche Verjüngung herrschend geworden, da die natürliche Wiederverjüngung der Schläge sehr häufig nicht zum erwünschten Ziele geführt habe. Heute sei die künstliche Verjüngung nicht mehr auf Fälle beschränkt, wo die natürliche Verjüngung unmöglich, sondern sie habe eine unabhängige Stellung erlangt und im Lauf der Zeit an Bedeutung und Anwendung gewonnen.

Das Abgehen von der Naturverjüngung hatte also seinen guten Grund, sie gelang nicht mehr allgemein unter dem Hartig-Heyerschen Schlagsystem, das, dem Fachwerk angepaßt, auf großer Fläche gleichzeitig verjüngte, oder man wollte sich doch der Gefahr des Mißlingens nicht aussetzen. In der Tat hat sich dieser Weg gleichzeitiger Naturverjüngung auf großer Fläche — außer bei Buche und teilweise Tanne — als ungangbar erwiesen, auch wenn derselbe in neuerer Zeit wieder in Borggreve (Holzzucht 2. A. S. 211 und Bericht der Versammlung deutscher Forstmänner zu Kassel 1890) einen beredten Verteidiger gefunden hat. Borggreve empfiehlt am erstgenannten Ort nach G. L. Hartigs Vorgang die Naturverjüngung der Fichte im Schirmschlagbetrieb (Hartig-Heyerscher Femelschlagbetrieb) als unfehlbar sicherste. Hartig schließt selbst alle Orte mit „außerordentlich starker Sturmgefahr“ und damit unseres Erachtens sofort die meisten Fichtenstandorte wieder aus, denn es dürfte wenige so sehr geschützte Lagen geben, daß in ihnen im Schirmhieb gelichtete Fichtenbestände nicht „außerordentlich starker Sturmgefahr“ ausgesetzt wären, wenn auch vielleicht noch nicht bei erster Dunkelschlagstellung, so doch im weiteren Verlauf der Ver-

jüngung. B o r g g r e v e fragt: „Wer hat es etwa versucht ohne Erfolg?“ Er dürfte erschrecken, wenn sich alle bei ihm melden wollten, die im Wald auszuführen versuchten, was sie aus Lehrbüchern gelernt hatten, um die schon so oft gemachten üblen Erfahrungen wieder von neuem zu bestätigen, auch Verfasser zählt zu ihnen. Eine Dunkelschlagstellung mit Erfolg reicher Ansamung ist, geeigneten Boden und ein reiches Samenjahr vorausgesetzt, allerdings nicht schwer. Was aber dann? Nun erst beginnen die Schwierigkeiten, ein Kampf mit Lichtbedürfnis und Empfindlichkeit des Anflugs, Rücksichten auf den Etat, Sturm-, Fällungs- und Rückungsschäden u. a. m., aus dem der Wirtschaftler nur selten und unter günstigsten Verhältnissen als Sieger hervorgeht. Auf einem für Ansamung minder geeigneten Boden dagegen, der nur zu häufig ist, tritt Bodenverödung ein. Uebrigens stellt sich der Anflug im Dunkelschlag durchaus nicht überall in der vorausgesetzten Fülle ein, sonst wären unsere Fichtenalthölzer, die sich meist ohne unser Zutun mit Vollkommenheitsgraden von 0,7—0,8 selbst in Dunkelschlag gestellt haben, überall mit Anflug gesegnet, was nicht der Fall ist. Im einzelnen mag ja die Naturverjüngung der Fichte im Dunkelschlag manchmal Erfolg haben, im großen Betrieb ist sie jedoch viel zu unsicher und schwierig.

Aehnlich leicht scheint H e c k (Allg. F. u. J.Ztg. 1903 S. 79) die Naturverjüngung der Fichte zu nehmen. Es sei, sagt er, leicht, vom massenhaften Anflug derselben ausgiebigen Gebrauch zu machen. Die Naturverjüngung der Fichte setze nur voraus, daß man mit vorsichtigen Nachhieben tunlichst über die ganze Fläche hin nicht lange warte. Was sagen dazu Sturm und Nutzungssatz?

Im übrigen wurde und wird zumeist heute noch die Kunstverjüngung als unvermeidliches, zugleich aber einfachstes praktisches Verfahren betrachtet für Verjüngung größerer Flächen in kurzer Frist, wie sie der Wirtschaftsplan meist vorschreibt, jedenfalls für zahlreiche Holzarten wie Fichte, Kiefer, Eiche und ungünstigen Boden, während Buche und Tanne der Natur der Sache nach der Naturverjüngung verbleiben (vgl. z. B. Ber. der Vers. des sächs. Forstvereins zu Altenburg 1882; P ö p e l, Forstl. Zentralbl. 1882 S. 609; W e i s e, Mündener forstl. Hefte V 1894 S. 1 u. and.).

Insbesondere scheint fast allgemeine Uebereinstimmung zu herrschen über die Notwendigkeit der Kunstverjüngung der Fichte. So sagt F ü r s t (Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? S. 75), in reinen Fichtenbeständen müsse die Naturverjüngung wegen der mit der Lichtung wachsenden Sturmgefahr rasch vor sich gehen, an ihre Stelle habe auf trockenem Boden, in sturmexponierter Lage und bei hohem Nutzholzausbringen (also unter gewöhnlichen Verhältnissen wohl immer!) Kahlhieb mit Kunstverjüngung zu treten.

Ebenso stellt M a r t i n (Folgerichtungen der Bodenreinertragslehre (Band V S. 136) bezüglich der Fichte die übereinstimmenden Anschauungen der deutschen Staatsforstverwaltungen fest, daß diese Holzart künstlich verjüngt werden müsse, so für Preußen, Bayern, Baden, Württemberg, Sachsen.

So führen z. B. die württembergischen Wirtschaftsregeln von 1864 aus: „Die Samenschlagstellung mit rein natürlicher Verjüngung hat sich wegen der langen Dauer und Unsicherheit der Wiederbestockung der Schlagflächen und wegen der Gefahren, welchen die Samen- und Lichtschläge durch Sturmwind ausgesetzt sind,

in den meisten Fällen als unzweckmäßig gezeigt, wie denn diese Art der Verjüngung als die hauptsächlichste Ursache der so häufig eintretenden Bodenverschlechterung anzusehen ist“.

Dieselbe Uebereinstimmung herrsche, sagt Martin, mit wenigen Ausnahmen in der Literatur, und er selbst kommt (a. a. O. S. 140) auf Grund der Uebereinstimmung von Literatur und Praxis zu dem Ergebnis, daß das Bestreben, der natürlichen Verjüngung der Fichte mehr Geltung zu verschaffen, nicht genügend begründet sei.

Auch Stötzer bezeichnet neuestens in der Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens der Forstlehranstalt Eisenach S. 60 den Kahlschlag der Fichte als Bestes gegen den Sturm.

In der Tat entsprechen auch diese Anschauungen den durch die heutige räumliche Ordnung im Wald gegebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen, d. h. dem heutigen Waldzustand und der herrschenden Betriebsordnung durchaus.

Das typische Produkt dieser Entwicklungsphase, der „taxatorischen Einwirkung auf den Wald“ (Lorey, Waldbau im Handbuch der Forstwissenschaft I, S. 445) sind in Süddeutschland die „reine Fichtenkultur“, in Norddeutschland die „reine Kiefern-schonung“. Daß aber in diesen bezeichnenden Erscheinungen der heutigen Wirtschaft der Flächenplan, „welcher seit einem Jahrhundert die Forsteinrichtung des Hochwalds beherrscht, befriedigende Waldzustände geschaffen“ habe (siehe Zeitschr. f. Forst und Jagdwesen 1896 S. 237), darin möchten wir Dankelmann nicht zustimmen. Wie ungünstig diese sich unter an sich schon schwierigen waldbaulichen Verhältnissen gestalten können, dafür bietet ein Vergleich der nachfolgenden vier Abbildungen (Fig. 1—4) ein drastisches Beispiel. (Wir werden später aus anderem Anlaß nochmals auf dieselben zurückkommen.)

Die Bilder zeigen in den Althölzern den herrlichen, geraden Wuchs der Schwarzwaldkiefer selbst auf dem geringen sog. „Klebsand“¹⁾ und unmittelbar daneben (in der nächstanstoßenden Abteilung und auf gleichem Standort), aus Schirm- und Kahlschlag hervorgegangen, künstliche Kiefern-jungbestände von kläglichstem Zustand in bezug auf Boden wie auf Bestockung. Dieser Zustand ist teils der Bodenverdichtung bei Schirm- und Kahlschlag, teils wohl auch der ungeeigneten Samenherkunft zuzuschreiben.

Siehe Fig. 1—4 Seite 16 u. 17.

Zwar hat nun im Verlauf der letzten Jahrzehnte ein wesentlicher Umschwung der Anschauungen zugunsten der natürlichen Verjüngung stattgefunden (neueste Äußerungen: Jankowsky, Begründung naturgemäßer Hochwaldbestände 3. A. 1904, Mayr, Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage 1909) — ein hohes Verdienst insbesondere Gayers, der einen in vielen Fällen gangbaren Weg gezeigt hat —, praktisch und tatsächlich aber überwiegt heute noch, wie schon aus dem Vorstehenden hervorgeht, die künstliche Verjüngung, und das hat seinen

1) Klebsand, nach neueren Untersuchungen aus Al₂O₃ bestehend, soll aus Ton durch Desoxydation entstanden sein. Er findet sich auf ausgedehnten Flächen des württ. Schwarzwalds. (Die Abbildungen stammen aus dem Forstbezirk Hirsau, Distrikt Weckenhardt.)

guten Grund, denn sobald wir die heute herrschende räumliche Betriebsordnung als gegeben voraussetzen, ist Naturverjüngung nur bei gewissen Holzarten, beson-

Altholz.

Fig. 1.

Fig. 2.

Auftrieb für Blendersaumverjüngung

alter Schirmschlag

n. b.! Die geradschäftigen Bäume sind sämtlich Kiefern, nicht etwa Fichten, wie namentlich beim ersten Bild aus der Form von Schaft und Krone geschlossen werden möchte. (Vgl. in dieser Hinsicht Kienitz, Zeitschr. f. F. u. Jagdwesen 1911 Heft 1).

ders Tanne und Buche, und unter günstigen Verhältnissen möglich, und muß bezüglich der Fichte den oben angezogenen Ausführungen Martins vollkommen beigetreten werden. Geändert haben sich wohl die Anschauungen eines großen Teils der forstlichen Welt, der jetzt Naturverjüngung wünscht¹⁾, nicht aber die räumlichen Grundlagen des Betriebs, die über die Verwirklichung dieses Wunsches entscheiden und die nur langsam dem neuen waldbaulichen Bedürfnis folgen. So erklärt es sich von selbst, daß die Aenderung der Anschauungen bis heute im großen wenig praktische Folge gehabt hat, eine Ausnahme macht Bayern, wovon später die Rede sein soll.

Besonders wird die Fichte, die uns hier in erster Linie interessiert, nach wie vor, und trotz der angeblich so einfachen Naturverjüngung, fast ausschließlich künstlich angebaut. Es geht nicht anders, und es gilt bei der Mehrzahl der Praktiker der in den Tatsachen begründete Satz: daß sich die Fichte im großen Wirtschaftsbetrieb unter den meisten Verhältnissen nicht natürlich verjüngen lasse. In der Tat führen die immer

1) Nach Graner allerdings ist das Eintreten für Naturverjüngung nur „Modesache“ (siehe Verhandlungen des deutschen Forstvereins zu Heidelberg, Ber. S. 59)

wieder angestellten Versuche auf der Grundlage der heutigen räumlichen und zeitlichen Wirtschaftsordnung immer wieder zu großen Mißerfolgen: Sturmblößen,

Künstliche Kiefernjungbestände.

Fig. 3.

Fig. 4.

Die Bilder stammen aus dem Jungwuchs, der sich an das Altholz auf Fig. 2 nach rechts unmittelbar anschließt. Der Bestand zeigt den im Bild festgehaltenen Zustand auf ausgedehnten Flächen.

verrasten Lichtschlägen, durch Räumung schwer beschädigten Jungwüchsen, ein Erfolg, wie ihn die zitierten württembergischen Wirtschaftsregeln von 1864 auf Grund vielfacher praktischer Erfahrungen schildern.

Daß dies so sein muß, ist für jeden Kenner der Fichtenwirtschaft begreiflich, ja selbstverständlich, denn:

1. erträgt — besonders günstige Verhältnisse ausgenommen — das mehr oder weniger gleichaltrige Fichtenaltholz wegen Sturmgefahr den Hartig-Heyerschen Schirmhieb („Femelschlagbetrieb“) nicht, jedenfalls nicht in allen seinen Phasen. Dasselbe gilt in sehr vielen Fällen auch von den ungleichförmigen Lichtungen, den Löcher- und Ränderhieben des Blenderschlags, besonders da, wo diese Hiebe über große Flächen, ganze Bestände und Abteilungen gleichzeitig hingeführt werden, wie dies durch die herrschenden Einrichtungsverfahren in Hinblick auf die Ertragsbestimmung bedingt bzw. nahegelegt ist;

2. ist der Fichtenanflug zu empfindlich, einmal gegen langandauernde Beschattung, wie sie die Etatswirtschaft notwendig mit sich bringt infolge außerordentlicher Holzanfälle, die gerade im Fichtenwald fast regelmäßig wiederkehren oder infolge großer Altholzvorräte, die waldbauliche Hindernisse bilden, dann aber gegen Schlagbeschädigungen, die beim Ausformen langer Nutzhölzer (das bei der Fichte die Regel bildet) über große Flächen hin unvermeid-

lich sind oder selbst mit großen Kosten nur teilweise vermieden werden können;

3. tritt auf vielen Fichtenstandorten alsbald die der Fichte so lästige *Verrasung* und *Verunkrautung* ein, verursacht durch Einzelwindfälle, durch Mißgriffe in der Lichtstellung, die sehr leicht vorkommen, oder durch Ausbleiben entsprechend reichlicher Besamung. Sie und die ihr folgende Bodenverschlechterung kann nur durch raschen Kahlabtrieb mit nachfolgendem künstlichem Anbau aufgehalten werden.

Die Aufgabe, der sich der praktische Betrieb bei heutiger Wirtschaftsordnung gegenübergestellt sieht, eine mehr oder weniger gleichaltrige Fläche von 10—25 ha, einen „Bestand“, eine Abteilung, in einer Periode, d. h. einen Zeitraum von 20 Jahren natürlich zu verjüngen, ist nur unter besonders günstigen Umständen lösbar; neben einem nach Boden und Lage zu natürlicher Ansamung besonders geeigneten Standort sind zu gutem Erfolg überdies Bodenreinheit, Holzartenmischung und geeignetes Bestandesalter erforderlich. Versuche, Naturverjüngung auf großer Fläche gleichzeitig durchzuführen, führen daher in der Regel zu Mißerfolgen, und damit zu *Kunstverjüngung* unter erschwerten Umständen wegen Bodenverwilderung, Unordnung u. dergl.

Was aber der praktische Betrieb in erster Linie braucht, ist *Sicherheit* des Erfolgs und Schutz vor den Folgen immer wieder vorkommender Mißgriffe.

Sehen wir die Literatur genau durch, so finden wir, daß die Waldbaulehrer bis zu Gayer überhaupt keine Naturverjüngungsmethode allgemein (für alle Holzarten und äußeren Verhältnisse) zu empfehlen vermögen, daß die Einschränkungen, die sie machen müssen, den praktischen Wert der Methoden wieder aufheben: Schirmschlag war nur für sturm feste Schattenhölzer geeignet, Kahlschlag und Saumschlag lieferten keine oder unsichere Naturbesamung, blenderartige Hiebe paßten nicht in die Schablone oder zerstörten wieder, was sie vorher erzeugt hatten. Insbesondere treffen die Einschränkungen die meisten Fichtenstandorte, sodaß aus ihnen mittelbar der Satz abgeleitet werden kann:

Auf den meisten Standorten ist nach den empfohlenen Methoden Naturverjüngung der Fichte im großen ausgeschlossen.

Wer diesem Ziele zustrebt, muß *neue Voraussetzungen* schaffen! Das hat Gayer getan. Er ist von der gleichförmigen (d. h. gleichzeitig auf großer zusammenhängender Fläche arbeitenden) Verjüngung zur ungleichförmigen, vom gleichaltrigen Hochwald zum gruppen- und horstweise verjüngenden Blenderschlagbetrieb übergegangen, der wirtschaftlich zwischen dem gleichaltrigen Hochwald und dem Blenderwald steht. Er hat der vor ihm allein herrschenden gleichzeitigen Verjüngung auf großer Fläche den Rücken gekehrt. Und doch ist auch die von Gayer empfohlene Betriebsform nicht allgemein anwendbar, wie später gezeigt werden soll. Auch hier wieder ist die Fichte diejenige Holzart, die am ersten zu Bedenken Anlaß gibt, ganz besonders beim Uebergang aus dem herrschenden gleichaltrigen Hochwald zum Blender Schlag. Bei ihr wird Gayers Betriebsform nur beschränkte Anwendung finden können und gegebenenfalls andere Hiebsformen zu Hilfe nehmen müssen (vgl.

auch Esslinger Bericht der deutschen Forstvers. zu Regensburg 1901). Dieselbe hat denn auch bei dieser Holzart außerhalb Bayerns kaum Fuß fassen können.

So liegen heute die Verhältnisse für Naturverjüngung der Fichte anscheinend nicht günstig. Dasselbe gilt, wenn auch teilweise aus anderen Gründen, für die andere verbreitetste Holzart, die Kiefer¹⁾. Sollen wir nun auf die Naturverjüngung verzichten, weil sie unter der Herrschaft der heute bestehenden Wirtschaftsordnung gar zu sehr erschwert wird? Oder sind vielleicht die Nachteile bei der fast allgemein geübten künstlichen Verjüngung so bedeutend und die Vorzüge der Naturverjüngung so groß, daß sie die Rückkehr zur letzteren entschieden empfehlen, selbst wenn zu dem Ende wesentliche Änderungen in der ganzen räumlichen Wirtschaftsordnung nötig würden?

Diese Fragen haben den Verfasser schon durch längere Zeit beschäftigt, den Ausgangspunkt für eingehende Studien und Versuche im Wald gebildet und ihn zu der hier darzulegenden Ansicht und den weiterhin zu machenden Vorschlägen geführt. Sie führten ihn längst, im praktischen Betrieb, in täglicher Berührung also mit allen einwirkenden Momenten (nicht nur den waldbaulichen) zu der Erkenntnis:

Es muß eine Wirtschaftsform geben, beider Naturverjüngung — auch unter schwierigsten Verhältnissen und gleichmäßig bei allen Holzarten, in erster Linie aber bei der Fichte — mit der überhaupt möglichen Sicherheit des Erfolgs erzielt wird, und zwar unter voller Berücksichtigung aller anderen, wirtschaftlich maßgebenden Forderungen. Nach ihr wollen wir suchen.

Den Schlüssel zur Lösung dieser Aufgabe bildet die räumliche Ordnung im Wald; sie muß eingehender Untersuchung unterworfen werden. Ist die für Naturverjüngung zweckmäßigste Raumordnung im Walde gefunden,

1) Gute Belege für die vorstehenden Ausführungen liefert Guse unter dem Titel „Wiederkehrende Strömungen“ im Forstwiss. Zentralbl. 1909 S. 455. G. unterstützt uns dort — ungewollt — in dem Nachweis, daß unter bisherigen Verhältnissen und nach den bisher empfohlenen Methoden die Naturverjüngung wenig Aussicht auf allgemeinen Erfolg hat.

Wenn er aber den heutigen süddeutschen Anhängern der Naturverjüngung Lessings Worte aus Emilia Galotti zuruft:

„Laßt uns da nicht weise sein,
wo wir nichts als glücklich waren!“

um damit den Erfolg der Naturverjüngung ganz auf die günstigeren süddeutschen Standortverhältnisse zu beschränken, so müssen wir dem widersprechen. Man weiß ja noch gar nicht, was der wahre Grund der Mißerfolge der Naturverjüngung im Norden — aber ebenso im Süden — ist, ob sie tatsächlich der Ungunst des Standorts zuzuschreiben sind, wie Guse ohne weiteres unterstellt, oder aber dem herrschenden Wirtschaftssystem. Wir möchten das letztere vermuten, denn einmal waren auch in früherer Zeit die heutigen norddeutschen Waldflächen nicht Steppe, sondern Wald, der sich selbst verjüngte und dann ist ja heute im Norden der Großschlag dem wir den Mißerfolg in erster Linie zuschreiben möchten, ganz besonders in Blüte. Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß es sich für uns nicht darum handelt, volle Naturverjüngung zu erzwingen, wir wollen der Natur ja nur dauernd günstigste Gelegenheit bieten, den Wald zu verjüngen. Versagt sie selbst dann, so ist niemand mit künstlicher Hilfe schneller bei der Hand, als unser Verfahren mit seinem grundsätzlich kurzen Verjüngungszeitraum. Solche günstige Gelegenheit hat man aber der Natur bis jetzt im Großschlag entschieden nicht geboten, weder im Norden, noch im Süden. Folglich handelt es sich nicht um eine Wiederkehr alter, längst überwundener Strömungen, wenn hier grundsätzliche Naturverjüngung empfohlen wird.

so wird deren Durchführung die entscheidende Forderung darstellen, die der Waldbau an die Forsteinrichtung zu stellen hat.

Ehe wir nun der Lösung dieser Aufgabe selbst näher treten, soll zunächst versucht werden: die Vorzüge der Naturverjüngung und die Schäden, die der künstliche Anbau mit sich bringt, nachzuweisen, jedoch, ohne daß diese Betrachtungen Anspruch machen, den Gegenstand zu erschöpfen, der schon vielfach behandelt worden ist; sie beschränken sich vielmehr auf einige, dem Verfasser, besonders erheblich erscheinende Punkte, die mitunter nicht die gebührende Beachtung finden¹⁾. Besonders aber soll durch diese Besprechung die ganz besondere Bedeutung dargetan und begründet werden, die der Verfasser der Naturverjüngung im allgemeinen und derjenigen der Fichte im besonderen beilegt. Gerade bei dieser letzteren Holzart hat Verf. die Naturwidrigkeit der üblichen Pflanzung im großen Wirtschaftsbetrieb seit dem ersten Tag seiner praktischen Tätigkeit schwer empfunden. Nie hatte er so viel Grund zur Unzufriedenheit mit dem, was unter seiner Leitung geschah, als eben zur Zeit der Kulturarbeiten. Wer die Eigenart der Fichte kennt, die Zartheit und hohe Luftbedürftigkeit ihrer Wurzeln, wer sie nicht, wie dies leider häufig geschieht, für ein robustes Gewächs hält, das unkrautgleich fröhlich weiterwächst, mag es noch so schlecht behandelt worden sein, wer dabei als Gartenfreund selbst schon vielerlei Gewächse gepflanzt und gepflegt hat und daher deren Bedürfnisse kennt, der muß sich von dieser Beleidigung der Natur — der Fichtenpflanzung im großen Betrieb — mit Bedauern abwenden. H. R e u ß spricht in seiner Schrift „Ueber die nachteiligen Einflüsse naturwidrig mißhandelnder Pflanzmethoden auf die Bestandeszukunft mit spezieller Bezugnahme auf die Fichte“ mit Recht von „barbarischer Mißhandlung der Wurzeln“ durch manche Pflanzverfahren. Wir möchten dieses Urteil, wenn auch gemildert, auf alle Pflanzmethoden der Fichte im großen Betrieb ausdehnen und werden den Nachweis später erbringen.

Und doch, wie soll sich der Wirtschaftler anders helfen, auch wenn er den Schaden erkennt? 20 oft 30 ha Kahlflächen müssen alljährlich in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit mit ungenügenden Arbeitskräften bewältigt werden, mag nun der Boden naß oder trocken, mag er fest, verhärtet, verrast oder durchwurzelt sein. Aufenthalt darf nicht entstehen, es gilt vielmehr, rasch vorwärts zu kommen, damit man mit der Arbeit überhaupt zu Ende gelangt. Unter solchen Verhältnissen darf man füglich fragen: Treiben wir darum die eingehendsten waldbaulichen Studien und fertigen die schönsten Wirtschaftspläne, um schließlich nicht viel mehr zu erreichen als flächenweisen Abtrieb des Altholzes und Wiederanpflanzung unserer wichtigsten Holzart auf der Kahlfläche unter so ungünstigen Umständen, einen Wirtschaftserfolg, den jeder Waldhüter erreichen kann? (Vgl. auch J a n k o w s k y, Die Begründung naturgemäßer Hochwaldbestände S. 6.)

1) Erst nach Abfassung dieses Abschnittes zeigte sich, wie sehr einer dieser Punkte zur Zeit in den Vordergrund des Interesses zu treten beginnt, da sich die Frage der Samenherkunft fast gleichzeitig auf den Tagesordnungen der VII. Hauptversammlung des deutschen Forstvereins 1906, der V. Versammlung des Internat. Verbands forstlicher Versuchsanstalten 1906 und des VIII. Internat. landw. Kongresses zu Wien 1907 findet. Seit 1906 hat sich dieses Interesse von Jahr zu Jahr vertieft (vgl. die XVII. Tagung des Forstwirtschaftsrats 1910 Mitt. S. 61 ff.).

Nur zu leicht beruhigt sich der Mensch über Dinge, die ihm nicht beständig vor Augen stehen. Würden die Wurzeln, wie Schaft und Krone, dem Auge zugänglich sein, so hätten sich unsere Methoden der Waldbegründung nach ganz andern Richtungen entwickelt ¹⁾).

Das Gesagte bezieht sich natürlich nur auf Fälle, wo Naturverjüngung, wenn auch mit künstlicher Nachhilfe, überhaupt möglich ist. Aber auch da, wo sie unmöglich ist und nach herrschender Anschauung sorgfältige Pflanzung als besser gilt, weil sie sicherer und rascher zum Ziele führe, auch da bleibt ein Weg offen, der den hier vertretenen Anschauungen besser entspricht. Er wird bei später sich bietender Gelegenheit vorgeschlagen werden.

Von den zahlreichen Vorzügen, die der Naturbesamung im Gegensatz zum künstlichen Anbau, besonders zur Pflanzung, zukommen, sollen im folgenden einige näher nachgewiesen werden, diejenigen, auf die nach Ansicht des Verfassers besonderes Gewicht zu legen ist, und zwar mit besonderer Berücksichtigung der Fichte.

Obenan stehen, weil sie ausschließlich nur Naturverjüngung zur Voraussetzung haben, einmal die volle Sicherheit für Erhaltung der „Standortsvarietäten“ (bzw. der örtlich erworbenen Sondereigenschaften der Bestockung), und dann die Möglichkeit, diese durch intensive wirtschaftliche Auslese fortgesetzt zu veredeln. Nur Naturverjüngung macht es nämlich möglich, das wichtigste Produktionsmittel — eine bestveranlagte Bestockung — nicht allein auf gleicher Höhe dauernd zu erhalten, sondern auch mehr und mehr zu verbessern. Des weiteren führt sie, durch die ihr eigene Beschattung der jungen Pflanzen und die dichte Bestockung des Bodens zu naturgemäßer Jugendentwicklung der Bestände im Gegensatz zu dem häufig allzu üppigen Aufwachsen der Pflanzbestände; sie schaltet die, jedenfalls bei der Fichte naturwidrige Pflanzung soweit als möglich aus, oder gestattet doch, ein Pflanzverfahren anzuwenden, das die Nachteile der Pflanzung, soweit als überhaupt möglich, vermeidet.

Auf weitere bekannte Vorzüge der Naturverjüngung, wie dauernde Bodendeckung, sichere Holzartenmischung u. a. braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden, sie sind längst in klassischer Weise nachgewiesen, so besonders durch Gayer in seinen Schriften: „Der gemischte Wald“ 1886 und „der Femelschlagbetrieb“ 1895.

Die Erhaltung örtlicher Sondereigenschaften der Bestockung.

Zur Klarstellung unseres Standpunkts müssen zunächst einige allgemeine Betrachtungen vorausgehen, die auch im weiteren Verlauf unserer Untersuchungen von Wert sein werden.

In der organischen Natur gleicht kein Individuum dem andern vollkommen. Die systematische Botanik, die dieser Vielgestaltigkeit der Natur in der Pflanzen-

1) Vgl. auch Martin, Forstliche Statistik S. 32.

welt gegenübersteht, scheidet, um systematische Einheiten zu gewinnen, Formenkreise ab, deren Individuen sich in allen wichtigen morphologischen Eigenschaften gleichen und sich erheblich von anderen Kreisen unterscheiden, oder wie *Prantl* sagt, so untereinander übereinstimmen, als ob sie die unmittelbaren Nachkommen derselben Individuen wären. Für die Botanik bilden diese Formenkreise den engsten systematischen Begriff, sie nennt dieselben „*Arten*“. Zu ihnen gehören unsere verschiedenen Holzarten.

Die botanische Art ist somit durch eine Reihe feststehender Eigenschaften, die Artenmerkmale, bestimmt. Die Anlagen dieser Eigenschaften *vererben* sich, d. h. sie werden innerhalb der Art von den Eltern auf die Nachkommen übertragen. Die Bedingungen für gleiche Entfaltung ererbter Anlagen sind übereinstimmende äußere Verhältnisse; weichen diese ab, so ist die Entfaltung eine verschiedene. Aber auch die Vererbung der Anlagen selbst ist eine verschiedene, denn innerhalb gewisser, wenn auch verhältnismäßig enger Grenzen zeigen sich, auch bei gleichen äußeren Verhältnissen stets *Abweichungen*, die nur auf verschiedener Vererbung der Anlagen beruhen können (vgl. die Chromosomentheorie). Die Nachkommen derselben Eltern gleichen sich nicht vollkommen und gleichen nicht vollkommen den Eltern. Die Individuen *variieren* also in ihren typischen Eigenschaften, von denen bald die eine, bald die andere mehr hervortritt oder zurücksteht, gegebenenfalls können sogar Eigenschaften zwar in der Anlage vorhanden sein, aber nicht sichtbar hervortreten, sie schlummern, um vielleicht in der nächsten Generation wieder zum Vorschein zu kommen.

Diese Abweichungen innerhalb der Art schwanken um einen Mittelwert, das „*Variationsmittel*“, das Maß der gewöhnlich vorkommenden höchsten Abweichungen ist die „*Variationsweite*“. Dieses Maß, in dem die einzelnen Eigenschaften bei der Vererbung variieren, geht über eine gewisse, durch die Artenmerkmale gezogene Grenze nicht hinaus. Durch diese Abweichungen ist innerhalb der Art eine gewisse individuelle Beweglichkeit gegeben, die man „*Variabilität*“ nennt, auch „*kleine*“ Variabilität im Gegensatz zur großen, spontanen, der „*Mutabilität*“ nach *de Vries*, von der später die Rede sein wird.

Die Variabilität ist nicht zu verwechseln mit der Fähigkeit der Individuen, sich durch entsprechende Ausbildung ihrer Eigenschaften den äußeren Verhältnissen, dem Standort, anzupassen. *Nägeli* nennt diese Eigenschaft die „*Modifizierbarkeit*“. Standortsmodifikationen sind nach ihm *Abänderungen* im Typus, die durch Verschiedenheit des Standorts bedingt sind, und *zunächst* nicht *vererbt* werden, denen also nach üblicher Vorstellung keine Veränderung der Vererbungssubstanz entspricht, die aber unter gleichbleibenden Standortverhältnissen bei den Nachkommen in gleicher Weise in die Erscheinung treten.

Diese Eigenschaften, Variabilität wie Modifizierbarkeit, befähigen die Pflanzen, sich den mannigfaltigen Standortverhältnissen anzupassen. Werden nämlich die als Variationen bezeichneten Schwankungen um einen Mittelwert von außen her beeinflusst, und dies geschieht seitens der in der Forstwissenschaft unter der Bezeichnung „*Standort*“ zusammengefaßten äußeren Wachstumsfaktoren in verschiedenster Weise, so entstehen erst unvererbliche Standortsmodifikationen, schließlich aber bilden sich nach *sehr lange andauernder* gleichgerich-

teter Einwirkung innerhalb des großen Formenkreises der Art selbständige Unterkreise, welche die erworbenen modifizierten Eigenschaften vererben, sei es nun infolge unmittelbarer oder mittelbarer Anpassung (Hypothesen von L a m a r c k und von D a r w i n) oder vielleicht, wie neuerdings angenommen wird, durch beide Momente zugleich. Diese Unterkreise liegen ganz innerhalb der Variationsweite der betreffenden Art, nur erscheint ihr Variationsmittel gegenüber demjenigen der Art nach irgend einer Seite hin verschoben.

Ein ausgezeichnetes Beispiel bildet hier die gemeine Kiefer. Sie besitzt offenbar eine bedeutende Variationsweite; das geht schon aus ihrem riesigen Verbreitungsbezirk hervor, der nur bei hoher Anpassungs- und daher Variationsfähigkeit denkbar ist, und das zeigt ebenso die große Zahl von Wuchsformen, die diese Holzart dem sorgfältigen Beobachter offenbart. In einer sehr beachtenswerten Arbeit zeigt uns K i e n i t z (Zeitschr. f. Forst- u. J.wesen 1911 S. 1) an einer Reihe typischer Bilder aus verschiedenen Wuchsgebieten die große Variabilität der Kiefer, insbesondere nach ihrer Wuchsform. Diese Holzart variiert im Aufbau von Schaft und Krone zwischen — um es kurz auszudrücken — Fichten- und Pinienform. Ueberall bildet sie neben einander Formen der verschiedensten Art, die zwischen diesen beiden Extremen stehen; aber wenn wir genauer zusehen, so herrscht tatsächlich in einer Reihe von Waldgebieten bald die eine, bald die andere Form auffallend vor, d. h. das Variationsmittel ist in den einzelnen Wuchsgebieten bald nach der Seite der Fichtenform verschoben, eines geraden schlanken Schafts, der durch die ganze Krone bis ins höhere Alter beibehalten wird und um den sich schwache, senkrecht abstehende und verhältnismäßig kurze Aeste ringsum gruppieren (vergl. die Kiefernkrone im Titelbild, links); bald nähert es sich der Pinienform, mit weniger geradem Schaft, über dem sich die Krone frühzeitig ausbreitet und wölbt, beides dadurch veranlaßt, daß das Wachstum der Achse von Jugend auf durch die stärkeren schräg aufstrebenden Aeste vielfach beeinträchtigt wird. Hier entsteht leicht Sperrwuchs, vergl. Fig. 5 und 10. Andere, meist mit der Wuchsform vergesellschaftete Eigenschaften, wie die Langsamwüchsigkeit und Kurznadeligkeit der ersteren, die Raschwüchsigkeit und Langnadeligkeit der letzteren Form sollen hier nur erwähnt werden.

Es zeigen sich da also Formenkreise innerhalb der Art, gekennzeichnet durch örtlich starkes Vorherrschen der einen oder andern Form. Die Verschiebung des Variationsmittels nach der Richtung der Fichtenform, die wir im Norden und in den Gebirgen finden, erklärt nun K i e n i t z sehr einleuchtend mit der Tätigkeit des Schnees (dem wir den Duftanhang in den höheren Gebirgslagen an die Seite stellen möchten), eine Erklärung, der jeder ohne weiteres zustimmen wird, der die Wirksamkeit dieser Elemente in den Hochlagen unserer Gebirge aus eigener Anschauung genau kennt. Schnee und Duft merzen hier alle Individuen fortgesetzt und unerbittlich aus, die entweder größere Auflagerungsflächen bieten oder durch stärkere Seitenäste eine einseitige Belastung zulassen, so daß fast nur noch Kiefern mit fichtenartig aufgebauter Krone übrigbleiben und zur Fortpflanzung gelangen. So mußte sich unter dieser Einwirkung im Laufe langer Zeiträume das Variationsmittel allmählich nach dieser Seite verschieben. Umgekehrt im Tiefland! Hier haben die zu stärkerer Astbildung geneigten, daher sich horizontal ausbreitenden

Individuen, durch nichts zurückgehalten, schon von Jugend auf ein natürliches Uebergewicht über die schlankwüchsigen, die bei Gleichaltrigkeit durch den sperrigen Wuchs ihrer Nachbarn leicht unterdrückt werden; hier wird also eher eine Verschiebung des Mittels nach der Seite der Sperrwüchsigkeit stattgefunden haben.

Vergleicht man z. B. den in verschiedenen Abbildungen (Titelbild, Figur 1, 2, 7, 8, 9) zur Darstellung gebrachten „Schwarzwaldtypus“ der Kiefer mit den im benachbarten Rheintal vorherrschenden Formen, so wird selbst der um den guten Ruf der „Darmstädter“ Kiefer Besorgte ohne weiteres zugeben müssen, daß diese Wuchsform in der Main-Rheinebene mindestens nicht vorherrschend ist, wenn sie sich vielleicht auch überall in einzelnen Exemplaren vorfindet.

Wir wollen jene selbständigen Unterkreise zunächst „Standortsvarietäten“ nennen und folgen dabei Nägeli's „Mechanisch-physiologischer Theorie der Abstammungslehre“, wo der Verfasser gewisse Formenkreise innerhalb der Arten „Varietäten“ nennt, die dort entstanden sind durch sehr langsam wirkende Einflüsse im Sinne einer Vervollkommnung oder Anpassung.

Zu erläutern wären noch die Begriffe der unmittelbaren und mittelbaren Anpassung, auf die wir später zurückkommen müssen:

Die von Lamarck (1809) zur Erklärung des Entstehens von Arten und Varietäten gelehrte unmittelbare Anpassung ist gedacht als unmittelbare Einwirkung der Standortsfaktoren, besonders des Klimas auf die Vererbungssubstanz, den Träger der Vererbung in der Eizelle. Danach müßten also Eigenschaften, die von den Eltern erst im Lauf ihres Lebens durch Anpassung an den Standort erworben werden, in die Vererbungssubstanz übergehen und sich so auf die Nachkommen übertragen, wenn auch nur in sehr geringem Grad, sodaß viele Generationen hingehen würden, die fortgesetzt unter der gleichen Einwirkung stehen müßten, bis eine hervortretende Abänderung zustande käme. Die durch solche langandauernde Einwirkung erworbenen abgeänderten, dem Standort angepaßten Eigenschaften würden sich dann dauernd auf die Nachkommen vererben, dabei um so mehr hervortreten und um so fester haften, je länger die Einwirkung erfolgte.

Im Gegensatz hiezu nimmt Darwin (1859) als Ursache der Arten- und Varietätenbildung eine nur mittelbare Anpassung an und zwar im Wege natürlicher Auslese oder Zuchtwahl. Nach ihr bewirken die Standortsfaktoren, daß von den in der Natur fortgesetzt zahllos entstehenden Keimen immer nur diejenigen zur Entwicklung und schließlich zur Fortpflanzung gelangen, deren Anlagen dem Standort am meisten entsprechen, während alle andern Keime teils sofort zugrunde gehen, teils von den in ihren individuellen Eigenschaften besser sich anpassenden unterdrückt und so zum Ausscheiden gebracht werden, ehe sie sich fortpflanzen konnten, eine Vorstellung, die uns aus dem Wald geläufig ist. Durch diese natürliche Auslese würde das Variationsmittel allmählich nach der durch die Standortsfaktoren begünstigten Seite der Eigenschaften verschoben.

So faßt also die Botanik unter dem Begriff der Art einen Kreis von Individuen zusammen, die zwar in ihren wichtigsten Eigenschaften übereinstimmen, innerhalb deren sich aber durch stark abweichende und langandauernde Standorts-

einflüsse Unterkreise mit abweichenden Eigenschaften gebildet haben, die sich vererben.

Die Einwirkung des Standorts wird zunächst vorwiegend nur die physiologischen Eigenschaften berühren, sie wird sich jedoch später auch morphologisch äußern. Abänderungen in physiologischer und morphologischer Beziehung gehen nämlich nicht parallel, es können physiologische Abweichungen vorliegen ohne morphologisch hervortretende Merkmale. So meint z. B. von Sivers (Forstw. Zentralbl. 1898, S. 538), es sei nicht richtig, Pflanzen einer Spezies, die aus verschiedenen Klimaten stammen, wenn man bisher keine augenfälligen morphologischen Differenzen bemerkt habe, für klimatisch gleichwertig zu nehmen, und stellt beim Vergleich der „Darmstädter“ Kiefer mit der Kiefer seiner Heimat Livland fest, daß botanische Unterschiede, die zur Trennung in systematisch deutlich gekennzeichnete Varietäten berechtigen würden, nicht vorhanden seien, die einzige, äußerlich sichtbare, bleibende Abweichung sei die Krummwüchsigkeit der ersteren.

Die Botanik scheidet nun solche Unterkreise innerhalb der Art als Varietäten nur dann aus, wenn augenscheinliche Abweichungen in den Eigenschaften sichere Vererbung zeigen und diese abweichenden Eigenschaften nur dem betreffenden engeren Formenkreis angehören. So werden rein physiologische Abweichungen nur selten zur Unterscheidung von botanischen Varietäten führen, schon deshalb, weil sie nur sehr wenig hervortreten und ihre dauernde sichere Vererbung, also ihre Unterscheidung von bloßen Standortmodifikationen nur sehr schwer nachgewiesen werden kann.

Uebertragen wir nunmehr diese Betrachtungen auf das forstwirtschaftliche Gebiet, d. h. stellen wir statt der morphologischen Eigenschaften, auf die sich die systematische Botanik in erster Linie stützt, die physiologischen voran, die allein wirtschaftliche Bedeutung haben und gehen wir aus der Pflanzenwelt im allgemeinen auf unsere Waldbäume im besonderen über, so zeigt sich uns hier das schönste Feld für Erblichwerden von Standortmodifikationen, wir finden die günstigsten Voraussetzungen für dauernde Abweichungen infolge von Standortseinflüssen.

Es sind das zunächst die großen Verbreitungsbezirke der meisten Holzarten, die sehr verschiedene, insbesondere in klimatischer Beziehung abweichende Standorte einschließen (erinnert sei nur an Fichte und Kiefer) und die auf große Anpassungsfähigkeit der betreffenden Holzarten an die äußeren Wachstumsbedingungen (starke Modifizierbarkeit) hinweisen; dazu kommt dann der Umstand, daß die Holzarten ihre abweichenden Standorte schon seit langen Zeiträumen inne haben. Von Bedeutung sind ferner: die lange Lebensdauer und das späte Fruchtttragen der Holzpflanzen (im Hinblick auf die Lamarck'sche Hypothese) und das gedrängte Zusammenleben der Individuen, der ausgeprägte Kampf ums Dasein im Wald (im Hinblick auf die Darwin'sche Auffassung). Endlich ist noch zu erwähnen, daß die Holzarten durch die Beschaffenheit ihrer Samen im allgemeinen beschränkte Bewegungsfähigkeit haben, daß sie als Samen im Vergleich zu ihrem Verbreitungsgebiet auf verhältnismäßig geringe Entfernungen befördert werden. So stellt Cieslar fest (Zentralbl. f. d. ges. Forstwes. 1895, S. 12), daß die Voraussetzungen zur Annahme einer „physiologischen Umstimmung“ durch Vererbung

bei der Fichte in vollem Umfang gegeben seien, da Samenübertragung sich auf geringe Entfernung beschränke.

Allgemein bekannt sind denn auch die vielfach starken Abweichungen der Wuchsform (z. B. bei Kiefer und Lärche), der Wachstumsleistungen u.s.w. in den einzelnen Wuchsgebieten, wenn diese Verschiedenheiten auch meist lediglich als Standortmodifikationen aufgefaßt werden, da eine dauernde Vererbung bis heute nicht einwandfrei nachgewiesen ist.

Wenn nun trotz der geschilderten günstigen Voraussetzungen die Bildung botanischer Varietäten bei unseren Holzarten beschränkt bzw. in vielen Fällen bestritten ist und sich vielfach, wie z. B. bei der Fichte auf Spielarten (Monstrositäten) — Schlangen-, Hänge-, Buschformen u.s.w. — beschränkt, die keinerlei forstwirtschaftliche Bedeutung haben, so mag das einmal daher rühren, daß die Abweichungen sich vorwiegend auf physiologischem und nur wenig auf morphologischem Gebiet zeigen und dann, daß ihre auch auf anderem, abweichendem Standort sichere Vererbung bis jetzt noch nicht mit voller Zuverlässigkeit und nur in beschränktem Maß nachgewiesen ist. Doch auch wenn diese meist wenig hervortretenden Abweichungen als sicher vererbend nachgewiesen wären, könnte es immer noch fraglich erscheinen, ob bzw. inwieweit sie von der systematischen Botanik zu berücksichtigen wären, da es sich wohl meist nur um geringe Differenzierung, um mehr oder weniger schwache Anläufe zur Varietätenbildung handelt.

Ganz anders hat sich unseres Erachtens die praktische Forstwirtschaft zur Frage der Beachtung kleiner nur physiologischer Abweichungen innerhalb der Arten und botanisch anerkannten Varietäten zu stellen. Ihr Interesse legt seinen Schwerpunkt an sich schon auf die physiologischen, durch den Standort bedingten Abweichungen und auf die Frage, ob diese, wenn auch vielleicht nur in geringem Maß, erblich sind, d. h. ob die Nachkommen, auch wenn sie unter andere Standortbedingungen gebracht werden, die abweichenden Eigenschaften ihres Heimatgeschlechts dauernd oder zunächst wenigstens für eine Generation beibehalten. Letzteres dürfte der praktischen Wirtschaft fürs erste genügen, auch läßt es auf ferneres Festhalten der angestammten Heimateigenschaften schließen. Nehmen wir nämlich an, daß es einer sehr langen Reihe von Generationen bedarf, bis es den Standortsfaktoren, sei es unmittelbar oder mittelbar gelingt, einen merklichen Einfluß auf Vererbungssubstanz oder Variationsmittel der örtlichen Bestockung auszuüben, so wird der Schluß berechtigt sein, daß auch die Rückbildung eine langsame ist, daß also die erworbenen Sondereigenschaften lange festgehalten werden.

Sobald nun nachgewiesen werden kann, daß solche Vererbungen örtlicher Sondereigenschaften — sei es auch nur in geringstem Maße — vorkommen, so muß unseres Erachtens die Wirtschaft diesem Moment unverzüglich und in weitestem Umfang Rechnung tragen, sofern dies ohne sonst erhebliche wirtschaftliche Nachteile möglich ist, denn auch geringste physiologische Abweichungen sind bei der großen Individuenzahl im Wald wirtschaftlich beachtenswert. Ja wir gehen noch weiter und fordern, daß die Wirtschaft unter diesen Umständen der Sache Rechnung tragen muß, sobald nur die

Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Vererbung örtlicher Eigentümlichkeiten gegeben ist, denn es ist Gefahr im Verzug. Hat einmal die Kunstverjüngung mit fremdem Samen das heimische Geschlecht verdrängt, so ist es nicht mehr möglich, dasselbe zurückzubringen. Die Wirtschaft scheint uns im vorliegenden Fall zu entsprechendem Vorgehen um so mehr verpflichtet, weil sie der Möglichkeit der Vererbung ohne jeden wirtschaftlichen Nachteil Rechnung tragen kann, ja weil, wie gezeigt werden soll, alle sonstigen wesentlichen Wirtschaftsmomente nach derselben Richtung weisen.

Gegen die Zurückweisung des Handelssamens, zu der wir dadurch gelangen, wird man uns einwenden, daß die ganze Frage der Vererbung örtlich erworbener Eigenschaften noch strittig ist und weiterer Klärung durch exakte Versuche bedarf. Das ist vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus ganz richtig, auf ihn stellt sich z. B. M a y r. Die Wirtschaft jedoch wird den einwandfreien Nachweis nicht abwarten dürfen, da es sonst leicht endgültig zu spät wird, ihr muß vielmehr der fremde Samen schon auf Grund der vorliegenden Nachweise in hohem Grad verdächtig erscheinen, wie dies ja auch M a y r für Livland bezüglich des süddeutschen Kiefernssamens anerkannt hat. Sie hat die entsprechenden Folgerungen unseres Erachtens unverzüglich zu ziehen.

Es liegt hier ein Fall vor, wo die Wirtschaft auch ohne vollen wissenschaftlichen Beweis vorzugehen hat; mögen auch die wissenschaftlichen Untersuchungen in der Folge zu negativem Ergebnis führen — was übrigens nach den schon jetzt vorliegenden Ergebnissen ausgeschlossen erscheint —, so haben die ergriffenen Maßregeln doch keinesfalls nachteilig gewirkt.

Einen andern Standpunkt nimmt M a y r ein (Forstw. Zentralbl. 1898, S. 121), er anerkennt eine wirtschaftliche Bedeutung der Herkunft des Samens nur dann, wenn „eine äußerlich sichtbare und bleibende Abweichung von der typischen Form“, also eine botanische Varietät vorliegt, wie ihn auch seine „Versuche und Beobachtungen dahin geführt haben, den Wert der Herkunft des Saatguts bezüglich der Wärme- und Kältefrage der Waldbäume zu bestreiten“, wofür er l. c. und in seinem Werk: „Fremdländische Wald- und Parkbäume für Europa“ S. 205 zahlreiches Beweismaterial beibringt. Er hat übrigens angesichts der sich entgegenstehenden Ansichten in der Herkunftsfrage in dankenswerter Weise Anregung gegeben, daß die Frage auf breitester Basis durch exakte Versuche geklärt wird.

Soll bezüglich der Samenherkunft nur die botanische Varietät wirtschaftlich von Bedeutung sein, so ist damit jede auch nur vorübergehende örtliche Differenzierung der physiologischen Eigenschaften innerhalb dieses Formenkreises geleugnet oder als wirtschaftlich unerheblich betrachtet. Nun scheinen aber örtliche physiologische Abweichungen in der Tat in beträchtlicher Zahl zu bestehen (wobei die Frage offen bleiben kann, ob sie vorübergehend oder dauernd erblich sind), denn solche sind innerhalb der von der Botanik bis heute anerkannten Arten und Varietäten in neuerer Zeit mehrfach einwandfrei nachgewiesen worden, allerdings ohne entsprechend hervortretende morphologische Unterscheidungsmerkmale, obgleich v. S i v e r s (l. c. S. 540) für wahrscheinlich hält, daß sich außer den physio-

logischen Verschiedenheiten auch noch entsprechende morphologische Abweichungen werden entdecken lassen.

Die bezüglichen Untersuchungen weisen darauf hin, daß unsere weitverbreiteten Holzarten sich auf räumlich getrennten und insbesondere in klimatischer Beziehung stark abweichenden Standorten allmählich nach verschiedenen Richtungen entwickelt haben, daß sie, wie Cieslar sagt, „physiologische Umstimmungen“ zeigen, das heißt, die Arten hätten im Lauf langer Zeit in getrennten Entwicklungsreihen durch — sei es unmittelbare oder mittelbare — Anpassung an den Standort ihre physiologischen Eigenschaften mehr oder weniger merklich abgeändert und diese Abänderungen wären erblich geworden. Cieslar z. B. gelangt (Zentralbl. f. d. ges. Forstwesen 1899, S. 65) auf Grund eingehender Versuche zu dem Ergebnis, daß abweichende, physiologische Zustände innerhalb der botanischen Art, ja innerhalb der Varietät durch die Herkunft des Samens bedingt werden.

Solche Abänderungen der physiologischen Eigenschaften sind nun allerdings sinnlich nur wahrzunehmen bei stark abweichenden klimatischen Verhältnissen, z. B. zwischen Pflanzen aus Hochgebirgs- und Tieflandssamen, aus Samen verschiedener geographischer Breite oder räumlich weit entfernter Gebiete, sie sind bis jetzt nur für solche Fälle nachgewiesen und werden vermutlich auch nur hier mit Sicherheit nachweisbar sein. Die Annahme, daß zwischen diesen Extremen überall, wo die Verhältnisse dies zulassen, stetige Uebergänge stattfinden, liegt aber nahe, wenn wir auch bezüglich verhältnismäßig geringer Standortsabweichungen wohl immer auf Gleichschlüsse angewiesen sein werden.

Man spricht in bezug auf die nachgewiesenen extremen Fälle forstlich von „Standortsvarietäten“, von „physiologischen“ oder „klimatischen Varietäten“ (Cieslar l. c. S. 102) oder aber vom botanischen Standpunkt vorsichtiger von „klimatischen Formen“ (Schröter), da bis jetzt die dauernde Vererbung solcher physiologischer Abweichungen noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist, wenn diese auch größte Wahrscheinlichkeit für sich hat. Die Nachweise gehen bis jetzt nur in einem Fall über die erste Generation hinaus, aber das genügt, wenn auch nicht in botanischer, so doch unseres Erachtens in forstwirtschaftlicher Beziehung.

Die bisher vorliegenden Untersuchungen auf diesem Gebiet sind fast durchweg neuen Datums und beziehen sich vorwiegend nur auf die Nadelhölzer, besonders die Fichte, Kiefer und Lärche. Seit 1900 hat auch der internationale Verband forstlicher Versuchsanstalten den Gegenstand in sein Arbeitsprogramm aufgenommen.

Hervorzuheben sind insbesondere die Arbeiten bzw. Feststellungen von L. de Vilmorin, Kienitz, Cieslar, v. Sivers, Mayr, Schott, Engler, Oppermann, Hauch, Haack¹⁾.

1) de Vilmorin: Exposé historique et descriptif de l'école forestière des Barres. Mémoires d'Agriculture 1862 S. 332.

Kienitz: Ueber Formen und Abarten heimischer Waldbäume 1879. Formen und Abarten der gem. Kiefer. Ztschr. f. F. und J.wes. 1911 S. 1.

Cieslar: Zentralbl. f. d. ges. Forstwes. 1887, S. 149. 1890, S. 448. 1895, S. 7. 1899, S. 49. 1907, S. 1, 49.

v. Sivers: Ueber Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus silvestris. Mitteilungen

Um nur die wichtigsten Ergebnisse zu erwähnen, so haben, nachdem längst Kienitz Vererbungserscheinungen bei der Keimung von Waldsamen derselben Art aus verschiedenen Klimaten nachgewiesen hatte, Cieslar und Engler hauptsächlich die Fichte zum Gegenstand eingehender und erfolgreicher Untersuchungen gemacht, und zwar unter Verwendung von Samen aus verschiedenen Höhenlagen der Alpen, Cieslar verwendete auch nordische Samen. Das übereinstimmende Ergebnis zahlreicher Versuche beider Forscher war, daß die rasch wachsende Fichte der Tieflagen und die langsam wachsende des höheren Gebirgs und des Nordens je ihr besonderes Wuchsvermögen auf die Nachkommen vererben, daß diese also die besonderen Eigenschaften ihrer Vorfahren auch unter veränderten klimatischen Verhältnissen beibehalten. Die Abweichungen in Keimung und Wachstum der Fichten aus hoher und tiefer Lage sind in den ersten Jahren meist sehr bedeutend.

Wie lange diese Sondereigenschaften sich erhalten, konnte noch nicht festgestellt werden, da sich die Versuche nur auf eine beschränkte Zahl von Jahren erstrecken. Cieslar (l. c. 1899 S. 57), dessen Versuche auf längere Zeit zurückgehen, vermutet in bezug auf die im Wuchs zurückbleibenden Hochgebirgs- und nordischen Fichten, daß sie voraussichtlich erst in späteren Jahren zu einer wohl verhältnismäßig aber bei weitem nicht vollkommen gleichen Wuchstätigkeit sich aufschwingen werden wie die dem Tiefland entstammenden Fichten.

Stehen nun die Hochgebirgsfichten in bezug auf ererbte Wuchsenergie den Tieflandspflanzen weit nach, so übertreffen sie diese andererseits an ebenfalls erblichen Eigenschaften, die sie befähigen, den äußeren Gefahren ihrer Heimat leichter zu trotzen, sie zeigen verhältnismäßig stärkere Wurzelbildung und größere Dicke der Rinde, gedrungeneren Wuchs, sowie kürzere, zahlreichere Nadeln (letzteres nach Engler l. c. S. 155 kein Rassenmerkmal, also nicht sicher vererblich). Auch Vegetationsdauer und Wärmebedürfnis werden vererbt.

Aehnliche Ergebnisse zeigen die Versuche derselben Forscher an der Lärche:

Cieslar vergleicht die alpine Tirolerlärche mit der aus dem Mittelgebirge stammenden Sudetenlärche und stellt hier nicht allein die Vererbung von verschiedenem Wuchsvermögen, abweichender Wurzelentwicklung, Rindendicke und anderem fest, wie wir sie als bezeichnendes Unterscheidungsmerkmal für hohe und tiefe Lage bereits bei der Fichte kennen gelernt haben, sondern er weist, was für die Forstwirtschaft praktisch besonders wichtig ist, auch noch die Vererbung besonderer Wuchsformen nach. Die Tirolerlärche zeigt gedrungeneren Wuchs, abfälligeren und gekrümmten Schaft, stärkere sperrige Astbildung

der Deutsch. dendr. Gesell. 1895 S. 49. Forstl. Zentralbl. 1898 S. 537.

Mayr: Allg. F. und J.Ztg. 1900, S. 81. Forstw. Zentralbl. 1908, S. 1.

Schott: Forstw. Zentralbl. 1904, S. 123. 1907, S. 199.

Engler: Mitteilungen der schweizerischen Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen 1905 VIII. 2. S. 81. Forstw. Zentralbl. 1908 S. 295.

Oppermann: „Vränge Boege“ (Renkbuchen). Mitt. aus d. dän. forstl. Versuchswesen Bd. II.

L. A. Hauch: Erblichkeit bei Buche und Eiche. Zentralbl. f. das ges. Forstwes. 1909, S. 333.

Schotte: Ueber Variationen des schwed. Kiefernzapfens... Natw. Ztschr. f. Land- u. Fw. 1906, S. 22.

Haaak: Die Beschaffenheit des Kiefern- und Fichtensamens einst, jetzt und künft. Mitt. des deutschen Forstvereins 1909.

gegenüber der gerad- und schlankschäftigen, sowie schwächer beasteten Sudetenlärche. Endlich stellt Cieslar (1899 S. 101) einen durch 12 Jahre gleich gebliebenen Unterschied in der Zeit des Nadelabfalls fest.

Engler beschränkt sich auf die Alpenlärche und gelangt hier zu ähnlichen Ergebnissen, wie Cieslar. Seine Untersuchungen steigen jedoch bis zu viel größeren Höhen empor, er vermag daher hier zwei wichtige „klimatische Rassen“ zu unterscheiden, eine raschwüchsige Lärche bis zu 1700 Meter ü. M. und eine Lärche mit bedeutend verringertem Zuwachsvermögen über 1700 Meter. Engler ist ferner, was ebenfalls größte wirtschaftliche Bedeutung hat, in der Lage, nachzuweisen, daß Wuchsformen der Lärche, die durch Eigenschaften des Bodens bedingt sind, erblich sein können.

Gegenstand von Feststellungen und Versuchen, zugleich den ältesten, die wir besitzen, war sodann die Kiefer:

Schon im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts, als der Varietäten- und Herkunftsfrage der Kiefer in Frankreich besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde (vergl. Schottl. c.) hat Louis de Vilmorin zu Les Barres im Loiregebiete Kiefern verschiedener Herkunft nebeneinander angebaut und 1862 über das Ergebnis berichtet. Er stellt fest, daß der Samen von Riga die schönsten Stämme erzeugt habe, die sich durch gerade, vollholzige und schwachbeastete Schäfte vor den „Hagenauer“ und mehr noch vor den französischen Kiefern auszeichnen. Diesen guten Eigenschaften der Rigakiefern von Les Barres soll nach späteren Berichten auch eine zweite, aus deren Samen inzwischen erzogene Generation treu geblieben sein, auch sie hätte somit die im Gegensatz zu Individuen anderer Herkunft stehende Geradwüchsigkeit beibehalten. Damit scheint ein wichtiger Nachweis der Vererbung der heimischen Wuchsform unter ganz veränderten Verhältnissen auf zwei Generationen erbracht.

Gewissermaßen als Bestätigung der durch die französischen Versuche festgestellten Erblichkeit der Wuchsform bei der Kiefer dient, was von Sivers aus seiner Heimat Livland mitteilt, daß dort die aus „Darmstädter“¹⁾ Samen begründeten Kiefernbestände die Krummwüchsigkeit ihrer Heimat beibehalten, im Gegensatz zu den als geradwüchsig bekannten livländischen Kiefern. Von Sivers warnt dementsprechend, unseres Erachtens mit Recht, vor Einfuhr fremden Saatguts in seine Heimat, empfiehlt dagegen, worauf wir später zurückkommen werden, den Bezug livländischen Samens für Deutschland. Mayr (Allg. F. und J.-Ztg. 1900 S. 81 ff.), der die Verhältnisse an Ort und Stelle geprüft hat, bezeichnet übrigens die Grundlagen der Siversschen Ausführungen nicht als einwandfrei und voll beweiskräftig, wenn er auch zugibt (S. 88), daß die zahlreichen Mißerfolge den Livländern gewiß Ursache geben, dem Kiefernnsamen aus Deutschland gegenüber mißtrauisch zu sein.

Immerhin liefern uns de Vilmorin und v. Sivers zwei Belege, die es in hohem Grad wahrscheinlich machen, daß einerseits der Samen von Kiefern aus Gegenden, wo diese geradschäftig erwachsen, auch da gerade Schäfte erzeugt, wo

1) D. h. aus Darmstadt bezogenem Samen. Ueber die Herkunft des Samens ist damit nichts bestimmtes gesagt, derselbe kann auch aus anderen Gegenden Deutschlands oder aus Frankreich ... stammen, was aber an dem Ergebnis, soweit es hier in Frage kommt, nichts ändert.

die einheimische Kiefer krummschäftig zu werden pflegt, und umgekehrt, daß Samen aus Gegenden mit bekannt schlechter Schaftbildung auch da keine geraden Schäfte zu erzeugen vermag, wo das Klima auf solche hinweist (vgl. auch die nachfolgenden Abbildungen).

In neuerer Zeit hat endlich S c h o t t Samen und junge Pflanzen aus verschiedenen natürlichen Kieferngebieten Europas untersucht und kommt aus dem abweichenden Verhalten bei verschiedener Herkunft zu dem Ergebnis (l. c. S. 602), daß innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets der Kiefer so viele „physiologische Varietäten“ dieser Holzart aufgestellt werden können, als es in diesem Verbreitungsgebiet Gegenden gibt, die sich durch Klima und sonstige für den Wuchs wichtige Faktoren von einander unterscheiden.

Von Ergebnissen der Untersuchung weiterer Holzarten wären noch zu erwähnen:

E n g l e r gelangt (l. c. S. 207) bei der T a n n e zu einem negativen Ergebnis. Diese Holzart scheint keine ausgesprochenen „physiologischen Varietäten“ zu bilden, paßt sich insbesondere dem Standort in bezug auf Frosthärte ihrer Jungwüchse nicht an. (M a y r erklärt, Allg. F. und J.-Ztg. 1900 S. 82, den Mangel größerer Frosthärte bei Pflanzen nordischer Herkunft, wenn sie in den Süden gebracht werden, sehr einleuchtend mit dem Schutz durch hohe Schneedecke in ihrer Heimat und dem Austreiben schon bei geringerer Wärme, also sehr zeitig bei Aufzucht in wärmerem Klima. Ebenso weist er auf die frostgeschützte Jugendentwicklung im natürlichen Wald hin, welcher der Tanne gar keine Gelegenheit gibt, sich besondere Frosthärte zu erwerben.)

Für den B e r g a h o r n dagegen kann E n g l e r feststellen, daß er eine ganze Reihe von Anpassungen der vegetativen Tätigkeit an das Klima auf die Nachkommen vererbt.

Ueber die E s c h e teilt v. S i v e r s aus Livland mit (forstw. Zentralbl. 1898 S. 541), daß dieselbe dort aus heimischem Samen erzogen, winterhart ist, während die aus deutschem Samen stammenden Eschenpflanzen regelmäßig unter Winterfrost leiden.

Aus allen diesen Feststellungen scheint mit genügender Sicherheit hervorzugehen, daß eine Reihe örtlich erworbener Eigenschaften Gegenstand der Vererbung ist, so besonders: das Wuchsvermögen, die Formbildung von Schaft und Aesten, die Widerstandsfähigkeit nach außen durch entsprechende Wurzelentwicklung, Rindenbildung usw.

Das ist bei mehreren unserer wichtigsten Holzarten für verschiedene Eigenschaften nachgewiesen, und zwar durch voneinander unabhängige, einwandfreie Versuche. Sind wir da vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus nicht berechtigt, diese Ergebnisse durch Gleichschluß auf alle andern Holzarten, für die noch keine exakten Versuche vorliegen, je nach deren Anpassungsfähigkeit zu übertragen, und zwar auf deren physiologische Eigenschaften, wie auf alle Standortsfaktoren, je nach Art, Grad und Zeitdauer der Einwirkung?

Wir dürfen wohl als Bestätigung des früher Gesagten annehmen, es haben sich unsere Holzarten innerhalb ihres Verbreitungsbezirks im Laufe sehr langer Zeiträume den abweichenden Standortseinflüssen in solchem Maß physiologisch angepaßt, daß wir die jeweilige örtliche Bestockung als in dieser Beziehung auf

das betreffende Wuchsgebiet gewissermaßen abgestimmt betrachten können, und daß sich die besonderen physiologischen Eigenschaften der Bestockung des einzelnen Gebiets auf die Nachkommen vererben, also auch hervortreten, wenn diese auf anderem Standort zur Entwicklung gebracht werden.

Ist nun zwar unsere Erkenntnis nach dieser Richtung, besonders in bezug auf Umfang und Dauer der Vererbung, heute noch mangelhaft, da es noch fraglich erscheint, wie lange sich diese Eigenschaften erhalten, ob sie nur gefestigte Modifikationen sind oder Varietätenbildung bedeuten, so darf uns doch dieser Umstand, wie oben betont wurde, keinesfalls hindern, aus der Tatsache der physiologischen Abweichungen innerhalb der Arten für unsere Wirtschaft Schlüsse zu ziehen. Für Berücksichtigung seitens der Wirtschaft ist es nämlich, zunächst wenigstens, unerheblich, ob die Abweichungen dauernd haften und sich auch weiterhin vererben, oder aber nach Aufhören der Einwirkungen allmählich wieder verschwinden, ob wir es also schließlich, was ja noch strittig ist, mit physiologischen Varietäten im eigentlichen Sinn zu tun haben oder nur mit vorübergehend erblich gewordenen Modifikationen. Es genügt vielmehr für die Wirtschaft allein schon die Tatsache, daß sich die Abweichungen auf die nächste Generation vererben, ja sie würden selbst dann schon, wie wir sehen werden, von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sein, wenn sie, was uns nicht als wahrscheinlich gilt, mit der Jugendentwicklung ihr Ende erreichten.

Darum wollen wir hier, um jeder Irrung vorzubeugen, weiterhin lieber nicht von „Varietäten“, sondern lediglich von „wirtschaftlichen Rassen“ sprechen, um damit zu bekunden, daß wir die Scheidung vom rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus vornehmen.

Noch ein weiteres wirtschaftlich bedeutsames Moment heben wir hervor, das die Untersuchungen von Cieslar, Engler und Schott übereinstimmend ergeben haben, daß nämlich die Keime stets auf demjenigen Standort bestes Gedeihen zeigen, dem sie entstammen, während dasselbe in abweichendem Wuchsgebiet vermindert erscheint (darauf führen besonders Cieslars Versuche), auch daß einheimische Keime in der Regel solchen fremder Abstammung nach verschiedenen Richtungen in der Entwicklung überlegen sind.

Auch v. Sivers kommt in seinen Betrachtungen zu dem Ergebnis (l. c. S. 542): „Für einheimische Holzarten aber ist natürlich der einheimische Samen der beste, es sei denn, daß die einheimische Rasse mit Wuchsfehlern erblich belastet ist“, eine Einschränkung, auf die wir später zurückkommen werden.

Den für die Forstwirtschaft hoch bedeutsamen Versuchen auf diesem Gebiet ist ein guter Fortgang zu wünschen; mögen dieselben, nach voller Klärung der Jugendentwicklung, insbesondere auch dazu weiterschreiten, das Verhältnis der wirtschaftlich entscheidenden Faktoren: des Massenzuwachses, der Schaftentwicklung, der Holzqualität und Widerstandskraft gegen äußere Gefahren, sowie deren Vererbung auf weitere Generationen zu untersuchen, und so unser Wissen über den Bestand der „physiologischen Varietäten“ weiter auszubauen.

Heute sind wir leider noch darauf angewiesen, die zahlreichen Lücken durch Gleichschlüsse auszufüllen.

Wie vermögen wir nun diese Erkenntnis für unsere Wirtschaft zu verwerten?

Unsere Holzarten bilden, wie wir annehmen wollen, den Wuchsgebieten entsprechend, „wirtschaftliche Rassen“. Die bestimmte Abgrenzung dieser „Rassen“ ist nun allerdings sehr schwer, wo nicht unmöglich, denn es treten, wie wir schon gesehen haben, zwar bei starken, insbesondere klimatischen Abweichungen des Standorts klar erkennbare Verschiedenheiten zu Tage, zwischen diesen aber zeigt sich allmählicher Uebergang oder ist doch solcher anzunehmen. Können wir nämlich, der Natur der Sache nach, kleinere Unterschiede wohl nicht mehr nachweisen und zu „Rassen“ merkmale stempeln, so berechtigt uns doch die Analogie, unbedenklich anzunehmen, daß sie vorhanden sind. Jeder auf großer Fläche stark abweichenden Standortseinwirkung werden Abänderungen entsprechen, die vielleicht an sich, am einzelnen Individuum, geringfügig, durch die im Forstbetrieb herrschende große Zahl erheblich wirksam sind. Einwandfrei nachweisbar dürfte z. B. eine auch ziemlich große Abweichung im Massenwachstum, in der Schaftform usw. vielfach nicht sein, weil die sonstigen, zufälligen und nicht kontrollierbaren Einwirkungen das Hervortreten dieser Wirkung verschleiern. Ist dieser Unterschied aber auch beim Einzelindividuum möglicherweise sehr klein, so fällt er doch durch die große Menge der Individuen ins Gewicht.

So vermutet auch S c h o t t (l. c. S. 603) in bezug auf die Kiefer, daß an der Grenze der alten Wachstumsgebiete die Rassen ineinander übergehen werden, so daß wir eine fortlaufende Kette von Süden nach Norden, von Westen nach Osten, von der Ebene ins Gebirge annehmen können.

Wir werden daher am besten, wenigstens theoretisch, jedem Standort, d. h. gleichartigen Wuchsbezirk von entsprechender Ausdehnung, auch seine besondere „wirtschaftliche Rasse“ zuschreiben.

Die wirtschaftliche Bedeutung der nachgewiesenen bzw. vermuteten Abweichungen tritt dann hervor beim Samenaustausch zwischen verschiedenen Wuchsgebieten und zwar kann die Wirkung der Verwendung fremder Samen eine günstige oder ungünstige sein, je nach Lage der Verhältnisse.

Eine vorwiegend ungünstige Wirkung zeigt bei fremder Herkunft des Samens seine dem neuen Standort nicht entsprechende Jugendentwicklung, darauf haben C i e s l a r und E n g l e r bezüglich des Hochgebirgs nachdrücklich hingewiesen. Der rasche, wenig gedrungene Wuchs der Tieflandspflanze unterliegt dem rauen Klima der Gebirge, wie umgekehrt die langsame Entwicklung der Gebirgspflanze im Tiefland dem Gras- und Unkräuterwuchs, oder der rascheren Entwicklung beigemischter Holzarten zum Opfer fällt. Waldbaulich werden also die Abweichungen bei Verwendung nicht heimischen Samens im allgemeinen nachteilig wirken.

In ähnlicher Weise kann die verschiedene Wuchskraft bei Verbringen von Samen aus Gebieten geringeren in solche größeren Massenzuwachses wirtschaftlich und zwar statisch ungünstig wirken, weil durch die fremden Individuen dem Boden

weniger Holzmasse abgewonnen wird, als durch die heimische „Rasse“. Dabei wirkt verschärfend noch der besprochene Umstand, daß Pflanzen fremder Herkunft in der Regel an sich schon weniger gedeihen als die heimischen, jedenfalls aber schlechter, als dies in ihrer Heimat der Fall wäre. Ob es daher umgekehrt gelingt, durch Einführen fremder Samen, welche die Anlage stärkeren Wachstums besitzen, die Massenerzeugung zu steigern, scheint in vielen Fällen fraglich, da nicht sicher ist, ob die im Samen ruhenden Anlagen sich unter den veränderten äußeren Verhältnissen auch entsprechend entfalten und ob der Vorteil nicht durch gesteigerte äußere Gefahren aufgehoben wird.

Große wirtschaftliche Vorteile scheint uns dagegen bei zweckmäßigem Vorgehen die Vererbung abweichender Wuchsformen zu bieten, aus ihr kann die Wirtschaft wesentlichen Nutzen ziehen. Die Tatsache dieser Vererbung würde der Wirtschaft einerseits die Aufgabe stellen, überall da, wo örtlich gute Wuchsformen vorliegen, diese durch Verwendung nur heimischen Samens zu erhalten, sie würde aber andererseits auch im gegebenen Fall gestatten, an Stelle heimischer, wirtschaftlich nicht befriedigender Formen bessere zu setzen, an Stelle krummer, kurzer Schäfte, geradere und längere, und dadurch den Qualitätszuwachs zu heben.

In bezug auf die wohl ebenfalls vererbliche Widerstandskraft gegen äußere Gefahren wird die heimische Rasse meistens die bestangepaßten Eigenschaften besitzen, was für deren Erhaltung spricht, während bei einem Wechsel wohl selten auf Verbesserung nach dieser Richtung zu rechnen sein dürfte, vielmehr darauf Bedacht zu nehmen wäre, daß wenigstens keine Verschlechterung eintritt. Bei Neueinführung einer Holzart in einer Gegend wird man daher den Samen zweckmäßig aus einem Gebiet wählen, wo die Holzart unter möglichst ähnlichen äußeren Bedingungen steht.

Diese Betrachtungen sprechen unseres Erachtens nicht, wie bei Erörterung der Frage der Samenherkunft vielfach hervorgehoben wird, in erster Linie für Einführung fremder besserer „Rassen“, sondern bei befriedigenden Eigenschaften der vorhandenen Bestockung für Erhaltung der heimischen „Rasse“, also Verwendung nur heimischen Samens, und lassen ebenso bei nicht befriedigenden Eigenschaften der heimischen „Rasse“ größte Vorsicht bei Wahl des Ersatzes ratsam erscheinen.

Daraus ergibt sich der Satz:

daß das Saatgut für jede Waldfläche von der örtlich angestammten „Rasse“, d. h. aus der Flächeselbst oder aus möglichst naher Nachbarschaft mit ähnlichen Standorts-, insbesondere klimatischen Verhältnissen gewonnen werden soll. (Ausnahmen später.)

Verwendung nur heimischen Saatguts fordern insbesondere v. Sivers, Cieslar, Schott, Engler. v. Sivers erklärt l. c. S. 541 die Samenherkunft für eines der wichtigsten Momente in der Baumzucht, während im Gegensatz dazu Mayr bei Mangel heimischen Saatguts „ohne Bedenken“ solches von nördlicher oder südlicher Herkunft verwendet (Allg. F. u. J.Ztg. 1900 S. 84 u. 89).

Aus obigem Satz folgt unmittelbar, daß Handelssamen d. h. Samen

von unbekannter Herkunft im Wald grundsätzlich nicht verwendet werden sollte. Wir können unserer Auffassung über diesen Punkt durch nichts besser Ausdruck geben, als indem wir Worte von Endres wiedergeben, die er bei der Beratung des Forstwirtschaftsrats 1909 zu dieser Sache sprach (Mitt. 1909 S. 69): „Wenn ich Chef einer großen Verwaltung wäre, würde ich anordnen, daß nur Samen, der von der Forstverwaltung selbst geklenget ist, Verwendung finden darf. Was helfen uns alle unsere Aufwendungen und Beratungen für die Pflege der Forsten, wenn wir Kulturen herstellen, von denen wir jetzt schon wissen, daß sie nach 70—80 Jahren nicht die Haubarkeitserträge geben werden, die wir nach Lage der Verhältnisse fordern können. Ich halte diese Samenfrage für die allerwichtigste der ganzen praktischen Forstwirtschaft und möchte besonders auf die kolossale moralische Verantwortung aufmerksam machen, die die Gegenwart in dieser Richtung gegenüber den kommenden Generationen hat“.

Es haben auch nach dieser Richtung in neuester Zeit verschiedene große Verwaltungen Schritte getan, so die hessische und preußische Staatsforstverwaltung; vergleiche die Mitteilungen Thalers im Januarheft der Allg. Forst- u. J.Ztg. 1908, sowie diejenigen Möllers über Kiefernnsamenbeschaffung und -behandlung in preuß. Staatsforsten Ztschr. f. F. u. J.wes. 1910 S. 694.

Um den großen Schaden zu verhindern, welcher der deutschen Forstwirtschaft aus der Verwendung fremder Kiefernnsamen drohen kann, macht Schottl. c. S. 605 Vorschläge, die bestimmt sind, das fremde (außerdeutsche) meist billigere Saatgut aus dem deutschen Wald fernzuhalten. Ganz abgesehen davon, daß diese auf Erschwerung der Einfuhr gerichteten Vorschläge, so erwünscht eine solche wäre, schwer durchzuführen sein dürften, (vergl. auch die Verhandlungen bei der XVII. Tagung des Forstwirtschaftsrats, Mitt. 1909 S. 62), sind sie nicht ausreichend. Wir möchten vielmehr das Uebel an der Wurzel gefaßt wissen und den allgemeinen Grundsatz aufstellen, der für die gesamte Forstwirtschaft maßgebend sein sollte:

Daß der Wald der Regel nach nur natürlich verjüngt werden darf (vergl. auch Engler l. c. S. 236) und daß, wo dies ausgeschlossen ist, der zur Kunstverjüngung erforderliche Samen stets durch die Verwaltung selbst gesammelt werden muß.

Nur wenn die gesamte Forstwirtschaft sich diesen Grundsatz zu eigen macht, ist die Erhaltung der „wirtschaftlichen Rassen“ sichergestellt.

Das Prinzip: „Jeder Forstbetrieb soll seinen Samen selbst sammeln“, geht natürlich nicht davon aus, daß jeder Bezirk auch seine eigene Rasse besitze — dies ist nur für große Waldgebiete mit abweichenden Lebensbedingungen anzunehmen — sondern es sollte jedes Amt nur zu dem Zweck grundsätzlich auf eigene Samengewinnung eingerichtet sein, daß die Deckung seines Bedarfs in heimischem Samen gesichert und daß beim Wechsel des Samenetrags in den verschiedenen Teilen des Waldgebiets ein Austausch zwischen Nachbarbezirken möglich ist, ein Austausch, der nach dem später zu Erörternden (Förderung der Kreuzung) geradezu als erwünscht bezeichnet werden muß.

Was nun den hiedurch zurückgewiesenen Handelsamen betrifft, so ist dessen Herkunft beim heutigen Verkehr gar nicht mehr festzustellen, da das Samen-

ertragnis der einzelnen Holzarten nach Gegenden und Ländern wechselt und der jährliche Bedarf seitens der Handlungen vielfach neben Verwendung alter Samenbestände im Weg des Handels gedeckt wird, wo die näher liegenden Bezirke versagen oder der Samen aus bestimmten Gegenden dauernd billiger und keimkräftiger geliefert wird. Die Samen selbst aber können nach ihrer Herkunft nicht oder jedenfalls nicht mit Sicherheit beurteilt werden, das ist allgemein bekannt, bezüglich Fichte und Kiefer durch Engler l. c. S. 112 und 182 und Schott l. c. S. 599 noch besonders nachgewiesen.

Bei längerem Ausbleiben von Samenjahren muß der Handel gegebenenfalls sehr in die Ferne greifen, um den Bedarf seiner Kunden zu angemessenen Preisen zu decken. Diese würden es ihm auch sehr übel nehmen, wenn er sich leistungsunfähig erklärte, weil kein einheimischer Samen gewachsen ist, oder wenn er für den mühsam zusammengesuchten Samen unverhältnismäßig hohe Preise fordern wollte; die Wirtschaft hat sich schon zu sehr an diese bequeme alljährliche Bezugsweise gewöhnt. Der Handel hat auch im vorliegenden Fall gar kein Interesse, bezüglich der Herkunft besondere Sorgfalt zu üben, da dem Samen ja die Herkunft nicht anzusehen ist, die Nachteile aber, wo der klimatische Unterschied nicht gar zu groß ist, sich erst spät zeigen, bzw. nie mit Sicherheit festgestellt werden können. Dazu ist ein Einfluß der Samenherkunft ja noch vielfach bestritten und nicht nach allen Richtungen geklärt. Dem Samenhandel selbst kann daher hieraus nicht der geringste Vorwurf gemacht werden, was auch dem Verfasser vollkommen ferne liegt. Der Forstwirt muß sich vielmehr in diesem Fall an die eigene Brust schlagen!

Der Samen wandert zumeist aus dem Süden, wo er in der Regel billiger ist, nach Norden, wo er teurer zu sein pflegt, also aus Gebieten höherer Keimprocente in Gegenden niedrigerer Keimung. Dabei wird z. B. der Händler, der uns französischen oder ungarischen Kiefern Samen liefert, in keinem Fall Gefahr laufen, unsere Gunst zu verlieren. Im Gegenteil, der Samen der südlichen Kiefer keimt früh und prozentisch günstig und wenn die dicht aufgegangene frisch grüne Saat nachher nicht hält, was sie versprach, so wird die Schuld dem Boden, dem Wetter, der Schütte oder irgend einem tierischen Schädling zugeschrieben, der Händler geht frei aus, denn der Samen hat ja gut gekeimt, das gilt allgemein als entscheidendes Merkmal für seine Güte. Beim Wandern des Samens von Süden nach Norden wird der Käufer stets den Eindruck haben, gut bedient zu sein.

Auch um die wirtschaftlichen Eigenschaften der Individuen, von denen der Samen gewonnen wird, braucht sich der Händler keine Sorge zu machen, er wird sogar, wenn auch unbewußt, den Samen der kurzschäftigen, krummen und ästigen Bäume bevorzugen, weil er vom Sammler billiger geliefert werden kann. Dieser wird begreiflicherweise beim Sammeln so geartete Stämme bevorzugen und nicht ohne Not auf besonders lang- und geradschäftige, sowie astreine Bäume klettern.

Die beste Illustration bildet für die Bedeutung der Samenherkunft wohl die Kiefer. Aus dem schon erwähnten Aufsatz von Schott können wir entnehmen, aus welchen verschiedenen Klimaten und Wuchsgebieten der teure Samen dieser Holzart stammt, den uns der Samenhandel liefert und den wir jährlich dem deutschen

Waldboden zuführen. Dort heißt es z. B. in bezug auf Frankreich: „Dieses Land lieferte besonders im letzten Jahrzehnt bedeutende Zapfenmengen nach Deutschland“, eine wenig erfreuliche Mitteilung, wenn wir damit die Abbildungen vergleichen, die Schott zur Darstellung der Wuchsverhältnisse der französischen Kiefer liefert und die unsere Kenntnisse vom kurzschäftigen, krummen und sperrigen Wuchs der südlichen „Rassen“ bestätigen. Noch schlimmer wird die Sache, wenn Schott mitteilt, daß die „taillis de pin“, die Kieferniederwälder der Privaten und die 4 bis 12 m hohen Kiefern der Gemeindewälder vor andern viel Zapfenmaterial in den Handel liefern. Nach ihren Ausfuhrmengen an Kiefern Samen nach Deutschland bilden die Ausfuhrländer nach Schott folgende Reihe: Obenan steht Belgien, dann folgen Frankreich und Ungarn, in letzter Reihe stehen Finnland und die baltischen Provinzen. Von diesen Ländern zeigt die Kiefer in Belgien einen im allgemeinen befriedigenden Wuchs, während sie in Frankreich (außer in Hochlagen) und Ungarn rasch wächst, aber einen krummen und kurzen Schaft erzeugt. Entgegengesetzte Eigenschaften zeigen die baltische und die nordische Kiefer, welch letztere Mayr als besondere Art bezeichnet und *Pinus septentrionalis* oder *lapponica* nennt (Fremdländische Wald- und Parkbäume S. 206 und 348), beide wachsen langsamer, aber sehr gerad- und langschäftig. Die deutschen Kiefern nun stehen bezüglich ihrer Wuchseigenschaften in der Mitte zwischen Süden und Norden, sie sind also wirtschaftlich besonders günstig geartet, denn sie sind raschwüchsiger als die nordischen, gerad- und langschäftiger als die südlichen Kiefern, welch letztere Eigenschaft überdies durch entsprechende Bestandserziehung wenigstens für den Haubarkeitsbestand, gesteigert werden kann. Mayr wendet sich daher mit Recht (Allg. F. u. J.Ztg. 1900 S. 88) gegen den Ersatz unserer deutschen Kiefer durch die baltische, deren Einführung v. Sivers empfohlen hatte.

Welch große Schädigung der deutschen Forstwirtschaft bedeutet nun, wenn sich die Vererbung auch nur teilweise bestätigen sollte, allein schon die Tatsache der großen Einfuhr von Kiefern Samen aus Frankreich und Ungarn, einen Schaden, der nicht wieder gut zu machen wäre, denn diese Einfuhr brächte uns, davon soll später die Rede sein, durch Fortpflanzung und Kreuzung minderwertige Eigenschaften in unsere heimischen „Rassen“, ganz abgesehen von dem wirtschaftlichen Minder- also Mißerfolg des ersten Anbaus.

Wie oft mag der Boden, mögen Witterungs- und andere Einwirkungen verantwortlich gemacht werden, wenn die Verjüngung mit Handelssamen nicht gelingt oder durch Schütte wieder zugrunde geht, wenn Frost, Schneedruck u.s.w. in den jungen Beständen hausen oder diese sperrigen Wuchs und schlechte Schaftform zeigen, demgemäß Brennholz liefern, wo der Standort Nutzholz erzeugen könnte, während vielleicht in erster Linie die Samenherkunft die Schuld trägt. Schon nach den heute vorliegenden Untersuchungsergebnissen scheint uns weitgehendes Mißtrauen gegen fremden Samen nicht unberechtigt.

Was die eben erwähnte Schütte betrifft, so weist Mayr (Fstw. Zentralbl. 1903 S. 547, inzwischen mehrfach bestätigt) nach, daß die nordische Föhre, die er allerdings als besondere Art ausscheidet, im Gegensatz zur deutschen und

baltischen wenig unter derselben leidet. Da liegt die Vermutung nahe, daß südliche Herkunft (Frankreich und Ungarn) bei uns noch mehr dieser Gefahr unterworfen ist, als das heimische Geschlecht, da sie weniger Widerstandskraft besitzt.

Auch innerhalb der beiden deutschen Hauptwuchsgebiete der Kiefer, Nord- und Süddeutschland, können — wenn auch vielleicht in kleinstem Ausmaß und daher schwer nachweisbar — erbliche Abweichungen in den wirtschaftlich bedeutsamen Eigenschaften vorhanden sein, welche die Kunstverjüngung allmählich vernichtet. So zeichnet sich z. B. der Schwarzwald vermöge seiner höheren Luftfeuchtigkeit (vergl. Mayr Allg. F.- u. J.-Ztg. 1900 S. 86) und der Auslesetätigkeit von Schnee und Duft (s. oben S. 23 und Kienitz l. c.) durch besondere Geradwüchsigkeit seiner Kiefern vor dem benachbarten Rheintal („Hagenau“, „Darmstadt“) aus. Wie sehr wäre es zu beklagen, wenn diese günstige Eigenschaft, sofern sie sich auch nur einigermaßen in der Schwarzwaldkiefer gefestigt haben sollte, verloren ginge, verdrängt durch Samen von unkontrollierbarer Herkunft, denn dadurch würde die Produktion vielleicht für immer geschädigt. Daß dies tatsächlich schon jetzt in hohem Maße der Fall ist, kann leider heute als feststehend angesehen werden, den Beweis mögen einige photographische Aufnahmen erbringen.

Man vergleiche die beiden Gruppen von Abbildungen aus dem württembergischen Schwarzwald, die u. E. eine deutliche Sprache sprechen:

1. 3 Photographien aus dem Forstbezirk Calmbach, Distrikt Eyberg (Enzgebiet), alle 3 unmittelbar neben einander aufgenommen, Gesamtentfernung etwa 100 m, Standortsverschiedenheiten ausgeschlossen.

Siehe Fig. 5—7 Seite 39.

2. 4 Photographien aus dem Forstbezirk Hirsau, Distrikt Weckenhardt.

Siehe Fig. 8—11 Seite 40.

Die Aufnahmeorte liegen wiederum in unmittelbarer Nachbarschaft, sie sind nur durch einen Weg und eine etwa 100 m breite Schlagfläche getrennt. Es stehen sich je Fig. 8 und 10, sowie 9 und 11 vom Weg aus betrachtet gegenüber, Standortsunterschiede kommen als Ursache der Verschiedenheit nicht in Betracht.

Die Altbestandsbilder zeigen aufs beste den Habitus der Schwarzwaldkiefer (es sind sämtlich, wie wieder ausdrücklich bemerkt werden muß, 100- und mehrjährige Kiefern, nicht etwa Fichten!).

Die gegenüberstehenden Stangenorte sind Kunstprodukte aus gekauften Samen unbekannter Herkunft; sie zeigen fast durchweg nur schlechteste Schaftformen und Neigung zum Sperrwuchs und sind vielfach vom Schnee gelichtet, auch auf großen Flächen schon wieder mit Tannen unterbaut, was auf die Absicht der Wirtschaft schließen läßt, sie bald wieder zu entfernen.

Die dargestellten Gegensätze bilden nun nicht etwa Ausnahmefälle, sondern sie sind — leider — überall auf großen Flächen neben einander zu sehen,

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 5. Das Bild zeigt vier 20—30jährige Anflugkiefern (Stangen) von verschiedener Höhe am Altholzrand (die sich auf dem Bild leider schlecht vom Hintergrund abheben, weshalb genaue Betrachtung nötig ist), vollkommen freiständig aber durchaus gerade erwachsen, mit kurzen Horizontalästen, die den Schaft vollkommen gleichmässig umkleiden (Fichtenhabitus). Die Stangen beweisen, dass die Nachkommenschaft der alten Bäume selbst im Freistand den gleichen geraden Wuchs annimmt, wie die Eltern.

Fig. 6. Blick in das auf Fig. 5 den Hintergrund bildende Altholz. Die Aufnahme zeigt die Geradwüchsigkeit der Altholzkiefern. Sämtliche geraden Schäfte des Vorder- wie des Hintergrundes sind nicht etwa Fichten, sondern sämtlich Kiefern und nicht das Ergebnis besonderer Auslese durch frühere rationelle Durchforstung (nach Heck), sondern in früher ungepflegtem Bestande erwachsen.

Fig. 7. — Nur wenige Schritte von Fig. 5 entfernt — Blick in eine Kieferndickung von grosser Ausdehnung, auf künstlichem Weg aus gekauftem Samen von unbekannter Herkunft entstanden, die Bestockung geschlossen erwachsen, aber von durchweg geradezu abscheulichen Formen in Schaft und Krone. Die Kiefern zeigen nicht allein andere Wuchsform, als die heimischen, sondern auch andere Nadeln, Rinde u. s. f.

so daß sich der Schaden, den die Wirtschaft bisher durch Nichtbeachtung der Samenherkunft in diesem Gebiet erlitten hat, schon heute sehr hoch beziffern dürfte.

Trägt nun ein Waldgebiet „Holzartenrassen“ mit wirtschaftlich günstigen Eigenschaften, und das werden die in Tausenden von Jahren durch Anpassung

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

erworbenen in der Regel sein, und ersetzen wir diese „Rassen“ durch Pflanzen, die aus Saatgut von unbekannter Herkunft stammen, so geht damit das Werk der Anpassung, das die Natur im Lauf vieler Jahrtausende an Ort und Stelle

zuwege gebracht hat, unwiederbringlich verloren, und es muß mit dieser Arbeit von neuem begonnen werden.

So kann denn auch, wie wir glauben möchten, in dem eben vorgeführten Fall der Kiefer des württ. Schwarzwalds, die Zeit nicht mehr ferne sein, in der die Erkenntnis zum Sieg gelangen wird, daß all die häßlichen reinen Kiefernjugbestände, die zudem den Boden der Verwilderung preisgeben — so schwer dies auch im Hinblick auf Kosten und Nachhaltigkeit fallen mag — wieder entfernt werden müssen, und zwar so rasch als dies waldbaulich möglich ist, jedenfalls aber ehe sie reichlich Frucht tragen und damit die heimische Rasse verschlechtern.

Zwei Einwendungen werden gegen unseren Grundsatz der Selbstgewinnung des Saatguts durch die Verwaltung und des Ausschlusses jeden Handelssamens erhoben werden; sie sind im nachfolgenden zu würdigen.

Einmal wird man einwenden, die Verwaltung könne sich nicht selbst mit Samengewinnung befassen, zudem seien die Samenjahre selten, man brauche aber alljährlich Samen, könne also fremden Samen nicht entbehren.

Ferner kann es vorkommen, daß die einheimische „Rasse“ nicht befriedigt, sei es, daß sie mit Wuchsfehlern im wirtschaftlichen Sinn behaftet ist, oder daß sie geringen Zuwachs zeigt u.s.w. — man wird also in diesem Fall wünschen, sie durch bessere Bestockung zu ersetzen.

Was den ersten Einwand betrifft, so fragt es sich zunächst: Brauchen wir, wo erfolgreiche Naturbesamung möglich, überhaupt noch Samen in größerer Menge, um mit den daraus erzogenen Pflanzen die Lücken zu füllen? Verfasser behauptet: Nein! Die Natur liefert bei entsprechendem Vorgehen eine solche Fülle von Keimen und in so stetiger Weise, daß ein Mangel nur in Ausnahmefällen vorkommen sollte, nur müssen wir den Gang unserer Verjüngung so leiten, daß diese Fülle auch benützt werden kann, und dies ist möglich, wie aus dem folgenden hervorgehen wird.

Unser oben begründetes Streben nach Naturverjüngung würde damit auf ein neues ferneres Ziel gerichtet. Wir hätten nicht allein Naturbesamung anzustreben, sondern auch ein solches Verfahren zu suchen, das uns besonders reichliche Besamung liefert, sowie das Material zu den wirtschaftlich unvermeidlichen Ergänzungen. Auf Vorschläge nach dieser Richtung wird später einzugehen sein.

Es bleibt nun noch der Samenbedarf für Umwandlungen, Neuaufforstungen und bei Versagen der Naturverjüngung. Hier ist an der Forderung festzuhalten, daß die Verwaltung selbst ihren Samenbedarf in möglichster Güte und aus nächster Umgebung zu beschaffen hat; wir halten dies für eine der wichtigsten Aufgaben jeder guten Verwaltung. So gut heute von einer solchen allgemein gefordert wird, daß sie die Nutzung des Waldes und dessen Wiederverjüngung selbst besorgt und nicht etwa dem Käufer des Holzes überläßt, so gut ist von ihr zu verlangen, daß sie grundsätzlich ihren Samenbedarf selbst gewinnt, will sie nicht auf den Vorzug einer zweckmäßigen Wirtschaft verzichten.

So geschah es in früherer Zeit, heute ist es anders geworden. Der

Brauch, den Samen einfach durch den Handel zu beziehen, hat sich mehr und mehr eingebürgert, besonders im Großbetrieb; für Staats- und Gemeindewälder wird meist aller Samen, selbst in besten Samenjahren einfach von dorthier bezogen. Das ist viel einfacher und bequemer, als den Samen selbst im eigenen Bezirk zu sammeln. Die meisten Verwaltungen sind gar nicht mehr für Sammeln und Ueberwintern im Eigenbetrieb eingerichtet, obgleich erfahrungsgemäß der im eigenen Revier gesammelte Samen meist nicht allein besser, sondern auch billiger ist, also Mehrkosten wohl kaum in Frage kommen (was übrigens nicht entscheidend wäre). Selbst in Jahren, wo keine Mast vorlag, sondern Besamung nur örtlich und in geringem Maß vorhanden war, hat Verfasser dies bei Eicheln festgestellt.

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Selbstgewinnung des Samens wird später zu erörtern sein.

Man wird uns entgegenhalten, einerseits, daß auch bei bester Naturverjüngung der Samenbedarf besonders im Großbetrieb stets ein großer sei, unter anderem, weil vielfach unvorhergesehene Fälle eintreten, und andererseits, daß Samenjahre oft lange auf sich warten lassen und spärlich ausfallen, wie z. B. bei der Kiefer, und daß die Gewinnung bei manchen Holzarten eine schwierige sei. Dies alles berechtigt uns aber in keinem Fall zu dem üblichen Verfahren, denn es gibt zahlreiche Mittel, um einem Mangel vorzubeugen: z. B. mehrjährige Aufbewahrung des Samens, besonders in den Zapfen, Saaten auf Vorrat in guten Jahren, Verwendung bald älterer, bald jüngerer Pflanzen, Verlegen größerer Aufforstungen in Jahre, wo reichliche Samenmengen oder viele Pflanzen zur Verfügung stehen, Bezug auswärtigen Samens von bestimmter, geeigneter Herkunft. Wir möchten die Verwendung älteren Samens und älterer Pflanzen in Notfällen dem Bezug von Handelssamen immer noch vorziehen. Unseres Erachtens würde sich die Forstwirtschaft selbst ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wenn sie bekennen müßte, daß sie nicht mehr wie ehemals in der Lage sei, den erforderlichen Samen selbst zu gewinnen.

Im gleichen Sinne spricht sich H. Reuß (naturwissenschaftliche Zeitschrift f. Land- und Forstw. 1904 S. 180) aus, der die Eigenbeschaffung des Samens zu den vornehmsten und ernstesten Pflichten des Forsthaushalts zählt. Der Samen sei von Mutterbäumen zu nehmen, die nach Standort, Alter, Gesundheit, Wuchseigenschaften als zuchttüchtig zu betrachten seien, während Samenbezug aus fremder Hand, welche die Samenbeschaffung geschäftsmäßig betreibe, grundsätzlich zu verwerfen sei.

Was die Samengewinnung betrifft, so kann sich die Verwaltung häufig durch Fällung geeigneter Samenträger helfen, ein Mittel, das dem privaten Samensammler nicht zu Gebot steht. Die erstere wird daher im allgemeinen billiger sammeln und namentlich zu besserem Samen gelangen. Nichts ist z. B. einfacher, mühe- und kostenloser, als das Sammeln gerade des Fichten- und Kiefern Samens. Die Zapfen werden im Winter in den Altholzschlägen von den schönsten geradwüchsigsten Stämmen nach der Fällung abgelesen, in Säcken unter dem Dach aufgehängt und zu Ende des Winters einige Tage in der Sonne ausgebreitet oder in einen geheizten Raum gebracht, damit die Zapfen aufspringen.

Das Ausklengen der Waldsamen mit künstlicher Hitze bis zu 50 und mehr Graden zählt unseres Erachtens auch zu jenen Naturwidrigkeiten, die sich in der Forstwirtschaft im Laufe der Zeit eingebürgert haben. In früherer Zeit hatten die Förster noch vielfach Vorrichtungen, um ihre Samen in der Frühlingssonne auszuklengen. Dem Ausklengen hat die sofortige Aussaat des beflügelten Samens zu folgen. (Hiervon an anderem Ort.)

In guten Samenjahren werden stets Zapfen für mehrere Jahre gesammelt, besonders reichliche Saaten gemacht, und wird der Samen, soweit er nicht verwendet wird, in den Zapfen aufbewahrt, wo er sich mehrere Jahre gut keimfähig erhält. Irgendwo im Revier findet man übrigens fast in jedem Jahr den eigenen Samenbedarf (geschützte Lagen, Waldränder). Zur Selbstgewinnung der wichtigsten Samen, des Fichten- und Kiefersamens, sind also recht wenige Inventarstücke erforderlich: einige Säcke und ein geeigneter Aufbewahrungsraum! Ähnliches gilt für andere Holzarten.

Es wäre eine schwere Sünde der Wirtschaft, diese doch so geringe Mühe zu scheuen, zugunsten des allerdings noch bequemeren Bezugs vom Händler. Welcher dauernde, unersetzliche Schaden an unserem wichtigsten Produktionsmittel könnte entstehen, wenn die heutige Uebung die herrschende bliebe! Kehren wir also um, ehe es zu spät ist!

Auch rückwirkend läßt sich, um auch darauf hinzuweisen, noch manche Verbesserung an der Bestockung erzielen, wenn man den Grundsatz befolgt, daß bei Reinigungen und Durchforstungen stets die gepflanzten Individuen zugunsten der angeflogenen ausgehauen werden, auch wenn erstere im Wachstum voraus sind (in der Regel geschieht heute das Gegenteil). Derartigen Anflug, der entweder, schon vorhanden, bei der Pflanzung nicht beachtet wurde, oder erst nachträglich auf der Kahlfläche angekommen ist, besonders von Fichte und Lichthölzern, trifft man sehr häufig zwischen den Pflanzreihen an. Aber auch sonst wird man nicht selten in die Lage kommen, zwischen Natur- und Kunstprodukten zu wählen, da, wo bei Naturverjüngung zu voreilig ausgepflanzt oder zu gründlich nachgebessert wurde.

Der zweite Einwand ist kurz zu erledigen:

Die einheimische „Rasse“ befriedigt nicht, man will etwas Besseres an ihre Stelle setzen. Mit diesem Streben wird man sich unter gewissen Verhältnissen einverstanden erklären können; dann aber darf der Samen wiederum nicht durch den allgemeinen Handel bezogen werden, sondern es muß bestes Material von bestimmtem bekanntem Standort gewählt werden, der dem eigenen klimatisch möglichst nahe steht und von dessen Bestockung die gewünschten, der heimischen Rasse fehlenden Eigenschaften erwartet werden dürfen. Uebrigens bestehen gegen solchen Wechsel immerhin Bedenken: Verpflanzen wir, um nur einige Beispiele anzuführen, die Hochgebirgsfichte in das Tiefland, weil uns die dort heimische nicht gefahrlos genug ist, so bekommen wir vielleicht mehr Sicherheit, aber sicher weniger Zuwachs. Verpflanzen wir umgekehrt die Tieflandsfichte in das Gebirge, so werden wir zwar mehr Zuwachs erzielen, aber auf Kosten der Sicherheit. Versetzen wir die Kiefer von Süden nach Norden, so erhalten wir mehr Holzmasse aber weniger

gute Form. Uebertragen wir sie umgekehrt von Nord nach Süd, so gewinnen wir an Form, verlieren aber an Zuwachs (vgl. auch M a y r Allg. F.- und J.-Ztg 1900 S. 82 f.).

Wir werden also meist mit den Vorteilen auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen müssen (vgl. M a r t i n Forstw. Zentralbl. 1906 S. 294 bezgl. der Erfahrungen mit der nordischen Kiefer in Belgien), und halten daher diesen Weg in den meisten Fällen nicht für den besten, um zu einer wirtschaftlich besser gearteten Bestockung zu gelangen. Einen unseres Erachtens besseren werden wir nachher besprechen.

Betrachten wir nochmals zusammenfassend den heutigen Zustand in Bezug auf Erhaltung der „wirtschaftlichen Rassen“, so ist derselbe deshalb ein besonders ungünstiger, weil gerade unsere beiden verbreitetsten Holzarten, die, wie gezeigt wurde, der Erhaltung der örtlichen Eigenart am meisten bedürfen, fast durchaus künstlich verjüngt werden und zwar unter Verwendung von Handelssamen. Die deutsche Forstwirtschaft ist also seit längerer Zeit mit Eifer — wenn auch nicht mit Willen — an der Arbeit, unsere „wirtschaftlichen Rassen“ zu zerstören. Dieser Tätigkeit, die wohl darauf hinausläuft, **den wichtigsten Produktionsfaktor dauernd zu verschlechtern**, muß Einhalt getan werden, und das kann mit bestem Erfolg und ohne Opfer nur geschehen durch volle Rückkehr zur Naturverjüngung.

Naturverjüngung sichert uns die Erhaltung der wirtschaftlichen „Rassen“. Bei dieser Erhaltung allein dürfen wir uns jedoch nicht beruhigen und stehen bleiben, denn Stillstand bedeutet hier Rückschritt. Wir müssen vielmehr zielbewußt an der Verbesserung der heimischen „Rasse“ arbeiten und diese Arbeit wird uns wiederum erleichtert, ja erst möglich gemacht eben durch die Naturverjüngung. Sie allein gestattet uns, „Zuchtwahl“ zu treiben.

Die wirtschaftliche Züchtung.

Ehe auf die Erörterung der forstwirtschaftlichen Seite dieser Frage eingegangen werden kann, müssen wir nochmals zu unseren allgemeinen botanischen Betrachtungen zurückkehren.

Wir haben gesehen, daß die Eltern ihre Eigenschaften in der Anlage auf die Nachkommen übertragen, daß dies aber nicht in durchaus gleichem Ausmaß geschieht, sondern daß die Nachkommen in ihren Eigenschaften Schwankungen um einen Mittelwert zeigen, deren Grenzen durch die Arten- bzw. Varietätenmerkmale gegeben sind. (Das Auftreten abweichender Merkmale bei der Vererbung ergibt die Variabilität.)

Art und Ausmaß der Vererbung von Anlagen und demgemäß die Beschaffenheit der Nachkommen hängt ferner noch ab von den verschiedenartigen verwandtschaftlichen Beziehungen der Eltern.

Vom Gesichtspunkt der Züchtung kann man unterscheiden:

1. Selbstbefruchtung oder In z u c h t ,

wenn die Befruchtung zwischen den Organen einer Blüte oder der Blüten eines Individuums vor sich geht. Die Abstammung erfolgt von einem Individuum, der Mutterpflanze.

2. Fremdbefruchtung oder K r e u z u n g ,

wenn die Befruchtung zwischen den Organen verschiedener Individuen derselben Art bzw. Varietät vor sich geht. Die Abstammung erfolgt von zwei Individuen desselben Formenkreises (also mit verwandter „Vererbungssubstanz“) die sich verwandtschaftlich mehr oder weniger nahe stehen können.

3. Bastardierung ,

wenn die Befruchtung zwischen Individuen verschiedener Varietäten erfolgt. Die Abstammung erfolgt hier von zwei Individuen aus je sicher vererbenden Formenkreisen, also mit abweichender „Vererbungssubstanz“.

Was nun die Nachkommen aus diesen verschiedenen Befruchtungsarten betrifft, so sind die Erzeugnisse der Inzucht und Kreuzung in der Regel an die Grenzen der gewöhnlichen Variabilität gebunden, wobei die individuellen Anlagen bei der Inzucht durch die Eigenschaften der Mutterpflanze gegeben sind, während bei der Kreuzung der Nachkomme bald mehr der Mutter, bald mehr dem Vater folgen, bald ein Gemisch der Eigenschaften beider zeigen kann.

Vergleichen wir die Erzeugnisse der Inzucht und Kreuzung miteinander, so gilt ganz allgemein die Regel, daß die Kreuzung bessere Produkte, solche mit günstigeren, insbesondere Wuchseigenschaften liefert als die Inzucht, daß also Kreuzungsprodukte den Inzuchtsprodukten überlegen sind. Ebenso gilt für die Kreuzung selbst, daß die Produkte umso günstigere Eigenschaften zeigen, je ferner sich die Eltern innerhalb ihres Formenkreises verwandtschaftlich stehen, unter je verschiedeneren äußeren Verhältnissen deren Vorfahren gelebt haben. Befruchtung zwischen Individuen einer Varietät, die wie ihre Vorfahren unter denselben Verhältnissen erwachsen, gibt verhältnismäßig ungünstige Erzeugnisse und wird als „indirekte Inzucht“ bezeichnet. In der Landwirtschaft bezieht man deshalb zur „Samenauffrischung“ einen Teil des Saatguts aus anderer Gegend (vgl. Fruwirth: Die Züchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen I. Bd. 2. Aufl. 1905). Auch in der Forstwirtschaft wird daher der oben aufgestellte Grundsatz der Verwendung nur heimischen Samens zweckmäßig gewisse Beschränkungen erleiden, wovon später.

Schon Darwin hat in seinem Werk „Variation of animal and plant“ 1868 nachgewiesen, daß je weiter bei Kreuzung die Individuen derselben Varietät in ihren äußeren Wachstumsbedingungen auseinander stehen, umso günstiger die Wirkung auf ihre Erzeugnisse ist, während der günstige Einfluß durch dauernd gleiche äußere Bedingungen der beiderseitigen Vorfahren abgeschwächt wird.

Bastardierung verschiedener Formen derselben Art wirkt, wie vielfach in der Botanik nachgewiesen wurde, meist günstig auf die Nachkommen, hier wohl umso günstiger, je näher sich die Formenkreise stehen; jedenfalls gilt dies von Wuchsvermögen und Fruchtbarkeit. Bastarde zeigen Zwischenbildungen in Form und physiologischen Eigenschaften.

Bei Inzucht und Kreuzung bewegen sich, wie schon erwähnt, die Eigenschaften der Nachkommen für die Regel innerhalb der Grenzen der gewöhnlichen Variabilität, d. h. es treten nur kleine Unterschiede unter den Nachkommen auf, die sich auf das verschiedene Maß des Hervortretens der einzelnen Eigenschaften beschränken. Zuweilen jedoch zeigen sich spontan große Abweichungen, es erscheinen ganz neue Eigenschaften, die Aenderung geht also über die Grenzen des Formenkreises hinaus: Es entstehen neue Arten oder Varietäten. De Vries hat diese Eigenschaft „Mutabilität“ genannt. Wir wollen hier auf die Ursachen dieser Erscheinung nicht näher eingehen, da sie für uns wenig praktische Bedeutung hat.

Anders verhält sich die Bastardierung. Bei ihr tritt neben den bei der Kreuzung besprochenen Erscheinungen noch eine ungewöhnlich große Variabilität d. h. Schwankung der Eigenschaften bei den einzelnen Nachkommen zwischen den Eigenschaften der Vater- und Mutterpflanze und sogar über diese hinaus auf, die sich durch die verschiedenartige Mischung zweier ganz oder teilweise verschiedener Vererbungssubstanzen erklärt (Chromosomentheorie). Das Ergebnis der Vereinigung zweier Individuen abweichender Formenkreise kann zunächst verschieden sein. Entweder zeigt sich sofort von der ersten Generation ab, und zwar durch mehrere Generationen große Variabilität, oder aber das einzelne Individuum der ersten Generation folgt zunächst scheinbar entweder ganz der Vater- oder der Mutterpflanze (was man damit erklärt, daß sich die Vererbungssubstanzen wegen ihrer Verschiedenartigkeit noch nicht genügend vermischt haben), dann aber tritt in allen Fällen große Variabilität von der zweiten Generation ab auf.

Die geschilderten Vererbungsregeln können nun zur Züchtung verwendet werden, d. h. zur Aenderung (Verbesserung) der Eigenschaften von Arten und Varietäten durch Bildung von Rassen (Rassen entstehen nach Nägeli nur im Kulturzustand, durch Kreuzung oder Befestigung von Variationen, wir haben also oben und zwar aus Mangel an einer zutreffenden anderen Bezeichnung das Wort „Rasse“ in etwas anderem als dem botanisch üblichen Sinn gebraucht). Es findet hier eine Umbildung von Formen statt. Solche Umbildungen haben in der freien Natur nachweislich in großer Zahl stattgefunden und finden fortgesetzt statt: durch Anpassung, Auslese (allmähliche Umformungen), Mutation (plötzlichen Uebergang) und Bastardierung. Ebenso werden auf künstlichem Weg fortgesetzt Umbildungen unter unseren Kulturgewächsen erzielt, auch zeigen zahlreiche Versuche anerkannter Forscher, daß es möglich ist, selbst wilde Formen auf dem Weg bewußter Auslese zu veredeln (vgl. auch Fruwirth l. c.).

Das Vorgehen bei der Rassenbildung ist ein ähnliches, wie es Darwins Selektionstheorie für die freie Natur bei Bildung von Arten und Varietäten annimmt, nur tritt an Stelle der natürlichen die künstliche Auslese. Dabei unterstützt uns die Natur, indem sie ja selbst ohne Unterbrechung empfindliche und unwüchsige Individuen entfernt und so das Variationsmittel in der Richtung

auf größere Widerstandsfähigkeit verschiebt oder doch auf gleicher Höhe erhält.

Die künstliche Auslese unterscheidet sich von der natürlichen nur durch die Art, wie jede das Ziel zu erreichen strebt. Während die natürliche Auslese nur unbewußt der natürlichen Anpassung folgt und damit die Formen zu höherer Stufe führt, verfolgt die künstliche bewußt wirtschaftliche oder andere Ziele, sie strebt einem Züchtungsideal zu, das alle diejenigen Eigenschaften umfaßt, welche die zu züchtende Rasse auszeichnen sollen.

Wir haben zwei Züchtungsformen zu unterscheiden: Die Veredlungszüchtung und die Neuzüchtung.

Die Veredlungszüchtung stützt sich auf die gewöhnliche Variabilität, die zunächst richtungslos wirkt und nun in bestimmte Richtung gelenkt werden soll. Das Variationsmittel soll nach der Richtung des Züchtungsideals verschoben werden. Züchtungsmittel ist Auslese geeigneter Individuen zur Nachzucht. Die Veredlungszüchtung sucht somit durch Auslese innerhalb eines vorhandenen Formenkreises das Ausmaß gewisser Eigenschaften zu steigern, dasjenige anderer vielleicht zu verringern, sie bewegt sich also innerhalb der Varietät. Bei diesem Züchtungsverfahren werden Individuen als Träger bestimmter Eigenschaften ausgelesen und nur diese zur Fortpflanzung gebracht, und zwar wählt man diejenigen Individuen aus, die in ihren Eigenschaften am meisten nach bestimmter Richtung vom Variationsmittel abweichen, beseitigt dagegen alle Individuen, welche die erwünschten Eigenschaften in geringem Maß oder andere für Veredlung ungünstige Eigenschaften besitzen, die also nach unerwünschter Richtung vom Mittel abweichen. Bei Selbstbefruchtung wirkt dann allein nur die Tatsache dieser Beseitigung, während bei Fremdbefruchtung der Erfolg noch durch geschlechtliche Vereinigung erlesener Individuen gesteigert wird. Dadurch drängt man, wie früher gezeigt, das Variationsmittel bei der Vererbung nach der Richtung der erwünschten Eigenschaften, so daß diese in den Nachkommen immer mehr bzw. häufiger hervortreten.

Die bedeutende Wirksamkeit dieser Züchtungsart wird allgemein anerkannt; sobald eine Auslese in bestimmter Richtung stattfindet, tritt infolge derselben ein Fortschreiten der Abänderung in gleicher Richtung von Generation zu Generation ein. Dieses Fortschreiten hat naturgemäß seine Grenzen, die im allgemeinen durch die Variabilitätsgrenzen gegeben sind, dagegen werden sich die erlesenen Eigenschaften mit der Dauer der Auslese immer mehr befestigen, ja es wird eine stetige Fortdauer der Auslese notwendig sein, soll nicht eine allmähliche Rückbildung in der Richtung des früheren Zustandes stattfinden; eine solche würde sofort nach Aufhören der Auslese einsetzen.

Anders verfährt die Neuzüchtung. Während sich die Veredlungszüchtung stets innerhalb eines scharf begrenzten Formenkreises bewegt und hier Verschiebungen in den Eigenschaften anstrebt, geht die Neuzüchtung über diese Grenzen hinaus und sucht neue selbständige Formenkreise zu schaffen, sei es, daß sie einzelne oder daß sie mehrere neue Eigenschaften einführt. Sie bedient sich demgemäß auch nicht der gewöhnlichen Variabilität, sondern stützt sich auf das Vorkommen großer Schwankungen, also einerseits auf die Mutabilität und andererseits auf die ungewöhnlich großen Variationen infolge von Bastardie-

rung. Dabei ist zu bemerken, daß wir es bei diesen Züchtungen nicht immer mit lebensfähigen, sich selbst erhaltenden oder auch nur erwünschten Neubildungen zu tun haben, auch hier muß vielmehr die Auslese ergänzend eintreten.

Die Neuzüchtung unter Benützung zufällig vorkommender Mutationen: Man benützt jene jeweils sich einstellenden, schon oben gekennzeichneten Mutationen, also plötzlich vor sich gegangene Bildungen neuer elementarer Formen oder einzelner neuer Eigenschaften zu weiterer Auslesezüchtung und zwar im Wege der Inzucht. Man braucht nur das mutierende Individuum zu isolieren und vor Bastardierung mit seinen Verwandten zu schützen, sowie dann unter den Nachkommen stets diejenigen zur Weiterbefruchtung auszuwählen, welche die neuen Eigenschaften am stärksten zeigen (Stammbaumzucht). Uebrigens ist charakteristisch für Mutationen, daß sie die neuen Eigenschaften meist sofort sicher vererben.

Zielbewußter geht die Neuzüchtung mit Hilfe der Bastardierung vor. Hier wird die Befruchtung zwischen zwei Individuen verschiedener Formenkreise (Varietäten) bewirkt, von denen jeder gewisse erwünschte Eigenschaften zeigt, die in den Individuen eines neu zu schaffenden Formenkreises tunlichst vereinigt werden sollen. Die zur Züchtung gewählten Individuen werden isoliert und befruchtet. Die große Variabilität der Nachkommen beginnt nun, wie oben gezeigt, nicht immer schon in der ersten Generation, wo die Nachkommen vielfach nur einer der Elternpflanzen folgen, stets aber erscheint sie in den folgenden Generationen, wo dann durch entsprechende fortgesetzte und sorgfältige Auslese die hier viel weniger (als bei Mutationen) konstanten Neubildungen nach den erwünschten Richtungen gefestigt werden müssen.

Wie können wir nun die in der forstlichen Literatur vielerwähnte und gewünschte „Zuchtwahl“ (vgl. z. B. Heyer, Waldbau, 4. Aufl. S. 134) im Wirtschaftsbetrieb durchführen?

Nirgends tritt wohl die natürliche Auslese, wie sie Darwin lehrt und als Hebel des Fortschritts in der organischen Natur betrachtet, in der Pflanzenwelt so sehr in die Erscheinung, wie im Wald, wo der Kampf einer großen Menge von Individuen um den notwendigen Wuchsraum nur bei solchen Eigenschaften sicheres Fortkommen gestattet, die das höchste unter den gegebenen Verhältnissen erreichbare Gedeihen sichern. Träger solcher Eigenschaften sind es, die in erster Linie im Kampf um einen Platz an der Sonne siegen und zur Fortpflanzung gelangen, während die meisten andern vorzeitig untergehen. So liegt es gerade im Wald nahe, von „Zuchtwahl“ zu sprechen und die auf andern Gebieten erzielten Erfolge auch für die Forstwirtschaft anzustreben.

Betrachten wir zunächst die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie die Forstwirtschaft bietet, so findet gerade im gleichwüchsigen Hochwald, der dort vorherrscht, fortgesetzt eine scharfe natürliche Auslese unter den Individuen der Bestockung statt.

Unter „gleichwüchsigem Hochwald“ möchten wir einen solchen verstanden wissen, in dem jedes Individuum in annähernd gleichaltriger (demgemäß gleich

hoher) Umgebung aufwächst, der Bestand also entweder gleichaltrig oder im Alter überall gleichmäßig und langsam abgestuft ist, sodaß zwischen benachbarten Individuen immer nur sehr kleine Alters- und damit Höhenunterschiede vorhanden sind. Hier bewirkt die Natur selbst — durch die Wirtschaft unterstützt — eine Auslese nach bestimmter Richtung, sie läßt die Standortsfaktoren auf die individuellen Anlagen wirken und stellt die Individuen unter dieser Einwirkung in einen Kampf ums Dasein. Aus diesem Ringen gehen diejenigen als Sieger hervor und behaupten das Feld, welche die größte Wuchskraft besitzen und deren Eigenschaften dem Standort am meisten entsprechen, deren Gedeihen also durch seine Einwirkung am meisten gefördert wurde. Sie bilden schließlich den Haubarkeitsbestand und liefern den Samen für die neue Generation.

Der entscheidende Faktor für den Sieg ist im gleichwüchsigen Hochwald der Höhenwuchs; dort wird also die natürliche Auslese Raschwüchsigkeit, Lang- und Geradschäftigkeit steigern. Bei solchem Fortgang natürlicher Auslese muß durch fortgesetztes Ausscheiden aller Individuen von nicht voll entsprechenden Eigenschaften im Lauf der Zeit eine raschwüchsige Rasse entstehen, die sich dem betreffenden Standort und seinen Verhältnissen immer mehr anpaßt.

Zu diesem Fortschritt steht der Natur als wesentliches Mittel die Erzeugung reicher Samenmengen zu Gebot. Sie geht mit dem Samen geradezu verschwenderisch um, denn sie braucht diese unendliche Fülle von Keimen, nicht allein um fortzuschreiten, sondern schon um ihre Arten auf gleicher Höhe zu erhalten. Mag Darwins Hypothese sonst bestritten sein, das reinigende Prinzip in der Selektionslehre ist allgemein anerkannt.

Wie oben gezeigt wurde, entstehen stets Keime sehr verschiedener Wertigkeit, teils infolge der Variabilität der Rasse, teils durch verschiedene Abstammung der Samen. Inzucht, direkte und indirekte, die bei den Pflanzen naturgemäß vorherrscht, erzeugt fortgesetzt minderwertige Keime in großer Zahl, droht also das qualitative Mittel der Rasse herabzudrücken. Der Wald braucht daher ein Hilfsmittel, diese in großer Zahl immer wieder erscheinenden minderwertigen Keime auszuschneiden und den wertvolleren aber selteneren Kreuzungsprodukten die Herrschaft zu sichern. Dieses Mittel ist große Individuenzahl also dichte Jugendbestockung, die nicht eine dauernde Erhaltung aller oder der meisten Keime gestattet und notwendig macht, sondern innerhalb der eine andauernde scharfe Ausscheidung minderwertiger Keime stattfindet, wo die überall verteilten Kreuzungsprodukte und unter diesen wieder diejenigen, die von verwandtschaftlich sich möglichst fernstehenden Eltern stammen, zur Vorherrschaft über die minder begabte Umgebung gelangen und so deren Ausscheiden bewirken werden.

Nur bei dichten Jungwüchsen ist also auf eine Hebung des Mittels zu rechnen.

Zu der hier im natürlichen Interesse aufgestellten Forderung einer Fülle von Keimen und einer entsprechend dichten Jugendbestockung tritt Tichy in seinem „Qualifizierten Plenterwald“ (S. 44) trotz der natürlichen Grundlagen, auf die er seine Betriebsform aufbaut, scheinbar in Gegensatz, wenn er den Satz aufstellt: Kein Wirtschaftler handle rationell, der mehr jungen Nachwuchs

produziere, als absolut notwendig und geschäftsspekulativ gerechtfertigt sei. Ueberproduktion von Jungwuchs sei noch wirtschaftsnachteiliger, als Ueberschreitung der finanziellen Hiebsreife. Der Gegensatz ist nur ein scheinbarer, denn tatsächlich findet in Tichys Blenderwaldideal, das dem von Wessely in seinem Werk „Die österreichischen Alpenländer und ihre Forste“ (I. Bd. S. 300) so anschaulich geschilderten Fichtenblenderwald nachgebildet ist, schärfste Auslese unter zahllosen Keimen statt. Von all den vielen fortgesetzt zum Boden gelangenden Samen, die unter ähnlichen Verhältnissen keimen, bleiben nur diejenigen erhalten, und gelangen schließlich zur Herrschaft und Fortpflanzung, deren Lebenskraft die fortgesetzte Beschattung und wohl auch häufige Beschädigung zu überdauern vermag. Wir haben also hier wohl die schärfste Auslese unter größter Zahl von Keimen vor uns, die im Forstbetrieb überhaupt vorkommt. Und doch wird uns diese Auslese vom wirtschaftlichen Standpunkt aus nicht befriedigen, denn es fehlt das wirtschaftliche Moment bei der Auslese. Es ergibt sich dort, jener Wirtschaftsform entsprechend, nur eine Auslese auf höchstes Schattenertragen und größte Lebenskraft.

Damit kommen wir von der natürlichen zur künstlichen, zur wirtschaftlichen Auslese. Mit dem Eingreifen der Wirtschaft in die Auslesetätigkeit der Natur werden noch andere Momente mitbestimmend. Während die Natur nur auf bestes Gedeihen ihrer Arten hinwirkt, folgt die wirtschaftliche Auslese daneben noch anderen Gesichtspunkten. Sie hat zwar zunächst dieselben Ziele im Auge, wie die Natur, stellt aber daneben noch eine Reihe anderer, wirtschaftlicher Forderungen an die Bestockung und muß deshalb folgerichtig noch höhere Anforderungen an den Reichtum der Keime stellen, mehr Auslesematerial fordern als die Natur. Im übrigen wirkt die künstliche Auslese schärfer, weil sie zielbewußt vorgeht und wird demgemäß auch rascher Erfolge erzielen als die Natur, bzw. überhaupt nur Erfolge in unserem Sinn erzielen.

Grunderfordernis für den Fortgang der natürlichen durch die Wirtschaft unterstützten Auslese ist — das ergeben auch diese Betrachtungen: *Naturverjüngung*. Sie allein erhält die Rasse, sichert den in der Natur auf jedem Standort stetig fortlaufenden Anpassungsprozeß und liefert eine entsprechende Fülle von Auslesematerial.

Betrachten wir die tatsächliche Wirtschaft, so ist sofort klar, daß diese in der vielgeübten Kunstverjüngung nicht nur keine Verbesserung innerhalb der Arten erstrebt, sondern sogar dem natürlichen Fortschritt hemmend in den Weg tritt, sie handelt unmittelbar naturwidrig, weil sie den natürlichen Anpassungsprozeß der Arten mit jedem Abtrieb der Bestockung und jeder künstlichen Wiederaufforstung abschneidet. Dabei benützt sie die von der Natur gebotene Fülle von Keimen nicht, sondern setzt an deren Stelle eine beschränkte Anzahl fremder, zweifelhafter, oft geradezu zuchtuntüchtiger Keime, und gibt damit das einzig mögliche und wirksame Mittel zur Verbesserung der Eigenschaften der Bestockung durch Zuchtwahl im großen Forstbetrieb preis. So bereitet sie, wie Frömbling in einem Aufsatz über „Dichte oder weitständige Kulturen?“ bei Bekämpfung der üblichen geringen Pflanzenzahl richtig hervorhebt, den allmählichen Rückgang der Arten vor! (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwes. 1905 S. 239).

Im Gegensatz zur Naturverjüngung, welche die Bestandesentwicklung nicht selten mit vielen Hunderttausenden von Keimpflanzen je ha beginnt, beschränkt sich die Kunstverjüngung, im besonderen die Pflanzung, auf 6000—8000 Individuen, die ganz abgesehen von der meist zweifelhaften Samenherkunft eine Menge minderwertiger Keime (Inzuchtsprodukte) enthalten, um so mehr, als diese sich im wohlgepflegten Keimbett der Pflanzschule besonderen Schutzes erfreuten, und als — hauptsächlich infolge der üblichen Sparsamkeit bei der Aussaat des teuren Samens und nachher bei der Auslese der Verschulpflanzen — viele Pflanzen zur Entwicklung gelangten, welche die freie Natur schon in den ersten Jahren hätte untergehen lassen (vgl. auch *Borggreve*: Die Holzzucht 2. Aufl. S. 293). Die vierjährige Anflugpflanze ist im Mittel hochwertiger (erlesener) als die vierjährige Verschulpflanze des Pflanzgartens.

Aus dieser verhältnismäßig geringen Zahl von Individuen ist es hernach nicht möglich, nur erstklassige Pflanzen auszuwählen. Minderwertiges bleibt erhalten, zeigt verminderte produktive Leistungen und gefährdet durch Vererbung seiner weniger guten Eigenschaften die Art.

Würdig reiht sich, vom Standpunkt der Züchtung, dieser Verjüngungsart das da und dort in Reinigung und Durchforstung geübte Prädestinationsprinzip an. Wie heute gewisse weise Pädagogen unter dem Beifall vieler Mütter der lieben Jugend alle Mühe und Arbeit in der Schule und zu Hause, alle Schrecken der Prüfung ersparen möchten, damit aber ohne Auslese eine weichliche Rasse groß ziehen, da sie Energielosigkeit und Trägheit gewähren lassen und der Jugend wenig Gelegenheit geben, sich in intensiver Arbeit und geistiger Anstrengung zu üben und zu messen: so will man im Walde schon in der frühen Jugend die Haubarkeitskandidaten vorausbestimmen und allen Wettbewerb möglichst aus dem Weg räumen, um diesen Erwählten im Laufe ihres Lebens Mühe und Kampf mit den Nachbarn zu ersparen (*numerus clausus!*), ohne zu bedenken, daß man damit eine wichtige Einrichtung der Natur aus dem Walde bannt, daß der Kampf es ist, in dem die Individuen ihre Kräfte messen und erst ihr Uebergewicht zeigen können, das uns natürlich und wirtschaftlich berechtigt, sie vor andern zu bevorzugen (vgl. auch *Schädelin*, Schweizer Zeitschr. f. Forstwesen 1907 S. 270). *Frömbli* weist mit Recht auch auf die Bedeutung der *Ausdauer* im Kampf ums Dasein hin (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1909 S. 663). Wählen wir, ohne die natürliche und wirtschaftliche Ueberlegenheit sicher festgestellt zu haben, so arbeiten wir an der Verschlechterung der Rasse. Diese Feststellung ist aber in der Regel nicht vor dem späteren Stangenholzalter möglich. Dann erst ist unseres Erachtens der richtige Zeitpunkt gekommen, um zum Zweck einer gleichmäßigen Verteilung der Stämme und zur Förderung der Kronenentwicklung die Haubarkeitsstämme auszuwählen und zu bezeichnen.

Es wurde bisher gezeigt, wie die Natur im Walde züchterisch wirkt und welche Rücksicht die Wirtschaft auf ihr Wirken nehmen muß. Es wird sich nun nicht nur darum handeln, die natürliche Zuchtwahl gewähren zu lassen und nicht zustören, sondern darum, sie der Forstwirtschaft dienstbar zu machen, sie plan-

mäßig anzuwenden. Neben der selbstverständlichen Pflicht, die Naturgesetze nicht zu verletzen, hat ja wohl eine Wirtschaft, sofern sie zweckmäßig sein will, noch eine andere Aufgabe, die ist: an der besten Benützung und der Verbesserung der Produktionsmittel fortgesetzt zu arbeiten. Unter die Produktionsmittel aber zählen wir, mit anderen als wichtigste Glieder, die physiologischen Eigenschaften der Bestockung. Als solche wurden oben aufgeführt: die wirtschaftlich besonders wichtigen Wuchseigenschaften, Massen- und Wertserzeugung, also Massenzuwachs, Längenwachstum, Schaft- und Astentwicklung (Gerad- und Langschäftigkeit, Astreinheit). Die Vererbung dieser individuell verschieden zugemessenen Eigenschaften auf die Nachkommen, sofern sie nicht erst durch die Mutterpflanze erworben wurden, wie die Möglichkeit einer Einwirkung auf ihr Ausmaß sind wohl im allgemeinen unbestritten.

Borggreve spricht sich freilich an verschiedenen Stellen seiner „Holzzucht“ (2. Aufl. S. 44, 235, 293) gegen die Berücksichtigung des Prinzips der Zuchtwahl im Forstbetrieb aus. Er sagt unter anderem (S. 235), forstwirtschaftlich komme aus theoretischen (Befruchtung) wie praktischen (Herkunft des Handelsamens) Gründen eine Berücksichtigung der etwa aus natürlicher Zuchtwahl entstandenen Lokalrassen oder gar eine Bildung von Sorten durch künstliche Zuchtwahl vorläufig nicht in Frage und sei wahrscheinlich überhaupt aussichtslos. Borggreve will zwar nicht die individuellen Eigenschaften an sich, wohl aber den Einfluß auf die Ausscheidung während der Bestandesentwicklung in Abrede ziehen, indem er die schlechtere Veranlagung zurückbleibender Stämme bestreitet; es spiele, sagt er, bei der Entscheidung der Frage, welche Individuen schließlich übrig bleiben, die innere Veranlagung nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Zum Beweis seiner Ansicht weist er auf zahlreiche Zufälligkeiten hin, die das eine Individuum einen Vorsprung vor dem andern gewinnen lassen können. Er legt aber diesen Zufälligkeiten zu großes Gewicht bei; denn diese dürften gar nicht so sehr häufig wirksam werden, wie Borggreve voraussetzt, außer in ganz jugendlichem Alter, in dem dann aber begünstigende, wie schädigende Momente meist nicht einzelne Individuen, sondern kleinere oder größere Gruppen von solchen treffen. In diesem Fall ist es wiederum das wuchskräftigste Individuum, das den Schaden rascher überwindet oder von Vorteilen intensiver Nutzen zu ziehen vermag, als seine minderbegabte Nachbarschaft. Solche Zufälligkeiten bilden jedoch sicher nicht die Regel. Es gibt ja wohl unendlich viele Möglichkeiten, durch die eine Pflanze Vorsprung vor der andern erhält, die bald da, bald dort eintreten (wobei übrigens immer noch nicht gesagt ist, daß dieser Vorsprung sogleich ein bleibender wird!), aber die wichtigste Ursache ist und bleibt doch die individuelle Anlage (Wuchskraft, namentlich Höhenwuchs, Unempfindlichkeit, Genügsamkeit u. s. w.), die immer und überall gleichmäßig wirkt, während die Zufälligkeiten bald da bald dort und nur vorübergehend eingreifen; die überall gleichmäßig und dauernd wirkende Ursache muß aber, wo nicht abnorme Verhältnisse vorliegen, bei so andauernder Wirkung, wie sie durch die Bestandesentwicklung gegeben ist, schließlich doch den Ausschlag geben; sie wird insbesondere das Uebergewicht erhalten, sobald

das Jugendstadium überwunden ist, und da, wo es nicht an Individuen fehlt, diese vielmehr besonders reichlich vorhanden sind. Wir haben also allen Grund, bei der forstlichen Auslese die Interessen der Züchtung im Auge zu behalten und zu wahren.

Im Gegensatz zu *Borggreves* Ansicht finden sich außerhalb der schon genannten Veröffentlichungen in der Literatur da und dort Äußerungen, die auf eine Auffassung der Frage in dem hier vertretenen Sinn schließen lassen. So sagt z. B. *Weise* (Mündener forstl. Hefte XVI, 1900, S. 170) zur Erklärung der Tatsache, daß die Bestandeshöhe im Hochwald eine größere ist, als im Mittelwald: „Wir treiben im Hochwald und namentlich mit Hilfe der Durchforstungen eine gewisse Zuchtwahl. Versuche haben gelehrt, daß die Kraft des Höhenwuchses auf individueller Begabung und Veranlagung beruht“ und *Köhler* geht in einem Aufsatz über: „Pflanzenzucht und Zuchtwahl“ (Allgemeine Forst- und Jagdztg. 1903 S. 41) von der Voraussetzung aus, daß absolutes und relatives Wachstum der Individuen von Jugend auf verschieden sei. Er fordert daher „Bezug guter Samen von bester passender Herkunft, reichliche Saaten und Verschulungen und fleißige Auslese der Pflanzen“.

Wir aber wollen einen Schritt weiter gehen und von der Forstwirtschaft verlangen, daß sie bei Verjüngung des Waldes grundsätzlich Zuchtwahl treibt und ihre Verjüngungsgrundsätze dieser Aufgabe anpaßt, ja wir müssen mah-nend aussprechen, daß die Entscheidung über Zuchtwahl sowohl, wie über Erhaltung der „Lokalrassen“, so wie wir sie auffassen, keinen Aufschub erleiden kann, da es sonst bald zu spät sein dürfte.

Landwirtschaft (vergl. z. B. *Fruwirth*: Die Züchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen I. Bd. 2. Aufl. 1905) und *Gärtnerei* haben seit langer Zeit durch Benützung der Tatsache der individuellen Sondereigenschaften und deren Vererbung Hervorragendes geleistet, warum sollte eine zielbewußte Forstwirtschaft nicht ein Gleiches können? Wenn der Gärtner Abarten von riesigem Wuchs oder besserer Qualität zu züchten vermag, weshalb soll der Forstmann nicht stärker, schlanker, geradschäftiger u. s. w. wachsende Waldbäume züchten: stärker wachsende, schlankere Fichten- und Tannensassen, grad- und langschäftige Eichen- und insbesondere Kiefern- und Ahornrassen, oder wenigstens auf deren Züchtung hinarbeiten? Unseres Erachtens liegt kein durchschlagender Grund vor, der uns daran hinderte ¹⁾!

1) Auf diese Ausführungen und die nachfolgenden Vorschläge in erster Linie bezieht sich wohl eine Äußerung *Englers* auf S. 295 des Forstw. Zentralbl. von 1908, wo es heißt: „Manche aber verlassen in ihrem Enthusiasmus für das Neue, wie lit. Erscheinungen aus jüngster Zeit dartun, den sicheren Boden der Empirie und entwickeln allerlei phantastische Ideen und Vorschläge, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Sie halten jede Stammkrümmung, jede geringe Wachstumsleistung für erblich und wollen im Wald in ähnlicher Weise züchterisch vorgehen, wie der Landwirt beim Getreide- und Zuckerrübenbau“. Sich lediglich auf dem „Boden der Empirie“ zu bewegen, ist zwar Sache des Handwerks, nicht der Wissenschaft; doch wäre immerhin interessant, zu erfahren, wo denn sich unsere Vorschläge von sicherem Boden entfernen. Wenn die Grundlagen dieser übrigens nicht „neuen“, sondern schon recht alten Sache (schon die ältesten Kulturvölker haben sich mit Züchtung befaßt) richtig sind, von denen die Vorschläge ausgehen, und die E. nicht bestreiten wird, und wenn die Züchtungserfahrungen verwandter Betriebe zu Rate gezogen werden, so bedarf es weder großen „Enthusiasmus“ noch großer „Phantasie“, noch braucht „in die Luft gegriffen“ zu werden, um zu solchen Vorschlägen zu kommen, sie liegen vielmehr sehr nahe. Sie unterscheiden sich vom Vorgehen der Landwirtschaft und Gärtnerei

Nur in einem Punkt stehen wir allerdings tatsächlich, in einem andern aber nur scheinbar hinter Landwirt und Gärtner zurück. Was sie in Jahren erreichen, erzielen wir erst in Jahrhunderten; doch in dieser ungünstigen Lage befindet sich ja die Forstwirtschaft anderen Betrieben gegenüber überhaupt, sie kann auch erst nach einem Jahrhundert ernten, was sie heute gesät hat und damit den Erfolg ihrer Tätigkeit feststellen, nicht alljährlich, wie andere Betriebe. Vieles was wir im Wald tun, geschieht für eine ferne Zukunft, ohne daß diese Tatsache als Grund gelten könnte, die Arbeit zu unterlassen! Weshalb sollen wir nicht ebenso, wenn auch auf ferne Sicht, an der Verbesserung unserer Holzarten zielbewußt arbeiten? Erst wenn wir das Prinzip der Wirtschaftlichkeit auf solche Gebiete ausdehnen, erst wenn wir sämtliche Produktionsmittel nach allen Richtungen zu verbessern streben, insbesondere die von der Natur gebotenen Mittel zur Entfaltung höchster Tätigkeit bringen, sind wir berechtigt, unsere Wirtschaft in vollem Sinn eine intensive zu nennen.

In einem zweiten Punkt ist uns der Gärtner nur scheinbar überlegen. Er isoliert und befruchtet unmittelbar von Individuum zu Individuum und liest die reifen Samen ab, kann also im eigentlichen Sinn „Zuchtwahl“ treffen. So wie er können wir nun selbstverständlich nicht verfahren, wir können nicht von Baum zu Baum klettern und die Befruchtung vermitteln, wir müssen diese vielmehr der Natur überlassen! Aber wenn auch der Forstbetrieb der gärtnerischen Züchtung in der Zeit, in der er sein Ziel erreicht, weit nachsteht, und wenn er ein anderes Verfahren anwenden muß, so hat er ihr gegenüber gerade hierin einen ungeheueren Vorteil: er braucht gar nicht erst Individuen auszuwählen, zu isolieren und künstlich zu befruchten, der ganze Forstbetrieb ist vielmehr im gleichwüchsigen Hochwald und bei zweckmäßiger Wirtschaft selbst ein Zuchtwahlbetrieb im großen, sofern wir dies nicht durch künstliche Verjüngung und hindernde Durchforstungsgrundsätze absichtlich vereiteln. Bei Naturverjüngung und entsprechenden Erziehungsprinzipien stellen die haubaren Bestände das erlesenste Zuchtmaterial dar, in ihrer Bestockung haben wir durch Auslese während einer ganzen Umtriebszeit so weit als irgend möglich unser Züchtungsideal verwirklicht.

Durch das Gesagte ist schon die Richtung gezeigt, nach der sich Vorschläge in bezug auf Züchtung im Forstbetrieb zu bewegen haben werden, ist die anzuwendende Form der Züchtung, wie das Vorgehen bei derselben nahegelegt.

Wenn wir hiernach im Forstbetrieb Zuchtwahl treiben wollen, so geschieht das am besten und muß geschehen, indem wir unsern ganzen Betrieb auf Züchtung einrichten, „Massenzüchtung“ treiben, im Gegensatz zu der außerhalb des Wirtschaftsbetriebs stehenden Einzelzüchtung, die man sonst wohl im Auge hat. Die landwirtschaftliche Züchtungspraxis scheint allerdings bei Getreide, Erbsen, Wicken u. s. w. nach den Ergebnissen Nilssons in Svalöf (besprochen durch de Vries im Archiv für Rassen- und Gesellschafts-

nur dadurch, daß sie den Verhältnissen der Forstwirtschaft entsprechend längere Zeit brauchen und einen teilweise anderen Weg einschlagen. Dabei stellen sie sich ganz auf den Boden der wirklichen Wirtschaft, denn was dort durchgeführt werden kann und was ins Gebiet der Unmöglichkeit gehört, darüber glaubt Verfasser ein genügendes Urteil zu haben.

biologie 1906 im Sinne seiner Mutationstheorie) auf große Ueberlegenheit des für uns ausgeschlossenen Stammbaumverfahrens (Nilsson geht von einer besonders vollkommenen Aehre . . . als Mutterpflanze aus und vermehrt dieselbe im Wege der Inzucht) gegenüber dem gewöhnlichen Samenausleseverfahren hinzuweisen. Dieses letztere entspricht übrigens nicht den Verhältnissen der Massenzüchtung im Forstbetrieb, weil dort die stets wieder erscheinenden minderwertigen Individuen bis zur Samenreife auf der Fläche bleiben, also an der Wechselbefruchtung teilnehmen, während sie im Wald längst vor Eintritt der Mannbarkeit entfernt wurden.

Als Form der Züchtung kommt, wie Vorstehendes ergibt, zunächst jedenfalls und in erster Linie „Veredlungsauslese“, die oben beschrieben wurde, als durch die Wirtschaft gegeben, in Betracht.

Was die Voraussetzungen ihrer Durchführbarkeit im großen, im ganzen Forstbetrieb betrifft, so ist sie zunächst an das Vorhandensein des geschlossenen gleichwüchsigen Hochwalds auf größerer Fläche gebunden. Nur wo gleichaltrige Individuen in Wettbewerb treten, also in geschlossenem Bestand, ist Veredlungsauslese voll möglich. Nur hier kann das erste Moment, die individuelle Wuchskraft, richtig beurteilt werden.

Diese Waldform muß sich weiterhin über entsprechend große Flächen ausdehnen, da, wie schon erwähnt, eine Isolierung der einzelnen Individuen ausgeschlossen ist, an deren Stelle die Massenzüchtung tritt. Je mehr wir nämlich das Züchtungsverfahren auf größere Flächen ausdehnen können, also auf ganze Waldkomplexe, ja Waldgebiete, desto mehr sind wir vor dem Eindringen fremden, vielleicht zuchtuntüchtigen Fortpflanzungsmaterials (Pollenstaub) gesichert. Unter den Samenträgern des Zuchtbezirks bzw. der einzelnen Bestände befinden sich ausschließlich oder vorwiegend zuchttüchtige Individuen. Diese werden die große Mehrzahl der Befruchtungen bewirken und die verhältnismäßig geringe Menge von Pollenstaub, den der Wind aus Wäldern außerhalb des Zuchtbezirks anweht, wird einen nur sehr geringen Prozentsatz von Keimen liefern, die hernach mit einer großen Zahl aus zuchttüchtigem Material entstandener Samen in Wettbewerb treten müssen, also ausgeschaltet werden, wenn sie nicht Hervorragendes leisten. Letzteres ist allerdings nicht ausgeschlossen, da wie oben gezeigt, Kreuzung umso wertvollere Keime zu liefern pflegt, unter je verschiedenere äußeren Verhältnissen die Eltern und deren Vorfahren gelebt haben. Vom Mangel strenger Isolierung ist also bei einiger Ausdehnung des Zuchtbezirks nichts zu fürchten.

Weitere selbstverständliche Voraussetzung für Züchtung mittels Veredlungsauslese im großen ist: Naturverjüngung; denn einmal muß sämtlicher Samen vom Mutterbestand stammen, und dann ist eine so große Menge von Keimen erforderlich, daß dieselbe in wirtschaftlichen Grenzen nur durch Naturbesamung geliefert werden kann. Damit ergibt sich uns ein weiteres entscheidendes Moment, das auf grundsätzliche und ausschließliche Naturverjüngung hinweist und gegen künstlichen Anbau spricht. Wollen wir im Wald erfolgreich Zuchtwahl treiben, so kann das nur auf der Grundlage sicherer Natur-

verjüngung geschehen, und ist Borggreve (Holzzucht, 2. Aufl. S. 293) insoweit vollkommen beizustimmen, wenn er sagt: „Wer einerseits durch Pflanzung Bestände gründet und andererseits voraussetzt oder gar behauptet, daß die bessere innere Veranlagung der wichtigste oder nur ein wichtiger Grund für das Siegen im Bestandeskampfe und Uebrigbleiben für den Hauptbestand sei, befindet sich . . . mit seinen eigenen Voraussetzungen in einem unlösbaren Widerspruch!“

Wir brauchen also zur Züchtung nicht allein Keime vom Mutterbestand, sondern wir brauchen auch eine sehr große Zahl solcher Keime, wenn die Züchtung von Erfolg sein soll; denn auch der erlesene Haubarkeitsbestand liefert eine Menge minderwertiger Individuen, insbesondere durch Inzucht und mangelhafte Ausbildung der Samen, die verschiedene Ursachen haben kann. Die Schwächlinge werden im Schatten der Mutterbäume schon in den ersten Jahren ausgeschieden und es ist schon eine in gewissem Grad erlesene Schar (mehr als bei Pflanzung nach Saatschulerziehung), die in den ersten Dickungsschluß gelangt, um den Kampf ums Dasein mit der Nachbarschaft aufzunehmen.

Je größer die Zahl der Individuen bei Beginn des Wachstums, um so intensivere Zuchtwahl ist möglich, daher sind dichte Jungwüchse erwünscht, die in wirtschaftlichen Grenzen nur die Naturverjüngung allgemein zu liefern vermag. Bei ihr sind dann die 600 Haubarkeitsstämme die letzte Wahl aus Hunderttausenden von Individuen, im Pflanzbestand nur aus 6000—8000, — ein bemerkenswerter Unterschied.

An reichlicher Samenbildung fehlt es bei den zur Zucht gewählten und gewissermaßen isolierten Individuen (dem haubaren Bestand) nicht, sie tragen meist frühe und reichlich Samen und es handelt sich nur um einen wirtschaftlich voll befriedigenden Weg, die Keime auch festzuhalten. Gelingt dies selbst unter ungünstigen äußeren Verhältnissen, wenn auch hier weniger vollkommen, so hat der sich hier erhaltende Anflug schon eine scharfe Auslese hinter sich, mehr als auf Böden, die leicht Besamung aufnehmen. Das Ziel der Züchtung kann also dort auch bei weniger dichter Bestockung ebenso rasch und vollständig erreicht werden.

Eine weitere, gleichfalls entscheidende Voraussetzung ist endlich entsprechende Bestandeserziehung, denn sie bildet zugleich den Ausleseakt für die Züchtung (s. dagegen Engler l. c. S. 197). Hier liegt der günstige Fall vor, daß das Ideal der Bestandeserziehung vollkommen mit dem Züchtungsideal übereinstimmt (oder doch übereinstimmen sollte). Dieselben Eigenschaften bester Formentwicklung und raschesten Wachstums, die wir bei der Bestandeserziehung begünstigt haben, weil wir wünschen, daß sie dem Haubarkeitsbestand eigen sein möchten, sind es ja auch, die wir in erhöhtem Maß bei der nächsten Generation zu finden wünschen; sie sollen, das ist das Ziel der Veredlungsauslese, bei der gesamten Bestockung von Generation zu Generation in immer steigendem Maße vorhanden sein.

Wenn auch beide Aufgaben im Ziel meist einig sind, so hat die Züchtung doch noch gewisse Forderungen an das Durchforstungsverfahren zu stellen:

Die Bestandeserziehung soll, ohne den Kampf ums Dasein im Schlußstand,

besonders in der Jugend, aufzuheben, dauernd darauf hinarbeiten, daß diejenigen Individuen in den Haubarkeitsbestand gelangen, die den höchsten Wertszuwachs (Masse + Qualität) erzeugen. Die Erziehung hat also zu erfolgen unter Mitberücksichtigung der natürlichen Bestandesausscheidung, also eines Fingerzeigs der Natur, denn der Kampf ums Dasein, sagt Frö m b l i n g l. c. mit Recht, „den man dem Wald ersparen will, ist mit nichts vom Uebel, sondern eine notwendige Einrichtung einer weisen Natur, die organischen Geschöpfe auf voller Höhe ihrer Entwicklung zu erhalten und letztere weiter zu fördern“.

Die Berücksichtigung der natürlichen Bestandesausscheidung darf jedoch nicht nach schematischen Grundsätzen, lediglich der Stellung im Kronenraum entsprechend, geschehen, sondern muß erfolgen unter freier Würdigung von Massen- und Wertserzeugung (also besonders auch der Schaftform!), wie sie wohl seit längerer Zeit an vielen Orten in der Praxis geübt, von Heck (Mündener forstl. Hefte XIII. S. 18, Allg. F. und J.Ztg. 1902 S. 289) in seiner „freien Durchforstung“ auch wissenschaftlich begründet wurde und neuerdings als E-grad in den Arbeitsplan der forstlichen Versuchsanstalten übergegangen ist.

Durchforstungsgrundsätze, wie die durch B o r g g r e v e vertretenen, würden jedenfalls, sofern sie sich nicht auf die Entnahme schlechtgeformter „Protzen“ beschränken, nicht zum Ziel führen. Dasselbe gilt von der neuestens durch S c h i f f e l (Wuchsgesetze norm. Fichtenbestände 1904), S c h w a p p a c h (Zeitschr. f. F. u. J.wes. 1905 S. 11) und R e b e l (Forstw. Centralbl. 1905 S. 239) geschilderten und empfohlenen „Worliker Bestandeserziehung“ B o h d a n e c k y s, der in Fichtenbeständen die Bestockung bis zum 30—35-jährigen Alter von 10 000 auf 2250 Stämme vermindert, „so daß sich scharf der Kegel (kegelförmige Krone) der Haubarkeitskandidaten zeigt“.

Dieses Verfahren geht von dem richtigen Gedanken aus, daß die Kronenausdehnung der Fichte vom Höhenwuchs abhängt, da die Krone bis zu einem gewissen Grad an der Schaftachse haftet und großer Horizontalausdehnung nicht fähig ist. Neben andern Nachteilen, auf die wir später zurückkommen werden, zeigt aber das Vorgehen B o h d a n e c k y s in seiner jetzigen Ausbildung, d. h. bei sehr frühem stärkstem Eingriff (oder gar weitständiger Pflanzung!) eine völlige Beseitigung des Kampfs ums Dasein in der Jugend. Ohne Kampfleistung und damit ohne sicheres Feststellen der individuellen Leistungsfähigkeit (S c h w a p p a c h l. c. S. 19: „Die ersten Eingriffe müssen stets mehr oder minder schematisch geschehen“) sind schon vom jugendlichsten Alter an die Haubarkeitskandidaten vorausbestimmt, ein Verfahren, das nicht allein Zuchtwahl ausschließt, sondern sogar, wie früher gezeigt wurde, jedenfalls wo es im großen und dauernd angewendet wird, zu entgegengesetztem Ergebnis, zur Verschlechterung der Rasse, führt.

Dagegen ließen sich die Grundsätze dieses Verfahrens unseres Erachtens ganz wohl mit den Forderungen der Veredlungsauslese, wie auch mit den später zu erörternden technischen Forderungen an das erzeugte Holz vereinigen, wenn nach scharfem Wettbewerb, d. h. großer Pflanzenzahl in der ersten Jugend allmählich zu den Grundsätzen B o h d a n e c k y s übergegangen würde, nachdem eine gewisse Scheidung im Bestand stattgefunden hat und ein sicherer Finger-

zeigt für vergleichende Beurteilung der individuellen Anlagen vorliegt. Man müßte also später vorgehen, als dies B.s Verfahren tut, dagegen wesentlich früher, als dies heute üblich, wo man den Bestand erst die Hunger- und Durstperiode des Stangenholzalters voll auskosten läßt, samt der Kronenverkümmern, die sie mit sich bringt, ehe man sich zu noch lange nicht genügend kräftigen Eingriffen entschließt. Griffen man dagegen nach gutem Jugendschluß rechtzeitig ein, so wäre es unseres Erachtens immer noch möglich, auf die Fichtenkrone im Sinne B o h d a n e c k y s einzuwirken und zwar ohne ungünstige Nebenerscheinungen.

Den mitgeteilten Voraussetzungen entsprechend, gestaltet sich nun das Verfahren der Veredlungszüchtung sehr einfach:

Erziehung der Bestände unter Würdigung der Individuen nach ihrer Wertserzeugung, wobei neben dem Massenzuwachs noch Gerad- und Langschäftigkeit, Astreinheit u. s. w. eine Rolle spielen werden; grundsätzlich natürliche Verjüngung nach einem Verfahren, das möglichst reichliche Besamung sichert. An Keimen best veranlagter Mutterbäume dürfte meist kein Mangel sein, die Erzeugung an Samen ist vielfach sogar eine überreiche.

Erstreckt sich solche Wirtschaft über große Flächen oder ganze Waldgebiete, so können wir es nur mit Freuden begrüßen und wird es zur Förderung der Sache dienen, wenn in reichen Samenjahren die Pollenkörner der Nadelhölzer in gelben Wolken von Berghang zu Berghang ziehen und durch Gewitterböen weiter fortgeführt werden; da ja, je verschiedener der Standort der Eltern, umso günstiger das Produkt der Befruchtung ist!

Was die Dauer des Zuchtverfahrens betrifft, so ist unbeschränkte Fortsetzung desselben in Aussicht zu nehmen, da die Fortdauer der Züchtung die Nachhaltigkeit der gezüchteten Eigenschaften erhöht und Rückbildung ausschließt.

Solcher Züchtung durch Veredlungsauslese ist nun zwar erfahrungsgemäß bester Erfolg sicher, nur hat sie den gerade für den Forstbetrieb besonders empfindlichen Nachteil, daß sie ihr Ziel verhältnismäßig langsam erreicht, da wohl eine Reihe von Generationen erforderlich ist, um entsprechende Wirkung zu erzielen. Diese Generationen sind aber bei unseren Waldbäumen von besonders langer Dauer und werden im Wirtschaftsbetrieb durch die Umtriebszeit meist noch wesentlich verlängert, da diese durch andere Momente als die beginnende Mannbarkeit der Bestockung bestimmt ist.

Es ist also wohl gerechtfertigt, im Interesse rascheren Erfolgs noch einen Schritt weiter zu gehen und den Weg der Neuzüchtung ins Auge zu fassen, umsomehr, als dieses Verfahren, wie sich zeigen wird, mit kleiner Ergänzung des schon besprochenen durchgeführt werden kann und sich glatt und ohne Kostensteigerung in den üblichen Wirtschaftsbetrieb einfügt. Nur so konnten wir es selbstverständlich wagen, derartig weitausblickende und im Erfolg unsichere Absichten in den Kreis unserer Betrachtungen zu ziehen und der Verwirklichung näherzurücken.

In Betracht kommt nur die Neuzüchtung durch Bastardierung, auch wird an dem oben geschilderten Verfahren wirtschaftlicher

M a s s e n z ü c h t u n g festzuhalten sein, während die Stammbaumkultur spontaner Varietäten (Mutationen) wegen der erforderlichen langen Zeiträume praktisch wohl nicht in Frage kommt. Die Bastardierung setzt das Vorhandensein verschiedener Varietäten voraus. Solche Varietäten im eigentlichen Sinn stehen uns nun zwar in der Regel nicht zur Verfügung. Dagegen sind wir von der Annahme ausgegangen, auf welche die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen hinweisen, daß sich in den einzelnen Wuchsgebieten physiologische Sonderkreise abgeschieden haben oder doch in Abscheidung begriffen sind, die wir „wirtschaftliche Rassen“ genannt haben. Auf sie hätte sich unsere Neuzüchtung zu stützen, wobei die Tatsache, daß wir es wohl meist nicht mit Varietäten im eigentlichen Sinn zu tun haben, am Erfolg nichts ändert, da ja die geschlechtliche Vereinigung sich verwandtschaftlich sehr fernstehender Individuen desselben Formenkreises in gleicher Richtung, wenn auch weniger stark, wirkt, wie bei Individuen scharf getrennter Kreise, während sie dafür zu reichlicher Kreuzbefruchtung keiner künstlichen Beihilfe bedarf. Es wären somit lediglich die Bezeichnungen „Neuzüchtung“ und „Bastardierung“ angreifbar, dieselben wurden trotzdem gewählt, um die verschiedenen Verfahren und ihren vermutlichen Erfolg klar zu trennen.

Die Neuzüchtung kann im Rahmen unserer Wirtschaft erst bei der Erzeugung der nächsten Generation ins Leben treten, wir können also zunächst nur vorbereitende Schritte tun, doch dürfen wir diese nicht unterlassen, wenn überhaupt je eine planmäßige Bastardierung zustande kommen soll. Die Vorbereitungen bestehen darin, daß wir diejenigen Individuen verschiedener „Rassen“, zwischen denen bei der nächsten Verjüngung Befruchtung stattfinden soll, im Bestand zusammenbringen. Auszugehen wäre bei Bastardierung unseres Erachtens stets von der heimischen „Rasse“, als der angepaßten Grundform, die alle dem Standort entsprechenden physiologischen Eigenschaften in vollstem Maße besitzt; ihr wäre eine fremde „Rasse“ beizufügen, die durch ihre besonderen Eigenschaften geeignet erscheint, die heimische zu verbessern. Es wären also nur solche fremden „Rassen“ mit hervorstechenden, wirtschaftlich erwünschten Eigenschaften beizuziehen (und zwar in erlesenem Samen), die insbesondere geeignet sind, die einheimische in den ihr fehlenden guten Eigenschaften zu ergänzen, so daß Aussicht besteht, es möchten aus der Verbindung beider späterhin Bastarde entstehen, welche die beiderseitigen guten Eigenschaften in hervorragendem Maß in sich vereinigen.

Das Verfahren wäre also folgendes:

Zunächst ist auch hier Naturverjüngung der heimischen „Rasse“ Vorbedingung und Grundlage, und das Vorgehen unterscheidet sich von dem besprochenen nur dadurch, daß hier Pflanzen aus fremden erlesenen Samen (also nicht Handelssamen) beigemischt werden. Auch das Ausleseverfahren wäre dasselbe, wie oben besprochen, nur müßte dafür gesorgt werden, daß nicht die eine „Rasse“ in allen Individuen ausscheidet, falls sie im Wuchs der andern gegenüber zurückbleiben sollte. Es läßt sich das am besten durch Gruppenmischung verhindern. Die haubaren Ausleseestämme beider Rassen würden sich dann gegenseitig befruchten mit dem Ergebnis der Bastarderzeu-

gung. Ein Hindernis gegen weitgehende geschlechtliche Vermischung wird nicht vorliegen, da die „wirtschaftlichen Rassen“ sich verwandtschaftlich sehr nahe stehen.

Nun folgen, und darauf hebt das Verfahren ab, in den folgenden Generationen die großen Variationsschwankungen, die sich stets im Gefolge von Bastardierung einstellen, und sich hier wohl sicher schon in der ersten Generation einstellen werden, umsomehr, als wir es nicht mit so gefestigten, sich fern stehenden Varietäten zu tun haben, mit denen die Züchtung sonst zu arbeiten pflegt. Diese große Variabilität erzeugt Produkte mit im guten und schlechten Sinn hervorragenden Eigenschaften. Aufgabe der Bestandserziehung wird es dann sein, in dieser Zeit des starken Variierens der Zuchtprodukte immer mit gesteigerter Aufmerksamkeit diejenigen Individuen auszusuchen, zu erhalten und zur Nachzucht zu bringen, die uns erwünschte wirtschaftliche Eigenschaften in hervorragender Weise in sich vereinigen, sie werden im Lauf der Erziehung ihre Eigenschaften dem Wirtschafter bald zu erkennen geben.

Dafür ein Beispiel: Die „Hagenauer“ oder „Darmstädter“ Kiefer hat guten Zuwachs, läßt aber in der Schaftform zu wünschen übrig, man mischt ihr die benachbarte Schwarzwaldkiefer bei, die geradschäftig wächst. Die späteren Bastardierungsprodukte dieser beiden „Rassen“, wenn man sie so nennen darf, werden verhältnismäßig abweichende Eigenschaften aufweisen, es werden weniger gerade, aber raschwüchsige und besonders gerade, dabei langsamwüchsige Individuen zutage treten. Aber auch eine große Zahl solcher, die beide günstige Eigenschaften in sich vereinigen; sie sind das Ziel unseres Vorgehens und sie müssen natürlich zur Fortpflanzung erhalten bleiben. Das Ergebnis der Züchtung wird — von Generation zu Generation immer mehr hervortretend — eine Kiefernrasse (nun im eigentlichen Sinn) sein, die nicht allein die Eigenschaften der Rasch- und Geradwüchsigkeit in sich vereinigt, sondern auch diese Eigenschaften mehr und mehr gefestigt hat; oder wir werden, mit andern Worten, der Rheintalkiefer, ohne ihre Raschwüchsigkeit zu beeinträchtigen die Eigenschaft größerer Geradschäftigkeit angezüchtet haben, und zwar rascher, als durch bloße Auslese bei der Durchforstung, die natürlich auch hier mitzuwirken hat.

Das Verfahren ist ähnlich demjenigen, das der Landwirt anwendet, wenn er sein Saatgut durch „Samenauffrischung“ zu bessern trachtet. Er mischt unter den eigenen Samen solchen von entferntem Standort und hebt dabei auf Besserung der Keime durch Kreuzung mit Individuen gleicher Varietät, aber entfernter Heimat, ab. Vielfach werden in der Landwirtschaft auch Samen verschiedener Sorten (Rassen) gemischt.

Unsere Vorschläge fügen sich in einfachster Weise in den Wirtschaftsbetrieb ein, ja sie dürften vielfach tatsächlich in Uebung sein, nur unbewußt und ziellos. Wenn wir natürlich verjüngen, so geht es ohne kleinere oder größere Unvollkommenheit der natürlichen Bestockung nicht ab. Holen wir nun die Ergänzungspflanzen aus der Saatschule, wo der Handelssamen herrscht, so gehen wir bereits in der vorgeschlagenen Weise vor, nur mit im höchsten Grad fragwürdigem Material, das möglicherweise die Anlagen zu krummem, astigem, kurzschäftigem Wuchs besitzt, so daß der Erfolg in das Gegenteil um-

schlagen kann, da die Gefahr vorliegt, daß wir „schlechtes Blut“ in unsere heimische Rasse bringen.

Es handelt sich also — Naturverjüngung und Ergänzung auf künstlichem Weg vorausgesetzt — nur darum, für letztere bestes Saatmaterial zu gewinnen und zwar solches einer andern, zur Bastardierung besonders geeigneten „Rasse“. Diese müßte nach reiflicher Erwägung gewählt, es dürfte daher der Samen selbstverständlich nicht durch den Handel bezogen werden. Am besten wäre es, wenn der Wirtschaftler auf Studienreisen geeignete Wuchsgebiete aufsuchen und dabei Verbindung mit anderen Verwaltungen anknüpfen würde zum Zweck dauernden gegenseitigen Samenaustauschs. Solche Verbindungen könnten auch durch Ausschreibungen in Zeitschriften oder Vermittlung der Forstvereine angeknüpft werden auf Grund einer Beschreibung der Wachstumsfaktoren und der örtlichen Wuchseigenschaften der Bestockung. Durch derartige Verwendung fremden Samens könnte auch der Mangel beim Ausbleiben von Samenjahren vorübergehend gedeckt werden. Bei solchem Vorgehen würde sich alles Weitere im Sinn des Züchtungsverfahrens in Zukunft ganz von selbst ergeben.

Damit können wir auf der Grundlage natürlicher Verjüngung und vorwiegender Verwendung heimischen Saatguts von der bestimmten Forderung abgehen, daß nur solches verwendet werden soll, müssen dagegen daran festhalten, daß bei Verwendung fremden Samens nur solcher von bekannter bester Anlage und nur in Mischung mit heimischem Saatgut verwendet werden darf. Wo Naturverjüngung die Grundlage bildete, wird somit auch die heute übliche Verwendung von Handelsamen zur Ergänzung, wenn er aus guter Quelle stammte, wohl kaum geschadet, sondern viel eher genützt haben.

Auch bei besten Eigenschaften der heimischen „Rasse“ kann solche Bastardierung zu weiterer Steigerung der guten Eigenschaften, besonders der Wuchskraft in Frage kommen, da besonders üppiges Gedeihen eine bekannte Eigenschaft vieler Bastarde ist. In diesem Fall muß jedoch selbstverständlich eine ebenbürtige „Rasse“ verwendet werden, da sonst teilweise Verschlechterung durch die Züchtung zu erwarten wäre.

Besonders aber wird das Verfahren sich da empfehlen, wo die heimische Bestockung nicht oder nicht voll befriedigt, sei es, daß Mängel in der Form, oder im Wachstum vorliegen. In diesem Fall wird man fremde Rassen zur Bastardierung wählen, welche die fehlenden Eigenschaften in besonderem Maß aufweisen, auch wenn sie in anderen vielleicht zurückstehen. Dieses Verfahren wird dem vielfach üblichen völligen Aufgeben der heimischen Rasse und dem Uebergang zu einer fremden vorzuziehen sein. Der ausschließliche Gebrauch auserlesenen Fremdsamens kann zwar rascheren Erfolg bieten, ist aber unsicher, während die Bastardierung langsam, aber sicher zum Ziel führt; denn in der angestammten Rasse haben wir den verkörperten Einfluß der örtlichen Standortsfaktoren vor uns, die, in den Bastard übergehend, eine gewisse Gewähr für dessen sicheres Gedeihen geben, während die fremde Rasse ihm die fehlenden

Eigenschaften verleiht. Der unvermittelte Uebergang zu fremder Art dagegen kann ebensogut zu vollem oder teilweisem Mißerfolg führen. Auch der Hebung der heimischen Rasse ausschließlich durch Veredlungsauslese möchten wir dieses Bastardierungsverfahren vorziehen, es verspricht rascheren Erfolg.

Ist dagegen die örtliche Rasse stark minderwertig oder als nicht angestammt zu betrachten, so liegen die Verhältnisse allerdings anders, und wird vollständiger Wechsel vorzuziehen sein.

Wir möchten also zusammen mit Cieslar (Zentralbl. f. d. ges. Forstw. 1899 S. 115) und Mayr (Allg. F. u. J. Ztg. 1900 S. 88) dem Vorschlag von v. Sivers nicht zustimmen, wenn er an Stelle der unzweifelhaft nicht besonders geradwüchsigen süddeutschen Kiefer die livländische eingeführt wissen will; dagegen dürfte sich Bastardierung beider „Rassen“ sicher empfehlen.

Die im vorstehenden gemachten Vorschläge mögen im Erfolg vielfach sehr zweifelhaft sein, schon weil sie auf ferne Zeiten blicken, doch fügen sie sich dafür, wie schon oben hervorgehoben wurde, wenn wir Naturverjüngung voraussetzen, in so glatter Weise in unsern Wirtschaftsbetrieb ein und bringen weder Nachteile noch gesteigerte Betriebskosten, daß wir glauben, die Forstwirtschaft wird sich auf die Dauer solchen Erwägungen nicht verschließen können.

Unter der Bezeichnung „Zuchtwahl“ wird gewöhnlich empfohlen, Samen nur von bestgewachsenen Bäumen des Hauptbestands zu nehmen, wie es Gärtner und Bauer auf Grund langer Erfahrungen des täglichen Lebens bei ihren Gewächsen tun. Wir schließen uns dieser Forderung durchaus an, denn, wenn das Verfahren auch sehr unvollkommen ist, so gibt es uns doch die größte Sicherheit, die unter den vorliegenden Verhältnissen überhaupt erlangt werden kann, daß wir einen verhältnismäßig großen Prozentsatz guter Keime bekommen, die den Eigenschaften der uns als gut bekannten Mutterpflanze entsprechen — wenn wir auch die Eigenschaften der Vaterpflanze nicht kennen. Sofern letztere schlechte Eigenschaften hat, wird freilich ein Teil der Keime stets minder günstige Anlagen besitzen, auf was man ohnedies schon wegen der besprochenen Variabilität gefaßt sein muß. Wählen wir dagegen Samen eines unterdrückten oder krummen, astigen, kranken u. s. w. Mutterbaums, so wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, daß das Mittel der Keimanlagen an Güte unter demjenigen der erstgenannten Mutterpflanze steht. Dies wird allerdings da nicht der Fall sein, wo das Zurückbleiben im Wuchs, die Krummheit oder Astigkeit nicht Anlage der Mutterpflanze war, sondern durch äußere Umstände verschuldet ist. Da sich dies aber meist nicht mit Sicherheit feststellen läßt, wird man sicherer gehen, wenn man es allgemein vermeidet, Samen von derartiger Herkunft zu benützen, da die Anlagen seiner Keime immerhin verdächtig sind. Engler hat l. c. S. 191 die Produkte zweier herrschender Fichten mit denen von zwei unterdrückten verglichen, und zwar Samen und zweijährige Saatzpflanzen, mit dem Ergebnis, daß die Samen der unterdrückten

gleich schwer und keimfähig, die Pflanzen gleich hoch und schwer waren, wie die der herrschenden, ja daß sie dieselben teilweise sogar übertrafen. Dem Schluß aber, den Engler aus dem kleinen und kurz andauernden Versuch zieht, daß es ganz gleichgültig sei, ob wir Samen von den größten, schönsten, oder von den beherrschten und weniger gut geformten Bäumen eines Bestandes sammeln, möchten wir nach allem bisher Besprochenen nicht ohne weiteres beitreten, solange wir nicht wissen, weshalb die unterdrückten Mutterbäume in diese Lage kamen, ob infolge geringer angeborener Wuchskraft oder aus Gründen, die außerhalb ihrer inneren Veranlagung liegen, und ehe wir festgestellt haben, wie sich die Nachkommen weiterhin verhalten werden.

Vielmehr ist unseres Erachtens daran festzuhalten, daß immer da, wo wir genötigt sind, künstlich einzugreifen (unvollkommene Naturbesamung, Holzartenwechsel), das Saatgut mit möglichster Sorgfalt (auch in bezug auf Wahl der Samenträger) gewählt werden soll. Am meisten aber müssen wir uns hüten vor Einführung fremder Samen von fragwürdiger Herkunft in unseren Wald, weil es nicht ausgeschlossen ist, daß wir dadurch die Bestockung, unser wichtigstes Produktionsmittel, in ihrer Güte dauernd schädigen könnten. Vollkommen sicher läßt sich dies nur verhüten durch Naturverjüngung.

Die naturgemässe Jugendentwicklung der Bestände.

Naturverjüngung liefert in der Regel dichte Jungwüchse, jedenfalls bei entsprechendem Vorgehen, könnte sie ja doch bei der ungleichen Verteilung der Individuen und deren vielfachen Beschädigungen ohne solche überhaupt nicht bestehen. Vergleichen wir sie mit der Kunstverjüngung, so haben wir im praktischen Betrieb vorwiegend nur die Pflanzung in Betracht zu ziehen, da man von Anwendung der Saat bei den meisten Holzarten, besonders bei der Fichte, vielfach abgekommen ist. Die Pflanzung aber zeigt geringste Dichtigkeit der Bestockung bei gleichmäßiger Verteilung der Individuen, da die Zahl der Pflanzen durch ökonomische Erwägungen beschränkt ist. Wir können also ganz allgemein die Naturverjüngung mit großer — der Kunstverjüngung mit kleiner Pflanzenzahl gegenüberstellen.

Eine günstige Folge der großen Pflanzenzahl bei Naturverjüngung haben wir bereits in der Möglichkeit scharfer Veredlungsauslese kennen gelernt. Einige weitere Vorzüge dieser und Nachteile der weitständigen Pflanzkulturen mögen hier noch Platz finden:

Dichte Jugendbestockung deckt den Boden rasch und vollkommen. Dies hat besonders für die Fichte Bedeutung, die vermöge des Flachstreichens ihrer Wurzeln der stets im Gefolge der Pflanzung auftretenden Verrasung des Bodens besonders abhold ist. Auch die Buche fordert dichten Stand in der Jugend, und ähnliches gilt wohl für die meisten übrigen Laubhölzer, zumal für diejenigen mit großem Ausladungsvermögen. Wer kennt nicht die locker verjüngten Stellen in den Buchenjungwüchsen, die sich sofort nach der Freistellung, zumal auf Kalk- und Tonboden, mit dichtem Grasfilz bedecken, in den sich dann

im Winter die Mäuse des ganzen Schlags zusammenziehen, um die ohnehin lockere Bestockung vollends ganz zu vernichten und auch noch in die benachbarte geschlossene Verjüngung einzugreifen? Hohe Ergänzungskosten, Kollerwüchse, Frostlöcher u. s. f. sind die Folgen lockerer Laubholzverjüngung.

Beschädigungen einzelner Individuen und kleiner Gruppen, die vielfach unvermeidlich sind, wie Schlagschäden, Rüsselkäferfraß, Wildverbiß u. s. w. bringen bei reicher Naturverjüngung keinen Nachteil, denn die große Pflanzenzahl bietet hier den Vorteil, daß kleine Schäden in der Regel keine wirtschaftlichen Arbeiten zur Folge haben müssen; etwa entstehende kleine Lücken schließen sich auch ohne Ergänzung rasch wieder.

Ferner sichert dichte Jugendbestockung die Astreinheit des unteren Schafts, die gerade für diesen Baumteil von besonderer Bedeutung ist, weil er zu Schnittwaren verarbeitet zu werden pflegt. Diese Astreinheit ist aber im Fall dichter Begründung selbst bei sehr früh einsetzender starker Lockerung des Schlusses noch in weit höherem Maß zu erreichen, als im gleichen Fall beim weitständigen Pflanzbestand, denn die Verhältnisse liegen in beiden Fällen für die Wirkung starker Eingriffe sehr verschieden; das darf nicht übersehen werden. Es ist in der Wirkung durchaus nicht dasselbe, wenn man einen Bestand erst dicht verjüngt und dann früh kräftig lockert und wenn man ihn gleich von Haus aus weitständig begründet! Im Pflanzbestand bleiben die ohnehin stark entwickelten unteren Aeste bei früher Lockerung nur um so länger erhalten, während sich in dichtem Jugendbestand starke untere Aeste überhaupt nicht ausbilden konnten und die schwachen meist längst abgestorben sind, so daß hier die Pflanzen die Wuchsanregung, die ihnen eine frühe kräftige Lockerung gibt, nur zu stärkerem Wuchs im oberen Teil ihrer Krone verwenden. Ähnliches gilt für den Boden! Im Pflanzbestand haben sehr frühe Eingriffe die üble Folge, daß die ohnehin lästige Unkrautdecke noch länger erhalten bleibt, während dieselbe in dichter Naturverjüngung überhaupt fehlt, und dann auch bei starker Lockerung nicht Zeit hat, sich anzusiedeln. Es kann demnach im dichten naturverjüngten Bestand eine kräftige Lockerung des Kronendachs schon sehr frühzeitig einsetzen, ohne die Nachteile nach sich zu ziehen, die dabei dem weitständigen oder frühgelichteten Pflanzbestand drohen.

Ebenso ist Menge und Wert des Durchforstungsmaterials abhängig von der Bestockungsdichte. Kein Verfahren liefert bekanntlich wertvolleres Reinigungs- und Durchforstungsmaterial, bessere und schlankere Stangen, als Naturverjüngung mit dichtem Stand in allererster Jugend. Für den regelmäßigen Pflanzbestand im Gegensatz zur Naturverjüngung erwähnt Gayer (Gemischter Wald, S. 118) mit Recht — neben Aestigkeit und geringer Holzqualität — die Schwierigkeit der Auswahl der zu entfernenden Stämme bei der Durchforstung.

Auf die zahlreichen Vorteile großer Pflanzenzahl weist unter Anderen in neuester Zeit wieder Frömbling¹⁾ in seinem schon erwähnten Aufsatz nach-

1) Vergl. auch den neueren Aufsatz desselben Schriftstellers in der Zeitschrift f. F. u. J.wesen 1909 S. 660 ff.

drücklich hin, indem er insbesondere die „neuerdings übliche äußerste Beschränkung der Samen- und Pflanzenmenge“ bei der künstlichen Bestandesbegründung bekämpft. Und Martin beruft sich in seinen „Folgerungen der Reinertragslehre“ Bd. V. S. 105 auf die Statistik als einen Beleg dafür, daß in zivilisierten und wirtschaftlich fortschreitenden Staaten nicht die weitständige, sondern die enge Bestandesbegründung die Regel bilden müsse.

Anders die schon erwähnte Auffassung Tichys (l. c. S. 57), die ganz von der Bedeutung der wirtschaftlichen Auslese absieht und die Stammzahl der jugendlichen Altersklassen von dem Maß der Verwertbarkeit des schwachen Holzes abhängig sein läßt. Dieses Moment mag nun wohl in der Bewirtschaftung abgelegener Gebirgstäler scharf hervortreten, die Tichy in erster Linie im Auge hat, in den wirtschaftlich entwickelteren Gegenden, besonders Deutschlands tritt es meist zurück, hier sind im Gegenteil die schwachen und schwächsten Sortimente vielfach volkswirtschaftlich von hoher Bedeutung, ja unentbehrlich.

In enger Verbindung mit dem Besprochenen steht ein anderer Nachteil der Pflanzung auf der Kahlfläche, der mit der geringen Pflanzenzahl zusammenhängt, und der uns besonders nachteilig bei der Fichte entgegentritt, d. i. das unnatürliche, ungesunde, meist allzu üppige Aufwachsen der Pflanzkulturen.

Am schärfsten tritt das Unnatürliche wohl bei der Fichte hervor. Waten wir z. B. durch die weiten, mit kniehohem Grasfilz bedeckten Kahlschläge, wo aus dem Grase die in den ersten Jahren gelben, kränklichen Pflanzfichten kaum hervorsehen, — gehen wir in der brütenden Mittagshitze des Hochsommers durch die weiten sonnendurchglühten reinbestockten Fichtenjungwuchsflächen unserer heutigen Großschlagwirtschaft, so verspüren wir am eigenen Leib und merken am Tritt unseres Fußes auf dem ausgedörrten Boden, daß hier nicht die Atmosphäre herrscht und nicht die Bodenverfassung gegeben ist, welche die Natur der Fichtenjugend zugeordnet hat, und die deren gesundes Wachstum verbürgt. In der Tat ist kein größerer Gegensatz denkbar, als derjenige zwischen der Großschlagfläche und den Orten, an denen die Natur die Fichte nachzieht, dem kühlen schattigen Altholzrand und dem ungleichaltrigen Wald! Gerade extreme Witterungsverhältnisse — die heißesten Hochsommertage, die trockensten Tage von Dürreperioden — müssen wir zu unseren Betrachtungen und Beobachtungen wählen, wenn wir zu richtigen Ergebnissen gelangen wollen. Zwar scheinen uns die jungen Fichtenpflanzbestände selbst Lügen zu strafen, denn sie zeigen ja, sobald sie des Grasfilzes Herr geworden sind, ein vielfach geradezu üppiges Gedeihen. Doch das ist nur schöner Schein. Gayer spricht von der „Treibhausluft gleichaltriger Hochwaldbestände“ und betont (l. c. S. 123) die geringe Ausdauer und Widerstandskraft der Pflanzbestände. „Es wäre,“ sagt er, „eine Ausnahme von dem allgemein bei allen Organismen zutreffenden Naturgesetz, wenn schon von früher Jugend auf forciert gemästete Bestände die gleiche Lebensenergie im höheren Alter besitzen sollten, wie Bestände, deren Hauptentwicklung in das Alter voller Mannesstärke fällt.“

Ursache der üppigen Jugendentwicklung ist aber die freie Stellung aller einzelnen, gleichmäßig über die Fläche verteilten Pflanzen, für die der beste Boden bei der Pflanzung vielfach zusammengegräbt wurde, der volle Lichtgenuß und die freie unbeschränkte Wasserzufuhr von oben, im Gegensatz zu Anflug, der gedrängt steht und von dem durch die Mutterbäume Licht und Wasser teilweise abgehalten werden.

Diesem üppigen Aufwachsen der Pflanzen in der ersten Jugend folgt — und das ist unseres Erachtens der erste und wichtigste Nachteil besonders des reinen Fichtenbestandes — nur zu früh, d. h. mit Beginn des Bestandesschlusses ein allgemeines Stocken des Wachstums durch Verengung des Standraums und ein Rückgang der Nahrungs- und Wasserzufuhr, denn der Lichtgenuß wird durch die Nachbarn geraubt, der von der letzten Generation her in der obersten Schicht mineralisch bereicherte Boden ist ausgesogen, während im besondern die Fichtenwurzel wenig Fähigkeit hat, sich in die Tiefe zu entwickeln und dort Ersatz zu suchen; dabei hält das Kronendach mehr und mehr Wasser zurück, das alles, während doch das größer werdende Individuum einen immer steigenden Bedarf hat, soll das Wachstum in gleicher Weise weiter gehen. So muß notwendig, und zwar ziemlich plötzlich, Stockung im Wachstum eintreten, an der auch die ersten schwachen Durchforstungen noch nicht viel ändern können. Der Nachteil der Stockung nach üppigem Wuchs ist in erster Linie ein physiologischer; solcher Entwicklungsgang muß ungünstig auf die Gesundheit der Individuen wirken, was auch aus dem oben zitierten Ausspruch Gayers hervorgeht. Schon gebildete Organe treten wieder außer Funktion, nicht nur Zweige über dem Boden, sondern auch Wurzeln unter demselben; das scheint für die wurzelempfindliche Fichte besonders bedenklich und kann leicht zu Wurzelfäule führen. Dabei hat sich in dieser Zeit des üppigen Wachstums im Innern des Schafts ein Kern weitringigen Holzes gebildet, der bei der Fichte im besondern aus großen Mengen lockeren Frühholzes besteht und später eine leichte Beute der Rotfäule wird.

Noch einen weiteren Nachteil hat der unnatürliche Wachstumsgang des reinen Fichtenpflanzbestandes. Die Forstbenutzung fordert vom Nutzholz möglichst gleichmäßige Breite der Jahrringe, also von Jugend auf sich stetig steigerndes Wachstum, während hier das Wachstum mit sehr breiten Ringen einsetzt und die Ringbreiten nach Eintritt des Schlusses rasch abnehmen, bis die Durchforstungen eingreifen. Wir erhalten also hier ungleiche Struktur und technisch weniger wertvolle Ware ¹⁾.

1) In bezug auf diese wie die folgenden Ausführungen mag hier an einige Sätze Robert Hartigs aus seiner Schrift: „Das Holz der deutschen Nadelholzbäume“ erinnert werden. Es heißt dort: S. 63: „Im eng geschlossenen Bestand der natürlichen Verjüngungen ist die Qualität des Holzes von Jugend auf eine relativ große, mag der Bestand annähernd gleichaltrig oder ein aus verschiedenen Altersklassen gemischter Plänterwald sein. Zwar leidet die Schnellwuchsigkeit durch die Beschattung der etwa vorhandenen höheren Altersklassen. Das Holz bleibt in der Jugend schon eng-ringig, dagegen ist die Qualität von Anfang an eine hochwertige.“ Und S. 67: „Die geschätzte Ware ist die feinringige, aus geschlossenen Waldbeständen stammende, besonders das Holz aus Beständen, welche der natürlichen Verjüngung entsprungen sind“. Und endlich S. 105: „Das beste Holz wird erzeugt bei stetigem Bodenschutz, also natürlicher Verjüngung, mäßiger Durchforstung, starker Lichtung im höheren Alter behufs Förderung der Massenproduktion unter gleichzeitiger Herstellung des Bodenschutzes durch natürlichen Anflug“.

Diesem Wachstumsrückgang durch den Bestandesschluß sucht bei der Fichte die schon erwähnte Worliker Bestandeserziehung (S. 57) entgegenzuwirken, indem sie mit Eintritt des Schlusses sofort sehr kräftige Durchhiebe vornimmt. Dadurch entgeht sie nun zwar den geschilderten Nachteilen und erhält das Wachstum der seitlich unbeengten Individuen bis zur Mitte der Umtriebszeit in entsprechender Höhe, tauscht aber dafür empfindlichen Schaden an der Nutzholzqualität ein. Sch w a p p a c h und R e b e l, die dieser Methode der Erziehung des Fichtenbestandes das Wort reden, scheinen uns zu geringes Gewicht auf die Tatsache zu legen, daß hier in den ersten 50 Jahren am untern Stammteil ein sehr weitringiges und astreiches Holz erwächst. Es ist dies unseres Erachtens ein entscheidender Nachteil, der die Anwendung des Verfahrens im großen ausschließt, denn gerade der untere Stammteil ist derjenige, der sich vermöge seiner Dimensionen besonders zur Verarbeitung zu Schnittwaren i. e. S. eignet, für die gleichmäßiger Jahrringbau und möglichste Astreinheit erste Erfordernisse sind, und der, wenn er diese Eigenschaften besitzt, besonders hoch bewertet wird. Weit weniger sind heute bei Fichte und Tanne diese Eigenschaften für den oberen Stammteil ein technisches Bedürfnis, vielmehr kann das Gipfelstück mehr oder weniger astig sein, da es mit Vorteil doch nur zu Bauholz verarbeitet wird. Die technische Verwendung des Fichtenstammes wird also auf Astreinheit und gleichmäßigen Jahrringbau für die unteren 5 oder 10 m des Schaftes hinweisen, während von hier ab bis zum Gipfel Astigkeit kein Moment der Entwertung bildet. Der Worlikerstamm aber zeigt entgegengesetzte Eigenschaften: am untern Stammende breite Jahrringe und dicke Aststummeln im Innern, was kann da die Schale feinjährigen, astreinen Holzes nützen, die solchen Kern umgibt? Nach oben zu ist die Jahrringbildung eine gleichartigere, was aber angesichts der Verwendung zu Bauholz, bei der man nur Vollholzigkeit schätzt, weniger Bedeutung hat.

So kommen wir wieder, um das Gute, das in dem Gedanken der Worliker Bestandeserziehung liegt, unter Vermeidung der Nachteile für den Wald nutzbar zu machen, zu dem Vorschlag, von dichter Jugendbestockung auszugehen und erst allmählich zu starker Lichtung fortzuschreiten, nämlich dann, wenn sich der unterste Schaftteil von Aesten gereinigt hat. So wäre es möglich, das Ziel höchster Massenerzeugung zugleich mit andern Vorteilen zu erreichen; denn daß auch dann noch durch entsprechende Eingriffe vieles in bezug auf Massenerzeugung zu erreichen ist (das Vorausgehen normaler Kronenpflege vorausgesetzt), zeigt das von Sch w a p p a c h (Zeitschr. f. F. u. J. wes. 1905 S. 18) mitgeteilte Beispiel, in dem uns der Entwicklungsgang der Versuchsfläche „Warnen 174“ entschieden besser erscheint, als derjenige von „Padrojen 30“, denn erstere hat bei astreinerer Erziehung und wertvollerem Durchforstungsmaterial im 40-jährigen Alter die gleiche Masse erreicht, wie letztere, die schon mit 25 Jahren stark verminderte Stammzahl zeigte.

Auch die K i e f e r n pflanzung steht bei erfahrenen Praktikern vielfach in

Von neueren Veröffentlichungen vergl. insbesondere J a n k a s Untersuchungen über die Elastizität und Festigkeit der österreichischen Bauhölzer. III. Fichte (Mitt. aus dem forstl. Versuchswesen Oesterreichs Heft XXXV).

schlechtestem Ruf. So sagt Frey (Forstw. Centralbl. 1907 S. 649), Kiefernplantation liefere keine Nutzhölzer. Er betont die besondere Krummwüchsigkeit der Pflänzlinge — wohl ebenfalls von ihrem üppigen Aufwachsen herrührend — und fordert dichte Jungwüchse, Naturverjüngung, wie früher, oder Saat mit heimischem Samen.

Die geschilderten und andere Nachteile einer weiten Pflanzung, wie die durch große Pflanzenzahl bedingten Vorteile, weisen uns also wieder auf die Naturverjüngung hin, die uns, im Gegensatz zur Pflanzung, eine naturgemäße Jugendentwicklung, sowie entsprechende Grundlagen für gute Erziehung der Bestände sichert.

Der angebliche Vorteil stufigeren Wuchses und besserer Wurzelentwicklung, daher größerer Standfestigkeit, welcher der Fichtenpflanzung als ausschließlicher Vorzug gegenüber der Saat, und vielfach auch gegenüber dichter Naturverjüngung nachgerühmt wird (vgl. z. B. Bargmann l. c. S. 164), kommt jedenfalls nicht ihr allein zu, denn nichts hindert die Wirtschaft, Saaten oder natürlich entstandene Jungwüchse bis zur kritischen Zeit ebenso stufig und weitständig werden zu lassen, wie es der Pflanzbestand ist. Wenn wir nur einen Teil der bei Naturverjüngung im Vergleich zur Pflanzung ersparten Arbeit auf die Durchreiserung der Anflüge verwenden, so ist gleicher Erfolg bald erreicht! Dann aber haben diese eine viel bessere Bewurzelung voraus, eine solche, die auch gesünder bleiben wird, als diejenige der Pflanzung. Wenn Saatbestände oder gleichaltrige Naturverjüngungen sich tatsächlich da und dort weniger sturmfest erwiesen haben sollten, als Pflanzungen, so rührt das nicht von der Art der Begründung, sondern von der mangelhaften Jugenderziehung her, sonst müßte das Gegenteil der Fall sein.

Das führt zu einem weiteren Moment, das ist:

Die Naturwidrigkeit der Fichtenpflanzung ¹⁾.

Wenn hier noch im besonderen der Pflanzung gedacht wird, so geschieht dies, weil es als wesentlicher Vorzug der Naturverjüngung hervorgehoben werden will, daß sie die durch Wurzelverstümmelung stets mehr oder weniger naturwidrige Pflanzung des Großbetriebs ausschaltet, soweit dies wirtschaftlich

1) Die nachfolgenden Betrachtungen sind vielfach mißverstanden worden (z. B. von Pause Allg. F. u. J. Zeitg. 1908 S. 352). Selbstverständlich will Verf. die große wirtschaftliche Bedeutung der Fichtenpflanzung als solche — so wie die Verhältnisse im Wald nun einmal heute liegen — nicht in Abrede ziehen, nicht die großen Erfolge leugnen, die mit ihrer Hilfe erzielt worden sind, bildet sie ja doch in vielen Fällen die einzige Möglichkeit, um überhaupt zu guter und ertragsreicher Waldbestockung zu gelangen. Die nachfolgenden Ausführungen wenden sich vielmehr, wie die ganze Schrift, gegen eine Tendenz in unserem Fach, die von kameralistischem (ja nicht zu verwechseln mit ökonomischem!) Geiste beseelt, unsere ganze Wirtschaft einer bequemen zeitlichen Etatsordnung untergeordnet hat und die das Pflanzen deshalb als das höchste und vollkommenste der forstlichen Kunst preist, weil sie allein ihr willig Handlangerdienste tut. Es handelt sich somit hier nur darum, zu zeigen, daß die Pflanzung nicht jener Inbegriff höchster Vollkommenheit der Forstwirtschaft ist, sondern

überhaupt möglich ist. Das ist unseres Erachtens ganz besonders im Interesse der Fichte zu begrüßen, und es soll, um die entscheidende Bedeutung der Naturverjüngung gerade für diese Holzart zu zeigen, hier die Verwerflichkeit der üblichen Fichtenpflanzung im besonderen nachgewiesen werden. Die andere künstliche Verjüngungsart, die Saat, ist gerade bei der Fichte in der Regel so wenig erfolgreich (vgl. v. Uiblagger forstw. Zentralbl. 1904, S. 463), daß sie praktisch jedenfalls für heutigen Großbetrieb nur selten in Frage kommt.

Was für die Fichte in bezug auf Pflanzung gilt, trifft dann übrigens, wenn auch in wesentlich geringerem Maße, bei den andern Holzarten zu.

Die Fichte gilt ziemlich allgemein als eine der leichtest zu erziehenden und zu pflanzenden Holzarten, sie wird ja auch fortgesetzt, wie keine andere, in ungeheuren Mengen gepflanzt. Trotzdem möchten wir unser auf S. 20 abgegebenes Urteil aufrecht erhalten und zwar trotz Hügel- und Lochhügelpflanzung, Anwendung von Verschulmaschinen und andern Hilfsmitteln einer fort-

Fig. 12.

4jähr. Anflugfichte mit relativ normaler Länge und natürlicher Lagerung der Wurzeln.

geschrittenen Technik, die ja ohne Zweifel für die Wirtschaft sehr zu begrüßen sind gegenüber einem großen Teil der früher üblichen und empfohlenen Verfahren. Die Fichte ist wohl die am leichtesten zu erziehende und zu verpflanzende Holzart, aber sie ist das am schwersten richtig zu erziehende und zu pflanzende forstliche Gewächs.

Verfasser kennt keine Holzart, kaum ein Gartengewächs, das bei der Pflanzung so schwer richtig in den Boden einzusetzen wäre, wie eben die Fichte. Es rührt dies von der Beschaffenheit und den physiologischen Bedürfnissen der Bewurzelung her. Die Fichte hat unbestritten eine sehr weitausgreifende und luftbedürftige, dabei zart gebaute Bewurzelung, ihre Wurzeln

daß sie, richtig betrachtet, vielmehr nur einen mit zahlreichen Mängeln behafteten Notbehelf darstellt, von dem Gebrauch zu machen ist, wo bessere Mittel versagen. Wir wollen die Pflanzung nicht aus der Wirtschaft streichen, sondern wollen sie nur auf den ihr gebührenden Platz zurückgedrängt wissen, denn sie verdankt ihre weitverbreitete Herrschaft eben jenem kameralistischen System, unter dem der Wald ein Jahrhundert lang geseufzt hat. Sie soll ultima ratio der Wirtschaft bleiben, aber die Forstwirtschaft soll lernen, sich so einzurichten, daß sie von dieser ultima ratio so wenig als möglich Gebrauch machen muß.

streichen, wo keine wirksame Durchlüftung des Bodens möglich ist, im kritischen Alter flach unter der Bodenoberfläche hin (vgl. die beigelegte, nach der Natur hergestellte Skizze Fig. 12), bei ausreichender Bodendecke zum größten Teil sogar zwischen mineralischem Boden und Bedeckung oder vollständig innerhalb letzterer, die Lagerung ist somit eine mehr oder weniger horizontale, wobei die Länge der Wurzeln die Höhe der Pflanzen meist übertrifft. Die Bewurzelung ist daher augenscheinlich für die Lagerung im Boden sehr empfindlich (vgl. H. Reuß: Ueber die nachteiligen Einflüsse naturwidrig mißhandelnder Pflanzmethoden auf die Bestandeszukunft mit spezieller Bezugnahme auf die Fichte). Im Pflanzgarten kommt dies weniger zur Geltung, denn hier finden die Wurzeln einen gelockerten humusdurchsetzten Boden, der im Lauf des Jahres durch Behacken locker erhalten wird, die Pflanze bleibt überdies nicht lange dort. Erst durch die Verpflanzung ins Freie, wo sie in mehr oder weniger undurchlüfteten Boden eingebettet und weiterhin ihrem Schicksal überlassen wird, tritt diese ihre Eigenschaft schärfer hervor. Da zeigt sich dann, daß die Fichtenwurzel physiologisch an ein ganz bestimmtes Niveau gebunden ist, bestimmt durch Bedeckung und Lockerheitsgrad des Bodens, und daß sie nur da leben und wachsen kann, wo ihr der nötige Sauerstoff zugeführt wird ¹⁾.

Die normale Lage der Fichtenwurzeln im Boden während des kritischen Alters von 2 Jahren (für Verschulung) und von 4—5 Jahren (für Verpflanzung)

Fig. 13.

2 jährige Anflugfichte.

Fig. 14.

4 jährige Anflugfichte.

ist leicht festzustellen. Man entfernt den locker aufliegenden Bodenüberzug (Moos, Streu) rings um Anflugpflanzen dieses Alters und zieht dieselben langsam aus der Erde. Man findet dann, wie bekannt:

1. Daß die Wurzeln zum größten Teil mehr oder weniger wagrecht verlaufen und um so weniger in den Boden eindringen, je schwerer er ist, und

1) Vergl. auch: Gräbner: „Beiträge zur Kenntnis nicht parasitärer Pflanzenkrankheiten an forstl. Gewächsen Zeitschrift f. F. u. J. wesen 1909 S. 578. Gräbner gibt hier interessante Einzelheiten über Verlegung des Wurzelhorizonts bei Fichten und zwar infolge von Erhöhung der Bodenoberfläche durch Rohhumus. Die untersuchten Individuen bildeten immer wieder neue Adventivwurzeln in höherer Lage, während die tieferen Wurzeln allmählich außer Funktion traten. — Auch sonst ist die Abhandlung eine Fundgrube für Fragen der Wurzelentwicklung.

je günstiger die Bodendecke wirkt. Bei geeigneter Bodenbedeckung verlaufen die Wurzeln zumeist zwischen dieser und dem mineralischen Boden.

2. Daß die wagrechte Entwicklung der Wurzeln die Höhe der Pflanzen stets erreicht, oft weit übertrifft (vgl. die Skizzen Fig. 13 und 14).

Wenn wir die Pflanzen aus der Erde nehmen und in der Hand halten, so hängen die Wurzeln allerdings senkrecht herab; aber nur die Gedankenlosigkeit wird daraus entnehmen, daß sie auch so in der Erde gelagert waren. Solche Pflanzen nun in ihrer natürlichen Wurzelbeschaffenheit und richtigen Wurzellage verpflanzen zu wollen, wäre unmöglich; man muß also die Bewurzelung für die Pflanzung umformen, somit in ihre natürlichen physiologischen Verhältnisse ändernd eingreifen. Man schafft einen „Wurzelballen“, den die Fichte von Natur nicht bildet. Das geschieht durch das Verschulen.

Die von Natur mehr oder weniger wagrecht wachsenden Wurzelfasern werden beim Verschulen senkrecht in den Boden gebracht, wie beifolgende Skizzen (Fig. 15 und 16) andeuten, wie übrigens überall zu sehen und gar nicht anders zu machen ist, man denke nur an die Verschulbretter- und Maschinen, in denen die Verschulpflanzen eingehängt sind, um mit senkrecht hängenden Wurzeln in den Boden gebracht zu werden. Also schon dieses Verschulen der Fichte ist ein durchaus naturwidriges Verfahren, wenn auch weiterer Schaden in der gelockerten Pflanzbeeterde vorerst nicht entsteht. (Trotzdem zieht Verf. eine gut erzogene 3 jährige Saatfichte einer 4 jährigen, 2 jährig verschulten, für Freipflanzung entschieden vor.)

Siehe Fig. 15 und 16 Seite 72.

An Stelle der weit ausstreichenden Wurzeln im unbearbeiteten Waldboden entsteht im gedüngten und gelockerten Gartenbeet ein mehr oder weniger dicht gebauter Wurzelballen, eine Idealform für das Pflanzgeschäft, das keine langen Wurzelfasern brauchen kann, und physiologisch einem tiefgelockerten nahrungsreichen Boden angepaßt. Die so angepaßte Pflanze nun wird auf die Waldfläche gebracht, also in Lebensverhältnisse, für die ihr Wurzelsystem physiologisch nicht geeignet ist; man hat somit die Fichte vorher dem Pflanzgeschäft zuliebe in enge Formen gezwängt, ohne die Verhältnisse zu berücksichtigen, unter denen sie nachher leben soll. So muß sie bei der besprochenen Empfindlichkeit ihrer Wurzeln eine vollkommene Wandlung vornehmen; es gehen denn auch alle Wurzelteile, die durch die Pflanzung unter physiologisch falsche Bedingungen gebracht wurden, früher oder später zugrunde und müssen erst durch richtig gelagerte ersetzt werden. Den Schilderungen der Wirkung schlechter Pflanzung, die H. Reuß l. c. S. 7 gibt, ist wohl kaum etwas beizufügen, Verfasser möchte aber ebenso die heutigen sorgfältigeren Verfahren, wenn auch nicht für so schädlich, so doch für nicht einwandfrei halten. Vergleichen wir z. B. die durch v. Uiblagger l. c. S. 477 gegebene Abbildung der Lochhügelpflanzung, so wird zugegeben werden müssen, daß selbst bei ihr die Lagerung der Wurzeln nicht der natürlichen Lagerung im Boden entspricht, die Pflanze wird auch hier Umbildungen vornehmen müssen.

Wenn nun weiterhin die Pflanzung besprochen wird, so geschieht dies ohne Hinblick auf ein besonderes Pflanzverfahren.

Wir haben gesehen: Die Fichte muß mit ihren Wurzeln in ganz bestimmte Tiefe und Lage im Boden gebracht werden.

Fig. 15.

2 jährige Fichte. Natürliche Lage
der Wurzeln.

Fig. 16.

2 jährige Fichte. Wurzellage.
nach der Verschulung.

Zu hoch pflanzen, was an sich physiologisch weniger nachteilig wäre, verbietet sich von selbst, weil die Pflanze hier keinen Halt hat, leicht vertrocknet, in ihren Wurzeln durch Regen und Wind bloßgelegt wird und später zahlreichen Beschädigungen ausgesetzt ist, während die Stämme bei solcher Pflanzung in erhöhtem Maß der Gefahr des Schneedrucks oder Windwurfs unterliegen. In Stangenhölzern, die durch Hügelpflanzung entstanden sind, ist es (besonders auf Tonboden und in feuchter Lage) manchmal geradezu möglich, die Stangen mit der Hand umzudrücken, so oberflächlich haften sie am Boden.

Viel häufiger kommt vor und viel schlimmer wirkt das Zutiefpflanzen. Setzen wir nämlich die Fichte nur um ein geringes, um wenige Zentimeter, zu tief ein, und fehlt den Wurzeln die nötige Luftzufuhr, so hat das ein Kränkeln und allmähliches Absterben derselben zur Folge. Alles, was zu tief in den Boden gelangt, und dies ist meist der ganze Wurzelballen, tritt allmählich außer Tätigkeit, stirbt rascher oder langsamer den Erstickungstod.

Davon sehen wir nun freilich nichts. Was wir sehen ist nur, daß die Pflanze, oder gegebenenfalls die ganze Pflanzkultur, für ein oder mehrere Jahre im Wachstum stockt und meist ein gelbliches, kränkliches Aussehen zeigt, bis sie dann früher oder später zu wachsen beginnt. Nun scheint alles gewonnen! Während dieser Zeit der Stockung suchen sich die zu tief eingesetzten Pflanzen, sofern sie die entsprechende Lebenskraft besitzen, den durch die Tiefpflanzung gegebenen Verhältnissen anzupassen. Der zu tief eingesetzte Wurzelballen arbeitet zwar mit den vorhandenen Organen weiter und leitet das erforderliche Wasser zu, er wird das umso leichter und länger tun können, je lockerer, luftführender der Boden ist, in den er eingesetzt wurde; von Bildung zahlreicher neuer oberirdischer Organe, lebhaftem Weiterwachsen wird dagegen zunächst keine Rede sein. Der alte Wurzelballen ist also im allgemeinen nur befähigt, die Pflanze für mehr oder weniger lange Zeit am Leben zu erhalten. Diese hilft sich nun dadurch zu normaler Weiterentwicklung, daß sie, und zwar an den in den Boden gelangten ehemals untersten Astquirlen, in physiologisch richtiger Höhe und Lage ein neues Wurzelsystem bildet (Fig. 17). Davon kann sich jedermann durch Ausziehen von Fichten überzeugen, die vor mehreren Jahren gepflanzt wurden, das zeigen aber auch in klassischer Weise die zahlreichen Abbildungen in der oben angeführten Schrift von H. Reuß. Wo nur ein Teil der Wurzeln, nicht der ganze Wurzelstock zu tief in den Boden gekommen ist, treten nur diese außer Tätigkeit und die Rückkehr zu normalem Gedeihen geht rascher vor sich.

Fig. 17.

7 jährige Fichte, 4 jährig zu tief gepflanzt.

Bei Verschulpflanzen fallen diese Bildungen, obgleich ebenfalls vorhanden, noch wenig ins Auge, weil die Abstände zu gering sind, der ursprüngliche Wurzelknoten von den überhängenden Sekundärwurzeln zugedeckt und eingeschlossen ist, und weil insbesondere in dem gelockerten Boden der Pflanzbeete und bei der kurzen Zeit, welche die Pflanzen dort zubringen, der Prozeß nur langsam fortschreitet und wenig zur Entwicklung kommt. Trotzdem sind die Verschulverfahren allgemein naturwidriger, als die nachfolgenden Pflanzverfahren, denn erstere bringen die Pflanzen grundsätzlich mit senkrecht nach unten ge-

richteten Wurzeln in den Boden, während sich die neueren Pflanzverfahren wenigstens bemühen, die Wurzeln in die richtige Lage zu bringen.

Hat nun auf solche Weise die Pflanze eine neue, normal gelagerte und daher richtig arbeitende Bewurzelung geschaffen, so daß ihr Wurzelvermögen ihrem Blattvermögen wieder entspricht, so beginnt wieder normales Wachstum, die Pflanzung zieht, und der Wirtschafter ist befriedigt. Der alte Wurzelknoten aber tritt nun außer Tätigkeit und stirbt ab.

Bei normaler Pflanzung darf — auch im ersten Sommer — ein Stillstehen des Wachstums überhaupt nicht stattfinden. Ist dies dennoch der Fall, so liegt der Schaden nicht allein an der bei der Pflanzung unvermeidlich eintretenden Verringerung des Wurzelvermögens, die Stockung im Wuchs ist vielmehr, wo nicht unverantwortliche Behandlung des Pflanzmaterials oder sonstige besondere Schädigungen die Schuld tragen, durch Zutiefpflanzen verursacht. Damit trägt ein großer Teil der jungen Kultur überhaupt schon den Todeskeim in sich. Die Achillesferse der Pflanzfichten ist nach unserer Ueberzeugung der langsam sterbende alte Wurzelstock. Je älter die Fichte bei der Pflanzung war, und je langsamer der Stock z. B. in lockerem Boden abstirbt, umso schlimmer wird es sein. Der alte Wurzelstock bildet einen faulenden Kanal, der in das Herz des Stamms führt, der nur bei raschem Absterben zeitig überwältigt werden kann. Hier können die Wurzelpilze, sofern sie sich im Boden befinden, schon früh und ungehindert ihren Einzug halten. Diese Gefahr ist nicht beseitigt, auch wenn der Pflanzbestand nach Erneuerung der Wurzeln ein noch so üppiges Wachstum entwickelt. Im Gegenteil, das Ergebnis dürfte ein umso schlimmeres sein, je üppiger er wächst, denn dann umgibt den Fäulnis Kanal ein umso lockereres Gewebe, in das der Pilz leicht eindringen kann, sobald der Pflanzbestand ins Hungerstadium seiner Entwicklung kommt. Dürfen wir uns da wundern, wenn uns vielfach in Pflanzbeständen schon im Stangenholzalter besonders auf lockerem (Kalk-, Sand-, Acker-)Boden rotfaule Stangen in großer Menge anfallen, die ein übles Anzeichen für die Bestandesgesundheit bilden?

Verfasser ist daher geneigt, das, was man heute mit Recht dem früheren Ackerboden nachsagt, daß auf ihm die Rotfäule herrsche, bis zu einem gewissen Grad auf alle schlecht eingesetzten Pflanzbestände zu übertragen und ihnen keine allzuhohe Lebensdauer zuzutrauen. Es steht zu befürchten, daß uns als Frucht des Zeitalters der Fichtenpflanzung vielfach noch recht unliebsame Ueberraschungen auch nach dieser Richtung bevorstehen ¹⁾.

Ist es nun an sich schon schwer, die Fichtenwurzeln in die ihnen zusagende Lage zu bringen, so treten auf der Kahlfläche im Wald noch entscheidende **Erschwerungs momente** hinzu.

Die schlimmste Erschwerung bildet häufig der Boden, in den g e p f l a n z t werden muß. Bei den nach Boden, Holzart, Lage u. s. w. so vielfach wechselnden Bedingungen ist es schwer, dem Aufsichtspersonal und

¹⁾ Vergl. auch Vogls Aeußerung über die Rotfäulegefahr der Pflanzbestände Allg. F. u. J.Ztg. 1902 S. 313. Er sagt dort unter anderem: „Allerdings nicht alle, unzweifelhaft aber viele Fichtenpflanzungen werden wir den Nachfolgern als Faulholzbestände hinterlassen, als Errungenschaft der Kahlhiebs-Blößenwirtschaft“.

den Arbeitern Regeln zu geben, und solche sind doch im großen Betrieb notwendig, denn auf selbständiges Denken ist nicht immer zu rechnen. Ungünstige Beschaffenheit des Bodens, Verdichtung, Verrasung, Verwurzelung, die im Frühjahr so häufige Nässe, starker Tongehalt erschweren gutes Pflanzen ungemein und machen es oft, da mehrere dieser ungünstigen Momente zusammenzutreffen pflegen, tatsächlich unmöglich. Da müssen dann die zarten luftbedürftigen Fichtenwurzeln nicht selten in einen wahren Teig eingeknetet werden, der bei nachfolgender Trockenheit zu einer harten Kruste wird; im grauen Ton sieht dies oft aus, als wären die Pflanzen einbetoniert. Und solches läßt sich nicht einmal freundlich dem Auge und der Sonne durch Rasen, Humus, Laub oder Moos verdecken, denn dadurch würde dem Rüsselkäfer ein willkommener Unterschlupf geschaffen. Hier versagen all die schönen Pflanzmethoden!

Ungünstig wirkt weiter bei der für die Pflanzhöhe so empfindlichen Fichte das nachträgliche Sichsetzen des Bodens als Folge der Auflockerung bei der Pflanzung, verstärkt durch Humusgehalt und Beimischung von Bodenüberzug; dazu kommt das auf berastem oder mit starker Humusschicht versehenem Boden notwendig vorausgehende Entrasen der Fläche und teilweise Entfernen des Humus, alles Momente, die darauf hinwirken, die Pflanze zu tief in den Boden zu bringen. Tatsächlich wird auch die Fichte meist zu tief gepflanzt.

Noch hervorzuheben wäre von den Untugenden bei der Pflanzung, die nicht alle aufgezählt zu werden brauchen, da sie jedem Praktiker bekannt sind, das Einseitigpflanzen, welches das Wachstum hemmt und die Standfestigkeit vermindert. Dasselbe kann nur bei intensivster Aufsicht verhindert werden, da es die bequemste Pflanzart ist: kaum wendet der Aufseher den Rücken und flugs wird mit der Hand ein kleines Loch in den Pflanzhügel oder die Stufe gewählt, der Wurzelpack seitlich gesammelt und hineingestreift, rasch Erde darauf gedrückt und die Pflanze sitzt scheinbar gut!

Man wird diesen Ausführungen all die schönen Verschul- und Pflanzmethoden entgegen halten, bei denen alle Fehler vermieden werden, und die Pflanzen tadellos zu sitzen kommen. Diesem Einwand gegenüber soll gerne zugegeben werden: man kann die Pflanzung auch ohne hohe Kosten leidlich gut machen. Es gibt Pflanzmethoden, die ihre Aufgabe in durchaus zweckmäßiger Weise lösen; das ist wichtig und sehr zu begrüßen, denn wir haben leider so viele Fälle in der Praxis, wo Naturverjüngung und Saat unmöglich sind, wo wir darum auf die Pflanzung als sichersten Weg angewiesen sind, um unser Ziel zu erreichen.

Aber wie steht es in Wirklichkeit, bei der Ausführung im großen? Das allein ist für unser Urteil über Kunst- und Naturverjüngung maßgebend. Hier entscheidet nicht die Methode allein, sondern neben ihr das persönliche Moment und zwar diejenige Person, welche die Arbeit beaufsichtigt und diejenige, die sie ausführt, letztere in erster Linie, denn andauernde, ins einzelne gehende Aufsicht ist der Natur der Sache nach unmöglich.

Wenn nun auch viele sehr gute und sorgfältige Arbeiten gemacht werden, so doch noch viel, viel mehr mangelhafte, sobald es an waldbaulichem Verständnis und Interesse und an eingehender Aufsicht fehlt, davor schützt auch die beste Methode nicht. Ein scharfes Auge kann sich darüber unmöglich täuschen!

Damit kommen wir an einen weiteren, unseres Erachtens entscheidenden Punkt für die Beurteilung der Pflanzung: nämlich an die Personen, welche die Pflanzung ausführen, und dieser Punkt würde für den Verfasser, wenn er Gegenwart und Zukunft ins Auge faßt, allein genügen, die Pflanzung soweit möglich zu verlassen, beziehungsweise sie nur als notwendiges Uebel zu betrachten, — notwendig, wo die Naturverjüngung unmöglich ist oder versagt.

Wenn nach dem Besprochenen schon der Gärtner von seinen Verhältnissen aus die Fichte als eine von denjenigen Pflanzen bezeichnen müßte, die am schwierigsten richtig einzusetzen sind, so wäre vollends bei den Schwierigkeiten im rauhen Waldboden zu verlangen, daß nur gewandteste, in ihre Aufgabe eingearbeitete Personen zu dieser Arbeit verwendet werden dürfen. Wie steht es aber heute vielfach in Wirklichkeit? Unsere ausgedehnten Fichtenpflanzungen werden vorwiegend von weiblichen Arbeitskräften ausgeführt, deren Zahl und Qualität von Jahr zu Jahr zurückgeht. Es sind diejenigen Arbeiterinnen, die Fabrik und Hauswirtschaft nach Deckung ihres Bedarfs übrig lassen, und die in der Landwirtschaft vorübergehend entbehrlich sind. Die Mehrzahl der weiblichen Arbeitskräfte nimmt heute die Industrie in steigendem Maß in Anspruch, die übrigen sind größtenteils mit landwirtschaftlicher Arbeit schwer belastet, so daß wenige, und diese nur unregelmäßig für die mäßig lohnende forstwirtschaftliche Arbeit zu haben sind. Auswahl zu treffen, kann man sich also heute nicht mehr gestatten, man muß nehmen, wer kommt, und froh sein, wenn sich eine genügende Zahl von Arbeiterinnen meldet, wenn auch von oft recht zweifelhafter Güte, um nur überhaupt noch die steigenden Kulturaufgaben bewältigen zu können. In früherer Zeit war es anders, da drängten sich in den Waldgegenden aus Mangel an anderer Arbeitsgelegenheit die tüchtigsten Arbeiterinnen um geringen Lohn zum Pflanzgeschäft, da konnte noch Auswahl getroffen werden. Dieselben Personen arbeiteten, wie die alten Verzeichnisse ausweisen, viele Jahre, ja Jahrzehnte lang bei kargem Lohn alljährlich im Wald und bildeten so einen Stamm geübter und erfahrener Arbeiter. Die Alten sind in den Waldgegenden wohl noch vielfach vorhanden, aber ein entsprechender Nachwuchs fehlt. Heute arbeiten die meisten und gerade die tüchtigsten Arbeiterinnen in der Regel nur kurze Zeit im Wald, und so geht deren Erfahrung und Uebung im Behandeln der Waldpflanzen dem Wald zu seinem Schaden immer wieder verloren. Alle kommen als durchaus ungeübt in den Wald, sie haben, was das schlimmste ist, bis dahin nur Kohl und Rüben gepflanzt, bei denen bekanntlich die Regel gilt, daß sie so tief als möglich eingesetzt werden sollen, damit sie dicker werden. Hat man ihnen diese Uebung glücklich abgewöhnt und mit Mühe gute Pflanzverfahren für die verschiedenen Holzarten beigebracht, was bei 20—30 teilweise geistig beschränkten und meist sehr jugendlichen Personen je Rotte keine leichte Aufgabe ist, so geht die Kulturzeit wieder ihrem Ende zu, die Gesell-

schaft läuft auseinander, und die wenigen, die im nächsten Jahr neben vielen Neulingen wiederkommen, haben das meiste glücklich vergessen.

Mag es nun auch so schlimm, wie hier geschildert, heute an vielen Orten noch nicht sein, so geht doch unbestreitbar mit fortschreitender wirtschaftlicher Entwicklung und steigendem Verkehr die Reise nach dieser Richtung, und auch Gegenden, die sich heute noch günstiger Arbeiterverhältnisse erfreuen, gehen diesem Zustand entgegen. Schließlich werden an manchen Orten die erforderlichen Arbeitskräfte ohne große Geldopfer gar nicht mehr zu beschaffen sein. Dazu kommt, daß mit dem Steigen der Arbeitslöhne die Kulturarbeiten immer teurer werden und die Rentabilität herabdrücken, während bei der Naturverjüngung die teilweise an ihre Stelle tretenden Mehrkosten der Erziehung jedenfalls nicht hindernd in Betracht kommen, denn in guter Absatzlage werden die Aufwendungen der Erziehungshiebe früher oder später durch die Erlöse aus dem Material reichlich gedeckt; wo dies nicht der Fall ist, greifen wir in die Kasse der vorher ersparten Kulturgelder, wie wir auch bezüglich der Arbeitskräfte für die ersten Reinigungen auf die bei den Kulturarbeiten entbehrlich gewordenen zurückgreifen dürfen.

Die Arbeiterfrage allein schon, ihre heutigen und künftigen Schwierigkeiten müssen uns zur Naturverjüngung aller Holzarten, insonderheit der Fichte, hinführen. Arbeit für die verfügbaren Arbeitskräfte bleibt im Wald immer noch mehr wie genug.

Den geschilderten Nachteilen der Pflanzung im großen Wirtschaftsbetrieb können wir nur durch Naturverjüngung entrinnen; sie müssen uns veranlassen, bei der Fichte jedenfalls — unseres Erachtens aber auch bei allen andern Holzarten — grundsätzlich und allgemein zu ihr zurückzukehren, sei es selbst um den Preis eines vollkommenen Bruchs mit der heutigen räumlichen Betriebsordnung.

Sind wir so der Fichtenpflanzung gegenüber im allgemeinen zu einem Verdammungsurteil gelangt, so gibt es doch ein Verfahren, das von diesem Urteil auszunehmen ist, da ihm die besprochenen Nachteile nicht anhaften. Das ist die *Ballenpflanzung* (wo der Boden sie irgend gestattet).

Die Ballenpflanzung kann nun allerdings nicht Grundlage des Kunstverjüngungsbetriebs im großen sein, aber sie fügt sich aufs beste in den Rahmen der von uns geforderten grundsätzlichen Naturverjüngung ein.

Das beste Pflanzmaterial ist die junge (2—4 jährige) Ballenpflanze (bei der Fichte breiter und flacher, nicht schmaler, tiefgestochener Ballen). Ihre Wurzeln sind nicht verdorben durch zünftige „Pflanzenerziehung“, durch Ausheben, Einschlagen, oft während längerer Zeit, durch weiten Transport, Anschlemmen und anderes mehr; und ferner, was das Wichtigste ist, die Wurzeln bleiben im Ballen in ihrer normalen Lage und werden bei der Einpflanzung nicht aus derselben gebracht. Der Ballen enthält eine Menge unverletzter Faserwurzeln, sodaß die Pflanze, ohne erst zu kümmern, bis neue Faserwurzeln gebildet sind, sofort weiterwachsen kann

und meist weiterwächst, als ob sie immer am neuen Ort gestanden hätte. Bei richtigem Verfahren ist überdies kaum Gefahr, daß sie etwa zu tief in den Boden gebracht werden könnte.

Der einzige, unvermeidliche Nachteil für die Pflanze bei der Verpflanzung ist, daß ihr die weit ausragenden Wurzelenden abgeschnitten werden, sie wird also in ihrem Wurzelvermögen vorübergehend beschränkt, was sie aber sofort, da sie sonst keinerlei Nachteil erlitten, zu raschem lebhaftem Wurzelbilden veranlaßt, so daß der Verlust bald ergänzt ist. Die herrschende Regel, man dürfe Nadelholzwurzeln nicht kürzen, lassen wir in diesem Fall nicht gelten, denn der langsame Erstickungstod ausgedehnter Organe wirkt doch unzweifelhaft physiologisch viel ungünstiger als die scharfe Abtrennung eines Teils dieser Organe, die sofort wieder ersetzt werden können. Die Fichtenballen werden mit dem Spaten ringsum abgestochen, flach abgehoben und ebenso wieder eingesetzt ¹⁾.

Voraussetzung für dieses Pflanzverfahren, soll es wirtschaftlich anwendbar sein, ist, daß die Ballen in nächster Nähe der Kulturfläche, oder besser auf dieser selbst gewonnen werden können. Die Voraussetzungen hiefür sind bei Naturverjüngung meist in bester Weise gegeben und müßten andernfalls vorher geschaffen werden.

Das Verfahren hat noch eine Reihe weiterer Vorzüge, es ist billig und einfach, denn es findet fast kein Abgang statt, so daß nur wenige Nachbesserungen erforderlich sind, sein Erfolg ist von Witterung und Jahreszeit wenig abhängig, und der Rüsselkäfer schadet kaum (darum auch die Anwendung im sächsischen Erzgebirge), da das Stocken im Wachstum nur ein sehr geringes ist. Pflanzenerziehung im Garten samt Transport auf die Pflanzstelle fallen weg, weil bei entsprechendem Verjüngungsgang, von dem später die Rede sein wird, das Material in nächster Nähe des Pflanzorts gewonnen werden kann, wobei auch die ganze Arbeit eine übersichtlichere ist.

Erfreulicherweise mehrten sich nach lang dauernder entgegengesetzter Strömung in neuerer Zeit wieder die Stimmen, die j u n g e n ²⁾ Ballenpflanzen das Wort reden und den 3—4 jährigen Fichtensaatballen der Verschulpflanze vorziehen (schon 1791 für alle Nadelhölzer aufs wärmste empfohlen durch K n o r z in Mosers Forstarchiv XII S. 376, ebenso während des ersten Drittels des vorigen Jahrhunderts durch zahlreiche Schriftsteller: Cotta, Pfeil, Heyer und andere). Dem Franzosen A. F r o n (Silviculture, Paris 1903, eingehend besprochen in Allg. F. und J. Ztg. 1904, S. 92), stimmen E u l e f e l d (Allg. F. und J. Ztg. 1904, S. 381) und ein „a l t e r P r a k t i k e r a u s T h ü r i n g e n“ (ebenda 1905 S. 175) zu.

F r o n sagt, und darin ist er wohl der Zustimmung vieler Praktiker sicher,

1) Weitere Ausführungen^r des Verfassers über Ballenpflanzung, siehe Allg. F. u. J. Ztg. 1908 S. 3 und 4.

2) Die meisten Gegner der Ballenpflanzung dürften bei ihrem Widerspruch das früher vielfach übliche Versetzen älterer Pflanzen mit Ballen im Auge haben. In diesem Fall, wie bei der Notwendigkeit des Beischaffens der Ballen aus größerer Entfernung oder bei ungeeignetem Boden begegnet allerdings die Ballenpflanzung den schwersten wirtschaftlichen Bedenken. Aber alle diese Fälle scheiden ja hier ohne weiteres aus.

„Nadelholzpflanzen sollte man nicht verschulen, da dies die Kosten vermehrt, und die verschulerten Pflanzen nicht besser sind als die unverschulerten“. Nach dem oben Besprochenen möchten wir den Schlußsatz für die Fichte noch schärfer fassen und sagen: da die verschulerten Pflanzen weniger gut sind als die unverschulerten (für letztere geeigneten Boden vorausgesetzt!)

Eulefeld tritt Fröns Anschauungen bei und teilt günstige Ergebnisse bei Kulturen mit Saatballen mit. Er stellt mit Recht einander gegenüber:

bei Saatballen: gutes Anwachsen, weil keine Wurzelentblößung stattfindet, keine Wurzelverkrümmung, kein Zutiefpflanzen,

bei Verschulppflanzen dagegen: Wurzelentblößung, Wurzelverkrümmung, Zutiefpflanzen.

So dürfen wir den übrigen empfehlenden Eigenschaften der Naturverjüngung auch die anreihen, daß sie der Ballenpflanzung nicht im Wege ist, sondern sie begünstigt.

Noch ein Gedanke, der für Naturverjüngung und insbesondere gegen Kahlgroßschlag spricht, soll hier nicht unterdrückt werden, so wenig greifbare Anhaltspunkte er auch heute bieten mag.

Ueber die Vorgänge im Boden und die Wachstumsbedingungen der Wurzeln, insbesondere nach der Richtung der Tätigkeit der Bodenbakterien und ihrer möglichen Symbiose mit den Baumwurzeln sind wir noch so wenig unterrichtet, daß ganz wohl wenigstens von der Möglichkeit gesprochen werden darf, es könnte für die nachfolgende Waldgeneration nachteilig sein, wenn die ununterbrochene Fortdauer der Waldbestockung auf großen Flächen regelmäßig gewaltsam unterbrochen und der Boden vorübergehend der Steppenformation und ihren klimatischen Bedingungen ausgeliefert wird, wie dies beim Kahlgroßschlag geschieht. Wie leicht kann da eine nachteilige Unterbrechung in dem stetigen Arbeiten des Bodens unter den Bedingungen der Waldbestockung stattfinden? Wie leicht kann diese Unterbrechung das Verschwinden gewisser Bodenbakterien zur Folge haben oder dadurch nachteilig wirken, daß die Wurzeln der alten Pflanzen nicht mehr lebend in Berührung kommen mit denjenigen der jungen Generation, so daß vielleicht keine Bakterienübertragung stattfindet u.s.f.? (vgl. die Lupinenimpfung). Wir wissen das alles nicht, können höchstens Verdichtungserscheinungen im Boden als Folge der Kahllegung feststellen; aber daß dem alten Waldboden ein Etwas innewohnt, das dem bisherigen Feldboden fehlt — der schwarzwälder Bauer nennt es den „Holzgeschmack“ — (vermutlich ist es hauptsächlich die Durchwurzelung und Durchlüftung des Holzbodens in der Tiefe im Gegensatz zur Dichtlagerung des Feldbodens dort), das sehen wir ja an der geringen Gesundheit unserer Neuaufforstungen! Wie leicht könnte uns da durch die Kahllegung wenigstens ein Teil des „Holzgeschmacks“ verloren gehen?

Auch unsere Ergebnisse bezüglich der Pflanzung der Fichte, wie die

zuvor besprochenen Ziele: Erhaltung der wirtschaftlichen Standortsrassen, Durchführung wirtschaftlicher Zuchtwahl und Förderung einer naturgemäßen Jugendentwicklung der Bestände — bilden unseres Erachtens ebenso viele gewichtige Gründe für eine allgemeine Rückkehr zur Naturverjüngung um jeden Preis. Ist diese im einzelnen Fall ausgeschlossen, so soll wenigstens das Verjüngungsverfahren ein solches sein, wie es dem natürlichen in der Wirkung am meisten entspricht, es soll sich, wo irgend möglich, der Saat und der Ballenpflanzung bedienen. (Vgl. den Bericht Grobes über Neuaufforstungen von angekauften Oedländereien seitens der k. sächs. Staatsforstverwaltung auf der 49. Versammlung des Sächs. Forstvereins, besprochen im Forstw. Centralbl. 1906 S. 329.)

Wo z. B. Aenderung der Holzart oder Beimischung einer bisher fehlenden beabsichtigt, also Kunstverjüngung unvermeidlich ist, würde sich zunächst Naturverjüngung der vorhandenen Holzart empfehlen, die einen Grundstock für Bodendeckung zu schaffen hätte, in den die neue Holzart einzubetten wäre. Für deren Samenbeschaffung und Pflanzverfahren würden die früheren Forderungen gelten. Eine eingehende Erörterung des Verfahrens sei einer Betrachtung an anderem Ort vorbehalten.

Mit den vorstehenden Untersuchungen glaubt Verfasser die Naturverjüngung der Fichte, aber auch der andern Holzarten als höchstes Wirtschaftsziel nachgewiesen zu haben, und es wäre nun weiterhin die Verjüngungsweise der verschiedenen Betriebsarten von unserem waldbaulichen Standpunkt aus zu betrachten und auf ihre Vereinbarkeit mit unseren Zielen zu untersuchen. Diese Ziele werden wir in einem Verjüngungsverfahren verwirklicht finden — sei es nun in einem vorhandenen, oder neu zu begründenden —, das uns auch unter ungünstigsten äußeren Verhältnissen eine möglichst reichliche Ansamung sichert und deren Erhaltung für den künftigen Bestand auch ohne besondere Vorkehrungen verbürgt.

Dabei werden wir uns an diesem Ort, soweit irgend möglich, auf rein waldbauliche Gesichtspunkte beschränken und äußere Gefahren und Nutzungsschwierigkeiten späterer Betrachtung überlassen. So wird dann das Ergebnis dieser Untersuchungen in denjenigen Forderungen gipfeln, die der Waldbau für sich allein in bezug auf räumliche Ordnung im Wald an die Forsteinrichtung zu stellen hat. Diese aber hat, will sie für wirtschaftliche Ordnung in zweckmäßiger Weise sorgen, noch eine Reihe anderer Gesichtspunkte zu berücksichtigen, so daß in diesem Abschnitt eine endgültige Entscheidung über die beste räumliche Betriebsordnung noch nicht getroffen werden kann.

2. Kapitel.

Die Bedingungen der Naturverjüngung.

Haben wir uns nun grundsätzlich für Naturverjüngung entschieden, so werden wir, einer Betrachtung der verschiedenen möglichen Verfahren vorgreifend, einige allgemeine Forderungen zu besprechen haben, die von dem hier vertretenen Standpunkt aus an das einzuschlagende Verfahren zu stellen sind.

Eine solche Forderung haben wir bereits bei Besprechung der wirtschaftlichen Zuchtwahl kennen gelernt, es ist die sichere Erzeugung reichlichsten Anflugs. Das Verfahren muß, will es diese Bedingung erfüllen, der Natur zur Ansamung Zeit lassen, also insbesondere für jeden Flächenteil die Benützung mehrerer Samenjahre zulassen.

Mit diesem Verlangen ist sofort ein weiteres erfüllt, daß nämlich der Anflug einen, je nach Bedürfnis mehr oder weniger langdauernden Schutz durch den Mutterbestand genießen soll, teils durch unmittelbare Ueberschirmung, teils durch Seitenschutz.

Ferner wird kein Verfahren der Naturverjüngung, selbst wenn es sich des Hilfsmittels der künstlichen Bodenvorbereitung in weitem Maß bedient, auf jedem Boden, in jedem Klima und bei jeder Holzart von sich aus und ohne Kulturbeihilfe zu der erwünschten, wirtschaftlich vollkommenen Bestockung gelangen. Naturverjüngung wird vielmehr immer mehr oder weniger der Ergänzung auf künstlichem Wege bedürfen; denn einmal gelingt sie nie vollkommen¹⁾ — Vollbesamung in unserem Sinn dürfen wir nicht erwarten, sie entspricht nicht dem Prinzip im Haushalt der Natur, das auch für andere Gewächse Raum lassen will —, dann werden stets Teile durch Fällung und Wegschaffen des Holzes beschädigt und zerstört, und endlich kann die Verjüngung ganz versagen, ganz ausbleiben. Auch unabhängig vom Gelingen werden fast immer wirtschaftliche Eingriffe notwendig sein, da die Natur selbst nur selten die Mischung und Verteilung der Holzarten in wirtschaftlich gewünschter Weise vornehmen dürfte.

Braucht also Naturverjüngung in der Regel künstliche Beihilfe, so soll mit der letzteren grundsätzlich nicht gezögert werden. Wir möchten uns entschieden dagegen aussprechen, die Verjüngung auf der einzelnen Fläche so sehr in die Länge zu ziehen, daß zwar die letzten Stellen angesamt, dafür aber allerlei sonstige Nachteile entstanden sind. Die Verjüngung wird umso günstigere Gesamtergebnisse liefern, je rascher sie über die einzelne Fläche hinweggeführt werden kann, auch wenn dadurch einige Ergänzungen erforderlich werden²⁾. Geben wir aber, unbeschadet des Prinzips, den Ergänzungen grundsätzlich Raum, so ist es auch

1) Die nachfolgenden Betrachtungen gehen, wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, von mittleren äußeren Verhältnissen, also auch von mittlerer Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit aus. Liegen dagegen diese für Naturbesamung besonders wichtigen Momente sehr günstig, so werden sie ja teilweise wohl andere Folgerungen zulassen, als die sind, zu denen wir hier gelangen.

2) Wir stellen uns hier auf den Standpunkt des gleichwüchsigen Hochwalds.

notwendig, das Verfahren so einzurichten, daß die bisher erörterten Grundsätze gewahrt bleiben. Dies geschieht dadurch, daß, jedenfalls bei der Fichte, nur *Ballenpflanzung* angewendet wird, daß ferner nur auf der Fläche selbst entstandenes Pflanzmaterial Verwendung findet oder, wo im Züchtungsinteresse fremder Samen beigemischt werden soll, dieses Material mit Rücksicht auf die erste Forderung auf der Fläche selbst erzogen wird.

Endlich sollen bei vorübergehendem Ausbleiben der Naturverjüngung die an ihre Stelle tretenden Pflanzungen nicht zusammenhängende ausgedehnte Flächen bilden und in dieser Form ihre ungünstigen Wirkungen äußern, sondern sie sollen in Streifen den im übrigen natürlich verjüngten Bestand durchziehen, den Seitenschutz des Altholzes genießen und so gelagert sein, daß auch noch die Möglichkeit einer nachträglichen Ansamung bestandesbildender Holzarten zwischen den Pflanzreihen vorhanden ist. Diesen Forderungen entspricht in bester Weise eine Verjüngung, die sich streifenförmig über die Fläche hinwegbewegt, worüber später.

Die Möglichkeit allgemeiner Naturverjüngung des Waldes ist zu bejahen für jeden Standort, auf dem Wald überhaupt von sich aus gedeiht, und für alle standortsgemäßen Holzarten. Ausnahmen tun dieser Regel keinen Eintrag, sie sind meist in einem dermalen abnormen Bodenzustand begründet. Zu bejahen ist im gleichen Sinn auch die allgemeine Möglichkeit der Naturverjüngung im ökonomisch behandelten Wirtschaftswald, sicher bei entsprechender Beihilfe seitens der Wirtschaft durch Bodenvorbereitung und nachfolgende Ergänzung, somit auch ohne Preisgabe wirtschaftlicher Interessen, wie dies z. B. beim reinen Bländerbetrieb nach mancher Richtung der Fall ist. Im besonderen die Fichte scheint dem Verfasser nach seinen Beobachtungen diejenige Holzart zu sein, die sich am leichtesten und reichsten besamt, auch wenn es bis heute nur selten gelingen will, diesen Reichtum an Besamung für die Wirtschaft festzuhalten und nutzbar zu machen.

Fast überall streut die Natur reichlichen Samen aus, es handelt sich nur darum, Verhältnisse zu schaffen in Boden und Bestand, unter denen, unbeschadet der wirtschaftlichen Bedürfnisse, eine erfolgreiche Keimung und Aufzucht stattfinden kann. Wieviel Samen keimt nicht fast alljährlich im Wald, — von der Wirtschaft unbeachtet und unbenützt — um nach kurzer Zeit wieder zu verschwinden. Je länger Verf. diesem Umstand seine Aufmerksamkeit zuwendet, um so schärfer tritt ihm Reichtum und Mannigfaltigkeit der Keime überall im Wald entgegen, und erhebt gegen eine Wirtschaft Klage, deren Vorgehen diese Tatsache vielfach ganz zu übersehen scheint. Wer natürlich empfindet und wirtschaftlich denkt, muß beklagen, daß all diese Leistungen der Natur, durch die Wirtschaft preisgegeben, in so großem Umfang verloren gehen müssen, um einer teurer kauften Bestockung Raum zu geben, deren Keime uns die Eisenbahn von irgendwoher in Samensäcken bringt. Die Wirtschaft müßte vielmehr dem Wald einen solchen Aufbau geben, in dem alle an der Ernte stehenden Flächen sich *ununterbrochen*

in besamungsfähigstem Zustand — gewissermaßen in fortgesetzter Bereitschaft und Erwartung der bevorstehenden Besamung — befänden.

Auf vollkommene Naturbesamung wird allerdings, wie schon oben erwähnt wurde, kaum überall zu rechnen sein. Neben sonstiger Ungunst der Verhältnisse ist es noch unser Nutzungsbetrieb, der nie ganz naturgemäße Voraussetzungen schafft, und vieles, was die Natur geboten, wieder zerstört. Aber vollkommene Besamung entspricht auch garnicht einem dringenden Bedürfnis unserer Wirtschaft, die stets bestrebt sein muß, ihrerseits zum Zweck entsprechender Mischung und Holzartenverteilung einzugreifen und nachzuhelfen. Wir werden also — wie bereits betont wurde —, welche Verjüngungsmethode wir auch wählen mögen, in schwierigen Fällen stets mit künstlicher Beihilfe: mit Vorbereiten des Bodens, Vorbau von Schattenhölzern, Ergänzen des Anflugs, nachträglichem Einbringen erwünschter Holzarten u. s. w. zu rechnen haben, wenn auch unseres Erachtens eine gut geführte Axt in sehr vielen Fällen die Haue und den Spaten entbehrlich macht.

Immer muß jedoch, soll der Zweck erreicht werden, bei aller Ergänzung durch die Wirtschaft der natürliche Anflug den Grundbestand bilden, auch bei Holzartenwechsel (hier im Interesse rascher Bodendeckung), und nur eine solche Methode kann unsere Zustimmung erhalten, die diesen unter allen Umständen mit größtmöglicher Sicherheit liefert.

Endlich sei nochmals hervorgehoben, daß Naturverjüngung zu normalem Erfolg stets sehr reichlichen Anflug braucht, nicht allein aus den schon besprochenen Gründen, sondern auch wegen der zahlreichen Beschädigungen und der an sich ungleichen Verteilung der Pflanzen. Wir werden also nur selten mit dem Ergebnis nur eines Samenjahrs auskommen können, sondern es muß der Natur die Möglichkeit bleiben, immer neuen Samen zwischen den vorhandenen Anflug oder die Pflanzung zu streuen; sie scheint uns auch mit besonderer Vorliebe an Vorhandenes anzuschließen.

In bezug auf Ort und Zeit des natürlichen Ankommens von Jungwuchs, die auf die räumliche Ordnung und Fortführung der Verjüngung von entscheidendem Einfluß sein werden, hört und liest man nicht selten von „Launen der Natur“ und ähnlichen Ausdrücken; es wird behauptet, daß man die Besamung nicht da hervorlocken könne, wo man dies wirtschaftlich wünsche, sondern daß sie da erscheine, wo es ihr gefalle, und es wird dann gefordert, daß die Wirtschaft ihr und ihrem Fortschreiten zu folgen habe. Vielfach geht daher besonders bei Blenderschlagbetrieb die Verjüngung beim ersten Angriff des Bestandes räumlich von „schon vorhandenen“ Besamungsstellen aus. Wie eine „Bosheit lebloser Dinge“ möchte es dem Wirtschaftler allerdings nicht selten erscheinen, wenn der Anflug hartnäckig da ausbleibt, wo er sehnlichst auf ihn wartet, oder immer wieder von selbst verschwindet, wenn er angekommen war, dafür aber in Fülle erscheint und sich mit Zähigkeit hält da, wo er nicht gewünscht wird. Aber hier stehen wir nicht leblosen Dingen gegen-

über, sondern der lebenden Natur, sie folgt nicht Launen, sondern Gesetzen, und was uns als Laune erscheinen möchte, sind unverstandene Naturgesetze. Nicht Aerger soll es in uns erzeugen, wenn die Natur unsern Maßnahmen nicht folgt, sondern Nachdenken. Nicht nachgeben dürfen wir diesen scheinbaren Launen und denselben unsere Ordnung im Betrieb opfern, wie dies vielfach gefordert wird, sondern die Gründe müssen wir erforschen, weshalb dort am unerwünschten Ort reichlicher Anflug gedeiht, zäh festhält und gegen unsern Willen fortschreitet, während er hier ausbleibt, wo wir auf ihn wirtschaften, ihn herbeisehnen. Unsere Aufgabe ist, diese Gründe zu erforschen, um unsere räumliche Ordnung mit den Forderungen der Natur in Einklang zu bringen, nicht eines dem andern zu opfern. Dann werden wir erreichen, daß der Anflug da kommt, wo wir ihn haben wollen, und da ausbleibt, wo er uns nicht erwünscht ist, bzw. hier unberücksichtigt bleiben kann, um später wieder entfernt zu werden und neuer Besamung Platz zu machen, zu der Zeit, da wir dieselbe wirtschaftlich brauchen. Eine Fabel nur kann es sein, wenn man uns in letzterer Beziehung sagt, jeder Bestand besame sich nur einmal, werde der daraus entstandene Anflug nicht benützt, sondern wieder entfernt, so sei es endgültig mit der Naturverjüngung der betreffenden Fläche vorbei. Die Beobachtungen, die zu dieser Anschauung Anlaß geben, würden wohl, richtig verstanden, zu folgendem Satz führen: Hat die Wirtschaft es unterlassen, die Naturverjüngung innerhalb des nach Alter und Bodenbeschaffenheit günstigen Zeitraums einzuleiten, so verjüngt sich der Bestand in höherem Alter infolge zunehmender natürlicher Lichtung allmählich von selbst, und dies ist alsdann die letzte Verjüngung, die er erzeugt. Auch der Umstand kann obige Anschauung mitveranlaßt haben, daß die Wegnahme des alten Anflugs immer erst dann zu erfolgen pflegt, wenn der Bestand vom Fachwerk der I. Periode zugewiesen worden ist, somit bei dem nun gegebenen Drängen der Nutzung die entsprechende Zeit für volle Neubesamung fehlt.

Erst müssen wir also der Natur ihre Forderungen ablauschen und diesen die räumliche Ordnung anpassen, dann erst sind wir imstande, sie ohne Zwang im Rahmen dieser unserer räumlichen Ordnung zu leiten. Im Widerspruch zur Natur darf dieselbe nicht stehen, sonst ist der Erfolg ausgeschlossen; am wenigsten ist es mit Periodenziffern für große Flächen, dieser groben Verkenning der Natur, allein getan (vgl. Kautzsch: Ueber die Wirtschaftsregeln für Weißtanne von Elsaß-Lothringen, Allg. F. u. J. Ztg. 1893, S. 352).

Ziemlich allgemein herrscht, um nur ein Beispiel für die vorstehenden Ausführungen zu nennen, die Anschauung, die Tanne füge sich der räumlichen Ordnung nicht, eine Anschauung, die in dem lehrreichen Kampf für und gegen die reichsländischen Wirtschaftsregeln für die Weißtannenwaldungen der Vogesen mehrfach zum Ausdruck kommt, wie in der vorherrschenden Meinung, die Tanne könne mit Erfolg nur in langsam blindernden, sich über große Flächen erstreckenden Hieben verjüngt werden, bei denen sie sich allerdings zweifellos (wenn wir die Schlagbeschädigungen nicht in Betracht ziehen) besonders wohl fühlt.

Die Tannenregeln wollen nach Carl (Allg. F. u. J. Ztg. 1893, S. 163) in

großen Altholzkomplexen Ordnung schaffen und zwar mit Hilfe des Fachwerks, der Verteilung der einzelnen Abteilungen auf die verschiedenen Nutzungsperioden. Das angestrebte Ziel geordneter Wirtschaft verdient nun zwar volle Anerkennung, doch ist die geplante Ordnung eine unnatürliche, da sie Naturverjüngung erschwert, und das Fachwerk selbst ein schlechtes Hilfsmittel, zu guter Ordnung zu gelangen, verführt es uns doch zum Planen künftiger Unmöglichkeiten, denn mit römischen Ziffern, die wir in die Karte schreiben, wird die Ordnungsfrage nicht gelöst. Sobald das Fachwerk zugeben muß, daß es in geschlossenen Perioden wirtschaftet, ist es gerichtet, da es für sichere Naturverjüngung nicht Raum bietet, am wenigsten bei der Tanne.

In diesem Sinne bekämpft insbesondere Kautzsch in zahlreichen Artikeln verschiedener Zeitschriften, sowie in einem besonderen Schriftchen: „Beiträge zur Frage der Weißtannenwirtschaft“ 1895 die Tannenregeln. Er bezeichnet die Tanne in bezug auf ihre Verjüngung als eine „Spröde, die sich nicht locken, die sich auch nicht reglementieren lasse“, sondern anfliege, wo sie wolle (z. B. Allg. F. u. J. Ztg. 1892, S. 279, 1893, S. 353, 1897, S. 145). Deshalb fordert er mit zahlreichen anderen Schriftstellern (z. B. Dressler: Die Weißtanne auf dem Vogesensandstein 1880, S. 48, Pilz, Thar. Jahrbuch 1883, S. 193), man müsse ihr bei der Verjüngung dahin folgen, wo sich ihre Besamung von selbst einstelle, man müsse sich also bezüglich der räumlichen Anordnung der Verjüngung nach schon vorhandenem Anflug richten und von dort aus mit ihrer Ansamung fortschreiten; die Schablone des Fachwerks, die Ort und Zeit der Verjüngung festlegt, passe nicht für sie.

Der Streit um die reichsländischen Tannenregeln ist ein Kampf des natürlichen gegen das wirtschaftliche Prinzip, ein Streit natürlicher Ordnungslosigkeit gegen unnatürliche schematische, daher wirtschaftliche falsche Ordnung. In seiner Einseitigkeit verdient keiner der beiden Standpunkte volle Zustimmung.

Wenn Kautzsch aus der Tatsache, daß die Tanne der Schablone des Fachwerks widerstrebt, den Schluß zieht, daß sie sich überhaupt in keine Ordnung füge, daß sie beziehungsweise der Zufall, nicht der Wirtschaftler, bestimmen müsse, wo die Verjüngung zu beginnen habe und wie sie weiter zu führen sei, so dürfte dies unseres Erachtens nicht der richtige Schluß aus obiger Tatsache sein. Aus derselben wird vielmehr nur der Schluß zu ziehen sein, daß die Ordnung des Fachwerks nicht die richtige Ordnung ist, sonst müßte sie mit der Tannenverjüngung in Einklang zu bringen sein, woraus nur folgt, daß diese Ordnung geändert werden muß, denn Ordnung muß sein, sie ist unzertrennlich von zweckmäßigem Wirtschaftsbetrieb. Wir glauben, die nachfolgenden Ausführungen werden beweisen, daß die hier vertretenen Ansichten und Grundsätze bezüglich der Naturverjüngung in allen wesentlichen Punkten mit denjenigen übereinstimmen, die Kautzsch in seinen Veröffentlichungen zum Ausdruck bringt, und die er den in seiner genannten Schrift aufgestellten Wirtschaftsregeln für die Tanne zugrunde legt, außer in der Frage der räumlichen Ordnung. Wir können daher auch den Folgerungen nicht zustimmen, die er aus dieser Anschauung

ableitet, wie z. B.: an schmale Schläge lasse sich die Tannenverjüngung nicht binden (Allg. F.- u. J. Ztg. 1893, S. 353), und die Behauptung auf S. 76 seiner Schrift, die von H. Speidel vertretene Theorie des fachwerklosen, kürzeren Hiebszugs sei für die Tanne ebensowenig anwendbar, wie der Periodenhiebszug; endlich an anderem Ort: kleine Hiebszüge seien nur bei Kahlschlag möglich. Auf diese weitreichenden Folgerungen wird erst an anderem Ort einzugehen sein. Hier haben wir uns nur mit den Voraussetzungen zu befassen. Vielfach, auch bei Kautzsch, spielen, wie oben erwähnt wurde, die zu Beginn der Verjüngung schon vorhandenen Anflugstellen eine Rolle, es wird empfohlen, die beginnende Verjüngung solle an diese beliebig zerstreuten Orte anschließen und von dort aus die Besamung der Flächen betreiben, denn da schreite die Verjüngung am raschesten und sichersten fort. Wir möchten dieses Abhängigmachen des räumlichen Verjüngungsgangs von zufälligen Anflugstellen nicht für empfehlenswert halten. Weshalb sollen denn frühzeitig entstandene zufällige Lücken, die — zur Zeit, da man ihn an anderem Ort wünschen möchte — reichlichen Anflug tragen, nun maßgebend sein für die räumliche Ordnung, für Beginn und Fortgang der Verjüngung? Ist es nicht der Wirtschaft würdiger, durch ebenfalls frühzeitig getroffene wirtschaftliche Maßregeln solchen Anflug am erwünschten Ort zu erzeugen und später die Verjüngung von dort aus in einer der Tanne zusagenden Richtung weiter zu führen, sie in der Hand zu behalten und so auch für räumliche Ordnung innerhalb der gewählten Wirtschaftsfiguren zu sorgen, als sich zufälliger Ansamung folgend in ein zunehmendes Chaos hineinzuarbeiten? In diesem Fall dürfte das Geheimnis des Erfolgs das sein, nicht dem Machtanspruch zu folgen, der die Abteilung in eine bestimmte Nutzungsperiode bannt, und, sobald diese Zeitperiode anbricht, nun in kurzer Frist an allen Enden reichlichen Anflug zu fordern, sondern möglichst zeitig überall da zu beginnen, von wo künftig die Verjüngung ausgehen soll, und hübsch langsam und stetig weiterzugehen, sobald die Natur sich regt. Schmiegt sich hiebei die Wirtschaft in räumlicher Beziehung den physiologischen Bedürfnissen der Tanne an, d. h. führt sie die Verjüngung in derjenigen Richtung fort, in der die Tanne verjüngt werden will, schreitet sie dazu im Tempo der Ansamung selbst weiter, so leistet die „unbezähmbare Eigenart der Tanne“, anstatt Schwierigkeiten zu bereiten, dem Wirtschaftler vielmehr eine willkommene Bundesgenossenschaft, hebt ja doch Kautzsch mehrfach (unter anderem im Forstw. Zentralbl. 1893, S. 269) selbst die Zähigkeit und Hartnäckigkeit hervor, mit der die Tanne die einmal begonnene Verjüngung weiterführe. Die Verjüngung sei, sagt er, wo sie hinstrebe, nicht aufzuhalten. Wie schön für die Wirtschaft, wenn sie ihre Ordnung so einrichtet, daß sie diesem Fortschreiten folgen, es fördern kann! Gerade auf kleiner Fläche bei stetig langsamem Vorgehen scheint nach unseren Beobachtungen die Tanne recht willig, was auch durch Stötzer (Allg. F. u. J. Ztg. 1874, S. 188) bestätigt wird, der die vorzüglichen Erfolge der Weißtannenverjüngung bei Saumschlag im Thüringer Wald hervorhebt.

Dagegen bezweifelt Bargmann (l. c., S. 135), der auf gleichem Stand-

punkt mit K a u t z s c h steht, ob die Tanne kleinen Hiebszügen folge, sie habe südländisches Temperament, sie lasse sich in keine Ketten schmieden, mögen es nun Fachwerks-, Perioden- oder Hiebszugketten sein. Aber muß denn der Hiebszug zur Kette werden? Ist nicht vielmehr von der Forsteinrichtung zu fordern, daß sie den Hiebszug dem Wesen der Holzarten anpaßt, ihnen gewissermaßen auf den Leib schneidet, so daß er einem dem menschlichen Körper angepaßten Gewand gleicht, das schützt, aber nicht hemmt?

Art und räumliche Anordnung der Verjüngung können wir nicht aus rein abstrakten Voraussetzungen ableiten, wir müssen sie der Natur im konkreten Wirtschaftsbetrieb ablauschen, hier finden wir alle treibenden Momente vereint. So werden zwar die in dieser Schrift niedergelegten Vorschläge auf allgemeinen Erwägungen aufgebaut werden, dieselben sind aber nicht auf diesem Wege festgestellt, sondern aus vielfachen Beobachtungen und Versuchen in der Praxis abgeleitet und in ein System gebracht worden.

Wenn wir die waldbaulichen Forderungen suchen, welche die Naturverjüngung an die räumliche Ordnung des Betriebs stellt, so gehen wir aus — so hat G a y e r (Waldbau 3. Aufl., S. 143) uns gelehrt — vom

Blenderwald ¹⁾,

als der dem Naturwald nächststehenden Waldform ²⁾, die auch Naturverjüngung in normaler Weise gestattet. In einer dem Blenderwald ähnlichen Waldform haben unsere Holzarten durch Jahrtausende im Kampf ums Dasein ihre Eigenschaften gebildet, von ihr müssen wir daher auch ausgehen, wollen wir die Geheimnisse der Naturverjüngung ergründen. Hier finden wir die Bedingungen zu leichtester und sicherster Naturbesamung.

Uebrigens müssen wir uns, ehe wir auf die Wachstumsbedingungen des Blenderwalds näher eingehen, erst darüber klar sein, daß der Blenderbetrieb als solcher im rationellen Ertragswald — im großen wenigstens — undurchführbar ist, da er unseren wirtschaftlichen Anforderungen an den Wald zu wenig entspricht ³⁾. Gegen den überzeugenden Nachweis F ü r s t s (Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? 1885) nach dieser Richtung ist wohl kaum etwas einzuwenden ⁴⁾. In waldbaulicher Beziehung hat diese Betriebsform, die in

1) Zur Geschichte des Blenderwalds vergl. Matthes „Der Plenterwald“ in der Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens der Großh. Sächs. Forstlehranstalt Eisenach.

2) Vergl. M a y r, Waldbau ... S. 252.

3) Vergl. des Verf. Aufsätze über „Blenderwald oder schlagweiser Hochwald?“ im Forstwiss. Centralbl. 1908 S. 16 und 1909 S. 23.

4) Man hat diese Bezugnahme auf F ü r s t s Schrift beanstandet, weil letztere schon 25 Jahre zurückliege. Wir halten unsere Bezugnahme jedoch in vollem Umfang aufrecht, denn der Inhalt jener Schrift ist in den verflossenen 25 Jahren nach der Seite der Beurteilung der Blenderform von keiner Seite widerlegt worden. Fürst hat in seiner trefflichen Schrift damals schon in wohl kaum zu widerlegender Weise auf die Lücken in G a y e r s Methode hingewiesen und wir verkleinern die Verdienste dieses hervorragenden Führers der forstlichen Welt in keiner Weise — Verf. wird gewiß nicht in den Verdacht kommen, dies tun zu wollen — wenn wir bekennen, daß

der älteren Literatur ganz zurückgewiesen worden war, in neuerer Zeit eine gerechtere Würdigung erfahren und besitzt heute sogar Anhänger, die sie allgemein empfehlen.

Im Ertragswald ist, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, der Blenderbetrieb ein Phantom, ein rein waldbauliches Idealbild, das uns vorschwebt, das wir aber nicht verwirklichen dürfen und wollen. Woher haben wir uns dieses Ideal gebildet? Die Bauernwälder und die Naturwälder des Hochgebirgs können doch wahrlich nicht die Idee des wirtschaftlich Vollkommenen in uns erzeugt haben! Vielleicht stammt diese neben theoretischen Erwägungen von kleinen Waldbildern her, die da und dort unter günstigen Verhältnissen entstehen und waldbaulich unser Wohlgefallen erregen, weil sich hier alle Individuen augenscheinlich so recht wohl fühlen, weil gerade hier die natürliche Besamung am reichsten und üppigsten aufsprießt, ohne daß sich wirtschaftliche Mängel erkennen lassen. Diese Waldbilder prägen sich uns ein und erzeugen in uns die Idee der Zweckmäßigkeit des Blenderwalds. Wir übertragen vom Kleinen aufs Große, ziehen aber damit einen argen Trugschluß, denn die unwirtschaftlichen Seiten des Blenderbetriebs, die sich im kleinen ganz oder fast ganz vermeiden lassen, treten im großen um so schärfer hervor, er wird zur „plan- und kontrollelosen Wirtschaft“ (Schnittspahn, Allg. F. u. J. Ztg. 1885, S. 9), so daß dort, d. h. auf großer Fläche, uns die in die Augen fallende Unzweckmäßigkeit eher abstößt, ebenso wie vom ästhetischen Standpunkt das Unschöne infolge der Fällungs- und Beförderungsschäden und der zu lange dauernden Beschattung der Jungwüchse, weshalb v. Salisch (Forstästhetik 2. Aufl., S. 152) mit Recht sagt, für große Verhältnisse passe er ästhetisch ebensowenig wie wirtschaftlich. (Vgl. auch Schiffel, Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1906 S. 416.)

Die Mängel, die dem Blenderbetrieb im großen auch bei bester Wirtschaft anhaften und ihn vom Großbetrieb ausschließen, liegen weniger auf waldbaulichem Gebiet, als auf wirtschaftlichem, und sollen deshalb hier nur kurz erwähnt werden; sie zeigen sich einmal in den Produkten der Nutzung: den ungleichen technischen Eigenschaften des Nutzholzes, der vielfach, besonders auf geringerem Standort mangelnden Astreinheit und Vollholzigkeit, dem großen Reisholzanteil; dann aber insbesondere in der Bewirtschaftung selbst: in der Schwierigkeit und den Kosten der Fällung, Aufbereitung, Wegschaffung, in der beschränkten Sortimentsbildung und in den trotz aller Kosten und Sorgfalt unvermeidlichen Beschädigungen des stehenden Holzes, schließlich im Mangel an Ordnung und Uebersichtlichkeit des Betriebs überhaupt und in der Unmöglichkeit sicherer Ertragsbestimmung, alles Folgen mangelnder räumlicher Ordnung. Wer z. B. im Nadelwald einmal in der Lage war, Auszugshiebe starker Stämme aus jünge-

seine Anregungen noch manches enthielten, das für die Forstwirtschaft der Verbesserung fähig war. Neue wahre Ideen finden nicht immer sofort einen praktisch vollkommenen Ausdruck; das System muß erst reifen und viele müssen an ihm arbeiten, bis etwas in jeder Hinsicht Brauchbares zustande kommt. So wird auch Gayers Prinzip nie wieder aus Wissenschaft und Wirtschaft verschwinden, auch wenn die Formen, unter denen es erscheint, sich ändern. Den Mängeln der erstgebotenen Form hat Fürst in überzeugender Weise Ausdruck gegeben. Wer sich auf Gayer stützt, wird somit stets auch Fürsts Einwendungen gelten lassen müssen.

rem oder mittelaltem Holz in größerem Umfang machen zu müssen, der wird, wenn er sich Mühe, Kosten und Schaden besieht, — vorausgesetzt, daß er den Betrieb im gleichwüchsigen Hochwald kennt und überhaupt Sinn für Ordnung und zweckmäßige Wirtschaft hat, — ein für allemal von der Idee allgemeiner Durchführbarkeit dieser Betriebsform im Ertragswald geheilt sein.

Die Blenderwaldschwärmerei stellt eine Aufgabe unserer produktiven Tätigkeit zu sehr in den Vordergrund und vernachlässigt darüber die andere, sie pflegt den Produktionsfaktor „Boden“ und vergißt darüber ihre Aufgabe, diesen in zweckmäßiger Weise zur Wertschöpfung zu benutzen, ihm die wertvollsten Erzeugnisse, die höchste Rente abzugewinnen. Der Blenderbetrieb paßt für extensive Waldbehandlung, Brennholz- und Blockholzwirtschaft, für die weitständige Bestockung hoher Gebirgslagen, für felsige Steilhalden, im Ertragswald dagegen ist für ihn kein Raum.

In diesem Sinn beurteilt ihn auch Gayer l. c. wenn er sagt: „Kann sohin die Femelform auch nicht mehr die Bedeutung einer regulären Bestandesform beanspruchen, so bleibt sie immer die unerschöpfliche Quelle für das Studium des Waldes und seiner Gesetze, und es bleibt unsere Aufgabe, diese letzteren nach Möglichkeit und in anderen, der Femelform genäherten Formen zu erfüllen. . . . Eine Rückkehr zu naturgemäßen Bestandesformen wird für die Zukunft der Forstwirtschaft unerläßlich Soll hiezu aber auch der richtige Weg eingeschlagen werden, dann müssen wir uns vorurteilsfrei an die Natur und ihre im Femelwald so deutlich wahrnehmbaren Fingerzeige halten — wir müssen vom Femelwalde lernen.“

Dieser, von unserem Altmeister Gayer vorgezeichnete Weg soll im nachfolgenden besprochen werden. Dabei ist hier, ohne daß auf die Begriffsbestimmung des Blenderwalds oder seine mannigfaltigen Formen eingegangen werden soll, da dies späterer Betrachtung überlassen bleibt, noch zu bemerken, daß den nachfolgenden Untersuchungen nicht ein Blenderwald zugrunde gelegt werden soll, wie ihn Wessely zeichnet, d. h. ein Hochwald mit allen Altersklassen in etwa gleicher Individuenzahl, einzeln oder in Gruppen gemischt, in dem nur haubare Stämme genutzt werden, — denn diese Form kann nicht das waldbauliche Optimum für die von uns vorausgesetzten Verhältnisse werden, — sondern ein Hochwald, bei dem alle Altersklassen im Stammzahlverhältnis des schlagweisen Hochwalds einzeln oder in Gruppen gemischt enthalten sind, und bei dem sich der Hieb entsprechend auf alle Stärkeklassen ausdehnt, eine Betriebsform, die Tichy im Gegensatz zu der erstbezeichneten Blenderform „Femelwald“ nennt.

Wir haben nun, da der Blenderbetrieb nicht selbst Grundlage unserer räumlichen Ordnung sein kann, von ihm zu lernen, was wir bei deren Aufbau erstreben, und was wir vermeiden müssen, wenn das Ziel allgemeiner Naturverjüngung unter Erhaltung ihrer unerläßlichen Vorbedingungen, der Bodenkraft und Bodenfrische, erreicht werden soll.

Vergleichen wir z. B. im Nadelwaldgebiet den Staatswald mit dem dicht anstoßenden Bauernwald (privatem Kleinbesitz mit landwirtschaftlichem Betrieb verbunden), so muß uns, wenn letzterer einigermaßen pfleglich behandelt

ist, der Anblick beider schon zum Nachdenken Anlaß geben. Der erstere, geschlossener gleichaltriger Hochwald, seit langer Zeit geschont und wohlgepflegt, alt, mit geschlossenem Kronendach und seit lange gedecktem Boden, macht

Fig. 18.

Profil eines Bauern-Blenderwalds.

(Bem.: Die alten Stämme erscheinen im Bilde als etwas zu stark geastet.)

bei der Verjüngung die größten Schwierigkeiten, läßt mit Ansammlung lange auf sich warten, oft mißlingt diese ganz; der Boden verrast schließlich, denn Anflug kann nicht Fuß fassen, wohl aber siedeln sich die zäheren Keimlinge von Gräsern und Unkräutern an.

Daneben auf gleichem Boden der Bauernwald, in weitgehender Weise, oft ganz unpfleglich benützter Blenderwald, mit wenig altem Holze, dagegen auf irgend geeignetem Standort reichem, oft geradezu unverwüsthlichem Anflug aller bestandsbildenden Holzarten in mehreren Etagen. Das wird jeder bestätigen, der solche Wälder näher kennt und nach Ankauf zu bewirtschaften Gelegenheit hatte. Wir können da die ungleiche vorwüchsige Bestockung, soweit sie uns mißfällt, nicht selten mehrmals weghauen und immer noch bleibt uns eine überreiche Menge von Anflug verschiedener Holzarten, um bei entsprechender Ergänzung einen neuen Bestand zu bilden (Fig. 18).

Woher kommt hier, trotz geringer Zahl von Samenträgern, die reiche Naturverjüngung, die dort fehlt, wo doch der ganze Bestand aus samentragenden Bäumen besteht, und der Boden — nach forstlichem Urteil — so wohlgepflegt und geschützt ist?

Wollen wir den Blenderwald allgemein auf die Bedingungen prüfen, unter denen bei ihm die Naturbesamung erzeugt wird, um diese Bedingungen als Grundlagen für die zu wählende räumliche Ordnung festzuhalten, so gehen wir wohl am besten von dem eben geschilderten Bauernwald ¹⁾ aus, in dem der Besitzer alljährlich arbeitet und nutzt, wie es den Bedürfnissen seiner Land- und Hauswirtschaft entspricht; denn hier ist wohl der Ort üppigster und sicherster Naturbesamung, der uns zu Gebot steht. Nicht jeder Form des Blenderbetriebs wird das nachgesagt werden können!

¹⁾ Stötzer und Borgmann erheben den Einwand, daß es solche Wälder in Norddeutschland nicht gebe!

Im gepflegten Bauernwald haben wir es mit einer „Wirtschaft auf kleinster Fläche“ im eigentlichen Sinn des Worts zu tun, einer Wirtschaft, die fortgesetzt, stetig nutzt, astet, verjüngt, jeden Horst, jede Gruppe, ja jeden Baum für sich und mit Rücksicht auf seine Umgebung, man möchte fast sagen, — liebevoll betrachtet und behandelt. Besonders die Astung ist ein unseres Erachtens sehr wichtiges Glied im Blenderbetrieb. Schätzle erklärt sie auf der Versammlung des badischen Forstvereins 1885 beim Blender- und Blenderschlagbetrieb, wie er in der Tannenwirtschaft des badischen Schwarzwalds üblich ist, für zweckmäßig, ja unerlässlich. Er fordert mehrmalige Astung, gegebenenfalls bis zu $\frac{2}{3}$ der Höhe, sowie Anwendung auch schon bei jüngeren Stämmchen.

Die der Naturbesamung so günstigen Bedingungen sind wohl im Bauernblenderwald folgende:

- 1) Die Stetigkeit des Betriebs und damit der Entwicklung des Walds.

Sie wirkt gleich günstig auf Boden und Bestand, Gayer nennt sie mit Recht das „Lebensprinzip des Walds“ (der gemischte Wald, S. 5). Sie sorgt für dauerndes Gedecktsein des Bodens und bewahrt so dessen physikalische und chemische Eigenschaften; sie liefert, durch das allmähliche Verschwinden der alten Bäume und die nach Bedarf erfolgenden Astungen, fortgesetzt kleinste Bodenflächen in allen Stadien der Humuszersetzung, in allen Graden der Belichtung und Benetzung durch Regen; der Samen jeder Holzart findet also stets irgendwo ein wohl vorbereitetes Keimbett ohne Gefahr der Verrasung. Die Stetigkeit läßt Zeit zur Samenbildung, zur Besamung, sie benützt alle Samenjahre, diese mögen kommen, wann sie wollen, sie benützt sie an der einzelnen Stelle so lange, bis volle Bodendeckung erreicht ist; daher die dichten Jungwuchsgruppen, der Reichtum an Individuen aller vorhandenen Holzarten. Solche Wirtschaft ist damit im eigentlichsten Sinn eine „Wirtschaft auf kleinster Fläche“. Weiter bewirkt die Stetigkeit eine langsame Jugendentwicklung des Anflugs, dessen Lichtgenuß und Befeuchtung sich allmählich stetig steigert mit dem Verschwinden der alten und der sperrigen Individuen und mit der Wiederkehr der Astung. Kautzsch spricht bei Erörterung der Tannenregeln in ähnlicher Weise von Windfällen, Dürrstämmen u. s. w., die den Fortgang der Verjüngung sichern. Der Vorteil liegt auch hier in der Stetigkeit. Diese langsame Entwicklung sorgt zugleich dafür, daß alles minder lebensfähige Material um so sicherer zurückbleibt und wieder verschwindet. Wir finden hier ferner nicht das trostlose Bild frisch geräumter Schirm- und Blenderschläge, wo neben den Schlagbeschädigungen die plötzlich eintretende volle Besonnung augenscheinlich ungünstig auf den Anflug wirkt.

Das Prinzip der Stetigkeit ist das wichtigste Moment bei allen natürlichen Vorgängen im Walde. So ist denn auch unseres Erachtens für all die waldbaulichen Vorteile, die wir dem Blenderwald zuschreiben, erste Voraussetzung: stetiger Betrieb, d. h. fortgesetzte langsame Abnutzung auf der ganzen Fläche in niedriger Umlaufszeit. Die Verjüngung muß fortgesetzt auf kleinsten Flächen erfolgen. Mit Erhöhung der Umlaufszeit im Blenderwald sinkt dessen waldbaulicher Wert, und Umlaufzeiten von 10, 20 ja mehr Jahren, wie sie in der

Literatur empfohlen werden, bedeuten unseres Erachtens einen Verzicht gerade auf diejenigen Vorteile, um derentwillen diese Betriebsform überhaupt in Frage kommt.

Weitere Bedingungen für sichere Naturbesamung, die der Blenderbetrieb bietet, sind:

- 2) Luftruhe am Boden und langdauernder Seitenschutz gegen Wind in der Jugend,

darauf beruhend, daß das Kronendach bis zum Boden reicht und somit die Luftbewegung am Boden hindert. So ist es möglich, daß sich unmittelbar über diesem durch Verdunstung eine besonders feuchte Luftschicht bildet und erhält, die Boden und Anflug gegen starke Austrocknung schützt. Dieser Schutz kommt aber in erster Linie den Keimlingen und jungen Pflanzen zugut, die mit ihren Wurzeln noch nicht tief in den Boden gedrungen sind, und deshalb leicht der Austrocknung der obersten Bodenschicht zum Opfer fallen, sie überdauern hier besser etwaige Trockenperioden. Noch lange Jahre sind sie dann weiterhin inmitten der ungleichaltrigen Bestockung gegen Wind geschützt.

Die hohe Bedeutung der Luftruhe für alles Pflanzenwachstum ist bekannt; für den Anflug insonderheit ist sie überall zu erkennen, denn an allen windigen Orten, denen Seitenschutz fehlt, wie an Bergköpfen, offenen Feldrändern, bleibt unter dem gelockerten Kronendach des Schirmschlags der Anflug in der Regel ganz aus, auch wenn er sich in der Umgebung leicht einfindet und trefflich gedeiht.

- 3) Holzartenmischung, die der Blenderwald regelmäßig zeigt und sicher erhält (vgl. Gayers Schriften).

Daß Holzartenmischung die Naturverjüngung in hohem Maße fördert, weil jede Holzart sich stets besonders gerne unter dem Schutz anderer Holzarten einstellt, ist überall zu beobachten und zu oft erwähnt, als daß diese Tatsache besonderen Beweises bedürfte. D ü e s b e r g gibt ihr neuestens („Der Wald als Erzieher“ S. 5) in folgenden Worten Ausdruck: „In den ostdeutschen Mischwäldungen läßt sich häufig eine Art Fruchtfolge beobachten, indem die Kiefer sich am liebsten unter alten Eichen ansiedelt, Eiche und Buche unter Kiefern“.

Ohne Zweifel wird weiterhin einem Moment noch zu wenig Beachtung geschenkt, das vielleicht vor allen anderen solche verdient, da es entscheidenden Einfluß hat, das ist

- 4) das richtige Verhältnis zwischen Besonnung (Austrocknung) und Benetzung des Bodens durch Niederschläge. Die Ueberschirmung durch ältere Bäume überhaupt wirkt auf Boden und Anflug in doppelter Weise. Der Schirm übt einerseits Einfluß auf den unmittelbaren Zutritt der Sonnenstrahlen, also auf Belichtung und Erwärmung des Bodens, andererseits wirkt er auf die Zufuhr der Niederschläge, beide werden durch ihn vermindert. In ersterer Hinsicht wirkt die Ueberschirmung fördernd, in letzterer nachteilig auf die Besamung des Bodens und den vorhandenen Anflug, der weiterhin durch die Wurzelkonkurrenz der Schirmbäume selbst beeinträchtigt wird. (Vgl. Fricke, Centralbl. für das ges. Forstwesen 1904.)

Man war und ist vielfach heute noch gewöhnt, dem Licht die allein ent-

scheidende Bedeutung für die Besamung des Bodens und das Gedeihen des Anflugs zuzuschreiben (so spricht man z. B. stets von „Lichtung“, statt von Lockerung des Kronendachs) — offenbar mit Unrecht, das stellt Borgreve (Holzucht 2. Aufl. S. 120 und 126) fest. Er weist diesem Faktor mit Recht eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle zu und zeigt, daß unmittelbare Bestrahlung in den ersten 10—15 Jahren überhaupt nicht erforderlich ist, daß sich die Pflanzen vielmehr in dieser ganzen Zeit mit indirektem Licht begnügen, und sich dabei wohl fühlen ¹⁾. Der Entzug direkter Lichtstrahlen kann somit im Jugendstadium jedenfalls nicht ungünstig wirken, wir können dieses Moment ganz außer Berücksichtigung lassen, da es bei der Schlagstellung selten derjenige Wachstumsfaktor sein dürfte, der im Mindestmaß vorhanden ist. (Vgl. Mayr, Waldbau, Seite 97).

Dagegen wirkt die Beschirmung günstig auf den Anflug dadurch, daß sie die mit unmittelbarer Sonnenbestrahlung verbundene Erwärmung verhindert, weil diese den Boden, wie den Anflug selbst, zu gesteigerter Wasserabgabe veranlaßt, also durch Austrocknung schadet.

Dieser günstigen Wirkung der Ueberschirmung auf die Bodenfrische steht aber eine ungünstige gegenüber, das ist der Entzug eines Teils der Niederschläge und zwar, wie wir sehen werden, gerade desjenigen Teils, dessen ungeschmälerter Zufuhr die Verjüngung in erster Linie bedarf.

Wir haben also in der Wirkung des Schirms auf den Anflug ein günstiges Moment: er hindert starkes Verdunsten und Austrocknen des Bodens, und ein ungünstiges: er hält die volle Zufuhr der Niederschläge ab, wozu noch die Wurzelkonkurrenz hinzutritt. Vom Verhältnis nun, in dem diese beiden Momente bei der Beschirmung wirksam sind, hängt die erfolgreiche Keimung und das Gedeihen des Anflugs ab; denn wird durch den Schirm viel Sonne und wenig Regen abgehalten, so sind die Befeuchtungsverhältnisse des Bodens günstig und dies wirkt belebend auf Keimung und Anflug, wird dagegen umgekehrt mehr Regen abgehalten als Sonnenstrahlen, so tritt ein Mißverhältnis in bezug auf Befeuchtung und Austrocknung ein, der Boden wird durch die Sonne ausgebrannt, die Folge ist Bodenverödung, und von erfolgreicher Keimung und Erhaltung des Anflugs kann keine Rede mehr sein.

Soll somit am Boden reichliche Besamung eintreten und sich erhalten, so muß die Sonne durch den Bestandesschirm stets stärker abgehalten werden als der Regen. Namentlich ist ein großes Schattenbedürfnis des jungen Anflugs bei Entzug auch nur eines kleinen Teils der Niederschläge durch den Schirm mindestens für solange anzunehmen, bis die Wurzeln die oberflächliche, der Trocknung besonders ausgesetzte Schicht durchdrungen und sich entsprechend ausgebreitet haben, um vorübergehende Trockenperioden zu überdauern.

Die Bedeutung der Befeuchtungsverhältnisse des Bodens im Wald, besonders gerade der oberflächlichen Schicht, für Bestandesbegründung und -erziehung scheint uns bei weitem noch nicht genug erkannt zu sein und gewürdigt zu werden.

¹⁾ Ueber neue Untersuchungen bezw. Veröffentlichungen von Wiesner, Mayr, Ciesler siehe weiter unten.

Diesem Bedürfnis nun nach einem richtigen Verhältnis zwischen Besonnung und Benetzung des Bodens genügt der gut behandelte Bauernwald in der Tat in erheblichem Maß, denn einerseits läßt die Bestockung durch unmitttelbaren und seitlichen Schutz keine Sonne zum Boden gelangen und andererseits können durch das von allen „Blendern“ befreite Kronendach, das durch fleißige Astung insbesondere auf der Nordseite der Gruppen und Stämme weiterhin in zweckmäßiger Weise gelockert ist, verhältnismäßig zahlreiche Niederschläge zum Boden gelangen.

Der Forderung eines besonders günstigen Verhältnisses zwischen Regenzufuhr und Besonnung des Bodens genügt übrigens auch der Blenderwald nicht immer in vollkommenem Maße, am meisten noch genügt ihr der besprochene Bauernwald infolge der ins einzelne gehenden Pflege und der fleißigen Astung besonders auf der Nordseite an Einzelstämmen und kleinen Gruppen, zu denen die Altersklassen zusammentreten, während größere Gruppen und Horste hier seltener vorkommen.

Diese Form des Blenderbetriebs kann deshalb auch auf trockenem geringem Boden noch erfolgreich durchgeführt werden, während sonst ziemlich allgemein die aus praktischer Erfahrung abgeleitete Anschauung gilt, daß Blenderbetrieb und verwandte Formen auf mineralisch kräftigem und frischem Boden durchführbar seien, während auf geringem und trockenem Grund Kahlschlag mit Kunstverjüngung an ihre Stelle treten müsse; insbesondere betont Fürst l. c. S. 29 und 75, daß die Fichte auf trockenem Boden wenig schatten-ertragend sei und sich schwer natürlich verjüngen lasse. In Wirklichkeit dürfte es hier wohl nicht der Schatten sein, den die Fichte, die gegen oberflächliche Austrocknung des Bodens empfindlichste Holzart, schlecht erträgt, sondern der Entzug atmosphärischer Niederschläge, das ungünstige Verhältnis der Wasserzufuhr zur Besonnung, das natürlich empfindlicher auf trockenem und schwachem Boden wirkt, als auf frischem, mineralisch kräftigem Grund. Ähnliche Verhältnisse werden übrigens allgemein auftreten, wo die Fichte außerhalb ihrer niederschlagsreichen und luftfeuchten Heimat angebaut wird und dies ist ja in erheblichem Maße fast überall der Fall.

Wollen wir eine Betriebsform finden, die zur Naturverjüngung der Fichte auch auf geringem Boden und außerhalb ihrer Heimat führen kann, so müssen wir gerade diesem Moment besondere Aufmerksamkeit zuwenden und womöglich für die Regenzufuhr gegenüber der Besonnung ein günstigeres Verhältnis herstellen, als es der Blenderwald in seinen meisten Formen bietet.

Wenn nun auch der Blenderwald gerade in dieser Beziehung nicht immer beste Bedingungen schafft, so wirken die seinigen doch günstiger in bezug auf Naturverjüngung, als diejenigen gleichaltriger Bestandesformen, die durch Lichtung auf großer Fläche verjüngt werden, und zwar dadurch, daß im Blenderwald der Anflug im allgemeinen nicht unter altes, starkbekrontes, daher viel Wasser zurückhaltendes Holz zu stehen kommt. Denn beim Blenderbetrieb erfolgt die Verjüngung gerade durch Wegnahme der ältesten dichtbekronten, sowie jüngerer allzusehr zu Horizontalausdehnung neigender Stämme, der „Blender“, aus dem benachbarten jüngeren Holz, das mehr Regen durchläßt und unter

und zwischen dem der Anflug, gegen Sonne geschützt, günstige Wachstumsbedingungen hat. Diese günstigen Verhältnisse werden dann durch zutretende Astung noch verstärkt. So ist der Blenderwald jedenfalls an denjenigen Punkten, wo gerade Verjüngung vor sich geht, frei von alten Schirmbäumen mit undurchlässiger Krone und Rohhumusbildung. Im Gegensatz dazu zeigen im schlagweisen Hochwald z. B. viele unserer Tannenalthölzer geradezu denkbar ungünstigste Verhältnisse, und es darf uns nicht wundern, wenn dort Naturverjüngung, sei es im Schirm- oder Blenderschlagbetrieb, nicht gelingen will, denn diese Althölzer bestehen vielfach vorwiegend gerade aus jenen Schirmbäumen (Blendern) des früheren Blenderwalds, die keinen Regen durchlassen¹⁾. Man ist hier seinerzeit vom Blenderbetrieb zum schlagweisen Hochwald übergegangen einfach, indem man aufhörte, die Blender auszuziehen, so daß diese allmählich in Schluß gelangten und den jüngeren Unter- und Zwischenstand erdrückten, der dann im Weg der Durchforstung entfernt wurde.

Auf den Boden solcher Bestände gelangen bei der Auflichtung wohl Sonne und Wind, dagegen werden ihm alle schwächeren Regen des Sommers vorenthalten, so daß er, vollends bei dem großen Wasserverbrauch der Blender selbst, trocken ist und Rohhumus bildet, weshalb Keimpflanzen auf ihm nicht Fuß fassen können.

Dies führt uns zu einer weiteren wichtigen Bedingung für erfolgreiche Naturbesamung, das ist:

- 5) Niedrige Umtriebszeit und Verzicht auf die Aufbereitung von Sortimenten mit großen Längendimensionen.

Was den Bauernwald vor Fällungs- und Bringungsschäden schützt und dafür sorgt, daß alles, was die Natur bietet, auch erhalten werden kann — von besonderer Bedeutung ist dies bei ungünstigen Besamungsverhältnissen —, das sind die kurzen und leichten Nutzungsprodukte, d. h. die schwachen Hölzer der niedrigen Umtriebe und das Zerschneiden der wenig zahlreichen Starkhölzer in Sägeblöcke, Spaltholz u. s. w. Sobald wir den Umtrieb im Bauernblenderwald über 60—80 Jahre steigern und Langhölzer aufbereiten wollten, würde vieles von dem schönen Anflug verschwinden und das Gesamtbild ganz wesentlich an Wirkung verlieren. Der Jungwuchs darf nicht in Berührung mit langen und starken Sortimenten kommen.

Was die Umtriebszeit betrifft, so stimmt die Naturverjüngung bezüglich ihrer Bedürfnisse mit den Forderungen der Wirtschaftlichkeit überein, die ebenfalls auf Umtriebsermäßigung hinweisen. Anders steht es mit dem Verlangen nach Zerkleinerung der Sortimente; diese Bedingung wird die Wirtschaft unmöglich erfüllen können, ihr Streben muß im Gegenteil insbesondere bei Nadelholz auf Gewinnung möglichst langer Sortimente bei

1) Vergl. Neys Ausführungen über die Tannenwaldungen der Vogesen (Verhandlungen der X. Hauptvers. des deutschen Forstvereins zu Heidelberg. Ber. S. 54.) ferner: Stoll: das Versagen der Weißtannenverjüngung im mittleren Murgtal. Naturwiss. Zeitschrift für Forst- u. Landwirtschaft 1909. Stoll bezeichnet als Ursachen für das Zurückweichen der Tanne aus den höheren Lagen des badischen Schwarzwalds den Zusammenschluß des Kronendachs ursprünglich femelartiger Bestände, allerdings im Hinblick auf Wärmeentzug.

jeder Stärke gerichtet sein, wir werden also die sich widerstreitenden Interessen nur dann versöhnen, unser Ziel nur dann voll erreichen können, wenn wir bei der zu suchenden Betriebsform im Gegensatz zum Blenderbetrieb auf möglichste räumliche Scheidung der Altersklassen Bedacht nehmen, damit Schaden am Jungwuchs nach Möglichkeit verhütet und doch dem Bedürfnis der Wirtschaft nach freier Sortimentsbildung Rechnung getragen wird.

Die Erwähnung der Umtriebszeit als eines Moments, das auf die Naturbesamung Einfluß hat, gibt uns Anlaß, auf zwei Punkte hier näher einzugehen, die zwar nicht unmittelbar unser Thema berühren, aber sonst Interesse bieten, das ist: die Umtriebszeit im Blenderwald und der Einfluß der Umtriebszeit auf die Naturbesamung im allgemeinen.

Was den ersten Gegenstand betrifft, so spielt der Blenderbetrieb heute noch eine berechtigte praktische Rolle im Gebiet des Schutzwaldes, an hohen Steilhängen, Fels- und Geröllhalden u. s. w., dort werden ihm finanzielle Erwägungen nicht weniger als waldbauliche und forstpolitische Gesichtspunkte dauernd den Vorrang sichern. Aber er kann seine Aufgabe hier nur ganz erfüllen bei Anwendung eines niedrigen Umtriebs. Verf. muß es nach seinen Wahrnehmungen für den größten wirtschaftlichen Fehler halten, wenn versucht wird, an steilen oder zu Rutschung und Abschwemmung geneigten Hängen hohe Umtriebe einzuhalten und starkes Holz zu erziehen, was leider nur zu häufig geschieht, weil man an solchen Oertlichkeiten nicht den Mut oder die Lust hat, Nutzungen vorzunehmen, oder geflissentlich starke Durchmesser erziehen will, um die Stämme ohne Schaden am Erlös in kurze Stücke (Sägeblöcke) zerschneiden zu können. Hoher Umtrieb und damit starkes Holz an steilen Hängen führt jedoch — beim Nadelholz in erster Linie — infolge der schweren Schlagschäden zu dem, was man dort am meisten vermeiden will und muß, zu Kahlflächen und zur Unmöglichkeit jeder erfolgreichen Naturverjüngung. Dies gilt jedenfalls für das Mittelgebirge. Hier sollte die Umtriebszeit im Schutzwald dem niedrigsten Alter entsprechen, in dem am einzelnen Ort nutzbare Stärken und volle Mannbarkeit erreicht werden, und dies wird wohl im allgemeinen für Nadelholz bei einem Brusthöhendurchmesser von etwa 30 cm der Fall sein. Es sollte somit als allgemeine Regel gelten: je steiler das Gelände und je schwieriger die Bringungsverhältnisse, um so niedriger der Umtrieb.

Was den zweiten Punkt betrifft, so wurde oben die Ueberzeugung ausgesprochen, daß ein Hauptmoment der reichlichen Naturverjüngung im Bauernwald der dort übliche niedrige Umtrieb sei. Da mag hier der Ort sein, kurz auf eine Behauptung einzugehen, die sich in der Literatur ohne ernstlichen Widerspruch mehrfach wiederfindet, daß nämlich bei niedrigem Umtrieb Naturverjüngung unmöglich sei, daß dieser also zum Kahlschlag führe.

Zur Beurteilung dieses Satzes ist entscheidend, was hier unter niedrigem

Umtrieb zu verstehen ist. Der Zusammenhang lehrt dies. Diese Behauptung rührt nämlich von Anhängern der Waldreinertragslehre her, die mit derselben die Unbrauchbarkeit und Naturwidrigkeit des finanziellen Umtriebs beweisen wollen, im Gegensatz zu dem hohen Umtrieb des Waldreinertrags. Als niedriger Umtrieb wird also im allgemeinen bei unseren Hauptholzarten mit Ausnahme der Eiche ein solcher von 60—100 Jahren zu verstehen sein.

Soweit die Beobachtungen des Verf. reichen, ist nun gerade das Gegenteil der Fall, die meisten Holzarten (die Nadelhölzer jedenfalls) verjüngen sich vom Baumholzalter ab meist sehr leicht, am leichtesten im Alter von 70—100 Jahren, während die Verjüngung vom 100 jährigen Alter ab immer schwieriger, von 120 Jahren ab praktisch meist unmöglich wird, sicher aber wesentlich erschwert ist durch Rohhumusbildung, Bodenverwilderung, schlechtere Samenqualität und insbesondere durch die Schwere des Holzes bei der Ernte. Die schönste, reichste Verjüngung insonderheit der Fichte hat Verf. stets unter 60—90 jährigem Bestand gefunden, in bezug auf die Tanne stimmt er Kautzsch zu, der als kräftigste Zeit des Bestandes zur Verjüngung das 80.—100. Lebensjahr bezeichnet (Beiträge zur Frage der Weißtannenwirtschaft 1895 S. 63). Die hohen Umtriebe von 120 und mehr Jahren, die als diejenigen des Waldreinertrags geltend gemacht werden, führen, das soll hier besonders hervorgehoben werden, bei den herrschenden Methoden der Ertragsregelung für alle normal bestockten Bestände tatsächlich zu noch höheren Abtriebsaltern, denn je höher der Umtrieb, desto größer die Zahl derjenigen Bestände insbesondere im gefährdeten Nadelwald, die das normale Abtriebsalter nicht erreichen, sondern früher zum Einschlag gebracht werden müssen. Dazu kommen die zufälligen sogenannten Scheidholzanfälle, die vielfach ebenfalls der Abtriebsnutzung zugerechnet werden. Ist die Umtriebszeit gleich dem durchschnittlichen Abtriebsalter der sämtlichen Bestände, so muß jedem Bestand, der das Umtriebsalter nicht erreicht, ein anderer entsprechen, der an seiner Statt über die Umtriebszeit hinaus stehen bleibt, und naturgemäß werden dazu immer die besten und vollkommensten ausgewählt werden.

Daraus folgt der Satz: daß das tatsächliche Abtriebsalter von schönen und vollkommenen Beständen, zumal im gefährdeten Nadelwald, stets höher ist, als die Umtriebszeit, und daraus folgt weiter, daß bei an sich schon hohen Umtrieben hier leicht künstliche Verjüngung notwendig wird, da die natürliche infolge überhohen Alters des Mutterbestands mißlingt, an Orten, wo sie unter normalen Bedingungen sicher und leicht erfolgt wäre. Wir können uns daher der Auffassung Carls (Allg. F. u. J. Ztg. 1893 S. 167) nicht anschließen, der in Verteidigung der reichsländischen Tannenregeln sagt, daß diese Wirtschaftsregeln 120 jährigen Umtrieb fordern, weil die gangbarsten Stammstärken von der Tanne spätestens im 120 jährigen Alter, von der Fichte noch früher erreicht werden. — Ist dies der Fall, worüber jedenfalls kein Zweifel herrscht, so ist die Umtriebszeit fürs Fachwerk zu hoch, weil alsdann gerade die wüchsigsten und besten Bestände noch über dieses schon sehr hoch gewählte mittlere Haubarkeitsalter hinaus ausharren müssen.

Der Blenderwald hat neben großen wirtschaftlichen Mängeln, die aus der räumlichen Ordnungslosigkeit entspringen, wie sich zeigte, auch einen waldbaulichen Nachteil: das ist das ungünstige oder doch nicht genügend günstige Verhältnis zwischen Regenzufuhr und Besonnung, ein Zustand, der sich nur durch eine ins kleinste gehende Wirtschaft verbunden mit fleißiger Astung vermeiden läßt. Auch dieser Nachteil entspringt der räumlichen Anordnung der Altersklassen. Wenn somit selbst der Blenderwald als solcher nicht den waldbaulich günstigsten Zustand für Naturverjüngung verkörpert, was sich darin zeigt, daß er auf geringen Standorten vielfach wenig erfreuliche Bilder aufweist, so liegt der Gedanke nahe, diese Waldform räumlich so umzugestalten, daß sie sowohl wirtschaftlich anwendbar wird, als auch unter selbst ungünstigsten Verhältnissen den irgend möglichen Verjüngungserfolg verspricht.

Gelänge im Rahmen der Blenderwaldform eine solche Anordnung der Altersklassen, die — unter Wahrung der geschilderten Vorteile — Abhilfe schaffte in bezug auf die besprochenen Mängel, so wäre das Ziel erreicht.

Das führt uns zur Idee des

räumlich geordneten Blenderwalds.

Ein „geordneter Blenderwald“ scheint zwar ein Widerspruch in sich, denn durch das räumliche Ordnen verliert der Betrieb eine kennzeichnende Eigenschaft, eben die Ordnungslosigkeit und wird zum Schlagbetrieb; doch mag hier dem Gedanken immerhin im Interesse unserer weiteren Betrachtungen nachgegangen werden, denn trotz der Aenderung im Formcharakter können dem sich ergebenden räumlich geordneten Betrieb die Vorteile des Blenderwalds in weitestem Maße erhalten bleiben.

Der Gedanke eines räumlich geordneten Blenderbetriebs ist nicht neu, schon Ney (Die Lehre vom Waldbau 1885) ist ihm nachgegangen, um ihn — mit wenig Erfolg allerdings — der praktischen Verwirklichung zuzuführen. Wir werden später eingehender darauf zurückkommen. Wenn hier ähnliche Gedanken auf anderer Grundlage entwickelt werden, so ist damit — bei dem Waldzustand, der uns tatsächlich vorliegt — nicht an deren unmittelbare Verwirklichung gedacht, wenn Verfasser auch überzeugt ist, daß ein derartiger Betrieb, wo er schon bestände, durchaus befriedigen müßte und keinerlei Anlaß zu Aenderungen geben würde.

Der Blenderbetrieb erscheint — in größerer Ausdehnung — praktisch noch am ehesten möglich unter mehr oder weniger gruppen- und truppweiser Anordnung der Altersklassen, wenn auch die Gruppen ganz klein sein können (vgl. das Profil Fig. 23 auf S. 112).

Halten wir uns einen solchen Wald vor Augen, in dem die Altersklassen nach kleinen Gruppen gemischt sind, so ist klar, daß durch die, wenn auch allmähliche Wegnahme einer haubaren Gruppe alle gegen Norden, NE und NW angrenzenden Bodenflächen unmittelbarer Besonnung preisgegeben werden, sofern

sie nicht durch Träufe gedeckt sind, die bis zum Boden reichen. Schaden wird in diesem Fall nur dann ganz vermieden werden, wenn die dort stockenden Gruppen aus jungem, bis höchstens 30 jährigem Holz bestehen, noch fähig, sich auf der S-, SW- und SE-seite zu betraufen; andernfalls wäre, auch wenn die Freistellung allmählich erfolgte, am S-, SW- und SE-rand der freigestellten Gruppen Bodenverödung und Rindenbrand zu befürchten, eine gerade im Blenderwald nicht allzu seltene Erscheinung; auch Sturmschaden wäre nicht ausgeschlossen. Nie wird man also bei zweckmäßigem Betrieb Gruppen älteren Holzes auf ihrer Südseite freistellen dürfen. Ebenso wird die Abtriebsfläche selbst sich nur dann befriedigend besamen, bzw. dem schon vorhandenen Anflug sofort bestes Gedeihen gewähren, wenn die nach Süden vorgelagerte Gruppe Schatten spendet und damit ein günstiges Verhältnis zwischen Niederschlag und Sonne auf der Fläche herstellt, also aus älterem Holz besteht.

Auch die Schneedruckgefahr verbietet z. B., daß jüngere Stangenholzgruppen zwischen Altholzgruppen eingezwängt stehen oder sich nördlich oder nordöstlich an solche anschließen, besonders gilt dies für die Nadelhölzer, da der vielfach aus SW antreibende Schnee hinter den höheren Gruppen zusammengewirbelt wird. Dazu kommen noch die Schneelasten, die von den Randstämmen der höheren Gruppen seitlich abgleiten, so daß die an sich schon im Schatten des älteren Holzes überschlank erwachsenen Stangen besonders stark belastet werden (vgl. V o n h a u s e n , Allg. F. u. J. Ztg. 1882 S. 289) und der Schneedruckgefahr in erheblichem Grad unterliegen (vgl. die Abbildung Fig. 19). Derart entstandene Druckschäden lassen sich überall im ungleichaltrigen Wald, auch schon in der Umgebung nicht abgestufter Vorwuchsgruppen und einzelner Vorwüchse im Fichtenpflanzbestand beobachten. Die Wirkung ist im kleinen ähnlich derjenigen an Nord- und Osthängen.

Wollten wir also im Blenderwald unsere Wirtschaft in einer Weise führen, die alle Nachteile und Gefahren vermeidet, so müßten die Altersgruppen so gelagert sein, daß sich je an die hiebsreife Gruppe nördlich junges Holz, südlich aber angehend haubare Bestockung anschließt, die den durch Verjüngung der hiebsreifen Gruppe entstehenden Anflug in der ersten Zeit gegen Besonnung schützt, d. h. die Gruppen im Blenderwald müßten sich nach dem Alter von Nord nach Süd abstufen.

Fig. 19.

Schneedruckgefahr im Blenderwald.

Stellen wir weiterhin, um ohne wesentliche Schlagbeschädigungen alle Sortimente aufbereiten und anrücken zu können, die Forderung, daß das Abtriebsmaterial nicht mit den jüngeren Altersklassen in Berührung kommen darf, sondern die Stämme in älteres Baumholz geworfen, dort aufbereitet und abgerückt werden müssen, so ist es weiterhin notwendig, daß die gleichaltrigen Gruppen

Fig. 20.

Aufriß eines „geordneten“ Blenderwalds in der Nord-Südrichtung.

in Streifen von Weg zu Weg zusammengerückt werden, damit das haubare Holz in den südlich vorliegenden Baumholzstreifen geworfen und durch diesen nach dem nächsten Weg geschafft werden kann. Die gleichaltrigen Gruppen wären somit in schmale, von Ost nach West laufende Streifen zusammengefaßt, die sich unter stetiger Altersabstufung gegen Süden aneinanderschließen. Der Wald würde von oben gesehen einem wellenbewegten See gleichen, über den der Südwind weht. (Vgl. die beiden Skizzen, von denen die eine (Fig. 20) den Aufriß in Nordsüdrichtung, die andere (Fig. 21) eine Seitenansicht darstellt. Die letztere Skizze zeigt allerdings insofern eine Abweichung von unserer Idee als sie die Bestockung zu geschlossen darstellt, deshalb nicht mehr die Gruppenbildung der Altersklassen zum Ausdruck bringt, von der ausgegangen wurde und nicht den gegen die Jungwüchse hin gelockerten Altholzrand.)

Siehe Fig. 21 Seite 101.

Diese Anordnung hätte dem ungeordneten Blenderwald gegenüber zahlreiche Vorteile. Vor allem würde sie der Verjüngungsfläche günstige Verhältnisse in bezug auf ihren Feuchtigkeitszustand schaffen; denn die Sonne wäre vollständig abgehalten, die Regenzufuhr dagegen nur verhältnismäßig wenig beeinträchtigt. Dazu würden starke Traufbildungen rings um die älteren Gruppen vermieden, also Astreinheit und Vollholzigkeit gefördert und schließlich wäre die Ernte, das Gewinnen und Wegschaffen der Schlagerzeugnisse erleichtert und die Uebersichtlichkeit des Betriebs gesteigert. Verloren gegangen wäre dagegen durch solche Anordnung der Altersklassen die typische Ordnungslosigkeit des Blenderwalds, bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch die Luftruhe am Boden, da auf der Verjüngungsfläche Luftbewegung in der Ostwestrichtung möglich wäre, und endlich etwas von der Standfestigkeit der Individuen und Gruppen, würde ja doch der freie Wuchs und damit die Traufbildung der Randstämme bei den älteren Gruppen beeinträchtigt! Ob übrigens die Sturmfestigkeit im echten Blenderwald immer so groß ist, wie vielfach angenommen wird, darf füglich bezweifelt werden (vgl. Fürst, Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? S. 21).

Einen Blenderwald im üblichen Sinn hätten wir damit nicht mehr vor uns

Fig. 21.
Seitenansicht eines „geordneten“ Blonderwalds.

(dagegen einen solchen im Sinne von N e y s Waldbau!), vielmehr einen Schlagbetrieb, da der Hieb, wenn auch an zahlreichen Orten gleichzeitig und in schmalen Säumen, so doch tatsächlich auf scharf begrenzten Schlagflächen erfolgen würde. Erhalten geblieben wäre dagegen in vollem Umfang die wichtigste Eigenschaft dieser Betriebsform, die Stetigkeit der Abnutzung über die ganze Fläche hin und damit die stetige Verjüngung auf kleinster Fläche. Wenn auch infolge dieser Anordnung vielleicht die Luftruhe am Boden etwas beeinträchtigt erscheint, so tritt dafür ein in gesteigertem Maß günstiges Verhältnis von Regen- zu Besonnung ein. Rechnet man dazu die übrigen, Naturverjüngung begünstigenden Verhältnisse, so kann füglich behauptet werden, daß diese durch die Aenderung in Anordnung der Altersklassen nicht verloren, sondern eher gewonnen hat und daß an dem „geordneten Blenderwald“ waldbaulich wohl kaum etwas auszusetzen sein dürfte, während die übrigen, den ungeordneten Blenderwald ausschließenden Bedenken wirtschaftlicher Natur sehr zurücktreten. Ein naheliegender Einwand, die Sturmgefahr wird im zweiten Abschnitt untersucht werden.

Damit soll nun aber nicht schon diese Art der Verjüngung zu praktischer Durchführung empfohlen werden, vielmehr wollen diese Betrachtungen nur zeigen, nach welcher Richtung räumlicher Umgestaltung die Blenderwaldform sich weiter entwickeln und den Forderungen der Wirtschaft anpassen läßt, nach welcher Richtung uns also die nachfolgenden Untersuchungen führen werden.

Wenn wir nun weiterhin darangehen, eine praktisch brauchbare Betriebsart zu suchen, die uns sichere und reiche Naturverjüngung aller Holzarten, insbesondere der Fichte gewährt, so werden wir unter allen Umständen, festzuhalten haben an der Verjüngung auf kleinster Fläche in stetigem Betrieb, dazu aber anstreben müssen: ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen Regen und Sonne auf der Verjüngungsfläche, Luftruhe am Boden und räumliche Scheidung der Altersklassen zur Verhütung von Erntebeschädigungen.

3. Kapitel.

Die Betriebsformen in ihrem Verhältnis zur Naturverjüngung.

Ehe wir dazu übergehen können, die herrschenden Betriebsformen speziell von unserem Gesichtspunkt der Naturverjüngung aus zu betrachten und zu beurteilen, ist es zunächst notwendig, den Begriff und die Bezeichnungen der einzelnen Formen schärfer ins Auge zu fassen, denn leider herrscht heute in dieser Beziehung gerade in Hinsicht auf die uns interessierenden Naturverjüngungsbetriebe, in der Literatur noch nicht volle Uebereinstimmung, es werden die Bezeichnungen im Sinne bald der Begriffsbestimmungen C a r l H e y e r s , bald derjenigen G a y e r s gebraucht.

Schon vor G. L. H a r t i g und H. C o t t a war — ohne systematische Scheidung allerdings — natürliche Verjüngung durch Vorhiebe, Samenschläge, Licht- und Nachhiebsschläge (Blenderschlag und Schirmschlag) neben Kahl-

schlag geübt worden. Durch diese Männer, insbesondere Hartig, der von der Buche ausging und einen ausgesprochenen Schirmschlag lehrte, wurde sie dann in die Literatur eingeführt, durchgebildet und in der Praxis allgemein verbreitet. Während Cotta in seinem Waldbau (2. Aufl. 1817, S. 19 ff.) ohne besondere Bezeichnung und systematische Trennung mehrere Verfahren der Naturverjüngung kennt und beschreibt, unterscheidet Hartig und nach ihm Pfeil u. a. zwei verschiedene Betriebsarten:

den schlagweisen Hochwald (Schlagwirtschaft), bei dem alles Holz binnen weniger Jahre geräumt wird und

den blenderartigen Betrieb (Plenterwirtschaft), bei dem nur die ältesten Bäume unter Schonung der jüngeren genutzt werden.

Innerhalb des schlagweisen Hochwalds drehten sich in der Folge die Meinungsverschiedenheiten unter allgemeinem Festhalten an gleichmäßiger Kronenlockerung lediglich um Lichtgrad und Verjüngungsdauer, es standen sich gegenüber: „Dunkelmänner“ und „Lichtfreunde“.

Carl Heyer, der wie vordem trennt: Blenderbetrieb (Ausdehnung der Fällung auf den ganzen Wald mit dem Ergebnis ungleichwüchsiger Bestockung) und Schlagwirtschaft (Beschränkung des Hiebs auf einzelne „Schläge“ mit Erzeugung gleichwüchsiger Bestände), fordert innerhalb der „Schlagwirtschaft“ bei Naturverjüngung möglichst gleichzeitige Besamung der ganzen Verjüngungsfläche und nennt diese Form zuerst „Femelschlagbetrieb“ (Waldbau 1. Aufl. 1854, S. 220) unter Zusammenfassung aller Naturverjüngung, die nicht Blenderbetrieb ist. Zwischenstufen zwischen den beiden Extremen des Blenderbetriebs und dieser gleichaltrigen Schlagverjüngung kennt C. Heyer noch nicht oder nimmt doch keine Scheidung vor, sondern vereinigt alle unter dem Begriff des Femelschlagbetriebs.

Erst Gayer hält die Betriebsformen der Naturverjüngung schärfer auseinander und trennt gleichaltrige und ungleichaltrige Formen. Er unterscheidet innerhalb der schlagweisen Naturverjüngung zwei grundsätzlich abweichende Methoden:

1. Den schlagweisen Betrieb mit gleichaltriger Naturverjüngung im Sinn von C. Heyers „Femelschlagbetrieb“, der mit gleichmäßiger Bestandeslichtung arbeitet, er nennt ihn „Schirmschlagbetrieb“.

2. Die schlagweise aber ungleichaltrige Naturverjüngung mit horst- und gruppenweiser Hiebsführung, die er, weil sie dem Blenderbetrieb näher steht, als „Femelschlagbetrieb“ bezeichnet.

Diese Scheidung, die bei der neueren Entwicklung des Waldbaus einem wirklichen Bedürfnis entsprach, ist denn auch ziemlich allgemein durchgedrungen, auch hier soll derselben gefolgt werden. Nur vereinzelt wird noch in der Literatur an der älteren Begriffsbestimmung Heyers festgehalten, so leider auch in der neuesten, von Heß herausgegebenen 5. Auflage des Heyerschen Waldbaus (vgl. I. Band S. 381). Man hat Gayers Scheidung als wenig glücklich und für das Studium nachteilig bezeichnet. Das ist schwer zu verstehen, denn die Art der Hiebsführung, der Gang der Verjüngung, ja der ganze waldbauliche Erfolg sind bei Schirmschlagbetrieb und „Femelschlagbetrieb“ so grund-

verschieden, daß eine Trennung als dringendes Bedürfnis erscheint. Im Gegenteil dürften im Interesse einer klaren Scheidung und Weiterbildung der Naturverjüngungsverfahren noch schärfere Trennungen, logisch richtigere und bestimmtere Bezeichnungen am Platz sein, eine Forderung, in der wir mit Wappes (Zentralbl. f. d. ges. F.wes. 1904, S. 389) vollkommen übereinstimmen, auf dessen beachtenswerte Vorschläge hier besonders hingewiesen werden soll.

Als unterscheidendes Merkmal für die Naturverjüngungsbetriebe wählt Gayer die Verjüngungsdauer, d. h. die Zeit vom Hiebsbeginn bis zur völligen Räumung der Schlagfläche. Dieses Kriterium trifft unseres Erachtens das Wesen der Sache nicht und gibt insbesondere keine scharfen Trennungslinien. Nicht die Verjüngungsdauer kann Kriterium sein für Scheidung von Schirmschlag, Blenderschlag und eigentlichem Blenderbetrieb, denn es müßten da willkürliche Grenzen gezogen werden. Gayer z. B. fordert (Waldbau 3. Aufl. S. 135) für Blenderschlag eine Verjüngungsdauer von 20—40 Jahren, Kautzsch dagegen (Beiträge 1895, S. 82) eine solche von 30 Jahren bis zur halben Umtriebszeit. Warum gerade 20, bzw. 30, bzw. 40 Jahre? Das richtige Kriterium ist vielmehr die räumliche Folge, in der sich die Verjüngung auf dem Boden vollzieht. Sie trifft zusammen mit dem Gesichtspunkt, dem Weise folgt, der Zahl der benützten Samenjahre, denn diese bestimmt die Art des räumlichen Vorgehens, insofern als die Benützung nur eines Samenjahrs die gleichmäßige Lichtung der ganzen Schlagfläche bedingt, während die grundsätzliche Benützung mehrerer Samenjahre eine ungleichförmige Hiebsführung auf der Schlagfläche veranlaßt. Erfolg der Wirtschaft ist im ersteren Fall ein gleichaltriger, im letzteren ein ungleichaltriger Bestand.

Dieser Einteilungsgrund führt zu folgender Kennzeichnung der besprochenen Verjüngungsgrundformen Gayers: Wir sprechen von Schirmschlagform bei grundsätzlicher Benützung eines Samenjahrs auf der ganzen Fläche zugleich, woraus sich kurze Verjüngungsdauer ergibt. (Etwa nachfolgende Ueberschirmung von langer Dauer berührt das Prinzip nicht.) Die Hiebsführung geht hier darauf aus, eine bestimmte Schlagfläche durch ein volles Samenjahr auf einmal vollständig zu verjüngen und bringt diese Absicht zum Ausdruck durch gleichmäßige Lichtung über die ganze Fläche hin. Werden nun tatsächlich in der Regel mehrere Samenjahre benützt, weil eines meist nicht genügt, so kann dies der Grundsätzlichkeit des Verfahrens keinen Eintrag tun, wie es auch auf die Gleichmäßigkeit der Hiebsführung ohne Einfluß bleibt. Das Ergebnis ist ein mehr oder weniger gleichaltriger Bestand. Blenderschlagform liegt vor bei grundsätzlicher Benützung verschiedener Samenjahre für die einzelnen Teile der Schlagfläche, woraus sich eine mehr oder weniger lange Verjüngungsdauer ergibt. Die Hiebsführung rechnet hier grundsätzlich mit Benützung mehrerer, in der Regel zahlreicher Samenjahre, was sie im Hiebsgang dadurch zum Ausdruck bringt, daß sie die Lichtung ungleichförmig vornimmt; so erfolgt die Verjüngung gleichzeitig nur auf kleinen getrennten Teilen der Schlagfläche oder schreitet von Mittelpunkten aus, die über die Schlagfläche verteilt sind, zonenförmig fort. Das Ergebnis ist ein ungleichaltriger Bestand. Endlich

haben wir die Blenderform vor uns bei fortgesetzter Benützung aller Samenjahre. Die Hiebsführung hat hier, der Benützung aller Samenjahre auf der Gesamtfläche entsprechend, ihre Schlagfläche auf die gesamte Betriebsfläche auszudehnen. Sie geht in unregelmäßigem Hieb fortgesetzt über dieselbe hinweg und immer finden sich über die ganze Fläche zerstreute Punkte und Kleinflächen in Verjüngung. Das Ergebnis ist eine die ganze Betriebsfläche gleichmäßig bedeckende ungleichaltrige Bestockung, die alle Altersklassen enthält.

Auf dieser Grundlage würde sich folgende Einteilung der Betriebsformen ergeben.

1. Der Blenderbetrieb

benützt alle Samenjahre über die ganze Betriebsfläche hin. Die Nutzung ist eine stetige, sie erfolgt jährlich oder in kurzen Perioden wiederkehrend mit unbeschränkter Verjüngungszeit auf der ganzen Fläche und in ungleichmäßigem Hieb, die Verjüngung geht in einzelnen Punkten oder auf kleinen Flächen vor sich, auf letzteren zumeist fortschreitend. Demnach sind im Blenderwald alle Altersklassen unregelmäßig, meist horst- und gruppenweise gemengt, dauernd über die ganze Fläche zerstreut.

Tichy (Qualifizierter Plenterwald S. 31) unterscheidet innerhalb des Blenderbetriebs wiederum Unterarten, je nach dem Gang der Verjüngung. Erfolgt diese in einzelnen Punkten ohne Erweiterung der Lücken, so spricht er von „Blenderbetrieb“, findet eine allmähliche, zonenförmige Erweiterung der Lücken statt, so nennt er das „Femelbetrieb“. Der erstere Betrieb ist dadurch gekennzeichnet, daß vorwiegend nur haubare Stämme genutzt werden, und alle Altersklassen in etwa gleicher Stammzahl vorhanden sind, während beim „Femelbetrieb“ sich die Nutzung auf alle Altersklassen erstreckt und diese nach ihrer Stammzahl etwa im gleichen Verhältnis vorhanden sind, wie beim schlagweisen Hochwald. Diese Scheidung ist in Deutschland nicht üblich, hier werden die Bezeichnungen „Blender“- und „Femelbetrieb“ meist mit gleicher Bedeutung gebraucht, so von C. Heyer, Gayer u. a.

Dem Blenderbetrieb stehen gegenüber:

2. Die Schlagbetriebe.

Sie benützen, soweit sie Naturbesamung anstreben, auf der einzelnen Verjüngungsfläche eine beschränkte Zahl von Samenjahren und teilen dementsprechend die Betriebsfläche in Schlagflächen.

Der gewöhnliche Sprachgebrauch bezeichnet mit „Schlag“ ganz allgemein eine zusammenhängende, bestimmt abgegrenzte Fläche, auf der gleichzeitig genutzt wird. Solche Flächen gibt es auch im geregelten Blenderwald, den wir, der Umlaufszeit entsprechend, in „Schläge“ einteilen können (vgl. Tichy: Forsteinrichtung in Eigenregie).

Man stellt aber auch „Blenderhieb“ und „Schlag“ einander gegenüber. Während dann unter „Blenderhieb“ ein ungleichförmiger zusammenhangsloser Hieb ohne bestimmt abgegrenzte Fläche verstanden wird, der einzelne starke oder vorwüchsige Stämme oder Gruppen entfernt, faßt man hier

den Begriff des „Schlags“ offenbar enger und versteht darunter eine zusammenhängende und bestimmt abgegrenzte Waldfläche, die in bestimmter Zeit vollkommen abgenutzt wird und über die sich jeder einzelne Hieb mehr oder weniger vollständig erstreckt. In diesem Sinn spricht man von „Schlagbetrieben“, doch erscheint diese Bezeichnung nicht nach jeder Richtung glücklich, da die Schlagbetriebe teils Jahresschläge, teils Periodenschläge bilden, je nachdem die Hiebsart bestimmte Flächen entweder im einzelnen Hieb kahllegt, oder aber innerhalb bestimmter Zeitperioden durch allmähliche Lichtung abnutzt. Zu ersteren zählen Kahlschlag- und Saumschlagbetrieb, zu letzteren Schirmschlag- und Blenderschlagbetrieb.

Als Schlagbetriebe sind folgende Formen zu nennen:

a) der Kahlschlagbetrieb

legt breite Schlagflächen kahl, verjüngt also auf großer Fläche zugleich und erzeugt dadurch einen gleichaltrigen Bestand auf der Schlagfläche.

b) der Saumschlagbetrieb

entfernt das Altholz in saumförmigen Schlägen, wobei wir verstehen wollen unter „Saum“: einen so schmalen Streifen (etwa gleich der halben Stammlänge), daß das verbleibende Altholz erheblich auf die entstehende Verjüngungsfläche (Boden und Bestockung) einzuwirken vermag.

Es erweist sich hier nämlich als notwendig, von der Begriffsbestimmung bzw. Erklärung des Saumschlags durch Gayer (Waldbau 3. Aufl. S. 133) abzuweichen, da diese keine scharfe Abgrenzung gegenüber dem bei Nadelholz (Fichte, Kiefer) häufigen streifenförmigen Kahlschlag gestattet. In Saumschlag geht solcher Streifenkahlschlag ohne Zweifel dann über, wenn der Streifen zum „Saum“, d. h. zum sehr schmalen, in unserem Fall so schmalen Streifen wird, daß eine erhebliche Einwirkung des verbleibenden Altholzes auf die Hiebsfläche besteht und benützt wird, (oder doch erwartet zu werden pflegt!) und zwar in bezug auf Boden, Besamung, Schutz des Jungwuchses u. s. w. Dies ist bei entsprechender Himmelsrichtung bis auf etwa halbe Stammlänge der Fall. Der Hieb darf nicht als Kahllegung wirken! Voraussetzung ist also für Saumschlag ein volles Ausnützen der günstigen Einwirkung des Altholzes auf die Verjüngungsfläche, andernfalls wäre die Form als Streifenkahlschlag zu bezeichnen. Der Saumschlag verjüngt die Fläche in schmalen Bändern, — die bandförmige Verjüngungsfläche rückt gewissermaßen als Linie stetig über die Bestandesfläche fort —, er erzeugt also im ganzen einen ungleichaltrigen, im Alter nach bestimmter Richtung abgestuften Bestand, während die einzelne Schlagfläche gleichaltrig bestockt ist. Gayer zählt (l. c. S. 126) die Saumschlagform zu den gleichaltrigen Hochwaldformen, weil der einzelne Streifen gleichaltrig ist. Betrachten wir aber den aus Saumschlag hervorgegangenen Bestand, so kann derselbe nach Gayers Begriffsbestimmung praktisch als gleichaltrig oder als ungleichaltrig betrachtet werden, je nachdem sich die Streifen in größerer Breite und rascherer Zeitfolge aneinander schließen oder sehr schmal sind und sich in zeitlicher Unterbrechung folgen. Nach unserer Begriffsbestimmung erzeugt der Saumschlag zweifellos nur ungleichaltrige aber gleichwüchsige Bestände.

c) Der Schirmschlagbetrieb

geht — sofern Naturverjüngung stattfindet, was die Regel bildet — auf Benützung nur eines Samenjahres aus, beginnt also die Abnutzung mit gleichmäßiger Lichtstellung des Altholzes über die ganze Schlagfläche hin. Er verjüngt daher gleichzeitig auf großer Fläche durch gleichförmige Schirmstellung und durch Besamung in einem oder wenigen Samenjahren, erzeugt somit gleichaltrige Bestände, — solche, die nur eine Altersstufe enthalten.

d) Der Blenderschlagbetrieb

sucht grundsätzlich Naturverjüngung mit beschränkter Verjüngungsdauer und benützt dazu eine Reihe von Samenjahren, setzt also jeweils nur Teile der Schlagfläche der Besamung aus, indem er die lichtenden Hiebe ungleichförmig über die ganze Verjüngungsfläche verteilt. Die Verjüngung erfolgt, der ungleichförmigen Hiebsführung entsprechend, in Gruppen und Horsten, also auf kleinen Flächen gleichzeitig und erzeugt einen Bestand, der aus mehreren, unregelmäßig gemengten Altersstufen besteht.

Diese allgemein übliche Nebeneinanderstellung nun des Saumschlags mit Kahlschlag, Schirmschlag und Blenderschlag, als verschiedener Schlagbetriebe, der wir bisher gefolgt sind, ist wohl logisch nicht richtig insofern wir es beim Saumschlag mit einer Schlagform zu tun haben, während bei den drei letzteren Formen nur die Hiebsart das Unterscheidungsmerkmal bildet. So sind zwei Einteilungsgründe ineinander gemischt, Hiebsart und Schlagform. Beide haben ihre Berechtigung, aber eine klare Einteilung gewinnen wir nur, wenn wir sie reinlich sondern und den einen Einteilungsgrund dem andern überordnen: die Schlagformen als das zeitlich zuerst zu Bestimmende, Grundlegende den verschiedenen Hiebsarten, nach denen der Betrieb innerhalb jeder der Schlagformen sich gliedert.

Wir können nämlich drei Hauptarten des Eingriffs in den haubaren Bestand zum Zweck seiner Verjüngung unterscheiden, d. h. drei Haupthiebsarten:

Kahlhieb, wenn die Fläche vollkommen kahl gelegt wird,

Schirmhieb, wenn dieselbe gleichförmig gelichtet,

Blenderhieb, wenn sie ungleichförmig gelichtet wird (mit Unterformen: Einzelhieb, gruppen- und horstförmiger Hieb, Löcherhieb u. s. w.).

Diese Hiebsarten können nun aber in verschiedenen Schlagformen auf den zu verjüngenden Bestand angewendet werden, d. h. wir können dem „Schlag“, als der zusammenhängenden Fläche, auf die sich der Hieb gleichzeitig erstreckt, verschiedene Formen geben. Praktisch kann neben der ganzen (großen) Bestandesfläche nur Streifen- und Saumform in Betracht kommen, wir können also unterscheiden:

Großflächenform bei gleichzeitiger Ausdehnung des Hiebs auf die gesamte Fläche des zu verjüngenden Bestands;

Streifenform bei gleichzeitiger Ausdehnung nur auf einen Streifen desselben;

Saumform bei gleichzeitiger Ausdehnung auf einen „Saum“ im obigen Sinn, vgl. Seite 106, (also gewissermaßen auf eine fortschreitend gedachte Linie).

Die üblichen Verjüngungsverfahren nun sind durch Hiebsart und Schlagform bestimmt, bilden Verbindungen derselben. Dabei bestimmt die **Hiebsart** mehr die Verjüngungsweise, d. h. die Art, wie das Erscheinen der neuen Bestockung zustande kommt, während die **Schlagform** in erster Linie Einfluß hat auf den Verjüngungsgang, d. h. die räumliche Folge, in der die Verjüngung von der Gesamtfläche Besitz ergreift bzw. auf ihr fortschreitet.

Die möglichen Verbindungen der angeführten Hiebsarten und Schlagformen müssen nun auch die oben ausgeschiedenen Betriebsformen umfassen, wobei sich zeigt, daß meist die Hiebsart, in einem Fall aber die Schlagform, als bezeichnendes Merkmal erschien und der Form den Namen gegeben hat.

Diese Verbindungen sind folgende:

Die Anwendung des Kahlhiebs auf der ganzen Fläche gleichzeitig, in streifenförmigen oder endlich in saumförmigen Schlägen ergibt: **Kahlgroßschlagform**, **Kahlstreifenform**, **Kahlsaumform**.

Die beiden ersteren Formen, und zwar der Streifenschlag vorherrschend, bilden ohne besondere Scheidung die gewöhnliche „**Kahlschlagform**“.

Kahlsaumschlag entspricht der üblichen reinen „**Saumschlagform**“, wobei übrigens zu bemerken ist, daß sich der übliche Saumschlag nicht notwendig des Kahlhiebs als Hiebsform zu bedienen braucht.

In gleicher Weise können Schirmhieb und Blenderhieb auf diese Schlagformen Anwendung finden, es entstehen einerseits: **Schirmgroßschlag**, **Schirmstreifenschlag**, **Schirmsaumschlag**, und andererseits: **Blendergroßschlag**, **Blenderstreifenschlag**, **Blendersaumschlag**. (Vgl. auch den oben erwähnten, hiemit im wesentlichen übereinstimmenden Vorschlag von Wappes, Zentralbl. f. d. ges. Forstw. 1904, S. 389.)

Schirmgroßschlag ist die gewöhnliche „**Schirmschlagform**“, die sich regelmäßig über die ganze Bestandesfläche erstreckt. (Naturverjüngungsformen nach den Regeln von G. L. Hartig, Carl Heyer, Borggreve u. A., von C. Heyer „**Femelschlagform**“ genannt.)

Schirmstreifenschlag bildet keine besondere Betriebsart, während

Schirmsaumschlag als Verbindung der Saumschlagform mit der Schirmschlagform bekannt ist: Gayers „**Schirmbesamung in Saumschlägen**“.

Blendergroßschlag entspricht der gewöhnlichen „**Blenderschlagform**“ (Gayers „**Femelschlagform**“), deren Betrieb sich in der Regel über den ganzen Bestand erstreckt und für die solches mehrfach ausdrücklich gefordert wird. So sagt z. B. Pilz (Tharandter Jahrb. 1882, S. 200) bezüglich des Tannenblenderns, es liege in der Natur dieser Hiebsweise, daß ein zu verjüngender Bestand nicht an einer Seite angehauen und in nebeneinander

liegenden Schlägen verjüngt werde, sondern, daß der Hieb sich von Haus aus über die ganze Fläche erstrecke, daß die ganze Fläche unter der Axt stehe.

Anderer Ansicht scheint man dagegen bezüglich dieser Betriebsform in Bayern zu sein; von dorthier wird mehrfach die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit einer Beschränkung des Hiebs zunächst auf einen Teil der Fläche und eines späteren Fortschreitens in bestimmter Richtung hervorgehoben (vgl. z. B. B r a z a auf der deutschen Forstversammlung zu Kassel 1890, Ber. S. 18).

Damit wäre dann der:

Blenderstreifenschlag gegeben, der bei stetigem Vorrücken in schmalem Band zum

Blendersaumschlag wird.

Die hier vorgenommene Scheidung sollte nur der Klarstellung im Interesse unserer nachfolgenden Untersuchungen dienen, während wir weiterhin soweit als möglich an den bisher üblichen kürzeren Bezeichnungen festhalten werden.

Die Betriebsarten der Praxis, die sich den mannigfaltig wechselnden Verhältnissen im Wald anzupassen haben, bedienen sich meist mehrerer von den aufgezählten Betriebsformen gleichzeitig, die grundlegende Form gibt alsdann dem Verfahren den Namen. Das beste Beispiel ist wohl das „bayrische Femelschlagverfahren“ (B r a z a, Kassel 1890, Eßlinger, Regensburg 1901), das sich unbeschadet des Prinzips neben der Großschlagform auch der Streifen- und Saumform mit Erfolg bedient, ja gegebenenfalls den Blenderhieb in Schirmhieb und Kahlhieb übergehen läßt (Saumfemelschläge).

Es ist überhaupt — und damit möchten wir dieser freieren Auffassung ohne Einschränkung beitreten — speziell der Blenderbetrieb (dasselbe gilt bis zu einem gewissen Grad auch für die ihm nächst verwandten Formen) befähigt, ohne seine charakteristischen Eigenschaften einzubüßen, auf der Kleinfläche alle andern Formen in sich aufzunehmen, er ist eine im höchsten Grad bewegliche und anpassungsfähige Betriebsform.

Prüfen wir nun die verschiedenen Betriebsformen auf diejenigen Forderungen, die oben für beste Naturbesamung gestellt wurden, in erster Linie also in bezug auf stetige Verjüngung auf kleiner Fläche, so erscheint als wesentlich, nicht sowohl, ob diese oder jene Hiebsart angewendet wird, ob die Schlagstellung gleichförmig oder ungleichförmig, lichter oder dunkler erfolgt, ob die Verjüngung auf der Einzelfläche rascher oder langsamer vor sich geht, denn alles dies hängt von der Holzart und von zufälligen Umständen, wie Standort, Niederschlag, Meereshöhe ab, als vielmehr, ob die, der Besamung gleichzeitig ausgesetzte Fläche eine große zusammenhängende ist, oder ob sie aus zahlreichen getrennten Kleinflächen besteht; nur die letztere Form sichert uns Stetigkeit.

Die Verjüngung ergreift bei den verschiedenen Betriebsformen in sehr verschiedener Weise von der Bestandesfläche Besitz: bei der reinen Blenderform in einzelnen, unregelmäßig zerstreuten Punkten (Wesselys

Gebirgsblenderwald) oder Kleinflächen; in ähnlicher Weise bei der Blenderschlagform, wo die Verjüngung vielfach von zahlreichen Mittelpunkten aus zonenförmig fortschreitet; bei der Saumschlagform in schmalen Bändern, die sich aneinander reihen; bei Kahl- und Schirmschlag endlich auf der ganzen Fläche zugleich.

Wir können damit die herrschenden Betriebsformen scheiden in:

Großflächenbetriebe, die auf großer Schlagfläche gleichzeitig verjüngen, daher zu gleichaltrigen Beständen führen, demgemäß alle wirtschaftlichen Maßregeln auf großer Fläche gleichzeitig und gleichartig vornehmen, durchaus im großen, daher auch mit großem Risiko wirtschaften, und in:

Kleinflächenbetriebe, die nur auf kleinen Flächenteilen gleichzeitig Verjüngung anstreben, daher diesen kleinen Verjüngungsflächen entsprechend zu Ungleichaltrigkeit auf großer Fläche führen. Die Wirtschaft zeigt hier stets räumlich beschränktes, meist stetiges Vorgehen, alle wirtschaftlichen Maßnahmen erfolgen auf kleinen, gesonderten Flächen, mit kleinem Risiko. (Wappes hebt l. c. S. 393 für den bayrischen Femelschlag hervor, daß das Risiko nicht so groß sei, weil der Eingriff auf kleiner Fläche erfolge.)

„Groß“ und „klein“ sind relative Begriffe, unter denen recht verschiedene Maße verstanden werden können; so bezeichnet z. B. Pilz (forstl. Blätter 1882, S. 169), in Uebereinstimmung mit Borggreve und mit der Auffassung der französischen Forstwirtschaft, als „Großflächen“ Zusammenhänge von 100 und mehr Hektaren, als „kleine Flächen“ dagegen solche von etwa 20 ha = 1 Abteilung des preussischen Fachwerks. Flächen von letzterer Ausdehnung werden aber sonst doch wohl, zumal im Hinblick auf die Gleichaltrigkeit und ihre Wirkungen, meist als „große“ Flächen bezeichnet werden. Wenn hier und im nachfolgenden mehrfach von „Großfläche“, „Großbestand“ u. s. w. gesprochen wird, so geht Verf. in bezug auf die Untergrenze von „groß“ im Maß noch sehr viel weiter herab, als dies sonst wohl üblich ist, herrscht doch im Forstbetrieb der Charakter der Großflächenwirtschaft durchaus vor. Für uns soll die „Großfläche“ immer schon da beginnen, wo die spezifischen Wirkungen der Gleichaltrigkeit und der Kahlfläche einsetzen.

Die Größe der gleichzeitig der Verjüngung ausgesetzten Fläche ist einmal bestimmt durch die Hiebsart; der ungleichförmige Blenderhieb sucht an sich schon eine gleichzeitige Ansamung, wie früher erörtert wurde, nur auf kleinen getrennten Flächenteilen, während dies Kahlhieb und Schirmhieb von sich aus nicht tun. Aber auch die Schlagform als solche kann zur Verjüngung auf kleiner Fläche führen, wenn der „Schlag“ bei langgestreckter Form so geringe Breite erhält, daß auf ihm die Wirkung der kleinen Fläche erzielt wird, und dies ist nach der gegebenen Definition beim Saumschlag der Fall.

Wir hätten also zu den Großflächenbetrieben ohne weiteres zu zählen, weil sie grundsätzlich auf großer Fläche gleichzeitig verjüngen: Kahlschlagbetrieb und Schirmschlagbetrieb, während als typischer Kleinflächenbetrieb, da er grundsätzlich nur auf kleinsten Flächen gleichzeitig verjüngt, der Blenderbetrieb zu bezeichnen ist.

Als Kleinflächenbetriebe erscheinen ferner, wenn auch nach dem gegebenen Begriff nur bedingt: Blenderschlagbetrieb und Saumschlagbetrieb, beide gekennzeichnet durch die stetig über die Fläche fortschreitende Verjüngung. Der Jungwuchs nimmt allmählich von der Bestandesfläche Besitz, dadurch eben erscheinen diese Betriebsformen als Kleinflächenbetriebe; sie sind es aber nicht so absolut, wie der echte Blenderbetrieb; ihre Wirkung als solche hängt vielmehr vom Tempo des Verjüngungsfortschritts ab und ist umsomehr diejenige des typischen Kleinflächenbetriebs, je stetiger und langsamer die Verjüngung fortschreitet, während diese Betriebsformen sich in ihrer waldbaulichen Wirkung umsomehr den Großflächenbetrieben nähern, je rascher dies der Fall ist, je kürzer beim Blenderschlag die allgemeine Verjüngungsdauer bemessen ist, und je größere Flächen gleichzeitig in Schlag gestellt sind; und beim Saumschlag, je breiter die Säume sind und je rascher die Hiebe aufeinander folgen.

Wir können daher als normale Kleinflächenbetriebe nur Blenderschlag mit langer allgemeiner Verjüngungsdauer und Saumschlag mit langsamem stetigem Vorrücken betrachten. Beim Blenderschlag sind es die kleinen, gleichzeitig der Ansamung ausgesetzten Flächenteile des großen Periodenschlags, beim Saumschlag ist es Größe und Form des Schlags selbst (eines Jahresschlags), die das Vorgehen als Kleinflächenform kennzeichnet, während Blenderschlag mit kurzer Verjüngungsdauer dem Schirmschlag, rasch und in breiten Streifen vorrückender Saumschlag (der übrigens unserer Begriffsbestimmung garnicht entspricht) dem Kahlstreifenschlag gleichzuachten sind, sie zeigen mehr oder weniger die Wirkungen des Großflächenbetriebs, wir wollen sie also diesen Formen zurechnen.

Zur Erläuterung mögen die beigegebenen kennzeichnenden Aufrisse der verschiedenen Betriebsformen dienen (S. 112, Fig. 22—28).

Nachdem wir so die Gebiete des Groß- und Kleinflächenbetriebs abgegrenzt haben, können wir zu deren Würdigung im einzelnen vom Gesichtspunkt der Naturverjüngung übergehen.

Die Großflächenwirtschaft.

Wir fassen, wie eben erläutert wurde, unter dieser Bezeichnung diejenigen Wirtschaftsformen zusammen, die darauf ausgehen, den Wald über große Flächen hin mehr oder weniger gleichzeitig zu verjüngen mit dem Ergebnis gleichaltiger oder solcher Hochwaldbestände, die als gleichaltige wirken, sich wie solche verhalten. Zu diesem Zweck bedienen sich diese Verfahren der Kahlschlagform, der Schirmschlagform, oder der kurzfristigen Blenderschlagform; für uns kommen nur die beiden letzteren in Frage, da nur sie Naturverjüngungsverfahren sind.

Aufzisse der wichtigsten Betriebsformen.

1. Großflächenbetriebe.

Fig. 22. Kahlschlagform, Schirmschlagform, kurzfristige Blenderschlagform.

2. Kleinflächenbetriebe.

Fig. 26. Blenderschlagform (bayrisches Femelschlagverfahren).

Fig. 28. Stetiger Saumschlag.

Das Großflächenprinzip ist, wie schon früher betont wurde, nicht aus dem Wald heraus gewachsen, sondern durch die Wirtschaft in ihn hineingetragen worden, es ist demnach auch der reine Ausfluß des ökonomischen Prinzips, eines einseitigen Strebens nach schematischer räumlicher Ordnung im Wald in großem Stil. Daher die weite Abweichung vom natürlichen (waldbaulichen) Prinzip, in erster Linie der gänzliche Mangel der Stetigkeit, welcher der Naturverjüngung verhängnisvoll werden muß, ebenso wie der Mangel an Luftruhe über dem Boden, das ungünstige Verhältnis zwischen Benetzung und Besonnung des Bodens u. s. f.

Entstanden ist dieses Streben nach einer, auf mehr oder weniger großer Fläche gleichzeitig erfolgenden Ernte und demgemäß Verjüngung unseres Erachtens in erster Linie aus Bedürfnissen der Ertragsregelung und zwar derjenigen Verfahren, die sich auf den Ertragsfaktor der Fläche gründen, insbesondere, soweit sie die einzelnen (großen) Bestandesflächen kurzen, festbegrenzten Nutzungsperioden zuweisen und demgemäß ihre Abnutzung und Verjüngung in bestimmt begrenzter Zeit fordern, sei es nun durch den im Erfolg sicheren Kahlschlag, oder die unsicheren Schirm- und Blenderschläge mit kurzer Verjüngungsdauer. Diese Verfahren der Ertragsregelung bedurften der gleichaltrigen Bestände, der Erzeugnisse solcher Wirtschaft, überdies zur Sicherung der Massennachhaltigkeit. In ihren Zielen wurde diese Wirtschaft weiterhin bestärkt durch zahlreiche andere wirtschaftstechnische Vorteile, von denen an anderem Ort die Rede sein soll.

Der mehr oder weniger gleichaltrige Hochwald, das Ergebnis der Großflächenwirtschaft, herrscht heute in den Waldungen des Nachhaltbetriebs weitaus vor und gilt ziemlich allgemein als erstrebenswertes Ziel und als Träger wirtschaftlicher Vollkommenheit! Daß er dies, zunächst waldbaulich betrachtet, nicht ist, soll im nachfolgenden gezeigt werden.

Die Großflächenwirtschaft hat, wie eben ausgeführt wurde, den betriebstechnischen Anforderungen in weitgehender Weise Rechnung getragen und entspricht ihnen demgemäß in hohem Grad, hat sich aber dabei vom Boden des Natürlichen sehr weit entfernt. Sie verfährt folgendermaßen:

Sie betrachtet die auf größeren Flächen, in Beständen, Abteilungen vereinigten, aus den besprochenen Verjüngungsverfahren hervorgegangenen jüngeren Altersklassen zunächst lediglich als Erziehungsobjekte und läßt den einzelnen Komplex unter Beschränkung auf Erziehungseingriffe fortwachsen, bis er die Hiebsreife erreicht hat, oder auch, bis er im Hinblick auf die Massennachhaltigkeit in die Reihe der hiebsbedürftigsten Bestände eingetreten ist. Nun erfolgt eines Tags plötzlich — durch Machtspruch des Wirtschaftsplans! — die Einreihung des bisherigen Erziehungsobjekts in den Endnutzungsplan, d. h. denjenigen Plan, der die Abnutzungsflächen der nächsten Nutzungsperiode festsetzt. Damit ändert sich ebenso plötzlich die Behandlung. Der Bestand soll nun mit einer beschränkten Zahl von Leidensgenossen den berechneten Nutzungs-

satz einer nächsten kurzen Nutzungsperiode befriedigen und zugleich innerhalb dieser Frist von 10 oder 20 Jahren verjüngt werden.

Die Exekution kann erfolgen durch Kahlschlag und Künstverjüngung, — das sicherste Verfahren, welches unter normalen Verhältnissen die Durchführung des Plans ohne Schwierigkeit gestattet, — oder wo, wie bei Schattenhölzern, Naturverjüngung kaum zu umgehen ist, durch Schirmschlag und kurzfristigen Blenderschlag. Die Verjüngung muß aber hier, wenn Aussicht auf Durchführung des Plans, d. h. auf Beendigung der Arbeit innerhalb der gesteckten Frist bestehen soll, über die Gesamtfläche hin gleichzeitig in Angriff genommen, die ganze Großfläche muß so rasch als möglich „in Schlag gestellt“ werden, der Anflug hat prompt einzutreffen, oder muß, wenigstens in bescheidenem Umfang, schon vorhanden sein. Es ist also rasche, auf großen Flächen gleichzeitig erfolgende Ansamung notwendig; diese hat nicht Zeit, sozusagen linear fortzuschreiten, wie sie so gerne tut, wenn sich zonenförmig Anflug an Anflug schichtet.

Dieser Gang der Wirtschaft kennzeichnet sich ohne Zweifel als ein sehr unsanfter Eingriff in das stetige Walten der Natur. Uneingedenk des alten Satzes: „*natura non facit saltus*“ läßt er dieselbe in seinem Verjüngungsverfahren fortgesetzt über die Klinge springen, was sie damit beantwortet, daß sie solchem Betrieb ihr sonst so reiches Füllhorn verschließt. Nur wo der Zufall zur rechten Stunde ein überreiches Samenjahr bringt, oder wo die Schattenhölzer die Verjüngung bereits eingeleitet hatten und schon Fuß gefaßt haben, ist voller Erfolg möglich. Auch mißt Gayer (Der gemischte Wald, S. 18) dem „zur äußersten Verkürzung forcierten schlagweisen Verjüngungsprozeß“ die Hauptschuld am Verschwinden des Mischwuchses zu und betont l. c. S. 55, daß unsere heutige Buchennot und der Mangel aller nutzholzwertigen Beimischung, wie sie früher so zahlreich vorhanden war, allein der schlagweisen, rasch geführten Verjüngung „durch schulgerecht gehandhabte gleichförmige Hiebe“ zugeschrieben werden müsse.

So gelingt denn tatsächlich auch, wie die Erfahrung lehrt, eine befriedigende Naturverjüngung nur unter günstigsten Verhältnissen; sie hängt von allerlei Zufälligkeiten ab, und in sehr vielen Fällen führt das Vorgehen zu sehr mangelhaften oder gar keinen Ergebnissen, ein Erfolg, der noch unter demjenigen des reinen Großflächenkahlschlags steht, da dieser seine Kunstverjüngung wenigstens auf gras- und unkrautfreiem Boden vornehmen kann, während dort der Boden durch Verrasung u. s. w. verdorben, alle schlimmen Folgen der Verwilderung zeigt, die sich in höheren Kosten der Pflanzungen, schlechterem und schwierigerem Einsetzen der Pflanzen, geringem nachfolgendem Gedeihen und größerem Reinigungsaufwand bemerkbar macht.

Ist nach Ablauf der Nutzungsperiode so oder so der Wille des Wirtschaftsplans erfüllt, der Bestand verjüngt, so hört dieser wieder für lange Zeit auf, Schauplatz der Verjüngungstätigkeit zu sein, bis wiederum die Exekutionsfrist abgelaufen ist.

Das Unnatürliche, Gewaltsame dieses Vorgehens liegt auf der Hand, es ist der plötzliche Uebergang aus einem sehr langdauernden Erziehungszustand

in eine kurze Verjüngungsfrist ohne richtige Vorbereitung, denn die kurze Zeit der Vorhiebe kann nicht dafür gelten; das schon hohe Alter und die geringe Zahl der Nutzungsbestände hindert ein entsprechendes langsames Vorgehen am einzelnen Ort. Längst hat die Praxis diesen Mangel gefühlt, und mehrfach die „Oeffnung der II. Periode“ verlangt, sie hat damit gezeigt, daß das ganze System unnatürlich und unhaltbar ist. Der Grundfehler aller Großflächenwirtschaft liegt somit im Mangel an Stetigkeit.

Gehen wir nunmehr zur speziellen Betrachtung der beiden Hiebsarten über, die in der Großschlagform die Naturbesamung ermöglichen sollen, so ist zunächst: der **Schirmhieb** dadurch gekennzeichnet, daß er durch gleichmäßige Lockerung des gesamten Kronendachs auf der ganzen Bodenfläche, die verjüngt werden soll, gleich günstige Verhältnisse für Ansamung zu schaffen sucht. Er verwendet somit eine Besamungsstellung des Altholzes, bei der die Samenbäume die Verjüngungsfläche gleichmäßig überschirmen, wir wollen sie „Schirmstand“ nennen, und bei der die Besamungsfläche keine intensive Seitendeckung durch geschlossenes Altholz genießen kann, weil sich der Schirmstand über den ganzen Bestand erstreckt: „Ungedeckter Schirmstand“ (Fig. 30). Die gleichmäßig verteilten Schirmbäume schaffen — auch bei guter Schlagstellung — außer der Lichtzufuhr keine günstigeren Keimbedingungen auf dem Boden, als sie der geschlossene Bestand schon vorher besaß, sie lassen zwar etwas mehr Wasser durch, aber in gleichem Maß auch Sonne und Wind. Keimbett und Anflug fordern, wie wir gesehen haben, volle Deckung gegen unmittelbare Sonne zum Schutz vor Austrocknung und Unkräuterwuchs, dabei etwas Licht und häufige Befeuchtung durch Niederschläge. Die gleichmäßige Lichtung des Schirmstands kann nun aber allen diesen Forderungen zugleich nicht genügen, denn je mehr sie Niederschläge von oben durchläßt, desto mehr dringt die Sonne von der Seite ein und desto stärker wirken austrocknende Winde am Boden. Dazu kommt noch der durch die Lockerung des Kronendachs gesteigerte Wasser- und Nahrungsverbrauch des Schirmbestandes selbst, dessen „Wurzelkonkurrenz“¹⁾.

Die Verhältnisse dürften also sicherlich bei ungedecktem Schirmstand nicht so vorteilhaft sein, wie Borggreve (Die Holzzucht, S. 132) annimmt, insbesondere wirken in den letzten Phasen der Verjüngung, wo noch ein Drittel des Bestands steht, die einzelnen Bäume ähnlich wie Ueberhälter.

Auch die Beschaffenheit der Schirmbäume selbst spielt eine Rolle. Individuen mit dichter Krone und Holzarten, die viel Wasser zurückhalten, wirken im Schirmstand ungünstig. So zeigt die Erfahrung, daß im Mischbestand von alten Schirmtannen und Fichten der Anflug lieber unter letzteren erscheint,

1) Mayr sagt (Waldbau S. 102) in bezug auf die Wirkung des Lichts bei Schirmstand, daß für das Aufwachsen der Jungwüchse Seitenschatten am günstigsten sei, „wenn aber wegen Schutzes gegen Frost, Unkrautwuchs u. s. f. statt der Seitenbeschattung Schirmbeschattung gewählt werden muß, dann ist dieses notwendige Uebel stets mit einem Verlust an Zuwachs in der Jugend wegen ungenügender Assimilation verknüpft“.

Aufrisse der verschiedenen Hiebsarten (Schlagstellungen).

Fig. 29. Geschlossener Bestand.

Fig. 30. Ungedeckter Schirmstand.

Fig. 31. Gedeckter Schirmstand.

Fig. 32. Bländerstand.

Aussensaum Innensaum

Innensaum

Aussensaum

Fig. 33. Randstellung mit Bländerstand.

weil ihre Kronen lockerer sind, während er bei Mischung von Fichte und Buche die Buche bevorzugt, weil diesmal sie es ist, die mehr Wasser durchläßt. Verstärkt wird die ungünstige Wirkung für die Ansamung durch gleichmäßige Lichtung auf großen Flächen; hier findet eine Steigerung der Luftbewegung am Boden statt, an der gleichaltrige Großbestände im höheren Alter ohnedies leiden.

Wir müssen daher bei ungedecktem Schirmstand neben Mangel an Stetigkeit auch noch ungünstige Verhältnisse zwischen Regenzufuhr und Austrocknung, sowie in bezug auf Luftruhe am Boden feststellen.

Schirmstand auf großer Fläche wirkt nur sehr dunkel gehalten, und nur auf geeignetem Standort günstig auf die Besamung der Fläche; der „Dunkelschlag“ kann also nur für Schattenhölzer in Frage kommen. Wo diese aber, wie das zumeist, und immer auf weniger günstigem Standort geschieht, nur in Gruppen und Horsten erscheinen, und wo nun zu rascher Nachbesamung lichter gehauen wird, da besamen sich die großen Restflächen immer schwerer und langsamer, ja vielfach gar nicht mehr, — sie verrassen! Daher dann die unvollkommenen Verjüngungen, die zahlreichen Einzelvorwüchse, Gruppen und Horste mit Steilrändern, die zum großen Teil wieder weggehackt werden müssen, oder aber, wo dies nicht geschieht, unschöne Waldbilder und wirtschaftlich sehr unbefriedigende Zustände schaffen.

Lichtere Schirmstellung aber, wie sie die Schattenhölzer im späteren Stadium der Verjüngung, die Lichthölzer von Anfang an fordern, wirkt nach unseren Beobachtungen im Wald nur durchaus ungünstig, ja wir müssen sie für eine der schädlichsten Maßregeln halten, denen man überhaupt den Wald unterwerfen kann. Der lichte Schirm hält mehr den Jungwuchs zurück, als er ihn fördert, führt dagegen zur Verwilderung, ja schließlich Entartung des Bodens. Den Ehrentitel eines „Schutzbestands“, den die heutige Wirtschaft dem lichten Schirmstand verleiht, sollte man fallen lassen, da er beim weniger Unterrichteten nur zu irrigen Annahmen führt; er verdient diesen Titel nur allein der Frostgefahr gegenüber.

Wenn somit unter lichter Schirmstellung Naturbesamung vollkommen ausbleibt, so ist uns das noch lange kein Beweis dafür, daß sich die Fläche unter besseren Bedingungen nicht sehr gut natürlich verjüngen ließe. Erscheint und erhält sich aber Ansamung auf der Fläche unter so ungünstigen Umständen auch nur in geringem Maße, so ist uns das ein untrüglicher Beweis dafür, daß sich eine vollbefriedigende Naturverjüngung der Fläche auf besserem Wege sehr leicht erreichen ließe.

Bisher wurde gute Schlagstellung vorausgesetzt. Diese ist nun aber eine sehr schwierige Sache, und man muß daher von vornherein mit zahlreichen Mißgriffen in der Hiebsführung rechnen. Solche können in gleicher Weise in zu starkem, wie in zu schwachem Eingriff bestehen. Während zu starker Eingriff leicht zu Verrassung oder Bodenverödung führt, schadet zu schwacher Eingriff durch Ausbleiben des Besamungserfolgs. Daß solche Mißgriffe sehr leicht und häufig vorkommen, braucht im einzelnen nicht erläutert zu werden und wird wohl von niemand in Abrede gestellt. Selbst Borggreve, der

Hauptvertreter des Schirmschlags in neuerer Zeit, bestätigt in seiner Holzzucht (2. Aufl. S. 196) ausdrücklich, daß beim Schirmschlag leicht und vielfach Mißgriffe vorkommen, die das Ganze verderben. Das liegt eben daran, daß beim Schirmhieb eine gute Schlagstellung schwer herzustellen ist; allgemeine Regeln lassen sich bei den nach Holzart, Boden, Lage, Sturmgefahr u. s. w. wechselnden Verhältnissen schwer geben und noch schwerer anwenden. Eine erfolgreiche praktische Anwendung der von **Borggreve** gegebenen Schirmschlagregeln im großen z. B. kann sich Verfasser nach seiner Kenntnis der Praxis nicht vorstellen. Dieselben können bei der heutigen Nutzholzausformung, vollends bei **Borggreves** hohen Umtrieben unmöglich allgemein zu befriedigenden Ergebnissen führen. Ebenso schwer ist das Erlernen der richtigen Schlagstellung seitens des Jüngeren vom Älteren, Erfahrenen. Jeder wird vielmehr hier seine Erfahrungen selbst machen wollen und selbst machen müssen, und das geschieht besser auf kleiner als auf großer Fläche. Daß endlich die letzten Hiebe des Schirmschlags eine völlige Einzelmischung der ältesten und jüngsten Altersklassen vorfinden, daß also in der Ernte dieser über die ganze Fläche zerstreuten Holzmassen der jungen Bestockung ein Maximum von Gefahren droht, die zu schweren Beschädigungen, ja zur Vernichtung führen können, und daß der Sturm bei dieser Hiebsform ein mächtiges Wort mitspricht, wollen wir hier nur erwähnen, es soll davon an anderem Ort die Rede sein.

Dagegen zeigt der **kurzfristige Blenderschlag** — wenigstens zu Anfang der Verjüngung — günstigere Verhältnisse, die Lichtung ist eine ungleichförmige, kleine gelichtete Flächen liegen inmitten größerer geschlossener Bestandesteile; die einzelne kleine Besamungsfläche — sei es nun gleichförmig oder ungleichförmig gelichtet — steht also unter dem Seitenschutz des umschließenden geschlossenen Bestands. Bei gleichförmiger Lichtung zeigt die Besamungsfläche „Schirmstand“. Derselbe ist im Gegensatz zum Schirmschlagbetrieb durch den umliegenden geschlossenen Bestand seitlich gedeckt, also: „**Gedeckter Schirmstand**“ (Fig. 31), während bei ungleichförmiger Lichtung kleine Lücken mit dichter geschlossenen Stellen wechseln, die Besamungsfläche somit teils frei liegt, teils mehr oder weniger stark überschirmt ist, dabei aber volle Seitendeckung des geschlossenen Bestandes genießt; wir wollen diese Stellung „**Blenderstand**“ nennen (Fig. 32). Beide Stellungen, und zwar letztere mehr noch als erstere, sind dadurch gekennzeichnet, daß sie in reicherem oder geringerem Maße Niederschläge auf die Ansamungsfläche gelangen lassen, während der seitliche Zutritt der Sonne durch die geschlossene Umgebung fast vollkommen, jedenfalls mehr abgehalten bleibt, als durch ungedeckten Schirmstand. Die schräg durch die Lücken einfallenden Sonnenstrahlen gelangen zum großen Teil außerhalb der eigentlichen Verjüngungsfläche unter geschlossenem Bestand auf den Boden und wandern dort im Lauf des Tages, können also nicht intensiv austrocknend wirken und üben auf an sich frischem Standort sogar günstigen Einfluß in bezug auf Ansamung. Dazu kommt noch die schützende Rückwirkung der geschlossenen Umgebung auf die Verjüngungsfläche.

Dem entsprechend zeigen zunächst die ersten Lichtungen oft das erfreulichste Bild des Ankommens und Gedeihens der jungen Generation, dank dem

eben geschilderten günstigen Verhältnis zwischen Regen und Sonne. Der Besamungserfolg dieses Stadiums entscheidet denn auch meist über das gesamte Gelingen. Denn diese günstigen Verhältnisse dauern nur fort, bis die ersten Räumungen der entstandenen Horste beginnen und die Lichtung weiter fortschreitet, bis, wie Borggreve sagt, „aus den Löcherchen Löcher werden“ und die Sonne ungehindert unter die Ränder des gelockerten Altholzes scheint. Hier können dann, allerdings nur mit örtlicher Beschränkung, die Verhältnisse für Besamung und Gedeihen des Anflugs noch viel ungünstiger werden als bei Schirmschlag. Der Boden muß ein sehr guter und der Besamung günstiger sein, und es müssen sich dem entsprechend die Randflächen bereits besamt haben, wenn nicht an den nach den meisten Himmelsrichtungen geöffneten Altholzrändern Bodenverödung in großer Ausdehnung eintreten soll, die jede weitere Besamung ausschließt. Je weiter nunmehr die Verjüngung fortschreitet, umso ungünstiger werden die Verhältnisse, bis sie schließlich nach dieser Richtung ihren Höchststand erreichen, wenn sich zwischen den noch niedrigen verjüngten Horsten nurmehr schmale lichte Altholzstreifen hinziehen, die der Besamungsfläche zwar Niederschläge vorenthalten, der Sonne und dem Wind aber freien Zutritt gestatten, vgl. Fig. 26 links. Kommen nun auch diese ungünstigen Verhältnisse bei gutem Standort nicht voll zur Geltung, so zeigen sie sich dafür aufs schärfste auf geringem, trockenem Boden. Allerdings sind die Bedingungen des kurzfristigen Blenderschlags im ganzen wohl günstiger als diejenigen des Schirmschlags, vermöge des guten Anfangsstadiums, das wenigstens einen teilweisen Erfolg in sichere Aussicht stellt. Dazu kommen noch weitere wesentliche Vorzüge: die bessere räumliche Trennung von Altholz und Jungwuchs und die größere Sicherheit vor Mißgriffen in der Schlagstellung. Immerhin schaffen jedoch beide Betriebsformen, — die eine mehr, die andere weniger — ungünstige Ansamungsverhältnisse.

So ist denn, wie schon Gayers Waldbau (3. Aufl. S. 407) hervorhebt, bei schlagweisem Betrieb die Gefahr des Mißlingens der Naturverjüngung eine große. Die Großflächenwirtschaft führt, wo nicht besonders günstige Verhältnisse vorliegen, nur zu häufig, direkt oder indirekt zum künstlichen Anbau. Für die Fichte speziell sind ihre Naturverjüngungsverfahren in den meisten Fällen direkt ausgeschlossen. Mit Kahlhieb und mißlungener Schirmverjüngung hat sie durch Jahrzehnte in großem Maßstab jene wohlbekannten öden, waldbaulich minderwertigen Großbestände erzeugt (Fichtenkulturen, reine Kieferngrößbestände), deren Unzweckmäßigkeit, ja wirtschaftliche Gefährlichkeit heute fast allgemein anerkannt ist (vgl. auch Gayer: Der gemischte Wald, S. 116, dagegen C. Heyer: Der Waldbau 5. Aufl. I. Bd. 1906 S. 9).

Von weiteren Nachteilen möchten wir — als besonders bedauerlich — hier nur den hervorheben, daß die gleichzeitige Lichtung auf großer Fläche die Holzartenmischung erschwert und hohe Erziehungskosten fast unvermeidlich macht, da der Anflug der zuerst erscheinenden Schattenholzart durch Schuld der leidigen Etatswirtschaft vielfach zu alt wird und uns über den Kopf wächst (Buche!), ehe es uns möglich ist, den Ansprüchen auch anderer Holzarten Rechnung zu tragen; denn von dem Moment ab, wo wir große Flächen lichten,

haben wir den Gang der Verjüngung mehr oder weniger aus der Hand gegeben. Daher dann die großen Reinigungskosten, um Mischung zu erzielen und zu erhalten, daher nicht selten die Scheu, z. B. vor Buchenbeimischung gerade da, wo diese Holzart besonders gut gedeiht, daher endlich die Annahme, sie vertrage sich mit andern Holzarten schlecht.

Fassen wir das Ergebnis unserer Betrachtungen über die Großflächenwirtschaft zusammen, so ergibt sich ein fast vollkommenes Fehlen der Voraussetzungen zu sicher erfolgreicher Naturbesamung. Die Schuld an diesem Mangel trifft aber zum kleineren Teil die Hiebsarten, zumeist ist sie vielmehr bei der Großschlagform zu suchen, bei deren Mangel an Stetigkeit. Wo man daher dem Großflächenbetrieb nicht sofort den Rücken kehren will, wird sich doch im Interesse der Naturverjüngung dringend empfehlen, gleichaltrige Komplexe nie auf ganzer Fläche in Schlag zu stellen, sondern sie stets nur streifenweise in Angriff zu nehmen und so allmählich über die Fläche fortzuschreiten, man wird dadurch die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Naturverjüngung steigern und wenigstens einen Schritt in der Richtung zur Kleinflächenwirtschaft machen. Eine Wirtschaft, die diesem Rat nicht folgt, sondern die bisher unberührten Bestände stets sofort in ganzer Ausdehnung in Schlag stellt, begibt sich damit der Herrschaft über den Gang der Verjüngung, sie begeht u. E. den größten taktischen, wie waldbaulichen Fehler, der auf diesem Gebiet überhaupt begangen werden kann! Ihre weitere Aufgabe ist alsdann, insonderheit beim Nadelholz, nichts mehr als ein ständiges Vermitteln zwischen den sich widerstreitenden Interessen der Etatserfüllung und des Waldbaus, besonders schwierig wegen des unberechenbaren Ausbleibens oder Eintritts der Samenjahre, der Empfindlichkeit des Anflugs, der Sturmanfälle u. s. w. Diese Arbeit ist keine angenehme, und das Ergebnis dem entsprechend selten ein befriedigendes.

Naturverjüngung im Großflächenbetrieb bindet die Wirtschaft, vernichtet die wirtschaftliche Freiheit. Die auf großer Fläche gleichzeitig begonnenen Maßregeln erheischen dringend entsprechende Fortführung, soll der beabsichtigte Erfolg erzielt werden. Die ersten Hiebsmaßregeln entscheiden also über den späteren Verlauf auf lange Zeit. Das nachfolgende Geschlecht hat zu Ende zu führen, was das vorhergehende angefangen, es ist wirtschaftlich gebunden, während bei streifenweisem Vorgehen doch noch eine gewisse Verfügungsfreiheit bleibt. Möge das leidige „Herumkrebsen“ in den Altbeständen des schlagweisen Hochwalds, das man auch heute noch vielfach „Naturverjüngen“ nennt, und auf das unser heutiges Geschlecht durch die Hartig-Heyersche Waldbau-richtung hingeführt wurde, bald zum Vorteil des Waldes in seiner Schädlichkeit voll und allgemein erkannt werden und ganz aus demselben verschwinden!

Die Kleinflächenwirtschaft.

Typischer Kleinflächenbetrieb ist der Blenderbetrieb. Ihn haben wir in bezug auf Naturbesamung schon oben eingehend betrachtet und haben aus ihm unsere Bedingungen für diese abgeleitet. Da er selbst wirtschaftlich,

wie gezeigt, nicht allgemein in Frage kommt, so bleibt uns nur die Aufgabe, die ihm verwandten Formen, die sich ergeben haben, zu betrachten, um festzustellen, unter welchen Bedingungen die Naturbesamung hier steht.

Die Verjüngung im Kleinflächenbetrieb ist in den allein hier in Betracht kommenden Formen dadurch gekennzeichnet, daß die Besamung in stetigem Fortschreiten vom Boden Besitz ergreift, wie dies dem natürlichen Prinzip in vollem Maß entspricht. Hier gilt, wie in der Natur, das Prinzip gewissermaßen linearen Fortschreitens über die Fläche, im Gegensatz zu dem in der Großflächenwirtschaft verkörperten Prinzip gleichzeitiger flächenweiser Ansamung. Im Kleinflächenbetrieb kann also der „Bestand“ nicht als Hiebsfläche betrachtet werden für bestimmte, beschränkte Zeitdauer; denn Einreihen in kurze Nutzungsperioden ist praktisch undurchführbar. Das führt zu Schwierigkeiten in der Nachhaltwirtschaft und ist der Grund, weshalb die taxatorisch beeinflusste Forstwirtschaft sich mehr und mehr von diesen Formen abgewendet hat. Deren Erzeugnis ist ja vielmehr der aus Großschlägen entstandene auf großer Fläche gleichaltrige Bestand.

Der Kleinflächenbetrieb bringt stets nur kleine Flächenteile gleichzeitig in Besamungsstellung und schreitet von diesen aus langsam weiter. Hier sind somit insbesondere die Bedingungen für Durchführung des Prinzips der Stetigkeit gegeben. Es handelt sich also nur darum, dieses Prinzip in den zu besprechenden Formen, dem *Blenderschlag* und *Saumschlag*, in möglichster Vollkommenheit durch entsprechende Ausgestaltung derselben zu verwirklichen.

Wir haben bereits gesehen, daß beide Formen nicht ohne weiteres als typische Kleinflächenbetriebe erscheinen, haben auch schon eine entsprechende Abgrenzung vorgenommen. Wir betrachten demnach hier als *Blenderschlag* nur eine langfristige Form von so langdauernder stetiger Verjüngung, daß die Besamung auf Kleinflächen fortschreiten kann und die Vorteile der kleinen Fläche voll genießt, und zwar wollen wir hier die horst- und gruppenweise vorgehende Form, wie sie in Bayern üblich ist, als bestes Verfahren allein ins Auge fassen. Wenn wir damit das bayr. Verfahren dem im badi-schen Schwarzwald, den französischen Vogesen und der Schweiz üblichen vorziehen, so treten wir in Gegensatz zu dem Urteil Englers (Schweizer Zeitschrift für Forstwesen 1905 S. 29), der in seiner vergleichenden Schilderung der verschiedenen Verfahren auf Grund eigener Anschauung zu entgegengesetztem Ergebnis gelangt. Was uns nötigt, die von Engler bevorzugten Verfahren hier außer Betracht zu lassen, ist: daß sie erstens mehr noch als das bayrische auf besondere Verhältnisse zugeschnitten sind, weil sie durch den langen speziellen Verjüngungszeitraum bestimmte Holzarten (die Schattenhölzer) und für Ansamung günstigste Standortverhältnisse voraussetzen (sie bedürfen reichster Besamung, also hoher Luftfeuchtigkeit und Regenmenge, sowie mineralisch kräftigen Bodens) und daß sie zweitens die gleichwüchsige Erziehung des Holzes mehr zurücktreten lassen, sich also der reinen Blenderform nähern. Sie mögen einer teuren Kunst- wie Naturverjüngung

durch Ersparen der Kulturkosten statisch überlegen sein, verstoßen aber gegen mehrere wirtschaftliche Forderungen, die in den nächsten Abschnitten zu erörtern sein werden und an denen wir glauben festhalten zu sollen.

Wenn hier langdauernde Verjüngung gefordert wird, so meinen wir nach bayrischer Bezeichnung (*B r a z a*, auf der deutschen Forstversammlung zu Kassel 1890 Ber. S. 21) den „allgemeinen Verjüngungszeitraum“, den Zeitraum für Verjüngung des ganzen Bestands, während natürlich der „spezielle Verjüngungszeitraum“ der einzelnen Kleinfläche so kurz als möglich gehalten werden soll und wir künstliche Beihilfe einer Verzögerung vorziehen würden. In dieser Beziehung muß allgemeiner Grundsatz sein: möglichst zeitiger Uebergang von der Beschirmung zur Seitendeckung.

In gleicher Weise kommt als *S a u m s c h l a g* hier nur eine Form in Frage, wie sie unserer früher gegebenen Definition entspricht; sie ist auf ein langsame stetiges Vorgehen in so schmalen Streifen berechnet, daß entsprechende Einwirkung des Altholzes auf die saumförmige Verjüngungsfläche gesichert ist und grundsätzlich benützt wird. Findet dagegen bei *Kahlhieb* in, wenn auch noch so schmalen Streifen, eine Einwirkung nicht statt, z. B. infolge ungeeigneter Himmelsrichtung, oder wird von der Einwirkung durch rasche Fortsetzung des Hiebs grundsätzlich kein Gebrauch gemacht, so möchten wir dieses Verfahren zum *Kahlschlag* (*Kahlstreifenschlag*) zählen.

Unsere so umgrenzten Betriebsformen, *Blenderschlag* und *Saumschlag* bedienen sich nun zur Ansamung der einzelnen Verjüngungsflächen mehrerer Formen der Besamungsstellung des Altholzes: des gedeckten Schirmstands, des *Blenderstands*, die wir oben gekennzeichnet haben, und der „*Randstellung*“. Die letztere ist zunächst begrifflich festzulegen.

Unter „*Randstellung*“ des Altholzes befindet sich die Besamungsfläche dann, wenn sie nach der einen Seite durch das mehr oder weniger geschlossene Altholz gedeckt wird, nach der andern vollständig schirmfrei ist. Die bei *Randstellung* stets saumförmige Besamungsfläche befindet sich somit am Rand des Altholzes, sie wird durch die Randlinie in zwei Teile geteilt, einen Saum außerhalb des Bestands, der nur Seitendeckung aus der Richtung des Altholzes genießt, von oben und von der andern Seite aber vollkommen schirmfrei ist: wir wollen ihn künftig „*Außensaum*“ nennen und einen Saum innerhalb des Rands, den „*Innensaum*“, der neben Seitendeckung durch den Bestand noch von oben überschirmt wird, während er nach außen ohne Deckung ist (vgl. Fig. 33).

Der langfristige *Blenderschlag* bedient sich in gleicher Weise, wie oben für den kurzfristigen gezeigt wurde, zunächst d. h. zu Beginn der Verjüngung des gedeckten Schirmstands und insbesondere des *Blenderstands*. Diese Stellungen verwendet der *Saumschlag*, und zwar dann unter gleichen Voraussetzungen, nur bei Benützung des Schirmhiebs oder *Blenderhiebs*. Ueberwiegend kommt aber bei beiden Verjüngungsverfahren die *Randbesamung* zur Anwendung und zwar beim *Saumschlag* von Anfang an; der unbesamte oder teilweise besamte Boden gelangt hier stets so-

fort oder nach kurzer Zeit unter die Bedingungen der Randstellung, beim Blenderschlag ist dasselbe erst dann der Fall, wenn die Ansamung der ersten Verjüngungsflächen unter Schirm- oder Blenderstand vollendet ist. Nachdem beim Blenderschlag die ersten Gruppen, durch örtliche Lichtung entstanden, von der Ueberschirmung befreit sind, erfolgt die weitere Verjüngung vorwiegend durch Benützung des Fortschreitens der Besamung an den Rändern der Gruppen und Horste. Besonders bei den Nadelhölzern spielt dann die Randbesamung eine große Rolle (vgl. B r a z a l. c. S. 31).

Was die Bedingungen dieser drei Besamungsstellungen für das Keimen und Fußfassen des Anflugs betrifft, die demnach den Wert oder Unwert unserer beiden Verjüngungsmethoden bestimmen, so sind diese für gedeckten Schirmstand und mehr noch für Blenderstand oben als günstige bezeichnet worden, da diese Besamungsstellungen die Sonne abhalten, dagegen den Regen mehr als vorher zufließen lassen, so daß erfolgreiche Keimung und das Fußfassen des Anflugs gesichert sind.

Diese Vorteile des gedeckten Schirmstands und des Blenderstands genießt übrigens der Saumschlag, soweit er sich des Schirm- und Blenderhiebs bedient, nur dann voll, wenn die Saumfläche nach Süden zu durch geschlossenen Bestand geschützt wird, die Absäumung also mehr oder weniger von Norden nach Süden fortschreitet.

Bei R a n d b e s a m u n g erfolgt das Keimen und Fußfassen des Anflugs unter und neben dem mehr oder weniger geschlossenen Bestandesrand, dessen Linie die mit Altholz bestockte Fläche einerseits und die altholzfrie Fläche andererseits trennt; von der einen Seite liegt also mehr oder weniger volle Deckung gegenüber Sonne und Regen, von der andern freier Zugang beider vor. Die Ansamungsbedingungen der Randflächen hängen nun hier wiederum ab vom Verhältnis der Regenzufuhr zur Besonnung auf denselben; dieses Verhältnis aber ist abhängig von der Himmelsrichtung, gegen welche der Bestandesrand geöffnet ist, und ist, wie sich denken läßt, je nach deren Wahl sehr verschieden, ein allgemeines Urteil läßt sich hier nicht fällen. Wo die Sonne abgehalten wird, dagegen der Regen zufließen kann, werden günstige Besamungsbedingungen vorliegen, je stärker dagegen die Sonne Zutritt, umso günstiger muß neben gesteigerter Regenzufuhr der Boden von Haus aus für Ansamung beschaffen sein, soll diese überhaupt noch zustande kommen, bis schließlich die Möglichkeit bei nach Süden geöffneten Rändern fast ganz aufhört. — Näheres darüber später.

Die Ansamung kann erfolgen im Außen- wie im Innensaum, doch wird nach Beobachtungen des Verf. ziemlich allgemein für Schattenhölzer und Fichte die Regel aufgestellt werden können, daß der Anflug schon im Innensaum Fuß gefaßt haben muß, wenn auf seine Erhaltung mit Sicherheit gerechnet werden will, da er auf dem Außensaum bald in den Kampf mit Gras und Unkräutern einzutreten hat, also schon ein entsprechendes Wurzelvermögen besitzen muß, um obzusiegen. (Zur Verunkrautung nicht geneigter Sandboden macht eine Ausnahme, dort findet sich erfolgreiche natürliche Ansamung besonders der Fichte, aber auch sogar der

Tanne und Buche vielfach auf dem Außensaum.) Die Wirtschaft wird also stets mit Vorteil darauf ausgehen, die Besamung schon auf dem Innensaum zu erzeugen, und erst, wenn sie dort Fuß gefaßt hat, den Randhieb fortzusetzen, die dann weiterhin etwa noch eintretende Besamung aber als erwünschte Ergänzung begrüßen.

Im allgemeinen wird die **R a n d b e s a m u n g**, günstige Himmelsrichtung vorausgesetzt, als die **s i c h e r s t e** bezeichnet werden dürfen. Die Verjüngung schreitet unter Rändern, besonders wenn sie gelockert sind, mit Vorliebe, ja mit einer Zähigkeit fort, die z. B. bei der Tanne in der Literatur mehrfach, besonders von **K a u t z s c h** mit Recht hervorgehoben wird. Die Randstellung hat dazu den entscheidenden Vorteil, daß sie eine **a l l m ä h l i c h e U e b e r f ü h r u n g** in den **F r e i s t a n d** gestattet und daß auch nach erfolgter Freistellung der Seitenschutz noch ziemlich lange erhalten bleiben kann, wobei überdies die Möglichkeit einer Nachbesamung bleibt. Wir möchten die erfahrungsgemäß günstige Wirkung der Randstellung dem bei bestimmter Himmelsrichtung besonders günstigen Verhältnis von Regenzufuhr und Besonnung zuschreiben, wovon später noch eingehender gesprochen werden soll. Auch die feuchtkühle Luft, die dem Bestandesrand bei heißem und trockenem Wetter aus dem geschlossenen Bestandesinnern am Boden zufließt, mag ihre günstige Wirkung äußern, indem sie die Wasserverdunstung von Boden und Anflug, diesen für Keimung und Fußfassen des Anflugs entscheidenden Faktor, vermindert.

Diese Betrachtungen lassen auf einen **h o h e n W e r t d e s l a n g f r i s t i g e n B l e n d e r s c h l a g b e t r i e b s** in bezug auf Naturbesamung schließen, wenn auch noch gewisse Mängel bestehen bleiben.

Die erste Ansamung unter Blenderstand dürfte unter günstigsten Besamungsbedingungen vor sich gehen. Beim Uebergang zur Randbesamung werden sich dann allerdings diese günstigen Verhältnisse nur teilweise erhalten lassen, d. h. nur da, wo die Ränder unter entsprechenden Einwirkungen stehen. Günstige Bedingungen liegen jedoch nicht nach allen Himmelsrichtungen vor. Der Blenderschlag aber muß, da er im Lauf der Verjüngung die zuerst gebildeten Jungwuchshorste freistellt und erweitert, seine Bestandesränder nach allen Himmelsrichtungen öffnen, so daß es ihm weiterhin nicht mehr möglich sein wird, sich an allen Stellen des Bodens günstigste Besamungsverhältnisse zu erhalten. Bei sehr günstigen Bodenverhältnissen werden zwar die Nachteile an den sonnenbeschienenen Rändern weniger scharf hervortreten, ja sich durch entsprechende Maßnahmen mildern lassen; um so intensiver müssen sie dafür auf Standorten mit an sich erschwerter Naturbesamung wirken. Es herrscht deshalb die allgemeine Anschauung, daß auf geringem insbesondere trockenem Standort selbst langfristiger Blenderschlag nicht anwendbar sei, da er ganz oder teilweise zu Bodenverödung führe. Diese tritt in erster Linie gerade an denjenigen Stellen ein, wo Bestandesränder nach ungünstiger Himmelsrichtung geöffnet wurden. Je weiter die Verjüngung fortschreitet, um so mehr nehmen diese Stellen zu und um so ungünstiger werden die Besamungsverhältnisse, — auch deshalb, weil die Lichtungsflächen sich näher rücken und

die bisher geschlossenen Bestandesteile, die einen günstigen Einfluß auf sie ausübten, mehr und mehr verschwinden. Auf den Altholzstreifen, die zwischen den emporwachsenden Jungwuchshorsten schließlich verbleiben, werden die Verhältnisse leicht ähnliche, wenn auch nicht in gleichem Maß ungünstige sein, wie dies oben für den rasch vorgehenden Blenderschlag geschildert wurde, weil die heranwachsenden, schon geschlossenen Horste, welche die geräumten Flächen bedecken, manche Nachteile vermindern und insbesondere eine günstige Rückwirkung auf die Luftbewegung am Boden haben; auch hatten die Zwischenflächen mehr Zeit, sich schon frühzeitig genügend zu besamen.

Aehnlich beurteilt Martin in seinen Folgerungen der Reinertragslehre II. Bd. S. 206 dieses Verjüngungsverfahren. Er anerkennt die Vorteile der von Mittelpunkt ausgehenden Verjüngung, ist jedoch der Meinung, daß der günstige Einfluß beim Fortschreiten der Verjüngung nicht bestehen bleibe.

Wenn wir so auf Grund theoretischer Betrachtungen zu einem im allgemeinen recht günstigen Urteil über die Naturverjüngung im Blenderschlagbetrieb gelangen, wenigstens für geeignete Standorte, und wie noch beigelegt werden muß, geeignete Holzarten, d. h. solche, die in der Jugend ein größeres Maß von Schatten zu ertragen vermögen, so steht dies in vollem Einklang mit der praktischen Erfahrung.

In Bayern, wo diese Betriebsform durch die Großflächenwirtschaft nie ganz verdrängt worden war, und wo sie als „gruppen- und horstweiser Femelschlagbetrieb“ theoretisch durch Gayer, praktisch insbesondere durch Huber weitergebildet worden ist, wird dieselbe mit bestem Erfolg auch bei der Fichte im großen Wirtschaftsbetrieb angewendet (vgl. die Berichte der deutschen Forstversammlungen zu Kassel 1890 und zu Regensburg 1901, hier S. 106). Wir werden später, wo wir diese Betriebsform mit unsern eigenen Vorschlägen zu vergleichen haben, eingehender auf sie zurückkommen.

Ebenso ist der Blenderschlagbetrieb, in etwas anderer Ausbildung allerdings, von altersher eingebürgert und hat sich bis heute erhalten in den Tannenwäldungen des badischen Schwarzwalds (vgl. Ber. der deutschen Forstversammlung zu Wildbad 1880), wo Holzart und Boden (kräftiger Urgebirgsboden) den Blenderschlag in gleicher Weise begünstigen, während er sich unter den bezüglich des Bodens und teilweise auch der Holzart nicht so vorteilhaften Verhältnissen des württembergischen Schwarzwalds nicht erhalten konnte. Gerade bezüglich der Tanne tritt deshalb die Forderung des Blenderschlags, als derjenigen Betriebsart, welche bei dieser Holzart allein sicher zum Ziele führe, auch mehrfach anderwärts in der Literatur hervor, so insbesondere bei Kautzsch (Beitr. zur Weißtannenwirtschaft 1895, S. 82) in dem früher erwähnten Streit gegen die vom Großflächenprinzip beherrschten Wirtschaftsregeln für die Weißtanne in den Reichsländern.

Sind demnach die waldbaulichen Mängel des Blenderschlags wohl klein,

so sind sie doch immerhin groß genug, um ihn für geringere Standorte mehr oder weniger auszuschließen, also gerade für solche, die naturgemäßer Verjüngung am meisten bedürfen. Dazu kommen noch gewisse Nachteile, die außerhalb des Waldbaus liegen, — Nachteile, die ihn nicht überall und allgemein empfehlenswert erscheinen lassen. Daß er nicht allgemein anwendbar ist, sondern günstige Verhältnisse voraussetzt, — nicht brauchbar ist an steilen Hängen, bei Sturmgefahr, auf geringem Boden u. s. w., — betonen *H u b e r* u. *A.* auf Grund reicher Erfahrung (*Regensburger Forstversammlung 1901*), während ihn *E n g l e r* bei anderem Hiebsgang auch auf geringem Boden für erfolgreich durchführbar hält. Andere Nachteile sind wirtschaftlicher Natur und entspringen teils aus seiner nahen Verwandtschaft zum *Blenderbetrieb*, teils aus seiner Eigenschaft als *Großschlagform*, sie sind später zu besprechen.

So scheint es gerechtfertigt, nach einer allgemeiner brauchbaren, einwandfreieren Form zu suchen, welche die Mängel des *Blenderschlags*, insbesondere auch die waldbaulichen, vermeidet. Diese Form glauben wir im *Saumschlag* gefunden zu haben.

Während die besprochene *Blenderschlagform* eine bestimmt abgegrenzte Betriebsart ist, nämlich, wie wir gesehen haben, eine Verbindung der *Großschlagform* mit dem *Blenderhieb*, haben wir im *Saumschlag* nur eine Schlagform vor uns, die wiederum mit verschiedenen Hiebsarten verbunden werden kann und zwar hier, ohne daß die *Kleinflächenverjüngung* dadurch in Frage gestellt würde, denn diese ist schon durch die Schlagform als solche gesichert. Wir finden daher beim *Saumschlag* die Voraussetzungen für größte Beweglichkeit und Vielgestaltigkeit, ohne Gefahr der Verletzung des *Kleinflächenprinzips*. Auch das Grundsätzliche des *Saumschlags* wird nicht berührt, wenn wir je nach Lage der Verhältnisse oder wechselnden Bedürfnisse bald die eine, bald die andere Hiebsart anwenden. Die große Bedeutung, die wir dieser Schlagform beimessen zu dürfen glauben, die zahlreichen Möglichkeiten, die sie bietet und der verschiedene Wert derselben für *Naturverjüngung* veranlassen uns, ihrer eingehenden Betrachtung ein besonderes Kapitel zu widmen.

Das Verjüngungsverfahren ist, wie wir oben gesehen haben, dadurch charakterisiert, daß nur seitlich gedeckter Schirmstand, *Blenderstand* und *Randstellung* für die Ansamung in Frage kommen und daß letztere den Ausschlag gibt. Da es hiernach die *Randbesamung* ist, die über den Wert des Verfahrens in bezug auf sichere und reichliche *Naturverjüngung* entscheidet, dieser Wert aber ausschließlich von der Himmelsrichtung abhängt, nach welcher der Bestandesrand geöffnet ist, so wird es eine Hauptaufgabe der nachfolgenden Betrachtungen sein, in dieser Beziehung Klarheit zu schaffen.

4. K a p i t e l.

Der Saumschlag.

Der Saumschlag ist, richtig betrachtet, nicht an sich schon eine Betriebsart, sondern, wie wir oben gezeigt haben, nur eine Schlagform. Die Schläge werden hier in Saumform geführt, d. h. in so schmalen Streifen, daß durch den anliegenden Altholzrand gewisse waldbauliche Wirkungen auf die Schlagfläche ausgeübt werden. Diese Schlagform beherrscht jedoch hier das ganze Verfahren in einer Weise und drückt ihm seinen Stempel auf, daß die angewendeten Hiebsarten gar nicht zu derselben Geltung kommen, wie dies z. B. beim Großschlag der Fall ist, sondern ganz zurücktreten. So kommt es, daß hier die Schlagform dem Verfahren den Namen gibt, im Gegensatz zu den andern Betriebsarten wie Kahlschlag, Schirmschlag, Blenderschlag, die sich nach der Hiebsart benennen, ja daß sie selbst als eine Betriebsart gilt, die sich bald der einen bald der andern Hiebsart bedient.

Gerade die waldbaulichen Wirkungen nun, die man bei der Saumschlagform voraussetzt, sind es, die uns hier interessieren, der Schutz von Boden und Anflug gegen Austrocknung, gegen Frost und andere ungünstige Einflüsse, denn sie bedingen die Möglichkeit der Naturbesamung, sie entscheiden also bei der Beurteilung des Werts des Saumschlags nach dieser Richtung. Wir haben zu betrachten: das Zustandekommen der Wirkungen, ihr Maß und die dieses Maß beeinflussenden Faktoren.

Der Saumschlag ist dadurch gekennzeichnet, daß diejenige Fläche, die gleichzeitig der Verjüngung unterworfen wird, einen schmalen, am Bestandesrand entlang laufenden Saum, im äußersten Fall fast eine Linie bildet, — wir wollen ihn weiterhin den Verjüngungssaum nennen — und daß die Verjüngung erfolgt durch ein allmähliches Fortschreiten dieser Linie über die zu verjüngende Bestandesfläche. Es kommt dabei für das Zustandekommen der Besamung zunächst die angewendete Hiebsart in Betracht, die über die Art der Ueberschirmung entscheidet, dann der Hiebsfortschritt, der den Grad der Stetigkeit bestimmt und endlich die Hiebsrichtung, die den Zutritt von Regen und Sonne bedingt und daher über den Erfolg der Randbesamung in erster Linie mitentscheidet.

Die Hiebsart.

Der Saumschlag kann sich zunächst des Kahlhiebs bedienen, wir haben die Form: *Kahlsaumschlag* genannt. Sie entsteht durch saumförmigen Kahlabtrieb des Bestandes, und die sich daraus ergebende Verjüngungsfläche steht unter den besprochenen Bedingungen reiner Randstellung, die Naturbesamung ist also eine reine Randbesamung.

Er kann sich aber auch mit dem Schirmhieb verbinden, so entsteht der

Schirmsaumschlag. Hier geht der Kahllegung des Randstreifens eine gleichmäßige Kronenlockerung desselben voraus, die seine Besamung einleiten soll. Ist dann die Saumfläche unter Schirmstand besamt, so findet deren Räumung statt und wird der nächste Saum in Schirmstand gebracht, während die freigelegte Fläche noch weiterhin Seitenschutz durch den Altholzrand genießt. Die Naturbesamung erfolgt hier unter seitlich gedecktem Schirmstand und unter Randstellung.

Durch Anwendung des Blenderhiebs endlich entsteht der **Blendersaumschlag**, bei dem der Räumung des Saums eine ungleichförmige Kronenlockerung des Randstreifens vorausgeht. Hier geht die Verjüngung vor sich unter Blenderstand und unter Randstellung.

Beim Blenderschlagbetrieb hat die Großschlagform nachteilige Wirkung dadurch geübt, daß die Besamungsstellungen, mochten sie auch zunächst im einzelnen Punkt günstig wirken, über große Flächen unregelmäßig ausgedehnt waren, so daß mit fortschreitender Verjüngung die Hiebsführung am einen Verjüngungsort früher oder später störend auf die Verhältnisse am andern einwirken mußte. Die Besamungsstellen sind in ihren Bedingungen für Keimung und Fußfassen des Anflugs vom Zutritt der Sonne, des Winds und der Niederschläge, daher von der Deckung nach bestimmten Himmelsrichtungen abhängig, und diese wird im Lauf der Verjüngung bei der Großschlagform notwendig durch die Umgebung gestört, es muß daher an mehr oder weniger zahlreichen Stellen früher oder später ein ungünstiges Verhältnis entstehen. Dieser Nachteil ungünstigen gegenseitigen Einflusses läßt sich bei Saumschlag vermeiden, weil die fortschreitenden Besamungsstellen stets linear angeordnet sind.

Alle drei Hiebsarten können nun im Saumschlagbetrieb unbeschadet seines Prinzips angewendet werden und ohne dem Verfahren ein wesentlich abweichendes Gepräge zu geben; daher dessen große Beweglichkeit, ja **Schmiegsamkeit**, die den verschiedensten waldbaulichen Anforderungen des Bodens, der Holzarten (besonders auch der Fichte) und Holzartenmischungen, wie den Etatsrücksichten und anderen wirtschaftlichen Forderungen in gleicher Weise gerecht zu werden vermag und insbesondere in der Lage ist, Etatsrücksichten und waldbauliche Forderungen miteinander in Einklang zu bringen, im Gegensatz z. B. zum Schirmschlag.

In dieser Schmiegsamkeit und dem Umstand, daß sich der Betrieb immer nur auf schmaler, leicht zu überschauender Fläche bewegt, liegt ein Moment der wirtschaftlichen Freiheit, das unserer Wirtschaft im Hinblick auf die Forderungen des Waldbaus dringend not tut. Gayer (Waldbau, 3. Aufl. S. 184—185) rühmt der „Saumschlagform“ und „Kleinflächenform“ nach, daß beide sich besonders für die Fichte eignen, bei der diese Formen vielfach Eingang gefunden haben, „so daß durch diesen künstlichen Vorgang (der Ausformung von Kleinbeständen) die Tendenz und das Bedürfnis einer Annäherung an die ungleichaltrigen Bestandesformen deutlich ausgesprochen ist“.

Hervorzuheben ist schließlich noch der leichte Uebergang aus einer Hiebsart in die andere, und die Möglichkeit, ohne die Gefahr größeren Schadens für den Fall eines Mißgriffs, diejenige Hiebsführung zu ermitteln, die nach Lage des einzelnen Falls in bezug auf Holzarten und Boden den besten Erfolg sichert. Der Saumschlag ist somit gekennzeichnet durch größte Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit, ohne daß, wie S. 126 gezeigt wurde, Gefahr vorläge, den Rahmen der Kleinflächenform zu überschreiten.

Der Hiebsfortschritt.

Wir verstehen darunter das Tempo, in welchem der Hieb über die Fläche fortschreitet, bestimmt einmal durch die Breite und dann durch die Wiederkehr der Saumschläge.

Wenn wir hier, ähnlich dem Blenderschlag, einen allgemeinen und speziellen Verjüngungszeitraum unterscheiden, — wobei der erstere dem Zeitraum entspricht, in dem ein Bestand verjüngt wird, während der letztere die Zeit für Besamung der einzelnen Schlagfläche angibt —, so würde die Wiederkehr des Hiebs durch den speziellen Verjüngungszeitraum bestimmt. Für die Dauer dieses speziellen Verjüngungszeitraums nun gilt ganz allgemein der schon früher aufgestellte Grundsatz, daß im Interesse des Jungwuchses so zeitig als möglich von der Ueberschirmung zur Seitendeckung übergegangen werden sollte, weil durch letztere das Wachstum infolge normaler Zufuhr der Niederschläge und Ausschalten der Wurzelkonkurrenz der alten Stämme wesentlich mehr gefördert wird, als durch Ueberschirmung. Der spezielle Verjüngungszeitraum wäre also möglichst niedrig, die Wiederkehr des Hiebs damit möglichst häufig anzusetzen.

Die Schlagbreite ist nach oben durch den Begriff des „Saums“ begrenzt, sollte übrigens stets eine möglichst geringe sein, damit der Anflug solange als möglich unter Seitenschutz steht und nur allmählich zum vollen Freiland kommt. Als Regel für den Hiebsfortschritt würde sich somit ergeben: Breite des Schlags gering, Wiederkehr häufig! eine Regel, die in vollstem Maß dem Grundsatz der Stetigkeit entspricht, unserer ersten Forderung an jeden Naturverjüngungsbetrieb. Die Regelung des Hiebsfortschritts ist es ja, die beim Saumschlag den Grad der Stetigkeit bestimmt, sie entscheidet also auch darüber, in welchem Maß diese Betriebsform als Kleinflächenbetrieb wirkt. Bei Naturverjüngung aber muß das Prinzip der Stetigkeit den Hiebsfortschritt beherrschen, — ein Verhältnis, das am sichersten erreicht wird durch den Grundsatz: der Hiebsfortschritt hat sich ganz nach den Bedürfnissen der Ansamung zu richten, dieser zu folgen.

Unter normalen Verhältnissen soll also der Hieb dem Weitergreifen des Anflugs entsprechend fortschreiten, wodurch er in seinem Fortschritt von Holzart, Besamungsfähigkeit des Bodens, Samenjahren u. s. w. abhängig wird.

Nun haben aber im Wirtschaftsbetrieb vielfach andere, nicht waldbau-

liche Momente zwingenden Einfluß auf das Tempo, sei es im Sinn einer Verzögerung, oder, was häufiger der Fall ist, einer Beschleunigung. In Verzögerung des Hiebs kann sehr weit, bis auf durchschnittlich 1 m Hiebsfortschritt fürs Jahr herabgegangen werden. Im Fall der häufig notwendigen Beschleunigung gegenüber dem natürlichen Fortschreiten der Ansamung, die bedingt ist durch große gleichaltrige Bestände, Etatsrücksichten u. s. w., kommen, neben Zuhilfenahme von Schirm- und Blenderhieb auf entsprechend breiten Vorhiebsbändern, künstliche Nachhilfen in Betracht, wie z. B. zeitige Bodenvorbereitung, Vorbau, weitgehende künstliche Ergänzung u. s. w.¹⁾

Der Hiebsfortschritt bestimmt neben der Stetigkeit auch noch den Grad der Luftruhe am Boden. In dieser Beziehung zeigt zunächst der Saumschlag keinen wesentlichen Vorteil gegenüber dem Großflächenbetrieb; er gewinnt jedoch mit zunehmender Verlangsamung des Hiebsfortschritts, weil sich um so stärker die Bestandeskrone abdacht, und um so öfter den Boden erreicht. Im Extrem, dem früher gezeichneten „geordneten Blenderbetrieb“, sind wir schon zu einem recht hohen Maß von Schutz des Bodens gegen Luftbewegung gelangt (vgl. die Abbildungen Fig. 20 und 21 auf S. 100 u. 101). Weitere Mittel zur Steigerung der Luftruhe am Boden werden an anderem Ort nachgewiesen werden.

Die Hiebsrichtung.

Wir verstehen darunter diejenige Himmelsrichtung, in welcher der Hieb über die Bestandesfläche fortschreitet. Da diese Richtung bei ungebrochenem Saum senkrecht zur Randlinie des Saumschlags steht, bestimmt sie auch die Himmelsrichtung, nach welcher der Altholzrand geöffnet ist und wird damit entscheidend für die Möglichkeit erfolgreicher Randbesamung. Denn der Erfolg der Naturbesamung unter Randstellung hängt von der Himmelsrichtung ab, nach der das Altholz geöffnet ist, da diese das Verhältnis von Regenzufuhr und Austrocknung durch Sonne und Wind auf der Besamungsfläche bestimmt.

Daß die Himmelsrichtungen in letzterer Beziehung nicht gleichwertig sind, liegt auf der Hand; wir werden sie schon vor eingehender Untersuchung ihrer Verhältnisse in für Besamung produktive und unproduktive scheiden und annehmen können, daß eine bestimmte Richtung ein Optimum der Besamungsmomente bedingt. Die beste Himmelsrichtung wird vom rein waldbaulichen Gesichtspunkt bestimmt durch das Höchstmaß des Verjüngungserfolgs unter der zugehörigen Randstellung. Andere Momente, die neben dem waldbaulichen ebenfalls Einfluß üben, sind hier noch nicht zu besprechen. Deshalb werden

1) Es sind mehrfach Zahlen für das mittlere oder das zulässige Maß des Hiebsfortschritts gefordert oder unterstellt worden. Man hätte uns gar zu gerne vorgerechnet, wie lange man braucht, um einen gleichalterigen Großbestand im Saumschlag fertig zu verjüngen. Daß solche Zahlen nicht allgemein gegeben werden können, liegt auf der Hand; sie hätten ja auch für den einzelnen Fall gar keinen Wert — etwa denselben Wert, wie die Angabe einer allgemeinen mittleren Umtriebszeit des Waldes überhaupt für die Hiebsreife irgend eines Bestands. (Schon unsere Angabe von 1 m als Mindestmaß hat zu Irrtümern geführt.) Vergl. die Ausführungen des Verf. im Maiheft der Allg. F. u. J. Ztg. 1908 und im Forstw. Centralbl. 1910 S. 216.

Für seine „Regelmäßigen Femelbetriebe“ gibt Ney (Forstw. Centralbl. 1881 S. 269) den jährlichen Hiebsfortschritt bei Tanne zu 2 m an.

wir auch regelmäßig zu einem geradlinigen Saumschlag, d. h. einem solchen mit gerader Schlagfront¹⁾ gelangen, auf den auch andere Rücksichten dringend hinweisen, die wir an anderem Ort zu besprechen haben werden.

Im Gegensatz dazu steht Neys Ringfemelbetrieb, der alle Himmelsrichtungen als gleichwertig voraussetzt. Auch der bayrische Blenderschlagbetrieb zeigt in dieser Beziehung, wie schon besprochen, waldbauliche Nachteile.

Dadurch, daß der Besamungserfolg des Saumschlags von der Himmelsrichtung wesentlich abhängt, ist ein abschließendes waldbauliches Urteil über denselben immer nur für eine bestimmte Himmelsrichtung möglich. Insoweit entzieht sich somit der Saumschlag einer allgemeinen Beurteilung, es läßt sich aber doch aus dem Besprochenen feststellen, daß er eine ganze Reihe für den Erfolg günstiger Momente in sich schließt, die bei entsprechender Hiebsrichtung zu voller Geltung gelangen können, es sind dies seine Schmiegsamkeit, der hohe Grad von Stetigkeit, der sich beliebig steigern läßt, die Luftruhe am Boden, sowie der Umstand, daß beim Saumschlag der für Naturverjüngung ungünstige ungedeckte Schirmstand ausgeschlossen ist, im übrigen aber solche Besamungsstellungen vorwiegen, die wir als für Naturbesamung günstigste bezeichnen konnten. Weshalb diese Verjüngungsform trotz günstiger Momente im praktischen Betrieb tatsächlich so sehr zurücktritt und besonders in bezug auf Naturverjüngung so wenig Erfolg zeigt, wird aus den nun folgenden Untersuchungen hervorgehen.

Die nachfolgenden Betrachtungen über die Hiebsrichtung in ihren Beziehungen zur Naturbesamung stützen sich ausschließlich auf Beobachtungen im Wald. Verf. ist bezüglich der letzteren und der sich daraus ergebenden Vorschläge in der glücklichen Lage, darauf hinweisen zu können, daß jedermann an der Hand von Karte und Kompaß im Wald selbst seine Angaben zu prüfen vermag, denn es werden sich für den aufmerksamen Beobachter wohl überall, sei es auch auf kleinster Fläche, hiezu geeignete Objekte finden.

Einziges Erfordernis ist ein guter Kompaß; er ist u. E. neben der Karte das wichtigste Hilfsmittel des rationellen Forstbetriebs, ist aber leider dort noch recht wenig in Gebrauch. Der Kompaß muß, um wirklich brauchbar zu sein, eine hinreichend lange Nadel (5—6 cm) besitzen, sowie eine Grad-einteilung, damit die magnetische Deklination berücksichtigt werden kann. Die genaue Feststellung der Himmelsrichtung am einzelnen Ort ist in vielen Beziehungen, insbesondere aber für den Einblick in die Grundbedingungen der Naturverjüngung von entscheidender Bedeutung und es beruht auf grobem Irrtum, wenn man glaubt, der Wirtschaftler könne ohne weiteres an jedem Ort im Wald die Himmelsrichtung genau angeben. Irrungen bis zu 45° und mehr sind keine Seltenheit, besonders in sehr unregelmäßigem Gelände und

1) Im Gegensatz zur gebogenen, nicht zur durch Staffellung gebrochenen Schlagfront.

im Nadelwald, der den Ausblick hindert, wo aber gerade die Himmelsrichtung die größte Rolle spielt. Ein guter Taschenkompaß ist somit eines der wichtigsten Inventarstücke jedes Forstbetriebs¹⁾. Wo finden wir ihn, oder wo wird ausgiebiger Gebrauch von ihm gemacht? Diese Gleichgültigkeit in bezug auf genaue Feststellung der Himmelsrichtung im Wald (z. B. bei Ansamung, bei Lage der Windfälle u. s. w.) verschuldet zum großen Teil unsere auffallende Unkenntnis in bezug auf die Bedürfnisse der Ansamung, die örtlich herrschende Sturmrichtung u. s. w.

Wenn wir uns hier auf den Wald selbst berufen, so hat dies seinen Grund darin, daß sich in der Literatur wohl kaum eine Stütze für das nunmehr zu Besprechende finden wird; sie bietet wenig Anhalt nach dieser Richtung. Zwar lautet schon Cottas Regel 8 zur Anordnung der Schläge in seiner „Anweisung zur Forsteinrichtung“ 1820 S. 31: „Man muß die Hauungen nach solchen Richtungen führen, daß die natürliche Besamung begünstigt wird“. Cotta geht aber nicht näher auf diese „Richtungen“ ein, sondern erläutert seine Regel nur allgemein mit dem Schutz gegen Sonne, Kälte und mit der Rücksicht auf den Samenflug²⁾. Dieses letztere Moment — der Samenflug — spielt auch eine Hauptrolle in neueren Werken, wo von der Hiebsrichtung im Saumschlag die Rede ist — neben dem Sturm fast allein, vgl. C. H e y e r, Waldbau 5. Aufl. S. 64 —, als ob nicht der Samen nach allen oder fast allen Richtungen hin in Menge zerstreut würde. Der Samenflug mag in Frage kommen bei streifenweisen Kahllieben, wie man sie zuweilen im Hochgebirg macht, um solche dann zu allmählicher natürlicher Wiederbestockung durch seitlichen Samenanflug liegen zu lassen (vgl. W e s s e l y: Die österreichischen Alpenländer . . . I. Bd. S. 314). Für unsern Saumschlag hat er geringe Bedeutung, das zeigt klar der Umstand, daß gerade die Nordwestränder alter Bestände, gegen die bei uns doch wohl vom Bestand her nur wenige Winde wehen (vgl. dagegen Z ö t l, Handbuch der Forstwirtschaft im Hochgebirge 1831 S. 250), meist die reichste Besamung tragen.

Im übrigen geht unsere Waldbaulehre merkwürdig kurz über die natürlichen Vorbedingungen der Ansamung hinweg; die meisten Waldbaulehrer gehen hier nicht ins kleine, bauen nicht auf den Grundbedingungen natürlicher Ansamung auf — eine Folge der Großflächenwirtschaft. Eine bemerkenswerte Ausnahme macht nur B o r g g r e v e s Holzzucht (2. Aufl. S. 118), die sich mit diesen Grundbedingungen in anregendster Weise befaßt. Allerdings werden dort andere Richtungen verfolgt, und finden sich daher relativ wenige Belege für die hier zu führenden Nachweise.

Die speziellen Beobachtungen des Verf. stammen vorwiegend aus einer Zone günstiger Niederschlagsverhältnisse; die dort beobachtete Wirkung verschiedener

1) Fast noch mehr zu empfehlen ist eine kleine Handbussole, die gleichzeitig andern Zwecken dienen kann, hier aber insbesondere gestattet, Schlagränder in genauer Richtung auszuzeichnen.

2) Vergl. auch F e i s t m a n t e l: Die Forstwissenschaft in ihrem ganzen Umfang 1835, der den Hieb von Nordwest gegen Südost empfiehlt und diese Hiebsrichtung mit dem Samenflug begründet.

Hiebsrichtungen muß aber, wie sich zeigen wird, um so schärfer hervortreten, je geringer die Niederschlagsmengen sind, während sie sich in sehr niederschlagsreichen Gebieten bis zu einem gewissen Grad verwischt.

Wenn wir nun dazu übergehen, die Forderungen des Waldbaus an die Hiebsrichtung im Saumschlag zu ermitteln, so wird wohl am besten so verfahren, daß hier kurz geschildert wird, wie Verf. zu den nachfolgenden Beobachtungen und Vorschlägen gelangt ist. Derselbe hatte sich, wie schon oben mitgeteilt wurde, im praktischen Betrieb die Aufgabe gestellt, nicht allein, wie üblich, Tanne und Buche natürlich zu verjüngen, sondern alle Holzarten, insonderheit die Fichte, und zwar womöglich unter allen, selbst den ungünstigsten Verhältnissen. Daß dieses Ziel am gegebenen Ort und unter den vorliegenden Verhältnissen durch Schirm- und Blenderschlag, ganz abgesehen von den Schlagbeschädigungen, allein schon wegen der Sturmgefahr nicht zu erreichen sein würde, war nach den schon vorliegenden örtlichen Erfahrungen zu erwarten und bestätigte sich alsbald durch den ersten Versuch, es blieb also nur der Saumschlag als einziges Mittel zu erfolgreicher Verjüngung der Fichte übrig, der dem Verfasser durch das System der räumlichen Ordnung, das ihm vorschwebte, ohnedies nahelag. (Vgl. auch F ü r s t, Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? S. 76.)

Diesem nun versuchten Verfahren kam sofort ein reiches Fichtensamenjahr zu Hilfe und so wurden denn überall auf den E- und NE-Seiten der hiebsreifen Bestände schmale Aufhiebe gemacht und die ersten Saumschläge angelegt. Die Maßregel schien nur zu erfolgreich, denn im folgenden Frühjahr begrünten sich die Flächen in weit mehr als erwünschtem Maß mit Fichtenkeimlingen und — was für den Fortgang des Hiebs besonders wertvoll erschien, — die Begrünung zog sich bis weit unter das Altholz hinein. Der Keimung folgten im Juni 4 Wochen Trockenheit mit wenigen schwachen Niederschlägen und der ganze Zauber war wieder verschwunden! Spätere Nachkeimung brachte dann wiederum einigen, wenn auch geringen Ersatz, der sich teilweise erhalten hat. Auffallen mußte bei diesem Vorgang, daß an wenigen Stellen von beschränkter Ausdehnung, — an kleinen Einbuchtungen, an Bruchpunkten der Saumschläge und Loshiebe, — und zwar immer an Orten, die gegen Süden gedeckt waren, der Anflug sich in voller Dichtigkeit erhalten hatte und erhalten blieb.

Die nächstliegende Erklärung des Mißerfolgs, des so auffallenden, vollständigen Wiederverschwindens von allem Anflug nach kurzer Trockenperiode, wie sie fast jeder Sommer bringt, bei der sich Verf. zunächst beruhigte, war, daß die Hiebe erst im vorausgegangenen Jahr ausgeführt waren, also die ungenügende Zersetzung der Bodendecke die Schuld tragen konnte. Woher aber dann die Erhaltung des Anflugs an einzelnen Stellen?

Auf den richtigen Weg führte eine andere Beobachtung. Nirgends im ganzen Bezirk fand sich so schöne Naturbesamung nach Dichtigkeit, Abstufung und Mischung aller bestandesbildenden Holzarten, als an etwa sechs

räumlich sehr beschränkten Stellen. Es waren bei näherer Betrachtung Idealverjüngungen, sämtlich ohne menschliches Zutun entstanden, denn sie befanden sich an Orten, wo sie nicht beabsichtigt sein konnten, an den Rändern ehe-

Fig. 34.

Aufgen. durch Forstass. Feucht 1909.

Blendersaumschlag.

(Der Bildausschnitt zeigt das Verjüngungsergebnis von etwa 15 Jahren.)

Der höhere Bestand, der am rechten Rand des Bildes sichtbar wird und an den sich die Sammverjüngung anschließt, ein etwa 40-jähriges Stangenholz, stockt auf einer langgestreckten, von SW nach NE ausgedehnten ehemaligen Sturmlicke. Vom NNW-Rand dieser Lücke ab rückten Stumm und Wirtschafft zunächst gegen Süden vor, (es bestand keine Absicht, den Bestand zu verjüngen, doch sollte an das Stangenholz angeschlossen werden) bis zur Mitte des Bilds; Ergebnis: reichste, dichte Ansammlung von Tanne, Fichte und Buche, denen Lärche, Kiefer, Weymouthskiefer beigemischt wurden. Von der Mitte ab gegen links unvorberichtetes rasches Vorrücken; Ergebnis: teilweise Verrassung und Notwendigkeit, mit Fichten zu ergänzen.

maliger Sturmblößen, und zwar am offenen Nordwestrand von Althölzern aus Fichte, Tanne, Buche; der Boden war von sehr verschiedener Besamungsfähigkeit: Sand, Lehm, Ton (vgl. z. B. Fig. 34).

Wie waren diese Verjüngungen zustande gekommen, teilweise auf Boden der sonst die Naturverjüngung durchaus nicht begünstigte? Lassen sich, das war die weitere Frage, die hier wirksamen Bedingungen nicht auch durch die Wirtschaft herstellen? Diese Fragen drängten sich bei der Betrachtung der Objekte sofort auf.

Die äußeren Bedingungen waren durchaus gleichartig, verschieden nur der Boden. In allen Fällen handelte es sich um ungeschützte Nordwestränder, die von den Weststürmen seitlich fortgesetzt benagt wurden. Fast alljährlich ergaben sich dort einzelne Windfälle, zuerst fielen die Fichten, bei stärkeren Stürmen folgten die Tannen, stehen blieben, soweit vorhanden, meist die Buchen. Die Wirtschaft wagte natürlich an solcher Stelle keinerlei Eingriff, sondern beschränkte sich auf die Bestattung der Toten. So wich also hier der Rand des Altholzes sehr langsam und stetig zurück, ihm folgte der sich abdachende Anflug überaus reichlich und üppig, meist in erwünschter Mischung der vorhandenen Holzarten. Die Ansamung erscheint nicht erst auf der Kahlfläche, sondern sie erstreckt sich, soweit das Licht reicht, 10—20 und mehr Meter unter das ziemlich geschlossene Altholz. Tannen und Buchen erscheinen in kleinen Gruppen zuerst, zwischen sie schiebt sich von außen her die Fichte.

Die Erklärung der reichen Besamung ist folgende: Erstens wirkt hier das Prinzip der Stetigkeit in der Absäumung. Langsam aber fortgesetzt, — stammweise — schreitet die Lichtung und Räumung seit dem Sturmjahr fort, das die Lücke schuf; alle, auch die kleinsten Samenmengen der einzelnen Jahre werden benützt, immer findet sich für den Samen eine Stelle, deren Boden in bester Verfassung für Keimung ist, ähnlich wie wir dies beim pfleglich behandelten Bauernwald gesehen haben.

Von gleicher Bedeutung ist aber zweitens die Himmelsrichtung, nach welcher der Bestandesrand geöffnet ist, denn unter, nach andern Richtungen geöffneten Rändern findet sich die Erscheinung nicht. Die Himmelsrichtung ist ohne Zweifel der Hauptpunkt, der Schlüssel zum Erfolg des schmalen Saumschlags bei Naturverjüngung.

Hiedurch aufmerksam gemacht, betrachtet Verf. seither alle ihm zu Gesicht kommenden Altholzränder mit dem Kompaß in der Hand auf ihre Ansamung, ebenso jeden unter Seitendeckung vorhandenen Anflug auf die Himmelsrichtung der vorliegenden Deckung. Die zahlreichen Beobachtungen ergaben eine solche Gesetzmäßigkeit im Verhalten der Ränder in bezug auf Ansamung, daß Verfasser sich auf Grund vieler Proben anheischig machen möchte, aus Vorhandensein und Beschaffenheit des Anflugs, wo nicht störende Einflüsse vorliegen, die unbekannte Himmelsrichtung festzustellen.

Das Ergebnis dieser Beobachtungen bildet die nachstehende **Reihe**, in der sich die Himmelsrichtungen der Bestandesränder in bezug auf ihre Besamungsfähigkeit anordnen.

Dabei ist vor auszuschicken:

1. Daß sich die Angaben zunächst in erster Linie auf den Innensaum beziehen, in zweiter Linie aber, wenn auch in etwas abgeschwächtem Maß, den Außensaum einschließen, hier mit Ausnahme der gegen S, SW und W offenen Ränder, die keinen Einfluß nach außen haben.

2. Daß alle störenden Momente, wie: stark geneigte Lage, durch seitlichen Zufluß gesteigerte Bodenfeuchtigkeit u. s. w. ausgeschaltet sind, die Angaben sich insbesondere zunächst auf ebenes und schwach geneigtes Gelände beziehen.

3. Daß zunächst das Verhalten der Fichte zugrunde gelegt ist, als einer in der ersten Jugend besonders empfindlichen Holzart, die ferner in bezug auf Ertragen von Schatten unter unseren wichtigsten Waldbäumen in der Mitte steht. Damit soll übrigens nicht gesagt sein, daß dasselbe nicht auch für alle andern Holzarten gilt, wenn auch nicht immer in gleich scharfer Ausprägung, wie bei der Fichte. Ähnliches Verhalten wurde vom Verfasser beobachtet bei Tanne, Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Kiefer, Lärche.

I. Am besamungsfähigsten hat sich unter diesen Voraussetzungen erwiesen: der Nordwestrand, ihm gleichwertig ist der gelockerte Nordrand.

II. In zweiter Reihe folgen der Nordostrand und der windgeschützte Westrand.

III. Alle weiteren Ränder, also der dem Wind stark ausgesetzte Westrand, der Südrand und Ostrand und alle zwischen diesen liegenden Richtungen sind mehr oder weniger steril.

Auffallen muß zunächst das ungünstige Ergebnis des Ostrands. Sein Verhalten hat besonderes Interesse, da es ganz im Gegensatz steht zu den in der Forstwissenschaft üblichen Voraussetzungen. Ziemlich allgemein gebräuchlich ist ja die Absäumung von E gegen W, wobei mit einer waldbaulich günstigen Wirkung des Altholzrandes gerechnet wird. Diese Richtung muß somit als eine für Naturbesamung ungeeignete bezeichnet werden. Dasselbe trifft, wenn auch in etwas vermindertem Maß für die Nordostränder zu, wenigstens besamen sie sich nicht leicht. Damit soll nun nicht gesagt sein, daß sich an Osträndern nie Anflug findet, dies ist unter besonders günstigen Verhältnissen immerhin der Fall, aber eben nur unter solchen, als da sind: reiche Samenjahre, besonders günstige Witterung im Keimungsjahr, Bodenverwundung, geschlossene Umgebung im Blenderschlagbestand; meist aber fristet Anflug, der dort Fuß gefaßt hat, ein kümmerliches Dasein und wird vielfach später wieder durch die Sonne weggebrannt. Insbesondere gilt dies vom Fichtenanflug, während andere Holzarten wie Eiche, Tanne, die mehr Trockenheit ertragen und Wärme lieben, die Unterschiede nicht so scharf erkennen lassen. So war z. B. das überreiche Fichtensamenjahr von 1899 zunächst geeignet, das verschiedene Verhalten der Ränder zu verwischen. Die Trockenperioden von 1904 und 1905 haben jedoch nach Beobachtungen des Verf. die an ungeeignetem Ort entstandenen Anflüge zum großen Teil wieder weggebrannt.

Im vollen Gegensatz dazu zeigt die Nordwestseite reichliche Besamung

— auch ungewollt — im Innensaum; besonders samt sich hier die Tanne auch unter geschlossenem Bestand gerne und reichlich an, wohin immer das Seitenlicht reicht, während auf der Nordseite der Anflug sich mehr auf den Außensaum beschränkt und nur vom Innenstreifen Besitz ergreift, wenn derselbe etwas gelockertes Kronendach zeigt. Auf der reinen Westseite läßt sich endlich nicht selten beobachten, daß am Rand selbst, den die Frühnachmittagssonne noch erreicht, und der Wind bestreicht, keine Besamung Fuß fassen kann, daß dies aber etwas tiefer im Bestand der Fall ist, insbesondere finden sich dort Tanne und Buche, während die Fichte den Schatten scheut.

Diese Feststellungen stehen im Gegensatz zu den Angaben von *Borggreves Holzzucht* 2. Aufl. S. 131, wo behauptet wird, die Erscheinung der Bodenverödung finde sich merklich an allen, sehr erheblich aber an den nach der westlichen Hälfte der Windrose zu ihres Mantels beraubten Vollbestandsrändern. Wäre dies allgemein richtig, so würde sich jeder Saumschlag mit Vorverjüngung unter dem Schlagrand verbieten. Die „Holzzucht“ kennt allerdings folgerichtig diese Schlagform nicht, beziehungsweise nur als Kulissenhieb, der — mit vollem Recht — verdammt wird.

Aehnlich wird in *Heyers Waldbau* (5. Aufl. S. 72) ausgeführt, am meisten hagere der Boden dann aus, wenn er dem Wehen der westlichen Winde ausgesetzt sei; die Bodenkraft werde daher durch den Anrieb der Bestände von Osten her geschützt.

Durch das geschilderte allgemeine Verhalten der Schlagränder in bezug auf Ansamung erklärt sich denn auch, weshalb in dem oben erzählten Fall aller Anflug entlang der Ost- und Nordostränder und unter diesen wieder verschwand und sich nur an nach Süden gedeckten Ecken erhielt.

Womit ist nun dieses Verhalten der Schlagränder zu erklären?

Ehe die Beantwortung dieser Frage möglich ist, muß auf die Keimung und Jugendentwicklung des Anflugs und auf den Aufbau des Bestandesrands mit einigen Worten eingegangen werden.

Die Keimlinge aller Holzarten durchdringen mit ihren Wurzeln die Bodenbedeckung (Laub, Moos, Humus) nur allmählich und es vergeht stets das Frühjahr, nicht selten das ganze erste Jahr, bis sie den mineralischen Boden erreichen, die Fichte speziell begnügt sich oft jahrelang damit, in der Humusdecke zu wurzeln (vgl. die Abbildungen Fig. 12—15 S. 69—72). Mehrere Jahre vergehen dann weiterhin bei den meisten Holzarten, bis sie entsprechend tief in den Boden eingedrungen sind, um von den starken Feuchtigkeitsschwankungen der Oberfläche unabhängig zu sein. Bis dies erreicht ist — der Anflug „Fuß gefaßt“ hat —, bleibt derselbe zur Aufnahme des erforderlichen Wassers auf die Humus- und alleroberste Bodenschicht angewiesen. Aber gerade diese sind andauernder Austrocknung ganz besonders stark ausgesetzt, und so sehen wir in trockener Zeit zuerst die Keimlinge, bei andauernder Trockenheit oft auch mehrjährige Pflanzen in Massen dahinsterven, da sie den mineralischen Boden noch

nicht erreicht haben, oder nicht tief genug in ihn eingedrungen sind, um ihren Wasserbedarf zu decken.

Somit sind alle Holzarten im Keimjahr, die Fichte durch eine Reihe von Jahren, sehr empfindlich gegenüber starker Austrocknung der Humus- und obersten Bodenschicht, und ist auf sichere, reichliche Besamung nur zu rechnen unter Verhältnissen, durch die solche verhütet wird. Daraus folgt auch, daß die Fichte noch nach mehreren Jahren wieder verschwinden kann, wenn sie durch vorübergehende Gunst der Verhältnisse an Orten ankam, die sich sonst für Ansamung ungünstig zeigen. Dafür wurde schon oben ein Beispiel angeführt.

Weiterhin ergibt sich aus dem Besprochenen, daß nicht die Summe aller etwa zugeführten Niederschläge für die Ansamung maßgebend ist, sondern eine möglichst häufige, wenn auch nicht tiefgehende Benetzung des Bodens, in erster Linie während und nach der Keimzeit, daher die Zuführung insbesondere aller, wenn auch schwacher Niederschläge in den Trockenperioden des Frühjahrs und Sommers, wobei der Boden gleichzeitig, soweit als irgend möglich, geschützt sein muß gegen Austrocknung durch direkte Einwirkung von Sonne und Wind. Keimung und Fußfassen der Keimlinge verlangt also Zuführung womöglich aller schwächeren Niederschläge und Abhaltung der Sonne. Eine stete gleichmäßige Oberflächenfeuchtigkeit bedeutet aber nicht allein unmittelbar den günstigsten Zustand für Besamung, sondern sie wirkt auch günstig auf die Bodentätigkeit, die Arbeit insbesondere der Lebewesen im Boden, der Bakterien und Regenwürmer, die keine starke Bedeckung oder Verdichtung aufkommen lassen, was wiederum der Besamungsfähigkeit zugute kommt.

Bei dem hier in Frage kommenden Verhältnis der Benetzung zur Austrocknung der Decke und obersten Schicht des Waldbodens während der Vegetationszeit wird die Benetzung vorwiegend durch Regen und Tau bewirkt, die Austrocknung durch direkte Besonnung, durch Wurzelkonkurrenz des alten Holzes und durch Wind; wir werden jedoch im Nachfolgenden zunächst Regen und Besonnung als die wirksamsten Einflüsse allein einander gegenüberstellen. Im Wald haben beide Elemente verminderten Zutritt zum Boden; sollen dort trotzdem günstige Bedingungen für Naturbesamung vorliegen, so muß wenigstens die Sonne stärker abgehalten sein, als der sommerliche Regen. Ist dies nicht der Fall, so befinden sich Keimlinge und junge Pflanzen in steter Gefahr des Vertrocknens, werden mindestens durch jede Trockenperiode in ihrem Wachstum wesentlich geschädigt (Vertrocknen der Wurzelenden, vgl. Gräbner l. c.); ist aber gar der Regen mehr abgehalten als die Sonne, so tritt vollständige Bodenverödung ein, weil Keimlinge überhaupt nicht Fuß fassen können.

Die Aufgabe, das richtige Verhältnis zwischen Regenzufuhr und Besonnung herzustellen, fällt beim Saumschlag dem Rand des Altholzes zu. Wir haben es hier stets mit offenen Bestandesrändern zu tun, d. h. die Kronen sind hoch angesetzt, die Schäfte bis zu etwa $\frac{2}{3}$ der Bestandeshöhe astrein, das ganze Kronendach bildet also eine mehr oder weniger geschlossene Decke über dem

Boden, die auf Säulen ruht und zwar auf Säulen von teilweise beträchtlicher Höhe (15—20 m und mehr).

Dadurch ist nun eine, wenn auch beschränkte seitliche Einwirkung von Sonne und Regen auf die Bodenfläche des Bestands und zwar auf den Innensaum möglich, während das Dach von oben gleichmäßig deckt und selbst auch eine seitliche Wirkung über die Bestandesfläche hinaus, auf den Außensaum zu üben vermag, wobei beide Wirkungen in bezug auf ihren Ort durch die Richtungen bestimmt werden, aus denen die wirkenden Elemente kommen. Das Bestandesdach kann nun einerseits Sonnenstrahlen, andererseits aber auch Niederschläge von der inneren wie äußeren Randfläche abhalten und das geschieht je nach der Himmelsrichtung in sehr verschiedenem Maß, da die Elemente aus verschiedenen Richtungen kommen. Darauf beruht der Einfluß der Himmelsrichtung auf die Besamungsfähigkeit der Randflächen.

Betrachten wir nun zunächst die Wirkungsweise von Sonnenschein und Regen (mit Tau).

Die Sonnenstrahlen kommen stets schräg zu uns, sind also imstande, seitlich unter das Bestandesdach zu gelangen und so den Innensaum zu treffen. Für unseren Fall kommt hier in erster Linie ihre ungünstige, austrocknende Wirkung in Betracht, die wesentlich nur hervortritt, wenn die Strahlen den Boden unter größerem Winkel treffen. Das ist am Spätmittag und Frühausgang der Fall, die schadenbringenden Sonnenstände sind also von etwa SE-SW; wir wollen weiterhin zunächst kurzweg den mittleren Stand, die Mittagssonne und ihre Richtung als schädigend annehmen; denn, wenn auch das Höchstmaß der Sonnenwirkung nicht diesem Stand zukommt, sondern in die ersten Nachmittagsstunden fällt, so wird doch die Mehrwirkung am Nachmittag durch die zahlreich aus Südwesten kommenden Regen mehr als ausgeglichen.

Weitere, und zwar günstige Wirkungen der Sonne sind Lichtzufluß und Erwärmung des Bodens.

Das Licht¹⁾ hat, wie schon oben erwähnt wurde, für die Ansamung und die Entwicklung in der allerersten Jugend (vgl. Mayr, Waldbau . . . S. 97) zweifellos — die eigentlichen Lichthölzer ausgenommen — nicht diejenige ausschlaggebende Bedeutung, die man gewöhnt ist, ihm beizumessen, denn das Licht ist bei unseren üblichen Schlagstellungen für Zwecke der Verjüngung wohl selten (Lichthölzer) der im Mindestmaß vorhandene Wachstumsfaktor; viel eher dürfte dies zumeist die stetige Befeuchtung der Bodenoberfläche sein — man mache nur die Probe mit Begießen in trockener Zeit, und wird die Beziehung zwischen Lichtbedarf und Bodenfeuchtigkeit bald erkennen! Wenn z. B. Pause (Allg. Forst- und J.-Ztg. 1908 S. 345) von „lichthungerigen jungen Fichten“ spricht, so wird wohl tatsächlich der Mangel an Feuchtigkeit in den Trockenperioden des Frühjahrs und Sommers mit dem als Folge eintretenden massenhaften Absterben von Wurzelenden die Hauptschuld an dem schlechten Gedeihen tragen. In besonderem Maß aber gilt jene Auffassung über die Bedeutung des Lichts bei der Naturverjüngung für alle Bestandesränder. Für sie kommt eher die Gefahr der

1) Cieslar „Licht- und Schattenholzarten, Lichtgenuß und Bodenfeuchtigkeit“ Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1909 S. 4.

„Uebersonnung“ in Betracht, denn nach den Feststellungen Wiesners (Der Lichtgenuß der Pflanzen, 1907) wirkt zerstreutes Sonnenlicht günstiger als unmittelbares; volle Besonnung führt leicht ein Uebermaß von Licht zu, das die Tätigkeit der Pflanzen herabsetzt (Uebersonnung). Mayr faßt (Waldbau . . . S. 102) die Wirkung des Lichts, wie sie für die Randflächen in Frage kommt, in die Worte zusammen: „Ganz allgemein zeigt sich im Walde, daß es für das Aufwachsen der Jugend am günstigsten ist, wenn ihr Seitenbeschattung, somit verschleiertes Licht und auf der Südseite gedämpftes Vorderlicht geboten werden kann“.

Was die Erwärmung des Bodens betrifft, so kann dieser Wachstumsfaktor wohl nur an der Nordgrenze des Verbreitungsgebiets der einzelnen Arten, also bei uns nur bei ausgesprochen wärmebedürftigen Holzarten eine ausschlaggebende Rolle spielen. Vielleicht ist das Bevorzugen der Nordwestränder durch Tanne und Eiche mit auf die Erwärmung des Bodens durch die Abendsonne zurückzuführen, während die ungünstige, austrocknende Wirkung durch die Nähe der Nacht mit ihrer Taufrische und durch die häufige Unterbrechung der Austrocknung durch Niederschläge gemildert wird. Für den ostdeutschen Küstenstrich macht Düesberg auf S. 62 seines Buchs „Der Wald als Erzieher“ geltend, daß dort starke Erwärmung für eine Zersetzung der toten Bodendecke notwendig sei. Gefährlich seien Dickungsalter und enger Schluß im Stangenholz, weil die kühle feuchte Luft dichte Moospolster mit nachfolgendem Beerkraut begünstige. Ähnlich wirke eine nach Süden vorstehende hohe Holzwand auf den Jungwuchs, nicht durch Mangel an Licht, sondern an Wärme.

Beim Regen haben wir für unsere Zwecke zwei verschiedene Arten zu unterscheiden:

1. die mehr oder weniger senkrecht fallenden Regen, also die meisten Landregen und Platzregen,
2. die schräg fallenden, fast immer vom Westwind gebrachten Regen, also die meisten Gewitter- und Strichregen.

Die ersteren Regen kehren in der Vegetationszeit seltener wieder, bringen dann viel Wasser, sorgen also für reichliche Durchnässung des Bodens, sie treffen den Außensaum vollkommen und dringen auch durch Dauer oder Gewalt zum großen Teil durch das Kronendach auf den Waldboden des Innensaums.

Die letzteren Regen kehren in der Vegetationszeit häufig wieder, sie sind es namentlich, welche die Pflanzenwelt in Trockenperioden des Frühjahrs und Sommers vorübergehend erfrischen. Sie bringen in der Regel wenig Wasser zumal und durchdringen nur die Bodendecke und etwa noch die oberste Bodenschicht, kommen also in der Hauptsache nur für die flachwurzelnde Vegetation in Frage, welche aber in trockenen Zeiten des Frühjahrs und Sommers oft wochenlang ausschließlich auf sie angewiesen ist (z. B. Sommer 1904, Frühjahr 1905). Diese meist kürzeren Regenschauer werden fast durchweg vom Westwind angepeitscht und fallen daher mehr oder weniger schräg zu Boden. Sie sind somit wie die Sonne in der Lage, auf der Seite, von der sie kommen, seitlich unter

das Kronendach einzudringen und den Innensaum zu benetzen, wie in entgegengesetzter Richtung das Kronendach den Regen vom Außensaum abhält (vgl. den Aufriß von Fig. 1). Von diesen Regen läßt das Kronendach meist nichts oder nur sehr wenig durchdringen. Zu Beobachtungen nach dieser Richtung findet sich allenthalben reichliche Gelegenheit. So konnte z. B. Verf. im trockenen Frühjahr 1905 beobachten, daß nach einer Dürrezeit von 4 Wochen ein zweitägiger wenig ausgiebiger Regen fiel und zwar schräg von Westen her. Der Garten des Verf. wurde erfrischt und oberflächlich etwa 5 cm tief benetzt mit Ausnahme des westlichen Rands, wo eine Fichte und einige andere Bäume den Regen abhielten. Ein Streifen von drei Viertel der Baumhöhe blieb vollkommen trocken. Es folgte dann wieder eine mehrwöchige Trockenperiode! Aehnliche Witterungsverhältnisse sind fast alljährlich zu beobachten.

Diese letzten vom Westwind gebrachten Regen wollen wir weiterhin allein in Betracht ziehen, da sie eine Lebensbedingung für den Anflug unter Randstellung bilden, und wollen sie kurz „Gewitterregen“ nennen, wenn sich die Bezeichnung sich nicht ganz mit der Sache deckt.

Auch des Taus muß hier noch Erwähnung geschehen, da einerseits seine zwar verhältnismäßig kleine, aber durch die Trockenperioden des Sommers stetig fortlaufende Wirkung nicht unterschätzt werden darf, andererseits seine Wirkung an verschiedenen Bestandesrändern eine abweichende sein kann. Schon die Betauung an sich wird nicht an allen Rändern in gleichem Maß stattfinden, noch mehr aber wird die Tauwirkung abweichen, da wir es mit dem schwächsten, nur die Oberfläche treffenden Niederschlag zu tun haben, der somit gegen Abtrocknung am Morgen besonders empfindlich ist und nur da wirksam werden kann, wo in den Morgenstunden nur geringe Abtrocknung stattfindet. Die Tauwirkung ist in klaren Sommernächten eine ziemlich bedeutende, 0,1—0,3 mm und entspricht nicht selten einem leichten Regenschauer. Hann sagt auf Seite 186 seines Lehrbuchs der Meteorologie: „Alle Umstände, welche die nächtliche Wärmeausstrahlung begünstigen, wie jene, welche die absolute, aber zugleich auch die relative Feuchtigkeit der Luft erhöhen, begünstigen die Stärke der Taubildung. Dieselbe kann schon am Abend, an schattigen Stellen sogar schon vor Sonnenuntergang beginnen und die Nacht hindurch bis Sonnenaufgang andauern, wenn die Umstände günstig sind“. Am Waldrande, zumal auf der kühlen Nordseite, sind aber die Umstände verhältnismäßig sehr günstig. Sehr reichlich ist nach Hann der Tau auch in den — meist bewaldeten — Gebirgstälern. Homén (Bodenphysikalische und meteorologische Beobachtungen Berlin 1894, III. Taubildung S. 88) findet im Gegensatz zu früherer Anschauung, die annahm, die Taufeuchtigkeit stamme fast ausschließlich aus dem unterliegenden Boden und seiner lebenden Decke, daß, wenn Tau in großen Mengen abgesetzt werde, derselbe zum großen Teil aus der Luftfeuchtigkeit stamme. Der Tau bildet also Gewinn, nicht Verlust an Feuchtigkeit.

Nun trifft der Tau zwar zunächst nur den Außensaum der Bestandesränder;

auch der Innensaum, besonders der gelockerte, zieht jedoch aus der milder Temperaturerniedrigung bis zur Sättigung steigenden relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung großen Vorteil. Der während des Tags ausgetrocknete Boden nimmt vermöge seiner hygrokopischen Eigenschaften in seinen obersten Schichten Wasser auf, er „zieht an“, wie der Volksmund sagt. Es handelt sich also nur darum, diese Feuchtigkeit auch für einige Zeit festzuhalten.

Nunmehr können wir zur Feststellung des Einflusses der verschiedenen Bestandesränder auf den Zutritt der beiden Elemente, Regen und Sonnenschein übergehen.

Zunächst scheidet der senkrecht fallende Regen aus, da er durch das Kronendach von der gesamten Bestandesfläche in gleichem Maß teilweise abgehalten wird, also an allen Rändern gleichmäßig wirkt. Doch muß festgestellt werden, daß damit schon für die ganze Bestandesfläche, also auch den Innensaum, eine Beschränkung der Regenzufuhr eingetreten ist, der nach dem oben Besprochenen eine entsprechende Verminderung der Besonnung gegenüberstehen muß, soll nicht ein Mißverhältnis zwischen Bodenbefeuchtung und Austrocknung mit seinen Folgen eintreten. Es bleibt nun noch: der aus West kommende Gewitterregen, der nicht abgehalten werden darf, da sein Ausbleiben nachteilig wirkt, und die aus Süd kommenden Strahlen der Mittagssonne, die möglichst abgehalten werden müssen, da sie den Boden austrocknen. Diese Elemente treten an den verschieden gerichteten Schlagrändern in verschiedenen Kombinationen wirksam auf.

Wir untersuchen nun nacheinander alle Haupthimmelsrichtungen in bezug auf Wirkung der Randstellung den beiden Elementen gegenüber und bedienen uns dabei am besten der beigegebenen Skizzen (Figuren 35—39).

Die erste stellt Grundriß und Aufriß eines nach den Haupthimmelsrichtungen orientierten 8eckigen Bestandes dar, dessen Ränder nach allen Seiten offen gedacht sind, also den Zutritt von Sonne und Regen gestatten. Die Grenzen sind im Grundriß stärker (schwarz) ausgezogen. Auf diesen Bestand soll nun einwirkend gedacht werden: einerseits ein aus Westen kommender Gewitterregen, andererseits die Mittagssonne. Diejenige Fläche, die vom Regen voll benetzt wird, ist blau, diejenige, auf welche die Mittagssonne scheint, gelb schraffiert. Der Sonnenschatten greift selbstverständlich nach Norden, der Regenschatten nach Osten über die Bestandesfläche hinaus. Berücksichtigt man auch noch die Vor- und Nachmittagssonne, so treten die abweichenden Verhältnisse an den verschiedenen Bestandesrändern noch viel schärfer hervor. Ein dritter — ungünstiger — Faktor, der austrocknende Wind, hat bisher, wie auch in dieser Darstellung, absichtlich keine Beachtung gefunden, einmal, weil durch die Wirkung des Westwinds nur die gleichgerichtete günstige Regenwirkung um etwas vermindert wird, und dann, weil dem Westwind der Ostwind gegenüber steht, der zwar seltener weht, dann aber viel ungünstiger wirkt, so daß man Ost- und Westseite als gleicherweise vom Wind heimgesucht betrachten

Fig. 35.

Darstellung des Einflusses von Sonne und Gewitterregen auf die Randflächen eines nach allen Seiten offenen (trauflosen) Bestandes.

kann. Die weiteren Skizzen (Fig. 36—39) geben die einzelnen Aufrisse der wesentlich in Betracht kommenden Ränder.

Betrachten wir nun nach der Reihe die verschiedenen Seiten, so erweisen sich die Verhältnisse der S-, SE- und E-Seite als durchaus ungünstig (Hervortreten der gelben Farbe in der Skizze Fig. 35). Nicht nur der Außensaum, sondern auch der Innensaum wird, wenn wir bei der Ostseite die Vormittagssonne mitberücksichtigen, von der Sonne direkt getroffen, während die Bestandeskrone ihnen allen die gesamten Gewitterregen entzieht. Da im Innensaum auch noch die senkrechten Regenfälle teilweise abgehalten werden, so liegt ein vollkommenes Mißverhältnis zwischen Regen und Sonne vor; die Folge ist Bodenverödung, von Naturbesamung kann weder auf Innen- noch Außensaum eine Rede sein. Auch die Taufrische der Nacht wird am Morgen durch die Sonne sofort wieder weggenommen. Was die Ostseite vor S und SW etwa noch voraus hat, nehmen ihr der trockene raue Ostwind und die Wirkung der Morgensonne nach Frostnächten weg (Spätfrost und Barfrost). Auch die Südwestseite ist nicht besser daran, sie hat zwar die Gewitterregen auf dem Innensaum, aber auch die volle Nachmittagssonne, also immer noch ein Mißverhältnis zwischen Regen und Sonne, wozu verschlimmernd die vielen Winde kommen.

Schon etwas günstigere Lage zeigt die Westseite ohne Mittagssonne auf dem Innensaum, dagegen mit vollem Zutritt der Gewitterregen. Ungünstig wirken jedoch Nachmittagssonne und Wind, so daß nur an einem gegen letzteren geschützten Ort einigermaßen günstige Verhältnisse vorliegen.

Günstig nach jeder Richtung erweist sich dagegen die Nordwestseite (Hervortreten der blauen Farbe in der Skizze). Sie zeigt vollen Zutritt der Gewitterregen auf Außen- und Innensaum, sowie vollkommene Abhaltung der Mittagssonne, für den Innensaum auch der Frühnachmittagssonne; dabei ist sie den Ostwinden nicht, den Westwinden wenig ausgesetzt.

Einigermaßen steht hinter ihr die Nordseite zurück, die zwar weder der Vormittags- noch Nachmittagssonne ausgesetzt ist, dagegen nur im Außensaum von den Gewitterregen erreicht wird. Trotzdem ist auch hier das Verhältnis als sehr günstig zu bezeichnen, um so mehr, als verhältnismäßig häufig das Anpeitschen von Gewitterregen aus Nordwesten beobachtet werden kann.

Beide, die Nord- und Nordwestseite, zeigen ferner günstigste Verhältnisse in bezug auf Taubildung, wie insbesondere auf Tauwirkung. Boden und Gewächse werden weniger durch die Sonne erwärmt und es beginnt daher die Taubildung bei Zutritt der feuchten Luft aus dem Bestandesinnern früh am Abend, erfolgt besonders reichlich und setzt sich bis in die Morgenstunden fort. Boden und Gewächse befinden sich daher verhältnismäßig lange Zeit unter einer Decke gesättigter Luft, aus welcher der Boden Feuchtigkeit anziehen kann, während ihm weiteres Wasser durch Abtropfen von den Gewächsen zugeführt wird. Diese selbst sind während jener Zeit vor Verdunstung geschützt. Diese Feuchtigkeit nun vermögen die Nord- und Nordwestränder, da sie während des ganzen Tages

Aufrisse der Randstellung nach den wichtigsten Himmelsrichtungen.

Südrand

Nordrand

Nordostrand

Nordwestrand

bzw. bis zum Spätnachmittag unbesonnen bleiben, sehr lange zu bewahren. Sie helfen damit den jungen Pflanzen über die Durstperioden heißer trockener Tage hinweg, indem sie diese verkürzen, und wäre es auch nur durch längeres Erhalten einer gesättigten Luftschicht über dem Boden, die den Wasserentzug aus diesem und dem Anflug herabsetzt. Jeder Waldgang im heißen Sommer wird es bestätigen, daß die Nordränder nach Taunächten ihre Feuchtigkeit oft bis zum Mittag bewahren, während diese an Ost- und Südrändern schon in aller Frühe verschwindet.

Die Nordostseite, die als letzte übrig bleibt, ist zwar frei von Mittagssonne (nicht dagegen von Vormittagssonne!), aber sie bleibt ohne Benetzung durch Gewitterregen im Innen- wie im Außensaum, und ebenso wird ihr schon in der Frühe des Morgens die Taufeuchte der Nacht durch die Sonne wieder weggenommen. Von besonders günstigen Verhältnissen in bezug auf Besamung kann also nicht die Rede sein, wir möchten nach dem früher Besprochenen den Mangel an Gewitterregen als Nachteil sogar höher anschlagen, als den Vorteil der Beschattung, die immerhin, wenigstens für den Außensaum keine vollkommene ist, während die trockenen E- und NE-Winde, die gerade in Trockenperioden wehen, ihrerseits für Austrocknung der oberen Schicht sorgen, so daß der Mangel an Befeuchtung durch Gewitterregen auch hier besonders nachteilig wirken muß.

Die Ergebnisse dieser Erwägungen stimmen aufs beste mit den oben angeführten Beobachtungen im Wald überein, so daß sie als deren Erklärung gelten können. Daß die Wirkungen nicht in der schematischen Weise erfolgen, wie hier angenommen wurde, ist selbstverständlich, doch dürften die Annahmen immerhin den Mittelwerten entsprechen.

Auch die praktische Erfahrung bestätigt unsere Ergebnisse nach verschiedenen Richtungen: Jedermann weiß z. B., daß er unter dem Westrand eines Bestands vor einem hereinbrechenden Regenschauer keinen Schutz findet, wohl aber unter dem Ostrand, und es kann immer beobachtet werden, daß es dort, selbst nach kräftigen Güssen, noch trocken ist, wie zuvor, während die Westseite von Wasser trieft.

Insbesondere ist aber allgemein bekannt, denn wohl jeder Praktiker hat sich einmal darüber geärgert, daß der Anflug immer da reichlich kommt und üppig wächst, wo man ihn nicht haben will, und da ausbleibt, wo man sein Kommen erwartet. Der erstere Ort ist die W- bzw. NW-Seite, der letztere die E-Seite, da wir regelmäßig von E nach W verjüngen. So sagt Kautzsch (Allg. F.- und J.-Ztg. 1892, S. 279), der Eintritt der Verjüngung lasse meist lange auf sich warten, erfolge überall vor dem Wind, wo man ihn nicht wünschen möchte; die Verjüngung lasse sich, wo sie auf natürlichem Weg begonnen habe, nicht aufhalten, lasse sich nicht nach Belieben beschleunigen noch künstlich ermöglichen (vermutlich in anderer Richtung, d. Verf.). Die alten Förster haben sich zuweilen verleiten lassen, „dem Anflug nachzuhausen“ und mit dem Wind zu verjüngen, sie haben mit einigem Sturmrisiko eine schöne Verjüngung erzielt, aber dem Fachwerk großen Kummer bereitet, denn dort geht

man von der zwingenden Vorstellung aus, die Schläge müßten direkt gegen den Wind geführt werden¹⁾.

Damit wäre also die Frage der Naturbesamung und des Gedeihens in der Jugend — bei Saumschlag, aber auch sonst — eine Frage günstiger Wasserzufuhr (insbesondere des Wassers der schwachen Niederschläge), einer Zufuhr, welche nach Ueberzeugung des Verf. im Waldbau überhaupt eine viel größere Rolle spielt, als gewöhnlich angenommen wird.

Ein weiteres, die Naturverjüngung beeinflussendes Moment, die Wurzelkonkurrenz, hebt neuerdings wieder Fricke (Zentralblatt für das ges. Forstwesen 1904) hervor, indem er dem „Auspumpen des Bodens“ durch das Altholz die entscheidende Rolle bei der Verjüngung und für das Verhalten der Holzarten zuschreibt. Wenn sich am Bestandesrand die jungen Kulturen schlechter entwickeln, als auf freier Fläche, so werde, sagt er ferner, der Halbschatten des angrenzenden Bestands verantwortlich gemacht, tatsächlich sei es die Wurzelkonkurrenz.

Fürst (Forstw. Zentralbl. 1905 S. 1), der die weitgehenden Folgerungen Fricke's auf das richtige Maß zurückführt, hält in letzterer Beziehung an der Mitwirkung des Lichtentzugs fest; wir dagegen möchten, ohne beide Wirkungen zu leugnen, doch die Wirkung des Verhältnisses von Regen und Sonnenschein (Oberflächenbefeuchtung) für bestimmte Himmelsrichtungen über beide stellen.

Insbesondere wird die Wurzelkonkurrenz wirksam werden im Bestandesinnern und an langezeit stillstehenden Schlagrändern, weil hier die Randbäume ihre Wurzeln mehr und mehr nach außen senden, während sie nur sehr wenig wirksam werden dürfte an sich vorwärts bewegenden Schlagrändern, wie sie der stetige Saumschlag zeigt.

Daß der entscheidende Punkt bei der Verjüngung die Benetzung der Bodenoberfläche ist, das bestätigen zahlreiche Ausnahmen von den besprochenen Regeln über das Verhalten der Bestandesränder. Dafür nur wenige Beispiele:

Auffallend ist, daß sich unter Osträndern am ehesten noch Tannen- und Eichenanflüge, wenn auch kümmerlich, erhalten, da

1) In der Festschrift zum 75 jährigen Jubiläum von Eisenach S. 65 z. B. sagt Stötzer: „Alles kommt darauf an, daß die Schläge der herrschenden Windrichtung entgegen geführt werden“.

Eine gute Bestätigung lieferten auch die Verhandlungen des württ. Forstvereins zu Neuburg 1908:

Graner (Vertreter des Fachwerks) polemisierte dort (Bericht S. 80) gegen unseren Vorschlag, von Norden nach Süden zu hauen, jedoch offenbar ohne genaue Kenntnis des Inhalts dieser Schrift, hat er doch aus dem Vorschlag den Schluß gezogen, Verf. gehe von falschen Annahmen über die herrschende Sturmrichtung aus. Er hielt es nämlich für notwendig, der Hiebsführung Nord-Süd gegenüber auf die Sturmgefahr aufmerksam zu machen, aber nicht etwa auf den Nordweststurm, — nein! vielmehr darauf, daß der Sturm bei uns regelmäßig aus Südwesten, ja zuweilen sogar aus Westen wehe, — und zwar unter Hinweis auf mehrere meteorologische Werke und in ganz ähnlichen Ausführungen, wie sie auch in dieser Schrift (S. 181—191) zu finden sind.

dieselben, wenn sie einmal unter vorübergehend günstigen Verhältnissen Fuß gefaßt haben, rasch tief wurzeln und — vielleicht hauptsächlich eben deshalb (?) — weiterhin wenig regenbedürftig sind.

Dann fand Verf. befriedigend gedeihende Anflüge unter Ostrand — allerdings auch wieder Tanne — bis jetzt nur in einem Klima mit sehr reichen Niederschlägen und hoher Luftfeuchtigkeit (Schwarzwald), ferner an Orten mit frischem, von außen durchfeuchtetem Untergrund und in Lagen, wo die Sonnenwirkung vermindert war (N- und NW-Hänge).

Fast durchgängig bilden nämlich stark geneigte Flächen eine wichtige Ausnahme, insofern die Neigungslage je nach ihrer Himmelsrichtung auf die Faktoren Regen und Sonnenschein verschieden einwirkt; der Regen wird in bezug auf die Richtung beeinflusst, aus der er kommt, da die ihn bringenden Winde an den Hängen entlang streichen, somit abgelenkt werden, während die Wirkung der Sonne je nach dem Einfallswinkel auf die Bodenfläche verstärkt oder abgeschwächt erscheint. So wird z. B. die mittlere Richtung der von Westen kommenden Gewitterregen gegen Süden oder Norden verschoben, je nachdem wir es mit SW- und NE- oder mit NW- und SE-Hängen zu tun haben. Ebenso wird die Sonne mit sehr verschiedener Intensität austrocknend wirken, je nachdem die Fläche gegen Süden oder Norden geneigt ist. Die Differenz wird um so größer sein, je stärker die Neigung der Flächen ist, so daß also dem Faktor Sonne am S-, SE- und SW-Hang eine viel größere Bedeutung zukommt, die sich zudem mit der Steilheit der Hänge steigert, als am N-, NE- und NW-Hang, wo ihre trocknende Wirkung stark zurücktritt, um so mehr, je steiler der Hang ist. Die Schlagränder werden sich hier also anders verhalten; Verf. kann dies bestätigen, er hat z. B. bei auch sonst günstigen Verhältnissen am steilen Nordhang, sogar unter Südrand gute Naturbesamung gefunden, was sich daraus erklärt, daß in solcher Lage die Gewitterregen Zugang haben, die Trockenwirkung der Sonne dagegen stark zurücktritt. Inwiefern diese Verhältnisse für die Hiebsführung Bedeutung erlangen, werden wir bei anderem Anlaß eingehend festzustellen haben.

Noch einige weitere Faktoren haben wir auf ihre Wirksamkeit hin zu betrachten, wollen wir die Ansamungsfähigkeit der Bestandesränder nach verschiedenen Himmelsrichtungen voll würdigen, da auch sie auf deren produktiven Wert Einfluß üben. Neben Sonne und Regen haben wir schon den Wind mitberücksichtigt. Ein weiterer Faktor ist der Frost, als Spätfrost wie als Barfrost. Er wird der gesamten Ostseite gefährlich und wirkt insbesondere auf die Keimlinge ungünstig ein. Sein Schaden beruht darauf, daß sich nach Frostnächten die NE-, E- und SE-Ränder sofort der Morgensonne voll darbieten, so daß bei Spätfrost die Keimlinge und neuen Triebe verbrüht, bei Winterfrost die einjährigen Pflanzen aus dem Boden gezogen werden. Hier also eine weitere für Besamung nachteilige Wirkung der genannten Himmelsrichtungen!

Einfluß übt endlich der Schnee, besonders in schneereichen Waldgebieten. Es ist überall zu beobachten, daß der meist aus SW antreibende Schnee hinter den windstillen N- und NE-Rändern der Althölzer zusammengewirbelt wird und sich dort auf dem Außensaum in besonders großen Mengen an-

sammelt. Diese höhere Schneeschicht der N-Seite ist dann weiterhin auch noch durch den südlich vorliegenden Bestand gegen direkte Besonnung geschützt, so daß sie während vorübergehender Tauwetter im Winter sich nur erweicht, um nachher fest zusammenzufrieren und aus diesem vereisten Zustand später um so langsamer abzutauen. So sammelt sich hier nicht selten während des Winters Schicht auf Schicht zu oft beträchtlichen Mengen an und taut im Frühjahr nur sehr langsam ab, der Schnee hält sich hier viel länger, als an allen andern Rändern und im Innern des Bestands selbst.

Dieser Umstand bringt aber für den Anflug wesentliche Vorteile mit sich:

1. Schutz gegen Wildverbiß. Alle kleinen Pflanzen sind in der kritischen Zeit vollständig mit Schnee bedeckt, dem Wild also unzugänglich, und das ist, wie jeder weiß, der den Wald objektiv — mit dem Auge des Forstmanns, nicht des Waidmanns allein — betrachtet, ein entscheidendes Moment. Jede 1—4jährige Weißtanne insbesondere, aber auch jede 1—2jährige Fichte oder Kiefer, die unmittelbar am Boden abgeäst wird, — und das bildet, wenigstens bei der Weißtanne, in diesem Alter die Regel, — ist verloren. Sind die Pflanzen älter, so werden sie nicht mehr vollständig abgebissen, sondern bleiben wenigstens erhalten und können eher geschützt werden. Bei irgend erheblichem Wildstand ist übrigens trotzdem volle Naturverjüngung wohl ausgeschlossen: vgl. Wappes treffenden Ausspruch (Zentralbl. f. d. ges. F.Wes. 1904, S. 393) „Kultiviere in erster Linie mit der Axt, in zweiter mit dem Gewehr, in dritter mit der Sichel (der wir noch die Werkzeuge zur Bodenvorbereitung zugesellen möchten, der Verf.) erst dann greife zum Pflanzspaten“.

2. Späteres Keimen und Ausschlagen in dem lange mit Schnee bedeckten, nachher viel kühleren Boden, den die Sonne nicht unmittelbar erwärmen kann und dadurch Bewahrung vor Spätrösten.

3. Einen reichen Vorrat an Winterfeuchtigkeit, der dem Boden durch die größeren Schneemassen zugeführt wird und zwar in gesteigertem Maß durch das langsame Abtauen, das dem Wasser Zeit läßt in den Boden einzudringen (deshalb auch weniger Engerlingschaden vgl. S. 241).

Dieser Faktor, der Schnee, gibt u. E. der Nordseite ein wesentliches Uebergewicht über die andern Himmelsrichtungen, wirkt auch in gewissem Grad zu gunsten der Nordostseite.

Fassen wir nunmehr das Ergebnis unserer Betrachtungen zusammen, so gilt bezüglich des rein waldbaulichen Werts der Himmelsrichtungen im Saumschlag, daß der für Randbesamung geeignetste Ort ohne Zweifel zwischen Nord- und Nordwestrand liegt, also einer nordsüdlichen, leicht gegen Osten gewendeten Hiebsrichtung entspricht, während alle andern Richtungen als minderwertig bezeichnet werden müssen. Damit soll nun nicht behauptet werden, daß auf der E- und besonders NE-Seite eine Naturverjüngung überhaupt ausgeschlossen sei, solche ist immerhin möglich, insbesondere in Verbindung mit Vorverjüngung im Innern des Bestands

und findet sich da und dort, aber sie setzt günstige Verhältnisse voraus, besonders in bezug auf Bodenfrische; ohne solche ist kein Erfolg zu erwarten, denn wir arbeiten hier vorweg unter ungünstigen Voraussetzungen. Wenn tatsächlich der Saumschlag im Sinne G a y e r s so wenig Eingang in der naturverjüngenden Praxis gefunden hat, so mag der Hauptgrund eben die verkehrte Hiebsrichtung und der deshalb mangelnde Erfolg dieser Schlagform gewesen sein. Dazu kommt, daß die auf Großflächenbetrieb hinarbeitenden Einrichtungsmethoden einen Saumschlag in unserem Sinn überhaupt ausschließen, denn eine Führung eigentlicher Saumschläge ist bei der heutigen räumlichen Ordnung im Wald nicht möglich aus Mangel entsprechend zahlreicher Anhiebsstellen und bei dem herrschenden Einstellen viel zu großer zusammenhängender Nutzungsflächen in die einzelnen Nutzungsperioden.

Beachtenswert ist P f e i l s Ansicht über die Verjüngung der Kiefer im Saumschlag, mitgeteilt durch W e i s e in den Münd. forstl. Heften V. S. 2. Nach W e i s e selbst scheidet hier die Besamung der Kiefer vom stehenden Bestandesrand ganz aus, als Gegenstand, „über den die Meinung im Lauf der Zeit keine Aenderung erfuhr“. P f e i l aber wendet gegen diese Verjüngungsform ein, daß sie leicht zur Verrasung führe, daß die Schläge notwendig schmal sein müßten (was mit dem Fachwerk nicht verträglich ist! der Verf.) und daß der Seitenschatten schädlich sei. P f e i l sagt in dieser Beziehung, und das ist mittelbar eine wertvolle Bestätigung für unsere früheren Ausführungen durch einen so scharfen Beobachter wie P f e i l: „Nicht nur die unmittelbare Beschirmung wird der Kiefer schädlich, sondern auch der Seitenschatten bringt sie sehr im Wuchs zurück, darum ist der schmale Schlagstreifen, wo die hohe Holzwand den Schatten auf die Kultur wirft, beinahe noch nachteiliger, als die Beschattung durch Samenbäume, die auf der Fläche stehen“. Davon meint er, könne man sich leicht überzeugen, denn der Wuchs des jungen Holzes bleibe in dem Maße mehr zurück, wie die Holzwand näher stehe. Der Hieb wurde von Ost nach West geführt, da hat P f e i l wohl die Wirkung, nicht aber die Ursache, wenigstens nicht die wirksamere Ursache richtig erkannt, er hat die Wirkung von Licht- und Regenschatten verwechselt! Bei Saumschlag von N nach S oder NW nach SE wird ein solches Zurückbleiben in der ersten Jugend nicht, beziehungsweise auch bei der Kiefer infolge Lichtentzugs nur soweit in die Erscheinung treten, als es naturgemäß und nicht nachteilig ist.

In seiner „deutschen Holzzucht“ kommt P f e i l schließlich zu dem Ergebnis, daß die Kiefer durch schmale Kahlschläge garnicht zu verjüngen sei. Und doch würde dem Wunsche P f e i l s, der „rasche Verjüngung“ fordert, also kurze spezielle Verjüngungsdauer, durch gar keine Methode besser gedient werden, als durch Saumschlag, allerdings nicht von Osten her.

Wenn in der Folge die Naturverjüngung der Kiefer nicht mehr gelang und meist ganz aufgegeben wurde, so trägt die Schuld daran unzweifelhaft die Unbehilflichkeit der Großflächenwirtschaft.

Die Hiebsführung gegen Südost nun, die wir neben der nordsüdlichen als waldbaulich beste erkannt haben, ist, wie wir später sehen werden, wenn auch nicht für alle Lagen und alle Holzarten, so doch für alle diejenigen Fälle ausgeschlossen, wo S t u r m g e f a h r vorliegt, insonderheit gilt dies für die

Fichte. Dagegen kommt die Nordsüdrichtung ohne wesentliche Einschränkung für den Saumschlag in Frage. Die Wirkung ihres Schlagrands steht, wie wir gesehen haben, derjenigen des Nordwestrands nahe; in einigen Beziehungen, wie z. B. in voller Beschattung und starker Schneeansammlung am Außenrand ist sie ihr sogar überlegen. Möglich ist auch, daß das etwas ungünstigere Ergebnis unserer Beobachtungen an Nordrändern nur durch die weniger geeigneten Beobachtungsobjekte verursacht ist. Als Nordwestränder standen uns nämlich im gleichaltrigen Hochwald überall zahlreiche vom West-Sturm geöffnete Altholzränder zur Verfügung, an denen der Sturm fortgesetzt langsam weiterarbeitet. Das finden wir an den Nordrändern nicht, denn dort ist Ruhe, dort bildet sich, wo noch nicht von Haus aus vorhanden, allmählich ein Trauf, der den Rand mehr und mehr verschließt und wohl auch durch Wurzelkonkurrenz nach außen wirkt. In stetigem Fortschreiten begriffene Nordränder im schlagweisen Hochwald hat Verf. nicht gefunden (ein günstiges Zeichen übrigens dafür, daß der Sturm hier nicht oder nur wenig und selten angreift, — wovon später), während im Blender-schlagbetrieb das Ergebnis durch störende Einflüsse der Umgebung getrübt ist. So zeigt sich am geschlossenen Nordrand Ansamung auf dem Außensaum und in der Randlinie selbst, weniger dagegen auf dem Innensaum. Unzweifelhaft wird aber auch auf der Nordseite die Ansamungsfähigkeit des Innensausms wesentlich gesteigert, sobald das Moment der Bewegung, das dem Nordwestrand eigen ist, unterstützend hinzukommt. Nach den augenscheinlichen Erfolgen auf zahlreichen, wenn auch erst seit wenigen Jahren geschaffenen Hiebsflächen glaubt Verf. dies bestimmt annehmen zu dürfen ¹⁾.

Daran knüpft sich ein Verbesserungsvorschlag, der die Nordseite der nordwestlichen ebenbürtig machen soll, d. i. die grundsätzliche Lockerung des Bestandesrands auf der Nordseite, also die Anwendung nicht des Kahlhiebs auf dieser Seite, sondern des Schirm- oder noch besser des Blenderhiebs. Ein solches Lockern des Rands steigert die Benetzung des Bodens, während die damit verbundene Verminderung der Beschattung gerade auf der Nordseite den geringsten oder keinen Nachteil bringt, weil nach Süden zu die Mauer des geschlossenen Bestands vorliegt. Die Besamungsfläche steht alsdann unter seitlich gedecktem Schirmstand oder Blenderstand, befindet sich also unter günstigen Ansamungsbedingungen. Wir können unter solchen Voraussetzungen den Nordrand dem Nordwestrand gleichwertig an die Seite stellen, was wie sich später zeigen wird, für die Möglichkeit einer Erfüllung der waldbaulichen Forderungen des Saumschlags auch bei sturmgefährdetem Nadelholz von großer Bedeutung ist.

Die Beobachtung der Randwirkungen des Altholzes auf den Jungwuchs legt es nahe, auf einige u. E. irrige Voraussetzungen einzu-

1) Die Annahme hat sich inzwischen in jeder Hinsicht bestätigt. Der fortschreitende reine Nordsaum ist dem Nordwestsaum in bezug auf Ansamungsfähigkeit mindestens gleichwertig, bei der Fichte sogar überlegen. Die durchschnittlich günstigsten Verhältnisse für alle Holzarten dürfte wohl der Nordnordwestsaum bieten.

gehen, die im Waldbau ziemlich allgemein verbreitet sind:

Die heutige Wirtschaft treibt ihre Althölzer von E nach W oder NE nach SW streifenweise ab, sei es im Kahlhieb, oder nach vorausgegangener teilweiser Schirmverjüngung. Sie fordert dabei, um ihr waldbauliches Gewissen zu beruhigen, daß die Hiebe in möglichst schmalen Streifen geführt werden sollen und daß entsprechende Schlagpausen einzuhalten seien, damit der Jungwuchs noch einige Zeit unter dem „Seitenschutz des Altholzes“ stehe. Sehen wir nun an der Hand des Besprochenen zu, welcher Art dieser „Schutz“ des nach Westen vorliegenden Altholzes ist: Es „schützt“ die junge Kultur auf dem Außensaum wirksam vor dem Genuß der fruchtbaren Gewitterregen, aber nur in sehr mangelhafter Weise vor Austrocknung, wirkt also tatsächlich mehr schädlich, als nützlich. Dies ist umso mehr der Fall, je näher der Jungwuchs den geschlossenen Bestand vor sich hat. Wenn daher von Ost nach West durch Kahlabräumung verjüngt wird, so ist es ganz im Gegenteil waldbaulich immer noch besser, die Schläge breit, als sie schmal zu machen, denn so steht dann wenigstens immer nur ein verhältnismäßig kleiner Teil des Jungwuchses in der durch den Ostrand des Altholzes nachteilig beeinflussten Zone (Außensaum). Damit entfällt für diese Hiebsrichtung z. B. alles, was zugunsten der Bildung „kleiner Hiebszüge“, dieses unbestimmten Schlagworts, ins Feld geführt wird, wie schmale Schläge, Schlagpausen „bis der Streifen zieht“, u. a. (vgl. z. B. Allg. F. u. J. Ztg. 1903, S. 3).

Daß der Ostrand des Altholzes ungünstig auf die Bestockung des Außensaums wirkt, kann fast überall festgestellt werden, wo gleichaltrige Kulturen, z. B. Fichtenkulturen, östlich unmittelbar an Althölzer anschließen; solche Fälle finden wir ja im schlagweisen Hochwald nicht selten. Die waldbauliche Einwirkung des Altholzrands auf den Randstreifen muß sich am abweichenden Höhenwuchs der Pflanzen desselben gegenüber der übrigen Kulturfläche zeigen; wäre also die vorausgesetzte günstige Wirkung des Rands vorhanden, so müßten die Individuen, je näher sie ihm stehen, desto stärkeren Höhenwuchs besitzen, die Kultur müßte, wenn sie älter wird, gegen das Altholz in einer in die Augen fallenden Weise ansteigen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, sie dacht sich gegen das Altholz ab, wie aus dem früher Gesagten nicht anders zu erwarten ist (vgl. auch Pfeils zitierte Beobachtung).

Ferner: Die Erscheinung, daß am Fuß von Ueberhältern regelmäßig Verödung des Bodens eintritt oder doch der Jungwuchs in der Entwicklung zurückbleibt, wird gewöhnlich durch die Rückstrahlung des Schafts erklärt (vgl. C. H e y e r, Waldbau 5. A. S. 409). Diese Erklärung, welche übrigens schon durch B o r g g r e v e (Die Holzzucht, 2. A. S. 130) als unhaltbar nachgewiesen wurde, ist, wie auch aus den vorstehenden Erörterungen erhellt, irrig. Die Rückstrahlung des Schafts ist, wie B o r g g r e v e zeigt, nicht einmal eine intensive, da die Strahlen zerstreut werden. Wenn sie dennoch eine starke Beeinträchtigung des Wachstums zur Folge hätte, wie viel schlimmer müßte dann die Südseite eines Felsen, einer Mauer, besonders eines weißgetünchten Hauses wirken, während doch von solcher Schädigung, wie jeder Hausgarten beweist, keine Spur zu entdecken ist. Die Verödung des Bodens rührt vielmehr auch hier von einem Mißverhältnis zwischen

Regenzufuhr und Austrocknung her. Die Sonne liegt vollständig ungehindert auf der Fläche unter dem Ueberhälter, der Wind streicht über dieselbe, aber ein großer Teil der Niederschläge, in diesem Fall der senkrecht fallenden, wird in der Krone des Ueberhälters zurückgehalten. So ist gerade die oberste Bodenschicht besonderer Dürre ausgesetzt. Den starken Wasserverbrauch der Ueberhälter selbst möchten wir nicht als erste Ursache bezeichnen, da die alten Stämme ihren Wasserbedarf in erster Linie aus größerer Tiefe und weiterer Entfernung beziehen.

Ein ähnliches, wenn auch nicht so scharf hervortretendes Mißverhältnis haben wir beim seitlich ungedeckten Schirmstand kennen gelernt, dessen ungünstige Wirkungen im letzten Stadium des Schirmschlagbetriebs bei raschem Verjüngungsgang und auf trockenem Boden besonders scharf hervortreten.

Endlich möchten wir nochmals die Aufmerksamkeit auf die Wachstumsbedingungen an der Westseite der Bestände und auf die forstlich so verrufene Westrichtung überhaupt lenken und besonders hervorheben, daß die so beliebte Deckung gegen Westen zwar Schutz bietet gegen Sturm und Wind, daß sie aber auch die fruchtbarsten, für das Wachstum besonders der jüngsten flachwurzelnden Pflanzen so wichtigen Sommerregen in empfindlichem Maß abhält.

Haben wir so die Bedingungen der natürlichen Ansamung für die wichtigsten üblichen Verfahren und insbesondere für den Saumschlag beleuchtet, so kann nunmehr zur Darstellung desjenigen Verjüngungsverfahrens übergegangen werden, das wir für das beste halten möchten, weil es u. E. allen waldbaulichen Forderungen genügt, die wir bisher aufgestellt haben.

Es bedient sich der Saumschlagform und wir kehren zur Ableitung seiner Grundsätze am besten wieder zu den früher geschilderten natürlich entstandenen Verjüngungsbildern zurück:

Dort war der schräg ankommende Weststurm stetig an der Arbeit. Fast alljährlich brachten die Stürme des Winters oder Frühjahrs den einen oder andern der Randstämme zu Fall, schwächere Stürme begnügten sich mit rotfaulen Fichten in der Nähe des Rands oder mehr im Innern, während stärkere Stürme gesunde Randfichten und die standfesteren Tannen, vielleicht da und dort auch eine Buche warfen. Im übrigen hielt diese letztere Holzart, soweit vorhanden, meistens stand. Auf solche Weise entstand ein ungleichförmig gelockerter Bestandesrand, ein allmählicher Uebergang aus dem dichten Schluß in den lockeren Einzelstand. Buchen und Tannenanflug stellten sich in kleinen Gruppen oder flächenweise meist schon im geschlossenen Bestand unter Seitenlicht ein, während sich die Fichte im gelockerten Randstreifen zugesellte.

Daraus können wir unter Mitberücksichtigung des früher Besprochenen für unsern Saumschlag folgende Grundlagen entnehmen:

1. als normale Hiebrichtungen kommen nur in Betracht: Nord-west-Südost bis Nord-Süd für Laubhölzer und für besonders geschützte Lagen; Nord-Süd für die Nadelhölzer und

für die weniger festen Laubhölzer in besonders gefährdeter Lage.

Nur wo diese Richtungen aus später zu besprechenden Gründen ausgeschlossen sind, kommt die Nordost- und schließlich selbst die Ostrichtung in Frage. Für die Hiebsrichtung bestimmend sind somit Holzart und Standort. Der entscheidende Faktor Sturm soll hier nicht weiter in Betracht gezogen werden, auf ihn gehen wir später besonders ein.

2. Die Hiebsart muß eine ungleichförmige Lockerung des Bestandesrands bewirken, wie wir sie früher als Blenderstand kennen gelernt haben; unter dieser Besamungsstellung scheinen sich alle Holzarten am leichtesten anzusiedeln, sie ist am ehesten befähigt, die gruppenweise Ansamung weiter zu entwickeln, sich ihr anzupassen und ihre allmähliche Ueberführung aus dem gedeckten in den freien Stand zu bewirken.

3. Der Hiebsfortschritt hat möglichst langsam und stetig zu erfolgen, der Hieb entfernt also in häufiger Wiederkehr im einzelnen Punkt jedesmal nur wenige Stämme.

Aus diesen Grundlagen ergibt sich folgender Verjüngungsgang, und zwar zunächst allgemein, ohne Berücksichtigung des besonderen Einflusses von Boden und Holzart:

Der Hieb beginnt am nördlichen bis nordnordwestlichen Bestandesrand und wird so geführt, daß er den Rand langsam und stetig gegen Süden vorwärts schiebt. Er dringt zunächst ungleichförmig in die Randfläche ein, die damit zum „Verjüngungsstreifen“ wird (vgl. Abbildung Fig. 40, die den Aufriß des Verjüngungsstreifens darstellt). In tastendem Fortschreiten und stets im Blick auf Boden und Ansamung werden aus dem geschlossenen Bestandesrand Stämme nicht erwünschter und besonders stark vertretener Holzarten und zwar immer zuerst die dichtestbekronten ausgezogen, während in der Folge der Hieb im schon gelichteten Saum ganz den Bedürfnissen des in der Regel gruppenweise erscheinenden und von Mittelpunkten her sich ausbreitenden Anflugs folgt, und gleichzeitig die Randlinie des Altholzes nach Bedarf vorrückt.

Jede Schlagführung besteht somit hier gewissermaßen aus drei Hieben:

aus dem ersten ungleichförmigen Lockern eines Saums des bisher geschlossenen Bestands und Herstellen immer neuer Kleinflächen für die erste Ansamung;

aus dem Lichterstellen der vorhandenen Anfluggruppen im innern Teil des schon gelockerten Streifens, zur Erweiterung der Ansamung;

aus dem Nachholen der äußeren Nachhiebstämme und damit Vorrücken des Schlagrandes.

Die Hiebe folgen in drei sich aneinander schließenden Säumen, die zusammen den Verjüngungsstreifen bilden. Dieser Streifen zieht sich am Altholzrand hin, begrenzt nach außen durch den Schlagrand, nach innen durch den geschlossenen Bestand. Er selbst zeigt blenderartige Schlagstellung mit vom Vollbestand bis zum Altholzrand stetig zunehmender Lichtung, sodaß sich in ihm — ähnlich dem Blenderwald — alle Stadien der Bodenzersetzung, Belichtung und Regenzufuhr finden, daß sich also überall Orte finden, wo Samen keimen, Keimlinge erstarken

geschlossenen Holzes; dann gegen den Rand hin, unter weiterer Ergänzung, das Fußfassen und Erstarken der Ansamung, endlich am Rand unter Seitenschutz gegen Süden der Dickungsschluß. Die Ansamung muß in der Regel unter Blenderstand Fuß fassen und das nötige Wurzel- und Blattvermögen sammeln, ehe sie in den Freistand gelangt, damit sie die ihr dort drohende Konkurrenz von Gras und Unkräutern niederzukämpfen vermag, rasch in vollen Schluß kommt, und den Boden deckt, wozu noch einiger Seitenschutz erwünscht ist.

Einige Abbildungen (Fig. 41—46) mögen die Schlagstellung, soweit diese bildlich darstellbar ist, und ihren Erfolg erläutern. Die dargestellten Ränder sind sämtlich durchbrochene reine Nordränder. Die Federzeichnungen wurden nach der Natur hergestellt; die photographischen Aufnahmen entstammen teils dem Keuper, teils dem Buntsandstein, ähnliche Bilder sind übrigens auch auf allen andern Formationen, besonders häufig auf Muschelkalk, zu finden.

Fig. 41.

Fig. 41. zeigt den Saum eines Mischbestandes mit nach innen stetig abnehmender Lichtung, als letzte Altholzstämme stehen Laubhölzer (Buchen) in der Ansamung sie sollen einigen Sturmschutz nach rückwärts gewähren.

Der Hiebsfortschritt, d. h. die Geschwindigkeit mit welcher der Verjüngungsstreifen vorrückt, hängt zunächst von rein waldbaulichen Momenten ab: vom Fortgang der Besamung und den Bedürfnissen des Anflugs, daneben aber auch von ökonomischen Forderungen, die in dem einzuhaltenden allgemeinen Verjüngungszeitraum zum Ausdruck kommen, d. h. in der Zeit, innerhalb der nach dem Wirtschaftsplan eine bestimmte Bestandesfläche verjüngt werden soll.

Erste Forderung an das Fortschreiten des Hiebs wäre somit, daß er soweit als irgend möglich den Bedürfnissen und Fingerzeigen des Anflugs folgt. Dabei bleibt jedoch der Wirtschaft für ihre etwa abweichenden Wünsche dadurch ein gewisser Spielraum, daß sich die Besamungshiebe (ersten Lichtungen) mehr oder weniger weit in den geschlossenen Bestand hinein ausdehnen lassen. Diese den wirtschaftlichen Bedürfnissen folgende, allerdings beschränkte Dehnbarkeit des Verjüngungstreifens ist der allgemeine Regulator für den Hiebsfortschritt innerhalb der durch den Waldbau gezogenen Grenzen. Je kürzer die allgemeine Verjüngungszeit für eine gegebene Fläche aus wirtschaftlichen Gründen sein muß, desto breiter der Verjüngungstreifen. Nur so bleibt es auch bei notwendig werdendem raschem Hiebsfortschritt möglich, der Verjüngung die Vorteile der Stetigkeit einigermaßen zu wahren.

Fig. 42.

Fig. 42. Ergebnis etwa 12jähriger langsamer Verjüngung (der Uebergang vom lockern Rand zum dichten Schluß des Altholzes ist nicht ganz richtig dargestellt)

Den Samenjahre n, die sonst den Hiebsgang wesentlich zu beeinflussen pflegen, steht das Verfahren ganz anders gegenüber, als die heute herrschenden Großschlagformen (vgl. des Verf. Ausführungen im Forstw. Zentralbl. 1909 S. 127). Letztere Formen, zumal der Schirmschlag, rechnen nur mit reichen Samenjahren, während der geschilderte Saumschlag alle, auch die kleinsten Samenmengen, die in anderen Jahren erzeugt werden, für sich voll auszunützen vermag, bietet er doch dem reifen Samen durch die Art der Schlagstellung u n u n t e r b r o c h e n ein bestes Keimbett dar. Und solcher Samen wird, zumal im Mischwald und am gelockerten Bestandesrand, vielfach fast alljährlich bald von der einen, bald von der anderen Holzart erzeugt und durch Wind und Vögel auf der Saumfläche in

besonderem Maß zusammengetragen. So ist es auch gar nicht nötig, beim Eintritt von eigentlichen, d. h. reichen Samenjahren den stetigen Gang der Wirtschaft zu unterbrechen und besondere Maßregeln zu treffen; es sei denn, daß man sich

Fig. 43.

Aufgen. durch Forstass. Feuch t 1909.

Fig. 43. Auftrieb eines Altholzes von Tanne, Fichte und Buche auf der Nordseite von 10—12 Jahren. Rechts fertige Verjüngung, links Vorwuchsgruppe von Schattenholzlern (Tanne und Buche) unter dem Altholz. Zwischen dieser Gruppe und der Mitte des Bilds ist der Ort, wo Fichte (und Kiefer) aufliegen. Der rückliegende Bestand (Tanne ungleichaltrig) hat sich beinahe vollkommen betrauft.

in solchen Jahren bei den Saumhieben auf Eingriffe in den noch geschlossenen Bestand beschränkt und die Nachhiebe auf spätere Jahre zurückstellt oder daß man sich bei der Wahl der Schläge zuerst denjenigen Orten zuwendet, wo besondere

Beschleunigung des Hiebsfortschritts erwünscht ist oder gesteigerte Verjüngungsschwierigkeiten vorliegen, um hier das Samenjahr in besonderem Maß auszunützen. Trotzdem kommen aber die andern Säume nicht zu kurz! Eine weitgehende gleichzeitige Ausnützung reicher Samenjahre auf allen Saumflächen wird durch die Dehnbarkeit des Verjüngungsstreifens ermöglicht. Seine Breite, besonders diejenige des Vorverjüngungssaums, d. h. desjenigen Teils der Verjüngungsfläche, der, schwach gelichtet, fortgesetzt in Bereitschaft zur Aufnahme der ersten Besamung steht, vermag sich vollkommen nach einer häufigeren oder selteneren Wiederkehr von Samenjahren zu richten. Bei seltenem Eintritt wird ihm möglichste Breite gegeben, bei häufiger

Fig. 44.

Fig. 44. Reiche Tannen- und Buchenansamung, die sich unter den schmalen Innensaum und unter den noch fast geschlossenen Bestand erstreckt, vom Rand ab (links) dicht ergänzt durch Fichten- u. s. f.-anflug.

Wiederkehr kann er schmal gehalten werden. Reifen dann reiche Samenmengen und besamt sich der Vorverjüngungsstreifen, so läßt sich im Fall seltener Wiederkehr mit dem entstandenen Anflug oder Aufschlag durch eine Reihe von Jahren weiterwirtschaften, sofern man nur in den folgenden Jahren für Erhaltung der Ansamung sorgt. Im Lauf der samenarmen Jahre wird der Streifen zunächst ohne Verbreiterung weiter gelichtet und der Rand vorwärtgeschoben, so daß er immer schmäler wird, bis nach entsprechender Zeit, bei Aussicht auf ein neues Samenjahr, wieder ein breiter Vorlichtungsstreifen gehauen wird. So ist der Saumschlag in der Lage, die Ergebnisse eines und desselben Samenjahrs auf Jahre hinaus zu benützen (auf 10 und mehr Jahre bei Buche und Tanne, auf etwa 5 Jahre bei Fichte,

auf kürzere Zeit bei Lichthölzern), und diesen Grundstock durch die geringeren Samenmengen der Zwischenjahre zu ergänzen. Aber auch auf der schon längst in Verjüngung befindlichen Fläche, bis auf den Außensaum hinaus, vermag unsere

Fig. 45.

Fig. 45. Dieselbe Stelle wie bei Fig. 44. (Außensaum). Fertige natürliche Saumverjüngung, ohne jede künstliche Beihilfe entstanden, enthält (was auf dem Bild leider nicht zu erkennen ist) fast alle wichtigeren heimischen Holzarten (Fichte, Tanne, Buche, Eiche, Esche, Ahorn), da zufällig Samenbäume aller genannten Holzarten in der Nähe stehen.

Schlagstellung das Samenjahr auszunützen. Der reiche Samen, der überall ein geeignetes Keimblatt findet, fällt zwischen den vorhandenen Anflug und füllt

Fig. 46.

Fig. 46. Stark abgedachte Saumverjüngung auf Fichte, Tanne, Kiefer.

die meist noch bestehenden Lücken aus; er erzeugt dadurch den für die weitere Entwicklung wirtschaftlich so wichtigen ungleichaltrigen Aufbau des Jungwuchses.

In ähnlicher Weise lassen sich Anforderungen des Wirtschaftsplans an den Hiebsfortschritt, die über das waldbaulich gegebene Maß hinausgehen, im Rahmen des Saumschlags befriedigen. Wo rascheres Vorgehen wirtschaftlich notwendig ist, wird man eine Verkürzung des speziellen Verjüngungszeitraums vermeiden, sich also nicht durch raschere Wiederkehr gleich breiter Schläge, sondern nur durch Verbreiterung des Verjüngungsstreifens helfen. Die Schlagform nähert sich dann dem Streifenschlag, behält aber trotzdem ihren Saumschlagscharakter, da es sich um eine vorübergehende Maßregel handelt und der stetige Uebergang erhalten bleibt. Mit der Verbreiterung über das Maß des Kleinschlags hinauszugehen, wird man soweit als möglich vermeiden, weil sich sonst leicht Großflächenwirkung geltend macht. Kann der erforderliche Hiebsfortschritt trotz der Verbreiterung des Verjüngungsstreifens nicht erreicht werden, weil sich der spezielle Verjüngungszeitraum zu lange hinzieht infolge geringer Ansamungsfähigkeit des Bodens oder geringer Samenerzeugung, bleibt also die Besamung lange Zeit ganz oder teilweise aus, so muß die spezielle Verjüngungsdauer durch Zuhilfenahme künstlicher Mittel gekürzt werden. In erster Linie kommt Bodenvorbereitung in Betracht, die beim ganzen Verfahren eine große Rolle zu spielen hat, wo immer die Besamung erschwert ist; ferner *Ergänzung*, sei es durch Vorbau und Saat von Schattenhölzern oder durch Nachpflanzung von Fichte und Lichthölzern.

Doch selbst da, wo künstliche *Ergänzung* in weitem Umfang notwendig werden sollte, ja, wo Ungunst der Verhältnisse oder Holzartenwechsel uns zu reiner Kunstverjüngung zwingen, selbst da bewähren sich noch die Vorzüge des vorgeschlagenen Verfahrens. Weshalb sollten wohl auch die günstigen Wuchsbedingungen für die junge Generation am Nordsaum, die bei der Naturansamung und dem Gedeihen des Anflugs so klar hervortreten, bei künstlichem Anbau nun plötzlich verschwinden und die Pflanzkultur nicht gerade so gut fördern, wie den Anflug? Befinden sich doch z. B. die Pflanzungen in den ersten Jahren in besonders schwieriger Lage, bedürfen also guter Wuchsbedingungen in besonderem Maße! Die Vorzüge des Nordsaums kommen zunächst darin zum Ausdruck, daß dort in vielen Fällen die billigere und naturgemäßere Saat angewendet werden kann, die von der Praxis infolge ihrer Unsicherheit und Gefährdung auf der Großfläche, außer bei Kiefer und Eiche, fast ganz aufgegeben ist. Aber auch Pflanzungen in der heute üblichen Form zeigen nach den Wahrnehmungen des Verfassers am Nordsaum viel besseres Aussehen (z. B. nicht die bekannte gelbliche Färbung der Fichten in den ersten Jahren), und geringeren Abgang durch Vertrocknen, Insektenfraß, Frost u. s. f., auch wachsen sie rascher an, da ihr Gedeihen bei stetiger Oberflächenfeuchte durch das zerstreute Oberlicht und das Fehlen unmittelbarer Seitenbesonnung günstig beeinflusst wird.

Erste wirtschaftliche Voraussetzung für Durchführbarkeit auch unter wenig günstigen Verhältnissen ist aber jedenfalls — das geht aus dem bisher Gesagten deutlich hervor — das Vorhandensein möglichst zahlreicher

Hiebsorte, die der Wirtschaft Beweglichkeit, d. h. Wechsel nach Bedarf gestatten. Davon an anderem Ort.

Abänderungen des besprochenen Verjüngungsgangs ergeben sich nun infolge verschiedener Beschaffenheit des Bodens, wie infolge abweichender Eigenschaften der Holzarten. Da wir beabsichtigen, auf diese Gegenstände an anderem Ort näher einzugehen, sollen hier nur die wesentlichen Momente hervorgehoben werden.

Was den Boden betrifft, so ist in erster Linie der verschiedene Grad der Besamungsfähigkeit für den Gang des Saumschlags maßgebend, dann die Neigung zu Gras- und Unkrautwuchs. Am vorsichtigsten und langsamsten muß der Hieb vorgehen auf schwerem und auf trockenem Boden, wie auf Boden, der zur Verwilderung neigt. Rasches, wenig stetiges Vorgehen, stärkere Lichtung, ja Kahlschlag sind z. B. auf Tonboden unverzeihliche waldbauliche Fehler. Solche Bodenarten besamen sich nicht leicht, sie werden daher einen Prüfstein bilden für den Wert des Verfahrens, das auch hier, unter schwierigen Verhältnissen, zum Ziel führen soll. Natürlich wird hier, wie auch bei verheidetem und mit Rohhumus bedecktem Boden, wohl in der Regel Bodenvorbereitung helfend eingreifen müssen. Je leichter sich dagegen der Boden besamt, je weniger er zur Verrasung neigt, desto leichter und rascher schreitet die Verjüngung fort, desto schmaler kann auch der Verjüngungstreifen sein.

Höhere Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit stellen natürlich die von einander abweichenden Eigenschaften der Holzarten. Auch ihnen zeigt sich das Verfahren gewachsen. Die Sturmfestigkeit hat, wie wir gesehen haben, Einfluß auf die Wahl der Hiebsrichtung; das Ertragen von Schatten und die Art der Jugendentwicklung dagegen bestimmen den Gang des Hiebs. Sie sind maßgebend für den Hiebsfortschritt, daher für die Breite des Verjüngungstreifens und den Grad der Lichtung. Den breitesten Verjüngungstreifen mit allmählicher Abstufung vom tiefsten Dunkelstand, in dem sie, bei geringem Lichtreiz von N her, erscheinen, bis zum Lichtstand, brauchen die Schattenhölzer, Tanne und Buche, sie stellen sich von Norden her leicht ein — öfters auch ohne jede Vorrichtung —, bilden zunächst meist kleine Anfluggruppen, um die sich gerne die weitere Ansamung gleichsam krystallisiert, sobald man die Ausbreitung durch entsprechenden Hieb begünstigt; nur Zeit und Muse wollen sie haben, sich festzusetzen. Der Saumschlag hat sich daher, der langsamen Jugendentwicklung dieser Holzarten entsprechend, eines breiten Verjüngungstreifens zu bedienen; volle Räumung mit Freistellung darf erst bei entsprechender Höhe des Anflugs bzw. Aufschlags erfolgen. Muß künstlich eingegriffen werden, so kann dies mit den gleichen Holzarten nur durch Bodenvorbereitung, Pflanzung oder Saat unter dem Innensaum geschehen.

Ganz besonders hat sich dem Verfasser die Fichte als diejenige Holzart erwiesen, für deren Ansamung und Gedeihen die Saumschlagform erfolgreich sein wird, indem sie durch ihr reichliches Ankommen und freudiges Wachstum zeigt, wie angenehm ihr die hier gebotenen Wachstumsbedingungen sind. Für die Fichte genügt schon ein ganz schmaler Verjüngungstreifen, obgleich sie sich auch auf einem ziemlich breiten nicht weniger wohl fühlt, so daß größte Beweg-

lichkeit herrscht und die bei dieser Holzart wegen Sturmgefahr gefährlichen Blen- derhiebe und Schirmstellungen, wo dies nötig, auf das Mindestmaß beschränkt werden können. Die Fichte fliegt meist auf dem Verjüngungstreifen im Dunkel- wie im Lichtstand an, ja sie stellt sich auch noch, wo der Boden nicht stark ver- rast, oft in erheblicher Menge auf dem Außensaum ein. Künstliche Beihilfe be- steht mit Vorteil in Bodenvorbereitung, für welche die Fichte sehr dankbar ist, und in Ergänzung auf der völlig geräumten Fläche.

Die Lichthölzer endlich lieben, soweit Verf. beobachten konnte, einen schmalen und lichten Verjüngungstreifen und siedeln sich auf diesem an, die leicht- besamten noch lieber unmittelbar auf dem Außensaum; auf ersterem dürfte sich Bodenverwundung ziemlich allgemein empfehlen. Dittmar, der sich uns in seinem trefflich geschriebenen „Waldbau“ als scharfer Beobachter der Natur und klar denkender Wirtschaftler zeigt, sagt Seite 239 über die natürliche Saumschlag- verjüngung: „bei der Kiefer ist wie bei keiner anderen Holz- art der Anrieb von Norden her notwendig¹⁾“, was Verfasser nach eigenen Wahrnehmungen nur bestätigen kann.

Recht eigentlich geschaffen scheint nun aber das Verfahren zu sein für Erzeugung gemischter Bestände²⁾, in gleichem Maß wie Gayers Blenderschlagbetrieb (Gayer: Ueber den Femel- schlagbetrieb 1885). Dabei ist Mischwald selbst eine wichtige Vorbedingung für den Erfolg der Naturverjüngung. Es war dem Verf. schon an den früher bespro- chenen Waldbildern aufgefallen, wie sich dort ungesucht die verschiedenen Holz- arten zu schönster Mischung zusammenfanden und sich auf Saumflächen selbst Holzarten einstellten, die in dem betreffenden Wald nur sehr wenig vertreten waren. In der Tat wird hier den Bedürfnissen aller Holzarten in bester Weise Rechnung getragen, beziehungsweise kann ihnen Rechnung getragen werden, in- folge der großen Beweglichkeit des Verfahrens. Eine Bestätigung für diese An- sicht finden wir auf S. 155 der Schrift: „Der gemischte Wald“, wo Gayer die Randverjüngung, verbunden mit vorgreifenden Hieben im geschlossenen Bestand als günstig bezeichnet für Begründung gemischter Bestände. Gayers Aus- führungen hat sich in neuester Zeit wieder Neumann angeschlossen in einem Vortrag vor der Versammlung des böhmischen Forstvereins 1903 (s. Ber. im Cen- tralbl. f. d. ges. Forstw. 1904 S. 166), hat aber in der Folge durch Schiffel Widerspruch erfahren, auf Grund von Anschauungen jedoch, die ganz dem Groß- flächenprinzip angehören.

1) Wir heben dies andern Stimmen aus Norddeutschland gegenüber ausdrücklich hervor, die sich bei der norddeutschen Kiefernwirtschaft keinen Erfolg von einer Saum- verjüngung von Norden her versprechen.

2) Auch die Holzartenmischung, insbesondere die Art der Anordnung der Holz- arten im Mischwald, gehört, strenge genommen, ins Gebiet der räumlichen Ordnung; doch soll sie, da sie auf die Raumordnung im großen keinen weiteren Einfluß hat, hier nicht näher behandelt werden. Nur soviel sei bemerkt, daß in dieser Schrift stets von wirklich er Mischung, d. h. solcher von Einzelindividuen, Trupps oder höchstens kleine Gruppen ausgegangen wird, da unseres Erachtens nur Einzelmischung alle Vorteile des Mischwaldes zu verwirklichen vermag. Diese Form ökonomisch kurzweg zu ver- urteilen, halten wir für voreilig, denn für deren ökonomische Beurteilung ist die Art maßgebend, wie der Wuchsraum unter die verschiedenen Holzarten verteilt ist, wovon an anderem Ort die Rede sein soll.

Im geschilderten Saumschlagverfahren durchläuft, wie schon hervorgehoben wurde, der ungleichförmig gelichtete Verjüngungsstreifen stetig alle Stadien der Humuszersetzung, des Lichtgenusses und der Regenzufuhr, es müssen also auch alle Holzarten zu irgend einer Zeit die ihnen zusagenden Bedingungen vorfinden, und das ist tatsächlich der Fall. Im gemischten Wald zeigen sich am innern Ende des Verjüngungsstreifens die Schattenhölzer bei geringster Belichtung, wo sie nicht schon unter Schluß ankamen. Sie bilden Gruppen, die sich allmählich erweitern, und zwischen denen sich, bald früher bald später, die Fichte festsetzt, der dann andere, einigen Schatten ertragende Hölzer: wie Ahorn, Esche, Eiche folgen, bis sich schließlich auf den freigebiebenen Stellen Kiefer, Lärche und andere Lichthölzer unter dem Bestandesrand und auf der schon freigelegten Fläche ansiedeln. Denken wir uns eine gleichmäßige Zunahme der Lichtung im Verjüngungsstreifen vom geschlossenen Bestand nach außen, so müßten die Mittellinien derjenigen Flächen, auf denen die einzelnen Holzarten sich besamen, verschieden liegen, je nach dem Maß, in dem sie Schatten ertragen: der Besamungsaum der Schattenhölzer entlang dem noch geschlossenen Bestand, derjenige der Lichthölzer gegen den Rand zu. Die Natürlichkeit des ganzen Verjüngungsvorgangs wird nun ganz besonders dadurch bewiesen, daß die Holzarten sich ohne Zutun gerade in derjenigen Reihenfolge zusammenfinden, die ihrer Jugendentwicklung entspricht und in der sie sich nachher im Bestand vertragen, so daß unter günstigen Verhältnissen Axt und Schere allein genügen, aus dem reichlich gelieferten Material jede gewünschte Mischung herauszuarbeiten.

Auch der innere Aufbau der Mischung sichert deren Erhaltung. Am Blendersaum finden sich nicht nur verschiedene Holzarten leicht zusammen, sondern jede Holzart erscheint auch in verschiedenen Altern. Das gibt eine Zusammenstellung, die der Axt ihre Arbeit sehr erleichtert, da sie gestattet, jede erwünschte Mischung in einfachster Weise herauszuarbeiten und da sie Gewähr bietet für Erhaltung dieser Mischung.

Auch eine Beimengung von Holzarten, die nicht Ziel der Wirtschaft sind, kann sich sehr empfehlen und ist hier sehr erleichtert, sei es, daß diese Holzarten selbst ankommen, sei es, daß sie fast kostenlos beigebracht werden. Sie verfallen der Axt, sobald sie ihre vorübergehende Aufgabe: rasche Bodendeckung, Frostschutz, Wildäsung, u. s. f. erfüllt haben. (Hievon an anderem Ort.)

Selbst das Mischungsverhältnis läßt sich durch die Hiebsführung beeinflussen. Soll eine Schattenholzart vorherrschen, so wird man langsam in breiten, dunkel gehaltenen Streifen verjüngen, während einer Begünstigung der Lichthölzer ein rasches Vorgehen mit schmalen Verjüngungsstreifen entspricht.

So gestaltet sich die normale Form unseres Saumschlags im gemischten Wald, für den sie in erster Linie bestimmt ist, folgendermaßen ¹⁾:

1) Voraussetzung ist Reinheit des Bodens von Gras, Unkräutern und Anflug, daher guter Kronenschluß vor Beginn des Angriffs. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so müssen sie rechtzeitig ersetzt werden durch Bodenbearbeitung bzw. rechtzeitige Entfernung unbrauchbaren Anflugs.

Der erste Hieb wird starke und starkbekronte Schattenhölzer greifen, der spätere den wenig sturmfesten Fichten nachgehen und bis zuletzt die Lichthölzer (Kiefer, Lärche, Eiche u. s. w.) stehen lassen, zur Besamung und Ausnützung des Lichtungszuwachses, aber auch zur Bildung einer gewissen Rückendeckung gegen Sturm; davon später.

Ehe wir zum Vergleich mit andern Verfahren übergehen, ist es notwendig dem hier geschilderten einen Namen zu geben. Nach der oben (vgl. S. 107 bis 109) gegebenen Gliederung haben wir dasselbe als: „**Blendersaumschlag**“ zu bezeichnen, denn es bedient sich der Saumschlagform in Verbindung mit dem Blenderhieb, auch erfolgt die erste Besamung vorwiegend unter Blenderstand. Dazu hat das Verfahren in seinen Eigenschaften, insbesondere der Stetigkeit, viel Gemeinsames mit dem Blenderbetrieb, wie denn auch die oben versuchte Konstruktion eines „geordneten Blenderwalds“ ohne weiteres zum Blendersaumschlag geführt hat. Beide Formen erzeugen auf großer Fläche ungleichaltrige Bestände, beide besitzen größte Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Dagegen weicht der Blendersaumschlag in zwei anderen wesentlichen Punkten vom Blenderbetrieb ab: er hat als Schlagbetrieb räumlich geordnete Altersklassen und führt zu gleichwüchsigem Hochwald, — Vorzüge, welche der Blenderwald entbehrt.

Was die eben erwähnte Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit betrifft, so möchten wir hier noch besonders betonen, daß auch der Blendersaumschlag derselben Vielgestaltigkeit fähig ist, ohne seinen Charakter zu verlieren, wie dies oben vom Blenderwald hervorgehoben wurde. Wie dieser kann er sich nach Bedarf in der Hiebsführung bald dem Schirmhieb, bald dem Kahlhieb nähern, ja diese Hiebsarten selbst vorübergehend verwenden, ohne seinen Formcharakter zu verlieren.

Noch ist der Fall zu erörtern, in dem (aus später nachzuweisenden Gründen) die normale Hiebsrichtung des Blendersaumschlags (N/S) wirtschaftlich ausgeschlossen ist. Die Verjüngungsart ist auch dann keineswegs unwirksam, da die Nachteile des von Ost nach West fortschreitenden Hiebs in erster Linie nur die Randstellung und weniger das Innere des Verjüngungsstreifens treffen. Nur in Randstellung befinden sich hier Keimfläche und Anflug unter ungünstigen Bedingungen, es muß daher in diesem Fall der Schwerpunkt der ganzen Verjüngung mehr als bei normaler Hiebsrichtung in das Innere des Verjüngungsstreifens verlegt werden; die einzelnen Flächenteile sind erst dann in Randstellung (Innen- und Außensaum) zu bringen, wenn ihre Besamung das gewünschte Maß bereits erreicht und der Anflug festen Fuß gefaßt hat, da ja weiterhin keine Nachbesamung und Wachstumsförderung zu erwarten ist. Die Vorhiebe im Verjüngungsstreifen werden hier zweckmäßig die Form schmaler gegen Westen langgestreckter Löcher annehmen, damit dem Boden möglichst viele Niederschläge zugeführt werden, während die Sonne abgehalten bleibt. Von weiteren Mitteln soll an anderem Ort die Rede sein.

Nunmehr wäre das geschilderte Verfahren vom rein waldbaulichen Standpunkt kritisch zu betrachten und darauf mit verwandten Formen zu vergleichen.

Ein günstiges waldbauliches Urteil muß dem Blendersaumschlag schon die Stetigkeit sichern, mit der er vorgeht. Auch alle andern waldbaulichen Vorzüge, die für die Blenderform nachgewiesen wurden, glauben wir diesem Verjüngungsverfahren zuschreiben zu dürfen; wenn es der ersteren bezüglich der Luftruhe am Boden in etwas nachsteht, so zeigt es dafür entscheidende Vorzüge in sicherer und dauernder Deckung der Besamungsfläche gegen Süden und besserer Ausnützung der von Westen kommenden Regenfälle wenigstens auf dem Außensaum, also durchaus die denkbar günstigsten Verhältnisse zwischen Regenzufuhr und Besonnung auf der Keimungs- und Aufzuchtfläche des Anflugs. Wir können daher den Blendersaumschlag in waldbaulicher Hinsicht dem Blenderwald selbst unbedenklich als ebenbürtig an die Seite stellen.

Die Natürlichkeit des Vorgehens bei der Verjüngung, die ungesuchte Entstehung gemischter Bestände wurde bereits hervorgehoben. Besonders muß aber noch auf die weitgehende Erfüllung aller an das Verjüngungsverfahren früher gestellten Forderungen hingewiesen werden, aus der sich der gewünschte Reichtum der Besamung von selbst ergibt. Dieser Reichtum scheint denn in der Tat, nach allen Beobachtungen des Verfassers, die hervorragendste Eigenschaft des Blendersaumschlags zu sein, — eine Eigenschaft, die unter günstigen Verhältnissen geradezu lästig werden kann. Das ist auch nicht anders zu erwarten, denn die Natur beschränkt sich hier im Verjüngungsstreifen nicht auf die Benützung einzelner Samenjahre, sondern aller Samen, der während der speziellen Verjüngungsdauer erzeugt wird, kann zur Keimung gelangen und zwar umsomehr, je stetiger das Vorgehen ist. Der neue Samen keimt sehr gerne zwischen dem schon vorhandenen Anflug, wo er besonders günstige Keimbedingungen zu finden scheint, was wohl auf die erhöhte Luftruhe der betreffenden Stellen zurückzuführen ist. So können z. B. bei Fichte nicht selten Pflanzen aus mehreren (3—4) Samenjahren auf einem Quadratmeter beisammen gefunden werden. Welch großen Vorzug dieser Umstand insbesondere für Regelung und Erhaltung von Mischungen hat, da nach Bedarf ältere oder jüngere Pflanzen zur Bestandesbildung herangezogen werden können, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Wir haben in diesem Etagenaufbau insbesondere ein gutes Mittel, den Lichtholzpflanzen den erforderlichen Vorsprung zu verschaffen.

Die Ansamung wird noch erhöht durch das reichliche Samentragen des gelockerten Verjüngungsstreifens¹⁾ und das Zusammenwehen

1) Eulefeld teilt im Oktoberheft der Allg. F. und J. Ztg. 1908 seine Beobachtung mit, daß Nordränder mehr befähigt sind, Samen zu tragen, als südliche Bestandesgrenzen, und erklärt diese Erscheinung einleuchtend damit, daß am Nordrand die Bäume später blühen und dadurch die Blüte weniger leicht den Spätfrösten zum Opfer fällt.

der leichter beflügelten Samen hinter dem Altholzrand durch den Wind (von S und SW her, vgl. Z ö t l l. c. S. 250, H e y e r, Waldbau 5. A. I S. 72), ähnlich, wie dies früher für den Schnee erwähnt wurde.

Derselbe Umstand, wie ferner die streifenförmige Anordnung und Uebersichtlichkeit des ganzen Betriebs, erleichtern die Anwendung der Ballenpflanzung zur Ergänzung des Anflugs dadurch, daß stets örtlich entstandenes Material, das in allen Größen in nächster Nähe zur Verfügung steht, verwendet werden kann. Scheint die Besamung der erwünschten Holzarten nach bisheriger Erfahrung am Ort erschwert zu sein, oder soll, zum Zweck der Umwandlung, der Beimischung nicht vorhandener Holzarten, oder der Züchtung, fremder Samen beigemischt werden, so finden sich im Verjüngungsstreifen immer geeignete Stellen, an welchen rechtzeitig Saaten gemacht werden können, deren Pflanzen später in Ballenform über die Fläche verteilt werden.

Ein Vorzug des Verfahrens, den wohl kein anderes in gleichem Maß mit ihm teilt, ist die Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit, die wir schon beim Verhalten gegenüber dem wechselnden Samenanfall und den Bedürfnissen der verschiedenen Bodenarten und Holzarten kennen gelernt haben. Diese Eigenschaften sichern ihm allgemeine Anwendbarkeit und dem Betrieb wirtschaftliche Freiheit, denn die ganze Hiebsführung kann sich, wo nicht einschneidende außerwaldbauliche Beschränkungen vorliegen, mit Hilfe verschiedener Breite des Verjüngungsstreifens, des Wechsels im Grad der Lichtung, im Fortschreiten und in der Art des Hiebs (Blenderhieb, Schirmhieb, Kahlhieb) ganz nach den Verhältnissen des einzelnen Falls richten und allen denkbaren Aufgaben gerecht werden. Ebenso leicht vermag sich das Verfahren bei einem Wechsel des Wirtschaftsziels den neuen Verhältnissen anzupassen und in kürzester Zeit in den veränderten Zustand überzugehen. Sollen z. B. Verjüngungstempo, Holzartenmischung oder Hiebsart geändert werden, so kann dies immer in aller kürzester Frist ohne wesentliche Störung der Wirtschaft geschehen.

Es wird auch, darauf möchten wir besonderen Wert legen, das Verfahren am einzelnen Ort leicht immer mehr den vorliegenden Verhältnissen angepaßt werden können; denn Versuche, die auf die Ermittlung des örtlich erfolgreichsten Vorgehens gerichtet sind, lassen sich hier jederzeit im kleinen — daher ohne Schaden — machen. Die Erfahrungen, die der einzelne sich dabei im Laufe seiner Wirtschaftsführung sammelt, kann er stets sofort — ja am selben Bestand — in die Tat umsetzen und am Erfolg die Güte seines Vorgehens nachweisen; er sammelt sie also nicht einseitig auf Kosten des Waldes, sie kommen diesem vielmehr sofort wieder zugute, und auch der Nachfolger kann aus den Ergebnissen seines Vorgängers vom ersten Tag ab für seine Wirtschaft Nutzen ziehen.

Die Mißgriffe, denen alle Naturverjüngungsverfahren mehr oder weniger ausgesetzt sind und die auf großer Fläche lange Zeit unangenehm nachwirken, werden hier in kürzester Frist wieder ausgeglichen. Hier kann nicht der Nachfolger zerstören oder verkommen lassen, was der Vorgänger gut gemacht hat, noch hat umgekehrt der Nachfolger das zu büßen, was der Vorgänger sündigte; vielmehr beginnt jeder seine eigene Arbeit und schließt sie selbst ab. Ähnliches gilt

von dem vielfach unverschuldeten Mißlingen infolge von trockenen Jahren, Mangel an Samenerzeugung u. s. w. Auch Gayer hebt in seinem Waldbau neben andern Vorteilen des streifenweisen Vorgehens den hervor, daß „die Gefahr des Mißerfolgs auf ausgedehnten Flächen“ vermieden werde. Er setzt für die Durchführung — worauf wir an anderem Ort eingehend zurückkommen werden — eine Vervielfältigung der Angriffspunkte voraus und betont endlich den gegebenenfalls der Blenderform sich nähernden Charakter dieser Betriebsart.

Endlich haben wir hier den einzigen Naturverjüngungsbetrieb vor uns, der mit weitgehender Erfüllung aller waldbaulichen Forderungen einen hohen Grad räumlicher Ordnung und Uebersichtlichkeit im Wald in bezug auf Lagerung und Verteilung der Altersklassen verbindet, — Vorzüge, die auch auf den Waldbau günstig zurückwirken, deren eingehende Berücksichtigung aber späteren Ausführungen vorbehalten bleibt.

Kann so dem Blendersaumschlag in waldbaulicher Beziehung das beste Zeugnis ausgestellt werden, so haben wir vor dem Uebergang auf andere forstliche Gebiete zum Schluß noch festzustellen, welche ähnlichen Verfahren sich in Literatur und Praxis finden und in welchem Verhältnis der Blendersaumschlag zu ihnen steht ¹⁾.

Dasjenige Verfahren, das vielleicht dem Blendersaumschlag am nächsten steht, ist das von Fürst in seiner Schrift: Plänterwald, oder schlagweiser Hochwald? S. 13 aus dem bayrischen Frankenwald mitgeteilte: „wo haubare Tannenbestände,

1) Ein Blendersaumschlagverfahren soll im württembergischen Schwarzwald eingebürgert sein, teilt doch das Supplementheft der Allg. F. u. J. Ztg. 1908 für dieses Waldgebiet mit:

S. 14: Die Idee des Blendersaumschlags sei schon in den dortigen Wirtschaftsregeln der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts und in jenen von Elsaß-Lothringen (?) enthalten, und

S. 22: Das Wagnersche Streifen- und Saumschlagverfahren sei schon von den früheren Revierverwaltern geübt worden und der größte Teil des heutigen Walds sei aus natürlicher Verjüngung hervorgegangen (?).

Kenner sowohl der württ. Schwarzwaldwirtschaft, wie gleichzeitig unserer Vorschläge werden diese Mitteilungen zwar mit Lächeln entgegengenommen haben, aber bei andern Lesern müßte es auffallen und zu Mißdeutungen Anlaß geben, daß hier dieses angeblichen Vorkommens in einem dem Verfasser wohlbekannten Waldgebiet überhaupt nicht gedacht wurde. Das hat jedoch seine guten Gründe, denn tatsächlich herrschte bisher im württembergischen Schwarzwald fast ohne Ausnahme die blühendste Großschlagwirtschaft! Jene Mitteilungen sind auf einen Aufsatz Gönners in der Allg. F. u. J. Ztg. 1908 S. 299 zurückzuführen, in der dieser Autor von durchaus unzutreffenden Vorstellungen über unser Verfahren ausgehend, Aeüßerungen tat, die zu jenen Annahmen führen konnten.

Als Tatsache hat Verf. inzwischen nur soviel feststellen können, daß vor einem halben Jahrhundert etwa ein Forstmeister des württembergischen Schwarzwalds (Lang) für ganz bestimmte Verhältnisse und zwar für geringe Tannenstandorte eine streifenweise Verjüngung von Norden her gefordert habe. Leider scheint ihm die Praxis nirgends gefolgt zu sein — unter der damaligen Herrschaft des krassesten Abteilungsfachwerks war dies ja auch ausgeschlossen —, denn wir finden dieses Verjüngungsverfahren im Schwarzwald tatsächlich nirgends seit längerer Zeit systematisch durchgeführt, oder die Ergebnisse einer früheren Durchführung. Wo sich da und dort vereinzelt Waldbilder ergeben haben, die unserem Verfahren entsprechen, waren sie Zufallserscheinungen.

Es ist daher leicht zu erklären, weshalb Verf. trotz der Nähe des Waldgebiets keine Kenntnis von jenem Vorschlag erhielt, der zudem, da er weder praktische Verwirklichung fand, noch literarisch begründet wurde, kaum der Erwähnung wert gewesen wäre. Erst auf unsere Vorschläge hin ist er wieder ausgegraben worden!

die eine Berglehne bedecken, am oberen Rand angegriffen und durch langsam nach der Talsohle fortschreitende natürliche Verjüngung genutzt und verjüngt werden“, so daß sich im oberen Teil der Gehänge eventuell schon Stangenhölzer befinden, während das Altholz am Fuße des Bergs noch nicht angegriffen ist und sich zwischen beiden alle Verjüngungsphasen aneinander reihen. Fürst bezeichnet diese Verjüngungsmethode als Dunkelschlagwirtschaft (Schirmschlag), was sie ohne Zweifel im einzelnen Verjüngungsstreifen auch ist. Charakteristischer als der Umstand, daß die Ansamung am einzelnen Ort zunächst unter Schirmstand erfolgt, scheint aber vom hier vertretenen Standpunkt aus die Tatsache, daß die Verjüngung sich nicht gleichzeitig über die ganze Bestandesfläche erstreckt, sondern daß sie über dieselbe gewissermaßen linear fortschreitet, die Schlagform ein Streifen oder Saum ist, und wir möchten deshalb, sofern der Fortschritt in stetiger Weise und in ungleichförmigem Hieb geschieht, dieses Vorgehen als *Blendersaumschlag* bezeichnen.

Am gleichen Ort S. 76 empfiehlt dann Fürst das Bilden entsprechend kleiner Abteilungen und das Schaffen zahlreicher Angriffsflächen zum Zweck häufigen Hiebwechsels und Durchführens einer „Saumfemelswirtschaft“ d. h. einer langsam gegen den Wind fortschreitenden natürlichen Verjüngung, was vollkommen mit dem im Vorstehenden Empfohlenen übereinstimmt, nur glaubt Verfasser, daß einiger Erfolg beim Hieb gegen den Wind, also gegen Westen nur bei sehr günstigen Bodenverhältnissen zu erwarten sein dürfte, d. h. nur da, wo auch bei Schirm- und Blendergroßschlag bald volle Ansamung sich einstellt.

Ein ähnliches Verjüngungsverfahren, „die Randverjüngung“ schildern ferner Gayer (Waldbau, 3. Aufl. S. 409—413) und Huber (Wirtschaftsregeln für die Waldungen bei Kehlheim 1886).

Ersterer nennt sie „Schirmbesamung in Saumschlägen“ und versteht darunter „jene Art der Schirmverjüngung, bei welcher der Verjüngungsprozeß jeweils nur auf einem bandförmigen Flächenteile des Großbestands sich vollzieht“. Gayer schildert zunächst, wie sich Vorbereitungs-, Besamungs- und Nachhiebsstreifen aneinander reihen und rechtfertigt damit die gewählte Bezeichnung. Wenn er aber dann das Verfahren dahin erläutert, daß „in Wirklichkeit eine scharfe Abgrenzung dieser Verjüngungsstreifen nicht stattfindet, dieselben vielmehr allmählich ineinander und in den noch geschlossenen Bestand übergehen“, wenn er endlich eine Verbindung dieses Saumschlags mit horstweise geführtem, blenderartigem Hieb erörtert, so dürfte diese Hiebsführung dem geschilderten Blendersaumschlag sehr nahe stehen, es fehlt nur die ausdrückliche Betonung der Stetigkeit des Vorgehens, auch kennt Gayer nur die Sturmgefahr als entscheidenden Grund für Anwendung dieser Hiebsart und für Wahl der Hiebsrichtung.

Auch an anderem Ort (Ueber den Femelschlagbetrieb, S. 12) wird Gayer durch die Berücksichtigung der Windgefahr dazu geführt, eine ähnliche Hiebform zu empfehlen, die in Bayern Eingang gefunden hat (vgl. auch die Verhandlungen auf der Casseler (1890) und Regensburger (1901) deutschen Forstversammlung). Er beschreibt hier einen streifenweise vorgehenden Blenderschlagbetrieb. Bei größerer Windgefahr sollen hier die Verjüngungshiebe zonenweise gegen die Windrichtung geführt werden. Bei schmalen Saumstreifen (30—50 m) nähere

sich diese Hiebsführung bei der Fichte der gleichförmigen Schirmverjüngung, wobei aber auf Einbringen und Einbeziehen vorhandener Mischwuchshorste in den Grundbestand dieser Saumstreifen fortgesetzt Bedacht genommen werde. G a y e r nennt dies „Saumfemelschläge“.

Von einem ähnlichen Verfahren berichtet ferner E n g l e r l. c. aus der Schweiz (Solothurn, Winterthur, Zofingen), wo in älteren, etwas lückigen Beständen zunächst Buche und Tanne gruppenweise verjüngt werde, während die Fichte nachher unter saumweise geführten Schirmschlägen mit Benützung des Seitenlichts zwischen den schon vorhandenen Gruppen der Schattenholzarten zur Verjüngung gelange.

G a y e r rühmt die Anpassungsfähigkeit des Blenderschlagbetriebs. Wir haben dieselbe Eigenschaft oben für den Blendersaumschlag in Anspruch genommen und möchten hier noch betonen, daß eine Scheidung in so viele verschiedene Verfahren je nach der Hiebsart, wie sie G a y e r vornimmt, uns nicht angezeigt erscheint. Wir wollen als Blendersaumschlag lediglich eine stetig linear fortschreitende Hiebsführung verstehen, die dem Zweck natürlicher Besamung dient und der es vollkommen freisteht, nach Lage der Verhältnisse, insbesondere der Holzart oder Mischung sich neben der Grundform bald dieser bald jener speziellen Hiebsart zu bedienen, mag es im einzelnen Punkt Blenderhieb, dunkler oder lichter Schirmhieb, Löcherhieb, Kahlhieb sein. Gerade solche freie Vielgestaltigkeit ist ja eine charakteristische Eigenschaft des reinen Blenderbetriebs und kennzeichnet ebenso den Blendersaumschlag als einen blenderartigen, er ist ein freier, vielgestaltiger Saumschlag.

Den oben erwähnten Männern (G a y e r und H u b e r) in erster Linie verdankt B a y e r n die Erhaltung und Durchbildung eines Blenderschlagverfahrens, wie es neben den schon erwähnten Schriften besonders durch die deutschen Forstversammlungen zu Cassel und zu Regensburg allgemein bekannt geworden und namentlich an letzterem Ort in seiner Ausbildung und seinen schönen Erfolgen weiteren Kreisen vorgeführt und erläutert worden ist. (Bericht d. Versammlung deutscher Forstmänner zu Cassel 1890, Bericht u. Schriften der II. Hauptversammlung des deutschen Forstvereins zu Regensburg 1901.)

Daraus, wie aus andern Mitteilungen in der Literatur geht hervor, daß das Femelschlagverfahren G a y e r s unzweifelhaft als die normale Betriebsform in den Staatswäldungen Bayerns zu betrachten ist, eine Auffassung, die durch die Einwendungen B l u m s (Allg. F. u. J.Ztg. 1906, S. 149) nicht erschüttert werden kann, der die allgemeine Durchführung in Bayern bestreitet und von einem „Neuessinger Femelschlagverfahren“ spricht. Die Einwendungen werden durch die Mitteilung begründet, daß das Verfahren im „Bayrischen Wald“ nur in den „Idealen der Wirtschaftsregeln“ durchgeführt sei, während sich die wirkliche Anwendung im Wald infolge der dermaligen Bestockung von selbst verbiete. Das braucht u. E. nicht zu hindern, das Verfahren trotzdem allgemein das „bayrische“ zu nennen, denn es liegt im Wesen des Forstbetriebs und ist selbstverständlich, daß die praktische Durchführung eines neuen Ver-

fahrens oft durch die örtlichen Verhältnisse der Bestockung vorübergehend auf Hindernisse stößt, so daß seine Vorschriften nicht selten für lange Zeit lediglich die Wirtschaftsregeln zieren, bis sie endlich voll durchführbar werden; und doch wäre es gleicher Weise ein Fehler, wollte man entweder in übermäßiger Hast den Wald vergewaltigen oder aber ganz auf die Vorschriften und die allmähliche Anbahnung ihrer Durchführung verzichten. Soll ein Verfahren als allgemein herrschendes gelten, so genügt es u. E. vollkommen, wenn die Verwaltung ganz von demselben durchdrungen ist und ihr ausgesprochenes Bestreben vorliegt, dieses Verfahren überall da und zu der Zeit durchzuführen, wo und wann dasselbe ohne wirtschaftliche Nachteile durchführbar ist, und das scheint uns in Bayern für das „Femelschlagverfahren“ zuzutreffen. Dem Wald selbst überall den Stempel des Verfahrens aufzudrücken, dazu sind nicht selten erhebliche Zeiträume erforderlich. Engler allerdings entwirft l. c. ein wenig günstiges Bild der Wirtschaft im bayrischen Wald, das jedoch Wappes (Forstw. Centralbl. 1905 Dez.) als nicht typisch bezeichnet.

Dieses bayrische Verfahren also sucht Verjüngung durch ungleichförmige Hiebsführung, die sich mit etwa 30jährigem Verjüngungszeitraum über, in der Regel ziemlich große Schlagflächen erstreckt, aber stets nur auf kleinen Flächenteilen gleichzeitig verjüngt, den übrigen Bestand dagegen geschlossen hält. Diese Grundform verbindet sich je nach Lage der örtlichen Verhältnisse mit andern Hilfsformen: Schirmschlag, Saumschlag, Kahlschlag, wie überhaupt für den Blenderschlag mit Recht volle Freiheit im einzelnen in Anspruch genommen und unter dieser Voraussetzung seine Anpassungsfähigkeit hervorgehoben wird. So soll in bestimmten Ausnahmefällen, welche die Anwendung des reinen Blenderschlags nicht gestatten, von diesem abgewichen werden unter Uebergang zum Saumschlag oder zu Kombinationen desselben mit Schirm- und Blender Schlag und zwar:

bei stark geneigtem Gelände, insbesondere an den der Ueber-
sonnung und dem Winde ausgesetzten Südost-, Süd- und Südwesthängen;

bei Vorherrschen des Nadelholzes, insbesondere der Fichte,
und vorhandener Windgefahr.

Auch sonst wird die Anwendbarkeit des Blenderschlags
als eine beschränkte bezeichnet.

Voraussetzungen für dieselbe sind:

entsprechende Bodenbeschaffenheit, insbesondere minera-
lisch kräftiger und frischer Boden, da für geringen Boden die Gefahr vorliege, daß
er an den Rändern rückgängig werde;

günstige Geländebeschaffenheit, d. h. ebene und mäßig ge-
neigte Lage.

Vergleichen wir dieses „bayrische Femelschlagverfahren“ samt seinen Kom-
binationen mit dem Blender-saumschlag vom rein waldbaulichen Standpunkt, so
zeigen sich wesentliche gemeinsame Momente. Beide folgen dem Prinzip der Stetig-
keit, verjüngen nur auf kleiner Fläche gleichzeitig und betonen die Freiheit der
Hiebsart auf kleiner Fläche, wobei der Blenderhieb die Grundform bildet. Gerade
in den beigezogenen Hilfsformen des Saumschlags tritt der bayrische Femelschlag

unserem Verfahren sehr nahe. In andern Punkten aber gehen sie auseinander. Das bayrische Verfahren geht von der Großschlagform aus, das hier empfohlene dagegen grundsätzlich und allgemein von der Saumschlagform. Das erstere stützt sich auf die vorwiegend guten Bodenverhältnisse und das für Naturbesamung günstige Klima vieler bayrischer Waldungen und zieht Hilfsformen bei für geringeren Boden und sonstige Sonderfälle, während das letztere von Anfang an darauf ausgeht, überall, und in erster Linie auf geringerem Boden, das Ziel der Naturverjüngung zu verwirklichen. Dies bedingt eine viel weiter gehende Berücksichtigung einmal des Prinzips der kleinen Fläche bei der Wahl nicht nur der Hiebsart, sondern auch der Schlagform, und dann des Schutzes gegen Austrocknung der Besamungsfläche, der Deckung gegen Süden und der Oeffnung gegen Westen, daher auch die Abweichung in der Hiebsrichtung, da hier nicht wie dort der Sturm die allein entscheidende Rolle spielt. Im Schutz der Besamungsfläche gegen Austrocknung ist denn auch der Blendersaumschlag dem bayrischen Femelschlag ohne Zweifel überlegen. Somit dürfte das hier empfohlene Verfahren, das auf gutem und schlechtem Boden und unter beliebigen sonstigen Verhältnissen in gleicher Weise anwendbar ist, als das allgemeiner brauchbare bezeichnet werden. In Bayern selbst wird, wie wir gesehen haben, der Blenderschlagbetrieb nicht als allgemein anwendbar betrachtet. Dies zeigen die beigezogenen Hilfsformen, wie die mehrfache und ausdrückliche Anerkennung, daß er ausgeschlossen sei auf geringem Boden, in steiler Lage, wie in vielen Fällen bei der Fichte (vgl. z. B. Eßlingers Referat auf der Regensburger deutschen Forstversammlung 1901, Ber. S. 108). Gerade in diesen Fällen geht man auch in Bayern auf die letzte und sicherste Möglichkeit, die Saumschlagform zurück.

Noch einen weiteren Vorteil, neben der allgemeinen Anwendbarkeit, möchten wir für den Blendersaumschlag dem bayr. Verfahren gegenüber in Anspruch nehmen, das ist der leichte und gefahrlose Uebergang aus der heute herrschenden gleichaltrigen Großflächenform in die Saumschlagform, insbesondere bei der meist in Betracht kommenden sturmgefährdeten Fichte. Während der Uebergang aus dem gleichaltrigen Hochwald in den bayr. Femelschlag bei den Nadelhölzern in sehr vielen Fällen mit erheblichen Gefahren verknüpft, ja nicht selten einfach ausgeschlossen ist, geht die Wandlung in den Blendersaumschlag, wie an anderem Ort eingehend gezeigt werden soll, leicht und gefahrlos vor sich, und kann dabei dem heutigen Zustand in jeder Weise Rechnung getragen werden. Mit Rücksicht auf die heutige Fassung der meisten, in geordneter Wirtschaft befindlichen Waldungen scheint uns dieser Vorteil ein schwerwiegender zu sein. Wir können also dem bayr. Femelschlagverfahren innerhalb der von ihm selbst gezogenen Grenzen vom rein waldbaulichen Standpunkt aus rückhaltlos zustimmen, wenn auch unser waldbauliches Ziel über diese Grenzen hinausgeht. Dagegen liegen unsere wesentlichen Bedenken gegen den Blenderschlag überhaupt, die bis zu einem gewissen Grad auch dieses Verfahren treffen, auf anderen Gebieten. Sie bestimmen uns, dem Blendersaumschlag trotzdem den Vorzug zu geben.

Endlich darf ein allerdings nur literarisch vertretenes Verfahren nicht übergangen werden, da es den hier ausgesprochenen Anschauungen sehr nahe zu kommen scheint, das sind:

Neys „regelmäßige Femelbetriebe“, die Ney auf der XI. Versammlung deutscher Forstmänner zu Wildbad 1880 (Ber. S. 94), im forstlichen Zentralblatt 1881 S. 261 und in seinen Schriften: „Die Lehre vom Waldbau“ 1885, S. 329 und: „Die Schablonenwirtschaft im Walde“ 1886 vertreten hat. Ney geht von der Tanne aus und bringt den hier besonders naheliegenden Gedanken der Saumverjüngung in verschiedenen Formen, als: Schachbrettfemelbetrieb, Saumfemelbetrieb und Ringfemelbetrieb zur Darstellung, sucht also die natürliche Vielgestaltigkeit des Blenderbetriebs in bestimmte schematische Formen zu gießen, indem er die für schadhafte Nutzung und Vollwertigkeit der Produkte so nachteilige Unregelmäßigkeit der Altersklassenlagerung durch eine geordnete Lagerung ersetzt, ähnlich wie dies weiter oben auch hier geschehen ist. Damit wird aber, da die Unregelmäßigkeit eine charakteristische Eigenschaft des Blenderbetriebs ist, dieser tatsächlich verlassen, die entstehenden Formen sind Saumschlagformen.

Entscheidend für Beurteilung dieser Betriebsformen scheint uns, daß Ney, welcher der „Wirtschaft der kleinsten Fläche“ und damit einer Steigerung der Intensität der Wirtschaft zustrebt, beim Einordnen des Blenderbetriebs in bestimmte Formen zu wenig dessen produktiven Eigenschaften Rechnung trägt, die ihm daher mehr oder weniger verloren gehen. Ney betrachtet alle Himmelsrichtungen als waldbaulich gleichwertig, muß also die Bodenverödung und Wachstumsbeeinträchtigung, die in den meisten Himmelsrichtungen im Gefolge des Saumschlags auftreten, mit in Kauf nehmen. Das von ihm mit Recht betonte Prinzip der Stetigkeit kann beim Mangel wesentlicher anderer Voraussetzungen nicht wirksam werden. So geht denn auch sein Saum- und Ringfemelbetrieb nicht in erster Linie von der Naturverjüngung, sondern von der betriebstechnischen Grundlage einfacher und schadhafte Abnutzung aus, so daß er bei dem zweifellos berechtigten Streben nach Rückkehr zur Kleinflächenwirtschaft unter Erhaltung der räumlichen Ordnung auf halbem Weg stehen bleibt. Weder mit dem gegen den Wind geführten Saumfemelhieb, noch — und zwar noch weniger mit dem Ringfemelhieb wird er überall günstige Voraussetzungen für Naturbesamung oder auch nur für das Gedeihen der Jungwüchse schaffen. Dies bedarf nach den vorausgegangenen Erörterungen keines Beweises, wie denn auch das Verfahren die Naturverjüngung als grundsätzliches Ziel des Kleinflächenbetriebs nicht zu kennen scheint, vielmehr beim Blenderbetrieb auch grundsätzliche Kunstverjüngung für möglich hält (Kahlschlagfemelwaldungen!).

Anzuerkennen ist dagegen Neys intensives Streben nach Stetigkeit und Verjüngung auf kleinster Fläche — im Gegensatz zu den herrschenden Anschauungen —; auch ist dem Satz, den er im forstw. Zentralblatt 1881 S. 273 aufstellt: „auf schlechtem Standort muß, auf gutem Standort kann gefemelt werden“ insoweit zuzustimmen, als er den Schwerpunkt der Bedeutung des Blenderprinzips gerade auf die geringeren Standorte legt. Wir halten es für einen Hauptmangel des sonst erfolgreichen bayr. Blenderschlags, daß er gerade da versagt, wo er im Inter-

esse des Bodenschutzes am nötigsten wäre, — auf schlechtem Boden und an steilem Hang.

Was hat nun der Waldbau auf Grund all dieser Betrachtungen von der räumlichen Ordnung im Walde zu fordern?

Er fordert eine solche räumliche Anordnung der Altersklassen, die ihm günstigste Voraussetzungen für eine sichere und reiche Naturverjüngung¹⁾ aller Holzarten schafft, — eine Forderung von einer, auch ökonomisch betrachtet, so hohen Bedeutung, daß kein anderes Verlangen aus irgend einem forstlichen Gebiet ihr gleichwertig gegenüberreten kann; denn versagt selbst die Naturverjüngung, oder wird sie nicht gewünscht, so kommen doch jene besten räumlichen Wachstumsbedingungen ebensowohl der Kunstverjüngung zugute.

Als Richtschnur aber zur Verwirklichung jener Forderung ergibt sich aus diesem Abschnitt, daß Naturverjüngung mit größter Wahrscheinlichkeit des Erfolgs nur auf kleiner Fläche gleichzeitig und zwar in stetigem Fortschreiten des Hiebs in bestimmter Richtung zu erzielen ist, und daß der Betrieb dabei voller wirtschaftlicher Freiheit im einzelnen bedarf; d. h.: der einzelne Verjüngungsakt muß unabhängig bleiben von estatstechnischen Beschränkungen und darf nicht gebunden sein durch äußere Gefahren. Zur Erfüllung dieser Bedingungen braucht die Wirtschaft einerseits eine Fülle verfügbarer Angriffsorte und andererseits einen entsprechenden äußeren Rahmen in der Waldeinteilung.

Aus dem Wald aber muß verschwinden als unvereinbar mit den Bedürfnissen sicherer und reicher Naturverjüngung:

Die Gleichaltrigkeit auf großer Fläche und der sich auf sie stützende und auf sie hinarbeitende Betrieb.

1) Pause findet diese Forderung gewagt (Allg. F. u. J. Zeitg. 1908 S. 353), im Hinblick auf die sächsische Staatsforstwirtschaft, die durch dieselbe „erschüttert“ würde.

Wir glauben wohl an eine Möglichkeit, diese Wirtschaft weiterzuentwickeln, nicht aber — bei richtiger Anwendung unserer Vorschläge — an irgend welche „Erschütterung“ derselben. Denn wo immer sich Schwierigkeiten zeigen, wird streng ökonomisch abzuwägen sein, was das Bessere ist; dabei soll auch keineswegs in Abrede gezogen werden, daß bei der heutigen räumlichen Lagerung und Ausdehnung der Altersklassen und angesichts der scharf gezogenen ökonomischen Grenzen in der sächsischen Fichtenwirtschaft die Naturverjüngung für heute wohl häufig den Kürzeren ziehen müßte. Dies würde aber keineswegs verhindern, weder, daß die an Stelle der Naturbesamung tretende Pflanzung oder Saat dieselben Vorteile für ihre Jugendentwicklung genöÙe, die jener zugebracht waren, noch auch, daß alle Vorbereitungen getroffen würden, um jene Hindernisse, wenigstens für spätere Zeiten, allmählich wegzuräumen. Denn daß der reine Fichtenkahlschlag auf denselben Flächen mit gleichem Erfolg durch zahlreiche Waldgenerationen soll weiterbetrieben werden können, scheint uns im Hinblick auf den Boden nicht wahrscheinlich.

Pause hat unsere Ausführungen in der Einleitung übersehen, wo wir ebenso, wie nachher er selbst, von einem wohl abgewogenen Zusammenwirken aller forstwirtschaftlichen Forderungen ausgegangen sind. Es ist also keine Gefahr, daß wir einseitig nur den Waldbau zu Wort kommen lassen, aber es war um so nötiger, daß wir in demjenigen Abschnitt, in dem gerade seine Forderungen festzustellen waren, diese besonders scharf hervorkehrten, weil sie nicht selten zurückstehen müssen und zwar sehr zum Schaden des Gesamterfolgs, für den uns genau dasselbe Ziel vorschwebt, auf das die sächsische Forstwirtschaft hinarbeitet.

2. Abschnitt.

Die Sicherheit des Betriebs.

Wie sich nun die Gesundheit der waldbaulichen Verhältnisse in der Forstwirtschaft in erster Linie auf die räumliche Ordnung im Walde gründet, so ist auch die Sicherheit des Betriebs äußeren Gefahren gegenüber — ein weiteres und wichtiges produktives Moment — in ebenso erheblicher, ja entscheidender Weise von diesem Faktor abhängig. Es muß daher im rationell geordneten Wirtschaftswald umgekehrt die räumliche Ordnung sich wesentlich leiten lassen durch die Rücksicht auf die Sicherung des Betriebs gegen äußere Gefahren. Dieser Rücksicht haben wir in der Tat beim Aufbau unserer räumlichen Ordnung in weitgehendem Maß Rechnung zu tragen, was uns vor die Aufgabe stellt: Zunächst diese Gefahren kennen zu lernen und ihre Beziehungen zur räumlichen Ordnung nachzuweisen, um dann den Einfluß feststellen zu können, den wir ihnen der räumlichen Ordnung gegenüber einräumen wollen. Daß hier übrigens unbedingte Sicherheit des Betriebs nicht als oberstes Moment und erste Aufgabe der räumlichen Ordnung betrachtet, sondern ihr Interesse demjenigen des Waldbaus nachgestellt wird, ist schon dadurch angedeutet, daß sie nicht an erster Stelle genannt wurde. Verfasser steht nicht an, zu erklären, daß er, wo dies nicht zu umgehen sein sollte, vorziehen würde, einzelne Forderungen des Forstschutzes dringenden Ansprüchen des Waldbaus zu opfern, daß er also bereit wäre, gewisse unvermeidbare Gefahren mit in Kauf zu nehmen, um nur gewiß eine vollwertige, natürlich entstandene Bestockung zu erhalten und derselben eine durchaus gesunde Entwicklung zu sichern, denn hierin liegt zugleich das beste Vorbeugungsmittel gegen die verschiedensten Schäden.

Tatsächlich ist ein solcher Verzicht auf volle Sicherheit nicht, oder nur in sehr geringem Maße notwendig, denn auch hier, wie überall in der Natur, finden wir weitgehende Harmonie des Natürlichen mit dem wirtschaftlich Zweckmäßigen. Wie könnten wir auch dem Betrieb mehr Sicherheit gewähren, als dadurch, daß wir den Wald aus gesunden, voll wuchskräftigen und standortsgemäßen Individuen aufbauen und ihnen für ihr volles Gedeihen dauernd naturgemäße Bedingungen schaffen? So fordert z. B. K u j a w a auf der Vers. deutscher Forstm. zu Wildbad 1880 (Ber. S. 87) mit Recht — im Gegensatz zur herrschenden Anschauung — Naturverjüngung der Fichte gerade aus Rücksicht auf künftige Gefahren.

Wie sich überhaupt die Rücksichten auf Waldbau und Waldschutz an Wertigkeit nahe stehen, so gehen sie auch fast immer Hand in Hand. Beide bilden zusammen den Grundpfeiler unserer Wertserzeugung und sind damit auch berufen, erste Grundlagen der räumlichen Ordnung im Walde zu sein.

Das enge Zusammenleben der Baumindividuen im Wald ändert gegenüber dem Einzelstand die Lebensbedingungen und äußeren Lebensumstände und bedingt so eine Abhängigkeit des einzelnen von der räumlichen Anordnung seiner Umgebung dadurch, daß diese Einfluß gewinnt auf seine Ernährung, sein Gedeihen und seine Wuchsform (Kronen-, Schaft- und Wurzelbildung).

Die Art der Nebeneinanderstellung schafft äußere Verhältnisse, die zwar einerseits zahlreiche Schutzwirkungen, andererseits aber auch gewisse Gefahren in sich schließen. So wirkt das enge Zusammenleben der Individuen ungünstig auf deren Widerstandskraft nach außen und innen, und zwar ebensosehr gegen äußere mechanische Kraftwirkungen durch seinen Einfluß auf die Wuchsform, wie gegen Krankheit und Insektenangriffe durch Verschlechterung der Lebensbedingungen. Gesteigert wird die ungünstige Wirkung durch Anhäufung von großen Massen so geschwächter Individuen gleichen Alters und gleicher Holzart, also durch Gleichaltrigkeit und reine Bestockung auf großer Fläche, — zwei Momente, die erfahrungsgemäß steigernd auf manche Waldkalamitäten wirken, da diese meist nur eine Altersklasse und eine Holzart besonders bedrohen. Die Verminderung der Widerstandskraft kann im kleinen Bestand, für sich sowohl, wie in ihren mittelbaren Folgen, nicht so gefahrbringend wirken, wie im großen; dies gilt jedenfalls für Insekten, Feuer, Schnee, Duft u. s. w. (vgl. Stötzer, Festschrift S. 66), während der Sturm in dieser Beziehung verschieden beurteilt wird, wovon später.

Diese gegenseitigen Einwirkungen haben also einerseits zur Folge, daß Individuen, Gruppen und Bestände im Wald auf einander angewiesen sind, sie müssen sich gegenseitig Schutz, Halt, Deckung gewähren, wie sie andererseits in bezug auf Ernährung und Entwicklung auf einander einwirken. So kommt es, daß durch bestimmte Gruppierung (räumliche Anordnung) dieser Bestockungseinheiten des Waldes nach Alter und Holzart eine Steigerung oder Verminderung gewisser äußerer Gefahren bedingt ist.

In früherer Zeit hat der Forstschutz zum Schaden des Waldes eine sehr einseitige Entwicklung erfahren, die ihm heute noch nachgeht; er hatte sich zu einer nicht selten unfruchtbaren Forstinsektenkunde entwickelt, die, von der Praxis losgelöst, zuweilen gerade dann versagte, wenn es sich um Sein oder Nichtsein des Waldes handelte — wir erinnern nur an die Nonne, gegen die man nach Schema F wohl nur deshalb Leimringe verordnete, weil diese bei einem andern Insekt, dem Kiefernspinner, gute Dienste geleistet, und man der Nonne gegenüber keinen Rat wußte, — während die Lehre vom gefahrtrotzenden räumlichen Aufbau des Waldes nach Individuen und Beständen wenig gepflegt wurde.

Die Herrschaft über die räumliche Ordnung im Wald lag in den Händen der Forsteinrichtung und so führte uns die Ertragsregelung und in ihr das Streben nach strengster Massennachhaltigkeit und nach äußerlich übersichtlicher Regelung des Waldzustandes, das allein die räumliche Ordnung beherrschte und bestimmte, zu rein schematischer Raumordnung im Walde, zur Bildung gleichaltriger Großbestände und Abteilungen.

Später erst, als die „taxatorische Einwirkung“ auf den Wald ihre Wirkung tat in großen Insektenverheerungen, Sturm- und Schneeschäden, Waldbränden u. s. w., erinnerte man sich mehr und mehr der Forderungen des Forstschutzes an die räumliche Ordnung. Sein Einfluß trat — immer im Bann der Ertragsregelung — zuerst hervor in der Frage der Orientierung des Waldeinteilungsnetzes und der Rücksicht auf Lagerung der Altersklassen, in der Hiebszugsbildung; und endlich — frei von ihr — im Streben nach Holzartenmischung und in der Rückkehr zu ungleichaltrigen Bestandesformen. Die zwingende Not den zerstörenden Naturgewalten gegenüber, die eine frühere Mißachtung der Natur zu rächen begannen, ist es in erster Linie gewesen, die diese Rücksichtnahme zuwege gebracht hat; die aufbauenden Naturkräfte allein, die im stillen und kleinen walten, hätten solche Wandlung wohl kaum vermocht.

Nur wo die verheerenden Naturkräfte vorwiegend hausen — im Nadelwald — hat man seit langer Zeit auf Sicherung der Produktion Bedacht genommen und anerkennt man heute allgemein die Notwendigkeit, die räumliche Ordnung auf entsprechender Basis aufzubauen. Im Laubwald dagegen sind nach verbreiteter Ansicht Änderungen der alten Ordnung, z. B. Zerschlagen größerer Alterszusammenhänge, Bildung von Hiebszügen u. a. unnötig, weil der Laubwald weniger gefährdet ist.

Trotzdem ohne weiteres zugegeben werden kann, daß bezüglich einer Gefährdung durch Katastrophen in erster Linie nur der Nadelwald in Frage kommt, während dieses Moment beim Laubwald sehr zurücktritt, möchten wir doch den letzteren hier nicht ausgeschlossen wissen, sondern wie in der Einleitung begründet wurde, einer gleichen Behandlung beider in bezug auf räumliche Ordnung das Wort reden. Uebrigens verdienen die aufbauenden Naturkräfte und ihre Pflege gleiche Berücksichtigung, wie die zerstörenden und ihre Bekämpfung.

Wir werden also hier Nadelwald und Laubwald zusammenfassen. Maßgebend für die räumliche Ordnung sind dann diejenigen Holzarten, welche die höchsten Anforderungen stellen, weil sie meistgefährdet sind: Fichte und Kiefer. Ihren weitgehenden Ansprüchen folgen mit weniger scharfer Betonung derselben die andern Hölzer.

Die schlimmsten Gefahren, bei denen sich der Einfluß der räumlichen Ordnung geltend macht, drohen dem Wald durch:

Sturm, Schnee, Frost, Feuer, Pilze, Unkrautwuchs, Insekten und Wild, — schädigende Ursachen, die den einzelnen Holzarten in sehr verschiedenem Maß gefährlich werden und die in bald näheren, bald

ferneren Beziehungen zur räumlichen Ordnung stehen. Am schärfsten wohl tritt der Einfluß der räumlichen Ordnung auf die *Sturmgefahr* zutage; ihr soll denn auch die eingehendste Besprechung gewidmet werden. Im übrigen wollen wir uns hier so kurz als möglich fassen und auf weitere, nur örtlich wirkende Gefahren, wie z. B. *Duftbruch*, über den *Heß* (*Allg. F. u. J.Ztg.* 1862 S. 375) und *Stötzer* berichten, nicht näher eingehen¹⁾. Wo solche Gefahren örtlich hervortreten, fordern sie ohne Zweifel Berücksichtigung, die seitens der Wirtschaft innerhalb des hier zu gebenden Rahmens leicht möglich ist; doch bleibt auch dann noch im Einzelfall zu erwägen, inwieweit solche örtlichen Momente mit den hier zu entwickelnden allgemeinen Forderungen in Einklang zu bringen sind. Ist eine Uebereinstimmung nicht zu erreichen, so wäre erst abzuwägen, welcher Schaden oder Nachteil im einzelnen Fall der größere ist, welchen Rücksichten wir somit zu folgen haben.

Doch auch bezüglich der Hauptgefahr, des Sturms, sind wir in der glücklichen Lage, uns relativ kurz fassen zu dürfen; entbindet uns doch von einer erschöpfenden Besprechung die Tatsache, daß gerade der Sturm in der neuesten Literatur mehrfach und eingehend behandelt worden ist, von *Eifert* und *Bargmann* (s. Vorwort); wir können uns daher auf die Feststellung der vorherrschenden Sturmrichtungen, sowie derjenigen Eigenschaften beschränken, die den Stürmen der verschiedenen Himmelsrichtungen erfahrungsgemäß eigen sind.

Unsere Aufgabe wird nun weiterhin sein:

Die Eigenschaften der schädigenden Ursachen kennen zu lernen, ihre Wirkungen auf den Wald zu ergründen und daraus den Einfluß festzustellen, den sie auf die räumliche Ordnung des Betriebs notwendig ausüben müssen.

Gerade auf dem Gebiet der räumlichen Ordnung wird es möglich sein, all die zahlreichen *Vorbeugungsmittel*, die gegen die vielen großen und kleinen Schäden und Gefahren des Walds seitens des Forstschatzes je für sich getrennt empfohlen werden und die zusammengenommen unseres Erachtens den vornehmsten Teil des Forstschatzes ausmachen, in ein achtungsgebietendes System zu vereinigen, indem wir ihre gemeinsamen Tendenzen herauschälen. Nur so werden wir sie alle gleicherweise der Verwirklichung zuführen, während jene vielen Mittel und Mittelchen, jedes für sich allein, dem großen Wirtschaftsbetrieb gegenüber meist lediglich den Charakter von *frommen Wünschen* haben müßten.

Auch im Interesse einer wirksamen Anwendung der meisten *Bekämpfungsmittel* und einer der Schädigung des Walds nachfolgenden *Wiederherstellung der Ordnung* bedürfen wir gleich dringend der Einwirkung auf die räumliche Ordnung. Diese muß uns günstige äußere Bedingungen schaffen durch räumliche Gliederung des Walds in übersichtliche und günstig geformte Bestockungseinheiten.

1) Während es nach *Stötzers* Bericht im Thüringer Wald die Nordränder sind, denen durch Duft- und Eisbruch Gefahr droht, gilt dies in Böhmen nach einer freundlichen brieflichen Mitteilung des Herrn Forstrat *Wachtel-Neuhaus* für die Ostränder, die in dieser Hinsicht z. B. auch auf der Hochfläche der württembergischen Alb meistgefährdet sind. Allgemein dürften wohl in ganz Süddeutschland die Ostränder in erster Linie der Duftbruchgefahr unterliegen.

1. Kapitel.

Der Sturm.

„Sturm“ nennen wir stark bewegte Luft, deren Geschwindigkeit so groß ist, daß sie auf der Erdoberfläche zerstörende mechanische Wirkungen auszuüben vermag. Dies tritt in der Regel bei einer Geschwindigkeit von etwa 17 m je Sekunde aufwärts ein. Nach M o h n (Lehre von Wind und Wetter) spricht man von: starkem Wind bei einer Geschwindigkeit von 11—17 m je Sek.

Sturm	„	„	„	„	17—28	„	„	„
Orkan	„	„	„	„	über 28	„	„	„

Die Meteorologie verwendet besondere Skalen zur Bestimmung der Windstärken (vgl. z. B. H a n n, Lehrbuch der Meteorologie 2. A. 1906 S. 279). Nach der von H a n n l. c. gegebenen Landskala würde der Sturm, der hier ins Auge zu fassen ist, die Stufen 7 (Sturm, der Aeste bricht, Dächer abdeckt) und 8 (starker Sturm, der kleine Bäume bricht, Dächer beschädigt) umfassen, denen die Stufen 9 (Orkan) und 10 (Wirbelsturm) folgen, gegen die es in der Forstwirtschaft keine Schutzmittel gibt. Dagegen dürfte im Wald unter besondern Umständen auch schon die Stufe 6 (stürmischer Wind, der größere Bäume bewegt) zu Windwurf führen. Meteorologisch bestehen zwischen Wind und Sturm nur graduelle Unterschiede; wo die Isobaren sich dichter drängen, wird der Wind zum Sturm (S u p a n, Statistik der unteren Luftströmungen S. 12). B a r g m a n n nennt den Sturm, gestützt auf Sturmstatistik und Literatur mit zahlreichen Schriftstellern „den schlimmsten und gefährlichsten Feind des Waldes“ sc. des Nadelwaldes (Allg. F. u. J.Ztg. 1904 S. 82); er berechnet auf Grund seiner Zusammenstellung heftigerer Stürme (l. c. S. 84) einen durchschnittlich jährlichen Holzmassenanfall in Deutschland während des verflossenen Jahrhunderts von 350 000 Fm, eine Zahl, die mangels einer allgemeinen genauen Statistik, die auch die zahlreichen, fast alljährlich eintretenden kleineren Sturmanfälle umfassen würde, hinter der Wirklichkeit weit zurückbleiben dürfte.

Die gesamten Holzmassenanfälle durch Sturm bezeichnen nun noch nicht ohne weiteres den Umfang des Schadens; die Praxis zeigt vielmehr zahlreiche Fälle, wo Schaden kaum verursacht wird, ja es kommt vor, daß der Sturm geradezu segensreich wirkt, wo er durch Wurf die Wurzelfäule der Fichte aufdeckt und wo er einer überkonservativen Wirtschaft nahelegt, daß sie im Streben nach Massenausgleichung dem Wald nicht Unmögliches zumuten darf, indem er sie hindert, der Gegenwart die gesunden, hiebsreifen Bestände vorzuenthalten, um der Zukunft altersmüde Wälder mit vielem Faulholz zu hinterlassen.

Der Schaden, den der Sturm dem Wald und der Wirtschaft zufügt, ist ein mannigfaltiger, obgleich nicht alle hier aufzuzählenden Momente bei jedem Sturmschaden wirksam werden; alle zusammen treten vielmehr gleichzeitig nur bei großen Sturmverheerungen hervor. Den nächstliegenden, in die Augen fallenden Schaden verursacht der Massenanfall an Holz zu ungünstiger

Zeit, am unerwünschten Ort und in nicht gewolltem Umfang; derselbe übt schädlichen Einfluß auf den Markt durch Ueberfüllung desselben und Sinken der Holzpreise, er erhöht die Erntekosten durch gesteigerten Bedarf an Arbeitskräften und ungünstige äußere Umstände für die Nutzung. Ein weiterer Schaden besteht in Materialverlust und Verschlechterung der Produkte durch Abbrechen, Zersplittern, Verbiegen, und durch langes Lagern bis zur Aufbereitung. Dazu kommt bei noch nicht hiebsreifem Holz der Zuwachsverlust.

Großen Sturmschäden folgt auf dem Fuß eine Gefährdung des erhalten gebliebenen umliegenden Waldes durch die lagernden Holzmassen, die zur Vermehrung schädlicher Insekten und zur Steigerung der Feuersgefahr beitragen.

In empfindlicher Weise wird ferner die zeitliche Ordnung des Betriebs gestört; die planmäßige Folge der wirtschaftlichen Maßregeln erleidet eine nachteilige Unterbrechung, wozu noch die Störung der Nachhaltigkeit mit ihren privat- und volkswirtschaftlichen Folgen kommt.

Nicht zuletzt aber wird die Wirtschaft im gleichaltrigen Hochwald in besonders empfindlicher Weise getroffen durch die Störung der räumlichen Ordnung mit ihren vielfachen, schädlichen Folgen, die sich über lange Zeiträume fortpflanzen, es sind: die großen Kahlflächen mit Bodenverschlechterung und Kunstverjüngung, die zu ausgedehnten, gleichaltrigen meist reinen Bestandeskomplexen führen, das Bloßstellen ungeschützter, oft unregelmäßig geformter Bestandesränder für weitere Schäden und die Störung der normalen und geordneten Lagerung der Altersklassen.

Dies letztere Moment, die Störung der räumlichen Ordnung, wie der Umstand, daß wiederum gerade letztere es ist, die fast allein dem Sturmschaden zu steuern vermag, gibt uns Anlaß, den Sturm bei der Untersuchung der Beziehungen zwischen räumlicher Ordnung und Sicherheit des Betriebs voranzustellen. Seine Wirkungen sind dem Grade nach bedingt durch das räumliche Nebeneinander der Altersklassen und Holzarten.

Der Sturm hat steigende Bedeutung erlangt mit dem Hervortreten der Herrschaft des ökonomischen Prinzips im Wald, mit dem Uebergang von der ungleichwüchsigen Waldbestockung zum gleichwüchsigen Betrieb, zum schlagweisen Hochwald. Daß die Vergangenheit den Sturmschutz vielfach vernachlässigt hat, dürfen wir ihr nicht übel nehmen, es erklärt sich daraus, daß sie dem früheren Waldzustand entsprechend noch nicht die mißlichen Erfahrungen hinter sich hatte, die heute vorliegen, nachdem die Früchte früherer Wirtschaftsgrundsätze gereift sind.

Unsere Aufgabe ist nun, festzustellen: Welche Mittel gibt uns die räumliche Ordnung an die Hand, den Wald gegen Sturmschaden zu schützen, wie müssen wir das Nebeneinander im Wald anordnen, um unsern Betrieb gegen diesen schlimmsten Feind zu sichern?

Da erhebt sich zunächst die Frage: Können wir den Wald gegen jeden Sturm schützen? und wo nicht: Gegen welchen Grad der Sturmgewalt ist erfolgreiche Sicherung möglich?

Wir müssen diese Frage vorweg kurz beantworten, um den Vorwürfen zu begegnen, die den Schutzmaßregeln nicht selten gemacht werden, daß sie unwirksam seien (vgl. z. B. Frey, Forstw. Centralbl. 1906 S. 359, welcher Autor sich auch gegen den Hiebszug ausspricht, mit der Begründung, daß er keinen Sturm-
schutz biete). Die Erfahrung lehrt, daß Stürme eintreten, gegen die es kein Schutzmittel gibt; so berichtet z. B. Eßlinger im Sept.-Okt.heft des Forstw. Centralbl. 1909 aus der Pfalz über Sturmbeschädigungen, bei denen kein Schutz wirkte und geschützte, wie ungeschützte Bestände geworfen wurden. Wir können den Wald voll schützen gegen die oben näher gekennzeichneten Windstärken 6 und 7 der Hannschen Skala, bei 8 ist die Möglichkeit des Schutzes fraglich, sie hängt von sonstigen Eigenschaften des Sturms, insbesondere seiner Struktur ab, ein Schutz gegen 9 und 10 ist unmöglich. Die beschränkte Möglichkeit der Sicherung entbindet uns aber nicht von der Pflicht, alles zu tun, was nach dieser Richtung getan werden kann, ohne entscheidende andere Interessen zu schädigen, denn eine einschränkende Wirkung in bezug auf den Schaden werden unsere Maßregeln doch unter allen Umständen selbst auf den heftigsten Sturm üben, und dann bilden zum Glück diejenigen Sturmstärken, gegen die voll wirksamer Schutz möglich ist, die große Mehrzahl, während die zu unvermeidlichen Katastrophen führenden Stürme selten sind. Diesen letzteren gegenüber kann unser Streben nur darauf gerichtet sein, im Wald solche räumliche Bedingungen zu schaffen, die gestatten, nach Eintritt von Katastrophen die Ordnung so rasch als möglich wieder herzustellen.

Wir wollen nunmehr unserer Aufgabe in der Weise nähertreten, daß wir zunächst die für den Forstbetrieb entscheidenden Eigenschaften der Stürme zu ermitteln suchen, sodann zu Besprechung der Wirkung der stark bewegten Luft auf den Wald übergehen, um daraus Grundsätze für wirksamen Sturm-
schutz abzuleiten. Schließlich wären dann die üblichen Betriebsformen und ihr Verhältnis zur Sturmgefahr an der Hand der ermittelten Grundlagen zu prüfen, um Wahl zu treffen.

I. Die wirtschaftlich entscheidenden Eigenschaften der Stürme.

Die für die räumliche Ordnung wichtigste, ja vielfach entscheidende Eigenschaft des Sturms ist die Richtung, aus der er weht. Sie bedingt dann, da sie die Herkunft der Luft bestimmt, noch weitere hier in Betracht kommende Eigenschaften. Wir haben uns deshalb zunächst diesem ersteren Moment zuzuwenden, um alsdann erst die sonstigen, forstlich erheblichen Eigenschaften der stark bewegten Luft zu erörtern, es sind dies: Geschwindigkeit, Feuchtigkeitsgehalt und Struktur des Windes.

Unsere Besprechung wird sich auf die in Deutschland überall auftretenden Stürme beschränken und auf örtliche Besonderheiten, wie Ueberfallwinde (Föhn) und Land- und Seewinde (Monsun) nicht eingehen.

1. Die Richtung der Stürme.

Keine Eigenschaft des Sturms ist, wie schon oben betont wurde, von solcher Bedeutung für die räumliche Ordnung im Wald, wie eben seine Richtung. Ueber diejenigen Richtungen, welche die verheerenden Stürme des letzten Jahrhunderts in Deutschland genommen haben, gibt uns guten Aufschluß die wertvolle Zusammenstellung Bargmanns (l. c. S. 84). Doch kann diese Tabelle nicht allein schon unser Urteil über das Maß der Gefährdung des Waldes aus den verschiedenen Himmelsrichtungen bestimmen; denn einmal sind die tatsächlich geworfenen Holzmassen für sich allein kein einwandfreier Maßstab für die aus bestimmter Himmelsrichtung drohende Gefahr, da dieselben neben den gefährlichen Eigenschaften des Sturms noch durch zahlreiche andere Momente bestimmt werden, und dann enthält das aus Angaben in der Literatur zusammengestellte Verzeichnis nicht alle, und namentlich nicht die schwächeren, fast alljährlich eintretenden Stürme und stürmischen Winde, die nur örtlich und unter besonderen Bedingungen schaden, die aber wirtschaftlich, gerade wegen ihrer Häufigkeit, gleiche Berücksichtigung erheischen.

So ist es in Ermangelung einer lückenfreien forstlichen Sturmstatistik notwendig, neben Bargmanns Zusammenstellung noch andere Betrachtungen heranzuziehen.

Was zunächst die meteorologische Lage unseres Untersuchungsbezirks — Deutschlands — betrifft, so befindet sich derselbe im „Gebiet der Westwinde“ der nördlichen Halbkugel (Hann, Lehrbuch der Meteorologie 2. A. S. 342), das sich als ein Gürtel, der etwa den 30.—60° nördl. Breite umfaßt, an den Windstillengürtel der Roßbreiten nördlich anschließt. Dieses Gebiet zeigt im Gegensatz zu den konstanten Ostwinden des Passatgebiets vorherrschend Westwinde mit polwärts gerichteter Komponente, also WSW- und SW-Winde. Auch sonst zeigt das Westwindgebiet bemerkenswerte Verschiedenheiten gegenüber dem Passatgebiet. Es findet kein regelmäßiges Zurückfließen der Luft statt, es existiert also kein Gegensatz in der Richtung der Luftbewegung der untern und obern Regionen, die ganze Atmosphäre befindet sich vielmehr bis in die größten Höhen im Fluß von Westen nach Osten. Sie kreist in östlicher Richtung um den Nordpol, dem die Luft zustrebt, um in höheren Breiten von dort zurückgestaut zu werden (nördliche Winde). Die nachher zu besprechenden Störungen dieses Kreislaufs rings um die Erde in östlicher Richtung reichen nicht in große Höhen der Atmosphäre, daher nehmen mit der Höhe die Westwinde zu, die Ostwinde werden immer seltener und wenn der Westwind in Erdnähe eine polwärts gerichtete Komponente zeigt, ist diese in großer Höhe äquatorwärts gerichtet (rückgestaute Luft).

Ein großer Unterschied besteht ferner, was die Stetigkeit der Windrichtung betrifft, zwischen den beiden Gebieten entgegengesetzter Luftbewegung. Das Westwindgebiet besitzt viel geringere Stetigkeit; ganz besonders gilt dies gerade für

die nördliche Halbkugel, wo die normale West-Ostrichtung der Luftbewegung vielfach gestört wird durch die Einwirkung der ungleich verteilten Meere und Festländer, denn diese erwärmen die Luft bei gleicher geographischer Breite zu verschiedenen Jahreszeiten in verschiedenem Maße und erzeugen daher verschiedenen Luftdruck. Fortwährend bilden sich unter diesen Verhältnissen große Luftwirbel (Zyklone) in unserem Windgebiet, die sich i. a. ebenso, wie die ganze Atmosphäre von West nach Ost bewegen und auf ihrem Weg lebhaften Einfluß auf die örtliche Luftbewegung nehmen. Dazu kommen dann die örtlichen Störungen durch die Kontinente und über denselben.

So zeigt sich in diesem Gebiet geringe Stetigkeit in der Windrichtung, es ist gekennzeichnet durch fortwährende Drehung der Windfahne; wir befinden uns in der „Region der veränderlichen Winde“, in der nach früherer Auffassung der „Polarstrom“ mit dem jenseits der Roßbreiten in die tieferen Luftschichten herabsinkenden „Aequatorialstrom“ um die Herrschaft streitet.

Aus dem Vorstehenden mag hervorgehen, daß bei der gewaltigen Ostbewegung der gesamten Atmosphäre nördlich der Roßbreiten die grundlegende Windrichtung in unsern Breiten — trotz der zahlreichen, das Bild verwirrenden Störungen — die Südwest- bis Westrichtung ist. Sie wird durch zahlreiche, von West nach Ost vorüberziehende Zyklone, sowie durch die verschiedene Erwärmung von Meer und Festland mehr oder weniger häufig gestört.

Um einen gewissen Ueberblick über die Windbewegung in den verschiedenen Teilen Deutschlands zu erlangen, hat Verfasser das von Supan (Statistik der unteren Luftströmungen 1881) gegebene Zahlenmaterial, das sich auf langjährige Beobachtungen (durchschnittlich etwa von 20 Jahren) stützt, entsprechend zusammengestellt.

Supan trennt zunächst Norddeutschland und Süddeutschland als zu verschiedenen Windgebieten gehörig. Innerhalb Norddeutschlands unterscheidet er bezüglich der Windverteilung eine westliche und eine östliche Hälfte, wobei die Trennungslinie vom nordwestlichen Pommern über Berlin zum obern Main geht. Er trennt diese Gebiete, da sie im Sommer entgegengesetztes Verhalten in bezug auf Windrichtung zeigen, indem in Nordwest-Deutschland äquatoriale, in Nordostdeutschland polare Winde vorherrschen, während bei beiden im Herbst und Winter die Aequatorialströmungen, im Frühjahr die polaren Winde überwiegen. Zwischen beiden Bezirken schaltet Supan ein Uebergangsgebiet ein und gelangt so zu den unten verzeichneten Beobachtungsbezirken.

Stellen wir Supans Angaben nach diesen Windgebieten und nach den Haupthimmelsrichtungen zusammen, so ergibt sich folgender prozentische Anteil für das ganze Jahr:

Siehe Zusammenstellung Seite 184.

Aus dieser Zusammenstellung geht das starke Vorherrschen der südlichen (und westlichen) Luftströmungen gegenüber den nördlichen (und östlichen) hervor. Dasselbe beweist jedoch, — mag auch der Sturm dem Wind gegenüber nur graduell verschieden sein, — noch nicht, daß sich nun auch die dem Wald gefährlichen Stürme in gleicher Weise auf die

Windgebiete	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N mit NE u. NW	S mit E u. W
P r o z e n t e										
1. Norddeutschland										
Westl. und südl. Holland und Rheinprovinz	(vom nordwestl. Mitteleuropa zu trennen, da hier im Sommer, trotz sonst vorherrschender SWwinde, die Summe der nördlichen die der südlichen übertrifft.)								38	62
Nordholland und Nordwest- deutschland	6,5	8,4	10,9	10,9	11,0	22,1	17,7	12,4	27,4	72,6
Norddeutsches Uebergangs- gebiet	7,1	9,1	10,1	8,4	11,0	21,4	19,6	13,3	29,5	70,5
Nordostdeutschland	9,4	8,4	9,5	10,3	12,6	14,7	20,0	15,1	32,9	67,1
2. Süddeutschland										
Mittel- und Oberrhein	7,1	18,4	10,2	7,2	12,5	27,1	10,2	7,3	32,8	67 ,
Württemberg und Bayern	4,5	13,3	10,4	9,7	4,5	26,4	22,0	9,2	27,0	73,0

einzelnen Himmelsrichtungen verteilen. Im Gegenteil erhalten die vom Aequator gegen den Pol abfließenden Luftströme nach *H a d l e y s* Prinzip der Rotationsablenkung und Geschwindigkeitssteigerung, wie nach dem Prinzip der Erhaltung der Flächen, durch Annäherung an die Rotationsachse eine bedeutende Steigerung der Geschwindigkeit (die allerdings durch Reibung vermindert wird) und dabei eine außerordentlich starke östliche Komponente, liefern daher stürmische Westwinde, während sich umgekehrt bei Verschiebung von Luftmassen aus hohen in niedrige Breiten eine viel geringere relative Windgeschwindigkeit ergibt (*H a n n l. c.* S. 315). Ueberdies ist nach *S u p a n* (*l. c.* S. 37) das Gleichgewicht der Luft auf der nördlichen Halbkugel im Winter am meisten, im Sommer am wenigsten gestört, die heftigste Luftbewegung fällt also in die Zeit, in der die westliche Strömung nach *S u p a n s* Statistik besonders stark vorherrscht.

Daraus geht hervor, daß wir die dem Wald gefährlichen Stürme zum ganz überwiegenden Teil aus SW und W zu erwarten haben, da sich hier viel größere Geschwindigkeiten entwickeln und die Stürme viel häufiger auftreten, als von N und E her.

Eine weitere Quelle lebhafter Bewegung der Luft ist die Gewitterbildung. Hier sind es weniger die, eine mehr oder weniger örtliche Luftbewegung verursachenden Wärmegewitter, die dem Wald gefährlich werden, als die großen sog. Frontgewitter oder Wirbelgewitter (*H a n n l. c.* S. 494). Diese letzteren sind Randbildungen größerer Depressionen, sie entstehen unter deren Einfluß stets am SE- oder S-Rand des Niederdruckgebiets und sind durch Einbuchtungen in den Isobaren oder durch Teilminima gekennzeichnet. Dabei ist bemerkenswert, daß unser Untersuchungsgebiet gerade südlich einer Hauptzugstraße solcher Depressionen gelegen ist, die sich aus dem atlantischen Ozean kommend über England und Skandinavien nach Osten bewegen.

Diese Gewitter besitzen eine viel größere Fortpflanzungsgeschwindigkeit und daher lebhaftere Luftbewegung, als die Wärmegewitter; der Gewitterwind weht

hier meist als Sturm, doch sind sie trotz der an sich gefährdeten Lage Deutschlands nicht häufig. Sie kommen nach H a n n in fast ganz Europa vorherrschend aus W und SW, während Ostgewitter selten sind, gewöhnlich örtlich und zeitlich beschränkt auftreten und geringe Fortpflanzungsgeschwindigkeit besitzen. Von Osten kommende Wirbelgewitter bilden sich auf der Nordseite der Alpen unter dem Einfluß eines Barometerminimums in Oberitalien. Alle gefährlichen Wirbelgewitter ziehen dagegen von W nach E, mit nordsüdlicher Front, was v o n B e z o l d speziell für Bayern nachgewiesen hat.

Besonders gefährlich werden diese Frontgewitter, wenn sie die Form von G e w i t t e r b ö e n annehmen (vgl. d. Skizze S. 187), die sich durch orkanartige Windstöße kennzeichnen. Hier schreitet der Wettersturz mit großer Geschwindigkeit von W nach E fort, wobei die Windgeschwindigkeit in der Sturmböe sogar noch größer ist, als das Fortschreiten des ganzen Phänomens (H a n n S. 520). Charakteristisch für sie ist ein kalter, stoßweise wehender Weststurm.

Somit sind auch die gefährlichsten Gewitterstürme so gut wie ausschließlich aus der West- und Südwestrichtung zu erwarten, ebenso wie die örtlichen und weniger heftigen Stürme der Warmegewitter, die allerdings in ihrer Richtung zuweilen unberechenbar sind, vgl. z. B. K r ü g e r s Bericht über einen Gewittersturm (ohne Zweifel Warmegewitter) am Brocken den 17. Juni 1904 aus NW und W (?) (Zeitschr. f. F. und J.wes. 1905 S. 178), dem nur leider keine Karte beigelegt ist, so daß der mit der Oertlichkeit nicht Vertraute kein sicheres Bild vom Weg erhält, den der Sturm genommen hat.

Betrachten wir nun die Zusammenstellung B a r g m a n n s, so finden wir in Uebereinstimmung mit dem bisher Ausgeführten, daß die größte Zahl der verzeichneten Stürme und überdies fast alle diejenigen, die große Holzmassen warfen, SW- und W-Stürme waren z. T. mit Uebergang in NW, denen gegenüber die Schädigungen aus E und NE zurücktreten.

Uebrigens, wenn die Zahlen richtig gewürdigt werden sollen, ist weiter noch zu erwägen:

1. Daß die Oststürme, da die Forstwirtschaft ihre Hiebe heute von E nach W führt, in der Regel auf offene Schlagränder treffen, während die Wälder auf der Westseite gedeckt und betrauft sind, so daß die hier auftretenden Stürme unter andern Vorbedingungen für ihre Wirksamkeit stehen, als die Oststürme; diese müßten bei gleicher Gewalt viel größere Massen zu Fall bringen, als die Weststürme. Wenn somit B a r g m a n n schon für die von ihm verzeichneten schweren Stürme berechnet, daß in den letzten 100 Jahren dem Wald 62,5% Weststürme, dagegen nur 32% Oststürme und 5,5% Süd- und Südoststürme schädlich geworden sind, so verschiebt sich dieses Verhältnis noch sehr bedeutend nach der Richtung der Weststürme, wenn wir beide Sturmrichtungen unter gleiche Bedingungen bezüglich der Hiebsrichtung stellen und wenn wir die sehr zahlreichen Winterstürme und die Gewitterstürme zurechnen, die dem Wald in der Regel deshalb nicht in großem Umfang schaden können, weil er speziell gegen sie geschützt ist.

2. Daß die relativ großen Massenankfälle durch Oststürme in Schwarzwald und

Vogesen geeignet sind, das allgemeine Bild zu trüben, da sie ihre Erklärung teilweise in rein örtlichen Momenten finden: in der Geländebildung, von der später die Rede sein soll, und im Vorhandensein großer zusammenhängender Altholzflächen, die zum Zweck der Naturverjüngung in weiter Ausdehnung gelockert wurden.

Diese Momente lassen die Wirkung der nördlichen und östlichen Stürme (des „Polarstroms“) auf den Wald noch weiter vermindert und örtlich beschränkt erscheinen; es bliebe somit als Hauptsturmrichtung, die dem Wald gefährlich wird, die Südwest- und Westrichtung („Äquatorialstrom“), die zuweilen, anscheinend besonders in Norddeutschland, in Nordwest übergeht.

Diesen allgemeinen Sturmrichtungen stehen nun gewisse, durch die Geländebildung veranlaßte örtliche Ablenkungen gegenüber, Ablenkungen im großen und kleinen, die gegebenenfalls sehr bedeutend sein, ja die entgegengesetzte Richtung annehmen können. Sie sind durch die Lage der Gebirgszüge zur Sturmrichtung, durch deren Form, die Höhenunterschiede, und insbesondere durch den Verlauf und die Gestalt der Täler bestimmt.

Die auf der einzelnen Waldfläche vorherrschende Sturmrichtung ist daher gegeben durch deren Lage im Gelände: an den verschiedenen gerichteten Talhängen, an Bergköpfen, in Sätteln, Mulden, am Tal-schluß u. s. w.

Auf solche örtliche Ablenkungen wurde schon seit langer Zeit hingewiesen (vgl. Hundeshagen, Enzyklopädie 3. A. I. Bd. S. 201—202, Zötl, Handbuch der Forstwissenschaft im Hochgebirge 1831 und andere), sie sind neuestens mehrfach erörtert und besonders eingehend untersucht worden durch Eifert (Allg. F. u. Jztg. 1903 S. 323) und Bargmann (l. c. S. 241). Auch Baudisch (Centralbl. für das ges. Fwes. 1884 S. 522) weist mit Recht auf die verschiedenen Verhältnisse des Sturms in Ebene und Bergland hin: während sich die Luft in der Ebene ausbreiten könne, erleide sie im Bergland bei Steigerung der Bewegung örtliche Pressungen. Baudisch untersucht besonders den Einfluß des Verlaufs der Täler. Ähnlich führt Hann (l. c. S. 287) aus, in Bergländern sei die Windgeschwindigkeit sehr verschieden, ebenso die Windrichtung; nur Borggreve bestreitet (Forstabschätzung S. 287) örtliche Aenderungen in der Richtung der Sturmgefahr durch die Geländebildung.

Daß solche Ablenkungen nicht selten sind, daß der Sturm durch die mit der Ablenkung verbundene Pressung gerade hier besondere Gewalt zeigt und daher gefährlich wird, läßt sich übrigens im Bergland vielfach beobachten, vgl. die zahlreichen Beispiele Eiferts und Bargmanns.

So konnte auch Verfasser — um diese durch ein weiteres drastisches Beispiel zu vermehren — kaum 8 Tage vor dem Niederschreiben dieser Zeilen in nächster Nähe seines damaligen Aufenthaltsorts eine interessante derartige Ablenkung beobachten:

Am 10. August 1905 fegte ein heftiger Gewittersturm in böigen Stößen mit

Hagel verbunden (also ganz den Charakter einer Gewitterböe tragend) aus WSW vom Rheintal her über den Kamm des Schwarzwalds (vgl. die beiden Skizzen Fig. 47 und 48). Weg und Richtung des Phänomens war auf der Schwarzwaldhöhe überall durch geworfene Einzelstämme bezeichnet. In einer, — wie aus der ersten Skizze zu ersehen — gegen diese Richtung vollständig gedeckten Mulde

Fig. 47.

Fig. 48.

(Vgl. die Abbildung bei H a n n , Lehrbuch der Meteorologie, 2. A., S. 519.)

entstand, offenbar durch Anprallen der Luft am gegenüberliegenden Berggrat — Verf. erklärt sich den Vorgang in der in der zweiten Skizze dargestellten Weise — eine so heftige, dem herrschenden Sturm fast genau entgegengesetzte örtliche Sturmbewegung, daß derselben eine Fläche von etwa $\frac{1}{2}$ ha vollständig zum Opfer fiel, wobei der Sturm starke, festwurzelnde Fichten teils entwurzelte, teils abriß,

während in unmittelbarer Umgebung weitere zahlreiche Einzelstämme und Gruppen geworfen wurden. Der Befund wies auf besonders große Kraftentwicklung in der Mulde hin. Hier und in der Umgebung, soweit sich dieselbe im direkten Schutz des gegen Westen vorstehenden Berggrats befand, lagen sämtliche Stämme fast genau der allgemeinen Sturmrichtung entgegen, also gegen W und WSW, während sie am anschließenden SW-Hang, je weiter sie von der Hauptwurffläche und vom deckenden Grat entfernt beziehungsweise tiefer lagen, um so mehr eine nach Süden weisende Fallrichtung zeigten. Es weist dies auf ein seitliches Ausweichen der örtlich gepreßten Luft gegen Süden und ein Abfließen derselben in der Richtung des stärksten Gefälls hin.

Sind die allgemeinen Sturmrichtungen insbesondere die Richtungen der Gewitterstürme an sich schon großen Schwankungen und nach Landstrichen wesentlichen Abweichungen unterworfen, so wird die Frage nach der vorherrschenden Sturmrichtung auf der einzelnen Waldfläche im Berggelände durch die örtlichen Ablenkungen zu einer noch wesentlich schwierigeren.

Wirtschaftlich von Bedeutung ist nämlich nicht die allgemeine Sturmrichtung, sondern die vielleicht abgelenkte, wie sie auf die einzelne Waldfläche einwirkt, dort vorherrscht: die örtlich herrschende Sturmrichtung.

Die sichere Feststellung derjenigen Sturmrichtungen, die wirtschaftlich zu berücksichtigen sind, kann daher weder auf Grund theoretischer Erwägungen, noch ganz allgemein für alle Fälle erfolgen, sondern nur durch sorgfältige Statistik und — jedenfalls im Bergland — nur örtlich (vgl. Baudisch l. c., Eifert und Bargmann).

Die Aufstellung einer Gesamtsturmrichtung, nach der sich der gesamte Forstbetrieb zu richten hätte, ist somit nicht möglich, — nicht für den einzelnen Bezirk, noch weniger für große Gebiete. Nachweisbare Abweichungen von der allgemeinen Regel in bezug auf die vorherrschende Sturmrichtung, auf die wir nachher zurückkommen werden, zeigen z. B. Teile des Schwarzwalds und der Vogesen, wo der Oststurm vorherrscht, und Teile des Erzgebirges, die von SE-Stürmen bedroht sind (Augst, Allg. F. und Jztg. 1902 S. 8).

Trotzdem läßt sich in Uebereinstimmung mit der praktischen Erfahrung auf Grund der vorstehenden Betrachtungen die Vermutung aufstellen:

Daß die meisten Oertlichkeiten die weitaus überwiegende Zahl der gefährdenden Stürme aus einer Hauptrichtung erhalten und daß dies für die meisten Orte — wo nicht besondere Geländebeziehungen vorliegen — die südwestliche bis westliche Richtung ist.

Dies bestätigt sich darin, daß die Praxis heute in allererster Linie ja ausschließlich nur den SW- und W-Sturm berücksichtigt, während sie auf örtliche Besonderheiten nicht oder nur in geringem Maße Rücksicht nimmt.

2. Sonstige Eigenschaften der Stürme.

Wirtschaftliche Bedeutung haben neben der Richtung noch andere, mit ihr zusammenhängende Eigenschaften der Stürme, weil sie deren Wirksamkeit, d. h. Gefährlichkeit beeinflussen. Es sind dies:

Die Geschwindigkeit der bewegten Luft, deren Feuchtigkeitsgehalt, die Temperatur bei der die Stürme wehen und endlich deren „Struktur“.

Alle diese Eigenschaften sind bedingt durch die Entstehung der Luftbewegung und die Herkunft der bewegten Luft.

Der Sturmschaden, seine Art und Größe hängt in erster Linie von der Geschwindigkeit des Windes ab, denn diese bestimmt den Druck, den er auf die Kronen der Bäume ausübt.

Große Bedeutung hat ferner der Zustand des Bodens, in dem die Bäume stocken, zur Zeit des Sturm Eintritts. Ist der Boden fest (trocken oder gar gefroren), so haben die Bäume guten Halt, werden nicht leicht entwurzelt; dagegen besteht bei größerer Gewalt die Gefahr des Zerbrechens der Schäfte und damit gesteigerten materiellen Schadens. Ist aber der Boden durchfeuchtet und daher weich, so ist der Halt, den er den Bäumen bietet, ein verminderter und es tritt schon bei relativ geringer Sturmgewalt Entwurzelung ein; dagegen ist hier auch bei großer Gewalt ein Zerbrechen der Schäfte seltener, der Materialschaden also geringer. Der Feuchtigkeitszustand des Bodens aber hängt von den Niederschlägen zur Zeit des Sturmes und damit vom Wassergehalt der Luft ab, die er führt.

Auch die Struktur der Stürme hat wesentlichen Einfluß auf deren Wirksamkeit. Wir können einen gleichmäßig fließenden Luftstrom, einen stoßweise ankommenden „böigen“ Sturm und Wirbelbewegung unterscheiden, jede dieser Bewegungsarten wird in anderer Weise auf den Wald wirken.

Eine vollkommen gleichmäßige Bewegung stark strömender Luft, die dem Wald am wenigsten gefährlich wird, dürfte übrigens unmittelbar über der Erdoberfläche selten eintreten (Oststürme), da sich der Luftstrom meist an den Unebenheiten der Erdoberfläche bricht, wodurch brandungsartige Erscheinungen entstehen.

Noch mehr beruht der eigentlich böige Sturm auf brandungsähnlichen Vorgängen. Hier befindet sich das ganze Luftmeer in wellenförmiger Bewegung, die Luftwellen brechen sich an den Widerständen der Erdoberfläche und äußern sich dort in heftigen Sturmstößen, die in etwa gleichen Zeitabschnitten wiederkehren. Solche Sturmstöße versetzen den Wald in schwingende Bewegung und ihre Wirkung kann sich summieren, wenn die Zeiträume zwischen den Sturmstößen und die Dauer der Baumschwingungen in bestimmtem Verhältnis stehen (vgl. Hann l. c.), was dem Wald besonders verderblich werden kann, jedoch nicht häufig der Fall sein dürfte. Wenn wir bei böig bewegter Luft von der Höhe über eine Waldfläche hinblicken, so können wir die fortschreitenden und sich folgenden Luftwellen an ihren Eindrücken im Kronendach leicht beobachten; das Wogen

des Waldes gleicht dem Bild, das uns im kleinen vom Kornfeld her geläufig ist.

Solche böigen, zwar kurz aber vielfach besonders heftig einsetzenden Sturmstöße können trotz ihrer kurzen Dauer dem Wald deshalb gefährlich werden, weil sie neben den selteneren Wirbeln am meisten imstande sind, in das feste Gefüge des Kronendachs der Bestände Bresche zu legen.

Bei kreisförmiger Bewegung der Luft kommen Wirbel mit horizontaler und vertikaler Achse in Betracht, von denen letztere in unserem Untersuchungsgebiet selten sind. Sie finden sich besonders bei Gewitterstürmen und sind dem Wald, wie die stoßförmigen Stürme, dadurch besonders gefährlich, daß sie sich in seinen geschlossenen Aufbau gewissermaßen einbohren.

Endlich ist noch von Bedeutung, ob der Luftstrom horizontal über die Erdoberfläche wegstreicht, oder ob die Luft aus der Höhe herabsinkend eine Inklination gegen dieselbe besitzt, einen Druck auf sie ausübt (vgl. Allg. F. und J.Ztg. 1902 S. 414).

Betrachtet man die Stürme auf diese Eigenschaften hin, so lassen sie sich ihrer Herkunft aus südlicher oder nördlicher gelegenen Gegenden entsprechend in 2 Gruppen scheiden:

1. Die Weststürme (dem „Aequatorialstrom“ entstammend), die von Süden kommen und gegen Osten abgelenkt erscheinen, jedoch meist noch eine nördlich gerichtete Komponente besitzen,

2. die Oststürme (dem „Polarstrom“ entstammend), die von Norden kommen und gegen Westen abgelenkt sind, mit südlicher Komponente.

Der Weststurm, der alle aus S—NW kommenden Stürme umfaßt, ist, wie wir oben festgestellt haben, der weitaus häufigere. Zu ihm gehören nicht allein die meisten schweren Stürme, die den Wald selten, aber empfindlich treffen, und selbst in seinen geschlossenen Aufbau einbrechen, sondern auch die fast alljährlich auftretenden Aequinoktialstürme, die vorwiegend an der Grenze derjenigen Geschwindigkeit stehen, die dem geschützten Wald schaden kann, und die daher in der Regel nur wirken, wo sie ihn ungeschützt treffen.

Die Gefahr, die dem Wald von dem an sich häufigen Weststurm droht, steigert sich nun noch ganz bedeutend durch dessen sonstige Eigenschaften. Er erlangt auf seinem Weg nach Norden aus den früher angedeuteten Gründen relativ hohe Geschwindigkeiten, auch zeigt er vielfach böigen Charakter. Er kommt ferner aus südlicheren, daher wärmeren Breiten zu uns, kühlt sich dabei ab und zeigt somit hohe relative Luftfeuchtigkeit, weshalb er Regen bringt. Der sich zum Sturm steigernde Westwind findet deshalb meist den Boden durchnäßt und erweicht, und daher die Standfestigkeit der Bäume vermindert. Endlich führt der Weststurm warme Luft und viel Wasserdampf, ist daher leicht, und streicht, der Erdoberfläche voraneilend, flüchtig und horizontal über dieselbe weg. Deshalb trifft er in erster Linie Hochflächen und freiliegende Orte, während er Einsenkungen und gedeckte Lagen meist verschont.

Diesem Weststurm steht mit fast durchaus entgegengesetzten Eigenschaften der Oststurm gegenüber. Er tritt viel seltener ein und erreicht, wie oben gezeigt wurde, allgemein viel geringere Geschwindigkeiten. Er ist trocken, denn er kommt aus nördlichen Zonen in südlichere und erwärmt sich dabei, während er

über Land wehend nicht in der Lage ist, seine an sich geringe relative Luftfeuchtigkeit durch entsprechende Wasseraufnahme auf gleicher Höhe zu erhalten. Er führt somit trockene Luft, weht bei trockenem Boden und meist klarem Himmel, im Winter wohl auch bei starkem Frost, also gefrorenem Boden. So findet er die Waldbäume wesentlich standfester, als der Weststurm, ist also weniger befähigt, sie zu entwurzeln, stiftet dagegen in den seltenen Fällen, wo er entsprechende Gewalt besitzt, erheblichen Schaden durch Zersplittern der Schäfte.

Im Gegensatz zum Weststurm drückt der Oststurm schwer nach unten, denn er führt kalte und trockene, daher schwere Luft, bleibt gegenüber der Erdoberfläche zurück und erscheint häufig als breiter, aus einem Hochdruckgebiet kommender Luftstrom, der eine gegen die Erdoberfläche gerichtete Komponente besitzt (vgl. Allg. F. u. Jztg. 1902 S. 413). B a r g m a n n spricht l. c. S. 205 geradezu von „Horizontal- und Vertikalwinden“. Diese Eigenschaften bewirken nun, daß der Luftstrom mit besonderer Wucht in die der Ostwestrichtung sich nähernden Täler und Mulden abfließt; dort findet alsdann bei Talwindungen, sowie im oberen Teil der nach Osten fallenden Täler durch deren Steiler- und Engerwerden, am meisten aber am Talschluß eine starke Pressung der Luft statt, die hohe Geschwindigkeiten erzeugt, um dann örtlich, auch noch jenseits des Berggrats, großen Schaden zu stiften. Das zeigen die zahlreichen, z. T. großen Sturmschäden durch Ost- und Nordoststürme in Schwarzwald und Vogesen. Typisch waren z. B. die Schäden durch den Sturm vom 1. Februar 1902 in den württembergischen Staatswäldungen zwischen Kniebis und Hornisgrinde (vgl. auch den eingehenden Literaturnachweis B a r g m a n n s l. c. S. 201).

Dieselben Oertlichkeiten nun, die infolge der Geländebildung der Oststurmgefahr in erheblichem Maß unterliegen, zeigen meist, eben durch ihre Lage, einen weitgehenden Schutz gegen westliche Winde. Das sind die durch einen höheren Gebirgskamm gegen Westen gedeckten Osthänge und der obere Teil der nach Osten verlaufenden Täler der Gebirge, für welche die Ostrichtung ohne Zweifel vielfach die allein gefahrdrohende Sturmrichtung ist (vgl. H a b e r m a a s Allg. F. u. Jztg. 1897 S. 303). Im Gegensatz zu seinem Eindringen in Täler und sonstige als geschützt geltende Lagen schadet der Oststurm vermöge seiner geringen allgemeinen Geschwindigkeit seltener auf Hochflächen und an freigelegenen Orten, weil dort die Bedingungen für Pressung der Luft nicht gegeben sind.

Auch diese Betrachtungen erhärten wiederum die frühere Feststellung, daß nur örtliche Statistik über die herrschende Sturmrichtung entscheiden kann.

Man sollte nun erwarten, es seien im Lauf der langen Zeit, durch welche die Forstwirtschaft schon gegen ihren „schlimmsten Feind im Walde“ kämpft, eingehende statistische Aufzeichnungen über schadenbringende Windrichtungen für jede Oertlichkeit, insbesondere in den mit Nadelholz bestockten Gebirgen gesammelt worden. Dem ist jedoch leider nicht so. Wir besitzen nur die sehr dankenswerten Beobachtungen einzelner. Mühsam müssen die überall zerstreuten, von zahlreichen Autoren nach verschiedenen Grundsätzen aufgestellten Sturmberichte

gesammelt werden, ohne jedoch einen Gesamtüberblick, ein allgemeines Urteil zu gestatten. Eine allgemeine Statistik nach gleichen Grundsätzen existiert nirgends. Alle Erörterungen über Sturmrichtung ruhen somit auf sehr unsicherer Grundlage.

Trotz des schweren Drucks der Sturmgefahr, der seit lange auf dem forstlichen Großbetrieb lastet, fehlen also noch immer die schon von *Hundeshagen* empfohlenen fortlaufenden und planmäßigen statistischen Aufzeichnungen über Sturmrichtungen im Wald, nur die großen Stürme sind durch Besprechung in der Literatur aufgezeichnet. Da ist es ganz besonders zu begrüßen, wenn in neuester Zeit wiederum *Eifert* und *Bargmann* übereinstimmend einerseits das Vorhandensein starker örtlicher Abweichungen nachweisen und andererseits deren planmäßige Feststellung durch fortgesetzte Beobachtungen und Anlage einer Sturmstatistik anregen. Insbesondere empfiehlt *Eifert*, die Sturmrichtungen, die auf der einzelnen Oertlichkeit vorkommen, aus den Fallrichtungen der Stämme unter kritischer Würdigung derselben festzustellen, und in besondere Sturmkarten einzutragen. Den letzteren Gedanken spricht schon *Hundeshagen* in seiner Enzyklopädie (3. A. I. Bd. S. 202) aus, wo er sagt: „Es würde ein lohnendes Unternehmen sein, mittels besonderer Charten die Richtung und Heftigkeit verheerend gewordener Stürme chronologisch nachzuweisen“.

Diese Vorschläge verdienen lebhafte Unterstützung. In der Tat sollte man keine Zeit verlieren, um so bald als möglich zu einer zuverlässigen örtlichen Statistik über Richtung und sonstige Eigenschaften der Stürme zu gelangen.

Die Durchführung ist eine verhältnismäßig einfache und wenig zeitraubende, bedingt nur fleißigen Gebrauch des schon im 1. Abschnitt als wichtiges forstliches Instrument empfohlenen Kompasses. Das Ergebnis solcher Statistik würde schon nach wenigen Jahrzehnten ein für die Wirtschaft überaus wertvolles werden, und wie wir glauben, auch manche hergebrachte oder vorgefaßte Meinung zerstören.

Für die Durchführung können wir auf die Ausführungen *Eiferts* hinweisen und möchten hier nur noch einige allgemeine Betrachtungen und Vorschläge anfügen.

Gegenstände der Beobachtung und Aufzeichnung, die wirtschaftliche Bedeutung besitzen und daher in den Kreis der statistischen Erhebungen gezogen werden sollten, sind folgende:

1. Sturmrichtung, als wichtiges Moment.
 2. Art des Sturmes, Abstammung und Bewegungsform der Luft.
 3. Sturmstärke.
 4. Holzanfall.
 5. Art der Beschädigung: Wurf, und zwar Einzelwurf oder Flächenwurf (Löcherwurf, Gassenwurf), und Bruch.
 6. Zeit des Sturms.
 7. Beschaffenheit des Bodens zur Zeit des Sturms.
 8. Nähere Umstände, unter denen der Schaden örtlich zustande gekommen ist.
- Diese Momente können mit Ausnahme des letztgenannten alle auf der Karte

zur Darstellung gebracht werden und werden im Interesse der Uebersichtlichkeit am besten dort dargestellt.

Als Karten, in denen die Sturmbeobachtungen dauernd niederzulegen wären, empfehlen sich die an anderem Ort zu besprechenden „Einrichtungs-Grundkarten“, ein Kartenwerk in großem Maßstab, das ausschließlich und dauernd der Forsteinrichtung dient und zur Aufnahme aller für sie wichtigen Tatsachen bestimmt, also auch der gegebene Ort ist zur Aufnahme der Sturmbeobachtungen. Dieses Kartenwerk hat überdies den Vorteil, daß es den für solche Aufzeichnungen erwünschten großen Maßstab besitzt.

Aus den Daten der Grundkarten könnten dann für größere Bezirke Sturmübersichtskarten gefertigt werden, die sowohl den Weg einzelner Stürme, wie das Verhältnis der verschiedenen Sturmrichtungen auf der einzelnen Fläche im Lauf längerer Zeiträume zu übersichtlicher Darstellung bringen würden. Zu solchen Uebersichtskarten eignen sich die lithographierten Vordrucke der Wirtschaftskarten, sofern sie Höhenkurven besitzen, wie die Höhenkurvenkarten im Maßstab 1 : 25 000.

Die näheren Umstände, unter denen der Sturmschaden zustande gekommen ist, hätten in einem besonderen, nach der Zeit geordneten Verzeichnis Aufnahme zu finden. Dort wären aufzunehmen: die Holzart, etwa vorausgegangene Durchhiebe, Freistellung von Bestandesrändern nach der Sturmrichtung oder sonstige wirtschaftliche Maßregeln, die auf das Zustandekommen der Schädigung Einfluß hatten, ferner verbreitete Wurzelfäule, Alter, Vorherrschen der Entwurzelung oder des Bruchs und sonstige bemerkenswerte Momente.

Was die Feststellung der einzelnen Daten betrifft, so finden sich über den ersten und wichtigsten Punkt, — die Bestimmung der örtlichen Sturmrichtung aus der Lage der geworfenen Stämme — eingehende Betrachtungen in der Sturmstudie von Eifert, worauf wir verweisen.

Die Art des Sturms ergibt sich teils aus den Mitteilungen der meteorologischen Stationen, teils aus örtlichen Beobachtungen und den Wahrnehmungen auf dem Sturmfeld (vgl. Eifert l. c.).

Die Sturmstärke wird natürlich nach ausschließlich forstlichem Maßstab festzustellen sein und zwar nach Merkmalen der Wirkung auf den Wald. Für forstwirtschaftliche Zwecke dürfte eine einfachste Abstufung genügen, nach der die Sturmstärke ohne besondere Hilfsmittel geschätzt werden kann.

Wir möchten 3 Stufen vorschlagen:

Erste unterste Stufe: gekennzeichnet durch Einzelwurf oder Wurf kleiner Gruppen wenig standfesten Materials unter Umständen, die den Wurf begünstigen, sowie Bruch von Stämmen mit wesentlich verminderter Festigkeit des Schafts; also z. B. Wurf freigestellter, des gewohnten Halts beraubter Stämme, flachwurzelter und wurzelfauler Individuen, Wurf auf nassem, lockerem Grund u. s. w., Bruch von Krestannen, Schwammbäumen u. s. f.

Diese geringste Sturmstärke (etwa H a n n s Stufe 6—7 entsprechend), welche die fast alljährlichen Winterstürme und gewöhnlichen Gewitterstürme besitzen, kann normal erzogenen Beständen nur unter besonders ungünstigen Umständen gefährlich werden, insbesondere wenn dieselben auf größeren Flächen stark ge-

lockert oder dem Sturm trauflos preisgegeben wurden, ferner bei nassem Boden und verbreiteter Wurzelfäule, und zwar auch hier in der Hauptsache nur Nadelhölzern.

Zweite mittlere Stufe: gekennzeichnet durch Einzelwurf, gruppen- und flächenweisen Wurf alter, auch gesunder und nicht freigestellter Nadelhölzer bei sonstigen den Wurf begünstigenden Verhältnissen, sowie mehr oder weniger freigestellter Laubhölzer, Bruch einzelner Individuen ohne Stammschäden, jedoch Entwurzelung vorherrschend. Das Wurfbild zeigt die Entwicklung größerer Gewalt, also z. B. Wurf in allen Verjüngungsschlägen bei Schirm- und Blenderhieben nicht allein im Nadelholz, sondern auch in Buchenschlägen. Einbruch auch in geschlossene ältere Nadelholzbestände besonders der Fichte bei feuchtem oder sehr lockerem Boden.

Stürme dieser Stufe (entspr. H a n n Stufe 7—8) brechen somit in Verjüngungsschläge jeder Art ein, werfen freigestellte Laubhölzer und können auch geschlossenen Nadelholzbeständen im höheren Alter, insbesondere bei nassem Boden oder Wurzelfäule, gefährlich werden.

Dritte oberste Stufe: gekennzeichnet durch Einzelbruch, gruppen- und flächenweisen Wurf und Bruch aller Holzarten nach Freistellung (festere Laubhölzer) und im geschlossenen Bestand (Nadelhölzer, Buche), Einbruch in geschlossene Träufe. Das Wurfbild zeigt die Einwirkung großer Gewalt auf den Wald.

Dieser Sturmstärke (entspr. H a n n 8, 9 und 10) unterliegen jüngere und ältere Nadelholzbestände jeder Verfassung sowie ungedeckte Laubholzbestände insbesondere bei gelockertem Kronendach. Ihr vermag der Wald nur unter besonders günstigen Voraussetzungen zu widerstehen.

Die Einschätzung der Sturmstärke im einzelnen Fall nach dem vorliegenden Befund dürfte an der Hand einer derartigen einfachen Skala nicht schwer sein und wird den forstlichen Bedürfnissen genügen. Die übrigen Feststellungen ergeben sich von selbst.

Nun noch die Darstellung auf der Karte:

Da die Sturmrichtung naturgemäß durch einen Pfeilstrich dargestellt wird, so ist es vielleicht zweckmäßig, die aus der Wirkung örtlich geschätzte Sturmstärke durch die Zahl der Pfeilspitzen zu kennzeichnen und die erste Stufe durch eine, die zweite durch zwei und die dritte durch drei Pfeilspitzen darzustellen (Fig. 49).

Fig. 49.

Für Art und Ursprung des Sturms empfiehlt Eifert sehr zweckmäßige Darstellungsweisen, wir verweisen darauf.

Die geworfene Holzmasse ist eine Größe, die nicht ausschließlich das Ergebnis der Sturmstärke ist, da sie überdies ganz wesentlich von der Beschaffenheit des Bodens und der Bestockung abhängt. Immerhin gibt sie jedoch einen gewissen Maßstab für die einer Oertlichkeit aus bestimmter Richtung drohende

Sturmgefahr und sollte darum festgehalten werden. Ob übrigens nicht besser statt der Derbholzmasse die Zahl der Stämme festgehalten würde, mag dahingestellt bleiben.

Die Darstellung der Maße bzw. Stammzahl erfolgt zweckmäßig (vgl. E i f e r t) durch die Zahl der Fiederstriche am Sturmpfeil, wir möchten dazu vorschlagen, einen kurzen Fiederstrich = 10 Fm oder Stück, einen langen = 100 Fm oder Stück zu setzen. Ein Pfeil ohne Fiederstrich würde einen Anfall unter 10 Fm oder Stück bezeichnen.

Schwieriger ist die Darstellung der Art des Wurfs oder Bruchs, des Einzel- oder Flächenwurfs. Hier könnte der Einzelwurf durch kurze Pfeilstriche bezeichnet werden, die über die in Betracht kommende Fläche verteilt werden, und deren Zahl, wenn sie einen kleinen Fiederstrich zeigen, dem Anfall von je 10 Fm bzw. Stück entsprechen würde, während Flächenwurf durch (der Flächenausdehnung entsprechend) lange Pfeilstriche am Ort des Windwurfs zu bezeichnen wären.

Die Zeit des Sturms könnte durch Zahlendatum über dem Pfeilstrich angegeben werden; ebenso, ob der Boden feucht, trocken oder gefroren, durch einen entsprechenden Vermerk (f. t. g.).

Es würde also z. B. darstellen:

Fig. 50: Gleichmäßigen Einzelwurf auf einer bestimmten Fläche durch Weststurm am 8. Nov. 1903 bei feuchtem Boden, geringer Sturmstärke, mit 50 Fm Derbholzanfall:

Fig. 51: Sturm mittlerer Stärke aus NE am 10. Aug. 1905, mit Flächenwurf von 250 Fm und Einzelwurf in der Umgebung bei feuchtem Boden (vgl. Beispiel S. 187).

Fig. 50.

Fig. 51.

Bei Stürmen mit größeren und räumlich ausgedehnten Anfällen wird es sich im Interesse der Uebersichtlichkeit empfehlen, den Sturmpfeilen für das ganze Sturmgebiet eine besondere Farbe zu geben.

Durch derartige örtliche Sturmaufzeichnungen könnte die Forstwirtschaft im Lauf der Zeit wertvolle Aufschlüsse erlangen, die für die räumliche Ordnung von großer Bedeutung wären; es würden nicht allein Verlauf und Ablenkungen der Stürme festgestellt und daraus die gefahrdrohenden allgemeinen und örtlichen Richtungen bestimmt, sondern es könnte auch das Ausbleiben oder die vermin-

derte Wirkung aus bestimmten Richtungen nachgewiesen werden, was ebenfalls von Bedeutung sein kann.

II. Die Wirkung der stark bewegten Luft auf den Wald.

Der Wald besteht aus zahlreichen, von der Erdoberfläche senkrecht in den Luftraum emporragenden Baumindividuen, er muß also für die wagrecht über die Erde hinstreichende Luft ein Hindernis bilden, auf das sie nach Maßgabe ihrer lebendigen Kraft und der sich ihr entgegenstellenden Oberfläche — hauptsächlich der Baumkronen — einwirkt.

Betrachten wir zunächst den Gegenstand der Einwirkung, den einzelnen Baum, so sollen hier nur die Hauptmomente hervorgehoben, soll aber von der verwickelten Gesamtwirkung abgesehen werden.

Hauptgegenstand unmittelbarer Einwirkung ist die *K r o n e*, die sich frei in den Luftraum erhebt. Sie ist so beschaffen, daß sie im belaubten Zustand bewegte Luft nur in geringem Maß durchläßt, da bei starkem Luftdruck vielfach Aeste, Zweige, Blätter vermöge ihrer Biegsamkeit sich zu einem möglicherweise noch dichteren Gefüge zusammenschließen. Die Wirkung des Luftdrucks ist neben der wechselnden Beschaffenheit der Krone in erster Linie bestimmt durch deren Querschnitt senkrecht zur Windrichtung, wobei zu berücksichtigen ist, daß sich dieser Querschnitt bei stark bewegter Luft gegenüber der Ruhelage jeweils nicht unwesentlich ändert.

Diese Angriffsfläche ragt auf einer senkrechten Säule, dem *S c h a f t*, der durch die Bewurzelung im Boden verankert ist, frei in den Luftraum. Der Schaft überträgt die Sturmwirkung auf den Wurzelstock und bestimmt die an den Wurzeln wirkende Kraft durch seine Länge, seinen Bau und seine Elastizität, er wirkt teils als Hebel, der die Sturmgewalt auf die Bewurzelung überträgt, teils schützt er sie durch seine Elastizität vor starker und plötzlicher Krafteinwirkung. Beide, Schaft und Wurzeln, sind durch den Wurzelanlauf verbunden, der einen für die Festigkeit des Ganzen besonders vorteilhaften Bau besetzt.

Die Sturmfestigkeit des *W u r z e l s t o c k s* endlich wird bedingt einerseits durch Stärke und Ausdehnung der Wurzeln und zwar mehr durch die senkrechte als durch die wagrechte Ausdehnung, andererseits durch die Beschaffenheit des Untergrunds.

Damit ist die Wirkung der Sturmkraft auf den Baum in erster Linie bestimmt durch die Beschaffenheit und die Eigenschaften der 3 Teile:

K r o n e, *S c h a f t* und *W u r z e l s t o c k*; eine dichte, breite und hochangesetzte Krone, ein langer schlanker und vollholziger Schaft und eine flache oder dichtgebaute, besonders in senkrechter Richtung wenig ausgedehnte Bewurzelung, werden die Sturmgefahr steigern; eine lockere, schwache, tiefangesetzte Krone dagegen, eine kurze gedrungene abfällige Schaftbildung und eine starke weitausgreifende und insbesondere tiefgehende Bewurzelung zu deren *V e r m i n d e r u n g* führen.

All diese Eigenschaften des Individuums werden nun aber bedingt durch Holzart, Wuchsraum, Alter und Gesundheit, und so sind es diese Faktoren, die mittelbar den Grad der Sturmgefahr bestimmen.

Die Sturmwirkung hängt also ab:

1. Von der Holzart, denn bei den verschiedenen Holzarten sind die Baumteile an sich in abweichender Weise entwickelt.
2. Vom Wuchsraum der Individuen, denn dieser bestimmt die Entwicklung der maßgebenden Baumteile.
3. Von Alter und Gesundheit der Individuen, da sich die Formen und Eigenschaften der Baumteile im Lauf des Lebens erst allmählich entwickeln, und da die Neigung zu Krankheiten (besonders im höheren Alter), und die Empfindlichkeit gegen Beschädigungen, die eine Schwächung von Wurzelstock und Schaft mit sich bringen, in ihren Folgen eine große Verminderung der Sturmsicherheit bewirken.

1. Holzart und Sturm.

Wenn im Verhalten der Holzarten dem Sturm gegenüber ein Unterschied besteht, so daß wir mehr und weniger sturmgefährdete Holzarten unterscheiden können, so hat dies seinen Grund zunächst einmal in dem verschiedenen Aufbau der Individuen (Wurzelentwicklung, Schaftbau, Kronenform), dann aber in zwei weiteren wesentlichen Momenten: den technischen Eigenschaften des Holzes und dem Zustand der Belaubung, in dem sich die Kronen zur Zeit der Stürme befinden.

Die technischen Eigenschaften, die hier in Frage kommen, insbesondere die Festigkeit, stellen i. a. die Laubhölzer über die Nadelhölzer. Noch mehr gilt dies bezüglich der Belaubungsverhältnisse zur Zeit der Stürme. Der Luftraum befindet sich in unserem Untersuchungsgebiet während des Winterhalbjahrs in wesentlich lebhafterer Bewegung als im Sommer, wir haben somit, und dem entspricht die Erfahrung, die meisten Stürme zur Zeit der Wachstumsruhe zu erwarten. Deshalb haben alle Holzarten, die zu dieser Zeit kahlstehen, also sämtliche Laubhölzer und die Lärche einen bedeutenden Vorteil gegenüber den immergrünen Nadelhölzern, weil erstere dem auf sie eindringenden Sturm weniger Fläche entgegensetzen, als letztere.

Diese Momente lassen somit die Laubhölzer als im allgemeinen sturmfest, die Nadelhölzer als sturmgefährdet erscheinen. Die Stufenfolge innerhalb dieser Gruppen wird in erster Linie durch die Beschaffenheit der Bewurzelung, den Grad des Tiefwurzelns bestimmt.

Von den Laubhölzern gilt als standfesteste Holzart die Eiche, als meistgefährdet wohl die Buche; von den Nadelhölzern stehen obenan Kiefer und Lärche, dann folgt die Tanne, als meistgefährdet gilt mit Recht allgemein die flachwurzelnde Fichte. Zu gleichem Ergebnis gelangt neuestens Stötzer, der die Windständigkeit der Holzarten in der Festschrift zur Feier des 75-jährigen Jubiläums der Forstlehranstalt Eisenach bespricht. Er sagt, daß in den Stürmen der letzten Dezennien die Buche sich nicht besonders windständig

gezeigt, daß auch die Tanne den Erwartungen nicht entsprochen habe, die man früher von ihr hegte und daß sich selbst die Kiefer weniger standfest zeigte, als vorausgesetzt worden war.

Was die beiden ersteren Holzarten betrifft, so mag bezüglich der Tanne darauf hingewiesen werden, daß der Vorteil, den sie in bezug auf Bewurzelung der Fichte gegenüber hat, auf lockerem und durchweichtem Boden nicht selten dadurch wieder aufgehoben wird, daß sie in Mischung mit dieser meist älter daher stärker ist, sich im Schaft weniger biegsam zeigt, auch eine dichtere Krone besitzt und daher ebenso leicht, zuweilen sogar leichter geworfen wird (vgl. auch die Anführung *B a r g m a n n s* Allg. F. u. Jztg. 1904 S. 211). Selbst bei der Buche hat Verf. unter den angegebenen Bodenverhältnissen einmal beobachtet, daß einige starkschäftige Buchen, die in schlankes Nadelholz (Fichte und Tanne) eingemischt waren und nach üblicher Ansicht zur Festigung des Bestands beitragen sollten, vom Sturm aus diesem herausgeworfen wurden, ohne daß das Nadelholz am betreffenden Ort irgend wesentlich gelitten hätte.

Für das Gebirge stellt *B a u d i s c h* (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1884 S. 530) in bezug auf Sturmfestigkeit obenan den *A h o r n* (Berg- und Spitzahorn) die „Eiche des Gebirges“, in zweiter Reihe folgen Esche und Buche, in dritter Lärche und Tanne und in letzter die Fichte.

2. Wuchsraum und Sturmwirkung.

Die Ausbildung von Krone, Schaft und Wurzelstock ist eine ganz verschiedene einerseits im *F r e i s t a n d* und andererseits im *B e s t a n d e s b e s c h l u ß*. Ersterer findet sich ganz oder teilweise bei ungleichaltriger oder sehr lichter gleichaltriger Bestockung und am Bestandesrand, letzterer im Innern gleichaltriger oder gleichwüchsiger Bestände.

Dem verschiedenen Aufbau der Individuen entspricht das Verhalten des freistehenden Einzelstamms, der gleichaltrigen Gruppe, des durch mehr oder weniger gleichaltriges Zusammenleben sehr zahlreicher Individuen entstehenden Bestands und endlich des aus gleichaltrigen Beständen verschiedener Altersklassen zusammengesetzten Waldes, des schlagweisen Hochwalds.

Der *f r e i s t e h e n d e* *E i n z e l s t a m m* genießt Luft und Licht von allen Seiten, hat freien Raum zur Ausbreitung seiner Krone über der Erde, wie seiner Bewurzelung unter derselben. Er wird von allen Seiten fortgesetzt vom Wind bewegt, vom Sturm umbraust, und wie er einerseits durch seinen freien Stand in der Lage ist, von den Abwehrmitteln in vollem Umfang Gebrauch zu machen, mit denen Mutter Natur seine Art ausgerüstet hat, so erhält er andererseits durch seine Lebensbedingungen auch einen starken Anreiz hiezu, denn er steht in fortgesetztem Kampf mit der bewegten Luft und ist in diesem Kampf ganz auf seine eigene Kraft angewiesen, genießt nicht fremden Schutz und fremde Hilfe. Er schützt sich durch starke Verankerung im Boden, durch kegelförmigen Schaftbau mit mächtig sich entwickelndem Wurzelanlauf, eine Folge des Baus der Krone und des fortgesetzten Reizes, den die starke Bewegung auf die betreffenden Baumteile ausübt; er deckt endlich seinen Fuß durch

eine bis zum Boden reichende Krone. So kommt es, daß der allen Unbilden, der größten Krafteinwirkung des Sturmes ausgesetzte Einzelstamm aller, auch der sonst gefährdetsten Holzarten als mindestgefährdet bezeichnet werden muß, er ist sturmfest, besitzt volle Selbständigkeit.

Ist der Freistand kein vollständiger, so erscheint auch die Windständigkeit vermindert, doch erhält sie sich auch bei weitgehender Beschränkung des Wuchsraums noch in verhältnismäßig hohem Maß.

Ganz anders liegen die Verhältnisse, sobald sich ganz oder annähernd gleichaltrige Individuen zu Gruppe, Horst, Bestand zusammenschließen. Hier ändern sich sofort die Wachstumsbedingungen gegenüber dem Freistand und zwar in verschiedener Weise für diejenigen Individuen, die sich am Rand der Gruppen u. s. w. befinden und für die Individuen im Innern.

Was zunächst die letzteren betrifft, so werden sie durch den Schlußstand in Wurzel- und Kronenraum beschränkt; das hat geringere Verankerung im Boden, weniger starke Entwicklung des Wurzelanlaufs und Hinaufschieben der Krone am Schaft zur Folge, die nur noch dessen oberes Ende einnimmt. Am Schaft betätigt sich dadurch das im Verhältnis zur Längenentwicklung ohnehin geringere Stärkenwachstum mehr gegen den oberen Teil zu, so daß die Schaftform in ihrer Entwicklung dem Zylinder zustrebt, somit weniger widerstandsfähig wird. Dazu fehlt der von außen kommende Anreiz zu stufiger Entwicklung, da das Individuum im Bestandesinnern sicher eingebettet ist. Hierdurch wird nun zwar die Widerstandskraft des einzelnen Baums stark herabgedrückt, er braucht aber auch eine größere Festigkeit des Aufbaus zunächst gar nicht, da der Bestand als Ganzes ihn schützt, da er durch seine Nachbarn gestützt wird. Den Schutz, den das Individuum sich selbst nicht in vollem Maß zu geben vermag, übernimmt die Genossenschaft. Bricht ein Sturm über den geschlossenen Bestand herein, so vermag seine Kraft zunächst nur schräg von oben auf das Individuum im Innern zu wirken. Dieses wird vermöge der Elastizität seines Schafts zur Seite gebogen, die Verschiebung kann aber nur soweit gehen,* als Spielraum vorhanden ist, d. h. bis die Krone sich an die Nachbarkronen anlehnt und diese das Maß der Seitwärtsbewegung begrenzen. Der Sturm bedarf schon sehr erheblicher Gewalt oder sonstiger, ihn unterstützender Momente, soll er dieses ganze System gegenseitiger Stützung durchbrechen und in das geschlossene Innere des Bestands eindringen.

Das Einzelindividuum besitzt also, im geschlossenen Bestand erzogen, geringe Standfestigkeit, es ist aber trotzdem nicht besonders sturmgefährdet, solange es unter denselben äußeren Bedingungen bleibt, unter denen es erwachsen ist, die Gefahr steigert sich erst mit Aenderung dieser Bedingungen.

Wir haben bei unsern bisherigen Betrachtungen über die Entwicklung des Individuums dichten Bestandesschluß vorausgesetzt. Je lockerer derselbe nun ist, desto größer wird auch die Festigkeit der Individuen sein, besonders wenn der lockere Stand schon von Jugend auf vorhanden war, ja wir können zwischen vollem Freistand und dichtem Bestandesschluß und ihren Wirkungen auf die Standfestigkeit eine stetige Reihe von Uebergängen feststellen, so daß der allgemeine Satz gilt:

Je dichter der Schluß während der Bestandesentwicklung, desto geringer, je lockerer derselbe, desto größer die Standfestigkeit der Individuen im Innern und damit ihre Selbständigkeit nach außen.

Festigt sich so die gleichaltrige Genossenschaft im Innern trotz der Unselbständigkeit der Individuen durch gegenseitige Stützung und bildet sie dadurch ein festes inneres Gefüge, so gewinnt sie, sofern sie selbst freisteht, ihre Selbständigkeit nach außen durch Panzerung der Ränder. Die Randstämme der freistehenden Gruppe u. s. w. befinden sich nämlich nicht unter denselben Wachstumsbedingungen, wie die Innenstämme; sie erwachsen nach einer Seite im Freistand und nehmen hier den dem Freistand eigenen Aufbau an: starke Bewurzelung nach außen, wo sie durch den Wettbewerb ihrer Genossen nicht beschränkt sind, tiefe Beastung, kegelförmigen Wuchs des Schafts mit starkem Wurzelanlauf auf der Außenseite. Nach innen lehnen sie sich an ihre Nachbarn an. So sichert sich die Genossenschaft nach außen durch diesen festgeschlossenen Panzer der Randstämme, der sich allem Eindringen ungünstiger Wirkungen ins Bestandesinnere, insbesondere der Sturmgewalt entgegensetzt; denn dieser gegenüber sind die Randbäume durch ihre Rückendeckung, die sie befähigt, alle Kraft in die Bewehrung nach außen zu setzen, ganz besonders günstig gestellt.

Diesen durch volle Beastung, stufigen Wuchs und starke Bewurzelung der Randstämme bewehrten Bestandesrand nennen wir *T r a u f*, auch *Waldmantel* oder *Windmantel*.

Wir sehen also, wie beim engen Zusammenleben im gleichaltrigen Bestand die einzelnen Bäume ihre natürlichen Waffen mehr oder weniger aus der Hand geben, da es ihnen zu entsprechender Entwicklung an Wuchsraum fehlt, und wie sie dadurch in gegenseitige Abhängigkeit geraten. Den Schutz nach außen übernimmt die Genossenschaft, die Individuen sind nur noch Glieder einer Einheit, unter welche die Leistung des Schutzes ungleich verteilt ist.

So bildet denn der gleichaltrig und geschlossen erwachsene Bestand eine organisierte Einheit in bezug auf Sturmschutz, nach außen und innen ein festes Gefüge, das der Gewalt bewegter Luft einen elastischen, daher sehr wirksamen Widerstand entgegenzusetzen vermag. Der frei erwachsene, geschlossene Bestand ist somit an sich in ähnlicher Weise als sturmfest zu bezeichnen, wie der frei erwachsene Einzelstamm, da die bewegte Luft hier nicht oder nur mit sehr großer Gewalt imstande ist, auf das Einzelindividuum voll einzuwirken.

Und doch hat der geschlossene Bestand seine Achillesferse! Eine große Gefahr liegt nämlich für ihn in der Abhängigkeit der Individuen von einander, die, wie wir sahen, um so größer ist, in je engerem Schluß sie erwachsen. Allerdings kann — soweit die Beobachtungen des Verfassers reichen — für den geschlossenen Bestand gesagt werden, daß der Sturm, auch wenn er dort unter besonderen Verhältnissen den Schluß durchbrochen hat, in der Regel, d. h. bei nicht allzugroßer Gewalt, nicht tief einzudringen vermag, weil durch Stauung der Massen infolge Anlehns der geworfenen und gebrochenen Stämme an die noch stehenden eine starke Mauer sich bildet, die der Sturmwirkung — fürs erste

wenigstens — Halt gebietet, auch wenn der Sturm noch längere Zeit fortwütet. Ein sofortiges Weitergreifen setzt in der Regel eine lockere Bestockung voraus (vgl. die Skizze Fig. 52).

Fig. 52.

Stauung der Holzmassen bei Einbruch des Sturms in den geschlossenen Bestand.

Trotzdem bleibt jedoch der gegenseitige Halt der Individuen, auf den sich die Sturmfestigkeit des geschlossenen Bestands gründet, eine sehr unsichere Sache; denn sobald dieses natürliche Gefüge durch irgend eine Ursache in irgend einer Weise durchbrochen wird, steigert sich bei der geringen Widerstandsfähigkeit der Individuen die Sturmgefahr bedeutend.

Der geschlossene, nach außen gesicherte Bestand aber kann nur in den seltensten Fällen dauernd geschlossen erhalten werden, das läßt weder die Natur noch die Wirtschaft zu.

Wie häufig entstehen — bei einigen Holzarten und in manchen Lagen fast mit Regelmäßigkeit — auch gegen den Willen der Wirtschaft schon frühzeitig größere oder kleinere Bestandeslücken und gelockerte Stellen im Bestand infolge von Beschädigungen u. s. w., oder verliert der Bestand seinen schützenden Trauf. Die Folge ist immer bedeutende Steigerung der Sturmgefahr.

Unter allen Umständen aber stört die Wirtschaft selbst das Schutzsystem, sobald der Bestand in das Alter der Hiebsreife eintritt, durch ihren Hiebseingriff zum Zweck der Verjüngung. Dieser entfernt je nach dem Verfahren entweder den Trauf auf irgend einer Seite und greift von dorthier in den Bestand ein, oder sie durchbricht den vollen Schluß der Bestandeskrone, sei es nun durch gleichförmige oder ungleichförmige Lichtung oder durch Löcherhiebe, — alles Fälle, in denen die bis dahin, d. h. während ihrer ganzen Entwicklung geschlossen erwachsenen Stämme eines Teils ihrer Stützen beraubt werden.

Verschieden wird sich — bei Eingriff der Natur wie der Wirtschaft — die Gefährdung gestalten, je nachdem im bisher geschlossenen Bestand entweder nur Lücken entstehen, oder aber dieser gleichmäßig ge-

lichtet wird. Im ersten Falle bleibt die Umgebung der Lücken wie bisher geschlossen; die Randindividuen behalten nach einer Seite in vollem Maße ihre Stützen durch die Geschlossenheit des Bestands, sie werden derselben nur einseitig beraubt, ein hereinbrechender Sturm kann also an dem seiner Herkunft zugekehrten Rand einzelne Individuen fassen und in die Lücke werfen, — ein Schaden, der erfahrungsgemäß nicht großen Umfang annimmt — und er hat weiterhin durch die Lücke Gelegenheit, in erhöhtem Maße auf die Randindividuen der gegenüberliegenden Seite zu wirken, und zwar um so mehr, je breiter die Lücke in der Sturmrichtung. Der Sturm wird dann zwar die Randstämme gegen den geschlossenen Bestand drücken, der sie stützt, und sie bei entsprechender Gewalt werfen, weil er sie von der Seite her zu fassen vermag, aber er wird auch hier bald wieder durch Stauung des geworfenen und halbentwurzelten Materials am Weitergreifen gehindert werden und nur verhältnismäßig geringen Schaden stiften können, vgl. z. B. Frey (Forstw. Zentralbl. 1906 S. 363), der die Beobachtung mitteilt, daß die offenen Ränder der Sturmücken späterhin keineswegs besonders beschädigt wurden.

Anders bei gleichmäßiger Lockerung der Bestandeskrone. Alle verbleibenden, an seitliche Anlehnung gewöhnten Stämme, die den gelockerten Bestand bilden, sind ihrer seitlichen Stützen ringsum im gleichen Maße beraubt, der Sturm vermag sie bei dem größeren Spielraum der Kronen viel weiter, bzw. beliebig weit seitwärts zu drängen und sie schließlich mangels jeden festen Halts zu werfen. Das feste Gefüge des ganzen Bestandes ist also gleichmäßig gelöst, derselbe in seiner ganzen Ausdehnung der Sturmgefahr preisgegeben, und zwar umso mehr, je dichter der Schluß vorher war und je rascher und stärker die Lockerung erfolgt ist. Bricht hier der Sturm ins Bestandesinnere ein, so wird er je nach der Zeit der Wirksamkeit mehr oder weniger weit in demselben werfend fortschreiten (vgl. Borggreve, Forstab-schätzung S. 298) und seine Nachfolger werden da eingreifen, wo er erlahmte, ohne aufgehalten zu werden, denn jeder Halt der Stämme nach rückwärts fehlt und eine Stauung erfolgt nicht, weil es dazu an der erforderlichen Fülle von Individuen mangelt.

Das Entstehen großer Sturmgefahr aus gleichmäßiger Lichtung wird durch die allgemeine Erfahrung bestätigt, ebenso betont man in Bayern auf Grund der gemachten Erfahrungen die geringere Sturmgefahr des Löcherhiebs bei geschlossener Umgebung.

Ist somit der Grad der Sturmgefahr des geschlossen erwachsenen Holzes durch die Unselbständigkeit der im Innern erwachsenen Individuen bedingt, so wird für die ganze Genossenschaft der Grad der Sturmgefahr vom Anteil dieser unselbständigen Individuen an der Gesamtzahl abhängen; wir werden also geringere Sturmgefahr finden in Gruppe und Horst, wo der feste Rand dem Innern gegenüber einen verhältnismäßig größeren Anteil hat, als im gleichaltrigen Bestand, und in diesem wird sie mit der Ausdehnung der gleichaltrigen Fläche steigen, da hier die Zahl der unselbständigen Stämme im quadratischen Verhältnis zunimmt, diejenige der Randstämme nur im einfachen. Je größer die zusammenhängende gleichaltrige Fläche ist, desto ungünstiger ist nun aber

nicht allein das Verhältnis der Innenstämme zu den standfesten Randstämmen, sondern um so größer ist auch die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Durchbrechung des Schlusses und um so mehr und länger haben nachfolgende Stürme Gelegenheit, in dem einmal geöffneten Bestand weiterzugreifen, um so wehrloser steht die Wirtschaft solchem Fortschreiten gegenüber.

Diese Erwägungen führen uns zu dem Satz: daß die Sturmgefahr mit der Ausdehnung der gleichaltrig bestockten Fläche zunimmt.

Daß große gleichaltrige Flächen sehr sturmgefährdet sind, und am schwersten vom Sturm zu leiden haben, ist denn auch unbestreitbare Erfahrungstatsache. Auch weitere allgemeine Erwägungen führen darauf hin:

Das gleichaltrige Kronendach bildet eine mehr oder weniger ebene Fläche, auf der die Luft geringeren Widerstand findet, also bei großer Ausdehnung der Fläche größere Geschwindigkeit erlangt und mehr nach unten drücken kann, als über einem ungleichaltrigen oder dem Alter nach abgestuften, also unebenen Dach, das die Bewegung der Luft verzögert und ihr eine nach oben gerichtete Komponente gibt.

Ferner — und dies dürfte entscheidend sein — hat fast jeder größere, gleichaltrige Bestand (wobei wir in erster Linie Nadelholzbestände im Auge haben) seine schwachen Punkte — Achillesfersen — um so gewisser, je größer er ist, oder erhält solche mit zunehmendem Alter, als da sind: feuchte, flachgründige, moorige Stellen, Harzfluß (*Agaricus*) und Wurzelfäule (*Trametes*) an Einzelstämmen und Gruppen, Krebsstämme, Schneedrucklücken, Fällungs- und Rückungsschäden, Nutzungsfehler, Blitzschäden und Käferplatten. . . . (Wir stellen diese beiden letzteren Erscheinungen zusammen, weil mehrere Beobachtungen des Verfassers, die in der neueren Literatur Bestätigung finden, darauf hinweisen, daß Käferplatten vielfach, vielleicht vorwiegend, Folgen von Blitzschlägen sind. Blitzschläge bringen ohne äußere sichtbare Beschädigung ganze Gruppen von Nadelhölzern zum Kränkeln und allmählichen Absterben, diese Gruppen treten dann, nachträglich von Borkenkäfern befallen, als sog. „Käferplatten“ in die Erscheinung.)

Reißt der Sturm an solcher Stelle in den Bestand ein, so hinterläßt er eine Lücke, die eine dauernde Gefahr für den ganzen Bestand bildet, wo weitere Stürme ein leichtes Spiel und ein um so weiteres Arbeitsfeld haben, je größer der Bestand ist. Wir stehen in solchen Fällen insbesondere in an sich schon lichten Althölzern ihrem jahrzehntelang währenden Weitergreifen machtlos gegenüber, wie tausend Stellen im Wald zeigen.

Ganz besonders groß aber wird die Gefährdung dadurch, daß wir bei Naturverjüngung genötigt sind, diese großen Flächen mehr oder weniger gleichzeitig zu lichten, wenn Abnutzung und Verjüngung überall wirtschaftlich rechtzeitig erfolgen sollen.

Wir vertreten deshalb im Gegensatz zu Borggreve (Forstl. Blätter 1882 S. 67 und Forstabschätzung 1888 S. 298) die Anschauung: Daß sich die Sturmgefahr nicht mit dem Umfang (der Angriffslinie), sondern mit dem Inhalt der gleichaltrig bestockten Fläche

steigert; vgl. Neys Mitteilungen (Heidelberger Forstvers. 1909 Ber. S. 55) über die Wirkung tiefer und schmaler Durchhiebe gegenüber dem Sturm. Von ähnlichen Anschauungen, wie Borggreve, scheint Pilz auszugehen (Thar. Jahrb. 1883 S. 206), wenn er annimmt, daß der Sturm bei schmaler Angriffsfront weniger schädlich wirke als bei breiter. Wir glauben, daß bei richtiger Wahl der Himmelsrichtung das Gegenteil der Fall ist, denn je schmaler die Front, desto tiefer in der Sturmrichtung der gleichaltrige Bestand, der gelockert werden muß, also der Sturmgefahr preisgegeben ist; je breiter dagegen die Front, desto schmaler kann in der Sturmrichtung die gleichaltrige bestockte Fläche sein, desto geringer also der Schaden, falls der Sturm einbricht.

Die Umfanglinie des gleichaltrigen Bestands ist in der Regel, wo nicht unvorsichtige und unvorbereitete Freistellung stattgefunden hat, infolge von Festigung der Randstämme und Anlehnung nach innen sehr widerstandsfähig; der Sturm scheint dem Verfasser nach seinen Beobachtungen dort selten, vorwiegend nur bei sehr heftigem Auftreten (namentlich bei Orkanen) einzugreifen, selbst wenn die Traufbildung keine besonders vollkommene ist. Viel häufiger sind wohl, jedenfalls gilt dies für das Bergland, Einbrüche ins Innere gleichaltriger Zusammenhänge besonders bei Schirmschlag. Die häufigen Winterstürme halten ihre Ernte zumeist auf den Flächen der Abtriebsnutzung, die durch Schirm- und Blenderhiebe gelockert sind, und zwar im Innern der Bestände, während die Ränder in der Regel unberührt bleiben.

Borggreve geht im Gegensatz hiezu von der Voraussetzung aus, daß die Stürme meist in den Bestandesrand, nur selten ins Innere einbrechen, er bezeichnet die letzteren Eingriffe als „Ausnahmen“, die nicht zu vermeiden seien, und gelangt daher in bezug auf räumliche Ordnung zu einem dem unsrigen entgegengesetzten Ergebnis (l. c. S. 201), daß — auch bei dem von ihm empfohlenen Schirmschlagbetrieb — möglichst große gleichaltrige Flächen, und wo der Wind aus einer Richtung wehe, lange Hiebszüge geringste Sturmgefahr bedingen.

Dagegen sagte Judeich auf der deutschen Forstversammlung zu Stettin 1892 (Ber. S. 143): „die Erfahrung lehrt hinreichend, daß alle Stürme stets dort die größten Verheerungen angerichtet haben, wo ausgedehnte Komplexe von Altholz in ununterbrochenem Zusammenhang lagen“. Er schildert in ähnlicher Weise, wie hier geschehen, den Einbruch des Sturmes und sein Weiterfressen im Großbestand und betont die andern, noch zu erörternden großen Gefahren der Großfläche.

Borggreves Anschauung tritt auch Pilz (Forstl. Blätter 1882 S. 168) entgegen, indem er zeigt, daß der Sturm auf einer großen gleichaltrigen Fläche mehr Schaden verursacht, als auf mehreren kleinen (vgl. dagegen oben); ebenso Pöpel, (Forstw. Centralbl. 1882 S. 609) und andere.

Wir haben bisher den Bestand als selbständige Größe betrachtet; auch er ist jedoch meist Glied eines größeren Verbands, eines ganzen Waldbezirks und dadurch abhängig von seiner Umgebung, die ihn hindert, seine Schutzmittel voll anzuwenden. Wir wollen jedoch diesen Gegenstand späterer Betrachtung vorbehalten.

3. Alter und Gesundheit.

Endlich sind Alter und Gesundheit des Holzes wesentliche Momente, beide stehen in engem Zusammenhang. Junges Holz ist in der Regel sehr wenig der Sturmgefahr ausgesetzt, denn es ist gesund und besitzt noch geringe Dimensionen. Im höheren Alter dagegen gestalten sich die Verhältnisse immer ungünstiger; der oberirdische Baumkörper gewinnt mehr und mehr an Umfang, denn die Krone breitet sich aus und der Schaft wird länger und überdies stärker, verliert daher an Biegsamkeit. So nimmt die Standfestigkeit ab, denn die Krafteinwirkung der bewegten Luft steigt in einem Maße, mit dem die Entwicklung der Wurzeln nicht vollkommen Schritt halten kann.

Mehr noch sind es aber die im höheren Alter nicht selten eintretenden *Erkrankungen* des Wurzelstocks und des Schafts, welche die Sturmgefahr steigern. Obenan steht hier die Wurzelfäulnis der Nadelhölzer, besonders der Fichte, die vielen Sturmschaden veranlaßt. So ist es die verschieden große Neigung zu Krankheiten und die verschiedene Empfindlichkeit gegen Wurzel- und Schaftbeschädigungen, die bei den einzelnen Holzarten die Sturmgefahr mit zunehmendem Alter sehr verschieden beeinflußt und dadurch die verschiedene Gefährdung der Holzarten ganz wesentlich mitbedingt.

Unsere Betrachtungen über die Wirkung der stark bewegten Luft auf den Wald führen uns somit zu dem Ergebnis, daß — neben Holzart und Bestandesalter — dem *Wuchsräum* und damit der räumlichen Anordnung der Individuen nach dem Alter der erste Einfluß zukommt. Die Bestandesindividuen sind, wenn im gleichaltrigen Schluß erwachsen, unselbständig gegen Sturm, und zwar steigt die Unselbständigkeit mit dem Schlußgrad. Die Sturmgefahr ist damit am größten im gleichaltrigen Hochwald, also gerade bei derjenigen Betriebsform, auf die unsere ökonomischen Interessen gebieterisch hinzuweisen scheinen.

III. Der Sturmschutz.

Aus den vorstehenden Betrachtungen einerseits über die Stürme und ihre Eigenschaften und andererseits über die Beziehungen zwischen Bewegung der Luft und Aufbau des Waldes ergeben sich nun für die Wirtschaft diejenigen *Methoden*, deren sich der Sturmschutz zur Sicherung des Betriebs bedienen kann, sowie diejenigen *Bedingungen*, denen die räumliche Ordnung Rechnung zu tragen hat hinsichtlich der Stellung der Individuen zu einander, der Holzartenverteilung und der Lagerung der Altersklassen und Bestände. Sie setzen uns zugleich in den Stand, die verschiedenen Betriebsarten nach dieser Richtung zu beurteilen.

Den besten Sturmschutz, der überhaupt möglich ist, geben uns, wie gezeigt

wurde, zwei Extreme, nämlich entweder freiständige Erziehung der Individuen, oder aber — bei gleichwüchsiger Erziehung — dauerndes Geschlossenhalten des Bestands, (zum mindesten ein Vermeiden ausgedehnter Lockerung des Kronendachs älterer Bestände) und Erhaltung des natürlichen Traufs.

Die Forderung dauernden Geschlossenhaltens des Bestands ist nun aber, wie schon oben ausgeführt wurde, weder vom natürlichen, noch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus erfüllbar, wirtschaftlich schon nicht bei Kunstverjüngung, die meist eine Oeffnung des Bestandesrands nach einer Seite fordert; noch viel weniger aber bei Naturverjüngung, denn mit dieser ist immer notwendig eine mehr oder weniger starke Lockerung des Kronendachs oder aber eine Oeffnung des Bestandesrands verbunden, um Niederschläge und Licht in dem Maß auf den Boden gelangen zu lassen, als dies für Keimung der Samen und Wachstum der jungen Bestockung erforderlich ist. Dazu erfolgt diese Lockerung stets im höheren, daher meistgefährdeten Alter. Naturverjüngung ist somit ohne eine mehr oder weniger große Gefährdung des bisher geschlossenen Bestandes gar nicht durchzuführen, weshalb wir genötigt sind, uns nach weiteren Hilfsmitteln zur Festigung des Bestandesinnern gegen Sturm umzusehen. An sie hätte sich alsdann eine Betrachtung des Schutzes nach außen anzureihen.

Ehe wir jedoch diesen Aufgaben näher treten, bedarf es einiger Vorbemerkungen:

Die geschilderte Abhängigkeit der Individuen des geschlossenen Bestandes von einander, die den ganzen Wald in Sturmgefahr bringt, beruht auf deren Aufbau. Dadurch ist uns nun zwar einerseits die Möglichkeit gegeben, dieser Gefahr zu steuern, indem wir die Wachstumsbedingungen und damit den Aufbau ändern; andererseits aber liegt auch ein Hindernis für bessere Sicherung darin, daß sich eine Aenderung im einzelnen Fall nicht ohne weiteres und in kurzer Zeit erreichen läßt, denn wir haben im Aufbau der Individuen das Ergebnis langwieriger Wachstumsvorgänge vor uns, es ist also längere Zeit und im allgemeinen jüngeres Bestandesmaterial erforderlich, wenn in diesem Aufbau eine wirksame Aenderung erzielt werden soll. Aeltere Hölzer gelangen kaum je noch in vollem Maß zu der in der Jugend nicht erworbenen Windständigkeit und es ist daher zeitiges Vorgehen nach dieser Richtung notwendig, wo für das höhere Alter ein gewisses Maß von Windständigkeit erstrebt wird.

Ebenso sind Bestandesränder, die einen festen Trauf nicht besitzen, nur in noch jugendlichem Alter bei allen Holzarten befähigt, sich bei allmählicher Freistellung nachträglich sicher zu betraufen und so volle Windständigkeit zu erlangen. In höherem Alter ist dies bei vielen Holzarten eine sehr unsichere Sache, besonders, wenn die Festigung in kurzer Zeit erfolgen soll.

Gehen wir nun zur Betrachtung der Schutzmittel gegen Sturmgefahr über, so müssen wir scheiden:

den Schutz der Bestände nach innen und den nach außen.

1. Der Schutz nach innen.

Drei Hauptmittel stehen uns für innere Festigung der Bestände zu Gebot:

Die Ungleichaltrigkeit der Bestockung, und — bei gleichaltriger Bestockung — die lockere und stufige Erziehung der Einzelstämme, sowie endlich die Holzartenmischung.

Die Ungleichaltrigkeit, d. h. die Einzel-, Gruppen- und Horstmischung mehrerer Altersklassen trägt deshalb wesentlich zur Steigerung der Standfestigkeit bei, weil hier stets eine mehr oder weniger große Zahl von Individuen ganz oder teilweise im Freiland erwächst, es sind dies die Einzelvorchüchse und die Randstämme der älteren Gruppen und Horste; von ihrem Anteil an der Bestockung und dem Maß, in dem sie den Freiland genießen können, hängt der Grad der Windständigkeit des Ganzen ab, dessen festes Gerippe sie bilden. Deshalb wird die Sturmsicherheit um so größer sein, je kleiner und wechselnder die gleichaltrigen Einheiten sind und je größer der Altersunterschied.

Bei der jeweils wiederkehrenden Wegnahme haubarer Gruppen und Horste werden allerdings örtlich ungünstige Verhältnisse eintreten durch ein schutzloses Freistellen der Umgebung, doch werden sich dieselben stets auf kleine Flächen beschränken und in kurzer Zeit durch Verwachsen verschwinden.

Die Ungleichaltrigkeit bringt nun aber eine Reihe ökonomischer Nachteile mit sich, die auf gleichaltrige oder gleichwüchsige Erziehung trotz gesteigerter Sturmgefahr hinweisen. Wir brauchen also auch für die Gleichaltrigkeit Mittel zur Bekämpfung der Sturmgefahr. Es ist dies zunächst die lockere und stufige Erziehung des gleichaltrigen Bestandes.

Sie sucht den Individuen wenigstens einen Teil ihrer natürlichen Waffen gegen den Sturm in die Hand zu geben. Ein gesteigertes Maß von Windständigkeit ist, wie aus früheren Ausführungen hervorgeht, zu erzielen, wenn von Jugend auf für eine entsprechend gelockerte Bestandeskrone gesorgt wird, die zu einer mehr gefestigten Schaft- und Wurzelbildung führt, als dies der dichte Schluß tut. Wird dagegen diese Lockerung erst in späterem Alter gewährt, nachdem vorher dichter Schluß geherrscht hatte, so festigen sich allerdings die Stämme noch bis zu einem gewissen Grad, jedoch erst, nachdem zunächst eine Periode gesteigerter Windgefahr vorausgegangen war. Das weist uns darauf hin, unsere Festigungsmaßregeln so frühzeitig als möglich zu ergreifen.

Uebrigens verhalten sich die Holzarten in dieser Beziehung sehr ver-

schieden: bei der meistgefährdeten Fichte z. B. dürfte von einer späten Lockerung der Kronen früher dicht geschlossener Bestände nicht mehr allzuviel zu erwarten sein, denn wie sie die von ihr erwartete große Zuwachssteigerung meist nicht mehr leistet, so wird auch ihre Standfestigkeit, die ja ebenfalls vom Wachstum abhängt, nur langsam zunehmen. Als Ursache möchten wir neben der früher erörterten Eigentümlichkeit dieser Holzart, daß ihre Kronenentwicklung wesentlich vom Längenwuchs abhängt und nach der Breite beschränkt ist, noch eine Wirkung des Sturmes selbst hervorheben. Die überschlang erwachsenen Fichten werden nämlich bei entsprechender Kronenlockerung in erheblichem Maß durch Wind und Sturm gegeneinander gepeitscht und verlieren dadurch fortgesetzt eine solche Menge von Trieben, daß von einer wesentlichen Zuwachssteigerung und damit auch von einer raschen Zunahme der Standfestigkeit keine Rede sein kann. Ein wahrer Regen von 1—2jährigen Endtrieben kommt bei heftigen Sturmstößen in solchen Beständen auf den Boden und wir finden diesen in unsern früher zu dichten Beständen nach jedem Sturm mit solchen Trieben förmlich besät, begrünt.

Gute Dienste dürfte — nächst der allgemeinen Bestandeslockerung — auch die stufige Erziehung einzelner Individuen, die gleichmäßig über den sonst geschlossenen Bestand verteilt sind, dadurch leisten, daß diese standfesteren Stämme, vom Sturme weniger zur Seite gebogen, ihren Nachbarn Halt und Stütze bieten, gewissermaßen das Gerippe des Bestandes bilden, ähnlich wie man dies von der nachher zu besprechenden Holzartenmischung erwartet. In dieser Richtung bewegt sich ein Vorschlag H e c k s, dem reinen Fichtenbestand dadurch Festigkeit zu geben, daß eine bestimmte Zahl über die Fläche zerstreuter Stämme von Jugend auf fortgesetzt umlichtet, also mehr oder weniger freiständig erzogen wird, so daß diese Stämme durch ihre erhöhte Standfestigkeit gestatten, zwischen ihnen ohne große Sturmgefahr das erwünschte schlanke Holz zu erziehen.

Ein wichtiges Mittel, den geschlossenen Bestand windständiger zu machen, ist endlich die H o l z a r t e n m i s c h u n g. Einerseits sollen hiebei die standfesteren Hölzer den weniger standfesten Halt und Stütze bieten, und andererseits kann durch entsprechende Mischung die Wirtschaft in den Stand gesetzt sein, der weniger festen Holzart ein größeres Maß von Kronenfreiheit zu gewähren, um damit ihre Standfestigkeit zu steigern, und zwar dies ohne sonstigen Nachteil, weil die beigemischte Holzart die Funktion der Bodendeckung u. s. w. übernimmt. Wir möchten diesem letzteren Moment, zumal vom ökonomischen Standpunkt aus, die weitaus größere Bedeutung beimessen.

Die Standfestigkeit der Holzarten ist, wie gezeigt wurde, eine sehr verschiedene; da liegt es denn nahe, die Bestände der sturmgefährdeten Holzarten durch entsprechende Beimischung von Individuen standfesterer Art zu sichern, die der Seitwärtsbewegung der weniger festen durch den Sturm eine Grenze setzen, sie stützen, und dadurch Sturmeinbruch erschweren. Sollten aber je die weniger festen Individuen dem Sturm trotzdem zum Opfer fallen, so wäre doch Aussicht vorhanden, daß die festeren erhalten blieben und die Lücken füllten.

Daraus geht auch die erforderliche bzw. wirksamste Form der Mischung hervor, es ist Einzelmischung oder truppweise Mischung.

Einer solchen Festigung bedarf insbesondere der gleichwüchsige Fichtenbestand durch Beimischung der Tanne, Kiefer und Buche. Von der Beimischung der Buche im besonderen verspricht sich Stötzer (l. c. S. 58) keinen großen Nutzen. Wenn wir uns auch dessen ungünstigem Urteil über die Windständigkeit der Buche voll anschließen, so glauben wir trotzdem an deren große Bedeutung für die Sicherung der Fichtenbestände und möchten ihr, ganz abgesehen von ihren waldbaulichen und andern Vorzügen, auch von dem hier in Betracht kommenden Gesichtspunkt das Wort reden, — nicht in erster Linie ihrer unmittelbar festigenden, sondern ihrer mittelbaren Wirkung wegen. Im Fichtenbestand, dem die Buche mit einem ihrer langsamen Jugendentwicklung entsprechenden Altersvorsprung beigemischt ist — wir haben hier Einzelmischung und truppweise Mischung im Auge — bleibt die Buche im Höhenwuchs fast überall früher oder später hinter der Fichte zurück (vgl. Lorey, Allg. F. u. J.Ztg. 1896 S. 9) und wird

Fig. 53.

Unter- und zwischenständige Beimischung der Buche zur Fichte.

unter- und zwischenständig. Gerade in dieser Stellung aber vermag sie wertvolle Dienste zu leisten, denn sie bleibt als ausgesprochenes Schattenholz am Leben und setzt durch gute Bodendeckung die Wirtschaft in die Lage, die Fichte ohne Nachteil schon frühzeitig entsprechend weitständig zu erziehen; diese aber, deren Krone diejenige der Buche meist erheblich überragt, erlangt so die Eigenschaften freien Wuchses, sie erwächst stufiger und verankert sich besser im Boden. Brechen trotzdem Sturm oder andere Schäden in den Mischbestand ein, so ist es die Buche, die erhalten bleibt, die Lücken schließt, den Boden deckt und weiteren Schaden verhütet, — ein Vorgang, der im Walde vielfach zu beobachten ist (vgl. die Skizze, Fig. 53).

Schiffel sagt (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1906 S. 349):

„Der Füllbestand leistet die Dienste:

1. der Schaftpflege der Haubarkeitsstämme

2. des Bodenschutzes

3. des Ersatzes abgehender Haubarkeitsstämme“.

Diesen Forderungen kann in bester Weise ein Füllbestand von Schattenhölzern gerecht werden, also die waldbaulich bessere Buche, oder die technisch bessere Tanne.

2. Der Schutz nach außen.

Wir haben bisher den frei erwachsenen, selbständigen Bestand geschildert, der sich nach innen durch Schluß festigt, und nach außen durch Traufbildung bewehrt. Der Bestand verliert nun seine geschilderte Selbständigkeit nach außen, sobald er Glied eines größeren Verbands, eines ganzen Waldes, wird, ähnlich wie dies beim Einzelstamm innerhalb des Bestands der Fall ist. Wo zahlreiche Bestände in einem Waldkomplex vereinigt sind, hindern sie sich durch Verwachsen der Ränder gegenseitig, dichte sturm feste Träufe zu bilden und sich durch diese nach außen zu sichern; sie geraten so in gegenseitige Abhängigkeit, bedürfen des gegenseitigen Schutzes in ähnlicher Weise, wie wir dies oben beim Einzelstamm im gleichaltrigen Bestand gesehen haben; sie verlieren nach außen den bisher vorausgesetzten Traufschutz und sind auf Deckung durch die vorliegenden Nachbarbestände angewiesen.

Wir können somit zwei Formen des Bestandesschutzes nach außen unterscheiden, den Traufschutz und den Schutz durch Bestandesdeckung, wir wollen ihn kurz Deckungsschutz nennen.

Der Trauf, mit dessen Ausbildung wir uns an anderem Orte näher zu befassen haben werden, bildet, wie oben gezeigt wurde, den natürlichen Bestandesschutz nach außen. Er entsteht und erhält sich durch freien Wuchs der Bestandesränder von Jugend auf, auch kann er sich durch späteres Freistellen des Randes nachträglich bilden, — in der Regel jedoch nur bis zu gewissen Altersgrenzen; doch verhalten sich hier die einzelnen Holzarten sehr verschieden.

Das wirtschaftlich wesentliche Merkmal des Traufs ist die Selbständigkeit, die er dem Bestand verleiht, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Nachbarbestände von einander; die Wirtschaft kann die Umgebung nutzen, wann und wie sie will, ohne auf den betrauten Bestand Rücksicht nehmen zu müssen und ohne ihn zu gefährden. Traufschutz gewährt also wirtschaftliche Freiheit.

Als segensreich hat sich die Traufbildung jederzeit in größeren Waldkomplexen bewährt, besonders wo diese von großen Sturmschäden heimgesucht wurden. Die Träufe stellen sich hier meist mit Erfolg dem zerstörenden Element entgegen und verhindern dessen Weitergreifen; sie bieten ferner bei Eintritt einer Katastrophe wertvolle Stützpunkte für Wiedergewinnung der Ordnung.

Der ungleichaltrige Wald in gruppen- und horstweiser Mischung der Altersklassen verdankt seinen Ruhm der Standfestigkeit mit in erster Linie den zahlreichen Traufbildungen auch im Innern seiner Bestände, die überdies etwaigen Schaden örtlich beschränken und die Wiederherstellung der räumlichen Ordnung erleichtern.

Daher ist die Forderung wohlbegründet, es sollen in größeren Zusammenhängen des schlagweisen Hochwalds sturmefeste Bestandesränder in möglichst großer Zahl erzogen und erhalten werden, als Sicherheitslinien für den Fall eines Einbruchs in den Bestandesschluß, sei es durch den Sturm selbst, oder durch andere Schäden, die das Innere der Bestände öffnen. So begründet z. B. auch Thaler (Allg. F. u. J.Ztg. 1903 S. 3) für Hessen die Bildung kleiner Hiebszüge unter anderem damit, daß zahlreiche Träufe im Innern der Waldzusammenhänge die Sturmsicherheit steigern.

Wirtschaftlich ist nun aber mit dem Traufschutz der Bestände allein nicht auszukommen, denn er erfordert auf zusammenhängender Waldfläche eine weitgehende Absonderung der einzelnen bestockten Flächen und schafft deshalb viel ertragslose Fläche. Eine große Rolle im Wald spielt daher neben ihm der Deckungsschutz, den der vorgelagerte Bestand seinem trauflosen Hintermann gewährt.

Jeder durch unmittelbaren Anschluß an seine Nachbarn trauflose Bestand bedarf dringend — und je älter er wird, um so mehr — dauernden Deckungsschutzes, d. h. der Deckungsschutz muß — einmal in Anspruch genommen — stets durch das ganze Bestandesleben gewährt werden, soweit nicht etwa nachträgliche Wiederbetraufung möglich ist. Damit macht er eine bestimmte Anordnung des Hiebs und daher auch eine bestimmte Altersabstufung in derjenigen Richtung notwendig, nach der die Deckung gewährt werden soll. So schafft der Deckungsschutz Abhängigkeit der Bestände in bezug auf Hiebsführung und räumliche Alterslagerung, und zwar muß die Altersabstufung eine solche sein bzw. werden, daß beim Hieb jedes Bestandes zur Zeit seiner Hiebsreife jede schutzlose Freistellung anderer Bestände vermieden wird.

Dauernder Deckungsschutz ist ferner nicht nach allen Seiten möglich, äußersten Falls nach zwei Richtungen, die zu einander senkrecht stehen, er ist also nur nach einer Hälfte der Windrose wirksam. Dies genügt jedoch praktisch, da die Stürme, wie wir gesehen haben, zum überwiegenden Teil aus einer Hälfte der Windrose kommen.

Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß das Deckungsprinzip im Gegensatz zum Traufschutz wirtschaftliche Gebundenheit bedingt, da es die Abnutzung der Bestände von deren gegenseitiger Lage zur Sturmrichtung abhängig macht.

Und ebenso bringt der Deckungsschutz nur eine teilweise Sicherung, und zwar nur nach bestimmten Richtungen; nach andern muß der Bestand früher oder später deckungslos freigestellt werden. Der höchste Grad möglicher Sicherheit ist hier dann erreicht, wenn der ungedeckte Rand

nach derjenigen Hälfte der Windrose gerichtet ist, aus der ihm die geringste Gefahr droht, von einem Sturm von außen her unter größerem Winkel getroffen zu werden.

Mit dieser an sich unvollkommenen Sicherung begnügt sich die praktische Forstwirtschaft notgedrungen; so fordert Pöpel (Forstw. Centralbl. 1882 S. 609) Deckungsschutz gegen alljährliche Stürme aus SW und W, gegebenen Falls auch SE und NW, und betont, gegen Stürme aus unerwarteten Richtungen und Orkane gebe es kein Schutzmittel; und Baudisch sagt (Centralbl. f. d. ges. Forstwes. 1884 S. 522), daß die Schläge demjenigen Sturm entgegengeführt werden sollen, der nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse als der sturzgefährlichste zu betrachten sei. Baudisch will demgemäß gegebenen Falls sogar von SE gegen NW hauen! Um die Gefahr der Stürme aus unerwarteter Richtung zu vermindern, wird da und dort möglichste Verringerung der Zahl offener Schlagränder gefordert bzw. vor deren starker Vermehrung gewarnt, wobei jedoch die unseres Erachtens viel größere Gefahr der großen gleichaltrigen Flächen dafür eingetauscht wird.

Allgemein kennt die heutige Forstwirtschaft für Wahl der Hiebsrichtung nur ein bestimmendes Moment, eben den Deckungsschutz gegen Sturmgefahr. Diese Beschränkung hat ihren Grund in der herrschenden Großschlagwirtschaft, von der sie auch auf den Saumschlag übergegangen ist.

Wie sich das Traufschutzprinzip nicht durchaus auf die Sicherung des Bestandesrands beschränkt, sondern im ungleichaltrigen Wald gewissermaßen ins Innere der Bestände dringt, so tritt auch das Deckungsprinzip nicht allein in Wirkung zwischen verschiedenen Beständen, sondern auch zwischen Teilen desselben Bestands; wir erinnern an das unter verschiedenen Bezeichnungen empfohlene und angewendete Stehenlassen von Bestandesteilen, die als Sturmbrecher wirken und den gefährdeten Schlagrand gegen Sturm seitlich schützen sollen, sowie an die Deckung gelichteter und damit höherer Sturmgefahr preisgegebener Bestandesteile durch den vorliegenden geschlossenen Teil. Soll dieser Deckungsschutz, den der geschlossene Bestandesteil gewährt, durch den gelichteten voll ausgenützt werden, so muß die Lichtung im Bestand streifenweise gegen die gefahrdrohende Richtung fortschreiten. Ein solches Vorgehen ist übrigens der Natur der Sache nach an eine bestimmte räumliche Anordnung der Altersklassen gebunden, insbesondere an eine verhältnismäßig geringe Ausdehnung der Gleichaltrigkeit in der Hauptsturmrichtung.

Für beide Schutzmittel, Trauf und Bestandesdeckung, drängt sich nun die Frage auf: Inwieweit schützen diese Mittel die rückliegenden Flächen?

Wir können für Beantwortung dieser Frage die beiden Schutzmittel ohne weiteres zusammenfassen, denn beide wirken durchaus gleichartig und zwar dadurch, daß sie das Bestandesinnere gegen wagrecht gerichtete Einwirkung des Sturms schützen und nur eine schräg von oben kommende zulassen.

Was zunächst den Trauf betrifft, so muß der anscheinend verbreiteten Auffassung entgegengetreten werden, als ob der Panzer, mit dem sich der freistehende Bestand umgibt, schützend bis weit ins Bestandesinnere wirken solle, als ob der Trauf den Schutz für den gesamten Bestand mitzuübernehmen habe. Dies ist unseres Erachtens nicht seine Aufgabe; der Trauf ist gar nicht in der Lage, einen Schutz auf irgend erhebliche Entfernungen auszuüben, er ist lediglich dazu da, das Bestandesinnere nach außen abzuschließen, und wagrechten Sturmdruck auf geschlossen erwachsene Stämme zu verhindern.

Ebensowenig erwarten wir vom geschlossenen Bestand eine so erheblich ausgedehnte Deckungsschutz-Wirkung auf die rückliegenden Flächen, wie dies da und dort in erstaunlichem Maß angenommen zu werden scheint.

Die Frage nach der wirklichen Ausdehnung der Schutzwirkung kann wohl überhaupt nicht allgemein und bestimmt beantwortet werden, da sie von zahlreichen Umständen abhängt, sie dürfte aber im allgemeinen als sehr wenig weitreichend anzunehmen sein. Pilz schätzt l. c. die Wirkung der Deckung auf doppelte Stammlänge, etwa 50 m.

Wir haben den Traufschutz als ein befreiendes, den Deckungsschutz als ein bindendes Moment in der Wirtschaft kennen gelernt. Mit keinem der beiden Hilfsmittel für sich allein wird sich nun aber unsere räumliche Ordnung begnügen können; mit dem Traufschutz allein — trotz seiner Vorzüge — nicht, weil er an großem Raumbedarf leidet, zu viel ertragslose Fläche schafft; mit dem Deckungsschutz allein nicht, weil er schwerfällig ist und die wirtschaftliche Freiheit unterbindet. Zudem steigt diese Eigenschaft notwendig mit der Ausdehnung der sich deckenden Bestände und mit deren Zahl, wie mit der Zahl der Richtungen nach denen Deckung stattfinden muß.

Die richtige Lösung wird eine zweckmäßige Verbindung beider zum Schutz des Waldes sein, wobei die beiderseitigen Vorzüge möglichst benützt, die Nachteile vermieden werden; dabei werden wir unser Ziel am vollkommensten erreichen, wenn wir die Deckungseinheit, den Bestand, möglichst klein wählen und nur nach einer Richtung decken, um der Schwerfälligkeit des Deckungsprinzips aus dem Wege zu gehen. Wie sich die Wirtschaft dieser Hilfsmittel in der räumlichen Ordnung bedient und wie sich die verschiedenen Verfahren der Raumordnung zu dem zuletzt aufgestellten Grundsatz verhalten, wird an anderem Ort zu erörtern sein.

Fassen wir das Ergebnis der vorstehenden Betrachtungen zusammen, so wird unsere erste Forderung im Interesse des Sturmschutzes wohl auf Ungleichaltrigkeit lauten müssen. Doch wäre weiterhin zu erwägen, ob diese der gleichaltrigen Erziehung des Holzes gegenüber solche Vorteile in bezug auf Sturmsicherheit gewährt, daß sie als unbedingte Forderung des Forstschutzes bezeichnet werden kann, — was von Fürst (Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? S. 21), und zwar unseres Erachtens mit Recht bestritten wird —, oder ob die gleichaltrige Erziehung der Individuen in solcher Weise geordnet

werden kann, daß sie wenigstens ausreichenden Schutz gewährt; denn wir möchten der, wenn auch gefährdeteren Gleichaltrigkeit um so mehr das Wort reden, als wir ihr aus ökonomischen Gründen den Vorrang einräumen.

Daß ein ausreichender Schutz auch bei Gleichaltrigkeit möglich ist, das verbürgen uns die weiteren Sicherungsmittel, die wir kennen gelernt haben, und zwar nach innen: stufige Erziehung und Holzartenmischung, nach außen: Trauf- und Deckungsschutz; jedenfalls aber glauben wir, daß das größere Sturmwarnis der Gleichaltrigkeit durch deren ökonomische Vorteile weit aufgewogen wird, und daß die Wirtschaft dasselbe ohne weiteres auf sich nehmen kann.

IV. Die Betriebsformen und der Sturm.

(Eine Zusammenstellung von Äußerungen in der Literatur über diesen Gegenstand gibt Bargmann Allg. F. u. Jagd Ztg. 1904 S. 161.)

Für eine Beurteilung der Betriebsformen in bezug auf Sturmsicherheit wird die Art der Bestandeszusammensetzung entscheidend sein, zu der sie führen und zwar:

Die Verteilung der Altersklassen über die Fläche und damit die Art der Verjüngung,

die Verteilung der Holzarten, die Bildung reiner oder gemischter Bestände.

Bei Betriebsformen im besonderen, die sich gleichaltriger Bestockung bedienen, bei denen also volle Standfestigkeit der Individuen ausgeschlossen ist, können die weiteren Sturmschutzmittel: Bestandesschluß, Traufbildung und Deckung ihre volle Wirkung nicht dauernd bewahren, besonders nicht während der Zeit der Verjüngung. Durch letztere wird der Bestand früher oder später teils im Innern geschwächt infolge der Verminderung des Schlusses bei Lichtung des Kronendachs, teils wird nach außen hin infolge der Wegnahme des Traufs der Traufschutz, oder durch Abtrieb von Beständen und Bestandes teilen der Deckungsschutz beeinträchtigt.

Die Art und Weise, wie dies alles geschieht, ist eben durch die einzelne Betriebsform gegeben, und wir können im Hinblick auf Sturmsicherung zunächst zwei Gruppen bilden und einander gegenüberstellen:

die Betriebsformen mit ungleichwüchsiger Bestockung,

die Betriebsformen mit gleichwüchsiger Bestockung.

Die ersteren arbeiten teils mit mehr oder weniger freiständig, teils mit geschlossen erwachsenen Individuen, die letzteren innerhalb der Bestände nur mit Individuen der letztgenannten Art.

A. Die Betriebsformen mit ungleichwüchsiger Bestockung.

Sie stützen sich in ihrem inneren Aufbau auf die Standfestigkeit mehr oder weniger zahlreicher, freiständig erwachsener Individuen, gewissermaßen auf Traufschutz im Innern.

Dieses Mittel wirkt nach allen Seiten gleichmäßig, es ist ohne Zweifel das beste, und deshalb tritt auch bei dieser inneren Festigung der Schutz nach außen an Bedeutung mehr zurück.

Diese Betriebsformen lassen somit geringe Sturmgefahr erwarten, um so geringere, je stärker die Ungleichaltrigkeit ausgebildet ist. Diese Eigenschaft wird aber noch dadurch verstärkt, daß diese Formen der Ort erleichterter Holzartenmischung sind, denn diese letztere wirkt in gleicher Richtung günstig. Ebenso können wir bei ihnen auf ein hohes Maß wirtschaftlicher Freiheit und Unabhängigkeit schließen. Die typische Form ist die Blenderform, die wir allein hier betrachten. Ihr dürften mehr oder weniger nahestehen: die Blenderschlagformen des badischen Schwarzwalds, der französischen Vogesen und der Schweiz.

Der Blenderbetrieb besitzt ohne Zweifel in der, durch gruppen- und horstweise Verjüngung gegebenen, ungleichaltrigen Erziehung kleinster Einheiten das wirksamste Schutzmittel gegen Sturm, solange und soweit diese Ungleichaltrigkeit durch die Form, die dem Betrieb gegeben wird, dauernd in Wirksamkeit bleibt. Hier bilden die verhältnismäßig zahlreichen Randstämme der Gruppen und Horste zusammen mit den freiständig erwachsenen Einzelstämmen ein schutzverbürgendes Gerippe des Bestandes. Der Blenderwald hat den Vorteil, nach allen Seiten in gleicher Weise gesichert zu sein. Mag auch örtliche Lockerung und Freistellung der auch hier zahlreich vorhandenen nicht standfesten Individuen unvermeidlich sein und Eingriffe des Sturms zur Folge haben, so wirft dieser zwar Stämme, aber er ist nicht in der Lage, irgend erheblichen Schaden zu stiften, denn seine Wirksamkeit bleibt örtlich beschränkt und er ist insbesondere nicht fähig, eine Störung der räumlichen Ordnung mit ihren schädlichen Folgen zu bewirken. Beim typischen Reichtum an Individuen im Blenderwald werden in der Regel die fallenden Stämme sofort durch schon vorhandene jüngere Individuen ersetzt, die Lücken schließen sich alsbald wieder. Dazu kommt der vorteilhafte Einfluß der Holzartenmischung, die hier so recht ihre Heimat hat. Günstig wirkt hier endlich die Unebenheit des Bestandesdachs, welche die Bewegung der unmittelbar über den Kronen hinstreichenden Luft bedeutend hemmt und so der Entwicklung großer Geschwindigkeiten entgegenarbeitet (vgl. Bargmann l. c. S. 164).

Wenn wir nur die Sturmgefahr als maßgebend betrachten, so ist ohne Zweifel die Blenderform als die beste zu bezeichnen.

B. Die Betriebsformen mit gleichwüchsiger Bestockung.

Ein Uebergangsglied zu den Betriebsformen mit gleichwüchsiger Bestockung, die unsere meisten „Schlagbetriebe“ umfassen, bildet der Blenderschlagbetrieb.

Wir wollen jedoch zunächst die Schlagbetriebe einer allgemeinen Betrachtung unterziehen.

Sie führen alle mehr oder weniger zu gleichwüchsiger Erziehung des

Holzes und entbehren somit der Selbständigkeit und Standfestigkeit zahlreicher Einzelindividuen im Innern der „Bestände“, der typischen Einheiten jeder Schlagwirtschaft. Sie sind nach außen auf Deckungsschutz und daher bestimmte Hiebsfolge, nach innen auf die in der Geschlossenheit liegende Sicherung angewiesen, weshalb ihre Mängel hauptsächlich im Verjüngungsstadium hervortreten. Denn bei Naturverjüngung kann der Schlußstand im Innern nicht aufrecht erhalten werden, während auch nach außen hin Trauf- und Deckungsschutz nur nach einer Seite bestehen bleiben; überdies erfolgen diese Schwächungen des Bestandesaufbaus am alten, hiebsreifen Holz, wo sie am schärfsten wirken. Dazu kommt noch die Erschwerung der Holzartenmischung, die Neigung zu reiner Bestockung, die den Schlagbetrieben eigen ist, alles Momente, die auf gesteigerte Sturmgefahr hinweisen und die umso schärfer wirken, je größer die gleichaltrige Fläche ist und auf je ausgedehnterer Fläche demgemäß die Verjüngung sich gleichzeitig vollzieht.

Um klar zu sehen, zerlegen wir zunächst die Betriebsformen, wie schon im ersten Abschnitt geschah, in ihre Elemente: Hiebsart und Schlagform, und betrachten zunächst:

Die Hiebsarten.

Der Kahlhieb entfernt geschlossene Bestandesteile vollkommen, ohne sie zuvor zu lockern und damit gesteigerter Sturmgefahr auszusetzen. Diese ist daher hier nur gegeben durch die örtliche Unsicherheit, die dem Schlußstand allgemein eigen ist, und durch die Einseitigkeit des Deckungsschutzes, da die Kahlhiebe den Bestand notwendig nach einer Seite seines Traufs berauben müssen.

Der Schirmhieb beraubt alles Bestandesmaterial durch gleichmäßige Lockerung seiner seitlichen Stützen, und zwar in einem mit dem Fortschritt der Verjüngung steigenden Maße, wodurch höchste Sturmgefahr erzeugt wird.

Der Blenderhieb raubt die seitlichen Stützen stets nur einem Teil der Individuen gleichzeitig und erhält daneben grundsätzlich geschlossene Teile, bei denen die gelockerten und freigestellten teilweise Anlehnung oder Deckung finden. In gleichem Sinne wirken, in gewissem Maß wenigstens, einerseits die Ungleichaltrigkeit nach Art der reinen Blenderform und andererseits der vielfach vertretene, weil begünstigte Mischwuchs.

Im einzelnen wirken nun diese Hiebsarten wiederum verschieden, je nach der Schlagform, in der sie angewendet werden.

Die Schlagformen.

Die Großflächenform wirkt ungünstig, weil jede Schwächung durch Lockern des Kronendachs für eine weite Umgebung Gefahr bringt. Dem örtlich einbrechenden Sturm ist ein weites Feld der Tätigkeit innerhalb eines ausgedehnten, in seinem Gefüge geschwächten Bestandes geboten. Zudem erzeugt

diese Form große gleichaltrige Bestände, deren ebenes Kronendach wenig zur Verminderung der Luftgeschwindigkeit beiträgt. Wo der Sturm aus früher erörterten Gründen einbricht, findet er weite Flächen auch für spätere Angriffe. Dazu wird hier durch Sturmschaden die räumliche Ordnung in empfindlicher Weise gestört und fordert meist auch noch in fernerer Zukunft Opfer.

Als Milderung dieser Nachteile kann bezeichnet werden, daß eine Freistellung des Bestandesinnern nach außen nicht unbedingt erforderlich ist, der Trauf kann bis zum Schluß der Verjüngung ringsum erhalten bleiben.

Bei der Streifenform ist ein teilweise wirkender Deckungsschutz durch den geschlossenen Bestandeteil von einer Seite her möglich, auch werden Einbrüche des Sturms, wo sie im Verjüngungsstadium erfolgen, auf kleinere Flächen beschränkt und haben keine weitere Störung der räumlichen Ordnung zur Folge. Dagegen bedingt diese Form eine Bloßstellung des Bestandesinnern nach einer Seite, derjenigen, von der aus der Eingriff in den Bestand erfolgte.

Bei der Saumform endlich ist voller Deckungsschutz nach der einen Seite möglich, der durch Schirm- oder Blenderhieb gelockerte Saum genießt die volle Deckung des geschlossenen Bestands; nach der andern Seite dagegen ist der des Traufs beraubte Bestand wie bei der Streifenform dem Wind preisgegeben, wobei jedoch das geschlossene Bestandesinnere vor irgend erheblicher Ausdehnung des Schadens sichert.

Bei den beiden letzteren Formen entscheidet über die Sturmgefahr ausschließlich der Grad der Wahrscheinlichkeit, daß der offene Schlagrand durch einen von rückwärts kommenden Sturm unter größerem Winkel getroffen wird und der ist ja abhängig von der Himmelsrichtung, nach welcher der Schlagrand offen steht. Von der gedeckten Seite dagegen hat insbesondere die Saumform kaum etwas zu befürchten; in keinem Fall aber wird bei der Saumform die räumliche Ordnung in irgend erheblicher Weise gestört.

Betrachten wir nun die einzelnen Betriebsformen nach der gebräuchlichen Scheidung, so zeigt:

1. Der Kahlschlagbetrieb verhältnismäßig geringe Sturmgefahr. Seine Gefährdung liegt in der Gleichaltrigkeit auf großer Fläche und dem Umstand, daß er in der Regel reine Bestände erzeugt und dieselben bei der Ernte von einer Seite her angreift. Dagegen vermeidet er jede Kronenlockerung. Dieser Vorzug wird denn auch vielfach hervorgehoben, wo es sich darum handelt, den Kahlschlagbetrieb für die meistgefährdete Fichte zu empfehlen und zu begründen (vgl. z. B. Stötzer, Festschrift . . . S. 60).

Von unserem Standpunkt aus kommt aber der Kahlschlagbetrieb als berechnete Wirtschaftsform nicht in Frage.

2. Der Schirmschlagbetrieb. Er verjüngt den gleichaltrigen Bestand durch plötzliche, gleichzeitige und gleichmäßige Kronenlockerung auf der ganzen Fläche und sucht auf diesem Wege auf großer Fläche gleichaltrige Bestände zu erzeugen. Er lockert eine bis zur Hiebsreife geschlossen, also

unter der Voraussetzung gegenseitiger seitlicher Stützung erwachsene Bestockung auf großer Fläche gleichmäßig, beraubt dadurch alle verbleibenden Individuen mit zunehmender Lichtung mehr und mehr, bald rascher bald langsamer, aller seitlichen Stützen, und beschwört damit höchste Sturmgefahr für den Bestand herauf (vgl. z. B. Pilz, Forstl. Bl. 1882 S. 70). Der Bestand umfaßt während der ganzen Verjüngungsdauer nur freigestellte, je für sich wenig standfeste Stämme, und wo sich der Sturm erst den Weg ins Innere gebahnt hat, bietet sich keinerlei Halt mehr; deshalb ist hier Flächenwurf häufig. Dabei ist zu bedenken, daß sich in diesem labilen Zustand in der Regel 20% und mehr der gesamten Betriebsfläche befinden (100jähriger Umtrieb und 20jährige Verjüngungsdauer vorausgesetzt).

Es gilt denn auch diese Betriebsform allgemein als sehr sturmgefährdet, selbst bei den an sich weniger gefährdeten Holzarten, wie Buche und Kiefer (Pilz, Allg. F. u. Jztg. 1903), für die meistgefährdete Fichte aber ist sie von der Praxis längst als unanwendbar zurückgewiesen. Vgl. u. a. die im ersten Abschnitt wörtlich zitierten württ. Wirtschaftsregeln von 1864, ferner: Ney, auf der deutschen Forstvers. zu Wildbad 1880, Ber. S. 95, Eßlinger und Huber auf der deutschen Forstvers. zu Regensburg 1901.

Dieses Verhalten des Schirmschlags scheint uns auch die heute noch in der Praxis vielfach vorhandene übermäßige Furcht vor Sturmschaden im Nadelwald zu verschulden, die sich z. B. in unbegründeter Aengstlichkeit bei Herstellung wirtschaftlich zweckmäßiger Aufhiebe äußert, so daß für solche leicht der richtige Zeitpunkt versäumt wird. Diese Aengstlichkeit ist unzweifelhaft die Frucht einer Schirmschlagwirtschaft auf großer Fläche, wie sie die Vergangenheit durch beinahe hundert Jahre beherrscht hat. Sie hat die Wirtschaft unfrei gemacht, denn diese wagt es heute noch kaum, die an sich notwendigsten Maßregeln zu ergreifen; und doch stellt auf der andern Seite sie selbst den gefährlichen Zustand durch ihre Hiebsführung eigentlich erst in diesem Maß her.

Aufhiebe z. B. sind unseres Erachtens nur gefährlich durchhauenen, spät und stark gelockerten Beständen gegenüber, oder, wo örtlich besonders ungünstige Umstände vorliegen. Verfasser hat im Lauf der letzten 18 Jahre eine sehr große Zahl solcher Aufhiebe im Nadelwald, vielfach unter ungünstigsten Verhältnissen, auch im alten Holze gemacht und wüßte doch keinen einzigen Fall zu nennen, wo im rückliegenden geschlossenen Bestand irgend welcher Sturmschaden entstanden wäre, obgleich in den umliegenden im Schirmschlag durchhauenen Beständen an reichlichem Sturmschaden kein Mangel war.

Ueber das Sturmwarnis — je nach den verschiedenen Arten des Vorgehens bei Verjüngung großer gleichaltriger Zusammenhänge — wird an anderem Ort zu sprechen sein.

3. Der Blenderschlagbetrieb. Er steht zwischen Blenderförm und Schirmschlagform und nähert sich in seinen Eigenschaften je nach Art der Durchbildung mehr der einen oder andern Form. Das Verfahren beschränkt sich darauf, das Kronendach an einzelnen Stellen zu lockern, und erhält den Schluß auf der übrigen Fläche so lange als möglich. Mit dem Fortschreiten

der Verjüngung und insbesondere gegen den Schluß derselben ist jedoch ein immer weitergehendes Eingreifen in die festen Bestandteile notwendig, bis schließlich die letzten Bestandesreste vollkommen freigestellt und durchlichtet, also großer Sturmgefahr ausgesetzt sind.

Die in der Jugend scharf hervortretende Ungleichaltrigkeit tritt im Lauf des Bestandeslebens mehr und mehr zurück, es sei denn, daß die Verjüngungsdauer eine sehr lange ist, so daß im kritischen Alter, d. h. zur Zeit der beginnenden Verjüngung die Wirkung der Ungleichaltrigkeit nur noch in beschränktem Maß zur Geltung kommt (vgl. die Aufrisse im 1. Abschnitt). Diese Abschwächung ist eine um so stärkere, je rascher die Verjüngung d. h. je kürzer der „allgemeine“ Verjüngungszeitraum; auch trägt eine intensive Wirtschaft viel zu derselben bei: durch ihre Sorge für gleichmäßige Abstufung der Horste, Vermeiden aller Steilränder und Entfernen der astigen Stämme im Interesse der Nutzholzerzeugung.

Daher besitzt bei ökonomischem Vorgehen der Blenderschlag wohl nicht diejenigen günstigen Verhältnisse dem Sturm gegenüber, die vielfach angenommen werden. Das bestätigen mehrere Äußerungen in der Literatur (Fürst l. c. S. 21, Eßlinger, Huber, Borggreve, Reuß auf der deutschen Forstvers. zu Regensburg 1901, Ber. S. 106 . . ., Stötzer, Festschrift . . . S. 58).

Für den bayrischen Blenderschlagbetrieb anerkennt Huber (l. c. S. 151) ausdrücklich die Sturmgefahr und betont, daß an windgefährdeten Stellen diese Hiebsart nicht angewendet werde.

Trotzdem hat Gayer (Gemischter Wald S. 96), wenn er dem Einwand gesteigerter Windgefahr widerspricht, ohne Zweifel vollkommen recht im Hinblick auf denjenigen Gegner, gegen den er sich wendet, den Schirmschlag, da diese damals herrschende Betriebsform, die er durch den Blenderschlag ersetzt wissen will, in ungleich höherem Maß den Wald gefährdet. Jedenfalls ist Gayers Widerspruch berechtigt vom Standpunkt des in Bayern geltenden Grundsatzes aus: Die Bestandespartieen zwischen den Löchern geschlossen zu halten, der sehr zur Erhöhung der Sturmsicherheit beiträgt und diese Betriebsform hoch über den Schirmschlag stellt (vgl. Pilz, Vers. des els.-lothr. Forstvereins zu Colmar 1899 Ber. S. 25).

Wir möchten auch aus diesem Grunde dem bayrischen Verfahren den Vorzug vor dem im badischen Schwarzwald, den französischen Vogesen und der Schweiz üblichen geben (vgl. dagegen Engler, „Aus Theorie und Praxis der Femelschlagwirtschaft“ in der Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen 1905), das der örtlichen Ausformung von Gruppen und Horsten einen allgemeinen Durchhieb (Schirmhieb) des Bestandes vorausgehen läßt, sofern dieser Durchhieb über das Maß einer guten Durchforstung hinausgeht, — ein Nachteil, der übrigens bei diesen Verfahren wohl durch den langen Verjüngungszeitraum und die dem Blenderbetrieb sich nähernde Hiebsweise voll ausgeglichen wird, der aber bei gleichwüchsiger Erziehung und kürzerem Verjüngungszeitraum gefahrsteigernd wirken müßte. Der Vorzug des bayrischen Verfahrens liegt darin, daß sich die gelockerten und freigestellten Teile in der Deckung der noch voll-

kommen geschlossen befinden, und daß sich die freigestellten Ränder geschlossen dem Wind entgegenstellen, während jede gleichmäßige Lockerung dieses günstige Verhalten beeinträchtigen muß. Im übrigen ist die Steigerung der anfangs geringen Sturmgefahr im Laufe der Verjüngung durch Freistellen von Rändern gegen Westen und Süden, wie durch das Uebrigbleiben bandförmiger Nachhiebsreste zwischen den verjüngten Flächen in beiden Fällen dieselbe.

Weiterhin läßt sich die Anwendbarkeit des Blenderschlagbetriebs mit Bezug auf die Sturmgefahr nur beurteilen auf Grund der besondern Verhältnisse: der Holzart, der Beschaffenheit von Boden und Klima, des eingehaltenen Verjüngungszeitraums und der Art der Hiebsführung.

Bei reiner Fichte z. B. ist diese Betriebsform wohl in den allermeisten Fällen ausgeschlossen; jedenfalls gilt dies für lockeren flachgründigen Boden und feuchtes Klima, wie für kurzen Verjüngungszeitraum. Dagegen trägt der Umstand, daß sie Holzartenmischung besonders begünstigt (Gayer, Der gemischte Wald und an anderem Ort) zur Hebung der Standfestigkeit bei.

Endlich ist darauf hinzuweisen, daß sich der Wald, bei Anwendung des Blenderschlags, dem Sturm gegenüber nur dann normal, d. h. so, wie besprochen, verhalten kann, wenn der einzelne Mutterbestand aus derselben Betriebsform hervorgegangen ist, also aus Mischung älterer und jüngerer Gruppen und Horste besteht, so daß die jüngeren Gruppen noch eher befähigt sind, sich zu halten und sich während der Nutzung der älteren an Freistellung zu gewöhnen. Ist dagegen der Mutterbestand gleichaltrig, — handelt es sich also, wie vielfach, um Uebergang aus gleichaltrigem Großflächenbetrieb zum Blenderschlag —, so steigt die Sturmgefahr ohne Zweifel ganz bedeutend (vgl. Stötzer l. c. S. 59). Ein Uebergang aus gleichaltrigem Hochwald in Blenderschlag, der heute in der Praxis vorwiegend in Betracht käme, wäre somit durch große Sturmgefahr gekennzeichnet; daher auch meist, wenigstens außerhalb Bayerns, die Einwendungen gegen diese Betriebsform.

Fassen wir unser Urteil über den Blenderschlag zusammen, so ist diese Form nicht als allgemein anwendbar zu bezeichnen. Sie ist um so sicherer, je sturmfester die Holzart — sie eignet sich für Tanne und Buche, nicht aber oder nur in Ausnahmefällen für Fichte — je trockener und tiefgründiger der Boden, je geschützter die Lage, je ungleichaltriger der Mutterbestand, je schattenertagender die Holzart und je länger dementsprechend die allgemeine Verjüngungsdauer. Die Sturmgefahr ist zwar nicht so groß, wie bei Schirmschlag, da sie durch die geschlossenen Zwischenpartien während des überwiegenden Teils der Verjüngungszeit vermindert wird (Wappes Zentralbl. für das ges. Forstw. 1904 S. 394), sie ist aber trotzdem immer noch auf vielen Standorten erheblich.

4. Der Saumschlag. Der Saumschlag greift den Bestand stets seitlich an, dringt dagegen nicht oder nur wenig in den Schluß des Kronendachs des verbleibenden Teils ein, beschränkt sich vielmehr im Gegensatz zu den ausgedehnten Schlußunterbrechungen bei Schirm- und Blenderschlagbetrieb, wo er solche nicht vollständig vermeidet und sich des Kahlhiebs bedient, bei der Lockerung des geschlossenen Kronendachs grundsätzlich auf schmale Bän-

der, die in bestimmter Richtung mehr oder weniger langsam über die Fläche fortschreiten. So entsteht ein in dieser Richtung abgestuftes Kronendach.

Diese Art der Hiebsführung beraubt den geschlossenen Bestand stets nach einer Seite hin seiner natürlichen Schutzwehr und gewährt hier weder Trauf- noch Deckungsschutz, sondern stellt die Randindividuen nach dieser Richtung vollkommen ungeschützt frei, ja sie schwächt den Bestandesrand, wo sie sich des Schirm- oder Blenderhiebs bedient, noch weiterhin durch Lockerung des Kronendachs im Randstreifen, allerdings in der Regel nur auf geringe Tiefe.

Wenn so der Saumschlag nach einer Seite in bezug auf Sturm- schutz versagt, so schafft er nach der andern Seite um so bessere Gewähr für Sicherheit, denn einmal bleibt fast der ganze Bestand dauernd geschlossen, während der schmale gelichtete Streifen am Rand nach dieser Seite mehr oder weniger vollkommen im Bereich seines Deckungs- schutzes liegt; und dann wird durch das ansteigende Kronendach der Wind- druck vermindert und durch die Altersabstufung jede Steigerung der Gefahr, wie sie Gleichaltrigkeit erzeugt, verhütet. Fehlt somit dem Saumschlag ein sicherer Schutz nach der einen Seite, so besitzt er dafür nach der anderen dauernd die denkbar beste Wappnung gegen Sturmgefahr; es wird also in der Regel nur da, wo ein Sturm von der offenen Seite des Schlagrands her in diesen einbricht, wenn auch nicht immer Schaden, so doch Windwurf eintreten. Doch dürfte der Einbruch nur in dem Fall einen größeren Umfang annehmen, wenn schwerer Sturm den Schlagrand von rückwärts unter größerem Winkel trifft, denn auch bei rückwärtigem Einbruch wird das Anlehnen der Stämme an den geschlossenen Bestand dem Rand noch eine gewisse Widerstandskraft verleihen.

Wollte die Betriebsform als vollkommen sturmsicher bezeichnet werden, so müßte einmal vorausgesetzt werden können, daß am einzelnen Ort alle gefahrdrohenden Stürme aus einer Hälfte der Windrose kommen und müßten ferner alle Hiebe grundsätzlich nur dieser Seite entgegengeführt werden.

Was die erste Voraussetzung betrifft, so haben wir oben gesehen, daß sie nicht vollkommen zutrifft, da in der Tat Stürme aus fast allen Himmels- richtungen kommen können, es schlosse somit auch der Saumschlag stets einen gewissen Grad von Sturmgefahr in sich, selbst dann, wenn die Hiebsrichtung ganz ausschließlich mit Rücksicht auf diese Gefahr gewählt würde.

Aber auch dies ist weder immer wirtschaftlich wünschenswert, noch überhaupt unter allen Umständen möglich. Wir haben schon im 1. Abschnitt Forderungen des Waldbaues kennen gelernt, die sich auf die Hiebsrichtung beziehen und werden noch im 3. Abschnitt solche aufzustellen haben, die von denjenigen des Sturm- schutzes mehr oder weniger abweichen können. Nach heutiger Praxis allerdings gibt die Sturmgefahr fast allein den Ausschlag.

Ist sonach bei Saumschlag der Schlagrand gegen Sturmangriff nicht voll- kommen gesichert, so ist doch die Gefahr nicht groß, kaum größer als bei Kahlschlag:

1. weil es tatsächlich fast an jedem Waldort eine Seite des Bestandes gibt, auf der ein Sturmeinbruch von rückwärts unter großem Winkel kaum zu erwarten ist,

2. weil der Bestand — mit Ausnahme des Saums — immer geschlossen bleibt, sich also des natürlichen guten Schutzes bedient, den der Bestandesschluß gewährt. Von der einzelnen Bestandesfläche (und damit von der ganzen Waldfläche) befindet sich stets nur ein prozentisch kleinster Flächenanteil in dem labilen Zustand der Lichtung. Damit wird der Sturm unter normalen Verhältnissen nie in der Lage sein, in dem Bestand weit vorzudringen,

3. weil auch bei Anfall von Holzmassen doch nie eine Störung der räumlichen Ordnung zu fürchten ist. Nur in Ausnahmefällen nimmt der Schaden durch Stürme, die von der Rückseite einfallen, örtlich größeren Umfang an. Immer fällt auch dann ausschließlich dasjenige haubare Holz, das zu allernächst zur Nutzung gekommen wäre.

Es gilt denn auch der Saumschlag allgemein als sehr wenig gefährdet, unter der Voraussetzung allerdings, daß nur der Sturm die Hiebsrichtung bestimmt.

So hebt Stötzer mehrfach (Allg. F. u. J. Ztg. 1874 S. 188 und Festschrift . . . 1905) besonders hervor, wie sehr sich der Saumschlag gegen Sturm bewährt habe, und Braza schildert und empfiehlt (Deutsche Forstvers. zu Cassel 1890, Ber. S. 24) ein dem Blendersaumschlag ähnliches Verfahren allmählichen Vorrückens des Blenderhiebs in „speziellen Hiebszügen“ über die Fläche gerade für dem „Wind opponierte Oertlichkeiten“ (Saumfemelschläge); ebenso empfehlen Huber und Eßlinger (Regensburger Vers. 1901) Saumschläge an windgefährdeten Orten.

Eine Würdigung des Saumschlags ist somit an die Wahl der Hiebsrichtung gebunden und da diese nach unseren früheren Ausführungen in jedem einzelnen Fall auf der Grundlage örtlicher Beobachtungen festzustellen wäre, so ist auch ein endgültiges Urteil über die Sturmgefahr beim Saumschlag nur zu fällen auf Grund der am einzelnen Ort gewählten Hiebsrichtung.

Von ihr muß gefordert werden: daß die Seite, nach welcher der Hieb fortschreitet, alle meistgefährdenden Richtungen einschließt, so daß der offene Rand nach der mindestgefährdeten Seite weist.

Sehen wir von örtlichen Besonderheiten ab, so hat die Praxis längst als meistgefährdete Himmelsrichtung, gegen die der Wald unter allen Umständen geschützt werden muß, die Westrichtung (SW bis NW) festgestellt (vgl. z. B. Borggreve, Forstabschätzung S. 283, Stötzer, Festschrift . . . S. 51), denn aus dieser Richtung kommt nicht allein die überwiegende Mehrzahl der schweren Stürme, sondern dorthier stammen auch fast sämtliche schwächeren Stürme des Winterhalbjahrs und der Gewitter, mit denen die Praxis infolge ihrer Häufigkeit in erster Linie rechnen muß, schon deshalb, weil sie sich gegen diese Stürme voll sichern kann.

Die Forstwirtschaft führt dem entsprechend heute ihre Saumschläge, ihre

Streifenkahlschläge und ihre streifenweisen Räumungen der Nachhiebsreste von Schirm- und Blenderschlägen — und sie liebt solche saumartigen Hiebe — stets gegen W und SW, und zwar für gewöhnlich ohne irgend wesentlichen Schaden auf der Rückseite. Ebenso betrachtet die Forstwirtschaft die Lagerung der Altersklassen im gleichaltrigen Hochwald dann als normal, wenn ihr Alter von E nach W abnimmt.

Nun erhebt sich die Frage: Können wir diese allgemein anerkannten günstigen Eigenschaften des Saumschlags auch in Anspruch nehmen für die im 1. Abschnitt empfohlene Form des Blendersaumschlags?

Ihre besonderen Merkmale, die hier den Ausschlag geben, sind:

1. Die Nord-Südrichtung als normale Hiebsrichtung, von der ohne zwingende Gründe nicht gegen Westen abgewichen werden sollte.
2. Die grundsätzliche Lockerung des Bestandesrands.
3. Die in dem langsam stetigen Vorgehen begründete Anordnung der Altersklassen in langgezogenen Streifen und die Abdachung der Bestandeskrone in der Hiebsrichtung.

Was den ersten Punkt betrifft, so führt er zu der Frage, die beantwortet werden muß: Ist der offene Nordrand mehr gefährdet als der offene Ostrand?

Die Praxis hat sich, wie gezeigt, für den Ostrand als den am wenigsten gefährdeten entschieden und Borggreve und Stötzer heben die Gefährdung des Nordrands ausdrücklich hervor. Borggreve bezeichnet l. c. S. 288 die ganze westliche Hälfte der Windrose als sturmgefährdet einschließlich der reinen Nordrichtung, die östliche als mindergefährdet.

Wir möchten — vorbehaltlich einer Klärung der Frage durch eine einwandfreie Sturmstatistik — die Wahl der Ost-Westrichtung nach unseren persönlichen Beobachtungen nicht für die einzig mögliche halten — jedenfalls nicht für alle Windgebiete —, wenn auch zuzugeben ist, daß sie sich in ihrer Wirkung auf den Wald gerade bezüglich des Sturmschutzes durchaus bewährt hat.

Was uns veranlaßt, diese Frage neu aufzuwerfen, ist nicht das Bedürfnis nach Steigerung der Sturmsicherheit, sondern das Streben nach Verständigung mit andern Forderungen an die Hiebsrichtung; wir haben schon im 1. Abschnitt eine solche Forderung kennen gelernt, die gerade für den Saumschlag von entscheidender Bedeutung ist. Wir gehen dabei von dem Grundsatz aus, daß nicht der Sturmschutz allein es sein darf, der die Hiebsrichtung im Saumschlag bestimmt, sondern daß stets die Möglichkeit bestehen muß, auch noch andere produktive Momente bei der Wahl der Hiebsrichtung zu berücksichtigen. Wir müssen daher bei Betrachtung des Sturms mehrere Möglichkeiten ins Auge fassen und gelangen so zu der Frage: Gibt es außer der Ost-Westrichtung nicht noch eine andere, die, wenn

sie auch jene Richtung an Sicherheit nicht übertrifft, doch ausreichende Sicherheit gewährt?

Wir möchten diese Frage mit der schon oben angedeuteten Einschränkung bezüglich örtlicher Abweichungen bejahen und als eine solche Richtung die Nordsüdrichtung bezeichnen.

Der Nordrand scheint dem Verfasser nach seinen bisherigen Wahrnehmungen wirtschaftlich genügende Sicherheit zu bieten, wenigstens ließ sich in nunmehr 15jähriger Beobachtung eine irgend erhebliche Krafteinwirkung des Sturms auf Nordränder nicht feststellen, — weder waren dort je irgend erhebliche Sturmfälle zu beobachten, noch wies das Aussehen der Bestandesränder auf solche Einwirkung in der Vergangenheit hin. Selbstverständlich umfassen diese Beobachtungen ein sehr beschränktes Gebiet, und sind, wie alle Feststellungen, die wir heute in bezug auf Sturm machen können, mehr oder weniger bestimmte Vermutungen, die ihre volle Prüfung nur durch die heute noch fehlende Statistik finden können.

Eine Sturmstatistik, die über die Gefährdung des reinen Nordrands aufklären könnte, wird in gewissem Maße ersetzt durch den Befund im Walde.

Mehr als nach allen anderen Seiten (Ost- und Nordost natürlich ausgenommen) hat die Wirtschaft in der Vergangenheit Ränder gegen Norden zu ohne Trauf freigestellt. Während nun die E, SE und S-ränder unverkennbar durch die Sonne, die SW, W und NW-ränder ebenso durch die Weststürme zu leiden haben und dies in ihrem Aussehen klar erkennen lassen, hat Verfasser nirgends, auch nicht im Fichtenwald, reine Nordränder finden können, die Spuren irgend welcher Art von früherer Sturmeinwirkung aufgewiesen hätten, wie solche ja z. B. schon bei leichter Wendung des Nordrands gegen Westen (NW-rand) so sehr in die Augen fallen. Dabei ist es der Wirtschaft, wenigstens in Süddeutschland, nie eingefallen, auf der Nordseite etwas zur Sicherung des Traufs zu tun. Es dürfte daher nur höchst selten vorkommen, daß der Nordrand durch Schaden bringende Stürme heimgesucht wird.

Doch weisen auch allgemeine Betrachtungen auf die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Ansicht hin.

Am meisten, — fast alljährlich, gefährden Winterstürme, wie auch Gewitterstürme, die aus SW und W wehen, den Wald. Diese Stürme scheinen nicht selten in Norddeutschland, aber auch unter bestimmten Verhältnissen — vielleicht örtlich — in Süddeutschland (vgl. Eifert l. c.) in NW überzugehen.

Wenn die Beobachtungen des Verfassers mit den Ansichten Borggreves und auch Stötzers nicht in Einklang stehen, weil diese Autoren der NW-Richtung eine viel größere Bedeutung beimessen, so erklärt sich dies wohl daraus, daß dieselben die norddeutschen Windgebiete im Auge haben, der Verfasser aber das süddeutsche.

Wenn es nämlich richtig ist, daß die hier in Betracht kommenden Luftströmungen, die aus Süden stammen, dadurch nach Osten abgelenkt erscheinen, daß sie aus Orten größerer in solche geringerer Umdrehungsgeschwindigkeit kommen, so ist auch anzunehmen, daß sie um so mehr abgelenkt erscheinen

werden, je weiter sie nach Norden vordringen, es müßten also Winde, die in Süddeutschland aus SW und W wehen, in Norddeutschland eine weitere Drehung gegen E angenommen haben und dort aus W und NW kommen. Dies scheint auch, wenn wir alle Luftströmungen betrachten, tatsächlich der Fall zu sein, und so dürfte es auch für die Stürme gelten. Nach Supans oben (S. 184) mitgeteilter Statistik ergeben sich nämlich aus dem Durchschnitt mehrerer Jahrzehnte folgende prozentischen Anteile der Himmelsrichtungen für die am meisten auseinandergehenden Windgebiete Deutschlands:

1. Mittel- und Oberrhein	27,1 % SW	10,2 % W	7,3 % NW.
2. Nordostdeutschland	14,7 „ „	20 „ „	15,1 „ „.

Auch Bargmanns Zusammenstellung weist darauf hin. Jedenfalls kann für Süddeutschland unseres Erachtens die NWrichtung keine entscheidende Bedeutung haben.

In zweiter Linie kommen die Oststürme in Betracht: NE, E und SE¹⁾. Dieselben sind seltener und beschränken sich, wie gezeigt wurde, meist auf bestimmte Oertlichkeiten, können aber trotzdem gefährlich werden. Bargmanns Zusammenstellung verzeichnet schwere Sturmschäden aus diesen Richtungen in Schwarzwald und Vogesen, wie in Erzgebirge und Harz.

So droht also Gefahr, wenn auch in ungleichem Grade von zwei entgegengesetzten Seiten: West und Ost; wollen wir beiden zugleich entrinnen, so kann dies nur durch Hieb von Norden her geschehen. Halten wir daher alle Möglichkeiten zusammen, so werden wir dem offenen Nordrand, an dem sowohl Ost- wie Weststürme ohne Schaden entlangstreichen (über solches Entlangstreichen vgl. Augst l. c. S. 9), — für Süddeutschland jedenfalls — kaum irgend wesentlich größere Gefährdung zuschreiben können, als dem Ostrand, denn dieselbe Möglichkeit, die am Nordrand besteht, es könnten Stürme von NW her schräg einbrechen, droht am Ostrand von dem mehr oder weniger senkrecht auf den Schlagrand treffenden Oststurm.

Sicher ist der Unterschied überall da gering, wo der NW nicht ganz besonders zu fürchten ist, und bleibt der Nordsüdrichtung der Vorzug vor allen andern Hiebsrichtungen, daß sie Ost- und Weststurm gleichzeitig abhält²⁾ und daß sie gegen Süden voll deckt. Stellen wir an der Hand von Supans Statistik fest (vgl. die Zusammenstellung S. 184), wie viele Winde insgesamt den offenen Nordrand und wie viele den Ostrand treffen, so kommen wir für beide bei allen Windgebieten Deutschlands etwa zu demselben Ergebnis: beide werden etwa gleich häufig getroffen, der Nordrand in den meisten norddeutschen Gebieten etwas mehr, der Ostrand dagegen häufiger in Süddeutschland.

1) Vgl. Augst, Allg. F. u. J.Ztg. 1902 bzgl. des sächsischen Erzgebirgs.

2) In diesem Sinne schreibt Herr Forstrat Wachtel-Neuhaus, der seit Jahrzehnten mit Nordhieben arbeitet dem Verfasser: „Wenn man berücksichtigt, daß hier, wie auch in anderen Gegenden Böhmens der Ostwind ebenso gefährlich wie der Westwind sich äußert, — dagegen an der gegen Norden gestellten Wand beide Luftströmungen, ohne zu schädigen, vorüberstreichen —, so ist dies gewiß geradeso ein wesentlicher Vorzug, wie derjenige, der darin besteht, daß die sich lagernden Novembernebel durchfluten können, ohne sich an den Wänden zu lagern, um dann Rauhreif zu verursachen.“ (Vgl. S. 178).

Wenn übrigens hier einer nordsüdlichen Hiebsführung das Wort geredet wird, im Gegensatz zu der heute üblichen ostwestlichen, so soll jene nicht — wie dies heute mit der ostwestlichen leider geschieht — ohne Wahl überall angewendet werden, sondern sie soll **nur die Grundlage bilden**, von der nicht ohne zwingende Gründe abgewichen werden darf. Ein Hindernis, das neben anderen, später zu besprechenden, unbedingte Berücksichtigung erheischt, ist das Auftreten nördlicher Stürme (NW und NE), sei es nach den allgemeinen Verhältnissen des betreffenden Windgebiets oder infolge ständiger örtlicher Ablenkung. Solche Abweichungen sind zunächst im einzelnen Fall durch sorgfältige Beobachtungen festzustellen und sind dann ohne Zweifel geeignet, die Hiebsführung örtlich zu beeinflussen.

Aber auch an Orten, wo nicht selten Stürme von Norden her zu erwarten sind, gibt es noch sehr zahlreiche Fälle nach Boden, Lage oder Holzart, in denen dem Wald trotzdem geringe Gefahr von dieser Seite her droht, also die Nordsüdrichtung beim Hieb eingehalten werden kann, so insbesondere ganz allgemein bei der Eiche und den meisten andern Laubhölzern, auf vielen Standorten auch bei Buche und Kiefer, und selbst bei den sturmgefährdetsten Holzarten auf geringem und trockenem Boden, wie in geschützter Lage.

Zum entgegengesetzten Vorschlag, d. h. zum Hieb von Süden nach Norden „in der Ebene und auf Plateaus“ gelangt Stötzner (Festschrift S. 65) im Bestreben, ebenfalls gleichzeitig West- und Oststürme, dann aber auch Nordstürme abzuhalten. Auch dieser Vorschlag zeigt wieder die größere Bedeutung nördlicher Stürme in Norddeutschland, aus süddeutschen Verhältnissen würde sich ein solcher Vorschlag nie und nirgends ergeben, denn hier herrscht der SWsturm vollkommen vor. Ferner ist dieser Vorschlag nicht auf der Grundlage des Saumschlags, sondern auf derjenigen der Großschlagwirtschaft mit künstlicher Verjüngung gemacht; unser Ziel der Verbindung von Saumschlag und sicherer Naturverjüngung wäre mit ihm keinesfalls in Einklang zu bringen.

Ein weiterer Punkt, der die Wirkung des Sturms im Blendersaumschlagbetrieb bestimmt, ist die grundsätzliche Lockerung des Bestandes. Bildet der offene Schlagrand an sich schon eine gewisse, wenn auch sehr geringe Gefahr, so wird diese naturgemäß sehr gesteigert durch Lockerung des Rands, indem die Stämme des Randstreifens gegenüber von Stürmen, die vom offenen Schlagrand her wehen, oder von der Seite kommen, der rückwärtigen Stützen entbehren und darum leichter geworfen werden. Uebrigens erstreckt sich die Gefahrsteigerung nur auf den an sich schmalen Verjüngungsstreifen, während der hinterliegende geschlossene Bestand die im Schlußstand liegenden günstigen Momente voll genießt. Da sich nun die mehr oder weniger weitgehende Lockerung des Schlagrands im Interesse der Naturverjüngung nicht umgehen läßt, müssen wir versuchen, der damit verbundenen Gefährdung auf andere Weise zu steuern. Im gemischten Wald, den wir anstreben und dem der Blendersaumschlag besonders günstig ist, steht uns ein Schutzmittel gegen Sturmeinbruch von rückwärts zu Gebot, das seine günstige

Wirkung nicht verfehlen dürfte, es ist dies ein möglichst langdauern- des Ueberhalten der sturmfesteren Holzarten am Bestandesrand, die so am äußersten Rand des Verjüngungstreifens gewissermaßen einen Schutzwall bilden. Die natürlichen Verhältnisse kommen auch hier wieder unsern wirtschaftlichen Bedürfnissen entgegen, insofern gerade diejenigen Holzarten, die wir aus waldbaulichen Gründen bis zuletzt überhalten, die Lichthölzer, auch diejenigen sind, die als die standfestesten bezeichnet werden können. An ihre Stelle kann im Bedarfsfall auch die Buche treten, die, soweit sie nicht Nutzholz liefert, ziemlich lange im Jungwuchs stehen bleiben kann, da sie keine Rückungsschäden verursacht.

Als Schutzmittel gegen Sturmschäden wirkt übrigens in diesem Fall die Holzartenmischung an sich schon mit, und wenn wir dazu noch stufige Bestandenserziehung treten lassen, so haben wir zusammen mit der besprochenen Rückendeckung dem Blendersaumschlag Waffen gegen den Sturm in die Hand gegeben, mit denen er seine einzige schwache Seite voll zu schützen vermag.

Die dritte Besonderheit des Blendersaumschlags dem gewöhnlichen Saumschlag gegenüber, die schmalstreifenförmige Anordnung der Altersklassen und die damit verbundene starke Kronenabdachung wirkt hier durchaus günstig und spricht für diese Betriebsform.

Die Streifen der einzelnen Altersklassen sind bei dem stetig-langsamem Vorrücken des Blendersaumschlags schmal. Da nun Sturmeinbrüche ins Innere des geschlossenen Bestands zumal bei stufiger Erziehung und Holzartenmischung fast ausschließlich nur die ältesten Altersklassen treffen, dort aber — zumal bei böigem Charakter des Sturms — an schwachen Stellen des Bestands nicht zu umgehen sind, so bietet diese Eigenschaft des Blendersaumschlags den unter solchen Umständen nicht geringen Vorteil, daß hier der Schaden am einzelnen

Fig. 54.

Ort nie groß sein kann, und daß insbesondere ein langwieriges Weitergreifen des Sturms im Bestand, wie es der Großfläche eigen ist, vermieden wird. Vergleiche hiezu N e y s „Schablonenwirtschaft im Walde“ S. 43, wo das Weiterfressen der Stürme im gleichaltrigen Wald geschildert und hervorgehoben wird, daß beim Saumschlag die Sturmflächen kleiner bleiben. Die entstandene Sturm-

lücke liegt in der Regel in der ältesten Altersklasse, also nicht weit vom Schlagrand entfernt, und die Angliederung der Kahlfläche an den vorhandenen Jungwuchs kann, wie die beigegebene Skizze (Fig. 54 auf S. 227) andeutet, hernach ohne Opfer und insbesondere ohne jede Störung der räumlichen Ordnung erfolgen. Die Angliederung erfolgt durch beschleunigte Verjüngung der Zwischenfläche und langsamen Saumhieb am südlichen Rand der Lücke; dieser sorgt für Abstufung nach vorwärts und nach der Seite, bis die Saumschläge nachgerückt sind.

Ebenso kann die stetige Kronenabdachung nur günstig wirken, da sie die Geschwindigkeit der von SW her über den Wald hinstreichenden Luft verringert und den Luftstrom nach oben drängt. Dadurch wird der Druck des Windes gerade auf die älteste meistgefährdete Altersklasse gemindert und Schaden verhütet, vgl. die Skizze, Fig. 55.

Fig. 55.

SW—NE-Aufriß eines vollkommen geordneten Blendersaumschlag-Bezirks.

Diese Betrachtungen zeigen, daß wir die günstigen Eigenschaften des Saumschlags in bezug auf Sturmsicherheit auch für unsere Betriebsform in Anspruch nehmen dürfen. Wir glauben ferner, daß sie den Vergleich mit allen andern Verfahren der Naturverjüngung, den reinen Blenderbetrieb vielleicht ausgenommen, ohne weiteres aushält, ja daß sie denselben überlegen ist — trotz der dem Nordrand vielleicht drohenden Gefahr —, weil sie trotz gleichwüchsiger Erziehung mit fast dauernd geschlossenem Kronendach arbeitet und dessen Lockerung auf das für Naturverjüngung denkbare Mindestmaß beschränkt, so daß es dem Sturm mehr als jedes andere Verfahren den Zutritt zum einzelnen, geschlossen erwachsenen Individuum verwehrt.

Betrachten wir ferner den Schaden. Der Blendersaumschlag hat nur die seltenen NW- und NEStürme zu fürchten, die allerdings den offenen Schlagrand, aber doch meist unter kleinem Winkel treffen; sie werfen, wo sie den Bestand angreifen nur haubares Holz und zwar in für die Abfuhr günstiger Richtung und stören dabei, was von besonderer Bedeutung ist, die räumliche Ordnung nicht (vgl. Borggreve, Forstabschätzung S. 288 zugunsten des Oststurms). Auch dringen sie nicht leicht tiefer in den Bestand ein, weil derselbe geschlossen ist und räumen zumeist schon besamte Flächen ab. Diese Stürme wirken also meist nur ungünstig

auf die E t a t s w i r t s c h a f t, eigentlichen Waldschaden bringen sie nicht oder doch nur in geringem Maß.

Verfasser glaubt daher diese kleine Gefahr den im 1. Abschnitt besprochenen Vorteilen gegenüber nicht schwer nehmen zu sollen; er hat auch, seit er Nordränder freistellt, an denselben noch keine Windfälle oder doch nur solche beobachten können, die sich durch vorgeschrittene Wurzelfäulnis erklären.

Ein u n g ü n s t i g e r U m s t a n d darf jedoch nicht verschwiegen werden, der den Blendersaumschlag trifft, das ist das E r f o r d e r n i s einer möglichst großen Zahl von offenen Hiebsrändern. Dadurch ist ein, wenn auch vielleicht am einzelnen Ort geringer, so doch im ganzen großer Holzmassenanfall bedingt, sobald ein schwerer Sturm unter großem Winkel in die Schlagränder einbricht.

Dieser Nachteil wird mehrfach, unseres Erachtens mit Unrecht, gegen das „Zerreißen“ der Altersklassen überhaupt, gegen zahlreiche Aufhiebe zur Bildung kleiner Hiebszüge ins Feld geführt und würde in erhöhtem Maß den Blendersaumschlag treffen (B o r g g r e v e in seinen Ausführungen gegen „Zerreißung der Altersklassen“ Forstabschätzung S. 291 B a r g m a n n l. c. und Stötzer Allg. F. u. JZtg. 1904 S. 261). Uns scheint in solchem Fall immer die G e s a m t g e f a h r und damit der G e s a m t s c h a d e n maßgebend zu sein, und da muß der Vergleich bei gleicher Voraussetzung (Naturverjüngung) nach unsern früheren Ausführungen zu Ungunsten der Großflächenwirtschaft ausfallen. Die besprochene Gefahr weist uns nur um so dringender darauf hin, bei Wahl der Hiebsrichtung vorsichtig zu sein und auch sonst alle Mittel anzuwenden, die der Sturmgefahr vorbeugen können.

Ein Beispiel für den Einbruch des Sturms in offene Schlagränder bildet die von A u g s t (Allg. F. u. JZtg. 1902 S. 8) geschilderte Wirkung von Südoststürmen auf das sächsische Revier Olbernhau mit ostwestlicher Hiebsrichtung. A u g s t selbst führt l. c. S. 9 den Schaden in seinem Bezirk auf die richtige Quelle zurück, wenn er schreibt: „Auf Fehlern aufgebaut, wird selbst die Wohltat zur Plage, der Schaden würde nicht so groß sein, wenn auf Olbernhauer Revier eines der Ziele des sächsischen Forsteinrichtungsverfahrens, die Bildung möglichst vieler und kurzer Hiebszüge, nicht nahezu erreicht wäre“. Der F e h l e r, der zum Schaden führte, ist hier die falsche Hiebsrichtung, die — auf der Annahme einer Generalsturmrichtung aufgebaut — den ö r t l i c h e n Verhältnissen nicht Rechnung trug, die örtlich schädlichen Sturmrichtungen nicht kannte. Die mehrfachen Sturmschäden aus Südost weisen auf eine nord-südliche Hiebsrichtung hin, die der örtlichen südöstlichen, wie der allgemeinen westlichen Sturmrichtung in gleicher Weise gerecht würde. Das Beispiel weist also klar auf das dringende Bedürfnis der oben schon geforderten Sturmstatistik hin, ohne die eine erfolgreiche räumliche Ordnung im Sinne saum- oder streifenförmiger Verjüngung unmöglich ist.

Die Gefahr des Sturmeinbruchs von der Rückseite her wird auf ein Mindestmaß beschränkt, wenn die gefährlichen Sturmrichtungen vor Wahl der Hiebsrichtung genau festgestellt sind, und zwar, w o A b l e n k u n g e n z u

vermuten sind, für jede einzelne Oertlichkeit. Es wird dann weiter zu erwägen sein, ob nicht erforderlichenfalls ein gewisser Grad von Sturmgefahr im Interesse sicherer Naturverjüngung in Kauf genommen werden will.

Betrachten wir die Sturmverheerungen, die in den Gebieten der Naturverjüngung des Nadelholzes nach jetzigem Verfahren eintreten, so dürfen wir wohl, auch wenn wir einen erheblichen Grad der Gefährdung in Kauf nehmen, nicht fürchten, durch Einrichten des Blendersaumschlags den heutigen Stand der Sturmsicherheit zu verschlechtern. Ein gewisses Sturmwarnis muß jeder Naturverjüngungsbetrieb im gleichwüchsigen Hochwald tragen, es fragt sich nur, ob die Gegenleistung eine entsprechende ist! Daß eine solche beim Blender-saumschlag mit nordsüdlicher Hiebsrichtung in vollem Maß zu erwarten ist, glauben wir im ersten Abschnitt nachgewiesen zu haben. Ein Vergleich mit den anderen Naturverjüngungsverfahren, die eine gleichwüchsige Bestockung erzeugen, muß ohne weiteres zugunsten des Saumschlags ausfallen: in erster Linie dem Schirmschlag, aber auch dem bayrischen Blenderschlag gegenüber, der die Ränder nach allen Seiten freistellt und trotzdem mit weniger Sturmschaden rechnen darf, als der Schirmschlag.

Schwere Stürme und Orkane treffen, besonders wenn sie aus unerwarteter Richtung kommen, auch den Blendersaumschlag ohne Zweifel schwer, doch zeigt er alsdann ähnliche Eigenschaften wie der Blenderwald, er ist in der Lage, sich nach unabwendbaren Schädigungen sofort wieder aufzurichten und seine räumliche Ordnung wieder herzustellen, während die Großschlagbetriebe lange Zeit am Boden liegen und durch Jahrzehnte, ja dauernd, an der Störung ihrer räumlichen Ordnung und deren Folgen leiden.

Eine Besonderheit des Blendersaumschlags mag hier noch Erwähnung finden; er begünstigt den Ueberhalt dadurch, daß er für allmähliches Freistellen der Ueberhälter sorgt und diese noch lange im Freistand gegen Sonne und Südwestwind schützt. Damit soll übrigens nicht gesagt sein, daß Verf. den Ueberhaltbetrieb allgemein für wirtschaftlich zweckmäßig, ja überhaupt berechtigt hält. Dies ist mit wenigen Ausnahmen nicht der Fall, denn zum Ueberhalten sind unsere Umtriebe zu hoch und ist das Warnis für die Ueberhälter wie für den Bestand meist entschieden zu groß.

Sturmliteratur und praktische Erfahrung lehren, daß Sturmschaden weder im ungleichaltrigen noch im gleichaltrigen Wald, weder bei der einen noch bei der andern Verjüngungsart ganz zu vermeiden ist. Die Wirtschaft wird immer mit diesem Schaden zu rechnen haben; ihre Aufgabe im gleichwüchsigen Hochwald kann nur sein, ihn mit Hilfe entsprechender räumlicher Ordnung auf dasjenige Mindestmaß zu beschränken, das sich mit einem rationellen Betrieb verbinden läßt und ihn hier durch möglichst hohe Gegenwerte auszugleichen. Die Sturmgefahr und ihre Verhü-

tung ist uns daher ein sehr wichtiger, aber nicht der allein entscheidende Faktor beim Aufbau der räumlichen Ordnung, er kann nicht allein und in erster Linie über die Hiebsrichtung im Blendersaumschlag entscheiden. Dagegen müssen und können wir jede größere Störung der räumlichen Ordnung durch den Sturm mit ihren vielseitigen und weitreichenden schädlichen Folgen vermeiden.

Ein wichtiges Moment, das nicht unmittelbar zu unserem Thema gehört, ist weiterhin das Alter der Individuen, von dem Gesundheit, Elastizität und Kronenausbildung abhängen, es weist auf niedrige Umtriebe zur Bekämpfung der Sturmgefahr hin.

Verfasser hat die feste Ueberzeugung gewonnen, daß eine rationelle Raumordnung im Wald zusammen mit grundsätzlicher Holzartenmischung, stufiger Erziehung der Bestände und den niedrigeren Hiebsaltern der Zukunft dazu führen wird, dem Sturm seine Schrecken zu nehmen und seine Schäden ganz wesentlich zu verringern. Die heutigen Verhältnisse sind die Frucht der herrschenden Großflächenwirtschaft mit Schirmschlag und reiner Bestockung, der früher und heute noch zu dichten Bestandserziehung, sowie der oft allzuhohen Abtriebsalter der Vergangenheit und Gegenwart. So glaubt auch Sieber (Allg. F. u. J.Ztg. 1903 S. 109), daß die Sturmgefahr wesentlich übertrieben worden sei. Kräftige Durchforstungen und das Einhalten nicht zu hoher Umtriebe seien die besten Mittel gegen Sturm, das zeige Sachsen; und Martin führt (Folgerungen der Bodenreinertragslehre V. S. 5) die geringen Sturm Schäden in Sachsen auf kräftige Durchforstung und Betraufung der Bestände zurück.

Wir fürchten somit den Sturm nicht in dem Maß, wie dies sonst wohl geschieht, und können daher den etwaigen Einwand der Undurchführbarkeit des Blendersaumschlags wegen Sturmgefahr nicht gelten lassen, denn die Voraussetzungen der heutigen Sturmschäden sind nicht diejenigen der Zukunft.

2. Kapitel.

Weitere Gefahren.

Weitere Gefahren, die zur räumlichen Ordnung in Beziehung stehen und Ansprüche an sie zu stellen haben — die deshalb hier, wenn auch nur kurz zu erörtern sind — wurden schon oben aufgezählt, es sind:

Schneedruck, Frost, Feuer, Pilzschaden, Unkrautwuchs, Insektengefahr und Wildverbiß.

Dabei kann es sich hier, wie beim Sturm, nicht in erster Linie um Abstellungsmittel handeln, sondern nur um die allerdings ökonomisch viel wertvolleren Vorbeugungsmittel gegen Schaden, sowie um Durchführung einer solchen Raumordnung, die eine Bekämpfung erleichtert und den Schaden auf seinen Herd beschränkt, und die endlich auch durch den Eintritt von Schaden nicht allzu sehr gestört wird. Es genügt hier eine kurze Besprechung der auf-

gezählten Feinde des Waldes, denn es handelt sich nur darum, nachzuweisen, daß die Vorbeugung gegen alle diese Gefahren nach denselben Richtungen weist, die wir schon bisher festgestellt haben.

I. S c h n e e d r u c k .

Der Schneeschaden, den wir hier ins Auge zu fassen haben (Einzelbruch kann außer Betrachtung bleiben), entsteht durch Auflagerung von Schneemassen auf der Bestandeskrone und Belastung derselben über die Grenze der Standfestigkeit der Stämme und der Tragkraft ihrer Schäfte hinaus. Die Vorbeugungsmaßregeln werden sich also einerseits auf Verminderung der Auflagerung, andererseits auf Steigerung der Tragkraft zu richten haben.

Nach beiden Richtungen wird der Forstschutz Anforderungen an die räumliche Ordnung stellen. Beiden dient U n g l e i c h a l t r i g k e i t der Bestockung bzw. ungleiche Höhe der Individuen. Daß diese übrigens nicht immer und nicht allein schon Schneedruck verhütet, wurde im 1. Abschnitt gezeigt. Dies hat z. B. der Schneeschaden vom Dezember 1886 bewiesen, wo Fichtenbestände mit reihenweise beigemischten und stark vorgewachsenen Kiefern in erster Linie dadurch zerstört wurden, daß die Kiefernreihen zusammenbrachen, sich über die zwischenstehenden Fichtenbänder legten und diese niederdrückten.

Daraus geht zugleich hervor, daß ein anderes Mittel, die Einzelmischung verschiedener Holzarten nicht ohne weiteres günstig wirkt. Dagegen ist dies der Fall, wenn Holzarten, die keine Ansammlung von Schnee in ihren Kronen veranlassen (Laubhölzer), gemischt werden mit solchen, die dies in erheblichem Maß tun (Nadelhölzer) (vgl. Fig. 53 S. 209), damit der Schnee kein zusammenhängendes Dach zur Auflagerung findet und seitlich abgleiten kann.

Beiden Forderungen wird endlich bei gleichaltriger Bestockung am meisten gedient durch lockere Bestandeseziehung, sie verhindert übermäßige Auflagerung und sorgt für stufigen Wuchs und Ausbildung kräftiger Schäfte.

Die Sicherung des Waldes nach dieser Richtung ist also weniger auf Ungleichaltrigkeit gerichtet als auf lockeren Bestandesschluß, auf Mischung gefährdeter mit wenig gefährdeten Holzarten und damit auf eine solche räumliche Anordnung, die Holzartenmischung begünstigt.

II. F r o s t .

In Betracht kommen B a r f r o s t und insbesondere S p ä t f r o s t im jungen Bestand. Sie stellen bestimmte Forderungen an die räumliche Ordnung, die, was den Spätfrost betrifft, besonders scharf in eigentlichen Frostlagen hervortreten, wo ihnen die räumliche Ordnung in erster Linie Rechnung tragen muß.

Was die Barfrostgefahr betrifft, so haben wir ihrer Wirkung und Bekämpfung bereits Erwähnung getan und die mangelnde Besamungsfähigkeit der ostseitig geöffneten Ränder teilweise auf Barfrost zurückgeführt. Der Forstschutz fordert zur Verhütung von Barfrostscha den, daß Keimlinge und noch nicht angewachsene Pflanzungen nicht fortgesetztem Gefrieren und Wiederauftauen des Bodens ausgesetzt seien, was durch unmittelbare Ueberschirmung oder wohl besser noch durch Seitenschutz gegen Süden erreicht wird.

Aehnliche Forderungen stellt der Schutz gegen Spätfrost. Es handelt sich hier darum, die jüngste Altersklasse so lange als möglich vor Entstehung und Wirksamkeit des Frostes zu schützen. Beides geschieht, indem Wärmeausstrahlung bei Nacht, Entstehung froststeigernden Graswuchses und Besonnung am Morgen (hier ist es die Vormittagssonne, die nach Frostnächten besonders schädlich wirkt) verhindert werden, und dazu stehen uns langdauernde Ueberschirmung durch das alte Holz und ausgedehnter Seitenschutz zu Gebot. Ferner muß die Bildung windstillen Kessel ohne Schirmstand vermieden werden. Wir müssen somit zur Verhütung von Frostschaden den Jungwuchs so lange als möglich unter Schirm- und Seitenschutz des alten Holzes belassen, — so lange jedenfalls, bis der junge Bestand den Boden vollkommen deckt, also keinen Graswuchs zuläßt und bis er mit seinen Spitzen die Frosthöhe überschritten hat. Dabei gilt hier der schon früher ausgesprochene Grundsatz, so bald als möglich von der Ueberschirmung zur Seitendeckung überzugehen und sie dem Jungwuchs möglichst lange zu erhalten, da unter Seitendeckung das Wachstum ein gesteigertes ist und der Jungwuchs rascher die kritische Höhe erreicht. Vom Seitenschutz aber ist zu fordern, daß er die Vormittagssonne so weit als möglich abhält.

Auch hier wird der von Norden (oder NW) her fortschreitende Blenderschlag bei langsamstem Vorrücken die gestellten Forderungen in bester Weise erfüllen, denn er gibt den Jungwuchs grundsätzlich erst nach vollendetem Schluß vollkommen frei, läßt somit Graswuchs womöglich gar nicht aufkommen und gestattet, die Seitendeckung zeitlich so lange auszudehnen, als dies örtlich erforderlich erscheint. Der Anflug, der zuerst unter Schirm steht, ist hier, wie nachher unter Seitendeckung, der Besonnung entzogen. Endlich können bei dieser Form der Verjüngung Orte ohne Luftbewegung (Frostlöcher) nicht entstehen, denn die an den Altholzrand sich anschließende Jungwuchsrinne verläuft von Ost nach West, so daß sich in derselben, wo dies nicht absichtlich verhindert wird, stets eine gewisse Luftbewegung geltend machen muß.

Günstig scheint sich auch — auf den ersten Blick — der Schirmschlag diesen Forderungen gegenüber zu stellen, da er die ganze Verjüngungsfläche bis zur vollen Räumung überschirmt. Doch ist gegen ihn — ganz abgesehen von der nur allzu häufigen Unvollkommenheit des Jungwuchses nach der Räumung, die ausgedehnte Ergänzungen auf der Kahlfäche fordert und leicht zu Frostlöcherbildung führt — geltend zu machen, daß er aus später zu besprechenden Gründen nur bei möglichst frühzeitiger Abräumung des Altholzes Erfolg ver-

spricht, daß sich also bei ihm wesentliche, den Forderungen des Schutzes gegen Frost entgegengesetzte Tendenzen geltend machen.

Auch der *Blenderschlag* ist in bezug auf Frostgefahr nicht ganz einwandfrei; *Martin* sagt der bayrischen Form nach (*Forstl. Blätter* 1890 S. 344), daß sie durch Hemmen der Luftbewegung seitens der vorgewachsenen Horste Forstlöcher schaffe.

Bleibt somit, als gegen Frost sicherstes Naturverjüngungsverfahren, der *Blendersaumschlag* übrig, so ist hier noch besonders zu betonen, daß große örtliche Frostgefahr (Frostlagen) ein besonders langsame Vorgehen fordert, dem, soll es durchführbar sein, eine möglichst weitgehende Gliederung der Altersklassen entspricht.

III. Feuer.

Es liegt weniger im Sinne dieser Erörterungen, hier auf die zahlreichen Vorschläge und Verfahren der Einflußnahme auf die räumliche Ordnung zur Bekämpfung von Waldbränden einzugehen, die in der Waldeinteilung (Anlage von Feuerstellen etc.) und in ausgedehnten Feuerwach- und Meldesystemen zum Ausdruck kommen. Uns liegen nicht die Abstellungs-, sondern die Vorbeugungsmittel am Herzen, denn wir möchten auch dieses Uebel an der Wurzel gefaßt wissen. Gelingt es der räumlichen Ordnung, die örtlich ins Große gesteigerte Gefahr ganz wesentlich zu vermindern, so fällt das Bedürfnis dahin, ihr durch teure künstliche Mittel entgegenzutreten.

Die Feuersgefahr ist im wesentlichen an bestimmte Holzarten und bestimmte Bestandesalter gebunden, nur hier ist die Gefährdung eine große.

An Holzarten kommen nur Nadelhölzer und unter ihnen in erster Reihe die *Kiefer*, in zweiter die *Fichte* in Frage. Nach dem Bestandesalter ist es nur die jüngste Altersklasse, bis zum Beginn des Stangenholzalters, die großer Gefahr unterworfen ist.

Betrachten wir diese Momente, so zeigt sich die Schädlichkeit der mit reiner gleichalter Bestockung arbeitenden Großflächenwirtschaft in keiner Beziehung — auch nicht bei der Sturmgefahr — so klar und unbestreitbar, wie hier bei der Feuersgefahr.

Gefährdet sind in erster Linie mehr oder weniger reine Kiefernjungwüchse, in zweiter Linie Fichtendickungen, — nicht, weil nur hier Feuer entstehen kann, sondern weil es, wenn entstanden, hier reichste Nahrung findet und rasch große bedrohliche Dimensionen annimmt. Dies ist um so mehr der Fall, je größer die zusammenhängende Fläche ist, auf der dem Feuer diese günstigen Verhältnisse geboten werden. Ist das Feuer hier, wo die Umstände eine Bekämpfung kaum zulassen oder doch sehr erschweren, mächtig erstarkt, so ist es auch, am Ende der Jungwüchse angelangt, in den Stand gesetzt, in Bestände anderer Altersklassen und Holzarten — also unter an sich weniger günstigen Verhältnissen — vorzudringen, ohne daß es möglich wäre, dies zu verhindern. So kann es großen Waldflächen und wertvollen Beständen verhängnisvoll werden.

Wie viel anders ist der Gang des Waldbrands auf kleiner Jungwuchsfläche! Die rasch herbeieilenden Löschmannschaften stehen hier nicht unübersehbaren Dickungsflächen gegenüber, sie finden in nächster Nähe älteres Holz, von dem aus die Bekämpfung einsetzen kann und das Feuer ist abgedämmt, ehe es bedenkliche Dimensionen angenommen hat.

Daraus geht die klare Forderung nach möglicher Kleinheit der gleichaltrigen Flächen, nach Gliederung der Altersklassen hervor. In ähnlicher Weise wirkt die Mischung der stark gefährdeten mit wenig gefährdeten Holzarten, z. B. Kiefer mit Eiche und Buche, Fichte mit Buche u. s. f., denn wenn auch die Mischung dem Fortschreiten des Feuers keinen wesentlichen Einhalt zu tun vermag, so erleichtert sie doch die Bekämpfung und verhindert durch die Stockausschläge der Laubhölzer, daß wir nach dem Brand großen leeren Kahlflächen gegenüberstehen, die jahrelang voller Bodendeckung entbehren müssen. Auch die Trennung der Nadelholzkomplexe durch Laubholzstreifen wird mit Recht empfohlen. So empfiehlt Heß (Forstschutz S. 381) einerseits die Anzucht von Laubholz in Nadelwäldungen, in Mischung oder in Form von sog. Feuermänteln, andererseits „die Vervielfältigung der Hiebszüge, um hiedurch kleine Abteilungen zu formieren und einen häufigeren Wechsel der Altersklassen herbeizuführen“. Borggreve, der als Anhänger der G. L. Hartigschen Altersklassenvereinigung die Zweckmäßigkeit der „Altersklassenzerreißung“ in bezug auf alle andern Gefahren, insbesondere den Sturm verneint, anerkennt (Forstl. Blätter 1882 S. 65 und Forstabschätzung 1888 S. 294) ihre Vorteile der Feuergefährdung gegenüber, allerdings mit starken Einschränkungen, besonders auf die meistgefährdete Kiefer.

Die Feuergefährdung im Wald führt uns somit zu denselben Forderungen einer Gliederung der Altersklassen und Mischung der Holzarten, die schon mehrfach das Endergebnis unserer Betrachtungen war, und wenn diese Gefährdung des Waldes auch zumeist keine entscheidende Stimme beim Aufbau der räumlichen Ordnung beanspruchen kann, so darf uns doch das Bewußtsein wohlthuend sein, daß die Erfüllung dieser Forderungen — geschehe sie auch aus anderen Gründen — doch zugleich der Sicherung unseres Betriebs gegen diesen, wenn auch verhältnismäßig seltenen, Schaden dient.

IV. Pilzschaden.

Auch der Pilzschaden führt zu Forderungen an die räumliche Ordnung im Wald und zwar möchten wir dies an den zwei schlimmsten Pilzschädigungen des Waldes, der Rotfäule der Fichte und der Schütte der Kiefer zeigen.

Die Rotfäule der Fichte, die schlimmste Krankheit dieser Holzart, mag hier deshalb erwähnt werden, weil sie heute schon in der Fichtenwirtschaft eine Rolle spielt, und nach Ansicht des Verf. (vgl. die bezüglichen Ausführungen im 1. Abschnitt, sowie Allg. F. u. JZtg. 1902 S. 227) unter der Herrschaft reiner Fichtenbestockung und insbesondere fast ausschließlicher

Fichten pflanzung auf den von ihr bedrohten Standorten immer mehr hervortreten wird.

In den Pflanzkulturen auf Kahlfäche entwickeln sich die Wurzeln der Fichte in dem gelockerten und durchfeuchteten Boden und bei der sofort folgenden Verrasung der Oberfläche zunächst mehr in die Tiefe. Diese Wachstumsbedingungen sind jedoch nur vorübergehender Art. Im Dickungsalter schon stirbt der Grasfilz ab und nun häuft sich unterm Stangenholz der Nadelabfall mehr und mehr; ihm folgt später die Moosdecke. Die Niederschläge, die vor dem Eintritt des Bestandesschlusses in Menge in den Boden eindringen, bleiben jetzt, außer bei sehr ausgiebigem Regen, fast ganz in Moos, Moder, Trockentorf u. s. f. haften. Dies, wie die Luftbedürftigkeit ihrer Wurzeln und der wachsende Humusreichtum der Oberfläche veranlaßt die Fichten, ihren Wurzelhorizont höher zu legen; die zuvor in größere Tiefe vorgedrungenen Wurzeln, die mehr und mehr an Wasser- und Sauerstoffmangel leiden, treten allmählich außer Tätigkeit und sterben ab. Zu dieser Annahme führt uns einerseits die Wahrnehmung, daß durch die Rotfäule zunächst fast immer nur die unteren Wurzeln zersetzt werden und andererseits, daß bei Grabungen unter Fichtenstangenhölzern (tiefe Einschnitte bei Wegbauten oder Steinbrucharanlagen bieten willkommene Gelegenheit zu Beobachtungen) ein ganz ausgedörrter und unfruchtbarer Untergrund zutage zu kommen pflegt, in dem die tiefergehenden Wurzeln verharzt, erkrankt oder abgestorben stecken. Der Zustand dort kann jedenfalls nicht immer so gewesen sein, sonst wären keine Fichtenwurzeln dorthin gewachsen! So ist denn vom Stangenholzalter ab dem *Trametes* die Pforte geöffnet! Ähnlich ungünstige Verhältnisse ergeben sich übrigens auch in reinen Saaten und Naturverjüngungen der Fichte auf Sand und Kalk, wenn diese zu lange Zeit in überdichtetem Schluß verharren müssen, was leider früher die Regel bildete. Auch hier werden sich die Wurzeln zunächst vorwiegend nach unten entwickeln. Unsere Auffassung steht daher nicht notwendig im Gegensatz zu den Feststellungen von Flury im IX. Band der Mitteilungen der Schweizer Zentralanstalt für forstliches Versuchswesen S. 252 „Naturverjüngte reine Fichtenbestände werden mehr von der Rotfäule befallen als Pflanzbestände“. Es handelt sich hier um reine Fichten, die wohl meist ungünstige Bedingungen für die Jugendentwicklung (große Dichtigkeit) hinter sich haben. Ueberdies spielt die Bodenart eine entscheidende Rolle, insofern als die Kalkböden, auf denen die Rotfäule besonders zu Hause ist, auch diejenigen sind, auf denen die Fichte sich am leichtesten und reichsten natürlich ansamt, also in der Vergangenheit die meisten Naturverjüngungen geliefert hat. Durch diese Momente mag sich das Verhältnis zu Ungunsten der Naturverjüngung verschoben haben.

Wer schon vielfach mit ansehen mußte, wie an sich nutzbare bzw. hiebsreife Fichtenbestände vom Pilz mehr und mehr ergriffen werden und gewissermaßen vor unseren Augen faulen, während sie doch aus Rücksichten der räumlichen Ordnung der II. oder III. Nutzungsperiode zugeteilt werden müssen, der versteht, weshalb die Rotfäule hier unter denjenigen Faktoren erscheint, die geeignet sind, auf die räumliche Ordnung Einfluß zu üben. Es ist da nämlich meist nicht möglich, größeren Schaden durch rechtzeitigen Bestandes-

abtrieb zu verhüten, weil noch ausgedehnte gleichaltrige oder ältere Bestände hinter der von der Rotfäule ergriffenen Fläche liegen, — Bestände, die weder freigestellt werden dürfen mit Rücksicht auf Sturmgefahr, noch auch in kürzester Zeit abgetrieben werden können.

Die Ausbreitung der Rotfäule im Fichtenbestand bedingt einen unvermittelt raschen, ja plötzlichen Eintritt der Hiebsreife. Wenn es bei allen andern Holzarten — auch statisch — ohne Belang sein mag, ob sie nach Eintritt ihrer rechnerischen Hiebsreife mit Rücksicht auf Etat, Hiebsfolge oder Verjüngung um ein Jahrzehnt früher oder später zur Nutzung kommen, da Bodenrente und Weiserprozent nur langsam sinken, so ist das bei den sehr zahlreichen, immer mehr zunehmenden Rotfäulestandorten der Fichte ganz anders.

Der Pilz befällt erst die unteren Wurzeln und dringt nach deren Zerstörung rasch durch das Stockinnere in den unteren Stammteil ein, ohne hiefür irgend welche äußere Anzeichen zu geben, und zwar scheint uns dieser Angriff auf das Schaftholz bei zahlreichen Stämmen des Bestands ziemlich gleichzeitig zu erfolgen. Mit diesem Zeitpunkt nun tritt die Hiebsreife des Fichtenbestands, der eben noch die befriedigendste Wertsmehrung gezeigt hatte, plötzlich ein und wird sofort zur Hiebsbedürftigkeit, da sich nunmehr der Schaden rasch ausbreitet und eine von Jahr zu Jahr gesteigerte Wertsabnahme des Holzes folgt, — darin begründet, daß nicht allein der nutzwertigste untere Teil des Schafts mehr und mehr in minderwertiges Brennholz und schließlich Faulholz übergeht, also auf etwa $\frac{1}{4}$ seines bisherigen Werts zurückfällt, sondern auch der gesund gebliebene Nutzschaft selbst durch Verminderung von Länge und Mittelstärke in eine niedrigere Wertklasse herabsinkt.

Daß eine Holzart, deren Wertsentwicklung nicht stetig erfolgt, sondern in zahlreichen, dazu schwer festzustellenden Fällen plötzlich abbricht, wie dies bei der durch Rotfäule gefährdeten Fichte der Fall ist, weitgehende wirtschaftliche Freiheit bezüglich der Abnutzung aufs dringendste erheischt und daher entsprechende Forderungen an die räumliche Ordnung stellt, bedarf keines weiteren Beweises, — zumal für die Fichte, die ja vermöge ihrer großen Sturmgefährdung im gleichwüchsigen Wald auf vollen Deckungsschutz angewiesen ist, also keine Wegnahme außer der Reihe gestattet.

Auch hier gelangen wir somit zur Forderung möglichst weitgehender Gliederung der Altersklassen, die jeden der Hiebsreife sich nähernden Fichtenort jederzeit der Axt zugänglich macht. Nur so ist zu erreichen, daß wir nicht dem Fortschreiten der Rotfäule untätig zusehen müssen, wie es überall da der Fall ist, wo die fragliche Fläche sich im wohlgeordneten Hiebsverband großer Bestände je einer Altersklasse befindet.

Daß wir überdies in der natürlichen und daher naturgemäßen Verjüngung und gesunden Aufzucht der Bestände, sowie in der Mischung der Fichte mit der Buche ein Mittel erblicken, der Rotfäule wirksam zu steuern, und daß dieses Vorbeugungsmittel der räumlichen Ordnung dieselben Wege weist, wurde im 1. Abschnitt ausgeführt.

Die Schütte der Kiefer, die sich mehr und mehr zur Hauptkalamität der Kiefernwirtschaft auswächst, ist durch die Versuche insbesondere Mayrs (Forstw. Centralbl. 1903 S. 547) als ausschließliche Infektionskrankheit nachgewiesen worden. Der Schaden ist ein so großer, daß man sich heute nach Bekämpfungsmitteln umzuschauen gezwungen sieht, die bisher nur der Weinbau und die Gartenkultur in Anwendung brachten, und die uns, in den Wald verpflanzt, geeignet erscheinen, jeden Ertrag des Waldbodens in Frage zu stellen (Bespritzen der Kiefernkulturen mit Kupfermitteln).

Sollte die Ursache dieser wachsenden Kalamität nicht in den Grundbedingungen der heutigen Kiefernwirtschaft zu suchen sein, und sollte nicht auch das beste und dabei ökonomisch unanfechtbare Mittel zur Verhütung dieses Schadens in der Aenderung dieser Grundbedingungen gefunden werden?

Tierische und insbesondere pflanzliche Schädlinge stellen sich in der Natur immer da in Massen ein und betreiben ihr Zerstörungswerk im großen, wo große Mengen von Individuen gleicher Art unter ungünstigen äußeren Bedingungen leben müssen und daher ihrem Angriff leicht unterliegen, und so glauben wir, daß auch dieses Uebel seine Wurzel im Großkahlschlagbetrieb mit künstlicher Begründung des Waldes auf, für die Entwicklung der Waldpflanzen unnatürlich großen und daher schädlichen Flächen hat (vgl. auch Mayr l. c. S. 550). Dazu kommt wohl verschärfend die Verwendung von Samen einer vielfach höchst fragwürdigen Herkunft¹⁾. Die Kiefer scheint uns eben nicht, wie man anzunehmen gewohnt ist, die so ganz unempfindliche Holzart zu sein, die unter allen, auch den unnatürlichsten Bedingungen fröhlich gedeiht, — das zeigt uns die Schütte und ihr Ueberhandnehmen²⁾.

Wir können daher das Heil für den Wald nach dieser Richtung nicht im Bespritzen der Kulturen mit Bordelaiser-Brühe sehen, die uns um jede Bodenrente zu bringen droht — sie bildet ein Bekämpfungsmittel, das nur durch die Not des Augenblicks gerechtfertigt wird —, sondern wir erwarten ein, wenn auch nur allmähliches Zurückdrängen der Schütte von einem Aufbau der Kiefernwirtschaft auf natürlicher gesunder Grundlage. Das ist die Naturverjüngung, die Beimischung geeigneter Holzarten und der Jugendschutz durch seitliche Beschattung wenigstens in den ersten Jahren, und diese führt uns wiederum, da sich nach reichlicher Erfahrung die Verjüngung im Schirmgroßschlag als unbefriedigend erwiesen hat, zu natürlicher Ansamung auf der Kleinfläche in stetigem Vorgehen gegen Süden, also zum Blendersaumschlag.

1) Versuche von Mayr und andern haben inzwischen in überzeugender Weise dargetan, daß die Kiefern südlicher Herkunft, deren Samen in den verflossenen Jahrzehnten in immer steigenden Massen bei uns verwendet wurden, in stärkerem Maße der Schütte zum Opfer fallen, als diejenigen heimischer und insbesondere nordischer Herkunft.

So stellt zum Beispiel Herrmann in der Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- und Landw. 1910 S. 105 fest: „Westungarische Kiefern erliegen in Westpreußen den Angriffen des Schüttepilzes“.

2) In einem Aufsatz: „Zur Bekämpfung der Kiefernschütte“ (Oesterreichische Forst- und Jagd-Ztg. 1906) schreibt Vogl die Schütteplage der Kunstverjüngung auf Kahlfäche zu und fordert Rückkehr zur Naturverjüngung.

Somit würde auch hier die Forderung an die räumliche Ordnung auf ein weitgehendes Gliedern der Altersklassen und Schaffen der Vorbedingungen für sichere Naturverjüngung, ferner auf Holzartenmischung und Seitenschutz in der Jugend zu richten sein; vergleiche auch die sehr beherzigenswerten Ausführungen von Tubeufs in seinen „Pflanzenkrankheiten“ 1895 S. 95, 96.

V. Unkrautwuchs.

Unkraut am Boden schadet durch Verschlechterung und Verschließen desselben und damit durch Erschweren jeder Art von Verjüngung, ferner durch Verdämmen der jungen Pflanzen, durch Beherbergen von Schädlingen, besonders von Mäusen und durch Steigerung der Frostgefahr. Ein Verhüten von Unkrautwuchs ist aber nicht allein eine wichtige Aufgabe der Wirtschaft im Hinblick auf diese Schäden, sondern ebenso sehr deshalb, weil die Anwesenheit von Unkräutern der untrügliche Beweis dafür ist, daß die Waldbestockung die Produktionsfaktoren des Standorts nicht vollkommen, beziehungsweise während der Verjüngungszeit nicht ununterbrochen ausnützt.

Beide Momente führen zu der wichtigen Forderung an den räumlichen Aufbau des Walds: er muß unter allen Verhältnissen wenigstens die Möglichkeit bieten, den Boden unverwildert der jungen Generation zu übergeben. Zu diesem Zweck muß sich der Jungwuchs ohne Gefahr der Zerstörung bei der Ernte unter das Altholz schieben können, um dort sofort alle von diesem freigegebenen Produktionskräfte für sich zu benützen, und das Altholz darf die Fläche erst verlassen, wenn die junge Generation die erforderlichen Organe und damit die Kraft besitzt, sie samt den auf ihr tätigen natürlichen Produktionsmitteln voll in Besitz zu nehmen. Nur so kann verhütet werden, daß andere unerwünschte Pflanzen diese Mittel vorübergehend an sich reißen.

Ein Uebergang ohne Verwilderung des Bodens wird insbesondere erleichtert, wenn in der Uebergangszeit die Bedingungen für Unkrautwuchs ungünstiger sind, als für die jungen Holzpflanzen, wenn Massenzucht von Unkrautsamen vermieden wird und wenn die alten Bäume zur rechten Zeit abrücken können, ohne der jungen Generation schwere Wunden zu schlagen. Alle drei Bedingungen erfüllt nach unseren Wahrnehmungen keine andere Hiebsweise besser, als die Verjüngung unter Blendersaum und zwar gerade besonders unter Nordsaum, vor dem die Unkräuter in auffallender Weise Halt machen, während dagegen jede Form von Großschlag stets mit der Verjüngung gleichzeitig Massenzucht von Unkrautsamen treibt und dadurch die Gefährdung steigert und die Bodenverwilderung beschleunigt.

VI. Insektenschaden.

Hier sind es wiederum die Nadelhölzer, und unter ihnen Fichte und Kiefer, die am meisten bedroht erscheinen und in deren Interesse Forderungen an die räumliche Ordnung zu stellen wären.

Die Beziehungen der räumlichen Ordnung zum Insektenschaden ergeben sich aus der Erwägung, daß die Insekten in bezug auf bestes Gedeihen in der Regel an bestimmte äußere Verhältnisse, bestimmte Holzarten und Altersklassen gebunden sind, und daß daher Massenvermehrung bedingt oder doch begünstigt ist durch Vorhandensein dieser Voraussetzungen auf möglichst großem Raum, auf großen zusammenhängenden Flächen gleicher Holzart und gleichen Alters. Hier treffen die zur Massenvermehrung neigenden Tiere, nach welcher Richtung sie sich auch bewegen mögen, überall gleich günstige Bedingungen für Leben und Fortpflanzung an, auch finden sich die Individuen leicht und ohne Gefährdung zur Begattung zusammen; von der neu erzeugten Brut geht unter allseits günstigen Bedingungen wenig verloren, so daß, wo nicht andere Störungen eintreten, in wenigen Jahren große Massen von Insekten erzeugt werden können, die dann befähigt sind, umfassende Schädigungen auf der Fläche ihres ersten Auftretens hervorzurufen und auf andere Flächen zu übertragen.

Trennen wir jedoch die Flächen gleicher Holzart und gleichen Alters in kleine Stücke, und trennen wir überdies durch Einzelmischung die Individuen derselben Art, so finden die Insekten stets nur kleine Flächen mit günstigen Lebensbedingungen; von den dort erzeugten Individuen wird stets ein großer Teil den Erzeugungsort verlassen und auch bei tüchtigsten Bewegungsorganen (vgl. Borggreves Einwand) einen andern gleich geeigneten Ort nicht leicht erreichen, sich zahlreichen Gefahren aussetzen und so verloren gehen, oder seine Brut an ungeeignetem Ort absetzen. Auch die größere Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen eines solchen Waldes fällt ohne Zweifel sehr ins Gewicht; sie bedingt ein reicheres Tierleben im Gegensatz zur Einförmigkeit großer gleichaltriger Flächen, es siedeln sich insbesondere mehr Vögel, aber auch andere Feinde der Insekten an und sind leichter in der Lage, diese im Zaum zu halten.

Entgegengesetzte Ansicht vertritt Borggreve in seiner Forstabschätzung (S. 297), indem er sich insbesondere auf die Fluchtüchtigkeit der fraglichen Insekten stützt. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen dagegen, daß Massenvermehrungen fast stets nur eingetreten sind, wo sich auf großen Flächen gleichartige Bedingungen vorfanden, gleichaltrige oder sich im Alter nahestehende Bestände einer Holzart (vgl. Judeich, Forsteinrichtung 6. A., S. 283 und die dort gegebenen Literaturnachweise).

Dies trifft zunächst für die in Beständen des Baumholzalters hausenden Schmetterlinge und Borkenkäfer zu, die fast stets in geschlossenen Reinbeständen von großer Ausdehnung die Stätte ihrer Massenvermehrung gefunden haben. Die verschiedenen Borkenkäfer z. B. brauchen stets bestimmte Holzarten, Stammstärken und Gesundheitsgrade der Bäume; sind diese auf zusammenhängendem Raum zahlreich vorhanden, so findet Massenvermehrung statt; andernfalls irren die Tiere umher und gehen zum großen Teil, ohne Nachkommenschaft erzeugt zu haben, zu Grunde.

Diesen Großflächen älteren Holzes entsprechen dann aber im gleichaltrigen Hochwald ebensolche Jungwuchsflächen, sowie Hiebe in rascher Folge, die denjenigen Schädlingen günstig sind, die im Jungwuchs ihr Unwesen treiben, dem Rüsselkäfer und Engerling.

Die rasche Aufeinanderfolge der Schläge begünstigt den Uebergang der Insekten von einer Fläche zur andern, was in Hessen zu Hiebswechsel in kleinen Schlägen Anlaß gibt (vgl. Allg. F. u. JZtg. 1903, S. 3).

Der große braune Fichten-Rüsselkäfer z. B. braucht als Brutort frische-Stöcke, er ist also für starke Vermehrung an Hiebe gebunden, die auf gleicher Fläche in kürzester Zeit wiederkehren. Als Nahrung bevorzugt er saftarme junge Fichten und Kiefern, also Pflanzen, die erst frisch und mit entblößten Wurzeln eingesetzt wurden, während er in kräftigem Wuchs befindliche, somit vollsaftige Individuen, (gesunde Anflug- und Saatzpflanzen, auch Ballenpflanzen) auffallend meidet.

Beide Bedingungen für bestes Gedeihen — bzgl. Brut und Nahrung — schafft ihm nun der Großschlag in zuvorkommendster Weise: reiche Brutgelegenheit durch häufige Wiederkehr und großen Umfang der Schläge, da es an der erforderlichen Auswahl in Hiebsorten zur Einhaltung entsprechender Hiebspausen zu fehlen pflegt; und erwünschte Nahrung durch die nachfolgende Großflächenpflanzung mit entblößten Wurzeln.

So ist denn auch der Rüsselkäfer ein ständiger, gefürchteter und durch Schaden und Bekämpfung (Nachbesserungen, Sammeln der Käfer, Stockgraben, Schlagruhe) teurerer Gast der Kahlschlag- und Kunstverjüngungswirtschaft, während er im Gebiet der Naturverjüngung meist kaum Beachtung verdient und findet.

Der Maikäfer liebt es, seine Eier in den warmen Sandboden großer Kahlfächen zu legen, zumal in vorher gelockerten Boden, was mehrfach Anlaß gegeben hat, die Rückkehr vom Kahlschlag zum alten Schirmschlag anzuraten. Im Forstw. Centralblatt 1898 S. 71 wird die „Maikäfer- und sonstige Insektenkalamität“ an der Kiefer der Main-Rheinebene dem Anbau ausgedehnter reiner Kiefern, dem „Aneinanderreihen der Hiebsorte zur Herbeiführung der normalen (!) Altersstufenfolge“ und dem Kahlhieb zugeschrieben; es werden statt der Aneinanderreihung kurze Hiebszüge gefordert und wird betont, daß schmaler Saumschlag am sichersten zum Ziel führe.

Und in der Tat wird der von Norden her vorrückende Blendersaumschlag auch hier günstigste Bedingungen bieten, da der Maikäfer für die Eiablage den schattigen Verjüngungstreifen möglichst meiden wird, der zu dieser Zeit noch kühl und winterfeucht ist.

Eine wertvolle Bestätigung dieser Ausführungen verdankt Verfasser der freundlichen Mitteilung von Forstrat Wachtel-Neuhaus (Böhmen). Diese besagt, daß auf der Domäne Neuhaus in den Jahren 1858—1870 eine allgemeine schwere Engerlingsplage bestand, bei der selbst der kleinste Kahlschlag an der Ostseite ein Wagnis war, da manche Orte 10—15mal bepflanzt werden mußten. Und nicht nur die sämtlichen Neukulturen, sondern bis zu 15jährige Fichtenjugenden wurden schließlich ein Opfer des Insekts. Unter dem Eindruck

dieser, die fernere Bewirtschaftung lahm legenden Plage sei der Uebergang zur natürlichen Verjüngung in Schirmschlägen¹⁾, bzw. zum Saumschlagbetrieb mit dem Anhieb von Norden her entstanden. So sei dem Uebel dauernd gesteuert worden.

Alles weist somit auch bei den Insektenschäden auf eine möglichste Gliederung der Altersklassen hin, die nicht allein eine übermäßige Vermehrung dieser Schädlinge aufhält, sondern auch deren Bekämpfung erleichtert. In letzterer Hinsicht sagt wohl Putscher (Zeitschr. f. F. und J.wes. 1910 S. 90) nach Erfahrungen bei der Nonnenbekämpfung in Sachsen mit Recht: „Neben der mäßigen Größe der Reviere . . . fällt bei Durchführung der erforderlichen Maßnahmen besonders die Tatsache ins Gewicht, daß die sächsischen Reviere dank eines schon seit vielen Jahrzehnten geübten Forsteinrichtungsverfahrens, das für eine bewegliche Schlagführung innerhalb vieler kleiner Hiebszüge sorgt, eine außerordentlich günstige Verteilung der einzelnen Altersklassen nach Lage und Umfang aufweisen. Diese Beschaffenheit der Reviere erleichtert die Bekämpfung von schädlichen Forstinsekten vom Standpunkt der Vorbeugung aus ungemein, im Gegensatz zu Revieren mit großen gleichaltrigen Bestandeskomplexen, die ein rechtzeitiges Erkennen der beginnenden Massenvermehrung eines Schädlings, wie z. B. der Nonne fast unmöglich machen.“

Nehmen wir aber selbst mit Borggreve an, die Altersklassenzerreißung habe keinerlei günstigen Einfluß geübt, weder in bezug auf Vermehrung noch auf Bekämpfung, es sei trotzdem Massenvermehrung irgend eines Insekts und Kahlfraß eingetreten, so muß doch zugegeben werden, daß dann, d. h. nach Eintritt des Schadens, die gegliederten Altersklassen den großen gleichaltrigen Zusammenhängen gegenüber bedeutend im Vorteil sind. Während wir im letzteren Fall trostlosen Großkahlflächen gegenüberstehen, die sich nicht

1) Auffallen muß das Urteil von Puster, der in seinem Aufsatz „Ein Jahrzehnt im Kampfe mit dem Maikäfer“ (Forstwiss. Centralbl. 1910 S. 633) auf S. 648 sagt: Blenderswirtschaft und Femelschlagbetrieb begünstigen die Maikäferplage; während doch sonst jede Form von Bodenbeschirmung gegen ihn empfohlen wird (vgl. oben). Verfasser hat sich deshalb persönlich an den Herrn Autor gewendet, und ist in liebenswürdigster Weise dahin belehrt worden, daß der größte Feind des Maikäfers und damit der beste Schutz gegen dieses Insekt der geschlossene hohe Wald sei. Dieser bilde eine natürliche Schutzwehr gegen das Vordringen der Plage, und zwar deshalb weil er den schwärmenden Maikäfer vom Bestandesinnern fernhalte. Der Käfer schwärme entlang der Bestandesränder, wobei die Angriffsrichtung keine Bedeutung habe, setze sich dort zum Fraß fest und benutze dann die nächstgelegene offene Bodenstelle zur Eiablage. Durch Schirm- und Löcherhiebe auf großen Flächen werde er auch ins Innere der Bestände geführt, es werden für ihn gewissermaßen die Randlinien vergrößert. Diese Begründung wird jedem Beobachter des Maikäferflugs ohne weiteres einleuchten, sie ist auch für unser Vorgehen von größtem Interesse. Die Regeln für den Blendersaumschlag müssen demnach in maikäfergefährdeten Lagen dahin abgeändert werden, daß hier die Vorhiebe nur möglichst wenig tief und jedenfalls nicht in Löchern oder Buchten in den Bestand eingreifen dürfen und daß im Mischwald nicht, wie sonst wohl mit Rücksicht auf den Sturm, die Nadelhölzer zuerst fallen und die Laubhölzer gegen den Rand hin stehen bleiben, sondern umgekehrt, alle Laubhölzer zuerst ausgehauen werden, und die Nadelhölzer schließlich den Rand bilden.

selten ausdehnen, so weit das Auge reicht, die uns eine schwere Kulturaufgabe unter ungünstigsten Verhältnissen in Aussicht stellen, und während unsere ganze räumliche Ordnung zerstört ist, zerfällt bei gegliederten Altersklassen die entstandene Gesamtkahlfläche in zahlreiche räumlich getrennte übersichtliche Teile, überall können wir an erhalten Gebliebenes anschließen und die räumliche Ordnung ist nicht oder nur wenig gestört, wir blicken nicht, wie z. B. bei Kahlfraß auf großer Fläche, über eine unabsehbare Wüste, deren Wiederbestockung alle waldbaulichen Nachteile in sich birgt.

In gleicher Weise wird der Massenvermehrung schädlicher Insekten Abbruch getan durch Begründung und Erziehung gesunder, vollwüchsiger Bestände und durch Holzartenmischung, das braucht kaum näher begründet zu werden.

Auch dieser Waldschaden weist daher dringend auf Erhaltung der natürlichen Mannigfaltigkeit des Waldes hin, soweit die ökonomischen Bedürfnisse diese irgend gestatten, also auf Gliederung der Altersklassen und Mischung der Holzarten, — auch hier zeigt somit der Blendersaumschlag günstigste Bedingungen.

VII. Wildverbiß.

Auch der Wildschaden darf nicht vergessen werden; denn er scheint leider in neuester Zeit an vielen Orten in Zunahme begriffen zu sein. Er erschwert die natürliche Wiederverjüngung ungemein und drängt insbesondere sonst wenig gefährdete und leicht ankommende Holzarten, wie z. B. die Tanne mehr und mehr aus dem Walde.

Betrachten wir im besonderen diese Holzart, so muß es sehr auffallen, daß dieser schöne, forstlich so wertvolle Baum, der in den Alt- und Mittelhölzern seines natürlichen Verbreitungsgebiets noch zahlreich vertreten ist, in den jungen Beständen meist so gut wie vollständig fehlt, er hat in der Regel reiner Fichtenbestockung Platz gemacht. Und doch hat die Tanne fast keine Feinde — nur eben das Wild — und ist vermöge ihrer Lebenszähigkeit, ihres Schatten-ertragens und ihrer geringen Empfindlichkeit dazu ausgerüstet, sich im Wald zu behaupten, ja auszudehnen, wie kaum eine andere Holzart. Was sie aus dem Wald verdrängt, ist der Großschlag, aber wohl weniger durch unmittelbare Einwirkung, wie man meist annimmt, als mittelbar, eben durch Steigerung des Wildverbisses.

Die Vertretung der Tanne im Wald hat im Lauf des vorigen Jahrhunderts augenfällig abgenommen und doch kann man wohl kaum von einer starken Zunahme des Wildstands während jener Zeit sprechen, solche scheint erst im neuen Jahrhundert da und dort vorzuliegen. Wenn nun trotzdem nicht allein die Naturverjüngung besonders gefährdeter Holzarten mehr und mehr unmöglich geworden ist, sondern selbst die Kunstprodukte vom Wild wenig begehrter Arten, wie Fichtenkulturen, vielfach besonderen Schutzes bedürfen, so möchten wir diese Erscheinung insofern der Großschlagwirtschaft zur Last legen, als sie

die ehemals über die ganze Waldfläche verteilten und reichliche Nahrung bietenden Aesungs- und Aufenthaltsorte — des Blender-, Mittel- und Niederwalds — auf verhältnismäßig wenige Großflächen zusammengedrängt und dem Wild den größten Teil, oft mehr als $\frac{4}{5}$ der Gesamtfläche durch deren geschlossene Bestockung mehr oder weniger vollständig entzogen hat. Das Wild ist somit heute im Großschlagwald für Aufenthalt und insbesondere Aesung auf einen kleinen Teil der Gesamtfläche in wenigen großen Schlägen zusammengedrängt, die zudem meist eine sehr beschränkte, genau bemessene Zahl junger Holzpflanzen tragen. Dürfen wir uns da wundern, wenn nun hier, auf den wenigen Tummelplätzen des Wilds, der Schaden besonders empfindlich hervortritt?

Will man somit diesem schlimmsten Waldschaden, soweit als dies möglich ist, begegnen, so müssen wir an Stelle der wenigen Großschläge eine große Zahl von Kleinflächen mit einem solchen Reichtum an Jungpflanzen aller Art setzen, daß ein bescheidener Wildstand gar nicht mehr über ihn Herr zu werden vermag. Gegen einen großen Wildstand wäre allerdings auch auf diesem Wege nicht aufzukommen, er schließt gefährdete Holzarten von der Naturverjüngung aus.

Auch hier wird nach dem Besprochenen der Blendersaumschlag wohl kaum von einem andern Verfahren an Eignung übertroffen werden, wobei hier noch in die Wagschale fällt, daß die schmalstreifenförmige Anordnung der Ansamung einer Durchführung von Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiß (z. B. Anstreichen u. s. f.) sehr günstig ist. Nur die Anwendung des allerdings wirksamsten Mittels, der Einzäunung im großen, ist erschwert.

Schl u ß b e t r a c h t u n g.

Fassen wir das Ergebnis der Untersuchungen dieses Abschnitts zusammen, so zeigt sich fast überall eine Steigerung aller Gefahren und Schäden mit der Zunahme der gleichaltrigen Fläche.

Die Ansprüche, welche die Sicherung des Betriebs an die räumliche Ordnung zu stellen hat, vereinigen sich neben dem selbstverständlichen Verlangen nach naturgemäßer Begründung und gesunder Erziehung des Bestandesmaterials — der Hygiene im Wald — in den Forderungen einer möglichst weitgehenden Gliederung der Altersklassen und einer zweckmäßigen Mischung der Holzarten. Alle diese Forderungen bedingen sich gegenseitig und führen uns zu möglichster Annäherung des Ertragswalds — des gleichwüchsigen Hochwalds — an die Blenderform, die ihnen allen in bester Weise entspricht.

Je weiter wir im „Zerreißen der Altersklassen“ gehen, desto mehr werden wir uns dieser Waldform nähern, desto mehr werden wir damit auch den Wald vor Schaden sichern.

Stellen wir die Sicherheit des Betriebs in den Vordergrund, so tritt noch viel schärfer hervor, als beim Waldbau: die Verderblichkeit gleichaltriger Bestockung auf großen Flächen, die übrigens für die extremen Formen der Großflächenwirtschaft heute wohl allgemein anerkannt wird.

Der letzteren gegenüber kann gesagt werden:

Große gleichaltrige Flächen — wir zählen hiezu auch die gleichaltrige Abteilung — bieten allen Schädigern des Waldes bessere und ausgedehntere Unterlagen. Auf solchen Flächen, in Großbeständen, steht ferner die Wirtschaft bei Eintritt von Schädigungen der Zerstörung mehr oder weniger machtlos gegenüber; dasselbe gilt bezüglich schädlicher Nachwirkungen, wie für die rasche Wiederherstellung normaler und geordneter Waldzustände. Im Nadelwald rauben überdies die Gefahren der großen gleichaltrigen Fläche in Verbindung mit der Etatswirtschaft dem Betrieb nicht selten jede wirtschaftliche Freiheit. Die Leidtragenden sind Waldbau und Forststatik.

Darum lautet die Gesamtforderung des Forstschutzes an die räumliche Ordnung:

Fort aus dem Wald mit der Großflächenwirtschaft, die so viel Unheil über ihn heraufbeschwört und zurück zu Formen, die dem Blenderwald nahestehen¹⁾!

1) Vgl. N e y s ähnliche Aeüßerung, Forstw. Centralbl. 1881 S. 273.

3. Abschnitt.

Technische Eigenschaften und Nutzung der Produkte.

Die Forderungen an die räumliche Ordnung des Waldes, die in den beiden ersten Abschnitten ermittelt wurden, sind Ansprüche, welche die Waldesnatur selbst an die Wirtschaft stellt, und die sie stellen muß im Interesse der Erhaltung und natürlichen Wiedererzeugung des Waldes. „Der Wald ist sich Selbstzweck, dem Menschen Nutzzweck“, sagt Gayer (gemischter Wald S. 70). Wir haben bisher die eine Seite betrachtet, sind dem natürlichen Prinzip gefolgt, wir haben nun auch die andere zu würdigen und die Forderungen festzustellen, die unsere Wirtschaft an den Wald als Ertragswald in bezug auf seine räumliche Ordnung stellt; denn auch das ökonomische Prinzip ist, so gut wie das natürliche, berechtigt, am Aufbau der räumlichen Ordnung mitzuwirken.

Die Forderungen der Waldesnatur an die räumliche Ordnung zeigen, wie wir gesehen haben, durchweg die Neigung nach blenderwaldartigen Formen hin, wenn auch schon bisher der „Nutzzweck“ nicht aus dem Auge gelassen wurde. Stellen wir nun den Nutzzweck des Waldes in den Vordergrund, so werden wir sehen, daß seine Forderungen nach entgegengesetzter Richtung streben, d. h. vom Blenderwald weg und nach dem gleichaltrigen Hochwald hin.

Die Forstwirtschaft der Vergangenheit ist dieser Neigung in weitestem Maße gefolgt; sie wird heute von ihr und ihren Wirkungen fast durchaus beherrscht, denn die heutigen Betriebsarten und Einrichtungsmethoden sind vorwiegend ihr Produkt. Gayer war der erste, der sich dieser einseitigen Strömung energisch entgegengestellt und den Rückweg zum natürlichen Prinzip angetreten hat; seine Anschauungen gewinnen auch in der forstlichen Welt mehr und mehr an Boden. Demgegenüber stellt sich der Verfasser weder vollkommen auf den einen, noch auf den andern Standpunkt, das Ziel seiner Untersuchungen ist vielmehr eine Vermittlung zwischen beiden Tendenzen, es sollen die begründeten Ansprüche beider, der Wirtschaft wie der Natur festgestellt und gegen einander abgewogen werden, um so eine Betriebsform zu gewinnen, die — soweit möglich — beiden in gebührendem Maß Rechnung trägt. Weder die Natur noch der Nutzzweck darf allein entscheiden, sondern unsere räumliche Ordnung, unsere tatsächliche Betriebsform muß, wollen wir wirklich rationell und mit dauernd höchstem Erfolg wirtschaften,

vollen Einklang herstellen zwischen allen wichtigen natürlichen und ökonomischen Forderungen.

Wir haben uns also weiterhin die Frage vorzulegen:

Wie sind — unter voller Wahrung der besprochenen natürlichen — die ökonomischen Forderungen am vollkommensten zu befriedigen? (d. h. mindestens ebensogut, wie dies die reine Pflanzkultur tut, siehe 5. Abschnitt).

Das Ergebnis wird die beste räumliche Ordnung für unseren Wald sein.

Im vorliegenden Abschnitt haben wir die ökonomischen Erfordernisse zu ermitteln, die sich auf die Nutzung im Walde beziehen. Zwei wichtige Gebiete der Forstbenutzung, auf denen die Wirtschaft dringende Forderungen an die räumliche Ordnung stellt, sind hier zu besprechen: Die technischen Anforderungen an den Gebrauchswert der Produkte und die Ernte der Produkte, die Fällung und Abfuhr des Holzes.

Wir haben also im folgenden zunächst die Frage zu beantworten:

Worin bestehen die Ansprüche, die unsere Wirtschaft an die räumliche Ordnung zu erheben berechtigt ist in bezug auf die Eigenschaften der Ernteprodukte?

1. Kapitel.

Die Anforderungen an Beschaffenheit und Dimensionen des Holzes.

Der Nutzzweck der Forstwirtschaft gipfelt in der Gewinnung technisch vollwertiger Walderzeugnisse. Diesem Endziel muß die räumliche Ordnung in weitestem Maß Rechnung tragen, ihm gegenüber ist die **Pflege des Produktionsfaktors Natur nur Mittel** — freilich entscheidendes und unentbehrliches — diesen Zweck zu sichern; die Pflege der Natur darf somit in keinem Fall in solcher Weise zum Ausdruck gebracht werden, daß dadurch der Endzweck beeinträchtigt oder gar ausgeschlossen wird!

Vollwertige Ernteprodukte liefert nur das Schaftholz, es stellt den technisch höchsten Wert der Walderzeugnisse dar im Gegensatz zum Ast- und Wurzelholz. Daher geht das Streben der Wirtschaft auf höchste Schaftholzerzeugung, die zugleich höchsten Nutzholz- und geringsten Brennholzanteil, sowie günstigstes Verhältnis zwischen Derbholz- und Reisiganfall in sich schließt; denn der Schaft vereinigt in sich die Eigenschaften höherer technischer Brauchbarkeit nach Form und innerer Beschaffenheit des Holzes.

Von diesem Schaftholz fordern wir weiter im Hinblick auf seinen Ge-

brauchswert folgende technischen Eigenschaften, die durch die räumliche Ordnung bestimmt werden:

Gerad- und Langschaftigkeit, Vollholzigkeit, Astreinheit, Freisein von inneren Schäden, wie sie besonders von früheren Rindenbeschädigungen herrühren, gleichmäßige Struktur des Holzes, insbesondere gleichmäßigen Jahrringbau.

Betrachten wir diese Anforderungen an unsere Produkte, so weisen sie fast alle — die Forderung höchster Schaftholzerzeugung wie die Ansprüche an die Eigenschaften dieses Schaftholzes — nach gleicher Richtung und zwar nach gleichaltriger Erziehung der Individuen im mehr oder weniger dicht geschlossenen Bestand (Gayer, Forstbenutzung 9. A. S. 94), während der ganzen Entwicklung oder doch während der Zeit lebhaften Höhenwuchses. Sie werden von den Holzpflanzen um so weniger erfüllt, je freier diese, besonders während ihrer Jugendentwicklung, stehen, je ungleichaltriger oder lockerer sie also im Bestand erwachsen.

Erste Bedingung ist somit die Gleichwüchsigkeit der geschlossenen Bestockung¹⁾; auf sie weisen zunächst insbesondere die drei erstgeforderten Eigenschaften: Gerad- und Langschaftigkeit sowie Vollholzigkeit hin. Sollen sie erzielt werden, so müssen die Individuen gleichaltrig nahe zusammengedrückt werden, so daß der Wuchsraum des einzelnen beschränkt ist. Die Bestockung muß daher für jeden einzelnen Stamm nach allen Seiten gleichaltrig erscheinen, seine Krone muß sich mit ihrer Umgebung gleichmäßig nach oben drängen. Dies ist der Fall, wenn entweder der ganze Bestand gleichaltrig (Borggreve erklärt in seiner „Holzzucht“ 2. A. S. 194 gleichmäßiges Hinaufdrängen des Kronendachs für besser als wellenförmiges) oder im Alter stetig abgestuft d. h. gleichwüchsiger Hochwald ist. Dieses geschlossene, gleichwüchsige Zusammenleben der Baumindividuen hindert die Einzelstämme an Kronenausbreitung, die Gruppen und Horste an Traufbildung, und bewirkt ein rasches Hinaufrücken und hohes Ansetzen der Krone, also Gerad- und Langschaftigkeit wie Vollholzigkeit und, infolge der stetigen Wachstumsbedingungen, eine gleichmäßige Holzstruktur.

Ebenso bewirkt diese räumliche Anordnung Astreinheit des Holzes, da die Äste nicht in der Lage sind, sich stärker zu entwickeln, vielmehr während der Zeit des lebhaftesten Höhenwuchses bald absterben und abgestoßen werden. Nicht für alle Holzarten geht übrigens die Forderung nach Astreinheit gleich weit. Während sie sich bei den Laubhölzern und Nadellichthölzern (Kiefer, Lärche) tunlichst auf den ganzen nutzbaren Schaft bezieht, beschränkt sie sich bei Fichte und Tanne aus früher erörterten Gründen auf den unteren Schaftteil, 5 oder höchstens 10 m.

Für alle Holzarten wird demnach im Interesse der Astreinheit des wert-

1) Ähnliche, teilweise vielleicht sogar bessere Eigenschaften des Holzes vermag der Halbschattenwuchs zu erzeugen (vgl. Duesberg „Der Wald als Erzieher.“); doch wäre unseres Erachtens ein Schaffen solcher Wuchsbedingungen für die gesamte Bestockung mit so großen Schwierigkeiten, allein schon hinsichtlich der im nächsten Kapitel zu besprechenden Ernte verknüpft, daß dieser Weg für die große Praxis nicht in Frage kommt. Das beweisen wohl schon Duesbergs Vorschläge bezüglich des Ernteverfahrens zur Genüge.

vollsten unteren Stammteils dichte Jugendbestockung zu fordern sein, die jedoch bei der Fichte und Tanne schon sehr frühzeitig in eine lockere Erziehung übergehen könnte. Dasselbe gilt dann in späterem Alter auch für die übrigen Holzarten, da die Schäfte die einmal erworbenen Eigenschaften durch spätere Bestandeslockerung nicht oder nur in geringem Maß wieder verlieren können.

Dichter Stand in der Jugend (wie auch Ueberschirmung in diesem Stadium) gestattet den Individuen nur, schwache Aeste zu bilden, die früh absterben und abgestoßen werden, im Gegensatz zu der starken unteren Bestattung weitständiger Pflanzkulturen, die erst spät abstirbt, noch viel später abgestoßen wird und demgemäß die Nutzholztüchtigkeit des unteren Schaftteils wesentlich vermindert. (Vgl. auch Seite 64.)

Astreinheit muß übrigens auf natürlichem Weg erreicht werden; künstliches Erzeugen derselben durch Astung kann vom ökonomischen Standpunkt aus, schon der hohen Kosten wegen, nur in sehr beschränktem Maß in Betracht kommen. Ueberdies verspricht Grünastung nur Erfolg am schwachen Reis und in der Jugend. Von Astung älterer Stämme unter Entnahme entsprechend starker Aeste einen Vorteil für die Nutzholzqualität erwarten zu wollen, wäre Selbsttäuschung, denn eine wesentliche Verbesserung der Holzstruktur wird durch die Astung nicht erreicht, jedenfalls steht sie in keinem Verhältnis zum Aufwand.

In gleicher Weise wirkt dichte Jugendbestockung günstig auf die Struktur des Holzes, die Gleichmäßigkeit der Jahrringbildung, vgl. Gayer, Gem. Wald S. 118; eine von diesem Zustand aus stetig gesteigerte Lockerung des Kronendachs, die auch den Zuwachs stetig hebt, vermag ohne Zweifel sehr günstig in der Richtung gleicher Jahrringbreiten zu wirken, im Gegensatz zu dem früher geschilderten unnatürlichen Wachstumsgang weitständiger Pflanzkulturen, die nach freier und üppiger Jugendentwicklung später in dichten Schluß geraten und längere Zeit in demselben erhalten werden.

Alle erwähnten Eigenschaften fördert dichte Jugendbestockung aber nicht allein durch die von ihr gebotenen Wachstumsbedingungen, sondern auch durch die große Zahl der Individuen, die der Wirtschaft reiches Material zur Auswahl liefert und ihr gestattet, nur bestbeanlagte, insbesondre gerad- und schlankwüchsige, wenig zu Verastung neigende Individuen für ihre Zwecke auszuwählen.

Die Bedingungen dichter Jugendbestockung erfüllt innerhalb ökonomischer Grenzen allgemein nur volle oder teilweise Naturverjüngung. Wie günstig die Güte des Holzes auch sonst durch diese Verjüngungsart beeinflußt wird, geht aus den auf Seite 66 gegebenen Zitaten R. Hartigs deutlich hervor.

Gibt somit die Naturverjüngung einerseits beste Garantie für Erfüllung unserer Forderungen, insbesondre der Astreinheit, so zeigt sie andrerseits eine für die Güte der Erzeugnisse ungünstige Neigung, sofern sie der Vereinigung

mehrerer Altersklassen auf derselben Fläche zustrebt, ja fast undenkbar ist ohne Mischung mindestens der jüngsten und ältesten Altersklasse. Diese Vereinigung aber führt zu Fällungs- und Räumungsschäden, vollends, wenn die nachher zu erörternde Forderung durchgeführt werden soll, daß die räumliche Ordnung das schadloße Aufbereiten und Abrücken aller, auch der längsten und schwersten Sortimente gestatten soll.

Wo mehrere Altersklassen auf der Nutzungsfläche vereinigt sind und längste und schwerste Sortimente ausgehalten werden sollen, da sind Rindenbeschädigungen am jüngeren Holz gar nicht zu vermeiden. Diese Beschädigungen sind, wo es sich nicht um ganz jungen Anflug handelt, auch in technischer Beziehung durchaus nicht harmlos. Die durch die Fällung und besonders durch das Wegschleifen der Stämme entstehenden Rindenschäden am untern Schaftteil überwallen allerdings in mehr oder weniger kurzer Zeit, der Schaden verschwindet dadurch fürs Auge, wird aber nicht gebessert, er bleibt vielmehr als brauner oder schwarzer Fleck oder Streifen im Innern des Schaftes erhalten, umgeben von Holzschichten mit einer durch die Ueberwallung verursachten ungleichmäßigen Struktur — technische Schäden, die zutage treten, sobald das Holz gefällt und verarbeitet wird. Der Nachteil für die Forstwirtschaft, liegt alsdann, auch wenn sich der Schaden meist nur in geringe Höhe erstreckt, darin, daß er gerade am Stockabschnitt hervortritt, also bei langen Stämmen am einzigen Ort, der ein Urteil über die innere Beschaffenheit des Holzes zuläßt. Jede Rindenbeschädigung am älteren Jungwuchs bildet somit eine bleibende Beeinträchtigung der Nutzholzqualität; durch Ueberwallen wird der Schaden nicht wieder gut gemacht, sondern nur verdeckt.

Diesem Schaden beugen wir, ebenso wie vollständigem Zerstören und Schiefdrücken der Jungwüchse, nur vor durch möglichst frühzeitige und weitgehende Trennung der Altersklassen, soweit diese sich mit voller Naturverjüngung irgend vereinigen läßt. Die Ernteprodukte dürfen mit erstarktem Jungwuchs nicht mehr in Berührung kommen.

Die technischen Ansprüche an die Güte der Forsterzeugnisse führen somit übereinstimmend zu folgenden Forderungen an die räumliche Ordnung:

Das Holz soll erzogen werden im gleichwüchsigen Hochwald mit — jedenfalls in der Jugend — geschlossener Bestockung. Diese soll hervorgehen aus möglichst dichter Naturverjüngung, jedoch bei frühzeitiger räumlicher Trennung von altem und jungem Bestand, also kürzestem speziellem Verjüngungszeitraum. Den besten Aufbau des Holzkörpers, besonders gleiche Jahrringbreiten, erzielen wir durch zunehmendes Lockern des Kronendachs vom Stangenholzalter ab und schließliches Lichten desselben unter Erhaltung eines bodenschützenden Unterstands von Schattenhölzern, besonders Buche (vgl. R. Hartig l. c. S. 105).

Betrachten wir nun die verschiedenen **Betriebsarten** im Hinblick auf diese Forderungen, so zeigt sich den letzteren der **Blenderbetrieb** wenig gewachsen. Er nötigt nicht alle Stämme zu vorwiegender Schafthbildung, sondern gestattet — infolge des Freistands von Einzelstämmen und Gruppen — zahlreichen Individuen eine reiche Astentwicklung und erzeugt deshalb einen verhältnismäßig hohen Anteil von Reisig und Brennholz an der Gesamtmasse, während aus demselben Grund nicht alles Schafthholz die Eigenschaften der Langschaftigkeit, Vollholzigkeit und Astreinheit besitzt.

Bei der ordnungslosen Vereinigung aller Altersklassen auf derselben Fläche, die diese Betriebsform kennzeichnet, ergeben sich überdies zahlreiche Fällungsschäden am jüngeren Holz, die weiterhin die Nutzholzgüte beeinträchtigen. Auch der Bau der Jahrringe muß vielfach ungleiche Entwicklung zeigen¹⁾, einmal, weil die Betriebsform notwendig bald zu lang dauernder Ueberschattung, bald zu vollkommenem oder einseitigem Freiland führt, wobei der Uebergang aus dem einen ins andere Extrem nicht selten unvermittelt eintritt, und dann, weil der Anteil der Randstämmen von Gruppen und Horsten, die stets einseitige Entwicklung zeigen, an der Gesamtmasse ein verhältnismäßig großer ist. Es liefert also ganz unzweifelhaft der Blenderwald weniger Nutzholz als der gleichwüchsige Hochwald, das zudem teilweise durch Astigkeit und ungleichförmigen Bau weniger wertvoll ist — ein Nachteil, den die Vorzüge der Naturverjüngung, der schattenreichen, daher langsamen Entwicklung in jüngerem Alter, vielleicht auch einer größeren Massenerzeugung nicht auszugleichen vermögen. Vergl. auch die Äußerungen **Bühlers** auf der deutschen Forstvers. zu Wildbad 1880 (Ber. S. 111) und die erschöpfenden Ausführungen **Fürsts** in seiner Schrift: Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? (S. 23—28), sowie endlich die Aufsätze des Verfassers unter dem Titel: „Blenderwald oder schlagweiser Hochwald“ im Forstwiss. Centralbl. 1908 S. 16 und 1909 S. 23.

Diesen Nachteilen, die den Blenderbetrieb im Ertragswald ausschließen, vermag der verwandte **Blenderschlagbetrieb** nur bei größter Sorgfalt im Verfahren und in der Ausführung zu entgehen, sei es durch horst- und gruppenweise Verjüngung und stetige Abstufung, sowie Verbindung mit dem Saumschlag wie in Bayern, sei es durch weitgehende Sorgfalt bei der Nutzung und durch Vorwuchspflege (Astungen vor der Fällung und an den Vorwüchsen), wie in Baden und im Elsaß. Aber hiedurch werden Schlagbeschädigungen, auch am älteren Anflug, nie ganz vermieden werden können, sagt doch **Wappes** für Bayern (Centralbl. f. das ges. Forstwesen 1904 S. 393): „Wo Langholz erhalten wird, müssen eben die letzten Zwischenbänder mit einem Male geräumt und erforderlichenfalls ausgepflanzt werden“.

Günstige Voraussetzungen scheint dagegen hier zunächst der **Schirmschlagbetrieb** zu bieten, da er mit Naturverjüngung ein gleichaltriges Aufwachsen des Bestandes verbindet und so all die geforderten und erwünschten Eigenschaften der Erzeugnisse sichert. Die Nachteile sind bei dieser Betriebsform

1) **R. Hartig**: „Das Holz der deutschen Nadelwaldbäume“ S. 63: „Die festen harten engringigen Kerne vieler aus dem Plänterwald stammenden Bäume sind ja zur Genüge bekannt.“

im Verjüngungsstadium zu suchen. Für dieses gestaltet sich das Urteil anders im Hinblick auf den jungen Bestand, für den schlimme Schäden nur vermieden werden bei kürzester Verjüngungsdauer, d. h. sofern die Verjüngung und Räumung *rasch* und über ganz schwachen und sehr reichlichen Anflug weg erfolgt. Dies ist jedoch im großen Betrieb aus zahlreichen Gründen, besonders wegen der Unsicherheit des Gelingens der Besamung und des gleichmäßigen Ankommens auf großer Fläche praktisch undurchführbar. So müssen wir bei Schirmschlag fast durchaus mit längerer Verjüngungsdauer rechnen und diese führt infolge der Einzelmischung der alten Nachhiebsmasse mit dem heranwachsenden jungen Bestand zu schwerer Beschädigung, ja nicht selten völliger Zerstörung des Jungwuchses, wo es sich nicht um sehr unempfindliche Holzarten und geringe Nutzholzausbeute handelt, wie etwa bei der Buche.

Am günstigsten verhält sich auch diesen Forderungen gegenüber der *stetige Saumschlag* in seinen verschiedenen Hiebsformen. Er sorgt für gleichwüchsige Erziehung der Stämme und führt die räumliche Trennung der Altersklassen in demjenigen Maß durch, das überhaupt mit Naturverjüngung vereinbar ist.

Im Blendersaumschlag erwachsen selbst bei langsamstem Vorrücken der Verjüngung alle Individuen in fast gleichaltriger Umgebung und zeigen also diejenigen guten technischen Eigenschaften, die der gleichaltrige Hochwald verleiht und die vollberechtigte Forderungen des ökonomischen Prinzips an die Forsterzeugnisse bilden. Dabei sind trotz sicherster Naturverjüngung und ausgiebigster Benützung der Samenjahre die Jugendbeschädigungen auf ein Mindestmaß beschränkt, da die Trennung von Altholz und Jungwuchs so weit und dabei in so günstiger Form durchgeführt ist, als dies sichere Naturverjüngung irgend gestattet; zum mindesten besteht immer die Möglichkeit, die Ernteprodukte ohne Berührung mit dem älteren Jungwuchs und ohne Schaden wegzuschaffen, wie im nächsten Kapitel näher nachgewiesen werden soll. Dabei gibt uns diese Verjüngungsform die beste Gewähr dafür, daß wir zu dichten Jungwüchsen gelangen, auch gestattet sie, dieselben einer genügend langdauernden Beschattung mit allmählichem Uebergang zum Lichtstand zu unterwerfen, zwei Momente, die eine starke Astbildung am untersten Stammenteil verhindern und einer gleichmäßigen Holzstruktur günstig sind.

Der Blendersaumschlag erfüllt somit alle hier gestellten Forderungen.

2. Kapitel.

Die Ernte des Holzes.

Eine wichtige Aufgabe der Wirtschaft ist die Ernte des hiebsreifen Bestands; sie umfaßt das Fällen, das Aufbereiten und das Anrücken des Holzes an die Wege. Mitentscheidend für den Wirtschaftserfolg ist die Art und

Weise, wie diese Arbeiten durchgeführt werden und diese Durchführung wiederum ist abhängig von der räumlichen Anordnung der Altersklassen.

Von größtem ökonomischem Interesse ist zunächst, daß die Ernte möglichst geringe Kosten verursache, denn der Ernteaufwand bedeutet eine unmittelbare Schmälerung des Waldertrags, und weiterhin, daß die räumliche Anordnung ohne Schädigung des Waldes volle Freiheit in bezug auf Aufbereitung beliebiger Sortimente lasse, denn jede Beschränkung freier Sortimentsbildung wirkt ungünstig auf den Roherlös.

Was die Ausmaße (Dimensionen) der Sortimente betrifft, so spielt hier fast allein die Länge eine Rolle, im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Stücke ohne Schaden aus dem Schlag wegzuschaffen. Verhältnismäßig geringe Bedeutung in bezug auf Wertschätzung hat nun allerdings die Länge bei den Laubholzsortimenten, so daß dort nur geringe Gefahr droht; um so wichtiger ist sie dagegen bei den Nadelhölzern, und wenn sie hier auch nicht allorts in gleichem Maße entscheidend wirken mag, so ist sie doch jedenfalls überall ein wichtiger wertsbestimmender Faktor.

Beim Nadelholz genießen die Langholzsortimente, die den nutzholztüchtigen Baumschaft möglichst in voller Länge umfassen, die allgemeinste und höchste Wertschätzung, denn sie gestatten die Beförderung auch in Flößen und sie lassen, was von entscheidender Bedeutung ist, jede Art von Verwendung zu; sie sind in voller Länge als Gerüstholz, Leitungstangen u. s. f. zu gebrauchen und gestatten die Einteilung in Bau- und Sägeholz verschiedenster Ausmaße. Letzteres ist darum besonders wichtig, weil das Ablängen der Bauhölzer nach ihren wechselnden Ausmaßen, bei dem nur die volle Länge der Schäfte eine möglichst zweckmäßige Einteilung gestattet, nicht im Wald, sondern nur auf den Sägewerken erfolgen kann, (es gibt hier keine Normallängen).

Besonders für die an den Rhein liefernden süddeutschen Waldgebiete hat das Nadellangholz große Bedeutung erlangt, einmal wegen der Möglichkeit der Floßbeförderung, und dann, weil der drückende Wettbewerb des Auslands in den sog. breiten Schnittwaren die heimischen Sägewerke mehr und mehr auf das Bauholzschneiden nach Listen hingedrängt hat. Dieses Bauholzschneiden gilt bei uns noch als verhältnismäßig lohnendstes Geschäft, weil ein Schneiden von Bauhölzern in Normalmaßen, also auf Vorrat, nur in beschränkter Weise möglich ist und darum hier ein Wettbewerb des Auslandes sehr erschwert wird, im Gegensatz zu den breiten Schnittwaren, die nach Normalmaßen auf Vorrat geschnitten werden und sich leichter mit der Bahn auf große Entfernungen verschicken lassen. Zu Bauholz aber sind als Rohstoff Langhölzer notwendig, die erst auf den Sägewerken nach Angabe der Listen eingeteilt werden. Haben wir somit im Nadellangholz nicht allein ein allseitig verwendbares Sortiment, sondern auch ein solches vor uns, dessen unsere Abnehmer in hohem Maße bedürfen, so wird für den Aufbau eines allgemein gültigen Wirtschaftssystems erste Bedingung sein, daß ein unbeschränktes Aushalten dieses Sortiments ohne Schaden oder besonderen Aufwand sichergestellt wird.

Dem wirtschaftlichen Drängen nach Langholzaufbereitung ist man denn

auch in Süddeutschland längst in weitester Ausdehnung gefolgt, und der Grund, weshalb die Naturverjüngung in den alten Großschlagformen immer weniger gelingen wollte, und dadurch in Rückgang gekommen ist, dürfte sicherlich mit anderem auch in dieser Aenderung der Sortimente zu suchen sein, dem grundsätzlichen Aushalten aller Nadelnutzhölzer in voller Länge, durch das bei Verjüngung auf großer Fläche die Mehrzahl alles dessen wieder zerstört zu werden pflegt, was vorher mit größter Sorgfalt herangezogen worden war.

Das ökonomische Wirtschaftsziel voller Freiheit in der Sortimentsbildung nun erreicht in weitestem Maße der *Kahlschlag*. Bei ihm steht die Nutzungsfläche ausschließlich dem Erntebetrieb zur Verfügung; diese Betriebsform kann daher ungehindert und ohne jede besondere Sorgfalt nutzen, die Ernte wird weder nach irgend welcher Richtung erschwert oder verteuert, noch unterliegt die Wirtschaft in bezug auf das Aushalten beliebig langer oder schwerer Sortimente irgend welcher Beschränkung. Wir können somit, soweit nur die hier in Rede stehende Seite in Betracht gezogen wird, den Kahlschlag ohne weiteres in ökonomischer Beziehung als günstigste Betriebsform bezeichnen. Er bringt die junge Altersklasse erst auf die Fläche, nachdem diese vollkommen vom alten Holz geräumt ist, so daß sowohl Erschwerungen der Ernte als auch Beschädigungen ausgeschlossen sind.

Anders liegen die Verhältnisse bei *Naturverjüngung*. Hier kann die Ernte nicht frei über die Fläche verfügen, denn Naturverjüngung erfordert eine Vereinigung mehrerer Altersklassen auf derselben Fläche, mindestens der ältesten und jüngsten; der Jungwuchs muß schon da sein, ehe das Altholz vollkommen entfernt wird. Bei der Ernte des alten Holzes ist somit auf das vorhandene jüngere Holz Rücksicht zu nehmen, soll dieses nicht schwer beschädigt oder gar vernichtet werden, — eine Rücksichtnahme, die in gesteigerten Erntekosten und in Beschränkung der freien Sortimentsbildung zum Ausdruck kommt. Es wirft sich daher die Frage auf: Ist es möglich, die ungünstigen äußeren Umstände durch entsprechende räumliche Anordnung der Altersklassen zu vermeiden, ohne dabei dem Hauptzweck, der sicheren Naturbesamung, Abbruch zu tun?

Die Wirkung der Erntearbeiten selbst auf jüngeres Holz ist eine durchaus ungünstige. Bei der Fällung alter Bäume ist ein je nach deren Gewicht und Höhe mehr oder weniger heftiges Aufschlagen des Schafts und insbesondere der Krone auf den Boden kaum zu vermeiden, wobei die diesen bedeckenden Pflanzen der jüngsten Altersklasse zertrümmert, die der älteren abgebrochen, zur Seite gebogen oder durch Anstreifen seitlich ihrer Rinde beraubt werden. Das Zerstörungswerk vollenden dann die *Aufbereitungsarbeiten*: Das Drehen der Schäfte und Schaftteile zum Zweck der Entastung und Entrindung, das Aufspalten der Trümmer, das Aufsetzen des Erntematerials, insbesondere des Reisigs, auf Haufen, und das mehr oder weniger langdauernde Lagern dieser Haufen am Ort der Aufbereitung, worauf endlich das *Anrücken* schwerer und langer Stücke die Beschädigungen auch

noch auf die Bahn vom Fällungsort zum nächsten Weg ausdehnt. Insbesondere wirkt das Schleifen der Stämme durch Abbrechen, Zurseitedrücken, Entrinden der jungen Bestockung sehr nachteilig, am schlimmsten, wenn mit langen Stücken Schwenkungen ausgeführt werden müssen.

Der gesamte Schaden ist um so größer, je größer und schwerer die aufbereiteten Bäume sind und je umfangreichere Sortimente ausgehalten werden. Er ist aber ebenso sehr abhängig von Alter und Beschaffenheit des jüngeren Holzes, über dem die Nutzung stattfindet. Je höher sich die jüngeren Individuen über den Boden erheben, je stärker ihre Schäfte sind, um so schwerer werden naturgemäß auch die Beschädigungen sein und um so empfindlicher sind die Individuen gegen solche.

Damit erweist sich als ein wichtiger Faktor das Alter, und zwar sowohl das der Erntegegenstände, wie dasjenige des jüngeren Holzes. Der Schaden, den die hiebsreifen Bäume verursachen, wird mit deren Gewicht und Ausmaßen, insbesondere der Kronenausdehnung und Schaftlänge, daher mit dem Alter steigen, und zwar ist dies in sehr erheblichem Maße der Fall.

Entscheidenden Einfluß auf die Größe des Schadens aber übt das Alter des jungen Holzes, und zwar in dem Sinne, daß Anflug in den ersten Lebensjahren bzw. bis zu etwa $\frac{1}{2}$ m Gipfelhöhe vernichtenden Schlagschäden wenig ausgesetzt ist; über ganz jungem Anflug läßt sich daher die Ernte bei einiger Sorgfalt ganz wohl ohne große Zerstörung durchführen, besonders, wenn günstige äußere Umstände, wie Schutz durch eine Schneedecke, vorliegen. Von hier ab steigt jedoch die Gefährdung mit dem Höherwerden sehr bedeutend und hält bis zum Ende des Stangenholzalters an.

Aehnlichen Einfluß übt die Art der räumlichen Verteilung der Altersklassen über die Fläche. Je gleichmäßiger das Altholz über die Fläche verteilt ist, desto größer wird auch der Ernteschaden sein, je mehr es dagegen auf bestimmte Flächenteile vereinigt ist und vom Jungwuchs geschieden bleibt, desto eher wird sich großer Schaden verhüten lassen.

Man kann daher allgemein sagen: die Ernteschwierigkeiten und dementprechend die Schäden werden um so größer, je mehr Altersklassen auf derselben Fläche vereinigt, je inniger dieselben gemischt sind, und je älter bei nur 2 Altersklassen die eine oder die andere, insbesondere aber der Jungwuchs zwischen den Altholzstämmen, ist. — Wollen wir nun die Gefahren und damit die Ernteschwierigkeiten vermindern, so müssen wir auf möglichst weitgehende Trennung der Altersklassen hinarbeiten und dafür sorgen, daß die Besamungsflächen so frühzeitig als möglich geräumt werden, was einer grundsätzlich niedrigen speziellen Verjüngungsdauer, zu der wir schon auf anderem Wege gelangt sind, entsprechen würde.

Noch ist der Vollständigkeit wegen zu erwähnen, obgleich dieses Moment für unsere Untersuchungen keine weitere Bedeutung hat, daß das Maß der Ernteschäden auch abhängig ist von der Holzart. Nicht bei allen Holzarten zeigen die Jungwüchse gleich große Empfindlichkeit nach dieser Richtung; am größten ist dieselbe wohl bei Fichte und Kiefer, weniger empfindlich

ist die Tanne, während endlich die meisten Laubhölzer sich verhältnismäßig viel leichter von Schlagschäden erholen, als die Nadelhölzer.

Dem Gefahrengrad parallel laufen nun die Maßregeln, welche die Wirtschaft ergreift und ergreifen muß, um Schaden zu verhüten und diese kommen zum Ausdruck teils in gesteigerten Erntekosten, teils in Beschränkung der Sortimentsbildung. Damit geben uns diese Betrachtungen einen Fingerzeig dafür, nach welcher Richtung wir tätig werden müssen, wenn wir die oben gestellten ökonomischen Forderungen nach niedrigsten Erntekosten und freier Sortimentsbildung bei Naturverjüngung erfüllen wollen. Wir müssen auf Verminderung der Gefahren für den Anflug bei der Ernte hinarbeiten, um kostspielige Erntemaßregeln entbehrlich zu machen und frei sortieren zu können, und wir können dies Ziel erreichen, wenn wir die räumliche Ordnung im Walde nach der Richtung einer möglichst weitgehenden räumlichen Trennung der Altersklassen beeinflussen.

Andere Mittel, die geeignet sind, Schaden am Jungwuchs bei Naturverjüngung zu verhüten, stehen zwar der Forstwirtschaft in genügender Zahl zur Verfügung, doch fragt sich, ob diese Mittel den oben aufgestellten ökonomischen Forderungen entsprechen. Zu nennen sind:

- die Verwendung besonders tüchtiger Arbeiter,
- das Entasten der zu werfenden Stämme vor der Fällung,
- das Zerschneiden der Schäfte in kürzere und leichtere Stücke,
- das pflegliche Anrücken der Hölzer an die Wege auf Kosten des Waldbesitzers.

Diese Hilfsmittel, die vielfach angewendet und empfohlen werden, wo es gilt, die natürliche Verjüngung vor Schaden zu sichern, wären nun zunächst kritisch zu betrachten.

Manche Betriebsformen bzw. Arbeiten innerhalb derselben setzen „besondere Geschicklichkeit und Tüchtigkeit der Arbeiter“ voraus. Verjüngungsverfahren, die diese Voraussetzung machen müssen, schließen sich unseres Erachtens damit vom allgemeinen Wettbewerb aus, sie sind nicht an jedem Ort anwendbar, denn auf besondere Geschicklichkeit der Arbeiter ist nicht durchweg zu rechnen. Weise (Mündener forstl. Hefte V S. 58) betont die fast überall festzustellende Abnahme der ständigen und geübten Arbeiter und findet einen Widerspruch darin, daß bei solcher Sachlage die „Weiterverbreitung komplizierter Betriebsformen“ (gemeint ist der Blenderschlagbetrieb) empfohlen werde. Dem ist zuzustimmen, wenn auch die Möglichkeit nicht bestritten werden soll (Gayer und Fürst gegenüber), daß die Arbeiter angelehrt werden können. Ein solches langandauerndes bzw. oft wiederkehrendes Anlernen, wie es wechselnde Arbeiterschaft mit sich bringt, ist jedoch eine teure und zweifelhafte Sache, da den Leuten während der Lernzeit bei geringer Leistung gleiche oder höhere Löhne gewährt werden müssen; auch bedeutet es eine große Belastung der Verwaltung. Eine Betriebsform, die ohne besondere Geschicklichkeit der Ausführenden nicht erfolgreich bestehen kann,

mag wohl örtlich mit Erfolg angewendet werden und anwendbar sein, allgemein ist sie es nicht, jedenfalls nicht ohne Steigerung der Erntekosten. Es wäre ihr zum mindesten eine möglichst einfache Form, die keiner weiteren Uebung bedarf, bei gleichem Erfolg vorzuziehen.

Uebrigens kann selbst für Gegenden, die sich heute noch tüchtiger Arbeitskräfte in großer Zahl rühmen dürfen, die Zeit kommen, wo diese immer schwerer zu beschaffen sind und schließlich ganz verschwinden. Was soll dann werden, wenn verwickelte Verjüngungsformen im großen eingeleitet worden sind? Dann ist die Beibehaltung der Betriebsform nur mit wesentlich gesteigerten Erntekosten oder mit vermindertem Erfolg möglich. Wir haben daher allen Anlaß, für die Zukunft auf möglichste Vereinfachung des Erntebetriebs hinzuwirken. Die Erntearbeiten sollen so beschaffen sein, daß sie von jedem, auch dem wenig geübten Arbeiter ausgeführt werden können und leicht zu erlernen sind.

Den größten Schaden bei der Fällung verursacht, wie gezeigt wurde, das Aufschlagen starker Kronen der Altholzstämmе auf dem mit Anflug bewachsenen Boden. Vielfach wird daher die Entastung stark bekronter Stämme vor der Fällung geübt und empfohlen. So läßt z. B. Kautzsch (Allg. F. u. J. Ztg. 1893 S. 351) alle Stämme, die über Jungwuchs gefällt werden sollen, bis hinauf in die Spitzen entasten. Aehnlich sprechen sich badische Praktiker aus und ebenso wird in vielen Privatwaldungen mit ungleichaltriger Bestockung verfahren (vgl. 1. Abschnitt).

Wir können vom ökonomischen Standpunkt aus diese Astungen nur als Ausnahme maßregeln betrachten, ihre dauernde allgemeine Anwendung im Großbetrieb kann wohl nicht ernstlich in Frage kommen. Das Abhauen der Äeste vor der Fällung ist nämlich eine sehr schwierige, gefährliche, anstrengende und die Kleider schädigende, daher teure Arbeit. Wer wird uns künftig noch auf die hohen Bäume klettern und sein Leben aufs Spiel setzen? Die Lust hiezu hat heute schon vielfach sehr bedeutend abgenommen. Die Arbeiter sind nicht mehr so abgehärtet und nicht mehr ohne Ueberlegung zu jeder Arbeit bereit, wie dies früher wohl der Fall war; sie sind klüger geworden und übernehmen gefährliche und anstrengende Arbeiten nicht mehr in blindem Gehorsam zum gewöhnlichen Lohn, sondern fordern, wenn sie sich überhaupt bereitfinden lassen, entsprechende Lohnerhöhung. Wo heute noch der alte patriarchalische Zustand herrscht, wird er nicht mehr lange währen; jedenfalls läßt sich für die Zukunft keine zweckmäßige Betriebsform auf Entastung vor der Fällung im großen gründen, daran hindern allein schon die Kosten und die Unmöglichkeit, die für allgemeine Durchführung erforderlichen Arbeiter zu gewinnen, vgl. Schiffel, Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1906 S. 353. Was würde die Unfallversicherung dazu sagen, wenn solch gefährliche Arbeiten dauernd im großen im Wald vorgenommen werden wollten? Eine Betriebsform, die zu vollem Erreichen des Zwecks genötigt ist, Menschen vor der Fällung auf die Bäume klettern zu lassen, hat unseres Erachtens heute keine wirtschaftliche Berechtigung mehr. Die räumliche Ordnung

soll vielmehr Mittel und Wege finden, die diese Arbeit unter allen Umständen vermeidbar macht.

Besonderer Beachtung wert scheint uns Philipps dringender Hinweis auf die soziale Seite der waldwirtschaftlichen Ernte- und Anrückverfahren, — neben der rein technischen und ökonomischen Seite, die in der forstlichen Literatur fast allein Berücksichtigung findet. Philipp weist in einem, in der Tagespresse veröffentlichten Aufsatz (Freiburger Tagespost 1910 Nr. 20) in überzeugender Weise darauf hin, welcher Schaden an Leben und Gesundheit der Arbeiterschaft aus einem forstlichen Fällungs- und Beförderungsbetrieb erwächst, der nicht mit in erster Linie auf möglichste Verhütung von Gefahr und Ueberanstrengung der Arbeiter abgestellt ist.

Leider fehlt uns heute noch eine Bearbeitung der Statistik, die den Berufs-krankheiten der Waldarbeiter im besonderen nachgeht, sie würde sicher eine nicht mißzuverstehende Sprache reden!

Ein weiteres Mittel zum Schutz der Jungwüchse, diesmal gegen Rückungsschäden, ist die Zerkleinerung der Schäfte am Fällungsort in Stücke, die vermöge ihrer geringen Länge oder ihres kleinen Gewichts leicht und ohne Schaden nach den Wegen befördert werden können, im Gegensatz zur Aufbereitung langer und schwerer Nutzhölzer, denn je kleiner und leichter die Stücke, desto geringer der Schaden! Kurze Blöcke und Brennholz lassen sich fast ohne Schaden entfernen. Deshalb waren auch früher, zur Zeit der Blockholz- und Brennholzwirtschaft, manche Verfahren der Naturverjüngung, z. B. Schirmschlag, vielfach von gutem Erfolg begleitet und haben mehr oder weniger vollkommene Verjüngungen geliefert, und doch dürfen wir aus dem Umstand, daß sie uns schöne Bestände hinterlassen haben, nicht den Schluß ziehen, daß sie heute — bei schärfster Nutzholzausbeute — immer noch den gleichen Erfolg erzielen können. Das ist nur bei Holzarten der Fall, die kein oder wenig Nutzholz liefern.

Solches Zerschneiden der Langsortimente vermindert aber, besonders bei Nadelholz, meist den Verkaufswert, da durch das Zerlegen in kürzere Stücke ein wesentlicher Faktor der Wertschätzung — die Länge — ausscheidet; es widerspricht daher dem ersten ökonomischen Grundsatz bei der Ernte, daß alle Produkte in Dimensionen von möglichst vielseitiger Verwendbarkeit auf den Markt gebracht werden sollen, weil sie in dieser Form die höchste Wertschätzung genießen. Welche Folgen für den Waldbesitzer z. B. das Zerschneiden von Nadellanghölzern in Blöcke schon im Schlag — jedenfalls in Süddeutschland — hat, zeigt uns Philipp in seinen „Hilfstabellen...“ wo er (S. 54) für Baden sagt: „Durch die Verklotzung der Nutzholzstämmen tritt, wie ich mich durch Messungen überzeugt habe, bei Stämmen II. Klasse (Heilbronner Sortierung) eine Wertsverminderung von über 3 Mk., bei Stämmen I. Klasse von über 4 Mk. je Festmeter ein. Diese Tatsache scheint mir in der Praxis vielfach noch nicht genug gewürdigt zu werden. Nur durch zwingende Gründe sollte man sich zum Zerschneiden der Langhölzer bewegen lassen.“ Diese Ausführungen wird jeder süddeutsche Praktiker im Gebiet des rheinischen Markts ohne weiteres bestätigen müssen.

Eine Betriebsform, die uns nötigt, die Stämme oder auch nur einen geringen Teil derselben im Interesse der Verjüngung über die ökonomische Grenze hinaus zu zerkleinern, die also freie Sortimentsbildung ausschließt, hat somit keine wirtschaftliche Berechtigung, denn sie schmälert den Ernteertrag.

In gleichem Sinne wird empfohlen, das Anrücken des Stammholzes an die Wege auf Kosten des Waldbesitzers besorgen zu lassen, damit es in pfleglicherer Weise erfolge, als wenn es dem Käufer überlassen bleibt. Dieses Anrücken durch den Waldbesitzer stellt sich jedoch vom ökonomischen Standpunkt nur dann als zweckmäßig dar, wenn erhebliche Geländeschwierigkeiten vorliegen, die es als besser und gegebenenfalls billiger erscheinen lassen, wenn die Arbeit im ganzen auf Rechnung des Waldbesitzers besorgt wird. In allen anderen Fällen erscheint diese Maßregel ökonomisch nicht gerechtfertigt, da ihr regelmäßig kein voll entsprechender Mehrerlös gegenübersteht, so daß sie sich als eine Erhöhung der Erntekosten darstellt. Die Verteuerung ist dadurch bedingt, daß eine Leistung, die ein Fuhrmann mit Gespann in fortlaufender Arbeit besorgen könnte, in zwei getrennten Teilen durch zwei verschiedene Fuhrleute je mit Gespann erledigt werden muß.

So zeigen sich die sämtlichen besprochenen Mittel von ökonomischem Standpunkt aus als nicht einwandfrei, denn sie alle führen unmittelbar oder mittelbar zu einer Erhöhung des Ernteaufwands und demgemäß zur Schmälerung des Ertrags, während unsere Aufgabe im Gegenteil ist, auf möglichste Verminderung der Erntekosten hinzuarbeiten. Eine Steigerung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn der Wirtschaftszweck nicht auf billigerem Weg erreicht werden könnte. Dies ist jedoch möglich auf dem Weg entsprechender räumlicher Ordnung. Sie allein ist in der Lage, Schwierigkeiten und Kosten bei der Ernte ohne Schädigung des Verjüngungszwecks zu vermeiden und zwar durch zweckmäßige Anordnung der Altersklassen.

Unsere Forderungen an die räumliche Ordnung gehen daher im ökonomischen Interesse geradezu nach entgegengesetzter Richtung. Wir fordern für die Ernte: Entbehrlichkeit besonders geschickter Arbeiter, Vermeidbarkeit jeder Entastung vor der Fällung und jedes unerwünschten Zerschneidens von Nutzstücken, Beschränkung des Anrückens von Stammholz durch die Verwaltung auf sehr schwierige Fälle bei ungünstiger Geländebildung, während im übrigen solche räumliche Verhältnisse zu schaffen wären, die gestatten, daß diese Arbeit dem Käufer ohne weitere Gefahr überlassen werden kann. Dahin führt auch die Erwägung, daß die zunehmende Arbeiternot im Walde uns verbietet, Betriebsformen im großen anzuwenden, bei denen die Arbeiten, die auf Rechnung der Verwaltung vorgenommen werden, über das notwendigste Maß hinausgehen, besonders bei

gleichzeitig zunehmender Arbeitsintensität im Reinigungs- und Durchforstungsbetrieb, beim Wegebau u. s. w.

Unser ganzer Nutzungsbetrieb wäre somit so einfach und billig als möglich zu gestalten. Fällung und Anrücken hätten in möglichst ungehinderter und übersichtlicher Weise vor sich zu gehen, ohne eine über das normale Maß gesteigerte Arbeitsleistung und besondere Geschicklichkeit der Arbeiter.

Wollen wir unsere räumliche Ordnung im Wald in diesem Sinne formen, so weisen uns die nachfolgenden Einzelerfordernisse den Weg. Sollen nämlich Schäden verhütet, sollen die oben gezeigten Schwierigkeiten und Kosten bei der Holzernte vermieden werden, so müssen wir bezüglich der Altersklassenlagerung und Hiebsführung dafür sorgen, daß folgende Momente Berücksichtigung finden:

1. Es muß möglich sein, alle Stämme stets in der Richtung vom Jungwuchs weg zu werfen.

Die räumliche Ordnung hat für die Möglichkeit zu sorgen, daß bei der Fällung der Stämme deren Kronen nie in älteren Anflug fallen, sondern stets, wo nicht auf anflugfreien Boden, so doch in ganz jungen, noch wenig empfindlichen Anflug.

2. Alle Stämme mit Nutzholzschäften, also insbesondere alle Nadelholzstämmen müssen unmittelbar in die Anrückrichtung geworfen werden können, und zwar unbeschadet der ersten Forderung (vgl. Skizze S. 268). Nur dann läßt sich insbesondere das so schädliche Umschwenken der Stämme im Bestand beim Anrücken vermeiden, und gerade dieses muß seiner ganz besonderen Schädlichkeit wegen grundsätzlich verhütet werden.

Diese Forderung bedingt, daß sämtliche Bäume des Schlags in eine Richtung geworfen werden, die aufbereiteten Stämme also mehr oder weniger parallel zu liegen kommen. Welche Bedeutung für Vermeiden von Beschädigung des Anflugs die richtige Lage jedes einzelnen Langholzstamms in bezug auf Anrück- und Abfuhrrichtung hat, ist jedem Praktiker zur Genüge bekannt. Liegen alle Stämme des Schlags in der Anrückrichtung, so braucht jeder nur am dünnen Ende gefaßt und geradlinig, also auf schmalster Bahn weggeschleift zu werden, wobei sich die Schäden auf ein Mindestmaß beschränken.

3. Jede örtliche Häufung der Erntearbeiten muß sich vermeiden lassen.

Es sollen nicht zahlreiche Stämme gleichzeitig an einer Stelle gefällt werden (Löcherhiebe...), denn dadurch entsteht eine schädliche Häufung der Ernteerzeugnisse, die zu gesteigertem Schaden führt, weil gegenseitige Behinderung die Folge ist und bei Fällung und Abfuhr wegen des notwendig werdenden Ausweichens den erstgestellten Forderungen nicht genügt werden kann.

4. Endlich muß die räumliche Ordnung darauf gerichtet sein, daß stets die

Bahn vom Ernteort zum nächsten Weg freibleibt von Anflug und junger Bestockung.

Das Anrücken an die Wege sollte nur durch haubares oder wenigstens angehend haubares Holz erfolgen, da, wie gezeigt, Jungwüchse und jüngere Bestände bis über das Stangenholzalter hinaus großen Beschädigungen ausgesetzt wären, und zwar infolge ihrer größeren Stammzahl und der Zartheit ihrer Rinde. Niemals dürfen daher ältere Hölzer durch jüngere Bestockung vom Weg abgeschnitten werden. Eine ähnliche Forderung in bezug auf Schlagführung stellt schon Cotta in seiner „Forsteinrichtung und -abschätzung“ (1820 S. 31) auf, indem er verlangt, die Schläge müßten so angelegt werden, daß man nicht gezwungen sei, das Holz von den nachfolgenden Schlägen durch die vorher schon geführten abzuführen.

Die räumliche Anordnung der Altersklassen erlangt nun da erhöhte Bedeutung, wo die Abrückrichtung des Holzes eine gezwungene ist, nämlich im stärker geneigten Gelände. Dort ist, wie später noch näher ausgeführt werden soll, die Richtung des Anrückens durch die Neigungsrichtung des Geländes mehr oder weniger fest bestimmt, da das Anrücken in der Regel bergab zu erfolgen hat; hier müßte also die Strecke vom Fällungsort bergab bis zum nächsten Weg frei von junger Bestockung sein.

Weiterhin ergibt sich aus dieser Forderung noch für die räumliche Ordnung, daß Flächen verschiedener wirtschaftlicher Behandlung (sei es nach Betriebsart, Umtriebszeit oder Holzart), auch wirtschaftlich unabhängig voneinander gehalten, d. h. durch Wege getrennt sein müssen, so daß auf diesen die Walderzeugnisse ohne Berührung mit Flächen anderer Bewirtschaftung genutzt und abgeführt werden können.

Betrachten wir die besprochenen Momente, denen die räumliche Ordnung Rechnung tragen soll, so finden wir, daß sich dieselben vereinigen in den Forderungen einer möglichst weitgehenden Scheidung der Altersklassen, insbesondere der Vermeidung regelloser Mischung derselben, bei Naturverjüngung somit einer möglichst frühzeitigen Trennung von Mutter- und Tochterbestand.

Auch hier zeigt sich also die für die Forstbenutzung schon im ersten Kapitel zutage getretene Neigung nach räumlicher Trennung der Altersklassen. Wir haben derselben somit im ökonomischen Interesse zu folgen, soweit dies die Erfordernisse der Naturverjüngung irgend zulassen.

Von den verschiedenen Betriebsformen zu deren kritischer Betrachtung an der Hand der gestellten Forderungen wir nunmehr übergehen, sind es wiederum:

Blenderbetrieb und Blenderschlagbetrieb,

die sich am meisten von den aufgestellten Grundsätzen — besonders denjenigen räumlicher Trennung der Altersklassen — entfernen, und daher durch erschwerte und verteuerte Nutzung gekennzeichnet sind.

Die ungleichaltrigen Betriebsformen vereinigen alle oder mehrere Altersklassen in unregelmäßiger Mischung auf der Nutzungsfläche; bei ihnen wird also die Gefahr des Zusammenstoßes zwischen den fallenden Stämmen oder den aufbereiteten Teilen und dem jüngeren Holz am größten sein, und zwar sind hier die jüngeren Altersklassen den Beschädigungen bei der Ernte der älteren in um so höherem Maße ausgesetzt, als die haubaren Stämme infolge bisherigen Freistands vielfach stark entwickelte Kronen besitzen, und die jüngeren Individuen das Alter geringster Empfindlichkeit meist längst überschritten haben.

Als erste Notwendigkeit tritt daher häufig das oben verurteilte Entasten vor der Fällung hervor, wie es denn auch nach Mitteilungen in der Literatur in Schwarzwald und Vogesen geübt wird (vgl. z. B. die Verhandlungen der deutschen Forstvers. zu Wildbad 1880: Sch u b e r g, Ber. S. 71, P r o b s t, Ber. S. 84, sowie Regel 12 von K a u t z s c h s Beiträgen zur Weißtannenwirtschaft 1895 S. 71, in der das Aufasten und Anrücken derjenigen Stämme gefordert wird, die im Anflug stehen). Ja, selbst auf das stehen bleibende Holz erstreckt sich in Baden, wie früher gezeigt wurde, die Astung, und zwar soll sie, wie S c h ä t z l e fordert, mit „besonderer Sorgfalt“ ausgeführt werden.

In ähnlicher Weise führt die blendernde Hiebsführung durch die Schwierigkeiten, die sich infolge der unregelmäßigen Mischung der Altersklassen ergeben, zum Zerschneiden der Langhölzer und zum Anrücken auf Kosten der Verwaltung — alles zur Schonung des verbleibenden Bestands. Ueberall wird endlich auf besondere Tüchtigkeit und Geschicklichkeit der Arbeiter hingewiesen, als eines ausdrücklichen Erfordernisses dieser Verjüngungsformen (vgl. z. B. G a y e r, Femelschlagbetrieb S. 28, F ü r s t, Plänterwald oder schlagweiser Hochwald? S. 42).

Den oben ausgesprochenen Grundsätzen am nächsten steht von den ungleichaltrigen Formen ohne Zweifel das bayrische Femelschlagverfahren, da es durch seine horstweise Verjüngung und Randbesamung in der räumlichen Trennung der Altersklassen von allen am weitesten geht, und insbesondere grundsätzlich vermeidet, Einzelstämme oder kleine Gruppen im Jungwuchs stehen zu lassen. Deshalb bedarf es auch der Maßregel der Entastung stehender Stämme vor der Fällung nicht oder nur selten. Den Vorteil, daß bei diesem Verfahren die Nachhiebsreste nur an den Rändern der Jungwüchse stehen, betont besonders B r a z a l. c., Ber. S. 37. Diese Altholzreste allerdings, welche die Flächen bandförmig durchziehen, bieten bei ihrer Räumung größere Schwierigkeiten, sofern nicht für die Nachhiebsstreifen auf Erzielen oder volles Erhalten des Anflugs mehr oder weniger verzichtet wird (vgl. W a p p e s l. c.).

Schlimmer steht es unseres Erachtens auch hier mit dem Wegschaffen

der Schlagerzeugnisse, dasselbe wird erschwert durch die ungleichförmige Verteilung von Altholz und Jungwuchs, wogegen Gayer (Gem. Wald S. 98), der den erschwerten Fällungsbetrieb zugibt, das Ausbringen des Holzes als nicht schwierig bezeichnet. Dies gilt wohl in erster Linie nur für die Anfangshiebe, weil älterer Anflug noch fehlt, während sich Schwierigkeiten um so mehr zeigen, je weiter die Verjüngung fortschreitet. Entscheidend scheint uns dabei, daß bei gruppen- und horstweiser Verjüngung die Stämme stets von den Horsten weg, also nach allen Seiten geworfen werden müssen, wodurch zahlreiche Schwenkungen, dazu Umwege um die Horste herum notwendig werden. Nur bei reichster Besamung, schwächerem Holz und zahlreich vorhandenen Wegen kann solche Abfuhr ohne größeren Schaden abgehen. Soll dieser vermieden werden, so muß die Verwaltung das Anrücken selbst in die Hand nehmen und müssen lange Schäfte in kürzere Trümmer zerlegt werden, besonders gilt dies für die Fichte, deren Anflug sehr empfindlich gegen Rückungsschäden ist.

Ohne Zweifel ist die Ernte in waldbaulicher wie ökonomischer Beziehung der wunde Punkt aller ungleichaltrigen Betriebsformen, ihre Vertreter betonen stets auch ganz besonders die waldbaulichen Vorteile, während jene doch ebenso wichtige Seite der Sache wenig berührt wird. Die Erntekosten, wie die häufige Beschränkung freier Sortimentsbildung lassen uns die ungleichaltrigen Formen nicht als wirtschaftliches Ziel für den reinen Ertragswald erscheinen.

Ungünstiger noch muß unser Urteil über den Schirmschlag lauten. Gayer sagt l. c. S. 28, daß die Fällungsschwierigkeiten im Blenderwald zwar größer seien, als beim Kahlschlag, aber nicht größer als beim Schirmschlag. Wir möchten fast noch weiter gehen! Die ersten Hiebe mögen zwar wenig Schwierigkeiten bereiten, da der Anflug, wo vorhanden, noch niedrig ist, um so mehr aber die Endhiebe, denn hier stehen wir einer völligen Einzelmischung von altem und jungem Holz gegenüber; — kein Ort, nach dem wir ausweichen können, wie dies bei der Blenderschlagform doch immer noch bis zuletzt möglich ist. So wird hier häufig — und um so mehr, je höher der Anflug ist (nach Borggreve soll er bis mannshoch sein!) — ein großer Teil von dem wieder zerstört, was vorher entstanden war, und an dessen Ankommen und Gedeihen man sich erfreut hatte.

Unter Verhältnissen, die nach verschiedenen Richtungen günstig sind, bei sehr reichlichem und noch niedrigem Anflug, wenig und schwachem Nutzholz, wenig empfindlicher Holzart, mag wohl ein einigermaßen befriedigender Rest übrig bleiben, auch können Gruppen und größere Horste gerettet werden, wenn die Nachhiebe mehr blender- und saumschlagartig geführt werden; dagegen wird von Fichte, Kiefer und auch Tanne bei größeren Ausmaßen der Nutzhölzer durch eine gleichmäßige Räumung über hohen Anflug weg so gut wie alles wieder zerstört oder schwer beschädigt, sobald Langholz in normaler Menge ausgeformt wird. Das Aussehen geräumter Schirmschläge ist denn

auch meist trotz aller Sorgfalt und Kosten durchaus kein befriedigendes, ganz abgesehen von der gelben kümmerlichen Farbe des plötzlich freigestellten Anflugs und den häufig nachfolgenden Frostschäden. Das Schlimmste sind die im hohen Anflug entstandenen Lücken und die, auf der zerstörten Fläche zurückgebliebenen „geretteten“, mehr oder weniger großen Gruppen, die meist ohne Uebergang und Abstufung Steilränder bilden und der künftigen Erziehung große Schwierigkeiten und vielfache Kosten bereiten, bis sie in ihre Umgebung eingewachsen sind. Dazu kommt dann die schwierige und teure Ergänzung aller Lücken durch Pflanzung, die unter ungünstigen Verhältnissen: Verrasung, Rüsselkäfer, Frost, Wildverbiß, Ueberwachsenwerden durch Anflug und Unkräuter steht. Erfreuliche Bilder derartiger Räumungen hat Verfasser nie gesehen, um so öfter trostlose. B o r g g r e v e nennt in seiner „Holzzucht“ (2. Aufl. S. 215) die Schlagräumung mit Recht „ein sehr wichtiges Rad in dem Gesamtgetriebe der Naturverjüngung“, er gibt die großen Schwierigkeiten und Schäden zu und empfiehlt Anwendung besserer Rückmethoden. So große Bedeutung aber eine Verbesserung der Anrückverfahren für Naturverjüngung hat, so halten wir sie doch — wobei wir ganz von den Kosten absehen — nicht allein schon für genügend, um dem Schaden zu steuern, hier muß vielmehr unseres Erachtens die räumliche Ordnung vorbeugend eintreten.

Wir haben nunmehr die räumliche Ordnung des Schirmschlags auf Großflächen auf allen Gebieten der Produktionslehre geprüft. Fassen wir die Ergebnisse dieser Betrachtungen zusammen, so erscheint der Standpunkt begründet, den Verfasser auf Grund eigener Beobachtungen gegenüber der gleichmäßigen Lichtung größerer Flächen zum Zweck der Verjüngung einnimmt: er betrachtet sie nämlich als eine der gesamtwirtschaftlich verderblichsten Maßregeln, denen der Wald unterworfen werden kann, als eine Maßregel, die dort schon großen Schaden gestiftet hat und heute noch stiftet, und wäre es nur dadurch, daß sie die Naturverjüngung aus dem Walde verdrängt und der Wirtschaft den Glauben an deren sicheren Erfolg raubt. Dieses räumliche Vorgehen kann daher unseres Erachtens nicht entschieden genug bekämpft werden!

Vergleichen wir diese Form vom Gesichtspunkt der Produktionslehre aus mit dem Blenderschlag im Sinn Gayers, so zeigt der letztere, obgleich er sich ebenfalls vorwiegend der Großschlagform bedient, dennoch entscheidende Vorteile:

In bezug auf Waldbau ist es die überwiegende Benützung des Blenderstands und der Randstellung für Besamung, die mehr Schutz gegen Sonne gewähren und mehr Wasser zum Boden gelangen lassen als der gleichmäßige Schirmstand. Dieser Vorteil dehnt sich jedoch nicht auf die ganze Fläche aus, der Blenderschlag bevorzugt einzelne Flächenteile, vernachlässigt andere (offene Südränder und letzte Nachhiebsflächen), bei denen dann auf geringem Standort die Naturbesamung versagt.

In bezug auf Forstschutz ist es besonders der Umstand, daß der Blenderschlag im Gegensatz zum Schirmschlag die gefahrbringende gleichmäßige Lockerung des ganzen Kronendachs vermeidet, auch bis zu einem gewissen Grad aus der Ungleichaltrigkeit Vorteile zieht und daß er sich für Holzartenmischung eignet, diese begünstigt.

In bezug auf Forstbenutzung endlich liegt der Vorzug des Blenderschlags in der ziemlich weitgehenden räumlichen Trennung der Altersklassen (Altholz und Jungwuchs), die uns Schlag- und Rückungsschäden auf größeren Teilen der Fläche vermeiden läßt; doch verhält sich auch hier wieder der Blenderschlag nicht allen Flächenteilen gegenüber gleich, insofern die Endflächen der Verjüngung erheblichen Schäden ausgesetzt sind.

Dagegen finden wir die räumlichen Bedingungen für zweckmäßige Holzernte in höchstem Maß verwirklicht im Saumschlagbetrieb, wobei hier nur diejenige Form näher ins Auge gefaßt werden soll, die uns Naturbesamung sichert, der Blendersaumschlag.

Der Blendersaumschlag.

In der Tat trägt, wie sich zeigen wird, kein Naturverjüngungsbetrieb allen hier aufgestellten Forderungen der Forstbenutzung in so vollendetem Maße Rechnung, wie eben der Blendersaumschlag, denn eine geordnete Trennung der Altersklassen wird hier so vollständig erreicht, als dies beim Festhalten an sicherer Naturverjüngung überhaupt möglich ist.

Die Abnutzung erfolgt stetig in schmalen langgezogenen Streifen, eine Häufung oder gegenseitige Behinderung des Schlagmaterials kommt also hier nicht in Frage.

Ehe wir uns jedoch weiterhin ein sicheres Urteil darüber bilden können, inwieweit hier auch die übrigen Forderungen berücksichtigt werden, bedürfen noch zwei Punkte der Klärung: die Hiebsrichtung und die Wurfrichtung der Stämme beim Blendersaumschlag.

Die Hiebsrichtung soll, wie der Waldbau fordert, wo nicht dringende andere Rücksichten dies verbieten, von Nord nach Süd verlaufen. Rücksichten auf den Forstschutz, die zu Abweichungen zwingen können, haben wir im 2. Abschnitt kennen gelernt. Auch die Forstbenutzung fordert solche und zwar für stärker geneigtes Gelände bei bestimmten Neigungsrichtungen. Hier geraten die allgemeinen Anforderungen der Naturverjüngung und der Ernte — scheinbar wenigstens — in unmittelbaren Widerstreit, denn die Forstbenutzung fordert aufs allerbestimmteste, daß die Anrückbahn für das gefällte Holz bergabwärts gehe. Diese Richtung muß also, sollen Nachteile vermieden werden, bis zum

nächsten Weg frei sein von jüngerer Bestockung, besonders von erstarktem Anflug. Sobald nun das Gelände gegen Norden geneigt ist, tritt ein Gegensatz zwischen dieser Forderung und derjenigen des Waldbaus in bezug auf die Hiebsrichtung hervor.

Fig. 56.

Grundriß eines Pyramidenstumpfs, auf dessen Seitenflächen die Hiebsrichtungen dargestellt sind, die den verschiedenen Hangrichtungen entsprechen.

(Nach dem Muster der in den „Mitteilungen aus der bayr. Staatsforstverwaltung“ 1894 1. Heft gegebenen Darstellung.)

In geneigtem Gelände ist nämlich bei stärkerer Neigung (etwa von $5^\circ = 9\%$ aufwärts) die Anrückrichtung, besonders für Stammholz, durch die Richtung des stärksten Gefälls bestimmt, insofern hier schwerere Sortimente durch ihr Eigengewicht in dem Maß in dieser Richtung nach abwärts gezogen werden, daß das Anrücken zum nächsten Weg wagrecht oder bergab

erfolgen muß, soll dasselbe nicht erhöhten Kräfteaufwand, also gesteigerte Kosten verursachen. Da nun das Anrücken stets durch älteres Holz gehen muß und nie über den Jungwuchs erfolgen darf, so wird auch die Hiebsrichtung im Saumschlag durch die Richtung des stärksten Gefälls entscheidend beeinflusst, und zwar um so mehr, je steiler der Hang ist; sie wird also je nach der Neigungsrichtung von der Nordsüdrichtung mehr oder weniger abweichen müssen, denn sollte auch die Wirtschaft bereit sein, die erhöhten Beförderungskosten einer bergaufgerichteten Hiebsführung zu tragen, so wäre damit der unterhalb liegende Jungwuchs noch nicht vor Beschädigung durch zufällig oder fahrlässig loswerdende und hinabschießende Stämme geschützt.

Diesen Verhältnissen kann nun aber der Blendersaumschlag recht wohl Rechnung tragen, ohne den Verjüngungszweck zu gefährden, also ohne in Widerstreit zum Waldbau zu geraten. Die Naturbesamung fordert freilich in ebener und schwachgeneigter Lage nordsüdliche Hiebsrichtung, aber für die nach der Nordseite stärker geneigten Flächen sind die waldbaulichen Bedingungen bezüglich der Besonnung und Befeuchtung des Bodens andere, und für solche kann der Blendersaumschlag eine Aenderung seiner Hiebsrichtung ohne wesentlichen Nachteil ertragen. An Ost-, West- und Südhängen dagegen, wo dies nicht der Fall wäre, tritt ein Widerstreit mit den waldbaulichen Tendenzen überhaupt nicht ein (vgl. Fig. 56).

In bezug auf die Schlagrichtung (Richtung der Längenausdehnung der Säume) stehen sich — und zwar je nachdem das Holz über die Saumfläche oder durch das Altholz weggebracht werden soll, — zwei entgegengesetzte Anschauungen gegenüber. Die eine will den Schlag in die Richtung des stärksten Gefälls legen (Tichy, Forsteinrichtung in Eigenregie S. 29), die andere dagegen senkrecht zu dieser Richtung, also wagrecht am Hang, wobei der Hieb von oben nach unten fortschreitet. Für den Blendersaumschlag hat die Schlagrichtung keine ausschlaggebende Bedeutung; über sie entscheidet in erster Linie die Himmelsrichtung, in welcher der Hieb fortschreiten soll, und es wird von ihr nur gefordert, daß es möglich sein muß, die Stämme so ins Altholz zu werfen und durch dasselbe nach abwärts wegzuschaffen, daß der Jungwuchs nicht Schaden leidet.

Dies führt uns zum zweiten Gegenstand, der vor Beurteilung des Saumschlags erörtert werden muß, zur Wurfrichtung der Stämme (vgl. Fig. 57 Seite 268).

Beim Blendersaumschlag muß der Grundsatz gelten, der keine Ausnahmen zuläßt, daß sämtliche Stämme, soweit irgend möglich, in gleicher Richtung, und zwar in derjenigen des Hiebsfortschritts zu werfen sind, die zugleich Anrückrichtung ist, — im Gegensatz zum gewöhnlichen sog. Saumschlag, oder besser Kahlstreifenschlag, bei dem das Holz dem Bestandesrand entlang geworfen und über die Schlagfläche weg angerückt wird.

Die Fallrichtung der Stämme, die übrigens selbstverständlich einen ge-

wissen Spielraum haben muß, also auch schräg zur Hiebsrichtung gewählt werden kann, geht somit hier grundsätzlich stets vom Jungwuchs weg in den Altbestand hinein, so daß die Krone des geworfenen Stamms immer entweder auf noch unbesamten Boden oder in jüngsten Anflug fällt (vgl. Ney, Schablonenwirtschaft ... S. 45); der Saumschlag erfüllt damit eine Grundbedingung erfolgreicher Naturbesamung.

Die in gleicher Richtung geworfenen, also nach der Zurichtung mehr oder weniger parallel liegenden Stämme bedürfen weiterhin keiner Schwenkungen, um an den Ladeort gebracht zu werden, sondern werden an ihrem Lagerungsort am dünnen Ende gefaßt und in gerader Rich-

Fig. 57.

Wurfriktung und Anrücken der Stämme im Blendersaumschlag.

tung durch altes Holz — auf meist anflugfreier Bahn oder durch jüngsten Anflug — ohne Schaden an den Weg geschleift, ja es findet durch dieses Anrücken infolge Aufreißen des der Besamung noch harrenden Bodens eine die Verjüngung fördernde Bodenverwundung statt¹⁾. Auch ist es auf diese Weise nicht notwendig, die Zugtiere in höheren Anflug zu führen, oder besondere Anrückgeräte zu verwenden. Nie, auch wenn sich die Vorverjüngung auf Tanne und Buche ziemlich tief in den Bestand erstreckt, kann das Wegschleifen wesentlichen Schaden stiften, da der Anflug noch jung oder bei blendernden Vorhieben in Gruppen vereinigt ist, denen leicht auszuweichen ist, wozu der Fuhrmann schon im eigenen Interesse allen Anlaß hat. Aber auch beim Schleifen

1) Solche Bodenverwundung ist als schädlich bezeichnet worden wegen der möglicherweise mit ihr verbundenen Wurzelverletzungen. Allein Schaden kann doch hier unmöglich entstehen, nicht nur nicht, weil die Stämme, am dünnen Ende gefaßt, sich nie tief in den Boden einwühlen, vielmehr meist nur die Bodendecke abstreifen, sondern auch nicht, weil etwaige Verletzungen nur das zu allernächst an den Hieb kommende Holz treffen. Für das gefürchtete Eindringen von Pilzen in den Baum bleibt also gar nicht die erforderliche Zeit.

mitten durch Anflug kann der Schaden nicht groß sein, weil das Schleifen geradlinig erfolgt und entstehende Lücken noch lange Zeit haben, sich mit neuem Anflug zu füllen. Ueberhaupt ist als ganz besonderer Vorzug des Blendersaumschlags zu rühmen, daß er für alle etwaigen Schädigungen des Anflugs durch Fällung, Aufbereitung oder Anrücken reichliche Zeit zur Wiederbesamung läßt, selbst nach der letzten Räumung noch im Außensaum. Mit älterem Anflug dagegen kommt das gefällte Holz in keinem Fall mehr in Berührung. So ist es im Gegensatz zu allen andern Naturverjüngungsverfahren hier möglich, fast alle Individuen, die am Boden Fuß zu fassen vermögen, auch für die Bildung des neuen Bestandes zu erhalten, was in vielen Fällen von entscheidender Bedeutung für den Erfolg ist, z. B. bei geringer Besamungsfähigkeit des Bodens, bei kleiner Zahl von Samenträgern der erwünschten Holzart, oder wo die Notwendigkeit zu raschem Fortschreiten der Verjüngung vorliegt.

Bei so einfachen Verhältnissen kann ferner das Anrücken ohne Gefahr und ohne besondere Sicherung dem Käufer überlassen werden, es sei denn, daß außerordentliche Geländeschwierigkeiten vorliegen. Dadurch werden nicht unerhebliche Beträge gespart.

Die Wurfrichtung wird, wie wir gesehen haben, durch Hiebs- und Anrückrichtung bestimmt, und diese Richtungen sind ihrerseits wieder vom Gelände abhängig. Da fragt es sich, ob die so gegebene Wurfrichtung von der Forstbenutzung ohne weiteres angenommen werden kann, ob sie nicht Gefahren für das Holz mit sich bringt, durch Abbrechen der Stämme bei Bergabwerfen. Dies ist nicht der Fall, denn am Nordhang, an dem das längste, daher nach dieser Richtung meistgefährdete Holz wächst, wird gegen Westen gehauen, die Stämme werden also wagrecht, oder besser in kleinem Winkel bergab geworfen. Ebenso kommen die Stämme am Ost- und Westhang beim Fall wagrecht zu liegen, und nur am Südhang verläuft die Hiebsrichtung unmittelbar im stärksten Gefäll bergab. Hier wird es sich übrigens empfehlen, die Stämme nicht in diese Richtung selbst, sondern — schon im Interesse des Abbringens durch Zugtiere — schräg abwärts zu werfen, was kaum Nachteile für den Anflug hat. Die Gefahr des Abbrechens oder der Beschädigung der fallenden Stämme infolge der Wucht des Sturzes ist dabei gerade hier am geringsten, da am Südhang besonders zähes und elastisches, meist nicht langschäftiges Holz erwächst, das an steilen Hängen auf die nach unten stärker entwickelte Krone fällt, also einen gewissen Schutz genießt. Werfen von Stämmen in die Richtung des stärksten Gefälls selbst sollte allerdings an steileren Hängen vermieden werden.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß Nutzung und Abfuhr beim Blendersaumschlag allen früher gestellten Forderungen aufs beste genügen und wie ohne Schaden, so auch ohne erhöhte Kosten erfolgen können. Diese Betriebsform vermeidet Beschädigungen des Anflugs, denn die Kronen fallen vom

Jungwuchs weg, die Stämme kommen ohne Häufung von Holzmassen parallel und in die Anrückrichtung zu liegen und können durch den alten Bestand weggeschafft werden, was bei nicht reichlicher Besamung der Verjüngungsfläche ganz besonders ins Gewicht fällt; diese hat ferner noch bis zur letzten Räumung Gelegenheit, sich zu ergänzen. Dabei erfordert der Betrieb weiterhin keine Entastungen, läßt volle Freiheit in der Sortimentsbildung, und gestattet, das Anrücken des Stammholzes ohne Gefahr dem Käufer zu überlassen. Endlich läßt sich das ganze Erntegeschäft bei so klarer Raumordnung ohne besondere Mühe oder Gefahr und ohne ungewöhnliche Geschicklichkeit und Uebung der Arbeiter durchführen.

So können wir kühnlich behaupten, daß der Blendersaumschlag auch allen ökonomischen Forderungen der Forstbenutzung in denkbar bester Weise genügt, — kaum weniger gut, als selbst der Kahlschlag.

4. Abschnitt.

Die Durchführung der Betriebsmassregeln.

Nicht als letzter stellt der Wirtschaftsbetrieb selbst, die Ausführung der Betriebsmaßregeln des Wirtschaftsplans, dringende Forderungen an die räumliche Ordnung — Forderungen, die beim Aufbau derselben alle Berücksichtigung verdienen; denn es ist eine der ersten Aufgaben der räumlichen Ordnung, den Betrieb und seine Kontrolle zu erleichtern und übersichtlich zu gestalten, soll sie uns ja doch wirtschaftliche Freiheit bringen, die sich gerade in der Betriebsführung am wirksamsten und fühlbarsten äußert.

Entscheidende Forderungen richten sich hier zunächst an die äußere Raumordnung im Walde, die wir jedoch einer Betrachtung an anderem Ort vorbehalten möchten, auf die wir hier schon deshalb nicht näher eingehen werden, weil sie nur ein mittelbarer Ausfluß der räumlichen Betriebsordnung ist, nur den Rahmen für den Betrieb bildet und der Orientierung dient.

Der Betrieb fordert nach dieser Richtung eine übersichtliche Waldeinteilung, ein Zerlegen der Gesamtfläche in Teilflächen von übersichtlicher Größe, die der Orientierung von Personal und Käufer, der Ortsbestimmung für alle Betriebsanordnungen, für Kontrolle und Buchung dienen, und die den Rahmen für die wirtschaftlichen Maßregeln und die Herstellung der räumlichen Ordnung bilden sollen.

Wir verlangen von der Waldeinteilung ganz allgemein, daß alle ihre Einheiten diejenige Form und Größe haben sollen, die deren Zwecke und Aufgaben entspricht, daß diese Einheiten den erforderlichen Ueberblick gestatten, und daß sie für alle wirtschaftlichen Maßregeln ein Arbeitsmaß einschließen, das in geeigneter Zeit bewältigt werden kann.

Was uns hier beschäftigt und dem Verfasser wirtschaftlich von größerer Bedeutung zu sein scheint, als die äußere Einteilung — die im Grund genommen nur die Frage beantwortet: wo liegt das einzelne Arbeitsfeld? —, das sind die Ansprüche, die wir im Hinblick auf die Betriebsführung an den inneren Aufbau des Waldes zu stellen haben. Wenn uns die ökonomischen Momente nun einmal in bezug auf Raumordnung von dem ungeordneten, dafür aber naturgemäßen Zustand der Blenderform wegführen, so ist es unseres Erachtens ihre selbstverständliche Pflicht, daß sie uns als Ersatz für die aufgegebenen Vorteile zu einer Betriebsform gelangen lassen, die eine Führung und Kontrolle der Wirtschaft in übersichtlichster Weise gestattet.

1. Kapitel.

Die Ableitung allgemeiner Forderungen.

Wollen wir den Einfluß feststellen, den der innere Aufbau der räumlichen Ordnung auf den Wirtschaftsbetrieb selbst ausübt, um aus ihm unsere räumlichen Forderungen abzuleiten, so haben wir zuerst die hier in Betracht kommenden Funktionen des ausführenden Betriebs zu betrachten und zu zergliedern.

Der periodische Betriebsplan, auf den sich die laufende Wirtschaft stützt, kann der Natur der Sache nach vorwiegend nur allgemeine und zusammenfassende Anordnungen treffen, die sich in der Regel auf größere Teilflächen des Wirtschaftsbezirks und auf längere Zeiträume beziehen; ihre Verwirklichung innerhalb dieses räumlichen und zeitlichen Rahmens bleibt der laufenden Betriebsführung überlassen. Sie hat im Rahmen der periodischen Vorausbestimmung jährliche Betriebspläne zu fertigen, unter Berücksichtigung und auf Grund der fortgesetzten Weiterentwicklung der Waldverhältnisse und der Bedürfnisse, die sich aus dieser Entwicklung ergeben, und die sich im einzelnen nicht voraussehen lassen. Die Ausführung dieser jährlichen Pläne ist alsdann von der Betriebsführung einzuleiten und zu überwachen, sowie nach Fertigstellung der Arbeiten zu prüfen.

Die wichtigsten Betriebsaufgaben des einzelnen Jahrs, die zu der räumlichen Ordnung in Beziehung stehen, und die in der besprochenen Weise ihre Erledigung finden, erstrecken sich besonders auf folgende Gebiete der forstwirtschaftlichen Tätigkeit:

1. Die Verjüngung des Waldes,
2. Die Erziehung des Holzes,
3. Die Erhebung der Abtriebsnutzung.

Jede dieser Betriebsaufgaben zerfällt ihrerseits in zeitlicher Folge in nachstehende Einzeltätigkeiten der laufenden Wirtschaft, bezüglich deren die besonderen Anforderungen an die räumliche Ordnung nachzuweisen wären:

Erste, und unseres Erachtens wichtigste Aufgabe ist die fortgesetzte Beobachtung des wirtschaftlichen Zustandes jeder Einzelfläche. Sie gibt den nötigen Aufschluß über die wirtschaftlichen Bedürfnisse derselben, auf Grund deren die zu ergreifenden Wirtschaftsmaßregeln festgestellt werden.

Ihre praktische Verwendung finden die Ergebnisse dieser fortgesetzten Beobachtung in der Aufstellung der jährlichen Betriebspläne, die einen ununterbrochenen klaren Ueberblick über die Sachlage erfordert, — begründet in dem sich fortgesetzt weiterentwickelnden wirtschaft-

lichen Zustand jeder einzelnen Teilfläche des Wirtschaftsbezirks. Nur ununterbrochen klarer Einblick ermöglicht es, daß jeweils am einzelnen Ort die richtigen Wirtschaftsmaßregeln zur rechten Zeit und in bester Weise ergriffen werden. Der Wirtschaftler muß also stets auf dem Laufenden sein über alle wirtschaftlichen Bedürfnisse der einzelnen Fläche und je intensiver die Wirtschaft sein will, desto mehr muß diese Kenntnis ins einzelne gehen.

Der Aufstellung der Pläne folgt die spezielle örtliche Unterweisung des Wirtschaftspersonals und der Arbeiter für die Ausführung jeder einzelnen Maßregel und für deren Ueberwachung, und zwar als Vorläufer der Arbeitsausführung selbst, also der Tätigkeit der Arbeiter unter Aufsicht und Anleitung des Personals; worauf endlich die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Ausführung nach Fertigstellung der Arbeit den Abschluß bildet.

Betrachten wir diese Einzeltätigkeiten, so können wir sie in zwei Gruppen zusammenfassen: in eine betriebsleitende Tätigkeit, die beobachtet, begutachtet und dementsprechend plant, die anordnet, überwacht und kontrolliert: die Arbeit des „Wirtschafters“, wir nennen sie die „Wirtschaftsführung“; — und eine ausführende Tätigkeit, die jene geplanten Maßregeln durch Arbeitsleistung verwirklicht: die Arbeit des Hilfspersonals und der Arbeiter, die Arbeitsausführung und ihre Beaufsichtigung.

Von der Güte der geleisteten Arbeit, sowohl des Wirtschafters als des Hilfspersonals und der Arbeiter, hängt nun Gang und Erfolg der ganzen Betriebs-tätigkeit in erster Linie ab und zwar ist es der Natur der Sache nach die betriebsleitende Tätigkeit, auf der stets der Schwerpunkt ruht, denn die Seele des ganzen Betriebs ist der Wirtschaftler. Wir werden daher im folgenden auf diejenigen Momente besonders Gewicht zu legen haben, die auf diese Tätigkeit und ihre Anforderungen Bezug nehmen.

Zwei Momente bestimmen die Güte der forstwirtschaftlichen Arbeit, es sind die Personen, die dieselbe leisten, und die äußeren Umstände, unter denen sie geleistet werden muß. Da wir das persönliche Moment als gegeben zu betrachten haben, bleibt uns nur das sachliche Moment — die äußeren Umstände — auf das wir einwirken können, und zwar im Weg entsprechender räumlicher Anordnung der Arbeit.

Die Güte der menschlichen Arbeit, die den Wirtschaftsbetrieb beherrscht, hängt zunächst vom Individuum ab, das die Arbeit leistet. Somit müssen wir, wenn unsere nachfolgenden Betrachtungen der Wirklichkeit gerecht werden sollen, die ausführenden Personen in Betracht ziehen, und zwar haben wir von Persönlichkeiten durchschnittlicher Art auszugehen: bei Betrachtung der betriebsleitenden Tätigkeit von Personen mittlerer Arbeitskraft, mittlerer körperlicher Leistungsfähigkeit insbesondere Beweglichkeit, auch von solchen, deren Interesse etwa nicht in erster

Linie nach der waldbaulichen Seite ihres Berufs geht; bei Betrachtung der ausführenden Tätigkeit von Arbeitern und Aufsehern mit geringerer Uebung, geringerem Verständnis für ihre Arbeit und mäßigem Fleiß, also von solchen, die während der Ausführung der Arbeiten einer eingehenden Beaufsichtigung und Anleitung bedürfen.

Wir betonen dieses Moment hier ausdrücklich, weil es uns scheinen möchte, als ob bei Erörterung derartiger Dinge nicht selten ein unbegründeter Optimismus in bezug auf das persönliche Moment Platz griffe, unter dem an sich vortreffliche Wirtschaftsmaßregeln, weil sie auf vielfach nicht zutreffenden Voraussetzungen aufgebaut sind, nicht den erwarteten Erfolg haben können. Ungewöhnlich tätige, sachkundige und bewegliche Personen werden ja wohl selbst unter schwierigsten räumlichen Verhältnissen Gutes leisten und der gestellten Aufgabe gerecht werden; aber so wenig ein solches Personal die allgemeine Regel bildet, so wenig dürfen auch solche äußere Verhältnisse allgemeine Betriebsgrundlage sein. Wir müssen vielmehr unsere räumliche Betriebsordnung einem Wirtschaftler von mittlerer Tüchtigkeit, einem mäßig geübten, erfahrenen und fleißigen Aufseher und Arbeiter anpassen; dieselbe muß so beschaffen sein, daß auch bei weniger sachkundiger und geschickter Leitung und Ausführung nichts wesentliches versäumt werden kann.

Dies führt uns zu der Aufgabe: Die ganze Betriebsarbeit in räumlicher Beziehung möglichst einfach und durchsichtig zu gestalten.

Schon der, gerade in mittleren und oberen Stellen, immer häufiger werdende Beamtenwechsel weist darauf hin. Derselbe ist zwar dem Wald nicht immer und in allen, aber doch in vielen Beziehungen nachteilig und zwar eben wegen der für Uebersicht und Einblick ins einzelne meist so ungünstigen räumlichen Ordnung. Wie will sich auch der fleißigste Wirtschaftler, wenn er neu ankommt, neben all den andern Arbeiten, die ihn vom Wald fernhalten, in kurzer Zeit über den Stand von 400—600 ha und mehr Fläche an Verjüngungsschlägen und Jungwüchsen eingehend und zuverlässig unterrichten, zumal in bergigem Gelände, wenn solche, auf großen Flächen vereinigt, teilweise kaum zugänglich sind. Bis dies endlich geschehen ist, kann es manchen Orts zu besserndem Eingreifen zu spät sein. Nur der Zufall — als ein Vorzug der Jagdausübung durch das Forstpersonal wird dies häufig hervorgehoben, das sagt wohl genug! — führt den Wirtschaftler nicht selten an Orte, wo nicht alles ist, wie es sein sollte.

In welche Beziehungen treten nun die besprochenen Aufgaben des ausführenden Betriebs zur räumlichen Ordnung im Walde?

Die Durchführung der laufenden Betriebsmaßregeln erfolgt auf der Fläche des Wirtschaftsbezirks, und zwar — geordneten Betrieb vorausgesetzt — im einzelnen Fall stets auf bestimmt abgegrenzten Teilen derselben, welche die räumlichen Einheiten für die Betriebsführung bilden, als da sind: Kultur-

flächen, Durchforstungsbestände, Schläge u. s. w.; wir wollen diese bestimmt abgegrenzten Teilflächen allgemein „Arbeitsfelder“ nennen.

Wir verstehen also im folgenden unter „Arbeitsfeld“: Die einzelne, für sich abgeschlossene Waldfläche, über die sich im einzelnen Jahr ein gewisses Maß einer bestimmten Betriebsarbeit erstreckt.

Mit dieser Abscheidung von Arbeitsfeldern tritt die Betriebsführung in Beziehungen zur räumlichen Ordnung. Die Wahl der Einzelflächen, auf denen sich die wirtschaftliche Tätigkeit des einzelnen Jahrs vollziehen soll — der Arbeitsfelder — ist Aufgabe der jährlichen Betriebspläne und wird durch die, dem periodischen Betriebsplan zugrunde liegende räumliche Ordnung mitbestimmt.

Die Betriebsführung wird nun insbesondere abhängen von Größe und Form des einzelnen Arbeitsfelds, vom Arbeitsmaß, das es umfaßt und von der Verteilung der Arbeitsgegenstände über dasselbe.

Das gesamte Arbeitsmaß des einzelnen Jahrs kann nämlich in sehr verschiedener Weise einerseits über die Gesamtfläche verteilt werden, andererseits innerhalb des einzelnen Arbeitsfelds angeordnet sein, und es fragt sich nun:

Welche Verteilung des jährlichen Arbeitsmaßes über die Betriebsfläche und welche Anordnung innerhalb des einzelnen Arbeitsfeldes entspricht den Bedürfnissen des ausführenden Betriebs am meisten?

Wir haben also unser Augenmerk zu richten auf:

1. die Verteilung der Arbeit über die Gesamtfläche,
2. Größe, Form und Arbeitsmaß des einzelnen Arbeitsfelds und die Verteilung der Arbeit innerhalb desselben.

Ehe wir allgemeine Forderungen über die Arbeitsverteilung aufstellen, müssen wir nun zuerst die verschiedenen Betriebsaufgaben der ausführenden Wirtschaft einzeln betrachten, aus deren Verhältnissen diese Forderungen abzuleiten sind.

Die einzelnen Betriebsaufgaben und ihre Erfordernisse in räumlicher Beziehung.

1. Die Verjüngung.

Wenn wir den einzelnen Betriebsarbeiten in zeitlicher Folge nachgehen, so ist bei der Verjüngung die erste und wichtigste Aufgabe der Wirtschaft — mag es sich um Natur- oder Kunstverjüngung handeln — fortgesetzt zu beobachten und ununterbrochen über Stand und Bedürfnisse von Verjüngungsfläche und Jungwuchs unterrichtet zu sein.

Gerade für diese Aufgabe liegen nun die Verhältnisse auf der eigent-

lichen Verjüngungsfläche meist günstig, insofern der Boden des Arbeitsfelds für den Blick in der Regel freiliegt, da er entweder kahl oder mit alten Stämmen und — wo überhaupt — mit ganz niedrigem Anflug bedeckt ist.

Größte Bedeutung hat selbstverständlich die Beobachtung und darum der freie Ueberblick bei Naturverjüngung. Hier beginnt die Ueberwachung des Bodens mit der ersten Lichtung, deren Wirkung im Auge behalten werden muß. Der Wirtschaftler sieht die Keimlinge ankommen und erstarken oder wieder verschwinden, er stellt ihre Bedürfnisse fest und richtet danach seine Nachlichtungen oder sonstigen Maßregeln ein, bis endlich die letzte Räumung erfolgen kann, der dann die Ausmerzungen unerwünschter Individuen, die Ergänzung der Bestockung und die Regelung der Mischung folgen. Die Ergänzungen müssen weiterhin im Auge behalten und nachgebessert werden, auch sind sie in den ersten Jahren vor Beschädigungen wie Wildverbiß, Rüsselkäferfraß, Unkrautverdämmung u. s. w. zu schützen, bis ein vollkommener Bestand von erwünschter Verfassung erzielt ist.

In ähnlicher Weise erfordert auch künstliche Verjüngung, sei es durch Saat oder Pflanzung, mehrjährige, eingehende Beobachtung, damit zeitige Nachbesserungen und erforderliche Schutzmaßregeln angeordnet werden können.

Alle diese Aufgaben der betriebsleitenden Tätigkeit stellen Forderungen weniger an die Verteilung der Arbeitsfelder über die Gesamtfläche, als an die Beschaffenheit des einzelnen Arbeitsfeldes nach Größe, Form und innerer Uebersichtlichkeit. Der Wirtschaftler soll fortgesetzt über die innere Beschaffenheit aller seiner Verjüngungsflächen bis ins einzelne auf dem Laufenden sein. Dies wird ihm aber in gleichem Maß erschwert auf großen, nach allen Richtungen ausgedehnten Flächen, wie bei ordnungsloser Zersplitterung kleinster Verjüngungsflächen und -punkte über ausgedehnte Arbeitsfelder. Er wird seiner Aufgabe ohne übermäßige Mühe nur dann gerecht werden können, wenn jedes einzelne Arbeitsfeld eine übersichtliche Form und Größe besitzt und wenn die Beobachtungsgegenstände auf ihm fortlaufend aneinander gereiht sind.

Der mehr oder weniger klare Einblick des Wirtschaftlers in die Verjüngungsbedürfnisse seines Waldes verrät sich dann in besseren oder schlechteren Nutzungs- und Kulturplänen, in der großen oder kleinen Zahl von Versäumnissen, und damit schließlich im Verjüngungserfolg selbst.

Sind die Pläne gefertigt, so führt die Zuweisung der Arbeit an Personal und Arbeiter und die Ueberwachung der Ausführung zu gleichlautenden Forderungen an die räumliche Anordnung der Arbeit. Auch hier spielt die Uebersichtlichkeit des Arbeitsfelds die erste Rolle, während es besonders die Zersplitterung der einzelnen Arbeitsgegenstände ist, die nachteilig wirkt.

Im Gegensatz dazu weisen uns die Verhältnisse bei der Ausführung der Kulturarbeiten selbst, der Saat und Pflanzung — wenigstens bei Kahlschlagbetrieb — zunächst auf ein großes zusammenhängendes Arbeitsfeld hin, über das ein möglichst großes Arbeitsmaß gleichmäßig verteilt

ist. Die erste Kulturarbeit wird durch solche große Kulturflächen in Ausführung und Beaufsichtigung wesentlich gefördert: es können große Mengen von Pflanzen oder Saatmaterial an einer Stelle verwendet werden, die Arbeiter werden in großer Zahl und in fortlaufender Reihe beschäftigt und sind bei der Uebersichtlichkeit der Kahlfläche leicht zu beaufsichtigen, auch bleibt wenig Zeit auf den Wegen liegen, wie dies bei kleinen, weithin zerstreuten Arbeitsplätzen der Fall ist, die einen häufigen Ortswechsel und vieles Hin- und Hergehen erfordern, und bei denen viele Arbeiter ohne Aufsicht bleiben.

Dagegen hat die Kultur auf großer Fläche trotz einfacher erster Ausführung einen Nachteil, der ihre günstige Beurteilung wesentlich abschwächt, ja in das Gegenteil umkehren kann, das sind die in der Regel zahlreichen Nachbesserungen, die sie fordert, die nicht selten durch viele Jahre fort dauern, und die ihrerseits die allerungünstigsten Verhältnisse vorfinden: regellose Zersplitterung eines kleinen Arbeitsmaßes über ein großes Arbeitsfeld. Das kleine, über sehr viele, schwer aufzufindende Orte zerstreute Arbeitsmaß, das ein sorgfältiges Begehen der ganzen großen Fläche notwendig macht, bringt viel Zeitverlust durch Aufsuchen der Arbeitsgegenstände, Aufsichtslosigkeit der Arbeiter und vielfach mangelhafte Ausführung mit sich.

Anders als bei Kahlschlag liegen die Verhältnisse bei Naturverjüngung. Hier sind die äußeren Umstände schon von Haus aus ungünstiger, denn es handelt sich meist nur um Ergänzung von Fehlstellen, um bessere Verteilung der Holzarten und Einbringen fehlender, es liegt also an sich schon Zersplitterung der Arbeitsgegenstände innerhalb des Arbeitsfelds vor, auch ist dessen Uebersichtlichkeit durch den vorhandenen Anflug vielfach vermindert. Unter solchen Umständen ist daher bei Naturverjüngung eine günstige Form und Größe des Arbeitsfelds von entscheidender Bedeutung. Hier wird die Ausführung leichter und erfolgreicher auf räumlich beschränktem, daher übersichtlichem Arbeitsfeld vor sich gehen, für das jedoch ein möglichst großes Arbeitsmaß erwünscht ist.

Spricht somit zwar auf Kahlfläche die Erstaussführung der Kultur für großes Arbeitsfeld, so weisen die Nachbesserungen, und die Ergänzungen, wie sie die Naturverjüngung erfordert, auf übersichtliche Form und Größe, also auf beschränkte Ausdehnung des Arbeitsfeldes hin.

Ebenso wird die Kontrolle der Ausführung durch Wirtschaftler und Inspektor, wie das Wachen über das weitere Gedeihen der Saaten und Pflanzungen eine übersichtliche Form und mäßige Größe des Arbeitsfelds fordern, während große Flächen — ebenso wie Zersplitterung der Arbeit — auch diese wirtschaftliche Aufgabe wesentlich erschweren und weniger erfolgreich machen.

2. Die Bestandserziehung.

Andere, und zwar ungünstigere äußere Verhältnisse zeigt die Erziehung der Bestände in der Jugend, also in der ersten und wichtigsten Erziehungsperiode.

Während zur Zeit der Bestandesgründung die Bodenfläche bei den meisten Verfahren leicht zu übersehen war, weil sie keine Bestockung trug, die den Rundblick hinderte, finden wir jetzt nach Abschluß der Begründungsperiode den Boden in einer Weise bedeckt, die jeden Ueberblick ausschließt und nur die aller-nächsten Gegenstände für das Auge freiläßt; der Bestand ist in sein Dickungsstadium getreten, es beginnt die Zeit der ersten Erziehungshiebe.

In diesem Zeitraum der Entwicklung, der nächst der Verjüngungsperiode, bei dem lebhaften Höhenwuchs der Individuen, des wachsamem Auges der Wirtschaft am meisten bedarf, ist der fortlaufende sichere Einblick in die Verhältnisse und Bedürfnisse der Bestockung die denkbar schwierigste Aufgabe, die der Natur der Sache nach um so mehr erschwert ist, je ausgedehnter die Fläche, über die sich die Dickung erstreckt. Vom Beginn des Schlusses bis zu dem Zeitpunkt, wo die Astreinigung bis über Mannshöhe fortgeschritten ist, erscheint die Fläche so gut wie abgeschlossen. Nur mit der Axt in der Hand vermag sich die Wirtschaft von Punkt zu Punkt Gewißheit über Beschaffenheit und Weiterentwicklung der Bestockung zu verschaffen. Der Erziehungsaufgabe widersetzt sich somit für Orientierung, Ausführung und Kontrolle ein großes zusammenhängendes Arbeitsfeld mehr noch, als eine Zerstreuung kleinster Dickungsflächen in ordnungsloser Mischung von älterem und jüngerem Holz; die ersten Erziehungsarbeiten drängen stärker als die Verjüngung nach der Richtung eines kleinen übersichtlich geformten Arbeitsfelds, weil in dem Durcheinander großer zusammenhängender Dickungsflächen die Wirtschaft sich verliert.

Standen bisher bei allen an die räumliche Ordnung gestellten Forderungen die Nadelhölzer, insonderheit die Fichte, im Vordergrund, so ist es unseres Erachtens hier, wie übrigens schon bei der Verjüngung, das Laubholz, das an die räumliche Ordnung dringendere Ansprüche erhebt.

Während nämlich das Nadelholz bei seinem, von der Vertikalachse wenig abweichenden, symmetrischen Wuchs, der mangelnden Ausschlagfähigkeit seiner Stöcke, der charakteristisch verschiedenen Form und Farbe der einzelnen Holzarten, im Jungwuchs auch auf größerer Fläche noch einigen Ueberblick über die Sachlage gestattet, so ist das Durcheinander ausgedehnter gleichaltriger oder gruppenweise ungleichaltriger, — besonders gemischter — Laubholzjungwüchse unmöglich zu überblicken und zu beurteilen, schon ihrer vielen unerwünschten Nebenholzarten, Sträucher und Stockausschläge wegen, die selbst durch ein geübtes Auge, und auf geringe Entfernung kaum von den erwünschten Individuen zu unterscheiden sind. Dem Verfasser sind solche oft 10, 20 und mehr Hektare umfassende Dickungsflächen immer unheimlich gewesen, da es vollkommen unmöglich ist, sich ohne ganz übermäßigen Zeitaufwand über deren Verfassung, besonders deren Reinigungsbedürftigkeit Klarheit zu verschaffen, während es beim nächsten Hieb nach üblichem Turnus leicht da und dort zu spät ist, etwaige Mängel zu verbessern. Ungünstig wirkt hier besonders das rasche Wachstum der Stockausschläge und Weichhölzer in der Jugend.

Wer unter solchen Verhältnissen nicht selten die unangenehme Entdeckung eigener oder fremder Versäumnisse aus der Vergangenheit gemacht

hat, den beschleicht vor der undurchdringlichen Mauer ausgedehnter mehr oder weniger gleichaltriger Dickungsflächen ein unbehagliches Gefühl. Er zieht unwillkürlich Gleichschlüsse und läßt sich durch die schönen Pflanzreihen entlang der Wege nicht beruhigen, sondern fragt sich: Was mag wohl alles hinter diesem schönen, undurchdringlichen Vorhang stecken?

Das Gefühl der Unsicherheit über die Bestockung großer gleichaltriger oder nur wenig ungleichaltriger Flächen und ihre Bedürfnisse führt — hier wie im Verjüngungsbetrieb — den Wirtschaftler leicht zu übermäßigen, weil tatsächlich überflüssigen Aufwendungen für Reinigung bzw. Kultur. Nur weil der Ueberblick fehlt und auch die Kontrolle über die Ausführung wirtschaftlicher Maßregeln eine unsichere ist, ordnet der Wirtschaftler, um sein Gewissen zu beruhigen, Kulturen und Reinigungen unnötig frühe und häufig an und verfährt damit unwirtschaftlich, schädigt den Ertrag. Wer hätte solche Neigung nicht schon beobachtet und an sich selbst verspürt? Wir möchten glauben, daß der Faktor „Unsicherheit“ einen nicht unerheblichen Betrag im jährlichen Wirtschaftsaufwand veranlaßt, und zwar mehr noch im Laubwald, als im Nadelwald.

Das Gesagte gilt wohl weniger für denjenigen Wirtschaftler, unter dessen Hand und Leitung die Jungwüchse entstanden sind, — obwohl auch er sich auf großen Flächen nur schwer auf dem Laufenden erhält —, als für den, der die Verjüngung halbfertig übernimmt, — ein Fall, der heute leider die Regel bildet.

Am ungünstigsten liegen die Verhältnisse für den Inspektionsbeamten. Er soll die Wirtschaftsführung überwachen und Versäumnisse verhindern, und ist doch bei der kurzen, ihm zu Gebot stehenden Zeit am allerwenigsten in der Lage, sich zu unterrichten und die innere Verfassung großer Dickungsflächen festzustellen.

Ebenso schlimm, wie mit der Orientierung, steht es bei großen Flächen mit der Anweisung, Ausführung und Beaufsichtigung der Arbeit selbst. Die Anweisung kann bei der Unwegsamkeit der Flächen nur an einzelnen Punkten erfolgen, will nicht der Wirtschaftler die Aufsicht über die ganze Ausführung selbst übernehmen, — ein höchst anerkennenswerter, aber gewiß seltener Fall, da dem Wirtschaftler abgesehen von andern persönlichen und sachlichen Hindernissen meist gar nicht die entsprechende Zeit zu Gebot steht. So bleibt in den meisten Fällen die wichtige Arbeit der ersten Erziehungshiebe, bei mangelhafter Anweisung und erschwelter Aufsicht, in ausgedehnter Weise den Arbeitern und ihrem zweifelhaften Verständnis überlassen, — notdürftig geleitet durch einige Generalregeln, mit denen sie auf die Bestände losgelassen werden. Der zweifelhafte Erfolg solcher Vorschriften ließe sich mit zahlreichen drastischen Beispielen aus der Praxis belegen. Bei großen Flächen muß zudem in der Regel auch eine größere Arbeiterrotte, also nicht wie bei kleinen Flächen nur auserlesenes Personal Verwendung finden. Dazu kommt, daß bei großen Dickungsflächen, — sei es aus mangelnder Orientierung oder aus Nachlässigkeit —, nicht selten größere Flächenteile übergangen werden und ohne Erziehungsmaßregeln bleiben, ohne daß die Kontrolle dies bemerkt.

Am besten wird dieser Nachteil dadurch vermieden und gleichzeitig der Orientierung gedient, daß man die Dickungsgroßfläche vor Beginn der Arbeit durch Parallellinien in Streifen zerlegt, die dann nacheinander in Angriff genommen werden. Das streifenweise Vorgehen ermöglicht dabei volle Beaufsichtigung, indem die Arbeiter jedesmal auf der einen Schmalseite des Streifens, über dessen ganze Breite weg, neben einander aufgestellt werden und so unter den Augen des Aufsehers gleichmäßig über den Streifen vorwärtsarbeiten. Die Streifenbildung erleichtert endlich den Verkauf des angefallenen Holzes und die Kontrolle der Ausführung. Damit ergibt sich uns ein Wink für die zweckmäßigste Form des Arbeitsfelds bei ersten Erziehungshieben.

Die späteren Erziehungshiebe, die Durchforstungen, unterscheiden sich von den ersten dadurch, daß hier bei wachsender Uebersichtlichkeit des Arbeitsfelds der Nutzzweck neben dem Erziehungszweck immer schärfer hervortritt, sie weisen demgemäß, wie im folgenden bei Besprechung der Endnutzung gezeigt werden soll, eher auf größeres Arbeitsfeld hin.

3. Die Endnutzung.

Fassen wir ausschließlich den Nutzzweck ins Auge und sehen von Naturverjüngung ganz ab, so zeigt die nutzende Tätigkeit ohne Zweifel ein Streben nach Arbeitsvereinigung auf größerer Fläche. Das Auszeichnen der Schläge, die Fällung, Aufbereitung und Aufnahme des Holzes, die übersichtliche Lagerung, die Kontrolle, die Bewachung und der Verkauf, endlich unter besonderen Verhältnissen auch die Beförderung, — alles das weist nach herrschender Anschauung auf Vereinigung eines großen Arbeitsmaßes auf großem Arbeitsfeld hin. Als günstigste Form wird daher vielfach der Kahlgroßschlag erscheinen, was zum Ausdruck kommt in der Forderung der „Führung entsprechend massenreicher Schläge“ im Interesse des Fällungsgeschäfts, der Aufsicht und Kontrolle, wie des Verkaufs und der Beförderung.

Und doch scheint uns, daß unter fortgeschrittenen Wirtschafts- und Verkehrsverhältnissen der Großschlag auch vom rein betriebstechnischen Standpunkt aus nicht immer das Bestmögliche der Waldabnutzung bildet (vergl. auch Ney, Schablonenwirtschaft im Walde S. 43, über die Vorteile nicht zu großer Schläge).

Stellen wir die Haupterfordernisse zweckmäßiger Abnutzung zusammen, so tritt uns als erstes das Bedürfnis nach entsprechendem Raum für Betätigung des Fällungsgeschäfts entgegen. Es soll keine Ueberhäufung der Fläche mit Schlagerzeugnissen entstehen, da diese zu wesentlicher Behinderung der Fällungsarbeiten und Gefährdung von Arbeitern und aufbereitetem Holz führt; denn durch solche Ueberhäufung ist die Fallrichtung der Stämme beschränkt, die Arbeiter sind an freier Bewegung gehindert, es fehlt an Raum zur Lagerung des Schlagergebnisses, und endlich sind Aufnahme, Besichtigung und Abfuhr der über einander gehäuften Holzmassen erschwert.

Eine zweite Forderung will eine zu große Entfernung der einzelnen Arbeitsgegenstände (Stämme, Stammgruppen) von einander vermieden wissen, weil sonst der Ueberblick leidet und das Holz für Zusammenstellung der Schichtholzsortimente aus zu großen Entfernungen zusammengetragen werden muß.

Endlich zählt zu den Haupterfordernissen einer zweckmäßigen Nutzung: eine geordnete und übersichtliche Lagerung der Schlagzeugnisse, die jedes Stück leicht zugänglich macht und dadurch, wie insbesondere durch eine klare Nummernfolge derjenigen Sortimente, die nicht angerückt werden, die Aufnahme und Kontrolle erleichtert und der Besichtigung wie der Abfuhr förderlich ist.

Diese Erfordernisse bedingen für die Arbeitsfläche einerseits eine Beschränkung des Arbeitsmaßes auf der Flächeneinheit und verbieten andererseits jede Arbeitszersplitterung; die Arbeitsgegenstände sollen vielmehr ununterbrochen aneinander gereiht sein. Sie bedingen ferner für das Arbeitsfeld solche Form und Größe, die eine übersichtliche Lagerung und eine klare Nummernfolge gestatten.

Diese Momente scheinen uns gleicherweise gegen Großkahlschlag, wie gegen blenderartige Hiebe über große Flächen zu sprechen, sie weisen überhaupt nicht auf die Kahlhiebsform, sondern auf allmähliche Schlagräumung hin, wie sie die Naturverjüngung mit sich bringt, und auf Schläge von übersichtlicher Form und mäßiger Größe.

Lassen sich demgegenüber nun auch gewichtige Momente geltend machen, die für die Großschlagform sprechen, so zeigt doch das Besprochene, daß diese Vorteile der „Waldexploitierung“¹⁾ im großen beim Kleinschlag durch entsprechende räumliche Schlagordnung ausgeglichen werden können.

Nach dieser Betrachtung der einzelnen Betriebsaufgaben und ihrer Betätigung können wir nunmehr zur **Ableitung allgemeiner Forderungen an die räumliche Ordnung** übergehen.

Die vorstehenden Untersuchungen lehren in bezug auf räumliche Anordnung, daß im allgemeinen die betriebsleitende Tätigkeit in erster Linie auf Uebersicht über die Arbeitsflächen und Einblick in deren innere Verfassung ausgehen muß, während die ausführende Tätigkeit mehr auf Arbeitsvereinigung hinweist und die Zusammenlegung eines großen Arbeitsmaßes auf dem einzelnen Arbeitsfeld einer weitgehenden Zerstreuung oder gar Zersplitterung vorzieht.

Darin treten uns zwei entgegengesetzte Neigungen entgegen, die jedoch beide ihre Grenzen haben.

Das Streben nach Arbeitsvereinigung findet seine Schranken in der erschwerten Beschaffung der Arbeitskräfte, und — insbesondere bei der Erntetätigkeit — in der Rücksicht auf die gute Verwertung derjenigen Schlag-

1) Wohl das häßlichste Fremdwort im Sprachschatz der forstlichen Literatur.

produkte, die nicht Gegenstand des Großhandels sind, sondern dem örtlichen Verbrauch dienen.

Der forstwirtschaftliche Arbeiter, wie der Käufer dieser letzteren Erzeugnisse (Brennholz, Reisig . . .), hat in der Regel an sich schon weite Wege von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle beziehungsweise zum Lagerungsort des Holzes zurückzulegen. Es muß daher bei Verteilung der Arbeit über die Betriebsfläche darauf Bedacht genommen werden, daß sich jederzeit entsprechend zahlreiche Arbeitsfelder in möglichster Nähe aller, meist auf den verschiedenen Seiten der Betriebsfläche liegenden Wohnorte der Arbeiterrotten und der Abnehmer der Schlagerzeugnisse befinden, damit in möglichster Nähe jedes einzelnen Wohnorts für nachhaltige Arbeits- und Kaufgelegenheit gesorgt ist und dadurch allzu weite Wege zur Arbeits- bzw. Lagerungsstelle vermieden werden, wie sie weitgehende Arbeitsvereinigung leicht mit sich bringt.

Ebenso findet das entgegengesetzte Streben nach Uebersichtlichkeit und daher Kleinheit des Arbeitsfeldes seine Grenze darin, daß mit der Verkleinerung des einzelnen Arbeitsfeldes die Zahl der Arbeitsfelder notwendig steigt und schließlich Zersplitterung eintritt, die für den Ueberblick und die Leitung ebenso ungünstig wirkt, wie zu große Flächen.

Nicht allzuschwer ist daher eine Versöhnung der Gegensätze und läßt sich eine Mittellinie für beide Ziele finden. Dies gestattet schon die Forderung der Uebersichtlichkeit des einzelnen Arbeitsfeldes. Wir haben diese Eigenschaft zunächst im Interesse der Betriebsleitung gefordert. Uebersichtlichkeit ist jedoch auch eine wichtige Forderung der ausführenden Tätigkeit, denn ihr Mangel trifft nicht allein den Wirtschaftler, sondern ebenso sehr das Aufsichtspersonal und selbst die Arbeiter.

Die Erfüllung dieses wichtigsten Anspruchs auf die räumliche Ordnung ist nun aber im Forstbetrieb durch zwei Momente besonders erschwert, das ist einmal der Umstand, daß dieser an sich schon stets auf verhältnismäßig großen Flächen arbeitet (im Gegensatz zu andern Arten der Bodenbenützung), und dann die Tatsache, daß zudem seine Flächen in der Regel mit Holzgewächsen bestockt sind, die den Ausblick erschweren oder ganz verwehren.

Ueberblick über die einzelne Fläche wird aus diesen Gründen im Wald nie von einem Punkt aus zu erlangen sein; um sich über deren Beschaffenheit und Bestockung zu unterrichten, ist es vielmehr stets notwendig, die Fläche sorgfältig zu begehen. Das Begehen einer Fläche wird aber nur dann alle Punkte treffen, also zu vollständiger Orientierung führen, wenn für den einzuschlagenden Weg eine klar vorgezeichnete Richtlinie vorhanden ist. Solche Richtlinien sind, soweit nicht zufällig andere vorhanden, die Grenzen der Fläche. Daraus ergibt sich zunächst die Notwendigkeit des Vorhandenseins klarer Grenzen, also der Vereinigung der Arbeitsgegenstände in geschlossenen Arbeitsfeldern, die, als zu jedem geordneten Betrieb gehörig, bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde. Vom Verlauf

der Grenzen jedes geschlossenen Arbeitsfelds, und damit von seiner Größe und Form wird dann weiterhin die Möglichkeit sicherer Orientierung in erster Linie abhängen. Ein weiteres Moment der Orientierung ist die Art und Weise, wie sich innerhalb der Fläche des Arbeitsfelds die einzelnen Beobachtungs- bzw. Arbeitsgegenstände aneinanderreihen. Uebersicht und Einblick in die Beschaffenheit der Fläche wird hier um so mehr gefördert werden, je mehr sich diese Gegenstände fortlaufend aneinander schließen, und wird um so mehr leiden, je mehr sie räumlich getrennt und unregelmäßig über die Fläche zerstreut liegen und je größer und unübersichtlicher dabei diese Fläche an sich ist; wir haben in diesem Fall oben von „Zersplitterung“ gesprochen.

Die Uebersichtlichkeit des laufenden Betriebs ist somit abhängig von Größe und Form des einzelnen geschlossenen Arbeitsfelds und von der Anordnung der Beobachtungs- bzw. Arbeitsgegenstände innerhalb dieser Flächen.

Mehr als der Flächeninhalt des einzelnen Arbeitsfelds ist dessen Form d. h. das Verhältnis der Ausmaße zu einander von entscheidender Bedeutung, denn sie bestimmt den Verlauf der Grenzen des Arbeitsfelds. Je näher die Grenzlinie allen einzelnen Punkten der Fläche liegt, um so leichter wird sie sich restlos begehen und besichtigen lassen; je ferner die Grenzen, je größer und nach allen Richtungen ausgedehnter die Fläche ist, desto schwerer und zeitraubender wird dies sein. Insbesondere erweisen sich die notwendigen Kreuz- und Quergänge auf ausgedehnten Flächen stets als eine sehr unsichere Sache, da hier leicht große Flächenteile überhaupt übergangen werden, denn hier fehlt dem Begehenden zu seiner Orientierung die notwendige Richtlinie.

Da im Forstbetrieb ein Ueberblick über das Ganze von einem Punkt aus ausgeschlossen ist, so muß das Bestreben allgemein dahin gehen, solche räumliche Bedingungen zu schaffen, die eine Besichtigung jedes einzelnen Arbeitsfelds von einer klaren Mittellinie aus gestatten. Solche Bedingungen sind aber nur gegeben, wenn die gegenüberliegenden Grenzen sich so nahegerückt werden, daß der Begehende sie jederzeit vor Augen hat, also die Mittellinie festhalten kann; sei es nun, daß er sich in dieser selbst bewegt oder von ihr aus nach beiden Seiten hin- und hergeht, also einen Zickzackweg macht.

So gelangen wir zu einer langgestreckten Flächenform, die in der Breite sehr wenig, in der Länge beliebig ausgedehnt ist, also zu einem streifenförmigen Arbeitsfeld als Optimum für Uebersicht und Einblick in alle Einzelheiten, und zwar wird sich diese Form um so mehr empfehlen, je weniger übersichtlich die Fläche an sich infolge ihrer Bestockung ist. Streifenform allein sichert restlose Besichtigung der Fläche ohne besondere Mühe. Gleiche Vorteile bietet die langgestreckte Form des Arbeitsfelds für die Arbeitsanweisung, für das Anstellen der Arbeiter und für das Fortschreiten der Arbeit über die Fläche, deren Beaufsichtigung und Kontrolle.

In bezug auf die Form des Arbeitsfelds leitet der Verfasser aus

praktischer Beobachtung — in Uebereinstimmung mit den vorstehenden Betrachtungen — den Satz ab:

Alle Maßregeln des Betriebs werden, in der Leitung sowohl wie in der Ausführung, ungemein erleichtert und übersichtlich gemacht durch Vornahme auf streifenförmigen Flächen.

Auf langgezogenem Arbeitsfeld stellt der Wirtschaftler am leichtesten sowohl Zustand als wirtschaftliches Bedürfnis der Fläche fest, hier lassen sich die Arbeiter am einfachsten zur Arbeit anstellen und unterweisen und die Arbeit selbst schreitet unter sicherer Aufsicht gleichmäßig über die Fläche fort, ohne daß etwas übersehen wird oder überflüssige Wege zurückgelegt werden müssen. Gleich sicher ist hier die nachfolgende Kontrolle der Ausführung. Der Grund für dieses günstige Verhalten ist der stets vorhandene Ueberblick und der für Arbeit und Besichtigung der Fläche klar vorgezeichnete Weg.

Streifenweises Vorgehen ist denn auch in der Praxis vielfach beliebt, Pilz, Huber und andere fordern schließliche Räumung sogar der Blenderschläge in streifenförmigem Hieb, derselbe ist bei Schirmschlag nicht selten praktisch in Uebung, wie auch Kahlschläge meist streifenweise geführt werden. Allen diesen Nutzungsmaßregeln folgen dann entsprechende streifenförmige Kulturarbeiten. Nur Tichy nennt in seiner „Forsteinrichtung in Eigenregie“ S. 28 die Saumschlagform „ein notwendiges Uebel“. Ihre Notwendigkeit sehen wir ohne weiteres ein, aber weshalb sie ein „Uebel“ sein soll, dafür vermissen wir den Beweis.

Weiterhin ist die Anordnung der Beobachtungs- und Arbeitsgegenstände auf dem Arbeitsfeld in gleichem Maß von Bedeutung für die leitende, wie für die ausführende Tätigkeit. Entscheidend sind leichtes Auffinden und kurzer Weg von Gegenstand zu Gegenstand; die Besichtigung und ebenso die Arbeit soll unmittelbar von Objekt zu Objekt fortschreiten, es soll nicht zwischen den Gegenständen ein weiter Weg zurückgelegt oder gar die nächste Arbeitsstelle erst mühsam gesucht werden müssen; beides beeinträchtigt den Ueberblick und erschwert die Arbeit. Das führt zur Forderung gleichmäßiger Verteilung eines entsprechend großen Arbeitsmaßes über die Flächeneinheit des Arbeitsfelds, und spricht gegen ungleichförmige Verteilung, wie gegen Verteilung eines kleinen Arbeitsmaßes über große Flächen.

Bezüglich desjenigen Arbeitsmaßes, das je für die Flächeneinheit erwünscht ist, gehen die verschiedenen Betriebsarbeiten auseinander: während nämlich Verjüngung und Erziehung ein möglichst großes Arbeitsmaß der Flächeneinheit fordern, weisen die Verhältnisse bei der Endnutzung (die Aufbereitung und Lagerung der Nutzungsmassen) auf ein im Verhältnis zur Flächenausdehnung — mäßiges Arbeitsmaß hin.

Die zweckmäßige Größe des gesamten Arbeitsmaßes je

für ein Arbeitsfeld endlich wird vorwiegend durch Rücksichten der Ausführung bestimmt. Dasselbe muß die Arbeiterrotten mindestens für ganze Tage — womöglich aber für längere Zeit — an einem Waldort festhalten, damit nicht zu häufiger Wechsel der Arbeitsstelle notwendig wird, der stets mit Zeitverlust verknüpft ist, und der auch sonst nachteilig auf den Betrieb wirkt. Bei der Nutzung kommt noch dazu die Forderung entsprechender Holzmassen in den einzelnen Schlägen mit Rücksicht auf Verkauf, Behütung, Abfuhr u. s. w.

Fassen wir die Forderungen an die räumliche Ordnung, die sich aus den vorstehenden Betrachtungen ergeben, kurz zusammen, so beziehen sich dieselben:

1. auf die Verteilung der Arbeit über die Gesamtfläche:

Die Arbeit des einzelnen Jahres soll möglichst gleichmäßig über die Betriebsfläche verteilt sein und zwar in einer entsprechenden Zahl von geschlossenen Arbeitsfeldern;

2. auf das Maß der Arbeit im einzelnen Arbeitsfeld:

Jedes Arbeitsfeld soll ein solches Arbeitsmaß einschließen, das gestattet, die Arbeiterrotten für längere Zeit, mindestens für ganze Tage, an einem Waldort festzuhalten und das — im besondern bei der Endnutzung — am einzelnen Ort eine entsprechende Menge von Schlagerzeugnissen liefert;

3. auf die Verteilung der Arbeit innerhalb des einzelnen Arbeitsfelds:

Die Arbeitsgegenstände sollen gleichmäßig und zusammenhängend über die Fläche verteilt, nicht auf unregelmäßig auseinanderliegende Punkte zerstreut sein.

Bei Verjüngung und Erziehung ist ein möglichst hohes Arbeitsmaß je für die Flächeneinheit erwünscht, während der Nutzung nur ein solches Maß günstig ist, das eine Ueberhäufung der Fläche mit Nutzungsmassen vermeidet;

4. auf die Uebersichtlichkeit des Arbeitsfelds:

Flächengröße und Gestalt des Arbeitsfelds sind vom Gesichtspunkt besten Ueberblicks zu bestimmen. Dieser Gesichtspunkt führt zu mäßiger Größe und zu Streifenform.

Zeigt nach dem Besprochenen auch hier das ökonomische Prinzip eine gewisse Neigung zu Arbeitsvereinigung auf großer Fläche, so lassen sich seine Ziele doch mit der entgegengesetzten Neigung des natürlichen Prinzips, — das, wie wir früher festgestellt haben, in seinen Folgerungen zu ordnungsloser Zerstreuung der Arbeitsgegenstände über große Flächen führt — vereinigen, wenn unser vermittelndes Streben dahin geht, geordnet aneinandergereihte Kleinflächen so zu Arbeitsfeldern zusammenzuschließen, daß sie die Nachteile der Arbeitszersplitterung vermeiden, dabei aber die Vorteile leichter Uebersicht und klaren Einblicks auf kleiner Fläche in vollem Maße sichern.

Der laufende Wirtschaftsbetrieb richtet seine Forderungen in bezug auf

räumliche Ordnung an das „Arbeitsfeld“ und dessen zweckmäßige Beschaffenheit nach Größe, Form, Arbeitsmaß und Arbeitsverteilung. Räumliche Einheit für wirtschaftliche Betätigung — also Arbeitsfeld — ist nun aber beim schlagweisen Hochwald stets der „Bestand“, die gleichartig beziehungsweise gleichaltrig bestockte Einheit des Betriebs, oder ein Teil des Bestands.

Damit ist Größe, Form und Verteilung der Arbeitsfelder gegeben und bestimmt durch die Anordnung der Altersklassen. Unsere Betrachtungen laufen also mehr oder weniger auf die Beurteilung von Anordnung, Größe und Form der gleichaltrigen Flächen hinaus, und unsere Forderungen sind darauf gerichtet, Verteilung und Aufbau der Altersklassen zu regeln.

Auch auf dem Gebiet der Betriebsausführung finden wir somit, wenn wir unsere vorhin gestellten Forderungen auf die Altersklassen übertragen, das Optimum der Forstwirtschaft in einer weitgehenden Gliederung und streifenförmigen Anordnung der Altersklassen. Soll von dem Vorteil der streifenförmigen Anordnung aller wirtschaftlichen Arbeiten im großen allgemeiner Gebrauch gemacht werden, so muß schon die ganze räumliche Ordnung hierauf gegründet sein, d. h. jeder Bestand, von dessen Flächengröße und Gestaltung ja Größe und Form des einzelnen Arbeitsfelds abhängt, muß Streifenform haben, was uns wiederum zum Saumschlag führt.

So würden wir also, nachdem das Uebergewicht des ökonomischen Prinzips die ehemals ordnungslose Ausbreitung der Altersklassen in eine geordnete Vereinigung auf großer Fläche verwandelt hatte, auch wenn wir dem gleichen Prinzip weiterhin folgen, — also selbst ohne entscheidenden Einfluß des natürlichen — zurückgeführt zur Zerstreuung der Altersklassen, aber nicht mehr zur alten, ins kleine gehenden Ordnungslosigkeit, sondern zu einer wohlgedachten Gliederung der Altersklassen in kleine, voll wirtschaftsgerechte Einheiten.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen gehen wir wiederum zur Betrachtung und Beurteilung der wichtigsten Betriebsformen über.

2. Kapitel.

Die Betrachtung der einzelnen Betriebsformen.

Betrachten wir nunmehr die Betriebsformen unter dem Gesichtspunkt der aufgestellten Forderungen, so stehen sich zunächst als Gegensätze in bezug auf Arbeitsverteilung gegenüber:

Die Großschlagformen und die Blenderform.

Die ersteren Formen folgen der ökonomischen Tendenz weitgehender Arbeitsvereinigung, um hiedurch im Großbetrieb für die meisten Kultur- und Abnutzungsarbeiten günstige Ausführungsbedingungen zu schaffen, während die Blenderform die natürliche Tendenz der Zerstreuung der Arbeit in

kleinsten Einheiten über große Flächen zeigt. Und doch zeigen sie von unserem Gesichtspunkt aus etwas *Gemeinsames*. Bei beiden wird stets auf großer Fläche gleichzeitig gearbeitet, beide zeigen also großes Arbeitsfeld und zwar die Großschlagform mit mehr oder weniger zusammenhängenden Arbeitsgegenständen, innerhalb desselben, die Blenderform mit regelloser Zerstreuung derselben über die Fläche. Während sich die Großschlagformen einseitig der Ordnung und Uebersichtlichkeit im großen befleißigen, zeigt die Blenderform diese Eigenschaften weder im großen noch im kleinen; sie wird also durch ihre im großen wie im kleinen herrschende Ordnungslosigkeit weder der Uebersichtlichkeit, noch einer zweckmäßigen Arbeitsausführung gerecht werden. Sie scheidet daher als eine Form, die eine intensive Wirtschaft erschwert, aus unseren Betrachtungen von vornherein aus; wir werden, wenn wir zu einem wirtschaftlichen Optimum gelangen wollen, nicht von der Blenderform ausgehen dürfen, sondern von den Großschlagformen, die wenigstens Ordnung und Uebersicht im großen erstreben und deren Hauptnachteil — die Größe und Unübersichtlichkeit des Arbeitsfelds — durch Verkleinerung und Umformung desselben gehoben werden kann; wir müssen also schließlich nicht zu einem blenderartigen, sondern zu einem *Schlagbetrieb* gelangen.

Das Besprochene zeigt schon, daß von den Großschlagformen die *Blenderschlagform* sehr wenig günstige Verhältnisse erwarten läßt. Sie setzt mit dem Streben nach Ordnung — der Blenderform gegenüber — gerade *da* ein, wo dies für guten Ueberblick am wenigsten wertvoll ist, nämlich im großen, durch Schaffen großer (periodischer) Arbeitsfelder, innerhalb deren jedoch meist eine weitgehende Arbeitszersplitterung stattfinden muß, soll das Blenderprinzip erhalten bleiben. Nur wo, wie beim bayrischen Verfahren durch möglichst weitgehende Scheidung der Altersklassen — mit Hilfe von Saumbieben — eine gewisse Ordnung und ein Zusammenhang der Arbeitsgegenstände auch im kleinen erzielt wird, treten diese Nachteile weniger hervor; doch stellt auch hier Zahl, Größe und weitgehende Unübersichtlichkeit der Arbeitsfelder sehr bedeutende Anforderungen an die Betriebsführung, was auch in Regensburg hervorgehoben und anerkannt wurde. Ein großer Teil der Betriebsfläche befindet sich infolge des langen Verjüngungszeitraums fortwährend im Zustand der Verjüngung; die einzelnen Besamungsflächen, über die in erster Linie das Auge der Wirtschaft zu wachen hat, sind in unregelmäßigen Formen über große Räume zerstreut und durch Dickungsflächen getrennt, die den Ausblick hindern. Wie schwer bei Naturverjüngung, besonders in gemischten Beständen, an sich schon ein guter Ueberblick über das erste Ankommen und Gedeihen des Anflugs auf großen Flächen zu gewinnen und dauernd zu erhalten ist, wird jeder Wirtschaftler in vielen Fällen erfahren haben. Durch Zersplitterung wird aber diese Aufgabe kaum erleichtert.

Ist so schon die Orientierung erschwert, so gilt dies noch mehr von der Einzelfeststellung, Anordnung und Ausführung der fast immer notwendigen Ergänzungen und deren Nachbesserungen, die überdies durch Arbeitszersplitterung verteuert werden.

In gleicher Lage befindet sich die Betriebsausführung den ersten Er-

ziehungsarbeiten gegenüber. Auch hier liegen die Dickungsflächen unregelmäßig über große Arbeitsfelder zerstreut und treten fortgesetzt neue, unregelmäßig geformte Teilflächen in dieses Stadium ein. Hier muß das Reinigungsbedürfnis stets rechtzeitig erkannt werden, soll der Eingriff nicht in vielen Fällen zu spät kommen; der Wirtschaftler muß daher fortgesetzt auf dem Laufenden sein, was doch andererseits infolge der ungünstigen Raumverhältnisse kaum möglich sein wird, so daß stets die Gefahr des Versäumnisses von ersten Erziehungsmaßregeln besteht, die sich in Erhaltung schlechter Vorwüchse, zu dichter Verjüngungsstellen, unerwünschter Holzarten und unbeabsichtigter Mischungsverhältnisse, astiger Steilränder u. s. w. äußert.

So klingt z. B. in Carls Besprechung der Tannenverjüngung in den Vogesen (Allg. Forst- und JZtg. 1893 S. 163) die Klage durch über mangelhafte Pflege und Ergänzung der Verjüngungsschläge. Er sagt dabei mit Recht: „Jeder erzieht seine Kinder lieber als die seiner Vorgänger“ und begründet damit das Streben der bekannten „Tannenregeln“ nach Abkürzung der Verjüngungszeit und schematischer Ordnung.

Auch das Fällungsgeschäft und der Ueberblick über das Ernteergebnis dürften vielfach unter der Arbeitszersplitterung und der Unübersichtlichkeit der Fläche leiden und zu erhöhten Aufwendungen für Zusammenschaffen des Holzes und Anrücken führen (vgl. 3. Abschnitt). Endlich muß die Kontrolle aller Arbeiten und die Inspektion bei der Blenderschlagform wesentlich erschwert erscheinen und zwar um so mehr, je weniger für Ordnung im kleinen durch zeitigen Uebergang zur Absäumung gesorgt wird.

Jedenfalls setzt der Blenderschlagbetrieb kleine Wirtschaftsbezirke, selten eintretenden Beamtenwechsel und Wirtschaftler von besonderem waldbaulichem Interesse und entsprechender Rüstigkeit voraus.

Etwas günstiger in bezug auf den Betrieb erweist sich die räumliche Ordnung der Schirmschlagform. Die der Betriebsführung günstigen Momente sind hier die gleichmäßige Lichtung und Verjüngung und der kurze Verjüngungszeitraum. Beide begünstigen die Uebersichtlichkeit, indem sie eine gleichmäßig fortlaufende Arbeit ermöglichen und Zersplitterung vermeiden.

Die dem Betrieb trotzdem bleibende Erschwerung von Ueberblick und Arbeitsausführung liegt nur am großen, ungünstig geformten Arbeitsfeld. Gestiegt können allerdings die Schwierigkeiten der großen Fläche werden durch zahlreich hinzutretende Nebenumstände: Holzartenmischung, Ungleichaltrigkeit der Jungwüchse, die zunächst nur stellenweise ankommen, Berggelände, der für Schirmschlag bezeichnende unregelmäßige Wechsel von natürlich verjüngten Teilen mit Pflanzflächen, der bei der ersten Erziehung besonders dadurch ungünstig wirkt, daß die ersteren Flächen in der Regel einer viel eingehenderen Pflege bedürfen, als die zwischenliegenden regelmäßig bestockten Pflanzflächen. Herrschen die letzteren vor und verdecken sie — besonders entlang der Wege — die ersteren, so entbehren diese nur zu häufig der erforderlichen Pflege.

Die Schuld an den Schäden, die nicht selten als Folgen von Versäumnissen im Verjüngungs- und Reinigungszeitraum hervortreten, trifft nicht immer den

Wirtschafter. Es könnten uns sonst nicht, — auch in gutverwalteten Bezirken — in den Jungwüchsen, besonders abseits der Wege, immer wieder so wenig erfreuliche Bilder entgegentreten, die von Versäumnissen Kunde geben, die, als sie entdeckt wurden, nicht wieder gut zu machen waren. Die Schuld liegt vielmehr am System, an der Großflächenwirtschaft, welche Versäumnisse um so mehr begünstigt, je größer die gleichzeitig in Arbeit stehenden Flächen sind.

Wollen wir diese Nachteile der Schlagwirtschaft vermeiden und uns doch deren unzweifelhafte Vorzüge, die im geschlossenen Arbeitsfeld mit gleichmäßiger Arbeitsverteilung liegen, zunutze machen, so kann dies, wie oben gezeigt wurde, nur dadurch geschehen, daß wir dieses geschlossene Arbeitsfeld, — den „Schlag“ — verkleinern und umformen. Wir gelangen damit zum *S a u m s c h l a g* als derjenigen Form, die befähigt ist, den übrigen hier in Betracht kommenden Vorzügen des Schlagbetriebs auch noch denjenigen der Uebersichtlichkeit bis ins einzelne beizufügen und so allen Forderungen der Betriebsführung am besten zu genügen ¹⁾.

Die Saumschlagform und die Forderungen der Betriebsführung.

Vor allen andern Betriebsformen ist der Saumschlag ausgezeichnet durch das stets streifenförmige Arbeitsfeld, das, wie gezeigt wurde, beste Uebersichtlichkeit und günstigste Verhältnisse für alle Arbeitsausführung gewährt. Dieser Vorteil ist so groß, daß die Bedeutung der zweckmäßigen Aneinanderreihung der einzelnen Arbeitsgegenstände innerhalb des Arbeitsfelds

1) Dem gegenüber vertritt Fricke den Standpunkt (Zeitschr. f. F. u. J.wes. 1908 S. 471), die Wirtschaft auf großer Fläche sei „jedenfalls sehr viel übersichtlicher“, als der hier vorgeschlagene Saumschlag.

Da kommt es wohl ganz auf die Art von Uebersichtlichkeit an, die man im Auge hat. In einer Art von Uebersichtlichkeit ist der Großschlag, wenigstens der Kahlschlag, dem Saumschlag allerdings weit überlegen. Es ist die Uebersichtlichkeit der extensiven Wirtschaft. Für den Verwalter des Holzmagazins „Wald“, den reinen Verwaltungsmann oder den Kameralisten, ist es unzweifelhaft übersichtlicher und auch angenehmer, wenn er seine Arbeit draußen auf wenigen großen „übersichtlichen“ Kahlflächen beisammenfindet und sich nicht um zahlreiche Kleinflächen zu kümmern braucht. Von hohem Roß herab überschaut er mit sicherem Blick die ganze Fläche. Wie leicht ist da zu regieren! Der Forstwirt in unserem Sinn dagegen muß notwendig ins kleine gehen; denn er soll seine Produktionsmittel voll anspannen und in Tätigkeit erhalten; er braucht also eine ganz andere Art von Uebersichtlichkeit. Sie besteht weniger im Ueberblick im großen, als vielmehr im sicheren Einblick in alle Einzelheiten, in die Verhältnisse auf jedem einzelnen Flächenteil, deren keiner übersehen werden darf, wie dies oben gezeigt wurde. Er muß und will jede Einzelheit überschauen, anordnen und kontrollieren können. Daß es aber auf der Großfläche für eine intensive Wirtschaft sehr viel schwerer ist, den Betrieb nicht nur im großen zu regieren, sondern — und das ist viel wichtiger —, auch im kleinen zu überschauen, die Wirtschaft, wenn wir so sagen dürfen, *vollkommen zu durchschauen*, als dies etwa bei streifenweiser Anordnung der Fall ist, das wird jeder Wirtschafter in unserem Sinn uns bestätigen, der große Kulturflächen nachzusehen, der in 15—20 ha großen Schirm- und Blenderflächen Holz auszuzeichnen oder nach deren Räumung Ergänzungen vorzunehmen hatte, oder der schon Dickungen von ähnlicher Ausdehnung, zumal im Laub- oder Mischwald, reinigte u. s. f.

gegenüber der sehr günstigen Form desselben ganz zurücktritt, obgleich auch die erstere meist in hohem Maß vorhanden ist.

Wir gehen hier die einzelnen Betriebsarbeiten durch: Verjüngung, Bestandenserziehung und Endnutzung, um das Verhalten des Saumschlags zu den Forderungen der Betriebsführung im einzelnen festzustellen.

1. Die Verjüngung.

Arbeitsfeld ist der Verjüngungsstreifen, also eine mehr oder weniger schmale, langgezogene, seitlich gut begrenzte Fläche, über die der Ueberblick auf geradem oder zickzackförmigem Weg in völlig sicherer Weise und leicht erlangt werden kann. Wie leicht kann sich hier der Wirtschaftler fortgesetzt über alle, die Verjüngung berührenden Fragen auf dem Laufenden erhalten, als da sind: Beschaffenheit des Bodens, Fortschritt der Ansamung, Dichtigkeit derselben, Lücken u. s. w., das Verhältnis der ankommenden Holzarten, die Bedürfnisse des Anflugs in bezug auf Lockerung des Kronendachs, die etwaige Notwendigkeit von Bodenvorbereitung oder künstlichem Vorbau von Holzarten, die Ergänzung und Nachbesserung vor und nach der Freistellung und anderes mehr.

Ein einziger Gang über den Streifen oder ein solcher hin und zurück, entlang der beiden scharf hervortretenden Grenzen, genügt zu diesen Feststellungen. Dabei ist die ganze Anordnung der Wirtschaft eine solche, daß jeder Gang, den der Wirtschaftler durch den Wald macht, nützlich verwendet werden kann, wenn er nicht den Wegen, sondern den Verjüngungsstreifen folgt, und so deren Verfassung im Vorbeigehen prüft. Die kritischen Punkte der Wirtschaft, die Verjüngungsorte, sind hier bei Saumschlag in Schmalstreifen angeordnet, und diese Streifen sind demnach die gegebenen Wege des Wirtschaftlers innerhalb seines Bezirks. So ist er ohne besondere Mühe oder großen Zeitaufwand jahraus jahrein in der Lage, sich über die Bedürfnisse seiner Verjüngungsflächen auf dem Laufenden zu erhalten und die erforderlichen Kenntnisse für die Maßnahmen des nächsten Jahres zu sammeln, die dann in den nächsten Nutzungs- und Kulturplänen, sowie im Auszeichnen der Schläge, dessen wir nachher gedenken werden, zum Ausdruck kommen. In unvorteilhaftem Gegensatz dazu stehen auf großer Fläche die Kreuz- und Quergänge, ohne alle Sicherheit, sämtliche Punkte berührt zu haben und ohne vollen Ueberblick über die Sachlage.

In gleicher Weise ist die Arbeitsanweisung für die Kulturmaßregeln an Personal und Arbeiter durch die Streifenform erleichtert, ebenso, wie die Ausführung selbst und deren Beaufsichtigung, während auf großer Fläche stets die Unsicherheit bestehen bleibt, ob alle Lücken richtig gefüllt sind. Wie oft wird da am einen Ort zu viel, am andern zu wenig getan! Dagegen können alle auf dem Verjüngungsstreifen etwa gleichzeitig notwendigen Arbeiten, wie: Bodenvorbereitung, Vorbau, Ergänzung von Lücken, Herstellen der erwünschten Holzartenmischung durch Beipflanzen oder Wegnahme, Durchreisern zu dichter Anflüge und Aushauen unerwünschter Individuen — zusammen in einem oder wenigen Gängen und zwar unter bester Aufsicht erledigt werden, eine

Arbeitsvereinigung, durch die stets auch ein entsprechend großes Arbeitsmaß und fortlaufende Arbeit gesichert sind. Man stellt die Arbeiterrotte am einen Ende des Streifens an und läßt sie gleichmäßig über denselben vorwärts arbeiten, wobei die beste Gewähr gegeben ist, daß nichts vergessen bleibt und keine unnötigen Wege gemacht werden. Wie einfach ist endlich das Ergänzen der Naturverjüngung und das Herstellen entsprechender Holzartenmischung, wenn Ballenpflanzen aus Anflug oder früheren Saaten von der Fläche selbst Verwendung finden, und die Arbeit erleichtert wird durch fortgesetzten vollen Ueberblick über den Stand der Dinge auf der Fläche.

Auch die Ausführung von Schutzmaßregeln für den Jungvuchs wird, wo solche trotz des Reichtums an Individuen notwendig werden sollten, von dieser Anordnung gleichen Nutzen ziehen, z. B. das Fangen der Rüsselkäfer, das Anstreichen gegen Wildverbiß u. s. w.

Allgemein tritt der — in der räumlichen Anordnung des Saumschlags begründete — Umstand, daß hier der Ort für das Einsetzen irgend welcher wirtschaftlichen Tätigkeit stets ohne weiteres gegeben ist, überall da vorteilhaft hervor, wo es sich um den Eintritt unvorhergesehener Fälle handelt, denen die Wirtschaft sofort Rechnung tragen soll, also ganz besonders bei der Verjüngung. Bleibt z. B. der gewünschte Erfolg der ersten Bestandeslockerung zu lange aus, siedeln sich die Schattenhölzer nicht in genügendem Maß an, so ist jederzeit, wenn gerade unerwartet Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wenn Streumangel eintritt, oder wenn besondere Mengen von Samen oder Pflanzen verfügbar werden, der Ort gegeben, wo etwa Bodenbearbeitung, gegebenenfalls verbunden mit Gewinnung übermäßiger Streuablagerungen, wo Untersaaten oder Vorbau der erwünschten Holzarten Platz greifen können.

Ebenso, wie die Ausführung selbst, ist endlich deren Kontrolle seitens des Wirtschafters und Inspektors durch die Streifenform erleichtert, und guter Erfolg derselben gesichert.

2. Die Bestandeserziehung.

Mehr noch als bei der Verjüngung, bei der, wenigstens in der Anfangszeit, der Ueberblick über die Fläche in der Regel nicht allzusehr erschwert ist, weil sie mit noch niedrigen Pflanzen arbeitet, tritt der Vorteil streifenweiser Anordnung hervor in den ersten Stadien der Bestandeserziehung. In dieser Zeit ist, wie oben gezeigt wurde, ein Ueberblick über die Bestockung wegen deren Höhe und Dichtigkeit nur Schritt für Schritt zu erlangen, während er doch gerade hier am notwendigsten wäre. Da ist bei den oben erörterten Nachteilen der großen Flächen die durch Saumschlag gegebene Streifenform auch dieses Arbeitsfelds von besonderer Bedeutung für den Betrieb.

Der Dickungstreifen, der sich unmittelbar an den Verjüngungstreifen anschließt, zeigt beiderseits klar hervortretende Grenzlinien: auf der einen Seite ist es eben der Verjüngungstreifen, auf der andern derjenige Bestandesteil, der sich schon über Mannshöhe herauf von Aesten gereinigt hat, daher

einigen Ueberblick gestattet. Zwischen diesen beiderseits scharf hervortretenden Grenzen vermag sich Besichtigung und Ausführung leicht durchzuarbeiten, im Gegensatz zum Durcheinander großer Flächen, in dem sich Wirtschaftler und Arbeiter mehr oder weniger verlieren. Ebenso ist beim Saumschlag innerhalb des verhältnismäßig schmalen Streifens die Beaufsichtigung und die so notwendige Unterweisung der Arbeitenden von Fall zu Fall in hohem Grad erleichtert.

Große Vorzüge für den ausführenden Betrieb zeigt endlich der Saumschlag bei

3. Der Endnutzung.

Ihre Betätigung richtet sich beim naturverjüngenden stetigen Saumschlag nach dem Fortschreiten der Verjüngung und den Bedürfnissen des Anflugs. Arbeitsfeld ist hier wiederum der Verjüngungsstreifen.

Schon die Arbeitsanweisung, das Auszeichnen der Schläge ist hier durch die übersichtliche Anordnung der ganzen Aufgabe ein wahres Vergnügen. Der Wirtschaftler begeht die Fläche mehr oder weniger geradlinig, parallel dem Schlagrand, um sich seiner Aufgabe am besten in zwei Gängen zu entledigen; der eine Weg führt entlang der inneren Grenze des Verjüngungsstreifens und dient in erster Linie dem Vorrücken der Besamungsstellen, der Rückweg erfolgt auf der äußeren Seite des Streifens und dient dem Nachrücken des Bestandesrands. Auf diesem Weg überblickt der Wirtschaftler von seinem Standpunkt aus stets die ganze kritische Fläche und läuft vermöge der leichten Orientierung nicht Gefahr, von seiner Bahn abzuirren oder wesentliche Flächen-teile zu übersehen. Er wählt die Stämme nach dem örtlich erwünschten Lichtgrad bzw. dem vom Wirtschaftsplan geforderten Hiebsfortschritt aus und wird dabei in seiner Arbeit wesentlich gefördert dadurch, daß er jederzeit eine stetige Stufenreihe der Lichtstellung, deren Wirkung auf Boden und Anflug, und damit einen sicheren Maßstab für zweckmäßigen Eingriff vor Augen hat: auf der einen Seite den vollkommen geschlossenen Bestand, auf der andern den mehr und mehr gelichteten bis zum hellen Schlagrand. Auch sonst liegen die Verhältnisse klar und einfach, da Wurf- und Abfuhrriechung der Stämme ein für allemal gegeben sind (vgl. 3. Abschnitt) und Rücksichten auf höheren Anflug nur wenig in Frage kommen. Ist der Weg zurückgelegt, so hat der Auszeichnende das sichere Gefühl, ganze Arbeit gemacht, seine Aufgabe vollständig gelöst zu haben, da nicht wohl etwas Wesentliches übersehen oder über-gangen werden konnte.

Viel verwickelter und undurchsichtiger, daher auch weniger befriedigend, gestaltet sich die gleiche Arbeit auf großen Schirm- und auch Blenderschlag-flächen. Hier muß man meist ohne Ueberblick und klar vorgezeichneten Weg kreuz und quer über die Fläche gehen, um mit tausend Rücksichten auf Anflug, Sturmgefahr, Wurfmöglichkeit und Abrückrichtung die zu nutzenden Stämme auszusuchen, und die Wurfriechung zu bestimmen, wobei der Auszeichnende nach langem Umherirren auf der weiten Fläche kaum mehr weiß, ob er alle

Punkte berührt hat oder nicht. Ihm wird nach dieser anstrengenden und zeitraubenden Arbeit nicht selten die unbefriedigende Empfindung bleiben, daß er bei aller Sorgfalt doch manches möchte übersehen und nur halbe Arbeit gemacht haben — eine Empfindung, die ihren Grund im Mangel eines klaren Ueberblicks, einer sicheren Richtlinie für die Begehung der Fläche hat. Sie wird sich noch mehr beim gleichförmigen Schirmschlag einstellen, als bei dem sich schon frühzeitig gliedernden Blenderschlag.

Die Hauptvorteile der langgestreckten Anordnung der Schläge kommen jedoch erst bei der *Nutzungsaußführung* selbst und den nachfolgenden Arbeiten voll zur Geltung (vgl. 3. Abschnitt). Günstig wirken hier neben der gestreckten Form des Schlags die räumige Verteilung der einzelnen Arbeitsgegenstände, der zu fällenden Stämme, und das parallele Werfen derselben. Sie bewirken, daß die Fällung stets ohne Behinderung oder Häufung von Holz und Gefährdung der Arbeiter erfolgen kann und daß den liegenden Stämmen keine Beschädigung durch die erst zu werfenden droht. Dabei ist trotzdem die Forderung des ununterbrochenen Nebeneinanders der Arbeitsgegenstände und eines entsprechenden Arbeitsmaßes je für die Flächeneinheit gewahrt.

In gleicher Weise, wie die Fällung, zieht die *Aufbereitung* aus diesen Verhältnissen Nutzen, insofern einerseits stets reichlicher Raum für Lagerung derjenigen Erzeugnisse vorhanden ist, die sich aus der Aufbereitung ergeben, während andererseits wieder diese Erzeugnisse trotzdem in solcher Menge auf der Flächeneinheit vorhanden sind, daß die Arbeit eine fortlaufende sein kann und besonders beim Zusammenschaffen der Hölzer zur Füllung der Raummaße u. s. w. weite Wege vermieden werden. Während ferner die Gleichlagerung der Stämme deren schadloses Anrücken erleichtert, kommt die übersichtlich streifenförmige Anordnung des Schlags der Aufnahme und Kontrolle der Schlagerzeugnisse, wie dem Verkauf und der Abfuhr derjenigen Erzeugnisse ganz besonders zu statten, die, wie das Stammholz, in der Regel nicht angerückt, sondern am Ort der Fällung lagernd verkauft werden.

Alle diese Vorteile stehen in angenehmem Gegensatz zu den vielfach bei Kahl-, Schirm- und Blenderschlag hervortretenden Schwierigkeiten. Wie schwierig ist hier z. B. in der Regel die Schlagaufnahme und Kontrolle, das Auffinden aller einzelnen Stücke und das Herstellen einer klaren Nummernfolge und zwar in gleicher Weise, wenn das Holz über größere Flächen regellos zerstreut ist und Stämme und Abschnitte nicht selten im Anflug versteckt liegen (Blenderschlag und Schirmschlag), wie dann, wenn die Langhölzer auf kleinem Raum vereint kreuz und quer übereinander lagern (Kahlschlag, Löcherhiebe), die Meßpunkte häufig erst mit Mühe freigemacht werden müssen und die Nummerierung nicht an ordnungsmäßiger Stelle erfolgen kann. Wie leicht kann es bei unklarer Nummernfolge vorkommen, daß Stämme vergessen bleiben oder doppelt aufgenommen werden und welch zeitraubende Folgen können solche Versehen für Verwaltung und Käufer haben!

Auch wer die Schlagverzeichnisse nachprüft, wird bei Schirm- und Blenderschlag von seiner Tätigkeit nicht sehr befriedigt sein können; denn, wenn er seine Aufgabe nicht mit einer übermäßigen, weil allzu zeitraubenden Gründ-

lichkeit löst, wird auch er solche Verstöße nicht immer finden, da er örtlich noch weniger vertraut ist, als derjenige, der die Aufnahme besorgt hat. Die Schlagkontrolle vermag also ihre Aufgabe, Fehler zu finden, nach dieser Richtung wenigstens, nur mangelhaft zu erfüllen.

Ganz anders ist das Bild, das uns Schlagaufnahme und -kontrolle beim Saumschlag zeigen. Fehler sind dank der streifenweisen Anordnung der Schlagserzeugnisse nahezu ausgeschlossen, die Arbeit ist in halber Zeit getan, denn die aufzunehmenden und nachzuprüfenden Stämme liegen sämtlich in einem leicht übersehbaren Streifen, der in der Regel frei ist von höherem verdeckendem Anflug, kein Stück kann übersehen werden. Die Stämme liegen parallel und so ist jeder einzelne für Messung, Nummerierung und Besichtigung ringsum leicht zugänglich. Von ganz besonderer Bedeutung ist die klare Nummernfolge, wie sie nur Streifenanordnung des Schlags geben kann, für diese Arbeiten, wie für den besichtigenden Liebhaber, den Käufer und Fuhrmann. Wer die Praxis kennt, weiß, wie viel Zeit im Wald verloren geht mit Suchen der Nummern bei der Abfuhr aus unübersichtlich angelegten Schlägen.

Auch das nachfolgende Wegschaffen des nicht angerückten Stammholzes durch den Fuhrmann wird durch die streifenweise Anordnung und Parallelagerung der Stämme wesentlich erleichtert. Die vielfach durcheinander lagernden Stücke der verschiedenen Verkaufslose können hier ungehindert weggebracht werden, da jeder Stamm einzeln zugänglich ist; es bedarf nicht, wie sonst so oft, des ebenso langwierigen und mühsamen, wie waldschädlichen Beiseiteschaffens quergelagerter und sonst hindernder Stämme, ehe der Abführende zu seinen Stücken gelangen kann.

So zeigt der Saumschlag auch in der Betriebsführung durchaus günstige Bedingungen. Was ihm an Arbeitsvereinigung und „Führung“ entsprechend massenreicher Schläge“ andern Betriebsformen gegenüber vielleicht fehlt, läßt sich, wie an anderem Ort zu zeigen sein wird, auf andere Weise erreichen.

Das Ergebnis der vorstehenden Betrachtungen läßt sich dahin zusammenfassen, daß die Betriebsführung bei Saumschlag bestimmt und gekennzeichnet ist durch die Streifenform des Arbeitsfelds, durch eine gewissermaßen lineare Anordnung der kritischen Punkte der Wirtschaft, nämlich der Orte der Verjüngung, und daß der Saumschlag gerade durch diese Vereinigung der Arbeit auf Flächenstreifen die oben (S. 285) gestellten Forderungen in vollstem Maß erfüllt.

Noch ein anderes Moment, das sich auf die Betriebsführung bezieht, spricht für den Saumschlag.

Wichtigstes Organ des Betriebs, die Seele der ganzen Wirtschaft ist der Wirtschaftler. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt und lag wohl jederzeit in der Verjüngung des Waldes, und da ist unseres Erachtens besonders zu betonen, daß die Naturverjüngung stets bei allen Regeln

und Vorschriften etwas Individuelles, eine persönliche Tat ist, ähnlich einem künstlerischen Werk, und daß sie, wo dies nicht zutrifft, wohl selten voll gelingt. Eine solche Tat wirklich zu vollbringen, eine Verjüngung zu beginnen und auch zu Ende zu führen, gestattet nun aber die Großflächenwirtschaft dem einzelnen Wirtschaftler in der Regel nicht — bzw. unter heutigen Verhältnissen nicht mehr — am wenigsten beim Blenderschlag, seines langen Verjüngungszeitraumes wegen; dies gilt aber auch in weitem Maße von aller Naturverjüngung auf großer Fläche, auch vom kurzfristigen Schirmschlag. Der einzelne hat so, wie die Verhältnisse heute liegen, immer nur ein Stück der Arbeit zu leisten, wodurch diese eben ihren persönlichen Reiz verliert. Der Anfang der Verjüngung, das Hervorlocken der ersten Besamung ist wohl schön, Fortführung und Abschluß mit ihren sich häufenden Schwierigkeiten sind es sehr viel weniger, besonders für den, der nicht anfangen durfte. „Freude und Lust am eigenen Werk werden herabgestimmt“ durch das Bewußtseins, daß man dasselbe nicht beginnen durfte oder daß man es nicht wird zu Ende führen können; vgl. ähnliche Ausführungen Weises (Mündener forstl. Hefte V. S. 57) gegenüber der Blenderschlagverjüngung. Im Großbetrieb tritt der Beamte meist an seine wichtigste wirtschaftliche Aufgaben heran als einer, der schon Begonnenes fortzuführen hat, der niemals auf ein durch ihn selbst von Anfang bis zu Ende voll durchgeführtes Werk blicken darf; er wird mehr oder weniger das Glied einer Maschine, das subjektive Moment wird ausgeschaltet oder leidet doch, und dies sehr zum Schaden der Naturverjüngung. Wir dürfen und wollen daher dieses subjektive Moment aus der forstlichen Arbeit nicht verschwinden lassen! Regel soll vielmehr sein, daß jeder Wirtschaftler sein Werk selbst beginnt und selbst zu Ende führt; er soll Freude an ihm gewinnen, auf seine fertige Arbeit, seine Erfolge zurückblicken können, er soll sich nicht in eine Tretmühle gestellt fühlen, in der er nur das Rad weiterzutreiben hat, das sich längst in Drehung befindet.

Erfüllung dieser Forderung kann uns nur eine entsprechende räumliche Ordnung bringen, **die Arbeit auf fortschreitender Kleinfläche**. Diese bietet uns der Blendersaumschlag. Hier finden wir jederzeit Abschluß und Anfang, hier kann der Wirtschaftler täglich abtreten im Gefühl, etwas Selbständiges geleistet zu haben und etwas Fertiges zu hinterlassen, und der Nachfolger steht vor einem stets neuen Arbeitsfeld; er wird von Anfang an die Empfindung haben, am eigenen Werke zu arbeiten. Bei solch stetigem, räumlich geordnetem Vorgehen in allen wirtschaftlichen Maßregeln — auf kleiner Fläche und an bestimmtem Ort — wird es nie möglich sein, daß unter dem neuen Wirtschaftler das wieder verschwindet oder verkommt, was der alte vielleicht mit Mühe und Kosten begonnen und erstrebt hat, und ebenso wird der neue sich nie durch die Tätigkeit seines Vorgängers beschränkt und beeinträchtigt fühlen; keine Klagen, wie wir sie heute so oft hören, werden laut über zu viele früher angehauene Bestände, die den Wirtschaftler zwingen, unter allerlei Schwierigkeiten die begonnene Arbeit zu Ende zu führen und ihn hindern, selbständig tätig zu werden. Hier findet jeder den Ort seiner Tätigkeit genau und

mit räumlicher Beschränkung zugewiesen, innerhalb dessen er jedoch frei wirken und die Wirtschaft zu höchstem Erfolg führen kann.

Jeder schließt im Blendersaumschlag seinen Verjüngungsweg in einer Linie ab, kann gewissermaßen einen Strich unter seine Arbeit machen; der Nachfolger beginnt auf dieser Basis seine Tätigkeit, wobei durch den unmittelbaren Anschluß der Flächen an einander Erfolg wie Mißerfolg des Vorgängers ihm gleicherweise ein Ansporn sein werden, es ebenso gut oder besser zu machen.

Verfasser erstrebt für die Betriebsführung eine solche räumliche Ordnung der Verjüngung, und glaubt diese in dem geschilderten Blendersaumschlag gefunden zu haben, bei welcher der Wirtschaftler am Schlagrand stehend jederzeit hinter sich die abgeschlossene Verjüngungsarbeit, die Gewißheit einer erfolgreich beendigten Aufgabe, ein Gebiet gemachter Erfahrungen hat, vor sich aber auf langer Front sein übersichtliches Arbeitsfeld.

Nur das aus klarem Ueberblick des Arbeitsfelds hervorgehende sichere Bewußtsein, etwas wirklich vollkommen Fertiges hinter sich und den Ort, wo die Arbeit einzusetzen hat, klar vor sich zu haben, verleiht das Gefühl voller innerer Befriedigung über unser Werk und wahrer Freude an unserer Arbeit, und diese Schaffensfreude scheint uns ein sehr wichtiges forstwirtschaftliches Moment.

Im Gegensatz dazu werden die vielfach chaotischen Bilder, welche die Wirtschaft auf Großflächen in gleicher Weise zeigt, wie diejenige auf ungeordneten Kleinflächen, — wo die Arbeit nie fertig ist und die Wirtschaft nie zur Ruhe kommt, wo stets vieles, was schon erreicht schien, wieder zerstört wird, — bei Jedem Mißbehagen erzeugen, der sein Arbeitsfeld klar zu überblicken und den Betrieb fest in der Hand zu haben wünscht.

Verfasser erwartet deshalb von der Durchführung der Verjüngung im Blendersaumschlag mit Bestimmtheit eine Steigerung des waldbaulichen Interesses und der Freude an forstlicher Tätigkeit.

5. Abschnitt.

Forderungen der Forststatik.

Haben wir uns bisher fast ausschließlich nur auf dem Gebiet der räumlichen Ordnung bewegt, so betreten wir nunmehr das Grenzgebiet zwischen räumlicher und zeitlicher Ordnung, haben insbesondere den Forderungen der zeitlichen an die räumliche Ordnung nachzuforschen.

Auch die Forststatik zählt hier zu denjenigen Gebieten der Forstwissenschaft, die in der Verwirklichung ihrer Ziele von der räumlichen Ordnung im Walde abhängen, schon im Hinblick auf den besprochenen Einfluß der letzteren auf die Produktionslehre. Auch die Forststatik muß also Einfluß auf die räumliche Ordnung des Waldes gewinnen, teils durch eigene Forderungen, die sie stellt, teils dadurch, daß sie die Anforderungen der Produktionslehre unterstützt. Uns soll übrigens hier nur eine Forderung, die sich unmittelbar an die räumliche Ordnung wendet, beschäftigen, es ist das Verlangen nach einem solchen Aufbau unseres Wirtschaftswaldes, der es möglich macht, alles Holz dann schadlos zu ernten, wenn es hiebsreif geworden ist.

Eine weitere, noch wichtigere Forderung richtet sich nur mittelbar an die räumliche Ordnung, es ist diejenige schärfster Anspannung aller erzeugenden Naturkräfte zur Produktion bei geringstem Aufwand an Kapital und Arbeit, d. h. die Forderung höchster Naturintensität.

Beide Forderungen bedürfen getrennter Betrachtung.

I. Die Möglichkeit, alles Holz dann schadlos zu nutzen, wenn es hiebsreif ist.

Diese Forderung der Forststatik richtet sich unmittelbar an die räumliche Ordnung. Sie verlangt von ihr solche Formen, vermöge deren jeder kleinste Wirtschaftsgegenstand, jeder Bestand, Bestandesteil, ja Baum, ohne Schaden der Axt zugänglich ist, sobald die Zeit seiner Hiebsreife gekommen ist. Sie fällt zusammen mit der Forderung vollster wirtschaftlicher Freiheit des Betriebs.

Die Lösung dieser Aufgabe ist der räumlichen Ordnung innerhalb der ihr sonst gezogenen Schranken nicht in ausschließlichem Sinne möglich, wohl aber innerhalb derjenigen Grenzen, in denen die praktische Wirtschaft die Aufgabe tatsächlich stellt.

Die Freistellung aller Einzelgegenstände, seien es Bestände oder Einzelstämme, ist praktisch nicht möglich und würde zu Raumverschwendung oder zur Blenderform mit ihren besprochenen Nachteilen führen. Es wird somit beim Festhalten an der gleichaltrigen Erziehung stets eine gewisse Abhängigkeit der Einzelgegenstände von einander bestehen bleiben, wie sie in der unvermeidlichen Anwendung des Deckungsschutzes begründet ist.

Diese Abhängigkeit, die in der Altersabstufung nach bestimmter Richtung zum Ausdruck kommt, kann bestehen bleiben und trotzdem der gestellten Forderung genügt werden, weil — unter Voraussetzung nicht zu sehr abweichender Boden- und Bestockungsverhältnisse — doch wohl mit seltenen Ausnahmen je innerhalb der Abstufungsreihe das ältere Holz zuerst hiebsreif wird, somit die Hiebsreife von selbst in der Reihenfolge der Altersklassen eintritt.

Dagegen muß, um trotzdem Zugänglichkeit jedes Einzelgegenstands und Beweglichkeit zu sichern, einerseits der bindende Deckungsschutz auf ein Mindestmaß beschränkt, und andererseits der gleichaltrigen Bestandesfläche geringste Ausdehnung gegeben werden. Die geforderte Freiheit ist also nur zu erwarten bei **Kleinflächenwirtschaft verbunden mit geordneter Lagerung der Altersklassen.**

Die volle Zugänglichkeit des Einzelobjekts, wie sie die Forststatik fordern muß, ist nicht vorhanden in der Gebundenheit des Großflächenbetriebs, — eine notwendige Folge der Größe der gleichaltrigen Fläche —, wohl aber bei kleiner Ausdehnung der letzteren. Die Kleinheit der Einzelfläche bedingt jedoch eine Vermehrung der Wechselbeziehungen der Altersklassen zu einander, die wiederum zu Gebundenheit der Wirtschaft führen müßte, wenn nicht geordnete Lagerung der Altersklassen und zweckmäßiges Beziehen des Traufschutzes dem vorbeugen würden.

Ordnungslose „Wirtschaft auf kleinster Fläche“ müßte, wollte sie unseren Forderungen genügen, zu viel isolieren; dies würde zu zahlreichen Traufbildungen und mangelhafter Bodenausnützung führen, also andere forststatistische Mängel zeitigen. Dagegen umschließt ein Wirtschaftsbezirk mit kleinen durch Traufschutz selbständigen Wirtschaftseinheiten und innerhalb derselben geordneter Lagerung der wenig ausgedehnten Altersklassen, wie sie der Saumschlag bietet, das höchste Maß wirtschaftlicher Freiheit und entspricht so am meisten unserer statischen Forderung; (Weiteres darüber an anderem Ort).

II. Die schärfste Anspannung aller erzeugenden Naturkräfte zur Produktion bei geringstem Aufwand an Kapital und Arbeit.

Wir stellen uns hier voll auf den Boden der Reinertragslehre. Wenn man selbst heute noch in unserer Literatur nicht selten Aeüßerungen über die Reinertragslehre liest, wie z. B. diejenige von Schöpffer (Zeitschr. f. F. u. J.wesen 1908 S. 428), die lautet: „Auf jeden Fall verschwanden in der engherzigen einseitigen Bevorzugung der jüdischen Geldwirtschaft, die der moderne Forstmann direkt auf den Wald sich anzuwenden vermaß, so manche Buchendome, so manche

Eichenhaine, um eintönigen, langweiligen Nadelwäldern Platz zu machen“, so möchte man fast versucht sein, das wahre Wesen der Reinertragslehre wieder einmal darzulegen. Doch das dürfte romantischer Weltanschauung gegenüber wenig nützen. Hier sei deshalb nur betont, daß die beklagte heutige Eintönigkeit des Waldes, d. h. die Gleichaltrigkeit reiner Bestände auf großen Flächen an sich nicht das mindeste mit der „jüdischen Geldwirtschaft“ zu tun hat. Dieser Zustand ist vielmehr die Frucht vorwiegend etatstechnischer (kameralistischer) Waldbehandlung und läuft, wie wir zeigen werden, der richtig verstandenen Reinertragslehre geradezu zuwider; er wäre auch ohne diese Lehre dem Wald nicht erspart geblieben und gerade sie wird ihn wieder zum Verschwinden bringen. Mit sehr viel mehr Recht könnten wir die Eintönigkeit der Fichten- und Kiefern-kulturen jener Romantik zur Last legen, die, um in „Eichenhainen“ und unter „Buchendomen“ wandeln zu können, den Wald auf großen Flächen und in großen Zusammenhängen hat zu alt werden lassen für sichere Naturverjüngung und die dadurch die Wirtschaft gezwungen hat, mochte diese nun wollen oder nicht, zum Pflanzspaten zu greifen, der fast stets reine Bestände schafft, — jene Romantik, die es nicht für nötig hält, ein „von den Vätern ererbtes Gut“ auf höchsten Nutzen zu bewirtschaften, der die Schwärmerei Weniger, wirtschaftlich Gesättigter so hoch steht, daß sie ihr zuliebe die große Menge darben läßt!

Nun haben aber unerwarteter Weise selbst ausgesprochene Anhänger der Reinertragslehre Bedenken gegen unsere Ziele geltend gemacht, daher scheint es uns hier zunächst geboten, auf einen Punkt besonders einzugehen, in bezug auf den der Verfasser vielfach mißverstanden worden zu sein scheint, obgleich dies nach dem Gesamtinhalt dieser Schrift kaum möglich sein sollte.

Wir erstreben bei der Naturverjüngung ein Verjüngungsprodukt, das einem reinen Kunstprodukt in nichts nachsteht, als in der Höhe der aufgewendeten Kosten! Ein Verfahren, das eine weniger gutwüchsige und gleichmäßige Bestockung liefern sollte, als dies ein vollkommener Pflanzbestand tut, würden wir ohne weiteres preisgeben. Bei dem von uns angedeuteten Verfahren soll der spezielle Verjüngungszeitraum ein möglichst kurzer sein und künstlicher Anbau durch Saat oder Pflanzung jedem langen Zuwarten vorgezogen werden, so daß demnach unsere Schläge rüstig genug vorwärtsschreiten, um eine volle und gleichartige Bestockung zu liefern. Wir wollen, wenn wir uns wieder der Natur voll zuwenden, damit keine der Erzungenschaften der bisherigen Entwicklung preisgeben, was z. B. eine volle gleichmäßige Bestockung und deren Zusammensetzung aus Individuen betrifft, die nach Holzart und Beschaffenheit den höchsten Wertszuwachs leisten, wir wollen also einen, der reinen Pflanzkultur in Güte und Vollkommenheit der Bestockung mindestens gleichwertigen Jungwuchs schaffen. Verfasser geht von der, für einen überzeugten Anhänger der Reinertragslehre selbstverständlichen Voraussetzung aus, daß z. B. die Fichtenkahlschlagwirtschaft unter geeigneten Verhältnissen ihren heutigen Wettbewerbern gegenüber ökonomisch weit überlegen ist, und es fällt ihm nicht ein, irgend einen ihrer wahren Vorzüge — ihre volle und gleichmäßige Bestockung mit Individuen von höchster Wert-

erzeugung — aufzugeben, wie man wohl annimmt. Im Gegenteil! Unter Festhalten aller jener Vorteile wollen wir den der Kunstverjüngung zumal auf großer Fläche immer noch anhaftenden großen Mängeln zu Leibe gehen, d. h. die Nachteile der Bodenverschlechterung, des Unkrautwuchses und damit Zuwachsverlusts, der Krankheiten und Plagen (Kalamitäten) aller Art und endlich der überflüssig hohen Kosten auszumerzen suchen.

Unsere Vorschläge aber leiden, das zeigen verschiedene Äußerungen klar, unter dem tiefeingewurzelten Mißtrauen, das die mangelhaften Erfolge der Naturverjüngung im Schirmschlag und Blenderschlag und die dabei angestrebten und erreichten wenig zweckmäßigen Mischungsformen im Laufe der Zeit erzeugt haben, — einem Mißtrauen, das man nun ohne weiteres auf jede neue Form von Naturverjüngung überträgt, ohne zu bedenken, daß z. B. beim Saumschlag jene Nachteile ganz wegfallen. Sie gehen ja alle aus dem Umstand hervor, daß die künstliche Ergänzung der Verjüngung bei mangelhaft gelungener Naturansamung in Schirm- und Blenderschlag erst zuletzt, nach voller Räumung des Schlags, also sehr spät erfolgen kann, und zwar unter sehr unübersichtlichen Verhältnissen, während dagegen bei Saumschlag die künstliche Füllung der Lücken jederzeit, daher ohne Verzug und bei übersichtlichstem Arbeitsfeld möglich ist; die mit Recht gefürchteten Kulturrückstände können hier überhaupt nicht entstehen¹⁾. Das Ergebnis kann somit schlimmstenfalls lediglich dasselbe sein, wie dasjenige reiner Kunstverjüngung, dagegen sind alle Aussichten geboten, daß es sehr viel günstiger werde! Doch nun zur Sache selbst!

Der Wirtschaftserfolg (im Sinne von Endres, Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik 2. A. S. 184) wird bestimmt durch Art und Maß der Heranziehung der forstlichen Produktionsfaktoren zur Gütererzeugung von seiten der Wirtschaft. Dabei sind jedoch diese Faktoren verschieden zu behandeln, denn die erzeugenden Kräfte der Natur (die Standortsfaktoren), die wir im „Naturfaktor“²⁾ zusammenfassen, stehen dem Bodenbesitzer in vollem Maß unentgeltlich zu Gebot, während die beiden andern Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, nur gegen Entgelt heranzuziehen sind. Die Wirt-

1) So wurde unterstellt (Thaler, Graner), unsere Vorschläge führen wieder zu Waldzuständen zurück, wie sie das Ergebnis einer früheren Naturverjüngungsperiode waren (Schirmschlag), aus denen man sich rettete, indem man „den Kulturbetrieb energisch in die Hand nahm“, was z. B. mehrfach von derselben Seite als „Ruhmesblatt in der Geschichte des württembergischen Forstwesens“ bezeichnet wurde und wohl auch jenen übeln Verhältnissen gegenüber war. Wer aber unsere Vorschläge überhaupt kennt, weiß ohne weiteres, daß solche „jämmerlichen Ergebnisse“, wie verlichtete Althölzer auf großen Flächen, verwilderte Verjüngungsschläge, große Sturmschäden, geringe Ansamung und große Vorwüchsigkeit derselben, hier gar nicht entstehen können, da ja das räumliche Vorgehen hier ein ganz anderes ist und jene früher übliche Hiebsführung von uns ausdrücklich bekämpft und in ihren Fehlern gekennzeichnet worden ist.

2) Hierbei wird unter „Natur“ die Summe der in Boden und Luftraum tätigen Naturkräfte verstanden, die das Pflanzenwachstum vermitteln. Repräsentant des Naturfaktors ist uns die Bodenfläche, auf der sich die Produktion vollzieht; sie ist die notwendige Unterlage für unsere Wirtschaft, der Ort, wo sich die Naturkräfte — je nach Bodenbeschaffenheit und Lage verschieden — produktiv betätigen. Der einzelnen Bodenfläche selbst schreiben wir daher den ökonomischen Wert der auf ihr wirkenden natürlichen Produktionsmittel zu (Bodenwert).

schaft muß daher die sich unentgeltlich bietenden Standortsfaktoren im höchsten nachhaltig möglichen Maß auszunützen suchen; deren Ausnützung aber wird vermittelt durch die Bestockung und ihre Eigenschaften; somit ist hier der Hebel anzusetzen: wir bedürfen einer, den Standort intensiv ausnützenden Bestockung. Im Gegensatz dazu dürfen die entgeltlichen Faktoren nur in dem Maß zur Produktion herangezogen werden, in dem dies zu höchstem Gesamterfolg notwendig ist. Die Wirtschaft muß somit ihnen gegenüber größte Sparsamkeit beobachten und höchstem Erfolg mit geringstem Aufwand zustreben.

Zur Begründung dieser Ausführungen mag hier einer Sonderstellung der Forstwirtschaft innerhalb des allgemeinen Wirtschaftslebens gedacht werden, die auf diesem Gebiete besteht, und die uns ganz besonders geeignet erscheint, unseren forstlichen Betrieb nach der in dieser Schrift vorgeschlagenen Richtung zu drängen.

Wo die Volkswirtschaft ihre Betriebe durch Steigerung des Kapital- und Arbeitsaufwands zu heben sucht, indem sie ihre Produktionstechnik verfeinert, ihre Maschinen und Werkzeuge vervollkommnet, die Roh- und Hilfsstoffe schärfer ausnützt, geschultere Arbeitskräfte heranzieht u. s. f., sei es, um eine Ermäßigung der Produktionskosten für das einzelne Stück zu erzielen, oder um zu einer Verfeinerung oder Verbesserung ihrer Erzeugnisse bei geringerem Aufwand zu gelangen, da wird solches Vorgehen: Steigerung der Kapital- und Arbeitsintensität genannt. Die Volkswirtschaft bemißt nämlich die Intensität der Betriebe nach dem Umfang, in dem die beiden genannten Faktoren innerhalb ökonomisch gerechtfertigter Grenzen zur Gütererzeugung herangezogen werden. Roscher sagt z. B. in seiner „Nationalökonomik des Ackerbaus“ (10. Aufl. S. 69): „Der Nationalökonom unterscheidet die Ackerbausysteme hauptsächlich danach, ob sie den Boden verhältnismäßig schwach oder stark mit Kapital und Arbeit versehen. Die der ersteren Art, welche also den Faktor Natur möglichst ungemischt wirken lassen, nennen wir extensive, die der letzten Art, welche an Grundstücken möglichst zu sparen suchen, intensive.“ Voraussetzung ist natürlich, daß durch die Kapital- und Arbeitszuführung größere Massen oder wertvollere Stoffe erzeugt werden, so daß die Erzeugungskosten für die Einheit zurückgehen.

Dieselbe Wissenschaft lehrt ferner für alle Wirtschaftszweige, daß mit steigender Kultur die Produktion immer intensiver, d. h. mit Anwendung immer größerer Mengen von Arbeit und Kapital betrieben werden müsse. Für die Bodenwirtschaften liegt die Ursache der notwendigen Intensitätssteigerung im Teurerwerden des Bodens und in den höheren Ansprüchen an seine Leistungen (vgl. Martin, Forstliche Statik S. 153). Von intensiverer Ausnützung des Faktors „Natur“ ist dabei nirgends unmittelbar die Rede, weil dem Volkswirt eine gesteigerte Inanspruchnahme der Naturkräfte eben nur durch Vermittlung gesteigerten Kapital- und Arbeitsaufwands z. B. besser konstruierter Maschinen, stärkerer Bearbeitung des Bodens, Zufuhr fehlender Nährstoffe u. s. f. möglich erscheint, somit in ihnen zum Ausdruck kommt. Man denkt daher, wenn man in der Nationalökonomie kurzweg von Intensität des Betriebs spricht, regelmäßig nur an die Beteiligung der Faktoren Kapital und Arbeit, während der Naturfaktor unwillkürlich als eine

im Standort gegebene Größe betrachtet zu werden scheint, auf deren Maß der Mitwirkung bei der Produktion der Unternehmer keinen unmittelbaren Einfluß habe, vielmehr nur einen mittelbaren, eben durch gesteigerte Anwendung von Kapital und Arbeit. Man hat dabei offenbar nur die Verhältnisse bei der Landwirtschaft im Auge.

In der Forstwirtschaft liegen nun diese offenbar etwas anders, denn hier kann auch der Naturfaktor für sich allein und ohne gesteigerte Inanspruchnahme der andern Faktoren mehr oder weniger stark angespannt werden und zwar lediglich durch eine an sich kostenlose Aenderung des technischen Verfahrens. Die obige Betrachtungsweise bedarf daher für die Forstwirtschaft einer gewissen Aenderung, da sonst Gefahr besteht, daß auf diesem Gebiete eine falsche Auffassung von der wahren Bedeutung der einzelnen Produktionsfaktoren, ihrer Betätigung in der Wirtschaft und ihrem Verhältnis zu einander platzgreife und das klare ökonomische Ziel der Forstwirtschaft verschleierte.

Literatur und Praxis zeigen deutlich, daß in der Tat solche falsche Auffassung in forstlichen Kreisen weit verbreitet ist. Nur sie konnte z. B. bewirken, daß man Intensitätssteigerung auch hier nur durch Vermehrung von Arbeitsleistung und Kapitalaufwand anstrebte, beides sogar bewußt auf Kosten einer vollen Ausnützung des Naturfaktors, den man beiseite schob und auf dessen volle Mitwirkung bei der Hebung des Betriebs man nach manchen Seiten verzichten zu können glaubte, statt ihn zuerst und am meisten heranzuziehen.

Am klarsten tritt dies hervor bei der Verjüngung des Waldes. So werden die Wälder Deutschlands heute sicher zu mehr als $\frac{9}{10}$ mit hohen Kosten künstlich verjüngt, während man zahllose Keime einer reich und kostenlos spendenden Natur achtlos verkommen läßt. Man hielt sich für berechtigt, die Naturverjüngung ganz beiseite zu schieben, nachdem deren kameralistisch aufgebaute Verfahren des vorigen Jahrhunderts sich als unsicher und wenig erfolgreich erwiesen hatten, um die kostenlosen Leistungen der Natur durch Arbeit und Kapitalaufwand zu ersetzen. Man hätte der Wirtschaft als oberstes Ziel für ihre Intensität die Aufgabe stellen sollen, durch Weiterbildung der Naturverjüngungstechnik diesen Reichtum ohne besonderen Aufwand wirtschaftlich festzuhalten. So aber konnte es geschehen, daß mit zunehmendem Aufwand an Kapital und Arbeit im Wald zwar der Wert der Einheit der Erzeugnisse und auch deren Menge fortgesetzt gestiegen ist, noch mehr aber der Erzeugungsaufwand für die Einheit und daß somit ein wesentliches Merkmal wahrer Intensität fehlt, nämlich die Verminderung der Produktionskosten für die Einheit durch Verfeinerung der Produktionstechnik. Der heutige Forstbetrieb leidet wie in den früheren Abschnitten gezeigt wurde, an einem Zuviel von Arbeitsbetätigung bei Verjüngung, Erziehung und Ernte, auch ist ziemlich allgemein anerkannt, daß nicht wenige forstliche Betriebe durch ihre übermäßigen Holzvorräte als geradezu kapitalüberlastet bezeichnet werden müssen. Man wird deshalb im Forstbetrieb mehr von Anhäufung, als von stärkerer Anspannung produktiver Kräfte sprechen können, wie sie im Begriff gesteigerter Intensität liegen würde. Der Wirtschaftserfolg

dürfte demnach auch nicht in höherem Maß gestiegen sein, als der Aufwand an Produktionsmitteln, er mag eher hinter ihm zurückbleiben.

Der Grund für diese Besonderheit muß in den eigenartigen Verhältnissen der Forstwirtschaft liegen. Will man forstliche Betriebe nach ihrer Intensität beurteilen, so muß man von anderen Gesichtspunkten ausgehen, als auf sonstigen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. Schon Roscher betont (System der Volkswirtschaft II. Band, 4. Aufl. S. 529) die geringe Intensität der Forstwirtschaft (sc. nach der Richtung der Kapital- und Arbeitsbetätigung) im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen und begründet sie damit, daß die Forstprodukte in viel höherem Maße als andere, Naturerzeugnisse seien, während Kapital und Arbeit viel weniger mitwirken, daß die Waldbäume Atmosphäre und Untergrund wirksamer auszunützen verstehen, daß der Rothertrag im Verhältnis zur Bodenfläche gering sei, daß das Niveau der Preise noch nicht den Produktionskosten entspreche und daß endlich das Volumen der Waldprodukte im Verhältnis zum Wert groß sei.

Darin ist schon eine eigenartige Stellung angedeutet, die unsere Forstwirtschaft innerhalb der Volkswirtschaft einnimmt, — nicht in dem Sinne allerdings, wie man gerne annimmt, daß bei ihr im sog. „Interesse der Allgemeinheit“ an Stelle der höchsten Rentabilität eine höchste Produktivität zu treten habe, d. h. die Erzeugung möglichst vieler und wertvoller Güter, ohne Rücksicht darauf, ob sich deren Erzeugung für den Unternehmer lohnt, — sondern eben in bezug auf das zulässige Maß der Beiziehung von Kapital und Arbeit zur Gütererzeugung. Nach dieser Richtung ergeben sich für den mitteleuropäischen Forstbetrieb, will er sich innerhalb der Grenzen der Rentabilität bewegen, viel engere Schranken, als für andere Wirtschaftszweige, — Schranken, die er nicht überschreiten darf, die aber unseres Erachtens vielfach übersehen werden, ja deren sich manche Forstwirte gar nicht voll bewußt zu sein scheinen, eben weil solche in gleicher Enge für andere Produktionszweige nicht bestehen.

Auf diese Schranken soll deshalb hier mit besonderem Nachdruck hingewiesen werden. Sie werden dadurch gezogen, daß die Deutsche Forstwirtschaft einen Stoff erzeugt, der im Umkreis ihres Marktgebiets in großen Mengen als mehr oder weniger reines Naturerzeugnis vorhanden ist, das also unbelastet durch Erzeugungskosten nur der Ernte und Beförderung nach dem Markte harrt. Es gilt dies für die Nutzhölzer des Weltmarkts, die, unter sehr abweichenden Erzeugungsbedingungen entstanden, mit den Haupterzeugnissen unseres forstlichen Betriebs auf unserem Großmarkt in Wettbewerb treten. Dies führt zunächst zu einer eigenartigen Preisbildung für diese Erzeugnisse, die wir zunächst ins Auge fassen wollen.

Bei den meisten anderen Produktionszweigen bezeichnen die Kosten der Erzeugung unter normalen Verhältnissen die Untergrenze für den Preis der Erzeugnisse. In der Regel muß dieser höher sein, sonst würde schließlich die Erzeugung des betreffenden Gegenstands aufhören, da sie für den Erzeuger keinen Zweck hätte (vgl. Martin, Forstliche Statik S. 116 ff.). In der Forstwirtschaft ist dies anders. Hier hört die Stofferzeugung auch bei dauernd niedrigeren Preisen nicht auf, kann nicht aufhören, das liegt eben in ihren besonderen Ver-

hältnissen; der Waldbesitzer begnügt sich vielmehr mit einem niedrigeren Ertrag seiner natürlichen Produktionsmittel, ja er verzichtet überhaupt auf solchen oder setzt sogar noch zu (negative Bodenrente!) und zwar nicht selten um so mehr, je intensiver er zu wirtschaften scheint. An Stelle der Erzeugungskosten als normaler Untergrenze für die Preisbildung treten nämlich auf unserem Markt, wie nachher gezeigt werden soll, bei den Nutzhölzern des Großhandels die Ernte- und Beischaffungskosten zum Markt (einschließlich Zoll) aus der wirtschaftlich entlegensten Urwaldzone, deren Holz zur Bedarfsdeckung gerade noch notwendig ist. Nicht die Erzeugungskosten des Holzes innerhalb unseres Wirtschaftsgebiets sind es somit, die — wie bei andern Sachgütern — bei der Preisbildung eine entscheidende Rolle spielen. Dieses Moment tritt hier vielmehr vollkommen zurück. Die Gründe sind ja nicht unbekannt, so daß deren Aufzählung genügt und sich ein näheres Eingehen bei den meisten erübrigt. Einmal sind die wahren Erzeugungskosten schwer festzustellen infolge des sehr langen, im wirtschaftlichen Leben einzig dastehenden Produktionszeitraums. Dabei fallen die Kosten und Erträge in Zeiträume verschiedener Wertsmaßstäbe, auch bestehen erstere vorwiegend aus Zinsen, deren Höhe nur unsicher zu bemessen ist. Dann aber pflegen die forstlichen Unternehmer leider nicht zu rechnen, die kleinen, weil sie nicht können, die großen, weil sie bzw. ihre Wirtschaftler, auch wenn sie könnten, meist nicht rechnen wollen; die Eigenart der vorliegenden wirtschaftlichen Verhältnisse bringt das mit sich. Weiterhin kommt in Betracht, daß die allgemeine wirtschaftliche Wertschätzung des Holzes von altersher verhältnismäßig gering ist; die Verbraucher sind nicht gewöhnt, hohe Preise für das Holz zu zahlen, auch ist dasselbe bei hohen Preisen vielfach durch andere Stoffe ersetzbar, wie Steinkohle, Eisen, Stein, Gips, Cement u. s. w. Der Hauptgrund aber für die eigenartige Preisbildung wurde oben schon angedeutet, er bietet hier entscheidendes Interesse. Ein beträchtlicher Teil des Nutzholzes, das heute auf unseren Markt gelangt, ist mehr oder weniger reines Naturerzeugnis; dies gilt für einen großen Teil der aus Oesterreich, Rußland, Finnland, Skandinavien, Amerika u. s. f. in Deutschland eingeführten Nutzholzmassen, die heute mehr als $\frac{1}{3}$ unseres Bedarfs decken müssen und die vorwiegend nur mit ihren Ernte- und Beförderungskosten belastet auf unserem Markt erscheinen, um mit den im Inland aus kapital- und arbeitsintensiver Wirtschaft entstandenen Erzeugnissen in Wettbewerb zu treten. Daß bei solchem Wettbewerb die letzteren leicht zu kurz kommen, liegt auf der Hand und daß auf solcher Grundlage für die Preisbildung unsere wirtschaftliche Rechnung zu ungünstigen Ergebnissen führt, weil sie hohe Erzeugungskosten einsetzen muß, darf uns nicht wundernehmen.

Durch diese Verhältnisse unseres Marktes nun: Die an sich gedrückten Preise und den Wettbewerb kostenlos erzeugter Urwaldhölzer mit unseren, aus mehr oder weniger intensiver Mitwirkung von Kapital und Arbeit hervorgegangenen Wirtschaftserzeugnissen, scheint uns ein wichtiger Fingerzeig dafür gegeben, nach welcher Richtung sich unsere Forstwirtschaft

notgedrungen weiterzuentwickeln hat und welche Richtungen sie meiden muß, weil diese für sie auf Abwege im ökonomischen Sinn führen. Sie kann mit jenen Erzeugnissen der freien Natur ohne Verlust offenbar nur dann in Wettbewerb treten, wenn sie sich den ökonomisch günstigeren Erzeugungsbedingungen des Urwalds soweit als irgend möglich anschließt, also ihre Intensitätssteigerung in erster Linie im unentgeltlich tätigen Naturfaktor und seiner Ausnützung sucht, dagegen Arbeit und Kapital grundsätzlich nur soweit heranzieht, als dies für höchste Anspannung der natürlichen Kräfte notwendig ist. Die Forstwirtschaft muß also höchster Naturintensität zustreben. Sie betreibt Rohproduktion, d. h. „Leitung der Natur, um brauchbare Rohstoffe hervorzubringen“ (Roscher), die Natur ist somit hier so zu „leiten“ und kann durch entsprechende räumliche Betriebsordnung so geleitet werden, daß bester Erfolg auch ohne große Arbeitsbetätigung oder gesteigerten Kapitalaufwand erzielt wird.

Wir gelangen daher zu dem Satz:

Will die Forstwirtschaft mit höchster Intensität Holz erzeugen, so darf sie dies nicht, wie andere Wirtschaftszweige in erster Linie durch gesteigerte Arbeitsbetätigung und Kapitalbeziehung versuchen, da diese Mittel große Erhöhung der Erzeugungskosten mit sich bringen, sondern sie muß sich den unentgeltlichen Produktionsfaktoren, den Naturkräften, zuwenden und ihre Produktionstechnik in der Richtung nach deren höchster Anspannung zu verfeinern suchen, dabei aber mit Arbeits- und Kapitalaufwand geradezu so sparsam als möglich verfahren.

Sie darf somit, um den Satz an Beispielen zu erläutern, wenn sie vollkommenere Bestockung und dadurch höheren Zuwachs erreichen will, nicht ohne weiteres dichte Pflanzkultur mit hohem Arbeitsaufwand wählen, sondern muß, wo irgend möglich, Naturverjüngung anstreben, die bei entsprechender Leitung die gewünschte Bestockung meist mit wesentlich geringerem Aufwand liefert; oder sie darf, um stärkere Sortimenten zu erzielen, nicht einfach den Umtrieb erhöhen und damit das Holzvorratskapital vermehren, sondern muß diesem Ziel zustreben, indem sie den Individuen im geeigneten Alter größeren Wuchsraum gewährt u. s. w. Erst, wo die natürlichen Mittel versagen, ist die Wirtschaft berechtigt, Kapital und Arbeit in höherem Maß zur Hilfe heranzuziehen.

Welche Wege stehen uns nun offen, um die Erzeugungskraft des Naturfaktors ohne Kostensteigerung in vollstem Maß nutzbar zu machen?

Erwähnt sei zunächst die natürliche, mehr oder weniger kostenlose Pflege der Bodenkraft durch dauernde Bodendeckung, entsprechende Holzartenmischung u. s. f., während künstliche Hebung durch Bodenmeliorationen, Düngung u. s. f. auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben muß, da sie in besonderem Maß Arbeit und Kapital benötigt.

Am meisten aber werden wir die stoffbildenden und wertschaffenden Eigen-

schaften der Natur in unseren Dienst zwingen können durch Vermittlung desjenigen Elements unserer Wirtschaft, das die Naturkräfte holzbildend ausnützt, und das ist die Bestockung. An ihr ist der Hebel anzusetzen!

Die Bestockung bietet nun folgende Handhaben zu schärferer Anspannung des Naturfaktors: Zunächst zeigt sie gesteigerte Wertsmehrung der Individuen und Bestände, wenn dem einzelnen Individuum jeweils der für den Gesamterfolg geeignetste Standraum gewährt wird, also bei rationeller Bestandesserziehung, deren Arbeitsaufwand sich meist unmittelbar aus dem Anfall an Holz reichlich bezahlt macht. Dann aber vermögen die verschiedenen Holzarten unter denselben natürlichen Erzeugungsbedingungen verschieden hohe Werte zu schaffen. Es sind daher stets diejenigen zu wählen, die am gegebenen Ort bei entsprechend geringem Aufwand höchste Werte aus der Natur zu schöpfen vermögen. Innerhalb der einzelnen Holzarten scheinen wiederum Rassen, ja Individuen in verschiedenem Maß jene Fähigkeit zu besitzen, auch vererben sich die maßgebenden Eigenschaften und können zum Gegenstand der Züchtung gemacht werden (vgl. oben S. 21—63). Endlich besitzt die Bestockung in der Regel die natürliche Fähigkeit, sich durch Samenabfall selbst zu verjüngen und zwar geschieht dies unter geeigneten äußeren Verhältnissen ohne Kosten, oder doch mit verhältnismäßig geringem Aufwand. Zu den wichtigsten Aufgaben zweckmäßiger Wirtschaft müßte es somit gehören, diesen Momenten vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Hat nun, so müssen wir uns fragen, die Forstwirtschaft diese ihre eigenartige Stellung in der Volkswirtschaft allgemein richtig erkannt und betrachtet sie es demgemäß als ihre erste ökonomische Aufgabe, sich die freien Gaben der Natur in vollstem Maß zu eigen zu machen? Ist es ihr erstes ökonomisches Gesetz, mit allen Mitteln dahin zu wirken, daß der unentgeltliche Faktor Natur in erster Linie und nach allen Richtungen zur Produktion herangezogen werde; betrachtet sie allgemein die gesteigerten Aufwendungen von Arbeit und Kapital an Stelle der Selbsttätigkeit der Natur als Notbehelf, nur da berechtigt, wo die natürlichen Mittel gleichen Erfolg versagen? Wir können diese Fragen, ohne begründeten Einwand befürchten zu müssen, verneinen. Was die aufgeführten Mittel betrifft, die Natur durch die Bestockung in höherem Maß in den Dienst der Wirtschaft zu zwingen, so sind die neueren Anschauungen auf dem Gebiet der Bestandesserziehung (vgl. z. B. Martins Forstliche Statik, Schiffel, Centralblatt f. d. ges. Forstwesen 1906 S. 333) und der Holzartenwahl ohne Zweifel auf dem richtigen Wege, auch hat sich neuestens die allgemeine Aufmerksamkeit mit großem Eifer der Frage der Rassen- und Zuchtwahl zugewendet. Nicht aber wird auch heute noch billige Naturverjüngung allgemein als erstes Ziel intensiver Forstwirtschaft anerkannt, wohl hauptsächlich darum, weil die meisten, tatsächlich angewendeten Verfahren dieser Art unverkennbar den Stempel extensiver Wirtschaft tragen. Und doch hat die Verfeinerung unserer Produktionstechnik gerade auf diesem Gebiet die meiste Aussicht auf einen durchschlagenden Erfolg.

Man betont zugunsten grundsätzlicher Kunstverjüngung, daß sie zu rascher und gleichmäßiger Wiederbestockung führe im Gegensatz zu dem unsicheren Erfolg der Naturverjüngung. Das kann für gleichzeitige Verjüngung

auf großen Flächen ohne weiteres zugegeben werden, berechtigt aber angesichts der oben geschilderten gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen der Forstwirtschaft noch nicht dazu, deshalb auf Naturverjüngung ohne weiteres und endgültig zu verzichten und zum künstlichen Anbau überzugehen, weil diesem Schritt die hohen Kosten reiner Kunstverjüngung neben anderen Nachteilen entgegenstehen. Ehe die Wirtschaft diesen Schritt tut, müßte sie erst nachgewiesen haben, daß billige und gute Naturverjüngung auch auf keinem andern Wege zu erreichen ist, und diesen Nachweis hat sie noch nicht erbracht.

Die Großflächenwirtschaft des 19. Jahrhunderts hat die Tätigkeit der natürlichen Produktionsfaktoren bei der Verjüngung des Waldes mehr und mehr zurückgedrängt, um die Arbeits- und Kapitalintensität des Forstbetriebs durch teure Kunstverjüngung, vielfach auch durch übermäßig kostspielige erste Erziehungsmaßregeln und dergleichen zu steigern, oder aber, sie hat sich die Mitwirkung der natürlichen Faktoren bei der Verjüngung zu teuer erkauft durch kostspielige Ernte-, Ergänzungs- und Schutzmaßregeln, chaotische und daher unübersichtliche und teure Wirtschaft u. s. f. Sie tat dies zu einer Zeit, wo eine Verteuerung der Produktion sicherlich nicht allgemein und nicht in solchem Maße gerechtfertigt war. Künftig mögen einmal Zeiten kommen, wo infolge Zurückweichens und Verschwindens des Urwalds und Ausdehnung hoher Kultur in den heutigen Holzausfuhrländern die äußeren Verhältnisse unserer Forstwirtschaft andere sein werden; doch liegen diese Zeiten selbst für die an sich weitausschauende Forstwirtschaft noch in weiter Ferne, denn noch lange wird unser Betrieb den Wettbewerb mit den Erzeugnissen einer viel billigeren Produktion anderer Länder aushalten müssen. Ist dies einst nicht mehr der Fall, dann mögen dichte Pflanzungen, teure Pflanzverfahren, gärtnerische Jungwuchspflege, sorgfältige Astung, Düngung des Waldes und anderes mehr am Platze sein, soweit sie nach Klima, Lage und Beschaffenheit des Bodens zu höherem Ertrag führen, als natürliche Mittel, heute gilt dies nur in Ausnahmefällen.

Wollen wir somit die Intensität des Forstbetriebs (insbesondere auf dem Gebiet der Verjüngung) in ökonomischem Sinne steigern, so bedürfen wir dazu einer Produktionstechnik, die uns, wie die ersten vier Abschnitte dieser Schrift zeigen, nur eine entsprechende räumliche Ordnung zu bieten vermag. Sie hat uns Hilfe zu leisten:

1. zu höchster Ausnützung der Standortsfaktoren durch eine wirtschaftlich bestbefähigte Bestockung,
2. zu möglichster Ermäßigung der bezüglichen Erzeugungskosten.

1. Volle und ununterbrochene Ausnützung der Standortsfaktoren äußert sich für die Wirtschaft in höchster Wertserzeugung. Dieses Ziel fordert von der räumlichen Ordnung einerseits — wie im 1. Abschnitt gezeigt wurde — die Anzucht nur ertragstüchtigster Individuen und Rassen und ununterbrochene Bodendeckung, führt somit zu Naturverjüngung, und fordert andererseits — wie der 3. Abschnitt ergab — gleich-

altrige Erziehung der Individuen, führt somit zum gleichwüchsigen Hochwald.

Da nämlich höchste Wertserzeugung den größten Massen- und Qualitätszuwachs in sich schließt, so wird die Blenderform mit ihren ungleichwüchsigen Verwandten ausgeschlossen; denn mag auch, wie Tichy, Engler und Andere annehmen, durch diese Bestockungsform mehr Masse erzeugt werden, da bei unebenem Kronendach zahlreichere Assimilationsorgane tätig werden können, somit der Produktionsfaktor „Licht“ mehr ausgenützt wird — was der bisher üblichen, an Dichtigkeit einem Hanfland nicht unähnlichen Erziehungsweise der gleichaltrigen Hochwaldbestände gegenüber unzweifelhaft richtig ist —, so ist doch sicherlich die entscheidende durchschnittliche Qualitätserzeugung eine geringere, als bei gleichwüchsiger Bestockung, ihr Mangel könnte durch einen höheren Massenzuwachs der Blenderform nicht ausgeglichen werden ¹⁾.

Selbst der Lichtungszuwachs, der zugunsten langer, spezieller Verjüngungszeiträume bei Schirm- und Blenderschlag ins Feld geführt wird, dürfte nicht immer ohne weiteres auch die Qualität steigern. Bei den Kernholzbäumen z. B., in erster Linie bei der Eiche, muß er unseres Erachtens schon längere Zeit wirksam sein, soll er nicht vorwiegend das Splintholz verstärken also den Stamm nicht, oder doch nur wenig wertvoller machen.

Jedenfalls aber möchte uns scheinen, als ob eine Wirtschaft, die bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens auf den Lichtungszuwachs besonderes Gewicht legt, mit den Maßregeln der Zuwachssteigerung zu spät käme; die Zuwachspflege gehört beim gleichwüchsigen Hochwald in das Erziehungsstadium, und wenn wir den Lichtungszuwachs während der Verjüngung auch dankbar annehmen, so darf er doch in keinem Fall auf Art und Gang derselben einen irgend bestimmenden Einfluß üben und als „Vorzug“ eines Verjüngungsverfahrens gelten; bei Vergleich mehrerer Verfahren dürfen wir doch nur Vorzüge hervorheben und in die Wagschale werfen, die, sei es unmittelbar oder mittelbar, den Hauptzweck betreffen.

Wir werden auch des Lichtungszuwachses gar nicht mehr im bisherigen Maß bedürfen, sobald die frühere bzw. bisher in der Praxis übliche Erziehung in dauernd dichtem Schluß endgültig der Vergangenheit angehört, und jede Verkümmern der Individuen von Jugend auf verhütet wird.

Der Einfluß des Wuchses der Individuen bei Gleichwüchsigkeit, also der Dichtigkeit der Bestockung, auf die Wertserzeugung soll nicht weiter in den Kreis dieser Betrachtungen gezogen werden. In dieser Frage ist eine allgemeine Behandlung ausgeschlossen, weil hier die Einzeleigenschaften der Holzarten den Ausschlag geben. Uebrigens ist diese Seite der räumlichen Ordnung ohne weiteren

1) Martin sagt (Forstl. Statik S. 40): „Wenn der Plenterwald aus wüchsigen mittleren Stammklassen besteht, so wird er der durchschnittlichen Leistung des schlagweisen Hochwalds nicht nachstehen, manche Altersklassen sogar übertreffen. Infolge des Einflusses der älteren auf die jüngeren Stammklassen und weil es kaum möglich ist, die Stämme zur Zeit ihrer Hiebsreife und ohne Schädigung des stehen bleibenden Holzes zu nutzen, leistet er tatsächlich im Großbetrieb weniger als der regelmäßige Hochwald. Dieser ergibt nachhaltig den höchsten Zuwachs.“

Einfluß auf den räumlichen Aufbau des ganzen Waldes, auf den unsere Betrachtungen hinzielen. Wir können hier auf die Ausführungen Schiffels im Centralblatt f. d. ges. Forstwesen 1906 S. 333 hinweisen, wo die Frage der räumlichen Stellung der Individuen zueinander ganz in dem hier vertretenen Sinne in überzeugender Weise behandelt ist. Vgl. auch Weinkauff, Naturwissenschaftl. Zeitschrift für Forst- und Landw. 1909 S. 578.

2. Die wichtigsten Produktionskosten, zu deren möglichster Ermäßigung die Forststatik der Hilfe der räumlichen Ordnung bedarf, sind Verjüngungskosten und Erntekosten, von denen die letzteren, wie aus dem 3. Abschnitt hervorgeht, wesentlich von der räumlichen Anordnung im Walde und zwar von der Art der Verjüngung abhängen. Wir können sie also mit den Verjüngungskosten vereinigen, denn sämtliche, den Aufwand für einfachste Kahlabholzung überschreitenden Erntekosten sind durch die Verjüngung veranlaßt. Wir betrachten daher zusammenfassend: die Verjüngungskosten einschließlich des durch das Verjüngungsverfahren verursachten Erntemehraufwands.

Die Verjüngungskosten spielen forststatisch eine sehr wichtige Rolle, denn wir haben in ihnen — mögen wir den Wald ansehen, wie wir wollen — Aufwendungen vor uns, deren voller Rückersatz erst mit dem Abschluß der Produktion, also am Ende des Umtriebs zu erwarten ist und die somit den Betrieb mit ihren Zinsen schwer belasten. Da ist es nur selbstverständlich, wenn die Forststatik auf möglichste Ermäßigung der Kosten dringt, gleiche Güte der Bestockung vorausgesetzt. Die Möglichkeit dazu ist gegeben, wenn die Wirtschaft den Produktionsfaktor „Natur“, der seine Leistungen mehr oder weniger kostenlos bietet, in intensiver dabei haushälterischer Weise ausnützt.

Die Natur bietet zur Waldverjüngung, wie wir aus dem 1. Abschnitt wissen, Keime bester Art in reicher Menge und kostenlos dar, es handelt sich nur darum, dieselben ohne großen Aufwand wirtschaftlich festzuhalten. Die Naturverjüngung wird also jedenfalls dasjenige Verjüngungsverfahren in sich schließen, das die billigste und dabei beste Bestockung liefert und daher dem statischen Ideal entspricht; denn sie hat den Vorteil intensivster Benützung des unentgeltlichen Faktors „Natur“.

Wie sieht nun solche statisch beste Naturverjüngung aus? Zwei Werkzeuge arbeiten im Forstbetrieb an der Wiederbegründung des Waldes: die Axt und der Spaten. Die Axt hat als Verjüngungswerkzeug gewissermaßen dem Willen der Natur zu folgen, der Spaten arbeitet unabhängig von ihm. Eine gut geführte Axt macht nun den Spaten in sehr vielen Fällen entbehrlich; auf solche Führung aber müssen wir ausgehen, denn in bezug auf Verjüngung können wir den Satz aufstellen: daß die Axt stets haushälterischer wirkt als der Spaten, weil die erstere ihre Arbeit

— entsprechenden Absatz vorausgesetzt — meist sofort durch den Holzanfall bezahlt macht, was beim Spaten nicht der Fall ist.

Eine haushälterische Wirtschaft wird also ihren Betrieb so einrichten, daß sie soweit möglich nur wegzunehmen, nicht hinzupflanzen braucht, sie wird zu diesem Zweck der Natur reichliche Gelegenheit geben und Zeit lassen, ihr Füllhorn auszuschütten. Wir betonen dies einer Auffassung gegenüber, die bei reicher Naturverjüngung die Notwendigkeit vieler Reinigung und Durchreiserung beklagt gegenüber dem angeblich kostenfreien Heranwachsen der Pflanzkulturen.

Die statisch beste Form der Naturverjüngung ist da zu suchen, wo ausgiebigste Benützung mehrerer Samenjahre möglich, somit ohne besondere Kosten dichte Jungwüchse erzeugt werden, die alle früher betonten Vorteile bieten, auch vielfach schon sehr frühzeitig Erträge liefern.

Naturverjüngung darf weiterhin nicht verteuert werden, weder durch gesteigerte Erntekosten (vgl. 3. Abschnitt), noch durch Arbeitszersplitterung. In letzterer Beziehung gilt der Satz, daß übersichtlich geordnete, vereinigte Arbeit stets billiger ist, als ungeordnete, über große Flächen zerstreute (vgl. 4. Abschnitt). Ebenso wenig darf sie endlich verteuert werden durch unökonomische, kleinliche Maßregeln. Teuere, ins kleine gehende — gärtnerische — Arbeiten, besonders solche der Ergänzung und Jungwuchspflege, haben im normalen Forstbetrieb keinen Raum.

Dabei ist hier selbstverständlich ganz davon abgesehen, daß nicht wenige Verjüngungs- und Erziehungsmaßregeln, die heute im Wald Anwendung finden, forststatisch geradezu unter die Rubrik „Liebhaberkünste“ gehören, weil sie lediglich auf waldbauliche Erfolge ausgehen, die sich nur zu oft als wirtschaftliche Scheinerfolge kennzeichnen. Wir zählen dahin — wobei Ausnahmeverhältnisse nicht gemeint sind — z. B. Heisterpflanzungen, Behacken der Jungwüchse, Anwendung von Kunstdünger im freien Wald, übermäßiges Beschneiden und Einzelpflege der Laubholzjungwüchse u. dergl., sofern diese Maßregeln im großen und grundsätzlich angewendet werden.

Somit weist ökonomische Naturverjüngung auf bestimmte räumliche Ordnung hin; sie wird dann stets billiger und dabei besser sein, als die vielgerühmte und vorherrschende Kunstverjüngung, wenn sie weder durch unzumutbare Raumordnung und dadurch gegebene Steigerung der Erntekosten verteuert wird, noch durch teure Ergänzung und Erziehung (infolge von Arbeitszersplitterung über große Flächen).

Die Forderung natürlicher Verjüngung im Sinne des 1. Abschnitts wird somit weiterhin auch noch durch statische Rücksichten gestützt.

Wir haben in unseren früheren Ausführungen die Kosten der Verjüngung — unmittelbare wie mittelbare — nicht in den Bereich unserer Betrachtungen gezogen, oder doch nur gestreift. Sie sind forststatisch von er-

heblicher Bedeutung und rechtfertigen allein schon die dringende Forderung nach billigster Verjüngung, also Naturverjüngung.

Schon Preßler sagt in der Regel 4, auf S. 136 seiner forstlichen Finanzrechnung 1859: „Gib bei Kernwald i. a. der Vorverjüngung den Vorzug vor der Nachverjüngung und prüfe im Geiste des Reinertrags, ob bei letzterer nicht die Saat den Vorzug vor der Pflanzung verdiene“.

Den Weg zu billigster Naturverjüngung bahnt uns, wie aus den früheren Abschnitten hervorgeht, nur die Art der räumlichen Anordnung der Altersklassen und eine entsprechende Führung der Axt. Diese läßt uns bei möglichst sicherer und billiger Verjüngung zu dichten, aus wertvollem Material zusammengesetzten Jungwüchsen gelangen. Auch wo Naturverjüngung ausgeschlossen, vermag solche räumliche Ordnung, wie früher angedeutet wurde und an anderem Ort näher ausgeführt werden soll, äußere Bedingungen für billigste und dabei beste Wiederbestockung — durch Saat und Ballenpflanzung — zu schaffen.

Wie es dagegen um eine Wirtschaft steht, die sich auf den Spaten als Hauptkulturwerkzeug stützt, weil sie in entsprechender Führung der Axt durch die räumliche Ordnung gehindert ist, zeigen uns am besten die statistischen Zahlen heutiger Kulturkosten, die bei dem allgemeinen Steigen der Löhne in Zukunft eine bedeutende Steigerung zu erwarten haben.

Dabei ist es meist üblich, beim forstlichen Rechnen viel zu niedrige Kulturkosten anzunehmen, die dem tatsächlichen Gesamtaufwand der heutigen Betriebsformen gar nicht entsprechen, denn zu den Waldverjüngungskosten gehören neben dem Aufwand für ersten Anbau die durchschnittlichen Wiederholungs- und Nachbesserungskosten, die Kosten der Schutzmaßregeln gegen Rüsselkäfer, Wildverbiß, Schütte u. s. w. und endlich die Reinigungskosten sowie etwaiger Erntemehraufwand im Interesse der Verjüngung, kurz aller Aufwand bis zu der Zeit, wo der Ertrag aus dem Anfall der Erziehungshiebe deren Kosten deckt; denn wo sonst sollte dieser Aufwand, wenn wir unsere Formeln betrachten, in der forstlichen Rechnung Berücksichtigung finden? Man mag sich wohl scheuen, die wahren Waldbestockungskosten unserer Großflächenwirtschaft von 250 Mk. je ha und mehr einzusetzen, wegen der unbrauchbaren Rechnungsergebnisse, die unsere Methoden alsdann liefern (negative Bodenwerte u. s. w.), die man gerne der Rechnungsmethode zur Last legen möchte, während sie doch nur ein eigentümliches Licht auf die Wirtschaft werfen.

So nennt auch Gayer (Gemischter Wald S. 125) die „Kulturziffer den wundesten Fleck unseres Wirtschaftswalds“. Den Ausführungen Gayers am angegebenen Ort ist kaum etwas beizufügen, nur möchten wir an Stelle von „Wirtschaftswald“ die Bezeichnung „Großflächenwirtschaft“ setzen.

Wollen wir uns ein Bild machen von den Verjüngungsverhältnissen — Erfolg und Kosten — auf der Grundlage der heute im Wald herrschenden Raumordnung, so genügt ein Blick in die Statistik irgend einer größeren Verwaltung.

Wir werden da überall, mehr oder weniger scharf ausgeprägt, auf dieselben Verhältnisse stoßen.

Vor dem Verfasser liegen z. B. die „Forststatistischen Mitteilungen“ der württembergischen Staatsforstverwaltung für das Jahr 1904. Unterwerfen wir diese nur einer flüchtigen Prüfung, um ein allgemeines Bild zu erlangen, so ergibt sich:

Bei einer gesamten ertragsfähigen Staatswaldfläche von 184 127 ha werden für das Jahr 1904 (eine Reihe von Vorjahren zeigt durchweg ähnliche Zahlen) Neuausführungen von Saaten und Pflanzungen auf einer Fläche von 1667 ha nachgewiesen. Da wir durchschnittlich etwa mit 100 jährigem Umtrieb zu rechnen haben, ergibt sich insgesamt eine normale jährliche Nutzungs- und daher Verjüngungsfläche von 1841 ha, von der die wirkliche durchschnittlich jährliche Verjüngungsfläche kaum wesentlich abweichen dürfte. Von diesen etwa 1841 ha wurden somit 1667 ha künstlich verjüngt, so daß der Naturverjüngung eine Fläche von nur etwa 174 ha = rund 10 % der ganzen Verjüngungsfläche verbleibt. Auch wenn wir eine vielleicht etwas größere Nutzungsfläche, sowie die Wirkung zahlreicher Neuaufforstungen und Umwandlungen in andere Holzart in Betracht ziehen, zeigen doch diese Zahlen bei dem offenbar vorhandenen Streben, soweit irgend möglich, natürlich zu verjüngen, einen sehr bescheidenen Erfolg der Naturverjüngung. Wenn nun aber die reiche Fülle von Keimen, die durch die Natur fortgesetzt erzeugt wird, — trotz des unzweifelhaft guten Willens, sie zu benützen, — in solchem Maße verloren geht, wie dieses Beispiel zeigt, um durch teure Kunst ersetzt zu werden, so muß der Fehler an einem wichtigen Glied des wirtschaftlichen Mechanismus liegen und dieses Glied ist unseres Erachtens die räumliche Ordnung.

Noch trüber wird das Bild, sobald wir zu den Kosten dieser Kunstverjüngung übergehen. Dieselben betragen für Saaten, Pflanzungen, Pflanzschulen und sonstigen Aufwand 406 509 Mk., somit je Hektar der erstmaligen Ausführung durchschnittlich 244 Mk. Diese Kulturkosten finden ihren vollen Rückersatz erst am Ende des zurzeit 100 jährigen Umtriebs, sind also bis dahin bei $2\frac{1}{2}\%$ zu 2880 Mk., bei 3% zu 4680 Mk. je ha angewachsen. Würde die Verwaltung nur noch mit der Axt verjüngen, sich auf den Erfolg der Naturverjüngung allein beschränken, d. h. würde sie den Pflanzspaten ganz beiseite stellen und den Kulturetat streichen, um die Kultur Gelder statt sie im Wald zu verbrauchen, auf der Sparkasse verzinslich anzulegen, so könnte sie nach hundert Jahren dem alsdann wohl nicht erheblich geringeren Endertrag die angewachsenen Ersparnisse an Kultur Geldern von jährlich 4,8 bzw. 7,8 Millionen Mark zuschießen. (Der jährliche Waldreinertrag beträgt zurzeit rund 10 Millionen Mark.) Wir glauben, diese Zahlen sprechen für sich allein und weisen zugleich den Weg, auf dem die Wirtschaft fortschreiten muß, wenn sie günstigere Beurteilung vom ökonomischen Gesichtspunkt finden will.

Unsere flüchtige Betrachtung zeigt somit ein wenig günstiges Bild sowohl bezüglich des Verjüngungserfolgs wie des Verjüngungsaufwands.

Neuestens hält Weber-Gießen (vgl. Allg. F. u. J. Ztg. 1905 S. 221)

dem heutigen Forstbetrieb den Spiegel vor bezüglich der statischen Bedeutung seiner Kulturaufwendungen und deren oft unglaublichen Ausschreitungen. Er weist uns zahlenmäßig nach, wie sehr der Bodenertragswert und damit die Rente aus dem Waldboden, dieser empfindlichste Wertmesser unserer wirtschaftlichen Tätigkeit durch hohe Kulturkosten beeinträchtigt wird. Möge diese ebenso verdienstvolle wie eindringliche Mahnung, die Grenzen des Erlaubten in bezug auf Kulturaufwand nicht zu überschreiten, nicht ungehört verhallen. Weber rät (S. 262), neben Naturverjüngung und billiger Saat, zur Anwendung von Maschinen; wir möchten, wo dies angeht, eine natürliche, dabei geordnete Wiederverjüngung allem anderen voranstellen; sie allein ist befähigt, der statischen Not der praktischen Forstwirtschaft zu steuern. Denn diese letztere befand sich und befindet sich heute noch in bezug auf Rentabilität ihres Betriebes inmitten des allgemeinen Wirtschaftslebens in einer — recht sonderbaren Lage, die sich aus ihrer angeblichen Ausnahmestellung wohl kaum ganz erklären läßt, viel eher aus dem Mangel ökonomischen Denkens und Empfindens bei einem großen Teil ihrer Vertreter, was schon Bernhardt in seiner Geschichte des Waldeigentums feststellt und beklagt.

Gerade die forststatische Bedeutung der Begründungs- und ersten Erziehungskosten kann unserer Praxis daher nicht oft und drastisch genug vor Augen geführt werden.

Den Wirtschaftserfolg rechnerisch mit einiger Sicherheit klarzustellen, sind wir heute leider nur in seltenen Fällen und nur mit der größten Mühe imstande. Um so mehr ist es erste und dringendste Pflicht jeder guten Verwaltung, sich so rasch als möglich in den Besitz zuverlässiger Ertragszahlen zu setzen, nicht nach Masse allein, sondern auch nach Sortimentsbildung und Preisen, um ihre Wirtschaft am Ertragswert des Bodens zu prüfen. Sie wird dann finden, daß nur billigste und dabei beste Verjüngung den Forderungen der Wirtschaftlichkeit genügen kann. Diese wiederum ist nur möglich durch sichere Naturverjüngung. Sie allein läßt unsere Waldwirtschaft im allgemeinen Wirtschaftsleben als ökonomisch vollwertig erscheinen, denn nur sie nützt den Produktionsfaktor Natur voll aus. Teure Kunstverjüngung dagegen, vollends in Verbindung mit der notwendig nachfolgenden teuren Pflege in erster Jugend, wie sie heute leider so vielfach üblich ist, am meisten gerade bei Holzarten mit sehr hohen Umtrieben (Laubhölzer!), kann vor dem Forum der Wirtschaftlichkeit so wenig bestehen, wie Naturverjüngung mit übermäßigen Kosten: für Schutz des Anflugs gegen Schlagbeschädigungen durch Abasten vor der Fällung, durch Anrücken sämtlichen Holzes und Zerschneiden von Schäften in kurze Stücke, dann für teure Ergänzungen, Nachbesserungen und Erziehungsmaßregeln (Asten der Vorwüchse!).

Solche Verfahren bringen dem Waldbesitzer mehr oder weniger um seine Bodenrente, die in den hohen Produktionskosten aufgeht, sie haben somit keine wirtschaftliche Berechtigung. Die Natur bewirkt eben das Zustandekommen einer angemessenen Rente aus dem

Waldboden nur dann, wenn ihre Kräfte nach jeder Richtung voll ausgenützt werden.

Wir gelangen somit zu folgender Forderung der Forststatik:

Die räumliche Ordnung im Wald ist so einzurichten, daß die Eigenschaften unserer Holzarten, die der Fortpflanzung dienen, in möglichst vorteilhafter und zweckmäßiger Weise benützt werden können. Die Darbietungen der Natur sind in weitestem Maße, aber mit geringsten Kosten, festzuhalten. Wie dies unseres Erachtens möglich ist, wurde im 1. Abschnitt gezeigt.

Die Betrachtungen dieses Abschnitts zeigen die volle Uebereinstimmung unserer forststatistischen Forderungen mit den früher gestellten, geben also die Sicherheit, daß die aufgestellten Ziele der Produktionslehre durch die Forststatik in keiner Weise verrückt werden.

6. Abschnitt.

Die Ertragsregelung und die räumliche Ordnung.

Wenn hier unter den Faktoren, welche die räumliche Ordnung im Wald bestimmen, die Ertragsregelung an den Schluß gestellt wird, — der Faktor, der doch früher die räumliche Ordnung fast ausschließlich bestimmte und es in hohem Maß heute noch tut —, so geschieht dies mit voller Absicht. Der Verfasser möchte dadurch bekunden, daß diese Rücksichten in letzter Linie Einfluß üben sollen, daß es nicht Sache der Ertragsregelung ist, die räumliche Ordnung im Walde zu bestimmen oder auch nur wesentlich zu beeinflussen, wie sie es zu dessen Schaden vielfach getan.

Vielmehr möchten wir im Gegensatz dazu den Grundsatz aufstellen: die Ertragsregelung hat diejenige räumliche Ordnung als gegeben hinzunehmen, die den Forderungen insbesondere der produktiven Momente entspricht und hat auf der Grundlage dieser ihr gegebenen Ordnung ihre Methoden zu entwickeln und nicht, wie heute geschieht, selbst wesentlichen Einfluß auf diese Ordnung zu nehmen ¹⁾.

Wenn ihr hier trotzdem — an letzter Stelle — das Wort erteilt wird, so geschieht dies einmal, um den Einfluß nachzuweisen, den sie tatsächlich auf die räumliche Ordnung geübt hat, und dann, um ihr Gelegenheit zu geben,

1) Fricke bestreitet (Zeitschr. f. F. u. J.wes. 1908 S. 473) den Einfluß der Ertragsregelung auf die räumliche Ordnung unter Hinweis darauf, daß sich für Mittelwald, Niederwald, Blenderwald und Schlaghochwald je eigene Einrichtungsverfahren herausgebildet hätten, woraus hervorgehe, daß die Ertragsregelung sich den jeweils durch die Betriebsart gegebenen räumlichen Verhältnissen anpasse. Dies trifft nun natürlich für jene großen Gruppen von Betriebsarten vollkommen zu, aber darauf beziehen sich ja unsere Ausführungen gar nicht! Diese haben vielmehr nur das räumliche Vorgehen innerhalb des weiten Rahmens des schlagweisen Hochwalds zum Gegenstand, und hier, im schlagweisen Hochwald, hat z. B. das Flächenaufteilungsprinzip des Fachwerks einen ganz entscheidenden Einfluß auf die räumliche Anordnung der Altersklassen geübt. Das Fachwerk hat allerdings für sich abgeschlossene Hochwaldsbestände teilweise schon angetroffen (es fanden ja natürlich schon früher gleichzeitige Abholzungen auf großen Flächen statt), aber es hat noch viel mehr solche selbst geschaffen, denn es hat — und darauf kommt es hier an — diese Abnutzungsform zum Prinzip erhoben und jede andere Art räumlichen Vorgehens ausgeschlossen. Daß das Fachwerk sich nicht lediglich gegebenem anpaßte, sondern vielmehr sein, einem taxatorischen Bedürfnis entsprungenes, räumliches Ideal zu verwirklichen suchte und dem Wald tatsächlich aufgenötigt hat, dürfte übrigens unbestreitbar sein, denn es ist nicht nur in der Literatur und in den Einrichtungswerken, sondern auch im Wald auf Schritt und Tritt festzustellen.

ihre berechtigten Wünsche geltend zu machen; denn diese lassen sich, wie gezeigt werden soll, mit der bisher geforderten Ordnung ganz wohl in Einklang bringen.

Die ganze Forsteinrichtungslehre ist aus dem Bedürfnis einer nachhaltigen Regelung des Waldertrags — also der zeitlichen Ordnung — herausgewachsen. Da nun aber diese Aufgabe durch entsprechende räumliche Anordnungen im Wald sehr erleichtert wird, ja fast bedingt ist, so lag es nahe, die Regelung der räumlichen Ordnung mit der Ertragsregelung zu verbinden, ein Weg, der zumeist beschritten worden ist.

Die große Mehrzahl der Methoden der Ertragsregelung stellen sich nämlich die doppelte Aufgabe:

1. den Hiebsatz zu bestimmen, den Ertrag zeitlich zu ordnen,
2. den Hiebsort festzulegen und dadurch unmittelbar entscheidend auf die räumliche Ordnung einzuwirken.

Bei dieser gemeinsamen Behandlung beider Aufgaben liegt nun die Versuchung nahe: einmal, dieselben unlösbar miteinander zu verquicken, und dann die räumliche Ordnung im Sinne einer Erleichterung der Ertragsregelung zu beeinflussen. Viele Methoden sind dieser Versuchung unterlegen, zum Nachteil der in den bisherigen Abschnitten gestellten Forderungen, andere haben sich von einer Vermengung freigehalten.

Es wird daher zunächst unsere Aufgabe sein, die Methoden der Ertragsregelung auf ihr tatsächliches Verhältnis zur räumlichen Ordnung im Wald zu untersuchen und hernach erst, festzustellen, welches denn eigentlich die berechtigten Ansprüche der Ertragsregelung an die räumliche Ordnung sind.

1. Kapitel.

Die Methoden der Ertragsregelung und ihr Verhältnis zur räumlichen Ordnung.

Um klar zu erkennen, welche Rolle die räumliche Ordnung tatsächlich in der Forsteinrichtung spielt, hätten wir zuerst die Methoden der Ertragsregelung nach dieser Richtung ins Auge zu fassen. Sie wirken, wie wir sehen werden, in sehr verschiedener Weise auf die räumliche Ordnung ein.

Ehe wir dies jedoch feststellen können, wird es notwendig sein, eine kurze Kennzeichnung dieser Methoden zu geben, um Mißverständnisse zu vermeiden; denn leider zeigt ein Blick in die Literatur sofort, daß in bezug auf Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Methoden der Ertragsregelung durchaus noch nicht volle Klarheit und Einigkeit unter den maßgebenden Schriftstellern herrscht, diese gehen vielmehr in wesentlichen Punkten auseinander.

Wir versuchen daher hier zunächst, eine klare Begriffsbestimmung und Begrenzung der einzelnen Methoden zu geben, damit der Leser weiß, was im

nachfolgenden unter den einzelnen Bezeichnungen verstanden werden will und was dem Verfasser für den Begriff wesentlich erscheint. Dagegen ist zu einem näheren Eingehen auf dieses interessante Gebiet hier nicht der Ort, weshalb die Ausführungen sich auf Feststellen und kurzes Begründen der Begriffe und der gewählten Einteilung der Methoden zu beschränken haben, unter Stellungnahme zu den vorhandenen Systemen.

Erst dann ist es möglich mit Erfolg, das Verhältnis zu erörtern, in dem die Methoden der Ertragsregelung zur räumlichen Ordnung stehen, — ein Verhältnis, das für die ganze Rolle entscheidend ist, welche die räumliche Ordnung in der heutigen Forsteinrichtung spielt.

I. Kennzeichnung der Methoden der Ertragsregelung.

Die hier hauptsächlich in Betracht kommenden Schriftsteller, die zumeist Einteilungssysteme für die Methoden der Ertragsregelung aufgestellt haben, sind:

Hundeshagen (Forstabschätzung 1826, Encyclopädie der Forstwiss. 2. A. 1828 II. Bd.),

Carl Heyer (Waldertragsregelung 1. A. 1841, Hauptmethoden der Waldertragsregelung 1848),

Denzin (Allg. Forst- und Jagdzeitung 1874—1877 und 1883),

Judeich (Tharander Jahrb. 1879, Forsteinrichtung 6. A. 1904, S. 331),

Grebe (Betriebs- und Ertragsregelung 2. A. 1879),

Stötzer (Forstw. Centralbl. 1884 S. 522, Forsteinrichtung 1898 S. 195).

Es sollen nun hier zunächst in zeitlicher Folge die Systeme kurz erörtert werden, die für die Methoden der Ertragsregelung aufgestellt worden sind, woraus sich unmittelbar die geschichtliche Entwicklung der Frage ergibt:

1. Der Erste, der verschiedene Methoden der Ertragsregelung einander gegenüberstellte, und dadurch ein System schuf, war wohl Hundeshagen. Er scheidet zuerst: „Fachwerke“ und „rationelle Methoden“, indem er seine eigene Methode — eine Normalvorratsmethode —, die er die „rationelle“ nennt, den herrschenden Methoden G. L. Hartigs und Cottas gegenüberstellt, die er als „Fachwerksmethoden“ bezeichnet.

Die Bezeichnung „Fachwerk“ stammt ohne Zweifel von Cotta her oder wurde doch durch ihn in die Literatur gebracht (z. B. Forsteinrichtung 1820 S. 43), sie wurde für die Rubriken des Periodenplans gebraucht, den man mit einem in Fächer geteilten Schrank verglich (vgl. Forstwiss. Centralbl. 1884 S. 525). Dagegen ist die Bezeichnung „Fachwerksmethoden“ für bestimmte Methoden der Ertragsregelung unzweifelhaft eine Schöpfung Hundeshagens. Er gebraucht dieselbe erstmals in seiner Forstabschätzung 1826 S. 114, wo er von, „mit unendlich vieler Registrierung und Fachwerk verbundenen Methoden“ spricht (gemeint sind die Methoden von G. L. Hartig, Cotta und And.) im Gegensatz zu seiner eigenen Methode, für die „einige Multiplikationen

ausreichen“, die „eine rationelle Basis“ besitzt. Er will nun dieses sein „rationelles Verfahren“ gegen die „früheren Fachwerksmethoden in Vergleich stellen“. Daß Hundeshagen damit bewußt eine den Bedürfnissen entsprechende neue Bezeichnung schafft, geht aus der Anmerkung hervor, die er ihr beifügt: „Zur Abkürzung der Worte für gewisse Begriffe wollen wir uns der hier für die verschiedenen Methoden gebrauchten Bezeichnungen fernerhin allgemein bedienen“.

So faßt also Hundeshagen zunächst unter der Bezeichnung:

„Fachwerksmethoden“ alle registrierenden Methoden zusammen, Methoden mit feststehendem besonderem Wirtschaftsplan, mit „mechanischer Ertragsausgleichung“, — mit Vermengung der Sorge für räumliche und für zeitliche Ordnung, s. später — darunter auch die Schlageinteilung, wie aus seinen Beispielen hervorgeht, wenn er auch in erster Linie (vgl. Encyklopädie der Forstw. 2. A. 1828 §§ 617 und 638) die Fachwerksmethoden Hartigs und Cottas im Auge hat. Ihnen stellt er die Normalvorratsmethoden gegenüber, als „rationelle Methoden“.

2. Hundeshagens Schöpfung wurde nun in der Folge in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen, aber, wie es scheint, nicht ganz in dem Sinn, in dem er selbst die Bezeichnung ursprünglich gebraucht hatte, sondern sie wurde im besondern auf das damals die forstliche Welt beherrschende Massenfachwerk Hartigs angewendet, das ja auch Hundeshagen bei Schöpfung des Namens in erster Linie im Auge gehabt hatte.

In diesem engeren Sinn gebraucht sie noch Carl Heyer in der 1. Auflage seiner Waldertragsregelung 1841. Er stellt dort einander gegenüber:

Flächenteilung, Fachwerksmethode, Vereinigung beider, und schließt daran die verschiedenen Normalvorratsmethoden an.

Unter „Fachwerksmethode“ versteht er das Massenfachwerk Hartigs, da er sie als eine Methode kennzeichnet, die eine „möglichst gleichmäßige Verteilung der gesamten Holznutzungen auf die einzelnen Perioden (Fache) der Einrichtungszeit bezweckt“ (S. 186).

3. Anders stellt sich Carl Heyer später zum Fachwerksbegriff. Im Jahr 1848 läßt er in einer besondern, den Methoden der Ertragsregelung gewidmeten Schrift (die Hauptmethoden der Waldertragsregelung 1848) die alte Einteilung und den bisherigen Begriff der Fachwerksmethoden fallen und faßt: Flächenteilung, Fachwerksmethode (Massenfachwerk) und Vereinigung beider — zusammen unter der Bezeichnung: „Fachwerksmethoden“, die er in „Flächenfachwerk“, „Massenfachwerk“ und „komponiertes Fachwerk“ teilt, wobei er die dem Fachwerk Hartigs und Cottas so charakteristische Perioden- oder Fächerbildung als nicht bezeichnend beiseite schiebt.

In dieser Rückkehr zur ursprünglichen Auffassung Hundeshagens scheint dem Verfasser derjenige Mangel an Folgerichtigkeit zu liegen, der die nachfolgende Verwirrung in erster Linie verschuldet haben mag. Hundeshagen hat allerdings die Bezeichnung zuerst in ganz allgemeinem Sinne für alle registrierenden Methoden, für alle Methoden, die räumliche und zeitliche

Ordnung vermengen, gebraucht, — zu einer Zeit, da noch keinerlei Klärung der Methoden vorlag; er hat aber später in seiner Encyklopädie selbst, und jedenfalls hat nach ihm der allgemeine Sprachgebrauch bei der Bezeichnung „Fachwerksmethoden“ stets nur an periodenbildende Methoden gedacht. H e y e r hätte diesem allgemeinen, den Begriff einschränkenden Sprachgebrauch folgen müssen, wie er es auch zu Anfang getan hatte; sobald er aber auf die ursprüngliche, ganz allgemeine Bedeutung des Worts zurückgehen wollte, wäre er auch genötigt gewesen, in seinem System der Methoden auf dasselbe — als nicht scharf bezeichnend — überhaupt zu verzichten, ist es ihm ja doch selbst nicht gelungen, eine scharfe Definition seines erweiterten Fachwerksbegriffs zu geben (Hauptmethoden . . . S. 63).

Ein solcher Verzicht ist nun aber gar nicht erforderlich, denn tatsächlich verband von jeher und verbindet heute noch der allgemeine Sprachgebrauch — ohne Rücksicht auf den unsicheren Begriff H e y e r s und der ihm folgenden Schriftsteller — ganz überwiegend, in Literatur und Praxis, mit der Bezeichnung „Fachwerk“ einen bestimmten, klar abgegrenzten Begriff, nämlich den des Periodenfachwerks (vgl. auch J u d e i c h, Thar: Jahrb. 1879).

Wollte man somit, was C. H e y e r sehr zweckmäßigerweise getan hat, die Bezeichnung „Fachwerk“ von der Massenmethode H a r t i g s, deren bezeichnendes Merkmal gegenüber den früheren einfachen Massenteilungsmethoden unzweifelhaft die Periodenbildung und Periodenausgleichung war, auf die Flächenmethoden übertragen, so konnte man dies unseres Erachtens doch nur solchen Methoden gegenüber tun, die — wie das typische Massenfachwerk — Perioden bilden, und diese, wie dort mit Massen, hier mit Flächen ausstatten, um alsdann daraus durch Ausgleich einen nachhaltigen Nutzungssatz abzuleiten.

C. H e y e r wollte nun aber die Periodenbildung nicht mehr als kennzeichnend anerkennen, und zwar weil er ihren Zweck nicht mitberücksichtigte. (Er hat sie jedoch bei der Definition des Massenfachwerks beibehalten!) Als Grund gibt er an, daß auch H u b e r Perioden bilde, während doch dessen Methode zweifellos keine Fachwerksmethode sei. Das ist richtig, aber H u b e r s Perioden sind keine Fachwerksperioden, weil sie nicht demselben Zweck, dem Ausgleich der Erträge im Interesse der Nachhaltigkeit dienen. Ebenso wenig, und zwar hier ohne Zweifel mit Recht, anerkennt H e y e r allgemeine periodische und jährliche Wirtschaftspläne als entscheidende Merkmale des Fachwerks, denn diese seien Gemeineigentum aller Methoden.

C a r l H e y e r gelangt denn auch, wie schon erwähnt, zu keinem scharfen, bündigen Begriff des Fachwerks; dasselbe umfaßt bei ihm sämtliche Teilungs- und Fachwerksmethoden. Diese Anschauungen sind in der Folge in die 2. Aufl. seines Lehrbuchs übergegangen, während die 3. Aufl. die Begriffsbestimmung D e n z i n s gibt und auch das Massenfachwerk nicht mehr nach H u n d e s h a g e n, sondern dem Flächenfachwerk analog definiert.

4. D e n z i n hat sich eingehend mit den Fachwerksmethoden beschäftigt (vgl. Allg. F. u. J. Ztg. 1874 bis 1877 (S. 44) und 1883 S. 294) und geht dabei

von Carl Heyers weiter Begriffsfassung aus. Er bezeichnet als einziges bezeichnendes Merkmal der Fachwerksmethoden: „sie sollen auf der Bedingung basieren, daß die Betriebsfläche im Lauf eines vorausbestimmten Zeitraums gerade einmal abgenutzt werde“, wobei er der „Betriebsfläche“ eine besondere Deutung gibt, um seine Begriffsbestimmung mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen.

Denzin anerkennt, wie Carl Heyer, die Periodenbildung nicht als kennzeichnendes Moment für das Fachwerk; er sagt, die periodische Ausgleichung habe den Fachwerksmethoden offenbar ihren Namen verschafft, „aber mit Unrecht, denn sie sei nur Hilfsmittel, nicht Endzweck, bestimmt und geeignet, die Auffindung des jährlichen Etats zu erleichtern“. Unseres Erachtens entscheidet aber beim Aufsuchen der bezeichnenden Unterscheidungsmerkmale für die Methoden der Ertragsregelung, die zu deren Begriffsbestimmung und zur Aufstellung eines Systems der Methoden führen sollen, nicht der „Endzweck“, denn er ist für alle Methoden mehr oder weniger derselbe, — nämlich die Anbahnung der Nachhaltigkeit durch entsprechende Nutzungsregelung —; kennzeichnend und entscheidend für Begriff wie für Gruppierung der Methoden scheint uns vielmehr der Weg, den die einzelnen Methoden einschlagen, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, den gemeinsamen Endzweck zu erfüllen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die periodische Ausgleichung ohne Zweifel ein entscheidendes Merkmal, das hat der allgemeine Sprachgebrauch längst erkannt.

So gelangt denn auch Denzin schließlich, infolge des mangelnden Einklangs seiner Begriffsbestimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch — Judeich sagt mit Recht: Thar. Jahrb. 1879, S. 101: „die von Denzin aufgestellten Diagnosen weisen auf ein Fachwerk ganz gewiß nicht hin“ —, zu dem, offenbar durch eine mißverständene Äußerung Judeichs angeregten Vorschlag, die althergebrachte Bezeichnung, mit der die große Mehrzahl der Schriftsteller und die Praxis einen ganz bestimmten Begriff verbinden, überhaupt aufzugeben und durch eine andere Bezeichnung zu ersetzen, — ein Weg, auf dem ihm niemand gefolgt ist, den insbesondere Stötzer mit Recht bekämpft (vgl. auch Borggreve, Forstabschätzung S. 150 ff.).

Auch auf die Unterteilung der Fachwerksmethoden mußte die Erweiterung des Begriffs im Sinne von Heyer und Denzin, welche die periodische Ausgleichung nicht als bezeichnendes Merkmal anerkennt, unheilvoll wirken. Hierbei konnte die Unterscheidung von Massenfachwerk, Flächenfachwerk und kombiniertem Fachwerk nicht auf die Art der Ausstattung der Perioden (mit Masse, Fläche oder mit beiden) allein bezogen werden, sondern es mußte auch die, beim Periodenfachwerk ganz unwesentliche Bestimmung des Jahresetats innerhalb der I. Periode nach Masse oder Fläche mitberücksichtigt werden, von der Judeich l. c. S. 107 mit Recht sagt: „Wie beide Fachwerksmethoden innerhalb der Periode die Jahre bedenken, ist Nebensache“. So entstand unter Denzins Hand ein ganzes System von kombinierten Methoden (siehe Denzin l. c. 1883 S. 292).

Denzins System hat außer bei Gustav Heyer (Waldertragsregelung 3. A. S. 290) keine Annahme gefunden und wurde insbesondere durch Stötzer (Forstw. Centralbl. 1884 S. 522) und Judeich (Forsteinrichtung 6. A. S. 331) zurückgewiesen.

5. Stötzer (l. c. S. 522) geht unter Hinweis auf Hundeshagen und andere von der Voraussetzung aus, daß für das Fachwerk der Betriebsplan die Grundlage bilde und die Ertragsberechnung durch ihn bedingt sei, während derselbe bei den Normalvorratsmethoden erst in zweiter Linie erscheine. Er betrachtet somit als bezeichnendes Merkmal der Fachwerksmethoden den zur Sicherung der Nachhaltigkeit dienenden „tabellarischen Plan“ mit Fächereinteilung und stellt ihnen einerseits die Schlageinteilung gegenüber, die sich zu gleichem Zweck örtlicher Einteilung des Walds bedient, und andererseits die Formelmethode, die den nachhaltigen Nutzungssatz aus dem „arithmetischen Verhältnis zwischen Vorrat und Zuwachs“ mit Hilfe einer Formel ableiten. Stötzer legt den Schwerpunkt auf den Tabellenplan und die mechanische Herleitung des Nutzungssatzes aus demselben; ersterer ist ihm entscheidendes Merkmal des Fachwerks und auf ihn gründet er sein System (l. c. S. 531).

Gegen die Annahme des Tabellenplans als eines entscheidenden Merkmals des Fachwerks hat sich schon Carl Heyer (Hauptmethoden . . . S. 63) ausgesprochen, da ein solcher Plan Gemeingut aller Methoden sei, „eher schon dürfte die Art der Benützung der Pläne einen wirklichen Unterschied begründen“. Und in der Tat stützt sich das Stötzersche System nicht auf das Vorhandensein des Betriebsplans an sich, sondern auf dessen Zweck und Verwendung bei Feststellung des Nutzungssatzes. Trotzdem möchten wir den Betriebsplan und die Ableitung des Nutzungssatzes aus ihm deshalb nicht als entscheidendes Moment betrachten, weil er lediglich eine äußere Form ist, in die sich die Etatsbestimmung kleidet, ähnlich der Formel bei den Normalvorratsmethoden, so daß innerhalb dieser Form Wege eingeschlagen werden können, die sehr verschiedenen Prinzipien folgen. Dieser Umstand führt denn auch dazu, daß die in ihrem Prinzip vom Fachwerk grundverschiedenen Altersklassenmethoden von Stötzer deshalb zu den Fachwerksmethoden gezählt und „unvollkommenes“ oder (da sie sich auf eine Periode beschränken) „beschränktes Fachwerk“ genannt werden, weil sie den Nutzungssatz mechanisch aus einem Tabellenplan ableiten, was doch nicht prinzipielle Bedeutung hat. (Vgl. auch Sieber, Allg. F. u. J. Ztg. 1903 S. 111.)

6. Judeich (Forsteinrichtung 6. A. S. 332), der die Vorzüge des Stötzerschen Systems, seine geschichtliche Grundlage und seine Einfachheit, vor andern hervorhebt, beanstandet nur, daß der Begriff des Fachwerks etwas zu weit ausgedehnt sei, so daß er auch Judeichs „Bestandeswirtschaft“ in sich schließt, die doch die Periodenteilung als Mittel zur Ertragsbestimmung nicht benützt. Er stellt die „Altersklassenmethoden“ dem Fachwerk selbständig gegenüber, als Methoden, welche die Abtriebsnutzung bestimmen auf Grund einer Vergleichung des wirklichen mit dem normalen Altersklassenverhältnis. Aus dieser Vergleichung

ergibt sich die Größe des Jahresschlags ohne die Notwendigkeit einer Verteilung von Fläche, Masse u. s. w. auf bestimmte Zeiträume.

Judeich definiert l. c. das Flächenfachwerk entsprechend der alten Begriffsbestimmung des Massenfachwerks. — Mangels eines voll zutreffenden Systems scheidet er alsdann in seinem Lehrbuch lediglich: Flächenmethoden, Massenmethoden, kombinierte Methoden und Werteinheitsmethoden, je nachdem sie der Ertragsregelung den Faktor der Fläche, der Masse u. s. w. zugrunde legen.

Mit Ausnahme der obengenannten — betrachten die meisten Schriftsteller die Periodenbildung als das entscheidende Merkmal der Fachwerksmethoden, so Pfeil, Grebe, Judeich, Borggreve, Graner, Weise, Weber (obgleich er die Begriffsbestimmung Denzins gibt), Martin, v. Guttenberg.

Daraus geht hervor, daß heute noch nicht volle Einigkeit über Einteilung und Benennung der Methoden der Ertragsregelung besteht, daß insbesondere noch Streit darüber herrscht, in welchem Verhältnis die sog. Altersklassenmethoden zu den Fachwerksmethoden stehen. Außerdem dürfte das Gesagte beweisen, daß die ganze Unklarheit und Meinungsverschiedenheit in bezug auf Einteilung der Methoden der Ertragsregelung zurückzuführen ist auf die verschiedenen Auffassungen über das Wesen des Fachwerks bzw. die Unklarheit darüber, was nun eigentlich „Fachwerk“ genannt wird.

Ehe die Methoden und ihre Bezeichnungen in ein System gebracht werden können, das eine allseitige Verständigung sichert, muß diese Frage entschieden sein, sowohl zu sicherer Abgrenzung des Fachwerks nach außen, wie zu klarer Unterteilung desselben nach innen. Entscheidend dafür sind: die geschichtliche Entwicklung und der herrschende Sprachgebrauch. Der letztere hindert uns in gleicher Weise, auf die erste, ganz allgemeine Bezeichnung Hundeshagens zurückzugreifen, wie Denzin zu folgen. Uns scheint vielmehr aus beiden Gesichtspunkten hervorzugehen, daß wir als „Fachwerk“ eine Methode zu bezeichnen haben, die auf dem Weg zur Nachhaltigkeit zunächst nur periodischen Ausgleich sucht und zu nachhaltiger Nutzung gelangt durch Zerlegen der Umtriebszeit in Nutzungsperioden und Aufteilen der ganzen Betriebsfläche unter dieselben, wozu sie sich als äußerer Form des Tabellenplans bedient (vgl. auch Borggreve, Forstabschätzung S. 121 und 152).

Diese Begriffsbestimmung schließt nicht allein die Schlageinteilung, sondern auch die Altersklassenmethoden aus, denn sie ist enger als diejenige Stötzers; wir glauben deshalb annehmen zu dürfen, daß Judeich derselben zugestimmt hätte, was auch aus seiner Begriffsbestimmung des Fachwerks auf S. 337 seines Lehrbuchs und seinen Ausführungen im Thar. Jahrb. 1879 S. 105 hervorgeht. Sie entspricht dem alten Fachwerkbegriff Heyers von 1841 und damit dem allgemeinen Sprachgebrauch, der unter „Fachwerk“ ausschließlich das Periodenfachwerk versteht. Auch dasjenige Merkmal, das Denzin als „einziges charakteristisches“ hervorhebt, die einmalige Abnutzung der ganzen Betriebs-

fläche in einem vorausbestimmten Zeitraum kommt in der „Aufteilung der Betriebsfläche“ zum Ausdruck. Doch handelt es sich hier um ein Merkmal, welches das Fachwerk mit der einfachen Teilung gemein hat, während Denzins Begriffsbestimmung das andere unterscheidende Merkmal, dem die Methoden ihren Namen verdanken, nicht gelten läßt, — die Aufteilung unter die Zeitfächer des Umtriebs. Die Periodenbildung ist für ihn, wie vor ihm für Carl Heyer, nicht bezeichnend; wir dagegen sehen im Uebergang von der Teilung in Einzeljahre zur Teilung in Perioden —, innerhalb deren wirtschaftlich, insbesondere waldbaulich freie Bewegung bleibt, — einen grundsätzlichen Schritt vorwärts in der Wahl des Wegs zur Nachhaltigkeit.

Wenn wir nunmehr zur Aufstellung eines Systems schreiten, so finden wir beim Ueberblick über die große Zahl der im Laufe der Zeit vorgeschlagenen und angewendeten Methoden der Ertragsregelung große Mannigfaltigkeit. Diese Methoden verfolgen verschiedene Wirtschaftsziele oder dieselben Ziele in verschiedenem Maß und auf verschiedenen Wegen, sie wählen zur Grundlage für die Ertragsregelung bald die Masse, bald die Fläche u. s. w., sie zeigen schließlich zahlreiche Uebergänge und Verbindungen.

Diese Vielgestaltigkeit in ein System zu bringen, das allen Anforderungen genügt, besonders auch kritische Betrachtung und Vergleichung der Gruppen und einzelnen Methoden gestattet, erscheint nur möglich auf der Grundlage eines allen gemeinsamen entscheidenden Wirtschaftsziels.

Dieses Wirtschaftsziel kann nur die **Nachhaltigkeit** sein (vgl. auch den Einteilungsgrund Stötzers, Forstw. Centralbl. 1884 S. 531). Das Streben nach Ausgleichung der Jahresnutzung allein ist es, das alle Methoden, wenn auch in verschiedenem Maße und gegebenenfalls nur bedingt (s. Judeich, Forsteinrichtung S. 429)¹⁾, gemein haben. Ihm verdanken sie ja auch ihre Entstehung.

Und wiederum können die Methoden der Ertragsregelung nur gekennzeichnet werden: durch die **verschiedenen Wege**, auf denen sie diesem gemeinsamen Ziele zustreben.

Wir müssen uns also, um ein Einteilungssystem zu finden, zuerst die Frage vorlegen: Welche grundsätzlich verschiedenen Wege werden von den vorhandenen Methoden eingeschlagen, um zu nachhaltiger Nutzung zu gelangen?

Sind wir mit Hilfe dieser Wege zur Bildung von Gruppen und deren Benennung gelangt, so können zur Unterteilung innerhalb der Gruppen sonstige bezeichnende Momente dienen, wie z. B. die Benützung des Faktors der Masse oder Fläche zur Ertragsausgleichung.

1) Die „Bestandeswirtschaft“ z. B. geht zunächst von dem Grundsatz aus, daß jeder Bestand für sich im aussetzenden Betrieb behandelt werden soll; unter dieser Voraussetzung gehört diese Methode überhaupt nicht in das nachfolgende System.

Nur auf dieser Grundlage gelangen wir zu einem System, das sich aufs beste mit der geschichtlichen Entwicklung und den eingebürgerten Begriffen und Bezeichnungen deckt, was unbedingt gefordert werden muß (vgl. auch Judeich, Forsteinr. S. 331, Stötzer l. c. S. 522). Das System wird dann bei den nachfolgenden kritischen Betrachtungen seine Probe zu bestehen haben.

Die verschiedenen Wege nun, die eingeschlagen worden sind, um bei Regelung des Ertrags dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu dienen, sind folgende ¹⁾:

1. Unmittelbares Aufteilen der Vorrats- und Zuwachsmassen unter die einzelnen Nutzungsjahre bestimmter Zeitabschnitte.

2. Aufteilen dieser Massen unter Herstellung des normalen Vorrats.

3. Zerlegen der Betriebsfläche in Jahres- oder Periodenschläge.

4. Zerlegen der Umtriebszeit in Nutzungsperioden und Aufteilen der ganzen Betriebsfläche unter dieselben mit Hilfe eines Tabellenplans.

5. Bestimmen der Nutzungsfläche für den nächsten Wirtschaftszeitraum so, daß durch dieselbe das vorhandene Altersklassenverhältnis dem Normalzustand zugeführt wird.

Daraus ergibt sich folgendes Einteilungssystem:

1. Die Massenteilungsmethoden

bestimmen die nachhaltige Nutzung auf dem Weg einfacher gleicher Aufteilung der Gesamtmasse von Vorrat und Zuwachs unter die einzelnen Nutzungsjahre des Berechnungszeitraums. Sie bilden die Vorstufe einerseits zu den Normalvorratsmethoden und andererseits zum Massenfachwerk.

Hierher gehören z. B. die Methoden von Beckmann, Trunk, von Wedell-Wiesenhavern, Maurer u. a. Einen Uebergang zum Massenfachwerk bildet die Methode Hennerts.

2. Die Normalvorratsmethoden

erstreben die Nachhaltigkeit durch Herstellen des Normalzustands auf dem Wege des Normalvorrats. Sie bestimmen die jährliche Nutzung aus Zuwachs und Vorrat mit Hilfe einer Formel so, daß sich allmählich der Normalvorrat einstellt.

Sie deshalb „Formelmethoden“ zu nennen, halten wir nicht für begründet, denn die Formel ist nicht das Entscheidende an der Methode, sondern nur ein kurz gefaßter Ausdruck der Beziehungen, in welche die bestimmenden Größen zur Jahresnutzung gebracht werden, also nur eine an sich entbehrliche Form, in die sich die Methoden im Interesse der Einfachheit kleiden.

¹⁾ Einige Methoden von geringerer theoretischer und praktischer Bedeutung sollen hier nicht berücksichtigt werden.

Die Methode von Brey mann, die sich ebenfalls der Formel bedient setzt an Stelle der Masse das Durchschnittsalter und schlägt damit einen eigenen Weg ein.

Zu dieser Gruppe gehören als wichtigste Methoden: die österreichische Kameraltaxe, die Hundeshagensche und die Carl Heyersche Methode.

Carl Heyer gibt seiner Formel ausdrücklich einen Betriebsplan bei, der mit der zeitlichen Ertragsregelung nichts zu tun hat, der also, wie Heyer selbst hervorhebt, das Grundsätzliche der Methode nicht berührt und ebensogut wegleiben könnte. Derselbe dient der räumlichen Ordnung des Betriebs und der Regelung der Betriebsausführung, — er ist später unter Gustav Heyers Hand zum reinen Fachwerksplan geworden.

Carl Heyer sagt selbst über diesen Betriebsplan in seiner Schrift: Hauptmethoden der Ertragsregelung 1848 S. 62: „Wir brauchen wohl nicht mehr besonders hervorzuheben, daß diese Pläne bei uns nicht Mittel zur Etatsbestimmung und -bemessung selbst, sondern nur dazu bestimmt sind, die Ergebnisse einer vorgängigen und mit allseitiger Berücksichtigung der hiebei entscheidenden Verhältnisse angelegten Waldertragsregelung nach Materialbetrag, Flächenraum und Zeit übersichtlich darzustellen“.

3. Die Flächenteilungsmethoden

bestimmen die nachhaltige Jahresnutzung durch unmittelbares Ausmessen von entsprechend großen Jahresschlägen, d. h. durch Aufteilen der Betriebsfläche unter die einzelnen Nutzungsjahre ohne Tabellenplan.

Hierher gehören die einfache Schlageinteilung und die Proportionalschlageinteilung, von denen die erstere auf gleiche jährliche Nutzungsflächen, die letztere auf jährliche Nutzungsflächen gleicher Ertragsfähigkeit, oder aber gleichwertiger Bestockung ausgeht, oder auch beide Momente berücksichtigt, wie Schilchers Methode.

4. Die Fachwerksmethoden

suchen zunächst nur periodischen Ausgleich und gelangen zu nachhaltiger Nutzung durch Zerlegen der Umtriebszeit in Nutzungsperioden und entsprechendes Aufteilen der ganzen Betriebsfläche unter dieselben. Dazu bedienen sie sich eines Tabellenplans.

Das Zerlegen der Umtriebszeit in Nutzungsperioden und das Beschränken von Aufteilung der Betriebsfläche und Ausgleich auf diese Perioden bedeutet, geschichtlich betrachtet, einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der Teilung in Einzeljahre (Judeich, Thar. Jahrb. 1879 S. 102), für die Ertragsregelung, wie in waldbaulicher Beziehung. Die Periodenbildung entsprach einem dringenden Bedürfnis des Hochwaldbetriebs, und es verdient deshalb dieser Weg zu nachhaltiger Nutzung besonders hervorgehoben und der einfachen Teilung gegenübergestellt zu werden. So kommt es auch, daß diese Periodenbildung als

hervorstechendste Eigenschaft den Methoden ihren Namen gegeben hat, und wenn auch H u n d e s h a g e n ursprünglich alle registrierenden Methoden mit eingeschlossen hatte, so hat er doch die Periodenbildung in erster Linie im Auge gehabt, denn von „unendlich vielem Registrieren und Fachwerk“ konnte er doch nur bei ihr sprechen. So haben denn auch Literatur und Praxis in richtiger Würdigung der Periodenbildung als des die Fachwerksmethoden kennzeichnenden Moments die Benennung in diesem engeren Sinn beibehalten.

Zur Abgrenzung der Fachwerksmethoden gegen die Teilungsmethoden ist zu bemerken, daß für die Zugehörigkeit zum Fachwerk an sich noch nicht entscheidend ist, ob die Methoden Nutzungsperioden bilden und die Gesamtfläche unter sie aufteilen, sondern, ob dies der Weg für sie ist, um zur Nachhaltigkeit zu gelangen, ob also ein Ausgleich zwischen den Perioden im Interesse der Nachhaltigkeit stattfindet, oder nicht.

So gehören z. B. die Methoden v. W e d e l l s und M a u r e r s nicht zu den Fachwerksmethoden, obgleich sie Altersklassen bilden, weil sie nur innerhalb derselben den Nutzungssatz feststellen, ohne einen Ausgleich im Interesse der Nachhaltigkeit vorzunehmen. Die erstere Methode dient eher dem Interesse der Wirtschaftlichkeit insofern sie fordert, daß die Nutzung in der einzelnen Altersklasse gegebenenfalls unter Verkleinerung des Etats so lange festgehalten werden soll, bis in der nächsten haubares Holz vorhanden ist.

Anders die Methode H e n n e r t s. Sie bildet einen Uebergang von der Massenteilung zum Massenfachwerk; sie bestimmt zunächst die Nutzungssätze für die einzelnen Altersklassen, beruhigt sich aber nicht bei deren verschiedener Größe, sondern berechnet den nachhaltigen Nutzungssatz des ganzen Umtriebs und sucht nun Nutzungsperioden mit gleichen Sätzen zu gewinnen, benützt also, wenn auch noch unklar und unbestimmt, die Klassen gegebenenfalls zum Massenausgleich.

Zum Fachwerk gehören ferner nicht die sog. „Periodenschläge“ (vgl. J u d e i c h, Thar. Jahrb. 1879 S. 102), obgleich sie eine Uebergangsform zum Flächenfachwerk bilden, da diese Vereinigung von Jahresschlägen nicht dem Zweck der Ertragsausgleichung, sondern bloß dem der Verjüngung dient. Ueberdies wird hier die Feststellung des nachhaltigen Nutzungssatzes nicht durch einen Tabellenplan vermittelt.

Für die Unterteilung der Fachwerksmethoden ist nun weiterhin bestimmend der Maßstab, nach dem die Aufteilung der Betriebsfläche unter die Perioden und der Ausgleich im Interesse der Nachhaltigkeit erfolgt, also Masse, Fläche, Wert. Kein kennzeichnendes Merkmal scheint uns dagegen der Maßstab zu sein, nach dem die weitere Teilung innerhalb der ersten Periode erfolgt und in dem sich dann der jährliche Nutzungssatz ausdrückt (Flächenetat oder Massenetat) vgl. J u d e i c h l. c. S. 107.

So gelangen wir zu folgenden Fachwerksmethoden:

a. Das Massenfachwerk

ist gekennzeichnet durch Aufteilen der Betriebsfläche unter die Perioden nach Maßgabe der denselben zufallenden Nutzungsmassen.

Hier werden die einzelnen Waldflächen¹⁾ nach ihren Nutzungsmassen den Perioden zugeteilt und findet im Interesse der Nachhaltigkeit ein Massenausgleich statt, durch Verschieben geeigneter Waldflächen zwischen den Perioden.

Innerhalb der ersten Periode kann nun weiterhin der Nutzungsausgleich erfolgen: entweder nach dem Faktor der Masse, — wir erhalten einen Massenetat, wie z. B. beim Massenfachwerk Hartigs; oder nach dem der Fläche — mit Flächenetat, ohne daß das Prinzip des Massenfachwerks davon berührt wird.

b. Das Flächenfachwerk

zeigt ein Aufteilen der Betriebsfläche unter die Perioden nach Maßgabe der denselben zufallenden Flächengrößen. Hier findet im Interesse der Nachhaltigkeit Ausgleich der Flächenmaße zwischen den Perioden statt durch Verschieben geeigneter Bestände zwischen denselben.

Innerhalb der nächsten Periode kann auch hier die Jahresnutzung als Massen- oder Flächenetat festgestellt werden, ohne daß dies für die Methode von grundsätzlicher Bedeutung wäre.

Judeich schildert in seinem Lehrbuch dieses Flächenfachwerk. Das Beispiel, das er im Anschluß mitteilt (S. 346) und in dem er, nach Zuteilung und Ausgleich der Nutzungsflächen sämtlicher Perioden, für die drei ersten derselben auch noch die Massen berechnet, kann irreführen. Es ist aber trotz dieser Berechnung der Massen für mehrere Perioden ein Flächenfachwerk und kein kombiniertes Fachwerk, das hier angewendet wird, wie Stötzer annimmt (Lehrb. S. 200), weil kein Massenausgleich zwischen den Perioden stattfindet, die Massen also nicht zur Förderung der Nachhaltigkeit benützt werden. Der Anbahnung der Nachhaltigkeit dient vielmehr nur das Flächenmaß. Die Massen wurden wohl nur deshalb für mehrere Perioden berechnet, um den mangelhaften Erfolg des Flächenfachwerks in bezug auf Ausgleich der Massenerträge im ersten Umtrieb darzutun.

c. Das kombinierte Fachwerk

besteht im Aufteilen der Betriebsfläche unter die Nutzungsperioden mit Berücksichtigung beider Faktoren — der Masse und des Flächenmaßes — beim Ausgleich im Interesse der Nachhaltigkeit.

Hier wird bei Ausstattung der Perioden der Einfluß beider Maßstäbe

1) Das Wort „Fläche“ wird in doppeltem Sinne gebraucht, einmal versteht man darunter die Fläche in concreto, ebenso aber auch das Flächenmaß. Das kann zu Unklarheiten führen. Wir sprechen hier deshalb absichtlich von „Waldflächen“ = konkreten Flächen und nicht, wie üblich, von Beständen, um zu zeigen, daß auch das Massenfachwerk eine Aufteilung der Flächen vornimmt, wenn es auch nicht nach dem Flächenmaß ausgleicht.

auf die Ausgleichung der Erträge in eigenartiger Weise verbunden, mit dem Ergebnis, daß der Faktor der Masse mehr auf die Ertragsregelung der nächsten Perioden, derjenige der Fläche mehr auf die fernere Zukunft (spätere Perioden und zweiter Umtrieb) Einfluß nimmt.

Ob Massen zuteilung und -ausgleich sich auf sämtliche Perioden erstreckt oder auf die 2—3 nächstliegenden beschränkt, ist ohne grundsätzliche Bedeutung. Weshalb wir dagegen eine Beschränkung der Flächen zuteilung oder das Zusammenfassen mehrerer Perioden zu diesem Zweck für unzulässig halten, davon später (S. 346). Ebenso darf beim kombinierten Fachwerk eine Beschränkung der Massenberechnung auf die nächste Periode allein nicht stattfinden, da in diesem Fall ein Massenausgleich zwischen den Perioden im Interesse der Nachhaltigkeit nicht mehr möglich ist. Das beim kombinierten Fachwerk vielfach hervortretende Streben, die Massenberechnung auf die erste Periode zu beschränken und der Nachhaltigkeit nur durch Ausstatten der späteren Perioden mit entsprechenden Flächen zu dienen, führt eben zum reinen Flächenfachwerk zurück.

Auf eine weitere Unterart des Fachwerks soll hier nicht eingegangen werden.

Von den Fachwerksmethoden geht das Massenfachwerk unmittelbar auf sein Ziel gleicher Nutzungsmassen für die Perioden los, indem es einfach durch Zuteilung entsprechender Nutzungsobjekte Massenausgleich zwischen denselben herstellt. Anders verfahren Flächenfachwerk und kombiniertes Fachwerk. Beide streben zunächst einer Anbahnung normaler Altersklassen nach Flächenausdehnung und Lagerung zu, durch Ausstattung der Perioden mit gleichen Flächenmaßen und mit Waldflächen von entsprechender räumlicher Lagerung, und gelangen so auf dem Umweg über den Normalzustand zur Nachhaltigkeit in späterer Zeit, während das kombinierte Fachwerk dazu noch, soweit möglich, einen Massenausgleich für die nähere Zukunft, also zwischen den nächsten Perioden sucht.

5. Die Altersklassenmethoden.

(Judeich, Forsteinrichtung S. 414.)

Zu nachhaltiger Nutzung führt endlich die unmittelbare Einwirkung auf das Altersklassenverhältnis. Sein Normalzustand soll dadurch allmählich hergestellt werden, daß die Nutzungsfläche für einen nächsten kurzen Nutzungszeitraum in entsprechender Größe festgesetzt wird. Dabei wird die Periodenbildung und die Aufteilung der Betriebsfläche unter diese Perioden grundsätzlich unterlassen und auf das Herstellen räumlicher Ordnung durch diese Aufteilung verzichtet, wovon später die Rede sein soll.

Die Altersklassenmethoden bestimmen die nachhaltige Jahresnutzung für den nächsten Wirtschaftszeitraum aus der demselben zufallenden Nutzungsfläche; diese aber wird zuvor an der Hand des wirklichen Altersklassenverhältnisses so festgesetzt, daß die Altersklassen in kürzester Zeit und mit geringsten

Opfern den Normalzustand erreichen; diese Methoden weisen ferner dem Wirtschaftszeitraum eine entsprechende Zahl von Nutzungsbeständen zu.

Die räumliche Ordnung, die den ungestörten Fortgang der Nutzungen zu sichern hat, und die eine weitere Hauptbedingung für den Normalzustand der Altersklassen ist, überlassen diese Methoden im Gegensatz zum Flächen- und kombinierten Fachwerk anderweitiger Regelung, und unterstützen dieselbe durch entsprechende Auswahl der Nutzungsbestände für den Hauungsplan.

Nach Judeich soll sich der Nutzungssatz aus dem Entwurf des Hauungsplans ergeben, geregelt durch den normalen Jahresschlag.

Zu den Methoden dieser Gruppe gehören:

Das „ältere“ sächsische Verfahren (Judeich l. c. S. 415), das neue württembergische Verfahren (vgl. H. Speidel, Allg. F. u. J. Ztg. 1893 S. 145; das Verfahren entspricht im allgemeinen den dort geforderten Aenderungen am bestehenden kombinierten Fachwerk) und Judeichs Bestandeswirtschaft.

Diese Methoden versehen lediglich den nächsten Nutzungszeitraum mit einem Flächenanteil, welcher der Nachhaltigkeit dadurch dient, daß er die Normalität des Altersklassenverhältnisses fördert, und zwar geschieht dies seitens der „Bestandeswirtschaft“, soweit sie nicht aussetzenden Betrieb der Einzelfläche voraussetzt (Judeich l. c. S. 429), in gleicher Weise, wie bei den beiden erstgenannten Methoden, nur daß sie dabei das Prinzip der Wirtschaftlichkeit voranstellt.

II. Das Verhältnis der Methoden der Ertragsregelung zur räumlichen Ordnung.

Aufgabe dieser Methoden ist das zeitliche Ordnen der Abnutzung des Waldes im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips, eine Aufgabe, die nicht durchführbar ist — wie schon aus den Betrachtungen der früheren Abschnitte, insbesondere des 2. Abschnitts hervorgeht — ohne Voraussetzung einer gewissen räumlichen Ordnung, zumal im schlagweisen Hochwald, wo die Einheiten der Abnutzung, die Bestände, in vielfachem Abhängigkeitsverhältnis zu einander stehen. So kommt es, daß die meisten der besprochenen Methoden sich die Aufgabe stellen, neben ihrem Hauptziel der zeitlichen Ertragsregelung — und um diesem zu dienen — auch noch für räumliche Ordnung zu sorgen. Sie üben dementsprechend einen so entscheidenden Einfluß auch auf die räumliche Ordnung aus, daß wir sie besser nach Graners Vorgang (Forstbetriebseinrichtung 1889 S. 99) „Methoden der Betriebseinrichtung“ nennen würden, weil hier mit der Ertragsregelung zusammen tatsächlich der ganze Betrieb geordnet wird.

Doch gilt dies nicht für alle Methoden, wir können vielmehr scheiden:

1. Methoden, die sich nur die zeitliche Ordnung des Betriebs zur Aufgabe machen, sich auf Feststellung des nachhaltigen Nutzungssatzes beschränken, und

2. Methoden, die räumliche und zeitliche Ordnung gleich-

zeitig, d. h. in einem Akt anstreben, bzw. mit der Ertragsregelung die Einwirkung auf die räumliche Ordnung im Wald verbinden.

Diese Scheidung soll bei der nachfolgenden Besprechung des Verhältnisses der einzelnen Methoden zur räumlichen Ordnung beibehalten werden. Sie deckt sich wohl, um dies hier nur zu erwähnen, mit der ursprünglichen Scheidung Hundeshagens von „Fachwerksmethoden“ und „rationellen Methoden“, der Teilung v. Wedekinds (Anleitung zur Betriebsregulierung und Holzertragschätzung der Forste 1834) und der Unterscheidung von „mechanischer“ und „rechnerischer“ Herleitung des Nutzungssatzes.

1. Methoden, die sich auf Ermittlung des nachhaltigen Hiebssatzes beschränken.

Hierher gehören die Massenteilungsmethoden und die Normalvorratsmethoden.

Was insbesondere die letzteren betrifft, so beschränken sie sich auf Feststellung des jährlichen Nutzungssatzes und verschmähen es ausdrücklich, bei der zeitlichen Ertragsregelung in demselben Akt gleichzeitig auf die räumliche Ordnung einzuwirken, woraus aber nicht zu folgern ist, daß ihre Vertreter die räumliche Ordnung darum geringer achten oder sie gar überhaupt für entbehrlich halten.

Man hat vom Standpunkt des Fachwerks aus den Normalvorratsmethoden den Vorwurf gemacht, daß sie die räumliche Ordnung vernachlässigen, unseres Erachtens mit Unrecht.

Die Normalvorratsmethoden erachten es einfach nicht als ihre Aufgabe, gleichzeitig der Ertragsbestimmung und der räumlichen Ordnung zu dienen; sie beschränken sich vielmehr — und darin muß ihnen vollkommen Recht gegeben werden — auf ihre eigenste Aufgabe, die zeitliche Regelung des Ertrags, und vermeiden es grundsätzlich, zwei Aufgaben zu verquicken, die von ganz verschiedenen Grundlagen ausgehen und ganz verschiedenen Zielen folgen.

In dieser Beziehung war Hundeshagen unseres Erachtens vollkommen berechtigt, seine Methode im Gegensatz zum Fachwerk seiner Zeit die „rationelle“ zu nennen.

Daß beide Aufgaben nichts mit einander zu tun haben, geht, wie bereits in der Einleitung hervorgehoben wurde, schon daraus hervor, daß die Ertragsregelung zu erfolgen hat unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, während die räumliche Ordnung das Ergebnis ist, oder doch sein sollte, von Erwägungen ganz anderer Art; sie ist abzuleiten in erster Linie aus Forderungen von Waldbau, Forstschutz, Forstbenutzung und Betriebsführung. Eine an sich überflüssige, unlösbare Vermengung dieser verschiedenen Aufgaben, wie wir sie nachher kennen lernen werden, kann nur zur Unklar-

heit und Verwirrung der einzelnen Gesichtspunkte führen und zur Hintansetzung des einen zugunsten des andern.

Jedes „Verfahren der Forsteinrichtung“ besteht aus 2 Teilen:

1. dem Ordnen des Betriebs in räumlicher Beziehung,
2. der angewendeten Methode der (zeitlichen) Ertragsregelung.

Ein Vorwurf an diese letztere Methode, daß sie die räumliche Ordnung vernachlässige, ist daher überhaupt nicht statthaft, dieser Vorwurf kann sich nur an das ganze Einrichtungsverfahren richten. Beide werden aber leider meist gleichgesetzt, da nirgends auf eine klare Trennung beider Aufgaben — der räumlichen und zeitlichen Ordnung — gedrungen wird.

Daß auch bei Aufstellung der Vorratsmethoden die Notwendigkeit einer Regelung der räumlichen Ordnung nicht vergessen worden ist, zeigen deren vornehmste Vertreter aufs klarste: *Hundeshagen* und *Carl Heyer*. Ebenso geht aber auch aus den Ausführungen dieser Männer hervor, daß sie eine Vermengung der Pflege der räumlichen und der zeitlichen Ordnung nicht wollten und nicht für zweckmäßig hielten.

Insbesondere gilt dies von *Hundeshagen*. Er weist in seiner Forstabschätzung (1826 S. 236) den Vorwurf zurück, als ob seiner Einrichtung gerade diejenigen Momente fehlten, die „Plan und Ordnung“ in die Wirtschaft bringen. Er will diese Momente, die räumliche Ordnung, nur nicht mit der Ertragsermittlung verquicken, und geht von dem richtigen Grundsatz aus, daß ihre Regelung größerer Freiheit und Einwirkung der äußeren Verwaltung bedürfe, als die Ertragsbestimmung gewähren kann. *Hundeshagen* will grundsätzlich dem Verwaltungspersonal die Wahl der Hiebsorte überlassen (d. h. es sollen waldbäuliche und andere Gesichtspunkte maßgebend sein) und die Wirtschaft nicht auf bestimmte Flächen festlegen, da die künftige Behandlung sich nicht voraussehen lasse. „Wenn der Techniker erst weiß, wieviel er fällen soll, so wird es ihm nicht schwer halten, diejenigen Bestandesabteilungen herauszufinden, die sich am besten eignen“. Ferner will *Hundeshagen* (Encyklopädie der Forstwissenschaft 1821 S. 545) den Betrieb vor Festsetzung des Nutzungssatzes geordnet wissen, und zwar „soll mit größter Umsicht erwogen werden, auf welche Weise jeder einzelne Forstteil am zweckmäßigsten für den höchsten Ertrag der ganzen Wirtschaft benützt werden könne“, es werden Betriebsklassen gebildet, es werden allgemeine Regeln für Anlage und Reihenfolge der Schläge und Kulturen aufgestellt u. s. w., allerdings nicht in der bindenden Art des Fachwerks. Von dieser Tätigkeit unabhängig erfolgt dann die Ertragsregelung durch Rechnung mit Hilfe der Formel.

Wenn sich weiterhin *Hundeshagen* darauf beschränkt, den Betriebsplan auf 10 Jahre festzulegen, „um der Einsicht des Verwaltungspersonals nicht vorzugreifen“ (d. h. um der Wandelbarkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse Rechnung zu tragen), so zeugt diese mehrfach angegriffene Bestimmung, wie die ganze Stellung *Hundeshagens* zur Forsteinrichtung unseres Erachtens von hoher wirtschaftlicher Einsicht, die der Zeit weit vorausgeeilt war.

Carl Heyer (Waldertragsregelung 1. A. S. 235) gibt seiner Formel aus-

drücklich einen Betriebsplan bei; „obgleich seine Anfertigung gerade nicht durch das Prinzip der Methode bedingt wird, so ist sie doch aus . . . Gründen für deren wirtschaftliche Nützlichkeit und Notwendigkeit nicht zu unterlassen“. Dieser Betriebsplan soll neben Beschaffung der Formelgrößen besonders der Herstellung räumlicher Ordnung dienen, weil, wie Heyer ausdrücklich hervorhebt, die praktische Etatsordnung mit gutem Erfolg in die engen Grenzen einer mathematischen Formel sich nicht einzwängen lasse.

Uebrigens zeigen die Anschauungen Carl Heyers (Lehrbuch . . . I. A. S. 5 und Methoden der Waldertragsregelung S. 11) nicht mehr den klaren Blick in bezug auf das Verhältnis der räumlichen zur zeitlichen Ordnung im Wald, der Hundeshagen ausgezeichnet hatte. Denn jener will zwar — ein an sich richtiger Gedanke — das natürliche Prinzip bei der Ertragsregelung ausdrücklich ausgeschaltet wissen, — bekämpft er doch am letzteren Orte (S. VI) die oben zitierte These 4. Cottas, „durch welche man sich zu der Annahme habe hinreißen lassen, der Waldbau sei viel wichtiger als die Waldertragsregelung, ja letztere in der Regel ganz entbehrlich“, — bezeichnet aber trotzdem als Aufgabe der Ertragsregelung: „Das Einkommen aus den Wäldern zu bemessen und den Ertrag derselben räumlich und zeitlich zu ordnen“, wie er auch in seinem „Lehrbuch der Waldertragsregelung“ die Besprechung der gesamten Regelung der räumlichen Ordnung nicht umgehen kann. Damit aber gerät diese ganz in den Dienst der Ertragsregelung, die sie bestimmenden produktiven Momente werden zurückgedrängt.

Der Betriebsplan selbst aber, den Carl Heyer seiner Formel beigibt, wurde späterhin, wie schon erwähnt, unter Gustav Heyers Hand zum reinen Fachwerksplan; für ihn gilt, was bezüglich des Fachwerks gesagt werden soll.

Aus dem Vorstehenden geht hervor, daß beide Schriftsteller den Betriebsplan, der für räumliche Ordnung sorgt, als eine notwendige Ergänzung ihrer Methoden betrachten, jedoch ohne daß er ihnen ein grundsätzliches Erfordernis wäre, weil sich ihre Methoden ausschließlich mit der zeitlichen Ordnung befassen.

Bezeichnend scheint uns, daß gerade diese beiden wissenschaftlich höchststehenden Männer der älteren Zeit, Hundeshagen und Carl Heyer, zu den Normalvorratsmethoden geführt wurden und damit zu einer Trennung der Pflege räumlicher und zeitlicher Ordnung im Wald, wenn auch ihre mehr spekulative Art, die Aufgabe der Ertragsregelung zu lösen, im praktischen Betrieb auf Schwierigkeiten stieß. Im Gegensatz zur Wissenschaft wendete sich alles, was vorwiegend von der Praxis ausging, dem schematisierenden Fachwerk zu, das mit seiner greifbareren räumlichen Grundlage, der Fläche, leichter in der Praxis zu handhaben war und zu größerer Uebersichtlichkeit führte.

Und doch hatte die wissenschaftliche Spekulation den richtigen Weg eingeschlagen, wie nicht anders zu erwarten ist, da ihr Blick das Ganze zu umfassen vermag und nicht durch näherliegende Sorgen des praktischen Wirtschaftsbetriebs getrübt und abgelenkt wird, wie die von der Praxis ausgehende

und ausschließlich auf ihr aufbauende Empirie. Nur hat erstere es nicht verstanden, ihren Weg für die Praxis gangbar zu machen, weil sie deren Bedürfnissen zu ferne stand¹⁾).

2. Methoden, die mit der Ertragsregelung eine Einwirkung auf die räumliche Ordnung im Wald verbinden.

Während die besprochenen Methoden, die sich geringer praktischer Bewertung erfreuen, sich einer Vermengung der Sorge für räumliche und zeitliche Ordnung grundsätzlich enthalten, sind es gerade die von jeher und heute noch im Wald herrschenden Methoden, die in mehr oder weniger ausgeprägter Form beide Ziele gemeinsam anstreben. Es sind: die Flächenteilungsmethoden, die Fachwerks- und die Altersklassenmethoden. Sie müssen einer näheren Betrachtung unterzogen werden:

a. Die Flächenteilungsmethoden.

Die Schlageinteilung zeigt uns das Bild vollkommenster Vereinigung der Sorge für räumliche und zeitliche Ordnung. In dem einen Akt der Aufteilung der Betriebsfläche in Jahresschläge wird gleichzeitig die räumliche Ordnung im Wald bestimmt und die zeitliche Ertragsregelung vorgenommen, und zwar erfolgt die Aufteilung allein vom Gesichtspunkt der letzteren aus — wir haben eine vollkommene Unterordnung der Momente der räumlichen Ordnung (also der produktiven!) unter diejenigen der zeitlichen Ordnung vor uns, eine Unterordnung, wie sie nur der unverwüsthche Niederwald und Mittelwald ertragen.

b. Die Fachwerksmethoden.

Sie sind nach unserer Begriffsbestimmung gekennzeichnet durch ein Aufteilen der gesamten Betriebsfläche unter die hiezu gebildeten Nutzungsperioden mit entsprechendem Ausgleich. Einheiten für die Aufteilung sind die gleichartig bestockten Teile der Betriebsfläche, die Bestände, Abteilungen u. s. w.²⁾). Durch das Verteilen dieser Einheiten unter die Nutzungsperioden des Umtriebs ist die räumliche Folge der Abnutzung und aller mit ihr zusammenhängenden Betriebsarbeiten, sowie die räumliche Stellung der Altersklassen, also die

1) Wenn daher die Normalvorratsmethoden ganz allgemein als „Notbehelf für noch wenig entwickelte forstwirtschaftliche Zustände“ bezeichnet werden (vgl. Gräner, Forstbetriebseinrichtung S. 111), so möchten wir im Gegenteil darauf hinweisen, daß diese Methoden einen Weg eingeschlagen haben, der eine viel höhere Entwicklung der Forstwirtschaft voraussetzt, als sie bis heute erreicht ist. Die Methoden setzen nämlich vollen Einblick in Zuwachs und Ertrag von Holzarten und Standorten voraus, den wir mangels guter örtlicher Ertragsstatistik leider heute noch nicht besitzen. Ist dies einst der Fall, so wird sich die Ertragsregelung ganz von selbst dem von jenen Methoden eingeschlagenen Wege zuwenden.

2) Damit erweisen sich die Fachwerksmethoden ausschließlich nur anwendbar auf den Großschlag—Hochwald.

räumliche Ordnung im Walde selbst gegeben. Die Aufteilung selbst aber dient in erster Linie dem Zweck zeitlicher Ertragsregelung.

Also auch hier finden wir, ähnlich wie bei der Schlageinteilung, eine untrennbar vereinigte Pflege der räumlichen und zeitlichen Ordnung und ebenso eine Ueberordnung der Zwecke der zeitlichen Ertragsregelung über diejenigen der räumlichen Ordnung. Das Fachwerk schlägt für seine zeitliche Ertragsregelung einen Weg ein, der eine gleichzeitige Entscheidung über die räumliche Ordnung ohne weiteres mit sich bringt.

Im übrigen verhalten sich die verschiedenen Fachwerksmethoden der räumlichen Ordnung gegenüber sehr verschieden:

Das Massenfachwerk

weist bestimmte Waldflächen mit ihren Massen den einzelnen Nutzungsperioden zu. Es hat mit den übrigen Fachwerksmethoden nur das eine Prinzip der Teilung der Umtriebszeit in Nutzungsperioden und der Aufteilung der Betriebsfläche unter diese gemein, im übrigen geht es eigene Wege und bedarf von unserem Gesichtspunkt aus getrennter Betrachtung.

Das Massenfachwerk kümmert sich — von sich aus — nicht, oder nur wenig um die räumliche Ordnung im Walde, nimmt — gleichaltrigen Hochwald vorausgesetzt — im allgemeinen die gegebene hin (vgl. G. L. Hartig, Anweisung zur Taxation 3. A. 1813 S. 23, sowie Judeich, Thar. Jahrb. 1879 S. 120). Carl Heyer sagt von ihm (Hauptmethoden . . 1848 S. 87), daß ihm alle Faktoren des Waldnormalzustands fremd seien.

Es wirkt aber als echte Fachwerksmethode (s. oben) mittelbar dadurch auf die räumliche Ordnung, daß es bestimmte Waldflächen bestimmten Zeitperioden zur Abnutzung zuweist, also sowohl die räumliche Folge der Hauungen und damit die künftige Altersklassenlagerung beeinflusst, als auch innerhalb der einzelnen Waldflächen die Verjüngungsdauer, und damit das räumliche Vorgehen auf der Fläche, in bestimmte Schranken legt.

Dadurch aber wirkt das Massenfachwerk einmal fortschrittswidrig auf die räumliche Ordnung, weil es sich vorwiegend auf den zufällig vorhandenen Waldzustand stützt und von sich aus nicht darauf ausgeht, denselben zu verbessern, — es wirkt wohl ändernd auf die Ausdehnung, nicht aber auf die Verteilung und Lagerung der Altersklassen — und dann geradezu schädlich, weil es den Verjüngungsgang der einzelnen Waldfläche schematisch beschränkt.

Wir haben dem Massenfachwerk mangelnde Kraft in bezug auf Besserung der räumlichen Ordnung nachgesagt, und doch hat G. L. Hartig, der vornehmste Vertreter dieser Methode, auch auf die räumliche Ordnung zu wirken gesucht. Während anfangs sein Auge vornehmlich auf Ausgleichung der Erträge und Abtrieb der Bestände zur Zeit ihrer Hiebsreife, also auf die zeitliche Ordnung als Hauptziel gerichtet war und jede Rücksicht auf räumliche Ordnung fehlte, fordert er später wenigstens einen vorläufigen Betriebs-

plan mit einer Waldeinteilung — zur Orientierung, für wirtschaftliche Zwecke und gegen Gefahren, aber ohne Ordnung der Hiebsfolge. Seine Einwirkung auf die räumliche Ordnung — in unsereff Sinn — bewegte sich nach der Richtung tunlichster Vereinigung der Altersklassen (l. c. S. 14, 93 und: Die Forstwissenschaft in ihrem ganzen Umfang 1831 S. 212), und zwar erstrebte er sie nur aus rein betriebstechnischen Gründen, nicht aber zugunsten der Produktion.

Hartig betrachtete als beste räumliche Bestandesordnung eine solche, bei der alle Bestände einer Periode eine zusammenhängende Fläche bilden, so daß die einzelnen Schläge unmittelbar aneinandergereiht werden können. Er fordert die Einteilung des Walds in Distrikte von 150—200 Morgen, die gleichen Holzbestand erhalten und die Einheiten bilden sollen für Ausstattung der Perioden. Diese Distriktsbildung fordert er für Zwecke der Orientierung und Kontrolle, des Ueberblicks über den Betrieb und eines gleichmäßigen periodischen Ertrags.

Diese allerdings nicht dem Prinzip des Massenfachwerks entspringende Lehre „des wünschenswerten Zusammenhangs der periodischen Wirtschaftsteile“, d. h. der Vereinigung der Altersklassen, mußte um so verhängnisvoller wirken, als ihre praktische Geltung in die Zeit häufigen Uebergangs aus Blenderwald, Mittelwald und Niederwald in gleichaltrigen Hochwald fiel, in der dieses naturfeindliche Ziel am leichtesten gefördert werden konnte. So wurde das Massenfachwerk der Ausgangspunkt für eine Art von räumlicher Ordnung im Wald, an deren Folgen unsere Wirtschaft noch heute vielfach krankt.

Die Schädlichkeit dieser Hartigschen Lehre für Wald und Wirtschaft ist denn auch längst allgemein erkannt; die Einwirkung auf die räumliche Ordnung bewegt sich fast überall in genau entgegengesetzter Richtung, auch hat diese Lehre in neuerer Zeit nur noch wenige Vertreter gefunden.

Da muß es auffallen, wenn von neuem wieder Kautzsch (Allg. F. u. J. Ztg. 1893 S. 351), ein Mann, der wirtschaftlichen Zwang so scharf empfindet, der Ansicht Ausdruck gibt, es sei noch gar nicht ausgemacht, ob das alte Hartigsche Streben, die einzelnen Altersklassen, jede auf großer zusammenhängender Fläche auftreten zu lassen, bei der Tanne in jedem Fall so sehr unangebracht sei. Man müsse abwarten, ob die Bildung von Hiebszügen gelinge.

Kautzsch will sich offenbar durch Flucht auf die große Fläche dem beengenden Zwang des Fachwerks entziehen, der insbesondere in dessen Hiebsfolge liegt. Ob er aber dort nach jeder Richtung freie Wirtschaft finden würde — es sei denn bei blenderartigem Betrieb — darf nach unseren früheren Ausführungen füglich bezweifelt werden, denn wir möchten gerade die Großflächen-Hiebsfolge des Fachwerks für den Zwang verantwortlich machen.

Weit mehr, als das auf die Masse sich stützende Fachwerk, sehen sich natürlich die ganz oder teilweise auf den Flächenfaktor gegründeten Methoden auf Pflege auch der räumlichen Ordnung hingewiesen:

Das Flächenfachwerk und das kombinierte Fachwerk.

Beide sind sich nahe verwandt und verhalten sich der räumlichen Ordnung gegenüber durchaus gleich. Wir können sie daher für unsere weiteren Betrachtungen zusammenfassen, und wenn wir weiterhin kurz von „Fachwerk“ sprechen, so verstehen wir darunter, wie dies heute auch dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht, eben diese beiden Methoden.

Diese Methoden ziehen die Folgerungen aus dem von ihnen beschrittenen Weg zur Ertragsregelung: einer innigen untrennbaren Vereinigung beider Aufgaben der Forsteinrichtung — der Etatsbestimmung einerseits und der räumlichen Ordnung des Betriebs andererseits —, indem sie auch der letzteren ihre erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden. Sie müssen dies auch tun, wenn anders ihre zeitlichen Bestimmungen wirtschaftlich durchführbar sein sollen.

Mit der Bildung der wirtschaftlichen Einheiten innerhalb der Betriebsfläche, der Bestände und Abteilungen, und mit deren zeitlicher Verteilung auf die einzelnen Nutzungszeiträume des Umtriebs ist auch die räumliche Ordnung festgelegt. Es ist daher nicht mehr als billig, daß die Ertragsregelung nun auch deren besondere Grundlagen bei dieser Verteilung ein Wort mitreden läßt, — ja es ist unumgänglich notwendig, daß bei dieser Arbeit die bestimmenden Momente der räumlichen Ordnung mitberücksichtigt werden, da sonst die zeitliche Ordnung selbst darunter leiden müßte.

Schon Cotta — wo nicht Vater, so doch erster hervorragender Vertreter dieser Methoden — stellt in der These 4 seiner Anweisung zur Forsteinrichtung von 1820 (zu der wir uns in der Einleitung, allerdings in etwas anderem Sinn als Cotta, bekannt haben) die räumliche Betriebsordnung, der er in erster Linie dienen will, über die Ertragsausgleichung. Die Gründe, die ihn hiezu veranlassen, sind aber nicht vorwiegend produktiver, sondern vielmehr betriebstechnischer Natur. Auch er ist in Rücksichten auf die Etatsbestimmung befangen, und wenn er auch die produktiven Momente zunächst stark betont, so baut er in der Folge doch seine räumliche Ordnung nicht auf ihnen auf. Cottas beherzigenswerte Forderungen an die räumliche Ordnung (l. c. S. 31, 40 . . .) werden durch seine Methode nur innerhalb des Rahmens, den die Ertragsermittlung in räumlicher Beziehung zuläßt, erfüllt, denn einige Seiten später (S. 43) heißt es wörtlich: „Durch obige Einteilung der Zeit (Periodenbildung) hat man gleichsam so viele Fächer gemacht, als Zeitabschnitte bestimmt sind, und in diese Fächer müssen bei der Forsteinrichtung die Waldabteilungen gebracht werden“. Wo bleibt da noch Raum für den Aufbau der räumlichen Ordnung auf ihren wahren Grundlagen?

Hundeshagen schon bekennt sich zwar mit Nachdruck zu der These 4 von Cotta (Forstabschätzung 1826 S. 61), betont jedoch mit Recht, daß diese These mit den von Cotta empfohlenen Methoden der Schlageinteilung und des Fachwerks nicht in Einklang stehe.

Dasselbe gilt auch von einer schon älteren Forderung Cottas in seinem Abriß zur Vermessung . . . 1815 S. 5, daß der Taxator nur den Betrag der jähr-

lichen Nutzung zu bestimmen habe, alsdann aber dem Wirtschaftspersonal überlassen bleiben solle, das Wo und Wie hinsichtlich der Fällung zu bewirken.

Die räumliche Betriebsordnung steht deshalb auch, das gilt seit Cottas Zeiten bis heute fürs Fachwerk, nur scheinbar im Vordergrund; denn tatsächlich ist sie hier nicht Selbstzweck, baut sich nicht auf ihren natürlichen Grundlagen auf, sondern sie ist ausschließlich oder doch vorwiegend nur Mittel zum Zweck möglichst einfacher und sicherer Etatsbestimmung, während die Forderungen der Produktionslehre — soweit überhaupt berücksichtigt — meist in rein schematischer Weise zur Geltung gebracht werden (vgl. z. B. die Wirtschaftsregeln für die Weißtanne Elsaß-Lothringens und das Beispiel eines Fachwerksplans in Heyers Waldertragsregelung 3. A. S. 227), voll wirksam nur, soweit sie wirklichen Zwang auf die Ertragsregelung üben, wie z. B. beim Sturm im Nadelwald.

Etatstechnische und erst in letzter Linie produktive Momente bilden im Fachwerk die treibenden Kräfte der Einwirkung auf die räumliche Ordnung.

Wird uns nunmehr die Aufgabe, klarzulegen, wie sich die räumliche Ordnung des Fachwerks aufbaut, aufbauen muß, so entwickeln wir diese Ordnung am besten aus dem Fachwerksprinzip selbst:

Prinzip ist, wie gezeigt wurde, das Aufteilen der gesamten Betriebsfläche unter die Nutzungsperioden des Umtriebs. Diese erhalten je einzelne, bestimmt abgegrenzte Teile der Gesamtfläche zur Abnutzung zugewiesen. Das Aufteilen aber soll so erfolgen, daß in einem Akt der Ertrag nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit (und bis zu einem gewissen Grad auch der Wirtschaftlichkeit) geregelt und die räumliche Ordnung auf der Betriebsfläche hergestellt wird.

Das Fachwerksprinzip setzt — als erste Wirkung auf die räumliche Ordnung — das Vorhandensein scharf begrenzter und mehr oder weniger gleichaltrig bestockter Teile der Betriebsfläche voraus, die als Einheiten für die Aufteilung dienen können, und führt damit zum schlagweisen, womöglich gleichaltrigen Hochwald. Erste Folge ist daher: Die Gleichaltrigkeit der Einzelfläche. Die Altersunterschiede innerhalb derselben dürfen die Periodendauer nicht überschreiten. Stahlmann (Forstw. Centralbl. 1897 S. 348) läßt Altersunterschiede bis zu 30 Jahren innerhalb der Abteilung zu.

Eine weitere unmittelbare Folge des Fachwerksprinzips ist das Einzwängen aller Einzelflächen des Waldes in bestimmt abgegrenzte Nutzungszeiträume. Das Fachwerk bestimmt für jede einzelne Waldfläche im voraus ganz genau, in welchen Jahren sie zur Abnutzung gebracht werden soll, und es muß hier ausdrücklich festgestellt werden, daß diese Maßregel ausschließlich im Interesse einer nachhaltigen Verteilung des Waldertrags über künftige Nutzungszeiträume erfolgt; daß sie ein waldbaulich u. s. w. durchaus unzulässiges Verfahren ist, braucht nicht besonders be-

wiesen zu werden. Sie legt nicht allein den Beginn, sondern auch den Gang der Verjüngung vollkommen fest.

Vor vielen Jahren schon wurde Verfasser durch einen alten, in Forsteinrichtung und Waldbau gleich erfahrenen Praktiker, der durch lange Zeit zahlreiche Wirtschaftspläne der Instruktion gemäß nach dem kombin. Fachwerk gefertigt und nach ihnen gewirtschaftet hatte, dahin belehrt, daß man, wenn Naturverjüngung mit Erfolg möglich sein solle, niemals einen Bestand mit seiner ganzen Masse in die I. Periode einstellen dürfe, sondern daß stets ein Teil der Masse in die II. Periode zurückgestellt werden müsse, da es nur so möglich sei, den Forderungen des Waldbaus bei der Verjüngung zu genügen.

Derartige Umgehungen und Hilfen wendet die Praxis vielfach an, um die waldbauschädlichen Wirkungen des Aufteilungsprinzips unwirksam zu machen. Auch in der Literatur spielt die „Öffnung der II. Periode“ eine Rolle. So bespricht Michaëlis (Mündener forstl. Hefte VII S. 118) die Verlegenheit, in welche die Wirtschaft bei Naturverjüngung notwendig gerät, und die Notwendigkeit einer „Öffnung der II. Periode“, und macht Vorschläge bezügl. der Ordnung der Vorgriffe in die II. Periode.

Ebenso kommt Martin (Wegnetz, Einteilung und Wirtschaftsplan in Gebirgsforsten 1882 S. 78, wie in späteren Veröffentlichungen) zu dem Ergebnis, daß der Begriff der Periode und der Gang der tatsächlichen Abnutzung nicht mit einander harmonieren.

Liegt in dem Einreihen der Einzelfläche in einen bestimmten zeitlichen Nutzungsrahmen an sich schon ein schwerer Zwang, so wird diese Wirkung noch verschärft dadurch, daß die Periodenzuweisung regelmäßig in räumlich fortlaufender Reihe für alle oder die Mehrzahl der Nutzungsperioden erfolgt bzw. mit Rücksicht auf äußere Gefährdung des Walds erfolgen muß. Es ist dies eine weitere notwendige Folge des Prinzips, das räumliche und zeitliche Ordnung in einem Akt regeln will. Die gleichaltrigen Aufteilungseinheiten, die Bestände, fordern nämlich einen weitgehenden Deckungsschutz. Die Erfahrung im schlagweisen Hochwald hat längst, insbesondere bei den Nadelhölzern, die Bedeutung der Bestandeslagerung und Hiebsfolge für die Ertragsregelung gezeigt. Dem Fachwerk würden, wollte es die Bestände ohne Rücksicht auf ihre Lagerung unter die Perioden verteilen, bei Ausführung seiner Pläne — im Nadelwald und teilweise auch im Laubwald — infolge äußerer Gefahren die Hände gebunden und Schwierigkeiten bereitet; es muß also räumliche Ordnung — in seinem Sinn — schaffen, auch hier wieder in erster Linie im Interesse der Ertragsregelung, um künftig ungehindert verteilen und dementsprechend abnutzen zu können. Die Sturmgefahr tritt damit hier, das muß wiederum ausdrücklich hervorgehoben werden, lediglich als ein die Ertragsregelung hinderndes Moment auf und findet als solches Beachtung, indem sie durch entsprechende Periodenzuteilung und künftige Lagerung der Altersklassen bekämpft wird. Diese Auffassung ist deshalb berechtigt, weil das Fachwerk andere, viel wirksamere Mittel zur Bekämpfung dieser Gefahr nicht beachtet, wie sie z. B. im Vermeiden der Gleichaltrigkeit auf größerer Fläche, im Unterlassen gleichzeitigen

Hiebs über ganze Bestände weg zu Gebot stehen. An solche Bekämpfungsmittel denkt das Fachwerk deshalb nicht oder nur in höchst mangelhafter Weise, weil sie seinen Zielen und seinem ganzen Wesen zuwiderlaufen. Um so mehr weist das Aufteilungsprinzip auf reinen Deckungsschutz hin, und von diesem, die Wirtschaft bindenden Schutzmittel macht denn auch das Fachwerk ausgiebigsten, wo nicht ausschließlichen Gebrauch.

Somit steht fest, daß das Fachwerk grundsätzlich von der Voraussetzung ausgeht, folgende Vorschrift sei berechtigt und wirtschaftlich durchführbar:

Die Waldfläche A ist zu verjüngen zwischen den Jahren 1900 und 1920, die sich entgegen der Sturmrichtung daran anschließende Fläche B zwischen den Jahren 1920 und 1940, die sich weiter anschließende Fläche C zwischen den Jahren 1940 und 1960 u. s. f.

Es legt sich die Frage gar nicht zuerst vor, ob solche Vorschrift heute schon gegeben werden kann und waldbaulich überhaupt durchführbar ist, — das überläßt das Fachwerk der Zukunft, — sondern es gibt die Vorschrift lediglich im heutigen Interesse des Ertragsausgleichs, mag dann die Zukunft sehen, wie sie sich waldbaulich zu ihr stellt! Vom waldbaulichen Gesichtspunkt aus betrachtet haben wir somit im Fachwerksprinzip eine Zwangsmaßregel vor uns (vgl. auch Martin, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1902, S. 73). Hier liegt der Ausgangspunkt für allen Kampf gegen diese waldschädliche Lehre; daher auch die allgemeine Klage, daß das Fachwerk den waldbaulichen Bedürfnissen nicht entspreche (Martin, Folgerungen . . . II S. 279 III S. 241).

Schon Hundeshagen (Forstabschätzung 1826 S. 239) nennt gerade dieses „ängstliche Einrahmen des Wirtschaftsgangs — das vorzüglich gerühmte — das größte Gebrechen des Fachwerks und Hindernis, zum Normalzustand zu gelangen“. (Das Fachwerk legt mit seinem Flächenaufteilungsprinzip für die ganze Betriebsfläche und Umtriebszeit vollkommen fest: Die Form und Größe des Periodenschlags, den Verjüngungszeitraum und die Reihenfolge der Periodenschläge; es läßt nur in gewissem Maß freie Hand in der anzuwendenden Hiebsart.) Voll ist ferner die neuere Literatur von Klagen über die mangelnde Uebereinstimmung der Periodenausstattung mit den Forderungen des Waldbaus; sie führen zu einer scharfen Bekämpfung des Fachwerks, wir erinnern nur an die Ausführungen Neys (Schablonenwirtschaft im Walde S. 17), Hugo Speidels (Allg. F. u. J. Ztg. 1893), dem sich Dorrer an die Seite stellt¹⁾, Kautzschs und Martins.

Kautzsch gelangt in seinem mehrerwähnten literarischen Kampf gegen

1) Der folgerichtige, in seiner Art mustergültige Aufbau des württembergischen Fachwerks war wohl mit in erster Linie das Werk Dorrers. Trotzdem hat dieser Mann noch am Ende seiner praktischen Tätigkeit das Werk eines langen Lebens preisgegeben und sich in Literatur (Allg. Forst- und Jagd-Ztg. 1894 S. 167) und Praxis freimütig auf die Seite Hugo Speidels gestellt, als er erkannte, daß dessen Einwendungen gegen das geltende Verfahren begründet waren. So ist es Dorrer mitzuverdanken, daß in Württemberg der Uebergang zur Altersklassenmethode möglich wurde. Ein solches Maß von Sachlichkeit verdient um so höhere Anerkennung, ja Bewunderung, als es sich leider so selten findet; nicht aber den Tadel, den Dankelmann unter Hinweis auf Dorrers früheren Standpunkt aussprach.

das Fachwerk (Weißtannenwirtschaft 1895, S. 76, wo sich eine Sammlung von Stimmen findet, die Tannenverjüngung und Fachwerk für unvereinbar erklären, sowie Zeitschr. f. F. u. Jwes. 1893 S. 350 1895 S. 292, 1896 S. 233 u. a. a. O.) zu dem harten, aber gerechten Urteil: „Das kombinierte Fachwerk ist ein Prokrustesbett, in dem sich allenfalls Laubholzwaldungen marmelieren lassen. Der Nadelwald nimmt dieses Verfahren durchaus nicht an“. Martin untersucht (Zeitschr. f. F. u. Jwes. 1902) die Frage, ob sich Fachwerk und Wirtschaftsführung leicht in Uebereinstimmung bringen lassen und kommt zu dem Ergebnis, daß entscheidende Gegensätze nicht allein bei Naturverjüngung hervortreten, wo sie sich am schärfsten bei der Tanne zeigen, sondern daß auch keine Uebereinstimmung zwischen Fachwerk und künstlicher Verjüngung bestehe.

Doch was bedarf es weiterer Zeugnisse? Das Fachwerk liefert selbst den Nachweis seiner waldbaulichen Schädlichkeit! Die heute tatsächlich vorliegende und vielfach eingestandene Unfähigkeit der Wirtschaft, mit gutem Erfolg natürlich zu verjüngen, sobald irgendwelche Schwierigkeiten vorliegen, ist nach des Verfassers Ansicht die Frucht der Raumordnung des Fachwerks.

Die überwiegende Mehrzahl aller Einwendungen gegen das Fachwerk richtet sich gegen dessen Einfluß auf die räumliche Ordnung.

Die räumliche Ordnung gründet sich also beim Fachwerk auf die Verteilung der Betriebsfläche über die ganze Umtriebszeit.

Diese Verteilung ist nun naturgemäß eine sehr unsichere Sache, denn es läßt sich heute noch nicht mit einiger Sicherheit bestimmen, in welchem Zeitpunkt die einzelnen Flächen zur Abnutzung kommen werden; viel eher läßt sich mit Sicherheit voraussagen, daß eine ganze Reihe von Verfügungen später wieder umgestoßen werden muß. Somit ruht die räumliche Ordnung des Fachwerks auf sehr unsicherer Grundlage. Darauf, daß die weitreichende Vorausbestimmung trotz dieser Unsicherheit einen unnötigen Zwang auf die Wirtschaft ausübt, soll hier kein entscheidendes Gewicht gelegt werden, denn dieser Zwang läßt sich vermeiden; ebenso ist die genaue räumliche und zeitliche Festlegung der Wirtschaft an sich unschädlich, denn die Annahmen, auf denen sie beruht, können ja später immer wieder geändert werden. In diesem Sinne sagt Stötzer in Verteidigung des Fachwerks: Die Forderung, jede Abteilung einer Periode zuzuweisen, stelle als einstweilige Bestimmung nichts Definitives dar, sondern gebe nur vorläufige Ueberblicke, die später abzuändern, nichts im Wege stehe. (Demgegenüber darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß im Gegensatz hiezu andere Vertreter des Fachwerks soweit gehen, z. B. einem Hiebsfolgeplan zulieb sogar Wechsel der Holzart und vorzeitigen Abtrieb von Beständen vorzunehmen.)

Solche labile Vorausbestimmungen sind aber nicht allein in der Voraussetzung ihrer künftigen Abänderung minderwertig, sondern sie wirken auf die räumliche Ordnung deshalb geradezu schädlich ein, weil sie, wie

die Praxis in tausend Fällen zeigt, zu später nicht wieder gut zu machenden Unterlassungen führen, ja zu bewußt unmöglichen oder doch unwahrscheinlichen Annahmen verleiten, wenn solche sonst gut in das Schema passen und Schwierigkeiten auf künftige Lösung abwälzen. Wie oft finden wir z. B. im Fachwerkswald künftige Hiebsfolgeschwierigkeiten ungelöst und durch hübsche Gruppierung der Periodenziffern verdeckt; wie oft wird ein heute schon rotfäuleverdächtiger oder nicht mehr vollkommener, also hiebsbedürftiger Bestand in die II. oder III. Periode zurückgestellt, weil es gefährlich erscheint, einen Aufhieb zu wagen, u. s. f. Nicht ohne Grund ist daher dem Fachwerk der Vorwurf gemacht worden, es verleite zum Planen von Unmöglichkeiten!

Eine weitere Gefahr ist die, daß die Annahmen auf ferne Zukunft leicht nachlässig und ohne gründliche Prüfung gemacht werden, im Bewußtsein, daß sie ja doch später nachgeprüft werden und nicht zur Ausführung kommen (vgl. H. Speidel, Allg. F. u. J. Ztg. 1893 S. 152). Erfolgt dann später diese genaue Prüfung, so ist vielleicht der richtige Zeitpunkt zum Eingreifen verpaßt. Das Fachwerk hindert die Wirtschaft, zweckmäßige Maßregeln zur rechten Zeit zu ergreifen, oder unterläßt es wenigstens, einen heilsamen Zwang auszuüben, der besonders nottäte, wo solche Maßregeln mit Gefahr und Verantwortung verknüpft sind.

Jede Methode ist aber, wie schon bei anderem Anlaß hervorgehoben wurde, soll sie nach ihrem praktischen Wert richtig gewürdigt werden, auch danach zu beurteilen, ob sie nach ihrer Art Mißgriffe und Unterlassungen begünstigt oder erschwert, und da ist das Fachwerk ohne Zweifel zu den Methoden der ersteren Art zu rechnen (vgl. z. B. Allg. F. u. J. Ztg. 1894 S. 256, wo zahlreiche Mißgriffe zugegeben werden); es ist aus dem Schematismus geboren und führt leicht zu demselben hin, auch wenn er ganz wohl vermieden werden kann.

Das Fachwerk hat denn auch der räumlichen Ordnung im Wald nach der produktiven Seite hin schlechte Dienste geleistet.

Sind so schon die unmittelbaren Wirkungen des Fachwerksprinzips auf die räumliche Ordnung verhängnisvoll für den Wald, so sind es nicht weniger die weiteren Folgen, die dasselbe zeitigt. Können wir auch sofort zugeben, daß es sich hier nicht um unbedingt zwingende Folgerungen des Prinzips handelt, so sind diese Einwirkungen auf die räumliche Ordnung doch so sehr durch dasselbe nahegelegt, daß sie von allen Vertretern des Fachwerks gefordert worden sind.

Die Waldflächenzuteilung, die zugleich die Hiebsfolge regelt, fordert im Interesse der äußeren Ordnung und Uebersichtlichkeit des Betriebs Bestockungseinheiten von entsprechender Form, Lagerung und Größe. Sie zwingt zwar nicht absolut, aber sie gibt doch Anlaß zum grundsätzlichen Aufgeben der vorhandenen natürlichen Bestockungseinheiten, der Bestände, und zum Schaffen künstlicher Einheiten im Wege der Waldein-

teilung. Das Fachwerk nötigt hierzu um so mehr, da sein Prinzip kaum Raum läßt zu einer anderweitigen und selbständigen Pflege der räumlichen Ordnung. Judeich (Thar. Jahrb. 1879 S. 125) ist sogar im Gegensatz zu Denzin der Ansicht, das Prinzip des Flächenfachwerks erfordere unbedingt eine entsprechende Waldeinteilung.

Mit dem Schaffen künstlicher Einheiten im Wege der Waldeinteilung überträgt das Fachwerk die Fächerbildung von der Umtriebszeit auch auf die Waldfläche (Judeich, Forsteinrichtung S. 337). Wer Fächer zur Verteilung bildet, setzt auch gleichartige Gegenstände für diese Verteilung voraus!

So ist die Einheit der Waldeinteilung, die Abteilung — eine künstliche Wirtschaftsfigur —, zugleich allgemein die Grundlage und Einheit der räumlichen Ordnung des Fachwerks geworden. Sie ist die ideale Einheit für Periodenzuteilung, sie soll daher, wo sie eine gleichaltrige Bestockung noch nicht besitzt, eine solche erhalten; wir gelangen damit zum Grundsatz der „Abteilungseinheit“, der sich lediglich als das Ergebnis darstellt des einseitigen Strebens nach ungehinderter und übersichtlicher Aufteilung der Nutzungsflächen unter die Perioden des Umtriebs. Die „Abteilungseinheit“ ist somit rein kameralistischer Einwirkung auf den Wald zu verdanken.

Die Abteilung wird so zur idealen Bestockungseinheit und damit zur wahren Einheit der räumlichen Ordnung des Fachwerks; es muß daher ihre Form, Lagerung und Größe entscheidend sein für die räumliche Ordnung. Darum wäre hier auch der Ort, wo die produktiven Momente in erster Linie zur Geltung kommen sollten, und dies ist der Fall, wenn auch teilweise nur scheinbar. Form und Lagerung der Abteilung werden nämlich, neben der Rücksicht auf Uebersichtlichkeit, besonders durch Sturmgefahr und Erfordernisse der Abnutzung bestimmt; dagegen entscheidet bei der wichtigsten Eigenschaft, der Flächengröße der Abteilung, leider wiederum der Gesichtspunkt der Ertragsregelung. Die Rücksichten auf Uebersichtlichkeit und Großzügigkeit des Plans und auf leichte Zuteilung zu den Perioden fordern eine entsprechende Größe der Abteilung; und, wie um zu bestätigen, daß auch hier das estatstechnische Moment gebietet, fordern die Vertreter des Fachwerks, daß die Größe der Abteilung im Verhältnis stehe zur Größe der Betriebsfläche: große Reviere große Abteilungen, kleine Reviere kleine Abteilungen! Begründet wird diese Forderung eben mit der Rücksicht auf die Verteilung der Betriebsfläche unter die Perioden (!).

So wird die Fachwerksabteilung für eine waldbauliche Einheit in der Regel viel zu groß. Der heutige Stand der Anschauungen bewegt sich im Rahmen von 10—20 ha, mit anderen Worten: das Fachwerk führt zu dem, was wir im 1. Abschnitt Großflächenwirtschaft genannt haben, zu einer „groben Waldwirtschaft“ im Gegensatz zur „feineren Bestandeswirtschaft“ (Judeich).

Das Fachwerk überweist dem Waldbau Abteilungsflächen von 300—500 m

Länge und Breite zur Verjüngung in 20 Jahren, — einem Zeitraum, in dem weder gute natürliche, noch gute künstliche Verjüngung sicher und allgemein durchgeführt werden kann; so zwingt es z. B. die Wirtschaft, die Naturverjüngung gleichzeitig auf großer Fläche einzuleiten. Die früher und heute noch übliche Größe der Wirtschaftsfiguren entspricht unter der Voraussetzung, daß sie zugleich Bestockungseinheiten sein sollen, nicht den Interessen von Waldbau und Forstschutz, vollends nicht, wenn man berücksichtigt, daß sich mehrere solche Flächen mit geringer Altersabstufung aneinanderreihen; sie so klein zu machen, wie dies den Bedürfnissen der Natur entspräche, verbietet dagegen die Rücksicht auf den Betrieb. Somit hat der Grundsatz der Abteilungseinheit keine natürliche Berechtigung; er ist, wie schon hervorgehoben wurde, ausschließliches Erzeugnis der Ertragsregelung.

Zunächst stützt sich das Fachwerk naturgemäß auf die gegebene Raumordnung im Wald und deren Einheiten, die Bestände, es sucht jedoch erstere, soweit wirtschaftlich möglich, nach der Richtung der Abteilungseinheit zu beeinflussen. Ein räumlich normal geordneter Wald ist ihm ein solcher, der nur gleichaltrige Abteilungen aufweist.

In dieser durchaus folgerichtigen Weise hat sich das Fachwerk z. B. in Württemberg bis in die neuere Zeit entwickelt (Graner, Forstbetriebseinrichtung 1889 und Forstw. Centralbl. 1897 S. 137, ferner Dorrer, Allg. F. u. J. Ztg. 1896 S. 316), und es erscheint — vollends bei Vertretern des Fachwerkprinzips — nicht begründet, diese Entwicklung anzugreifen bzw. als einer sachgemäßen Fachwerkspraxis nicht entsprechend zu bezeichnen (vgl. Dankelmans Ztschr. f. F. u. Jwes. 1896 S. 237, Stötzer, Forsteinrichtung S. 212). Im Gegenteil tritt gerade in dieser Form das wahre Wesen des Fachwerks am klarsten hervor und zeigt seine Lichtseiten wie seine Schattenseiten am besten, Uebersichtlichkeit des Plans und Großzügigkeit der Wirtschaft auf der einen, Schematismus und Waldbaueindlichkeit auf der andern Seite. Wenn Dankelmann, selbst ein Verteidiger des Prinzips, dieser Entwicklung diejenige in Preußen als die bessere gegenüberstellt, so zeigen die neueren Veröffentlichungen Martins (Zeitschr. f. F. u. Jwes. 1902 S. 83), wohin dort die Entwicklung steuert — nämlich weg vom Fachwerk —, so daß Martin zu dem Ergebnis gelangt, das Fachwerk in Preußen bestehe nur noch im Schema der Formularien, aber nicht in Wirklichkeit.

Auch das Fachwerk Stötzers bedarf, wie später gezeigt werden soll, nur noch eines Schritts zum Aufgeben des Fachwerkprinzips.

Während nämlich das württembergische Fachwerk die Abteilungseinheit, die Trägerin seiner räumlichen Ordnung, als klares Ziel in greifbare Nähe rückt und dieses Ziel, soweit nach Lage der Verhältnisse wirtschaftlich möglich, zu erreichen strebt, was Dankelmann „ein rohes Verfahren nennt, das in sachgemäß gehandhabter Fachwerkspraxis nicht vorkomme“, rücken er und Stötzer die Abteilungseinheit und damit das Ziel der räumlichen Ordnung etwas mehr in die Ferne, ohne es jedoch ganz fallen zu lassen, wie ihre eigenen Äußerungen besagen. Dankelmann sagt: „Die Abteilungseinheit

ist zwar ein berechtigtes, dem Begriff der Abteilung innewohnendes Ziel, aber seine Verwirklichung darf nur da und dann stattfinden, wenn nicht wichtige Rücksichten entgegenstehen“, und Stötzer (Forsteinrichtung S. 19) fordert: „Es soll eine Ortsabteilung nach Möglichkeit zu einer gleichartigen und gleichaltrigen Bestockung gebracht werden“ und S. 20: „... sind ... Bestandesabteilungen ... nur vorübergehender Natur ...“, da es als das Ideal und künftige Ziel feststeht, daß die Ortsabteilung nach und nach gleiche Bestockung erhalten soll“.

Ganz ähnliche Einschränkungen macht auch das württembergische Verfahren, so daß es sich nur um graduelle Unterschiede handeln könnte, die übrigens nicht einmal bestehen, wie überhaupt jedes Verfahren, soweit irgend möglich — nicht selten unter Verzicht auf klare Ordnung — bestrebt sein wird, auf waldbauliche und andere produktive Momente möglichst Rücksicht zu nehmen. Aber schließlich muß doch das Endziel für unser Urteil über die Methode entscheidend sein, mag es nun naheliegen oder fernegerückt erscheinen. Ist das Ziel ein waldschädliches, so kann die Methode nicht bestehen, mag jenes auch in noch so große Ferne gerückt werden, da es bei allen Schutzmitteln des Verfahrens schließlich doch nachteilig auf den Wald wirken muß; ja man dürfte einer Methode ohne Zweifel den Vorzug geben, die ihr Ziel scharf ins Auge faßt und ihm, wenn auch mit einigen Opfern, rasch zusteuert, weil wir dann wenigstens der Vorteile, die wir am Ziel erhoffen, in absehbarer Zeit gewärtig sein können.

Eine weitere Frucht des Aufteilungsprinzips ist nächst der Abteilungseinheit die „Periodentour“, auch „Hiebszug“ genannt.

Die gewonnenen Einheiten besitzen, wie mehrfach gezeigt wurde, nach außen keine wirtschaftliche Selbständigkeit, sondern sind bezüglich Abnutzung und daher Periodenzuteilung abhängig von der herrschenden Sturmrichtung. Die einzelne Abteilung bedarf des dauernden Deckungsschutzes durch ihre in der Sturmrichtung anstoßenden Nachbarn und so sieht sich das Fachwerk genötigt, seine Abteilungen in der Sturmrichtung aneinander zu reihen und Periodentouren zu bilden, in welchen der herrschenden Sturmrichtung entgegen immer die nächstfolgende Abteilung der nächst- oder höchstens übernächstfolgenden Periode zur Abnutzung zugewiesen wird. Da die Abteilungen selbst beträchtliche Ausdehnung haben, so entstehen jene für das Fachwerk charakteristischen „Hiebszüge“, die im Verhältnis ihrer Ausmaße und in ihrer Gliederung Eisenbahnzügen gleichen, und die mit mehreren Kilometern Länge in der Hiebsrichtung und nicht selten 100 und mehr Hektar Fläche aller waldbaulichen Begriffe aber auch Maßregeln spotten.

Zwar wird energisch betont, daß das Fachwerk auch die Bildung kleiner Hiebszüge zulasse, z. B. von Dankelmann (Ztschr. f. F. u. Jwes. 1895 u. 1896): Das Fachwerk lasse je nach Bedürfnis das Entstehen großer und kleiner Hiebszüge zu; doch gibt Dorrer (Allg. F. u. J. Ztg. 1894 S. 167), der an dem logischen Aufbau des Einrichtungsverfahrens in Württemberg her-

vorrangend beteiligt war, selbst zu, daß man sich durch die Periodenziffern leicht bestimmen lasse, zu lange Hiebszüge zu bilden. Und K a u t z s c h weist (Ztschr. f. F. u. Jwes. 1896 S. 234) mit Recht auf die Kehrseite des kleinen Hiebszugs fürs Fachwerk hin, indem er sagt: „Je kleiner der Hiebszug, desto mehr entfernt sich das Fachwerk von der Uebersichtlichkeit, die unstreitbar zu seinem Wesen gehört“.

Uebrigens sind „groß“ und „klein“ relative Begriffe! Vielleicht zeigt hier am besten ein Beispiel die Wirkung des Fachwerkprinzips und schafft Klarheit darüber, ob das Fachwerk die Bildung „kleiner“ Hiebszüge begünstigt, oder nicht. Wir ziehen dasjenige Beispiel bei, das D o r r e r in der Allg. F. u. J. Ztg. 1894 S. 167 gebraucht und das sich im Wald nicht allzuseiten findet:

Es seien 4 in der Hiebsrichtung hinter einander liegende Abteilungen gleichzeitig vor kurzem mit Fichten aufgeforstet worden und sollen nun unter die Perioden verteilt werden.

Betrachten wir zunächst jede der vier Einheiten für sich allein, so ist in ihr das räumliche Ideal des Fachwerks verwirklicht, die „Abteilungseinheit“ erreicht. Abnorm ist nur die Altersfolge innerhalb der in der Sturmrichtung liegenden Reihe. Das Fachwerk fordert eine solche Periodenzuweisung und entsprechende spätere Altersabstufung, daß die Einheiten in der dem Sturm entgegengesetzten Richtung sich folgend zur Abnutzung kommen. Es muß also im vorliegenden Fall, da eine Altersabstufung nicht vorliegt, eine solche geschaffen werden. Bei dem heutigen jugendlichen Alter der Flächen kommen für die Zuteilung — 100jährigen Umtrieb vorausgesetzt — aus ökonomischen Gründen nur die IV. und V. Periode in Frage.

Das alte Fachwerk hat, wie D o r r e r mitteilt, aus dem Ganzen einen Hiebszug gebildet und die zwei hinteren Abteilungen der IV., die zwei vorderen der V. Periode zugewiesen und sich dabei beruhigt, ein Zeichen — nebenbei bemerkt — wie wenig der Waldbau bei der Einreihung in die Perioden mitzusprechen hatte. (Vergleiche Fig. 58, in der angedeutet ist, wie sich wohl das Fachwerk den weiteren Verlauf der Altersabstufung in künftigen Umtrieben dachte.)

Neuerdings werden nun „kleine“ Hiebszüge gebildet; man wird also das Ganze in z w e i Hiebszüge zerlegen, in denen je eine Abteilung der IV. und V. Periode zugewiesen wird (vgl. Fig. 59). In diesem Fall müssen die beiden mittleren Abteilungen unabhängig von einander erhalten werden, also räumlich getrennt bleiben, damit seiner Zeit die Abteilungen 1 und 3 gleichzeitig angehauen werden können ohne Gefahr für Abt. 2.

Diese beiden Hiebszüge betrachten wir nun von unserem Standpunkt aus immer noch als „große“, nicht wegen ihrer Gesamtlänge, die offenbar für Waldbau und Forstschutz nicht in erster Linie entscheidend ist, sondern wegen der A u s d e h n u n g d e r A l t e r s k l a s s e n, die sie einschließen, dem Fachwerk erscheinen sie dagegen als „kleine“, weil von den 5 möglichen Perioden nur 2 vertreten sind. Weiter in der Verkürzung der Hiebszüge kann das Fachwerk unseres Erachtens nicht gehen, soll es sich nicht untreu werden,

darüber wird keine Meinungsverschiedenheit herrschen; und doch wird ebenso unbedingt allgemein zugegeben werden müssen, daß auch die letztbesprochene Zuteilung vom Standpunkt des Waldbaus und Forstschutzes noch nicht befriedigt, sondern daß von jeder Abteilung die hintere Hälfte der IV. die vordere der V. Periode zugewiesen werden sollte. Dies würde Maßregeln für die nähere Zukunft bedingen, die dafür sorgen, daß jede der 4 Abteilungen wirtschaftlich selbständig erhalten wird, also nicht dem Zwang des Deckungsschutzes anheimfällt, um später eine normale, sei es natürliche oder künstliche Verjüngung zu ermöglichen (vgl. Fig. 60). Daß die räumliche Ordnung des Fachwerks von selbst auf solche Maßregeln und damit auf Bildung wirklich kleiner Hiebszüge hinweist, wird niemand behaupten wollen. Das gibt Dankelmann selbst zu, indem er sagt (Ztschr. f. F. u. Jwes. 1896 S. 240): „Allerdings widerstreben Einrichtungsmethoden, welche womöglich jede Abteilung zum Hiebszug mit Heranbildung aller Altersklassen einrichten wollen, der fachwerksmäßigen Behandlung ebensosehr, wie der Plenterwald“.

Fig. 58.

	4.	3.	2.	1.	
	V	V	IV	IV	1. Umtrieb
W	V	IV	IV	III	2. „
	V	IV	III	II	3. „

Fig. 59.

	4.	3.	2.	1.
	V	IV	V	IV
W				

Fig. 60.

	4.	3.	2.	1.
	V IV	V IV	V IV	V IV
W				

Unser Beispiel zeigt ferner, daß der Vorschlag, die späteren Perioden zusammenzufassen und damit die Zuteilung der Abteilungen bzw. Bestände zu der einen oder andern Periode der ferneren Zukunft zu überlassen, — was ja für heute recht bequem wäre, — sich nicht empfiehlt, weil dann in unserem Beispiel, wie in vielen andern Fällen, zunächst überhaupt nichts geschehen würde. Dies könnte aber zu Unterlassungen führen, die sich später rächen müßten. Das Fachwerk hat nun einmal die Sorge auch für die räumliche Ordnung im Wald in vollem Umfang auf sich genommen und will seine

Aufgabe lediglich mit Hilfe der Periodenzuteilung erfüllen; so ist es auch verpflichtet, dieselbe voll durchzuführen.

Aus den vorstehenden Betrachtungen geht hervor, was auch die praktische Erfahrung lehrt, daß das Fachwerksprinzip ungeeignet ist, eine rasche „Gliederung der Altersklassen“ zu bewirken. Es ist ihm auch in den Wäldungen, in denen es durch ein halbes Jahrhundert und länger geherrscht hat, vielfach nicht gelungen, die schädlichen Altersvereinigungen aus der Zeit des Hartigschen Prinzips aufzuheben, im Gegenteil, es hat eher zu weiterer Häufung beigetragen.

Doch noch einen Schritt weiter geht das folgerichtig durchgeführte Fachwerksprinzip in bezug auf räumliche Ordnung und führt so zu den schlimmsten Zwangsjacken, die dem Wald je zugemutet worden sind, den Periodendecksystemen.

Die Einheiten des Fachwerks sind nämlich nicht nur nach einer Seite äußerer Gefahr ausgesetzt, sondern bedürfen des Schutzes nach zwei Richtungen, und wenn wir uns — was für das Aufteilungsprinzip nahe liegt — ausschließlich des Deckungsschutzes bedienen und auf Traufschutz ganz verzichten, so muß die Abdeckung, und damit die Periodenfolge, nach zwei Richtungen entsprechend geregelt werden. Dadurch entsteht ein vollständiges System allseitiger Deckung, aber auch Bindung. In dem weitgehenden Zwang, der hier auf der Wirtschaft lastet, will das bekannteste Decksystem, die „Reußsche Schablone“, wenigstens einige Erleichterung schaffen, indem es die ununterbrochene Periodenfolge in der meistgefährdeten Richtung verhindert und dadurch kürzere Periodenzüge schafft.

Damit sollte nur gezeigt werden, wohin ein Prinzip folgerichtig führt, das zeitliche und räumliche Ordnung untrennbar verquickt und dabei den rein etatstechnischen Gesichtspunkten den Vortritt einräumt.

Die besprochenen Klippen des Fachwerks sind nun seit langer Zeit bekannt und die neueren Verfahren sind, z. T. mit Erfolg, bemüht, dieselben zu vermeiden, — allerdings, wie von verschiedenen Seiten mit Recht hervorgehoben wird, mehr oder weniger auf Kosten des Prinzips. Das Fachwerk, wenigstens soweit es an der Abteilungseinheit festhält, bedingt eine Wirtschaft auf großer Fläche; je mehr der Betrieb auf kleiner Fläche arbeitet, um so schwieriger und wertloser wird das Aufteilen, da die Uebersichtlichkeit leidet, desto mehr Abweichungen vom Prinzip sind notwendig, um Verfahren und Wirtschaft in Einklang zu bringen. Das Fachwerk fügt sich diesen Notwendigkeiten, es sucht sich den neueren Anforderungen der Wirtschaft anzupassen, rückt seine Ziele in die Ferne oder gibt sie und damit schließlich sich selbst auf.

In neuerer Zeit hat insbesondere Stötzer in seinem Lehrbuch der Forsteinrichtung 1898 und an anderen Orten eine Lanze für das Fachwerk gebrochen und man könnte sich vom Standpunkt der räumlichen Ordnung mit einem „Fach-

werk“, wie er es schildert, ganz wohl abfinden, sobald er den weiteren Schritt tun wollte, das Ziel der Abteilungseinheit fallen zu lassen; denn sein Verfahren gründet sich auf die Unterabteilung, bildet kleine Hiebszüge und verteilt Abteilungen und Bestände, gegebenenfalls auf mehrere Perioden. Die nächste Frage: Bleibt damit das Prinzip des Fachwerks erhalten? ist unbedingt zu bejahen, denn die Aufteilung der Gesamtfläche nach Unterabteilungen, ja selbst nach Teilen solcher verstößt durchaus nicht gegen dasselbe, nur muß alsdann an Stelle der Abteilung als räumlicher Rahmen zur Förderung der Ordnung und Uebersichtlichkeit der kleine Hiebszug treten. In dieser Form können wir das Fachwerk Stötzers in seiner Wirkung auf die räumliche Ordnung der nachfolgenden Gruppe der Altersklassenmethoden an die Seite stellen. Dies kann geschehen, weil in diesem Fall der Vorwurf gegen das Fachwerk, daß es über die ferne Zukunft entscheide, weniger schwerwiegend erscheint, als derjenige, der die früheren Formen trifft, daß sie sich infolge des Grundsatzes der Abteilungseinheit auf der Großflächenwirtschaft aufbauen, also auf einer waldbaulich u. s. w. nicht haltbaren Grundlage. Ob übrigens die wichtigste Eigenschaft des Fachwerks, die Uebersichtlichkeit, bei solcher Wandlung erhalten bleibt, ist eine andere Frage. In der Literatur wird dies mehrfach bezweifelt. Martin z. B. meint (Folgerungen . . . II S. 279), durch derartige Verteilung höre der Zweck auf, dem die Periode dienen solle, eine klare Uebersicht über die zeitliche Ordnung zu gewähren, und Dorrer sagt (Allg. F. u. J. Ztg. 1896 S. 320), die Abteilung sei als Einheit der Unterabteilung vorzuziehen, sobald sich der Einrichtungsplan auf die ganze Umtriebszeit erstrecke.

Auch Verfasser ist der Ansicht, daß das Fachwerk nach solcher Umgestaltung seiner ursprünglichen Bestimmung nicht mehr voll entspricht. Sind wir soweit gelangt, so bedarf es nur noch eines Schritts, es zu verlassen. Dann erscheint nämlich die Flächenaufteilung unter die Perioden im sogenannten „Einrichtungsplan“ entbehrlich, denn wir erhalten die Auskünfte, die er uns gibt, ebensogut, wenn wir — in der einen Hand das Altersklassenverhältnis, in der andern die Bestandskarte — den Nutzungsplan feststellen und uns überzeugen, ob für die Zukunft alle räumlichen Nutzungshindernisse beseitigt sind, oder deren Beseitigung angeordnet ist (vgl. H. Speidel, Allg. F. u. J. Ztg. 1895 S. 112). Man kann es alsdann doch ruhig der Zukunft überlassen, ihre Nutzungsflächen im einzelnen auszuwählen, nachdem die heute von uns gewählten abgeerntet sein werden; wenn nur dafür gesorgt wurde, daß der Zukunft ein gutes Altersklassenverhältnis und freie Hiebsführung gesichert sind. Während Martin in gleichem Sinne (Wegnetz, Einteilung und Wirtschaftsplan in Gebirgsforsten 1882 S. 79) die Periodenbildung für „ein außerordentlich umständliches Mittel“ erklärt, die Hiebsfolge ersichtlich zu machen und sagt (Zeitschr. f. F. u. Jwes. 1902 S. 83), in Sachsen habe eine fast hundertjährige Geschichte gelehrt, daß die Periodenbildung zum Zweck der Hiebsordnung nicht erforderlich sei, hält Stötzer am Einrichtungsplan als einem wertvollen Hilfsmittel zur Herstellung der räumlichen Ordnung, besonders in schwierigen Fällen, fest.

Das Ergebnis unserer Betrachtungen über das Verhältnis des Fachwerks zur räumlichen Ordnung im Wald ist folgendes:

Das Fachwerk stellt sich die Aufgabe, zugleich mit der Ertragsregelung den Wald auch räumlich zu ordnen! Es sucht dabei einen für seine eigenen Zwecke d. h. für Periodenzuteilung und -ausgleich räumlich geordneten Wald zu gewinnen, indem es mehr oder weniger gleichaltrige Bestockungseinheiten von geeigneter Form und Größe — Abteilungen — schafft und diese nach ihrem Alter in, gegen die Sturmrichtung fallende Reihen anordnet. An Stelle der zunächst willkürlich gelagerten Bestände sollen somit in Zukunft regelmäßig geformte und bestimmt gelagerte Wirtschaftsfiguren mit gleichaltriger Bestockung treten, die sich übersichtlich und ohne Hindernis in die Nutzungsperioden einreihen lassen. Abteilungseinheit, Periodenzug und Periodendecksystem ergeben sich zwar nicht als unbedingte Forderung des Prinzips, wohl aber als kennzeichnende Merkmale des folgerichtig weiterentwickelten Fachwerksgedankens.

Entscheidend für Beurteilung dieses Strebens des Fachwerks ist, daß dieses alles geschieht, damit durch solche Ordnung die Zuteilung zu den Perioden und die ihr entsprechende Abnutzung in einfacher und ungehinderter Weise erfolgen kann. Wir glauben den Nachweis erbracht zu haben, daß die gesamte räumliche Ordnung des Fachwerks, wenn nicht allein, so doch in erster Linie durch die Erfordernisse der Ertragsregelung, also der zeitlichen Ordnung, bestimmt ist, und daß sie sich als logische Folge des Fachwerksprinzips, der Vereinigung des Strebens nach zeitlicher und räumlicher Ordnung darstellt. Wenn dabei auch der Forstschutz bezüglich der Altersabstufung, der Waldbau und die Forstbenutzung bei Bestimmung der Abteilungsgröße mitberücksichtigt werden, so erweist sich doch die Ertragsregelung als das treibende und entscheidende Moment für Einwirkung des Fachwerks auf die räumliche Ordnung.

Der räumliche Normalzustand des Fachwerks stellt sich also vielleicht dar als ein Normalzustand der Ertragsregelung, aber sicher nicht als ein solcher der Produktion, er ist das Ergebnis der Vorherrschaft einer kameralistisch beeinflussten Richtung in der Forstwirtschaft. Die Einwirkung dieser Methode auf den Wald muß daher notwendig eine Verschlechterung von dessen Produktionsverhältnissen zur Folge haben.

Der Stern des früher Theorie und Praxis beherrschenden Fachwerks ist im Verblissen begriffen, überall wendet man sich mehr und mehr von dieser Methode ab. In der Praxis hat sie nur noch wenige Freunde. Betrachten wir ihren heutigen Besitzstand, so ergibt sich, daß Sachsen (vgl. Judeich, Forsteinrichtung) sie schon sehr frühzeitig, Baden (Krutina: die badische Forstverwaltung 1891) schon lange aufgegeben hat, dasselbe kann heute von Würt-

temberg gesagt werden, und auch in Preußen (Martin, Zeitschr. f. F. u. Jwes. 1902) und Bayern (Wappes, Forstw. Zentralbl. 1905 S. 284) soll sie tatsächlich verlassen sein, während aus dem Elsaß (Kautzsch u. a.) begründete Einwendungen vorliegen.

Die Zeit ist wohl nicht mehr fern, wo das Fachwerk endgültig der Geschichte angehört. Fragen wir nach dem Grund dieses Niedergangs, so ist er u. E. in der unlösbaren Verquickung von räumlicher und zeitlicher Ordnung zu suchen, die dieser Methode eigen ist.

c. Die Altersklassenmethoden.

Diese Gruppe von Methoden bestimmt den nachhaltigen Flächennutzungssatz zunächst ohne Rücksicht auf die räumliche Ordnung, auf Grund durchaus zeitlicher Momente: der normalen Flächenquote, des Altersklassenverhältnisses und des wirtschaftlichen Zustands im Walde. Die Methoden müssen jedoch als solche auch für die räumliche Ordnung Sorge tragen, weil sie auf deren Grundlage den Hauungsplan festsetzen, der den jährlichen Etat bestimmt. Die Pflege der räumlichen Ordnung ist aber eine selbständige Aufgabe der Methoden, die gelöst wird durch die Waldeinteilung, die Bildung kleiner Hiebszüge. Damit ist der äußere Rahmen gegeben, innerhalb dessen sich der Hauungsplan bei Auswahl seiner Gegenstände zu bewegen hat.

Dieser Hauungsplan beschränkt sich auf einen kurzen nächsten Nutzungszeitraum, er wählt die einzelnen Nutzungsgegenstände innerhalb der Grenzen des vorher festgesetzten periodischen Flächensatzes aus und bestimmt daraus die Jahresnutzung. Er ist es, der die Wechselwirkungen zwischen räumlicher und zeitlicher Ordnung vermittelt; er bewegt sich einerseits innerhalb des durch die räumliche Ordnung gegebenen Rahmens (Hiebszugsnetz) und trifft andererseits seine Wahl unter den Flächen teils nach zeitlichen teils nach räumlichen Gesichtspunkten. Die Bestände werden ausgewählt einerseits nach Momenten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und andererseits nach solchen der Hiebsfolge.

Bei Auswahl der Hiebsorte kommen nämlich nach Judeich (l. c. S. 428) neben den „entschieden hiebsreifen Orten“ in erster Linie die „wirtschaftlichen Notwendigkeiten“ und die „Opfer der Hiebsfolge“ für die Aufnahme in den Hauungsplan in Frage, es wird also hier durch Einstellen der Notwendigkeiten und Hiebsfolgeopfer im besonderen für die räumliche Ordnung Fürsorge getroffen ohne Rücksicht auf die Ertragsregelung und wird dabei, was ebenfalls hervorzuheben ist, ausschließlich über Opfer entschieden, die sofort zu bringen sind, nicht über solche, die einer fernerer Zukunft zugemutet werden sollen, wie dies das Fachwerk in ausgedehntem Maß tut. Die „zweifelhaft hiebsreifen Bestände“ bilden dann geeignete Objekte, durch deren Vorrücken oder Zurückstellen sowohl der räumlichen Ordnung, wie der Nachhaltigkeit gedient werden kann.

Betrachten wir diese Art, auf die räumliche Ordnung einzuwirken, kritisch,

so zeigt sich hier zuvorderst die Möglichkeit einer ungehinderten und unmittelbaren Einflußnahme der produktiven Faktoren auf die Größe sowohl, wie auf die Form des Hiebszugs und, was noch mehr ins Gewicht fällt, auf die Ausdehnung der Bestockungseinheiten, wofern von solchen überhaupt noch die Rede ist. Der Anreiz zur Bildung geschlossener Einheiten, wie sie das Fachwerk für seine Zuteilung braucht, fällt hier ganz weg, denn dem Hauungsplan können ebensogut beliebige Teilflächen von Bestockungseinheiten zugewiesen werden. Geschlossene Unterabteilungen werden sich nur da erhalten, wo ein großes Gewicht auf Buchung und Kontrolle gelegt wird und diese nach dem Willen der Wirtschaft den produktiven Momenten vorgehen. Dagegen schreibt auch dann keine ökonomische Forderung für dieselben eine bestimmte Größe vor. Noch weniger werden die produktiven Faktoren auf dem Gebiet der Waldeinteilung einen Einfluß der Ertragsregelung zu fürchten haben, weil bei Vornahme der Ertragsbestimmung die räumliche Ordnung in ihren Hauptzügen auf der Karte schon gegeben ist.

Soweit wären also die Voraussetzungen für Wahrung der Interessen der Produktionslehre in vollem Maße gegeben. Auch noch bei Aufstellung des Hauungsplans ist dies, wie gezeigt wurde, der Fall. Ist dagegen die Wahl getroffen, so lastet auch hier auf den gewählten Flächen derselbe Zwang, der am Fachwerk gerügt wurde, es müssen bestimmt begrenzte Flächen innerhalb des genau begrenzten Nutzungszeitraums zum Abtrieb gebracht werden. Der Grund dieses Zwangs ist wiederum in der Vermengung von Maßregeln der räumlichen und zeitlichen Ordnung zu suchen, im Festlegen bestimmter Waldflächen zur Abnutzung in bestimmten Zeiträumen.

So sagt Sieber (Allg. F. u. J.Ztg. 1903 S. 112), so elastisch die sächsische Wirtschaft bei der Ertragsregelung sei, so starr sei sie im sächsischen Wirtschaftsplan und macht den beachtenswerten Vorschlag, der z. B. im neuen württemb. Verfahren bereits verwirklicht ist, in den Hauungsplan mehr Hiebsflächen aufzunehmen, als zum Abtrieb bestimmt wurden, um dem Wirtschaftler die erforderliche Bewegungsfreiheit zu lassen.

Es fehlt somit den Altersklassenmethoden noch etwas zu voller wirtschaftlicher Freiheit, es ist die Freiheit des Hiebsorts, seine Unabhängigkeit von der Ertragsregelung. Die Bindung der periodischen Nutzungsfläche für den nächsten Nutzungszeitraum, die sich — gewissermaßen als ein Rudiment des Fachwerks — aus früherer Entwicklungszeit erhalten hat, beengt besonders den Waldbau in erheblichem Maße; daß dieses Glied sich trotzdem erhalten konnte, darf uns nicht wundern, denn es waren nicht in erster Linie produktive, sondern betriebstechnische, besonders ökonomische Gründe, die zum Abschütteln des Fachwerkjochs und zur Entstehung der freieren Altersklassenmethoden geführt haben. Auch diese Methoden stellen ihre räumliche Ordnung in erster Linie unter den Gesichtspunkt eines ungestörten Fortgangs der Nutzungen, sowie bester Buchung und Kontrolle; bei der „Bestandeswirtschaft“ im besonderen kommen noch forststatistische Gründe hinzu, — somit stehen auch

hier die produktiven Momente noch zurück. Eine Ausnahme macht nur das neue württ. Verfahren (vgl. H. Speidel, Allg. F. u. J. Ztg. 1893 S. 152 und S. 181 ff.), zu dessen Entstehung in erheblichem Maße waldbauliche Gesichtspunkte Anlaß gegeben haben.

Damit kommen wir zu einem Gegenstand, der größtes Interesse bietet; zum Verhältnis der Altersklassenmethoden zum Fachwerk.

Diese Methoden sind aus dem Fachwerk herausgewachsen, und zwar durch Verlassen des Aufteilungsprinzips. Nach Judeichs Forsteinrichtung S. 415 wurde in Sachsen beim Cottaschen Fachwerk der Schwerpunkt der Ertragsregelung im Lauf der Zeit mehr und mehr auf die Revisionen und die Versorgung der nächsten Zukunft mit geeigneten Nutzungsflächen gelegt; die zeitliche Ordnung wurde auf die 3 Faktoren: normaler Jahresschlag, Altersklassenverhältnis und frühere Abnutzung gegründet; es wurde nicht mehr aufgeteilt, oder doch kein Gewicht mehr auf die Aufteilung gelegt. Die Sorge für die räumliche Ordnung beschränkte sich auf die Ordnung der Hiebsfolge, die durch die gegebene Einteilung des Walds in allgemeinen Umrissen angebahnt war. Dazu kam die Bildung kleiner Hiebszüge, um ungerechtfertigte Opfer zu vermeiden.

So löste die Sorge für die räumliche Ordnung sich von der Ertragsregelung mehr und mehr los und wurde zur selbständigen Aufgabe der Forsteinrichtung.

Die Trennung beider Aufgaben ist eine sehr weitgehende, aber, wie wir gesehen haben, noch keine vollkommene, deshalb waren die Altersklassenmethoden unter 2. zu besprechen.

Das Verhältnis der Altersklassenmethoden zum Fachwerk ist mehrfach Gegenstand der Erörterung und Meinungsverschiedenheit gewesen; teils werden erstere Methoden zu den Fachwerkmethode n gerechnet, teils, wie hier geschehen, als besondere Gruppe in Gegensatz zum Fachwerk gestellt. Dies rührt daher, daß sich die Altersklassenmethoden allmählich aus dem Fachwerk herausgebildet haben, und daß sie ihre Abstammung heute noch nicht verleugnen können, denn sie haben vielfach die äußeren Formen des Fachwerks beibehalten, und ihnen nur einen anderen Inhalt gegeben. Wenn z. B. Sieber (Allg. F. u. J. Ztg. 1903 S. 111) sagt: „Was wirklich verschieden ist, muß sich auch im Wald unterscheiden lassen! Fachwerk und Bestandeswirtschaft lassen dies nicht zu“, so kann sich diese Aeüßerung doch wohl nur auf die äußeren Formen beziehen, denn wenn beide Methoden in bezug z. B. auf Auswahl der Nutzungsflächen zu genau demselben Ergebnis kommen sollten, so müßte bei Anwendung der einen oder anderen das Prinzip verleugnet worden sein.

Die Vertreter des Fachwerks sind fast durchweg der Ansicht, daß Fachwerk und Altersklassenmethoden im Prinzip übereinstimmen, somit die letzteren unter die erstere Gruppe zu rechnen seien. Stötzers Ansicht haben wir schon früher erwähnt. Grebe sagt, daß das kombinierte Fachwerk in fast allen

Punkten grundsätzlich mit der „Bestandeswirtschaft“ übereinstimme (Betriebs- und Ertragsregelung der Forsten 2. A. S. 339), während Graner bezüglich der letzteren Methoden wenigstens das Bestreben zugibt, aus den Schranken des Flächenfachwerks herauszutreten (Forstbetriebseinrichtung 1889 S. 122).

Worin bestehen denn also die Verschiedenheiten? Sie bestehen, wie aus unseren Betrachtungen hervorgehen dürfte, in der verschiedenen Einwirkung auf die räumliche Ordnung. Während das Fachwerk in einem Akt den Nutzungssatz bestimmt und eine der Ertragsermittlung untergeordnete räumliche Ordnung schafft, trennen die Altersklassenmethoden beide Aufgaben und führen daher zu selbständiger, freier Raumordnung. Hier kann die räumliche Ordnung Selbstzweck sein, — wo sie es nicht ist, da trägt die Methode nicht die Schuld. Aeußerlich tritt dies darin zutage, daß erstere Methoden auf Ordnung im großen hinarbeiten, während bei letzteren Raum gegeben ist zu einer Ordnung auch im kleinen und kleinsten. Dies bestätigen die ersten Vertreter dieser letzteren Methoden.

Nach Judeich (Lehrbuch S. 282) und Neumeister (Thar. Jahrb. 1883 S. 25) unterscheiden sich die Altersklassenmethoden vom Fachwerk grundsätzlich dadurch, daß sie an Stelle des allgemeinen Hauungsplans mit Periodeneinteilung (Einrichtungsplan) die Einteilung der Betriebsklasse in kleine Hiebszüge setzen.

Man bestreitet nun zwar, daß der „kleine Hiebszug“ ein besonderes Merkmal nur der Altersklassenmethoden sei, und macht geltend, das Fachwerk könne ebensogut kleine Hiebszüge bilden (vgl. z. B. Stötzer, Allg. F. u. J.Ztg. 1904 S. 261 u. Wappes, Forstw. Centralbl. 1905 S. 284). Das ist ganz richtig; denn der „kleine Hiebszug“ ist an sich nur eine räumliche Form, der sich jede Methode bedienen kann. Wir sehen dabei ganz davon ab, daß die Bezeichnung „kleiner Hiebszug“ bei beiden Methoden — wie oben gezeigt — eigentlich gar nicht dasselbe bedeutet, der „kleine Hiebszug“ des Fachwerks besteht aus wenigen Abteilungen, der „kleine Hiebszug“ der Altersklassenmethoden aus kleinen Beständen. Aber auch, wenn wir diesen Umstand nicht berücksichtigen, ist der „kleine Hiebszug“ trotzdem ein Kennzeichen der letzteren Methoden durch die Rolle, die er bei ihnen spielt. Er ist eine eigenartige Folge des Prinzips der Selbständigkeit der räumlichen Ordnung; er ist selbst der Träger der letzteren und ersetzt den Periodenplan, beim Fachwerk dagegen ist er eine sekundäre Erscheinung. Es ist nicht zweifelhaft, daß auch das Fachwerk „kleine Hiebszüge“ im Sinn der Altersklassenmethoden bilden könnte, es hat sie aber nicht gebildet, weil es ihrer für gleiche Zwecke nicht bedarf, und weil das Prinzip nach anderer Richtung zeigt; es schafft seine Raumordnung durch Periodenzuteilung, und diese weist — der Uebersichtlichkeit wegen — auf die Abteilungseinheit hin.

Wir haben gesagt, daß die Altersklassenmethoden beim Uebergang aus dem Fachwerk die Formen zwar beibehalten, ihnen aber einen anderen Inhalt gegeben haben. Beide Methoden bilden sowohl Abteilungen wie Hiebszüge. Während aber das Abteilungsnetz als Wald-einteilung des Fachwerks in erster Linie aus den Bedürfnissen des Aufteilungs-

grundsatzes herauswächst und die Grundlage der ganzen räumlichen Ordnung bildet, dient es bei den Altersklassenmethoden nach Judeich (l. c. S. 280) nur mehr der Orientierung, der Ordnung der Schlagführung und der Erleichterung der Vermessung. v. Guttenberg (Forstbetriebseinrichtung 1904 S. 186) bezeichnet es als einen Vorzug der Bestandeswirtschaft gegenüber dem Fachwerk, daß sie die Abteilung nicht als Hiebsfläche für bestimmte Zeitdauer ansehe.

Und in ähnlicher Weise kennzeichnet sich das feste Hiebszugsnetz als die Waldeinteilung der Altersklassenmethoden; es ist das Ergebnis unmittelbarer Einwirkung der die räumliche Ordnung bestimmenden Faktoren. Der Hiebszug ist die wahre räumliche Einheit dieser Methoden, denn er bildet den Rahmen für die Zuteilung der Flächen zum Hauungsplan und für normale Hiebsfolge, während er sich beim Fachwerk erst mittelbar und zufällig aus der Zuweisung der Abteilungen an die Nutzungsperioden — also aus dem Periodenplan — ergibt, der die Abteilungen nach Bedarf zum Hiebszug zusammenschließt.

Wohl bilden die Fachwerksmethoden auch feste Hiebszüge, gerade so, wie die Altersklassenmethoden Abteilungen besitzen, aber es fehlt in diesem Fall jedem der beiden Gebilde bei der einen Methode der volle Inhalt, den es bei der andern hat, ja es kann als überflüssig bezeichnet werden.

Im Grund genommen bedürfen nämlich die Altersklassenmethoden der Abteilungen gar nicht, denn Orientierung, Ordnung der Schlagführung und Erleichterung der Vermessung sind Funktionen, die ein entsprechend gearteter Hiebszug mitübernehmen kann. Wenn sie dieselben trotzdem bis heute beibehielten, so geschah dies wohl, weil sie diese Organe vom Fachwerk übernommen haben, weil sie an der Einteilung im Interesse der Buchung und Orientierung nicht rütteln wollten, und weil Hiebszugsbegriff wie Hiebszugsnetz noch nicht entsprechende Durchbildung erfahren haben. Die Hiebszüge sind in der Regel noch zu groß, um die räumliche Orientierung allein zu übernehmen.

Ebensowenig bedarf das Fachwerk festbegrenzter Hiebszüge, wenn es die Abteilungen im Einrichtungsplan zu Periodenzügen zusammenstellt.

Wir haben oben gezeigt, wie nahe Stötzers Fachwerk den Altersklassenmethoden steht. Als grundsätzlicher Unterschied beider bleibt nur übrig, daß die letzteren Methoden die Reihenfolge der Abnutzung lediglich auf der Karte feststellen und im Wald sichern, während Stötzer die Zeiträume der Abnutzung für jede einzelne Fläche im Einrichtungsplan festlegt — also an der Aufteilung der Betriebsfläche festhält — wobei die Abteilungseinheit als räumliches Endziel bestehen bleibt, wenn sie auch mehr als bei den älteren Verfahren zurücktritt.

Die Altersklassenmethoden haben also, das ist das Ergebnis unserer Betrachtungen, auf Periodenzuteilung und Fachwerksplan verzichtet und an ihre Stelle die Einwirkung auf die räumliche Ordnung durch das Hiebszugsnetz gesetzt. Dieses soll die allgemeine Ordnung des Hiebsgangs anbahnen und

einen Rahmen für den Gang des Hiebs bilden (Judeich l. c. S. 424). Sie haben sich dadurch von einem schweren Zwang befreit, doch geschah dies, wie bereits angedeutet wurde, nicht im Interesse des Waldbaues, sondern hauptsächlich in demjenigen der Wirtschaftlichkeit und Etatsordnung; so ist durch räumliche Festlegung der periodischen Nutzungsflächen der waldbauliche Zwang in gewissem Maße erhalten geblieben und wir können Danckelmann nicht Unrecht geben, wenn er sagt, daß die Bestandeswirtschaft auf die in Sachsen herrschende Fichtenwirtschaft zugeschnitten sei, wogegen sich Judeich verwahrt, der sein Verfahren als allgemein anwendbar bezeichnet.

Dazu wäre es jedoch nötig, noch einen Schritt weiter zu tun, und den hat die Bestandeswirtschaft nicht getan. Die Hervorkehrung der Hiebsreife des Einzelbestands hat uns in den Altersklassenmethoden einen Weg gezeigt, der durch die räumliche Ordnung zu wirtschaftlicher Freiheit im kleinen führt, nach der alle Gebiete der Forstwirtschaft unter dem Fachwerksjoch gleichmäßig seufzten. Dieser Weg sollte jedoch nicht allein der Statik, sondern besonders auch dem Waldbau volle Freiheit bringen!

Einen wesentlichen Fortschritt nach dieser Richtung zeigt schon das „Neue württembergische Verfahren“. Hugo Speidel hat sich für Umformung des württembergischen Fachwerks das sächsische Verfahren zum Vorbild genommen, hat aber dabei die waldbaulichen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt, die ihn zu seinen Aenderungsvorschlägen in erster Linie veranlaßten. Er gelangt damit zur Aufstellung des Hauungsplans für eine 20 jährige Periode, so daß innerhalb dieses Plans der Wirtschaft für Erfüllung ihres 10 jährigen Nutzungssatzes die doppelte Nutzungsfläche zur Verfügung steht, was ihr einen entsprechenden räumlichen Spielraum für Befriedigung waldbaulicher Bedürfnisse läßt, den das sächsische Verfahren nicht bietet.

Die auf die Fläche gegründeten Methoden der Ertragsregelung zeigen nach unseren Betrachtungen in bezug auf räumliche Ordnung folgende Entwicklungsreihe:

Die Flächenteilung ist starr in ihrer Aufteilung und gestattet keine Rücksicht auf produktive Momente.

Das Fachwerk will diese Starrheit mildern und setzt an Stelle der Einzeljahre die Perioden und an Stelle des Jahresschlags den Periodenschlag, die Abteilung. Damit ist jedoch der Zwang im Hochwald noch nicht beseitigt, deshalb gehen:

die Altersklassenmethoden noch weiter. Sie beschränken die räumliche und zeitliche Bindung der periodischen Nutzungsfläche auf die nächste Nutzungsperiode und sorgen nur in allgemeiner und freier Weise für die fernere Zukunft.

Ein weiteres letztes Glied und unseres Erachtens das Ziel dieser Entwicklung ist ein grundsätzliches Auseinanderhalten der zeit-

lichen Ertragsregelung und der Pflege der räumlichen Ordnung.

Durch solche Trennung erst wird der wirtschaftliche Zwang vollkommen vom Wald genommen, den die Ertragsregelung auf ihn übt, und ist eine volle Pflege der forstlichen Produktion durch eine, Freiheit gewährende räumliche Ordnung ermöglicht. Durch solche Trennung erst gelangen wir zu der viel geforderten „freien Wirtschaft“.

Dies führt uns zum **Vorschlag vollkommener Trennung der Pflege zeitlicher und räumlicher Ordnung des Waldes**, wie sie schon **Hundeshagen** (Forstabschätzung 1826 S. 215 und 240) und anfangs auch **Cotta** (Abriß einer Anweisung zur Vermessung 1815, S. 5) im Auge hatten.

Keine von beiden Aufgaben soll Einfluß auf die andere haben, weder die Bestimmung der Höhe des Jahressatzes auf den Ort seiner Erhebung, noch aber auch umgekehrt die Pflege der räumlichen Ordnung auf die Höhe des Hiebsatzes, denn durch solche innerlich unbegründete Einflüsse werden beide in der richtigen Lösung ihrer selbständigen Aufgaben beeinträchtigt, vom Ziele abgelenkt.

Der Gang der Ertragsregelung sollte also unseres Erachtens grundsätzlich folgender sein:

Zuerst wäre — und zwar ohne jede Festlegung von Hiebsorten — der jährliche Massennutzungssatz für den nächsten Wirtschaftszeitraum zu ermitteln, und zwar aus dem gegebenen Waldzustand nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, sei es nun mit Hilfe der Altersklassen oder aus Zuwachs und Vorrat.

Nun erst hätte die Auswahl der Hiebsorte im einzelnen zu folgen, und zwar im Rahmen eines ausschließlich auf produktiven Momenten aufgebauten festen Hiebszugnetzes. Die auf Grund des vorher ermittelten Nutzungssatzes im nächsten Wirtschaftszeitraum zu erhebenden Nutzungsmassen wären auf die vorhandenen hiebsreifen Waldflächen zu verteilen, ganz nach Maßgabe der Forderungen von Waldbau, Forstschutz, Forstbenutzung, und unter voller Berücksichtigung der Hiebsbedürftigkeit der Einzelfläche, jedoch ohne strenge Bindung der Wirtschaft im einzelnen. Diese letztere wäre lediglich gehalten, den nachhaltigen Nutzungssatz streng zu erfüllen und an den zum Angriff bereitstehenden Hiebsorten die Zwecke der Wirtschaft in bestmöglicher Weise zu fördern.

Prüfen wir die Methoden der Ertragsregelung auf ihre Brauchbarkeit für solches Vorgehen, so zeigen zunächst nur die Normalvorratsmethoden die hier erforderliche vollkommene Trennung von Ermittlung des Hiebsatzes und Wahl des Hiebsorts. Sie kommen jedoch heute praktisch wohl nur an wenigen Orten in Frage, da uns Ertragsuntersuchungen und örtliche Ertragsstatistik für eine sichere Ermittlung von Vorrats- und Zuwachsgrößen meist noch fast ganz im Stiche lassen. Haben aber jene erst ihre Schuldigkeit getan und uns zuverlässiges Zahlenmaterial geliefert, so steht dem Uebergang zu Vorrats- und Zuwachsmethoden kein Hindernis mehr im Wege. Für laufende Zwecke genutzt dürfte dann unseres Erachtens werden: Der

wirkliche Zuwachs; bei vorhandenen Uebervorräten und unter der Voraussetzung intensiven Hinarbeitens auf normale Bestockung wohl auch heute schon der künftig mit Bestimmtheit zu erwartende höhere Zuwachs. Uebervorräte würden allmählicher Grundstocksnutzung verfallen, ihr Ertrag teils dem Waldgrundstock, teils einem Ausgleichsstock zufließen, der dann einzutreten hätte, wenn der laufende Zuwachs aus Mangel an haubarem Holz nicht voll erhoben werden kann.

Für heute müssen wir uns jedoch an die Fläche halten. Doch auch hier finden wir bei den Altersklassenmethoden die Trennung von Hiebsmasse und Hiebsort schon in einem Maße vorbereitet, daß es nur noch eines letzten Schritts bedarf, um die Verbindung völlig zu lösen und sie zu freien Methoden auszugestalten, und dieser Schritt ändert nicht einmal etwas am Prinzip dieser Methoden. Judeich leitet den Hiebsatz aus dem Entwurf des „Hauungsplans“ ab und legt damit die Hiebsorte mehr oder weniger fest. Wir möchten dagegen vorschlagen, zunächst den Flächenhiebsatz lediglich aus einer Zusammenstellung der Hiebsnotwendigkeiten, hiebsreifen und fraglich hiebsreifen Bestände abzuleiten, indem wir deren Ergebnis mit dem normalen Flächenanteil und dem Altersklassenverhältnis zusammenhalten. Sind wir so zu dem ökonomisch und nachhaltig besten Flächenhiebsatz gelangt, so ermitteln wir weiterhin den Massenhiebsatz, indem wir wiederum mit Hilfe jener Zusammenstellung (diesmal der Massen der Bestände) den durchschnittlichen Vorrat und Zuwachs je Hektar der hiebsreif bestockten Flächen bestimmen und mit dem gewählten Flächensatz multiplizieren.

Nun erst nach Feststellung der jährlichen und periodischen Nutzungsmasse würde zur Aufstellung des Hauungsplans, d. h. zur Wahl der Hiebsorte geschritten. Es würden diejenigen Orte ausgewählt, an denen aus statischen und waldbaulichen Gründen, nach Forderungen der Hiebsfolge u. s. f. im kommenden Jahrzehnt Endnutzungen erhoben werden sollen, und unter sie würden die in diesem Zeitraum zu erhebenden Nutzungsmassen nach Maßgabe der an der einzelnen Oertlichkeit zu erstrebenden Zwecke ohne strenge Bindung verteilt.

Sieber scheint, wenn wir seine Äußerungen in dem Aufsatz der Allg. F. u. J. Ztg. 1903 S. 103 richtig gedeutet haben, ebenfalls solcher Trennung zuzuneigen, jedenfalls spricht er sich l. c. Seite 112 gegen genaues Festlegen der Hiebsflächen aus.

Der große Wert solch vollkommener Trennung der Aufgaben der räumlichen und zeitlichen Ordnung im Wald geht teilweise schon aus dem bisher Gesagten hervor.

Obenan steht der vollständig freie Aufbau der räumlichen Ordnung auf denjenigen Grundlagen, die ihn allein zu bestimmen berechtigt sind.

Ein weiterer Vorteil ist die volle Ungebundenheit, mit der die Wirtschaft die einzelnen Nutzungsflächen ausschließlich nach produktiven Gesichtspunkten auswählen kann. Dabei gibt es sich von selbst, daß bei zu großer räumlicher

Ausdehnung der Gleichaltrigkeit nur entsprechende Teilmassen der Bestände dem Nutzungsplan zugewiesen werden, daß in der Zuweisung von Massen überhaupt kein Zwang für die Wirtschaft liegt, die Abnutzung bestimmter Flächen in bestimmt festgesetzter Zeit durchzuführen, sondern daß dies im einzelnen Fall dem wirtschaftlichen Bedürfnis anheimgegeben bleibt und nur die Einhaltung der Gesamtnutzung bindend ist.

Selbst der Umstand bietet Vorteile, daß auch umgekehrt jede Einwirkung der räumlichen Ordnung auf die Höhe des Nutzungssatzes verhindert wird. Wir gelangen hiedurch zu einer im Sinne des Nutznießers gerechteren Festsetzung des Nutzungssatzes. Die Gegenwart hat Anspruch darauf, die volle Rente zu beziehen, die der nachhaltige Betrieb aus ihrem normalen Flächenanteil liefert, sofern derselbe haubares Holz trägt. Soll nun z. B. bei normalem Altersklassenverhältnis der normale Flächenanteil zur Abnutzung gebracht werden, so kann dies doch meist aus Gründen der Bestandesverfassung und -lagerung nicht durchaus in Beständen der ältesten Altersklasse geschehen, obgleich diese in entsprechender Ausdehnung vorhanden sind, sei es, daß Hindernisse des Waldbaus, der Hiebsfolge u. s. f. vorliegen, sei es, daß die Althölzer in größeren Zusammenhängen vereinigt sind, oder unvollkommene jüngere Bestände ihren Abtrieb dringend fordern und darum vor ältere, vollkommenere geschoben werden müssen. In allen diesen Fällen wird der Entwurf des Hauungsplans, der den jährlichen Nutzungssatz ergibt, eine mehr oder weniger große Zahl von Flächen aufzunehmen haben, die bei gesteigerten Betriebskosten, insbesondere für Verjüngung, verminderten Ertrag liefern, also die Rente der Gegenwart herabdrücken, während zahlreiche gutbestockte Altholzflächen für spätere Nutzung zurückgestellt werden müssen, damit der normale Flächenanteil eingehalten werden kann. Unseres Erachtens hat aber in solchem nicht seltenen Fall der Rentenempfänger zum mindesten Anspruch auf Bezug einer, den hiebsreifen Hölzern seines Flächenanteils entsprechenden Nutzungsmasse, da er es übernimmt, die erforderlichen Opfer für Verbesserung der räumlichen Ordnung und Steigerung des Gesamtzuwachses zu bringen und da er sich dabei zum Teil mit weniger wertvollen, jüngeren Hölzern begnügt. Ihn dazu auch noch in bezug auf Nutzungsmasse zu verkürzen, wäre nicht gerechtfertigt; dies ist aber der Fall, wenn der Nutzungssatz unmittelbar aus dem Hauungsplan abgeleitet wird.

In diesem Fall wäre nach unserem Vorschlag zunächst der Massennutzungssatz aus dem normalen Flächenanteil der hiebsreifen Bestände zu ermitteln und wären erst dann die einzelnen Hiebsorte so auszuwählen, wie es nach Maßgabe der tatsächlichen Verhältnisse am zweckmäßigsten erscheint; auf diese Orte wären nun die Massen zu verteilen.

Die Betrachtung des Verhältnisses zwischen den Methoden der Ertragsregelung und der räumlichen Ordnung zeigt, welcher maßgebenden Einfluß die Ertragsregelung gerade in den bis vor kurzer Zeit herrschenden Methoden auf die räumliche Ordnung geübt hat. Wir haben diese Herrschaftsansprüche schon

früher als unbegründet zurückgewiesen; doch bleibt die Frage, ob es nicht doch auch berechnigte Forderungen gibt, die dieses so überaus wichtige Gebiet forstlicher Tätigkeit an die räumliche Ordnung zu stellen hat, mit der es in zahlreichen Punkten in enge Berührung tritt. Dies zu untersuchen, soll Aufgabe des 2. Kapitels sein.

2. Kapitel.

Die berechtigten Forderungen der Ertragsregelung an die räumliche Ordnung.

Nachdem unsere Betrachtungen im vorigen Kapitel zur Forderung vollkommener Trennung der Ertragsermittlung von der Pflege der räumlichen Ordnung geführt haben, bleibt der Ertragsregelung als einzige selbständige Aufgabe, die Höhe des jährlichen Hiebsatzes zu ermitteln, während ihr die Wahl des Hiebsorts entzogen wird.

Bei allem Trennen von räumlicher und zeitlicher Ordnung bedarf nun aber doch eine sichere und leichte Ertragsregelung gewisser räumlicher Voraussetzungen, die, — wenn sie auch nicht unbedingte Forderungen darstellen, wie es z. B. die waldbaulichen sind —, doch soweit als möglich erfüllt werden sollten. Die von der Ertragsregelung an die räumliche Ordnung zu richtenden Wünsche beziehen sich sämtlich auf die Sicherung der Nachhaltigkeit.

Die Durchführung des Nachhaltprinzips fordert von der räumlichen Ordnung:

1. Die jährliche Erhebung des Nutzungssatzes soll mit allen andern Rücksichten leicht in Einklang erhalten werden können, es sollen keine Schwierigkeiten entstehen zwischen ihr und Waldbau, Forstschutz u. s. w., insbesondere sollen Hieb und Fortgang der Verjüngung miteinander Schritt halten.

Schwierigkeiten entstehen in dieser Beziehung erfahrungsgemäß am meisten bei Naturverjüngung im Schirm- und Blenderschlag auf großen Flächen, wo die gleichmäßige Etatserhebung leicht durch den verschiedenen Grad der Besamungsfähigkeit der Flächen, durch die Empfindlichkeit des Anflugs, durch Sturmanfälle u. s. w. gestört wird. Daher die verbreitete Ansicht, hohe Nutzung erschwere die Naturverjüngung und diese hindere umgekehrt die Erhebung verstärkter Nutzungen. Dies trifft wohl nur zu bei plötzlicher Einstellung solcher, wo die Erhöhungen den Wald unvorbereitet treffen, wie dies z. B. gegenwärtig teilweise im württembergischen Schwarzwald infolge der plötzlichen Steigerung der Nutzungen für den Reservefonds ohne vorbereitenden Plan der Fall zu sein scheint. Bei entsprechender wirtschaftlicher Vorbereitung des Walds und insbesondere bei guter Gliederung der Altersklassen kann unseres Erachtens die Naturverjüngung durch Verkürzung des heute meist zu langen speziellen Verjüngungszeitraums nur gewinnen. Am leichtesten lassen sich die verschiedenen Rücksichten übersehen und vereinigen — nächst dem hier nicht in Frage stehenden Kahlschlag — beim naturverjüngenden Saumschlag,

vermöge der im 1. Abschnitt geschilderten Uebersichtlichkeit und Beweglichkeit des Betriebs.

2. Die räumliche Ordnung soll gestatten, daß auch auf kleinster Betriebsfläche bei Naturverjüngung streng nachhaltig gewirtschaftet werden kann.

Nach herrschender Ansicht ist nur die Blenderform in der Lage, diese Forderung zu erfüllen, Schirm- und Blenderschlagform sind ausgeschlossen, weil sie Gleichaltrigkeit auf mehr oder weniger großer Fläche voraussetzen. Demgegenüber möchten wir als einen besondern Vorzug des Blendersaumschlags hervorheben, daß auch er in gleichem Maße wie der Blenderbetrieb befähigt ist, diese Forderung zu erfüllen, und zwar ohne die ökonomischen und andern Bedenken, die am Blenderbetrieb haften. Insbesondere sind es die aus Teilung größerer Flächen entstandenen, daher vielfach Streifenform zeigenden kleinen Privatwälder, die auf diese Betriebsform als das Bestmögliche geradezu hinweisen.

Der Blendersaumschlag gestattet uns somit, selbst kleinste Waldflächen bei ökonomisch bester Benützung des Bodens so zu bewirtschaften, daß sie dem Besitzer einen jährlichen gleichmäßig fließenden Ertrag liefern; er vermag dadurch manchen wirtschaftlichen Nachteilen der Waldzerstückelung entgegenzuwirken.

Bei dieser Gelegenheit mag endlich noch auf eine Eigenschaft des Blendersaumschlags hingewiesen werden, vermöge deren unsere Schlagform ohne weiteres Zutun die Ziele der Ertragsregelung fördert und so ihren eigenen Wert erhöht. Sie wirkt nämlich intensiv nachhaltig allein schon durch ihre gleichmäßige Abstufung der Altersklassen auf kleiner Fläche und die stetig fortlaufende Verjüngung jeder einzelnen Waldfläche. Deshalb bedarf sie auch keiner besonderen Maßregeln zur Sicherung einer nachhaltigen Verteilung von Ertrag, Arbeits- und Kaufgelegenheit über alle einzelnen Flächen ausgedehnter Wirtschaftsbezirke. Das Stetigkeitsprinzip, das den Blendersaumschlag vollkommen durchdringt, ist selbst ein entscheidendes Moment der Nachhaltigkeit, das diese mehr sichert, als alle dem Wald von außen her aufgenötigte Großflächennachhaltigkeit unserer Ertragsregelungsmethoden, die nur auf dem Papier steht und nie mit ihm zu verwachsen vermag.

Weitere Forderungen beziehen sich auf die Grundlagen der Ertragsermittlung selbst. Hier ist eine solche Ordnung erwünscht, die ein sicheres Erfassen dieser Grundlagen gestattet. Zuverlässigste Grundlage der Ertragsregelung aber ist heute im Schlagwald die Fläche. Auf diesen greifbarsten Faktor kommt sie, wie ihre Geschichte zeigt (vgl. z. B. Borgmann, Entwicklung des Forsteinrichtungswesens . . . 1904 S. 42), immer wieder zurück; die Fläche wird noch so lange die sicherste Grundlage jeder Ertragsregelung bleiben, bis uns die Ergebnisse guter Ertragsuntersuchungen und

Ertragsstatistik von diesem Zwang befreien. Aber auch dann noch wird sie uns beim schlagweisen Hochwald im Altersklassenverhältnis immer den sichersten Prüfstein der Nachhaltigkeit liefern.

Aus der Benützung der Fläche als Grundlage für Ertragsregelung ergeben sich folgende weitere Forderungen:

3. Die Flächen, auf denen der Betrieb verschiedenen Wirtschaftszielen folgt (Ertragswald, Schutzwald, Luxuswald u. s. w.) oder zum gleichen Ziel verschiedene Wege einschlägt (verschiedene Betriebsarten, Umtriebszeiten, ev. Holzarten), sollen räumlich scharf getrennt und wirtschaftlich unabhängig von einander sein.

Diese Forderung klarer räumlicher Scheidung der Flächen verschiedener „Betriebsklassen“ scheint uns heute vielfach nicht in demjenigen Maß berücksichtigt zu werden, das die Ertragsregelung fordern kann, und zwar trägt die Schuld daran der Umstand, daß der an sich richtige wirtschaftliche Grundsatz: „jeder Holzart ist der ihr am meisten zusagende Standort zuzuweisen“ übermäßig betont und zu sehr ins kleine gehend durchgeführt wird.

Zu weitgehende Forderungen nach dieser Richtung, denen die Nutzung und Betriebsführung nicht weniger als die Ertragsregelung widerstreben, scheinen uns N e y s Wirtschaft der kleinsten Fläche (Schablonenwirtschaft im Walde 1886 S. 66) und die Betrachtungen J a n k o w s k y s über „naturgemäße Hochwaldbestände“ (Begründung naturgemäßer Hochwaldbestände 1904) in sich zu schließen. Beide folgen einem an sich durchaus gesunden Streben unseres Erachtens weiter, als dies im Interesse der räumlichen Ordnung im Wald gut ist.

So sehr wir z. B. den waldbaulichen Ausführungen J a n k o w s k y s zustimmen, so möchten wir doch — anknüpfend an sein bildlich dargestelltes Beispiel, — Bedenken erheben bezüglich der weiteren Bewirtschaftung der nach seinen Grundsätzen verjüngten Bestände (vgl. den von J a n k o w s k y beigegebenen Plan):

Auf einer Fläche von 20 ha zeigt dort die vollendete Verjüngung fünf Holzarten verschiedener Hiebsreife: Fichte, Tanne, Buche, Esche, Eiche, in reinen und gemischten Flächen von unregelmäßiger Form durcheinandergelagert. Wie soll man sich da dauernd geordnete Bewirtschaftung und sichere Ertragsbestimmung denken? Rechtfertigt solch feine Standortsberücksichtigung die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sie im Gefolge hat? Das sind die ersten Fragen, die sich uns beim Anblick solcher Flächen aufdrängen. Erst wird die Fichte hiebsreif werden und zu verjüngen sein, dann folgen in Zeitabständen die andern Holzarten; es entsteht während dieser Zeit eine Menge unregelmäßiger Ränder mit teilweise ungünstigen Wuchs- und Schutzbedingungen, auch gefährdet das Ausbringen der genutzten Hölzer, besonders des Langholzes die noch nicht reifen Flächen. (In dem Beispiel stoßen allerdings alle Teilflächen an den Rand und können — in der Ebene wenigstens — nach dieser Richtung geräumt werden, was jedoch nicht die Regel bilden dürfte.) Der ganze Wald wird

sich bei Weiterführung dieser Wirtschaft im Lauf der Zeit in blinderwaldartige Ordnungslosigkeit und Unübersichtlichkeit auflösen.

Wir glauben nun aber, daß auch bei weitgehender Standortsberücksichtigung nur wenige Waldflächen zu einer so unregelmäßigen Mischung von Holzarten verschiedener Hiebsreife zwingen, bei der wir der räumlichen Ordnung nicht entsprechend Rechnung tragen könnten. Die Natur zeigt selten auf kleiner Fläche so schroffe Standortswechsel; vielfach gehen die Standorte allmählich ineinander über, auch sind meist mehrere Möglichkeiten für dieselbe Fläche gegeben, die im Wirtschaftserfolg wenig von einander abweichen. Sollte es da nicht möglich sein, — in den allermeisten Fällen ohne irgend erheblichen Nachteil — eine klare räumliche Abscheidung derjenigen Flächen vorzunehmen, die mit Holzarten oder Mischungen verschiedenen Reifealters — z. B. Eiche und Fichte — bestockt werden sollen? Der Vorteil sicherer Ertragsregelung und leichter, gesonderter Bewirtschaftung wäre dabei doch auch zu berücksichtigen. So ungefügig ist die Natur denn doch nicht, daß sie sich diesem bescheidensten Gebot der Ordnung nicht ohne Schaden fügen würde! Im vorliegenden Beispiel, das wohl eine Abteilung darstellt, scheint uns die Waldeinteilung nicht zweckentsprechend zu sein. Setzen wir den Fall, wir hätten in dem betreffenden Waldbezirk 2 Standortsklassen vor uns, deren eine für die Gruppe der sich nahestehenden Holzarten Eiche, Esche, Buche, deren andere für Fichte, Tanne, Buche mehr geeignet erschiene, so wäre erst eine Standortskarte des ganzen Gebiets zu fertigen und die Waldeinteilung so zu legen, daß, soweit irgend möglich, Hiebszüge entstehen, auf denen der eine oder andere Standort weitaus vorherrscht. Dann würden die Hiebszüge dementsprechend unter die Holzartengruppen verteilt und mit diesen bestockt, wobei kleinere minder geeignete Flächenteile keine Rolle spielen. So könnte im großen derselbe Erfolg erzielt werden, den Jankowsky anstrebt, aber ohne die großen wirtschaftlichen Nachteile bei Nutzung, Verjüngung, Erziehung, die eine ordnungslose Mischung von Flächen notwendig mit sich bringt, welche verschiedene Hiebsreife und wirtschaftliche Bedürfnisse zeigen.

Eine wichtige Forderung der auf die Fläche gegründeten Ertragsregelung ist endlich:

4. Die räumliche Ordnung soll eine möglichst genaue Scheidung der Flächen der einzelnen Altersklassen zulassen.

Vom Grad der räumlichen Scheidung der Altersklassen und der Sicherheit, mit der sich deren Flächen bestimmen lassen, hängt die genaue Ermittlung des Altersklassenverhältnisses und daher dessen Wert für die Ertragsregelung ab. Dieses bildet nämlich die sicherste und klarste Grundlage für die Prüfung der Wirtschaft auf ihre Nachhaltigkeit und für die Anbahnung der letzteren, seine zuverlässige Feststellung bildet daher eine wesentliche Forderung der Ertragsregelung.

Dieser Forderung klarer räumlicher Trennung der Altersklassen sind wir schon bei der Nutzung der Waldprodukte begegnet.

Je vollkommener die Trennung, desto genauer das Altersklassenverhältnis! Das führt uns zunächst zum *Kahlschlag*, der die Forderung allein voll erfüllen kann, während die Naturverjüngung ohne eine mehr oder weniger weitgehende Vereinigung mindestens zweier Altersklassen — der ältesten und jüngsten — nicht denkbar ist. Am wenigsten vermögen obiger Forderung die blenderwaldartigen Formen zu genügen, bei denen sich mehrere Altersklassen — unregelmäßig gemengt — auf derselben Fläche vereinigen.

Die Achillesferse aller Flächenmethoden bei Naturverjüngung ist die Scheidung von Altholz- und Jungwuchsflächen, die Reduktion der Verjüngungsschläge. Sie drängt daher immer wieder zur Masse, als demjenigen Faktor hin, der uns dieser Schwierigkeit enthebt. Wollen wir dagegen am Flächenfaktor als bester Grundlage festhalten, so ist eine *Schätzung der Vollkommenheit der Verjüngungsschläge* in irgend welcher Form nicht zu vermeiden. Diese Schätzung wird nun um so mehr eine unsichere Sache sein, je größer die Fläche und je unübersichtlicher die Hiebsführung ist, — unsicher schon bei *Schirmschlag*, mehr noch bei *Blenderschlag*, und hier um so mehr, je weiter sich die Verjüngung der Blenderform nähert. Schätzung kann daher nur in Frage kommen und erfolgreich sein bei übersichtlicher räumlicher Anordnung der Schätzungsgegenstände, bei Zusammendrängen derselben auf kleinste Fläche zur Förderung des Ueberblicks. Solchen Ueberblick bietet die *Blendersaumwirtschaft*. Hier sind die Bedingungen für sicherste Flächenscheidung gegeben und ist damit ein zuverlässiges Altersklassenverhältnis auf Grund des reinen Flächenfaktors gesichert, und zwar braucht die Flächenscheidung hier nicht auf dem Umweg der Schätzung des Bestockungsgrads im Altholze zu erfolgen, sondern es kann Altholz- und Jungwuchsfläche im Weg sicherer und unmittelbarer Schätzung räumlich geschieden werden. Wir gehen zu diesem Zweck (wie an anderem Ort näher ausgeführt werden soll), dem Verjüngungsstreifen entlang und legen Punkte fest, in denen sich schätzungsweise entsprechen: einerseits die Aushiebsmasse auf der Seite des Altholzes, und andererseits der Altholzrest auf der Seite des Jungwuchses, so daß sich nach ersterer Seite ein vollkommenes Altholz ergibt, wenn man sich die auf letzterer stehenden Nachhiebsstämme in die Lücken gestellt denkt (Abzählen der Stöcke nach innen und der Stämme nach außen). Verbinden wir diese Punkte, so erhalten wir eine mittlere Grenze zwischen Altholz und Jungwuchs, die jedoch vermessen und in der Karte dauernd festgehalten werden muß¹⁾, da sie im Wald verschwindet.

1) Für diesen Zweck ist ein eigenes Einrichtungs-Kartenwerk in großem Maßstab notwendig, das nur die auf solchem Weg festgestellten Saumverjüngungsgrenzen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt aufnimmt und das zur Flächenbestimmung dient. Die Jahreszahlen des jeweiligen Verjüngungszeitraums werden in die entstehenden Flächenstreifen eingetragen. So sind dann Grenzen, Flächengröße und Alter der Bestockung für jeden einzelnen Flächenstreifen dauernd gegeben. Die Karte gibt uns jederzeit das genaue Altersklassenverhältnis und gestattet uns, im Bedarfsfall die im Wald nicht mehr sichtbaren Altersgrenzen ohne weiteres dorthin zurückzuübertragen. Näheres darüber an anderem Ort.

So ist der Blendersaumschlag, obgleich er alle Altersgrenzen durch seine Stetigkeit verwischt, diejenige Form der Naturverjüngung, die vermöge ihrer räumlichen Anordnung die Ermittlung eines genauen Altersklassenverhältnisses ohne Beiziehen des unsicheren Faktors der Masse am leichtesten und zuverlässigsten gestattet. Er ist es also wiederum, der bei zweckmäßigem Vorgehen auch diese Forderung der Ertragsregelung von allen Naturverjüngungsformen am besten erfüllt.

Schlussbetrachtung.

Für den Aufbau der räumlichen Ordnung im Wald haben wir auf unserem Wege durch die verschiedenen Gebiete forstlicher Tätigkeit eine Menge von Bausteinen gesammelt und teilweise schon zusammengefügt; es sind die vielgestaltigen **Forderungen**, die sich von den verschiedensten Seiten an die Form der räumlichen Ordnung richten. Wir fanden als solche Forderungen: die zahlreichen waldbaulichen Bedingungen für sicherste, vollkommenste und dazu billigste Naturverjüngung, die uns insbesondere zur Saumform der Schläge und zur sorgfältigen Berücksichtigung der Himmelsrichtung führten, die Bedingungen für Wahrung der erreichbaren Betriebssicherheit, die gleichwüchsige Erziehung und einfachste, billigste Ernte des Holzes, die Uebersichtlichkeit der ganzen Betriebsführung, die weitgehende räumliche Scheidung der Altersklassen, die Zugänglichkeit der hiebsreifen Hölzer für die Axt u. a. m.

Von diesen Forderungen sollen diejenigen der Produktionslehre als die weit- aus wichtigeren, ja grundlegenden, die Fundamente unseres Baus bilden, während die betriebstechnischen Erfordernisse auf diesem Grundbau ruhen, und sich ihm anzupassen haben.

Wie verschiedenartig nun auch all die Voraussetzungen waren, aus denen heraus die einzelnen Richtungen der forstlichen Tätigkeit ihre Forderungen stellten, so drängt sich doch beim Rückblick auf unsere Erörterungen eine Wahrnehmung auf, die für die Möglichkeit der Vereinigung all der vielerlei Rücksichten in ein System spricht, das ist: daß sie **fast niemals in Widerstreit zu einander treten oder sich gegenseitig ausschließen**, sondern **beinahe ausnahmslos eine bemerkenswerte Neigung nach derselben Richtung zeigen** und daß die wenigen Ausnahmefälle (Sturmrichtung, Tendenz der Arbeitsvereinigung, sichere Flächengrundlage der Altersklassen) sich doch schließlich mit den Hauptrücksichten in Uebereinstimmung bringen lassen. So ist ein **gemeinsamer Boden gegeben auf dem wir daran denken können, die räumliche Ordnung aufzubauen mit dem Ergebnis einer natürlich wie ökonomisch zweckmäßigen Wirtschaftsordnung**.

Die zahlreichen bestimmenden Momente haben sich im Lauf der Betrachtungen zu einer bestimmten Form verdichtet und wir haben die Ueberzeugung ausgesprochen, daß nach theoretischen Erwägungen, wie besonders nach den

in der Praxis gemachten Beobachtungen des Verfassers wohl keine Form all den vielseitigen Ansprüchen an die räumliche Ordnung in so vollkommener Weise entsprechen werde, als der hier geschilderte **Blendersaumschlag**, der unter stetigem saumförmigem Vorrücken in bestimmter Richtung die reifen Produkte in Blenderhieben nutzt und für natürliche Wiederbestockung des Waldes sorgt. Bei ihm finden wir die Hauptforderungen des Waldbaus nach Stetigkeit und dauernder Bodendeckung voll verwirklicht in Einklang mit allen andern produktiven wie betriebstechnischen Bedürfnissen der Wirtschaft.

Bezeichnend ist doch ohne Zweifel, daß die *ultima ratio* aller sich der Natur voll anpassenden Betriebsformen ebenfalls der Saumschlag ist. Vgl. z. B. das bayerische Verfahren, und Tichy, Forsteinrichtung in Eigenregie S. 8. Spricht das nicht dafür, daß diese Form allen, selbst den schwierigsten Verhältnissen noch am ehesten gerecht wird?

Es bleibt uns nun die Aufgabe, die gebräuchlichen Einheiten und Organe der räumlichen Ordnung im Lichte unserer Forderungen zu prüfen, sie ihnen anzupassen und den Weg zu zeigen, auf dem die Formen der heutigen Wirtschaft dem Blendersaumschlag ohne Nachteile in einfachster Weise zugeführt werden können. Dies wird der Inhalt weiterer Untersuchungen sein.

Doch auch nach dieser Richtung haben uns die Betrachtungen dieser Schrift schon Fingerzeige gegeben. Wir haben erkannt, daß eine **selbständige Pflege** der räumlichen Ordnung erste und wichtigste Aufgabe der Forsteinrichtung ist, daß die Ertragsregelung, mag sie mechanisch oder rechnerisch verfahren, sich jeder Einwirkung auf die räumliche Ordnung zu enthalten und das als gegeben hinzunehmen hat, was ihr die von ihr unabhängig aufgebaute räumliche Ordnung bietet. Nur durch deren **selbständige Pflege** gelangen wir zum Optimum der forstlichen Produktion, der Grundlage und Voraussetzung wahrer Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Ueberhaupt sind wir zu der Ueberzeugung gelangt, daß die räumliche Ordnung, ja die ganze Wirtschaft, in dem hier besprochenen Sinn nur bestehen kann, wenn die Forsteinrichtung ihre beiden Aufgaben der Herstellung räumlicher und zeitlicher Ordnung vollkommen getrennt und unabhängig von einander löst.

Die steigende Wirtschaftsintensität führt zu fortgesetzter Verkleinerung der Bestockungseinheit, mit der sich die Wirtschaft beschäftigt, denn diese sieht sich genötigt, sich um immer kleinere Flächen zu kümmern, sie als selbständige Wirtschaftsgegenstände zu betrachten, die wertvoll genug sind, um besondere Berücksichtigung und Pflege zu verdienen. Es wird eine Zeit kommen, welche scheidet: Die heutige Wirtschaft auf großer Fläche als *extensiven* Betrieb und die Wirtschaft auf kleiner Fläche — jedoch unter Voraussetzung gleichzeitig bester räumlicher Ordnung im Wald — als

intensiven Betrieb. Die herrschende Großflächenwirtschaft zeigt alle Merkmale der ersteren Form.

Prophetisch sagt schon Bernhardt (Geschichte des Waldeigentums I 1872 S. 239) die Rückkehr zum Blenderbetrieb voraus. Er betont mit Recht, daß sich die Wirtschaft mit steigender Wertschätzung des Waldes mehr und mehr individualisiere. Die Entwicklungsreihe, die er aufstellt, zeigt uns einen Weg von der ungeordneten Benützung des Waldes über die Großschlagwirtschaft und die Bestandeswirtschaft zur Wirtschaft der kleinsten Fläche. Er sagt l. c. wörtlich: „Es wird dann (im II. Teil) darauf hinzudeuten sein, wie der Blenderbetrieb auf der untersten Entwicklungsstufe zusammenfallend mit der rohesten okkupatorischen Waldbenutzung, wiederkehrt auf einer sehr hohen Wirtschaftsstufe, wie er, der Betrieb der kleinsten Fläche und der intensivsten Arbeit des wirtschaftenden Menschen, sich verfeinert zur Wirtschaft nach dem individuellen Bedürfnis des Stammes oder der Stammgruppe, wie er, frei von der naturwidrigen starren Regelmäßigkeit des Kahlschlagbetriebs, auch frei ist von der Schädigung der wirtschaftlichen Interessen, welche unerbittlich strafend jeder Naturwidrigkeit folgt, und jene Freiheit der Wirtschaft repräsentiert, welche nur dann zulässig ist und ihre fruchtbringende Kraft entfaltet, wenn die Ungebundenheit der untersten, die Schulregel der mittleren Stufen überwunden sind.“

Wenn jedoch Bernhardt (l. c. III S. 206) den Uebergang aus der auf ganzer Fläche arbeitenden Blenderwirtschaft zur Zusammenlegung der einzelnen Altersklassen auf großen Flächen (welche die „wirtschaftliche Mittelstufe“ kennzeichnet) als ein notwendiges Glied der Entwicklung zu intensiver Wirtschaft darstellt und ausdrücklich sagt, daß dieser Uebergang „mit Recht“ erfolgt sei, so können wir dem nicht zustimmen. Wir halten vielmehr im Gegenteil den Uebergang von der freien Blenderform zur Großschlagwirtschaft, wie sie insbesondere Hartig dem Wald aufzwang, für einen gewaltsamen Sprung aus einem Extrem ins andere, der jeder inneren Begründung entbehrt und sich nur aus einer ebenso unberechtigten, wie unheilvollen Herrschaft der Ertragsregelung und in ihr des Fachwerksprinzips über die räumliche Ordnung erklärt. Dem deutschen Wald ist daraus ein lange nachwirkender Schaden in seiner Produktionskraft erwachsen, der sich besonders im Rückgang der Naturverjüngung und damit in der Steigerung der Produktionskosten geltend machte. Das andauernde Streben nach Verkleinerung der Betriebsfläche, nach weiterer Lokalisierung der wirtschaftlichen Tätigkeit das sich nach dem Sprung in der „Mittelstufe“ geltend macht und von der Großschlagform weg Schritt für Schritt der Wirtschaft der kleinsten Fläche zusteuert, können wir daher auch nicht mit Bernhardt als ein weiteres Glied einer stetigen Fortentwicklung betrachten, sondern als ein nachhaltiges Zurückstreben zu der unvermittelt verlassenen naturgemäßen Wirtschaftsform, als natürliche Gegenwirkung gegen eine Gewaltmaßregel.

Der wirtschaftliche Entwicklungsgang führt also zur Wirtschaft der kleinsten Fläche zurück. Wir können uns jedoch nach den Ausführungen dieser Schrift die Rückkehr zur alten Blenderform nur so

denken, daß die Wirtschaft als teuer erkaufte Errungenschaft dieses langdauernden Entwicklungsgangs von ihrer weiten Rundreise zweierlei mitbringt: **Die Gleichwüchsigkeit der Bestockung** und insbesondere **eine klare räumliche Ordnung an Stelle der alten Ordnungslosigkeit**, denn sie sind absolute Forderungen des ökonomischen Prinzips.

Nur Ordnung in großen Zügen und freier Spielraum innerhalb ihres Rahmens sichert wahre wirtschaftliche Freiheit. Ungebundenheit auf großer Fläche dagegen führt zum Chaos und ist ebenso der Tod wahrhaft freier Wirtschaft, wie die Gebundenheit im kleinen.